110
V. 1

Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde.

Charakteristik der in Mitteleuropa heimischen und im Freien angepflanzten angiospermen Gehölz-Arten und Formen mit Ausschluß der Bambuseen und Kakteen.

Von

Camillo Karl Schneider.

== Band I. ==

Mit 460 Abbildungen im Text.

Jena
Verlag von Gustav Fischer
1906.

13

Es erschien:

Seite 1—160 am 1. Juni 1904
„ 161—304 „ 1. Sept. 1904
„ 305—448 „ 2. Febr. 1905
„ 449—592 „ 15. Juni 1905
„ 593—810 „ 1. Mai 1906

Den Herren

Fritz Graf v. Schwerin und **Maurice L. de Vilmorin**

Präsident der Deutschen Dendrologischen
Gesellschaft

Vice-Président de la Société Dendrologique
de France

den unermüdlichen Förderern der Dendrologie

gewidmet.

Handbuch der Laubholzkunde.

Charakteristik der in Mitteleuropa heimischen und im Freien angepflanzten angiospermen Gehölz-Arten und Formen mit Ausschluß der Bambuseen und Kakteen.

Von
Camillo Karl Schneider.

Mit 95 Abbildungen im Text.

Erste Lieferung. ✓

Verlag von Gustav Fischer in Jena
1904.

Die Ausgabe erfolgt in Lieferungen zum Preise von je 4 Mark.

Dendrologische Winterstudien. Grundlegende Vorarbeiten für eine eingehende Beschreibung der Unterscheidungsmerkmale der in Mitteleuropa einheimischen und angepflanzten sommergrünen Gehölze im blattlosen Zustand. Von Camillo Karl Schneider. Mit 224 Textabbildungen. 1903. Preis: 7 Mark 50 Pf.

Gartenkunst, Bd. V, Nr. 6:

... So wird das Werk, dessen Preis bei der schönen Ausstattung ein mäßiger ist, dazu dienen, immer mehr in die Schönheiten der Natur einzudringen und unsere Liebhaber immer mehr kennen und schätzen zu lernen, dem Dendrologen und allen denen, die sich mit der Gehölzzucht und der Verschönerung dieser Erde durch Baum und Strauch befassen, wird es zum unentbehrlichen und anregenden Hilfsmittel werden.

Der deutsche Gartenrat Nr. 9, 1903:

... Namentlich für Landschaftsgärtner und Gartenkünstler ist solch ein Buch unentbehrlich. ...

Botan. Ztg. Nr. 14/15 vom 20. Juli 1903:

Der Verf. hat ohne Zweifel ein sehr nützliches Buch geschaffen, indem er 434 zu 235 Gattungen gehörige Arten unserer Holzpflanzen im Winterzustand kurz und doch eingehend charakterisierte und einjährige Zweige derselben, auf die es beim Bestimmen hauptsächlich ankommt, mit allen Details abbildete. ... Schön sind namentlich die winterlichen Habitusbilder einer Reihe von Bäumen.

Der praktische Ratgeber im Obst- und Gartenbau Nr. 32 vom 3. August 1903:

Das Buch ist eine fleissige, von vielen guten Abbildungen begleitete Arbeit; es will ein später herauszugebendes Gehölzhandbuch vorbereiten. Die Unterscheidungsmerkmale der Gehölze im winterlichen Zustande waren bisher noch nicht bearbeitet, das Buch wird daher der Wissenschaft wie auch der Praxis in gleicher Weise willkommen sein.

Wiener Illustr. Garten-Ztg., VII, 1903, Juli:

Das vorliegende Werk, welches von seinem geschätzten Autor in bescheidener Weise nur als eine grundlegende Vorarbeit bezeichnet wird, muß als eine sehr wertvolle, für den Mann der Wissenschaft wie auch für den Gärtner hochwichtige und interessante Arbeit bezeichnet werden. ... Nachdem es aber gerade für den intelligenten Gärtner notwendig ist, die Unterscheidungsmerkmale der von ihm gepflegten Gehölze zu kennen, so sind wir dem werten Autor für seine „dendrologischen Winterstudien“ zum grössten Danke verpflichtet, da er sich nicht auf die Schilderung gewisser Gattungen und Arten beschränkt, sondern auf 434 Arten von 235 Gattungen, der wichtigsten unserer heute kultivierten laubabwerfenden Gehölze ausdehnt. ...

Wochenschrift für deutsche Förster Nr. 25 vom 18. Juni 1903:

... Das Werk bietet bereits im Text zerstreut eine ziemliche Anzahl derartiger ausgezeichnet gelungener und wiedergegebener Aufnahmen. Nach einer „Allgemeinen Organographie“ folgt eine „Spezielle Artbeschreibung“ mit ganz vorzüglichen und überaus zahlreichen Abbildungen, an diese schliesst sich eine „Systematische Uebersicht der Gattungen und Arten.“ Ein alphabetisches Namenregister erleichtert das Nachschlagen und Auffinden. Die allgemeine Sprache, wie auch die besondere Beschreibung einzelner Teile der Pflanzen ist auch für geringere Vorbildung allgemein verständlich, ein Vorzug, der leider nicht jedem ähnlichen Werk nachgerühmt werden kann.

Gartenwelt Nr. 38 vom 20. Juni 1903:

Ich muss dieses Werk als ein ausgezeichnetes anerkennen, welches viel mehr bietet, als der Titel vermuten lässt. Eine unendlich grosse, eingehende Arbeit an Text wie an Zeichnungen ist in demselben niedergelegt. ...

Flora oder Allg. bot. Zeitung, 1903, Bd. 92, III. Heft:

Der Verf. bringt ein sehr reichhaltiges, gut illustriertes Material, welches die Bestimmung von Gehölzen im winterlichen Zustand gestattet. ...

Mitt. d. Sektion f. Naturkunde des Oe. T.-K., 1903, Nr. 6:

... Das Buch kann jedem, der sich für den Gegenstand interessiert, bestens empfohlen werden.

Handbuch der Laubholzkunde.

Charakteristik der in Mitteleuropa heimischen und im Freien angepflanzten angiospermen Gehölz-Arten und Formen mit Ausschluß der Bambuseen und Kakteen.

Von
Camillo Karl Schneider.

Mit 95 Abbildungen im Text.

Erste Lieferung.

Verlag von Gustav Fischer in Jena
1904.

Alle Rechte vorbehalten.

Vorwort.

Durch die rührige Tätigkeit der im Jahre 1902 ins Leben gerufenen Deutschen Dendrologischen Gesellschaft hat das Interesse an die Gehölzkunde eine wesentliche Belebung erfahren. Arbeiten doch in ihren Reihen Vertreter der Wissenschaft und der gärtnerischen Praxis Hand in Hand. Auf den ausgezeichneten, vor kaum zwei Jahren allzufrüh verstorbenen ersten Präsidenten VON ST. PAUL-ILLAIRE ist ein nicht minder eifriger Dendrologe, GRAF V. SCHWERIN, gefolgt. Wir dürfen somit hoffen, daß die Bestrebungen der Gesellschaft sich immer mehr erweitern und vertiefen.

Nicht wenig hat ferner die 1893 abgeschlossene Dendrologie von Professor E. KOEHNE dazu beigetragen, der Tätigkeit der Vertreter der angewandten Botanik eine sichere wissenschaftliche Grundlage zu bieten. Die Knappheit und Schärfe der Diagnosen, der sichere Blick des Autors für den Wert oder Unwert der Merkmale stempeln das Werk zu einem unentbehrlichen Handbuche. DIPPELS ebenfalls 1893 beendigte Laubholzkunde ist wohl viel breiter angelegt und bietet scheinbar mehr. Aber in Wirklichkeit versagt sie gegenüber der exakten Kürze KOEHNES nur allzuoft. Doch hat DIPPEL den von KOEHNE ganz stiefmütterlich behandelten Formenkreisen der Arten größeren Raum gewidmet. Allein es ist ihm nicht gelungen, die so zahlreichen, besonders in der Kultur entstandenen Formen scharf zu sichten.

Wie schwierig Dies und wie groß ihre Zahl, das beweist uns das im Vorjahre im Auftrage der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft herausgegebene Handbuch der Laubholzbenennung. Mit Freuden habe ich bei meiner Arbeit das Erscheinen dieses Namenhandbuches begrüßt. Hat auch meine Wertschätzung, je eingehender ich es im Einzelnen kritisch prüfte, sehr nachgelassen, so bieten doch die aus der Feder eines ZABEL stammenden Übersichten und die, denen Arbeiten von KOEHNE, V. SCHWERIN und anderen wirklichen Laubholz Kennern zugrunde liegen, wertvolle Hinweise. Jedenfalls hat das Werk mir selbst manche Erleichterung gebracht, da es eine fast vollständige Übersicht über die in Zeitschriften und Katalogen verstreuten Gartennamen gibt.

Es beweist außerdem, daß eine dem Stande unserer heutigen Kenntnisse vollauf Rechnung tragende Laubholzkunde ein Hauptgewicht darauf legen muß, die Formenkreise eingehend zu besprechen und zu versuchen, die „Gartenformen“ nach ihrem wirklichen systematischen Wert einzuordnen. Hierzu tritt noch die Beschreibung der in den letzten 10 Jahren — vor Allem durch so eifrige Sammler, wie Herrn C. A. PURPUS — neu eingeführten Arten und spontanen Formen.

Beides strebt mein Buch an, dessen ersten Teil ich heute der Öffentlichkeit übergebe.

Es war notwendig, das zu behandelnde Gebiet möglichst klar zu umgrenzen. Ich habe Dies in folgender Weise getan. Aufgenommen werden alle innerhalb der politischen Grenzen von Deutschland, Öster-

reich-Ungarn und der Schweiz spontan beobachteten angiospermen Gehölzarten und -formen — mit Ausschluß der polymorphen Gattungen *Rosa* und *Rubus*, von deren europäischen Arten nur die wichtigsten Repräsentanten der Hauptgruppen behandelt werden — sowie sämtliche innerhalb dieses Gebietes im Freien kultivierten „ausländischen“ Laubgehölze. Bei Feststellung dieser habe ich meist die Angaben des Namenhandbuches der D. D. Gesellschaft zugrunde gelegt, aber die dort geführten Bambuseen und Kakteen grundsätzlich ausgeschlossen. Dagegen treten eine Anzahl Arten hinzu, die ich dort nicht erwähnt, aber doch in Kultur fand, ferner solche, deren Einführung bevorstehend oder wünschenswert scheint, sowie schließlich nicht wenige, deren Erwähnung aus rein wissenschaftlichen Gründen mir ratsam erschien. In mehreren Fällen war es schwer, zu entscheiden, ob eine Pflanze noch zu den Gehölzen zu zählen oder besser als Kraut (Staude) zu betrachten sei. Eine scharfe Grenze zwischen holzigen und krautigen Gewächsen läßt sich ja nicht ziehen.

In der Nomenklatur, die der Systematiker mit Recht als ziemlich unwesentlich ansieht, während für den Gehölzzüchter oft der Name das Wichtigste zu sein scheint, folge ich hier den gleichen Prinzipien, die für mich bei Herausgabe meiner „Dendrologischen Winterstudien“ maßgebend waren, d. h. ich führe strikte Priorität für Arten und Gattungen bis zum Jahre 1753, der ersten Ausgabe der „Species Plantarum“ LINNÉs, durch. Um aber mit den Bestrebungen der D. D. Gesellschaft, wie sie in dem Namenhandbuch zum Ausdruck kommen, möglichste Fühlung zu behalten, habe ich die dort gültigen Namen, sofern ich sie nicht voranstellen konnte, in gleichem Druck in Klammer daneben gesetzt. Da ich außerdem die Synonymie mit genauen Literaturzitaten so weit als nötig anführe, so wird Niemand im Zweifel bleiben können, was ich unter diesem oder jenem ihm neu erscheinenden Namen verstanden wissen will.

Schwierig ist es, die Varietäten und Formen in exakter Weise zu benennen. Hier bot mir das Namenhandbuch der D. D. Gesellschaft fast keine Anhaltspunkte, da dort die Namen gewöhnlich mit dem so nichtssagenden Zusatze „HORT.“ geführt werden. Es kam mir aber darauf an, ausfindig zu machen, wo der Name zuerst für Jedermann zugänglich publiziert wurde; die Nennung der Namen in Katalogen, die im Buchhandel nicht geführt werden, kann als wirkliche Publikation nicht gelten. Gewiß erscheint es gerechtfertigt, die gärtnerischen Quellen einer Form möglichst genau festzustellen, und wenn ein Gehölzzüchter seine Neuheiten in einer jedem Botaniker zugänglichen Druckschrift ordnungsgemäß publiziert, so wird er auch als Autor geführt werden können. Ich bin mir bewußt, in nur zu vielen Fällen die ältesten Quellen nicht gefunden zu haben und bitte deshalb alle diejenigen, denen meine Zitate ungenau scheinen, mir dies direkt oder durch eine Publikation bekannt zu geben. Ich bin auch bereit, in der Benennung der Formen den Gehölzzüchtern so weit als möglich entgegen zu kommen und stehe z. B. nicht auf dem Standpunkte DIPPELS und anderer Autoren, unter einem Kollektivnamen, wie etwa *variegata*, alle buntlaubigen Formen der betreffenden Art zu vereinigen, sondern ich unterscheide nach Möglichkeit diese Formen im Einzelnen, soweit wirkliche Unterschiede vorliegen. Aber oft ist strengste Auslese nötig und noch viele Gartennamen müssen als wertlos ausgemerzt werden.

Wenn ich auch, wie gesagt, gerade die Gartenformen möglichst gründlich durchgehe, so betone ich doch, daß es mir andererseits sehr daran liegt, die Artdiagnosen auf Grund spontaner Exemplare zu

geben. In vielen Fällen war ich in der Lage, Original Exemplare des Autors einzusehen und zu allermeist liegen den Beschreibungen sicher bestimmte Exsiccate aus der Heimat zugrunde, die das wundervolle Herbarium des K. K. Hofmuseums in Wien birgt. Der Vorstand der botanischen Abteilung dieses Museums, Herr Kustos Dr. ZAHLBRUCKNER, war so liebenswürdig, mir hier einen ständigen Arbeitsplatz einzuräumen und mir die Benutzung der so wertvollen Herbarsammlungen und der schönen Bibliothek in weitgehendster Weise zu gestatten. Ich bin ihm dafür außerordentlich zu Danke verpflichtet. Ebenso Herrn Professor Dr. v. WETTSTEIN, dem Direktor des wiener botanischen Gartens, der mir die Benutzung des Herbars, der Bibliothek und der nicht unbedeutenden lebenden Gehölzschatze des Gartens jederzeit gestattete. Die Herren Assistenten dieser Institute, insbesondere die Herren Dr. v. KEISSLER und Dr. RECHINGER vom Hofmuseum, unterstützen mich fast tagtäglich bei meinen Studien, wofür ich ihnen vielmals danke. Auch Herrn Garteninspektor WIEMANN und seinen Herren Obergärtnern spreche ich meinen Dank aus.

Außer aus den beiden genannten großen wiener Herbarien kann ich aber noch Material aus zahlreichen anderen Sammlungen benutzen, was ich im Texte im Einzelnen hervorhebe.

Selbstverständlich ist es sehr notwendig, die zu beschreibenden Sachen auch lebend zu studieren. Ich hatte dazu in früheren Jahren in vielen Baumschulen und Gärten Deutschlands reiche Gelegenheit und habe auch hier in Wien und Umgebung während der letzten drei Jahre meine Beobachtungen an spontanen und kultivierten Gehölzen ständig fortgesetzt. Infolge des außerordentlichen Entgegenkommens des Herrn Verlegers, dem ich ohnedies für die reiche bildliche Ausstattung des Buches nicht dankbar genug sein kann, war es mir im letzten Sommer möglich, mehrere Monate einer ausgedehnten dendrologischen Studienreise zu widmen, die mich durch Norditalien, Südfrankreich, die Westschweiz, Südwest- und Mitteldeutschland führte. Auf dieser Reise sammelte ich ca. 2500 Arten und Formen selbst. Hierzu treten noch gegen 4000 Nummern, die ich teils früher sammelte, teils im Laufe der letzten Jahre durch Vermittlung vieler der weiterhin genannten Herren, im Wesentlichen aber aus den Baumschulen zu Baumschulenweg-Berlin, Muskau und Plantières, sowie aus dem Arnold-Arboretum in Jamaica-Plain (Nordamerika), dem botanischen Garten zu Darmstadt, dem forstbotanischen Garten zu Hann.-Münden, dem Hofgarten zu Karlsruhe und der Stadtgärtnerei zu Magdeburg erhielt. Ferner noch die vielen Gartenformen aus den Herbarien KOEHNE und ZABEL, die mir, soweit ich ihrer bedarf, durch die Güte der Herren Besitzer zugänglich gemacht werden.

Auf diese Weise bin ich in die Lage versetzt, alles zu Beschreibende erst selbst gründlich kennen zu lernen, und es ist mein Bestreben, die Publikation dieses von mir durchgearbeiteten Materials so zu gestalten, daß sie nicht nur den strengen Anforderungen der Systematik genügt, sondern auch den Wünschen Derer Rechnung trägt, die als Gehölzverwerter eine schnelle und sichere Möglichkeit der Bestimmung wünschen. Deshalb habe ich, soweit es zulässig erschien, die Blattmerkmale sehr in den Vordergrund treten lassen. Ebenso die „Wintermerkmale“, über deren Bedeutung ich in meinen Dendrologischen Winterstudien gesprochen habe.

Einen Schwerpunkt des Buches sollen die am Schluß zur Ausgabe gelangenden Hauptbestimmungstabellen für die Gattungen bilden,

von denen ich drei zu geben gedenke. In der ersten sollen alle Merkmale in Rücksicht gezogen werden, während die zweite sich auf die Blatt-, die dritte auf die Wintermerkmale beschränken wird. Sämtliche Tabellen werden streng dichotomisch durchgeführt, analog etwa den jetzt bei *Salix*, *Quercus* etc. gegebenen Artbestimmungstabellen.

So darf ich wohl hoffen, daß es — zumal dank der so überaus reichen Ausstattung, die der Herr Verleger dem Werke gibt — mir gelingen wird, meinem Buche Freunde zu gewinnen und dazu beizutragen, die Dendrologie in jeder Weise zu fördern.

Nichts wird mir willkommener sein, als strenge Kritik wirklicher Kenner. Ich meinerseits bin gern bereit, durch Ratschläge, Ausführung von Bestimmungen und sonstige Hilfe allen Interessenten zu dienen und bitte etwaige Sendungen und Wünsche an die unten gegebene Adresse gelangen zu lassen. Alle Mängel, die während des Erscheinens meines Buches zutage treten, werden in einem ergänzendem Nachtrage richtig gestellt. Es würde mich freuen, rechtzeitig davon benachrichtigt zu werden oder auch Hinweise zu erhalten, die für das noch nicht Publizierte von Interesse sein könnten.

Nachstehende Herren, denen ich für ihr bisheriges hilfreiches Entgegenkommen sehr zu Danke verpflichtet bin, bitte ich, mich auch fernerhin zu unterstützen. Es sind die Herren: G. BEAUVERD, Conservateur de l'herbier BARBEY-BOISSIER, Chambésy b. Genf; Professor G. BECK v. MANNAGETTA, Prag; Obergärtner E. B. BEHNICK, Berlin; Kurator ALWIN BERGER, La Mortola (Italien); Professor BÜSGEN, Hann.-Münden; A. CALLIER, Roßwein; Direktor CORREVON, Genf; Geheimrat Professor ENGLER, Berlin; Geheimrat Professor FISCHER v. WALDHEIM, St.-Petersburg; Hofgartendirektor GRAEBENER, Karlsruhe; Baumschulenbesitzer HESSE, Weener a. E.; Rev. HILL, Chicago; Obergärtner JAHN, Genua; Professor E. JANCZEWSKI, Krakau; Professor J. M. JANSE, Rijks Herbarium, Leiden; Direktor E. JOVIN der Baumschule SIMON-LOUIS FRÈRES, Plantières b. Metz; Professor KOEHNE, Friedenau; Gartendirektor LAUCHE, Eisgrub; Parkinspektor LAUCHE, Muskau; Garteninspektor MASSIAS, Heidelberg; Garteninspektor MÜLLER, Straßburg; Hofgärtner NOHL, Insel Mainau; Gartenarchitekt OLBRICH, Zürich; Hofgartenverwalter PICK, Hannover; Gartenmeister v. POSER, Hann.-Münden; Garteninspektor PURPUS, Darmstadt; A. REHDER, Arnold-Arboretum (N.-Amerika); Professor SARGENT, Arnold-Arboretum; Hauptmann a. D. v. SEEMEN, Berlin; Professor SHIRASAWA, Tokio Japan; Gartendirektor SCHOCH, Magdeburg; Graf v. SCHWERIN, Wendisch Wilmersdorf; Gartenbaudirektor SIEBERT, Frankfurt a. M.; Ökonomierat SPÄTH, Berlin; Gartenarchitekt A. USTERI, Zürich; Baumschulenbesitzer E. J. VEITCH, London; Oberforstmeister WEISE, Hann.-Münden; Professor WILHELM, Wien; Gartenmeister a. D. ZABEL, Gotha; Professor ZIMMERMANN, Eisgrub.

Meinen verbindlichsten Dank sage ich auch an dieser Stelle Herrn Rittergutsbesitzer RUD. SEIDEL, Grüngräbchen.

Die Ausführung der Zeichnungen erfolgte durch die Herren J. FLEISCHMANN und A. KASPER in Wien, die meines Dankes für die vorzügliche Ausführung versichert seien. Die Reproduktion übernahmen die Herren ANGERER & GÖSCHL in Wien.

Wien, den 1. März 1904,
Botanische Abteilung des K. K. Hofmuseums.

Camillo Karl Schneider.

Alphabetisches Verzeichnis der im Folgenden angewendeten Abkürzungen*) und Zeichen.

Abkürzungen:

<p> A. = Anthere, Staubbeutel.
 Afghan. = Afghanistan.
 Afr. = Afrika.
 Alab. = Alabama.
 Alp. = Alpen in ihrer Gesamtheit.
 alp. = alpin.
 Am. = Amerika.
 Anm. = Anmerkung.
 Ariz. = Arizona.
 arkt. = arktisch.
 As. = Asien.
 atl. = atlantisch, z. B. atl. N.-Am. = atlantisches Nordamerika.
 Austr. = Australien.

 B.**) = Blatt, auch in Zusammensetzungen, wie B.-Stiel = Blattstiel, o. B.-Rand = Blattrand.
 Bayr. = Bayern.
 B.chen = Blättchen.
 Beh. = Behaarung.
 beh. = behaart.
 beiders. = beiderseits.
 bes. = besonders.
 betr. = betreffend.
 bez. = beziehentlich, bezüglich.
 Bl. = Blüte.
 Blh. = Blütenhülle, Perianthium (allgemein).
 Bl.-Kn. = Blütenknospe.
 Blst. = Blütenstand.
 Blz. = Blütezeit.
 B.-N. = Blattnarbe.
 Böh. = Böhmen.
 Bosn. = Bosnien.
 Bulg. = Bulgarien.

 C. = Corolle, bez. Petalen, Blumenblätter, im Gegensatz zu K. (Kelch), nicht im Sinne von P. (Perigon). </p> | <p> Calif. = Californien.
 Carol. = Carolina.
 cm = Centimeter.
 Col. = Columbia.
 Color. = Colorado.
 Cot. = Cotyledonen, Keimblätter.
 Ct.***) A. = Cantone Appenzell, St. Gallen, Glarus.
 Ct. B. = Cantone Freiburg und Bern.
 Ct. Gb. = Canton Graubünden.
 Ct. J. = Cantone Neuburg, Bern (Jura, Seeland), Solothurn, Basel.
 Ct. L. = Cantone Luzern, Burg.
 Ct. O. = Canton Bern Oberland.
 Ct. S. = Canton Schaffhausen.
 Ct. T. = Canton Tessin.
 Ct. W. = Canton Wallis.
 Ct. Wdt. = Canton Waadt.
 Ct. Z. = Cantone Zürich, Aargau, Thurgau.

 D. = Deutsches Reich; nur bei Verbreitungsangaben hinter I. G. (= im Gebiet).
 Deckb. = Deckblatt.
 d. h. = das heißt.
 diesj. = diesjährig (im Gegensatz zu j., (·) o. (○)).
 dioec. = dioecisch, zweihäusig.
 Dm. = Durchmesser.

 E. = Embryo, Keimling.
 End. = Endosperm o. Perisperm, Sameneiweiß, Nährgewebe.
 Engl. = England.
 Eur. = Europa.
 event. = eventuell.

 Fam. = Familie.
 fehl. = fehlen, fehlend. </p> |
|--|--|

*) Ausgenommen sind die Abkürzungen bei Autornamen und Literaturzitatzen (mit einigen besonders erwähnten, in der Liste mit bezeichneten Ausnahmen), die ohne Weiteres verständlich sein dürften, bez. sich den allgemein üblichen Formen anschließen

**) Stets ohne Blattstiel, nur die Spreite gerechnet.

***) Nur bei näheren Angaben über die Verbreitung hinter **Sch.** (Schweiz), in Anlehnung an SCHINZ et KELLER, Flora der Schweiz, 1900.

fg. = förmig, z. B. eifg. eiförmig.
 Flor. = Florida.
 Fr. = Frucht.
 fr. = fruchtig.
 Frank. = Frankreich.
 Frkn. = Fruchtknoten ohne Gr. und N.
 (Gyn. = Gynoeceum, bezeichnet gewöhnlich die Gesamtheit der ♀ Geschlechtsorgane).
 Frz. = Fruchtzeit, d. h. Reifezeit der Fr.

gegst. = gegenständig, opponiert.
 Georg. = Georgia.
 Gr. = Griffel, Stylus.
 Griechl. = Griechenland.
 Gyn. = Gynoeceum (vgl. Frkn.).

*H. d. D. D. G. = Handbuch der Laubholzbenennung.
 Herzeg. = Herzegowina.
 hfg. = häufig.
 Himal. = Himalaya.

ib. Halb. = iberische (pyrenäische) Halbinsel, Spanien und Portugal.
 I. G. = im Gebiet, d. h. innerhalb der politischen Grenzen von Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz.

Ill. = Illinois.
 incl. = inclusive, einschließlich.
 Ind. = Indien.
 Integ. = Integument, Hülle der Sa.
 Istr. = Istrien.
 Ital. = Italien.

K.***) = Kelch, Kelchblätter, Sepalen.
 Kans. = Kansas.
 Karp. = Karpathen.
 Kauk. = Kaukasus.
 Kent. = Kentucky.
 Kl.-As. = Kleinasien.
 Kn. = Knospe, d. h. Blattknospe, sonst steht Bl. (= Blüte) davor.
 Kn.-Sch. = Knospenschuppe.
 Kztr. = Kurztrieb, Stauchsproß.

L.-Dm. = Längsdurchmesser.
 Lent. = Lenticellen, Rindenhöckerchen, Rindenporen.
 Lgtr. = Langtrieb, Dehnsproß.
 Lohd. = Lohden, Wurzelschosse, Wasserreiser, also üppigste Lgtr.
 Louis. = Louisiana.
 L.-Schn. = Längsschnitt.

M. = Mittel, z. B. M.-Eur. = Mitteleuropa.
 m = Meter.
 Mähr. = Mähren.
 Mandsch. = Mandschurei.
 Mass. = Massachusetts.

Medit. = Mediterran- (Mittelmeer-) Gebiet in seinem ganzen Umfange, also incl. N.-Afr.
 Mich. = Michigan.
 Minn. = Minnesota.
 Miss. = Missouri.
 Mk. = Mark der Zw.
 mm = Millimeter.
 monoec. = monöcisch, einhäusig.

n. = nach.
 *Nat. Pfl. = ENGLER-PRANTL, Natürliche Pflanzenfamilien; nur in Literaturzitat.

Neb. = Nebenblätter, Stipulae.
 Nebr. = Nebraska.
 NO. = Nordosten, nordöstlich.
 NW. = Nordwesten, nordwestlich.

o. = oder.
 O. = Osten, östlich.
 Ö. = Österreich.
 overs. = oberseits.
 obs. Sp. = oberseitige Spaltöffnungen.
 Ont. = Ontario.
 Or. = Orient.
 OU. = Österreich-Ungarn.

P. = Perigon.
 pacif. = pacifisch.
 Pers. = Persien.
 Pfl. = Pflanze.
 Plac. = Placenta, Samenträger, das Gewebe, an dem die Sa. sitzen.
 Prov. I(–VII) siehe Erklärung S. IV.

Q.-Dm. = Querdurchmesser.
 Q.-Schn. = Querschnitt.

reduz. = reduziert.

S. = Süden.
 S. = Seite, z. B. siehe S. (= siehe Seite), Verwechslung mit „Süden“ nie möglich.
 Sa. = Samenknope, Eichen, Ovulum.
 Sch. = Schuppe, fast nur in Verbindung mit Kn.
 Sch. = Schweiz.
 Serb. = Serbien.
 Sib. = Sibirien.
 Siebb. = Siebenbürgen.
 Sizil. = Sizilien.
 SO. = Südosten, südöstlich.
 Sp. = Spaltöffnungen, Stomata.
 Span. = Spanien.
 St. = Stamm.
 Stb. = Staubgefäß, Staubblatt.
 Stbf. = Staubfaden, Filament.
 St.chen = Stämmchen.
 Std. = Staminodium, verkümmertes Stb.
 SW. = Südwesten, südwestlich.

*) Herausgegeben im Auftrage der Deutsch. dendrol. Gesellschaft von BEISSNER, SCHELLE und ZABEL, 1903.

**) Worte mit K vergl. eventuell auch unter C.

teilw. = teilweise.
 Tenn. = Tennessee.
 Transk. = Transkaukasien.
 Trgb. = Tragblatt.

U. = Ungarn.
 unters. = unterseits.

verbr. = verbreitet.
 Ver. St. = Vereinigte Staaten von N.-Am.
 verstr. = verstreut.
 vgl. = vergleiche.

Virg. = Virginia.
 Vorb. = Vorblatt.
 vorh. = vorhanden.
 W. = Westen, westlich.

z. B. = zum Beispiel.
 zerstr. = zerstreut.
 zieml. = ziemlich.
 z. T. = zum Teil.
 zuw. = zuweilen.
 Zw. = Zweig.
 z. Zt. = zur Zeit.

Zeichen (Ziffern):

⌒ = Staude, perennierende krautige Pfl.	⊙ = spiralig alternierend, abwechselnd.
§ = Schlingstrauch.	± = mehr oder weniger.
h = Halbstrauch, nur am Grunde verholzend und bis dahin alljährlich absterbend.	∞ = zahlreich, viele.
h = Strauch.	☐ = strahlig, aktinomorph (nur bei Erklärung der Bl.).
h = baumartiger Strauch.	↓ = zygomorph, symmetrisch (vgl. ✕).
h = Baum.	♂ = männlich.
⊙ = einjährig.	♀ = weiblich.
⊙ = zweijährig.	♂♀ = eingeschlechtlich.
⊙ = mehrjährig, älter.	♂♀ = zwittrig.
	I—XII = Januar bis Dezember.

Bemerkungen zu den Angaben über Spez.-Literatur:

Hierunter werden nur solche Arbeiten geführt, die ich eingesehen und event. benutzt habe, soweit sie mir nicht als ganz unverläßlich oder unbedeutend gelten. Von folgenden Autoren beziehe ich mich, wenn nur ihr Name genannt, stets auf nachstehende Werke: BECK (BECK VON MANNAGETTA) (Flora von Niederösterreich, 1893). — BOISSIER (Flora orientalis I—V, 1864—1887). — DIPPEL (Handb. d. Laubholz., 1889—1893). — K. KOCH (Dendrologie, 1869—1872). — KOEHNE (Deutsche Dendrologie, 1893). — SARGENT (Silva of North-America, vol. I—XIV, 1891—1902).

Bemerkungen über Maßangaben:

- Bei Größen-(Höhen-)angaben, z. B. der Bäume, ist stets zuerst die Höhe, dann die Breite gemeint, es bedeutet also z. B. h, bis 20:0,4 m., daß der Baum bis 20 m hoch und dabei der Stamm (ca. 1 m über der Erde gemessen) bis 40 cm dick wird.
- Bei Maßangaben hinsichtlich der Blattgröße wird stets zuerst die Länge (der Durchmesser in der Achse des Blattstiels), dann die Breite (der Durchmesser senkrecht zur Blattstielachse) angegeben, also z. B. B 4—8:2—5 cm heißt das Blatt (die Blattspreite) wird 4—8 cm lang und entsprechend 2—5 cm breit. Stehen einige Zahlen in Klammer, z. B. (2—4:8—10:0,8—1,2—5 (—6,5)), so bedeuten diese, daß die Blätter zuweilen auch nur 2 cm lang und 0,8 cm breit, zuweilen auch bis 10 cm lang und 6,5 cm breit werden, daß aber die Durchschnittsmaße 4—8 cm Länge bei 2—5 cm Breite sind.
- Sind Maße angegeben, ohne daß eine Maßeinheit (also mm, cm oder m) beigefügt, also z. B. 1:1, so heißt das, daß das Blatt viermal so lang wie breit ist.

Bemerkungen zu den Winterhärte-Angaben (Klimaprovinzen).

Im Anschluß an das „Handbuch der Laubholzbenennung“, welches die Deutsche Dendrol. Gesellschaft 1903 herausgegeben, drücke ich die Angaben über die Winterhärte*, der Gehölze durch Hinweise auf Klimaprovinzen aus. Im Allgemeinen gilt, daß nicht besonders bezeichnete Arten oder solche, die ich nur winterhart nenne, auch für die kältesten Lagen des Gebiets dies sind. Sonst bedeutet der Hinweis Prov. I, II, III etc., daß die betreffende Art ohne Deckung die im nachstehenden angegebenen Normalkältegrade der betreffenden Provinzen ohne Schaden ertragen dürfte! Dabei sind die Provinzen nicht immer als Landstriche zu denken, sondern zum Teil auch als rein lokal aufzufassen.

Prov. I. normale Winterkälte $-28-30^{\circ}\text{C}$ (Maximum 36°C).

Prov. II. norm. bis $-26,5^{\circ}\text{C}$ (Max. $-30,5^{\circ}\text{C}$).

Prov. III. norm. bis $-22,5^{\circ}\text{C}$ (Max. $27,5^{\circ}\text{C}$), etwa Berlin!

Prov. IV. norm. bis $-19,5^{\circ}\text{C}$ (Max. $-23,5^{\circ}\text{C}$) entspricht der Weingegend

Prov. V. norm. bis -16°C (Max. -22°C), etwa Plantières b. Metz.

Prov. VI norm. bis -14°C (Max. bis 17°C).

Prov. VII. Kälte wie VI, aber nur sehr kurze Zeit anhaltend, tiefste Grade oft nur eine Nacht; etwa Insel Mainau, Heidelberg (Schloßgarten).

Eine VIII. Prov. würde den südlichsten Teilen des Gebietes (Istrien, S.-Tirol, S.-Ung. etc.) entsprechen, für D. aber schon „Kalthaus“ bedeuten.

*) Ich muß betonen, daß ich die von SCHELLE, l. c. gegebenen Hinweise nicht immer akzeptieren konnte, da ich im Einverständnis mit einigen unserer besten dendrologischen Praktiker der Meinung bin, daß SCHELLE intenter zu optimistisch verfahren ist. Da aber m. E. derartige Hinweise nur Zweck haben, wenn sie unbedingte Winterhärte anzeigen, so habe ich z. T. einen wesentlich anderen Standpunkt vertreten. Bei künstlichem Schutz kann man auch in günstigen Lagen von Prov. II–III Sachen aus Prov. IV o. V noch gut durchbringen.

Abteilung: *Anthophyta*, Blütenpflanzen.

A. BRAUN, in Aschers. Fl. Brand. I. 26. 1864 (*Phanerogamae*) L., Syst. Veg. 1735; *Siphonogamae* ENGL., Führer Bot. Gart. Breslau 14. 1886; *Embryophyta siphonogama* ENGLER, Nat. Pfl. II. 1. 1. 1889).

Generationswechsel in der Samenbildung verdeckt, nicht mehr, wie bei den *Archegoniatae* (*Bryophyta* und *Pteridophyta*), zwei verschiedene Generationen zu unterscheiden. Geschlechtsorgane, wenigstens bei den hier in Betracht kommenden Formen, keine Archegonien. Die Befruchtung erfolgt nicht mehr durch Spermatozoïden, sondern durch den Pollenschlauch. Die sexuellen Organe entstehen als Blüten an bestimmten Sprossen der Achse, die ihre Vegetation gewöhnlich damit abschließen.

Unterabteilung I: *Gymnospermae*, Nacktsamige Pfl.

LINDLEY, Nat. Syst. 1830.

— Geschlechtsorgane nie geschlossene Frkn. bildend, N. fehlend. Bl. σ .. Diese Unterabteilung umfaßt die Klassen der *Cycadales*, *Ginkgoales*, *Coniferae* und *Gnetales*. Sie kommt für uns nicht in Betracht.

Unterabteilung II: *Angiospermae*, Bedecktsamige Pfl.

sensu A. BRAUN, in DOELL. Fl. Großh. Baden 104. 1857.

— Geschlechtsorgane geschlossene Frkn. mit N. bildend. Bl. σ .. o. γ .

*) Dieser Name ist als veraltet auszuschalten. Er entspricht nicht mehr den wissenschaftlichen Anschauungen. Wer eine gedragte Übersicht über die neueste Systematik sucht, sei verwiesen auf: R. V. WEIßSTEIN, Handbuch der systematischen Botanik, 1902/03 und A. ENGLER, Syllabus der Pflanzenfamilien, 3. Aufl., 1903. — In der Wiegertsaufnahme des kurzen und treffenden Namens *Anthophyta* folge ich V. WEIßSTEIN.

Klasse I: *Dicotyledoneae*, Zweikeimblättrige Pfl.

DC., Syst. I. 123. 1818.

E. meist mit 2 gegst. Cot. Gefäßbündel des St. gewöhnlich zentrisch angeordnet und offen. B. in der Hauptsache netznervig. Bl. vorwiegend 5- o. 4-zählig.

Unterklasse A: *Archichlamydeae*, Kronenlose o. Freikronblättrige Pfl.

ENGL., Nat. Pfl. II. 1. 3. 1889.

Blh. auf niederer Stufe, also fehlend o. einfach (hochblattartig o. blumenkronenartig o. doppelt K. und C.) o. einfach infolge Abort der inneren Hülle.

Reihe I: *Salicales*, Weidenähnliche Pfl.

ENGL., Führ. bot. Gart. Breslau 31. 1886.

b b: B. meist ☉, einfach; Neb. vorh.; Blst. ährenfg. (Kätzchen) (vgl. Fig. 8 g o. Fig. 21 n. o.); Bl. ohne Blh., γ , dioec., mit becherfg. o. auf einzelne zahnartige Sch. Drüsen reduzierten Diskus. γ ; Stb. 2— ∞ . γ ; Gyn. (2), selten 3—4 Frb., einjährig mit wandständigen Plac. und ∞ anatropen Sa. Fr.: Kapsel mit ∞ S., diese klein, mit basilärem Haarschopf (vgl. Fig. 6 u o. Fig. 11 k); End. fehl.; E. gerade (vgl. Fig. 8 w).

Familie I: *Salicaceae*, Weidengewächse.

LINDL., Nat. Syst. ed. II. 186. 1836.

Vgl. Reihe I oben: Kn. 1- o. mehrschuppig; B. sommergrün, ungeteilt, seltener gelappt; Neb. bleibend o. abfällig; Bl. einzeln in Achseln von ganzrandigen o. zerschlitzten Trgb.; γ ; Gr. von wechselnder Länge o. fehl.; N. 2—4 (oft 2—4-spaltig).

Gattungen:

- A. Kn. mehrschuppig. Bl.-Trgb. stark zerschlitzt o. gezähnt. Stb. (4—16) ∞ . Disk. becherfg. **1. *Populus*.**
 B. Kn. einschuppig. Bl.-Trgb. fast stets ganzrandig, an Stelle des Disk. 1—2, selten bis 5 Drüsen. Stb. meist 2, selten 3—5 (—12). **2. *Salix*** (Seite 23).

Gattung 1: *Populus**) L., Sp. pl. 1034. 1753.
 [Pappel; poplar; peuplier.]

Vgl. Fam. I oben: meist hohe b, Mk. der Zw. γ , 5-strahlig (vgl. Fig. 2 g). B. ☉, zuw. gelappt. Neb. abfällig; Bl. vor o. mit B.-Ausbruch.

*) *Sp. Illustratio*: WESMAEL, in DC., Prodr. XVI, 2, 323. 1868. — MAXIMOWICZ, in Bull. Soc. nat. Mosc. LIV, 1, 56. 1879. — WESMAEL, in Bull. Soc. bot. Belg. XXVI, 1, 371. 1887. — KOEHNE 1893 und in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges., VIII, 52. 1902. — SARGENT, Silva IX, 1896 und XIV, 1902. — Ich hatte seiner Gelegenheit, außer den reichen Sammlungen in Wien auch die *Populus* des Herbar. des Kgl. Botau. Mus. aus in Berlin durchzusehen, wofür ich Herrn Geheimrat Prof. Dr. ENGLER auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank abstatte. Ferner bin ich vor Allem Herrn Prof.

Diskus den Frkn. am Grunde o. bis $\frac{3}{4}$ umgebend, ganzrandig o. (selten) zerschlitzt. N. 2—4, Fr. 2—4-klappig. — 28—30 Arten in der nördl. gemäß. Zone.

Bestimmungstabelle für die Arten nach ausgereiften Sommerblättern, unter fast ausschließlicher Berücksichtigung der an normalen Lgtr. und Bl.-Zw. auftretenden Formen.

- 1a. B. unterseits deutlich o. nur wenig heller grün, nicht weißlich *) 2.
- 1b. B. unterseits deutlich weißlich *) 9.
- 2a. obs. Sp. vorh., fast so ∞ , wie unterseits 3.
- 2b. obs. Sp. fehl. 6.
- 3a. B. wie Fig. 1q—t, äußerst variabel, Textur derb, kahl, $\pm$ graugrün, Adernetz beiderseits gleich scharf: 1. *euphratica*.
- 3b. Die gleichen Merkmale nicht zusammentreffend 4.
- 4a. B. wie Fig. 1o—p¹, Grund vorwiegend seicht herzfg., Lgtr. durchweg scharfkantig 7. *angulata*.
- 4b. B.-Grund keilig o. $\pm$ gerade abgestutzt, wenn fast herzfg., so doch mehr gerade abgestutzt o. B. unter 9 cm lang und eher breiter als lang. 5.
- 5a. B. wie Fig. 1d—k, nur an den $\pm$ kantigen Sommertrieben o. an Lohden am Grunde gestutzt, vgl. 2. *nigra* o. 3. *deltoides*.
- 5b. B. wie Fig. 1a—c, durchweg am Grunde abgestutzt o. an den wenigen groben Zähnen (Fig. 1l—n) leicht kenntlich, vgl. 4. *monilifera*, 5. *fremontii* o. 6. *wislizenii*.
- 6a (2b). B.-Stiele zusammengedrückt, B.-Zählung grob kerbig bis lappig, vgl. 17. *grandidentata* (Fig. 7q—r) o. 20. *tremula* (Fig. 7a—g¹).
- 6b. B.-Stiele rundlich o., wenn zusammengedrückt, B.-Zählung fein o. flach kerbig 7.
- 7a. B.-Stiele meist deutlich zusammengedrückt, B.-Zählung fein o. flach kerbig, vgl. 18. *sieboldii* (Fig. 7h—l) o. 19. *tremuloides* (Fig. 7m—p).
- 7b. B.-Stiele $\pm$ rundlich 8.
- 8a. B.-Formen wie Fig. 8a—d, vgl. 23. *alba*.
- 8b. B.-Formen nicht so, wenigstens Zählung reichlicher, kleiner und unregelmäßiger, vgl. 16. *lasiocarpa* (B. groß! aus herzfg. Grunde breit eirundlich), 21. *heterophylla* (Fig. 7s) o. 22. *tomentosa* (Fig. 7t—u).
- 9a (1b). obs. Sp. fehl. 10.
- 9b. obs. Sp. verstr. bis ∞ 12.
- 10a. $\odot$ Zw. $\pm$ deutlich kantig, B.-Stiele im Mittel über 3 cm lang, $\pm$ fein beh., vgl. 15. *trichocarpa* (Fig. 4k—l).
- 10b. $\odot$ Zw. rundlich 11.
- 11a. B.-Stiele kaum über 3—4 cm lang, beh., vgl. 8. *tristis* (Fig. 4a—c).
- 11b. B.-Stiele bis 6 cm, im Verhältnis zur B.-Länge deutlich länger, als bei 11a, kahl, vgl. 10. *balsamifera* (Fig. 4f—g).
- 12a. 9b. B.-Stiele meist nicht über 1 cm lang, vgl. 14. *summa* (Fig. 6o—p).
- 12b. B.-Stiele länger 13.
- 13a. $\odot$ Zw. flügelig-kantig, grau o. gelbgrau, vgl. 13. *monifera* (Fig. 6v—y).
- 13b. $\odot$ Zw. nicht so scharfkantig o. rundl., bez. anders gefärbt 14.
- 14a. B. meist aus herzfg. Grunde breit rundlich eifg., am Rande gleich den Stielen beh., vgl. 9. *candicans* (Fig. 4d—e).
- 14b. B. eiellipt. bis eilanzettl., kahl o. $\pm$ beh., vgl. 12. *angustifolia* (Fig. 6k—n) o. 11. *suaveolens* (Fig. 6r—u) o. 15. *trichocarpa*.

- A. B. beiders. gleichfarben o. unten nur wenig heller grün, durchscheinend knorpelig gerandet, obs. Sp. zieml. so ∞ wie unterseitige. B siehe S. 12.
- I. B. graugrün, Nervennetz beiders. gleich hervortretend, Kn. $\pm$ beh., nicht o. kaum klebrig.

E. KOEHNE zu Danke verpflichtet für Übersendung der *Populus* seines Herbars. Lebend. Pflanzen konnte er besonders in Phytotrois vergl. ¹), wobei mich Herr F. JOTIS in weitgehendster Weise mit seinem wertvollen Räte unterstützte.

*) An getrocknetem Material ist die Färbung der B.-Unterseite nicht immer leicht zu bestimmen, man wird dann die Ähnlichkeiten der B.-Formen gut vergleichen müssen und an der Hand dieser und des über obs. Sp. Gesagten die Art fast immer ermitteln können.

Fig. 1. *Populus*: B.-Formen: a—c *monilifera*; — d *f. deltoides* (*canadensis*); d—f B. vom selben B., *f. Q.* Schn. des B. Stieles nahe dem B.-Grund: g *nigra*; g typ. Form alter B., h i vom Lohden, k von Sämling; l *velutina*; — m—n *fremontii*; — o—p *angulata*; o—p B., p' B.-Grund mit Drüsen (a); q—t *euphratica* (t nat. (tr.) (Original).

Sekt. 1.) *Turanga* BGE., Pl. Lehm. 498. 1848. — B. äußerst variabel. Bl.-Becher der ♂ und ♀ Bl. zerschlitzt. Stb. 20—30. Frkn. beh. mit 3(—2) N., Fr. kahl 3(—2)-klappig.

1. *P. euphratica*: ♂—♂—♂, Zw. jung fein hell beh., ☉ kahl, rundlich, gelbgrau o. gelbbraunlich. Kn. etwa 7 mm lang, seitliche ange-drückt, zweifarben, zweischuppig. Sch.-Ränder kahl. B.-N. senkrecht, fast ohne Kissen: B. der ♂ — weidenfg. (Fig. 1 s—t), an ♂ — ♂ treten mehr die rundl. Formen auf, oft in allen Übergängen (Fig. 1 q—s), nur jung — beh., derb; Bl. vgl. Fig. 3 v—x. Trgb. kahl, sehr früh abfallend.

P. e. OLIV., Voy. dans l'emp. Othom. III, fig. 45/46, 1801 (*diversifolia* SCHRENK, Enum. pl. 15. 1842). — Euphrat-P.; p. de l'Euphrate. — Von Algier durch Ägypt., brit. O.-Afr., Syrien, Mesopotamien, S. Pers., Turkest., Afghan., NW. Ind. bis Mongolei und China (Chili, Kansu). — Die Einführung dieser höchst interessanten, aber empfindlichen Art bereits wiederholt erfolglos versucht, dürfte aber zur die nächste Zeit wieder bevorstehen.

II. B. satt- o. gelblichgrün. Nervatur kaum hervortretend. B.-Stiele seitlich zusammengedrückt, Kn. meist kahl, — stark klebrig.

Sekt. 2. *Aigeiros* DUBY, in DC. Syn. pl. fl. gall. ed. 2, I. 427. 1828. — Becher der ♂ und ♀ Bl. nicht zerschlitzt, höchstens schwach ausgerandet. Stb. 6 — über 30. Frkn. und Fr. kahl. 2—4-klappig.

C Bl.-Trgb. tief fransig zerschlitzt. — Zw. — rundlich, auch an Lohden nie flügelig-kantig. Bl.-Basis — keilig o. gerade (auch wenn ange-deutet herzf.) abgestutzt.

○○ siehe S. 9.

— — Zw. rundlich, nur an üppigen Lohden kantig, auch nur an diesen B.-Grund gerade abgesetzt. N. stets nur 2. Fr. 2-klappig.

2. *P. nigra*: ♂—♂, bis 30(—40): 2(—2,5) m, St. durch die seith. Ausschläge — stark wulstig. Borke schwärzlich, tiefrissig. Krone aufstrebend, aber breit, locker. Äste hfg. wagrecht ablaufend: Zw. und Kn. vgl. Fig. 2 h—m, — glänzend gelb o. hellgelbbraun, bald fein längs-rissig. — olivgrau, Lent. verstr.: B. nur ganz jung mit wenigen Haaren, an älteren Pfl. wie Fig. 1 g. 1,5—10: 2,5—6 cm, an Lohden wie Fig. 1 h—i, bis 13,5—16 cm lang und fast gleichbreit. Randzählung wech-selnd. Stiel 2—6 cm. Q.-Schnitt analog *deltoides*: Bl. vgl. Fig. 8 g—r. Trgb. purpurn. ♂ Blst. bis 7:1,2 cm. Stb. 6—30. Stbf. weißl. A. pur-purn: — Blst. bis 10:0,8—1 cm. N. 2, gelb, dem Frkn. dicht aufsitzend. Frst. bis 13 cm.

Var. a. typica. Zw. stets kahl, breitkronig. — *b. italica* DUROI, Harbk. Baumz. II, 141. 1772 (*P. italica* MOENCH, Bäume Weißenstein 79. 1785; *P. dilatata* ART., Hort. Kew. III, 406. 1789; *P. pyramidalis* ROZ., Cours d'agric. VII, 619, zwischen 1790—1805; *P. pyramidata* MOENCH, Meth. 339. 1794; *P. fastigiata* DESF., Tabl. écol. Paris 213. 1804; *nigra* var. *pyramidalis* SPACH, in Ann. Sc. Nat. 1841, 31b. Pyramiden-Pappel. Äste in spitzen Winkel vom St. ablaufend. Krone pyra-midal, ♂ bis 33·1 m. Zw. kahl. B. hfg. breitrundlich. — *c. pubescens* PARLAT., Fl. ital. IV, 289. 1867 (*P. hispida* HAUSSKN. et SINT., in Mitt. thür. Bot. Verein, neue Folge XIII, 21. 1866). Zw. und B., bes. B.-Stiele, absteheud borstig beh., scheint ♂-Form. — *d. hudsonica***) (*P. hud.* MCHX. F., Hist. Arb. for. III, 293, tab. X,

*) Zu dieser Sekt. scheint nur noch *P. pruinosa* SCHRENK, in Bull. Phys. Math. Akad. Petersb. III, 210, 1845 zu zählen, die ich nur steril kenne und die mir eher eine gute Art, als eine var. der *euphratica* mit rundlichen ganzrandigen B. zu sein scheint. Heimat O.-Sib.

**) KOEHNE ist geneigt, diese Form zu *deltoides* zu stellen. Nach amerikanischen Autoren, insbesondere SARGENT, soll es sich um eine in Am. entstandene Form von *nigra* handeln, mit welcher *hudsonica* habituell, wie in Zw. und B. nach meinen Beob-

BESSER, Enum. pl. Volh. 38. 1821. Was ich als solche sah, war stets *maria*. Ferner *P. v. castulensis* DODE in litt., von der ich in Plantières Zw. sammelte. Sie wächst nach Herrn E. JOUIN breitkronig, dieser hält sie für eine Form von *nigra*.

2. var. *talca* $\times$ var. *hudsonia*: *P. plant. canad.*, wurde in der Baumschule SIMON-LOUIS gezüchtet und weicht im Wesentlichen von *talca* var. ab durch die Beh. der Zw. etc., die schwächer als bei *hudsonia* ist. *P. plant. canad.* bildet bis 20 m hohe, ziemlich schwächliche Pyramiden.

• Lgtr. meist kantig). B. sämtlich o. wenigstens die der Sommertriebe am Grunde gerade abgestutzt, N. 2—4. Fr. 2—4-klappig.

• B. vorwiegend länger als breit, jedenfalls im Mittel über 6 cm lang, fast ringsum zieml. gleichmäßig kerbsäggig, vgl. Fig. 1, a—f¹.

• B. der Frühjahrstriebe wie bei *nigra* geformt, stets ganz kahl. $\odot$ Zw. $\pm$ oliv- o. hellgelbbraun, N. 3—4, Bl. kurz vor B.

3. *P. deltoides* (*P. canadensis*): schnellwachsender $\mathfrak{h}$ bis 45:2.20 m, St. schlanker als bei *nigra*, nicht so wulstig, Borke weniger dick, mehr schwärzlich gelbgrau, Krone mehr aufstrebend, Äste spitzwinkliger ablaufend, so daß Habitus deutlich abweichend, Kn. und Zw. vgl. Fig. 9 g—m; B. vgl. Fig. 1 d—f, an Lgtr. im Mittel bis 12:12—(13) cm, bes. bei der üppigen Form *P. erecta* [DIPPEL 1892] *monilifera erecta* SELYS, in Bull. Soc. bot. Belge 1864, 13: peupl. régénéré CARR. in Rev. hort. 1865 58., *regenerata* und *grandis* o. *grandifolia* (der Gärten): Stiele grün, Bl. vgl. Fig. 3 o—p¹, selten nur 2 N., die dem Frkn. gedrängt breit aufsitzen, Blst. bis 12:1.2, Frst. bis 25 cm.

P. d. MARSH., Arb. am. 106. 1785 (*canadensis* MOENCH, Bäume Weißenst. 81. 1785; *marilandica* POIRET, in LAM. Dict. Suppl. IV, 378. 1799. — Kanada P.; cotton wood; p. suisse ou p. du canada. — O.-N.-Am., von Kanada bis mittl. Ver. St., im S. dieser durch *angulata* vertreten. Blz. IV. Schöner $\mathfrak{h}$, der infolge seiner Schnellwüchsigkeit und Anspruchslosigkeit in den Kulturen *nigra* zu verdrängen beginnt. Vorwiegend $\mathfrak{f}$ in Kultur.

• B. durchweg am Grunde breit gestutzt, z. T. gewimpert, $\odot$ Zw. $\pm$ stark gebräunt, N. meist 2, zuw. 3, Bl. lange vor B.

4. *P. monilifera*: $\mathfrak{h}$, analog *deltoides*, doch Krone oben abgeflacht, Kn. wohl ganz wie bei *deltoides*; B. vgl. Fig. 1 a—c, im Mittel kleiner als bei 3, nur bis 10:9 cm, Stiel aber relativ länger und gerötet; Bl. vgl. Fig. 3 n—n², N. gestielt und aufgerichtet.

P. m. ARR., Hort. Kew III, 106. 1789 et MICHX. r., Hist. Arb. for III, t. 10, f. 2. 1813¹. — Rosenkranz P.: virginian p.; p. de Virginie — O. N. Am., ziemlich analog *deltoides*, gegen W. durch *tridentata* und im SW. durch *resinosa* ersetzt. — Treibt am spätesten aus von allen Arten dieser Sekt. Erst seit letzter Zeit auch $\mathfrak{f}$ in Kultur.

Die beiden letzten Pappeln sind bereits von MICHX. r. sehr gut unterschieden worden. Spätere Autoren haben sie oft verwechselt. Unter den Neueren gebührt KOEHNE das Verdienst, sie wieder als Arten getrennt zu haben. Es ist aller-

*) Ich betone aber, daß alte $\mathfrak{h}$ aller drei Arten rundliche Lgtr. zeigen, daß jedenfalls die kantigen Zw. an sich kein sicheres Merkmal bieten, so man *nigra* o. *deltoides* hat.

**) Herr E. JOUIN in Plantières machte mich ganz besonders auf dies Merkmal aufmerksam, ebenso auf die im Gegensatz zu *monilifera* kaum gebräunten $\pm$ Zw. und die oben stumpfspitzige Krone.

Fig. 3. *Populus*. *a—d tremuloides*: *a* ♀ Bl., *b* dgl. im L.-Schn., *b*¹ N., *b*² Sa., *c—d* ♂ Bl.; — *e—g grandidentata*: *e* ♂, *f* ♀ Bl., *g* Fr.; — *h—i sieboldii*: *h* ♀ Bl., *i* ♂ Bl. ohne Stb.; — *k—m heterophylla*: *k* ♂, *l* ♀ Bl., *m* aufgesprungene Fr.; — *n—n'* *monilifera*: *n* ♀ Bl., links N., *n*¹ Frkn. im Qu.-Schn., *n*² Trgb.; — *o—o'* *deltoides*: *o* ♀ Bl., *o'* Frkn. im Qu.-Schn., *p* Fr., *p'* Trgb.; — *q—r'* *angulata*: *q* ♀ Bl., *q'* dgl. ohne N., *q'* im L.-Schn., *q* Frkn. im Qu.-Schn., *r* Trgb., *r'* Fr.; — *s—t wislizenii*: *s* ♀ Bl., *s'* N., *t* ♂ Bl.; — *u fremontii*: ♀ Bl.; — *v—x euphratica*: *v* ♂ Bl., *v'* Discus von oben ohne A., *v''* Stb., *w* ♀ Bl., *x* Fr. (*c—s*, *m* nach SARGENT, *i* nach SHIRASAWA, sonst Original).

dings z. Zt. noch nicht leicht, die durchgreifenden Unterschiede sicher zu präzisieren. Da die amerikanischen Autoren merkwürdigerweise beide Arten nicht auseinander halten, ist vor allem die Heimat nicht genau abzugrenzen. Unter den kultivierten Exemplaren sind sicherlich viele Hybriden, denn schon die Tatsache, daß *monilifera* bisher fast nur ♂ in Kultur war und bei *deltoides* die ♀ Pfl. überwogen, läßt vermuten, daß Bastardierungen hfg. vorkamen. Und in der Tat begegnen uns viele Expl., die nicht mit Sicherheit der einen o. anderen Art zugeschrieben werden können. Wir finden z. B. auffallend spät austreibende, die doch typische *deltoides* B.-Formen zeigen, andererseits gibt es *monilifera* mit 3—4 N. usw. Ich schlage für diese Bastarde den Namen *pseudocanadensis* vor und möchte hiermit zu genauer Beobachtung anregen. Vor allem ist es nötig, von ♀ Pfl. Bl.-Zw. und alle auftretenden B.-Formen, sowie Winter-Zw. zu sammeln.

+ B. fast stets breiter als lang, im Mittel kaum über 6:7 cm, meist am Grund und an der Spitze eine deutliche Strecke

ganzrandig, dazwischen gleichmäßig fein kerbsäggig o. nur mit 5—10 groben Zähnen, vgl. Fig. 11—n.

△ B. zieml. gleichmäßig breit zugespitzt (Fig. 1 m—n), ♂ und ♀ Bl. nur kurz gestielt, N. sitzend.

5. *P. fremontii*: breitkroniger, bis über 30 m hoher B., jüngste Triebe beh., o. Zw. kahl, gelbbraun, Lgtr. bis stark kantig, Kn. an diesen klein, kahl, Sch. 2—3, kaum gewimpert, Bl.-Kn. Herbar bis 1.5:0.7 cm, Sch. 4—5, olivgrün, auf dem Rücken fein beh., Rand spärlich kurz gewimpert, kaum klebrig: B. bis 19:11 cm (an Lgtr. zuw. lang zugespitzt), Stiele bis 8 cm, gleich den B. jung beh., Bl. vgl. Fig. 3 u, Frst. bis 9 cm, Kapseln etwa 8:8—9 mm.

P. f. WATS., in Proc. Am. Akad. X, 350. 1875. — Kalifornische P. — N.-Am. vom Saskatchewan durch N.- bis S.-Calif., Nevada, Utah, Colorado. — Blz. III—IV. — Erst seit neuerer Zeit in Kultur, wohl bis Prov. IV hart.

B. mit mehr abgesetzter, schärferer Spitze (Fig. 1 h), Bl. lang gestielt, N. dgl.

6. *P. wislizenii*: analog *fremontii*, nur noch unterschieden: Zw. stets kahl, B. dgl. o. Stiele jung beh.: Bl. vgl. Fig. 3 s—t), Frst. 5—6—12 cm, Kapseln etwa 1.3:0.9 cm, ihre Stiele so lang o. etwas länger.

P. w. SARG., Silva XIV, 71. 1902 (*fremontii* var. (?) *wislizenii* WATS.; in Am. Jour. Sci. ser. 3, XV, 136. 1878. — N.-Am. von S.-Dakota und W.-Texas durch Neu-Mexiko bei N.-Mexiko**). — Wohl noch nicht in Kultur.

CC Bl.-Trgb. nur kerbzähnig, o. Zw. stets, an Lohden flügelig-kantig, B.-Basis ± herzförmig.

7. *P. angulata*: B. bis 27 m hoch, breitkronig: Borke analog *monilifera*, Zw. o. olivbraun, mit deutl. hellen Lent., Lohd. mit starken Flügelkanten, Kn. olivgrün, an Lohd. anliegend, etwa 8 bis 10:3 mm, Bl.-Kn. abstehend, gerade, bis 12:5 mm: B. vgl. Fig. 1 o—p¹, nur jung unten verstr. beh., Rand dicht anliegend gewimpert, 9—15—25:8—12—23, zuw. deutl. länger als breit, Stiele 4.5—12 cm, am B.-Grunde meist deutl. Drüsen (Fig. 1 p¹), Neb. lanzettl., bis über 1 cm lang, Bl. vgl. Fig. 3 q—r¹, Frst. bis über 20 cm lang, N. 3—4, Becher zur Frz. sehr geschrumpft.

P. ang. AIT., Hort. Kew. III, 407. 1789 (*macrophylla* LODD., Cat. 1836). — Karolina-P.; carolinian p. — O. Ver.-St. (Carolina, S.-Louisiana, Georgia, Ufer des Mississippi bis Missouri, nördl. bis S.-Virginia) — Blz. III—IV, treibt sehr früh aus. — Empfindlicher als *deltoides* o. *monilifera*.

Im Anschluß an die Arten dieser Gruppe sind folgende Bastarde zu besprechen, die ihrem Ursprung nach noch nicht sämtlich sichergestellt sind.

2b×3 *P. nigra* var. *italica* × *deltoides* (*canadensis*): *P. eugenei*: die Stammpfl. dieses im Hort. SIMON-LOUIS zu Plantières entstandenen Bastardes ist ein stattlicher B. von 50—230 m. Tracht im Alter im Wesentlichen wie *deltoides*, aber die unteren Kn. der Lgtr. pflegen sofort auszutreiben, wodurch eine auch für ungepfl. ganz charakt. Verzweigung entsteht, die auf *italica* deutet, *P. eugenei* übertrifft obendrein, wie so viele Hybriden, die Eltern an Wuchskraft. Die B. spiegeln alle Formen dieser wieder. Für Kulturen sehr zu empfehlen!

¹) An normalen Lgtr. älterer Pfl. durften die Kn. wohl über 3 mm lang sein.

²*) In Mexiko vertreten durch *P. mexicana* WESML., in DC Prodr. XVI, 2, 328 1868, die langer zugespitzte B. besitzt, deren Zahng. hfg. mehr *fremontii* o. fast *monilifera* ähnelt, Bl. nicht so lang gestielt, wie bei *wislizenii*, aber länger als bei *fremontii*. Fr. etwa 9:6 mm, Stiele $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ so lang, N. sitzend.

Was ich von SPÄTH als *charkowiensis* SCHROEDER, in MÖLLERS deutsch. Gärtnerztg., XVII, 393. 1902) erhielt, scheint mir *eugenei* analog. KOEHNE deutet im Herbar diesen von SCHROEDER, l. c. als *nigra* $\times$ *nigra italica* gekennzeichneten Bastard als *angulata* $\times$ *nigra italica*. Ich sehe keinen rechten Grund, *angulata* herbeizuziehen, dagegen ist es mir wahrscheinlicher, daß an Stelle *nigra* die mit dieser jetzt so oft verwechselte *deltoides* gesetzt werden kann, wie ja auch der Bastard in Wuchskraft *eugenei* ebenbürtig scheint, nur vielleicht habituell alles in allem *italica* ein wenig näher steht. Die größten B., die ich sah, maßen 11,5:12,5 cm. ihre Stiele 6,5 cm. Blüten noch unbekannt!

Fig. 4. *Populus*, B.-Formen: a—b *tristis*; — c *tristis* var. *elongata*; — d—e *canadensis*; — f *balsamifera*; — h—i *balsamifera* f. *angustata*; — k—l *trichocarpa*; — m—n *nigra* var. *hudsonica*; — o—p *berolinensis* (vom selben Zw.); — q—s *rasumowskyana*; — t—v *petrowskyana*; — w *wobstii* ($\frac{1}{3}$ nat. Gr.) (Original).

(2b×3)×7 *P. eugenei* × *angulata*: *P. robusta*. Diese von SIMON-LOUIS-Plantières als *angulata cordata robusta* dem Handel übergebene Form ist nach Mitteilung des Herrn E. JOURN sicher aus S. der *angulata* gefallen. Sie weicht aber von dieser in den schwächer kantigen, oft fast kantenlosen Zw. ab und ist nach JOURN wahrscheinlich aus obengenannter Kreuzung hervorgegangen, was mir nach dem mir vorliegenden Material nicht unwahrscheinlich scheint, doch ist weitere Beobachtung sehr nötig. Der Name *P. robusta* dünkt mir kurz und bezeichnend.

2b×12 *P. nigra* var. *italica* × *suaveolens*: *P. rasumowskyana* SCHROED., nach RGL., Russ. Dendrol. 133. 1889 ex DIPPEL*). — Zw. jung meist ± bis ziemlich scharfkantig, Kn. bis etwa 16 mm lang, sehr klebrig, B. vgl. Fig. 19. S. oben tiefgrün, unten viel heller, gelblichgrün, schmal weißlich gerandet, wenigstens auf den Rippen verstr. beh., bis 11:12 cm, dann Grund leicht herzförmig, Stiel 1.5–4.5 cm, am Ende seith. zusammengedrückt und verstr. beh., oben schmalmantig, am B-Grunde hgt. 2 Drüsen, Bl. ? KOEHNE deutet diesen Bastard im Herbar als *italica* ~ *balsamifera*, mir ist obenstehende Kreuzung wahrscheinlicher, die obendie den Angaben des Züchters entspricht. Für *canadensis* ~ *suaveolens*, wie REGER will, fehlt jeder Anhalt!

2b×13 *P. nigra* var. *italica* × *laurifolia*: *P. berlinensis* DIPPEL, Laubholzsk. II, 210. 1892 (*P. hybrida berlinensis* K. Koch. in Wochenschr. für Gärten VIII, 225. 1895; *P. certinensis* der Gärten B. bis 20 m; Hybride von äußerst wechselnder Tracht, bald im breiten Wuchs, den starkkantigen gelbgrauen Zw., den oben leicht rinnigen B.-Stielen und den gestreckten B-Formen an *laurifolia*, bald im aufrechten, fast pyramidalen Wuchs, in den fast o. ganz runderl. gelblich braunlichen Zw., den seith. zusammengedrückten B.-Stielen und den rhombischen B-Formen an *italica* gemahnend. Die B. (Fig. 10 p) variieren sehr und erinnern hgt. an *angulatifolia* o. *trichocarpa*, aber ihre Untersseiten sind nie deutl. weißlich und die Ränder fein durchscheinend. B. teils bis 13:11.5, Stiel etwa 6 cm, teils bis 13:7.5, Stiel etwa 3–4 cm.

3×13 *P. deltoides* (*canadensis*) × *laurifolia*: *P. petrowskyana* SCHR. et RGL. Diese Hybride ist zum ersten Male 1882 in Gard. Chron. II, 108 genannt, wo sie als Kreuzung aus *canadensis* ♀ × *suaveolens* ♂ mit dem Namen *petrowskyana* bezeichnet wird. Sie ist gleich *rasumowskyana* von SCHROEDER gezüchtet. REGER deutet sie ebenso. DIPPEL führt sie als *canadensis* var. *petrowskyana* und denkt an *canadensis* × *canadensis* ♂. KOEHNE führt sie im Herbar als *angulata* × *laurifolia*. Mir scheint zunächst nur das eine sicher, daß *P. petrowskyana* einer Kreuzung entstammt, an der von den Balsampappeln *balsamifera* beteiligt war (nicht *suaveolens*!), welche Art der Schwarzpappeln indes anzunehmen, ist mir etwas fraglich. Ich glaube *P. deltoides*, obwohl auch manches für *angulata* spricht. Jedenfalls steht nach dem mir vorliegenden Material diese Hybride *laurifolia* näher. Zw. graubraun, meist starkkantig, Kn. anliegend, klebrig, bis ca. 1 cm lang, B. vgl. Fig. 11 v, 6–16–3.8–10 cm, Grund vorwiegend runderl., Form etc. oft stark an *berlinensis* gemahnend, die aber bei weitem nicht so uppig wächst, Stiel 1.8–4.5 cm. Bl. ?

4×7 *P. monilifera* × *angulata*: *P. serotina* HARTIG, Forstl. Kulturpfl. 437. 1851 (*angulata* var. *serotina* KOEHNE, Dendrol. 82. 1893). Ich deute diese mir nicht näher bekannte Art als Hybride, denn durch ihre tief gezahnten o. geschlitzten Bl.-Trgb., den späten Austrieb und größere Winterhärte weicht sie von *monilifera* gut ab, dagegen gemahnt sie in der nach HARTIG flachen Krone, dem späten Austreiben und der Form der Bl.-Trgb. und z. T. der B. an *monilifera*. SCHELLE führt sie im H. d. D. D. G. als Art mit dem Zusatz *angulata* × *canadensis*.

4×13 *P. monilifera* × *laurifolia*: *P. braunii*. — Unter den von mir durchgesehenen *Populus* des Herbars des Kgl. Bot. Museums zu Berlin lag dieser von A. BRAUN im Berliner bot. Garten gesammelte Bastard, der nachweisbar aus S. einer einzigen *P. laurifolia* stammen soll, die nur von der nahen *balsamifera* betrachtet worden sein konnte. Die betr. Pfl. existierten nicht mehr, aber nach den Herbarstücken dürfte die Deutung richtig sein. B. im Mittel 10–7 cm, dabei an *berlinensis* gemahnend, doch kürzer und breiter, Stiel 5–6 cm, größte B. 14:10 cm, kahl. Färbung wie bei *berlinensis*, Grund meist breit runderl. bis runderl. selten

*) REGERs Werk war mir leider nicht zugänglich. Im Gard. Chron. 1882, II, 108, wird als auf der Moskauer Ausstellung von SCHROEDER gezeigter Bestand *P. rasumowskyana* (*angulata* × *suaveolens*) *P. robusta* erwähnt. Außer dieser Angabe der *P. petrowskyana* werden hier noch aufgezählt *P. petrowskyana* (*canadensis* × *laurifolia*) und *P. rasumowskyana*, die ich nicht erinnern soll, *P. odorata* (*balsamifera* ♀ × *vetula* Hort. Mosk. ?) und *P. moscoviensis*, welche drei mir unbekannt sind.

**) SCHELLE schreibt in H. d. D. D. G. *canadensis* × *nigra*, was sicher ganz falsch, keine dieser 2 Arten scheint beteiligt.

deutl. stumpfkeilig. Neb. schmal bis eilanzettlich; Fr. 2klappig (N?), kurzgestielt. Erst. bis 9 cm. — Es wäre interessant, diesen noch zweifelhaften Bastard wieder aufzufinden.

Fig. 5. *Populus*. *a--b* *candicans*: *a* ♀ Bl., *a'* deren Trgb., *b* Frkn. im Q.-Sch., *b'* (rechts auf Zeichnung) B.-Stiel ganz und im Q.-Schn.; *c--d* *balsamifera*: *c* ♂ Bl., *c'* dgl. ohne A., *c'* deren Trgb., *d* ♂ Bl., *d'* B.-Stiel ganz und im Q.-Schn.; *e* *marceolensis*: *e* Bl. mit Trgb.; *f--g* *tomentosa*: *f* Bl.-Trgb., *g* ♂ Bl., *g'* Frkn. im L.- und Q.-Schn., *g* N. ausgebreitet; *h--h'* und *u--u'* *alata*: *h* Bl.-Trgb., *h'* ♂ Bl. und rechts N. ausgebreitet, *h'* Frkn. im Q.-Schn., *u* ♂ Bl., *u'* Stb.; *i--k* *marceolensis*: *i* ♂ Bl., *i'* deren Trgb., *k* ♂ B. und Stb., *k'* B.-Stiel ganz und im Q.-Schn.; *l--l'* *angustifolia*: *l* ♂ Bl., *l'* ♂ Bl.; *m--n* *laurefolia*: *m* ♂ Bl., *m'* deren Trgb., *n* langer B.-Stiel im Q.-Schn., *n* dgl. kurzer B.-Stiel; *o--p* *trichocarpa*: *o* ♂ Bl., *p* deren Trgb.; *q* N. ausgebreitet, *q* B.-Stiel im Q.-Schn.; *r--s* *simonei*: *s* ♂ Bl., *t* deren Trgb., *t'* Stb.; *u--u'* *alata* siehe *h--h'* (d nach SARGENT, sonst Original).

B. B. unterseits deutl. weißlich, o. wenn gleichfarbig ohne obs. Sp.
o. B. 2 : 3 : 1 mit dichter feiner knorpelig-drüsiger Randzähnung.

II siehe S. 16.

I. B. unterseits stets deutl. weißlich, dabei kahl oder fast kahl, wenn grünlich, so obs. Sp. vorh., Rand kaum durchscheinend knorpelig, obs. Sp. selten fehl., aber auch selten mehr als $\frac{1}{2}$ der unterseitigen.

Sekt. 3. *Tacamahaca* SPACH, in Ann. Sc. nat. 1841. 32. b o. meist ♂ mit dickästiger sperriger Krone, Borke zeitig auftretend, Kn. hfg. sehr stark klebrig, Bl.-Trgb. vgl. Fig. 5 a¹, c², i¹, l etc., Stb. 20 : 30, N. meist breitlappig, Frkn. und Fr. kahl o. (selten) dicht beh.

*) Vollständig fehlt die knorpelige Berandung wohl nie, ist aber zumeist so fein, daß sie nicht leicht zu erkennen. Jedenfalls ist sie ein Merkmal von untergeordneter Bedeutung!

○ Frkn. und Fr. kahl.

† B.-Stiele und B. deutlich + beh., B.-Grund vorwiegend herzfg. o. rundl.

+ obs. Sp. fehl., B. deutl. länger als breit, Grund hfg. rundl. bis stumpfkeilig, Neb. meist bleibend, da an Kn. festklebend.

8. *P. tristis*: b $\bar{b}$, sparrig wachsend, Zw. rundl., + meist und hfg. auch + + fein beh., glänzend dunkel braunrot, Lent. hell, zieml. groß, verstr., Kn. etwa 15 : 25 : 5 — 8 mm, sehr klebrig, Sch. meist nur 3—4, + locker, + braun, hell gewimpert, an Lohd. Seit.-Kn. angedrückt, z. T. viel kleiner: B. vgl. Fig. 4 a—b und *var.*, oben tief bis schwärzl. grün, nur jung auf Nerven fein beh., unten weißlich, + fein locker beh. und gewimpert, Drüsen am B.-Grund deutl., Stiele 1.5—4 cm, Neb. breit 3-eckig bis lanzettl.; Bl. ?.

var. a. typica: B. + breitoval o. eilänglich, Grund + herzfg.; 7—15 : 4.5—9 cm. — *b. elongata**) KOEH. in Herb. (*candicans var. elongata* DIPP., Laubholzk. II, 204. 1892), B. aus rundl. o. + breitkeiligem Grunde breitlanzettl. o. cilanzettl., bis 15 : 5 cm.

P. t. FISCHER, in Bull. Sc. Ak. Imp. Pétersbg. IX, 343. 1842. — Dunkelblättrige *P.* — Stammt voraussichtlich aus N O.-As. — Vgl. aber Anmerkung unten. Sicher spontane Expl. sah ich noch nicht.

++ obs. Sp. vereinzelt bis verstr., B. wenig länger als breit, aus herzfg. Grunde meist breit rundl.-eifg.**.

9. *P. candicans*: üppiger $\bar{b}$, bis 35 m, ausgebreitet verästelt, offenkronig, Zw. meist nur jung + beh., + oliv- o. + rotbraun, rundl., Lent. verstr., + groß, hellgelblich, Kn. spitz, etwa 10 : 12 : 4—5 mm, zweifarben, kahl, + klebrig, kaum anliegend, Bl.-Kn. + vom Zw. abgelenkt, bis 2 cm, stark klebrig, Sch. 3—4—5, hfg. locker: B. vgl. Fig. 4 d—e, 6—13—20 : 5—12—16 cm, sonst wie *tristis*, Stiel bis 6—10 cm, Neb. meist abfällig, aber ihre N. deutlich; Bl. vgl. Fig. 5 a—b¹, N. 2, Stb. 20—30, Frst. bis 20 cm lang.

P. c. ART, Hort Kew. III, 406. 1789 (*ontariensis* DESF., Cat. hort. Paris 1829; *balsamifera var. candicans* GRAY, Man. ed. II, 419. 1856). — Ontario-P.; balm of gilead; p. hard. — O N.-Am. (Neu-Braunschw., S.-Kanada bis New-Jersey, westl. bis Minnesota) im nördl. u. westl. Teil meist durch Kultur verbreitet, wild vorwiegend nördl. — Sonst vgl. *balsamifera*. — Seit 1752 in Kultur, häufigste Balsampappel, oft als *balsamifera* o. *suaveolens* in den Gärten.

†† B.-Stiele und B. durchaus kahl, o. nur sehr fein beh., bez. gewimpert, dann aber B.-Grund nicht herzfg., bez. + Zw. nicht glänzend dunkelrotbraun.

+ + Zw. rundl. o. nur angedeutet kantig, dunkelpurpurbraun o. gelbgraubraun, nicht deutl. grau, B. unten deutl. weißl.

△ ⊙ Zw. dunkelpurpurbraun, B.-Stiele und B. stets kahl, obs. Sp. fehl., N. 2, Fr. deutl. gestielt.

*) KOEHNE führte 1903 diese Form als fragliche *candicans* × *laurifolia*. SCHELLE druckt dies im H. d. D. D. G. nach und führt sie als Art: *P. elongata*. Es liegt aber gar kein Grund vor, sie als Hybride o. eigene Art anzusehen. Jedenfalls hat sie, wie auch KOEHNE inzwischen sich überzeugt, mit den obengenannten Arten gar nichts gemein.

**) Das asiatische Gegenstück zu *candicans* scheint *ciliata* WALL., Cat. 2796. 1831 (*rotundifolia* GRIFF., in Posth. pap. Not. pl. asiat. 382. 1854) zu sein. Ich ziehe hierher die von KOEHNE, Dendrol. 83. 1892, zu *tristis* gestellten Herbar-Expl. Man vgl. die Bl. Fig. 5 h—h², u—u¹, die Furchung des Frkn. bei h¹ ist nur Schrumpfungerscheinung durch Trocknen. Vom N.-W.-Himal. bis Zentral-China (N.-Shen-si) verbreitet.

10. *P. balsamifera*: (b—) $\text{b} = \text{b}$, bis 35 m. Äste mehr aufstrebend als bei *candicans*. Krone zieml. schmal, offen; Borke zuletzt grau, stark-rissig, junge Rinde bräunlichgrün, mit deutl. Höckerehen. Zw. kahl, Kn. zweifarben, gerade o. — gebogen, meist gleich groß, etwa 12 : 15 : 4—5 mm, 3—4—5 Sch., Bl.-Kn. — größer, stark klebrig; B. vgl. Fig. 4 f—g, jung gelbgrün, klebrig, zuletzt dünn lederig-häutig oben tiefgrün, unten weißlich o. etwas gelblich, Stiel 1.5—6 cm; Bl. vgl. Fig. 5 c—d¹, Blst. 6 : 12 : 1.2—2 cm, vor B.-Ausbruch, zur Frz. bis 15 cm, Fr. 2-klappig.

Nach den B. unterscheide ich: *f. typica*, B. aus breitrundl., selten — herztg. Grunde eitg. o. eilänglich, 6—15 : 2.5—12 cm. *f. angustata*: B. aus schmal-rundl. o. $\pm$ keiligem Grunde eilänglich bis schmalellipt. 4—11 : 1.5—4.5—5 cm.

P. b. L., Sp. pl. 1034. 1753 (*tacamahaca* MILL., Gard. Diet. No. 6. 1759). — Balsam-P.; *tacamahac*, *balsam-p.*; p. baumier. — S.-Kanada, N.-Ver.-St., Neufundl., Hudsonbai, Alaska südl. bis Maine, New York, Michigan, Idaho, Brit. Col., Besonders Flußniederungen, Seeufer. — Blz. IV. — Frz. V—VI. — Seit 1731 in Kultur; bei uns nur Zier- b , in Heimat Holz und Rinde z. T. nutzbar.

— o. gelbgrau o. gelbbraun, B.-Stiele hfg. fem beh. und B. gewimpert, obs. Sp. vorh., N. 3—4, Fr. $\pm$ sitzend.

11. *P. suaveolens*: (b—) $\text{b} = \text{b}$, bis über 15 m. Zw. jung verstr. beh., — kahl, Kn. olivbräunlich, 8—15 mm lang, — angedrückt, Bl.-Kn. bis 20 mm, zuw. trocken, Sch. (3—) 4—5; B. vgl. Fig. 6 r—t, oben dunkelgrün, sehr schmal weiß gerandet, B.-Grund drüsenlos, Stiel 0.5—4.5 cm, oben — rinnig, bes. an Lohden kurz; Bl. vgl. Fig. 5 i—k, r Blst. 2—3 cm, Stb. 18—25, Frst. bis 10 cm.

Zu unterscheiden: *f. typica*: B. vgl. Fig. 6 r—t, bis 9 : 4.5 cm, dabei Stiel 1 cm, an üppigen Trieben B. auch bis 11 : 6 und Stiel nur 1.8 cm. *f. oblongata* KOLHNE (*balsamifera* obl. DIPP., Laubh II, 207. 1892), B. wie Fig. 6 u bis etwa 10 : 3.5 cm.

P. s. FISCHER, in Bull. Sc. Ak. Imp. Petersbg. IX, 348. 1842 (*balsamifera* var. *suaveolens* LOUD., Arb. ed. 2, III, 1674. 1844). — Wohlriechende P. — Turkest., Songarei, W. Sib. — Mandschurei, Mongolei. — Ziemlich selten, echt vorh. Entspricht der *balsamifera* in N.-Am.*).

— — — Zw. — deutl. bis scharfkantig, wenn rundl., so doch B. unten nicht deutl. weißl.

— B.-Stiele im Mittel über 1 cm lang, wenn nicht, so jedenfalls B. über 2 : 1 und $\odot$ Zw. $\pm$ graugelb.

— $\odot$ Zw. nicht flügelig-kantig, z. T. $\pm$ rundl., bräunl. gelbgrau.

12. *P. angustifolia*: b bis 20 m. Krone ziemlich schmal und pyramidal (Weidenhabitus). St. — hellgelbgrün berindet, Borke nur an den ältesten Teilen, Zw. kahl, Lent. sehr verstr., Kn. 6—10 : 12 mm, wenig dunkler als Zw., Sch. 2—3—5; B. vergl. Fig. 6 k—n, *laurifolia* hfg. stark ähnelnd, gleich dieser mit ∞ obs. Sp., 2.5—13 : 1.5—3, an Lohd. bis 15 : 21 : 8.5 cm, bei einer kleinblattrigen Form (*f. parvifolia*) im Mittel nur 5 : 1.5—2 cm, Stiele 1—4 cm; Bl. vgl. Fig. 5 l—l¹, r Blst. 2 bis 4.5 : 1 cm, Stb. 12—20, r 4—7.5 : 1, zur Frz. bis 12 cm, N. 2, klein.

*) Nur kurz sei hier verwiesen auf 2 verwandte Arten, deren erste: *P. przewalskii* MAXIM., in Mém. Biol. Bull. Ak. Petersbg. XI, 321. 1887, mit 11 Expl. als Cnema (Kausu) vorlag, während die andere: *P. acuminata* RYDBERG., in Bull. Bot. Cl. 1893, 46, aus N.-Am. (S.-Dakota, Utah, N.-Mex.) stammt. Beide erinnern in den B. z. T. an *angustifolia*. Die erste mißt bis 7 : 3.5 cm und hat nur mäßig ∞ obs. Sp., wegen *acuminata* B. bis 10 : 6 cm und sehr ∞ obs. Sp. besitzt.

P. a. JAMES, Longs Exped. I, 497. 1823 (*canadensis* var. *angust.* WESM., in DC. Prodr. XVI, 2, 329. 1868; *balsamif.* var. *ang.* WATS., in Kings Rep. V, 327. 1871). Schmalblättrige *P.*; narrow leaved or black cottonwood. — N.-Am. (NW.-Territ. bis Nebraska, N.-Mex. und Arizona [bes. hfg. in N.-Color., Utah, S.-Montana, O.-Idaho] Licht Feuchtigkeit, bes. längs Flußläuten, bis 3000 m — Blz. IV—V. — Nicht ganz so hart wie *laurifolia*.

Fig. 6. *Populus*. B.-Formen: a—d *alba*: a—b typ. Form, c von einem alten B., d von Lohden, bez. var. *bolleana*; — e—i *hybrida*; — k—n *angustifolia*; — o—p *simoni* (q *brevifolia*); — r—t *suaveolens*; u *suav. f. oblongata*; — v—y *laurifolia*. ($\frac{1}{3}$ nat. Gr.) (Original.)

— — ⊙ Zw. ± flügelig-kantig, hellgraugelb.

13. *P. laurifolia*: B. bis gegen 30 m, Krone sperrig, umfangreich, Borke rissig, braungrau. Zw. grau. • kahl, Lent. ∞, aber kaum auffällig, Kn. etwa 1 cm, klebrig. — angedrückt, gelbbraun, hfg. dunkler und sich scharf abhebend, Kztr. sehr ∞; B. vgl. Fig. 6 v—y, jung klebrig. — verstr. beh., später oben glänzend sattgrün, unten — blatt-o. weißl. grün, 6—13:2.5—4.5, an Lohden bis 20:10 cm, im unteren Teil der Zw. meist länger gestielt (bis 7 cm) und hfg. kaum gezähnt, Stiel sonst 1—4.5 cm, Neb. kurz dreieckig, hfg. an klebrigen Kn. bleibend; Bl. vgl. Fig. 5 m—n¹, vor o. mit B.-Ausbruch. ♀ Blst. 3—8 cm, Stb. 20—30, Frst. bis 12 cm, Frkn. sitzend.

P. l. LEDEB., Fl. alt. IV, 297. 1833 excl. syn. (*balsamif.* PALLAS, Fl. ross. I, 67. 1784 ex parte; *bals. var. laurif.* WESM., in DC. Prodr. XVI, 2, 330. 1868) — Lorbeer-P. Sib. (Altai), bes. Flußtäler. — Blz. V. — Üppiger harter Zier- $\text{\textcircled{b}}$. Wie oben erwähnt, an vielen Bastarden beteiligt.

— B.-Stiele meist nicht über 1 cm. • Zw. • stark o. flügelig-kantig, oliv- o. rotbraun.

14. *P. simoni*: $\text{\textcircled{b}}$ (in Heimat wohl $\text{\textcircled{b}}$), Zw. kahl, Lent. hell, verstreut. Kn. zieml. gleich groß, etwa 7 mm lang, zweifarben, kahl, wenig klebrig, anliegend. Bl.-Kn. bis 14 mm. Sch. 3—5; B. vgl. Fig. 6 o-p, oben frisch-, unten blaßgrün, kaum weißl., 5—13:2—8 cm, Stiele 0,3—0,9 (—1,8) cm. Bl. vgl. Fig. 5 s-t, ich sah nur $\text{\textcircled{♂}}$ Blst.^{*)}, bis 3:0,8 cm.

P. simoni CARR., in Rev. Hort. 1867. 360 (*brevifolia* CARR.). — Chinesische P. — N.-China (nur Peking), vertritt, wie es scheint, im S. die *suaveolens*. — Interessante, wohl zieml. harte P.

○○ Frkn. und Fr. dicht beh.

15. *P. trichocarpa*: hoher $\text{\textcircled{b}}$, bis über 30:2,4 m. St. hellgrau berindet, Rinde schon an ganz jungen St. abblätternd. Zw. jung • fein beh., • meist kahl und deutl. kantig, olivbraun, Lent. verstr. hell, • Zw. rundl., • graugelb; Kn. • anliegend, 9—12 mm lang, klebrig, kahl o. verstr. beh. und Sch. gewimpert, zweifarben; Kztr. $\sim$; B. vgl. Fig. 4 k-l, jung gleich den Stielen • fein beh., oben frischgrün, unten ausgesprochen weißl., obs. Sp. scheinen z. T. ganz zu fehlen!, Grund breit rundl. o. • herzfg. 9—13—14:4,5—9, Serratur meist wenig auffällig, Stiel 3—6 cm; Bl. vgl. Fig. 5 o-r, $\text{\textcircled{♂}}$ Blst. 4,5—6:1,2 cm, Stb. 40—60 nach SARGENT, • 6—9:1 cm, zur Frz. bis 12 cm, N. 3.

P. l. HOOPER, Icon IX, t. 878. 1852. — Haarfrüchtige P. — Pacif. N.-Am. (S.-Alaska, Brit. Col., W.-Washingt., Oreg. bis S.-Kalif. — Blz. III—IV. — Schöner $\text{\textcircled{b}}$, Gegenstück zu *balsamifera*, aber größer, doch empfindlicher.

Als mutmaßlicher Bastard sei noch geführt:

? 86×13? *P. tristis* var. *elongata* × *laurifolia*: *P. robusta* SCHROED. [ex DIPPEL, Laubh. II, 206. 1892, als *balsamifera* b. *robusta* RGL.]. Zw. • gelbbraun, meist nur jung deutl. kantig, Lent. an ganz jungen Zw. als helle Striche deutl., Kn. sehr harzig, gleichgroß, 1,3—1,5 cm lang; B. (Fig. 4 w) nur ganz jung verstr. beh., aus breit-rundlichem o. etwas verschmalertem, aber • rundl.-keiligem Grunde eilänglich o. eilanzettlich, 11—16,4—6 (—7,3), größte Breite unter o. fast in Mitte, Rand deutl. kerbsäggig, obs. Sp. zieml. $\sim$, unters. weißlichgrün, Stiel nur 0,8—1,9 cm, oben flach rinnig, breit eirundlich, sehr locker kurz beh. — Wahrscheinlich eine gute Art. Jedenfalls noch sehr ungenau bekannt und sicher keine Form von *suaveolens*, wie es bei SPÄTH heißt; noch weniger von *balsamifera*.

II. B. beiders. • gleichfarben, unters. jedenfalls höchstens durch Beh. weißlich, obs. Sp. fehl., Rand kaum o. deutl. durchscheinend knorpelig.

Sekt. 4. *Leuce* DUBY, l. c. 1828: $\text{\textcircled{b}}$ — $\text{\textcircled{b}}$. Rinde meist lange glatt, Kn. fast stets trocken, Bl.-Trgb. dicht o. kaum zottig gewimpert, Stb. 4—8—15—40, N.-Äste $\pm$ schmal. Frkn. meist kahl.

○ • Bl.-Becher o. Frkn. und Fr. beh., B. vgl. Fig. 7 q—r o. wie unter *.

• Frkn. und Fr. beh., B. aus herzfg. Grunde breit eirundlich (*heterophylla* ähnlich, doch an Bl.-Zw. größer).

^{*)} Im Expl. im Herb. Berlin als *suaveolens*, leg. BRETSCHNEIDER (Fl. Pecinensis).

16. *P. lasiocarpa*: ♀, Höhe ?, Borke ?, junge Zw. dicht filzig, → sehr fein kurz zottig, Kn. → beh.: B. groß, bis 26:17 cm (nach OLIVER bis 33:23 cm!), Randzähne grob, aber zieml. gleichmäßig, vorwärts gebogen, oberseits kahlend, unterseits → beh., bes. am B.-Grund filzig und drüsig, Stiel rund, beh., bis 10—24(?) cm, Neb. schmal-lanzettl., abfällig: Bl. (mir nur Fr. bekannt) mit schmal-langgezogenen an der Spitze → verbreiterten, wenig zerschlitzten, kahlen Trgb., 2 Blst. bis 9:1.5 cm, Bl. gestielt, Stb. 30—40, A. leicht gespitzt, Becher → leicht ausgerandet, Frst. bis 17(—24) cm, Spindel gleich Frkn. graufilzig, Fr. sitzend, 7—8:5—6 mm, stumpfspitzig, 2—3nählig, Becher → lappig, die Fr. nur am Grunde umgebend, N. ?.

P. l. OLIVER, in HOOK. Jc. pl. XX, t. 1943. 1891. — Wollfrüchtige P. — China (Prov. Hupeh), wie es scheint auch Sikkim (Tonghoo). — Sehr interessante Art, die jetzt durch VEITCH (England) zur Verbreitung gelangt.

✱✱ Nur Bl.-Becher beh., B.-Grund breit-keilig o. rundlich, Rand auffällig lappenzähnig, vgl. Fig. 7 q—r.

17. *P. grandidentata*: ♀, bis 20:0.70 m. Rinde glatt, graugrün, nur am Grunde alter St. korkig: Zw. jung filzig beh., → meist kahl, glänzend braunrot, → graubraun, B. jung nebst Stielen und Neb. wie Zw. beh., bald kahlend o. an Lohden wie bei *tremula* → beh. bleibend, oben dunkler, unten grau- o. hellgrün, 6—11:4—9 o. an Lohd. bis 20:17 cm o. mehr, Stiele → zusammengedrückt*) 2—7.5, an größt. B. meist nicht über 5 cm, Drüsen am B.-Grund meist vorh.; Bl. vgl. Fig. 3 e—g, ♂ Bl. wie meist bei den *Populus* früher als → erscheinend, bis 9:1.2 cm, Frst. länger, lockerer, Stb. 6—12, Kapseln zweiklappig, etwa 5 mm lang, kahl, aber → papillös runzelig.

P. g. MCHX., Fl. bor. am. II, 243. 1803. — Großzahnige P.; large-toothed aspen; p. à grandes dents. — N.-Am. (Neuschottl. bis Ontario, Minnesota, südl. bis New Jersey und in den Alleghanies bis N.-Carol., Tennessee). — Liebt nährhaften, etwas feuchten Sandboden — Blz. III—IV. — Harter schöner Zier-♀

○○ Frkn., Fr. o. Bl.-Becher kahl.

✱ B.-Stiele (ausgen. an Lohden) meist deutl. flach o. wenn rundlich, so Drüsen am B.-Grund deutl., Kn. → glänzend, zuw. → klebrig.

✱✱ siehe S. 20.

✱ Drüsen am B.-Grund stets deutl., Stiele meist → gerundet und beh., B. fein und gleichmäßig gesägt, ± eirundlich.

18. *P. sieboldii*: ♀, bis 18:0.7 m, Zw. jung beh., ⊙ ± kahl, schwach kantig, olivgrün o. bräunlich, Lent. als feine gelbliche Punkte wenig hervortretend, Kn. → anliegend, etwa 5—8:3—4 mm, → zweifarben, meist nur an Spitze weißl. beh., Sch. 2—3—4), leicht glänzend, gewimpert, B.-N. senkrecht: B. vgl. Fig. 7 h—l, jung beiders., später wenigstens unten noch → wirr (vgl. *var.* grau beh., an alt. ♀ ganz kahlend, 4—8:2.5—8—8.5, an Lohd. bis 12:12 cm, Stiel 1—4 cm: Bl. vgl. Fig. 3 h—i, Blst. analog *tremula*, aber Trgb. meist stärker zottig (bes. →), A. nach MIQUEL mit Haarschopf, was ich nicht sah.

var. a. typica: Beh. der B. wirr, kraus, wie bei *tremula typica*. — *b. subsericea*: Beh. analog *tremula villosa*, aber B. in Zahnung und durch die Drüsen, überhaupt im ganzen Charakter von typ. *tremula* deutl. abweichend.

*) Wie bei allen *tremula* nahestehenden Arten sind die Stiele nur an Lohden-B. ± rundlich!

Fig. 7. *Populus*: B.-Formen: a—g¹ *tremula*; a—g B., vgl. Text: g—g² ein B.-Stiel im oberen Teil und im Q. Schnitt; — h—l *sieboldii*: h—k B., l B.-Stiel am B.-Grund mit Drüsen und Stiel-Q.-Schn.; — m—p *tremuloides*; — q—r *grandidentata*; — s *heterophylla* (kleines B.); — t—u *tomentosa* (1/2 nat. Gr.) (Original).

P. s. MIQ., in Ann. Mus. bot. Lugd.-Bat. III, 29. 1867 (*tremula villosa* MAXIM. et al. auct., nec LANG). — Japanische Zitter-P. — Japan. — Meidet Schatten! — Blz. IV. — Gute Art, von *tremula* und Formen stets abweichend.

++ Drüsen am B.-Grund meist fehl. o. B. durchaus kahl und Stiele (ausgen. an Lohd.) stark zusammengedrückt.

△ B. fein und gleichmäßig gesägt.

19. *P. tremuloides*: b ♂, analog *tremula*, bis 30:1 m. Zw. höchstens ganz jung verstr. beh., ♂ dunkelrotbraun, Lent. wenig auffällig, ♀ graubraun, Kn. spitz-kegelig, etwa 7—9:3 mm, leicht absteehend o. an den kantigen Lohd. anliegend, kahl, ♂ fein klebrig, Sch. rot- o. gelbbraun, gewimpert, 4—6, Bl.-Kn. kürzer und mehr eikugelig: B. vgl. Fig. 7 m—p, auch jung nur gewimpert, zuletzt dünn lederighäutig, unten gelblich o. leicht bläulichgrün, 3—6, bez. 8—16 cm lang und breit (zuw. sehr klein bis 3:2.5), an Stocktrieben wie Fig. 7 p, (*tremula*-ähnlich), Stiele bis 9 cm, am B.-Grunde hfg. 2 Drüsen: Bl. vgl. Fig. 3 a—d, ♂ Blst. bis 7:1.5 cm, Stb. 6—15; ♀ Blst. etwa 5:1, zur Frz. bis 11 cm.

P. t. MCHX., Fl. bor. am. II, 243. 1803 (? *atheniensis* LUDW., Neue wilde Baumz. 35. 1753; *trépida* WILLD., in L. Sp. pl. ed. 4, II, 803. 1805; *gracca* LARCHE, Dendr. ed. II, 316. 1883, ob ART.?). — Amerikanische Espe; american aspen or quaking asp; p. faux-tremble. — N.-Am. von Neu-Schottl. bis Hudsonbai und Alaska, südl. bis New Jersey, Kentucky, Nebraska und in den Rocky Mts. bis Mexiko und S.-Kalif. — Standorte analog *tremula*. Blz. III—IV(—V). Seit etwa 1812 in Kultur, auch eine Hängeform (*var. pendula*) vorh.

△△ B. ± grob und ausgeschweift kerbsäggig.

20. *P. tremula*: hfg. b o. mittelhoher ♂, zuw. bis über 30:1 m; St. anfangs glatt gelbgrau berindet, später ♂ schwarzgrau korkig, Zw. jung ♂ beh. o. stets kahl (vgl. *var.*), ♂ glänzend gelbbraun, rundlich, Lent. meist erst am ♂ oliv- o. schwärzl.-grauen Holze deutl.; Kn. etwa 6—7:3—4 mm, etwas stumpfer als bei *tremuloides*, braun, zuw. ± klebrig, an Spitze meist ♂ fein beh., Sch. meist 4, gewimpert, Bl.-Kn. eikugelig: B. vgl. Fig. 7 a—g¹, 3—7:3—8 cm, Stiel 3—6 cm, o. an üppigen Trieben bis 14(—19:12—13.5 cm, Stiel bis 8 cm, an Lohden gleich den Zw. beh., Form vgl. Fig. 7 g. Drüsen am Grunde selten vorh.; Bl. vgl. Fig. 8 a—f, ♂ Blst. bis 11:2 cm, Stb. 4—12; Frst. bis 12 cm.

var. a. typica KOEHNE, Dendrol. 80. 1893. Zw und B. nie seidig beh. — hierher: *f. pubescens* [A. BR. in Herb. (*var. villosa* KOEHNE, l. c., non LANG)], sie tritt an üppigen Lgtr. und Stockausschlägen regelmäßig auf und zeigt krause wirre Beh.; *f. viridifolia* [DIPPEL, Laubh. II, 196. 1892], B. beiders. ♂ gleichfarben, im Herb. ZABEL sah ich Expl., die Herr ZABEL im Willroder Wald bei Erfurt gesammelt, sie zeigen an Lohdentrieben B. bis 13:9.5 cm, die aus tief herztg. Grunde eifg. in eine ♂ deutl. vorgezogene Spitze auslaufen, *f. macrophylla* [A. BR. in Herb.], vgl. Fig. 7 t, sehr zierlich; *t. freyni* [HERV. in Rev. gén. bot. VIII, 177. 1899], B. wie Fig. 7 d — b, *villosa* LANG, in RECHB. Fl. germ. excurs. 173. 1830 (*var. typica f. sericea* KOEHNE, l. c.), junge Zw. u. B. ♂ dicht glänzend seidig beh. — c. *var. pendula* PEYZ. et KIRCH., Arb. Musc. 396. 1894, Zw. ♂ hängend.

P. t. L., Sp. pl. 1043. 1753 *australis* TENORE, Ind. sem. hort. Neap. 1830. 15; *gracca* GRISB., Spic. fl. Rum. II, 345. 1844). Zitter-P., Espe, Aspe; european

*) LANGS *villosa* bezieht sich zweifellos auf die markante seidig behaarte Form, nicht auf die eine gute Form nicht repräsentierende Beh. von Lohden etc. KOEHNE'S Auffassung ist irrtümlich, weshalb sein an sich treffender Name *sericea* nicht beibehalten werden kann. Ubrigens ist *var. villosa* meist gut markiert und durchaus nicht in beliebigen Übergängen mit der typischen kahlen Form verbunden.

+ B.-Basis + übereinandergreifend herzförmig, bis breitkeilig. Spitze stumpf, Stiele meist über $\frac{1}{2}$ so lang, vgl. Fig. 7 s.

21. *P. heterophylla*: unregelm. verzweigter B., bis etwa 25:1 m. Borke zieml. zeitig auftretend!, Zw. kräftig, stumpfkantig, jung + filzig beh., (•) fast (o. ganz) kahl, oliv- o. rotbraun, mit strichförmig., gelbbraunen Lent., Kn. kurz kegelförmig., glänzend rotbraun und an Spitze beh., Sch. gewimpert, an den aufrechten kleineren [etwa 7:4.5 mm] Seit.-Kn. meist nur 2, B.-N. groß, senkrecht; B. jung beiders., unten dichter graufilzig, meist nur an Lohden + bleibend beh., 7—15(—21):6.5—11(—18). Stiel 4—10 cm; Bl. vgl. Fig. 3 k—m, ♂ Blst. dicht, bis etwa 6:1.5 cm, + 5—30-blütig, locker. Bl.-Stiele so lang wie Frkn., zur Frz. bis fast 2 cm, Fr. 2—3-klappig.

P. h. L., Sp. pl. 1034. 1753 (*cordifolia* BURGSD., Anleit. Anpfl. II, 177. 1787). Herzblättrige P.; swamp or downy p.; p. hétérophylle. Ver.-St. (S.-Connect. und New Jersey bis Georgia, westl. bis Louisiana, nördl. im Mississippi-tale bis Arkans., Indiana). Liebt sumpfige Orte, wie *Acer rubrum*. Blz. III—IV(—V). Seit 1765 in Kultur. Schöne, aber ziemlich empfindliche Art.

+ — B.-Basis selten stark herzförmig, B. + spitz, z. T. handlappig. B. nie wirklich handlappig, vgl. Fig. 7 t—u, an alten Pfl. in Zähnung an *tremula* gemahnend.

22. *P. tomentosa**): wohl hoher B., junge Pfl. sehr wüchsig. Zw. jung dicht weißl. filzig, zuw. + gerötet, (•) rundlich, glänzend olivgrün o. bräunlich, + beh. o. an alten Pfl. kahl, (•) grau. Kn. an Lgtr. etwa 6—8:5 mm, wie bei *alba* beh., + anliegend, 2—4 Sch., o. kahl, braunrot, + glänzend, nur Sch. gewimpert, Bl.-Kn. etwa 12:7 mm, 4—5 Sch., fast kahl, B.-N. senkrecht, Kissen schwach; B. jung oben +, unten wie Zw. dicht filzig, dieser Filz bleibt an jungen Pfl. + bis Herbst, an alten kahlen die B. oben fast ganz, unten + stark. Form im Mittel wie Fig. 7 t, welche ein großes B. darstellt. Zähnung hfg. sehr unregelmäßig, hie und da + breit groblappig; B. alter B. (u) im Mittel 7:6 cm, Zähnung stark an *tremula* gemahnend, an Johannistrichen B. zuw. breiter als lang, + tief herzförmig, Zähnung sehr grob kurz-lappig, bis 12:14 o. 17:12 cm, Stiel 3—6 cm; B. oben sattgrün mit bronzefarbenem Ton; ♀ Bl. (♂ noch?) vgl. Fig. 5 f—g², Blst. dichter und dicker als bei *tremula*, zur Frz. ? —

P. tomentosa CARR., in Rev. Hort. 1867. 340 (*alba* f. *denudata* MAXIM., Fragni. 1879. 49, non HARTIG; *pekinensis* L. HENRY, in Rev. hort. LXXV, 355. 1903). — Chinesische Weiß-P. (China (bei Peking und N.-Shensi). — Blz. III. Interessante, noch zu erprobende und klarzustellende Art.

△△ B. an Lgtr. ± handlappig, vgl. Fig. 6 a—d.

23. *P. alba*: B.—B., bis über 30:1 m. Berindung weißgrau. Borke nur am Grunde alter St., Krone breit rundlich; junge Zw. meist dicht weißgraufilzig, (•) unter der sich + ablösenden Beh. glänzend oliv-

*) Diese Art bedarf noch recht der Untersuchung. In Kultur sind mir nur üppige junge Pfl. bekannt, die trotz aller Abweichungen in den B. kaum zwei verschiedene Arten (*tomentosa* und *pekinensis*) darstellen. An üppigen Lgtr. wechselt eben bei *Populus* die B.-Form sehr, aber zu *alba* selbst darf man *tomentosa* nicht ziehen. Ich fand nur im Herb. Berlin ein ♀ Expl. [leg. GIRALDI, No. 1155, März] und ein Expl. mit Sommer-B. [leg. GIRALDI, No. 5352, August] aus Zentr.-China (N.-Shensi bei Tunjan-fan), die beide zusammenzugehören scheinen und in *P. tomentosa* darstellen. Nach ihnen gebe ich die Beschreibung, sowie nach jungen Trieben aus Hort. SIMON-LORTS, dessen Pfl. von CARRIÈRE bez. HENRY stammen.

braun o. grau, rundlich, Kn. vgl. Fig. 9 a—f. wie Zw. beh., aber auch zuw. fast kahl, nur Sch. gewimpert; B. jung oben flaumig, später kahl, $\pm$ glänzend grün, unten gleich Stiel weißfilzig, in der rundlichen Form älterer Pfl. 4–8:3–5 cm, Stiel 2–3 cm, an Lgtr. buchtig-ge-lappt, 6–10(–17):5–9(–15) cm, Stiel 5–9 cm, vgl. auch *var.*: Bl. wie Fig. 8 s–x, N. gelb.

Fig. 9. *Populus*: a—f *alba*: a $\odot$ Zw., b—d Kn., e Krztr. mit Bl.-Kn. (a), f Teil eines Q.-Schn. eines σ , Zw. (1–6 vgl. Fig. 2g, S. 6); g m *deltoides* (*canadensis*); g h σ Lgtr. im oberen und unteren Teile, i k B.-N., l wie f, m $\odot$ Zw. mit Bl.-Kn. (Original nach C. K. SCHNEIDER).

var. a. genuina WESM., in DC. Prodr. XVI, 2, 324. 1868, erweitert: Wuchs nie ausgesprochen pyramidal, hierher: *f. nigra* (P. n. Willd., Berl. Baumz. 227. 1796; *argentea* und *argentea vera* HORT.) stellt eigentlich nur jüngere Pfl. dar, deren gelappte B. unten dick weiß überzogen bleiben, sich wie weiches Leder anführend, Stiele ringsum beh., in den Gärten auch als *acerifolia*, *arenbergiana*, *salomonii* und besonders üppige als *macrophylla*; *f. globosa* [DIPP. l. c.], eine mir noch etwas fragliche Form, soll im HORT. SPATH entstanden sein und durch rundliche Krone, sowie eigenartig grau-rosafarbene, weiß angehauchte Belaubung der jungen Zw.-Spitzen sich auszeichnen. *var. b. creatica* WESM., l. c. 1868 (*P. creatica* W. et K., ex BESSER in Flora XV, 2, Beibl. 14. 1832; *P. holleana* MAST., in Gard. Chr. 1882. II, 96; *alba holleana* WESM., in Bull. Soc. Bot. Belg. XXVI, 373. 1887; *alba pyramidalis* DIPP., Laubh. II, 191. 1892). Wuchs deutl. pyramidal, Gegenstück zu *nigra italica*; B. meist wie bei *f. nigra*, σ Bl. nach dem mir vorlieg. Material mit 3–5 Stb. *var. c. pendula* DIPP., Laubholz. II, 191. 1892, Zw. wenigstens im Alter $\pm$ stark überhängend.

P. alba L., Sp. pl. 1463. 1753. Silber o. Weiß-P., white or silver-leaf poplar; p. blanc. I. G. überall verbr., aber wild (nach WILLKOMM), in D. wohl nur längs der Donau und auf der badisch-elsässischen Rheinfläche, überhaupt in der oberrheinischen, süddeutschen Zone, in ÖU. im Donaugebiet, der Alpen- und Karpathenzone, sowie in der adriatischen, in Sch. wohl nur verwildert und kultiviert, sonst noch durch ganz S.-Eur. Or. bis Kauk., W. Zentral-As.). Liebt humöse

(1) In N.-Afr. bis Teneriffa, auch schon in Span., tritt sie in der charakteristischen *var. subintegerrima* LGE., in WILLK. et LGE. Prodr. Fl. Hisp. I, 233. 1861 auf, deren

tiefgründige Böden, bes. Flußauen, auf magerem trockenem Lande nur krüppelhalt. — Blz. III—IV. — B.-Ausbruch zwischen 10. IV. und 28. V. — Frz. V—VI. — Alter 3—400 Jahre. — S. keimt in 8—10 Tagen. — *P. alba* ist nicht nur als Zier-^h von Bedeutung, auch forstlich z. B. in Überschwemmungsgebieten, wo wertvolle Nutzhölzer nicht gut gedeihen, als Massenerzeugerin wertvoll. Holz leicht zu bearbeiten und zu leimen, doch wenig zäh und fest. Spez. Gew., lufttrocken, etwa 0,48.

20×23 *P. tremula* × *alba*; *P. canescens* SM., Fl. brit. III, 1080. 1805. (*hybrida* M. B., Fl. taur.-cauc. II, 422. 1808; *bachofeni* WIERZB., in REHB. Ic. Fl. Germ. XI, 29. 1849; *denudata* A. BR., in HART., Lehrb. forstl. Pflk. 434. 1850; *steiniana* BORNM., in Gartfl. XXXVII, 173. 1888). Diese in ihren Merkmalen so schwankende Hybride, deren B. an alten ^h etwa 6 8:5 6,5 cm messen, ist im Hauptgebiet der *alba* nicht eben selten; sie scheint stellenweise „als Art“ aufzutreten*) und wird meines Erachtens mit Unrecht in mehrere Formen gespalten. Nach RECHINGER**) treten an derselben *canescens* alle *alba*- und *tremula*-B.-Formen auf, ja oft solche, die an *euphratica* gemahnen. Was als *hybrida* in den Herbaren liegt, sind gewöhnlich sterile Lgtr. mit B. wie Fig. 6 e—i; Analoges hat BORNMÜLLER l. c. auch als *steiniana* beschrieben und sehr mit Unrecht als *nigra* × *alba* gedeutet. Ein solcher Bastard existiert nicht! Er wäre durch die obs. Sp. der *nigra* leicht nachzuweisen.

Fig. 10. *Populus alba*: beginnende Borkebildung am Grunde eines 0,60 m starken Stammes. (Original nach C. K. SCHNEIDER.)

Gattung 2: *Salix**) L., Sp. pl. 1015. 1753. [Weide; willow; saule.]

Vgl. Fam. S. 2; Zwerg-^b — ^h, selten ^h. Krztr. fehl.: Kn. 1-schuppig (vgl. Fig. 18c,g). End-Kn. fehl. B. sehr selten gegst., vorwiegend mehr-

B. an älteren Pfl. fast ganzrandig und oft wintergrün sind. Die gleiche Form ist in Mexiko beobachtet, wohl aber nur angepflanzt, denn sonst kommt keine *Populus* der Alten Welt auch in der Neuen spontan vor. Das Gegenstück dieser zu *alba* ist *P. monticola* BRANDEGEE, in Zoö 1890. 274, in S.-Kalf. Da dieser Name von MERTENS (siehe LOUD., Arb. III. 1045 1844) bereits einer anderen *Populus* beigelegt, nenne ich sie *brandegeei*.

*) Vgl. POSPICHAL, Flor. oestr. Küstenland I, 336. 1897.

**) Dr. KARL RECHINGER, Über den Polymorphismus der Laubblätter bei *Pop. canescens* SM., in Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 284. 1899. Ich habe mit Herrn Dr. RECHINGER, dem ich für viele Hinweise zu großem Dank verpflichtet bin, mehrmals über *P. canescens* gesprochen und das, was dieser treffliche Beobachter angibt, völlig bestätigt gefunden. Freibe, wie die von KOEHNE (Dendrol. 79 1893) bei *bachofeni* genannten, lassen sich bei jeder *canescens* nachweisen.

***) Spez.-Literatur: W. D. J. KOCH, Commentatio de Sal. europ. 1828. — A. KERNER, Niederostr. Weiden, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien X, 1860. — F. WIMMER, Salices europaeae 1866. — ANDERSSON, in DC., Prodr. XVI, 2. 1868. — W. ROWLEE, North American Willows, in Bull. Torr. Bot. Club. XXVII. 1900. — O. V. SEEMEN, Salices japonicae 1903. — R. WOHLFARTH, in W. D. J. KOCHS Syn. ed. III, 2298 1903. Ferner KOEHNE, auch in Mitt.-deutsch. Dendrol. Ges. VIII 1899; sowie H. d. D. D. G. — Herr V. SEEMEN in Berlin, einer unserer besten lebenden

mals länger als breit, Stiele 0.2—1.8 cm, Neb. hfg. bleibend; Blst. vor o. mit B.-Ausbruch, Bl. mit 1—2(—6) Drüsen, selten mit zerschlitztem Diskus (z. B. Fig. 20s¹). Trgb. ganzrandig, sehr selten fein gezähnt; ♂: Stb. 1—2—8(—12), Stb. frei o. — bis ganz verwachsen; ♀: Gyn. (2), Kapsel 2-klappig (Fig. 11 l¹).

Tabelle zur Bestimmung der Arten zur Blz.

- 1a. ♂ Blst. 2.
- 1b. ♀ Blst. 35.
- 2a. Bl. mit einer vorderen und einer hinteren Drüse o. zuw. mit mehreren Drüsen o. einem $\pm$ zerschlitztem Diskus 3.
- 2b. Bl. mit nur einer (hinteren) Drüse 13.
- 3a. Stbf. mehr als zwei 4.
- 3b. Stbf. 1—2. 7.
- 4a. Bl.-Trgb. an Spitze gezähnt: 1. *lasiandra* (Fig. 11c).
- 4b. Bl.-Trgb. ganzrandig, Spitze höchstens ausgerandet 5.
- 5a. Stb. 3(—2): 4. *amygdalina* (Fig. 17p).
- 5b. Stb. (3—)4—12. 6.
- 6a. B.-Stiele drüsenlos: 5. *nigra* (Fig. 11a).
- 6b. B.-Stiele mit Drüsen: 2. *lucida* (Fig. 11e—g) o. 3. *pentandra* (Fig. 13).
- 7a (3b). Bl.-Trgb. 2-farbig (Spitze dunkel, Grund hell): 17. *glauca* (Fig. 21e).
- 7b. Bl.-Trgb. 1-farbig, meist grün, selten dunkel 8.
- 8a. Blst. vielblütig, 2 oder mehr cm lang, meist zu mehreren übereinander an üppigen Lgtr. 9.
- 8b. Blst. meist wenigblütig, höchstens 2 cm lang, zu 1—3(—5) an kurzen seidl. Trieben, Zwerg-b. 10.
- 9a. Blst. auf langen beblätterten Stielen, diese etwa $\frac{1}{2}$ Blst.: 6. *fluvialis* (Fig. 11h) o. 7. *argyrophylla*.
- 9b. Blst. nur kurz gestielt: 8. *fragilis* (Fig. 14u) o. 9. *alba* (Fig. 11q) o. 10. *babylonica* (Fig. 11n).
- 10a. Stbf. am Grunde beh.: 15. *reticulata* (Fig. 14g).
- 10b. Stbf. kahl 11.
- 11a. Bl.-Trgb. beiders. zottig, meist zerschlitzter Diskus vorh.: 16. *vestita* (Fig. 19l) o. 19. *arctica* (Fig. 19n).
- 11b. Bl.-Trgb. nur — gewimpert o. verstr. beh. bis fast kahl, meist nur 2 Drüsen vorh. 12.
- 12a. Drüsen verschieden groß: 12. *retusa* (Fig. 14d¹).
- 12b. Drüsen gleich groß: 11. *serpyllifolia* (Fig. 19q) o. 13. *herbacea* (Fig. 19r¹—r²).
- 13a (2b). Stb. 1 (nicht zu verwechseln mit 2 verwachsenen Stbf., wo deutlich zwei A. zu erkennen): 62. *sitchensis* (Fig. 19u¹).
- 13b. Stb. 2, Stbf. frei o. $\pm$ bis ganz verwachsen 14.
- 14a. Stbf. ganz verwachsen 15.
- 14b. Stbf. frei o. nur $\pm$ bis $\frac{3}{4}$ verwachsen 17.
- 15a. Stbf. kahl: 55. *gracilistyla* (Fig. 27k) o. 60. *angustifolia* (Fig. 20x).
- 15b. Stbf. im unteren Teile beh. 16.
- 16a. Bl.-Trgb. an Spitze deutl. schwärzlich: 59. *caesia* (Fig. 21y) o. 61. *purpurea* (Fig. 20v¹).
- 16b. Bl.-Trgb. fast ganz hell: 56. *pierotii* (Fig. 27m).
- 17a (14b). Bl.-Trgb. immer o. meist 1-farbig: 18. *pyrenaica* (Fig. 21k).
- 17b. Bl.-Trgb. stets 2-farbig (Grund hell, Spitze dunkel) 18.
- 18a. Stbf. regelmäßig**) $\pm$ verwachsen 19.
- 18b. Stbf. frei 20.
- 19a. ☉ Zw. kahl o. nur sehr locker beh., Stbf. kahl: 30. *cordata* (Fig. 11s). — Stbf. beh.: 59. *caesia* (Fig. 21y).
- 19b. ☉ Zw. dicht filzig: 42. *medema* (Fig. 20f) o. 57. *incana* (Fig. 21r).
- 20a. Stbf. im unteren Teile $\pm$ beh. 21.

Weidenkenner und seit Jahren mit einer *Salix*-Monographie beschäftigt, hatte die Güte, mein Manuskript fluchtig durchzusehen und mir manchen wertvollen Fingerzeig zu geben, wofür ich ihm zu Danke verpflichtet bin.

*) Vgl. eventuell auch *polaris* o. *arctica* S. 39 und 41.

**) Hier und da finden sich auch unter Bl. mit stets freien Stbf. einige mit $\pm$ verwachsenen. Jedenfalls hat KOEHNE recht, wenn er sagt, daß normal die Verwachsung der Stbf. häufiger auftritt, als man bisher annahm.

- 20b. Stbf. kahl 24.
 21a. Blst. sehr dünn, 12—20:1 etwa: 31. *japonica* (Fig. 20z).
 21b. Blst. höchstens 6—8:1 etwa: 22.
 22a. Blst. mit nur 1—3 kleinen Sch.-B.chen am Grunde: 44. *silesiaca* o. 45. *grandifolia* (Fig. 24e).
 22b. Blst. mit 3—9 Sch.-B.chen am Stiel 23.
 23a. ☉ Zw. kahl o. fast kahl: 34. *glabra* (Fig. 24o) o. 38. *melchhoferi* (Fig. 20d) o. 48. *aurita* (Fig. 27h) o. 49. *livida* (Fig. 24c).
 23b. ☉ Zw. — bis dicht feinfilzig: 37. *nigricans* (Fig. 24h) o. 43. *cinerea* (Fig. 24a).
 24a (20b). Zw. bereift: 22. *daphnoides* (Fig. 20h) o. 23. *acutifolia*.
 24b. Zw. nicht bereift 25.
 25a. Blst. sehr klein, zu 1—3 an kurzen Zweigchen, winziger Zwerg-*b*: 14. *polaris* (Fig. 27e).
 25b. Blst. kräftiger, meist zu mehr als 4 übereinander an üppigen Lgtr., wenn zu 2—3, dann groß, goldig-zottig 26.
 26a. Blst. kurz, kugelig, kaum über 1,5 cm lang. 50. *myrtilloides* (Fig. 21s) o. 54. *repens* (Fig. 20t²).
 26b. Blst. (1,5—)2— mehr cm lang, gestreckt 27.
 27a. Blst. vor den B. erscheinend, sitzend, am Grunde höchstens einige kleine Sch.-B.chen 28.
 27b. Blst. mit o. nach B.-Ausbruch, am Grunde meist mit 1 deutl. (Stiel-)B.chen 30.
 28a. Blst. dicht goldig-zottig, zu 2—3(—4) am Zw.-Ende gedrängt: 27. *lanata* (Fig. 21a).
 28b. Blst. nicht goldig-schimmernd, zu mehr als 3 übereinander 29.
 29a. Blst. sitzend, ohne Sch.-B.chen: vgl. Sekt. 12 *Viminalis* S. 45.
 29b. Blst. am Grunde mit 1—2 bis mehreren Sch.-B.chen: vgl. Sekt. 20. *Capreae* 42—49 und 37. *nigricans* und 38a. *discolor*.
 30a. (27b) Blst. — sitzend, am Grunde höchstens 2—3 kleine Sch.-B.chen 31.
 30b. Blst. — gestielt, am Grunde mit einigen deutl. B.chen 32.
 31a. ☉ Zw. — deutlich beh.: 51. *tristis* (Fig. 11y) o. 52. *sericea* (Fig. 21m).
 31b. ☉ Zw. kahl o. sehr wenig beh.: 32. *pyrolaeifolia* (Fig. 20z¹) o. 41. *balsamifera* (Fig. 20a).
 32a. ☉ Zw. kahl 33.
 32b. ☉ Zw. — bis stark beh. 34.
 33a. Drüse meist wenig länger als breit. 33. *hastata* (Fig. 24n) o. 39. *bicolor* (Fig. 24l).
 33b. Drüse meist schmallänglich, bis 4:1 etwa: 20. *myrsinites* (Fig. 21v) o. 28. *lapponum* (Fig. 21c) o. 30. *cordata* (Fig. 11s) o. 40. *arbuscula* (Fig. 24t).
 34a. Blst. höchstens 2,5 cm lang: 26. *candida* (Fig. 20) o. 29. *helvetica* (Fig. 21).
 34b. Blst. bis 5 cm lang: 26a. *hookeriana* (Fig. 27n).
 35a. (1b) Bl. mit einer vorderen und einer hinteren Drüse o. einem zerschlitzten Diskus 36.
 35b. Bl. mit nur hinterer Drüse 40.
 36a. Kurzzweigige Zwerg-*b*. Blst. klein*, kaum bis 2,5:0,5 cm 37.
 36b. *b*—*b*, Blst. mindestens 2,5:0,8 cm 38.
 37a. Zw. *+* seidig beh.: 16. *vestita* (Fig. 20s).
 37b. Zw. kahl: 15. *reticulata* (Fig. 14h).
 38a. B. der Blst.-Stiele deutl. fein gezähnt 39.
 38b. B. der Blst.-Stiele fast ganzrandig: 8. *fragilis* (Fig. 14s, v).
 39a. Bl.-Trgb. an Spitze gezähnt: 1. *lasiandra* (Fig. 11d).
 39b. Bl.-Trgb. ganzrandig: 2. *laevis* (Fig. 14a) o. 3. *pentandra* (Fig. 13f—h).
 40a. (35b) Bl.-Trgb. 1-farbig grün 41.
 40b. Bl.-Trgb. am Grunde hell, an Spitze dunkel o. ganz dunkel 49.
 41a. Zwerg-*b*. Blst. klein, lockerblütig, kaum bis 2 cm* lang. — zwischen den B. verborgen: 11. *serpyllifolia* (Fig. 20p) o. 12. *retusa* (Fig. 14d) o. 13. *herbacea* (Fig. 20r).
 41b. *b*—*b*, Blst. 2 o. mehr cm lang 42.
 42a. Gr. so lang o. länger als N. 43.
 42b. Gr. fehl. o. kürzer als N. 44.
 43a. Zw. und B. durchaus o. fast kahl: 34. *glabra* o. 56. *picratis* (Fig. 27l).
 43b. Zw. *+* und B. filzig beh.: 18. *pyrenaica* (Fig. 21l) o. 57. *incana* (Fig. 21p—q).
 44a. Frkn.-Stiel 3—5mal so lang als Drüse: 4. *amygdalina* (Fig. 14o).

*) Vgl. eventuell auch *herbacea* und, wenn Bl.-Trgb. zweifarbig, *glauc*.

*) Vgl., wenn Blst. dicht weißfilzig beh. 29a. *desertorum* (Fig. 27b), bei der das Trgb., wie es scheint, zuw. ganz hell ist.

- 44b. Frkn.-Stiel fehl. o. höchstens 2mal so lang wie Drüse 45.
 45a. Frkn. beh.: 7. *argyrophylla* o. 18. *pyrenaica* (Fig. 21l).
 45b. Frkn. kahl 46.
 46a. Frkn.-Stiel fehl. o. kürzer als Drüse 47.
 46b. Frkn.-Stiel so lang o. doppelt so lang als Drüse 48.
 47a. B. jung dicht seidig beh.: 9. *alba* (Fig. 11o).
 47b. B. nur schwach beh. o. fast kahl: 6. *fluvialis* (Fig. 11k) o. 10. *babylonica* (Fig. 11m).
 48a. Bl.-Trgb. an Spitze gezähnelt: 1. *lasiandra*.
 48b. Bl.-Trgb. ganzrandig: 2. *lucida* (Fig. 14a) o. 5. *nigra* (Fig. 11b).
 49a. (40b) Frkn. kahl 50.
 49b. Frkn. beh. 59.
 50a. Frkn. sitzend o. Stiel höchstens so lang wie Drüse 51.
 50b. Frkn.-Stiel länger als Drüse 52.
 51a. Zw. bereift: vgl. Sekt. 11. *Pruinosae*, S. 44.
 51b. Zw. nicht bereift: 27. *lanata* (Fig. 21b) o. 36. *adenophylla* (Fig. 27a).
 52a. Gr. fehl. o. kürzer als N. 53.
 52b. Gr. so lang o. länger als N. 54.
 53a. Heidelbeer-ähnlicher Zwerg- b. Blst. klein, zieml. gestielt, B. kahl: 50. *myrtilloides* (Fig. 21t—u).
 53b. Langtriebige b. Blst. kurz gestielt, B. jung beh.: 41. *balsamifera* (Fig. 20b) o. 44. *silesiaca* (Fig. 24p).
 54a. Frkn.-Stiel beh.: 38. *milichhoferi* (Fig. 20c).
 54b. Frkn.-Stiel gleich Frkn. kahl 55.
 55a. Blst. schmalzylindrisch, 8—10:1 etwa: 31. *japonica* (Fig. 20z).
 55b. Blst. dicker u. kürzer 56.
 56a. Blst. vor B.-Ausbruch erscheinend: 32. *pyrolaeifolia* (Fig. 20z¹) o. 37. *nigricans* (Fig. 24g).
 56b. Blst. mit den B. erscheinend 57.
 57a. Blst. meist zu 1—3 am Ende der zottig beh. Zw., dichtzottig: 33. *hastata* (Fig. 24m).
 57b. Blst. meist zu mehr als 3 übereinander, Zw. kahl o. kurz beh. 58.
 58a. Zw. kurzhaarig: 26a. *hookeriana* (Fig. 27o) o. 37. *nigricans* (Fig. 24g).
 58b. Zw. kahl: 30. *cordata* (Fig. 11r) o. 35. *barclayi* (Fig. 11t).
 59a. (49b) Frkn.-Stiel fehl. o. höchstens so lang als Drüse 60.
 59b. Frkn.-Stiel $1\frac{1}{2}$ bis mehrmal so lang wie Drüse 67.
 60a. Gr. deutl., mindestens von N.-Länge 61.
 60b. Gr. ganz o. fast fehl. 64.
 61a. Blst. vor B.-Ausbruch erscheinend: vgl. Sekt. 12. *Uminales*, S. 45, o. 55. *gracilistyla* (Fig. 27i).
 61b. Blst. mit den B. erscheinend 62.
 62a. Blst. und B. dicht seidig beh.: 29. *helvetica**).
 62b. Blst. und B. nur $\pm$ beh. 63.
 63a. Drüse wenig länger als Stiel: 21. *chlorophylla* (Fig. 27f).
 63b. Drüse mindestens doppelt so lang wie Stiel: 20. *myrsinoides* (Fig. 21w—x) o. 28. *lapponum* (Fig. 21d).
 64a (60b). N. unmittelbar dem Frkn. aufsitzend 65.
 64b. N. auf kurzem, tief 2-teiligem Gr. 66.
 65a. Frkn. nach oben ... verschmälert, aber doch ohne eigentlichen Gr.: 58. *sibirica* (Fig. 20w¹) o. 60. *angustifolia* (Fig. 20y).
 65b. Frkn. breit stumpf endigend: 59. *caesia* (Fig. 21z) o. 61. *purpurea* (Fig. 20v).
 66a. Drüse (wenigstens z. T.) tief 2—3-teilig, zuw. 2 Drüsen vorh.: 17. *glauca* (Fig. 21f—g) o. 29a. *desertorum* (Fig. 27b).
 66b. Drüse ungeteilt, lang, dünn. 14. *polaris* (Fig. 27) o. 40. *arbuscula* (Fig. 24s).
 67a—59b). Frkn.-Stiel höchstens $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mal so lang wie Drüse 68.
 67b. Frkn.-Stiel (2—)5—6mal so lang wie Drüse 69.
 68a. B. starkfilzig o. seidig beh. 19. *arctica* (Fig. 20o) o. 26. *candida* (Fig. 20l) o. 26a. *hookeriana* (Fig. 27o) o. 62. *sitchensis* (Fig. 20u).
 68b. B. nur locker beh. o. kahl: 37. *nigricans* (Fig. 24g) o. 39. *bicolor* (Fig. 24k).
 69a. Blst. sehr klein, höchstens 2:1, etwa: 51. *tristis* (Fig. 11x) o. 54. *repens* (Fig. 20t¹).
 69b. Blst. mindestens 3:1 etwa 70.

*) Vgl. eventuell auch *sitchensis*, von der ich ♀ Bl. nicht sah. Nach KOEHNE ist ihr Frkn.-Stiel nur etwa $\frac{2}{3}$ so lang wie Drüse, nach SARGENT, wie Fig. 20u zeigt, doppelt so lang. — Vgl. ferner eventuell auch *candida* (Fig. 20l) und *desertorum* (Fig. 27b).

- 70a. ⊙ Zw. dicht kurz filzig 71.
 70b. ⊙ Zw. nur $\pm$ (Lupe!) beh. o. kahl 72.
 71a. B. unten dicht schimmernd seidig beh., Blst. kaum 2 cm lang: 26a. *hookeriana* (Fig. 27o) o. 52. *sericea* (Fig. 21m¹).
 71b. B. nicht schimmernd beh., Blst. über 2 cm lang: 42. *medemii* (Fig. 20f) o. 43. *cinerea* (Fig. 24a¹).
 72a. ⊙ Zw. durchaus kahl 73.
 72b. ⊙ Zw. $\pm$ fein beh. 74.
 73a. N. lang und dünn: 38a. *discolor* (Fig. 11u).
 73b. N. kurz und dicklich: 49. *livida* (Fig. 24b) o. 53. *petiolaris* (Fig. 27c).
 74a. N. zusammenneigend: 46. *caprea* (Fig. 11v¹).
 74b. N. auseinander spreizend: 45. *grandifolia* (Fig. 24d) o. 47. *bebbiana* (Fig. 11w) o. 48. *aurita* (Fig. 27g).

A. *Didymadeniaceae* v. SEEM., Sal. jap. 11. 1903. inkl. dessen *Hetera*-B. siehe S. 42. *deniae*. (*Chloriteae* A. KERNER, in Verh. z. b. Ges. Wien X. 43. 1860. inkl. *Chamitea*; *Pleandrac* ANDERSS., Monogr. Salic. 1865, sowie dessen *Diandrac* ex parte, 1 Bl. stets mit einer vorderen und einer hinteren Drüse, seltener 3–6 Drüsen o. zerschlitzter Diskus

Fig. 11. *Salix*: a–b *nigra*: a ♂ Bl. (α = hintere, β = vordere Drüse), b ♀ Bl.; — c–d *lasianдра*: wie a–b; — e–g *lucida*: ♂ Bl. (vgl. ♀ Fig. 14a); — h–l' *fluviatilis* (*longifolia*): h ♂ Bl. (α u. β wie oben), h' Trgb.: junge ♀ Bl. mit abnorm langem Trgb., k typische ♀ Bl., l, l' Fr., — m–n *babylonica*: m ♀ Bl., m' deren Drüse von vorn, n ♂ Bl. (♂); — o–q *alba*: o ♀ Bl. (♂), p Fr., q ♂ Bl. (Stbf. unten beh.); — r–s *cordata*: r–r' ♀, s ♂ Bl. (Stbf. $\frac{1}{4}$ – $\frac{3}{4}$ verwachsen!); — t *barclayi*: ♀ Bl.; — u–u' *discolor*: u ♀, u' ♂ Bl.; — v–v' *caprea*: v ♂, v'–v'' ♀ Bl.; — w–w' *bebbiana* (*rostrata*): w ♀, w' ♂ B., w'' N. (♂); — x–y *tristis* (*mühlenbergiana*): x ♀, y ♂ Bl. (n. v. nach v. SEEMEN, sonst Original)

vorh., nur bei *pyrcnaica* zuw. nur 1 Drüse. Trgb. meist einfarbig, grün o. $\perp$ bräunlich, nur bei *glauca* und hfg. *pyrcnaica* deutlich zweifarbig.

II. siehe S. 32.

I. *Pleonandrac* v. SEEM., Sal. jap. 12. 1903. - $\perp$ Bl. mit mehr als 2 Stb.

b. siehe S. 30.

a. σ und φ Bl. mit je 2 Drüsen.

Fig. 12 *Salix*-B.: a *nigra*; — b—b' *amygdalina* (*triandra*) und c var. *villarsiana*; — d—e *angustifolia*; e var. *microstachya*; — f—f' *pentandra*; — g *mollissima*; h *hexandra*; — i *meyeriana*; — k—k' *lucida*; — l *argyrophylla*; — m—m' *fluvialis* (*longifolia*); — n *candida*; — o *viminalis*; — p—q *incana*; q var. *lavandulifolia*; — r *petiolaris*; — s *bebbiana* (*rostrata*); — t *barclayi*; — u *tristis* (*mühlenbergiana*) (alle B. v. n. Gr.) (Original).

Sekt. 1. *Pentandrae* v. SEEM., l. c. 15. 1903. — ♀—♀; B. groß, lanzettlich bis oval, spitz, drüsig gesägt, glänzend grün; B.-Stiel drüsig; Blst. mit B. erscheinend, gestielt; Trgb. einfarbig; ♂ Bl.: Stb. meist 5, frei; ♀: Frkn. kahl, Stiel etwa = hinterer Drüse, Gr. fast fehl.

○ Bl.-Trgb. an Spitze gezähnel. B. allmählich lang fein spitzig (Fig. 15c) obers. Sp. sehr ∞.

1. *S. lasiandra**): (♂—)♀, bis 20:0,9 m; Zw. gelb- o. rotbraun, nur jung beh., Kn. zweifarben, kahl; B. (Fig. 15c), aus stumpfem Grunde längl.-lanzettlich, sehr lang spitzig, bald kahl, oben sattgrün, unten zuw. bläul.-weiß überlaufen; Neb. klein, nur an Lohden bleibend; B.-Stiel 0,8—1 cm, Drüsen oft sehr klein; B. der Blst. fein gesägt, Bl. (Fig. 11c—d) ♂: Blst. 3—5:1 cm, Stb. 5—9:1; ♀: Blst. schwächer, Frkn.-Stiel bis 2mal so lang wie Drüse.

Var. a. *lyalli* SARG., in Gard. a. For. VIII, 463. 1895 (*speciosa* NUTT., Sylv. I, 58. 1842, non HOOK. et ARN.; *lancifolia* ANDERSS., in Svensk. Vet. Ak. Handl., ser. 4, VI, 34. 1865, non DOELL). B. bis 18:3,5 cm, Grund mehr gerundet, Unterseite weißlich, B.-Stiel-Drüsen größer, Frkn.-Stiel bis 3mal Drüse. — b. *caudata* SUDW., in Bull. Torr. Bot. Club XX, 43. 1893. B. schmaler und dicklicher, Spitze ± sichelfg., ♂ Blst. kürzer und dichter.

S. l. BENTH., Pl. Hartw. 335. 1857. — O.-N.-Am. (Calif. [westl. der Sierra Nevada], W.-Oregon, Washington bis S.-Brit.-Col.; var. *caudata* N.-Montana, Color. bis N.-Neumexiko). — Ufergelände. — Blz. V. — Empfindlicher als *nigra*.

○○ Bl.-Trgb ganzrandig, B. ± plötzlich kurz o. lang gespitzt, obs. Sp. verstr. o. fehl.

* B.-Spitze lang und fein (Fig. 12k), obs. Sp. verstr.

2. *S. lucida*: ♀—♀, 3—8 m; St. zuletzt dünn borkig, Zw. etwas brüchig, stets kahl, wie *pentandra*, dgl. B. in Textur und Färbung, Form vgl. Fig. 12k; 8—15:2,5—6 cm; Stiel 1—1,5 cm, jung zuw. ± beh.; Neb. rundl.-herzfg., drüsig gesägt, oft bleibend; Bl. vgl. Fig. 11e—g und 14a—b; ♂: Blst. etwa 3:1,5 cm, Drüsen 2(—5), Stb. (3—)5, beh.; ♀: Blst. 4—6:1 cm, Frkn.-Stiel = Drüse.

S. l. MÜHLBG., in N. Schr. naturf. Ges. Berlin, IV, 239. 1803 (*pentandra* NUTT., Sylv. III, 77. 1842, non L.). — Glänzende W.; shining w. — N.-Am. NW.

Fig. 13. *Salix pentandra* a B.-Grund und Stiel, nebst Ansatzstelle am Zw. und Kn., mit Drüsen, b Blattrand jung, c dgl. älter; d—e ♂ Bl.; f—h ♀ Bl.; i Frst.; k Fr. (a—b, d—k nach HEMP. et WILH.).

*) *S. arguta* ANDERSS. dürfte hiervon verschieden und sicher nicht in Kultur sein.

Territ., New Jersey, Kentucky bis Nebraska). — An ähnlichen Orten wie *pentandra*. Blz. IV—V—VI. — Nur Zierwert, neuweltliches Gegenstück zur altweltlichen Lorbeer-W.

✱✱ B. kurzspitzig (Fig. 12f), obs. Sp. fehl.

3. *S. pentandra*: meist $\bar{b}$ $\bar{b}$, selten $\bar{b}$, 1,5—13 m. alte St. mit grauer, längsrissiger Borke: Zw. kahl, jung $\cdot$ klebrig, $\odot$ glänzend gelbgrün o. rotbraun: Kn. dgl.: B. (Fig. 12f—f') kahl, zuletzt lederig-häutig, 5—10—15:2—4,5 cm, Stiel (Fig. 13a) bis 1,3 cm: Neb. (meist durch Drüsen ersetzt) längl.-eifg., drüsig gerandet: Bl. (Fig. 13d—h) mit meist nur am Grunde zottigen Trgb., δ : Blst. 2,5—5:1—1,5 cm, Drüsen 2—6(4), Stb. 5—12, Stbf. bis Mitte beh.; γ : Blst. 2—6,5:0,7—1,2 cm, hintere Drüse stumpf, zuw. gespalten, vordere ähnlich o. als schmale seith. Zähne: Gr. an Spitze geteilt, N. gespalten, dicklich.

Von Formen nur erwähnenswert: *f. nana* [BOLLE, in Verh. Bot. Ver. Brandbg. V, 186. 1863]. Zw. niederliegend, B. kleiner.

S. p. L., Sp. pl. 1016. 1753 (*fragrans* SALISB., Prodr. 393. 1796; *lucida* FORB., Sal. Wob. 63. 1829, non MHLBG.; *laurifolia* WESM., in Bull. Congr. Bot. Brux. 280. 1864). — Lorbeer-W.; sweet osier; s. odorant. — I. G. zerstr.: D. fehl. Rheinpr. OU. fehl. Steierm., Krain, Istr. Sch. nur Ct. Gb., Ct. U., Ct. O.-W. und Ct. Wdt.; sonst vor allem N. und M.-Eur. und ganz N.-As., Südgrenze von 42° n. Br. in Span. längs S.-Alp. und S.-Karp. bis Kauk. Feuchte, aber seltener moorige Böden, mit Vorliebe in tiefgründigem Uferlande; in Gebirgen bis 1300 m. — Blz. V—VI. — Nur wertvoller Zier- $\bar{b}$, Rinde off., vgl. übrige Arten. B. vor Entfaltung balsamisch duftend.

3 $\times$ 4 *S. pentandra* $\times$ *amygdalina*: *S. schumanniana* V. SEEM., in D. Bot. Monatsschr. VII, 36. 1889.

3 $\times$ 8 *S. pentandra* $\times$ *fragilis*: *S. meyeriana* ROSTK., in WILLD. Berl. Baumz. ed. II, 427. 1811 (*cuspidata* SCHULTZ, Prodr. fl. Starg. suppl. 47. 1819). B. (Fig. 12i) ohne obs. Sp., langspitzig, Frkn.-Stiel 2—3mal so lang wie hintere Drüse, Stb. meist 4. — In Eur. im Gebiet der Eltern zertr.

3 $\times$ 9 *S. pentandra* $\times$ *alba*: *S. hexandra* EHRH., Beitr. VII, 138. 1791. — B. (Fig. 12h) anfangs $\cdot$ seidig beh., beiders. grün, obs. Sp. zerstr., Stb. meist 4, nur δ bekannt. — D., O., N.-Eur., sehr zerstr. *)

b. ♀ Bl. stets eindrüsiger.

2) siehe S. 32.

1) B. stets kahl, obs. Sp. nur verstr. o. fehl.

Sekt. 2. *Amygdalinac* W. KOCH, Syn. Fl. Germ. 641. 1837 [et KERN. 1860] (*Triandrae* V. SEEM., Sal. jap. 16. 1903). $\bar{b}$ — $\bar{b}$: B. groß, eilanzettlich, spitz, glänzend: Stiel $\cdot$ drüsig: Blst. mit B., gestielt, Trgb. einfarbig gelbgrün: σ Bl.: Stb. 3—5, frei; γ : Frkn. kahl, Stiel ebenso bis mehrmal so lang wie Drüse; Gr. fast fehl., N. kurz.

4. *S. amygdalina* (*S. triandra*): $\bar{b}$, 1—4 m. selten kleiner $\bar{b}$: Rinde der St. anfangs braunrot, später grauschwarz, fast platanenartig abschuppend, Zw.-Rinde innen grünlichgelb, Zw. biegsam, zäh. $\cdot$ oliv- oder röthl.-braun: B. (Fig. 12b—c) oben glänzend sattgrün, unten hell- o. $\cdot$ blaugrün: Neb. nieren- o. halbherzfg., gesägt: Bl. (Fig. 14o—p) mit $\cdot$ zottigen Trgb., B. der Kätzchenstiele gesägt, δ : Blst. 2,5 bis 8,5:1—2,5 cm, Stb. 3(—2), γ : Blst. 3—7:0,5—0,6 cm, Frkn.-Stiel 3—5mal so lang wie Drüse.

var. a. vulgaris WIMM., Sal. europ. 14. 1866. B. längl.-lanzettlich, kurzspitzig, bis 10:2,5 cm: hierher *f. concolor* WIMM. et GRAB., Fl. siles. III, 362. 1829. B. unten hellgrün und *f. discolor* W. et GR., l. c. B. unten blaugrün — *b. angust-*

*) Die im H. d. D. D. geführten *S. altobracensis* und *basaltica* COSTE, welche Bastarde der *pentandra* mit *cinnerea*, bez. *aurita* sein sollen, sind nach einer schriftl. Mitteilung des Herrn V. SEEMEN falsch gedeutet.

folia SER., Ess. 77. 1815. B. schmaler, spitzer, bis 6—13:0,8—1,5 cm; Formen wie bei a. — c. *villarsiana* WIMM., l. c. 14. 1866 (*S. vill.* FLÜGGE, in Willd. Sp. pl. IV, 650. 1805) B. (Fig. 12 c) eifg. o. schmal elliptisch, 4—5,5:1,2—2, klein gesägt; Formen wie a.

Fig. 14. *Salix*: a b *lucida*: a ♀, b ♂ Bl. (vgl. auch Fig. 11 e g); — c d' *retusa*: c Zw. mit Blst., d ♀, d' ♂ Bl.; — e f *fenzliana*: e ♂, f ♀ Bl.; — g h *reticulata*: g ♂, h ♀ Bl.; — i k *dasyclados*: i ♀, k ♂ Bl.; — l n *amygdalina* — *canadensis*: l ♀ Bl. (l' *hippophacifolia*, m *mollissima*, n *triviridis*); — o q *amygdalina* — o ♀ Bl., p ♂ Bl., q Keimpflz.; — r w *fragilis*: r ♂, s ♀ Blst., t Frst., u ♀, v ♀ Bl., w Keimpflz. (d, f l, n etwa $\frac{1}{2}$, sonst nat. Gr.) (c, o q, u—w nach HEMPEL et WILH., sonst Original).

S. a. L., Sp. pl. 1016. 1753. (*triandra* L., l. c. 1016. 1753; *hoppeana* Willd., Spec. pl. IV, 854. 1805). — Mandel- o. dreimännige W., almond leaved w.; s amandier. — I.G. hfg., sonst ganz Eur., Or., Kauk., Sib. — Sandige Uter, seltener sumpfige Waldstellen; in Gebirgen bis 1500 m. — Blz. IV—V, zuw. Herbst nochmals verkümmert (*S. semperflorans* Host, Sal. 2. 1828; *serotina* SCHUR, Enum. pl. Trauss. 617. 1866). Nicht nur Zier-*h.*, sondern eine der besten Kultur-W., ausgezeichnetes Material für Korbflechterei und Reifstäbe. Die geschälte Rinde dient zum Garbenbinden, Formobstheften, als Dung und zum Feueranzünden.

4×8 *S. amygdalina* $\approx$ *fragilis*: in drei Formen beobachtet: a. *coarctata* KERNER, in Verh. z. b. Ges. Wien X, 190. 1860, von *amygdalina can. vulgaris f. can.* fast nur unterschieden durch: ♂ Bl. mit 2—3 Stb. — b. *alopecuroides* TAUSCH, Ind. hort. Canal. 1821 (*speciosa* Host, Sal. 5 t. 17. 1828), Stb. 5, aber Blst. bis 10:1,2 cm,

B. der Blst.-Stiele teils gesägt, teils nicht, nur ♂ bekannt. — *c. subtrianda* NEILL., in Verh. z. b. Ges. Wien I, 119. 1851. Stb. 2¹—3, sonst *fragilis* sehr nahe.

4×9 *S. amygdalina* × *alba*: *S. erythroclados* SIMK., in Termesz. Füzet. XII, 158. 1890. (?) *undulata* EHRH., Beitr. VI, 101. 1791. — Vielfach mit *amygd.* × *viminialis* verwechselt, weicht davon aber ab durch kahle Frkn. und einfarbige Bl.-Trgb.

4×24 *S. amygdalina* × *viminialis*: in drei Formen: **a.** *trevirani* SPRENG., Pug. I, 61. 1813. Frkn. kahl (Fig. 14 n); B. ziemlich stark und dicht gesägt, etwa 1:8. — **b.** *hippophacifolia* THUILL., Fl. Par. ed. II, 514. 1799. Frkn. + beh. (Fig. 14 l), B. seichter und entfernter gesägt, etwa 1:10. — **c.** *mollissima* EHRH., Beitr. VI, 101. 1791. Frkn. beh. (Fig. 14 m), B. etwa 1:6—7 (Fig. 12 g), Rand wellig ausgeschweift.

4×43 *S. amygdalina* × *cinerea*: *S. krausei* ANDERSS., Mon. Sal. 29. 1867, vgl. WOHLF., in KOCH, Syn. ed. III, 343. 1903.

4×59 *S. amygdalina* × *purpurea*: FIGERT, in D. bot. Monatschr. 1891. 61.

2) B. (meist) jung ± seidig beh., obs. Sp. fast so ∞ wie unterseitige.

Sekt. 3 *Nigrac*: **b** = **h**, B. lang. — schmal lanzettlich, drüsig gesägt; Blst. mit B., Trgb. einfarbig gelbgrün. ♂: Stb. (3—)5—9, ♀: Frkn. kahl, Stiel so lang bis 3mal so lang wie Drüse, Gr. kurz.

5. *S. nigra*: (**b** = **h**, bis 40:1 m, Krone breiter und offener als bei *alba*; Zw. brüchig, nur jung zuw. beh., braunrot, Kn. dgl.; B. (Fig. 12 a) scharf gesägt, 6—12(—18):0,4—1,8(—2,1) cm, Spitze zuw. sichelfg. (*S. falcata* PURSH, Fl. Am. Sept. II, 614. 1814), höchstens zuw. unten auf Rippe + bleibend beh.; Neb. an Lgtr. meist vorh., halbherzfg., B.-Stiel 0,3—0,8(—1,2) cm, B. der Blst. + bis kaum gesägt, Bl. (Fig. 11 a—b) ♂: Blst. 3—5:0,6—0,8 cm, Stb. 3—7, ♀: Blst. 4—8:0,5—0,6 cm, ihre Trgb. vor Frz. abfällig, Stiel bis 2mal Drüse.

S. n. MARSH., Arb. Am. 139. 1785. — Schwarz-W.; black w.; s. noir. — N.-Am. (Neu-Braunschweig bis W. Ontario, südlich bis Florida und nach W. bis Californien). — Vorzüglich Ufergelände. — Blz. IV—V. — Seit 1805 in Eur. in Kultur. — Hybriden mit *alba* bekannt.

II. *Diandrae* v. SEEM., Sal. jap. 12. 1903. — ♂ Bl. nur mit 2 Stb.

b. siehe S. 37

a. Schlanktriebige über meterhohe **b** = **h**, B. 5—12:1, + scharf o. drüsig gesägt.

1) B. 8—12:1, Stiel kaum über 3 mm, obs. Sp. fast so ∞ wie unterseitige.

Sekt. 4. *Longifoliae* v. ANDERSS., in DC. Prodr. XVI, 2, 214. 1868. Langrutige aufrechte **h**, Zw. kahl o. + beh., B. lanzettlich bis lineal. — entfernt gesägt bis fast ganzrandig; Neb. meist nur an Lohden auftretend, Blst. auf deutl. beblätterten Stielen, die wenigstens zur Frz. die Frst. an Länge übertreffen, Stbf. beh., frei; Frkn. + beh., bis kahl, sitzend o. deutl. gestielt, N. meist sitzend.

⊂ B. und Zw. höchstens jung beh. meist deutl. gesägt. (Fig. 12 m).

6. *S. fluviatilis* (*S. longifolia*): Ausläufer treibender **b** = **h**, bis 6 m, selten bis 20:0,6 m; Zw. meist von jung auf kahl, gelb- o. purpurnbraun, Kn. analog; B. (Fig. 12 m) nur jung spärlich beh., oben dunkler, unten heller grün, 8—18:0,6—1,2 cm; Stiel 0,1—0,3 cm;

*) Vgl. ROWLEE, in Bull. Torr. Bot. Cl. XXVII, 247. 1900. Die Gruppe scheint mir in ROWLEES Fassung nicht einheitlich. Ueberhaupt vermisste ich bei ihm eine genügend scharfe Kennzeichnung. Ich sche um so mehr davon ab, mich seiner Auffassung anzuschließen, als nach einer Mitteilung v. SEEMENS auch dieser Weidenmonograph der Arbeit ROWLEES sehr skeptisch gegenübersteht.

Bl. vgl. Fig. 11 h—l²: ♂ Blst. bis 2,5:0,8, ♀ bis 5,5:0,6 cm. zur Frz. bis 7:1,5 cm.

S. f. NUTT., Sylva I, 73. 1842, teste SARG. (*S. longifolia* MHLBG., in Neue Schr. Ges. natf. Freunde IV, 238. 1803, non LAM. 1778; *S. interior* ROWLEE, l. c. vgl. Anm. unten). — Schmal-W.; sand-bar w. — N.-Am. (Pennsylv., New York, Ohio Michig., Minnes., Illin., Missouri). — Blz. IV—V. — Schöne, harte Zier-Weide.

CC B. und Zw. bleibend beh., B. meist nur undeutl. gesägt.

7. *S. argyrophylla*²⁾: b—h, meist etwa 5 m; wie es scheint im Wesentlichen nur durch die Beh. der Zw. und B. (Fig. 12h), sowie der Frkn. von *fluvialis* abweichend, lag mir nur steril vor. Nach ROWLEE bleiben die B. im Winter oft lange an den Zw. und erscheinen die Blst. nicht selten zu 2—3 an den Enden der Bl.-Kztr.

S. a. NUTT., Sylva I, 71. 1842 (*S. longifolia* var. *argyrophylla* ANDERSS., in DC. Prodr. XVI, 2, 214. 1868). — W.-N. Am. (Calif., westl. bis Oregon und Washington) — Sonst wie *fluvialis*. — In Kultur gewiß empfindlicher, aber auch schöner.

2) B. im Mittel 5:1. Stiel 0,5—1,5 cm, obs. Sp. in wechselnder Zahl.

a) ♂ und ♀ Bl. mit 2 Drüsen, B.-Stiel deutlich drüsig.

Sekt. 5. *Fragiles*: b—h, Zw. brüchig, kahl, B. groß, breit-lanzettlich, zieml. grob drüsig gesägt, kahl; Bl. mit B.: Frkn. kahl, Stiel bis 3mal Drüse, Gr. kurz, geteilt, N. ausgerandet, spreitzend.

8. *S. fragilis*: b—h o. meist h, 6—15 (+ 20) m; Rinde im Alter sehr dickborkig. • Zw. kantig, glänzend pappelgelb, Kn. im Qu.-Schnitt rundlich, rotbraun o. z. T. schwärzlich, Zw. graugelb; B. Fig. 15a) unter Mitte am breitesten, glänzend, 6—17:1,1—3,5 cm, obs. Sp. vereinzelt bis $\frac{1}{4}$ der unterseitigen, Stiel bis 2,5 cm; Neb. halbherz- o. nierenfg., grob gesägt; Bl. (Fig. 14r—w); Trgb. zottig, ♂: Blst. 2—4 (+ 4,5):0,7—1,2 cm, Drüsen gestutzt, vordere schmaler, Stb. zuw. 2—3 (+ 5) [*S. pockorny* A. KERNER, in Verh. z. b. Ges. Wien X, 183. 1860] ♀: Blst. 2—6:0,6—1 cm, hint. Drüse • quadratisch.

Folgende durch Übergänge + verbundene Formen: *f. latifolia* [ANDERSS. in DC. Prodr. XVI, 2, 209. 1868], B. bis 14:4,5 cm; *f. angustifolia* WIMMER, Fl. Schles. 31. 1849, B. bis 17:2,5—3 cm; sowie bei den Formen je *f. canolor* [NEILR., Fl. Nied.-Östr. 253. 1850], B. unten mattgrün und *f. discolor* KERNER, in Verh. z. b. Ges. Wien, X, 184. 1860 [NEILR.], B. unten blaugraugrün.

S. f. L., Sp. pl. 1017. 1753 (*decipiens* HOFFM., Hist. Sal. II, 9. 1791; *fragilissima* Host, Sal. 6. 1828; *monspeliensis* FORB., Sal. Wob. 59. 1829). — Bruch- o. Knack-W., brittle or crack w., s. fragile. — L. G.: D. hfg., ÖU. veror., Sch. nur Zürich und Uri; sonst: im N. von Dänemark über Petersburg bis Altai (ob weiter nach N. noch wild?), im S. von in Halb., Sizil., Griechl., Or. bis Zentral-As. — Uter, feuchte Walder, bes. in tiefgründigem Lehm Boden. — In Gebirgen bis ca. 870 m. — Blz. IV(—V). — Nutzen vgl. *alba*, aber als Kultur-W. geringwertiger.

Folgende Bastarde der *Fragiles* sind noch zu erwähnen***):

8×9 *L. fragilis* × *alba*: *S. rubens* SCHRANK, Baier. Fl. I, 226. 1789 (*russe-lana* W. KOCH, Com. 15. 1828, nec SMITH 1824) in drei Formen: a) *viridis* [FRIES,

*) Die unter i dargestellte junge Bl. gehört vielleicht einer nahestehenden Art an, die ich aber nach ROWLEE nicht identifizieren konnte.

**) Da mir NUTTALLS Sylva nicht zugänglich, konnte ich nicht entscheiden, ob ROWLEE im Recht ist, wenn er die echte *fluvialis* für nicht mit *longifolia* MHLBG. identisch halt. — Ebenso wenig vermag ich zu beurteilen, ob NUTTALL *argyrophylla* s. ROWLEE o. *argyrophylla* (s. SARG. et AUCT. AL.) geschrieben hat.

***)) Ganz unbekannt sind mir die im H. d. D. D. G. 23 zitierten *frag.* × *nigricans* und *frag.* × *daphnoides*.

Nov. Fl. Suec. ed. II, 283. 1828], B. zuletzt kahl, unten bleichgrün. *b. excelsior* [Host, Sal. 8, t. 28 29, 1828], B. gleichfalls kahlend, unten blaugrün. *c. palustris* [Host, Sal. 7, t. 24 25 1828], B. bleibend seidig beh.; außer in der Beh. noch durch den kurzen Frkn.-Stiel von *fragilis* abweichend.

8×10 *S. fragilis* × *babylonica*: *S. pendulina* WENDER, in Schrift. natf. Ges. Marburg, II, 235. 1831 (*blanda* ANDERSS., Mon. Sal. 50. 1867; *elegantissima* K. KOCH,

Fig. 15. *Salix*-B.: *a fragilis*, rechts oben Randzähnung; — *b babylonica*; wie *a* — *c lasiandra* var. *confusa*, *d pendulina* (*elegantissima*): Stiel etwa $\frac{1}{2}$ zu kurz gezeichnet; — *e alba*; wie *a*; — *f dasyclados*; — *g sericea* (kleines B.); — *h medemi*; wie *a*; — *i grandifolia*; wie *a*; — *k levidae*; — *l caprea*; wie *a* (rechts unten); — *m aurita*; — *n sitchensis* (alle B. $\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

in Wochschr. Ver. Bef. Gartb. XIV, 380. 1871). Von *babylonica*, als welche sie hfg. ausgegeben, abweichend durch: B (Fig. 15d) breiter, länger gestielt, Bl mit 2 Drusen und längerem Frkn.-Stiel. Vielleicht, entsprechend obigen Namen, drei Formen zu unterscheiden, die bald 8, bald 10 näher stehen. Vor allem scheinen sich in Bezug auf „Winterhärte“ deutliche Unterschiede zu zeigen. Vgl. *babylonica*.

8×61 *S. fragilis* × *purpurea*: *S. margaretae* V. SEEM., in D. bot. Monatschr. 1886, 124

β) Nur ♂ Bl. zweidrüsiger. B.-Stiel nicht oder kaum drüsiger.

Sekt. 6. *Albae* v. SEEM., Sal. jap. 16. 1903 (♂)—♂; B. lang, lanzettlich, nur im Anfang o. — bleibend seidig beh.; Blst. mit B. an beblätterten Stielen, hängend o. aufrecht; Trgb. einfarbig gelbgrün; Frkn. ganz o. fast sitzend, kahl, Gr. sehr kurz o. fehl, N. kurz.

♂ Zw. und B. — bleibend seidig beh., obs. Sp. fast so ∞ wie unterseitige.

Fig. 16. *Salix alba*: Winter-Habitus-Bild: ♂ etwa 15:1,2 m (Orig. nach C. K. SCHNEIDER).

9. *S. alba*: meist ♂, 6—25:1,5 m, vgl. Fig. 16 und 17; • Zw. meist noch schwach beh., rund, leicht glänzend olivbraun; Kn. dgl., zieml. flachgedrückt; B. Fig. 15e) etwas über der Mitte am breitesten, oben trüb, unten bleich- oder graugrün, 6—10:1—2 cm. Stiel drüsen-

los. 0,8—1,2 cm, Neb. lanzettlich: B. der Blst. gesägt o. ganzrandig. Bl. (Fig. 11 o—q, ♂ Blst. 4—5:0,8—1,2 cm: ♀ Blst. 5—6:0,6—0,8 cm).

var. *a. typica*. — ☉ Zw. nicht ausgesprochen dottergelb o. schwärzlichbraun, B. meist unten $\pm$ beh., hierher *f. splendens* [ANDERSS., in DC. Prodr. XVI. 2, 211. 1868] (*S. splendens* BRAY, ex OPIZ Boehm. Gew. 110. 1823; *alba* var. *argentea* WIMM., Sal. eur. 17. 1896; *leucophylla* und *regalis* der Gärten). B. bleibend beiders. seidig. — *b. vitellina* SER., Ess. Saule Suisse 83. 1815 (*S. vit.* L., Sp. pl. 1016. 1753). Zw. schön dottergelb, z. T. $\pm$ gerötet, hierher *f. britzensis* [SPÄTH, Kat. 1878]. Zw. stark gerötet und *f. pendula* (*S. aurca* der Gärten) Zw. hängend (hfg. mit *S. babylonica* verwechselt, deren B. kahl sind und nur verstr. obs. Sp. haben). — *c. coerulea* W. KCH., Syn. 644. 1837 (*S. coer.* SM., Engl. Bot. t. 2431. 1812). Zw. $\pm$ schwarzbraun, später $\pm$ übergeneigt, B. zuletzt ganz kahl.

Fig. 17. *Salix alba*: Borke eines 1 m starken Stammes. (Orig. nach C. K. SCHNEIDER.)

S. a. L., Sp. pl. 1021. 1753. — Weiß- o. Silber-W., common white w.; s. blanc. — I.G. hfg., sonst: N.-Grenze (nach WILLKOMM) etwa von 63° 52' n. Br. in Norwegen nach Jekaterinburg im S.-Ural (56° 30') bis ins baikalische Sib. (ob jedoch in N.-Eur. wirklich spontan?); im S. von ib. Halb. und N.-Afr. bis Or., Kauk., Pers., Zentral-As. — Feuchte Wälder, Niederungen, Gebirgstäler, Ufer etc. In Gebirgen bis höchstens 1600 m. — Blz. IV—V. — Alter: 80—100 Jahre, doch meist sehr zeitig kernfaul. — Bes. var. *vitellina* zählt zu den guten Kultur-W. (Faschinen, grobe Geflechte, Zahnstocher, z. T. Kisten, Kähne, Holzschuhe, Papier). Sie ist unsere hfgste. Kopf-W., steht aber an Kulturwert *amygdalina* u. and. nach.

CC Zw. und B. nur ganz jung beh., obs. Sp. nur vereinzelt.

10. *S. babylonica*: b h. bis 10 m, Äste und Zw. stark überhängend, daher meist hochstämmig veredelt: ♀ Zw. braun, kahl; B. (Fig. 15 b) 7—17,5:1—2,5 cm, oben glänzend dunkel-, unten graugrün; Neb. meist fehl., schief längl.-lanzettlich o. sichelfg.; Stiel nur bis 0,5 cm, oben hfg. bleibend beh.; B. der Blst. nicht o. wenig gesägt; Bl. (Fig. 11 m—n zuw. ♂ und ♀ gemischt, ♂ Blst. 2—4:0,6—0,8 cm; ♀ schlanker und anfangs kürzer, beide hfg. gekrümmt, Drüse breitrundlich.

Von Formen nur die unschöne *f. annularis* [ASCHERS., Fl. Brandbg. 630. 1864] (*S. a.* FORB., Sal. Wob. t. 41. 1829). B. gekräuselt geringelt.

S. b. L., Sp. pl. 1017. 1753 (*pendula* MOENCH, Meth. 336. 1796; *urpaleon* F. SCHULEZ, Arch. Fl. 239. 1859) — babylonische Trauer-W.; weeping w.; s. pleureur. — Kaukasien (Kaspisee, N. Pers., S.-Turkestan), China (Kiautschou, Chili, Shantung, Kiangsu, Chekiang, Chusan Archipel, Hupoh, Shensi, Yunnan), Korea, Japan. — Blz. IV—V. — Selten echt in Kultur, meist durch die Hybride *f. fragilis* — *babylonica* (siehe oben) ersetzt, da *babylonica* im NM-Eur. nicht winter

Die angebliche *alba* — *babylonica*: *S. sepulchralis* SIMK., in Fernes, Fuz. XII. 157. 1890 mir unbekannt. Vielleicht mit *S. alomoni* der Gärten identisch, die ich nur steril kenne.

hart, sondern nur im S. unseres Gebietes, ausgenommen sehr geschützte Lagen (Klimaprov. IV—V). Zuw. auch mit *purpurea pendula* verwechselt, die aber durch viel kleinere B. und kürzere Zw. sofort zu unterscheiden.

b. niederliegende Zwerg-b o. kurztriebige, kaum 80 cm hohe
b, B. 1—4:1, ganzrandig o. kerbsäggig.

1) Zwerg-b, 0,05—0,30 m, Bl.-Trgb. stets einfarbig. 2) siehe S. 41.

a. B. klein, $\pm$ sitzend, obs. Sp. sehr ∞ , Frkn. kahl. β) siehe S. 40.

Sekt. 7. *Retusae**) A. KERNER, in Verh. z. b. Ges. Wien X. 195. 1860. — Zw. kahl, wurzelnd: B. stets kahl: Blst nach B., meist wenig blütig, auf kurzen Stielchen. γ : Drüsen 2. δ : eindrüsigg. Stiel kürzer als Drüse, zuw. bei *herbacea* ähnliche Diskusbildung, wie bei den *Reticulatae*.

Fig. 18. a—d *Salix reticulata*: a $\odot$ Zw., b Kn., c dgl. im Q.-Schnitt, d $\odot$ Zw.-Q.-Schnitt (Zahlen wie Fig. 2g); e—f *retusa*: e verzweigtes Ästchen (bei a noch Sch.-Reste der Kn., aus denen die Seit.-Zw. hervorgingen), f Kn., g dgl. im Q.-Schnitt, h Lgtr.; i—j *repens*: k $\odot$ Zw., l dgl. die Beh. zeigend, m Kn.-Q.-Schnitt, n wie d (Orig. nach C. K. SCHNEIDER).

C B.-Grund keilig, Rand höchstens mit vereinzelten Zähnen.

* B. sehr klein, meist nicht über 0,4—0,8 cm lang.

11. *S. serpyllifolia*: rasiger Zwerg-b: B. (Fig. 19i) mit 3—4 Seitennerven stets ganzrandig, Blst. 5—7-blütig, zwischen den B. der Blst.-Stiele verborgen, γ : A. jung gelb, beide Drüsen gleich lang (Fig. 20 p—q).

S. s. SCOP., Fl. carn. II, 255. t. 61. 1760 (*retusa* var. *serp.* W. KOCH., Syn. 660. 1837). — Quendel-W.; bearberry-leaved-w. — I. G. nur Alp. und Gebirge von Siebb., Herzeg. und Bosn.; ferner Rumänien, Montenegro. — Liebt nach KERNER felsige, sonnige Stellen. Wurzelt in schwarzem Humus in Felsritzen und breitet ihre ineinandergeflochtenen, der Adventivwurzeln entbehrenden Zw. teppichartig über die an die Felsritzen grenzenden kahlen Steinflächen aus. Zwischen 1600 bis 2500 m. — Vgl. sonst *retusa*.

** B. im Mittel nicht unter 1 cm lang.

*) Die hierher o. zur Sekt. *Myrtosalix* gehörenden *S. ura-ura* PURSH, *cutleri* TUCKERM., *bray* LEDEBOUR und *retundifolia* TRAUTV. sind nirgends in Kultur und mir nur ganz unzureichend bekannt.

12. *S. retusa*: St. chen (Fig. 14c und Fig. 18e) bis 1 cm dick. Äste $\perp$ wurzelnd. Zw. rötlichbraun. in schattigen Lagen gestreckter*); B. (Fig. 19h) mit 4–6 Seitennerven; Blst. über 10blütig, die B. überragend, ♂: Drüsen ungleich lang (Fig. 14d–d'), A. jung rot.

Fig. 19 *Salix*-B.: a *glabra*; rechts B.-Rand; — b *bicolor* (*phylicifolia*); rechts B.-Rand; — c *repens*; — d *vestita*; — e *reticulata*; — f *herbacea*; rechts B.-Rand; — g *polaris*; — h *retusa*; — i *serpyllifolia*; — k *lappenum* und l *var. daphnifolia*; m *var. myrtillodes*; n *var. pedunculata*; o *myrsinites*; rechts B.-Rand; — p *arbuscula*; — q *milichhoferi*; — r *pyrenaica*; — s *helvetica*; — t *caesia* (alle B. $\frac{3}{5}$ n. Gr.) (Original).

*) Bei den meisten Weiden sind die Sonnen- und Schattenformen oft habituell sehr abweichend

var. *a. vulgaris* WILLK., Forstl. Flora 505. 1887 (var. *typica* KOEHNE, Dendr. 93. 1893). B. 0,8 : 2 : 0,5–0,8 cm, ♂ Blst. etwa 2 : 1, ♀ 3 : 1, hierher *f. integrifolia* [KERNER, in Verh. z. b. G. X, 197. 1860] B. ganzrandig und *f. denticulata* [KERNER, l. c.] B. im unteren Teile gesägt. — *b. kitaibeliana* W. KOCH, Syn. 660. 1837 (*S. kit.* WILLD., Sp. pl. IV, 663. 1828). Wuchs lockerer, B. 1,5 : 3,2 : 0,5 bis 1,7 cm, Blst. reicher blütig.

S. r. L., Sp. pl. ed. II, 1445. 1763. — Stutz-W.; retuse-leaved w. — I. G. D. nur bayr. Alp. OU. Alp., Karp. Sch. Alp., Voralp., Jura; sonst noch Pyren., Apennin und Balkan-Gebirge. — Zwischen 1600–2500 m, in Steingeröll, zwischen Kneholz, in der Narbe der Matten, hfg. zusammen mit *S. myrsinites* und *Dryas octopetala*. — Blz. im Hochgebirge VI–VII, in der Kultur der Ebene IV bis V. — Als Zier-W. für Gesteinspartien sehr brauchbar, artet wie alle Alpinen im Tiefland ± aus.

○○ B. rundlich, nicht o. ringsum kerbzähnig.

★ B. + ringsum kerbsäugig, meist über 1 cm lang, ♀ Bl. 2-drüsig.

13. *S. herbacea*: Habituell und in B.-Nervatur manche Analogie zu *reticulata*. Zw. dünn, lange krautig bleibend; B. meist nur zu 2–3 am Zw.-Ende, 0,8 : 2 : 0,7–2 cm (Fig. 19f). Blst. wenigblütig, zwischen B. verborgen, ♂: 0,4–0,8 : 0,4–0,6 cm, ♀ bis 1 : 0,5 cm. Bl. vgl. Fig. 20r–r². Stbf. zuw. verwachsen (var. *synandra* BUS., ex SCHINZ ET KELLER, Fl. Schweiz 133. 1900).

S. h. L., Sp. pl. 1018. 1753 (*pumila* SALISB., Prodr. 394. 1796). — Krautige W.; herbaceous-looking w. — I. G. vgl. *retusa*, sonst durch die gesamte nördl. arkt. Zone, in Ver. St. nur nordöstl. (Maine und white Mts.). — In Felsspalten, auf mit feuchtem Moos bedecktem Steingeröll etc. — Sonst vgl. *retusa*.

★ B. fast stets ganzrandig, meist nicht über 0,8 cm lang, ♀ Bl. stets 1-drüsig.

14. *S. polaris*: in vieler Hinsicht ein Gegenstück zur *herbacea*, aber abweichend durch: Trgb. meist deutl. zweifarbig, Frkn. dicht beh. (Fig. 27d), Stbf. zuweilen etwas verwachsen.

S. p. WAHLBG., Fl. lapp. n. 473. 1812. — Polar-W.; polar-w. — Nördliche polare Zone. — Blz. V–VII. — In Kultur*) kaum echt und sehr schwierig. — Da ich in den mir vorliegenden Expl. von Spitzbergen, die ich für echte *polaris* halte, in den ♀ Bl. nur eine hintere Drüse finden konnte, so stellte ich diese Art anfangs zu den *Monadenar.* allein infolge Herrn v. SEEMENS Hinweis habe ich sie dann hier einrangiert.

Auf die ∞ Bastarde, an denen die *Retusae* beteiligt, kann ich hier nicht näher eingehen, ich zitiere im Folgenden nur die in unserem Gebiete beobachteten**).

12 × 13 *S. retusa* × *herbacea*: *S. submyrsinitis* BRÜGG., in Jahrsb. Nat. Ges. Graubünden XXV, 106. 1882.

12 × 15 *S. retusa* × *reticulata*: *S. thomasiana* GÜRKE, in Richt. Pl. europ. II, 36. 1897 (*S. retusa* γ *thom.* RCHB., Ic. bot. 16. 1828).

12 × 16 *S. retusa* × *glauca*: in verschiedenen Formen (*S. curvadenia*, *logopoda*, *ausserdorferi*), vgl. WOLOSZ., in KERN. Sched. fl. austr.-hung. n. 1445–47. 1886. o. WOHLF., in W. J. KCH. Syn. ed. III, 2357. 1903, der alles unter *buxifolia* SCHLEICH, Coll. n. 832 zusammenfaßt. Hierher auch die im H. d. D. D. G. erwähnte *claeagnoides* SCHLEICH.

12 × 20 *S. retusa* × *myrsinites*: in zwei Formen: *S. retusoides* KERNER, in Verh. z. b. Ges. XII, 1221. 1862 und *S. semiretusa* G. BECK, Fl. Nied.-Östr. 278. 1860.

12 × 29 *S. retusa* × *helvetica*: *S. recandita* AUSSERD., Cat. exs. Tirol. 1874 vgl. WOLOSZ., in KERN. Sched. fl. Austr.-Hung. n. 1444. 1886).

12 × 33 *S. retusa* × *hastata*: *S. alpengora* KERNER in Östr. bot. Zeit. XIV, 369. 1864.

*) Nach dem H. d. D. D. G. soll auch der Bastard 13 × 18 *S. herbacea* × *polaris*, also *S. nothula* AND., in BLYTT, Norg. Fl. 484. 1874, in Kultur sein.

**) Von außerhalb des Gebietes aufgefundenen werden im H. d. D. D. G. als in Kultur erwähnt: 13 × 14 *S. herbacea* × *reticulata*: *S. onychiophylla* ANDERSS., in Bot. Notis. 1867, 119 und 13 × 19 *S. herbacea* × *myrsinites*: *S. sommerfelti* ANDERSS., l. c. 117.

12×34 *S. retusa* × *glabra*: *S. fenziiana* KERN., in Verh. z. b. Ges. Wien X, 195. 1860. — Sehr üppige *retusa*, zur Kultur zu empfehlen.

12×37 *S. retusa* × *nigricans*: *S. cotteti* KERN., in Öst. bot. Zeit. XIV, 368. 1864.

12×39 *S. retusa* × *bicolor*: *S. friburgensis* COTTET, in Bull. trav. Murith. 1892. 8.

12×40 *S. retusa* × *arbuscula* (BORNMÜLL., in Mitt. Thür. bot. Ver. N. F. VIII, 39. 1895).

13×28 *S. herbacea* × *lapponum*: *S. sobrina* WHITE, in Jour. Lin. Soc. XXVII, 440. 1890. — Nach H. d. D. D. G. in Kultur, wild nur in Lappl. u. Schottl.

13×29 *herbacea* × *helvetica*: *S. ovata* SER., Ess. Saul. Suisse 92. 1815.

13×33 *S. herbacea* × *hastata*: *S. sarmentacea* FRIES, Novit. Fl. Suec. Mant. I, 75. 1832.

13×40 *herbacea* × *arbuscula*: *S. simulatrix* WHITE, in Jour. Lin. Soc. XXVII, 439. 1890.

13×48 *S. herbacea* × *aurita*: *S. margarita* WHITE, l. c. 441.

β. B. im Mittel nicht unter 2 cm lang, deutlich bis lang gestielt, obs. Sp. fehl., Frkn. beh.

Sekt. 8. *Reticulatae* BORRER, in LOUD. Arb. a. Frut. III, 1542. 1844 (*Chamitea*) KERNER, in Verh. z. b. Ges. 275. 1860) Zwerg-b mit wurzelnden Zw., B. wenigstens jung seidig beh., auffallend netzaderig ganzrandig o. leicht kerbzähnig, Neb. fehl. o. winzig, ♂ und ♀ Bl. mit zerschlitztem Diskus o. ♀ Bl. hfg. nur mit einer tief 2-teiligen Drüse, Frkn. sitzend, Gr. tief 2-teilig.

○ B_f-Stiele 0,8—2 cm, B. bald kahlend.

15. *S. reticulata*: bis 0,30 m hoch, ♀ Zw. gelbgrün o. leicht gebräunt, kantig und glänzend, ♂ braungelb, rund, Kn. zu 2—4 am Zw.-Ende (Fig. 18a—d); B. (Fig. 19e) 1—4:0,8—2,5 cm, unten weißl. grün; Bl. vgl. Fig. 14g—h, ♂: Blst. 1—2:0,5—0,6 cm, A. jung rot; ♀: Blst. 0,8—2,2:0,4—0,5 cm.

S. r. L., Sp. pl. 1018. 1753 (*Chamitea ret.* KERNER, l. c.). — Netz-W.; net-veined w. — L. Geb. nur D. bayr. Alp.; ÖF. Alp., Karp., Kroat., Siebb.; Sch. Alp., Jura; sonst Pyren., franz. und ital. Alp., N.-Eur. bis Spitzbergen, N.-Am. (Labrador). — Blz. V—VI. — Sonst vgl. *retusa*, die ihr an Zierwert nachsteht.

CC B.-Stiele 0,4—0,8 cm, B. wenigstens unterseits ♂ seidig beh. bleibend.

16. *S. vestita*: 0,10—0,20 (0,50) m hoch, Zw. und B.-Stiele locker zottig, B. (Fig. 19d) jung oben ♂, unten dicht silberseidig-zottig, später oben kahl, auch unten hfg. fast ganz kahl, bläulich weißlich, 2—5:1,3—2,5—3,8 cm; Bl. vgl. Fig. 20s—t, ♂: Blst. bis 2,5:0,3 cm, ♀ bis 5 cm lang.

S. v. PURSH, Fl. Am. Sept. 610. 1814. — N.-Am. (Labrador und Quebec bis NW-Territor. und Oregon). — Bekleidete W.; hairy w. — Blz. VI. — Empfehlenswerte Zier-W., die *reticulata* sehr nahe steht und mit ihr anscheinend durch Zwischenformen verbunden ist.

Im Gebiet noch folgende Bastarde*) der *S. reticulata* beobachtet:

14×37 *S. reticulata* × *nigricans*: *S. semireticulata* WHITE, in Jour. Lin. Soc. XXVII, 444. 1890.

14×40 *S. reticulata* × *arbuscula*: *S. ganderi* GAND., in Flora XL, 231. 1882.

*) In Herb. östr. W., IV. Dekade, No. 35 hat KERNER die Gattung selbst wieder eingezogen.

*) Im H. d. D. D. G. ist 14×16 *S. reticulata* × *glauca* erwähnt. Mir weder aus Literatur noch sonst bekannt. — Auch 14×33 *S. reticulata* × *hastata*: *S. reticuloides* ANDERSS., in DC. Prodr. XVI, 2, 301. 1868 soll in Kultur sein.

2. Aufrechte Klein- b) wenigstens nie durchaus niedergestreckt, 0,40 bis 0,80 (—1) cm hoch, Bl.-Trgb. meist zweifarbig.

Sekt. 9. *Sericeae**) KOEHNE, Dendrol. 86. 1893. — Zw. beh.; B. weich beh., ganzrandig. Neb. fehl., Bl. nach B. [†]: (1—) 2-drüsig. ^{††}: (2—) 1-drüsig. Frkn. beh., Stiel nur zuw. länger als hint. Drüse. Gr. gespalten.

- B. 3—7:1—3 cm. obs. Sp. fehl., Bl.-Trgb. meist zweifarbig. [†] Bl. stets, ♀ meist 2 Drüsen**).

17. *S. glauca*: 0,4—1 m. Wuchs stets aufrecht, aber kurzästig, sparrig. • Zw. kahlend, rotbraun. Kn. beh., B. vgl. Fig. 25k, vgl. Formen: Bl. vgl. Fig. 21e—g. Blst. dicht zottig. ♂: bis 3:1,3 cm, A. dunkelviolett: [†]: auf deutl. beblätt. Stielen bis 5 cm. Gr. im dichten Pelz des Frkn. meist verborgen.

WOHLFARTH unterscheidet: var. **a.** *sericea* ANDERSS., in DC. Prodr. 2, 280. 1868 (S. v. VILL., Hist. pl. Dauph. III. 782. 1789). B. [†] dicht silberweiß beh., beim Trocknen bläul. grün-schneeweiß, breit eirund bis schmal lanzettlich. **b.** *pullata* ANDERSS., l. c. B. oben kahlend, unten [†] zottig und blaugrün, dünner. — **c.** *virescens* ANDERSS., l. c. 281. B. beiderseits zuletzt [±] kahlend, etwas derb, unten bläul.-grün***).

S. g. L., Sp. pl. 1019. 1753. — Blaugraue W.; northern w. — I. G. nur: O. Alp. von Tirol und Kärnt., Sch. Alp.; sonst noch ital. und franz. Alp., nördl. und arkt. Eur., Sib., Grönl., N.-Am. (Labrador bis Alaska). — Sonst vgl. *retusa*.

- B. selten über 3 cm lang, dann obs. Sp. vorh., • Bl. 1-drüsig (ob immer?).

† B. nur bis 3:1,8 cm. obs. Sp. fehl., Bl.-Trgb. meist 1-farbig.

18. *S. pyrenaica*: Steht *glauca* wohl sehr nahe, Wuchs weniger aufrecht, B. vgl. Fig. 19r; Bl. Fig. 21k—l, ♂ mit gelben A.

S. p. GOUAN, Ill. Obs. bot. 77. 1773 (*ciliata* DC., Fl. fr. ed. 3. III, 293. 1805). — Pyrenäen-W.; pyrenean w.; — Pyrenäen. — Sonst vgl. *glauca*†).

- † B. zuw. bis 5 cm lang, obs. Sp. vereinzelt. Bl.-Trgb. 2-farbig o. fast ganz dunkel.

19. *S. arctica*: Kleinstrauch, niedergestreckt o. aufrecht, 0,10—0,40 m; • Zw. dunkelpurpurbraun, beh.; B. (Fig. 26d) 1,5—3: 5:1,3—2,5: 3,8: cm, im Trocknen schwarzend, Stiel 2—3 mm; Bl. ^{††} vgl. Fig. 20n—o, Trgb. schwärzlich, weißseidig zottig, Blst.-Stiele mit deutl. B. besetzt, ♂ Blst. (ohne Stiele) bis 2:1, [†] bis 3:1, zur Frz. bis 4:1,3 cm.

S. a. PALLAS, Fl. ross. I, 2, 86. 1788 [non R. BR., Bot. Ross. Voy. ed. 2 II, 191. 1819 et ANDERSS., in DC. Prodr. XVI, 2, 286. 1868] (*S. pallasii* ANDERSS., l. c. 285) — arktische W. — Arkt. N.-Am., N.-As. bes. Grönland. — Ob echt in Kultur?

*) Die im H. d. D. D. G. aufgeführten *S. glaucops* ANDERSS. und *subcordata* ANDERSS. sind wohl nirgends in Kultur. Ob sie hierher o. nicht besser zur Sekt. *Lanatae* gehören, vermag ich aus Mangel an Material nicht zu entscheiden.

**) Bei meinen Beobachtungen fand ich bei *glauca* zuw. ganz ähnliche Drüsenverhältnisse wie bei *reticulata*.

***) *S. macrocarpa* TRAUTV. (non NUTT.), in Mem. Soc. Nat. Mosc. 1832, 292, ist mir unbekannt; sie soll eine + niederliegende Form aus N.-As. darstellen.

†) Als *S. thymelaeoides* SCHLEICH, Cat., ist ein Bastard *glauca* = *arbuscula* (FLOR.) in Bih. Sv. Vet. Acad. Handl. XVII, 3, n. 1, 34. 1891) aus Schweden bekannt, der auch in Sch. (Albula) aufgefunden sein soll, was indes fraglich. Im H. d. D. D. G. ist 16 × 40 *S. glauca* × *grandifolia*: *S. laggeri* WIM. als in Kultur geführt.

††) Diese Art ist noch nicht recht geklart, ich schließe mich der Auffassung von BEBB (in Bot. Gaz. XIV, 115. 1889) an. Die ♂ Bl. mit einer deutlichen vorderen Drüse scheinen darauf hinzudeuten, daß diese Art ähnlich den *Reticulatae* oder *S. herbacea* variiert. Vielleicht auch hybrider Natur, obwohl mir den Expl. nach unwahrscheinlich.

B. *Monadeniae* v. SEEM., Sal. jap. 12. 1903. — ♂ und ♀ Bl. stets eindrüsig; Bl.-Trgb. bleibend und zweifarbig (heller Grund, dunkle Spitze), nur bei den ♀ Bl. von *glabra* und *incana* einfarbig hell; Stb. 1—2.

II siehe S. 63.

I. *Choristandrae* v. SEEM., l. c. 1903 (*Diandrae* ANDERSS., ex parte) ♂ Bl. mit 2 Stb., deren Stbf. ganz frei sind, mit Ausnahme bei *cordata* und *medemii*, wo die + starke Verwachsung der Stbf. ganz normal ist*).

b. siehe S. 46.

a. *Dolichostylae* v. SEEM., l. c. 13. 1903**) — Gr. lang, mindestens halb so lang wie Frkn.

2) siehe S. 43.

1) Zwerg-♂ vom Habitus der *Retusae* in Kultur zuw. bis 0,50 m, B. klein, 1—2:1.

Sekt. 10. *Myrtosalix* A. KERNER, in Verh. z. b. Ges. X, 203. 1860. — niedergestreckte b, Zw. nur jung + seidig beh., B. dgl., eielliptisch bis + lanzettlich. Blst. mit B. erscheinend, kurzgestielt, Frkn. beh., z. T. zuletzt kahler, Stiel meist kürzer als Drüse.

○ B. (Fig. 190) sehr bald ganz kahl, obs. Sp. ∞, Frkn. zuletzt kahl.

20. *S. myrsinites*: niedergestreckter Zwerg-b, analog *retusa*. Zw. und B. jung fein dünn seidig beh., B. beiderseits glänzend grün (an die der Heidelbeere, *Vaccinium myrtillus*, gemahnend), 1,2—4:0,6—2 cm. Stiele 0,1—0,3 cm; Bl. vgl. Fig. 21 v—x, ♂ Blst. 1,2—2:0,8—1 cm, gleich den schwächeren ♀ dicht filzig, A. jung rot, dgl. Gr. und N. und Drüsen.

var. a. *serrata* NEILR., Fl. Nied.-Östr. 266. 1846 (var. *typica* KOEHNE, Dendrol. 95. 1893), B.-Rand fein drüsig gesägt. var. b. *jacquini* WIM., Sal. eur. 99. 1866 (? *S. alpina* SCOP., Fl. carn. ed. 2, II, 225. 1772; *S. jacquini* HOST, Syn. pl. austr. 529. 1797; *S. jacquiniana* WILLD., Sp. pl. IV, 692. 1805), B. ganzrandig.

S. m. L., Sp. pl. 1018. 1753. — Myrten- o. Heidel-W.; whortleberry-leaved w. I G. nur Öst. Alp. von Tirol, Steierm., Kärnt., Karp., Sch. Zentral-Alp.; sonst noch N.-Eur., N.-As. und arkt. N.-Am. bis Grönl. Blz. V. Vgl. sonst *myrtilloides*, aber in Kultur schwieriger.

○○ B. (Fig. 26 b) z. T. unten beh. bleibend, obs. Sp. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ der unters., Frkn. bleibend beh.

21. *S. chlorophylla*: niedergestreckter o. aufrechter, dickästiger b, 0,3 bis über 1 m; ○ Zw. beim Typ kahl, glänzend dunkelrotbraun, dgl. Kn.; B. (Fig. 26 b) trocken nicht schwärzend, 1,5—5:0,5 bis 1,8 cm, Stiel 2—6 mm; Bl. (mir nur + bekannt) vgl. Fig. 27 f, Blst. 1—2:0,8, zur Frz. bis 3,5:1,5 cm.

var. a. *typica*: Zw. und B. nur ganz jung + beh., dann B. oben hellgrün, unten + grauweißblau, Rippe gelb. var. b. *cestita* ANDERSS., in DC., l. c. 243. — Zw. beh., B. jung dicht, später wenigstens unten + beh.

S. chl. ANDERSS., in DC. Prodr. XVI, 2, 243. 1868. — Grün-W. — W. N.-Am. (vom Saskatchewan bis S.-Colorado.) Gebirge, bis 3500 m. — V. VI. — Selten echt in Kultur.

Von Bastarden der Sekt. *Myrtosalix* (*) sind aus dem Gebiet noch zu erwähnen.

*) Diese Tatsache zeigt von Neuem, daß in all und jeder Gruppierung der *Salix* auf Grund einzelner Merkmale den natürlichen Verwandtschaftsverhältnissen nur ganz ungefähre Rechnung getragen werden kann.

**) Diese Gruppe deckt sich mit den *Macrostylae* ANDERSSONS und auch KERNERS nicht ganz.

***) Im H. d. D. D. G. werden als in Kultur angegeben: 16×19 *S. glauca* × *myrsinites*: *S. normani* ANDERSS., in Bot. Notis. 1867, 116 (*S. glaucoides* ANDERSS., in DC. Prodr. XVI, 2, 284. 1868). — Ferner 19×33 *S. myrsinites* × *hastata* (KIHLM.

19×37 *S. myrsinites* × *nigricans*: *S. myrsinitoides* FRIES, Herb. norm. fasc. XVI, n. 62. 1864 (vgl. WOHLF., in KOCH, Syn. ed. III, 2327, 1903).

19×44 *S. myrsinites* × *silesiaca*: *S. tatrae* WOŁOZ., in Östr. bot. Zeit. XLI, 234. 1891.

2) Langtriebige hohe $\varnothing$ — $\varnothing$, B. mindestens $3\frac{1}{2}:1$.

Fig. 20. *Salix*: *a—b balsamifera*: *a* ♂, *b* ♀ Bl.; — *c—d millichhoferi*: *c* ♀, *d* ♂ Bl.; — *e—f medema*: *e* ♂, *f* ♀ Bl.; — *g—h daphnoides*: *g* ♀, *h* ♂ Bl.; — *i—k commutata*: *i* ♂, *k* ♀ Bl.; — *l—m candida*: *l* ♂, *m* ♂ Bl.; — *n—o arctica, pallasi*: *n* *n*¹ ♂ Bl., *aa* hintere, *β* vordere Drüsen, *c* ♀ Bl.; — *p—q arpyretica*, *p* ♂ Bl., *q* ♂ Bl.; — *r—r*² *herbacea*: *r* ♀, *r*¹ *r*² ♂ Bl.; — *s—t testata*: *s* ♂ Bl., *t*¹ die discussartig vereinten Drüsen, *t* ♂ Bl.; — *u—u*¹ *repens*: *u* ♂, *u*¹ ♂ Bl. (an *a* *β* die Drüsen); — *v—v*¹ *stichensis*: *v* ♂, *v*¹ ♂ Bl.; — *w—w*¹ *purpurea*: *w* ♂, *w*¹ ♂ Bl.; — *x—x*¹ *fabra*: *x* ♀ Bl., *x*¹ *glabra*: *x* ♂ Bl.; — *y—y*¹ *angustifolia von m. cretacea*: *y* ♂, *y*¹ ♀ Bl.; — *z—z*¹ *pyracetia*: links ♂, rechts ♂ Bl.; — *aa*¹ *pyracetia*: links ♂, rechts ♂ (Gr. vgl. Text) (*b*, *n* *n*¹ nach SARGENT; *c* nach VON SIEMEN; sonst Orig.).

in Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. XIII, 249. 1886. Ferner 10 × 40 *S. myosinides* ×
caprea (LINT., in Journ. of Bot. XXXII, 201. 1894, sowie 10 × 48 *S. myosinides* ×
aurita; *S. saxetana* WHITE, in Journ. Lin. Soc. XXVII, 434. 1890.

a) Zw. bereift, B. mit obs. Sp., Frkn. kahl.

Sekt. 11. *Pruinosae* W. KOCH, Comm. 22, 1828. — Zw. höchstens jung beh., innere Rinde im Sommer zitronengelb; B. ei- o. schmallanzettlich, später kahl, oben glänzend, unten blaugrün; Blst. vor B.-Ausbruch, dicht zottig; Drüse meist schmal, länger als Frkn.-Stiel, Gr. und N. lang, gelb, aufrecht, Fr.-Klappen sichelfg. zurückgebogen.

⊂ B. $3\frac{1}{2} : 5 : 1$, Neb. halbherzfg., obs. Sp. vereinzelt bis verstreut.

22. *S. daphnoides*: meist $\frac{1}{2}$, 3–10 m, Zw. zuw. jung beh., brüchig. — oliv- o. dunklerbraun, — grünlich, hechtblau bereift. Kn. anfangs beh., Bl.-Kn. viel größer; B. (Fig. 23 c–d), im Alter lederig-häutig, Blst. sehr dicht weißpelzig, ♂ sehr honigduftig, 3–5,6 : 1,6–2,8 cm, ♀ 2,5–5 : 0,8–1,2 cm, Bl. vgl. Fig. 20 g–h.

var. a. *typica*, Äste mäßig dick, nicht steil aufrecht, Blst. bis fast 6 cm lang.

Hierher *f. praecox* BECK, Fl. Nied.-Östr. 287, 1890 (*S. praecox* HOPPE, in Willd. Sp. pl. 670, 1805; *daph.* var. *angustifolia* KERNER, in Verh. z. b. Ges. X, 232, 1860) B. 6–11 : 1,1–2,5 cm, meist gleich den Zw. ganz kahl; *f. latifolia* KERNER, l. c. B. 6–12 : 3–5 cm, jung nebst Zw. $\pm$ beh., in Form *pentandra* ähnlich; *f. aglaja*, eine besonders wüchsige, teilweise unbereifte Gartenform, B. wie *f. latifolia*. — b. *pomeranica* W. KOCH, Syn. 646, 1837 (*S. pom.* WILLD., Enum. Hort. Berl. Suppl. 66, 1813) meist $\frac{1}{2}$, B. kürzer gestielt, 5–8 (–11) : 1–1,8 (–2) cm, Blst. schwächer. — c. *pulchra* GARCKE, Fl. Deutschl. ed. XVII, 547, 1895 (*S. pulchra* WIMM., Sal. eur. 7, 1866) $\frac{1}{2}$, Äste dick, steil aufrecht, B. mit abgerundetem Grunde, unten hellgrün, kaum bläulich, Gr. und N. kürzer.

S. d. VILL., Hist. pl. Dauph. III, 765, 1789 (*cinerea* WILLD., Berl. Baumz. 1796, et Host, Sal. S. t. 26–27, 1828, non L.; *bigenmis* HOFFM., Deutsch. Fl. II, 260, 1804). — Reif- o. Schimmel W.; violet w; s. daphné. — L. G. verbr., z. T. sehr zerstr.; sonst noch N.-Ital., Frankr., Rumän., N.-Eur. Zentr.-Rußl., Sib. bis Amurgebiet und Himal. — An Gewässern der Ebene, gern auf kalkhaltigem Leimboden; im Gebirge meist nicht über 600, selten bis 1200 m. — Blz. III (–IV), eine der frühesten Arten. — Zumal wegen der Winterfärbung des Holzes geschätzte Zierweide, kulturell wenig wertvoll, höchstens var. *pulchra* für grobes Flechtwerk.

⊂⊂ B. 6–7 : 1, Neb. lanzettlich, spitz, obs. Sp. etwa $\frac{1}{3}$ der unteren.

23. *S. acutifolia*: im Habitus schlanker als 22. b, Zw. dünn, zäh, tief violett- o. rotbraun, prächtig bereifend; B. stets kahl (Fig. 23 e), 6–12 : 1,2–2 cm; Blst. schwächer, kleiner und entfernter stehend.

S. a. WILLD., Sp. pl. IV, 668, 1805 (*violacea* ANDREWS, Bot. Repos. IX, t. 581, 1797–1811, *pruinosa* BESS., Cat. Hort. Crem. 121, 1810; in den Gärten als *caspia*, *fusca* oder *negra*). — Spitz- o. kaspische W.; s. à feuilles aiguës. — O.M.-Rußl., Sib., Turkest. — Blz. III (–IV). — Nicht nur Zier-, auch gute Kultur-W., da sie mit geringeren Böden vorlieb nimmt als *amygdalina* o. *viminialis*, deren Güte sie aber nicht erreicht. Vielfach zur Befestigung von Flugsandgebieten angebaut.

Von Bastarden*) der *Pruinosae* aus dem Gebiet sind zu erwähnen:

22 × 24. *S. daphnoides* × *viminialis*; *S. d. genia* J. KERN., in Östr. Bot. Z. XXIV, 204, 1874 (*S. viminalis* L. SCHWAIGL., in WOERL, Fl. Münch. Thaleb. 1863).
22 × 43. *S. daphnoides* × *cinerea*; *S. mariana* WOLSZ., in Ö. B. Zeit. 1888, 226.
22 × 46. *S. daphnoides* × *caprea*; in den Formen (*ordungen*) J. KERN., in Verh. z. b. Ges. Wien XI, 243, 1861. — *hungarica* A. KERNER, in Verh. z. b. G. Wien XIV, 9, 1864. — *cremensis* A. et J. KERNER, in Herb. Öst. Weid. Dec. VIII, n. 72, 1866. — *daphnoides* var. *pulchra* × *caprea* (FIGERF., in Allg. bot. Zeitschr. I, 2, 1895).

22 × 54. *S. daphnoides* × *repens*; *S. maritima* HARTIG, forstl. Kulturpfl. 574, 1851 (*patzeana* ANDERSS., Mon. 124, 1867).

*) Im H. d. D. D. G. wird als in Kultur angegeben: 22 × 39. *S. daphnoides* × *bicolor*; *S. macrorrhyncha* ANDERSS., Mon. Sal. 155, 1867. Ebenso *koernickei* ANDERSS., in DC. Prodr. XVI, 2, 263, 1868, die im H. d. D. D. G. als *daphnoides* × *bicolor* × *caprea* geführt wird.

22×57. *S. daphnoides* × *incana*: *S. reuteri* MORITZI, Fl. Schweiz 459. 1844 (*wimmeri* KERN., in Verh. z. b. Ges. Wien II, 61. 1852).

22×61. *S. daphnoides* × *purpurea*: *S. calliantha* J. Kern., in Verh. z. b. Ges. Wien XV, 43. 1865.

23×(24×43) *S. acutifolia* × (*viminalis* × *cinerea* [*stipularis*]) · *S. sacharowii* SCHROED., nach H. d. D. D. G. in Kultur.

22×43. *S. acutifolia* × *cinerea* (FIG., in Jahrb. Schles. Ges. LXVI, 178, 1888).

β) Zw. nie bereift, B. ohne obs. Sp., Frkn. beh.

Sekt. 12. *Viminales* W. KOCH, Comm. 27. 1828. ♀, selten ♂, Zw. jung stets dicht beh., zäh. innere Rinde grün: B. oben glanzlos, unten meist schimmernd beh. (Haare den Seitennerven parallel): Blst. sitzend, vor B.-Ausbruch, Drüse der . Bl. noch länger als bei *Prunosa*, N. sehr lang, bogig abstehend.

○ B. etwa 10:1, schmal lanzettlich.

24. *S. viminalis*: b ♂, 1,5–6 m, sehr selten ♀, bis 10 m: Rinde grünl.-graubrau, Äste stark mit Lent. besetzt. · Zw. grau- o. gelbgrün. · kahl o. auch beh. bleibend, sehr schlankkrutig^{*)}: B. (Fig. 12o) am Rande · ungerollt, nur leicht ausgeschweift, Nerven unten deutl. hervortretend, Stiel 0,4–1,2 cm: Neb. schmal lanzettlich: ♂ Blst. 2–3: 1,2–1,8 cm. · 2–3:0,8–1,4 cm. Frkn.-Stiel sehr kurz. Gr. und N. lang und dünn (vgl. Fig. 20i–k).

var. a. *vulgaris* KERNER, in Verh. z. b. G. Wien X, 211. 1860 erweitert. B. 7–12 (–16):0,8–1,2 (–1,8) cm, oben bleibend verstr. beh., hierher *f. angustifolia* [KERNER, l. c.] B. 10–15:0,5–1 cm und *f. abbreviata* DOELL., Fl. Bad. 495. 1859, Kätzchen kleiner. · b. *splendens* ANDERSS., in DC. Prodr. XVI, 2. 265. 1868 (*S. spl.* TURCZ., in Bull. Soc. nat. Mosc. XXVII, 1. 380. 1854.) B. 5–10:1–1,5 cm, oben dicht kurz beh., unten sehr seidig glänzend, Blst. schwächer und gekrümmt.

S. v. L., Sp. pl. 1029. 1753. — Korb-, Band- o. Elb.-W.; twiggy w., common osier; l'osier vert, le détail. — L. G. D. hfg. OU^{*)} verbr. Sch. wild nur Ct. W., B. und Z., sonst noch W.-Eur. (N.-Span. bis Engl.), M.-Eur. bis Or., Kauk., Sib., Amurgeb., Himal. (in N. und S.-Eur. nur kultiviert). · Niederungsgebiete, selten im Gebirge, eine der gemeinsten Bachweiden. · Blz. III–IV–V, mit *purpurea*, ihrer hfg. Genossin, später als *caprea* und *daphnoides*. · Schöne Zier- und als Kultur-W. neben *amygdalina* die beste, bes. die Formen mit gelber, wachsiger Rinde. Licht frischen, tiefgründigen Boden, ist robuster als *amygdalina*, aber doch eine · zärtliche Kultur-W. — Vgl. noch *viminalis* × *purpurea* (*rubra*).

○○ B. etwa 2–6:1, breit lanzettlich.

25. *S. dasyclados*: b, 3–4 m, selten höher: · Zw. dick, schwärzlich filzig. B. (Fig. 15f) 8–15:1,5–4 cm, Rand · kerbig bis fast gesägt, später oben fast kahl, unten blaugrau, dicht anhegend schimmernd beh., Rippe · braungelb, Stiel bis 1,5 cm: Neb. sichelig bis breit lanzettlich. · deutl. gesägt: ♂ und · Blst. dicker und größer als bei voriger, Bl. vgl. Fig. 14i–k. · Frkn.-Stiel bis 2, Drüse. Gr. und N. etwas dicker als bei *viminalis*.

S. d. WIM., in Flora XXXII, 35. 1849 (*longifolia* HOST, Sal. 19. 1829 ex parte^{**)}; *acuminata* PATZL., Fl. v. Pr. 283. 1850, non SMITH; *caprea* × *cinerea* × *viminalis*, nach WIEHURA). · Von Pommern durch W.-Preuß., Posen, russ. Polen

*) Nicht wie bei *S. alba* der Rippe parallel.

**) Da jedoch, sagt WILLKOMM, die über den Blst. stehenden Kn. nach der Blz. gewöhnlich verkümmern und die aus den tief unten stehenden Kn. hervorgehenden Sprosse kaum länger werden als die vorjährigen, so behalten die Korbweidenbüsche fast immer die gleiche Höhe.

***) HOST verstand auch *viminalis* × *caprea* darunter.

bis Galiz., ob auch Nied.-Östr.? — Blz. III—IV. — Standort vgl. *viminalis*. — Wohl nur Zierwert.

Die Bastarde der *Viminalis**) machen sich, nach v. SEEMEN, besonders bemerkbar durch die starke Verlängerung und die unterseits seidige Beh. der B., die lange schmale Drüse, sowie den langen dünnen Gr. und die analogen N. — Es sind aus dem Gebiet noch folgende bekannt:

24×28 *S. viminalis* × *lapponum*, im H. d. D. D. G. als in Kultur [Hort. Berol.] befindlich erwähnt. Mir aus Literatur nicht bekannt.

24×44 *S. viminalis* × *silesiaca*: *S. kotulae* WOLOSZ., in Ö. B. Z. 1891. 234.

24×43 *S. viminalis* × *cinerea*: *S. holosericea* WILLD., Berl. Baumz. 458. 1796 (*lanceifolia* DOELL., Fl. Bad. 512. 1859; ? *velutina* SCHRAD.). B. vgl. Fig. 23g. — In den Formen: *stipularis* SM., Fl. brit. III, 1069. 1804. — *zedlitziana* A. KERNER, in Verh. z. b. Ges. Wien X, 217. 1860. — *nitens* KERN., l. c. 217 [GREN. et GODR.]. — *canthiana* KERN., l. c. 218.

24×43×48 *S. viminalis* × *aurita* × *cinerea*: *S. hirtii* STRAEHL., in D. bot. Monatsschr. XIV, 96. 1896.

24×43×61 *S. viminalis* × *cinerea* × *purpurea* (UECHTR., in Jahresb. Schles. Ges. Bresl. LIX, 329. 1881).

24×46 *S. viminalis* × *caprea*: *S. smithiana* WILLD., Enum. hort. Berol. II, 1008. 1809. — B. vgl. Fig. 25b. — In den verschiedenen Formen: *hostii* A. KERN., in Verh. z. b. G. X, 213. 1860. — *vratislaviana* A. KERN., l. c. 216. — *sericans* TAUSCH, ex KERNER, l. c. 214 (*acuminata* KOCH, Comm. 30. 1828, non SMITH) — *neisseana* A. KERN., l. c. 217 (*intermedia* WIM., in Flora XXXII, 42. 1849, nec HOST). — *capreiformis* WIM., l. c.

24×48 *S. viminalis* × *aurita*: *S. fruticosa* DOELL., Fl. Bad. 515. 1859.

24×54 *S. viminalis* × *repens* vgl. bei 54 *repens* und unten *).

24×57 *S. viminalis* × *incana*: *S. kernerii* ERDINGER, in Verh. z. b. Ges. Wien XV, 78. 1865.

24×61 *S. viminalis* × *purpurea*: in den Formen: *elaeagnifolia* TAUSCH, ex W. KOCH, Syn. ed. II, 647. 1845 (*rubra* var. *sericea* W. KOCH, Syn. 560. 1837, nec *sericea* MARSH. steht *viminalis* näher, aber Blst. schlanker, Gr. kurz, B. 7,5–11,5:0,8–1,8 cm, unten seidig beh., $\pm$ gezähnt, gegen Spitze verbreitert. — *rubra* HUDS., Fl. angl. 364. 1762 ? *holva* L., Sp. pl. 1047. 1753. Zw. jung beh., o. kahl, Kn. - kahl; B. 4,5–13,5:0,8–1,8 cm, jung seidig beh., dann oben ganz, unten - kahlend, ? Blst. 2,4–3,6:1,2–1,4 cm, Stbf. - verwachsen, kahl; $\pm$ 1,5–2,4:0,4–0,6 cm, Frkn. dick, kurz beh., N. - Gr. aufrecht abstehend, vgl. Fig. 20w. Eine Kultur-W. ersten Ranges! — Wohl nur eine schmalblättrige Form von ihr ist: *angustissima* WIM., Sal. eur. 174. 1866, doch Gr. und N. meist kürzer. — *forbyana* SM., Engl. Fl. IV, 191. 1828, steht *purpurea* am nächsten, aber von üppigerem Wuchse, B. 7–12:1,2–2 cm, kahl, im obersten Drittel am breitesten, Gr. sehr kurz, N. länglich, Stbf. oft $\frac{1}{2}$ verwachsen. Gleichfalls gute Kultur-W. Liefert stärkere Ruten als *rubra*, ohne deren Güte zu erreichen.

25×46 *S. dasyclados***) × *caprea*: *S. acuminata* SMITH, Fl. brit. III, 1028. 1804 (*calodendron* WIM., Sal. eur. 187. 1866).

c. siehe S. 56. b. *Meiostylae* v. SEEM., Sal. jap. 13. 1903. Gr. mittellang, kürzer als $\frac{1}{2}$ Frkn.***), aber länger als N.

1) B. linealisch, 6–8:1, unterseits bleibend glanzlos weißfilzig, Frkn. beh., Stbf. kahl.

Sekt. 13. *Candidae*: b. Zw. und Kn. wenigstens jung weißfilzig. B. anfangs beiders. weißfilzig, dann oben trübgrün, obs. Sp. fehl., Neb. lanzettlich, Blst. - sitzend, vor B.-Ausbruch, dicht zottig, Trgb. zweifarbig, Frkn.-Stiel so lang bis 2mal Drüse, A. anfangs rot.

*) Über *viminalis* × *repens* × div. *Capreae* vgl. HEIDENR., in Öst. bot. Zeit XIV, 17, 18. 1864.

*) Im H. d. D. D. G. wird eine *longifolia* HEIDENR. als *dasyclados* × *purpurea* erwähnt. Ich konnte in der Literatur nichts dergleichen finden.

***)) Wenn Gr. doch so lang, so wenigstens N. nicht schmal länglich, mit Ausnahme von *S. lapponum*.

25. *S. candida*: aufrechter b. 0,6—1,5 m. • Zw. • braun bis etwas glänzend rotbraun: B. derbhäutig Fig. 12n), 6—15:0,7—1,8 cm. Stiel bis 2 cm; ♂ Blst. bis 2,5, ♀ bis 5 cm, Bl. vgl. Fig. 20l—m.

S. c. FLÜGGE, in WILLD. Sp. pl. IV, 709. 1805. — weißfilzige W.; hoary w. — N.-Am. (Labrador und Huds.-Bai bis NW.-Territ., südl. bis New-Jersey, westl. bis New York und Iowa). — Feuchte Stellen, Ufer etc. — Blz. IV—V. — Sehr schöne, noch seltene Zier-W. — In Am. Bastarde mit *cordata* und *petiolaris* bekannt.

Fig. 21. *Salix*: a—b *lanata*: a ♂, b ♀ Bl.; — c—d *lapponum*: c ♂, d ♀ Bl., Gr. u. N. von verschiedenen Seiten; — e—g *glauca*: e ♂, f ♀ Bl., g Fr.-Kn.-Grund und rechts davon die verschieden gestaltete hintere Drüse; — h—i *helvetica*: h ♂, i ♀ Bl.; — k—l *pyrenaica*: k ♂, l ♀ Bl.; — m—m' *sericea*: m ♂, m' (links darunter) ♀ Bl.; — n—r *incana*: n ♂, o ♀ Blst., p—q ♀ Bl. von vorn und seitlich, r ♂ Bl. von vorn (Stbf. unten beh.); — s—u *myrtilloides*: s ♂ Bl. von vorn, t—u ♀ Bl. von vorn und seitlich; — v—x *myrsinites*: v ♂, w—x ♀ Bl.; — y—z *caesia*: y ♂, z ♀ Bl. mit N. von verschiedenen Seiten (a—m', y—z $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ mal vergrößert; n—x nach HEMPEL et WILHELM, sonst Original).

2) B. nie wie unter 1, Stbf. und Frkn. kahl o. beh.

a) B. wenigstens unters. bleibend filzig. Blst. kurzgestielt (siehe S. 49).
o. sitzend.

Sekt. 14. *Lanatae* KOEHNE, Dendrol. 87. 1893. — Niedrige und sparrige, in Kultur zuw. bis über meterhohe b. Zw. wenigstens jung beh. B. breitfig. bis lanzettlich, meist ganzrandig und weich beh. Stbf. kahl, Frkn. sitzend o. Stiel bis = Drüse, kahl o. beh.

Subsekt. a. *Chrysanthae* [W. Koch, Commentatio 1828]. — B. rundlich-oval bis breit-elliptisch, Neb. groß: Blst. zu 2—3 am Zw.-Ende gedrängt, sitzend, Frkn. kahl.

⊖ B. 6—18:3—4,5 cm, Zw. nur jung dick filzig beh., später kahle.

26a. *S. hookeriana**: ♂ ♂ , selten ♂ , bis 10:0,3 m. als ♂ z. T. niedergestreckt, Zw. bis ins 2. Jahr bleibend beh., rotbraun; Kn. dunkelrot, zieml. rund, beh.; B. Fig. 26g) Grund z. T. rundlich, kerbsägig (bes. an Lohden) o. ganzrandig, jung beiders. dicht filzig beh., später derbhäutig, oben lebhaft gelbgrün, meist nur Rippe beh., unten bes. an Nerven beh., blaugrau, Stiele beh., 0,7–2,3 cm; Blst. mit B. sitzend o. sehr kurz gestielt, mit wenigen kleinen Behen am Grunde, ♂ bis 5:1,5, ♀ bis 4:1. Bl. wie Fig. 27n–o, zur Frz. bis 6:1,5 cm.

S. h. BARR., in HOOK., Fl. bor.-Am. II, 145. 1839. — Hookers W. — N.-Am. (von Vancouver Island südl. längs der Küsten des Puget Sund und des Pac. Ozeans bis S. Oreg.) — Am Rande sumpfiger Plätze, sandige Küstendünen. Scheint echt in Kultur, aber selten. Die mir vorliegenden sterilen Expl. waren nicht sicher zu identifizieren, da mir echtes Vergleichsmaterial fehlte.

⊖ B. höchstens 7,5:4,5 cm, ♀ Zw. langzottig weich beh.

27. *S. lanata*: B. prächtig seidenzottig, gleich den dichtseidigen Blst., goldig schimmernd, nur zuletzt oben kahlend (Fig. 25b), gleich den rundl.-lanzettlichen Neb. ganzrandig; obs. Sp. fehl., Bl. vgl. Fig. 21a–b, ♂ Blst. bis 5:1,5 cm, A. jung gelb.

S. l. L., Sp. pl. 1019. 1753. — Woll-W.; woolly leaved w. — nördl. arkt. Zone — V–VI. — Prächtige Zier-W., die allerdings in der (überdies nicht leichten) Kultur bei uns viel von ihrer nordischen Schönheit einbüßt.

Subsekt. b. *Villosae* ANDERSS., in DC. Prodr. XVI, 2. 275. 1868. — B. schmaler, Neb. klein o. fehl., Blst. zahlreicher und tiefer an den Zw. seitenständig, oder sonst gestielt, Frkn. fast stets beh.

⊖ Gr. meist ungeteilt, zuw. bis fast so lang wie der Frkn., Drüse der ♂ Bl. lang und dünn.

28. *S. lapponum*: ♀ Zw. kahl o. beh., dunkelbraun, Bl.-Kn. groß, dick, beh., hellbraun, fein gespitzt; B. oben kahlend, trübgrün, unten dichter bis zerstreut grauzottig mit seidigen Haaren gemischt, 3,5–7–9:0,8–2–3,5 cm (Fig. 19k), Stiel bis 1 cm; Blst. etwa 2–3:1 cm, ♀ deutlicher gestielt. Bl. vgl. Fig. 21c–d.

var. a. *typica* KOEHNE, Dendrol. 94. 1893. B. stets + beh., in Form sehr wechselnd, z. T. genau so wie var. b. — Hierher *S. marculifolia* (WIM.) SALICUR. 41. 1866) (S. m. TAUSCH, in Flora XX, 339. 1837), dicht beh. — b. *daphnoides* WIM., Fl. Schles. ed. III, 188. 1857 (S. d. TAUSCH, l. c. 1837), in allen Teilen kahler Klem- ♂ , B. nach dem nur vorlieg. Material vom einzigen Standort (Riesengebirge auf der sog. Pantschewiese) wie Fig. 19l.

S. l. L., Sp. pl. 1019. 1753 (*arenaria* SM., Fl. brit. III, 1058. 1804; *leucophylla* WILLD., Berl. Baumz. ed. II, 444. 1811; *limosa* WAHLBG., Fl. lapp. 265. 1812, *subulca* HOST, Sal. 28. 1828) — Lappland-W.; laplanders' w. — I. G. nur D. Riesengeb., Altvater, bayr. Alp. OÜ Sudeten, Karp.; sonst noch Bulgarien (M. Vitos), Frankr. (Mt. Dore), von Schottl. durch N. Eur. bis Sib. — besonders an quelligen und sumpfigen Orten — Blz. V–VII, in Kultur IV. — Nur mehr interessante, als schöne Zier-W.

⊖ Gr. meist geteilt, kürzer, Drüse stumpfer o. zuw. gabelig.

→ B. unten dicht mehlig-weißfilzig, Frkn. gestielt, Drüse wenig länger als Stiel, einfach.

29. *S. helvetica*: Zw. jung weißfilzig, ♀ kahl, Bl.-Kn. groß, aber stumpfspitzig; B. zuletzt oben fast kahl und glänzend grün, 2,5–7:1–2,5 cm (Fig. 19s); Bl. vgl. Fig. 21h–i, ♂ Blst. fast sitzend, bis 2,5:1,2 cm, ♀ länger gestielt, bis 4 cm.

*) Nach SARGENT, Silva IX, 147. 1896.

S. h. VILL., Hist. pl. Dauph. III, 783. 1789 (*arenaria* [helvetica] WILLD., Sp. pl. IV, 690. 1805; *glauca* SM., Engl. Bot. XXVI, t. 1810. 1808, nec L.; *nivea* SER., Ess. Saul. Suisse 51. 1815; *tomentosa* HOST, Sal. 28. 1828. — Schweizer-W.; swiss w. — Durchs ganze Alpengebiet, in D. und U. fehl. — Besonders an Gebirgsbächen und ähnlichen Orten in schattigen Lagen — Sonst vgl. *lapponum*.

• B. unten seidig-zottig. Frkn. sitzend. Drüse oft von Grund aus gegabelt.

29a. *S. desertorum*: kleiner aufr. b. junge Zw. dicht seidenzottig. • stark kahlend. rotbraun. glänzend purpurn. kahl. später schwarzgrau. Kn. rotbraun. kahl o. fast kahl: B. (Fig. 26e) jung beiders. seidig-zottig. später oben trübgrün. stark kahlend. unten ebenfalls kahlend. aber grauweiß. glatt. aber Seitennerven doch scharf. ganzrandig. gewimpert. 1.8–5.0.7–1.6 cm. Stiel 2–5 mm. flach. beh., nur Neb. kürzer. eifg., beh. • Blst. mir nur diese bekannt) mit B. auf 5–8 mm langen. mit 3–5 Blchen besetzten Stielen. deren oberste den 0.8–1.4:0.4–0.5 cm messenden Blst. überragend. Bl. vgl. Fig. 27 b–b¹. Frkn. und die leicht gebräunten Trgb. dicht weiß wollzottig. N. jung gelblich. Drüse teils 2-gablig (b²) teils einfach (b³).

S. d. RICH., in Frank. Jour. App. 371. 1823. — Wüsten-W. — NW.-Am., bes. in den Rocky Mts. — Diese Weide sandte mir Herr Zabel als *S. spec.* (= *tristis* HORT. DIECK.) Nach meiner Auffassung gehörte sie zu *desertorum* o. in deren Nähe. Herr v. SEEMEN, den ich um Auskunft bat, hat sie endgültig als *desertorum* bestimmt. Ob noch in Kultur?

Von Bastarden der *Lanatae* sind aus dem Gebiet o. als in Kultur noch folgende zu nennen:

27×33 *S. lanata* × *hastata*: *S. hartmanniana* ANDERSS., in Bot. Notis. 1867, 111, soll nach H. d. D. D. G. in Kultur sein.

28×43 *S. lapponum* × *cinerea*: *S. laestadiana* HARTM. (ex H. d. D. D. G.).

28×44 *S. lapponum* × *silesiaca*: *S. nepetifolia* PRESL, Fl. czech. 1819 (*tauschiana* SIEB., Cat. 1821) (vgl. WOHLF., in KOCH, Syn. ed. III, 2354. 1903).

28×46 *S. lapponum* × *caprea* (WIM., Sal. eur. 192. 1866).

28×48 *S. lapponum* × *aurita*: *S. obtusifolia* WILLD., Sp. pl. IV, 705. 1805.

28×50 *S. lapponum* × *myrtilloides*: *S. versifolia* WAHLENB., Fl. lapp. 271. 1812.

28×59 *S. lapponum* × *purpurea*: *S. schatilowii* SCHROED. Im H. d. D. D. G. erwähnt, indes nach Mittel des Herrn ZABEL nicht echt in Kultur.

29×33 *S. helvetica* × *hastata*: *S. huteri* KERNER, in Ö. Bot. Zeitschr. 1866, 370 (vgl. WOHLF. l. c.).

29×40 *S. helvetica* × *arbuscula*: *S. spuria* [Schleich] WOHLF., in KOCH, Syn. ed. III, 2355. 1903. — Ist nicht *myrsinites* × *helvetica*, denn B. ohne obs. Sp.

29×45 *S. helvetica* × *grandifolia*: wohl noch fraglich!

β B. unters. kahlend o. doch nicht filzig. wenn stärker beh., so Blst. auf deutl. beblätterten Stielen o. wenn seidenzottig. so B. obers. mit $\frac{1}{3}$ so viel Sp. als unters.

α' Frkn. nebst Stiel kahl.

β' siehe S. 54.

α' • Zw. kahl und glänzend. höchstens locker beh. (Lape!) β' siehe S. 52.

Sekt. 15. *Hastatae*) ANDERSS., in DC. Prodr. XVI, 2. 251. 1868 (sensu v. SEEM., Sal. jap. 18. 1903). Niedrige b. selten bis 5 m hohe b. B. später pergamentartig. glatt. lanzettlich bis oval. zugespitzt. ganzrandig bis gesägt. oben glänzend. unten heller. mit fein hervortretender Nervatur. kahl o. dünn seidig beh.: obs. Sp. fehl. Blst. vor o. mit B. auf langen beblätterten Stielen. meist schmal zylindrisch. Trgb. meist an Spitze nur wenig dunkler. nur bei *barclayi* fast ganz

*) Die in ihrer Zugehörigkeit zu dieser Sekt. mir noch fragliche *S. novae-angliae* ANDERSS. soll nach H. d. D. D. G. in Kultur sein. Aber wo?

schwärzlich $\frac{1}{2}$ lang hell beh. Stbf. frei (mit Ausnahme von *cordata*), Frkn. kurz bis lang verschmälert, N. kurz o. länglich; Drüse oval.

>> siehe
S. 51.

> Trgb. höchstens an Spitze dunkler.

○ Stbf. regelmäßig $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ verwachsen.

30. *S. cordata*: aufrechter b. 1,5—3,5 m, Zw. meist nur jung $\frac{1}{2}$ beh. und bald kahl, Kn. groß, kahl, hellbraun, B. (Fig. 25h links) jung $\frac{1}{2}$ beh., oben sattgrün, auf der Rippe meist beh. bleibend, unten ganz kahlend, hell- o. graugrün, Rippe gelb; Bl. vgl. Fig. 11r—s. ♂ Blst. bis 2,5:1, meist 2 B.chen am Grunde, ♀ bis 3:1 cm, Stiel mit 3—4 B.chen, Gr. zuw. bis $\frac{1}{2}$ gespalten.

var. a. *typica*. B. aus herzfg. Grunde eielliptisch o. eifg., 5—10:3—4,5 cm. — b. *rigida**) [WILLD., Sp. pl. IV, 2, 667. 1805]. B.-Grund abgerundet o. breitkeilig, breitlanzettlich, 5,5—12:1—2,5 cm; hierher f. *purpurascens*, Bl. u. junge B. purpurrot überlaufen.

S. c. MHLBG., in Neue Schrift. Ges. natf. Fr. Berlin IV, 236. 1803. Herzblättrige W.; heart leaved w. — N.-Am. (Neu-Braunschweig bis Brit.-Kol., südl. bis Virg., Missouri, Kolorado, Kalif. — Liebt feuchte Lagen. — IV—V. — Schöne Zier-W., bes. f. *purpurascens*, die im Frühjahr von allen Weiden scharf absticht.

○○ Stbf. normalerweise frei.

* Blst. lang und sehr dünn, etwa 10:1 bis 18:1.

31. *S. japonica* *): Zw. braun, kahl; B. (Fig. 23b) bis 7,5:2,5 cm (am Grunde der Zw. nur etwa 2:0,9 cm), oben hellgrün, glänzend, unten grau, beiders. kahl, nur jung $\frac{1}{2}$ seidig beh., Stiel 0,3 cm; Blst. mit B. ♂: bis 10:0,5 cm, nicht hängend, locker, Stbf. am Grunde beh.; ♀: bis 6,5:0,5 cm, Frkn.-Stiel doppelt so lang als Drüse (vgl. Fig. 20z).

S. j. THUNB., Fl. jap. 24. 1784 (*babylonica* var. *jap.* ANDERSS., in DC. Prodr. XVI, 2, 213. 1868). Japanische W. — Japan (Kiuschiu und Nipon).

** Blst. höchstens 6:1.

$\frac{1}{2}$ B.-Stiel meist 1,5—2,2 cm, Frkn.-Stiel 2—3mal so lang wie Drüse.

32. *S. pyrolaefolia* ***): meist b. zuw. b. bis 5:0,5 m, St. mit schwarzgrauer Rinde und breiter oft abgerundeter Krone, Zw. nur ganz jung stets beh., o. kahl o. sehr fein (Lupe!) beh., tief rotbraun o. purpurn, $\frac{1}{2}$ glänzend, innere Rinde zitronengelb, ♂ Zw. grünl. o. bräunl.-grau, Kn. kahl, zweigfarben; B. (Fig. 23n) 3—7:1,7—5,5 cm, an Lohden rundlich-elliptisch und $\frac{1}{2}$ krauswellig gerandet, sonst länglich-ellipt., kurz gespitzt, Seitennerven unterseits scharf, Netznerven kaum hervortretend, oben lebhaft sattgrün, unten graublau bis stark bläulich, Rippe $\frac{1}{2}$ gelb, oben auf ihr $\frac{1}{2}$ bleibend beh., sonst bald kahl, Neb. groß bis sehr groß, fast rund; Blst. kurz vor o. mit B., $\frac{1}{2}$ am kurzen Stiel mit einigen Sch.-B.chen, bis 5:1,5 cm, $\frac{1}{2}$ ohne B.chen bis 3:0,8—1 cm, N. und Gr. gelbgrün, vgl. Fig. 20z¹, aber Gr. versehentlich verzeichnet, der junge Frkn. verschmälert sich allmählich in den Gr., später ist dieser deutlich abgesetzt und bis $\frac{1}{2}$ Frkn. lang.

S. p. LEDER., Fl. alt. IV, 270. 1833. Wintergrünblättrige W. — Rußl. (Gouv. Perm), Sib. (Altai, Baikal, Dahurien). — In feuchtem und moorigem Boden. — Blz. V. — In Kultur noch sehr selten; hart.

*) *S. nicholsoni* DIECK halte ich für hiermit identisch. Das mir zugängliche lebende, von Dr. DIECK stammende ♀ Material deutet in nichts auf eine Hybride *cordata* × *nigra*.

**) Beschreibung nach VON SEEMEN (Sal. jap. 43. 1903), da ich keine Exemplare dieser Weide sah. Sie ist sicher nicht in Kultur, wird aber immer falschlich angeboten.

***) Beschreibung z. T. nach TEPLOUCHOW (in Herb.).

- + B.-Stiel kaum über 1(- 1.6) cm, Frkn.-Stiel höchstens 2 mal Drüse.

- Stbf. kahl, Bl.-Trgb. lang und krauszottig, B. oben stumpf grün.

33. *S. hastata*: knorrig verästelter 0.8—1.5 m hoher b , Zw. nur jung $\pm$ beh., $\odot$ rotbraun, Kn. stumpf-eifg., mit verstr. Haaren; B. sehr variabel (Fig. 23 o), 2—8:1—4 cm, nur selten jung $\pm$ beh., unten blau- o. weißgrün, zuletzt etwas derb, durchlaufende Seitennerven meist nicht über 7—9, Stiel 0.3—0.8 cm, Neb. meist vorh., halbherzfg., Blst. mit B., schlank, σ bis 3.5, φ bis 5 cm, N. deutl. 2-spaltig, Bl. vgl. Fig. 24 m—n.

Im Wuchs lassen sich zwei Typen festhalten: a. *vegeta* ANDERSS., Mon. Sal. 172. 1867 (inkl. var. *serrulata* ANDERSS., l. c.), b. aufrecht, bis über 1 m, B. größer, gröber o. feiner gesägt, z. T. mit $\pm$ abgerundeter Spitze, Neb. deutlich. — b. *hyperborea* GÜRKE, in RICHT. Pl. eur. II, 22. 1897 [ANDERSS.] (inkl. var. *alpestris* ANDERSS., l. c.). Kleiner, zuw. niederliegender b , B. kleiner, fast ganzrandig, Neb. $\pm$ fehl.

S. h. L., Sp. pl. 1017. 1753 *pontederac* VILL., Hist. pl. Dauph. III, 766. 1789; *malifolia* SM., Fl. brit. III, 1053. 1804; *serrulata* WILLD., Sp. pl. IV, 664. 1805; *pontederacae* LOIS., Fl. gall. II, 34. 1807). — Spieß-W.; halberd-leaved w. — I. G. D. selten, nur Voges., Harz, bayr. Alp., Sudet. OU. Mähr., Steierm., Tirol, Kärnt., Karp., Kroatien; Sch. Alp., Voralp.; sonst noch Span. (S.-Nev., Pyr.), Frankr. (Pyr., Alp.), Ital. (Alp., Apennin.), Kl.-As.-Gebirge, N.-Eur.- und N.-As.-Gebirge bis Tibet. — sumpfige Orte, alpin und subalpin. — Blz. V—VII. — Zier-W.

$\triangle\triangle$ Stbf. beh., Bl.-Trgb. $\pm$ kahl, B. oben glänzend.

34. *S. glabra*: durchaus kahler, 0.5—1.6 m hoher b , Kn. und $\odot$ Zw. mattgrün, $\odot$ braun; B. (Fig. 19 a) wenigstens im oberen Teile $\pm$ kerbsäggig, 3—8.5:1.5—4.6 cm, oben grün, unten blaugrün, Neb., wenn vorh., zieml. groß, halbrund, Stiel bis 1.6 cm; σ Blst. 1.6—3:0.6—1.4 cm, φ 2—4.5:0.5—1 cm, Frkn.-Stiel*) bis 2 mal Drüse, σ Bl. vgl. Fig. 24 o, φ mit einfarbig gelben Trgb., vgl. *hastata*.

S. g. SCOP, Fl. carn. ed. 2, II, 255. 1772 (*phylicifolia* WULF., in JACQ. Coll. II, 139. 1788, nec L., WAHLBG. o. SM.; *wulfeniana* WILLD., Sp. pl. IV, 660. 1805, nec SM.). — Kahle W. — I. G. nur D. Württbg., bayr. Alp. OU.**) Alp., Voralp., Kroat., Bosn. Sch. fehl. — Standort: vgl. *grandifolia*, im übrigen *hastata*.

$\gg$ Trgb. fast ganz schwärzlich, lang weißzottig.

35. *S. barclayi****): b , 1 m (ob mehr?), Zw. nur ganz jung seidig-zottig o. kahl, Kn. gelbbraun, vom B.-Stiel Grund $\pm$ verhüllt, B. an BEBBS Expl.) kahl, nur oberseits auf Rippe und B.-Stiel $\pm$ beh., unten weißl. blaugrün, Rippe gelb (Fig. 12 t), 4—7:1.5—2.5 cm, Grund z. T. gerundet, Adernetz analog *cordata*: Neb. klein (ca. 3 mm)

*) Nach KOEHNE beh., was ich nie sah.

**) In Tirol tritt noch die var. *cratargifolia* ANDERSS. in DC. Prodr. XV, 2, 259. 1868 (*S. crat.* BERTOL., in Desv. Journ. Bot. III, 76. 1873) auf, die durch anfangs $\pm$ beh., später oben kaum glänzende B. kürzeren Frkn.-Stiel und zottigere Trgb. abweicht.

***) Ich fasse diese Weide im Sinne von BEBBS., in Bot. Gaz. III, 21. 1878 und Herl. Sal. Am. 1876. Diese und viele andere amerik. Spezies bedürfen noch eingehender Untersuchungen. Die neueste Übersicht über die nordostamerik. Weiden, wie sie BRITTONS Manual von 1901 gibt, teilt die Merkmale zu wenig scharf. Spezielle Arbeiten über die ganze Gruppe fehlen aus neuester Zeit und das in Zeitschriften verstreute Einzelne genügt nicht, die Arten auseinander zu halten, deren es viel mehr gibt, als ANDERSSON 1868 kannte.

dreieckig, gezähnt: Stiel ca. 8 mm; Bl. wie Fig. 11t (nur ♀ bekannt); Blst. bis 5:1,2 cm, Stiel mit 2—3 kl. B.chen.

S. b. ANDERSS., Ofvers. of Wet. Aks. Förh. 1858, 125. — N.-Am. (Alaska [Kodiak, Sitka], bei Chicago, Illinois, Fountaindale, . . . Ob echt in Kultur?

Von im Gebiet wild beobachteten oder in Gärten kultivierten Bastarden der *Hastatae* sind noch zu nennen:

30×37 *S. cordata* × *nigricans*: SCHROEDER, ex ZBL., H. d. D. D. G. 35. 1903. Herr ZABEL sandte mir diesen Bastard. Allein das Expl. ist mir recht fraglich.

30×52 *S. cordata* × *sericea*: *S. myricoides* MÜHLBG.*), in Neue Schrift. Ges. Nat. Fr. Berlin IV, 236. 1803 (*S. angustata* PURSH, Fl. am sept. 613. 1814). B. vgl. Fig. 25h rechts, sonst noch von *cordata* abweichend durch: Gr. kürzer, Frkn.-Stiel länger, Frkn. beh.

30×59 *S. cordata* × *purpurea* soll nach ZABEL im H. d. D. D. G. in Kultur entstanden sein.

30×61 *S. cordata* × *purpurea*: ZABEL, l. c. 38. — Auch diesen Bastard sah ich im Herb. ZABEL. Aber auch hier mir Deutung noch fraglich.

32×37 *S. pyrolaefolia* × *nigricans*: SCHROEDER, ex ZBL., l. c. 35. — Diesen, mir aus Herb. ZABEL bekannt gewordenen Bastard möchte ich als *S. schroederiana* bezeichnen. Es ist ein ♂ Expl., das wohl nicht jeden Zweifel an der richtigen Deutung ausschließt, aber schon in den obs. Sp. auf *pyrolaefolia* deutet, während sonst Manches an *nigricans* gemahnt.

33×34×37 *S. hastata* × *glabra* × *nigricans*: *S. stenostachya* KERN., in Öst. Bot. Zeit. XIV, 188. 1864.

33×39 *S. hastata* × *bicolor*: *S. rhaetica* KERN., Herb. Sal. n. 119. 1870.

33×40 *S. hastata* × *arbuscula*: *S. combinata* HUTER, in Verh. z. b. Ges. Wien XLI. Sitzb. 21. 1891.

33×44 *S. hastata* × *silesiaca*: *S. chlorophana* ANDERSS., Mon. Sal. 178. 1867**).

33×57 *S. hastata* × *caesia*: *S. huguenini* BRÜGGE, in Jahrb. Natf. Ges. Graubünden XXV, 104. 1882.

34×37 *S. glabra* × *nigricans*: *S. subglabra* KERN., in Verh. z. b. Ges. Wien X, 257. 1860.

34×43 *S. glabra* × *cinerea*: nach ZABEL in H. d. D. D. G. (vom Comer See).

34×45 *S. glabra* × *grandifolia*: *S. bifax* WOLOSZ., in Östr. Bot. Zeit. 1888. 225 (*laxiflora* KERN., Herb. sal. n. 96. 1869, non BORR.).

β'. Zw. lang seidig-zottig oder . . . grau kurzhaarig-filzig.

α''. B. bleibend seidig-zottig, oberseits mit ca. $\frac{1}{3}$ so viel Sp. als unterseits.

Sekt. 16. *Adenophyllae*: b. bis 2,5 m. B. im Alter nur mäßig kahlend, fein dicht gesägt. Neb. groß: Blst. mit B. dichtzottig. Trgb. hellbräunlich, an Spitze wenig dunkler: Frkn.-Stiel kaum — Drüse.

36. *S. adenophylla*: sparriger b. 1—2,5 m; Zw., Kn. und B. durchaus dicht lang anliegend weiß seidig-zottig. B. vgl. Fig. 25i, 3—6: 1,5 bis 3,5 cm, Grund auch rundlich, Stiel etwa 0,5 cm; ⁷ Blz. . . Fig. 27a. Blst. bis 2,5—0,7 cm.

S. a. HOOK., Fl. bor. Am. II, 146. 1839. — Eukalyptus-W.; furry w. — N.-Am. Labrador bis Ontario, Pennsylv., Michigan. Ufer. IV—V. Schöne Zier-W.!

β''. B. meist bis auf Nerven kahlend, obs. Sp. fehl.

Sekt. 17. *Nigricantes* [KERNER, in Verh. z. b. Ges. Wien X, 235. 1860 ex parte] b. bis 4 m, selten b. B. jung mit oben deutl. vertieftem Adernetz: im Verwelken schwärzend, Neb. meist groß und bleibend, Blst. vor o. mit B., sitzend o. . . gestielt. Trgb. an Spitze schwärzlichrot, Stbf.

*) Nach BEBB, Herb. Sal. Am. No. 12—17. 1879.

**) Unter eine angebliche *hastata* × *grandifolia* [BUSER, vgl. WOHLF., in KOCH, Syn. ed. III, 2337. 1903.

und Frkn. zuw. beh., Stiel 2–3mal länger als Drüse. Fr.-Klappen schneckenförmig zurückgerollt.

Fig. 22. *Salix*. a–e *nigricans*: a ⊙ Zw., b–c Kn., d Kn.-Q.-Schnitt, e Zw.-Q.-Schnitt (1' — Epidermis, 2a — Hypoderm, 2 — Rindenparenchym, 3 — Innenrinde (Bast), 3' — mechanische Elemente (primäre Bastfasern), 4 — Cambium, 5 — Holz, 6 — Markkrone, 6' — Mark; — f–m *glabra*: f–h ⊙ Zw. (f im Endteil, h im unteren Teil, g mit gepaart stehenden Kn. αα, i Kn., k B.-N., l Kn.-Q.-Schnitt, m Q.-Schnitt einer unteren Kn.; — n–t: *glabra*: n ⊙ Zw., o B.-N., p Kn.-Q.-Schnitt, q ⊙ Zw., r Kn.-Q.-Schnitt, s–t wie e (Orig. nach C. K. SCHNEIDER).

37. *S. nigricans*: düsterer b. 0,5–2–4, selten b. 6–8 m; Zw. rutig, oft noch (⊙) etwas beh., dunkelrotbraun o. gelblichgrün. Kn. meist ⊙ kurz beh.; B. sehr variabel (Fig. 25c–d, jung ⊙ beh., später oben meist ganz, unten ⊙ kahlend, oben tief-, unten ⊙ blaugrün, mit grüner Spitze und hfg. auch grünem Rande, die 6–12 Seit.-Nerven scharf hervortretend, 2–10:1,2–4,5 cm, Stiel bis fast 2 cm, Bl. vgl. Fig. 24g i, x Blst. 1–2,5:0,8–1,6 cm, am Grunde hfg. mit 3 bis 6 Behen. ⊙ schwächlicher, N. ei- o. keilfg., ausgerandet o. 2lappig, meist ausgebreitet. Infolge ihrer großen Variabilität hat man ~ Formen unterschieden, auf die hier nicht eingegangen werden kann.

S. n. SM., in Trans. Lin. Soc. VI, 120. 1802 (⊙ *spadicea* CHAIX, in VILL. Hist. pl. Dauph. I, 373. 1786; *phylicifolia* WAHLBERG., Fl. Lap. 482. 1812, non SM. ⊙). Schwarze W.; dark broad-leaved w.; s. noirissant. — L. G. z. T. hfg., teils sehr zerstr. (fehlt wohl nur O. [Mähr., Istr.], sonst fast noch ganz Eur. ausgenommen Span., größt. Teil von Frankr., S.-Ital. und Griechenl., ob N.-As? — Mit Vorliebe im Berglande, an Bächen, auf Wiesen, Hoch- und Niederungs-Mooren, Auen u. dgl. — Blz. IV–V. Die zarten Ruten hier und da als Flechtwerk geschätzt, sonst nur Zier-W.

*) Was LINNÉ unter seiner *phylicifolia* (Sp. pl. 1016. 1753) für eine Art verstand, ist fraglich. Vielleicht weder *nigricans* noch *bicolor*, die beide nicht selten als *phylicifolia* L. bezeichnet werden.

Von den ∞ im Gebiet aufgefundenen Bastarden der *Nigricantes* sind noch zu nennen:

37 $\times$ 39 *S. nigricans* $\times$ *bicolor*: *S. tetrapla* WALK., Ess. 408, ex K. KOCH, Dendr. II, 578. 1872.

37 $\times$ 40 *S. nigricans* $\times$ *arbuscula*: *S. kraetthiana* BRUEGG., in Jahrb. Naturf. Ges. Graubünden XXV, 105. 1882.

37 $\times$ 48 *S. nigricans* $\times$ *aurita*: *S. coriacea* [SCHLEICH] FORB., Sal. Wob. n. 112. 1829 (vgl. WOHLF., in KOCH, Syn. ed. III, 2347. 1903).

37 $\times$ 46 *S. nigricans* $\times$ *caprea*: *S. latifolia* FORB., Sal. Wob. n. 118. 1828.

37 $\times$ 43 *S. nigricans* $\times$ *cinerea*: in den Formen: *S. fallax* WOLOSZ., in Verh. z. b. Ges. Wien XXV, 499. 1875; *nitida* WIM., Sal. Eur. 224. 1866 (*hammerli* H. BRAUN, in Öst. b. Z. XXXI, 107. 1881); *vaudensis* [SCHLEICH] FORB., Sal. Wob. n. 117. 1828; *puberula* DOELL, Fl. Bad. 518. 1859.

37 $\times$ 49 *S. nigricans* $\times$ *livida*: *S. pseudomyrtilodes* WOHLF., in KOCH, Syn. ed. III, 2350. 1903 (*myrtilodes* DOELL., Fl. Bad. 522. 1859, nec HARTM., non FRIES.).

37 $\times$ 57 *S. nigricans* $\times$ *caesia*: *S. landaueri* A. MEYER, in Allg. bot. Zeitschr. 1902, 74.

b'. Frkn. oder wenigstens dessen Stiel beh.

Sekt. 18. *Phyllicifoliae* ANDERSS., in DC. Prodr. XVI, 2. 240. 1868. — $\varnothing$, 0,2–3 m. $\odot$ Zw. kahl o. nur spärlich beh., B. breit-eifg. bis lanzettlich, oben $\pm$ glänzend grün, unten heller bis blaugrau; Blst. sitzend o. $\pm$ gestielt, vor o. mit B.; Trgb. wenig beh.; Frkn. zuw. kahl. Gr. dünn. N. länglich-bogig, Drüse schmaleifg. bis oblong. Fr.-Klappen schneckenfg. zurückgerollt o. $\pm$ sichelfg.

○ Frkn. kahl, nur Stiel beh., B. obers. mit etwa $\frac{1}{3}$ so viel Sp. als unterseits.

38. *S. milichhoferi*: $\varnothing$ bis über 2 m; Zw. rot- o. purpurbraun, jung heller, kurz beh., Kn. zweifarben, fein hell beh.; B. Fig. 19q 3–7:1–1,8 cm, B. höchstens jung oben auf Rippe $\pm$ beh., sonst kahl, unten wenig heller als oben, Stiel 0,5–1 cm, oben $\pm$ fein beh., Neb. abfällig, eilanzettlich; Bl. vgl. Fig. 20c–d; Blst. kurz gestielt o. Stiele oft fast $\pm$ Blst., diese etwa 2,5–3:1,3 cm, Trgb. dunkel, Drüse relativ groß und zuw. abgestutzt.

S. m. SAUT., in Flora XXXII, 662. 1849. — Salzburg, Tirol, bis 2000 m. — Seltener Zier- $\varnothing$.

○○ Frkn. beh., B. ohne obs. Sp.

* Frkn.-Stiel 2–3mal so lang wie Drüse.

B. 3–4:1. Blst. vor den B. erscheinend, meist sitzend.

38a. *S. discolor*: $\varnothing$ $\varnothing$ bis 7:0,3 m, Zw. purpurbraun, meist nur jung $\pm$ beh., Kn. gelbbraun, glänzend; B. (Fig. 26a) 4–9(–10):1,5–3,5 cm, vgl. *var.*, Stiel 0,6–1,2–2,4 cm, Neb. mäßig groß, abfällig; Blst. dicht, $\varnothing$ bis 4:1,8 cm, $\varnothing$ bis 3:1,4, zur Frz. bis 7 cm, Bl. vgl. Fig. 11u–u¹, aber Gr. nicht immer so lang.

Man kann folgende, auch als Arten gefaßte Varietäten unterscheiden: a. *typica*: $\varnothing$ Zw. kahl, B. nur jung beh., später dünnhäutig, oben lebhaft hellgrün, unten weißgrau, Blst. lange vor B., kurz und dick, doch mäßig seidig, Gr. relativ kurz. b. *crinocephala* [ANDERSS., in DC. Prodr. XVI, 2, 225. 1868] (*S. cr.* MICHX., Flor. bor. Am. II, 225. 1893), $\varnothing$ Zw. $\pm$ fein beh., B. unters. bleibend beh. und mehr blaugrau, Textur derber; Blst. dichter seidig beh. c. *prinoides* [ANDERSS., l. c.] *prinoides* PURSH, Fl. Am. Sept. II, 613. 1814., wie b, doch $\varnothing$ Zw. kahl, B. schmaler und weißlicher unten, Blst. schwächer, Frkn. lockerer beh. und Gr. länger.

S. d. MUHLBG., in Neue Schr. Natf. Fr. Berlin IV, 234. 1803. — Verschiedenfarbige W.; glaucous, pussy or chestnut-oak w. — N.-Am. und zwar: *var. a.* Neu-Schottl. bis Manitoba, Delaware und Missouri. *var. b.* Neu-Engl., bis Pennsylv.

und Illinois — *var. c.* New Jersey bis Virginia. — An feuchten Orten. — III—IV.
— Schöne Zier-W., in den Gärten teils als *tristis*, teils als *humilis*.

++ B. $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$:1, Blst. mit B., $\pm$ gestielt.

39. *S. bicolor*: In Tracht etwa die Mitte zwischen *nigricans* und *arbuscula* haltender b., meist nicht über 1—2, zuw. aber 3 (= 5) m, kurzästig, Zw. steif aufrecht, kahl, glänzend braun, Kn. zuw. leicht beh., B. (Fig. 19b), meist nur entfernt, selten gröber gesägt, nur ganz jung etwas seidig beh., oben glänzendgrün, unten blaugrün o. bläulichweiß, nur Hauptnerven stark hervortretend, 2—9:0,6—4,5 cm, Stiel 0,8—1 cm, Neb. fehl. o. klein-lanzettlich, Bl. vgl. Fig. 24k—l, ♂ Blst. 2—2,6:1,2—1,5 cm; ♀ 1,5—3,5:0,8—1,2 cm, Gr. hfg. + gespalten, Trgb. länger zottig als bei *nigricans*.

S. b. EHRH., Beitr. V, 162, 1790 (*phylicifolia* SM., in Fl. lapp. ed. II, 291, 1793; *weigeltiana* WILLD., Sp. pl. IV, 678, 1805^{*)}). Zweifarbiges W.; tea-leaved w.; s. *phylicia*. I. G. D. wild wohl nur Riesengeb., Elsaß, Harz, Holstein, OU, Böhmen, Tirol, Karp., Galiz., Sch. M.- und W.-Zentral-Alp., Ct. U., W., F.; sonst noch Pyrenäen, Montenegro, N.-Eur. (Engl. bis Rußl.) und Sib. Bildet nach KERNER in den Alpen an den Ufern der Gletscherbäche mit *S. pentandra*, *Alnus alnobetula* und *Lonicera nigra*, in höheren Lagen auch mit *S. helvetica* und *hastata* eine eigenartige Buschformation. — Blz. IV—V. — Hübsche Zier-W.

** Frkn.-Stiel kürzer als die längliche Drüse.

40. *S. arbuscula*: sehr variabler Hochgebirgsstrauch, 0,3—1 m, bald niederliegend, bald aufrecht „bäumchenartig“, buschig, dichtbelaubt, Kn. und Zw. selten + beh., B. ganzrandig o. durchweg gesägt (Fig. 19p) 1—5:0,6—2 cm, oben tiefgrün, etwas glänzend, unten blaugrün o. grau, Rippe gelb; Neb. sehr klein o. fehl.; Bl. vgl. Fig. 24q—u; ♂ Blst. 1,5 bis 2,6:2,8—1,2 cm, ♀ 1,5—3:0,5—0,8 cm.

var. a. erecta ANDERSS., Mon. Sal. 146, 1867 (*var. typica* KOEHNE, Dendr. 96, 1893), aufrechter, dickästiger b., hierher: *f. waldsteiniana* [KOCH, Syn. 658, 1837] (*S. wald.* WILLD., Sp. pl. IV, 679, 1805; *f. ovalifolia* ANDERSS., l. c.). B. etwa 2:1, beidseitig gleichmäßig verschmälert, ganzrandig o. fast so, Seit.-Nerv. ca. 8—10; *f. grandifolia* ANDERSS., l. c. B. bis 3:1, ringsum deutl. kerbsäsig, Seiten-nerven 10—16; *f. angustifolia* ANDERSS., l. c. Höchstens 1 m hoch, sehr dicht und kurzzweigiger b., Zw. + rötlich, B. ähnlich *f. grandifolia*, nur kleiner. Übergänge zwischen diesen Formen vorh. *b. foetida* KOCH, Syn. 658, 1837 [SCHLEICH] (*humilis* ANDERSS., l. c.), niedergestreckter b., B. bis 2, in Kultur bis 4 cm lang, drüsig gesägt, in Bl. keine durchgreif. Unterschiede vorh. **).

S. a. L., Sp. pl. 1018, 1753 (*myrtilloides* VILL., Hist. pl. Dauph. II, 770, 1787, non L.; *glauca* WILLD., Berl. Baumz. 388, 1796, non L.). — Bäumchen-W. — I. G. D. nur bayr. Alp., OU Alp., Voralp., Karp., Kroat. und Bosn., Sch. Zentral-Alp.; sonst noch übrige Alp., Pyrenäen, Bulg. (Balkan), N.-Eur.-Gebirge, Kauk., Sib. Subalpin o. alpin, nach KERNER vorzugleich an feuchten, nach W. exponierten Lehnen. — Blz. V—VII. — Nur Zier-b.

Von Bastarden der *Phylicifoliae* kommen für uns noch in Betracht:

39×44 *S. bicolor* × *silesiaca*: *S. paxii* WOLOSZ., in Öst. bot. Zeit. XLII, 233, 1891.

39×46 *S. bicolor* × *caprea*: *S. laurina* SM., in Trans. Lin. Soc. VI, 122, 1802.

39×43×46 *S. bicolor* × *cinerea* × *caprea*: *S. tephrocarpa* WIM., in Abh. Schles. Ges. 129, 1861.

^{*)} *S. hegetschweileri* HEER ist nach mir vorliegendem Material vom Originalstandort als Synonym zu *bicolor* zu stellen; nach WOHLFARTH (in KOCH, Syn. ed. III, 2317, 1903) gehen unter *hegetschweileri* auch *hastata*-Formen.

^{**) KOEHNE'S gegenteilige Angabe (in Dendrol. 97, 1893) beruht auf Irrtum, was auch aus dem Hinweis in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. VIII, 53, 1898 hervorgeht, wo er für diese Varietät ~ obs. Sp. angibt. Jedenfalls hat er echte Exemplare nicht in Händen gehabt.}

39×48 *S. bicolor* × *aurita*: *S. ludificans* WHITE, in Jour. Lin. Soc. XXVII, 405. 1890. Ob identisch mit *phylicifolia* × *aurita* ZABEL, in H. d. D. D. 27?

39×54 *S. bicolor* × *repens*: *S. schraderiana* WILLD., Spec. pl. IV, 695. 1805.

40×45 *S. arbuscula* × *grandifolia*: *S. fruticulosa* KERN., in Öst. bot. Zeit. XIV, 368. 1864.

40×50 *S. arbuscula* × *myrtilloides*: von ZABEL im H. d. D. D. G. als „Gartenzögling“ angeführt.

Fig. 23. *Salix*-B.: a *hierotii*; links B.-Rand; — *b japonica*; — c—d *daphnoides* (c links B.-Rand); — e *acutifolia*; rechts B.-Rand; — f *laschiana*; — g *holosericea*; — i *zeimerviana*; — k *hartwegiana*; — l *rubra*; — m *purpurea*; — n *pyrolaeifolia*; — o *hastata* (alle B. n. Gr.) (b nach V. SEEMEN, sonst Original).

c *Brachystylae* V. SEEM., Sal. jap. 17. 1903. Gr. fehl. o. höchstens von N.-Länge.

2) siehe S. 63.

1) B. $1\frac{1}{2}$ —3:1, groß bis sehr groß.

a) B. kahl, glatt, häutig, fein drüsig gesägt, Adernetz nicht hervortretend, Gr. ± fehl.

Sekt. 19. *Balsamiferae*: $\bar{b}$ — $\bar{b}$, Zw. kräftig, kahl; B. ohne obs. Sp., jung etwas balsamisch, Neb. fehl. o. klein, Blst. mit B., gestielt; Frkn.-Stiel 6—8 mal so lang wie Drüse.

41. *S. balsamifera*^{*)}: reich und regelmäßig verzweigter $\bar{b}$, bis 3 m, seltener $\bar{b}$, bis 8 m: Äste tief grau, glattborkig, Zw. anfangs olivgrün, $\bar{c}$ rotbraun, lichtseitig stärker gerötet, Kn. dgl., stark zusammengedrückt; B. (Fig. 23k) eifg. bis eilanzettlich, Basis rund o. $\pm$ herzförmig, 4—9:2—4,5 cm, jung rötlich u. zuw. mit verstr. Beh., später oben tiefgrün, unten heller bis bläulich, Stiel relativ lang, 1,5—3 cm; Bl. vgl. 20a—b, σ Blst. sehr seidig, bis 3—4,5:1,4 cm, Trgb. rötlich, A. jung rot, σ Blst. bis 6 cm, schwächer, N. 2-spaltig, dick, ausgebreitet, 2-lappig.

S. b. BARR., in HOOK. Fl. Bor. Am. II, 149, 1839 (*cordata* β . *balsamifera* HOOK., l. c.; *pyrolifolia* ANDERSS., in DC. Prodr. XVI, 2, 254, 1868, nec LEDEB.).

Balsam-W.; balsam w.; N.-Am. (Labrador bis N.-Maine, N.-New Hampshire, New York, Saskatchewan, N.-Michigan und N.-Minnesota) — Feuchte Stellen. Blz. V. — Nach SARGENT besonders im Winter schön: when the bright scarlet buds make the shining branches conspicuous!

β) B. meist beh., jedenfalls Adernetz ziemlich auffällig (runzelig) hervortretend, Gr. kurz o. fehl.

Sekt. 20. *Capreae*^{***)} ANDERSS., in DC. Prodr. XVI, 2, 215, 1868 [KOCH] (*Rugosae* KERNER, in Verh. z. b. Ges. Wien X, 52, 1860) $\bar{b}$ — $\bar{b}$, im alpinen Gebiet oft sehr niedrig, B. breit eifg. bis lanzettlich, ganzrandig o. grobkerbig gesägt, obs. Sp. fehl., jung meist dicht beh., später oben trübgrün, σ ganz kahl, mit oben vertieftem, unten vorspringendem Adernetz, welk sich bräunend; Neb. meist groß, Blst. vor o. mit B., sitzend bis deutlich gestielt; Frkn. selten kahl, Drüse kürzer als Stiel, N. dick, selten länglich, Stbf. selten verwachsen, A. jung meist goldgelb, Fr.-Klappen schneckenförmig zurückgerollt.

$\bar{c}$ $\bar{c}$ und σ Zw. gleich den Kn. dicht kürzer oder länger filzig beh. σ Stbf. verwachsen, B. sehr groß, im Mittel nicht unter 9 cm lang, oberseits sattgrün und zuletzt fast kahl. ○○ siehe S. 58.

42. *S. medemii*: üppiger, bis 4 m hoher $\bar{b}$ (in Heimat wohl höher), Zw. dick, Kn. groß und dick; B. (Fig. 15h), an kult. Expl. bis 16:6 cm, an orientalischen^{*)} z. T. nur bis 9:2,8 cm, Rand unregelmäßig kerbsäggig, jung beiders., unten dichter beh., später oben bis auf Rippe kahlend, unten verstr. beh., blau-weißlichgrau, Rippe gelb, dgl. die stark hervortretenden ca. 9—12 Haupt-Seit.-Nerven, Adernetz weitmaschig, Stiel bis 2 cm; Bl. vgl. Fig. 20e—f, σ Blst. sehr dick, bis 3,5:2 cm, am Grunde mit einigen Sch.-Behen, sehr zeitig vor B. erscheinend, σ Blst. bis 5:1,4 cm, zur Frz. bis 9 cm, Bl. stark an *cinerea* gemahnend.

*) Da ich nur junge sterile Pflanzen sah, gebe ich die Beschreibung im Wesentlichen nach einer Notiz in Garden and Forest I. 246.

**) Die im H. d. D. D. G. hieher gezählte *S. saboldiana* BLUME ist nicht in Kultur und gehört infolge der teilweise nur 1 Stbf. besitzenden σ Bl. zu einer besonderen Gruppe, den *Saboldianae* (vgl. S. 69). — Die ferner erwähnten *S. scouleriana* BARR. und *geyeriana* ANDERSS. sind mir weder aus Kultur- noch aus Herbar-Expl. bekannt.

**) Leg. SINTENIS, 1890 94 in Turk.-Armen, sub No. 2741, bez. 5523 ausgegeben.

44. *S. silesiaca*: meist b. 0,6—1,5 cm, untere Aste $\pm$ bogig abstehend. $\odot$ Zw. fast kahl, oliv- o. rotbräunlich. Kn. dgl., B. vgl. Fig. 25a, blutrot austreibend, in Nervatur und Beh. analog *grandifolia*, aber selten ausgesprochen verkehrt eifg., oben glatt, zuw. auch unten ganz kahlend, bis 10:5 cm, Stiel 0,6—1,2 cm. Bl. vgl. Fig. 24p, sonst wie *grandifolia*, nur Blst. etwas schwächer, bis 4 cm lang, Trgb. meist kürzer als Frkn.-Stiel.

S. s. WILLD., Sp. pl. IV, 660. 1805 (*mauschkii* HART., Naturg. forstl. Kult. 396. 1851). — Schlesische W. Nach KERNER nördl. Parallelförm von *grandifolia*,

Fig. 25. *Salix*-B.: a *silesiaca*; — b *smithiana*; — c—d *nigricans*; — e (fehlt); f — *cinerea*; — h links oben *cordata* var. *typica*; rechts unten *myricoides*; *adenophylla*; links B.-Rand; — k *glauca*; l *lanata* (alle B. $\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

von deutsch Schles., durch Böhm., Mähr., Karp., Bosn., Herzeg., ob auch Kauk.?
— Sonst wie folgende.

✱✱ Frkn. stets beh., B. unterseits deutlich blaugrau.

• Zw. meist $\pm$ beh., B. im Mittel nicht unter 6—10 cm lang.
Adernetz der B. unterseits sehr scharf und engmaschig. Blst.
mäßig seidig zottig, am Grunde nur mit 1—3 kleinen Sch.-
B.chen.

45. *S. grandifolia*: sparriger $\text{\textcircled{H}}$, 0.75—2.5 m, seltener $\text{\textcircled{H}}$, bis
6 m, dann meist mit kurzem, wenig verästeltm St., Kn. stroh- bis rost-
gelb, $\pm$ beh. o. kahl, B. (Fig. 15b) 5—15(—18):3—5(—9) cm, zu-
letzt derbhäutig, gewöhnlich oben bald kahl und tiefgrün, gelblich aus-
treibend: Stiel bis 2 cm, Neb. herznierenfg., meist gut entwickelt, Bl.
vgl. Fig. 24d—f, σ Blst. 1.5—2.5:1—1.2 cm, φ 1.5—3:0.8—1 cm,
Trgb. meist nicht länger als Frkn.-Stiel, dieser zur Frz. sehr verlängert,
Fr. ihm unter stumpfem Winkel [KERNER] aufsitzend, N. abstehend.

var. a. *vulgaris* WIM., Sal. eur. 66. 1866 (var. *typica* BECK, Fl. Nied.-Östr.
292. 1890), B. oben kahlend, hierher *f. latifolia* [KERNER, in Verh. z. b. Ges.
Wien. X, 243. 1866] (var. *fagifolia* WIM., l. c. 1866), B. breit oval, Basis ge-
rundet, 2—3:1, und *f. angustifolia* [KERNER, l. c.] (var. *lanceifolia* WIM., l. c.), B.
aus keiligem Grunde etwa 4:1. — b. *albicans* BECK, l. c. 1890 (*S. alb.* BONJEAN,
in SER. Ess. saul. Suisse 21. 1815; var. *lanata* GAUD., Fl. helv. VI, 248. 1830; var.
pubescens ANDERSS., in DC. Prodr. XVI, 2, 217. 1868), B. oben und besonders
unten dicht grau beh.

S. g. SER., Ess. saule Suisse 20. 1815 (? *appendiculata* VILL., Hist. pl. Dauph.
III, 775. 1789). — Großblättrige W.; s. à grandes feuilles — I. G. D. nur Bad.,
bayr. Alp. O. — verbr., fehlt aber Böhm., Mähr., Schles. und U., Sch. zerstreut;
sonst noch S.-Frankr., Serb., Bulg., Montenegro. Montan bis subalpin, gern auf
Kalk, in feuchtem Boden, besonders nördl. Lagen. Blz. IV—V(—VI). — Nur
Zier-b.

• Adernetz etwas weitmaschiger, Blst. dickpelzig, am Grunde
mit 4—7 Sch.-B.chen.

46. *S. caprea*: b $\text{\textcircled{H}}$ mit sparriger Krone, 3—7(—10) m, Rinde
anfangs feinrissig, später breitrissige Borke, Zw. nicht selten $\text{\textcircled{H}}$ fast
ganz kahl, oliv- o. rotbraun, Kn. zuletzt meist kahl, dick: B. (Fig. 15b)
variabel, $\pm$ ganzrandig o. unregelm. kerbsäggig, zuletzt oben kahl und
glänzend grün, 4—10(—14):3—6(—10) cm, Stiel bis 2.3 cm, Neb. meist
deutlich: Bl. vgl. Fig. 11v—v², σ Blst. 3—4.6:1.8—2.5 cm, φ 1.5—
4:1.2—2.6 cm, Frkn.-Stiel meist etwas kürzer als Trgb., zur Frz. kaum
länger, N. zusammenneigend.

Variiert sehr, markante Formen sind z. B.: *f. aurigera* [SCHUR., Enum. pl.
Transs. 620. 1866] Zw. goldgelb rindig; *f. elliptica* [KERNER, in Verh. z. b. Ges.
Wien X, 248. 1866], B. elliptisch, beidseitig spitz, etwa 2:1; *f. orbiculata* [KERNER,
l. c.], B. rundl., Grund $\pm$ herzförmig, Spitze zurückgekrümmt.

S. c. L., Sp. pl. 1020. 1753. — Sahl-, Saal- o. Sool-W.; goat w.; le marceau.
I. G. hfg., sonst fast ganz Eur., Or., Kauk., N.-As. bis Amurgeb. — Vorzüglich
im lichten Mischwalde (mit Birke, Föhre und Zitterpappel), auf Holzschlägen,
Wiesen etc., in den Alp. bis 1500 m. Blz. fast mit *daphnoides*, vor *aurita* und
grandifolia. — Fast nur Zier-b., doch hier und da Holz (als relativ bestes aller W.)
als Brennholz, zu Pfählen, Faschinen etc. verwendet.

✱✱ • Zw. stets kahl (vgl. Anm. unten), B. meist nicht über 4—5 cm
lang im Mittel.

*) Wenn $\text{\textcircled{H}}$ Zw. $\pm$ beh. und alte B. oberseits kurz beh. vgl. *aurita*.

- Zw. und B. wenigstens im Anfang — reichlich beh., B. auch später meist oberseits — fein beh., feines Adernetz unterseits ziemlich scharf.
- B. 3—9:2—3,5 cm, zuletzt oben ± glänzend, unten blaugrau und mäßig beh.

47. *S. bebbiana*: b, 2—6 m, o. b, bis 8 m; ⊙ Zw. rund, rotbraun, Kn. schnabelfg., zweifarben, meist kahl: B. (Fig. 12s), aus rundl. o. keiliger Basis eielliptisch o. eilänglich, mit — kurz aufgesetzter Spitze, unregelm. gesägt bis ganzrandig, selten zuletzt ganz kahl, Stiel 0,4—1,2 cm, oben — beh.: Bl. vgl. Fig. 11w — w²: ♂ Blst. mäßig zottig, 2—2,5 cm, — sitzend (vor B.) oder kurz gestielt mit kleinen B.chen am Grunde (mit B.-Ausbruch), Stbf. kahl, ♀ Blst. schwächer, zur Frz. bis 5 cm, Gr. fast fehl., N. — spreizend o. zusammenneigend, Fr. sehr dünn langkonisch, 5—6 mm auf 1/2 so langem Stiele.

S. b. SARG., in Gard. and For. VIII, 463. 1895 (*S. rostrata* RICH., in Frank. Jour. App. No. 7, 765. 1823, nec THILL. 1799; *vagans* β *rostrata* ANDERSS., in DC. Prodr. XVI, 2, 227. 1868). — N.-Am. (Anticosti bis Hudson-Bai und Brit.-Kol., südl. bis New Jersey, Pennsylv., Nebraska und Utah). — Ufer und zieml. trockne Böden. — Blz. IV—V. — Selten echt in Kultur (als *livida rostrata* gehend).

- B. 2—5(—7):1—3 cm, oben runzelig, trübgrün, unten ± weich beh. bleibend.

48. *S. aurita*: b, 0,4—2(—3) m, meist kurz- und dünnästig. ⊙ Zw. schwarzbraun, Kn. rot- o. gelbl.-braun, fein beh.: B. (Fig. 15m), unterseits — schmutziggrau, Adernetz sehr eng; Stiel 0,4—0,8 cm; Neb. meist bleibend; Bl. vgl. Fig. 27g — h., Blst. mehr *grandifolia* als *caprea* ähnelnd, nur 0,6—2 cm lang, Trgb. meist kürzer als Frkn.-Stiel, dieser zur Frz. stark verlängert, N. abstehend. Nicht selten Blst. ♂ und ♀, bez. abnorm mißbildet.

Vielleicht formenreichste Art der *Caprea*, *var. a. typica* BECK, Fl. Nied.Östr. 288, 1890, B. rundlich-verkehrt-eifg., hierher *f. heterophylla* (*S. lat.* Host, Sal. 26, t. 87 SS. 1828); *var. oblongifolia* KERNER, in Verh. z. b. Ges. Wien X, 254, 1860, B. mehr lanzettlich; *f. cordifolia* WIM., Sal. eur. 53, 1866, B-Basis herzig; *f. rhomboidalis* [WIM., l. c.], B. groß, bis 9:3,5 cm, Schattenform!; *f. uliginosa* WIM., l. c. (*S. ul.* WILLD., Enum. Hort. Berl. 1007, 1860, Zw. zieml. lang, gerade, B. zieml. groß, auch — Schattenform: — *b. spathulata* WIM., l. c. (*S. sp.* WILLD., Sp. pl. IV, 700, 1805), niedriger und kurzästiger, B. verkehrt eilanzettl., klein, unten blaugrau.

S. a. L., Sp. pl. 1019, 1753 (*rugosa* SER., Ess. saul. Suisse 18, 1815). — Ohr- o. Salbei-W; eared w.; s. auriculé — L. G. verbr., sonst wie *caprea*, doch nicht so weit südl. gehend. — Besonders in feuchten Lagen, mit Vorliebe sumpfigen Wiesen und moorig-sumpfigen Stellen. In den Alpen bis über 1600 m. — Blz. IV—V, nach *caprea*.

- Zw. und B. meist von Anfang an kahl, feines Adernetz wenig hervortretend.

49. *S. livida*: b, 0,30—1 m, dünnästig, Zw. rutig, — glänzend, Kn. rötl., kahl: B. (Fig. 15k) nach v. SEEMEN: rundl.-eifg. bis länglich, am Grunde keilfg. und mitunter herzf., oberwärts spitz o. mit gefalteter Spitze (1 1/2—2 1/2:1, bis 5:3 cm, — kerbsäug, unterwärts meistens ganzrandig, anfangs zuw. etwas seidig beh., später oberseits sattgrün, meist kahl, glänzend, glatt, unters. blaugrün, — beh. o. kahl: Stiel 0,4—1 cm; Neb. halb-nierenfg., grob gesägt, wechselnd groß; Bl. vgl. Fig. 24b — c; Blst. auf deutl. beblätt. Stielen, ♂ rundlicher, bis 2 cm, — zylindrisch, bis 3 cm; Frkn.-Stiel meist doppelt so lang, als

das zuw. einfarbig grüne Trgb., Gr. kurz, gespalten. N. tiefteilig, abstehend, gelb.

Von Varietäten seien nur erwähnt: var **a.** *typica*: B. stets kahl, Frkn. immer beh. — **b.** *pilosa* WIM., Sal. eur. 110. 1866. B. jung beiders. beh., Frkn. beh. — **c.** *orbicularis* WIM., l. c. B. mehr rundlich und deutlicher gekerbt, Frkn. kahl. *S. l.* WAHLBG., Fl. lapp. n. 272. 1812 (= *depressa* L., Fl. succ. ed. II, 352. 1755; ? *starkiana* WILLD., Sp. pl. IV, 677. 1805). Bleifarbene W. — l. G. D. Bad., Bayr., Schles., Pos., Westpr., U. Siebb., Galiz.; sonst noch N.-Eur., N.-As. — Moorbrüche, Sümpfe. Blz. IV–V. nicht selten VII–VIII nochmals. — Zier-b.

Von den vielen Bastarden der *Capreae*, von denen die der Arten dieser Sektion unter sich oft schwer zu deuten (nach v. SEEMEN nur nach der Form der B. und der Form und Richtung der N. sicher zu bestimmen), kommen im Gebiet noch folgende vor:

a) Bastarde der *Capreae) untereinander:**

- 43×44 *S. cinerea***) × *silesiaca*: *S. subcinerea* ANDERSS., Mon. Sal. 67. 1867.
 43×45 *S. cinerea* × *grandifolia*: *S. scrobigerica* WOLOSZ., in Ö. B. Zeit. 1886. 74.
 43×46 *S. cinerea* × *caprea*: *S. reichardtii* KERN., in Verh. z. b. Ges. Wien X, 249. 1860.
 43×48 *S. cinerea* × *aurita*: *S. multinervis* DOELL, Fl. Bad. 516. 1859.
 43×49 *S. cinerea* × *livida*: *S. caerulescens* DOELL, l. c. 517.
 44×46 *S. silesiaca* × *caprea*: *S. subcaprea* ANDERSS., Mon. Sal. 67. 1867.
 44×48 *S. silesiaca* × *aurita*: *S. subaurita* ANDERSS., l. c.
 44×49 *S. silesiaca* × *livida*: *S. oslaviensis* WOLOSZ., in Ö. B. Zeit. 1891. 235.
 45×46 *S. grandifolia* × *caprea*: in den Formen: *attenuata* KERN., in Verh. z. b. Ges. Wien X, 246. 1860 und *macrophylla* KERN., l. c. 247.
 45×48 *S. grandifolia* × *aurita*: *S. limnigena* KERN., in Ö. B. Zeit. 1864. 187.
 46×48 *S. caprea* × *aurita*: *S. capreola* [J. KERN.] ANDERSS., l. c. 79. 1867.
 48×49 *S. aurita* × *livida*: *S. sublivida* [LAESTAD.] GÜRKE, in RICH. Pl. eur. II, 12. 1897 (vgl. WOHLF. in KOCH, Syn. ed. III, 2346. 1903).

b) Bastarde der *Capreae* mit Arten der folgenden Sektionen:

- 43×50 *S. cinerea* × *myrtilloides*, im H. d. D. D. G. erwähnt.
 43×54 *S. cinerea* × *repens*: *S. subsericea* DOELL, Fl. Bad. 517. 1859.
 43×57 *S. cinerea* × *incana*: *S. capnoides* A. et J. KERNER, Herb. Öst. W. IX, n. 83. 1869.
 43×61 *S. cinerea* × *purpurea*: in den Formen *sordida* KERN., in Verh. z. b. Ges. Wien X, 257. 1860 (*S. pontederana* KOCH, Comm. 24. 1828, nec WILLD.) und *rakosina* BORB., in Öst. bot. Zeit. XXXIII, 360. 1883.
 44×61 *S. silesiaca* × *purpurea*: *S. siegerti* ANDERSS., in DC. Prodr. XV, 2, 313. 1868.
 45×54 *S. grandifolia* × *repens*: *S. proteifolia* [SCHLEICH] in FORB. Sal. Wob. 75. 1829.
 45×57 *S. grandifolia* × *incana*: in den Formen *intermedia* HOST., Sal. 17, t. 56–57. 1828 und *oenipontana* A. et J. KERN., Herb. östr. W. Dec. VI, 52. 1869.
 45×61 *S. grandifolia* × *purpurea*: in den oft kaum zu unterscheidenden Formen *sphaerocephala* KERNER, in Öst. bot. Zeit. XIV, 240. 1864 (*intercedens* BECK, Fl. Nied.-Östr. III, 291. 1890) und *austriaca* HOST, Sal. 19, tab. 64–65. 1828 (*neilreichii* KERN., in Verh. z. b. Ges. Wien X, 258. 1860).
 46×51 *S. caprea* × *repens*: *S. laschiana* WOHLF., in KOCH, Syn. ed. III, 2346. 1903. B. vgl. Fig. 23f.
 46×57 *S. caprea* × *incana*: *S. oleifolia* VILL., Hist. pl. Dauph. III, 784. 1789 (*sericeana* GAUD., in SER. Ess. saul. Suisse 37. 1815; *flüggeana* WILLD., Sp. pl. IV, 709. 1805, *incana* J. KERN., in Verh. z. b. Ges. Wien XIV, 99. 1864).
 46×59 *S. caprea* × *purpurea*: in den äußerst ähnlichen Formen *immeriana* GREN. et GODR., Fl. fr. III, 130. 1855 (*discolor* HOST, Sal. 18, t. 60–61. 1828, non WAHLBG.; *maunternensis* KERN., l. c. 261. 1860; *syntrandra* BECK, Fl. Nied.-Östr. 293. 1890) B. vgl. Fig. 23i. und *traunsteineri* KERN., ex ANDERSS., in DC. Prodr. XVI, 2, 311. 1868 (*stoderana* DURRNB., in Cat. bot. Tauschv. Wien. 1894. 6).

*) Nach H. d. D. D. G. soll 46×49 *S. caprea* × *livida* in Kultur sein.

**) Über mehrere dreifache Bastarde der *Capreae* unter sich vgl. STRAEHL. in Deutsch. bot. Monatssch. XIII und XIV, ferner (mit *repens*) vgl. v. SEEM. in D. bot. Monatschr. VII, 33. 1889 (*S. strahlerti*) und in Verh. Bot. Ver. Brandbg. XXXVI, 159. 1894 (*S. aschersoniana*).

48×50 *S. aurita* × *myrtilloides*: *S. onusta* BESS., Enum. Volh. 78. 1822 (*rugulosa* ANDERSS. in DC. Prodr. XVI, 2, 230. 1868) (vgl. WOHLF., l. c. 2347).

48×54 *S. aurita* × *repens*: *S. ambigua* EHRH., Beitr. VI, 103. 1791.

48×57 *S. aurita* × *incana*: *S. patula* SER., Ess. saul. Suisse 11. 1815 (*oleae-folia* ANDERSS. in DC. Prodr. XVI, 2, 304. 1868, nec VILL.).

48×61 *S. aurita* × *purpurea*: *S. dichroa* DOELL., Fl. Bad. 511. 1859 (*auritoides* KERN., in Verh. z. b. Ges. Wien X, 257. 1860), hierher auch *S. marchica* STRAEHL., in D. bot. Monatschr. XIII, 17. 1895.

49×50 *S. livida* × *myrtilloides*: *S. hirtula* ANDERSS., Mon. Sal. 100. 1867.

49×54 *S. livida* × *repens*: *S. stenoclados* DOELL., Fl. Bad. 521. 1859.

49×61 *S. livida* × *purpurea*: *S. ritschelii* ANDERSS., in DC. Prodr. XVI, 2, 313. 1868.

2) B. 5—10:1, wenn nur 1—3:1, dann höchstens bis 3 cm lang (Zwerg- $\varnothing$).

Sekt. 21. *Argenteae* W. KOCH, Comm. 46. 1828 (*Incubaceae* FRIES, in Mantissa I, 37. 1832; *Arenariae* HARTIG, Naturg. Forstl. Kult. 1850; *Repentes* PAX. in Nat.-Pfl. III, 1, 37. 1889), Zwerg- $\varnothing$ mit unterirdisch kriechendem St., o. $\pm$ höhere $\varnothing$, B. rundl. bis linealisch, ohne obs. Sp., mit beiders. schwach hervortret. Adernetz; Blst. kurz vor o. mit B., Stbf. meist kahl, zuw. $\pm$ verwachsen, Frkn. beh. o. kahl, N. meist purp., Stiel 2 bis mehrmal so lang wie Drüse.

Subsekt. a. *Myrtilloides* [ANDERSS., in DC. Prodr. XVI, 2, 229. 1868] B. höchstens 3:1 kahl (ausgen. *myrt. var. pedicellaris*), Stbf. frei, A. jung rötlich, Frkn. kahl, Stiel bis 6 mal Drüse.

Fig. 26. *Salix*-B. a *discolor*; b *chlorophylla*; c *sibirica*; d *arctica*; e *desertorum*; f *gracilistyla*; g *hookeriana* ($\frac{2}{3}$ nat. Gr.) (Original).

50. *S. myrtilloides*: 0,15—0,6 (—1) m hoher $\varnothing$, in Tracht stark an *myrsinites* gemahnend, kahl. $\odot$ Zw. hell- o. dunkelbraun; B. an *Vaccinium myrtillus* erinnernd (Fig. 19m), 0,8—3,5:0,6—1,5, später kahl, oben satt-, unten blaugrün, hfg. $\cdot$ violett überlaufen, Rand zurückgebogen; Blst. mit B., lockerblütig, $\varnothing$ fast sitzend, etwa 1,2—1,5 cm, $\cdot$ gestielt, bis 2 cm; Bl. vgl. Fig. 21s u. Die *var. pedicellaris* ANDERSS. l. c. weicht durch schmalere, längere B. (Fig. 19n) ab.

S. m. L., Sp. pl. 1019. 1753 (*elegans* BESS., En. pl. Volh. 77. 1821). — Heidel- o. Sumpf-W.; bog w. I. G. sehr zerstr. D. Pos., Westpr., Schles., Oberbayr. OÖ., Böhm., Tirol, Kärnt., Galiz., Ung. Sch. Torfmoore der Churfürsten, sonst noch N.-Eur., Sib., Amurgeb. und N.-Am. (Neu Braunschw., Quebec bis Brit.-Col., südl. bis New Jers. und Iowa). Torfige, sumpfige Niederungen, Waldsümpfe, Torfmoore, gern auf schwimmendem *Sphagnum*. Blz IV—V. Schwer zu kultivieren!

Subsekt. b. *Repentes* [ANDERSS., l. c. 233]. B. 1—10:1, zuw. *uminalis* ähnlich beh., o. auch etwas an *Capreae* gemahnend, Frkn. meist beh., Stiel bis 5mal Drüse.

○ B. kraus beh., in der Beh. und Nervatur der B.-Unterseite ziemlich analog *S. caprea* o. *bebbiana*.

51. *S. tristis*^{*)}: buschiger, schlanktriebiger, aufrechter b, 0,3 bis 0,6 m. Zw. jung fein weich beh., — kahlend, graubraun, Kn. kurz, stumpf. beh., kürzer als die kleinen lanzettl. Neb.: B. (Fig. 12u) 2—5 (—7):0,6—1,2 (—1,4) cm, — ausgerandet gezähnt, oben verstr. beh., glänzend tiefgrün, unten weich beh., hellgraublau, selten stark kahlend, Stiel 0,2—0,5 cm; Bl. vgl. Fig. 11x—y, Blst. vor B., sehr klein, dicht, sitzend, Frst. etwa 1 cm lang.

S. t. ART., Hort. Kew. III, 393. 1789 (*mühlenbergiana* WILLD., Sp. pl. IV, 692. 1805). — Düstere W.; dwarf gray or sage w.; — N.-Am. (Maine bis Minnesota, südl. bis Florida und Tennessee). Blz. III—IV. — In trockenen Lagen. — Hübscher Zier- $\mathfrak{b}$.

○○ B. — glänzend seidig beh., Nervenetz nicht hervortretend.

— • Zw. fein beh., B. im Mittel 8:1,5 cm, unten bleibend seidig.

52. *S. sericea*: aufrechter, 1—4 m hoher b, Zw. — purpurn, Kn. dgl., klein, beh.: B. (Fig. 15g) jung dicht schimmernd seidig, später oben kahl, glänzend grün, unten blaugrau, beim Trocknen bräunend. Rand zieml. fein drüsig gesägt, Stiel 0,4—1,4 cm; Neb. sehr klein, lanzettl.; Bl. vgl. Fig. 21m—m', Blst. vor B., sitzend, mit einigen Sch.-B.chen, dicht, ♂ bis 2 cm, ♀ zur Frz. bis 4 cm lang.

S. s. MARSH., Arb. am. 140. 1785. — Seidige W.; silky w. — N.-Am. (Maine bis Michigan und Virginia). Sumpfige Stellen und Ufer. Blz. V. — Schöne Zier-W.

— • • Zw. kahl o. fast kahl, B. kleiner, wenigstens schmaler, auch unten ± kahlend.

— • B. im Mittel 7:1 cm, Rand wenigstens über dem unteren Drittel zieml. scharf gesägt, Frkn.-Stiel meist 4—6mal Drüse.

53. *S. petiolaris*: der vorigen Art sehr nahe stehender b, junge Zw. und B. nur mäßig seidig beh., bald ganz oder fast kahlend, — • Zw. und Kn. tief purpurn, kahl: B. (Fig. 12r) 5—8:0,8—1,3 cm, beim Trocknen grün bleibend; Blst. vor B., ich sah nur —, diese zur Frz. etwa 2 cm lang, Bl. vgl. Fig. 27c.

S. p. F. E. SMITH, in Trans. Lin. Soc. VI, 122. 1802. — Stiel-W.; slender w. — N.-Am. Neu Braunschw. bis NW-Territ., südl. bis Tennessee und Wisconsin. — Sonst wie *sericea*, deren Schönheit sie nicht erreicht.

— • • B. höchstens 6 cm lang, Frkn.-Stiel höchstens 3½mal Drüse.

54. *S. repens*: b mit unterirdisch kriechendem St., mitunter Polster bildend, Äste dünn, aufrecht, 0,4—1 m, selten [v. SEEMEN] 3—4 m; Zw. und Kn. jung beh., später kahlend, braun (o. bei alten b gelb); B. sehr variabel, vgl. Formen und Fig. 19c, oben glänzend o. stumpf grün, unten graugrün, Neb. klein; Blst. vor B., meist ganz kurz gestielt, ♂ 0,6—1,6:0,6—1,2 cm, — 0,5—1,2:0,5—0,8 cm, Bl. vgl. Fig. 20t—t², Trgb. an Spitze oft lebh. purpurn, Stbf. meist frei und

^{*)} Die *tristis* sehr nahe stehende, im allg. nur durch größere B. und Blst. abweichende *S. humilis* MARSH., Arbust. amer. 140. 1785, wohl kaum echt in Kultur!

kahl, selten · verwachsen und (nach KOEHNE) beh., A. jung rötl., dann gelb; N. ganz o. ± geteilt.

Folgende Varietäten und Formen seien (meist nach v. SEEMEN) angeführt
var. a. vulgaris W. KOCH, Syn. 656, 1837 erweitert (*var. cylindrica* KERNER, in Verh. z. b. Ges. Wien X, 268, 1860), B. oval o. ellipt.-lanzettlich, nicht über 5:1, etwa 1,4—6:0,5—1,8 cm, Rand · ungerollt, Spitze zurückgekrümmt, Blst. zylindrisch; hierher: *f. lanata* [S. *lanata* THUILL., Fl. Paris 516, 1790, non L.; S. *argentea* SM., Fl. brit. III, 1059, 1804; *rep. var. argentea* W. KOCH, l. c.), B. beiderseits dicht seidig beh. — *f. fusca* [W. KOCH, l. c.] (S. *fusca* WILLD., Sp. pl. IV, 694, 1805, b 0,8—1 m, Zw. gelblich, bald kahl, B. oben glänzend, fast kahl, unten — seidig beh., Frkn. zuw. kahl; *f. ruscina* STRAEHL., in Östr. B. Z. XXVII, 373, 1877, B. klein, fast kreisrund, kaum über 1 cm lang und breit, mittlere und obere an Spitze herzförmig eingeschnitten; *f. vitellina* G. MEY, nach v. SEEM. in ASCHERS. et GRAEB. Fl. nordost. Flachl. 244, 1898, Zw. dottergelb, B. schwächer beh., zuletzt auch unten kahl und graugrün. **b. angustifolia** NEILL., Fl. Wien 79, 1846 (S. *ang.* WULF., in JACQ. Coll. III, 48, 1789, non WILLD., S. *rosmarinifolia**) W. KOCH, Comm. 48, 1828, non L.), B. lineal-lanzettlich, 5—10:1, etwa 1,5—5,6:0,3—0,8 cm, Rand fast eben, Blst. kurz kugelig; hierher: *f. laeta* [v. SEEM., l. c.] (S. L. C. F. SCHULTZ, Suppl. Fl. Starg. 51, 1819), Zw. gelb, zuletzt ganz kahl.

S. r. L., Sp. pl. 1020, 1753 (*incubacea*, *fusca* et *arenaria* L., l. c.; *rostrata* THUILL., Fl. Paris 516, 1799). Kriech. o. Moor-W.; creeping w.; s. rampant. I. G. zieml. verbr., sonst noch N.-Eur., in M.-Eur. südl. bis N.-Span., N.-Ital., Serb.; Or., Türk., Zentr.-As., Sib. Feuchte sandige Lagen, Torf- und Moorwiesen. — Blz. IV—V. — Hübsche zierliche Schmuck-W.

Von Bastarden der *Argenteae* sind noch zu nennen:

50×54 S. *myrtilloides* × *repens*: S. *finmarkica* WILLD., Berl. Baumz. ed. II, 441, 1811 (*aurora* ANDERSS., Mon. sal. 101, 1867).

50×61 S. *myrtilloides* × *purpurea*: als *kochiana* TRAUTV., in H. d. D. D. G.

52×53 S. *sericea* × *petiolaris*: S. *subsericea* (*petiolaris* var. *subsericea* ANDERSS., in DC., l. c. 234; *sericea* var. *subsericea* RYDBG., in BRITT. Manual 318, 1901). Scheint unter den beiden Elternnamen in Kultur und hält nach meinen Beobachtungen zieml. genau die Mitte zwischen diesen. Nach dem H. d. D. D. G. teilt ZABEL diese Ansicht.

54×57 S. *repens* × *incana*: S. *subalpina* FORB., Sal. Wob. 185, 1828 (vgl. WOHLF., in KOCH Syn. ed. III, 2381, 1903).

54×61 S. *repens* × *purpurea*: S. *domiana* SM., Engl. Fl. IV, 213, 1828.

54×24 S. *repens* × *viminialis*: S. *frustana* ANDERSS., Mon. 121, 1867. Nach WIMMER, KERNER, v. SEEMEN wäre dies die echte S. *rosmarinifolia* L., Sp. pl. 1020, 1753. Da jedoch die Art kaum ganz sicher klarzustellen, halte ich es für richtiger, den Namen *rosmarinifolia* ganz fallen zu lassen, denn jetzt geht bald *repens vulgaris*, bald *repens angustifolia*, bald *repens* × *viminialis* als *rosmarinifolia*.

II. *Synandrac* v. SEEM., Sal. jap. 20, 1903. 3 Bl. mit 2 Stb., deren Stbf. regelmäßig ± bis ganz verwachsen sind.

a. *Dolichostylac*: Gr. mindestens 3mal so lang wie N. — B. etwa 3—5:1, unten blau o. weißgrau.

Sekt. 22. *Subviminalis* v. SEEM., l. c. 20. — ♂—♂, Zw. von Anfang an fast kahl, o. noch · beh.; B. · breit lanzettlich, spitz, knorpelig gesägt, obs. Sp. vorh.; Blst. vor o. mit B., sitzend, Bl.-Trgb. deutl. 2-farbig, Stbf. ganz verwachsen, Frkn. beh.

C · Zw. meist verstr. beh., B. vgl. Fig. 26f, unters. · beh. bleibend.

55. S. *gracilistyla****): aufrechter b, Höhe? Zweige leicht übergebogen, jung dicht kurz graufilzig, · beginnen zu kahlen, braungrau, erst ganz kahl, rotbraun, später mehr grau, Kn. schmallänglich, rotbraun, · hell beh.; B. beim Ausbruch hell seidig beh., später oben

*) Vgl. wegen der Unterdrückung dieses Namens bei *viminialis* × *repens* oben.

**) v. SEEM., l. c., stellt den Namen *thunbergiana* voran, aber DC.'s Prodr. XVI, pt. 2 erschien in pag. 161—691 erst 1868!

satt olivgrün, meist bis auf Rippe kahlend, unten grau o. blaugrau, mehr beh. bleibend, die ∞ hellen Seitennerven beiders. scharf (Fig. 26f), obs. Sp. etwa $\frac{2}{3}$ der unters., Rand fein knorpelig-gesägt, 5—10,5:1,3—3,5 cm; Neb. bis 1:0,4 cm, breit halbherzfg., spitz, beh., fast ganzrandig; Stiel 0,4—0,8 cm, beh.; Blst. vor B., aufrecht, sitzend, schön seidig, am Grunde mit kleinen Sch.-Bchen. $\frac{2}{3}$ bis 3,5:1,5 cm, Bl. vgl. Fig. 27i—k, A. gelb: — bis 8:1,5 cm, Frkn. sehr kurz gestielt! n. v. SEEMEN sitzend), Drüse bis $\frac{3}{4}$ so lang wie Frkn.

S. s. Miq., in Ann. Mus. bot. Lugd. Bat. III, 26. 1867 (*thunbergiana* BLUME, nach ANDRÉSS. in DC. XVI, 2, 271. 1868). Thunbergs W. — Jap. (Kiushiu, Nipon), Korea, O-Mandschurei. — Blz. III. In Kultur noch sehr selten, erhielt sie aus Hort. Plantières und im Herb. ZABEL, aus dessen Garten in Gotha, Herr v. SEEMEN hatte die Güte, sie zu bestimmen. Sehr interessante, wohl zieml. harte Art!

Fig. 27. *Salix*: a *adenophylla*: ♀ Bl.; — b—b³ *desertorum*: b ♀ Bl., b¹ N., b² gespaltene Drüse, b³ einfache Drüse; — c *petiolaris*: — Bl.; — d *e. polaris*: d ♀ Bl., rechts Drüse von vorn, — e ♂ Bl.; — f *chrysophylla*: — Bl., unten Drüse von vorn; — g—h *aurita*: g ♀, h ♂ Bl.; — i—k *gracilistyla*: i ♀, k ♂ Bl.; — l—m *pierotii*: l ♀, l¹ Trgb. von vorn, l² Drüse dgl., m ♂ Bl.; — n—o *hookeriana*: n ♂, o ♀ Bl. (m nach v. SEEM., n—o n. SARGENT, sonst Original).

CC Zw. stets kahl. B. vgl. Fig. 23a, sehr bald ganz kahl.

56. *S. pierotii*: kleiner aufrecht verästelter B., Zw. kahl (höchstens ganz jung spärlich beh.), — gelb- o. rotbraun, Kn. dgl., meist — verstr. beh., B. höchstens ganz jung etwas beh., sehr bald ganz kahl, oben tiefgrün, unten blau- o. weißgrau, Rippe oben kaum, unten stark hervortretend, Seitennerven und Rand vgl. Fig. 23a, 7—15:1,6—3 cm; Stiel meist lange beh., 0,4—0,9 cm; Blst. aufrecht mit B., sitzend, am Grunde von einigen kleinen Bchen umgeben, ♂: bis 2,5:0,5 cm, Bl. vgl. Fig. 27l—m; ♀: bis 1,5:0,5 cm, vgl. l—l².

S. pierotii Miq., Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III, 27. 1867 (*japonica* DIPP., Laubh. II, 221. 1892, non THUNB.). — Pierots W. — Jap. (Kiushiu, Nipon). — Blz. IV. — Als *japonica* in den Gärten hie und da vorhanden. Schöne Art, die härter als *babylonica* sein dürfte.

b. *Meiostylae*: Gr. deutlich, so lang o. — länger als N. — B. 6—12:1, unterseits glanzlos weißfilzig.

Sekt. 23. *Canac* KERNER, in Verh. z. b. Ges. Wien X. 49. 1860 (*Incana* ANDERSS., in DC. Prodr. XVI. 2. 302. 1868. — b. selten ♂. Zw. aufrecht, brüchig; B. ohne obs. Sp.; Blst. kurz vor o. mit B. sitzend o. kurz gestielt; Trgb. der ♂ Bl. einfarbig gelbl., der ♂ an Spitze rotbraun; Stbf. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ verwachsen und beh., N. dünn, bogenfg.; Fr.- Klappen schneckenfg. zurückgebogen.

57. *S. incana*: meist b. 1—6 m, selten ♂, bis über 10 m, Ver- ästelung scheinbar gabelig, Zw. langrutig, jung grau beh., — stark kahlend, oliv- o. rotbraun, Kn. analog gefärbt, zuletzt kahl; B. (Fig. 12p) 4—16:0,3—1,2 cm, oben — kahlend, schmutzig-dunkelgrün, — ungleich- mäßig gesägt, Rand — ungerollt, Stiel 0,4—0,8 cm, Neb. fehl.; ♂ Blst. 1,5—4:0,6—1 cm, ♀ 1,5—4,5:0,5—0,9 cm, Bl. vgl. Fig. 21n—r.

In den Gärten geht als *angustifolia*, *asplenifolia*, *otites*, *rosmarinifolia* eine Form, deren B. nur 3—5 mm breit sind, der richtige Name dafür ist: *var. larandulifolia* KOHNE, in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. VIII, 52. 1899 (*S. larandulifolia* DE LA PEYR., Hist. pl. Pyrén. 601. 1813; *S. linearis* FORB., Sal. Wob. 177. 1829).

S. inc. SCHRANK, Bayer. Fl. I, 230. 1789 (*rosmarinifolia* GOUAN, Cat. Hort. Monsp. 501. 1762, non L.; ? *clacagnos* SCOP., Fl. carn. ed. 2, II, 257. 1772; *riparia* WILD., Sp. pl. IV, 698. 1805). — Grau-W.; hoary-leaved w.; s. drapé. — I. G. D. nur hier und da im SW. und S., sowie SO.-Schles., OU. verbr. (ohne Böhmen), Seh. verbr.; sonst durch ganz S.-Eur. und Kl.-As. — Uter. auf Sand- und Schutt- boden, an kiesigen Plätzen etc. — Blz. IV—V. — Brauchbare Zierw.

Von Bastarden der *Canac* ist noch zu nennen:

57×61 *S. incana* × *purpurea*: in den Formen: *subincana* ANDERSS., in DC. Prodr. XVI, 2, 303. 1868 (vielleicht nur Varietät der *incana*) und *weichurae* POK., Holzpflz. 97. 1864.

c. *Brachystylae*: Gr. sehr kurz o. fehl. — B. höchstens 8:1, nie filzig beh.

1) B. klein, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$:1, obs. Sp. fehl., Stbf. $\frac{1}{2}$ — $\frac{4}{5}$ ver- wachsen, A. aber noch getrennt.

Sekt. 24. *Caesia* KERNER, in Verh. z. b. Ges. Wien X. 205. 1860. Habituell an *myrtilloides* erinnernde kahle Klein-b. B. ganz- randig, oben hell-, unten — weiß-bläulichgrün, Bl. mit B., Frkn. — sitzend, beh., Gr. fast fehl., Stbf. beh.

○ Drüse der [mir allein bekannten*)] ♂ Bl. fast so lang wie das — ganz gebräunte Trgb., Gr. als kurzer Hals des Frkn. ange- deutet.

58. *S. sibirica*: Zw. rotbraun, gleich den gelbbraunen Kn. kahl, nur ganz jung verstr. beh., B. dgl., selten auch später unten verstr. seidig (Fig. 26c), im Mittel etwa 1,5:0,7 cm, unten wenig heller, Stiel 1—2 mm, Neb. fehl. (ob immer?); Bl. vgl. Fig. 20w¹, sonst wie *caesia*.

S. s. PALLAS, Fl. ross. II, 78. 1784. — Sibirische W. — O.-Sib. — Sonst wohl wie *caesia*. — Ob echt in Kultur?

○○ Drüse der ♂ Bl. kaum halb so lang, als das nur an der Spitze dunkle Trgb., Gr. fehl.

59. *S. caesia*: kleiner, — niedergestreckter, dichtbelaubter, kahler b. 0,3—0,9 m; Zw. gelb o. — gebräunt, Kn. gelb; B. (Fig. 19t)

*) Ich beschreibe diese seltene Weide, die vielleicht nur asiatische Form der *caesia*, vielleicht auch gar nicht den *Caesia* einzureihen ist, nach 2 Exemplaren aus O.-Sib. Aller- dings stimmen diese mit PALLAS' Diagnose nicht ganz überein, sind aber von einem so ausgezeichneten Weidenkenner, wie WIMMER, ebenfalls als *sibirica* angesprochen worden.

Nach sonst ganz ähnlichen Expl. vom Altai scheint sie auch in einer deutl. beh. Form aufzutreten.

1–3,5 (–5):0,6–1,8 (–2) cm, ganz fein gespitzelt, unters. bläulich-weißgrün, Stiel 2–3 mm; ♂ Blst. etwa 0,9:0,6 cm, Stbf. zuw. frei; A. jung rötlich: 0,9–1,3:0,6 cm, Gr. nur selten angedeutet, vgl. Bl. Fig. 21y–z.

S. c. VILL., Hist. pl. Dauph. III, 768. 1789 (*myrtilloides* WILLD., Sp. pl. IV, 686. 1805, non L.). — Hechtblaue W., grey leaved w. — I. G. nur Alp., in diesen auch bis Ital. und Frankr.*). An Alpenbächen, auf moosigen Böden, überall selten. — Blz. V. — Interessante Zier-W.

2) B. bis 11 cm lang, 4–8:1, obs. Sp. vereinzelt bis ∞ **).

Sekt. 25. *Purpureae****) W. KOCH, Comm. 11 1828. b–h. Zw. schlank, zähe, innere Rinde im Sommer zitronengelb: B. zuw. gegst., oben trübgrün, unten blaugrau, beim Welken schwärzend. Blst. vor o. mit B., zylindrisch, Frkn. sitzend beh., Gr. fast o. ganz fehl., Stbf. meist inkl. A. verwachsen.

○ B. höchstens 4 mm breit, obs. Sp. etwa $\frac{2}{3}$ der unterseitigen.

60. *S. angustifolia*: h. 1–5 m; Zw. dünnrutig, ☉ (☺) gleich den Kn. kurzseidig beh. o. schon früher kahlend, gelb- o. rotbraun: B. alle ☉, meist sehr gedrängt, zieml. entfernt fein gezähnt o. ganzrandig, jung beiders. beh., später kahlend: Stiele fehl. o. bis 2 mm: Blst. dünn, bis 2,3:0,5–0,6 cm, zur Frz. kaum länger, Stiele beblättert, Trgb. bleich o. gelblichbraun, meist nur am Grunde beh. und an Spitze $\pm$ gezähnt, N. rot, A. gelb.

var. a. *typica*. B. 2–5,5:0,2–0,4 cm. — b. *microstachya* ANDERSS., in DC. Prodr. XVI, 2, 315. 1868 (*S. microstachya* TURCZ., Cat. Baikal. n. 105, in Bull. Soc. Nat. Mosc. 1842; *S. spachii* KOOPMANN, ex H. d. D. D. G. 47. 1903). B. nur bis 3:0,3 cm, weicht nach mir vorlieg. Expl. von a. noch ab durch die nicht sitzenden N. (Bl. vgl. Fig. 20 x–y) und spärlicher beh. Frkn.

S. a. WILLD., Sp. pl. IV, 699. 1805 (*wilhelmsiana* M. B., Fl. Taur. Cauc. III, 627. 1819; *dracunculifolia* BOISS., Diagn. ser. I, 7, 99. 1846). — Schmal-W. — Kauk., S.-Ural, N.-Pers., Tibet, Turkest. bis S.-Sib. — Blz. IV. Hübsche Zier-W.

○○ B. breiter, obs. Sp. vereinzelt bis $\frac{1}{2}$ so viele, wie unterseits.

61. *S. purpurea*: b–h, 0,9–3 m, selten h. bis 10 m: alte St. mit glatter, aschgrauer Borke: Zw. glänzend gelb o. rot, meist von Anfang an kahl, dgl. Kn., B. Fig. 23 m) jung beh., später ganz kahl o. unters. beh. bleibend, oben matt dunkel-rostfarbig, unten blaugraugrün, im obersten Drittel am breitesten, Neb. meist fehl. o. lanzettlich: Blst. vor B., sitzend, 1,5–4,8:0,7–1 cm, zur Blz. gekrümmt, A. rötlich: nur ein wenig dünner, Gr. meist fehl., N. kopfig, gelblich, vgl. Bl. Fig. 20v–v¹.

Der Formenkreis†) dieser variablen Art sei wie folgt skizziert: Subspec. *eupurpurea*: B. niemals durchweg gegst., hfg. nur ☉, var. a. *typica* BECK, Fl.

*) Im Ural, Sib. u. Zentral-As. vertreten durch var. *multinervis* TURCZ., ex ANDERSS., in DC. Prodr. XVI, 2, 317. 1868 (*Sibirica* LIEDEB., Fl. ross. III, 622. 1849, non PALL.)

**) Nach KOEHNE fehlen bei *purpurea typica* obs. Sp. Ich habe im Herbar des Wiener Hofmuseums ∞ Expl., die von KERNER, WIMMER und anderen ausgezeichneten Salicologen als typische *purpurea* ausgegeben worden sind, untersucht und stets vereinzelt, zuw. aber auch verstreute und zahlreichere Sp. auf den B.-Oberseiten gefunden.

*) *S. ledoburiana* TRAUTV. und *aeolgens* ANDERSS. werden im H. d. D. D. G. erwähnt, sind mir jedoch weder lebend noch im Herbar zu Gesicht gekommen.

†) Die im H. d. D. D. G. erwähnte *S. multinervis* FRANCH. et SAV., Enum. Plant. II, 504. 1879 ist *purpurea* var. *multinervis* MATSUM. vgl. V. SEEM., Sal. jap. 56. 1903).

Nied.-Östr. 288. 1890. hoher b bis h , B. kahl, Trgb. der L Bl. spärlich-zottig, Gr. fehl.; hierher: *f. lambertiana* [W. KOCH, Syn. 647. 1837] (*S. lamb.* SM., Fl. Brit. III, 1041. 1804; *var. latifolia* KERNER, in Verh. z. b. Ges. Wien X, 272. 1860). B. höchstens 5:1, etwa 5—8,5:1,5—2,2 cm; sowie *f. angustifolia* KERN., l. c. (*S. helix* HOST, Sal. 10, t. 36/37. 1828, non L., *var. helix* W. KOCH, l. c.; *var. longifolia* DIPP., Laubholzk. II, 236. 1892). B. 6—10:1, etwa 5—12:0,6—1,7 cm; ganz besonders schmalblättrig und feinzweigig ist *f. gracilis* [GREN. et GODR., Fl. fr. III, 129. 1855] (*S. juratensis* SCHLEICHER nach W. KOCH; *var. uralensis* der Gärten). B. im Mittel nur 3—4:0,2—0,6 cm, ferner gehören zu *var. typica* und beiden Formen die *var. pendula* DIPP., Laubholzk. II, 236. 1892 (*var. scharfenbergensis* BOLLE, in Gartentfl. 1893. 378; in den Gärten auch als *nigra pendula*, *americana pendula* oder *napoleonis*). Zw. hängend (meist hochstämmig veredelt und schon durch die feinen kurzen Zw. von den anderen Trauerweiden gut zu unterscheiden) und *var. pyramidalis* DIPP., l. c. Wuchs — pyramidal. b . *eriantha* WIM., Sal. eur. 31. 1866. Trgb. der L Bl. lang seidigzottig. c . *sericea* W. KOCH, Syn. 644. 1837. B. jung dicht seidig beh. d . *styligera* WIM., Sal. eur. 32. 1866. Gr. — deutlich. e . *marabilis* HOST, Sal. 13, t. 46. 1828 (*var. monadelphica* KOCH, l. c. 647; *var. furcata* WIM., l. c.). Stbf. meist nur z. T. verwachsen, Blst. hfg. $\pm$ androgyn. Subspec. *amplexicaulis* BOISS., Fl. Or. IV, 1187. 1879 (*S. am.* BORY et CHAUB., Exp. scient. Mor. III, 2, 277. 1832. B. durchaus gegst. (Griechl. und Kl.-As.)

S. p. L., Sp. pl. 1017. 1853 (*monandra* ARD., Mem. I, 67. 1766; *oppositifolia* HOST, Sal. 11, t. 37. 1828). Purpur-W.; purple osier; osier rouge — I. G. verbr., sonst noch durch ganz W. (bis England), S.- und M.-Eur., N.-Afr., Or., Kauk., Pers., Turkest., Zentral-As., Sib., Nordgrenze nach WILLKOMM durch eine Linie von S.-Schweden über die Mündung der Düna nach Moskau am Besten angedeutet. — Besonders in der Ebene und den Tälern der Hügelgelände, auf feuchten Wiesen, an Ufern, Weg- und Waldrändern. In den Alpen bis 2000 m. — Blz. III–IV. — Nicht nur, besonders in einigen Formen, wie *pendula*, geschätzte Zier-W., sondern auch als Kultur-W. nicht ohne Bedeutung. Hierzu besonders eine als *var. utilis* *uma* bezeichnete Form sehr zu empfehlen, deren Ruten in Wasser gesotten nach dem Schälen blendend weiß werden. Die Rinde ist zur Salizingewinnung brauchbar. In der Produktivität steht *S. purpurea* früher genannten Kultur-W. nach, sie gehört aber zu den widerstandsfähigsten Arten, vor allem gegen Frostgefahr, sowie infolge ihrer bitter schmeckenden B. gegen Verbiß.

III. *Submonandrac* v. SEEM., Sal. jap. 21. 1903. σ Bl. normaler- weise wenigstens z. T. nur mit einem einzigen Stb.

Sekt. 25. *Sieboldianae* v. SEEM. l. c. b h , $\odot$ Zw. — beh. o. kahl, B. ganzrandig o. kerbsägg. — seidig beh.; Blst. vor o. mit B.; Trgb. an Spitze kaum dunkler, in σ Bl. länger, in L kurz beh.; L Bl. mit 1, selten mit 2 Stb., deren Fäden dann L verwachsen sind; f : Frkn. beh., Gr. und N. kurz, Drüse eifg.

62. *S. sitchensis*: b , selten h , bis 10:0,3 m; Zw. jung dicht, $\odot$ — grauzottig, L braunrot, nach SARGENT — reifartig glänzend: B. (Fig. 15n) ohne obs. Sp., 3—7—11:1,2—3—4 cm, verkehrt eilängl. o. eiliptisch, Rand höchstens leicht wellig gesägt, jung oben L beh., später meist kahl, tiefgrün, unten anfangs dicht, zuletzt L locker schimmernd seidig: Stiel 0,3—1,4 cm; Neb. an Lohden von B.-Stiel-Länge, sonst abfällig; Blst. auf kurzen beblätterten Stielen, σ 2—3(—4,5):1—1,2(—1,5) cm; f 2—4(—6):0,5—0,7(—0,9) cm, Frkn.-Stiel nach KOEHNE nur L L der Drüse, nach SARGENT wie Fig. 20u—u¹.

S. sitch. SANSON, nach BORY in Mém. Phys. et Nat. pt. 2. Ac. Sc. Pétersb. II, 162. 1831. — Sitka-W. — W. N.-Am. (von Alaska an der Küste südl. bis Santa Barbara Kalif.), nördl. u. westl. bis Cook-Insel, Kodiak Island. — Infolge der schimmernd beh. B. eine der schönsten Zierw.

Reihe II. Myricales, Wachsmyrtenähnliche Pfl.

ENGL., in Nat.-Pfl. Nachtr. 345. 1897.

Aromatische $\text{b} = \text{h}$; B. $\odot$, sommer- o. wintergrün, einf. o. fieder-
 teilig, Neb. fehl. o. vorh.; Blst. ährig, Bl. ? monoec. o. dioec., mit o.
 ohne Vorb., Disc. und Blh. fehl., Stb. 2–16[4]. Sa. 1, grundständig,
 orthotrop; Fr. trock. Steinfr., Exocarp. z. T. Wachs ausscheidend, S.
 ohne End.

Familie 2. Myricaceae^{*)}, Gagelgewächse.

LDL., Nat. Syst. ed. II, 179. 1836.

Vgl. Reihe II. Etwa 55 allweltliche, nur in Australien fehlende
 Arten. Für uns nur wenige als Ziersträucher von Belang.

Gattungen:

- A. B. ohne Neb., Zw. ? und B. unten stets mit gelben Drüsen be-
 setzt, B. ganzrandig o. meist im oberen Drittel gezähnt.
 I. B. meist wintergrün, derb, ? Bl. mit 2–16 Stb., Vorb. der
 Bl. nicht mit Fr. verwachsend, Exocarp Wachs ausscheidend. **3. Myrica.**
 II. B. sommergrün, häutig, ? Bl. mit 4 Stb., die 2 Vorb. der
 Bl. z. T. mit Fr. verwachsend und deren Flügel bildend, Exocarp
 nicht Wachs ausscheidend. **4. Gale.**
 B. B. mit Neb., Zw. ? und B. nur oben mit verstr. Drüsen, in der
 Form einem Wedel von *Asplenium viride* ähnlich. **5. Comptonia.**

Gattung 3. Myrica L., Spec. Pl. 1024. 1753 ex parte.

[Wachsmyrte; wax myrtle; cirier.]

Vgl. oben: $\text{h} = \text{h}$, Bl. monoec. o. dioec., ? meist mit 1. ? mit 0–4
 kleinen Vorb. — Etwa 50 Arten.

$\odot$ Pfl. monoec., B. spitz, nach oben und unten fast gleichmäßig sich
 zuspitzend, ? ganzrandig o. von unter der Mitte bis fast zur Spitze
 $\pm$ entfernt gezähnt.

1. *M. californica*: $\text{h} = \text{h}$, bis 13 m hoch, Zw. jung ? langzottig, ? hfg.
 ganz kahl, ? oliv- o. rotbraun, B. 5–8:1–2 cm, oben glänzend tiefgrün, leicht
 runzelig, ? bedrust, nur auf Rippe beh., unten ganz jung starker beh., später
 kahlerd, gelbgrün, sehr dicht bedrust, Stiel sehr kurz; Blst. zusammengesetzt,
 0.5–1 cm lang, eingeschlechtlich, ? unter den ? , o. der untere Teil des gleichen
 Blst. ? , der obere ? ; ? Bl. mit 5–8 an einem kurzen Säulchen stehenden Stb.,
 Fr. wie bei *compta* o. zu 2–3 zu einem Syncarpium sich vereinigend.

M. CHAM. et SCHL., in Linnaea VI, 335. 1835. — Kalifornische W. —
 Ver.-St. (Küstengebiet in Kalif. bis Oregon und Washington) — Dünen, feuchte
 Orte — Blz. IV–V. — Nach ZABEL früher in Hahn.-Munden in Kultur — Etwa
 für Prov. IV–V in geschützten Lagen passend.

$\odot$ Pfl. dioec., B. stumpf, o. wenn spitz, so doch nach dem Stiel viel
 stärker verschmälert, meist nur über der Mitte gesägt.

? B. oben auf Fläche mit verstr. Haaren, Drüsen ziemlich verstr.,
 unten Drüsen locker, nicht eingesenkt, Stiel sehr kurz, B.-Basis
 nur kurz verschmälert.

*) *Spez.-Lit.*: A. CHEVALIER, Monographie des Myricacées, 1901.

**) CHEVALIER sagt: „sans glandes“, was unrichtig.

2. *M. pennsylvanica*: $\bar{\text{p}}$, bis 3 m; $\odot$ Zw. reich gelbdrüsig und locker hellhaarig, bräunlich; B. wenig derb, oben wenig dunkler als unten, stumpf, 2.5–7.1.4–2.5 cm, meist nur im oberen Drittel mit 2–3 Kerbzahnen jederseits o. ganzrandig, γ Blst. 6–8 mm, Stb. 2–6; δ Blst. 8–10 mm, Fr. wie bei *cerifera*, sehr fein beh.

M. p. Lois., in Nouv. Duh. II, 190, t. 55 1802 (? *carolinensis* MILL., Dict. ed. VIII, n. 3. 1768). — Pennsylvanische W. — O. N.-Am. (von Ins. Miquelon und dem Gebiet der großen Seen bis Louisiana, — Bes. Meer- und Seenter. Blz. IV. — Ob echt in Kultur? Wohl härter als *cerifera*.

Fig. 28. *Myrica cerifera*: a Zw. mit ♂, b mit ♀ Blst.; c Fr.-St.; d ganzrandige B.-Form; e Drüschuppen davon; f dgl.; g ♂ Bl.; h Trgb. derselben von außen; i Stb. (2 A. bei 1 entfernt); k ♀ Bl.; l Frkn. im Längsschnitt; m Fr. im Längsschnitt (r = Wachscheidungen am Exocarp [2, 3 = hartes Endocarp, 4 = Testa, 5 = E.). — a–c nach SARGENT, f nach CHEVALIER, sonst Original).

B. oben auf Fläche kahl. Drüsen $\sim$, unten Drüsen meist rötlich und sehr $\sim$, eingesenkt. B.-Basis lang in den deutl. Stiel verschmälert.

3. *M. cerifera*: $\bar{\text{p}}$ 0.5–1.5 o. $\bar{\text{p}}$ bis 13 m, $\odot$ Zw. rot- o. gelbbraun, zerstr. beh. o. kahl. Drüsen und Lent. deutl., schwarzbraun, feinrissig. Kn. rundlich, glänzend, rötlich, kahl, vgl. Fig. 29 i o; B. derb, gelbgrün, 4–9; 0.8–1.5 cm, meist spitz, seltener stumpf, vgl. Fig. 28, oben nur auf Rippe, unten o. nur auf Nerven beh.; Bl. und Fr. wie Fig. 28, γ mit 4–6 Stb., die zum Teil längere, höher hinauf verwachsene Stbf. zeigen, als auf Abbildung; Fr. weiß, kahl.

Fig. 29. *a—e Plantago cynops*: *a* ♂ Zw., bei *b—c* die B.-Basen, welche die Kn. *d* verhüllen, *e* Zw.-Q.-Schnitt (1—6 vgl. Fig. 22*c*); — *f—h Comptonia asplenifolia*: *f* ♂ Zw. mit Blst. bei *a*, *g* Kn., *h* wie *e*; — *i—o Myrica cerifera*: *i* ♂ Zw., *k—l* Kn., *m* Sch.-Rand, *n* Drüse, *o* wie *e* (Original nach C. K. SCHNEIDER).

M. c. L., Sp. pl. 1024. 1753. — Wachsmyrte o. Wachsgagel; candle berry or wax myrtle; c. commun. — O. N.-Am. von S.-Maryland bis S.-Florida, westl. bis Arkansas, Texas; Bermuda-, Bahama-Inseln, Kuba, Haiti, San Domingo, Portorico, Guadelupe. — Küste, sumpfige Orte. — Blz. III—IV(—V). — Frz. X. — Variabler b. Etwa für Prov. IV. Fr. technisch zur Wachsgewinnung verwertet.

Gattung 4. *Gale* ADANS., Fam. pl. II, 345. 1763.

Vgl. oben S. 70, b; Bl. dioec., ♂ Bl. ohne Vorb., Stb. frei. Fr. nur drüsig, nicht wachsig. — 4 Arten bekannt.

Gale gale^{*)} (*G. palustris*): b. 0,3—1(—2) m. ♂ Zw. meist ganz kahl, weniger bedrüst als bei *M. cerifera*, Kn. dieser analog. Sch. fein gewimpert; B. vgl. Fig. 30*k*, zuw. an Spitze noch stumpfer. 2,5—4—6:0,8—1,5(—2,5) cm, oben ¹/₂ mattgrün, Drüsen verstreut, unten bleicher, Drüsen zahlreicher, Beh. wechselnd; Stiel 1—5 mm; Bl. vgl. Fig. 30, ♂ Blst. 1—1,5 cm, bräunlich, ♀ etwa ¹/₂ so groß, mehr grünlich; Bl. zuw. ♀; Fr. reich golddrüsig.

Von Varietäten, die meist durch Übergänge verbunden scheinen, sei nur *var. tomentosa* (DC., Prodr. XVI, 2, 148. 1864) hervorgehoben, die durch dicht beh., reich bedrüste Zw. und an der Spitze stumpf rundliche, oben schwächer, unten starker zottig beh. B. nicht unwesentlich abweicht.

G. g. C. K. SCHN., Dendr. Winterst. 234. 1903 (*M. gale* L., Sp. pl. 1024. 1753; *M. palustris* LAM., Fl. franc. II, 236. 1778; *G. pal.* CHEVAL., Mon. 93. 1901).

Echter Gagel, Brabanter Myrte; sweet gale, dutch myrtle, bay bush; bois sent-bon, lorette. — I. G. nur D. von niederhein. Tiefebene durch N. bis Ostpr., auch Nied.-Lausitz; sonst noch Span. bis Engl., N.-Eur., Sib. bis Kamtschatka, N. N. Am., Kanada, N. Ver.-St. bis Carolina, Tennessee. — Moore, Heiden, Kiefernwälder etc. — Blz. IV—V, vor B.-Ausbruch, Frz. X. — Rinde zum Gerben brauchbar, B. früher offiz.

^{*)} *G. hartwegii* CHEV., Mon. 107. 1901 (*M. hart.* WATS., in Proc. Am. Ak. X, 350. 1875) ist nicht echt in Kultur. Sie weicht ab durch lineal-längliche B., 3—4,5:0,3—0,7 cm. W. N.-Am. (Oregon, Kalif. bis Mexiko).

Fig. 30. *Gale (Myrica) gale*: *a* Zw. mit ♂ Blst.; *b* B.-Zw. und Frst.; *c* ♂ Blst.; *d* ♀ Bl.; *e* Stb.; *f* unnormale Bl.; links daneben normale ♀; *g* deren Trag-Sch. von außen; *h* Fr.; *i* im Längsschnitt; *k* B.-Formen; *l* ♀ Blst.; *m* reifer Frst. (*a—c, l—m* nach HEMP. et WILH., sonst Original).

Fig. 31. *a—f Akebia quinata*: *a* ⊙, *b* ⊙ Zw., *c* B.-N. im Schnitt unten, *d* Kn., *e* B.-N. im Schnitt oben, *f* Zw.-Q.-Schn. (vgl. Fig. 22.); *g—l Gale (Myrica) gale*: *g* ⊙ Zw., *h—i* Kn., *k* Wimperung der Kn.-Sch., *l* wie *f* (Original nach C. K. SCHNEIDER).

Gattung 5. *Comptonia* L'HÉR., ex ART. Hort. Kew. III. 334. 1789.
[Farnmyrte; fern gale.]

Vgl. oben S. 70; Bl. dioec. (selten monoec.), ♂ Bl. ohne Vorb., Stb. meist 4; ♀ Bl. mit 2 Vorb., die aus in ihren Achseln befindlichen rudi-

ment. Bl. (BAILLON sowie später am Rande Gebilde (Emergenzen entwickeln, welche die Fr., wie Fig. 32f zeigt, umgeben, ohne mit ihr verbunden zu sein; Fr. holzig, kahl. Nur folgende Art:

C. asplenifolia (*C. peregrina*): b, 0,5—1 m, aufrecht, dicht ästig, Zw. gleich denen der vorhergehenden Myricaceen brüchig, ☉ rotgrünlich o. braun, zottig beh., ☉ kahl; Kn. kugelig, rotbraun, Schicht gewimpert und $\pm$ bedrüst; B. vgl. Fig. 32, 4—12:0,4—2,5 cm, zuletzt $\pm$ kahl; Bl. vgl. Fig. 32, ♂ Blst. zur Blz. bis 3 cm lang, ♀ kugelig, zur Blz. 2—3 mm, Fr. bräunlich, gerippt.

C. a. AIT., Hort. Kew. III, 334. 1789 (*Liquidambar peregrina* L., Sp. pl. 999. 1753, et *Myrica asplenifolia* L., l. c. 1024; *C. peregr.* COULTER, in Mem. Torr. Club V, 127. 1894). — Aspleniumblättrige F.; sweet fern or spleenwort bush. — N.-Am., von 35—55° n. Br. und 65—110° w. Länge. — Trockne Wälder. — Blz. IV—V. Interessanter Zierstr., Prov. III—IV, liebt Schatten

Fig. 32. *Comptonia asplenifolia*: a B.; b Neb.; c (oben) Zw. mit ♂ und ♀ Blst.; c (darunter) ♂ Bl. und Stb. (d); e ♀ Bl. im Längsschnitt mit den beiden Vorb., die in ihren Achseln Knöspchen tragen; f reife Fr., umgeben von den im Text oben erwähnten Emergenzen; g ein S. (oberes c und f nach SCHMIDT, c nach ENGLER, sonst Original).

Reihe III. Juglandales, Walnußähnliche Pfl.

ENGL., in Nat.-Pfl. Nachtr. 1897, 345.

b=♂. B. ☉, unpaar gefiedert, sommergrün, aromatisch, Neb. fehl.; Blst. ährenfg., meist vielbl.; Bl. ♂, monoec., Blh. fehl. o. einfach (bracteoid), ♀; Stb. 2—40; ♀: Gyn. 2). Sa. je 1, grundständig, geradläufig, Gr. sehr kurz, N. 2; Fr. Steinfr. o. Nuß; End. fehl.

Familie 3. Juglandaceae²⁾, Walnußgewächse.

LDL., Nat. syst. ed. II, 180. 1836 (A. DC., Théor. élém. 215. 1823 als Juglandées).

Vgl. Reihe III oben; ♂ Blst. stets vielbl., ♀ zuw. wenig- o. einblütig; ♂ Bl. einzeln auf Trgb., am Grunde mit meist 2 Vorb.; Blh.

²⁾ Spez.-Literatur: DC., Mém. sur la fam. des Juglandées in Ann. sc. nat. sér. 4, XVIII, 1862, vgl. ferner vor allem KOEHNE und SARGENT (VII, XIV), sowie TRELEASE,

1–5 o. fehl., A. längsspaltig. Frkn.-Rudiment meist fehl.; Bl. auch auf Trgb., doch Vorb. mit diesem verwachsen. Blh. meist 4 o. fehl.; Fr. mit fleischig-saftigem Exo- und hartem trockenem Endocarp; E. mit fleishigen, runzeligen o. blattartig gefalteten Cot.

Gattungen:

A. Mk. der Zw. ungefächert.

I. Kn. beschuppt, B.chen 9–17, vgl. Fig. 44a, fast gleichgroß, deutlich sägezählig **6. *Platycarya*.**

II. Kn. nackt o. beschuppt, dann B.chen meist nicht über 7, ungleichgroß **7. *Hicoria*.**

B. Mk. der Zw. gefächert.

I. Kn. stets nackt, Seitenkn. selten kurz gestielt, B. vgl. Fig. 42a und 44h, m–p. Fr. grob, ungeflügelt **8. *Juglans* (S. 84).**

II. Kn. zuw. beschuppt, Seitenkn. lang gestielt, B. vgl. Fig. 48, 50, 51. Fr. klein, geflügelt **9. *Pterocarya* (S. 91).**

Fig. 33. *Platycarya strobilacea*: a ♂, b ♀ Blst.; c–d ♂ Bl.; e Stb.; f Partie aus ♂ Blst.; g ♀ Bl. im Längsschnitt; h Erst-; i reife S.; l nach BAILLON, sonst nach SHIRASAWA).

Gattung 6. *Platycarya* SIEB. et ZUCC.

in Abh. Ak. München III, 741, 1843 *Fortunaca* LEDL. in Jour. Hort. Soc. London I, 150, 1846) [Zapfennuß].

Vgl. oben. Blst. aufrecht, zu 3–9–12 an der Spitze diesjähriger Krztr., nur der oberste 1, selten auch dieser im oberen Teil 2; 1 Blst. bis 10:1.2 cm, Stiel 1–2 cm; 2 Blst. etwa 1.5:1 cm, zur Frz. bis 4:2.8 cm, Stiel etwa 1.5 cm; Blh. fehl.; Stb. 3–10; 1; die 2 Vorb. mit Gyn. fast ganz verwachsen, später die Fr.-Flügel bildend; Fr. bräunlich, mit dünnem Exo- und krustigem Endocarp, am Grunde unvollk. 2fächerig, S. 2-lappig, E. mit gefalteten Cot. — Nur folgende Art bekannt.

P. strobilacea: B., bis 10 m, bei uns wohl b., Zw. jung beh., Bl. meist kahl, olivbraun, Lent. deutlich; Kn. (nach SHIRASAWA) etwa 4–5schuppig, Sch.

Juglandaceae of the united states in Miss. Bot. Gard. Rep. VII, 1869 und ENGLER in Nat. Pfl. III, 1, 19, 1889.

rotbraun mit dunklerem Rande, End-Kn größer, Seit.-Kn. abstehend, z. T. 2 übereinander über der großen herzfg. B.-N.; B. vgl. Fig. 44a, oben dunkelgrün, unten mäßig heller, Stiel und Spindel gleich den jungen Zw. beh., B.chen im Mittel 4—9:1,5—2,7 cm, oberseits nur wenig, unten auf Nerven $\pm$ beh., hfg. deutl. achselbärtig, Drüsenschuppen beiders. $\pm$ verstr., Bl. vgl. Fig. 33.

P. str. S. et Z., l. c. (*Fort. chinensis* LDL., l. c.). — Japanische Z.; jap.: Nobunoki. N.-China, Japan. — In zieml. warmen Lagen. Äußerst selten echt in Kultur, hart höchstens in Prov. IV—V.

Gattung 7. *Hicoria* (*Scoria**) Raf.,

in N. Y. med. Rep. hex. 2, V, 352. 1808 (et Fl. lud. 109. 1817) (*Carya* NUTT., Gen. am. II, 221. 1818).

[Hickorynuß; hickory.]

Vgl. auch oben S. 75; ♂ Blst. vielbl., am vorjährigen o. gleich den ♀ am diesj. Holze, hängend, meist zu 3; — einzeln, 3—10-blütig; ♂ Bl. mit Trgb. und 2 Vorb., Stb. 3—10; — mit 1 reduzierten hinteren Trgb., 2 seidl. Vorb. und einem vorderen B. der Blh., die $\pm$ gleich o. verschieden groß sind, das Gyn. perianth-ähnlich umgeben und mit ihm verwachsen in dem lederartig-fleischigen, zuletzt holzigen Exocarp der Fr. aufgehen, das 4-klappig aufspringt; Steinkerne (Nüsse) — glatt, geschlossen, S. unten 2—4-lappig, E. mit runzeligen, nicht gefalteten Cot. — Etwa 12 Arten in N.-Am. Ihr Holz z. T. recht wertvoll, z. B. für Wagen- und Maschinenbau, aber gegen Wechsel von Nässe und Trockenheit nicht widerstandsfähig.

B. siehe S. 78. A.**) Kn. nackt, d. h. äußere Sch. $\perp$ blattartig an Spitze, jedenfalls End-Kn. nur 2-schuppig (im ganzen bis 6 Sch., die kreuzweise gegst., seitliche hfg. zu 2—3 übereinander, davon oberste gestielt.

Sekt. a. *Apohicoria* DIPPEL, Laubholzk. II, 336. 1892, inkl. *Pecania* (*Apocarya* DC., Prodr. XVI, 2, 144. 1864). — B. (5—17—13—15-zählig, seitliche B.chen meist leicht sichelig gebogen; ♂ Blst. aus altem o. jungem Holze.

C B.chen 11—15(—17), Rand deutlich scharfzähnig, Stiel, Spindel und Unterseiten (Nerven) $\perp$ weich beh., ♂ Blst. nur am alten Holze. Nuß durchweg 2-fächerig.

1. *H. pecan* (*C. olivaeformis*): B. bis 50 m, Borke dick, rissig, aber nicht abblätternd; Zw. jung dicht beh., C. — kahlend, grau- o. braungrau, schon $\perp$ fein längsrissig (ob immer?). Lent. gelbbraunlich, zieml. dicht, länglich, Kn. 6—7 mm, — gestielt, abstehend, fein beh. und bedrüst; B. vgl. Fig. 34a, B.chen selten nur 9, mittlere 8—18:2,8—3,5—6 cm, meist 3—6 mm lang gestielt, seitlich über der Rippe am Grunde meist — gerundet, unter dieser spitz keilig verschmälert, Beh. wechselnd, Drüsen hell, wenig auffällig, Stiel 4—6,5 cm; Bl. vgl.

*) *Scoria* ist Druckfehler, dessen Beibehaltung nicht zulässig scheint, da die richtige Fassung *Hicoria* sich längst eingebürgert hat. 1817 schreibt RAFINESQUE *Hicorius*.

**) Eine besondere B.-Bestimmungstabelle kann hier entfallen, da die folgende Übersicht sich nach den B. gut gliedern läßt. Ich bemerke, daß auf die Form der B.chen wenig Wert zu legen ist, da diese je nach Größe sehr wechselt, entscheidend sind die Art der Zahnung, die Beh. und die Bedrusung. Die Haare sind zum großen Teil Buschelhaare.

Fig. 34b -e: Fr. 3—6; 2—3 cm. Schale*) 2—3 mm dick, bis zum Grunde vierspaltig, sonst vgl. Fig. 34f—i.

Fig. 31. a -t *Hicoria pecan* (*Carya chacoensis*): a oberer Teil eines B. (in a ist die Randzählung für sich dargestellt), b -c ♂ Bl. von vorn und hinten; d Stb.; e ♀ Bl.; f Frst.; g-h S. (Nüsse) in verschiedenen Formen; j S. im Querschnitt; — *H. minima* (*C. amara*) k ausgewachsenes B., Zähnung wie β; l-m ♂ Bl. von vorn und hinten; n -o ♀ Bl. ganz und im Längsschnitt; p Frst.; q reife Nuss; r-s S. im Quer- und Längsschnitt; t Embryo (α und β nach Natur, sonst nach SARGENT).

H. p. BRITT., in Bull. Torr. Bot. Club XV, 282 1888 (*Juglans pecan* MARSH. Arb. Am. 69. 1785; *J. illinoensis* WANGH., Beitr. Forstw. nordam. Holz. 54, t. 18, f. 43. 1787 (non 1777!); *J. chacoensis* MCHX., Fl. bor. Am. II, 192. 1803; *C. ch.* NUTT., Gen. II, 221. 1818; *C. illinoensis* K. KOCH, Dendrol. I, 593 1809). — Pekan-Nuß; pecan; pacanier. — N.-Am. Indiana bis Iowa, Kentucky, Louisiana, Texas, N.-Mexiko. — Besonders in Fluthniederungen. — Blz. V. Frz. IX-X. Noch sehr selten, etwa Prov. IV-V, feuchte Boden. In Am. wegen der süßen wohl-schmeckenden Nüsse geschätzt**).

C C B.chen (5-7-11 (=13), Fr. am Grunde 4-fächerig.

~ B.chen 9-11 (=13), zieml. schmal lanzettlich, Rand nur entfernt kleingesägt.

*) Ich verstehe hier unter Schale stets das Exocarp.

**) Die noch nicht in Kultur befindliche *H. texana* LE CONTE, in Proc. Phil. Akad. 1853. 402 (*Carya texana* DC., in Ann. Sc. nat. ser. 4, XVIII, 34 1862) steht in

2. *H. aquatica*: meist kleiner schmalkroniger B., selten bis 30: 0,6 m; Borke längs abblätternd. Zw. bald kahlend. grau- o. rotbraun. Lent. klein, verstr., Kn. gelb bedrüst, höchstens End.-Kn. beh., Seit.-Kn. viel kleiner, sitzend: B. vgl. Fig. 44b. B.ehen selten sehr ungleich groß, jung beh., zuletzt stark kahlend, mittlere 7—13:1—2—2,5 cm, Stielehen 1—3(—5) mm, Stiel 3—5,5 cm; Bl. analog *minima*, aber Trgb. wie es scheint zuw. auffällig länger, Fr. 2—4 cm lang und ebenso breit, Schale 1 mm dick, Nuß runzelig und seitlich zusammengedrückt, vgl. Fig. 44c—d.

H. a. BRITT., l. c. 1888 (*Jugl. aquat.* MCHX. F., Hist. Arb. Am. I, 182, 1810; *C. aqu.* NUTT., l. c. 1818). — Wasser-H.; water h. — N.-Am. (Virginia bis Florida, Texas, nördl. bis Arkansas und S.-Illinois). — Feuchte o. nasse Böden. — Von allen Arten die minderwertigste. Wohl noch nicht in Kultur Für Prov. V—VI.

* B.ehen (5—) 7—9, Zähnung deutlich, seitliche meist über Rippe am Grunde schmaler, Kn. auffällig gelb bedrüst.

3. *H. minima* (*C. amara*): Bis 30 m hoher B., Krone eilänglich, Borke zuletzt dünn abblätternd. Zw. und Kn. vgl. Fig. 35a—h. olivgrün bis rotbraun, oval o. leicht kantig, meist kahl, nur am Ende gleich den Kn. gelbschuppig, Lent. fein, ∞ ; Mk. stark gebräunt: B. vgl. Fig. 34k, B.ehen meist sitzend, mittlere 7—15:1—3 cm, auf der helleren Unterseite gleich Spindel beh., beiders. mit ∞ feinen hellen Drüsen, Stiel bis 5,5 cm; Bl. vgl. Fig. 34l—o, Fr. 2—4,5 cm lang, zuw. breiter als lang, Schale 1 mm dick, nur zu $\frac{3}{4}$ aufspringend, sonst vgl. Fig. 34p—t.

H. m. BRITT., l. c. 1888 (*Jugl. alba minima* MARSH., Arb. Am. 68, 1785; *Jugl. cordiformis* WANGH., Nordam. Holz 25, t. 10, f. 25, 1787; *J. minima* BORKH., Handb. Forstb. I, 1760, 1800; *J. amara* MCHX. F., Hist. Arb. Am. I, 177, t. 4, 1810; *C. amara* NUTT., l. c. 1818). Bitternuß; bitter nut or swamp h. — Kanada und Maine bis Minnesota, Nebraska, südl. bis Texas und Florida. In den verschiedensten Lagen. Blz. V—VI — Frz. IX—X. Harte Art, deren Nüsse sehr bitter. — Habitusbild siehe Miss. Bot. Gard. Rep. VII, t. 5, 1896.

Von *Hybriden**, an denen Arten dieser Sektion beteiligt, sind in N.-Am. bekannt geworden:

- 1×3 *H. pecan* × *minima*.
- 1×6 *H. pecan* × *alba*.
- 1×7 *H. pecan* × *laciniosa*.

B. Kn. beschuppt (Sch. reitend, die inneren beim Austrieb meist stark vergrößert), End.-Kn. 4- bis mehrschuppig, zuw. Sch. nur 2, da das äußerste Paar zeitig abfällt, Seit.-Kn. sitzend, untere Bei-Kn. fehl. o. klein.

Sekt. b. *Euhicoria* DIPPEL, Laubhk. II, 331, 1892 (*Eucarya* DC., Prodr. XVI, 2, 142 1864). B. (3—, 5—7—9zählig, B.ehen nicht eigentlich sichelig, ♂ Blst. am Grunde diesj. Triebe.

der sehr schmalellipt. Fr. etc. *H. pecan* sehr nahe, weicht aber durch den bitteren Kern und die 7—11zähligen B. ab.

*) *H. myristicaeformis* BRITT., l. c. 1888 (*Jugl. m.* MCHX. f., l. c. 211, t. 10, 1810; *C. m.* NUTT., l. c. 1818), die *minima* nahe steht, ist noch nicht eingeführt. Sie erscheint ihrer schonen Belaubung und der süßen Fr. halber recht kulturwert. Diese sind auffällig flügelg 4-kantig! Sie findet sich in Arkansas bis Alabama, Texas, Mexiko, S.-Carolina.

In Kultur habe ich keine dieser Hybriden gefunden. Im H. d. D. D. G. werden noch *H. alba* (*C. tomentosa*) × *H. ovata* (*C. alba*) und *H. alba* × *H. laciniosa* (*C. sulcata*) genannt. IRELAND erwähnt 1896 nur die erste als sehr fraglich. Die letzte ist mir aus der Literatur nicht bekannt.

- ⊙ Bechen im Mittel 5:3—7, B.-Unterseiten und Spindel fast kahl o. ⊙ siehe wenn beh. Randzähne mit feinen Haarbüscheln. S. 82.

Fig. 35. *Hicoria* (*Carya*): a—h *H. minima* (*C. amara*): a ⊙ Zw. (a—e untere Bei-Kn.), b End. Kn. von a mit seittl. Bei-Kn., c dgl. von b; d B.-N.; e—g Zw.-Stück mit 3 übereinanderstehenden Kn., bei f B.-N. mit strichfg. Mittelspuren, in g Zw. im L.-Schnitt; h gelbe Drüschuppe, i—o *H. glabra* (*C. porcina*): i Teil eines Q.-Schnittes (i' o vgl. Fig. 22 e) eines ♂ Zw., j dgl. mit 2 Seit.-Kn., k Teil einer Kn.-Sch. mit Drüschuppen, l B.-N., m obere Kn. von l im Q.-Schnitt. (Original nach C. K. SCHNEIDER.)

- End-Kn. kaum über 1 cm lang, B.-Unterseiten und Spindel kahl, nur gleich große rote und helle Drüsen und Achselbärte vorh.

4. *H. glabra* (*C. porcina*) b. bis 25 m, Borke bei der typischen Form bleibend, kurzrissig (nach TRELEASE der der Weißesche ähnlich), ⊙ Zw. kahl, purpur- o. braungrau, Lent. deutl., End-Kn. hfg. nur 2schuppig, da äußerste Sch. zeitig abfallen, gelbdrüsig, sonst vgl. Fig. 35 i—o; B. vgl. Fig. 36, selten 9zählig, bräunlich austreibend, später oben glänzend hellgrün, unten gelblichgrün, Zähnung scharf, oberste Bechen bis 24:8 cm, zuw. 4mal größer als unterste, Stiel bis über 15 cm; Bl. vgl. Fig. 36, Fr. vgl. var.

var. a. *typica*, Borke bleibend, Fr. 3—5 cm, Schale 1—2 mm dick (nach Material, das mir Herr REHDER aus dem Arnold-Arboretum sandte, bis 4 mm) hfg. nicht bis zum Grunde aufspringend, Nußschale dick, Kern süß, aber minderwertig, vgl. sonst Fig. 36. — b. *macrocarpa* TRELEASE, in Miss. Bot. Gard. Rep. VII, 37, 1896; *Carya macrocarpa* NUTT., Gen. II, 221, 1818; *H. mac.* BRITT., in Bull. Torr. Club XV, 283, 1888; *H. glabra* var. *odorata* SARG., Silva VII, 167, t. 354 (1895), Borke abblatternd, Fr. unter 2.5 cm lang, Schale 1 mm dick, bis zum Grunde aufspringend, Nuß dünnchalig, Kern süß, gut, vgl. sonst Fig. 41 h—n. Möglicherweise ist var. b eine gute Art. — *H. borealis* ASHE, die ich nur aus der Be-

schreibung in BRITTON Manual 325. 1901 kenne, scheint von *microcarpa* kaum verschieden*).

Fig. 36. *Hicoria glabra* (*Carya porcina*): a ganzes B., Randzähnelung wie $2\frac{1}{2}$; b—e ♂ Bl. und Stb.; f ♀ Bl. (α — Perigon, β — N., γ — Trgb.); g dgl. im Längsschnitt; h Frst.; i Frucht (geschlossen); k m Nuß, im Längsschnitt, ganz und im Querschnitt (a, g — h, k—m nach SARGENT, sonst Original).

H. g. BRITT., in Bull. Torr. Club XV, 275. 1888 (*Juglans glabra* MILL., Diet. ed. VIII, No 5. 1768; *J. alba odorata* MARSH., Arb. am. 68. 1785; *J. porcina* MCHX. F., Hist. Arb. Am. I, 206, t. 9. 1810; *C. porc.* NUTT., l. c. 1818; *H. glabra* var. *odorata* TREL., l. c. 1896). — Ferkelnuß; pignut. — N.-Am., var. a. Maine bis Ontario, Florida, Kansas, Texas; var. b. Massachusetts bis Michigan, Virginia, Illinois und Missouri — var. a. hfg. in zieml. geringen Böden, var. b. in gutem Lande. — Blz. V—VI, Frz. IX—XI. — Diese und die folgenden Arten dieser Gruppe sind den *Apohicernae* (ausgen. *H. myristiciformis*) an Holz- und Kulturwert überlegen. Die typische *glabra* kommt am chesten als Nutzholz in Betracht. Prov. (II—)III, wenn aus N. der Heimat stammend.

→ End-Kn. bis 2,5 cm lang, B.-Unterseiten und Spindel büschelhaarig, Randzähne mit feinen Haarbüscheln.

5. *H. ovata***) (*C. alba*): h, 15—30(—40) m, Borke lang abblätternd, vgl. Fig. 38, Zw. jung beh., () kahl, bräunlich o. gelb-

*) Von *glabra* soll auch eine behaarte Abart, var. *hirsuta* ASHE, l. c., auftreten. Sie ist nicht zu verwechseln mit *H. villosa* ASHE, in Bull. Torr. Cl. XXIV, 481. 1897 (*glabra* var. *villosa* SARG., Silva VII, t. 355. 1895). Borke nicht abblätternd, B. 5—7—9-zählig, Stiel und Spindel büschelhaarig, Unterseiten mit ∞ zieml. großen hellen Drüsen auffällig besetzt und mäßig beh., Fr. etwa 2,5 cm lang, analog *microcarpa*, Missouri. — Hiermit soll *pallida* ASHE (Hickories of Un.-St. 1896) identisch sein, in BRITTON wird sie aber extra geführt und zu den „dickschaligen“ gerechnet.

*) Ihr steht sehr nahe die noch nicht eingeführte *H. carolinac-septentrionalis* ASHE (Hick. 1896); sie weicht ab durch kahlere Zw. und B., diese sind 3—5-zählig, die B. chen mehr lanzettlich, entfernter stehend; Fr. nur 1,5—3 cm lang. Auf sandigen o. felsigen Standorten von Delaware bis Georgia und Tennessee.

Fig. 37. *Hicoria ovata* (*Carya alba*): *a* ausgewachsenes B., Zähnung des Randes vergrößert für sich ($\frac{2}{1}$); *b*—*c* ♂ Bl. von vorn und hinten; *d* Stb.; *e* ♀ Bl. ganz und im Schnitt; *f* Fist.; *g* Nuß, *h* dicke Frkn.-Schale im Längsschnitt; *i* S. im Querschnitt; *j* E. zur Hälfte (nach SARGENT).

grün, Lent. ∞ , deutl., Kn. vgl. Fig. 40f—k; B.chen 5, sehr selten 7, vgl. Fig. 37, oberste 10—20:6—8 cm o. an Lohden viel größer, unten heller und hfg. stark kahlend; Bl. vgl. Fig. 37, Fr. 2,5—5,5 cm lang, Schale 5—8 mm dick, bis zum Grunde aufspringend, Nuß dünnchalig, Kern süß, vgl. Fig. 37.

H. o. BRITT., in Torr. Bot. Cl. XV, 283. 1888 (*Jugl. ovata* MILL., Gard. Diet. ed. VIII, No. 6. 1768; *J. ovalis* WANGH., Nordam. Holz. 24. t. 10. f. 23. 1787; *J. alba* MCHX., Fl. bot. Am. II, 193. 1803, 194. LINNE. *Carya alba* NUTT., Gen. II, 221. 1800. Schuppenrindige H.; shagbark or shellbark. — N.-Am. (Quebec bis Ontario, Minnesota, Florida, Kansas, Texas). — Blz. V—VI; Frz. X—XI.

Fig. 38. *Hicoria ovata* (*Carya alba*), Borke eines alten Stammes (Original nach C. K. SCHNEIDER).

Gleich den anderen am Besten so anzupflanzen, daß sie in der Jugend im Schutze alter $\mathfrak{H}$ steht. — Habitusbild siehe Miss. Bot. Gard. Rep. VII. t. 12. 1896.

CC B.chen im Mittel 7–9, selten 5. B.-Unterseiten $\cdot$ o. stark beh., Rand z. T. gleichmäßig gewimpert.

$\cdot$ B.-Spindel und -Unterseite reichlich büschelhaarig, neben größeren hellen ∞ kleinere rote Drüsen, z. T. auch oben, vorh., Lent. auffällig, Borke bleibend.

6. *H. alba* (*C. tomentosa*): $\mathfrak{H}$. bis über 25 m. auch $\cdot$ Zw. dicht beh., rotgrau bis olivbraun. Kn. vgl. Fig. 401 o. äußerste Sch. abfällig, so daß die dicht beh. inneren sich zeigen: B. vgl. Fig. 39 a. stark riechend, oberste B.chen 10–15:3–5.5 cm o. an Lohden größer, Stiel 4–9 cm: Bl. vgl. Fig. 39. Fr. 3–9 cm lang. Form sehr wechselnd, Schale 3–4 mm dick, kaum bis zum Grunde und oft erst spät aufspringend, Kernschale ca. 2 mm dick. Kern süß, vgl. sonst Fig. 39.

Fig. 39. *Hicoria alba* (*Carya tomentosa*). a ausgewachsenes B., Randzähnung vergrößert a β ; b $\cdot$ Bl. von vorn; c $\cdot$ d $\cdot$ Bl. im Längsschnitt und ganz; e Frst.; f längliche Fr.-Form; g–h Nußformen; i–k im Längsschnitt; l Fr. im Querschnitt (nach SARGENT).

H. a. BRITT., in Bull. Torr. Cl. XV, 283. 1888 (*Jugl. alba* L., Sp. pl. 997. 1753. *J. tomentosa* LAM., Enc. IV, 504. 1797; *C. tom.* NUTT., Gen. II, 221. 1818; *C. alba* K. KOCH, Dendr. I, 596. 1809). Spottnuß; mocker nut. N.-Am. (Massachusetts bis Ontario, Illinois, Florida, Nebraska, Texas). In besten Niederungsböden. — Blz. V–VI, Frz. X–XI. — Scheint von allen *Fuhicoriae* das wertvollste Holz zu haben. Bereits seit 1640 in Kultur.

- + > B.-Spindel kahl, Drüsen fast nur hell, Zähnung gröber. Zahnspitzen nach vorn gekrümmt, Lent. kaum hervortretend, Borke lang abblätternd.

7. *H. laciniosa* (*C. sulcata*:) ♂, bis 40 m, • Zw. beh., olivbraun bis graugrün, Kn. vgl. Fig. 40a—e, äußere Sch. bleibend, braungrün, fein beh.: B. vgl. Fig. 41a, oberste B. chen bis 17.7 cm,

Fig. 40. *Hicoria* (*Carya*): a—e *H. laciniosa* (*C. sulcata*): a ♂ Zw., b Seit.-Kn., c B.-N., d ♂ Zw. im Q- und L-Schnitt; f—k *H. sulcata* (*C. alba*): f ♂ Zw., bei s Beh. der Sch. vergr., bei a Q-Schnitt, über b Seit.-Kn. mit unterer Beikn. (α) und B.N. (β), diese in k mit strichtg. Mittelspuren γ; l ♂ *H. alba* (*C. tomentosa*): l ♂ Zw., m Wimperung der Kn.-Sch., n B.-N., o Zweig-Q-Schnitt (1—6 vgl. Fig. 22e). (Original nach C. K. SCHNEIDER.)

unters. beh., Stiel bis 8(—15) cm, im Winter z. T. lange bleibend!; Bl. vgl. Fig. 41b—e, Fr. 5—8 cm lang, Schale ca. 10 mm dick, sonst wie *alba* und Fig. 41f—g.

H. l. SARG., in Mem. Torr. Cl. 354. 1894 (*Jugl. laciniosa* MCHX. F., Hist. Arb. Am. I, 199, t. 8. 1810; *J. sulcata* PURSH, Fl. Am. Sept. II, 637. 1814, non WILLD.; *Carya* n. n. NUTT., Gen. II, 221. 1818; *Hic. sulc.* BRITT., in Bull. Torr. Cl. XV, 283. 1888). Königsnuß; big or bottom shellbark, king-nut. N.-Am. New Jersey, Pennsylv., bis Indiana, Iowa, Tennessee, Kansas und Ind.-Terr.) Sonst wie *alba*, erst 1804 eingeführt.

Fig. 41. *a-g* *Hicoria mollis* *Carya mollis*; *a* ausgewachsenes Bl., Rand zähmung für sich vergrößert; *b* *c* Bl.; *d* Stb.; *e* Bl.; *f* Frst.; *g* Nuß im Querschnitt. — *h-n* *H. glabra* var. *macrocarpa* (*Carya macrocarpa*); *h* B., Zähnung für sich $\times 10$; *i* *j* Bl. von hinten, *k* Blst., *l* Bl. unten *j*, oben *k*; *m* Frst.; *n* reife Nuß (nach SARGENT).

Gattung 8. *Juglans* L., Sp. pl. 997. 1753 ex parte.
[Walnuß; walnut: noyer.]

Vgl. oben S. 75: Rinde harzreich; $\frac{1}{2}$ Blst. hängend, einzeln am vorj. Holze, vielblütig; $\frac{1}{2}$ Blst. 2–20-blütig; $\frac{1}{2}$ Bl. mit 2 Vorb., Blh. 1–4, Stb. 8–40, Frkn-Rudiment fehl; $\frac{1}{2}$ Blh. 4, Gyn. mit den 2 verbundenen Vorb. und dem Trgb. verwachsen, N. papillös; Steinfr. grob, ungeflügelt, Exocarp grün, zieml. fleischig, — antreibend o. verwitternd, Endocarp holzig, runzelig, unvollkommen 2–4-fächerig, S. und E. vgl. *Hicoria*. — Bis auf 3 Arten aus M.- und S. Am. sämtliche Spezies im Folgenden erwähnt.

S. 88 ^{siehe} $\frac{1}{2}$ Bechen meist 7–9(5–13), ganzrandig, bis auf Achselbärte unten kahl.

1. *J. regia*: ♂, bis über 20 m hoch, Krone zieml. breit, locker-ästig. St. meist kürzer als bei *nigra* o. *cinerea*. Rinde anfangs aschgrau, glatt, später eine tiefrissige dunkle Borke, zuw. aber alte St. auffallend hell und glatt: • Zw. kahl, glänzend olivgrün o. bräunlich. Lent. verstr., Kn. vgl. Fig. 43 e i, oft schwärzlich, leicht glänzend, fein beh., B. vgl. Fig. 42, wohlriechend, zuletzt • derbhäutig. Behen 5 15:3–9 cm, an Lohden größer, • kurz gestielt. Stiel bis 25 cm lang: Bl. vgl. Fig. 42, ♂ Blst. bis 15:2 cm, Stb. 6–30; ♀ Bl. zu 1–3, selten bis 24; Fr. kahl, glattschalig, sonst vgl. Fig. 42.

Fig. 42. *Juglans regia*. a Zw. mit ♂ Bl. und ♀ Blst.; d vier ♂ Bl.; e ♀ Bl. von oben; f Stb.; g ♀ Bl.; h dgl. im Längsschnitt; i = Plac. mit Sa.; j Hypanthium; k = Kn.; l = P.; m = N.; n Frkn. im Querschnitt; o zentr. petale unvollständige Längsscheidewand, 2 und 3 wie 1–2 in n; p reife Fr.; q dgl. mit zur Hälfte betretenem S.; r = n S. im Längs- und Querschnitt; s Pollenkörner trocken und gewaschen; a, f–m leicht verkl., sonst • vergr.; nach BERG und SCHMIDT.

Von den ~ Formen dieser alten Kulturart seien als wichtigste folgende genannt: *f. ferruginea* PIERZ. et KIRCH. Arb. Musc. 335. 1864 (var. *frut. s. DIPPEL*, Laubhk. II. 318. 1862; var. *praeparviflora* und *frut. s. HORT.* b. frühzeitig tragend, Fr. dünnchalig. — *f. heterophylla* K. KOCH, Dendrol. I. 585. 1867, Behen vgl. Fig. 44f. — *f. lacunata* [LORD Arb. III. 1424. 1844, Behen vgl. Fig. 44e. — *f. monophylla* DC. Prodr. XVI. 2. 136. 1864, Behen vgl. Fig. 44g. — *f. pen-*

*) Die Kultursorten, bei denen die Form, Größe, Farbe etc. der Fr. verschieden, können hier nicht berücksichtigt werden.

dula Petz et K. l. c., Äste und Zw. . stark überhängend. — *J. racemosa* DUH., *Traité des arb.* ed. II, 174. 1809], Fr. in Trauben zu 6—10(—24).

J. r. L., Sp. pl. 997. 1753. — Gemeine W., welsche Nuß, Edelnuß; common w.; n. commun. — I. G. nur OU. Bosnien, sonst Griechl., Kl.-As., Himalaya, Birma; im übrigen in ganz Eur. seit Jahrhunderten allenthalben angepflanzt und z. T. verwildert, dgl. in O.-As., in China scheint eine besondere Varietät wild aufzutreten: in Norwegen bis 63° 35' n. Br. in günstigen Jahren Fr. reifend. In Griechl. in feuchten Tälern und Schluchten zwischen 6—1300 m. — Blz. IV—V, kurz nach Laubausbruch, Frz. IX. Alter bis 3—400 Jahre o. mehr? — Holz zieml. feinfaserig, leicht spaltbar, dauerhaft, von schöner Textur (Maserung), sehr politurfähig, mithin geschätztes Tischlerholz. — Aus unreifen Fr. Nußkörn, aus Kernen Öl, aus Rinde und Fr.-Schalen Farbstoffe zum Beizen gewonnen. — Gegen Spätfrost empfindlich. Forstl. Wert nach HEMPEL im allgemeinen recht hoch, aber Anzucht doch nur gering, da zum Fr. Ertrag treier Stand nötig und bei Anzucht im Oberholze im Mittelwalde der verdämmende Einfluß auf das Unterholz zu stark ist. — Vgl. *nigra*.

Fig. 43. *Juglans* a—d *nigra*; a . Zw., bei c im L.-Schnitt, b End-Kn. im Q.-Schnitt (a = 5 äußere Sch.), d Zw.-Q.-Schnitt. — e *J. racemosa*; e . Zw., f End-Kn. im Q.-Schnitt (α = 8 Sch., α' = 7 Kn.-Anlagen, ε Achse, s Bl.-Kn., h Seit.-Kn., i Q.-Schnitt eines . Zw. z. T., i b vgl. Fig. 22 c). — *J. cinerea*, k—m . Zw. (α = Bartung des oberen Randes der B.-N.), n analog, o äußerste Partien von n (α = Drüsenhaare). (Original nach C. K. SCHNEIDER).

Von Hybriden der *regia* sind folgende zu nennen, deren Beschreibung ich hauptsächlich nach Aufzeichnungen des Herrn E. JOUIN in Plantières gebe, wo CARRIÈRESche Originalpfl. stehen.

1—3 *J. regia* — *nigra*; *J. intermedia* DIPP., Laubh. II, 318. 1862. Von CARRIÈRE in Rev. Hort. 1863, 29, in zwei Varietäten beschrieben: a. *typica* *intermedia* *performans* CARR. l. c. non *J. pumila*. LIEBM. 1860¹. junge Zw. im Sommer bereits kahl, B.-Spindel dgl., B. 40—60 cm lang, Behen meist 11—13, meist deutl. gegst., Grund oft schief-herzfg., obers. kahl, unters. nur Nerven beh., 8—14:5—7 cm. Fr. bis 5 cm lang gestielt, etwa 6,5:5 cm, birnförmig, sonst wie *nigra*; Habitus (Tracht, Borke etc.)

regia-ähnlich, wie auch bei den folgenden zwei. — b. *vilmoriniana* CARR., l. c. 30.

Fig. 44. a *Platycarya strobilacea*: B. — b—d *Hicoria aquatica*: b B., c Fr., d S. — e—g *Juglans regia*: e B. von *f. laciniata*, f B. von *f. heterophylla*, g B. von *f. monophylla*. — h *J. rupestris*; i B., Fr., k Nuß, l dgl. im Q.-Schnitt. — m *J. nigra*: Behen. — n *J. schottiana*: Behen. — o *J. edulis*: Behen. — p *J. mandshurica*: Behen, q Fr., r Nuß, s dgl. im Q.-Schnitt. — t nach SARGENT, s nach MAXIM., sonst Orig.).

*CARRIÈRE schreibt nicht *vilmoriniana*, was allerdings wohl korrekter wäre.

weicht ab von *typica* durch: junge Zw. bis Winter fein beh., B. chen hfg. wechselständig, etwas kleiner, unters. auch auf Fläche + beh., Fr. rund, wie *nigra*.

1 ~ 4 *J. regia* × *cinerea*: *J. alata* (*intermedia alata* CARR., in Rev. Hort. 1865, 447), junge Zw. bis Winter fein beh., B. 25–40 cm lang, B. chen 7–9, Spindel kurz beh., End-B. chen zieml. langgestielt, die andern sitzend, ei- o. ellipt.-lanzettlich, plötzlich zugespitzt, beiders. beh., 6–13:4–7 cm; Fr. länglich, beh. und klebrig. Soll aus S. von *regia* f. *heterophylla* gefallen sein.

CC B. chen 11–13–21(–25), gesägt, unten meist bis stark beh.
– B. chen ± schmal lanzettlich, 1–2 cm breit, vgl. Fig. 44h.

2. *J. rupestris*: b–b₁ bis 15:1,20 m. Borke zieml. dick, grauschuppig; auch Zw. dicht kurz gelbgrau filzig, erst kahlend und Lent. deutl., Mk. sehr eng, Kn. gleich Zw. beh., End-Kn. größer, Sch. deutl. blattartig, Seitkn. meist zu 2 übereinander, klein, B.-N. schief, Kissen hfg. stark; B. vgl. Fig. 44h. Stiel 2–3 cm, gleich der Spindel fein beh., B. chen auf der dunkleren Oberseite meist nur auf Rippe, auf

der helleren Unterseite + fein beh., sichelig, 3–8:0,7–2,2 cm, Zähnung hfg. entfernt und schwach; Bl. vgl. *nigra*, nur ± kleiner, Stb. 16–20; Fr. vgl. *var.*, gleich *regia* und *nigra*, am Grunde 4-zellig, Nuß nur ± längsrissig, sonst fast glatt, dunkelfarben.

var. a. typica: mehr b–b₁, B. wie oben, Fr. kahl, nicht über 2,5 cm im Dm. — b. *major* TORREY, Sitgreaves' Rep. 171, t. 16. 1853 (sec. SARGENT), mehr b₁, B. chen bis 15:4,5 cm, Fr. fein beh., bis 4,5 cm Dm., vgl. Fig. 44i–1**).
J. rupestris ENGELM., Sitgreaves' Rep. 171, t. 15. 1853. — Felsen-W. N.-Am. (Kolorado, Texas, Neu-Mexiko, Arizona bis N.-Mexiko).
var. a. als östliche, *var. b.* als westliche Form

Fig. 45. *Juglans nigra*: Borke eines 0,60 m starken Stammes (Orig. nach C. K. SCHNEIDER).

— Standort sehr wechselnd, bis 2000 m. in Prov. III–IV.

Schöne Zierart für geschützte Lagen

**) Die ihr nächstverwandte, gleichfalls noch nicht eingeführte *J. californica* WATS. (in Proc. Am. Ak. X, 349, 1875, excl. syn.), ist durch kürzere stumpfere B. chen, die gleich den CC Zw. fast kahlen, und kaum 4 cm dicke Fr. verschieden, deren Nusse schwächer getaucht sind. Was KOLHNE (Dendrol. 76, 1893) als *var. major* beschreibt, ist mir fraglich, da er über die B. nichts sagt. Nur aus der Beschreibung kenne ich *torreyi* an. *J. mexicana* WATS. in Proc. Am. Ac. 1891, 152. Sie schließt sich im Fr.-Baue *rupestris* an. Die Nusse sind aber nach SARG., Trees and shrubs I, 1, 1902, größer, sowie 'deeply sulcate, with longitudinal simple or forked grooves'. Habitus, Borke und B. sollen an

✱✱ B.chen 2,5—4—6 cm breit.

B.chen oben bald kahlend, im Mittel nicht über 10:3,8 cm ungleichseitig und kaum ausgesprochen parallelrandig. Fr. kahl, am Grunde vierfächerig.

3. *J. nigra*: B., bis fast 50 m hoch, Krone schlanker, hochgewölbter als bei *regia*, Borke vgl. Fig. 45, Zw. anfangs stärker, staubgrau beh., dazwischen drüsig, nur schwach glänzend, olivgrün, Lent. kaum hervortretend, Kn. vgl. Fig. 43a—d, mehr an *regia* als an *cinerea* gemahnend, aber Sch. dicklicher, filziger: B.chen 11—13—19 (—23), vgl. Fig. 44m, unten bleibend weich beh., nicht so graugrün, wie bei *cinerea*, Stiel bis 40 cm lang, gleich der Spindel drüsig: ♂ Blst. bis 15:1,2 cm, Stb. 20—30; ♀ Bl. zu 3—5, weich beh., aber nicht drüsig, N. vgl. *regia*!, oft rötlich, Fr. wie Fig. 47a—c.

Fig. 16. *Juglans cinerea*: a Fiederblättchen; b unterer T. eines B.; c ♂ Bl. von der Seite; d Stb.; e ♀ Bl. von oben ohne Stb.; f ♀ Bl. mit Trgb.; g Perigon; h N. (30); i dgl. im Längsschnitt mit Sa.; j Frst.; k reife Nuß; l dgl. im Querschnitt (h—k nach SARGENT, sonst Original).

aller, die Beh. der B. und Zw. an *cinerea* gemahnen. Über *J. mollis* ENGLM., in HEMSL. Diag. Pl. nov. III, 54, 1886, ebenfalls aus Mexiko, bin ich noch ganz im Unklaren.

J. n. L., Sp. pl. 997. 1753. -- Schwarze W.; black w.; n. noir. — N.-Am. (Massachusetts bis S.-Ontario und Minnesota, südl. bis Florida, Kansas, Texas). Blz. V, Frz. X. — Holz nächst *regia* das wertvollste, auch *nigra* bevorzugt einen tieferündigen, mineralreichen, lockeren und frischen Boden und kommt auf geringem Waldboden, wie auf strengem Thonboden nicht gut fort. Liebt milde Eichenlagen (Auen), so auch in Heimat am schönsten. Im Schlusse bildet sie prächtige, astreine St. und scheint für geeignete Lagen ein wertvoller Waldbaum zu sein! — Fr. gleich denen der folgenden Arten, wohl frisch essbar, aber leicht ranzig werdend, da stark ölhaltig.

+ oberer Rand der B.-N. mit Bartsaum, B.ehen auch oben beh., wenn kahlend, so im Mittel reichlich gröber und lang parallelrandig; Fr. ± fein beh., durchaus 2-fächerig*).

△ ⊙ Zw. ± kurzzottig beh. und bedrüst, B.-Oberseiten beh., B.ehen im Mittel nicht über 12:4 cm. Fr. vgl. Fig. 46.

Fig. 47. a—c *Juglans nigra* Frst., S. und S. im Querschnitt; d *J. nigra* ma, d Teil eines Frst., e S., f dgl. im Längsschnitt, g Querschnitt durch den S., m, unteren, h im oberen Teile, E im Längsschnitt; k—n *J. cordiformis*, k Frst., l S., m ugl. im Längsschnitt, n E. a—c nach SARGENT, d—nach LAVALLÉE, k—n nach SHIRASAWA)

4. *J. cinerea*: ♀, selten über 30 m. Tracht und Borke wie *nigra*. Zw. und Kn. vgl. Fig. 43k—o, Lent. ~ fein. End-Kn. langgestreckt, dick graufilzig und drüsig, viel länger als Seit.-Kn.; B. vgl. Fig. 46. B.ehen 11—17(—21), 6—15:2,5—5(—6) cm, oben einfach beh., unten buschelhaarig und bedrüst, Stiel und Spindel dgl.; Bl. vgl. Fig. 46, zu 3—16—8, N. oft noch schmal länglicher, Fr. dicht klebrig beh.

Ich verhehle nicht, zu betonen, daß die Arten 5—7 noch sehr einer genaueren vergleichenden Untersuchung bedürfen. Die Früchte sind, wie schon MAXIMOWICZ im Bot. Ac. Petersburg XVIII, 58, 1873 gezeigt, gut verschieden, aber alle anderen Merkmale scheinen schwankend. Ich habe versucht, diejenigen hervorzuheben, die mir am charakteristischsten dünken.

J. c. L., Syst. nat. ed. X, 2, 1273. 1759 (*obl. ngra* MILL., Gard. Diet. ed. VIII, No. 3. 1768; *cathartica* MOHN, r., Hist. Arb. am. I, 165, t. 2. 1810) — Graue W., Butternuß, butter or oil nut; n. cendré — N.-Am. (Neu-Braunschweig und Ontario bis N.-Dakota, südl. bis Delaware, in den Allegh. bis Georgia, Mississippi und Arkansas). — Sonst vgl. *ngra*, deren Wert sie nicht ganz erreicht, der sie aber darin überlegen, daß sie auch etwas geringere Böden verträgt.

In der Heimat ist zwischen *ngra* und *amara* eine Hybride beobachtet worden. Ob sie auch in Kultur bei uns auftritt, ist mir sehr fraglich.

♀ Zw. zieml. stark kahlend. Lent. wohl deutl., aber verstr., B.chen im Mittel etwa 16 : 17 : 5—6 cm, relativ lang ferspitzig, Zähnung zieml. grob und auffällig, z. T. ungleich, Obers. nur auf Rippe beh., Fr. vgl. Fig. 44q—r.

5. *J. mandschurica* : h bis über 25 m, Verästelung ähnlich *Larix m. caudata*, Zw. jung dicht beh., k. rot- o. olivbraun, Kn. länglich, die oberen seitlichen hfg. deutlich gestielt; B. jung beiderseits buschelhaarig, B.chen 9—19, vgl. Fig. 44p, unten heller, k. weich beh., l. Blst. bis 10 : 1 cm, Stb. ca. 10, A. an Spitze beh.; ♀ 5—10 blütig; Fr. in Form *amara* ähnlich, aber viel stumpfrundlicher und weitgrubiger.

J. mand. MAXIM., Primit. Fl. Amur. 76. 1859. — Mandschurische W. — Mandschurei, Ussuri- und Amurgebiet bis Korea — Blz. V—VI. — Frz. IX—X. Schöne, durch die riesigen B. ausgezeichnete, wohl fast harte Art.

△△△ ⊙ Zw. ± beh., Lent. ∞, deutlich!, B.chen im Mittel 12—14 : 5—6 cm, ± kurzspitzig, Zähnung zieml. flach und hfg. kaum auffällig, Beh. wie es scheint sehr wechselnd, ± klebrig z. T., Fr. vgl. Fig. 47d—i.

6. *J. sieboldiana*: Hoher h, Kn. gedrungener als bei *mandschurica*, seith. wohl nicht gestielt; B. im Gesamtausmaß kleiner, B.chen vgl. Fig. 44n, hfg. recht ungleich, auch unten stark kahlend, aber achselbartig, l. Blst. nach LAVALLEE bis 30 cm lang, Stb. 9—15; k. Blst. 12—20 blütig; Nüsse heller gefärbt. Nuß zieml. glatt, nur 2kantig, rundlich.

J. seb. MAXIM., in Bull. Ac. Pétersb. XVIII, 61. 1875. — Siebolds W. Japan (Hakodate, Yedo, Kjusiu, Sachalin, wohl auch China). — Sonst vgl. 5.

• Zw. mit feinflockigen bräunlichen Haaren, Lent. undeutlich, B.chen im Mittel etwa 12 : 5 cm, sehr kurzspitzig, Zähnung zieml. eng, fein und scharf, B.chen unten reichlich, aber fast drüsenfrei beh., Fr. vgl. Fig. 47k—n.

7. *J. cordiformis*: h bis 15 : 0.7 m, Zw. braun, End-Kn. meist viel größer, Sch. blattartig, B.chen 11—15, vgl. Fig. 44o, *amara* recht ähnlich, l. Blst. nach SHIRASAWA, bis 18 : 1.5 cm, Stb. 20—25; k. 8—12 blütig, Fr. rundl., grün mit hellen Pünktchen, k. beh., Nuß seitlich zusammengedrückt, glatter als bei 6.

J. cord. MAXIM., l. c. 62. — Herzfg. W. Japan. — Vorzüglich in Niederungen. — Angeblich wegen der wohl-schmeckenden Kerne geschätzt — Sonst wie 5.

Gattung 9. *Pterocarya* KUNTH, in Annal. sc. nat. 1824. 345. [Flügelnuß; *Pterocarya*.]

Vgl. oben S. 75; von *Juglans* abweichend durch: k. Blst. stets vielblütig, l. Bl.: Stb. 9—18, Blh. meist 4, wie bei k.: hier Trgb. und 2 Vorb. mit Frkn. nur an Basis verwachsen, Vorb. später zu Fr.-Flügeln auswachsend; Fr. klein, Exocarp dünn, Endocarp hart, unvollkommen

*) Ob, *J. stenocarpa* MAX., l. c. 78, wirklich von *mandschurica* verschieden, ist mir noch sehr zweifelhaft. Vgl. aber REHDER, in Mit. Deutsch. Dendrol. Ges. 1903, 117.

4-fährig: S. am Grunde 4-lappig, Cot. runzelig gefaltet. 7 Arten bekannt *).

☞ siehe
S. 94.

Kn. nackt, meist zu 2(—3) übereinander. B.-Stiele am Grunde nicht deutl. scheidig.
• B.-Spindel geflügelt, Fr.-Flügel länglich-lanzettlich.

Fig. 48. *Pterocarya stenoptera*: a Zw.-Stück mit B.; b—c ♂ Bl. von unten und oben; d ♀ Bl.; e Frst.; f reife Fr.; g S. (Nüßchen) (nach LAVALLÉE).

1. *P. stenoptera*: In Tracht der bekannteren *fraxinifolia* analog.
• Zw. dicht bräunlich derbzottig beh., mit Drüsenschuppen gemischt. Kn. vgl. Fig. 49a—e; B.chen 9—25. End.-Behen, wie auch bei den Arten der vorhergehenden Gattungen zuw. fehl.; jung oben verstr., unten beh., später hfg. nur achselbärtig. Textur meist etwas derber als bei *fraxinifolia*, größte B.chen bis 12:4 cm, vgl. sonst Fig. 48. Stiel und Spindel wie Zw. beh.; Bl. und Fr. wie Fig. 48, l' Blst. bis 10 cm.

P. st. DC., Prodr. XVI, 2, 140. 1864. — Chinesische F. — China (Kiangau, Chekiang, Kiangsi, Hupeli, Shensi, Kansuh, Szechuen, Kweichau, Yunnan, Kwangsi). — In den Gärten zuw. als *P. chinensis*. Sonst wie folgende, nur nicht ganz so hart.

*) Die 4 chinesischen Arten: *delavayi* FRANCH., in Jour. de Bot. 1898. 317; *hupehensis* SKAN, in Jour. Lin. Soc. XXVI, 493. 1899; *macroptera* BATAL., in Act. Hort. Petrop. 1893. 100, und *paliurus* BAT., l. c. 101, kenne ich nur aus den Beschreibungen. Die letztgenannte wird jetzt durch VEITCH in London verbreitet (vgl. Jour. R. H. Soc. 1903. 65, Fig. 26).

1×2 *P. stenoptera* × *fraxinifolia*: *P. rehderiana* (*frax.* × *sten.* REHDER, in Mitt. D. D. G. 1903, 116. Herr REHDER sandte mir einiges Material des im Arnold Arboretum (N.-Am.) aus von Segrez (ehemal. Arboret. von LAVALLÉE) erhaltenen S. erzeugten Bastardes, er unterscheidet sich von *stenoptera* durch die nicht o. kaum geflügelten Spindeln, gröber gesagte, größere, spitzere Bechen, kürzere und breitere Fr.-Flügel, nicht über 2 cm lang und nicht unter 8 mm breit, und spitzere Nuß, wogegen er von *fraxinifolia* abweicht durch: zuw. geflügelte Spindel, schmalere Bechen, längere und schmälere, bis zum Grunde geteilte Fr.-Flügel. Soll härter als *stenoptera* sein, der sie mehr ähnelt.

Fig. 49. *Pterocarya*: a—e *stenoptera*: a—b ♂ Zw. (a oberste langgestielte Seit-Kn., β kleine untere Bei-Kn., γ B.-N., analog γ im L.-Schnitt, d Drüsen-Schuppe; e Zw. Q-Schnitt — f = k *fraxinifolia*, f = ♂ Zw., g dgl. im L.-Schnitt analog e; h = k äußere Teile von e, c = e vgl. Fig. 22c. Original nach C. K. SCHNEIDER.

• B.-Spindel ungeflügelt, Fr.-Flügel breit rundlich.

2. *P. fraxinifolia* L.: b. bis 20 m hoch, St. selten einfach, Habitus meist wie Fig. 51, Borke glänzend schwarzgrau, dunkel gefurcht, • Lgtr. im Winter kahl, nur ganz am Ende mit feinen Haar- und Drüsenresten, grün o. olivgrün bis gebräunt, Lent zerstr., Kn. vgl. Fig. 49f—k, Bechen deutl. mit braunroten Sch. Drüsen, Kztr. lfg. beh.; Bechen (5—15—23—27), bald spitzer, bald stumpfer, gewöhnlich nur unten in Achseln sternförmig beh., Textur zieml. dünnhäutig, vgl. auch *frax.*, Stiel bis 9 cm, gleich Spindel meist bald kahl: Bl. vgl. Fig. 50, • Blst. bis 20 cm, • zur Frz. bis 45 cm, Fr. bis 1 cm Dm.

*) Hierher gehört auch die *P. a. segrezii* Garter, die ursprünglich *stenoptera* sein soll. Was ich jedoch als *laevigata* erhielt, war stets *fraxinifolia*.

var. *a. typica*: h , $\odot$ Zw. nicht $\mp$ gelbbraunlich, B. chen im Mittel etwa 10:3 cm. — *b. dumosa* [LAV., Arbor. Segrez. 217. 1877, ex DIPPEL] (*P. fraxinifolia* K. KOCH, Dendrol. I, 599. 1869, et DIPPEL, Laubholz. II, 326. 1892), h , $\odot$ Zw. auffällig gelbbraunlich, B. dichter stehend, dgl. B. chen, diese im Mittel nur etwa 6:1,7 cm. Bl. und Fr. ?, in Tracht recht abweichend, aber spezifisch kaum verschieden. Wohl Kulturform.

Fig. 50. *Pterocarya fraxinifolia*: *a* ganzes B.; *b* Fiederblättchen; *c* ♀, *d* ♂ Blst.; *e*—*g* ♂ Bl. von vorn, von oben (ohne Stb.) und seitlich (1—4 = Perigon, *a* = Vorb., *β* = Stb.); *h* Stb.; *i* ♀ Bl. mit Trgb. *γ*, Vorb. 6—7 (*P.* und *N.* hier nicht bezeichnet); *k* ♀ Bl. im Längsschnitt (*a* = Vorb., *β* = Sa., *γ* = P., *δ* = N.); *l* Frst.; *m* reife Fr.; *n*—*o* Fr. im Quer- und Längsschnitt, 1 = Rest der Flüg., 2 = Pericarp, 3 = S., 4 = E., 5 = P.-Rest) (*a*, *c*, *d*, *l* nach LAVALLÉE, sonst Original).

P. f. SPACH, Hist. nat. veg. II, 180. 1834 (*Juglans frax.* LAM., Encycl. meth. IV, 502. 1797; *J. pterocarpa* MCHX., Fl. Bor. Am. II, 192. 1803; *Rhus obscurum* M. B., Fl. taur. cauc. I, 243. 1808; *Pt. caucasica* C. A. MEY., Verz. kauk. Pflz. 134. 1831; *P. palana* LAV., Arb. Segrez. 69. 1885; *P. rhafolia* DIPPEL, Laubholz. II, 327. 1892, non S. et Z.) Kaukasische F.; caucasian p. Kauk., Armen., W.-Pers. — Blz. Ende IV—V. — Frz. IX—X. — Empfehlenswerter Zier- h , jung $\pm$ empfindlich, später hart.

Kn. 3 2-schuppig, hfg. einzeln, B-Stiele meist am Grunde deutl. scheidig.

3. *P. rhoifolia*: h bis 30:1 m. St. höher und Krone mehr wagrecht verästelt. Kn.-Sch. schwarzbraun, zottig gewimpert, sonst fast kahl. fallen zuw. ab, dann Kn. analog *fraxinifolia*, ebenso $\odot$ Zw. kahl. olivbraun. Lent. ∞ , hell. B. chen etwa 13—19—21; Textur derb, oben sattgrau, unten bräunlich gelbgrün, jung wenigstens auf Rippe gleich Stiel und Spindel bräunlich büschelhaarig, außerdem unten

reich bräunlich drüsenschuppig. 7 12:2–4 cm, spitz: Bl. und Fr. vgl. Fig. 52.

P. r. SIEB. et ZUCC., in Abh. Ak. München Kl. IV, 2, 141. 1846 (*P. sorbifolia* S. et Z., l. c. *) = Japanische F. — Japan (Honshiu). — Feuchte Täler, Flußufer, 900–1500 m. — Gilt als härter als vorige, sonst wie diese.

Fig. 51. *Pterocarya fraxinifolia*: die Vielstämmigkeit einer schönen alten Pflanze zeugend (Original nach C. K. SCHNEIDER).

*) Der Name *rhoifolia* ist beizubehalten, da ihn bereits MAXIMOWICZ, l. c. 1873 akzeptiert hat. Vielleicht ist *rhifolia* als behaartere Form neben eine kahlere *typica* zu stellen. — Nach DIELS (in Engl. Bot. Jahrb. 1901. 274) ist diese Art auch in China (Kui-chou) gefunden.

Fig. 52. *Pterocarya rhoifolia*: a B.; b Fiederblättchen; c ♂, d ♀ Blst.; e—f ♂ Bl.; g Stb.; h—i ♀ Bl.; k Teil eines Frst.; l—m reife Fr.; n dgl. im Längsschnitt (b nach der Natur, sonst nach SHIRASAWA).

Reihe IV. *Fagales*. *Buchenähnliche Pfl.*

ENGL., Führ. bot. Gart. Breslau 31. 1886.

b. B. ☉, Neb. vorh.; Bl. in einfachen o. aus Trugdöldchen zusammengesetzten Ähren, zyklisch, o. meist ⁷, monoec., P. vorh. o. fehl., Stb. hfg. vor P., Gyn. (2—6), Sa. je 1—2; Halbfr. meist nußartig, S. 1, End. fehl.

Familie 4. *Betulaceae*, *Birkengewächse*.

C. A. AGARDH, Aphor. 208. 1825 ex parte.

Vergl. Reihe IV. Haare einzellig, junge Teile mit Drüsenwarzen o. Zotten, B. sommergrün; Bl. monoec., P. frei, verwachsen o. fehl.; ⁷ Bl. dem Trgb. aufgewachsen, Stb. 2—10, A. meist 2-teilig; Gyn. (2), am Grunde 2-fachig, Gr. 2, Sa. 2, hangend, anatrop, Integ. 1; Vorb. der ♀ Bl. mit Trgb. verwachsen o. eine Hülle bildend.

Unterfamilie A. *Betuleae* EICHL., Syllab. 19. 1876.

Vergl. oben; ⁷ Blst. fast stets, z. T. nackt überwinternd; ⁷ Bl. in Dichasien auf dem Trgb., Blh. vorh., A. stets kahl; Bl. ohne Blh., Vorb. dem Trgb. angewachsen, Fr. nur von außen gedeckt.

Gattungen:

- A. Kn. sitzend, 3- bis mehrschuppig, B. 2-zeilig; A. 2-teilig; Fr.-Sch. 3-lappig, mit Fr. abfallend 10. *Betula*.
 B. Kn. meist gestielt und nur 2-schuppig, B. ☉; A. ungeteilt; Fr.-Sch. 5-lappig, verholzend, erst lange nach Frz. abfallend 11. *Alnus*
 (S. 119).

Gattung 10. *Betula**) L., Sp. pl. 982. 1753 ex parte.

Vgl. oben, b ☐, alte St. meist mit weißer o. rotbräunlicher, sich papierartig abrollender Rinde. Borke meist spät auftretend; B. z. T. reichlich mit feinen Drüsenschüppchen bekleidet, obs. Sp. stets fehl., Bl. mit B.-Ausbruch o. später. ♀ zu 3 auf einem Trgb., Fr.-Flügel dünn, stets deutl. — Etwa 33. fast ausschließlich auf die nördl. gemäßigte Zone beschränkte Arten, die z. T. technisch und forstlich wertvolle ☐ darstellen.

- A. B. mit meist über 7 oberseits eingeschnittenen Seitennerven, B. siehe S. 103.
 Formen vgl. Fig. 53.

- I. B. aus herzfg. Grund breit-eifg., im Mittel etwa 9:6.5 cm, Zähnung feinspitzig (bes. Nervenzähne!), vgl. Fig. 53e.

Sekt. a. *Acuminatae***) RGL., in DC. Prodr. XVI, 2. 179. 1868. ☐, ♂ und ♀ Blst. traubig, Fr.-Flügel 1–3mal so breit wie Nüßchen.

1. *B. maximowiczii*: Schnellwüchsiger ☐, bis über 20:1 m, Rinde glatt, kirschbraun, im Alter fein dünn abblätternd, junge Zw. dicht abstehend kurzzottig. ♂ bis ganz kahl, leicht glänzend dunkelbraunrot, mit ∞, bes. an Zw. noch deutl. Lent., nicht warzig-drüsig; Kn. wie es scheint klein, stumpf-eifg., braunrot o. olivgrün; B. an Kztr. oben kahl, tief bläulichgrün, glatt, unten hellgrün, achselbärtig, an Lgtr. sich meist beiders., wenigstens jung, infolge der Beh. weich anführend, dann auch Rand mehr kurzklappig, die langen Nervenzähne wenig auffällig. 7–15: 5–11 cm, unterseits dicht braundrüsig, Seitennerven 7–12, Stiel 1.8 bis 3–4 cm, jung beh., oben rinnig; Fr. vgl. Fig. 54e–e².

B. m. RGL., in Bull. Soc. Mosc. 1865, II, 418. Maximowicz's B. Jap. nördl. Teil der gem. Zone, Honshu bis Hokkaido, Gebirge — Blz V — Frz X. — Eine der schönsten aller Birken, die auch ganz hart zu sein scheint! Forstliche Anbauversuche vielleicht lohnend.

- II. B. von wechselnder Form, meist schmaler und kleiner o. Zähnung gröber.

*) Diese Gattung gehört zu denen, deren Formen nur sehr schwierig zu klären sind. Außer den gewöhnlich benutzten Herbarien verdanke ich wertvolles Material den Herren Prof. G. BECK u. MANNAGETTA in Prag, Prof. KOEHNE in Friedland und Gartenmeister a. D. ZABEL in Gotha. Ferner habe ich über Vieles mit Herrn Dr. WINKLER in Berlin korrespondiert, dessen „Betulaceen-Monographie fürs Pflanzenreich“ gleichzeitig mit meiner Arbeit erscheint. Herrn Dr. WINKLER war so freundlich, mir die Korrekturassungen zu senden, wie ich auch ihn auf Drieses und Jones hinweisen konnte. Unsere Auflassungen weichen in gar manchem Punkte wesentlich voneinander ab, ich konnte indes im Einzelnen zu seiner Arbeit keine Stellung nehmen, da mein Manuskript bereits abgeschlossen war.

**) In dieser Sekt. gehört von mir bekannten Arten noch *B. alnoides* BUCH.-HAM., a. D. DON Prodr. fl. nepal. 58. 1825, aus dem Himal. und China (Yunnan), wozu WINKLER *B. cylindrostachya* LDL., in WALL. Pl. as. rar. II, 7. 1831, als *var.* zieht. Ferner beschreibt WINKLER in seiner Monogr. 1904 zwei neue Arten: *B. lumen fera* aus Satchuen und *B. baumkeri* aus Yunnan.

Sekt. b. *Costatae**) sensu PRANTL. Nat. Pfl. III. 1. 45. 1889. ♂ Blst. zu 1—4 nackt überwinternd, hängend. ♀ einzeln, meist aufrecht. Fr-Flügel gewöhnlich viel schmaler, selten ein wenig breiter als Nüßchen.
○ B. unterseits deutlich papillös**), ± grau getönt.

Fig. 53. *Betula*-B.: a *globispica*; — b vgl. Text Anm. S. 101; — c *medwedewii*; d vgl. S. 102 oben; — e *maximowiczii*; — f—g² *ermanni*; — h—l *ulmi*; — k—l *nigra*; — m—m¹ *lenta*; — n—n¹ *lutea*; — o—o¹ *ulmifolia*; — p *corylifolia* (alles ¹⁾ n. Gr.) (a nach SHIRAI, c nach REGER, sonst Original).

*) Von mir nur aus der Literatur bekannten Arten sind noch zu nennen: *B. insignis* FRANCH., in Jour. de bot. 1890. 206, in China (Sze-ch'uan); *B. fargesii* FRANCH., l. c. 205, wie vorge und Hupeh; *B. chinensis* H. WINKL., Korea; *B. delavayi* FRANCH., l. c., Yunnan; *B. raddiana* TRAUTV., in Act. Hort. Petrop. 1887. 129, aus dem Kauk., angeblich in Kultur, ob zu dieser Sekt. gehörend?

**) Andeutungen von Papillen findet man bei mikroskopischer Untersuchung auch bei anderen Arten, aber als scharfes Merkmal sind sie nur bei *nigra* und *corylifolia* ver-

- + B.-Form wie Fig. 53k. l. Fr. $\pm$ beh., Flügel $\frac{1}{3}$ bis ebenso breit wie Nüßchen (0,5—1,8 mm).

2. *B. nigra*: b. bis 30 m. oft von Grund auf mehrstämmig, jung $\pm$ pyramidalkronig, im Alter Krone (nach SARGENT) rundlicher, sehr unregelmäßig, pittoresk, Borke alter St. dick, *pendula* ähnlich, jüngere St. und Äste sehen durch die fein sich abkräuselnden, $\pm$ rotbraunen dünnen Rindenfetzen wie dicht zerzaust aus: Zw. jung dicht graufilzig zottig, $\odot$ meist tief rotbraun und $\pm$ kurz beh., Wachsdrüsen $\cdot$ verstreut, Lent. wenige, Kn. purpurbraun, gegen Spitze $\cdot$ beh.: B. jung dicht zottig, oben meist bald kahle, tief glänzendgrün, 3—9:2,2—6 cm, Seitennerven 6—9, Stiel 0,8—1,5 cm, Herbstfärbung tiefgelb; Frst. aufrecht, 2—4: etwa 1,5 cm, Stiel etwa $\frac{1}{4}$ so lang, sonst wie Fig. 54d—d².

B. n. L., Sp. pl. 982. 1753 (*lanulosa* MCHX., Fl. Bor. Am. II, 181. 1803; *rubra* MCHX. r., Hist. arb. Am. II, 142. 1812) — Schwarz-B.; red. b. N.-Am. (Mass. bis Iowa, Kans., südl. bis Florida, Texas). — In feuchten, tiefgründigen Böden; harter, aber immerhin warme Lage bevorzugender Φ .

- + B.-Form wie Fig. 53p. Fr. kahl. Fr.-Flügel sehr schmal.

3. *B. corylifolia*: b. Φ . Genaueres über Höhe, Wuchs, Borke mir unbekannt, $\odot$ Zw. kahl, purpurbraun, Lent. deutl., Drüsen hfg. fehl., Kn. noch zu untersuchen, B. durch Form und Zähnung gut gekennzeichnet, oben nur jung verstr. beh., sattgrün, unten meist minder deutl. papillos als *nigra*, also auch grünlicher, anfangs dicht seidig zottig, später kahle, 4,5—8:3—5,5 cm, Stiel 0,8—1,2(—2) cm, Seitennerven 11—14; Frst. bis 3,5:1,4 cm, meist nickend, Stiel 0—1 cm; sonst wie Fig. 54i—i².

B. c. RGL. et MAX., in Bull. Soc. Mosc. 1865. 417 — Haselnußblättrige B. — Jap.: höhere Gebirge von Nipon. — Nicht echt in Kultur, obwohl gewiß interessante und zieml. harte Art. Was in den Gärten als *corylifolia* geht, ist meist *ermani*.

$\odot\odot$ B.-Unterseiten nicht papillös. gelb- bis freudig grün.

- + B. $\cdot$ länglich-eifg., etwa 2—2 $\frac{1}{4}$:1. Seitennerven (10—)11
14, Serratur sehr feinspitzig.

* * siehe
S. 101.

- + B. in o. eher ein wenig über der Mitte am breitesten, Spitze
relativ kurz (Fig. 53m—n¹).

+ + siehe
S. 101.

B.-Oberseiten glänzend grün. $\cdot$ Zw. glänzend purpur-
braun, Fr.-Sch. kahl.

4. *B. lenta*: b. bis 25:1,5 m. Rinde junger St. glatt, glänzend kirschbraun, auch später nie abblättrnd, nur in rissige bleibende Borke sich verwandelnd; Zw. stets kahl (höchstens beim Austrieb mit verstr. Härchen), jung $\cdot$ klebrig-warzig, bald glatt, an $\odot$ Lent. deutl., $\cdot$ mit grauem Epidermishäutchen bedeckt, zuletzt schwarzgrün, Krone zuerst pyramidal, aber später werden, sagt SARGENT, einige der oberen Äste länger als untere, laufen in breiteren Winkeln ab und beginnen gegen Peripherie zu hängen; Kn. 6—8 mm lang. $\cdot$ hellbraun, Spitze leicht klebrig, die 3—4 Sch. gewimpert; B. vgl. Fig. 53m—m¹, im Allgemeinen etwas feiner gesägt und mehr allmählich zugespitzt als bei *lutea*, zuletzt nur unten auf Nerven und in Achseln zottig beh., 4—12:2,5—6,5 cm, Herbstf. lebhaft gelb, Stiele 0,8—1,5 cm; Frst. 2—3,5(—4) cm lang und unter 1,5 cm breit, Stiel kurz o. fast fehl., vgl. Fig. 54e—e¹.

B. l. L., Sp. pl. 983. 1753 (*nigra* DUROI, Obs. 30. 1771, non L.; *carpinifolia* EHRL., Beitr. VI, 99. 1791, non S. et Z. — Zucker- o. Hainbirke; black or cherry b.; b. merisier. — N.-Am. von Neu-Fundl. bis W.-Ont., Flor., Tennessee. — In

wertbar. Die selten fehlenden braunlichen Drüsen-schuppchen habe ich nie als besonders charakteristisch befunden, da ihr Vorkommen ebenso hfg. wie wechselnd ist.

tiefgrundigem Boden in Flußniederungen und an Hängen. — Blz. IV—V. — Frz. IX. Diese zu Unrecht so hfg mit *lutea* zusammengeworfene Art ist nicht nur ein schöner Zier b., sondern auch in der Heimat ihres wertvollen Holzes wegen geschätzt. Rinde und B. stark aromatisch! — WINKLER führt als *lenta* β . *persicifolia* die Form, die DIPP., Handb. II, 185. 1862, als *lutea* α . *persicifolia* beschrieben hat. Ich kenne sie nicht.

Fig. 54. *Betula*: Frst., Fr.-Sch. und S.: *a—a'*: *globispica* (*a'*—*a''* etwa $\frac{2}{3}$); — *b—b'* *medwediewii*; — *c—c'* *maximoviczii*; — *d—d'* *nigra*; — *e—e'* *lenta*; — *f—g* *lutea*; — *h—h'* *utilis*; — *i—i'* *corylifolia*; — *k—k'* *ulmifolia*; — *l—l'* *ermani* (*a—a'*, *c*, *i*, *k*, *l* nach SHIRAI; *b—b'* nach REGEL; sonst Original).

B.-Oberseiten stumpfgrün. • Zw. hell olivbraun. Fr.-Sch. beh.

5. *B. lutea*: Wie vorige nicht selten b., aber: weniger aromatisch. Rinde an jungen St. rötlichbraun, in feinen Längslinien quer abkräuselnd. Zw. jung beh., auch an • Zw. um die nicht selten leicht beh. Kn. noch Reste der Beh.!; B. vgl. Fig. 53n—n', kurzspitziger und • gröber gesägt, beim Ausbruch dicht, mehr gelbroth beh., auch oben hfg. • beh. bleibend: bis 12:7 cm. Stiel 0.5—2 cm. Herbstfärbung mehr sattgelb: Frst. 2 3:1.5—2 cm, $\pm$ sitzend, sonst vgl. Fig. 54f—g.

B. l. MCHX. F., Hist. arb. am. II, 152. 1812 (*excelsa* PURSH, Fl. am. sept. III, 621 1814, non ATL., *lenta* var. *lutea* RGL., in DC Prodr XVI, 2, 179. 1868). Gelb B.; yellow b.; b. jaune. N.-Am., von Neu-Fundl. und O.-Kanada bis Manitoba, südl. bis N.-Karol., Tennessee, bes. in den Allegh. — Nach S. nur in höheren Gebirgslagen, hfg. b., liebt kühlere und frischere Lagen als *lenta*. Sonst wie diese und auch im Holzwert gleich!

++ B. unter der Mitte am breitesten, zieml. lang und fein zugespitzt (Fig. 53 o—o¹).

6. *B. ulmifolia*: $\mathfrak{H}$, bis über 20:0,8 m; Rinde junger St. (nach SHIRASAWA) glatt, glänzend, kirschbraun, im übrigen wohl *lutca* ähnlich; Zw. höchstens jung beh., meist drüsenlos, $\odot$ glatt, glänzend rotbraun o. braungrau, Lent. deutl., fein; Kn. 8—10 mm lang, Seh. 5—6, zweifarben o. olivbräunlich, nur gewimpert; B. 4—8:2,5—4,5 (nach SHIRAI bis 13:8) cm, jung beiders., unten dichter, locker seidig beh., bald bis auf Nerven kahlend, Stiel 1—2 (—2,5) cm; Frst. 1,5—3:1—2 cm, oft fast kahl, Flügel $\frac{1}{4}$ bis fast so breit als Nüßchen; vgl. Fig. 54 k—k².

B. u. S. et Z., in Abh. bayr. Ak. Münch. IV, 3, 228. 1846 (*costata* TRAUTV., in MAX. Prim. Fl. Am. 253. 1850). Ulmen-B. — Amur, Japan (Honshu, Kiushu, Shikoku). Blz. V. — Frz. X. Meines Wissens kaum echt in Kultur; was ich als *ulmifolia* o. *costata* sah und erhielt, halte ich sämtlich für *ermani*, die ihr wohl manchmal sehr ähneln mag, aber in B.-Form und Zähnung abweicht. Allerdings muß betont werden, daß diese asiatischen Birken noch sehr der Beobachtung bedürfen, zumal auch unter den *Costatae* natürliche Hybriden sein werden, deren Deutung aber erst dann möglich, wenn der Variationskreis von *ermani*, *utilis* und nächstverwandten Arten scharf erkannt ist. Und Das dürfte wohl nur durch vergleichende Beobachtung am lebenden Material möglich sein. Ich bitte um Überlassung von B., Bl.- und Fr.-Material aller dieser Arten und Formen!

* * B. mehr breit-eifg., im Mittel $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{3}{4}$:1, Seitennerven (6—) 7—9(—11), Serratur wechselnd, gröber.

+ B. aus rundlichem o. stumpf keiligem Grunde mehr breit elliptisch, in der Mitte etwa am Breitesten und kurzspitzig, Serratur zieml. kurz und mäßig ungleich, vgl. Fig. 53 a, c, h—i.

— B. aus keiligem Grunde etwa $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$:1, Stiel meist nicht länger als Kn. (Fig. 53 a), Frst. — kugelig-eifg.

7. *B. globispica*: $\mathfrak{H}$, hochstämmig, bis 15—20:0,7 m, Borke (n. SHIRAI) anfangs glatt, graubraun, hart und dick, zuletzt rissig, Zw. und Kn. konnte ich nicht untersuchen^{*)}; Bl.-Kn. nach SHIRASAWA bis 12:5 mm; B. bis 7:5—6 cm, oben auf Nerven fein beh., unten auf Nerven gleich dem Stiel borstig, dieser 0,4—1,5 cm; Frst. bis 3,5:2,5 cm, vgl. sonst Fig. 54 a—a⁴.

B. g. SHIRAI, in Tok. bot. Mag. 1894, 318. Kugelhährige B. — Jap. (nach SHIRASAWA, dans les montagnes, Mitsumine à Chichibu, Chuzenji ou aux pieds S.-E. de Nautoizan à Nikko). Blz. V. — Frz. X. Gewiß sehr interessanter und kulturwerter $\mathfrak{H}$.

— B.-Grund mehr rundlich, B. $1\frac{1}{2}$ —2:1, Stiel meist deutl. länger als Kn. (Fig. 53 c, h—i), Frst. zylindrisch.

= B. stumpfspitzig, vgl. Fig. 53 c.

8. *B. medwediewii*:*) Hoher $\mathfrak{H}$, Verästelung nach REGEL aufrecht, $\odot$ Zw. noch beh., Kn. groß, eispitzig, meist klebrig, nur Seh. gewimpert; B. (Fig. 53 c) aus meist rundlicher, selten leicht herztg. Basis, eifg. o. — verkehrt-, selbst etwas rundlich-eifg., Seitennerven 8—11, ober. Nerven — beh., dgl. unter., o. kahlend, 5—8:3—7 cm, Stiele beh., 0,8—2 cm; Frst. 2,5—4:1,5—1,8 cm, 0,4—0,8 cm lang gestielt, Fr.-Sch. mit aufrecht abstehenden Seitenlappen und etwa doppelt so langem Mittellappen, Flügel bis 4mal schmäler als Nüßchen, vgl. Fig. 54 b—b².

*) Herr Garteninspektor PURPUS-Darmstadt war so freundlich, mir von einer jungen Pfl., die er als *globispica* aus Jap. S. erzogen, einen B.-Zweig zu überlassen. Dieser trägt kleine B. wie Fig. 53 b und scheint mir in seiner Identität sehr fraglich. Nach SHIRAI und SHIRASAWA, welche letztem Autor ich auch B. aus Jap. verdanke, dürfte die in Fig. 53 a wiedergegebene Form für *globispica* sehr bezeichnend sein. Ob sie erst an älteren Pfl. auftritt, läßt sich z. Z. nicht beurteilen.

**) Beschreibung nach Dr. WINKLER, da mir Pfl. nur aus Literatur bekannt.

B. m. RGL., in Gartenflora. 1887. 383. — Transkauk. — Gebirge bis 2300 m.

Ob in Kultur? Herr ZABEL gab mir ein Expl., welches aus Petersburg als *B. medw.* verteilt war. *B.* wie Fig. 53d. Mir recht fraglich!

== *B.* deutlich gespitzt. vgl. Fig. 53h—i.

9. *B. utilis*: ♂, 10–18 m, in hoher Lage ♀, Rinde braunrot, papierdünn*), Zw. jung beh. und bedrüst, ♂ rotgraubraun, so gut wie kahl und nur mit wenigen Drüsen, aber zieml. ∞ hellen Lent. (an *lutea* erinnernd, der aber die Drüsen ganz fehlen). *B.* 3–6 (9):2–3,8 (5) cm, Nerven (7–)8–11, ober. meist kahlend, unters. wenig heller und auf Nerven zottig beh. bleibend. Stiel 0,8–2,5 cm; Frst. zu 1–2), 3–4(–5):0,8–1,2 cm, Stiel 0,8–1,5 cm, sonst vgl. Fig. 54h–h².

B. u. DON, Prodr. 58. 1825 (*bhojpattra* WALL., Pl. as. rar. II, 7. 1832). — Asiatische Papier-*B.* — Afghan., Kashmir bis Sikkim, Bhotan, W.-Tibet, Zentr.-China, Jap. — Im Gebirge bis 4000 m. — Meines Wissens sehr selten echt in Kultur: was ich als *utilis* o. *bhojpattra* sah, halte ich für *ermani*. Indes sah ich im Herb. KOEHNE Zw. einer Pfl. aus dem Darmst. Bot. Gart., die mir die echte *utilis* zu sein scheint, aber jetzt wieder eingegangen sein dürfte. Vgl. auch den mutmaßlichen Bastard 9×22 auf S. 103.

—: *B.* aus rundlichem bis herzfg. o. meist abgestutztem Grunde breiteifg., spitz, unter der Mitte am breitesten. vgl. Fig. 53f–g².

10. *B. ermani*: ♂, wohl so groß wie *ulmifolia*, ich sah Pflz. von 8–10:0,3 m. St. und Äste glatt gelblichweiß berindet. Rinde sich nach *papyrifera*-Art in breiten Querstreifen lösend, worauf der St. mehr gelbbraun erscheint. Zw. jung beh. o. kahl. Bedrüsung sehr wechselnd, ♂ meist kahl, ♀ rotbraun. Lent. hell, Rinde hfg. schon an ♂ Zw. sich lösend; Kn. etwas weniger spitz als bei *ulmifolia* und wie es scheint meist nur 2–4-schuppig; *B.* mit im Mittel meist 7–9, höchstens 10 (ganz vereinzelt 11) Seitennerven, auch stets gröber gesägt als bei *ulmifolia*, an Lohden zuw. deutl. gelappt, oben ganz o. fast kahlend, unten feine Achselbärte und wenigstens Nerven beh., 4–10:3–7 cm, Stiel 0,5 bis 3,5 cm; Frst. 2–4:1,2–1,5 cm, Flügel $\frac{1}{4}$ bis gut so breit wie Nüßchen.

B. e. CHAM., in Linnaea VI, 537. 1831. — Ermans *B.* — Mandschurci bis Jap. — Blz. V. — Frz. IX–X. — Schöne Art, die nächst *lutea* von allen *Costatae* in unseren Gärten am Häufigsten, ich sammelte o. erhielt sie auch als *bhojpattra*, *corallifolia*, *costata*, *ulmifolia* und *utilis*. Man beachte das bei *ulmifolia* Gesagte.

Von Bastarden der *Costatae* sind folgende zwei anzuführen:

4×15 *B. lutea* × *pumila*: Diesen Bastard beschreibt J. G. JACK in Gard. a. For. 1895, 243 unter Beigabe einer guten Abbildung. Da mir nicht bekannt, daß er bereits einen bestimmten Namen trägt, nenne ich ihn *B. jacki*. Er ging 1888 aus einer Aussaat von *B. lenta*-S. hervor. Wichtigste Merkmale nach JACK: ♂ ♀, Rinde z. T. deutl. aromatisch, *B.* in Serratur mehr an *lutea*, als *pumila* gemahnend, aber nur etwa 1:2 cm im Mittel, Seitennerven etwa 7; ♂ Blst. ♂ hängend; Frst. aufrecht, dick, bis 2,5:1,2 cm, Fr. vgl. Fig. 59a–a¹.

5×15 *B. lutea* × *pumila*: *B. purpurea*: nach Mitteilung des Herrn PURPUS in Darmstadt, wo ich diesen Bastard sah, wurde er von dessen Bruder bei Clarks-lake in Michigan (N.-Am.) gefunden, und zwar in der ♀-artigen, *pumila* näher stehenden Form, die ich als *var. typica* bezeichne. Die Darmstadter Pflanze stellt einen ♂ dar und ähnelt *lutea* viel mehr, ich nenne sie *var. luteoides*, sie ähnelt, was bei der nahen Verwandtschaft von *lenta* und *lutea* erklärlich, *B. jacki* sehr. Von *lutea* weicht sie ab durch: braungraue ♂ Zw. und Kn. stärker beh., Kn. nur etwa 5 mm, Seh. meist 3; *B.* (vgl. Fig. 58a–a¹) 3–6:1,3–3,2 cm, Seitennerven 7–9,

*) Nach HOOKER: „peeling in horizontal flakes“, wogegen SHIRASAWA sagt: „ecore dure compacte, tombant en facettes d'une forme d'écailles de tortue“. Im Abgelenen scheint die Berindung dunkler rotbraun zu sein und sich in größeren Stücken abzulösen, als bei *ermani*.

oben stumpfgrün, · verstr. kurz beh., unten viel heller, locker weich beh., Stiel 0,5—0,8 cm.

? 9×22 *B. utilis* × *alba*: *B. pseudo-utilis*. Ein im Hort. Bot. Wien als *utilis* stehendes Expl. scheint dieser Kombination zu entsprechen, doch bedarf es noch weiterer Beobachtungen.

B. B. mit höchstens 7 oberseits nicht vertieften Seitennerven, Formen vgl. Fig 56, 60 und 63.

I. B. höchstens 0,8 (— 1) cm lang gestielt, feinstes Adernetz leicht runzelig, vgl. Fig. 56.

II. siehe S. 109.

Sekt. c. *Humiles* sensu PRANTL. l. c. (*Fruticosa* et *Nana* RGL. in DC. 1868). · Blst. nur z. T. nackt überwinternd und (meist) gleich den · aufrecht, Fr.-Flügel $\frac{1}{3}$ bis höchstens so breit als Nüßchen.

C B. · zugespitzt, deutlich länger als breit, Seitennerven (3—) 4—5 (—7), Zw. mit Drüsen ± besetzt.

○ ○ siehe S. 105

· B. im Mittel mit 5—6 Nerven, Serratur fein und regelmäßig, Zuspitzung deutlich, vgl. Fig. 56d—e.

11. *B. fruticosa*: ·, Alles in Allem wohl *humilis**) analog, außer in den B. nur noch abweichend durch: B. unten hfg. auf der Rippe ± beh. bleibend, Seitenlappen der Fr.-Sch. mehr aufrecht. Flügel im Mittel $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ so breit als Nüßchen, Frst. 1—2:0,8 cm, vgl. Fig. 57b—b¹.

B. fr. PALLAS, Itin. III, app. 758, n. 133, tab. Kk. f. 1—3. 1776 (et Flor. ross. I, 1, 62, t. 40, A—C. 1784). — Strauch-B. — Altai, O.-Sib., Amurgeb., Dahurien. — Sumpfige Wiesen, analog *humilis*. — Bis-

Fig. 55. a—e *Betula humilis*: a beblätterter Zw. mit reifen Frst. (c); b Winter-Zw. mit noch geschlossenen ♂ Blst.; d Fr.-Schuppe, e reife Fr. — f—i *B. nana*: B.-Zw., oben mit jungen ♂ Blst., unten mit reifen Frst. (g); — h Fr.-Schuppe; — i reife Fr. (nach HEMPEL et WILHELM).

her nicht echt in Kultur, obwohl ich im Herb KOEHNE junge Pfl. aus Hort. SPÄTH sah, die hierher gehören könnten.

· B. im Mittel mit 4—5, sehr selten 6 Nerven, Zähnung relativ grob, daher auch Spitze breiter, vgl. Fig. 56f—i.

12. *B. humilis*: b, 0,5—3—3,5 m, sehr ästig. Rinde braun, Zw. jung · beh. und hfg. sehr reich bedrüst, · nicht selten kahl, nur mit mehr o. weniger Drüsen, bräunlich o. rotbraun, Lent. verstr. fein.

*) Es erscheint mir nicht gerechtfertigt, *B. fruticosa* und *humilis* zu vereinigen, wie es WILLKOMM u. And. getan. Die mir vorliegenden guten Expl. unterscheiden sich im Blatthabitus sofort von den allerdings oft ähnlichen *humilis*. Nach PALLAS Zeichnung läßt sich Sicheres nicht sagen, da seine Figuren nicht exakt gezeichnet sind. Die Angabe KOEHNE'S, daß die B.-Stiele von *fruticosa* meist über 1 cm lang, finde ich nicht bestätigt.

hell. Kn. klein, eikugelig, 2–4-schuppig, zweigfarben, meist nur Sch.
gewimpert; B. variabel, vgl. auch Fig. 55 a, fast stets nur jung verstr.
beh., 1–3,2 (–4,5):0,8–2,5 (–3) cm, unten o. kaum heller als oben;
Frst. 0,8–1,5:0,5–0,6 cm, Stiel 1–4 mm, Fr.-Flügel meist schmaler

Fig. 56. *Betula*-B.: a–b *glandulosa*; — c *nana* (zieml. große B.); — d–e *fruticosa*; — e¹ *divaricata* (vgl. auch Fig. 58 b–b²); — f *humilis*; — k–l² *pumila*; m *muddendorffii*, vgl. auch Fig. 64 n–p (n, Gr.) (m nach TRAUTV. et MEY.; sonst Orig.).

als halbes Nüßchen. Seitenlappen der Fr.-Sch. spreizend, vgl. Fig. 55 b—e und 57 c.

B. h. SCHRANK, Bayr. Fl. I, 421. 1789 (*fruticosa* BESS., Primit. Gal. Austr. 291. 1800 [et W. KOCH 1837] non PALL.; *sokolowii* JACQ. F. ex herb.). — Niedrige B.; shrubby b.; b. chétif. I G. D. im N. zerstreut (Torfbrüche), Baden, Württemb., Bayern. OU O.-Galiz., Pol., Mähr., Salzb., Tirol, Krain. Sch. St.-Gallen; sonst noch N.-Eur., Rußl., in N.-As. wie es scheint, sehr selten, aber wohl sicher vereinzelt auftretend, in N.-Am. sicher fehl. Sumpfige Wiesen, Torfmoore etc. Blz. IV—V. — Frz. IX—X. — In Kultur verbr. und häufig als *fruticosa*, *sokolowii*, *quebeckensis* etc. ausgegeben.

○○ B. sehr stumpf o. deutl. gerundet, hfg. breiter als lang.

* Zw. stets · dicht drüsig-warzig o. · kahl und drüsenlos.

✕✕ siehe unten

+ B. im Mittel nicht unter 2,5 cm lang, Fr.-Flügel meist breiter als halbe Nuß.

12a. *B. middendorffii*: Variabler b., nach MAXIM. bis 3 m hoch und zieml. spärlich verästelt. Rinde glänzend rotbraun, mit teilweise abschülfernder, sehr dünner grauer Epidermis, Zw. meist nur jung · fein zottig, deutl. bedrüst, auch · · drüsig o. ganz kahl, rotbraun; B. vgl. Fig. 56 m und Fig. 64 n—p, die großen B. von jungen üppigen Lgtr. bis 7:5 cm, jung beiders. verstr. locker beh. und gewimpert, später meist ganz kahl, oben lebhaft gelbgrün, unten · heller; Frst. etwa 1,5—2:1 cm, auf · halb so langem Stiel, aufrecht o. · übergeneigt, Fr.-Sch. gewimpert o. kahl, Seitenlappen aufrecht und kürzer als Mittellappen, Flügelbreite ähnlich *fruticosa* wechselnd, meist nur wenig schmaler als Nüßchen, vgl. Fig. 59 q—q¹.

B. m. TRAUTV. et MEY., Flor. Ochot. phaenog. 84. 1850 (vgl. auch TRAUTV. in MAXIM., Prim. Fl. amur. 255. 1850). Middendorffs B. Am unteren Anaur.

Diese mir aus sicher echten Expl. nicht bekannte Art scheint im Hort. SPÄTH zu sein, wenigstens fand ich im Herb. KOEHNE Expl., die kaum anders zu deuten und auch von Prof. KOEHNE mit Reserve zu *middendorffii* gestellt waren. Ich möchte darauf hinweisen, daß sie in Manchem an eine von mir vermutete *pumila* ✕ *glandulosa* (vgl. *B. sulcanta*) erinnert. Jedenfalls der Beobachtung nach zieml. bedürftig. WINKLER stellt sie zu den unsicheren Arten.

++ B. im Mittel nicht über 2 cm lang, Fr.-Flügel meist schmaler als halbes Nüßchen.

13. *B. glandulosa*: Habituell wie *nana*, Zw. nur jung, seltener auch · sehr fein kurz beh., Kn. meist ein wenig größer, als bei *nana*, Sch. 3—4, meist nur gewimpert, · klebrig; B. aromatisch, im Umriß in allen Übergängen zwischen der breitrunden und länglichen Form, vgl. Fig. 56 a—b, die zuw. den Eindruck guter Varietäten machen, 1—2,5(—3):0,9—2 cm, kahl o. fast kahl, aber bes. auf der deutl. helleren Unterseite mit ∞ Drüsenschuppen, Seitennerven 2—4; Stiel 3—8 mm; Frst. 1—2(—2,5):0,5, Stiel bis 0,7 cm, sonst vgl. Fig. 57 a—a².

B. g. MOENCH, Fl. bor. am II, 180. 1803 (*nana sibirica* LEDEB., Fl. ross. III, 654. 1846 51). Drüsen.-B.: glandular b. N.-Am. (Grönland, Neutundl. bis

Alaska, höhere Gebirge von Maine, N.-New-York, Mich., Minnes., Rocky Mts. bis Colorado), N.-As. (Kamtschatka, Sib. bis Altai). Blz. V—VI—VII. Frz. X.

In Kultur selten echt. Hfg. mit *humilis* verwechselt.

++ Zw. meist bis · o. · dicht beh., aber ohne Wachdrüsen.

+ B. klein o. sehr klein, meist unter 1,2 cm Dm., vgl. Fig. 56 c, Stiel 0,5—4 mm.

14. *B. nana*: b, 0,2—0,8, seltener bis 1,2 m, hfg. niedergestreckt, oft kaum zwischen den Pfl. des Unterholzes hervorragend, Ästchen knorrig, rissig, sehr wenig abblätternd, Rinde der Zw. schwarzgrau, jüngere braungrau, Beh. kurz (sammetartig), Lent. verstr., hell; Kn. beh., Sch. 2—3, rotbraun: B. meist breiter als lang, 0,4—1,2:0,5—1,5 cm. zuw. deutl. fächerfg. (*var. flabellifolia* HOOK., Fl. bor. am. II. 156. 1839, Seitennerven 2—4; Frst. etc. vgl. Fig. 56f—i).

Fig. 57. *Betula*. Frst., Fr.-Sch., S.: a—*a*² *glandulosa* (a ein großer Frst.); — *b*—*b*¹ *fruticosa*; — *c* *humilis* (vgl. auch Fig. 55 b—c); — *d*—*d*² *pumila*; — *e* *populifolia*; — *f*—*f*¹ *papyrifera*; — *g*—*g*¹ *occidentalis*; — *h*—*h*¹ *papyrif.* var. *lyalliana*; — *i*—*i*¹ *alaskana*; — *k*—*k*¹ *daurica*; — *l*—*l*¹ *alba*, *l*¹ var. *hornemannii*; *m* (fehlt); *n*—*n*¹ var. *vulgaris*; *o* *f. parvifolia*; *p* var. *urticifolia*; *q*—*r* subvar. *carpatca*; *s*—*s*¹ subvar. *contortuosa*; *t*—*t*¹ subvar. *murithii*; — *u*—*u*¹ *pendula*; *v* *f. ovalis*; *w*—*w*¹ *f. dolabrata*; *x*—*x*¹ var. *japonica* (*h*—*h*¹ nach SARGENT, sonst Original).

B. n. L., Sp. pl. 983. 1753 *nichuvii* SPACH*, in Ann. Sc. Nat. (II), XV, 195. 1840. Zwerg-B., dwarf b.; b. nain — I. G. D. selten n. GARCKE: Torfbrüche, Moorboden, Schles. (Iserwiese), Brocken, W.-Preuß. (2), Ob.-Bayr. OU. an analogen Orten in Böhm., Ostr., Salzbg., Tirol, Kärnt., Steierm., Krain, Karpat., Sch. Torf-

*) WINKLER hält diese als eigene Art aufrecht. Die von ihm zitierten Exemplare kenne ich nicht.

her scheint auch *B. gmelini**) z. T. zu gehören. Vielleicht auch Kultur-Expl. dieser, die von Moskau aus verbreitet wurden, obwohl gerade deren Deutung (ich verdanke solche der Güte des Herrn ZABEL) mir noch sehr fraglich.

12×19 *B. humilis* × *pendula*: *B. zabelii* SCHELLE, in H. d. D. D. G. 56. 1903 (*humilis* var. *zabelii* DIPP., Laubh. II, 180. 1892) [Typ: Expl. aus Hort. Hann.-Münden von ZABEL aus *humilis*-S. gezogen]. Steht *humilis* habituell sehr nahe, aber höher werdend, B. (Fig. 58e—e¹) von dünnerer Textur, mehr *pendula*-Färbung, Stiele meist 9—12—15 mm, Frst. bis 2:0,8 cm auf etwa halb so langem Stiele, Fr. vgl. Fig. 59f—g¹.

12×22 *B. humilis* × *alba*: *B. warnstorffii* (*pubescens* × *humilis* WARNSTORFF, in Verh. bot. Ver. Brandb. XI, 129. 1869, [Typ: Expl. leg. C. SANIO, Juli 1873, Lyck (Preuß.), Sarker Bruch] b—h, bis über 3,5 m hoch, hfg. *alba* subvar. *pubescens* sehr ähnlich, z. T. auch sehr an *zabelii* erinnernd, aber junge und ☉ Zw. dichter beh., B.-Textur derber, Form vgl. Fig. 58d—d¹, d² von Lohd, Fr. vgl. Fig. 59h—i¹. Manche Zw.-Stücke erinnern in den B. auffällig an *hybrida*; jedenfalls bedürfen all diese Bastarde noch sehr des Studiums, um die einem jeden charakteristischen, oft kaum hervortretenden Eigenheiten genau festzustellen. Hierher scheint auch *fetisowi* HORT. z. T. zu gehören.

13×15 *B. glandulosa* × *pumila*: *B. sullivantii* (Typ. Expl. leg. SULLIVANT als *glandulosa* MCHX. in Ohio (Columbus), 1840). Dr. WINKLER hält dies Expl. für *pumila*, in den B. (Fig. 58h—h¹) ist der Einfluß der *glandulosa* deutlich erkennbar. Diese kahlen zuletzt ganz und auch die ☉ Zw. sind z. T. fast kahl. Fr. vgl. Fig. 59a'—a¹. Es wäre wünschenswert, daß in der Heimat weitere Expl. aufgefunden würden.

13×22 *B. glandulosa* × *alba*: *B. rosenvingei* [Typ: Expl. leg. DR. L. K. ROSENVIINGE, 25. VII. 1888 Grönland (Kagsiarsuk, Igaliko Fjord)]. In der Tracht etc. *B. intermedia* var. *alpestris* sehr nahe, aber durch die z. T. zieml. reich drüsigen jungen Zw. gut verschieden, sonst vgl. B. Fig. 58f—f², Fr. in Fig. 59k¹—k². — Hierher scheint auch *B. intermedia* × *glandulosa* BERLIN, ex LANGE, Comp. Flor. Grönl. II, 281. 1887 zu gehören.

14×15 *B. nana* × *pumila*: *B. winklerii*: Diesen Bastard fand ich im Hort. Hann.-Münden unter dem Namen *pumila* var. *dahurica*, die B. zeigen, vgl. Fig. 58i—i², deutl. beide Arten an, ebenso die Beh. Fr. sah ich noch nicht. Herr Dr. WINKLER, dem zu Ehren ich sie benenne, stimmte meiner Deutung bei. In mancher Hinsicht sehr ähnlich war eine *pumila* des gleichen Gartens, den ein Kenner wie ZABEL so mit Raritäten angefüllt hatte, hier scheint jedoch außer *pumila* eine Art der *Albae* beteiligt. Sicherer läßt sich erst sagen, wenn Fr. vorliegen. Da die Zw. in der Beh. deutlich auf *nana* weisen, aber *nana* × *pumila* der längeren B.-Stiele und der zahlreicheren Nerven halber ausgeschlossen scheint, so halte ich eventuell *nana* × *excelsa* (*pumila* × *papyrifera*) nicht für unmöglich.

14×19 *B. nana* × *pendula*: *B. fennica* DÖRFL., Herb. Norm. No. 4375. 1902 (*nana* × *torreana* SAELAN, in Meddel. Soc. Fennica XIII, 256. 1886) [Typ: Expl. leg. LUNDBERG, Fennia, Savonia borealis; in sphagneto ad „Järvikylä“ prope „Jorvis“; edit. ab DÖRFL. l. c.]. h, bis 3 m, von *intermedia* bes. abweichend durch die drüsigen jungen nur kurz beh. Zw., die auch in ihrer Feinheit auf *pendula* deuten, überhaupt durch schlankeren Wuchs, dünnere B. (Fig. 58g—g¹), für die bes. Form g¹ sehr bezeichnend, im Allgem. herrscht der *nana*-Einfluß vor, an die bes. die Fr. Sch. erinnern, wogegen die Fr.-Flügel hfg. deutlich breit sind (Fig. 59l—n). Scheint im N. weiter verbr., z. B. Schweden; für Kultur gewiß von hohem Interesse, zumal um sie näher beobachten zu können. *B. rosenvingei* weicht bes. in B.-Zahnung ab, hier sind auch ☉ Zw. meist deutlicher drüsig.

14×22 *B. nana* × *alba*: *B. intermedia* THOM., in GAUD. Fl. helv. VI, 176. 1830 (*nana* var. *intermedia* HARM., in Vet. acad. handl. 1818, 148), altbekannte Hybride, die im Gebiet der Stammarten zieml. verbreitet sein dürfte: b—h, bis 3 m hoch, sehr astig, auch ☉ Zw. meist noch beh., B. vgl. Fig. 58e—e², Fr. Fig. 59o—p¹, der Formenkreis bedarf noch der Untersuchung; ich halte vorläufig fest: var. *typica*: Typ.: Expl. leg. THOMAS, Schweiz, Jura, Mont Chasseral, *alba* nahestehend, B. vorwiegend wie e—e², und var. *alpestris* WINKL., Mon. Betulac. 1904 (*B. alp.* FRILS., Sum. veg. scand. I, 212. 1846 [Typ: Expl. leg. A. DAHLBERG, Lulen, Lappmark. 1852], *nana* näher, B. vgl. e⁴—e⁵).

15×21 *B. pumila* × *papyrifera*: *B. excelsa* AIT., Hort. Kew. III, 337. 1789. Als *excelsa* finden wir in den Kulturen ∞ Formen und der AITONsche Name

*) Eine *B. gmelini* BGE., wie sie TRAUTV. in Plant. Imag. fasc. I, 10, t. 5. 1844 beschreibt und abbildet, sah ich nirgends. Auffällig ist in der Zeichnung die Zahl der Seitennerven (4—9). WINKLER zieht *gmellini* zu *fruticosa*.

wurde in der verschiedensten Weise gedeutet. Nach eingehendem Studium sehe ich mich zu der Annahme gezwungen, daß die echte *excelsa* eine aus Amerika importierte Hybride der genannten Arten darstellt, welche als ♂ der *papyrifera* viel näher steht, aber doch in den kleineren, 3,5 : 7,5 : 2,5 : 5,5 cm messenden, im Mittel etwa 1,2 cm lang gestielten B. (Fig. 64q—s) auf *pumila* hindeutet. Ich führe sie als *var. typica*. Fr. siehe Fig. 59r—r¹. Sie macht fast den Eindruck einer Art. Daneben kann man als *var. berggreniana* (*B. berggreniana* ZABEL, ex H. d. D. D. G. 55, 1903) eine mehr b-artige Form unterscheiden, die zumal in der Beh. *pumila* näher steht (vgl. Fig. 59r²—r³). Herr ZABEL deutete einige mir gegebene Expl. als vielleicht *populifolia* < *pumila*, allein die Zahnung etc. sprechen dagegen. In den Gärten scheint *excelsa* u. T. auch als *dahurica* zu gehen.

Fig. 59. *Betula*: Fr.-Sch. und S.: a—a¹ *jackii*; — a²—a³ *sullivantii*; — b—c¹ *aurata*: b—b¹ *callierii*; c—c¹ *wettsteinii*; — d—d¹ *koehnei*; — e—e¹ *divaricata*; — f—g¹ *zabelii*; — h—i¹ *warnstorffii*; — k¹—k² *rosenvingei*; — l—n *fennica*; — o—p¹ *intermedia*: o—o¹ *var. typica*, p—p¹ *var. alpestris*; — q—q¹ *middendorffii*; — r—r³ *excelsa*: r—r¹ *var. typica*, r²—r³ *var. berggreniana* (Mit Ausnahme der nach JACK verkleinerten a—a¹ Alles $\frac{1}{2}$ und Original).

? 15—22 *B. pumila* < *alba*: *B. lancheana** so möchte ich eine Pfl. nennen, die mir Herr ZABEL als *excelsa* ATT gab und die er als *pubescens* HORR. MUSK. 1881 erhalten. Sie weicht von *excelsa* durch kleinere, an dem mir vorliegenden Expl. nicht über 1,5 : 3,5 cm messende B. ab und erinnert in Manchem an *intermedia*, aber *pumila* deutlich anzeigend. Bedarf noch eingehender Beobachtung!

II. B.-Stiele mindestens 1 cm lang Ausnahme z. T. *davurica*, B. glatt, feinstes Nervennetz meist kaum auffällig, vgl. Fig. 60, 63 und 64.

Sekt. d. *Albae* sensu PRANTL. l. c. ♂ Blst. nackt überwinternd, zur Blz. hängend, ♀ meist zuletzt ebenfalls hängend.

Subsekt. a. *Dahuricae* [RGL., in DC. Prodr. XVI, 2, 174. 1868]. Meist ♂, B. vgl. Fig. 60p. Fr.-Flügel höchstens $\frac{1}{2}$ so breit wie Nüßchen.

17. *B. davurica**: ♂ ♂, bis 20 m. habituell an *alba* erinnernd, doch St. mit gelbbraungrauer (dunkelkaffeebrauner), in losen Fetzen sich lösender Rinde o. mit glatter, fester, braungrauer, tief zerklüfteter Borke, Äste im Allgem. stärker, in spitzeren Winkeln vom St. ablaufend und erst an der Peripherie in feinere rotbraune Zw. sich auflösend, Kn. eilänglich, Sch. 2—3, nur gewimpert. klebrig; B. vgl. Fig. 60p, aus ganzrandiger, gerundeter, aber nie herzförmig und meist deutl. keiliger Basis eiförmig, zieml. kurz zugespitzt, Serratur ungleich, oben kaum lappig, zuw. auch oben jung auf Nerven beh., sonst hier kahl

*) Beschreibung z. T. nach TRAUTV. in MAXIM., Prim. Fl. am. 250 1859.

und unten fein nervenhaarig und achselbärtig, 3,5—6:2,5—4 cm, Seit.-Nerven ca. 6—7; Stiel 0,8—1,5 cm, $\pm$ beh.; Frst. 1—1,5 cm, auf $\frac{1}{2}$ bis gleichlangen Stielen, Sch. mit kurzer Basis, abstehenden, gerundeten Seiten- und zugespitzten langen Endlappen, Flügel $\frac{1}{4}$ — $\frac{3}{4}$ so breit wie Nüßchen, vgl. Fig. 57 k—k¹.

Fig. 60. *Betula*-B. a—c *populifolia*; — d—f *papyrifera*: d (links) f. *elongata*, d (rechts) f. *typica*, e f. *cordifolia*; — g—i *papyrifera* var. *lyalliana*; — k *alaskana*; — l *kenica* (teste REHDER); — m—o *occidentalis*; — p *davurica*; — q *alba* subvar. *entelliana*; — r dgl. subvar. *murithii* (vgl. auch Fig. 61 k—k¹); — s *pendula* var. *excelsa*; — t u *alba* subvar. *carpatca* (vgl. auch Fig. 64 b). (Alle $\frac{1}{2}$ n. Gr.) (i, n nach SARGENT, sonst Orig.).

B. d. PALL., Itin. III, 224, not. Tab. K. k., fig. 4 a, b. 1776. [et Flor. ross. I. 1. 60, tab. XXXIX, Fig. A]. — Dahurische B. — Dahurei, Amurgebiet —

Bergwälder, Hänge. — Kaum mehr echt in Kultur, was ich als *dahurica* HORT. PETERSBG. sah, stimmte nicht mit obiger Beschreibung. Indes zeigte es wohl Anklänge an PALLAS' Abb. in Flor. ross.! Dort ist die Serratur schärfer, lappen-zähniger. — ZABEL hat, in Mitt. D. D. Ges. 1895. 39, eine vermutliche *B. dahurica* *lenta* erwähnt. Ich habe darüber nichts Näheres in Erfahrung bringen können und glaube nicht, daß ein solcher Bastard existiert.

Subsekt. β . *Eualbae* *Albae* RGL., l. c.. Meist δ . B. vgl. bes. Fig. 60., Fr.-Flügel ebenso bis 3mal so breit wie Nüßchen.

○ · Zw. stets kahl, dünn, meist verstr. bis reich bedrüst, B. ausbreitem, etwas eckigem Grunde in eine lange Spitze vorgezogen (Fig. 60a—c und Fig. 62a—d). Mittellappen der Fr.-Sch. klein und kürzer als die breiteren, gerundeten und meist zurückgebogenen Seitenlappen (Fig. 57e—e⁸ und u—w¹).

* B. sehr auffällig lang und fein gespitzt (Fig. 60a—c).

○○ siehe S. 114.

Fig. 61. *Betula pendula* (*B. verrucosa*): a B.-Zw. mit reifen Frst.; b Trieb mit ♂ (b) und ♀ Blst.; c: d Trugdöldchen von vorn (Stb. entfernt); e dgl. von der Seite (vollständig); f dgl. von unten, daneben Stb. für sich; g wie f, doch A. entfernt, so daß die P. sichtbar werden; h dgl., doch mittlere P. entfernt, um die beiden inneren Deckschüppchen freizulegen; i Trugdöldchen mit 3 Bl.; k dgl. ohne die Bl., das äußere und die beiden inneren Deckschüppchen zeigend; l Längsschnitt durch reifen Frkn., die jungen Fr. Flug nur z. T. gezeichnet; m Fr.-Sch. von oben; n dgl. von unten; o reife Fr.; p Keim-Pilz.; q junge Drüsen-Schuppe vom B. (Scheitelaussicht); r ältere Drüsen-Schuppe vom Zw., der Rinde ansitzend, nach Weglösung des ausgeschiedenen „Wachsharzes“ durch Alkohol (Seitenansicht) (nach HEMPEL et WILHELM).

18. *B. populifolia*: δ . 6—10—15; 0.25—0.30 (—0.50) m. Rinde der Äste gebräunt, am St. allmählich in glatte, feste, weiße, nur ganz am Grunde alter St. in schwarzrisige Borke übergehend. Verästelung zuw. sehr tief ansetzend, unregelmäßig, o. schlanker, z. T. überhängend, Zw. nur schwach hängend. · meist dicht bräunlich wachsdürrig, sonst glänzend rotbr., auch Lohden. Lent. deutl., Kn. eistumpfl., Sch. · verklebt; kahl (ob immer?); B. dünnhäutig, oben glänzendgrün, jung klebrig, unten heller, meist mit ~ feinen Drüsen-Schuppen

(in Kultur eine Form mit purpurn angehauchten B., *f. purpurea*). 3-9:1,5-6, an Lohd. bis 12:8 cm. Herbstf. bleichgelb, Stiel 1,2-3 cm; Frst. z. T. aufrecht, 2-2,5:0,6-0,8 cm, Flügel wenig bis doppelt breiter als Nüßchen, vgl. sonst Fig. 57 e-e³.

B. p. MARSH., Arbust. Am. 19. 1785 (*acuminata* EHRH., Beitr. VI, 98. 1791, excl. syn.; *alba* subspec. *populifolia* RGL., in Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXVIII, 2, 399. 1895). Pappelblättrige B.; american white b.; b. à feuilles de peuplier N.-Am. Neu-Braunschw. bis S.-Ont., Pennsylv., Delaware. — Im Gebirge bis 600 m; n. MAYR in sumpligkalten Böden und an trockenen kiesigen Standorten; tritt meist zieml. vereinzelt auf. — Blz. IV-V. Frz. IX. Schönbelaubter harter Zier-*h*.

✱✱ *B.* weniger lang und fein zugespitzt (Fig. 62 a—q³).

19. *B. pendula*: (*b*—*h*), bis 26 (—30):0,5-0,8 m; vgl. *var.*. • Zw. meist nur mäßig dicht mit hellen Drüsenwarzen besetzt, Lohden hfg. auch beh., Kn. vgl. Fig. 63 k—p, unterste Sch. hfg. früh abfällig; B. nur ganz im Anfang verstr. beh., klebrig und sehr rasch kahl, dünn, oben lebhaft, unten heller grün, sonst vgl. *var.*, Bl. siehe Fig. 61, ♂ Blst. 3-6:0,6-0,8 cm, Trgb. bräunlich, A. gelb; ♀ zur Blz. 1-2:0,2 cm, gelbgrün, Gr. purpurn, Frst. vgl. Fig. 61 und *var.*

var. a. typica: als *h* zuletzt mit stark hängender Tracht, Rinde weiß, sich aber bald in schwarzrissige Borke verwandelnd, als *b* mehr aufstrebend verzweigt, hfg. nur leicht hängend, B. vgl. Fig. 62 a—d, 4-8:3,5-5,5 cm an Lohden — tief herzfg. bis 10:8 cm, Stiel 1,5-3 cm, Frst. 1,5-3,5(—4):0,7-1,2 cm, zuw. — aufrecht; hierher als Formen: *f. obscura* (*B. obs.* KOTULA, in Jahrb. Schles. Ges. LXV, 314. 1887). *h*, aber St.-Rinde nicht weiß, sondern — bräunlich getönt. — *f. expansa* [RGL., Mon. 18. 1861] (*alba verrucosa* WALLR., Sched. crit. 495. 1822; *edrata* REHB., Ic. fl. Germ. XII, 2, t. 626, f. 1288. 1850); hierunter verstehe ich die *b*-artige fruchtende Form, wie sie hfg. mit *alba* subvar. *cupubescens* an moorigen Orten auftritt, sie erhält nie die typische hängende Tracht; was RGL. in DC. Prodr. XVI, 2, 164. 1868 als *β. sterilis* führt, ist eine sterile, meist durch Abtrieb der St. entstandene Lohdentriebform mit sehr stark drüsigen Zw. und meist herzfg. B.; außerdem hebe ich noch folgende Formen hervor: *f. cuneata* (*B. cyclocuensis* HORT. NONN.), B.-Grund spitz und lang keilig, vgl. Fig. 62 e—g. *f. dalecarlica* (*alba dale* L., Suppl. 416. 1781, *B. hybrida* BLOM., in Vet. Ak. Handl. VII, 186. 1786 [et REHB., l. c. t. 627, f. 1289]; *B. palmata* BORKH., Forstb. I, 500. 1800). B. vgl. Fig. 62 h—i, in Schweden (Dalekarl., Verml.) spontan auftretend, in Kultur lange bekannt. — *f. denticulata* (*B. corylifolia* HORT. NONN.), B. vgl. Fig. 62 k, tritt auch spontan auf. *f. purpurea*, B. — purpurn getönt. — *f. nana*^{*)} (*B. verrucosa nana* HORT. SIM. LOUIS, vgl. BEISSNER, in Mitt. D. D. G. 1898, 86). B. vgl. Fig. 62 n. — *f. tristis*, eine feinzweigige zierliche Hängeform mit kugelter Krone. — *f. youngi* var. *elegans* o. *eleg. youngi* HORT.), Bes. stark hängend, Tracht einer Trauer-Sophora. *b. pyramidalis* DIPP., Laubh. II, 167. 1892 (var. *fastigata* SCHELLE, in H. d. D. D. G. 54. 1903). Wuchs — pyramidal, in verschiedenen Kulturformen, vgl. B. Fig. 62 o, von denen ich besonders nenne *f. parvula*. Diese Form, deren B. Fig. 62 p zeigt, stammt aus HORT. SPÄTH, ich sah sie in Herb. KOEHNE. Ihre Konstanz ist noch fraglich. — *c. arbuscula* [FRIES, Summ. veg. I, 212. 1846]. Niedriger *h* o. *b*, Zw. — hängend, B. klein, vgl. Fig. 62 q. Spontan in Dalekarlien, wohl nicht in Kultur. *d. oycoviensis* [RGL., in DC. l. c. 164, (*B. etc.* BESS., Prim. fl. Galie. II, 289. 1809; *alba* var. *microphylla* WIM., Fl. Sches. 327. 1840). — aufrechter rotbraun berindeter (*b*—*h*), Zw. meist bedrüst, B. klein, vgl. Fig. 60 s. Spontan in Galizien, wohl auch Schles. und sonst noch auftretend. *e. japonica* REHD., in BAILEY Cyc. am. hort. I, 159. 1901 (*B. japonica* STEB., in Verh. Bot. Gen. XII, 25. 1830; *B. alba* subspec. *latifolia* RGL., in DC. l. c. 165 ex parte). Nach einem Expl. im Herb. KOEHNE scheint diese Form bei SPÄTH echt in Kultur (vgl. Fig. 62 q¹), sie ist mir noch nicht genau bekannt und vielleicht als eigene Art zu fassen, wie es WINKLER tut. Im Wesentlichen weicht sie ab durch: junge Zw. — fein beh., — kahl u. meist bedrüst, B. junger Pfl. ebenfalls beiders. — beh., z. T. leicht herzfg., vgl. Fig. 62 q¹, sonst zuletzt höchstens an Rippe unten sehr fein beh. und achselbärtig und am Grunde — ge-

^{*)} Nach einer Mitteilung des Herrn Prof. KOEHNE wächst diese Form als ganz normaler *h* und nur einzelne Zw. nehmen einen Wuchs an, als ob es eine Zwerform wäre.

wimpert 3–8:2.5–6, Stiel 1.2–2.5 cm, Fr. vgl. Fig. 57w. Ich unterscheide *f. typica*, B. wie Fig. 62q mit oft sehr feiner Spitze, aber durch die Zähnung von *pendula* und *populifolia* gut geschieden, und *f. mucronata* Fig. 62q', die stark an *f. denticulata* (k) gemahnt.

Fig. 62. *Betula*-B. *q* *pendula*; *a–d* var. *typica* (a Stocktrieb B.); *e–g* *f. uncinata*; *h* *f. adlocartea*; *k* *f. denticulata*; *l* *f. youngi*; *m* *f. purpurascens*; *n* *f. nana*, o. var. *pyramidalis*; *p* *f. parvula*; *q* u. *arbuscula*; *q'* *q''* u. *typica*; *q'''* ex HORT. SPÄTH, noch fraglich, *q'''* *f. typica*, *q''''* *f. mucronata*, *r* *f. pseudo-alba*, *r'* *f. nitro-purpurea*, *r''* *f. atrovirens*, *r'''* *f. celtica*; *s* *f. schumacheri* (2 n. Gr.) (Original).

B. p. ROTH, Tent. Fl. germ. I. 405. 1788 [et SCHRANK, Bayr. Fl. I, 417. 1790], *alba* L., Sp. pl. 982. 1753 ex parte, *pendula* EHRH., Beitr. Naturk. VI. 98. 1791; *undulata* KANTZ., in Linnæa XXII, 351. 1860. — Genom. Hänge-, Raup- o. Harz-B.; white b.; b. verruqueux. — L. G. verbreitet, im Übrigen herrscht bezüglich ihres Verbreitungsgebietes noch Unklarheit. WINKLER hat es wie folgt zusammengestellt. Die N.-Grenze geht von Großbritannien nach Norweg. 63° 50' (Schwed. 66°) und Lappland (Ruutjarvi-See), von da über den Onega-See durchs Geny-Worogda nach As. Dort unsicher, soll aber in Jap. auch in typ. Form auftreten. Die S.-Grenze dürfte in O-As. etwa der 30. Breitengrad bilden, in Mongolei bis 37° 50', fehlt in Afghan. und Pers., tritt im Kauk. in höheren Gebirge wieder auf, während in Kl-As. sie noch fraglich. In Em. geht sie vom Rhodope-Gebirge in Thracien nach Pers., vendet Alp., Apennin, bis Atlas, O.-Pyren., Hochgeb. der ib. Halbinsel. Selbst auf sehr armen, trocknen Boden noch meistent. aber nach HEMPEL reine Kalkboden, gedeiht am besten in mäßig feuchten, lockeren, bes. sandig-lehmigen

Boden. Tritt hfg. mit *Pinus silvestris* vereint auf. Blz. (III—IV₁—V), kurz nach Laubausbruch. Frz. VI—VIII. Wird freistehend mit 10 bis 12., im Schlusse mit 20. bis 30. Jahre mannbar. — Alter 90—100, selten bis 150 Jahre. — Wertvoller Zier-*B.*, forstlich bes. als Mischholz geschätzt, und nach HEMPEL im Ganzen zwar nicht hervorragend wichtiger Waldbildner, aber immerhin nützlicher Wald-*B.*, der, von Natur mit einer außerordentlichen Verbreitungsfähigkeit ausgestattet, sich, ohne die forstliche Kunst in Anspruch zu nehmen, fast überall und oftmals im Übermaße einfindet und, in gehörigen Schranken gehalten, bes. wegen der von ihm gelieferten frühzeitigen Nutzungen dem Forstwirt oft willkommen ist. — Holz elastisch, fest, brennkräftig, weich wie bei den Erlen, aber schwerspaltig, spez. Gew. lufttrocken 0,65 im Mittel, nur für Verwendung im Trocknen von Wert (kein Bauholz!). Reisig für Besen begehrt.

19×21 *B. pendula* × *papyrifera*: *B. koehnei*, [als Typ Expl. in Herb. KOEHNE als *cuspidata* HORT. SPÄTH, bez. in meinem Herb. als *cusp.* HORT. HANN.-MÜND.], gemahnt im Umriss der B., die bis 9:6,5 cm messen (Fig. 62 s—s'), sehr an *papyrifera*-Formen, aber die feine Zähnung und Zuspitzung deuten auf *pendula*, die jungen Zw. sind verstr. beh., die B. derbhäutig, oben tiefgrün, bald kahl, unten viel heller, verstr. an Nerven borstig und achselbärtig, auch am Grunde gewimpert, Stiel 1—2,5 cm; Fr. vgl. Fig. 59 d—d', hier tritt der *pendula*-Charakter am meisten zurück. Bedarf noch sehr der Beobachtung, aber eine schöne kulturwerte Birke.

19×22 *B. pendula* × *alba* v: *B. aurata* BORKH., Forstb. I, 498. 1800; (*hybrida* BECHST., in Diana I, 80. 1797; *B. glutinosa* WALLR., Sched. crit. 497. 1822, excl. syn.; *ambigua* HAMPEL, in Rehb. Fl. sax. 120. 1842 [Name bereits 1836 publiziert]). Dieser Bastard scheint mit den beiden Eltern zieml. hfg. aufzutreten, ist aber sicher nur selten nachgewiesen. Seine Charaktere sind sehr schwankend. Habituell steht er *alba* fast stets sehr nahe, zeigt aber feinere gestrecktere Zweigenden, die wenigstens jung beh. und drüsig sind; den B. nach unterscheide ich vorläufig drei Hauptformen: *f. callera*, [als Typ ein Expl. leg. CALLIER, 6, 8. 1892. Grünberg: am Telegraphenberg, in Flor. sil. exs. No. 673], B. vgl. Fig. 62 r⁴—r⁵, meist rhombisch, im Mittel 4—5:2,5—3,5 cm, Rand fein, z. T. fast fadig gezähnt, bes. Spitze!, dadurch *pendula* nahe, aber Fr. wie Fig. 59 b—b'. *f. wettssteini* [als Typ Expl. leg. v. WETTSSTEIN bei Trins (Tirol) S. 9. 1890], B. vgl. Fig. 62 r¹, hält in allen Charakteren mehr die Mitte und stammt nachweisbar von *pendula typica* × *alba vulgaris subar. typica*, Fr. vgl. Fig. 59 e—e'. *f. pseud-alba*, B. vgl. Fig. 62 r¹, hierher scheinen eine ganze Anzahl oft *alba* sehr ähnlicher Formen zu stellen, die teils in Fr., teils in B.-Zuschnitt auf *pendula*-Einfluß deuten, z. Zw. fein beh., (⊖) kahl. Ferner erwähne ich *f. atropurpurea* [als Typ Expl. in Herb. Dendr. Dr. C. BAENZIG, Breslau, Sudpark, als *pubescens atropurp.*, B. Fig. 62 r¹ zeigt, daß unzweifelhaft *pendula* daran beteiligt, aber die Beh. der jungen und z. Zw. deutet auf *alba*.

(⊖) z. Zw. hfg. beh., nicht selten drüsenfrei, B. sehr verschieden, aber mehr eifg., Spitze kurz o. stumpf, vgl. Fig. 60 d—m, q, t, Mittellappen der Fr.-Sch. mindestens den meist deutl. aufrechten, eckigen Seit.-Lappen gleichlang o. deutl. länger, kräftig.

z. Zw. meist und hfg. reich bedrüst, sonst kahl, B. ziemlich grob und ungleich gezähnt, vgl. Fig. 60 m—o.

20. *B. occidentalis* *: b *B.* vielästig aufrecht, hfg. Dickichte bildend, o. seltener *B.* bis 13:0,5 m, Borke bräunlich, glänzend, Zw.

*) *B. torfacea* SCHLEICH., Cat. pl. Helv. ed. IV. 1821, dürfte nach mir vorliegender Herb.-Expl. nicht hierher gehören, sondern teils bei *alba subar. typica*, teils bei *subar. caudata* u. c. auch *nodata* einzureihen sein. Der Name *hybrida* kann nicht beibehalten werden, da eine *B. hybrida* BLOM bereits 1786 in Vet. Ac. Nya Handl. 180, t. 6 publiziert wurde, was schon BORKH. betont. Auch viele andere als Synonyme hierher gestellte Namen dürften nur auf *alba*-Formen zu beziehen sein.

**) In der Umschreibung dieser und der folgenden Art schreibe ich mich hier in der Hauptsache der Darstellung von Prof. SARGENT an, und zwar verstehe ich unter *occidentalis* HOOKER die von SARGENT in Silva IX, 65, t. 453. 1899 beschriebene Birke, wogegen ich seine *orientalis*, Silva XIV, 57, t. 725. 1902 als var. *hyalocarpa* unter *papyrifera* führe. An anderer Stelle werde ich über diese noch in keiner Weise erschöpfend studierten Baken, insbesondere vom NW.-N.-Am. ausführlicher sprechen und bemerke heute lediglich, daß die hier gegebene Übersicht nach Lage der Dinge nur eine provisorische sein kann. So wenig ich mich mit den Darlegungen FERNALDS in Am.

stets kahl. ☉ · glänzend braunrot, Lent. hell. ☉ Zw. · graubraun. Kn. · zweifarben. B. jung · klebrig und verstr. beh., später oben kahl und auf der helleren Unterseite nur an der Rippe · beh. und fein achselbärtig. Basis rundlich o. · keilig, vgl. Fig. 60 m—o, kaum über 6:3 cm. an Lgtr. wohl auch leicht herzfg. und bis 9:6 cm. Herbstf. stumpf gelb. Stiel 1—1.5—2 cm; Frst. 2.5—3.5:1—1.2 cm. Stiel 1—1.8 cm; Seitenlappen der Fr.-Sch. aufrecht. Flügel $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mal so breit als Nüßchen, Fig. 57 g—g¹.

B. o. HOOKER, Fl. bor. am. II, 155. 1840 (*rhombifolia* NUTT., Sylva I. 1842, fide SARGENT, non TAUSCH; *alba* subsp. *V. occidentalis* RGL., in DC., l. c. 165. 1868; *fontinalis* SARG., in Bot. Gaz. XXXI, 239. 1901). Von Brit.-Col. und N.-Kalif. in den Rocky Mts. südl. bis Nevada, Utah, N. Neu-Mex., Colorado, östl. bis Dakota, NW.-Nebraska. · Vorzüglich im Gebirge, · feuchte Orte. · Sonst vgl. *papyrifera* und die Anmerkung S. 114. — Das asiatische Gegenstück zu *occidentalis* scheint *resinifera* (*alba verrucosa resinifera* RGL., in DC. 166) zu sein.

++ ☉ Zw. meist beh., selten und wenig bedrüst, B. verschieden, vgl. Fig. 60 d—i, q, r, t—u und 64 a—o.

— B. vorwiegend etwas eielliptisch, d. h. die Seitenränder ein Stück · parallel. Grund meist gerundet o. herzfg., Länge 7—9 cm im Mittel (Fig. 60 d—i, ☉ Zw. beh. und zuw. bedrüst o. durchaus kahl.

21. *B. papyrifera*: meist 2, bis 25(—40:0.90) m. · aufrecht verästelt, aber Zw. nach außen ± übergeneigt, im Alter unregelmäßig, oft mehrstämmig, malerisch; Rinde glatt, sich in dünnen breiten Querslappen lösend. Borke nur am Fuße alter St.; Zw. jung fast stets beh. und hfg. · drüsig, · vgl. *var.*, Kn. 6—10 mm lang, · braunrot o. olivgrün und braun, die 3—4 Sch. meist nur gewimpert und · klebrig. B. jung · klebrig oben meist bald kahl, o. nur auf Rippe verstr. beh., tief stumpf grün, unten hellgelbgrün, · auf Nerven beh. o. nur achselbärtig bleibend (an üppigen jungen Pfl. ist Beh. dichter). Textur derbhäutiger als bei *populifolia* o. *pendula*, aber meist weniger als bei *alba*, sonst vgl. *var.*

var. a communis RGL., in DC., l. c. 166, erweitert. · 2, nicht ganz die Dimensionen von *b.* erreichend, Borke fast stets weiß, ☉ Zw. braunrot o. dunkelpurpurbraun *, meist ganz kahl. B. (Fig. 60 d rechts) mehr in die Länge gezogen, stärker kahlend, (4—6) 12:(2.8—3.5—9 cm, Stiel 1.5—2.8 cm. Frst. auf 1—1.5 cm langem Stiele 4—5:0.8—1.2 cm, hängend. · beh. o. kahl (Fig. 57 f—f¹: hierher *f. typica* B.-Grund · gerundet; *f. cordata* RGL., l. c. [· B.-Grund stets herzfg. (Fig. 60 e); *f. elongata*: B. vgl. Fig. 60 d links, oft sehr feingespitzt; — *f. grandis* (B. g. SCHRAD., Ind. hort. bot. Goett. 2. 1833; *B. macrophylla* HORT., B. groß, herztg., lappig gesägt (gleiche Form tritt an Lohden auf). — *b. lyalliana* KOEHNE, ex H. d. D. D. G. 55. 1903 (*B. occidentalis* LYALL, in Jour. Lin. Soc. VII, 134. 1864, ex parte; non HOOK.; *papyrifera* var. *ced.* DIPP., Laubh. II, 177. 1892; *B. lyalliana* KOEHNE, in Mitt. deutsch. dendr. Ges. VIII, 53. 1899; *B. occidentalis* SARG., in Bot. Gaz. XXXI, 237. 1901, non HOOK.), nach SARGENT mächtiger als *a* werdend, Rinde vorwiegend braungelb, · Zw. orange- o. hellrotbraun, hfg. beh. und z. T. bedrüst, B. mehr breit bis rundlich-eifg., unten

Var. *Se. ser.* 4, XIV, 107, 1902 betheiligen kann, so bin ich mir doch der großen Schwierigkeit bewußt, die darin liegt, die Fernverkreuzung der hier in Betracht kommenden Bäume sicher zu umgrenzen und bin zur Zeit von dem Anrecht der *B. alaskana* SARG., in Bot. Gaz. XXXI, 236, 1901 und *kenasana* W. H. EVANS, l. c. XXVII, 481. 1899 nicht überzeugt.

*) Die · Zw. dieser beiden Varietäten (o. Arten) scheinen sich (SARGENTS Angaben nach) analog *lenta* und *luta* zu verhalten.

**) Ich halte es nicht für ausgeschlossen, daß DIPPEL nur junge Pfl. von *papyrifera communis grandis* vor sich gehabt hat, denn seine Fig. 84 deutet darauf hin.

hfg. deutlicher beh. (Fig. 60 g i), Stiele meist beh.; Frst. (nach SARGENT) auf etwa 1 cm langen Stielen bis 4:1,5 cm, kaum hängend.

B. p. MARSH., Arb. Am. 19. 1785 (*papyracea* AIT., Hort. Kew. III, 337. 1789; *latifolia* TAUSCH, in Flora 1838, 751 [Original-Expl. verglichen!]). — Papier-B.: paper or canoe b.; b. à papier. — N.-Am., var. *a* von Pennsylv., Mich., Nebraska und Wash. nördlich bis Kanada und Neu-Fundl., im W. und N.-W. tritt, wie es scheint, var. *b*. für sie ein, die nach SARG. bes. in SW.-Brit.-Col. und NW.-Wash. vorkommt, noch weiter westl. und nordwestl. dürfte dann die typ. *occidentalis* allein auftreten, zu deren Formenkreis *alaskana* und *kenana* zu gehören scheinen*). — Hfg. waldbildend, sie liebt nach MAYR Flußufer, frische, selbst nasse Böden, wächst aber auch sehr rasch auf magerem Sandboden. — Im übrigen unserer *alba* analog, aber von höherem Zierwert!

— *B. p.* deutl. rundlich o. selbst rhombisch-eifg., Basis hfg. keilig. im Mittel nicht über 6 cm lang (Fig. 64 a—o), ♂ Zw. beh. o. kahl, nur ausnahmsweise spärlich bedrüst.

Fig. 63. a—d *Alnus alnobetula*: a ♂ Lgr., b Wimperung der Kn.-Sch., c Beh. des Zw., d dieser im Q.-Schnitt (1—6 vgl. Fig. 22 e); — e—i *Betula alba* (*B. pubescens* var. *a*): e Zw., f Wimperung der Kn.-Sch., g Zw.-Q.-Schnitt (1—6 vgl. Fig. 22 e); — k—p *B. pendula* (*B. verrucosa*): k ♂ Zw., l Kn., m—n B.-N., o Kn.-Sch.-Wimperung, p wie h (Original nach C. K. SCHNEIDER).

22. *B. alba* (*B. pubescens*): b ♂, Verästelung aufrecht o. ausgebreitet, Zw. nicht o. nur bei alten ♂ an der Spitze leicht überhängend, jung stets, zuw. indes nur sehr fein (Lupe!) beh., Lohden dicht und bleibend filzig, Drüsen meist nur an Spitze auftretend, Kn. vgl. Fig. 63 e i; B. sehr variabel, von der oft ähnlichen *papyrifera* durch geringere Größe, mehr rundliche o. rhombische Form abweichend, wogegen *occidentalis* sich bes. durch stärkere Bedrüsung auszeichnet, an Lohden B. meist herzfg.; Bl. zieml. analog *pendula*, Frst. und Fr. sehr wechselnd, aber Mittellappen der Fr. Sch. fast stets (wenn auch nicht ganz so stark, wie meist bei *papyrifera*) deutl. vorgezogen und die gewöhnlich spitzeckigen aufrechten Seitenlappen überragend, selten sind diese ähnlich wie bei *pendula* zurückgebogen, in solchem

*) Sicherlich bilden diese z. T. eben noch fraglichen Arten unter sich Bastarde, wodurch ihre Scheidung noch erschwert wird.

Falle kann nur B.-Form und Zw.-Beh. entscheiden, ob ein Bastard (*B. aurata*) o. eine *alba*-Form vorliegt: vgl. sonst die *var.*^{*)}.

var. a. vulgaris: b h , Wuchs aufrecht, St. schlank, nicht knorrig verbogen, $\cdot$ Zw. mit meist deutlich gestreckten Internodien, Kztr.-Bildung aus jüngstem Holze noch zurücktretend, B. etwa 3—8:2—6 cm; hierher: *subvar. typica*^{*)}; hoher h , St. mit kalkweißer, glatter, sich papierartig (aber weniger auffällig, als bei *papyrifera*) abrollender Rinde, die nur am Grunde alter St. in rissige Borke übergeht, $\cdot$ Zw. — kurz beh., B. oben meist kahlend, unten $\cdot$ beh., oder nur achselbärtig, bei *f. ovata* B.-Form vorwiegend am Grund gerundet (Fig. 64a—b²), bei *f. rhomboidalis* B.-Grund meist deutl. keilig (Fig. 64d—d²), *subvar. glabra* (*pubesc.*, *var. glabra* FIEK, in litt.), h , aber Zw. nur jung — beh. und meist deutlicher drüsig, $\cdot$ kahl, B. meist ganz kahlend o. nur $\cdot$ achselbärtig unten, Formen *f. ovata* und *f. rhomboidalis* analog denen der *subvar. typica* — *subvar. urticifolia* SPACH, in Ann. sc. nat. sér. II, XV, 187. 1841] (*B. urt.* RGL, in Mém. Soc. Nat. Mosc. XIII, 115. 1860; *rugulosa* FRIES, Herb. norm.). Diese in Vermland (Schweden) als h auftretende monströse Form galt lange als Art. BEISSNER ist wohl der Erste, der in Mitt. Deutsch. D. Ges. IX, 111. 1900 einen Rückschlag in typ. *alba* an einer *urticifolia* konstatierte. Ich sammelte in Hort. Hamm-Münden von einer als *B. alba*-Sämling bezeichneten, aus ZABELS Zeit stammenden Pfl. B., die ganz *urticifolia* sind, vgl. Fig. 64m—m'. Ferner erhielt ich aus Hort. Muskau eine *B. pubescens fol.* *var.*, die ebenfalls Mittelformen (m'—m') zeigt. Sonst sei die Nessel-B. noch skizziert wie folgt: h h , bis etwa 10 m, St. (n. WILLKOMM) mit weißer, rissiger Rinde, kurz: Krone aus fast rechtwinklig abstehenden, gewundenen, braunrindigen Ästen gebildet, die ein Gewirr abstehender, aufrechter und hängender, knotiger, dunkelgrau-brauner, jung dicht beh., mit $\sim$ Kztr. besetzter Zw. tragen; B. vgl. Fig. 64n², auf der viel helleren Unterseite wenigstens auf Nerven bleibend beh., Adernetz zieml. markiert, 2—6:1—3—4 cm, Stiel 1—2 cm, beh., Frst. bis 4:0.8 cm, sonst vgl. Fig. 57 p.

subvar. eupubescens (*B. pubescens* AUCT. PLUR.): h o. kleiner h , Rinde nie so reinweiß, meist — bräunlich o. rotbraun, $\cdot$ Zw. dicht beh., B. zumal an sterilen Expl. hfg. beiderse. filzig, sonst $\cdot$ kahlend, bei *f. ovalifolia* B.-Form wie Fig. 64e—e¹ o. *f. ovata* analog, bei *f. rhombifolia* B.-Form wie Fig. 64f [o. *f. rhomboidalis* analog], bei *f. parvifolia* (*subspec. pubesc.*, β *parvif.* RGL, in DC. l. c. 167, ex parte) B. bald gerundet, bald keilig; nicht über 3 cm lang (Fig. 64g), *subvar. nudata*: h o. h , Rinde — braunrot, Zw. nur jung beh., B. nie reichlich beh. (außer an Stocktrieben, meist nicht über 4—5 cm lang, hierher *f. ciliolata* (*B. ciliolata* AUCT. PLUR.), Zw. jung — deutlich bedrüst, nur verstr. zottig beh., $\cdot$ kahl, B. vorwiegend gerundet am Grunde (Fig. 64h—h²), jung sehr balsamisch, verstr. beh., auch später kaum ganz kahl; *f. ullepitschana* (*B. carpatica* AUCT. MULT.), Zw. und junge B. balsamisch, aber kaum bedrüst und höchstens ganz fein beh., $\cdot$ kahl, B. meist ganz kahlend, vorwiegend rhombisch (Fig. 64i—i¹).

var. b. tortuosa: b o. meist kleiner h h mit knorrigem St., $\cdot$ gewundenen, verbogenen Ästen und kurzgliedrigen $\cdot$ Zw., Kztr. am jüngeren Holze bereits $\sim$ und auffällig ausgebildet^{**)}, Beh. verschieden, B. $\cdot$ grobgezähnt, hierher: *subvar. eutortuosa* (*B. daurica* LEDEB, Fl. alt. III, 245. 1833, non PALL.; *B. tortuosa* LEDEB,

^{*)} Ich bin mir sehr wohl bewußt, daß die hier gegebene Gliederung des Formenkreises nur eine unvollkommene sein kann. *B. alba* ist eine ungemein variable, in rein lokale Formen sich gliedernde Art. Meines Erachtens können nur langjährige vergleichende Kulturversuche zeigen, welchen Merkmalen eine gewisse Konstanz zukommt. Ehe — vor der direkte Nachweis nicht erbracht ist, daß heute geographisch getrennte Typen, unter gleichen Verhältnisse gebracht, ineinander übergehen, erscheint es mir bedenklich, sie ohne weiteres unter einen Namen zu subsumieren. Überdies sind die Kennzeichen, die sie als „lebende Pflanzen“ bieten, noch viel zu wenig genau beobachtet, um auf Grund von Herbarbruchstücken ein nur einigermaßen sicheres Urteil fallen zu können. Es ist in gleicher Weise verfehlt, lokale Formen (wie *subvar. montana*) zu Arten zu erheben, als deren Eigenarten ganz zu ignorieren und ein Verfahren einzuschlagen, wie es FERNARD l. c. befürwortet.

^{**)} Dieser o. auch *eupubescens* scheint *pubescens* γ , *hornemannii* RGL., in DC. l. c. 167, sehr nahe zu stehen, wozu ich nur die Expl. vom Orient, Turk.-Armen. und Turkest. reiche, die ich nicht ohne weiteres mit europäischen Formen identifizieren kann!

^{***}) Ich betone nochmals, daß ich sehr wohl weiß, daß diese anscheinend so gut charakteristische Gebirgsform in die erste übergehen kann, aber sie repräsentiert doch einen Typ. der mit den h -artigen Gebirgsformen von *vulgaris* nicht gut zusammengeworfen werden darf.

Fl. ross. III, 652. 1846; *alba* subsp. *tortuosa* α *genuina* und β . *kuzmischeffii* RGL., in DC., I c. 169. 1868) — hierher gehören die Formen des Altai, ums Weiße Meer, ferner wohl auch in Turkest., Armen., Or. (Lazistan), alle zeigen: • Zw. beh., B. grob fast einfach o. doppelt gezähnt (vgl. Fig. 60q) o. auch Grund breit gestutzt bis herzförmig, 2–4,5 (6,5):1,8–3,5 (6) cm, Fr.-Flügel schmaler als Fr. (ob immer, ist fraglich, denn ein Expl. des Altai [leg. GEBLER] zeigte junge Fr. wie in Fig. 57s¹ rechts dargestellt!). — ihr steht habituell und in den B.-Merkmalen sehr nahe *subvar. murithii nigra* MUR., Guide bot. Val 1810, von L., *murithii* GAUD., Fl. helv. 178. 1830; *pubescens* MIN., GILLOT, in Bull. Herb. Boiss. III, App. I, 20. 1895, vgl. auch CHRIST, in Ber. d. Schweiz. Bot. Ges. V, 16. 1895), $\bar{h}$ – $\bar{h}$, bis 5:0,1 m, St. knorrig,

Fig. 64. *Betula*-B.: a—o *alba*: a—b² f. *ovalis* und f. *ovata*; c Stocktrieb-B.; d—d² f. *rhomboidea*; e—e¹ f. *ovalifolia*; f f. *cuneata*; g f. *parvifolia*; h—h³ f. *acutolata*; i—i¹ f. *ullepischana*; k—k¹ *subvar. murithii* (vgl. auch Fig. 60r); l *subvar. conferta*; B. von WILDES Orig. Expl.! (vgl. auch Fig. 60t—u); m—m³ *subvar. urticifolia*; — n—p *middendorffii* (vgl. auch Fig. 56m); — q—s *excelsa* (alles ca. $\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

meist kurz, mit glatter, grauer Rinde, Äste u. Zw. schief aufrecht, schwarzgrau, • Zw. fein beh., B. oben tief olivgrün, mit wenigen verstr. Haaren, unten viel heller, bis auf winzige Achselbarte meist kahlend, Form vgl. Fig. 60r, variabel, zuweilen breiter als lang, bis etwa 4 cm Dm., Frst. bis 3:1 cm, Stiel bis 1 cm, Fr. wie Fig. 57t—t¹, so nach Expl. von Mauvoisin (loc. class.) in Bagnes-Tal (Cant. Wallis, diesen ähneln auffallend Expl. leg. Dr. LAGGER (Fig. 64k) aus Freiburg (Schweiz), von ihm selbst als *murithii* ausgegeben und solche leg. E. THOMAS (Fig. 64k¹) im vallée (marais) du lac de Joux (Cant. Waadt), deren B. bis 5:4,5 cm groß und bis 2,3 cm lang gestielt sind. Die THOMASschen Expl. sind als *torfuea*

ausgegeben und mir noch fraglich. — *subvar. carpatica**) Zw. nur jung beh., kahl, B.-Form sehr wechselnd (Fig. 60t—u und Fig. 64l von WILLD.-Orig.), dgl. Zähnung, Grund hfg. gerundet, unterseits zuw. ganz kahlend, 2,5—5,4 2—4—4,5 cm, Stiel 1—2,2 cm; Frst. 2—3,5:0,8—1 cm, Fr. vgl. Fig. 57q—r (n. WILLD.-Orig.); ich sah Expl. aus den Karpath., dem Riesengeb., Sudeten, Erzgeb., Harz, tritt wohl auch in W.-Östr.-Gebirgen auf.

B. a. ROTH, Tent. Fl. Germ. I, 404. 1788 [L., Sp. pl. 982. 1753, ex parte] (*pubescens* EHRH., Beitr. Naturk. VI, 98. 1791 [V, 160. 1789/90, nomen solum]; *odorata* BECHST., Diana I, 74. 1797). — Weiß-, Buch- o. Moor-B.; common b.; b. pubescent. — I. G. verbr.; sonst noch ziemlich analog *pendula* verbreitet, nur weiter nördlich und minder weit südlich gehend. Grenzen der Verbreitung z. T. nur recht ungenau bekannt. Nach WINKLERS Zusammenstellung verläuft die N.-Grenze [n. KOEPPEN] vom Nordkap (71°) über Berlevaag in O. Finnmarken (70° 50') und die Fischerhalbinsel (fast 70°) längs der Murman'schen Küste zum Eingang ins Weiße Meer (etwa 67°); im O. dieses reicht sie an der Pjoscha bis 66°, dann steigt sie nördlich vom Flusse Indega zu den Seen Ssorwanskije (etwa 67° 35') und zur Ssewnaja (Görmjaga) einem Nebenflusse der Petschora (etwa 67° 40'); an der Kolwa (Nebenfluß der Ussa) erreicht die Birke an der Mündung des Ssandilwei (67°) ihre Grenze. Am Ob soll sie bis über 67°, in O.-Sib. noch unter 68° auftreten. In O.-As. endet sie in Kamtschatka. Vom N.-Kap westlich geht sie bis Island (65°) und SW.-Grönland (62°). Im S. scheinen in As. und Rußl. die großen Steppen eine Grenze zu ziehen. Im Kauk. und Armen. soll sie noch auftreten; in Eur. bilden die Karpaten und der S.-Rand der Alp. und die Dauphiné die Grenze ihres Vorkommens im S. — Sie bevorzugt mehr nasse, z. T. moorige Standorte und steigt im Gebirge bis fast 2000 m. Im übrigen vgl. *pendula*, die im Durchschnitt einige Tage früher blüht. Sie ist ein hfg. Zier-*h* o. *b* und ihre *~* Kulturformen und Bastarde sind oft nicht sicher zu deuten. Forstlich kommt sie zur Aufforstung bruchiger Bodenflächen in Betracht und ist wohl als ein wenig wertvoller als *pendula* zu bezeichnen.

Gattung 11. *Alnus**) GAERTN., De fruct. II, 54. 1791 (*Betula* L., Sp. pl. 983. 1753, ex parte).**

[Erle; alder; aune.]

Vgl. oben S. 97; meist *h*, End-Kn. vorh., B. *☉*, 3-, selten 2-zeilig, 2 Blst. 2-blütig, Trgb. mit je 4 Vorb. und mit diesen zur vorn 5-lappigen Fr.-Sch. verwachsend, diese nicht abfällig; Fr. schmal-dicklich, o. kaum geflügelt. Holz: trocken bräunlich, Mk.-Strahlen kaum sichtbar, weich, zieml. leicht, sehr spaltbar, wenig elastisch, nur unter Wasser von Dauer. — Etwa 30 Arten, vornehmlich der nördl. gem. Zone†).

*) In N.-Eur. tritt wiederum eine analoge Form auf, die vielleicht als *subvar. alpigena* (*odorata var. alpigena* BLYTH, Nong. Fl. 402. 1874) bezeichnet werden kann, ich kann sie hier ebensowenig besprechen, wie die mir noch ungenau bekannte *subvar. songarica* (*alba subsp. song.* RGL., in Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. XLI, 2, 422. 1898 aus Turkest., wozu nach LITWINOW (Herb. Flor. Ross. Fasc. XIII, Nr. 639) auch *B. tanschanica* RUPR. (in OSTEN-SACKEN et RUPR. Sert. tansch. 72. 1860) gehört.

*) Infolge des guten Entgegenkommens der Direktion des Kgl. Bot. Museums zu Berlin konnte ich das von KRAIBEL an WILDENOW gesandte Orig.-Expl. vergleichen. Ferner wurde mir bei der Bearbeitung einiger *Betula* für die Flor. Exsc. Austr.-Hung. ein Brief des Herrn Dr. A. V. DEGEN in Budapest bekannt, worin er das Original des KRAIBEL'schen Herbars beschreibt und ausdrücklich erwähnt, daß daran B. mit abgerundeter Basis auftreten, die obendrein unterseits nicht ganz kahlen. Unter *carpatice* ist also eine *cat. tiansch.* o. *mongol.* analoge Form zu verstehen, die von der als *f. ulupitschana* von mir bezeichneten *alba vulgaris*-Form abweicht.

***) Herr A. CALLIER, Rottweil (Sachsen), welcher sich seit 15 Jahren mit einer Monographie dieser Gattung beschäftigt, war so lebenswürdig, die Bearbeitung der Fien für mein Handbuch zu übernehmen. Ich bin ihm dafür außerordentlich zu Danke verpflichtet und habe nicht gezögert, um die Kenntnis der Gattung zu fördern, auch eine Anzahl Arten und Formen aufzunehmen, die vorläufig noch nicht in Kultur sind. Herr CALLIER und ich werden den Lesern für weitere Hinweise und Überlassung von Material jederzeit dankbar sein.

†) Nicht beschrieben sind hier die zu dem Subgenus *Uthopsis* [SPACH, l. c.] gehörenden *A. nitida* ENDL., Gen. Suppl. IV, 2. 1847, aus dem Himal. und Kashmir.

B. siehe S. 124. A. Kn. sitzend, äußere Sch. 3—6, selten nur 2, dann aber ungleich lang; B.-Unters. nicht papillös; 1 Blst. erst im Frühjahr erscheinend.

Subgenus a. Alnobetula W. D. KOCH, Syn. Fl. Germ. 633. 1837 (*Alnaster* SPACH, in Ann. Sc. Nat. sér. 2, XV, 200. 1841). b o. kleine Nüßchen deutl. geflügelt.

siehe S. 123. C B. breit-eifg. o. eirundlich, meist stumpf-spitzig o. abgerundet. Seitennerven 5—10 (—12).

✱✱ siehe S. 121. ✱ P. so lang o. länger als Stbf.

P. meist nur so lang als Stbf., diese meist ein wenig länger als A.

Theeen (A.-Hälften) ziemlich weit verwachsen o. oben frei, seltener deutlich spreizend, Mittel-Sch. der ♂ Bl. mit ± deutlichem Rückenknopf.

Fig. 65. *Alnus alnobetula*: a B.; b ♂, c ♀ Blst.; d Frst.; e ♂ Bl.; f Trgb. und Vorb. von ♂ Bl. ohne Stb. von außen, g dgl. von innen; h Stb. (A. hier zent. tief geteilt); i P. Schuppchen der ♂ Bl. mit drüsigen Randzähnehen; k Trugdolchchen, l dgl. nach Entfernung der Bl., um die 4 inneren kleinen, am Rande drüsigen Schuppchen zu zeigen; m Fr.-Sch.; n reifer S. (nach HEMPEL et WILHELM).

1. *A. alnobetula*: b, 0,5—2,5 m (selten ♂ bis 4 m), St. zuw. niedergestreckt, Rinde glatt, dunkelgrau; o. Zw. beh., etwas zusammengedrückt, olivgrün o. rotbräunlich, Lent. deutl., grau o. rot-

und *Leptocarpus* D. DON, Prodr. fl. nepal. 58. 1825, aus W.-Himal., Nepal, Sikkim, O. Bergabn.; ob. auch Zentr.-China. Beide Arten ausgezeichnet durch die am B.-Rande anastomosierenden Seitenerven, sowie die beidse. ganzrandigen o. nur sehr schwach gezahnten B. Vielleicht einer eigenen Gruppe gehört an die noch unvollständig bekannte *A. acuminata* BERK., in Jour. Lin. Soc. XXVI, 499. 1899, aus China (Sze-ch'uan, Setcisuen).

Wenn in dieser Übersicht B. als papillos bezeichnet werden, so geschieht dies nur dann, sofern die Papillen der Unts. sehr zahlreich und deutl., meist schon mit Lupe kenntlich sind und meist eine weißgrüne Färbung des B. bedingen. Im Übrigen gilt, daß bei fast allen Arten auf Präparaten unter dem Mikroskop entwickelte Papillen sich nachweisen lassen, wenn auch hfg. nur vereinzelt.

braun: Kn. vgl. Fig. 63a—d, leicht klebrig; B. vgl. *var.*; Bl. wie Fig. 65e—l, Blst. zu 4—7, klebrig; Fr. vgl. Fig. 65m—n.

var. a. typica BECK, Fl. Nied.-Östr. 262. 1890 (*var. genuina* RGL., in DC. Prodr. XVI, 2, 182. 1868, ex parte). $\text{b} \rightarrow \text{h}$, B. jung klebrig, oben sattgrün, unten heller, ganz kahl o. nur achselbärtig, selten Nerven zerstr. beh., 3—4:2.5—3.5 cm, vgl. Fig. 66a—b, Seitennerven 5—7; Frst. 1—1.3:0.6—0.7 cm, S. 2:1 mm; hierher *f. mollis* [BECK, l. c.] CALL., junge B. beiders. dicht beh., ältere nebst Stiel u. Zw. reichl. weich beh., 3—5:2.5—3 cm, Seitennerven 5—7. *f. grandifolia* [BECK, l. c.] CALL., B. 6—11:5—9 cm, unten kahl o. an Nerven schwach beh., Seitennerven (6—)8—10. — *f. repens* CALL. (*A. repens* WORMSKJ., in HORNM. Fors. oec. plant. ed. 3, I, 959. 1821, niederlieg. kleiner b , f Blst. kürzer als beim Typ, B. unters. mehr matt und trübgrün, zuw. schwach herztg. (Fig. 66c), 3—4:2—3 cm, Seitennerven 5—7. — *f. laciniata* [HAUSSKN. in Sched.] CALL., B. lappig eingeschnitten, wie Fig. 66f; spontan D. Freiburg im Breisgau, Zastler-Tal. $\text{b} \rightarrow \text{corylifolia}$ CALL. (*A. cor.* KERNER, in sched. 1875). B. (Fig. 66d) — rundlich, hfg. herztg., 4—7:3—6 cm, Seitennerven 7—8, Unters., Stiele und Frst.-Stiele dicht steinhaarig, Zähmung bes. fein; Tirol. *c. microphylla* CALL. (*A. micr.* ARV. TOUV., Addit. à l. Monogr. Pilosell. 20. 1879). B. (Fig. 66e) elliptisch, 2—3:1.5—2 cm, unten kahl, Seitennerven 5—8, Frst. 0.8—1:0.5—0.8 cm, S. 1—1.5:1 mm; Übergang zur *var. brembana*; Schweiz, ital. Alp., Salzb., Frkr. (Dep. Isère, loc. class.). — **d. brembana** CALL. (*A. brem.* ROTA, Prodr. Fl. Bergam. 79. 1855). Zwerg- h , B. (vgl. Fig. 66e') 0.8—1.5:0.6—0.8 cm, Seitennerven 6, Frst. 0.3—0.8:0.15—0.4 cm; Schweiz, ital. Alp., Tirol.

A. a. HART., Naturg. forstl. Kulturpflz. 372. 1851 (*Betula alnob.* EHRL., Beitr. Naturk. II, 72. 1788; *B. viridis* CHAIX, in VILL. Hist. pl. Dauph. III, 789. 1789; *Al. virid.* LAM., in DC. Flor. fr. III, 304. 1865; *Alnaster virid.* SPACH, l. c. 1841). Birken-Eller, Grün- o. Strauch-E; green or mountain alder; vert aumâtre — I G. D. nur Bad., Bayr., Elbsandsteingebirge, Lausitz, OU. fehlt nur Schles., Sch. fehlt nur Jura; sonst Bosnien, Serbien, Balkan; *f. mollis* mit Typ, z. B. bayr. Alp., Tirol, Steierm., N.-Östr., Schweiz; *f. grandifolia* z. B. Bad., Salzb., N.-Östr., Siebb., Schweiz; *f. repens* in Grönl., Labrador, Sib. (71° 10' am Boganida-Fluß, am Utschar-Fluß). Standort: in gemäß. Zone nur subalpin bis alpin, bis 2000 m, an Hängen, in Schluchten, in gleichmäßig feuchtem Boden. Blz. (IV—) V—VI (— Anf VIII), nach B.-Ausbruch. — Forstlich zuw. an Hängen als Schutzholz von Bedeutung, sonst nur Zier- h , in der Kultur der Ebene oft mehr h artig.

Thecen oben und unten stets frei, Mittel-Sch. der ♂ Bl. ohne Rückenknopf.

2. *A. suaveolens*: weicht von *alnabetula typica* noch ab durch: B. fast kreisrund (Fig. 66g, Grund gerundet o. schwach herztg., unters. völlig kahl, stark klebrig, Seitennerven 6—8.

A. s. REQUIEN, in Ann. sc. nat. V, 381. 1825. Korsika endemisch. — Nicht in Kultur.

++ P. länger als Stbf., diese meist so lang als A., Thecen in der ganzen Länge verwachsen, Mittel-Sch. der ♂ Bl. mit ± deutlichem Rückenknopf.

3. *A. fruticosa*: vgl. *var.*

var. a. typica CALL., b , Zw. jung rotbraun, — grau, Lent spärlich, B. vgl. Fig. 66h, breit-eifg., 4—6 (— 7):3—3.5—5 cm, stets nach Spitze verschmälert, unten kahl, Seitennerven 8—9 (— 10); Stiel 0.5—1 cm; Frst. 1:0.5 cm. $\text{b} \rightarrow \text{mandschurica}$ CALL., wohl meist h , B. vorherrschend breitelliptisch mit kurzer stumpfer Spitze; Stiel 0.5—1—2—2.5 cm; Frst. 1.5—1 cm.

A. f. RUPR., Beitr. Pfl. russ. Reich II, 53. 1845 (*Alnaster fr.* LEDEB., Fl. ross. III, 2, 655. 1850; *viridis*, *f. ibnica* RGL., in DC. l. c. 182, ex parte). Asiatisch: Strauch-Eller. *var. a.* Sib., Amur, Mandschurei, arkt. N.-Am.; *var. b.* Ural, Sib., Mandsch., Korea. — Nicht in Kultur.

++ P. kürzer als Stbf., diese deutl. länger als A.

++ Thecen in ihrer ganzen Länge verwachsen, Mittel-Sch. der ♂ Bl. mit ± deutlichem Rückenknopf.

4. *A. crispa*: weicht von *alnobetula typica* noch ab durch: B. (Fig. 66i) breit- o. rundl.-eifg., 6–9:3,5–6 cm, unters. bes. auf den Nerven dicht kurz-steifhaarig Rand ohne Lappung, Seitennerven 8–10, Stiel 0,5–1,5 cm. kurz beh.; Stb. 6–8!

A. c. PURSH, Fl. Am. sept. II, 622. 1816 (*Betula cr.* AIT., Hort. Kew. III, 339. 1789). — Krause F. — N.-Am., häufigere Art dieser Gruppe als *sitchensis*.

Fig. 66. *Alnus*-B.: a–f *alnobetula*: a–b var. *typica*, c f. *repens*, d var. *corylifolia*, e var. *microphylla*, e¹ var. *brembana*, f f. *laciniata*; — g *suaveolens* — h *fruticosa* — i *crispa* — k *maximowiczii* — l *sitchensis* — m *firma* (kleines B.) — n–n¹ *yasha* — o *multinervis* (kleines B.) — p–p² *cordata* — q *elliptica* — q¹ *dieckii* — r–r¹ *orientalis* (alles $\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

++ Thecen oben und unten frei, $\pm$ spreizend.

$\triangle$ Mittel-Sch. der σ Bl. ohne Rückenknopf.

1. *A. maximowiczii*: $\bar{h}$ 10 m hoher $\bar{h}$, Rinde der Zw. grau mit fast rundlichen Lent., junge Zw. hellbraun mit ∞ sehr schmalen Lent., Kn. 1–1,3:0,6–0,7 cm; B. (Fig. 66k) aus breitem, htg. herzf. Grunde breit- o. rundlich-eifg., 7–10:7–8 cm, Rand ohne Lappung, Zähne sehr fein und zieml. lang, unten kahl, Seitennerven 7–10; Stb. 6–8, Stiel 2–3,5 cm; Frst. 1,5–2:1–1,2 cm, auf 0,8–2–3 cm langen Stielen, Fr. vgl. Fig. 67i–i¹.

A. m. CALLIER (*A. viridis* γ . *sibirica* RGL., l. c., ex parte [pl. japon.] et MATSUM. et AL. AUCT. JAP.). Jap (Hakodate, Shinano, Nipon, Hakusan), Sachalin — Nicht in Kultur.

– Mittel-Sch. der σ Bl. mit deutlichem Rückenknopf.

6. *A.itchensis*: $\bar{h}$ $\bar{h}$, ältere Zw. mit sehr spärlichen großen rundlichen Lent., junge mit ∞ schmalen Lent., Kn. spitz, 0,8–0,3 cm; B. (Fig. 66h) aus htg.

schwach herzfg. Grunde breit-eifg., deutl. spitz, 6—9:5—9 cm, kahl, deutl. unters. achselbärtig, selten auf den Nerven verstreute Haare, Lappung deutl., Zähne sehr fein, lang vorgezogen, Seitennerven 8—9(—10); Stiel 1—1,5 cm; Stb. 4; Frst. 1—1,3:0,5—0,8 cm auf 0,5—1 cm langen Stielen, Fr. vgl. Fig. 67 k—k¹.

var. a. typica CALL., wie oben, B-Rand deutlich gelappt. *b. kamtschatka* CALL., B. kleiner, 5—6:3—4 cm, mit kurzer, stumpfer Spitze, Rand nicht gelappt, Seitennerven 8—9.

A. s. SARGENT, *Silva* XIV, 61. 1902 (*A. viridis* β . *sibirica* *b. sitchensis* RGL., Mon. Bet. 138. 1861; *A. viridis* δ . *innata* RGL., in Bull. soc. nat. Mosc. XXXVIII, II, 422. 1865 [et in DC., l. c. 183]; *A. innata* RYDB., in Bull. Torr. Cl. 1897, 190; *A. viridis* *var. stenophylla* H. WINKL., Monogr. 1904). — Sitcha-E. — *var. a.* nach SARG. von den Rocky Mts., Washington, Oregon bis Brit.-Col., Yukontal; ferner Sitcha, Alaska, Kamtschatka, Nutka Sund. *b.* nur Kamtschatka. Nicht in Kultur.

○○ B. eilänglich bis eilanzettlich, allmählich lang zugespitzt, Seitennerven über 12.

* Seitennerven 12—15(—17).

+ Zw. stets kahl, B. höchstens 2:1 (Fig. 66 m), Sch. der ♂ Bl. kahl*).

7. *A. firma*: b— $\frac{1}{2}$, bis 3 m. Zw. jung klebrig, $\odot$ grau-braun, Lent. als deutl. Höckerchen, Kn. olivgrün und braun o. durchweg braunrot, Sch. (2—3—4, gewimpert, B. 8—12,5:4,5—8 cm, oben meist nur auf Nerven, unten deutlicher beh.; Stiel 1,5—2 cm; Neb. etwa 2,1:0,6 cm; Frst. einzeln 1,6—2,5:1,5 cm, Stiel 1,2—2,7 cm, Sch. bis 8:6 mm, sonst vgl. Fig. 67 a—a².

A. f. SIEB. et Z., in Abh. Ak. Münch. IV, 3, 230. 1846, ex parte (? *Betula alnus* THBG., Fl. jap. 76. 1784; *A. sieboldiana* MATSUM., in Jour. of coll. Sci. Tokyo XVI, pt. 2. 1902). Steifblättrige E. — Japan (Hondo, in mehr südl. Lagen). Noch nicht in Kultur, wohl empfindlicher als *yasha*.

++ Zw. jung o. auch $\odot$ beh., B. 2½—3½:1 (Fig. 66 n—n²), Sch. der ♂ Bl. gewimpert.

8. *A. yasha*: weicht von *firma* noch ab durch: B. 5—12,5:2—4—4,5 cm; Stiel 0,7—1,5 cm, beh.; Frst. zu 1—2, Fr.-Sch. 5—7:4—7 mm, vgl. Fig. 67 b—c¹.

A. y. MATSUM., l. c. (? *A. harmsii* SIEB., Pl. occ. 25. 1825). — Jap. (Hondo, Shikoku, Kiushiu) in Bergwäldern, mehr N-Lagen. Schöne Zierpfl., noch sehr selten unter dem Namen der folgenden in Kultur. Scheint zieml. hart zu sein.

* Seitennerven im Mittel nicht unter 18(13—27), vgl. Fig. 66 o.

9. *A. multinervis*: von *yasha* abweichend noch durch: $\odot$ Zw. braunrot, kahl, meist mit ∞ hellen Lent., Kn. zweifarben, B. 5—12:2,5—4 cm, Stiele 0,2—0,8 cm; Frst. 0,6—1,4:0,8—0,9 cm, zu 2—5 in einer 5—6,5 cm langen überhängenden Traube, Stiele beh., Fr.-Sch. beh.!, sonst vgl. Fig. 67 d—d².

var. a. typica CALL., wie oben, B. gleichmäßig sich zugspitzend. *b. naka* CALL., B. breit-elliptisch, bis kurz unter die Spitze breit, dann plötzlich in eine kurze schmale Spitze verschmälert, Grund deutl. herzfg.; Neb. sehr schmal lanzettlich, spitz, Beh. wie beim Typ.

A. m. CALLIER (*firma* *var. multinervis* RGL., in DC. Prodr. XVI, 2, 183. 1868; *A. pendula* MATS., l. c.). Vielnervige E. — Jap., *var. a.* Yezo, Hondo, subalpin, bes. an Ufern; *var. b.* Nikko See (leg. J. REIN 1874). Bisher nur in Engl. in Kultur, aber gewiß äußerst einführenswert!

*) Diese Art dürfte in den ♂ Bl. noch weitere Unterschiede gegen *yasha* besitzen, doch ließ sich Sicheres an dem vorh. Material bisher nicht feststellen.

B. Kn. gestielt^{*)}, Sch. 2. gleichlang: B.-Unterseiten z. T. papillös, ♀ Blst. gleich den ♂ überwinternd.

Subgenus b. Gymnothyrsus SPACH, l. c. 1841 als Genus. — Meist b. Frst. einzeln o. traubig. Nüßchen sehr schmal o. kaum geflügelt.

○○ siehe S. 132.

* * siehe S. 128.

○ B.-Unterseiten nicht papillös**).

B.-Rand fast stets ganz ungelappt. Zähmung recht regelmäßig. Zähne ziemlich gleich groß.

† B. mit obs. Sp.!, Form vgl. Fig. 66 r — r¹. im Übrigen bis auf Achselbärte unten gleich den Zw. kahl, oben wenig dunkler als unten.

Fig. 67. *Betula*: Frst., Fr.-Sch. und S., die von außen (Rücken) gesehenen Fr.-Sch. sind mit ! bezeichnet, die übrigen sind von innen (Samenseite) dargestellt: a—a' *forma* — b—b' *yasha* — d—d' *multimeris* — c—c' *cordata* — f—f' *orientalis* — g—g' *subcordata* — h—h' *japonica* — i—i' *maximowiczii* — k—k' *sitchensis* — l—l' *maritima*: l¹! (b, d nach MATSUMURA, sonst Orig.).

10. *A. orientalis*: Wie *cordata*, bis etwa 15 m hoch, Kn. wie es scheint 8 mm lang, in den Stiel verschmälert, stumpfspitzig, wohl klebrig aber Sch.-Ränder deutl. gewimpert: B. 3.5—12:2.5—8, im Mittel 9.5 cm! An Lohden 2.5:2 cm, ± überkrustet, sonst vgl. Fig. 67 f—f¹.

A. o. DECNE., in Ann. sc. nat. sér. 2, IV, 348. 1835. — Orientalische E. — Syrien. Von *subcordata* durch die Kahlheit und die obs. Sp. sofort zu unterscheiden. Nirgends echt in Kultur!!

B. ohne obs. Sp., Formen vgl. Fig. 66 p—p² und 69 a, d—g, unterseits meist deutl. heller.

△ B.-Grund breit-rundlich o. herzfg.

Zw. stets kahl. B. mehr gerundet (Fig. 66 p—p²), Frst. einzeln, auf kräftigem, wenig kürzerem Stiele, S. aschgrau.

*) Wenn nicht anders angegeben, ist bei Angabe der Kn.-Länge der Stiel nicht mitgerechnet.

**) Vgl. Ann. S. 120; die Papillen erscheinen unter der Lupe als feine graue Kugeln. Der Hinweis bezieht sich auch nur auf „Arten“, denn bei hier geführten Bastarden sind Papillen z. T. deutl. Bei *rugosa* kann man schwanken, ob sie hierher o. schon zu den deutl. papillösen zu zählen.

11. *A. cordata*: $\varnothing$, bis etwa 10 m. an eine Linde gemahnend. Zw. jung klebrig, braunrot, kantig, mit feinen hellen Lent., Kn. zweifarben, überkrustet, etwa 5 mm lang, Stiel deutl. abgesetzt, gleichlang: B. jung klebrig, oben kahl, nur gleich Stiel wachsdrüsig, tiefgrün, unten heller, wenigstens auf den gelblichen Nerven $\pm$ gelbbraunlich borstig beh., o. zuletzt nur achselbärtig, an alten $\varnothing$ im Mittel 5:4 cm, an Lgtr. bis 12:9 cm, Textur festhäutig, Stiel 2–3 cm, Neb. etwa 10:3 mm, stumpf: Frst. zu 1–2–3, 1.2–2.7:1–1.8 cm, Stiel fast gleichlang, sonst wie Fig. 67e—e².

Man kann unterscheiden: *f. genuina* [RGL., Mon. 116. 1860]. B. $\pm$ deutl. gespitzt (Fig. 66p¹). *f. rotundifolia* [RGL., l. c.] (*A. rotundifolia* BERT., Fl. it. X, 160. 1854). B. an Spitze abgerundet (p).

A. c. DESF., Tabl. Hort. Par. ed. II, 244. 1815 (*Betula cordata* LOIS., Notice 139. 1810 [ex LOIS., Fl. gall. II, 317. 1828]; *A. cordifolia* TENORE, Fl. Neap. I, Prodr. pg. LIV. 1811). Herzblättrige F.; heart leaved a.; a. à feuilles cordiformes — Korsika, S.-Italien. — Etwa bis Prov. III harte, nur jung des Schutzes bedürfende, schöne Art.

11 $\times$ 17 *A. cordata* $\times$ *glutinosa*: *A. elliptica* REQUIEN, in Ann. sc. nat. V, 381. 1825. — B. vgl. Fig. 66q, breit- o. rundl.-ellipt., 4–6:3–3.5 cm, vorn stets abgerundet o. schwach ausgebuchtet (analog *glutinosa*), Grund abgerundet o. ungleich o. schwach herzförmig, Rand fast regelm. gezähnt, selten mit ganz schwacher Lappenbildung, nur unters. achselbärtig; Stiel 1.5–2 cm, kahl, Frst. zu 3–5, etwa 2:1 cm, lang dünn gestielt. — Korsika. Von *subcordata* durch die abgerundete B.-Spitze und die B.-Form leicht zu unterscheiden. — Die REQUIENsche Pfl. scheint der Kombination *cordata* $\times$ *rotundifolia* $\times$ *glutinosa* zu entsprechen. Eine im Arboret des Herrn Dr. DIECK in Zoschen vorh. Pfl. ist vielleicht als *cordata* *f. genuina* $\times$ *glutinosa* zu deuten. Vielleicht stellt sie aber auch eine *subcordata* $\times$ *glutinosa* dar. Sie sei hier als *A. duckii* CALL. bezeichnet (vgl. B. in Fig. 66q¹) und bedarf noch weiterer Beobachtung.

Zw. (der kult. Expl.) meist beh., B. mehr gestreckt (Fig. 69a), Frst. gewöhnlich zu 2–3, auf kurzen dünnen Stielen, S. hellbraun.

12. *A. subcordata*: $\varnothing$, bis 15 m. Zw. oliv- o. rotbraun, ähnlich *cordata*, aber auch Kn. fein beh.; B. jung beiders., später oben höchstens auf Nerven, auf der helleren Unters., bes. an Nerven weichborstig beh., 5–16:3.5–11 cm, im Mittel größer als bei den Arten 4–5; Stiel 1–3 cm; Frst. zu 1–4, bis 2.5:1.7 cm, sonst wie Fig. 67g—g¹.

A. s. C. A. MEY., Verz. Pfl. Kauk. 43. 1831 (*cordifolia* var. *subc.* RGL., in DC. Prodr. XVI, 2, 183. 1868). Kaukasische F. — Kauk., N.-Pers. — Feuchte Waldungen. — Blz. IV. — Wohl etwas weniger hart als *cordata*.

12 $\times$ 23 *A. subcordata* $\times$ *incana*: *A. koehnei* CALL. (? *cordata* γ . *villosa* RGL., in DC. Prodr. XVI, 2, 185. 1868, *rotundifolia* γ . *pubescens* DRP., Laubh. II, 151. 1892; *tomentosa* HORT. NONN.). Junge Zw. stets beh., vorherrschend dicht steifhaarig; B. (Fig. 69b) fast stets elliptisch, 6–9:3–5 cm, oben kahl o. zerstr. beh., unten bes. auf den Nerven dicht steifhaarig, seltener schwacher beh., B. Spitze kurz, nur jüngste B. mit vorgezogener längerer Spitze, Grund abgerundet, selten schwach herzförmig, Rand meist analog *subcordata* gleichmäßig gezähnt, selten schwach geappt; Seitenerven 7–8:9; Stiel 1.5–2 cm; Frst. zu 1–4, ca. 5 mm lang gestielt o. fast sitzend. Man kann unterscheiden: *f. rotundifolia* CALL., wie oben, zwischen den Eltern zieml. genau die Mitte haltend, Papillenbildung unters. schwach; *f. plurinervis* CALL., *incana* näher stehend, B. vgl. Fig. 69c, Seitenerven 10–12, Papillen deutlicher, Stiele 1.5–2–2.5 cm. Im Hort. Bot. Leipzig gefunden.

B.-Grund keilförmig, selten rundlich, vgl. Fig. 69d–g.

B. meist über 2 bis fast 3:1, auch unten bald ganz kahlend, o. nur $\pm$ achselbärtig.

siehe
S. 127.

- B. $\pm$ lang zugespitzt (Fig. 69f—g), Blz. II—IV, vor B.-Ausbruch.

13. *A. japonica*: $\text{b} - \text{b}$, bis 17:0,7 m, Zw. $\pm$ kantig, jung meist $\cdot$ beh., $\cdot$ gewöhnlich kahl, hell oliv- o. rötlichbraun, Lent. mäßig deutlich, Kn. kahl purpurbraun, $\cdot$ überkrustet, etwa 4—5:2,5—3 mm, ihr Stiel 2—3 mm; B. 5—10:2—3,5—5 cm, Zähnung scharf, hfg. $\cdot$ entfernt, jung meist gleich Stiel $\cdot$ beh. und drüsig gepunktet, später kahl o. nur unten achselbärtig; Stiel 1,5—2—4 cm; Frst. zu 2—6, 1,5—2,5:1—1,5 cm, Fr.-Sch. 6—7:6—8 mm, vgl. Fig. 67h—h¹.

A. j. S. et Z., in Abh. Ak. München Kl. IV, 3, 230. 1846 (? *A. harinoki* Sieb., Pl. occ. 25. 1825; *maritima* var. *jap.* RGL., in DC. Prodr. XVI, 2, 186. 1868).

Japan-E. = Japan (Yezo, Hondo, Kiushiu). Ufer, feuchte Niederungen. — Schöner und, wie es scheint, harter Zier b , meist als *maritima* in Kultur, die wohl sehr ähnlich, aber schon durch die Blz. auffallend abweicht.

13 $\times$ 23 *A. japonica* $\times$ *incana*: *A. spectabilis* CALL., $\odot$ Zw. kahl, braun, Lent. spärlich, schmal, orangegelb, $\odot$ rotbraun, Lent. mehr rundlich, grau; Kn. stumpf, braun, meist ganz kahl, wenig glänzend, etwa 3:2 mm, mit Stiel bis 7 mm lang; B. in Form sehr wechselnd (Fig. 69h—h²), man beachte bes. die verschiedene Ausbildung der Spitze! 5—7 (=10):3,5—5 (=6,5) cm, Lappung fehl. o. schwach stumpf o. etwas eckig, spitz, ober. mattgrün, kahl, unter. heller grün, matt, meist kahl, seltener (bes. jung) auf den Nerven schwach kurzhaarig und achselbärtig; Papillen unterm Mikroskop zieml. deutlich, Seitennerven 8—9 (=10); Stiel 1,5—2 cm; Frst. zu 3—9, 1,5—2,5:1,3—1,5 cm, ihre Stiele 0,3—0,5 cm; Fr.-Sch. etc. vgl. Fig. 68b bis b¹. — Bisher nur im Hort. Bot. Dresden beobachtet, wohin sie aus dem Arboret des Herrn DIECK in Zöschchen gelangte. Dortselbst nicht mehr vorh. Äußerst interessant und kulturwert!

13 $\times$? *A. japonica* $\times$? (ob eigene Art?): *A. mayri* CALL. Habituell *spectabilis* ähnlich, $\odot$ Zw. fast ohne Lent., rotbraun, schwach beh., $\odot$ grau bereit, später glänzend rotbraun, Lent. ∞ , rundlich, Kn. dicht beh.; B. breit ellipt. bis verkehrt-eitg., größte Breite meist etwas über Mitte, 7—9:4,5—6 cm, ober. zerstr. aber deutl. beh. (junge B. stark und dicht beh.), matt, unter. grau o. graugrün, auf Nerven zieml. dicht beh. (junge B. fast filzig), in Achseln deutl. weichbärtig, Seitennerven 8—9, B.-Spitze kurz zugespitzt, Grund kurz keilfg. verschmälert, Rand mit breiten groben Zähnen, zuw. schwach eckig gelappt, Papillen ∞ , deutl.; Stiele 2,5—3 cm lang, stets $\perp$ beh. — Jap. (Kushiro, mittl. Eso), leg. Prof. H. MAYR.

- • B. gleichmäßiger stumpf gespitzt o. Spitze $\pm$ rundlich (Fig. 69d); Blz. IX, mit den B.!!

14. *A. maritime*: schwacher b , bis 10:0,15 m o. meist b , Borke glatt, graubraun; Zw. hfg. von Anfang an kahl, $\cdot$ rot- o. orangebraun, Lent. $\cdot$ deutl., Kn. dunkelbraunrot, $\cdot$ überkrustet, Sch. gewimpert, inkl. dem etwas kürzeren Stiel etwa 7 mm lang; B. 5—12:3—6 cm, Zähnung weniger scharf als bei *japonica*, jung gleich dieser $\cdot$ beh., meist bald ganz kahl; Stiel 0,5—2 (=2,5) cm; Frst. zu 2—5, etwa 2:1,5 cm, sonst vgl. Fig. 67l—l².

A. m. MÜLLER, ex NUTT., Sylva I, 34, t. 10. 1842 (*oblongata**) RGL., in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. XIII, 171. 1860). — Meerstrands-E.; seaside a: a. maritime. — N.-Am. (Delaware Küstengebiet) und nach SARGENT auch am Red River im Ind. Territ. — Sehr selten echt in Kultur, wohl kaum so hart wie vorige. Durch die Blz. sehr interessant**).

*) Dieser auch ins H. d. D. D. G. übernommene, 1892 von DIPPEL, 1893 von KOEHNE gebrauchte Name wird auf MILLER 1757 zurückgeführt. MILLER hat jedoch unter seiner *oblongata* eine europäische Erle, wohl eine Form von *glutinosa*, verstanden.
 **) SARGENT sagt: „Its brilliant foliage and its bright golden staminate aments, hanging in September from the ends of the slender leafy branches, make it at that season of the year an attractive ornament for parks and gardens“.

- B. höchstens 2:1. Spitze stets stumpf und achselbärtig (Fig. 69e).
- B. unters. auf Nerven $\pm$ bleibend beh.

Fig. 68. *Alnus*: vgl. das bei Fig. 67 Gesagte: *a—a'* *hirsuta* — *b—b'* *spectabilis*: *b'¹* — *c—c'* *rhombifolia* — *d—d²* *serrulata*: *d'¹* — *e—e²* *rugosa*: *e'¹*, *e'²* Teil-Erst. — *f—f²* *oregona rubra*: *f'¹* — *g—g²* *tenuifolia virescens*: *g'¹* — *h—h²* *incorporata*: *h'¹* — *h'²*, *h—h'* nach KÖRNER [Icon. inedit.]; sonst Original).

15. *A. rhombifolia*: $\bar{b}$. bis 25:0.9 m; Borke dunkelbraun, kleinschuppig. Zw. bei kult. Pfl. jung und meist auch $\bar{b}$ beh., kantig, purpurn. Lent. undeutl., Kn. zweifarben, spärlich beh. o. kahl. 4—6:2 mm, ihr Stiel 1—2 mm; B.-N. schief, auf deutl. Kissen; B. breit ellipt., 6—8:3—5 cm, an Lohd. bis 12:6 cm. Rand nur an Lohd.-B. mit schwacher Lappenbildung, unters. gelblichgrün. Seitennerven 10—12; Stiel 1—2 cm, kahl o. verstr. beh., namentlich am Grunde rotbraun; Stb. (1—)2(—3); Frst. etwa 1.5:0.8 cm, zu 3—7, ihre Stiele 0.5—0.8 cm, sonst vgl. Fig. 68c—c¹.

A. r. NUTT., Sylva I, 33. 1842. — N.-Am., nach SARG. von N.-Idaho bis zum O.-Hang der Cascade Mts. in Wash. und SO. Oreg., südl. durchs kalit. Küstengebiet und entlang dem W.-Hang der Sierra Nevada. An Flußufern, bis 1250 m. — Blz. II—III. — Selten in Kultur, vielleicht bis Prov. IV hart, jedenfalls jung zu schützen.

- • B. unten kahl, selten auf den Nerven schwach beh., nur mit $\pm$ deutlichen starren Achselbärten (Fig. 69i).

16. *A. serrulata*: $\bar{b}$ $\bar{b}$. Zw. meist von Anfang an kahl, $\bar{b}$ kantig, olivbraun, Lent. ∞ deutl., Kn. purpurbraun, kahl, $\bar{b}$ klebrig, etwa 5—6:3 mm, ihr Stiel 3:2 mm. B. verkehrt-eifg. 5—9:3—6 cm, Rand selten schwach gelappt, Grund vorherrschend keilig. Seitennerven 8(—9); Stiel 0.5—1(—2) cm; Neb. schmal ellipt., kahl; Frst. zu 3—4, sämtlich etwa 0.5 cm lang gestielt o. nur unterster gestielt, andere sitzend, 1.2—1.7:1—1.1 cm; sonst vgl. Fig. 69d—d².

A. s. WILLD., in L. Sp. pl. ed. IV, 336. 1805 (*Petula serrulata* MOENCH, Flor. bor. Am. 181. 1803; *serrulata* var. *genuina* Rehd., in DC. l. c. 188. — Hasel-E;

smooth a.; a. denticulé. — N.-Am. verbreitet (Pennsylv., Miss., New-Orl., Virg., New.-Jers., Alab., Carolina, Canada). — Blz. III—IV. — Hfg. mit *rugosa* zusammengeworfen, die sehr gut unterschieden, bes. in den Fr.-Sch.!! , sowie durch die $\pm$ deutl. papillösen B.

Fig. 69. *Alnus*-B.: a *subcordata* — b—c *koehnei*: b f. *typica*, c f. *plurinervis* — d *maritima* — e *rhombifolia* — f—g *japonica* — h—h² *spectabilis* — i *serrulata* — k *glutinosa* f. *typica* — l *glut.* var. *denticulata* — m—q *glutinosa*: m f. *quercifolia*; n f. *sorbifolia*; o—o¹ f. *laciniata*; p—p¹ f. *incisa*; q f. *imperialis* — r—r¹ *silesiaca* — s—s¹ *spuria* (alles knapp $\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

*→ siehe
S 131.

** B.-Rand stets deutl. gelappt.

— Zw. stets kahl o. jung schwach beh., B.-Grund keilfg. vgl. Fig. 69k—q.

17. *A. glutinosa*: h h. bis über 35 m hoch, St. schlank, bis zum Wipfel reichend, Verästelung breit, aber zieml. locker und schwach, Krone länglich-eitg., Borke schwarzbraun, vgl. Fig. 71, reichlich Stock-, aber selten Wurzel ausschlag bildend; Zw. kahl, jung höchstens ganz verstr. beh., klebrig, gegen Spitze scharf 3-kantig, rot- o. olivbraun, Lent. ∞ , gelbbraunlich, Zw. grauschwarz, Kn. vgl. Fig. 73a—d, rotbraun, weißl. überkrustet, hfg. 1 Sch. abfällig; B. jung klebrig, kaum beh., nur unten bleibend rostgelb starr achselbärtig, wenig

beller als oben, im Mittel 4—9:3—7 cm. Seitennerven 5—7; Stiel 1—2 cm; Bl. und Fr. vgl. Fig. 70.

var. a. vulgaris SPACH, in Ann. sc. nat. sér. 2, XV, 207. 1841. Wuchs nie pyramidal; B.-Spitze stumpf o. ausgerandet; hierher als spontane Formen: *f. typica* CALL., B. wie oben, bez. Fig. 69 k u. 70 a. — *f. parvifolia* O. KTZE., Taschenfl. Leipz. 239. 1867. B. nur 3—5:3—5 cm. Beh. wie Typ. — *f. imberbis* CALL. (*glut. var. imb.* BORNH. in Bot. Centralbl. XXXVI, 153. 1885). Seitennerven 8—9 Achselbärte unters. fehlend, Nerven und B.-Stiele sonst wie bei *f. puberula* beh. — O.-Bulgarien (Varna), Dardanellen (Rhodostolus). — *f. puberula* CALL., B. unten bleibend beh., nicht nur achselbärtig; beob. in Rußl., Schwed., Griechl., Ital. — *f. quercifolia* CALL. (*A. q.* WILLD., Berl. Baumz. 44. 1796). B. wie Fig. 69 m, Beh. wie Typ; beob. in Schweden, Or. — Ferner Kulturformen: *f. callegata* CALL., wie Typ, nur B. $\pm$ weißgefleckt. — *f. incisa* [WILLD., in L. Sp. pl. ed. IV, I,

Fig. 70. *Alnus glutinosa*: a B.; b ♀, c ♂ Blst.; d ♂ Trugdöldchen, seitlich; e Stb. über seinem P.; f—g analog Fig. 65; h ♂ Trugdöldchen auf Deck-Sch. von außen; i—k analog Fig. 65 k—l; l Frst; m Fr.-Sch; n S. in verschiedenen Ansichten; o Keimpflz. (nach HEMP. et WILH.).

335. 1805] *al. corymbosa* Lodd., Cat. 1830p. B. klein, vgl. Fig. 69p—p'. — *f. sorbifolia* [DIPP., Laubh. II, 161. 1892]. B. wie Fig. 69 n. in Finnland spontan. — *f. lanata* [WILLD., l. c.]. B. vgl. Fig. 69 o—o'. — *f. imberbis* [PERZ et KIRCH., Arb. Musc. 599. 1864], wohl nur Untertorn der vorigen mit B. wie q. — *f. rubra* [DIPP., l. c.]. B. wie Typ. aber dunkler grün, mit roten Stielen und Hauptnerven. Wuchs etwas aufrechter. — *b. pyramidalis* [DIPP., l. c. *var. pyramidalis* HORN]. Wuchs pyramidal, B. wie Typ. — *c. denticulata* [EDER., Fl. ross. III, 657 *var. dent.* C. A. MEY., Verz. Pfl. Kauk. 43. 1850]. B. wie Fig. 69 l, breit ellipt. o. selten etwas verkehrt-eitg., nie ausgebuchtet, sondern stumpf o. kurzspitzig, an älteren Pfl. ohne deutl. Lappung und mit gleichmäßigerer feiner Zähnung, Seitennerven 7—9(—10); beob. im Kauk., N.-Pers., Kurdistan. — Hierher *f. barbata* CALL. (*A. b.* C. A. MEY., l. c.). B.-Unters. und Stiele dicht beh.).

*) Was in den Kulturen als *barbata* geht, ist meist *denticulata*. Ein Bastard *glutinosa* × *nana*, wie viele Autoren annehmen, ist sie sicher nicht. CALLIER.

A. g. GAERTN., De fruct. et sem. II, 54. 1791 (*Betula alnus glutinosa* L., Sp. pl. 983. 1753). — Schwarz-E.; sticky a.; a. glutineux. — I. G. verbr., sonst noch ganz Eur. bis Sib., im Kauk. durch *var. denticulata* vertreten. — Vorzugsweise feuchte Niederungen, in den Alpen bis 1200 m. — Blz. (XII) II–III (IV), Laubausbruch 2–5 Wochen später, Frz. Ende IX–X, doch Frst. erst II–III abfallend; Laubfall X–XI. — Mannbar: freistehend mit 12.–20. Jahr, im Schlusse gegen 40. Jahr. — Alter: kaum 100 Jahre im Mittel. — Holz: spez. Gew. 0,53 lufttrocken, industriell wenig wertvoll. — Zier-h., bes. die Formen. Forstlich ebenfalls für nasse, sonst wenig nutzbare Standorte recht brauchbar, jetzt aber besser durch wertvollere ausländische Gehölze zu ersetzen. Meidet entgegen *incana* kalkreiche Boden. In Wiesenmooren und nassen Auen sog. Erlenbrüche. Fr. und Rinde sehr gerbstoffreich.

Fig. 71. *Alnus glutinosa*: Borke eines 0,60 m starken Stammes (Orig. nach C. K. SCHNEIDER).

17×18. *A. glutinosa* × *rugosa*: *A. silesiaca* FIEK, in Jahresb. schles. Ges. LXVI, 178. 1888 (*A. hybrida* NEUM., in Verh. zool. bot. Ges. Wien IV, 2, 267. 1854, non A. BR.; *A. fieckii* CALL. var. *siles.* CALL., in Jahresb. schles. Ges. LXIX, 2, 86. 1891). ☉ Zw. schwach beh. o. ganz kahl, Kn. dgl., B. vorherrschend rundlich-ellipt. o. undeutl. verkehrt-eifg., in o. ganz wenig über der Mitte am breitesten, vgl. Fig. 69r–r¹, Grund meist gerundet, selten schwach herzfg., 6–8: 4–7 cm, obers. kahl, unters. heller, aber trübgrün, meist nur auf den Nerven + dicht fein rostfarben beh. und bald weichhaarig, bald starr achselbärtig, Seitennerven 10–12! Stiel 1,5–2 cm, fast kahl; Frst. 4–8, Stielung

wie *rugosa* o. länger, mehr analog *glutinosa*; Fr.-Sch. meist mehr wie bei *rugosa*.

Beobachtet in Schles. und Brandenburg; wahrscheinlich im Gebiet der Eltern häufiger; in Kultur nicht selten als *rugosa*.

17×23. *A. glutinosa* × *incana*: *A. spuria* CALL., in Jahresb. schles. Ges. LXIX, 2, 81. 1891. — Junge Zw. + dicht kurzhaarig; B. in ihren extremen Formen wie Fig. 69s–s¹, oben selten schwach beh., unten trüb- o. graugrün bis grau, dicht auf Nerven beh.; Seitennerven 7–8 o. 8–10; Stiele + dicht kurzbeh.; Frst. 0,3–0,5 cm lang gestielt. Es seien unterschieden: *var. a. tauschiana* CALL., in D. Bot. Monatschr. VII, 53. 1889 o. *pubescens* TAUSCH, in Flora 1834, 520, non SARTORELLI 1870. — B. verkehrt-eifg. (s.), selten kurz gespitzt, 3–6: 2–4 cm, unten trübgrün, + dicht auf den Nerven beh. und achselbärtig, Papillen hfg. kaum deutl., Seitennerven 7–8, Stiele 1–1,5–2 cm; beobachtet, durchs. Gebiet verstr., Schwed., Finnk., Rußl.; hierher *f. bodensis* LANG, in HAGEB. Fl. basiliensis 192, 1843. — B. unters. hfg. auch auf Flächen gleich den Stielen dicht steithaarig bis filzig; beobachtet: durchs. Gebiet verstr., Schwed., Dänem. — *b. hybrida* A. BR., ex REHB. Ic. fl. Germ. XXII, 3, Fig. 1292. 1850. — *var. c. intermedia* CALL., in Jahresb. Schles. Ges. LXIX, 2, 83. 1891. — B. rundlich-eifg. o. rundl. verkehrt-eifg., mit stumpfer o. kurzer Spitze, 4–8: 1–1,5–1,8 cm, unters. hellgrün, + dicht auf Nerven beh., achselbärtig, Papillen hfg. kaum deutlich, Seitennerven 8–9–10; Stiele 1,5–3 cm; I. G. nur D., Bosn., sonst Norw., Schwed. — *c. ambigua* CALL. (f. *amb.* BECK, in Verh. zool. bot. Ges. Wien 1888, 767; *barbata* var. *subnana* SIMONK., in Math. Ternes. Füz. 1879, 149; *beckii* CALL. et var. *figerti* CALL., in D. Bot. Monatschr. VII, 53–54, 1889). — B. rundl. o. rundl.-eifg., stumpf o. + deutl. kurzspitzig (s¹), 3–6: 2–5 cm, unters. grau o. graugrün, + dicht beh., meist ohne ausgesprochene Achselbärte, Papillen + wie bei *incana*; Seitennerven 8–10; Stiele 1–2 cm; beobachtet:

I. G. verstr., ferner Montenegro, Schwed., Norw., Dänem., Rußl. — *A. spuria* ist wohl überall mit den Eltern zu finden!

+ Zw. jung dicht rostfarben filzig. B.-Grund breit abgerundet bis fast schwach herzfg. (Fig. 72 a).

18. *A. rugosa*: h $\frac{1}{2}$ bis 4 m. ☉ Zw. purpurn, kantig, schwach glänzend, rostfarben beh., Lent. $\sim$, deutl., Kn. meist $\pm$ dicht beh., zweigfarben. 6—9:4—5 mm, ihr Stiel 2:2—2.5 mm; B. breit ellipt. o.

Fig 72. *Alnus*-B.: a *rugosa* — b—c *aschersoniana* — d—e *oregona* (*rubra*) — f—i *tenuifolia*: f—g var. *virescens*; h—i var. *occidentalis* — k *hirsuta* — l *tinctoria* — m—u *incana*: m—n var. *vulgaris*; o dgl. B. von Stocktrieb; p f. *acuminata*; q var. *subrotunda*; r var. *borealis*; s var. *arcuata*; t var. *orbicularis*; u var. *parvifolia* (alles $\frac{2}{3}$ n. Gr.) (Original).

breit-eifg., mit kurzer stumpfer o. längerer Spitze, größte Breite meist unter der Mitte, 6—10:4—7 cm, ober. nur jung beh., unters. graugrün, zw. schwach blaugrün, $\pm$ dicht rostfarben beh., meist nicht deutl. achselbärtig o. nur schwache weiche Härte, Papillen wohl immer vorh., aber nicht immer gut nachweisbar, Rand selten kaum gelappt, Seitennerven 10—12; Stiele beh., 1—2 cm; Neb. breit-ellipt. breiter als bei

serrulata: Frst. zu 6–13, unterste am längsten gestielt, oberste sitzend, sonst vgl. Fig. 68 e—e².

A. r. SPRGL., Syst. veget. III, 848. 1826 (*Betula rugosa* EHRH., Beitr. Naturk. III, 21. 1788; *A. serrulata* MCHX. F., Hist. arb. for. Am. sept. III, 320, t. 4, f. 1. 1813; dgl. AUCT. AM. ex parte; *A. autumnalis* HART., Forstl. Kulturpfl. 337. 1851). — Runzel-E.; hazel-leaved a. — N.-Am. (Pennsylv., Georgia, Flor., New-Yersey etc., verbreitet). I. G. seit langem verwildert und beobachtet in Brandbg., Schles., Preuß., Hess., Thür., Sachs., Schleswig, sowie in Böhm., ferner Dänem., Schwed. — Blz. III–IV. Häutig mit *serrulata* zusammengeworfen, aber schon durch die angegebenen B.- und Zw.-Merkmale meist, durch die Fr.-Sch. stets sicher zu unterscheiden. Vielleicht sind manche Expl. mit zahlreichen Papillen eher als zu *aschersoniana* gehörig anzusehen.

18×20 *A. rugosa* × *tenuifolia*: *A. purpusi* CALL. — Junge Zw. dicht rostfarb. filzig, Kn. dicht beh.; B. meist in Größe und Gestalt wie bei *tenuifolia typica*, unters. auf den Nerven dicht rostfarben beh., Stiele 0,5–1 cm, dicht rostfarb. filzig; Frst. sehr kurz gestielt o. sitzend, Sch. *tenuifolia*-artig, aber auch an *rugosa* gemahnend. Gesammelt von C. A. PURPUS 1887 in Brit.-Columbien: an Bachufern bei Spences Bridge. — Noch nicht in Kultur.

18×23. *A. rugosa* × *incana*: *A. aschersoniana* CALL., in Jahresb. schles. Ges. LXIX, 2. 85. 1891 (*autumnalis* × *incana* ASCHERS., Fl. Prov. Brandbg. 623. 1860). Von dieser Hybride lassen sich zwei Typen unterscheiden: *var. a. vulgaris* CALL., l. c. — Junge Zw. schwach beh. o. fast kahl; B. (Fig. 72 b) breit-eifg. o. breit-elliptisch, Spitze kurz o. stumpflich, 5–9:4–5 cm, Grund ± keilig bis schwach herztg. Lappung etwas spitz, Unters. grau- o. bläul.-grün, Nerven ± dicht beh.; Stiel 1–2 cm; Frst. 6–8, kurzgestielt o. sitzend; hält etwa die Mitte zwischen den Eltern; beobachtet in Brandbg., Schles. und N.-Am. — *b. fallax* CALL., l. c. — Junge Zw. fast filzig rostfarben beh., B. (a) rundl. o. verkehrt eifg., Spitze stets stumpf o. abgetundet, 3–6:2,5–4 cm, Lappung schwach und stumpf, Unters. schwach bläul.-grün, Nerven und Fläche dicht, fast filzig, hellrostfarben o. gelbl. beh.; Stiel 0,5–1 cm, ± filzig beh.; Frst. zu 3–7; bisher nur in Schles. beobachtet, steht *incana* näher.

○○ B.-Unters. papillös*).

• Zw. stets kahl. B. im Umriß vorwiegend eilängl. o. längl.-elliptisch, stumpf o. mäßig spitz, Lappung meist nur schwach (Fig. 72 d—e).

19. *A. oregona* (*A. rubra*): ♀, etwa wie *incana*, bis 25:1 m. Borke dünn, hellgrau, Zw. stets kahl, nur jung klebrig o. nach SARGENT auch beh. am Ende; rot- o. purpurbraun, kantig, mit verstr. hellen Lent., Kn. zweifarben, kahl, drüsig beschuppt und klebrig o. zuw. beh., zieml. schlank, spitz, 7–10:3–4 mm, Stiel 5–7:2 mm; B. nur im Anfang spärlich beh., Unters. graugrün, Nerven gerötet, 9–16:5–9 cm, an Schossen auch rundlicher und kräftiger gelappt, Stiel 1,5–3 cm; Frst. zu 5–8, bis 2,8:1,8 cm, ihre Stielehen etwa 2–3 mm, vgl. Fig. 68 f—f².

A. o. NUTT., Sylva I, 28, t. 9. 1842 (*rubra* BONG., in Mém. Ak. St. Pétersb. II, 162. 1833, non *Petula stum. rubra* MARSH.). Oregon-E.; oregon a. N.-Am. von Sitka südl. durch Brit.-Col., W.-Wash., Oregon bis Kalif. Santa Juez Mount.)

*) Vgl. Anm. S. 120; bei der sehr seltenen *A. hirsuta* sind die Papillen der sehr dichten Beh. häufiger oft nur schwer nachweisbar, man vgl. eventuell auch *rugosa*!! Zu den Arten mit papillosen B. gehören ferner folgende nicht in Kultur befindliche mittel- und südamerikanische: *A. acuminata* K. in H. B., Nov. gen. II, 16. 1817, Mexiko; *oblongifolia* TORR., Bot. Mex. bound surv. 204. 1859, Mex.; *ferruginea* K. in H. B., l. c. 17, Mex., Panama, Ecuador, Columbien, Argent., Costa Rica; *mirbelii* SPACH, in Ann. sc. nat. 1841, 204, Mex., Guat., Peru, Bolivia, Chile; *spachii* CALL. (*acuminata* γ. *spachii* RGL., in DC. Prodr. XVI, 2, 184. 1868), Mex.; *jorullensis* K. in H. B., l. c. 16, Mex., und *castaneaefolia* MIRB., in Ann. Mus. Paris 1827, 463, t. II, Peru. Im Einzelnen kann auf diese Arten hier nicht eingegangen werden, doch möchte ich hervorheben, daß ich nach mit der Zusammenziehung dieser Arten, wie sie WINKLER vorgenommen hat, nicht einverstanden erklären kann. CALLIER.

Im Gebirge bis 1000 m. bes. an Flußufern. — Schöner Zier-*h.*, der als völlig hart gelten kann.

— B. Zw. kahl o. . . beh., B. mehr breit o. rundl.-eifg., deutl. gespitzt und Rand deutl. gelappt, bald gröber, bald feiner gesägt (Fig. 72f—i).

+ B. unterseits . . hellgrün, wenn mehr graugrün, so Stiele . . lebhaft rot, Form vgl. Fig. 72f—i.

20. *A. tenuifolia*: b - *h.* bis 10:0.25 m. Rinde hellbraun, zuletzt . . korkig, . . Zw. meist kahl, glänzend, purpurbraun, zieml. dünn, Lent. verstr., mäßig auffällig, Kn. kahl zweifarben, meist sofort in Krztr. entwickelt, 4 - 5:2 - 3 mm, spitz, ihr Stiel 1 - 2:1.5 mm. B. aus meist breit gestutztem o. rundlichem, seltener herzförmig. Grunde, spitz eiförmig, jung . . klebrig und beiders., unten dichter, verstr. beh., hfg. bald ganz kahl o. unten . . verstr. beh. bleibend, vgl. *var.*, Neb. etwa 1:0.3 cm. . . beh.; Frst. zu 3 - 9, bis 18:12 mm, Stielehen 3 - 8 mm, vgl. Fig. 68 g—g².

var. a. virescens CALL. (*incana var. virescens* WATS., in Geol. Surv. Calif. 81. 1886; *tenuifolia var. viridescens* KOEHNE, in Sched., et *var. purpurea* KOEHNE, in Cat. Hort. Späth. 1897/98) — B. klein (Fig. 72f—g), 3 - 6:2.5 - 4 cm, unters. hellgrün o. gelbl.-grün, Spitze kurz, stumpf, Rand mit vorherrschend stumpfen kurzen Lappen, Seitennerven 8 - 10; Stiele meist hellgelb; Neb. schmal-lanzettl., spitzlich; wohl die häufigere Form; beobachtet in Kalif., Utah, Nevada, Idaho, Sierr.-Nevada, Oreg., Rocky-Mts., Montana. — *b. occidentalis* CALL. (*A. occ. DIPP.*, Laubh. II. 158. 1892; *tenuifolia var. dippelii* KOEHNE, in Sched.) — B. größer (h—i), 8 - 10(-12):4 - 6(-8) cm, unters. hell- o. etwas blaugrün, Spitze deutl. spitz, Rand mit scharfen spitzen Lappen, Seitennerven 10 - 12; Stiele 2 - 2.5 cm, meist orange-gelb o. rötlich-braun; Neb. eiförmig, breit, stumpflich, scheint viel seltener zu sein; nur beob. in Brit. Kol. (Originale), Oregon, Rocky-Mts.

A. t. NUTT., Sylva I, 32, t. 10. 1842. — Dünneblatt-E. — Heimat vgl. *var.* Ufer, Täler, im Gebirge bis 2300 m — Blz. IV, mit Laubausbruch. — Schöne, wohl ganz harte Art.

— B. unterseits graugrün o. hellgrau o. dick bräunlich beh., Form vgl. Fig. 72 k—u.

B. unten dicht dick bräunlich beh., Papillen schwer zu sehen.

21. *A. hirsuta*: b - *h.* bis 8:0.3 m. St. glatt, braunrindig. . . Zw. bräunlich, dicht gelbgrau zottig beh., . . kahlend, Kn. purpurbraun, beh., bes. die Stiele!, diese etwas kürzer als Kn., z. T. Haare unter dem klebrig. Überzug verschwindend; B. oben hellgrün, + beh. o. kahlend, 3.5 - 8.5 cm lang und fast gleich breit, Frst. zu 3 - 4 - 7, 0.5 - 1.9:0.7 - 0.8 cm, Stielehen 1 - 3 mm, Stiel 1 - 2.5 cm, meist dick beh., vgl. Fig. 68 a—a¹.

var. a. vulgaris CALL. + B. vgl. Fig. 72k, Spitze vorherrschend stumpf, Grund breit gestutzt, Rand mit deutl. Lappung, Seitennerven 5 - 6 - 7, beobachtet: Flußgebiete d. Angara, Amur, Ob. Lena; Kamtschatka, Sachalin, Mandschurie, Jap.

b. caudata CALL., B. deutl. kurz gespitzt, Grund meist fast herzförmig, Rand nur selten schwach gelappt, sondern nur gleichm. gezähnt, Seitennerven 8 - 9 - 10, junge B. auch obers. hfg. mit dichtem seidigem Filz; beobachtet Gebiet d. Lena, Amur und Sachalin**).

+ Von dieser *var.* tritt auch eine *A. s. abbreviata* auf, die wohl häufig mit *A. t. tenuifolia* verwechselt worden ist.

***) An *A. hirsuta* schließt sich nahe an die echte *A. sibirica* FISCH. in TURCZ., l. c. *A. mitis* var. *hirsuta* LEDEB., Fl. ross. III, 656. 1856; sie ist aber durch die fast vollständige Kahlheit aller Teile gut unterschieden; B. fast kreisrund, 7:7 o. 4 - 6:3 - 5.5 cm, Rand schwachlappig, Unters. hell- o. blaugrau, kahl, aber deutl. papillos, Seitennerven 7 - 8, Frst. 2 - 6, sitzend, selten unterster kurz gestielt. — Vertritt in Sib. die *incana*. Noch nicht in Kultur.

A. h. TURCZ., in Bull. Soc. Nat. Mosc. 1838. 101 (*incana* var. *hirs.* SPACH, l. c. 207. 1841). — Dichtbehaarte E. — Heimat siehe var. — In feuchten Böden. — Blz. IV. — Noch nicht echt in Kultur, aber ihrer schönen Beh. halber sehr einführungswert.

B. unten nicht dicht bräunlich beh., . kahlend, Papillen deutl.

B. breit rundlich, meist tief lappig-gezähnt, vgl. Fig. 721.

22. *A. tinctoria*: b. bis 20:0,7 m, Borke braunschwarz, rissig. Zw. jung deutlich zottig beh., . kahlend, kantig, purpurbraun, hfg. bereift (SARGENT, Lent. fein, hell, zieml. ~: Kn. rundl.-eifg., etwa 6 – 9:4 – 5 mm, auf 3 – 5 mm langem Stiele, z. T. beh., klebrig, zweifarben: B. oben stumpf dunkelgrün, zuletzt nur noch auf den eingesenkten Nerven beh., unten graugrün, jung ., durchaus weich beh., später auf Fläche kahlend, 6 – 12:5 – 11 cm, Stiel beh., 2 – 4 cm: Neb. beh., bis 1,8:0,8 cm: Frst. zu 2 – 6, bis 2,6:1,7 cm, Stielchen 1 – 5 mm, Stiel bis 4 cm, vgl. Fig. 68 h – h².

A. t. SARGENT, in Gard. a. For. X, 472. 1897 (*A. incana* var. *glauca* SHIRASAWA, Icon. Ess. For. 39 [t. 19, f. 1 – 17] 1899 et MATSUM., l. c. 10. 1902). — Farbige E. — Mandsch., Jap. (Yezo, Hondo, Shikoku). — Montan, feuchte Täler, Ufer. — Blz. II – III. — Üppige schöne Art, als *incana* var. *hirsuta* O. var. *suberect* in Kultur.

Fig. 73. *Alnus*: a – d *glutinosa*: a . Lgtr.; b B.-N.; c Kztr.; d ., Zw.-Q.-Schnitt; e – l *incana*, e – f . Lgtr., bez. Kn., davon, h Beh. und Bedrüsung der Kn.-Sch.; i Kn.-Q.-Schnitt, k l . Zw.-Q.-Schnitt (a – Epidermis, 2a – Hypoderm, 2 – Rindenparenchym, 3 – Innenrinde [Bast], 3' – mechanische Elemente [primäre Bastfasern], 4 – Cambium, 5 – Holz, 6' – Markkrone, 6 – Mark); (Original nach C. K. SCHNEIDER).

B. vgl. Fig. 72 m – n), Lappung und Serratur nur an Lohden grob.

23. *A. incana*: habituell wie *glutinosa*, aber niedriger bleibend, bildet auch Wurzelausschlag. Krone dichter, St. glatt walzig. Borke glatt hellgrau, Zw. meist bis . beh., Lent. deshalb erst an . deutlicher, Kn. vgl. Fig. 73 e – l, fein zottig beh., spärlicher bedrüst; B. nicht

klebrig, 4—10 (—12):3—7 (—9) cm, vgl. *var.* Stiel bis 3 cm. Neb. beh.: Bl. vgl. Fig. 74. dgl. Fr. (und *var.*), Frst. sitzend o. kurz gestielt.

Diese Art ändert von allen *Alnus* am meisten ab. Es sei folgende Übersicht gegeben: *var. a. vulgaris* SPACH, l. c. 206. 1841 (*var. tementosa* DIPP., Laubholzsk. II, 165. 1892), B. breit-eifg., vorn deutl. spitz (Fig. 72m—o), Lappen spitz, eckig, Unters. grau o. graugrün, — dicht beh., Seitennerven 8—10—12; Frst. sitzend o. kurz gestielt; von spontanen Formen gehören hierher: *f. typica* CALL., in Jahresb. schles. Ges. LXIX, 2, 78. 1891; B. wie oben, Frst. sitzend. — *f. dubia* CALL., l. c.; B. wie oben, Frst. kurzgestielt. — *f. acuminata* CALL. (*var. acum.* RGL., in DC. Prodr. XVI, 2, 189. 1868; *var. pinnatifida* DIPP., l. c., non WAHLBG., *A. pubescens* *var. pinnatifida* KOEHNE, Dendrol. 115. 1893, B. wie Fig. 72p—o, ganz analog Fig. 69o), Frst. — gestielt, in Schwed. beobachtet; ferner seien (z. T. nur vorläufig) hier eingereiht folgende Kulturtormen: *f. aurea* (SCHELLE, in H. d. D. D. G. 59, 1863, B. — gelblich getönt und Zw. und Blst. im Winter zieml. auffallend rotgelb. Es erscheint angebracht, diese *aurea* von der zu *var. glaucophylla* gestellten

Fig. 74. *Alnus incana*: a Zw. mit B. und Frst. (k); b, c Trugdöldchen von oben; d analog Fig. 65f—g; e analog Fig. 70; f—i Blst.; g—i analog Fig. 70h—k, k Frst.; l Fr.-Sch.; m S.; n Keimpflz. (nach HEMPEL et WILHELM).

f. coccinea getrennt zu halten! — *f. variegata* (SCHELLE, l. c.), B. — weißbunt. — *f. pendula* (*var. pendula nova* HORT V. D. BOM.), Zw. hängend. — b. *subrotunda* CALL., l. c. 78. — B. q) rundl. o. rundl-eifg., Spitze kurz o. stumpf, Rand mit schwachen abgerundeten Lappen, Unters. grau o. graugrün, — dicht beh., Seitennerven 8—10—12; Frst. sitzend; gesehen aus: D., O.-U., Sch., ferner Frankr., Ital., Norweg., Schwed., Rußl. — c. *argentata* NORRL., in Notis Fauna et Fl. fenn. 1871, 13. — B. beiders. dicht silberglänzend zottig beh.; in den Formen: *f. typica* CALL., B. rundl-eifg. o. kreisrund, vorn stumpf o. mit kurzer stumpfer Spitze, Lappung schwach, stumpf, Seitennerven 8—10, Frst. kurz gestielt; beobachtet in Finnland. — *f. dentiloba* CALL., B. eifg. mit deutl. kurzer Spitze und spitzer eckiger Randlappung, so in Finn- und Schweiz; hierher *A. incana var. setacea* CHRIST, in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 1891, 97. Die schweizer Pfl. hat bedeutend kleinere B. als die finnländische. — *f. pinnatifida* NORRL., Bidrag till Syd Tavastl. Flora 151. 1871. B. wie *culmaris acuminata*, aber mit der charakt. *argentata*-Beh., Finnland. — d. *glaucophylla* CALL. (*var. glauca* AUCE PLUR.), B. breit eifg., vorn meist spitz, Rand spitz-eckig gelappt, Unters. blaugrün kahl o. — schwach beh., Seitennerven 10—12; Frst. sitzend; hierher: *f. monstrosa* DIPP., l. c., niedriger b. Zw. am Ende Verbänderungen bildend, monströs. — *f. coccinea* (SCHELLE, l. c. vgl. *culmaris f. aurea* oben. — e. *hypochlora* CALL., l. c. 39, B. ellipt. o. breit-eifg., vorn kurz zugespitzt o. spitz, Lappung schwach, abgerundet, Unters. grün, schwach beh. bis fast kahl, Seitennerven 8—10—12, Frst. sitzend, gesehen aus D., O.-U., Sch., Skandinav., europ. Rußl.; hierher *f. belliana* (SCHWERIN, in Mitt.

D. D. G. V. 77. 1896, *var. aureo-canadensis* HORT. VAN HOUTTE, B. + gelbbunt. — f. *borealis* NORRÉ, l. c. *incana* *var. virens* WILBG., Flor. Lapp. 250. 1812, ex parte; f. *pubescens* HARTM. et ALER. SCAND., ex parte. B. kleiner als bei den vorhergehenden *var.*, eifg. o. breitelliptisch (Fig. 721), vorn meist stumpf, Lappung kurz, abgerundet, Unters. grün o. schwach blaugrün, schwach beh., Seitennerven 7–8; Frst. sitzend; hierher f. *glabra* CALL. BLYTR, Norges Fl. 405. 1874, B. fast völlig kahl, Skandinavien. — g. *lobulata* CALL. *incana* *var. pinnatifida* a. vulg. RGL., Mon. Bet. 100, t. XVII, f. 6. 1860, et in DC., Prodr. XVI, 2, 189. 1868, excl. syn., non WAHLBG.; *var. pinnatifida* RCHB., l. c. Fl. germ. XII, 630, f. 1294. 1850. B. eifg., meist stumpf, 2–4(–5):1,5–3(–3,5) cm, Rand mit stark ausgeprägten etwas stumpfen Lappen (v), Unters. grau o. graugrün, + dicht beh., Seitennerven 6–8, Frst. zuw. kurz gestielt; ursprünglich Schweden, ob auch Tirol?, jetzt wohl nur noch Kultur. — h. *orbicularis* CALL., in D. bot. Monatsschr. 1892, Beil. 24. B. wie t, unters. grün o. selten schwach graugrün, schwach beh. o. fast kahl; Seitennerven 5–6; Frst. sitzend. Beobachtet in Schles.; selten kult. als *incana* *var. parvifolia*. — i. *arcuata* SKARMAN, in Bot. Not. 1889, 1. b mit bogig aufsteig. Ästchen, B. wie s, zuw. + gefaltet, Unters. grün, schwach beh., Seitennerven 5; Schweden. — k. *parvifolia* RGL., in DC., l. c. 189. B. sehr klein (u), 1–1,5(–2):1–1,5 cm, Unters. grau o. graugrün, Seitennerven 5–7. Schweden, Finnland. — l. *pinnata* CALL. (*Betula pinnata* SWARTZ, in Act. Holm. 1799, 131, l. 5, fide WAHLBG.; *var. pinnatifida* WAHLB., Fl. suec. 622. 1824; *var. incisa* DIPP., l. c.; *var. laciniata* SCHELLE, l. c.), B. vgl. *glutinosa* *var. incisa* (Fig. 69 p–p¹), Unters. grau, dicht beh., 2–3:1,5–3 cm. Schweden.

A. i. MOENCH, Meth. 424. 1794 [et WILLD. 1805!] (*Betula alnus incana* L., Sp. pl. 983. 1753; *Bet. incana* ROTH, Tent. fl. Germ. ed. 2, II, 477. 1793. — Weiß- o. Grau E; speckled or hoary a; a. blanc ou grisâtre. — *var. vulgaris* und *var. glaucophylla* L. G. D. zerstr. O.-U. und Sch. verbr.; sonst durch ganz Eur., Kauk., N.-Am.; vgl. im Übrigen *var.*. Im Allgemeinen auf weniger nassen Standorten als *glutinosa*, sonst vgl. diese.

Unterfamilie B. *Coryleae* EICHL., Syllab. 19. 1876.

Vgl. oben S. 96: B. 2-zeilig, Blst. erst im Frühjahr erscheinend o. ² nackt überwinternd; ² Bl. einzeln auf Trgb., Blh. fehl.; ♀ Bl. mit Blh., Vorb. der Schließfr. als Hülle angewachsen, diese die Fr. ringsum o. nur von außen deckend.

Gattungen:

- A. Kn. + spitzkegelfg., B. + eilänglich o. ellipt., 1¹/₂–2:1, Seitennerven meist 9 o. mehr (Fig. 76 a–r und 78 a), A. mit Haarschopf.
 I. ² Blst. erst im Frühjahr erscheinend, Fr.-Hülle offen, dreilappig o. nur gezähnt. 12. *Carpinus*.
 II. ² Blst. nackt überwinternd, Fr.-Hülle sackfg., die Fr. einschließend. 13. *Ostrya* (S. 142).
 B. Kn. + stumpf-eifg., B. breit-eifg. o. rundl.-eifg., 1–1¹/₂:1, Seitennerven meist 5–8 (Fig. 76 s und Fig. 83), ² Blst. nackt überwinternd, Stb. ± geteilt, A. mit Haarschopf.
 I. + Blst. mit B., Fr. vgl. Fig. 75 l, m. 14. *Ostryopsis* (S. 143).
 II. + Blst. zur Blz. (vor B. knospenfg., nur purpurne N. hervorragend; Fr. vgl. Fig. 82, 85; 87. 15. *Corylus* (S. 144).

Gattung 12. *Carpinus* L., Sp. pl. 998. 1873, exkl. *Ostrya* *Distegocarpus* S. et Z., in Abh. Ak. Münch. IV, pt. III, 226. 1846).
 [Hornbaum, Hain- o. Weißbuche; hornbeam; charme.]

Vgl. oben: meist ♂, Rinde meist glatt, ² Blst. ährig, meist hängend, ² in (durch Abort) 2-blütigen Dichasien zu aufrechten Scheinähren ver-

*) *Spez.-Lit.* MAXIMOWICZ, in Bull. Ak. Pétersbg. XXVII, 535. 1881.

eint. Fr. 1-samig. Pericarp · holzig. S. mit häutiger Testa. Etwa 21 Arten, fast nur in der nördl.-gem. Zone**).

○ B. mit 14—25 Seitennerven, Frst. *Ostrya* ähnlich.

○○ siehe S. 138.

· B. aus meist gerundeter Basis zieml. schmallänglich (Fig. 76 l), zwischen Fr. und Frst.-Achse eine kleine freie Ligula, die das Nüßchen deckt (Fig. 75 b β).

1. *C. carpinus* (*C. japonica*): (b—) b, bis 15:0,8 m, breitkronig, Borke hellgrau-braun, ± rissig werdend; Zw. jung mehr, ⊙ ± locker zottig o. fast kahl, braungrau, Lent. ∞, deutlich, größere Kn. 0,7—1,3 cm, ähnlich *betulus*; B. rotbraun austreibend. Beh. *betulus* analog, Nerven oben etwas schärfer eingeschnitten, 6—12:3—4—5 cm, Stiel 0,7—1,5 cm, Neb. bis etwa 1 cm; Bl. vgl. Fig. 80 a—i (d, g—h durch Fig. 75 b korrigiert), Frst. bis etwa 6:2,5, Stiel bis 3 cm, ± übergeneigt.

Fig. 75. a *Carpinus cordata* (vgl. auch Fig. 80 k—q): Fr. mit am Grunde umgeschlagenem Brakteenlappen (α), der das Nüßchen deckt — b *C. carpinus* (*C. japonica*) (vgl. auch Fig. 80 a—i): Fr. mit Braktee und der dieser opponierten freien Ligula (β) — d—e¹ *C. caroliniana*: c—e Fr. mit wechselnden Brakteenformen, e¹ Nüßchen — f—m *Ostryopsis davidiana*: f Zw. mit ♀ Bl. (α) und ♂ Bl. (β), g ♂ Bl. (A. an Spitze beh.), h ♀ Blst., i ♀ Bl., k P. ausgebreitet, l Frst., m Fr. im L.-Schn. (g—k, m vergrößert) (f—m nach DECAISNE, sonst Original).

C. c. SARG., in Gard. a. For. 1862, 361. *Dist. carp. S. et Z.* l. c.; *C. japonica* Bl., in Mus. Lugd. Bat. 1, 308. 1849. 506. Japanische H.; ch. du Japon. Japan Kiushiu bis Hondo. Wälder der Ebene und Gebirge, nicht so weit nördlich und weniger hoch als *cordata* gehend. Blz. Auf. V. — Frz. X. Sehr schöne, bis Prov. III sicherlich harte Art.

· B. aus stets tieferzfg. Basis eifg. o. eilänglich (Fig. 76 m) Fr.-Hülle mit nur umgeschlagenem, nicht freiem Ohrchen (Fig. 75 a α).

2. *C. cordata*: Wie vorige, doch eher größer, Zw. mit weniger Lent., Kn. z. T. bis 1,8 (— 2) cm lang (doch gerade an Lgtr. sah ich sie auffällig klein), Bl. vgl. Fig. 80 k—q, Frst. bis 8:4,5, auf kaum bis 2 cm langem Stiele.

***) Van adem in O-As. (China), aus welcher Region WINKLER in seiner Betula-Monographie, deren Korrekturbogen ich einsehen konnte, eine Anzahl neuer Arten beschreibt.

C. c. BL., l. c., 309. 1849/51. — Herzblättrige H. — N.-Japan (Jesso, Hondo), Korea, Mandschurei — Sonst wie vorige, aber wohl ganz hart!

Fig. 76. a—m *Carpinus*: a—e *betulus*: d—d² f. *incisa*; e—e¹ f. *quercifolia* — f *orientalis* — g—h *caroliniana* (h von Kult.-Expl.) — i *laxiflora* — k *yedoënsis* — l *carpinus* (*japonica*) — m *cordata* — n—r *Ostrya*: n—o var. *italica*; p—q var. *virginiana*; r var. *japonica* — s *Ostryopsis davidiana* (alles " nat. Gr.) (Original).

CC B. mit 7—15 Seitennerven. Frst. lockerer. Nüßchen frei.

- B mit plötzlich aufgesetzter, feiner langer Spitze, im Mittel 5.5—6.5:2.5—3.5 cm (Fig. 76i). Frst. etwa 4:1.8 cm, auf fast so langem Stiele.

3. *C. laxiflora**): Höhe wie vorige, aber: Rinde glatt bleibend, wie bei *betulus*, Zw. bald kahl, Kn glänzend rotbraun, kahl, etwa 1 cm lang; B. hfg. nicht herztg., Seitennerven im Mittel 10—12, auch unten zuletzt fast ganz kahl, Stiel

*) *C. yedoënsis* MAX., l. c. 1881, kenne ich nur aus des Autors Diagnose, sie soll aus jap. S. in Darmstadt in kleinen Pfl. erzogen sein. Die Identität dieser von mir gesehenen Expl. mit *laxiflora* ist mir aber noch fraglich. Nach dem Autor weicht sie im Wesentlichen von *laxiflora* nur durch mehr aufg. Fruchthülle mit kurzem eifg. Öhrchen ab.

0,6—1,8 cm; ♂ Bl. (nach SHIRASAWA mit kahlen Trgb. und kahlen A., ♀ *C. carpinus* analog.

C. l. BLUME, l. c. 309. — Lockerblütige H. — Japan — meist mit *C. carpinus* zusammen, aber noch mehr warme Lagen liebend. — Sonst wie diese. Wahrscheinlich weniger hart und meines Wissens nicht echt in Kultur.

Fig. 77. *Carpinus betulus*: a ♂, b ♀ Blst. an Zw., c ♀ Blst. vergrößert; d ♀ Trugdöldchen; e ♀ Bl mit Vorb. (1—2); f ♂ Bl.; g Stb.; h ♂ Trugdöldchen von unten; i Frkn. im Längsschnitt; k Sa.; l Frst.; m Fr.; n reifer S.; o Keimptlz. (a—b, l, o nach HEMP. et WILH., sonst Original).

77 B. nicht plötzlich zugespitzt, Frst. dichter, größer o. Fr.-Hüllen breitovaler.

+ B. im Mittel länger als 5 cm. Fr.-Hülle deutl. 3-lappig, größer.

+ siehe 141.

— B.-Kn. im Winter meist nicht unter 8—10 mm lang^{**}, Fr.-Sch. am Grunde meist nur 3-nervig; Herbstf. der B. tief gelb o. gelbbraun.

4. *C. betulus*: b h. bis 25 (— 30): 1 m; St. mit seiner licht-grauen Korkhaut sehr an *Fagus* erinnernd, aber deutlich spannrückig, z. T. scheinbar gewunden, Äste sich in eine feine lockere, regellose Verzweigung auflösend, Stockausschläge reichlich; Zw. meist nur jung beh., wenigstens Lgtr., o kahl, glänzend, olivbraun, grauschwarz, Lent. deutl., Kn. vgl. Fig. 79e—k, braun o. braunrot, Sch. gewimpert und hfg. gegen Spitze beh., B. vgl. Fig. 76a—e und var., jung beiders. beh., später oben kahl, sattgrün, unten wenigstens auf Nerven verstr. beh. und achselbärtig bleibend, heller, 4—10 (— 11): 2,5—5,5: 6 cm, Stiel bis 1,5 cm; Bl. und Fr. vgl. Fig. 77 und var.

^{**}) Dies Merkmal ist vielleicht ebensowenig ganz konstant, wie das von WINKLER wieder in den Vordergrund gestellte der Fr.-Sch.

var. a carpinizza *) NEILR., Nachtr. Maly Enum. 76. 1861 (*C. edentula* W. et KIT., Pl. rar. hung. II, 32. 1805, nom. sol.; *C. carpinizza* KIT. in HOST, Fl. Austr. II, 626. 1831; *C. intermedia* WIERZB., in REHB. Ic. Fl. Germ. XII, 633. 1850). Lappen der Fr.-Hülle ganzrandig o., mit wenigen entfernten Zähnen; sie geht über in *b serrata* BECK, Fl. Nied.-Östr. 266. 1860, deren Fr.-Hülle meist spitz gelappt und ringsum scharf gesägt ist (Fig. 77 m), hierher insbesondere folgende Kulturformen: *f. aurea* [AIT., Hort. Kew. III, 362. 1787] (*f. heterophylla* PERZ. et KIRCH., Arb. Muse. 667. 1864). B. lappig gesägt, Lappen spitz (Fig. 76 d' d''). — *f. quercifolia* DESF., Tabl. de l'écol. bot. 213. 1804, Lappen gerundet (Fig. 76 e-e'). — *f. horizontalis* [HORT. SIM-LOUIS]. Verästelung wagrecht ausgebreitet, ähnlich *Crataegus linearis*. — *f. purpurea* [DIPP., Handb. Laubh. II, 140. 1892]. B. rotbraun. *f. albo-variegata*: B. weißbunt. — *f. auro-variegata*: B. gelbbunt. — *c. pyramidalis* DIPP., l. c. (*f. fastigiata* und *f. columnaris* SCHELLE, H. d. D. D. G. 18. 1903). Wuchs pyramidal, hierher *f. cucullata* [PERZ. et KIRCH., l. c.]. B. blasig aufgetrieben. — *d. pendula* PERZ. et KIRCH., l. c. Wuchs hängend.

C. b. L., Sp. pl. 998. 1753 ex parte (*vulgaris* MILL., Gard. Dict. ed. VII, Nr. 1. 1759). — Gemeine H.; common h.; ch. commun, la charmille. — I. G. verbr., sonst noch von SW.-Frkr., durch S.- und M.-Eur., nördl. bis S.-Engl., S.-Schwed. (bis 57° 20' n. Br.) und von hier durch SW.-Rußl. nach Krim bis etwa 37° n. Br. — Im Gebirge kaum über 800 m; meist im Mischwalde, selten geschlossene Bestände bildend, am liebsten in frischem bis mäßig feuchtem sandigem Lehm Boden. — Blz. Ende IV—Anf. VI, kurz nach Laubausbr., Frz. X. — Laubf. spät, oft erst Winter. — Meist schon vor 20. Jahre mannbar.

Holz ausgezeichnetes Brennholz, sonst wenig dauerhaft, Sp.-Gew. (trocken) im Mittel 0,74. — Alter etwa 80 bis 120 Jahre im Mittel. — Wertvoller Parkbaum, bes. aber Heckengehölz, da Schnitt weitgehendst verträgt. Daher Hauptheckenpfl. alter architektonischer Gartenanlagen. Forstlich eigentlich nur im Niederwaldbetriebe als Brennholzlieferantin lohnende Erträge bietend, auch als Unterholz im Mittelwalde, überhaupt

Fig. 78. *Carpinus orientalis*: a B.; b Zw. mit 3 ♂ Blst. und einem ♀ Blst. am Ende des noch unentwickelten jungen Triebes; c Zw.-Stück mit ♀ Blst.; d ♂ Bl. und e Stb.; f Hüllblättchen der ♀ Bl.; g ♀ Bl.; h Frst.; i Fr.; k reifer S.; (b—f, h nach HEMP. et WILH., sonst Original).

wegen ihrer starken Ausschlagkraft, ihres geringen Lichtbedarfes und ihrer Eigenschaft als gute Humuserzeugerin vielfach recht brauchbar.

B.-Kn. nicht über 6—8 mm lang, Fr.-Sch. am Grunde meist 5—7-nervig, Herbstf. der B. lebhaft orange-scharlachrot.

5. *C. caroliniana*: diese Art, die KOEHNE selbst nicht als *var.* der *betulus* gelten lassen möchte, scheint mir doch, so schwer sich gute

*) Wie NEILREICH l. c. bemerkt, verstehen die Wallachen unter „Carpinizza“ nicht *betulus*, wie HOST sagt, sondern *orientalis*. Jene heißt bei ihnen „Carpin“.

Unterschiede in Worte fassen lassen, abweichend: *b*—*h*, meist nicht über 5—6, selten bis 13:0,6 m. Krone zierlicher verästelt, äußerste Zw. überhängend, • z. T. noch verstr. beh.; B. (Fig. 76 g—h) 6—10 (—12):2,3—4,2 (—5) cm, zuletzt ober-, tief blaugrün, kahl, unters. hellgrün und meist nur leicht achselbärtig; sonst wie *betulus*, vgl. Fr. in Fig. 75 d—e¹.

C. c. WALT., Fl. carol. 236. 1788 (*betulus* L., l. c. ex parte; *bet. virginiana* MARSH., Arbust. am. 25. 1785, non *rogl.* MILL.; *americana* MICHX., Fl. bor. am. II, 201. 1803, et MICHX. F., Hist. Arb. Am. III, 57. 1813 [nur unter der t. 8 steht *virginiana*]). — Amerikanische H.; american h. or blue beech; ch. d'Amérique. — Neu-Schottl. und Ontario bis Minn., Flor., Texas, wohl auch Mexiko. — Harter Zier-*h*, der wegen seiner Herbstf. *betulus* zuw. vorzuziehen.

Fig. 79. *a—d* *Castanea castanea* (*C. cistifolia*): *a* ♂ Zw., *b* B.-N., *c* Kn., *d* Zw.-Q.-Schn. (vgl. Fig. 73 l) — *e—k* *Carpinus betulus*: *e* ♂ Zw., *f* Kn., *g* B.-N., *h* Kn.-Sch., *i* Kztr., *k=d*. — *l—n* *C. orientalis*: *l* ♂ Zw., *m* Kn., *n* B.-N. (Original nach C. K. SCHNEIDER).

++ B. (Fig. 76 f. im Mittel nicht über 5 cm lang, dabei meist nicht unter 10 Seitennerven, Fr.-Hülle breitfig., nicht o. kaum gelappt (Fig. 78).

6. *C. orientalis*: *b*—*h*, bis 10 (—15) m, von *betulus* im Wesentlichen noch abweichend durch: Verästelung feiner, zierlicher, • Zw. zottig, Kn. kleiner, vgl. Fig. 79 l—n; B. sehr selten schwach herzfg., 2,5—6:1,3—3 cm, auf der wenig helleren Unterseite meist deutlicher beh., Stiel 0,3—1 cm; Bl. und Fr. wie Fig. 78.

C. o. MILL., Gard. Diet. ed. VII, Nr. 3. 1759 *orientalis* SCOP., Flor. carn. ed. 2, II, 243. 1772. — Orientalische H.; eastern h.; ch. d'Orient. — I. G. nur OU, Istr., Banat, Siebb., Kroat., Bosn., Herceg.; sonst noch Ital., SO.-Eur., Ork., Kauk., Transkauk. — Hugelgelände, gern auf Kalk in sonniger Lage. — Blz. und Frz. wie *betulus*. — Alter selten über 100 Jahre. — Hubcher, wie es scheint fast ganz harter Zier-*h*, sonst kaum von Bedeutung.

Fig. 80. *a—i* *Carpinus carpinus* (*C. japonica*): *a* ♂ Bl., *b* (rechts unter *s*) dgl. seitlich ohne Stb., *c* Stb., *d* ♀ Trugdöldchen, *e* ♀ Bl., *f* Trgb. von *d*, *g—h* Fr. (vgl. auch Fig. 75b), *i* Nüßchen — *k—q* *C. ordata*, *k* ♂ Bl., *l* ♀ Trugdöldchen, *m* ♀ Bl., *n* wie *f*, *o* Frst., *p* Nüßchen, *q* Fr. (vgl. Fig. 75a) — *r—y* *Fagus americana* (*F. ferruginea*): *r* halbe ♂ Bl., *s* ♀ Trugdöldchen im L-Schn., *t* Fr., *u* 2 Nüßchen, *v* das eine im L-Schn., *w* dgl. im Q-Schn., *x* S. mit beh. Funiculus und den abortierten Sa. an Spitze, *y* Keimpfl. (*a—n*, *p*, *r—s* ± vergr., sonst nat. Gr. o. wie angegeben), (*a—q* nach SHIRASAWA, *r—y* nach SARGENT).

Gattung 13. *Ostrya* Scop., Fl. carn. ed. 2, II, 244. 1772.

[Hopfenbuche; hop-hornbeam, ostryer.]

Vgl. oben S. 136 und Art*).

C. ostrya (*C. carpinifolia*): *b—b*, bis 15 (—20):0.7 m, St. meist kurz. Borke rissig, aber dünn. Krone jung kegelfg., später mehr breit-offen. Verzweigung wie *Carpinus betulus*: Zw. jung stark beh., G. hfg. fast kahl, glänzend oliv- o. rotbraun, Lent. wechselnd: Kn. vgl. Fig. 90k—o, Sch. olivgrün mit braunem Rande o. ganz braun, ± beh. o. nur gewimpert: B. vgl. Fig. 76n—r und *var.*, oben stumpfgrün, unten heller, 5—13:2.5—6 cm, Seitennerven 11—17, Stiel 0.4—1.3 cm: c Blst. sich viel stärker verlängernd als bei *Carpinus*, Blh. der ♂ Bl. meist sehr undeutlich, Frst. bis 6:3 cm, sein beh. Stiel und das ohfg. kahle diesem angegliederte blattlose Zw.-Ende zusammen etwa 1/2 bis ebensolang.

*) Trotz eingehender Prüfung aller Merkmale, welche B., Bl. und Fr. bieten, war es mir nicht möglich, konstante Unterschiede zwischen den hfg. als „Arten“ angesehenen in Eur., Jap. und N.-Am. auftretenden Pfl. zu finden. SARGENT betont vorwiegend die im Habitus und der Bedornung etc. liegenden Unterschiede. Leider konnte ich aus Am. und Jap. stammende lebende erwachsene Expl. nicht vergleichen, ich betrachte deshalb diese nur als geographische Varietäten, über deren wirklichen Wert ich aber noch völlig im Unklaren bin. Es wäre mir sehr erwünscht, aus Jap. und N.-Am. gute Winterzweige zu erhalten. In den „Wintermerkmalen“, die gerade bei den *Fagales* noch genauester Untersuchung bedürfen, liegen vielleicht doch gute Unterschiede! — *C. knorltoni* COVILLE, in Gard. u. For. 1894, 114, kenne ich nur aus Literatur. Vielleicht gute Art.

var. *a. italica* (*O. italica* SCOP., Flor. carniol. 414, 1760; *carpinifolia* SCOP., l. c. ed. II, 2: 244, 1772; *vulgaris* WILLD., in L. Sp. pl. ed. IV, 469, 1805). B. meist kurz zugespitzt. Fig. 76n — o jung beiderseits, unters. stärker beh., später oben ganz und unten bis auf Rippe o. Achselbärte kahrend, Textur dünn, aber derb, Frst. meist über 1,5 cm lang, Spitze der Nüßchen meist deutl. beh. — *b. virginiana* (*Carp. virginiana* MILL., Gard. dict. ed. VII, No. 4, 1759; *O. virginica* WILLD., l. c.; *O. virginiana* K. KOCH, Dendr. II, 2, 6, 1873), B. meist lang zugespitzt (Fig. 76p — q), Frst. wie *a*, aber Nüßchenspitze meist kahl. — *c. japonica* = *O. mandchurica* BUDISCHESCHEW, ex TRAUTV., in Act. Hort. Petrop. IX, 166, 1884; *japonica* SARG., in Gard. a. For. 1893, 383. B.-Form wie *b* (vgl. auch Fig. 76r), aber B. gleich den *c*. Zw. unten stärker (meist auch auf Fläche) beh., sich weich, dünn anfühlend, Frst. gewöhnlich unter 4 cm lang.

Fig. 81. *Ostrya ostrya* (*O. carpinifolia*): *a* B.; *b* $\frac{1}{2}$, *c* $\frac{1}{2}$ Blst.; *d* — *e* $\frac{1}{2}$ Bl.; *f* Stb.; *g* $\frac{1}{2}$ Trugdöldchen; *h* $\frac{1}{2}$ Bl.; *i* Perigon davon aufgeschnitten; *k* Frkn. und Gr.; *l* Frst.; *m* Fr.; *n* S.; *o* Keimpflz. (*a* — *c*, *i* — *o* nach HEMP. et WILH., sonst Original).

O. o. KARST., Deutsch. Fl. ed. II, 20, 1895 (*Carp. ostrya* L., Sp. pl. 998, 1753). I. G. nur var. *a*. OU. zerstr. Tirol, Kärnt., S.-Steierm., Krain, Istr., Dalm., Ung., Bosn., Herzeg.; Sch. Misox ob Grono, Ct. T; sonst noch S.-Frankr., Ital., Balkan, Or., Kauk. — var. *b*. N.-Am. (Cape Breton Island bis Minnesota, Florida, Texas. — var. *c*. Jap. (Shikoku, Honshu, Nikko, Hokkaido) und wohl auch China (Hupeh). — Hügelgebiet, montan-subalpin, ziemlich trockne steinige Lagen, gern auf Kalk. Blz. (IV — V; B.-Ausbruch Mitte IV bis Anf. V; Frz. VII — VIII. Sonst vgl. *Carp. orientalis*, deren forstlichen Wert sie allerdings übertrifft. Var. *b* und *c* noch selten in Kultur.

Gattung 14. *Ostryopsis* DECNE., in Bull. Soc. Bot. France 1873. 155.

Vgl. oben S. 136 und Art. Nur diese bekannt.

O. davidiana: *b*. Tracht einer niedrigen *Corylus*, Zw. jung weich und etwas drüsig beh.; B. vgl. Fig. 76s, oben freudig grün, kahrend, unten mäßig heller, wenigstens auf Nerven weich beh., Textur dünn, aber derb, 3 — 4:2 — 3 cm, Stiel 0,5 — 0,7 cm; Blst., Bl. und Fr. vgl. Fig. 75f — m.

O. d. DECNE., l. c. (*Corylus david.* BAILL., Hist. pl. VI, 225, 1875) — Schein-Hopfenbuche. N. China, S.- und O.-Mongolei. — Gebirgshänge. Blz. IV.

Sah ich bisher in Kultur nur bei SIMON-LOUIS FRÈRES in Plautières als ganz junge Pfl. Jedenfalls interessanter und vielleicht auch zieml. harter $\bar{\phi}$.

Gattung 15. *Corylus* L., Sp. pl. 998. 1753.

[Haselnuß; hazel-nut; noisetier.]

Vgl. oben S. 136, $\bar{\phi}$ $\bar{\phi}$, selten $\bar{\phi}$, $\bar{\phi}$ Blst. in hängenden ährigen Blst., $\bar{\phi}$ in 2-blütigen Dichasien zu kugeligen Köpfchen vereinigt; Fr. teils mit tiefgeteilter, teils mit bis auf Spitze geschlossener, $\bar{\phi}$ schlauchfg. Hülle. — 10 Arten in der nördl. gem. Zone*).

○ $\bar{\phi}$ Zw. bereits längsrissig, $\bar{\phi}$ korkig berindet, B.-Stiele (1.5–2–4.5 cm, Fr.-Hülle offen, in $\sim$ lange die Nuß überragende Zipfel zerschlitzt**).

Fig. 82. a–f, h *Corylus colurna*: a $\bar{\phi}$ Blst.; b $\bar{\phi}$ Blst.; c $\bar{\phi}$ Bl. von innen, d eine A.; e $\bar{\phi}$ Trugdöldchen; f Frst. und B.; h Nuß. — g, i *C. maxima*: g Frst. und B.; i Nuß (nach HEMPEL et WILH.).

1. *C. colurna*: $\bar{\phi}$ o. meist $\bar{\phi}$, bis über 20 m. Äste hellbraun berindet, mit spitzem Ablaufwinkel eine breit-pyramidale Krone bildend, die erst im hohen Alter ihre strenge Form verliert; Borke sehr zeitig auftretend, rauh, kleinschuppig; Zw. brüchig, jung stärker beh. und drüsig, $\bar{\phi}$ kahlend, hellgelblichgrau o. olivbräunlich, Kn. vgl. Fig. 84 o–r; B. aus tief herzförmig, Basis rundlich-eiförmig o. breitelliptisch, zugespitzt, vgl. Fig. 83a, oben dunkelgrün, bald ganz o. fast kahl, unten heller, durchaus fein, aber nicht eigentlich weich beh., 7–15:5.5–10 cm;

*) Außer den im Folgenden beschriebenen, noch *C. ferox* WALT., Pl. as. rar. I, 77. 1830, mit $\pm$ fein-stachelig tief zerschlitzter Fr.-Hülle im Himalaya und *C. colchia* ALBOW, in Arb. bot. Gart. Tiflis 1895, 219, eine *maxima* nahe stehende Art vom Kauk. Einige Formen aus Zentr-China und dem Himal, die zu *colurna*, *heterophylla* und *mandschurica* gehören, sind nur ungenügend bekannt.

*) Ganz sicher bestimmen lassen sich, wie schon KOEHNE hervorhebt, die *Corylus*-Arten nur nach den Früchten, obwohl ein guter Kenner auch an Zw. und B. Merkmale findet, die wenigstens für einzelne Arten nie versagen. Sie lassen sich aber in einer so knappen Darstellung nur unvollkommen präzisieren. Auf die Form der Nüß möchte ich wenig Gewicht legen, da diese denn doch ziemlich stark variiert bei der gleichen Art.

Bl. vgl. Fig. 82 a–e. ♂ Blst. bis 12:1 cm. A. gelb; Fr. geknäuelte, vgl. Fig. 82 f, Nuß wie h, 1,7–2:1,2–1,8 cm.

C. c. L., Sp. pl. 999. 1753 (arborescens MÜNCHH., Hausv. III, 826. 1767). — Türkische o. Baum-H.; cluster nut; n. de Turque ou de Bysance. — I. G. nur OU. Istr., S. Ung., Bosn., Herzegow.; sonst noch SO.-Eur., Kl.-As., Kauk. bis Himal. Teilweise waldbildend. Blz. I–II–III(–IV). Frz. Ende IX–X, wird erst mit 15–20 Jahren mannbar, kaum über 100 Jahre alt. — Fast im größten Teil des Gebietes winterhart, schnellwüchsig und wohl nicht nur als Zierbaum, sondern, da das Holz von Kunstschlern sehr geschätzt wird, auch z. T. für forstl. Anbau zu empfehlen.

Hieran schließt sich ein Bastard:

1×4 *C. colurna* × *avellana*: *C. colurnoides (intermedia LODDIGES, Cat. 1836, non FINGERHUT; colurna arborescens FISCH. ex GOESCHKE, Die Haselnuß 92. 1887, non arborescens MÜNCHH.).* Von *colurna* abweichend: B. Rinde dunkler, weniger rissig korkig, B. vgl. Fig. 83 r o. mehr *avellana* ähnlich; ♂ Blst. kürzer und nicht so zahlreich, Fr.-Hülle die meist deutlich längere als breite Nuß weniger überragend, sonst aber *colurna* sehr ähnlich, nur kaum drüsenborstig, trägt früh, Fr. zu 2. An einer schönen Pfl. in Hann.-Münden (Forstgarten) sammelte ich im Sept. 1903 8 gut ausgebildete Fr., deren S. sehr wohlgeschmeckend waren. Nach REHDER sollen solche nur spärlich auftreten.

○ — • Zw. glatt, Lent. deutlich, nie korkig berindet. B.-Stiele hfg. kürzer; Fr.-Hülle offen, aber nicht so langzipfelig tief zerschlitzt o. geschlossen und die Fr. röhrig überragend.

• Fr.-Hülle aus 2 seitlich getrennten B. gebildet, vgl. Fig. 85 b, i. m.

• B. im Umriß zieml. auffällig rechteckig, vgl. Fig. 83 p–q.

B. der Fr.-Hülle grobzählig (Fig. 85 b).

×× siehe S. 148.

2. *C. heterophylla*: b. bis 4 m. Äste bis 10 cm dick. Zw. jung dicht zottig und drüsig. • kahlend (an Lohden auch filzig), zieml. hellbraun, Lent. verstr., Kn. wie es scheint klein, stumpf-eifg., beh., Seh. 3–5(?), rundlich, gewimpert und bedrüst; B. zuw. auch gerundet, Grund tiefherzfg. o. B.-Grund z. T. wie bei *avellana* / *zimmermanni*, vgl. S. 147, 6:5,5 bis 11:10 o. 12:8 cm, oben sattgrün, nur im Anfang auf Nerven beh., unten heller, meist nur weich nervenhaarig, Rippe gleich Stiel drüsig, Stiel (1–)1,5–2(–2,5) cm; ♂ Bl. vgl. Fig. 85 a, ihre Trgb. jung langgrannig (die Spitzen pflegen wie es scheint abzubrechen); Fr. wie Fig. 85 b–d, Hülle samthaarig mit nur wenigen Drüsenborsten am Grunde.

C. h. FISCHER, ex BESSER in Flora Sibir. Beibl. 8, 24. — Verschiedenblättrige H. Dahurien, Mandschurien, O. Mongolen, N.-China, Korea, Jap. (Kjusiu bis Nippon). Als Unterholz in Laubwäldern. Blz. II–III. Frz. X. Kaum echt bei uns in Kultur. Wohl aber hart und zu empfehlen!

— B. aus leicht bis tief-herzfg. Grunde rundlich- o. verkehrt-eifg. o. eilänglich, kurz o. allmählich zugespitzt, Fr.-Hülle zieml. fein und unregelm. gezähnt-gesägt o. kurz zerschlitzt.

REHDER, welcher 1894 in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. III, 43 diesen Bestand gut beschreibt, ist der Meinung, daß die ältere *intermedia*, welche FINGERHUT 1829 in Linnæa IV, 384 publiziert hat, zu einer Änderung des LODDIGESSchen Namens kaum Veranlassung geben könnte. FINGERHUTS Beschreibung wird indes sehr verschieden gedeutet, bald für *avellana* (DECANDOLLE), bald für *maxima* (REHDER), bald für *colurna* (GURKE). Mit der letzten hat sie nichts zu tun, dagegen könnte sie eine *avellana* × *maxima* repräsentieren, wenn es sich nicht um eine *avellana* handelt, was mir dem Vorkommen nach an schattigen Stellen bei Jisch im Kofler Regierungsbezirk eigentlich am Wahrscheinlichsten dünkt. Es scheint mir am Besten, dem Bastard den Namen *colurnoides* zu geben. GOESCHKE'S „Levantische Baumhasel“ dürfte mit ihm identisch sein.

△ B.-Grund rundlich o. nur leicht herzfg., Rand kaum lappig. Fr.-Hülle doppelt so lang wie Fr., vgl. Fig. 85 m.

3. *C. americana*: b, 0,8—2,5 (—3) m. Zw. wie bei voriger beh., rotbräunlich o. Lohden hellgelbbraun. — braungrau, rissig, mit hellen Querhöckerchen. Kn. vgl. Fig. 86 k—p, ziemlich klein, doch mehrschuppig, mäßig beh., braunrot; B. eilänglich o. breit eifg., 9—12 (—15: 6—9 (—12) cm, unten meist bleibend kurz weich beh., Herbstfärbung

Fig. 83. *Corylus*-B.: a *columna* — b—d *avellana*: d f. *urticifolia*. — e—f *maxima* — g—h *americana* — i—k *rostrata* — l—m *mandschurica* — n—o *sieboldiana* — p—q *heterophylla* — r *columnoides* (alles $\frac{1}{3}$ n. Größe) (Original).

rotbraun. Stiel 0,4—1,5 (—2) cm; $\frac{1}{2}$ Blst. meist einzeln, 7—10 cm lang, ihre Trgb. grannenspitzig, aber Spitze nicht langborstig beh.; Fr. vgl. Fig. 85 m—n. Hülle nur mäßig bedrust. Nuß hellbraun, 1—1,5 cm lang.

C. a. WALT., Fl. carol. 236, 1788. *americana humilis* WANGH., Beitr. nordam. Holz 88, 1787. *alnifolia* DIPP., Laubholz, II, 132, 1862. — Amerikanische H.; american h.; n. d'Amérique. — N.-Am. (Maine bis Ontario, südl. bis Manitoba, Florida, Kansas). — Gebüsch. — Blz. (II—)III—IV. — Frz. (VIII—)IX. — Wegen der Herbstfärbung beliebter Zierb., auch als *argentea* verbreitet o. mit *rostrata* verwechselt.

B.-Grund meist — deutl. herzfg., Rand fast stets lappig. Fr.-Hülle nur wenig länger o. kürzer als Fr., sehr wechselnd!, ± kurz zerschlitzt (Fig. 85 i—k).

4. *C. avellana*: b $\frac{1}{2}$, 1—7 m. zuw. wohl sogar kleiner $\frac{1}{2}$. Rinde glatt, braungrau. Zw. jung beh. und bedrüst. • ebenfalls, so daß die Lent. erst an • Zw. deutlich zu werden pflegen. Kn. vgl. Fig. 84a—h, grünlich bis bräunlich. Sch. meist auch auf Rücken leicht beh. • Bl.-Kn. wenig abweichend: B. vgl. Fig. 83b—d, später hfg. nur unten beh., aber schwächer als bei voriger. 7—13:6—10 cm. an Lohden auch reichlich größer. Stiel 0.5—1—1.7 cm: $\frac{1}{2}$ Blst. kaum über 5 cm lang. Trgb. sehr kurzspitzig. $\frac{1}{2}$ Bl. vgl. Fig. 85e—f, Fr. zu 1 4(—6), sehr formenreich!

Fig. 84. *Corylus*: a—h *avellana*: a • Zw. Stück, b Kn., c B.-N., d Wimperung der Kn.-Sch.; e Kztr., f $\frac{1}{2}$ Blst. im Winter; g Trgb. der $\frac{1}{2}$ Bl. von vorn; h Zw.-Q.-Schnitt — i—n *maxima*: i • Zw.-Stück, k Beh. des Zw.; l B.-N.; m Wimperung der Kn.-Sch.; n — $\frac{1}{2}$ — o *columna*: o • Zw.-Stück, p—q Kn. und Sch.-Wimperung; r — h (u. o. vgl. Fig. 73b). (Original nach C. K. SCHNEIDER).

Ohne die Frucht-Kulturrassen vgl. GOESCHKE zu berücksichtigen, seien folgende Formen erwähnt:

avellana typica: wie oben. Wuchs stets aufrecht, hierher: *f. atropurpurea* [PERZ. et KIRCHN., Arbor. Muscav. 670. 1864] var. *fusca-rubra* GOESCHKE. Die Haseln. hellrotbraun, nicht so schwarzrot wie bei *maxima f. purpurea*. *f. aurea* [PERZ. et KIRCHN., l. c.] schwachwüchsig, Zw. bes. im Winter deutl. gelblich. B. gelbgrün bis tiefgelb. *f. pendula* CHRIST, Pilzleb. Schweiz 206. 1876] *C. gland* SHUTTLEW; var. *glauca* BECK, Fl. N.-Östr. 267. 1860. Fr.-Hülle reichdrusig, wilde Form — *f. glomerata* AIT., Hort. Kew III. 363. 1789, Fr. zu 7—10 vereinigt, ebenfalls spontan auftretend. *f. mollis* DC., Prodr. XVI, 2. 131. 1864] *C. heterophylla* LODD., Cat. 1836, non FISCH.; var. *lucida* PERZ. et KIRCHN., l. c. vgl. Fig. 83d; hiervon weicht *f. quercifolia* PERZ. et KIRCHN., l. c. durch breitere, stumpfere, mehr eichenblattähnliche Lappung ab. *f. cimmeriana* HAHNE ex BLISSN., in Mitt. D. D. G. 1865, 12, B. z. T. durch das Zusammenwachsen der beiden Zipfel des B.-Grundes um den B.-Stiel herum durchwachsen (dütendg.); bei Schwelm (Rheinl.) gefunden. *C. albo-variegata* B. weißbunt. — *f. macro-marginata*: B. goldbunt gerandet. • Man kann auch die wilden Formen nach der Länge der Fr.-Hülle trennen in: *f. brachychlamys* [SPACH, in Ann. sc. nat.

ser. 2, XVI, 106, 1841. Fr.-Hülle kürzer als die Nuß und *f. schizochlamys* SPACH, l. c. Fr.-Hülle länger als die Nuß. — *b. pendula* GÖRSCHKE, l. c. 49, Zw. + stark hängend. — *c. pontica* H. WINKLER, l. c. 1904 (*C. pontica* K. KOCH, in *Linnaea* 1840, 329). Mir nur aus Literatur bekannt, WINKLER sagt: B. fast kreisrund, oben kahle, unten weich beh., Stiele kurz, Fr.-Hülle die Nuß überragend, viel-fiedrig, an einer Seite bis zum Grunde geteilt. SW.-Kauk. (Trapezunt).

C. a. L., Sp. pl. 998, 1753 (*silvestris* SALISB., Prodr. 392, 1796). — Wald-H.; common h.; n. commun, avellier. — l. G. sehr hlg.; sonst ganz Eur. (Polargrenze etwa von 59° [Orkney Ins.] bis 67° 56' [Norweg.], dann südöstl. bis 41° 40' [Gouv. Perm]); Kl.-Äs. bis Kauk., ? N.-Afr., — Gebüsch, lichte Laubwälder, im Gebirge bis 1400 m. — Blz. (I—)II—III(—IV), Laubausbr. Ende III bis Mitte IV. — Frz. (VIII—)IX—X. — Mit 10 Jahren mannbar, Stockausschläge viel früher. — Etwa bis 60–80 Jahre alt werdend. — Kulturrassen sehr wertvoll, typ. Art wenig von Bedeutung; das Holz wird für Reifen, Stöcke u. dgl. verwendet.

Bastarde mit *maxima* gewiß im südl. M.- und SO.-Eur. wild auftretend, unter den Kulturrassen natürlich hlg. Meines Wissens sind indes die spontanen Bastardformen noch nicht beschrieben und genau untersucht, wozu ich hiermit anregen möchte.

Fig. 85. *Corylus*: *a—d heterophylla*: *a* ♂ Bl. (*a* Trgb., *β* Vorb.), *a'* Trgb.-Spitze, *b* Fr., *c* Nuß, *d* Neb. — *e—k avellana*: *e* ♀ Blst., *f* ♀ Trugdöldchen mit Trgb. rechts, links ♂ Bl. mit Blh. (*δ*), *g* junge Fr. im oberen Teil im L.-Schn. (*ε* = Sa.), *h* Neb., *i* Frst. z. T., *k* Nuß. — *l—n americana*: *l* Neb., *m* Fr., *n* Nuß (*a, c* nach SHIRASAWA, *g* nach BAILLON, *i—k* nach HEMP. et WILH., sonst Orig).

B. der Fr.-Hülle ganz o. einseitig verwachsen, sich über der Fr. röhrig verengernd, vgl. Fig. 82 g und Fig. 87 c, e, h.

Kn. relativ groß, meist 5 bis mehrschuppig, Trgb. der ♀ Blst. nicht grannenspitzig, Fr.-Hülle nur weich beh. und drüsenborstig, nicht steif-, fast stachelborstig beh.

5. *C. maxima*: *b—b*, üppiger als *avellana*, der sie sonst sehr ähnelt, doch scheinen bei typ. wilden Pflanzen die Zw. fast ganz zu kahlen: Bl.-Kn. meist deutl. größer; vgl. Fig. 84 i—n; B. vgl. Fig. 83 e, f. Form analog *avellana*, aber im Mittel größer, Beh. wie bei

columna, Stiel 0,8—2(—2,8) cm: ¹ Blst. bis 9:1 cm: vgl. *var.*: Fr. vgl. Fig. 82 g; Fr. zu 3—6—8, etwa 2—2,4:1,4—1,5 cm.

Fig. 86. *Corylus* a. *rostrata*, a. — Zw.; b Kn.; c Sch.-Wimperung; d Seit.-Kn.; e Bl.-Kn.; f ¹ Blst im Winter; g Bl.-Trgb. von vorn; h — — Zw. im Q-Schnitt (1—6 vgl. Fig. 73b). k *p. americana*; k — Zw.; l Kn.; n Sch.-Wimperung; m Bl.-Kn.; o—p wie f—g (Original nach C. K. SCHNEIDER).

var. a. alba (C. a. LODD., Cat. 1836). B. grün, A. gelb, äußere S.-Schale weißlich. b. *rubra* (C. r. BORKH., Handb. Forstb. I, 723. 1800; äußere S.-Schale rot, hierher *f. normalis* „rote Lambertsnuß“ GOESCHKE, l. c. 78. B. und A. wie bei a, ferner *f. purpurea* (C. purp. LODD., Cat. 1836; *var. atropurpurea* DOCHS., Führ. Obstk. 19. 1866; „rotblattrige L.“ GOESCHKE, l. c. 79. B. tief bis schwarzrot, A. gerötet!, echte Bluthasel, auch als *atr. sanguinea* verbreitet.

C. m. MILLER, Gard. Diet. ed. VII, No. 3. 1750 (*tubulosa* WILLD., in L. Spec. pl. ed. IV, 470. 1805 — „Lambertsnuß, weiße H., Blutnuß; white or red filbert, n. tubulé. — 1 G. wild nur OC. Istr., Banat u. sonst SO.-Eur., Or. Wälder. Blz nach, Frz meist vor *acellana*. Ausgezeichneter Fr.-b., auch an Zierwert *avellana* überlegen, aber im N. des Gebietes nicht hart.

Kn. zieml. klein, meist 3—4-schuppig, wobei die unterste o. wenigstens zweitunterste Sch. bis über Kn.-Mitte reicht. Trgb. der ¹ Blst. grammenspitzig, Spitze meist mit Borstenhaaren besetzt, Fr.-Hülle wenigstens im unteren Teile rostgelb-steifhaarig, Haare stechend!

B.-Stiel 0,3—1,5 cm. Fr.-Hülle über der Nuß sehr eng-röhrig, vgl. Fig. 87 b—c.

6. *C. rostrata*: b. bis 2—2,5 m; Zw. hfg. drüsenlos, — kahl, braunlich. Lent. erst an — Zw. deutlicher; Kn. vgl. Fig. 86 a—1

* Anscheinend ist *maxima* in U. zieml. weit westlich verbreitet, jedenfalls bedarf ihr Vorkommen noch der Untersuchung.

**) *C. mandschurica* und *seboldiana* bedürften in dieser Hinsicht noch der Untersuchung!

beh., Sch.-Wimperung kaum drüsig: B. 6—10(—12.5):3.5—6.5(—8) cm. Grund rundlich o. seicht herzförmig. (Fig. 83 i—k), oben bald fast kahlend, unten zuletzt meist nur noch auf Nerven beh. Rippe und Stiel gewöhnlich drüsenlos; Fr. vgl. Fig. 87 b—c, Nuß gestreift.

C. r. AIT., Hort. Kew. III, 364. 1789 (*C. cornuta* HORT.). — Schnabel-H., gehörnte Nuß; beaked h.; n. cornu. — N.-Am. (Neu-Schottl. bis Brit. Col., südl. bis Georgia, Tennessee, Kansas, Oregon*). — Sonst wie *americana*, mit der sie hfg. verwechselt zu werden scheint.

Fig. 87. *Corylus*: a—c *rostrata*: a Neb., b Nuß, c Frst. — d—f *mandschurica*: d Neb., e Frst. ($\frac{1}{9}$), f Nuß — g—h *sieboldiana*: g Neb., h Fr., i Nuß (h—i nach SHIRASAWA, sonst Original).

△△ B.-Stiel im Mittel über 1.5 cm. Röhre der Fr.-Hülle weniger eng, vgl. Fig. 87 e—h**).

= Röhre der Fr.-Hülle über 2 mal länger als Fr.

7. *C. mandschurica*: b. bis 4.5 m. außer in dem üppigeren Wuchs von *rostrata* nach dem mir vorlieg. Material noch abweichend durch: • Zw. weich beh., B. mehr rundl. vgl. Fig. 83 l—m. im Mittel breiter, etwa 10:8.5 cm, unten reicher weich beh.; Fr. vgl. Fig. 87 e—f.

C. m. MAXIM., in Bull. Ac. Pétersbg. XV, 137. 1856. — Mandschurische H. — Mandchurei, N.-China — Sonst vgl. *rostrata*, die ihr an Zierwert nachsteht.

Röhre der Fr.-Hülle kaum $1\frac{1}{2}$ mal so lang wie Nuß.

8. *C. sieboldiana*: b. bis 5 m. Äste bis 15 cm dick. im Übrigen *mandschurica* sehr ähnlich, wie es scheint • Zw. mit deutlicheren ~ Lent., B. im Mittel länger (Fig. 83 n—o), spitzer, am Grunde mehr gerundet als herzförmig; Fr. vgl. Fig. 87 h. Nuß mehr an *rostrata* gemahnend.

C. s. BLUME, in Mus. Lugd. Bat. I, 310. 1850 (*rostrata* var. *sieb.* MAXIM., in Bull. Ac. Pétersb. XI, 1881) — Siebolds H. — Japan. Vorkommen, Blz. und Frz. nach SHIRASAWA wie *heterophylla*. Bei uns kaum in Kultur, ich erhielt Expl. aus dem Arnold-Arboretum (N.-Am.).

*) Die vielleicht in Kultur befindliche var. *californica* DC., Prodr. XVI, 2, 132. 1864 dürfte nur durch kürzere weniger enge Röhre der Fr.-Hülle abweichen.

**) Die folgenden ostasiatischen Arten scheinen durch die relativ langen B.-Stiele von der amerikanischen *rostrata* gut unterschieden, unter sich dagegen tormenteich und noch sehr der Untersuchung bedürftig.

Familie 5. Fagaceae, Buchengewächse.

A. BR., in ASCHERS. Fl. Prov. Brandbg. I, 615. 1864.

Vgl. Reihe S. 96, b. $\mathfrak{b}$. B. sommer-, winter- o. immergrün, ungeteilt bis tief fiederlappig. Neb. meist abfällig. Haare einzellig o. Buschelhaare, z. T. auch fädliche Drüsenhaare: Blst. meist ährenartig, am jungen Holze: Bl. gewöhnlich diklin. P. 4–7, selten P. fast getrennt: in σ^7 Bl. Stb. ebenso- o. doppelt soviel wie P., Frkn.-Rudiment zuw. vorh.: in ρ^7 Bl. Gyn. unterständig, am Grunde 2-, selten 6-fächerig. Gr. 3. Sa. je 2 an jeder Naht, hängend, anatrop. Integ. 2: σ^7 Bl. und Fr. einzeln o. gruppenweise von einer mit ∞ Sch.-B. besetzten ringfg. Achsenwucherung (Cupula, Fr.-Becher) umgeben, die erst zur Frz. ganz ausgebildet: Fr. 1-samige Schließfr., S. ohne End.: Cot. nur bei *Fagus* bei Keimung über Erde tretend.

Gattungen.

- A. Mk. der Zw. nicht 5-strahlig. Kn. lang-spindelfg., sehr spitz. B. 2-zeilig, nie scharf (stechend) gezähnt: **16. *Fagus***.
- B. Mk. der Zw. deutl. 5-strahlig. B. $\odot$ o., wenn 2-zeilig, scharfzähmig.
- I. Kn. meist 2-zeilig, 2–3-schuppig. B. scharfzähmig. **17. *Castanea*** (S. 156).
- II. Kn. $\odot$, mehrschuppig. B. verschieden gezähnt, gelappt o. ganzrandig.
- a. B. unters. goldig-schülferig, ganzrandig. Cupula stachelig-schuppig. **18. *Castanopsis*** (S. 159).
- b. B. verschieden, Cupula nie stachelig.
- a) σ^7 Bl. an aufrechten Kätzchen, Gr. steif zylindrisch, an Spitze mit punktf. N. **19. *Pasania*** (S. 160).
- β) σ^7 Blst. hängend, Gr. flach, die N. oberseits tragend. **20. *Quercus*** (S. 161).

Gattung 16. *Fagus* L., Sp. pl. 997. 1753. exkl. *Castanea*.

[Buche; beech; hêtre.]

Vgl. oben: meist $\mathfrak{b}$. Rinde hellgrau, glatt. B. sommergrün, Neb. schmallanzettlich, abfällig: σ^7 Blst. vielblütig, kugelig, langgestielt: P. (4–7, Stb. 8–12: ρ^7 Blst. 2-blütig, auf kürzeren dickeren Stielen aufrecht, P. (4–6), N. 3, rötlich: Cupula mit borstenfg., z. T. etwas stacheligen Sch., 4-teilig. Fr. dreikantig (Buchecker), sonst vgl. Arten, deren von den echten Buchen etwa 7 sich unterscheiden lassen.

C Nuß so lang o. kürzer wie Cupula, Stiel höchstens doppelt so lang wie diese, B. meist gleichmäßig breit zugespitzt.

Untere Sch. der Cupula gegen die Spitze verbreitert, Seitennerven meist unmittelbar vor dem B.-Rande deutlich umbiegend.

○○ siehe S. 154.

¹ Spec. Lit.: FR. KRASSER, in Annot. K. K. naturh. Holm. Wien XI, 149. 1899 (bes. *Vethofagus*!) und DIELS et V. SEEMEN, in ENGL. Bot. Jahrb. XXIX, 282. 1907 (nur *Eufagus*).

² Die hfg. als Gattung abgetrennte Sekt. *Vethofagus* umfaßt ca. 12 Arten, von denen einige in den Hochgebirgen Chiles vorkommende immergrüne (z. B. *V. dombeyi* OERST. o. *antarctica* OERST.) gewiß ebenso interessant, wie relativ harte Kulturobjekte bieten wurden.

Die zwei hier nicht beschriebenen *Fagus*-Arten sind: *sinensis* OLIV., in Hook. Ic. pl., t. 1936. 1891 (*Angustifolia* V. SEEM., in ENGL. Bot. Jahrb. 1897, Beibl. 57, 56), China Hupch. Kuichow und *castanifolia* V. SEEM., l. c. XXIX, 285, 1900, China (ebenda).

B. über der Mitte am breitesten, hfg. zieml. länglich-verkehrt-eifg., Cupula auf eben- bis doppelt so langem Stiele (Fig. 88).

1. *F. orientalis*: Diese in den Kulturen kaum vorh. Art weicht von *sylvatica* noch ab durch: Krone schmaler, mehr pyramidal aufstrebend als ausgebreitet, Kn. und $\odot$ Zw. hfg. deutlicher beh., B. 5,5—12:3,5—6 cm, Stiel 0,5—1,8 cm, meist stärker beh., P.-Lappen der σ Bl. kürzer und breiter. Frst. wie Fig. 88.

F. o. LIPSKY, in Acta Hort. Petrop. XIV, no. 10, 56. 1897; *sylvatica* β . *macrophylla* DC. et γ . *asiatica* DC. (ex parte) Prodr. XVI, 2, 119. 1864. — Orient-B. — N.-Kl.-As., Kauk., N.-Pers. — Gebirgswälder (bis 1300 m). — Sonst vgl. *sylvatica* o. die ihr noch näher stehende *sieboldi*.

++ B. meist unter der Mitte am breitesten, hfg. etwas kerbig geschweift am Rande, Cupula-Stiel höchstens so lang wie diese.

2. *F. sieboldi*: $\varnothing$, bis 30:1,8 m, St. (n. SHIRASAWA) zylindrisch, Krone zieml. rundlich, die Winter-Zw. erinnern mehr an *F. americana* als an *sylvatica*: ihre Merkmale bedürfen aber noch sehr der Untersuchung; B. (Fig. 91 e) 5—10 (—13):3—6

Fig. 88. *Fagus orientalis*: a B., b Fr., c Nuß (Orig.)

cm. Seitennerven 7—10, jung seidig beh., Stiel 0,5—1 cm; P.-Lappen der σ Bl. kurz-eifg., Fr. vgl. Fig. 91 f—g.

Fig. 89. *Fagus sylvatica*: a Zw. mit σ und $\varnothing$ Blst.; b σ Bl.; c $\varnothing$ Trugdöldchen; d $\varnothing$ Bl.; e Querschnitt durch Frkn., die 3 Fächer mit je 2 Sa. zeigend; f Zw. mit aufgesprungenen Fr; g h reife Früchte (Bucheckern); i Fr. im Querschnitt (nach HEMPEL et WILH).

F. s. ENDL., Gen. suppl. IV, 2, 29. 1847 (*silvatica* γ . *asiatica* DC., l. c., ex parte). — Jap. (Honshu, Hokkaido). — Wälder, bis 700 m. — Blz. V. Frz. X. — Selten echt in Kultur, nur für Liebhaber von besonderem Wert.

* Sch. der Cupula pfriemlich. Seitennerven wenigstens in die B.-Zähne deutl. eintretend.

B. höchst selten deutl. gezähnt, Seitennerven 5–8, 9). Fig. 91 i–m.

† siehe S. 154.

3. *F. sylvatica*: h. bis über 40:1,5 m. St. schlank, gerade, hfg. bis zur Spitze der Krone verfolgbar, diese anfangs aufstrebend, kegelfg., später domartig abgewölbt, dicht. Rinde grau bis weißgrau, sehr selten in echte Borke übergehend (Steinbuche). Äste braungrau: Zw. jung beh., * meist kahl, glänzend oliv- o. hellgraubraun. Lent, zieml. $\sim$, aber

Fig. 90. a–e *Fagus sylvatica*: a $\odot$ Zw., b Kztr., c Kn.-Grund, d Kn.-Sch., e Zw.-Q.-Schn. (u. 6 vgl. Fig. 731). f–l *F. americana* (l. *fortis*, n. l. * Zw., * Kn., h B.-N., i wie c, k *Ostrya ostrya* (O. *carpinifolia*); k * Zw., l Kn., m B.-N., n $\odot$ Blst., o Teil davon vergrößert (Original nach C. K. SCHNEIDER).

erst an * Zw. deutlicher. Kn. vgl. Fig. 90 a–e, am Grunde leicht verjüngt. Sch. hellbraun, meist mit dunkleren Streifen gegen Mitte hin und am verdeckten Grunde grünlich, gewimpert und gegen Spitze fein-flaumig: B. meist nur schwach wellig gerandet o. entfernt klein gezähnt, an Lohden zuw. gelappt, jung beiders. dicht-seidig, später kahl, glänzend grün, nur unten achselbärtig, 4–10:1,5–2,5–7:10 cm; Herbstf. bräunlich-gelbrot, Stiel 0,8–1,3:1,8 cm, Bl. vgl. Fig. 89, Cupula 1,5–2,5 cm lang, rostbraun beh., Nuß glänzend braun, 1–1,6 cm lang, vgl. Fig. 89 g–h; Bewurzelung kräftig, aber mäßig tiefgehend. Ausschlagvermögen gering.

Von den Formen seien erwähnt: *v. a. typica* Verästelung wagrecht ausgebreitet, hierher: *f. asplenifolia* Lodd., Cat. 1839, *var. comptonii* (Petz.) et KIRCHN., Arb. Muse. 661, 1864, B. vgl. Fig. 91 m. übergehend in *f. heterophylla*

[LODD., l. c.]. B. Fig. 911. — *f. quercifolia**) [SCHELLE, H. d. D. D. G. 62. 1903]. B. wie eichenähnlich gelappt — *f. undulata* HORT. SIMON-LOUIS]. B. wie Fig. 91 k, spitz, kurz lappig-gezähnt. — *f. cristata* [LODD., l. c.], monströse $\mathfrak{h}$ -Form mit $\perp$ gebüschelten, kleinen, $\pm$ lappig gezähnten B. — *f. latifolia* [PETZ. et KIRCHN., l. c. 662]. B. bis über 15:10 cm, ganzrandig. — *f. cochleata* [DIPP., Laubh. II, 52. 1802. Wuchs ähnlich *cristata*, B. am Grunde verschmälert, ganzrandig, dann tief gezähnt löffelförmig hohl. — *f. purpurea* [ART. Hort. Kew III, 262. 1789] var. *cuprea* LODD., l. c. B-Farbe bald heller braunrot, bald schwarzrot, daher viele Handelsformen. — *f. aurea* [SCHELLE, l. c.]. B. $\pm$ gelb getönt, besonders bei der *f. zlatia* [Hort. SPÄTH] für sonnige Lage! — *f. marmorata* (fol. *argenteo-marmoratis* HORT. SPÄTH). B. $\pm$ unregelmäßig weißbunt. — *f. aureo-variegata* (fol. *aureo-variegatis* PETZ. et KIRCH., l. c. 662). B. $\perp$ unregelmäßig gelbbunt. — *f. hartigii* (fol. *striatis* DIPP., l. c.), sog. Hartigs-Buche, deren B. (nach grünen Austriebe) goldgelbe Streifen zwischen den Nerven aufweisen. — *b. pyramidalis* [PETZ. et KIRCH., l. c.] pyramidal, wachsend — *c. pendula* LODD., l. c.], Trauerbuche, hierher: *f. tortuosa* [DIPP., l. c.]. Äste gedreht, hin- und her gebogen, Zw. z. T. hängend, B. $\perp$ gebüschelt.

F. s. L., Sp. pl. 998. 1753. — Rotbuche; common b.; h. commun. — I. G. verbr., fehlt nur D. O. Preuß.; sonst noch fast ganz Eur., Nordgrenze n. WILLKOMM zwischen 56° 57' n. Br. in Schottl. über Norweg. (60° 31'), SW.-Schwed. (59° 57' 5') südöstl. Deutschl. zwischen Elbing und Königsberg schneidend) nach dem Asowschen und Schwarz. Meer, wo dann *F. orientalis* für sie eintritt; im S. von Eur. ausschließlich Gebirgsbaum. Im Allgemeinen Gebirgslagen bevorzugend und vorwiegend nur im Ostseegebiet waldbildend in der Ebene auftretend. Durch Kultur nordwärts bis 67° 56' verbreitet, dann z. T. b. In den Alpen bis etwa 1600, in den Apenninen bis 1900, am Ätna bis 2000 m hoch gehend. — Blz. mit B-Ausbruch, (IV—V, leidet htg. durch Spätfrost; Frz. X. — Laubf. XI. — Freistehend mit 40—50, im Schlusse oft erst mit 80 Jahren mannbar. — Alter im Mittel 140—160, selten bis 300 Jahre. — Nicht nur Zier- $\mathfrak{h}$ ersten Ranges, auch forstl. sehr zu schätzen, obwohl ihre Kultur in letzter Zeit zurückgegangen, da sie kein wirklich erstklassiges Nutzholz liefert. Doch sind die Meinungen über dessen Wert geteilt und er wird häufig sehr unterschätzt. Auf jeden Fall ist sie, nach HEMPEL, in Anbetracht ihrer außerordentlichen Eignung für natürl. Verjüngung durch S., ihrer höchst bescheidenen Ansprüche an das Licht und ihres unvergleichlichen Bodenbesserungsvermögens als Grundlage für die Erziehung wertvollere Nutzholzer äußerst wertvoll. Holz bes. für Wagner-, Tischler-, Drechslerarbeiten gesucht, sowie zu Bodenbelag (Holzpflaster), als Brennholz erstklassig. Sp. Gew. dufttrock. im Mittel 0,705. Färbung lichtbräunlich. Härte und Spaltbarkeit ähnlich *Quercus robur*, gleichmäßig dicht, sehr beiz- und politurfähig, reißt jedoch und schwindet und wirft sich stark. Weiteres vgl. z. B. in der Denkschrift die industrielle Verwertung des Rotbuchenholzes. Wien. 1884.

+ B. meist deutl. gezähnt, Seitennerven (9—11—14—17 Fig. 91 b—d.

4. *F. americana* (*F. ferruginea* : Im Allgemeinen *sylvatica* analog, noch abweichend durch: Kn. (ob immer? in der unteren Hälfte gleichmäßig walzig, $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{4}$ kleiner, Sch. durchaus hellgelbbraun, vgl. Fig. 90 f—i: B. derbhäutiger, unten noch glänzender, 6—15:3—9 cm: Bl. und Fr. vgl. Fig. 80 r—y.

B. a. SWEET, Hort. Brit. 370. 1820 *americana latifolia* MUENCH., Hausv. 162 1770: *sylvatica atripuncta* MARSH., Arb. am. 46. 1785: *ferruginea* ART., Hort. Kew. III, 362. 1789: *glaberrima* MOENCH., Hist. arb. am. II, 170, t. 8, 1812. — Amerikanische B.; american b.; N.-Am. (Neu-Schottl. bis Ont., Wisconsin, Florida, Texas). — Sonst vgl. *sylvatica*, welcher sie höchstens als Zier- $\mathfrak{h}$ wegen der schöneren Herbstfärbung vorzuziehen. Seit Ende des 18. Jahrh. in Kultur.

C) Nuß etwa $\frac{1}{2}$ länger als Cupula, Stiel 2—3 mal so lang wie diese. B. meist mit deutl. vorgezogener Spitze Fig. 91 a—a².

*) var. *quercoides* PERS., in Trans. Lin. Soc. V, 233. bezeichnet eine deutlich borkige Buche, hat also auf die B. keinen Bezug!

5. *F. japonica*: Habituell ähnlich *sieboldi*, aber niedriger bleibend und hfg. mehrstämmig. : Zw. kahl, rotbraun, Lent. fein, Kn. an dem mir

Fig. 91. *a-m* *Fagus*: *a* *F. japonica*: *a* B., *a*¹ Fr. und eine Cupula-Klappe, *a*² Nuß ganz und im Q.-Schn. — *b-d* *americana* (*ferruginea*) — *e-g* *sieboldi*: *e* B., *f* Cupula, *g* Nuß — *h* *dehlt* — *m* *alberti*; *k* *t. undulata*, *l* *f. heterophylla*, *m* *f. asplenifolia*, *n* *t. Castanea*; *n* *e. pumila* — *p* *t. cuneata* (caesca), *q* *f. asplenifolia*, *r* *t. dentata* (americana), *s* *pubescens*, *t* *venata* — *u* *C. tanacetifolia* (*chrysophylla* (alles knapp $\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

von Herrn SHIRASAWA gesandten Zw.-Stück bis 3 mm lang gestielt, Form wie *sylvatica*, außerdem bis 2 cm lang, lebhaft hellbraun, Sch. nur an Spitze beh., sehr fein gewimpert; B. mit etwa 11—14 (nach MAXIM. mit 8—10 vor dem Rande unbiegender Seitennerven, 6—9; 3—5 cm, oben so gut wie kahl, unten wenig heller, auch auf Fläche verstr. seidig beh., Stiel 0,4—1 cm; Frst. vgl. Fig. 91 a¹.

F. j. MAXIM., in Bull. Ac. St.-Petersbg. 1887. 101. — Japanische B. — Sonst wie *sieboldi*, bei welcher nach SHIRASAWA die Nüsse mit der Cupula fallen, wogegen diese bei *japonica* bleibt.

Gattung 17. *Castanea* MILL., Gard. Dict. ed. VII. 1759.

[Edelkastanie; chestnut; châtaignier].

Vgl. oben S. 151: meist $\bar{b}$, Rinde in kleinschuppige Borke übergehend; B. sommergrün, an Mitteltrieben $\odot$, ¹ Blst. verlängert, aufrecht, P. meist (6); $\cdot$ Blst. meist 3-blütig, am Grunde der oberen ¹ Blst., Gr. gewöhnlich 6, weißlich, Cupula groß, stachelig, (3—)4-klappig, Nuß (Kastanie) rundlich. — Etwa 5 sehr nahe verwandte, z. T. vielleicht nur geogr. Varietäten repräsentierende Arten*).

C B. von Anfang an ohne Sternhaare, Grund fast stets spitzkeilig. Unterseite wenig heller als Oberseite, vgl. Fig. 91 s.

1. *C. dentata* (*C. americana*): $\bar{b}$, bis 33:1,2 m, o. kurzstämmiger und St. bis 3,5 m dick, vgl. *C. castanea*, von der sie im Wesentlichen noch abweicht durch: $\cdot$ Zw. kahl, B.-Textur dünner, B. meist leicht geneigt, nur ganz jung oben auf Rippe und unten auf Nerven seidig beh., aber unten reich mit feinen bräunlichen Drüsenhaaren ²). 12—24—30): 4—6 cm. Herbstfärbung spät, hellgelb, Neb. etwa 5—7 mm lang; Stiel 1—1,5(—2,5) cm, kahl; Fr. reichlicher beh., 1,5—3 cm breit, deutlicher zugespitzt.

C. d. BORKH., Handb. Forstb. I, 741. 1800 (*vesca americana* MCHX., Fl. Bor. Am. II, 193. 1803, *americana* RAR., New. Fl. III, 82. 1830). — Amerikanische E.; american e.; ch. d'Amérique. — N.-Am. (von Maine und Ontario bis Michigan, Georgia, Alabama). — Liebt guten reichen Boden, geht nördlicher als *C. castanea* bei uns. — Sonst vgl. diese, der *dentata* als härter für den Norden vorzuziehen.

C C B. wenigstens auf der oft viel helleren Unterseite stets $\cdot$ bis dicht sternhaarig, vereinzelte Sternhaare bleiben stets, aber zuw. nur mit Lupe zu erkennen, B.-Grund hfg. gerundet bis herzförmig.

×× siehe
S. 159.

$\cdot$ B. unterseits meist bald $\cdot$ kahlend und hellgrün, Fr. meist zu 3—4, ihre größte Breite über 1,5 cm.

B. fast stets deutlich grob geschweift gezähnt, unterseits, auch wenn so gut wie kahl, meist viel heller, vgl. Fig. 91 p—q.

2. *C. castanea* (*C. vesca*): $\bar{b}$ — $\bar{b}$, bis über 30 m hoch, da ihre Auschlagfähigkeit sehr groß, so entstehen oft höchst malerische kurzstämmige Gestalten, andererseits stattliche $\bar{b}$, wie Fig. 93 zeigt, Borke dunkelgrau; $\cdot$ Zw. $\cdot$ rundlich kantig, olivgrün o. rotbraun, hfg. noch mit feinen Haaresten, Lent. scharf, zieml. ∞ ; $\cdot$ Zw. rundlich, schwarzgrau, Kn. vgl. Fig. 79a—d, braunrot; B. (8—10—18)

*) Die fünfte Art würde *C. mollissima* BL., in Mus. Bot. Lugd. bat. I, 286. 1850, sein, die in China (Hupeh) gefunden.

**) SARGENT sagt, daß die B. jung unten »clothed with fine cobweb-like tomentum«, was ich nie sah; auch KOEHNE gibt davon nichts an.

25): 4–6.7–8 cm: zuletzt zieml. lederig, oben sattgrün und meist kahlend, unten zuw. filzig bleibend. Neb. etwa 1.5 cm lang: Stiel 0.5–2.5 cm: Bl. vgl. Fig. 92, σ Blst. 12–30: 0.8–1.2 cm, zur Blz. sehr schön: Cupula bis faustgroß, innen hellgelb anliegend weich beh., Fr. kurz-spitzig, tiefbraun, bis 3.5 cm Dm.: Bewurzelung ausgebreitet, kräftig.

Fig. 92. *Castanea castanea* (*C. vesca*): a Stück von σ Bl.-Ähre mit noch geschlossenen Bl; b σ Bl.; c Trugdoldchen zur Bestäubungszeit; d σ dgl zur beginnenden Frz., von außen und im Querschnitt; f Frst; g–i Nuß Kastanie von verschiedenen Seiten; k dgl. im Längsschnitt (nach HEMPEL et WILHELM).

Von den wenig bedeutsamen Formen nenne ich *C. pinnatifida* LAM., Arbor. Segrez 113, t. 33 1885, B. Tracht — hängend, an *denticata* gemahnend. — *C. glauca* (Lodd., Cat. 1836), B. kahl, recht groß, derb, tiefgrün, glanzend. — *C. pinnatifida* (K. KOCH, Dendrol. II, 2, 21 1873), wenigstens obere B. untersenst weißgrau filzig bleibend, sehrzierend. — *C. asplenifolia* (Lodd., l. c.), Form wie Fig. 91 r. — *C. alberta* (Lodd., l. c.) (var. *monstrosa* DIPP., Laubh. II, 55, 1892), B. kleiner, ta regelmäßig eingeschnitten, in der Mitte hohl o. blasig aufgetrieben. — *C. asperata* — *variegata*, var. *f. l. aculeosvariegata* PEIZ. et KIRCH., Arb. Musc. 665, 1864, B. weißbunt. — *C. f. maculata* var. *f. l. aurea*, P. et K., l. c. B. gelbbunt.

C. c. KARST., Pharm. bot. 495. 1882 (*Fagus cast.* L., Sp. pl. 997. 1753; *C. sativa* MILL., Gard. Diet. ed. VII, No. 1. 1459, *C. vulgata* LAM., Encycl. I, 508. 1783; *C. vesca* GAERTN., De fruct. I, 181. 1788. — Europäische E; spanish oakle c.; c. commun ou maronnier. — L. G. wild nur Öst. Tirol, Ung. und Südgrenze, Sch. ital. Schweiz; sonst noch durch ganz S.-Eur., N.-Af., Or. bis Persien Ebene und Gebirge, im S. bis 1600 m. — In tiefgründigem frischem, doch nicht nassem Boden. — Laubaussbruch V, Blz. Ende V) VI–VII — Frz. X–XI. — Laubf. X–XI. — Freistehend mit 20–30., im Schlusse mit 10–60 Jahre mannbar, Lohden hfg. sehr früh. — Alter oft 4–500–1000 Jahre. — Bis etwa Prov. IV hart, sonst hfg. nur b. — Forstlich innerhalb des Heimatsgebietes sehr geschätzt, da rasch wachsend und gutes Nutzholz liefernd, ohne zu hohe Ansprüche zu stellen: Niederwaldbetrieb fast noch günstiger als Hochwaldbetrieb. — Holz gleich *Quercus*

ringporig, aber Mk.-Strahlen sämtlich undeutlich, Kern dunkler, spez. Gew. lufttrocken, im Mittel 0,66, äußerst dauerhaft und zeitig verwendbar, gutes Bau- und Werkholz, als Brennholz minderwertig, aber gute Holzkohle gebend, sehr gerbstoffhaltig. — Fr. bes. im S. viel gegessen (bes. große sog. „Maronen“, als beste gelten die „Marons de Lyon“), auch zur Schweinemast.

Fig. 93. *Castanea castanea* (C. vespa). Habitusbild eines alten h im Winter. (Orig. n. C. K. SCHNEIDER).

— B.-Zähne meist nur auf die Grauen beschränkt, B. unten bfg kaum heller.

3. *C. pubinervis* (*C. crenata*): Diese in Kultur kaum echt vorh. Art steht *C. castanea* äußerst nahe, die B. sind im Mittel kleiner, vgl. Fig. 91t und meist spitzer, die Fr. zuw. noch etwas größer.

C. pubinervis (*Fagus castanea* THIBG., Fl. jap. 195. 1784, non L.; *C. vesca* BL., Bijdr. Fl. Ned. Ind. 524. 1825, non GAERTN.; *vesca* β . *pubinervis* HASSK., Cat. Alt. Hort. Bog. 73. 1844, nom. nud. fide SARGENT [et SIEB. et ZUCC., Abh. Ak. Münch. IV, Teil III. 224. 1846]; *crenata* et *strata* S. et Z., l. c.; *japonica* BL., Mus. Lugd. Bat. I. 284. 1850; *castanea* var. *pubinervis* SARG., Silva IX. 9. 1896. Japanische E. - Jap. (Hokkaido, Shikoku, Honshu) Zentr.-China (Hupch). Wie *castanea*, doch wegen ihrer viel früher eintretenden Fruchtbarkeit kulturell mehr geschätzt, deshalb auch nach N.-Am. importiert. In Heimat $\sim$ Kulturformen.

σ - B. (Fig. 91 n - o) unterseits bleibend weißgrau sternfilzig. Fr. meist einzeln, höchstens 1,2—1,5 cm im Dm.

4. *C. pumila*: meist b., selten σ , bis 16 m. mit kurzem, bis 0,90 m dickem St., Zw. jung dicht. σ locker beh., rotbraun. Kn. spitzer als bei *castanea*. σ beh.: B. oben bald stark kahrend. 9—15:3—6 cm, Zähne hfg. nur auf die Grannen beschränkt, welche kürzer und derber als bei *pubinervis*; Stiel 0,5—1,2 cm; Neb. etwa 7 mm lang; Cupula bis 4 cm Dm., Fr. sehr süß.

C. p. MILL., Gard. Diet. ed. VIII, No. 2. 1768 (*Fagus p.* L., Sp. pl. 998. 1753). Zwerg-E.; chinquapin. N.-Am. (New-Jersey und Pennsylv. bis Indiana, Florida, Texas). In trockenen Boden - Blz. VI. Frz. IX. - Bis Prov. IV harter, hübscher Zier- σ . SMALL trennt *C. nana* MUEHL., Cat. 86. 1813, als niedrigen σ mit unterirdischem Stamm ab. Georgia, Flor., Louisiana.

Fig. 94. *Castanopsis chrysophylla*: a Zw. mit Blst.; b unterer Teil eines Blst. mit σ und σ (σ) Trugdöldchen; c σ , d σ Bl.; e Gyn.; f Frst.; g Nuß, h dgl. im Längsschnitt, i S. (nach SARGENT).

Gattung 18. *Castanopsis* SPACH, Hist. vég. XI. 185. 1842.

Vgl. oben S. 151 und Art. Etwa 25 Arten, meist im trop. As.

C. chrysophylla: b. σ , bis 30 σ zuw. bis 50:3 m. Borke dunkelbraun, tiefrissig, dickschuppig; Zw. jung gleich B. beh., σ kahrend, rotbraun. Endkn. bis 1-0,8 cm, locker beschuppt, σ beh., Seitenkn. kaum halb so groß. B. (Fig. 91 n) zuletzt dicklederig, oberseits glänzend grün, 6—18:1,5—6 cm; Stiele 0,5—1 cm; Bl. zuw. 3-fächrig; Fr.-Reife 2jährig.

C. ch. A. DC., in Jour. Bot. 1893. 182 (*Castanea ch.* HOOK., Flor. Bor.-Am. II. 159. 1839). Kalifornien, Oreg. Am. schönsten in feuchten Tälern der N.-

Küste. Berents seit 1847 in Engl. in Kultur, bei uns nur für Prov. VI–VII ratsam.

Gattung 19. *Pasania* OERST., in Kjoeb. Vidensk. Medd. 1866, 81 (sensu PRANTL).

(*Quercus*, Sekt. *Pasania* MIQ., Fl. Ind. bat. I, 480. 1855.)

Vgl. oben S. 151. B. immergrün, ganzrandig, o. gezähnt: ♂ Bl. meist in dichasischen Gruppen an aufrechten Kätzchen, Stbf. die Blh. weit überragend; Frkn.-Rudiment vorh., beh.; ♀ Bl. einzeln o. zu 3–5 an besonderen Kätzchen o. häufiger am Grunde der vorderen oberwärts ♂ Blst., jede mit besonderem Fr.-Becher, der die Fr. weit umgibt; Gr. steif zylindrisch mit punktförmig. N.; Fr.-Reife 2-jährig; abortierte Sa. im oberen Teile der Fr. — Etwa 100 trop. o. subtrop., vorwiegend südostasiatische Arten, die für uns so gut wie nicht in Betracht kommen.

Sekt. a. *Chlamydobalanus* ENDL., Gen. suppl. 4 part. 2, 28. 1847. — Bl. einzeln, Fr. von Cupula ganz umschlossen, diese mit freien (o. meist in Zonen verwachsenen) Sch.

1. *P. cuspidata* L.: ♂, bis 30:1,5 m, Rinde lange glatt, an alten St. längs-rissige Borke, junge Zw. fein schuppenhaarig, Kn. beh., Bl.-Kn. größer, eiförmlich; B. ganzrandig o. wie Fig. 108 c, 4–9:1,4–3,5 cm, oben glänzend tiefgrün, nur jung spärlich beh., unten braunlichgelb, Beh. nicht leicht zu erkennen, Papillen fehl., aber Sp. sehr tiefliegend, so daß man an sehr dünnen Schnitten nur den darüber lagernden (Harz-?) Tropfen sieht; Seitennerven 8–14, wenig deutl., Stiel 0,6–1,2 cm; Bl. und Fr. vgl. Fig. 101 n–s, Cupula fein gelbgrau filzig, Eichel rotbraun.

P. c. OERST., l. c. (*Quercus cuspidata* THBG., Fl. jap. 176. 1784). — Jap. (Kinshiu, Hondo). — Wälder bildend, hfg. um Tempel gepflanzt. — Blz. VI. — Frz. XI. — Mir aus Freilandkultur unbekannt, höchstens für Prov. VI (Küstenklima) zu empfehlen.

Sekt. b. *Eupasania* PRANTL., in Nat.-Pfl. III, 1, 55. 1889 (ex parte), ♀ Bl. zu 3–5 gebüschelt. Cupula napfförmig, Sch. wie bei *Quercus* o. zuw. verwachsen.

2. *P. glabra*: von Grund aus mehrstämmiger ♂ o. ♂, bis 10:0,9 m, Rinde auch bei alten ♂ fast glatt, Zw. kahl; B. vgl. Fig. 95, 5–12:2–4 cm, oben glänzend tiefgrün, kahl, unten gelbgrau, dicht papillös (und dazwischen mit nur unter dem Mikro-

Fig. 95. *Pasania* (*Quercus*) *glabra*: a B., b ♂ Bl., c Stb., d ♀ Bl., e Frst. (Original).

skop deutl. feinen einzelligen knieförmig gebogenen Haaren, Sp. sehr tiefliegend, o. Seitennerven deutl. 6–12, Textur sehr dickledrig; Stiel 0,8–2 cm; Bl. und Fr. siehe Fig. 95.

*) Vgl. bei *Quercus* die B.-Bestimmungstabelle.

**) Die *Pasania*-Arten und auch z. T. *Quercus* bieten in der B.-Anatomie eine Fülle guter Merkmale, die bisher erst sehr unvollkommen untersucht und noch fast gar nicht systematisch verwertet sind. Allerdings muß man sich hüten, aus einzelnen Beobachtungen allgemeine Schlüsse zu ziehen. Nur eine monographische Behandlung der Gattung kann zeigen, was von all Dem für schnelle Bestimmung wirklich brauchbar ist.

Verlag von **GUSTAV FISCHER** in JENA.

Bau und Leben unserer Waldbäume. Von Dr. M. Büsgen, Prof. an der Grossh. Sächs. Forstlehranstalt in Eisenach. Mit 100 Abbildungen. 1897. Preis: 6 Mark.

Der Honigtau. Biologische Studien an Pflanzen und Pflanzenläusen. Von Dr. M. Büsgen, Prof. an der Grossh. Sächs. Forstlehranstalt in Eisenach. Mit 2 lithogr. Tafeln. 1891. Preis: 3 Mark.

Die Farnkräuter der Erde. Beschreibende Darstellung der Geschlechter und wichtigeren Arten der Farnepflanzen mit besonderer Berücksichtigung der Exotischen. Von Dr. H. Christ, Basel. Mit 291 Abbildungen. 1897. Preis: 12 Mark.

Die Farngattung Niphobolus. Eine Monographie. Von Dr. K. Giesenhagen, Prof. der Botanik in München. Mit 20 Abbildungen. 1901. Preis: 5 Mark 50 Pf.

Organographie der Pflanzen insbesondere der **Archegoniaten und Samenpflanzen.** Erster Teil: **Allgemeine Organographie.** Von Dr. K. Goebel, Prof. an der Universität München. Mit 130 Abbildungen im Text. 1898. Preis: 6 Mark.

——— Zweiter Teil: **Specielle Organographie.** 1. Heft: Bryophyten. Mit 128 Abbildungen im Text. 1898. Preis: 3 Mark 80 Pf. 2. Heft: Pteridophyten und Samenpflanzen. Erster Teil. Mit 173 Abbildungen im Text. 1900. Preis: 7 Mark. Zweiter Teil (Schluss des Ganzen). Mit 107 Textabbildungen. 1901. Preis: 5 Mark.

Soeben erschien:

Vorlesungen über Pflanzenphysiologie. Von Dr. Ludwig Jost, a. o. Prof. an der Universität Strassburg. Mit 172 Abbildungen. Preis: brosch. 13 Mark, geb. 15 Mark.

Lehrbuch der Pharmakognosie des Pflanzenreiches. Für Hochschulen und zum Selbstunterricht. Mit Rücksicht auf das neue Deutsche Arzneibuch. Von Dr. George Karsten, a. o. Prof. der Botanik an der Universität Bonn. Mit 528 Abbildungen im Text. 1903. Preis: 6 Mark, geb. 7 Mark.

Willkürliche Entwicklungsänderungen bei Pflanzen. Ein Beitrag zur Physiologie der Entwicklung. Von Dr. Georg Klebs, Prof. in Halle. Mit 28 Abbildungen im Text. 1903. Preis: 4 Mark.

Grundriss einer Histochemie der pflanzlichen Genussmittel. Von Dr. Hans Molisch, Prof. der Botanik und Vorstand des pflanzenphysiologischen Instituts der Univ. Prag. Mit 15 Holzschnitten. Preis: 2 Mark.

Untersuchungen über das Erfrieren der Pflanzen. Von Dr. Hans Molisch, Prof. der Botanik und Vorstand des pflanzenphysiologischen Instituts der Univ. Prag. Mit 11 Holzschnitten im Text. 1897. Preis: 2 Mark 50 Pf.

Die Pflanze in ihren Beziehungen zum Eisen. Eine physiologische Studie. Von Dr. Hans Molisch, Prof. der Botanik und Vorstand des pflanzenphysiologischen Instituts der Univ. Prag. Mit einer Tafel. Preis: 3 Mark.

Botanische Zeitung, 1892, S. 647.

„Die Arbeit ist durch die Genauigkeit und Kritik ihrer Methoden, die Vorsicht in der Deutung der Tatsachen und den Reichtum an neuen Beobachtungen gleich ausgezeichnet und verdient wohl zu den besten gerechnet zu werden, die die Pflanzenphysiologie in neuerer Zeit aufzuweisen gehabt hat.“

Studien über den Milchsaft und Schleimsaft der Pflanzen. Von Prof. Dr. Hans Molisch, Prof. der Botanik und Vorstand des pflanzenphysiologischen Instituts der deutschen Universität Prag. Mit 33 Holzschnitten im Text. 1900. Preis: 4 Mark.

Verlag von GUSTAV FISCHER in JENA.

Soeben wurde vollständig die erste Reihe von:

Vegetationsbilder. Von Dr. G. Karsten, Prof. an der Universität Bonn, und Dr. H. Schenck, Prof. an der technischen Hochschule Darmstadt.

Unter dem Namen „Vegetationsbilder“ erscheint hier eine Sammlung von Lichtdrucken, die nach sorgfältig ausgewählten photographischen Vegetationsaufnahmen hergestellt sind. Verschiedenartige Pflanzenformationen und Genossenschaften möglichst aller Teile der Erdoberfläche in ihrer Eigenart zu erfassen, charakteristische Gewächse, welche der Vegetation ihrer Heimat ein besonderes Gepräge verleihen, und wichtige ausländische Kulturpflanzen in guter Darstellung wiederzugeben, ist die Aufgabe, welche die Herausgeber sich gestellt haben.

Der Preis für das Heft von 6 Tafeln ist auf 2,50 Mark festgesetzt worden unter der Voraussetzung, dass alle Lieferungen bezogen werden. Einzelne Hefte werden mit 4 Mark berechnet.

Die erste Reihe bilden folgende Hefte:

Heft 1. Tafel 1—6. Südbrasilien.	Heft 6. Taf. 31—36. Monokotylenbäume.
Heft 2. „ 7—12. Malayischer Archipel.	Heft 7. „ 37—42. Strandvegetation Brasilens.
Heft 3. „ 13—18. Trop. Nutzpflanzen.	Heft 8. „ 43—48. Mexikan. Cacteen, Agaven- und Bromeliaceen-Vegetation
Heft 4. „ 19—24. Mexikan. Wald und Tropen u. Subtropen.	
Heft 5. „ 25—30. Südwest-Afrika.	

Beiträge zur Lehre von der Fortpflanzung der Gewächse. Von Prof.

Dr. M. Möbius in Frankfurt a. M. Mit 36 Abbildungen im Text. 1897. Preis: 4 Mark 50 Pf.

Die Reizleitung und die reizleitenden Strukturen bei den Pflanzen.

Von Dr. B. Němec, Privatdocent der Botanik an der K. K. böhmischen Univ. in Prag. Mit 3 Tafeln und 10 Abbildungen im Text. 1901. Preis: 7 Mark.

Pflanzengeographie auf physiologischer Grundlage. Von Dr. A. F.

W. Schimper, a. o. Prof. an der Univ. Bonn. Mit 502 als Tafeln oder in den Text gedruckten Abbildungen in Autotypie, 5 Tafeln in Lichtdruck und 4 geographischen Karten. 1898. Preis: brosch. 27 Mark, eleg. in Halbfranz geb. 30 Mark

Das botanische Praktikum. Anleitung zum Selbststudium der mikroskopischen

Botanik für Anfänger und Geübtere, zugleich ein Handbuch der mikroskopischen Technik, von Prof. Dr. Eduard Strasburger. Vierte umgearbeitete Auflage. Mit 230 Holzschnitten. 1902. Preis: 20 Mark, geb. 22 Mark 50 Pf.

Soeben erschien:

Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. Von Dr. Eduard Strasburger,

a. o. Prof. an der Universität Bonn, Dr. Fritz Noll, Prof. a. d. Landw. Akad. Poppelsdorf, a. o. Prof. an der Univ. Bonn, Dr. Heinrich Schenck, Prof. an der technischen Hochschule Darmstadt, Dr. George Karsten, a. o. Prof. an der Univ. Bonn. Sechste, umgearbeitete Auflage. Mit 741 zum Teil farbigen Abbildungen. Preis: brosch. 7 Mark 50 Pf., geb. 8 Mark 50 Pf.

Naturwissenschaftliche Wochenschrift einschliesslich der Zeitschrift „Die

Natur“ (Halle a. S.) seit 1. April 1902. „Organ der deutschen Gesellschaft für volkstümliche Naturkunde in Berlin.“ Herausgegeben von Prof. Dr. H. Potonié und Oberlehrer Dr. F. Koerber in Grosslichterfelde-W. bei Berlin. Preis: vierteljährlich 1 Mark 50 Pf.

Trotz des reichen Inhalts der Zeitschrift ist der Preis so billig angesetzt worden, um jeden zu ermöglichen, eine naturwissenschaftliche Zeitschrift selbst zu halten. Probenummern sind durch jede Buchhandlung oder von der Verlagsbuchhandlung unentgeltlich zu beziehen.

Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde.

Charakteristik der in Mitteleuropa heimischen und im Freien angepflanzten angiospermen Gehölz-Arten und Formen mit Ausschluß der Bambuseen und Kakteen.

Von

Camillo Karl Schneider.

Mit 102 Abbildungen im Text.

Zweite Lieferung.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.
1904.

Abgeschlossen am 1. September 1904.

Die Ausgabe erfolgt in Lieferungen zum Preise von je 4 Mark.

Lieferung 1 erschien am 1. Juni 1904.

Handbuch der Laubholzkunde. Charakteristik der in Mitteleuropa heimischen und im Freien angepflanzten angiospermen Gehölzarten und Formen mit Ausschluß der Bambuseen und Kakteen. Von Camillo Karl Schneider. Erste Lieferung. Mit 95 Abbildungen im Text. Vollständig in etwa 9 Lieferungen. Die Ausgabe erfolgt in Lieferungen von je 4 Mark.

Die Gartenwelt, vom 10. September 1904:

. . . . Diese wenigen Proben mögen zeigen, für wie wichtig ich das Studium dieses wertvollen Werkes halte, wie reichhaltig und wie sorgfältig gearbeitet dasselbe ist. Das Werk ist jedem, der mit Gehölzkunde irgendwie zu tun hat, nur bestens zu empfehlen. Kein Gehölzzüchter, kein Landschaftsgärtner, auch kein Botaniker kann dieses Buch entbehren, das auch durch seine vortrefflichen Bestimmungstabellen gleich wertvoll ist für den Meister wie für den Gesellen, besonders für den Lernenden.

Papier und Druck sind gut; der Preis von 40 Pfg. für einen Bogen ist mäßig zu nennen. Möge daher das vortreffliche Buch weiteste Verbreitung finden.

Dr. Masters in Lardeners Chronicle, 13. Aug. 1904.

Under the title of Handbuch der Laubholzkunde Mr. Camillo Karl Schneider has published the first part of a full descriptive catalogue of the trees and strubs native to, or cultivated in, the open air in Central Europe together with the Bambuseae and the Cactaceae. It is in the german language; with very numerous contractions and symbols which make it rather irksome to consult. The necessity for economising space has rendered this condensation unavoidable, as may be judged from the circumstance that no fewer than sixty-two species of Willow (*Salix*) and twenty-three of Poplar (*Populus*) are enumerated, together with varieties and hybrids. The value of the book is largely increased by the very numerous illustrations, which will be of great service in facilitating the determination of the species even in the absence of Coriaces. The part before us contains the Salicaceae, Myricaceae, Juglandaceae, Betulaceae (in which *Corylus* is included), Fagaceae, including *Castanea* and *Parasema*;

folgt nun eine Besprechung nomenklatorischer Einzelheiten mit Hinweis auf den »Vann. Congreß 1905, dann Schluß:

In any case, there is every reason to praise the thoroughness of the work before us, which may be had from Williams & Norgate or other foreign bookseller.

Dendrologische Winterstudien. Grundlegende Vorarbeiten für eine eingehende Beschreibung der Unterscheidungsmerkmale der in Mitteleuropa einheimischen und angepflanzten sommergrünen Gehölze im blattlosen Zustand. Von Camillo Karl Schneider. Mit 224 Textabbildungen. 1903. Preis: 7 Mark 50 Pf.

Gartenkunst, Bd. V, Nr. 6:

. . . So wird das Werk, dessen Preis bei der schonen Ausstattung ein mäßiger ist, dazu dienen, immer mehr in die Schönheiten der Natur einzudringen und unsere Liebe immer mehr kennen und schätzen zu lernen, dem Dendrologen und allen denen, die sich mit der Gehölzzucht und der Verschönerung dieser Erde durch Baum und Strauch befassen, wird es zum unentbehrlichen und anregenden Hilfsmittel werden.

Wiener Illustr. Garten-Ztg., VII, 1903, Juli:

Das vorliegende Werk, welches von seinem geschätzten Autor in bescheidener Weise nur als eine grundlegende Vorarbeit bezeichnet wird, muß als eine sehr wertvolle, für den Mann der Wissenschaft wie auch für den Gärtner hochwichtige und interessante Arbeit bezeichnet werden. . . . Nachdem es aber gerade für den intelligenten Gärtner notwendig ist, die Unterscheidungsmerkmale der von ihm gepflegten Gehölze zu kennen, so sind wir dem wertigen Autor für seine „dendrologischen Winterstudien“ zum größten Danke verpflichtet, da er sich nicht mit der Schilderung gewisser Gattungen und Arten beschränkt, sondern mit 434 Arten von 235 Gattungen, der wichtigsten unserer heute kultivierten laubwerdenden Gehölze ausdehnt. . . .

Der praktische Ratgeber im Obst- und Gartenbau Nr. 32 vom 3. August 1903:

Das Buch ist eine flüssige, von vielen guten Abbildungen begleitete Arbeit; es will ein später herauszugebendes Gehölzhandbuch vorbereiten. Die Unterscheidungsmerkmale der Gehölze im winterlichen Zustande waren bisher noch nicht bearbeitet; das Buch wird daher der Wissenschaft wie auch der Praxis in gleicher Weise willkommen sein.

P. g. OERST., l. c. (*Quercus glabra* THBG., Fl. jap. 175. 1784). — Jap. — Subtropisches Gebiet. — Sonst wie *cuspidata*.

Sekt. c. *Androgynæ* A. DC., Prodr. XVI. 2. 81. 1864. Wie Sekt. b, aber Cupula wie Fig. 96 g.

3. *P. densiflora*: $\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{2}$, bis 30:0,3 m, freistehend breitkronig, Borke tiefrissig, Zw. jung dicht gelbbraun büschelfilzig, Filz erst an $\odot$ verschwindend, diese dann $\pm$ rotbraun; B. vgl. Fig. 96, seltener ganzrandig, jung beiders. büschelfilzig und drüsig gewimpert, später oben grün, $\pm$ kahlend, unten graublau, mit abwischbarem Filz und papillös, Textur sehr derb, Seitenerven oben deutl. vertieft, unten scharf, etwa 12–18; Bl. und Fr. wie Fig. 96.

P. d. OERST., l. c. 83 (*Quercus dens.* HOOK. et ARN., Bot. Voy. Beechey 391. 1849). — Dichtblütige P.; bark or chestnut oak. — S.-Oreg., Kalif. und längs der

Fig. 96. *Pasania* (*Quercus*) *densiflora*: a B., b σ Bl. von oben ohne A., c Stb., d β Bl. im L.-Schn. (α = Sa., β = P., γ = N., δ = Cupula-Sch.), e Fr., f Eichel, g Cupula (Original).

westl. Sierra Nevada; bis fast 1500 m. Besonders in der feuchten Küstenregion. Wohl noch nicht eingeführt, vgl. *cuspidata*. Schöne, interessante Art!

Gattung 20. *Quercus* L., Sp. pl. 994. 1753. [Eiche; oak; chêne.]

Vgl. oben S. 151; Kn. und B. hfg. an den Zw.-Enden gedrängt. B. selten ganzrandig, hfg. fiederspaltig, meist sommergrün, γ Bl. einzeln in hängenden, fädigen Kätzchen aus den oberen Kn. vorjähr. Zw. P. (6–8), Stb. 6–12, Stbf. die P. kaum überragend, Frkn.-Rudiment meist fehl.; γ Bl. einzeln an besonderen, meist armblütigen Blst. Gr. flach, oberseits die N. tragend; Cupula stets napförmig, Sch. selten in Zonen verwachsen, Fr.-Reife im 1. o. 2. Jahre, abortierte Sa. im oberen o. unteren, selten in mittl. Teile der Fr., Cot. bei Keimung nicht über die Erde tretend. Die Eichen zählen teilweise zu den allerbesten Nutzhölzern. Jedenfalls gibt es sonst nur wenige, die man *Quercus robur*, *sessilis* o. *alba* an die Seite stellen kann. Ihr Holz sei kurz gekennzeichnet wie folgt: Gefäße auf Querschnitt ringporig, d. h. an der Innengrenze der Jahresringe bedeutend größer; einzelne Mk.-Strahlen sehr breit u. deutl., die übrigen äußerst fein und schwer erkennbar; Kernholz bräunlich, Splint meist heller; sonst schwer, dicht, sehr zäh, elastisch, dauerhaft, gerbsäurehaltig. Näheres bei den Hauptarten. Rinde zuw. ausgezeichnetes Gerbmateriale liefernd o. auch Kork. Fr. z. T. essbar o. nach entsprechender Behandlung zu Eichelkaffee verwertet; Fr.-Becher einiger Arten ebenfalls als Gerbmateriale brauchbar, im Handel als sog. Wallonen o. Knoppern, unter letzteren

versteht man eigentlich durch Gallwespen deformierte Fr.-Becher. Über 200 gute Arten*); fehlt nur in Zentr.- u. S.-Af., S.-Am., Austr. und auf den Inseln des pacif. Ozeans.

Bestimmungstabelle für die Arten(!) nach ausgewachsenen (Sommer-) Blättern**).

- 1a. B. sommergrün, Textur — häutig, bei einigen Arten zuletzt derbhäutig, aber nicht eigentlich lederig. Man vgl. eventuell unter 1b. Die B.-Gestalt unter 1a sehr variabel; die später nicht bes. erwähnten Seitennerven 2. und 3. Ordnung (das feinere Adernetz) sind — so weit nicht durch Beh. verdeckt — gut zu erkennen. 2.
- 1b. B. immer- (o. wenigstens hfg. winter-) grün, Textur ± deutl. lederig, das feinere Adernetz meist nicht o. nur schwer erkennbar; Rand ganzrandig, gezähnt (meist stachelig) o. kurz gelappt, nie tief gelappt o. fiederteilig. 29.
- 2a. B. durchaus ganzrandig, weidenähnlich o. elliptisch-lanzettlich, stachelspitzig. 3.
- 2b. B. nie ganzrandig. 4.
- 3a. B. durchaus kahlend o. wenigstens unters. nie auf Fläche beh. bleibend, nur + auf Nerven beh. o. achselbärtig: 1. *phellos* (Fig. 97a—b) o. 4. *laurifolia* (Fig. 98c—e) o. eventuell Form von 5. *nigra* (Fig. 99a, c).
- 3b. B. unters. auf Fläche ± bleibend beh.: 2. *brevifolia* (Fig. 98a) o. 3. *imbri- caria* (Fig. 98b).
- 4a. B. ohne Buchtnerven*); Seitennerven 6–18 (zuw. mehr), in scharfe Säge- zähne o. kurze Lappen endigend. 5.
- 4b. B. wenigstens im unteren Teile mit einigen Buchtnerven, meist bis zur Mitte o. tiefer gelappt, Lappennerven hfg. 5 o. weniger. 16.
- 5a. B. einfach (o. z. T. doppelt) gesägt, Zähne in feine scharfe Grannenspitzen auslaufend. 6.
- 5b. B. lappig gezähnt o. kurz gelappt, Lappen höchstens knorpelspitzig (zuw. drüsig), nicht stechend. 7.
- 6a. Zahl der Zahnspitzen gleich der der Seitennerven: 17. *serrata* (Fig. 108d) o. 19. *libani* (Fig. 108f).
- 6b. Zahl der Zahnspitzen größer als die der Seitennerven: 20. *macedonica* (Fig. 117a) o. 35. *pontica* (Fig. 102i).
- 7a. B.-Stiel nur 0,1–0,4 (—0,5) cm. 8.
- 7b. B.-Stiel stets über 0,5 cm lang. 9.
- 8a. B. unters. ± büschelhaarig†)-filzig: 62. *dentata* (Fig. 133).
- 8b. B. unters. — kahl o. ohne Büschelhaare o. mit Seiden- und Büschelhaaren: 60. *mongolica* (Fig. 126i) o. 61. *grosseserrata* (Fig. 108p).
- 9a. In der Beh. einfache anliegende Seidenhaare vorherrschend, diese ver- decken an jüngeren B. die (zuw. vielleicht fehl.) Büschelhaare mitunter ganz: 59. *glandulifera* (Fig. 108o).

*) Trotzdem seit DE CANDOLLE (in Prodr. XVI, 2, 1. 1864) manche größere Arbeiten über Eichen erschienen sind, fehlt eine wirklich erschöpfende Bearbeitung, denn solche Übersichten, wie sie etwa WENZIG, in Jahrb. Bot. Gart. Berlin III, 175. 1884 und IV, 179. 1886 gibt, kann man nicht ernst nehmen. Eine Monographie mußte in erster Linie neben den Fr. die Bl. berücksichtigen und die anatom. Verhältnisse der B. Wenn ich auch in Vielem mich an OERSTED, in Vidensk. Meddel. 1866, 11. anschleße, so kann ich ihm doch aus Gründen, deren Angabe hier zu weit führen würde, im Ein- zelnen, zumal der Gliederung von *Lepidobalanus*, nicht folgen. Im Rahmen meiner Über- sicht, die ja nur einen Bruchteil der Arten umfaßt, war es unmöglich, neue Grundzüge zur Darstellung zu bringen.

** Hier sind auch die 3 Pasanien mit einbegriffen. Natürlich bietet solche Tabelle keinen Anspruch auf absolute Sicherheit, sie soll nur ein annäherndes Bestimmen gewahr- leisten. Sie wurde in etwas anderer Form bereits in Gartenwelt IV, 544. 1903 von mir publiziert.

***) Als solche bezeichne ich alle Seitennerven, die von der Rippe nicht in Zähne o. Lappen auslaufen, sondern zwischen den Lappen in den Buchten endigen, man ver- wechsele sie aber nicht mit von den Lappennerven seitlich abzweigenden Seitennerven 2. Ordnung. Wenn ich sage: das B. hat so und so viel Seitennerven, so meine ich natür- lich Nervenpaare, ebenso bei Lappen! Der Ausdruck „Lappennerven“ (hfg. identisch mit Seitennerven) ist nach dem Gesagten wohl verständlich.

†) Ich ziehe für die mehrstrahligen Haare der *Quercus* den Namen Büschel- haare vor, man kann sie auch als Sternhaare bezeichnen, doch paßt dieser Name besser für Haare, wie sie etwa *Deutzia* etc. zeigt.

- 9b. Beh. aus (zuw. nur mit Lupe nachweisbaren) Büschelhaaren bestehend: einfache Haare, wenn überhaupt vorh., nie auffällig. 10.
- 10a. Seitennerven nicht o. sehr selten über sieben. 11.
- 10b. Seitennerven über sieben. 12.
- 11a. B. nicht über 6 cm lang: 33. *lusitanica* (Fig. 108h).
- 11b. B. im Mittel nicht unter 7 cm lang: 45. *pseudoturneri* (Fig. 126 g—h) o. 55. *prinoides* (Fig. 126 k); vgl. auch eventuell 18. *castaneaefolia* (Fig. 108 e).
- 12a. B. auch unters. stark kahlend, grünl. o. zuw. leicht bläul.-weiß bereift. 13.
- 12b. B. unters. auf Fläche bleibend $\pm$ filzig. 14.
- 13a. B. nicht über 8 cm lang: 34. *Q. veneris* (Fig. 120 a—d).
- 13b. B. im Mittel über 8 cm lang: 36. *mirbeckii* (Fig. 108 i) o. 57. *pinus* (Fig. 132 a—b).
- 14a. Neb. meist bleibend: 18. *castaneaefolia* (Fig. 108 e) o. 37. *macranthera* (Fig. 108 v).
- 14b. Neb. abfällig. 15.
- 15a. Lappenzähne spitz, etwas drüsig o. leicht stechend: 56. *acuminata* (Fig. 108 n) o. eventuell 33. *lusitanica* (Fig. 108 h).
- 15b. Lappenzähne rundlich, nicht drüsig: 57. *pinus* (Fig. 132) o. 58. *mahanova* (Fig. 108 s).
- 16a. Lappen meist deutl. gerundet, niemals grannenzähnig, wenn etwas stachel o. lang knorpelzähnig, dann etwa wie Fig. 108 m o. Fig. 110 a. 17.
- 16b. Lappung meist spitzzähnig, wenigstens stets mit aufgesetzter Grannenspitze, fehlt diese, dann B. wie Fig. 100 a. 27.
- 17a. B. (ausgewachsen!) durchaus kahl, o. wenn unten mit einigen verstr. Zottenhaaren an den Nerven und feinen Achselbärten so doch Stiel kahl und nie bleibende Neb. vorh. 18.
- 17b. B. (wenigstens unters.) bleibend dicht o. verstr. (zuw. nur mit Lupe erkennbar!) beh., wenn Stiel kahl, so B. unters. immer mit feinen Büschelhaaren. 19.
- 18a. B.-Stiel 0,2—1 cm, kürzer als der halbe B.-Grund breit: 43. *robur* (Fig. 124); vgl. eventuell auch *alba* (siehe 18 b).
- 18b. B.-Stiel länger, 1—3 cm: 42. *sessilis* (Fig. 102 b, c) o. 49. *alba* (Fig. 130).
- 19a. B. auch oben auf der Fläche $\pm$ bleibend beh. 20.
- 19b. B. oben ganz kahlend, höchstens auf Rippe einige Haare. 21.
- 20a. B.-Lappen lang stachel- o. knorpelspitzig: 21. *ehrenbergii* (Fig. 108 l) o. 22. *aegilops* (Fig. 108 m).
- 20b. B.-Lappen tief, am Ende gerundet o. höchstens schwach knorpelspitzig: 39. *toza* (Fig. 108 k); vgl. eventuell auch 48. *lobata*, 51. *gambelii*, 52. *garryana*, 54. *douglasii*.
- 21a. B.-Stiel 0,2—0,4(—1) cm, gewöhnlich nicht länger als halber B.-Grund breit: 38. *Q. conferta* (Fig. 121) o. 44. *haas* (Fig. 113 a).
- 21b. B.-Stiel (0,5—)1—3 cm, länger als halber B.-Grund breit. 22.
- 22a. B. im Mittel nicht über 6—8, selten bis 10 cm lang. 23.
- 22b. B. im Mittel über 10 cm lang. 24.
- 23a. Hauptlappen meist charakteristisch parallel abgestutzt, vgl. Fig. 102 a: 48. *lobata*.
- 23b. Lappung unregelmäßig variabel: 40. *lanuginosa* (Fig. 122) o. *dachorochensis* (Fig. 108 n); vgl. eventuell auch 45. *pseudoturneri* (Fig. 126 g—h) o. 54. *douglasii*.
- 24a. Lappen meist 6 o. mehr, nicht o. kaum bis zur Mitte der halben Spreite gehend, Buchten gewöhnlich schmal. 25.
- 24b. Lappen meist nur 3—5, alle o., wenn mehr, wenigstens mittlere bis fast zur Rippe gehend, Buchten weit. 26.
- 25a. Neb. bleibend: 23. *cerris* (Fig. 110).
- 25b. Neb. abfällig: 40. *lanuginosa* (Fig. 122) o. 47. *platanoides* (Fig. 108 q); vgl. eventuell auch 45. *pseudoturneri* o. 51. *gambelii*.
- 26a. B. meist nicht unter 20 cm lang, vgl. Fig. 127 a—b, Neb. bleibend: 46. *macrocarpa*.
- 26b. B. im Mittel nicht über 15 cm, Neb. abfällig: 50. *lyrata* (Fig. 102 d) o. 53. *minor* (Fig. 102 m—n); vgl. eventuell auch 48. *lobata* o. 52. *garryana*.
- 27a. (46b) B. ganzrandig o. wenig lappig, Lappen nicht o. nur undeutl. gezähnt, mit o. ohne Grannenspitze. 28.
- 27b. B. tief buchtig gelappt, Lappen meist deutl. gezähnt, mit Grannenspitzen, wenn Lappen einfach vgl. Fig. 102 g—h; vgl. Sekt. *Rubrae*, S. 169.
- 28a. B. im Mittel nicht über 12 : 5 cm: 1. *phellos* (Fig. 97 a—b) o. 5. *nigra* (Fig. 99 a—c).

- 28b. B. im Mittel nicht unter 15:20 cm lang und im oberen Teile zuw. ebenso breit: 5. *nigra* o. 6. *marilandica* (Fig. 100 a—c).
 29a. (1b). B. ganzrandig. 30.
 29b. B. $\pm$ gezähnt o. schwach gelappt. 31.
 30a. B. auch unters. kahrend (wenigstens fürs Auge): 63. *acuta* (Fig. 108 b), vgl. ferner *Pasania cuspidata* und *P. glabra*, S. 160.
 30b. B. unters. $\pm$ deutl. beh.: 30. *chrysolepis* (Fig. 108 t) o. 31. *ilex* (Fig. 118); vgl. eventuell auch *Pasania densiflora* S. 161.
 31a. Seitennerven deutl. in die Randzähne o. -lappen auslaufend. 32.
 31b. Seitennerven vor dem Rande verschwindend o. sich auflösend: 31a. *phillyraeoides* (Fig. 119 b) o. 65. *vibrayana* (Fig. 119 a).
 32a. B.-Stiel meist über 1 cm und B. im Mittel über 8 cm lang, wenn kleiner, so doch Spitze deutl. lang vorgezogen: 64. *glauca* (Fig. 119 b) o. *Pasania cuspidata*, S. 160; vgl. eventuell auch 27. *wislizeni* o. 28. *agrifolia* o., wenn Seitennerven etwa 12—18, *Pasania densiflora* S. 161.
 32b. B.-Stiel höchstens 1 cm und B. kaum über 8 cm lang. 33.
 33a. B. mit 4—9 kleinen Lappenzähnen: 32. *fruticosa* (Fig. 108 w) o. 33. *lusitanica* (Fig. 108 h).
 33b. B. nicht lappig, höchstens ausgeschweift und etwas stachlig gezähnt. 34.
 34a. B. unters. $\pm$ gelbfilzig: 24. *alnifolia* (Fig. 108 g); vgl. eventuell auch 30. *chrysolepis*.
 34b. B. unters. weißl. o. grau beh. o. kahl. 35.
 35a. B. meist kahrend, Stiel kaum über 4 mm lang: 26. *coccifera* (Fig. 114 f).
 35b. B. $\pm$ beh. bleibend, Stiel meist 5 o. mehr mm: 25. *pseudosuber* (Fig. 113 c—d) o. 29. *suber* (Fig. 117 c—d) o. 30. *chrysolepis* (Fig. 108 t) o. 31. *ilex* (Fig. 118).

B siehe S 210. A. Sch. der Cupula einzeln dachziegelig, nicht in Querzonen verwachsen.

II siehe S 177. I. Gr. linealisch, oben rinnig, an Spitze leicht verbreitert; abortierte Sa. im oberen Teile der Fr., Sch. der Cupula angedrückt, sich gleichmäßig zuspitzend.

Subgenus a. *Erythrobalanus* sensu OERST., l. c. 70 (*Melanobalanus* ENGELM., in Trans. St. Louis Ak. III, 388, 1877, ex parte). B. meist sommergrün, an Spitze und Abschnitten fein borstenzähmig; Eichelwand dick, mit 3 $\pm$ deutl. Scheidewänden, innen $\pm$ beh., Fr.-Reife 2-jährig, Fr. also an $\odot$ Zw.

Sekt. 2 siehe S 167. Sekt. 1. *Phellos* LORD., Arb. III, 1894, 1874. B. länglich bis lanzettlich, ganzrandig (nur an Lohden mit vereinzelt Lappenzähnen), grannenspitzig, Stiellänge höchstens $\frac{1}{2}$ der Spreite, Herbstf. lebhaft.

$\odot\odot$ siehe $\odot$ B. Stiele 0,2—0,8(—1) cm.
 S. 166.

B. 4—15:0,6—2,6 cm, dünnhäutig, erwachsen kahl $\pm$ o. nur unters. längs Rippe etwas weißl. büschelhaarig (Fig. 97 a—b).

1. *Q. phellos*: meist kleiner, selten bis 25:1,20 m hoher B. in Kultur hfg. b. Krone zieml. schmal rundlich, Borke lange glatt, dunkel-rotbraungrau, Zw. kahl, $\pm$ glänzend gelb- o. olivbraun, kantig, Lent. sehr fein und unauffällig, auf den $\pm$ braunen o. schwarzgrauen Zw. deutlicher, Kn. 2—4 mm lang, fahl gelbbraun, kahl: B. jung hellgelb, Herbstf. $\pm$ gelb o. rot: Bl. und Fr. wie Fig. 97 c—f, Eichel außen matt, $\pm$ fein beh. in kleinen Vertiefungen.

Q. p. L., Sp. pl. II, 994, 1753. — Weiden-E.; willow o.; ch. à feuilles de saule. — N.-Am. (Long Island, New York bis Florida, Missouri, Texas) — bes. an

*) Was DIPPEÉ in seiner Laubholzk. II, 108, 1892 als *Q. phellos microcarpa* mit z. 1. unters. filzigen, meist etwas kurz lappigen B. erwähnt und abbildet, stellt nach den von mir in Plantules gesammelten Expl. wohl *phellos* am nächsten, hat aber mit der von DIPPEL zitierten *Q. aquatica* MCHX., Hist. Chênes Am. t. 20, f. 2, 1801, nichts zu tun. Die von SARGENT, Silva VIII, 179, 1895, erwähnte beh. *phellos*-Form kenne ich nicht. Kann vorläufig die Gartenpfl. nicht deuten, vermute Hybride.

feuchten, überschwemmten Orten. Blz. IV—V. Frz. IX—X. — Interessante Zier-Eiche, etwa bis Prov. IV. hart*).

1×3 *Q. phellos* × *imbricaria*: Hierher stellt ZABEL (H. d. D. D. G. 65. 1903) *Q. phellosubimbricaria* DC., Prodr. XVI, 2, 63. 1864; SARGENT zieht diese in Silva VIII, 181. 1895 zu *rudkini*, die dann allerdings den älteren Namen *subimbricaria* annehmen müßte. Vielleicht kommen aber beide Bastarde vor.

1×6 *Q. phellos* × *marylandica*: *Q. rudkini* BRITT., in Bull. Torr. Cl. IX, 13. 1882 (*Q. ph.* × *m.* SARG., Silva VIII, 181. t. 437. 1895).

1×7 *Q. phellos* × *nana*: Scheint in der Heimat gefunden. Vgl. PETERS, in Bull. Torr. Bot. Club XX, 295. 1890.

Fig. 97. *Quercus phellos*: a—b B., bei a¹ und a² die wechselnde Form der Spitze und des Grundes dargestellt; c Zw. mit ♂ (unten) und ♀ Bl. (oben); d ♂, e ♀ Bl.; f Frst. (c ²/₃; d—e vergrößert) (c—f nach SARGENT).

1×8 *Q. phellos* × *digitata*: vgl. SMALL, in Bull. Torr. Cl. 1895, 74.

1×11 *Q. phellos* × *velutina*: *Q. heterophylla* MCHX. F., Hist. Arb. Am. II, 87, t. 16. 1812. *Q. ph.* × *coccinea* ENGELM., in Trans. St. Louis Ak. III, 541. 1877; *Q. ph.* × *r.* SARG., Silva VIII, 180, t. 436. 1895). Vgl. HOLLICK, aber B. unten meist auch auf Nerven verstr. beh., im Übrigen aber wohl oft nur sehr schwer, zumal ohne Fr., von der *rubra*-Hybride zu scheiden, die wohl häufiger und bisher nur meist mit *heterophylla* zusammengeworfen sein dürfte.

1×13 *Q. phellos* × *rubra*: *Q. hollickii* (*Q. ph.* × *r.* HOLLICK, in Bull. Torr. Bot. Club XV, 303. 1888). Diese Hybride erinnert in Vielem an *heterophylla*. Doch B. nur jung unters. beh., später höchstens achselbartig. Sie ist auch bei uns entstanden, z. B. im Hotgarten zu Karlsruhe, woselbst ich durch Herrn Gartendirektor GRAEBENER Material und Auskunft erhielt. Ich schlage vor, von der vielgestaltigen Art 3 Formen festzuhalten, die allerdings ineinander übergehen: *f. graebeneri*: *phellos* im Laube viel ähnlicher, B. etwa 8:1,8 bis 16:5 cm, kaum o. undeutl. lappenzähnig. *f. typica*: B. die Mitte zwischen den Eltern haltend, etwa 9:3,5 bis 13:7 cm, Lappen 5—6, kurz, zuw. mit einem seith. Zahn. *f. karlsruhensis*: B. fast wie bei *rubra*, bis 18:10 cm, Lappen gezähnt. Fr. mir nicht bekannt.

1×15 *Q. phellos* × *palustris*: *Q. schuchiana* (HORT, DIECK, ZABEL, l. c., vgl. Mit. D. D. G. 1896, 9).

1. *Q. phellos*: B. 4,5—9:1,3—3,8 cm, derbhäutig, zuletzt oben verstreut, unten dicht fein grau büschelfilzig (Fig. 98 a).

2. *Q. brevifolia* (*Q. cinerea*): meist b—h, nicht über 6:0,18 m, selten h, bis 30:0,6 m; Zw. jung dicht grau beh., alt gebraunt und kahlend, Kn. hellbraun, leicht beh., 3—4 mm lang; B. zuw. fast wintergrün, oben glänzend grün (von der sehr ähnlichen *pumila* durch nicht lederige Textur verschieden, auch im Mittel größer, mehr beh., Bl. und Fr. *phellos* zieml. analog).

*) Die wintergrüne *Q. pumila* WALT., Fl. Car. 234. 1788, darf der 1-jährigen Fr.-Reife halber nicht zu *phellos* gezogen werden, von der sie auch im Bl.-Bau abweicht. Meines Wissens nicht in Kultur und jedenfalls viel empfindlicher als *phellos*.

Q. b. SARG., Silva VIII, 171, t. 431. 1895 (*Q. phellos* β . *brevifolia* LAM., Diet. I, 722. 1783; *humilis* WALT., Fl. Car. 234. 1788, non LAM.; *cinerea* MCHX., Hist. Chên. Am. No. 8, t. 14. 1801) Kurzblattrige E: blue jack or high-ground willow o. — N.-Am. (Carolina bis Florida, Texas). — Vgl. *phellos*, aber weniger hart. Ob echt in Kultur?

2×9 *Q. brevifolia* × *catesbei*: vgl. SMALL, in Bull. Torr. Club 1895, 76.

Fig. 98. *Quercus*-B.: a *brevifolia* — b *imbricaria* — c—e *laurifolia* — f—g *palustris* (vgl. auch Fig. 106a) — h *digitata* (vgl. auch Fig. 102g) — i *catesbei* — k *cinerea* (vgl. auch Fig. 104a) (alles ! nat. Gr. — d—e nach SARG., sonst Original).

○○ Stiel 0,7—1,8 cm, B. 7—15(—21):2—6 cm (Fig. 98b).

3. *Q. imbricaria*: b. bis 20:0,9 (selten 33:1,20) m. Krone reich ausgebreitet verästelt, hfg. übergeneigt. Borke klein-, dickschuppig. Zw. nur jung verstr. beh., hellbraun. Kn. dgl., 2—5 mm lang. verstr. beh., B. beim Ausbruch gerötet, fast rechtwinklig vom Zw. abstehend, oben bald lebhaft grün und kahl, unten glänzend gelb- o. graugrün, deutl. o. nur verstr. fein büschelhaarig, an Lohden hfg. an Spitze 3-lappig. Textur dünn bis derbhäutig. Herbstf. oberseits dunkellederrot, Rippe lebhaft rot; Bl. und Fr. vgl. Fig. 101f—g. Cupula-Sch. fein beh.

Q. i. MCHX., Hist. Chên. Am. No. 9, t. 15, 16. 1801. — Glanz-, Schindel-E., shingle o.: ch. à lattes. — N.-Am. (von Pennsylv. durch S.-Mich., Wisc., bis N.-Miss., N.O. Kansas, südl. bis Columb., N.-Georg., Alab., Tenn., N.-Ark. — Liebt gute, z. T. etwas leuchte Lagen — Blz. IV—V. — Frz. Herbst. — Etwa bis Prov. III harter, schöner b!

3×6 *Q. imbricaria* × *marylandica*: *Q. tridentata* ENG., in Trans. St. Louis Ac. III, 339. 1877 (*nigra* var. *tridentata* DC., l. c. 64; *Q. a.* var. SARG., Silva VIII, 176, t. 433. 1895).

3×11 *Q. imbricaria* × *velutina*: *Q. leana* NUTT., Sylva I, 13. 1842 (*Q. i.* × *velutina* ENGELM., l. c. 540; *Q. a.* var. SARG., Silva VIII, 176, t. 434. 1895). ZABEL, im H. d. D. D. G. 66, stellt hierher *Q. michauxii* HORT. MUSK. Mit unbekannt.

3×13 *Q. imbricaria* × *rubra*: vgl. BUSH, in Gard. a. For. VIII, 33. 1895. Scheint unsicher.

3×15 *Q. imbricaria* × *palustris*: vgl. ENGELM., l. c. Scheint später nicht wiedergefunden.

Sekt. 2. *Nigrae* LOUD., l. c. 1890. B. ganzrandig, längl. o. meist verkehrt eifg., über der Mitte sich stark verbreiternd, gelappt, meist kahl o. unten beh., häutig, Stiel 0,5—1,5—2) cm, Herbstfärbung stumpf, gewöhnlich gelbbraun.

C B. über Mitte nicht o. kaum verbreitert (Fig. 98 c—e), beiders. ganz kahl, Stiel 0,5—0,8 cm.

4. *Q. laurifolia*: b. bis 33:1,2 m. Borke schwarzbraun, kleinschuppig, Krone dicht, breit-rundlich, Zw. kahl, grau-braun, Lent. deutl., Kn. 2—4 mm lang, bräunlich, Sch. gewimpert, Neb. zuw. bleibend: B. (3—7,5:1,5—1,5—6 cm, an Schossen auch tiefer, spitzer, 2—4-lappig mit Grannenzähnen, nur ganz jung unten beh., später beiders. glänzend grün: z. T. halbwintergrün: Bl. und Fr. vgl. *nigra*, meist auf 1—2 mm langem Stiel, Cupula nach SMALL: with a manifest and constricted base.

Fig. 99. *Quercus nigra* (*Q. aquatica*): a—c B.-Formen; d ♂ Blst.; e ♂ Bl.; f. ♀ Bl.; g Frst. (e—f vergrößert) (d—g nach SARGENT).

Q. l. MCHX., Hist. Chén. Am. No. 10, t. 17. 1801 (*aquatica* var. *laurifolia* DC., l. c. 68; *uliginosa* var. *laurifolia* ZABEL, l. c. 66). Lorbeer-L.; laurel o., eh laurier — N.-Am. (Virg. bis Florida, Labrador). — Längs der Flüsse und Sümpfe, bes. nahe der Küste. — Wie es scheint litg. mit der mindestens doppelt so lang gestielte B. besitzenden *imbricaria* verwechselt jedenfalls nur für Prov. V etwa zu empfehlen. Kaum echt in Kultur.

4×9 *Q. laurifolia* — *catechu* — ENGELM., l. c. 539, vgl. SARG., Silva VIII, 145, t. 419. 1895.

CC B. über der Mitte fast stets deutl. bis sehr auffällig verbreitert, unten selten ganz kahl, meist wenigstens achselbärtig.

• B. 2—4—6 cm breit, unten meist kahl o. nur achselbärtig (Fig. 99a—c), Stiel (0,2—)0,5—1,2 (—1,5) cm.

5. *Q. nigra* (*Q. uliginosa*): $\bar{h}$. bis 25:1 m, Krone zieml. symmetrisch, längl.-rund, Äste verhältnismäßig dünn, Rinde meist lange glatt, dann grau raubborkig, Zw. kahl, $\rightarrow$ braunrot, Lent. ∞ , fein; Kn. etwa 5 mm lang, eispitzig, nur Sch. gewimpert; B. häutig-lederig, 5—12:3—6 cm, Grannenzähne meist nur an Säml. und Lohden, deren B. bis 4mal so groß; Bl. und Fr. vgl. Fig. 99d—g, Fr.-Stiel höchstens 4 mm, Eichel leicht glänzend, Cupula hellrotbraun, fein beh.

Q. n. L., Sp. pl. II, 995, 1753*, non WANGH. (*nigra* a. *aquatica* LAM., Dict. I, 721, 1783; *uliginosa* WANGH., Nordam. Holzart. 80, 1787; *aquatica* WALT., Fl. carol. 234, 1788. — Sumpf-, Moor- o. Schwarz-E.; water o.; ch. aquatique — N.-Am. (Delaw. bis Kent., Miss., Flor. und Texas). — Bes. Flußtäler, frische kräftige Böden. — Blz. IV. — Frz. X. — B.-Fall meist im Laufe des Winters. — Raschwüchsiger Zier- $\bar{h}$, doch ohne schöne Herbstf. und jung des Schutzes bedürftig (Prov. IV).

5 $\times$ 9 *Q. nigra* $\times$ *catesbaei*: *sinuata* WALT., Fl. car. 235, 1788, vgl. SARG., Silva VIII, 144, t. 418, 1895.

5 $\times$ 13 *Q. nigra* $\times$ *rubra*: *Q. raineri* MANETTI, ex ZBL. im H. D. D. G. 67, 1903. Angeblich Gartenzögling. Mir unbekannt.

• B. (5—7—22 cm breit, unten meist bleibend bräunlich beh., Stiel (1—)1,5—2,2 cm (Fig. 100a—c).

6. *Q. marylandica* (*Q. ferruginea*): $\bar{h}$ $\bar{h}$, bis 10, selten bis 18:0,5 m, Krone etwas stumpf pyramidal, Rinde zuletzt schwarzgrau

Fig. 100. *Quercus marylandica* (*Q. ferruginea*): a—c B.-Formen; d $\bar{\sigma}$ Bl.; e $\bar{\sigma}$ Blst.; f Frst.; g Fr. (d—e vergrößert) (d—g nach SARGENT).

LINNE zitiert eine CATESBYSche Abbildung, aus der gut ersichtlich, daß er unter *nigra* diese und nicht die folgende Art versteht. J. K. SMALL unterscheidet, in seiner Flora Southeast. Stat. 350, 1903, neben *nigra* eine *Q. macrocarpa*, für die er B. dünn, Eichel unter 10 mm lang und Cupula tief becherfg. angibt, während *nigra* dicke B., über 15 mm lange Eicheln und eine flach becherfg. Cupula hat. *Q. macrocarpa* soll in Georgia, Little Stone Mountain, on granite rocks, vorkommen.

bis schwarz, klein, aber tiefrissig: Zw. jung dicht, • sehr locker büschelhaarig, oliv- o. rotbraun, mit ~ feinen Lent., kantig gestreift, Kn. kräftig, bis 6 mm lang, stark abstehend, bräunlich, zieml. beh., B.-N. senkrecht: B. jung gerötet, dicht beh., zuletzt derbhäutig bis dünnlederig, oben bis auf wenige Büschelhaare kahlend, glänzend tief olivgrün, unten gelbgrün o. gelbbraun, auf Fläche , an den Achseln und an Rippe stark büschelhaarig, 8 22,5:7 22 cm, Herbstf. stumpf braun: Bl. und Fr. vgl. Fig. 100 d g: Fr. zuw. bis 1,5 cm lang gestielt, Eichel hfg. bis 2, von beh. Cupula umschlossen, blauschwarz längsstreifig, dadurch nach MAYR von der sehr ähnlichen *coccinea* abweichend.

Q. n. MÜENCHH., Hausv., 253, 1770. CATESBY, Hort Brit.-Am., Fig. 13, 1793 [*ingra* β *maril.* L., Sp. pl. 996, 1753; *nigra* WANGH., Nordam. Holzart. 133, 1787; *ferruginea* MCHX., F., Hist. arb. am. II, 92, t. 18, 1812]. — Echte Schwarz- o. Prärie-E.; black jack, jack o.; eh. noir. — N.-Am. (Long Isl., New York bis Ohio u. Nebraska, südl. bis Flor., Texas), im N. selten, im S. hfg. — Liebt zieml. trockne, oft kiesig-sandige Böden. — Blz. IV V. — Schöner, aber wohl nur bis Prov. IV harter Park-**h.**

6×7 *Q. marylandica* × *nana*: *Q. brittoni* W. T. DAVIS, in Bull. Torr. Bot. Club 1892, 301.

6×8 *Q. marylandica* × *digitata*: als solche (= *ferruginea* × *cuneata*) erwähnt ZABEL im H. d. D. D. G. 66, 1903 eine *nana* *hybrida* HORT., die mir unbekannt. Der mit ? dazu gestellte Name *quinguleba* ENGELM. wird von diesem in Trans. St. Louis Ac. III, 542 1877 eingezogen, denn, it is not even a variety, but rather a juvenile state which had become permanent in that tree.

6×11 *Q. marylandica* × *velutina*: wird von ZABEL, l. c. 67 mit Autor SARG. als Synonym zu seiner *ferruginea* = *laetioria* = *magnifica* HORT. gestellt. Ich kann in der Silva keinen derartigen Bastard besprochen finden.

6×16 *Q. marylandica* × *georgiana*: von SMALL, in Bull. Torr. Bot. Club 1895, 75, t. 233, beschrieben als *georg.* × *nigra*. Scheint noch fraglich.

Sekt. 3. *Rubrae* LORD., l. c. 1877, erweitert. B. stets mehrlappig, nie gegen Spitze auffällig verbreitert, häufig tief fiederspaltig mit buchtig gezähnten grannenspitzigen Abschnitten, Herbstfärbung meist lebhaft scharlach- o. orangerot.

○ B. unters. gelb- o. weißgrau filzig, nie gelbgrün.

✧ B. vgl. Fig. 102 q—r, 6 12:3—5 8 cm, Stiel 0,7 1,5 —2,3) cm.

○○ siehe
S. 172

7. *Q. nana* (*Q. ilicifolia*): sparriger b mit ~ gewundenen, knorrigen Ästen, 0,9 3,5 mm, seltener **h.** bis 6:0,2 m; Borke • glatt: die anfangs sehr dichte hellgraue Beh. verliert sich erst an älteren Zw., Kn. hellbraun, stumpf-eifg., beh., 3 4 mm lang; B. mit (1—) 2—3 Lappennerven, oben bis auf sehr feine Haarreste kahlend, tiefgrün, derbhäutig, Herbstf. stumpf scharlach o. gelb: • Bl. und Fr. vgl. Fig. 101 d d¹, Cupula zuw. am Grunde kreiselfg., Eichel leicht längsstreifig, fein beh.

Q. n. SARG., in Gard. a. For. VIII, 93, 1895 (*rubra* var. *nana* MARSH., Arb. Am. 123, 1785; *ilicifolia* WANGH., Nordam. Holz. 70, t. 6, f. 17, 1787; *banisteri* MCHX., Hist. Chên. Am. No. 15, t. 27, 1801). — Zwerg-E.; bear or scrub o. — Maine bis Ohio, Gebirge von N.-Carol., Kentucky. — Liebt trockne, sandig-steinige Lagen. — Blz. V. — Frz. X XI. — Hübscher, bis etwa Prov. IV III harter **h.** Noch selten in Kultur.

7×8 *Q. nana* × *digitata* als solche (= *ilicifolia* × *cuneata*) war nach KOEHN, Dendr. 132 1893, *Q. hudsonica* HORT. MÜSK. zu deuten. Mir unbekannt.

7×11 *Q. nana* × *velutina*: In der Heimat gefunden. Siehe REHDER, in Rhodora 1901, 137.

7×16 *Q. nana* × *coccinea*: In Massachusetts gefunden. (*Q. ilicifolia* × *coc.*) GRAY, Man. ed. V, 454, 1867, vgl. REHDER, l. c.

** B. vgl. Fig. 98h und 102g—h, 8—20 (—24):5.5—12—15.
Stiel 1.5—3 cm.

Fig. 101. a *Quercus schneckii*: Fr. — b *Q. californica* (*Q. kelloggii*): Fr. — c *Q. digitata* (*Q. cuneata*): Fr. — d—d' *Q. nana* (*Q. ilicifolia*): d ♀ Blst.; d' Fr. — e—e' *Q. georgiana*: e ♀ Bl.; e' Fr. — f—g *Q. imbricaria*: f ♂, f' ♀ Bl.; g Fr. — h—k' *Q. acuta*: h ♂ Bl. mit Trgb.; h' ♂ Bl. ohne A. mit Frkn.-Rudiment ($\frac{1}{2}$); h'' Stb.; i ♀ Bl.; k Frst.; k' Fr.-Becher. — l—m *Q. glauca*: Fr. und Cupula. — n—s *Paumotu cupulata*: n Blst.; o ♂ Bl.; p ♀ Blst.; q ♀ Bl.; r—s Frst., bei r unten rechts (Buchstabe fehlt) geschlossene, bei s aufgesprungene Fr. (d—f', — h'', — q vergr.). a—s nach SARGENT; l, h—q nach SHIRASAWA, h n. d. Nat.

8. *Q. digitata* (*Q. cuneata*): B. bis 25—33 (0.9—1.5) m. breit, rund, offenkronig. Borke dünn-schuppig. Zw. jung dicht gelbgrau beh., erst kahlend. Kn. hellbraun, beh., stark abstehend, 3—4 bis 5 mm lang, stumpfspitzig. B. sehr variabel, derbhäutig, oben stark kahlend, tiefgrün: Fr. Fig. 101 c, kurz gestielt. Cupula-Basis zuw. kreiselfg. abgestutzt. Eichel etwa $\frac{3}{4}$ — $\frac{2}{3}$; frei, leicht beh., etwas fein runzelig.

*) Es scheint nicht angängig, die in Fig. 98 h dargestellte Form von der meist als *falcata* gehenden (Fig. 102 g—h) zu trennen, da die sichelige Lappung bes. an älteren Pflz. auftritt; dagegen unterscheiden die Amerikaner jetzt eine *Q. pagodaefolia* ASHE, in Bot. Gaz. XXIV, 375. 1897, die viel rauhere Borke, 5—11 buchtig spitzlappige, am Grunde keulfg., unten silberweiß schimmernde B. besitzt und leuchte, tiefgründige Lagen in Virg., Ind. bis Miss. und Georg. bewohnt. Wohl einführungswert.

Q. d. SUDW., in Gard. a. For. V, 98. 1892 (*nigra digitata* MARSH., Arb. am. 121. 1785; *cuneata* WANGH., Nordam. Holz. 78, t. 5, f. 14. 1787; *falcata* MCHX., Hist. Chên. Am. No. 16, t. 28. 1801; ? *triloba* MCHX., l. c. t. 26). — Keilblättrige o. Sichel-E.; spanisch o.; ch. à lobes falciformes. — N.-Am. (New Jersey bis Flor., Miss., Texas). — Bes. in ziemi. trockenen, sandigen Böden. — Blz. V—VI. — Frz. IX—X. Diese durch ihre B.-Formen sehr interessante Eiche ist bereits 1776, in Eur. eingeführt und trotz ihrer Variabilität nach SARGENT sehr gut zu erkennen. by their drooping habit and the peculiar rusty covering of the lower surfaces of the leaves. Bis etwa Prov. III hart.

Fig. 102. *Quercus*: B.-Formen: a lobata. — b—f (ohne d) sessilis. — g—h digitata. — i pontica. — k georgiana. — l minor (stellata). — m californica (kelloggii). — n texana. — o r. nana (ilicifolia) (alles $\frac{1}{2}$ nat. Gr.) (Original).

S. 11 *Q. d. digitata* = *lobata*; *Q. ac. d. c. m.* ZABEL, im H. d. D. D. G. 67. 1893 *cinerea* var. *alba* DIPPEL, Laubb. II, 122. 1893. Herr ZABEL schreibt mir, daß er diese Eiche seiner Zeit als *Q. cinerea* erhielt und sie sehr frostempfindlich war. Ob ein im Herb. Mus. Palat. Vindob. liegendes Expt. einer *Q. triloba* X *triloba*, ex Baltimore Herb. No. 5723d, Baltimore, N.-Carol., Sept. 20. 1897, damit identisch, ist mir noch fraglich.

6×13 *Q. digitata* × *rubra*: *Q. runcinata* ENGELM., in Trans. St. Louis Ac. III, 542 1877 *rubra* β. *runc.* DC., Prodr. XVI, 2, 60, 1864). Deutung noch etwas unsicher.

CC B. unten ganz kahl o. auf Fläche nur so beh., daß die Unters. der Sommer-B. doch deutl. gelbgrün.

×× siehe
S. 173.

✓ B. unters. auf Fläche bleibend fein o. verstr. beh. (Lupe! *).
+ B.-Stiel 0,6—1,5 (—2) cm, B. vgl. Fig. 98i.

9. *Q. catesbaei*: b h. bis 10 (—20:0,6) m, meist — unregelmäßig knorrig verästelt. Borke alter St. sehr dunkel, dickschuppig; Zw. jung gleich den ausbrech. B. braunfilzig. ♂ rotbraun, kahl o. fast kahl. Kn. eispitzig, rotbraun, beh., 6—7 mm lang; B. zuw. *digitata* sehr ähnlich, aber durch kürzeren Stiel und viel schwächere Beh. sofort zu unterscheiden. 3—5 (—7)-lappig, oben bald kahl, lebhaft grün, 9—20 (—36): 3—15 (—30) cm. Herbstf. stumpf scharlachrotbraun; in ♂ Bl. A. mit Konnektivspitze, + mit langen dünnen N.; Fr. meist einzeln, auf kurzem dickem Stiel. Cupula zieml. locker-großschuppig, bis 3 cm Dm., mit kurzer stielartiger Basis. Eichel lang stachelspitzig, 2—3:1,4—2 cm, hellbraun, leicht beh.

Q. c. MCHX., Hist. Chên. No. 17, t. 29, 1801. — Gabel-E.; turkey o. — N.-Am. (N.-Carol., Flor., O.-Louis.). — Sandig-kiesige Orte (Kiefernwälder). Kaum echt in Kultur. Höchstens für Prov. VI hart.

++ B.-Stiel (1,2—) 2—5 cm.

△ B.-Stiel 1,2—3,5 cm, B. vgl. Fig. 102o, 6—13 (—18): 4—10 (—12) cm, Fr. wie Fig. 101b.

10. *Q. californica* (*Q. kelloggii*): b h. bis 30:1,20 m, breit offenkronig. (Winter-Habitus-Bild in Gard. a. For. 1896, 145). Borke spät auftretend, schwarzbraun; Zw. jung feinfilzig. ♂ meist kahl, glänzend braunrot; Kn. eilänglich, 6—8 (—10) mm lang, braun, etwas beh.; B. an *velutina* gemahnend, derbhäutig, oben meist ganz kahlend, glänzend tiefgrün, unten hellgrün o. bräunlichgrau, Fr. groß, meist einzeln. Cupula tief becherfg., bis 3 cm Dm., großschuppig; Eichel feinfilzig.

Q. c. Coop., Smiths Rep. 1858, 261, 1859 *tinctoria* var. *calif.* TORREY, Pacif. Rep. IV, 1, 138, 1856: *kelloggii* NEWB., Pacif. Rep. VI, 28, t. 6; 89, 1857; *senomonensis* DC., Prodr. XVI, 2, 62, 1864). — Kalifornische E., black o. — N.-Am. (W.-OREG. bis S.-Kalif. u. S.-Alaska, zwischen 1300—2,000 m). — Liebt kühlere Lagen und bessere lehmreiche Böden, während sie (nach MAYR) in wärmeren Flußniederungen durch *arryana* vertreten wird. — Ob echt in Kultur? Vielleicht für Prov. V geeignet.

10+27 *Q. californica* × *western*: *Q. mercuris* KELLOGG, in Proc. Cal. Ac. II, 36, 1893 *calif.* × *kellog.* M. K. CERRAN, Bull. Cal. Ac. I, 146, 1885). Vgl. SARGENT, Silva VIII, 120, t. 407, 1895.

△△ B.-Stiel 3—5 cm, B. vgl. Fig. 103 a—b, 9—18 (—36): 6—16 (—30) cm, Fr. kleiner, Fig. 103 h—l.

11. *Q. velutina* (*Q. tinctoria*): h. bis 25 (—50:1,5) m, schmal offenkronig. Borke (n. MAYR) längs- und tiefrissig, aber im Gegensatz zu *coccinea* mit wenigen Querrissen, junge Rinde innen (gleich End.)

*) Keines der von mir gesehenen Expl. von *californica* o. *catesbaei*, die sämtlich in den Monaten IX—X gesammelt waren, zeigte sich unters. auf Fläche ganz kahl. Doch sagt auch SMALL, in seiner mir eben erst zu Gesicht kommenden Flora southeast. States 351, 1903, bei *Q. catesbaei*, leaf-blades glabrous on both surfaces, except the tufted axils of the nerves beneath.

gelb (bei *coccinea* weiß). Zw. nur jung beh., ♂ kahl, rotbraun. Lent. fein, hell. ~; Kn. 6–10 mm lang, stumpflich. + beh.; B. sehr variabel, jung gerötet, dicklicher als bei *coccinea*, an Lohden fast so groß wie bei *rubra*; Herbstf. noch später als bei *coccinea*, mehr stumpf rotorange o. bräunlich; Bl. und Fr. vgl. Fig. 103, Eichel feinflaumig.

Q. v. LAM., Dict. I, 721. 1783 (*nigra* DUROI, Harbk. Baumz. II, 272, t. 6, f. 1. 1772, excl. syn., non L. o. WANGH.; *discolor* AIT, Hort. Kew. III, 358. 1789; *tinctoria* MCHX., Hist. chên. No. 13, t. 24, 25. 1801). — Färber-E.; yellow bark o.; ch. quercitrone. — N.-Am. (Maine bis Ont., Minn., Flor., Nebraska, Texas). — Blz. V–VI. — Frz. IX–X. — Laubf. meist allmählich im Winter. — Seit etwa 1800 in Eur., als Zier-*Q. coccinea* und *rubra* nachstehend, aber forstl.-industriell in Heimat die wichtigste Roteiche. Rinde liefert gelben Farbstoff, gleich *pinus* auch ihres Tanningehaltes halber geschätzt.

Fig. 103. *Quercus velutina* (*Q. tinctoria*): a–b B.-Formen, + Bl., a Stb. + Blst., f–g + Bl. ganz und im Längsschnitt; n Frst; — k Fr-Formen, Cupula; m Fr. im Längsschnitt; n S. (c–g vergrößert) (c–n nach SARGENT).

11×12 *Q. velutina* × *coccinea*: dürfte nach ZABEL (= *cocc.* × *tinctoria* in H. D. D. G. 68. 1903) existieren, aber noch nicht sichergestellt.

11–13 *Q. velutina* × *rubra*: Scheint in Pennsylv. gefunden; vgl. SARG., Silva IX, 126. 1895.

** B. unters. ganz kahrend o. nur achselbärtig.

+ B.-Stiele mindestens 2 cm lang.

B. im Mittel über 12:10 cm, Eicheln meist über 1.5 cm lang.

= B. vgl. Fig. 98 k und Fig. 104 a, Fr. wie Fig. 104 e*).

12. *Q. coccinea*: b. bis 30:1 m, in seltenen Fällen bis 54 m; relativ schmal offenkronig. Rinde vgl. *velutina*. Zw. nur jung beh., +

* Leider tritt in der SARGENTschen Darstellung die stielartig abgesetzte Cupulabasis gar nicht hervor, die gerade für *coccinea* recht bezeichnend.

++ siehe
S. 177.
siehe
S. 176

kantig, olivgrün bis bräunlich. — glänzend grau. Kn. bis etwa 7 mm lang, hellolivbraun. Sch. nur gewimpert: B. sehr variabel. Textur dünn. 8—61 : 5—13—15) cm, im Mittel größer als *palustris* und meist ohne deutl. Achselbärte unters., wie wir sie bei dieser und der oft sehr ähnlichen *texana* zu finden pflegen: Herbstf. glänzend scharlachrot, zieml. spät, die schönste aller Roteichen: Stiel 3—6 cm: Bl. und Fr. wie Fig. 104b—d, g—i**).

Fig. 104. *Quercus coccinea*: a B.; b ♂ Bl.; c ♀ Blst.; d ♀ Bl.; e Frst.; (f Fr. von *Q. ellipsoidalis*); g längliche Fr.-Form; h Fr. im Längsschnitt; i S. (b—d vergrößert) (b—i nach SARGENT).

Q. c. MUENCHH., Hausv. 254. 1770, excl. b. [et WANGH. 1787]. — Scharlach-E.; scarlet o.; ch. écarlate. — N.-Am. (Maine, Ontario bis Minn., Flor., Miss.). — Auf verhältnismaßig trocknen Böden. — Vgl. *rubra*, Laubf. später. — Sehr wertvoller Zier-*P.* Gleich *rubra* ganz hart.

12×13 *Q. coccinea* × *rubra*: *Q. benderi* BAENTZ, in Allg. Bot. Zeitschr. 1903, 85; hiervon unterscheidet BAENTZ: *var. coccinoides*: B. *coccinea* ähnlich; kreiselfg. Cupula die Eichel bis zur Hälfte umfassend, ihr Rand nicht wulstig, ihr stielartiger Grund einem sehr kurzen dicken Stiel aufsetzend; hierher eine *f. voluta-annulata*: Cupula-Rand einen aufgetriebenen wulstigen Ring bildend. — *var. rubroides*: B. *rubra* ähnlicher; Eichel nicht bis zur Hälfte von der nicht wulstig gerandeten, am Grunde sanft in den deutl. Stiel übergehenden Cup. umschlossen. — In Parkanlagen Breslaus gefunden.

12×15 *Q. coccinea* × *palustris*: ? *Q. rugelii* ZBL., H. d. D. D. G. 68. 1903 *var. rugelii* DC., l. c. 62. Mir unbekannt, auch ZABEL vermutet nur, daß die DE CANDOLLEsche Form diesem Bastard entspricht.

== B. vgl. Fig. 105 a—b, Fr. wie i—m.

**) e zeigt die Fr. der von HILL, in Bot. Gaz. XXVII, 204. 1899, neu beschriebenen *Q. ellipsoidalis*, die vor Allen durch die mehr ellipt. Eichen auffällt. Sie soll ferner im Gegensatz zu *coccinea* sehr glattrindig sein und in mancher Hinsicht *palustris* näher stehen. Hybridität dürfte ausgeschlossen sein (Ill., Mich., Minn.).

13. *Q. rubra*: $\varnothing$, bis 25 o. bis 50:1,2 m; Krone $\pm$ symmetrisch, breitästig (vgl. Habitus-Detailbild in Gard. a. For. 1891, 341). Rinde anfangs glatt, hellgrau, später braungrau, schmal und dünn-schuppig. Zw. nur ganz jung beh., kantig, glänzend olivbraun, kräftig, Lent. sehr wenig auffällig. Kn. bis etwa 10:5 mm, hellbraun, beh.; B. dünn, aber festhäutig, anfangs rötlich, (8—12—19—25):(6—9—12—16)cm, unters. z. T. achselartig, oben zieml. stumpf tiefgrün, Herbstf. tiefer o. heller orange- bis scharlachrot o. braunrot, gegen *coccinea* und *palustris* zurücktretend: bei der mir nicht näher bekannten *Q. viridis* DIPP., Laubh. II, 118 1902, verfärben sich die B. im Herbst nicht bunt: Bl. und Fr. wie Fig. 104c—m.

Q. r. L., Sp. pl. 996. 1753 (*ambigua* MCHX. F., Hist. arb. Am. II, 120, t. 24, 1812). — Rot-E.; red o.; ch. rouge. — N.-Am. (Neu Schottl. bis Ontario, Minn., Flor., Kans., Texas), geht weiter nach N. als alle anderen *Quercus*, ebenso im Gebirge am höchsten. Standort sehr verschieden: am schönsten in reichem, frischem, lehmigem Boden. — Blz. V—VI. — Frz. X—XI. — Laubf. im zeitigen Herbst. — Holz: Sp. Gew. 0,66, an das von *cerris* erinnernd, wie bei den anderen Rot-

Fig. 105. *Quercus rubra*: a—b B.-Formen; c—d $\varnothing$ Bl. u. Stb.; e $\varnothing$ Blst.; f $\varnothing$ Bl., g dgl. ohne involuerum, h im Längsschnitt vor Befruchtung; i Zw. mit Fr. und $\varnothing$ Bl. (oben); k Cupula; l S.; m Fr. im Längsschnitt (c—h vergrößert) (c—m nach SARGENT).

eichen Splint dunkler als Kernholz; viel weniger dauerhaft und fest als bei den Arten der *robur*- und *alba*-Gruppe, dagegen leichter bearbeitbar. — Nutzen. Zu den besten Park- und Alleebäumen zählend, schon seit Ende des 17. Jahrh. in Europa kult., schnellwüchsig, hart. — Forstlich dürfte ihr Anbau bei uns teilweise lohnen, da ihr Holz von Zimmerleuten, Tischlern und Böttchern gern verarbeitet wird und sie auch genügsamer als *robur* o. *alba* in ihren Ansprüchen ist, doch zeigt sie sich sehr lichtbedürftig und strengen nassen, wie trocknen kalkigen Böden gleichermaßen abhold.

13×15 *Q. rubra* × *palustris*: *Q. richteri* BAENITZ, in Allg. Bot. Zeitschr. 1903. 85. Im Astbau und den tieffiederspaltigen B. an *palustris*, in der Herbstf. den größeren Fr. und der Gestalt der Fr-Becher an *rubra* gemahnend.

B. im Mittel nicht über 10 cm lang. Eicheln wie Fig. 101a o. unter 1,5 cm lang.

— B. vgl. Fig. 102 p. Fr. etwa 1,5 cm lang. Cupula halbkugelig, 9—11 mm breit.

14. *Q. texana*: nach SMALL: kleiner ausgebreitet verästelter B.; B. 5—10 cm lang, mit 3—7 dreieckigen o. eif. Lappen, der Endlappen viel länger als die übrigen, Grund breitkeilig o. abgestutzt; Stiel 1—3 cm; Fr. fast sitzend, Eichel länglich o. eilänglich, 8—10 mm dick.

Fig. 106. *Quercus palustris*: a B.; b Zw. mit ♂ (links) und ♀ Blst. (rechts); c ♂ Bl.; d ♀ Blst.; e ♀ Bl. ohne invol.; f ♀ Bl. im Längsschnitt; g Frst. mit großen Fr.; h S.; i Cupula (c—f vergrößert) (b—i nach SARGENT).

(?) BECKL., in Proc. Phil. Ac. 1860. 444, non SARG. — Texas-E. — S. und W. Texas. — Trockene o. felsige Plätze. — SARGENTS *texana* (Silva IX, 120. 1895) ist nach SMALL identisch mit *palustris* BRILL, Manual 333. *palustris*, deren becherfg. Cupula (vgl. Fig. 101 a), meist über 18 mm breit und deren Eicheln 1,5—2,5 cm lang sind. B. 6—20 cm lang. Der B. wird bis 65—75 m und findet sich in den Ebenen und Prärien von Iowa bis Flor., Texas. — *Q. texana* ist in neuester Zeit eingeführt, ob echt?

— B. vgl. Fig. 98 f—g), und Fig. 106 a: Fr. wie Fig. 106 g — o. kleiner!

*) f stammt von Expl. mit deutl. winzigen *palustris*-Fr.

15. *Q. palustris*: h. bis 25:0.9 m. selten bis 60:1.5 m: Krone breit-symmetrisch pyramidal, St. bis Wipfel durchgehend, Äste in fast rechtem Winkel ablaufend, unterste meist kürzer als nächstobere, im Alter Krone unregelm., locker: Äste dünn und geneigt, in ganz charakteristischer Weise mit kurzen Zw. besetzt (d. h. die abgestorbenen erhalten sich lange Zeit spießfg. vom h. abstehend, daher „Nadeleiche“): Borke dünn, vgl. Fig. 107: Zw. jung beh., glänzend olivgrün o. bräunlich, Kn. klein, etwa 4 mm lang, hellbraun: B. beim Austrieb bronzegrün mit rötl. Rande, später beiders. lebhaft glänzend grün, 7–13:6–10 cm, vgl. *coccinea*, Herbstf. sehr spät, oft nur teilweise eintretend, tief scharlachrot: Bl. und Fr. vgl. Fig. 106: Eichel zuw. nicht über 8 mm lang.

Q. p. MÜENCHL., Hausv. 253. 1770 [et DU ROI 1772 (*rubra dissecta* LAM., Diet. 720. 1783; *rubra imbricaria* MARSH., Arb. Am. 122. 1785)]. — Sumpf-, Nadel- o. Spieß-E.; pin o.; ch. des marais. — N.-Am. (Mass. bis Wis., Delaw., Ark., Ind.-Terr., Flor.). — Nicht in eigentlichen Sumpfgebieten, sondern am Rande feuchter Niederungen, vorzugsweise beste Böden. — Vgl. *velutina*. — Sehr raschwüchsig in Jugend, aber leider kaum über Prov. IV (III) wirklich hart.

Fig. 107. *Quercus palustris*: Borke eines starken Stammes. (Orig. nach C. K. SCHNEIDER).

+ B.-Stiele 0.3–1.3 cm, B. vgl. Fig. 102 k–l, Bl. u. Fr. Fig. 101 e–e'.

16. *Q. georgiana*: h. 1–4 m. selten h. bis 10:0.45 m. Borke dünnschuppig, Zw. stets kahl, Kn. eiellipt., sehr fein beh., 4–7 mm lang: B. 5.5–10(–12):2.8–6.5(–9) cm, beim Ausbruch gerötet, nur unten und am Rande beh., später oben glänzend grün, unten wenig heller und achselbärtig, Lappennerven 2–4, Herbstf. mehr stumpf orangescharlach.

Q. g. M. A. CURTIS, in Am. Jour. Sc. ser. 2, VII, 406. 1849. — Georgia-E. M.-Georgia, Ohio (leg. C. A. PURPUS 1887 ex DIPPEL, Laubh. II, 116 1892). — Felsige und sandige Orte. — Noch sehr selten in Kultur und kaum über Prov. IV hinaus hart.

II. Abortierte Sa. im unteren (o. mittleren) Teile der Fr., Gr. verschieden.

a. Gr. linealisch, zugespitzt, aufrecht o. zurückgebogen, Sch. derb siehe S. 187 Cupula teils angedrückt, teils zurückgebogen o. wenigstens die oberen verlängert abstehend o. zurückgebogen.

Subgenus b. *Cerris* OERST., l. c. 74. — B. sommer- o. winter-

*) Ich verzichte hier auf jede Sektionseinteilung, da sich eine Anzahl sehr differenter Arten hier drängen, die unter Berücksichtigung der nächstverwandten in eine ganze Anzahl von Sekt. zu gliedern wären.

o. immergrün, stachelspitzig-buchtig gezähnt o. gesägt o. spitz-fiederlappig, Fr.-Reife 2-jährig, nur bei *suber* 1-jährig.

○○ siehe S. 181. C B. meist über $2\frac{1}{2}:1$. Seitennerven kaum unter 8—10, Cupula-Sch. nie sämtlich lineal und $\pm$ zurückgebogen.

* B.-Stiel 0,5—2 cm.

+ Fr. vgl. Fig. 109b, B. vgl. Fig. 108d, Seitennerven 10—19.

17. *Q. serrata*: b—h, bis 13 m. Borke dick, tief längsrissig, Zw. jung beh., $\bar{\sigma}$ olivbraun, kahl. B. 6—16:2—3,2 cm, an Lohden verkehrt-eilänglich bis 20:6 cm, Grund dann γ herzförmig, jung oben γ anliegend steif hell beh., unten auf Nerven und Rand dgl., auf Fläche aber bräunlich kurzzottig, büschelhaarig-achselbärtig, zuletzt oben kahl, glänzendgrün, unten lebhaft hellgrün, nur noch sehr verstreut beh.*), Stiel 0,5 bis 1,2 cm; Bl. vgl. Fig. 109a—a¹, Fr. zu 1—2.

Q. s. THBG., Fl. jap. 176. 1784. — Kastanien-E.; japonese silkworm o. — Japan (Kiu-shiu bis Hon-shu). — Bes. an Südhängen der Gebirge. — Blz. V. — Frz. X. — Schöne Art, deren Anpflanzung in geschützten Lagen bis Prov. IV—III zu empfehlen.

++ Cupula-Sch. vgl. Fig. 109e—f.

Δ Fr. vgl. Fig. 109e, B. wie Fig. 108e, Seitennerven 6—12, Neb. meist bleibend.

18. *Q. castaneaefolia*: h, bis 25:1 m. Borke glatt, Zw. jung zartfilzig, $\bar{\sigma}$ kahl o. mit feinen Haarresten, stumpfkantig, gleich den σ mit ∞ hellen höckerförmig. Lent., B. 7—15:3—5 (—6) cm, Grund selten rundl. bis seicht herzförmig, obers. im Alter kahl, glänzendgrün, unters. hellgrün, jung dichter, später schwach grauweiß büschelhaarig, zuw. bis auf Nerven kahlend (*f. glabriuscula* DC., Prodr. XVI, 2, 50. 1864), Stiel 0,5—2 cm; Bl. vgl. Fig. 109c—d¹, Fr. zu 1—3.

Q. c. C. A. MEYER, Verz. kauk. Pflz. 44. 1831. — Kastanienblatt-E.; ch. à feuilles de châtaignier. — N.-Pers., S.-Kauk. — Für Prov. V—VI zur Anpflanzung zu empfehlen.

Δ Fr. vgl. Fig. 109f, B. wie Fig. 108f, Seitennerven 10—15, Neb. abfällig.

19. *Q. libani*: sparriger b bis 10 m hoher h, Zw. nur jung sehr fein beh., bald kahl, stark kantig, bräunl., mit ∞ feinen Lent., Kn. stumpfkantig, eispitzig, 4—6 mm lang, Sch. ∞ , gewimpert: B. 4—9,5:1—3,5 cm, Basis rundl.-ausgeschweift, doch immer ein Wenig am Stiel vorgezogen, oben fast stets kahl, unten teils durchaus verstr. fein büschelhaarig (Lape!) o. nur auf Nerven etwas beh., γ fein achselbärtig; Stiel 0,8—1,8 cm; σ Bl. ähnlich voriger; Eicheln fast ganz eingeschlossen.

Q. l. OLIV., Voy. II, 290, t. 32. 1807. — Libanon-E. — Gebirge Syriens, Ciliciens. — Sehr variabel und in ihren Formen noch nicht genau studiert. Scheint bis Prov. IV—V hart zu sein.

γ B.-Stiel 0,2—0,3 cm, B. vgl. Fig. 117a, Seitennerven 7—12.

20. *Q. macedonica*: Habituell *Q. libani* sehr ähnlich, $\bar{\sigma}$ Zw. olivbraun, fein mehlig beh., Lohden kahler, an diesen Kn. größer, sonst

*) Die keineswegs mit *serrata* zu vereinigende *chinensis* BGE., Enum. Pl. chin. 61. 1831, ist unters. dicht weich büschelhaarig. Sie heißt richtiger *brunzeana* FORB., in Jour. Bot. 1884, 83, da ABEL bereits in Narr. Jour. China 165. 1818 eine *Q. chinensis* publiziert hat.

Fig. 108. *Quercus* und *Paumotu* B.-Formen: a *glauca* (kleines B.) — b *aurata* (großes B.) — c *cuspidata* — d *errata* — e *castanea* (Paumotu) — f *alba* (großes B.) — g *oblongata* — h *lusitana* — i *macrocarpa* — k *texana* — l *chrysantha* — m *macrocarpa* — n *dehnbachensis* — o *glandulifera* — p *rossi* (serrata) — q *platensis* (becherf.) — r *gambelii* — s *macrocarpa* — t *chrysantha* — u *acuminata* (castanea) — v *macrocarpa* — w *fruticosa* (alles knapp 1 nat. Gr.) Original.

○○ B. meist nicht über 2:1, Seitennerven nicht über 6, o. sonst B. und Fr. wie Fig. 110.

* B. sommer- o. wintergrün, vgl. Fig. 108l—m und Fig. 110.

+ B. nicht o. wenig länger als breit (Fig. 108l), Cupula-Sch. durchaus aufrecht (Fig. 109h).

* $\frac{1}{2}$ siehe S. 183.

21. *Q. ehrenbergii*: b bis mäßig hoher breitkroniger b. Borke weniger rissig, braungrau, warzig; Zw. jung gleich Kn. dick gelbgrau filzig, auch © Zw. noch $\pm$ beh.; B. 4—6:2,5—4—6(—6,5) cm, vielgestaltig (an *Crataegus orientalis* gemahnend, spät abfällig, beiders. büschelhaarig-filzig, oben stark kahlend, tiefgrün, unten graugrün; Bl. mir unbekannt.

Q. e. KOTSCHY, Pl. exsicc. Cilic. No. 393. 1853 [et Die Eich. Eur., t. XV. 1862]. — Gebirge Cilic., Libanon, Antilibanon. — Kaum in Kultur. Vielleicht Prov. VI.

- B. deutlich länger als breit, Cupula-Sch. alle o. nur oberste zurückgebogen.

△ B. vgl. Fig. 108m, Zähne $\pm$ langgrannig, Cupula bis etwa 3,5 cm Dm., Sch. breit, nur schmalere oberste zurückgebogen, Eichel bis etwa 4,5:2 cm.

22. *Q. aegilops*: b, bis 25 m: Zw. wie vorige; B. 6—12:3—7 cm, jung beiders. dicht sternfilzig, dann stärker kahlend als vorige, Textur derber, mehr lederig; Stiel 1,5—3 cm; Fr. einzeln, sitzend, Eichel mindestens $\frac{1}{2}$ frei.

Q. a. L., Sp. pl. 996. 1753. Ziegenbart-E. — S.-Ital., Griechl., Or. — Der Formenkreis dieser Art ist noch recht wenig gesichtet, es dürften sich auf Grund der Fr.-Charaktere 4—5 Arten festhalten lassen, die jetzt als Formen o. gar Synonyme hierher gestellt werden. — In Kultur sah ich nur im Hort. SIMON-LOUIS ein junges Pflänzchen, welches hierher gehören dürfte; was ich sonst als *aegilops* erhielt, war *cerris*. Wohl nur für Prov. VI—VII geeignet.

△△ B. und Fr. vgl. Fig. 110, Grannenspitzen der Zähne höchstens 1 mm lang.

23. *Q. cerris*: b—b, bis über 35:1,5 m. Habitus *robur* ähnlich, aber Krone lockerer, nicht so mächtig, Borke schwärzlicher, dick wulstiger (Fig. 111), $\rightarrow$ Zw. $\rightarrow$ furchigkantig, $\rightarrow$ filzig und soweit kahl glänzend olivgrün o. bräunlich, erst an $\rightarrow$ grauen die Lent. auffälliger, Kn. vgl. Fig. 112d—h; B. oben meist ganz kahlend tiefgrün, unten wenigstens auf Nerven $\rightarrow$ beh. bleibend, an Lohden Beh. stärker, äußerst variabel (vgl. Fig. 110), lederig-häutig; Herbstf. gelbbraun, Neb. borstlich filzig, bleibend; Blst. ♂ bis 8 cm lang, $\rightarrow$ 1—4-blütig; Fr. sitzend o. kurz gestielt, braun, an Spitze filzig, bis 3 cm lang, $\frac{1}{2}$ $\rightarrow$ $\frac{1}{2}$, frei. Becher filzig.

Die Gartenformen, soweit sie nicht hybrider Natur, sind belanglos o. noch nicht klaggestellt. Es seien nur erwähnt: *var. a. typica* LOUD., Arbor. III, 1847. 1844. B. spitzlappig (Fig. 110a), hierher: *f. lacinata* PETZ. et KIRCH., Arb. Muse. 636. 1864, B. fiederspaltig spitzlappig. — *f. argenteo-variegata*: B. weißbunt. *f. aureo-variegata*: B. gelbbunt. — *b. austriaca* LOUD., l. c. 1848. *Q. austr.* WILLD., in L. Sp. pl. ed. IV, 454. 1805, B. seicht lappig (Fig. 110b), da an Stocklothen wie *c.*, aber auch an alten Pfl., dann identisch mit *f. helophyllos* [LAM., Encycl. I, 7, 18. 1783] (*Q. tournefortii* WILLD., l. c. 455). — *c. pendula* NEILL, in LOUD., l. c. 1847. Zw. $\pm$ überhängend.

Q. c. L., Sp. pl. 997. 1753 (*cinerea* LAM., Encycl. I, 718. 1783; *chinata* SALISB., Prodr. 393. 1796). — Zerr- o. österreichische E.; turkey or bitter or mossycupped o.; ch. chevelu ou lombard. — L. G. D. fehlend, OU. zerstreut in Mähr., Nied.-Östr., Steierm., Krain, Istr., Ung., Sch. nur Tess.; sonst S.- und SO.-Eur. —

Standort: Bergwälder, bis etwa 700 m. — Blz. V, Laubausbr. Mitte IV bis Auf. V, Frz. IX (2. Jahr), B.-Fall X–XI; Durchschnittsalter: 200 Jahre, wird etwa im gleichen Alter wie *robur* mannbar. — Holz: deutl. rotbraun, härter und dichter als

Fig. 110. *Quercus cerris*: a—d B.-Formen ($\frac{2}{8}$); e ♀ und f ♂ Bl.; g Stb. von vorn; h Frst.; i halbe Cupula im Längsschnitt; k Eichel (a nach KORSCHY, c—h, k nach HEMP. et WILH., sonst Original).

bei *robur*-Gruppe, aber von geringerer Dauer, doch sehr brennkräftig, sp. Gew. 0,55. — Nutzen: Schöner Parkbaum, soweit winterhart, sonst *robur* forstlich und industriell weit nachstehend. Sie liebt offene Lagen mit tiefgrundigem, nicht zu leichtem Untergrund. Als Brennholz der Buche fast gleichwertig. Da Fr. ziemlich groß, brauchbar als Futter.

23×27 *Q. cerris* × *suber*: *Q. lucombeana* HOLW., in Philos. Trans. LXII, 128. 1772 (*Q. exoniensis* LODD., Cat. 1836). $\frac{1}{2}$, aufrecht breitpyramidal, nach LOUDON bis 25:1,8 m, Borke ± stark korkig, B. vgl. Fig. 119 c, ± lederig, ± wintergrün, oben zuletzt fast kahl, unten ± grauweißfilzig. — Bl. und Fr. sind mir unbekannt, ich habe auch von B. noch nicht genug gutes Material gesehen, aber eine genaue ver-

Fig. 111. *Quercus cerris*: Borke eines 1 m starken Stammes. (Orig. n. C. K. SCHNEIDER.)

gleichende Betrachtung der Haarformen hat mir gezeigt, daß die Annahme *ilex* $\times$ *cerris* unhaltbar, überdies ist *ilex* eine viel weiter von *cerris* abstehende Art, als *suber* und ebensowenig, wie es Bastarde *cerris* $\times$ spec. sect. *Robur* gibt, wird es Hybriden *cerris* $\times$ *ilex* geben, denn die Arten des Subgenus *Cerris* kreuzen sich schwerlich mit denen von *Lepidobalanus*. Alle *cerris* $\times$ *pubescens* AUCT. gehören ins Reich der Fabel! — *Q. fulhamensis* LOUD., Arbor. III, 1850, 1844 *cerris* var. *dentata* WATS., Dendr. brit. II, t. 93, 1825, non *dentata* THBG., scheint nur eine weitere Form der Kreuzung *cerris* $\times$ *suber* mit mehr runder Krone, glatterer Borke und kahlerem Laube. Ich bitte alle Interessenten um gutige Überlassung von Bl- und Fr-Material dieser mir noch fraglichen Hybriden!

Fig. 112. *Quercus*: a—c *contorta*, a $\bullet$ Zw., b dgl. im Q.-Schn., c Kn.-Sch. d—h *cerris*: d $\bullet$ Zw., e dgl. mit Kn. ohne Neb., f Kn., g Kn.-Sch., h Zw.-Q.-Schn. i—n *lanuginosa* (*pubescens*): i $\bullet$ Zw., k Kn., l Kn.-Sch., n Zw.-Q.-Schn. 1—6 vgl. Fig. 731 (Orig. nach C. K. SCHNEIDER).

** B. immer- (o. winter-)grün, meist dicklederig.

+ Sch. der Cupula sämtlich zurückgekrümmt o. $\bullet$ stachelspitzig ++ siehe S. 185.

Δ B. (Fig. 108 g) unten dicht braungelbfilzig, Fr. vgl. Fig. 109 g¹.

24. *Q. alnifolia*: sparriger b $\bullet$ St. mit aschgrauer, warziger Rinde, junge Triebe dicht gelbgrau büschelhaarig. $\bullet$ nur noch schwach filzig: B. 2—5:1,8—4,5 cm, zuw. verkehrt-eifg., Grund meist leicht herzförmig, o. breit gerundet, oberseits tief olivgrün, fast ganz kahlend, unterseits die 5—7 Seitenerven trotz Beh. deutl., Stiel 0,4—1 cm: Blst. gleich Zw. beh., A. vgl. Fig. 109 g.

Q. a. POECH, Enum. pl. Cypri 12, 1842 (*Q. cypria* JAUB. et SPACH, Illustr. pl. or. I, t. 56, 1843). Erlen E.: ch. à feuilles d'aune. — Gebirge Cyprens Als Unterholz in Kiefernwaldungen. — Hält nach KOTSCHY in Heimat dort aus, wo im Winter einen Monat lang Schnee liegt. Also für Prov. VI—VII wohl versuchswert.

- B. unten hellgelblich o. grau- o. weißgrau beh. o. kahlend.
 = B. 4—9:2—4,5, Stiel 0,5—1 cm (Fig. 113 c—d), Fr.
 wie g—h.

25. *Q. pseudosuber*: b o. kl. knorriger b, bis 12 m. im Habitus vgl. *suber*, doch Korkrinde viel schwächer. Äste grau, gestreckt, mit vielen B.-N.-Wülsten; Zw. bräunlichgrau filzig; Kn. klein, rundlich; B. dünnlederig, oben tiefgrün, nur mit Lupe feine Haare erkennbar, unten hellgrau filzig, zaw. nur wintergrün; ♂ Blst. bräunlichfilzig; Fr. fast sitzend, Becher grau filzig.

Fig. 113. a—b *Quercus haas*: a B. mit Frst.; b ♂ Bl. — c—h *Q. pseudosuber*: c, d B.-Formen; e ♂ Bl. und f Stb.; g h Cupula und Eichel (a—b, e—f nach KORSCHY, sonst Original).

Q. p. SANTI, Viagg. M. Amiata I, 156, t. 3, 1795 (? *hispanica* LAM., Enc. méth. I, 712, 1783; *aculeopifolia* PERS., Syn. pl. II, 570, 1807; *fontanesa* GUSS., Ind. sem. Boec. 10, 1826). Falsche Kork-E.; false-cork o.; ch. faux Liège, Douino. — I. G. nur O. Istr. (bei Pola, Volosca, Dalm.; sonst S.-Frankr., S.-Ital., Montenegro, Alban., Rhodos. — Standort: trockne, sonnige Hügel, hie und da im Laubwald eingesprengt. — Blz. IV—V; Frz. Herbst. — Als Zier-b wohl belanglos; Rinde zur Kork- und Gerbstoffgewinnung nicht brauchbar.

- === B. 1—5:0,5—2,5, Stiel 0,1—0,4 cm (Fig. 114f),
 Fr. wie a—b.

26. *Q. coccifera*: meist sparriger, bis 2 m hoher b, selten b; Rinde hell, kaum rissig im Alter, sonst glatt; Zw. jung fein bräunlich sternhaarig, Kn. braun, klein, fast kahl; B. starr lederig, buchtig-wellig, meist sehr stachelig, oben kahl, glänzend sattgrün, unten fein gelblich-grau filzig o. kahlend; Blst. sternfilzig, Bl. vgl. Fig. 114e e; Fr. von wechselnder Größe, bis 3 cm lang, oberste aufrechte Schuppen weich.

Q. c. L., Sp. pl. ed. II, 1413, 1763 (*pseudococcifera* WEBB., It. hisp. 15, 1838, non DESF.; *mexa* BOISS., Voy. bot. Esp. II, 519, t. 166, 1845; *anodonta* BORB., in Erdesz. Lap. XXVI, 1887). — Kermes-E., kermes or berry-bearing o.; ch. aux kermes. — I. G. nur O. S.-Istr. u. Dalm. (Neresi, Sabbioncello); sonst Medit. — Sonnige trockene Lagen. — Blz. IV—V; Frz. Herbst; Holz: sehr hart, dicht. Sp.-Gew. 1,07 (lufttrocken). — Nutzen: Für unser Gebiet kaum von Bedeutung.

In Heimat Holz u. Rinde u. Fr. (für Mast) geschätzt. Wurz. liefern wertvolle Lohrinde (Garouille), sie hat 20% mehr Tanningehalt als *sessilis*. — Die auf dieser Art lebende Kermesschildlaus (*Coccus Laccinum*, Les L.) liefert den Kermesfarbstoff (unechte Cochenille).

Fig. 114. a—f *Quercus coccifera*: a—b Fr.-Formen; c Stb.; d ♀ und e ♂ Bl.; f B. — g—l *Q. ilex*: g ♂ Bl. und Stb. (h); i ♀ Bl.; k ♀ Blst.; l Fr. (a—e, k nach HEMP. et WILH.; g—i, l nach KOTSCHY, f Original).

26×31 *Q. coccifera* × *ilex*: SAPORTA, in Compt. rend. ac. sc. Paris 1877. 244. Mir sehr fraglich! Nicht gesehen.

++ Cupula-Sch. sämtlich aufrecht.

△ Fr.-Reife 2-jährig, Fr. vgl. Fig. 115d, B. wie f—g, zuletzt kahl o. fast kahl, beiders. ± glänzend grün.

27. *Q. wislizeni**): b—b, o. zuw. b bis 25:1,8 m; Borke alter St. dickschuppig; Zw. jung beh., ☉ kahl o. fast kahl, glänzend rotbraun, Lent. fein, ∞; Kn. hellbraun, fast kahl, 3—4 mm lang; B. dünn ledrig, zuw. ganzrandig, feine Nervatur deutl., bes. ober., 1,5—15:1—4,5 cm, Stiel 0,4—1,5 cm; Bl. und Fr. vgl. Fig. 115.

Fig. 115. *Quercus wislizeni*: a ♂ Bl. von oben, b Stb., c ♀ Bl., d Fr., e Eichel, f—g B. (Original).

*) Diese Art und *agrifolia* sind vielleicht richtiger zu *Erythrobalanus* zu stellen. Sie zeigen manche Analogien untereinander, wie wir sie zwischen *Q. suber* und *occidentalis* beobachten.

Q. w. DC., Prodr. XVI, 2, 67. 1864. — Lebens-E.; live o. — Kaliforn. (Küstenregion bis zu den niederen Hängen der Sierra Nevada). — Wohl noch nicht in Kultur. Für Prov. VI—VII zu erproben.

△△ Fr. Reife einjährig.

= Fr. vgl. Fig. 116f, B. wie g—h, unterseits meist stark kahlend, aber achselbärtig und ± glänzend hellgrün.

28. *Q. agrifolia*: zuw. niedergestreckter b h, o. auch bis 30: 2.1 m. kurzstämmig. Borke dick, Krone rundlich: erst o Zw. ganz kahlend; B. 2—16: 1.5—9 cm, derblederig. Rand meist zurückgebogen, hfg. ähnlich einer großen *coccifera*, obers. sattgrün: Stiel 0.7—7 cm: Bl. und Fr. vgl. Fig. 116.

Q. a. NÉE, in Ann. Cienc. Nat. III, 271. 1801 (*berberidifolia* LIEBM., in Overs. Dansk. Vid. Selsk. Forh. 1854. 172). — Kaliforn. (Küstenland u. im Gebirge bis 700 m). — Sanddünen, Täler etc. — Vgl. *wislizeni*.

=== Fr. vgl. Fig. 117k, B. wie c—d, unters. meist leicht grauweiß überzogen bleibend.

29. *Q. suber*: h—h, bis 16 m; Krone breit und locker, kurz über der Erde in mehrere Äste aufgelöst; Rinde anfangs glatt, rostbraun, bald korkig, in dicken Platten sich ablösend; Zw. gelbgrau filzig; Kn. klein, stumpflich, filzig; B. zuweilen fast ganzrandig, sonst Zähne meist kürzer und weniger scharf als bei *coccifera*, Beh. zuw. bis auf Rippe unten verschwindend; ♂ Blst. bis 4 cm lang, grau filzig, ♀ 1—3-blütig; Fr. fast sitzend, etwa 1/2 frei.

Q. s. L., Sp. pl., 995. 1753 (*suberosa* SALISB., Prodr. 392. 1796; *bivoniana* GUSS., Fl. sicul. syn. Vol. II, 604. 1844; *subera* ST. LAGER, in Ann. soc. bot.

Fig. 116. *Quercus agrifolia*: a ♂ Bl., b Stb., c P. von oben, d ♀ Bl., e N., f. Fr., g—h B. (Orig.).

Lyon VII, 133. 1886. — Kork-E.; cork tree; chêne Liège, Surier. — I. G. nur O Istr. (Kaiserwald b Pola); sonst SO-Frank., Span., Ital., N.-Afr. — Sonnge. trockene Lagen. — Blz. IV—V, Frz. Herbst. — Da sie nur bis 10° C. aushält, für uns belanglos. In Heimat sehr wertvoll wegen Korkrinde, auch innere Rinde treffliches Gerbmateriel (bis 15% Tanningehalt). Holzwert *alex.* — Über die Korkgewinnung sei noch bemerkt, daß die normale Korkrinde, der sog. *l* Kork (*liège mâle*), hart und wenig elastisch, also geringwertig ist. Die *h* werden vom 20—25. Jahr an (im VII—VIII) geschält, wobei Rindenparenchym freigelegt wird, welches den brauchbaren, weichen Kork (*l*, Kork, *liège femelle*) erzeugt, dessen Schälung alle 8—10 Jahre wiederholt werden kann, bis *h* etwa 150—200 Jahre alt*). — Fr. Viehfutter.

*) Vgl. sonst Dr. E. A. MÜLLER, Über die Korkeiche. Wien 1900 (aus Abb. K. K. Geogr. Ges. Wien 1900, No. 7).

Dieser Art steht sehr nahe die so hfg. mit ihr verwechselte *Q. occidentalis* GAY, in Ann. sc. nat. sér. 4, VI, 242. 1856, die sich aber vor allem durch 2-jährige Fr.-Reife unterscheidet. Es scheint hier ein ähnliches Verhältnis zu sein, wie zwischen *Q. phellos* und *Q. punctata*, denn daß *suber*, wie BOISSIER (Flor. or. IV, 1168. 1879) angibt, zu *ilex* zu stellen sei und N. wie die Arten von *Lepidobalanus* habe, konnte ich nicht bestätigt finden. Sind auch die N. von *suber* kürzer als bei *occidentalis* o. *pseudosuber*, so doch (vgl. Fig. 117 f) von den *ilex*-N. (vgl. Fig. 114 k [i ist ungenau!]) gut verschieden. Allerdings bedürfen alle Arten aus dem Verwandtschaftskreise der *suber* o. *ilex* noch gründlicher vergleichender Untersuchungen.

Fig. 117. a *Quercus macedonica*; B. b—l *Q. suber* und *occidentalis* (mit!); b junger Frst.; c d B-Formen; e ♂ Blst. z T.; f ♀ Blst.; g ♂ Blst.; h ♀ Blst.; i Stb. von vorn!; j Fr.; k Eichel b, f nach HEMP. et WILH., c, g, k nach KOTSCHY, sonst Original).

29×31 *Q. suber* × *ilex*: als solche gilt *Q. morisii* BORZI, Fl. for. Ital. 1880. Mir unbekannt und sehr zweifelhaft.

b. Gr. kurz, fast vom Grund aus nach vorn verbreitert, an Spitze abgerundet. Sch. der Cupula meist sämtlich aufrecht, angedrückt, plötzlich zugespitzt, selten oberste verlängert, schmal linealisch, ± zurückgebogen.

Subgenus c. *Lepidobalanus* sensu OERST., l. c. 65. B. meist sommer-, seltener winter-, selten immergrün, meist buchtig stumpflappig, seltener stachel-spitzig-zählig o. ganzrandig. Fr.-Reife 1-jährig, seltener 2-jährig.

Sekt. 1. *Ilex* OERST., l. c. 69, ex parte, B. immergrün, dick- lederig, Fr.-Reife 1- o. 2-jährig. Sekt. 2 siehe S. 190.

C Fr.-Reife 2-jährig, Fr. wie Fig. 131 o. B. wie Fig. 108 t.

30. *Q. chrysolepis*: b, z. T. niedergestreckt o. $\bar{b}$, selten $\bar{b}$, bis 15:1.5 m. Krone breit, buschig. überhängend. Rinde erst spät deutl. korkig: Zw. jung dicht, bis " gelbgrau beh., Kn. 3—4 mm lang, rundl.-eifg., kurz beh.: B. 2.5—4 : 1.3—2.2—3.2 cm (bei *var. vacciniifolia* ENGLM., in Trans. St. Louis Ac. II, 393. 1876, nur bis 2:1 cm, vgl. Fig. 1084 rechts) anfangs oben verstr. büschelhaarig und braun-drüsig, unten dicht beh. mit ∞ Drüsen, später oben tiefgrün, kahl, unten beh. bleibend, erst im 2. Jahre kahlend, dann bläulichgrau. Grundseicht herzfg. bis rundl.-keilig. Seitennerven 6—10; Stiel 0.2—0.8 cm; Bl. und Fr. wie Fig. 131 n—o, gleich den B. sehr variabel, Fr. zu 1(—2).

Q. ch. LIEBM., in Overs. Dansk. Vid. Selsk. Forh. 1854. 173 (*Q. vacciniifolia* KELLOG, in Proc. Cal. ac. I, 96. 1855). — Goldschuppige E; live or maul o. S.-Oreg bis SW-Sierra Nev. in Kalif. — Nach C. A. PURPUS bes. in der sog. Chapparal-region zwischen 900—1300 m als $\bar{b}$, bis 2600 m als $\bar{b}$. — Für Prov. V—VI zu erproben. — Vgl. Vegetationsbild in Gard. a. For. 1892. 127.

○○ Fr.-Reife 1-jährig.

- B. unten bleibend beh., wie Fig. 118, Fr. wie Fig. 1141.

31. *Q. ilex*: $\bar{b}$ $\bar{b}$, bis über 20 m; als $\bar{b}$ kurzstämmig, sparrig u. breitkronig, knorrig: Rinde glatt, aschgrau, zuletzt kleinschuppig; Äste bräunlich, $\pm$ warzig; Zw. jung gelbbraunfilzig; Kn. klein, stumpf-

Fig. 118. *Quercus ilex*: B.-Formen (c nach HEMP. et WILH., sonst Original).

lich, beh.: B. äußerst variabel, 1—7.5:0.3—5 cm, oben beh. bis kahl, sattgrün, unten bleibend filzig weißgrau, größere in Textur dünnlederig, an Lohden derber, schärfer gezähnt, was auch bei *suber* der Fall ist; Stiel 0.6—1.5(—2) cm; Blst. $\pm$ 4—6 cm lang, $\pm$ langgestielt; Fr. sitzend, bis 3.5 cm. — Auf die noch sehr der Untersuchung bedürftigen Varietäten kann hier nicht eingegangen werden.

Q. i. L., Sp. pl. 995. 1753 (*grammuntia* L., l. c.; *sempervirens* MILL., Gard. Diet. ed. VIII, No. 3. 1768; *ballota* DESF., in Mém. ac. Paris 1790, 393; *ilex folia* SALISB., Prodr. 392. 1796; *pseudolex* CHATIN, in Bull. Soc. bot. France XVI, 22. 1869). — Immergrün- o. Stein-E.; common evergreen or holm o.; ch. yeuse ou vert. — I. G. nur O. S.-Tirol, bei Triest u. dalmat. Insel Arbe; sonst Medit. — An

Zusammensetzung der Macchien stark beteiligt. — Blz. IV—V. Frz. Herbst. — Holz: sehr hart, schwer, dauerhaft, nach dem Kern zu — gebräunt, nicht deutl. ringporig, sehr brennkräftig, sp. Gew. 1,04. — Wird mit 12.—15. Jahr mannbar. — Von allen typisch medit. Eichen die wertvollste und härteste. Bis Prov. V in günstigen Lagen noch gärtnerisch verwendbar. — Forstlich verdient sie im Süden des Gebietes alle Beachtung und dürfte bei rationeller Kultur nutzbringend genug sein, zumal sie mit steinigten trocknen Lagen vorlieb nimmt; in S. Frankr. Anbau bereits erfolgt; — Holz industriell geschätzt, bes. Wurzelstock von Tischlern; es muß am besten vor dem Trocknen 1—2 Jahre im Wasser liegen, sonst stark reißend. — Rinde zum Gerben (etwa 7,25% Tanningehalt).

✱✱ B. wie Fig. 119h, unten ebenfalls ganz kahlend.

31a. *Q. phillyracoides*: sparriger b. h., sehr selten bis 10: 0,7 m, Zw. jung beh., auch ☉—☉ noch ±; B. 2,5—4—6,5:1,2—2—2,2—2,5 cm. jung unten und auf Rippe beiders. gleich Zw. beh., später nur Rippe am Grunde (bes. oben) z. und Stiel dicht beh., Seitennerven kaum hervortretend, obers. wenig dunkler grün als

Fig. 119. *Quercus*-B.: a *vibrayeana* — b *glauca* — c *lucombeana* — d—e *striata* — f *spec.* HORT. HEIDELBG. — g *dilatata* — h *phillyracoides* — i—k *dumalis* (alles 1/2 n. Gr.) (c nach LOUDON, i—k n. SARGENT, sonst Orig.).

unten, Stiel 0,2—0,6 cm; x Bl. P. glockig, vierlappig, verstr. beh., Stb. 3—4, wenn die Zeichnung der Bl. (N.) wie sie SHIRASAWA, Icon. Ess. For. t. XXXI, f. 4. 1899, gibt, richtig, müßte die Art in das Subgenus *Cerris* gestellt werden. OERSTED schließt sie bei *Ilex* ein, ich sah keine Bl., Fr. nach SHIRASAWA etwa 2:1,3 cm, Eichel 2/3 frei.

Q. ph. A. GRAY, in Mem. Am. Ac. n. ser. VI, 466. 1859. — Steinlinden E. Jap. (Kiushin, Shikoku, Kusu), China (Szechuen, Yunnan). Ich sah ein kleines Expl. im Schloßgarten zu Heidelberg.

Hieran schließen sich einige Eichen, die teils angeblich in Kultur, aber nicht echt vorhanden, teils als sterile Kulturpfl. nicht sicher zu bestimmen sind. Zunächst zwei nordamerikanische: *Q. dumosa* NUTT., Sylva I, 7. 1842, und *Q. coccinea*

MILL., Diet. ed. VIII, No. 16. 1768 (*sempervirens* WALT., Fl. Car. 234. 1788; *rarens* ARR., Hort. Kew. III, 356. 1789). Von *dumosa* sah ich im Hort. Bot. Darmstadt eine junge, wie es scheint echte Pfl. Sie ähnelt im B.-Charakter etwas *coccifera*, doch scheinen die B. nach SARGENT äußerst variabel, auch die Fr. Mir liegen fast nur Exemplare vor von *dumosa* var. *bullata* ENGELM., in Trans. St. Louis Ac. III, 393. 1877, die unter dem doch wohl unnötig von SARGENT (in Gard. a. For. 1895, 93) abgeänderten Namen var. *revoluta* gehen. Von *Q. virginiana* sah ich in La Mortola an der Riviera Expl., für uns höchstens in Prov. VI–VII zu versuchen. — Ferner erhielt ich durch die Güte des Herrn Garteninspektor MASSIAS aus dem Schloßgarten zu Heidelberg noch 2 angeblich asiatische Arten: *Q. dilatata* und *Q. striata*. *Q. dilatata* HORT. stimmt nicht mit *dilatata* LDB., denn diese hat B. wie Fig. 119g zeigt, die also in ihrem viel feineren Adernetz und der scharten Spitze stark abweichen. Die heidelberger Pfl. läßt sich nach dem mir vorliegenden Material wie folgt skizzieren: kurz gedrunken verästelter b (?), junge und c) Zw. flockig büschelhaarig zottig, sonst olivbraun, Lent. verstr. bis ∞, deutl. Neb. breit lineal, — beh., etwa 8–10 mm lang, bleibend, B. wie Fig. 119f, ober. bis auf Rippe kahlend, tiefgrün, Seitennerven deutl. vertieft, unters. ebenfalls stark kahlend, aber außer auf Rippe auch in Achseln der Nerven und auf Fläche — verstr. Haarreste, bräunlichgelbgrün, Seitennerven sehr scharf hervortretend, feinste Nervatur undeutlich, Textur lederig, Zähne scharf, 3,5–6,5 : 2,5–4 cm, Stiel 0,2–0,4 cm. — Als *striata* SIEB. hat ANDRÉ, in Illustr. Hort. 1870, 244, eine „japanische“ Eiche beschrieben. Mir ist gerade dieser Band nicht zugänglich und FRANCH. et SAV. erwähnen in ihrer Enum. pl. jap. 1879 eine solche Art nicht, ebensowenig finde ich sie in anderen Quellen wieder. Die heidelberger sonst nicht mit einer anderen Art identifizierbare Eiche sei nach dem von mir gesammelten Expl. wie folgt skizziert: b (?), Zw. jung dicht filzig, erst c) kahlend, Neb. schmal lineal, 0,7 cm lang, dicht beh., teilweise bleibend, B. vgl. Fig. 119d–e, zuw. Spitze deutl. ausgerandet, so daß oberster Zahn in Bucht sitzt, ober. bis auf Rippe am Grunde kahlend, — gelbgrün, unters. dicht weißgrau filzig, Haare denen von *lex* sehr ähnlich, der diese Art am nächsten zu stehen scheint, Seitennerven (6–8) schwach hervortretend, 1,5–6 : 1,5–2,2–3 cm, Stiel 0,3–0,6 cm, dicht beh., Textur derb lederig.

- Sekt. 2. *Gallifera* SPACH, Hist. nat. Veg. XI, 170. 1842. B. winter- o. sommergrün, z. T. lappig-gesägt, Fr.-Reife 1–2-jährig*).
 C B.-Stiel 0,2–0,4 cm. B. 3–5,5 : 1,2–2,5 cm. Rand wellig-buchtig-stachelzählig (Fig. 108w).

32. *Q. fruticosa* (*Q. humilis*): meist nicht über 1 m hoher, sparriger b, selten b, bis 4 m, *lusitanica* sehr nahe stehend; B. mit 4–7 Seitennerven, noch später abfällig; Cupula etwas niedriger.

Q. f. BROT., Fl. lus. II, 31. 1804 (*Q. humilis* LAM., Encycl. I, 719. 1783, non MILLER 1768). Strauch-E. — S.-u. M.-Span. und Portug., N.-Afr. — Offene trockene Lagen. — Mir in Kultur nicht bekannt geworden, nach KOEHNE (1893) im Forstgarten zu Chorin als *sessilifolia dentata*. Dürfte echt nur für Prov. VI–VII in Betracht kommen.

CC B.-Stiel über 5 mm lang, B. flacher und stumpfzählig.

- B. deutlich lappenzählig (Fig. 108h), Textur derb. Unters. bleibend feinfilzig. Fr. vgl. Fig. 109k, Fr.-Reife 2-jährig.

33. *Q. lusitanica*: sparriger b o. b, bis 20 m, Zw. jung kurz gelbgrau büschelhaarig; auch — noch — beh., Kn. etwa 5–6 mm lang, — beh., B. 3–6 : 1,5–4 cm, oben zuletzt fast ganz kahl, glänzendgrün, unten hellgrau, Seit.-Nerven 7–9, zieml. deutl., Stiel 0,5–1,3 cm.

*) Die noch sehr ungenau bekannten, äußerst variablen Arten dieser Gruppe, die man unmöglich in solche Sammel-species vereinigen kann, wie es ZABEL im H. d. D. D. G. 72. 1903 wohl nur auf Grund der mangelhaften Angaben BOISSIERS u. and. Autoren getan, scheinen z. T. 2-jährige Fr.-Reife zu haben. Jedenfalls bedürfen sie noch gar sehr der Sichtung! Ich kann hier nur einige Typen herausgreifen.

Q. / LAM., Encycl. I, 719 1783. — Lusitanische Gall-E.; eh. du Portugal. Geb. der Ib. Halbinsel. Von mir echt nur im Schloßgarten zu Heidelberg gesehen. Dürfte nur für Prov. VI—VII in Betracht kommen. In der Heimat finden die an den B. durch Gallwespen erzeugten Gallen technische Verwertung, ähnlich den „türkischen Gallen“ der *Q. infectoria* OLIV.

77 B. vgl. Fig. 120 b—d, nur dünnlederig, unters. leicht blau graugrün, an kult. Pfl. fast ganz kahlend, Fr. wie h, Fr.-Reife 1-jährig.

34. *Q. veneris*: $\mathfrak{h}$, die von mir beobachtete Pfl. maß etwa 6:0,3 m. Krone breitlänglich, locker. Borke seichtrissig. Zw. jung dicht büschelhaarig, erst $\odot$ kahlend (an Expl. aus Heimat schon $\odot$ fast o. ganz kahl, lebhaft braun), Kn. kastanienbraun, breit eispitzig, etwa 5 cm lang, leicht beh.; B. 3—8:1,3—3,5 cm, beim Austrieb wie Fig. 120 a, beiders. $\pm$ beh. (in der Heimat bleibt die Unters. feinfilzig), Seitennerven im Mittel 10, unters. ziemlich deutlich; Stiel (0,8—) 1,2—1,6 cm; Bl. vgl. Fig. 120 e—g, Eicheln meist nur $\frac{1}{2}$ frei.

Q. v. A. KERNER, in litt. (*Q. cypria* KOTSCHY, Exsicc. No. 720a. 1862, non JAUB. et SPACH). — Cypern (in valle Evrico versus Galata in hortis und ad pagum Trisedils prope Prodomo, 1200 m). KOTSCHY sandte (wohl gleichzeitig) reife Fr. an den damaligen Direktor des Bot. Gartens in Wien. Ein daraus erzogener $\mathfrak{h}$ hat sich als ganz hart erwiesen und fruchtet alljährlich. Schon KERNER hatte diese Eiche als gute Art erkannt und in bester Weise Analysen zeichnen lassen.

Fig. 120. *Quercus veneris*: a B. beim Austrieb, b—d Sommer-B.; e σ Bl., f Stb., g ϕ Blst., h Fr., i Cupula zur Hälfte, k Sch. davon; l Eichel (b—d nach der Natur, sonst nach KERNER [ic. inedit.]).

Durch die Güte des Herrn Prof. v. WETZSTEIN war ich in der Lage, diese Zeichnungen z. T. verwerten zu können und beschreibe oben die für die Kulturen wertvolle Eiche. Prof. v. WETZSTEIN gestattete mir auch, den Herren SIMON-LOUIS und SPÄHN Reiser zu senden, so daß die Einführung der Art in die Kulturen im Laufe der nächsten Jahre bevorsteht.

Sekt. 3. *Robur**) [SPACH] LOUD., Arb. III. 1731. 1844. Borke schwärzlich tiefrissig, sommergrün, $\therefore$ tieflappig, selten gezähnt-gesägt.

*) Diese Sekt. ist in dem hier gegebenem Umfange nur provisorisch.

hfg. mit Buchtnerven. Cupula-Sch. stets sämtlich aufrecht anliegend. Fr.-Reife 1-jährig.

C B. stets ohne Buchtnerven. durchlaufende Seitennerven mindestens (7—) 9.

+ B. (Fig. 102i). — fein sägezählig. Seitennerven mindestens 13, Textur dünn, aber fest.

35. *Q. pontica*: b (ob immer? . Zw. kahl. kantig. tiefbraunrot. B. 5,5—18:2,5—8 cm, oben tiefgrün, kahl, nur jung auf Rippe verstr. zottig, glatt, unten hfg. deutl. bläulich bereift (nicht papillös), außerdem mit sehr feinen Gabelhaaren und etwas größeren einfachen Härchen z. bekleidet (Lupe!); Stiel 0,5—1 cm, jung ober. zottig, Neb. lineal, zottig beh., abfällig; Bl. und Fr. mir unbekannt, nach KOEHNE Cupula-Sch. 3-eckig o. eilanzettlich, Eichel etwa $\frac{1}{2}$ frei.

Q. p. K. KOCH, in Linnaea XXII, 319. 1849. — Pontische E. — Gebiet Lazistan bei Trapezunt, nördl. Kl.-As., 1300 m. Eine der schönsten Eichen sah ich nur im Forstgarten zu Hann.-Münden. Dürfte etwa bis Prov. V—IV hart sein. — Die systematische Stellung noch strittig. Scheint besondere Sekt. zu repräsentieren.

✱✱ B. nicht feinzählig, Seitennerven meist 9—12.

+ B. (Fig. 108i) unters. kahlend, zuletzt oft leicht bläul. bereift, Neb. abfällig, Fr. vgl. Fig. 109i.

36. *Q. mirbeckii*: (♂—) ♀. bis 35:2 m. Rinde und Tracht an *sessilis* gemahnend, Zw. kahl o. fast kahl, tiefbraun. Lent. sehr ∞, fein, Kn. etwa 8:5 mm, beh.; B. (5—) 12—17:3—) 6,5—10 cm, aus leicht schief-herzfg. Grunde breit o. längl.-eifg. o. ellipt., oben nur ganz jung beh., glänzendgrün, auch unten verschwindet die flockig-büschelhaarige Beh. zuletzt fast ganz, Textur derb, Stiel 1—2 (—2,5) cm; ♀ Bl. mir unbekannt! Fr. einzeln gestielt o. zu 2—4 zu einem bis 3 cm langen Frst. vereinigt.

Q. m. DUR., in Duch. Rev. bot. II, 426. 1847. — Kabylen-E.; ch. zan (ou zeen des cabyles. — Algier, Tunis, zwischen 1000—1400 m Hochwalder bildend, S.-Span.? — Schwerlich echt in Kultur. Wohl nur für Prov. V—VI geeignet.

+ B. (Fig. 108v) unters. weich graufilzig, Neb. meist bleibend, Cup.-Sch. mehr lanzettlich, unterste sehr locker, oberste sehr fein, alle dicht zottig.

37. *Q. macranthera*: ♀. bis 20 m. Zw. filzig beh., erst kahlend, Kn. stumpf eifg., etwa 5—6 mm lang, wenigschuppig, beh.; B. 6—18:3—11 cm, oben sattgrün, kahl o. fast kahl, Seitennerven 8—12, Stiel 1—1,5 cm beh.; Fr. zu 1—4 sitzend, Cupula bis 2,5 cm Dm., Eichel bis 2,2 cm lang.

Q. m. FISCH. et MEY., in Bull. Soc. nat. Mosc. XI, 260. 1838. — Persische E.; ch. à grandes anthères. — Kauk., Transk., N.-Pers. u. O.-Armen. — Gebirgsregion, bis an Baumgrenze. — Blz. V. — Bisher nur als Parkbaum geschätzt. Ob forstlich und industriell wertvoll, müßten Versuche lehren. Etwa bis Prov. III ganz hart. — Die systematische Stellung mir noch zweifelhaft. — Bl. waren mir nicht zugänglich, nur junge Fr., deren N.-Reste durchaus *cecid*-ähnlich waren! OERSTED scheint diese Art nicht untersucht zu haben, alle anderen Autoren stellen sie zu *Lepidobalanus* und BOISSIER betont ihre Verwandtschaft mit Formen von *sessilis*, indes möchte ich doch glauben, daß sie in eine andere Untergattung gehört. — Ein gutes Habitusbild gibt RADDE, im Mus. cauc. II, t. 4. 1901.

37×42 *Q. macranthera* × *sessilis*: *Q. szovitzii* ZABEL, im H. d. D. D. G. 77. 1903 (*robur* subspec. II. *sessiliflora* × *szovitsii* DC., Prodr. XVI, 2, 9. 1894), mir unbekannt und fraglich.

CC B. wenigstens im unteren Teile mit Buchtnerven, durchlaufende Seitennerven (Lappennerven!) selten über 6—7 (—8).

+ Cupula-Sch. — länglich bis lanzettlich, bes. oberste fein, aufrecht, aber nur mäßig dicht, B. vgl. Fig. 108k und Fig. 121. Lappennerven hfg. 7—9—12 o. B. fiederspaltig gelappt. Unters. bleibend beh.

×× siehe S. 194.

+ B.-Stiele 0,2—0,4 cm, B. wie Fig. 121a—c, Fr. zu 2—5 gedrängt, ± sitzend.

38. *Q. conferta*: h o. meist h bis zur Größe von *robur*, im Habitus dieser ähnlich, freistehend mit breitgewölbter, mehr hängender Krone: Rinde anfangs glatt, grau, glänzend, vom 10. Jahre bräunliche, etwas

Fig. 121. *Quercus conferta*: a—c B.-Formen; d ♂ Bl. und e Stb.; f ♀ Blst. z. T.; g Cupula; h Eichel (nach HEMP. et WILH.).

reichere und feiner struierete Borke, die hfg. durch helle Farbe auffällt; Zw. jung beh., — meist kahl, olivgrün bis hellgraubraun, Lent. zieml. deutl., Kn. vgl. Fig. 112a—c hellbräunlich; B. wie bei *robur* an Zw-Enden gedrängt, dünnhäutig, 10—18:6—12 cm, oben meist kahlend, tiefgrün, unten hfg. — weißlich bereift, Büschelhaare 2—5-strahlig; Blst. 2—4 bis 5 cm lang, — wie Fig. 121f; Eichel 2,5 cm lang im Mittel, bis $\frac{2}{3}$ frei.

Q. c. KIT., in SCHULT. Östr. Fl. ed. 2, I, 619, 1814 (*farnetto* TEN., Cat. pl. hort. Neap. 65, 1800; *apenninica* Loist., in Nonn. Duh. VII, 1, 1802, non LAM., non a. HUBENY, in Gemeinn. Blätt. Öst. u. Peth. Zeitschr. XX, II, 754, 1851, non a. HORT. NONN. — gedrängtsüchtige o. ungarische F. hungarian o., L. à glands fasciculés. — I. G. nur ÖC., Ungarn, Sieb., Bosn., Herzog., S. Dalm., sonst Ital. u. SO-Eur. — Vielfach als h na. o. österr. Hugelgegend mit Blz IV—V; Frz. Spätherbst. — Holz sp. Gew. 0,84, im Werte gleich *robur*. Sehr schöner Zier h, sonst vgl. *robur*, die von ihr forstlich noch nicht getroffen wird, da *conferta* nicht nur bestes Brenn-, sondern auch gutes Nutzholz liefert. — Industriell vgl. *robur*. — Fr. gutes Mastfutter, doch Mastjahre selten. — Bis Prov. III etwa hart.

38×40 *Q. conferta* × *lanuginosa*: *Q. braunii* BORB., in Erdész. Lap. XXVI. 1887. An gleicher Stelle beschreibt der Autor noch 3 weitere Formen und in Öst. bot. Z. XLI. 322. 1891 ist als Hybride dieses Ursprungs eine *Q. seckenviana* BORB. genannt. Ich sah keine Exsiccaten.

38×42 *Q. conferta* × *sessilis**) : *Q. tabajdiana* SIMK., in Erdész. Lap. XXV. 568. 1886; hierher ferner *Q. tufae* SIMK., l. c., und *subglandulosa* BORB., in Erdész. Lap. XXVI. 1887.

38×43 *Q. conferta* × *robur*: *Q. heuffelii* SIMK., in Mag. Növ. Lap. VII. 68. 1883 (*esculus* var. *intermedia* HEUFF., in Wacht. Zeitschr. f. Natur- u. Heilk. I. 98. 1850, non *interm.* BOENN.; *spectabilis* KIT., ex Herb. [von GUERKE, in RICHT. et G. Plant. eur. II. 64. 1897 als Hauptname publiziert, aber wo vorher?]). Hierher *Q. haynaldiana* SIMK., l. c. und *budenziana* BORB., in Erdész. Lap. 1887, 350.

++ B.-Stiele 0,5—2 cm, B. wie Fig. 108 k, Fr. zu 1—5 sitzend o. auf bis 1,5(—2) cm langem Stiele.

39. *Q. toza*: Wurzelausläufer treibender ♂—♂, bis 10(—20):1 m. Borke wie *sessilis*, Zw. jung dicht rostgelb filzig, erst kahlend, Kn. eikugelig, 3—4 mm lang, gelbbraun beh.: B. sehr variabel, oberseits zuletzt nur sehr dünn o. kaum beh., tiefgrün, unterseits Haare meist 4—7-strahlig, 4—15:2,5—7—10 cm, Lappennerven 4—7—9; Bl. und Fr. wie Fig. 109 l—l², Fr. meist etwas kleiner.

Von Formen sei var. *pendula* DIPP., Laubh. II, 74. 1892 (*camata pendula* HORT.) erwähnt, deren B. nach dem mir vorliegenden Material zieml. schmal länglich sind, Wuchs ± hängend. DIPPELS l. c. beschriebene var. *tomentosa* (*Q. velani* HORT. MUSK.) ist mir unbekannt und den Angaben nach nur typische *toza*.

Q. t. BOSC, in Jour. hist. nat. II, 155. 1792 (*pyrenaica* WILLD., in L. Sp. pl. ed. IV, 451. 1805; *tauzin* PERS., Syn. pl. II, 571. 1807; *stolonifera* LAPEYR., Hist. arb. pl. Pyr. 582. 1813). — Pyrenäen-E.; ch. tauzin. — Ib. Halbinsel, SW.-Frankr. — Bevorzugt dürre Landstriche, z. B. Dünen. — Scheint bis Prov. IV hart.

39×42 *Q. toza* × *sessilis*: *Q. trabuti* HY, in Bull. Soc. Bot. France. 1895. 556, dgl. *guerangeri* HY, l. c. 557. Mir unbekannt.

39×43 *Q. toza* × *robur*: *Q. andegavensis* HY, in Bull. Soc. Bot. France 1895. 558. Die mir vorliegenden Expl. machen mehr den Eindruck einer *toza* mit bis 3 cm lang gestielten Blst. Dagegen soll die gleichzeitig von HY, l. c. 557, beschriebene 2. Hybride B. ganz wie *robur* haben und nur in den Cupula-Sch. *toza*-Einfluß zeigen.

• • • Cupula-Sch. durchweg klein, eilänglich, fest angedrückt, Lappennerven der B. kaum über 5—7.

++ siehe
S. 197.

+ Fr. sitzend o. Fr.-Stiel höchstens so lang wie B.-Stiel.

△ ⊙ Zw. ± beh., B.-Stiele 0,8—1,2 cm, gleich den B.-Unters. meist ± bis filzig beh., Haare an Sommer-B. ohne Lupe deutl.

40. *Q. lanuginosa* (*Q. pubescens*): hfg. ♂ o. ♂, ♂ bis 20 m, selten die Maße von *sessilis* erreichend, dieser im Allgemeinen recht nahe stehend, mit noch folgenden Unterschieden: B. kleiner, 5—8—10:4—6 cm, Bl. u. Fr. zu 1—4, sitzend o. kurz gestielt, Becher dicht-filzig, vgl. Fig. 122, ferner auch Fig. 112 i—n.

Von dieser sehr variablen Art beschränke ich mich darauf, folgende Formen** zu unterscheiden: *f. brachyphylla* (WIESB., in Vukot. Nov. obl. 19. 1880) var.

*) Von den Bastarden der *Robur*-Gruppe kann ich nur die wichtigsten zitieren, es sind da, namentlich von BORBAS, SIMONKAI etc., eine Menge ganz unhaltbarer Varietäten aufgestellt worden, deren Sichtung aber nur auf Grund der Originale und ~ Vergleichsexpl. möglich. Das Gleiche gilt ± auch von den nicht hybriden Formen.

** Die hfg. hierher gezogene *Q. hartwegiana* STEV., in Bull. Soc. Nat. Mosc. 1857. I, 387, bin ich nach einem Expl., das wohl sicher von STEVEN selbst stammt, geneigt, für eine der *macranthera* zugehörige Form o. einen Bastard dieser mit einer

typica BECK, Fl. N.-Östr. 270. 1890). B. kurzklappig, wie Fig. 122 b, c. *f. paniculifida* [A. BR. in SPENNER, Fl. Frib. 282. 1825; *asperata* PERS., Syn. pl. II. 571. 1807; *lanuginosa* BORR., Flor. centr. Fr. ed. 2, II. 568. 1869). B. zwischen Form a und b schwankend; ihr oft sehr ähnlich, aber krauser, derber und auf den B.-Unters. filziger ist *f. crispata* [BECK, l. c.] (*Q. crisp.* STEV., in Bull. Soc. nat. Mosc. 1857. I, 386). Lappen meist mehr gleichgroß, 6-7 und Buchtenränder umgeschlagen. *f. pruinota* [BECK, l. c.]. Lappung spitz, wie d, eine der Formen, die sehr mit Unrecht als Bastarde mit *cerris* angesprochen werden.

Q. l. THUILL., Fl. envir. Paris, ed. II. 502. 1799, non DON (*caespitosa* MILL., Gard. dict. ed. VII, No. 27. 1759, non L.; *lanuginosa* LAM., Enc. I. 717. 1783; *cerris* PALL., Fl. ross. I, 2, 44. 1788; *pubescens* WILLD., Sp. pl. IV. 459. 1805). Weichhaarige, französische o. Schwarz-E.; ch. pubescent ou blanc. I. G. zerstr. D. nur Elsaß, S.-Bad u. Thür. (Jena, am Kunitzberge, OU. fehlt Schles., Ob.-Östr. u. Salzb., Sch. nur im südl. u. westl. Teil; sonst S.- u. M.-Eur., Kl.-As., Kauk., N.-Transk., in Rußl. nur Krim. — Hügel u. niedr. Gebirge, waldbildend am

Fig. 122, *Quercus lanuginosa* (*Q. pubescens*): a—d B.-Formen ($\frac{2}{5}$); e—g ♂ Bl. und Stb. ($\frac{1}{1}$); h—i Cupula und Eichel (nach HEMPEL et WILHELM)

schönsten in N.- u. SW.-Frankr. Blz. V (nach *sessilis* Frz. X. Holz: dichter als bei *robur*, Sp.-Gew. 0,95 im Mittel, daher fast noch dauerhafter, härter und schwerer spaltbar, doch weniger elastisch u. zähe. — Vgl. *sessilis*, stellt noch geringere Ansprüche, liebt trockenen kalkigen Boden und sonnige Lage, schön auf Verwitterungsböden trachytischer Gesteine, doch nur bis Prov. III. II. winterhart. — Forstlich in zusagender Lage für Mittelwaldbetrieb, da bestes Krummholz für Schiffsbau liefernd.

40×42 *Q. lanuginosa* × *sessilis**) : *Q. streimii* HEUFF., in Wacht. Zeitschr. I, 97. 1850 (*pallida* HEUFF., in Öst. bot. Z. 1858, 28, non BLUME; *glabrescens* KERNER, in Öst. bot. Z. 1870, 230, non SEEM.; *kerneri* SIMK., in Mag. Növ. Lap. VII, 69. 1880). Ferner gelten als Formen dieser Kreuzung: *Q. tiszae* SIMK. et FEK., in Erd. Lap. 1887, 39; *suberispa* BORR., in Termesz. Füzet. 1890, 29; *intercedens* BECK, Fl. Nied.-Östr. 271. 1890; *badensis* BECK, l. c. 272.

40×43 *Q. lanuginosa* × *robur* : *Q. pedunculata* KIT., in SCHULT. Östr. Fl. ed. 2. 620. 1814. Hierher auch *Q. ludensis* BORR., in Termesz. 1878, 322 (*ambigua* KIT., in Linnæa 1863, 351, non ALCT. ALB.). Ferner die z. T. sehr fraglichen: *Q. rubra* BORR., a. mag. homokp. novényv. 54. 1880; *asterotrachia* BORR. et USATÓ, in Mag. Növ. Lap. 1880, 131; *emiliana* BORR., in Öst. bot. Z. 1887, 198; *kantiana* BORR., in Erd. Lap. 1887, 732; *decussata* SIMK., in Erd. Lap. 1887, 415.

• Zw. kahl, B.-Stiele 1—3 cm, gleich den B.-Unters. fürs unbewaffnete Auge ganz o. fast kahlend.

kahleren Art zu halten. Was als *hirtia*, o. *apudagensis* in den Gärten geht, scheint *f. crispata*, bez. Stocktriebformen (auch *f. pruinota*). Aus Plantières besitze ich eine *hartia*, die zwar nach dem Besagten recht mit STEVENS Pfl. identisch, aber eine gute Form von *lanuginosa* darstellt, deren wirklichen Namen ich noch nicht feststellen konnte. Der von ZABEL in H. d. D. D. G. 77. 1903 geführte Name *densifolia* CHEVALIER ist mir ganz unbekannt, ich finde die Beschreibung nirgends und überdies hat ABEL bereits 1818 eine *Quercus* dieses Namens aus China publiziert.

= B. (Fig. 108n) 5—8,5 (—10) : 2,5—3,5 (—4) cm, Lappen $\pm$ gleichmäßig, im Mittel 7. Unters. fein beh., Fr. zu 1—3 auf 0,5—1 cm langem Stiele.

41. *Q. dochorochensis*: b bis kleiner b, Borke wenig rissig, c Zw. tief rotbraun, kahl (o. mit sehr feinen Haarresten), Lent. fein, ∞ ; Kn. tiefbraun, schwach beh., etwa 0,5:0,3 cm; B. bes. durch größere Kahlheit und längeren (1—2 cm) Stiel von *lanuginosa* abweichend, Fr. vgl. Fig. 131a.

Q. d. K. KOCH, in LINNAEA 1849, 328. — Dschoroch-E. — Pontus, türk. Armen., ? Griechl. Zwischen 400—1200 m. — Meines Wissens nicht in Kultur; von ZABEL (H. d. D. D. G. 77, 1903) als Bastard *lanuginosa* $\times$ *sessilis* angesprochen, was aber die Fr. kaum zulassen und mir auch sonst fraglich scheint.

— B. (Fig. 102b—c), Lappen zieml. ungleich, hfg. nicht über 5, Unters. meist ganz kahrend o. die sehr feinen Haare nur schwer zu erkennen; Fr. zu (1—) 3—7 $\pm$ sitzend gedrängt.

42. *Q. sessilis* (*Q. sessiliflora*): Diese *robur* sehr ähnliche, nicht ganz deren Maximalmaße erreichende Art unterscheidet sich vornehm-

Fig. 123. *Quercus sessilis* (*Q. sessiliflora*): a Bl.; b Stb. von vorn; c, d Blt. z. T.; e Frst.; f dgl. ohne f Eichel (nach HEMPEL et WILHELM).

lich noch wie folgt: St. schlanker, meist bis Wipfel verfolgbar; Krone regelmäßiger; Zw. gleichmäßiger bekaubt, sonst vgl. 2. Ann. S. 197; B. im Allgemeinen symmetrischer, 8—12:5—7 cm; Bl. und Fr. vgl. Fig. 123. Fr. meist kleiner und auch frisch ohne jede Längsstreitung.

var a. *typica* B. Grund — herzte, leicht gebolt o. breitrandlich (Fig. 102c) hierher: *Q. macrocarpa* DC., Prodr. XVI, 2, 9, 84 (o. *Q. macrocarpa* WIRZB. in REICH. Leon XII, S. 1, 645, 1850), B. 8—9, 5—7 o. auch bis 11 cm, Lappen etwa 6, bis in die Spreite einschneidend, stumpflich, Unters. bleibend fein beh., Ausnab. gelb, Zw. jung — ockergelb; im SO. von OC. — *Q. macrocarpa* PLIZ. et KIRCH. Arb. Mus. 630, 1861, B. — hohl, sonst typisch — *Q. macrocarpa* B. wie Fig. 102c.

Ferner gehören hierher o. zu b.: *Q. pubescens* DC., B. — weißbunt, — *Q. pubescens* var. *pubescens* B. — gelbbunt; *Q. pubescens* DIPP. Laubh. II, 67, 1860, B. jung purpurn, später tiefgrün mit roth. Nerven. — b. *decipiens* BLICHSE., in Sylva 65, 1816, B. Grund — deutl. keiltg. (Fig. 102b); — hierher *Q. longistylis* DIPP. I c. 66, 2, *Q. macrocarpa* PLIZ. et KIRCH. I c.; *Q. macrocarpa* HORT. NONN., wie auch folgende. B. sehr variabel, z. T. wie Fig. 102d, zuw. bis 20:4—6—7 cm, Stiel

1.5—3 cm; *f. lacinata* [KOEHN, Dendrol. 130, 1893, B. vgl. f., feinklappiger als bei voriger Form, etwa 8—12:3—1 cm, *f. angustata* K. KOCH, Dendrol. II, 2, 32, 1873; *Q. s.* KIR., in SCHULT. Östr. Fl. ed. 2, I, 619, 1814; *Q. mespilifolia* WALLER., Sched. crat. 194, 1822; B. längl-elliptisch bis lanzettlich, unregelmäßig undentlich und stumpflappig o. so gut wie ganzrandig; am Harz, in Pommern, Nied. Östr., Ung. beobachtet. *c. pendula*: Wuchs hangend, hieher *f. laetifolia* PERZ. et KIRCH., l. c. 631. B. ähnlich *sublobata*. — Die auf Grund der Fr. beschriebenen meist belanglosen Formen müssen hier unberücksichtigt bleiben.

Q. s. EHRH., Beitr. V, 161, 1790 (*robur* MILL., Gard. Dict. ed. VII, No. 1, 1759, non L.; *robur* var. *sessilis* MARTYN, Fl. rust. t. 11, 1792; *sessiliflora* SALISB., Prodr. stirp. hort. Chap. 392, 1760. Trauben-, Stein- o. Winter-E.; sessiliflowered or chestnut o.; ch. rouvre ou noir. — L. G. D. litg., OU. fehlt Salzbr., Sch. weniger litg., als *robur*; sonst wie diese, nur weniger weit nach Norden u. Osten gehend, die Ostgrenze läuft von 60 n. Br. Norwegen etwa über Königsberg in O.-Preuß. den Bug u. Dnjestr entlang zur Krim. Standort: Sie fehlt im Tieflande u. bevorzugt ausschließlich Hügel u. Gebirge, wo sie um 5—600 m höher steigt als *robur*. Blz. u. B.-Ausbr. im Mittel 14 Tage nach *robur*, dgl. Frz. u. B.-Fall, namentlich jüngere Pflz. behalten das vertrockn. Laub oft bis Frühjahr. Alter im Mittel 200—250, nicht über 6—700 Jahre. Holz: Sp.-Gew. 0.74 im Mittel, z. T. etwas geringer als *robur*. — Sonst vgl. *robur*, der sie als Ziergeholz vorzuziehen ist, da sie in ihren Ansprüchen mäßiger u. im Allgemeinen trocknere Lagen liebt.

Forstlich für kühlere, minder nährstoffreiche Böden vorzuziehen, zumal Nutzholzausbeute größer, da weniger Astholz. Industriell gleich *robur*, dort wo es auf leichtere Bearbeitung ankommt beliebter, so bei Tischlern, Drechslern, Holzschnitzern.

42—43 *Q. sessilis* *schum.* *Q. robur* BECHSR., in Sylven 66, t. 6, 1813. Hierher ferner: *Q. intermedia* BORNN., in REICH Fl. germ. exc. 177, 1830, *bre. pos.* HERR., in Wacht. Zeitschr. I, 99, 1850; *salva* BORR., in Mag. Nov. Lap. 1886, 133; *foeta* SIMK., in Erd. Lap. 1887, 31; *cranchiana* BORR., in D. Bot. Monatschr. 1887, 164; *aperta* BORR., l. c.; *allard* HY., in Bull. Soc. Bot. Fr. 1895, 558; *bessleri* HY., l. c.

++ Fr. gestielt, Fr.-Stiel deutl. länger als B.-Stiel.

B.-Stiel kahl, etwa 0.4—0.8 mm. B. unters. wenigstens auf Fläche ganz kahrend, Eichel im Mittel 2—3 cm lang.

siehe
S. 200.

43. *Q. robur* (*Q. pedunculata*): b. meist b, bis über 50 m; Krone starkästig, mächtig, unregelmäßig; Äste gekrümmt gewunden; im Alter sehr zahlreiche Kztr.; Rinde anfangs glatt, glänzend, allmählich in graubraune bis schwärzliche tiefrissige Borke (Fig. 125) übergehend. Zw. nur ganz jung beh. o. stets kahl, glänzend oliv- o. rotbraun, kantig, hfg. fast silbergrau, Kn. hellbraun; B. derbhäutig bis fast lederighäutig, an Lohden o. überhaupt üppigen Trieben äußerst variabel in Form und Größe, im Allgemeinen stets unsymmetrisch, wogegen bei *sessilis* viel symmetrischer, 4—14:2—8 cm, o. an Lohden größer, jung etwas seidig beh., oben tiefgrün, unten blaugraugrün, Neb. abfällig; ¹ Blst. 2—4 cm lang, ² 1—5-blütig und gestielt, Frst. bis 3—8 (—15) cm lang gestielt (daher Name Stieleiche!). Fr. meist zu 1—5, selten bis 10, Eichel 1.5—5:1—2.2 cm, meist ¹/₂ o. mehr frei, frisch längsstreifig, Schuppen filzig, vgl. Fig. 124.

Von Varietäten und Formen seien als für uns wichtigste folgende genannt: *Q. n. a. typica* BECK, Fl. Nied.-Östr. 271, 1869, B. (Fig. 124g) am Grunde herztg.

*) Dieser Name ist älter als der erst 1816, l. c. 63, publizierte *hybrida*, und oben hat BROTERO bereits 1804 diesen Namen für eine andere Eiche verwendet.

**) Vgl. C. K. SCHNEIDER, Dendrol. Winterst. 163, Fig. 157, 1863.

Die immer hieher gestellten *Q. borealis* TENORE, Sem. ann. 1825 (man. adnot. 12, *th. mar.* TEN., l. c. und *apennina* LAM., Lycop. I, 725, 1783, sind als Varietäten einer südlichen Parallelart anzusehen, die unters. lebend beh. B. lat. und auch sonst gut abweicht. Was als solche in Kultur ist, meist *Juniperus* o. die Hybride dieser, die solchen Formen kommen höchstens für Prov. V—VII in Betracht.

o gerundet, Lappen 5–7; hierher die Formen *f. argenteo-marginata*: B. nur weiß gerandet — *f. argenteo-puncta*: B. reichlich weiß gefleckt — *f. atropurpurea* (var. *fol. atrop.* PERZ. et KIRCH., Arb. Musc. 626. 1864): B. tief purpurrot, fast schwärzlich, Wuchs schwach — *f. aureo-bicolor* (P. et K., l. c. 624): B. mit ∞ gelben und weißen Strichen gezeichnet, so daß sie dreifarbig erscheinen — *f. concordia* [PERZ. et K.,

Fig. 124. *Quercus robur* (*Q. pedunculata*): a Zw. mit ♂ Blst.; b ♂ Bl. und Stb.; c Stb.; d ♂ Bl. ohne Eichel; e, f ♂ Bl. quer- und längsgeschnitten; g Bz. mit Frst., i Eichel (nach HEMPEL et WILHELM).

l. c. 625): B. lebhaft gelb, Wuchs üppig — *f. latiloba* [LASCH. in Bot. Zeitg. 1857. 414]: B. wie Fig. 126e mit nur 3–4 breiten Lappen — *f. maculata*: B. nur spärlich weiß gezeichnet — *f. cucullata* (P. et K., l. c. 622): B. nur blaßgelblich — *f. sanguinea* [SPACH, Hist. vég. XI. 151. 1842] (*Q. sang.* BECHST., Forstbot. 333. 1810; *pedunculata purpurascens* DC., Fl. Fr. Suppl. 351. 1815; *pedun. purpurea* LOUD., Arb. III, 1735. 1844): B. $\pm$ purpurn getönt; bei LeMans wild gefunden. — var. *b. cuneifolia* BECK., l. c. (*Q. c. VUCOT.*

Fig. 125. *Quercus robur*: Borke eines 1,20 m starken Stammes (Orig. nach C. K. SCHNEIDER).

Form. *Quercus croat.* 22. 1883): B. Grund spitzkeilig; hierher: *f. aureo-sanguinea*: B. gelbbunt — *f. dactylota* (var. *asplenifolia*, *genuis* etc. HORT. NONN.): B. vgl.

Die Nomenklatur dieser und der folgenden Formen ist in den Gärten höchst verworren. DIPPELS Fassungen sind ohne Bilder unverständlich. Seine *asplenifolia*

f. manchmal sämtlich lineal. Fr. sah ich hiervon noch nicht. *f. heterophylla* [TOPP in NEUB., Deutsch. Mag. 1855: 31, ex P. et K., l. c. 622]: B. sehr unregelmäßig fadenlappig, Fig. 126c. *f. laciniata* [DC., Prodr. XVI, 2, 6, 1864] (*Q. lac.* LÖDD., Cat. 1836; *pedunculata heterophylla* LÖDD., Arb. III, 1732, 1844): B. vgl. Fig. 126a—b, hfg. aber im Umriß mehr dem Typ. gleichend. — *f. pectinata* [P. et K., l. c. 624]: B. wie Fig. 126d. *var. c. hyemalis* BECK, l. c. (*Q. hyem.* STEV., in Bull. Soc. Nat. Mose. 1857. I, 385): Frst. Stiel mindestens so lang wie das B., bei *var. a* — b nur etwa $\frac{1}{2}$ so lang. *var. d. fastigiata* SPACH, l. c. (*Q. f.* LAM., Encycl. I, 725, 1783; *pyramidalis* GMELL., Fl. Bad. III, 699, 1808). Wuchs auffallend pyramidal, Fr. wie beim Typ. B. dgl., o. z. T. bunt. Über die einzelnen Formen bin ich mir noch nicht klar: in S.-Deutschl., Galiz., Calabr., SO.-Frankr. wild beobachtet. *var. e. pendula* [LÖDD., l. c. 1732] (*Q. p.* LÖDD., Cat. 1869). Wuchs — hängend, Fr. und B. wie Typ.

Q. r. L., Sp. pl. 996. 1753 (*femina* MILL., Gard. Diet. ed. VII, No. 2. 1759; *fructipendula* SCHRANK, Bayer Fl. I, 666. 1780; *pedunculata* EHRH., Beitr. V, 161. 1790; *longarica* SALISB., Prodr. Stirp. hort. Chap. 392. 1760). — Sommer- o. Stiel-E:

Fig. 126. *Quercus*-B.: a—f *robur*-Formen: a—b *f. laciniata*, c *f. latiloba*, d *f. fastigiata*, e *f. filifolia*, f *f. diversifolia*. g *Q. pseudoturkestanica*, h *Q. prinoides* — i *Q. garryana* (alles reichlich $\frac{1}{3}$ nat. Gr.) (Orig.).

conation or peduncled british o; chêne à grappes ou pédonculé ou blanc. — I G. hfg., sonst fast ganz Eur., ihre Nordgrenze zieht sich von 63° n. Br. (Norwegen) bis 5. 17° n. Br. Rußl., Gouv. Perm., südl. zum Kauk., Transk., Kl.-As. u. Meda. *) — Liebt vorzugsweise Ebenen u. hügelige Gelände, steigt im Gebirge als h nur bis 300 m im Mittel, im Osten höher. — Blz. Ant. V bis Ant. VI. — B.-Ausbr. kurz vor Blz., Frz. Ende IX—X: — B.-Fall, Spätherbst, Winter, rascher als bei *Q. robur*. — Wind freistehend mit 50—60. Jahre mannbar, im Schlusse mit 80., bei Stock

z. B. konnte ich nirgends auftreiben. Ebenso wenig ist mir die von KOCH erwähnte *gracilis* klar.

*) Die südlichen Formen sind aber noch keineswegs klargestellt, so daß S.-Grenze der echten *robur* vorläufig fraglich bleibt.

löhden oft mit 20. Jahre. — Alter: etwa 500 Jahre im Mittel, unter günstigen Umständen bis fast 2000. — Holz: Sp.-Gew. 0,76 im Mittel, in Güte nur von bestem *alba*-Holz erreicht, welches aber nie ganz so dicht und tragkräftig, dafür aber elastischer ist, an Brennkraft von *cor* s. übertroffen, sonst erstklassig, selbst im Wechsel zwischen naß u. trocken bis 50 Jahre ausdauernd. — Parkbaum ersten Ranges (z. B. auch *car. fastigata*), vor Allem aber Waldbaum. Vielleicht der wertvollste, wenigstens unter den Laubhölzern. Als hauptsächlichste Bedingungen zu einem normalen Gedeihen lassen sich nach WILLKOMM folgende bezeichnen: eine wenigstens 4 monatliche Vegetationsperiode (VI–IX), während welcher keine anhaltende Durre alljährlich stattfinden und die nicht durch Froste unterbrochen sein darf, eine mittlere Wärme von 12,5° C. (von Anf. V bis Ende X), Vollgenuß des Lichtes u. ein tiefgründiger o. im Untergrund zerklüfteter, in den tieferen Schichten nie ganz austrocknender, lehmig-sandiger Boden. *Q. robur* übertrifft *Fagus* u. *Carpinus* an Raschwüchsigkeit, wird aber von *Betula*, *Populus* u. *Ulmus* überholt. Im Hochwaldbetrieb liefert sie bei 100jährigem Alter des Bestandes 305 cbm Holz im Mittel, im Niederwaldbetrieb 20–28 „ mehr. — Industriell wertvollstes heimisches Holz für Hoch-, Erd- und Wasserbauten, Eisenbahnschwellen, Schiffsbau, Fässer, Möbel, Wagenräder, Fensterrahmen, Pfähle, Parkettböden u. dgl.

Holzkohle der der Buche gleichwertig. — Ferner zur Gewinnung von Holzeszig, Gerbstoffextrakt, Lohrinde im Schälwaldbetriebe. Rinde officinell (Cortex *Quercus*), ebenso Fr. (semen o. glandes *quercus* decorticatae), letztere auch für Eichelkaffee u. zur Schweinemast verwendet. Gerbstoffreich sind namentlich die „Knoppcorn“ durch *Cynops callosus* RATZB. zwischen Eichel u. Becher erzeugte Gallen, die vornehmlich in S.-Deutschl. u. Ung. auftreten und gesammelt werden.

— B.-Stiel 0,2–1 cm. — beh.: B. unters. auf Fläche beh. (Beh. zuw. aber nur mit Lupe deutl.).

B.-Stiel meist nicht über 0,4 cm, B. vgl. Fig. 113 a, sommergrün, Eicheln kaum unter 3,5–4 cm lang.

44. *Q. haas*: b. Tracht etc. wie *robur*, aber — Zw. fein beh., Kn. dgl.; B. meist größer, unters. bläulichgrün, s. 20:3–6–13 cm; Fr. zu 1–2 auf 6–8 cm langem Stiele, Eichel etwa 2 cm Dm.

Q. h. KOTSCHY, Die Eich. Eur. u. Or. t. 2, 1862 — Haas-E. — Kl.-As. (Cilie, Taurus), ob S.-Eur. fraglich, vielleicht ist es richtiger, diese in Kultur nicht echt vorh. und sicher zieml. empfindliche Art zu *Q. brutia* zu ziehen; ein Bastard *robur* × *laevis*, wie ZABEL (H. d. D. D. G. 78, 1903) meint, ist es sicherlich nicht, es gehen aber *haas* in den Gärten, die solche Hybriden sein können.

B.-Stiel 0,5–1 cm, B. vgl. Fig. 126 g–h, — wintergrün, Eicheln etwa 2 cm lang.

45. *Q. pseudoturneri*: b o. kleiner b. ; Zw. — büschelzottig, olivbraun, Kn. braun, eistumpflich, — beh., bis 5 mm lang; B. oben nur jung beh. (bes. Rippe), bald kahrend, — sattgrün, unters. bis zuletzt bleibend fein büschelhaarig, wenig heller, etwas blaugraugrün, Nerven — gelblich, Textur derb, 5–11:2–3–5 cm, Spitze zuw. zieml. gerundet, so daß Umriß deutl. längl. verkehrt-eifg., Grund keilig o. schwach gerundet, Mitte aber immer — vorgezogen, Neb. zuw. — bleibend, beh.: Bl.z. an jungen Fr. N. deutl. breit, Fr. zu 3–6 eine lockere, bis 4 cm lang gestielte Ähre bildend, meist nur 1 ausreifend, Cupula 1:1,3 cm, Seh. fein, aber deutl., ~, längl. lanzettl., — angedrückt, locker beh., Eichel 1,5:1,1 cm, sich nach oben zuspitzend.

Diese Eiche geht als *australis semper-virens* HORL. SPÄTH und *turneri* in den Garten. Mit *turneri* WILLD., Enum. pl. hort. Barol. 975, 1809, stimmt sie der beh. und nicht stachelzahnigen B. halber keinesfalls. Auch mit *turneri*, sensu LOUD., Arb. III, 1922, 1844, die eher der echten WILLD.'schen Pfl. zu gleichen scheint, kommt sie nicht überein. Ich sah im Schloßgarten zu Heidelberg spärliche Fr. (wie oben!). Diese beweisen, daß *cor* s. mit dieser Pfl. nichts zu tun hat. Wenn es ein Bastard ist, so ist es mir jedenfalls momentan nicht möglich, zu sagen, was für Arten daran beteiligt. Vielleicht weder *robur* noch *ilex*.

Sekt. 4. *Macrocarpa*: Rinde teils wie bei *Robur*, teils mehr den *Alba* gleich. B. mit Buchtnerven. Fr.-Reife 1-jährig. Cup.-Sch. verschieden, untere angedrückt-aufrecht, gleichmäßig o. etwas höckerig verdickt mit feiner Spitze, oberste fädlich kraus. Sekt. 5 siehe S. 203.

C • Zw. ohne Lent., etwas feinrissig, — meist — korkig, B. vgl. Fig. 127 a—b, Neb. hfg. ± bleibend, Fr. wie g—h. siehe S. 202

46. *Q. macrocarpa*: b 1 h, bis 55:2.1 m (gutes Habitusbild in Gard. a. For. 1890, 407). Krone *robur*-ähnlich, aber schlanker verästelt. Rinde *robur*-ähnlich, hellbraungrau o. rötlich braun. • Zw. olivgraubraun beh., ohne Lent., schon — feinrissig. — meist korkig. Kn. vgl. Fig. 128 i m, bräunlich: B. 10—40:5—16 cm, variabel, bei *var. olivaceiformis* GRAY, Manual, ed. II, 404, 1856 *Q. ol.* MCHX. f., Hist. arb. am. II, 32, t. 2, 1812 besonders tief und zieml. schmallappig, oben tiefgrün, kahlend, unten bleibend grauweißlich beh., Neb. meist — bleibend: Stiel 1—3 cm; sonst vgl. Fig. 127, Cupula dickfilzig.

Fig. 127. *Quercus macrocarpa*: a, b B.-Formen; c ♂, d ♀ Bl.; e ♀ Blst.; f Frst.; g, h weitere Fr-Formen (c—e vergrößert) (a—h nach SARGENT)

Q. m. MCHX., Hist. chênes Am. No. 2, t. 23, 1801 — Großfrüchtige E.; overcup or bur or mossy cup o.; ch. à gros fruits. — N.-Am. (Neu-Schottl. bis Manitoba, südl. bis Mass., Penns., Kans., Texas). Vorzuglich in besten Niederungsböden, in höheren Lagen und Prariegegenden b. Blz. und Frz. wie *a. ba.* Seit 1795 in Eur. in Kultur, als Park-*h. alba* vielleicht vorzuziehen, obwohl ohne die schöne Herbstf., torstlich eventuell für Weinlagen zu empfehlen. Dürfte bis III—II hart sein.

46 < 49 *Q. macrocarpa* < *alba*; *Q. laevis*; B. sehr formenreich von typ. *alba* in allen Übergängen bis *macrocarpa*, ebenso wenn *alba* ähnlich unters. — beh., wenn

macrocarpa näher (aber kaum so groß und oft sehr schön fiederlappig stark kahlend doch blaugrau unten; Fr. zuw. *platanoides* sehr ähnlich, aber Stiel kurz. Zuerst von M. S. BEBB bei Fountaindale (Ill.) aufgefunden. Auf Grund reichen Materials lassen sich gewiß 3 Formen unterscheiden.

46×56 *Q. macrocarpa* × *acuminata*: Soll nach SARG., Silva VIII, 56. 1895 in Indiana gefunden worden sein. Sie dürfte identisch mit Dem sein, was ZABELL, H. d. D. D. G. 75. 1903 als *macr.* × *prinoides* HITCHCOCK aus Kansas führt. Die echte *prinoides* kommt, wie mir Herr REHDER schreibt, in Kansas nicht vor.

⊙ ⊙ · Zw. mit deutl. Lent., auch glattründig, Neb. meist abfällig, fädlicher Sch.-Kranz weniger deutlich.

✱ B. seichtlappig (Fig. 108 q), Fr. vgl. Fig. 131 f. Sch. der Cupula nicht höckerig-verdickt.

47. *Q. platanoides* (*Q. bicolor*): (b) ♂, bis 22:1,20 o. auch bis 30:3 m, Krone offen, rundlich, äußere Zw. überhängend (vgl. auch Gard. a For. 1891. 246); Rinde

löst sich wie bei *Hicoria ovata* nach MAYR frühzeitig in breiten Fetzen ab, später längl.-rissige helle Borke, Zw. jung ± beh., ⊙ meist kahl, ± rotbraun, Lent. deutl.; Kn. kaum beh., eirundlich, 3—4 mm lang; B. 10—18:5—12 cm, Grund ± spitzkeilig, Lappennerven 5—7, Obers. bald kahl, tiefgrün, unten bleibend weißlich

beh., Nerven ± gelb; Fr. meist zu 2 auf 3—6(—12) cm langem Stiele.

Fig. 128. *Quercus*: a—h *prinus*: a ⊙ Zw. mit B., b dgl. mit Bl.-Kn.; c Kn., d Neb., e / Kn.-Sch. von innen, f Zw. *Q.*-Schn., h Teil eines Lohdentraches, i *Q. macrocarpa* ♂, j Zw., k Kn. und Kn.-Sch., l korkiger Zw., m dgl. im *Q.*-Schn., n Korkthigel, (Orig. n. C. K. SCHNEIDER).

396. Zweifarbiges E: swamp white o. N.-Am. von Quebec bis Mich., Georg., Ark., Miss. Blz. V—VI. Frz. IX—X. Schoner Zier ♂ und fast ganz hart. Allerdings vergrünen in Kultur die B.-Unterseiten etwas.

47×49 *Q. platanoides* × *alba*: *Q. jackiana*: B. in Form etwa wie Fig. 130 b—c, aber Unters. wie bei *platanoides* beh., Fr. dieser ähnlich, aber an dem mit vorlieg. Expl. nur 1 cm lang gestielt. Wurde nach REHDER zuerst von J. G. JACK 1894 bei Chateaugay (Kanada) gefunden.

✱ ✱ B. tieflappig (Fig. 102 a), Fr. vgl. Fig. 131 m, untere Sch. höckerig-verdickt (der fädliche Sch.-Kranz sehr kurz, auf dem Bilde nicht hervortretend).

Q. p. SUDW., Rep. Soc. Agric. U. S. 1892. 327. 1893 *prinus* ♂ *platanoides* LAM., Encycl. I, 720. 1783; b — WILLD., in Neue Schr. Ges. Nat. Fr. Berlin 1801,

48. *Q. lobata*: (b—) b, bis 30:3 m, breitkronig, Äste z. T. bis auf den Grund überhängend (vgl. Gard. a. For. 1890. 611 und 1897. 55). Borke dick, tieflängsrissig und kleinschuppig, junge Zw. dicht, locker beh., grau- o. orangebraun, Kn. hellbraun, etwa 6 mm lang, beh. und Sch. zottig-borstig gewimpert: B. durch die zieml. parallel abgestutzten Hauptlappen gut gekennzeichnet, oben bleibend beh.; tiefgrün, unten grauweißfilzig, Textur zuletzt derbhäutig, 6—12:3—7 cm, Stiel 0,8—1,5 cm; Fr. zu 1—2 sitzend o. kurz gestielt, Cupula-Sch. sehr charakteristisch, Eichel eßbar.

Q. l. NÉE, in Ann. sc. nat. 1801. 271. — W.-Kalif. — Talniederungen von Sierra Nevada bis Küste. — Kaum echt in Kultur und etwa für Prov. VI—V, geeignet. Was ich im Hort. Bot. Darmstadt als *lobata* fand, weicht von Expl. aus der Heimat durch fast kahle, unters. hellgrüne B. ab und ist mir noch unsicher.

Sekt. 5. *Albae* LOUD., l. c. 1863. 1844, ex parte: Rinde in der Regel hell (weißgrau), Borke dünn-schuppig, B. mit Buchtnerven, Fr.-Reife 1-jährig Cup.-Sch. durchweg gleich, festangedrückt. Sekt. 6 siehe S. 206.

C B. oben satt-, aber gelbgrün, im Mittel nicht unter 8 cm lang. ○○ siehe S. 206.
 + B. unters. so gut wie ganz kahlend, sonst vgl. Fig. 129 und Fig. 130.

49. *Q. alba*: (b—) b, bis 33:1,2 m, Krone bei freiem Stande sehr breit, offen, relativ flach gerundet (vgl. Gard. a. For. 1891. 6, 7 und 1892. 259), Borke sich in dünnen Platten abschälend, Zw. jung beh., ♂ oft fast kahl, graubraun, Lent. deutl., Kn. kurz, rundleifig, braun-grau, ± beh., B. ± rötl. austreibend, oben glänzend grün, unten hellgrün o. leicht bereift, Nerven ± gelblich, 8—22:3—14 cm, Textur zieml. dünn, Herbstf. tief purpurviolett, oft lange dauernd. Stiel 0,4—2 cm; Fr. sitzend o. bis 5 cm lang gestielt. Eichel glatt, die flache Cupula 3—4mal überragend.

Fig. 129. *Quercus alba*: a ♂ Blst.; b ♂ Bl.; c Stb. von hinten, d ♀ Blst., e ♀ Bl., Längs- und Querschnitt; g—h S. im Längsschnitt und ganz; i Keimpflz. (nach SARGENT).

Q. a. L., Sp. pl. 996. 1753. — Weiß-E.; white o.; ch. blanc. — N.-Am., von Maine und Ontario bis Flor., Texas. — An ähnlichen Orten wie *lobata*. Blz V—VI. — Frz. IX—X. — Seit 1728 in Eur. kultiviert: schöner harter Park-b., *alba* der Horstl. halber vorzuziehen, forstlich aber wegen des etwas langsameren Wuchses als *lobata* und *sessilis* für uns zieml. belanglos, in der Heimat gleich diesen geschätzt.

49:53 *Q. alba* — *macrocarpa*. Vgl. VASEY, in Bull. Torr. Club 1880, 2, t. 29 und SARG., Silva VIII. 18, t. 359. 1895.

49:57 *Q. alba* — *prinus* — *Q. saundersii*, von *prinus*, der sie am nächsten zu stehen scheint, vor Allem durch die tieferen, weniger zahlreichen meist 6—9 Lappen und kahlere, mehr hellgraugrüne Unters. zu unterscheiden. Vgl. auch VASEY, l. c. t. 28, und SARG., l. c. t. 351. — Zuerst auf der Besitzung des Gärtners J. SARGENT bei Washington entdeckt, später auch in New-Jersey getunden.

· · B. unters. stets auf Fläche büschelhaarig (manchmal Lupe nötig).

+ B. oben wenigstens auf Fläche ganz kahle^{*)}.

△ B. (Fig. 102 d) (8—)11—24:(3,5—)5—12 cm, Fr. wie Fig. 131 g, selten Eichel bis reichlich $\frac{1}{3}$ frei.

50. *Q. lyrata*: (b—)h, bis 30:1,5 m. Krone im freien Stande breit symmetrisch, äußerste Zw. oft bis zum Boden herabgesenkt. Borke grau, dünnschuppig. Zw. meist nur jung verstr. beh., · · · rundl., olivbraun. Lent. verstr., klein; Kn. breit eifg., klein, 2—3 mm lang, fein beh.; B. zuw. *alba* sehr ähnlich aber meist die 3—5 Lappen unregelmäßiger. Buchten breiter, jung bronzegrün, oben bald glänzend tiefgrün.

Fig. 130. *Quercus alba*: B.-Formen (Original).

unten hellgrau, selten grünlich kahl, wie KOEHNÉ angibt, sah ich sie nie). Grund kaum ungleich, spitz keilig; Herbstf. hell scharlach-o. orangerot; Stiel 0,8—2 cm, Neb. zuw. · · · bleibend; Fr. zu 1—2 auf 0,5 bis über 3 cm langem Stiele.

Q. l. WALT., Flor. Car. 235. 1788. — Leier-E; overcup o. — N.-Am., von New-Jersey bis Indiana, Flor. Texas bes. in S.-Ill., Louis und angrenzendem Texas, Ark. hfg. — Sonst vgl. *alba*, mit dieser in Kultur hfg. verwechselt, nur etwa bis Prov. (IV—)V hart.

B. (Fig. 108 r) 6—12(—15):3—5—7 cm, Fr. wie Fig. 131 i.

51. *Q. gambelii*: Ausläufer treibender, bis 6 m hoher b, selten h, bis 15:0,5 m, breit verästelt, Borke dann dunkelgrau, tiefrissig. Kn. eistumplich, etwa 3—4—5 mm lang, fein beh., Zw. anfangs dichter, · · · nur noch verstr. gelbgrau zottig, olivbraun; B. variabel, zuw. mehr wie Fig. 130 b, Lappennerven 4—7, oben satt gelbgrün, unten hellgraugrün o. leicht gelblich, Grund ungleich, zuw. gerundet, aber nicht herzfg., Herbstf. wie *lyrata*, Stiel 0,5—1,2 cm; Fr. zu 1—2, sitzend o. kurz gestielt.

Q. g. NUTT., in Jour. Phil. Ac. n. ser. I, 2, 179. 1848. — Gambels E.; shin o. — N. Am., von Col. westl. bis Utah, südl. bis Texas, SW.-Nevada — In Kieferwäldungen o. als kaum meterhoher b Deckichte bildend, bis über 2000 m. Ich sah nur ein mir noch etwas zweifelhaftes junges Expl. in Plantières, sonst kaum in Kultur. Für Prov. V—VI etwa geeignet.

^{*)} Das Merkmal ist nicht ganz zuverlässig, *gambel.* scheint nicht immer und *garryana* zuw. ganz zu kahlen.

! + B. oben auf Fläche beh. bleibend. Haare oft schwer zu erkennen.

B. oben meist nur spärlich beh., Lappung zieml. gleichmäßig (Fig. 126b). Eichel im Mittel 2—3:1.4—1.8 cm.

52. *Q. garryana*: (b—) ♂, bis etwa 20, selten bis 30:0.9 m, breit, dicht kronig. Borke — graubraun, dünnscuppig. Zw. jung dick filzig. — locker zottig beh., olivbraun. Lent. verstr., Kn etwa 0.6—1 cm lang. — zottig beh., eikegelfg.: B. aus breitkeiligem bis herzförmig.

Fig. 131. *Quercus*: a *dschorochensis*: Fr. — b—c *glandulifera*: b ♀ Bl.; b' ♂ Bl. von oben ohne A., links daneben A.; c Fr. — d—e *parva*: d ♂ Bl. ohne Stb., links daneben A.; e Fr. — f *parva*: Fr. — g *minima*: Fr. — h *minima* (*stellata*): Frst., dazwischen B.-Stiel. — i *minima*: Fr. — j *minima*: Fr. — k—m *lobata*: k ♂, l ♀ Bl.; m Fr. — n—o *chrysolepis*: n ♂, n' ♀ Bl.; o Fr. — p *michauxii*: Frst. (a nach KOTSCHY; c, e nach SHIRASAWA; b—d, d' nach d. Nat., sonst nach SARGENT).

Grunde breit eiförmig o. verkehrt eiförmig. Lappennerven 4—5, oben tiefgrün, zuw. auf Fläche ganz kahl, unters. gelblichgrün. — beh., zuw. stark kahlend, 7—18:4.5—15 cm, Stiel 0.6—1.3 cm: Fr. meist einzeln, sitzend o. kurz gestielt, Eichel etwa $\frac{2}{3}$ frei.

Q. g. HOOK., Fl. bor.-am. II. 59. 1830. — Garrys E.; white o. — N.-Am., vom südl. Brit. Col. südwärts durch W. Wash., Oreg. und kaliforn. Küstengebiet bis zu den Santa Cruz-Bergen — Täler, trockene Hänge. — Wichtigste Eiche des

pacif. N.-Am. Bei uns vor Kurzem durch C. A. PURPUS eingeführt. Ich sah sie nur im Hort. Bot. Darmstadt. Etwa bis Prov. V hart.

B. oben meist leicht rauh durch die feine verstr. Beh., Lappung groß, unregelmäßig (Fig. 102 m—n, Eichel im Mittel 1,3—1,8: 1—1,4 cm (Fig. 131 h)*).

53. *Q. minor* (*Q. stellata*): (b) h. bis 20, selten bis 30: 0,9 m, Krone rundlich, dicht; Zw. jung dicht gelblich filzig, erst kahlend, Kn. stumpf-eifg., beh., 3—5 mm lang; B. breit verkehrt-eifg. bis eilänglich, meist nur 3 Lappennerven, aber durch den doppelt gelappten Mittellappen hfg. 5-lappig, an Lohden zuw. fast ganzrandig, an *marylandica*-Formen erinnernd, beim Austrieb gerötet und dicht beh., dann oben tiefgrün, unten grau- o. gelbgrün, beh., 10—15—20: 7—12—15 cm, Stiel 0,6—1—1,5 cm; Fr. meist zu 1—2 sitzend, Eichel etwas fein längsstreifig.

Q. m. SARG., in Gard. a. For. 1889, 471 (*alba minor* MARSH., Arb. Am. 20. 1785; *stellata* WANGH., Nordam. Holz. 78, t. 6, Fig. 15. 1787; *obtusiloba* MCHX., Chênes Am. No. 1, t. 1. 1801). — Pfahl-E., post o. — N.-Am., von Mass. bis S.-New-Jersey, Mich., Flor., Texas. — Nach MAYR auf ganz spezifischem, trockenem, kiesig-sandigem Lande o. hartem Leimboden (post oak land). — Seit etwa 1800 in Eur. kultiviert.

CC B. obers. blaugrün, im Mittel nicht über 5—6 cm lang, Eichel etwa 2,5:1,4, nach oben gleichmäßig breitkeilig o. bis 3:2 cm und über der niedrigen Cupula bauchig verdickt**).

54. *Q. douglasii*: b h. zuw. bis 20:—30: 1,20 m, Borke zieml. dünn, bald hellgrau, bald dunkler, Zw. brüchig, jung beh., kahlend, grau- o. rotbraun, Kn. stumpfeifg., 4—6 mm lang, leicht beh.; B. sehr variabel, in trockneren südlicheren Lagen mehr scharfzählig gelappt, ebenso wie es scheint an jungen Pfl. (Fig. 119 b) und Lohden, sonst stumpf-lappig (Fig. 119 i, k), jung stark beh., später oben tief blaugrün, meist mit verstr. Haaren, unten hell- o. gelbgraugrün, beh., Textur wohl dünn, aber fest, 2,5—7:1,3—4 cm, Stiel 0,5—1,5 cm; Fr. zu 1—2, sitzend o. kurz gestielt.

Q. d. HOOK. et ARN., Bot. Voy. Beech. 391. 1841. — Douglas-E.; blue o. — Kalit. Hügel, trockne Hänge, Täler; bis 1300 m. — Vgl. Anmerkung; etwa bis Prov. VI(—V) hart.

Sekt. 7 siehe
S. 208.

Sekt. 6. *Prinus* LOUD., Arb. III. 1872. 1844. Wie *Albac.* aber B. ohne Buchtnerven, Lappung kurz, zieml. gleichmäßig, zuw. mehr zahnartig.

C Seitenerven 5—7—8, B. 6—13:5—8 cm, vgl. Fig. 126 k, Fr. sitzend, Eichel 1,8—2,3:1,3 cm, $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ frei.

55. *Q. prinoides*: Ausläufer treibender h, 0,5—3 m, zuw. h, bis 5:0,15 m, Zw. sehr bald kahl, olivbraun, Lent. ~, deutl. fein; Kn. stumpf-eifg., 2—3 mm lang, Seh. gewimpert; B. wie bei *pinus*

*) SMALL führt in seiner Fl. southeast. Stat. 355. 1903 neben *minor* *Q. margaretta* ASHE, diese soll ein h o. kleiner bis 10 m hoher h sein, kahle Zw. haben; ihre B. sollen 6—9 cm lang »with rounded upper lobes«, Eicheln nicht über 14 mm lang und Cupula nicht über 14 mm breit sein. Virg. bis Flor., Alab. — Kiefernwälder.

**) Beschreibung nach SARGENT. Diese Art und ihre Verwandten *Q. undulata* TORR., in Ann. Lyc. N. Y. 1828, 248 (non BENTH. 1837 et KOCH 1847 et KIT. 1863), *Q. brevifolia* SARG., in Gard. a. For. 1895, 93, etc. bilden eine schwierige Gruppe, die mir aus Mangel an Material noch unklar. In Kultur nur *douglasii* als junge Pfl. im Hort. Bot. Darmstadt.

oben sehr bald so gut wie kahl, tiefgrün, unten — weiß- o. bläul. grau, aber Haare dünn, einzeln stehend; Stiel 0,5—1,3 cm.

Q. p. WILLD., in Neue Schr. Ges. Nat. Fr. 1801, 397 (*prinus humilis* MARSH., Arb. Am. 125, 1785, non MILL; *chinquapin* PURSH, Fl. Am. sept. II, 634 1814) Zwerg-Kastanien-E.; chinquapin o.; ch. chinquapin. N.-Am. (Maine bis Minn., Alab., Texas, westl. bis S.-Nebr., Zentr.-Kans., Ind.-Terr.). Felsänge, Hügel, Prärien. Seit Langem in Eur. eingeführt, mir aber nirgends echt in Kultur begegnet. Sicher so hart wie *acuminata*.

○○ Seitennerven selten unter 10, B. im Mittel größer.

* Fr. sitzend, Eicheln etwa 1,8:1,3 cm, $\frac{1}{2}$ frei; B. wie Fig. 108 u, meist über 2—2 $\frac{1}{2}$:1, Lappen ± spitz.

56. *Q. acuminata* (*Q. castanea*): h. 10—30 (—50:1,2) m. in Tracht nach MAYR an *glandulifera* erinnernd, zieml. schmalkronig. Borke hellgraubraun, dünnschuppig, geschlossen; Zw. nur jung verstr. beh., © orangebraun, braungrau, Lent. fein, hell; Kn. braun, längl.-eifg., spitz, etwa 7 mm lang; B. 12—19:3—9 cm, oben bald kahl, glänzend gelbgrün, unten jung dicht weißl.-filzig, später mehr grau, mit sehr feinem aber dichtem Büschelhaarbezug. Seitennerven 7—9—15, Grund ungleich keilig nach SARG. treten westl. der Alleghanies Formel auf, die *prinus* sehr gleichen, aber sich durch die drüsigen Zahnspitzen der seichten Lappen doch gut unterscheiden lassen; Herbstf. orange-rot, minder lebhaft als bei den *Albac*; Stiel 1,8—3,5 (—4,5) cm.

Q. a. SARG., in Gard. a. For. 1895, 93 (*prinus acuminata* MCHX., Hist. Chênes Am. No. 5, t. S. 1801; *castanea* MÜHLBG., in Neue Schr. Ges. Nat. Fr. 1801, 396, non NÉE; *muhlenbergii* ENGELM., in Trans. St. Louis Ac. 1877, 391). Gelb-E.; yellow o.; c. faux-pin. N.-Am., von Ont. bis Minn., Georg., Alab., Texas bis in Indiana, Tenn., Ill.). Zieml. trockne Boden. Seit 1822 in Eur. in Kultur, doch noch selten, etwa bis Prov. III hart.

+ Fr. deutl. gestielt, B. meist unter 2:1, Lappen rundlich.

+ Borke dunkel, zuletzt dickschuppig, geschlossen, B.-Unters. ± grünlich, dünn beh. (Fig. 132 a—b).

57. *Q. prinus*: h. bis 25:1,2, selten 30:2,1 m. Krone breit offen, Zw. höchstens jung beh., • olivbraun, Lent. zieml. deutl., Kn. hellbraun, eikegelfg., 6—10 mm lang, Sch. gewimpert; B. sehr variabel, 6—25 (—30):5—11—17 cm, Seitennerven 8—17, oben meist bald kahl, glänzend olivgrün, unten zuw. fast wie *michauxii*, Herbstf. tief orange- o. bräunlichgelb; Fr. vgl. Fig. 132.

Q. p. L., Sp. pl. 995, 1753 *montana* WILLD., in L. Sp. pl. ed. IV, 440, 1805. Gerber-E.; rock chestnut o.; ch. prin. N.-Am., von Maine und S.-Ont. bis Alab., Tenn. — Zieml. trockne Böden, vor allem Gebirge. Blz. V—VI. — Frz. X—XI. Seit 1750 eingeführt, hübscher Park-h., der die in den Ausprüchen ähnliche *cory* an Härte und Wüchsigkeit wohl übertrifft. In Heimat wegen des hohen Gerbstoffgehaltes der Rinde sehr geschätzt, Holz geringer als *alba*. Der Formenkreis bedarf noch der Untersuchung, DIPPEL'S Angaben (Laubh. II, 84, 1892) sind ungenau.

+ Borke hell, dünnschuppig, B.-Unters. weißl.- o. hellgrau-filzig (Fig. 108 s).

58. *Q. michauxii*: h. bis 33:2 m. Äste mit spitzem Ablaufwinkel eine zieml. kompakte Krone bildend, Zw. und Kn. wie *prinus*:

SMALL unterscheidet (Fl. southeast St. 354, 1863) eine *Q. bravi* neben *michauxii* und gibt an, daß sie von dieser abweiche durch: B. dünner, kahl, Seitennerven weniger, Zähne deutlicher, größer. Über die Fr. sagt er einmal: sessile or nearly so, in der

B. $\pm$ drachenfg. bis spitz-elliptisch, 8—16—20:5—10—12 cm, Seitennerven 8—15, zuw. B. fast ganzrandig mit leicht geschwungener Lappung, oben meist ganz kahlend, lebhaft grün: Stiel 1—3 cm: Bl. und Fr. *prinus*, zuw. fast sitzend.

Q. m. NUTT., Gen. II, 215. 1818, excl. syn. (*prinus palustris* MCHX., Hist. Chênes Am. No. 5, t. 6. 1801, non *palustris* MUENCHH.). — Korb-E.; basket or cow o. — N.-Am., von Del. bis Indiana, Manitoba, Ark., Flor., Texas. — Selten echt in Kultur, wohl minder hart als *prinus*. — Holz sehr spaltbar, daher zum Korbflechten benutzbar.

Fig. 132. *Quercus prinus*: a—b B.-Formen; c ♂ Bl.; d ♀ Blst.; e ♀ Bl.; f Frst.; g Cupula; h S.; i Eichel im Längsschnitt; k Teil der Cupula-Basis vergrößert (c—e vergrößert) (c—k nach SARGENT).

Sekt. 7. *Diversifilosa*: Borke vorwiegend dünn. B. stets ohne Buchtnerven. Beh. meist gemischt (einfache Seidenborsten und Büschelhaare). Fr.-Reife 1-jährig. Sch. der Cupula stets aufrecht, angedrückt, gleichförmig.

⊖ B.-Stiel 0,8—1,3 cm lang. B. unters. graugrün, zuletzt fast nur büschelhaarig (Fig. 108 o).

59. *Q. glandulifera*: b—b, bis 10(—17:0,7) m, Tracht an *pseudoturneri* gemahnend, junge Zw. gleich den B. anliegend seidig

Bestimmungstabelle jedoch peduncul. Von der, wie man scheint ähnlichsten *prinus* durch den 1,5—2,5 cm langen B.-Stiel verschieden. Zentr.-Texas, in cañons.

**) Auch bei den vorhergehenden Sekt. treten verstr. einfache Haare auf, herrschen aber nie vor.

beh., C. schon fast o. ganz kahl, - gebräunt. Lent. deutl. Höckerchen. Kn. tiefbraun, etwa 5 mm lang. Sch. ∞ , nur gewimpert; B. 5—10—15: 2—5—6.5 cm; aus schmalem, aber nicht immer keihigem Grunde verkehrt eilängl. mit deutl. Spitze o. mehr elliptisch, jung beiders., unten dichter, seidig beh., die Seidenhaare verdecken zunächst die Büschelhaare, die erst später ganz frei liegen; Seitennerven 7—12, Lappen drüsenzählig; Bl. und Fr. wie Fig. 131b—c.

Q. gl. BLUME, Mus. Lugd.-Bat. I, 295. 1840 51. — Drüsenzählige E. — Jap. von Kiushiu bis Hokkaido, die hfg. Eiche der Gebirge Zentr.-Jap., bis 1000 m., Korea, China (Shantung, Chekiang, Kiangsi, Hupeh, Szechuen, Yunnan). — In zieml. trocknen, felsigen Lagen. Blz. V. Frz. X. — Es sollen (am selben Ast auch B. mit nur seidiger Beh. auftreten, was ich nicht beobachtete. Vielleicht bis Prov. III hart.

CC B.-Stiel höchstens 0.5 cm lang, B. unten ganz o. nur auf Fläche kahlend.

+ B. jung beiders. locker gemischt beh., auch später obers. noch spärliche Haarreste, auch unters. stark kahlend (Fig. 108p).

60. *Q. grosseserrata*: b—h, bis 30:1.5 m. Zw. kahl, - oliv- bis rotbraun. Lent. deutl., Kn. kahl, zieml. groß, bis 1:0.5 cm, rotbraun; B. 6—13:2.5—6—7 cm, Seitennerven etwa 10—12, oben tiefgrün, unten hell- o. bläulichgrün. Bl. u. Fr. vgl. Fig. 131d—e.

Q. g. BL., Mus. Lugd. bat. I, 306. 1840 51. — Jap. (Honshu bis Hokkaido). — Bis 1000 m, mit *Fagus*, *Cercidiphyllum*, *Magnolia hypoleuca* etc. waldbildend. — Wie vorige, wohl etwas empfindlicher. — Die ihr sehr nahe stehende *Q. crispula* BL. l. c. 296, soll nach MIYABE sich dadurch unterscheiden, daß die bis zur Hälfte von der Cupula umschlossene mehr rundliche Eichel mit dieser abfällt, wogegen bei *grosseserrata* die längl.-eifg. Eichel frei abfällt. Im Hort. Bot. Darmstadt fand ich als *crispula* eine Pfl., die den B. nach echt zu sein scheint. Sonst selten in Kultur.

+ B. oben bald kahl, unten nur spärlich seidig beh. o. kahl. Seitennerven meist 7—9, Lappen stumpfer als bei den beiden vorhergehenden Arten (Fig. 126i).

61. *Q. mongolica*: b—h, Zw. stets kahl, - glänzend braunrot. Lent. hell, ∞ ; Kn. etwa 6—7 mm lang, zieml. locker beschuppt. Sch. nur gewimpert; B. aus — langer schmaler, herzfg. Basis wie i o. Spitze breit gerundet, an *macrocarpa* erinnernd, 7—16:4.5—7—10 cm; Bl. wie bei *glandulifera*, Fr. dgl. zu 1—3 sitzend, doch Cupula-Sch. auf dem Rücken $\pm$ gewimpert.

Q. m. FISCH., apud TURCZ. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 1838, 101. — Mongolische E. — Dahurien, Amurgebiet, Mongolei, Mandsch., China (Chili, Shingking, Shantung). — In Kultur kaum echt, aber wohl zieml. hart. Was ich als *mongolica* erhielt, war *tesa* o. eine zur *prunus*-Gruppe gehörige Art.

Sekt. 8. *Dentatae*: Borke dick, tiefrissig; B. ohne Buchtnerven, büschelhaarig; Fr.-Reife 1-jährig. Fr. vgl. Fig. 133g—i.

62. *Q. dentata*: b—h, bis 17:0.7 m, Krone mäßig groß, unregelmäßig, mit breiten braunen Ästen (vgl. Gard. a. For. 1803, 386); Zw. dick, gelbgrau filzig, erst — kahlend, graubraun, Lent. deutl., Kn. beh., Endkn. viel größer; B. — lederig-häutig, (12—)15—25—50: 8—9—14—30 cm, größte aller Eichen, oben kahlend, tiefgrün, unten weichzottig, hellgraugrün, Seitennerven 4—9, Herbstf. tief orange-rot. Stiel 0.1—0.4 cm; Bl. und Fr. wie Fig. 133.

Q. d. THBG., Fl. jap. 177. 1784 (*obovata* BGE., in Mém. Ac. St. Pétersbg. 1831, 135; *daumio* HORT. NONN.). — Kaiser-E. — Jap. (die chinesischen Pfl. scheinen eine gute Varietät darzustellen). — Ebene und Gebirge, auf zieml. trock. mageren Böden. — Blz. V. — Frz. XI (bei uns scheinen Fr. nicht zu reifen). — B. oft spät abfällig. Schöner Zier-*h* o. *b*, fast ganz hart! Rinde gerbstoffreich. Forstliche Kultur bei uns vielleicht versuchswert.

Fig. 133. *Quercus dentata*: a B., b Zw. mit ♂ Blst., c—d ♂ Bl. ohne Stb., e Stb., f ♀ Bl., g Frst., i Cupula, h Eichel (c—f vergrößert) (nach SHIRASAWA).

B. Seh. der Cupula in Querzonen verwachsen (Fig. 101 k¹, m).

Subgenus d. *Cyclobalanopsis* [OERST., l. c. 77, als Genus]. B. immergrün, lederig: Gr. kurz. ausgebreitet (Fig. 101 i), abortierte Sa. im oberen Teile der Fr., Fr.-Reife 1- o. 2-jährig.

C B. stets ganzrandig o. höchstens im obersten Drittel mit wenigen Zähnen (Fig. 108 b).

63. *Q. acuta*: *h*, bis 10:0,6 m, Borke dünn, glatt, aber großschuppig, Zw. jung dicht bräunlichfilzig-zottig. — braungrau, (fast) kahl. Lent. ~, deutlich: B. 7—10—14—20:2,8—4,5—5,5 cm, jung wie Zw. beh., meist sehr bald ganz kah-lend, oben sattgrün, unten gelbgraugrün, Seitennerven 8—13; Stiel 1—2,5 cm. Bl. und Fr. vgl. Fig. 101 k—k¹, SHIRASAWA gibt auf seiner hier kopierten Fr.-Zeich-nung nur 3—4 Zonen auf der Cupula, während ein mir vorliegendes Expl. 5—6—7 zeigt; Cupula hellbräunlich-filzig.

Q. a. THBG., Fl. jap. 175. 1784. — Spitz-E. — Jap. (Kiushiu bis Nippon [Tokio]). — Warme Gebirgshänge. — Nicht in Kultur, für Prov. VI—VII (See-klima) versuchswert.

○○ B. wenigstens von Mitte ab stets ± gezähnt.

- B. vgl. Fig. 119b und Fig. 108a, Seitennerven unterseits scharf in zieml. spitzem Winkel durchlaufend.

64. *Q. glauca*. B. bis 14:0,7 m, Rinde immer glatt, Epidermis zuw. korkähnlich; Zw. nur jung beh., purpurbraun. Lent. ∞ , deutl., hell, B. 6–13:2–6 cm, teils unten ganz kahlend, nur papillös, lebhaft blaugrau (f. *glabra* FRANCH. et SAV., Enum. pl. II, 501. 1879) o. bleibend fein seidenborstig, Haare vorwärts gerichtet, angedrückt (f. *sericea* FR. et SAV., l. c.); Stiel bis 2,5 cm; Fr. zu 1–3, kleiner als bei *acuta*, Cupula kahler, Zonen 4–6, Fig. 1011 m.

Q. g. THBG., Fl. jap. 175. 1784. Blaugraue E. Jap., etwas mehr nördlich als *acuta* gehend, daher wohl am Ehesten für Kulturversuche zu empfehlen.

- B. vgl. Fig. 119d, Seitennerven unters. kaum deutl., sich vor dem Rande auflösend, breitwinklig von Rippe ablaufend.

65. *Q. vibrayeana*: Wie *glauca*, aber: B. 7,5–15:2–3–4 cm, unters. stets blaugrau, kahl, nur papillös; Stiel 1–3 cm; Bl. und Fr. nach FR. et SAV. *glauca* am ähnlichsten, aber δ Bl. zahlreicher, Fr. ährig gedrängt.

Q. v. FRANCH. et SAV., Enum. pl. Jap. II, 498. 1879. — Vibrayes E. — Sonst wie *glauca*. Ich fand diese Eiche als *Q. thalassica* im Schloßgarten zu Heidelberg, wo so viele Raritäten dank der wunderbar günstigen Lage im Freien sich erhalten lassen. Die echte *thalassica* HANCE, in Hook. Jour. 1849. 176, ist aber eine *Pasania* und hat ganzrandige, unters. meist zieml. deutl. büschelhaarige B., sie steht *Pasania glabra* nahe.

Reihe V. *Urticales*, Nesselähnliche Pfl.

ENGL. Syll. 95. 1892.

b B. Zw. mit o. ohne Milchsaft, zuw. dornig, B. $\odot$, z. T. 2-zeilig, Neb. vorh.; Blst. meist trugdöldig, Bl. zyklisch, δ ♀, monoec. o. dioec. selten γ , Blh. einfach, selten fehl.; δ Bl. Stb. vor P.; ♀: Gyn. (2–1), Sa. 1; Fr. 1-samig, Nüßchen, Flügel- o. Steinfr.; End. vorh. o. fehl.

Fam. 6. *Ulmaceae*, Rüsterngewächse.

MIRB., Elém. II, 905. 1815.

Vgl. Reihe: ohne Milchsaft, dornenlos; Kn. meist $\perp$ schief über B.-N.; B. 2-zeilig, einfach, z. T. wintergrün, Neb. seitlich o. vor dem B.-Stiel, abfällig; Bl. $\odot$ o. monoec., in axillären Trugdolden o. ♀ einzeln, P. (3–)4–5(–8), meist γ , verwachsen, Stb. 3–8, Sa. hängend, anatrop., Gr. 2-spaltig, N. innenseitig, Fr. geschlossenes geflügeltes Nüßchen o. Steinfr., E. gerade o. gekrümmt, End. meist fehl.

Unterfamilie a. *Ulmoidae* A. BR., ex ASCHERS. Fl. Prov. Brandbg. I, 58. 1864.

Kn. abstehend, B. vgl. Fig. 136, Bl. alle o. wenigstens δ am alten Holze, Fr. geflügelt o. wie Fig. 140i; S. flach zusammengedrückt, E. gerade.

Gattungen:

A. B. vgl. Fig. 136 und 139b–k, Fr. geflügelt. 21. *Ulmus*.

B. B. dünnhäutig, etwa 2–5 mm lang gestielt, einfach grobzählig Fig. 139a, Fr. vgl. Fig. 140i. 22. *Planera*. (Seite 222.)

Gattung 21. *Ulmus) L., Sp. pl. 225. 1753.**
 [Rüster o. Ulme; elm; orme.]

Vgl. oben: Kn. gewöhnlich schief über der B.-N. sitzend. B. am Grunde meist ungleichseitig. siehe Arten. — Etwa 14—15 Spezies in der nördl. Hemisphäre (gemäß. Zone) bekannt.

h. siehe S. 221.

Sekt. a. *Euulmus* K. KOCH, Dendr. II, 1, 405. 1872. B. fast stets sommergrün. meist über 5 cm lang. Bl. vor B.-Ausbruch am alten Holze, P. meist $\frac{2}{3}$ verwachsen.

Fig. 134. a—f *Ulmus americana*: a Zw. mit Blst.; b Bl.; c dgl. im Längsschnitt; d Fr. im Längsschnitt; e S.; f dgl. im Längsschnitt. — g—k *U. thomasi* (*U. racemosa*): g Teil des Blst.; h Bl. im Längsschnitt; i Frst.; k Fr. im Längsschnitt. — l—p *U. fulva*: l—m Bl.; n Fr. im Längsschnitt; o S.; p dgl. im Längsschnitt. — q—t *U. crassifolia*: q Bl.; r Gyn.; s Fr.; t dgl. im Längsschnitt. — u—w *U. laevis*, *U. campestris*: u Bl. mit Trgb.; v Fr.; w Keimplz. — x—z Original, a nach HEMPEL et WILHELM, sonst nach SARGENT).

β. siehe S. 216

Subsekt. a. *Orcoptelea* [SPACH. in Ann. sc. nat. 1841. 363] B. vgl. Fig. 136. Bl.-Stiele 3—6mal so lang wie Blh. o. Blst. traubenähnlich, Frkn. und Fr. deutl. zottig gewimpert.

C B. vgl. Fig. 136c—f. Seitennerven höchstens 18, wenn B. gleichseitig, so Form breit oval o. Stiel über 8 mm, Blst. büschelig, Frkn. und Fr. nur gewimpert.

*) Die Unterscheidung der *Ulmus*-Arten wird durch ihre Variabilität und die vorh., aber noch nicht sicher in den Fr. nachgewiesenen Bastarde sehr erschwert. Ich habe versucht, in Wort und Bild möglichst klar zu sein und vor Allem anzudeuten, wie die ∞ z. T. belanglosen Gartenformen sich einreihen. Es ist bedauerlich, daß die von SCHELLE im H. d. D. D. G. gebotene Zusammenstellung ganz kritiklos abgeschrieben ist.

* B.-Stiel über (0.8—) 1 cm. o. wenn kürzer. B. unter der Mitte am breitesten. Zähnung kaum auffällig scharf und vorwärts gekrümmt, vgl. Fig. 136c—d.

1. *U. americana*: B. bis 35 (—40):1 (—3) m, Borke nach MAYR *scabra* ähnlich, aschgrau, Zw. der Kronenperipherie · hängend (bes. bei *var. pendula* PETZ. et KIRCH., Arb. Musc. 551. 1864⁴⁾); im Übrigen von *laevis* noch abweichend durch: Kn. nicht scharfspitzig, höchstens 8 mm lang, Sch. außen · beh., B. mehr in die Länge gezogen o. eifg., oben glatt o. etwas rauh (bes. an jungen Pfl., wo kurze Stielung und Form Fig. 136d vorherrscht), 7–15 (—18):3–8 (—9) cm. Herbstf. lebhaft gelb; Bl. und Fr. · kürzer gestielt und Fr. etwas kleiner, sonst vgl. Fig. 134a–f.

U. a. L., Sp. pl. 226. 1753 (*pendula* WILLD., Berl. Baumz. ed. II, 519. 1811; *alba* RAF., Fl. Lud. 115. 1817). — Amerikanische o. Weiß-U.; water or white e.; o. blanc. — Neufundl. bis Manitoba, Flor., Texas. — Bevorzugt kräftigen, frischen Boden der Flußufer und Tiefländer, auf trock. Boden niedrig m. MAYR. — Sonst vgl. *laevis*. Wertvoller, aber nur für genügend feuchte Lagen empfehlenswerter Zier-B.

* * B.-Stiel meist unter 8 mm. B. über der Mitte am breitesten, Grund meist sehr ungleich. Zähnung gewöhnlich sehr scharf und vorwärtsgekrümmt (Fig. 136e–f).

2. *U. laevis (U. effusa)*: B. bis 35: über 2 m; Habitus vgl. Fig. 135, Borke braungrau, z. T. in flachen, dünnen Sch. sich ablösend, St. mit meist starken Wurzelanläufen und kräftigem Ausschlagvermögen: Zw. jung · weich beh., ☉ hfg. ganz kahl, glänzend oliv- o. rotbraun, Lent. deutl., Kn. vgl. Fig. 138a–e, Sch. hellbraun mit dunklerem Rande, nur gewimpert; B. meist größer als bei *glabra* und kleiner als bei *scabra*, oben glatt o. leicht rauh, tief freudiggrün, unten · weich beh. bis fast kahl, kaum achselbärtig, · hell- o. graugrün, 6–14 (—17):3.5–9 (—12) cm, Stiel länger als bei *scabra*, kürzer als bei *glabra*; Bl. vgl. Fig. 134u–w, P. (6–8), A. dgl., weniger länger als P., Fr. mit · zentralem Nüßchen. — Von wohl hierher gehörigen Formen mir nur *f. punctata* [SCHELLE, l. c. 87] bekannt, deren B. weiß gefleckt sind.

U. l. PALL., Flor. ross. I, 1, 75, t XLVIII, f. F. 1784 (*pedunculata* Foug., misc. 1784, in Mem. sc. nat. Paris 211. 1787; *effusa* WILLD., Fl. berol. Prodr. 97. 1787; *ciliata* EHRH., Beitr. VI, 88. 1791; *racemosa* BORKH., Forstbot. I, 551. 1800). Flatter-U.; spreading-branched e.; o. pédonculé. — I. G. D. zieml. verbr., OU. zerstr., fehlt Istrien, Sch. selten (Basel, Freudenthal Ct. Schaffh. Lägeru; sonst wild noch S- und O.-Frankr. (selten), Belg., Holl., Dänem., M- und S.-Rußl., Kank., Montenegro, Serb., Bulg., N.-Ital. (selten). Fast ausschließlich in der Ebene, immer · vereinzelt auftretend, durch Kultur natürlich viel weiter verbr.; liebt den fetten Lehm Boden der Auen. — Blz. III–IV. — Frz V–VI. — Als Zier-B. *glabra* und *scabra* zieml. gleichwertig, forstlich von mäßiger Bedeutung, da Holz von geringerer Güte, dieses infolge des breiten hellgelblichen Splintes zuw. „Weißbrüsterholz“ genannt.

⊙⊙ B. vgl. Fig. 136a–a¹, Seitennerven meist über 18°. Blst. traubenähnlich, Frkn. und Fr. auch auf Fläche beh.

⁴⁾ *U. americ. nigricans* [DIPP., Laubh. II, 33. 1892] kenne ich nicht, ebenso wenig *U. laevis* × *americ.* [DIPP., l. c.] und *americ. variegata* [SCHELLE, l. c.]. — SMALL trennt (Fl. southeast. St. 363. 1903) die von SARGENT als Synonym zu *americana* gestellte *U. floridana* CHAPM., Fl. 416. 1895, wieder als Art ab und sagt: leafy twigs purple, glabrous; samara ovate, the tips erect or nearly so; bei *americana* dagegen: leafy twigs pubescent; samara oval or obovate, the tips converging. Die erste nur von N.-Karol. bis Florida.

⁵⁾ An den mir von Herrn REHDER gesandten Expl. und ebenso an denen, die ich im Bot. Gart. zu Darmstadt sammelte, hatten selbst die kleinen B. nicht unter 18

Fig. 135. *Ulmus laevis* (*U. effusa*): Habitus im Winter, $\bar{h}$ etwa 20:1 m (Orig. n. C. K. SCHNEIDER).

3. *U. thomasi* (*U. racemosa*): $\bar{h}$, oft hochstämmig, bis über 30:0,9 m; Borke (nach MAYR) tief und breitrissig, in dünnen weißlichen B.chen sich abschälend, Verzweigung ziemlich starr. Zw. hfg. korkig, ☉ meist nur $\cdot$, fein beh., hellbraun, Lent. undeutlich, Kn. bis etwa 8 mm, *laevis* ähnlich, aber beh.; B. meist mäßig ungleichseitig, an jungen Pfl. oben $\cdot$, schärflich, sonst glatt, sehr an *laevis* gemahnend,

Seitennerven, hingegen bei SPÄTHschen Expl. (Fig. 136a¹) traf dies Merkmal nicht z.z. Ich kann indessen diese zu keiner anderen Art stellen, da sie auch mit SARGENTS Fig. in Silva VII, t. 311 stimmen. Diese Darstellung ist aber nicht genau, da SARGENT damals *U. serotina* noch mit einbegriff. Die noch nicht in Kultur befindliche *U. alata* MCHX., Fl. bor. Am. I, 173. 1803, weicht ab durch: $\bar{h}$ $\bar{h}$, bis 12(-15:0,6) m, Zw. fast stets korkig, ☉ Zw. und Kn. beh., diese bis 6 mm, spitz, einfarbig, vielschuppig, B. bis 7,5:3 cm, *pumila* am ähnlichsten, Blst. vgl. *laevis*, aber Fr. höchstens 1 cm lang, an Spitze durch Gr. auffallend 2-hörnig. — SO.-Ver.-St. bis Texas.

Fig. 136. *Ulmus*-B.: a - a' *thomasi* (*racemosa*) — b *fulva* — c - d *americana* (d von junger Pfl.) — e - f *laccis* (*effusa*) — g - o *glabra* (*campestris*): g — var. *typica*; k f. *minor*; l — m f. *berardii*; n f. *terminalis*; o f. *antarctica* — p - t *dippeliana* (p f. *werderi*); q f. *muscarvensis*; r f. *rueppellii*; s f. *bataiana*; t f. *regia* — u - v *scabra* (*montana*); w f. *macrophylla*; x f. *heterophylla*; y f. *crispa* — z elliptica (Alles 1, n. Gr.) (Original).

Zählung etwas weniger scharf, mehr in o. unter der Mitte am breitesten. 6 13:3—8 cm, Stiel analog *scabra*, kaum länger als Kn., doch bald kahl; Bl. und Fr. vgl. Fig. 134g—k.

U. t. SARG., Silva XIV, 102. 1902 (*racemosa* THOMAS, in Ann. Jour. Sc. XIX, 170. 1831, non BORKH.). Trauben- o. Felsen-U.; rock e.; — N.-Am. von Quebec bis Ontario, Michig., NO.-Nebraska, Miss. bis New-Jersey. — Z. T. in steinigem Lagen, aber am üppigsten doch (n. MAYR) in feuchtem, kräftigem, tiefgrundigem Boden. — Blz. IV. — Frz. V. — Seltener, zieml. langsam wüchsiger, aber wohl harter Zier- $\bar{h}$.

Subsekt. β . *Dryoptelea**) [SPACH. l. c.]. B. vgl. Fig. 136b, g—z und 139i—k, Blst. büschelig, Bl.-Stiele kaum 1—2mal so lang wie Blh., Frkn. und Fr. ungewimpert.

C B. meist über 10 cm lang. : eielliptisch, vgl. Fig. 136b, z, Stiel meist deutl. 2mal so lang als Kn., Frkn. und Fr. auf der Flächenmitte beh.

* Serratur : unregelm., kaum deutl. scharf lappenzähnig, Kn. beim Aufbruch dicht braunrot filzig, Blh. auch im unteren Teile beh.

4. *U. fulva*: $\bar{h}$, bis 20—22:0,6 m, breit offen und zieml. flachkronig, Borke : dunkelbraun, tiefrissig, Zw. jung dichter und weicher. : und eher schärflich beh., hellgraubraun, Lent. undeutl., aber zuw. höckerig. Kn. stumpf-eifg., bis etwa 6 mm lang, rotbraun beh. (bes. auffällig die großen Bl.-Kn.); B. vgl. Fig. 136b, (8—)10—21:(4,5—)5—9 cm, Basis : ungleich, Oberseite sehr rauh, tiefgrün, Unters. : weich o. schärflich beh., leicht graugrün, Textur meist derbhäutiger als bei *elliptica* o. *scabra*; Bl. und Fr. vgl. Fig. 134l—p.

* *U. f.* MCHX., Fl. bor. am. I, 172. 1803 (*rubra* MCHX. F., Hist. arb. am. III, 278, t. 6. 1813). Rot-U.; slippery or red e.; o. fauve. : — N.-Am. (Quebec bis N.-Dakota, Flor., Tex.). — Wälder, Hänge, Ufer, in tiefgrundigem Boden am schönsten. — Blz. III—IV. — Frz. V. — Schönlaubiger Zier- $\bar{h}$, steril durch die Kn., die größeren B. und deren weniger scharfe Zählung von *americana* verschieden.

* Serratur mehr scharflappig, Kn. beim Aufbruch kaum deutl. braunrot filzig, Blh. nur an den Lappenrändern beh.

5. *U. elliptica*: Steht *fulva* sehr nahe, aber ihre Borke ist weniger rissig, die $\odot$ Zw. älterer Pfl. kahlen, die B. sind dünnhäutiger, gleich den Fr. mehr *scabra* ähnlich. Bedarf noch sehr der Untersuchung.

U. e. K. KOCH, in Linnaea XXII, 599. 1849 (*heyderi* HORT. SPÄTH, *sibirica* und wohl auch *tomentosa* HORT. NONN.). — Langblättrige U. — Kauk. (Alagir), Transk., Turkest., wohl auch N.-Pers., W.-Sib. — Schöner Zier- $\bar{h}$. Ob ebenso hart wie *fulva*?

CC B. hfg. unter 10 cm, wenn länger, dann Stiel meist kürzer (Fig. 135g—y und 139i—k), Frkn. und Fr. durchaus kahl.

* B.-Stiel 4—6(—10) mm, B. im Mittel 9—12(—15) cm lang (Fig. 136u—y), oben (z. T. auch unten :), rauh, dünnhäutig, Nüßchen etwa um eigene Länge vom oberen Fr.-Einschnitt entfernt.

6. *U. scabra (U. montana)*: üppig wachsender $\bar{h}$, bis 40:2 m, Tracht ähnlich *glabra*, Borke seichter rissig, dünner, härter, $\odot$ Zw. meist

*) Zu dieser Subsekt. gehören noch folgende Arten: *wallachiana* PLANCH., in Ann. sc. nat. s. 3, X, 277. 1848 (*erosa* WALL., Cat. 3546. 1831, non ROTH) W.-Himal.; *castaneifolia* HEMSL., in Jour. Lin. Soc. XXVI, 1894, China (Hupeh, Szechuen) und *macrocarpa* HANCE, in Jour. Bot. 1868, 332., China (Chili, Shingking), mit der wohl *dauidana* PLANCH., in Compt. rendus Ac. Paris 1872. I. 1498, identisch.

fein borstig beh., olivgrün o. rotbraun. Kn. vgl. Fig. 138 f h. braun.
 • fein rostrot beh., B. vgl. auch *var.*, unten mäßig heller, weich
 beh., aber stärker kahlend als *elliptica*. Zähnung schärfer, bis 16:9 bis
 über 11 cm. dann fast eirundlich; Bl. und Fr. vgl. Fig. 137 h—l. Stb. 5—6.
 Fr. bis 3:2 cm; bildet nie Wurzelbrut.

Fig. 137. a g. und u *Ulmus glabra* (*U. campestris*): a Zw. mit Blst; b Bl.; c Frst.; d—e Fr. (bei d S.-Fach geöffnet), f S. im Längsschnitt, g E., u Keimpflz.
 h—l *U. scabra* (*U. montana*): h Bl. mit Trgb. u. Vorb., i unterer Teil der Bl. nur mit Trgb.; k Fr.; l Keimpflz. — m—p *U. pumila*: m Bl. (a—Trgb.); n Teil der Blh. β; o Gyn. im Längsschnitt; p Fr. — q—s *U. parvifolia*: q Bl., r ein Perigonblatt; s Fr. (rechts daneben die beh. Spitze vergrößert) — t *U. laevis obtusus* Bl. (vgl. für diese Art sonst Fig. 134 u—w) — (a—c, h—i, l, t, u nach HEMPEL et WILH., sonst Original.)

Über die hierher gehörenden Formen sei folgende noch unvollständige Übersicht gegeben: *var. a. typica*, meist h. Zw. nie korkig, Verzweigung weder ausgesprochen pyramidal, noch flach horizontal, noch hängend; hierher: *f. aurea* [DIPP., Laubh. II, 26. 1892] (*U. scaberrima* HORT.), B. lebend am Rande aufgebogen, in der Mitte hohl, löffelförmig. — *f. crispata* [LORD, Arb. III. 1399. 1844] (*U. c.* WILD., Enum. pl. hort. Berl. 295. 1809; *U. montana* AUDUB., Cat. hort. Tonn. 1817, 23). B. vgl. Fig. 136 y. — *f. crispata-aurea* [SCHELLE, l. c.], wie vorige, aber B. — gelb. — *f. firma*: B. ganz typ. *scabra*, aber Textur derb wie bei *glabra*. — *f. lutescens* [SCHELLE, l. c.] B. von normaler Form, schön gelb. — *f. macrophylla* [DIPP., l. c. 29], hier fasse ich einstweilen, gleich DIPPEL, die Formen mit über 14:7 cm großen B. zusammen, die ich als *U. (o. U. mont.) escaillardii*

(z. T.), *fulva*, *gigantea*, *hollandica**), *latifolia*, *pitteursii**), *superba*, *vegeta* in Kultur fand; wahrscheinlich ergibt eine genaue Sichtung mehrere Formen, doch dazu bedarf es reichen Materials. Es treten auch spontan an Lohden ganz gleiche B.-Formen auf. — *f. nigra* (U. n. LODD., Cat. 1836): B. bes. tiefgrün, wohl nur Unterform der vorigen. — *f. purpurea* [K. KOCH, Dendr. II, 1. 416. 1872]: B., wenigstens zeitweise, purpurn getönt, hierher *f. atr. purpurea* HORT. SPÄTH, deren Purpurfärbung besonders tief und dauernd ist. — *f. heterophylla* (major var. *het* MAXIM. et RUPR., in Bull. Ac. Petersbg. XV, 139. 1857.; *mont. var. laciniata* TRAUTV., in MAXIM., Prim. Fl. Amur. 246. 1859; *scabra* e) *tricuspis* K. KOCH, l. c. 415): B. vgl. Fig. 136x, tritt spontan an Stocklöden auf, ferner, wie es scheint, bes. im Amurgeb. bis Jap. hfg., soll sehr guten Bast liefern und ist vielleicht besser als *var.* aufzufassen. — *b. fastigiata* [LOUD., Arb. III, 1399. 1844 (*var. pyramidalis* K. KOCH, l. c. 415; *exoniensis* und *perdu* HORT. NONN): Wuchs schön ebenmäßig pyramidal, Zw. nie korkig, B. der Zw. + angedrückt, mäßig groß, hierher *f. plumosa*: B. leicht kraus unregelmäßig lappig gezähnt. — *c. horizontalis* [PETZ et K., Arb. Musk. 564. 1864]. Verzweigung schirmartig ausgebreitet, leicht überhängend. — *d. pendula* (U. p. LODD., Cat. 1836), Zw. nie korkig, senkrecht herabhängend, hierher *f. serpentina* (DIPP., l. c. 29], Zw. z. T. spiralig gewunden. — *e. nana* [DIPP., l. c.]: *b.*, Zw. nie korkig, in der typischen Form kleine dichte kurzzweigige kugelige Büsche darstellend, etwas üppiger ist *f. monstrosa*: Zw. + krumm, B. z. T. dütenförmig mißgestaltet. — *f. major* GÜRKE, in RICHT. et G., Plant. eur. II, 1. 73. 1897 (? *U. hollandica* MILL., Gard. Dict. ed. VIII, n. 5. 1768, non PALL.**); *U. major* SM., Engl. bot. XXXVI, t. 2542. 1814). Zw. + korkig, sonst wie *var. a.*

U. s. MILL., Gard. Dict. ed. VII, n. 2. 1759 (*campestris* L., Sp. pl. 225. 1753, ex parte [et KERNER et WILLK.]; *montana* WITH., Bot. arrang. ed. 3, II, 279. 1776; *nuda* EHRH., Beitr. VI, 86. 1791, fide PLANCH.; *latifolia* MOENCH, Meth. 333. 1794, *excelsa* BORKH., Forstb. I, 839. 1800). Berg-, hfg. auch Weiß-U.; scotch or dutch e.; o. des montagnes ou o. à grandes feuilles. I. G. nirgends fehl., bes. schön im mittl. und nördl. Teile, nach S. vorwiegend im Hügel- und Bergland, bis 1300 m; sonst noch ganz Eur., in S.-Eur. nur in Gebirgen, die N.-Grenze geht von Schottl. nach Norweg. (bis 67° n. Br. spontan), Finnl. (bis 62°) und Rußl. etwa über Petersbg., Jaroslaw nach Kauk.; ferner in den Gebirgen des N.-Kl.-As., bis N.-Pers.; in O.-Rußl. und W.-Sib. scheint *scabra* noch nicht sicher nachgewiesen, doch tritt sie in O. Sib., Mandsch., Jap. wieder auf. Meist einzeln o. truppweise, selten in geschlossenen Beständen. Sonst vgl. *glabra*. Sie übertrifft diese an Zierwert und ist zumal als Alleebaum (bes. in den Formen der *f. macrophylla*) sehr geschätzt, dagegen ist ihr forstlicher Wert geringer, da das Holz nicht die Güte der *glabra* erreicht; indes ist im Auge zu behalten, daß *scabra* auch für kältere (nördl. o. Gebirgs-) Lagen noch von Bedeutung, wo *glabra* versagt, siehe diese.

6×7 *U. scabra* × *glabra*: *U. dippeliana*: DIPPEL beschreibt neben *campestris* eine *U. glabra*, deren Artberechtigung KOEHNE bereits angezweifelt hat. Ich halte es für ganz sicher, daß eine *glabra* im Sinne DIPPELS nicht existiert, dagegen scheinen mir nachstehende Formen aus einer Kreuzung *scabra* × *glabra* hervorgegangen und da bereits DIPPEL auf den hybriden Ursprung mancher hingedeutet, so gebe ich dem Bastard, dessen Vorhandensein auch andere Autoren gemutmaßt haben, den Namen *dippeliana*. Ich bemerke aber ausdrücklich, daß ich ein fruchttragendes Expl. von keiner der folgenden Formen sah und sie nur auf Grund der kürzeren oder längeren B.-Stiele in Verbindung mit einer derberen und glatteren oder einer dünnen und rauheren B.-Textur und schwächeren o. stärkeren Beh. als Bastarde anspreche, es sind: *f. bataviana*: B. (Fig. 136s) wie *scabra*, aber derber und ca. 1 cm lang gestielt. — *f. dampieri* (*mont. damp.* PETZ. et KIRCH., l. c. 563.), der *scabra fastigiata* ähnlich, aber feiner verzweigt, zierlicher, kleinlaubiger; noch zierlicher *f. wrederi* (*mont. damp. wrederi* HORT.): B. schön goldgelb (Fig. 136p). — *f. purpurea* (*campestr. purp.* HORT.): B. + purpurn getönt. — *f. rueppelii*: B. 6–7: 4–5 cm, in Stielung, Textur, Beh. sehr an *scabra* gemahnend; SPÄTH sagt allerdings von seiner *camp. rueppelii*: kleinblättrig, gedrungen wachsend, Rinde korkig, wonach die Form zu *glabra suberosa* zu stellen wäre. — *f. vegeta* (*glabra 2 vegeta* LOUD., Arb. III, 1404. 1844). Huntingdon-Rüster, B. 7–16: 4–10 cm, macht ganz

*) Nach SPÄTHS Katalog 1903/04 könnte diese eine *glabra* × *campestris* o. in meinem Sinne eine *dippeliana* sein, sicherlich gehen aber auch typ. *scabra* unter diesem Namen, ebenso unter *vegeta*, die ich in der echten Form allerdings als *glabra* × *scabra* ansehe.

**) *U. hollandica* PALL. (Flor. ross. I, 1, 77. 1784) kann der Beschreibung nach nur eine rauhblättrige *glabra* var. *suberosa* sein.

den Eindruck einer sehr großblättrigen *glabra*; ist außerordentlich wüchsig und bildet schöne pyramidale Kronen; als Alleebaum geschätzt. Ob mit *glabra ramifolia* LDB. (cf. JÄNNICK, in Mitt. D. D. Ges. II, 20, 1893) identisch? — Ferner gehören wohl hierher, was ich als *montanus* HORT. MUSK. erhielt, und eine nicht mit der *glabra ramifolia* identische, größere, etwa 9:5 cm messende B. (Fig. 136g) besitzende *ramifolia* HORT. MUSK., die ich *f. muscariensis* nennen will; sowie *f. tricolor* (mont. *tricolor* HORT.): B. $\pm$ weiß und gelb gefleckt.

*7 B.-Stiel 0,8—1,5 cm. B. selten über 9—10 cm lang. (Fig. 136g—o und 139i—k), oben meist glatt, Textur $\pm$ derbhäutig. Nüßchen in der Mitte der Fr. o. am Flügelausschnitt.

4. B. vgl. Fig. 136g—o, wenn $\pm$ gleichseitig hfg. rauh oben, dadurch von *pumila* abweichend. Nüßchen im oberen Teile der Fr. am Flügelausschnitt.

++ siehe S. 221.

Fig. 138. *Ulmus*. a—c *laevis* (effusa): a $\odot$ Zw. von oben, b—c Kn. (b von unten), d Wimperung der Kn.-Sch., e Bl.-Kn. — f—h *scabra* (montana): f $\odot$ Zw., g Kn., h Zw.-Q.-Schn. (1—6 vgl. Fig. 731 S. 134) — i—o *glabra* (campestris): i $\odot$ Zw., k—l Kn., m Wimperung der Kn.-Sch., n Bl.-Kn., o wie h (Orig. nach C. K. SCHNEIDER).

7. *U. glabra* (*U. campestris* AUCT. PLUR.): b $\odot$, bis 40:2 m. Rinde anfangs glatt, braungrau, später meist dick korkig-borkig, in zieml. kleine — rechteckige Sch. sich gliedernd, tief kurzrissig. Zw. jung, wohl stets $\odot$, G. nur zuw. beh., meist kahl, glänzend rotgelb bis rotbraun o. olivgrün. Kn. dunkelbraun, vgl. Fig. 138i—o, Sch. wenig auffällig anliegend zerstr. beh. (im Or. scheint eine alles in Allem stärker beh. var. aufzutreten). B. meist recht derb und im Sommer nur auf der helleren Unterseite achselbärtig. 2—10:1,5—5 cm. Seitennerven 9—12—14, Stiel fast stets mehr als 2—3mal so lang wie Kn., $\pm$ kahl und relativ dünn; Neb. variabel, wie bei allen Ulmen; Bl. fast sitzend, jedenfalls kürzer gestielt als bei *scabra*, Stb. 3—4, Fr. bis 2,5:2 cm,

gelbbraun mit dunklerer Zone um S., kurz vor der Reife oft intensiv gelb o. rot!; Wurzelbrut reichlich.

Diese Art ändert ebenfalls ganz außerordentlich ab, ich skizziere die wichtigsten var. und Formen wie folgt*): var. **a. typica** (*U. laevis* und *alba* HORT. NONN.): Zw. nicht korkig, jung gleich den B.-Stielen kahl o. nur verstr. beh., • kahl, Wuchs weder deutl. pyramidal, noch stark hängend, B. oben ganz glatt o. auch deutlich rauh; hierher: *f. corylifolia* (*U. c.* Host, Flor. Austr. I, 329. 1827); B. bis 8:6 cm, zieml. gedrängt sitzend, meist leicht rauh, *scabra*-ähnlich, aber nach Textur, Stielung und Fr. zu *glabra* gehörend. — *f. minor* (*U. m.* MILL., Gard. Diet. ed. VIII, n. 6. 1768; *U. pumila* PALL., Flor. ross. I, 1, 76. 1784 ex parte, t. XLVIII, f. D.E.; *U. microphylla* PERS., Syn. pl. I, 291. 1805 et BOISS., Fl. or. IV, 1158. 1879): ♀, B. oben meist stark rauh (Fig. 136 k), in Wuchs hfg. der var. *pubescens tortuosa* analog, tritt bes. an trocknen Hängen, auf Viehweiden etc. auf. — *f. nigrescens* (camp. *betulifolia nigr.* HORT.): B. nicht purpurn, nur • gebräunt. — *f. punctata* [HORT. SIM.-LOUIS]: B. weiß gepunktet. — *f. scampstonensis* [PETZ. et K. l. c. 560] (scampston elm LOUD.), von hohem, kräftigem Wuchs, im Übrigen nach dem mir vorliegenden und von mir lebend gesehenen Material reine *glabra*, ohne bes. charakt. Merkmale. — *f. tiliaefolia* (*U. t.* Host, Fl. Austr. I, 329. 1827), nach dem mir vorlieg. mit Fr. versehenen Originale nur eine großblättrige (B. bis 10:8 cm) *glabra* darstellend, die im B.-Zuschnitt an *scabra* erinnert. — *f. umbraculifera**, [HORT. SPÄTH, et DIPP., l. c. 24]: ohne Schnitt eine der Kugelakazie gleichende Krone bildend, B. 5–10:3–6 cm; ein Sport von ihr mit zierlicherem B. und feinerer, dichterem Verzweigung ist *f. gracilis* (umbr. *gracilis* HORT. SPÄTH 1897 68); die nach SPÄTH nur durch eine nicht kugelige, sondern langovale Kronenform von *umbraculifera* abweichende *f. koopmanni* ist mir noch unbekannt. **b. pubescens**: wie **a**, aber junge Zw. und B.-Stiele dicht weich beh., auch (•) Zw. nicht kahl; hierher dürften gehören: *f. argenteo-marginata* (fol. *arg.-marg.* PETZ. et K. l. c.): B. weiß gerandet, ziemlich stark rauh, unten weich beh., 6–8:3–4 cm. — *f. berardii*: diese durch hfg. leicht hängende Zw. und *Planera* ähnliche B. (Fig. 136 l m) gekennzeichnete auffällige, aber auf Grund anatomischer Merkmale sicher zu *Ulmus* gehörige und nachweisbar im HORT. SIMON-LOUIS 1864 aus S. von *glabra* gefallene Form ist jedenfalls eigenartig. — *f. purpurascens* (camp. *myrtifolia purpurea* HORT.): B. kaum über 6:3 cm, purpurn getönt. — *f. tortuosa* (*U. t.* Host, Fl. austr. I, 330. 1827; *minor* REHB., Icon. fl. germ. XII, 2, 12, t. DCLX, 1850, non MILL.), vgl. *typica f. minor*. — *f. van houttei* (camp. „Louis van Houtte“ HORT.): B. etwa 6–7:4–4.5 cm, • rauh, gelb getönt. — **c. stricta** [LODD., l. c. 1375] (*U. stricta* LODD., Syn. brit. Fl. ed. II, 227. 1837; camp. *cornubensis* LODD., l. c. 1376; camp. *fastigiata* HORT.): Zw. nicht korkig, Wuchs deutl. pyramidal; hierher: *f. mediana* (*U. tortuosa* LODD., Cat. 1836, fide KOCH, non Host), die „Tortillarde“-Ulm, eine Form mit gewundenen Ästen und knorrigem St., deren Holz wegen seiner schönen Maserungen die Tischler hoch bewerten. — *f. monumentalis* [HORT. RINZ] (camp. *ut.* PETZ. et K., l. c. 554) bildet schöne geschlossene Pyramiden, mit dieser wäre nach DIPPEL *U. wheatleyi* HORT. identisch und eine etwas zierlichere Form stellt *f. arguta* (*U. v.* HORT.) dar. — *f. sarmiensis* (*U. s.* LODD., Cat. 1836): B. etwa 6:4 cm, tiefgrün, meist leicht rauh, Wuchs zieml. offen pyramidal. — **d. pendula** [DIPP., l. c. 24]: Wuchs + stark hängend, hierher: *f. albo-dentata* (camp. *microphylla fol. albo-dentata* HORT.): B. hellgrün, weiß gezähnt. — *f. antarctica* (var. *viminalis antarctica* o. *gracilis* HORT.): B. vgl. Fig. 136 o, eigenartige monströse, aber hoch werdende Form. — *f. viminalis* (*U. v.* LODD., Cat. 1836, vgl. auch K. KOCH, l. c. 418): B. wie Fig. 136 n, Wuchs anfangs aufrecht, auch buntlaubig anzutreffen. — *f. wentworthii*, stellt wohl nur die typ. *glabra pendula* dar. — **e. suberosa** GURKE, in RICHT. et G., Pl. eur. II, 1, 72. 1897 (*U. s.* MOENCH, Verz. Weissenst. 136. 1785): bekannte Korkrüster, deren ältere Zw. • geflügelt sind, tritt als ♀ o. ♂ auf, B. bald glatt, bald rauh, z. B. bei *f. turkestanica* [REGL., in Gartpfl. XXXIII, 28. 1884], auch eine Hängelorm ist zu erwähnen, die ich zum Unterschied gegen die *pendula* der typ. *glabra f. propendens* (camp. *sub. pendula* HORT.) nenne.

*) Die von SARGENT in Gard. a. For. 1893, 327, f. 50 abgebildete *U. campestris* (= *glabra*) aus Jap. wird von SPÄTH als camp. *japonica* angeboten. Ich glaube kaum, daß sie eine gute var. darstellt. Jedenfalls treten ähnlich schöne alte ♂, wie das Bild zeigt, auch bei uns auf.

**) KOEPPEN nennt (Geogr. Verbr. Holzgew. Rußl. II, 38. 1889) eine camp. *umbraculifera* TRAUTV. (Diagnose mir nicht bekannt) als in Transkauk. wild wachsend. Ob SPÄTHS Pfl. dorthier stammt, ist mir nicht bekannt.

U. g. MILL., Gard. Dict. ed. VIII, n. 4. 1768 (*campestris* L., Sp. pl. 225. 1753, ex parte, et AUCT. PLUR; *nitens* MOENCH, Meth. 333. 1789; *nana* et *nemosa* BORKH., Forstbot. 839. 1800. Feld- o. Rot-U.; field or common small-leaved o.; o. champêtre. I. G. verbr., indes vorzugsweise in den südl. und mittl. Teilen auftretend, nach N. beschränkt sich ihr Vorkommen auf Flußtäler, die N.-Grenze ihres spontanen Vorkommens dürfte schon südl. von Engl. (dort durch Kultur längst eingebürgert) und Dänemark nach Polen, Wolhynien, Charkow zu ziehen sein, von wo sie nach O. bis etwa 55° n. Br. ansteigt, doch scheint sie noch in Eur. wieder auf 50° zurückzugehen und diese Breite bis O.-As. nicht mehr zu überschreiten; die Südgrenze dagegen verläuft von N.-Afr. nach Syrien, N.-Pers., Afghan., Turkest., Himal., Zentr.-China, Jap. — Am schönsten entwickelt in Tälern und Flußniederungen, dabei I. G. nur selten waldbildend auftretend; auf trocknen, felsigen Orten als b; im Eur.-Gebirge kaum bis 700 m steigend, doch in As. bis 3500 m hoch (Himal., Blz. III—IV). Frz. V—VI — Freistehend selten vor 35. Jahre mannbar; S. aller Ulmen) muß sofort nach Reife gesät werden; übrigens stets ~ Fr. taub!

Das höchste Alter kann man auf 4—500 Jahre schätzen. Holz sehr dauerhaft, schwerspaltig, spez. Gew. lufttrocken 0,74 im Mittel, als Bauholz und für Tischler (Maserholz), Wagner, Drechler, zum Waggonbau, für Kanonenlafetten etc. geschätzt. — *U. glabra* ist forstlich als wertvoller Nutzbaum zu bezeichnen, aber nach HEMPEL zu den b zu zählen, die die größten Anforderungen an Klima und Boden stellen. Sie braucht zur vollen Entwicklung sehr mineralkräftigen, dabei tiefgründigen, frischen bis feuchten Boden (Marsch-, Aueböden, humusreicher Kalk- und Mergel-, humöser lehmiger Sandboden, dagegen nicht Bruchland). Als Ziergehölze sind viele Formen schätzenswert.

++ B. vgl. Fig. 139 i—k,
± gleichseitig und
glatt, Nüßchen in der
Mitte der Fr.

8. *U. pumila*: b—kleiner b, bis etwa 5 m; z. T. an *campestris*, z. T. an *parvifolia* gemahnend, Zw. kahl, Kn. klein, Sch. 2—3, meist nur gewimpert, B. kaum über 6—7:3,5 cm, meist kleiner (Fig. 139 i), auch unten bis auf winzige Achselbärte kahllend, wenig heller, zuw. halbwintergrün (*campestris virens* HORT.), Bl. und Fr. vgl. Fig. 137 m—p, Stb. 4—5, nach KOEHNE bei Kultur-Expl. kürzer als Blh., was ich nicht fand.

Fig. 139. a *Planera aquatica*: B. — b—k *Ulmus*-B.: b—d *parvifolia* — e—f *crassifolia* — g—h *serotina* — i—k *pumila* (Alles $\frac{2}{3}$ n. Gr.) (Original).

U. p. L., Sp. pl. I, 226. 1753 [et PALL., Fl. ross. 77. 1784, ex parte, t. XLVIII, A, B, C, c]. Zwerg U.: dwarf o. O.-Sib., Amurgeb., Mandsch., Dahur., N.-China. — Blz. I—III (Bl. ertrieren hfg.). Frz. IV—V Hübscher Zier-b

Sekt. b. *Microptelea* PLANCH., in Ann. sc. nat. X, 260. 1848 [SPACH]: B. z. T. wintergrün, vgl. Fig. 139 b—h. Bl. im (II—IV—VI

in den Achseln vorjähriger, o. VIII—IX in denen diesj. B., $\pm$ gestielt, P. zu $\frac{2}{3}$ bis ganz frei.

○ Blz. IX, B. sommergrün, 6—12:3—6 cm, Textur dünn.

9. *U. serotina*: b , bis 15:0,9 m, Krone c überhängend, sonst in Zw. und Kn. an *thomasi* gemahnend, mit der sie früher verwechselt. bei jungen Pfl. Beh. reichlicher, B. wie Fig. 139 g—h, an Bl.-Zw. sind nach SARGENTS Abb. die B. feinspitzig, Seitennerven zahlreicher, Unters. nur auf Nerven beh., Herbstf. hellorange-gelb, Stiel 3—7(—8) mm; Blst. traubenähnlich, Blh. nach SARG. kahl, bis fast zum Grunde geteilt, Stb. 6, Frkn. und Fr. beh. und gewimpert, diese etwa 12:7 mm, *alata* sehr ähnlich.

U. s. SARG., in Bot. Gaz. XXVII, 92. 1899. — Späte U.; red e. — Ver.-St., Hügelgelände und Ufer von Zentr.-Tennessee bis N.-Alabama und NO.-Georgia. — Frz. XI. — Noch nicht eingeführt, aber für geschützte warme Lagen sicher zu empfehlen.

CC Blz. wechselnd, B. hfg. wintergrün, 2—6:0,8—2,8 cm, Textur dick.

✧ B. oben sehr rauh, unten wenigstens auf Nerven bleib. weich beh., Frkn. und Fr. beh. und gewimpert.

10. *U. crassifolia*: (b — b) b , bis 25:0,9 m, Krone c hängend. Borke dickschalig, tiefrissig, Zw. hfg. bis c b beh., c z. T. korkig, Kn. klein, dunkelbraun, eifg., c beh.; B. oben glänzend grün, jung c beh., unten mäßig heller, fallen meist spät im Jahre; Stiel 1—3 mm; Bl. vgl. Fig. 134 q—t, zu 3—5 gebüschelt, P. zu $\frac{2}{3}$ frei, kahl, Stb. 6; Fr. 0,8—1,2:0,6—0,8 cm.

U. c. NUTT., in Trans. Am. Phil. Soc. n. ser. 1837. 169. — Dickblättrige U.; cedar e. — Ver.-St., von Mississippi durch S.-Ark. bis W.-Texas. — Bes. im Uferlande. — Blz. nach SARG. VIII, zuw. nochmals X. — Selten in Kultur, hart wohl nur Prov. VI.

✧✧ B. oben glatt o. mäßig rauh, unten bis auf feine Achselbärte kahl, Frkn. kurz beh. und Fr. kahl o. wenigstens nicht gewimpert.

11. *U. parvifolia (U. chinensis)**: b — b , bis 14 m, Borke zieml. kleinschuppig, c Zw. und die kleinen Kn. beh., B. oben lebhaft grün, unten glänzend hellgrün, meist wintergrün, Stiel 0,2—0,8 cm; Bl. vgl. Fig. 137 q—s, P. 4, gewimpert, Fr. bis 1,4:1 cm.

U. p. JACQ., Hort. Schoenbr. III, 326. 1798 (*chinensis* PERS., Syn. pl. I, 291. 1805; *Planera chin.* SWEET, Hort. Brit. ed. III, 610. 1839). — Kleinblättrige U. — Von W.-Tibet (Nubra) durch Zentr.- und N.-China bis Jap. — Blz. in Jap. Ende IX, bei uns II—IV(—VI). — Frz. X, bez. V—VII. — Zuweilen mit *pumila* verwechselt, von der sie leicht durch die beh. Zw. zu unterscheiden. Hübscher, bis etwa Prov. IV ganz harter b .

Gattung 22. *Planera* GMEL., Hist. Nat. II. 150. 1791.

Vgl. oben S. 211 und Art. Nur diese bekannt.

P. aquatica: b , bis 16:0,6 m, Krone niedrig, breit, Borke zieml. groß abschuppend; Zw. jung beh., c rotbraun, Kn. 2—3 mm lang, kugelig-eifg., kastanienbraun, Sch. gewimpert; B. 2,5—7,5:1,5—3 cm, oben tiefgrün, leicht rauh, kaum beh., unten heller, c beh., zuletzt derb; Bl. und Fr. vgl. Fig. 140.

* Ihr steht nahe *U. lanceolata* ROXB., Hort beng. 86. 1814; *hookeriana* PLANCH., in DC. Prodr. XVII. 162. 1873) N.- und O.-Himal, China (?Hupeh).

P. a. GMEL., l. c. (*P. ulmifolia* MCHX. f., Hist. Arb. am. III, 283, t. 7, 1813; *P. richardi* TORR. et GR., in Pacif. Rep. II, 175, 1855, non MCHX.) Wasser-Ulme; water e. — Ver.-St., sumpfige Gebiete von N.-Karol. bis W.-Flor. und durch S.-Alab. und Mississippi bis Texas, nördl. W.-Louis., Ark., Missouri, Zentr.-Kentucky, Illinois. — Blz. mit B.-Ausbruch II—III. — War vor 100 Jahren bereits echt in Kultur, da aber sehr schwierig zu erhalten, wieder verschwunden. Habe sie nirgendher echt erhalten! Kaum über Prov. (III) IV hart. Habitus-Bild vgl. Rev. Hort. 1903. 351.

Fig. 140. *Planera aquatica*: a Zw. mit ♀ und ♂ (b) Blst.; c ♂ Bl.; d Stb.; e ♀ Bl.; f dgl. im Längsschnitt; g Gyn. im Querschnitt; h Sa.; i Fr.; k dgl. im Längsschnitt; l reifer S.; m E. (nach SARGENT).

Unterfamilie b. *Celtoidae* A. BR., l. c. Kn. abstehend (*Ulmus* ähnlich, o. (meist) anliegend, spitzer: B. vgl. die unten zitierten Fig.: Bl. (wenigstens +) am diesj. Holze. Fr. selten geflügelt, + kugelig, steinfruchtartig, S. (Stein) + kugelig, E. gekrümmt, Cot. gefaltet o. eingerollt.

Gattungen:

A. Kn. deutl. abstehend. B. am Grunde nicht 3-nervig, die 7 o. mehr parallelen Seitennerven in je einen Randzahn endigend. Blh. + verwachsen, Gr. exzentrisch, Fr. schief.

I. Kztr. z. T. verdornend*) B. vgl. Fig. 141 a. Fr. geflügelt.

23. Hemiptelea. (S. 224.)

II. Kztr. nie verdornend, B. vgl. Fig. 142 und 143 a—b. Fr. ungeflügelt. **24. Abelicea.** (Seite 224.)

B. Kn. meist deutl. angedrückt. B. am Grunde 3-nervig. Seitennerven ähnlich A, o. meist unter 6 und vor dem Rande bogig umbiegend. Blh. frei, Gr. zentral.

I. Seitennerven der B. meist in einen Zahn auslaufend (Fig. 146 a), nie bogig umbiegend, + Bl. ohne Stb., mit schmalen Cot.

25. Aphananthe. (Seite 226.)

*) Nach einer Angabe BREITSCHNEIDERS im Herb. Hofmus. Wien sind die Dornen bis 12 cm lang.

II. Seitennerven der B. bogig umbiegend.

a. B. vgl. Fig. 147 a. Fr. geflügelt. 26. *Pteroceltis*. (S. 227.)b. B. vgl. Fig. 149, Fr. ungeflügelt. 27. *Celtis*. (S. 228.)**Gattung 23. *Hemiptelea* PLANCH., in Compt. rend. Ac. Paris 6, Janv. 1872.**

Vgl. oben S. 223 und Art. Nur diese bekannt.

H. davidii: $\mathfrak{h}$, Näheres über Habitus mir unbekannt, Zw. schlank, zäh, jung stark, $\odot$ beh., braunrot, $\odot$ kahl, mit sich ablösender weißer Epid., Lent. späterdeutl. als quere Wülstchen hervortretend, Kn. beh., eikugelig o. $\frac{1}{2}$ flach, zweifarben, hfg. zu 3 nebeneinander; B. vgl. Fig. 141 a, derb, oben tiefgrün, glatt (Haare nur unter Mikroskop zu sehen!), unten viel heller gelbgrün, jung deutl. spärlich beh., später wie oben; Bl. (n. PLANCHON) zu 1—4 in den B.-Achseln diesj. Zw., gestielt, P. im Kn. imbricat (4—5), Stb. 4, vor P.; Fr. vgl. Fig. 141 b (a = Flügel), S. ?*H. d.* PLANCH., l. c. (*Planera d.* HANCE, in Jour. bot. VI, 333. 1868). — China (Prov. Chili, Chekiang, Shingking, Kiangsi), Korea. — Noch nicht eingeführt, aber sicher interessant und kulturwert, wie auch zieml. hart.Fig. 141. a—b *Hemiptelea davidii*: a B., b Fr. (a Fr.-Flügel) — a—d *Zelkova japonica* DIPP.: B. (c nach DIPPEL, sonst Original). **Gattung 24. *Abelicea* REHB., Consp. veg. 84. 1828 [BELL] (*Zelkova* SPACH, in Ann. sc. nat. sér. 2. XV, 356. 1841; *Planera* subgen. *Abelicea* PLANCH., in Ann. sc. nat. s. 3, X, 261. 1848).**Vgl. oben S. 223: Bl. monoec., δ gebüschelt im unteren Teile der Zw., σ darüber einzeln in B. Achseln. P. (4—5), Stb. 4—5 vor P., in σ Bl. reduz. Stb.; Fr. steinfruchtartig. E. mit breiten Cot. 3 Arten bekannt.

○ B. vgl. Fig. 142.

1. *A. ulmoides* (*Zelkova carpinifolia*): $\mathfrak{h}$ kleiner $\mathfrak{h}$. Zw. beh., rot- o. hellbraun, mit orangefarbenen Lent., die an den kahlen Zw. zu rundl. Höckerchen werden, Kn. flachkugelig eifg., 2—3 mm lang, zweifarben, beh., Sch. hell gewimpert; B. an jungen Pfl. meist oben bleibend rauh, an älteren glatt, tiefgrün, unten viel heller; σ weich beh., meist nicht über 5:2.5 cm, wenn aber bis 9:3 cm, also *hurta* ähnlicher, so doch am Ende nicht so schmal-spitzig und etwa in der Mitte am breitesten; Bl. vgl. Fig. 142, dgl. Fr.

A. u. O. KTZE., Rev. gen. II, 621. 1892 (*Rhamnus ulm.* GÜLDST., Itin. I, 313. 1787; *Rham. carpinifolia* PALL., Fl. ross. I, 2, 24, t. LX. 1788; *Planera richardi* MCHX., Flor. bor.-am. II, 248. Anm. 1803; *Planera crenata* DESF., Cat. Hort. Par. 3. Ausg. 1829; *Zelkova cren.* SPACH, l. c.; *Plan. carpinif.* K. KOCH, Dendr. II, 425. 1872; *Zelk. carpin.* DIPP., Laubh. II, 38. 1892). — Ulmen-A. — O.-Kauk., N.-Pers. (im SW. des Kasp. Meeres). — Wälder. — Blz. IV—V. — Etwa bis Prov. III hart, aber jung nur in geschützter Lage. — Die von DIPPEL, l. c. 39, aufgestellte *Zelk. japonica* ist teils mit *ulmoides* identisch, teils aber gehört sie in der typ. Form der *verschaffeltii* wohl überhaupt nicht zu *Abelicea*. Sowohl *A. hirta*, wie *A. ulmoides* zeigen im Präparat unter dem Mikroskop in der Aufsicht stark gewellte Zellgrenzen der Blattoberhaut beider Seiten, ferner

Fig. 142. *Abelicea ulmoides* (*Zelkova carpinifolia*): a—b B.; c Zw. mit ♂ und ♀ Bl.; d ♂ Bl., e ♀ Bl.; f Fr.; g diese im L.-Schnitt (c—g nach ENGLER).

auf der Unterseite weniger Sp., als z. B. *Ulmus glabra*. Diese hat gerade begrenzte Zellen, wie wir sie auch bei der fraglichen *verschaffeltii* finden, deren Sp.

Fig. 143. *Abelicea hirta* (*Zelkova kentsi*): a—b B. und B.-Zw.; c Zw. mit ♂ Bl., d ♀ Bl.; e dgl. von oben ausgebreitet ohne Stb. (f—g); h ♂ Bl.; i Frkn. im Längsschnitt mit Sa. 30; k S.; l dgl. im Längsschnitt; m—p E. mit den beiden Cot. (q—z) (b—z nach SHIRASAWA, sonst Original).

ebenso ~ wie bei *U. glabra* sind. Alles genau, wie bei der Berardi-Ulme, die lange als *Abelcea*-Form gedeutet wurde. Höchstwahrscheinlich ist *verchaffeltii* also zu *U. glabra* o. eventuell zu *U. dappoliana* zu stellen. Es wäre sehr erwünscht, die Herkunft genau festzustellen. Japanischen Ursprungs scheint sie sicherlich nicht. Es sei auch noch auf *A. abelicea* (*Zelkova cretica*) hingewiesen, die 3. bisher nur auf Kreta

und Cypern gefundene Art der Gattung, deren ledrige B. 1—4:0,7—2 cm messen und von *ulmoides* durch die an üppigen Trieben dicht beh., graugrünen Unterseiten abweichen. Hier sind die Zellgrenzen nicht gewunden und auch die Sp. zahlreicher, so daß das Bild an *Ulmus* erinnert. Die verworrene Synonymik dieser Art ist folgende: *Abelicea abelicea* (*Quercus abelicea* LAM., Encycl. méth. I, 725. 1783 [bez. 1789]; *Ulmus?* *abelicea* SIBTH. et SM., Fl. graec. Prodr. I, 172. 1806; *Planera abelicea* ROEM. et SCHULT., in L. Syst. veg. ed. 16, VI, 304. 1820; *Zelkova cretica* SPACH, Hist. vég. XI, 121. 1842; *Zelk. abelicea* BOISS., Fl. or. IV, 1159. 1879).

Fig. 144. *Abelicea hirta* (*Zelkova keaki*): glatte Borke eines alten ♂ (Orig. n. C. K. SCHNEIDER).

○○ B. vgl. Fig. 143.

2. *A. hirta* (*Zelk. keaki*): ♂, bis 30 m. Habitus vgl. C. K. SCHNEIDER, Dendr. Winterst. 6, Fig. 2. 1903, und Borke Fig. 144 oben: ♂ Zw. braunrot o. olivbraun, meist kahl, graubraun, feinrissig. Kn. vgl. Fig. 149 l—q, bräunlich, fein beh., B. in Beh. und Färbung analog *ulmoides*, Zähne mit deutlicheren, mehr nach vorn gerichteten Stachelspitzchen, 3—9:1—3—4 cm, Bl. und Fr. vgl. Fig. 143.

A. hirta (*Corchorus hirtus* THBG., Fl. jap. 228. 1784, teste MAXIM.; *Ulmus keaki* SIEB., Syn. pl. ocean. n. 170. 28. 1836; *Planera acuminata* LIDL., in Gard. Chr. 1862, 428; *Planera japonica* MIQ., Prol. 254. 1867; *Plan. keaki* K. KOCH, Dendr. II, 1, 427. 1872; *Zelk. acum.* PLANCH., in Compt. rend. Ac. Paris 1872, I, 1196; *Zel. keaki* DIPP., Laubh. II, 40. 1892; *Abelicea keaki* C. K. SCHN., Dendr. Winterst. 238. 1903). Japanische Keaki (Jap. Name „Keyaki“ ex SHIRASAWA). Jap. (Kushu, Shikoku, Honshu, China (Kiangsu, Chekiang), Korea. Blz. IV. Frz. IX—X. Schoner Zier-♂, forstlich wohl kaum verwertbar, denn selbst MAYR sagt nur: für die wärmsten Lagen Buchenklinao als Mischholz, in besten Böden

Gattung 25. *Aphananthe* PLANCH., in Ann. sc. nat. X. 265. 1848. (*Homoiceltis* BLUME, Mus. Lugd.-bat. II, 64. 1852).

Vgl. oben S. 223 und Art. 3—4 Species in O.-As und Australien.

*, Erst heute bin ich mir über die genaue Nomenklatur dieser Art ganz klar und gebe sie so ausführlich als notwendig.

A. aspera: $\bar{h}$. bis 20:1 m; Krone kegelig, Borke lange glatt, dann dickschuppig. St. alter $\bar{h}$ wulstig; ($\odot$) Zw. - beh., graubraun, sehr dicht mit feinen rotgelben Rindenhöckern bedeckt. ∞ fein längsrissig, Kn. mit Bei-Kn., in Form *Celtis* ähnlich, beh.; B. beiders. - rauh, oben viel dunkler, 3,5-10:2,5-4 cm, häutig; σ Bl. in dichten Trugdolden am Grunde der Zw. vor B.-Ausbruch, γ einzeln oberwärts in den B.-Achseln, sonst vgl. Fig. 145, Steinfr. kugelig, tief olivgrün, mit fleischigem Exokarp.

A. a. PLANCH., l. c. (*Prunus aspera* THBG., Fl. jap. 201. 1784; *Celtis muku* SIEB., Syn. 28 1830 [dgl. et *Sponia nudiflora* SIEB. et ZUCC., Abh. Ak. München III, 783. 1843*]); *Homoc. aspera* BL., l. c.). - Rauhe A. - Jap., Gebiet der temp. Zone, China (Chekiang). Blz. V. - Frz. IX-X. Ich erhielt sie bisher nur echt durch Herrn REHDER aus dem Arnold-Arboretum in N.-Am.

Fig. 145.

Fig. 145. *Aphananthe aspera*: a B., b Kn. mit B.-Stiel und Neb. (a), c σ Bl. (links Kn. mit imbricaten P.), d γ Bl., e dgl. im L.-Schn., f Fr., g S., h E. (gerollt und ausgebreitet (c-d, g-h mäßig vergr.) (b-d, f-h nach BLUME, sonst n. d. Nat.).

Fig. 146.

Fig. 146. *Pteroceltis tatarinowii*: a B., b Bl.-Kn., c σ Bl. (ganz jung der Bl.-Kn. entnommen), d Stb., e Fr., f E. gefaltet, d dgl. ausgebreitet (b, f, g mäßig, c-d stärker vergr.) (nach MAXIMOWICZ).

Gattung 26. *Pteroceltis* Maxim., in Bull. Ac. Pétersbg. XVIII. 291. 1873.

Vgl. oben S. 224 und Art. Nur diese bekannt.

*P. tatarinowii***: $\bar{h}$. Zw. glatt kastanienbraun, kahl (ob immer?). Lent. klein, wenige; B. $\odot$, vgl. Fig. 146, o kleiner; Bl. nach ENGELER wie bei *Celtis*.

*) Nicht *Celtis mukii*, wie SCHELLE im H. d. D. D. G. schreibt.

**) Beschreibung nach MAXIM., ich sah noch kein Material, hoffe aber, daß dieser so interessante $\bar{h}$ bald eingeführt wird.

vgl. auch c, was eine junge, der Kn entnommene Bl. darstellt! Fr. rundlich-viereckig (e), ulmenähnlich.

P. t. MAXIM., l. c. — Flügelzürgel. — Zentr.-China (Kansu, Shensi, Ku Chou). — Dürfte gleich *Aphananthe* für Prov. V—VI in Betracht kommen.

Gattung 27. *Celtis**) L., Sp. pl. 1043. 1753.

[Zürgel; hackberry; micocoulier.]

Vgl. oben S. 224; dornenlose b $\varnothing$, B. sommergrün, ganzrandig o. γ , bis scharf gesägt; δ Trugdöldchen büschelfg., Bl. einzeln, lang gestielt. P. meist frei, in Kn. dachziegelig; Steinfr. zuw. essbar, S. meist ohne End., die weißliche Schale selten ganz glatt, sondern meist leicht netzgrubig, E. mit quergefalteten Cot. Heimat der 12–15 *Euceltis* in der nördl. gemäß. Zone.*

C B. vgl. Fig. 147k, beiders. glatt, glänzend, durchscheinend gepunktet, auch Hauptnerven unten nur mäßig hervortretend, Textur derbhäutig, Papillen und Cuticularleisten fehl., Fr. unbekannt.

1. *C. davidiana*: $\varnothing$, mit schwanker, ausgebreiteter, hängender Verzweigung (in Heimat $\varnothing$?), Zw. jung beh., γ hellgrau-olivbraun, kahl, Lent. γ , hell; Kn. hellbraun, beh., 3–4 mm lang; B. nur mit wenigen hellen Härchen beiders. auf Rippe und unten in Nervenachsen, unters. wenig heller, 4,5–12:2,5–5 cm; Stiel 0,6–1,5 cm, oben deutl. rinnig, meist mit verstr. Härchen; Bl. ?

C. d. CARRIÈRE, in Rev. hort. 1868, 300. — Angeblich aus N.-China. — Dieser hübsche, allerdings nur für wärmste Lagen zu empfehlende b ist nur ungenau bekannt und weicht durch das glänzende Laub von allen anderen Arten, die ich lebend sah, auf den ersten Blick ab. Am nächsten wohl *hongana* verwandt, wie schon PLANCHON betonte. Ich fand Pfl. im Hort. Bot. Straßburg und Darmstadt.

CC B. nicht so, o. wenn in Textur und Färbung ähnlich, kleiner (Fig. 147q) und ohne durchscheinende Punkte.

Steine glatt, so daß nur 2–4 Nähte deutlich o. sehr leicht netzgrubig (Fig. 148p¹–s). B. vgl. Fig. 147l–r², im Alter meist kahl, o. bräunliche, mehrzellige Drüsenhaare vorh., nicht o. mäßig durchscheinend gepunktet.

7. siehe
S. 231

*) Von den etwa 70 Arten kommen nur solche aus der Untergattung *Euceltis* PLANCH., in Ann. sc. nat. sér. 3, X, 263. 1848, hier in Betracht. Diese bedürfen noch sehr vergleichender Beobachtung. Ich selbst konnte meine Studien aus Mangel an ostasiat. und nordam. Material nicht zu dem ersehnten Abschluß bringen und bitte alle diejenigen, welche in der Lage sind, mir solches zu verschaffen, um freundliche Unterstützung.

**) FR. PRIEMER hat in einer ausführlichen Arbeit: „Die anat. Verhältn. der Laubb. der Ulmac. etc.“ in Engl. Bot. Jahrb. XVII, 419. 1893 die B.-Merkmale der *Celtis* etc. eingehend behandelt. Für mein Buch können anatomische Merkmale nur sehr begrenzt benutzt werden, sofern ihr Nachweis ohne große Schwierigkeiten möglich. PRIEMER hat anscheinend sehr brauchbare Merkmale gefunden, allein ich fand in mehreren Fällen seine Angaben unzutreffend. So stellt er *C. mississippiensis* zu den Arten mit Papillen und Cuticularleisten, was nur auf falscher Bestimmung beruhen kann. Ferner soll *Ulmus hirta* (= *Zelk. acuminata*) auf den B.-Oberseiten im Gegensatz zu *A. ulmoides* (*Z. crenata*) keine undulierten Zellgrenzen haben, was nicht zutrifft. Diese und andere Nachweise haben mich veranlaßt, gegen PRIEMERS Angaben, solange ich sie nicht durchweg nachprüfen konnte, zurückhaltend zu sein, da mir nur wieder einmal ein Anatom aus unrichtig bestimmten Herbarexemplaren falsche Schlüsse gezogen zu haben scheint.

— B. nur über Mitte gezähnt, beiders. glänzend, glatt, undurchscheinend o. Drüsenhaare vorh., Papillen und Cuticularleisten meist ganz fehl.

B. vgl. Fig. 147q, glänzend, kahl, Stein (Fig. 148q) glatt.

Fig. 147. *Celtis*: a—d *australis* — e—e² *caucasica* — f—i *occidentalis* — k *dauriana* — l—l¹ *glabrata* — m—p¹ *tournefortii* — p¹ var. *betulaefolia* — q *bungeana* — r—r² *sinensis* — (auch das B. rechts davon) *reticulata* — t *mississippiensis* — u — *pamula* (u — w von Pfl. aus Hort. SPÄTH, w¹ aus Heimat) — x — z *crassifolia* (alles reichlich $\frac{1}{3}$ n. Gr.) (Original).

2. *C. bungeana*: Tracht? . Zw. dünn, kahl, olivbraun: B. 3.5 6:2—3 cm, vgl. *dauriana*, aber Aderung schärfer. Stiel 0.6—1 cm: Bl. (nach PLANCHON) sehr klein, 4-zählig: Fr. erbsengroß, reif trocken schwärzlich, Stiele 1—1.5 cm.

C. b. BLUME, Mus. Lugd.-Bat. II, 71. 1852. — Bunge Z. — China (Prov. Chili, Shinking, Chekiang, Hupeh, Szechuen. — Mir nur aus Herbar bekannt geworden.

B. vgl. Fig. 147r—r², zottige Drüsenhaare auffällig ~, Stein ganz leicht grubig.

3. *C. sinensis*: b, bis über 20:1 m, Zw. jung dicht gelbgrau kurzhaarig, o. dichter beh., seltener fast kahl, . rotbraun. Lent. m. SHIRASAWA) sehr deutlich. Kn. zweifarben, beh.: B. ziemlich glatt, unten wenig heller, bis 7:5 bez. 7.5:3.8 cm: Stiel 7—12 mm: Bl.

meist 4-zählig, P. $\equiv$ wimperig gezähmelt; Fr. etwa 8:7 mm, Stiel 8—10 mm.

C. s. PERS., Syn. I, 292. 1805 (*orientalis* THBG., Fl. jap. 114. 1784, non L.; *willdenowiana* ROEM. et SCHULT., Syst. veg. VI, 306. 1820; *japonica* PLANCH., in DC. Prodr. XVII, 172. 1873). Chinesischer Z. China (weit verbr.), Formosa, Korea, Japan. — Blz. IV. — Frz. IX. — Mir sicher echt in Kultur nicht bekannt geworden. Im Hort. Bot. Darmstadt sammelte ich als *Aphananthe*, Japan 1892, SARGENT, einen *Celtis*, dessen Identifizierung mir bisher noch nicht möglich war, der aber — auch nach REHDER — hierher zu gehören scheint.

++ B., wenigstens einseitig, fast vom Grund an gezähnt, weder auffällig glatt und glänzend, noch Drüsenhaare deutl. Unters. deutl. o. $\pm$ papillös.

Fig. 148. *Celtis*: a—f *australis*: δ Blst., b δ Bl., c σ Bl. von oben, c¹ Stb., c² P., d σ Bl., e Fr., e¹ Stein, e² Fr. im L.-Schn. f S. — g—i² *occidentalis*: g δ Bl., h σ Bl. im L.-Schn., i Fr., i¹—i² Stein. — k—n *pumila*: k δ Bl., l σ Bl., m Fr., n Stein. — o—o¹ (und s) *glabrata*: o—o¹ Neb., s Stein — p—p¹ *tournefortii*: p Neb., p¹—p² Stein — q *bungeana*: Stein — r *sinensis*: Stein — siehe o — t *caucastica*: Stein — u *reticulata*: Stein — v *mississippiensis*: Stein (a, b, f n. ENGLER; d, e² nach BAILLON; k—n nach HILL, sonst Original).

B. meist blaugraugrün getönt, Grund vorwiegend gerundet o. herzförmig, Spitze meist zieml. kurz (Fig. 147m—p). Stein glatt o. fast glatt*) (Fig. 148p¹—p²).

*) Deutlich netziggrubig ist der Stein auch bei der Pfl. vom Ätna nicht, die KOEHNE, Dendrol. 137, 1893, als *var. aetnensis* TENORE hervorhebt, wenigstens zeigten

4. *C. tournefortii*: $\text{b}-\text{b}$, ich sah Expl. bis 6:0,3 m; Zw. meist von Anfang an kahl (bei jungen Pfl. und einigen Formen scheint eine deutliche Beh. Regel, hier auch B. c , bis stark rauh und unten bleibend beh., c braunrot, Kn. dgl., 4—5 mm lang, c beh. o. nur Sch. gewimpert, seitliche Bei-Kn. hfg.; B. zuletzt meist derbhäutig und ganz kahl und glatt, Netznervatur nicht erhaben, 3—8:1,5—5 cm, Stiel 1—1,5 cm; Fr. reif rotgelb, bis 9:8 mm, Stiel 11—14 mm.

Von Formen sei erwähnt *f. betulaeifolia* (*C. bet.* VANDAS, in Schedae, 1891), eine anscheinend sterile, sehr rauhe b -Form mit durchweg herzfg., kleinen B (Fig. 147 p¹), gefunden in Herzegow. bei Trebinje.

C. t. LAM., Dict. IV, 138. 1797 (*C. orientalis* MILL., Dict. ed. VIII. n. 3, 1768, nec L.). — Sizil., Griechl., Kl.-As. (bis Kurdistan). — Tourneforts Z. — Blz. IV—V. — Frz. X. — Hübscher bis Prov. III harter Zier- b , dessen blaugraugrüner Laubton gut wirkt.

B. mit c spitzkeiligem, nie herzfg. Grunde und scharfer Spitze (Fig. 147 l—l¹, Stein leicht netzgrubig Fig. 148 s).

5. *C. glabrata*: diese Art scheint nur eine durchaus kahle, in B.-Form und der scharfen Zähnung z. T. an *caucasica* gemahnende Varietät von 4 zu sein.

C. g. STEV., ex PLANCH. in Ann. Sc. nat. 1848, 285 (*tournefortii* β . *glabrata* BOISS., Fl. or. IV, 1157. 1879). — Kähler Z. — Von Cilicien bis Georgien und N.-Pers. — Sonst wie voriger. Ob echt in Kultur?

+ $\times$ Steine stets deutlich netzgrubig, B. sehr wechselnd, Fig. 147 a—i, s—z.

+ c B. stets geschwänzt zugespitzt (Fig. 147 a—e²), Zähnung fast vom Grund ab reich und scharf, Textur zuletzt derb, hfg. rauh, Unters. meist bleibend weich beh., c graugrün, hfg. deutl. netzleistig papillös. ++ siehe S. 232.

$\triangle$ B. breit eirhombisch, höchstens 2:1 (Fig. 147 e—e²).

6. *C. caucasica*: alles in Allem *australis* sehr nahe, Zw. jung beh., c beh. o. kahl, rotbraun; B. am Grunde meist sehr ungleich, 3—8:1,5—4,5 cm²), Papillen unten zuw. nur sehr schwach o. kaum deutlich (Mikroskop); Fr. tief rotbraun, bis 1:0,8 cm, Stiel 1,3—1,7 cm, Stein vgl. Fig. 148 t, Form wechselnd.

C. c. WILLD., in L. Sp. pl. ed. IV, 994. 1805 (*australis* et *tournefortii* AUCT.). — Kaukasus-Z. — S.-Pontus, Kauk., Transkauk., N.-Pers., vielleicht bis Himal. Vgl. *australis*, als dessen östliche var. sie aufgefaßt werden kann. Ob in Kultur?

$\triangle\triangle$ B. eilänglich, meist 2 $\frac{1}{2}$:—3:1 (Fig. 147 a—d).

7. *C. australis*: ($\text{b}-$) b , bis 25:1,3 m, Krone im Alter eirundlich, unregelmäßig, St. lange glatt graurindig, erst spät aufreißend; Zw. jung stärker beh., c verstr. beh., c grau- o. rotbraun, Lent. ∞ , fein; Kn. vgl. Fig. 149 f—k, zweifarben, 3—5 cm lang, fein hell beh.; B. 4—15(—20):1,5—6 cm; oben meist sehr rauh, tiefgrün, unten c weich beh., selten stark kahlend, deutl. cuticularleistig-papillös; Stiel 0,5—1,8 cm; Bl. vgl. Fig. 148 a—d; Fr. anfangs gelblichweiß, dann rötlich, zuletzt violettbraun, bis 12 mm Dm., feinschmeckend; Stiel 1,8—2,7 cm, Stein vgl. Fig. 148 e—e²; Bewurzelung stark, tief und weitgehend.

die mir vorlieg. Orig.-Expl. Steine wie die in Fig. 148 p². Ferner sei betont, daß die Trennung des *tournefortii* z. T. zum Verwechseln ähnlichen *glabrata* auf Grund breiterer eig. Neb. nicht angängig, da die Neb. der zuerst austreibenden (unteren) B. auch bei der ersten Art breiter, und die der oberen auch bei *glabrata* schmaler sind. KOHNES Beschreibung paßt z. T. gut auf *caucasica*.

+ Ein von SINTENIS sub No. 1840 gesammeltes transkaspisches B.-Expl. zeigt B. bis 11,6 cm, die nicht fein gespitzt sind; BORNMÜLLER hat sie als *australis* bestimmt, ich halte sie für üppige Triebe von *caucasica*.

C. a. L., Sp. pl. 1043. 1753. — Südlicher Z.; southern n.; fabrecoulier. — I. G. nur OU, südl. von S-Tirol, S-Steierm. und S-Ung.; Sch. Tessin, Simplon; sonst noch S.-Frkr., ganz S.-Eur., N.-Afr., W. und M.-Kl.-As. (Ostgrenze noch unsicher). — Meist vereinzelt, selten kleine Bestände, im Gebirge bis etwa 700 m. — Blz. V, kurz nach B.-Ausbruch; Frz. X; Laubfall XI. — Alter über 600 Jahre. — Holz: zieml. hart, spez. Gew. lufttrocken im Mittel 0,78, schwer, dauerhaft. — Forstlich nur insofern von Bedeutung, als er noch auf trocknen, bodenarmen Karstgründen gedeiht. Junge Stämmchen liefern ausgezeichnete Peitschenstiele.

Fig. 149. a—e *Celtis occidentalis*: a ♂ Zw., b—c Kn., d B.-N., e Zw.-Q.-Schn. f—k *C. australis*: f ♂ Zw., g—h Kn., i Kn.-Sch.-Wimperung, k wie e (1—6 vgl. Fig. 731 S. 134). l—q *Abelucia hirta* (*Zelkova keraki*): l (♂) Zw., m dessen Beh., n—p Kn., q B.-N., r Neb.-N., s Bei-Kn., rechts bei p Wimperung der Kn.-Sch., q wie k (Orig. n. C. K. SCHNEIDER).

† B. selten so fein gespitzt, dann meist dünnhäutig, zieml. kahlend und unten deutl. gelbgrün (Fig. 147f i und s z), Papillen z. T. fehl., meist durchscheinend gepunktet.

B. gezähnt, selten einzelne ganzrandig.

B.-Rand meist durchweg gesägt, Grund vorwiegend herzfg., Flächen beiders. rauh, unten cuticularleistig-papillös. Stein mir unbekannt*).

*) Ich wandte mich wegen der nordam. Arten an Herrn E. J. HILL in Chicago, der im Bull. Torr. Bot. Club XXVII, 190, 1900, über „*C. pumila* PURSH, with Notes on Allied Species“ berichtet. Er war so lebenswürdig, mit seine Meinung mitzutheilen, mußte aber bekennen, daß er über *crassifolia* etc. nicht genau unterrichtet sei und mit *pumila* im Vergleich zu *occidentalis* gut untersucht habe. Er ist gleich mir über *C. crassifolia* BRITTON in seinem Manual 339 1901 im Unklaren, zumal aus einem Briefe BRITTONS an ihn hervorzugehen scheint, daß B. geneigt ist, *pumila* für identisch mit *crassifolia* zu halten. Ob *pumila* HORT sich in der Tat mit *pumila* sensu HILL deckt, ist mir noch fraglich. — C. D. BEADLE gibt in SMALL, Fl. southeast Stat. 365 1903, folgende Bestimmungstabelle für die nordamerikanischen *Celtis*-Arten: I leaf-blades of an ovate type: A. twigs glabrous: *C. occidentalis*, Quebec bis Manitoba, N.-Carol., Alab., Kansas. B. twigs puberulent: a. leaf-blades green beneath, glabrous or slightly pubescent: a) mature drupes 7—10 mm in diameter: 1) leaf-blades barely reticulated, species of the middle and eastern United States: *C. crassifolia*, New York bis Kansas.

8. *C. crassifolia*: b $\text{\textcircled{b}}$, Zw. jung beh., $\cdot$ dgl., braungrau, Lent. ∞ , fein: B. vgl. Fig. 147 x—z, unten gelblich o. graugrün, 5,5—12: 2,5—5,5 cm, Stiel 0,5—1 cm; Bl. und Fr.?

C. c. LAM., Encycl. méth. IV, 138. 1797 (*cordata* PERS., Spec. pl. I, 292. 1805; *audubertiana* SPACH, in Ann. Sc. nat. sér. 2, XVI, 41, 1841; *inducum* K. KOCH, Dendr. II, 434. 1872). — Dickblättriger Z.; hackberry. N.-Am., nach BRITTON von New-Jersey bis S.-Carol., Ohio, Ill., Missouri, Tennessee. Vielleicht nur *var.* des formenreichen *occidentalis*; als *crassifolia* bezeichnete Fr.-Expl. im Herb. Mus. Pal. Vindob. scheinen mir nicht von *reticulata* zu trennen. Material erwünscht. In den Gärten z. T. als *reticulata*, der aber nach meiner Auffassung ganzrandige B. und ein noch schärfer ausgeprägtes erhabenes feines Zellnetz unters. zeigt.

= B. wenigstens im unteren Drittel hfg. ganzrandig, Flächen meist glatt, Papillen unten meist deutl., Stein $\pm$ netzgrubig.

$\cdot$ $\text{\textcircled{b}}$, Kn. 4—7 mm lang, B. auch im Alter zieml. dünnhäutig, Stein unsymmetrisch, 6—8:5—6 mm.

9. *C. occidentalis*: $\text{\textcircled{b}}$, bis 30:0,9 m o. kürzer gedrungener, stärker (vgl. Fig. 130 auf S. 127 meiner Dendrol. Winterstudien). Borke unregelmäßig flockig-schuppig, oft grob wulstig; Zw. jung beh., $\bar{\cdot}$ höchstens am Ende noch beh., olivgrün o. $\cdot$ gebräunt, meist $\cdot$ stark knickig. Lent. ∞ , bräunlich, am unteren Teile der Zw. verfließend; Kn. vgl. Fig. 149 a—e, Sch. beh. und gewimpert; B. vgl. Fig. 147 f—i, davon h—i von Lgtr., f—g von Fr.-Zw., meist lang feinspitzig, aber Spitze im Gegensatz zu *australis* ganzrandig; jung oben kurz, unten filzig weiß beh., bald oben glänzend grün, glatt o. leicht rauh (stärker an Lohden-B.), unten mäßig heller, kahl o. auf den Nerven $\cdot$ beh., 6—12 (—16):3—6 (—8) cm; Stiel 1,2—2 cm, $\cdot$ beh. o. kahl; Bl. vgl. Fig. 148 g—h, Fr. 1,2—2 cm lang gestielt, eirundl., reif dunkelpurp. bis fast schwarz o. orangefarben, Fleisch orange, dünn, trocken, vgl. i—l².

C. o. L., Sp. pl. 1044. 1753 (Synonymie noch nicht geklärt). — Nordamerikanischer Z.; western nettle tree, sugar berry. N.-Am., etwa von Quebec bis Manitoba, Labrador, N.-Carol., Missouri, Kansas. Ständig nahe dem Wasser, im Gegensatz zu *pumila*, der nach HILL trockne, steinige Lagen bewohnt. Blz. IV—V. Frz. IX—X. — Seit über 200 Jahren in Eur. in Kultur. Schöner harter Zier- $\text{\textcircled{b}}$, bes. als Einzelpfl., als Straßen- $\text{\textcircled{b}}$ des sparrigen Wuchses halber nicht zu empfehlen. Forstlich ohne Bedeutung für uns. — Botanisch hinsichtlich seiner Variationen noch sehr wenig genau untersucht, wozu natürlich amerikanische Botaniker in erster Linie berufen erscheinen.

$\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ Stets $\text{\textcircled{b}}$, Kn. 1—3 mm lang, B. im Alter meist derber, Stein mehr symmetrisch, 5,5—6:5—5,5 m.

10. *C. pumila*: ausgebreitet, z. T. wohl auch niedergestreckt verästelter $\text{\textcircled{b}}$, 0,75—4 (selten bis 5:0,08—0,10) m, Verzweigung dünn, schwank, breitwinklig, Kztr. zuw. dornähnlich; Borke dünn, grau, meist glatt; Zw. jung beh., bräunlich, $\cdot$ grau, Lent. hell. ∞ ; Kn. beh.; B. vgl. Fig. 147 u—w¹), sonst wie *occidentalis*, aber vorwiegend glatt.

S.-Carol., Tennessee. 2) leaf-blades conspicuously reticulated, western species. *C. reticulata*, S.-Col. bis Texas, Ariz. — β) mature drupes 5—7 mm in diameter: *C. occidentalis* SMALL, Maryland and Miss. bis Georg., Flor., Alab. — β) leaf-blades gray beneath and submentose: *C. helleri* SMALL, S.-Texas. — II) leaf-blades of an lanceolate type. A. leaf-blades entire or nearly so: *C. mississippiensis*, Ind., Ill. bis Texas, Flor. — B. leaf-blades sharply serrate: *C. smalli*, BEADLE, N.-Carol., Tenness. bis Georg., Alab. — Da mir SMALL's Flora erst in letzter Stunde zu Gesicht kam, kann ich zu BEADLE's Angaben nähere Stellung nicht nehmen. Warum er *pumila* nicht erwähnt ist mir unklar, da dieser doch wohl sicher in dem Gebiete der Flora auftritt.

*) *u—w* von *pumila* HORT. SPACH, *u* von HILL, eine ganzrandige Form zeigend.

Herbstf. bleich o. grünl. gelb: Bl. vgl. Fig. 148k—l, P. 4—6: Fr. einzeln, 6—8 mm Dm., Stiel 9—12 mm, vgl. sonst m—n.

C. p. PURSH, Fl. am. sept. I, 200. 1814 [sensu HILL, l. c.] (? *occidentalis* var. *tenuifolia* PERS., Syn. pl. I, 292. 1805); *occid. var. pumila* MUEHL., Catalogue 95. 1813, fide HILL; ? *tenuifolia* NUTT., Gen. I, 202. 1818). — Niedriger Z. — N.-Am., von Delaware und Pennsylv. bis Kansas, Kolorado, Utah und südl. längs der atlant. Küste. — Er bewohnt, sagt HILL, Sanddünen, felsige Orte, felsige Flußufer, trockene Hügel und Berge, being generally xerophytic in habit. — Blz. V, mit Laubausbruch. — Frz. Spätherbst. — Vgl. Anm. S. 232.

△ B. normal ganzrandig, selten mit wenigen Zähnen.

B.-Textur sehr derb, rauh, Adernetz stark runzelig, Grund ± herzförmig, Unters. papillös, graugrün (Fig. 147s).

11. *C. reticulata*: kleiner, buschiger, bis 16 m hoher b o. b, c Zw. graubraun o. lebhaft braun, meist gleich den braunen, 3—4 mm langen Kn. beh.; B. in der Aderung von allen anderen Arten abweichend, oben sehr rauh, unten rauh und auch weich beh., 4,5—10:2—5 cm; Bl. nach SARG. kahl, 5-zählig, nur Stiele beh., Fr. etwa 7—8 mm Dm., Stiel 1,2—1,5 cm. Steine vgl. Fig. 168u.

C. r. TORR., in Ann. Lyc. N. Y. II, 247. 1828 (*occid. var. reticulata* SARG., Forest trees N.-Am. 10th Census U. S. IX, 126. 1884; *mississippiensis* var. *reticulata* SARG., Silva VII, 72, t. 319. 1895). — Starkgenervter Z. — N.-Am., von Texas westl. durch Neu-Mex. und Arizona bis S.-Utah, Nevada und Küste von Lower Calif. — Bes. in trockenen, steinigen Lagen. — Diese Art, die vielleicht nicht echt in Kultur, vgl. *crassifolia*, soll nach SARG. allmählig in *mississippiensis* übergehende Formen zeigen. Was ich bisher von beiden Arten echt sah, war total verschieden.

— B.-Textur dünn, meist glatt, auch Hauptadern wenig auffällig, Grund meist ± keilförmig, Unters. grünl., nicht papillös (Fig. 147t).

12. *C. mississippiensis*: b b, bis 20:0,9 m; Krone ausgebreitet, zierlich verzweigt, Borke hellgrau, mit deutl. Exkreszenzen; Zw. jung meist beh., c bräunlich, kahl, Lent. verstr., Kn. 2—3 mm lang, beh., stumpflich; B. beiderseits zieml. gleich lebhaft hellgrün, meist sehr rasch bis auf einige spärliche Haare unters. auf Rippe und in Achseln kahrend, 3,5—10:2—4 cm; Bl. und Stiele nach SARG. kahl, P. 5; Fr. 5—7 mm Dm., etwa 1 cm lang gestielt, reif heller o. tiefpurpurn, Stein vgl. Fig. 148v.

C. m. BOSCH, Dict. agric. nouv., éd. X, 41. 1810 (*C. laevigata* WILLD., Berl. Baumg. ed. II, 81. 1811; *occident. var. integrifolia* NUTT., Gen. I, 202. 1818). — Mississippi-Z., southern hackberry. — N.-Am., von S.-Ind. und Ill. durch Kent., Tennessee, Alab., bis Flor., durch Miss., Ark., Texas bis Nuevo Leon, vielleicht auch Bermuda-Ins. — Vornehmlich in tiefgründigem Uferlande. — Ob in Kultur? Jedenfalls gleich *reticulata* empfindlicher als *occidentalis* und eher mit *australis* in Parallele zu stellen.

Familie 7. Moraceae, Maulbeergewächse.

ENGL., in Nat.-Pfl. III, 1, 66. 1888 [LDL.].

Vgl. Reihe S. 211. b b, Zw. Milchsaft führend, zuw. dornig, B. c zweizeilig o. fast gegst., in Kn. gefaltet o. gerollt, einfach, z. T. gelappt; Neb. zuw. bleibend; Blst. i kätzchenförmig o. kugelige Scheinähren; Bl. d, monoec. o. dioec.; meist 4-zählig, Stb. in Kn. nach Innen gekrümmt o. gerade; Gr. 1—2, fädig, Sa. hängend amphitrop; Fr. 1-samige Schließfr., hfg. Syncarpium; E. gekrümmt, End. vorh. o. fehl.

*) DIPPEL nimmt diesen Namen im Handb. II, 46 1892 mit Unrecht als ältesten für *mississippiensis* an. Auf diesen paßt PERSOONS Diagnose nicht.

Gattungen:

- A. Stets dornlos. B. gezähnt, wenn ganzrandig, wie Fig. 151m—n.
- I. Zw. nie filzig, Kn. 3—6-schuppig, B. sommergrün, vgl. Fig. 151a—d und 152. Bl. und Scheinfr. vgl. Fig. 152. **28. Morus.**
 - II. Zw. z. T. filzig, Kn. 2(—3)-schuppig o. B. wintergrün.
 - a. Zw. mit Scheidewänden in den Knoten. B. wie Fig. 151o—r o. B. wintergrün, ganzrandig (m—n). **32. Ficus.** (Seite 243.)
 - b. Zw. ohne Scheidewände in den Knoten. B. wie Fig. 151e—k zuw. gegst. **30. Broussonetia.** (Seite 240.)
- B. Zw. fast stets dornig, B. ganzrandig, wenn Zw. dornlos, vgl. B. Fig. 151s—u.
- I. B. ungelappt, über 6 cm lang (Fig. 151s—u). **29. Toxylon.** (Seite 239.)
 - II. B. 3-lappig, meist unter 5 cm lang (Fig. 151l und 157). **31. Cudrania.** (Seite 242.)

Unterfamilie a. *Moroideae* A. BR., in ASCHERS. Fl. Brandbg. I. 57. 1864. — Vgl. oben: B. in Kn. gefaltet. Neb. niemals stengelumfassende B.-N. zurücklassend, Stbf. in Kn. einwärts gekrümmt, später zurückgebogen.

Gattung 28. *Morus* L., Sp. pl. 986. 1753.

[Maulbeere; mulberry; murier.]

Vgl. oben: $\text{b} = \text{b}$, St. im Alter mit schuppiger Borke, B. am Grunde 3–5-nervig, hfg. eigenartig buchtig gelappt, Neb. seith., lanzettlich, abfällig; Blst. eifg. o. zylindrisch, Bl. mon- o. dioec., grünlich, P. 4, in den 2 Bl. zur Frz. fleischig und die Fr. umschließend, so daß Blst. eine Scheinfr. (Maulbeere), Sa. mit 2 Integ., End. vorh. — 7(—10) Arten der nördl. temp. Zone und trop. Gebirge. B. der zartblättrigen Formen seit Alters wichtigstes Futter für die Seidenraupen. — Forstlich ohne Belang.

C B.-Grund meist sehr tief herzförmig, die 0,5–1,5 (—2,5) cm langen Stiele die Lappen kaum überragend (vgl. Fig. 151d), N. deutl. beh. (Fig. 158f).

1. *M. nigra*: b , bis 12 m, Krone dicht, gedrungen, — kurz-zweigig, — Zw. kahl, Kn. zieml. kräftig, gleich den Zw. glänzend oliv- o. gelbgraubraun, Sch. 3–5, — 2-zeilig, vgl. Fig. 150a—d; B. selten gelappt* (*M. laciniata* MILL., Dict. ed. VIII, n. 2. 1768, fide BUREAU, meist gleichseitig, oben sehr rauh, tiefgrün, unten leicht rauh-kurzhaarig, Textur oft derb, 9–15:7–13 (=15) cm, Stiel nur flach rinnig, — beh.; b Blst. 2–4 cm, ihr Stiel etwa 1 cm; — Blst. nur 1–1,2 cm mit kürzerem Stiele; Scheinfr. 2–2,5:1,5–1,8 cm, sehr kurz gestielt, glänzend schwarz.

M. n. L., Sp. pl. 986. 1753 (*morettiana* HORT. NONN., non JACQ.) — Schwarze M.: black fruited m.; m. noir. Wahrscheinl. in W.-As. heimisch, in As. und S.-Eur. seit Alters in Kultur. Blz. V. — Bis etwa Prov. III harter, aber jung des Schutzes bedürftender schöner Zier- b , der *alba* vorzuziehen scheint, obgleich diese wohl etwas härter und vor Allem wüchsiger. Ist früher, als auch in Deutschl. die Seidenraupenzucht blühte, viel weniger gebaut worden als *alba*, da deren zartere B. ein viel besseres Raupenfutter geben.

* In ASCHERS. et GRAEB. Fl. Nordostd. Flachl. ed. 2, 260 1898, finde ich bei *nigra* die Angabe, daß sie in den B. noch veränderlicher als *alba* sei. Dies trifft doch nicht zu, denn auch am selben b scheint *alba* stets viel variabler.

CC B.-Grund gestutzt o. seicht herzförmig, Stiele meist über 2 cm lang, die Lappen stets deutl. überragend; N. nur fein papillös.

* (.) Zw. meist kahl, lebhaft braun, Kn. kräftig, 5—8:3—4 mm, Sch. 3—5 (—6), B. (Fig. 151 a) jung unters. weißfilzig. Frst. zylindrisch (Fig. 158 e).

2. *M. rubra*: in der Tracht mehr *nigra* als *alba* nahestehender ♀, bis 20:1,2 m. B. zuletzt derbhäutig, Rand feiner gesägt als bei *nigra*, Spitze meist fein vorgezogen, unters. die Nervatur hfg. recht

Fig. 150. a—d *Morus nigra*: a (.) Zw., b Kztr., c Wimperung der Kn.-Sch., d Zw.-Q.-Schn. (a—d vgl. Fig. 731, S. 134) e (.) Zw., f Kn.-Sch., g—h B.-N., i wie d — k—m *Osyris alba*: k (.) Zw., l Kn., m wie d (Orig. n. C. K. SCHNEIDER).

scharf. Beh. zuletzt kurz, weich, Obers. tief- bis blaugrün, meist glatt, 5—17 (—20 : 4—10—13) : 1—1,7 cm; * Blst. 3—5 cm lang. Stiel 1—1,8 cm; * 0,6—1,3 cm lang, Stiel 0,5—1 cm; Bl. vgl. Fig. 158 a—b: Frst. bis 2,5:1,2 cm, anfangs rot, dann schwarzpurpurn. Fr. d—d¹, S. e.

Man kann unterscheiden: *f. tomentosa* BUR., in DC. Prodr. XVII, 246. 1875 (*M. tom.* RAR., Flor. Ind. 113. 1817); B. oben rauh, unten filzig, und *f. m.* BUR., l. c., B. ± 5-teilig.

M. r. L., l. c. (*canadensis* LAM., Encycl. IV, 380. 1797). — Rote M.; red m. N.-Am. (New-York und Ontario bis Mich., S.-Dak., Flor., Texas). — In guten Boden Blz. (IV—V). Frz. VI. — Noch selten in Kultur, aber härter als *alba*.

* (.) Zw. meist an Spitze noch beh., * grauolivbraun, Kn. kleiner, aber Sch. meist 5—7, B. (Fig. 152) jung unters. nicht weißfilzig, Frst. mehr kugelig (n).

3. *M. alba*: ♀ ♀, bis 12 m. Krone rundl., sparrig verästelt), aber alles meist schlanker und lockerer als bei *nigra*, Borke längsrissig.

*) Durch regelmäßiges „Kappen“ oft Kopfweiden nicht unähnlich.

Kn. vgl. Fig. 153h—p. B. vgl. *var.*, Stiel meist deutl. rinnig. Textur meist dünn: Blst. länger gestielt als bei *nigra*. — meist kaum so lang wie Stiel, vgl. Fig. 152.

Fig. 151. a—d *Morus*: a *rubra* — b—c *alba* (vgl. auch Fig. 152): b *var. skeletonata*; c *var. urticae* — d *nigra* — e *var. Brunsiana* — f *var. piperifera* — g *var. laciniata* — h *kaempferi* — i—k *kazinoki* — l *Cudrania tricuspidata*: vgl. auch Fig. 157a — m *var. lucida* — n *var. stipitata* — o *var. pinnatifida* — p *var. pinnatifida* — q *var. pinnatifida* — r *var. pinnatifida* — s—u *Loxylon pomiferum* (Machina aurantia) o calles knapp — v *Gr.* (o nach KING, sonst Orig.).

Die für uns wichtigsten Abänderungen, sind in Fassung nach BURTON folgende: *var. a vulgaris* BUR. in DC. Prodr. XVII, 238 1873. Meist einstammiger B., junges Holz weiß. B. herzförmig; hierher *f. rosea* SER. Deser. et cult.

o Eine sehr interessante *var.*, deren B. Fig. 151b wiedergibt, sendte mir Herr REIDER aus dem Arnold-Arboret in N.-Am., wo man sie als „Skeleton-Mulberry“ erhalten. Fr. purpurn. Näheres unbekannt. Ich nenne sie *var. skeletonata*.

Mûr 203. 1855: B. breit herzfg., mäßig groß, Stiele rosa. = *f. colombassa* SER., l. c.: der vorigen sehr ähnl., aber B. dünner, entfernter stehend, kleiner, meist gelappt. — *f. macrophylla* LODD., Cat. 1836] (*M. m.* MORETTI, Del sem. h. tie 1826; *M. morettiana* JACQ., ex BUR., l. c.: an *negra* gemahnend, aber B. dünner, deutlicher gestielt, glatt, Frst. rot. — *f. tatarica* [LODD., Arb. brit. III, 1358. 1844; *M. t.* L., Sp. pl. 286. 1753]: b—h, B. 7—9:3,5—5 cm, sehr wechselnd gestaltet (vgl. Fig. 152 b), vorwiegend ei-ellipt, Stiel 2—3 cm; Frst. rot. — b. *pyramidalis* SER., l. c. (*var. fastigiata* SCHELLE, im H. d. D. D. G. 90. 1903): Wuchs einer Pyramidenpappel ähnlich, B. meist spitz eifg., z. T. gelappt. — c. *pendula* DIPP., Laubh. II, 10. 1862]: Zw. fein, hängend, B. tieflappig. — d. *italica* LODD., l. c. 1349 (*M. t.* LAM., Encycl. IV, 377. 1797): gilt als starkwüchsig, frisches Holz rötlich, B. zieml. groß, häutig, z. T. gelappt. — e. *constantinopolitana* LODD., l. c. 1358

Fig. 152. *Morus alba*: a—d B.-Formen; e Zw. mit ♂ Blst.; f ♂ Bl., g Stb., h P. (f—h von *var. tatarica*); i—k junger und älterer ♀ Blst.; l ♀ Bl.; m P; n Frst.) (l—m $\frac{4}{11}$, g $\frac{6}{11}$) (e, k, n nach BAILLON, sonst Original).

(*M. const.* LAM., Encycl. IV, 381. 1797; *M. byzantina* SIEB., in Herb. Flor. cret. 1826): kleiner dichtästiger h mit gewundenen Ästen und Zw., etwas an eine Miniatur-*Robinia pseudacacia* *var. tortuosa* gemahnend, eine monströse Kulturform mit dicklichen B. 5—80:10:3—60—80 cm, hier und da als kleine Kronenbäumchen angepflanzt; hierher vielleicht als Form *M. jeyvickiana* HORT., ein kaum 50 cm hoch werdender Zwerg-h. — f. *venosa* DELILE, in Bull. Soc. d. l'Herault XIII, 328. 1826 (*var. nervosa* LODD., Cat. 1836; *var. fibrosa* SER., l. c. 212; *M. urticifolia* HORT.); schlankastiger h h, B. (Fig. 151 c) äußerst variabel, Spitze zugewendet, Nervatur stark hervortretend, monströs. — g. *multicaulis* LODD., l. c. 1348 (*M. latifolia* LAM., Enc. IV, 381. 1797; *M. mult.* PERROTTER, in Ann. Soc. Lin. Paris II, 129. 1824; *M. cucullata* BONAF., Mem. cult. Mûr 7. 1831; *M. chinensis* LODD., Cat. ed. 1836; *M. nervosa* HORT., ex parte): mehrstämmiger h, Äste grau.

mit deutl. hellen Lenticellen, Zw. beh.; B. dünnhäutig, oft etwas blasig aufgetrieben, aus breitem Grunde schwach herztgl. 16–30:9–20 cm; *culgaris* *I. macrophylla* recht ähnlich, jedoch in der vielästigen Tracht u. durch die schwarze Fr. abweichend.

M. a. L., Sp. pl. 986. 1753. — Weiße M.; white m.; m. blanc. — Heimat wohl Or., soll schon an unterer Wolga wild auftreten, seit ältesten Zeiten in As. kultiviert, ebenso seit 12. Jahrh. in Eur. — Blz. V.

Gattung 29. *Ioxylon* RAF., in Am. Month. Mag. II, 118. 1817. (*Maclura* NUTT., Gen. N.-Am. Pl. II, 233. 1818; *Toxylon* RAF., New-Fl. III, 43. 1836).

Vgl. oben S. 235 und Art. Nur diese bekannt.

I. pomiferum: ♂ ♀, bis 20:0,9 m (bei uns kaum über 8 m), aufrecht, vielästig, lockerkronig, Borke an *Robinia* gemahnend, aber

Fig. 153. *a–g* *Ioxylon pomiferum* (*Maclura aurantiaca*): *a* ⊙ Zw., *b–c* Kn., *d* Kztr., *e* ♀ Zw. mit Dornen, *f* Schnitt durch Kn. und B.-N. parallel zum Zw., *g* Kn., *h–j* Bei-Kn., *k* Zw.-Q.-Schn. (*h–j* vgl. Fig. 731 S. 134) *h–p* *Morus alba*: *h* ⊙ Zw., *i–k* Kn., *l* analog *f* (*a–k* Kn., *β–γ* Bei-Kn., *δ* B.-N., *m–n* Kn., *p* wie *g* (Orig. nach C. K. SCHNEIDER).

zierlicher tiefriefig, eigenartig: Zw. jung beh., ♀ kahl, grün, olivgrün o. gebräunt, Lent. klein, ∞, deutl., Dorne und die breitkugehigen Kn. vgl. Fig. 153 *a–g*; B. vgl. Fig. 151 *s–u*, jung ♂ beh., oben bald ganz, unten fast kahlend, olivgrün, glänzend, zuletzt meist derbhäutig, 7–16:3,5–10 cm; Stiel 1,5–4 cm; Blst. kugelig, Bl. dioec., ♀ Bl. zur Frz. fleischig, zusammen mit dem fleischigen Receptaculum eine große kugelige runzliche gelbgrüne Scheinfr. (orangenähnlich) bildend, S. hellbraun, ohne End., vgl. Fig. 154.

I. p. RAF., l. c. 1817 (*Maclura aurantiaca* NUTT., l. c. 1818; *Broussonetia tinctoria* TORR., in Ann. Lye. N. Y. II, 246. 1828, non KUNTH). — Apfelfrüchtiger Osagebaum; osage orange. — N.-Am. (Missouri und Kansas bis Texas). — Mit Vorliebe in besten Boden. — Blz. V–VI. — Frz. VIII–IX (Fr. bei uns kaum ihre volle Größe erreichend). — In N.-Am. als Zier- und bes. Heckenpflz. hfg. kult.; in Eur. seit 1878 in Kult., meist empfindlich, wenn alt, etwa bis Prov. IV hart, sonst geschützte, leicht beschattete Lage. B. zu Seidenraupenfutter untauglich.

Fig. 154. *Ioxylon pomiferum* (*Maclura aurantiaca*): *a* ♂ Blst.; *b* junge ♂ Bl. mit eingebogenen Stb.; *c* Längsschnitt durch eine ganz offene ♀ Bl.; *d* Diagramm einer ♀ Bl.; *e* ♀ Blst.; *f* ♀ Blst. im Längsschnitt; *g* ♀ Bl., *h* dgl., doch vorderes P. entfernt; *i* Gr. (mit Seitenast); *j* P., *k* Frkn. im Längsschnitt; *m* Scheinfr., *n* ein Teil davon im Schnitt, die in das Receptaculum eingebetteten Fr. zeigend; *o* Fr., *p* dgl. im Längsschnitt; *q*—*r* E. (*b*—*c*, *f*—*k*, *p*—*r* vergrößert; *m* $\frac{1}{10}$, *n* $\frac{1}{2}$) (*g*—*l* nach der Natur, sonst nach SARGENT).

Gattung 30. *Broussonetia* L'HÉR., in VENT. Tabl. règn. vég. III. 547. 1794.

(*Papyrius* LAM., Ill. t. 762. 1793.)

Vgl. oben S. 235: ♀ Blst. denen von *Morus*, ♂ denen von *Ioxylon* ähnlich, aber ♂ Blh. (4. . . schlauchfg., nur undeutl. kurz 4-zählig o. ganzrandig, von eigentüml. keuligen Brakteen umgeben, vgl. Fig. 155h; Fr. (m. . . nur durch den dicken Gynophor, der in die fleischige Außenschicht des Receptaculums übergeht, mit diesem verbunden. Scheinfr. (l) orangerot. — 3—4 ostasiatische Arten.

⌞ B.-Stiele über 3 cm lang, B.-Spitzen kurz. • Zw. dicht beh.

1. *B. papyrifera*: von Grund aus mehrstämmiger, aufrecht verästelter, bei uns kaum über 6 m hoher B., in Heimat B. bis 10:0,6 m; Äste zuw. durch eigenartig rotgrauen Rindenton sehr auffällig; • Zw. oliv- o. graugrün, vgl. Fig. 156i — o: B. wie Fig. 151 e oder f, oben tief-

grün, leicht rauh beh., unten graugrün, weich beh., 8—20:5—15 cm; Stiele 4—11 cm, beh.; sonst wie oben.

Interessante Kulturformen sind: *var. a. cucullata* SER., Descr. et cult. d. M. r. 237. 1855 (*M. c.* in Bon Jard. 1833. 919; *M. navicularis* LODD., Cat. 1836); *B. laevis*, tageteilt, hohl kapuzentg. unters. — *b. a. a.* SER., Descr. et cult. d. M. r. 237. 1855 (*M. a. a.* in Rev. hort. N. Y. 37. 1855) äußerst seltsame, monstrose Zweigform mit B. wie Fig. 151 g.

B. p. L'HÉR., in VENT. l. c. (*Morus pap.* L., Sp. pl. 986. 1753; *Papyrus* L., Sp. pl. 1204. 1753; *Papiermaulbeerbaum*, *papiermaulberry*, *papyrier*. Heimat Jap., ob auch China?, jedenfalls in O. As., S.-Am. und N.-Am. alte Kulturpfl., in N.-Am. z. T. verwildert. — Blz. V. — Frz. IV (bei uns Scheinfr. zieml. unvollk. ausreißend). Bis Prov. IV harter ZwiStrauch. Rinde in der Heimat, gleich der der folgenden Art zur Papierbereitung dienend. Scheinfrucht eßbar.

Fig. 153. *Broussonetia papyrifera* L. f. *B. kazinoki* Sieb. et Zucc. *B. p.* Blz. dgl. vergrößert; *d* Blz. *e* Stb., *f* Blz. im Längsschnitt; *g* Blz. mit Frk. mit Gr., *h* keuhge Brakteen; *i* Blz. davon 2 Frk. im Längsschnitt; *j* Frk. mit dem Perigon; *k* Frst; *l* Fr. *a* nach BAILLON, *b* nach SHIRASAWA, sonst Original).

B.-Stiele 1—2 cm, *B.*-Spitze lang vorgezogen. • Zw. kahl.

2. *M. kazinoki*: wie voriger, doch kleiner, schlanker verästelter. Zw. rot- o. violettbraun, nur beim Austrieb beh., *B.* vgl. Fig. 151 i—k, unten satt olivgrün, fast ganz kahlend, 8—15(—20):4—7—12 cm; Bl. rötl.-braun.

M. k. SIEB., in Verh. Bat. Gen. XII. 28. 1827 (*B. sieboldii* BL., Mus. bot. Lugd.-Bat. II. 86. 1856; *B. laempferi* SIEB., Kruidk. Naandijst. 25. 1824, non SIEB.

1827*); *Morus kaempferi* SER., Descr. Mûr. 228. 1855). — Strauch-P. — Jap., S.-Korea. — Hübscher, den vorigen an Härte kaum nachstehender Zier- b.

Unterfamilie b. *Artocarpoidae*. A. BR., l. c. Vgl. oben S. 235. B. in Kn. gerollt, Neb. zuw. stengelumfassende B.-N. zurücklassend. Stbf. stets gerade.

Fig. 156. a—e *Cudrania tricuspidata*: a $\odot$ Zw., b Kn. (a = Neb.), c Wimperung der Kn.-Sch., d $\odot$ Zw. Q.-Schn. (d vgl. Fig. 73 l S. 134), e dgl. äußerste Partie — f—h *Ficus carica*: f $\odot$ Zw., f¹ B.-N. im Schnitt, g Zw. im L.-Schn. (a Bl.-Kn., β B.-N., γ Scheidewand im B.-Knoten), h wie d — i—k *Broussonetia papyrifera*: i—k $\odot$ Zw., l Kn. und B.-N. (a— β vgl. n), m B.-N. im Schnitt, n Kn. (die 2 äußersten Sch.-B. α und β auseinandergezogen), o wie d (Original n. C. K. SCHNEIDER).

Gattung 31. *Cudrania* TRÉC., in Ann. sc. nat. sér. 3, VIII, 122. 1847.

Siehe oben S. 235 und Art. 2—3 Spezies von O.-As. bis Neu-Caledonien.

C. tricuspidata: b, 0,5—1,5 m. Zw. jung fein beh., c meist kahl, flach rundlich, leicht gestreift, olivbräunlich, ausgebreitet, zuw. überhängend; Kn. rotbraun, vgl. Fig. 156a—e; B. vgl. Fig. 151 l und 157a, nur jung beh., bald kahl, oben tief-, unten hellgrün, zuletzt lederhäutig, Stiel 4—6 mm; Bl. in kugeligen Scheinköpfchen (Fig. 157b)

*) Diese echte *B. kaempferi* SIEB., in Verh. Bat. Gen. XII, 28. 1827, hat unten papillöse B. wie Fig. 151 h und stellt einen — niederliegenden, kriechenden, o. kletternden b. dar. Nicht in Kultur.

ohne umhüllende Hochb., aber einzelne Bl. mit 2–4 Hochb. (h). σ : P. 4. φ : Blh. das Gyn. einschließend (d, g). Blh. und Hochb. zur Frz. fleischig mit dem Receptaculum zu einer fleischigen Masse vereinigt (f), Fr. mit krustigem Pericarp (i), S. (k) mit dünnem End., E. mit gefalteten Cot. (l).

C. t. BUR., in Herb. Paris, ex LAV., Arb. segreg. 1877 (*Maclura tri.* CARR., in Rev. Hort. 390. 1864). — Dreilappige C. — Zentral-China. — Soll härter als *Ioxylon* sein. Interessante Zier-Pfl. Junge B. in Heimat als Seidenraupenfutter dienend.

Fig. 157. *Cudrania triloba*: a bedornter B.-Zw.; b Zw. mit φ Blst.; c φ Bl. eingesenkt in das Receptaculum; d φ Bl. frei; e P. und Stb. von σ Bl.; f Teil eines Frst. im Schnitt, g φ Bl. im L.-Schn., h σ Bl., i Fr. (frei); k Fr. halb geöffnet, mit S.; l E. (nach HOOKER).

Gattung 32. *Ficus* L., Sp. pl. 1059. 1753.

Vgl. oben S. 235: b = φ , B. $\odot$, Neb. die End-Kn. einhüllend (also = Kn.-Sch.), Bl. in kugeligen o. verkehrt-eifg., zur Frz. fleischigen, innen unterhalb der engen Mündung mit $\sim$ Brakt. besetzten Receptaculis eingeschlossen (Fig. 158s), winzig, monoec.: σ : P. 2–6, Stb. meist 1–2 (d. n.). φ : Blh. meist mit mehr Abschnitten (p, q), Frkn. mit σ exzentrischem Gr., Fr. von Blh. eingeschlossen, E. gekrümmt (v²). — Etwa 600 allweltliche, bes. die Tropen bewohnende Arten.

B. einfach o. gelappt, gezähnt, sommergrün, an fertilen und sterilen Zw. gleich gestaltet.

σ Zw. kahl o. fast kahl, B. oben σ rauh, unten φ beh.

1. *F. carica*: kleiner φ , bis 10:1,5 m, mit kurzem St., breit-ästiger, umfangreicher, lockerer Krone, an b Äste σ niederlieg. o.

²) Über die so interessanten Befruchtungsvorgänge sei folgender kurzer Hinweis (nach ENGLER) gegeben: Die Receptacula der Feigen werden von gallbildenden Wespen aus der Gruppe der Chalcidier besucht. Diese (bei *F. carica* ist es *Blastophaga grossorum* GRAV.) streifen danach, ihre Eier in die Frkn. der φ Bl. zu legen; man findet sich hier in den Receptaculis einerseits lang-, andererseits kurzgrifflige φ Bl. Nur die kurzgriffligen, bei denen wir jetzt auch keine N.-Papillen vorfinden, können von der kurzen Legrohre der Wespe in ihrem Frkn. getroffen werden; in ihm kommt das E. der Inquiline zur Entwicklung; man nennt daher auch diese φ Bl. Gallenotuten während die anderen von der Wespe nicht berührten Samenblüten sind und genannt werden. Die beiden φ Bl.-Formen werden nun bei einigen Arten (wie *F. carica*, *hirta* u. and.) in getrennten Receptaculis entwickelt, derart, daß ein Teil der Recept. eines Stockes nur σ oder Gader-Bl., ein anderer nur φ (Samen-Bl.) enthält. Stocke mit vorwiegend σ Recept. mit man schon lange als Caprificus bezeichnet. Hier entwickeln sich nun die Gaderbfrüher als die σ , so daß diese erst den Pollen abgeben, wenn die Inquiline die Recept. verlassen. Hieraus erklärt sich der Nutzen der sog. Caprifikation, welche darin besteht, daß der ruhende φ Stock mit den Recept. von Caprificus behangen wird.

kletternd z. T. als Spalier gezogen in Kult., Zw. olivgrün o. bräunlich, Kn. kahl, vgl. Fig. 156f—h; B. von sehr wechselnder Form, Fig. 151q—r, o. einfach, herzförmig, zuletzt dicklich, 8—16:6—18 cm, oben satt-, unten hellgrün; Stiel 2—5 cm; Scheinfr. kahl, grünlichgelb o. violettbraun, 5—8 cm lang, vgl. sonst Fig. 158p—w.

F. c. L., l. c. — Echte Feige; common fig tree; figuier commun. — Heimat wahrscheinlich O.-Medit., jetzt in ganz Medit. bis zu den Canaren und östl. bis Indien verbr. I. G. bes. in Südtirol, Dalm., Kroat., S. Ung. hfg. gebaut. Fz. VIII—IX (wild) in Kult. VII und X (2. Mal). — Bei uns nur bis Prov. VI hart, sonst Winterdecke und warme Lage! — Was als *F. hirta* in den Gärten geht, gehört nicht zur echten Art, die kaum in Kultur und höchstens Kalthauspfl. Ich halte die *hirta* Hort., deren B., wie Fig. 151p zeigt, ungelappt sind, nur zu *F. carica* var. *rupestris* HAUSSKN., in BOISS. Fl. or. IV, 1154. 1879 gehörig. Sie kommt in den Gebirgen Ciliciens, Armeniens und SO.-Pers. vor. Scheinfr. fein beh.

Fig. 158. a—c *M. carica*: a Bl. geschlossen, a' dgl. im Längsschnitt, b Bl.; b' Gyn. im L.-Schnitt, c Frucht, d—d' Fr. mit und ohne Hülle; e St. v. *M. carica*; f Bl. v. *F. hirta*; g Kn.-Sch., h—i ♂ Bl.; k Scheinfr. l—o *F. hirta*: l Kn.-Sch.; m ♀, n ♂ Bl.; o Scheinfr. — p—w *F. carica*: p Gallen-Bl., q St.-Bl.; r—t Bl. im L.-Schnitt, u Blst. im L.-Schnitt; v—w St. dgl. im L.-Schnitt; x E. (v—e, f, h—i, m—n, p—t, u—w) stark vergrößert, sonst (a—e meist nach SARGENT; g, l—o n. KING; p—q n. SOLMS-LAUBACH; r—w n. BERG et SCHMIDT; sonst Orig.).

*** ☉ Zw. gleich den B. borstig beh.

2. *F. hirta* v: b o. kleiner b, jung Zw. kahl, B. sehr variabel, vgl. Fig. 151o, o. leierförmig, gelappt, 15—36 cm lang, oben schärflich, Neb. vgl. Fig. 158l. Bl. wie m—n. Scheinfr. klein, beh. (o), meist zu 2.

*) Nach KING, The Spec. of Ficus vol. I, 1888.

F. h. VAHL, Enum. pl. II, 201. 1806. — Rauhbehaarte F. — Vom Himal. durch Assam, Burma, Malay. Halbinsel und Archipel bis China. — Wälder, 600–1800 m. — Sonst vgl. *carica*.

2 B. stets einfach, ganzrandig, wintergrün, an fertilen Zw. wie Fig. 151 m, an sterilen wie n gestaltet.

3. *F. pumila* (*F. stipulata*): habituell und im B.-Dimorphismus an *Hedera helix* gemahnender b, sterile Zw. wurzelnd, Fr. Zw. aufrecht, wurzellos, ihre B. oben bis auf Nerven kahl, unten papillös, 4–10; 2–6 cm, Stiele gleich Zw. bräunlich beh., 0,5–2 cm; B. der Kriechzw. meist nicht über 3,5 cm lang, Stiele nur 3–6 mm; Bl. und Fr. vgl. Fig. 158 g–k, bei uns nur im Gewächshaus reifend.

F. p. L., Sp. pl. 1060. 1753 [et THBG., Fl. jap. 33. 1784 var. a] (*F. stipulata* THBG., Diss. de Fic. gen. No. 7. 1786 [pl. sterilis] et *pumila* THBG., l. c. No. 8 [pl. fertilis]). — Kletter-F. — Jap., China; in Ind. hfg. kult. — In den Gärten meist als *F. repens* bezeichnet, nur für die südlichsten Teile des Gebietes (Prov. VII) als Freilandpfl. in Betracht kommend. — Der im H. d. D. D. G. noch geführte *F. erecta* THBG., Diss. Ficus No. 9, 15. 1786, ist nach KING in China, Jap. und Formosa zu Hause. Ich sah in Freilandkultur nichts dergleichen und halte ihn nur für Kalthauspfl.

Familie 8. *Urticaceae*, Nesselgewächse.

WEDD., in Archiv. du Mus. d'hist. nat. IX. 1856 [ENDL.].

Vgl. Reihe S. 211 und Gattung.

Fig. 150. 1–n *F. hirsuta* (L.) Vahl: a Zw.-Stück mit B. und Blstr.; b Bl.; c dgl. im L.-Schnitt; d Gyn.; e Fr.; f dgl. im Q.-Schnitt; g E.; h ♂ Bl.-Kn. — 1–m *Buckleya distichophylla*: i ♀ Bl. (α = Hochb., β = P.), P. und N. rechts vergr., j ♂ Bl. von oben, rechts Stb. vergr., k Fr., links daneben oberer Teil im L. Schnitt, l der Q.-Schnitt; m Exo-, n Endocarp, o Endo-, p E. — n–p *Commersonia*: q B.; r Bl. im L. Schnitt, s Fr. (a–h nach WEDDELL, sonst Orig.).

Gattung 33. *Boehmeria* JACQ., Enum. pl. Carib. 9. 1760.

♂ — b ohne Brennhaare, B. (gegst. o.) ☉, an Basis 3-nervig, sommergrün, einfach (Fig. 159a), Neb. bleibend, linealisch, Bl. in (ählig o.) rispig gehäuftten Knäueln, achselständig, (monoec. o.) dioec., ♂: P. und Stb. 3 — 5 Stbf. in Kn.-Lage nach innen gebogen, später elastisch zurück-schnellend; ♀: Blh. röhrig, Mündung 2 — 4zählig (b — c), dem Frkn. (d) angewachsen, N. fädig, Sa. (in c) nahe dem Grunde angeheftet, atrop: Fr. (e) Achaenium mit trockenem, braunem Pericarp, S. (f) mit End., E. wie g. — Etwa 45, meist trop. Arten.

B. nivea: mehr ♂, bis 1 m hoch, ♂ Zw. und B.-Stiele weißborstig beh., B. 6—30:4,5—18 cm, oben tiefgrün, zerstr. beh., unten ± blauweiß, ± weißfilzig, Stiel $\frac{1}{2}$ bis fast so lang wie B., Neb. 8—12 mm, sonst wie oben.

B. n. HOOK. et ARN., Bot. Beech. Voy. 214. 1841 (*Urtica nivea* L., Sp. pl. 985. 1753). — Weißfilziger Ramie. — Trop. u. subtrop. O.-As.; dort als eine der nutzbringendsten Gespinnstpfl. hfg kult. Aus ihr wird sog. Nesseltuch hergestellt, ebenso Stricke, die denen aus Lein und Hant vorzuziehen. — Für uns eigentlich nur Kalthauspfl., meist mehr ♂ o. gar ♀; deshalb lasse ich auch die im H. d. D. D. G., bez. von DIPPEL und KOEHNE noch erwähnten Arten: *B. macrophylla* DON, Fl. nepal. 60. 1825; *platyphylla* DON, l. c. und *longispua* STEUD., in Flora XXXIII. 260 1850, unberücksichtigt. Sollte eine derselben sich als härterer b zeigen, so erbitte Mitteilung.

Reihe VI. *Santalales*. Sandelholzähnliche Pfl.

ENGL., Syll. 98. 1892.

b. meist chlorophyllführende Halbparasiten; B. ☉ o. gegst., einfach, ganzrandig, zuw. nur schuppenfg.; Bl. ×, ♂ o. ♀, mon- o. dioec., P. 3—6, Gyn. 1 — 2 — 3, zu jedem Frb. eine vom Scheitel der Fächer o. von einer zentralen freien Placenta herabhängende Sa. gehörig o. Placenta und Sa. nicht ausgegliedert, Sa. mit einem o. ohne Integ.; Fr. Scheinbeere o. steinfruchtartig.

Familie 9. *Santalaceae*, Sandelgewächse.

R. Br., Prodr. Fl. Nov.-Holl. I, 350. 1810.

Vgl. Reihe VI: B. normal, sommergrün, Neb. fehl.; Bl. klein, Blh. am Grunde röhrig, mit Diskus verwachsen, dieser wechselnd gestaltet, Stb. so viele wie P., Gyn. — unterständig, 1, Sa. 1—3 an der Spitze einer zentralen Placenta; Fr. steinfruchtartig, nicht aufspringend, S. 1, ohne S.-Schale, End. reichlich.

Gattungen:

A. B.-Stiel deutlich (0,5—0,8 cm), B. 2 — 2 $\frac{1}{2}$:1, obs. Sp. fehl.

34. *Pyrularia*.

B. B. ganz o. fast sitzend, 3—7:1, obs. Sp. vorh.

I. B. lineal-lanzettlich, 0,2—0,8 cm breit, Sp. beiders. ∞.

a. Diskus kaum gelappt, P. 3—4, N. 3—4-teilig. **35. *Caryota*.**

b. Diskus am Rande zwischen den Stb. in deutl. Lappen ausgezogen, P. 4—5, N. kleinkopfig. **36. *Comandra*.**

II. B. — breit lanzettlich, zweizeilig, 1,2 — 2,8 cm breit, Sp. unten mäßig ∞, oben etwa $\frac{1}{3}$ so viel. **37. *Buckleya*.** (S. 248.)

Gattung 34. *Pyrularia* MCHX., Fl. bor. am. II. 231. 1803.

Vgl. oben S. 246 und Art. Außer dieser noch 2 asiat. Arten bekannt.

P. pubera: ± niedergestreckter o. aufrechter, reichverzweigter b , 1–5 m; Zw. rundlich, jung und c verstr. anliegend zottig, – rötlichgrau; Kn. eikegeltg., 5–7 mm lang, abstehend, Sch. 6–8, grünlich, braun gesäumt, hell gewimpert, zugespitzt, zieml. locker; B.-N. 3-spurig, – senkrecht; B. jung gewimpert und beiderse. auf Nerven anliegend lang zottig beh., zuletzt stark kahlehd., unten wenig heller als auf der stumpfgrünen Oberseite, Grund gleich Ende breitkeilig o. c gerundet, 4–10:2–4–5 cm; Blst. traubig, an diesj. Krztr. endständig, 2–5:0,8–1 cm; Bl. vgl. Fig. 159 q r, dioec. o. c P. 4–5, in Kn. klappig Diskus langklappig zwischen Stb.; Fr. kirschenähnlich, bis 2,5 cm lang c , Exocarp fleischig; Endocarp hart, sehr dick; S. kugelig, E. kurz, stielrundlich.

P. p. MCHX., l. c. (*Hamiltonia oleifera* MÜHLBG. ex WILLD., in L. Spec. pl. ed. IV, 1120. 1805, non ROXB.; *P. oleif.* A. GRAY, Man. ed. II, 382. 1858). — Ölpcere; oil-nut. — N.-Am. (S.-Pennsylv. bis Georgia). — Bes. in Gebirgen. — Blz. V. – Frz. VIII–XI – Fr. essbar, aus S. wird fettes Öl bereitet. Nicht in Kultur.

Gattung 35. *Osyris* L., Sp. pl. 1022. 1753.

Vgl. oben S. 246 und Art. Außer dieser noch 5 Arten in Afr. und O.-Indien.

O. alba: aufrechter b , bis 1 m, Rinde olivgrün, längsfurchig, Zw. rutig, kantig, unten reich beblättert, oben nackt, kahl, grün o. hellgraugrün, Kn. klein (vgl. Fig. 150 k–m), 2–3 schuppig, dunkel, kahl, B.-N. 1-spurig; B. 1–2:0,2–0,3 cm, steif, kahl, hell- o. gelblichgrün; Bl. klein, dioec., grünl.-gelb, c in achselständigen Scheindolden (Fig. 160 a), c einzeln (b), sonst wie c –d; Sa. 2–4; Fr. wie f, steinfruchtartig, wie bei *Pyrularia*, aber Endokarp mehr krustig.

O. a. L., l. c. — Harnstrauch. — I. G. nur O., Istr., Dalmat., Kroat., Herzegowina; sonst Medit. — Auf Wurzeln von *Olea*, *Laurus*, *Ficus carica* etc. schmarotzend. — Blz. V. — Die Wurzeln und Fr. besitzen adstringierende Wirkungen. Kaum in „Kultur“, für den nördl. Teil des Gebietes nicht hart

Fig. 160. *Osyris alba*: a Zw. mit c , b mit c Bl.; c c Bl. von oben; d c Bl. im Längsschnitt; e Fr.; f dgl. im Längsschnitt (a–e nach HIERONYMUS).

Gattung 36. *Comandra* NUTT., Gen. Am. I. 157. 1818.

Vgl. oben S. 246 und Art. Außerdem noch 3 in N.-Am.

C. elegans: 0,30–0,60 m hoher b o. b , Wurzeltriebe weit kriechend, Äste netzig gestreift, kahl, graugrün, Zw. dgl., nach rutig, Kn. eikegelig, anstehend, ähnlich *Oxys*; B. dgl., aber 2–3,5:0,2–0,8 cm, Bl. endständig in kleinen von Hochbl. gestützten doldig gehäutten Trugdolden, – vgl. Fig. 159 o; Sa. 2–3; Fr. wie p, *Osyris* analog.

C. e. RCHB. F., Ic. Fl. germ. XI, 11. 1849 (*Thesium eleg.* ROCHEL, Pl. banat. rar. 36, 1, 1, 1828). — I. G. nur U. unteres Donaugebiet; ferner Serb., Bulg., wohl bis Türkei und Griechl. — Warme trockne Hänge — Blz. V–VI. — Halbparasit. Kaum in Kultur.

Gattung 37. *Buckleya* TORR., in Am. Jour. Sc. XLV. 170. 1843.

Vgl. oben S. 246 und Art. Außer dieser nur noch 1 Art in Jap. und 2 in Zentr.-China bekannt.

B. distichophylla: $\text{p} - \text{p}$, parasitisch auf Wurzeln von *Tsuga canadensis* lebend, junge und $\odot$ Zw. sehr fein beh., $\odot$ und $\odot$ oliv- o. hellgrau, Kn. 6—12-schuppig, breit eispitzig, B.-N. wohl nur 1-spurig; B. 4—8:1,2—2,8 cm, beiders. fast gleichfarben, am Rande mit feinen Haarzähnen, sonst fast nur auf Rippe beh., dünn; σ Bl. in gestielten, oberwärts achselständigen Dolden, f einzeln, an Zw.-Spitze, Bl. dioec., P. 4, hinter Stb. fand ich keine Haarbüschel; Diskus nur kurzstappig; f Bl. mit 4 kelchartigen, mit Frkn. verwachsenen Hochb. (a in Fig. 159i) ohne Std.; Sa. 3—4; Fr. länglich (l), anfangs mit den Hochb., die später gleich P. abfallen; Exocarp (γ) dickfleischig, Endocarp (δ) krustig, E. = η .

B. d. TORR., l. c. — Zweizeilig beblätterte B. — N.-Am. (Carolina, Tennessee). — War, wie mir Herr Garteninspektor RETTIG mitteilte, im Botan. Garten zu Jena in Kultur, ist aber wieder eingegangen.

Familie 10. Loranthaceae, Eichenmistelgewächse.

D. DON, Prodr. Fl. Nepal. 142. 1825.

Vgl. Reihe S. 246, auf p lebende parasitische p , B. normal, sommer- o. wintergrün, o. schuppenfg., gegst., Bl. klein, p o. f , P. 2—2 o. 2—3—3, Gyn. in Bl.-Achse eingesenkt, Plac. und Sa. meist nicht ausgegliedert; Fr. mit Bl.-Achse zu beerenartiger Scheinfr. vereinigt. Innenschicht der Bl.-Achse verschleimend und klebrig.

Gattungen:

A. B. normal, sattgrün.

I. B. sommergrün, häutig, deutl. kurz gestielt. 38. *Loranthus*.

II. B. wintergrün, lederig, fast sitzend. 39. *Viscum*.

B. B. schuppenfg., winzig. 40. *Razoumofskyia*. (S. 251.)

Gattung 38. *Loranthus* L., Sp. pl. 331. 1753.

Vgl. oben und Art. Etwa 200 Arten in der Alten Welt, meist tropisch.

L. europaeus: 0,30—1 m hoch, bes. auf *Quercus cerris* und *lanuginosa*, seltener auf *Castanea*, Ästchen fein querrissig, bräunlich, gabelig verzweigt, Zw. kahl, olivbraun, rundlich, ohne Lent., Kn. klein, kahl, abstehend, kugelig entg., B. vgl. Fig. 162 p, 3—4:1,5—2 cm; Bl. durch Abort dioec., gelbgrün, in endständigen wenigbl. Ähren, Achse bechertg., nicht selten um die Basis der Blh. als Rand (Calyculus) hervortretend, P. 4—6, Stb. 4—6, mit P. am Grunde verwachsen, A. längsspaltig, unbeweglich (q. r.), f wie s. t; Fr. wie u, hellgelb, Mittelschicht sattreich, klebrig, Innenschicht dünn, nicht deutl. abgesondert; End. reichlich.

L. e. JACQ., Enum. Stirp. 230. 1762. — Gemeine Eichenmistel, Riemenblume; *loranthus commun.* — I. G. D. nur Sachsen (Dolna bei Pirna) OU fehlt nur Karnt., Ob.-Östr., Salzbg., Schles.; sonst noch Ital. bis Or., S.-Rußl., Pers. — Blz. IV—V. — Frz. Sommer.

Gattung 39. *Viscum* L., Sp. pl. 1023. 1753.

Vgl. oben und Art. Insgesamt über 20 altweltliche, meist trop. Arten.

V. album: p , 0,30—0,60 m, auf sehr verschiedenen p *); Äste und Zw. gelbgrün, B. 3—4:1—1,5 cm; Bl. dioec., sitzend, in endständig gegabelten Traugdolden, Calyculus fehl., P. 2—2, zuw. 7, Endblüte 2—3 o. 3—3 o. 2—4, stets ohne Vorb., doch End-Bl. des f Blst. mit 2 Vorb.; f Bl. mit sehr kurzen, nicht hohem Basalteil, A. mit P. vereinigt, Fig. 161 j—k, vgl. sonst Fig. 162 k—m, Fr. weiß (anfangs gelblich) erbsengroß, Fig. 162 i, s. u. o, in Fig. 161 l—m mit 1—3 E. im reichl. End.

*) z. B. *Populus*, *Salix*, *Pyrus*, *Malus*, *Betula*, *Sorbus*, *Juglans*, *Acer*, *Abies*, selten auf *Quercus*, wohl aber wieder auf *Loranthus* (WILLKOMM).

var. a. typicum BECK, Fl. Nied.-Östr. 604. 1890. S. verkehrt herzeifg., 1½: 1, E. meist 2, B. breiter; auf Laubbölkern und *Abies*. - *b. laxum* FIEK, Fl. Schles. 192. 1881 (*V. lax.* BOISS. et RETT., Diag. pl. nov. Hisp. 16. 1842; *austriacum* WIESB., in Gen. Doubl. Verz. Schles. Tauschver. XXXI 1883). S. ellipsoidisch, L. meist

Fig. 161. *Viscum album*: a—f Keimung: a erstes Stadium der Keimung von Scheinbeeren, die an einen Lindenzweig angelegt wurden, diese werden durch das Viscin *a*, festgehalten; das Stammchen (Hypocotyl *b*) wendet sich dem Ast zu, aus der oberen Scheinbeere treten 2 Keimptz. heraus; *b* Überwinterungsstadium mit stark entwickelter Haftscheibe *c*, die Scheinbeere ist nun losgelöst und die Anheftung wird nur durch die Haftscheibe bewirkt; *c* junge Pflz. im 2. Jahre, nachdem die Scheinbeere abgeworfen; *d* Längsschnitt durch eine Haftscheibe *c*, in der die Entwicklung des Senkers *d* eben beginnt; *e* dgl., doch die Entwicklung des Senkers bereits soweit vorgeschritten, daß dieser schon das Cambium des Nährzweiges erreicht hat; *f* eine 3-jährige Pflanze mit Sprossen *g* aus der Haftscheibe *g* *h* Verhalten älterer Pflz; *h* unterer Teil des Stammes einer älteren Mistel *h* das Holz der Sproßachse, *i* der primäre Senker, *j* Rindensaugstränge, an denen bei *h* zwei Kn. entspringen, *k* die sekundären Senker; *l* *h* das Holz des Nährastes, bei *l* halbquer durchschnitten, die Jahresringe zeigend; *m* ein Stück Kiefernholz mit „Wurzeln“ und Ausschlägen der Mistel bei *l* eine Brutknospe, bei *g* zwei sich entwickelnde Ausschläge Der Rindensaugstrang, von dem hier nur die älteren Teile (vom 7.—13. Jahre) ausgebildet sind, ist durch die Neubildung von Phloem schon sehr nahe an die Borkengrenze gerückt Bei *h* liegen zwei Senker, die vor 6—7 Jahren isoliert wurden, sich bis dahin aber scheinbar völlig gesund erhalten haben Bei *l* liegen fünf Senker, die vor 10—14 Jahren von ihrem Rindenstrang dadurch abgeschnitten worden sind, daß dieser mit den ihn umgebenden Bastlagen zur Borkeschicht übertrat. Die Senker sind abgestorben und braungetarbt, die benachbarten Holzschichten völlig verküht Das Holzstück ist von zahlreichen Senkern durchsetzt, wie noch bei *l* auf der inneren Wobtblache die Durchschnitte anderer Senker zeigen. Langsschnitt durch einen *l* Blst; *k* Querschnitt durch eine *l* Bl. zeigt die innige Vereinigung der A. mit der Blh und die zahlr. Pollenfächer. *l* *m* Frucht; eine Fr. nach Entfernung der fleischigen, aus der Blütenachse hervorgegangenen Hülle im Längsschnitt mit einem E., *n* *n* dgl. mit 2 o. 3 E. *o* *h* *o* nach GUMPEL, *d* *e* nach PETRA, *f* nach GRIFFITH, *g* nach SACHS, *h* nach R. HARTIG, *m* nach ENGLER, *n* nach KRONFELDT.

1. B. schmaler; bes. auf *Pinus* (Scheint nicht scharf von *a* zu trennen, je nach Nährpfl. variiert *V. album* $\pm$).

V. a. L., l. c. — Gemeine Mistel; mistle toe; le gui. — I. G. verbr., sonst noch ganz Eur. (ausgenommen nördlichste Teile), N.-Afr., Or. bis Zentr.-As., N.-As. bis Jap. Blz. III–IV. — Frz. Herbst-Winter. — Über die biologisch interessante Entwicklung vgl. Fig. 161. Zw. im Winter hfg. als Zierde verkauft.

Fig. 162 a–d *Aristolochia macrophylla* (A. siphoc): a Zw. mit B. und Bl.; b Bl. im Längsschnitt c; c Stb. und Gr.; d auspringende Fr. $\frac{1}{2}$ nat. — e *A. tomentosa* Zw. mit B. und Bl. — f–h *A. sempervirens*: f B. und Bl.; g Stb. und Gr.; h Frk. im Q. Schn. — i–o *Viscum album* (vgl. auch Fig. 161): i Zw. der $\frac{1}{2}$ nat. mit B., Bl. und Fr.; k $\frac{1}{2}$ Blst.; l Bl. im L. Schnitt; m $\frac{1}{2}$ Bl. ohne Blh.; n — S. von verschied. Seiten. — p–u *Loranthus europaeus*: p Zw. mit B. und Blst.; q–r Bl. q Stb., r Stb.; s $\frac{1}{2}$ Bl. q; t Blh.-B. mit Stb.; u Frst. va, e verkleinert; a, k, o vergrößert; p, u nat. Gr. (a–d n. BAILLON; e n. Bot. Mag.; f n. Bot. Reg.; g–h. KOEHLER; p, u n. JACQUIN; q–t n. ENGLER; sonst n. d. Nat.).

Gattung 40. *Razoumofskya* HOFFM., Hort. Mosq. 1808.

(*Arceuthobium* M. B., Fl. taur. cauc. III, 629. 1819.)

Vgl. oben S. 248 und Art. Etwa 10 Spezies der nördl. Hemisphäre.

*R. oxycedri**: winziger, 2—15 cm hoher, parasitisch auf *Juniperus oxycedrus*, *drupacea* o. *absinth* lebender b. grünlich, vgl. Fig. 163 a etc., Bl. einzeln, ohne Vorh. in Achseln der schuppigen, paarweise verbundenen Nieder-B. (2); dioec., ♂: P. 2—5, A. mitten auf P. sitzend, querspaltig (7), Frkn.-Rudiment vorh. (9), ♀: P. 2; Scheinbeere eifg., vom Saum der Blh. (3) gekrönt, mit breiter Basis einem oberwärts erweiterten Stiel (17) aufsitzend, bei der Reife (im 2. Herbst, durch einen am Grunde ringsum verlaufenden Spalt (15) elastisch aufspringend und die längl.-eitg. Fr. (g) herauswerfend; E. (12) in reichlichem End. (13).

Fig. 163 *Razoumofskya* (*Arceuthobium*) *oxycedri*. a Habitusbild (verkleinert); b Zweigstück mit B. (2) und Bl. (1); c Bl. im Längsschnitt, dgl. d—e im Querschnitt; 3 Blh., 4 N., 5 Gefäßbündel, 6 Sa.; f Fr. im Längsschnitt; 3—5 wie vorhin, 10 S., 11 klebriges Endocarp, 12 E., 13 End., 14 Stiel, 15 Stelle, an der die Fr. aufspringt; 8 S. (10) im Endocarp (11); h ♂ Bl. als Kn.; i Bl. offen von oben; 7 geschlossene A., 8 entleerte A., 9 Frkn.-Rudiment; c—f z. T. nach JOHNSON, sonst Original).

R. o. F. W. SCHULTZ, ex NYM. Consp. 320. 1878/82 (*Visc. oxyc.* DC., Fl. fr. ed. 3, IV, 274. 1865; *Raz. carcasca* HOFFM., Hort. mosq. n. 4, t. 1. 1808; *Arceuth. oxyc.* M. B., l. c.). — I. G. nur O., Istr., Dalm., Kroat.; sonst Medit., bis Pers. — Blz. IV. Nur botanisch von Interesse.

Reihe VII. *Aristolochiales*. Osterluzeiähnliche Pfl.

ENGL., Syll. 100. 1892.

§: B. ☉, einfach, ganzrandig; Bl. zyklisch, groß, 4, P. (1—3) verwachsen, korollinisch; Stb. 6, mit Gr.-Säule verwachsen. Gyn. unterständig, (4—)6, Placenta zentralwinkelständig, Sa. ∞, anatrop; Fr. viel-samige Kapsel, S. mit reichl. End.

*) Spez. Lit. T. JOHNSON in Annals of Bot. II, 137. 1888/89.

2. *A. macrophylla* (*A. siphon*): §. 4—10 m. Äste rissig beberindet. Lent. an grauen Zw. zu korkigen Massen verfließend: Kn. vgl. Fig. 164a—g: B. anfangs gelblich, dann oben sattgrün, unten grau- o. bläulichgrün, 10—25 cm Dm., Stiel bis 9,5 cm: Bl. bis fast 10 cm lang gestielt, am Grunde mit kleinen Hoch-B., am Stiele meist mit 1—2 laubigen Trgb.: gelbgrün mit rotbrauner Aderung: sonst vgl. Fig. 163, N. 3-lappig (e). Kapsel (nur in warmen Jahren reifend) bis 9:2,6 cm, braungrün (d).

A. m. LAM., Enc. méth. I, 252. 1783 (*siphon* L'HÉR., Stirp. nov. I, 13. 1784; *macrophylla* MARSH., Arb. am. 24. 1785). — Großblättrige O., dutchmans pipe, aristoloché siphon. — N.-Am. (S.-Pennsylv. bis Minnesota, Georg., Tennessee, Kansas). — Bis 1500 m hoch gehend. — Blz. (V—)VI—VIII. — Frz. (IX—)X. — Bekannter, wertvoller, harter §.

✱✱ ⊙ Zw., B. unten und Blh. außen weich beh.

3. *A. tomentosa*: Wie vorige, doch B. meist etwas kürzer gestielt, 10—16:8—12 cm, Bl. fast stets einzeln, ohne Trgb., sonst vgl. Fig. 163e.

A. tomentosa SIMS, in Bot. Mag. 1811, t. 1369 (*hirsuta* MÜHL., Cat. pl. am. 81. 1813). — Filzige O.; woolly pipe vine; a. tomenteux. — N.-Am. (Miss., S.-Illinois bis N.-Karol., Alabama, Florida). — Sonst wie vorige und wohl ebenso hart.

Reihe VIII. *Polygonales*. Knöterichähnliche Pfl.

ENGL., Syll. 101. 1892.

♂ — ♀ o. §. B. ⊙, einfach, ganzrandig, meist mit stengelumfassender häutiger Ochrea. Bl. ♂, ♀ o. §. Gyn. 1. Sa. 1. atrop. Integ. 2. Fr. 1-samiges Nüßchen. End. vorh.

Familie 12. *Polygonaceae*, Knöterichgewächse.

LDL., Nat. Syst. ed. II, 211. 1836.

Vgl. Reihe VIII, Bl. zyklisch o. z. T. ⊙, P. 3—6, Stb. 6—9—18, Gr. 2—3—4, E. gerade o. gekrümmt.

Gattungen:

A. ♀. B. meist grundständig, rosettig, ohne Ochrea, unten weißfilzig.

42. *Eriogonum*. (S. 254.)

B. ♀ — ♀ o. §. B. nie rosettig, mit Ochrea, kahl o. nur unten mit verstr. Härchen.

I. ♀, aufrecht. sparrig o. überhängend, B. vgl. Fig. 166a und 167c—e, f¹, äußere 2 P. (bei unseren Arten deutl. kleiner, zur Frz. zurückgeschlagen, o. wenn nicht, Stb. über 9, am Grunde mit Haarpolster.

a. B. meist deutl. P. ungleich, Stb. kahl. 43. *Atraphaxis*. (S. 255).

b. B. lineal, hfg. fehl. (durch Kztr. ersetzt), P. gleich, Stb. mit Haarpolster. 44. *Calligonum*. (S. 257).

II. ♀ o. §, B. vgl. Fig. 165e, l. 167l, o und 169a, f, h—i, P. ± gleich, äußere aber nie kleiner, zuw. geflügelt.

a. B.-Unters. u. B.-Stiele kahl, nie Zw. in Winkelranken endigend.

1. ♀ o. — niederliegend, mit lanzettl. o. eilanzettl. B. (Fig. 169t, h)

o. §, deutl. verholzend mit breitflächigen, pfeilfg. B. (Fig. 167o und 169i), Ochrea dann kurz, breit, nur am Grunde geschlossen. 45. *Polygonum*. (S. 258).

2. ♀, ± ♂, B. vgl. Fig. 165e, Ochrea wie a, o. B. klein, ± kreisrund (wie l). 46. *Muehlenbeckia*. (S. 259).

b. B.-Unters. und Stiele fein beh., Ochrea sehr kurz, seith. und Blst.-Zw. hfg. zu Wickelranken umgebildet, vgl. Fig. 167l.

47. *Brunnichia*. (S. 259).

Gattung 42. *Eriogonum* MCHX., Flor. Bor.-Am. I, 246. 1803.
[Wollknöterich.]

Vgl. oben S. 253 und Art. Über 120 Arten beschrieben, die in N.-Am. heimisch und fast sämtlich ☉ o. 4 sind.

○ B. rosettig, Blst. scheindoldig, Stbf. beh.

1. *E. umbellatum*: ♀, von der Tracht einer *Dryas*, B. vgl. Fig. 165d, unten weißfilzig, oben z. beh., graugrün: Haupt-Blst. auf straffem, filzig beh., 5—15 cm hohem Schaft, sich aus 4—10 unbeblätterten Partialdolden zusammensetzend, die am Grunde von einer B.-Rosette gestützt sind; Partial-Blst. reichbl. (Fig. 165a), Involucrum beh., 6—8-lappig (a), Bl. gelblich, gestielt, kahl, sonst vgl. b—c; Frkn. im oberen Teile verstr. beh., Fr. mir unbekannt.

E. u. TORR., in Ann. Lyc. New-York II, 241. 1828. — Doldiger W. — Gebirge von Nebraska bis Oreg., Nevada, N.-Kalif., in Rocky Mts. bis 3000 m. — Blz. Sommer.

Fig. 165. a—d *Eriogonum umbellatum*: a Bl.-Köpfchen (a = Involucrallappen, β = Stiele der entfalten abgeschnittenen Bl., γ = Bl.-Kn.); b Bl. (δ = äußere P., ε = innere P., ζ = Gr.); c Bl. im L.-Schn., d B. — e—k *Muehlenbeckia sagittifolia*: e B. (α = Ochrea); f ♂ Bl. von oben; g ♀ Blst. z. T.; h ♀ Bl. im L.-Schn., i Fr., k dgl. im Q.-Schn. — l *M. complexa*: B.-Zw. (g—k n. FLOR. BRASIL., sonst Orig.).

An diese kaum zu den Gehölzen zu zählende Art schließen sich mehrere an, die stärker verholzen, aber noch der Beobachtung bedürfen. Ich weise nur hin auf *L. stellatum* BENTH., Trans. Linn. Soc. XVII, 409. 1827 sensu WATSON, Bot. of Calif. II, 20. 1880], das im Wesentlichen wohl nur durch beblätterte wieder verzweigte Partial-Blst. und beblätt. Hauptschaft abweicht, zu ihm zieht WATSON, l. c., 107, *bicolor* (E. polyanthum var. bah., TORR. et GR., in Proc. Am. Ac. VIII, 159. 1870), das am meisten b-artigen Eindruck macht und nicht rasenartig bleibt, sondern etwa 25—30 cm hoch wird. Vielleicht gute Art. Die genannten und noch die eine o. andere Art sah ich im Bot. Garten zu Darmstadt in Kultur, auch bei SPÄTH haben sie z. T. schon geblüht. Scheinen hart, wie etwa *Dryas* zu behandeln.

CC B. nicht rosettig. Blst. ∞ an Kztr. längs der rutigen Zw., Stbf. kahl.

2 *E. wrightii*: variabler, viel- und feinzweigiger bis 60 cm hoher $\mathfrak{b}$. Zw. gleich den in ihrem unteren Teile ∞ vorh. B. grautilig; B ei- o. lineallanzettlich, 0,5–2–3, em lang, Stiel 0,3–0,5 cm; Blst etwa 0,5 em lang, Involuera zottig beh., steif- und spitzzählig. Bl. rosa, kahl. A. purpurn. Fr. nach WATSON im oberen Teil an den Kanten schärflich beh., an Basis sehr spitz.

E. w. TORR., apud BENTH. in DC. Prodr. XIV, 1, 15. 1856. — Wrights W. WN.-Am. (Kalif. bis New Mex.); Gebirge bis fast 3000 m. Sah ich ebenfalls im Hort. Bot. Darmstadt.

Gattung 43. *Atraphaxis* L., Sp. pl. 333. 1753. [Bocksweizen].

Vgl. oben S. 253 und Arten. Deren sind etwa 18 beschrieben, die z. T. nur Varietäten darstellen dürften. Heimisch in M.- und W.-As., N.-Afr., Griechl.

C $\mathfrak{b}$ meist dornig. B. klein, kaum über 1(–1,3):0,5 cm.

* P. meist 4 und Stb. 6, N. 2, Fr. flach, 2-kantig.

1. *A. spinosa*: $\mathfrak{b}$, bis etwa 0,5 m hoch, gedrungen und knorrig verästelt, Zw. sparrig, meist dornig, kahl, weißgrau, Kn. vgl. Fig. 168 a–h, B. sehr variabel, dicklich, graugrün; Bl. vgl. Fig. 166, Stiele unterhalb der Mitte gegliedert, so daß oberer Teil länger als äußerste P., Fr. glänzend gelbbraun.

A. s. L. Sp. pl. 333. 1753 (*Tragopyrum* sp. PRESL, Bot. Bem. 109. 1844). — Dorniger B. — Von ägypt.-arab. Wüste durch W.-As., S.-Rußl. bis Songarei. — Blz. (V–) VI–VIII. — Seit Langem in Kultur, aber weniger zu empfehlen als *lanceolata* o. *latifolia*. Man gebe Schneedecke. Liebt als Steppenstrauch sonnige, sandige, trockne Lagen.

Fig. 166. *Atraphaxis spinosa*: a B.; b Bl.; c Stb. und Gyn.; d Zw. mit Fr.; e Fr., von der auswachsenden Blh. bedeckt; f Fr. im Längsschnitt (nach DAMMER).

** P. meist 5 und Stb. 8, N. 3, Fr. 3-kantig.

2. *A. billardieri*: $\mathfrak{b}$, wie voriger, aber z. T. wohl höher werdend und zuw. fast dornlos. B. vgl. Fig. 167 d, es treten Formen auf (*A. variabilis* JAUB. et SPACH, Pl. or II, 16. 1844 46) bei denen 4-zählige Bl. vorherrschen, die also gleichsam einen Übergang zu *spinosa* bilden.

A. b. JAUB. et SP., l. c. 14, t. 111. — Labillardières B. — Griechl., Klein-As., Syrien. — Sonst wie *spinosa*.

b dornlos, B. größer, 1—7 cm lang und bis 3.2 cm breit, Bl. und Fr. meist wie bei *billardieri*.

* B. meist verkehrt breit- bis rundl.-eifg., 1—2.5:0.6—1.8 cm.

3. *A. buxifolia*: b gedrunken und kurz, aber doch mehr aufrecht verästelt, bis etwa 0.6 m. Zw. jung sehr fein drüsig-hellhaarig.

Fig. 167. a—c *Atraphaxis buxifolia*: a Gyn., a' Frkn. im Q.-Schnitt, b Fr., c B. — d *A. billardieri*: B. — e—f *A. frutescens*: e B., f Bl. von oben — f' *A. latifolia*: B. — g *Cathgenium p. l. s. u. d. e.*: g Bl. von oben, ohne Gyn., dieses in h. — i deren Q.-Schn. — j T. l. n. l. m. a. l. e. u. l. s. a.; k B.; l m Bl. — m' Gyn. im L.-Schn.; n Fr.; n' deren Q. Schn. (a Pericarp, β Testa, γ Endl., δ T. — o—q *Polygonum baldschuanicum*: o B., p Bl., q Gyn., p' Stb. (m—m' n. DAMMER, o—q n. BOT. MAG., sonst Orig.).

B. vgl. Fig. 167 d, sattgrün. Bl. meist ∞ am beblätterten Zw.-Ende scheintraubig gehäuft, sonst wie Fig. 167 a—b und vorige Art.

A. b. JAUB. et SP., l. c. 14 (*Polygonum bux.* M. B., Fl. taur.-cauc. I, 300. 1868; *P. crispulum* SIMS, Bot. Mag. XXVII, 1, 1665. 1868. Buchsblättriger B. — Transkauk., Turkest. — Sonst wie vorige.

** B. schmaler o. viel größer.

+ B. $\pm$ lanzettlich, 1—3:0.1—0.9 cm.

4. *A. frutescens*: b, mehr schlank aufrecht (aber wohl sehr variabel, in der Heimat auch zuw. etwas dornig), bis 80 cm hoch, Zw.

Diese Art scheint nahe zu stehen eine von mir aus Mangel an B. noch nicht genau bestimmte Spezies, die ich in Herb. ZABEL als *Polygonum* sp. Sikkim HORT. LEICHTLIN 1888 sah. Herr ZABEL hatte sie bereits als zu *Atraphaxis* gehörend erkannt.

kahl. B. z. T. graugrün. Seitennerven wenig deutlich, Bl. ähnlich *buxifolia*, meist weniger reich und kleiner. vgl. Fig. 167 e-f.

A. f. K. KOCH, Dendr. II, 360. 1872 (*Polygonum fr.*, L., Sp. pl. 359. 1753; *Tragopyrum lanceolatum* M. B., Fl. taur.-cauc. III, 285. 1819; *Atraphaxis lan.* MEISSN., in DC. Prodr. XIV, 1, 78. 1856. — SO. Rußl., Kauk., Transkauk., Turkest., SW. Sib. bis Songarei. — Blz. VII-IX. Härter und weniger heikel als die ersten Arten, aber bei Weitem weniger schön als *latifolia*.

++ B. längl.-lanzettlich, 3—7:0,7—3,2 cm (Fig. 167 f¹).

5. *A. latifolia*: b. bis 1 m hoch, weniger reich und schlanker verästelt als *frutescens*. Zw. hfg. leicht gebräunt, B. lebhaft hellgrün. Bl. in dichten schönen Scheintrauben. P. weißlich mit grünl. Mittelnerv. sonst wie vorige.

A. l. KOEHNE, Herb. Dendr. No. 211 [cf. in Mitt. D. D. Ges. III, 13. 1894] (*Tragopyrum lanceolatum* var. *latifolium* Recl., in Gartfl. XL, 169. 1891). — Breitblättriger B. — Turkest. (am Almatinka-Fluß b. Werny). Blz. V. — Schönste und empfehlenswerteste Art, die keinen ausgesprochenen Steppen-b darstellt. Ganz hart.

Gattung 44. *Calligonum* L., Sp. pl. 530. 1753. erweitert. [Schönknöterich.]

Vgl. oben S. 253. Fr. geflügelt o. mit Borsten besetzt, S. (nach DAMMER) oft lang geschnäbelt, im Schnabel das Stämmchen des zentralen E. Sonst vgl. Art. Es sind etwa 20 bekannt, die in trockenen sandigen Gegenden von N.-Afr., S.-Rußl. W.- und M.-As. leben.

C. polygonoides: b-artiger b, reich und unregelm. verästelt und $\pm$ feinrutig verzweigt (etwas an eine *Ephedra* gemahnend), etwa 30—60 cm hoch, Zw. kahl, $\pm$ weißgrau; B. lineal 7—13 mm lang, sehr hinfällig, Bl. zu 1 bis wenigen in den Achseln der Ochrea gebüschelt, σ , P. 5—6, Stb. 12—18, vgl. Fig. 167 g—h, die Fr. (i) mit reich verzweigten freien Borsten besetzt, die in 12—16 Reihen (k) stehen.

Fig. 168. a—h *Atraphaxis spinosa*: a $\odot$ Zw., b $\odot$ Zw. mit Kztr., c verdornter Zw., d—f Kn. (1 = Neb., 2 = B.-N., 3 = Kn.), g Kn.-Sch., h Zw.-Q.-Schn. — i—n *Polygonum baldschuanicum*: i $\odot$ Zw., k Kn., l B.-N. im Schnitt, m Zw. und Kn. im L.-Schn. (a = Scheidewand), n Zw.-Q.-Schn. (1—6 vgl. Fig. 164 g S. 252) (Orig. n. C. K. SCHNEIDER).

C. p. L., Sp. pl. 530. 1753, non PALL. Echter Sch. Armen., Pers. Salzsteppen. — Blz. Sommer. Diese interessante, aber heikle Pfl ist jetzt ebenso wenig in Kultur, wie *C. polygonoides* PALLAS, Reis. Prov. russ. Reich. III, 356. 1770, welches nicht wie das echte LINNESCHE *C. polygonoides* zur Sekt. *Eucalligonum* Schneider, Illustr. Handbuch der Laubholzkunde.

(vgl. DAMMER, in Nat.-Pfl. III, 1a, 25. 1893), sondern wegen der 4-flügeligen Fr. zur Sekt. *Pterocarpus* gehört und dessen Nomenklatur folgende ist: *C. aphyllum* (*Pteroc. aphyllus* PALM., Reise I. c. II, app. 738, No. 109. 1773; *C. pallasia* L'HER., in Transact. Lin. Soc. I, 180. 1791). Heimat: S.-Rußl., O.-Turkest., Songarei.

Gattung 45. *Polygonum* L., Sp. pl. 359. 1753.

[Knöterich; knotweed; persicaire.]

Vgl. oben S. 253, Bl. einzeln o. meist zu ährigen o. traubigen Blst. vereinigt, meist $\pm$ P. gerötet, teilw. verwachsen, äußere zur Zeit der Fr.-Reife die Fr. einhüllend, z. T. geflügelt. Stb. meist 8, einem schwachen ringfg. Disk. angewachsen, Frkn. frei, nackt, Gr. 2–3, Fr. flach o. 3-kantig, Exocarp glatt, meist derb, E. exzentrisch, gekrümmt, Cot. schmal, nicht gefaltet. Etwa 150 allweltliche Arten bekannt, meist C., C. o. 2.

C b. nur an Basis verholzend, Äste kriechend, B. nicht über 10–12 mm breit, nicht pfeilfg., Ochrea fädig zerschlitzt.

— B. schmal lanzettl. (Fig. 169f, h), Bl. unscheinbar, in den B.-Achseln am Zw.-Ende, nicht ährig.

1. *P. romanum*: Zw. fein, dünn, B. 1–3:0.2–0.5 cm. beiders. grün, Bl. weißlich, Fr. schwarzbraun (Fig. 169g).

P. r. JACQ., Observ. III, 8, t. 58. 1776 (*flagellare* BERTOL., in SEB. et MAUR., Fl. rom. prodr. 142. 1818). Römischer K. Auf trocknen Hügeln, Triften der Campagna bei Rom o. um Neapel auf vulk. Boden. — Leicht wachsender, den Boden überziehender b für trockne Lagen, im Winter Deckung.

— B. eilanzettlich (Fig. 169a), Bl. lebhaft rosa, zu schönen ährenfg. Blst. vereint.

2. *P. vacciniifolium*: die am Ende aufstrebenden, etwa spannenhohen Zw., tragen B. und Blst. wie Fig. 169a, B. 1–2.5:0.5–1.2 cm. oben tiefgrün, unten hübsch blauweiß, Bl. vgl. Fig. 169c, Fr. mir unbekannt.

P. v. WALL., Cat. n. 1695. 1829. — Heidelbeer-K.; whortle-berried k. — O.- und W.-Himal. Zwischen 3–1000 m. Blz. VIII–XI. Sehr hübsche Zier-Pfl., deren Härte noch zu erproben.

CC f. Zw. verholzend, B. über 1.5 cm breit, pfeilfg., Ochrea kaum zerschlitzt, Blst. zieml. groß, scheinrispig.

— Zw. mit solidem weitem Mk., meist stark windend, Stbf. am Grunde beh., äußere P. zur Frz. kaum vergrößert.

3. *P. baldschuanicum*: hochwindend, St. (nach ZABEL) mit hellgrauer bis bräunlich grauer Rinde, bis 13 mm dick, Lent. $\sim$, Zw. jung kantig-gestreift, Kanten fein bedrüst (sah ich nicht!), Kn. vgl. Fig. 168i–n, B. vgl. Fig. 167 o., 2.5–9:1.5–5.5 cm. fein knorpelrandig, z. T. undeutlich ausgeschweift gezähnelt, Unters. wenig heller; Stiel 2–4 cm, Blst. bis 50 cm lang, Blst.-Achse nur an Kanten schwach fein beh., Bl. vgl. Fig. 167 p–q, zur Blz. 5–8 mm Dm., weißlich, sich immer mehr rötend, Fr. schwarz.

*) Im Herb. ZABEL sah ich einige B.-Zweige einer als *Polygonum „cordatum“* Dr. BOLLE. 1879 bezeichneten, mir unbekannten Art. Es ist vielleicht gar kein *Polygonum* und scheint sich seiner Empfindlichkeit halber nicht lange in Gärten gehalten zu haben.

P. b. RGL., in Act. Hort. Petrop. VIII, 3, 684. 1883. — Baldschuan-K. — Bucharci (am Wachschfluß, Sevistan-Gebirge). — Zwischen 1500–2000 m. — Blz. VII–X. — Wertvoller schöner §, etwa bis Prov. IV hart; liebt warme Lage an sonniger Mauer, auch für Lauben.

— Zw. hohl o. mit sehr lockerem Mk., mäßig windend. Stbf. kahl, äußere P. zur Frz. stark vergrößert.

4. *P. multiflorum*: Tracht und Zw. ähnlich dem Vorigen, Kn. selten und dann einzeln, etwa 1:0.4 cm, locker beschuppt. B. 7—13:10—5, Rand gerade, Stiel (2—)3—7 cm; Blst. zierlicher als beim vorigen, Achsen fein beh. (Fig. 169 k), Bl. zur Blz. 2—3 mm Dm., rosa, Fr. gelblichweiß, vgl. Fig. 169 l—m.

P. m. THBG., Fl. jap. I, 169. 1784. — Japan-K. — Japan. — Die von mir nun im 3. Jahre beobachtete Pfl. im wiener botan. Garten ist hier (etwa Prov. IV) fast ganz hart. Blüht erst sehr spät.

Fig. 169. *Polygonum*: a—d *vaccinifolium*: a Zw. mit Blst., b Bl.-Kn., c offene Bl., d Stb., e Frkn. im L.-Schn. — f—h *romanum* (*flagellare*): f B.-Zw.-Stück eines spontanen Expl., g Fr., h wie f, aber kultiv. Expl. — i—m *multiflorum*: i B., i' B.-Stiel mit Ochrea (a), k Bl.-Gruppe aus Blst. mit einer geschlossenen Bl., l Fr., m S. im Q.-Schnitt (a—c nach BOT. MAG., sonst Orig.).

Gattung 46. *Muehlenbeckia* MEISSN., Gen. pl. vasc. 316. 1840.

Vgl. oben S. 254 und Art. — Etwa 15 Spezies in Austral., Neuseel., den Inseln des Stillen Ozeans und S.-Am. bekannt.

M. sagittifolia: kahler, h-artiger §, B vgl. Fig. 165 c, Basis . . spitzöhrig. Umr'B zieml. wechselnd, 3—7:1—2 o. 3.5—6:2.5—4 cm, Stiel 0.5—1.5 cm.; Blst. als lockere Scheumrispen am Ende kurzer Seitentriebe, Bl. dioec., unscheinbar, etwa 3 mm Dm., weißlich, sonst vgl. Fig. 165 f—k.

M. s. MEISSN., l. c. — Pfeilblättrige M. — S.-Am. (von Buenos-Ayres bis S.-Brasil. — In Kultur noch selten, nur für wärmste Lagen in Prov. VI, sonst besser gleich den übrigen im H. d. D. G. erwähnten 3 Arten fürs Kalthaus. *M. complexa* MEISSN., l. c. (*Polig. compl.* A. CUNN., in ANN. NAT. HIST. I, 454 1838), die durch ihre runden, in Fig. 165 l dargestellten B. bekannt, kommt höchstens für die südlichsten Lagen des Gebietes (S.-Tirol) fürs Freiland in Betracht.

Gattung 47. *Brunnichia* BANKS, in GAERTN. De fruct. I, 213. 1788.

Vgl. oben S. 254 und Art. — Nur 2 Spezies bekannt, die eine im trop. W.-Afr.

B. cirrhosa: §(♂) 2—6 m hoch, Zw. stark kantig, etwas an *Clematis* erinnernd, kahl; B. (Fig. 167 h) 3,5—15 : 2—5,5 cm, oben meist kahl, Stiele 1—2,5 cm; Blst. am Zw.-Ende rispig gehäuft, Bl. , azyklisch, P. (5), ihre Röhre zur Frz. korkig auswachsend mit 1 Flügel, Stb. 7—9, Gr. 3, Fr. wie n—n', E. in einer Ecke

B. c. BANKS, l. c. (*Rajana ovata* WALT., Fl. carol. 247. 1788). — Wickelrankige B. — Ver.-St. (S.-Illin. bis Arkansas, S.-Karol., Florida). — Flußufer. — Blz. V—VI. — Wohl nicht in Kultur und etwa für Prov. V—VI geeignet.

Reihe IX. *Centrospermae*, Mittelsamige Pfl.

ENGL., Führ. Bot. Gart. Breslau. 36. 1886.

♂ ♀, z. T. ausgesprochene Halophyten, B. ☉ o. gegst., einfach und fast stets ganzrandig, Bl. ♂♂, monoec. o. dioec., o. , Bl. mit P. o. mit C. und K., Stb. meist ebensoviel wie P., diesen opponiert, Trgb. 1—∞, meist vereint, Gyn. meist oberständig und einfächrig, Sa. 1—∞, campylotrop, Integ. 2; S. mit Perisperm, E. gekrümmt.

Familie 13. *Chenopodiaceae*, Gänsefußgewächse.

LESSING, in Linnaea 1834. 197 (*Salsolaceae* Moq., in DC. Prodr. XIII. 2, 41. 1849).

Vgl. Reihe IX, B. zuw. fleischig, ganzrandig o. unregelm. gezähnt, Neb. fehl.; Bl. sehr klein, unscheinbar, in meist knäueligen, trugdoldigen, racemös vereinigten Partialinfloreszenzen, meist ♂, ♀ o. ♂♀, P. ☉, meist 5, 3 o. 2, dachig, Stb. ebensoviel, Frb. meist 2, Gyn. oberständig, 1-fächrig, Sa. 1, grundständig; Fr. eine Nuß o. eine mit dem Deckel sich öffnende Fr., von der bleibenden Blh. umgeben.

Gattungen*):

A. B. ☉ o. gegst., lineal o. breit-lanzettlich, ei- o. rautenfg., mit einfachen Sternhaaren o. meist mit Blasenhaaren (mehlartig beschülfert) überzogen.

a. B. nur mit Blasenhaaren. 48. *Atriplex*.

b. B. mit Blasen- und Stern- o. nur Stern- o. einfachen Haaren.

1. B. kaum über 1,5—2 cm lang, jung mit 2erlei Haaren (vgl. Fig. 172 k—k'), zuletzt fast kahl o. nur mit Blasenhaaren.

49. *Grayia*. (S. 262.)

2. B. stets deutlich sternhaar-filzig. 50. *Eurotia*. (S. 263.)

3. B. schmal lineal, Haare einfach. 51. *Kochia*. (S. 264.)

B. B. deutl., ☉, lineal, kahl o. gegst. und auf eine mantelartig das ganze Zw.-Internodium umhüllende verwachsene Scheide (Fig. 175 b) reduziert.

a. B. ☉, deutlich, lineal.

1. Zw. sparrig, stechend, B. meist 1,5—2,5 cm. 54. *Sarcobatus*. (S. 266.)

2. Zw. nicht stechend, B. meist nur 0,8—1,5 cm. 55. *Suaeda* (S. 267.)

b. B. gegst., reduziert, scheidig.

1. Zw. meist ☉, vgl. sonst Fig. 175. 52. *Arthrocnemum*. (S. 265.)

2. Zw. gegst., vgl. sonst Fig. 176. 53. *Salicornia*. (S. 266.)

*) Die im H. d. D. D. G. erwähnte Gattung *Nitrophila* (S. WATS., in Bot. Kings Exped., 297. 1871), von der nur eine Art, *N. occidentalis* S. WATS., l. c., bekannt, stellt eine niedrige L. mit gegst. stengelumfassenden fleischigen B. dar und kommt mithin hier nicht in Betracht.

Gattung 48. *Atriplex* L., Sp. pl. 1052. 1753.

[Melde; orache; arroche.]

h h. B. ☉. selten gegst., Bl. in Knäueln, meist beblätterte Scheinähren bildend, monoec. o. dioec., γ : Blh. 3–5, spongiös o. häutig, Stb. 3–5, Frkn.-Rudiment zuw. vorh.; δ : Blh. fehl., nur 2 Vorb. vorh., die das Gyn. klappig einschließen und zur Frz. eine vergrößerte, verwachsene Hülle bilden, die meist spongiös und hfg. mit Anhängen versehen; N. 2, fädig; Fr. membranös; E. ringfg., Radicula oben (bei unseren Arten). — Etwa 120 allweltliche, nur in den Tropen fehlende Arten.

Fig. 170. *Atriplex portulacoides*: a–b Zw. mit B. und Bl.; c B.; d Bl.-Kn.; e ♂ Bl.; f Perigonteile; g Stb.; h ♀ Bl. (1–2 = Blh., 3 = N.); i dgl. im Längsschnitt (1 = Sa.); j Fr.; k dgl. im Längsschnitt; m E. ausgebreitet (a–b nach FIORI, sonst Original).

○ B. gegst. vgl. Fig. 170.

1. *A. portulacoides*: h. bis 0,5 m, Äste dünn, am Grunde niederliegend, B. bis 5:1,3 cm, dicklich, gelblich- o. graugrün, silberweiß bestäubt; Bl. meist monoec., Blst. a) blattlos, Vorb. der Bl. zur Frz. dreilappig, auf dem Rücken mit schwammigen Höckerchen (k).

A. p. L., Sp. pl. 1053. 1753 (*Obione port.* Moq., *Chenop. Enum.* 75. 1840). — Portulak-Melde. — L. G. nur O. Küstengebiet, sonst noch Küsten des Medit., Engl., Danem., S.-Rußl. — Auf salzhaltigem Boden, Strandchutt, Salinendämmen, Dünen. — Blz. VIII. — Kaum in Kultur.

○○ B. ☉.

— Vorb. der Bl. nur am Grunde verwachsen, zur Frz. ohne Flügel o. Anhängsel.

+ B. vgl. Fig. 172 a, Bl. monoec.

2. *A. halimus*: aufrechter, buschiger, bis 2 m hoher h. o. Zw. dicht grauweiß beh., hellgelbgrau, kahler, später löst sich Epidermis in Fetzen ab; B. bläulich- o. weißgrau, dünn, 1,5–3,5(–5):0,8–2(–2,5) cm, zuw. mit einzelnen Randzähnen, Stiel 0,2–0,8 cm; Blst.-Knäuel zu langen Scheinrispen vereint. — Bl. und Fr. vgl. 172 b–e.

A. h. L., Sp. pl. 1052. 1753. — Strauch-M. — Küsten des Medit. — Blz. IX. — Für Prov. V–VI in geschützten Lagen brauchbarer h.

++B. vgl. Fig. 171 a, Bl. dioec.

3. *A. confertifolium*: locker verästelter, bis 1,5 m hoher b. Zw. sparrig, z. T. fast verdornend, sonst wie bei *halimus*: B. bis 1,8:0,8—1 cm, zieml. dicklich, Stiel 0—0,5 cm; Blst. zu zieml. kurzen beblätterten Scheinähren vereint. ♂ vgl. Fig. 171 b, ♀: (mir unbekannt) nach WATSON Vorb. sitzend, 0,6—1,5 cm lang, aus keiligem Grunde rundlich, zur Frz. dicklich.

A. c. WATS., in Proc. Am. Ac. IX, 119. 1874 (*Obione conf.* TORR., Frem. Rep. 318. 1845). — Dichtlaubige M. — W. N.-Am. (von N.-Nevada bis Utah, S.-Kolor., N.-Mexiko). — Trockene Täler. — Sah sie nur im Herb. KOEHNE, da Herr Prof. KOEHNE so liebenswürdig war, mir seine *Atriplex* zur Durchsicht zu senden. Ob in Kultur?

✱✱ Vorb. der ♀ Bl. sehr hoch verwachsen, zur Frz. geflügelt o. mit höckerigen Anhängseln, Bl. dioec.

+ B. 2—6:(0,2—)0,3—0,6(—0,7) cm (Fig. 172 f), Fr.-Hülle geflügelt (i).

Fig. 171. *Atriplex*: a—c *confertifolium*: a B., b ♂ BL ohne A., c Stb. — d—f *corrugata*: d B., e Bl. (α = Blh., β = Anhängel), f dgl. im L.-Schn. (Orig.).

4. *A. canescens*: b. bis 0,6 m, Zw. dünn beh., ♀ hellgelbgrau, B. dünn, weißgrau, in einen 0,2—0,8 cm langen Stiel verschmälert: Blst. zu großen, beblätterten Scheinähren gehäuft. Bl. vgl. Fig. 172 g h. Fr. bis 2,3 cm Dm.

A. c. JAMES, in Trans. Am. Phil. Soc. II, 178. 1825 (*Pterochiton occidentale* TORR., Frem. Rep. 318. 1845). — Graue M. — Von N.-Nevada und Kolor., bis N.-Mex. und S.-Kalif. Blz. VIII. — Schönste Art, die ich in Kultur fand, scheint auch härteste (vielleicht Prov. III).

+ B. bis 1,5:0,4 cm (Fig. 171 d), Fr.-Hülle mit höckerigen Anhängseln (β in e).

5. *A. corrugata*: b. bis 0,30 m hoch, stark beh.: B. dicht weißgrau: Blst. in kurzen beblätterten Scheinähren, ♂ wie bei *canescens*.

A. c. WATS., in Bot. Gaz. 1891, 345 (*plagustium* KOEHNE, in Mitt. D. D. G. III, 13. 1894). — Runzel-M. — Kolorado — Blz. V. — Mir nur aus Herb. KOEHNE bekannt. Ob in Kultur?

Gattung 49. *Grayia* HOOK. et ARN., Bot. Beech. 387. 1841.

Vgl. oben S. 260 und Art. Nur 2 bekannt.

G. polygaloides: b. 0,3—0,9 m, Zw. verdornend, hellgelbgrau, B. spatelig o. verkehrt-eilanzettl., im Mittel etwa 1,5:0,3 cm (Fig. 172 k), in stielartige Basis zusammengezogen, Bl. meist dioec., ♂ in axillären Knäueln, ♀ scheinbar in Trauben, vgl. Fig. 172 l—n, ♀ mit 2 kahlen, in der Mittelrippe gefalteten, an den Rändern fast bis zur Spitze verwachsenen, auf dem Rücken gekielten, an der Fr. (o—p) sich stark vergrößernden Vorb., N. fadenfg., zur Blz. heraustretend (m), E. ringtg.

G. p. HOOK. et ARN., l. c. (*G. spinosa* Moq., in DC., Prodr. XIII, 2. 119. 1849). — Kreuzblumenartige G. — Auf salzigen Böden NW.-N.-Am., östlich der Sierra Nevada vom Kolumbiatluß in Wyoming bis Utah und SW.-Kalif. — Kaum noch in Kultur, gleich den meisten ♂-artigen Chenopodiaceen nur für Liebhaber

ratsam, die den Pfl. spezielle Wartung angedeihen lassen können. Die im H. d. D. D. G. geführte *G. brandegei* (GRAY, in Proc. Am. Ak. XI, 101, 1877) ist kleiner, dornenlos, B. schmaler, deutlicher beh., Frkn. sitzend, die kurzen N. nicht heraustretend, Fr. kleiner, zuw. 3-flügelig.

Fig. 172. a—e *Atriplex halimus*: a B.; b B.-Querschnitt; c ♀ Bl. im L.-Schnitt; d Fr.; e S. im L.-Schnitt. f—i *A. canescens*: f B.; g ♂ Bl. (a Frkn.-Rudiment, β Stbf.); h S. Bl.; h' dgl. im L.-Schnitt; i rechts neben h', Buchstabe fehlt, Fr. k, p *Grayia polygaloides*: k—k' B. und Haarformen; l Bl.; m ♂ Bl.; n Gyn.; o Fr.; p dgl. im Querschnitt. q—s *Sarcobatus cernuatus*: q Zw.-Spitze mit oben l, unten ♂ Bl., r ♂ Bl.; s Bl.; t Fr. u—v *Erechtia phyllanthoides*: u Zw. mit Blst; v Bl., v' dgl. im L.-Schnitt; w Gyn. (a verwachsene Filamentbasis, β abgeschnittene Stbf., γ Frkn.); x Frkn. im L. Schnitt; y S.; z dgl. im L.-Schnitt. E. q End. (b, k' s' n. VOLKENS, t n. HOOKER, sonst Orig.).

Gattung 50. *Eurotia* ADANS., Fam. des pl. II. 260. 1763.

Vgl. oben S. 260 und Arten.

C B. 1—4:0,2—0,8 cm, oben deutl. grünlich, unten graugrün bis weißlich, Rand schwach o. kaum umgerollt.

1. *E. ceratoides*: aufrechter B. b. bis 1 m, meist nur an Basis verholzend, Zw. gelbgrau, stärkere kahl, jüngste feinfilzig, B. mit

2–3 mm langer stielartiger Basis; Bl. gegen die Spitze der Zw. hin in Knäueln, die Scheinähren bilden, mon- o. dioec., vgl. Fig. 173. — mit 2 beh., an den Rändern bis über die Mitte verwachsenen, gespitzten Vorb., Frk. seidenhaarig, Fr. membranös, in eine harte, von den Vorb. gebildete, innen und außen sternhaarige, zusammengedrückt vierkantige, oben 2-hörnige, zuletzt hfg. 4-klappige Kapsel eingeschlossen; E. hufeisenfg., weiß.

E. c. C. A. MEY., in LEDEB. Flora alt. IV, 239. 1853 (*Axyris cerat.* L., Sp. pl. 979. 1753; *Diotis cerat.* WILD., in L. Sp. pl. ed. IV, 368. 1805; *E. lanata* K. KOCH, in Linnaea XXII, 184. 1849, non Moq.). — Orient-Hornmelde. — I. G.

Fig. 173. *Eurotia ceratoides*; a Zw. mit ♂ Blst.; b ♂ Bl. mit Trgb. (die Beh. nur teilweise gezeichnet); c dgl. im Schnitt; d ♀ Bl.; e Gyn. im Längsschnitt; f Frst.; g Fr. schematisch im Schnitt; h–i Haarformen (a, d–i nach VOLKENS).

nur eingeschleppt in Ung. und Nied.-Östr., ob auch Mähr.?; sonst noch Span., N.-Afr., Or., M.- und S.-Rußl., Transkauk., Sib., M.-As. bis China. — Blz. VII–IX. Dürfte bis Prov. IV hart sein, bleibt aber nur in südlichen Gegenden wirklich b., sonst h. Liebt warme, sonnige Lage und leichten Boden.

CC B. 1 3:0.1–0.3 cm. beiders. deutl. weißfilzig. Rand stark umgerollt.

2. *E. lanata*: Im Wesentlichen nur noch durch geringere Höhe und schwächeren Wuchs von *ceratoides* abweichend. E. grün.

L. l. Moq., in DC. Prodr. XIII, 2, 121. 1849. — Wollige H.; white sage — Auf salzhaltigen Boden in W.-N.-Am. vom Saskatchewan bis Oregon, Nevada, Neu-Mexiko. — Vielleicht noch schöner und kulturwerter als *ceratoides*.

Gattung 51. *Kochia* ROTH, in SCHRAD. Jour. I, 2, 307. 1800.

Vgl. oben S. 260 und Art. Etwa 30 Spezies bekannt, die in Austr., dem gemäß. As., N.- und S.-Afr. und M.-Eur. leben.

K. prostrata: h., bis 60 cm hoch. Habitus Fig. 174a. Wurzel (n. BUCK) walzig-ästig, holzig, B. vgl. b, Bl. zu 3–5 blattwinkelständig, sitzend, zu lockeren beblätterten Scheinähren vereinigt, — o. —, P. (5), bei Fr.-Reife auf dem Rücken mit Flügelanhang (1 in e), Stb. 5, N. 2, Fr. vgl. f, E. wie h und g, grün.

K. p. SCHRAD., Neues Jour. III, 3–4, 85. 1809 (*Salsola prost.* L., Sp. pl. 222. 1753; *Chenopodium angustatum* ALL., Fl. Pedem. II, 198. 1785). — Halbstrauchiges Strandkraut. — I. G. nur OU. Mähr., Nied.-Östr., Ung., Kroat., Slavonien; sonst noch Serb., Bulg., Rumänien, M.- und S.-Rußl., N.-Ital., Piemont, S.-Frkt., Span., N.-Afr., Transk., Kauk., Sib., Himal. — Blz. VII–IX. — Für Kultur kaum von Belang.

Gattung 52. *Arthrocnemum* Moq., Enum. Chenop. 111. 1840.

Vgl. oben S. 260 und Art. Etwa 7 Spezies bekannt, an den Meeresküsten der Alten Welt verstr.

A. glaucum *; Wurzelstock knorrig-holzig, dick, gedreht, senkrecht o. schief, in reichem Brackwasser b-artige Stöchen treibend, die an den Köpfen kurze Zw.-Büschel tragen, auf Sumpfboden einzelne, dicke, holzige, aufsteigende, an der Basis weitschweifig, oben kurz, aber dicht und aufrecht verästelte, glatte, (scheinbar) blattlose, bis 60 cm hohe Zw. ansetzend (Fig. 175 a). Bl. in den Achseln der reduz. B., meist zu 3, getrennt (b) d) zu 4–6 cm langen Scheinähren vereint, A. gelb, Fr.-Perigon 4 mm lang, kahl, S. (e) von feinen, sternartig angeordneten Wörzchen etwas rauh, glänzend schwarz, E. vgl. f.

Fig. 174.

Fig. 174. *Kochia prostrata*: a Habitus; b Zw. mit B.; c junge ♂ Bl.; d ♀ Bl. von oben; e Perigonblatt (1 = Flügelanhängsel, 2 = Blh. mit häutigem Rand); f Frkn.; g E. ausgebreitet; h Fr. im Schnitt (a–b nach FIORI, sonst Original).

Fig. 175. *Arthrocnemum glaucum*: a Zw.-Stück; b Blst.; c Bl. im ♂, d Bl. im ♀ Zustand; e–f S. ganz und im Längsschnitt (nach VOLKENS).

A. gl. UNG.-STERNBG., in Atti Congr. Bot. Fir. 1871, 283. 1876 (*Salicornia* *A. DELILE*, Fl. aegypt. 69. 1813; *Sal. macrostachya* MORIC., Fl. Venet. I, 2. 1820; *A. macrost.* MOR. et DELP., Ind. Sem. Hort. bot. Taur. 1854, 35). — Bläuliche Gliedermelde. — I. G. nur O. Istr., Dalm.; sonst noch Küsten des Medit. — Blz. Ende VI. — In allen Teilen (m. Posp.) massiger als *Sal. frut. o. a.* und leichter an der dadurch bedingten derbstrauchigen Tracht, als an anderen Merkmalen zu unterscheiden.

* Beschreibung v. T. nach POSPICHAL, Flora östr. Küstenl. I, 352. 1897, da ich noch keine Gelegenheit hatte, diese für die Kultur nicht in Betracht kommenden Pfl. lebend zu beobachten.

Gattung 53. *Salicornia* L., Sp. pl. 3. 1753.

Vgl. oben S. 360 und Art. Etwa 9, auch an den neuweltlichen Küsten auftretende Arten.

S. fruticosa: Von *Arthrocnemum* noch abweichend durch: Wurzelstock wagrecht kriechend, Verästelung dünnrutig, bis 40 cm hoch, Bl. meist unter sich $\uparrow$ verwachsen und der Basis der Höhlung, in der sie stehen, angewachsen, A. gew. nur 1, vgl. Fig. 176 c—e, Fr. membranös f—h; S. wie i, E. wie k.

S. f. L., Sp. pl. ed. II, 5. 1763 (*S. europaea* β . *frut.* L., Sp. pl. 3. 1753; *Halocnemum frut.* A. DIETR., Sp. pl. I, 88. 1831; *Arthrocnemum frut.* Moq., Chenop. Enum. 111. 1840, ex parte). — Meersalzkraut; saltwort; soude. — I. G. nur O. I-str., Dalm., Kroat.; sonst ganz Medit., Rot. Meer, S.-Afr. — Brackwassersümpfe, Salinengräben. — Blz. VIII. — Für Kultur nicht in Betracht kommend.

Fig. 176. *Salicornia fruticosa*: a unterer Stengelteil mit Wurzelstock, b oberer Stengelteil mit Blst.; c Zw.-Stück mit Bl. (1 = Perigon, 2 = Lappen desselben, 3 = N., 4 = Stb.); d Bl. im Längsschnitt (5 = Sa.); e Stb.; f Fr. von vorn, nur Fr.-Perigon (6) zu sehen; g dgl. von hinten; h dgl. seitlich (7 = Sa.); i S. ohne Hülle, k E. von verschiedenen Seiten (a—b nach FIORI, sonst Original).

Gattung 54. *Sarcobatus* NEES, in NEUWIED, Reise N.-Am., II. 446. 1841.

Vgl. oben S. 260 und Art. Nur diese bekannt.

S. vermiculatus: b. 0,6—3 m. Äste weißgrau, mit zuletzt rissiger Rinde, junge Triebe — beh. B. 1—4:0,2—0,3 cm, sitzend, halbzylindrisch. Ähren 0,6—2,5 cm lang (Fig. 172 q), an ein *Equisetum* erinnernd. ♀ Bl. unter ihnen einzeln achselständig; ♂ Bl. r) aus Stb. mit ganz kurzen Stbf. bestehend, die regellos unter schildfg. Sch. verteilt sind; s) unten beh. P. fast ganz mit Frkn. verwachsen, nur oben an einem freien, an der Fr. zu einem breiten, faltigen Flügel (s¹) auswachsenden Ringwulst erkennbar; Fr. rhombisch-eifg.; S. (n. VOLKENS) aufrecht, mit hyaliner Schale und planspiralem grünem E.

S. vermiculatus TORR., in Emorys Rep. 150. 1848 (*Batis (?) vermiculata* HOOK., Fl. bor. am. II, 128. 1840; *Sarc. maximiliani* NEES, l. c.; *Fremontia vermicularis* TORR., in Fremont. Rep. 95 et 317, t. 3. 1845). Grease-wood. N.-Am. von W. Nebraska und Montana bis Nevada und Neu-Mexiko. — Auf trockenen, salzhaltigen Böden. — Blz. VI—VII. — Kultur nicht schwer, scheint bis Prov. III hart

Gattung 55. *Suaeda* FORSK., Fl. aegypt. arab. 69. 1775.

Vgl. oben S. 260 und Art. Etwa 40 allweltliche Arten (Meeresküsten, Salzsteppen).

S. fruticosa: b. 0,3–0,6–1) m. dicht aufrecht verästelt und feinzweigig. B. fleischig, gelbgraugrün. rundlich, lineal, 0,5–1,5: 0,1–0,2 cm. z. T. wintergrün. Bl. unscheinbar. (z. T. $\frac{3}{4}$), zu 1–3 in B.-Achseln zu beblätterten Scheinähren vereinigt, vgl. Fig. 177. P. 5, anhangslos, zur Frz. unverändert, Frkn. niedergedrückt kugelig, N. 2–5. Fr. membranös (d), S. (e) glänzend schwarz mit bräunlichem Funiculus, E. meist grün (f), End. fehl.

S. f. FORSK., l. c. 70 (*Chenopodium fruticosum* L., Sp. pl. 221. 1753; *Salsola frut.* L., l. c. ed. II, 324. 1763; *Schoberia frut.* C. A. MEY., in LEDEB. Fl. alt. I, 402. 1829). — Strauchige Kelchmelde; suedée frutescente. — Medit. bis Afghan. — I. G. (Triest) nicht mehr beobachtet. — Blz. VIII–IX. — Bis Prov. VI harte, für Liebhaber interessante bekannte Kultur-Pfl.

Fig. 177. a–f *Suaeda fruticosa*: a Zw. mit B.; b ♂ Bl. von oben; c Stb.; d Fr.; e S.; f dgl. im Q.-Schn. — g *Eurotia lanata*: B.-Zw. (Original).

Familie 14. *Phytolaccaceae*, Kermesbeerengewächse.

LDL., Nat. syst. ed. II, 210. 1836.

Vgl. Reihe S. 260 und Gattung.

Gattung 56. *Ercilla* JUSS., in Ann. sc. nat. sér. 1. XXV. 11. 1832.

♂. B. ☉, einfach, ganzrandig, lederartig. Bl. in dichten Ähren (Fig. 172 t). weitlich, anscheinend $\frac{3}{4}$, aber in $\frac{3}{4}$ die Frkn., in $\frac{1}{4}$ die Stb. verkümmert. Bl. mit 3 Vorb. au., P. 5, Stb. 8–10, Gyn. 5 (vi. von einer kurzen Achsenverlängerung getragen, Sa. 1, campotrop (w.), Fr. beerenähnlich. Perikarp wenig saftig, S. x mit schwarzer spröder Testa, ohne Arillus, E. vgl. y. — 1–2 Arten.

E. volubilis: Vgl. Gattung: ☉ Holz braun, + gestreift, ☉ Zw. olivgrün, B. 3–8,5:1,6–4,8 cm. kahl, oben tiefgrün, unten $\frac{1}{2}$ gelb olivgrün, Stiel 0,5–1 cm. ♂ Blst. bis 5,5 cm lang.

E. v. JUSS., l. c. (*Phytolacca vol.* HEIMERL. in Nat. Pfl. III, 1 b. 11. 1887). Ährenblütige E. Chile, Peru. — Kommt nur für wärmste Lagen in Prov. VII in Betracht, meist Kalthauspfl.

Familie 15. *Caryophyllaceae*, Nelkengewächse.

RCHB., Conspect. 206. 1828.

Unterfam. *Silenoideae* A. BR., in ASCHERS., Fl. Prov. Brandbg. I. 60. 1864.

Vgl. Reihe S. 260 und Gattung.

Gattung 57. *Silene) L., Sp. pl. 416. 1753.**

h. Stengel knotig mit gegst. B., unterste — rosettig gehäuft, einfach, ganzrandig, sommergrün, Blst. von traubigem Habitus, Bl. . . K. (5), 10-nervig, C. 5 mit den Stb. und Gyn. einem stielhg. Internodium aufsitzend (Fig. 178i), genagelt, meist mit Ligularkrönchen, Stb. 10, Gyn. (3—5), Sa. ∞ , an zentraler Placenta, campylotrop, Fr. klappige, am Grunde 3—5-fächerige Kapsel, S. ∞ , meist nierenfg., E. gekrümmt.

Fig. 178. a—f *Trochodendron aralioides*: a Zw.-Stück mit B. und Blst.; b Bl.; c Gyn. im L.-Schnitt; d S. am Myceropylende im L.-Schn.; e, f Fr. im L.-Schnitt und ganz; g, h S. im L.-Schnitt; i S. B.; k Blst.; l Bl. im Längs-Schnitt und Stb.; m Fr.; n dgl. im Q.-Schnitt; m—m' S.; n—n' dgl. im Längs- u. Q.-Schnitt — o, p S. *Idem*; q S. B.; r Blst.; s Bl. im Schnitt (a—abgeschnittene C., b—Stb.); t—s S. ($10/1$); t dgl. im L.-Schnitt (b—d vergr., sonst nat. Gr. o. wie angegeben). (c—f nach PRAXEL, bez. SIEB. et ZACC.; h n. SIEBH. et ZACC.; p n. Bot. MAG.; sonst Orig.)

○ B. graugrün, deutl. gewimpert, K. drüsig beh.

1. *S. fruticosa*: am Grunde verholzender h. Zw. aufstrebend, fein beh. o. kahl, rundlich, unterste B. wie Fig. 178g, obere schmaler

*) Wer sich näher über die etwa 300 Arten der Gattung (1, 2, 3) unterrichten will, sei hingewiesen auf ROHRBACH, Monogr. der Gatt. *Silene*, Leipzig 1868.

lanzettlich, Nervatur kaum auffällig: Blst. (h) von langen, zottig gewimperten Trgb. gestützt. K.-Zähne hell gerandet, C. rosa mit grünl. Aderung. Anhänge kurz, Kapsel (k) wenig länger als ihr Träger. S. schwärzlich (m—n').

S. fr. L., Sp. pl. 417. 1753 (*carnea* SALISB., Prodr. 301. 1796). — Strauch-S. Sizilien, Cyp., Peloponnes. Bes. auf Kalktelsen. Blz Sommer — Hübscher, aber zärtlicher $\wp$.

○○ B. $\mp$ blaugrau, kahl, K. kahl.

2. *S. chloraefolia*: Weicht von *fruticosa* noch ab durch: Wuchs schwächer, z. T. niedergestreckt. Zw. an Knoten deutlicher geschwollen, unten kahl, an Spitze klebrig. B. unten wie Fig. 178o, obere gleich den Trgb. (p) rundlich, zugespitzt, bis 2 cm Dm., sitzend; Bl. länger gestielt, C. weißlich o. rosa, rötlich geadert, größer; Kapsel so lang bis doppelt so lang als Träger, S. wie r—t.

S. ch. SM., Ic. ined. I, 14. 1789 [im engeren Sinne]. — Chlorablättrige S. Anatolien, Armen., Iberien, Kurdist., Pers. Steinige Berghänge. Härter als *fruticosa*.

Reihe X. *Ranales*. Hahnenfußähnliche Pfl.

ENGL., Syll. 106. 1892.

$\wp$ $\wp$ $\wp$ o. $\$$, B. $\odot$ o. gegst., selten wintergrün, sehr verschieden. Bl. $\odot$, meist homoichlamydeisch, selten ohne Blh., epigyn bis hypogyn. * o. $\downarrow$, meist mit ∞ Stb., Trgb. ∞ —1, meist frei.

Familie 16. *Trochodendraceae*), Radbaumgewächse.

PRANTL, in Nat. Pfl. III, 2, 21. 1891 (beschränkt).

$\wp$ $\wp$, Endkn. groß, vielschuppig. B. $\odot$, sommer- o. wintergrün, einfach, Neb. fehl., Bl. in endständigen (?) traubenfg. Blst. o. zu mehreren aus einer Kn. seitenständig. o. $\downarrow$. Blh. fehl., Stb. ∞ , Frb. 5— ∞ , Sa. 1—8, Fr. steinfruchtähnlich o. Samara. S. mit reicl. End. und kleinem E.

Gattungen:

- A. B. wintergrün, vgl. Fig. 178a. 58. *Trochodendron*.
B. B. sommergrün, vgl. Fig. 179i. 59. *Euptelea*. (S. 270.)

Gattung 58. *Trochodendron* S. et Zucc., Fl. jap. 83. 1835.

Vgl. oben und Art. Nur diese bekannt.

T. aralioides: $\wp$ $\wp$, bis 15:0,6 m, Tracht einer *Aralia*, Rinde graubraun, Zw. rundl., Internodien an älteren $\wp$ sehr kurz; Kn. braun, eikegelfg., 10—12 mm lang, gleich Zw. kahl; B. aromatisch, gegen Zw.-Ende meist quirlig genähert, ledrig, ober. glänzend-, unter. hellgrün, 6—10:3—6 cm, Stiel 2—8,5 cm, Blst. vgl. Fig. 178a, Bl. $\wp$ (b), A. gelb, stumpf, Frb. 5—8, in einen Kreis gestellt, sitzend und an Basis kurz verbunden, Sa. $\sim$ (c—d), anatrop; Fr. olivbraun (e—f).

T. a. S. et Z., l. c. — Kraftwurzähnlicher Radbaum — Jap. (Houshu, Kiushu, Shikoku). — Berghänge, 6—1600 m, auch noch an felsigen Orten. Blz Ende VI. — Frz. X. — Schwerlich in Kultur und höchstens für beste warme Lagen in Prov. VI—VII geeignet. Versuche zu empfehlen!

^{*)} *Spec. Lit.*: H. SOLEREDER, in Berichte deutsch. bot. Ges. XVII, 387. 1899, dessen ausgezeichneten Darlegungen ich mich anschließe.

Gattung 59. *Euptelea)**

SIEB. et ZUCC., Fl. jap. 133.
1835.

Vgl. oben S. 269 und Art. Nur
2—3 Arten von Assam durch China
bis Japan.

E. polyandra: B., kaum bis 6,5 :
0,4 m, in der Tracht an eine Erle ge-
mahnend, Rinde bräunlich. Zw. kahl,
⊙ braungrau, mit verstr. deutl. hellen
Lent., Kn. etwa 1 cm lang, Sch. 6—10,
schwarzpurn, wie lackiert!, hellge-
wimpert, die Kn. in Fig. 179 a ist schon
leicht angetrieben; B. jung beh., aber
sehr bald bis auf feine Achselbärte unten
kahlend, häutig, oben schön grün, unten
heller, 5—14 : 3,5—12 cm, Stiele 1—5
cm; Bl. gestielt, dioec., kurz vor o. mit
B., ♂ (b) mit rudiment. Frb. (c), A.
lebhaft rot, gespitzt, ♀ mit ∞ Frb.
(d—e) und je 1 Sa. (f—g); Fr. (h) Sa-
mara, S. und E. vgl. i—k.

E. p. S. et Z., l. c. 134. — Viel-
männige E. — Japan. — Vornehmlich
in Talgebieten der nördl. subtrop. Zone.
— Blz. Ende V. — Frz. IX. — Meines
Wissens nicht in Kultur und wohl nur
für Prov. VI VII als hart anzu-
sprechen.

Fig. 179. *Euptelea polyandra*: a
Zw. mit ♂ Blst.; b ♂ Blst.; c Frkn.-
Rudiment; d ♀ Blst.; e ♀ Bl.; f dgl.
im Längs-, und g im Querschnitt; h Fr.;
i S. im Längsschnitt (a = E); k E.; l B.
(a n. SHIRASAWA, sonst Orig.).

Familie 17. *Ranunculaceae*, Hahnenfußgewächse.

JUSS., Gen. 231. 1789.

Kleinere aufrechte o. mit den B.-Stielen kletternde b, B. ⊙ o.
gegst., fast stets geteilt o. zusammengesetzt. Neb. fehl.: Bl. einzeln o.
in zusammengesetzten Blst., ♂, ♀, seltener ♂, ♀, hypogyn. Blh. meist ein-
fach, petaloid, o. K. und C., hfg. Honigblätter zwischen Blh. und Stb.,
Stb. 5—10—∞, Gyn. 5—10—∞, Sa. je 1, grundständig o. mehrere
an Bauchnaht angeheftet, anatrop. Integ. 1—2, Fr. Balg o. 1-samige
Schließfr., S. mit reichl. ölhaltigem End., E. klein, gerade.

Gattungen:

A. B. ⊙, Bl. mit K. und C. o. an Stelle der C. Honigblätter, Fr. auf-
springende Balgfr.

*) Nicht *Euptelaea*, wie es im H. d. D. D. G. heißt.

I. B. vgl. Fig. 180, Bl. groß, einzeln, mit C. 60. *Paeonia*.

II. B. vgl. Fig. 181, Bl. klein, in Scheinrispen, mit Honigb.

61. *Zanthorhiza*. (S. 273.)

B. B. gegst., Bl. nur mit petaloiden P., Fr. Schließfr. 62. *Clematis*. (S. 273.)

Gattung 60. *Paeonia* L., Sp. pl. 530. 1753.

Vgl. oben und Art. Etwa 15, vorwiegend altweltliche Spezies bekannt, die fast sämtlich 4.

P. arborea: Reich, kräftig und knorrig verästelter b-artiger b. 0,5—1,5(—2) m: Zw. rund, braungrau, kahl und leicht glänzend o. sehr fein beh., Lent. winzig, punktf., Kn. (Fig. 181 d—f) meist braun und rosa gescheckt: B. meist doppelt 3-zählig, B. chen 3—5-lappig, ± eifg., ober. lebhaft grün, unters. gelb- o. blaugrün, verstr.

Fig. 180. *Paeonia arborea* var. *papaveracea*: a Bl.; b Gyn. im L.-Schn. (α = K., β = Discus, γ = Frkn., ε = Sa.), c aufgesprungene Fr. (α = S.) (a nach Bot. MAG., sonst nach BAILLON).

beh.: Bl. , bis über 30 cm Dm., meist rosa o. rot, K. meist 5, C. (5—)8—∞ [sog. gefüllte Bl.], Stb. ∞, in mehreren Reihen, A. intrors, langgestreckt, längsspaltig, Stbf. am Grunde zu einem ringfg., fleischigen Diskus verwachsend, der sich (bei unserer Art) noch in einen das Gyn. umhüllenden Sack fortsetzt (Fig. 180 b β, so daß nur die hakigen Gr. (δ) heraussehen, Gyn. 2—6, 20, beh., Sa. ∞ (ε), anatrop, Integ. 2: Fr. an Bauchnaht aufspringende Balgfr. (c).

*) *Spec.-Lit.*: E. HUTH, Monogr. d. Gatt. *Paeonia*, in Engl. Bot. Jahrb. XIV, 258. 1892.

P. a. DONN, Cat. pl. hort. Cantabr. 196. 1796 (*P. officinalis* THBG., Fl. jap. 230. 1784, non RETZ.; *montan* AIT., Hort. Kew. ed. 2. III, 315. 1811 [et SIMS, Bot. Mag. XXIX, t. 1154. 1817]). China, Jap. Wild in neuerer Zeit nicht wieder gefunden, aber seit Jahrhunderten in ∞ Kulturformen gezüchtet. Eine solche auch *P. papaveracea* ANDREW, Bot. Repos. VII, t. 463. 1797 1804, deren halbgefüllte Bl. mit weißen, am Grunde purpurnen C. in Fig. 180a dargestellt. Von ihr sollen die meisten b Gartenformen stammen, während bei typ. *arborea* der Diskus-Sack das Gyn. nicht ganz soweit umschließen soll (bei den 2-Päonien ist er meist auf einen niedrigen Ring reduziert, der die Frb. kaum $\frac{1}{2}$ deckt). — Ferner sei hingewiesen auf *P. delavayi* FRANCH., in Bull. Soc. Bot. France, 1886, 382. eine neuere aus

Fig. 181. *a* *Clematis vitalba*, *a* Kn. im L.-Schn. (*a* — B.-Stiel, β = Kn. diese daneben ganz); *b* Zw. mit Kn.-Paar, vgl. *a*, *c* (unten links) Zw.-Q.-Schn. (vgl. Fig. 164g, S. 252). — *d* *Paeonia arborea*: *d* Zw. mit Kn.; *e* (versehentlich als *c* bezeichnet, und *f* Zw.-Q.-Schn. wie *c*. — *g* — *m* *Zanthorhiza apifolia*: *g* Zw.; *h* Kn.; *i* Spitze der Kn.-Sch.; *k* B.-N. (stengelumfassend); *m* wie *c* (Orig. nach C. K. SCHNEIDER).

China (Jün-nan, Gebirge bis 3500 m) stammende $\mathfrak{b}$ -Art, die der Beschreibung nach abweicht durch: B. 3-zählig, B. chen — lanzettlich (5–10:1–2 cm), Bl. kleiner, dunkel-purpurn, Frkn. kahl. Dürfte bald auch in unseren Kulturen Eingang finden. $\mathfrak{b}$ -artig scheint auch *P. lutea* DELAVAY, in FRANCH. pl. yunnan. 382. 1886, die gleichzeitig mit voriger aufgefunden wurde und ihrer gelben Bl. halber als Zierpfl. wertvoll sein dürfte. Mir ebenfalls noch nicht bekannt. — Blz. V–VII. — *P. arborea* ist bis Prov. III hart, liebt aber warme geschützte Lagen.

Gattung 61. *Zanthorhiza* L'HÉR., Stirp. nov. 79. 1784.

Vgl. oben und Art. — Nur diese bekannt.

Z. apii folia: gelbholziger kleiner $\mathfrak{b}$ -artiger $\mathfrak{b}$, 0,30–0,60 m; Zw. kurz, olivbraun, kahl, grau, rund, durch B.-N. gerunzelt, Periderm löst sich leicht ab: Kn. vgl. Fig. 181 g–m, Sch. blattartig, gelbgrün, mit dunkleren Adern, trockenspitzig; B. büschelig gedrängt (Fig. 182 a); 3-zählig o. meist einfach bis doppelt unpaar gefiedert; Blst. wie a, Bl. bräunlichpurp., $\mathfrak{f}$ (b), Stb. 5–10 (d), Gyn. 5–15, Sa. 2, anatrop (e), Fr. wie f (ich sah sie nur so beh. und fand auch keine carp. pubescentes, wie sie PRANTL bez. ASA GRAY abbildet und HUTH angibt) S. 1, bräunlich (g).

Fig. 182. *Zanthorhiza apii*.
a) Zw. mit B. und Blst.;
b) Bl. von oben (a = P.); c) Stb.;
d) Stb.; e) Frkn. im L.-Schn.; f)
Fr.; g) S. (a nach PRANTL, sonst
Orig.).

Z. a. L'HÉR., l. c. (*Xanthorrhiza simplicissima* MARSH., Arb. am. 167. 1785). — Gelbwurz; yellow root. — Ver.-St. (New York bis Florida). — Blz. IV–V. — Interessanter harter $\mathfrak{b}$ für schattige Lagen.

Gattung 62. *Clematis* L., Sp. pl. 543. 1753.

[Waldrebe; clematis; clématite.]

Vgl. oben S. 271. $\mathfrak{b}$ $\mathfrak{b}$, meist $\mathfrak{f}$. Zw. scharf streifig gefurcht, man vgl. den Querschnitt Fig. 181 c; beschuppte Winterkn. nur teilweise vorh.; B. gegst., sommergrün, selten einfach, meist dreizählig o. unpaar gefiedert o. flammuliform, B. chen ganzrandig o. ge-

*) *Spec.-Literatur*: MAXIMOWICZ, Clem. spec. As. or. in Bull. Ac. Pétersbg. XXII. 1877. — DECAISNE, Rev. des clem. de groupe d. tub. in Norv. Arch. du Mus. Paris. 2. ser. IV. 195. 1881. — LAVALLEE, Les clem. à grands t. ms. 1887. — O. KUNTZE, Mon. c. Gatt. *Clematis*, in Verh. bot. Ver. Brandenburg XXVI. 83. 1885. — PRANTL, Beitr. zur Morph. u. Syst. d. Ranunculaceen, in Erg. bot. Jahrb. IX. 225. 1888. — Vgl. ferner KOLHNE und ASA GRAY, Syl. Fl. I. 1865.

Als flammuliform abgekürzt flam. bezeichne ich mit KUNTZE die einfach gefiederten B., deren Fader-B. chen dreizählig oft nur das unterste Paar sind, an doppelt gefiederte B. sind biflammuliform. Auf doppelt dreizählige mit mehr B. werde ich den Ausdruck nicht an.

teilt o. gezähnt; Bl. einzeln o. in wenig- bis reichblütigen, komplizierten Blst., Blh. einfach, petaloide P. 4–5–8, Bl. ♂ o. ♀, Stb. 1- bis mehrreihig, meist ∞ , Stbf. zuw. mit Nektarien*), Std. nicht selten, zuw. petaloid; Gyn. 4– ∞ . Sa. 1, hängend, epitrop, intrors, Integ. 1. Fr. einsamige Schließfr., oft mit Haarschweif.

Tabelle zur (approximativen) Bestimmung nur nach den B.**).

- 1a. B. durchweg (o. vorwiegend) einfach 2.
- 1b. B. 3-zählig, gefiedert o. flam. 3.
- 2a. B. sitzend o. in kurzen Stiel verschmälert, vgl. 1. *integrifolia* (Fig. 184a) o. 20. *songarica* (Fig. 188d).
- 2b. B. zieml. lang gestielt, 17. *lanuginosa* (Fig. 186a).
- 3a. End-B.chen fehl., zu einer (oft kleinen) Wickelranke umgebildet 4.
- 3b. End-B.chen vorh. 5.
- 4a. B.chen dünn, hautartig, Aderung nicht hervortretend, vgl. 7. *fusca* (Fig. 184b) o. 3. *simsii* o. 4. *viorna* (Fig. 184e).
- 4b. B.chen derb, scharf netzaderig, vgl. 5. *reticulata* (Fig. 184f) o. 6. *coccinea* (Fig. 184g).
- 5a. B. dreizählig 6.
- 5b. B. biternat, gefiedert o. flam. 8.
- 6a. B.chen ganzrandig, vgl. 17. *lanuginosa* (Fig. 186a).
- 6b. B.chen $\pm$ gezähnt o. gelappt 7.
- 7a. ☉ Zw. $\pm$ rundlich, mit Krztr. 24. *montana* (Fig. 188g).
- 7b. ☉ Zw. deutlich gerippt, vgl. 23. *apifolia* (Fig. 188e) o. 28. *virginiana* (Fig. 188f) o. Subsekt. *Tubulosae* S. 281.
- 8a. (5b) B. vorwiegend biternat, ☉ Zw. mit Krztr., bez. beschuppt. Kn. 13. *alpina* (Fig. 187g), wenn B.chen ganzrandig, vgl. 18. *florida* (Fig. 186d).
- 8b. B. vorwiegend gefiedert o. flam., Kn. selten ausgebildet 9.
- 9a. obs. Sp. fehl. 10.
- 9b. obs. Sp. vereinzelt bis ∞ 17.
- 10a. B. einfach gefiedert 11.
- 10b. B. doppelt gefiedert o. meist flam. und biflam. 14.
- 11a. B. ganzrandig o. nur z. T. mit einzelnen zieml. groben Zähnen 12.
- 11b. B.chen durchweg $\pm$ bis reichlich gezähnt 13.
- 12a. B. im Sommer kahl, vgl. 22. *paniculata* o. 26. *vitalba* (Fig. 189a).
- 12b. B. im Sommer wenigstens unten beh., vgl. 19. *patens* (Fig. 186g) o. 26. *vitalba* (Fig. 189a).
- 13a. B. beiderseits, oben oft nur schwach, beh., vgl. 11. *buchaniana* (Fig. 188a) o. 25. *grata* (Fig. 188i).
- 13b. B. kahl o. nur unten $\pm$ verstr. beh., vgl. 26. *vitalba*.
- 14a. (10b) B.chen klein o. sehr klein, feinschnittig, vgl. 12. *aethusaefolia* (Fig. 188b).
- 14b. B.chen größer 15.
- 15a. B.chen sämtlich ganzrandig, vgl. 18. *florida* (Fig. 186d).
- 15b. B. $\pm$ gezähnt o. gesägt 16.
- 16a. ☉ Zw. ohne Zwischenstränge, also mit sechs Gefäßbündeln, vgl. 2. *crispa* o. 15. *viticella* o. 27. *brevicaudata*.
- 16b. ☉ Zw. mit Zwischenstränge erster o. auch zweiter Ordnung, vgl. 15. *viticella* o. 16. *campaniflora* o. 21. *flammula*.
- 17a. (9b) B. flam. o. subflam., B.chen vorwiegend ganzrandig, vgl. 21a. *fragrans* o. 30. *mendocina* (Fig. 188m) o. 31. *glauca* (Fig. 191b) o. 32. *orientalis* (Fig. 191c).
- 17b. B.chen stets $\pm$ gezähnt o. gesägt, vgl. 29. *cordata* (Fig. 188k–l) o. 32. *orientalis* o. 33. *graveolens* o. 34. *tangutica*.

B siehe S. 285. A. Stb. aufrecht zusammenschließend, Stbf. nur am Grunde kahl, sonst bis zur (hfg. deutlich vorgezogenen) Konnektivspitze beh., oberseits über dem Grunde mit Nektarium (vgl. erste Ann. unten).

*) Das Honig sezernierende Gewebe befindet sich oberseits über der Basis der Stbf. und ist mit Sicherheit nur am lebenden Material nachweisbar.

**) Ich habe hierbei die B. der nichtblühenden Zw. im Auge; an Bl.-Zw. sind sie sehr hfg. dreizählig o. gar einfach, wenn die der Hauptstengel gefiedert o. flammuliform zu sein pflegen.

Sekt. 1. *Viorna* sensu PRANTL*), in Engl. bot. Jahrb. IX, 258. 1888.
 L. o. aufrechte D. o. §. B. in allen Formen vorh., obs. Sp. fehl., P. in
 Kn. klappig o. eingefaltet, Bl. sich nie weit öffnend, P. – glockig zu-
 sammenneigend, röhrig o. krugfg., nur an der Spitze ± zurückgebogen.

I. Keine petaloiden Std.**) vorh., Bl. an diesjährigen Trieben.

II siehe S. 283.

Subsekt. a. *Crispae* PRANTL, l. c. – B. einfach o. gefiedert, zuw. flam., B. chen ganzrandig. Bl. einzeln, glockig o. krugfg.

Subsekt. b. siehe S. 281.

Fig. 183. *Clematis*: a–c *integrifolia*: a P., b Stb., c Fr. — d–f *fusca*: d Bl., e Stb., f Fr. — g–i *crispa*: g Bl., g¹ P., h Stb., i Fr. — k–m *viorna*: k Bl. im L.-Schn., l Stb., m Fr. — n–p *reticulata*: n Bl. im L.-Schn., o Stb., p Fr. — q–r¹ *coccinea*: q Bl., q¹ Stb., r Frkn., r¹ Fr. — s–s² *aethusaefolia* var. *violacea*: s Bl., s¹ Stb., s² Frkn. — t–t³ *buchanana*: t Teil des Blst., t¹ Stb., t² Frkn., t³ Fr. — u–u³ *alpina*: u–u¹ var. *occidentalis*: u Stb., u¹ Std.; v var. *sibirica*: Std. — w–w³ *campanulora*: w Bl., w¹ P., w² Stb., w³ Frkn. — x–x³ *songarica* var. *gebleviana*: x P., x¹ Stb., x² Frkn., x³ Fr. — y–y⁶ *paniculata*: y P., y¹ Stb. jung, y² Stb. alt, y³ Frkn., y^{4–5} Fr., y⁶ dgl. im L.-Schn. — z–z⁴ *apiifolia*: z P., z^{1–2} Stb., z³ Frkn., z⁴ Fr. (d, k–p, q nach LAVALLEE; t nach COLLETT, sonst Original)

*) Ich folge diesem Autor in der Hauptgruppierung.

**) Diese werden hfg. als C. und die P. als K. bezeichnet.

○ B. einfach, sitzend, Bl. einzeln, endständig.

1. *C. integrifolia**): aufrechte 2 o. 2, 0,3—1 m; Zw. scharf sechsrrippig, locker grau zottig beh., Bl. gelb o. rotbraun; B. (Fig. 184a) 4,5—10 (—11):1,8—5,5 (—6) cm, oben fast stets kahl, sattgrün, unten wenig heller, meist wenigstens auf den Nerven locker beh., Rand gewimpert; Bl. (Fig. 183a—c) violettblau o. weiß (*f. alba*), P. stark zugespitzt, am Grunde schmal, über der Mitte breiter geflügelt, Flügelsaum grauzottig, Gr. kürzer als Stb., Fr. ± stark beh.

C. i. L., Sp. pl. 544. 1753 (in den Gärten auch als *ovata*). — Einfachblättrige W. — I. G. nur OÖ. wiener Becken, S.-Mäh., Küstengebiet, Ungarn; sonst noch Pyren., SO.-Eur., S.-Rußl., Kl.-As., Kauk., Altai, Songarei. — Feuchte Wiesen u. dgl. Orte. — Blz. (V—)VI—VII—VIII. — Vgl. ferner die am Schlusse der *Crispa* genannten Hybriden.

○○ B. gefiedert o. flam., Bl. einzeln, achselständig.

* B. mit Endblättchen.

2. *C. crispa*: 2, Zw. sechsrrippig, kahl o. fast kahl, braunrot; B. (Fig. 184c) gefiedert bis flam., B. chen sehr variabel (vgl. *var.*), dünn, kahl o. leicht gewimpert o. unten verstr. beh., Hauptstiel bis 8 cm, kahl o. — beh., Bl.-Stiel dgl., Bl. (Fig. 183g—i) rosa o. violett, nach Orangen duftend, P. oft bis $\frac{1}{2}$ zurückgebogen o. ausgebreitet, in diesem Teile breit geflügelt, Stb. etwas kürzer als Gr., A. zuw. fast ohne Konnektivspitze, Gr. ganz o. nur am Grunde beh.

var. a. typica: B. vgl. Fig. 184c, B. chen bis 7:3,5 cm. — *b. walteri* GRAY, Syn. Fl. N.-Am. I, 1, 7. 1895 (*C. walteri* PURSH, Fl. II, 384. 1814); durch Übergänge mit *a* verbunden, B. vgl. Fig. 184d, B. chen bis 6:0,8 cm.

C. c. L., Sp. pl. 543. 1753. — Krausblütige W.; marsh c.; c. *crépue*. — N.-Am., *var. a.* von SO.-Virgin. bis Florida und Texas; *var. b.* von S.-Carolina bis Texas. — Besonders in feuchten Niederungen. — Blz. (V—)VI—IX. — Amerikanisches Gegenstück zu unserer *viticella*.

↔ B. ohne Endblättchen, diese als Wickelranke ausgebildet.

+ Gr. höchstens im unteren Teile beh.

3. *C. simsii*: eine noch nicht recht geklärte Art, von *crispa* noch abweichend durch die mehrrippigen Zw., die derbere Textur der B. chen und die mehr krugfg. Bl., deren P. nur an der Spitze zurückgebogen. Sie hält in vieler Hinsicht die Mitte zwischen *crispa* und *pitcheri*, ist aber 2—2 (2).

S. s. SWEET, Hort. Brit. 1. 1827. — N.-Am. (nach RYDBERG von S.-Indiana bis Nebraska und Texas). — (V—)VI—VIII.

++ Gr. durchaus beh.***)

Bl. achselständig, ihre Stiele stets mehrmals länger als Bl.

△△ siehe
S. 277.

*) Sehr nahe stehen dieser Art die amerikanischen *C. fremonti* S. WATS. und *C. can. bencei* AIT., beide sind 2 m, kommen hier nicht in Betracht, zumal die Letztere kaum in Eur. in Kultur ist. — Im H. d. D. D. G. wird auch *integrifolia* nicht geführt, sie ist aber als Stammart vieler Gartenhybriden für uns von Wichtigkeit.

**) Nach SMALL, dessen Flora southeast. States 1903 mir während des Druckes noch zu Gesicht kommt, weicht *simsii* von *viorna* besonders durch die dünnen P. und von *crispa* durch die derben B. ab. Das Fehlen o. Vorhandensein der Endblättchen erwähnt er nicht. — *C. pitcheri* TORR. et GRAY ist eine 2 des westl. N.-Am., deren Gr. nur im unteren Drittel beh. sind und die sich ferner durch die rötliche Blattextur von der in den Bl. sehr ähnlichen *viorna* unterscheidet.

***) SMALL, l. c. 438, führt die *C. o. Viorna gattengeri*, deren B. pubescent on both sides as well as glandular sein sollen. — Leaves on the banks of the Cumberland River, near Nashville).

= P. außen $\pm$ beh., stumpf gefärbt.

— B. chen dünnhäutig, ohne hervortretende Nervatur.

4. *C. viorna**): Φ , bis 4 m, Zw. 10—12-rippig, kahl o. $\pm$ verstr. beh., braunrot; B. gefiedert bis flam., Hauptstiel bis 10 cm; B. chen (Fig. 184e) beiders. grün, leicht herz-eifg. bis eilanzettlich, bis 7:4,2 cm, meist auf den Nerven $\pm$ verstr. beh., Bl. (Fig. 183k—m). Stiel 2—6 cm, $\pm$ beh., P. stumpf rot o. bräunlich-purpurn, außen locker fein beh., Stb. so lang wie Gr.

S. v. L., Sp. pl. 543. 1753. — Braunblütige W.; leather-flower; c. viorne. — N.-Am. (S.-Pennsylv. und Missouri bis Alabama). — Blz. V—VII. — Bekannteste Kulturart der krugblütigen Waldreben, an Schönheit von der allerdings empfindlicheren *coccinea* übertroffen.

— B. chen lederig-häutig, hervortretend netznervig.

5. *C. reticulata*: abweichend von *viorna* noch durch: B. chen (Fig. 184f) fast durchweg stumpfspitzig bis abgerundet, bis 5,5:4 cm; P. außen dichter feinfilzig, vgl. Fig. 183 n—p.

S. r. WALT., Fl. carol. 156. 1788. — Netznervige W.; c. reticulée. — N.-Am. S.-Carolina, Alabama, Florida, Texas). — An mehr trockenen Standorten als *viorna*. — Bei uns kaum echt in Kultur.

== P. außen kahl, lebhaft gefärbt.

6. *C. coccinea**) : Φ , bis 2 m, fast durchaus kahl, Zw. braunrot, zuw. leicht bereifend; B. (Fig. 184g), gefiedert bis flam., B. chen wie bei *reticulata* derb, aber nicht ganz so scharf geadert, $\pm$ bläul.-grün, bis 7:5,5 cm, Bl. (Fig. 183q—r²) hell karmin o. scharlachrot, Gr. an Spitze kahl.

C. c. ENGELM., in GRAY, Pl. wright, II, 7. 1853 (*texensis* BUCKL., in Proc. Acad. Philad. 1861, 148. — Scharlach-W.; — N.-Am. (Texas). — Steinige Hänge, im Halbschatten. — Blz. (VI—)VII—X. — Schöner Zier- Φ .

Bl. end- und achselständig, die Stiele der letzten kürzer als Bl.

7. *C. fusca*: $\varnothing$ Φ bis 4 m, Zw. vielrippig, braun. $\pm$ verstr. beh.; B. gefiedert o. subflam. Stiele $\pm$ beh., B. chen (Fig. 184b) kahl o. auf Nerven beh. und gewimpert, oben sattgrün, unten wenig heller, meist spitz eifg., doch Form variabel (vgl. *var.*); Bl. vgl. Fig. 183d—f bez. *var.*

*) SMALL, l. c. 438, stellt neben *viorna* noch drei neue Arten auf. Zwei davon weichen ab durch: leaflets simple and usually entire; von ihnen hat *C. obliqua* (*Viorna obliqua* SMALL, sepals over 2,5 cm long, leaflets glabrous; sie stammt aus Florida (on pine lands near St. Augustine). Die zweite Art, *C. (Viorna) draccula* SMALL, in BRITT., Manual 421. 1901, hat sepals less than 2,5 cm long, leaflets silky beneath und wächst in Tennessee und Kentucky (in thickets). Die dritte Art, *C. (Viorna) canophylla*, hat im Gegensatz zu *viorna* und den zwei anderen rundliche Fr. und untersetzt blauech überlaufene B. chen. Sie soll von Kentucky bis N.-Carol., Flor. und Ala. verbreitet sein, wo sie les in Flußtalern wächst. In die nähere Verwandtschaft von *C. viorna* gehört ferner die nicht kletternde, 0,3—1 m hohe, aber sträuchige *C. adnata* BRITT., vgl. Manual 422. 1901 und SMALL, l. c., die von Vng. bis N.-Carol. und Tennessee verbreitet ist und von der BRITTON eine Hybride mit *C. viorna* als *C. canophylla* führt. Wie diese Arten bedürfen wohl noch sehr der Beobachtung, denn SMALLS Speziesbegriff ist meist sehr eng und seine Auflösung von Gattungen, wie *Cherites*, in 4 Genera wird mir ganz und gar nicht gefallen.

**) SMALL, l. c., sagt von *C. coccinea* »peduncles simple: calyx over 2 cm long: sepals thick und steht gegenüber *C. (Viorna) versicolor* SMALL, in BRITT. Manual 421. 1901, mit peduncles terking, calyx less than 2 cm long: sepals thin; Miss., Arkansas (on dry rocky ledges).

Fig. 184. *Clematis*, B.-Formen: a *integrifolia* — b *fusca* var. *violacea*, c *d. crispata* var. *typica*, d var. *walteri* — e *florosa* — f *recta* — g *coccinea* — h *tubulosa* — i *stans* — k *daurica* — l *stans* var. *kousabotan*. (1/2 nat. Gr.) (Original).

var. a. typica: in allen Teilen, bes. Zw. und B.-Stiele, vor Allem aber P. außen dichter beh., Bl. infolge der bräunlichen Beh. braunviolett, B. z. T. subflam. b. *violacea* MAXIM., Primit. Fl. Amur. 11. 1859 (*C. lanthana* KOEHNE, Dendrol. 159. 1893) durchweg schwach beh., Bl. sattviolett, B. gefiedert (ob immer?). Nach MAXIM. durch deutl. Übergänge mit *a* verbunden.

S. f. TURCZ., in Bull. Soc. nat. Mosc. 1840, 60. — Violettbraune W.; c. à fleurs brunes. NO.-As. (vom Baikalsee bis Kamtschatka, Sachalin, Japan, Kurilen). — Wiesen, lichte Gebüsch. — VI—VIII. — Bisher nur *var. violacea* in Kultur.

Von Bastarden, an denen Arten der *Crispae* beteiligt, sind folgende zu nennen:

1×2 *C. integrifolia* × *crispa*: *C. cylindrica* SIMS, in Bot. Mag. XXIX, t. 1160. 1899. B. vgl. Fig. 191f f¹, aber in allen Übergängen von den einfachen der *integrifolia* bis zu den Formen der *crispa* auftretend, so daß je nach dem Vorrerrschen der einen o. anderen Stammart recht abweichende Formen entstehen können. Hieran schließt sich eng

1×15 *C. integrifolia* × *viticella**): wozu zu rechnen sind *C. hendersoni* ex K. KOCH, Dendrol. I. 434. 1869, *C. intermedia* BONAMY, ex KUNTZE Mon. 187. 1885 und *C. eriostemon* DCNE., in Rev. Hort. 1852. 341. Man wird sehr oft im Zweifel sein, ob man *crispa* o. *viticella* als 2te Stammart betrachten soll. Ich halte den Bastard mit der letzten für weitaus häufiger, denn alle Exemplare, die ich sah, besaßen in den Zw. Zwischenstränge, die den typischen *crispa* und *integrifolia* zu fehlen pflegen. Im Übrigen vgl. man die Unterschiede in den Bl. der drei Arten und schließe daraus auf den Ursprung des Bastardes. Sicherlich treten auch wiederum Hybriden dieser Bastarde mit *viticella* auf. In bestimmte Beschreibungsschemen lassen sich die Formen nicht hineinpressen.

1×4 *C. integrifolia* × *vorna*, *C. dracicata* JACQ., Ecl. pl. t. 33. 1811 16, nach KUNTZE. Ich habe diese Hybride nirgends in Kultur getunden und auch keine Herbar-Expl. gesehen.

(1×15)×17 *C. hendersoni* (*integrifolia* × *viticella*) × *lanuginosa*: *C. jackmani* JACKM., in L'illustr. hort. 1864. Die bekannte großblütige, tief blauviolette *jackmani* ist nach Angabe des Züchters aus dieser Kreuzung entstanden. Mit ihr so gut wie identisch ist die *viticella* × *lanuginosa* = *splendida*, welche von der Firma SIMON-LOUIS gezüchtet und bereits 1863 dem Handel übergeben wurde**). Später ließen die Züchter der so ähnlichen *jackmani* wegen ihren Namen fallen.

1×17 *C. integrifolia* × *lanuginosa*: *C. durandi* DURAND ex KUNTZE (*C. integrifolia* *sempervirens* HORT.). Weicht von *lanuginosa* ab durch: B. einfach, Bl. meist vierzählig, ihre Stiele länger als P.; von *integrifolia* durch: untere B. lang gestielt, groß (bis 11:8 cm), Bl. bis 12 cm Dm. Farbe der Bl. hell- o. blauviolett.

1×21 *C. integrifolia* × *flammaria*: *C. aromatica* LEXNÉ et KOCH, App. ind. sem. ht Berol. 1855. 15. Aufrechter, nicht schlingender h; B. einfach bis gefiedert (nicht flam.), Blst. vielblütig, Bl. violett, wohlriechend.

3×15 *C. crispa* × *viticella*: diese vermutlich vorkommende Hybride zitiert KOEHNE 1893 ohne weitere Angabe. Sicher nachgewiesen scheint sie bis jetzt nicht.

6×([1×15×17]) *C. coccinea* × *jackmani* (in der Kulturform „Star of India“): *C. pseudococcinea* C. K. SCHNEIDER, in Wien. Illustr. Gartenztg. 1904. 15. Tracht der *coccinea*, Zw. braunrot, verstr. beh. o. kahl, mit Zwischensträngen erster Ordnung, B. (an Bl.-Zw.) einfach gefiedert, mit End.-Bchen, Bchen ganzrandig, eilauglich, stumpfspitzig, mit Stachelspitzchen, 2,5–5:1,5–3 cm, oben sattgrün, unten heller, verstr. beh., gleich den im Mittel 1 cm langen Stielchen und 5 cm langen Hauptstielen, Bl. an mit 2 einfachen kurzgestielten Bchen besetzten Seitentrieben einzeln, 4–8 cm lang gestielt, P. röhrig-glockig zusammenneigend, aber von Grund aus getrennt, leuchtend rosa o. satt karmin, außen fast kahl, bei der Sorte „grace darling“ nur 2–2,5 cm, bei „Duchess of Albany“ 5 cm lang, von Grund aus geflügelt, Flügel im obersten Drittel am breitesten (3 bez. 5 mm), Spitze sehr fein, Stb.

*) KUNTZE sagt über die Hybriden von *C. integrifolia*, daß sie in der Regel eine Eigenschaft besitzen, die sonst unbekannt ist und sich bei fiederteiligen Abarten einfachblättriger Arten nicht findet: es teilt sich meist bloß eine Anzahl der B. und von diesen die meisten unvollkommen, indem die Teilstücke unregelmäßig breit auf dem Mittelnerv sitzen o. oft gar nicht gegst. sind. Nur bei größeren Expl. teilen sich auch einzelne B. vollständig zu gefiederten B.; dann aber sind gar nicht selten die untersten zwei Bchen eines B. sitzend, während die oberen Bchen lang gestielt sind.

**) Diese Angaben nach mündlichen Mitteilungen des Herrn E. JOUIN, Direktor der Ziergeholzabteilung der Firma SIMON-LOUIS FRÈRES in Plantières.

wie bei *coccinea*, die nur ganz an der Spitze kahlen Gr. ein Wenig überragend, nur reichlich $\frac{1}{3}$ so lang wie P., Fr.?

Fig. 185. *Clematis*: a—c *tubulosa*: a Bl., b dgl. im L.Schn., b¹ Stb., b² Frkn., c Frst. — d—f *davidiana*: d Teil des Blst., e Stb., e¹ Frkn. im L.Schn. — f—g *davidiana*: f Teil des Blst., g Stb. — h—i¹ *stans*: h Teil des Blst., i Stb., i² Frkn. — k—k² *integrifolia*: k P., k¹ Stb., k² Frkn., k³ Fr. — l—l² *integrifolia*: l Bl., l¹ P., l² Stb., l³ Frkn. — m—m² *integrifolia*: m Bl. von oben, m¹ Stb., m² Stb., m³ Frkn., m⁴ Fr. — n—p¹ *integrifolia*: n Bl.-Kn., n¹ P., n² Stb. rechts jung, links alt., n³ Stb., p Frkn., p¹ Fr. — q—q² *integrifolia*: q P., q¹ Stb., q² Frkn. — r—r² *integrifolia*: r Bl., r¹ Stb., r² Frkn., r³ Fr. — s—s² *orientalis*: s P., s¹ Stb., s² Frkn., s³ Fr. — t—t² *integrifolia*: t Bl., t¹ P., t² P.-Spitze, t³ Stb. jung, t⁴ Stb. alt., t⁵ Frkn. — u—u² *integrifolia*: u Bl., u¹ P., u² Stb., u³ Frkn. — v—v² *integrifolia*: v Bl., v¹ P., v² Stb., v³ Frkn. — w nach ANDRÉ, sonst Original).

Subsekt. b. *Tubulosae* *) DECNE., in Nouv. Arch. Mus. Paris, sér. 2, IV, 203. 1881. 2- $\varnothing$, kaum Φ , Zw. stets mit Zwischensträngen erster und zweiter Ordnung, B. dreizählig, B.chen scharf und grob gesägt o. gezähnt, Bl. in B.-Achseln gebüschelt o. in die B. überragenden Blst. (Dichasien o. Dichasientrauben), röhrig (hyazinthenähnlich).

Subsekt c
siehe S. 283.

○ Bl. hell o. satt violettrot o. indigoblau, nicht weißlich, meist in B.-Achseln büschelig gedrängt, P. außen $\pm$ locker beh.

• Bl. hell indigoblau, duftend, hfg. sitzend; B.chen grob ungleich und kurzlappig gezähnt, ihre Basis stets $\pm$ keilig.

8. *C. davidiana*: 2- $\varnothing$, aufrecht, bis 1 m, Zw. $\pm$ beh., gelbgrün o. bräunlich, vielrippig; B. Fig. 184k) auf gleich den Zw. beh., am Grunde violett überlaufenen Stielen, B.chen der unteren B. bis 13:10 cm, meist beiders. auf den Nerven $\pm$ beh., zieml. derb, oben tiefgrün, unten heller, Adern oben eingesenkt, unten zieml. scharf hervortretend; Bl. vgl. Fig. 185f—g, dioec., Stb. kahl o. mit wenigen Haaren unter den langen A.

C. d. DCNE., apud VERLOT in Rev. Hort. 1867. 90. — N.-China. — Blz. VII—IX. — Vielleicht die schönste Art der Gruppe!

• Bl. hell o. satt violettrot, geruchlos, B.chen leicht gezähnt, wenigstens Basis der End-B.chen $\pm$ breit-rundlich.

9. *C. tubulosa*: $\varnothing$, aufrecht, bis 1 m; Zw. $\pm$ verstr. beh., braunrot, vielrippig, z. T. $\pm$ violett überlaufen, z. T. auch grau; B. (Fig. 184h) in Beh. analog *davidiana*, End-B.chen der unteren B. bis 14:12 cm; Bl. vgl. Fig. 185a—c, o. monoec., tiefviolett o. heller (*var. hookeri*), bei letzter treten meist Blst. analog *lavalleyi* auf. Stbf. kahl, etwa so lang wie A.

C. t. TURCZ., in Bull. Soc. nat. Mosc. XI, 141. 1839 (*hookeri* DCNE., in Nouv. Arch. Mus. Paris, 2. sér., IV, 206. 1881). — Röhrenblütige W.; c. tubuleuse. — Zentral- und N.-China. (VII—VIII—IX. — Verholzt wie alle diese Arten wenig, doch erhalten alte Pfl. ein bis etwa 30 cm hohes, knorrig verästeltes Stammchen; *C. tubulosa* ist jetzt hfg. als Herbstblüherin angepflanzt und als solche recht wertvoll.

○○ Bl. weißlich o. weißgrau, außen zieml. dicht fein beh., Blst. zuw. bis 60 cm hoch entwickelt, zuw. auch zu Büscheln in den B.-Achseln reduziert.

10. *C. stans*: $\varnothing$, aufrecht o. zuw. Φ , bis 2 m; Zw. meist stärker grauweißl. beh. als bei den vorigen Arten, sonst wie diese; B. vgl. Fig. 184i, Form und Zähnung wechselnd, dgl. Beh., End-B.chen der hfg. bis 14 cm lang gestielten unteren B. in Form nicht selten wie bei *tubulosa*, nur Zähnung stets anders; sonst vgl. *var.***).

var. a typica: Bl. klein, 10—14 mm lang, dioec. — *b. kousabotan* *) (C. DCNE., l. c. 208); Bl. monoec., 10—17 mm lang, B. vgl. Fig. 184j — *c. lavalleyi*

*) Die für uns in Betracht kommenden Arten dieser Gruppe werden hfg. als Formen unter dem Namen *heracleifolia* DC. vereinigt. Obgleich nun die einzelnen Spezies noch nicht scharf abgegrenzt und in ihrem Werte geklärt sind, so scheint mir doch die Annahme einer Art unhaltbar. Ich lasse deshalb, wie es auch schon DECAISNE getan, den Namen *heracleifolia* fallen.

**) Auf Grund des mir vorliegenden Materials vermag ich die japanischen *Tidm* nicht in gute Arten zu trennen, da wohl extrem kleimblütige *stans*-Formen von *lavalleyi* sehr abweichen, aber alle Übergänge gegeben scheinen.

**) Diese beiden Varietäten gehören eng zusammen, da sie nach LAVALLÉE stets Beide aus den S. Beider fallen! Ob *kousabotan* = *stans* $\times$ *lavalleyi*?

Fig. 186. *Clematis*-B.: a *buchaniana* (Kintleil eines B.) b b' *aethusaefolia*: b var. *latisecta*, b' var. *typica* c *alpina* var. *occidentalis* d *con-*
garia var. *geblennia* e *apifolia* f *virginiana* — g *montana* h *italica* var. *normalis* i *grata*: ein B. oben k - k' *cordata* var.
typica - l *cordata* var. *ligusticaefolia* — m *mendocina*: ein B. oben (alles 1/2 nat. Gr.) (g nach LAVALLÉE, sonst Original).

(S. *var.* DCNE., l. c. 209): Bl. monoec., wohlriechend, 15—18 mm lang. Die mir nur aus DECAISNES Beschreibung bekannte *C. saratieri* DCNE. scheint lediglich eine auf den B.-Unterseiten dicht weichhaarige, hierher gehörige Form darzustellen.

Im Anschluß an die *Tubulosae* ist ein interessanter Bastard zu erwähnen, der sich als *C. grata* in den Gärten verbreitet hat.

8×26 *C. davidiana* × *vitalba*: *C. jouiniana* C. K. SCHNEIDER, in Wien, ill. Gartztg. 1904. 17. Bl. anfangs gelblichweiß, zuletzt zart bläulich überlaufen, vgl. Fig. 1851¹—1⁴, in den Blst., der Beh. der P., dem Gr. an *vitalba* gemahnend, in dem kaum schlingenden Wuchs, den Behen der dreizähligen o. gefiederten B., der Form der Bl.-Kn. und P. auf eine Art der *Tubulosae* deutend, von denen mir *davidiana* am wahrscheinlichsten dünkt. Blz. VIII—X.

Subsekt. c. *Connatae** KOEHNE, Dendrol. 158. 1893, erweitert. §. Zw. hfg. nur mit Zwischensträngen erster Ordnung. B. gefiedert o. flam., B.chen gesägt o. gezähnt: Blst. 1—3 o. mehrblütig, achselständig. Bl. + röhrig-geschlossen. P. nicht immer an der Spitze zurückgebogen, gelblichgrün.

C B. gefiedert, B.chen im Mittel etwa 5 cm lang, Blst. 8- bis mehrblütig.

11. *C. buchaniana*: Zw. ± braungelb o. grau, ± beh.; B. vgl. Fig. 186a, B.chen breit-herzeifg., End.-B.chen bis 11:8 cm, oben satt-, unten graugrün, meist beiders. ± beh.; Bl. vgl. Fig. 183t—t³, P. beiders. beh.

C. b. DC., Syst. I, 140. 1818. — Gemäßigt. Himalaya, 1600—3000 m. — Blz. (VIII—IX—XI. Dürfte für die Klimaprovinzen IV—V passen, leichte Decke sicher im Winter ratsam.

CC B. flam. o. subflam., B.chen im Mittel 1 cm lang o. viel kleiner, Blst. 1—3-blütig.

12. *C. aethusaefolia*: Zw. dünn, olivgrün o. bräunlich; B. beiders. beh., vgl. *var.*; Bl. vgl. Fig. 183s—s², P. am Rande filzig, auf Fläche ± kahl, nickend.

var. a. typica: B. wie Fig. 186b¹, Bl.-Stiele 5—8 cm lang. — *b. latisecta* MAXIM., Prim. Fl. amur. 12. 1859 (*C. latisecta* PRANTL, in ENGL. Bot. Jahrb. IX, 258. 1888). B.chen breiter, vgl. Fig. 186b, Bl.-Stiele 3—4 cm lang. Nach MAXIM. kommen zwischen *a* und *b* deutliche Mittelformen vor, so daß ich vor der Hand *b* nicht als eigene Art führe.

C. a. TURCZ., in Bull. Soc. Mosc. V, 181. 1832. — Gleißblättrige W. Mongolei, Mandchurei. — Sonnige Fels-hänge. VIII—IX. — Bisher nur *var. latisecta* in Kultur, eine reizende Zier-Pfl., die im Gebiet fast ganz hart sein dürfte.

II. Petaloide Std. vorh., Bl. am alten Holze.

Subsekt. d. *Atrageneae**) PRANTL, l. c. 258 (*Atragene* L., Sp. pl. 542. 1753). §. Zw. rundl. o. 6-rippig, ohne Zwischenstränge, be-

*) Die von KOEHNE einzig hierher gestellte *C. connata* DC., Prodr. I. 4. 1824, ist noch nicht in Kultur. Sie steht *buchaniana* sehr nahe, weicht in der Hauptsache ab. durch fast völlige Kahlheit der Zw. und B., mehr eilanzettliche Behen, die länger zugespitzt sind, sowie durch die oft (nicht stets) kahmartig verwachsenen gegst. B.-Stückchen. Beide Arten scheinen formenreich und noch keineswegs genügend aufgeklärt.

*) Die im H. d. D. D. G. angeführte, hierhergehörige, aber Std. nicht besitzende *C. rebotant* AITCH. et HEMSLE., in Jour. Lin. Soc. 1880. 29, mit gelben Bl. ist nicht in Kultur. Ihre Einführung erscheint jedoch sehr wünschenswert. Auch die durch stets dreizählige B. von *alpina* und *var.* ausgezeichnete, nicht mit *occidentalis* identische *var. tatarica* DC., Syst. I. 166. 1818, ist meines Wissens aus N.-Am. noch nicht importiert. Von der durch dreizählige B. ausgezeichneten europ. Form der *alpina*, die als *tender thym*

schuppte. Kn. vorh.: B. biternat o. flam., B. chen meist grob gezähnt; Bl. einzeln, P. 4–6.

⊂ B. biternat, selten dreizählig o. flam., Std. weiß, so lang wie Stb.

13. *C. alpina*: §, bis 3 m, Zw. rotbraun, B. vgl. Fig. 187 g, dünnhäutig, gewöhnlich gleich Stiel — verstr. beh., oben dunkler, unten heller grün, meist ei- o. längl. lanzettlich, Serratur wechselnd, B. chen 2–7:0.8–4.5 im Mittel; Bl. vgl. Fig. 187 g–n und var., P. 2–6 cm lang.

Fig. 187. a–f *Clematis viticella*: a typisches B.; b Blst. und Bl.; c Stb. von vorn; d Frkn. mit Gr.; e reifer Frst.; f einzelne Fr. — g–n *C. alpina*: g beblätterter Zw. mit Bl.; h, verschiedene Std.; i Stb. von vorn; j Frkn. und Gr.; m Frst.; n reife Fr. (nach HEMPEL et WILHELM).

var. a. *normalis* KUNTZE, Mon. 161. 1885. Bl. blauviolett, Std. ringsum beh., ∞, Form wie Fig. 187 h–i, meist ohne rudim. A. — b. *occidentalis* GRAY, in POWELL, Geol. Surv. Rep. Dakota 1880, 531. Bl-Farbe wie bei a, Std. wenige und fast stets mit rudim. A., B. chen zuw. fast ganzrandig. — c. *sibirica* KUNTZE, L. c. 162. Bl. gelblichweiß, Std. wie bei a, aber fast stets nur gegen die Basis mit wenigen Haaren.

C. a. MILLER, Gard. Diet. ed. VIII, No. 9. 1768 (*Atragene alp.* L., Sp. pl. 542. 1753; *A. sibirica* L., Sp. pl. 543. 1753; *C. sib.* MILL., Gard. Diet. ed. VIII,

STEUD. Nomencl. 1. 380. 1840 *Atrag. alp.* SCHLED., in Linnæa 1837. 560) geht, sich bisher keine Exemplare. Sie scheint mir sehr zweifelhaft! Die im H. d. D. D. G. zu *viticella* gestellte, von PRANTL zu den *Atrageneae* gezählte *C. japonica* THBG., Fl. jap. 240, 1784, ist mir unbekannt und nicht in Kultur.

No 12. 1768; *A. occidentalis* HORNEM., Hort. Hafn. 1813, 520). — Alpen-W.; c. des Alpes. — I. G. nur *var. a.* im Alpengebiet und Karp., sowie Pyren. und Lappl.; *var. b.* in N.-Am. (Rocky mount.), New Mexiko bis Dakota und Washington; *var. c.* N.-As. (Gebirge vom Ural bis O.-Sib.). — Blz. V—VII—VIII. — Hübscher Zier- ϕ .

CC B. meist flam., Std. gleich den P. violett, diesen fast gleich lang!

14. *C. macropetala*: diese schöne, noch nicht in Kultur befindliche Art weicht durch die großen spitzen Std. ab.

C. m. LEDEB., Ic. pl. Fl. ross. I, 5, t. 11. 1829. — Dahurien, China (Chili).

B. Stb. · lose abstehend, Stbf. ganz kahl o. nur unter den A. mit C siehe S 288 einigen Haaren, A. meist ohne Konnektivspitze, Nektariumgewebe fehl., P. in Kn. eingefaltet, von Grund aus (breit) gesäumt.

Sekt. 2. *Viticella* sensu PRANTL, l. c. 259. — $\S$, nur starke Zw. mit Zwischensträngen, B. in allen Formen vorh., obs. Sp. fehl., P. später ausgebreitet o. breitglockig abstehend, verschieden gefärbt.

Subsekt. a. *Euviticellae* PRANTL, l. c. Bl. nicht ganz flach Subsekt. 1
offen, $\pm$ breitglockig, P. 4, 0,5 4, selten bis 6 cm lang, Stbf. unter siehe S 286
den A. mit einigen Wimperhaaren.

O P. 2—4(—6) cm lang, Gr. kahl*).

15. *C. viticella*: $\S$, bis über 3,5 m; Zw. · rotbr. und meist · verstr. beh., B. (Fig. 187a) gefiedert o. flam., B. chen ganzrandig o. mit vereinzelt Lappenzähnen, breit ellipt. bis schmal eilanzettlich, 1—2,5 6:0,6 1,5—2 cm, meist nur jung verstr. beh., Hauptstiel bis 5 cm; Bl. vgl. Fig. 187a f, einzeln end- o. achselständig o. in 3-blütigen Dichasien, meist leicht nickend, A. im Mittel den Stbf. gleichlang, Konnektivspitze $\pm$ fehl.

var. a. normalis O. KTZE., Mon. 136. 1885. Hoher $\S$, hierher: *f. villosa* K. KOCH, ex KTZE., l. c. B. unten $\pm$ weich beh. — *f. gigantiflora* O. KTZE., l. c. P. bis 4:4 cm, violett. — *f. maxima* O. KTZE., l. c. P. bis 6:3 cm, rosa. — *f. albiflora* O. KTZE., l. c. 137. P. weiß. — *f. pulchella* O. KTZE., l. c. (*C. p.* PERSSON, Syn II, 99 1807: Bl. gefüllt) — *b. nana* CARRIÈRE, in Rev. hort Zwetziger ϕ .

C. v. L., Sp. pl. 543. 1753. — Blaue W.; c. viticelle. — I. G. nur OU. Küstenland und Herzegow.; sonst von Ib. Halb durch Ital., SO.-Eur., Or bis Kauk — Liebt lichte Gebüsch. — Blz. VI—VIII(—X). — Schöner, fast ganz harter $\S$.

OO P. 0,5—1,5 cm lang, Gr. bis $\frac{2}{3}$ beh.

16. *C. campaniflora*: $\S$ in der Tracht einer schwachwüchsigen, in allen Teilen zierlicheren *viticella*, B. gefiedert bis flam., kahl o. verstr. beh. ·; Blst. wie bei *viticella*, Bl. vgl. Fig. 183w—wz: blau violett, rosa o. weißlich, nicht so lebhaft wie bei *viticella*, A. kürzer als Gr.

C. c. BROT., Fl. lus. II, 359. 1804 (*C. viticella var. camp.* WILLK. et LGE., Prodr fl. hisp. III, 954. 1880). — Spanische W.; c. campaniflora Ib Halbinsel — Blz. VII—IX. — Viel unscheinbarer als *viticella*.

*) KUNTZE führt auch eine *var. pilostylis*, also mit beh. Gr. Ich bezweifle deren Vorkommen, zumal KUNTZE z. T. N.-Am. als Heimat angibt, also nur *C. p.* meinen kann, die er nicht scharf scheidet. Vgl. auch den Bastard 15X16.

** Die stark beh., nicht in Kultur befindliche *C. andrea* HUTER scheint nach mir vorliegenden Originaten eine gute Art dieser Gruppe zu repräsentieren, die jedoch noch der Untersuchung bedarf. Der Name mußte übrigens geändert werden, da bereits 1873 BORKH., Handb. Forstb. II, 1199, ihn für eine *vitalba* verwendet hat.

Von Bastarden der *Euviticellae* seien genannt:

15×16 *C. viticella* × *campaniflora*: als solche betrachte ich *C. revoluta* DESF., Hort. Par. ex Kuntze, l. c. und *C. parviflora* DC., Plant. rar. Genève 43, t. 12. 1826. Bald sind die Bl. ihrer Größe nach zu *viticella* zu rechnen, zeigen aber am Grunde beh. Gr., bald sind die P. kaum 12–15 mm lang, aber Gr. kahl. Man behalte aber im Auge, daß beide Stammarten sehr variieren und eine üppige großblütige Kulturpfl. von *campaniflora* (vgl. LAVALLEE, t. VIII) stark an *viticella* erinnert.

15×17 *C. viticella* × *lanuginosa*: vgl. das über *C. jackmani* S. 279 Gesagte. Man wird sonst hierher diejenigen großblumigen Gartenformen stellen, die z. T. einfache oder dreizählige, unten + stark beh. B. haben und in den Bl. an *lanuginosa* (siehe diese) gemahnen.

15×18 *C. viticella* × *florida*: also solche wäre *venosa**) KRAMPEN, in Rev. hort. 1860, 183, zu deuten (*florida* var. *venosa* LAV., Les élém. à grandes fleurs 1884). Charakteristisch ist für diese Hybriden, die, wie KUNTZE schon betont, von echter *florida* oft nur schwer zu scheiden, die verkehrt-eifg. Gestalt der P., die bei *florida* unter o. in, nie über der Mitte am breitesten sind.

15×19 *C. viticella* × *patens*: als solche führt KOEHNE *C. guascoi* LEMAIRE, in Illustr. Hort. 1857, t. 117. Ich kenne sie nur aus dieser Abbildung.

15×21 *C. viticella* × *flammula*: *C. violacea* A. DC., in Mém. soc. phys. et d'hist. nat. Genève XI, 67. 1810. Ich besitze nur ein fast verbluhtes Expl. aus Plantières, das ich als *rubiginosa* empfang. Von *viticella* weicht sie ab durch: Blst. mehr- bis vielbl., P. 1–1,5 cm lang, blaßviolett o. nur violett gerandet; sie erinnert, wie schon KUNTZE hervorhebt, an *campaniflora*, hat aber reichblütigere Blst., offenere Bl. und überdies hfg. 6 P.

Subsekt. b. *Floridac***) PRANTL, l. c. — Bl. flach offen, P. (4–) 6–10 cm lang, Stbf. kahl o. unter A. auf Rücken beh.

○ Bl.-Stiele kürzer als P., B. einfach o. dreizählig.

17. *C. lanuginosa*: ‡, bis 3 m. B. vgl. Fig. 188a. unten meist stärker beh. als bei den folgenden Arten, aber selten durchaus weichhaarig. B. chen im Mittel 7–12:3,5–8 cm, Textur derb; Bl. seitenständig, vgl. Fig. 188a–c, zuw. gefüllt, P. in Größe und Farbe wechselnd. innen kahl, außen im Mittelfeld + verstr. beh., daneben zwei dichter beh. Streifen. Randsaum kahl; Stbf. kahl, A. + kürzer als Stbf., Gr. und Fr.-Schweife beh.

C. l. LDL., in PAXT. Flow. Gard. III, 107, t. 94. 1853. — Weichbehaarte W.; c. laineuse. — N.-China. — Blz. (VI–)VII–IX. — Gleich den folgenden Zwei in O.-As. seit Langem in Kultur und in den typischen wilden Formen noch nicht recht geklärt.

○○ Bl.-Stiele länger als P., B. vorwiegend gefiedert, biternat o. flam. ÷ B. biternat o. flam., selten 3-zählig. B. chen mittelgroß, im Mittel 3,5–1,8 cm.

18. *C. florida*: ‡, bis 2 m; B. vgl. Fig. 188d, B. chen + verstr. beh. bis fast kahl. Textur + häutig; Bl. vgl. Fig. ***) 188d–f¹, seiten-

*) Übrigens hat bereits 1839 Royle, Illustr. 51, eine *C. venosa* beschrieben!

**) Die im H. d. D. D. G. erwähnten *C. fortunei* MOORE, in Gard. Chron. 1863, 400, und *hakonensis* FRANCH. et SAV., Enum. Pl. jap. II, 263 1870, sind wohl japanische Kulturrassen, von denen die erste nur gefällt bekannt. Ich kenne sie nur aus der Literatur. Sie dürften höchstens in England in Kultur und bei uns ziemlich empfindlich sein.

*** In Kultur wohl nur gefüllt. Die „wilde Form“ scheint noch ungeklärt. KOEHNE gibt die Gr. als kahl an. Er war so lebenswürdig, mir die *Clematis* seines reichen Herbars zur Durchsicht zu senden, wofür ich ihm auch an dieser Stelle danke. Ich fand darunter ein einziges einfach blühendes Expl. als *florida*, dessen kahle Gr. die Stbf. überragte. Da dies Expl. von einer europäischen Kulturpfl. stammte, so kann ich es nicht für typisch halten. Meine Angaben basieren auf einem japanischen Expl. aus dem Herbar des wiener Hofmuseums. Ob dieses allerdings spontan, ist die Frage. KUNTZE, der 17–19 als eine Art, *C. florida*, auffaßt, worin ich ihm mit PRANTL und KOEHNE

ständig. P. beh. wie bei *lanuginosa*. Gr. über Mitte kahl. kürzer als Stb., A. kürzer als Stbf.

C. f. THBG., Fl. jap. 240. 1784 (*anemonoides* HOUTT., Pflz. syst. VII, t. 55, fig. 1 anno?; *sieboldi* DON, in SWEET Brit. Fl. II, t. 396. 1823 29). — Reichblütige W.; c. à grandes fleurs. — Japan. — VII—IX. — Wie 17.

✱✱ B. dreizählig o. gefiedert, B. chen groß. im Mittel 7—10:3,5 cm.

Fig. 188. *Clematis*: a—c *lanuginosa*: a Bl., b Stb., c Frkn. d—f¹ *florida*: d (1/2) Bl. und B., e Stb., f Frkn., f¹ Fr. — g—k *patens*: g (1/2) Bl. und B., h Stb., i Frkn., k Fr. — l—p *montana*: l Bl., m P., n Stb., o Frkn., p Fr. (a n. BOT. MAG., d—e, f¹, g—k, l, n—o n. LAVALLÉE, sonst n. d. Nat.).

nicht folgen kann, sagt: „caudae carpellorum albo-rarius ochraceo-barbatae, longe barbatae vel superne glabrae“. THUNBERG gibt in seiner Orig.-Diagnose nur an: „stamina . . . corolla dimidio breviora“.

19. *C. patens*: §, bis 2 m; B. vgl. Fig. 188g, B. chen breiter o. schmaler eilanzettlich, unten $\perp$ verstr. beh.; Bl. endständig, vgl. Fig. 188g—k, P. aber oft sich deckend, ihre Beh. wie bei vorigen: Stb. kahl, A. $\pm$ kürzer als Stbf., Gr. und Fr.-Schweife beh.

C. p. MORR. et DCNE., in Bull. Ac. Brux. III, 173. 1836 (*coerulea* LDB., in Bot. Reg. X t. 1955. 1837). — Offenblütige W.; c. à fleurs étalées. — Japan. — Blz. etc. wie 18, bez. 17.

Bastarde dieser drei Arten untereinander kommen gewiß vor. Besondere Formen lassen sich kaum beschreiben.

C. Stb. wie bei B., Stbf. kahl o. unter den A. bis zum Grunde beh. und dieser hfg. $\cdot$ verbreitert, P. in Kn. klappig o. eingefaltet, dann nur gegen Spitze $\pm$ gesäumt.

Sekt. 3. *Flammula* sensu PRANTL, l. c. — $\wp$ §, Zw. mit Zwischensträngen, alle B.-Formen vorh., obs. Sp. zuw. vorh.; Bl. breit offen, weiß o. gelblich bis sattgelb.

II. siehe S 292.

I. Stbf. kahl.

Subsekt. b
siehe S 290

Subsekt. a. *Rectac* *) PRANTL, l. c. — Blst. mehr- bis vielblütig, am jungen Holze, Bl. stets $\cdot$, Stbf. anfangs wenig länger als A., P. meist nur am Rande beh., wenn auch auf einer o. beiden Flächen, dann entweder B. einfach o. Bl. mit Stb. in mehreren Reihen.

○ B. sitzend, einfach, obs. Sp. so viele wie unterseitige.

20. *C. songarica*: $\wp$ $\cdot$ b, aufrecht, Zw. $\cdot$ gelbgrau, kahl, $\cdot$ rundl.; B. vgl. var.; Bl. vgl. Fig. 183x—x³, in achselständigen reichblütigen Blst., P. stumpfspitzig o. abgestutzt, außen beh., innen kahl, gelblich.

var. a. *integrifolia* TRAUTV., Enum. pl. Schrenk. no. 2. 1864/68. B. dicklich, starr und bläul. o. graugrün ganzrandig o. nur am Grunde $\cdot$ gezähnt, lineal-lanzettlich. — b. *gebleriana* O. KTZE., Mon. 112. 1885 (*C. geb.* BONGARD, in Bull. Sc. Ac. Pétersbg. 1841. 338; *song.* var. *serratifolia* TRAUTV., l. c.): B. mehr häutig und grüner, $\pm$ fein lappig doppelt o. einfach gesägt, vgl. Fig. 186d, bis etwa 10:4 cm.

C. s. BUNGE, Ind. sem. ht. Dorp. 1839. — Songarei-W. — Turkest., Mongolei, S.-Sib. — Wüstengebiete, steinige Hänge. — VIII—X. — Nur var. *gebleriana* vereinzelt in Kultur und hier den charakteristischen wilden Habitus einbüßend. Wohl nur für geschützte sonnig-warme Lagen!

○○ B. gestielt, dreizählig, gefiedert o. flam.

* * siehe
S 290.

* B. meist flam. o. gefiedert.

+ B. meist flam., wenn vorwiegend gefiedert, dann mit vereinzelt obs. Sp., Fr. wie Fig. 189e.

$\triangle$ B. flam. o. biflam., obs. Sp. fehl.

21. *C. flammula*: §, bis 4 m, Zw. kahl; B. vgl. Fig. 189a, B. chen von sehr wechselnder Form, im Mittel nicht über 4:2 cm, meist deutlich kleiner, in der Hauptsache spitz eilanzettlich, selten $\cdot$ rundlich, zuw. $\cdot$ lineal-lanzettlich; Blst. vgl. Fig. 189b, Bl. bis 2,5 cm Dm., weiß o. leicht gelblich, nach Mandeln duftend, P. vorwiegend stumpfspitzig, nur am Rande beh., Fr. rundl.-dreieckig.

*) Die hie und da kultivierten *C. angustifolia* JACQ. und *maritima* L. sind 24 und im H. d. D. D. G. mit Recht nicht erwähnt, ebenso natürlich *recta* L.

var. *a. typica*: B.chen wie Fig. 189 a. — *b. caespitosa* RCHB., Ic. Fl. Germ. IV. 19. t. 63 γ 1840 (*C. caespitosa* SCOP., Fl. carn. ed. 2, I, 389. 1772): B.chen kleiner, mehr eingeschnitten gelappt*).

C. fl. L., Sp. pl. 544. 1753 (*suaveolens* SALISB., Prodr. 371. 1796). — Blasenziehende W.; c. flammule; c. brûlante. — Durchs ganze Medit., S. Rußl., Or. bis Pers. — Blz. VII—X. — Bedarf im N. einer Winterdecke.

B. gefiedert o. flam., obs. Sp. vereinzelt (bes. längs der Nerven!)

21a. *C. fragans*: wie *flammula*, doch in vieler Hinsicht stark an *paniculata* gemahnend, ihre B.chen sind $\pm$ rundlich bis stumpfspitzig, im Mittel kleiner als bei letzter und Fr. stets wie bei *flammula***).

C. f. TENORE, Fl. napol. 308, t. 48. 1811/15 (*flammula* var. *rotundifolia* DC., Syst. nat. I, 134. 1818). — Duftende W. — Medit. mit *flammula*. — Ob echt in Kultur? Jedenfalls empfindlicher als 21.

++ B. gefiedert, obs. Sp. fehl.

22. *C. paniculata*: Tracht wie *flammula*, B.chen 5—7, meist ganzrandig, Grund $\pm$ herzfg. bis keilig, meist sehr bald ganz kahl, 1,5—3—7(—8):1—2—3(—4) cm, $\pm$ derbhäutig; Blst. zuw. wenigblütig, Bl. vgl. Fig. 183

Fig. 189. *Clematis flammula*: a typisches B.; b Blst.; c Stb. von vorn; d Frkn. und Gr.; e reife Fr. (nach HEMPEL et WILHELM).

γ γ' , bis 3 cm Dm., weiß. — wohlriechend. P. sonst wie 21. Stb. etwa 40, Gr. 4—8, Fr. braunrot, beidendig spitz!

C. p. THBG., in Trans. Lin. Soc. 1794. 337. — Rispige W.; c. paniculée. — Jap., Mandschurei, Korea**). — Sonst wie 21.

*) KUNTZE var. *tricomposita*, mit biflam. B., deren B.chen ganzrandig und $\pm$ lineal sind, durfte nicht in Kultur sein.

**) Nach KUNTZE soll *paniculata* auch in Alger und Ital. vorkommen, aber alle Expl. aus diesem Gebiete, die ich sah, hatten typische *flammula* Fr. Da KUNTZE den Unterschied in den Fr. nicht hervorhebt, so dürfte er *fragans*-Formen o. echte *flammula* mit *paniculata* verwechselt haben!

✱✱ B. dreizählig, selten biternat.

23. *C. apiifolia*: §, bis 3 m. Zw. $\pm$ graubraun und flaumig beh., B. vgl. Fig. 186e, zuw. biternat, Hauptstiel bis 8 cm, B. chen häutig, oben meist kahl o. $\pm$, unten wenigstens auf Nerven reichlicher beh. und wenig heller, bald stärker, bald schwächer eingeschnitten und lappig gesägt, End.-B. chen bis etwa 8:6 cm: Blst. meist von B. überragt, am Ende der Triebe zu einer belaubten Scheinrispe gehäuft, Bl. vgl. Fig. 183z—z⁴, weißlich, etwa 1,5 cm Dm., P. außen dicht, innen $\pm$ grau beh., Fr. spitz dunkelbraun, Stb. mehrreihig (im Gegensatz zur ähnlichen *virginiana*, die in den ♂ Bl. nur eine Reihe Stb. zeigt), A. relativ klein z. T.

C. a. DC., Syst. veg. I, 149. 1818. — Sellerieblättrige W. — Jap., M.- und N.-China. — Blz. VIII—X (die *f. praecox*, welche ich von SIMON-LOUIS in *Plantores* erhielt, blüht 14 Tage früher als Typ.). — Wohl harte Art.

Subsekt. b. *Montanae**; Bl. einzeln in den unteren B.-Achseln von Seitenzweigen, die aus beschuppten Kn. hervorgehen, $\pm$.

24. *C. montana*: üppiger §, Tracht und Zw. wie bei *alpina*; B. vgl. Fig. 186g, Hauptstiel bis 8 cm, B. chen zuletzt derbhäutig, 4—6: 2—4 cm im Mittel, nur jung $\pm$ verstr. beh., unten wenig heller; Bl. vgl. Fig. 188l—p auf bis 15 cm langem $\pm$ beh. Stiel, weiß, nur an Spitze breit eingefaltet in Kn., außen wenigstens nach dem Rande zu in 2 Streifen sehr feinfilzig beh., Fr. kahl.

Bei der typ. Form haben die Bl. 4—5 cm Dm., bei *f. anemoniflora* O. Ktze., Mon. 141. 1885 (*C. anem.* Don., Prodr. Fl. Nepal. 192. 1825; *var. grandiflora* Hook. in Bot. Mag. t. 4061. 1844) beträgt der Dm. 6—9 cm.

C. m. BUCHAN. ex DC. Syst. I, 164. 1818. — Anemonen-W.; c. des Montagnes. — Himalaya (Khasia, Nepal, Kaschmir) 1600—3000 m. — Blz. V—VI. — Bedarf im nördl. Teil des Gebietes der Winterdecke, aber sehr empfehlenswerte Art!

Subsekt. c. *Vitalbae* PRANTL. l. c. 260. — Blst. mehr bis vielblütig, Bl. $\pm$ o. dioec., Stbf. vor dem Aufspringen der A. 2—3 mal so lang wie diese, P. beiders. o. einseitig auf der ganzen Fläche beh.

Zweig a) *Euvitalbae* PRANTL. l. c. — Bl. sämtlich $\pm$, Zw. mit nur Zwischensträngen erster Ordnung.

○ B.***) meist gefiedert, selten subflam.

$\pm$ P. innen kahl o. nur ganz spärlich beh., B. chen unten $\pm$ reichlich, hfg. auch oben verstr. beh.

25. *C. grata*: § von Tracht der *vitalba* var. *taurica*, Zw. $\pm$ weich beh.; B. vgl. Fig. 186i, zuw. subflam, B. chen manchmal etwas rauh sich anführend, im Mittel 3—7: 2,5—5 cm; Blst. in den B.-Achseln; kürzer bis etwa so lang wie B., Bl. vgl. Fig. 185k—k³, 1,5—2 cm Dm., gelblichweiß, Fr.-Schweife kürzer als bei *vitalba*.

C. grata WALL. Cat. 4668. 1831. — Liebliche W. — Von Afghanistan durch Himal. bis S.-China; 600—2500 m. — IX—XI. — Jetzt nicht mehr in Kultur, früher echt im Bot. Gart. zu Wien. Die *grata* der Gärten ist *javanica*. (S. 283)

$\pm$ P. beiders. deutl. beh., B. chen kahl o. wenigstens oben ganz, unten bis auf Nerven kahlend.

*) Ich kann mich nicht entschließen, diese so abweichende Art, wie PRANTL. es tut, den *Rectae* einzureihen.

**) Ich unterlasse nicht, nochmals zu betonen, daß bei allen diesen Angaben Stengelblätter, nicht B. von Bl.-Zw. gemeint sind!

26. *C. vitalba*: §. bis 12 m. St. alter Pfl. bis 3 cm dick, Winter-Kn. z. T. vorh. ¹⁾, Zw. jung beh.; B. vgl. Fig. 190. Hauptstiel bis 7 cm. B. chen 2.5—8:2—5.5 cm, vgl. *var.*, Bl. vgl. Fig. 190: weiß. Stb. 40—60, Gr. 20—30, Fr. lang geschwänzt.

var. a. normalis O. Ktze., Mon. 101. 1885. B. chen wie in Fig. 186h, ganzrandig o. kaum gezähnt, kahl. — *b. taurica* O. Ktze., l. c. 100 (*C. taur.* BESSER, ex LEDEB. Fl. ross. I. 3. 1842; *var. syriaca* BOISS., Fl. or. I. 4. 1867): B. chen wie Fig. 190a, zuw. stark an *grata* gemahnend, aber nie so stark beh. (und P. innen nie kahl).

C. v. L., Sp. pl. 544. 1753 (*banatica* SCHUR., in Verh. Sieb. Ver. Naturw. IV, 7. 1853^{**}). — Gemeine W.; c. des haies. — I. G. verbr., sonst noch ganz Eur. Or., Kauk., ob auch Himal.? — Lichte Gebüsch, Hecken. — Blz. VII—X.

Fig. 190. *Clematis vitalba*: a Zw.-Stück mit B.-Teil und Frst.; b Bl. und Bl.-Kn.; c Bl. nach Wegnahme einiger Stb., die Frkn. zeigend; d Stb. vor, f dgl. nach Pollenabgabe; g reife Fr. (nach HEMPEL et WILHELM).

○○ *C. flam. o. biternat.*

27. *C. brevicaudata*: §. in Tracht an *vitalba taurica* gemahnend. Belaubung meist zierlicher, oft aber nur durch flam. B. zu unterscheiden. Beh. z. T. an *grata* erinnernd, zuw. B. kahl, vgl. Fig. 191a: Bl. vgl. Fig. 185 r—r', beim Typ kaum 1.5 cm. in Kultur bis 2 cm Dm.. P. meist beiders. beh., schmäler als bei *grata*, doch Fr. Schweife kurz.

C. b. DC., Syst. I, 138. 1818^{***}). — Kurzschwänzige W. — Sib., N.-China, Jap. — Wohl nur sehr selten in Kultur!

Zweig β) *Diocae* PRANTL, l. c. — Bl. polygam o. dioec., in 2 Stb., o. ♀ höchstens mit einer Reihe Stb., in den Zw. nur Zwischenstränge erster Ordnung beobachtet.

○ B. dreizählig, obs. Sp. fehl.

¹⁾ Triften auch bei anderen Arten, die am jungen Holze blühen, auf, doch nicht regelmäßig, und sind nicht dadurch bezeichnend, daß die Bl. nur aus ihnen hervorgehen.

^{**}) Steht nur eine zieml. gelbweiß blüh. Form der *var. normalis* dar.

^{***}) Nach KUNTZE wäre *biternata* DC. l. c. 149 damit synonym. Diese weicht aber nach PRANTL durch dioec. Bl. und hohle Zw. ab. PRANTL erwähnt *brevicaudata* nicht, ich gebe die Beschreibung nach Expl. aus N.-China und Jap. Sie gehört zu den asiat. Arten, die noch näherer Untersuchung bedürfen, KUNTZE faßt sie zu weit. Nach ihm soll sie sogar in Eur. vorkommen. Ich habe unter Hunderten von Expl. von *vitalba*, die ich in wiener Herbaren sah, nichts Analoges bemerkt.

28. *C. virginiana*: § analog *vitalba*. B. vgl. Fig. 186 f, B. chen gezähnt o. — gelappt nach KOEHNE zuw. völlig ganzrandig, was ich nicht sah, höchstens jung beh., oben dunkel-, unten hell- o. bläul.-grün, bis 9:5 cm. Hauptstiel bis über 11 cm: Blst. wie bei *vitalba*, zuw. wenigblütig, Bl. vgl. Fig. 185 n—p¹, P. außen beh., innen lfg. kahl, Bl. rein ♂ o. — mit einer Reihe Stb. o. Std., Fr.-Schweife 2—4 cm lang.

C. v. L., Amoen. acad. IV, 275. 1759 (*canadensis* MILL., Gard. Dict. ed. VII, No. 4, 1759; *virginica* PURSH, Fl. II, 384. 1814; *cordifolia* MOENCH, Meth. 104. 1794). Virginsche W.; Virgin's bower; c. de virginie. — O.-N.-Am. (Georgia bis Kansas, nördl. bis Neu-Schottl. u. Manitoba). Standorte ähnlich *vitalba*. Blz. VII—IX(—X). — Fast ganz hart.

○○ B. biternat, gefiedert, subflam. o. flam., obs. Sp. vorh.

* B. gefiedert bis subflam.

29. *C. cordata*: §, bis 3 m. Zw. kahl o. — beh., B. vgl. *var.* und Fig. 186 k—k¹. Bl. weiß, in *vitalba* analogen Blst., vgl. Fig. 185 m—m¹, ♂ mit ca. 30 Stb. o. ♀ mit 30—50 Stb. und 6—11 Gr. o. ♀ mit bis über 70 Gr. und einer Reihe Std., P. beiders. beh., Fr.-Schweif 2—4 cm lang.

*var. a. typica**) (*ligusticifolia brevifolia* NUTT. in TORR. et GR., Fl. N.-Am. I, 9. 1838 ex parte; *C. brevifolia* HOWELL, Fl. of NW.-Am. I, 8. 1897): B. chen herzeifg bis breitoval, bis ca. 8:6 cm, obs. Sp. ¹/₄—¹/₂, der unterseitigen, Zellgrenzen ziemlich stark gewunden. *b. ligusticifolia* NUTT., in TORR. et GRAY l. c. B. chen eifg. bis eilanzettlich, bis ca. 8:3,5 cm, unten z. T. beh., obs. Sp. sehr vereinzelt bis ca. ¹/₄, der unterseitigen, Zellnetz zieml. scharf polygonal, Wandungen höchstens leicht gewunden.

C. c. PURSH, Fl. Am. Sept. II, 384. 1814. — Herzblättrige W. — N.-Am. (*var. a.* wohl vorzüglich im östl., *var. b.* im westl. Teil, die atl. Küste wie es scheint nicht erreichend). — *var. b.* scheint trockenere Lagen zu lieben. — VII—IX. — Winterschutz jedenfalls ratsam.

✱✱ B. flam., z. T. auch biternat, seltener dreizählig.

30. *C. mendocina*: §, Zw. — rundl. und kahl. B. vgl. Fig. 186 m, — bis ganz kahl, obs. Sp. ¹/₄—¹/₂, der unterseitigen, B. chen bis 7:2,8 cm an Kultur-Pfl.; Bl. vgl. Fig. 185 q—q¹, P. außen stärker, am Rande beiders. dicht filzig, innen nur verstr. beh., Stb. in ¹/₂ Bl. ∞, in ¹/₂ Bl. einreihig, — staminodial, Fr. mit sehr langem Schweif.

C. m. PHIL., in Anal. Univ. Chile II, 389. 1862. — Mendoza-W. — Chile. — Blz. IX—X. — Im H. d. D. D. G. nicht geführt, aber bei SPÄTH-Berlin in Kultur. Schutzbedürftig.

II. Stbf. behaart, meist ± verbreitert.

*) Daß *cordata*, wie es in GRAY, Syn. Fl. I, 4. 1895 geschieht, zu *virginiana* als Synonym gestellt wird, ist sicher falsch; ob nun aber *cordata* und *ligusticifolia* vielleicht gute Paralleldarten des atl. bez. pacif. N.-Am. sind und inwieweit sie von den mir unbekannten *californiana* PURSH, Fl. II, 736. 1814, *salsdorfii* ROBINSON, in GRAY, l. c., und *missouriensis* RYDB., in BRITT. Manual 421. 1901, schon geschieden sind, kann ich z. Zt. aus Mangel an Material nicht feststellen. Den Beschreibungen nach steht *californiana* der *virginiana* nahe, während die beiden letzten ganz gut Formen der *cordata* sein konnten. SMALL, Fl. southeast. Stat. 436. 1903, sagt von *californiana*: leaf-blades many twice ternately compound. Er führt noch *drummondii* TORR. et GR., Fl. N.-Am. I, 9. 1838, die vor Allem durch die 5—10 cm langen Fr.-Gr. abweicht. Ihre B. chen sollen nicht über 4 cm lang sein. Heimat: Texas bis Arizona und Mexiko.

**) Abgebildete B. chen ex Herb. KOEHNE aus Hort. SPÄTH, sonst Beschreibung nach Orig.-Pfl. PHILIPPIS, von Mendoza. Ob von *campestris* ST. HIL. wirklich gut verschieden?

Subsekt. d. *Orientales* PRANTL, l. c. — $\S$, B. flam. o. subflam., obs. Sp. vorh., Blst. (1—3—8) mehrblütig, am jungen Holze. P. 1,5—2,5 cm lang, gelblichweiß o. weißlich, vorwiegend am Rande filzig beh.

Fig. 191. *Clematis*: B-Formen: *a* *brevicaudata*. — *b—b'* *glauca*. — *c* *orientalis* — *d* *tangutica* — *e* *graveolens* — *f—f'* *cylindrica* (Original) ($\frac{1}{3}$ nat. Gr.).

○ P. innen kahl, B. — flam., B.chen herz-eifg. o. oval und ganzrandig. obs. Sp. verstr. bis etwa $\frac{1}{3}$ der unterseitigen.

31. *C. glauca*^{*)}: $\S$, B. vgl. Fig. 191 *b—b'*, kahl, blaugrün, B.chen bis etwa 5:4 cm; Bl. etwa 3 cm Dm., P. zugespitzt, Stb. kürzer als Gr., Fr.-Schweife wie bei *orientalis typica*.

C. g. WILLD., Berl. Baumz. 65. 1796 (*orientalis* var. *normalis* KRZL., Mon. 123 1885 ex parte). — Blaugüne W. Sibirien. VII—IX. — In den Gärten hfg. als *orientalis*, die selten echt und sicher empfindlicher ist.

^{*)} Die Arten 31—33 stehen einander sehr nahe. Sie bedürfen noch eingehender Untersuchungen auf Grund reichsten Materials, um nicht nur die Grenzen ihrer Verbreitungsgebiete sicher festzulegen, sondern vor Allem ihre Merkmale, die heute noch schwankend sind, zu präzisieren. Vielleicht läßt sich diese Gruppe der typischen *Orientales* noch weiter gliedern. Die in den Gärten häufigste *graveolens* scheint in den Herbarien die seltenste. Was ich hier als *orientalis* im Sinne LINNÉ'S gegründet auf DILLÉNII'S Abb. in Hort. Elth. 144, t. 119) fasse, dürfte sich auf Grund der Beh. o. Kahlheit der B. und der Länge der Stb. im Vergleich zu den Gr. noch in mehrere gute Varietäten zerlegen lassen. Die Form der B.chen ist bei allen drei Arten sehr dem Wechsel unterworfen.

○○ P. auch innen beh. (Lupe!), obs. Sp. der B. $1\frac{1}{3}$ bis reichlich $1\frac{1}{2}$ der unterseitigen.

✕ P. zugespitzt. B. meist subflam., also B.chen nur 3-lappig, sonst $\pm$ ganzrandig.

32. *C. orientalis*: §. B. vgl. Fig. 191 c, kahl o. $\pm$ beh., blau- o. graugrün. B.chen sehr variabel, meist kleiner als bei *graveolens*, oft schmal lanzettlich: Bl. vgl. Fig. 185 s—s³, Stb. meist so lang wie Gr. oder kürzer, Stbf. verbreitert o. nicht.

var. a. *typica*: Fr.-Schweife nur 3—5 cm lang. — b. *longicaudata* BOISS., Fl. or. I, 4. 1867 (*C. long.* LEDER., Fl. ross. I, 3. 1842): Fr.-Schweife 6—8 cm lang.

C. or. L., Sp. pl. 543. 1753 (*flava* MOENCH, Meth. 296. 1794; *tenuifolia* ROYLE, Illustr. of bot. hym. mount. 51. 1839). — Orient-W. — var. a. Orient bis Turkest. und Himal., var. b. Turkestan. — Sonst vgl. *glauca*.

✕✕ P. stumpf o. $\pm$ ausgerandet, meist „Spitzchen“ unter der Spitze (Fig. 185 u²), B. flam., B.chen z. T. mit mehreren Zähnen.

33. *C. graveolens*: üppiger §, B. vgl. Fig. 191 c, nur wenig blau-grün. $\pm$ beh., wenigstens gewimpert, B.chen bis 6:3,5 cm, im Mittel aber nicht über 4 cm lang, Bl. vgl. Fig. 185 u—v².

C. gr. LDL., in Jour. Hort. Soc. I. 307. 1846. — Afghan., W.-Himal. (2—3500 m), wahrscheinl. aber weiter verbreitet! — Sonst vgl. *glauca*.

Subsekt. e. *Tanguticae*: §, B. flam., obs. Sp. vorh.; Bl. einzeln am alten Holze. P. 2,5—4 cm lang, sattgelb, fast nur am Rande beiders. beh.

34. *C. tangutica*: bis 3 m hoch, B. vgl. Fig. 191 t, jung beh.: Bl. vgl. Fig. 185 w—z, Stiel bis 25 cm lang, Fr. langgeschwänzt.

C. t. ANDRÉ, in Rev. hort. LXXIV, 528. 1902 cum tab. col. (*orientalis* var. *tangutica* MAXIM., Fl. tangutica 3. 1889; *criopoda* KOEHNE, Dendrol. 155. 1893, et Hort., non MAXIM.). — Tangutische W. — Pamir, N.-Tibet, Mongolei. — V—VI, nach ANDRÉ zuw. im Herbst an üppig. Trieben. Wertvolle Art, die für Bastarde von Bedeutung werden könnte wegen ihrer schönen gelben Bl.-Farbe. Wohl fast hart.

Familie 18. *Lardizabalaceae*^{*}), *Lardizabalagewächse*.

LDL., Veg. Kingd. 303. 1847.

Vgl. Reihe S. 269, meist §, B. ☉, handfg. zusammengesetzt, B.chen ganzrandig, kahl, Neb. fehl., Bl. ♂, ♀, monoec., mit Rudimenten der Stb. bez. des Gyn.: Frkn. 3—9), getrennt, mit ∞ , in Längsreihen an den Seitenwänden sitzenden anatropen Sa., Integ. 2, Fr. eine Beere. S. ∞ , End. vorh., E. klein, gerade.

Gattungen:

A. B.chen deutl. gespitzt, P. 6.

I. B.chen eilängl., längl.-elliptisch bis lanzettlich, über 2mal so lang wie breit, 6 Std. vorh. **63. Hollboellia.**

II. B.chen breit-elliptisch o. verkehrt-eifg., etwa $1\frac{1}{2}$ —2:1, Std. fehl. **64. Stauntonia.**

B. B.chen an Spitze $\pm$ ausgerandet, P. 3. **65. Akebia.** (Seite 296.)

^{*} Zum Teil nach PRANTL, in Nat.-Pfl. III, 2, 67. 1891. Die Vertreter dieser Familie kommen mit Ausnahme von *Akebia quinata* für unser Gebiet fast nur für dessen südlichste Teile in Betracht.

Gattung 63. *Hollboellia) WALL., Tent. Fl. Nep. 23. t. 16. 1824.**

Vgl. oben und Art. 4—5 Arten vom Himal. bis Zentr.-China. Als Typ sei folgende genannt:

H. latifolia: sehr variabler, §. Stämme nach HOOKER an alten Pfl. bis etwa 0,5 m Dm., hfg. niederliegend, bis 15 m lang. Rinde dann korkig-borkig; Zw. gelbgraubraun, rundl., kahl, Kn. stumpf eifg., Sch. 6—8, locker; Behen 3—9, meist gleichgroß, 5—18:1,8—6 cm, Grund keilig oder gerundet, ober. glänzend grün, zieml. glatt, unters. graugrün, Nervatur deutl., Stielchen bis 4 cm, Hauptstiel bis 15 cm; Bl. gestielt scheindoldig; Bl. grünlich purpurn, nach Orangen duftend; ♀ bis etwa 1,5 cm lang, ♂ größer, Stb. frei; Fr. nicht aufspringend, 6—9 cm lang, eßbar.

H. l. WALL., l. c. 24. — Breitblättrige H. — Himal. (Bhotan bis Kumaon Khasia, Ober-Assam, Zentr.-China (Szechuen, Kuichou, Hupeh — Im Himal. bis 3000 m. — Blz. VII—VIII. — Bei uns wohl nur Kalthauspfl.

Fig. 192. *Akebia quinata*: a Zw. mit B. u. Bl.; b ♂ Bl.; c—d Stb.; e ♀ Bl.; f Gyn.; g h Frkn. im Längs- und Querschnitt; k—l S.; m dgl. im Längsschnitt (a, i verkleinert; b, k 1/1; sonst ± vergrößert) (nach LAVALLÉE).

Gattung 64. *Stauntonia* DC., Syst. I. 513. 1818.

Vgl. oben S. 294 und Art. 2 Arten*) von O.-China, Korea bis Jap.

St. hexaphylla: habituell *Hollboellia* ähnlicher § mit kahlen, glatten, braungrauen, z. T. leicht bereiften Zw.: Behen 5—6, etwa 6—10(—12:3—5,5(—6) cm, Spitze plötzlich abgesetzt. Blst. 2—4-blütig, 3—4 cm lang gestielt, Bl. weißlichviolett, etwa 2 cm lang, Stb. verwachsen, Fr. klaffend, violett-purpurn, etwa 6:4 cm, eßbar.

St. h. DECNE., in Arch. Mus. Paris I. 191. t. 11. C. 1839. *Rajana hex.* THBG., Fl. jap. 145. 1784] — Sechsbältrige St. Jap., Korea Blz. IV. — Frz. VII—VIII (Heimat). — Bei uns wohl nur Kalthauspfl. Vgl. Abbildung in STEB. et Zucc., Fl. jap. t. 76. 1835.

*) Vgl. auch DIELS, in Engl. Bot. Jahrb. XXIX, 342. 1901.

**) Die 2. Art ist *St. chinensis* DC., Syst. I. 514. 1818, China (Hongkong) Vielleicht sind beide zu vereinigen.

Gattung 65. *Akebia* DECAISNE, in Arch. Mus. Paris I, 195. 1839.

Vgl. oben S. 294. halbwintergrün. Blst. doldentraubig, achselständig. Bl. ♂: P. meist 3(–6), Stb. meist 6, frei. A. extrors. rud. Frkn. 2–6; ♀: Gyn. 3–12, N. sitzend, $\pm$ schildfg., Sa. ∞ , rud. Stb. 3–9; Fr. große, längl.-walzenfg., an Bauchnaht aufspringende Beere, S. ∞ , in das pulpöse Fr.-Fleisch eingesenkt. — 2–3 Arten bekannt.

A. quinata: vgl. Gattung; bis über 3 m hoher &. c. Zw. rund, glatt, glänzend, trübviolett-purpurn, feinstreifig, Lent. erst an den bräunlich- o. gelblichroten c. Zw. auffällig. Kn. kahl, gelbbraun, vgl. Fig. 31 a–f. S. 73; B. (Fig. 192a) kahl, derbhäutig. B.chen 2–5:1, 5–3 cm, oben dunkelgrün, unten viel heller; Stiele 6–10 cm; Blst. mit (1–) 2–3 unteren größeren ♀ (e–h) und 4–9 oberen kleineren ♂ Bl. (b–d); P. bräunlich-violettrot, Fr. purpurbraun (i), S. und E. l. m).

A. q. DCNE., l. c. — Fünfblättrige A., akébia à cinq feuilles. — China, Japan. Bergwälder. Blz. IV–V. Fr. bei uns selten reifend — Bis etwa Prov. III harter, schöner &. Die verwandte *A. lobata* DCNE., l. c., aus Japan besitzt 3–5-zählige B., deren B.chen bis 7:5–7 cm messen und eirundlich, z. T. seitlich schwach kerbig 3-lappig sind. Scheint nur Kalthauspfl.

Fig. 193. a–f *Barbiers thunbergii*: a c. Zw., b Zw. mit Stachel (aa), Kn. (n) und den sie umgebenden B.-Basen (β), c c. Kn. (nd) und B.-Basen (β) und c, f Zw.-Q.-Schn. — g–m *B. vulgaris*: g c. Zw., h Lgtr. mit 3-teiligen Stacheln, Kn. (β) und einfacher Stachel (aa), k B.-Base, l Kn., a Stachelnarbe, β N. der B.-Basen, γ Kn.-B.chen), m wie f (1–6 vgl. Fig. 164g, S. 252). — n–r *Aand ma domesticus*: n c. Zw., o. Kn., p B.-N. im Schnitt, q Beh. der Kn., r wie m. Original n. C. K. SCHNEIDER.

Familie 19: Berberidaceae, Berberitzengewächse.

TORR. et GRAY, Fl. N.-Am. I. 49. 1838.

Vgl. Reihe S. 269; ♀, B. sommer- o. immergrün, einfach o. zusammengesetzt. Bl. einzeln o. traubig o. zymös, - . zyklisch, meist 2—4 Kreise Blh., 2 Kreise Stb., A. mit Klappen o. Längsspalten, Frb. 1. Sa. ∞ —1, Integ. 2, Fr. Beere, End. vorh., E. klein, gerade.

Gattungen:

A. B. einfach o. einfach gefiedert o. dreizählig.

I. B. einfach, Lgtr. fast stets mit Dornen. 66. *Berberis*.

II. B. einfach gefiedert o. dreizählig, Lgtr. dornenlos. 67. *Mahonia*.

B. B. mehrfach gefiedert. 68. *Nandina*.

Gattung 63. *Berberis* L. Sp. pl. 330 (1753). ex parte.

[Berberitze, Sauerdorn; berberry; épine-vinette.]

Vgl. oben; b, selten kleine ♀: B. sommer- o. immergrün, in Form sehr wechselnd, charakteristisch genervt: Bl. einzeln o. gebüschelt, deutlich traubig (besser wohl scheintraubig) o. in zusammengesetzten Blst., Vorb. 2—3, K. 3+3, C. 3+3 o. 5, Stb. 6(—5), Sa. 1—12, Fr. rot o. schwarz, meist bereift. — Etwa 150 Arten, vor allem in As. (nördl. gemäßigte und subtropische Zone, sowie in Mittel- und S.-Am.

A. B. immergrün, also von derber, lederartiger Konsistenz in Zweifels- B siehe S. 305. fällen vgl. auch unter B.).

I. B. unterseits deutlich papillös**).

II. siehe S. 299.

a) B. linealisch und gerollt (o. schmal-lanzettlich, etwas gerollt, hie und da mit einigen Zähnen) (Fig. 194 l, q).

*) Ich ziehe es mit FEDDE, dem Monographen von *Mahonia*, vor, beide Gattungen getrennt aufrecht zu erhalten. *Berberis* gehört zu denjenigen, die sowohl in Hinblick auf die spontanen Arten und Varietäten, wie auch hinsichtlich der überaus zahlreichen Gartenformen von meist hybridem Ursprung nur eben sehr unvollkommen bekannt sind. Herr USTERI, dem ich für Überlassung seines Materials Dank schuldig bin, hat in Mitt. d. D. Dendr. Ges. 1899. 77 einen Versuch gemacht, das Chaos zu ordnen, der aber — da im wesentlichen auf Kompilation beruhend — keine genügende Grundlage bietet. Ehe ich selbst nun mit Erfolg hoffen durfte, an die Klarstellung der Formen zu gehen, schien es mir nötig, die spontanen Arten genau zu untersuchen. Ich stehe jetzt (Anfang Sept. 1904) vor dem Abschluß einer längeren Arbeit, darin die ca. 150 Spezies der Gattung behandelt und in ganz neuer Gruppierung gegliedert werden. Diese Publikation dürfte in Kurze im Bull. de l'Herbier Boissier erscheinen und auf sie seien alle die verwiesen, welche eine Übersicht über die ganze Gattung wünschen. Hier im Handbuch muß ich mich — schon aus Mangel an verfügbarem Raum — darauf beschränken, eine lediglich auf leichte und schnelle Bestimmung berechnete Gruppierung der Arten zu geben, in welcher die natürliche Verwandtschaft nicht zum Ausdruck gebracht werden kann, zumal es nur unmöglich ist, die große Arbeit vor Beendigung des Druckes fürs Handbuch abzuschließen. Die Gartenformen, welche ZABEL in seiner provisorischen Übersicht im II. d. D. D. G. auführt, habe ich sämtlich gesehen. Die Herren Prof. KOEHNE, ZABEL, DE VILMORIN, VEITCH, SPAETH u. a. sandten mir ihr reiches Material. Ihnen allen, aber besonders Herrn Prof. KOEHNE, bin ich ganz außerordentlich zu Dank verpflichtet. Ferner muß ich der Direktion des Herbar BARBEY-BOISSIER in Genf auch hier meinen Dank abstaten. Trotz dem ich also sehr viel sah, kann ich heute nur einen kleinen Bruchteil der Gartenformen sicherstellen. Im übrigen vergleiche man die Sonderarbeit. Von spezieller Literatur sei hier auf eine Studie von Dr. G. TISCHLER, die Berberidaceen und Podophylaceen, in Engl. Bot. Jahrb. XXXI, 596. 1902, verwiesen.

**) Wenn ich von papillosen B. rede, so meine ich nur solche, bei denen sich die Papillen unter Lupe o. Mikroskop auch ohne Schnitt nachweisen lassen. Sehr viele Arten haben papillös vorgezogene Epidermiszelltaschen, die aber erst im Schnitt bei starker Vergrößerung deutlich werden. Die weißliche Farbe der B. Unters. wird oft nur durch »Reif« bewirkt.

1. *B. empetrifolia*: Habituell an *Empetrum* gemahnender, bis etwa 0.50 m hoher b. ☉ und ☾ Zw. rotbraun, kahl, hfg. bereift, ☉ grau, ☾ rissig; Dorne 1-3-teilig, hellbraun, mittlere 0.5-1.5 cm; B. 0.5-2 cm lang, lebhaft grün, Papillen bes. am umgerollten Rande ± haarartig, Hypoderm*) vorh., Stiel 0-2 mm; Blst. 1-2-bl., bis 1.5 cm lang; Bl. goldgelb, Sa. 8-11, vgl. Fig. 194m--o, Fr. schwärzlich.

Fig. 194. *Berberis*-Arten: a—c¹ *heteropoda*: a B.-Stiel-Q.-Schnitt; b K.; b¹ C.; c Gyn. im L.-Schnitt; c¹ Fr. — d—f *cretica*: d Zw. mit B. und Bl.; e Gyn. im L.-Schnitt; e¹ Stb.; f Fr. — g—k *buxifolia*: g Zw. mit B. und Bl.; h Gyn. im L.-Schnitt; i Stb.; k Fr. — l—o *empetrifolia*: l Zw. mit B. und Bl.; m C.-Formen; n Stb.; n¹ Gyn. im L.-Schnitt; o Fr. — p—p³ *darwini*: p B.; p¹ Gyn. im L.-Schnitt; p² Stb.; p³ Fr. — q—q³ *darwini* = *empetrifolia* (*stenophylla*): q B.-Formen; q¹ Gyn. im L.-Schnitt; q² Stb.; q³ Fr. — r—s *lycium*: r—r¹ Stb.; r² Gyn. im L.-Schnitt; s Fr. — t—u³ *birica*: t Zw.-Stück mit den charakt. vielteiligen Dornen; t¹ B.-Formen; u C.; u¹ Stb.; u² Gyn. im L.-Schnitt; u³ Fr. — v—w *angulosa*: v Gyn. im L.-Schnitt; v¹ Stb.; v² Fr.; w B.-Formen. — x—z *concana*: x B.-Formen; y Gyn. im L.-Schnitt; y¹ C.; y² Stb.; z Fr. (d nach SIBTHORP; g nach Bot. Mag.; l nach Bot. Reg.; sonst Orig.)

B. c. LAM., ex POIR. in LAM. Encycl VIII, 621. 1808 (*cretolata* SM., ex DC., Syst. II, 16. 1821). Krähenbeeren-B. Chile (etwa 30° s. Br.) bis Feuerland. — Blz. V—VI (in Heimat etwa XII). — Etwa Prov. IV—V, leichte Decke.

1-9 *B. empetrifolia* = *darwini*; *B. stenophylla* LEDL. in Gard. Chr. 1864. 460 *B. handsworthensis* HORT. ANGL. Trotz USTERIS gegenteiliger Angabe ist *stenophylla* ganz sicher ein Bastard. In der var. *typica* steht er gut zwischen den

*) Siehe darüber bei *Mahonia*.

Eltern, dabei in Wuchs, B. und Sa. auf *empetrifolia*, in Beh. der Zw., Blst. und Fr.-Griffel auf *darwinii* deutend. Die von ZABEL aus selbst geernteten S. erzeugte *var. super-darwini* ZBL. erinnert bedeutend mehr an *darwinii*, ihre z. T. 3—5-zähligen B. messen etwa 1—1,5 : 0,4—0,6 cm. Vgl. Fig. 194 q—q³.

b) B. $\pm$ verkehrt-eilänglich bis rundlich.

a) Dorne normal*).

○ B. derb lederig, im Mittel 4:2 cm, Blst. $\pm$ traubig.

2. *B. asiatica*: sparrig, kräftig verästelter bis 1,8 m hoher $\bar{b}$, ⊙ Zw. sehr fein beh., $\pm$ gefurcht, hell- o. graugelb, Dorne zweifarben, 0,5—0,8 cm; B. verkehrt-eifg. bis eilänglich, spitz o. $\cdot$ abgestutzt, ganzrandig o. 2—5 Zähne jederseits, 2—7 : 1,5—3 cm, ober. sattgrün, unter. weißlich, Nervatur scharf, Hypoderm fehl., Stiel 0—1 cm; Blst. 8—25-bl., 2—5 cm; K. und C. an Spitze gerundet, Stb. mit Konnektivspitze, Sa. 4—6; Fr. purpurn, bereift, mit deutl. Griffel.

B. a. ROXBG., in DC. Syst. II, 13. 1821 (? *B. hypoleuca* LDL., in Jour. Hort. Soc. II, 246. 1847). — Asiatische B. — O.-Himal. — Blz. IV (Riviera). — Schöne, aber wohl nur für die südlichsten Teile des Gebietes in Betracht kommende Art. Ihr steht nahe *B. tinctoria* LESCH., in Mém. Mus. Paris 1822. 306, Zw. kahl, Dorne bis 1,8 cm, B. 1,5 : 0,7 o. 1,5 : 1 bis 4,5 : 2 cm, meist ganzrandig, Sa. 2. Von *aristata* und *chitria* gut verschieden. SW. Vorderindien (Nilgiri-Hills), nicht in Kultur.

○○ B. dünnlederig, im Mittel 1,5—2 : 1—1,5 cm, Bl. einzeln o. gepaart.

3. *B. concinna*: ausgebreitet verästelter, z. T. niedergestreckter, 0,3—0,9 m hoher $\bar{b}$, ⊙ Zw. hellgelb o. rotbraun, kahl, gefurcht, Dorne zweifarben, bis 1,8 cm, B. ober. tiefgrün, unter. auffallend weißlich, 0,8—3,7 : 0,4—2 cm, Zähne 3—5 jederseits, Adernetz weit, scharf, Stiel 0,1—0,8 cm; Bl.-Stiele bis 2 cm, Blst. zuweilen ebenso lang gestielt, Bl. tiefgelb, Sa. 5—8, vgl. Fig. 194 x—z, Fr. rot.

B. c. HOOK. F., in Bot. Mag. t. 4744. 1853. — Niedliche B. — Himal. (Sikkim, bis 4000 m). Blz. VI—VII. — Eine der schönsten, für Prov. V—VI (wohl auch III—IV mit Decke) zu empfehlen.

β) Dorne $\pm$ blattartig, o. klein, mehrstrahlig.

4. *B. hakeoides*: $\bar{b}$, bis etwa 1 m; ⊙ Zw. kahl, rotbraun, hfg. bereift, $\pm$ kantig, $\cup$ grau; B. rundlich o. ei-elliptisch, derb, mit Hypoderm, unter. heller, meist 3—6-zählig, 1—2 : 1—2 o. bis 4 : 2,8 cm, Stiele 0,3—2 cm; Bl. zu 10—20 gebüschelt, gelb, Stiele etwa 0,8—1 cm, Stbf. gezähnt, Fr. etwa 7 mm lang, eiförmlich, blauschwarz, meist 1-samig.

B. h. (congestiflora var. hakeoides) HOOK. F., in Bot. Mag. t. 6770. 1884). — Hakeablättrige B. — S.-Am. (Chile?) — Ich erhielt diese von *congestiflora* verschiedene Art von VILMORIN und VETICH. Sie scheint der *dealbata* LDL., in Bot. Reg. XXI, t. 1750. 1830, ebenfalls unbekannter Herkunft (Neu-Granada?) sehr nahe zu stehen, wenn LDL. nicht deutliche dichtblütige Trauben abbildete und von den B. sagte: *subtus albedine densa corticata*, so würde ich *hakeoides* als Synonym zu *dealbata* ziehen. Vielleicht kann nur ein Leser ein Exemplar der LINDLEYSchen Art vermitteln. Möglicherweise ist *hakeoides* identisch mit *hercynica* GAY, Fl. ch. I. 1845, obwohl die Blätter spontaner Exemplare eine grubig-runzliche Rückseite zeigen und viel starrer sind.

II. B. unters. nicht deutlich o. gar nicht papillös.

a) Dorne $\cdot$ blattartig, mehrzählig o. 5—7-strahlig, kurz, wenn b siehe S. 301 3-strahlig, dann $\cdot$ flach und breittrinnig unterseits, nicht schlank und rundlich.

α Dorne fast sämtlich blattartig (Fig. 195 bei a, b, g, h). B. ohne (o. wenigstens ohne durchlaufendes) Hypoderm.

*) Unter normalen Dornen verstehe ich immer 1—3-teilige vom Typ der *vulgaris* (an Lohden wohl auch bis 5-teilig). Bei Längenangaben ist stets der Mitteldorn gemeint.

○ B. unterhalb der Blst. meist ganzrandig, diese bis 3 cm lang gestielt, ± scheindoldig, mehrblütig.

5. *B. congestiflora*: b, Höhe?, Zw. grau, rundlich, ± fein beh., ⊙ leicht bräunend; B. (Fig. 195 a—b), wenn ganzrandig bis 2,5 : 1,6, sonst etwa 1,5 : 1,3 bis 2,5 : 2,3 cm, ober. tiefgrün, glatt, unters. bereift, Nerven schwach deutlich, Stiel bis 1,3 cm, am Grund o. an Spitze abgegliedert, Bl. klein, Sa. 4, vgl. Fig. 195 c—f.

B. c. GAY, Fl. chil. I, 75. 1845. — Gedrängtblütige B. — Chile (Valdivia, Malleco). Blz. (Heimat) IX—XI; Frz. XII. Kaum echt in Kultur. Höchstens für Prov. VII zu versuchen.

○○ B. sämtlich gezähnt, Bl. gebüschelt.

6. *B. crispa*: b, Höhe?, Zw. rotbräunlich, leicht kantig, deutlich kurzhaarig, grau; B. (Fig. 195 g—h) etwa 1,2 : 1,2 bis 3,3 : 3 cm, Stiel bis 1,8 cm, beh., stets unter Lamina abgegliedert, sonst vgl. *congestiflora*; Bl. zu 5—8, Stiel 0,8—1,2 cm, Sa. etwa 6, vgl. Fig. 195 l—m.

B. c. GAY, Fl. chil. I, 86. 1845 (*actinacantha* var. *crispa* REICHE, Fl. Chil. I, 41. 1896; *umbellulata* POEPP., Exsicc. No. 116). — Krausblättrige B. — N.-Chile (sterile Orte). — Blz. VII (Heimat). — Erhielt ich aus Hort. Heidelberg als *congestiflora*.

β) Dorne 3—5 7-strahlig, Strahlen häufig gleichlang.

○ Bl. einzeln o. zu 3—5 gebüschelt; B. im Mittel kaum über 2 cm lang, z. T. ganzrandig.

± Bl. einzeln, B. ohne durchlaufendes Hypoderm (Fig. 195 t, u).

7. *B. heterophylla*: b, bis 0,5 m; Zw. kahl, leicht kantig, braungelb, grau; Dorne 3—5-teilig, ± breittrinnig; B. ober. sattgrün, glänzend, unters. hell- o. weißlichgrün, dünnlederig, am Grunde 3(—5)-nervig, Hauptnerven beiders. deutlich, größte B. bis 3 : 1, Stiel 0,5 cm; Bl. etwa 7 mm lang gestielt, vgl. Fig. 195 v—w¹, Fr. schwarzpurpurn, bereift, erbsengroß, 4-samig.

B. h. JUSS., ex POIR. in LAM. Encycl. VIII, 622. 1808. — Wechselblättrige B.; various leaved b. S.-Chile bis Magalhães-Str. Blz. XII (Heimat). Im botanischen Garten zu Wien steht eine alte Pflanze, die sich fast ganz akklimatisiert hat, obwohl sie gelegentlich recht zurücktreten mag. Sonst habe ich diese Art nirgends echt gefunden.

± Bl. zu 3—5, B. mit fast gleichmäßigem Hypoderm (Fig. 195 n—o).

8. *B. actinacantha*: kleiner b, Zw. meist fein beh., leicht kantig, gelbbraun; B. derber als bei voriger Art, bis 3 : 1,3 cm, Nerven kaum vortretend; Bl. bis 1 cm lang gestielt, die B. meist nicht überragend, Bl.-Dm. 8—10 mm, orangegelb, vgl. Fig. 195 p—s, Fr. blauschwarz, eirundlich, etwa 7 mm lang.

B. a. MART., in SCHULT. Syst. Veg. VII, 1, 12. 1829. — Strahldornige B. Central-Chile. Blz. XI (Heimat); Frz. VIII—IX (Hort. VILMORIN). Wohl nur für Prov. VI—VII versuchswert.

○○ Bl. traubig angeordnet, B. im Mittel größer, besonders über 1 cm breit, sehr selten ganzrandig, stets deutliches Hypoderm vorh., derblederig.

± Zw. stark beh., B. 0,7—3,5 : 0,5—2 cm, Blst. länger als B.

9. *B. darwini*: b, 0,5—1,7 o. höher (♂); Zw. braunrot, grau; Dorne 2—5 mm lang; B. mit jederseits 1—5(—9) Zähnen (Fig.

*) Derartige Angaben beziehen sich auf den getrockneten Zustand, im lebenden Blatt tritt die Nervatur meist weniger scharf hervor.

194p. beiders. : glänzend, unters. heller, nur Hauptnerven deutlicher: Blst. inkl. Stiel 6–10 cm lang, 5–10–20-bl., Bl. goldgelb, außen : gerötet, vgl. Fig. 194p¹—p³, Fr. blauschwarz, Sa. 3–6.

B. d. HOOK., Icon. pl. VII, t. 672. 1844. — Chile bis Patagonien. — Blz. VI (Heimat X), Frz. VIII (d.). In geschützten Lagen für Prov. V–VII. Ziemlich hfg. in Kultur. Vgl. *stenophylla* S. 298.

++ Zw. feiner beh., B. 2:1 bis 5:3 o. 6:2 cm. Blst. kürzer als B.

10. *B. ilicifolia*: ♀, ± sparrig, bis 2,5 m; ⊙ Zw. purpurn, kantig, ⊙ grau; B. Fig. 195x) in Farbe und Textur ähnlich *darwinii*, Stiel 0,2–0,6 cm; Blst. 2–3(–7) cm lang, 5–10-bl., Bl. bis 1,5 cm Dm., Sa. 5–6, vgl. sonst Fig. 195y–z².

B. i. FORST., in Comm. goett. IX, 28. 1789 (*lagenaria* POIR., in LAM. Encycl. VIII, 619. 1808). — Ilexblättrige B.; holly-leaved b. — S.-Chile bis Feuerland. — Blz. XI–III (Heimat). — Was bei uns als *duffels* geht, ist der Bastard *neuberti*. Die echte Art wäre für Prov. VI–VII zu versuchen.

Fig. 195. *Berberis*-Arten: a–f *congestiflora*: a Zw.-Stück mit gestielten B. und Dornen; b dgl. mit Blst., Dorn für sich von unten gesehen; c K.; d C.; e Stb.; f Gyn. und Sa. rechts vergrößert. — g–m *crispa*: g–h Zw.-Stücke mit B. und Dornen; i–m wie c–f. — n–s *actinacantha*: n Zw.-Stück mit B. und Dorn, ein solcher abgelöst darüber; o extreme B.-Formen; p–s wie c–f. — t–w *heterophylla*: t Zw. mit B. und Dorn; u dgl. von Bl.-Zw.; v–w¹ wie c–f. v–w² *atropurpurea*: x B. und Dorn; y – – d f; z² Fr. (z nach KOEHNE, Icon. nied., sonst Origin.)

b) Dorne normal.

a) B. unters. deutl. weißlich o. bläulichweiß*).

11. *B. pruinosa*: b. Höhe?: : Zw. rundlich, gelbbraunlich, kahl. : bereift. : grau, Dorne gelblich, bis 2,5 cm; B. (Fig. 196a–b) dünnlederig, zuw. nur jederseits 3–4-zählig, 1,8–5:0,8–2 o. an jungen Pflanzen bis 5,5:4 cm, dann auch bis 3 cm lang gestielt; Blst. : sitzend (büschelig) o. bis 2 cm lang gestielt, 8–25-bl., Bl.-Stiele dünn, bis 2 cm, unterste bis 3 cm; Bl. vgl. Fig. 196c–d¹, A. weiß, Fr. blauschwarz, stark bereift, 6–7 mm lang.

B. p. FRANCH., in Bull. Soc. bot. France 1886. 387. — Bereifte B. — China (Yunnan) in Gebüsch. — Blz. IV–V, Frz. VIII–XI. — Eine der schönsten neuen Arten der letzten Jahre. Scheint bis etwa Prov. IV–V hart.

β) B. unters. hellgrün, kaum deutl. weißlich.

*) Vgl. eventuell auch *hookeri* var. *candidula* S. 303.

C B. ganzrandig o. mit je 1—2 Zähnehen, höchstens an Jugendformen mehrzählig.

• • Zw. (meist) fein beh., gestreift, rotbraun, B. ohne Hypoderm. breit spatelfg. o. elliptisch, im Mittel nicht über 2 cm lang, Bl. einzeln (ausgenommen var. d).

12. *B. buxifolia*: b, 0,3—0,75(—2) m, Wuchs aufrecht, später übergeneigt, Dorne 1—4-teilig, meist nicht über 1,5 cm; B. — sitzend, 0,7—2:0,3—0,8 cm, o. $\pm$ gestielt, bis 4,5:1,2 cm; Bl. ziemlich groß, goldgelb, so lang bis doppelt so lang als B. gestielt, vgl. Fig. 194 g—k. Fr. blauschwarz, kaum bereift, S. 7—12.

Man kann unterscheiden: var. a. *typica*: ☉ Zw. beh., B. unters. papillenfrei, Dorne — kürzer als B. o. fast null, Bl. einzeln, hierher als Jugendform mit gestielten, z. T. etwas gezähnten B. und ohne Dorne f. *pygmaea* (*B. pygmaea* KOEHNE, Dendrol. 166, 1893) und als Zwergform des Typus f. *nana* (*microphylla nana* DIPP., Laubh. III, 135, 1892), sowie als Form mit — fehlenden Dornen f. *inermis* (*B. inermis* PERS., Syn. pl. 1, 387, 1805). — var. b. *spinosissima*: REICHE, Fl. chil. I, 39, 1896 (var. *macracantha* PHIL., ex USTERI, in Mitt. D. D. G. 1899, 90) Dorne bis 3 cm, die B. $\mp$ überragend. — var. c. *papillosa*: ☉ Zw. fast kahl, B. unters. deutl. papillos, Fr.-Stiele bis fast 3 cm, Fr. etwa 8 mm Dm. — var. d. *microphylla*: SPEG., ex ALBOFF, Essai fl. Terre de feu, 1807 (*B. m. FORST.*, in Comm. Goett. IX, 29, 1789) stets kahl, Bl. zu 3—5 in fast sitzender Scheindolde; B. eher dünner, htg. mit 2—4 feinen Zähnehen, ob sommergrün? Vielleicht gute Art, doch lag mir zu wenig Material vor.

B. b. LAM., ex POIR., in LAM. Encycl. VIII, 619, 1808 (*B. dulcis* SWEET, Flow.-Gard. ser. II, t. 100, 1823). — Buchsbaum-B. — S.-Chile bis Feuerland. — Blz. IV—V. — Frz. VIII—IX. — Schöner Zier-b., nach USTERI als Unterlage für empfindliche südamerikanische Arten wertvoll. Verträgt viel Schatten. Interessant sind besonders die durch künstliche Vermehrung — konstant zu erhaltenden Jugendformen, die habituell oft sehr variabel, aber kaum in mehrere besonders zu benennende trennbar sind.

+ • • Zw. kahl, rundlich, gelbgrau, B. mit Hypoderm, nicht unter 3—4 cm lang, ganzrandig o. schmal-lanzettlich meist 2-zählig. Blst. 4— ∞ -bl.

+ B. 1,5—3:0,5—1 cm, $\pm$ sitzend, Blst. bis 2,5 cm, 4—5-bl.

13. *B. ruscifolia*: b, Höhe ?, Dorne bis 12 mm; B. beiders. ziemlich gleichfarben, glatt, glänzend; Bl. klein, etwa 6 mm Dm., K. und C. eirundlich, Stbf. mit Konnektivverlängerung, Gr. deutl., Sa. 5, Fr. blauschwarz, eirundlich, 6—7 mm lang.

B. r. LAM., ex POIR., Encycl. VIII, 619, 1808. — Mäusedorn-B. — Argentinien (Buenos Aires, Cordoba), auch Chile? — Was als *ruscifolia* mir aus Gärten zuing, war *lycium*. Ob USTERIS Aussaaten von heimischen S. Erfolg hatten, wurde mir nicht bekannt.

++ B. 3—7,5:7—3 cm, Stiel kurz; Blst. bis 12 cm, 15—50-bl.

14. *B. laurina*: b, bis etwa 1,5 m; Dorne 3-teilig, schwach o. bis fast 3 cm; B. zieml. dünnlederig, auf der helleren Unterseite Nerven mäßig deutlich; Bl. bis 1 cm lang gestielt, bis 8—10 mm Dm.; K. und C. gerundet, Stbf. ohne Konnektivspitze, Gr. deutlich, Sa. 2—5, Fr. schwarz, bereift.

B. l. BILLBG., in THBG., Plant. Bras. Dec. I, 8, 1817 [t. 2, fig. 2 s. n. *laurifolia* *glaucescens* ST. HIL., Fl. bras. mer. 46, t. 10, 1825; *andrea* NAUD., in Rev. Hort. 1866, 96. — Lorbeer-B. — S.-Brasilien, Uruguay. — An der Riviera in Kultur, für Prov. VI—VII sehr wohl versuchswert.

CC B. stets mehrzählig, wenn Zähnehen — null, so Unterseite auffallend weiß, Hypoderm fehlt.

* B. 4—6:1, Bl. einzeln, gebüschelt, Zw. kahl.

+ B. lineal-lanzettlich, kaum bis 1 cm breit (Fig. 196 e).

15. *B. sanguinea*: b, 2—3 m; Zw. kahl, braungrau, leicht kantig; Dorne bis 1,8 cm; B. 2—5(—6):0,3—0,8 cm, ober- u. tiefgrün, unters. heller. Nerven kaum zu sehen; Stiel 1—3 mm; Bl. zu 2—4(—8), bis 2 cm lang gestielt. K. = rot, C. gelb, Dm. 6—8 mm, Sa. 1—2, vgl. Fig. 196 f—g¹.

B. s. FRANCH., in Nouv. Arch. Mus. Paris, sér. 2, VIII, 12. 1888. — Rotblütige B. — China (Szechuan). Blz. IV. Hierher scheint eine junge Pflz. zu gehören, die ich im Hort. SIMON-LORIS als Spec. Thibet sah. Eine interessante, wohl relativ harte Art (Prov. V—VI?). *B. stenophylla* HANCE, in Jour. of Bot. 1882. 257, scheint mir identisch damit, höchstens eine reichblütigere Form zu sein. Der Name müßte sowieso *stenophylla* LDBL. 1864 halber eingezogen werden.

†— B. länglich bis breit-lanzettlich, kaum unter 8 mm breit.

△ B. (2—)2,5—5:(0,8—)1—1,5(—1,8) cm (Fig. 196 k), Bl. zu 1—6, 1,6—2 cm lang gestielt.

16. *B. hookeri*: b. Höhe ?, Zw. kahl, gelb- o. rotbraun, kantig; Dorne schlank, zweifarben, bis etwa 1,5 cm; B. vgl. var., Rand umgebogen, Dornzähnen etwas *ilex*-artig hin und her gebogen, ober- u. höchstens Hauptnerven deutlicher; Bl. außen bleicher als innen, etwa 1,5 cm Dm., C. nicht immer ausgerandet, Sa. (1—)4, ± sitzend, vgl. Fig. 196 l—m¹, Frucht schwarzblau.

Fig. 196. *Berberis*-Arten: a—d₁ *pruinosa*: a großes B. von Lohden; b Zw.-Stück mit B., Dorn und Frst.; c K.; c¹ C.; d Stb.; d¹ Gyn. — e—g¹ *sanguinea*: e B.-Formen; f—g¹ wie c—d¹. — h—m¹ *hookeri*: h—i B., Dorn und Bl. von var. *candidula*; k—m¹ var. *typica*: k B.; l C.; l¹ Stb.; m Gyn. und links Sa. vergrößert; m¹ Fr. — n—p *wallichiana*: n B.; o—p wie c—d¹, bei p rechts die einzige langgestielte Sa. — q—v *aristata*: q B.; r—u = c—d¹, v Fr. (Original).

var. *a. typica*: B. unters. hellgrün, Maße wie oben, Bl. zumeist 3—6. —
var. *b. candidula*: B. unters. schneeweiß, bereitt, vgl. Fig. 196 h—i. Bl. einzeln, ob immer? Diese prächtige Form erhielt ich aus Hort. VILMORIN.

B. h. LEMAIRE, in Ill. Hort. VI, t. 207. 1859 (*B. jamesoni* et *wallichiana* HORT. NONN). Himalaya? Blz. V; Frz. IX. Diese Art ist mit keiner der von HOOK. f. et TH. in Flor. ind. o. Fl. brit. ind. geführten Formen zu identifizieren. Über den echten *wallichiana* vergleiche folgende Art. Unserem *hookeri* stehen sehr nahe ein Expl. der *wallichiana macrocarpa* HOOK. f. et TH. aus Khasia und ein solches als *wallichiana var.* bezeichnetes Herb. GRIFFITH No. 1251 aus dem O.-Himal. Das erste möchte ich aber doch für eine Form des echten *wallichiana* halten, denn die allein vorh. Fr. zeigen am einzigen S. noch deutl. den langen Funiculus. GRIFFITHS Expl. ist wenig gut erhalten und zeigte nur eine, aber sitzende Sa. Es ähnelt in den kleinen B. am meisten var. *candidula*, besitzt

aber nicht deren weiße Unterseite und mehrblütige Blst. Da HOOKER r. et TH. ihre *Berberis* ziemlich ungenau bearbeitet zu haben scheinen, so dürfte sich *hookeri* sicher noch für den Himal. nachweisen lassen. Jedenfalls eine schöne, für Prov. VI—VII sicher zu empfehlende Art.

△△ *B.* im Mittel nicht unter 6:1,5--2 bis 9:3 cm (Fig. 196 n), Bl. zu 10--20, 1--1,5 cm lang gestielt.

17. *B. wallichiana*: weicht von *hookeri* noch ab: Zw. mehr gelbbraunlich o. braungrau, Dorne meist fein und kurz, zuweilen auch bis 2 cm; B.-Zähne feiner, vorwärts gerichtet, Nervatur auch obers. deutlicher: Bl. kleiner, Sa. 1, langgestielt, vgl. Fig. 196 o—p.

Fig. 197. *Berberis*-Arten: a--c *thunbergi*: a Gyn. im L.-Schnitt; a¹ Stb.; b Fr.; b¹ S. von unten, oben und im Q.-Schnitt; c B.-Formen. d *thunbergi* var. *minor*: B. e *culgar*: e Krztr. mit Blst.; f Bl.; f¹ dgl. im L.-Schnitt, f² Stb.; g Fr.; g¹ dgl. im L.-Schnitt; g² S. h--l *fendleri*: h äußere K.; h¹ C. Stb.; h² Gyn. im L.-Schnitt; i Fr.; j B.-Formen. m--n *serotina*: m Stb.; m¹ Gyn. im L.-Schnitt; m² Fr.; n B.-Formen. o--q *viridens*: o Gyn.; o¹ Stb.; p Fr.; q B.-Formen. r--t *crataegina*: r Gyn. im L.-Schnitt; r¹ Stb.; s Fr.; s¹ S.; t B.-Formen. u--z *hetzeri*: u B.; v Frst.; v¹ Bl.; v² Stb.; v³ Gyn. im L.-Schnitt; z S. (e--g² nach BAILLON, o--o¹ nach HOOKER, sonst Orig.)

B. w. DC., Prodr. I, 107. 1824 (*B. atrovirens* WALL., Pl. as. rar. III, 23, t. 243. 1832). -- Nepal, Sikkim, Khasia, Java. Aus Kultur sah ich nur ein Expl. im Hb. ZABEL ex Hort. VAN HOUTTE, was sich seinerzeit in Munden nicht gehalten hatte. Möglicherweise ist die Himalaya-Pflanze mit der aus Java, wozu

Bau und Leben unserer Waldbäume. Von Dr. M. Büsgen, Prof. an der
Grossh. Sachs. Forstlehranstalt in Eisenach. Mit 100 Abbildungen. 1897.
Preis: 6 Mark.

Die Farnkräuter der Erde. Beschreibende Darstellung der Geschlechter und
wichtigeren Arten der Farnpflanzen mit besonderer Berücksichtigung der Exo-
tischen. Von Dr. H. Christ, Basel. Mit 291 Abbildungen. 1897. Preis: 12 Mark.
Soeben erschienen:

Die Theorie der direkten Anpassung und ihre Bedeutung für das An-
passungs- und Deszendenzproblem. Versuch einer methodologischen Kritik des
Erklärungsprinzips und der totalistischen Tatsachen des Lamarckismus. Von
Dr. phil. Karl Detto, Assistent am botanischen Institut der Universität Jena.
Mit 17 Abbildungen im Text. Preis: 4 Mark.

Inhalt: I. Methodologische Voraussetzungen. II. Die organische Zweck-
mäßigkeit und das Ausgangsproblem. III. Die Lamarckistischen Theorien, ihr
Erklärungsprinzip und ihre Konsequenzen. IV. Die Thatsachen der direkten An-
passung und die Möglichkeit ihrer kausal physiologischen Deutung. V. Indirekte
Ökogenese als Erklärungsprinzip der Selektionstheorie.

Die Keimpflanzen der Gesneriaceen mit besonderer Berücksichtigung von
Streptocarpus, meist vergleichenden
Studien über die Morphologie dieser Familie von Dr. Karl Fritsch, o. ö. Pro-
fessor der Botanik an der k. k. Universität in Graz. Mit 8 Abbildungen im
Text. Preis: 4 Mark 50 Pfg.

Vorlesungen über Pflanzenphysiologie. Von Dr. Ludwig Jost, a. o. Prof.
an der Universität Strassburg. Mit 12 Abbildungen. Preis: brosch. 13 Mark,
geb. 15 Mark.

Pathologische Pflanzenanatomie. In ihren Grundzügen dargestellt. Von
Dr. Ernst Küster, Dozent für Botanik
an der Universität zu Halle a. S. Mit 121 Abbildungen im Text. 1903.
Preis: 8 Mark.

Botanische Zeitung, Nr. 17 v. 1. September 1903.

Das vorliegende Buch wird jedermann zur Orientierung in dem behandelten Gebiet
erwünscht und angenehm sein, weil es eine Reihe von Dingen im Zusammenhang bespricht,
über die man sonst nur sehr zerstreute Einzeluntersuchungen findet und weil es eine aus-
gedehnte und sorgfältige Verarbeitung der einschlägigen Literatur enthält. Insofern füllt
es eine Lücke aus, und kann es als ein unentbehrliches Handbuch bezeichnet werden.

Leuchtende Pflanzen. Eine physiologische Studie von Professor Dr. Hans
Molisch, Direktor des pflanzenphysiologischen Institutes
der k. k. deutschen Universität Prag. Mit 2 Tafeln und 14 Textfiguren. 1904.
Preis: 6 Mark.

**Ein Blick in die Geschichte der botanischen Morphologie und die
Pericaulom-Theorie.** Von Dr. Hans Potonié, Königl. preuß. Landesgeo-
loge und Professor bzw. Privatdozent der Palaeo-
botanik an der Königl. Bergakademie und der Universität zu Berlin. Mit
9 Abbildungen. Preis: 1 Mark.

Naturwissenschaftliche Wochenschrift einschliesslich der Zeitschrift „Die
Natur“. Halle a. S. seit April 1902. „Organ der deutschen Gesellschaft
für volkstümliche Naturkunde in Berlin“. Herausgegeben von Prof. Dr. H.
Potonié und Oberlehrer Dr. F. Koerber in Grosslichterfelde W. bei Berlin.
Preis: Vierteljahrl. 1 Mark 50 Pf.

Trotz des reichen Inhalts der Zeitschrift ist der Preis sehr niedrig angesetzt worden, um
jeden zu ermöglichen, eine naturwissenschaftliche Zeitschrift selbst zu halten. Preis er-
höht sind durch jede Buchausgabe von der Verlagshandlung eingetragene Rechte.

Pflanzengeographie auf physiologischer Grundlage. Von Dr. A. E.
W. Schimper, a. o. Prof. an der Univ. Bonn. Mit 302 als Tafeln oder in den
Text gedruckten Abbildungen im Autotyp, 5 Tafeln im Lichtdruck und 1 geo-
graphischen Karten. 1898. Preis: brosch. 27 Mark, eleg. in Halbfranzgeb. 30 Mark.

Verlag von GUSTAV FISCHER in JENA.

Vor Kurzem wurde vollständig die erste Reihe von:

Vegetationsbilder. Von Dr. G. Karsten, Prof. an der Universität Bonn, und
Dr. H. Schenck, Prof. an der technischen Hochschule Darmstadt.

Unter den Namen „Vegetationsbilder“ erscheint hier eine Sammlung von Lichtdrucken, die nach sorgfältig ausgewählten photographischen Vegetationsaufnahmen hergestellt sind. Verschiedenartige Pflanzenformationen und Genossenschaften möglichst aller Teile der Erdoberfläche in ihrer Eigenart zu erfassen, charakteristische Gewächse, welche der Vegetation ihrer Heimat ein besonderes Gepräge verleihen, und wichtige ausländische Kulturpflanzen in guter Darstellung wiederzugeben, ist die Aufgabe, welche die Herausgeber sich gestellt haben.

Der Preis für das Heft von 6 Tafeln ist auf 2.50 Mark festgesetzt worden unter der Voraussetzung, daß alle Lieferungen bezogen werden. Einzelne Hefte werden mit 4 Mark berechnet.

Die erste Reihe bilden folgende Hefte:

Heft 1. Tafel 1—6. Südbrasilien.	Heft 6. Taf. 31—36. Monokotylenbäume.
Heft 2. „ 7—12. Malayischer Archipel.	Heft 7. „ 37—42. Suandvegetation Brasiliens.
Heft 3. „ 13—18. Trop. Nutzpflanzen.	Heft 8. „ 43—48. Mexikan. Cacteen-, Agaven- und Bromeliaceen-Vegetation
Heft 4. „ 19—24. Mexikan. Wald und Tropen u. Subtropen.	
Heft 5. „ 25—30. Südwest-Afrika.	

Beiträge zur Lehre von der Fortpflanzung der Gewächse. Von Prof.

Dr. M. Möbius in Frankfurt a. M. Mit 26 Abbildungen im Text. 1897. Preis: 4 Mark 50 Pf.

Praktikum für morphologische und systematische Botanik. Hilfsbuch bei prak-

tischen Übungen und Anleitung zu selbständigen Studien in der Morphologie und Systematik der Pflanzenwelt. Von Professor Dr. Karl Schumann, weil. Kustos am Königl. Botanischen Museum und Privatdozent an der Universität zu Berlin. Mit 154 Figuren im Text. 1904. Preis: 13 Mark, geb. 14 Mark.

Das botanische Praktikum. Anleitung zum Selbststudium der mikroskopischen

Botanik für Anfänger und Geübtere, zugleich ein Handbuch der mikroskopischen Technik, von Prof. Dr. Eduard Strasburger. Vierte umgearbeitete Auflage. Mit 230 Holzschnitten. 1902. Preis: 20 Mark, geb. 22 Mark 50 Pf.

Streifzüge an der Riviera von Eduard Strassburger, o. ö. Professor der Botanik an der Universität Bonn. Illustriert von Louise Rensch. Zweite, gänzlich umgearbeitete Auflage. 1904. Preis: brosch. 10 Mark, elegant geb. 12 Mark.

Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. Von Dr. Eduard Strasburger,

o. o. Prof. an der Universität Bonn, Dr. Fritz Noll, Prof. a. d. Landw. Akad. Poppelsdorf, a. o. Prof. an der Univ. Bonn, Dr. Heinrich Schenck, Prof. an der technischen Hochschule Darmstadt, Dr. George Karsten, a. o. Prof. an der Univ. Bonn. Sechste, umgearbeitete Auflage. Mit 741 zum Teil farbigen Abbildungen. 1904. Preis: brosch. 7 Mark 50 Pf., geb. 8 Mark 50 Pf.

Soeben erschien:

Beiträge zur Frage des naturwissenschaftlichen Unterrichtes an den höheren Schulen von W. Detmer-Jena, R. Hertwig-München, M. Verworn-Göttingen, H. Wagner-Göttingen, J. Wagner-Leipzig, J. Walther-Jena, gesammelt und herausgegeben von Max Verworn. Preis: 1 Mark 50 Pf.

Soeben erschien die zweite verbesserte Auflage von:

Vorträge über Descendenztheorie, gehalten an der Univ. Freiburg i. B.

Von Prof. August Weismann. Mit 3 farbigen Tafeln und 131 Textfiguren. Preis: 10 Mark geb. 12 Mark.

Frankfurter Zeitung. Nr. 287 vom 16. Oktober 1902 sagt über die erste Auflage:

Wenn ein Naturforscher von der Bedeutung Weismanns, der während eines langen Lebens über die tiefsten Probleme der Biologie geforscht, gedacht und geschrieben hat, ein anregendes Werk über die Abstammungslehre erscheinen lässt, so sollte dies nicht nur die Fachgelehrten angehen, sondern es sollte ein Ereignis für die ganze gebildete Welt sein.

ZABELS Expl. gehören könnte, nicht identisch und würde diese als var. *xanthoxylon* (*B. xanthoxylon* HASSK., Cat. Hort. Bog. alt. 180. 1844) zu führen sein. Der HOOKERsche Typ zeigt längere und schmälere B. (4 11:1 1,8 cm) und stärker gefurchte Zw., die bei der Java-Pflz. eher rundlich sind. Leider scheint die schöne Art für uns als Freilandpflz. aussichtslos.

++ B. 2 3:1. Bl. in zusammengesetzten Trauben, Zw. beh.

18. *B. chitria*: b, 0,6—1,8 m; ♂ Zw. gelbrot- o. tiefrotbraun, z. T. rundlich; Dorne schlank, bis 1,8 cm; B. 2,5—7:1—3 cm, vgl. Fig. 197 u o. ganzrandig. Textur und Farbe analog *aristata*; Blst. wie Fig. 197 v, bis 13 cm lang, im Mittel etwa 20-bl.; nackter Stiel hfg. $\frac{1}{2}$ so lang wie Blst., Bl. tiefgelb, z. T. gerötet, vgl. Fig. 197 w—z, die (4) Sa. bei y sind manchmal nicht ungleichlang gestielt, aber ungleich hoch inseriert, Fr. wie bei *aristata*, aber Gr. etwas länger.

B. ch. LDL., Bot. Reg. t. 729. 1823 (*aristata* SIMS, Bot. Mag. t. 2549. 1825 et AUCT. AL. nec DC.; *gratissima* KLOTZSCH, in Bot. Ergeb. Reise Wald. 130. 1862). — Chitria-B. Himal. (von Simla bis Nepal und in Sikkim in einer etwas abweichenden Form verbreitet). Gebirgswälder zwischen 3—4000 m. Blz. VI—VIII. — Die typische *aristata* hat nach DC.s guter Beschreibung »racemi . . . sat racemis B. vulgaris similes». DE CANDOLLE hat seine Pflz. aus Nepal von BUCHANAN-HAMILTON unter dem Namen *chitria* erhalten. HAMILTON hat aber augenscheinlich auch die hier beschriebene Form als *chitria* ausgegeben und solche Exemplare hat dann LINDLEY beschrieben. Sie gehen fälschlich als *aristata* in den Gärten und in der Literatur. Siehe im übrigen unter *aristata*.

B. B. sommergrün, von derb- oder dünnhäutiger Konsistenz (in Zweifelsfällen vgl. auch unter A. Seite 297).

I. B.-Unterseiten deutlich papillös*, . . . weißlich o. hellgrau. II siehe S. 308

a) Bl. gebüschelt oder in kurzgestielten, selten mehr als 5-blütigen Scheindolden.

○ B.-Unterseiten deutlich weißlich, dicht papillös, Fr. länglich-elliptisch, pflaumenrot, mit angedeutetem Gr.

19. *B. virescens*: b, 0,6—1,5 m; ♂ Zw. kahl, meist rundlich und lebhaft glänzend gelbrot, . . . dunkel- o. purpurbraun; Dorne normal, schlank, bis 1,8 cm; B. 1—3 $\frac{1}{2}$ —4:0,8—1,5 (2) cm, vgl. Fig. 197 q, an jungen Pflanzen hfg. langgestielt und rundlicher, ganzrandig fast nur an Bl.-Zw.; Bl. blaßgelb, zuweilen in kurztraubigen Scheindolden, innerer K. größer als C., diese an Spitze eingeschnitten, Stb. ohne Konnektivspitze, die Zeichnung in Fig. 197 o—q ist ungenau!, Sa. 1—4; Fr. etwa 10:4—5 mm, bereift.

B. v. HOOK. f., in Bot. Mag. t. 7116. 1800. — Blaßblütige B. — Himal. (Sikkim, Bhutan). Gebirgswälder c. 3000 m. Blz. V—VI. Frz. X. Vielleicht bis Prov. III harte durch ihre Holzfärbung ausgezeichnete Art.

○○ B.-Unterseiten weißlich- o. hellgraugrün, Fr. dick-elliptisch.

+ Dorne gewöhnlich über 1,5 cm lang, Fr. opalfarben, an Spitze mit wurstförmigem, gedrehtem Fortsatz (Fig. 198 g).

20. *B. diaphana*: b, bis 3 m; ♂ Zw. gefurcht, kahl, . . . gelbbraun, . . . grau; Dorne normal, ziemlich kräftig, mittlere 1—4 cm; B. vgl. Fig. 198 a—b, meist auch am Bl.-Zw. gezähnt, 2—4:0,8—2,8 o. bis 5:2,8 cm; Bl. zu 1—5, bis 3 cm lang gestielt, sattgelb, ca. 12—14 mm Dm., sonst vgl. Fig. 198 c—g.

*) Wenn Blätter mit oberseitigen Sp. so vgl. unter *B. integerrima* S. 308; ebenso vgl. eventuell unter *thunbergi* S. 309.

B. d. MAXIM., in Bull. Ac. Imp. Pétersbg. XXIII. 309. 1877. — Durchscheinende *B.* — China (Kansu, ob auch Sz'tschwan?). Im Gebirge bis über 3000 m. — Blz. V; Frz. VIII–IX. — Bis etwa Prov. III harte, noch wenig verbreitete Art.

✱✱ Dorne meist unter 1 cm lang. Fr. rotgelb o. rot, wie Fig. 198n.

21. *B. yunnanensis*: $\mathfrak{h}$, bis 2 m; sonst im wesentlichen wie *diaphana*, nur Zw. rundlicher, Blätter im Mittel kleiner, an Bl.-Zw. meist ganzrandig; Bl. bis 18 mm Dm., Details wie Fig. 198 h–n.

B. y. FRANCH., in Bull. Soc. bot. France 1886. 388. — Yunnan-B. — China (Yunnan), Gebirge bis 3200 m. — Blz. V. — Frz. VII–VIII (IX). — Sah ich nur aus Hort VILMORIN und vom Arnold Arboretum. Dieser gewiß harten Art kommt in der Größe der Fr. nur *B. macrosepala* HOOK. f. et TH., Fl. ind. II. 228. 1855 aus Sikkim gleich, die im wesentlichen nur durch sehr fein beh. $\odot$ Zw. abweicht.

b) Blst. meist über 10-blütig, entweder deutlich gestreckt-traubig o. 2–3 cm lang gestielte Scheindolden bildend.

$\odot$ Bl. in 2–3 cm lang gestielten, z. T. etwas verästelten Scheindolden.

22. *B. umbellata*: $\mathfrak{h}$, Bl.-Zw. grau, kantig, mit feinen Haarresten, Dorne gerade, rundlich, 1–2 cm lang; B. lanzettlich oder verkehrt-eilanzettlich, fast durchweg ganzrandig, 2:0,5–3:1 cm; Stiel sehr kurz; Bl. ?, ich sah nur Frst. mit jungen, etwa 7:3 mm messenden, griffellosen 3–4-samigen Fr., deren Stiele 5–9 mm maßen.

B. u. WALL., Cat. No. 1475. 1829, ex parte. — Doldige *B.* — Himal. (Nepal), ca. 3500 m. — Fr. im September noch nicht reif. — Meines Erachtens gehört das, was ich hier beschreibe, zur echten *umbellata*, die nicht in Kultur ist! HOOKER et THOMSON zitieren dazu Bot. Mag. t. 2549, die aber nur eine schwachblütige *B. chitria* darstellt. Vgl. meine Sonderarbeit.

$\odot\odot$ Bl. in deutlichen Trauben.

✱ *B.* sämtlich gezähnt, breit- o. rundlich-eifg., 3:3–4,5:3,5 cm. Bl. in ährigen Trauben, klein, ca. 6 mm Dm.

23. *B. dasystachya*: $\mathfrak{h}$, bis 3,50 m; $\odot$ und $\odot$ Zw. grau, schwachkantig, Dorne 1–3 cm; B. an Basis plötzlich in den 0,8–2,5 cm langen Stiel zusammengezogen; Blst. 3,5–5,5 cm, Bl. kurzgestielt *), K. etwa $\odot$, diese nicht ausgerandet, Stbf. ohne Konnektivspitze, Fr. ?

B. d. MAXIM., in Bull. Ac. Pétersbg. XXIII. 308. 1877. — O.-China (Kansu, Tangut, Sz'tschwan). — Einführens-wert!

✱✱ *B.* nur zum Teil gezähnt.

† $\odot$ Zw. hellgelbgrau, rund, fein beh., B. vgl. Fig. 198o–p, unterseits glatt, weißgrau, oberseits weitmaschig geadert.

24. *B. lycium*: aufrechter $\mathfrak{h}$, bis über 2 m; $\odot$ Zw. grau; Dorne gelbbrau, 0,8–2 cm; B. 1,8–5:0,5–1,2–1,6 cm; Blst. 2–8 cm, 10–bis etwa 25-blütig, Bl. gelb, 6–18 mm lang gestielt, innere K. größer als $\odot$, sonst vgl. Fig. 194r–s, Fr. bis 10:7 mm ohne den Gr.

B. l. ROYLE, in Trans. Lin. Soc. XVII. 94. 1837. — Bocks-dorn-B. — Himalaya (Kaschnir bis Simla); an sonnigen Plätzen zwischen 1000 und 3000 m. — Blz. V–VI; Frz. VIII–IX. — Ich erhielt diese Art als *B. umbellata*, *glaucescens* und *culgaris* var. *elegans*, sie geht auch als *ruscifolia*. Geschützte warme Lagen in Prov. VI–VII.

*) Es scheint, nach MAXIMOWICZ' Angaben, daß hier gar keine Trauben, sondern in den Achsen 2. Grades zymose Blst. vorliegen. Leider sah ich bis heute nur sterile Exemplare und aus des Autors Abbildung in Flor. tangut. t. 7. Fig. 1–7 geht nichts Sicheres hervor.

1-1 (●) und (○) Zw. glänzend graupurpurbraun, meist rund, kahl; B. vgl. Fig. 198p o. wie r, im Alter beiderseits feinnetzig geadert, unterseits mehr grau.

Fig. 198. *Berberis*: a—g *diaphana*: a B., b Blst., c K., d C., e Gyn., f Stb., g Fr. — h—n *yunnanensis*: h B.-Formen, i K., k C., l Stb., m Gyn. und Sa., n Fr. — o *lycium*: B.-Formen (vgl. auch Fig. 194r—s). — p—q *nummularia*: p B., q Fr. — r—v¹ *integerrima*: r B., s K., t C., u Stb., v Gyn. und Sa., v¹ Fr. — w—w⁴ *aetnensis*: w B., w¹ K. und C., w² Gyn., w³ Stb., w⁴ Fr. — x—z *dictyophylla*: x B., x¹ Blst., y K., y¹ Stb., z Fr. (b—e nach MAXIM., g n. KOEHNE, sonst Original).

25. *B. nummularia*: b, wohl bis über 2 m; Zw. allmählich grau werdend; Dorne meist einfach, zweifarben, rundlich, kräftig, bis 3 cm; B. bei dem Typ (siehe unten) nicht papillös, 2:1,2—5:3—4 cm; Blst. schlanktraubig, dicht blütig, Bl. klein, ca. 6 mm Dm., ihre Stiele 4—6 mm lang, Fr. schwarz, kugelig-eifg., ca. 6—7 mm Dm. (Fig. 198q), vgl. sonst s—v, die C. sind nicht immer ausgerandet und die Stiele der Sa. zuweilen ein wenig kürzer oder ein wenig länger.

B. n. BGE., in Arbeit. naturf. Ver. Riga I. 130. 1847. — Münzen-B. — Von Turkestan (Thian-Schan, 2500—3000 m, Tschatkal) und der Bucharei (Karatau-Gebirge) durch N.-Pers. bis russisch Armenien. Bes. in felsigen, sonnigen Lagen. Blz. V—VI; Frz. IX. — Diese Art unterscheidet sich von *B. integerrima* im wesentlichen nur durch das Fehlen der obers. Sp. sowie kleinere Bl. und kleinere Fr. Die Papillen treten nicht immer auf. In meiner Sonderarbeit führe ich die Form mit vorwiegend rundlichem Laube als var. *typica* und von den Formen mit B. wie *integerrima* diejenige ohne Papillen als var. *stenophylla* und die mit deutlichen Papillen als var. *pyrearpa* (*B. integerrima* var. *pyrearpa* Rgl. in Act. Hort. Petrop. V. I. 228. 1877). Nur der Typ und dieser auch sehr selten, ist als *B. integerrima* in Kultur. — Hier sei auch noch eine interessante Art, *B. caroli* C. K. SCHN. [Sonderarbeit (*B. integerrima* var. *stenophylla* MAXIM., Fl. tangut. 29. 1886) über *B. stenophylla* LDB.] aus der S.-Mongolei und NW-China erwähnt, die durch schmäl-

lanzettliche, höchstens 8 mm breite Blätter ausgezeichnet ist. Sie bewohnt die Flußtäler des Hoangho und dringt wohl auch in die Steppengebiete vor.

II. B.-Unterseiten nicht papillös*).

a) B.-Oberseiten mit Sp.

○ B. lanzettlich, ganzrandig, nur 0.8—1.6:0.2—0.7 cm, vgl. Fig. 194d.

26. *B. cretica*: b, 0.4—0.6 (—1) m, sparrig verästelt, (•) Zw. purpurbraun, oft leicht beduftet, gestreift, c braungrau o. grau; Dorne ∞ , bis 22 mm lang; B. oben dunkler, unten heller grün; Blst. büscheltraubig, 2—7-blütig; C. ausgerandet, etwa so lang wie K., Sa. 2, sonst vgl. Fig. 191e—f, Fr. schwarzrot, bereift.

B. c. L., Sp. pl. 331. 1753. — Kreta-B., cretan B., v. de Crète — Thessal., Mazed., Griechl., Kreta, Samos, Cypern; Gebirge zwischen 900—2000 m. — Blz. V. — Frz. VIII—IX. — Sah ich nie echt in Kultur, nur aus alter Zeit ein Exemplar aus Hort. Valleyres. Bei uns wohl auch nur Kalthauspflanze. Dagegen vgl. *B. libanotica*.

○○ B. größer o. gezähnt und scharf geadert.

✕ B. vorwiegend ganzrandig o. jedenfalls nicht wie Fig. 198w gezähnt.

+ B. vgl. Fig. 198r, wenigstens im Alter derb und beiders. feinnetzig geadert, mehr graugrün, Sa. wie 198v.

27. *B. integerrima*: man vgl. im übrigen das bei *B. nummularia* Gesagte. B. 2.5:1—4:2 cm; Fr. 5—6:4 oder 8:4 mm, ihre Stiele 5—6 o. 8—10 mm lang.

B. i. BGE., in Arb. naturf. Ver. Riga I. 129. 1847 (*B. densiflora* BOISS. et BUNSE, in Nouv. Arch. Soc. nat. Mosc. VII. 9. 1860; *B. pachyantha* BIENERT, in Herb. BUNGE, nec KOEHNE). — Ganzrandige B. — Von Turkestan, S.-Transkasp. durch ganz Pers. bis türk. Armenien. — Vornehmlich im Gebirge. — Blz. Ende V. — Frz. IX. — Die Varietäten vgl. in meiner Sonderarbeit. Die echte *densiflora* ist eine Var. mit unterseits nicht papillösen B., während der Typ Papillen besitzt. Die Zähnung der B. und die Art der Bedornung wechselt ebenso sehr wie die Form und Größe der Blst. Fr. zur Reifezeit wohl fast schwarz und $\frac{1}{2}$ bereift.

++ B. vgl. Fig. 197t, dünnhäutig, meist hellgrün, Adernetz kaum hervortretend o. weit, Sa. wie r.

28. *B. crataegina*: b, bis etwa 1.5 m; (•) und (••) Zw. kahl, glänzend dunkelbraunrot, rundlich o. leicht kantig, c grau; Dorne meist einfach, 0.8—3 cm, flachrundlich; B. 1—4:0.3—1.3 cm, meist ganzrandig; Blst. 2—5 cm, 6—20-blütig; Bl. gelb, ca. 8 mm Dm., C. meist etwas ausgerandet, den K. gleichlang, Fr. schwarzrot, vgl. Fig. 197r—s.

B. c. DC., Prodr. II. 9. 1821. — Weißdorn-B. — Klein-As. (Lycaonien, Cilicien, Kappadozien, türk. Armen., Lyzien), Gebirge bis etwa 2000 m. — Blz. V. — Frz. VIII. — Nicht echt in Kultur. Eine gute, aber variable Art, deren Varietäten ich hier nicht besprechen kann.

✕✕ B. sämtlich scharfzähnig, vgl. Fig. 198w.

29. *B. aetnensis*: b, meist niedrig und gedrungen wachsend; (•) Zw. kantig, kahl, gelbgrau o. etwas gebräunt, c grau; Dorne ∞ , 3-, selten 5-teilig, geturcht, 1—2 cm; B. 1.5—2:0.6—1 o. auch bis 4.5:1.5 cm, beiderseits scharf geadert, graugrün; Blst. 2—3 cm, 8—14-blütig; Sa. 2, vgl. Fig. 198w¹—w⁴, Fr. rot (zuletzt wohl schwärzlich).

B. a. PRSL., Fl. sicula I. 28. 1826. — Aetna-B. — Sizilien und Kalabrien, sonnige Gebirgshänge. — Blz. VI—VII. — Frz. IX—X. — Nicht in Kultur. — Ihr nächstverwandte ist *B. boissieri* C. K. SCHN. (Sonderarbeit) von Sardinien und Korsika, abweichend durch hellgrüne, schwächer genervte, mehr rundliche B. und meist nur 2—3-blütige Blst.

b) B.-Oberseiten ohne Sp.

*) Vgl. eventuell auch bei *B. nummularia*.

⊖ Bl. zu 1—4 gebüschelt o. in 2—4-blütigen kurzgestielten Schein- ⊖ ⊖ S 310
dolden (wenn diese ziemlich lang- und feingestielt und B. ringsum
dicht fein wimperzählig siehe *B. sieboldii*).

* ⊙ und ⊖ Zw. fein dicht beh., ebenso Bl.-Stiele.

30. *B. angulosa*: b, bis 1,5 m; ⊙ Zw. stark furchig-kantig,
gelbbraun, ⊖ grau; Dorne zweifarben. 1—3(—5)-strahlig. 0,4—1,6 cm;
B. oberseits tief-, unters. weißlichgrün [aber nur bereift*]. vgl. Fig. 194w.
1—4:0,6—1,5 cm. Herbstfärbung rot; Bl. meist einzeln, sattgelb, fast
15 mm Dm., Stiele etwa 1—1,5 cm. C. ausgerandet, kleiner als K.,
sonst vgl. Fig. 194v—v², Sa. 5—8, Fr. rot, glänzend, eßbar.

B. a. WALL., Kat. No. 1475. 1829, ex parte. — Kantige B. — Sikkim und
angrenzendes Tibet (ob auch Yunnan?). — Gebirge 3—4000 m. — Blz. V—VI. —
Frz. IX. — Seit neuerer Zeit in Kultur und wohl ziemlich hart. USTERIS im H. d.
D. D. G. 113 erwähnte var. *puberella* ist nur der Typ. — Nahe steht dieser Art *B.*
jaeschkeana C. K. SCHN. (Sonderarbeit), von der ich dort var. *typica* und var. *usteri-*
ana beschreibe. Sie vertreten in Kaschmir bis Kumaon die *angulosa*, haben fast
kahle Zw., 3—5-blütige kurze Trauben und kleinere, etwa 9 mm im Dm. messende
Bl. — Außerdem kommt in Kumaon noch *B. kumaonense* C. K. SCHN. (Sonder-
arbeit) vor, die von *angulosa* vor allem durch kahle Zw., Bl.-Stiele und unterseits
papillöse B. abweicht.

* * Zw. kahl (o. eine feine drüsige Beh. nur eben angedeutet, aber
Bl.-Stiele stets kahl).

+ B. alle o. fast alle gezähnt, Sa. 3—5.

— B. vgl. Fig. 194t¹, unterseits grünlich, Dorne z. T. vielstrahlig.

31. *B. sibirica*: b, 0,6—1,2 m, dichtästig; ⊙ Zw. gelb- o. gelb-
rot braun, sehr fein (drüsig?) beh. o. kahl, kantig, ⊖ grau; Dorne fein,
5—11 mm, 3—5—mehrstrahlig (Fig. 194t); B. 0,8—2,7:0,3—1 cm,
Hauptnerven hervortretend; Bl. einzeln, selten 2, nach KOEHNE glockig,
lebhafte gelb, K. außen gerötet, Dm. ca. 7 mm; C. ausgerandet, größer
als K., sonst vgl. Fig. 194u—u³, Fr. jung weißgelb, später rot.

B. s. PALL., Reisen II. App. 737. t. P. Fig. 2. 1773 (*B. altaica* PALL., Fl.
ross, II. t. 67. 1788.). — Sibirische B.; sibirian B.; v. de sibirie — S-Sibirien (vom
Altai bis zu den Gebirgen der Meeresküste), N.-Mongolei — In Felsspalten und an
steinigen Hängen der Gebirge. — Blz. V. — Frz. VIII—IX. — Selten echt in
Kultur. Man vergleiche das im „Nachtrage“ über die *Berberis*-Bastarde Gesagte.

— B. vgl. Fig. 198x—x¹, unterseits weißlich bereift. Dorne
1—3-teilig.

32. *B. dictyophylla*: b, bis 1,8 m; ⊙ und ⊖ Zw. rot o. purpur-
braun, leicht kantig, kahl; Dorne gelbbraun, bis 1,5 cm; B. an Spitze
rundlich, oberseits feiner und schärfer geadert. 1,2—2,3:0,5—1,2 cm;
Bl. einzeln, 15—18 mm Dm., hellgelb, vgl. Fig. 198y—z, Fr. rot.

B. d. FRANCH., Plant. Delavay. 39. t. 11. 1889. — Netzblättrige B. — China
Yunnan, Gebirge bis 3200 m. — Blz. V. — Frz. IX. — In neuester Zeit durch
VILMORIN eingeführte, schöne, wohl ziemlich harte Art.

++ Bl. sämtlich ganzrandig, Sa. 1—2.

33. *B. thunbergi*: b, bis 1,5 m, Tracht zierlich. • Zw. (vgl.
Fig. 193a—f) stark kantig, purpurn o. auch hellbraunrot, kahl, • gelb-
o. graubraun bis grau; Dorne fein, 1—3-teilig, 7—15 mm; B. vgl.
Fig. 197c, unterseits heller grün oder auch weißlich und papillös. 1,1:

*) Auf den B.-Oberseiten treten Papillen auf.

0,5—2,5:1,8 cm, Herbstfärbung bunt, Stiel 1—8(—20) mm; sonst vgl. var. und Fig. 197a—b¹.

var. *a. typica* C. K. SCHN. (Sonderarbeit): aufrechter, gestreckt zweigiger b, B. meist über 1,5 cm lang, im Mittel; Bl. ca. 12 mm Dm. Hierher als Formen *f. pluriflora* KOEHNE, Dendrol. 169. 1893, Blst. scheindoldig 3—7 blütig, und *f. uniflora* KOEHNE, l. c., Bl. einzeln. Nach dem Fehlen oder Vorhandensein der Papillen Formen zu unterscheiden, scheint mir ziemlich aussichtslos. Was REGER in Gartenflora 1872. 238 als *B. maximowiczii* beschreibt (und 1873, in Akt. Hort. Petrop. II. 2—420 als Varietät von *thunbergii* führt), würde die papillenfrie Form darstellen.

var. *b. minor* REHDER, in Möll (Gärtnerztg. 1898. 330): niedriger, kaum 50 cm hoher Zwergstrauch, Zw. kurz, gedrängt, B. klein (Fig. 197d), Bl. etwa 9 mm Dm., einzeln o. zu 2—4.

B. th. DC., Syst. II. 9. 1821. — Japan (Kiuschiu, Hondo), Gebirgshänge. — Blz. V; Frz. IX—X. — Harte, zuweilen auch als *sinensis* in den Gärten gehende Art.

○ ○ Blst. verkürzt o. langtraubig (wenn gestielt scheindoldig und nur 3—5-blütig, so *B. ringsum* fein wimperzählig).

* Blst. verkürzt traubig, 4—9-blütig, die B. wenig oder nicht überragend.

+ B. im Mittel kaum über 7 mm breit, ganzrandig. Blst. meist kürzer als Dorne, Fr. ohne Gr., eielliptisch.

34. *B. libanotica*: wie *B. cretna*, nur Wuchs eher gestreckter, Dorne bis 2,8 cm, größte B. bis 3,2:1,2 cm.

B. l. EHRENBERG, in Herb. Boiss [C. K. SCHN. in Sonderarbeit]. — Libanon-B. — Libanon, zwischen 1600—2200 m. — Sah ich bisher in Kultur echt nur in Sämlingspflanzen in Hort. Bot. Wien. Diese haben, wie es ja bei *Berberis* Regel ist, gezähnte B. Wahrscheinlich für unser Klima wenig geeignet.

++ B. im Mittel breiter, o. Blst. länger als Dorne und Fr. mit Gr.

— B. lanzettlich zugespitzt (Fig. 199a), Fr. mit Gr. (wie b).

35. *B. calliobotrys*: b, ♂ Zw. leicht kantig, kahl, purpurbraun, + bereift, ziemlich schlank, ♀ grau; Dorne rotbraun, 1—2 cm; B. beiderseits grün, unten deutlicher netzaderig, 1,5:0,6—2,5:0,9 cm; Bl.?; Frst. bis 2,5 cm, Fr. bereift, hohl, (unreife) S. 2.

B. c. AITCH., in Jour. Lin. Soc. XIX. 151. 1882, nec BIENERT. — Schöntraubige B. — Afghanistan (Kuran Tal), 3000 m. — Fr. vom Juni länglich, vom Dezember kreiselförmig. — Vgl. das bei der folgenden Art Gesagte.

— B. lanzettlich o. verkehrt eilänglich, stumpf (Fig. 199c—d), Fr. ? (wohl länglich und ohne Gr.).

36. *B. orthobotrys*: b, bis etwa 1 m; von voriger Art noch abweichend durch: B. 1:0,5—3:1,7 cm, meist gezähnt, Blst. wie in Fig. 199e o. auch bis 12-blütig, Sa. 2—5, vgl. e—g.

B. o. BIENERT, apud AITCH., l. c. (*B. vulgaris* var. *brachybotrys* HOOK. f. et TH., Fl. ind. II. 220. 1855*); *calliobotrys* BIENERT in Herb., nec AITCH.; *pycnantha* BIEN., in Herb. — Aufrechttraubige B. — Kaschmir, Afghan., N.-Pers. im Gebirge bis 3000 m. — Blz. VI — Frz. IX—X. Die Arten *calliobotrys* und *orthobotrys* sind sehr gut unterschieden durch die Früchte. Über die letzte vgl. meine Sonderarbeit. In Kultur konnte ich bisher nichts mit *orthobotrys* sicher identifizieren. Ich werde bei Besprechung der Bastardformen von *Berberis* im „Nachtrage“ darauf zurückkommen und dort auch *emarginata* WILLD., *serrata* KOEHNE, *scrotina* LGE. usw. behandeln.

*+ Blst. meist gestreckt-traubig, Trauben hfg. nackt gestielt (nur bei *sieboldii* 3—5-blütige Scheindolden).

*) Ob auch *B. brachybotrys* EDGEW., in Trans. Lin. Soc. XX. 29. 1851 (nec GAY 1845!), ist mir noch fraglich.

+ B. sämtlich (ausgenommen an Jugendformen o. hier und da an Lohden) ganzrandig (o. sonst Sa.-Stiel 3—5mal so lang wie Eichen).

△ B. wie Fig. 199h o. m, Blst. locker traubig, kaum über 5—7-blütig.

= Sa. langgestielt (Fig. 199l), Fr. ± rundlich (l¹), B. wie h, o. zuw. wie m, doch spitzlicher.

Fig. 199. *Berberis*: a—b *calliobotrys*: a B., b Frst. mit einer jungen Fr. und dabei eine reife Fr. — c—g *orthobotrys*: c Formen des Blst., d B., e K. und C., f Stb., g Gyn. — h—l¹ *heteropoda*: h B., i = e, k Stb., l Gyn. und die Sa., l¹ Fr. (vgl. auch Fig. 194a—c¹). — m *tschonoskyana*: Frst. und B. — n—p¹ *sinensis*: n Blst. und B., o K. und C., p Stb. und Gyn. mit Sa., p¹ Fr. — q—s *iberica*: q Blst. und B., r = o, s = p. — t—u *sieboldii*: t B., u Frst. — v—y *rehderiana*: v B., x Frst., w = o, x = p (Original).

37. *B. heteropoda*: b, bis 1.2 m, lockerästig; Zw. glänzend kastanienbraun, leicht kantig, ☉ grau; Dorne 1-3-teilig, bis 2.5 cm, doch hfg. fehlend; B. etwas blaugrün, unterseits heller (zuweilen oberseits mit verstreuten Sp.), 1.8—5:1.5—2—2.5 cm, Stiel bis $\frac{2}{3}$ so lang; Bl. sattgelb, in meist etwas büscheligen Trauben. Fr. blauschwarz, vgl. Fig. 199i—l¹, die Darstellung in Fig. 194a—c¹ ist z. T. ungenau.

B. h. SCHRENK, Enum. pl. nov. I. 102. 1841. — Ungleichstielige B. — Zentr.-As. — Dzungarischer Alatau, nach MAXIM auch Altai, Thian Schan, N.-Mongolei. Blz. V. Frz. IX—X. — Harte, durch die Sa. sehr gut charakterisierte Art. — Ihr steht nahe *B. oblenga* C. K. SCHN. (*B. heteropoda oblenga* Recl., in Act. Hort. Petrop. V. I. 227. 1877), die aber durch nur 2 sitzende Sa. und 10—20-blütige, z. T. verästelte Blst., sowie elliptische Fr. abweicht. Turkestan (Tschatkal, 2500—3000 m).

= Sa. sitzend, Fr. elliptisch (Fig. 199m), B. wie m.

38. *B. tschonoskyana*: b, ☉ Zw. rundlich, rotbraun, ☉ graubraun; Dorne fehlend o. einfach, bis 6 mm lang; B. 2:0.5—1.2 cm, Stiel bis 1.5 cm; Bl. 2, Fr. in 3—5-blütigen gestielten Scheindolden o. Trauben.

B. t. RGL., in Act. Hort. Petrop. II. 2. 421. 1873 (*B. sikokiana* YAT., in Tokio Bot. Mag. V. 283. 1891). — Japan (Kiusechiu, Hondo), Gebirge. — Noch nicht in Kultur.

△△ B. und Blst. wie Fig. 199n o. q.

= Dorne schwach, fast stets einfach, Trgb. der Bl.-Stiele meist auch zur Frz. $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$ so lang wie diese.

39. *B. sinensis**): b, bis 1,8 cm. c Zw. tief purpurbraun, kahl, fast glänzend, kantig, c; braun, o. grau wie die c; Dorne kaum 1 cm; B. 1,6:0,5 — 3:0,7 cm o. bis 4:0,6 — 1 cm, unterseits stets grünlich; Blst. bis 4,5 cm lang, 8-14-blütig, zur Frz. hängend; Bl.-Stiele nur 4-5 mm, Sa. 1, Fr. bis 9:4 mm, sonst vgl. Fig. 199n — p¹.

B. s. DESF., Arb. II. 27. 1809 (*B. sinensis angustifolia* RGL., in Act. Hort. Petrop. II. 2. 416. 1873). — N.-China, O.-Mongolei. — Diese so hfg. verkannte Art ist wohl nur noch sehr selten ganz echt in Kultur. Ich werde über sie und die folgenden im „Nachtrage“ sprechen, dabei auch *B. guimpeli* K. KOCH u. a. behandeln.

Dorne hfg. 3-teilig, bis 2 cm; Bl.-Stiele mindestens 3mal so lang als ihre Brakteen.

40. *B. iberica*: wie vorige, doch noch abweichend durch: B. wie Fig. 199q, an Blst. im Mittel 2:0,6 — 3,5:1,1, an Lohden 2:1 — 3:1,5 cm; Blst. anfangs aufrecht, dann abstehend, ca. 12-15-blütig, 1-2 cm lang gestielt, Bl.-Stiele 6-10 mm, Fr. ca. 8:4 mm, sonst vgl. Fig. 199q—s.

B. i. STEV. et FISCH., in DC. Syst. II. 6. 1821 (*B. vulgaris? iberica* DC., l. c.). — Vorder-As. (südlich vom Kaukasus und in Paphlagonien, welche Form ich in der Sonderarbeit als var. *paphlagonica* unterscheide. Spontan noch genau zu studieren. In Kultur vielleicht echt, jedenfalls an Bastarden beteiligt. Siehe „Nachtrag“.

++ B. sämtlich o. vorwiegend gezähnt.

Bl. klein, etwa 7—8 mm Dm., in 3—5-blütigen gestielten Scheindolden o. Blst. mehrblütig, etwa wie Fig. 199x, B. wie t o. v, Fr. kugelig!

= B. ringsum fein wimperzählig, wie Fig. 199t.

41. *B. sieboldii*: b, 0,3—0,75 m; c Zw. dunkelrotbraun, leicht kantig, kahl, grau werdend; Dorne fein, bräunlich, 3- oder auch mehrteilig, bis etwa 12 mm lang; B. 2:0,7 — 7:2,8 cm, unterseits heller, im Herbst tief weinrot, Stiel bis 1 cm; Bl. bleichgelb, in 3-6-blütigen, bis 1,25 cm langgestielten, zur Frz. überhängenden Scheindolden, Sa. 2, Fr. glänzend gelbrot, wie lackiert, etwas trocken (Fig. 199u) sonst vgl. v—w.

B. s. MIQ., in Ann. Mus. Lugd. Bat. II. 69. 1865/66. — Japan (Hondo), Gebirge. — Blz. V—VI. — Frz. X. — Schöne, selten echte (was als *sieboldii* geht, ist meist *japonica*) Art, die als hart gelten kann. Durch die Zähnung der B. von allen anderen Arten ausgezeichnet, auch ähnliche Fr. hat nur die folgende.

= = B. vgl. Fig. 199v o. auch kleiner, ganzrandig.

42. *B. rehderiana*: b, c, Zw. kahl, lebhaft rotbraun, schwach kantig, c rot-purpurn in grau übergehend, Dorne 3—5 cm 7-strahlig, bis kaum 1 cm lang; B. 1,8:0,8 — 3,3:1,1 cm, unterseits heller, nur Hauptnerven hervortretend, Stiel 2—8 mm; Blst. vgl. Fig. 199x, bis 1,5 cm lang gestielt, c 8—15-blütig, Bl.-Stiele 5—7 mm, Fr. wie bei *sieboldii*, sonst vgl. v—w.

*) FRANCHET hat (Plant. Delav. 1889. 35) eine *sinensis* var. *elegans* aus Yunnan (Gebirge) beschrieben, die eine gute Art, *B. elegans* C. K. SCHN. darstellt und vor allem durch kleine nur 5:2 — 12:3 mm messende unterseits deutlich papillose B. ausgezeichnet ist.

B. r. C. K. SCHN., in Sonderarbeit. — Diese *Berberis* erhielt ich zuerst von Herrn VILMORIN und sah sie auch in Herb. KOEHNE. Sie soll vom Arnold-Arboretum aus verbreitet worden sein. Näheres über ihren Ursprung konnte ich bis heute nicht ermitteln. Ein Bastard kann sie kaum sein.

- Bl. meist größer o. jedenfalls in deutlichen meist nicht unter 10-blütigen Trauben, Fr. nie kugelig, größer, B. größer, o. wenigstens nicht so fein wimperzählig.
- = Fr. groß, 10—12:6—7 mm ohne den deutlichen kurzen Gr., zuletzt pflaumenrot, beduftet (Fig. 196v), B. wie q o. auch ganzrandig.

43. *B. aristata*: b. bis 3 m, z. Zw. kahl, gelbrot o. gelbbraun, leicht kantig, ☉ grau; Dorne vorwiegend einfach, zweifarben, bald nur schwach, bald stark ausgebildet und bis fast 3 cm lang; B. 2,5:1,3—6,5:2 oder auch 4—5:3 cm, eilänglich, eielliptisch o. auch eirundlich, spitz o. stumpf, unterseits hellgrün, bis weißlich, Nervennetz deutlich, jedenfalls viel schärfer als bei *canadensis*, aber nicht so scharf wie bei *japonica*, der ihm in B.-Form oft nahe kommt, Textur zuletzt derb; Stiel 1—10 mm; Bl. durchaus gelb, in kräftigen, meist steif abstehenden, bis 6 cm langen Trauben (die gesamten Bl.-Zw. hängen meist über!) (8—)10—25-blütig, Bl.-Stiele kürzer bis so lang wie Fr., diese anfangs gelbrot, dann lebhaft rot, zuletzt pflaumenfarben; vgl. sonst Fig. 196r—u.

B. a. DC., Syst. II. 8. 1821 (*B. chitria* HAMILT., Herb., ex parte, nec LDL.; *floribunda* WALL., Cat. No. 1474. 1829, ex parte; *B. coriaria* ROYLE, ex LDL. Bot. Reg. XXVII. t. 46. 1841; *aristata* var. *floribunda* HK. f. et TH., in Fl. ind. II. 222. 1855, ex parte) — Grannen-B. — Himalaya (Garhwal, Distr. Jaunsáh). — Blz. V; Frz. IX—X. — In Kultur meist als *B. nepalensis*, *sinensis*, *asiatica* usw. Im Hort. Bot. Wien steht eine sehr alte große Pflanze, die ganz winterhart ist und alljährlich reich blüht und fruchtet. Diese Art, nicht die *aristata* im Sinne USTERIS (= *chitria*), ist an Gartenformen hybriden Ursprungs sicher stark beteiligt, worüber ich im „Nachtrage“ sprechen werde.

- Fr. meist kleiner, stets griffellos, lebhaft o. tiefrot.
- B. wie Fig. 200a—c, unterseits grauweis, glatt, nur oben die Hauptnerven deutlicher, ☉ Zw. heller o. dunkler braun bis purpurn, schwach kantig.

44. *B. canadensis*: niedriger o. bis 2 m hoher, vielrutiger b. von z. T. überhängender Tracht, Zw. kahl, ☉ grau; Dorne ziemlich schwach, kaum über 12 mm, braun; B. meist stumpfendig (die Form Fig. 200a ist selten), zuletzt derb, schöne Herbstfärbung, 2:0,8—5:1,3 oder 2:1,2—4,5:2,3 cm; Blst. 2,5—5,5 cm, 10—25-blütig, Bl. 8—10 mm Dm., 5—10 mm lang gestielt, Sa. 2—4, Fr. 7—9:6—7 mm, zuletzt tiefrot, vgl. Fig. 200d—f.

B. c. MILL., Gard. Dict. 1768. No. 2 (*B. caroliniana* LOUD., Hort. Brit. ed. III. 19. 1839; *angulicaris* Hort. [MASSIAS, in Gartenwelt I. 101. 1897, c. tab. col.]). — Kanada-B. — N.-Am. (N.-Carolina, Virg. Tennessee wohl bis Georgia), in Wäldern, vorzüglich in den Alleghenies. — Blz. V—VI. — Frz. X. — In Kultur selten echt. Vielleicht lassen sich die Formen der Heimat in 2 gute Arten trennen. Im N.-O. der Ver. St. und in Kanada kommt nur *B. vulgaris* verwildert vor. Weiteres siehe „Nachtrag“.

- B. unterseits hellgrün o. jedenfalls scharf netziggeadert, bez. feiner, reicher gezähnt.
- > ☉ und ☉ Zw. glänzend purpurbraunrot, rundlich, Dorne fein 3—5-teilig, B. vgl. Fig. 197l.

45. *B. fendleri*: ♂, bis 1,5 m; Zw. kahl; Dorne bis 12 mm, Stacheln hfg. gegabelt; B. nur an Schossen gezähnt, dann bis 1,5:2, Stiel bis 1,5 cm, an Blzw. 2:0,6—3:1 cm; Blst. bis 2 cm langgestielt, 6—12-blütig, hängend, Bl.-Stiele 4—6 mm, Sa. 3—4, innere K. eirundlich, zuweilen kürzer als C., vgl. Fig. 197h—k, Fr. elliptisch.

B. f. GRAY, Plant. Fendl. 5. 1848. — N.-Am. (Gebirge von S.-Colorado bis Neu-Mexiko). — Blz. VI. — Frz. IX. — Wohl nur sehr selten echt in Kultur.

>> ⊙ Zw. wohl ± rot- o. gelbbraun, aber nicht purpurn, ⊕ meist schon grau, Dorne 1—3-teilig, B. größer, stets gezähnt.

|| ⊙ (und z. T. auch ⊕) Zw. rund, leicht glänzend gelbbrot bis tief kirschbraun, B. dünn, gespitzt (Fig. 200g), unterseits hellgrün, Blst. locker, hängend.

Fig. 200. *Berberis*: a—f *canadensis*: a—c B.-Formen, d K. und C., e Stb. und Gyn., f Fr. — g—i *pachyacantha*: g B., h = d, i = f. — k—m *amurensis*: k B., l = d, m = f. — n—q *japonica*: n B., o K. und C., p Stb. und Gyn., q Fr. — r—t *vulgaris*: B.-Formen (vgl. auch Fig. 197e—g²) (Original).

46. *B. pachyacantha*: b, bis 2 m; Zw. kahl; Dorne (an spontanen Exemplaren meist einfach) bis 1,8 cm, flachrundlich, braun: B. 3:1,8—6,5:3,3 cm, Stiel bis 2 cm; Blst. bis ca. 5 cm lang, etwa 15-blütig. Bl. ca. 10 mm Dm., Bl.-Stiele wenigstens im unteren Teile ca. 10 mm. Sa. 2—5, Fr. ?, vgl. Fig. 200h—i.

B. p. KOEHNE, Dendrol. 170 1893, nec BIENERT¹⁾. Stachel-B. — Himal. Lahol und Kaschmir, 2—3000 n., nach JAECHKE bes. in feuchten schattigen Gebüschen an N.-Hängen. — Im Herbar KOEHNE sah ich Exemplare aus dem Bot. Gart. Berlin, z. T. als spec. von Saharanpur (südlich von Lahol) bezeichnet. Demnach wäre diese Art in Kultur. Sie ist von den Arten 47—49 vor allem durch die runden Zw. verschieden. KOEHNE scheint 1893 zu seiner *pachyacantha* auch

¹⁾ BIENERT'S *pachyacantha*, die ein Herbarname geblieben, siehe *integrifolia* (sie ist = *densiflora* var. *macracantha* BOISS.).

das gezogen zu haben, was ich in der Sonderarbeit als *B. zabeliana* C. K. SCHN. aus Kaschmir beschreibe, diese Art ist vor allem durch auch zur Frz. gestreckte dichte Blst., deren Bl. nicht über 5 mm lang gestielt sind verschieden. Die *pachycantha* ist in den Herbarien von Kew aus z. T. als *vulgaris actinensis* verbreitet worden, dabei vermengt mit *B. kunzeanus* ROYLE, Ill. Bot. Himal. 64. 1839 die durch behaarte, rispige Blst. abweicht und ebenfalls in Kaschmir auftritt.

|| || Zw. kantig, ⊙ höchstens gelb- o. leicht rotbraun, ⊖ und ⊙ grau.

— B. vgl. Fig. 200n. ziemlich derbhäutig, unterseits (hfg. auch oberseits) hellgrau, fein und scharfnetzig geadert.

47. *B. japonica**): b, bis 2 m, ⊙ Zw. hellgrau o. graubraun, kahl, ⊖ grau; Dorne meist 3-teilig, schlank, spitz, furchig, bräunlich, bis 22 mm; B. vorwiegend längl.-elliptisch, abgerundet, hfg. aber auch eirundlich, selten länglich-spitz, 3:1,3 - 6:3,5 - 3. Stiel bis 1,8 cm, o. B. 3:2 - 6:4 cm, Stiel kaum bis 1 cm, Zähnung an den rundlichen (am selben b auftretenden!) Formen meist viel weniger eng und scharf; Blst. teils auch zur Frz. aufrecht, kaum 3 cm lang, 6—10-blütig, teils von Anfang an überhängend, bis 6 cm lang, 14—18-blütig, Bl. ca. 8—9 mm Dm., Sa. 2, Fr. lebhaft rosakarmin mit bläulichem Duft, vgl. Fig. 200o—q.

B. j. C. K. SCHN. [Sonderarbeit] (*B. vulgaris* var. *japonica* RGL., in Act. Hort. Petrop. II. 2. 415. 1873). — Japan: Gebirge von Hondo — Blz. V—VI. Frz. IX—X. — In Kultur als *sieboldii*. Vielleicht gehören die stumpfblättrigen Exemplare, die ich hier fast allein im Auge habe, einer Form an, die von der mit spitzen B. abweicht, bei letzterer sind die Blst. (wie oben gesagt) länger und mehrblütig.

== B. dünn, jedenfalls unterseits grünlich und Adernetz nicht scharf hervortretend.

√ B. auch am Bl.-Zw. kaum unter 6 cm lang, elliptisch Fig. 200k, Blst. meist kürzer als B.

48. *B. amurensis*: b, bis 1,5 m; Zw. und Dorne wie *japonica*; B. bis 10:5 cm, Stiel 2 cm, Zähnung meist feiner und dichter als bei *vulgaris*; Blst. bis 7 cm, Bl.-Stiele 5—7 mm, Sa. 2, vgl. Fig. 200l—m (Fr. vgl. „Nachtrag“!)

B. a. RUPR., in Bull. Ac. Pétersbg. XV. 260. 1857 (*B. vulgaris* var. *amur.* RGL., in Pl. Maack. 14 [ex RGL. 1873]) Amur-B — Amur ebiet, Mandschuri. — Weiteres siehe „Nachtrag“.

√√ B. am Bl.-Zw. kleiner, von den Blst. meist überragt (Fig. 197c und Fig. 200u—w.)

49. *B. vulgaris*: b, 0,5—3 m, Zw. im wesentlichen wie bei den beiden vorhergehenden Arten (vgl. Fig. 193g—m); Dorne im Mittel 10—15 mm lang, bräunlich- oder gelbgrau, gefurcht; B. etwa 3:0,8

*) Falls man *Mahonia* nicht als Gattung abtrennt, wie ich es tue, so muß diese Art *B. regeliana* KOEHNE, in litt., heißen.

6:2—3.5 cm o. auch an Lohden bis 8.4 cm, Stiel 2—15 mm, Zähnung wie in Fig. 200u—w angedeutet, wechselnd: Blst. 4—6 cm, 15- bis etwa 22-blütig, Bl.-Stiele 6—12 mm, Bl. ca. 10 mm Dm., Fr. ca. 10—11:6 mm, + lebhaft gelb- o. karminrot mit bläulichem Duft, vgl. sonst Fig. 197e—g².

Über die Varietäten und Gartenformen siehe „Nachtrag“.

B. v. L., Sp. pl. I. 330. 1753 (Synonyme bei den Formen im „Nachtrag“) — gemeine b.; common B.; *épine vinette*. — Blz. V—VI — Frz. IX—X. — I. G. wohl überall, ferner Frankreich, Großbritannien, N.-Eur., M.- und S.-Rußl. bis N.-Kaukas., Balkanstaaten, N.-Italien, S.-Grenze noch fraglich, ebenso wie weit nach N. wirklich spontan! In As. mir nicht bekannt. Was dort ihr am nächsten steht, ist außer den eben genannten 3 Arten *B. orientalis* C. K. SCHN. (Sonderarbeit, südlich von Kauk., Armenien, N.-Pers.

Die spontanen Formen dieser Art sind nicht reich, aber schwer abzugrenzen. Kulturformen gibts mehr, die aber z. T. hybrider Natur sind. Da ich nun bis heute (15. November 1904) noch nicht in der Lage war, die von SCHRADER, in *Linnaea* XII. 1838, beschriebenen ∞ „Arten“, die zu allermeist hybrider Natur sein werden, in den Original-Exemplaren zu studieren — ohne diese gesehen zu haben, aber eine Identifizierung der SCHRADERschen Arten nicht möglich ist — so muß ich leider die Besprechung der *Berberis*-Hybriden und der Formen von *vulgaris* auf den „Nachtrag“ des Buches verschieben. Ich bitte aber heute die Leser, mir nach Möglichkeit noch gutes blühendes oder fruchtendes (am besten beides) Material zugänglich zu machen.

Ich erwähne jetzt einzig und allein noch den Gattungsbastard:

B. vulgaris × *Mahonia aquifolium*: *B. neuberti* BAUMANN, apud LEMAIRE, in Ill. hort. I. Misc. 111. tab. c. 1854: diese eigenartige Hybride geht meist als *thetifolia* in den Gärten. Sie erinnert an *Mahonia* durch das Fehlen der Dorne, die an Lgtr. einzeln stehenden B., das Auftreten gedreiter B., die auch älteren Pflz. nicht fehlen, welche *B. vulgaris* ähnlicher zu sein pflegen, denn an ihnen ist die B.-Textur häutig, die Zähnung fast wie bei *vulgaris*, wogegen die Lohden-B. meist sehr grob buchtig dornzählig und von *aquifolium*-ähnlicher Textur sind. Ein interessanter vielgestaltiger, wenn auch nicht ganz harter, + immergrüner Zierstrauch.

Gattung 67. *Mahonia**) NUTT., Gen. amer. II. 211. 1818. (*Berberis* L., Spec. pl. 330. 1753 ex parte.)

Vgl. oben S. 297, b, mit bräunlicher rissiger Rinde und gelblichem Holze, B. am Zw.-Ende gedrängt, B.-Spindel knotig-gegliedert, am B.-Stiel-Grunde etwas scheidenartig verbreitert, Neb. auf fadenfg. Gebilde reduziert, Blst. meist vielblütige Trauben o. Rispen, Bl. gelb, K. 3 + 3 + 3, C. 3 + 3, am Grunde mit Nektarien, Stb. 3 + 3, Beere kugelig o. eifg., dunkelblau mit hellem Reif, selten rötlich. — Bekannt 37 Arten im pacifischen N.-Am., O.- und SO.-As.

Tabelle zum Bestimmen der beschriebenen Arten nach den B.

- 1a. B.chen ganzrandig o. fast so 2.
- 1b. B.chen deutlich gezähnt 4.
- 2a. B.-Unterseiten deutlich papillös: 1. *repens* var. *rotundifolia*.
- 2b. B.-Unterseiten nicht papillös 3.
- 3a. B. fast immer etwas gezähnt: 5. *gracilis* (Fig. 201k).
- 3b. B. durchaus ganzrandig, 9. *tennifolia* (Fig. 202c) o. 10. *chrysantha* (Fig. 202d).
- 4a. B. unterseits deutlich papillös 5.
- 4b. B. unterseits nicht papillös 7.
- 5a. B.chen ziemlich seicht buchtig gezähnt, Hypoderm fehl.: 1. *repens* (Fig. 201a) o. 2. *pumila*.

*) *Spez.-Lit.*: F. FEDDE, Versuch einer Monographie der Gattung *Mahonia*, in Engl. Bot. Jahrb. XXXI 30. 1901. — An diese ausgezeichnete Arbeit schließe ich mich vollständig an. Herr Dr. FEDDE war so freundlich, die Mahonien meines Herbars durchzusehen und mir über Vieles noch besondere Auskunft zu geben. Ich danke ihm auch an dieser Stelle verbindlichst dafür.

- 5b. B. chen tief wellig-buchtet gezähnt, Hypoderm vorh. 6.
 6a. B. 3zählig: 6. *trifoliolata* (Fig. 201m).
 6b. B. (3—) 5—7zählig: 7. *fremontii* (Fig. 202a) o. 8. *haematocarpa* (Fig. 202b).
 7a. B. ohne Hypoderm, Textur also nicht eigentlich starr lederig 8.
 7b. B. mit Hypoderm, Textur starr 9.
 8a. B.-Unters. hellgrau, gegen die dunklen Oberseiten stark abstechend: 11. *M. pallida* (Fig. 202e).
 8b. B. Unters. hellgrün, hfg. gegen Oberseiten wenig abstechend: 3. *M. aquifolium* (Fig. 201g) o. 4. *pinnata* (Fig. 201h).
 9a. B. fein gezähnt, vgl. Fig. 201u: 15. *M. fortunei*.
 9b. B. stark buchtig gezähnt: siehe Sekt. 4, S. 322, die Arten 12—14.

Sekt. 1. *Aquifoliatae* FEDDE, in Engl. Bot. Jahrb. XXXI. 75. 1901. B. dornig oder fein gezähnt, lederig, ohne Hypoderm. Trauben (meist) dicht- und vielblütig, aus der Achsel von verhältnismäßig kleinen schuppenfg. Tragb. entspringend.

Sekt. 2
siehe S. 320

○ B. deutlich scharfzähnig.

✧ B. oberseits stumpfgrün, unterseits stark papillös* (vgl. Fig. 201b—b¹).

— B. mäßig dick, vorwiegend rundlich o. breiteifg., Zähnung gleichmäßig, nicht wellig-buchtet.

1. *M. repens***): niedriger, 30—50 cm hoher, Ausläufer treibender b. B. hellbläulichgrün, unters. etwas heller, 15—20 cm lang, B. chen (Fig. 201a) 4—6:3—4 cm, Blst. bis 8 cm lang, ihre Trgb. 6 mm lang; Bl.-Stiele 5—7 mm lang, ihre Trgb. 2—5 mm lang, Fr. blauschwarz, bereift (vgl. Fig. 201c—e).

var. a. *typica*: B.-Rand deutlich gezähnt. — b. *rotundifolia* DIPPEL, Laubholzsk. III. 107. 1893. (*rotundifolia herveyi*, *latifolia* und *latifolia mermis* der Gärten). B. chen fast völlig ganzrandig, 4—8:2—7 cm, zuweilen fast rund, Wuchs im ganzen wohl üppiger.

M. r. G. DON, Dichlam. pl. I. 118. 1831 (*Berb. rep.* LDL., Bot. Reg. t. 1176. 1828; *B. aquifolium* var. *repens* TORR. ET GR., Pac. R. Rep. IV. 63. 1856). — Kriechende Mahonie; creeping Mahonia, ash berberry. Pacif. N.-Am. (in den Rocky Mts. von Brit.-Col. bis Neu-Mexiko, ostwärts bis Wyoming und S.-Dakota). Standorte ähnlich *M. aquifolium*, deren Areal n. FEDDE nicht so groß ist. Blz. V—VII. — In Kultur wohl bis Prov. II—III hart. Scheint abzuändern und zu bastardieren.

1 × 3. *M. repens* × *aquifolium*: Herr VILMORIN sandte mir zwei Mahonien, die eine als *M. repens* (No. 775), die andere als *M. aquifolium* (No. 770). Beide könnten nach FEDDE dieser Kombination entsprechen, doch möchte ich vorläufig noch nichts Entscheidendes sagen, ehe ich nicht mehr Material sah. Daß diese Hybride existiert, ist wohl anzunehmen. ZABEL betrachtet *B. repens rotundifolia* als solche, und wie mir Herr JOUIN in Plantières sagte, soll *M. rotundifolia herveyi* von *aquifolium* stammen. Dafür bietet aber die Blattanatomie keine Handhabe und es könnte sich höchstens um *M. (repens* × *aquifolium*) × *repens* handeln, was eine nicht eben plausible Annahme ist.

*) Bei den Arten, die ich als stark papillös bezeichne, ist dies Merkmal ein sehr brauchbares, da man nach einiger Übung die Papillen schon mit der Lupe sieht, man braucht jedenfalls keinen Schnitt zu machen. Bei *M. pinnata* dagegen z. B. wird man die Papillen erst mit dem Mikroskop finden.

**) *M. nana* FEDDE l. c. 83 (*Berb. nana* GREENE, in Pittonia III. 98. 1896) scheint nach den mir vorliegenden Exemplaren (leg. Heller, No. 3178, Idaho) nur eine Form von *repens* zu sein. — Interessant war es mir, aus einem Briefe des Herrn B. I. ROBINSON an Herrn FEDDE, den mir dieser zur Einsicht sandte, zu erfahren, daß unter *M. repens* sens. strict. nur das zu verstehen sei, was BRITTON and BROWN in ihrer Flora als *Berberis aquifolium* führen, also die nordwestlichen Formen der Mahonien, während die südwestlichen Formen der Rocky Mountains von Col., Neu-Mexiko etc. die *nana* darstellen.

†† B. derblederig, zugespitzt, wellig-buchtig, stachelzähnig.

2. *M. pumila*: aufrechter, nicht kriechender $\bar{b}$, 10—30 cm hoch, B.chen graugrün, matt, Rand stark hornartig verdickt, 2,5 : 4 : 1,5—2,5 cm, Blst. bis 4 cm, ihre Trgb. 3—5 mm lang, Bl. 5 mm lang gestielt, ihre Trgb. 1—2 mm lang, Stb. unter den A. gezähnt, Fr. klein, sehr bereift.

M. p. FEDDE, l. c. 82 (*Berb. pumila* GREENE, in *Pittonia* 1891. 161). — Pacif. N.-Am. (coast mountains of S.-Oreg. and N.-Calif.). — Kaum in Kultur.

†† B. oberseits glänzendgrün, unterseits nicht o. nur schwach papillös.

† B.chen oberseits stark glänzend, gleichmäßig, kaum buchtig gezähnt, das unterste Paar meist 2—3 cm von Bl.-Stiel-Basis entfernt, Bl. ohne Vorb.*).

3. *M. aquifolium*: aufrechter, 0,5—1 m hoher $\bar{b}$, Äste gelbbraun, B. 10—20 cm lang, B.chen in Form (Fig. 201 g) und Zahl recht veränderlich, selten oberseits ziemlich mattgrün, jung (wie auch im Winter) oft gerötet, 4—8 : 2—4 cm, B.-Rand im Vergleich zu *pumila* und *pinnata* meist wenig verdickt, Neb.-Rudimente 2—3 mm lang, Blst. zu 3—6, dichtblütig, bis 10 cm lang, ihre Trgb. etwa 6 mm lang, B.-Stiele 5—10 mm, ihre Trgb. 2—3 mm lang, Bl. zuw. rötlich überlaufen, Beere kugelig, bereift, mit dunkelpurpurenem Saft, Sa. 2—5, glänzend rotbraun.

ZABEL führt als Varietäten *M. aquifolium murrayana* (*M. murrayana* HORT.) und *M. aquifolium erecta*. Die letzte ist mir unbekannt. *M. murrayana* hält FEDDE, dem es bis heute noch nicht möglich war, sichere Varietäten bei *aquifolium* abzugrenzen, nur für die typische Form. Was als *M. aquifolium gracilis* in den Gärten geht, konnte weder FEDDE noch ich bisher deuten. ZABEL denkt an *M. aquifolium × nervosa*, was mir aber vorläufig noch recht unwahrscheinlich scheint.

M. a. NUTT., Gen. am I. 212. 1818 (*Berb. aquif.* PURSH, Fl. am sept. I. 219. t. 4. 1814; in den Gärten auch hfg. als *Berb. o. Mah. fascicularis*, *pinnata* und *repens*) — gemeine Mahonie; trailing Mahonia, holly leaved berberry — Pacif. N.-Am. (von S.-Brit.-Col. durch Washington, Color., Oreg., Kalif., Idaho, Arizona, W.-Nebraska) — auf feuchtem, fruchtbarem Boden, zwischen Felsen etc. — In Kultur als Heckenpflanze (für milderes Klima) und als Material für Kranzbinderei geschätzt, wohl bis Prov. II—III hart. In Heimat wird aus den Fr. Wein und Brautwein gewonnen, der Saft soll auch zum Färben von Rotwein dienen.

3 × 4 *M. aquifolium × pinnata*: das was in den Gärten als *M. fascicularis* geht, könnte nach FEDDE diese Hybride darstellen. Es ist üppiger als die echte *pinnata* der Heimat und bedarf noch der Beobachtung.

? 3 × 12 *M. aquifolium × nervosa*: Siehe bei *aquifolium*.

3 ~ 15 *M. aquifolium × fortune*: *M. heterophylla*: Schon ZABEL hat die *M. heterophylla* der Gärten als mutmaßlichen Bastard der genannten Arten angesprochen. FEDDE ist ebenfalls dieser Ansicht, obwohl er es auch nicht für ausgeschlossen hält, daß es nur eine Varietät von *aquifolium* sein kann. Der Name kann, sofern man *Mahonia* von *Berberis* getrennt hält, bleiben. Die Blättchen messen im Mittel etwa 8 : 1,8 cm. Nach ZABEL sollen bei Aussaat Rückschläge auf *aquifolium* eintreten.

• B.chen oberseits mäßig glänzend, ziemlich kräftig buchtig gezähnt, das unterste Paar meist nur etwa 1—1,5 cm vom Stielgrund entfernt, Vorb. der Bl. (meist) vorh.

*) Man verwechsle die am Bl.-Stiele stehenden Vorbl. nicht mit den Trgb., in deren Achseln die Bl. entspringen.

Fig. 201. *Mahonia*-Arten: *a—e repens*: *a* kleines B.-chen*); *b* B.-Querschnitt (*a*, bez. *b* zeigt die Papillen der B.-Unterseite; *c* Bl.; *d* C.; *d'* Stb.; *d''* Gyn. im L.-Schnitt; *e* Fr. — *f—g'* *aquifolium*: *f* Stb.; *f'* S.; *f''* S. im L.-Schnitt, *g* B.-chen, *g'* B.-Querschnitt. — *h—i'* *pinnata*: *h* B.-chen; *i* Stb.; *i'* Gyn. — *k—l* *gracilis*: *k* B.-chen; *l* Fr. — *m—o'* *trifoliolata*: *m* B.-chen; *n* C.; *n'* Stb.; *o* Gyn.; *o'* Fr. — *p—r* *nervosa*: *p* B.-chen; *p'* B.-Querschnitt (*p'* — hypodermale Sklerenchymschicht); *q* C.; *q'* Stb.; *r* Fr. — *s* *japonica*: B.-chen. — *t* *japonica* var. *bealeri*: B.-chen. — *u—v'* *fortunei*: *u* B.-chen; *v* C.; *v'* Stb. — *w—y* *nepalensis*: *w* B.-chen; *x* Gyn. und Stb. (rechts neben *x*, Konnektiv endigt wie bei *x*), *y* Fr. *b*, *b'*, *g'*, *p'* stark vergr.) (Original).

*) Die B.-chen sind stets von der Unterseite gesehen.

4. *M. pinnata**) (*M. fascicularis*): $\bar{h}$, etwa 1 m; B. graugrün, Blättchen 3–6 · 1,25–3 cm, oberseits wenig, unterseits deutlich genervt; Blst. dichtblütig, bis 8 cm lang, Trgb. 2–3 mm; Bl.-Stiele 3–5 mm, Trgb. 1,5–2 mm; Fr. eher eifg., Sa. rotbraun.

FEDDE unterscheidet eine var. *hortensis* mit größeren, bis 8 cm langen, weniger lederartigen, tieferbuchtig gezähnten B. Vielleicht handelt es sich hier aber, wie S. 318 gesagt, z. T. um *aquifolium* $\times$ *pinnata*.

M. p. FEDDE, l. c. 86 (*Berb. pinnata* LAG., Elench. hort. Madr. 6. 1803; *M. fascicularis* DC., Syst. II. 19. 1821; *B. fascicularis* SIMS, Bot. Mag. t. 2396. 1823).

Fieder-Mahonie; fasciculated Berberry. — Pacif. N.-Am. in Calif. von der San Franciscobai bis südwärts gegen San Diego, dann östlich bis Neu-Mexiko und von hier gegen Süden bis Mexiko. — In Kultur bei uns selten echt und empfindlich (Prov. VII). Selbst in England nach LONDON too tender to be treated as a bush, aber it will grow freely against a wall with scarcely any protection. Der gleiche Autor sagt: It is readily distinguished at a distance from the other mahonias, by the glaucous green and subdued tone of colour of its leaves; those of all the others being of a darker green, and more or less shining.

○○ B. chen schwach und fein gezähnt o. + ganzrandig (Fig. 201 k).

5. *M. gracilis*: $\bar{h}$, 1–1,5 m hoch, mit ∞ kurzen Seitenästen; B. 8–12 cm lang, B. chen eifg. bis lanzettlich, derb, oberseits glänzend grün, unterseits heller, an der meist geröteten Spindel 1,5–2 cm entfernt stehend, 3,5–5 : 1,5–3 cm; Trauben mit 2–3(–5) mm langen Trgb., Blst. am Grunde mit Vorb. 1–3 mm lang, C. ganzrandig, Fr. blauschwarz, bereift (vgl. Fig. 201 l).

M. g. FEDDE, l. c. 95 (*B. grac.* HARTW., ex BENTH., Pl. Hartw. 34. n. 271. 1840). — Zierliche Mahonie. — Mexiko, S.-Texas. — Sehr selten echt in Kultur. Sicher nur unter guter Decke zu durchwintern. — Nahe verwandt ist *M. subintegrifolia* FEDDE, l. c. 94, die zierlicher ist (B. chen 2–3 : 0,5–1 cm), ebenfalls aus Mexiko.

Sekt. 3

siehe S. 321

Sekt. 2. *Horridae* FEDDE, l. c. 77. — B. meist wenig-paarig. B. chen blaugrün, ziemlich schmal, starr-lederig, langstachelig-buchtig gezähnt, beiders. — papillös, Hypoderm vorh., Blst. kurze, wenigblütige, aus der Achsel von kleinen Trgb. entspringende Trauben.

○ B. 3-zählig.

6. *M. trifoliolata*: $\bar{h}$, 1–2,5 m hoch; B. 3–10 cm lang, B. chen, vgl. Fig. 201 m, + graublau, 2–6 : 0,5–1,5 cm; Blst. bis 4 cm lang, wenigblütig, zu 2–3 an seitlichen Kztr. aus der Achsel von dunkelpurpurnen, 2 mm langen Trgb., Bl. 0,5–1 cm lang gestielt, ihre Trgb. 1,5–2 mm lang, safrangelb, Fr. blauschwarz, bereift, vgl. Fig. 201 n–o¹.

M. t. FEDDE, l. c. 96 (*Berb. trifoliolata* MORIC., Pl. Nouv. americ. 113. t. 69. 1833 46; *B. trifoliata* HARTW., ex IDL., Bot. Reg. XXVII. misc. 149. 1841; *B. ilicifolia* SCHEELE, in Linnaea 1848. 591; *B. schiedeana* WATS., in Proc. Am. Ac. 1882. 318 et DIPP., Laubh. III. 104. 1893). — Gedreitblättrige M. — Texas, Neu-Mex., Mexiko. — auf Prärien, z. T. mit die sog. chaparral zusammensetzend — Wohl nur in Engl., Frankr. und an Riviera in Kultur, bei uns für günstigste Lagen versuchswert. Nicht identisch mit *M. trifolia*, siehe Anmerkung unten!

*) Sehr nahe steht nach FEDDE *M. dictyota* FEDDE l. c. 89. (*B. dict.* JEPSON, in Bull. Torr. Bot. Club. 1891. 319, *B. wilcoxii* BRITT. et KEARNEY, in Trans. N. Y. Acad. 1894. 29); ferner sind verwandt: *M. trifolia* CHAM. et SCHLDL., in Linnaea 1830. 211 (*Berb. trifolia* ROEM. et SCHULT., Syst. VII. b. 1616. 1830; *B. schiedeana* SCHLDL., in Bot. Zeit. 1854. 654, non DIPP.; *M. schied.* FEDDE, l. c. 90), im H. d. D. D. G. von ZABEL irrtümlich mit *M. trifoliolata* (MORIC.) FEDDE vereint, nur diese ist in Kultur. — *M. entriphylla* FEDDE, l. c. 91. Nach dem Autor die einzige, wirklich 3-blättrige Mahonie. — Zu Sekt. 1. gehören ebenfalls noch: *M. angustifolia* FED., l. c. 91. (*B. angust.* HARTW., ex BENTH., Pl. Hartw. 34. n. 270. 1840) und *M. lanceolata* FED., l. c. 92 (*B. lanceolata* BENTH., l. c. 34), beide aus Mexiko, sowie vielleicht die eben daherstammende *M. incerta* FEDDE, l. c. 93.

○○ B. (3—)5—7-zählig.

→ End-B. chen (meist) nicht länger als seitliche, diese enf. Fig. 202a) bis lanzettlich, Fr. schwarzblau.

7. *M. fremontii*: B., bis 4 m hoch; B. glanzlos, hellgraugrün, 3—10 cm lang; B. chen 1—2: 0,5—1 cm; Blst. meist zu 2, bis 8 cm lang, 4—8-blutig; Bl. 10—15 mm langgesticht, hellgelb, süßlich duftend, Stb. mit Anhängsel unter A., Fr. rundoval, zur Reifezeit trocken und aufgeblasen.

M. f. FEDDE, l. c. 98 (*Berb. frem.* TORR., in Bot. Mex. Bound. 30. 1858). — Graue Mahonie. — Pacif. N.-Am. (von W.-Texas, Utah, Arizona bis S.-Calif.). — Auf trockenen Böden, zuw. ein schwer passierbares Gestrüpp bildend. Blz. V—VI, Frz. VIII. — Sehr kulturwerte, aber empfindliche, nur für günstigste Lagen mit Erfolg bei uns akklimatisierbare Art.

→ End-B. chen meist länger als seitliche, diese mehr schmallanzettlich (Fig. 202b), Fr. blutrot.

8. *M. haematocarpa*: B., bis 2 m hoch, St. meist schon aus Erde heraus verzweigt; B. 4—7 cm lang, B. chen 1,5—4: 0,5—1 cm; Bl. bis 2 cm lang gesticht, Stb. fast ohne Anhängsel unter A.; Fr. am Gipfel von der kurzen breiten N. gekrönt, 7—8 mm Dm., Sa. 8—18, strohgelb.

M. h. FEDDE, l. c. 100 (*Berb. haem.* E. O. WOOTON, in Bull. Torr. Cl. 1898. 304). — Rotfrüchtige M. — Pacif.-N.-Am. (Nou-Mex., Color., Calif.). — Sonst wie *fremontii*, der sie sehr ähnlich*). Durch die roten Fr. von allen Mahonien abweichend, aber eine Einteilung der Gattung in Sekt. *Erythrocarpeae* und *Atrocarpeae* wie sie ZABEL vorschlägt, ist hier ebensowenig durchführbar, wie bei *Euberberis*. Eine nahe verwandte Art ist *M. nevini* FEDDE, l. c. 102 (*Berb. nev.* A. GRAY,

Fig. 202. *Mahonia*-Arten: B.-Formen: a *fremontii*; b *haematocarpa*; c *tenuifolia*; d *ehrenbergii*; e *pallida*; f *japonica* var. *trifurca* (Alles $\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

Synopt. Fl. I. 1. 69. 1895). Fr. noch unbekannt, S.-Calif. — Gelblich weiße bis rötliche Fr. soll *M. swaseyi* FEDDE, l. c. 100 (*B. swaseyi* BOECKL., in YOUNG Fl. Tex. 152. 18?) haben. Artrecht fraglich.

Sekt. 3. *Paniculatae* FEDDE, l. c. 77. — B. meist vielpaarig, stark o. seicht gezähnt o. ganzrandig. Textur schwankend. Hypoderm fehlt. Blst. Rispen, die als Seitenäste Dichasien tragen, seltener langgestreckte lockere Trauben. Sekt. 4
siehe S. 322

○ B. chen ganzrandig, Textur dünnlederig.

* Blst. traubig**), B. chen wie Fig. 202c, glänzend.

9. *M. tenuifolia*: B., bis 3 m hoch, schlankästig, B. 10—13-zählig, B. chen obers. lebhaft grün, unters. wenig heller, 4,5—10: 1,5—2,5 cm, Blst. bis 15 cm lang, teils hangend, teils aufrecht, Bl. duftend, 0,5—1,2 cm lang gesticht, 12—16-blutig, 1—1,5 mm lang, C. ganzrandig, Stb. gezähnt, Fr. dunkelblau, rund, 3—4 mm Dm.

*) FEDDE ist übrigens jetzt geneigt, sie nur als *fremontii* var. *haematocarpa* anzusprechen!

**) Zu dieser Gruppe gehören nach FEDDE noch: *M. andricuxii* FEDDE, l. c. 103 (*B. a.* HOOK. et ARN., Bot. Beech. Voy. 318, adnot. 1841) und *M. chihuensis* FEDDE, l. c. 103 (*B. choc.* SCHDL., in Bot. Ztg. 1854. 652), beide aus Mexiko.

M. t. LOUD., ex STEUD., Nomencl. ed. 2. 1. 197. 1840 (*Berb. tenuifolia* LDL., Bot. Reg. 1838 misc. 61. n. 121; *B. fraxinifolia* Hook., Ic. pl. t. 329 30. 1841) — Dünablättrige *M.* — S.-Mexiko. — Blz. XII (Kalthaus). — Wohl nur fürs Kalthaus!

*** Blst. rispig, B.chen wie Fig. 202 d, kaum glänzend.

10. *M. ehrenbergii*: b, bis 1 m, B. 7—15-zählig, B.chen 3—4,5:1—2 cm; Blst. samt Stiel bis 30 cm lang, Bl. 5—10 mm langgestielt, K. abstehend, weißgelb, C. sattgelb, Stb. mit sehr kleinen Zähnchen, Fr. ?.

M. e. FEDDE, l. c. 106 (*B. ehr.* KUNZE, in Linnaea 1847. 45). — S.-Mexiko.

Blz. V. — Wohl nur fürs Kalthaus verwertbar. — Am nächsten verwandt sind ihr nach FEDDE die gezähntblättrigen *M. paniculata* OERST., in Kjoeb. Vid. Meddel. 1856. 36, aus Costa-Rica und *M. hartwegii* FEDDE, l. c. 109 (*B. hart.* BENTH., Pl. Hartw. 31. n. 272. 1840) aus Mexiko.

CC B.chen gezähnt, Textur ziemlich derb (Fig. 202 e).

11. *M. pallida*: b, 2—2,5 m hoch, B. 11—13-zählig, B.chen oben tiefgrün, unten hellgrün, aber nicht papillös, Spindel und Rippe dunkel, 5—9:2—4 cm; Blst. rispig, bis 10 cm lang, Bl. 0,5—1 cm lang gestielt, Stbf. mit Anhängsel, Beere rundlich, blaupurpurn, bereift.

M. p. FEDDE, l. c. 109 (*B. pall.* HARTW., in BENTH., Pl. Hartw. 34. n. 268. 1840). — Bleiche *M.* — S.-Mex. — Blz. V—VIII. — Kalthaus. Was als *pallida* in Kultur, nur Form von *aquifolium*. — Nächste Verwandte: *M. zimapana* FEDDE, l. c. 111, und *M. ilicina* SCHLDL., in Linnaea. 1835—236., aus Mexiko. Zur Sekt. 3 scheint ferner zu gehören *M. paxii* FEDDE, l. c. 113, Mexiko.

Sekt. 4. *Longibracteata**) FEDDE, l. c. 78. — B. groß, starr, mit Hypoderm, (Fig. 201 p¹), Blst. traubig, ihre Trgb. mächtig entwickelt, spelzenartig, langzugespitzt.

○ B.-Rand durchweg gleichmäßig gezähnt.

• Unterstes B.-chen-Paar von Bl.-Stiel-Basis 3—10 cm entfernt.

12. *M. nervosa*: niedriger, kaum über 40 cm hoher b, B. 9—17-zählig, B.chen (Fig. 201 p), Randzähne 7—14 jederseits, oberseits von Grunde aus: deutlich viernervig, ziemlich mattgrün, unterseits heller: 3—8:1,5—4 cm; Blst. aufrecht, 7—20 cm lang, ihre Trgb. 2—3 cm lang, Bl. hellgelb, vgl. Fig. 201 q—r.

M. n. NUTT., Gen. am. I. 212. 1818 (*B. n.* PURSH, Fl. Am. sept. I. 219. t. 5. 1814, nur B!; *M. glumacea* DC., Syst. II. 21. 1821; *B. glum.* SPRENG., Syst. II. 120. 1825). — Starknervige *M.*; strong-nerved *B.* — Pacif. N.-Am. (W.-Küste von Vancouver bis Monterey) — Besonders Kiefernwälder. — Blz. V—VI. — Frz. VII—VIII. — Bis etwa Prov. III—IV in guten Lagen hart, liebt Heideboden.

• • Unterstes B.-chen-Paar der B.-Stiel-Basis stark genähert.

• B.-Oberseiten kaum o. wenig glänzend, B.chen am Grunde breit abgestutzt bis herzförmig (Fig. 201 s, t), End-B.chen-meist größer.

13. *M. japonica*: bis über 2(—5?) m hoher b; B. 7—13-zählig, B.chen breit-, seltener länglich-eiförmig, am Grunde breitkeilig o. abgestutzt o. herzförmig, oberseits lebhaft bis tiefgrün, 6—12:3—8 cm, Zähne jederseits 4—6; Blst. zu 4—5 gehäuft, bis 15 cm lang, ihre Trgb. 1,5—2 cm lang, Bl. etwa 5 mm lang gestielt, Trgb. eben so lang o. wenig länger, C. an Spitze zweilappig, Stb. ungezähnt, Stbf. meist doppelt so lang wie A., Fr. eiförmig, tiefblau, bereift.

*) Nicht beschrieben aus dieser Gruppe habe ich die Arten: *M. polyodont* FEDDE, l. c. 126; *curvibracteata* FEDDE, l. c. 127 und *M. gracilipes* FEDDE, l. c. 128 (*B. gracilipes* OLIV., in Hook. Ic. pl. XVIII. t. 1754. 1887; *B. subtriplicata* FRANCH., in Bull. Mus. hist. nat. Paris I. 63. 1895; *Mah. subtriplicata* FEDDE, l. c. 129), sämtlich aus Sz'tschwan (China).

var. **a. typica**: B. chen wie oben. — **b. bealei** FEDDE, l. c. 119 (*Berb. bealei* FORT., in Gard. Chron. 1850. 212, *Mah. bealei* CARR., in Fl. d. serr. X. 166. 1854). B. chen breiter mehr rundlich (Fig. 201 f), End-B. chen größer, bis über 11 cm lang. — **c. gracillima** FEDDE, l. c. 120, B. chen kleiner, als bei a, etwa 4—5:1—1,5 cm. — **d. trifurca** FEDDE, in litt. (*Berb. trifurca* FORT., in Jour. Hort. Soc. VII. 2. 26. 1852; *Mah. trif.* LOUD., Encycl. Fl. Suppl. II. 1346. 1842. ex FEDDE): B. chen im Mittel etwa 10,5 cm, End-B. chen sitzend. — Ein im Herb. ZABEL. liegendes Exemplar scheint der echten *trifurca* zu entsprechen. Jetzt kaum mehr bei uns echt in Kultur.

M. j. DC., Syst. II. 22. 1821 (*Ilex jap.* THBG., Fl. jap. 77. 1784; *Berb. jap.* R. BR., in TUCKER, Congo Exp. App. 22. 1810). — Japanische M. O.-As.: Nepal und Himal., China (Sz'tschwan, Hupei) in Jap. nur kult.! — Blz. IV—VI. — Frz. Sommer. — Schöner Kulturstrauch, besonders var. *bealei* mit ihren mächtigen B. Die var. *gracillima* ebenfalls in Kultur, und zwar als Typ. Sie steht *nepalensis* außerordentlich nahe und dürfte zuweilen nur recht schwer zu unterscheiden sein. Bei uns etwa bis Prov. V(—IV) in günstigen Lagen hart.

++ B.-Oberseiten stark glänzend. B. chen am Grunde keilig o. abgerundet (Fig. 201 w), End-B. chen meist gleichgroß.

14. *M. nepalensis*: von *japonica* etwa noch abweichend durch: B. bis 25-zählig, B. chen 5—10:2—4,5 cm. Randzähne jederseits meist 5—10, Blst. bis 30 cm lang, Fr. 5—8 mm Dm.

FEDDE führt: var. *leschenaultiana* HOOK., Fl. Brit. Ind. I. 109. 1875 (*Berb. leschenaultiana* WALL., Cat. n. 1479, ex WIGHT et ARN., Prodr. Fl. Pen. Ind. or. I. 16. 1834). — B. chen wie lackiert glänzend, so dicht an Spindel angeordnet, daß Ränder sich dachziegelartig decken. — var. *pyncophylla* FEDDE, l. c. 124, B. breiter, oft fast rundlich, gewissermaßen einen Übergang zu *japonica* bildend. — var. *macrophylla* FEDDE, l. c. 125, B. chen lang-lanzettlich, 8—15:2—3 cm. Und als neu sei noch hier genannt: var. *integerrima* FEDDE: folia integerrima, ad marginem latissime et levissime undulata, vel dentibus minimis vix prominentibus, non spinosis armata. Vorder-Indien; East Bengal Herb. GRIMM n. 120 in Herb. Boiss. FEDDE fugt hinzu, daß diese merkwürdige Erscheinung vielleicht teratologischer Natur sein könne und sich vielleicht nicht auf den ganzen B. erstrecke. Auffällig ist das vorliegende Exemplar jedenfalls.

M. n. DC., Syst. II. 21. 1821 (*B. nep.* SPRENG., Syst. II. 120. 1825; *B. miccia* HAM., ex DON Prodr. Fl. nep. 205. 1825). — Nepalsche M.; the nepal ash leave l Berberry. — O.-As.: Verbreitet durch ganz Vorderindien vom Himal. bis zu den Nilghiribergen. Ferner auf den Gebirgen von Hinterindien, Java, China Kansu, Sz'tschwan, Jünnan, ob in Jap. ? — Blz. XI—XII. — Sonst vgl. *japonica*, die wohl härter.

CC B.-Rand im unteren Teile ganzrandig (Fig. 201 u).

15. *M. fortunei*: aufrechter, 1,2—1,8 m hoher b; B. bis 30 cm lang, zusammen mit Bl. in dichten Büscheln am Zw.-Ende; B. chen ober. lebhaft bis hellgrün, ins Bläuliche spielend, lanzettlich, 6—12:1—2,5 cm; Trauben bis 15 cm lang, gedrängt, Bl. nur 2 mm langgestielt, vgl. Fig. 201 v—v¹, Fr. ?

M. f. FEDDE, l. c. 130 (*B. fortunei* LDL., in Jour. Hort. Soc. I. 231. 1846). — N.-China um Shanghai, Hupei, Sz'tschwan. — Blz. Herbst. — FEDDE betont, daß bei den kult. Exemplaren die B. Oberseiten dunkler, die Unterseiten ganz hellgrün sind und die Zahnung des Randes bis fast zum Grunde geht; außerdem ist das unterste Fiederpaar 1—5 cm vom B.-Stiel-Grunde entfernt. Hübsche Art, wohl aber nur für warme Lagen in Prov. VI—VII.

Gattung 68. *Nandina* THBG., Fl. jap. 9. 1784.

Vgl. S. 297 und Art. Nur diese bekannt.

N. domestica: bei uns kaum über 2 m hoher b, Zw. kahl, gelbrotbraun, bald abfasernd, Kn. beh., vgl. Fig. 193 n—r; B. bis 40 cm lang, meist 3-fach gefiedert, kahl, beim Austrieb rotbräunlich, später

oben sattgrün, unten heller. Bl. ehen aus keiligem, oft ungleichem Grunde eilänglich, langzugespitzt, etwa 2.5:0.6—6.5:2 cm, o. auch mehr eirhombisch, breiter, kurzspitziger 1.5:0.8—5:2 cm, ganzrandig, sitzend; Blst. meist terminale rispige Cymen, 20—40 cm lang; Bl. unscheinbar, weißlich, knospenfg., auf die in 5 o. mehr 3-gliedrigen Quirlen stehenden K. folgen 2mal 3 C., die nicht solche Nektarien wie *Berberis* tragen. Stb. 6, A. intrors, in Längsspalten sich öffnend. Gyn. 1. Sa. 2—3. N. 3-lappig; Fr. eine rote, kugelige, erbsengroße Beere.

N. d. THRG., l. c. — Japan (Kjusiu, Hondo, China (Tschili, Kiangsu, Chekiang, Kiangsi); lichte Wälder, Gebüsche, Wegraine. Im Gebirge bis 1000 m. — Blz. VI—VII. — Fr. bei uns kaum reifend. — Prov. V—VII. — Die im H. d. D. D. G. 119 erwähnten Formen halte ich für belanglos.

Familie 20. *Menispermaceae*, **Mondsamengewächse.**

DC., Prodr. I. 95. 1824.

§. B. ☉, meist sommergrün, einfach, Neb. fehl., Bl. klein, in achselständigen zusammengesetzten Trauben. K. 6—9, C. 6; ♂: Stb. 6—24, A. intrors, basifix; ♀: Gyn. 3—6, Std. 6, Sa. 1, semianatrop, an Bauchnaht hängend, Mikropyle nach oben, Integ. 2, Fr. Steinfr., nierenfg., 1-samig.

Gattungen*):

A. ☉ Zw. kahl, B. dgl. o. fast kahl, ♂ Bl. mit 9—25 Stb., N. geteilt:

69. *Menispermum*.

Fig. 203. *a—d* *Menispermum canadense*: *a* ☉ Zw., *b* Kn (1) und B.-N. (2) von vorn, *c* dgl. im L.-Schn., *d* Zw.-Q.-Schn. (1—6 vgl. Fig. 164g, S. 252). — *e—h* *M. danianum*: *e* ☉ Zw., *f—g* Kn und B.-N. von oben und im L.-Schn. (*a—f* übereinander stehende Kn.), *h* = *d* (Original nach C. K. SCHNEIDER).

*) ZABEL führt im H. d. D. D. G. noch *Stephania japonica* MIERS, in Annal. Mag. Nat. Hist. ser. III. 1860. 14 (et Centr. Bot. III. 213. 1864 71). Aus Mangel an

B. ♂ Zw. und B. weich beh., ♂ Bl. mit 6 Stb., N. ungeteilt: 70. *Cebatha* (*Cocculus*).

Gattung 69. *Menispermum* L., Sp. pl. 340. 1753.

[Mondsame; Moonseed; Ménisperme.]

Vgl. oben. Kn. über B.-N., — im Zw. verborgen, B. schild- o. herzförmig, K. 6, C. 6, an den Seiten eingerollt, Fr. am Rücken mit drei Längsleisten, Innenfortsatz ohne Höhlungen. 3 Arten.

○ B.-Stiel fast am B.-Grund o. höchstens 5 mm über diesem schildförmig eingefügt, B. stets gewimpert und unters. auf Nerven (wenigstens am B.-Grunde) beh., ♂ Blst. hfg. über 4—5 cm lang.

1. *M. canadense*: 2—4 m hoch, Zw. höchstens jung beh., eiförmig, leicht streifig-riefig, olivgrün o. bräunlich, Lent. kaum sichtbar, Kn. vgl. Fig. 203a—d, B. vgl. Fig. 205e—i, vorwiegend stumpf lappig, bis 20 cm Dm., selten unten ganz kahle, oben tiefgrün, unten bläulich- o. graugrün; Bl. etc. vgl. Fig. 204a—h, weißlich-gelbgrün, Fr. schwärzlich, bereift, 6—8 mm Dm.

M. c. L., Sp. pl. 340. 1753. — N.-Am., von Quebec bis Manitoba, Georgia, Ark. — in Gehölzen — Blz. VI—VII. — Bekannter harter ♂.

○○ B.-Stiel etwa 6—10 mm über dem B.-Grund eingefügt, ♂ Blst. kaum 4 bis 5 cm lang.

Fig. 204. a—h *Menispermum canadense*: a ♂ Bl., b Stb. und A. von oben; c + Bl. (z. T. im Schnitt (1 = Trgb., 3 = Vorb., 2 = Bl.-Stiel, 4 = K., 5 = C., 6 = Std., 7 = Gynophor, 8 = Gyn., d K., e C., f Frkn. im L.-Schn., g h S. im L.-Schn. und von der schmalen Seite gesehen (α = äußere, β = innere S.-Haut, γ = End., δ = E.). — i—l *M. dauricum*: i ♂ Blst., k ♀ Bl. im L.-Schnitt, l Fr. — m—q *Cebatha orbiculata* (*Cocculus thunbergii*): m K., n C. und Stb., o Fr., p—q S. (i—l nach BAILLON, sonst Orig.)

2. *M. dauricum*: dem vorigen sehr nahe stehend, die besten Kennzeichen scheinen noch zu sein: B.-N. auf deutl. Kissen (Fig. 203e), B. oberseits glänzender, auch unters. meist hellgrün, Lappung ausgeprägter, spitzer Fig. 205a—d; daß der Gynophor, wie KOEUNE angibt, so lang wie Frkn. ist, sah ich nie, die von mir in Fig. 204k reproduzierte Zeichnung BAILLONS ist ganz korrekt.

Material bin ich mir nicht klar geworden, was unter dieser Art eigentlich zu verstehen; jedenfalls scheint sie mit *St. bernardifolia* WALP., Rep. I 96 1842, nicht identisch. In Kultur nichts Ähnliches vorh.

Ich unterscheide: var. *typicum*: B. ganz kahl, und var. *pilosum*: B. unterseits, bes. am Ausgangspunkt der Hauptnerven, am oberen Teile des Blattstieles locker beh. und $\pm$ am Rande gewimpert. (Sah ich nur im Herb. ZABEL.)

M. d. DC., Syst. I. 540. 1818. — Sib. (vom Baikalsee ostwärts), Mongolei, China (Tschib, Shingking, Shantung, Jap. — Sonst wie vorige Art, vielleicht schöner. — *Men. diversifolium* PRANTL, in Nat.-Pfl. III. 2. 83. 1891 (*Cocculus diversifolius* MIQ., in Ann. Mus. Lugd.-Bat. 1867. 16) weicht ab durch nicht schildfg. B., gehört aber den Bl. nach (ich sah nur ♂ mit 9 Stb.) zu dieser Gattung und nicht zu *Cebatha*.

Gattung 70. *Cebatha* FORSK., Fl. aegypt.-arab. 171. 1775 (*Cocculus* DC., Syst. I. 515. 1818).

Vgl. oben S. 325. B. nicht schildfg., K. 6–9, C. 6, mit 2 Öhrchen die Stbf. umfassend. Gyn. 3–6, Fr. fast kugelig, mit 2 seitlichen Höhlungen im Innenfortsatz. Vielleicht 20 gute allweltliche Arten (selbst bei weiter Fassung der Gattung, meist im trop. As.

Fig. 205. *a–d* *Menispermum dauricum*: B.-Formen, *a* von var. *pilosum*. — *e–i* *M. canadense*: B. — *k–n* *Cebatha orbiculata* (*Cocculus thunbergii*): B., *n* von var. *triloba* (Alles knapp $\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

⊖ B. vgl. Fig. 206a–b, zuw. ringsum 5-lappig. Grund sehr tief herzförmig. Dm. bis 12 cm, C. an Spitze nicht gespalten, A. nicht kürzer, Fr. rot.

1. *C. carolina*: Tracht zierlicher wie *Menispermum*, Höhe bis 3 m. Zw. und Kn. zottig beh., B. oben kahlend, glänzendgrün, unterseits weich beh., Stiele 2–10 cm lang. Blst. 2–13 cm lang, sonst vgl. Fig. 206.

C. c. KOEHNE, Dendr. 161. 1893 (*Menisp. virginicum et carolinum* L., Sp. pl. 340. 1753; *Cocc. carolinus* DC., l. c.; *Ceb. virginica* O. KTZE.*), Rev. gen. I. 9. 1891). Amerikanischer Kokkelstrauch; carolina moonseed. N.-Am. (Virg. bis Ill., Kans., Flor., Texas). — Bes. an Ufern. — Blz. VI–VIII. — Noch nicht häufiger §, dessen polymorphe Laubtracht recht zierend ist. Ob über Prov. III hinaus hart?

Fig. 206. *Cebatha (Cocculus) carolina*: a B., b Blst.; c–d ♂ Bl. ganz und im Längsschnitt; e–h Stb. (z. T. mit P.) von verschiedenen Seiten; i ♀ Bl.-Kn. (1 = Vorb., 2 = K., 3 = C.); k offene ♀ Bl. von oben; l P. (1) mit Std. (2); m Frkn. im Längsschnitt mit Sa. (a); n Fr.; o S.; p–q S. im Schnitt (1 = Testa, 2 = Tegmen, 3 = End., 4 = E. [in p liegt rechts oben die radicula, der die Cot. andeutende Strich ist versehentlich bis ans Ende durchgeführt] b nach GRAY, c–d nach BAILLON, sonst Original).

○ B. vgl. Fig. 205k–n, im Mittel kleiner, meist deutl. breiter als lang, C. an Spitze gespalten, A. reichlich kürzer, Fr. schwarzblau.

2. *C. orbiculata (Cocc. thunbergii)*: weicht sonst noch ab durch. Beh. reicher, meist auch auf B.-Oberseiten sich haltend, B. bis etwa 10, Stiel bis 3 cm lang, Blst. meist kleiner.

Nach den B. kann man 2 var. festhalten: var. a. *typica* B. nicht o. schwach gelappt (*Menisp. orbiculatum* THUNB., Fl. jap. 194. 1784; *Coc. thunb.* DC., Syst. I. 224. 1818), vgl. Fig. 205k–m. var. b. *triloba* (*Menisp. trilobum* THUNB., l. c.; *Cocc. tril.* DC., l. c.), B. vgl. Fig. 205n.

* Es dürfte doch wohl richtiger sein, den Namen *carolina* vorzuziehen, d. ihm ja DC. bereits angewendet. Bei dieser Gelegenheit möchte ich richtigstellen, daß ich in meinen „Dendr. Winterstudien“ an Stelle von *C. virginica* auf S. 66 *Menisp. dauricum* beschrieben und abgebildet habe (vgl. übrigens Fig. 203).

C. o. O. KTZE., Rev. gen. I. 9. 1891 (*Nephroica thunbergii* MIERS, Contr. Bot. III. 263. 1864/71; sonst vgl. *var.*). — Japanischer K. — Jap., S.-Korea, Formosa, O.-China. — Blz. VII–VIII. — Erst in neuerer Zeit eingeführt; *var. typica* erhielt ich aus Hort. Bot. Darmstadt als *Coc. japonicus* (vgl. Ann. S. 324), der echt stark schildfg. B. hat, und aus dem Arnold-Arboret. *var. triloba* hat SPAETH eingeführt. Sie ist von sehr zierlicher Tracht und wohl so hart wie *carolina*.

Familie 21: Magnoliaceae, Magnoliengewächse.

J. Str.-HIL., Expos. Fam. II. 74. 1805.

Vgl. Reihe S. 269. b. $\frac{1}{2}$ o. $\frac{1}{3}$: B. sommer- o. immergrün. $\odot$, ungeteilt, selten gelappt, mit Ölzellen, die manchmal + durchsichtige Punkte bedingen. Bl. einzeln, end- o. achselständig, o. eingeschlechtlich, hypogyn. Blh. aus mehreren Kreisen (meist petaloide P., selten K. und C.), Stb. 5–15 ∞ , Frkn. ∞ , frei auf verlängerter o. stark gewölbter Achse. Sa. 2 ∞ , wandständig, anatrop, Integ. 2, Sa. mit reichlichem, nicht zerklüftetem End., E. klein.

Gattungen*):

A. b. $\frac{1}{2}$ Mk. weiß, voll, Kn. 1- o. 2-schuppig; B.-Rand ungezähnel.

I. Kn. 1-schuppig, B. ungeteilt: 71. *Magnolia*.

II. Kn. 2-schuppig, B. $\pm$ gelappt: 72. *Liriodendron*. (S. 339.)

B. $\frac{1}{3}$, Mk. grünlich o. hohl, Kn. mehrschuppig (*Kadsura*?), B.-Rand $\pm$ gezähnel.

I. Mk. voll, grünlich, B. ohne obs. Sp. aber durchscheinend punktiert: 73. *Schisandra*. (S. 340.)

II. Mk. hohl, B. mit obs. Sp., ohne durchscheinende Punkte: 74. *Kadsura*. (S. 341.)

Unterfamilie a. *Magnolieae* DC., Prodr. I. 79. 1824. B. mit Scheiden, die in Kn. ringsum geschlossen sind, Bl. groß, mit verlängerter Achse.

Gattung 71. *Magnolia***), L., Sp. pl. 535. 1753.

Vgl. oben: Bl. endständig, P. petaloid o. äußerster Kreis K.-artig, A. intrors; Sa. 2; Fr. Balgkapsel, meist auf dem Rücken, seltener am Grunde ringfg. aufspringend, Sa. an langen Fäden heraushängend. — Etwa 30 Arten. Die hier nicht erwähnten stammen aus dem tropischen Asien und Am.

Sekt. 2
siehe S. 333

Sekt. 1. *Gaillimia* ROTTLER, ex DC., Syst. I. 455. 1818. Kn. mit zwei tutenfg. Sch. vor den B., deren äußere meist kahl o. minder beh.

*) Im H. d. D. D. G. wird *Michelia compressa* SARG., For. Fl. Jap. II. t. 5. 1894 als *Magnolia compressa* MAXIM., in Bull. Ac. Pétersbg. 1872. 417, geführt. Die Gattung *Michelia* weicht von *Magnolia* im wesentlichen ab durch: Bl. achselständig, P. sämtlich petaloid, Stb. und Gyn. durch deutliches Internodium getrennt. *M. compressa* ist ein (in der Heimat) bis 17 m hoher $\frac{1}{2}$, der die Ebenen des subtropischen Jap. bewohnt und für uns als Freilandpfl. wohl ebenso belanglos ist, wie die Arten der Gattung *Illicium*. Im Heidelberg'schen Schloßgarten sind in den letzten Jahren Versuche mit *I. anisatum* L., Sp. pl. 664. 1753 (= *I. religiosum* S. et J., Fl. Jap. I. 5. t. 1. 1835) aus dem subtrop. Japan und China Kwangtung, sowie *I. glaberrimum* FLIES, in Act. angl. 1770. 524, aus dem SO.-N.-Am. (Florida bis Louisiana) gemacht worden, doch glaube ich nicht, daß diese Gattung die Mühen der Akklimatisation lohnen wird. Die Gattung ist charakterisiert durch: B. immergrün, ganzrandig Form etwa wie Fig. 222h o. m., durchscheinend gepunktet, Bl. achselständig, P. ∞ (äußere kelchartig), Stb. ∞ , A. intrors; Gyn. 8–20, Frkn. frei, Gr. pfriemlich, Sa. 1; Fr. Balgfr.

**) Spez.-Lit.: MAXIM., in Bull. Ac. Pétersbg. 1872. 418 und SARGENT, I. 1891.

ist und hfg. zeitig abgestoßen wird, so daß die stark beh. Kn. scheinbar wie bei Sekt. 2 sind: B. sommer- (o. auch immer-) grün, Bl. vor o. mit, seltener nach Laubausbruch (asiatische Arten).

○ Äußere P. deutl. K.-artig, viel kürzer als innere.

○○ s. S. 331

• B. • unter der Mitte am breitesten, unters. bläul.-weiß bereift (Fig. 209a).

1. *M. salicifolia*: glattrindiger $\text{♂} - \text{♀}$, bis 5 (0,20–0,40) m. • Zw. kahl, bräunlich, leicht bereift, Lent. undeutlich, Kn. kahl, etwa 0,6–0,9:0,2–0,3 cm; B. 7–16:2,5–6 cm, aus rundl.-keiligem Grunde eilänglich, zugespitzt, Seitennerven 10–14, unters. sehr fein (Lupe!) beh., Nervatur • gelbl., Stiel 0,6–1,5 cm (ein aus der Arnold-Arboret

Fig. 207. a–g *Magnolia kobus*: a B; b Bl; c–d Stb.; e Frst; f S. mit Arillus; f' dgl. ohne Arillus; g S. im Längsschnitt. -- h–p *M. hypoleuca*: h Bl.; i–k Stb.; l–m N.; n Gyn., o. dgl. im Längs- und p im Querschnitt (nach SHIRASAWA).

erhaltenes Exemplar weicht von den jap. ab durch vollige Kahlheit d. B., diese mehr längl.-elliptisch [bis 11:6 cm], Stiele 2–3 cm lang; Bl. nach SHIRASAWA weiß, duftend, K. grün, C. 6, verkehrt eilänglich, etwa 7:2,5 cm, Frst. grünlich, etwa 7:3 cm, Sa. scharlachrot.

M. s. MAXIM., in Bull. Ac. Pétersb. 1872. 418. (*Buergeria? salic.* S. et Z., in Abb. Ak. Münch. IV. H. 187. 1875). — Weidenblättrige M. — Jap. Honshu, Kiso, Kotsuke, Rikuoku. Zwischen 600–1000 m., feuchte Berghänge, tiefgründige Böden. — Blz. IV. — Frz. IX. — Ob in Kultur? Was ich als *salicifolia* sammelte, war *stellata*. Die zitierte Pfl. des Arnold-Arboret ist mir fraglich.

★★ B. in o. ± über der Mitte am breitesten, unters. grünlich.

+ C. weißgebl., ± ausgebreitet (Fig. 207 b).

2. *M. kobus*: $\text{♂} - \text{♀}$, bis 20:0,6 m; • Zw. kahl, • olivbraun, Lent. verstr., braunrot, z. T. zusammenfließend, Kn. • kurz beh., seit-

liche bis 1.2:0.3 cm; B. (Fig. 209c, d) zuletzt oben kahlend, glänzend-grün, glatt, meist nur unten längs Rippe und Seitennerven kraus-
beh. und gebartet. Nervatur runzelig, scharf. Seitennerven etwa 8—11.
Basis keilig, Spitze kurz aufgesetzt. 6—16:2.5—9 cm; Stiel 1—
1.8 cm; Bl. vgl. Fig. 207b. K. grünl., etwa 6:1.8—3 cm, Gr. an Spitze
zurückgekrümmt. Frst. vgl. e. leicht gerötet. Sa. tiefrot.

M. k. DC., Syst. I. 456. 1818. Kobus-M. Jap. (Honsku, Hokkaido
Ebenen und Gebirge. Blz. V—VI. — Frz. IX. Selten echt in Kultur, vielleicht
bis III—IV hart. Was ich in Hort. Hann.-Münden sammelte, dürfte echt sein.

± C. wenigstens außen rot o. ganz purpurn, aufrecht (Fig. 208a).

3. *M. denudata* (*M. obovata*): ♂ ♀, kaum über 3 m, von *kobus*
abweichend durch: Zw. mit deutl. hellen Lent., Kn. vgl. Fig. 216h—l.
B. (Fig. 209b) mehr elliptisch, Basis und Spitze gleichmäßiger, 10—20:
4.5—11(—14) cm, unters. wohl stärker kahlend, glatter, da nur Haupt-
nerven scharf-runzelig. Stiel 1—2.5 cm; Bl. nicht duftend, größer. C.
im Mittel 7:4 cm, vgl. *var.*

var. a. typica: Bl. vor B.-Aus-
bruch, C. beiders. gerötet; hierher wohl
f. gracilis (*M. gracilis* SALISB., Parad.
Lond. t. 87. 1806, fide MAXIM.) in allen
Teilen zierlicher, angeblich als *M. kobus*
in Kultur. — ? *var. b. purpurea* (*M.*
p. CURTIS, Bot. Mag. XI. t. 390. 1797;
M. discolor VENT., Malm. t. 24. 1803),
Bl. mit B., C. außen ± purpurn, innen
weiß, mir echt unbekannt. — ? *var. c.*
liliflora (*M. l.* LAM., Encycl. III. 675.
1789), Bl. mit B., C. ganz weiß. Mir un-
bekannt.

M. d. LAM., Encycl. III. 675. 1789
(*glauca* β. THBG., Fl. jap. 237. 1784, non
L.; *obovata* THBG., in Trans. Lin. Soc.
1794. 336. ex parte). — Rote M. — Chi-
na (Sz'tschwan, Kiangsu), in Jap. wohl
nur kultiv. — Blz. V—VI. — Zahlreiche
Kulturformen und Bastarde, deren Ur-
sprung z. T. unklar. Überhaupt bedarf
die Gattung *Magnolia* einer eingehenden
Kritik der Bastarde auf Grund leben-
den Materials. — Vielleicht als bis Prov.
III hart anzusehen.

3 × 5. *M. denudata* (*obovata*) × *pre-
cia* (*yulan*): *M. soulangiana* SOULANGE-
BODIN, in Ann. soc. d'hortic. Par. 1826.
90 (*yulan* var. soul. LDL., in Bot. Reg.
XIV. t. 1164. 1828; *hybrida* var. soul.
DIPP., Handb. III. 151. 1893). — Dieser
Bastard ist noch an anderen Orten (wohl
auch in Japan, vgl. *conspicua* var. *pur-*

Fig. 208. a—b *Magnolia denudata*
(*M. obovata*): a Zw.-Stück mit B. und
Bl.; b S. im Längsschnitt. — c—f *M.*
stellata: c Zw. mit Bl.; d S., e—f dgl. im
Längs- und Querschnitt. — g—h *M. con-
spicua*: g Zw. mit Bl. und B.; h Bl. im
Längsschnitt (a nach Nouv. Duh., c,
g nach Bot. Mag.; b, h nach BAILLON,
sonst Original).

purascens MAXIM., in Bull. Ac. Pétersbg. 1872. 419) gezüchtet worden und in mehreren Formen vorh. Der Name *soulangian* dürfte als Hauptname für die Formen beizubehalten sein, die *precia* (*yulan*) näher stehen, wogegen als ältest publizierter für die, bei denen *denudata*-Charaktere stärker hervortreten, *lennei* TOPF, ex VAN HOUTTE, Flor. d. serr. XVI. t. 1693 94. 1867 in Betracht käme. Auf die *M. grandis*, *alexandrina*, *norbertiana*, *cyathiformis*, *reflorescens* HORT, etc. hier einzugehen, muß ich mir aus Mangel an Material versagen. Es würde mich freuen, wenn mir Interessenten Blüten dieser Formen zur Verfügung stellen könnten.

○○ Alle P. ± gleichlang und petaloid.

* B. ± hautartig, sommergrün.

✱✱ s. S. 333.

+ Hauptseitennerven kaum über 6—10. B. unters. meist deutl. grünlich.

△ B. im Mittel nicht über 8:3,5 cm, vgl. Fig. 209e, f.

4. *M. stellata*: in Heimat ½, bis 4 m. bei uns kaum über 2—3 m. Zw. jung seidig beh., + kahlend, erst ganz kahl. Kn. seidig beh., etwa 1:0,3 cm; B. jung gleich Stiel + seidig beh., später oben meist ganz, unten bis auf Rippe kahlend, kaum über 10:4 cm, Stiel 0,9—1,3 cm; Bl. duftend, vor B., P. weiß, etwa 9—18, vgl. Fig. 208c f. Stb. wenige, Gyn. ∞; Frst. bis etwa 5 cm lang.

M. st. MAXIM., in Bull. Ac. Imp. Pétersbg. 1872. 419 (*Buergeria st.* S. et Z., l. c. 186. 1846; *M. halleana* PARS., ex Flor. Mag. N. S. 1878. sub. t. 309). — Stern-M., magnolier étoilé. — Jap. (Kiuschiu, Nippon). — Waldungen. — Blz. III—IV — Ihrer reichen frühen Blüte halber sehr schön, aber kaum über Prov. IV. hart

△△ B. im Mittel größer, wenigstens über 5—6 cm breit.

= Bl. in Form ähnl. *denudata*, P. nicht unter 5:2 cm.

5. *M. precisa* (*M. yulan*): ½, 10—15 m, o. bei uns ½, Krone licht verästelt, oval, + Zw. kahl o. fast kahl, braunrot. Kn. etwa 1,2:0,4 cm; B. 7—14:5,5—8 cm, vgl. Fig. 209h o. auch bis 20:12 cm (i), zuw. kaum länger als breit. Beh. ähnlich *stellata*, feinste Nervatur unten scharfrunzlig. Stiel 1,5—3 cm; Bl. vor B., duftend, erst zuletzt offener, wie Fig. 208g, P. weiß, etwa 9, dicklich.

M. p. CORR., in VENT. Jard. Malm. 24. Note 2. 1803 (*conspicua* SALISB., Par. Lond. t. 38. 1806; *yulan**) DESF., Hist. arb. II 6. 1809). — China (Tschili, Kiangsu, Kiangsi, Hupei, Kweichou); in Japan nur kultiv. — Waldwege. — Seit Alters in Kultur! — Wohl härteste asiatische Art. Bes. in den Hybriden bekannt.

= = Bl. in Form an *glauc*a gemahnend, P. kaum über 2,5—4 cm.

6. *M. parviflora*: ½—½, Zw. jung + rostfarben beh., erst kahlend, Kn. etwa 1:0,2—0,3 cm; B. vgl. Fig. 209g, z. T. mehr rundl. elliptisch, 6—12:4,5—8 cm, jung dicht bräunl. seidig beh., später oben stark, unten + kahlend, z. T. auch hellhaarig (so B., die mir Herr SHIRASAWA sandte), feine Nervatur weniger scharf netzig, als bei *precia*; Stiel 1,5—3,5 cm, Bl. mit B., weiß, Stiel etwa 4 cm, Fr. nach MAXIM., wie bei *hypoleuca* mit bleibendem Gr.

M. p. S. et Z., l. c. 187. 1846. — Kleinblütige M. — Jap. (Kiuschiu, Nippon). — Bergwälder. — Blz. VI. — Im Garten des Herrn v. SE-PAUL in Fischbach (Riesengebirge) in Kultur. Scheint bis IV hart.

*) Die Erwähnung der *Magnolia yulan* (dies chinesischer Name) in Mem. concern. l'hist., etc. de Chine p. l. russ. de Pék. III. 441 1778, fide K. KOCH, ist doch nicht als Publikation der Art aufzufassen.

++ B. mit meist über 14 Hauptseitennerven, unters. meist deutlich weißlich (Fig. 209k), Bl. mit B., kremefarben.

... B. gelbgerandet, unters. weißl.-grün, nicht eigentlich bereift, äußere P. der Bl. gerötet.

Fig. 209. *Magnolia*-B.: a *salicifolia*. — b *deundata* (obovata). — c—d *kobus*. — e—f *stellata*. — g *parviflora*. — h—i *precia* (yulan). — k *hypoleuca* (ziemlich kleines B.). — l *foetida* (*grandiflora*). — m *glauca*. — n—o *acuminata*. — p *fraseri* (kleineres B.). — q *cordata* (alles $\frac{1}{4}$ n. Gr.) (Original).

7. *M. watsoni* : nach HOOKER: kleiner B., Zw. kahl, B. 12–21 : 6–11,5 cm, ellipt. o. verkehrt eilängl. o. verkehrt grundlich, stumpfspitzig, oben tiefgrün, auch Nerven – gelblich, unten jung fein seidig beh., Grund – rundkeilig, Seit.-Nerven 10–15; Stiel 1,5–3 cm; Bl. fast sitzend, duftend, 15–18 cm Dm., innere P. breit verkehrt eifg., etwa 7 : 3–3,5 cm, hohl, ausgebreitet, Stb. ∞ , etwa $\frac{1}{2}$, so lang als P., Gyn. hoch, Gr. schlank.

M. w. HOOK., in Bot. Mag. t. 7157. 1891. — Japan (wo wild?). — Diese mir noch ungenügend bekannte Art dürfte für milde Lagen brauchbar sein; nach Angabe in Mitt. d. D. D. Ges. 1898: 63, gleich voriger in Fischbach in Kultur, wo ich auch Ende Mai 1904 ein Expl. mit knospigen Bl. fand.

B. ganz grün, unten deutl. bereift, äußere P. grünlich (Fig. 209k).

8. *M. hypoleuca*: b. bis 25 : 1 m, Zw. kahl, – olivgrün o. bräunlich, hfg. bereift, Lent. deutl., Kn. 2–3 : 0,7–1 cm, kahl, blauschwarz:

*) *M. campbelli* HOOK., in Bot. Mag. t. 6793, 1885, die DIPPEL (1893) führt, dürfte für uns nur Kaltwasserpfl. sein. Sie entstammt dem Himal. Bhutan und hat große, außen lebhaft, innen schwach gerötete, vor den B. erscheinende Bl., deren schmallängliches Gyn. zur Blz. in den Stb. fast verborgen ist (n. HOOKER).

B. 15—40:7,5—17,5 cm, auch unters. zuletzt sehr stark kahlend. Nervatur scharf. Stiel 2,5—7 cm; Bl. fast sitzend. P. etwa 8:3,5 cm, derb; Frst. bis 18:6 cm, kolbenfg., scharlachrot, sehr schön!

M. h. S. et Z., l. c. 187. — Weißrückige M.; jap.: Honoki. — Jap. (Honsku, Hokkaido); Centr.-China (Hupei, Kweitschou) — Gebirgswälder (Nordseite, tiefgründ. Boden). — Blz. VI/VII. — Fr. IX—X. — Prächtiger Zier-*h.*, der bis Prov. III. hart zu sein scheint und wegen seines wertvollen olivgrünen Holzes für forstl. Anbau empfohlen. Verlangt guten Eichenboden, soll aber z. T. recht langsam wachsen! Tracht ähnlich *M. macrophylla*.

✱✱ B. lederartig, immergrün.

9. *M. delavayi*: diese habituell wohl an *foetida* gemahnende Art beschreibt FRANCHET, wie folgt. *h.*, 8—9 m, Zw. mit deutl. Lent., B. jung unten fein beh., bald ganz kahl, — bläulich-weiß, aus rundl. o. kurzbreitkeuliger Basis stumpf breit-eifg., Hauptseitenerven 12—16, unten deutlich erhaben; bis 20:10—12 cm; Stiel 3—6 cm; Bl. weiß, duftend, Stiel etwa 4 cm, P. dick, etwa 7—8 cm lang, nach Abb. von FRANCHET glockig geschlossen, Gyn. zuw. — beh., Frst. bis 14:5 cm, Färbung?

M. d. FRANCHET, Pl. Delav. 33. t. 9/10. 1889. — China (Jünnan). — Wälder. Wird durch VETICH in Engl. verbreitet, ob aber härter als *foetida grandiflora*?

Sekt. II. *Magnoliastrum* DC., Syst. I. 450. 1818. Kn. nur mit einer tutenfg. Sch., auf die sofort ein B. folgt. B. sommer- o. immergrün, Bl. lange nach B.-Ausbruch. (Arten der Neuen Welt.)

○ Kn. kahl, B. sommergrün, am Ende der Zw. gedrängt.

✱ B. vgl. Fig. 209p; Bl. ähnlich *tripetala*.

10. *M. fraseri*: *h.* o. *h.*, bis 15:0,5 cm, Krone aufstrebend, ausgebreitet, Borke fast glatt, Zw. kahl, ☉ braunrot, Lent. deutl., Kn. 2—3:0,5—0,7 cm, purpurn, bläul. bereitt; B. dünn, 13—28(—35):7—13—20 cm, oben tiefgrün, jung — rot überlaufen, unten hellgrün o. bläulich, kahl, Stiel 4—10 cm; Bl. kremweiß, duftend, äußere P. kürzer, abfällig, innere kaum unter 11:3,5 cm, 6—9, dünn, nach der Basis allmählich verschmälert, Frst. lebhaft rot, 12—15:4,5 cm, Fr. mit bleibendem Gn.

M. f. WALT., Flor. carol. 159. 1788 (*auriculata* LAM., Encycl. III. 645. 1789). — Frasers M.; mountain m. — N.-Am. von Virg., Kent. und Miss. bis Georgia, N.-Alabama. — Bergwälder (Tier., kaum unter 600 m herabsteigend). — Blz. VI. — Noch selten in Kultur; ob härter als bis Prov. IV?

✱✱ B. und Bl. vgl. Fig. 210 und B. auch Fig. 215a.

11. *M. tripetala*: *b.* o. *h.*, wie vorige. Borke hellgrau. Verästelung mehr ausgebreitet. Zw. und Kn. vgl. *fraseri*, nur — kräftiger: B. hellgrün, zuletzt nur noch unten — verstr. beh., 20—35—60:7—18 (—29) cm, Stiel nur 1—3(—4,5) cm; Bl. vgl. Fig. 210, unangenehm riechend, äußere P. — grün, zurückgebogen, innere 6—9 weiß, dicklich, etwa 8—12:2—3,5 cm, Frst. bis 12:4,5 cm, rosa.

M. t. L., Syst. ed. X. II. 1082. 1759 (*virginiana* *δ.* *tripetala* L., Sp. pl. 536. 1753; *umbrella* LAM., Encycl. III. 673. 1789; *umbellata* HORT. NONN.). — Schirm-M.; umbrella tree; arbre à parasol. — N. Am. SW.-Pennsylv. bis Alab., westl. ins Ark., Mississippi. — Liebt feuchte Lagen, Berghänge mit *R. deltoideum* *var. comm.* und *Acer rubrum*. — Blz. V—VII. — Seit 1732 in Eur. in Kultur, scheint fast ganz hart. In Am. hfg. als Unterlage für weniger wüchsige Arten.

*) Die Formen der Ebene (in low rich soil near the streams) aus S. Georgia, W.-Flor. und S.-Alabama werden von SARGENT, Trees and shrubs III. 101. 1903, wieder als *M. pyramidata* PURSH, Fl. Am. Sept. II. 382. 1814, als Art abgetrennt. Sie soll von *fraseri* vor allem durch „smaller flowers, with more slender and elongated tips of the anther connectives and smaller fruits, with shorter and incurved points of the carpels“ abweichen.

11×13. *M. tripetala* × *glauca*: *M. major* (*glauca* var. *major* SIMS, Bot. Mag. t. 2164. 1820; *thompsoniana* THOM., in Trans. hort. Soc. 1823. 205). Ein mir nur ungenügend bekannter, wohl zieml. harter Bastard, den nach SIMS der Gärtner THOMSON (nicht THOMPSON) aus im Jahre 1808 gesäten *glauca*-S. in seiner Gärtnerei zu Mile End erzielte und der in den größeren B. (an Bl.-Zw. bis 24:11,5, an Löhden bis 30:15 cm) und in den ebenfalls größeren Bl. (P. bis 9 cm lang) die Charaktere von *tripetala* anzeigt.

Fig. 210. *Magnolia tripetala*: a Bl.; b Früchtchen geöffnet; c—d S. im Längs- und Querschnitt; e S. ohne Arillus; f E. (nach SARGENT).

CC Kn. beh., B. z. T. immergrün, mehr gleichmäßig am Zw. verteilt.

* B. immergrün, lederig (Fig. 209l).

12. *M. foetida* (*M. grandiflora*): pyramidal-kroniger B., bis 25:1,3 m; Borke zuletzt graubraun, klein und dünn-schuppig, Zw. gleich den Kn. beh. erst kahlend, Kn. etwa 1,5:0,5 cm; B. oben glänzend tiefgrün, kahl, unten gelblich o. bräunlich, ± fein beh., in Tracht an *Ficus elastica* erinnernd, 12—25:6—12 cm, Stiel 2—3—4 cm; B. groß, cremeweiß (Fig. 211), wohlduftend (nicht den Namen *foetida* verdienend), P. 6—11, dicklich, sonst vgl. die Fig.

M. f. SARG., in Gard. a. For. 1889. 615 (*virginiana* β *foetida* L., Sp., pl. 536. 1753; *grandiflora* L., Syst. ed. X. II. 1082. 1759). — Großblütige M.; bull bay; m. à grandes fleurs. — N.-Am. (N.-Carol., Georg., Flor., Texas, W.-Louis., Ark.). — Feuchte Ufergelände etc. — Blz. VII—VIII. — Seit 1732 in Eur. eingeführt und im Medit. einer der häufigsten und schönsten immergrünen Zier-B., sonst nur für Prov. VI—VII (als B.) zu verwerten. In Heimat Holz geschätzt.

** B. sommergrün, ± häutig.

s. S. 337.

Äußere P. nur wenig kürzer als innere, Bl. duftend.

△ B. und Bl. vgl. Fig. 209m und 212.

*) Die Angabe bei PRANTL und KOEHNE, daß bei *foetida* die Neb. dem B.-Stiel nicht angewachsen und kahl seien, finde ich nicht bestätigt. Bei dieser Art ist die äußerste Hülle ± beh., dann folgen Neb.-Scheiden, die gleichfalls beh. sind und denen die winzigen B. unten mit dem B.-Stiel anhaften.

Fig. 211. *Magnolia foetida* (*M. grandiflora*): a Bl.; b Stbl.; c Gyn. im Längsschnitt; d, e Sa.; f Frst.; g, h S. im Längs- und Querschnitt; i S.; bei k halb, bei l ganz von Arillus befreit; l E. (nach SARGENT).

13. *M. glauca**: h h, bis 23:0.9 -- 1 m. Borke zuletzt aschfarben, kleinschuppig, Zw. nur jung beh., k olivgrün, meist kahl, Kn. mäßig beh., k bereift, etwa 2:0.4 cm; B. oben kahlend, lebhaft grün, unten k fein beh., bläulich-weiß, in Heimat zuw. sehr spät fallend, 5--18:3--6--7.5) cm, Stiel 1--2.5 cm; Bl. cremeweiß, P. 9--12, Fr. dunkelrot, kahl. -- Ob und was sich für Varietäten unterscheiden lassen, ist mir noch fraglich.

Fig. 212. *Magnolia glauca*: a Bl. und B.; b Stb.; c Frkn. im Längsschnitt; d, e S. im Längs- und Querschnitt; f S. ohne Arillus; g E. (nach SARGENT).

*) Von einigen amerikanischen Autoren (wie SMALL) wird der Name *B. virginiana* L. auf diese Art angewendet, was wohl auch das Korrekteste ist.

M. g. L., Syst. ed. X. II. 1082. 1759 (*virgin. a glauca* L., Sp. pl. 535. 1753; *fragrans* SALISB., Prod. 379. 1799). — Blaugraue M.; sweet or swamp bay; m. glauque. — N.-Am. von O. Mass., Long Isl., bes. östl. der Allegh. bis Flor., westl. durch Golfstaaten bis Ark., Texas. — Feuchte Lagen. — Blz. VI—IX. — Schon seit 1688 in Engl., schöne, aber kaum über Prov. IV. harte Art.

△△ B. und Bl. vgl. Fig. 214.

14. *M. macrophylla*: ♂ ♀, bis 16:0,5–0,6 m (vgl. Fig. 213). Borke hellgrau, glatt, Zw. auch noch . . . beh., Kn. dicht feinseidig, bis 6:1,2 cm: B. an Zw. Enden . . . gehäuft 20–50:–90.: 11–19(–30) cm, oben kahlend, sattgrün, unten silbergraublau, . . . weich beh., Stiel 4–9(–12) cm: Bl. kremweiß, P. etwa 6, innen am Grunde . . . rotgefleckt, Frst. bis 8:7 cm, rosenrot, Frkn. beh.

Fig. 213 *Magnolia macrophylla* Winter-Habitus Original n. C. K. SCHNEIDER.

M. m. MCHX., Flor., bor. Am. I. 327. 1803. — Großblättrige M.; great-leaved m., large leaved cucumber tree; m. à grandes feuilles. — N.-Am. (S.-O.-Kent. bis Flor., westl. bis Ark., Louis.). — Geschützte Talwälder. Blz. VI VII. Durch ihre großen B. sehr auffällig, seit 1800 in Eur. in Kultur, wohl bis Prov. IV hart.

Fig. 214. *Magnolia macrophylla*: a B.; b Bl.; c Stb.; d—e S. im Längs- und Querschnitt; f—g (= Fig. 211 i—k); h E. (nach SARGENT).

++ Äußere P. deutl. kürzer als innere, — K.-artig, Bl. geruchlos
 ... B. meist 2:1. Spitze deutl. Fig. 209n o. Bl. grünlich-weiß (Fig. 215).

Fig. 215. *Magnolia tripetala*: B., sonst wie Fig. 210. — b—l *M. acuminata*: b Bl.; c Stb.; d Bl. ohne Bl.blätter; e Gyn. im Längsschnitt; f Frst.; g—h S. im Längs- und Querschnitt; i—k analog Fig. 211); l E. (b—l nach SARGENT).

15. *M. acuminata*: $\mathfrak{h}$, bis 30:1,20 m. Krone (bes. jung pyramidal, Borke braungrau; Zw. jung beh., $\odot$ meist kahl, olivgrün bis bräunlich, σ rotbraun, Kn. vgl. Fig. 216a σ ; B. oben bald kahl, sattgrün, unten verstr. beh., hellgrün, 12–22 (—30):6–12 (—18) cm, Stiel 2–4,5 cm; Bl. halb geöffnet, P. 6–9, außen bereift, Frst. tiefrot.

Fig. 216. a–g *Magnolia acuminata*: a $\odot$ Zw., b Kn (α = äußerste Sch., β B.-N., γ Kn (nach Entfernung von a sieht man das B. β und die 2. Neb.-Scheide δ), ϵ dgl. im Q.-Schn., δ = 2. B., ϵ = 3. Neb.-Scheide, ζ = 3. B.), f Zw.-Q.-Schn., g kurzer Trieb. h–l *M. denudata* (*M. obovata*), h σ Zw. (α σ wie zuvor), i vgl. b, k B.-N., l Zw.-Q.-Schn. (1–6 vgl. Fig. 164 σ S. 252). — m–s *Liriodendron tulipifera*: m Zw.-Ende, n Kn., bei o ihre äußeren 2 Sch. (α , β) geöffnet, sodaß das 1. B. (γ) und seine 2 Neb. (δ , ϵ) freiwerden, in p ist bereits das 2. B. noch zu sehen (σ rechts), q Zw.-Q.-Schn., r L.-Schn., die angedeutete Mk.-Fächerung zeigend, s wie l (Orig. nach C. K. SCHNEIDER).

M. a. L., Syst. ed. X. II. 1082. 1759 (*virgin. e. acuminata* L., Sp. pl. 536. 1759). — Gurken M., cucumber tree. — N.-Am. (New York bis Ill., südl. bis Kent., N.-Carol., Alab., westl. bis Ark.). — Wälder, mit *Liriodendron*, *Quercus alba* etc. — Blz. V–VI. — Seit 1750 in Kultur. In Bl. weniger schön, aber sonst im Alter härter und üppiger als andere Magnolien.

B. meist $1\frac{1}{2}$ – $1\frac{1}{2}$:1. Spitze stumpf (Fig. 209q). Bl. kanariengelb.

16. *M. cordata*: vielleicht nur *var.* von voriger, weicht noch ab: $\mathfrak{h}$ bis 17:0,45 m. B. zuw. seicht herztgl., von 7,5 bis 20:18 cm. Textur derber, unters. mehr graugrün; Stiel 1,5–2,8 cm; Bl. kleiner, P. bis etwa 6:2,3 cm; Frst. nach SARG. 4:2 cm, nach KOEHNE meist 3:1.

M. c. MCHX., Flor. Bor.-Am. I. 328. 1803 (*acum. var. cord.* SARG., in Am. Jour. Sci. Ser. 3. XXXII. 473.). — Herzblättrige M. — Carol., Zentr.-Alab., nach SARG. indes nicht in der typ. Form MICHAUX' wiedergefunden. Wohl kaum über Prov. IV hart.

Gattung 72. *Liriodendron**) L., Sp. pl. 535. 1753.

[Tulpenbaum; tulip tree; tulipier.]

Vgl. oben S. 328: B. sommergrün; Bl. endständig, äußere 3 P. kelchartig, zurückgebogen, innere 6 petaloid, aufrecht; A. extrors: Fr. einsamige Schließfr. — Nur folgende Arten bekannt.

A. Bl. ca. 6 cm Dm., P. ca. 5 cm lang (Fig. 217a).

1. *L. tulipifera*: B. im Mittel etwa bis 35, in der Heimat hier und da bis 65:4 m. St. pfeilgerade bis zum Wipfel. Krone locker, aufrecht, kräftig verästelt; Zw. kahl, z. rund, olivgrün, allmählich bräunend.

Fig. 217. *Liriodendron tulipifera*: a Bl. in Seiten-Ansicht; b P.; c Bl. im Längsschnitt; d Gr.; e N.; f Frkn. im Längsschnitt; g Sa.; h Frst.; i Fr.; k Fr. im Längsschnitt; l, m S. von verschiedenen Seiten; n–o S. im Längs- und Querschnitt; p E. (a–c, i Original, sonst nach SARGENT).

oft gleich den Kn. bereift, diese vgl. Fig. 216m s. feinstreifig, sehr fein hell gepunktet; B. sehr polymorph, Fig. 218e–g zeigt nur die häufigsten Typen. 6–24 cm lang und eher breiter, kahl, oberseits glänzendgrün, unterseits wenig heller oder blaugraugrün, Stiel 6–12–18 cm; Herbstfärbung intensiv goldgelb! Bl. und Fr. vgl. Fig. 217. innere P. gelbgrün o. schwefelgelb mit Orange-Zeichnung.

L. t. L., Sp. pl. 535. 1753. — N.-Am. (Vermont und Rhode Island bis Flor., Mich., Ark.). Am schönsten in geschützten Tälern der südl. Alleghanies. Blz

*) Spez.-Lit.: E. W. BERRY, Notes on the phylogeny of *Liriodendron*, in Bot. Gaz. 1902. 44.

(V—) VI—VIII. — Frz. X, bei uns selten ganz reifend. — Einer der schönsten Zier-
 ♂, auch forstlich z. T. anbauwert, da sein leichtes, weiches Holz als Konstruktions-
 holz etc., bes. für Pumpenröhren, sehr brauchbar. Er liebt guten, gleichmäßig leuchten,
 lehmigen Boden und etwas gegen raue Winde geschützte Lage. Bereits seit 1688
 in Eur. in Kultur. — Die ∞ Gartenformen sind belanglos, die buntblättrigen nur
 nur ungenügend bekannt, ebenso die im H. d. D. D. G. geführten Wuchsformen.

B. Bl. (wenn wie bei Fig. 217a halb ausgebreitet) nur ca. 4 cm
 Dm., P. ca. 3—3,5 cm lang.

2. *L. chinense*: nach SARGENT: kleiner, ausgebreitet verzweigter, bis 15:1 m
 hoher ♂; B. vgl. Fig. 218d, 12—14 cm lang, unterseits bleicher und — bereift,
 Stiel 7—9 cm; P. gegen Spitze allmählich verschmälert, innere kaum über 1,5 cm
 breit; Frst. 9—10:2,5 cm, innere Früchtchen breiter und stumpfer als die unteren
 äußeren.

L. ch. SARG., Trees and shrubs III. 103. 1903 (*L. tulipifera* var.? *chinense**)
 HEMSLE., in Jour. Lin. Soc. XXIII 25. 1886). — China (Kiangsi, Hupei, Sz'tschwan).
 Gelangt durch VERTCH and SONS in den Handel. Ich sah noch keine Exemplare.

Fig. 218. a *Schisandra chinensis*; B. — b *Sch. nigra*; B. — c *Kadsura ja-*
ponica; B. — d *Liriodendron chinense*. — e — g *tulipifera*: B.-Formen eines Baumes
 (alles $\frac{1}{3}$ n. Gr.) (d nach SARGENT, sonst Original).

Unterfamilie b. *Schisandreace* BAILL., Hist. pl. I. 189. 1868.
 B. ohne Scheiden o. Neb., Bl. klein, ♂, Achse konvex, zur Frz. bei
Schisandra gestreckt.

Gattung 73. *Schisandra* RICH., in MCHX Flor. bor. am. II. 218. 1803.

Vgl. oben und S. 328, sowie Art.

*) DIELS hat, in Engl. Bot. Jahrb. XXIX. 332. 1900, den Namen in *sinensis*
 korrigiert.

Sch. chinensis: §, bis etwa 4 m. Zw. kahl, ♂ rund, glänzend. Lent. anfangs undeutlich, am Holze ∞, feinhöckerig. Kn. vgl. Fig. 225l—p. B. häutig, vgl. Fig. 218a, Grund hfg. — keilig, Spitze mehr gerundet mit kurzem, aufgesetztem Spitzchen, 5—10:3—6 cm, oben sattgrün, unten wenig heller o. — graugrün, jung an Nerven beh., später fast kahl; Stiel 1—2—3,5 cm; Bl. und Fr. vgl. Fig. 219, Bl. duftend. P. 9—12, gelblich-weiß, z. T. gerötet, Stb. 5—15, Gyn. ∞, Fr. rot.

Sch. ch. BAILL., Hist. pl. I. 148, 1868 (*Kadsura ch.* TURCZ., in Bull. soc. nat. Mosc. VII. 149, 1837). — Japan (Hondo, Jesso), China (von Kweitschou und Kiangsi bis Kansu und Tschili), Amurgebiet. — Vorzüglich in schattigen Wäldern. — Blz. V—VI. — Etwa bis Prov. III harter, interessanter §. — Die im H. d. P. D. G. geführte *Sch. nigra* MAXIM., in Bull. Ac. Petersbg. 1872. 141, aus Japan (Kiusehin, Hondo, Jesso) weicht ab durch: B. kahl (vgl. Fig. 218b), breit bis rundlich-ellipt., fast ganzrandig, 3,5—7:3,5—5,5 cm; Stiel 2—4,5 cm! S. vgl. Fig. 219h, verrukos. Ich sah sie ebensowenig in Kultur, wie die übrigen asiatischen Arten: *axillaris* HK. F. et TH., Fl. brit. ind. I. 45, 1872 (Khasia, S.-China, Java); *elongata* HK. F. et TH., l. c. 41 (wie vorige, auch Nepal, Sikkim); *grandiflora* HK. F. et TH., l. c. (Himalaya: Simla bis Bhutan); *propinqua* HK. F. et TH., l. c. 45 (Kumaon, Nepal und in China: S.-Kansu, Hupei, Kweitschou) oder die nordamerikanische *coccinea* MCHX., Fl. II. 219. t. 47, 1803, aus S.-Carol. und O.-Texas.

Fig. 219. a—i *Schisandra chinensis*: a Blst., b ♂ Bl. ohne P., c Stb.; d ♀ Bl. im L.-Schn., e Frkn. mit N. (α), f dgl. im L.-Schn., g Frst., h S. (von LAVALLÉE nicht richtig dargestellt, denn die Testa ist glatt, h zeigt sie wie bei *nigra*!), i dgl. im L.-Schn. — k—u *Kadsura japonica*: k ♂ Bl., l dgl. im L.-Schn., m Androeceum, n Stb., o Gyn., p—q Frkn., r Frst., s Fr., t im L.-Schn. (a—d, g—i n. LAVALLÉE, k—u, s—t n. BAILLON, o—r n. SIEB. et ZUCC.).

Gattung 74. *Kadsura* JUSS., in Ann. Mus. d'hist. nat. 1810. 340.

Vgl. oben und S. 328, sowie Art. — Etwa 7 Species im trop. As. bis Japan bekannt, die als Freilandpflz. für uns kaum in Betracht kommen.

K. japonica: §, bis etwa 2 m. St. korkrindig, Zw. kahl. — hellbraun, sehr bald fem längsrissig; B. — derbhäutig, z. T. wintergrün Fig. 218e, 5—10:3—4,5 cm,

oberseits sattgrün, unterseits – heller; Stiel 1–1,5 cm; Bl. und Fr. vgl. Fig. 219k–u. Bl. gelb, nach KOEHNE wie ränzige Butter riechend, P. 9 (–15), Stb. und Gyn. ∞ , Fr. rot.

K. j. DUM., Monogr. fam. Anon. 57. 1817. (*Uvaria jap.* L., Sp. pl. 536. 1753. – Japan (Kiuschiu, Hondo), in Gebüsch. – Blz. VII–VIII. – Frz. X. – Bei uns nur im Schloßgarten in Heidelberg in Freilandkultur.

Familie 22. *Calycanthaceae*, Gewürzstrauchgewächse.

LDL., Nat. Syst. ed. II. 159. 1836.

Vgl. Reihe S. 269. b. Kn. nackt o. beschuppt. B. gegst., einfach, ganzrandig, sommer- o. wintergrün, mit Ölschläuchen, gerieben gewürzhaft riechend. Neb. fehl.: Bl. einzeln achselständig, meist wohlriechend. σ , τ , P. $\odot$, petaloid, Stb. 5–13 (–30), äußere in Std. umgewandelt. Gyn. ∞ , im Innern der hohlen Bl.-Achse grund- und wandständig, Sa. je 2, anatrop. Integ. 2. Fr. einsamige Schließfr., in der Bl.-Achse eingeschlossen.

Fig. 220. a–d *Butneria (Calycanthus) florida*: a $\odot$ Zw., b Kn., c Zw. im L., d im Q.-Schn. — e–h *B. fertilis*: e $\odot$ Zw.; f–g Kn., h Zw.-Q.-Schn. — i–o *Chimonanthus praecox*: i $\odot$ Zw., k Kn. (1 = Kn., 2 = untere Bl.-Kn., 3 = B.-N. auf starkem Kissen), l Bl.-Kn. (a), m B.-N. im Schnitt, n Kn.-Schn., o Zw.-Q.-Schn. — p–s *Butneria occidentalis*: p $\odot$ Zw., q r Kn und B.-N., s Zw.-Q.-Schn. (1–6 vgl. Fig. 164g S. 252, a–g Schichten eines primären Gefäßbündels (Orig. n. C. K. SCHNEIDER).

Gattungen:

- A. Kn. nackt, Bl. mit o. nach B. an jungen Trieben, heller o. dunkler bräunlichrot, fruchtbare Stb. etwa 13: **75. Butneria** (*Calycanthus*).
 B. Kn. beschuppt, Bl. lange vor B. am alten Holze, gelblichweiß, im Innern $\pm$ purpurn, Stb. 6: **76. Chimonanthus** (S. 346).

Gattung 75. Butneria* DUHAM., *Traité d. arb.* I. 113. t. 45. [Sept.] 1755. (*Basteria* MILL. Fig. Pl. t. 60. [Dez.] 1755: *Beurreria* EHRET. Pl. et Pap. Rar. depict. t. 13. [?] 1755: *Calycanthus* L., *Syst.* ed. X. 1066. 1759.)

[Gewürzstrauch; straw-berry shrub; calycanthe.]

Vgl. oben; 3—4 nordamerikanische Arten.

- C B. unten bleibend deutl. weichfilzig, Bl. mit starkem Erdbeerduft.

1. *B. florida*: zieml. sparrig verästelter, dichter, 1–2(–3) m hoher b. Zw. jung dicht filzig, $\odot$ noch fein weich beh., stumpfkantig, olivbraun, Lent. ∞ , heller, Kn. schwärzlich, vgl. Fig. 220a–d; B. Fig. 222a–b jung beiders. beh., später oben lebhaft grün, — rauh, unten weißgrau, 6–10:4–5,5 o. auch bis 11:9 cm, Stiel 0,6–1 cm; Bl. braunrot, etwa 1–3 cm lang gestielt, 4–5 cm Dm., Stb. wie Fig. 221t, Frkn. wie o.

Nach den B. könnte man folgende Formen festhalten: *f. typica*: B. wie Fig. 222a o. noch gestreckter, also 2–2 $\frac{1}{4}$:1. — *f. ovata* (*Calyc. ovatus* AIR., Hort. Kew. II. 220. 1789) B. mehr wie b, etwa 1 $\frac{1}{2}$:1. — *f. asplenifolia* (*Calyc. flor. f. aspl.* LOUD., Arb. II. 936. 1844) B. zerschlitzt, mir unbekannt. — *f. bullata* (*Calyc. flor. f. bullatus* K. KOCH, Dendr. I. 365. 1869). B. blasig aufgetrieben *f. lutea* (*Calyc. flor. f. luteus* BEHNSCH, in: H. d. D. D. G. 1903) und *f. variegata* (*Calyc. flor. f. varieg.* SCHELLE. l. c.).

B. f. Kearney, l. c. 1894 (*Calyc. flor.* L., l. c., 1759; *C. sterilis* WALT., Fl. car. 151. 1788; *Beurreria flor.* O. Ktze., Rev. Gen. 5. 1891). Erdbeer-G.; hairy st.; arbre aux anémones. — N.-Am. (N.-Carol. bis Georg., Alab., Mississippi). In fruchtbarem Lande. — Blz. (V–)VI–VII. — Bis etwa Prov. III hart, sonst wenigstens Bodendecke im Winter. Nächst *occidentalis* die schönste Art. — WASSMALL, in Flor. southeast. stat. 528. 1903 als *B. mohrii* beschreibt scheint mit *f. ovata* identisch und müßte, wenn wirklich gute Art *B. ovata* heißen.

1 $\times$ 2 *B. florida* $\times$ *fertilis*: scheint vorh., doch bisher nicht sicher nachweisbar.

- CC B. auch jung nicht filzig, später ganz oder ziemlich kahlend, Bl. nicht oder schwach duftend.

γ B. meist unter 10 cm lang, Bl. — stumpf dunkelbraunrot, Fr. mit oben verengtem Halse (Fig. 221k).

2. *B. fertilis*: weicht vom vorigen im wesentlichen ab (vgl. auch *var.*, durch: Zw. jung γ , kurz beh., γ kahlend o. spärlich beh., Kn. vgl. Fig. 220e–h; B. oben nur γ schärflich beh., unten ganz kahlend o. verstr. beh., vgl. Fig. 222e–d, 5–10–15; 2–5 cm, Stiel 0,6

Ich habe über den Namen *Butneria* bereits in meinen Dendrol. Winterstudien gesprochen. Auch hier sei auf die Abhandlung von T. H. KEARNEY, in Bull. Torr. Club 1894. 173, hingewiesen. Obwohl ich selbst die erste Ausgabe von DUHAMEL'S Werk nicht emsehen konnte und in der 2. Ausg. *Buttneria* zitiert wird, so muß doch nach LINNÉ und KEARNEY der Name zuerst *Butneria* gelautet haben. Ihn in *Buttneria* zu korrigieren, wie es KUNTZE und KEARNEY tun, liegt absolut kein Grund vor und als *Butneria* kollidiert er durchaus nicht mit *Byttneria* LOEFF., wie *Buttneria* L. und als *Butneria* kollidiert er durchaus nicht mit *Byttneria* LOEFF., wie *Buttneria* L. zuerst publiziert wurde. Den von KUNTZE gewählten Namen *Beurreria* EHRET korrigiert er in *Beurreria*. Die Gattung *Chimonanthus* habe ich lediglich aus praktischen Gründen wieder hergestellt.

1,3 cm. Bl. etwas kleiner, nicht o. schwächer duftend, vgl. Fig. 221,
A. etwa 2—3:1. Frkn. nur am Grunde und Spitze o. auch ganz beh.!!

Es seien folgende zwei, oft, und vielleicht mit Recht, als Arten betrachtete *var.* unterschieden: **a. *glauca*** (*Cal. glaucus* WILLD., Enum. pl. hort. berol. 559. 1809). B. unters. deutl. graublau bereift, meist mehr stumpf längl.-ellipt. bez. kurz gespitzt, Bl. heller bräunlich o. etwas grünl. z. T., kaum duftend, hierher: *f. oblongifolia* *var. obl.* NUTT., Gen. northam. pl. I. 312. 1818. B. spitzer, länglicher, als beim Typ. — **b. *ferax*** (*Cal. ferax* MCHX., Flor. bor. am. I. 305. 1803; *C. laevigatus* WILLD., l. c. 1809; *C. inodorus* ELL., a sketch bot. Carol. I. 576. 1821). B. unters. hellgrün, stets kahlend, meist deutl. spitz, Bl. tiefbraun purpurn, kaum o. -

Fig. 221. *a—d Chimonanthus praecox*: *a* Zw. mit 2 Bl., *b* Bl. von oben, *c* im L.-Schn., *d* Std. — *e—h Butneria (Calycanthus) fortalis*: *e* Bl., *f* dgl. im L.-Schn. (1 = P., 2 = Std., 3 = Frkn.), *g* = *h* Stb., *i* Frkn., *k* Fr., *l* S. im L.-Schn. (1 = 2 Samenschale, *a* = Radicula des E., *m* S. im Q.-Schn., *n* wie in *l*, 3 = 4 Coto., *n* E., *o* = Radicula, *p* und *t* (unten links) *B. florida*: Frkn. und Stb., Sa. *q* = *p* + *t* *B. occidentalis*: *p* Bl. im L.-Schn., vgl. *f* (*a* = Std.), *q* Frkn., *r* = Stb., *t* Fr. (*k*, *o* nach BAILLON, sonst Orig.).

duftend; hierher *f. nana* (*Cal. nanus* LOISEL., in DUH., *Traité arb.* ed. 2. I. 219. t. 48. 1801) in allen Teilen kleiner, mir nur ungenügend bekannt*).

B. f. KEARNEY, l. c. (*Cal. fertilis* WALT., *Flor. carol.* 151. 1788; *Beurera f.* O. KTZE. l. c. 1891). — Fruchtbare G.; smooth st. — N.-Am. (Pennsylv. bis N.-Carol., O. Tennessee, Georg.) — Sonst wie *florida*, aber etwas härter. Zwischen den *var. a* und *b* kommen Mittelformen vor, die vielleicht als Bastarde zu deuten. Jedenfalls bedarf diese Art sehr der Beobachtungen am spontanen Material.

* — *B.* meist nicht unter 10 cm lang. Bl. lebhaft purpurn o. mehr ziegelrot, Fr. oben ohne Hals (Fig. 221t).

Fig. 222. B-Formen: a—b *Butneria (Calycanthus) florida*. — c—d *But. fertilis*. — e—f *But. occidentalis*. — g *Benzoin (Lindera) hypoglauca*. — h *Chimonanthus praecox*. — i *Benzoin aestivale (Lindera benzoin)*. — k *Benzoin hirsutum*. — l *Benzoin sericeum*. — m *Benz. glaucum*. — n *Sassafras sassafras* (S. officinale). — o *Asimina triloba*. — p *Persia berbonica* (*P. carolinensis*). — q *Malapenna (Litsa) japonica*. — r *Umbellularia californica* (V. n. Gr.) (Original).

3. *B. occidentalis*: locker ausgebreitet, rutig verästelter, bis 4 m hoher b, Zw. jung beh., meist kahl, olivgrün o. bräunlich, leicht glänzend, zuw. etwas kantig, Lent. undeutlich, grau, Kn. spitz, schwärzlich, vgl. Fig. 220p—s; B. wie 222e—f, aus rundl. o. zuw. leicht herzförmig. Grunde eilänglich, bis 18:8—10) o. auch bis 12:4,5 cm, oben glänzend grün, meist recht rauh, unten hell- o. gelbgrün, zerstr. beh. o. kahl; Stiel meist nicht über 0,8 cm; Bl. 5—6 cm Dm., nach Essig duftend, vgl. Fig. 221p—t, A. etwa 3½—4½:1, die Konnektivspitze rundlich o. länglich, veränderlich wie bei allen Arten.

B. o. GREENE, in *Erythaea* 1893: 267. C. o. HOOK. et ARN., *Bot. Capt. Beech. Voy.* 340. t. 84. 1841). — Westlicher G.; western st.; c. d'occident

* SMALL, l. c. 1903, stellt *var. ferax* als *B. nana* neben *B. fertilis*, was mir nicht eben korrekt erscheint.

W.-N.-Am. (Calif., S.-Brit.-Col.). — Sonst wie vorige. Bis etwa Prov. IV hart. Blüht und fruchtet in Wien reichlich.

Gattung 76. *Chimonanthus* LDB., in Bot. Reg. VI. 451. 1819.

Vgl. oben S. 343 und Art. Nur 2 in O.-As. bekannt.

Ch. praecox: zieml. aufrecht verästelter, 1–2,5 m hoher b. Zw. jung beh., . fast kahl, grauolivgrün o. . gebräunt, leicht kantig. Kn. vgl. Fig. 220i o: B. (Fig. 222h) nur jung unten beh., später beiders. glänzend hellgrün. 7–20:3,2–7 cm. Stiel bis 0,8 cm; Bl. vgl. Fig. 221a–d, sehr stark und angenehm duftend; Fr. (nur in südl. Lagen reifend) beh., *B. occidentalis* ähnlich, aber mit . angedeutetem Halse.

Fig. 223. *Asimina triloba*: Winterhabitus. (Orig. nach C. K. SCHNEIDER.)

Ch. pr. LINK, Enum. pl. hort. Berol. II. 66. 1822 (*Calyc. pr.* L., Sp. pl. ed. 2. 718. 1762; *Chim. fragrans* LDL., l. c.; *Butneria praecox* C. K. SCHN., Dendrol. Winterst. 241. 1903). -- Winterblüte. -- China (Tschili, Kiangsi, Schensi, Kansu, Hupei, Kweichou), in Jap. eingeführt. -- Blz. (I—)II—III. -- Scheint in Wien (etwa Prov. IV—V) ganz hart, nur Bl.-Kn. leiden durch strengen Frost. An der Riviera wintergrün. In Heimat vielleicht auch? Dort noch *Ch. nitens* OLIV., in HOOK. Ic. pl. t. 1600. 1887, gefunden, der - immergrün ist und feiner gespitzte B., hellere kleinere Bl. mit spitzen Std. besitzt.

Familie 23. *Anonaceae*, Flaschenbaumgewächse.

DC., Syst. veg. I. 463. 1818.

Vgl. Reihe S. 269; b h. B. ☉, ohne Scheiden u. Neb., gerieben unangenehm riechend, Bl. einzeln achselständig, , übelriechend. äußere P. (K.) 3, kleiner, grünlich, abfällig, innere P. 6, Stb. ~, ☉, Gyn. 3 - 15, Sa. 4 - 20, anatrop, Integ. 2; Fr. große fleischige Beerenfr. Sa. mit zerklüftetem End., E. klein.

Gattung 77. *Asimina* ADANS., Fam. pl. II. 365. 1763.

[Papau; papaw; assiminiere.]

Vgl. oben und Art. Etwa 6 Arten im O.-N.-Am.

A. triloba: h h, bis 15 m, Habitus vgl. Fig. 223, Zw. jung beh., , meist bis auf Spitze kahl, glänzend olivbraun, rundlich, Lent. erst an , grauen Zw. deutl., Kn. vgl. Fig. 225a - d, braunrot filzig; B. häutig (Fig. 222o), sommergrün, dicht durchscheinend gepunktet.

Fig. 224. *Asimina triloba*: a Bl., b dgl. im Längsschnitt; c - d Stb.; e Gyn., f Frkn. im Längsschnitt, g dgl. im Querschnitt; h - i Fr. ganz und im Längsschnitt; k S. mit Arillus; l S. ohne Arillus; m - n dgl. im Längs- und Querschnitt; o E. (a - d, h - i nach BAILLON, sonst nach SARGENT).

oben bald ganz kahl, tiefgrün, unten jung rotbraun beh., später stark kahlend, hell- o. graugrün, 12 - 28(-36):4,5 - 11(-15) cm; Stiel 0,8 - 1,2 cm; Bl. am alten Holze, bis 3 cm lang gestielt, bräunlich-purpurn, bis 4,5 cm Dm., sonst vgl. Fig. 224, Fr. 0,7 - 20:2 - 7 cm lang, essbar, gelb.

A. t. DUN., Mon. Anon. 83. 1817 (*Anona t.* L., Sp. pl. 537. 1753). N. Am. (SW.-Ont., W.-New-York, Pennsylv., W.-New-Jersey bis Mich., südl. bis Flor., Texas). -- In Flußniederungen. -- Blz. (IV - V - VII. -- Frz. X (bei uns nur unvollkommen reitend). -- Bereits seit 1736 in Eur. in Kultur. Schöne bis VI(-V) harte Art, sonst unter Schutz als h. Die übrigen 5 Arten sind h der SO.-Ver. Staaten.

Familie 24. Lauraceae, Lorbeergewächse.

LDL., Nat. Syst. ed. II. 200. 1836.

Vgl. Reihe S. 269; b = $\frac{1}{2}$, B. $\odot$, meist wintergrün, ungeteilt o. dreilappig; Neb. fehl., in B. und Rinde ∞ Schleim- u. Ölzellen, daher gewürzhaft riechend, z. T. durchscheinend gepunktet; Blst. sehr verschieden, Bl. π , σ , $\frac{1}{2}$, P. meist (3 + 3), Stb. in mehreren Kreisen, innere meist als Std., A. 2- o. 4-fächrig, intrors, Gyn. 1, Sa. 1, hängend, anatrop, Integ. 2, Fr. später von der fleischig werdenden Bl.-Achse gestützt o. eingeschlossen, S. ohne Endl., Testa dünn, E. gerade, Cot. groß, fleischig.

Fig. 225. a—d *Asimina triloba*; a = Zw., b = c Kn. und B.-N., d Zw.-Q.-Schn. (1—6 vgl. Fig. 164g, S. 252) e—k *Cordaphyllum japonicum*; e = Zw., unten rechts Kn., f = Zw., g Kn., h B.-N., i Zw.-Q.-Schn., k Kn.-Q.-Schn. (1—3 die aufeinander folgenden Kn.-Schn.) l—p *Schumacheria chinensis*; l = Zw., m—n Kn. und B.-N., o durchsichtige Punktierung der Kn.-Schn., p wie d (Orig. nach C. K. SCHNEIDER)

Gattungen:

- A. B. sommergrün, häutig, durchscheinend gepunktet.
 I. B. vgl. Fig. 222 n, A. 4-klappig: 80. *Sassafras*. (S. 349.)
 II. B. vgl. Fig. 222 g, i—m, A. 2-klappig: 82. *Benzoin* (*Lindera*). (S. 351.)
- B. B. immergrün, lederig, nur bei *Umbellularia* mit durchscheinenden Punkten.
 I. B. beiders. grün, unten kaum heller, kahl.
 a) B. durchscheinend gepunktet, A. 4-klappig: 79. *Umbellularia*.

- b) B. undurchsichtig (nur in Adern durchscheinend), A. 2-klappig: 83. *Laurus*. (S. 352.)
- II. B. unters. lebhaft bläulich bereift und fein beh., o. filzig beh., A. 4-klappig.
- a) B. unters. bereift, Beh. sehr fein: 78. *Persea*.
- b) B. unters. mit filzig beh.: 81. *Malapocnna* (*Litsca*). (S. 350.)

Unterfamilie a. *Perseoideae* PAX., in Nat. Pfl. III. 2. 1891. A. 4-fächerig, mit 4 Klappen.

Gattung 78. *Persea* GAERTN., De fruct. III. 222. 1805 7.

Vgl. oben und Art. Specieszahl schwankend, je nach Umgrenzung der Gattung, Trop. und subtrop. As., Am.

P. borbonia (*P. carolinensis*): b — h, in Heimat auch h, bis 20:0,9 m; Borke klein und dickschuppig, rotbraun; Zw. sehr fein beh. (nicht filzig), bräunlich o. olivbraun, B. vgl. Fig. 222 p, 5 — 12:2—4,5 cm, oben bald kahl oder fast kahl und glänzend grün; Stiel 1—2,5 cm; Bl. in bis 3 cm lang gestielten, gleich den Zw. beh., 3- bis etwa 30-blütigen Scheindolden, P. beh., aufrecht, äußere kaum ¹, so lang, innere etwa 4—5 mm lang, die Stb. und den Gr. ein wenig überragend, Stb. 9, Stbf. beh., die der innersten Reihe am Grunde mit je 2 orangenen Drüsen, dann folgen noch 3 Std., die an Spitze beh. und fast den Stbf. gleich lang sind, Frkn. kahl, Gr. etwa 2mal so lang mit stumpfer N.; Fr. eine blauschwarze, etwa 1,2 cm dicke Beere, auf verdicktem, gerötetem Stielchen, am Grunde von den bleib. P. gestützt, die auch nach Fr.-Abfall mit den Blst.-Stielen noch stehen bleiben, Perikarp dünn, S. breit eifg., Testa graubraun, 2-schichtig, Cot. halbkugelig.

P. b. SPRGL., Syst. II. 268. 1825 (*Laurus b.* L., Sp. pl. 370. 1753; *Laurus carolinensis* MCHX., Fl. bor.-am. I. 245. 1803; *Persea carol.* NEES, Syst. Laur. 150. 1836, excl. var. a). — Isabellen-Holz; red bay or Isabella-wood. — N.-Am. (Virg. bis Flor., Texas, Ark.). — Blz. VI—VII. — Für Prov. VI—VII zu versuchen; ich sah nur im Hort. SIMON-LOUIS kleine Versuchspfl.

Gattung 79. *Umbellularia* NUTT., Sylva I. 87. 1842.

Vgl. oben S. 348 und Art. Nur diese bekannt.

U. californica: b — h, bis 30:1,5 m; Borke dunkelbraun, dünnsehuppig; Zw. nur jung fein beh., o. kahl, rundl., bräunlich; B. dünnlederig, höchstens jung unten — beh., vgl. Fig. 222 r, 5 — 10:2 — 4 cm, Stiel 0,5 — 1,2(—1,5) cm; Bl. in kurzgestielten reichbl. Scheindolden, die einzelnen Döldchen anfangs von 5—6 Involukrall. B. eingeschlossen, die dann abfallen, so daß die 5—9 gelblichen Bl. frei werden, diese —, P. kahl, gleichlang, ausgebreitet, Stbf. kahl, Std. sehr klein, kahl; Fr. pflaumenähnlich, gelb mit roth. Anflug, bis etwa 3:2,5 cm, Perikarp dünnfleischig, Sa. eifg., hartschalig, sonst vergl. *Persea*.

U. c. NUTT., l. c. (*Tetranthera? cal.* HOOK. et ARN., Bot. Voy. Beech. 159. 1833, *Oreodaphne c.* NEES, Syst. Laur. 463. 1836; *Drimophyllum pauciflorum* NUTT., l. c. 85). — Kahlornischer Berglorbeer; californica laurel or spice tree — N.-Am. (Oregon, Calif.). — Küste und Gebirgshänge, bis 800 m. — Blz. — das ganze Jahr. — In Kultur wohl nur im Schloßgarten zu Heidelberg versuchsweise angepflanzt. Für Prov. VI—VII zu erproben*).

Gattung 80. *Sassafras* NEES et EBERM., Handb. med.-pharm.

Bot. II. 418. 1831.

Vgl. oben S. 348 und Art. Nur diese bekannt.

S. sassafras (*S. officinale*): b — h, o. in Heimat zuw. h bis 30:1,8 m, Borke dunkelbraunrot, dickschuppig, Zw. nur ganz jung beh.,

*) Die in Mitt. d. D. D. Ges. 1902. 93, als im Schloßgarten zu Heidelberg angepflanzt geführte *Tetranthera causticans* PASQ. soll nach Kew-Index mit *Umbellularia* identisch sein. Ich habe die Heidelberger Pfl. nicht gesehen.

• und • rund, kahl, glänzend gelbgrün. Lent. verstr., kaum auffällig. Kn. grün, Sch. blattartig geadert, vgl. Fig. 150e i. S. 236; B. wie Fig. 222n, hfg. nur einseitig gelappt, ganz jung beiders. beh., oben sehr bald kahl, tiefgrün, unten später kahlend. graublaugrün, im Herbst lebhaft orange-rot, 7—13:3,5—8 o. gelappte bis 24:17 cm, Stiel 1,5—3,5 cm; Bl. vgl. Fig. 226a, dioec., gelblich, kahl, innerste Stb. wie d, Std. fehl., • Bl. mit 9 Std. (f—g), Fr. vgl. i—k, glänzend dunkelblau, Stiel gerötet. S. wie l, E. wie m—m'. — Bildet Wurzelausläufer.

S. s. KARST., Pharm. Med. Bot. 305. 1882 (*Laurus s.* L., Sp. pl. 154. 1753; *L. varifolia* SALISB., Prodr. 344. 1796; *Sassafras offic.* NEES et EBERM., Handb. Med.-pharm. Bot. II. 418. 1831). — Echter S.; Ague tree. — N.-Am. (Maine und Ontario bis Mich., Flor., Texas). — In mehr trockenen Lagen. — Blz. IV—V. — Frz. VII—VIII. — Etwa bis Prov. IV hart, aber geschützte Gegenden liebend. Schön belaubt und aromatisch duftend.

Fig. 226. a—m' *Sassafras sassafras* (*S. officinale*): a ♂ Blst.; b ♂ Bl.; c dgl. im Längsschnitt; d inneres, e äußeres Stb.; f ♀ Bl.; g dgl. im Längsschnitt; h Sa.; i Teil eines Frst.; k Fr. im Längsschnitt; l S.; m—m' E. im Längsschnitt. — n—x *Benzoin aestivale* (*Lindera benzoin*): n ♂ Bl.; o—p ♀ Bl.; q inneres Stb., bei r der Anhang von vorn; s äußeres Stb.; t Fr.; u S.; v—w S. im Längs- und Querschnitt; x E. mit Würzelehen. (a—m' nach SARGENT; n—p nach BAILLON, sonst Original.)

Gattung 81. *Malapoenna* ADANS., Fam. Pl. 447. 1763 (*Litsea) LAM., Encycl. III. 574. 1789; *Tetranthera* JACQ., Hort. Schoenbr. I. 59. 1797).**

Vgl. oben S. 349 und Art. Etwa 150 Species, je nach Fassung der Gattung; meist trop. und subtrop. As. und Am.

M. japonica: b o (hfg. mehrstämmiger) ♂—♂, bis 8 m, Zw. dicht, bräunlich filzig, erst — kahlend; B. vgl. Fig. 222q, oben bis auf Rippe kahlend, tiefgrün, Rand — umgebogen, 5—14:2—4,5 cm, Stiel 0,8—3,5 cm; Bl. dioec., in kleinen, seitenständigen, an den Zw.-Enden gehäuftten Scheindöldchen, deren 5—9 Bl. anfangs

*) *Litsaea* schreibt PERSOON, Syn. II. 4. 1807.

von meist 5 imbrikaten Involukral-B. umhüllt sind; von diesen die beiden äußersten kleiner, alle außen bräunlich filzig; ♂: P. (6), kurzröhrig, freie Abschnitte knapp halb so lang, alles außen seidig beh., Stb. 6—9, die P. überragend, bei 6 alle, sonst nur die 6 inneren mit drüsigen Anhängen am Grunde, unter diesen Stbf. beh.; ♀: P. zieml. analog, an Stelle der Stb. 6 Std., die nur über den größeren Anhängen beh., Frkn. kahl, etwa halb so lang als der Gr. mit stumpfer N.; Fr. eielliptisch, bis etwa 2:1 cm, blauschwarz, am Grunde von P.-Röhre umgeben, Sa. olivgrau.

M. j. O. KTZE., Rev. Gen. Pl. II. 572. 1891 (*Litsea jap.* MIRB., Hist. nat. Pl. ed. 2. IX. 150; *Tet. jap.* SPRGL., Syst. II. 366. 1825). — Jap. (Kiuschiu), Korea, Luchu. — Besonders an feuchten Orten. — Ob in Kultur? Wohl nur für Prov. VI—VII in geschützten Lagen zu versuchen. Das Gleiche gilt von *M. sieboldii* O. KTZE., l. c. (*Litsea glauca* SIEB., in Verh. Bat. Genoot. XII. 24. 1830, non *Tetranthera glauca* WALL. 1828), ebenfalls in Jap. und Korea heimisch, B. beidendig spitz, 6—12:2,5—4 cm, unters. bläul. bereift, Haare seidenzottig, fein, nach vorn gerichtet, anliegend, die ich gleichfalls an der Riviera im Hort. Mortola sammelte. Im H. d. D. D. G. wird noch die hübsche *M. geniculata* COULT., in Mem. Torr. Cl. 1894. 164 (*Laurus gen.* WALT., Flor. car. 133. 1788; *Lit. gen.* MEZ, in Jahrb. Bot. Gart. Berlin 1889. 476) geführt, die in S.-Virg. und Flor. lebt und sommergrüne, 1—5:0,6—1,3 cm messende, zuletzt kahle o. nur unten auf Nerven beh. B. besitzt.

Unterfamilie b. *Lauroideae* PAX, l. c. — A. 2-fächerig, mit 2 Klappen.

Gattung 82. Benzoin FABRIC., Enum. pl. hort. Helmst. ed. II. 401. 1763 (*Lindera* THBG., Diss. nov. gen. 44. 1783).

Vgl. oben S. 348; Bl. in sitzenden Scheindolden, anfangs von 4(—6) Involukral-B. eingeschlossen, dioec., P. 6: 4: Stb. 9, nur 3 innerste mit Anhängen, Std. fehl.: 4: Std. 9 (o. mehr), Fr. mit o. ohne Blh. am Grunde, ihr Stiel nicht o. schwach verdickt. — Bei enger Fassung der Gattung etwa 12 Arten im O.-Himal., S.-Jap.*), atl. N.-Am.

○ B. ungelappt.

* B. zuletzt ganz kahl.

† B. im Mittel über 7 cm und Stiel etwa $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{4}$ so lang (Fig. 222b).

1. *B. aestivale* (*Lindera benzoin*): aufrechter, 1—3 m hoher b. Zw. höchstens jung leicht beh., kahl, grün o. leuchtseitig olivgrün. Lent. deutl., oft zu bräunl. Flecken verfließend. hellgrünlichbraun. j. feinrissig, Äste schwärzlichgrau. Kn. zu 2—3 übereinander, Sch. 2(—4). End-Kn. etwa 7:1,5 mm, B.-N. 3—5-spurig, schief: B. 5—15:2—7,5 cm, jung gewimpert, oben stets kahl, unten sehr bald kahlend, blaugrün, Stiel 0,6—1,5 cm; Bl. vor B., zu 3—6, gelblich, vgl. Fig. 226 n—x. Fr. 0,8—1:0,6 cm, tiefrot.

B. a. NEES, Syst. Laur. 495. 1836 (*Laurus aestivalis* et *L. benzoin* L., Sp. pl. 370. 1753; *Benz. odoriferum* NEES, in WALL. Pl. As. rar. 63. 1830; *Lindera benzoin* BL., Mus. Lugd. Bat. I. 324. 1850; *Benzoin benzoin* COULT., in Mem. Torr. Cl. 1894. 164). — Wohlriechender Fieberstrauch; spice or benjamin bush. — N.-Am. (Maine und Ontario bis Mich., N.-Carol., Tenn., Kans.) — Feuchte Ufer, sumptige Stellen. — Blz. III—V. — Frz. VIII—IX. — Bis Prov. III hart. Hübscher Zier-b., ebenso aromatisch wie *Sassafras*. — In N.-Am. kommt nur noch *B. melissaefolium* NEES, l. c. 494 (*Lind. mel.* BLUME, l. c.) von W.-Flor. bis N.-Carol. vor. Er besitzt beh. Zw. und B. Diese sind aus rundlicher Basis eitg. o. ellipt., kurz zugespitzt und messen nach MEZ ca. 6,5:3,3 cm.

*) In Japan außer den erwähnten Arten noch *B. membranaceum* O. KTZE., Rev. gen. II. 569. 1891 (*Lind. mem.* MAXIM., in Bull. Ak. Petersbg. 1868. 72) mit sommergrünem Laube aus den Bergwäldern Hondos und *B. umbellatum* O. KTZE., l. c. (*Lind. umb.* THBG., Fl. jap. 145. 1784; *Benz. thunbergii* S. et Z., in Abh. Ak. München IV, III. 1846—265), mit ledrigen, unters. bereiften B. aus den Bergwäldern von Kiuschiu und Hondo.

: + B. im Mittel kaum über 5—6 cm und Stiel etwa $\frac{1}{4}$ so lang (Fig. 222g).

2. *B. hypoglaucum* (Lind. *hypoglauca*): weicht von *austroale* noch ab durch: Zw. bräunlich, ganz glatt, Lent. nicht zu erkennen, Kn. einzeln, seidl. als Kztr., End-Kn. bis 1,1 : 0,2—0,3 cm, Sch. gegen Spitze beh.; B. 3,5—8 : 1,5—3 cm, unters. sehr blaugrau o. weißlich, Stiel 0,8—2 cm; Bl. (nach MAXIM., mit B., zu 3—5, Stielchen beh.; Fr. kugelig, schwarz.

B. h. O. KTZE., Rev. Gen. pl. II. 569. 1891 (Lind. *h.* MAXIM., in Bull. Ac. Pétersbg. 1868. 71). — Jap. (Hondo). — Bergwälder. — Vielleicht bis Prov. V harte, noch seltene, auch als *hypoleuca* gehende Art. — Ihr steht in den B. nahe *B. praecox* SIEB. et ZUCC., in Abh. Ak. Münch. IV. III. 1846. 265 (Lind. *p.* BL., in Mus. Lugd. Bat. 324. 1850), die im H. d. D. D. G. geführt wird, mir aber lebend nicht bekannt geworden ist. Sie weicht in der Hauptsache ab durch: Zw. bräunlich mit sehr ∞ helleren Lent., Kn. meist zu 2 übereinander, B. bis 9·4 cm, Spitze hfg. länger vorgezogen, Unters. mehr grünlich, Stiel kaum über 1,3 cm; Bl. vor B., Fr. größer, bis 1,5 cm Dm., Stiel warzig.

×× B. unters. bleibend $\pm$ beh., Bl. meist mit B.

+ B.-Stiele 0,2—)0,4—0,7 cm, B. zuletzt unters. $\pm$ blaugraugrün, verstr. beh. (Fig. 222m).

3. *B. glaucum* (Lind. *glaucum*): $\text{b}=\text{b}$, bis 10 : 0,3 m, $\odot$ Zw. bräunlich o. braungrau, Lent. deutl. länglich, Kn. braunrot, mehrschuppig, etwa 0,6—1,2 cm, Bl.-Kn. größer; B. beim Ausbruch dicht seidenzottig, 4,5—9 : 2—3,5 cm, Textur derbhäutig; Bl.-Stiele beh., aber glatt, Fr. erbsengroß, schwarz.

B. g. S. et Z., l. c. (Lind. *glaucum* BL., l. c.). — Blaugrauer F. — China (Kiangsu, Chekiang, Kiangsi, Formosa, Hupeh, Sz'tschwan, Kwangtun), Jap. (subtrop. Zone). — Im Verein z. B. mit *Camellia japonica* etc. — Kaum in Kultur und nur für Prov. VI—VII versuchswert.

+ + B.-Stiele (0,5—)0,8—1,2 cm, B. unters. $\pm$ graugrün, weich beh. (Fig. 222l).

4. *B. sericeum* (L. *sericeum*): weicht noch ab von *glaucum*: $\odot$ Zw. + kahl, rotbraun, glatt, Lent. kaum sichtbar, Kn. schwächer; B. 6—10 : 2—4,5 cm, beidendig spitz, oben kaum kahlend. — Es scheint eine ganz kahle Form vorzukommen: *var. glabrata* (BL., l. c.)

B. s. S. et Z., l. c. 204 (Lind. *sericeum* BL., l. c.). — Seidiger F. — Jap., Corea. — Ob in Kultur? Dürfte härter als *glaucum* sein.

○○ B. dreilappig (Fig. 222k), zuw. ungelappt.

5. *B. obtusilobum* (L. *obtusiloba*): b , bis 7 : 0,2 m, Zw. anfangs dicht, $\odot$ locker seidenzottig bis fast kahl, rotbraun, Lent. deutl., Kn. 3—4-schuppig, zweifarben, bis etwa 7 : 2—3 mm, Bl.-Kn. viel größer, $\pm$ eikugelig; B. 5—11 : 4,5—9—11 cm, zuw. etwas breiter als lang, oben lebhaft grün, zuletzt kahl, unten graugrün, fast kahlend, Stiel 1—2,5 cm, $\pm$ beh.; Bl. vor B., Bl.-Stiele beh., Fr. etwa 1 cm Dm., schwarz.

B. o. O. KTZE., Rev. Gen. pl. II. 569. 1891 (L. *ob.* BL., l. c. 325). — Stumpf-
gelappter F. — Jap. (Gebirge von Kina, Kii, Honsku), Korea. — Blz. III
Frz. IX. — Schöne erprobenswerte Art. Ob schon in Kultur?

Gattung 83. *Laurus* L., Sp. pl. 369. 1753.

[Lorbeer; laurel; laurier.]

Vgl. oben und Art. 2 Species im Medit. und auf den kanarischen Inseln.

L. nobilis: b — kleiner b , St. rauhborstig, graubraun, Krone aufstrebend verästelt, spitz, Zw. kahl, olivgrün; B. (Fig. 227a), etwa 5—

14:2—4—4.5 cm, Rand wellig, ober. glänzend, unten matt, wenig heller, Stiel 0.2—0.8 cm; Bl. normal dioec., in gestielten, wechselständigen Scheindolden, weißlich; Involukral-B. 4, P. 4; σ^7 : Stb. 8—12—14, alle mit Drüsen- o. die 2—4 äußersten ohne diese: $\therefore$ mit 4 Std.; Fr. schwarzgrün, vgl. Fig. 227.

Fig. 227. *Laurus nobilis*: a Zw. mit Blst. (b); c—d ♂ Bl. ganz und im Längsschnitt, bei c¹ die Bl. ausgebreitet, um die Stellung der Stb. im Verhältnis zu den P. zu zeigen; e—g Stb.; h—i ♀ Bl.; k Gyn. daraus; l dgl. im Querschnitt; m Std. aus ♀ Bl.; n—o Fr., bei o im Querschnitt; p E.; q Pollenkörner (trocken und geweicht); (b—m $\pm$ vergrößert, q stark vergr.) (nach BERG et SCHMIDT).

L. n. L., l. c. — I. G. an S.-Grenze (Istr., S.-Tirol) hie und da verwildert, sonst Medit. bis W.-As. — Uralte Kulturpfl., für uns aber fast nur Kalthauspfl. B. und Fr. Gewürz und Arzneimittel, auf sonstige Verwertung etc., sowie auf die Formen kann hier nicht eingegangen werden.

Reihe XI. *Rhocadales*. Mohnähnliche.

ENGL., Syll. 111. 1892.

$\wp$ o. kleine $\wp$, B. $\odot$, Neb. vorh. o. fehl., Bl. zyklisch, K. (2—)4, C. 4, σ^7 hypogyn. Stb. 6 o. ∞ . Gyn. (2—16), Sa. anatrop o. campylotrop.

Familie 25. *Papaveraceae*, Mohngewächse.

B. Juss., Hort. Trian. 1759.

Vgl. Reihe und Gattung (bez. Art.)

Gattung 84. *Dendromecon* BENTH., in Trans. Hort. Soc. 2. ser. I. 407. 1834.

Siehe Art.

D. rigidum: h. Zw. kahl, hellgrün, c. graubraun, . längsrissig abblätternd, B. dick, starr, graugrün, beiders. kahl, aber dicht papillös, 2,5–8:0,8–2,5 cm, aus rundl. keiligem Grunde ei- o. schmallänglich, spitz, Nervatur scharf-netzig, Stiel 0,1–0,3 cm; Bl. einzeln endständig, lebhaft gelb, 3–9 cm Dm., Stiele 3–12 cm, K. 2, C. 4, Stb. ∞ , Stbf. etwas kürzer als die linearen dithecischen A., Gyn. (2), cylindrisch, Gr. kurz, dreilappig; Fr. etwa 9:0,5 cm messende, vielsamige Kapsel, deren Klappen sich von den Placenten lösen, Sa. eikugelig mit Anhang.

D. r. BENTH., l. c. — Strauchmohn. — Calif. (Coast Ranges from San Diego to Clear Lake. — Trockne steinige Hänge. — Sehr heikle, für trockene Felspartien in Prov. (VI–VII) versuchswerte Art. — Außer dieser nur noch der sehr ähnliche *D. harfordii* KELLOGG, in Proc. Cal. Acad. V. 102. 1873 (*D. flexile* GREENE, in Bull. Torr. Club. XIII. 216. 1886), der die Inseln an der Küste von S.-Californien bewohnt.

Familie 26. Capparidaceae, Kapperngewächse.

LDL., Nat. Syst. ed. II. 61. 1836.

Vgl. Reihe S. 353 und Gattung.

Fig. 228. *Capparis spinosa*: a Zw. mit Bl.; b Diagramm der Bl. nach stattgehabter Drehung, im Anfang ist dasselbe also um 180° gedreht zu denken; c reife Fr.; d S. im Längsschnitt (nach BAILLON).

Gattung 85. *Capparis* L., Sp. pl. 503. 1753.

b. Neb. hfg. verdornend, Bl. einzeln, achselständig, K. 4, C. 4, in Kn. imbrikat o. fast gedreht, Stb. ∞ , Stbf. sehr dünn, A. längsspaltig, beweglich, Frkn. auf Gynophor, Frb. (2–8), Sa. ∞ , kampylotrop, Placenta parietal, Fr. vielsamig, beerenartig, E. gekrümmt, End. fehl. Über 150 ailweltliche, meist trop. und subtrop. Arten.

C. spinosa: ästiger h, 0,6–1 m; Zw. kahl o. beh., . glatt, grünlich, z. rot überlaufen, Neb.-Stacheln hell, schwach, leicht nach unten gekrümmt; (vgl.

Fig. 229k—p); B. aus leicht herztg. o. rundl. Basis cirundlich o. mehr langbeh., stumpfspitzig o. ausgerandet, beiders. beim Typ (auf d. e. $\sim$ π π kann nicht eingegangen werden) kahl, grün o. graugrün, dicklich; 3 5:2 2—1 5) cm, Stiel 0,3—0,9 cm; Bl. weißlich-rosenrot, Stbf. violett, A. gelb; Beere grün (Fig. 228).

Fig. 229. a—d *Ehretia serrata*: a $\odot$ Zw., b—c Kn. und B.-N. im L.-Schnitt und von oben gesehen (α — Kn., β — B.-N.); d Zw. Q.-Schnitt (1 — G. vgl. Fig. 164, S. 252). — e—i *Idesia polycarpa*: e $\odot$ Zw., f Kn. und B.-N. seitlich (bei a Neb.-N.); g B.-N. von vorn; h Kn.-Sch., i = d — k—p *Capparis spinosa*: k $\odot$ Zw., l — n Kn. seitlich, im Schnitt und von vorn (1 — Stipulardorn, 2 — B.-N., 3 — Stelle wo Kn. sitzen, e End-Kn., p Zw. Q.-Schnitt. Orig. n. C. K. SCHNEIDER.

C. s. L., Sp. pl. 503. 1753. — Kappernstrauch. — Medit., I. G. nur östr. Küstenland, S.-Tirol. — Bos. an Mauern. — Bz. VI—VIII. — Kommt als Zier-Pfl. nicht in Betracht; die unreifen, in Essig eingelegten Bl.-Kn. bilden die „Kappern“ des Handels, hfg. verfälscht durch junge Bl.-Kn. von *C. lei palustris*. — Die Varietät ohne Stipulardornen meist als *C. rupestris* SIBTH. et SM., Prodr. Fl. Graec. V. t. 487. 1825, geführt.

Familie 27. Cruciferae, Kreuzblütler.

B. JUSS., Hort. Trian. 1759.

Vgl. Reihe S. 353; $\mathfrak{b}_1$ — $\mathfrak{b}_2$, Bl. , K. 4, C. 4, diagonal; Stb. 2 seitliche kürzere und 4 (durch Verdoppelung aus 2 medianen entstandene) längere; Gyn. 2, mit nahtständigen Sa., meist mit unechter Scheidewand; S. kampylotrop; Fr. 2-klappige Schote, S. ohne End.

Gattungen:

A. Haare einfach o. fehl.

I. Zw. nie verdornend.

a) C. ungleich, Fr. nicht o. nur im oberen Teil breiter geflügelt:

86. *Iberis*.

b) C. gleich, Fr. ringsum breit geflügelt: 87. *Aethionema* (S. 357.

II. Zw. verdornend o. sonst gleich B. dicht weißborstig beh. 88.

Vella. (S. 358.)

B. Haare sämtlich o. z. T. verzweigt (sternfg. o. 2-spitzig).

I. K. am Grunde nicht gezackt. Fr. flach: 89. *Alyssum*. (S. 358.)

II. K. am Grunde gesackt, Fr. blasig aufgetrieben: 90. *Vesicaria*. (S. 359.)

Gattung 86. *Iberis* L., Sp. pl. 648. 1753.

Vgl. oben; kahle ♀. B. ganzrandig o. — gezähnt, Blst. Ebensträube, C. ungleich, äußere größer (strahlend), Stbf. ohne Anhängsel, Fr. am Rücken und vorn fast stets flügelig gekielt, S. 1. hängend. — Etwa 30 meist krautige Arten, M.- und S.-Eur., Or.

Sekt. 1. *Iberidium* DC., Prodr. I. 179. 1824, Fr. : geflügelt, S. ungeflügelt.

Bl.-Zw. oberwärts o. vom Grund ab verzweigt, mehrere Blst. tragend.

1. *I. gibraltaria*: nur an Basis verholzender, B.-Rosetten tragender, dicht rasiger ♀. Zw. krautig, aufsteigend, bis 30 cm hoch; B. vgl. Fig. 231 o, zuw. gewimpert, selten ganzrandig; Blst. zieml. ansehnlich, etwa 4 cm Dm., Bl. weiß-rosa, Fr. wie n.

I. g. L., Sp. pl. 649. 1753. — Gibraltar-Schleifenblume. — Gibraltar. — Auf Kalkfelsen. — Blz. IV. — Wo echt in Kultur? Vielleicht Prov. VI—VII.

○○ Bl.-Zw. einfach, mit nur 1 Blst.

+ Blst. an den B.-Zw. endständig, B. schmallineal, 8—15:1—1,5 mm, ± gewimpert.

2. *I. saxatilis*: zierlicher, — dichtrasiger ♀. Stämmchen knorrig, ausgebreitet, B.-Zw. kaum über 10 cm hoch, meist gegen Ende dicht, aber nicht eigentlich rosettig beblättert, alle B. : graugrün, etwas dicklich und halbstielrundlich, Blst.-Stiel sehr locker beblättert, + beh., Blst. 2—2,5 cm Dm., Bl. weißlich, K. : violett, Fr. etwa 7—8:5 mm, Flügel meist gleich K. gefärbt.

I. s. L., Sp. pl. ed. II. 905. 1763. — Felsen-S. — I. G. nur Sch. (Jura), sonst noch (? S.-Frank.), Pyren., Span., Ital. (Piemont, Centr.-Apen., Sicil.) und Or. (S. Taurus). — Blz. V—VI. — Sehr selten echt in Kultur. Etwa für Prov. V. Sonnige Gesteinsgruppen (Kalk).

+ Blst.-Triebe seitlich an den B.-Zweigen entspringend, B. größer o. wenigstens breiter, flacher.

+ B. ganzrandig, nie deutl. rosettig, Frst. : locker traubig.

3. *I. sempervirens*: ♀ mit verholzenden — niedergestreckten Stämmchen, B.- und Bl.-Zw. aufstrebend, kahl, bis etwa 20—25 cm hoch, B. kahl, schmallänglich, im Mittel etwa (1—2—4):0,3 cm, dicklich, trübblaugrün; Blst. 2—3 cm Dm., zur Frz. bis 6 cm lang, Bl. weiß, Stiele : mehlig flaumhaarig, vgl. sonst Fig. 230 a—h, die Fr.-Flügel in f sind von BAILLON nicht ganz korrekt gezeichnet, vgl. Fig. 231 n.

Eine hübsche Form ist *var. rosca* BOISS., Flor. or. I. 333. 1867 (*I. commutata* SCHOTT et KOT., in exsicc.), Bl. rosa.

I. s. L., Sp. pl. 648. 1753 (*I. garreviana* ALL., Fl. ped. I. 250. 1785). — Immergrün-S. — I. G. nur O U (Dalmat.), sonst noch S.-Frankr., S.-Eur. bis Kl.-As. Blz. V—VII. — Hübsche Kultur-Pfl., bes. wertvoll für Einfassungen.

+ B. : leicht gezähnt, z. T. deutl. rosettig, Frst. dicht, fast doldig.

4. *I. tenoreana*: weicht von voriger im wesentlichen noch ab durch: Wuchs dichter, B. mehr spatelförmig, gewimpert, Bl-Triebe und Stiele dichter beh., Bl. hfg. leicht rosa.

I. t. DC., Syst. II. 404. 1827. — Span., S.-Ital. (Neapel) — Blz. VI—VII. — Kaum echt in Kultur, für Prov. V—VI. zu versuchen.

Sekt. 2. *Iberidastrum* DC., l. c. 181. — Fr. ungeflügelt, S. geflügelt.

5. *I. semperflorens*: vielästiger, + aufrechter, 0,2—0,6 m hoher B., Bl.-Zw. unterhalb der Rosetten tragenden B.-Zw.

Fig. 230. *a—h Iberis sempervirens*: *a* Bl.-Zw.; *b* Bl.; *c* ♂ Bl. im Längsschnitt; *d—e* ♀ Bl. ohne P. und im Längsschnitt; *f* aufgesprungene Fr.; *g* S.; *h* E. — *i—l Alyssum saxatile*: *i* Bl.; *k—l* dgl. ohne Blh. und im Längsschnitt. — *m—p A. medium*: *m* Fr.; *n* dgl. halb geöffnet; *o* S.; *p* E. (*a—l* nach BAILLON, sonst Original).

entspringend, B. kahl, vgl. Fig. 2311, immergrün, Bl. duftend, weißl. o. rosa angehaucht, in kurzer, bis 3 cm breiter Traube, Fr. vgl. Fig. 231 i.

I. s. L., Sp. pl. 648. 1753. — Immerblühende S. — S.-Ital., Sicil. — Selten echt in Kultur. Die gefüllt blühende Form mir unbekannt. Vielleicht Prov. V—VI mit leichter Winterdecke.

Gattung 87. *Aethionema* R. BR., in AIT. Hort. Kew. ed. II. IV. 80. 1812.

Vgl. oben S. 355 und Art. Je nach Fassung der Gattung 20—50 Species, bes. im O.-Medit.

A. grandiflorum: B. mit verholzenden niederliegenden Stämmchen, Zw. dünn, schlank, aufrecht,

Fig. 231. *a—h Aethionema grandiflorum*: *a* Bl.; *b* C.; *c* K.; *d* Bl. im L.-Schnitt ohne Blh., 2 Stb. entfernt; *e* ein größeres Stb.; *f* Fr.; *g* S.; *h* ein größeres B. — *i—m Iberis semperflorens*: *i* Fr.; *k* S.; *l* Rosetten-B.; *m* oberes Stengel-B. — *n—o I. gibraltarica*: *n* Fr.; *o* größere B. — *p—w Vesicaria utriculata*: *p* K.; *q* C.; *r* Frkn.; *s* Fr. (über *t*); *t* S.; *u* Rosetten-B.; *v* Stengel-B.; *w* Haare der B. (Original).

bis 50 cm hoch, gleich den B. kahl, diese blaugraugrün (Fig. 231 h), gegen Basis der Zw. hfg. an kurzen Seitentrieben gehäuft, kleiner; Blst. endständig, bis 7:2,5 cm., Bl. lebhaft rosapurpurn, sonst vgl. a—g.

A. g. Boiss. et HOh., Diag. Pl. ser. 1. VIII. 42. 1849. — Großblütige Steinkresse. — Kurdistan, Armen., N.-Pers. — Blz. VI. — Sehr schön und reich blühend. Dürfte bis Prov. IV hart sein.

Gattung 88. *Vella* L., Sp. pl. 641. 1753.

Vgl. oben S. 356 und Art. Nur 3 in Span. und Algier bekannt.

V. spinosa: kaum 20 cm hoher, dornige Polster (vgl. Fig. 232 a) bildender h. B. dicklich beh., Bl. gelb, mit violetten Adern, in 3—5-blütigen endst. Trauben, sonst wie c—p.

V. sp. Boiss., Elench. pl. nov. 14. 1838. — Span. — Kalkfelsen. — Blz. VI—VII. — Kaum in Kultur und heikel. — Die im H. d. D. D. G. geführte *V. pseudocytisus* L., Sp. pl. 641. 1753, ist ein bis 0,90 cm hoher dornloser h., dessen junge Zw. gleich den stumpfen, verkehrt eilanzettlichen, bis etwa 2:0,8 cm messenden B. dicht hellborstig beh. sind. Blst. vielblütig, bis 8 cm lang, Fr. beh. Gewiß sehr interessanter, aber wohl schwierig zu erhaltender h. aus Span.

Fig. 232. *Vella spinosa*: a Teil einer Pflz. zur Frz.; b ein B.; c Bl.; d C.; e langes Stb. von vorn (jung); f kurzes Stb. von rückwärts (jung); g—h analoge Stb. nach Ausstaubung; i Gyn. im Längsschnitt; k Sa.; l—n Fr. von verschiedenen Seiten und im Längsschnitt; o S. im Querschnitt (α = Testa, β = γ = Cot., δ = Radicula); p E. mit ausgebreiteten Cot. (a nach PRANTL, sonst Original).

Gattung 89. *Myssum* L., Sp. pl. 650. 1753.

Vgl. oben S. 356, 2. h. B. rosettig o. verstreut am Stengel. Blst. traubig o. ebenstraubartig. Stbf. am Grunde mit drüsigem Anhängsel o. mit Hautflügel, Fr.-Fach 2- o. 4-samig.

3. B. der B.-Triebe rosettig, viel größer, Stbf. mit drüsigem Basalanhang. Fr. kahl.

1. *M. saxatile*: h. Stämmchen niederliegend, Zw. aufstrebend, Bl.-Zw. bis 40 cm hoch, am Ende rispig verzweigt, alle gleich den B.

*) Von dieser Gattung führe ich nur 2 Typen an, denn nur Arten wie *saxatile*, *medium* etc. können als h. angesehen werden, die *montanum*, *repens* etc. sind wohl besser als 2. zu betrachten.

grau sternfilzig, B. der Rosetten mit langer, stielartiger Basis, bis 15:2 cm, an Bl.-Zw. bis etwa 3:0.8 cm, grünlichgrau, Rispentraube auch zur Frz. nicht verlängert, Bl. gelb, vgl. Fig. 230i—l, Fr. etwa $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ so groß wie m, Fächer 2-samig.

A. s. L., Sp. pl. 650. 1753. — Felsen-Steinkraut. — I. G. D. Schles., Bair., O.U. Böhm., Mähr., N.-Öster., O.-Öster., Krain, Ung. Felsspalten, sonnige Geröllhänge, bes. auf Kalk. — Blz. IV—VI. — Bekannt und wohl bis II hart. — Kaum echt in Kultur und zieml. empfindlicher durfte das durch seine silberweißgraue B-Tracht ausgezeichnete *A. medium* Host, Fl. austr. II. 244. 1837, sein, dessen Blst. zur Frz. sich verlängern und dessen etwas größere, in jedem Fache 4-samige Fr. Fig. 230m—p zeigt. Es kommt i. G. O. (Krain, Oberkärnt., Küstenland) vor.

○○ B. nicht rosettig. — gleichgroß, Stbf. mit meist gezähntem Flügelanhang, Fr. beh.

2. *A. montanum*: mehr Stände mit spindeligem, ästigem Wurzelstock, Zw. dünn, + aufstrebend, bis etwa 20 cm hoch, B. spatelig o. linealisch, ganzrandig, stumpfspitzig, 1—20:1—4 mm, gleich den Zw. dicht sternhaarig, graugrün, Blst. unverzweigt, mit dem Abblühen sich streckend, K. mit Stern- und einfachen Haaren, C. sattgelb, Fr. rund, etwa 4 mm Dm., Fächer 2-samig.

A. m. L., Sp. pl. 650. 1753. — Berg-St. — I. G. verbr. D. zerstreut, bes. im S.-W.; O.U., fehlt nur Schles., Salzb.; Sch. sehr verstreut; sonst noch ganz M. und S.-Eur. — Blz. V. — Diese Art, sowie das eigentlich nur durch größere, lebhaftere Bl. abweichende *A. repens* BAUMG., Transsylv. II. 237. 1810 und das höhere, schöner beh. und rispig verzweigte Blst. besitzende *A. argenteum* VIRM., Summ. pl. IV. 30. 1790 sind, wie ich schon in Anmerkung S. 358 betonte, eigentlich 2.

Gattung 90. *Vesicaria* ADANS., Fam. II. 420. 1763.

Vgl. oben S. 356 und Art. Bei enger Fassung der Gattung (n. PRANTL) nur 2 Arten.

V. utriculata: am Grunde verholzender p, aus der Mitte der grundständigen B.-Rosetten erheben sich die kräftigen, bis 0.5 m hohen kahlen Zw., die grundständigen B. stielartig verschmälert, bis etwa 4.5:1 cm, obere breitlinealisch, 2—3.5:0.5—0.9 cm, vgl. Fig. 231v, verstr. beh., graugrün, Blst. endständig, zur Frz. stark verlängert (bis fast 20 cm), Bl. gelb, Stbf. glatt, Fr. kahl, vgl. Fig. 231p—t.

V. u. DC., Fl. franç. IV, 696. 1805 (*Alyssum utriculatum* L., Mant. I. 92. 1767). — Gemeine Blasenschote. — I. G. O.U. von Istr. durch die südl. Teile Sch. nur unteres Rhône-tal, sonst noch S.-Frankr., Italien, Griechl. — Felshänge am Fuße der Gebirge. — Mir aus Kultur nicht bekannt. Vielleicht bis Prov. IV hart. Empfindlicher dürfte die i. G. nur in Dalm. auftretende *V. sinuata* POIR., in LAM. Encycl. VIII. 580. 1806, sein, deren Grund-B. buchtig gezähnt und samtl. B. weichfilzig beh. sind, auch Zw. und Blst. beh.

Reihe XII. *Rosales*. Rosenähnliche.

ENGL., Syll. 115. 1892.

Bl. zyklisch, seltener spirozyklisch, heterochlamydeisch o. apetal. hypo- o. epigynisch. — o. v., Frb. frei o. vereint, zuw. mit dicken, ∞ Sa. tragenden Placenten.

Familie 28. *Crassulaceae*, Dickblattgewächse

DC., Fl. franç. IV. 382. 1805.

Vgl. Gattung.

Gattung 91. *Sedum* L., Sp. pl. 430. 1753.

B. fleischig, ☉, sommergrün, Blst. vielblütig, zymös, Bl. v., K. 5, C. 5, Stb. 10, epipetale den C. am Grunde angewachsen, Gyn. 5, am

Grunde jedes Frb. ein Drüsenschüppchen; Sa. 1— ∞ , in 2 Reihen an Bauchnaht, Integ. 2, Fr. an der Bauchnaht aufspringende Balgfr.

Von den etwa 150, fast nur in der gemäß. und kalten Zone der nördl. Hemisphäre vorkommenden Arten kommt nur folgende als φ für uns in Betracht.

S. populifolium: locker rasig wachsend, bis 0,40 m hoch, Stämmchen am Grunde verholzend, alles kahl, B. vgl. Fig. 233, obs. Sp. vorh., 1,5

Fig. 233. *Sedum populifolium*: a Bl. (1 = Vorb., 2 = K., 3 = C., 4 = Stb., 5 = Frkn., 6 = Drüsenschüppchen), b S., c B. (Original).

6: 1—4,5 cm, Stiel 0,5—3 cm; Blst. dicht, oft bis 20 cm lang rispig gehäuft, Bl. vgl. Fig. 233, weiß, A. violett.

S. p. PALL., Reise III. 730. 1776. — Pappelblättrige Fetthenne. — Sib. — Blz. VII—VIII. — Scheint ganz hart zu sein.

Familie 29. Saxifragaceae, Steinbrechgewächse.

DUMORT., Anal. Fam. 36. 1829 [DC., Fl. franç. IV. 358. 1805].

φ — φ (φ), B. meist sommergrün, seltener wintergrün, $\odot$ o. gegst., Bl. in 1- bis vielblütigen Blst., selten durch Abort eingeschlechtlich, meist φ , Bl.-Achse vielgestaltig, K. 4—5—12), C. dgl., dachig oder klappig, zuw. vereinigt, selten fehl., Stb. hfg. doppelt so viel wie C. und obdiplostemon o. ebenso viel als C. und mit diesen alternierend, zuw. ∞ , Frb. frei und den C. gleichzählig o. weniger und untereinander vereinigt, Sa. ∞ , anatrop, Fr. Kapsel oder Beere, S. meist klein, hfg. geflügelt, End. ∞ , E. klein, mit stielrundem Stämmchen und flach konvexen Cot.

Gattungen:

A. B. gegst.

I. B. ganzrandig, Frkn. o. wenigstens Fr. oberständig (wenn Frkn. unterständig, vgl. *Philadelphus*).

a) B. 3-nervig, sitzend, im Mittel nicht über 1,5 cm lang:

95. *Fendlera*. (S. 376.)

b) B. fiedernervig, gestielt größer: 92. *Carpenteria*.

II. B. gezähnt o. gesägt, selten ganzrandig.

a) alle Bl. gleichartig, fruchtbar*).

1. Stb. über doppelt so viele wie C.: 93. *Philadelphus*.

2. Stb. doppelt so viele wie C.

*) Wenn Bl. in vielblütigen zusammengesetzten Trugdolden und B. unten kahl (jedenfalls ohne Sternhaare) vgl. *Hydrangea arborescens*.

- α) B. meist mit Sternhaaren. Frkn. unterständig. C. in Kn. quincuncial o. imbricat: **96. Deutzia.** (S. 376.)
 - β) B. nie mit Sternhaaren. Frkn. ober- o. halboberständig. C. in Kn. gedreht.
 - α! B. fiedernervig, gestielt: **94. Jamcsia.** (S. 375.)
 - β! B. 3-nervig, ± sitzend: **97. Whipplea.** (S. 382.)
 - b) Randblüten (meist) mit vergrößerten petaloiden K. ohne C. und Stb.
 - 1. K. und C. 4—5.
 - α) Kn. gestielt, mehrschuppig. Stb. über doppelt so viele wie C., Gr. 2 (vgl. wenn Kn. anscheinend 1-schuppig *Hydrangea petiolaris*): **99. Platycrater.** (S. 383.)
 - β) Kn. sitzend, Stb. doppelt so viele wie C.
 - α! Gr. 2—5, frei: **100. Hydrangea.** (S. 384.)
 - β! Gr. 4—5, vereint: **101. Schizophragma.** (S. 393.)
 - 2. K. und C. 7—10, Gr. vereint: **102. Decumaria.** (S. 394.)

B. B. ☉.

I. C. 5, Stb. ∞: **98. Cardiandra.** (S. 383.)

II. C. 4—5, Stb. 4—5.

a) Frkn. ganz o. fast oberständig: **103. Itea.** (S. 395.)

b) Frkn. unterständig.

- α) B. (meist) lederartig, ungelappt. Fr. Kapsel: **104. Escallonia.** (S. 397.)

- β) B. (meist) häutig. gelappt. Fr. Beere: **105. Ribes.** (S. 399.)

Unterfamilie a. *Hydrangeoidae* ENGL., Nat.-Pfl.-Fam. III. 2. a. 46. 1891. B. (mit Ausnahme von *Cardiandra* gegst., Bl. meist 5-zählig. Stb. (zuw. ∞) meist epigynisch. Frkn. meist halbunterständig o. unterständig, meist 3—5-fächrig.

Trib. 1. *Philadelphae* ENGL., l. c. Bl. alle gleichartig, fruchtbar: C. hfg. gedreht; Stb. meist flach; Fr. scheidewandspaltig, die einzelnen Frb. hfg. nach innen fachspaltig.

Gattung 92. *Carpenteria* TORR., in Smith. Contrib. V. 12. t. 7. 1854.

Vgl. oben und Art. Nur diese bekannt.

C. californica: aufrechter, etwa bis 1 m hoher b, Zw. rundlich, jung violett überlaufen, bis ☉ feinbeh., gelbgrau, zuletzt längsabblättern, Kn. nackt: B. derbhäutig, eilanzettlich, 4—9:1,2—2 cm, oben kahl, tiefgrün, unten weißlich, dicht kräuselig beh., dazwischen angedrückte, gestreckte, mehr borstliche Haare, Stiel 0,5—1,5 cm: Bl. weiß, endständig, in traubig angeordneten 1—3-blütigen Trugdolden, Bl.-Achse ± halbkugelig, am Grunde mit Frkn. vereinigt, K. 5—7, klappig, C. 5—7, gedreht, Stb. ∞, Gyn. 5—7-fächrig, in jedem Fache mit ∞ Sa., Gr. 5—7, verwachsen, Kapsel lederartig.

C. c. TORR., l. c. — Calif. (Sierra Nevada). — Bei uns noch sehr selten und etwa für sonnige Lagen in Prov. V—VI geeignet.

Gattung 93. *Philadelphus) L. Sp. pl. 470. 1753.**

[Pfeifenstrauch; Syringa, Mock orange; Seringa.]

Vgl. oben S. 360: b, ☉ Zw. hfg. mit sich ablösendem Periderm. Kn. meist im Zw. verborgen, seltener frei. B. ± dünnhäutig, seltener derb. Bl. fast stets weiß, ansehnlich, in einfachen, zuw. nur 1—3-blütigen, selten in zusammengesetzten Trauben. K. 4 (ausnahmsweise 5—6), klappig. C. dgl., gedreht. Gyn. 4-, selten 3—5 fächrig, in jedem Fache mit ∞. lineallänglichen, hängenden Sa. an dicken Placenten. Gr. 3—5, fadenfg., meist verwachsen, Kapsel kreiselfg., in die einzelnen fachspaltigen Frb. o. in Klappen, die die Scheidewand tragen, zerfallend, S. länglich, mit locker anliegender, häutiger, genetzter Schale. Etwa 46 Arten.

Sekt. 2
siehe S. 366.

Sekt. 1. *Pocilostigma* KOEHNE, in Gartenflora 1896. 450. Kn. aus den B.-Winkeln deutlich hervorragend. Sind Kn. versteckt, dann N. entweder unter sich verwachsen (bei einer auffallend kleinblättrigen Art) o. länger und breiter als A.

A. Kn. vorragend.

Subsekt. b
siehe S. 365.

Subsekt. a. *Gemmati* KOEHNE, l. c. Blst. und N. verschieden.
○ Bl. in zusammengesetzten Trauben o. wenn diese einfach, so seitliche Bl.-Stiele am Grunde durch die N. von 2—4 Trgb. gegliedert (Fig. 234a bei a).

1. *P. californicus*: bis über 3 m hoch, Zw. kahl, ☉ lebhaft gelb- o. rotbraun, ☉ Zw. dunkelgelb- bis dunkelkastanienbraun, etwas glänzend, ins Graue übergehend, mit festhaftender o. nur hier und da etwas abblätternder Oberhaut. Kn. rundlich-eifg., erst nach Blz. deutlich; B. von Blzw. vgl. Fig. 236a, 2,8—7:1—5 cm, kahl o. unterseits verstreut beh., an Lohden Grund auch herzförmig, Rand mit 4—10 breiten und kurzen, zuweilen bis 2 mm langen, stachelspitzigen Zähnen. Beh. meist beiderseits gleichmäßig steitanliegend, Stiele 3—10 mm, kahl o. an Lohden ringsum beh.; Bl. vgl. Fig. 234a a', geruchlos, 2—2,5 cm Dm., C. auch mehr eilänglich, Stb. wenig o. fast $\frac{1}{2}$ kürzer als C., Fr. ca. 8 mm lang, mit dem oberen Drittel den K.-Ansatz überragend.

P. c. BENTH., Plant. Hartw. 309. 1849. (*P. lewisi* AUCT. ex parte). — Californischer P. Calif. (Gebirge bis 1300). Bl. VI—VII. — Schon längere Zeit in Kultur, aber immer verkannt und noch sehr selten. Scheint bis Prov. IV hart. Man vgl. das bei *cordifolius* S. 367 Gesagte. An *californicus* schließen sich 2 noch nicht eingeführte an, die im wesentlichen durch den beh. Gr. abweichen. Es sind *P. karwinskyanus* KOEHNE, l. c., Bl.-Achse und K. außen beh., und *P. affinis* SCHLECHT., in Linnaea 1839—419, ebenfalls aus Mexiko, aber Bl.-Achse und K. außen kahl.

○○ Blst. 1—3-blütig.

* ☉ Zw. nicht abblätternd.

2. *P. mexicanus*: b, bis etwa 2 m; Verästelung locker, + überhängend, ☉ und ☉ Zw. beh., kastanienbraun; B. oberseits zerstreut beh., unterseits viel heller, vorwiegend an der Rippe und sonst verstreut beh., Haare anliegend, gerade, Form vgl. Fig. 236b, Zähnung meist fast null, etwa 3:1,5—5:2,3 cm oder Form wie c,

*) Ich schreibe mich im folgenden an die Arbeit von Prof. E. KOEHNE, in Gartenflora, 1896, 450 ff. an. Auf eine Deutung der Gartenformen, die KOEHNE nur z. T. in Rücksicht zieht, gehe auch ich nicht ein. Dazu bedarf es noch vieler vergleichender Untersuchungen an der Hand von lebendem Material! Außerdem war es mir möglich auch die in den Mitt. d. Deutsch. Dendrol. Ges. 1904, 76 ff. erscheinende ergänzende Arbeit Prof. KOEHNEs zu berücksichtigen, da ich durch die Güte des Autors und des Herrn Grafen V. SCHWERIN in letzter Stunde noch die Korrekturfahnen zur Einsicht erhielt. Hier werden von Herrn Prof. KOEHNE die Angaben von 1896 in sehr vieler Hinsicht erweitert und z. T. auch berichtigt. Ich bin ihm daher für die Übersendung der Korrekturfahnen sehr zu Danke verpflichtet.

bis 7:3,8 cm; Bl. 2,5–3,5 cm Dm., wohlriechend, vgl. Fig. 234b b², Bl.-Achsen und K. außen meist locker anliegend steifhaarig, seltener mehr filzig, innen meist durchaus feinfilzig, Drüsenscheibe und Gr.-Grund $\pm$ beh.

P. m. SCHLECHT., in *Linnaea* XIII. 418. 1839. — Mexikanischer *P.* — Mexiko (Staat Mexiko), Gebirge bis 2500 m. — Blz. Ende V–VI. — Als Freilandpflanze kaum versuchswert. Hieran schließt sich sehr nahe *Ph. coulteri* S. WATS., in *Proc. Am. Acad.* XXII. 472. 1887. Diese Art ist sowohl KOEHNE als mir noch unklar. Interessant ist folgende Notiz aus *Gard. Chron.*, Bd. XXXIV. 218. 1903.

Fig. 234. *Philadelphus*: a—a² *californicus*: a Bl. ohne C. und Stb. im Längsschnitt, a¹ links N., rechts A., a² C. — b—b² *mexicanus*: wie a—a². — c—d² *hirsutus*: c Zw. mit Bl.-Trieben, d Bl. ohne C. und Stb., d¹ dgl. L.-Schnitt (mit Stb. und C.-Andeutung), d² C. — e—f² *microphyllus*: e Zw. mit B. und Bl., f Bl.- im L.-Schnitt, f¹ K., f² N. — g—k *grandiflorus*: g—i wie a—a², k Fr. — l—p *cordifolius*: l—n wie a—a², o = n, p Fr. (o, p nach LANGE, sonst Orig.).

Hier sagt F. W. BURBIDGE bei Besprechung des *Ph. mexicanus*: „There is a variety of *P. mexicanus*, called *P. m. coulteri* introduced (in England), it is said in NICHOLSON'S Supplement as recently as 1885; but probably this is a mistake, as the shrub has existed for many years in old Irish gardens, where it is known as the „Rose Syringa“. It forms a wall shrub of very erect habit of growth, and rarely flowers except during or after very hot summers. Like the type its flowers are solitary, deliciously perfumed, something like a blend of Orange flowers and Roses, and it differs from all*) other species or varieties of *Philadelphus* in as much as each of

*) Es gibt doch noch eine Form, deren Petalen am Grunde ein rotes Auge besitzen. Der Strauch ist unbekannter Herkunft und steht im Bot. Gart. zu Leipzig. Ich sah ihn im Juni 1904 in Blüte. Prof. KOEHNE schreibt mir, daß er diese zurzeit noch nicht näher identifizierbare, aber von *coulteri* ganz verschiedene Form *P. maculiflorus* in litt. genannt habe.

its four white petals have a purplish blotch at its base, which contrasts well with the central tuft of golden or yellow stamens."

An diese beiden Arten schließen sich an: *P. trichopetalus* KOERN., in Gartenfl. 1867. 73, aus Veragua und Costarica, mit beh. Gr. und beiders beh. C., nicht in Kultur; ebenso *P. asperifolius* KOERN., l. c., aus Mexiko, ausgezeichnet durch kleine (bis 3 cm langer), - lederartige B. und fast fehlende Gr., so daß die N. bis fast auf den Discus herablaufen.

✱✱ © Zw. stark abblätternd.

4. *P. hirsutus*: bis 2,5 m hoch, Zw. jung stärker, © verstreut zottig beh., leicht kantig, gelbbrotbraun, bald aufreißend, (•) dunkler, © gelb- oder braungrau, ohne Außenrinde, Kn. vgl. Fig. 235 a - e. B. (Fig. 236 d) 2 - 8,5 : 1,5 - 5,5 cm, oben tiefgrün, locker beh., unten grau-filzig, Stiel 0,2 - 1,2 cm: Bl. vgl. Fig. 234 c - d², Fr. flach gewölbt.

Fig. 235. *Philadelphus*: a—e *hirsutus*: a © Zw., b—c Kn., seitlich und von vorn, d Kn. ohne Sch., e Zw.-Qu.-Schn. (1—6 vgl. Fig. 164, S. 252, a analog 2, β analog 3¹). — f—m *pubescens*: f (•) Zw., g—h unter der B.-N. verborgene, sie aufwölbbende Kn., i—k dgl., bei α beginnt die Kn. die B.-N. (β) zu durchbrechen, vgl. L.-Schn. l, wo in dem Knoten bei γ Scheidewände angedeutet sind, m—o — *coronarius*: n—o (•) Zw., p—q Kn. (α), die die B.-N. (β) durchbrochen haben, im L.-Schn. r Kn. noch verborgen, s Zw.-Q.-Schn., vgl. e. (Original nach C. K. SCHNEIDER.)

P. h. NUTT., Gen. am. pl. I. 301. 1817. (*P. godolohokertii* PETZ. et KIRCH., Arb. Muse. 202. 1864.) — Rauhaariger P. — N.-Am. (Tennessee, N.-Carol. bis Georg. und Alabama.) — Blz. VI—VII. Bekannter, bis etwa Prov. III. harter Zier-p.

An diese Art schließt sich an *P. serpyllifolius* A. Gr., Pl. Wright I. 77. 1852, aus Neu-Mexiko; noch nicht in Kultur, im übrigen *asperifolius* nahe stehend.

B. Kn. im ausgehöhlten B.-Stielgrunde völlig verborgen o. bei Subsekt. c erst im Winter deutlich vorragend.

I. B. auffallend klein, 0,8—3:0,2—1,4 cm (Fig. 234e).

Subsekt. b. *Microphylli**) KOEHNE, l. c., Blst. 1—3-blütig. N. meist verwachsen.

5. *P. microphyllus*: bis etwa 70 cm hoch, Zw. jung dichter, beh., rotbraun, abblätternd, tiefbraun, darunter gelbgrau; B. 3-nervig, oben tiefgrün, kahlend, unten graugrün, angedrückt beh., Stiele 0—1,5 mm; Bl. vgl. 234e f², duftend, Bl.-Achse und K. hfg. kahl, innen am Rande stets beh.

var. a. *typicus* (KOEHNE, Dendrol. 185. 1893). B. bis 1,5 cm lang, ganzrandig o. an Laubtrieben mit vereinzelt, kleinen stumpflichen Zähnen, unterseits weißlichgrün, beiderseits zerstreut anliegend steifhaarig. . . b. *sargenti* KOEHNE, l. c. B. bis 3 cm lang, oft mit 1—4, an Laubtrieben zieml. groben Zähnen jederseits, unterseits graugrün und dicht, obers. zerstr. beh. (Sah ich nicht.)

P. m. A. GR., in Mem. Am. Ac. N. S. IV. 54. 1849. — Kleinblättriger P. — N.-Am. (Neu-Mexiko, Color.). — Gebirgshänge. — Blz. VI—VII. — Zierlichste Art. Bis etwa Prov. IV hart.

5 × 24a. *P. microphyllus* × *coronarius*. *P. lemoinei* LEMOINE, Cat. 1887 [et in Gard. a. For. II. 616. 1890]. Weicht von *microphyllus* vornehmlich durch höheren Wuchs, größere B. und Bl., weniger verwachsene Gr. ab und ist von LEMOINE in vielen, auch gefüllt blühenden Formen (im Katalog von 1904 finde ich 15 erwähnt) gezüchtet worden, welche die große Variabilität der Hybride dartun. Bei der Unsicherheit des Begriffes *coronarius* bleibt natürlich auch die genaue Abstammung der Hybride fraglich. Sie ist jedenfalls als Zierpflanze sehr zu empfehlen.

II. B. größer.

Subsekt. c. *Speciosi***) KOEHNE, l. c. Blst. 1—3(—7)-blütig. N. getrennt, breiter und länglicher als A., Gr. sämtliche Stb. deutlich überragend. ☉ und ☉ Zw. abblätternd.

○ Bl.-Stiele und Bl.-Achse kahl***).

+ Bl.-Achse, bez. Kapsel allmählich und unmerklich in den Stiel übergehend (Fig. 234k).

+ Wuchs ausgebreitet mit überhängenden Zw., B.-Unterseiten steif anliegend beh. o. wenigstens in Nervenwinkeln bleibend gebartet und an Hauptnerven beh.

6. *P. laxus*: den beiden folgenden Arten nahe stehender, aber kaum über 1,5 m hoher, schlaffer b, *, Zw. gelb- oder rotbraun; B. an Blzw. 5—6 cm lang, länglich bis breitlanzettlich, am Zw. etwas hängend, wodurch der b sofort auffällt, an Lgtr. bis etwa 8:4 cm, aus rundlichem o. keiligem Grunde eilänglich, sich allmählich zuspitzend, Zähnung fein, entfernt o. ganzrandig, Textur . . . derb zuletzt; Stiel 5—8 mm; Bl. zu 1—3, 3—4 cm Dm., geruchlos, vgl. *grandiflorus*; Fr. eiförmlich, etwa 1:0,8 cm, fast halb oberständig.

P. l. SCHRAD., apud DC., Prodr. III. 206. 1828. — Schlatter P. — Diese bisher in ihrem Ursprung fragliche Art stammt nicht, wie KOEHNE erst annahm aus N.-Am., sondern scheint aus China gekommen zu sein, wenigstens glaubt KOEHNE

*) Zu dieser Subsekt. o. zu den *Gemmati* gehören *P. argyrocalyx* WOOT., in Bull. Torr. Club 1898. 452, aus Neu-Mex. und Arizona, sowie *P. occidentalis* NELS., in Bull. Torr. Club. 1898. 374, aus Colorado, die KOEHNE und ich nur aus der Beschreibung kennen.

**) Zu dieser Subsektion gehört nach KOEHNE 1904 auch *falconeri* (siehe S. 371).

***) Ich charakterisiere die Arten 6—8 nach BEADLE in Baltimore Bot. Stud. I. 159. 1902, bez. in SMALL Flora of the southeastern United States 507. 1903.

Exemplare aus Sz'tschwan, die ihm Herr VILMORIN sandte, mit *laxus* identifizieren zu können.

+ Wuchs aufrecht, B. breiter, nicht überhängend, Unterseiten meist fast kahl.

K. kurz und mehr plötzlich zugespitzt, Bl. 3—4 cm. Dm.

7. *P. inodorus*: b, 2—3 cm; ♂ Zw. kastanienbraun, kahl; B. aus rundlichem o. wenig verschmälertem Grunde eifg. o. breiteifg. o. elliptisch, Spitze abgesetzt, 3—10:1.5—5 cm; kahl o. bes. unterseits verstreut beh., ganzrandig o. mit kleinen entfernten Zähnen; Bl. zuweilen bis 7, Gr., wie es scheint, tiefspaltiger.

P. i. L., Sp. pl. 470. 1753. — Duftloser P. — N.-Am. (N.-Carol. bis Mississippi und Tennessee), Flußufer, feuchte Wälder. Blz. V. — Frz. VIII. — BEADLE unterscheidet, l. c., noch eine var. *strigosus*: B. unterseits dicht angedrückt steifhaarig, ebenso meist auch K. außen. Inwiefern BEADLE recht hat, *inodorus* und *grandiflorus* zu trennen, kann ich nicht beurteilen, da wohl nur LINNES Original beweisen kann, was er als *inodorus* angesehen hat. KOEHNE'S *inodorus* umfaßt beide Arten. Ob *inodorus* L., sensu BEADLE, echt in Kultur, weiß ich noch nicht. An eine Deutung der Gartenformen kann erst gedacht werden, wenn die spontanen Arten absolut sichergestellt sind.

... K., wie Fig. 234k zeigt, sich allmählich lang zuspitzend. Bl. 4.5—5 cm Dm.

8. *P. grandiflorus*: von *inodorus* noch abweichend durch: B. mehr eilanzettlich o. elliptisch, allmählich zugespitzt; deutlicher gezähnt (Fig. 236e), 4—12:1.5—4 cm, kahl o. verstr. beh.; Bl. vgl. Fig. 234g—i, Fr. wie k., nur meist dicker und größer.

P. g. WILLD., Enum. pl. Hort. Berol. 511. 1809. — Großblütiger P. — N.-Am. (Virginia bis Florida), besonders längs der Gebirge, an Flußufern und feuchten Felshängen.

* Bl.-Achse, bez. Kapsel am Grunde plötzlich zusammengezogen und scharf vom Stiel abgesetzt.

9. *P. gloriosus*: sonst wie *inodorus*.

P. g. BEADLE, l. c. 1902. N.-Am. (N.-W.-Georgia), on rocky banks of the Coosa River. — Ob gute Art?

○○ Bl.-Stiele, Bl.-Achse und K. außen beh.

10. *P. floridus*: dürfte sonst nach BEADLES Angaben von *inodorus* nur durch die *grandiflorus*-ähnlichen K. abweichen.

P. f. BEADLE, l. c. N.-Am. (Georgia, Floyd County), on rocky slopes and banks of streams. — Ob gute Art?

Sekt. 2. *Stenostigma* KOEHNE, l. c. Kn. stets im ausgehöhlten B.-Stielgrunde völlig versteckt. N. stets getrennt, schmaler (aber an der Außenkante nicht immer kürzer) als die A.

A. Bl. in Rispen (nur an vereinzelt schwächlichen Zweigen in einfachen Trauben).

Subsekt. a. *Panniculati* KOEHNE, l. c.

Bl.-Achse und K. außen kahl o. fast kahl. * Zw. abblätternd.

11. *P. cordifolius*: nach LANGE: b, 1—1.8 m; Verästelung ausgebreitet. * Zw. glänzend zimmetbraun, kahl; B. vgl. Fig. 236f, ca. 5:3—8:5 cm, kahl o. unterseits wenigstens an Nerven verstr. beh., heller, ganzrandig o. mit vereinzelt Zähnen, zuletzt derbhäutig; Bl. in zusammengesetzten, bis 30-blütigen, abblätterten Blst., weiß, etwa 2.5 cm Dm., vgl. Fig. 234l—p.

P. c. LANGE, in Bot. Tidsskrift 3. Reihe. II. 132. t. 3. 1877—79. — Californien. Blz. VII—VIII. Ich halte ein Exemplar, welches mir Herr REHDER aus dem Arnold-Arboret als *californicus* sandte, für *cordifolius*, denn die Kn. sind nicht vorragend und außerdem hat ja nach KOEHNE *californicus* keine abblätternde Rinde. Das REHDERsche Exemplar weicht allerdings in den B. ab, denn diese messen an den Blzw. nur ca 5,5:3 cm und sind am Grunde mehr rundkeilig. *P. cordifolius* bedarf wohl auch noch der Beobachtung. KOEHNE zitiert (Gartenflora, Bd. III, 152) zu *californicus* Exemplare von BRIDGES, solche, die ich in Herb. Hofm. Wien sah, könnten der abrollenden Oberhaut der Zw. halber zu *cordifolius* gehören.

CC Bl.-Achse und K. außen dicht grauhaarig. ☉ Zw. nicht abblätternd.

Fig. 236. *Philadelphus*-B.: a *californicus* (Bl.-Zw.). — b — c *mexicanus* (Bl.-Zw.) — d *hirsutus*. — e *grandiflorus* (links Bl.-Zw.). — f *cordifolius*. — g *insignis*. — h *confusus* (unteres B. von Bl.-Zw.). — i *lewisii*. — k *columbianus* (oben Bl.-Zw.). — l—m *pubescens* (oben Bl.-Zw.). — n—o *latifolius* (unten Bl.-Zw.). — p *sericanthus* (links Bl.-Zw.). (Alles $\frac{1}{2}$ nat. Gr.) (Original, nur f nach LANGE.)

12. *P. insignis*: b. ☉ Zw. hellgelb- o. rotbraun, spärlich zottig beh., ☉ in Grau übergehend; B. aus rundlichem o. leicht herzfg. Grunde breit- bis rundlich eifg. (Fig. 236g, kurz zugespitzt, oberseits kahl, lebhaftgrün, unterseits gleichmäßig anliegend grau beh., besonders in den Nervenwinkeln; Bl. nach KOEHNE in unterwärts benähterten, etwa 15—40-blütigen Rispen, ich sah meist einfache Trauben, N. nach KOEHNE $\frac{1}{2}$ so breit und an der Außenseite $\frac{1}{2}$ mal so lang wie die A.

P. i. CARR., in Rev. Hort. 1870. 40 (*P. billiardii* KOEHNE, l. c. 450). — Heimat? Nach KOEHNE wohl W.-N.-Am. Ich glaube aber, daß wir es hier mit einer Kulturform zu tun haben, und auch Herr JORIS machte mich in Plantières darauf aufmerksam, daß diese als *pubescens* „Souvenir de Billiard“ gehende Form wohl ein Bastard der *pubescens* sei. Zu den „Rispenblütigen“ gehört ferner *P. umbellatus* KOEHNE, Dendrol. 181. 1893, den KOEHNE wohl mit Recht als Hybride anspricht, wenngleich auch hier eine sichere Deutung fraglich. Ich fand im Hort.

Bot. Wien eine Pflanze als *P. lewisii*, die ihrer abrollenden Epidermis halber, sowie auch in den 9—15-blütigen Blst. und den B. gut mit *umbellatus* stimmt. Sie blühte schon am 6. Juni.

B. Bl. in einfachen Trauben (ganz ausnahmsweise an vereinzelt üppigen Zw. in Rispen o. Zymen).

b) siehe S. 371. a) ☺ und ☻ Zw. nicht o. nur hier und da in kleinen Schuppen abblätternd.

Subsekt. b. *Gordoniani* KOEHNE, l. c. B. der Lgtr. mit abstehenden, oft sehr groben, selten sehr kleinen Zähnen o. ganzrandig, rundlich-oval o. breit eifg., Gr. stets kahl; Arten aus N.-Am. Blz. von Ende VI o. Anf. VII ab*).

○ Bl.-Achse und K. außen kahl.

- ☺ Zw. dunkelkastanienbraun o. haselnuß- o. graubraun (wenn mehr grau, so doch B. unterseits stets gleichmäßig beh.).

+ ☺ Zw. tiefkastanienbraun mit vielen scharfen Querrissen, B. unterseits meist nur in Nervenwinkeln bärtig (Fig. 236 h).

13. *P. confusus*: niedriger b; Zw. kahl; B. bis 7:5 cm, am Grunde meist nur ein deutliches Nervenpaar, Unterseite nur an Lohden zuweilen gleichmäßig beh., dann aber durch die sehr schwache Zähnung von *columbianus* verschieden: Blst. meist 5-blütig, kurz und dicht, Bl. geruchlos, 2,5—3,5 cm Dm., vgl. Fig. 237 a—b.

P. c. PIPER, in Bull. Torr. Club 1902, 225 (*P. lewisii* AUCT., non PURSH). — Nach KOEHNE: Vancouver, Brit.-Columbien, Washington, Oregon, Montana, Idaho. — Im Herbar *californicus* sehr ähnlich, aber Kn. versteckt! Die Nomenklatur vgl. man bei PIPER, l. c.

+ + ☺ Zw. mehr in grau übergehend, nicht querrissig, B. unterseits gleichmäßig beh. (Fig. 235 i).

14. *P. lewisii*: höherer b; B. bis 9:6 cm, jederseits mit 5—9 (—11), besonders an Lohden groben Zähnen, am Grunde meist 2 deutliche Nervenpaare; Blst. meist 7—9-blütig, Bl. ca. 3,5—4 cm Dm., geruchlos, vgl. Fig. 237 s—u.

P. l. PURSH, Fl. N.-Am. I. 239, 1814 (*P. gordonianus* LDB., in Bot. Reg. XXIV, 1838, Misc. 21). — Nach KOEHNE: Washington, N.-Calif. und wohl auch Brit.-Col. — KOEHNE stellt als Art daneben *P. columbianus*, er soll durch zierlicheren Wuchs und B. mit jederseits nur 1—4, selten 5, nur an Lohden groben Zähnen, abweichen (vgl. Fig. 236 k). Ich bin mir noch nicht klar, ob es sich hier wirklich um eine „Art“ handelt. Heimat? Jedenfalls bedürfen die *Philadelphus* des nordwestlichen N.-Am. noch der Bearbeitung und erst ein genaueres Studium von spontanem Material kann lehren, was Art, was Form ist, bez. was von den Kulturformen mit spontanen identisch ist.

* * * ☺ Zw. ockergelb o. gelbbraun, Bl. kahl o. fast kahl, ganzrandig o. entfernt gezähnt.

15. *P. intectus*: b, 2—3 m; B. eifg. bis elliptisch, allmählicher o. plötzlicher zugespitzt, 3—12:1—5 cm, Grund rundlich o. — keilig, 3-nervig; Bl. 3—4 cm Dm.

P. i. BEADLE, l. c., 1902. — N.-Am. (Tennessee, on bluffs of the Cumberland River, below Nashville). — Mir nur aus BEADLES Angaben bekannt.

☺☺ Bl.-Achse und K. außen, ebenso B.-Unterseiten reichlich beh.

*) KOEHNE betont 1896, daß diese und die folgende Sektion noch nicht hinreichend scharf abgegrenzt scheinen. BEADLE gibt für *latifolius* und *intectus* als Blz. nur „Spring“ an.

16. *P. latifolius*: b, 2—3 m. üppig: ♂ Zw. blaß ocker- o. strohgelblich, ♀ heller o. dunkler grau; B. vgl. Fig. 236n o. 3 10:2—7 cm, o. an üppigen Lohden bis 15 cm lang, ziemlich hellgrün. Zähnung nur am Blzw. hier und da fast null; Blst. meist 7-blütig, hfg. beblättert, sonst ähnlich *pubescens*, Fig. 237i—l.

P. l. SCHRAD., apud DC. Prodr. III. 206. 1828. — Breitblättriger P. — Nach BEADLE, N.-Am. (Tennessee, on rocky banks of streams, especially near Nashville). — KOEHNE hat als verwandte nordamerikanische Art *P. pubescens* LOTS, in Herb. anat. IV. 268. 1816/17. hingestellt. Sie soll durch mattbraune ♂ Zw. und schüsselfg. vertieft bleibende Bl., sowie etwas kleinere B. und weniger üppigen Wuchs abweichen (vgl. auch Fig. 235f m). BEADLE sagt, daß sie bisher spontan nicht aufgefunden worden sei. Man konnte hier wohl an eine Mutation denken. Jedenfalls scheint gerade *latifolius* in Kultur sehr formenreich zu sein und es werden vielleicht viele Formen mit Unrecht als Bastarde gedeutet. *P. americanus* SCHRAD., l. c., ist nach KOEHNE mit *pubescens* synonym. — Eine merkwürdige, *latifolius* nahe stehende Form ist *pendulifolius* CARR, in Rev. Hort. 1875. 360. In seiner hängenden Blatttracht erinnert er an *P. laxus*. KOEHNE deutet ihn als *latifolius* × *laxus*, JOUIN mehr als *pubescens* × *laxus*.

Subsekt. c. *Satsumani* KOEHNE, l. c. B. der Lgtr. mit meist vorwärts gerichteten, nie groben Zähnen, nie ganzrandig. Gr. zuweilen beh.; asiatische Arten; Blz. V—VI.

○ Gr. unterwärts beh. *)

○○ siehe S. 370.

* B. obers. kurz striegelhaarig und außerdem mit zerstreuten größeren steifen Haaren, unten sehr dicht grau steifhaarig. Recept. und K. außen braunviolett, mit feinen, anliegenden Härchen dicht bedeckt und dadurch grau.

17. *P. magdaleneae*: nach KOEHNE: buschiger, ca. 1.8 m hoher b, ⊙ Zw. hellbräunlich-ashgrau, kahl; B. 2—3,7 1—1,5 cm o. an Lohden 5,5—8,5:1,5—5,5 cm, aus abgerundetem bis breit keilf. Grunde eilanzettlich bis breit eif. plötzlich und oft ziemlich lang zugespitzt, jeders. mit ca. 1—15 sehr kleinen, an Laubzw. etwas größeren Zähnen, steifpapierartig, Stiel 5—6—15 mm; Blst. 3—7—9(—11) blütig, zuweilen bis 15-blütig; Bl-Stiele 3—10 mm, dicht beh., Bl. ca. 2,5 cm Dm., Stb. 25—28, Gr. merklich kürzer als längste Stb., bis über die Mitte verwachsen, N. reichlich „ so breit wie A., außen so lang wie diese. Fr. kreiselfg., zu ca. $\frac{2}{3}$ unterständig.

P. m. KOEHNE, in Mitt. d. D. D. Ges. 1904. 83. — China: Sz'tschwan. — Im Hort. VILMORIN in Les Barres in Kultur, blühte dort Ende V.

⌘ B. oben zuletzt kahl, unten auf Nerven reichlich steifhaarig, auf Fläche mit verstreuten Haaren. Recept. dicht graugelblich filzig.

18. *P. subcanus*: nach KOEHNE: ⊙ Zw. schmutzig-graubrau, kahl; B. 4,5—6,8:2,2—3,3 cm, o. an Lohden 6,7—11,5:1—8 cm, aus abgerundetem o. kaum zusammengezogenem Grunde eilänglich, an Laubtrieben eif. bis rundlich eif., plötzlich zugespitzt, mit etwa 8—18 Zähnen jeders., hautartig; Stiel 5—11 mm; Blst. 6—13 cm lang, unterwärts sehr locker, oberwärts dicht, 7—11 blütig, Hauptachse locker beh., Bl. Stiele 7—15 mm lang, dicht beh., Beh. des Recept. viel kürzer und feiner kraus als bei *incanus*, K. wenig länger als Recept., sehr kurz zugespitzt, außen etwas lockerer beh.; Bl. ca. 2,2 cm breit, Stb. 30—31, Gr. etwa — längste Stb., zu $\frac{3}{4}$ verwachsen, N. etwa $\frac{3}{4}$ so breit wie A.

P. s. KOEHNE, l. c., 1904. — China: Sz'tschwan [leg. A. HENRY, No. 8823]. Nicht in Kultur.

*) Dies auch noch bei *P. lancifolius* KOEHNE, l. c. 455, aus Sikkim, dessen Recept. und K. außen kahl sind. B. länglich o. länglichlanzettlich, schmal- und lang zugespitzt, unterseits dicht graufilzig.

○○ B. Gr. kahl.

+ Recept. und K. außen sehr dicht anliegend grau steifhaarig, B. vgl. Fig. 236 p.

19. *P. sericanthus*. Höhe ?, nur junge Lgtr. ± beh., ⊙ Zw. rotbraun, ⊙ außbraun, in Grau übergehend und fein abblätternd, B. jederseits mit 3-9 meist feinen, an Lohden groben Zähnen, jung hfg. violett überlaufen, später oben tiefgrün, kahrend o. verstr. beh., unten dgl. und leicht achselbärtig, hellgrün, 3,5-9:1,3-3,5-1 cm, Stiel 0,3-1,2 cm; Blst. 5-9-blutig, locker, unterste Bl.-Stiele bis 1,2 cm, Gr. etwas kürzer als längste Stb., sonst vgl. Fig. 237 m o, Fr. schwach gewölbt.

Fig. 237. *Philadelphus*: a-b *confusus*: a Bl. ohne C. und Stb. im L.-Schn., a¹ links N., rechts A., a² C., b S. — c-e *tomentosus*: wie a-a². — f-h *satsumi*: wie a-a². — i-l *pubescens*: wie a-a². — m-o *sericanthus*: wie a-a². — p-r *pekinensis*: wie a-a². — s-u *lewisii*: wie a-a². — v *falconeri*: Bl. — x-z *pallidus*: wie a-a² (b nach KOEHNE, v nach SARGENT, sonst Original).

P. s. KOEHNE, l. c., 1896. China (Hupei). — Blz. VI. — Bei uns kaum in Kultur, ich erhielt Expl. aus Arnold-Arboretum. Schöne und wohl ziemlich harte Art Prov. IV-V? — Ihm steht nahe *P. incanus* KOEHNE, l. c. 1896, gleicher Herkunft, der aber unterseits sehr dicht anliegend steifhaarige B. hat und im übrigen zu *subcanus* neigt, welche Art ja KOEHNE erst 1904 von *incanus* abgetrennt hat. L. HENRY hat, in Rev. Hort. 1903. 12, einen *Ph. delavayi* beschrieben, mit anfangs rotbraunen, später grauen Zw., unterseits reich hellgrau beh., derben, scharf

geaderten B., 7—11(—18)-blütigen Blst., deren Bl. 3,5—4 cm breit sind und deren K. außen kahl sein soll. Diese Art stammt ebenfalls aus Hupei, scheint von *incanus* wie *subcanus* verschieden zu sein und steht nach Ansicht KOEHNE wohl *lanceifolius* am nächsten. Ich sah im Hort. Plantières eine kleine sterile Pflze., auf Grund welcher ich nichts aussagen kann.

✱✱ Recept. und K. außen kahl o. sehr zerstr. beh.

+ B.-Unterseite gleichmäßig zerstreut o. dicht anliegend steifhaarig bis steifhaarig filzig.

20. *P. tomentosus*: bis etwa 2 m hoch, Zw. nur ganz jung beh., ☉ heller o. dunkler mattbraun, ☾ in Graubraun übergehend (nach KOEHNE matt dunkelbraun), zuw. + der Länge nach abblätternd (Exempl. leg. HÜGEL, No. 29., Himal. [Mussooree]); B. oben kahlend, sattgrün, unten graugrün, 4—10:2—6 cm; Stiel 0,5—1 cm; Bl. meist zu 5—7, unterste bis 10, zur Frz. bis 15 mm lang gestielt, sonst vgl. Fig. 237c—e, Fr. leicht gewölbt, etwa 1:0,8 cm.

P. t. WALL., Cat. No. 3563. 1831. — Filziger P. — Himal. (Sikkim, Mussooree), aber nach KOEHNE wahrscheinlich auch Japan (Nikko-Gebirge) bis über 3000 m. Blz. VI. — Bis etwa Prov. IV harter b. Hieran schließt sich eine Form wohl hybriden, aber unbekannten Ursprungs, die KOEHNE 1896 als *P. loddigesianus* beschreibt. Ob noch in Kultur?

+ B.-Unterseiten mit Ausnahme der bärtigen untersten Nervenwinkel und der zuweilen beh. Rippe kahl.

△ C. eifg. (Fig. 237h), B. wie Fig. 238a.

21. *P. satsumi*: bis etwa 1,5 m hoch, Zw. kahl, ☉ gelb- o. rotbräunlich, ☾ haselnußbraun o. schwärzlichgrau, zuw. + hell längsrissig; B. oben lebhaft grün, kahl, unters. hellgrün, recht spärlich beh., 4—10:1,5—5 cm; Bl. zu 5—7—11, duftend, unterste bis 1 cm lang gestielt, Bl.-Achse und Kn. kahl o. + beh., Gr. deutlich kürzer als Stb., sonst vgl. Fig. 237f—h.

P. s. SIEB., ex LDL. et PAXT., Flow.-Gard. II. 102. 1851/52 [exkl. Fig.!*]. — Nach KOEHNE Japan und Insel Tsu-schima. Ihm steht nach KOEHNE sehr nahe *P. acuminatus* LGE, in Bot. Tidsskr. 3. Reihe II. 131. t. II. 1877 79. Vielleicht überhaupt mit ihm identisch.

... C. schmallänglich vgl. Fig. 237v), B. wie Fig. 288d o. große B., ähnlich Fig. 236e (rechts).

22. *P. falconeri*: b., nach SARGENT ausgebreitet verästelt, bis 3 cm hoch; ☉ Zw. purpurrotbraun, ☾ etwas fein längsrissig; B. auch unten fast ganz kahl, an Bl.-Zw. ca. 3,5:1,5, an Lohden bis 10:5 cm. Zähne sehr fein, kaum auffällig. Textur ziemlich derb; Blst. locker 3—5-blütig, Bl. wohlriechend, reinweiß, K. kaum $\frac{1}{2}$ so lang wie die auffallend schmalen C., Gr. viel länger als die Stb., + $\frac{1}{2}$ verwachsen, Fr. 9 mm lang, halb oberständig.

P. f. SARG., in Gard. a. For. VIII. 494 Fig. 68, 1865. — Wahrscheinlich aus Japan stammend, doch Ursprung noch unsicher. Ob monströse Form? Interessant und kulturwert. Ich sah bisher nur ein steriles, von SARGENT stammendes Expl. in Plantières. KOEHNE stellt, wie ich oben schon anführte, diese Art des langen Gr. halber zu den *Speciosi*.

b. ☉, oft schon + Zw. in großen Stücken abblätternd, Oberhaut zuletzt ganz verschwindend.

*) Die Abbildung (Fig. 188) ist nicht mit SIEBOLDS Pflanze identisch, sondern stellt eine *laxus*-ähnliche Gartenform dar.

Subsekt. d. *Coronarii* KOEHNE, l. c. 451.

○ B. unterseits kahl o. nur verstr. auf den Nerven beh. und achselbärtig.

— B. unterseits meist ganz kahl, selten ein wenig achselbärtig, höchstens am Grunde $\pm$ gewimpert.

+ Bl.-Stiel $\pm$ beh.

△ Gr. unterseits meist beh., B. vgl. Fig. 238c.

23. *P. schrenkii*: b, aufrecht wachsend, ☉ Zw. $\perp$ gelbrotbraun, ... kastanien- o. graubraun: B. eifg. o. eilänglich, an Blzw. etwa 4:1,8 — 6,5:3,5 cm, an Lohden bis 9,5:4,5 cm, Textur später derbhäutig, Zähne der großen B. etwa 9—14 jederseits: Blst. meist 5—7-blütig, Bl. ca. 3,5 cm Dm., schwach duftend, flach ausgebreitet, Bl.-Achse kahl o. längs der in K.-Buchten laufenden Nerven beh., K. außen kahl, sonst vgl. *tenuifolius*, Fig. 237 w—w².

P. s. RUPR., in Bull. Ac. Pétersbg. XV. 365. 1857. — Mandschurei: St. Olga, Bai Possjet, Wladiwostock, nach dem Autor und MAXIMOWICZ im Gegensatz zu *tenuifolius* meist an offenen Orten. — Ob *schrenkii* u. *tenuifolius* nicht doch nur

Fig. 238. *Philadelphus*-B.: a *satsumi* (oben von Bl.-Zw.). — b *tomentosus* (links von Bl.-Zw.). — c *schrenkii*. — d *falconeri* (Bl.-Zw.). — e — f *pekinensis* (f von Bl.-Zw.). — g *nepalensis*. — h—k *pallidus* (h—k v. Bl.-Zw.). — l *coronarius* var. *salicifolius*. — m—n *tenuifolius* (n von Bl.-Zw.). (Alles $\frac{1}{2}$ nat. Gr.) (d nach SARGENT, sonst Orig.)

als Varietäten einer Art aufzufassen? Mir scheinen alle Merkmale sehr schwankend zu sein.

Gr. fest stets kahl, B.-Zählung vgl. Fig. 238m.

24. *P. tenuifolius*: im wesentlichen von *schrenkii* noch abweichend durch: Wuchs mehr schlaff, ausgebreitet, B. stets dünnhäutig, Zähne an Lohden-B. jederseits 10—20, B. kleiner.

P. t. RUPR., in Bull. Acad. Pétersbg. XV. 133. 1857. — Mandschurei, bis Amur und Ussuri, z. T. mit voriger Art in lichten Nadel- und Laubwäldern, aber auch in feuchten schattigen Wäldern. Beide Arten in Kultur. Blz. VI bis Anf. VII.

+ Bl.-Stiele kahl.

25. *P. pekinensis*: bis 3 m hoch. Zw. kahl, ☉ · rotbraun, ☾ kastanien- bis schwarzgrau-braun, darunter hellgrau: B. 3,5—8,5:2—5 cm, vgl. Fig. 238e—f. oben lebhaft, unten hellgraugrün, am Grunde mit 1(—2) Fiedernervenpaaren, Stiele und Nerven unters. purpurn überlaufen, Stiel 0,6—1,8 cm; Blst. 5—7-blütig, dicht, Bl. schwach duftend, gelblich, Gr. etwa so lang wie Stb., Fr. glockig, Scheitel halbkugelig gewölbt, sonst vgl. Fig. 237p—r.

P. p. RUPR. in Bull. Ac. Pétersb. 1857. 365. O.-Mongolei, China (Tschili, Shingking, Chekiang), Korea, Jap. — Blz. VI—VII. Schoner, bis etwa Prov. III—II harter b. Hierher stellt KOEHNE 1904 als var. *brachybotrys* eine ihm aus Hort. VILMORIN zugegangene aus China (Kiangsi) stammende Form, die er wie folgt beschreibt: junge Zw. verstreut steifhaarig, ☉ kahl, bräunlichgrau bis haselnußbraun; B. aus gerundetem Grunde schmal eifg. bis breit länglich, spitz, ganzrandig o. sehr undeutlich gezähnt, beiders. gleichmäßig mit locker stehenden, unters. längeren und steifen Haaren besetzt, dünn hautartig, an Bl.-Zw. auffallend klein, nur 1,5—2,5:0,9—1,4 cm; Blst. nur 1,5—3,5 cm lang, 5—7-blütig; Bl.-Stiele nur 2—4 mm lang; Bl. nur 1,5 cm Dm., C. oval, 8:5 mm, Stb. ca. 36—37, Gr. merklich kürzer, bis $\frac{1}{3}$ o. $\frac{1}{4}$ verwachsen; N. $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ so breit wie A., Fr. fast kugelig, ca. $\frac{2}{5}$ oberständig.

★ ★ B. unterseits auf den Nerven verstreut beh. und meist deutlich achselbärtig.

+ B. unterseits am Grunde, besonders in der Jugend auffällig dicht flockig gebartet, Form vgl. Fig. 238g.

26. *P. nepalensis*: zierlicher b. ☉ Zw. gelbrotbraun, ☾ kastanienbraun; B. ca. 5:2—9:4 cm, Zähnung wenig auffällig, dagegen die lange Zuspitzung markant; Textur ziemlich dünn; Blst. 5—7-blütig, Bl. weiß, ca. 3 cm Dm., kaum duftend, unterste bis 1,6 cm lang gestielt, Bl.-Achse und K. außen kahl, Gr. etwa im oberen Drittel gespalten, N. $\frac{2}{3}$ — $\frac{1}{2}$ so breit und an der Außenkante 1,5—2 mal so lang wie A., Fr. kreiselfg., am Scheitel halbkugelig gewölbt.

P. n. KOEHNE, Dendrol. 183. 1893. N.-W.-Himal. (Hill States etc.), bis 2000 m. — Vielleicht mit *P. triflorus* WALL., Cat. 3653. 1831, identisch. Nach KOEHNE ist die Himalaya-Form echt in Kultur.

+ + B. unterseits kaum auffällig gebartet, jedenfalls Form anders (vgl. Fig. 238h—k).

27. *P. pallidus*: b 1—3 m. · Zw. tiefbraunrot bis purpurbraun, ☾ mehr kastanienbraun; B. der Blzw. an der Form aus Steiermark wie Fig. 238i, 4:1,8—8:3 cm, Zähne sehr fein, ähnlich die armenische Form (k), deren B. bis 4 cm breit sind, an der italienischen Form sah ich die großen B. wie h, bis 10:4,5 cm; Hauptnerven 3—5 am Grunde, Unterseiten meist kahl, zuweilen aber ziemlich deutlich achselbärtig, Textur ziemlich dünn; Bl. 1—5- o. auch bis 10-blütig, Bl.-Stiele kahl o. — beh., Bl.-Achse und K. außen meist kahl, höchstens verstr. beh., Bl. gelblichweiß, duftend, 2,5—3 cm Dm., vgl. Fig. 237x—z (nach Form aus Steiermark).

P. pallidus v. HAYEK, in litt. — I. G. OU, nur Steiermark (Waizgraben) und Siebb. (Kapellenberg b. Kronstadt), ferner Italien (M. Baldo, Coll. Euganei, Toscana, bis Spoleto), Süd-Rußl., Kauk., Armenien. — Felsige Hänge, besonders auf Kalk. — Blz. VI. — Herr Dr. v. HAYEK, Wien, welcher die Flora von Steiermark bearbeitet, war so freundlich, mich darauf hinzuweisen, daß *P. coronarius* L., Sp. pl. 470. 1753, streng genommen, ein ganz unklarer Begriff ist. LINNÉ gibt kein Vaterland an und hat augenscheinlich nur Kulturformen vor sich gehabt. Es erscheint daher auch meines Erachtens besser, den Begriff *coronarius* auf Kulturformen zu beschränken und die spontane Art, auf welche man LINNÉ'S Namen (ob mit Recht?) zu beziehen pflegte, als *pallidus* zu führen. HAYEK versteht darunter

insbesondere die Form aus Steiermark, es ist nicht ausgeschlossen, daß man die Formen anderer Standorte als geographische Varietäten abtrennen kann. KOEHNE'S Angabe, daß *coronarius* auch in Österreich, Istrien, Böhmen und der Schweiz wild vorkomme, halte ich nicht für den Tatsachen entsprechend. In Österr.-Ung. sind nur die Standorte in Steierm. und Siebb. bekannt und in der neuesten Flora der Schweiz wird kein *Philadelphus* geführt.

Auf eine Charakteristik von *coronarius* L. muß ich verzichten. Aus seinem Formenkreise seien nur als 2 auffällige Typen erwähnt: var. *salicifolius* DIPP., Laubh. III. 337. 1893, B. wie Fig. 2381; und var. *nanus* DIPP., l. c. (*P. nanus* MILL., Gard. Diet. ed. VIII. No. 2. 1768). Zwergstrauch, 0,3–0,5 m, kugelig-dichtbuschig geformt, B. nur 3–6; 2–3,5 cm, Bl. zu 1–3, sehr selten erscheinend.

Eine abnorme Form mit rein γ Bl. o. nur mit spärlichen Std. hat ČELAKOVSKY in Ber. deutsch. bot. Ges. 1897. 448. beschrieben. Man vgl. auch U. DAMNER, in Abh. Bot. Ver. Brandenbg. 1888. 247.

Fig. 239. *Jamesia americana*: a Blst.; a' B.; b Bl.; c C.; d–f Stb.; g Bl. ohne C. u. Stb.; h Bl. im Längsschnitt; i Sa.; k Frst.; l–m Fr. im Längs- und Querschnitt; n reifer S.; o dgl. im Längsschnitt; p E. (a, i–p, nach LAVALLEE, sonst Original).

○○ B. unters. gleichmäßig beh.

28. *P. caucasicus*: nach KOEHNE: abrollende Rinde hell- oder schwärzlich-braun; B. 3,5–8 cm lang, schmal eifg. bis länglich, zugespitzt, mit 0–8 Zähnen jederseits, unters. graugrün mit langen, ziemlich feinen, gekrümmten Haaren, sehr dünn hautartig; Blst. meist 7–9 blütig, untere Bl.-Stiele 10–14 mm lang, locker beh., Recept. und K. außen locker beh.; Gr.-Grund meist beh., Gr. kürzer als Stb., $\frac{1}{2}$ o. darüber geteilt, N. $\frac{1}{2}$ – $\frac{2}{3}$ so breit wie A.

P. c. KOEHNE, l. c. 1896. — Abchasien, Kuban, pontische Region. — Nicht in Kultur.

KOEHNÉ führt außerdem einen noch unsicheren *P. matsumuranus* aus Japan mit kahlem Gr.-Grund. Er soll dem in Kultur befindlichen *P. floribundus* SCHRAD., l. c. 1828, nahe stehen, welcher wohl ein Kulturprodukt darstellt*).

*) Als sehr unsichere „Arten“ sind noch zu erwähnen: *P. parvifolius* CARR., in Rev. Hort. 1871. 460 und *P. rubricaulis* CARR., l. c., beide aus chinesischem Samen, sowie *P. stenopetalus* CARR., l. c. 1870. 340, der linealische C. haben und im Hort. BILLIARD erzogen worden sein soll. Man möchte an *falconeri* denken.

Gattung 94. *Jamesia* TORR. et GR., Fl. N.-Am. I. 593. 1840.

Vgl. oben S. 361 und Art. Nur diese bekannt.

J. americana: aufrechter b, 0,6–1,2 m. Zw. jung dicht, ♂ verstr. beh., gelbbraun, ♀ graugelb, da die braunrote Außenrinde abblättert: Kn. vgl. Fig. 240a–f. weiß beh.: B. vgl. Fig. 239a¹, derb, oben beh., tiefgrün, unten weißgrauzottig, 3–9:1,2–5 cm, Stiel 0,6–2 cm. Bl. in am Zw.-Ende rispig gehäuften Trugdolden, vgl. a, weiß o. rosa (var. *rosea* PURP.). Bl.-Achse und K. außen dicht o. verstr. zottig beh., K. und C. 5, C. außen gegen Spitze beh., Stb. 10, Frkn. einfächerig mit 3–5 Placenten (m), Sa. (i) ∞, Gr. 3–5, frei, aber meist erst zur Frz. getrennt (k–l), Fr. scheidewandspaltige Kapsel mit an den Bauchnähten sich öffnenden Frb., S. mit glänzender, gestreifter Testa (n), E. vgl. o–p.

J. a. TORR. et GR., l. c. — Gebirge von Nevada, Arizona, Color., Utah, Neu-Mex. — Bis etwa Prov. III harter ♂; Blz. VI. — Die von PURPUS in S.-Nevada entdeckte var. *rosea* noch kaum verbreitet.

Fig. 240. a–f *Jamesia americana*, a ♂ Zw., b–c Seit.-Kn.; d–e Beh. der Kn.; f Zw.-Q.-Schn. (1' Epidermis, 1 Periderm, 2a hypodermatisches Collenchym, 2 Rindenparenchym, 3 Innemrinde [Weichbast], 3' mechanische Elemente, 4 Cambium, 5 Holz, 6' Markkrone 6 Mark, m f. *Jamesia lera rupicola*; g ♂ Zw., h–i Seit.-Kn., j dgl. im L.-Schnitt, l Beh. d. Kn., m f. *Decumaria barbara*; n ♂ Zw., o–q Kn., seitlich, im Längsschnitt und von vorn (β Kn., γ B.-N., δ Kn.-Kissen), p (linker unterer Querschnitt) (Orig. nach C. K. SCHNEIDER).

Gattung 95. *Fendlera* ENGELM. et GR., in Smith. Contr. III.
Art. V. 77. 1752.

Vgl. oben S. 360 und Art. Nur diese bekannt*).

F. rupicola: sparriger, 0,5—1,2 m hoher $\mathfrak{b}$, Zw. jung fein beh., $\mathfrak{c}$ kahlend, gelbgrau o. leicht gebräunt, fein längs abfasernd, Kn. vgl. Fig. 240g m, bräunlichgrün, borstig gewimpert: B. 1—2(2,5 : 0,3—0,8 cm, derb, oben tiefgraugrün, rauh, unten hellgraugrün, gemischt beh. (feine Büschelhaare und gröbere einfache Haare); Bl. weiß, zu 1—3 an seith. Kztr., vgl. 241h u. K. 4, klappig, C. 4, außen beh., genagelt und am Rande feinzäbnelig (b), Stb. 8, wie o—p, Gr. (4), Fr. wie q—r, S. s—u.

F. r. ENGLM. et GR., l. c. — Texas; Felshänge. — Blz. V—VI. — Hübscher $\mathfrak{b}$ für sonnige Gesteinsgruppen; ob über Prov. IV hinaus hart?

Fig. 241. a—g *Whipplea modesta*: a Zw. mit Blst.; b Bl. von oben; c Stb.; d C.; e K.; f, g Frkn. im Längs- und Querschnitt. — h—u *Fendlera rupicola*: h Zw. mit Bl.-Kn.; i Bl. Stiel und Zw. Ansatz; j Bl.; k C.; l K.; m Bl. im Längsschnitt; n—p Stb.; q Fr.; r dgl. im Längsschnitt; s S.; t—u dgl. im Längs- und Querschnitt (a—b, d—e nach TORREY et GRAY, c, f—g nach ENGLER, q—u nach GRAY, sonst Original).

Gattung 96. *Deutzia* THBG., Diss. nov. gen. I. 19. 1781.
[Deutzie].

Vgl. oben S. 361, b, Zw. rundlich, Kn. zwei- bis mehrschuppig:

*) E. L. GREENE zieht (in Bull. Torr. Club 1881, 25) zu *Fendlera* die 1873 (in Am. Nat. VII, 300) von WATSON beschriebene *Whipplea utahensis*, ENGLER (in Nat. Pfl. III, 23, 72, 1897) behauptet sie aber *Whipplea*. Ich kenne sie nur aus den Zitate und glaube, daß es am besten ist, sie mit HELLER (in Bull. Torr. Club 1898, 626) als besondere Gattung *Fendlerella* zu führen; denn da die Bl. 5-zählig sind, in zusammengesetzten Blst. stehen und kein Lappenzpfl. haben, so erscheint GREENE'S Subsummierung von *Fendlerella* als Sekt. neben *Lafendlera* gezwungen. Die korrekte Bezeichnung ist somit *Fendlerella utahensis* (WATS.) HELLER, l. c., S.-Utah, Color., Arizona.

*) Spez.-Lit. MAXIM., in Mem. Ac. imp. St. Petersbourg, sér. 7, X, 1867; LEMOINE, in Journ. d. l. Soc. d'Horticulture de France 1902; C. K. SCHNEIDER, in Mitt.

B. eifg. o. lanzettlich, gesägt: Blst. selten 1-, meist wenig- o. vielblütig, an Seitentrieben endständig, selten einfach traubig, meist wenigstens Achsen zweiten Grades zymös verästelt: Bl. weiß o. rosa, Bl.-Achse glockig, mit Gyn. vereint, zur Frz. — holzig, K. und C. 5, Stb. 10 o. 12—15, Gyn. 3—5-fächrig, in jedem Fache mit ∞ dachziegelig gelagerten Sa., Gr. 3—5, Fr. 3—5-fächrig, von unten scheidewandspaltig, S. an Spitze $\pm$ geflügelt. — Alle Arten erwähnt.

Tabelle zur Bestimmung der Arten nach den Blättern.

- 1a. B.-Unterseiten dick weißgrau sternhaarfilzig 2.
- 1b. B.-Unterseiten hellgraugrün oder deutlich hellgrün, Sternhaare sehr verstreut bis gleichmäßig nebeneinander 4
- 2a. B. (der Bl.-Zw.) 1,8:0,8—4:1,7 cm, Sternhaare oberseits 7—9-, unterseits 12—15-strahlig: 9. *mexicana*.
- 2b. B. größer, Haare oberseits 5—7-strahlig 3.
- 3a. B. ca 3—9 cm lang, eilänglich, kurz-spitzig o. stumpflich, Haare oberseits 7—10-strahlig: 6. *discolor typica*.
- 3b. B. 3—8:0,8—3,8 cm, eifg. bis eilanzettlich, spitz, Haare unterseits 9—15-strahlig 5. *staminea* o. 6. *vilmorinae*, vgl. auch *hypoleuca* S. 379 Anm.
- 4a. (1b). B. oberseits reicher als unterseits beh., eilanzettlich, spitz, 3:1—7:2 cm, Haare oberseits 3—4-, unterseits 5(—6)-strahlig: 1. *gracilis*.
- 4b. B. unterseits reicher beh. 5.
- 5a. Haare beiderseits 3—5-strahlig oder 4—7-strahlig 6.
- 5b. Haare unterseits mehrstrahlig als oberseits 7.
- 6a. B. 3:1,5—2 bis 9:3,8 cm, Textur zuletzt hartlich, Oberseiten trübgrün, Unterseiten hellgraugrün, runzelig-geadert, Haare 3—5-strahlig: 2. *sieboldiana*.
- 6b. B. bis 14:4—5 cm, Textur papierartig, Oberseiten eher lebhaftgrün, Unterseiten hellgrün, glatt (nur eben durch Haare rau), Haare 4—7-strahlig: 4. *corymbiflora*, vgl. auch 7. *discolor purpurascens*.
- 7a. B. 1,5:2—10:4 o. 12:5 cm; Textur dünnhäutig, Haare oberseits 4—7-, unterseits 10—15-strahlig: 3. *scabra*.
- 7b. B. 3:1,5—7:3,5 o. 10:2,5 cm, Textur zuletzt hirtlich, Haare oberseits 4—6-, unterseits (6—)8—12-strahlig: 8. *corymbosa*.

A. Knospenlage der C. klappig (vgl. Fig. 242d). Stb. 10.

Sekt. 1. *Eudeutzia* ENGL., in Nat. Pflz. III. 2a. 72. 1890.

Sekt. 2
siehe S 382.

I. K. deutlich breit dreieckig o. eifg., kürzer o. kaum so lang wie II. siehe S 380.
die Bl.-Achse.

Subsekt. a. *Latisepalae**) C. K. SCHN., in Mitt. deutsch. Dendr. Ges. 1904.

○ B.-Oberseiten reicher beh. als die fast kahlen glatten Unterseiten.
Stbf. sämtlich kurz 2-zählig (vgl. Fig. 242e).

1. *D. gracilis*: niedriger, aufrechter, kaum meterhoher b; nur jüngste Zw. beh., — bräunlich, — grau, spät abblätternd; Kn.-Schn. 2, gleichlang: B. vgl. Fig. 242a—c und oben: Blst. vgl. var. Bl. weiß, C. verkehrt eilänglich, außen beh., Fr. eirundlich mit bleibendem K.

var. a. *typica* C. K. SCHN., l. c.: Trauben meist einfach, C. ca. 5—6 mm lang (spontane Form). — b. *distincta* C. K. SCHN., l. c., Seitenachsen der Blst.

Deutsch. Dendrol. Ges. 1904. In dieser Arbeit ist alles hier nicht Erwähnte ausführlich besprochen.

*) Hierher gehören noch: *D. fargesii* FRANCH., in Journ. de Bot. 1896: 281, aus China (O. Sztschwan), B. nach FRANCHET habil. — *D. taiwanensis* (MAXIM.) C. K. SCHN., l. c., aus Formosa und O-China, B. auch an Bl.-Zw. 6—9 cm lang, Haare beiderseits 3—5-strahlig. — *D. pulchra* VIDAL, Revist. Pl. Vasc. Filip. 124. 1880, von den Philippinen, mir unbekannt. — *D. setchuenensis* FRANCH., l. c., China. Mir ebenfalls unbekannt; vielleicht mit *corymbiflora* identisch.

meist 2-3-blütig, C. ca. 8-10 mm lang (Kulturform); hierher: *f. aurea* SCHELLE, H. d. D. D. G. 131. 1903. B. gelb; *f. aureo-marginata* LEMOINE, in Journ. d. l. Soc. Nat. d'Horticult. de France 1902. B. grün mit gelbem Rande; *f. albo-marmorata* LEM., l. c., B. grün, weiß gesprenkelt.

D. g. S. et Z., Fl. jap. I. 22. t. 8. 1835. — Zierliche D. — Japan (Kiuschiu, Centr.-Hondo, Jesso). — In Gebüsch der Gebirge. — Blz. V. Bekannter Zierp., bes. als Treibpflz. wertvoll.

Fig. 242. *Deutzia*: a-e *gracilis*: a B., b Haare von B.-Oberseite, c dgl. von Unterseite, d Bl.-Kn. (klappige Kn.-Lage der C.), e Bl. im L.-Schn. — f-k *sieboldiana*: f B.-Formen, g B. von var. *dippeliana*, h Haarformen der beiden B.-Seiten, i Fr. — l-q *scabra (crenata)*: l B. von Bl.-Zw., m von Lohden, n Haare (links von B.-Oberseite, rechts von B.-Unterseite), o Bl. im L.-Schn., p Fr., q S. und E. — r *corymbiflora*: B. (Original).

1-7b *D. gracilis* × *discolor purpurascens*: von dieser Kreuzung hat LEMOINE zwei Typen erzielt und diese in den nachstehenden Formen in den Handel gebracht. Näheres über Hybriden vgl. man bei LEMOINE selbst, l. c., o. in meiner oben zitierten Arbeit. Der erste Typ entspricht: *gracilis* × *purpurascens* 1, Formen: var. *rosa* LEM.**, var. *tenusta* LEM., var. *campanulata* LEM. und var. *eximia* LEM.; der zweite Typ stellt: *gracilis* × *purpurascens* 2 dar, Formen: var. *grandiflora* LEM. und var. *floribunda* LEM.

1-8b *D. gracilis* × *corymbosa parviflora*: *D. lemoinei* LEM., in Rev. Hort. 1894 214, bez. Gartenflora 1895. 566. Hierher var. *typica* C. K. SCHN., l. c., bekannter Treibstrauch!; var. *compacta* LEM. und var. „Boule de Neige“ LEM.

(1-8b) < 7b *D. lemoinei* × *discolor purpurascens*: *D. myriantha* LEM., Cat. Herbst 1904. S. VI. Bl. zart rosaweiß. Nach LEMOINES Abbildung eine ausgezeichnete Hybride.

○○ B.-Unterseiten reicher behaart.

- * Haare der Blattunterseiten (wie oben) 4-5-strahlig, diese runzlig geädert und zuletzt derb. Filamente meist ungezähnt (vgl. Fig. 242i).

*) Wie ich schon, l. c., betonte, ist es unkorrekt, wenn LEMOINE diese Formen, da ein binärer Hauptname für den Bastardtyp von ihm nicht gegeben wurde, als *D. gracilis rosea* etc. bezeichnet, die folgenden dann als *D. discolor grandiflora* etc. Es empfiehlt sich, will man keine neuen Hauptnamen schaffen, einen Formennamen dazu zu erheben. Ich möchte aber LEMOINE nicht vorgreifen.

2. *D. sieboldiana*: ca. 1 m hoher oder höherer b. • Zw. beh., spät abblätternd; Kn. 4-schuppig. Sch. fast gleichlang; B. vgl. Fig. 242f—g und S. 377; Stiel 0—5 mm; Blst. pyramidalrispig, gleich Receptaculum beh., Bl.-Stiele 5—15 mm, Bl. weiß, ca. 17 mm Dm., Fr. breitrundlich mit bleibendem K.

var. *a. typica* C. K. SCHN., l. c. (*scabra* S. et Z., Fl. jap. I. 20. t. 7, excl. Fig. IV. 1835; *scabra vera* Hort. plur.). Beh. der Blst und Receptacula anscheinend verschieden (heteromorph), d. h. bei einem Teil der Sternhaare der Mittelstrahl stark verlängert, so daß sie dem nackten Auge als einfache Borstenhaare erscheinen. — *b. dippeliana* C. K. SCHN., l. c. Beh. homomorph, d. h. alle Sternhaare gleich, flach.

D. s. MAXIM., l. c. 1867 (*D. sieboldii* KOERN., in Gartenflora 1867, 74). — Japan (Kiuschiu und Tsu-Shima bis Centr.-Hondo). In Gebüsch an Berghängen, hfg. mit *scabra* vereint. — Blz. (IV—V) Anf. VI. — In neuerer Zeit als *scabra*! eingeführt. Man vgl. meine Arbeit, l. c.

×× Haare der B.-Unterseiten 10—15- o. 5—7-strahlig, B.-Textur dünnhäutig, Stbf. fast stets deutlich gezähnt.

+ Blst. racemös, B. oberseits mit 4—7-, unterseits mit 10—15-strahligen Sternhaaren*), vgl. Fig. 242n.

3. *D. scabra*: üppiger, bis 2.5 m hoher, in der Tracht variabler b, Holz und Kn. ähnlich *sieboldiana*, doch Beh. schwächer, Zw. rascher abblätternd, Kn. spitzlicher; B. vgl. Fig. 242l, m und S. 377; Stiel 1—5 mm; Blst. zuweilen sehr schlankrispig, C. außen beh., Fr. meist ohne K., vgl. o—q.

Fig. 243. *Deutzia*: a—f *scabra*: a ♂ Zw., b Seit.-Kn., c B.-N., d Stück von ♂ Zw., e = b, f Zw.-Querschnitt. — g—k *corymbosa* var. *parviflora*: g ♂ Zw., h Seit.-Kn., i Haar von Zw., k = f (1—6 vgl. Fig. 240f). — l—o *gracilis*: l ♂ Zw., m—n Seit.-Kn., o = f (Original nach C. K. SCHNEIDER).

Man kann als Hauptformen festhalten: var. *a. typica* C. K. SCHN., l. c., Blst. homomorph beh. und var. *b. crenata* C. K. SCHN., l. c. (*D. crenata* S. et Z., Fl. jap. 19. t. 6. 1835, sensu strict.). Blst. heteromorph beh. Die folgenden Formen

*) Sind die B. weißfilzig unterseits, so kann *D. hypoleuca* MAXIM., ex Tokyo Bot. Mag. 1894. 505 (*discolor* MAXIM., in Bull. Ac. Petersbg. 1888. 187, non HEMSL.) in Betracht kommen. Hier sind die B. an Bl. Zw. 2—4 cm lang, sonst 5—10 : 3.3—6 cm, Bl. *scabra* ähnlich, doch kleiner und Filamentzähne schmallänglicher. Hierher vielleicht *D. canescens* HORT.

treten z. T. bei beiden var. auf, teils sind sie in ihrer Zugehörigkeit zu a oder b noch nicht sichergestellt: *f. albo-plena* [VAN HOUTTE]*) (*crenata fl. albo-plena* LEMOINE, l. c.): Bl. gefüllt, reinweiß; *f. plena* [FORTUNE apud LEM., l. c.]: Bl. gefüllt, außen rosa; *f. punicea* [SCHELLE] (*crenata fl. punicea* LEM.): Bl. einfach, außen rosapurpurn, hiermit vielleicht identisch *D. crenata watereri* LEM. (*hybrida watereri* VEITCH); *f. macropetala* [ZABEL]: Bl. einfach, weiß, aber C. ca. 15—16 mm lang, beim Typ nur ca. 10—12 mm; *f. albo-punctata* C. K. SCHN. (*crenata fol. albo-punctatis* LEM.): B. weiß gefleckt; *f. aureo-variegata* C. K. SCHN. (*crenata fol. variegatis* LEM.): B. gelb panachiert; fragliche Formen sind *crenata fortunei* LEM. (? *D. fortunei* CARR., in Rev. Hort. 1866, 338, nec VOSS) und *crenata wellsi* LEM. (*hybrida wellsi* VEITCH), beide vielleicht kaum vom Typ verschieden.

D. s. THBG., Fl. jap. 185. 1784, nec S. et Z., MAXIM., DIPPEL etc. — Raube D. — Japan (Kinschiu bis Jesso). — Verbreitet und seit alters kultiviert. — Blz. VI. — In Europa seit langem in Kultur und wohl für Prov. III—II hart.

+ Blst. trugdoldig (zymös); B.-Haare oberseits 4—7-, unterseits 5—7-strahlig.

4. *D. corymbiflora*: b. bis 1,5 m; Zw. jung beh., Kn. spitzlich, locker und spitzschuppig; B. vgl. Fig. 242r und S. 377; Stiele bis 1 cm; nach LEMOINE Blst. 50—100 blütig, Bl. schneeweiß, 1,5 cm Dm., C. aus breiter Basis zugespitzt, außen beh., längere Stb. kaum $\frac{1}{3}$ so lang, Filamente breit petaloid, zweizählig, A. zwischen beiden Zähnen aufsitzend, diese wenig überragend; Gr. 3, den kurzen Stb. gleichlang. Fr.?

D. c. LEMOINE, in Gard. Chron. 1898, II. 265 — trugdoldige D. — Zentr.-China, W.-Sz'tschwan. — Blz. VI—VII. — Nach LEMOINE eine ausgezeichnet reichblütige Art, die in Deutschland noch kaum erprobt ist. Wohl Prov. V—VI.

II. K. schmallänglich oder lineal, so lang o. länger als die Bl.-Achse.

Subsekt. b. *Stenosepalae***) C. K. SCHN., l. c.

○ K. nicht o. kaum länger als Bl.-Achse, B. unterseits mit 9—15-strahligen Haaren.

* Bl.-Stiele 5—7 mm lang, B. vgl. Fig. 244, Fr. (meist) ohne K.

5. *D. staminea*: b. bis etwa 1,20 m; auch ♂ Zw. beh., hellbraun, grau, abblätternd; Kn. wenig- oder lockereschuppig, Sch. gleichlang; B. vgl. Fig. 244 und S. 377, dünnhäutig; Stiel 1—6 mm; Blst. bald mehr razemös, bald mehr zymös, 8—15-bl., homomorph beh.; C. außen beh., weiß, A. hfg. beh.; Fr. rundlich.

var. a. *typica* C. K. SCHN., l. c. B. ei- o. länglichlanzettlich, 3—6:0,8—2 cm; C. ca. 7—9 mm lang. b. *brunoniana* MAXIM., l. c. (*D. brunoniana* WALL., Cat. n. 3650, 1831) B. eifg. mit lang vorgezogener Spitze, 4:2,3—8:3,8 cm, Beh. unterseits zuweilen lockerer; C. ca. 10—12 mm lang.

D. st. R. BROWN, in WALL. Cat. 3651, 1831 [et in WALL., Pl. as. rar. II. 82, t. 191, 1831] scheint von N.-W.-Himal. bis Nepal verbreitet, Gebirge bis 3200 m.

Blz.? — Nur var. b. in Kultur. Ob *canescens* HORT (bez. SIEB., apud STEUDEL, Nomenklator, ex Japan?) hierher oder zu *hypoleuca* (S. 379 Anm.) gehört, ist mir noch fraglich.

*) Die in [] gesetzten Autoren führten die Formen als solche von *crenata*.

**) Von noch nicht in Kultur befindlichen Arten gehören hierher: *D. glomerulifolia* FRANCH., in Nouv. Arch. Mus. Paris ser. 2, VIII. 236, 1885, aus Zentr.-China. B. b. idersseits mit 4—5-strahligen Haaren. — *D. macrantha* HK. F. et TH., in Journ. Lin. Soc. II. 84, 1858, aus Kumaon. B. groß, 7—12 cm lang, Haare unterseits 11—15-, oberseits 4—6-strahlig, Blst. wenigblütig, Bl. groß. — *D. longifolia* FR., l. c. 235, aus Zentr.-China. Bl. rosa. — *D. grandiflora* BGE., in Mem. Sav. Etr. Pétersbourg. II. 104, 1835 (*baroniata* DIELS, in Engl. bot. Jahrb. Bd. XXIX 372, 1901) aus S.-Mongolei, N.- und Centr.-China. Blst. 1—3-blütig, Bl. groß; Haare oberseits 5—6-, unterseits 7—9-strahlig.

- * 7. Bl.-Stiele kaum unter 10 mm, zuweilen bis 15 mm lang, B. gleichmäßiger schmallänglich, sich allmählich spitzend, Fr. mit bleibendem K.

6. *D. vilmorinae*: b, bis 1,25 m (aber wohl höher werdend), Zw. aufrecht, jung verstr. beh., ☉ meist kahl, rundlich, heller o. dunkler braun, ☉ aufreißend; Kn. ?; B. 5:1,5–8:2 o. 8:2,7 cm, oberseits sattgrün, gleichmäßig locker beh., Haare 4–6-strahlig mit Zentralstrahl, unterseits grau, dicht beh., Haare 9–12–14-strahlig, längs der Hauptrippe verstreut dimorph, Zähnung fein, gleichmäßig, aber ziemlich scharf und deutlich; Stiel 4–7 mm; Bl. in seitenständigen, ca. 6–10-blütigen Zymen, die sich am Zw.-Ende zu beblätterten Scheinrispen drängen, Beh. der Blst. und Bl.-Achse homomorph, diese halbkugelig, K. meist ein wenig länger, innen kahl, allmählich zugespitzt, C. often, schneeweiß, ca. 12:7 mm, außen sternhaarig, Stb. sämtlich gezähnt, längere etwa $\frac{3}{4}$ C., A. deutlich über die kurzen abstehenden Zähne emporgehoben, Gr. der längeren Stb. ziemlich gleichlang, Diskus und Gr.-Grund beh.

D. v. LEMOINE, [Cat. No. 158, Herbst 1904, mit gutem Habitusbild]. — China: Sz'tschwan (leg. Farges). Blz. V–VI. Ich erhielt Material von Herrn VILMORIN, dem wir die Einführung dieser, wie es scheint, sehr reichblütigen, schönen Art verdanken. Herr VILMORIN hat noch eine etwas abweichende Form (No. 7074 o. 2683) von mehr ausgebreitetem Wuchs, deren B. stärker kahlen, und die vielleicht eine gute Varietät darstellt. Den Typ erhielt ich als No. 7072 und 1547.

Fig. 244. *Deutzia*: a–d *staminea*: a B. vom Typ, b–c dgl. von var. *brunoniana*, d Bl. im L.-Sch. — e–f *discolor*: e B., f = d. — g–i *corymbosa* (Typ): g B., h Bl.-Kn. (imbricate Kn.-Lage der C.), i Bl. im L.-Schn. — k *m. corymbosa* var. *parviflora*: k B., l = i, m Fr. — n–p *mexicana*: n B., o Bl.-Kn., p Bl. im L.-Schn. (Original).

○○ K. etwa doppelt so lang wie Bl.-Achse. B. unterseits mit 7–9–10-strahligen Haaren.

7. *D. discolor**: B. unterseits dicht weiß beh., 6–9,5 cm lang, kurzspitzig o. stumpflich: Bl. weiß, über 15 mm Dm., Gr. länger als Stbf. — Dies aus HEMSLEYS Diagnose die Hauptunterschiede der var. *typica* C. K. SCHN., l. c. gegenüber

var. b. *purpurascens* FRANCH., apud HENRY in Le Jardin 1894. 147. Sie beschreibt LEMOINE, wie folgt: b, bis ca. 1 m; junge Zw. beh., bronzegrün, oft gerötet; B. 3–6 cm lang, vgl. Fig. 244e, oben lebhaft-, unterseits hellgrün; Blst. zymös,

*) Die von mir l. c. als var. *albida* hierzu gezogene *D. albida* BAT., in Act. Hort. Petrop. XIII. 97. 1893, aus Kansu ist vielleicht doch besser als eigene Art zu fassen, wie man wohl auch var. *purpurascens* als Art abtrennen müssen wird.

6 8-blütig, B. innen weißlich, außen deutlich rosa purpurn, C. außen beh., am Rande hfg. leicht ausgefressen, sonst vgl. Fig. 244 f. Fr. eilänglich mit K.

D. d. HEMSLEY, in Journ. Lin. Soc. XXIII. 275. 1887. — Zweifarbiges D. — China: var. a. Hupei, var. b. Kansu. — Blz. V—VI. — Nur var. b. in Kultur. Wohl Prov. V—VI.

7b $\times$ 8b *D. discolor purpurascens* $\times$ *D. corymbosa parviflora*: *D. kalmiaeflora* LEM., l. c. Mir nur aus der Beschreibung bekannt.

B. Knospenlage der C. dachziegelig (imbrikat), Stb. 10 oder 12—15.

I. Stb. 10.

Sekt. 2. *Mesodeutzia* C. K. SCHN., l. c.

8. *D. corymbosa*: b, bis etwa 1,5 m; junge Triebe beh., ☉ rotbraun, ☾ stark abblätternd. Kn. eifg., ungleich- und mehrschuppig; B. vgl. var.; Stiel bis 1 cm; Blst. zymös, bald mehr doldig, bald mehr rispig erscheinend, wie Bl.-Achse homomorph beh., C. außen fast stets beh., 5—6 mm lang, vgl. Fig. 244 i, l—m.

var. a. *typica* C. K. SCHN., l. c. (*parviflora* var. *corymbosa* FRANCH., in Journ. d. Bot. 1890. 283). B. vgl. Fig. 244 g und S. 377, lang- und feinspitzig, unterseits oft sehr verstreut beh., Stbf. stets gezähnt (1). var. b. *parviflora* C. K. SCHN., l. c. (*D. parviflora* BOE., in Mém. Sav. Etr. Pétersbg. II. 104. 1835.1: B. vgl. Fig. 244 k, meist kurzspitzig; bis 8,5 : 2,7 cm; Stbf. bald sämtlich ungezähnt, bald nur äußere zahnlos, bald alle kurzzähmig).

D. c. R. BR., in WALL. Cat. n. 3652. 1831 [et in ROYLE, Ill. Bot. Himal. 216. t. 46. Fig. 2. 1839]. var. a. Kumaon und NW.-Himal., var. b. von N.-China durch S.-Mandschurei bis Wladiwostock, wohl auch Zentr.-China. Blz. VI. — Nur var. b. in Kultur, von der LEMOINE, l. c., eine var. *musaei* beschreibt, die mir noch nicht genügend bekannt, aber wohl durch langgestrecktere B. und auch im Blst. abweichend ist. Hybriden siehe S. 378 und oben. Harte kulturwerte Art.

II. Stb. 12—15.

Sekt. 3. *Neodeutzia* ENGL., l. c.

9. *D. mexicana*: nach PRINGLE bis 3—4,5 m hoher b, (☉) Zw. beh., hellbräunlich, ☾ grau, längsrissig; B. vgl. Fig. 244 n und S. 377; Bl. zymös, schein-doldig, wenigblütig, vgl. o—p.

D. m. HEMSLEY, Diag. pl. nov. I. 9. 1878. — Mexiko. — VI—VII. — Nicht in Kultur. Die von mir l. c. beschriebene *D. pringlei* ist doch wohl besser nur als *mexicana* var. *pringlei* aufzufassen.

Gattung 97. *Whipplea* TORR., Pac. Rep. Bot. III. 34. t. VII. 1857.

Siehe S. 361 und Art. Nur diese bekannt, vgl. aber Anm. S. 376.

W. modesta: niedergestreckter, wurzelschlagender, kaum über 40 cm hoher, b artiger b, Zw. jung dichter, ☉ beh., etwas kraus, zuletzt Außenrinde abblätternd. Kn. z. T. von B.-Basen verdeckt; B. vgl. Fig. 241 a, bis etwa 3 cm lang, dünn, zuw. fast ganzrandig, beiders. anliegend beh., obs. Sp. vorh., Stiel fast fehl.; Blst. endständig, wie a, Bl. weißlich, Fr. eine kugelige in 4—5 nach innen aufspringende, 1-samige Teilfr. zerfallende Kapsel, S. länglich, E. klein, am Scheitel des End., sonst wie Fig. 241 a—g.

W. m. TORR., l. c. — Vom Columbia river durchs calif. Küstengebirge (*Sequoia*-Wälder). — Blz. V. — Meines Wissens nicht in Kultur.

Trib. 2. *Hydrangae* ENGL., l. c. Periphere Bl. des Blst. hfg. steril, mit stark vergrößerten petaloiden K., ohne C. und Stb.; C. in Kn. meist klappig, seltener dachig; Fr. am Scheitel nach innen fachspaltig o. zwischen den Rippen aufspringend.

Gattung 98. *Cardiandra* S. et Z., Fl. jap. 119. t. 65 66. 1835.

Vgl. oben S. 361 und Art. Nur diese bekannt.

C. alternifolia: kaum am Grunde verholzender h, 0,30–0,80 m, die aus dem Wurzelstock entspringenden, im Herbst absterbenden Zw. olivbraun, etwas kurz borstig; B. vgl. Fig. 247 o, 8–18, 2,5–7 cm, oben tiefgrün, fast ganz kahl, unten weißgrau, auf den Nerven anliegend steifhaarig; Stiel 1–3 cm; Bl. klein, in lockerer Scheindolde, rosa, lila o. weiß, sterile Randbl. 2–2,5 cm Dm., C' in Kn. quincuncial, Blst. und Bl-Achse nebst K. beh., o. letzte zwei kahl, Frkn. unvollkommen 3-fächrig mit ∞ Sa. an den einwärts gebogenen Placenten, Kapsel oben nach innen fachspaltig, sonst vgl. Fig. 245 m–q.

C. a. S. et Z., l. c. — Herzhortensie. — S.-Jap., China (Kiangsi). — Feuchte Niederungen, Gebüsch. — Blz. VII–VIII. — Selten in Kultur.

Gattung 99. *Platycrater* S. et Z., Fl. jap. 62. t. 27. 1835.

Vgl. oben S. 361 und Art. Nur diese bekannt.

P. arguta: h, bis etwa 1 m, Zw. überhängend, jung beh., o. zuw. kahl, rundlich, gelbbraun, Mk. und Holz in Q.-Schn. grün, dicht, Außenrinde bald aufreißend und stark abblätternd: hellweißgrau, feinstreifig, Äste niedergestreckt o. aufstrebend: Kn. vgl. 246 a–e; B.

Fig. 245. a–l *Platycrater arguta*: a Blst., b Bl.-Kn., c–c' K. und C., d Bl., e Gr. und N., f Stb., g Gyn. im Längsschnitt (α K., β Stb., γ Disc., δ = Gr.), l S. — m–p *Cardiandra alternifolia*: m Bl., n K. mit Gyn., o Stb., p Fr., q S. (a nach SIEB. et ZUCC.; h–c, m–o nach ENGLER, sonst Orig.).

vgl. 247 p, dünnhäutig, 6–20:1,3–5–6 cm, oben lebhaftgrün, unten glänzend hellgraugrün, beiders. verstr. anliegend beh. o. fast kahl; Stiel 0,5–1,5 cm; Blst. vgl. 245a, Bl. (d) weißlich, periphere (in a o. wie h) grünlichweiß, C' in Kn. klappig, Frkn. (g) unvollkommen 2-fächrig, Kapsel cylindrisch, am Scheitel sich öffnend.

Man kann mit MAXIMOWICZ unterscheiden: var. a *typica* spontane Pfl. wie oben und Fig. 245a. — b. *hortensis*. Kulturpfl., Wuchs niedriger, gedrungen, B. kaum über 11:2,5 cm, Blst. wenigblütiger, sterile Bl. fehl. o. verkümmert, kleiner als fertile.

P. a. S. et Z., l. c. — Schlüsselhortensie. — S.- und M.-Jap. Flußufer. — Blz. VII–IX. — Noch selten in Kultur (var. b), Prov. V–VII in geschützten warmen Lagen.

Gattung 100. *Hydrangea* L., Sp. pl. 397. 1753.
[Hortensie; Hydrangea].

b $\bar{h}$ o. $\bar{f}$. B. sommer-, selten immergrün, ganzrandig o. +⁺ grob gezähnt o. scharfgesägt, selten gelappt: Bl. klein, in zusammengesetzten Trugdolden o. Scheinrispen, die peripherischen hfg. (an Kulturrassen auch alle steril, mit petaloidem großem K., am Grunde der Blst. zuw. Involukren: K. und C. 4–5, C. zuw. an Spitze zusammenhängend, Stb. 8, 10 o. 15(–20), Frkn. halbober- o. unterständig, vollkommen o. unvollkommen 2–5-fächerig^{*)}, Sa. ∞ : Gr. 2–5: Fr. am Scheitel aufspringende Kapsel. Die bisher bekannten Arten sind sämtlich im folgenden erwähnt.

Fig. 246 a–e *Platycodon arguta*: a $\bar{z}$, Zw., b Kn., c Spitze der Kn.-Sch., d B.-N., e Zw.-Q.-Schn. (1–6 vgl. Fig. 240f, S. 375). f–m *Hydrangea paniculata*: f $\bar{z}$, Zw., g–h End- bez. Seitenkn. mit B.-N., i Lohdtrieb mit quirlständigen Kn., k Kn. davon, l–m Zw.-Q.-Schn., m $\bar{z}$ (Original nach C. K. SCHNEIDER).

B. siehe S. 393

Subgenus A. *Euhdrangea* MAXIM., in Mém. Ac. Pétersbg. sér. 7. 1867. 6. b $\bar{h}$, B. sommergrün, Stb. 8 o. 10, C. an Spitze frei.

Sekt. 1. *Americanae* [MAXIM., l. c.], B.-Stiel im Mittel nicht unter 2 cm, C. abfällig o. bis nach Verstäubung bleibend, Fr. unterständig, S. ungeflügelt, gestreift.

○ B. gelappt, im Mittel nicht unter 12 cm lang, Blst. pyramidal-scheinrispig.

1. *H. quercifolia*: b $\bar{h}$, in Heimat bis über 4 m, breitbuschig, Zw. dicht gelbrot filzig beh., darunter lilabraunrot, ○ längsrissig, Kn. vgl. Fig. 249n–s, gleich den Zw. beh.; B. wie Fig. 247a, 10–20(–28):8–14–20 cm, 3–5(–7)-lappig, dicklich, oben tiefgrün, meist

*) KOEHNE (Dendrol. 187. 1893) unterscheidet nach der vollkommenen o. unvollkommenen Fächerung der Frkn. 2 Untergattungen. Mir scheint dies Merkmal noch der Prüfung bedürftig, weshalb ich KOEHNE'S Einteilung nicht beibehalten kann. Auch die Gliederung der *Euhdrangea* nach MAXIMOWICZ ist wohl besser derart, wie ich es getan, abzuändern, da bei den amerikanischen Arten, die auch habituell abweichen, die C. nur z. T. bis nach der Anthese bleiben.

nur jung + verstr. beh., unten bleibend graufilzig. Stiel 3–10 cm; Rispen bis 20 cm hoch; Bl. grünlich bis rötl.-weiß, sterile 2–5 cm Dm., K. ganzrandig, $\pm$ rundlich; sonst vgl. Fig. 248a–c.

H. q. BARTR., Trav. through Carol. 382. t. 7. 1791 (*radiata* SM., Icon. pict. 12. 1791. non WALT.). — Eichenbl.-H.; gray-beard. — N.-Am. (Georg. bis Flor.) Flußufer. — Blz. (VI–)VII–IX. — In geschützten sonnigen Lagen bis etwa Prov. V hart. Eigenartiger, sehr schön belaubter Zier-p.

B. nie gelappt, im Mittel unter 10 cm lang. Blst. flach-trugdoldig.

* B.-Unters. durchaus beh.

– B.-Unters. weißfilzig. B. fühlen sich wie weiches Leder an. Haare der Fläche dicht verworren, ganz glatt (Fig. 248d).

Fig. 247. B.-Formen von: a–n *Hydrangea*: a *quercifolia* (kleines B.). — b *radiata*. — c *cinerea*. — d–f *arborescens*. — g–h *hirta*. — i–k *scandens* (*virens*): (k = var. *reinii*). — l *involucrata*. — m *aspera*. — n *heteromalla* (*vestita*). — o *Cardiandra alternifolia*. — p *Platycrater arguta*. (Alles $\frac{1}{2}$ nat. Gr.) (Original).

2. *H. radiata*: aufrechter, bis 2 m hoher b. Zw. jung beh., kahlend, gelb- o. rotbraun, glatt, rundlich; grau, Kn. fast ganz unter den B. Stiel-Basen verborgen; B. 6–16:3–8 cm; vgl. Fig. 247b. Zähnung im allgemeinen feiner als bei *arborescens*, Stiel 1.5–2–7 cm; Blst. bis 30 cm Dm., beh., Bl. weißlich, sterile vgl. Fig. 248e, 1.5–3 cm Dm., Fr. wie f, hellgerippt.

H. r. WALT., Flor Carol. 251. 1788 *nov.* MICHX., Fl bot am L. 268. 1803) Strahlen-H. — N.-Am. (N Carol., Georgia bis Tennessee felsige Hänge Blz VII. — Bis etwa Prov. III hart. Schöne Art. Liebt, wie wohl alle Hydrangeen, kalkfreien Boden. — Ist steht die mir nur aus der Beschreibung bekannte

H. mandarinorum DIELS, in Engl. Jahrb. 1901. 372. von allen asiatischen Arten am nächsten, weicht aber durch die Art der Beh. und die 3 Gr., sowie die beh. C. ab. Sie dürfte sich nach dem Bekanntwerden der Fr. und S. als zu Subsekt. *Petalanthae* der *Japonico-sinenses* gehörig erweisen.

2 × 4 *H. radiata* × *arborescens*: dieser Bastard scheint in europäischen Gärten zu existieren und in zwei Formen aufzutreten, von denen die eine, welche nach dem mir vorliegenden Exempl. von TAUSCH *radiata* näher steht als *H. eradiata* (*H. radiata* × *eradiata* TAUSCH, in Flora 1834. 195; *nana* × *glabrata* TAUSCH, in Herb.) zu bezeichnen wäre, während die *arborescens* ähnlichere *H. reticulata* (*H. rad.* β *reticulata* TAUSCH, l. c. 1834; *H. canescens* K. KOCH, Dendrol. I. 352. 1869) heißen müßte, falls nicht *H. arb.* β *discolor* SER., in DC. Prodr. IV. 14. 1830 sich auf die gleiche Form bezieht. Indes ist es noch nicht sicher, daß hier wirklich Bastarde vorliegen, vielleicht sind beides nur Kulturformen der *radiata*! Von *cinerea* sind sie durch die Beh. gut unterschieden (vgl. Fig. 248n).

Fig. 248. *Hydrangea*: a—c *quercifolia*: a Bl. ohne A, b dgl. ohne C. und Stb., c Fr. — d—f¹ *radiata*: d Haare der B.-Unterseite, e Rand-Bl., f Fr., f¹ S. — g—l *arborescens*: g—h Bl., i Fr., k S., h¹ E., l Haar der B.-Unterseite. — m *cinerea*: vgl. l. — n *radiata*: vgl. l. — o—q¹ *hirta*: o Bl. ohne Stb. und C., p C., p¹ Stb., q Fr., q¹ S. — r—s¹ *scandens* (*virens*): r wie o, r¹ C., r² Stb., s Fr., s¹ S. — t—y *aspera*: t wie o, u C., v Stb., w Fr., x S., y K. einer Rand-Bl. (g—h schwach, d. l—n stark vergr.) (Original).

+ B.-Unters. mehr grau o. hellgraugrün, Haare fein gekörnelt (vgl. Fig. 248m).

3. *H. cinerea*: Habituell wie *radiata* o. *arborescens*, 2—3 m hoch; B. vgl. Fig. 247c, 7—15:4—10 cm, auf der dunkelgrünen Obers. verstr. beh.; Blst. 5—15 cm Dm, wie *radiata* o. auch ohne sterile Bl. wie bei *arborescens*. (Mir nur unvollkommen bekannt).

H. a. SMALL, in Bull. Torr. Club, 1868, 148. — Graue H. — N.-Am. (Miss. bis Tenness. und Georgia) — Hänge der Alleghenies — Blz. VI—VII. — Aus Kultur mir nicht bekannt.

✱✱ B.-Unters. nur auf Nerven beh. und gebartet o. fast kahl.

4. *H. arborescens*: b, bis 3 m hoch. Zw. jung höchstens verstr. beh. o. stets kahl. • rund, hellgraubraun o. rotbräunlich. abblätternd. Kn. kahl, zweifarben, von etwa 4 Sch. locker umgeben: B. 5—10(—14):3—9 cm, vgl. Formen und Fig. 247 d—f, oben tiefgrün, auf Rippe beh., unten • hell- bis blaugraugrün, Stiel 2—5(—8) cm: Blst. 4—10(—18) cm Dm., Bl. weißlich, sterile selten vorh., kaum über 1,5 cm Dm., K. ganzrandig, sonst vgl. Fig. 248 g—l.

Man kann folgende, allerdings durch Übergänge eng verbundene Formen unterscheiden: *f. typica**) (*H. vulgaris* PURSH, Fl. Am. Sept. I, 309, 1814, nec MICHX.; *arborescens* var. *vulgaris* TORR. et GRAY, Flora I, 591, 1840): B. aus rundlicher Basis eifg. (Fig. 247 d); *f. vulgaris* (*H. vulg.* MICHX., Fl. Bor.-Am. I, 268, 1803; *cordata* PURSH, l. c. 1814; var. *cordata* T. et GR., l. c.): B. mit herzfg. Grunde (f); *f. oblonga* T. et GR., l. c.; B. eilänglich, Basis ± stumpfkeilig (e).

H. a. L., Sp. pl. 397, 1753. — Baumartige H. — N.-Am. (New Jersey bis Iowa, Florida, Missouri). Ufergelände, Wälder. Blz. (VI—)VII—X. — Seit langem in Kultur, wohl bis II—III hart. — TORR. et GR. erwähnen, l. c., noch eine Form *sterilis* mit lauter sterilen Bl. Ich sah sie noch nicht.

Sekt. 2. *Japonico-sinenses* [MAXIM., l. c., erweitert], B.-Stiele hfg. kürzer, C. abfällig o. bleibend, Fr. hfg. halboberständig, S. ungeflügelt o. geflügelt, ungestreift (ob immer?).

Subsekt. a. *Petalanthae* MAXIM., l. c., verengert. B.-Stiele im b siehe S. 388 Mittel (wenigstens bei unseren Arten) nicht über 1,5 cm lang. C. bis nach Verstäubung bleibend, Fr. halb- o. • halboberständig, S. ungeflügelt.

⊂ B. (vgl. Fig. 247 g—h) sehr grob gezähnt, kaum o. • plötzlich kurz zugespitzt, sterile Bl. fehlend.

5. *H. hirta*: dicht verzweigter aufrechter b, etwa bis 1,2 m hoch, Zw. • hin- und hergebogen, jung verstr. beh., • violett überlaufen, • kahl, violettbräunlich, rundlich, Kn. braun, Sch. am Grunde der Zw. lange bleibend: B. dünn, 4—5:2,5—4,5 cm, beiders. auf Nerven und Fläche verstr. angedrückt steif beh., oben sattgrün und wenig o. deutlich heller, Stiel 0,5—1,1 cm; Blst. 3—5 cm Dm., beh., gleich den Bl. • blauviolett überlaufen, C. z. T. weißlich, Stf. bläulich, A. gelb; Gr. 2—4, bläulich, sonst vgl. Fig. 248 o—q¹.

H. h. S. et Z., Fl. jap. I, 117, t. 62, 1835 (*Viburnum hirtum* THBG., Fl. jap. 124, 1784). Steifhaarige H. — Japan (Hondo). Bergwälder, bis 1000 m. Schöne, durch das Violettblau der Blst. und die B.-Tracht ausgezeichnete Art, deren Einführung wünschenswert scheint. — Ihr steht nach Angabe des Autors die in China (Kiangsu) gefundene *H. moellendorffii* HANCE, in Journ. of bot. 1874, 177, am nächsten. Sie weicht aber ab durch: sterile Bl. vorh., C. verkehrt-eifg., Fr. fast unterständig, B.-Rand weniger grob gezähnt.

⊂⊂ B. vgl. Fig. 247 i—k) nicht grob gezähnt, allmählich • lang zugespitzt, sterile Bl. vorhanden.

6. *H. scandens* (*H. virens*): aufrechter, dicht rutig verzweigter b, bis über 2 m hoch, Zw. meist • überhängend, jung beh. • kahle, rundlich, bräunlich, graubraun; B. vgl. Formen, zuletzt derbhäutig, oben sattgrün, auf Nerven beh., unters. heller, zuw. fast bläulich, dicht achselbärtig, sonst fast kahl, Stiel 0,3—1,2 cm; Blst. beh., mit etwa 10—20 fertilen und 2 sterilen Bl. an seitlichen behäuterten Krztr. gegen das Zw.-Ende gehäut, Bl. weißlich, sterile 2—4 cm Dm., sonst vgl. Fig. 248 r—s¹.

*) LINNÉ zitiert GRONOVIVS zu *arborescens* und in dessen Werk ist nach TORR. et GRAY diese Form beschrieben.

Man kann unterscheiden: *f. typica*: B. vgl. Fig. 247i, deutl. gezähnt, 2—5:1—2 cm. *f. reinii* [leg REIN, Kiuschiu] B. wie k, bis 7,5:2,8 cm.

H. sc. DC., Prodr. IV. 15. 1830 (*Viburnum sc.* L. F., Suppl. 184. 1781; *Vib. virens* THBG., Fl. jap. 123. 1784; *H. virens* SIEB., in Nov. Act. Leop. XIV. 2. 690. 1829). — Japan (Kiuschiu, Hondo). — Berghänge. — Blz. VI. — Interessante, einföhrungswerte Art. — Ihr, bes. *f. reinii*, steht nahe *H. chinensis* MAXIM., in Mém. Ac. Pétersbg. sér. 7. 1867, 7., aus China (Kwangsi, Kiangsi, Fokien, Formosa). abweichend bes. durch: B. unters. grünlich, Achselbärte schwächer, zuletzt ganz kahl, Grund mehr gleichmäßig keilig zugespitzt, Blst an Lgtr. endständig, reicher blütig, sterile Bl. mehr, aber kleiner, Gr. kürzer, dicker.

Subsekt. b. *Piptopetalae* MAXIM., l. c., B. meist länger gestielt, C. vor Verstäubung abfällig, Fr. unter- o. halboberständig, S. geflügelt.

☞ siehe
S. 390.

☞ B.-Serratur sehr fein und meist ungleich, Zähne fädig vorgezogen, zuweilen nur dem B.-Rand aufgesetzt, Unters. durchaus beh.

- Blst. im Anfang von Involukral-B. umhüllt (Fig. 250b), diese abfällig, Grund dann ohne Laub-B.

Fig. 249. *Hydrangea*. a—d *involucrata*: a ⊙ Zw., b—c Kn. und B.-N., d Zw.-Querschnitt. — e—m *petiolaris* (*scandens*): e—f ⊙ und ⊙ Zw., g—h Kn. auseinandergezogen und im Q.-Schnitt, i—o Bchen, l—o Kn.-Sch., k Zw. mit Haftwurzeln, l—m Zw. im Q.-Schnitt (a—o vgl. Fig. 240r, S. 355). — n *quercifolia*: n = Zw., o Seit. Kn., p dgl., äußere Sch. geöffnet, q Bch. der Kn., r Zw.-Stück, s = d (Orig. nach C. K. SCHNEIDER).

7. *H. involucrata*: dicht ausgebreitet-aufrecht verästelter b. 0,3—0,6 m hoch, Zw. noch + meist dicht grob beh., Haare z. T. gebuschelt o. gegabelt, bräunlich, stark abblätternd, Kn. vgl. Fig. 249a—d; B. vgl. Fig. 247l, 8—22:3—10 cm, auf der sattgrünen Obers. schwächer, auf der hellgraugrünen Unters. stärker + rauh beh., Stiel 3—4,5 cm, beh.; Blst. etwa 8—15 cm Dm., dicht beh., fertile Bl. rosafila, sterile weißlich, 1,2—2—3 cm Dm., sonst vgl. Fig. 250a—e¹.

H. i. SIEB., in Nov. Act. Leop. XIV. 2. 691. 1829. — Hüll-H. — Japan (Hondo). — Schattig feuchte Gebirgstaler. — Blz. VII—IX. — In Kultur noch selten, aber sehr schön, für geschützte Lagen bis Prov. V. — Eine sehr schöne Pflanze sah ich in Wilhelmshöhe.

• • Blst. ohne Involuerum, am Grunde meist von 2 bleibenden B gestützt.

+ Fr. unterständig, sterile Bl. gezähnt*).

8. *H. aspera*: ♂ — ♂ , bis fast 7 m hoch, $\odot$ Zw. dicht fein rauhhaarig, B. derb, breit eilänglich o. breit lanzettlich (Fig. 247m, 10—24; 4—9 cm, oben tief grün, auf Fläche verstr., auf Nerven dichter beh., unters. graugrün, dicht und rauh beh. und papillös (Mikroskop!); Stiel 1,8—3,5 cm; Blst. locker, bis 40 cm Dm., dicht beh., sterile Bl. 3—5 cm Dm., sonst vgl. Fig. 248t—y.

H. a. DON, Prodr. 211. 1825. (*Hortensia aspera* HAMILTON msc., ex DON; *H. vestita* var. *fimbriata* WALL., Cat. 440. β . 1829). — Rauhe H. — Himal. (Sikkim, Kumaon), 2000–2300 m. Nicht echt in Kultur, was als *aspera* geht, gehört wohl sämtlich zum Formenkreis der *heteromalla*. *H. aspera* scheint eine ungemein variable Art (vgl. HEMSLEY, in Journ. Lin. Soc. 1880. 272, und DIELS, in Engl. Jahrb. 1901. 374; indes wäre nur auf Grund eines sehr reichen Materials zu sagen, inwieweit hier nahe verwandte Arten oder Formen vorliegen. Bei *robusta* Hook. f. et Th. in Journ. Lin. Soc. 75. 1858, fand ich keine Papillen; *H. longipes* FRANCH., in Nouv. Arch. Mus. Paris 1880. 227, von HEMSLEY, aus W.-China und *H. rosthornii* DIELS, l. c., aus Zentr.-China, sowie *oblongifolia* BL., Bijdr. 920. 1826, von Java konnte ich nicht untersuchen, ebensowenig die von HEMSLEY, l. c., und DIELS, l. c., neu benannten *aspera*-Formen aus China.

Fig. 250. *Hydrangea*: *a—e*¹ *involucrata*: *a* B.-Randzählung, *b* junger Blst. noch von den Brakteen umschlossen, *c* Bl.-Kn., *d* Bl. ohne C., *d*¹ N., *d*¹ Frkn. im Q.-Schnitt, *e* Fr., *e*¹ S. — *f* *heteromalla (vestita)*: Bl. ohne C. und Stb. — *g—g*¹ *khasiana*: Fr. und S. — *h—l*¹ *bretschneideri*: *h* Rand-Bl., *i* Bl. und Bl.-Kn. und C., *k* Bl. im L.-Schnitt (1 = N., 2 = C., 3 = K., 4 = Frkn., 5 = Sa.), *l* Fr., *l*¹ S. — *m—n* *paniculata*: *m* Fr., *n* S. und E. — *o—t* *opuloides* var. *acuminata*: *o* Bl. ohne und C. Stb., *p* C., *q* Stb., *r* Frkn. im Q.-Schnitt; *s* Fr., *t* S. (Original).

++ Fr. halb oberständig. sterile Bl. ganzrandig.

9. *II. heteromalla (II. vestita)*: b 5, bis 3 m hoch, Zw. jung
 dicht beh., kahl, rundlich, olivbräunlich, Lent. deutlich, an mehr

*) Gezähnte sterile Bl. soll auch *H. pottingeri* PRAIN, in Journ. Asiat. Soc. of Bengal, LXVII, 290, 1898, „in montibus Kachin nuncupatis“, ca. 1000 m (NO-Indien).

grauen. Zw. als Höckerchen hervortretend. Kn. rotbraun, nur zum Teil schon frei (außer den größeren End.-Kn.), sondern als Höcker über der B.-N. sich vorwölbend, diese groß, senkrecht, ohne Kissen; B. vgl. Fig. 247m. 8—24:2,5—9 o. bis 21:12 cm, oben sattgrün, fast nur auf Nerven beh., unten graugrün, dicht weich o. leicht rauh beh., Textur dünn; Stiel 2—6 cm, beh.; Blst. bis 25 cm Dm., locker verästelt, beh., Bl. weißlich, vgl. Fig. 250f. C. und Stb. analog *aspera*. Fr. des Typ mir unbekannt, vgl. aber g—h.

H. h. DON, Prodr. 211. [Febr.] 1825. (*vestita* WALL., Tent. Fl. Nep. t. 49. 1826). Weich behaarte H. Himal. (Bhotan bis Kumaon). 2500—3300 m. Blz. VI—VII. Was ich im HORT. Plantières als *vestita* sammelte, scheint die typ. Pflz. zu sein, hiervon ist die *pubescens* HORT. Darmstadt nicht verschieden. Sie besitzen beiderseits gleichmäßig zugespitzte B., die im Mittel über 2:1 messen. Die in der Flor. brit. Ind. II. 405. 1878 wieder eingezogene *H. khasiana* H. F. et TH. in Journ. Lin. Soc. 1858. 75, besitzt kürzere und breitere, am Grunde gerundete B. Ob in den Bl. und Fr. gute Unterschiede vorliegen, konnte ich aus Mangel an ausreichendem Material nicht feststellen. Im Herb. ZABEL sah ich ein Kulturexemplar, dessen B. an Blzw. bis 12:9 (!) cm maßen. Vielleicht kann man *khasiana* als breitblättrige Varietät abtrennen! Über *pubescens* DCNE., in Flor. d. Serr. 1848. t. 378 79, bin ich noch unklar; es scheint, daß sie mit der typ. Himalaya-Pflz. so gut wie identisch und daß auch *giraldii* DIELS, in Engl. Jahrb. 1901 373, nicht verschieden, denn MAXIMOWICZ' Angabe zu seiner *var. pubescens* [DCNE.], in Mém. Ac. Pétersbg 1867. 10, wonach die K.-Zipfel bei *vestita* länger als die Bl.-Achsen sind, finde ich nicht bestätigt, ist also mindestens schwankend. Glabrate B.-Stiele haben z. T. auch Himalaya-Pfl. Mithin dürften die Expl. aus China (Tschili, Kansu) von *heteromalla* nicht abzutrennen sein. Unklar ist mir noch eine sterile *aspera* HORT. Hann.-Münden, die in Beh. etc. ganz an *vestita* gemahnt, aber eine *bretschneideri*-ähnliche Zähnung zeigt. Es handelt sich aber wohl nur um eine stärker behaarte *bretschneideri*.

○○ B.-Zähnung weniger fein bis grob, mehr vorwärts gerichtet. B.-Unters. nur locker beh. o. ± kahl.

* Fr. (reichlich) halboberständig, Blst. mit Hochb.

+ Blst. nicht pyramidal, B. stets gegst.

10. *H. bretschneideri*: bis etwa 2 m hoher buschiger b. Zw. jung beh., blaurot überlaufen. • kahl, rotbraun, Lent. verstr., abblätternd. Kn. kurz kugelig-eifg., zweifarben, abstehtend; B. vgl. Fig. 251a—b. 6—12:2,3—7 cm, oben bläulich- o. sattgrün, auf Nerven verstr. beh., unten hell blaugraugrün, jung stärker, später sehr locker beh.; Stiel 1—3 cm; Blst. flach o. leicht gewölbt, beh., bis etwa 15 cm Dm., Bl. weißlich, sterile sich rötend, 2—3 cm Dm., sonst vgl. Fig. 250h—l.

H. b. DIPP, Laubholz. III. 321. 1893 (*vestita* var. *pubescens* SARG., in Gard. a. For. 1890. 16, non MAXIM.; *pekinensis* HORT.), N.-China (Ort?). Blz. VI—VII

Nach der Beschreibung kann diese Art nicht mit *pubescens* DCNE. zusammenfallen, sie läßt sich aber mit keiner Art o. Form der Floten von DIELS o. HEMSLEY identifizieren. Jedenfalls steht sie dem Formenkreis der *heteromalla* (vgl. diese) nahe. Sie scheint für Prov. III—IV hart und blüht willig.

++ Blst. pyramidal, B. hfg. gedreit.

11. *H. paniculata*: b. b. in Heimat bis 6:0,18 m, mit dichter kugelig-er Krone. Zw. jung beh., • kahl, rund (Lohden pfeifenrohrartig), braun, aufreißend, graubraun, stärker rissig; Kn. vgl. Fig. 246f—m; B. vgl. Fig. 251c—d. 5—15:2,5—9 cm, oben tiefgrün, zerstr. beh. o.

besitzen. Ihre B. sollen nur auf den Nerven beh. sein. Leider aus den Angaben des Autors nicht zu ersehen, welcher Art diese nächstverwandte ist.

fast kahl, unten hellgrün, auf Flächen verstr., an Nerven dicht borstig. Stiel 0,5—2,5 cm: Blst. bei wilder Form bis etwa 20:12 cm, sterile Bl. bis 3,5 cm Dm., ganzrandig, weißlich, Gr. 2—3, kurz, dick, vgl. Fig. 250 m—n.

Man kann unterscheiden: *var. typica*: spontan, Wuchs baumfg., fertile Bl. ∞ vorh. — *var. minor* MAXIM., l. c., dgl., aber niedriger b , Blst. kleiner. — *var. grandiflora* SIEB., in Ill. Gartenztg. 1866, 81, t. VI (von *hortensis* MAXIM., in Mém. Ac. Pétersbg. 1867, 90). Kulturform, Wuchs üppig, fertile Bl. fast fehl. o. nur sterile vorh., Blst. bis gegen 30 cm hoch.

H. p. SIEB., in Nov. Act. Leop. 1829, 691. — Rispen-H. — Jap. (Kiuschiu, Hondo, Jesso, in Waldungen. Blz. VII—X in Heimat früher). Bekannter harter Zier- b , hfg. als Kronenbäumchen veredelt. Wertvolle Zierpflanze!

Fig. 251. B-Formen: a—m *Hydrangea*: a—b *bretschneideri*. — c—d *paniculata*: c *var. minor*, d *var. grandiflora*. — e—i *opuloides* (*hortensis*): e—f *var. acuminata*, g *var. japonica*, h *var. otaksa*, i *var. serrata*. — k *altissima*. — l *petiolaris* (*scandens*) *var. cordifolia*. — m *integerrima*. — n *Schizophragma hydrangeoides* (alles $\frac{2}{6}$ n. Gr.) (Original).

** Frkn. ganz o. fast unterständig, Blst. ohne Hochb.

12. *H. opuloides* (*H. hortensis*): aufrechter b , bis etwa 2 m; Zw. zuw. von Anfang an. — stets kahl: B. vgl. *var.*: Blst. breit scheindoldig o. gedrungen. — beh., Bl. vgl. *var.*, Gr. 3—7, Fr. vgl. Fig. 250 s.

Von dieser schon im wilden Zustande variablen Art sind durch jahrhundertelange Kultur eine Unzahl Formen herausgebildet worden, die nur sehr schwer sich in ein Bestimmungsschema einordnen lassen. Ich folge im wesentlichen den Angaben von FRANCH. et SAV., Enum. pl. jap. I. 150. 1875.

var. a. acuminata A. GR. | DIPP., Laubholzsk. III. 323. 1863 (*H. a.* S. et Z., Flor. jap. I. 110, t. 56 et 57, Fig. 1. 1835) spontan in Jap. (Kiuschiu, Hondo, Jesso) aufgefunden, B. oben fast nur auf Nerven beh., unten dgl. und gebartet, K.

der sterilen Bl. eifg. o. eielliptisch, Bl. bläulich, variiert in sonnigen Lagen in guten Böden durch kräftigeren gedrungeneren Wuchs, derbere B., größere sterile Bl. (3–4 cm Dm.), an schattigeren Orten durch laxeren Wuchs, dünnere B. und kaum über 2 cm messende sterile Bl., Form der B. vgl. Fig. 251e–f, sonst auch Fig. 250o–t, man kann festhalten *f. typica*: sterile Bl. ganzrandig und *f. buergeri* (S. b. S. et Z., Fl. jap. 111. t. 57. f. 2. 1835) sterile K. $\pm$ gezähnt; hierher gehört nach MAXIMOWICZ z. T. *H. japonica* & *coerulescens* RGL., in Gartenfl. 1866. 290. Ferner sei als rosablütige Form hierher *H. rosalba* VAN HOUTTE, Flor. d. Serr. XVI t. 1649 50. 1866. gestellt, falls sie nicht besser zu ziehen zu *var. b. japonica**) (*H. jap.* SIEB., in Nov. Act. Leop. 1829. 689; *hortensia* *var. jap.* MAXIM., in Mém. Ac. Pétersbg. 1867. 14; diese weicht im wesentlichen nur durch breit eifg., kürzer gespitzte B. (vgl. Fig. 251g) und breit-rhombisch-eifg. sterile K. ab, deren Färbung bald rosa, bald bläulich. Hier kann als *f. typica* die Form mit $\pm$ gezähnten und als *f. belzoni* (*H. belzoni* S. et Z., Fl. jap. I. 109. t. 55. 1835) die Form mit ganzrandigen sterilen K. bezeichnet werden. Spontan in Hondo beobachtet. — *var. c. azisai* [A. GR.] DIPPEL, l. c. (*H. a.* SIEB., l. c.) ausgezeichnet durch lang gestielte sterile Bl.; Stiel mindestens = Bl.-Dm., Bl. bläulich, sterile K. ganzrandig, B. wie *var. japonica*, aber fast ganz kahlend. Wild sehr selten (Jesso). — *var. d. pubescens* [Fr. et SAV., l. c. 151]. Soll vor allem abweichen durch lanzettliche, beiders. angedrückt leicht rauh beh. B.; spontan in feuchten Wäldern der Hakone-Berge aufgetunden. Mit ihr scheint ein mit der Beschreibung in Flor. jap. nicht übereinstimmendes steriles Original Exemplar der *buergeri* S. et Z. identisch, dessen B. bis 9:3 cm messen und kaum 1 cm lange Stiele haben. — *var. e. angustata* [Fr. et SAV., l. c.] soll von *pubescens* durch noch schmalere, vorwiegend nur auf den Nerven beiders. beh. B. abweichen. Tritt ebenfalls auf Hondo spontan auf. — *var. f. otaksa**) [A. GR.] DIPPEL, l. c. erweitert (*H. o.* S. et Z., Fl. jap. I. 104. t. 52. 1835) Kulturform mit nur sterilen Bl. B. (Fig. 251h) etwa wie bei *var. japonica*, K. ganzrandig. Man kann unterscheiden: *f. typica*: B. spärlich beh. Bl. blau und *f. hortensia* (*H. hortensia* HORT. PLUR.) B. ganz kahlend, Bl. rosa. Es ist dies unsere gewöhnliche Gartenhortensie, deren Bl. in spezifischen Erdmischungen auch blau werden. — *var. g. stellata* [MAXIM.] DIPPEL, l. c. 324. (*H. st.* S. et Z., Fl. jap. I. 112. t. 59. 1835) sterile Bl. mit mehrreihigen $\pm$ schmalellipt. K. (gefüllt), rosa oder bläulich. B. beiders. beh. Nach den Autoren (mir ist diese Form nicht genügend bekannt) ließen sich unterscheiden: *f. typica*: Bl. bläulich; *f. rosea*: Bl. rosa; *f. rubro-plena* DIPPEL, l. c., Bl. anfangs weiß rosafarben, später düsterrot; *f. umbrata* DIPPEL, l. c., K. weiß, nach Mitte hochrot, feingefranzt.

Zu dem Formenkreis der *opuloides* dürfte ferner gehören *H. cuspidata* Miq., in Ann. Lugd. Bat. III 98. 1867, deren Identität nach FRANCH et SAV., l. c., mangels Orig.-Expl. nicht sicherzustellen.

H. o. K. KOCH, Dendr. I. 353. 1869) (*Hortensia opul.* LAM., Encycl. III. 136. 1789; *Hydr. hortensis* SM., Ic. pict. I. t. 12. 1792; *H. hortensia* SIEB., in Act. Leop. XIV. 2 688. 1829) Echte Hortensie. Jap. (vgl. *var.*), China (wirklich spontan nur Prov. Kweichou bis Nan-chuan und Ku-shan). Blz. VII–X. Alte bekannte Kulturpfl., die aber nur für Prov. VI–VII in geschützten Lagen als Freilandpfl. gelten kann. Nahe steht ihr *H. lobii* MAXIM., l. c. 15, aus Java, die jedoch von allen Arten dieser Gruppe durch die sämtlich gleichlangen die Gr. nicht überragenden Stb. abweicht. — Zu erwähnen bleibt noch *H. serrata* DC., Prodr. IV. 14. 1830 (*Viburnum serratum* THBG., Flor. jap. 124. 1784; *Hydr. thunbergii* SIEB., l. c. 1829) Weder MAXIMOWICZ, noch FRANCH et SAV. kennen sie. Die Direktion des Rijks-Herbarium in Leyden war so gutig, mir THUNBERS und SIEBOLDS Originale zu senden. Danach scheint es sich um eine Kulturform der *opuloides* zu handeln, die sich etwa *var. e.* anschließt. Die B. messen nur 4:1,8–6:3,5 o. bis 7:3 cm, Grund keilig, Spitze abgesetzt, Zähnung meist nur über Mitte deutlich, gröber o. auch fein (aber entfernt) beiders. auf Nerven beh., auf Fläche kahl o. sehr locker beh.; Blst. bis 6 cm Dm., sterile Bl. ganzrandig, bis 1,8 cm Dm. (was KOEHNE 1893 als *serrata* beschreibt, ist mir unklar)

*) Hiermit scheint *H. opul. var. sinensis* DIPPEL, l. c. 324. zu vereinigen, sie scheint aber auf den Nerven (bes. an Rippe) unters. stärker behaarte B. zu besitzen, die bis 20:12 cm messen. Bl. rosa. Ebenso gehört hierher *H. opul. macrosepala* DIPP., l. c. (*H. jap. mac.* RGL., in Gartenfl. 1866. 290. t. 520).

**) In den Formenkreis dieser *var.* dürfte *H. mandschurica* KOEHNE, Dendr. 187. 1893 (*H. opul. var. cyanoclada* DIPP., l. c.) gehören, die durch violettschwarze $\odot$ Zw. und lebhaft rosafarbene Bl. auffällt. Angeblich aus der Mandschurei stammend.

Subgenus B. *Calyptranthe* MAXIM., l. c. §. B. sommergrün, C. an Spitze mützenfg. zusammenhängend, bei Aufrichtung der 10 o. 15 (20) Stb. abfallend.

○ Stb. 10.

13. *H. anomala* (*H. altissima*): habituell der folgenden sehr ähnlich, Kn. konnte ich noch nicht untersuchen; B. 8—18:4—10 cm, eifg. o. eilanzettlich, zieml. lang gespitzt, aber scharfer gesägt, als bei *petiolaris*, Stiel bis 8 cm lang, bei den oberen B nach HOOKER „often winged and woolly hairy“, Bl. anscheinend ohne Abweichungen von folgender Art, nur daß die Bl.-Kn. gewöhnlich feinspitzig sind und sterile Bl. hfg. ganz fehlen.

H. a. DON, Prodr. 211. 1825 (*H. altissima* WALL., Tent. Fl. Nep. t. 50. 1826).

Himal. (Gurwal bis Bhotan, 1200—3300 m), China (Hupei, Kweitschou). — Mir aus Kultur nur im Herb. ZABEL bekannt geworden. — Nahe verwandt ist *H. hemslleyana* DIELS, l. c. (*H. longipes* HEMSLE., l. c., non FRANCH.) aus China (Hupei, Kansu, Kweitschou), deren B. unters. durchaus beh. sind.

○○ Stb. 15—20.

14. *H. petiolaris* (*H. scandens*): über 5 m hoher schlingender b. Zw. höchstens jung beh., — gelb- o. gelbrotbraun. — Wurzeln schlagend, ohne Lent., — bräunlich, bald abblätternd; Kn. vgl. Fig. 249c m. B. wie Fig. 2511; 5—12:4—10 cm, vgl. *var.*, gewöhnlich nur auf der helleren Unters. — achselbärtig, sonst kahl; Stiel bis 11 cm lang; Blst. bis 25 cm Dm., vgl. Fig. 252k s. sterile K. z. T. gezähnelt.

var. a. ovalifolia FR. et SAV., l. c. 154 (*H. scandens a petiolaris* MAXIM., l. c.), B.-Grund nicht herzfg. — *var. b. cordifolia* FR. et SAV., l. c. (*H. cordifolia* S. et Z., Fl. jap. I. 113. t. 59. f. 2. 1835) B.-Grund herzfg.; hierher auch *H. bracteata* S. et Z., l. c. 176. t. 92.

H. p. S. et Z., l. c. 106. t. 54 (*H. scandens* MAXIM., l. c. 1867, non DC.). Jap. (Kinsehin, Nippon, Jesso). — Wälder — Blz. VII. — Seit langem in Kultur, bis etwa Prov. IV hart.

Subgenus C. *Cornidia* ENGL., in Nat. Pfl. III. 2a. 76. 1890 (RUIZ. et PAV., Fl. peruv. Prodr. 63. t. 35. 1794, als Genus: *Sarcostyles* PRESL. apud DC. Prodr. IV. 15. 1830). Kletterpflanzen wie *Hedera*, B. immergrün, lederig, Blst. end- o. seitenständig, mit Gesamtinvoluerum (ähnlich *H. involucrata* o. Teil-Involuerum für die Partialinfloreszenzen; C. frei, Stb. 8—10, Gyn. —, unterständig. Beschrieben sind 5 Arten), nach dem mir vorliegenden Material dürften aber noch 2 dazu kommen. Sie sind von S.-Chile bis zu den Antillen und Mexiko verbreitet.

15. *H. integerrima*: Zw. jung fein büschelhaarig, später kahle, braunrot-grau; B. vgl. Fig. 251 m, ganzrandig, obers. sehr spärlich beh., unters. heller, nur verstreut beh. o. fast kahl, 5:2—3 bis 11:6 cm; Blst. end- o. seitenständig, mit Teilinvolukren, die kleinen Scheindolden — rispig o. kugeldoldig angeordnet, Achsen ± fein beh., Bl. sämtlich fertil, gelblichweiß, Fr. 2—5-klappig.

H. i. ENGL., in Nat.-Pfl. III. 2a. 76. 1890 (*H. scandens* POEPP., in DC. Prodr. IV. 666. 1830, nec DC.; *Cornid. integerr.* HOOK. et ARN., in HOOK. Bot. Misc. III. 344. 1833) — Chile, auf Felshängen ausgebreitet o. in Gebüsch Bäume bekleidend. — Blz. XII. — Bei uns wohl im Freien noch kaum erprobt.

Gattung 101. *Schizophragma* S. et Z., Fl. jap. I. 58. t. 26. 1835.

Vgl. Art und oben S. 361.

Sch. hydrangeoides: etwas kletternder, bis 1/2 m hoher o. niederliegender b. Zw. jung beh., auch — meist noch — feinzottig, gelb-

*) Ihre korrekte Nomenklatur ist mir noch nicht klar. Die Angaben im Kew-Index und in den Nat.-Pfl. sind nicht genau.

braun, Lent. verstr., schwärzlich-grau, kaum abblätternd, Kn. vgl. 254k o; B (Fig. 251n) bald aus breit ovalem o. herzförmig. Grunde allmählich zugespitzt, bald rundl. eiförmig. und plötzlich zugespitzt, 6–12:4–10 cm, oben tief grün, meist nur jung auf Nerven beh., unten viel heller, auf Nerven beh. und achselbärtig, zuw. fast kahl, Nerven häufig gerötet, Stiel 2–6 cm; Blst. vgl. Fig. 252a, dgl. Bl. und Fr., Kapsel zwischen den Rippen aufspringend.

Fig. 252. a—i *Schizophragma hydrangeoides*: a Blst.; b, b' ein Strahl desselben; c Bl. ohne C.; d, f Stb. von vorn, hinten und seitlich; g (über q) C.; h Fr.; i S. — k—s *Hydrangea petolaris* (H. scandens): k Blst. zur Hälfte; l Strahlenblüte; m (oben links) Bl.-Kn., n sich öffnende, die C. abstoßende Bl.; o offene Bl.; p Stb.; q Fr.; r S.; s wurzelndes Zw.-Stück (a, k nach SIEB. et ZUCC.; b', h, i nach ENGLER, s nach DIPPEL, sonst Original).

Sch. h. S. et Z., l. c. — Echte Spalt- o. Scheinhortensie. — Jap. (Kiutschiu, Hondo, Jesso). — Bergwälder. — Blz. VII. — Bis etwa Prov. IV harter, in den Gärten z. T. als *Cornidia integerrima* gehender b. — In China (Sz'tschwan, Hupei ist noch eine Art bekannt: *Schiz. integrifolia* OLIV., in HOOK., Icon. pl. XX t. 1934, 1890 *hydrang. var. integr.* FRANCH., in Nouv. Arch. Mus. Paris 1885, 226, die jetzt durch VERTIC London in den Handel gebracht wird. Sie weicht im wesentlichen ab durch ganzrandige o. nur gegen die Spitze fein gezähnelte B., die bis 21:15 cm und größere sterile K., die bis 6:4,5 cm messen.

Gattung 102. *Decumaria* L., Sp. pl. ed II. 1663. 1702.

Vgl. oben S. 361 und Art.

D. barbara: niederliegend wurzelnd o. kletternder b. • Zw. hell anliegend kurzhaarig, Außenrinde sehr bald aufreißend und abblätternd, gelbbraun, rundoval, Mk. hohl, Kn. vgl. Fig. 240n—r; B. breit-eiförmig, bis fast eirundl., vgl. Fig. 253, 5–11:3–7 cm, ganzrandig, oben glänzendgrün, kahl, unten wenigstens an Nerven locker

beh., heller: Stiel 1–3 cm: Blst. vgl. a. Bl. gleichartig, weißlich, duftend. Bl.-Achse kreiselfg., mit Frkn. vereint, sonst vgl. b–g. Kapsel zwischen Rippen aufspringend (e–f).

D. b. L., l. c. (*D. radicans* MOENCH, Meth. 17, 1794). — Sternhortensie. — N.-Am. (Virg. bis Flor. und Louisiana) — feuchte Ufer, Gebüsch. — Blz. V–VI. — Kaum in Kultur. Etwa für Prov. VII. — Außer dieser nur noch in China (Hupei, Kweitschou) *D. sinensis* OLIV., in HOOK. Ic. pl. t. 1741. 1888, bekannt. Sie scheint im wesentlichen nur durch „pedicellis strigilloso-pilosulis“ verschieden zu sein, ist mir aber nur aus der Abb., l. c., bekannt.

Fig. 253. *Decumaria barbara*: a Blst.; b Bl.; c dgl. nach Entfernung der C. und Stb.; d Gyn. im Längsschnitt; e Fr.; f Teil einer sich auflösenden (abfasernden) Fr. (a—Rippen, β =S.); g S. (a nach BRITTON et BROWN, b–d, g nach ENGLER, sonst Original).

Unterfamilie c. *Escallonioidae* ENGL., l. c. B. einfach, abwechselnd, oft immergrün. Neb. fehl., Stb. ebensoviel wie C., Frkn. ober- o. unterständig. Sa. ∞ , mehr- o. 2-reihig stehend an den Placenten, selten wenige.

Gattung 104. *Itea* L., Sp. pl. 199. 1753.

Vgl. oben und S. 361. b–h. B. sommer- o. immergrün, drüsig gezähnt o. gekerbt. Bl. klein, ∞ , in end- o. achselständigen, oft sehr verlängerten, aus kleinen Büscheln zusammengesetzten Trauben. Bl.-Achse verkehrt kegelfg. o. glockig, nur am Grunde mit Gyn. verwachsen: C. linealisch, klappig. Gyn. 2-fächrig. Sa. 2-reihig. Gr. zuletzt 2-spaltig. N. 2-lappig. Kapsel mit 2 an der Spitze oft zusammenhängenden Klappen: S. vgl. Sekt.

Sekt. 1. *Sempervirentes* ENGL., l. c. 82. B. immergrün. Sa. ∞ , spindelfg., nach beiden Enden lang zugespitzt.

1. *I. ilicifolia* bis 3 m hoher b–h. Zw. kahl, B. breitelliptisch, beidendig zieml. gleichmäßig stumpf o. am Grunde mehr gerundet, $\angle$ o. ähnlich buchtig stachelzahnig. Lederig, kahl, 6–11:3–6 cm, Seitennerven 5–6, unters. hervortretend. Stiel 0,5–1 cm: Blst. ähnlich c–h, 15–36 cm lang. K. mehr breitreckig, reichlich $\frac{1}{2}$ kürzer als die schmalen, den Stb. gleichlangen C. Gyn. zu $\frac{1}{2}$ oberständig, Fr. ohne K.

I. OLIV., in HOOK. Ic. pl. 1538. 1886. — Hexblattrige Rosmarnweide. China (Hupei, Kweitschou). Diese schöne, mir nur aus der Literatur bekannte Art ist jetzt durch VERTEN in den Handel gebracht. Sie soll das Klima Englands gut aushalten, wäre also für Lagen, wie die Mainau, Heidelberg zu empfehlen.

Ihr ist durch die analogen Blst. nächstverwandt mit *I. nutans* ROYLE, Illustr. Bot. Himal. 226. 1839, aus dem Himal., aber B. bis 14:6 cm, an die noch größer blättrige [bis 20:9,5 cm] *I. macrophylla* WALL., in ROXB. Fl. Ind. II. 419. 1824, erinnernd, die jedoch axilläre, die B. nicht überragende Blst. hat. Ebenfalls axilläre Blst., aber meist kleinere B. [bis etwa 12:5 cm], hat *I. chinensis* Hook. et Arn., Bot. Capt. Beech Voy. 189. t. 39. 1841, deren Typ um Hongkong, Kanton auftritt. Hierzu werden von den Autoren die auf Formosa gefundenen Exemplare gezogen, wie auch die Pflanzen aus den Khasia Bergen, beides, wie ich glaube, mit Unrecht. Diese 3 geographisch so gut geschiedenen Pflanzen weichen vor allem im Laube recht wohl voneinander ab. Bei *chinensis* sensu strict. sind in der Aufsicht (im Schnitt) die Zellen der oberen B.-Epidermis gewunden. Ebenso bei *oldhamii* Typ: leg. OLDHAM, Formosa, Tamsuy, No. 108 und 109, die aber vor allem durch viel gröbere B.-Zählung auffällt. Bei *khasiana* Typ: leg. Hook. f. et Th., Khasia, 1300—2000 m, sind die Zellen der Oberhaut fast geradwandig und die B. in ihrer Zählung analog *chinensis*. Auch in den Bl. scheinen Unterschiede vorzuliegen, auf die ich aber hier nicht eingehen kann*). *I. chinensis* steht nach HEMSLEY dessen *parviflora*, in Ann. of Bot. 1895. 153, nahe, soll aber „folia tenuia papyracea anguste vel oblongo-lanceolata“ besitzen, während die Bl. nur „circiter lineam longi“ sind. Heimat in S.-Formosa.

Fig. 254. *a—d* *Cephaelanthus occidentalis*: *a* = Zw., *b—c* Seit. Kn., bei *e* im Schnitt (*a*, *β* = Kn., *γ* = B.-N.), *d* = Zw.-Querschnitt 1—6 vgl. Fig. 240f. S. 375b. — *e—i* *Itea virginica*: *e* ⊙ Zw., *f—g* Kn., bei *h* im Quer-Schnitt, *i* = *d*. — *j—o* *Schizophragma hydrangeoides*: *k—l* Zw., *n* Kn. (*α* = äußere Sch.), *n* B.-N., *o* = *d* (Orig. nach C. K. SCHNEIDER).

Sekt. 2. *Deciduae* ENGL., l. c. 83. B. dünn, sommergrün, Sa. wenige, eifg., zusammengedrückt, mit glatter, krustiger Schale.

2. *I. virginica*: b, 0,8—2,5 m. aufrecht, dicht buschig verästelt. Zw. jung dichter. — gleich den Kn. nur spärlich beh., kornusrot o.

*) Auch *I. riparia* COLL. et HEMSL., in Journ. Linn. Soc. 1890. 57, gehört der Beschreibung nach hierher und scheint fast nur durch „folia anguste glaberrima, calycis dentes deltoidei vix acuti“ von *nutans* abzuweichen.

*) Die im Index Kew. als echte *Itea* genannten *I. javanica* BL., Bjd. 863. 1820., und *I. umbellata* ROXB., Fl. ind. II. 119. 1824 [et Hort. Bengal. 85. 1824] kenne ich nur aus der Beschreibung. Sie scheinen einem anderen Genus anzugehören und werden auch von ENGLER, l. c., nicht geführt. Allerdings gibt dieser, wie auch CLARKE, in Flor. brit. Ind. II. 409. 1878, bei *macrophylla* auch Java als Heimat an.

grün, glatt, rundlich, Lent. undeutl., Kn. vgl. Fig. 254e—i; B. variabel, bald breit-eielliptisch, etwa 8:4,5 cm, bald mehr wie Fig. 255a, kahl o. unten verstr. beh., Bl. und Frucht wie b—k, Blst. bis 15 cm lang.

I. v. L., Sp. pl. 199. 1753. — Virginische R.; virginia willow. — N.-Am. (N.-Jersey, O.-Penns. bis Flor., WN.-Carol., Labr.). — Feuchte Orte. — Blz. V—VI. — Etwa bis Prov. IV hart, obwohl sie häufig als „empfindlich“ bezeichnet wird! Nach SCHELLE im H. d. D. D. G. hingegen sogar II. — An sie schließt sich an *I. japonica* OLIV., in Journ. Lin. Soc. 1867. 164, aus Jap. mit kaum halb so großen Bl., fein, aber schärfer gesägten B., die bei 5 cm Länge (an Bl. Zw.) etwa 8 Seitenerven besitzen und ziemlich lang gespitzt sind.

Fig. 255. *Itea virginica*: a B.; b Zw. mit Blst.; c—d Bl.; e dgl. im Längsschnitt; f Stb.; g Fr.; h eine Klappe der Kapsel halb geöffnet; i Sa., k dgl. im Längsschnitt (g—k nach ENGLER, b nach Bot. Mag., sonst Original).

Gattung 105. *Escallonia* MUTIS, in L. FIL. Suppl. 21. 1781.

(*Stereoxylon* R. et P., Pl. per. Prodr. 38. t. 13. 1794.)

Vgl. oben S. 331; b, selten ♂. B. einfach, meist winter- o. immergrün, fein gesägt; Blst. beblättert traubig o. deutlich rispig, Bl. von wechselnder Größe und Färbung, Bl.-Achse röhrig, halbkugelig o. kirseltfg., mit Frkn. verwachsen; C. meist lineal spatelig, mit aufrechtem Nagel und absteherender Platte, in Kn. dachig; Discus teils becher- o. krugfg., teils polsterfg., Frkn. 2—3-fächrig, mit 4—6 3-kantigen, bisweilen ganz schmalen, nur oben mit den Scheidewänden zusammenhängenden Placenten, mit ∞ Sa., Kapsel meist trocken, 2—3-fächrig, vom Grunde aus scheidewandspaltig, 2—3 klappig, S. ∞, klein, zusammengedrückt, länglich, oft gekrümmt, mit längsfurchiger, am Grunde oft getranster Schale, E. axil. fast cylindrisch. Etwa 50—60 Arten, vorwiegend im andinen S.-Am., wenige in S.-Brasilien und Argentinien. Außer den genannten erscheinen noch viele versuchswert.

A. C. deutlich spatelig, Bl. röhrig.

1. Discus krugfg. (Fig. 256da), Bl. in beblätterten Rispenraubem.

*) Spez.-Lit.: A. ENGLER, in Linnaea XXXVI. 532. 1869/70 und in Fl. Bras. XIV. 2. 131. 1871; vgl. ferner REICHE, Flora de Chile III. 14. 1902.

1. *E. rubra*: $\varnothing$, 2—4 m; $\odot$ und $\odot$ Zw. rotbräunlich, $\pm$ kantig, fein beh. und jung etwas klebrig; B. wie Fig. 256a o. schmallänglicher, spitzer, 2.5:1—4:5:2 cm, ober- tief-, unters. hellgrün, dort drüsenpunktig, sonst kahl, Stiele $\pm$ beh., 4—8 mm; Bl. rot, Bl.-Achse und Stiele außen $\pm$ bedrüst, sonst vgl. Fig. 256b—d.

E. r. PERS., Ench. I. 235. 1805 (*Stereoxylon rubrum* R. et P., l. c.). — Rotblütige *E.* — Chile (von Prov. Valparaiso bis Llanquihue), Gebirgshänge. — Blz. in Heimat XII—I. — Wohl nur für günstigste Lagen versuchswert. Sehr variabel, so auch mit weißen Bl. (*var. albiflora* HOOK. et ARN., Bot. Misc. III. 342. 1833). REICHE zieht jetzt auch *E. macrantha* HOOK. et ARN., l. c. (mit den Synonymen *E. punctata* DC., Prodr. IV. 3. 1830; *duplicato-serrata* REMY, in GAY Flor. chil.

Fig. 256. *Escallonia*: a—d *rubra*: a B., b Bl., c Stb. und C., d Bl. ohne C. und Stb. im L.-Schnitt (α = Discus). — e—i *montevicensis*: e B., f Bl.-Kn., g Bl. im L.-Schnitt (α = Discus), h Fr., i S. — k—n *philippiana*: k—l B., m Bl., n dgl. im L.-Schnitt. — o—r *virgata*: o B., p Details aus einem Bl.-L.-Schnitt zur Veranschaulichung der Gr.-Größe, q K., r C. (b nach BAILLON, sonst Original).

III. 58. 1847 und *rauhmeri* PHILL., in Anal. Univ. Santiag. Bd. 85. 302. 1894) zu *rubra* als Varietät. Ob mit Recht, lasse ich dahingestellt. *E. macrantha* zeichnet sich durch stärker beh. Zw., breit verkehrt-eifg. B. (1:2.5—6:3—3.5 cm), die beiderseits mindestens auf Rippe beh. und meist ziemlich deutlich doppelt gesägt sind. Bl. allerdings *rubra* sehr ähnlich, aber eher schöner. Gute Abbildung in Flor. d. Serr. VI. 1. 632. — Härter als beide dürfte die nächstverwandte *E. illinita* PREST. Rel. Haenk. II. 49. 1835 39, sem (vgl. Bot. reg. t. 1900), mit eiförmigen bis länglich-lanzettlichen B. (2:0.7—6:2 cm), die ziemlich derblederig, fein einfach drüsig gesägt, oberseits weniger o. kaum, unterseits reichlich drüsenpunktig, aber nicht beh. sind; die Blst. und Bl. sind unscheinbarer, die rosa o. weißlichen C. nur ca. 8 mm lang. PURPUS gibt in Mitt. d. D. D. G. 1869. 98 an, daß *illinita* in Darmstadt unter Schutz ganz gut aushalte. Die im H. d. D. D. G. geführte *pterocladon* HOOK., in Bot. Mag. t. 1827. 1855, gehört auch zu den Arten mit erhöhtem Discus und ist durch geflügelte Zw. ausgezeichnet. Heimat Patagonien.

II. *Discus* polsterfig. (Fig. 256ga). Bl. in deutlichen, kaum beblätterten Rispen.

2. *E. montevidensis*: b, 2—3 m; Zw. nur ganz jung beh., ☉ meist kahl, braunrot, leicht kantig, $\perp$ bedrüst; B. (Fig. 256e) 3,5:1—9:2,3 cm, beiderseits $\perp$ glänzend, unterseits wenig heller, ganz kahl o. auf Rippe unterseits o. beiderseits $\perp$ fein beh., unterseits stets fein drüsenpunktig, Stiel beh., 0,5—1 cm; Bl. weißlichrosa, Bl.-Stiele, -Achsen und K. außen sehr fein beh. und bedrüst; sonst vgl. Fig. 256f—i.

E. m. DC., Prodr. IV. 4. 1830 (*E. floribunda* var. β *montev.* CHAM. et SCHLECHT., in *Linnaea* 1826. 543; *floribunda* RCHB., Hort. bot. t. 202. 1827/30, nec KUNTH). — S.-Brasilien (Minas Geraes) bis Montevideo. — Walder, an Bächen. Blüht an der Riviera im August, als *floribunda* verbreitet. Echte *floribunda* KUNTH, in HUMB. et BONPL., Nov. Gen. III. 297. 1818, aus Columbien bis Peru, weicht vor allem durch nur halbsogroße Bl. (Gr. nur von Kapsellänge) und größere, etwa 8:2,8—10:3,3 cm messende, fast ganzrandige B. ab. — Der *E. montevidensis* steht nahe die *E. organensis* GARD., in Hook., Icon. 514. 1843. Sie weicht ab durch kleinere 3:1,2—6:1,8—2 cm messende deutlicher kerbsägige B. und vor allem durch etwas längere, die Röhre an Länge überragende K.-Zähne. Heimat S.-Brasilien (Serra dos Orgaos).

B. C. eirundlich, Grund kaum genagelt (Fig. 256m, n). Bl. also nicht röhrig.

3. *E. philippiana*: dicht sparrigästiger, bis 1 m hoher b; Zw. kahl, gelbbraun. bedrüst; B. (Fig. 256k—l) kahl o. selten gewimpert (l), ohne Drüsenpunkte, nur Mittelnerv unterseits $\perp$ deutlich. 10—15:3—5 mm; Bl. weißlich (m), einzeln in den B.-Achseln an den Enden kurzer Zw. kurztraubig*) gedrängt. Gr. sehr kurz (n).

E. ph. MAST., in Gard. Chron. 1873. 947 (*virgata* var. *philippiana* ENGL., in *Linnaea* XXXVI. 572. 1869/70; *E. angustifolia* PHIL. in *Linnaea* XXXIII. 85. 1864/65, nec PRESL, *stenophylla* PHIL., in Anal. Univ. Chile 1894. 502). — Chile (Cordill. de Linares). — Blz. in Heimat I. — Härteste in Kultur befindliche Art. Ob sie wirklich mit Recht von *virgata* PERS., Ench. I. 234. 1805 (*Stereox. virg.* R. et P., l. c.) zu trennen, wie es MASTERS tut, ist mir noch fraglich. Ich habe in Fig. 256o—r zum Vergleich Details von *virgata* gegeben. Konstant scheint nur der etwas längere Gr. zu sein, der K. ist auch bei *philippiana* meist feingezähnt und die B. von *virgata* wurden in Kultur gewiß größer. Interessant ist eine Hybride: *philippiana* $\times$ *rubra* = *E. langleyensis* VERR., in Gard. Chron. XXXII. 21. 1902. Nach dem H. d. D. D. G. soll *macrantha* anstatt *rubra* daran beteiligt sein, allein das mir von VERR. gesandte sterile Material zeigt kahle, nur eben bedrüste, etwa 15:8 mm messende B., die von der Beh. der *macrantha* nichts spüren lassen. Bl. sah ich nicht. Sie sollen blaßrosa sein.

Gattung 105. *Ribes***) L., Sp. pl. 200. 1753.

Vgl. oben S. 361 und S. 396. b, B. meist sommergrün, einfach, meist gelappt, in Kn. gefaltet o. gedreht; Bl. traubig, seltener büschelig

*) Nach der Abbildung in Gard. Chron. X. 1878. 109. sind die kultiv. Pflanzen allerdings viel reichblütiger als die spontanen, die ich sah.

**) Spez.-Lit.: Von älterer Literatur sei hier nur erwähnt: SPACH, Hist. végét. VI. 144 ff. 1838; MAXIM., in Bull. Acad. Pétersbg. XIX. 247. 1874, woran sich ENGLER, in Nat.-Pfl. III. 2a. 88. 1890 anschließt, sowie KOPFNE 1903. — In neuester Zeit hat Herr Prof. E. V. JANCZEWSKI in Krakau eine Monographie der Gattung in Angriff genommen. Er war so gütig, mich in weitgehender Weise durch seine Ratschläge zu unterstützen, wofür ich ihm an dieser Stelle verbindlichst danke. Seine Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen und außer einer Hauptübersicht über die Subgenera hat Prof. JANCZEWSKI noch nichts publiziert abgesehen von den Mitteilungen über Hybriden. Ich muß jedenfalls in manchen Punkten, die hier ungeklärt bleiben, auf die kommende Monographie vertrauen. Sollte vor Abschluß meines Werkes noch etwas erscheinen, werde ich im Nachtrage darauf hinweisen.

Auch Herrn Prof. TRELEASE, dem Direktor des Missouri Bot. Garden in N.-Am., bin ich für die Überlassung des Herbarmaterials dieses Gartens zu großem Danke verpflichtet.

o. einzeln. Trgb. vorh., Vorb. hfg. fehlend. o. ²2. Bl.-Achse (Receptaculum verschieden geformt, im unteren Teile mit Frkn. verwachsen, C. 4—5, oft klein und schuppenfg., meist kürzer als K., Stb. 4—5, Theken der A. der Länge nach o. nur zum Teil zusammenhängend, Gyn. einjährig, meist mit 2 seitlichen, selten mit 2 medianen, wandständigen Placenten, meist mit ∞ vielreihig, seltener wenigen, 2-reihig stehenden Sa., Gr. 2. — vereinigt, N. einfach, Fr. verschieden gestaltete Beere, Sa. ∞ , mit äußerer saftiger und innerer krustiger Schale, E. klein, stielrundlich, in fleischigem End. — Artenzahl nach JANCZ. 127.

Bestimmungstabelle für die Subgenera*)

A. B. (und Receptaculum etc.) kahl, beh. o. mit gestielten Drüsenhaaren besetzt (nie sitzende gelbe Drüenschüppchen vorh.).

I. Zw. stets unbewehrt o. (selten) unter den B. 2 feine gepaarte Stacheln.

a) Bl. $\frac{\sigma}{\sigma}$.

1. Kn.-Sch. trocken, die End-Kn. bringt nie Bl.; Fr. saftig, rot (selten schwärzlich), sauer, nie bereift, glatt. I. *Ribes*ia.

2. Kn.-Sch. saftig, grünlich, bräunlich o. rot; die End-Kn. ist zugleich Bl.-Kn.; Fr. meist schwarz, bereift, oft drüsenborstig.

V. *Calobotrya* S. 415.

b) Bl. $\frac{\sigma}{\sigma}$, diözisch, aber rudimentäre σ und $\frac{\sigma}{\sigma}$ Organe stets vorh., so daß Bl. scheinbar $\frac{\sigma}{\sigma}$.

1. Blst. aufrecht abstehend, nur bei *R. fasciculatum* büschelig verkürzt; Kn.-Sch. häutig; mit Ausnahme von *R. fasciculatum* Fr. rot o. gelbrot.

II. *Berisia* S. 405.

2. Blst. $\pm$ hängend, Kn.-Sch. stets saftig, Fr. schwarz.

V. *Calobotrya* S. 415.

II. Zw. stets bewehrt, Stacheln unter B. einzeln o. (meist) zu 3—5.

a) Bl. traubig.

III. *Grossularioides* S. 407.

b) Blst. wenigblütig, scheindoldig.

IV. *Grossularia* S. 408.

B. B. (und meist Receptaculum etc.) mit sitzenden gelben Drüenschüppchen, außerdem $\pm$ beh. o. kahl.

VI. *Coreosma* S. 421.

II S. 405

Subgenus I. *Ribes*ia sensu JANCZ., in Bull. Acad. Sc. Cracovie 1903. Vgl. oben, aufrechte, zuweilen fast kriechende b., Kn. mittelgroß, Sch. derb, — beh.; B. mittel- o. ziemlich groß, abfällig, in Kn. gefaltet, Drüsenhaare vorh., aber nicht klebrig, Blst. stets seitenständig, Trauben zurückgekrümmt o. hängend, Bl. klein o. mittelgroß, Stiele am Grunde des Receptaculums abgegliedert, dieses kahl, Fr. dgl. Etwa 14 Arten**).

S. 403

C. klein (vgl. Fig. 257a und 259e), höchstens $\frac{1}{2}$, so groß, wie K.***), spatelfg., an Spitze abgestutzt o. ausgerandet, Bl. grün, Gr. cylindrisch

*) Wahrscheinlich kommt noch ein VII. Subgenus: *Microsperma* JANCZ., in litt., dazu, dem folgende 4 zentralasiatische Arten, die zu den größten Seltenheiten der Herbarien gehören und nicht in Kultur sind, anzureihen waren. a) Bl. $\frac{\sigma}{\sigma}$: *R. ambiguum* MAXIM., in Bull. Ac. Pétersbg. 1874. 251 (Japan); *R. fargesii* FRANCH., in Bull. Soc. Linn. Paris 1895. 86 (China: Hepey, o. Bl. $\frac{\sigma}{\sigma}$); *R. davidii* FRANCH., in Nouv. Arch. Mus. Paris 2. sér. VIII. 240. 1885 (China: Sz'tschwan, Kweitschou, Hupei) und *R. henryi* FRANCH., in Bull. l. c. 87 (China: Hupei).

**) Außer den erwähnten noch *B. griffithii* HK. F. et THOM., in Journ. Linn. Soc. II. 88. 1858 (Himal. Bhatan, Sikkim); *R. longeracemosum* FRANCH., in Nouv. Arch. Mus. Paris 2. sér. VIII. 238. 1885 (China: Hupei, Sz'tschwan); *R. mandshuricum* KOM., in Act. Hort. Petrop. XXII. 437. 1903 (*multiflorum* var. *mand.* MAXIM., in Bull. Ac. Pétersbg. XIX. 258. 1874. Mandschurie); *R. mupinense* FRANCH., l. c. (Sz'tschwan) und noch etwa 4 neue Arten von JANCZEWSKI, deren Diagnosen noch nicht publiziert sind, und zwar *latifolium* (Japan), *setchuenense*, *soulieanum*, *warszewiczii* (siehe über diese Art das im Nachtrag Gesagte).

***) Ich bezeichne mit K. hier die Kelchabschnitte.

- K.-Becher platt, innen mit 5-eckigem Ringwall, Fig. 259⁷ in c.
- + A.-Hälften durch das breite Konnektiv getrennt (Fig. 259b).

1. *R. vulgare*:
1—2 m hoher, buschiger im Alter schwarzgrau rindiger b, ⊙ Zw. mit feinen Haarresten, hellgrau, rund, ganz schmal flügelig 4-streifig. Kn. vgl. Fig. 269 g—k; B. vgl. Fig. 258 a—b, oberseits sattgrün fast kahl, unterseits mäßig heller, auf Nerven oben auch sonst

Fig. 257. *Ribes*:
a rubrum: Bl. im L.-Schnitt. — *b kochneanum*: Bl. aufgeschnitten und ausgebreitet ohne Gyn. — *c meyeri*: wie *a*. — *d—e urceolatum*: wie *b*. — *f multiflorum*: Bl. im L.-Schnitt (α — Discusdrüsen, β — C., γ — K.), vgl. auch Fig. 261 *—p*. — *g—h orientale*: *g* ♀, *h* ♂ Bl. im L.-Schn. — *i—k glaciale*: wie *g—h*. — *l fasciculatum*: ♂ Bl. im L.-Schn. (*b*, *d—e* nach JANCZEWSKI, sonst Original).

beh., etwa 4—10:8—3 cm, Stiel (1,5—)3—5(—8) cm; Bl. vgl. Fig. 259 a—h. K. gelblichgrün, auf der Fr. ist der pentagonale Discusring noch erkennbar.

R. LAM., Encycl. III 47 1789, non K. Koch (*R. damascenum* JANCZ., in Compt. Rend. Paris 1900 789; *R. rubrum* Auct. plur., nec L.). Popularnamen wie *rubrum*. — I. G. wild?; sonst noch Frankr., Belgien, England. — Blz. IV—V

Frz. VI—VII. Bisher immer mit *rubrum* zusammengeworfen, zuerst von JANCZEWSKI, l. c., genau unterschieden, der später erkannte, daß LAMARCK'S *rubrum* mit seinem *d. macrocarpum* identisch. JANCZEWSKI beschreibt, l. c., auch ein *R. macrocarpum*, das im wesentlichen durch äußerlich gefleckte, stark zurückgenogene K. und tiefer geteilte Gr. sowie in der Tracht abweicht (seignés généraux ent normaux, mais les bractées se portent ordinairement de bords qu'à leur base, parce que les autres terminaux et axillaires avortent). Diese Art wird jetzt nur als var. von *rubrum* betrachtet. Beide Formen sind in erster Linie an der Entstehung der Kultur-Johannisbeeren beteiligt.

Als Hybriden zwischen *rubrum* und anderen Arten führt JANCZEWSKI an:

⁷ JANCZEWSKI führt l. c. 1904 auch ein *R. futurum*, das Ergebnis einer Kreuzung von ♀ *vulgare macrocarpum* × ♂ *warszewiczii* JANCZ. Zur Zeit der Publikation noch Sämling.

1×3 *R. vulgare* $\times$ *rubrum*: *R. houghtonianum* JANCZ., in Bull. Acad. Cracovie 1904, aber Diagnose schon 1901: 296: Hierher die Kultursorten „Houghton Castle“ und „Perle striée“.

1×5 *R. vulgare* $\times$ *petraeum*: *R. gonduini* JANCZ., wie oben: Hierher die Kultursorte „Gonduin rouge“. In den großen Kn. und den Bl. an *petraeum* erinnernd, aber Receptaculum breiter pentagonaler Discusring deutlich, Stielbasis weniger auffällig konisch.

1×6 *R. vulgare* $\times$ *multiflorum*: *R. koehneanum* JANCZ., l. c. 1904, steht in der Form der A. und der Bl. *vulgare* etwas näher, vgl. Fig. 257b, sonst gut die Mitte zwischen den Eltern haltend. KOEHNE fand ihn als *caucasicum* im Hort. Bot. Berlin.

Fig. 258. *Ribes*: B.-Formen: a—b *vulgare*. — c—d *rubrum* (d = subspec. asiaticum). — e—f *petraeum*. — g *meyeri*. — h—i *multiflorum*. — k—l *orientale*. — m—n *alpinum*. — o *glaciale*. — p—q *fasciculatum*. — r *urceolatum*. — s—u *diantha* (alles knapp $\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

++ A.-Hälften zusammenstoßend.

2. *R. triste**): kaum über 0,5 m hoher in der Tracht an *R. floridum* erinnerndes $\mathfrak{H}$, St. niederliegend und wurzelnd, Zw. aufrecht, glatt, bald abblätternd, dann kirschbraun, B. vgl. Fig. 267g, Basis herzig, fast kahl; Blst. klein, schlaff, fast hangend, etwa 12-blutig, Bl. Stiele 2—4mal länger als die kleinen Brakteen, Bl. gerötet, K. fast ründlich, C. klein, keilfg. o. fächerig, auch rot; Gr. sehr kurz, etwa $\frac{1}{2}$ gespalten, Fr. rot, kugelig, säuerlich, sonst vgl. *rubrum*.

R. t. PALL., in Nov. Act. Acad. Pétersbg. X. 378. 1797 (*rubrum* AUCT. AM., non L., *albinervium* MCHX., Fl. Bor.-Am. I. 110. 1803; *propinquum* TURCZ., in Bull. soc. Nat. Mosc. 1840. 70; *rubrum* var. *rubellum* RGL. et TILL., Fl. Ajan. 118, ex MAXIM.; *rubrum* var. *bracteosum* et var. *subglandulosum* MAXIM., in Bull. Acad. Pétersbg. 1874. 261; *fl. sum* HOWELL, Fl. of NW Amer. I. 208. 1898; *in grater* und SUKSD., in Deutsche Bot. Monatschr. XVIII. 86. 1909) Brit. N.-Am. und an-

*) Vgl. JANCZ., in Mém. soc. sc. nat. Cherbourg XXXIII. 341. 1902.

grenzende Teile der Ver. St., Japan, N.- und O.-Sib. — Nach JANCZ. in zwei Formen in Kultur. Infolge der weiten Verbreitung vielfach verkannt und neu beschrieben.

— K.-Becher schüsselfg., innen ohne Ringwall, A.-Hälften zusammenstoßend.

3. *R. rubrum* v. von *vulgare* noch abweichend durch: Bl. zuweilen etwas bewimpert, Ovarien gewölbt (Fig. 257a, Insertion der trockenen Bl. auf der Frucht rund, B. vgl. Fig. 258c—d.

R. r. L., Sp. pl. 200. 1753, non Auct. plur. (*R. lithuanicum* JANCZ., in Compt. Rendus Paris 1900. 589). — Rote Johannisbeere; red currant; groseille commun. — J. G. nur Nord-Deutschl.; sonst noch N.- und O.-Europa, Sib. — Blz. wie *vulgare*. — JANCZEWSKI unterscheidet eine stärker beh. Form mit dunkleren Bl. als *var. pubescens* (Schweden?) und trennt die asiatische Form (Sibirien, Kirgis.-Steppen) als subspec. *asiaticum* an, mit den obriethlichen Angaben: Jungtriebe borstig beh., Traube kurz, Bl. heller, Fr. größer, sehr sauer, hellrot (ob immer?), vgl. B. Fig. 258d.

2 × 5 *R. rubrum* × *petraeum*: in 2 Formen bekannt: 1) *R. pallidum* OTTO et DIETR., in Allg. Gartenztg. 1842. 268 (*R. ciliatum* KIT., apud KANITZ, in Linnaea 1863. 480, non HUMB. et BONPL., vel K. KOCH; *kitaibeli* DOERFL., Herb. Norm. Nr. 4264. 1902) seit Ende des XVIII. Jahrhunderts in den Gärten als rote holländische Johannisbeere *ronge de hollanden* bekannt. Ähnelt im späteren Austreten und der späteren Blz. *petraeum*, ebenso in der Blüte, aber Gr.-Fuß viel weniger auffallend konisch. 2. *holosericeum* OTTO et DIETR., i. e. Kultursorte „Velouté“ der Gärten. Vielleicht an Stelle von *rubrum* *R. warszewiczii* zu setzen.

⊖ C. etwa $\frac{1}{2}$ so groß wie K. o. linealisch, Bl. braunrot o. grünlich, bewimpert.

* Stb. und Gr. nicht hervorragend.

+ Stb. ein wenig tiefer als C. inseriert (Fig. 257c), Gr. cylindrisch, Frkn. ganz unterständig.

4. *R. meyeri*: habituell *petraeum* ähnlicher ♂, ⊙ Zw. braungrau, kahl, ⊙ rissig, schwarzgrau, Kn. klein, verlängert, zugespitzt; B. vgl. Fig. 258g, ober. sattgrün, verstreut angedrückt beh., unterseits wenig heller, auf Nerven borstig beh., 4,5—7,5:4—7 cm, Stiel bis 9 cm, + beh.; Blst. ± kahl, Bl. trichterfg., grünlichpurpurn, Fr. kugelig.

R. m. MAXIM., in Bull. Acad. Pétersbg. 1874. 261 (*himalayense* DCNE., in JACQ. Voy. Bot. 66. t. 77. 1844, nec ROYLE 1839; *atropurpureum* var. β. C. A. MEY., in LILDEB. Fl. alt. I. 268. 1820). Himalaya Kumaon, Kaschmir, Altai, China (nach Autor um Peking). — Im Bot. Garten zu Krakau in Kultur.

++ Stb. in gleicher Höhe mit C. inseriert, Gr. konisch, Frkn. halbunterständig.

5. *R. petraeum*: bis etwa 1 m hoher ♂, ⊙ Zw. fast stets kahl, braungrau mit verstr. Lent., Außenrinde bald abblättern, dann Zw. grau, Äste etwas kirschähnlich mit groben deutlichen Höckerehen, Kn. kegelfg., etwa 8:3 mm, seitlich anliegend, Sch. + gelbrot anliegend beh.; B. (Fig. 258e—f) bis 7—9 cm Q.-Dm., jung beiders., aber unten dichter beh., später ober. dunkelgrün, kahl, unters. wenigstens auf Nerven beh. bleibend, vgl. *var.*, Lappen spitz und geradseitig, Mittellappen meist hervortretend, Stiel 2—5(—9) cm, beh.; Bl. vgl. Fig. 259i—o, Fr. blutrot, sehr sauer.

Nach JANCZEWSKI kann man hierher folgende 4 Arten als Varietäten ziehen: a. *bullatum* (*R. bull.* OTTO et DIETR., in Allg. Gartenztg. 1842. 267) B. mit aufgedunsenem Mesophyll zwischen den Nerven; Pyrenäen und sonstige Gebirge Europas. — b. *carpathicum* (*R. carp.* KIT., ex SCHULTE Östr. Flor. ed. 2. I. 432. 1814) B.

*) In letzter Stunde werde ich durch ein Referat im Bot. Zentralbl. 89. Bd. 67. 1902. auf eine Arbeit von HEDLUND, in Bot. Notis. 1901. 33, aufmerksam, auf die ich Interessenten hinweise.

ebentflächig, aber Traube locker; Karpathen. — *c. biebersteini* (R. *mont.*) BERLAND, in Mém. soc. phys. Genève III 2 1876, 60. B. reichlich beh., Fr. schwarzlich; Kaukasus. — *d. atropurpureum* R. *alp.* p. C. A. MEY., in LEDER Fl. alt. I. 268, 1829. B. ebentflächig, ohne Borsten. Traube kurz, Bl. dunkelpurpurn; Sibirien (z. B. Alataugebirge).

R. p. WULF., in JACQ. Misc. austr. II. 36. 1781. Felsen-Johannisbeere, rock red currant. — L. G. D. Riesengebirge, mähr. Gesenke, Vogesen, Baden (am Felsberg); OU. Gebirge; Sch. Alp., Voralpen, Jura, sonst vgl. var. nach JANCZ auch auf dem Atlasgebirge. — Besonders feuchte Hänge. — Blz. IV—V. — Frz. VI—VII. — Auch an der Bildung von Gartenjohannisbeeren beteiligt. Nicht immer echt in Kultur.

5 × 6 *R. petraeum* × *multiflorum*: *R. urceolatum* TAUSCH, in Flora 1838. 720 (malapl. var. *var.* MAXIM., in Bull. Ac. Pétersbg. 1874 258) habituell und in Blst. und Fr. *multiflorum* ganz analog, aber durch Färbung und Struktur der Bl. [Fig. 257d—e] als Bastard mit *petraeum* sich erweisend.

Fig. 259. *a—h* *R. s. caucasicum*: *a* Bl. von oben, *b* Stb.; *c—e* Bl. im Längsschnitt *ca* K., *β* C.; Ringwulst; *d* Trig., *e* Bl. im L. Schn., *f* Frst.; *g* Sa., *h* del. im Längsschnitt. — *i* *R. p. caucasicum*: Blst., *k* Bl. im Längsschnitt *ca* K., *β* C., *p* kegelig, *ca* Basis, *δ* Stb., *l* K. und Stb. von vorn; *m* Stb. von hinten; *n* C., *Frst.* — *p—u* *R. ibid.*: *p* Bl.; *q* Bl. Stiel mit Trig.; *r* Gyn. und Bl. Achse im Längsschnitt; Blumenkrone *z*, T. *a* K., *β* C., *l* Fr., *g* S. *ca—h* nach BAILLON, *i, o* nach SCHMIDT, sonst Original).

** Stb. und Gr. lang, weit hervorragend, B. vgl. Fig. 258h—i.

6. *R. multiflorum*: wüchsiger, bis fast 2 m hoher b. Zw. jung hellbraun, locker beh., abblätternd, später grau. Kn. verlängert, auffällig größer wie bei anderen *Ribes*: B. bis 9 cm Q.-Dm., Beh. ähnlich *petraeum*, aber bes. unters. reichlicher, Lappen bogig geschweift am Rande und stumpflich, Stiel bis 6,5 cm, beh.: Blst. sehr reichblütig, bis 10 cm lang, vgl. Fig. 261k p. die Schwielen im K. Becher unter den C. *ca* in Fig. 257f sind hier sehr auffällig, Fr. dunkelrot, kahl.

R. m. KIR., in ROEM. et SCHUL. Syst. V 493. 1816, non KUNTH, in HB *caucasicum* HOST, Fl. austr. I 308. 1807; *petraeum* VIS., Fl. Dalm. III. 142. 1852, non ROES.). — Vielblütige Johannisbeere; many flowered red currant. — L. G. nur OU. Kroatien, Dalmatien; sonst noch Sardinien, Ital., Griechenl. — Blz. IV—V; Frz. VI—VII. — Schöne und reichblütige Art.

Subgenus II. *Berisia* SPACH, sensu JANCZ., l. c. — Vgl. oben S. 400, aufrechte b, Kn. mittel- o. zieml. groß, Sch. dünn, trocken (mit Ausnahme von *R. fasciculatum*), B. klein o. mittelgroß, in Kn. gefaltet o. bei *ducantha*-Gruppe gerollt; Drüsenhaare z. T. klebrig. Blst. end- und seitenständig, Bl. klein o. mittelgroß, Frkn. kahl o. $\pm$ drüsig beh., in ♂ Bl. ersetzt durch kurzen, vom Stiel abgegliederten Pedunculus, Fr. rot o. ziegelrot. — Die S. keimen im Gegensatz zu denen der Arten der anderen Subgenera schon im Laufe von 14—30 Tagen. — Etwa 14 Arten*).

III. siehe S. 407.

○ Zw. stets stachellos.

* Blst. - deutlich traubig, 5- bis mehrblütig.

+ Klebrige aromatische gestielte Drüsenhaare an Recept., B. etc. vorh.

Fig. 260. *Ribes*: a--e *grossularia*: a ○ Zw., b Kn. mit Stacheln, c Zw. mit Stacheln auch an Internodien, d Wimperung der Kn.-Sch., e B.-N. — f--l *alpinum*: f ○ Zw., g--h Kn., i=d, k B.-N., l Kztr. — m--r *aureum*: m ○ Zw., n--o Kn., p Teil der beh. Kn.-Sch., q Kztr., r ○ Zw.-Q.-Schnitt (1--6 vgl. Fig. 240 f, S. 375) (Original n. C. K. SCHNEIDER).

7. *R. orientale***): bis etwa 1,8 m hoher, dicht verästelter b, nie bestachelt — junge und • Zw. dicht feinzottig, diese längsaufreißend, hellbraun, später grau. Kn. oval, stumpf, ziemlich groß: B. im Mittel kaum über 3—4 cm lang, Lappen rundlich o. stumpf, vgl. Fig. 258 k—l; Bl. gelblich, vgl. Fig. 257 g—h, in kurzen — aufrechten Trauben, Trgb. den Bl.-Stiel überragend, Fr. rot, $\pm$ borstig.

*) Außer den erwähnten noch: *acuminatum* WALL., Cat. No. 6843. 1832 (*desmopticum* HK. f. et HK., in Journ. Lin. Soc. II. 87. 1858 (Himalaya, Bhutan bis Kaschmir); *maximowiczii* BAT., in Act. Hort. Petrop. XI. 2. 487. 1892 (China: O.-Kansu); *rosthornii* DIELS, in Engl. Bot. Jahrb. XXIX. 378. 1900 (China: S.-Sze'tschwan); sowie *vilmorini* JANCZ., worüber man das im Nachtrag Gesagte vergleichen wolle.

**) Als Varietäten sind hierherzustellen: *R. heterotrichum* C. A. MEY., in LEDEB. Fl. alt. I. 270. 1829 [Altai, Songarei, Turkestan?] und *montanum* BOISS. et HORN. Diag. ser. I. X. 19. 1849 (Persien).

***) Dieser Art nahe stehend, aber bestachelt, ist *R. giraldii* JANCZ., in litt., aus China (Schensi).

R. o. DESF., Hist. arb. II. 88. 1809 (*R. leptostachyum* DCNE., in JACQ., Voy. Bot. t. 76. 1844). — Griechenl., Kl.-As., Libanon, Kaukas., Himal. — Felsige Hänge etc., bis 4000 m. — Blz. V; Frz. VII.

Drüsenhaare nie klebrig, fehlend o. nur vereinzelt auf den Zw., dagegen auf B. oft zahlreich, Recept. kahl o. kurz weich beh.

△ Bl. rötlichbraun, Recept. und K.-Becher meist sehr fein beh.; Kn. klein, verlängert, spitz.

8. *R. glaciale*: 2–4 m hoher, dem *R. alpinum* sehr ähnlicher, ebenso variabler b. B. vgl. Fig. 258o (aber eben variabel!). Blst. mit winzigen kurzgestielten Drüschchen. Bl. vgl. Fig. 257i–k.

R. g. WALL., in ROXB. Fl. Ind. II. 513. 1824. (*R. laciniatum* HK. f. et TH., in Journ. Linn. Soc. II. 87. 1858). — Gletscher-Johannisbeere. — Himalaya (Bhutan bis Kaschmir, bis 4000 m, nicht selten epiphytisch wachsend), Thibet, China (Schenst. Sz'tschwan, Hupei, Yünnan). — Sonst vgl. *alpinum*.

△△ Bl. grünlich, Frkn. und K.-Becher stets kahl, Blst. mit winzigen sitzenden Drüschchen, B. vgl. Fig. 258m–n.

9. *R. alpinum*: vielgestaltiger, bis fast 3 m hoher, locker und z. T. überhängend verzweigter b. (–) Zw. fein, kahl, hellgelbgrau, schwarzgrau, abblätternd, Kn. vgl. Fig. 260f–l. B. wie Fig. 258m–n, aber eben sehr variabel, bis 5 cm lang, kahl (nur mit feinen Drüsenhärenchen); Bl. vgl. Fig. 261a–e, Fr. fade, schleimig.

R. a. L., Sp. pl. 200. 1753. — Alpen-Johannisbeere. — I. G. D. verstreut (Felsen, Wälder); OU. verbreitet, bes. in den Gebirgen; Sch. verbreitet, in Bergwäldern; sonst noch fast ganz Eur. — Blz. IV–VI; Frz. VI–VII. — Auf die Formen gehe ich heute nicht ein. Sie bedürfen noch der Klarstellung. In O.-As. (N.-Corea bis S.-Ussurigebiet) vertreten durch *R. distans* JANCEZ., in litt. (*R. maximowiczii* KOM., in Act. Hort. Petrop. XXII. 443. 1903, non BAR., *maximowiczianum* KOM., l. c. 787. 1904). Vergl. KOMAROW's Angaben.

— Blst. büschelig verkürzt, 2–4(–5)-blütig, Kn.-Sch. krautig.

10. *R. fasciculatum*: aufrechter bis etwa 1,5 m hoher b. (–) Zw. rundlich, sehr fein beh., hellbraun, kirschbraun, rissig, Kn. etwa 4 mm lang, ganz kurz gestielt, Schuppen saftig, locker beschuppt; B. vgl. Fig. 258p–q, bis 6 cm Dm., jung gewimpert und unters. auf Nerven, wie Stiel, beh., später kahlend, Textur zuletzt derbläutig, Stiel zuw. fast von B.-Länge; Bl. vgl. Fig. 257l, gelblich, stark nach Honig duftend, Fr. gelbrot.

R. f. S. et Z., in Abth. Ak. Münch. 1843. 189. — Büschel-Johannisbeere. — Jap., Hondo, Gebusche., Korea, N.-China (Schenst.). — Blz. Ende III–V. — Frz. VII–VIII. — Noch ziemlich selten in Kultur.

Zw. mit unter den B. gepaarten feinen und kleineren verstreuten Stacheln***) besetzt.

11. *R. diacantha*: üppiger, dicht verzweigter, bis etwa 1 m hoher b. Zw. und Kn. vgl. *alpinum*, an den Internodien fehlen die Stacheln htg., zuw. sind auch ältere Pfl. fast stachellos (*ovata* PALL.); B. mit keiliger Basis (Fig. 258s–u) etwa 1,5–4,5:1–1 cm, beiders.

*) Nahe verwandt mit *glaciale* ist *R. luridum* HOOK. f. et TH., l. c., aus Sikkim.

**) Ihm steht zur Seite *R. sardoum* MART., in Bull. Soc. Bot. Ital. 1894. 272, diese in Sardinien endemische Art zeichnet sich durch kleinere B. und drüsige Beh. aus. — Diese Stacheln sind im Gegensatz zu denen der Arten der Subgenera III und IV seitlich zusammengedrückt.

glänzend grün, kahl, dünn: Bl. grünlich, vgl. Fig. 261f—i. Beere gelbrot.

R. d. PALL., It. III. 320. app. 722. No. 79. t. I. f. 2 1776 (*saxatile* PALL., in N. Act. Petrop. X. 376. 1797; *cinnatum* KAR. et KIR., in Bull. Soc. Nat. Mosc. 1841. 426). Zweistachelige Johannisbeere; twin-prickled currant. — Sibir (Altai, Transbaikalien), Sengarei, Mandchurei. — Blz. IV—V. Frz. VII. — Ihr steht nahe *R. pulchellum* TURCZ., in Bull. Soc. Nat. Mosc. 1832. 191. B-Basis rundlich o. herztg., Bl. rotlich. Transbaikalien, Mongolei, China, Schensi, Tschili.

Subgenus III. *Grossularioides* JANCZ., l. c. Niedrige, stachel- IV. s. S. 408. beerähnliche b mit reichbestachelten Zwi., Kn. klein, Schuppen dünn, trocken, Beh. drüsig, aber nicht klebrig, B. vgl. Fig. 262a—b, in Kn. gefaltet, Blst. end- o. seitenständig, Trauben zurückgebogen, B. mittelfarb., Frkn. mit Drüsenborsten besetzt, Fr. dgl., rot o. schwarz. Nur folgende 2 Arten:

C B. vgl. Fig. 262a, Trauben 9- bis mehrblütig, 1—2 cm lang gestielt.

Fig. 261. a—c *R. alpinum*: a Blst.; b & Bl. im Längsschnitt, c dgl. Bl. & Stb.; d Frst., die Früchte sind mit einer kleinen Blüte abgeplattet und nicht mit einem Docht, wie in der Figur, versehen. — e—k *R. cereum*: e Blst.; f C., K. und Stb.; g—n Stb.; o Frst. — p *R. multiflorum*: p Blst.; q Bl. von oben; r dgl. im Längsschnitt, vgl. die bessere Fig. 257 f. n C. und K.; o Stb.; p Frst. — a, c, f. nach SCHMIDT; e—l nach ENGELM.; k, l, p nach LAVALLÉE.

12. *R. lacustre*: schlanktriebiger, bis etwa 80 cm hoher, aufrechter b, gelbgrün, gleich den grauen gewöhnlich sehr reich mit feinen, schwachen, geraden Stacheln besetzt, die unter den B. selten gedreht, meist vierteilig, kräftiger, und ca. 4—7 mm lang sind: B. 3—7 cm Dm., Lappen 5—7, Stiel 2—5 cm: Bl. vgl. Fig. 263a, C. $\frac{1}{2}$ so lang wie K.; Fr. schwarz, vgl. b.

R. l. POIR., in LAM. Encycl. Suppl. II. 856. 1811. — Sumpf-Stachelbeere; swamp gooseberry. — N. Am. Neu Fundl. bis Mass., Pennsylv., Mich., Brit.-Col., Wash., O.-As. (Sachalin, Mandsch. — Sümpfe, feuchte Orte. — Blz. V—VI. Eine interessante Form ist *var. heteroderm* JANCZ., in Bull. Acad. Cracovie 1893, deren B. beiderseits $\pm$ stachelborstig sind.

(C) B. vgl. Fig. 263b. Trauben 3—6—9-blütig, etwa 1 cm lang gestielt.

13. *R. lentum*: reich verzweigter, gedrunken wachsender, kaum über 50 cm hoher, sparriger B., der von *lacustre*, als dessen Varietät er bisher geführt würde, noch abweicht durch: Bl.-Becher schüsselfg., Stbf. gerade, Fr. rot.

R. l. COVILLE et ROSE, in Proc. Biolog. Soc. Washingt. XV. 28. 1902 (*lacustre* var. *molle* GRAY, Bot. Calif. I. 206. 1876, nec *molle* POEPP.; *nubigenum* M. CL., in Erythraea 1894. 80, nec PHIL.; *lacustre* var. *lentum* JONES, in Proc. Cal. Acad. ser. 2. V. 681. 1895; *montigenum* MC CLATCHIE, l. c. 1897. 38; *R. molle* HOWELL, Fl. of NW.-Am. 209. 1898). — Gebirge des westl. N.-Am. (nach HOWELL: on rocky ridges in the mountains of SO.-Oregon bis Calif.).

Fig. 262. *Ribes*: a—b *lacustre*: Bl. im L. Schnitt und Stb., b Fr. — c—g *speciosum*: Blst. mit Trgb. ohne Bl., d Bl., e C., f K., g Bl. im L.-Schnitt (1 = K., 2 = C., 3 = Stb.) — h—l *niveum*: h Stb. und Gr., i C. und K., k Bl., l Fr. — m—n *curvatum*: m Bl.-Stiel und Trgb., n Bl. im L.-Schn. und C. — o—p *amictum*: o Bl. im L.-Schn., p Fr. — q—t *lobbii*: q = o, r C., s K., t Fr. — u *subvestitum*: Fr. — v—w *velutinum*: v Bl. im L.-Schn., w Fr., x—y *leptanthum*, wie v—w. (Original).

wintergrün, in Kn. gefaltet. Drüsenhaare zuw. klebrig, hier und da durch feine Stacheln ersetzt, Blst. end- o. achselständig, Bl. mittelgroß o. zieml. ansehnlich und sehr zierend, zuw. 4-zählig, Stiel sehr kurz, ersetzt durch Pedunculus, der mit Fr. abfällt, A. kahl, selten beh., manchmal pfeilfg., Frkn. kahl, beh. o. drüsig-stachlig. Fr. kahl, beh. o. bestachelt, z. T. eßbar. — Arten etwa 27, fast alle erwähnt.

A. Bl. 4-zählig, C. den K. $\mp$ gleichlang.

14. *R. speciosum*: bis 4 m hoher b mit bis 15 cm dicken Ästen, Zw. anfangs hellgraubraun, später grau, rissig, Stacheln unter den B. gedreht, gerade, kräftig, 1—2 cm lang, die $\pm$ bis sehr reichlichen feinen Stacheln der Internodien 2—3 mm lang, mit Drüsenborsten gemischt; B. vgl. Fig. 263c, 1,5—2,5 : 1,2—2—2,5 cm, derb, halbbimmergrün, kahl, unten kaum heller als oben, Stiel 0,5—2 cm; Bl. vgl. Fig. 262c—g, in 3—5-blütigen, bis 2 cm lang gestielten, überhängenden Blst., lebhaft tiefrot, Fr. dicht drüsenborstig.

R. s. PURSH, Fl. am. sept. II. 731, 1814 (*stamineum* SM., in REES, Cycl. XXX. n. 30. 1815; *fuchsoides* MOC. et SESSE, ex BERL., in Mém. Soc. Phys. Genève 1826. 58). — Fuchsien-Stachelbeere; showy-flowered gooseberry. — California, Oregon. — Wälder, Schluchten. — Blz. VIII. — Eine der schönsten Arten, die aber als Freiland-Pfl. nur für die allersüdlichsten Teile des Gebietes in Betracht kommen kann.

B. Bl. 5-zählig, P. $\frac{1}{4}$ — $\frac{2}{3}$ so lang wie K.

a) Stf. und Gr. beh.

○ Stb. etwa $\frac{1}{2}$ mal länger als K., A. beh.

15. *R. niveum*: bis 2,5 m hoher, aufrechter b , Zw. kahl, ☉ glänzend, kastanienbraun, glatt, ältere grau, rissig, Stacheln nur unter B. zu 1—3, gerade, kräftig, 0,6—1,6 cm lang, Kn. $\pm$ fein beh., etwa 5 mm lang, locker beschuppt, aufrecht abstehend; B. vgl. Fig. 263d—e, etwa 1,5—4,5 : 2—5 cm, jung beiders. $\pm$ verstr. fein beh., später hfg. bis auf Achselbärte unten kahl, beiders. gleichgrün, Stiel 1—4 cm, beh.; Blst. meist 2—3-blütig, Bl. vgl. Fig. 262h—l, 1—1,5 cm lang gestielt, weiß, in k sind die Stb. eigentlich wie bei n. Fr. 8—10 mm Dm., blauschwarz, bereift.

R. n. LDL., Bot. Reg. t. 1692. 1835. — Weiße Stachelbeere; snowy flowered gooseberry. — N.-Am. (Wash., Idaho, Oregon). — Blz. V.

15×28 *R. niveum* × *divaricatum*: *R. succirubrum* ZABEL, im H. d. D. D. G. 137. 1903. Dieser interessante Bastard wurde von ZABEL in mehreren Formen erzogen, deren Originale Herr ZABEL so freundlich war, mir zur Ansicht zu senden. Wenn ich nicht irre, werden die eben in Druck befindlichen Mitt. d. D. D. G. 1904 eine nähere Beschreibung aus ZABELS Feder bringen.

○○ Stb. knapp so lang wie K., A. kahl.

16. *R. curvatum**): locker verzweigter, 0,5—0,8 m hoher b , Zw. kahl, ☉ lebhaft purpurbraun, glatt, kantig, später grau, antreibend, Stacheln nur unter B. meist zu 3, zweifarben, mittlerer bis 9 mm lang, gerade; B. vgl. Fig. 263f., 1—2 cm Dm., beiders. zieml. gleichgrün und $\pm$ verstr. (bes. unters.) fein beh. und gewimpert, Stiele dgl., etwa 1—2 cm lang; Blst. meist 1-blütig, 7—8 mm lang gestielt, Bl. vgl. Fig. 262m—n, weißlich, K. zurückgeschlagen, Fr. kugelig, 6—8 mm Dm., von Bl.-Rest gekrönt.

R. c. SMALL, in Bull. Torrey Bot. Club. XXIII. 1896. 295. — N.-Am. (Georgia, Alabama) an trockenen, steinigen Gebirgshängen. — Blz. IV. — Nach JANCZEWSKI bei VILMORIN und in Krakau in Kultur.

b) Stbf. und Gr. kahl, o. nur Gr. beh.

a) Stbf. und Gr., sowie K.-Becher innen kahl (nur bei *cynobati* beh., diese Art daher richtiger neben *scetosum* zu stellen).

*) Beschreibung zumeist nach SMALL, Fl. south-east. States 511. 1903.

○ A. pfeilfg., B. Fig. 263 g -h.

Recept. und Fr. stets bestachelt und drüsenborstig. Bl. lebhaft gefärbt, Fr. 1.5—2 cm lang.

17. *R. amictum*: 0,6—1,2 m hoher, sparrig verästelter ♂ , $\odot$ und $\odot\odot$ Zw. gelbbraun, kahle, zuletzt aufreißend. Stacheln nur unter B, 1—3, etwa 1 cm, auch fehlend; B. vgl. 263 g, kaum über 3 cm Dm., beiderseits beh. o. kahle; Blst meist 1-blutig, kaum 1 cm lang gestielt, Trgb. breit, länger als der kurze Bl.-Stiel, Bl. ziemlich groß, purpurrot, vgl. Fig. 262 o, Fr. wie p.

Bei var. *cruentum* JANCZ., in litt. (*R. cruentum* GREENE, in Pittonia IV. 35. 1899) sind die Bl. kahle, also nicht beh., aber sonst wie bei Typ bestachelt.

Fig. 263. *Ribes*: B.-Formen: a lacustre. — b lentum. — c speciosum. — d-e niveum. — f curvatum. — g amictum. — h menziesii. — i lobbii. — k-l cynosbati. — m leptanthum. — n velutinum. — o stenocarpum. — p setosum. — q-r grossularia (alles 2_{a} u. Gr.) (Original).

R. a. GREENE, in Pittonia I. 69. 1887. — N.-Am. (SW.-Oregon und angrenzendes Calif. — Felsige Hänge — Blz V. — Frz VII. — Dem *amictum* steht nahe *R. californicum* Hook et ARN., in Bot Capt Beech. Voy 346 1841. Es

*) Man vgl. über diese Art und *R. occidentale* HK. et ARN., l. c., das, was HELLER, in Mullerbergia I. 87. 1904, sagt. JANCZEWSKI hält vorläufig nur an dem Namen *occidentale* fest. — Nahe verwandt ist ferner *R. hesperium* Mc CL., in Layton II. 79. 1894. Calif. (San Gabriel Mts.).

besitzt unscheinbare, grünliche o. rotangelautene Bl. und ähnliche, nur meist kleinere, eher tiefer eingeschnittene B., Trgb. im Gegensatz zu *amatum* bleibend. *R. amatum* steht ferner sehr nahe *R. wilsonianum* GREENE, in Erythea III. 79. 1895, das wohl nur als Varietät davon aufzufassen. Calif.: mountains of Kern.

✱✱ Recept. und Fr. hfg. nur drüsenborstig, Drüsen etwas klebrig, aromatisch, Bl.-Farbe trüb, Fr. kleiner.

18. *R. menziesii**): starkwüchsiger b, Zw. beh., drüsenborstig und außerdem mit ∞ Internodialstacheln besetzt. Stacheln sonst meist 3, bis 2 cm, ziemlich schlank; B. vgl. Fig. 263 h, besonders unterseits reich beh. und drüsenborstig, oberseits hfg. ziemlich kahlend; Blst. 1–2-blütig, bis 2 cm lang gestielt, Bl.-Stiele etwa doppelt so lang wie Trgb., Bl. trübpurpurn, C. weiblich, Becher röhrig, deutlich länger als breit, Fr. wie Fig. 262 u.

R. m. PURSH, Fl. am sept. II. 732. 1814. Calif. Blz. IV–V. Frz. VII. — Wohl nur als Var. von *menziesii* ist aufzufassen: *R. subvestitum* HK. et ARN., in Bot. Beech. Voy. 346. 1841. Es wurde die Formen mit klebrig behaarten B. und stachellosen Fr. darstellen, während das typ. *menziesii* kaum klebrige B. und stachelige Fr. hat. Allein GREENE sagt, perhaps confluent with the preceding *subvestitum*, though the typical forms of the two appear abundantly distinct. — Dem *subvestitum* steht nahe *R. victoris* GREENE, in Pittonia I. 224. 1888, aus Calif., hier ist Bl.-Becher kaum länger als breit.

○○ A. an Spitze gerundet, B. vgl. Fig. 263 i–o.

• Recept. und K. Becher außen mit einfachen o. Drüsenhaaren o. ✱✱ S. 413. Stacheln (selten Recept. kahl).

+ Stb. etwa 2mal so lang wie C., A. auf Rücken drüsig, Recept. drüsig.

19. *R. lobbii*: aufrechter, ausgebreitet verästelter, bis etwa 1,8 m hoher b, Zw. fein beh. und drüsig, jüngere gelbbraun, älter grau, längsrissig, Stacheln zu 1–3(–4) unter den B., gelbbraun, gerade, längste 0,9–1,7 cm; B. vgl. Fig. 263 i, unters. gleich den Stielen — wie Zw. beh., obers. fast kahl, gelbgraugrün, 1–2 3,5 cm Dm., Stiele bis 3 cm lang, Blst. meist 1–2, seltener bis 3 blütig, Bl. und A. schön purpurviolett, vgl. Fig. 262 q–s, Fr. wie t.

R. l. GRAY, in Am. Natural. 1874. 276. — Lobbs Stachelbeere. WN-Am (Calif., Wash., Oreg., Van Couver). — Blz. V–VI.

++ Stb. so lang o. kaum länger als C.

△ Recept. und Fr. ± stachelborstig, außerdem beh. o. fein drüsenborstig (K.-Becher innen und Griffel behaart).

20. *R. cynosbati*): bis etwa 1 m hoher, aufrecht o. ausgebreitet verästelter b, Zw. jung beh., gelbgrau, ältere unter der sich ablösenden weißgrauen Oberhaut — kirschbraun, Stacheln meist einzeln, oder auch zu 3 unter den B., 0,5–1 cm, gerade, schwarzbraun, Stachelborsten auf den Internodien fein und wenige o. fehlend, selten ∞ , vgl. var.; B. vgl. Fig. 263 k–l, hfg. etwas graugrün, 3–5 cm Dm., ± weich beh., bes. unters., Stiel 1,5–4 cm; Bl. und Fr. vgl. Fig. 264 a–g' — P. weiß, K. blaßgrünlich.

) Als Form ist zu betrachten *R. amarum* MC CL., in Erythea II. 79. 1894. Calif. (San Gabriel Mts.).

**) Das asiatische Gegenstück ist *R. burejense* FR. SCHMIDT, Reisen Amurland. 42. 1868, im Amurgebiet, Fr. stachelborstig.

*** Die von SCHMIDT übernommene Darstellung ist nicht genau. In α müssen die B.-Becher weiter gedacht werden, die Bl. in B. zeigt den kontrahierten Zustand nach der Anthese.

R. c. L., Sp. pl. 202. 1753. — Cynosbati-Stachelbeere; dog-berry. — N.-Am. New-Braunschweig, südl. bis N.-Carol., westl. bis Manitoba, Miss. — Blz. IV—VI.

Dieser seit langem kultivierten Art schließt sich eng an *R. watsonianum* KOHL., Dendrol. 197. 1893 (*ambiguum* WATS., in Proc. Calif. Acad. XVIII 193. 1883, nec MAXIM.) aus Washington und N.-Calif. at high altitudes, abweichend durch: Bl. mittlgroß, Becher kurz, kahl, K. 3—4mal länger, Gr. kahl, Fr. stachelborstiger.

Ferner sei hier, da neuerdings ebenfalls in Kultur gekommen, erwähnt: *R. pinetorum* GRENE, in Bot. Gaz. V. 157. 1886. Bl. orange, Becher etwas länger als breit, innen kahl, K. zurückgeschlagen, C. so lang wie diese, Gr. kahl, Fr. stachelborstig. Wenn ich Material erhalte, komme ich im Nachtrag auf diese Art zurück.

Fig. 264. *a—g²* *Ribes cynosbati* (vgl. das im Text Gesagte): *a* Blst., *b* Bl.; *c* Stb.; *d* Gr.; *e* K.; *f* C.; *g* Fr.; *g¹* S., *g²* dgl. im Längsschnitt. — *h—l* *R. grossularia*: *h* Bl. im Längsschnitt; *i* Bl.-Achse mit tief gespaltenem Gr., einem C. und Stb.; *k* Frst. mit borstenlosen Fr.; *l* drüsig-borstige Fr. — *m—t* *R. nigrum*: *m* (vgl. Text S. 421); *n* K.; *o* C.; *p* Fr.; *q—r* S. von verschied. Seit.; *s* junges B. mit scheidig. B.-Stiel; *t* Stück des B.-Unterseite mit Drüsenpunkten (*a—b*, *g*, *k—l* nach SCHMIDT, sonst Original).

20 × 25 *R. cynosbati* × *grossularia*: Ueber diese in Amerika gezüchtete als „Mountain Goosberry“ kultivierte Hybride wolle man den Nachtrag vergleichen.

△△ Recept. und Fr. nicht stachelig, höchstens beh. o. fein drüsenborstig.

21. *R. leptanthum**): Wuchs sparrig, dichtästig, Höhe bis 1,3 m, Zw. fein beh., gelbgrün später hellgrün, rissig Stacheln zu 1—3 unter B., hellgelbbraun, spitz, zuw. leicht gebogen, C. 8—13 cm; B. vgl. Fig. 264m, bis 2,5 cm Dm., graugrün, beiderseits gleich dem bis 2,5 cm langen Stiel feinzottig; Blst. 1—3 blutig, sehr kurz gestielt, Bl. vgl. Fig. 262x, weißlich, Fr. wie *y*, kahl o. nur verstr. beh., rot o. schwärzlich.

* *R. l.* GRAY, in Mem. Am. Ac. N. S. IV 33. 1849. — Schlankblütige Stachelbeere. — Gebirge WN.-Am. (Calif., Col., Utah.). — Blz. IV—V. — Frz. VII. —

*) Nahe steht dieser Art *R. microphyllum* KUNTH, in H. B. Nov. Gen. VI. 62. 1823, aus Mexiko.

In neuester Zeit eingeführt. Ihm steht nahe *R. velutinum* GREENE, in Bull. Cal. Acad. I. 85. 1885 (on dry hills at the southern base of the Siskiyou Mountains), Bl. wie Fig. 262v, Fr. wie w, also dicht und fein drüsig beh., B. wie Fig. 263n.

✱✱ Recept. und K.-Becher außen kahl.

+ Stacheln unter den B. (1—)3. sehr kräftig, bis 2,2 cm lang, braun, Recept. und Fr. längl.-elliptisch (Fig. 265a—b).

22. *R. stenocarpum*: dicht verzweigter, sparriger, aufrechter, bis etwa 1,5 m hoher b , $\odot$ Zw. heller o. dunkler braun, fein beh., $\pm$ kantig, grau, schwach rissig: B. vgl. Fig. 263o, etwa 2—5 cm Dm., beiders. , unten stärker, locker beh., oben tiefgrün, unten heller. Textur zuletzt zieml. derb; Bl. meist einzeln, blaßgrün, Fr. sauer.

R. s. MAX., in Bull. Ac. Pétersbg. 1881. 475. — Schmalfrüchtige Stachelbeere. — China (Kansu). — Blz. V. — Frz. VII. — Von den asiatischen Arten dieser Gruppe steht ihm zunächst *R. grossularioides* MAXIM., in Bull. Acad. Pétersbourg, 1874. 250. aus Japan (Hondo). Fr. eirundlich, stachellos.

++ Stacheln unter den B. bis zu 7, fein, 0,5—0,8 cm lang. Recept. und Fr. rundlich, vgl. Fig. 264c.

23. *R. aciculare**): Tracht etc. von *R. grossularia*, Internodialstacheln $\pm \infty$, Fr. glatt o. drüsenborstig, gelblich o. rötlich.

R. a. SM., in REES Cycl. XXX. n. 25. 1815. — Nadel-Stachelbeere. — NO.-Asien (Sajan, Altai, Alatau, Thian-Schan, Tarbagatai), Gebirge. — Blz. etc. wie *grossularia*.

β) K.-Becher innen und Gr. beh. (vgl. aber auch 20. *R. cynosbati*).

Stb. so lang o. doppelt so lang wie C., jedenfalls viel kürzer als K.

✱ Stb. nach Anthese nur so lang wie C., Recept. und Fr. kahl.

24. *R. setosum*, niedriger b , Internodialstacheln ∞ , Stacheln unter B. 1—3, schwach: B. vgl. Fig. 263p, beh.; Blst. 2—3 blütig, Bl. vgl. Fig. 265f, weiß o. etwas rosa, Fr. schwarz, glatt (o. nach LDL. borstig).

R. s. LDL., in Bot. Reg. t. 1237. 1829. — Borsten-Stachelbeere; bristly-stemmed gooseberry. — NW. Am. (Nebraska, Dakota, Wyoming). — Blz. V. — Frz. VII. — Nach Beschreibung bei HOWELL scheint mir *cognatum* GREENE, in Pittonia III. 115. 1896, mit dieser Art identisch. Danach soll der b 0,9—3 m hoch werden. Eine Var. dürfte sein *R. aridum* GREENE, in Pittonia IV, 35. 1899. Calif. (near Caliente, Kern County).

✱✱ Stb. nach Anthese etwa doppelt so lang wie C., Recept. und Fr. meist beh. o. drüsenborstig.

25. *R. grossularia*: buschiger, bis 1,5 m hoher b , $\cdot$ Zw. weißgrau, staubig beh., graubräunlich, stark abblätternd, Kn. vgl. Fig. 260a—e, Internodialstacheln meist fehlend: B. wie Fig. 263q—r, unterseits meist beh., Blst. 1—3-blütig, kaum bis 1 cm lang gestielt, Bl. grünlich o. etwas purpurn überlaufen, vgl. Fig. 264h—i und var.

var. **a.** *glanduloso-setosum* W. KOCH (LINNÉ's Typ), Syn. Flor. Germ. 265. 1857. Recept. und Fr. drüsenborstig (L. G. nur Sch. und OC., aber viel seltener als b, sonst noch Frankr., Schweden, Polen, Genua, Balkan). — **b.** *uva-crispa* SM. Engl. Fl. II. 333. 1824. (*R. uva-crispa* L., Sp. pl. 201. 1753; var. *pubescens* W. KOCH, l. c.) Recept. und Fr. nur beh., nicht borstig (L. G. durchweg $\pm$ verbreitet, ferner N.-Eur., sowie nach JANCZEWSKI auf dem Atlas-Gebirge). — **c.** *reclinatum* BERL., apud LOUD. Arbor. III. 972. 1844 (*R. reclinatum* L., l. c.; var. *glabrum* W. KOCH, l. c.) Recept., Fr. (und B.) kahl (Kaukasus, Span. [Sierra Nevada]).

R. g. L., Sp. pl. 201. 1753. — Gemeine Stachelbeere; common gooseberry; grossulaire commune. — Verbreitung vgl. Var. — Blz. IV—V. — Frz. (VI—)VII.

*) Dieser Art ist verwandt *R. alpestre* DCNE., in JACQ. Voy. bot. 64. t. 75. 1844, aus dem NW.-Himal. Es hat aber sehr starke Stacheln und saure Fr.

— Seit Alters in Kultur. Zahllose Sorten, die natürlich hier nicht behandelt werden können.

24 — 34 *R. grossularia* × *sanguineum*: *R. fontenayense* JANCZ., in litt. — Siehe Nachtrag.

24 × 43 *R. grossularia* × *nigrum*: *culverwelli* MCFARL., The Structure of Certain New Hybrids, ex Gard Chron. XXVIII. 7. 1900 (schmaler); MAURER, ex KOEHNE in Gartenfl. 1902. 409). Diese botanisch hochinteressante Hybride wurde bereits 1883, in Gard Chron. ser 2 XIX. 635, von J. W. CULVERWELL beschrieben. Sie stellt im wesentlichen eine stachellose *grossularia* dar, deren B. aber unters. vereinzelt *nigrum*-Drüsen zeigen, deren Gr. nur wenige Haare trägt und deren K.-Becher innen kahl ist. Die schwarzroten fein beh. Fr. sind etwa 8 mm lang und entbehren der S.

○○ Stb. so lang o. länger als K.

* Becher ± glockig-röhrig, vgl. Fig. 265d—e.

K.-Becher breitglockig-röhrig (becherfg.). Stb. kürzer o. kaum länger als K.

26. *R. oxyacanthoides*: Tracht wie *grossularia*. Zw. kahl, hellgelbgrau mit o. ohne Internodialstacheln, unter der abblättrnden Rinde kirschbraun, Stacheln unter B. meist einfach, kurz, kaum 1 cm.

Fig. 265. *Ribes* (Bl. immer im Längsschnitt): a—b *stenocarpum*: Bl. und Fr. — c *aciculare*: Bl. — d—d' *oxyacanthoides*: Bl. und Fr. — e *rotundifolium*: Bl. — f *setosum*: Bl. — g—h *divaricatum*: Bl. und Fr. — i *gracile*: Bl. — k—l *aureum*: Bl. und Fr. — m—n *malvaceum*: Bl. und Fr. — o *glutinosum*: Bl. und Trgb. — p *sanguineum*: Bl. — q *viscosissimum*: Bl. und Trgb. — r *variegatum* (*mogollonicum*): Bl. — s *nevadense*: Bl. — t—u *cereum*: Bl. und Trgb. — v—w *inebrians*: Bl. und Trgb. (Original).

o. fehlend; B. vgl. Fig. 266a, $\pm$ beh. o. kahl; etwa 2,5—4 cm Q.-Dm.; Blst. 1—3-blütig, sitzend o. $\pm$ gestielt, Bl. vgl. Fig. 265d, grünlich gelb, zuweilen $\mp$ rot überlaufen; Fr. wie d¹, rotpurpurn.

R. o. L., Sp. pl. 201. 1753 (*R. hirtellum* MICHX., Fl. Bor.-Am. I. 111. 1803; *R. irriguum* DOUGL., in Trans. Hort. Soc. VII. 516. 1830.) — Weißdorn-Stachelbeere; hawthorn gooseberry. — N.-Am., von Labrador und Neufundland bis N.-Jersey und dann durch die nördlichen Verein. Staaten bis Oregon, N.-Calif., Brit.-Col. — Feuchte Gehölze, Flußufer. — Blz. V. — Frz. VII. — Variabler $\wp$, geht oft unter den angegebenen Synonymen!

+ $\frac{1}{2}$ K.-Becher deutlicher röhrig, Stb. die K. weit überragend.

27. *R. rotundifolium*: vgl. *gracile*, von diesem noch durch die zurückgeschlagenen K. abweichend; B. wie Fig. 266b und Bl. wie Fig. 265e.

R. r. MICHX., Fl. Bor.-Am. I. 110. 1803, non AUCT. AL. (*R. missouriense* NUTT., ex TORR. et GR., Fl. N.-Am. I. 548. 1840). — Rundblättrige Stachelbeere; eastern wild gooseberry. — N.-Am. (Missouri, Indiana, Illinois, Virginia). — Steinige bewaldete Hänge.

✱✱ K.-Becher kegel- o. trichterfg. (vgl. Fig. 265g—i).

+ K. zurückgeschlagen, Stacheln meist kräftig, bis 2 cm lang.

28. *R. divaricatum*: 0,9—3,5 m hoher $\wp$, Bestachelung an starken Trieben ähnlich *oxyacanthoides*, meist aber Stacheln kräftiger, 1—3. nach abwärts gerichtet; B. vgl. Fig. 266c; Blst. 2—6(—9)-blütig, $\frac{1}{2}$ lang gestielt, Bl. grünlich, $\frac{1}{2}$ rot überlaufen, vgl. Fig. 265g, Fr. klein, schwärzlich (h).

R. d. DOUGL., in Trans. Hort. Soc. VII. 515. 1830. — Sparrige Stachelbeere. — NW.-Am. (Wash., Oreg., Calif., Van-Couver; ob Colorado?) — Blz. V. — Frz. VII. — Vielfach verkannte Art.

++ K. nie zurückgeschlagen, nur trichterfg. o. ausgebreitet, Stacheln schwach.

29. *R. gracile*: habituell *oxyacanthoides* sehr ähnlicher, bis etwa 1,5 m hoher $\wp$, ☉ Zw. hellgelbgrau, $\frac{1}{2}$ kahl, ☉ grau, unter der sich allmählich ablösenden Außenrinde kirschbraun, Stacheln unter den B. meist einzeln und schwach, kaum über 1 mm lang, seltener kräftig und braunrot, bis 12 mm. Internodialstacheln nicht vorh.; B. vgl. Fig. 266d, bis 3,5 cm Dm., Lappen meist länger und spitzlicher als bei *rotundifolium*, gewimpert und unten $\mp$ achselbärtig, sonst meist kahl, Stiele 0,5—2 cm; Blst. meist 2-blütig, 0,2—0,6 cm lang gestielt, (wenn 3-blütig = *R. triflorum*), Bl. (Fig. 265i) grünlich-purpurn, Fr. purpurn, 6—8 mm Dm.

R. g. MICHX., Fl. bor. am. I. 111. 1803 (*triflorum* WILLD., Hort. Berol. t. 61. 1840; *villosum* NUTT., in TORR. et GR. Gen. northam. pl. I. 547. 1840; *rotundifolium* AUCT. PLUR. non MICHX.). — Zierliche Stachelbeere; slender gooseberry. N.-Am. (Michigan! Kansas, Minnesota, Nebraska, Indiana und wohl noch weiter verbreitet). — Trockene, steinige Böden. — Blz. V. — Frz. VII.

Subgenus V. *Calobotrya* sensu JANCZ., l. c. — aufrechte o. niedrige, VI s. S. 421 zum Teil fast kriechende $\wp$, Kn. mittelgroß bis groß, Seh. häutig; B. von wechselnder Größe, sommer- o. immergrün, in Kn. gefaltet o. eingerollt; Drüsenhaare meist klebrig, oft aromatisch; Blst. end- o. seitenständig, zuw. an kurzen diesjährigen Trieben, Trauben normal, — aufrecht o. zurückgebogen, o. doldig-verkürzt, zuw. Einzelbluten; Bl. sehr verschieden groß, ♀ o. ♂♀, Frkn. kahl o. drüsig beh., am Stiel abgliedert, Fr. schwarz o. rot. Etwa 46 Arten*).

*) Eine Angabe der hier nicht erwähnten Arten würde zu weit führen, zumal es sich zumeist um südamerikanische handelt, die für Freilandkultur kaum in Betracht kommen. Es sind obendrein eine große Anzahl neuer Arten darunter, deren Diagnosen Prof. JANCZEWSKI noch nicht publiziert hat.

A. B. in Kn. gerollt*), Bl. lebhaft gelb (Fig. 265k).

30. *R. aureum*: Aufrechter, wüchsiger, bis 3 m hoher b. • Zw. mit feinen drüsigen Haarresten, sonst glänzend gelbgrau, Kn. vgl

Fig. 266. *Ribes*: B.-Formen: a *oxyacanthoides* — b *rotundifolium* — c *divaricatum* — d *gracile* — e *aureum* — f *gordonianum* — g—h *malvaceum* — i *variegatum* (*mogollonicum*) (kleine B.) — k *nevadense* — l *sanguineum* (B. von Blzw.) — m *inebrians* — n *affine* — o *cereum* (Alles $\frac{2}{3}$ n. Gr.) (Original).

Da ich innerhalb der Subgenera Sektionen nicht abtrenne, so sei hier nur darauf hingewiesen, daß die Arten mit solcher Kn.-Lage zu den folgenden Sekt. (bez. Gattungen) gestellt zu werden pflegen: *Symphoricarpa* BERL., in Mem. Soc. Geneve III 50. 1826 (*Chrysothrix*) SPACH., in Ann. Sc. nat. 1835. 18; *Siphocampylus* FENDL., Gen. 824. 1836.

Fig. 260m r. fein beh., $\odot$ Zw. auch noch ziemlich glatt, erst $\odot$ längs-rissig und Äste $\odot$ abblätternd; B. vgl. Fig. 266e, beiders. $\odot$ glänzend hellgrün, wenigstens jung gleich dem Stiele $\odot$ fein beh. und gewimpert, später zuw. ganz kahl, c. 3—6 cm lang und etwa gleichbreit; Trauben 7—15-blütig, 3—5 cm lang, Achsen beh. o. kahl (var. *leiobotrys* ZABEL), Bl. vgl. Fig. 265k, Fr. wie l. schwarzviolett (selten gelb o. rot).

R. a. PURSH, Fl. Am. sept. I. 164. 1814 (*R. palmatum* DESF., Cat. Hort. Paris 3. ed. 274. 1829; *R. leiobotrys* KOEHNE, Dendrol. 192. 1893). — Goldtraube; golden-currant. — N.-Am. (von Texas bis Calif. nördlich bis Minnesota und NW-Territ.), steinige Hänge, Flußufer. — Blz. IV—V. — Fr. VI—VII. — Sehr nahe steht dieser altbekannten Art *R. tenuiflorum* LDL., in Trans. Hort. Soc. VII. 242. 1830, dessen Hauptunterschiede in viel zierlicheren B.-Formen mit $\pm$ herztg. Basis, duftlosen Bl. und säuerlichen „amber colored and translucent“ Früchten bestehen (n. GREENE). Nach HOWELL in S.-Oregon und dem angrenzenden Calif.

29 $\times$ 34 *R. aureum* $\times$ *sanguineum*: *R. gordonianum* LEMAIRE, in Fl. d. serr. 1846. II. t. 165. (*R. beatonii* HORT. NONN.) Diese in Engl. entstandene Hybride hält zwischen den Eltern zieml. genau die Mitte und wird hfg. kultiviert. Auffällig durch ihre gelbroten Bl. B. vgl. Fig. 266f.

B. B. in Kn. gefaltet, Bl.-Farbe wechselnd, nie tief reingelb.

I. Bl. $\varnothing$.

II s S 420.

○ K.-Becher innen und Gr. beh.

31. *R. malvaceum*: aufrechter, bis 2 m hoher $\wp$, $\odot$ Zw. rotbraun, fein hellgrau zottig und reich bedrüst, $\odot$ kahlend, kirschbraun, allmählich abblätternd; B. vgl. Fig. 266g—h, 2—5:2—4,5 cm, derb, oben stumpf tiefgrün, rauh beh., unten graufilzig, mit Drüsen untermischt, Stiel 1—2,3 cm, beh. und bedrüst; Blst. inkl. des 1—1,5 cm langen Stiels etwa 3,5—5 cm lang, dichtblütig, Bl. hellrosa, vgl. Fig. 265m, bes. Frkn. dicht hell beh., Fr. wie n, rötlich, zuletzt $\pm$ bereift.

R. m. SM., in REES Cycl. XXX. No. 13. 1815 (*tubulosum* ESCHSCH., in Mém. Ac. Pétersbg. X. 283. 1821/22). — Malven-Johannisbeere. — Calif. (from Marin county to Monterey county, and especially on the outer Coast Range). — Blz. VI. — Bei uns noch nicht in Kultur.

30 $\times$? 34. *R. malvaceum* $\times$? *sanguineum*: *R. bethmontii* JANCZ., in Bull. Acad. Cracovie 1904. — In französischen Gärten als *malvaceum* kultiviert, dem er alles in allem wohl sehr nahe steht.

○○ K.-Becher innen und Gr. kahl.

... S 418

* Stb. und C. in gleicher Höhe inseriert*).

+ K.-Becher flachglockig o. wenigstens kürzer als C. lang.

△ K.-Becher flachglockig, vgl. Fig. 265r.

32. *R. variegatum (mogollonicum)*: aufrechter bis 3 m hoher $\wp$, $\odot$ Zw. kahl, hellgelbgrau, $\odot$ grau bis schwarzgrau, $\odot$ rissig; B. vgl. Fig. 266n, 2—7,5:2—8 cm, dünnhäutig, oben lebh. grün, kahl, unten wenig heller, ziemlich reich tein-drüsig, Stiel 1—4 cm; Blst. etwa 2—4 cm lang, auf ebenso langen Stielen aufrecht, dichtblütig, Bl. vgl. Fig. 265r, grünlich weiß, Frkn. reich stieldrusig, desgl. Fr. diese schwarz (bleifarben), eßbar.

R. v. AV. NELS., Key R. M. Pl. 34. 1902 (*R. sanguineum* var. *variegatum* WATS., Bot. King Exped. 100. 1871; *R. mogollonicum* GREENE, in Bull. Terr. Club 1887. 121). — N.-Am. (Colorado, Utah, wohl auch Calif. nach HELLER). — Blz. V. — Frz. VII. — In neuester Zeit eingeführt.

△△ K.-Becher tiefer glockig, vgl. Fig. 265s.

33. *R. nevadense*: aufrechter bis etwa 1,5 m hoher $\wp$, junge Zw. $\pm$ violett überlaufen, fein hellgrau beh., $\odot$ kahl braungelb, $\odot$ grau, erst spät deutl. rissig; B. vgl. Fig. 266k, 3—6 cm Dm., obers. tiefgrün, meist nur auf Nerven $\pm$ fein beh., unters. heller, verstr. fein beh. und tein bedrüst, Stiel dgl. 1,5—4 cm, Blst.

*) Vgl. aber auch 39. *R. affine*.

ohne den gleich langen Stiel 2–3 cm lang, anfangs aufrecht, dann über-
gänglich, Bl. vgl. Fig. 265s, rot-karmin, Fr. etwa 7 mm Dm., stark bereift.

R. n. KELLOGG, in Proc. Cal. Ac. I. 65. 1855. — Calif.: Sierra-Nevada. —
Noch nicht eingeführt.

K.-Becher tief röhrig-glockig, mindestens so tief wie C. lang.

△ C. etwa so lang wie K.-Becher, K. länger als dieser,
Blst. gestreckt, vielblütig.

= junge Zw. dicht weichhaarig, dgl. B. auf beiden Seiten.
Blst. ± aufrecht, Trgb. nicht zurückgeschlagen, Recepta-
culum am Grunde ohne Vorb.*).

34. *R. sanguineum*: ♂, 1,2–2,4 m; ⊙ Zw. stumpf rot; B.
Fig. 266l, Blzw.) 3–5-lappig, dicklich, 6–9 cm breit; Stiel e. 6 cm;
Blst. kurz gestielt, dichtblütig; Bl. (Fig. 265p) tief rosenrot, C. weiß.
Fr. klein, blauschwarz, ± bereift (pulp firm, black, insipid).

R. s. PURSH, Flor. Am. sept. I. 164. 1814. — Blutrote Johannisbeere. —
WN. Am., from Del Norte in Colorado and perhaps Humboldt, northwards to
Brit.-Columbien, in Zentr.-Calif. durch *glutinosum* und *malacicum* ersetzt. — Nach
JANCZEWSKI ist diese Art nirgends ganz typisch in Kultur! Nur vom Typ
schon etwas abweichende Formen, darunter solche mit gefüllten Bl.

= = junge Zw. spärlich rauhlich beh., B. im Alter kahl
o. ± beh., Blst. hängend, Trgb. zurückgeschlagen,
Receptaculum am Grunde anfangs mit Vorb.

35. *R. glutinosum*: von *sanguineum* noch abweichend durch:
höherer b bis 4,5 m. • Zw. hell und glänzend, B. dünn, 9–15 cm
breit Fig. 267a; Blst. lang gestreckt, Bl. hell nelkenfarben bis rosen-
rot (Fig. 265o); Fr. groß, kugelig.

R. g. BENTH., in Trans. Hort. Soc. I. 176. 1835. — Klebrige Johannisbeere. —
Wash., Calif.**) — Zu dem Formenkreis gehört auch *R. albidum* PAXT., Mag. Bot.
X. 55. 1843. — JANCZEWSKI beschreibt in Bull. Acad. Cracov. 1904 ein *R. glutino-
sum albidum* × *nigrum*; *R. intermedium* CARRIÈRE, in Rev. Hort. 1867. 125. Allein
da TAUSCH bereits 1838 den Namen verwendet hat, so nenne ich diesen Bastard
im Einverständnis mit Herrn Prof. JANCZEWSKI *R. carrièrei*.

△△ C. etwa halb so lang wie K.-Becher, K. so lang wie
dieser, Blst. ± schein-doldig verkürzt.

36. *R. viscosissimum*: bis etwa 1,8 m hoher, aufrechter ♂, Zw. jung dicht
beh. und stieldrusig, an den gelbgrauen • verlieren sich die Drüsen und die
schwarzgrauen werden kahl und rissig; B. vgl. Fig. 267b, bis 9:8 o. bis 12 cm
breit, beiders unten meist starker beh. und drusig, Stiel 1–3 cm; Blst. 1–2 o. 3 cm
lang gestielt, etwa 5–8 blütig, Bl. gelblich weißgrün, vgl. Fig. 265q, zuw. bis 1 cm
lang gestielt, Fr. ca. 1:0,8 cm, zuletzt schwarz.

R. v. PURSH, Fl. am. sept. I. 163. 1814. — Schmierige Johannisbeere. —
NW.-Am. (Brit. Col. bis Calif. und Rocky Mts.). — Wälder, trockene steinige Orte
— Von Prof. JANCZEWSKI versuchsweise eingeführt. Wenig aussichtsreich!

× × Stb. tiefer inseriert als C.***).

s S 420

K.-Becher lang-röhrig-glockig, 2–5mal so lang wie C.

*) Ich beschreibe die Arten 34 u. 35 nach GREENE, Flora Franciscana II. 197. 1891.

*) GREENE sagt: Common on moist banks of streams, and around springy places,
at low altitudes in the Coast and Mt. Diablo Ranges, chiefly or exclusively in the middle
section of the State, not in the Sierra. Too unlike *R. sanguineum* to be a mere variety
of it, yet hardly more than a geographical subspecies and remarkable, as a curant, for
the long interval between the flowering of the shrub and the opening of its fruit. In
flower from I (or even XII) to III. Fr. not ripe until VIII–IX.

***). Vgl. aber 39 *R. affine*.

△ K.-Becher 3—5mal so lang wie C., Gr. meist etwas beh.
= Bl.-Trgb. deutlich gezähnt, Gr. reich beh., vgl. Fig.
265t—u.

37. *R. cereum*: bis etwa 80 cm hoher, reich verzweigter b, ⊙
Zw. wechselnd dicht fein beh., aber reich drüsig. lebhaft gebräunt,
grau, rissig abblätternd; B. vgl. Fig. 266o, 1,5—3,5 cm Dm., grau-
grün, beiders. reich fein beh. und bedrüst; Blst. 2—5-blütig, bis etwa
1 cm lang gestielt, Bl. weißlich o. leicht gerötet, etwas wachsig, Fr.
orangerot, durchscheinend.

Fig. 267. *Ribes*: B.-Formen: *a glutinosum*. — *b viscosissimum*. — *c prostratum*. —
d laxiflorum. — *e bracteosum*. — *f floridum*. — *g triste*. — *h nigrum* (alles reichlich
 $\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

R. c. DOUGL., in Bot. Reg. XV. t. 1263. 1829. — Wachs-Johannisbeere. —
WN.-Am. (Sierra Nevada, Rocky Mts., Cascade Mts. in Calif., Oreg., Washing.,
Arizona, New Mexiko). Eine weit verbreitete Art der Gebirge. Blz. IV. In
Kultur selten echt, aber sehr zierliche Art. Was als *cereum* geht ist meist *schubertii*
oder der Bastard.

36 × 37 *R. cereum* × *inebrians*: *R. spachii* JANCZ., in Bull. Acad. Cracov.
1904. Steht alles in allem wohl *cereum* näher, aber Gr. kahl (o. sehr spärlich beh.),
Stb. inseriert wie bei *inebrians*.

= = Bl.-Trgb. nicht o. kaum gezähnt, Gr. kahl (Fig. 265v—w).

38. *R. inebrians*: noch abweichend von *cereum* durch grünliche, von Wachsüberzug freie (ob ganz?) B. Fig. 266m., Bl. mehr violett rosa.

R. i. LDL., Bot. Reg. t. 1471. 1831 (*spaethianum* KOEHNE, in Gartenflora 1899. 338; ? *R. mesalerium* COV., in Proc. Biol. Soc. Wash. XIII. 195. 1900). — WN.-Am (Colorado, Montana, Utah). — Man unterscheidet eine etwas üppigere, durch größere B. und hellere Bl., Laub- und Zw.-Farbe abweichende Form als *var. majus* (KOEHL.) JANCZ. vom Typ (= *var. minus*).

△△ K.-Becher etwa 2mal so lang wie C., Gr. kahl.

39 *R. affine*: aufrechter b., ± Zw. tiefbraunrot, mit den Resten einer feinen reichdrüsigen Beh. + bedeckt, — grau; B. vgl. Fig. 266n., etwa 3—6 cm Dm., oben tiefgrün, unten heller, beiders. + fein beh. und verstreut drüsig, Stiel 1,5—4 cm; Blst 2—4 cm lang gestielt, anfangs aufrecht, ziemlich lockerblütig, Bl. vgl. Fig. 268a, aber Stb. in gleicher Höhe mit den C. inseriert*).

R. a. KUNTH, in H. B. Nov. Gen. et Sp. VI. 60. 1823, non DOUGL.. — Mexico. — Nicht in Kultur.

++ K.-Becher nur so lang o. kürzer als C.

K.-Becher beckenfg. (Fig. 268c), Trauben aufrecht, Drüsen nicht klebrig.

40. *R. prostratum*: unangenehm riechender b., Zw. + niedergestreckt, wurzelnd, dann ausgebreitet aufstrebend; B. vgl. Fig. 267c, 3—7 cm lang, kahl, selten unters. auf Nerven etwas beh., Stiele 3—7 cm; Bl. etwa 4—5 mm lang gestielt, grünlich mit rötlicher Aderung; Fr. rot, drüsenborstig.

R. p. L'HÉR., Stirp. nov. I. 3. t. 2. 1784. — Niederliegende Johannisbeere; fetid currant. — Von Labrador bis NW.-Terr. und Brit.-Col., südl. bis N.-Carol., Mich., Color. — Kalte feuchte Orte. — Blz. IV—V. — Frz. VII.

K.-Becher flach (Fig. 268b), Drüsen nicht klebrig, geruchlos.

41. *R. laxiflorum* *): von dem in Tracht ähnlichen *prostratum* noch abweichend durch: B. an Basis herzförmig (Fig. 267d); Bl. trübbrot; Fr. purpurn o. schwarz, ± bereift.

R. l. PURSH, Flor. am. sept. II. 732. 1814 (*affine* DOUGL., apud BONG., in Mém. Acad. Pétersbg. II. 138. 1833, nec KUNTH). — Lockerblütige Johannisbeere NW.-Am., von den Rocky Mts. bis zum Stillen Ozean, Japan, Saechalm, Alaska — Wohl selten echt in Kultur.

II. Bl. f., B. immergrün, Blst. an kurzen diesjährigen Trieben *).

42. *R. gayanum*: junge Zw. drüsig o. zuweilen weich beh., — kahl; B. rundlich o. verkehrt-ernudlich, stumpf 3-lappig, selten Mittellappen deutlich vorgezogen, beiders. weich und unters. — drüsig beh., 1,5—5 cm lang, Stiel dgl., Blst. kurztraubig; Bl. klein, gelb, glockenförmig, (Fig. 268f); Fr. klein, schwarz, beh.

R. g. STEUD., Nomenclat. 2. Aufl. II. 439. 1841 (*Rebis gayana* SPACH, in Ann. sc. nat. sér. 2. IV. 29. 1858). — Chile Cord. de Santiago bis Talca, sowie Cord. de la costa. — Gleich den anderen südamerikanischen Arten dieser Gruppe wohl nur für Gewächshauskultur geeignet!

*) Die abgebildete Bl. stellt die nahe verwandte *R. ciliatum* H.B., in R. et SCH., l. c. (*R. jorullense* KUNTH, in H. B. Nov. Gen. et Sp. VI. 61. 1823) dar.

**) Fälschlich hermit vereinigt wird oft *R. acrifolium* HOWELL, in Erythra III 34. 1895, nec K. KOCH, o. richtiger *R. howelli* GREENE, in Erythra IV. 57. 1896, ein b von aufrechtem Wuchse, der sich mehr an *nevadense* anschließt.

***) Ich erwähne diese Art nur als einen Vertreter der Gruppe dieser Sektion mit zweihäusigen Bl.

Sekt. VI. *Coreosma* sensu JANCZ., l. c. — Aufrechte o. $\pm$ niedergestreckte b., Kn. mittelgroß, Sch. krautig; B. meist mittelgroß o. klein, selten groß, sommer- o. seltener immergrün, in Kn. gefaltet; Blst. end- o. achselständig, vielblütige gestreckte aufrechte o. $\pm$ hängende Trauben, o. auch scheindoldig, wenigblütig; Bl. $\pm$ o. $\pm$; Fr. meist schwarz. — Etwa 20 Arten*).

○ Blst. $\pm$ hängend.

K.-Becher so lang bis fast doppelt so lang wie breit, Frkn. ganz unterständig, Trgb. länger o. mindestens $\frac{1}{2}$ so lang wie Bl.-Stiel (Fig. 259q—r).

43. *R. floridum*: b von der Tracht des *nigrum* aber weniger üppig, B. vgl. Fig. 267t, oberseits kahl, unterseits wenigstens auf Nerven weich beh. und beiderseits drüsenpunktig, 3—8 cm Dm.; Blst. im Mittel etwa 5 cm lang, $\pm$ lang gestielt, Bl. grünlich weiß, vgl. Fig. 259p—u, Fr. meist nicht über 6 mm Dm.

Fig. 268. *Ribes*: Bl.-Längsschnitte: a *ciliatum* — b *laxiflorum* — c *prostratum* — d *bracteosum* — e *japonicum* — f *gayanum* — g *fragrans* (Original).

R. f. L'HÉR., Strip. nov. 4. 1784 (*nigrum* var. *pensylvanicum* MARSH., Arb. Am. 132. 1785; *pensylvanicum* LAM., Encycl. III. 49. 1786. Amerikanische Ahlbeere; wild black currant. N.-Am. (Neu-Schottland bis Virginia, Manitoba, Nebraska, Walder. Blz. IV—V. Frz. VII. — Seit Langem in Kultur. Da die Amerikaner und Prof. JANCZEWSKI den Namen *montanum* MILL., Gard. Diet. ed. 8. No. 4. 1798, nicht als ältesten akzeptieren, so behalte auch ich *ciliatum* bei. Eine Varietät von *floridum* ist *R. intermedium* Tausch, in Flora XXI. 220. 1858, non CARR., die sich vom Typ vor allem durch die breiteren kürzeren Bl.-Becher unterscheidet, aber keineswegs einen Bastard *floridum* $\times$ *japonicum* darstellt.

*) Die ca. 8 südamerikanischen Arten mit δ ♀ Bl. sind für uns Kalthauspflanzen und von ihnen ist außer *R. integrifolium* PHIL., in Gartenfl. 1886. 145, aus Chile und *R. punctatum* R. et P., Fl. Peruv. III. 12 t. 233 Fig. 6. 1867, nur noch *R. valdivianum* PHIL., in Linnaea XXVIII. 650. 1856 und *R. polyanthes* PHIL., l. c. 649; beide aus Chile, in Kultur. Von abartigen Arten ist noch *R. viburnifolium* A. GRAY, in Proc. Am. Acad. XVII. 202. 1881/82 aus Calif. zu nennen; ferner amiten-ähnliche: *R. dikuscha* FISCH., ex TURCZ. in Bull. Soc. Nat. Mosc. XVII. 1. 254. 1842, aus Mandschurei u. O.-Sib. vielleicht mit *indianum* identisch und *R. ussuriense* JANCZ., in litt.

— K.-Becher — breiter als lang. Frkn. halboberständig^{*)}, Trgb. nur etwa $\frac{1}{3}$ so lang wie Bl.-Stiel (Fig. 264m).

44. *R. nigrum*: Bis etwa 2 m hoher, in Tracht *rubrum* recht ähnlicher b., dessen Holz aber durch den bekannten unangenehmen Geruch frisch sofort zu erkennen, — Zw. — beh., — bald stark abblättrnd. Kn. vgl. Fig. 269l—p; B. wie Fig. 267h, meist nur unterseits drüsig gepunktet; Bl. etc. vgl. Fig. 264m—t.

Von Formen seien nur *f. apiifolium* und *f. aconitifolium* KIRCHN., Arb. Musc. 112. 1864, mit — fein zerschlitztem Laube erwähnt. Es gibt auch weißbunte, gelbgerandete, sowie Formen mit gelben Fr.

R. n. L., Sp. pl. 201. 1753. — Ahlbeere. — J. G. D. zerstr. (feuchte Wälder, Bäche, Sümpfe), OU. dgl., dtg. nur verwildert, Sch. selten; sonst noch fast ganz Eur., Sib., Turkest., Himal. — Blz. IV—V. — Frz. VII.

Fig. 269. a—f *Ribes gordianum*: a ⊙ Zw., b Kn., c Beh. der Zw., d Wimperung der Kn.-Sch., e B.-N., f Zw.-Q.-Schnitt. — g—k *R. vulgare*: g Zw., h Kn., i Kztr., k Beh. der Kn.-Sch. — l—p *R. nigrum*: l Zw., m Kn., n B.-N., o Beh. der Kn., p f (1—6 vgl. Fig. 240f, S. 375) (Original nach C. K. SCHNEIDER).

○○ Blst. aufrecht o. ± aufsteigend.

— Blst. vielblütig, 8—12 cm o. zur Frz. zuweilen bis fast 30 cm lang, B. vgl. Fig. 267e.

45. *R. bracteosum*: 1—3 m hoher b., Zw. kahl; B. 7—25 cm Dm., unterseits meist ganz kahlend, nur reichlich drüsenpunktig. Lappung wechselnd, oft noch tiefer eingeschnitten und spitzer als auf Fig. 267e; Bl. vgl. Fig. 268d, grünlich-weiß, Trgb. bleibend, Fr. schwarz, drüsenpunktig, ca. 1 cm Dm.

R. b. DOUGL., in Hook. Fl. bor. Am. I. 233. 1833. — Deckblättrige Johannisbeere. — WN-Am., von Mendocino in Calif. nördl. bis Alaska. — Schattige Wälder an Gebirgsflüssen. — Blz. V. — Ihm steht sehr nahe das japanische *Jesso*, N-Hondo *R. japonicum* MAX., in Bull. Acad. Pétersbg. 1874: 253. Man vgl. die Bl. Fig. 268e, B. unters. — weichhaarig und spärlich bedrüst, Form sehr ähnlich.

*) Fig. 264m ist nicht ganz korrekt

- < Blst. wenigerblütig, meist nicht über 5 cm lang. B. kürzer, stumpfer, z. T. fast rundlich gelappt.

46. *R. fragrans*: aufrechter $\bar{b}$, $\odot$ und $\odot$ Zw. gelbbraun, kahl, nur reich bedrüst, $\odot$ grau; B. etwa wie in Fig. 267b das untere B., 2—4 cm Dm., unters. nur spärlich beh., aber reich bedrüst; Bl. vgl. Fig. 268g grunlich gelb, Fr. nach MAXIMOWICZ rot.

R. f. PALL., in Nov. Act. Pétersbg. X. 377. t. 9. 1797. — Duftende Johannisbeere. Mandschurei, O.-Sib., Transbaikalien, Dahurien. Felsige Berghänge. Außerdem sei noch erwähnt *R. procumbens* PALL., Fl. ross. I. 2. 35. t. 65. 1788. aus demselben Gebiete. Ein niedergestreckter $\bar{b}$, Zw. schwach und kaum bedrüst, ebenso die kahleren B. unterseits weniger drüsenpunktig, in Form ähnlich Fig. 267e (unteres B.), am mir vorliegenden Material bis 6 cm Dm., Bl. purpurn. — Auch *hudsonianum* RICH., in Franklin 2nd. Journ. App. 6. 1823 gehört noch zu den Arten dieser Gruppe mit langgestreckten Trauben, obwohl diese hier zuweilen nicht über 6 cm messen. B. 3—10 cm Dm., 3—5-lappig, z. T. ähnlich Fig. 267c, mehr breit als lang, unters. $\pm$ beh. und drüsenpunktig, Fr. nur 4—6 mm Dm. Von der Hudson Bai und W.-Ontario bis O.-Washington und Brit. Col.

Familie 30. Hamamelidaceae, Zaubernußgewächse.

LDL., Veg. Kingd. 784. 1847.

Vgl. oben S. 359; $\bar{b}$ — $\bar{b}$, B. immer- o. sommergrün, meist $\odot$, meist mit Neb., meist einfach; Bl. sehr wechselnd, meist unansehnlich in Ährchen o. Köpfchen. $\bar{b}$ o. $\bar{b}$, mit K. und C. o. ohne beides, o. nur mit K., hypo-, peri- o. epigyn. K. und C. meist 4—5-zählig, Gyn. 2, Sa. anatrop, hängend; Fr. eine 2-fächerige, fach- o. zugleich auch wandspaltige Kapsel, selten geflügelt, Sa. hfg. geflügelt, Testa hornig, F. gerade, End. vorh.

Gattungstabelle:

A. B. gegenständig (Fig. 271). 107. *Cercidiphyllum* (S. 424).

B. B. $\odot$.

I. B. handfg. gelappt (Fig. 273e—f). 109. *Liquidambar* (S. 426).

II. B. ungelappt.

a) B. immergrün.

a) Bl. ohne C., $\bar{b}$ (monoecisch).

1. B. vgl. Fig. 273g, zuletzt ganz kahl, Bl. etc. wie Fig. 274a—c. 110. *Distylium* (S. 428).

2. B. vgl. Fig. 275m, unters. $\pm$ beh. bleibend, Bl. etc. wie Fig. 278a—f. 116. *Sycopsis* (S. 433).

β) Bl. mit C., Fig. 277h—n, B. reichlich büschelig beh. (Fig. 275k—l). 115. *Loropetalum* (S. 433).

b) B. sommergrün.

a) Bl. $\bar{b}$, ohne C. und K., vgl. Fig. 270, B. wie Fig. 273a. 106. *Eucommia* (S. 424).

β) Bl. $\bar{b}$, z. T. ohne C.

1. C. vorhanden.

$\odot$ C. lineal, vgl. Fig. 272s und 278h.

* B. wie Fig. 275n—p. 117. *Hamamelis*. (S. 434).

** B. wie Fig. 273b. 108. *Disanthus*. (S. 425).

$\odot\odot$ C. aus schmalem Grunde verkehrt eifg., Fig. 277b, B. wie 275g—i. 114. *Corylopsis*. (S. 431).

2. C. fehlend.

○ Blst. jung von gefärbten Hochb. umhüllt.

* Hochb. klein, schuppenfg., dunkel gefärbt, Bl. wie Fig. 274d—e, B. wie 275a. **111. *Parrotia*** (S. 428).

** Hochb. groß, häutig, hell, Bl. wie 274h—i, B. wie 275b. **112. *Parrotiopsis***. (S. 429).

○○ Blst. ohne die gemeinsame Hochb.-Hülle, Bl. wie Fig. 274n, B. wie 275c—f. **113. *Fothergilla*** (S. 430).

Gattung 106. *Eucommia*) OLIV., in Hook. Icon. pl. XX. t. 1950.
1890.

Vgl. oben und Art.

E. ulmoides: $\bar{h}$, 7—10 m; B. vgl. Fig. 273a, an Blzw. 6—12:2,5—6 cm, sonst bis 21:9 cm. oberseits fast kahl, unters. auf Nerven beh.; Bl. vor o. mit den B. erscheinend, ♀♂, zu mehreren aus einer Kn. hervorgehend, seitenständig; ♂ Bl. (Fig. 270a) gestielt mit ∞ Stb., ♀ gestielt mit syncarpen, von 2 Frb. gebildeten und durch Abort 1-fächerigen Gyn. (c), Fr. geflügelt (e), S. mit großem E.

S. u. OLIV., l. c. [et XXIV. t. 2361]. — China: Hupei, O.- und S.-Sz'tschwan, vielfach kultiviert. — Rinde medizinisch verwertet, liefert teure Droge. — Noch nicht eingeführt.

Fig. 270. *Eucommia ulmoides*: a ♂ Bl., b Stb., c ♀ Bl., d Gyn. im oberen Teil im Querschnitt, e Fr., f dgl. im L.-Schnitt mit einem S., g E. (d nach SOLEREDER, sonst nach OLIVER).

Gattung 107. *Cercidiphyllum*) SIEB. et Zucc., in Abh. Acad.
Münch. XIX. 238. 1846.

Vgl. oben S. 423 und Art.

C. japonicum: aufrechter, jung , breit pyramidal wachsender b—h, in der Heimat bis 30:1,2 m, hfg. mehrstämmig; . Zw. kahl, rund, glänzend rotbraun o. rot, mit ∞ feinen hellen Lent., graubraun.

*) Beschreibung nach OLIVER und nach SOLEREDER.

**) Man vergl. hierzu und zu *Eucommia* die Arbeit von SOLEREDER, in Ber. d. D. Bot. Ges., 1899, 397.

Kn. kahl, rot, vgl. Fig. 225e k. S. 348; B. vgl. Fig. 271h o. etwas mehr in die Länge gezogen. Grund oft stärker herzförmig, bis etwa 6 cm Dm., kahl, oberseits lebhaft grün, unterseits bläulichgrün bis weißlich, Stiel bis 3 cm, hfg. violett; Bl. σ , in köpfchenartigen, auf seitenständigen Kztr. befindlichen Blst.; σ Blst. mit einem 4-blättrigen Involuerum und ∞ Stb. (Fig. 271a), die einzelnen σ Bl. sind nicht zu unterscheiden; ρ Blst. mit analogem Involuerum und mit je 2–6 in einen Kreis gestellten Bl., jede ρ Bl. besteht nur aus einem, von einem einzigen Frb. gebildeten, kurzgestielten Gyn., Gr. lang, auf seiner nach außen gerichteten Seite fast ganz mit Papillen besetzt. Sa. ∞ , in 2 Reihen (f. g), Fr. nach außen aufspringende Balgfr. (in h), S. geflügelt (k).

C. j. S. et Z., l. c. — Japanisches Judasbaumblatt; jap. Katsura. — Japan: Jesso, Hondo, Kuischiu. 300–1600 m, nach MAYR bes. auf alten Flußauen, hart an Gebirgswäldern. Blz. Ende IV–V. — Frz. X. Nach MAYR ein sehr lichtbedürftiger, aber raschwüchsiger B., bei uns winterhart und seit letzter Zeit vielfach angepflanzt. — Mir unbekannt ist *C. ovale* MAX., in Mém. biol. VIII, 369, ex FRANCH et SAV., Enum. plant. Fl. jap. I, 19. 1875. Hondo (in montibus altissimis).

Fig. 271. *Cercidiphyllum japonicum*: a Zw. mit σ Blst.; b Stb.; c Zw. mit ρ Blst.; d ρ Blst. mit 2 Paar Trgb.; e eines der äußeren Trgb. vergrößert; f, g Frktn. im Längs- und Querschnitt; h Zw. mit B. und Fr.; i B. Rand; k Sa. — h nach SHIRASAWA).

Gattung 108. *Disanthus* MAXIM., in Bull. Acad. Pétersbg. X. 485. 1866.

Vgl. oben S. 423 und Art.

D. cercidifolia: b. 2–3 m; σ Zw. kahl, rotbraun, mit hellen Lent. Kn. stumpflich-eiförmig, Schuppen etwa 6, kastanienbraun, gewimpert; B. vgl. Fig. 273b, zuweilen mehr rundoval und scharfer gespitzt, oberseits tiefgrün, unterseits heller, kahl, zuletzt derb, prächtige purpurne o. orangefarbene Herbstfärbung, 8–10 cm lang, Stiel 5–6 cm; Bl. sitzend, in achselständigen, kurzgestielten, 2blütigen Köpfchen (Fig. 272o, r), mit schuppenförmigen Trgb. und Vorbl., 5zählig σ , t, C. lang und schmal, dunkel violett-purpurn, Gyn. 2, Sa. je 5, Fr. 2fächerige Kapsel, Endokarp knorpelig, vom Exokarp sich lösend, S. wie v, E. wie w.

D. c. MAXIM, l. c. — Judasbaumblättrige Doppelblute. Jap.: Hochgebirge von Centr.-Hondo. Blz. X. Fr. des letzten Jahres reiten dann — Nach den Angaben in Mitt. d. D. D. G. 1900, 1, bei Herrn LEICHTLIN in Baden-Baden in Kultur, das Exemplar in Fischbach habe ich im Mai 1904 nicht gefunden.

Gattung 109. *Liquidambar* L., Sp. pl. 999. 1753.

Vgl. oben S. 423. ♂ ♀ B. mit lanzettlichen, der B.-Stielbasis angewachsenen kleinen Neb., Bl. ♂ , monoecisch, in Köpfchen, die an-

Fig. 272. *a—n Liquidambar styraciflua*: *a* Blst. ($\alpha = \text{♂}$, $\beta = \text{♀}$); *b* ♂ Bl.-Köpfchen im Längsschnitt; *c* — *d* Stb.; *e* — *f* Bl.-Köpfchen im Längsschnitt; *g* — *h* Frst.; *h* Fr. im Längsschnitt (linkes Fach mit reifem S., rechtes mit unentwickelt. Sa.); *i* — *k* S. von versch. Seit.; *l* — *m* dgl. im Längsschnitt; *n* E. — *o—w D. antans circa folia*: *o* Zw. mit Bl.; *p* über *o* C.; *q* K.; *r* 2-blütiges Bl.-Köpfchen; *s* Bl. von oben; *t* A. und Gyn. dgl.; *u* Bl. ohne C. im Längsschnitt; *v* Zw. mit Bl. α und Fr. β ; *w* S. ganz und im Längsschnitt (α — n nach SARGENT, $o—w$ nach „Dendrol. Mitteil.“).

fangs von 4 Hochb. eingehüllt werden, ♂ Köpfchen in endständigen Ähren (α in Fig. 272a), die einzelnen Bl. nicht unterscheidbar, ♀ Köpfchen einzeln, langgestielt (β in Fig. 272a), die einzelnen Bl. ebenfalls unter sich verwachsend (*c*, *f*), meist mit je 4 rudimentären Stb., Gr. an Fr. (*h*) bleibend, Sa. ∞ , Frst. wie *g*, Epikarp holzig, Endokarp dünn, ablösend, S. meist nur 1—2, geflügelt (*m*), E. wie in *n*. — 4 bis 5 Arten.

A. B. 3–5–7-lappig, Lappen nicht wieder gelappt, nur knorpelzählig, Unterseiten am Grunde deutlich achselbärtig, Textur — derb (Fig. 273, c–e).

1. *L. styraciflua*: B. in der Heimat bis 40:1.5 m; Krone pyramidal, St. schlank, gerade; Zw. jung — beh., — kahl, rotbraun, mit verstreuten Lent., — korkig geflügelt, Kn. etwas länger und spitzer, als bei *orientalis*; B. bis 21 cm Dm., Stiele — gleichlang, Herbstfärbung meist ± karminrot; Bl. etc. wie oben.

L. s. L., l. c. — Storaxliefernder Amberbaum; sweet gum, bilsted. — N.-Am., von Connecticut und S.-Newyork bis Florida, Illinois, Missouri. Am schönsten in reichem Uferlande, das gelegentlich überflutet wird, in trockneren Böden und höheren Lagen kleiner bleibend. — Blz. IV–V. — Frz. X–XI. — Seit 1688 in Eur. in Kultur und gelegentlich in schönen großen Exemplaren auch in Deutschland zu finden. Vgl. Fig. 23 in meinen „Dendrol. Winterstudien“. Das Holz wird in N.-Am. mannigfach verwendet; daß die *Liquidambar*-Arten infolge ihres Balsamgehaltes (Storax) geschätzt sind, ist bekannt. — Die Form aus Mexiko, var. *mexicana* OERST., Am. Cent. XVI, t. 11. 1863, hat meist 3-lappige B., die noch südlichere *macrophylla* OERST., l. c. (Guatemala) kenne ich nicht. — An *L. styraciflua* scheint sich die chinesische *L. formosana* HANCE, in Ann. sc. nat., 5. sér., V, 215, 1866, anzuschließen, die augenscheinlich sehr formenreich ist. Ob *L. maximowiczii* MIQ., in Ann. Mus. Lugd. Bat. III, 200. 1867 (*L. acerifolia* MAXIM., in Bull. Acad. Pétersbg. X, 486. 1866, non UNGER) aus Japan mit der chinesischen identisch, wie allgemein angegeben, ist mir noch unklar. DIELS hat, in Engl. Bot. Jahrb. XIX, 380. 1901, eine *L. rosthornii* aus Sz'tschwan beschrieben, die der *orientalis* näher stehen soll. Auch FORBES and HEMSLEY geben in Jour. Lin. Soc. XXIII, 292. 1887 voraussichtlich neue Formen an, doch ist die Gattung in O.-As. noch nicht gründlich bekannt und artenreicher, als man anzunehmen pflegte.

Fig. 273. B.-Formen von: a *Eucommia ulmoides*, b *Daphniphyllum*, c *Liquidambar styraciflua*, d *Liquidambar styraciflua* var. *mexicana*, e *Liquidambar styraciflua* var. *macrophylla*, f *Liquidambar styraciflua* var. *formosana*, g *Liquidambar styraciflua* var. *rosthornii* (1/2 n. Gr.) (a nach OLIVER, sonst Original).

B. B. vgl. Fig. 273f. meist 5-lappig, aber Lappen gewöhnlich wieder lappenzählig, dafür die feinere Kerbzählung zurücktretend, Textur dünn, Bartung unterseits fehlend o. schwächer.

2. *L. orientalis*: sonst von *styraciflua* noch abweichend: b von kleineren Dimensionen, bis etwa 15 m hoch, Kn. vgl. Fig. 279o–p, rotpurpurn; B. kleiner, dgl. Blst. zierlicher.

L. o. MILL., Dict. ed. VIII. No. 2. 1768 (*L. imberbe* AIT., Hort. Kew. III. 365. 1789). Orient.-St. — S. Kl.-Asien: von Smyrna durch Carien, Lykien bis Syrien.

Wälder bildend. — Er ist sicher von *styraciflua* gut verschieden, allein da dieser auch im Orient kultiviert wird, hat man *orientalis* oft grundlos mit ihm vereinigt. KOLHNE gibt auch Griechenland an als Heimat, allein das beruht augenscheinlich auf einem Irrtum. HALÁCSY führt in seinem Consp. Flor. Graecae, der eben vollendet ist, die Gattung *Liquidambar* nicht. — *L. orientalis* ist seit langem in Frankreich in Kultur und hat sich auch bei uns akklimatisiert. Die Angaben im H. d. D. D. G. über die Unterschiede in der Winterhärte beider Arten sind sehr cum grano salis zu nehmen, da je nach Provenienz ¹⁾ genau das Umgekehrte der Fall sein kann!

Gattung 110. *Distylium* SIEB. et ZUCC., Fl. jap. I. 178. t. 94. 1835.

Vgl. oben S. 423 und Art.

D. racemosum: in Heimat hoher $\mathfrak{b}$, bei uns $\mathfrak{b}$; Zw. ganz jung gleich Kn. büschelhaarig, • fast kahl, purpurbraunrot, — in grau übergehend; B. vgl. Fig. 273g, nur jung unterseits und z. T. auch obers. verstr. büschelhaarig, später kahl, oberseits lebhaft grün, unterseits weißlich- o. hellgrün, 3:1,3—7:3 cm, Stiel 0,5—1,2 cm; Neb. lanzettlich, abtrüggig; Bl. polygam, in achselständigen Ähren; K. 3—6, C. null, • Bl. vgl. Fig. 274a mit 2—8 hypogynen Stb. und rudimentärem Gyn. (ca: 1 mit rudim. Stb. (2 „ob immer“), Gyn. 2, mit je 1 Sa., Fr. (c) 2-klapplige, beh. Kapsel, mit ablösendem Endokarp, S. nach BAILLON fast wie bei *Hamamelis*.

D. r. S. et Z., l. c. — Traubiger Doppelgriffel. — Japan: Kiuschiu, Hondo (Bergwader). — Blz. III—IV. — Versuchsweise im Heidelberger Schloßgarten angepflanzt. — Die B. der dortigen Pflze. sind aber breiter, stumpflicher und messen bis 5,5:fast 4 cm. Geblüht hat sie meines Wissens noch nicht. — Es sind noch 3 Arten bekannt, von denen vor allem genannt sei *D. chinense* FRANCH. (*racemos. var. chin.* FR., in Jour. Lin. Soc. XXIII. 290. 1887) aus Hupei, Szetschwan, das einen kleinen $\mathfrak{b}$, mit kaum 3 cm langen, elliptischen o. eilänglichen, gegen die Spitze — gezähnten B. bilden soll. — Die 2 anderen sind: *D. maicium* BLANCH. in Hook. Fl. brit. Ind. II. 427. 1878, aus dem Khasia-Gebirge und *D. stellare* KTZE., Rev. GEN. I. 233. 1891, von Java.

Gattung 111. *Parrotia* C. A. MEY., Verz. Pflz. Kauk. 46. 1831.

Vgl. oben S. 424 und Art.

P. persica: $\mathfrak{b}$ $\mathfrak{b}$, seltener $\mathfrak{b}$, bis 4—6 m; Verästelung aufrecht, • Zw. — büschelhaarig o. kahlend, olivgrün bis bräunlich, Lent. verstr., hell: — Zw. grau, längsrissig; Kn. vgl. Fig. 276g—k, bräunlich, dicht büschelfilzig; B. vgl. Fig. 275a, oberseits tiefgrün, kahl o. in Jugend auf Nerven beh., unten auf Nerven und z. T. auf Fläche — beh., Umriß wechselnd, 4—9—12):3—6—9 cm, meist aus abgerundet bis seicht herzförmig, Basis verkehrt eiförmig, bis eiförmig, hfg. etwas zugespitzt und im oberen Teile — undeutlich gekerbt, Stiel nur 2—6 mm! Neb. lanzettlich; Bl. vor B. in kopfigen seitenständigen Ähren (Fig. 274b, diese anfangs von schuppenförmig, olivpurpurnen, filzigen Hochb. umgeben, K. 5—7, zuerst nur die violetten 5—7 A. deutl. entwickelt, später das Gyn. heranwachsend, dies büschelhaarig, A. hier wie in c, schmal und lang, Fr. rundlich-viereckig, S. wie h.

¹⁾ So hat z. B. KOTSCHY aus Cypern kultivierte Exemplare verbreitet.

Herr V. SIVERS in Roemershof (Livland) hatte die Güte, mich wiederholt darauf hinzuweisen, daß es von richtiger ist, genau anzugeben, unter welchen Verhältnissen eine Art in der Heimat gedeiht, als solche „Härteprovinzen“ zu konstruieren, die im Grunde nichts aussagen, denn je nach Provenienz kann die selbe Art sich sehr verschieden verhalten. Ich werde daher in Zukunft auf die Angaben „Prov. Pr.“ etc. weniger Gewicht legen! Zumal ich ohnedies von Anbeginn an, auf dem Standpunkt des Herrn V. SIVERS stand.

P. p. C. A. MEY., l. c. (*Hamamelis persica* DC., Prodr. IV. 268. 1830; *P. siderodendron* C. A. MEY., ex LEDEB. Fl. ross. II. 1. 377. 1844). — Nach NIEDENZU: Charakter- $\mathfrak{P}$ der feuchtwarmen schattigen Niederungswälder (bis 200 m) N.-Pers. Blz. IV—V. — Frz. IX—X. — Bei uns seit langem in Kultur, blüht selten, fruchtet noch seltener. Vgl. folgende Gattung.

Gattung 112. *Parrotiopsis* C. K. SCHN.

(*Fothergilla* subgen. *Parrotiopsis* NIEDENZU, in Nat.-Pfl. III. 2a. 126. 1891).

Vgl. oben S. 424 und Art.

P. involucrata: 1,5—3,5 m hoher, einer *Corylus* sehr ähnlicher $\mathfrak{P}$, Zw. jung dicht, $\mathfrak{F}$ büschelhaarig, braungrau, $\mathfrak{M}$ grau, Kn., wie es scheint, analog *Parrotia*: B. vgl. Fig. 275b, breitrundlich, 2,5:3—6:7 cm. Bch. analog *Parrotia*, Stiel 7—14 mm, Neb. oval. Bl. in an seitlichen Kztr. endständigen kopfigen Ähren, anfangs von großen hautigen Brakteen (Fig. 274h) umschlossen. K. 5—7, wechschnd., Stb. ca. 15, sonst vgl. Fig. 274i—l, Gyn. im L.-Schnitt wie bei *Fothergilla*, S. wie bei *Parrotia* dargestellt.

Fig. 274. *a—c* *Distylium racemosum*: *a* $\mathfrak{M}$ Bl. mit rudimentärem Gyn. (*a*), *b* $\mathfrak{F}$ Bl., *c* Fr. — *d—g* *Parrotia persica*: *d* junge Blst., *e* Bl. aufgeschnitten und ausgebreitet (α = K., β = Stb., γ = Gr.), *f* Stb., *g* Frst., *h* S. — *h—l* *Parrotiopsis involucrata* (*Parrotia jacquemontiana*): *h* junger noch umhüllter Blst., *i* Bl., *k* Stb., *l* Fr. — *m—p* *Fothergilla carolinensis*, *abundant*: *m* Blst., *n* Bl., *o* aufgeschnittenes Receptaculum, *p* Gyn. im L. Schnitt. — *q* *l*, *m* *r*: Fr. (*b*, *m* *p* nach NIEDENZU, *q* nach BAILLON, sonst Original).

P. involucrata (*Fothergilla invol.* FALC., in Proc. Lin. Soc. I. 18. 1839 [nomen seminudum], *Parrotia jacquemontiana* DCNE., in JACQ. Voy. Bot. t. 82. 1844. Himal. (Kaschmir) und Afghanistan, 2500—3000 m. — NIEDENZU stellt diese Art als besondere Untergattung zu *Fothergilla*, man könnte sie mit ebensoviel Recht als Subgenus bei *Parrotia* belassen, ich glaube jedoch daß es am besten ist, sie als eigene Gattung zu nehmen, was ja NIEDENZU schon andeutet. — Nach Angabe des Herrn JOURN war sie in Plantières in Kultur und nicht empfindlicher als *Parrotia*.

Gattung 113. *Fothergilla* MURR., Syst. ed. XIII. 418. 1774.

Vgl. oben S. 424 und Arten.

A. B. vgl. Fig. 275c—e. Blst. wie Fig. 274m. Stbf. nach Anthese kaum über 9 mm lang, Fr. 6—9 mm lang.

1. *F. carolina* (*F. alnifolia*): 0,4—1 m hoher, aufrechter, buschiger b; • Zw. rund, etwas kniebig, bräunlich büschelhaarfilzig, kahlend, grau werdend, Kn. vgl. Fig. 279h—m, Mk. grünlich: B. von ziemlich wechselnder, im allgemeinen eiförmiger Form 4:2—8:5 cm o. auch schmal länglicher, oberseits lebhaft grün, • verstr. beh., unterseits

Fig. 275. Blattformen von: a *Parrotia persna*. — b *Parrotopsis involucrata* (*Parrotia jacquemontiana*). — c—e *Fothergilla carolina* (*F. alnifolia*). — f *F. major*. — g *Corylopsis spicata*. — h *Cor. pauciflora*. — i *Cor. glabrescens*. — k—l *Loropetalum chinense*. — m *Sycopsis sinensis*. — n *Hamamelis virginiana*. — o *H. japonica*. — p *H. mollis* (Alles $\frac{3}{5}$ nat. Gr.) (Original, nur m, p nach OLIVER).

hellgrün bis weißlich grau, Beh. sehr wechselnd, Herbstfärbung purpurrot, Stiel 5—10 mm; Bl. in an Haupt- oder Seitentrieben endständigen Ähren vgl. Fig. 274m—p, weißlich, duftend, K. 5—7, Stb. bis 24, Stf. dicklich, Gyn. 2—3, mit je 1 Sa. Fr. 2—3 klappige Kapsel, dicht beh.

F. c. BRITT., in Mem. Torr. Club V. 180. 1894 (*Hamamelis virginiana carolina*, L., Mant. pl. 333. 1771; *Foth. alnifolia* L. F., Suppl. 52. 1781; *F. gardeni* JACQ., Coll. ad. bot. I. 79. 1786.) N-Am. (Virginia bis Georgia), trockene Böden.

Blz. IV—V. — Frz. X. — Hübscher Zier-b. Neuerlich wird von KEARNEY (in SMALL, Fl. southeast. States 509, 1903) eine *F. parvifolia* davon abgetrennt, die in N.-Carol. bis Florida (sandige Eichen und Kiefernwälder) wachsen soll und deren B. aus herztg. Grunde etwa so breit wie lang sind. Die Zahnung soll tiefer herabreichen. Scheint mir nur eine Form zu sein.

B. B. vgl. Fig. 275f. Blst. größer. 3—5 cm lang. Stbf. nach Anthese 11—14 mm lang, Fr. 11—13 mm lang.

2. *F. major*: höherer b., dessen oberseits ganz kahle und unterseits hellgrüne fast kahle B. bis 10—12:9 cm messen, die Blst. erscheinen meist etwas später, wenn die B. schon halb entwickelt sind. Sonst wie vorige Art.

F. m. LODD., Bot. Cabinet t. 1720. 1825/33 (*F. monticola* ASHE, in Bot. Gaz. XXIV, 374, 1897). — N.- und S.-Carol. Alabama, Berghänge 1—1200 m. — Auch in Kultur, aber seltener.

Fig. 276. a—f *Hamamelis virginiana*: a ⊙ Zw., b End-Kn., c—e Seiten-Kn., bei c im Querschnitt (1—Neb.-N.), f ⊙ Zw.-Querschnitt (1—6 vgl. Fig. 240), S. 375. — g—k *Parrotia persica*: g ⊙ Zw., h—i Kn. (α = B.-N., β = Neb.-N.), k = f. — l—o *Corylopsis spicata*: l ⊙ Zw., m Kn., n Beh. der Unterseite der Kn.-Sch., o ⊙ f (Original n. C. K. SCHNEIDER).

Gattung 114. *Corylopsis* SIEB. et ZUCC., Fl. jap. I. 45. 1835.

Vgl. oben S. 423. b. B. zweizeilig. Neb. breitlänglich, groß, abfällig. Bl. in achselständigen überhängenden Ähren, die vor den B. erscheinen und am Grunde von großen hellgelben Tragschuppen gestützt werden, perigyn. K. 5, C. 5, 5—15 kurzpfriemliche o. hakig auswärts gebogene Std., 5 opposipetale, fruchtbare Stb., sonst vgl. Arten, die sämtlich erwähnt sind.

A. Blst. meist über 5-blütig, B. vgl. Fig. 275g, i.

1. B. im Mittel kaum unter 8 cm lang (g), von Rippe zum Rande durchlaufende Seitennerven 7—9, unterseits auch Fläche verstr. beh. bleibend.

1. *C. spicata*: etwa 2 m hoch werdender b. Zw. jung + beh., c. meist kahl, rund, glänzend olivbraun o. graubraun, mit ∞ feinen hellen Lent., in Grau übergehend, Kn. vgl. Fig. 276l—o. braunrot, innere Sch. grünlich o. gerötet, auf Innenseite beh., Mk. grünlich; B. zuletzt von ziemlich derber Textur, 5:4,5—11:10 cm, Stiel bis 2,5 cm; Blst. vgl. Fig. 277a, Bl. hellgelb, wie die aller (?) Arten nach Primeln duftend, sonst vgl. b—f.

C. s. S. et Z., l. c. 47. t. 19. — Ährige Scheinhasel. — Japan (Bergwälder um Nagasaki); China (Kiangsi). Blz. IV(V) — In der Heimat viel kultiviert, bei uns seltener als *pauciflora*. Die verwandte *C. multiflora* HANCE, in Ann. sc. Nat. 1. sér. XV. 224. 1861 aus China (Fokien) hat stark beh. Kn. und Tragschuppen, die länglich-ellipt. B. messen bis ca. 11:5 cm, unters. beh., Seitennerven 7—8.

In Form und Größe *spicata* ähnlich sind die B. von *C. himalayana* GRIFF., in Journ. Asiat. Soc. Beng. XXIII. 642. 1854, Textur aber derber, Seitennerven 7—10, Bl.-Tragschuppen und Blst.-Achsen sehr zottig beh., Bl. an sich unansehnlicher. Khasia, O.-Bengal., Bhutan, Gebirge bis über 2000 m.

II. B. wohl durchweg kleiner, unters. kahle, Seitennerven 10—12 (Fig. 275i).

2. *C. glabrescens*: Bl., wie es scheint, kleiner als bei *spicata*.

C. g. FR. et SAV., Enum. pl. jap. II. 576. 1879. — Ich sah von dieser aus der Prov. Satsuma in Kiuschiu stammenden Art nur ein Original REINS. Die Bl. sind verblüht, die B. noch nicht ausgewachsen. Die fragliche *C. kesakii* S. et Z., l. c. 49, scheint nicht damit identisch. Allein zur Entscheidung ist ein Original exemplar nötig. Die Angaben von MIQUEL, Ann. Mus. Lugd. Bot. III. 207. 1867, könnten auch auf *pauciflora* deuten.

B. Blst. 2—3-blütig, B. vgl. Fig. 275h.

3. *C. pauciflora*: breitbuschiger bis 1,20 m hoher b. Zw. etwas weniger auffällig mit Lent. bedeckt, Kn. kleiner, als bei *spicata*: B. 3:2—6:4 cm, stärker kahle; N.-Enden etwas schärfer kopfig sich abhebend.

Fig. 277 a—f *Corylopsis spicata*: a Blst., b Bl., c Gyn. und Stbl., die Gr.-Enden daneben vergrößert richtig dargestellt, d Gyn. im L.-Schn., e dgl. im Q.-Schnitt, f Fr. — g—n *C. pauciflora*: g Blst., h Bl., i dgl. nach Entfernung der K. und C., k aufgesprungenes Stb., l Gyn., m dgl. im Schnitt, n Fr. (von *chinense*) (a—e nach NIEDENZU, g nach Gartenflora, h—l nach OLIVERO.

Bl. vgl. Fig. 277g, sonst kaum verschieden, nur N.-Enden etwas schärfer kopfig sich abhebend.

C. p. S. et Z., l. c. 48, t. 20. — Wenigblütige Scheinhasel. — Japan: Gebirge von Kiuschiu bis Hondo (?). Schöner, empfehlenswerter Zierstrauch.

Gattung 115. *Loropetalum* [R. BR.*)] OLIV., in Trans. Lin. Soc. XXIII. 459. 1862.

[*Tetrathyrium***)] BENTH., Fl. Hongk. 132. 1861.]

Vgl. oben S. 423 und Art.

L. chinense: reich verzweigter b. • Zw. zottig büschelhaarig, olivbraun; B. vgl. Fig. 275k—l, gleich den Zw. beh., oberseits sattgrün, unterseits hell grauweiß, etwas mehr beh., ganzrandig, aber die Beh. täuscht feine Zähnechen vor; Neb. lanzettlich, abfällig; Bl. in an seitlichen Krztr. endständigen Köpfchen, vgl. Fig. 277h n. K und C 4 (in der nach OLIVER kopierten Fig. des sonst in den Bl. nicht verschiedenen *subcordatum* 5!), dgl. die Staminodialschuppen a in i.

L. ch. OLIV., l. c. (*Hamamelis chin.* R. BR., in ABEL, Narr. Jour. China, App. 375. 1818). Riemenblume. — China (Hupei, Szetschwan, Kiangsi, Kwangtung), Himal., Khasia. — Die mir vorliegenden Expl. aus China haben B. wie Fig. 275k, also nur bis 3:1,3 cm, die aus Khasia aber messen bis 6,5:3 cm, ihnen gleicht mehr ein Zweig, den mir die Herren VERTEN and SOXS sandten (l). — Die 2. Art, *L. subcordatum* OLIV., in HOOK. Icon. pl. V, t. 1117. 1883, von den Black Mountain um Honkong hat B. bis 8:4,5 cm.

Gattung 116. *Sycopsis* OLIV., in Trans. Lin. Soc. XXIII. 83. 1862.

Vgl. oben S. 423 und Art.

S. sinensis: nach OLIVER: b • b, bis 6 m; B. vgl. Fig. 275m, aus keilfg. o. rundlicher Basis eilanzettlich, • entfernt gezähnt [o. ganzrandig***)], oberseits kahl, unterseits meist verstreut büschelhaarig, 6—9(12):3—4,5 cm, Stiel 1—1,5 cm, Neb. klein, lanzettlich; Bl. in an seitlichen Kztr. endständigen, 6—12-blütigen Köpfchen, vgl. sonst Fig. 278, ♂ von kapuzenfg. Brakteen umhüllt, mit rudimentärem K. (e) und Gyn. (f), Stb. 5; + wie a, die ein schon etwas fortgeschrittenes Stadium zeigt, Fr. ähnlich *Loropetalum*.

S. s. OLIV., in HOOK. Icon. pl. XX, t. 1931. 1890. — China (Hupei, Szet'schwan) Scheint einführenswert! — Die 2. Art ist *S. griffithiana* OLIV., l. c. 1862, aus dem Khasia-Gebirge, sie hat ganzrandige, etwas schmallänglichere B. Während bei *sinensis* die ♂ Bl. in unscheinbareren Köpfchen als die ♀ stehen, sollen beide bei *griffithiana* meist gemischt sein.

Gattung 117. *Hamamelis* L., Sp. pl. 124. 1753.

Vgl. oben S. 423: b • b, B. mit lanzettl. abfallenden Neb., Bl. in 1—5-blütigen, an kurzen Seitentrieben stehenden Köpfen (Fig. 478g). K. und C. 4 (selten an Endblüten 5), äußere Stb. fruchtbar, innere staminodial; Fr. erst im 2. Sommer reifend.

A. K. innen gelbbraun, außen dunkler, nicht zurückgerollt, Fr. halb-oberständig (Fig. 278l, B. wie Fig. 275n, *Corylus* ähnlich).

1. *H. virginiana*: b—b gelegentlich bis 10:0,4 m, breit offen verästelt: • Zw. rundlich, büschelhaarig, bräunlichrot o. braungrau, kahl, grau, mit deutlichen Lent., Kn. vgl. Fig. 276a—f; B. ziemlich variabel, z. T. mehr breit rundlich, aber vorwiegend wie Fig. 275n, Nervenpaare 5—7, 8—16:6—10 cm, unterseits •, oberseits verstr. beh., schöne Herbstfärbung, Stiel 8—18 mm, Bl. etc. vgl. Fig. 278g—m.

*) BROWN hat den Namen noch nicht als Gattungsnamen geführt.

**) NIEDENZU hält diese Gattung für *Lorop. subcordatum* aufrecht. Mir scheint der einzige Unterschied die 5-zähligen Bl. Siehe Text.

***) var. *integrifolia* DIELS, in ENGL. bot. Jahrb. XXIX. 381. 1901.

H. v. L., l. c. 1753 (*maurophylla* PURSH, Fl. am. sept. I, 116, 1814). — Virginische Zaubernuß; witch hazel. — N.-Am. (Neubraunschweig u. Neuschottl. bis Minnesota, Missouri, Flor., Texas). — Ufer, Gebüsch, ähnlich unserer *Corylus avellana*. Blz. (VIII—)IX—XII. — Seit langem in Kultur. Die Kapseln öffnen sich sehr explosiv und schleudern die S. weit weg, doch bei uns Fr. wohl selten reifend, da die Bl. meist vom Frost leiden. — Ihr steht nahe *H. mollis* OLIV., in Hook. Icon. pl. XVIII, t. 1742, 1888, die nach OLIVER 12:15:7—11 cm (vgl. Fig. 275 p) messende, unterseits filzig büschelhaarige B. hat, sonst in den Bl. von den beiden anderen Arten nicht abweicht, Fr. scheint noch tiefer unterständig als bei *virginiana*, K.-Farbe? China (Hupei); $\varnothing$, bis 3 m.

Fig. 278. a—f *Synopsis sinensis*: a — Bl. (Beh. des Recept. nur 7 T. gezeichnet), b diese im L.-Schn., d — Bl. mit Trgb., c K-Schuppe, f rudimentäres Gyn. — g—m *Hamamelis virginiana*: g Zw. mit Blst. und einer noch geschlossenen Fr., h Teile einer Bl. (1 — Tragschuppe, 2 — K., 3 — C., 4 — Stb., 5 — Std.), h' Stb. mit aufgesprungener A.-Klappe, i ein Ovarium im L.-Schn., k Bl. im L.-Schnitt ohne K. und C., l aufgesprungene Fr., m S. im L.-Schn. — n *H. japonica*: Fr. (a—f nach OLIVER, g, k—m nach NIEDENZU, sonst nach d. Nat.).

B. K. durchaus violett-purpurn, zurückgerollt. Fr. $\varnothing$, oberständig (Fig. 278 n). B. mehr denen von *Alnus incana* ähnlich, also rundlicher, aber auch wie Fig. 275 o.

2. *H. japonica*: Von *virginiana* sonst kaum abweichend, die Bl. sind schöner, die B. hfg. aus herzfg. Grunde nicht über 6:6 cm, in Nervenzahl kein Unterschied.

H. j. S. et Z., in Abh. Acad. Münch. IV. 2. 193. 1843 (*arboria* MAST., in Gard. Chron. 1881. 1. 216. Fig. 38). — Japan (Bergwälder von Kiuschiu und Hondo). — Blz. II—VI. — Seltener als vorige Art in Kultur.

Familie 31. Platanaceae, Platanengewächse.

LDL., Nat. Syst. ed. II. 187. 1836.

Vgl. Reihe S. 359 und Gattung.

Gattung 118. *Platanus) L., Sp. pl. 999. 1753.**

h, B. ☉, sommergrün, 3–7-lappig, B.-Scheiden die Kn. einschließend, Neb. groß, verwachsen, den Zw. kragenfg. umschließend;

Fig. 279. a–g *Platanus orientalis*: a ☉ Zw., b Kn., c deren zweite seidig beh. Sch., d B.-N. im Querschn (α = Neb.-N.), e Blattstielbasis (γ), welche die Kn (δ) verbirgt, im L.-Schn., f Krzr., g Zw.-Querschnitt (1–6 vgl. Fig. 240f. S. 375). — h–m *Fothergilla carolina* (*F. alnifolia*): h ☉ Zw., i Kn., k deren Querschnitt, l Büschelhaar, m = g. — n–r *Liquidambar orientalis* (*L. imberbe*): n ☉ Zw., o–p Kn., q Wimperung der Kn.-Sch., r = g. (Original nach C. K. SCHNEIDER).

Blst. kugelige Köpfchen, die einzeln oder zu 2–7-ährig an einer langen Spindel sitzen; Bl. (im einzelnen schwer unterscheidbar) 5. monoec., lfg. mit Rudimenten des anderen Geschlechts, schwach perigyn. 1/2

*) Spez.-Lit.: In erster Linie weise ich hin auf die Arbeit von FR. JAENNICKÉ, in Nov. Act. Leop. Carol. Bd. 77. 115. 1899, der ich mich in der Hauptsache anschließe; ferner seien erwähnt: S. SCHOENLAND, in Engl. bot. Jahrb. IV. 308. 1883, und J. JANKÓ, l. c. XI. 412. 1890; E. GADECEAU, in Bull. Soc. Sc. Nat. de l'Ouest, Nantes, IV. 105. 1894 und USTERI, in Mem. de l'herb. Boiss. No. 20. 53. 1900, sowie G. WYTHES, in Gard. Chron. XXIX. 363. 1901.

meist 4-zählig, K. beh., C. kahl, beide sehr klein und hfg. schwer nachweisbar, Stb. fast sitzend mit langen A. (Fig. 280b), die von dem beh., $\dagger$ schildfg. Connectiv überdeckt werden, Rudimente von Gr. selten nachweisbar: ♀: meist 3- o. 6-zählig, K. und C. wie bei ♂, meist Std.*) vorh. (vgl. 3 in Fig. 280a und f),

Frkn. frei, Sa. je 1, selten 2, hängend (g), Gr. am Ende hakig gekrümmt, N. an der Innenseite herablaufend; Fr. eine Sammelfr., die einzelnen Frb. zu Caryopsen werdend, wie c, d, h; End. schwach, E. lang dünn.

Fig. 280. *Platanus*: a—b *occidentalis* a hexamere ♂ Bl. (1—K., 2—C., 3 Std., 4=Gr.), b Stb. aus ♂ Bl., c reife Fr., rechts von d Andeutung, daß der Haarkranz nur ganz am Fuße ansitzt. — d *orientalis*: reife Fr., rechts wechselnder Ansatz der Haare. — e—m *acerifolia* **): e ♂ Bl. nach Entfernung der A., f ausgebreitete tetramere ♀ Bl. (1—4 vgl. a), g Ovarium im L.-Sch., h Fr. dgl., i—k junges und ausgewachsenes Haar von der B.-Unterseite, l—m Haare aus dem Fr.-Schopf (a nach SARGENT, c—d z. T. nach GADECEAU, b Orig., sonst nach SCHÖNLAND und NIEDENZU).

s. S. 439 C B.-Lappen fast stets gezähnt, Unterseiten gewöhnlich bald kah-
lend (Fig. 281, 282 und 283 a—e).

* B. vgl. Fig. 281, Lappen 5—7, selten 3, Mittellappen schmaler als
an Basis breit; Frst. meist zu 3—4, Fr. spitz-dreieckig in den
Gr. auslaufend (Fig. 280d).

1. *P. orientalis*: B. bis 30:3(—4) m, St. schlank, hfg. bis fast
zur Spitze verfolgbar, mit lockerer breit aufrechter, starkästiger Krone.
Borke*) etwa 1 m starker St. dünn-abblätternd, so daß die weiße o.
graugelbliche Rinde zutage tritt; Kn. vgl. Fig. 279 a—g; B. im Mittel
etwa 15:15—20 cm, Stiel dabei 5—7 cm, vgl. var.; Bl. und Fr. vgl.
oben und Fig. 280.

var. a *insularis*†) DC., Prodr. XVI. 2. 159. 1864. Typische Form, B. vor-
wiegend wie Fig. 281a—c. b. *liquidambarifolia* SPACH, in Ann. Sc. nat. sér

*) Ich sah diese stets beh. und nie so, wie sie SCHÖNLAND in f abbildet.

**) Bei NIEDENZU bez. SCHÖNLAND als *occidentalis*!

*** Vgl. meine Dendrol. Winterstudien Fig. 37, wo die Borke von *P. acerifolia*
in einer *P. orientalis* näher stehenden Form abgebildet ist.

†) Vielleicht synonym mit var. *longata* AIT., Hort. Kew. III. 364. 1709. Über
die von LONDON zu var. *cuneata* gezogene *undulata* AIT., l. c., bin ich ebenfalls noch
im unklaren.

2. XV. 292. 1841 (*var. teneri* K. KOCH, Dendrol. II. 2. 457. 1872): Lappen schmaler, ganzrandig (d). — *e. cuneata* LOUD., Arb. III. 2034. 1844 (*P. cuneata* WILLD., Sp. pl. IV 473. 1805), B. mit besonders stark keilfg. Grunde und kurzen B-Stielen bis 3 cm, vgl. f—g. — *d. digitata* JANKÓ, l. c., B. wie *e* mit außerordentlich schmalen Lappen, wohl aber nur Form von var. *b*. — Über var. *atifolia* siehe bei *P. acerifolia*.

P. o. L., l. c. (*P. palmata* MOENCH, Meth. 358. 1794; *hispanica* TEN., Cat. Ort. Nap. 1845. 91). Morgenländische Platane. — Von Corfu, Griechenl., Maced., Creta, Cypern, Libanon bis Persien und wohl O.-Ind., allem im äußersten Westen des Gebiets wohl ebenso kultiv. wie im Kauk. und Eur. — Blz. V. — Frz. XI—XII. Ich möchte gleich hier meine von JAENNICKÉ etwas abweichende Anschauung der Sachlage betonen. Dieser Autor hat gewiß recht, wenn er (für das Gebiet, in dem er hauptsächlich seine Beobachtungen anstellte [Hessen, Baden etc.]) die echte *orientalis* als selten hinstellt. Allein m. E. wird diese Art je weiter wir nach SO., S- und W.-Eur. kommen, häufiger. In und um Wien sind echte *orientalis*-B nicht so selten, wenn auch lange nicht so hfg. wie die Formen, die auch ich vorläufig als *P. acerifolia* führe. Dagegen ist die typische *occidentalis* hier so gut wie gar nicht vorhanden und m. E. auch in Deutschland und überhaupt auf dem Kontinent sehr selten! Wenn JAENNICKÉ anderer Ansicht ist, so rührt das m. E. daher, daß er Formen zum Typ zieht, die ich schon für solche hybriden Ursprungs halten möchte. Ich bitte das bei *acerifolia* Gesagte zu beachten und dabei im Auge zu behalten, daß wir bis heute noch nicht genau wissen, wie denn die Typen von *orientalis* und von *occidentalis* in der Heimat variieren! Das Herbarmaterial gibt darüber nur ganz ungenügenden Aufschluß, und es hat mich — gleich GADECEAU — in der Annahme bestärkt, daß *occidentalis* echt nur ganz vereinzelt noch auftritt, so sah ich nur ein sicheres Exemplar im Hort. SIMON-LOUIS zu Plantières, übrigens sagt auch SARGENT Ähnliches. Ich glaube auch, daß die von JAENNICKÉ zu *occidentalis* gezogenen Formen *pyramidalis*, *suttneri* und *kelseyana* eher zu *acerifolia* zu ziehen sind. Nicht eher scheint es mir möglich, solche Gartenformen sicherzustellen, als bis wir ganz genau wissen, wie die Typen in der Heimat (spontan!) variieren, so habe ich immer das Gefühl, als schrieben wir namentlich *occidentalis* einen Formenreichtum zu, der nur dadurch erklärlich wird, daß wir eben Hybriden mit *orientalis* vor uns haben. Ich möchte denn doch betonen, daß die auf Fig. 280 in c und d dargestellten Fr.-Charaktere für die echten Arten ziemlich konstant scheinen*), ebenso auch die Zahl der Frst. einer Fr.-Ähre. Alle Unklarheit wird durch die hybride *acerifolia* hervorgerufen, der ja die allermeisten angepflanzten Platanen zugehören und die der Natur der Sache nach bald mehr dem einen, bald mehr dem anderen Elter gleichen und deshalb je nach dem vorliegenden Material ebensogut als var. von *orientalis* wie von *occidentalis* angesehen werden kann.

*) B. vgl. Fig. 282 und 283a—e, vorwiegend 3- o. 5-lappig, Mittel-lappen an Basis meist breiter als lang, Frst. einzeln, selten zu 2**). Fr. an Spitze stumpf-rundlich (vgl. Fig. 280c).

1 × 2. *P. orientalis* × *occidentalis*: *P. acerifolia*: Wuchs, Zw., Kn. etc. vgl. Stammarten, bez. Fig. 279a—g; B. wie Fig. 283a—e, aber vgl. auch Formen†, vorwiegend 5, selten schwach 7-lappig, hfg. aber 3-lappig, in Gestalt der Lappen und Weite und Tiefe der Buchten alle Übergänge des einen Elters zum anderen!, das Gleiche gilt von den Frst. und Fr., Bl. vgl. Fig. 280e—m.

Formen lassen sich bei einer Hybride, wenn man will, natürlich sehr viele unterscheiden. Ich ziehe folgende 3 im Gegensatz zu JAENNICKÉ hierher: *f. pyramidalis* (*P. orient.* *f. pyramidalis* BOLLE, apud JANKÓ, l. c. 449; *occid. var. pyr.* JAENNICKÉ, l. c. 120) in der Jugend pyramidal wachsende Form, die augenscheinlich der *occidentalis* näher steht†) (Fig. 282g); *f. suttneri* (*occid. var. suttneri* JAEN., l. c.), Form mit weißgeflecktem (*fol. albo-variegata*) Laube, nach von

*) Vgl. die Arbeit von GADECEAU!

**) Vgl. GADECEAU, der das reiche Material in Paris, und USTERL, der das Herbar BOISSIER durchsah. Ich fand in Wien dasselbe!

***) Für den Bastard *acerifolia* gelten natürlich zum Teil die Merkmale unter †, S. 436.

†) Hier JAENNICKÉ betonte die Zugehörigkeit zu *occidentalis* nochmals in einer Mitteilung. Sonst vgl. das was WYTHES sagt!

mir in Hort. Plantières gesammelten, von SPÄTH stammenden Exemplaren unmöglich zu *occidentalis* zu stellen, man vgl. nur das B. in Fig. 282h; *f. kelseyana* (occ. var. *kels* JAEN., l. c.), Form mit gelbbuntem Laube, nach meinen Beobachtungen ebenfalls mit gleich viel Recht hier wie bei *occidentalis* einzureihen. Erwähnt sei, daß nach GADECEAU, welcher SPACHS Original seiner *vulgaris* var. *vitifolia*, l. c. 292, sah, diese zu *acerifolia* gehört und nicht zu *orientalis*.

P. a. WILLD., Sp. pl. IV. 474. 1805 (*P. orient.* var. *acerif.* ARR., Hort. Kew. III. 304. 1799). Ob die hierher gerechneten Formen sämtlich hybriden Ursprungs sind, ist zurzeit noch die Frage und diese, wie ich oben bei *orientalis* betonte, erst dann zu lösen, wenn man den Variationskreis der spontanen Eltern viel genauer kennt, als es heute der Fall ist. Das Experimentieren mit Gartenformen führt nur zu leicht zu Trugschlüssen!

Fig. 281. *Platanus*-B.: a—b *orientalis*: typische B. spontaner Pflanzen, c dgl. von Kultur-Pflz. — d *orientalis* var. *liquidambarifolia*. — e var. *digitata*. — f—g var. *cuneata* ($\frac{1}{8}$ nat. Gr.) (nach JAENNICKÉ).

2. *P. occidentalis*: B., in der Heimat gelegentlich bis 55:3.80 m. in Wuchs, Borke, Zw., Kn. sind mir sichere Unterschiede gegenüber *orientalis* noch nicht bekannt geworden: B. vgl. Fig. 282a—c, etwa 15 bis 22 cm im Mittel Dm., an üppigen Schossen natürlich auch viel größer, oft breiter als lang, Lappung, wie Fig. 282b zeigt, oft auffallend kurz und, wie JAENNICKÉ mit Recht betont, sind die ganzrandigen Formen von der gezähnten meist recht abweichend, Stiel im allgemeinen länger als bei *orientalis* und Unters. meist etwas reichlicher beh., Neb. größer, wie bei *orientalis*; Bl. vgl. Fig. 280a—b.

P. occ. L., Sp. pl. 999. 1753 (*P. lobata* MOENCH, Meth. 358. 1794; *hybridus* BROTT., Fl. lus II. 487. 1804, teste JAENN.; *vulg.* var. *angulosa* SPACH, l. c. 1846. — Abendlandische P.; Syeamore, Buttonwood. — N.-Am., Maine bis Ontario und Minn., Flor., Kans., Texas. — Flußufer, feuchte Böden. — Blz. V. — Frz. XI. — Dürfte etwa 1640 nach Eur. gekommen sein und war gewiß im Anfange häufiger.

Die von USTERI hervorgehobenen Unterschiede in den Haarformen kann ich nicht als zutreffend ansehen.

während sie jetzt ganz allgemein durch *acerifolia* verdrängt ist. Man vgl. oben bei *orientalis*. Der Wert der *occid.* var. *hispanica* WESM., in Mém. Soc. Sc. Hainaut. sér. 3. I. 12. 1867 (nec *P. hisp.* TEN.), ist mir noch problematisch. Eine abnorme Form mit „stipulis elongatis, tubiformis“ stellt var. *tubifera* JAEN., l. c., dar.

○○ B.-Lappen fast stets ganzrandig. Unterseiten gewöhnlich bleibend filzig beh. (Fig. 283g—l).

✱ B. kurz und spitz 3-lappig (Fig. 283h—i). Frst. meist zu 4.

Fig. 282. *Platanus*-B: a—c *occidentalis*, typische B. spontaner Pflz. — d—e B., die JAENNICKE ebenfalls zu typ. *occidentalis* rechnet. — f, cc., var. *hispanica* — g *acerifolia* f. *pyramidalis*. — h f. *suttneri* ($\frac{1}{5}$ nat. Gr.) (nach JAENNICKE).

3. *P. mexicana* **): hoher B., junge Zw. filzig, ♂ + beh.; B. unters. bräunlich o. silbrig-filzig, oben tiefgrün, zuweilen fünflappig, Lappen meist ganzrandig. Textur derb, breiter als lang; Frst. kleiner, meist ca. 2 cm Dm., Fr. mehr an *orientalis* erinnernd.

P. m. MORICAUD, in Bull. Ferr. Bot. 1830. 79 (occ. var. *mexicana* JANKÓ, l. c. 451). Mexico (Veraeruz, Orizaba). Blz. IV. — Hierher gehört das als *lindeniana* verbreitete Expl. leg. PRINGLE No. 8107, wogegen die echte *lindeniana* MART. et GAL., in Bull. Acad. Brux. X. 2. 342. 1843, nach JAENNICKE eine var. von *occidentalis* darstellen soll, worauf allerdings das von ihm zitierte, nur ebenfalls vorliegende Exemplar leg. PRINGLE No. 1962 (verbreitet als *P. mexicana* hindeutet (vgl. B. in Fig. 283f). Ich betone aber, daß ich die Originaldiagnose nicht kenne und daß es doch vielleicht eines Originalexemplars bedarf, um die Art sicherzustellen. Ihr dürfte die nach dem mir vorliegenden Exemplar (leg. PRINGLE No. 8319, Mexico, State of Coahuila) ebenfalls einzeln stehende Frst. besitzende *P. glabrata* FERNALD (wo?) nahe stehen, deren ähnlich geformte B. sehr bald fast ganz kahlen.

✱✱ B. tief handfg. (3—5(—7)-lappig. Frst. meist zu 4—5.

*) Meines Erachtens wohl schon stark an *acerifolia* gemahnend.

*) JAENNICKE führt eine var. *peltata* (Fig. 283k): foliis elongatis-lobatis, basi cuneata, vel rotundata a petiolis perforatis.

4. *P. racemosa*: $\bar{h}$, in Heimat zuweilen bis 40:3 m; junge Zw. dichtfilzig, o., kahl. Kn. wie es scheint, kürzer und stumpfer als auf Fig. 283g; B. zuweilen 3-lappig, meist etwa so lang wie breit, unters. dick weißgrau filzig, oben tiefergrün; Frst. kaum 2 cm Dm., Fr. mit abgerundetem Kopf, aber deutlichem Gr.

P. r. NUTT., Sylva I. 47. t. 15. 1842 (*californica* BENTH., Bot. Voy. Sulphur 54. 1844). Californien (nach SARGENT: from the valley of the lower Sacramento River southward through the interior valleys and coast ranges of the state, finding its southern home on San Pedro Martir Mountain in Lower Calif.). Blz. V. — Bei uns nur sehr vereinzelt versuchsweise in Kultur. Ihr ähnelt hfg. im Laubwerk (Fig. 283h) *P. wrightii* WATS., in Proc. Am. Acad. X. 349. 1875 aus SW.-Neu-Mexico, S.-Arizona und Mexico (Sonora), Lappung der B. noch tiefer und schmaler wie bei *racemosa*, zuweilen 7 Lappen, Textur dünner, Beh. unters. eher schwächer. Fr. nach SARGENT ohne Gr., Frst. meist zu 3.

Fig. 283. *Platanus*-B.: a—e *acerifolia*. — f. *occid. var. lindeniana*. — g *racemosa*. — h *i. mexicana*. — k *mex. var. peltata*. — l *wrightii* (ca. $\frac{1}{5}$ nat. Gr.) (nach JAENNICKE).

Familie 32. *Spiraeaceae* ^{*)}, **Spierstrauchgewächse**

sensu MAXIM., in Act. Hort. Petrop. VI. 1. 163. 1879.

(*Rosaceae* Unterfam. *Spiracoidae* FOCKE, in Nat.-Pfl. III. 3. 13. 1888).

Vgl. Reihe S. 359: 2, $\bar{h}$ o. $\bar{b}$, B. ☉, meist sommergrün, einfach, o. gefiedert, fast immer gezähnt, Neb. vorh. o. fehl.; Blst. traubig o. zymös zusammengesetzt, Bl. meist klein, weiß o. rosa. Bl.-Achse flach

^{*)} Obwohl ich die enge Verwandtschaft der *Spiraeaceen*, *Rosaceen* (im engeren Sinne), *Pomaceen* und *Drupaceen* (= *Prunoideen*) nicht verkenne, halte ich es doch für den Zwecken meines Buches angemessener, diese Familien nicht als *Rosaceen* im erweiterten Sinne zu führen. — Von spec. Literatur vgl. außer MAXIM., l. c., auch ZABEL, die strauchigen *Spiräen* unserer Gärten. 1893.

bis trichterförmig o. fast röhrig : K. und C. 5, selten 4 o. 6, Stb. 10—20—70, perigyn, in Kn. einwärts gekrümmt. Frb. 12—1, meist 5-2, wirtelig gestellt, weder auf besonderem Gynophor noch in die bleibende Bl.-Achse eingesenkt, mit je 2 o. mehreren Sa., diese anatrop und meist hängend. Integ. 1—2, Fr. zur Frz. meist aufspringend. S. ohne o. mit wenig End.

Gattungstabelle:

A. B. einfach, nur meist $\pm$ gezähnt bis gelappt.

I. B. häutig, sommergrün.

a) B. (meist) gelappt (Fig. 286). Neb. vorh., Samenschale glänzend, steinhart.

1. B. vgl. Fig. 286a—h, Frb. 2—4—5, Fr. aufgeblasen, an Bauch- und Rückennaht aufspringend. **119.** *Opulaster* (*Physocarpus*).

2. B. vgl. Fig. 286i—o, Frb. 1(—2), Fr. nicht aufgeblasen, nur an Bauchnaht sich öffnend.

a) B. wie in Fig. 286i—k, Gr. endständig, Sa. 3—6 (Fig. 285l). **120.** *Neillia* (S. 446).

β) B. wie Fig. 286l—o, Gr. zuletzt seitlich, Sa. nur 2 (Fig. 285r). **121.** *Stephanandra* (S. 448).

b) B. (meist) ungelappt. Neb. fehlend, Samenschale häutig o. lederig runzelig.

1. Fr. aufspringend, B. ganzrandig o. $\pm$ gezähnt.

a) niedrige rasige b. B. an den Enden der verholzenden Wurzelstöcke rosettig gehäuft (vgl. Fig. 297). **123.** *Petrophytum* (c—d¹) und **123a.** *Lactkea Eriogynia* (g—h¹).

β) meist hoch aufrechte b. jedenfalls B. nie rosettig gehäuft.

○ Frb. frei o. nur am Grunde verwachsen, S. ungeflügelt, Bl. $\pm$ bis sehr klein.

* Frb. frei, Bl. meist ♀, B. meist gezähnt (jedenfalls sonst viel kleiner als bei *Sibiraea*). **122.** *Spiraea* (S. 449).

** Frb. am Grunde verwachsen, Bl. ♀♂, B. ganzrandig (vgl. Fig. 297e—f¹). **124.** *Sibiraea*.

○○ Frb. fast bis oben verwachsen, S. flügelrandig, Bl. etc. vgl. Fig. 302. **129.** *Exochorda*.

2. Fr. nicht aufspringend, B. zuw. lappig, sonst vgl. Fig. 300 a—k **130.** *Holodiscus*.

II. B. wintergrün, $\pm$ lederig (vgl. Fig. 300l, q).

1. Bl. klein, in zusammengesetzten Trugdolden. B. länglich-lanzettlich, über 3 cm lang. **128.** *Vanquelinia* (l—p).

2. Bl. groß, einzeln. Mispel ähnlich. B. oblong, kaum über 2,5 cm lang. **127.** *Lindleya* (q—w).

B. B. gefiedert (Fig. 299).

I. B. einfach gefiedert, sonst vgl. Fig. 297. **125.** *Sorbaria*.

II. B. doppelt gefiedert, sonst vgl. Fig. 297. **126.** *Chamaebatiaria*.

B. siehe S. 449

Unterfamilie A. *Neilliac* MAXIM., l. c. 105. B. ... gelappt, Neb. vorh., Frb., wenn isomer, mit den Sepalen alternierend, S. hartschalig End. $\pm$ reichlich vorh.

Gattung 119. *Opulaster)** MEDIC., Pflanz.-Anat. II. 109. 1799.
(*Physocarpa* RAF., New. Fl. N.-Am. III. 73. 1836.)
[Blasenspiere; Ninebark].

Vgl. oben: b. B. sommergrün, vgl. Fig. 286a—h, Neb. abfällig; Bl. weiß, in (meist einfachen) Doldentrauben am Ende diesjähriger Kztr., K. 5, valvat, C. 5 imbrikat, Stb. 20—40, in 2—3 Reihen am Discusrand inseriert, Gyn. 1—5, am Grunde o. bis fast $\frac{2}{3}$ verwachsen, mit je 2(—4) Sa., Gr. mit kopfiger, o. — zweilappiger N., Balgkapseln vom bleibenden Gr.-Grund gespitzt, so lang o. länger als K., in der oberen Hälfte der Bauch- und Rückennaht aufspringend, S. meist einzeln, Testa hart, gelblich, End. fast null. — Alle Arten erwähnt**).

○ Frkn., bez. Fr. kahl o. nur an der Spitze spärlich beh.

4 B. unters. ganz kahl o. nur in den Achseln der Hauptnerven etwas sternhaarig gebartet, Fr.-Kapseln die K. um mindestens das Doppelte ihrer Länge überragend.

1. *O. (Physocarpus***) opulifolius*: bis 3 m hoher, ausgebreitet verästelter b. Zw. später hfg. — überhängend, kahl, $\pm$ hellbraun, $\pm$ graubraun, längsrissig, später abblättern: Kn. vgl. Fig. 284d—p; B. wie Fig. 286a—b, oberseits tief-, unterseits hellgrün, am Blzw. im Mittel etwa 5:4 cm, sonst bis 13:10 cm, Lappen hfg. spitzlicher und Basis mehr herzfg.; Blst. kahl o. — bis reichlich beh., vgl. var., Bl. etwa 10—12 mm Dm., Stb. c. 30, Frkn. 3—5, selten an Spitze wie in Fig. 285a beh., sonst vgl. dort.

Man kann unterscheiden: var. a. *typicus*: Bl.-Stiel zur Frz. ganz kahl, Bl.-Achse und K. außen ebenfalls kahl o. fast kahl; hierher als Formen: *f. luteus* (*Phys. opul. var. lutea* KIRCHN., Arb. Musc. 217. 1864), B. wenigstens jung gelb und *f. debrichyanus* (*Spir. opul. „de Brichy“ aur.-marg.* Hort. SIMON-LOUIS), B. unregelmäßig, vgl. Fig. 286c und — hellgelb panachiert; ob identisch mit var. *krusna* Hort. SPATH? — var. b. *tomentellus* (*Spir. opul. var. tomentella* SER., in DC. Prodr. II. 542. 1825), Bl.-Stiele, Bl.-Achse und K. außen bleibend — filzig beh., durch die kahlen B. von *O. capitatus* sofort zu unterscheiden. — var. c. *nanus* (var. *nana* KIRCHN., l. c.). Zwergform —? var. d. *inebrians* (*Phys. opul. var. ineb.* ZBL., l. c. 108) mir noch unklare Form, die vielleicht hybriden Ursprungs, doch kann ich das mir vorliegende Material von var. a. kaum unterscheiden.

O. o. O. KTZE., Rev. gen. II. 949. 1891 (*Spiraea opul.* L., Spec. pl. 489. 1753; *Phys. opul.* RAFIN., l. c.; *Neillia opul.* BENTH. et Hook., Gen. Pl. I. 612. 1845) — Schneeball-B.; — eastern n. — O.-N.-Am., von Quebec östlich bis Ohio, Kentucky, südlich bis Georgia. — Vorzüglich an felsigen Hängen, Bachufern. — Blz.

*) Außer den S. 440 zitierten Werken vom MAXIM. und ZABEL vgl. besonders GREENE, in Pittonia II. 25. 1889 und JONES, in Zoe IV. 38. 1893. Besonders die letzte Arbeit beweist, daß die *Opulaster*-Arten sehr variabel sind. Jedenfalls ist es eben nur auf Grund sehr reichen spontanen Materials möglich, die Arten zu umgrenzen, die vielleicht durch Bastartformen — wie solche in Gärten sicherlich auftreten — verbunden sind.

**) BATALIN beschreibt in Act. Hort. Petrop. XIII. 92. 1893 eine *Spiraea anomala* aus China (Hupei). Er glaubt, daß sie zu *Physocarpus* gehört. Mit ihrem „receptaculum totum intus dense et longe hirsutum“ und den ungelappten B. wurde sie einen ganz neuen Typ der Gattung darstellen. Jedenfalls ist nur ihre Zugehörigkeit zu *Opulaster* zweifelhaft.

***) Die Schreibweise *Physocarpus* stammt von MAXIMOWICZ.

VI—VIII. — Frz. X. — Altbekannter Kultur-b. Seine östliche Verbreitungsgrenze in der Heimat noch unsicher. JONES, l. c., scheint mir denn doch die Arten zu wenig scharf auseinanderzuhalten *).

✧ B. unters. auch auf Fläche — beh. bleibend, Fr.-Kapseln die K. hfg. nur um die Hälfte ihrer Länge überragend.

2. *O. (Physocarpus) capitatus*: im allgemeinen niedrigerer als *opulifolius*, Zw. mehr überhängend, nach GREENE oft hingestreckt unter höheren Gehölzen, — gewunden: B. vgl. Fig. 286h, im Umriß meist rundlicher, 6—7.5 cm lang und eher breiter: Bl. eher größer, Frkn. (2—)3—5, meist an Spitze beh., Bl. Stiele, Bl.-Achse und K. außen stets filzig, im übrigen *opulifolius* hfg. sehr ähnlich, die S. geben nach meinen und JONES' Beobachtungen sichere Unterschiede nicht ab.

Fig. 284. a—c *Opulaster (Physocarpus) amurensis*: a ⊙ Zw., b B.-N. im Schnitt, c = a. — d—p *O. opulifolius*: d—e ⊙ Zw., f Seit.-Kn., g—h B.-N., i Buschelhaar, k—n Kn., dazu Beh. derselben und B.-N. im Schnitt, o—p Zw.-Q.-Sehn. (1—6 vgl. Fig. 240f, S. 375). — q—v *Malus spectabilis*: q ⊙ Zw., r—s Kn. (1—3 B.-N.), t Kn. mit vorderer Beiknospe, u Kztr., v—w (Original nach C. K. SCHNEIDER).

O. c. KTZE., l. c. (*Spir. cap.* PURSH, Fl. Am. Sept. I. 342. 1814; *Phys. tomentosa* RAF., l. c.; *Spir. ribifolia* NUTT., apud TORR. et GR., Fl. of N.-Am. I. 414. 1840; *Spir. opul.* var. *molle* TORR. et GR., l. c.; *Viburnum cap.* GREENE, l. c.)

Kopfdoldige B. — W.-N.-Am. von Brit. Columb. bis Calif., südliche und westliche Grenze noch unsicher, wohl aber kaum westlich der Rocky Mts. — Viel seltener in Kultur als *opulifolius* und mit deren var. *tomentellus* hfg. verwechselt.

C — Frkn. und Fr. durchaus beh., Fr.-Kapseln die aufgerichteten K. nicht o. kaum überragend *).

*) Von TORR. et GRAY, Fl. of N.-Am. I. 414. 1840, wird eine var. *ferruginea* NUTT. erwähnt: leaves and branchlets tomentose throughout with a brownish stellate pubescens; carpels glabrous. Mit dieser identifiziert RYDBERG in SMALL, Fl. of Southeast States 513. 1903 seinen *C. stellatus* aus Georgia und Florida. Allein er sagt, follicles pubescent. Ich sah bisher weder Expl., die auf *stellatus*, noch solche, die auf *ferruginea* passen.

- 7 B. an Bl.-Trieben kaum unter 5, an Lgtr. kaum unter 8 cm lang, C. mindestens $\frac{1}{2}$ mal länger als K., Frkn. 4—3(—2), zur Frz. die K. höchstens um $\frac{1}{3}$ ihrer Länge überragend.

3. *C. (Physocarpus) amurensis*: in Höhe und Tracht *opuloides* sehr ähnlicher b. c. Zw. am Ende meist noch beh. Kn. vgl. Fig. 284a—c: B. an Lgtr. spontaner Expl. wie Fig. 286d, also fast 5-lappig und Lappen spitz (an *Ribes nigrum* erinnernd, im Mittel ca. 8:7 cm, jedoch kommen an Kulturexemplaren alle Übergänge zu *opulifolius*-Formen vor (vgl. e), wie auch andere Arten spitzlappig sein können. Beh. ähnlich *capitatus*, zuweilen aber stark kahlend; Bl. 13—16, nach ZBL. 16—18 mm Dm., Stiele und Bl.-Achse, sowie K. außen dicht beh., C. außen am Grunde beh., Stb. ca. 40, Fr. vgl. Fig. 285f, wenn weniger Frkn., so mehr der von *monogynus* ähnelnd.

O. a. O. KTZE., l. c. (*Spir. amur.* MAXIM., Prim. Fl. amur. 90. 1859; *Phys. amur.* MAXIM., in Act. Hort. l. c. 1879). — Amur-B. — Amurgebiet. — Diese Art ist schon zieml. verbreitet, es scheint aber, daß z. T. auch die im folgenden kurz besprochenen amerikanischen Formen, die sich sehr eng an *amurensis* anschließen, unter dessen Namen kultiviert werden. Leider hatte ich von diesem und den west-amerikanischen Arten zu wenig spontanes Material, um ihre — von den amerikanischen Autoren ganz vernachlässigten! — Beziehungen zu studieren. So schließt sich meines Erachtens eng an der durch verwickelte Nomenklatur ausgezeichnete *C. pauciflorus* HELLER*), in Bull. Torr. Cl. 1898. 626 (*Spiraea paucifl.* NUTT., apud TORR. et GR., Fl. of N.-Am. I. 414. 1840; *S. opul.* var. *paucifl.* T. et GR., l. c., ex parte!; *Neillia malvacea* GREENE, in Pitt. II. 30. 1889; (*O. malvaceus* O. KTZE. *), l. c., 1893). Diese Art ist von HOOKER, in Bot. Mag. t. 7758. 1901, als *Neillia torreyi* beschrieben und abgebildet worden. HOOKER hat diese Angabe in einer Nachschrift auf Grund von Mitteilungen B. L. ROBINSONS selbst korrigiert, wonach seine Pflanze zu *N. malvacea* = *O. pauciflorus* gehört. Nach ROBINSON soll diese Art von Oreg. und den nördl. Rocky Mts., Wash. und Idaho bis Utah, Nevada und W.-Texas verbreitet sein, während *O. monogynus* (*N. torreyi*) von S.-Dakota, Wyoming, den Rocky Mts. von Color. bis Neu-Mex. vorkommen soll. *O. pauciflorus* hat 3—5 cm lange und ca. ebenso breite, stumpflappige, ähnlich *capitatus* o. auch schwächer beh. B., Bl. *monogynus* sehr ähnlich, aber von Größe der *amurensis*, Frkn. 2—3, Fr.**) den K. nicht überragend. Jedenfalls eine gute, aber der *amurensis* nächstverwandte Art.

Das oben für *pauciflorus* angegebene Verbreitungsgebiet dürfte aber einzuschränken sein, wenn *C. intermedius* RYDBG., in Br. et Br. Manual 492. 1901, aus S.-Dakota, Illinois, Alab. und Color. tatsächlich eine gute Art und nicht etwa als ein Bastart *opulifolius* = *pauciflorus* anzusehen ist, was jedoch wegen seiner so weiten Verbreitung kaum möglich erscheint. Er würde von *pauciflorus* durch kahlere B., meist 3—4 Frkn. und etwas längere Fr., kurz durch *opulifolius* ähnliche Merkmale abweichen, von diesem aber durch die ganz beh. Fr. sofort zu unterscheiden sein. Mit *intermedius* scheint mir synonym *C. ramaleyi* A. NELSON, in Bot. Gaz. XXXIV. 367. 1902, Rocky Mts. von Color.

- 7 B. an Blzw. kaum über 2—3, an Lgtr. kaum über 5 cm lang.
C. nicht o. kaum länger als K., Frkn. 1—2, zur Frz. die K. nicht überragend.

4. *C. (Physocarpus) monogynus*: in seiner typischen Form in der Heimat ein felsbewohnender, ausgebreitet überhängender, kaum

*) Nach HELLER gehört dem Original Exemplar NUTTALLS zufolge dessen *pauciflorus* nicht zu *O. monogynus*, sondern zu *malvaceus*, so daß NUTTALLS Name an erste Stelle zu treten hat. ZABELS *Physocarpus pauciflorus* 1893 ist von ihm im H. d. D. D. G. 1903 ganz richtig als Synonym zu *monogynus* gestellt worden.

**) GREENE hat seine *Neillien* später auch in *Opulaster* umgetauft, aber erst nach KUNTZE.

**) GREENE gab an: carpels indehiscent, allein sie springen wie bei allen Arten auf, fallen nur nach J. B. LEIBERG, in Bull. Torr. Cl. 1895. 271, uneröffnet mit den Stielen meist im Anfang des Winters ab und öffnen sich erst dann.

0,6 m hoher b: B. von spontanen Expl. wie Fig. 286f o. kleiner, nach HOWELL bis 3 cm Dm., in Beh. wechselnd (analog *pauciflorus*): Blst. 5—18-blütig, Bl. und Fr. vgl. Fig. 285 g—i.

O. m. O. KUNTZE, l. c. (*Spir. monogyna* TORR., in Ann. Lyc. N. Y. II. 194. 1827; *Neillia torreyi* WATS., in Proc. Am. Acad. XI. 136. 1876; *Phys. torreyi* MAXIM., l. c.). — Armweibige B. — Heimat vgl. *pauciflorus*, im Gebirge bis

Fig. 285. a d *Opulaster* (*Physocarpus*) *capitatus*: a Bl. im L-Schn., daneben Stb. und ein Frk., besonders, b Frk. L-Schnitt 2 Sa. zeigend, c Frst., d S. — e *O. capitatus*: Bl. im L-Schn. — f *O. amurensis*: Frst. — g — i *O. monogyna*: g = e, h dgl. zur Frz. im L-Schn., i S. — j n *Neillia thymifolia*, k Bl. im L-Schn., daneben Stb. und oberer Teil eines Frk., l — h, m Bl. zur Frz. im L-Schn. Schn., daneben Stb. und oberer Teil eines Frk., n — b, m Bl. zur Frz. im L-Schn. Schn., daneben Stb. und eine aufgesprungene Fr. zeigend mit S. (m). — o p *N. saonensis*: o Zw. mit B. und Blst., p Bl. im L-Schn. (1 äußere, 2 innere Stb.-Reihen). — q t *Stephanandra incisa*: q Bl. im L-Schn., daneben Stb., K. und C. besonders, r Gyn. im L-Schn. die Sa. zeigend, s Fr., t S. (o nach OLIVER, sonst Original).

3000 m. — Es ist möglich, daß man *monogyna* zu *pauciflorus* ziehen muß, d. h. nur als eine Standortsvarietät davon zu betrachten hat. In Kultur wird er üppiger, die B. (Fig. 286g) werden größer, kurz die Grenzlinien verwischen sich, Dies betont auch JONES, indem er *Neillia malacca* als var. zu *N. monogyna* stellt,

was allerdings ein auch durch die Nomenklatur jetzt nicht mehr gerechtfertigtes Verfahren ist*). Eine besonders reich behaarte, klein- und wenigblütige Form von *monogynus* scheint var. *alternans* JONES, l. c. 42, zu sein; Nevada (Scheid Creek Mts.).

Gattung 120. *Neillia* DON, Prodr. Fl. nepal. 228. 1825.
[Traubenspiere.]

Vgl. oben S. 441; b, B. sommergrün, vgl. Fig. 286i—k, Neb. abfällig; Bl. weiß o. rot, in endständigen einfachen oder verzweigten Trauben, Bl.-Achse glockig o. röhrig, K. und C. 5, imbrikat; Stb. 10—30, in 1—2—3 Reihen; Gyn. 1—2(—3), mit je 5—10 Sa., Fr. an Bauchseite aufspringend, Testa der S. wie bei *Opulaster*, aber End. reichlicher. — Arten sämtlich genannt**).

○ Bl.-Achse glockig, K. so lang oder eher länger als sie (Fig. 285k)

1. *N. thyrsiflora*: nach HOOKER ***) in Heimat üppiger b mit überhängenden Zw., in Kultur bei uns niedrig, da meist stark zurückfrierend, Kn. vgl. Fig. 312a—d: B. wie Fig. 286i—k, 4:2,5—10:7 cm. Obers. sattgrün, + kahl. Unters. reichlich heller, Hauptnerven ± beh., Stiel 5—15 mm; Bl. in einfachen o. meist verzweigten, an den Zw.-Enden hfg. etwas rispig gehäuften Trauben, Bl.-Trgb. meist gezähnt, Achsen des Blst., Bl.-Achse und K. ± seidig-borstig beh., die erst zur Frz. deutlichen Drüsenborsten anfangs kaum zu sehen, Frkn. kahl o. ± beh., vgl. Fig. 285k—n.

N. t. DON, l. c. (*N. virgata* WALL., Cat. No. 7108. 1832 *Spir. thyrs.* K. KOCH, Dendrol. I. 307. 1869). — Himal. (Nepal, Sikkim), Khasia-Mts., O.-Bengal; ob auch China (Sz'tschwan)? (und Java??) — Blz. VII—IX. — Frz. XI. — Selten in Kultur, da empfindlich. — Ihr steht am nächsten *N. rubiflora* DON, l. c., deren Hauptunterschied in der mehr filzigen Beh. der Bl.-Achsen und K. und vor allem in den zahlreicheren 3-reihig angeordneten Stb. liegt. Die C. sind eher größer, die Blst. kürzer, gedrängter, aber auch z. T. zusammengesetzt. Die B. zeigen etwas tiefere oder wenigstens spitzere Lappen, in den Neb. und Trgb. ist kein Unterschied, da sie bei beiden Arten bald ganzrandig, bald gezähnt sind. Nepal, Sikkim, im Gebirge nach HOOKER noch höher steigend, bis über 3000 m. Soll auch in China (Sz'tschwan) auftreten. — Nach FRANCHET gehört zu den Arten mit glockiger Bl.-Achse auch dessen *N. gracilis*, Plant. Delav. 202. 1889. Soweit es sich nach der Beschreibung beurteilen läßt, handelt es sich m. E. eher um eine *Stephanandra*-Art. Heimat Yunnan. Was nun HEMSLEY, in Journ. Linn. Soc. XXIX. 304. 1892, als *N. affinis* aus Sz'tschwan sehr unvollkommen beschreibt (species *N. gracili* arcte affinis et forsan ejus varietas . . .), ist mir vollkommen unklar. Ebenso wenig kann man sich nach seinen Angaben von seiner *N. longiracemosa*, l. c., ein klares Bild machen. Sie soll *rubiflora* sehr nahe verwandt sein, aber bis 18 cm lange einfache Trauben besitzen. Von PRATT in W.-China nahe O.-Thibet gesammelt.

○○ Bl.-Achse röhrig, K. höchstens $\frac{1}{3}$ so lang als sie (Fig. 285p).

2. *N. sinensis*: b, nach VEITCH bis ca. 1,2 m hoch, Zw. bald ganz kahl, bräunlich, jedoch zeitig durch Abblättern der Rinde grau werdend; B. vgl. Fig. 285o, hfg. bloß lappig gesägt, selten deutlich gelappt, oben kahl, unters. verstreut beh. o. kahlend, 3,5:2,5—7,5:

*) Viel zu weit geht JONES jedoch, wenn er von *monogynus* sagt: It may be advisable for the present to keep up this species, but there is no necessity for concealing the probable fact, that it is only the most reduced form of *N. opulifolia*. Mit dieser hat *monogynus* sicher nichts gemein, will man nicht alle *Opulaster* in einen Topf werfen.

**) Die Gattung *Neillia* umfaßt nur asiatische Arten. Die amerikanischen siehe unter *Opulaster*.

***) MAXIMOWICZ und ZABEL geben an, daß die Gattung in der Flora of Brit. India II. fehle, allein im Nachtrag dieses Bandes S. 749 ist sie enthalten, was MAXIM. allerdings kaum wissen konnte und ZABEL übersehen hat.

5 cm, Stiel 0.3—1 cm: Blst. vgl. o., gleich Bl.-Achse und K. außen kahl, sonst Bl. wie p, Frkn. 1—2, Fr.?

N. s. OLIV., in HOOK Ic. pl. t. 1540. 1886. — Nach DIELS in China von Kansu, Hupei, Schensi und Sz'tschwan häufig. Nach VEITCH, der sie in den Handel bringt, durch die rosafarbenen Bl. und die bis 12 cm langen Blst. sehr zierend und etwas an *Ribes sanguineum* erinnernd. — BUREAU et FRANCHET beschrieben im Journ. de Bot. V. 45. 1891 eine *N. thibetica**) aus Sz'tschwan. Sie

Fig. 286. *a—c* *Opulaster* (*Physocarpus*) *pulchellus*: *a* B. von Blzw., *b* von Lgtr., *c* von var. *debrachyana*. — *d—e* *O. amurensis*: *d* von spontanen, *e* von Kultur-Expl. — *f—g* *O. mongolicus*: wie *d—e*. — *h* *O. capitatus*. — *i—k* *Neillia thyrsiflora*: *i* von Lgtr., *k* von Blzw., *k*¹ Neb. — *k*² *N. sinensis*: Neb. (vgl. B. auf Fig. 28501). — *l—m* *Stephanandra incisa*: *m*¹ Neb. — *n—o* *St. tanakae*: wie *a—b*. (Alles ²/₃ nat. Gr.) (Original).

hat röhrige Bl. wie *sinensis*, aber: folia supra sparse puberula, subtus velutina (7—9:5—6 cm, Stiel kaum 1 cm), calycis tubus cylindricus extus adpresse sericeus, stamine 20 . . . uniseriata. Wird von den Autoren, die *sinensis* nicht zu kennen scheinen, nur mit *thyrsiflora* und *rubiflora* verglichen.

*) So der Hauptname. Im Text heißt es dann *N. velutina*.

**Gattung 121. *Stephanandra* SIEB. et ZUCC. in Abh. Acad. Münch.
Kl. III. 740. 1843.**
[Kranzspiere].

Vgl. oben S. 441: b. B. 2 zeilig, sommergrün (vgl. Fig. 2861—o).
Neb. vorh.: Bl. in rispig verästelten Trauben, K. und C. 5, contort.
Stb. 10—20, Gyn. 1 mit 2 Sa., Fr. spät und infolge des auf der Fr.
stark seitenständigen Gr. unvollständig an Bauchnaht aufspringend, End.
zieml. reichlich. — Arten erwähnt.

○ B. vgl. Fig. 2861—m, Stb. 10, Bl.-Achse auch innen kahl.

1. *St. incisa*: 0,5—1,5 m hoher übergebogen verästelter b,
(○) Zw. hellbraunrot, meist kahl, doch die 2-zeiligen Ktzt. beh.,
graubräunlich, längsrissig. Kn. vgl. Fig. 287 m—s; B. 2,5:2—6:
4,5 cm, oberseits lebhaft grün, kahl o. verstr. beh., unters. heller.

Fig. 287. a—f *Kerria japonica*: a—b ○ Zw., c Kn., d Wimperung der Kn.-Sch., e B.-N., f Zw.-Q.-Schn. — g—l *Rhodotyus kerrioides*: g ○ Zw., h Kn. (1) mit Bei-Kn. (2) und B.-N. (3), i B.-N., k Wimperung der Kn.-Sch., l f. — m—n *Stephanandra incisa*: m n Zw., o die übereinander stehenden Seiten-Kn., p q Kn. und B.-N., r Wimperung der Kn.-Sch., s=f. — t—x *Neviusia alabamensis*: t ○ Zw., u—w Kn., x=f (Original nach C. K. SCHNEIDER).

beh. o. fast kahl, Stiel 5—10 mm; Blst. an Seitentrieben endständig,
meist wenigblütig und kaum über 4 cm lang. Bl. weiß, ca. 6 mm Dm.,
K. gewimpert, C. eilänglich, vgl. Fig. 285q—t.

St. i. ZABEL, in Garten-Ztg. IV. 510. 1885 (*Spi. incisa* THBG., Fl. jap. 213.
1784; *St. flexuosa* S. et Z., l. c.). — Jap. (Kiusehio, Hondo), S.-Corea — in Ge-
büschen. — Blz. VI. — Frz. VIII—IX. — In Kultur mäßig verbreitet, nicht so
schön wie *St. tanakae*.

An *St. incisa* schließt sich an nach HANCE dessen *St. chinensis*, in Journ. of Bot. XX. 210. 1882, die ihr im Bl.-Bau. gleichen soll, „but it is distinguishable at a glance by its larger, differently shaped, and less incised leaves, and by its ampler and more compound inflorescence“. Gesammelt von BULLOCK in Prov. An-hwei, ca. urbem Wuhu. Mir unbekannt.

○○ B. vgl. Fig. 286n—o, Stb. 20, Bl.-Achse innen beh.

2. *St. tanakae*: weicht von *incisa* noch ab durch: Zw. stets kahl, B. auch unten fast kahl, bis 10:8 cm, im Herbst orange- bis rotbraun, Stiel (locker beh.) bis fast 2 cm; Blst. bis fast 10 cm lang, reichblütiger, Bl. mit rundlichen C.

St. t. FR. et SAV., Enum. pl. jap. II. 332. 1879 (*Neillia tanakae* FR. et SAV., l. c. I. 121. 1875). — Jap. (Hakone). — Blz VI—VII. — Frz. VIII. — Noch seltener als *incisa* in Kultur, aber schöner. — Was FR. et SAV., l. c., II. 333, als *St. gracilis* beschreiben, scheint mir nur eine sehr zierliche Varietät der *tanakae* zu sein.

Unterfamilie B. *Spiraecae* MAXIM., l. c. 164. B. verschieden, ohne Neb., Frb. wie bei *Neilliac.* S. mit häutiger Testa. End. fehl. o. kaum vorh.

Gattung 122 *Spiraea* L., Sp. pl. 489. 1753 [sensu MAXIM. 1]. [Spierstrauch; spiraea; spirée.]

Vgl. oben S. 441; ♀, B. einfach, sommergrün, gezähnt, seltener ganzrandig, z. T. mit obs. Sp. und unterseitigen Papillen; Bl. weiß o. rosa, in traubigen o. zymösen Blst., seltener 2., mit Rudimenten des anderen Geschlechts, Bl.-Achse glockig, K. 5, C. 5, mit imbrikater o. kontorter Kn.-Lage, Stb. 15—70, in 1 oder mehreren Reihen, am Außenrande des drüsigen Discusringes inseriert, dieser selten fehlend, Gyn. 5-8, die einzelnen Frb. unter sich stets frei mit meist je über 3 anatropen hängenden Sa., Fr. an Bauchnaht aufspringende Balgkapseln. — Arten sämtlich erwähnt.

Subgen. a. *Isospiraea*: Blst. scheidoldig, einfach doldentraubig^{b)} siehe S. 484 o. zymös verastelt, nie deutl. gestreckte Trauben. Vorb. hfg. fehlend, Gyn. meist 5, B. mit o. ohne obs. Sp.

A. Blst. traubig o. doldentfg., jedenfalls Bl.-Stiele 1-blutig [ausge- B. siehe S. 467 nommen 29. *nipponica*, die z. T. zusammengesetzte Blst. hat]**).

Sekt. 1. *Chamaedryon* SER., in DC. Prodr. II. 542. 1825 (sensu MAXIM.). — Bl. weiß, ♀, Drüsenring stets vorh.

*) Gerade bei den Spiräen war es mir möglich, die spontanen Formen auf Grund recht reichen Materials zu untersuchen, wobei ich ziemlich viel Neues fand. Da ich im Bull. de l'Herbier BOISSIER 1905, S. 335, die neuen Arten und Formen ebenfalls kurz bespreche, so weise ich darauf hin und sage gleichzeitig auch hier der Direktion der Herb. BARBEY-BOISSIER für die gütige Überlassung des reichen BOISSIERSchen und des neuen BARBEYschen Materials vielen Dank. Ferner bin ich den Herren ZABEL und KOEHNE, sowie Herrn Geheimrat WITTMACK, Berlin, für das Herbar K. KOCH und Herrn ISTEL, Wiesbaden, für das Herbar DIEPPEL Dank schuldig. In Beurteilung der Garterbesten schließe ich mich vorläufig noch sehr an ZABELS treffliche Arbeit an, von dem ich fast alle Formen in Originalen im Hort. Münden wiederholt selbst sammelte. Mir war es zunächst besonders um Klarstellung der spontanen Formen zu tun, und von vielen Gartenformen kann man nicht genug Material prüfen, um sie richtig zu bewerten. Auch Herrn R. PAUL, Wien, bin ich für viele wertvolle Hinweise zu Danke verpflichtet.

**) Diese Angaben beziehen sich nur auf die Arten, die Bastarde sind hierbei nicht berücksichtigt und werden stets im Anschluß an den in der hier gewählten systematischen Reihenfolge zuerst genannten Elter kurz besprochen. Vgl. Angaben S. 453.

II. siehe S. 454

I. Blst. doldig, sitzend, an Basis nackt o. von kleinen ganzrandigen schuppigen B.chen gestützt (bei 5 *S. obovata* und 7 *anatolica*, Blst. hie und da $\pm$ doldentraubig, gestielt).

○ siehe
S. 452.

○ B. fein und scharf gesägt, vgl. Fig. 289a—b, lebhaft grün.
+ B. eilänglich (Fig. 289a—a²) stumpflich, unters. gleich den $\odot$ Zw. durchaus beh.

1. *S. prunifolia*: fein und schlank verzweigter, bis 2(—3) m hoher (infolge Zurückfrierens hfg. niedrig bleibender) b. $\odot$ Zw. rundl., kahlend, Kn. kaum 2 mm lang, breitkegelig, zwischen den 2 fast kahlen Sch. bricht die beh. Spitze durch; B. vgl. var., Stiele bis 6 mm lang; Blst. 3—7-blütig, Bl. vgl. Fig. 288g—h; Fr. (nach ZBL.) weit auseinander fahrend, kahl, stumpf, Gr. an der Rückennaht unter der Spitze stehend und $\pm$ rechtwinklig zurückgebogen, nur $\frac{1}{2}$ so lang als Fr.

Fig. 288. a—f *Spiraea thunbergi*: a Zw. mit Blst.; b C.; c K.; d Frst.; e Fr. im L.-Schn.; f S. — g—h¹ *S. prunifolia*: g Bl. im L.-Schn.; h C.; h¹ links neben p) B. — i—p *S. hypericifolia*: i Blst.; k Bl. im L.-Schn.; l Recept. z. T. und K.; m C.; n Frkn. im L.-Schn.; o Frst.; p *S. obovata*: B. der f. *dentata*. — q—r *S. hypericifolia* var. *acutifolia*: q = l; r C. — s *S. arguta*: Blst. (a nach SIEB. et ZUCC., sonst Orig.).

var. a. *typica*: B. kaum über 2,5:1 cm (Fig. 288h¹), Bl. einfach, 5—10 mm lang gestielt. — b. *plena* (*crenata* var. *fol. ovatis flor. plenis* THBG., Fl. jap. 211. 1784; *prunifol. fl. pleno* BOSSE, Handb. IV. 625. 1859/61): B. bis 4(—4,5):1,8(—2) cm, Bl. größer, gefüllt, meist länger gestielt.

S. p. S. et Z., Fl. jap. I. 131. t. 70. 1835. — Pflaumenblättriger Sp. — China (Tschekiang, ob auch Kansu?) — Blz. IV. vor o mit B.; Fr. (nach ZBL.) selten reifend. Die eintachtruhende Form selten, dagegen die gefüllte hfg. in Kultur und in O.-As. (bes. in Jap.) seit langem kult. und z. T. verwildert. Liebt geschützte warme Lagen.

— B. spitz, breit o. schmallanzettlich (Fig. 289b u. 292v¹), gleich den $\odot$ Zw. $\pm$ bis fast kahlend.

+ B. wie Fig. 292 v³, Fr.-Griffel leicht rückenständig (v²).

2. *S. fauriana*: $\frac{1}{2}$, habituell wohl *thunbergi* ähnlich, Höhe ?, Zw. jung beh., $\odot$ $\pm$ kahl, rotbraun, leicht streifig, $\odot$ abblätternd, purpurbraun, Kn. wie bei *thunbergi*; B. breitlanzettlich, 1,8:0,8—3,8:1,5 cm, in Serratur wohl *thunbergi* sehr ähnlich, aber doch ein wenig an *prunifolia* gemahnend, nur jung gewimpert und auf Rippe beh., später ganz kahrend (bis auf den Stiel), beiders. $\pm$ gleich grün; Blst. wie bei *prunifolia*, Sch.-B.chen am Grunde sehr klein, spatelig, ganzrandig, aber so gut wie kahl, Bl.-Stiele ca. 9—12 cm lang, sonst vgl. 292 v—v³.

S. f. C. K. SCHN., in. Bull. Herb. BOISS. 1905. 337. — Ich fand diese sehr merkwürdige Art im Herb. BOISSIER als *S. thunbergi*, lg. FAURIE, no. 6297, Japan (Hakodate), VI. 1890, mit ziemlich reifen Fr. und vereinzelt Bl. Sie macht zunächst den Eindruck einer breitblättrigen Form der *thunbergi*, zeigt aber in den etwa 10 mm breiten Bl. und vor allem in der Fr. deutliche Abweichungen, die sehr an *prunifolia* erinnern. Das Exemplar scheint wild zu sein, so daß an *prunifolia* $\times$ *thunbergi* kaum zu denken ist.

B. in Fig. 289 b, lineal-lanzettlich, Fr.-Gr. endständig Fig. 288 d—e).

3. *S. thunbergi*: 0,5 — 1 — 1,5 m hoher, dichtbuschig feinzweigiger, aufrechter b. • Zw. nie ganz kahl, leicht kantig, rotbraun, ab

Fig. 289. *Spiraea*: Blattformen von: a—a² *prunifolia* — b *thunbergi* — c—d *hypericifolia*: d von der noch fraglichen *f. turcestanica* ZBL. — e—e¹ *obovata* — f *aquilegifolia* (*thalictroides*) — g *obovata f. dentata* — h *gemmata* — i *alpina* — k—k² *crenata* — l—m¹ *media* — n *cana* (reichlich ² n. Gr.) (Original).

blätternd, Kn. beh., eirundlich, ca. 1 mm lang, mehrschuppig; B. 2 — 4:0,2 — 0,8 cm, zerstreut feinhaarig, Stiel 1 — 3 mm; Blst. kahl, Bl. vgl. Fig. 288 a—f. C. weiß, über doppelt so lang als Stb., diese eher kürzer als K.

S. th. SIEB., in Bl. Bijdr. III. 115. 1825 (*crenata* THBG., Fl. jap. 210. 1784, non L.) — China: S-Sztschwan, nach DIELS, Kiangsi, nach FORBES et HEMSLEY, wahrscheinlich weiter verbreitet, ob in Japan so litz. wild, wie S. et Z. und FRANCH. et SAV. angeben, ist nach dem, was MAXIM und SARGENT in Gard. a. For. VI. 27. 1893) sagen, fraglich. — Blz. meist Ende IV kurz vor den B.; Frz. VI. — Reizende reichblühende, aber etwas empfindliche Art.

2 $\times$ 3 = 4 *S. arguta* $\times$ *prunifolia* = *S. arguta* ZBL. in Deutsche Gartenztg. 1887. 494 eine ihrer reifen Fig. 288 s) frühen Bl. wegen geschätzte Hybride, über die man auch ZABELL, l. c. 22. 1887 vgl. wolle, der sie aus S. von *prunifolia* $\times$ *thunbergi* erzog. Ich habe meine Untersuchungen über *prunifolia* etc. noch nicht beendet, da diese Formen sehr schwer klarzustellen sind und bitte Interessenten mir gutes, reichhaltiges Material in Bl. und Fr. freundlichst zur Verfügung zu stellen.

○ B. ganzrandig o. nur an der rundlichen Spitze mit wenigen Kerbzähnen (Fig. 289c—e¹), ± graugrün.

✕✕ siehe
S. 453.

z B. der Lgtr. etwa wie Fig. 289d, e o. g. jedenfalls fast immer doppelt so lang wie breit.

+ B. vgl. Fig. 289c—d o. auch wie e und g, obs. Sp. verstreut o., wenn solche ganz fehlend, B. ganzrandig und spitz schmal-lanzettlich.

4. *S. hypericifolia*: 0,5—1,5(—2) m hoher feinzweigiger b. ☉ Zw. kahl o. fein beh., rundlich, braun. ☉ nach Abblättern der Außenrinde rotbraun; Kn. dick eifg., 1—1,5 mm lang, mehrschuppig, z. fein beh. o. fast kahl, hfg. mit seitlichen Beiknospen; B. vgl. var.; Bl. weiß, meist nicht über 1 cm lang gestielt, vgl. Fig. 288i o und var.

var. a. *plukenetiana* SER., in DC. Prodr. II. 543. 1825. B. mit stumpflicher, oft etwas kerbzähniger Spitze, an *obovata* gemahnend, doch nicht so breit werdend und stets mit verstr. obs. Sp!., Beh. z. verstreut bis fast fehlend, Bl. rein weiß, mit rundlichen, bis 3 mm langen, sich berührenden C., K. etwa so lang wie Receptaculum (Fig. 288j), Stb. kürzer als C. — b. *acutifolia* DIPPEL, Laubholz III. 464. 1893 (*S. acutifolia* W., Enum. Pl. Hort. Berol. 540. 1809; *hyp. v. acuta* SER., l. c.), B. spitz, lanzettlicher, obs. Sp. vereinzelt (ob ganz fehlend zuweilen?), Bl. unscheinbarer, C. z. kleiner, z. T. lauglicher, sich kaum berührend, K. kürzer als Recept. (q), Stb. eher ein wenig länger als C.

S. h. L., Sp. pl. I. 489. 1753 (*S. sibirica* HORT. NONN.). — Johanniskrautblättrige S. — Von der Mongolei (S.-Altai O-Thian-Schan) durch Sib. (Dahurien, Transbaikalien, Altai) bis Turkestan, S.-Ural, SO. und S.-Rußland (ob auch südlich vom Kaukasus und N.-Pers.). Die beiden Var. geographisch o. morphologisch zu trennen, bin ich außer stande. Sie scheinen mir durch Zwischentformen verbunden.

Blz. Ende IV—V. — Frz. VI. — In Kultur gar nicht so häufig und meist die var. *acutifolia*. Was sonst als *hypericifolia* geht, ist die *obovata*. Die *hypericifolia turcomanica* ZBL., 1885, die er im H. d. D. D. G. zu *acutifolia* stellt, hat so viele obs. Sp. wie var. a. und scheint ein Bindeglied, wenn nicht eine besondere Form zu sein. Auch die von KOEHNE, in Mitt. d. D. D. Ges. 1899. 56, als Spec. aus Hochsuanetien geführte Form, hat, wie ich an dem mir von KOEHNE gesandtem Material sehe, obs. Sp. Allein gerade diese westasiatischen und kaukasischen Formen der *hypericifolia* sind noch nicht ganz klargestellt, so daß ich im Nachtrage einiges ergänzen muß.

4×5 *S. hypericifolia* × *obovata*: vielleicht in Kultur entstanden.

4b×12 *S. hypericifolia* var. *acutifolia* × *media*: *S. acutifolioides* (*S. micropetala* f. *acutifolioides* ZBL., l. c. 34. 1893). Vgl. unter *micropetala* und bei ZABEL, l. c.

++ B. vgl. Fig. 289e—e¹ und g, ohne obs. Sp.!

5. *S. obovata*: der *hypericifolia* habituell sehr ähnlicher, eher üppigerer b. B. vgl. var.; Blst. zuw. im unteren Teil der Zweige kurz gestielt, Bl. bis 8 cm Dm., bis 2 cm lang gestielt, sonst kaum abweichend, Beh. in allen Teilen wechselnd.

Man kann unterscheiden f. *typica*: B. ganz oder fast ungezähnt und f. *dentata*: B. an Spitz deutlich kerbig gezähnt (beide nicht scharf trennbar). Die letzte geht in den Gärten als *S. turcomanica* und *S. hypericifolia turcomanica* (Zu ihr gehört auch ZABELS *hyp. var. truncata* zum Teil*).

S. o. W. et K., in WILLD. Enum. Hort. Berol. 54. 1809 (*S. hypericifolia* HORT. PLUR. — Westeuropäischer S. — J. G. OUF. Kraut, ob aber sicher wild? in Ungarn und Steiermark wohl nur verwildert; sonst in Frankr., nach COSTE, Fl. de la France 9. 1893 (Lieux secs et pierreux des terrains calcaires, Causses des Cévennes; Lot, Corrèze, Charente, Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, Indre, Cher), ferner sah ich sie von Spanien aus den Landschaften Leon

*, Ein Original von ZABELS *truncata* steht durch die untersch. entwickelten Papillen auf den B. in Beziehung zu gewissen westasiatischen Formen, auf die ich im Nachtrag zu sprechen kommen werde.

(Peña Redonda), Alt-Kastilien (Prov. Palencia, Prov. Burgos) und Navarra (Prov. Pamplona). — Blz. V—VI. — Frz. VII—VIII. — Diese Art scheint von der in Eur. nur in S.-Rußl. spontan auftretenden *hypericifolia* scharf zu scheiden. Wenn ich für die sicher spontanen spanischen und französischen Exemplare den Namen *obovata* beibehalte, so bin ich mir sehr wohl bewußt, daß dieser von WALDST. et KITAIBEL Exemplaren beigelegt wurde, die nur als verwilderte Kulturformen anzusehen sind. Da ich aber nach dem von mir gesehenen Materiale annehmen muß, daß die spontanen westeuropäischen Pflanzen in der Tat nicht scharf von den Kulturformen und den in Krain, Steiermark und Ungarn beobachteten „verwilderten“ Formen zu trennen sind, so möchte ich weder den von GANDOGGER auf Exsikkaten vorgeschlagenen Namen *cavanillesii* noch den von LEVIER *S. rhodoclada* neu einführen. Aus Italien sah ich noch keine Exemplare. Nach FIORI, Fl. anal. d'Italia I. 562. 1896, soll sie in M.-Ital.: presso Spoleto, Teramo et Aquila degli Abr. ed al Lago Fucino, auftreten und es unterscheidet sie ausdrücklich von *hypericifolia* und führt sie als *hypericifolia* var. *flabellata**). Jedenfalls müssen über das spontane Vorkommen der *obovata* noch eingehende Untersuchungen gepflogen werden, um zu ermitteln, wo denn eigentlich das Zentrum ihrer Verbreitung zu suchen ist. Jetzt deuten alle Anzeigen auf SW.-Eur.

5×6 *S. obovata* × *crenata*: *S. multiflora* ZBL., in Gartenztg. III. 494. 1884: Herr ZABEL hatte die Güte mir ∞ Original Exemplare mit genauen Angaben über Herkunft etc. zu senden. Ich habe dabei seine, l. c. 21. 1893, gemachten Angaben durchaus bestätigt gefunden, nur präzisiere ich die Hybride als *obovata* × *crenata* und halte die typische *multiflora* nur davon ausgeschlossen. Die Beschreibung aller hybriden Formen würde mehr Raum erfordern, als die der spontanen Arten und Formen, ich betone daher, daß ich nur Andeutungen geben kann und nur eine ausführliche Darstellung unter Berücksichtigung der anatomischen Merkmale für später vorbehalten. Hier soll vor allem nur gesagt werden, ob und wo nun Zweifel auftauchen an ZABELS und anderer Autoren Annahmen und soll eine Übersicht über alle angenommenen Formen nebst Hinweis auf die Literaturquellen gegeben werden.

5×10 *S. obovata* × *cana*: *S. cinerea* ZBL., l. c. ex parte. ZABEL nimmt an *conferta* *hypericifolia*, allein ich glaube es kommt nur *hypericifolia* vor, aber sicheres über diese Hybride überhaupt könnte ich bisher nicht feststellen. Vgl. das unter *conferta* Gesagte.

5×12 *S. obovata* × *media*: *S. micropetata* ZBL., l. c. 495. Ich muß nach meinen Untersuchungen den Begriff *micropetata* etwas anders fassen. Denn weit aus die meisten Formen halte ich für *hypericifolia* *hypericifolia*. Jedemals stelle ich alle solche, die obs. Sp. zeigen und in den Bl. an *hypericifolia* gemachen, zu *hypericifolia*. Vgl. dort und im übrigen ZABEL, l. c. 33. 1893.

- - B. der Lgtr. breitrandlich, so breit o. hfg. breiter als lang (vgl. Fig. 289f, links und Fig. 292a).

+ B. ohne obs. Sp., an Lgtr. ziemlich dünn und kurz, also nicht filzig-wollig beh., Bl.-Stiele, Bl.-Achsen und K. kahl o. höchstens (meist nur Stiele) ± verstreut beh.

6 *S. aquilegifolia*: b etwa vom Habitus der *hypericifolia*, Zw. der mir vorliegenden guten Expl. rundlich, hellbraungelb; Bl. dichter, kurz beh., abfasend, Kr. 1—1,5 mm lang, eiförmlich, spitz 2—3 schuppig, wie Zw. beh.; B. an Lgtr. etwa wie Fig. 289f links o. bes. 8 mm breit und dabei 13 mm lang, Stiel bis 6 mm, sattgrün oben, grau o. blaugraugrün unten, an Blzw. wie das rechte B., aber im allgemeinen brüchiger und weniger ruzettlich als bei folgender Art; Bl. 3—8 mm lang gestielt, klein, 6—7 mm Durchmesser, schwach gelblich-weiß, C. oblong, entfernt, Gr. und Drüsenring hellviolett, mit Ausstrahlung der Beh. wie bei *hypericifolia*, nur Frkt. nach dem Grunde stielig und Gr. kürzer (Fig. 292d), Frst. wie c.

*) Diese *flabellata* BERTOL., in GUSSONE Pl. rar. 205. t. 40. 1826, hat nach der Artbildung auffällig genug keilförmig an der Spitze geklobte B., wie ich sie noch bei keiner *hypericifolia*-Form sah. Gussone Analogs hat schon 1824 BARRILLIER in seinen Prodr. p. 616. Hesp. et Ital. observ. in Fig. 564 abgezeichnet und unter No. 1370 beschrieben. Die Pflanze heißt dort aber nicht, wie K. KOCH angibt, *S. hypericifolia*, sondern die Tafel trägt die Unterschrift: *Oxyacantha angustifolia* von spinosa und *Hyperacanthus truncatus* C. Adt. Robini. Mir ist *flabellata* veranlaßt noch eine problematische Art o. Form.

S. a. PALLAS, Itin. III. 734. 1776 (*S. thalictroides* PALL., Flor. ross. I. 34. t. 18 1784; *hypericifol.* var. *thalict.* LEDEB., Fl. ross. II. 13. 1844). — Ich sah Expl. aus Transbaikal, Nertschinsko und Irkutsk. Sie soll auch in der Mongolei auftreten. — Berghänge. — In Kultur noch nicht vorhanden. Sie bildet mit *S. anatolica* eine in der B.-Tracht ausgezeichnete Gruppe und ist von *hypericifolia* gut unterschieden.

++ B. mit obs. Sp., an Lgtr. dicklich, Beh. wollig-zottig (Haare $\pm$ gewunden), Bl.-Stiele, Bl.-Achse und K. $\pm$ kurz beh.

7. *S. anatolica*: im übrigen von *aquilegifolia* noch abweichend durch: Wuchs, wie es scheint mehr sparrig schlanktriebzig, Kn. mehr kugelig, abstechend, dick, zottig beh.; B. wie Fig. 292a an Lgtr., an Blzw. etwa wie b, beiders. $\pm$ graugrün; Blst. mehr doldentraubig, Bl. wie c, Stb. kaum über $\frac{1}{2}$, so lang wie die gelblich weißen C., Gr. vgl. c¹, Fr. mir noch unbekannt.

S. a. HAUSSKN., apud C. K. SCHN., in Bull. Herb. Boiss. 1905: 338. — Türkisch Armenien [G. SENTENIS, No. 2194, 2301, 2948]. Felsige Berghänge. — Blz. V. — Eine höchst interessante, wie es scheint, geographisch eng lokalisierte Art, deren Einführung in die Kultur erstrebenswert wäre.

II. Blst. stets doldentraubig u. gestielt, Stiele bis reichlich beblättert (selten einzelne Blst. an den Zweigenden in sitzende Scheindolden reduziert und denen unter I. gleich).

a) B. mit ∞ obs. Sp., meist 3 deutliche vom Grunde zur Spitze durchlaufende Hauptnerven vorh. (Fig. 289k k²), K. zur Frz. aufrecht (Fig. 290i und Bl. wie h).

8. *S. crenata* *) (*S. crenifolia*): kaum über 1 m hoch werdender, aufrecht verästelter b. u. Zw. fein beh., leicht stumpfkantig, bräunlich, später kahlend, abblätternd, rotbraun, dann grau, Kn. kaum über 1 (= 1.5) mm lang, flach breit-eiförmig, mehrschuppig, beh., hfg. mit seitlichen Bei-Kn.: B. graugrün, unters. kaum heller, Beh. wechselnd, an Blzw. etwa 1:0.3 — 2:0.6 cm, Stiel sehr kurz, an Laubtrieben bis 3.5 — 4:1.8 — 2.5 cm, Stiel bis 14 mm; Blst. 1 — 5(— 7) cm lang gestielt u. beh. o. fast kahl, mit 3 — 15 Behen besetzt, Bl. etwas gelblich-weiß, etwa 7 — 8 mm Dm., ihre Stiele ca. 5 — 10 mm, Stb. so lang o. deutlich länger als C., sonst vgl. Fig. 290h — i².

S. c. L., Sp. pl. I. 489. 1753. ex parte [et PALLAS 1784] (*crenifolia* C. A. MAX., Beitr. Pflzk. Russ. R. VI. 43. 1844; *acnifolia* HORT. NONN., Kerbblättrige S. — J. G. nur in U. Marmaroser und Arader Comitatus und Siebb. wild. ob Galizien? in Böhmen, Schweiz, Belgien u. T. verwildert; sonst noch Bulgarien, M- und S-Rußl., Kaukasus, Sib. (Altai-, Alatau-Gebirge). — Steinige Hänge, vorzüglich auf Kalk. — Blz. V. — Frz. VII. — Von dieser gar nicht so häufig echt in den Gärten vorkommenden Art hat MAXIM., l. c. 189, den Typ als var. *pallasiana* und daneben eine var. *capitata* TRAUTV., in Act. Hort. Petrop. II. 528. 1873. unterschieden, welche letzte aber wohl nur eine besonders reich beh. Form mit kleineren Behen und Bl. vorstellt. Wahrscheinlich lassen sich nach der Beh. der Blst. 2 Formen sondern, wie dies LEWISOW, in Schedae ad Herb. Fl. Ross. III. 74. 1901 getan, indem er var. *pallasiana* f. *puberula* (No. 873, 873a) und f. *glabrata* (No. 874) ausgibt. Die B. sind niemals ganz kahl und beide Formen durch Übergänge verbunden.

Im Anschluß an *crenata* sei auf die mir noch unklare *S. mongolica* MAX., in Bull. Pétersbg. XXVII. 467. 1881 (*S. crenifolia* var. *mongolica* MAX., in Act. Hort. Petrop. VI. 581. 1879), hingewiesen, deren Heimat die S. Mongol. u. N-China (Kansu) ist und die von *crenata* durch die stets ganzrandigen B. und durch „tolluculis exsertis“ sich unterscheiden soll.

*) Vgl. aber auch *obovata* S. 452 und oben *anatolica*.

**) Wenngleich LINNÉ seinen Citaten zufolge auch *S. flabellata* BERTOL. mit zu seiner *crenata* zog, so halte ich es doch für ganz angebracht, den LINNÉschen Namen für die hier besprochene Art beizubehalten. LINNÉ spricht ja auch von „corymbis“ und nicht von „umbellis“, wie bei *hypericifolia*.

8×11 *S. crenata* × *cana*: *S. conferta* ZABEL, in Gartenztg. 1884. 495. Diese Hybride muß naturgemäß viel Anklänge an *pikoviensis* zeigen, aber doch in der Behaarung schon meist gut abweichen. Ich züchte hierher was im Herb. Dendr. KOEHNE, No. 380 als *conferta* ausgegeben wurde, welche letzte durch den Mangel an obs. Sp. ausgezeichnet sein muß, nur aber, wie S. 453 gesagt, nicht recht bekannt wurde. Über *conferta* vgl. ZABEL, l. c. 35. 1893.

8×12 *S. crenata* × *media*: *S. pikoviensis* BESS., Enum. Pl. Volh. 46. 1821. Nach mir vorliegenden Originalen BESSERS, aus Podolien, handelt es sich hier sicherlich um einen *crenata* × *media*-Bastard. Meist aber scheint der Einfluß der *media* zu überwiegen, doch hat eines der Orig.-Expl. oberseits verstreute Spaltöffnungen. Die Beschreibung ZABELS, l. c. 35. 1893, ist recht genau. Die Spiraea geht in den Gärten auch als *S. alpina* und *S. praecox*, allein ich halte eine Anführung der Gartennamen im Grunde für nutzlos, denn gerade unter diesen beiden

Fig. 290. *Spiraea*: a—d *cana*: a Bl. im L.-Schn.; b Frkn.; c Frst.; d Fr. — *alpina*: e Bl. im L.-Schn. und K.; f Frkn.; g Bl. im L.-Schn. und K.; h Frkn.; i Bl. im L.-Schn. und K.; j Frst.; k Bl. im L.-Schn. und K.; l Frkn.; m Bl. im L.-Schn. und K.; n Frst.; o Bl. im L.-Schn. und K.; p Frkn.; q Bl. im L.-Schn. und K.; r Frst.; s Bl. im L.-Schn. und K.; t Frkn.; u Bl. im L.-Schn. und K.; v Frst.; w Bl. im L.-Schn. und K.; x Frkn.; y Bl. im L.-Schn. und K.; z Frst. (die gesamte Fig. ist nachträglich um 1/2 reduziert worden). (k, m—o, t—t¹ nach KOEHNE, sonst Original.)

Namen erhielt und sammelte ich so heterogene Dinge, daß aus dem Gartennamen keine Schlüsse auf den richtigen Namen zu ziehen sind. Hierher gehört auch *S. nicoudiertii* BOSSE, Handb., II. Aufl., IV. 624, ex K. KOCH 1869, in dessen Herb. ich Expl. sah, die alles in allem in der Tracht *media* näher stehen.

8×12b *S. crenata* × *media* var. *mollis*: *S. inflexa* K. KOCH, in Gartenfl. III. 405. 1854: nach den Originalen in Herb. KOCH, die nur Blüten.-Expl. zeigen, wage ich nicht zu entscheiden, ob *crenata* × *media* oder *crenata* × *cana* vorliegt. Es handelt sich also entweder um eine Form der *pikoviensis* o. der *conferta*. Obs. Sp. sind vorhanden.

b) B. ohne obs. Sp., ± deutl. fiedernervig, K. zur Frz. aufrecht o. zurückgeschlagen.

a) B. unterseits deutl. papillös, klein (Fig. 289i), K. zur Frz. aufrecht, Bl. wie Fig. 290e.

9. *S. alpina*: kaum viel über 0,5 m hoher, etwas kurzsparrig verästelter, aufrechter b. Zw. dann überneigend. • fein beh., leicht kantig, hellbraun. — tiefbraun, erst spät abfasernd, mit dicken knospenfg. Kztr., Kn. eikugelig, ca. 2 mm lang, mehrschuppig, fast kahl, von der ¹/₂ so langen B.-Basis gestützt: B. an Blzw. fein lanzettlich, sonst bis 2:0,7 cm inkl. der stielg. Basis, tiefgraugrün: Blst. fast sitzend (schein-doldig) bis 2—2,5 cm lang gestielt, schwach beblättert, spärlich beh., Bl. etwas gelblich weiß, ca. 7 mm Dm., 5—10 mm lang gestielt, sonst vgl. Fig. 290e—e'. Fr. die K. kaum überragend, auseinanderneigend, die bogig aufrechten Gr. an der Rückennaht unter der Spitze.

S. a. PALL., Flor. Ross. I. 35. t. 20. 1784. — Bergspiere. — Mongolei, Altai, Baikalgebiet, O. Thibet (Tongolo, lg. SOULIN 722). — Besonders Gebirgshänge auch Wästergebiete langs der Flüsse. Blz. V. Frz. VIII. — Noch seltene, kulturwerte Art, z. T. als *mongolica* in den Gärten. Die var. *altaica* MAXIM., l. c. 183 (*S. oblongifolia* RGL., Pl. Semen. n. 333 [ex MAXIM.], nec W. K.) wohl kaum verschieden.

µ) B. unters. nicht papillös (o. jedenfalls größer, wie Fig. 291h).

○○ s. S. 460. (K. zur Frz. zurückgeschlagen). C. meist etwas länger als Stb.

• • s. S. 458 * Zw. rund, B. vgl. Fig. 289i - n.

B. meist ganzrandig o. nur mit 2—3 Zähnen an Spitze, Fr.-Gr. an der Spitze stehend, aufr. o. — zurückgebogen (Fig. 290d u. 292u¹).

B. fast stets ganzrandig, unters. dicht weichzottig, Blst. stets ± reich beh.

10. *S. cana*: 0,3—0,6 m hoher, erst im Alter bis etwa 0,8(—1) m hoch werdender b. mit aufrechter, breitbuschiger feiner Verästelung, St. eben lfg. niedergestreckt. • Zw. beh., rund, gelbbraun. — abfasernd rotbraun, zuletzt grau: Kn. eifg., ca. 1—1,5 mm lang, mehrschuppig, beh.: B. bes. auf der heller grauen Unters. dicht weichzottig, an Blzw. 0,8—1,5:0,4—0,8 cm, sonst bis 3,5:1,4—1,6 cm, an Spitze sehr selten mit wenigen Kerbzähnen, Stiel 1—2(—3) mm: Blst. 1,5—5 cm lang gestielt, mit 4—8—10 Behen., Bl. schmutzigweiß, ca. 5 mm Dm., 3—10 mm lang gestielt, sonst vgl. Fig. 290a—d.

S. c. W. et K., Pl. Hung. rar. III. 252. t. 227. 1812. — Grauer S. — J. G. nur OF Kroat., Dalm., Bosn., Herzegow., sonst noch ital. Ost-Alpen: Prov. Udine (teste ASCHERS. et GRALB.) und Serbien (nach ASCHERS. et GRALB. auch Kl.-As.).

*) Vgl. eventuell 19. *S. maximowicziana*.

Armen., wofür ich keine Belege sah). — Blz. IV—VI(—VII). — Fr. VIII—X. — Diese in den Gärten seit langem bekannte Art steht der *media* sehr nahe. So treten z. B. in Bosnien und Kroatien Formen mit breit rundlich elliptischen B. auf, die etwa 3,5:3 cm messen und eine Zähnung fast wie *media* zeigen, allein die Fr. sind, so viel ich sah, stets wie beim Typ und bilden ein sehr gutes Unterscheidungsmerkmal.

10×15b *cana* × *chamaedrifolia* var. *ulmifolia*: *S. gieseleriana* ZABEL, in Gartenztg. III. 495. 1884. Vgl. ZABEL 1893, S. 28

△△ B. meist mit 1—3 feinen Zähnen an Spitze. Beh. unters. ± locker seidenzottig. Blst. ganz kahl o. locker beh.

11. *S. mombetsusensis*: in Wuchs anscheinend *cana*, in B.-Tracht mehr *media* ähnlicher, dicht buschiger $\mathfrak{b}$, Zw. jung beh., ⊙ ± kahl wie die ⊙ kahlen purpurbraun, zuletzt grau; B. vgl. Fig. 292u², ober. sattgrün, ± kahlend, unters. mäßig heller; Bl. und Fr. vgl. u—u¹, sonst wie *cana*.

S. m. FRANCH., apud C. K. SCHN., in Bull. Herb. Boiss. 1905. 339. — Diese auffällige „ostasiatische *cana*“ wurde von FAURIE, sub No. 7036 (Mont. de Iwanai) und 777 (Mont. de Mombetsu) in Japan gesammelt und von FRANCHET benannt, aber meines Wissens von ihm nirgends publiziert. Sie liegt in einer Form mit ganz kahlen (777) und einer mit locker beh. Blst. (7036) vor.

++ B. kahl und schmallanzettlich o. sonst fast stets (wenigstens im oberen Drittel) gezähnt und Fr.-Gr. auf dem Rücken unter der Spitze sitzend (meist zurückgebogen) und noch tiefer als auf Fig. 290p².

⌒ B. fast stets beh. und über 5 mm breit, sowie ± gezähnt.

12. *S. media*: meist 1—1,5 m hoher aufrechter $\mathfrak{b}$, ⊙ Zw. gelbbraun, meist beh., rotbraun, abfasernd, zuletzt in Grau übergehend. Kn. 1,5—2 mm lang, eigl. zugespitzt, mehrschuppig o. B. wie Fig. 289l—m¹, 1,2:0,6—5,5:2(—2,5) cm, vgl. sonst var.; Blst. im unteren Teile bis reichlich 8 cm lang gestielt und mit 5—8 normalen B. besetzt, im oberen Teile sich verkürzend, B. häufig nur am Grund gebuschelt, kleiner, Bl. weiß, 7—8 mm Dm., vgl. Fig. 290p—p¹, K. meist deutlich kürzer als Bl.-Achse, sonst vgl. var.

var. *a. oblongifolia* BECK, in RCHB. Icon. XXIV, 10. t. 149. 1904 (*S. oblongifolia* W. et K., Icon. pl. rar. Hung. III. 261. t. 235. 1812; *media subintegerrima, glabrescens et pilosiuscula* ZABEL, l. c. 32), typische Form mit kahlen o. fast ganz kahlen Blst. B. ober. kahl, hellgrün, und meist kahl nach gewinkelt und unters. beh. Bei *S. media* vgl. SIMONKA, Enum. pl. Frats. 235. 1881, kahlen die Zw. und B. stark. Heirat. Stereom. Kroat. Istr., Dalm. Kroat. Bosn. Serb. Ung. Slav. und (von da wohl durch S. Rußl. und W. Sotaj) des O. See. B. *mollis* S. vgl. C. KOCH et BOUCHÉ, in Gartenfl. 1854. 404; *cana* var. *mollis* BECK, l. c. 9). Blst. reichlich etwas zottig beh., ebenso B. unters. reichlicher und ober. beh. durch Übergänge mit *a* verbunden. Ich sah spontane Expl. aus Serbien, Bosnien und Ungarn. Ihn reiht sich als Form an *f. polonica* S. vgl. BROCKT. in D. Bot. Monatschr. X. 130. 1872, die nach BROCKT. Origin der vor. Form durch sehr gelbe Bl. abweicht und auch naheliegt, in B.-Tracht nach Art der Blst. zu *a* gehend scheint. Sie wurde in Galizien auf basaltischen Kalksteingebirgen, des steilen Draestertales und des Seretats gemacht. Vielleicht ist sie als nordliche u. als südliche Form von *a*. anzusehen. — Erwähnt sei noch die aus den Gärten, wie es scheint, verschollene, weder von ZABEL, KOEHNE noch DIPPEL, und auch 1903 in H. d. D. D. G. nicht geführte *f. ambigua* S. vgl. K. KOCH Hort. Dendr. 1891, bez. *media* var. *ambigua* K. KOCH, Dendr. I. 318. 1871, eine auffällige Form mit langkeiligen, schmalen, gegen die Spitze mit ein 5-lappig-zahner verschärfen oder ganzrandigen B., die 2:1,0—5:1,3 cm messen. Ich sah Originale im Herb. K. KOCH. Mit var. *b*. hängt besser nahe zusammen var. *c. sericea* Retz. Fl. Usur. n. 101. ex MAXIM. (S. vgl. FROZ., Fl. Baie Dah. I. 558. 1871, die vor allem durch mehr serige Beh. der jungen B. abweicht. Indes waren Vergleiche lebender

*) Vgl. meine Dendrol. Winterstudien Fig. 176a—c.

Pflz. erwünscht, um die Unterschiede gegen b. scharf festzustellen. Sie stammt aus der Mandschurei und dem Amurgebiet, sowie nach MAXIM. auch von Saechalin und der N.-Mongolei.

S. m. SCHMIDT, Oest. Baumz. I. 53. t. 54. 1792 (*S. confusa* RGL. et KOERN., in Gartenfl. VIII. 48. 1858; *S. banatica* JANKA, in Acad. Közl. XII. 166. 1876 [teste BOBB.]). — Heimat wie oben. — Blz. V. — Frz. VII—VIII. ZABEL und KOEHNE führen die var. *mollis* als Hybride: *cana* × *media*. Wenn nun auch diese Annahme nicht ganz von der Hand zu weisen ist bei in Kultur befindlichen Exemplaren, so stimmte doch KOCHS Original (ein Fr.-Expl.) mit den spontanen Formen, die als var. *mollis* geführt werden, völlig überein. Von diesen spontanen Formen aber ist die Annahme, daß sie Hybriden darstellten, vorläufig durch nichts beweisbar, im Gegenteil sprechen die Fr. gegen jeden Einfluß von *cana*, und ich wundere mich daher, daß ein so ausgezeichnete Beobachter wie G. BECK v. MANNAGETTA die *mollis* als var. zu *cana* zieht. Er tut dies anscheinend nur aus Rücksicht auf ihre geogr. Verbreitung. Zwischen typischer *media* und *mollis* scheinen alle Übergänge vorhanden, zwischen *mollis* und *cana* sah ich aber keine sicheren Bindeglieder. Ich besitze auch kein Kulturmateriel, was mit Sicherheit als *cana* × *mollis* angesprochen werden könnte.

Im Anschluß an *media* sei auch auf *S. prostrata* MAX., in Act. Ht. Petrop. VI. 184. 1879, aus O.-China (Hupei, Schensi) hingewiesen, die fast sitzende Blst. haben soll und eigentlich nur wegen der zur Frz. zurückgekrümmten K. von dem Formenkreise der *hirsuta* etc. getrennt werden kann. Mir nur aus der Literatur bekannt.

12×14 *S. media* × *flexuosa*: *S. oxyodon* ZAB., in Gartenztg. III. 495. 1884. ist mir noch fraglich. Was ich besitze, scheint eher *media* × *chamaedrifolia* zu sein.

12×53 *S. media* × *alba*: *S. microthyrsa* ZBL., l. c. 83. 1893. Vgl. ZABEL. Mir noch etwas fraglich.

△△ B. kahl, lanzettlich, ganzrandig.

13. *S. dahurica*: nach MAXIMOWICZ 1—1,5 m hoher b, Zw. locker, ausgebreitet aufrecht, ⊕ rotbraun, ⊙ mit ablösender Außenrinde, Kn. eilänglich, abstehend, 3—4-schuppig, fast kahl, 1—2 mm; B. 1,3:0,3 3,8:6 mm, beiderseits lebhaft gelbgrün (Fig. 292 f); Blst. 0,7—2,5 cm lang gestielt, im unteren Teile mit 3 B., kahl, Bl.-Stiele 5—10 mm, ziemlich doldig gedrängt, Bl. gelblich-weiß, 6 mm Dm., sonst vgl. g—h.

S. d. MAXIM., in Act. Hort. Petrop. VI. 190. 1879. — Nördliche Mandschurei. — Wohl nicht in Kultur, erinnert in den B. an *alpina*, aber durch die nicht papillösen B. sofort zu unterscheiden.

· · · Zw. stark kantig. B. hfg. vom unteren Drittel an gezähnt.

+ ⊙ Zw. stark (etwas flügelig) kantig, B. vgl. Fig. 291 d—e, meist nur über der Mitte einfach gesägt.

14. *S. flexuosa*: etwas sparrig ausgebreitet überneigend verästelter, bis über 1 m hoher b, · Zw. kahl, hellgelbbraun, gewundenknickig, aber nicht so stark gebogen wie häufig bei der folgenden Art. grau werdend, spät die Außenrinde ablösend, Kn. ca. 4—5 mm lang, abstehend spitzkegelig, die 2 äußeren Sch. beh. und mit den fädigen Spitzen meist abgebogen; B. vgl. var., durch die einfache Zähnung und die ziemlich schmallängliche Form sofort von 15 abweichend, Stiele nicht viel länger als Kn.; Blst. 0,7—3,5 cm lang gestielt, mit kleineren, mehr eifg. B. besetzt, wenigblütig, Bl. weiß, ca. 8—10 mm Dm., sonst wie Fig. 290 n—n¹.

Man kann unterscheiden: var. a. *typica*: B. etwa 2:1—6,5:3 o. bis 5:2,5 cm und var. b. *stenophylla* (*chamaedrifolia stenophylla* ZBL., l. c., 26.; *media oblongifolia* HORT. NONN.): 2:0,7—0,5:1,3 cm, in allen Teilen zierlicher. — Interessant ist eine monströse Form *f. foliosa* (*S. foliosa* POIR., in LAM. Encycl. VII. 303. 1806), deren K. groß blattartig ausgebildet sind. Möglicherweise tritt diese Erscheinung auch bei anderen Arten auf und bezieht sich POIRETS Name auf eine Form der *media*, da er von runden Zw. spricht.

S. f. FISCH. in Ann. sc. nat. I. 365. 1824, non RCHB. (*chamaedr.* var. *flexuosa* MAXIM., l. c. 1866). Krummzweigige *S.* SO.-Sib. (Amur- und Baikalgebiet), Alatau-, Tarbagatai-gebirge. Blz. V–VI. Frz. VIII. Eine von dem Formenkreis der *chamaedrifolia* sehr gut geschiedene Art. Vgl. das dort Gesagte.

++ ⊙ Zw. nicht flügelig kantig, nur hfg. ⊙ stark wellig verbogen. B. vgl. Fig. 291 a–c. meist vom unteren Drittel an ± ungleich o. doppelt gesägt.

Fig. 291. *Spiraea*: Blattformen von: a–c *chamaedrifolia*: (vgl. Text) – d–e *flexuosa*: e var. *stenophylla* – f f' *disjuncta* f' var. *travancora* – g *trilobata* – h *blumei* – i *nipponica* (*bracteata*) – k *cantoniensis* – l *chinensis* – m *pubescens* – n *decumbens* – o *hacqueti* (Alles reichlich $\frac{2}{3}$ n. Gr.) (Original).

15. *S. chamaedrifolia*). vielgestaltiger, aufrecht ausladend verästelter bis über 2 m hoher b. + Zw. gelbgrau o. graubraun, kahl, + und abblätternd, z. T. rotbraun o. grau; Kn. amersich von 2 gleich langen, leicht klaffenden gewimperten Sch. umhüllt, spitz eifg. o. länglich, (2–)3–4 mm lang, abstechend; B. ober., lebhaft gelbgrün, kahl, unters. heller, meist leicht bläulichgrün, wenigstens jung verstr. beh., vgl. var.; Blst. ca. 1–6 cm lang gestielt, Stiel beblättert, diese

*) In ASCHERSON et GRAEB., Synopsis VI. 14. 1900, wird dieser Name zur Bezeichnung der Gesamtheit *media* und *canadensis* gewählt. Der darin ausgedruckten Annahme, daß *media* phylogenetisch näher mit *canadensis* als mit *chamaedrifolia* verwandt, kann ich ganz und gar nicht zupflichten. Ich halte daher, da die beiden Gesamtheiten (*canadensis* und *media*) und *chamaedrifolia* als drei verschiedene Arten betrachtet werden müssen, aber nicht *canadensis* und *media* so auseinanderreißen darf.

B. den anderen ähnlich, nur kleiner (vgl. Fig. 291 a. b.). sonst Blst. kahl, vgl. var.

Var. *a. typica*: vgl. insbesondere die B. von Fig. 291 b und Bl. von Fig. 290 n—o, B. bes. an Blzw. breit-eifg., unters. $\pm$ reichlich beh., Blst. ziemlich flachdoldig, Bl. etwas kleiner und frühzeitiger als bei var. *b. ulmifolia* (*S. ulmifolia* Scop. Fl. carn. I. 349. t. 22. * 1772), deren B.-Form in Fig. 291 a und deren Bl. in Fig. 290 k—m dargestellt sind, sie ist durch die mehr halbkugeligen Blst., deren Bl.-Stiele mehr traubenfg. an verlängerter Achse befestigt sind, oft gut gekennzeichnet, doch wage ich vorläufig noch nicht — wie es KOEHNE, in Gartenfl. 1902, 61, möchte — sie als Art abzutrennen, da sie durch ∞ Zwischenformen mit *a* verbunden scheint. Diese meine Ansicht teilt auch A. REHDER, und aus ZABELS Darstellung geht hervor, daß er sogar *flexuosa* nicht abtrennen zu können glaubt, obwohl er sie 1903 im H. d. D. IV. G. 150, wenigstens als Unterart führt neben *chamaedrifolia ulmifolia*. — Var. *c. transiens* ZABEL, l. c. 25, ausgezeichnet durch relativ schmale B. (Fig. 291 c), die aber von *flexuosa* doch durch lappige Zähnung abweichen, und vor allem durch reduzierte auf $\mp$ sitzende Büscheldolden zusammen-geschrumpfte Blst. Nach ZABEL scheint es allerdings, daß diese reduzierten Blst. nur am obersten Teil der Zw. auftreten, daß also diese Form auch normale Blst. ausbilden kann. Ich sah nur Zw.-Enden mit sehr stark reduzierten, z. T. nur 3—4-blütigen Blst. Var. *transiens* scheint spontan in Dalmatien und Sib. aufzutreten. Die var. *crataegifolia* ZABELS ist mir nicht genau bekannt. Er sagt darüber: B. breit-eifg., bis 8:4,5 cm, abnehmend 5-lappig, Blst. kürzer gestielt, weniger blütig, mehr doldig; Fr. stärker beh.

S. ch. L. Spec. pl. 489. 1753. — Gamander.-Sp. — J. G. nur OU. O.-Alpen, Steierm., Krain, Küstenland, Kroat., Bosnien, ungar. Bergland, Karpathen, O.-Galiz., Siebb.; ferner Serb., Rumelien, sowie Sib. vom Altai ostwärts durch die Mandschurei bis Japan (Hondo). — Blz. V—VI. — Frz. VII—VIII. — Altbekannte Art. LINNÉS Name wird vielfach jetzt auf *flexuosa* bezogen und streng genommen hat er gewiß auch diese mit im Auge gehabt. Da aber eine einwandfreie Entscheidung, ob ob er nur *flexuosa* darunter verstanden, unmöglich scheint, so behalte ich den Namen in dem gebräuchlichen Sinne bei. Da die *chamaedrifolia* in 2 geographisch so ganz getrennten Verbreitungsgebieten auftritt, so glaube ich, daß die ostasiatischen Formen sich gegenüber den europäischen abtrennen lassen, allein trotz Durchsicht recht reichen Materials konnte ich bis heute ganz sichere Anhaltspunkte für eine solche Scheidung nicht gewinnen. Aus O.-As. sah ich nur var. *a.* und diese scheint da keineswegs hfg. aufzutreten. In Eur. überwiegt var. *b.* und die ihr näher stehenden Formen. Wo das Zentrum der geogr. Verbreitung unserer Art zu suchen, sofern sie einheitlich ist, darüber bin ich vorläufig noch im unklaren.

15b $\times$ 25 *S. chamaedrifolia* var. *ulmifolia* $\times$ *trilobata*: *S. schinabecki* ZBL., in Gartenztg. III. 495. 1884: von *ulmifolia* im wesentlichen abweichend durch: Kn. kürzer, B. z. T. breit-eirundlich-eifg., Stb. kürzer als C., K. zur Frz. abstehend. Es scheinen verschiedene unter sich abweichende Formen vorzuliegen. In den Gärten zuweilen als *corymbosa*.

15b $\times$ 36 *S. chamaedrifolia ulmifolia* $\times$ *bella*: *S. nudiflora* ZBL., l. c. 47. 1893: macht den Eindruck einer *ulmifolia*, aber Kn. kürzer, B. wenigstens z. T. $\mp$ beh., unters. etwas papillös, Blst. $\pm$ zusammengesetzt, locker beh., Fr. oben etwas auseinander neigend. Jedenfalls ein mehr goneokliner als intermediärer Bastard, wie dies ja bei *Spiraea* Regel zu sein scheint, wodurch die richtige Deutung oft sehr erschwert wird und leicht eine einfache Varietät als Hybride angesprochen werden kann, und umgekehrt.

(K. zur Frz. aufrecht o. abstehend, höchstens an Spitze zurückgebogen.

* $\times$ s. S. 465.

* Kn. kurz, $\pm$ eifg., meist nicht über $\frac{1}{3}$ so lang als B.-Stiel.

++ s. S. 463.

+ Blst. durchweg dicht zottig beh., dgl. Bl.-Achse und K.

$\triangle$ Zwerg- δ , Kurztr. z. T. $\pm$ verdornend, B. sehr klein, kaum über 12:6 mm, vgl. Fig. 292 t.

16. *S. brahuica*: ein durch seine sparrige, verworren steifästige Tracht sehr ausgezeichneter kleiner δ , 5. Zw. purpurn o. tiefbraun, rundlich, kahl o. fast kahl. — grau, Kn. sehr winzig, spitzlich, fast kahl; B. ober. beh., graugrün, unters. weißlich zottig, Nerven unters. scharf vortretend (Fig. 292 t); Blst. sehr

klein, $\pm$ doldig, an 1—2 cm langen regulär beblätterten Trieben, Bl.-Stiele 3—5 mm, Bl. ca. 8 mm Dm., C. schmutzig weiß, $\pm$ oblong (s^3), sonst vgl. $s-s^2$, Fr. mir nicht bekannt.

S. b. BOISS., Fl. or. II. 690. 1872. — Balutschistan (Chehel-Berge [lg. STOCKES, No. 1029]) und nach HOOKER: Wuzuristan beyond Peshawur in NW.-Indien. — Gebirge 18—2500 m. — Noch wenig bekannte, nicht eingeführte Art.

$\triangle\triangle$ höhere schlanktriebige $\wp$, Kztr. nie verdornend, B. im Mittel über 15 mm lang.

= Stb. nur ca. $\frac{1}{2}$ so lang als C. (Fig. 292 q—r), B. = = siehe S. 463.
unters. dicht weißgrau kurzzottig beh. o. B. kahl und papillös.

> B. $\pm$ beh., kaum 4 cm lang, nicht papillös.

— Bl. sehr klein, kaum über 5 mm Dm., Bl.-Achse und K. außen bes. dicht zottig graufilzig, B. vgl. Fig. 291 f—f¹.

17. *S. dasyantha*: aufrechter $\wp$, Tracht und Höhe?, Zw. rundlich, jung $\pm$ filzig zottig. $\odot$ kahlend, rotbraun, $\odot$ purpurn mit ablosender Außenhaut, $\odot$ grau. Kn. sehr klein, eispitzlich, abstehend; B. ober. tiefgrün, $\pm$ spärlich beh., vgl. var.; Blst. $\pm$ doldig am Ende 1,5—6 cm langer normal beblätterter Zw., Bl.-Stiele fein, ca. 5—8 mm, vgl. 292 r—r².

Var. a. *typica*: Zw. $\pm$ knickig, B. wie Fig. 291 f, aus breitkeilig abgestutztem Grunde $\pm$ rhombisch-eifg., Lappung stumpf, 1,2:0,9—3:2,2 cm. — b. *wawrana*: Zw. schlank, gerade, B. vgl. Fig. 291 f¹, aus $\pm$ spitzkeiligem Grunde spitzrhombisch, spitzlappig, 1,3:0,5—2,3:1,3 cm, in Tracht und B. gut von a. verschieden, aber in Bl. ganz identisch, und da Fr. von keiner Form vorliegen, wage ich noch nicht, sie abzutrennen. lg. WAWRA, No. 860, China (Ku-pei-ku).

S. d. BGE. in Mém. Sav. Etr. Pétersbg. II. 79. 1835. — Ich sah echte Expl. des Typs nur aus N.-China (um Peking), FORBES u. HEMSL. werfen diese Art und *chinensis* zusammen, und ob das von DIELS zitierte HENRYSche Expl. aus Hupei hither gehört und nicht vielleicht mit meiner *S. d.* identisch, ist mir zweifelhaft. MAXIMOWICZ zieht als Synonym zu *dasyantha* die *S. nervosa* FRANCH. et SAV., Enum. pl. II. 331. 1879, aus Japan (Hondo), wozu die unvollständige Diagnose wenig Anhaltspunkte bietet. Mir ist *S. d.* noch zweifelhaft. Ob *S. d.* recht in Kultur? Herr VILMORIN sandte mir auf meine Bitte Winterzweige mit Frst. einer Art (No. 5066), die er als *dasyantha* kultiviert. Allein schon die Fr.-K. zeigen deutlich, daß es nicht die echte ist. Eine nähere Bestimmung kann erst im Sommer möglich sein.

— Bl. ca. 10 mm Dm., Achse und K. außen etwas weniger dicht beh., B. vgl. Fig. 292 q³.

18. *S. boissieri*: anscheinend zierlich und schlank verzweigter, doch ziemlich kurztriebiger $\wp$, der der *dasyantha* sehr ähnelt, in der B.-Ausbildung der mir vorliegenden Exemplare noch zu jung ist, aber in den größten, kaum über 5 mm lang gestielten Bl., die meist in der Mitte ein radiales Verb. tragen und nur zu etwa 5—10 $\pm$ doldig vereinigt sind, sowie in der stärkeren Beh. der Frkn. gut abweicht (Fig. 292 p—q²). *S. dasyantha* hat meist über 10-blütige Scheindolden und zeigt nur ganz vereinzelt ein Verb. am Bl.-Stiel.

S. b. C. K. SCHN., in Bull. Herb. BOISSIER 1905. 341 (*S. brahuica major* BOISS., in Herb.). — Afghanistan: Kurrum valley, lg. AITCHISON 1879, No. 331. 546. 232. — Bedarf gleich *dasyantha* noch der Untersuchung der Fr.

>> B. kahl o. fast kahl, unters. deutl. papillös, groß, ca. 6:3 cm; Bl. ca. 5 mm Dm.

19. *S. maximowicziana*: anscheinend mittelhoher, locker verästelter $\wp$, Zw. kurz, rundlich, $\pm$ zottig beh., rotbraun, $\odot$ grau. Kn. sehr klein, $\odot$ beh., B. derb, trocken beiders. $\odot$ gleich graugrün, aus langkeiligem Grunde (rhombisch, etwa von Mitte ab gleichmäßig doppelt lappig kerbzähnig, $\pm$ gewimpert, bis 7:3,4 cm, Stiel 5—11 mm, beh., Blst. sehr reiche und dichtblütige Doldenbüschel bildend, die ca. 40 Bl. entspringen mit ihren dünnen, beh., 5—14 mm langen Stielen genau

an einem Punkte quirlig, so daß eine von den meisten anderen Spiräen abweichende Infloreszenz entsteht, die am Ende von ca. 4–5 cm langen normal belaubten Seitenzw. sitzt. Bl. unscheinbar. K. kurz 3-eckig. C. über 2mal so lang, rundlich verkehrt eifg., Bl.-Achse etwas länger als K., innen und außen beh., Drüsenring deutlich. Stb. ca. 25, ¹, so lang wie C., Frkn. wenig kürzer als Gr., spärlich beh., Fr. ?

Fig. 292. *Spiraea* ¹ *arcuata*: a B. von Lgtr.; b dgl. von Blzw.; Bl. im L.-Schn.; ¹ Frkn. — d ¹ *zabeliana*: d ¹ Frkn.; e Frst. und Fr. — f ¹ *hirsuta*: f B.; g Bl. im L.-Schn. und K.; ¹ Frkn.; h Frst. und Fr. — i—i³ *arcuata*: i Bl. im L.-Schn.; i¹ K.; i² Frkn.; i³ B. — k—m *zabeliana*: k—k¹ wie i—i²; l Frst.; m B. — n—p¹ *hirsuta*: n B. von Blzw.; n¹ von Lgtr.; o—o² wie i—i²; p Frst.; p¹ Fr. — q—q³ *boissieri*: q—q² wie i—i²; q³ B. — r—r² *dasyantha*: wie i—i². — s—t *brahuca*: s—s² wie i—i²; s³ C; t B. — u—u² *mombetsusensis*: u Bl. im L.-Schn.; u¹ Frst.; u² B. — v—v³ *fourcroyana*: wie u; v¹ Frkn.; v² Frst.; v³ B. — w—w³ *henryi*: w—w² wie i—i²; w³ B. — x—x³ *gracilis*: x—x² wie i—i²; x³ B. (Original).

S. m. C. K. SCHN., in Bull. Herb. Boiss. 1905. 341. — Die mir vorliegenden Exemplare wurden von HENRY, No. 3506, in China (Hupei) gesammelt. Ihre Einreihung hier ist nur eine provisorische.

= = Stb. $\frac{2}{3}$ o. so lang wie C., B. unters. nur locker beh. o. Beh. deutlich gelblichgrau.

> Beh. der Blst. und B. grau, nicht gelblich, K. wie Fig. 292o¹, Stb. ca. 40—50.

20. *S. hirsuta*: Tracht und Höhe?, junge Triebe $\pm$ dicht grau beh., $\odot$ kahl, rundlich, rotbraun; B. wie Fig. 292n an Blzw., wie n¹ an Laubtrieben, dünn, aber Nervatur zuletzt unters. ziemlich scharf und Beh. sehr locker, vorwiegend auf Rippe und Nerven; Blst. $\pm$ doldig, 10—15-blütig, auf 1—2,2 cm langen, bis zur Mitte mit 2—4 normalen B. besetzten Trieben, Bl. weiß, ca. 7—8 mm Dm., die Stiele 8—10, zur Frz. bis 18 mm lang, Stb. etwa so lang wie C., Frkn. fest aneinander gepreßt, sonst vgl. o—p.

S. h. C. K. SCHN., in Bull. Herb. Boiss. 1905. 342. — China: (Hupei), lg. HENRY, No. 1109 et 1229. — Diese bis auf die B. in den vorliegenden Exemplaren gut charakterisierte Art, steht der *S. yunnanensis* FRANCH. Plant. Delav. I. 200. 1890 aus Yunnan nach des Autors Beschreibung sehr nahe. Nur gibt er im allgemeinen kleinere B. (12—18 mm lang) und ganz kahle Carpelle an. Da ich nun aber glauben mochte, daß auch die von HEMSLY in Jour. Linn. Soc. XXIII. 224. 1887, als *S. chinensis* var. *hirsuta* geführte Pflanze HENRYs aus Hupei mit der nun vorliegenden zusammenfallen dürfte, so halte ich vorläufig den Namen *hirsuta* aufrecht. Die durch unsere Arten 16 bis 21 (exkl. 19) gebildete Spiraea-Gruppe ist genetisch sehr eng verbunden und bedarf noch sehr eingehender Beobachtungen, die sich aber auf ein viel reicheres Material, als ich es sah, stützen müssen, um zu entscheiden, inwieweit hier z. T. ein Formenkreis einer Art vorliegt. Vgl. auch unter *blumei*, S. 465.

>> Beh. der Blst. und B. deutlich gelbgrau, K. wie Fig. 290s (rechts), Stb. ca. 30.

21. *S. chinensis*: 0,5—1,5 m hoher, etwas sparriger aufrechter b. $\cdot$ Zw. fast rundlich, fein beh., ältere grau, später auch etwas kirschbraun, Kn. ca. 1,5 mm lang, eistumplich, beh., B. (Fig. 291l der Blzw. kaum über 1,5:0,8, sonst 2:1,5—4,5:3,5—4 cm, oben tieferün, locker beh., unten hellgrau bis gelbgrau filzig, Hauptadern deutlich, Stiel kaum über 7 mm; Blst. nur 1—2 cm lang gestielt, breit doldig, Bl. gelbweiß, 8—18 mm lang gestielt, ca. 10 mm Dm., sonst vgl. Fig. 290s—t¹.

S. ch. MAXIM., in Act. Hort. Petrop. VI. 1. 193. 1879 (*S. pubescens* LDL., in Jour. hort. Soc. II. 157. 1847 [et Bot. Reg. XXXIII t. 38. 1847]). — China (Chusan, ex MAXIM. — Blz. V—VI. — Frz. VIII. Häufig als *pubescens* in Kultur. HEMSLY zieht sie, in Journ. Linn. Soc. XXIII. 225. 1887, zu *desantha*, für die er in China: Tschili, Kiangsu, Kiangsi, Hupei als Heimat angibt. Allein diese Art ist, wie ich oben schon sagte, sehr gut verschieden.

21 $\times$ 23 *S. chinensis* $\times$ *cantonensis*: *S. blanda* ZBL., in Gartenztg. III. 496. 1884: von *cantonensis* durch Beh. der B. und Blst., die größeren, 12—15 mm im Dm. zeigenden reinweißen Bl., und die z. T. etwas an *serotina* erinnernden, stets schwächer als *chinensis* beh., eirhombischen B. meist lappiger gezahnt als in Fig. 293c, — sofort zu unterscheiden, ebenso von *chinensis* durch B-Form und die schwächere Beh. der Blst. und Zw. Sehr formstreich, üppig wachsende, reich blühende und fruchtende Hybride. Blz. V—VI, Frz. VII—VIII. Macht trotz der Formen den Eindruck einer „Art“.

Blst. kahl o. fast ganz kahl, höchstens K. und Bl.-Achse innen deutlich beh.

$\triangle$ B. vgl. Fig. 291m, unters. stets $\pm$ beh., hell bis leicht graugrün.

22. *S. pubescens* $\cdot$: 1,6—2 m hoher b., mit bogenfg. Ästen, zwischen den Nachbargebüschchen fast kletternd, ohne Ausläufer. $\cdot$ Zw.

¹) Beschreibung z. T. nach KOHNLE in Gartenflora 1902. 50. Ich sah aber auch im Herb. BOISS. ein Stück eines Original-Expls. aus Herb. BUNGE.

kahlend, rundlich, tiefbraun, später grau, häufig kniebig gewunden; Kn. eifg., 1–2 mm lang, beh., wenigschuppig; B. an Blzw. 1–2:0,6–1,2 cm, sonst bis 4:2 cm, oben etwas dunkler, stark kahlend, Blst. 1–3,5 cm lang gestielt, mit 3–7 B.chen, $\pm$ flach, Bl. weiß, ca. 7–8 mm Dm., Stiele 5–12 mm, sonst vgl. Fig. 290u u¹, Fr. weit heransragend, aufrecht, Gr. unter der Spitze außen, zurückgebogen.

S. p. TURCZ., in Bull. Soc. Mosc. V. 190. 1832, nec LDB. (*S. laucheana* KOEH., in Mitt. D. D. Ges. VIII. 56. 1899 [nomen]). — Behaarter S. — O.-Mongolei, N.-China (Kansu, Schensi, Tschili, Shingking). — Blz. Ende V–VI. — Frz. VIII–IX. — In Kultur sehr selten echt, wie es scheint, öfter mit *blanda* und *chinensis* verwechselt. Man vgl. auch das bei *S. henryi*, S. 469, Gesagte.

$\Delta\Delta$ B. kahl, unters. $\pm$ deutlich blaugrau o. blaugraugrün.
= B. spitz o. $\pm$ zugespitzt, vgl. Fig. 291k.

23. *S. cantoniensis*: 0,8–1,5 m hoher, schlankzweigiger aufrechter b., . Zw. rundlich, rotbraun, in Grau übergehend, dann

Fig. 293. a–b, g–i *Spiraea cantoniensis*: a Zw. mit Blst.; b B. von Blzw. (vgl. auch Fig. 291k); c Bl. im L.-Schm.; d, e, f, g, h, i Frkn. — c, d, e, f, g, h, i *S. cantoniensis*; B. von Blzw. — d, f, g *S. blanda*, B. von Laubtrieben, a, g nach BAILLON, sonst Orig.

abfasernd, Kn. kurzzeitg., etwa 4-schuppig, Sch. gewimpert, sonst fast kahl; B. an Blzw. etwa 2:0,8–3:1 cm, sonst bis 5,5:1,5–2 cm; Stiele bis 1 cm; Blst.-Stiel 1,5–4 cm, nur im unteren Teile mit 3–6 B.chen besetzt, Bl. weiß, ca. 8–10 mm lang gestielt, 8–10 mm Dm., sonst vgl. Fig. 293a–b, g–i, Fr. etwas kürzer als K., Gr. nach außen abstehend.

Zu erwähnen var. *lanceata* LABEL, l. c. 41 (*S. reevesiana* fl. pl. HORT.) B. besonders schmal, zuweilen fast ganzrandig, Bl. meist gefüllt.

S. c. LOUR., Fl. cochinch. I. 322. 1790 (*lanceolata* POIR., in LAM., Encycl. VII. 354. 1806; *japonica* SIEB., in Bl. Bijdr. 1114. 1826, non L. 1.; *ambusa* ROXB., Fl. ind. II. 512. 1832, non RAF.; *reevesiana* LDB., in Bot. Reg. XXX. 1. 10. 1844, *neumannii* HORT. NONN.) — Kanton S. — China (Fokien, Kwangtung, Hongkong, Japan (Kiuschiu, Hondo), — Berghänge, Walder — Blz. VI — Frz. IX. — Da

empfindlich, bei uns selten echt, meist gehen unter diesem Namen *blumei* und *van houttei*. In As. durch Kultur weit verbreitet.

23×25 *S. cantoniensis* × *trilobata*: *S. van houttei* ZABEL, in Gartenztg. III. 496. 1884. (*S. aquilegifolia van houttei* BRIOT, in Rev. Hort. 1866. 269. Dieser von BILLIARD in Fontenay aus *S.* der *S. aquilegifolia* HORT. (= *trilobata*) gezogene Bastard ist üppiger als beide Eltern, zeigt in den bis 4,5 : 3 cm messenden, oberseits sattgrünen, unterseits bläulich grünen Bl. alle Übergänge, sie sind breiter (Fig. 293 c), am Grunde rundlicher und lappiger gezahnt als bei *trilobata*, und spitzer, länglicher, mehr aber meist kürzer lappiger als bei *trilobata*. Bl. ca. 8–9 mm Dm. Blz. VI–VII. Frz. VIII–IX. Sehr empfehlenswerte Kulturform. Eine Varietät ist von ZABEL, in Mitt. d. D. D. G. 1904. 59, beschrieben, als var. *phyllothyrsa* mit z. T. verzweigten und mit laubigen Hoch besetzten Blst. Eine sehr interessante Form, die ZABEL durch Aussaat der *van houttei* gewann. Sie soll niedriger als diese bleiben und buschiger sein, die Bl. sind kleiner, nur 6–7 mm Dm., reife Fr. noch nicht beobachtet.

= = B. an Spitze stumpf bis abgerundet (Fig. 291 g–h).
 > B. wie h. im Umriß aus ± spitzkeiligem Grunde
 ± rhombisch o. eifg., Hauptadernetz der Unters.
 ± scharf vortretend.

24. *S. blumei*: 0,5–1 m hoher, aufrechter b. + Zw. kahl, rundlich, leicht kniebig, + kirschbraun, Kn. abstehend, mehrschuppig. Beh.: B. kahl, an Blzw. etwa 1:0,8–2:2,5:1,5 cm, sonst bis etwa 3,5:2,5–3 cm, unters. + graugrün, nicht eigentlich bläulich. Stiel bis 6 mm; Blst. etwa 2–2,5 cm Dm., auf 1,5–4 cm langen, beblätterten Stielen, Bl. weißlich, 8–9 mm Dm., Stiele 6–11 mm, sonst vgl. Fig. 290 v–x, S. 455.

S. b. G. DON, in GARD. Syst. II. 518. 1832 (*chamaedrifolia* BLUME, Bijdr. 1114. 1826, et THBG., ex parte, nec L.) Japan (Kiuschiu), China (Hupei, Kiangsi [teste DIELS und HEMSLEY]). Gebüsche offener Berghänge. — Blz. V–VI. Frz. VII–VIII. — Zartliche, bei uns selten echte, oft mit *van houttei* verwechselte Art, von der sie durch kleinere Bl. und die scharfe Blattnervatur zu unterscheiden ist. — HEMSLEY beschreibt, in Journ. Lin. Soc. XXIII. 224. 1887, 3 Varietäten: *hirsuta*, *rotundifolia* und (mit? *latsepala*), allein es ist mir sehr zweifelhaft, ob nur eine davon wirklich zu *blumei* gehört. Vgl. übrigens unter *S. hirsuta* S. 463.

>> B. wie Fig. 291 g, im Umriß rundlich mit abgerundetem, breit abgestutztem oder etwas herzförm. Grunde, Hauptnerven unterseits kaum vortretend.

25. *S. trilobata*: weicht von *blumei* noch ab durch: B. bis 3:3 cm, unterseits hellgrün; Blst. 3–5 cm lang gestielt, Bl. und Fr. vgl. Fig. 290 q–r, S. 455.

S. t. L. Mant. II. 244. 1771 (*triloba* L., Syst. veg. ed. 13. 394. 1774; *grossulaefolia* HORI, NONN.). Dreilappige *S.* — China (Tschili, Kansu, Schensi, Sztschwan), Mongolei, Dsungarei, S. Sib. (Tarbagatai), Altai Gebirge. — Blz. V–VI. Fr. VIII. — Die von ZABEL 1893 erwähnten Exemplare L. VAGNERS aus Ungarn (Marmaros) sind durchaus nicht zu *triloba*, sondern wie angegeben zu *chamaedrifolia* gehörig.

25×29 *S. trilobata* × *nipponica* (*bracteata*): von ZABEL 1893 erwähnter mir noch nicht genügend bekannter Gartenzögling.

• • Kn. lang und feinspatzig, 2 schuppig, — so lang o. eher länger als B.-Stiel.

+ B. unters. nicht papillös, länglich.

B. und Blst. kahl, diese bis 2 cm lang gestielt o. fast sitzend, einfach traubig-doldig, Bl.-Stiele ohne Trgb.

26. *S. gemmata*: 0,8—1,5 m $\bar{b}$, Zw. ausgebreitet, $\pm$ überhängend, $\odot$ kahl, gelb- o. rotbraun, $\pm$ kantig, $\odot$ $\pm$ gebogen, graubraun; B. 1:0,4—2,5:1 cm, an Blst. kleiner, Stiel 1—3 mm; Blst. gewölbt doldig, Bl. weiß, 8—9 mm Dm., Stiele 5—10 mm; sonst vgl. Fig. 290f—g, S. 455.

S. g. ZABEL, die strauch. Spir. 23. 1893 (*S. mongolica* KOEHNE, Dendr. 212. 1893). — Knospen-S. — Wahrscheinlich S. O.-Sieb. — Blz. V. — Frz. VII—VIII. Noch wenig verbreitet und ziemlich unscheinbar, an *alpina* erinnernd.

$\triangle\triangle$ B. und Blst. $\pm$ beh., untere Bl.-Stiele meist mit (hfg. laubigen) Trgb.*).

= Blst. und Bl. klein, diese ca. 6 mm Dm., K. vgl. Fig. 292i¹, Stb. eher länger als C., nur ca. 18—25.

27. *S. arcuata*: kleiner, nach HOOKER, kurz und derb stämmiger $\bar{b}$, $\odot$ Zw. purpurn, spärlich beh., tief streifig, $\odot$ anfreißend, Kn. fast fädlich, etwa 3—4 mm; B. länglich-elliptisch, kaum gezähnt, ca. 8:3—12:5 mm (Fig. 292i³), Stiel dünn und relativ lang; ober. tiefgrün, spärlich beh., unter. graugrün, locker beh., zuletzt vielleicht ganz kahlend; Blst. am Ende ca. 1,5 cm langer, normal belaubter Zw., breit doldig traubig, ca. 2 cm Dm., 10—15-blütig, Bl.-Stiele 3—10 mm, gleich Bl.-Achse $\pm$ beh., K. außen kahl o. fast kahl, sonst vgl. i—i², Fr. nach HOOKER: wholly exserted, glabrous, shining.

S. a. Hook. F., Flor. Brit. Ind. II. 325. 1878 (*canescens* var. *glabra*, Herb. Ind. Or. Hb. et Th.) Sikkim, 3—3500 m, Garhwal, Nila-Valley, 1000 m (leg. DUTHIE, No. 1106). — HOOKER sagt noch: closely allied to *S. canescens*, but more robust and glabrate, with more petioled leaves, larger red flowers and very different fruit. Das mir vorliegende Original zeigt, daß diese und folgende Art sich eng an *canescens* anschließen, daß also vom Standpunkt eines Monographen die von mir vorläufig beibehaltene Sektionsgruppierung kaum noch berechtigt scheint. Die „roten Bl.“ sind wohl nur als gelbrot zu bezeichnen und die unverästelten Blst. sind auch an dem Garhwal-Expl. vorh.

= = Blst. und Bl. reichlich groß und vielblütig, Bl. ca. 1 cm Dm., K. vgl. Fig. 292k¹, Bl. etwa 30—40, kaum so lang wie C.

28. *S. zabeliana*: anscheinend üppiger $\bar{b}$ von der Tracht der *canescens*, junge Zw. zottig beh., kahlend rotbraun, streifig, Kn. meist ein wenig länger als B.-Stiel; B. der Lgtr.?, an den 4—5 cm langen Blzw. wie Fig. 292m, ober. sattgrün, jung beh. und reichlich gewimpert, zuletzt ganz kahlend, B.-Stiel bis 4 mm; Blst. flach traubig-doldig, ca. 4 cm Dm., Bl. Stiele 5—18 mm, Bl. gelblich weiß?, vgl. o—p.

S. z. C. K. SCHN., in Bull. Herb. Boiss. 1905. 343. — Garhwal und Kumaon, 3—4500 m. — Blz. VI. — Frz. VIII. — Diese Art sah ich im Herb. Boiss. (lg. DUTHIE, No. 2842 et 1106 c). So sehr sie an *canescens* gemahnt auf den ersten Blick, so weicht sie doch schon durch die nicht papillösen B. und die an den üppigen vorliegenden Expl. mehr zusammengesetzten Blst. sehr gut ab. Sie kann ebensowenig mit *arcuata* vereinigt werden, obwohl diese auch in Garhwal vorkommt, aber dann doch den Originalen aus Sikkim ganz gleich ist. Ich halte ihre Einführung für sehr wünschenswert und widme diese jedenfalls eigenartige schöne Spiräe Herrn H. ZABEL.

++ B. unters. papillös, $\pm$ rundlich, Fig. 291i, S. 459.

29. *S. nipponica* (*S. bracteata*): 1,5—2 m hoher $\bar{b}$, Zw. schlank, aufrecht, zuletzt an Spitze übergeneigt, kahl, leicht kantig, braunrot, graubraun; Kn. abstehend, an Spitze gekrümmt; B. an Blzw. etwa 1,5:1,2—2(2,2):1,6(2) cm, sonst bis 4,5:3 cm, unter. graugrün, Nerven nicht hervortretend, Stiel bis 1 cm; Blst. meist

*) Ich sah aber an den z. B. von HOOKER als „compound“ bezeichneten Blst. bis heute nirgends rispige Verästelung, indes dürfte hier das gleiche Verhalten wie bei *nipponica* wahrscheinlich sein.

einfach, traubig, seltner zusammengesetzt ¹⁾. Bl. gelblich weiß, bis 8—15 mm lang gestielt, 9—10 mm Dm., sonst vgl. Fig. 295a—b, S. 474.

Zu erwähnen wäre *f. dumosa* [ZABEL, in Mitt. d. D. D. G. 1904. 60], welche einen niedrigen dicht buschigen ²⁾ bildet, bei dem die Blst. am Ende der ³⁾ Triebe gedrängt sitzen.

S. n. MAXIM., in Mém. biol. XII. 455. 1886 (*S. bracteata* ZBL., in Gartenztg. III. 496. 1884, nec RAFIN.; *media rotundifolia* NICHOLS., in Gard. Chron. 1885. 283). — Nippon-S. — Japan (Hondo). — Blz. V—VI. — Frz. VIII. — Eine sehr schöne Art. Unter dem von mir in Hort. Münden gesammelten Material scheint auch eine von der S. 465 erwähnten abweichende Hybride zu sein, die aber noch der Beobachtung bedarf.

B. Blst. zymös verästelt, also Seitenachsen erster Ordnung mehr als 1-blütig.

I. Blst. flache Doldenrispen bildend, die breiter als hoch sind. II s. S. 480

Sekt. 2. *Calospira* K. KOCH, in Gartenfl. III. 397. 1854: Bl. zum Teil rosa, zuw. ♂♀, Drüsenring zuw. fehlend.

a) Stb. so lang o. kaum länger als C.

b) s. S. 470.

○ B. unters. nicht papillös.

Blst.-Achsen kahl, B. vgl. Fig. 291n kahl (oder mit vereinzelt Haaren).

30. *S. decumbens*: kleiner b. mit niedergestreckten bis 0,5 m langen Ästchen und bis etwa 20(—30) cm hohen aufstrebenden Zw. Zw. kahl, rundlich, gelbbraun, rotbraun, Kn. etwa 1,5 mm, stumpflich, Sch. wenige, gewimpert: B. 1:0,5—3:1,5(—1,9) cm; oberseits satt graugrün, unterseits heller. Stiel 2—7 mm: Blst. am Ende verlängerter diesjähriger Zw. wenig bis viel-, aber lockerblütig, Bl. ca. 7 mm Dm., weißlich, sonst vgl. Fig. 295c—c¹, S. 474.

S. d. W. KOCH, in MERT. et KOCH, Deutschl. Flor. III. 433. 1831 (*flexuosa* RCHB., Fl. Germ. exc. 627. 1832, non FISCH.). — Niederliegender S. — J. G. nur O. SW.-Kärnten; sowie Ital. (Prov. Udine). — In Felsspalten, auf Geröllhalden auf Kalk, 400—800 m. — Blz. V—VI(VIII). — Frz. VIII—X. — In Kultur nicht hgt., doch in lehmigem Moorbeete nach ZABEL gut gedeihend, wie ich sie auch im Hort. Münden sammelte.

30×31 *S. decumbens* × *hacqueti*: *S. pumilionum* ZBL., in ASCHERS. et GRAEB., Syn. VI. 20. 1900. Von ZABEL aus S. der *S. hacqueti* gezogen, dieser nach den mir vom Autor gütigst zur Ansicht gesandten Originalen viel näher stehend, aber doch in der etwas schwächeren allgemeinen Beh., wie etwas in der B.-Form, vor allem aber durch die zur Frz. z. T. ganz kahlen Blst.-Achsen an *decumbens* erinnernd. Auch diese Hybride zeigt, daß bei *Spiraea* die wirklich intermediären Bastarde selten sind und die goneoklinen überwiegen. Vgl. auch unter *hacqueti*.

Blst.-Achsen dicht weich beh., dgl. B.-Unterseiten, vgl. Fig. 291o.

31. *S. hacqueti*: wie vorige, doch Zw. beh., B. meist länglicher, weniger und kürzer gezähnt, sonst vgl. Fig. 295d—d¹, S. 474.

S. h. FENZL et K. KOCH, in Gartenfl. 1854. 400 (*decumbens* var. *tomentosa* POECH, in Flora XXVII. 510. 1844, non *S. tomentosa* L.; *lancifolia* MAXIM., l. c. 206, non HOFFMANSEGG**); *decumb* var. *bellunensis* BIZZ., in Atti Ist. Ven. Ser. 6.

*) ZABEL hat auf Grund dieser Tatsache die Sekt. *Nothospira* geschaffen, in die er noch Bastarde wie *nudiflora* und von Arten z. B. *arcuata* einreicht. Ich glaube, es ist nicht nötig, sie aufrecht zu halten, da ein schärferer Ausdruck der Verwandtschaftsverhältnisse dadurch nicht erreicht wird. Man wird vielmehr bei einer künftigen Monographie eine ganz wesentlich andere Sektionseinteilung vornehmen müssen, will man die genetischen Zusammenhänge wirklich zum Ausdruck bringen.

**) Die Diagnose von HOFFMANSEGG, in Preisv. Pflz. 1836, Anm. S. 44, ist ganz unklar. Er spricht anscheinend von einer kahlen Form und hat nur sterile Expl. gehabt. Mithin ist seine *lancifolia* kaum zu deuten.

I. 582. 1883, teste FIORI; *dec. var. mollis* K. KOCH und *dec. var. poechi* HSM., in Herb.). — Ich sah aus Krain ein Expl. ohne Standortsangabe (ig. HACQUET) und, dgl. aus S-Tirol (REICHENBACH), ferner solche aus Ital.: Prov. Udine von Perarolo, Agordo, M. Cavallo, Belluno, Straße von Resiutta nach Chiusaforte, Piave Tal, Friaul, Ringmauern b. Gemona, Canale di Cimolais, M. Serva. — Sonst wie *decumbens*, von der sie meines Erachtens keine Form ist, denn ich habe in dem reichen Material, was mir vorlag, vergeblich nach wirklichen Zwischenformen gesucht. Ich kann also dem, was ASCHERS. et GRAEB. l. c., sagen, nicht beistimmen, jedenfalls ist das Hauptgewicht auf die Beh. der Blst.-Achsen! zu legen, die für Spiräen, wie auch KOEHNE betont, recht bezeichnend ist.

Fig. 294. *Spiraea*: Blattformen von: a—b *canescens*: b = *var. myrtifolia* — c *vaccinifolia* — d (fehlt) — e—g *bella*: f von Kulturpflanze, g von WALLICHs *expansa*-Expl. — h *tristis* — i *longigemmis* — k *bullata* — l *albiflora* — m *japonica* — n *betulaefolia* — o *arbuscula (splendens)* — p *corymbosa* und *var. lucida* (alles reichlich $\frac{2}{3}$ n. Gr.) (Original).

○○ B. unterseits deutlich papillös.

— B. vgl. Fig. 294a—b, meist unter 3 cm lang, Kn. verlängert

32. *S. canescens*: bis 1,8 m hoher, dichtästiger, etwas sparrig und übergeneigt verzweigter b. • Zw. beh., kantig, rotbräunlich. grau-braun, Kn. flach, länglich, spitzlich, 2-schuppig, 2—4 mm lang: B. dicklich, oberseits graugrün, locker-, unters. hellgrau, dicht beh.: 1,3:0,7—3:1,6 cm, an Blzw. kleiner, Stiel 1—5 mm, beh.: Blst. ziemlich dicht

rispig-doldig, 2–13 cm lang gestielt, dicht beblättert (Blzw. 2-zeilig). Bl. gelblich weiß, 5–6 mm Dm., sonst vgl. Fig. 295e–f. S. 474.

Etwas abweichend ist var. *myrtifolia* ZABEL, l. c. 56, deren B. oben tiefgrüner, unten etwas bläulich und schwächer beh., sowie im allgemeinen länglicher und spitzlicher sind, die Bl. sind eher kleiner, aber reiner weiß. Sonst vgl. das im folgenden Gesagte.

S. c. DON, Prodr. 227. 1825 (*cuneifolia* WALL., Cat. No. 699. 1829; *nutans, nepalensis, flagelliformis* HORT.) Weißgrauer S. Himalaya (Kaschmir bis Sikkim), 2–4000 m. Blz. VII–VIII. Frz. X. — Frucht hfg zurück. Es sind noch mehrere Formen beschrieben worden, so zunächst var. *glauca* ZBL., *cuneifolia* var. *glauca* KIRCHN., Arbor. Muse 214. 1864, die aus S. des Typs gefallen sein soll. Ich sah typische Exemplare davon nicht und glaube, daß es sich nur um eine verkahlende Form der typischen *canescens* handelt, daß aber diese *glauca* vielleicht doch nicht identisch ist mit var. *glaucophylla* FRANCH., Pl. Delav. I. 200. 1880, aus Yunnan, die nach DIELS in W.-China den Himalaya Typ zu vertreten scheint. Was BATALIN, in Act. Hort. Petrop. XIV, 321. 1898, aus Sztschwan als *canescens* var. *sulphurea* beschreibt und für von *glaucophylla* verschieden hält, ist nach den mir vorliegenden von ihm zitierten Expl. lg. PRATT, No. 230, Tachienlu, 3–4500 m, sicherlich identisch mit FRANCHERS Varietät, die gelbe Bl.-Farbe ist keineswegs so sehr markant und in Hinsicht auf die sonstige Übereinstimmung fast bedeutungslos. BATALIN glaubt, daß *canescens*, *glaucophylla* und *aphylla* eventuell 3 gute Arten sein könnten, darin kann ich ihm aber gar nicht beistimmen. Die var. *glaucophylla*, zu der also seine *sulphurea* als Synonym gehört, tritt auch im Himalaya (Kumaon) auf, wie mir im Herb. Boiss. ein Expl. von DURR., No. 1106^b zeigt. Die B.-Form wechselt je nachdem der Grund kahl o. mehr oval ist und die Unters. ist (zur Blz.) bald ganz kahl, bald sehr verstr. beh. Der K ist außen meist kahl, nur innen beh., die Bl.-Achse innen und außen beh., o. innen kahl, die Bl.-Stiele sind $\pm$ beh. Sonst wie Typ.

Unklar ist mir noch *S. uratensis* FRANCH., Pl. David. I. 107. 1884, aus der Mongolei (Ourato, dans les montagnes, die von der kahlenden *canescens* durch kahle Bl.-Stiele, die C. eher überragende Stb. und länglich lanzettliche, 10–15 mm lange B., sowie kleine Bl. von 5–6 mm Dm. abweichen soll. Ich sah noch nichts ihr Ähnliches oder Gleiches.

32–37 *S. canescens* $\times$ *fastigiata*: *S. nivea* ZABEL, l. c. 56. 1893 (*S. expansa nivea* HORT. BILLARD 1867): das mir vorliegende Material entspricht gewiß dieser Kombination, steht aber *fastigiata* alles in allem namentlich in den B. näher, nur hat ZABEL recht, daß Wuchs und Bl. auf *canescens* deuten. Da die Hybride schöner als beide Eltern, so empfiehlt sich ihre Kultur.

32–52 *S. canescens* $\times$ *salicifolia*: *S. fontenaysi* BILL., apud ZABEL, l. c. 83. 1893: hochinteressanter, in seinen Formen sehr verschiedenartiger Bastard, der aber durch die unters. papillösen B. immer an *canescens*, in B.-Zählung und in der Form der Blst. an *salicifolia* gemahnt, welche Formen derselben (o. von *alba*) aber daran beteiligt, möchte ich vorläufig nicht entscheiden. ZABEL führt *f. rosea* mit fleischfarbenen und *f. alba* mit weißen Bl. Meine Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen.

32–55 *S. canescens* $\times$ *douglasii*: *S. brachybotrys* LANGE, in Bot. Tidskr. XIII. 26. 1882 (*S. pruinosa* ZABEL, l. c. 84. 1893): nach einem mir vorliegenden Original ist LANGES Pflze mit *pruinosa*-Formen identisch, also sein Name als ältest korrekt publizierter voranzustellen. Vgl. sonst ZABEL, l. c.

* * B. vgl. Fig. 292w³, im Mittel stets über 3 cm lang, Kn. sehr kurz.

33. *S. henryi*: reich verzweigter, bis 2 m hoher b. (c) Zw. kahlend, gelbrotbraun. aufreißend, r. purpurbraun; B. oval o. eiförmig, seltener die kleineren mehr oboval-rundlich, obers. sattgrün, zur Blz. sehr spärlich beh., unters. graugrün, wenigstens auf Nerven locker zottig, Papillen dicht, fein, aber deutlich (fast

³) Beschreibung z. T. nach HEMSLEY und nach VEITCH, in Journ. Roy. Hort. Soc. XXVIII. 61. 1903. Das mir vorliegende HENRYSche Expl. im Herb. Boiss. scheint vom Typ nicht verschieden, jedoch sind die Stb. kaum so lang, selten ganz wenig länger als C., wogegen HEMSLEY, l. c. t. 5, sie deutlich länger abbildet.

schon mit Lupe zu sehen), 2:1,2—6:2 cm, Stiel bis 8 mm; Blst. breit und locker doldenrispig, reichblütig, bis ca. 7 cm Dm., am Ende von im Mittel 8 cm langen ganz normal belaubten Zw., Achsen, Bl.-Stiele und Bl.-Achsen zottig beh., Bl.-Stielchen ca. 10 mm, Bl. weiß, 6—7 mm Dm., sonst wie Fig. 292 w—w², der Drüsenring liegt fest über die Frkn. gebogen und ist auffällig entwickelt, Stb. ca. 20, Fr.?

S. h. HEMSLE., in Journ. Lin. Soc. XXIII. 225. t. 5. 1887. — China (Hupei, Sz'tschwan). — DIELS, in Engl. Jahrb. XXIX. 383. 1900, rangiert diese Art merkwürdigerweise zwischen *pubescens* und *dryantha* und sagt, daß *pubescens* in sie übergehe. Wahrscheinlich hat er *henryi* ganz verkannt. Sie ist von dem Kreise der beiden genannten ganz und gar verschieden.

Ihr am ähnlichsten ist wohl *S. veitchi* HEMSLE., in Gard. Chron. XXXIII. 258. 1903, die ebenfalls aus W.-China stammt. HEMSLE. sagt von ihr: it differs from *S. henryi* in the lateral flower bearing branchlets being arranged distichously, in the oblong or ovate-oblong leaves being entire, and in the somewhat denser clusters of flowers. Sie soll in blattlosem Zustande sehr an einen *Phyllanthus* gemahnen. Im übrigen nach den Angaben der *canescens glaucophylla* ähnlich, doch B. mit Stiel bis etwa 5,5 cm lang.

b) Stb. mindestens $\frac{1}{2}$ mal länger als C. (ausgenommen in vorwiegend ♀ Bl.).

○○ siehe
S. 473

B. unters. deutlich papillös (vgl. eventuell auch 40. *S. longigemmis* S. 473).

* Bl. ♀*), B. ± kerbzähnig (vgl. Fig. 292 x³ und 294 c).

+ Blzw. und Blst. dicht weißgrau filzig beh.

34. *S. vaccinifolia*: nach DON kleiner aufrechter b , ⊙ Zw. filzig beh., ⊙ kahleud. grau; Kn. sehr klein, beh.; B. der Lgtr.?, an Blzw. wie Fig. 294 e, ca. 15:7—25:12 mm, ober. sattgrün, kaum beh., unters. hellblaugrau, auf Nerven zottig beh. und gewimpert, Papillen dicht und fein; Stiele filzig, bis 8 mm; Blst. dicht doldenrispig, bis 6 cm Dm., z. T. in mehrere kleine Doldenrispen zertallend am Ende von 3—15 cm langen Zw., Bl.-Stielchen ca. 3—5 mm, meist mit Trgb., Bl. gelblich weiß?, ca. 6 mm Dm., sonst wie Fig. 295 g, Fr.?

S. vacc. DON, Prodr. Fl. Nepal. 227. 1825. — Ich habe diese Art nach einem Expl. aus dem NW.-Himal. N. Kulu Beas valley from Bjaura to the base of the Rottang pass 4—6500', micaceous rocks, lg. Dr. STOLITZKA, beschrieben, das mir am ehesten den Typ wiederzugeben scheint. Was ZABEL als *vaccinifolia* beschreibt, was ich in Hort. Münden nur steril sammelte, erinnert in den zierlicheren Zw. mehr an *guthriei*, gleicht ferner der *vaccinifolia* LEDB., Bot. Reg. XXVI. t. 17. 1840, deren Identität mit DON's Pflanze mir noch fraglich ist. Die Abbildung von LEDB. in Bot. Cab. t. 1103, sah ich noch nicht, die *taxifolia* LEDB. in Bot. Reg. 1840. Misc. 60 et in PAXT., Flow. Gard. II. 98. t. 183, könnte wohl auch zum *bellia*-Formenkreis gehören. Auf jeden Fall bleiben mir die Arten 34 bis 37 z. Z. noch etwas unklar, denn das spontane Material liegt viel zu spärlich vor und die Kulturformen können doch erst dann recht bewertet werden, wenn die Typen der Heimat scharf gesichtet sind.

* Blzw. und Blst. kahl o. diese nur im oberen Teile sehr verstreut beh.

35. *S. gracilis*: sehr fein und zierlich verzweigter b , Zw. purpurn, kahl, rundlich, ⊙ grau; Kn. ca. 1 mm lang, abstechend, eispitzlich; B. an Lgtr.?, an Blzw. wie Fig. 291 x' o. kleiner, ober. sattgrün, so gut wie kahl, unters. hell weißgrünblau, sehr spärlich (Rippe) beh., Papillen wie bei voriger Art; Blst. doldenrispig, ca. 4 cm Dm., am Ende von 4—7 cm langen belaubten Zw., Bl.-Stielchen sem. 1 cm, etwa 3 mm lang, mit linealischem, zottig gewimpertem Vorb., Bl. weiß, ca. 5 mm Dm., sonst wie x—x², Bl.-Achse zuweilen außen verstr. beh., Fr.?

S. gr. MAXIM., in Act. Hort. Petrop. VI. 200. 1879 (*S. parvifolia* BERT., Plante nuove asiat. II. 10 t. IV. 1865, non BENTH.). Himalaya Kishwar. 18—2800 m. — Vgl. das oben bei *vaccinifolia* Gesagte.

*) Vgl. wenn B. im Mittel über 3,5 cm lang, unters. scharf erhaben genervt und reich zusammengesetzt gezähnt, sowie Blst. am Ende von langen Blzw. auch 38. *S. velutina*, und 39. *S. pratti*, S. 472.

×× Bl. ♀♂, o. wenn ♀, so B. etc. wie in Anmerkung S. 470 angegeben.

• Bl. +♂, in den + die reduzierten Stb. kürzer als C. Fig. 295 n. in ♂ Gyn. wie in m, C. ± doppelt so lang wie K.

△ Zw. deutlich kantig, B. vgl. Fig. 294 f—g o. noch schärfer gespitzt und deutlicher und spitzer vorgestreckt, doppelt sägezählig.

36 *S. bella*: b von variabler Tracht, im allgemeinen wohl niedriger und ausgebreiteter als *fastigiata*, Zw. jung beh., • kahlend, rotbraun, • grau, Kn. 1–2 mm, • stumpf eitg., • beh. bis fast kahl, B. sehr variabel, oft von der folgenden nicht mit Sicherheit zu scheiden, an Blzw. etwa bis 1,5 × 0,8–5 : 2–2,5 cm, an Lgtr. bis doppelt so groß, oberse. sattgrün, • verstr. beh. bis kahl, unterse. bes. auf Nerven zottig beh. o. auch kahlend, weiß- o. bläulich graugrün, Papillen oft erst unter Mikroskop sicher nachweisbar, Zahnung meist vom untersten Drittel an, Stiel 3–7 mm, beh.; Blst. locker doldenrispig, meist kleiner und Blzw. kürzer als bei *fastigiata*, Achsen, Bl. Stiele und Bl. Achsen • dicht zottig beh., K. außen kahl, Bl. ± rosa o. weißlich rosa, ca. 5 mm Dm., vgl. Fig. 290 m n, Fr. wie bei *fastigiata*, wenigstens sichere Unterschiede mir noch nicht bekannt.

S. b. SIMS, Bot. Mag. t. 2426. 1823 (*S. expansa* WALL. Cat. No. 702. 1829, non K. KOCH, ZBL. etc., *allosa* WALL. l. c. No. 707; *S. stellata* WALL. in Herb.

Ich ziehe hierher folgende von mir gesehene spontane Expl. Nepal (WALLICH, No. 702 et 703, Sikkim lg. HOOKER, sub *callosa* distr., lg. CLARKE, No. 35050 B., weitere Verbreitung mir fraglich. Blz. Ende V–VI, Frz. VII–VIII. Vgl. sonst das unter *fastigiata* Gesagte!

Im Anschluß an *bella* muß erwähnt werden *S. tristis* ZABEL, l. c. 62. 1873, die in den mir vorliegenden Expl. vor allem durch reichere zottigere Beh. abweicht, B. vgl. Fig. 294 h. Ihr Ursprung ist fraglich. Sie stellt eine empfindliche, ziemlich unscheinbare Form dar, die noch weiterer Beobachtung bedarf. Hier und da als *S. hookeri* in den Gärten.

△△ Zw. rundlich, B. vgl. Fig. 294 e. Zahnung hfg. noch einfacher, gröber, z. T. aber B. wie unter △.

37. *S. fastigiata*: • aufrechter, 0,6–2 m hoher, ausgebreitet verastelter b, • Zw. • fein beh., gelb- o. rotbraun, • dunkler, fast kahl, • grau; Kn. eispitz., • zottig beh., 1–1,5 mm lang; B. meist eitg. o. eielliptisch, z. T. aber auch wie bei *bella* eilänglicher und spitzer, in Größe, Form und Zahnung sehr variabel, aber meist erst von der Mitte an gezähnt, Beh. eher reicher als bei *bella*, was auch für die Blst. z. T. gilt, die Blzw. sind bis 18 cm lang und die Doldenrispen bis 7–10 cm Dm., Bl. ca. 6–8 mm Dm., C. • weiß, sonst wie *bella*, Frst. wie Fig. 295 o, Frkn. und Fr. meist nur an Bauchnaht beh., seltener ganz beh.

S. f. WALL., Cat. No. 708. 1829, *S. expansa* K. KOCH, Dendrol. I. 330. 1869, et ZBL. non WALL. Ich stelle hierher die gesehene spontane Expl. aus Hill States: Simla (lg. THOMSON, Dr. STOFFEKA und Garhwal Jamara ?) lg. DUTHIE, No. 1103, Deota (lg. DUTHIE, No. 23537), Mussoree (lg. HUGEL, No. 112) im Gebirge 2–3000 m. Bl. V–VI. Es hat den Anschein, als ob dieser Typ dem NW. Himalaya angehöre, während die echte *exposita* (sensu SIMS, HOOKER etc.) von Nepal ostwärts bis Sikkim und vielleicht noch weiter geht. Sie stellt einen der schwierigsten zu klarenden Formenkreise der Spiraea dar, und wir dürften jedenfalls nur auf Grund reichsten spontanen Materials zu sicheren Ergebnissen gelangen. Was mich in Gärten als *exposita* geht, ist zum Teil als Hybride mit anderen Formen anzusehen, z. F. vielleicht auch als *bella* + *fastigiata*. *S. pulchella* KZE. in Lamaca XX. 60. 1877 (sensu ZABEL!) anzusprechen, obwohl ich, ohne KENZES Originale gesehen, zu haben, seine *pulchella* nicht deuten mochte. Ich verzichte jedenfalls vor der Hand darauf, solche Gartentformen eingehend zu erörtern, ehe ich nicht von den spontanen Formen ganz sichere Vorstellungen habe. Der Name *exposita* muß durch *fastigiata* ersetzt werden, denn WALLICH'S Originale von *exposita* gehören zu *exposita*, von der SIMS ausdrücklich sagt, branches somewhat angular. Übrigens hat schon HOOKER, Fl.

Brit. Ind. II. 324. 1878, das dargelegt und ZABEL scheint nur auf Grund von KOCHS Vorgang den Namen *expansa* ergriffen zu haben. KOCHS Herbar lehrt, daß er durchaus keine klare Vorstellung von den von ihm unterschiedenen beiden Arten gehabt hat und doch hat er selbst im Wiener Herbar WALLICHs *expansa*-Originale als *bella* bestimmt.

Im Anschluß an *fastigiata* muß noch auf die mir unbekannte und unklare *S. micrantha* HOOK., Fl. Brit. Ind. II. 324. 1878, aus Sikkim hingewiesen werden, die HOOKER et TH. wegen ihrer großen B. (bis 7 inches) früher als *callosa* var. *macrophylla* verbreitet haben.

37×41 *S. fastigiata* (= *expansa* ZBL.) × *japonica*: *S. revirescens* ZBL., l. c. 69. 1893: Von ZABEL aus *S.* der *fastigiata* gezogen. Sehr variable, interessante Hybride, von der ZABEL, l. c., 6 Formen führt, auf die ich heute nicht eingehen kann. Habitus meist sehr an *japonica* erinnernd, auch Blst. und Bl., aber Beh. und Papillosität der B. an *fastigiata*, sowie der kräftige Drüsenring der Bl. Die vielfach für diese Hybride angesehene *S. ruberrima* K. KOCH, in Gartenfl. III. 398. 1854, ist einem Exemplar seines Herbar zufolge eine *fastigiata*-Form (♀-Expl.), die jedenfalls mit *japonica* gar nichts zu tun hat.

37×42 *S. fastigiata* × *albiflora*: *S. concinna* ZBL., l. c. 70. 1893; eine im wesentlichen den Eindruck einer beh. *albiflora* machende, von ZABEL aber aus *fastigiata*-*S.* erzeugte Hybride. B.-Unters. ± papillös.

37×53b *S. fastigiata* × *alba* var. *latifolia*: *S. brumalis* LGE., in Bot. Tidskr. XIII. 28. 1882; ich sah LANGESche Originale, die dieser Kombination wohl entsprechen könnten. ZABEL teilt 1903 diese Ansicht. Vgl. sonst ZABEL, 1893, 89.

37×55 *S. fastigiata* × *douglasii*: *S. rubra* ZABEL, l. c. 85. 1893: Von ZABEL aus *fastigiata*-*S.* erzeugt. Vgl. Näheres l. c.

—+ Bl. ♀. C. kaum länger als K. o. die Kn. auffällig breit, flach und ganz plötzlich fein und lang gespitzt, — so lang als B.-Stiel.

— C. kaum länger als K., Kn. breit eifg., kaum $1\frac{1}{2}$ so lang wie B.-Stiel. Blst. breit doldenrispig und locker verästelt.

38. *S. velutina*: b, anscheinend von der Tracht der *japonica*, Zw. gerade, kräftig, rund, jung fein und dicht, C. — grau beh., allmählich purpurbraun und kahl werdend, Kn. — beh. bis fast kahl, äußerlich meist nur 2 — klaffende Sch.; B. in Form ähnlich *japonica* (Fig. 294 m), doch Zähnung meist mehr zusammengesetzt, kurzklappiger, etwa 3.5:1.5 o. 3.5:1.8 9:4 cm, oberse. tiefgrün, meist nur auf Nerven verstreut beh., unterse. — blauweiß-grau o. hellgrünlich weiß, z. T. auf Fläche o. nur auf Nerven zottig-filzig beh., Papillen — deutlich; Stiel nur 2—4 mm, filzig, Blst. am Ende von Lgtr., hfg. mehrere kleine Seiten-Blst. unter Hauptblütenstand und mit diesem eine breite lockere beblätterte Doldenrispe bildend, Achsen, Bl.-Stiele und Bl.-Achsen zottig-filzig, Bl. klein, ca. 7 mm Dm., weiß (?), K. — kahl beiders., länglich-dreieckig, so lang wie die innen — beh. Bl.-Achse, Discuslappen dünn, aber deutlich, Stb. ca. 30, Frktn. zur Blz. nur mit den eher längeren Gr. aus der breittrichterigen Bl.-Achse herausragend, nur an Bauchnaht beh., zur Frz. — frei, oben etwas auseinander neigend, Gr. endständig, leicht auswärts gebogen, K. zurückgeschlagen.

S. v. FRANCH., Pl. delav. I. 201. 1889 (*S. callosa* var. *robusta* HOOK. et TH., in Herb. Ind. Or.). — Ich beschreibe die Expl. von Hk. f. et Th. aus Khasia (18—2000 m), ob sie ganz mit FRANCHETS *velutina* aus Yunnan identisch sind, vermag ich nicht zu sagen, da ich deren Originale nicht sah. Aber vor allem FRANCHETS Angabe, petala . . . calyceum vix excedentia, bestimmte mich, die HOOKERSche *robusta* einstweilen mit ihr zu identifizieren.

— C. doppelt länger als K., Kn. wie unter + + angegeben.

39. *S. pratti*: anscheinend sehr kraftiger, schlanktriebiger b von der Tracht der *japonica*, Zw. fast rund, C. locker zottig, tief purpurbraun, später graugelb; Kn. äußerlich 1 schuppig, etwa 4 mm lang und an Basis 2 mm breit, anliegend, ganz kahl, nur B.-Narbe zottig beh.; B. in der — regulär spitzklappigen Zähnung etc. sehr an *longipinna* gemahnend, aus rundlichem Grunde spitz eilänglich, ca. 3:1.5 cm im Mittel, an Lohden wohl größer, beiders., unten dichter, seidig-zottig beh., Papillen der grau-blauen Unters. — nur unter Mikroskop recht deutlich. B.-Stiel bis 5 mm lang; Blst. sehr dicht doldenrispig, ca. 5—6 cm Dm., vielleicht etwas

gewölbt, am Ende derber, 10–15 cm langer Seitentriebe, Achsen, Bl.-Stiele und Bl.-Achsen zottig beh., desgleichen K. - und Bl.-Achse innen, K. breit und spitz 3-eckig, so lang wie die ziemlich breit glockigtrichterige und kurze Bl.-Achse, Bl. weiß (?), ca. 6 mm Dm., Drüsenring deutlich. Frkn. zur Blz. schon ein wenig hervorragend, durchaus zottig beh., $\pm$ kürzer als Gr., Stb. 20–25, Fr.?

S. p. C. K. SCHN., in Bull. Herb. Boiss. 1905. 345. — China (W.-Sz'tschwan: Tachienlu), 3–4500 m, lg. PRATT, No. 190 (Herb. BARB. BOISSIER). Diese interessante, meines Wissens noch nicht beschriebene Form steht zwischen *n. gemma* und *japonica* oder *retutina*. Sie zeigt von neuem, daß alle die Haupttypen der Spiraeen, wie *hypericifolia*, *crenata*, *jama. bella*, *long. gemma*, *japonica* etc., sich in mehrere gut unterscheidbare Arten (o. Subspecies vom Standpunkt des Monographen) gliedern, daß jedenfalls in den bisherigen Arbeiten, die Gattung nur ganz unzulänglich behandelt und gegliedert wurde. Indem ich hier auf so viel Neues hinweise, will ich dazu anregen, überall das Material kritischer zu sichten und die Lücken meiner Darstellung zu ergänzen, bez. diese zu rektifizieren. — *S. pratti* ist von *long. gemma* vor allem durch breitere und kürzere Kn. und die größeren, dichteren Blst. verschieden. Das Vorhandensein von Papillen muß noch bei weiterem Material verglichen werden.

○○ B. unterseits nicht papillös*).

* Kn. auffallend groß, flach, spitz, länger als die B.-Stiele (5–9 mm).

40. *S. longigemma*: aufrechter breitästiger, bis 1,8 m hoher b. ♂ Zw. etwas kahl, kantig, braunrot, ♀ grau. Kn. kahl, abstehend, einschuppig: B. vgl. Fig. 294i, oberseits lebhaft grün, kahl o. fast kahl, unterseits blaugraugrün, auf Nerven - beh. und gewimpert, an spontanen Formen auch beiders. - reicher beh., 2:0,7–7:3 cm, o. an Blzw. etwas kleiner, Stiel bis 6 mm: Blst. meist nicht über 20 cm lang gestielt, locker beh., 4–8 cm Dm., Bl. weiß, 7–8 mm Dm., sonst vgl. Fig. 295q–r.

S. l. MAXIM., in Act. Hort. Petrop. VI. 205. 1879. — Langknospiger *S.* China: Kansu, Bergwälder, feuchter Boden und W.-Sz'tschwan (Tachienlu, lg. PRATT, 3–4500 m, No. 221 in Herb. BARB.-BOISSIER). Blzw. VI–VII. Frz. VIII–IX. — Interessante, in Kultur noch seltene Art.

* * Kn. nicht auffallend verlängert, kürzer o. - so lang als B.-Stiele o. jedenfalls nicht über 4 mm lang.

Blst. - bis filzig beh., man vgl. aber jedenfalls unter - - - ++ siehe S. 476.

Bl. mit deutlichem Drüsenring, B. flach, nicht runzelig, $\frac{b}{h}$ hoch, schlanktriebig.

= Bl. weiß, Zw. deutlich kantig, B. vgl. Fig. 294l.

41. *S. albiflora*: niedriger, steif aufrechter $\frac{b}{h}$, Zw. sehr fein locker beh., - gelb o. rotbraun, - dunkelgrau. Kn. spitzer als bei *japonica*, ca. 3–4 mm lang, hfg. den B.-Stiel etwas überragend: B. schmallänglich bis breitlanzettlich, 4:1,2–7:2 cm, unters. mäßig heller, - bläulichgrün, kahl. Zähmung meist erst vom untersten Drittel ab, Stiele sehr kurz, 2–3 mm: Blst. - flach, dichter als bei *japonica*, aber hfg. auch mehrere kleine zu beblätterten Doldentrauben um den Haupt-Blst. gedrängt, Achsen etc. nur - locker beh., K. außen kahl, Drüsenring deutlich, sonst wie Fig. 295h–i.

S. a. MIQ., Prodr. fl. Jap. 221. 1869/77 (*S. japonica* var. *alba* MIQ., in Cat. Mus. Lugd.-Bat. 1870, teste ZABEL: *japonica alba*, *allosa alba*, *fortunei alba* HORT.) Japan, ob aber wild? Meines Wissens bisher nur als Kulturtorm bekannt. Erst eine sehr gründliche Untersuchung des *japonica*-Formenkreises kann vollge Klarheit über *albiflora*, wie über *bullata* bringen.

*) Vgl. eventuell *S. pratti* oben.

41×42 *S. albiflora* × *japonica*: *S. pumila* ZABEL, l. c. 64. 1893 (*S. bumalda* KOEHNE, Dendr. 216. 1893 et DIPPEL 1893): eine in den runden Zw. meist an *japonica*, in dem schmalen B.-Werk an *albiflora* gemahnende Hybride, die indes sehr viele Formen (ZABEL, l. c. unterscheidet sieben und 1903 sogar acht) aufweist.

Fig. 295. *Spiraea*: a—b *nipponica* (*bracteata*): a Bl. im L.-Schn.; a¹ C.; a² Frkn.; b Frst. und Fr. — c—c¹ *decumbens*: ♂, c Bl. im L.-Schnitt und K., c¹ Frst. — d—d¹ *hacqueti*: d = a; d¹ Frst. — e—f *canescens*: e Bl. im L.-Schn. und K.; e¹ Frkn.; f Frst. und Fr. — g *vacciniifolia*: Bl. im L.-Schn., sowie K. und Frkn. — h—i *albiflora*: h = g; i Frst. — k—l *japonica*: k Bl. im L.-Schn.; l Frst. — m—n¹ *bella*: m ♂; n ♀ Bl. im L.-Schn.; n¹ Frkn. — o *expansa*: Frst. — p *bullata*: Bl. im L.-Schn. und Frst. — q—r *longigemmis*: q Bl. im L.-Schn. und K.; r Frst. — s—s¹ *betulacifolia*: s Bl. im L.-Schn.; s¹ Frst. und Fr. — t *corymbosa*: Bl. im L.-Schn. und Frkn. — u—u¹ *corymbosa* var. *lucida*: u = q; u¹ Frst. — v—v¹ *arbuscula*: Bl. im L.-Schn. und Frst. — w—w¹ *alba* var. *latifolia*: wie v—v¹ — x *salicifolia*: Frst. — y—y¹ *douglasii*: wie v—v¹. — z—z³ *tomentosa*: z Bl. im L.-Schn.; z¹ Frkn. und St.; z² Frst. und L. — z¹ *cephala* Frst. — z² *menziesii* Bl. im L.-Schn. und Frkn. (die gesamte Fig. ist nachtraglich um 1/10 reduziert worden (a—a² nach KOEHNE, sonst Original).

zu denen außer *humalda* auch *colosa* *procheta* Ht. gehört. Bei der Variabilität der *japonica* bin ich über die Hybridität mancher ZABEL'scher Formen noch im Zweifel.

(41×42)×43 *S. pumila* × *bullata*: *S. lemoinei* ZABEL, l. c. 64. 1893: nach ZABEL's Angaben durch Betrachtung von *pumila* f. *humalda* mit *bullata* von LEMOINE erzeugt und von diesem 1892 als *humalda rubromunda* dem Handel übergeben. Meine Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen.

(41×42)×51 *S. pumila* × *arbuscula*: *S. assimilis* ZABEL, l. c. 74. 1893 [et 1903]: ZABEL erklärte 1893 die *assimilis* für *betulifolia* × *pumila*. Daß *arbuscula* f. *plandens* ZABEL, wie er 1903 meint, beteiligt, kann ich nicht finden, muß aber weitere Untersuchungen anstellen, ehe ein bestimmtes Urteil über diese Form mir möglich ist. Da *arbuscula* auf den B. obs. Sp. hat, mußte dies doch auf dem Bastard zum Ausdruck kommen.

41×49 *S. albiflora* × *corymbosa*: *S. superba* ZABEL in DIECK'S Catal. 1885 et l. c. 73. 1893: Vgl. ZABEL, l. c.

(41×49)×42 *S. superba* × *japonica*: *S. margaritae* ZBL., l. c., 1887 et l. c. 71. 1893: Vgl. ZABEL, l. c.

(41×49)×52 *S. superba* × *salicifolia*: als Gartenzögling von ZABEL im H. d. D. D. G. 159. 1903 erwähnt. Mir unbekannt.

(41×49)×55 *S. superba* × *douglasii*: wie vorige.

41×52 *S. albiflora* × *salicifolia*: *S. syringiflora* LEMOINE, apud ZABEL, l. c. 87. 1893: Vgl. ZABEL, l. c.

41×53 b *S. albiflora* × *alba* var. *latifolia*: *S. conspicua* ZABEL 1885 in Catal. von Dr. DIECK, et l. c. 90. 1893: eine interessante Hybride mit breitkegelfg. doldentraubigen Rispen, die auf den ersten Blick wenig von *albiflora* verrät, aus deren *S.* sie ZABEL erzeugen hat. Er erwähnt auch, daß er der *latifolia* noch näher stehende Formen erhalten habe. Ich verweise vorläufig auf ZABEL's Angaben.

41×55 *S. albiflora* × *douglasii*: *S. intermedia* LEM., apud ZABEL, l. c. Vgl. das dort Gesagte.

= = Bl. heller o. dunkler rosa, Zw. rund o. nur leicht gestreift, B. vgl. Fig. 294 m.

42. *S. japonica*: 0,8—1,5 m hoher, aufrechter b. Zw. jung fienfilzig, • meist kahl, purpurbraun, o. auch • noch • bleibend beh. Kn. breit eifg., 2—2,5 mm lang. • beh. o. kahlend; B. jung • braunrot, dann ober- u. lebhaft grün, verstr. beh. bis kahl, unters. blau- o. hellgraugrün, locker beh. o. kahl, an Igtr. bis 11:4 cm, Zähmung fast vom Grund ab, Stiel 3—7 mm; Blst. nach ZABEL's guter Charakteristik vom Grund ab, Stiel 3—7 mm; Blst. nach ZABEL's guter Charakteristik endständig an verlängerten diesjährigen Trieben, bei kräftigen Pflz außer einer größeren endständigen und einigen am Ende längerer Seitenzw. stehenden (doldentraubig bis spirrig angeordneten) beblätterten Doldenrispen zusammengesetzt, ziemlich locker, Bl. 4—6 mm Dm., zuweilen angedeutet polygam, Drüsenring schwach entwickelt, Fr.-K. aufrecht abstehend bis zurückgebogen, sonst wie Fig. 295 k—l.

Eine sehr variable Art, von der ich vorläufig nur folgende Formen hervorhebe: var. a *typica*: B wie in Fig. 294 m, Bl mit • entwickeltem Drüsenring, B wenigstens unters. • bleibend verstr. beh.; härter u. • *typica*, B ganz kahl, die *typica* der Gärten, Bl hellrosa, *intermedia* ZABEL, l. c. 65, Bl dunkelrosa, Blst. lockerer beh. und *intermedia* ZABEL, l. c. Bl. tetrosa, Blst. dicht filzig beh.; ferner tritt eine *intermedia* mit weißbunten B auf. b. *macrophylla* SIMON-LOUIS, apud ZABEL, l. c., B. auffallend groß, etwas blasig-runzelig bis 7 cm breit, Blst. nach ZBL. klein. Eine auffällige „Mutation“ c. *laxissima* ZABEL, in litt. (S. *laxissima* KOEHL, Dendr. 215. 1895), Drüsenring fehlend, Doldenrispe sehr locker, Bl schmutzig weiß, etwas kleiner. ZABEL glaubt, daß es sich

*) Die var. *alpina* MAXIM., in Act. Hort. Petrop. VI. 204. 1879, eine zwergige Gebirgsform aus Hondo (Hakone) sah ich noch nicht.

hier nur um eine Varietät der *japonica* handelt, hält indes eine hybride Beeinflussung auch nicht für ausgeschlossen. Die Pflanze scheint jetzt nicht mehr zu existieren.

S. j. L. F., Suppl. 262. 1781, nec THBG., non SIEB. (*S. callosa* THBG. Fl. jap. 209. 1784; *fortunei* PLANCH. in Fl. des Serres IX. 871. 1853) — Japanischer *S.* Japan (Hakodate, Yokohama, Nagasaki, betreffs China vgl. das Folgende. Blz. VII–VIII. Frz. IX–X. — Alteingeburgte, auch in der Heimat kultivierte Art, die bei uns hier und da zu verwildern anfängt. Ihr Formenkreis bedarf noch ganz genauer Untersuchung. Was ich aus China von ähnlichen Formen sah, war nie ganz identisch damit. Ich bin daher gegen die Angaben bei FORBES et HEMSLEY, sowie gegen das, was PRITZEL bei DIELS sagt, ziemlich skeptisch gestimmt. FRANCHET beschreibt in Plant. David. II. 36. 1888, zwei angebliche *japonica*-Formen aus W. Sz'tschwan (Mupin) als var. *acuminata* und var. *ovalifolia*, allein aus seinen kurzen Angaben läßt sich kein sicherer Schluß ziehen.

PRITZEL'S *S. rosthornii*, apud DIELS, in ENGL. Jahrb. XXIX. 383. 1900, aus S.-Sz'tschwan (Nanchuan) sah ich nicht. Er gibt an: von den übrigen Verwandten durch die tiefer eingeschnitten-gesägten B., von *S. japonica* durch die dachig-gegipfelten Ästchen verschieden.

42×49 *S. japonica* × *corymbosa*: *S. foxii* ZBL., l. c. 71. Vgl. das dort Gesagte.

42×52 *S. japonica* × *salicifolia*: *S. semperflorens* ZBL., l. c. 86. 1893: Formenreich. Manches mir noch fraglich. Vgl. ZABEL, l. c.

42×55 *S. japonica* — *douglasii*: *S. sanssouciana* K. KOCH, in Garten-Ztg. 1857. 214: Diese Hybride ist ganz identisch mit *S. nobleana* Hook., Bot. Mag. t. 5169. 1860. Das hat schon KOCH 1869 betont und es ist mir nicht ganz verständlich, warum ZABEL und KOEHNE 1893 die *nobleana* als *corymbosa* (bzw. *betulifolia*) — *douglasii* führen, was nach HOOKERS Bild und NOBLES bei HOOKER zitierter ausdrücklicher Angabe ausgeschlossen sein muß. Eine im KOCHschen Herbar liegende Farbentafel der *sanssouciana* gleicht der Abb. in Bot. Mag. außerordentlich. Was ZABEL im H. d. D. D. G. 159. 1903 für *douglasii arbuscula* (= *splendens*) erklärt und mit *nobleana* identifiziert stimmt mit HOOKERS Bild erst recht nicht, denn weder *arbuscula* noch *douglasii* besitzen Drüsenringe. Überdies wäre ja ein Bastard von *arbuscula* von allem durch die obs. Sp. leicht zu kontrollieren, ich muß aber gestehen, daß keine einzige Form, die ich als *nobleana*, *aemula* etc. sah, diese Kombination gerechtfertigt hat. Trotz alledem freilich kann sie ja vorhanden sein, darf aber jedenfalls nicht *nobleana* genannt werden.

Bl. ohne Drüsenring (vgl. auch *japonica*!) sehr klein,
B. unregelmäßig geformt und — runzelig-blasig aufgetrieben.

43. *S. bullata*: sehr dicht buschiger, kaum bis 0.5 m hoher steifaufrechter b. junge Zw. dicht gelbgrün filzig, rotbraun, kahle; Kn. sehr klein, stumpflich, beh., viel kürzer als B.-Stiel; B. vgl. Fig. 294k, oben trübgrün, spärlich beh., unten blaugrün, mehr beh., bis 3.5:2.5 cm, Stiel beh., 2–4 mm; Blst. sich aus sehr kleinen, oft etwas halbkugeligen Doldenrispen zusammensetzend, filzig, Bl. erst dunkelrosa, dann + heller werdend, vgl. Fig. 295p, die Stb. scheinen z. T. an Basis zusammenzuhängen und tauschen hier und da eine Art Discusring vor, vgl. den Frst.*).

S. b. MAXIM., in Act. Hort. Petrop. VI. 204. 1879 (*S. crispifolia* HORT. NONN.) — Nur als Kulturpfl. aus Japan bekannt. Eine höchst merkwürdige Form, die mir mehr als monströse *japonica*-Form erscheint. Auch MAXIMOWICZ und ZABEL deuten auf Ähnliches hin.

+ Blst. kahl o. fast kahl, wenn + mehr beh., so doch B. wie Fig. 294n–p, also mehr verkehrt eifg. o. eielliptisch als bei den vorigen Arten o. fast ganzrandig.

△ Drüsenring in den Bl. vorh., B. ohne obs. Sp.
= Zw. deutlich bis fast flügelig kantig.

△△ siehe
S. 480.

* Vielleicht fehlt der Drüsenring gar nicht eigentlich, doch war mein Material teils zu knospig, teils zu weit verblüht, um Sicheres zu sagen.

> Kn. nur $\frac{1}{3}$ so lang wie B.-Stiele, B. im Umriß wie bei *japonica*, unters $\pm$ beh. beibend.

44 *S. fritschiana*: schlanker, aufrechter, in der Tracht der *alpina* wohl ähnlicher b., von ihr außer in den kahlen Blst. und scharf kantigen glänzend purpurbraunen, fast ganz kahlen Zw. vielleicht nur noch in der grobzahngigeren, fast einfachen Serratur verschieden, es liegen nur Fr-Expl. vor, deren B. 3:1,5—8:3,8 cm messen, oben verstr., unten reichlich beh. auf Nerven s. od. Stiel 5—10 mm, beh., dünn; Frst. 6—7 cm Dm., dicht doldenrispig, Drüsenang. abscheinend nur schwach entwickelt, Fr. etwas mehr beh., doch vorwiegend an Bauchkante.

S. f. C. K. SCHN., in Bull. Herb. Boiss. 1905. 347. Die mir vorliegenden schönen von WAWRA, No. 1190, in China: Tschitu, gesammelten Expl. hat Prof. FRITSCH, der seiner Zeit die Spiraea des Herb. Hofm. Wien durchsah und dabei auch folgende Art neu benannte, als *japonica* bestimmt, sie steht aber der *alpina* in manchem näher, nur B. breiter, wie bei *japonica* und Frst. eben ganz kahl. Ich glaube, man kann diese Form mit Recht als Art ansprechen, weshalb ich mir erlaube, sie Herrn Prof. FRITSCH zu widmen. Als Monograph. ich betone immer wieder — kann man ja später einen abweichenden Standpunkte einnehmen und mehr zusammenfassen. Jetzt trägt es nur zur Klärung der Begriffe bei, wenn man abscheinend gut umschriebene Formen als Arten abtrennt.

>> Kn. so lang o. fast so lang wie der B.-Stiel, B. im Umriß aus fast herzfg. Grunde etwa wie Fig. 294n (unten), ganz kahl.

45. *S. angulata*: b., etwa von Tracht der *betulaefolia*, Zw. / T. fast flügelig kantig, kahl, glänzend purpurbraun, Kn. kegelförmig, mehrschuppig, B. oben tiefgrün, unten blauweiß grau, 2,5:1,5—3,5:2,5 cm, aus breitrundlichem o. gestutztem, beinahe leicht herzfg. Grunde eiförmig, kurz gespitzt, Zahnung gestutztem, beinahe leicht herzfg. Grunde eiförmig, kurz gespitzt, Zahnung einfach, flach kerbig, erst von der Mitte ab; Frst. am Ende von 7—17 cm langen Zw., 2,5—5 cm Dm., mäßig dicht flach doldenrispig, Fr. zu 2, frei, nur an Bauchnaht beh., glänzend olivgrün, wenig auseinander neigend, Gr. endständig, fast gerade o. leicht nach außen gebogen, K. so lang wie Bl.-Achse breit spitz dreieckig, zurückgeschlagen.

S. a. FRITSCH, apud C. K. SCHN., in Bull. Herb. Boiss. 1905. 347. Diese gut gekennzeichnete Form sammelte WAWRA, No. 865, in China (Ku-peï-ku) — Man vgl. noch das unter *fritschiana* oben Gesagte.

= = Zw. rund, o. wenn $\pm$ kantig, so B. nicht wie bei *fritschiana* o. größer als bei *angulata* o. Blst. $\pm$ beh.

> K. zur Frz. o. schon zur Blz. scharf zurückgeschlagen, so lang o. eher länger als Bl.-Achse. >> siehe S. 479.

$\pm$ Blst. beh., B. kaum über 2,5 cm lang, zwergige $\frac{1}{2}$ mit $\pm$ kantigen Zw.

B. $\mp$ sitzend, ihr Stiel jedenfalls kürzer als die breit eirundlichen Kn.

46 *S. aemiliana*: kleiner nach dem mir vorliegenden vollständigen Expl. nur 22 cm hoher b., Verzweigung straff aufrecht, dicht, gedrungen: junge Zw. reichlich, bis $\frac{1}{2}$ beh., blaupurpurn, kantig, zuletzt lebhaft braunrot, aufreißend, Kn. ca. 1,5:1 mm, beh.; B. aus leicht herztig o. sehr breit rundlichem Grunde eifg. o. rund-eifg., vom unteren Drittel ab ziemlich gleichmäßig kerbzahngig, ähnlich wie bei *alpina*, oben hellgrün, verstr. beh., unten grauweiß beh., Papillen angedeutet, Beh. reichlicher 1,5:1,4—2,5:2,1 cm, Textur dicklich, feines Nervennetz unters. sehr scharf, Stiel kaum 1 mm, Blst. klein, dicht 2—2,5 cm Dm., *alpina* sehr ähnlich, Bl. 4—5 mm Dm., weiß o. rosa, 6—8 eirundlich, halbmal länger als die der Bl.-Achse gleichlangen K. Stb. ca. 2—3 mal so lang wie C., Bl.-Achse und K. außen locker beh., innen kahl, Frkn. an Bauchnaht unter Gr. und am Rücken verstr. beh., Gr. fast doppelt so lang, Fr.?

S. a. C. K. SCHN., in Bull. Herb. Boiss. 1905, 347. Das mir vorliegende Expl. wurde von R. P. FAURIE, No. 628, in Japan: Volcan de Mori, sur les rochers qui dominant le cratère, am 9. VII. 1887 in vollster Blüte gesammelt. Es ähnelt am meisten *S. arbuscula*, ist aber von deren beh. Form, wie die Angaben lehren, gut verschieden.

∨∨ B. kurz, aber deutlich gestielt. Stiel doppelt so lang als Kn. o. B.-Grund deutl. keilfg. in den Stiel vorgezogen.

47. *S. beauverdiana*: in der typischen Form ein anscheinend kaum spannenhoher Zwerg-b, Zw. jung beh., ☉ kahlend, später kahl, purpurbraun leicht kniebig, aber aufrecht, scharf kantig, Kn. sehr klein, fast kahlend; B. dünn, oben verstr., auf der wenig helleren Unterseite reicher beh., Hauptnerven hier scharf vortretend, Zähnung fast von Grund aus doppelt kerbig, sonst vgl. var.; Blst. sehr klein, 1–1,5 cm Dm., dichtblütig, Bl. 3–4 mm Dm., wohl weiß, C. rundlich, kaum o. wenig länger als die die außen und innen $\perp$ beh. Bl.-Achse meist an Länge etwas übertreffenden K., diese $\pm$ analog beh., Fr. ?, sonst vgl. var.

Ich unterscheide: var. a. *typica*: B. verkehrt eiförmlich, ca. 1 : 0,8 cm, Grund gerundet; Stb. ca. 30–40, wohl gut 3mal so lang als C., Frkn. durchaus, bes. aber oben an Bauchnaht langzottig beh.; Japan, sammelt du Rushima, lg. FAURIE, No. 8403, 30. VII. 1892, ziemlich verblüht. — b. *steveni* C. K. SCHN., l. c. 348: eine mir ganz vorliegende Pflanze bis 25 cm hoch, B. aus breitgestutztem, aber plötzlich in den B.-Stiel vorgezogenem Grunde eiförmlich, 1,8 : 1,1–2,7 : 1,8 cm; Stb. ca. 20–25, etwa 2mal so lang wie C., Frkn. wie bei a. o. kahl o. nur oben an Bauchnaht beh.; Kamtschatka (ex Herb. STEVEN in Herb. BOISSIER, als *betulaefolia*) und N.-NW.-Amerika Kotzebue's Sound (lg. BEECHY).

S. b. C. K. SCHN., in Bull. Herb. Boiss. 1905, 348. Heimat wie oben. Sehr interessante kleine Formen, die gewiß genetisch mit *betulaefolia* zusammenhängen, die ich aber zunächst besser als „Arten“ fasse, da sie sich von den mir vorliegenden *betulaefolia*-Expl. sehr gut scheiden. Die bei dieser von mir beschriebene var. *ajanensis* steht in der B.-Form und Zähnung etc. dem Typ. viel näher, also nicht nur auf Grund der Beh. der Blst. trenne ich die *beauverdiana* ab.

Gewiß bedürfen gerade diese Formen noch sehr der Beobachtung und ein anderes Expl. aus dem Herb. REICHENBACH im Hort. Wien aus Kamtschatka deutet auf Beziehungen zu var. *ajanensis* der *betulaefolia*, jedenfalls ist es heute noch nicht möglich zu sagen, ob diese mit *beauverdiana* durch Formen direkt verbunden o. ob insbesondere die Formen mit ganz beh. Frkn. allein zur letzten zu stellen sind.

• • • Blst., kahl o. wenn beh., so doch B. im Mittel über 2,5 cm lang.

48. *S. betulaefolia*: anscheinend im allgemeinen kleiner und gedrungenere b, Zw. meist jung beh., gewöhnlich kahl und leicht kantig, seltener deutl. stielrund, braunrot o. schwarzpurpurn, wenigstens • und •; Kn. recht klein, eistumplich, kahl, viel kürzer als B.-Stiel; B. meist wie Fig. 294n, seltener deutlich breit verkehrt-eifg. mit scharf keiliger Basis (f. *obovata* m.), 2,5 : 1,3–6 : 3,5 o. bis 5,5 : 3,8 cm, oben spärlich beh. bis kahl, unten mehr beh. o. fast kahlend, gewimpert, deutlich heller bis weißgrau, nur Hauptnerven scharf vortretend, Stiel 3–6 mm; Blst. 2,5–5,5 cm Dm., ziemlich dicht doldenrispig, Bl. 5–8 mm Dm., K. $\perp$ so lang wie Bl.-Achse, diese innen meist beh., sonst vgl. Fig. 295s—s¹ und var.

var. a. *typica*: Blst. kahl, dgl. Bl.-Achse und K. außen, B. meist über 2 cm breit und unten ganz o. fast kahlend, wohl höherer b als b. *ajanensis*: Blst., Bl.-Achsen und K. dicht beh., B. schmahliptisch, im Mittel 2,5–4 : 5 : 2,2 cm, unten beh., mir nur in Bl.-Expl. bekannt, lg. THUNG, Aman, No. 92.

S. b. PAUL, Fl. ross. I. 33, t. 16, 1784. — Birkenblattrige S. O. Asien: Amurgebiet bis Kamtschatka und Sachalin, Japan, lg. FAURIE, Iwozan, No. 5453, f. *beccata*, Sommet de Ganju, No. 5989, Tombières de Nemuro, No. 5584, Blz. V–VII, Frz. VIII–IX. Wohl nur selten echt in Kultur. Ein reiches Material hat mir gezeigt, daß GRELNE mit seinem 1892, in Pittonia II, 220,

gegebenen Hinweis recht hat, wonach die asiatische *betulaefolia* sich vom Formenkreise der amerikanischen *corymbosa* vor allem durch die zur Frz. (meist schon zur Blz.) scharf zurückgelegten K. unterscheidet, während alle mir vorliegenden amerikanischen Formen $\pm$ aufrechte o. abstehende höchstens leicht nach außen übergebogene K. zeigen. Durchs Pressen erhalten Herbarexemplare z. T. zurückgeschlagene K., aber selbst an Herbarexemplaren erkennt man die Unterschiede deutlich.

Erwähnt sei, daß auch bei *betulaefolia* sich Formen zeigen mit fast ganzrandigen B (vgl. Fig. 294n oben), wenn auch diese nicht so scharf abweichen, wie *S. virginiana* von *S. corymbosa*.

>> K. zur Frz. aufrecht o. aufrecht abstehend, höchstens leicht nach außen zurückgebogen, Zw. rund, sehr schlank.

B. stets und meist doppelt und lappig eingeschnitten gezähnt.

49. *S. corymbosa*: Ausläufer treibender, aufrechter, schlank-rutiger 0,3–0,6 (–1) m hoher b., Zw. fast stets kahl, vgl. var., Kn. mehrschuppig, stumpf- o. länglich-eifg., 2–3 mm lang; B. vorwiegend breit eifg. o. eielliptisch, oben lebhaft grün, unten viel heller bis weißgrau, meist ganz kahl, Stiel bis 1 cm, vgl. sonst var.; Blst. breit und locker doldenrispig, sich meist deutlich aus mehreren Partialblst. aufbauend (was bei *betulaefolia* nie eigentlich der Fall ist) insgesamt bis 10 cm o. mehr Dm., und kahl, meist nur Trgb. beh., Bl. weiß, ca. 4–7 mm Dm., Bl. und Fr. vgl. Fig. 295t–u¹, Fr. kahl o. an Bauchnaht $\pm$ beh.

var. a. *typica*: GREENE, in Pittonia II. 220. 1892, ist der Meinung, daß diese ostamerikanische Form, die (insbesondere in den Alleghanies) von N.-Jersey bis Georgia und Kentucky vorkommt, eine besondere Art gegenüber der westamerikanischen b. darstellt. Die beh. Blst., die er andeutet, sah ich nicht, übrigens scheint er 1892 nur 1 Fr.-Expl. gehabt zu haben. Mir liegen mehrere gute Expl. aus Virginia vor, die eigentlich nur durch auffällig schwarzbraune Zweige von var. *acuta* abweichen, ihre B. sind groß, 5:2,5–6,5:4,5 cm, treten aber genau so groß an Expl. von b. auf, jedenfalls ist nur ein sicherer Unterschied gegen var. *acuta* noch nicht bekannt. — b. *lucida* ZABEL, in H. d. D. D. G. 157 1903 (*S. lucida* DOUGL., apud Hook. Fl. Bor.-Am. I. 172. 1833): umfaßt die Formen in W.-N.-Am., wo sie von Brit.-Col. durch Washington bis Oregon vorzukommen scheint, wohl aber auch in den Rocky Mts. noch weiter südöstl. bis Montana und Wyoming geht, in Calif. dagegen fehlen dürfte. Geographisch ist sie also sehr gut getrennt von var. a., aber weder in der wechselnden Serratur der B. (Fig. 294p) noch in der Bl. finde ich gute Unterschiede; die Zw. sind viel mehr rotbraun.

S. c. RAF., Préc. Découv. 36. 1814 (*S. betulaefolia* var. *corymbosa* MAXIM. et ALER. PLUR. Unter, steinige Plätze, in armen Boden. Blz. V–VI. Häufiger in Kultur als *betulaefolia*.

49×53 *S. corymbosa* × *alba* (? var. *latifolia*): *S. notha* ZBL., 1885 et l. c. 91. 1893 diese durch die breiten bis eirundlichen, an Lgtr. bis 7:5 cm messenden wie *alba* gezähnten B. und die an *pyramidalis* gemahnenden Blst. ausgezeichnete Hybride liegt mir nur in Fr.-Expl. vor. Jedentalls deutet die Beh. der Erst. an, daß es sich nicht um *acuta* – *alba* s. str. handelt. Sie würde einen ziemlich intermediären Typ darstellen. Sie bedarf noch des Vergleiches mit der von ZABEL als *corymbosa* – *alba* *per* beschriebenen *S. difformis* l. c. 96. 1893 von der ich noch zu wenig Material sah.

49×55 *S. corymbosa* × *douglasii*: *S. pachystachys* ZBL., l. c. 94. Vgl. das dort Gesagte. Diese Formen gehen z. T. als *S. pyramidalis*, *pubera* und *nobilis* in den Gärten.

— B. ganzrandig o. nur gegen Spitze entfernt gezähnt, Stb. kaum o. nur etwa $\frac{1}{2}$ mal länger als C., Blst. $\pm$ locker beh.

50. *S. virginiana*: vielästiger b., BRITTON sagt: the branches forming wands 0,3–1,2 m long; Zw. rundlich, $\pm$ olivbraun, später graubraun, Kn. wohl sehr klein;

B. länglich-elliptisch, 3,5 : 1,5–6,5 : 2 cm, ober. tief trübgrün, unter. mäßig heller, auf Rippe beiders. anliegend beh. Stiel 5–10 mm; Blst. ähnlich *corymbosa*, nur eher dichter und vielleicht etwas gewölbt, ca. 5 cm Dm., Bl. weiß, ca. 5 mm Dm., Bl.-Achse kurz breit kreiselfg., hfg. beh., K. etwa gleich lang, spitz dreieckig, C. kaum doppelt so lang wie K., Stb. ca. 40–50, Drüsenring gut entwickelt, Frkn. kahl, schon zur Blz. vorstehend, Gr. kaum länger, Fr. mir unbekannt, bei BRITTON nicht näher beschrieben.

S. a. BRITT., in Bull. Torr. Cl. XVII. 314. 1890. W. Virginien bis in die Gebirge von N. Carol. und Tennessee. Blz. VI. — Das nur vorliegende Expl. macht einen ganz aparten Eindruck. Ob die Stb. später noch länger werden, weiß ich nicht, die Abbildung bei BRITT. et BR., Flora II. 197. Fig. 1886. 1897, ist jedenfalls ungenau.

△△ Bl. ohne Drüsenring, B. mit obs. Sp.

51. *S. arbuscula*: aufrechter, buschig verästelter, 0,5–1,2 m hoher b., ohne Ausläufer, also in Tracht mehr wie *betulaefolia*. Zw. gewöhnlich kahl, rundlich, braungelb. purpurbraun. bereift z. T., abblätternd. Kn. spitz eifg., z. T. so lang wie der kurze B.-Stiel; B. vgl. Fig. 294o o. auch auffälliger schärfer gezähnt, ober. lebhaft grün, bis 4 : 2,8 cm, vgl. var.; Blst. dicht, 2–6 cm Dm., Bl. rosa, ca. 5 mm Dm., vgl. sonst Fig. 295v—v¹, S. 474.

Es lassen sich unterscheiden: var. a. *typica*: Zw. und Blst. kahl, meist auch Bl.-Achsen, K. und Fr. b. *pubigera*: Zw., Blst., Bl.-Achsen und K. innen und außen, sowie Fr. beh. Wohl durch Zwischenformen mit a. verbunden.

S. a. GREENE, in Erythra III. 63. 1895 (*S. betulaefolia* var. *rosea* A. GR., in Proc. Am. Acad. VIII. 381. 1877; *Incida* var. *rosea* GREENE, in Pittonia II. 211. 1892; *rosea* KOEHNE, in Dendr. 218. 1893, non RAF.) — Subalpine Sierra Nevada von Calif. bis Washington. — Erst seit neuerer Zeit in Kultur. Herr ZABEL, der mir sehr schönes Kulturmateriel zur Ansicht sandte, ist der Meinung, daß diese Art mit *S. splendens* Hort. BAUMANN zu identifizieren sei. Wenn ich nun auch glaube, daß er recht hat und daß dieser Name der älteste brauchbare wäre, so kann ich doch aus den Notizen in Gard. Chron. 1877 I. 245 und 1883 II. 12, keinen sicheren Anhalt gewinnen, daß die hier besprochene *splendens* wirklich unsere Art und nicht eine *japonica*-Form vorstellt. Deshalb behalte ich einstweilen GREENES Namen bei.

51×55 *S. arbuscula* (= *splendens* ZBL.) × *douglasii*: Vgl. das unter *S. sansoniana*, S. 476, Gesagte.

II. Blst. — pyramidale Rispen bildend, die meist viel höher als breit sind.

Sekt. 3. *Spiraria* SER., in DC. Prodr. II. 514. 1825. Bl. stets , weiß o. rosa, Drüsenring vorh. o. fehlend.

○○ s. S. 482. ○ K. zur Frz. aufrecht, Drüsenring vorh. (vgl. aber auch 54 *S. pyramidata* S. 482).

— Blst. 1 bis etwa 10–15 cm lange — zylindrische Rispen darstellend, deren unterste Hauptachsen selten seitlich deutlich verlängert sind, die sich aber nie eigentlich breit pyramidal aufbauen, jedenfalls setzen sie sich im unteren Teil nie aus deutlich beblätterten verlängerten Teil-Blst. zusammen, Achsen — beh. bis fast ganz kahl.

52. *S. salicifolia*: schlank aufrecht verästelter, 0,5–1,50–2 m hoher b., Zw. gerade, rund, oder auch kantig, hellgelb- o. rötlich-braun, o. dunkler, kahl, später graubraun, abfasernd, Kn. 1,5–2 mm lang, eifg., leicht abstehend, mehrschuppig, Sch. gewimpert; B. vgl. Fig. 296c c. gewöhnlich nur jung gewimpert, dann ganz kahl, oben lebhaft grün, unten mäßig heller, etwas bläulich, mit gelblichem scharfem

Hauptadernetz, Zähnung einfach o. zusammengesetzt, Stiel 2–6 mm; Bl. rosa o. auch weiß, Bl.-Achse und K. meist kahl, Fr. wie Fig. 295x, S. 474, sonst wie bei *alba*.

Von Formen seien erwähnt: *f. alpestris* PALL., Fl. Ross. I. 36. t. 22. 1784 *f. nana* K. KOCH, Dendrol. I. 311. 1866 eine niedrige zwergige Form, des östlichen As. und des nördlichsten NW.-N.-Am., nach MAXIMOWICZ B. vgl. Fig. 290 c, S. 482. Augenscheinlich mit dem Typ durch Übergänge verbunden; ferner *f. grandiflora* K. KOCH, l. c. (*Sp. grandiflora* LODD., Bot. Cab. XX. t. 1988. 1833, non AUCT. AL.) Bl. größer als beim Typ, schön hellrosa, Kulturform.

S. s. L., Sp. pl. 489. 1753 (et AUCT. PLUR. ex parte). — J. G. S.-Böhmen, Mähren, Nieder- und Ober-Östr., Steierm., Kärnten, Krain sicher spontan, ferner wohl auch in Ungarn (Marmarós, Siebb.); sonst durch S. und M.-Rußland, Sib. bis O.-As. (für Jap. mir noch fraglich) und in NW.-Am. in Alaska, Sitcha (teste MAXIM.). — Waldränder, sonnige Hügel, Bachufer, Moore. Blz. VI–VII, zuw. bis Herbst; Frz. VIII–X. — Altbekannte Kulturart, die bei uns noch an vielen anderen Orten verwildert ist. ASCHERSON et GRAEB bezweifeln, in Syn. VI. 22. 1900, daß die *salicifolia* L. G. wirklich wild auftritt, allein eine ganze Reihe ausgezeichneter Beobachter haben mir versichert, daß die betr. Standorte unbedingt auf ein spontanes Vorkommen schließen lassen, und ich finde darin nichts Unwahrscheinliches. KOEPPENS Ausführungen (Geogr. Verbr. Holzg. Eur. Rußl. I. 311) vermögen mich ebenfalls nicht vom Gegenteil zu überzeugen. Vgl. Weiteres bei *alba*.

51×55 *S. salicifolia* × *douglasi*: *S. billiardii* (*S. menziesii* var. *billiardii* ZBL., l. c. 101. 1893: unter diesem Namen könnte man diejenigen Formen vereinigen, die der angegebenen Kombination entsprechen. Daß *S. menziesii* sens. str. nicht als Hybride anzusehen, ist S. 483 gesagt. Welche von ZABELS vielen *menziesii*-Formen zu *billiardii* gehören und welche zu der Kombination, die ich *merithyrsa* (S. 482) nenne, kann ich vorläufig nicht sagen.

77 Blst. fast stets breit pyramidal, indem die unteren Hauptachsen sich verlängern o. unter die Hauptblst. an deutlich beblätterten Seitentrieben Teilblst. treten, so daß oft ein sehr großer aus pyramidalen o. auch zylindrischen Teilrispen sich aufbauender breiter Gesamtblütenstand entsteht. Achsen reichlich beh. bis ganz kahl.

53. *S. alba*: habituell der *salicifolia* analoger, hfg. reicher verästelter b. Zw. meist mehr purpurn, hfg. bereift, zuweilen jung beh., B. vgl. var.: Bl. weiß, selten rosa, vgl. Fig. 295w–w¹, S. 474.

var. a *typica*: junge Zw., Blst.-Achsen, Bl.-Stiele, Bl.-Achsen und K. beh., B. vorwiegend wie unter Fig. 296b; hierher als Form mit besonders schmalen, sehr an *salicifolia* gemahnenden B. zu stellen *f. incerta* var. *efolia* var. *incerta* TORR. et GR., Fl. N.-Am. I. 415. 1840 ex parte, sowie *f. paniculata* var. *paniculata* AIT., Hort. Kew. II. 189. 1789, deren B. meist kleiner sind als bei voriger Form, etwa wie in Fig. 296 bei b das B. neben c, und deren Blst. sich aus dem zylindrischen Teilrispen zusammensetzen. var. b *latifolia* DIPP., Handb. Laubh. II. 484. 1833 *latifolia* var. *latifolia* AIT., l. c., *S. latifolia* BORCKH., Forsth. II. 1455. 1803; *capitata* W., Enum. pl. Hort. Berol. 540. 1801; *capitata* RAE., New Fl. III. New. Sylva 65. 1826, von a durch die Kahlheit aller Teile und die breiteren B. Fig. 296a meist scharf geschieden, doch treten Mittelformen auf, die mich veranlassen, sie nicht wie KOPHN als Art aufrecht zu halten, Blst. meist breit pyramidal und Seitenblst. sich dicht zusammenschließend.

ZABEL 1893 et 1895 schließt hieran als Form, die gleichsam zu *typica* überleitet, *f. bethlehemiensis* an; was ich in Gärten als *bethlehemiensis* fand, schließt sich wohl meist an *typica* Formen eng an, bedarf aber noch der Beobachtung. Immerhin kann *bethlehemiensis*, wie ich sie in Herb. DIPPEL sah, $\times 17$ sein und wurde dann dessen *S. rosalba*, Laubh. 484. 1893, entsprechen. Aber alle solche Deutungen sind sehr cum grano salis zu nehmen.

S. a. DURL. Harbk. Baumz. II. 430. 1772. N.-Amer. von Neu-Fundl. bis zu den Rocky-Mts. und Georgia, westl. bis Missouri. Meist feuchte Orte. Blz. VI–VII. Frz. VIII–X. Ebenfalls seit langem in Kultur und im Gebiet hier und da verwildert. Exemplare aus dem westl. N.-Am. sah ich nicht, finde hier und da verwildert. Exemplare aus dem westl. N.-Am. sah ich nicht, finde auch weder bei GREENE, HOWELL noch anderen Floristen eine Angabe, daß sie

da vorkommt, sie wäre also von *salicifolia* so gut als nur denkbar geographisch verschieden, ich muß aber sagen, daß selbst das sehr reiche mir vorliegende Material mir in B. und Bl. keine sicheren Unterschiede gezeigt hat, daß gewisse *alba*-Formen der *salicifolia* auch im Habitus des Blst. verzweift ähnlich sehen und sehr große Vertrautheit mit den *alba*-Variationen dazu gehört, um manchmal bei Herbar-exemplaren zu sagen, ist es *alba* o. *salicifolia*.

53b×55 *S. alba* var. *latifolia* × *douglasii*: *S. macrothyrsa* ZABEL, l. c. 103. 1893. Die Formen dieser Kombination sind von denen der *balliardi* sehr schwer zu scheiden und ich möchte unter *macrothyrsa* speziell, wie auch ZABEL, die var. *latifolia* × *douglasii* verstanden wissen, deren Nachweis leichter ist als der von typischer *alba* × *douglasii* im Vergleich zu *salicifolia* × *douglasii*.

Fig. 296. *Spiraea*: Blattformen von: a—b *alba*: a var. *latifolia* — c—e *salicifolia*: c var. *alpestris* — f *douglasii* — g *menziesii* — h *tomentosa*: i f. *angustata* (Alles $\frac{2}{3}$ n. Gr.) (Original).

○○ K. zur Frz. herabgeschlagen, Drüsenring fehlend (nur bei *pyramidata* vorh.)

* Drüsenring in den Bl. vorh.

54. *S. pyramidata*: 0,3 bis etwa 1 m hoher, Ausläufer treibender, beste GREENE, HOWELL b, Zw. — rund, schlank, purpurbraun, hfg. bereift, sehr fein beh., Kn. kurz breit eifg., beh., kaum halb so lang wie B.-Stiel; B. an typische *cymbosa* gemahnend, in Zähnung z. T. auch *douglasii* ähnlich, breit elliptisch, 4,5:2,3—9:4,3 cm, oben — trübgrün, auf Nerven — fein beh., bis ganz kahl, unten mäßig heller o. etwa blaugrau, sehr fein verstr. beh. bis fast ganz kahl, Hauptnerven gelb- o. gelbbraunlich, — scharf hervortretend, unter dem Mikroskop Papillen — deutlich nachweisbar, Stiel 4—9 mm; Blst. dicht hoch gewölbt bis breit pyramidalrispig, wenn wenig verästelt etwa 8:5, sonst bis 15:10 cm, im unteren Teil mit einigen großen B.; Achsen, Bl.-Stiele, Bl.-Achsen und K. — fein beh. (letzte beide — innen und außen, Bl. weiß, 6—7 mm Dm., K. spitz 3-eckig,

knapp so lang wie Bl.-Achse, C. rund oval, doppelt so lang als K., Drüsenring hell, hfg. nicht sehr auffällig, Stb. ca. 30, doppelt so lang als C., Frkn. kahl, getrennt (hfg. 6), Gr. kaum länger, zur Frz. $\frac{1}{2}$ – $\frac{2}{3}$ frei, $\frac{1}{2}$ parallel, Gr. etwas nach außen endständig, leicht zurückgebogen.

S. p. GREENE, in Pittonia II. 221. 1892. — GREENE sammelte die Art in Washington am unteren Yakima-River, ich sah folgende unter sich vollkommen identische Expl.: Wash. dg. SUKSDORF, VII et IX. 1881, borders of woods, Falcon Valley; Idaho (Coeur d'Alene-Reserv., lg. HELLER, No. 539, VII. 1862 und S.-Brit.-Col. [Yalefelsige Orte auf Granit, lg. PURPUS, VI. 1888–89*]). Eine gute Art, die ihren Blst. nach in diese Gruppe gehört. Ob in Kultur und als was?

×× Drüsenring fehlend in Bl.

+ Beh. der Zw., B. und Blst. weißgrau o. B. $\pm$ ganz kahl, B. nur über der Mitte gezähnt o. ganzrandig, an Spitze $\pm$ breit gerundet.

B. unters. durchweg dicht weich weißfilzig, vgl. Fig. 296f, Zw. $\pm$ reichlich weißgrau beh.; Bl.-Achse auch innen beh., Fig. 295y, S. 474.

55. *S. douglasii*: 0.6 bis über 2 m hoher, aufrechter, Ausläufer treibender, oft breite Büsche bildender b; Zw. fast rund, jung weißfilzig, nach und nach kahlend, rotbraun, erst $\varnothing$ wirklich oder fast kahl; Kn. beh., kurz und dick stumpf eifg., ca. 2 mm lang, mehrschuppig, leicht abstehend; B. 3.5:1.2–9:3.5 cm, obers. trübgrün, anfangs dichter + verstr. beh., Zähnung hfg. ziemlich scharf und doppelt, Stiel ca. 4 mm; Blst. dicht, fast zylindrisch, bis 20:4–5 cm seltener unterste Seitenachsen deutlich verlängert und Blst. mehr pyramidal, Achsen, Bl.-Stiele, Bl.-Achsen und K. außen + weißgrau filzig, Bl. dunkelrosa, K. innen hfg. fast kahl, sonst vgl. Fig. 295y–y¹.

S. d. Hook., Fl. Bor.-Am. I. 172. 1840. — Pacif. N.-Am. von Brit.-Col. bis Calif. südlich bis Humboldt-Co. — Nach HOWELL: common in low grounds and swales. — Blz. VII–IX. — Frz. IX–X. Seit langem in Kultur.

DIPPEL führt 1893 eine Anzahl mutmaßlicher Hybriden der *douglasii* mit *alba* (= *angustifolia*), mit *corymbosa* (= *S. magnifica* und *S. oblongifolia* sowie *S. majestica*), mit *tomentosa* (= *S. fulvescens*) mit *japonica* (*S. longifolia*) und mit *betulaefolia* (*S. brachystachys*), die teils mit bereits genannten identisch sein dürften, teils nicht sicherzustellen sind, da im Herbar DIPPEL sichere Originale nicht vorhanden sind. ZABEL (1903) war ebenfalls nicht in der Lage, die fraglichen Formen zu klären.

B. unterseits stark bis fast ganz kahlend, graugrün, vgl. Fig. 296g, c Zw. spärlich beh., + lebhaft rotpurpurn o. braun, Bl.-Achse innen kahl, Fig. 295z⁵, S. 474.

56. *S. menziesii*: der vorigen habituell ähnlicher, aber meist niedrigerer, kürzer verzweigter b, Kn. kürzer, ein wenig mehr abstehend, kahler; B. meist weniger gezähnt, obers. tiefgrüner, unters. schärfer genervt; Blst. eher etwas lockerer, untere Seitenachsen z. T. etwas mehr abstehend, Beh. viel schwächer, Frkn. meist mit einigen Haaren, zur Frz. kaum so weit hervorragend.

S. m. Hook., Fl. Bor.-Am. I. 173. 1840 (*S. douglasii* var. *menziesii* PRESL., Epimel. Bot. 195. 1849). Die mir vorliegenden Expl. stammen aus Washington, Oregon und Idaho. HOWELL sagt: in cold marshes, Alaska to Oregon. — Blz. etwa wie vorige. Wohl sicher gute Art, aber immerhin als Var. der *douglasii* denkbar, in keinem Falle aber ein Bastard *douglasii* $\times$ *salicifolia*, wie es ZABEL

*) Dieses Expl. war mit HAUSSKNECHTS Bestimmung als *salicifolia* var. *latifolia* von DIECK verbreitet worden.

sogar 1903 unter ausdrücklichem Hinweis „wild in N.-Am.“ noch angibt. Die *S. salicifolia* fehlt ja in NW.-Am. ganz und gar und die spontanen Pilz deuten in nichts auf einen hybriden Ursprung hin. Daß eine solche Hybride in Kultur entstanden ist, bestreite ich nicht. Man vgl. darüber das auf S. 481 Gesagte.

++ Beh. der Zw. etc. dicht dick gelbgrau- o. braungelblich.
B. vgl. Fig. 296h—i, Zw. $\pm$ kantig.

57. *S. tomentosa*: schlank aufrecht, meist einfach verzweigter, bis 1.5 m hoher b. Zw. bis ins Alter - rostfarben-filzig beh., zuletzt braunrindig, Kn. stumpf-eifg., gleich beh., kaum bis 2 mm lang; B. etwa 3,5:2—5:3 cm o. bei *f. angustata* länglicher, 4:1.2—5,5:2 cm, oben matt- aber sattgrün, spärlich beh., unten trotz des Haarfilzes Hauptnervatur scharf vortretend, Zähnung vom unteren Drittel ab, Stiel 3—6 mm; Blst. bis fast 25 cm lang, aus 5—10 cm breitem, schlank verästeltm Grunde in eine sehr feine lange Spitze auslaufend, Bl. lebhaft rosa bis violettrosa, ca. 5 mm Dm., ihre Stiele etc. wie die Achsen braungelbfilzig, sonst vgl. Fig. 295z—z³, S. 474.

S. t. L., Spec. pl. 489. 1753. — Filzige *S.*; Hardhack, steeple-bush. — O.-N.-Am., von Neu-Schottl. bis Manitoba, Georg und Kansas. — Sümpfe, Niederungen. — Blz. VII—IX. — Frz. IX—XI. — Altbekannte, auffällige Art.

Daß *S. tomentosa* Bastarde bildet mit verwandten Arten ist nicht ausgeschlossen. Sicher bekannt ist mir keiner. ZABELS *S. pallidiflora* (vgl. 1893, S. 105) ist mir noch fraglich.

Subgenus b. *Homoiospiraea*: Bl. in deutlichen verlängerten lockeren meist einfachen Trauben, je mit einem Trgb. und 2 Vorb., Gyn. 3, B. mit ∞ obern. Sp.

58. *S. parvifolia*: wohl kleiner, zierlicher, locker verzweigter b. Zw. kahl, braunrot, etwas kantig gestreift, $\odot$ aufreißend, B. klein Fig. 297b¹) beiderseits graugrün, kahl, in die relativ lange Stielbasis verschmälert, ganzrandig; Blst. am Ende 1—6 cm langer, reich normal beblätterter Seitentriebe, im unteren Teile hier und da etwas zymös verästelt und Tragb. laubig, sonst Bl.-Stiele 2—4 mm, Trgb. reichlich halb so lang, Bl. klein, ca. 4 mm Dm., weißlich, vgl. alles in Fig. 297a—b

S. p. BENTH., Pl. Hartw. 36. 1840. — Kleinblättrige *S.* — Mexico. — Noch nicht in Kultur. Jedenfalls ein interessanter, von allen anderen Arten abweichender Typ. den man aber nicht mit *Petrophytum* oder *Sibiraea* zusammenbringen kann. Die von MAXIMOWICZ noch als fraglich geführte *S. magellanica* POIR., in LAM. Encycl. VII. 350 1806, ist wohl sicher die in aller Welt kultivierte *S. cantoniensis*.

Gattung 123. *Petrophytum* C. K. SCHN. (*Spiraea* Sect. *Petrophytum* NUTT., apud TORR. et GR., Fl. N.-Am. I. 418. 1840).

Vgl. oben S. 441 und Art.

P. caespitosum: dichte, an *Saxifraga*-Arten erinnernde Polster bildender Zwerg- b mit kurzem, dickem, knorrigem Stämmchen, das sich oft ziemlich lang am Erdboden hinzieht und viele wulstig-knorrige, B.-Polster tragende, sehr kurze Seitenzweige bildet: B. dicht rosettig, lineal-spatelig, wie Fig. 297d oder stumpflicher, kaum über 3 mm breit, beiders. seidig beh., und gleicher Weise mit Sp. versehen; Blst. aus dem Zentrum der B.-Rosetten entspringend, straff aufrecht, 5—16 cm lang, am Ende eine 1—8 cm lange dichte ährige Traube tragend, deren unterste Seitenachsen hfg. zu kleinen Seitentrauben verlängert sind, während sonst der dicht seidenfilzige Blst.-Stiel mit wenigen Hoch-B. chen besetzt ist, Bl. ca. 4 mm Dm., gelbweißlich, sehr kurz gestielt, mit verlängerten Trgb. und kleinen Vorb., Stb. 15, sonst vgl. Fig. 297c—d, Discusring meist ganzrandig, S. 2, länglich, fast stielrundlich, mit deutlichem End.

P. c. (*S. c.* NUTT., l. c.; *Eriogynia caesp.* S. WATS., in Bot. Gaz. XV. 241. 1890; *Luetkea caesp.* O. KRZE., Rev. Gen. I 217. 1891). Rasenspire. Ich sah Expl. aus Arizona, Utah und Nevada. — Gebirge bis 3000 m. — Blz. VIII. — In Kultur sehr selten und heikel. Bedarf sehr durchlässigen lockeren Bodens und sonnigen Standortes. — Die Vereinigung dieser Art mit *Luetkea* erscheint mir unbegründet, denn beide Gattungen sind, wie die Darstellungen der Blütenverhältnisse hier klar zeigen, sehr gut geschieden. Und die Schaffung von Sammelgattungen hat gewiß keinen Zweck.

Gattung 123a. *Luetkea* BONG., in Mém. Acad. Pétersbg. II. 119. 1832.

[*Eriogynia* HOOK., Fl. Bor.-Am. I. 255. t. 88. 1833*.)]

Vgl. oben S. 441 und Art.

L. pectinata: niederliegender, z. T. etwas rasiger Zwerg-b. Stämmchen dünn, mit feinen, dünnen, aufstrebenden, bis etwa 5 cm hohen - kahlen Zw., die am Ende B.-Büschel tragen nicht eigentliche Rosetten, B. 3-lappig wie Fig. 297 h. o. unterste bis 2 cm lang, die Lappen wieder tief 3-spaltig, einfache Basis z. T. bis 1 cm, grün, kahl; Blst. bis 10 cm, ähnlich *Petrophytum*, aber reichlich beblättert und die Ährentrauben weniger dichtblütig, 2-4 cm lang, fast kahl, Bl. vgl. Fig. 297 g. h. Stb. ca. 20, an Basis vereint, Discusring nicht ausgebildet, S. mehrere, End?

L. p. O. KTZE., Rev. gen. pl. I. 217. 1891 (*Saxifraga pectinata* PURSH, Fl. I. 312. 1814; *Luetkea sibbaldii* BONG., l. c.; *Eriogynia pectinata* HOOK., l. c.; *Spiraea pect.* TORR. et Gr., Fl. N.-Am. I. 417. 1840). Traubenspire. Ich sah Expl. von Sitka, Oregon und vom Crater-Lake, HOWELL sagt: Alaska to Calif. and the Rocky-Mts. — Blz. VIII. — Mir aus Kultur nicht bekannt.

GREENE beschreibt, in Pittonia II. 219. 1892, eine *L. hendersonii* aus Washington (Olympic Mts.). Nach seinen Angaben: leaves . . . coriaceous and evergreen, spatulate-oblong, entire, acutish, $\frac{1}{2}$ to $\frac{1}{4}$ inches long, rather obscurely silky-pubescent or glabrate . . . carpels 3 to 5, villous along the suture. Kann ich nicht mit Sicherheit angeben, ob diese Art zum Genus *Luetkea* gehört.

Noch eine andere Gattung sei im Anschluß hieran erwähnt. *Kelseya* (*Eriogynia* Sect. *Kelseya* WATS., in Proc. Am. Soc. XXV. 130. 1890). Sie umfaßt *K. uniflora* *Eriogynia unifl.* S. WATS., l. c., aus Montana (on precipitous cliffs bordering the Missouri river) die der Autor, wie folgt, beschreibt: very densely caespitose (6-9 cm hoch), with numerous slender branching stems densely covered with persistent imbricated leaves, which are light green becoming brownish, narrowly oblong-lanceolate (2-3 mm lang) nerveless, acute, entire, silky villous. Flowers solitary, terminal (often apparently lateral from the prolongation of a branch), equalling the leaves, very shortly pedicellate; calyx-lobes oblong-ovate, obtuse, villous; petals a half longer, linear-spathulate, obtuse or emarginate, stamens 10, distinct, long-exserted, inserted outside of the thickened margin of the disk; carpels usually 4 (or 5) alternate with the sepals distinct, oblong, somewhat hairy on the ventral edge, coriaceous in fruit and more or less dehiscent by both sutures; styles elongated, stigmatic at the narrow apex, seeds 3 or 4, linear-oblong, with a thin close testa. — Allem Anschein nach eine in vieler Hinsicht dem *Petrophytum* am nächsten stehende Gattung.

Gattung 124. *Sibiraea* MAXIM., in Act. Hort. Petrop. VI. 215. 1870.

Vgl. oben S. 441 und Art. Nur diese bekannt.

S. altaiensis (*S. laevigata*): kräftiger, aufrechter bis 1 m hoher, steif verzweigter b. Äste mit rissiger borkenartiger Rinde, Zw. kahl, schon fast ganz abgeblättert, braunrot bis purpurn, o. auch gelbgrau, glatt, rund; Kn. vgl. Fig. 298 i—p. ihre Sch. trockenhäutig, blattartig, locker, braun; B. ganzrandig, breit-länglich, etwa 3:1—12:2 cm, Spitze stumpflich, mit feinem Spitzchen, am Grunde allmählich in die stielartige Basis verschmälert, beiders. gleich grün o. etwas bläulich sattgrün, kahl

* Der mir vorliegende Bd. I von HOOKERS Flora trägt die Jahreszahl 1840 wie Bd. II, ich habe demgemäß bisher meist 1840 zitiert, allein nach PRITZEL, KUNZE etc. ist Bd. I schon 1833 erschienen.

o. am Rande verstr. gewimpert, Sp. beiders. gleich ∞ ; Bl. an 5—18 cm langen, beblätterten Seitentrieben in achsel- und endständigen zu ansehnlichen ca. 5—10 cm langen Rispen gehäuften ährigen Trauben, Stielchen kaum über 5 mm, mit höher oder tiefer stehenden Trgb., ♂♀ (dioecisch), vgl. Fig. 297 e—f¹, Stb. ca. 25, Gyn. 5(4—7), S. meist 2, reichlich groß, End. $\pm$ vorh.

S. a. (*Spiraea alt.* LAMX., in Nov. Com. Act. Petrop. XV. 554. t. 29. Fig. 2, Juni 1771 teste MAXIM.; *Sp. laevigata* L., Mant. II. October 1771; *Sib. laev.* MAX., l. c.). — Blauspiere. Altai, Thian-Schan. Felsige Hänge, Ufer. Blz. V. Frz. VII. — Seit langem in Kultur. — Wenn ZABEL, in Gartenztg. III. 494. 1894, für *Sibiraea* und *Petrophytum* (1893 zieht er auch *Spiraea parvifolia* und *Kibeya* hinzu) die Sekt. *Bothryospora* unter *Spiraea* aufstellt, so halte ich dies nicht für glücklich. Es hat, wie ich schon oben betonte, gar keinen Zweck, so heterogene Elemente zusammenzufassen, es ist vielmehr nötig, das Differente durch gesonderte Genera so klar als möglich hinzustellen. Ob dabei mehrere vorläufig monotype Gattungen herauskommen, tut nichts zur Sache.

D. siehe S. 492

Unterfamilie C. *Gilleniac* MAXIM., l. c. — B. gefiedert, sommer- o. immergrün, Neb. vorh., Frb. (wenn isomer) den K. opponiert, S. derbhäutig, ungeflügelt, End. vorh.

Gattung 125. *Sorbaria* AL. BR., in ASCHERS. Fl. Brandenbg. 177. 1864.
(*Spiraea* Sect. *Sorbaria* SER., in DC. Prodr. II. 545. 1825; *Schizonotus* LDL., ex WALLICH, Cat. No. 703. 1829; *Basilima* RAF., New. Fl. III. 75. 1836).

Vgl. oben und S. 441, $\text{b} - \text{b}(\text{---}\text{b})$, B. groß, einfach gefiedert, sommergrün; Blst. meist groß, rispig, endständig, Bl. meist klein, weiß, K. 5, C. 5, imbrikat, Stb. 40—50, Gyn. 5(4—8), Frkn. zu $\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{2}$ mit Bauchnaht verwachsen, Sa. mehrere, hängend, S. wenige. Alle Arten erwähnt.

○ Fr.-Gr. tief unter der Spitze rückenständig, Frkn. schon zur Blz. die flache Bl.-Achse fast zur Hälfte überragend (Fig. 297 p—q), Pflze. kahl o. so gut wie kahl.

1. *S. kirilowi*: nach MAXIM. 2—3 m hoher, aufrechter b , junge Zw. kahl, rund, olivgrün, später graubraun; Kn. der mir vorliegenden Expl. nur 2,5 mm lang, aus verengtem Grunde eifg., kahl, anscheinend 1 schuppig, abstehend; B. (7—12—19-zählig, bis 23 cm lang, Bechen vgl. Fig. 299 d (Serratur doppelt, aber Zähnen nicht sehr auffällig) fast ganz kahl, obers. sattgrün, unters. mehr graugrün, auch Stiel so gut wie kahl; Blst. breit wagrecht verästelt, fast so breit wie hoch (bis 18:15 cm), unterste Teilrispen in den Achseln von B., Bl. 7—8 mm Dm., Stb. etwa so lang wie C., sonst vgl. Fig. 297 p—q.

S. k. MAXIM., in Act. Hort. Petrop. VI. 225. 1879 (*Spiraea kirilowi* RGL., in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc. XI. 81. 1859). — Die mir vorliegenden Expl. sammelte WAWRA, No. 811, in China: Peking, Yuen-ming-huen. MAXIM. gibt außerdem die S.-Mongolei an, spricht aber nur von Kulturpflz. Bei uns noch nicht eingeführt, soviel mir bekannt.

○○ Fr.-Gr. an o. wenig unter der Spitze stehend, Frkn. zur Blz. die tiefe Bl.-Achse nicht o. kaum überragend, Pflze. meist beh., bes. im Blst., o. B. einfach sägezählig.

- Bl. über 10 mm Dm., Blst. klein, kaum bis 9 cm hoch, Bechen kaum über 4 cm lang, Stb. wenig o. kaum länger als C.

Fig. 297. *a* *b* *Sorbaria parvifolia*: *a* Bl. im L.-Schn., daneben gesondert Stb., K., Frkn.; *b* Frst. und Fr., *b'* B. — *c* *d* *Petrophytum caespitosum*: *c* Bl. im L.-Schn., daneben Frkn.; *c'* Stück vom K. mit Drüsenrand, einem C. und Stb.; *d* Frst. und Fr.; *d'* B. — *e* *f* *Sorbaria altaicensis*: *e* *f* Bl. im L.-Schn., daneben Stb., K., C.; *f* dgl. *g* Bl.; *f'* Frst. — *g* *h* *Luetkea chrysantha pectinata*: *g* Bl. im L.-Schn. (2 verkümmerte Frkno.), daneben Frkn.; *h* Frst., *h'* B. — *i* *Sorbaria lindleyana*: Bl. im L.-Schn., mit K. und Frkn. gesondert; *k* Frst. und S. — *l* *S. angustifolia*: Bl. im L.-Schn., mit K. und C. gesondert, *l'* Frkn. — *m* *n* *S. sorbifolia*: *m* *n* Bl. im L.-Schn., mit K. und Stb. gesondert; *n'* Frkn.; *o* Frst.; *o'* S. und E. — *p* *q* *S. koibana*: *p* Bl. im L.-Schn., mit C. und K. gesondert; *p'* Frkn.; *q* Frst. — *r* *r'* *S. stellata*: *r* Bl. im L.-Schn., mit C. und K. gesondert; *r'* Frkn. — *s* *s'* *Chamaebatiaria millefolium*: wie *r* — *t* *t'* (*Origo*).

2. *S. alpina*: kleiner, kaum über 30 cm hoher, kurz und sparrig verästelter b. Zw. fein beh., rotgrau, später abblätternd. Kn. vgl. Fig. 298 d—h: B. 9—13-zählig, bis 8 cm lang, B. chen ca. 2,5:0,9 cm (Seratur deutlich doppelt, scharf und tief), kahl, o. mit wenigen Büschelhaaren auf der wenig helleren Unters., Stiel und Spindel büschelhaarig; Neb. groß (8 mm), länglich; Blst. kurz rispig-traubig, dicht feinhaarig, nur Bl.-Achse im oberen Teil und K. hfg. etwas kahler, sonst vgl. Fig. 297 m—m¹, Fr. dicht beh.

S. a. DIPP., Laubh. III, 593, 1893 (*Spiraea sorbifolia* var. *alpina* PALL., Fl. ross. I, 38, t. 25, 1784; *Sp. grandiflora* SWEET, Hort. brit. 194, 1827; *Sp. pallasii* G. DON, Gard. syst. II, 520, 1832; *Sorb. grandiflora* MAXIM., l. c. 223, 1879; *Basilima alpina* ZABEL, l. c. 115, 1893 et KOEHNE 1893). Alpine Fiederspire. O.-Sib.: Ajan etc.

Blz. VI—VII. In Kultur nicht häufig echt, treibt mit am frühesten von allen Gehölzen aus. Fruchtet nach ZABEL selten. Vgl. Anmerkung.

✱✱ Bl. kleiner, Blst. meist viel länger, ebenso B. chen.

B. chen stets deutlich doppelt gezähnt, B. o. Blst. o. Zw. meist alles, ± beh.

— Fr. aufrecht, Blst. dicht, B. wohl spitz, aber nicht eigentlich mit fein vorgezogener langer Spitze, Stb. meist deutl. doppelt so lang wie C.

— Frkn. kahl o. nur schwach beh., B. unters. — bis ganz kahl, sonst jedenfalls B.-Stiele und Bl.-Achsen nicht beh., nur mit feinen Drüschchen besetzt**).

3. *S. sorbifolia*: aufrechter bis 2 m hoher, schlank verzweigter b mit weitkriechender Grundachse, Zw. fein beh. o. fast ganz kahl. Kn. vgl. Fig. 298 a—c; B. 13—21(—25)-zählig, bis etwa 30 cm lang, B. chen sehr variabel, vgl. Fig. 299 b—c (Zählung bei dieser wie der folgenden Art relativ schärfer, mit tieferen, mehr vorgebogenen, spitzeren Hauptzähnen als bei allen anderen, ober. sattgrün, unters. mäßig heller, vgl. var.: Blst. (10—15—30 cm hoch und kaum über 12 cm breit im unteren Teile, also eine ziemlich dichte, sich fast gleichmäßig zuspitzende Hauptrispe bildend, vgl. aber var.

var. a. *typica*: B.-Unters. ganz kahlernd o. nur auf der Spindel gleich der Rippe unters. fein beh. und bedrüst bleibend, Blst. wie oben, ihre Achsen durchweg dicht fein beh. o. z. T. mit deutlich hervorstehenden Büschelhaaren, nur Bl.-Stiele, Receptaculum und K. meist kahl o. fast kahl, sonst vgl. Fig. 299 n—o¹; hierher die Expl. aus NO.-As. vom Ural bis Kautschatka und Sachalin. — b. *dubia*: B.-Unters. sternföckig abwischbar beh. bleibend, Spindel ähnlich beh., o. nach Abfall dieser Büschelhaare nur $\frac{1}{2}$ fein kurzhaarig, Rispen mehr eifg. im Umriß als pyramidal, größte Breite in der Mitte, Verästelung etwas lockerer, Bl. mehr an *indleyana* gemahnend, Stb. kürzer als bei a, Achsen wenig o. dicht beh. (auch z. T. deutlich buschelg.), aber Bl.-Stiele und Bl.-Achsen, sowie K., wie es scheint, stets kahl o. fast kahl, nur — bedrüst; B.-Zählung etwas weniger deutlich, Hauptzähne

1) Beschreibung nach spontanen Expl. In Kultur wird die Pflanze spärlicher, doch kaum meterhoch, B. chen dann denen der *sorbifolia* sehr ähnlich, aber durch die großen Bl., die kürzeren Stb. und die mehr an *indleyana* gemahnende Beh. der Blst. verschieden. Es scheinen aber hybride Formen *alpina* × *sorbifolia* in Kultur, doch konnte ich sie bisher noch nicht ganz sicher nachweisen.

**) Die einzelnen Formen stehen sich oft sehr nahe, allein das mir vorliegende recht reiche Material zeigt mir doch, daß man HEMSLEYS Standpunkt (Journ. Lin. Soc. XXIII, 227) nicht einzunehmen braucht, wonach einfach alles als *S. sorbifolia* in einen Topf geworfen wird. Die von mir gegebenen Unterschiede zwischen *sorbifolia* und *indleyana* scheinen allerdings nach der Nachprüfung. Dagegen ist *S. arbuscula* augenscheinlich eine ganz typische Art, deren Verwandtschaft mit *indleyana* jedoch so lange zweifelhaft bleibt, als ihre Fr. nicht bekannt sind.

kürzer, mehr aneinanderschließend. Zu dieser provisorisch an *verbifolia* angegliederten Form stelle ich Bl.-Expl. aus W.-Sibirien: Tachienlu lg. PRATT No. 709 und aus O.-Tibet: Tongolo, lg. SOULIE No. 258. Das chinesische hat stärker beh. Blst. als das tibetanische. Ohne Fr.-Expl. gesehen zu haben, ist eine sichere Entscheidung nicht möglich. Möglicherweise ist diese Form schon im Arbor. VILMORIN in Kultur. Von der *S. stellipila* weicht sie vor allem in den kahlen o. wenig beh. Frkn., wie auch in Form und Beh. der Infloreszenz gut ab, ob die B. etwa zuletzt ganz kahlen, weiß ich noch nicht.

Fig. 298. *a—c* *Sorbaria verbifolia* (*a* ♂) Zw.; *b* B.-N.; *c* Q. Schn. des Zw. — *d—h* *S. alpina*: *d* ♂ Zw.; *e* B.-N.; *f* dgl. mit den als Höckerchen vorstehenden Spuren *ao*; *g* Kn.-Sch.-Wimperung; *h* Zw.-Q.-Schn. (vgl. Fig. 240t, S. 375). — *i—p* *Sorbaria altaica* (S. *lucida* var. *altaica*) (*i* ♂) Zw.; *k* Stiel der Kn. mit B.-N. (*g*); *l* Kn.-Schn. (*m—n* Kn. mit B.-N. (*l*); *o* Zw. mit abblätternder Außenrinde (*ao*); *p* *h* (Orig. nach C. K. SCHNEIDER).

S. s. A. BR. in ASCHERS., Fl. Brandbg. 177. 1860 (*Spiraea sorb.* L., Sp. pl. 490. 1753; *Sp. palmata* MOENCH, Meth. 663. 1794; *Bastema sorb.* RAT., New Fl. III. 75. 1836). — Ebereschen Fiederspire. — Heimat siehe oben, bei uns und in M.-N.-Am. zuweilen verwildernd. — Blz VI—VII o. länger. — Frz. IX—X. — Seit langem eingebürgert in unseren Kulturen. Ihr Formenkreis bedarf noch des Studiums. Vgl. auch Anmerkung S. 488.

— Frkn. durchaus (dgl. Fr.) dicht beh., B. unters. bleibend büschelhaarig o. auch ganz kahlend, dann aber jedenfalls Bl.-Stiele (und Bl.-Achsen im unteren Teil) bleibend dicht beh.

1. *S. stellipila*: im allgemeinen wohl *verbifolia* ganz ähnlich, B. 11—19-zählig. Behen vgl. Fig. 299e, o. auch etwas schmäler und spitzer, sonst vgl. var.; Blst. etwa 18:7 cm, also ziemlich schmal und dicht, reichlich filzig und mit deutlichen Büschelhaaren. Bl. wie bei *verbifolia* ca. 9 mm Dm., vgl. Fig. 297r—r', Fr. nur

nur von var. *incerta* bekannt, dort ca 5 mm lang, parallel, Gr. wie bei *sorbifolia*, aber alles dicht beh.

var. a. *typica*: (*Sp. assurgens* HORT. NONN.) B., wenigstens zur Blz., unters. durchaus locker bis dicht büschelfilzig, weiß- o. bräunlichgrau, Fiedern $\rightarrow$ gedrängt: Japan: ohne Ortsangabe im Herb. Hofm. Wien, nach MAXIM. Yezo: um Hakodate. Ein sehr schönes Expl. verdanke ich Herrn ZABEL. Ob die sibirischen Expl., welche MAXIM. zitiert nicht doch zu *sorbifolia* gehören, weiß ich nicht, da er über die Beh. der Frkn. nichts sagt. — b. *incerta*. B. zur Blz. schon unters. kahl o. fast ganz kahl, sonst wie a. Die Beh. der Fr. scheint mir doch, im Verein mit der von *sorbifolia* auch abweichenden Beh. der Blst., zu charakteristisch, als daß ich diese Form zu letzter ziehen möchte, sonst müßte ja auch *stellipila* nur als Varietät der *sorbifolia* betrachtet werden. Zu *incerta* stelle ich Expl. aus Japan: Sobetsu, lg. FAURIE, No. 1075 (Bl. 6. IX. 1887) und Yezo: Biro, lg. FAURIE, No. 4843 (reife Fr. 15. IX. 1889).

S. s. (*S. sorbifolia* var. *stellipila* MAXIM., in Act. Hort. Petrop. VI. 223. 1879). — Büschelhaar-Fiederspierre. — Heimat: oben. — Erst seit neuester Zeit in Kultur. Die *assurgens* Arb. VILMORIN aus China dürfte eher zu *sorbifolia* var. *dubia* gehören.

— Fr. hängend*), Blst. — breit lockerästig, B. mit fein vorgezogener, oft sicheliger Spitze, Stb. kaum länger als C. — B. auch jung unters. spärlich beh., Haare fast durchweg einfach, z. T. etwas langzottig, Blst.-Achsen stets dicht fein beh., aber Büschelhaare kaum auffällig, zur Frz. hfg. stark kahlend.

5. *S. lindleyana*: sehr üppige, *sorbifolia* an Höhe oft beträchtlich übertreffende Art. in den Holzmerkmalen dieser ähnlich, nur kahler, Zw. gebräunter; B. (11—)15 -21-zählig, bis 30:14 cm, B. chen vgl. Fig. 299a, unten wenig heller als oben, lebhaft hellgrün; Blst. bis 35:25 cm, Verästelung fein, schlaff und etwas übergebogen, aber doch nicht so fein wie bei *arborescens*, die Blst. heben sich meist freier hervor über die B., als bei *sorbifolia*, Bl. 5-6 mm Dm., Frkn. kahl, Fr. ca. 4 mm lang, vgl. Fig. 297i—k.

S. l. MAXIM., in Act. Hort. Petrop. VI. 224. 1879 (*Spiraea lindl.* WALL., Cat. No. 703. 1829; *Schizonotus tomentosus* LIDL., Bot. Reg. 1840. Misc. p. 71). — NW.-Himalaya: Simla, Mussoree, Kumaon. — Bis über 2000 m — In Kultur bereits viel verbreitet, blüht nach *sorbifolia* (VII—VIII).

— B. jung unters. $\pm$ reichlich flockig büschelhaarig, Blst.-Achsen meist schon zur Blz. $\pm$ stark kahlend, z. T. mit deutlichen Büschelhaaren.

6. *S. arborea*: nach HENRY $\frac{5}{6}$ $\frac{5}{6}$, 3—10 m hoch, Zw. jung olivgrau, leicht flockig-büschelhaarig o. kahl, Kn. ?, B. der Blzw. ca. 15 -17-zählig, 15 28:12 -16 cm; B. chen $\pm$ entfernt, Grund etwas mehr keilig als bei *lindleyana*, Umriß häufig mehr *sorbifolia* ähnlich, ebenso Serratur, doch Spitze meist deutlich lang und fein vorgezogen, im Mittel ca. 5:1,3 -8:2 o. 8,5:3 cm, Neb. länglich-lanzettlich, bald abfällig, — beh. o. kahl; Blst. sehr an *lindleyana* gemahnend, vielleicht z. T. noch größer, jedenfalls zierlicher, dünnästiger (bes. zur Zeit der Bl.-Kn. sehr zierlich), die sehr dünnen Bl.-Stiele, gleich den Bl.-Achsen und K. meist schon zur Blz. kahl, sonst Bl. wie bei *lindleyana*, Fr.?

S. a. C. K. SCHN. Hierher die Exemplare aus China: Hupei, lg. HENRY, No. 1813, 6458 und 4705. Die letzte No. ist noch ganz im Kn.-Zustande, die Blst. sind etwas mehr beh. und die B. breiter als bei No. 6458 und der noch schmalere blättrigen No. 1813. Auf jeden Fall hat HEMSLEY ganz unrecht, wenn er (vgl. Anmerkung S. 488) die HENRYschen Expl. (er zitiert keine No.) zu *sorbifolia* zieht. Hoffentlich wird diese neue Art bald eingeführt.

*) Von *S. arborea* kenne ich die Frucht noch nicht, sie steht aber in allem der *lindleyana* am nächsten und die sehr dann verzweigten Blst. lassen vermuten, daß die Fr. auch hängen werden.

++ B. chen nur einfach oder undeutlich doppelt gesägt, sehr schmal (Fig. 299f). Pflze. so gut wie ganz kahl. Fr. aufrecht.

7. *S. angustifolia*: b von der Tracht der *lindleyana*, nach HEMSLEY bis 2,4 m hoch, Zw. glatt, $\pm$ blaurot, Kn. ?, B. etwa 13—17-zählig, bis 22:14 cm; B. chen hfg. schmaler als auf Abbildung, beiders. lebhaft grün, glatt; Blst. schlank pyramidalrispig, im unteren Teile meist beblättert, insgesamt bis 30:15 cm, kahl; Bl. 8—10 mm Dm., vgl. Fig. 297 1—1', Fr. der *sorbifolia* ganz ähnlich.

S. a. ZABEL im H. d. D. D. G. 163. 1903 (*Spir. sorbifolia* var. *angustifolia* WENZIG, in Flora, Bd. 71. 1888. 283; *Sorb.* [et *Spiraea*] *aitchisoni* HEMSLEY, in Gard. Chron. 1900. II. 254. Fig. 75). — Afghanistan: Kuram-valley, lg. AITCHISON, No. 386, 2—3000 m. — Blz. VII. — In Kultur noch seltene, aber sehr schöne Art, die wohl besser zwischen *sorbifolia* und *lindleyana* eingeschaltet würde.

Fig. 299. a—f *Sorbaria*: Formen der Fiederblättchen von: a *lindleyana* — b—c *sorbifolia* — d *kiri-lowi* — e *stellipila* — f *angustifolia* — g *Chamaebatiaria millefolium* (Alles $\frac{1}{1}$) (Original).

Gattung 126. *Chamaebatiaria* MAXIM., in Act. Hort. Petrop. VI. 225. 1879.

(*Spiraea* sect. *Chamaebatiaria* PORTER, in BREW. et WATS. Bot. Calif. I. 170. 1876.)

Vgl. oben S. 441 und 486, sowie Art. Nur diese bekannt.

Ch. millefolium: aufrechter, breit verzweigter, 0,9—2,4 m hoher b., Zw. gelb. o. rotbraun, dicht drüsig-klebrig und büschelhaarig, erst die glattrundigen,

grauen Ästchen kahl. Kn klein, büschelhaarig. B.-N. scharf, 3-spurig, halbmond-förmig, auf deutl. Kissen. Neb.-N. ebenfalls scharf daneben, punktförmig; B. vgl. Fig. 299g, bis 8-2,5 cm, graugrün, bes. unters. dicht beh., zuletzt kahlend, Neb. schmallanzettlich ganzrandig; Bl. in an Seitentrieben endständigen zymös verästelten Scheintrauben, 5-20 cm lang, bis ca. 10 cm Dm., alles dicht drüsig und sternzottig. Bl. weiß, ca. 12 mm Dm., 5-zählig, C. kaum länger als K., Stb. ∞. Gyn. 5, vgl. Fig. 297s-s¹, Fr. ledrig, spät 2-klappig, den K. kaum überragend, S. wenige, mit deutl. End.

Ch. m. MAXIM., l. c. (*Spiraea mill.* TORR., in Pac. R. Rep. IV. 83. t. 5. 1857; *Sorbaria mill.* FOCKE, in Nat.-Pfl. III. 3-16, 1888; *Basilima mill.* GREENE, Fl. Francisc. 57, 1891.). — N.-Calif., Wyoming, Arizona, Utah. — Trockene Fels-hänge. — Bis 5000 m. — Blz. VIII. — In Kultur noch selten.

Im Anschluß hieran sei noch die seltene Gattung *Spiraeanthus*, MAXIM., l. c. (*Spiraea* Subgenus *Spiraeanthus* FISCH. et MEY., Ind. sem. hort. Petrop. IX. 96, 1877) ein Wüsten-*h* aus der Dsungarei, erwähnt. Nach mir vorliegenden Originalen ist die einzige Art, *S. schrenkianus* MAXIM., l. c. (*Spiraea schrenk.* C. A. MEY., l. c.) charakterisiert durch: sparriger dickästiger, 0,6-0,9 m hoher *h*, Zw. kahl, gelb-grau, rissig; Kn. anscheinend klein, stumpfzög.; B. 2-7, 0,2-0,5 cm, einfach gefiedert, Fiederehen ca. 25-50-paarig, eiförmig, 1-2; 0,5-1,5 mm, dicklich, gleich der leicht verbreiterten Spindel graugrün, sehr fein beh., wohl leicht drüsig, abfällig, so daß die starren Spindeln als Scheinzw. bleiben; Blst. 9-15 cm, in schlanken, lockerblütigen, unten häufig beblätterten Rispentrauben ihre wirkliche Tracht an dem vorliegenden von *Cuscuta* arg umspinnenen Material nicht recht zu erkennen, gleich den winzigen Trgb. und Vorb., den Bl.-Achsen und den K. tem beh. und = drüsen-schuppig, Bl. klein, fast sitzend, nach MAXIMOWICZ (ich sah nur Fr.): Bl.-Achse glockig, innen beh., K. 5-4, stumpf dreieckig bis fast rundlich, kürzer, C. 5-4, dicklich, breit erundlich, doppelt länger als K., Stb. 20-25, kaum länger als C., Gyn. (2-5), beh., Gr. endständig, kurz, kahl, mit kopfiger N., abfällig; Sa. je 2, aufsteigend, anatrop; Fr. 4-3 länger als K., hart, an der Bauch-naht am Grunde verwachsen, S. 1-2 (nach dem Aufkochen von einem zähen Schleim umhüllt), Testa dünn, End. vorh.

E siehe S. 494.

Unterfamilie D. *Quillajaceae* (BAILL.) MAXIM., l. c. — B. einfach, meist immergrün, Frb. den Sepalen opponiert, S. geflügelt, End. fehl. o. gering.

Gattung 127. *Lindleya* KUNTH, in H. B. Nov. gen. pl. VI. 239. t. 562 bis 1823.

Vgl. oben, ferner S. 441 und Art: nur diese bekannt (vielleicht Kollektivspecies).

L. mespilioides: reich und dicht verästelter, immergrüner *h* *h*, Zw. kahl, braunlich, mit ∞ Lent., später schwarzgrau; B. vgl. Fig. 302q, polymorph, meist kleiner als auf Abb., beiders. glänzend grün, kahl, drüsenzählig, auch sonst etwas drüsig, Neb. winzig, abfällig; Bl. einzeln, an Kztr. endständig, etwa 3 cm Dm., weiß (b) mit dunklerem Schlundmal, 5-zählig, C. doppelt länger als K., Stb. 15-20, Gyn. 5, verwachsen, zur Frz. holzig, sonst alles aus Fig. 302q-w, S. 496 ersichtlich.

L. m. K., l. c. — Scheinmispel. Mexico: Gebirge. Blz. in Heimat IV-V, gleichzeitig mit reifen Fr. — Bei uns kaum mehr in Freilandkultur.

Gattung 128. *Vauquelinia* CORR., in HUMB. et BONPL. Pl. équinoct. I. 140. t. 40. 1808.

Vgl. oben, ferner S. 441 und Art. Alle Species erwähnt.

V. corymbosa: baumartiger, immergrüner, kahler *h*, Zw. jung sehr tem weiß-wollig beh., olivbraun, später kahl, dunkler, zuletzt grau; B. vgl. Fig. 302l, oder glänzend hellgrün; Blst. in lockeren unterwärts beblätterten Doldenrispen ca. 4-7 cm Dm., Achsen anfangs, gleich Bl.-Stielen, Bl.-Achsen und K. leicht beh.

und bedrückt, Bl. , ca. 9 mm Dm., gelblich, 5-zählig, in Kn. weiß wollig-zottig, Haare sich allmählich verlierend, bes. am K.-Rand länger bleibend, Stb. 15—20, Gyn. 5, beh., Frb. dicht zusammenschließend, aber nicht eigentlich wie bei *Lanthura* verwachsen, Fr. verholzend, den K. weit überragend, S. in Flügel verschmälert, End.?, sonst alles wie in Fig. 302 1—p, S. 496.

V. c. CORR., l. c. — Mexico: Gebirge von Chihuahua. — Blz. V. — Schwierig in Kultur. — Von der ihr nach den Beschreibungen ähnlichen *V. torreyi* S. WATS., in Proc. Am. Ac. XL 141, 1870, aus Arizona, die vor allem durch unters. weißfülige B. abweichen soll, sah ich ebensowenig Material wie von *V. karwinskyi* MAXIM., in Act. Hort. VI. 239, 1870, aus Mexico (Santayaguillo) die oblonge, etwa 9:3 cm messende kahle B. und kahle dichte Blst. besitzen soll. — Nach FOCKE umfaßt die Gattung 4 Arten, mir ist jedoch eine 4. noch nicht bekannt geworden.

Gattung 129. *Exochorda* LDL., in Gard. Chron. 1858. 925.

Vgl. oben S. 441 und S. 492: b, B. sommergrün, Neb. fehl. (ob ganz?). Blst. traubig., Bl. ansehnlich, polygam-dioecisch, 5-zählig, K. zur Frz. abfällig, Stb. 15 o. 25, Gyn. 5 (in 3 Bl. reduziert), Frb. unten verwachsen, oben frei, Fr. eine 5-seitige, 5-furchige Kapsel, die in 5 1—2-samige Teile zerfällt. — Alle Arten erwähnt.

- Stb. 25, zu je 5 vor jedem C., Bl. etwa 3 cm Dm., ± sitzend, B. der Lgtr. am B.-Grund meist mit angedeuteten Fiederlappen o. am B.-Stiel mit Pseudostipellen.

Fig. 300. *Exochorda alberti*: a ♂ Zw.; b ♂ Zw. mit Krzt.; c Kn.; d B.-N.; e—f Kn. und Wimperung deren Sch.; g Zw.-Q.-Schn. (vgl. Fig. 240f., S. 375) (Original nach C. K. SCHNEIDER).

1. *E. alberti*: üppiger reich und schlankästiger, wohl bis 4 m hoher b, Zw. kahl, purpurbraun, mit in der Farbe kaum abstechenden Rindenhöckerchen besät, Kn. dunkelbraun, vgl. Fig. 300. B. oblong, 4:1,3—9:3 cm, nach Basis allmählich in Stiel verschmälert, an Spitze fast rundlich o. kurzspitzig, an Lgtr. gegen die Spitze zuweilen mit deutl. Zähnung; oberseits lebhaft, unters. hellgelb bis hellgraugrün, kahl, Stiel bis 2 cm, von sehr wechselnder Länge; Blst. ca. 5—8-blütig, bis 8 cm lang, unansehnlicher und spärlicher als bei *grandiflora*, C. schmaler, Fr. aber größer (bis 17 mm lang).

E. a. RGL., in Act. Hort. Petrop. VIII. 696. t. VIII. 1884 (*E. grandiflora* var. *alberti* ASCHERS. et GR., Syn. VI. 30. 16. — O-Bucharei: Baldschuan 13. 2000 m. — Blz. V. — Frz. VIII. — Von voriger Art scheinb. unterschieden, auch KOEHNE hält sie jetzt für eine gute Art.

1—2 *E. alberti* × *grandiflora* = *E. macrantha* LEMOINE, Cat. 1882. 10. Mir noch nicht genau bekannt. LEMOINE sagt: nous avons obtenu cet hybride en fécondant l'*E. alberti* par le pollen de l'*E. grandiflora*. Les grappes des fleurs, qui terminent toutes les pousses, sont dressées ou horizontales, comptent chacune de 8 à 10 fleurs larges, bien ouvertes et bien étalées, d'un blanc de neige. L'arbuste

nouveau possède la végétation vigoureuse de l' *E. grandiflora*. Comme sujet isolé, l'effet en est magnifique.

○○ Stb. 15, zu je 3 vor jedem C. Bl. etwa 5 cm Dm., $\frac{1}{2}$ gestielt, B. der Lgtr. ohne Andeutung von Lappung o. Pseudostipularbildungen.

2. *E. grandiflora*: weicht von voriger noch ab durch: Wuchs niedriger, sparriger. B. an Lgtr. hfg. wie Fig. 301a, Blst. dicht und reichblütiger (b), Bl. wie c—d, Fr. kleiner, wie f—g.

S. g. LDLE., l. c. (*Amelanchier racemosa* LDLE.) in Bot. Reg. 1847, im Text zu t. 38; *Spiraea grandiflora* HOOK., Bot. Mag. t. 4795. 1854.) Großblütige Blumenspiere China: Kiangsu, Chekiang, N.-Schensi. — Blz. V. — Frz. VIII. — Altbekannter Zier-b, doch empfindlicher als *alberti*.

Fig. 301. *Exochorda grandiflora*. a B.; b Blst.; c Bl. im Längsschnitt; d Frkn. im Längsschnitt; e Gyn. im Querschnitt; f Frst.; g Fr. im Querschnitt (nach LAVALLEE).

Ferner noch zu erwähnen *E. serratifolia* S. MOORE in HOOK., Ic. pl. XIII. 44. t. 1255. 1877, aus China: Shingking, ausgezeichnet durch unters. beh. B., die vom unterem Drittel ab deutlich gezähnt sind und nach MOORE bis 7 : 3 cm messen; Blst. lockerer und gestreckter als bei *grandiflora*, aber Bl. nur ca. 4 cm Dm., C. schmaler; im Text steht über die Stb. nichts, der Tafel nach aber sind es wie bei *alberti* 25 in 5 Gruppen. Mir sonst unbekannt, auch MAXIMOWICZ sah sie nicht

Unterfamilie *E. Holodisceae* FOCKE. in Nat. Pfl. III. 3. 18. 1888. B. sommergrün ob immer ?). — gelappt o. ganzrandig, Neb. fehl., Fr. einsamig, nicht aufspringend, S. mit dünnem End.

*) Konsequenterweise mußte wohl eigentlich jetzt *E. racemosa* gesagt werden. Ich weiche aber vorläufig dieser Umtaufung aus, mit dem Hinweise, daß LDLE.'s 1847er Angaben zur Identifikation des dort Gemeinten ungenugend scheinen.

Gattung 130. *Holodiscus*) MAXIM., in Act. Hort. Petrop. VI. 253. 1879.

(*Schizonotus* RAF., New Fl. III. 75. 1836, non LDL., *Spiraea* sect. *Holodiscus* K. KOCH, Dendr. I. 309. 1869.)

Vgl. oben und S. 441; b. Blst. — lockerrispig. Bl. klein, weißlich, 5-zählig, C. wenig länger als K., Stb. etwa 20, Gyn. 5, — dicht zottig, dgl. Fr., vgl. Fig. 302d—e, h. — Arten sämtlich erwähnt.

C B. mit — langkeiliger Basis und meist gut 2mal so lang als breit (Fig. 302i—k), Obers. entweder gleich Unters. dicht seidig beh. o. Obers. ± ganz kahl.

✱ B. beiders. dicht schimmernd angedrückt seidig beh. (Fig. 302i).

1. *H. argenteus*: b. Höhe ?, Verzweigung wohl schlank, aber Zw. reichlich mit dichtbeblätterten Kztr. besetzt, kantig, dicht seidenzottig-filzig, auch — scharfkantig, noch — beh., grau; B. 12:5—25:12 mm, Zähne gegen Spitze etwa 3—5 jederseits, kurz, zuweilen auch denen von *fissus* ähnlicher, Stiel bis 8 mm; Blst. schlankrispig, an kurzen Seitentrieben im Mittel etwa 10:5 cm, im unteren Teile beblättert, zuweilen sich am Ende von Zw. zu einem beträchtlichen Gesamtblst. häufend, Achsen, Bl.-Stiele, Trgb., Vorb. und Bl.-Achsen gleichmäßig dicht seidenzottig, K. beiders. meist etwas schwächer beh., Bl. ca. 6 mm Dm., C. ca. 2 mm, etwa 1, mal länger als K., Stb. diesen — gleich lang, Frkn. durchaus lang weißzottig, Fr. ?.

H. a. MAXIM., in Act. Hort. Petrop. VI. 254. 1879 (*Spiraea argentea* MUTIS, in L. f. Suppl. 261. 1781). — Ich sah folgende Exsic.: Bogota (lg. KARSTEN, lg. TRIANA, No. 4215; lg. HOLTON, No. 939), sowie GOUDET, No. 1, Ort unleserlich. — Bl. nach GOUDET im Dezember. — Nicht in Kultur.

✱✱ B. obers. fast o. ganz kahl, unters. locker bis dicht filzigzottig beh. (Fig. 302k) (vgl. eventuell auch 4. *H. australis*).

2. *H. fissus*: anscheinend lockerer verästelt als *argenteus*, Höhe ?, Beh. der Zw. schwächer, B. viel lockerer gestellt, bis 3,5:1,7 o. bis 5:2 cm, Zahnung deutlicher, zuweilen kurzklappig und dann Zahnsplätzchen deutlich abgesetzt und — wagrecht abgebogen, Stiel im Verhältnis kürzer; Blst. ganz ähnlich, Beh. eher dünner, zottiger, Bl. vgl. Fig. 302h, die K. sind etwas spitzlicher, die C. länglicher als bei *argenteus*, Fr. ohne den kurzen Gr.-Rest etwa 2 mm lang, bes. an den Kanten langzottig, auf Fläche Beh. z. T. drüsig.

H. f. (*Spiraea fissa* LDL., in Bot. Reg. 1840. Misc. S. 73. No. 170; *Sp. mexicana* SCHIEDE, apud RGL. Ind. Sem. Hort. Petrop. 1857. 58). — Ich sah folgende Exsic.: Costa-Rica (San José, lg. SCHERZER; Vule, Irazu, 3300 m, lg. PIERRE, No. 14101; ohne Ort lg. ENDRES), Costa-Rica o. Panama (Veragua) lg. WARSCEWICZ, No. 2; Guatemala (ad fl. de los Molinos, lg. HARTWEG, No. 575 (dgl. in Mexico);

*) So klein die Gattung ist, so verworren ist ihre Systematik. O. KUNTZE hat, Rev. Gen. I. 225. 1891, den Versuch gemacht, die Formen zu sondern. Indem er jedoch davon ausging, daß die Gattung monotyp sei und alle Formen durch Zwischenglieder verbunden seien, gelangte er zu einer künstlich aufgebauten Übersicht, die in der Vielheit ihre 10 Formen aus das Gegenteil eines klaren Einblickes in die genetischen Zusammenhänge gibt. Seine Angaben sind so knapp gehalten und nahere Belege werden nicht zitiert, so daß ich hier auch nicht weiter damit beschäftigen will und kann. Meines Erachtens haben wir zum mindesten 2 Haupttypen, deren erster von Columbien bis Mexiko reicht und die Arten *H. fissus* und *H. argenteus* umfaßt, deren 2. nordamerikanisch ist und nur spärliche Ausläufer bis Mexico sendet, zu ihm gehören *H. discolor*, *H. australis* und *H. dumosus*. Diese nördlichen Arten sind insofern schwierig klarzustellen, als die Begriffe *discolor* und *dumosus* in verschiedenster Weise gedeutet werden. HELLER, RYDBERG und andere amerikanische Autoren sind sich über das, was z. B. unter *dumosus* in Wirklichkeit von NUTTALL gemeint wurde, unklar. Von HELLERS *salicifolia* sah ich ein von ihm zitiertes Expl., meines Erachtens ist RYDBERGS *microphyllus*, wovon ich JONES No. 1142 sah, ganz dasselbe, und ich kann vorläufig *dumosus* nur als den ältesten Namen für beide ansehen. Ich zitiere alle Expl., die ich meinen 4 Arten zu Grunde lege und bitte amerikanische Autoren, denen die Originale von PURSH, NUTTALL etc. vorliegen, in bestimmter Weise diese zu beschreiben und meine Auffassung eventuell zu rektifizieren.

Cartago, lg. FRIEDRICHSTHAL, No. 1393 et 221; Vol. de Fuego, lg. O. SALVIN; Mexico Orizaba (lg. WAWRA, No. 931; lg. GALEOTTI, No. 3081; lg. LINDEN, No. 663); Chiapas (lg. GHIESBRECHT, No. 502); Ciudad. real (lg. LINDEN, No. 703) — Blz. in Heimat: Winter. — In Kultur wohl nur in englischen Gärten. — Vielleicht könnte man nach der Beh. der B.-Unters. 2 Varietäten aufstellen, ich sehe aber vorläufig davon ab. Die Bl.- und Fr.-Merkmale aller *Holodiscus* sind sich so außerordentlich ähnlich und im einzelnen so wenig scharf, daß man eigentlich nur auf die B. und die Blst.-Tracht angewiesen ist.

Fig. 302. a—c *Holodiscus discolor*: B. — d—g *H. dumosus*: d Bl. im L.-Schn., daneben C. und K. gesondert; d' Frkn. ganz und im L.-Schn.; e Frst. und Fr.; f—g B. — h—i *H. argenteus*: h Bl. im L.-Schn. und Frkn.; B. — k *H. testis*: B. — l—p *Vauquelinia corymbosa*: l B.; m Bl. im L.-Schn. daneben K. und Frkn. gesondert; n Frst., o Fr.; p S. — q—w *Lindleya mespilifolia*: q B.; r Bl.-L.-Schn.; s Stb.; t C.; u Frst.; v Fr.; w S. (Original).

- B. mit breit abgestutzter Basis, o. wenn diese keilig, so doch B. kaum 2mal so lang wie breit (vgl. die Formen Fig. 302a—c, g—f). Beh. meist auch oberseits verstreut o. beide Seiten kahl.
 + Blst. aufrecht, an kurzen Seitentrieben, nur etwa 3—12 cm lang. Bl.-Stiele 1—3 mm. B. meist unter 3 cm lang, im Mittel 3—4(—5) Nervenpaare, vgl. Fig. 302f—g, b kaum über 1,5 m hoch.

3. *H. dumosus*: junge Zw. gelb- o. rotbraun, kantig, locker beh., später Rinde aufreißend, darunter Zw. purpurn, Äste grau, Kn. so lang o. kürzer als B.-Stiel, dicht beh.; B. vorwiegend aus breitgestutztem Grunde eirundlich o. eirhombisch, im Mittel ca. 2:1,7 cm, ober. lebhaft grün, verstr. beh., unters. grau (z. B. BAKER, No. 1431) o. silbrig weißfilzig, auf den Nerven seidenzottig, im Filz drüsig, zuweilen ziemlich stark kahlend *) (CUSICK, No. 2716); Stiele 2–5 mm; Blst. durchaus reichlich zottig beh., nur Bl.-Achsen und K. zuweilen etwas schwächer beh., bes. K. innen meist fast kahl, Bl. 5–6 mm Dm., vgl. Fig. 302d–e.

H. d. HELLER, Cat. N.-Am. Pl. 4. 1898 (*Spiraea dumosa* Nutt., apud Torr. et Gr. 1840, nomen solum, et apud Torr., in Stansb. Exp. Saltlake 287, t. 4. 1852, *Sp. discolor* var. *dumosa* S. Wats., Bot. Calif. I 170. 1876; *Schrenkianthus argenteus* var. *dumosus* O. Ktze., Rev. Gen. pl. I. 225. 1891; *Schizon dumosus* KOEHNE, Dendr. 565. 1893, *Helod. discolor* var. *dumosus* DIPP., Laubh. III. 508. 1893; *Hel. axon* HELLER, in Muhlenbergia I. 41. Januar 1904; *Hel. microphyllus* RYDBG., in Bull. Torr. Club 1904. 559). Ich ziehe hierher folgende Exsicc.: Californien: Yosemite-Valley (lg. WAWRA, No. 60, ohne Ort, BRIDGES, No. 73) Mt. Sanhedrin (lg. HELLER, No. 5911), Calaveras County (lg. G. HANSEN, No. 234), Soda Springs (lg. JONES, No. 2506); Oregon: eastern O. (lg. HOWELL, June 1886), Wagon tore Mts. (lg. CUSICK, No. 2716); Nevada: Ormsby County (lg. BAKER, No. 1431), Utah: Wahsatch Mts. (lg. JONES, No. 1142); Colorado: Rocky Mts. 39–41° n. Br. (lg. HALL et HARBOUR, No. 149), mountains near Georgetown (lg. PRINGLE, Clear Creek and „Middle Park“ (PARRY, No. 206), ohne Ort (lg. CANBY und Arizona: Santa Rita Mts. (lg. PRINGLE, 1881), New Mexico: Copper mines (lg. WRIGHT, No. 1055). Blz. VII. Diese Gebirgsart zeigt allerdings in den B. eine nicht unbeträchtliche Variabilität, auffällig ist vor allem die Arizona-Form PRINGLES, deren B. ziemlich lang keilig und tieflappenzählig sind. Vorläufig erscheint es mir aber untunlich Varietäten zu umgrenzen (vgl. Anmerkung S. 495). Ich möchte aber amerikanische Autoren anregen, die Formen mal auf Grund des reichsten Materials scharf zu vergleichen. Das Herausgreifen und als Species Beschreiben einzelner lokaler Typen bringt nur Verwirrung.

– Blst. zierlich überhängend o. nickend, an kürzeren o. langen Seitentrieben, meist viel größer, ♂ über 2 m hoch.

+ Blst. hfg. nicht größer als bei *H. dumosus*, doch Bl. ± länger (2–4 mm) gestielt, B. ± größer (3–5:1,7–2,7 cm), im Mittel etwa (5–)6 Nervenpaare.

4. *H. australis*: 2–3 m hoher, buschiger b. Zw. aufrecht ausgebreitet, jüngere rotbraun, beh., Äste grauschuppig; B. mattgrün, elliptisch oder eielliptisch bis länglich, Basis scharf und spitzkeilig, ober. kahlend, unters. dicht graufilzig und an Nerven z. T. etwas seidig beh., Lappenzähne ziemlich scharf und deutlich, Stiele 0,5–1,5 cm; Blst. im Mittel etwa 10:8 cm, von Tracht der *discolor*, Bl. kremweiß, 4–5 mm Dm., K. eilanzettlich, C. eifg., kaum länger als K., Stb. so lang wie C., Frkn. weißzottig.

S. a. HELLER, in Bull. Torr. Cl. 1898. 194. t. 338. — Ich sah das eine von HELLER zitierte Original, New Mexico (Santa Fe Canon, lg. A. et E. HELLER, No. 3840), er zitiert außerdem Mogollon Mts. (RUSBY, No. 121), ich sah ferner White Mts. (lg. O. WOODSON, No. 284), das schon mehr an *discolor* gemahnt, aber schmalere, scharfer keilige B. und kleinere Blst. hat; außerdem ziehe ich hierher

*) Das Expl. von CUSICK ist zu klein, um ein Bild dieser Form zu geben. Es scheint mir, daß sie dem *H. glabrescens* HELL., in Muhlenbergia I. 401. 1904 (= *Sp.* *discolor* var. *glabrescens* GREENMAN, in Erythra VII. 190. 1899) entspricht, doch gibt GREENMAN nur andere No. von CUSICK (No. 1253, 1908) aus Oregon; ferner Expl. aus Calif., Utah und Nevada an, die mir nicht vorliegen. Es dürfte sich hier wohl nur um eine Varietät des *dumosus* handeln.

aus Mexico (Chihuahua lg. TOWNSEND and BAKER, No. 144) und mit 2 ein Expl. lg. E. BOURGEOIS. Barranca au dessus de Tacubaya (?) dans les collines, vallée de Mexico, No. 267. Art der Gebirge, bis fast 3000 m. Diese gewiß noch sehr der Beobachtung bedürftige Art zeigt Anklänge an *S. tessus*, *S. dumosus* und *S. discolor* und ich bin vorläufig über ihre Abgrenzung noch nicht klar. Sie macht aber doch alles in allem den Eindruck einer selbständigen Form, nur sind eben bei *Holodiscus* die sicheren Unterschiede erst bei sehr eingehendem Studium reichsten Materials klarzustellen.

Fig. 303. a—l *Pyrus communis*: a—b Zw.; c—d Kn.; e B.N. im Schnitt; f Kn. Sch.; g Ktzt.; h dgl. mit Dornspitze; Zw.-Q. Schn. (vgl. Fig. 240t, S. 375). k—r *Holodiscus (Spiraea) discolor*: k—m Zw.; l—m Kn. nach Abfall einer Sch.; n B.N. im Schnitt; o Beh. der Kn.-Sch.; p Kn. mit den 2 Sch. a und der B.N. (β, γ); q—r Zw.-Q.-Schn., vgl. i (Orig. nach C. K. SCHNEIDER).

Blst. 12—24 cm lang und hfg. im unteren Teile ebenso breit. B. vgl. Fig. 302a—c. Bl.-Stiele so lang o. kürzer.

5. *H. discolor*: bis über 5 m hoher, breit und überneigend verzweigter eleganter b, Zw. schlanker, kräftiger und kahler als bei *dumosus*. Kn. vgl. Fig. 303k—r; B. ober- tief stumpfgrün, spärlich beh., unters. grau- o. weißlich-filzig, bis 9:7 cm, Stiel 5—18 mm; Rispen in

Beh. wie *dumosus*. Bl. gelblichweiß, sonst ebenfalls diesem analog, auch in Fr. sichere Unterschiede mir nicht bekannt.

Man kann mit KOEHNE bez. ASCHERS. et GRAEB. zwei Formen (höher mag ich sie nicht bewerten) festhalten: *f. eudiscolor* A. et G., Syn. VI. 31. 1900. B. unters. weißfilzig und die häufigere, in Kultur vielleicht allein vorhandene *f. ariaefolius* A. et G., l. c., B. unters. $\pm$ grau beh.

H. d. A. et GR., l. c. [et WATSON, MAXIM. ex parte, non GREENE vel HOWELL] (*Spiraea discolor* PURSH, Fl. Am. Sept. I. 342. 1814; *Sp. ariaefolia* SM., in REES Cycl. XXXIII. 16. 1819; *Schizonotus disc.* RAF., New Fl. III. 75. 1836; *Sp. disc. var. ariaefolia* WATS., Bot. Calif. I. 170. 1876; *Hol. ariaefolius* GREENE, Fl. Francisc. 58. 1891). Ich sah folgende spontane Expl.: Brit.-Columb.: Vancouver (lg. WOOD, 1859), Washington: Chehalis County (lg. LAMB, No. 1273; A. et E. HELLER, No. 4025), Idaho: Nez Perces County (lg. A. et E. HELLER*), No. 3425; Lake Coeur d'Alene (lg. SANDBERG, Mc DOUGAL et HELLER, No. 583); Oregon: Cascade Mts. (lg. LYALL, 1859), Clear Water (lg. SPALDING), ohne Ort (lg. GEYER, No. 567; HALL, No. 728; HOWELL, 1887); Californien: San Mateo county (lg. BAKER, No. 1552), San Francisco (lg. BEHRTS (?), 1852), Bolinas (A. B. GLEB (?), No. 6467), Santa Cruz (lg. GRUNOW, 1884); Marin County (lg. HELLER, No. 5729); Monterey (lg. HARTWEG (?), No. 1719), ohne Ort (lg. BOLANDER; KELLOGG and HARTFORD, No. 201) und Land? Rocky Mts. (HOOKER, No. 567) und PALMER, No. 118. Fraglich in ihrer Zugehörigkeit ist mir eine Form lg. DOUGLAS, 1833, Nova Calif. - Blz (VI, VII). Seit langem in Kultur. Die spontanen Formen bedürfen ebenfalls noch sehr der Untersuchung.

Familie 33. *Rosaceae* ^{***}), Rosengewächse.

H. JUSS., Hort. Trian. 1759, ex parte.

(*Rosaceae*, Unterfam. *Rosoideae* FOCKE, in Nat.-Pfl. III. 3. 13. 1888.)

Vgl. Reihe S. 359, meist $\text{b} = \text{b}(\text{ } \text{b})$, B. $\odot$, selten gegst., sommer- o. immergrün, einfach, 3-zählig, gefiedert o. gefingert, Neb. vorh.; Blst. sehr verschieden, Bl. ^1 o. ^2 (monoec. o. dioec.), Größe und Zahl der Bl.-Teile sehr wechselnd, dgl. Form der Bl.-Achse, K. meist 5 o. 4, Frb. meist ∞ , weder mit der Bl.-Achse noch untereinander verwachsen, hfg. auf gewölbtem Gynophor ein Köpfchen bildend, oft aber auch nur wenige und dann gewöhnlich in die hohle Bl.-Achse eingesenkt, Frb. mit 1–2 Sa., Gr. hfg. seiten- o. grundständig, Fr. niemals aufspringend, oft in der vergrößerten Bl.-Achse eingeschlossen.

Gattungstabelle:

A. Verzweigung gegenständig.

I. B. groß, vgl. Fig. 304. **131.** *Rhodotypos*.

II. B. klein, vgl. Fig. 315 p—v. **143.** *Cologync* (siehe S. 533).

B. Verzweigung $\odot$.

I. B. einfach, Zw. nie bestachelt o. drüsenborstig (vgl. eventuell unter *Rubus* o. *Rosa persica*).

a) B. groß, sommergrün, vgl. Fig. 305a und 306a.

1. Bl. groß, gelb, vgl. Fig. 305. **132.** *Kerria* (siehe S. 501).

2. Bl. ziemlich unscheinbar grünlich, vgl. Fig. 306. **133.** *Ne-viusia* (siehe S. 502).

*) Form mit auffällig keiligem B.-Grund, B. ca. 7,5 : 4 cm.

**) B. ebenfalls scharfkeilig, 5 : 3 cm, o. kleiner.

***) Vgl. die Anmerkung S. 440.

b) B. immergrün o. jedenfalls sonst kleiner als unter a).

1. B. sehr klein nadelfg. *), vgl. Fig. 315f—o. **142. Adenostoma** (siehe S. 533).

2. B. größer.

a) B. ungelappt, nur $\pm$ kerbzähnig.

1!) Bl. langgestielt, ansehnlich, weiß, Bl.-Achse flach, vgl. Fig. 314o—w. **136. Dryas** (siehe S. 525).

2!) Bl. fast sitzend, unansehnlich, Bl.-Achse langröhrig, vgl. Fig. 315a—e und 318a—m. **140. Cercocarpus** (siehe S. 529).

β) B. $\pm$ gelappt, sonst mit $\pm$ deutl. Drüsen.

1!) Bl. ansehnlich, wie Fig. 314a o. g, Fr. mit Federschweif.

α !) Bl. mit Außenkelch (g), B. $\pm$ reichlich drüsig. **137. Fallugia** (siehe S. 526).

β !) Bl. ohne Außenkelch (a), B. $\pm$ drüsenlos. **138. Cowania** (siehe S. 527).

2!) Bl. wenig ansehnlich Fig. 317a, Fr. ohne Federschweif. **139. Purshia** (siehe S. 528).

II. B. 3-zählig bis mehrzählig gefingert, einfach o. 3-fach gefiedert (Ausnahmen unter I).

a) B. 3-fach gefiedert, vgl. Fig. 317g—n. **141. Chamaebatia** (siehe S. 532).

b) B. 3-zählig, gefingert o. einfach gefiedert.

1. B. einfach gefiedert, B.chen klein, wie Fig. 318q, t, u.

a) B.chen linealisch o. lanzettlich (q, t). **144. Margyricarpus** (siehe S. 535).

β) B.chen rundlich (u). **145. Poterium** (siehe S. 536).

2. B.chen gefiedert o. gefingert o. 3-zählig, B.chen meist viel größer.

a) Zw. stets ohne Stacheln o. Drüsenborsten, B. gefingert (wie Fig. 313a—c, n, o) o. jedenfalls Bl. mit Außenkelch. **135. Potentilla** (siehe S. 522).

β) Zw. meist bestachelt o. $\pm$ drüsenborstig, B. meist gefiedert, Bl. jedenfalls ohne Außenkelch.

1!) Bl.-Achse $\pm$ flach, jedenfalls Frb. auf einem $\pm$ gewölbten o. kegelfg. Gynophor ein Köpfchen bildend, vgl. z. B. Fig. 309c, k. **134. Rubus** (siehe S. 503).

2!) Bl.-Achse krugfg. o. röhrig, die Frb. einschließend, vgl. z. B. Fig. 319a¹, b. **146. Rosa** (siehe S. 536).

B. s. S. 503.

Unterfamilie A. *Kerriac* FOCKE, in Nat.-Pfl. III. 3. 27. 1888.
b. B. sommergrün, © o. gegst., Neb. vorh., Recept. flach o. krugfg., Gyn. 4—6, Stb. ∞ , Fr. nußartig, End. $\pm$ vorh.

*) Vgl. eventuell unter *Cowania* S. 527.

Gattung 131. *Rhodotypos* SIEB. et ZUCC., Fl. jap. 185. t. 99. 1835.

[Scheinkerrie; Kaimastrauch.]

Vgl. oben S. 499 und Art. Nur diese bekannt.

R. tetrapetala (*R. kerrioides*): locker ausgebreitet verästelter, bis 2,5 m hoher b. • Zw. — rundlich, kahl, olivgrün o. bräunlich, Holz fein längsrissig: Kn. grünlich mit braunen Spitzen (Fig. 287g — l. S. 448): B. beiders. lebhaft grün, zuweilen gedreht, bis 14:7,5 cm, oben ganz, unten fast kahlend, Stiel kaum über 1 cm: Bl. einzeln, endständig, weiß, K. und C. 4, Gyn. 2 — 4(—6), vom krugfg. Receptaculum umgeben, Fr. mit spröder, harter, glänzend schwarzer Schale, sonst vgl. Fig. 304.

R. t. MAK., in Tok. Bot. Mag. XVII. 13. 1903 (*Keria tetr.* SIEB.*), in Verh. Bat. Genoot. XII. 69. 1830; *Rhod. kerrioides* S. et Z., l. c. 187. 1835). — Jap. (Prov. Bitchu), sonst nur kultiv., wie in ganz O.-As. — Blz. V, oft VIII zum 2. Male; Frz. X. — Häufiger schöner Zierstrauch.

Fig. 304. *Rhodotypos tetrapetala* (*R. kerrioides*). a B., b Basis des B. Stiels mit Neb. (1); c Bl. in Kn.; d Außen-K. mit Anhängsel; e C.; f Stb. von hinten und vorn; g offene Bl.; h dgl. im Längsschnitt, i Frst.; k reifer S.; l dgl. Längsschnitt mit E. (3) (h nach BAILLON, sonst Original).

Gattung 132. *Kerria* DC., in Trans. Lin. Soc. XII. 156. 1817.

Vgl. oben S. 499 und Art. Nur diese bekannt.

K. japonica: aufstrebend übergeneigt verästelter, buschiger, 0,5 — 1,5(—2) m hoher b. Zw. grün, • kahl, — glänzend, rundlich streifig, Kn. bräunlich o. grün, vgl. Fig. 287a — f. S. 448: B. wie Fig. 305a, 3:1,8 — 10:4 — 5 cm, Stiel bis 1,3 cm, sonst wie bei *Rhodotypos*: Bl. einzeln, endständig an dies-jährigen seitlichen Krztr., gelb, K. und C. 5, Stb. ∞.

*) Dieser Name ist nicht synonym mit *Kerria japonica*, denn SIEBOLD sagt ausdrücklich, daß seine Pflze. japanisch Sirojamabuki, d. h. weiße Jamabuki — Kerrie) heiße.

Gyn. 5-6, Frb. episepal. Discus flach, Fr. trocken, braunschwarz, nicht himbeerartig und eßbar**), sonst wie Fig. 305.

Von Formen seien genannt: *f. plena* (var. *fl. pleno* HORT.) Bl. gefüllt (vgl. Fig. 305b, zumeist allein in Kultur; *f. vittato-ramosa* ZBL., in H. d. D. D. G. 201, 1903, Zw. hell gestreift und *f. variegata* ZBL. l. c. (var. *fol. argenteo-marg.* HORT.) B. $\pm$ weiß gefleckt o. gerandet.

K. j. DC. l. c. (? *Rubus japonicus* L., Mant. I. 145. 1767; *Corchorus jap.* THBG., Fl. jap. 227. 1784). — China: Kiangsi, Hupei, Sz'tschwan, sonst in ganz O.-As. seit alters kultiviert und verwildert. — Blz. V. — Sommer; Fr. bei uns anscheinend nie ausreifend. — Häufiger, z. T. etwas empfindlicher b.

Fig. 305. *Kerria japonica*: a B.; b gefüllte Bl.; c Zw. mit normaler Bl.; d eine solche im L.-Schnitt ohne C., die Stb. nur z. T. angedeutet, um den Discus zu zeigen; e C.; f Stb.; g Frkn. im L.-Schn. und von vorn, die herablaufende N.-Rinne zeigend; h Fr.; i—k S. im L.- und Q.-Schn. (a—End.) (b—c nach SIEB. et ZUCC., sonst Original).

Gattung 133. *Neviusia* A. GR., in Proc. Am. Ac. n. ser. VI. 374. 1858.

Vgl. oben S. 499 und Art. Nur diese bekannt.

N. alabamensis: ausgebreitet übergeneigt verästelter 0,5–1,5 m hoher b. + Zw. — rundlich-kantig, braunrot, ganz fein hell beh. Kn. vgl. Fig. 287t—x, S. 448; B. 2,5 : 1,5–7 : 4 cm, vgl. Fig. 306a, aber etwas derber als bei *Rhodotypos* und etwas mehr beh., sonst wie dort. Stiel kaum 1 cm; Bl. zu 1–8 in seitlichen beblätterten Scheintrauben. K. 5, C. fehlend, Stb. ∞ , Gyn. 2–4, Fr. trocken, vgl. Fig. 306.

N. a. GR., l. c. — N.-Am., nur Alabama, nach SMALL: on cliffs, near Tuscaloosa and on Sand Mountain — Bl. V o später, Frz. Herbst — Nicht eben hfg. in Kultur und kaum so hart wie *Kerria*.

**) Die Angaben, daß die Kerrien-Fr. eßbar seien, beruhen auf Irrtum, man vgl. in Journ. of Lin. Soc. XXIII. 489! die Berichtigung.

Unterfamilie B. *Potentillaceae* FOCKE. l. c. — b — b. B. sommer-, C s S 525. winter- o. immergrün, Neb. vorh., Recept. flach, schüssel- o. becherfg., Gyn. meist ∞ und ∞ Stb., seltener wenige Frkn. und weniger Stb.

Gattung 134. *Rubus**) L., Sp. pl. 482. 1753.

Vgl. oben S. 500. L. b o. b, meist bestachelt und oft klimmend o. kriechend, B. sommer- o. (selten immergrün, einfach (nur — gelappt) o. verschiedenartig (gefingert, gefiedert, fächerfg. zusammengesetzt; Bl. einzeln o. in traubigen o. rispigen Blst., weiß, rosa o. purpurn, selten

Fig. 306. *Arctosa alabamensis*. a B.; b Bl.-Zw.; c Bl. mit K (1b); d Bl. im Längsschnitt; e Frkn. und Gr.; f Fr. im Längsschnitt; g freigelegter E. (d, e nach GRAY, sonst Original).

gelb. — o. r., Bl.-Achse flach bis trichterfg., K. 5, klappig, C. 5 (o. fehl.), Stb. ∞ , Gyn. ∞ , zu einem Köpfchen vereinigt, selten nur 5–6; Gr. fast endständig, die saftigen Steinfr. zu einer Sammelfrucht vereinigt (selten einzeln abfallend), rot, gelb, schwarz (selten grün), S. mit etwas End. — Artenzahl je nach Fassung des Artbegriffs ungemein schwankend **).

Bereits im Vorwort habe ich erklärt, daß ich bei dieser polymorphen Gattung von den europäischen Arten nur für unsere Zwecke speziell wichtige Typen besprechen kann. Ich werde hierbei ganz im Sinne KOPHNES (1863) vorgehen. Dagegen versuche ich, eine Anzahl außereuropäische Formen namhaft zu machen, die mit Aussicht auf Erfolg bei uns eingeführt werden könnten. Unzweifelhaft lassen sich ja in den südlichen Lagen unseres Gebietes selbst Typen wie *R. australis* o. solche aus den Gebirgen Mexicos anpflanzen, außerdem sind unter denen, die während der letzten Jahrzehnte in China gefunden wurden, die meisten kulturwert. Wie ja Zentral- und N.-China ein wahres Dorado für den Dendrologen ist. — Ich lege meiner Darstellung, so weit es irgend geht, ganz und gar die FOCKESchen Arbeiten zugrunde, insbesondere seine Batogr. Abhandl. (in Abh. Naturw. Ver. Bremen IV, 1874), die Syn. Rubor. Germaniae 1877, die Übersicht in Nat. Pl. III, 3, S. 28 ff. 1888 und vor allem seine Bearbeitung der Gattung *Rubus* in ASCHERS. et GRAEB., Syn. VI, S. 440 ff. 1902. Auf diese letzte ausgezeichnete Arbeit seien alle hingewiesen, welche europäische Formen bestimmen wollen. Weitere Arbeiten FOCKES sind im Text zitiert. Ferner möchte ich auf die anatomisch-systematischen Studien über die Gattung *Rubus* von K. FREISCH (in Sitzb. Akad. Wien, Bd. XCV, I, 187, 1887) hinweisen, die viele wertvolle Fingerzeige enthält.

*) Nach FOCKE (1902) bei weiter Fassung des Artbegriffes etwa 300 Arten, wovon auf M.-Eur. ca. 20 zu rechnen waren. Tatsächlich beschreibt aber FOCKE für dieses Gebiet 86 Arten, versteht also unter den 20 wohl Gesamtarten sensu ASCHERS. et GRAEB. Bisher wurden jedoch schon etwa 1500 sog. „Arten“ für M.-Eur. aufgestellt.

B. s. S. 514 A. Fr. vom stehenbleibenden Fr.-Träger als Sammelfr. selten einzeln sich ablösend (Himbeeren; Raspberries; Framboisiers).

II. s. S. 506. I. Pflanzen ohne Stacheln.

Sekt. 1. *Anoplobatus* FOCKE, in Abh. naturw. Verein Bremen IV. 146. 1874. — Aufrechte b mit einfachen, gelappten B. und großen aufrechten Bl., Gyn. auf flach gewölbtem Träger.

C Bl. Stiele ohne o. bei *trifidus* z. T. mit Stieldrüsen. Bl. an kurzen, kaum bis 10 cm langen beblätterten Seitentrieben.

* B. * spitzlappig, im Mittel etwa 7:6,5 cm (Fig. 307 a). Bl. etwa 3 cm Dm.

1. *R. trifidus*: Höhe?, Zw. kahl, bräunlich, z. T. leicht bereift, B. oberseits olivgrün, unterseits hell, 3—5—7 lappig, auf Fläche beiderseits kahlen. Neb. breitlanzettlich, meist ganzrandig, beh. und etwas drüsig-gewimpert, 1—1,5 cm lang, Bl. weiß, zu 1—3, K. beiderseits beh., ca. 1 cm, gleichmäßig spitz auslaufend, Bl.-Achse innen kahl, Fr. gelb.

R. t. THBG., Fl. jap. 217. 1784 (*ribifolius* S. et Z., in Abh. Akad. Münch. IV. 1843; *hydrastifolius* A. GR., Perrys Exp. 311. 1856; *acroides* MIQ., in Ann. Mus. Lugd. Bat. III. 36. 1867. Jap. (Nippon, Prov. Sagami, Idzu), Corea (Port Hamultom). — Schattige Wälder — Blz. V. — Mir lebend unbekannt, scheint sehr formenreich*).

* B. * stumpf bis rundlich gelappt, meist unter 6 cm Dm. Fig. 307 b), Bl. 4—5(—6) cm Dm.

2. *R. deliciosus*: 1—1,5 m hoher b, Seitentriebe bogig überhängend, Zw. beh., mit zerstreuten kurzen Stieldrüsen: B. bis 7,5 cm Dm., jung beiders. beh. und fein bedrüst, zuletzt fast ganz kahlen. 3—5-lappig, Neb. lanzettlich, gleich den bis 1,5 cm langen B. Stielen weich beh. und drüsig, anfangs schön gerötet, dadurch gegen die weißen Bl. hübsch abstechend, diese meist einzeln selten bis 7 an sehr kurzen Trieben, nach KOEHNE dioecisch (ob wirklich?), sonst vgl. Fig. 309 a—c, S. 512, Fr. nach JENSEN) klein, unansehnlich, hellviolett (nach JAMES: large and delicious).

R. d. JAMES, Long's Exped. II. 193. 1821 (et TORREY, in Ann. Lye. Nat. Hist. New York II. 196. 1828). *R. neo-mexicanus* GRAY, Pl. Wright. II. 57. 1853; *occid.* ROE., in Act. Hort. Petrop. III. 285. 1875. — Rocky Mts. von Colorado und Grenze zwischen Arizona und New Mex. — Blz. V. nach GRAY VIII. — Frz. nach GRAY X. — Schöne, in Kultur noch seltene Art. — Ihr schließt sich eng an *R. trilobus* MOQ. et SIESE, in DC. Prodr. II. 566. 1825, aus Mexico (Oaxaca) bis Guatemala, abweichend durch spitzlappige (Mittellappen vorgezogen), beiders. reicher beh. B. und meist durch blattartige Spitzenanhangsel verlängerte K. Bl. gleich schön, weiß.

C Bl.-Stiele reichlich stieldrüsig, Bl. an längeren, kaum unter 10 cm langen beblätterten Trieben.

* Bl. weiß, zu 3—5(—7) in scheindoldigen Blst., B. vgl. Fig. 307 d

3. *R. parviflorus* (*R. nutkanus*): bis 1,5—2,5 m hoher b, Zw. jung beh. und drüsig, dann unter der abblätternden Außenrinde braunrot, kahl, glatt: Kn. vgl. *odoratus*; B. häutig, 9—20 cm Dm., oben

*) Auf O. KUNTZE'S Darlegungen (Method. d. Speciebeschr. *Rubus*. 1879. 91) einzugehen verzichte ich, denn ich kann bei *Rubus* ebensowenig seinen Standpunkt teilen, wie bei seiner *Clematis*-Monographie, seiner *Holodiscus*-Bearbeitung etc. — Man vgl. da gegen über die japanischen Arten die Zusammenstellung von MATSUMURA, in Tokyo Bot. Mag. XV. 155. 1901 und XVI. 1. 1902, der diverse neue Arten beschreibt und genau das Vorkommen angibt.

sattgrün, verstreut kurz und etwas raublich beh., unten heller, gleich o. mehr weich beh., Neb. lanzettlich, etwa 12 mm, Stiele 3—17 cm; Bl. bis 4 cm Dm., K. langgeschwänzt, innen weich beh., außen fein drüsig, Fr. breit halbkugelig, rot, kaum eßbar.

R. p. NUTT., Gen. I. 308. 1818 (*nutkanus* Moç., apud DC., Prodr. II. 566. 1825). — N.-Am. nach BRITTON: Michig., Minnes. und W.-Ontario, bis Alaska, Calif., Utah und Color. — In Wäldern. — Blz. V—VII. — Nicht selten in Kultur. — Ihm steht sehr nahe *R. velutinus* HOOK. et ARN., Bot. Beech. Voy. 140. 1840 (*R. nutk.* var. *velut.* BREW., Bot. Calif. I. 172. 1876; *parvifl.* var. *velut.* GREENE, in Bull. Torr. Club. XVII. 14. 1890) W.-Calif., dessen B. kaum über 12 cm Dm. zeigen, derber und beiders. weich filziger beh. sind, K. außen dicht grau zottig filzig und ± borstig, aber kaum drüsig.

Fig. 307. *Rubus*: B.-Formen: *a* *trifidus* — *b* *deliciosus* — *c* *odoratus* — *d* *parviflorus* (*nutkanus*) — *e* *palmatus* — *f* *spectabilis* — *g* *crataegifolius* — *h—k* *hirtellus*, *h* subsp. *hirtellus*, *i* subsp. *hirtellus*, *j* subsp. *hirtellus*, *k* subsp. *hirtellus*, *l* subsp. *hirtellus*, *m* *triphylus* — *n* *leucodermis* — *o* *occidentalis* — *p* *rosaefolius* (Alles ca. $\frac{1}{3}$ n. Gr.) (Original).

Bl. rot, in mehrblütigen länger rispig verästelten Blst., B. vgl. Fig. 307 c.

4. *R. odoratus*: wie wohl alle diese Arten Ausläufer treibender, in Tracht dem *parviflorus* ähnlicher, bis 1,5 m hoher b. Zw. dicht stiel-drüsig, rund, abblätternd, gelbgrau, Kn. vgl. Fig. 308 i—o, S. 509; B. 8—20—30 cm Dm., 3—5-lappig, oben satt, unten hellgrün, beiders. verstr. kurz beh. o. zuletzt bis auf Nerven kahlend; Stiel bis 10 cm drüsig, Neb. lanzettlich, kaum 10 mm; Bl. duftend, 4—5 cm Dm., K. außen filzig und stieldrüsig, vgl. Fig. 309 f—g¹, S. 512, Fr. wie *parviflorus*.

Eine Form ist *f. albus* ZBL., in H. d. D. D. G. 201. 1903. Bl. weiß*).

* Nach BRITTON wild im Staate New York, at Pine hill, Ulster Co. gefunden.

R. o. L., Sp. pl. 494. 1753 (*Rubacer o.* SMALL, Fl. Southeast. States 515. 1903). — Von Neu-Schottl. und Ontario bis Michigan, Georgia, Alabama, Tennessee. — Wälder, steinige Hänge. — Blz. VI–VIII. — Mir unbekannt ist der nahe verwandte *R. columbianus* RYDBG., in BRITT. Manual. 495. 1901 (odor. var. *columb.* MILLSP., Fl. of W.-Virg. 356. 1892), die B. sollen 5–7-lappig und ihre Lappen lanzettlich, tiefer und tief eingeschnitten gezähnt sein, Bl. nur 2–3 cm breit, Fr. rot, klein, „of a very musky taste“. Gebirge von W.-Virginia, Blz. VII.

4×9 *R. odoratus* × *idaeus*: *R. nobilis* RGL., in Gartenflora VI. 86. 1857: nach FOCKE, die Pflz.-Mischlinge 117. 1881: b. jüngere Zw. undeutlich bereift, B. 3-zählig mit kurz gestieltem End-Beichen, Beichen groß, langlich elliptisch, unterseits dünn graufilzig, Blst. reichblütig, fast ebensträußig, Bl.-Stiele etwas drüsig, mit vereinzelt, kaum bemerkbaren Stachelchen, sonst Pflze. wehrlos, Bl. ziemlich klein, C. rundlich, rot, unfruchtbar. — Dieser von E. DE VOS in England erzogene Bastard hat somit Habitus, Blst., Mangel an Stacheln, sowie Gestalt und Farbe der Blüten von *R. odoratus*, die Drüsen des Blst. sind indes viel spärlicher, die Bl. viel kleiner. Auf *R. idaeus* weisen vorzugsweise die B. hin, außerdem die dünne Beh. der jungen Zw. Scheint ein Sämling des *R. idaeus* zu sein, da *odoratus* selten Fr. bringt und die S. in Eur. schwer keimen.

Stachellose Arten mit einfachen, oft ganz ungelappten B. treten noch in ziemlicher Anzahl in der Sect. *Malachobatus**) FOCKE, l. c., auf. So beschreibt FOCKE, apud DIELS in Engl. Jahrb. XXIX. 394. 1900, *R. irenaeus* und *R. pacatus* aus M.-China (Hupei, Sz'tschwan), die dem *R. pacificus* HANCE, in Journ. of Bot. XII. 259. 1874 aus Kiangsi nahe stehen, sowie einige andere z. T. wohl kaum als b. anzusprechende Formen, deren Einführung erwünscht wäre. Die Sect. *Malachobatus* und manche andere ist ja erst ganz unvollkommen bekannt und gerade durch Einführung der Gebirgsformen aus dem Himal. und M.-China könnte unsere Kenntnis sehr gefördert werden. Ich kann mich eben nur auf ganz kurze Hinweise beschränken. Wenn es mir gelingt, von den bei VERTCH in Kultur befindlichen (vgl. in Journ. Hort. Soc. XXVIII. 61. 1903), *irenaeus* FOCKE, l. c., *lasio-stylus* HOOK., in Bot. Mag. t. 7426. 1825, *henryi* HEMSL. et KTZE., in Journ. Lin. Soc. XXIII. 231. 1887, *chroosepalus* FOCKE, in HOOK. Ic. pl. t. 1952. 1891, und *bambusarum* FOCKE, l. c., Material zu erhalten, so komme ich vielleicht im Nachtrage noch darauf zurück.

II. Pflanzen bestachelt, meist an allen Achsen und B.-Stielen (zuweilen aber recht vereinzelt)

b) s. S. 508

a) B. einfach o. 3-zählig, Bl. einzeln o. zu wenigen an kurzen, selten längeren Zw. stehend.

Sekt. 2. *Batothamnus* FOCKE**), l. c. 148. — Aufrechte b, von denen die für uns wichtigen ostasiatischen und nordamerikanischen im folgenden erwähnt sind.

○ B. einfach, nicht o. ± gelappt, Bl. weiß.

• Bl. einzeln an meist unter 6 cm langen Seitentrieben, B. vgl. Fig. 307 e o. noch feiner 5–7-teilig.

5. *R. palmatus****): zierlicher Kletter-b, an Spalieren über 6 m hoch, Zw. kahl, rundlich, nur mit feinen, fast geraden bräunlichen Stacheln besetzt; B. sehr

*) Im H. d. D. D. G. 202 führt ZABEL als einzige Art dieser Sekt. *R. nivalis* DOUGL., in HOOK. Fl. N.-Am. I. 181. 1833, an. FOCKE stellt sie 1874 zur Sekt. *Batothamnus*, führt sie aber 1888 mit *Malachobatus*. Nach HOWELL, Fl. of NW.-N.-Am. I. 183. 1898, handelt es sich aber um eine brombeerartige Form (fruit persistent upon the somewhat juicy receptacle which is at length deciduous from the calyx). Es scheint eine sehr interessante Hochgebirgsart (Wash., bis N.-Calif., Idaho, in Wäldern) zu sein mit niederliegenden, kleinstacheligen Zw., rundlich herzfg. z. T. ± 3-lappigen, selten 3-zähligen B., 3–6 cm lang, nur unten beh., „persistent“, Bl.-Stiele kurz, 1- bis wenigblütig, Bl. ♀, C. schmallanzettlich, länger als die beh. K., Frkn. wenige. Mehr b als b!

**) Man vgl. auch die von FOCKE, apud DIELS, l. c., 391–393 beschriebenen chinesischen Arten, deren nähere Besprechung hier zu weit führen würde, die übrigens z. T. zu Sekt. *Malachobatus*, siehe oben, gehören.

***.) Beschreibung z. T. nach HOOKER, Bot. Mag. t. 7801. 1901.

variabel, hfg. nur 3-lappig an Blzw. und kaum 3—4 cm lang, sonst bis 7-lappig und bis 6:4,5 cm o. auch bis 9 cm lang, oberseits lebhaft grün, unten heller, jung an dem mir vorliegenden spontanen Material oben auf Nerven —, unten dgl. etwas mehr seidig-zottig beh., dann kahlend, Stiel bis 4 cm, mit leinen Hakenstacheln, Neb. wie Fig. 309i, S. 512, Bl. weiß, ihr Stiel, Bl.-Achse und K. außen — seidig beh., K. innen kahl o. fast kahl, — breit lanzettlich, gezähnt, C. 1, —, länger, vgl. Fig. 309h—h¹, Fr. kugelig, etwa 2,5 cm Dm., eßbar, gelb.

R. p. THBG., Fl. jap. 217. 1784 (*coptophyllus* A. GR., Bot. Perry Exp. Jap. 311. 1850) — Jap. (Kiuseku, Central-Hondo); Corea²; China (Chekiang). In Gebüsch, im Gebirge bis über 2000 m. — Blz. in England IV — Bei uns noch nicht in Kultur. Vgl. auch MATSUMURA, in Tok. Bot. Mag. XVI. 1. 1902. Dagegen ist bei uns *R. incisus* THBG., l. c., aus Japan eingeführt, über den ich im Nachtrage berichten werde, da mir z. Zt. genügendes Material mangelt. (Vgl. MATSUMURA, l. c. XV. 157. 1900.) Dort hoffe ich auch den *R. morifolius* HORT. (nec SIEB.) klarstellen zu können. — Einführungswert scheint ferner *R. corchorifolius* L. l., Suppl. 263. 1781 (*R. c. Hosus* THBG., Fl. jap. 218. 1784), aus Japan (S.-Hondo, Prov. Suo, Kiuseku), der auch in Formosa und China (Szechuan, Sutschwan) auftritt. Er hat ungelappte, eiliptische B. (nur an Schossen 3-lappig mit stark vorgezogenem Mittellappen), die zuletzt etwa 6,3 cm messen, auf der dunkleren Oberseite nur auf den Nerven, auf der hellen Unters. — durchaus o. nur auf Nerven kurz weichhaarig sind, Stiel 5—22 mm, Bl. ca. 2 cm Dm., Bl.-Achse und K. außen dicht beh., K. innen — beh., C. ziemlich schmal, — länger als K. — Die var. *oliveri* FOCKE, apud DIELS, l. c. 1900 (*R. c. oliveri* MIQ., in Ann. Mus. Lugd. Bat. III. 35. 1897) zeigt an einem mir vorliegenden Expl. etwa 14 mm lange und 8 mm dicke, beh. Fr. MATSUMURA beschreibt, l. c. 157, eine var. *glaber* (Formosa). — Dem *corchorifolius* ist in den B. sehr ähnlich *R. malifolius* FOCKE, in Hook. Ic. pl. t. 1944. 1896, eine interessante Art aus China (Hupei). Hier stehen die Bl. wie bei *crataegifolius* etc. in etwa 7-blütigen Trauben am Ende längerer beblätterter Triebe, FOCKE gibt als Hauptkennzeichen sonst folgende an: Zw. wenig o. nicht bestachelt (Stacheln gekrümmt), junge Triebe beh., B. 6—7:3—12:5 cm, oben kahl, unten auf Nerven beh., Stiel 1—1,5 cm; Bl. ca. 3 cm Dm., K. eifg., gespitzt, filzig, C. außen beh., Stb. (im Abb.) — ausgebreitet, Stb. und A. beh., Discus dgl., Gyn. kahl.

• • Bl. in etwa 5—17-blütigen Trauben am Ende über 6 cm langer beblätterter Zw., z. T. auch in den Achseln der nächst unteren B. einzeln o. bis 3; B. vgl. Fig. 307g, S. 505.

6. *R. crataegifolius*: aufrechter bis über 1 m hoher b., junge Triebe — beh., — kahl, braunrot, — bereift, rundlich, mit verstreuten, leicht gekrümmten Stacheln besetzt; B. ziemlich variabel, z. T. nur lappenzählig o. nur 3-lappig, jung — auf Nerven und Flächen weichborstig verstr. beh., zuletzt fast ganz kahl, unten wenig heller, 4:4—13:10—12 cm, Herbstfärbung lebhaft bunt, Stiel 2—5 cm; Bl. weiß, vgl. Fig. 309r, S. 512, Stb. wenigstens im Anfang aufrecht, genau so wie in h¹, Bl.-Stiele und Bl.-Achse nebst K. außen wenig beh., K. innen (bes. am Rande) filzig, Gynophor am Grunde beh., sonst Gyn. und Stb. kahl, Fr. lebhaft scharlach orange-rot, etwas säuerlich (vgl. Gartenfl. 1878. t. 1424).

R. c. BOE. in Mém. Sav. Étr. Pétersbg. II. 98. 1835 — In Jap. von Kiuseku bis Jesso, China (Tschili, Shingking), Corea. — Wakler, Gebüsch, der Gebirge — Blz. (IV—V—VI. — Frz. VII—VIII. — In Kultur, doch noch selten.

Ihr schließt sich an die in ihren 4,5—6,5 cm großen Bl. an *peltatus* erinnernde *R. peltatus* MAXIM., in Bull. Ac. Pétersbg. XVII. 154. 1872, aus Zentral-Hondo und Schukoku; Zw. kahl, — kaum stachelig, B. schildfg., Stiel etwa 7—16 mm und über dem Grunde inseriert, Umriß herzförmig-eirundlich, — kurz 3—5-lappig (Endlappen etwas vorgezogen), Lappen scharf gezähnt, Beh. beiderseits — auf Nerv. beh., schwach verstreut, Unters. kaum viel heller, Neb. dem Stiel zu — angewachsen, ganzrandig, Bl. einzeln, endständig, weiß, K. kahl, gezähnt, spitz, C. 2mal so lang, Gyn. sehr —, Fr. nach MATSUMURA 3:0,9 cm, Carpelle an Spitze beh. — Ein sehr eigenartiger Typus, dessen Einführung hochinteressant wäre!

○○ B. 3-zählig (Fig. 307f, S. 505). Bl. rot.

7. *R. spectabilis*: 1 bis über 3 m hoher, ziemlich üppiger b., junge Triebe beh., — kahl, rundlich, spärlich mit kurzen geraden Stacheln

besetzt o. wehrlos; B. selten einfach, beiderseits ziemlich gleich grün, meist nur unten auf Nerven ein wenig beh., Form und Größe wechselnd. End-B. 4:2.5–12:9 cm; Bl. meist einzeln, endständig an kurzen (4–8 cm) unbewehrten, -beblätterten Seitentrieben, 2.5–4 cm Dm., im L.-Schn. im wesentlichen wie Fig. 309h¹, S. 512, doch Gynophor beh. und die Frkn. ihn bis zum Grunde umkleidend, K. eilanzettlich spitz, verstreut beh. und gewimpert, C. eifg., länger als K., Fr. kahl, rot o. gelb, Gr. lang, bleibend.

R. s. PURSH, Fl. N.-Am. I. 348. t. 16. 1814. — Pracht-Himbeere. — Calif. (Mendocino) bis Alaska, sowie nach MATSUMURA in N.- und M.-Jap. — Ufer, feuchte Wälder. — Blz. (IV—)V–VI. — In Kultur noch selten. — Erwähnt sei die var. *menziesii* WATS., Bot. Calif. I. 172. 1876 (*R. menziesii* HOOK., Fl. bor. am. I. 141. 1833) aus Calif. (um San Francisco und nordwärts) mit $\pm$ dicht filzigseidigen B. — Außerdem wäre noch zu nennen *R. vitifolius* CHAM. et SCHL., in Linnaea II. 10. 1827 (*R. ursinus* CH. et SCHL., l. c. 11; *R. macropetalus* DOUGL., in HOOK., Fl. bor.-am. I. 178. 1833) eine variable Art des pacif. N.-Am. (Calif. bis Alaska), deren Formen ich mit GREENE, Fl. Francisc. I. 72. 1891, unter diesem Namen vereinige, denn nach dem mir vorliegenden Material von *ursinus* und *macropetalus* stellen diese kaum mehr als Varietäten dar. Jedenfalls ist diese Formengruppe, von der ich in Kultur noch nichts sah, charakterisiert durch: Zw. kahl und bereift o. -beh., feinstachelig, liegend o. -aufrecht, 1–6 m lang, junge Triebe reich stachelborstig, -beh.; B. einfach o. 3–5-zählig, B. eiförmlich o. mehr spitz eilänglich (End-B. etwa 3.5:3–8:5 cm), auf der dunkleren Oberseite, auf der hellgrauen Unters. dicht weich bis filzig beh. (z. T. wohl auch stark kahler), Hauptstiel borstig, 2–6 cm, Neb. lanzettlich; Bl. - zu mehreren am Ende längerer beblätterter Seitentriebe, bzw. in den obersten B.-Achseln, $\frac{1}{2}$ größer, mit bis 13 mm langen, verkehrt eifg. C., kleiner, C. kürzer, K. außen -borstig, sonst durchaus $\pm$ filzig, mit Spitzenanhangsel, Fr. länglich, schwarz, süß.

7 $\times$ 9a *R. spectabilis* $\times$ *idaeus vulgatus*; von FOCKE, in Abh. Bremen XII. 96. 1893, beschrieben. Wurde von einem Herrn BRIGGS in Engl. aus S. von *p. spectabilis* gezogen. Einen binären Namen scheint diese Kreuzung noch nicht zu besitzen. Ich kenne sie nur aus FOCKES Angaben.

b) B. getiedert o. 5-zählig gefingert o. wenn 3-zählig, so unten dicht weißfilzig, Blst. verschieden.

2. siehe S. 514.

1. B. sommergrün, vgl. Fig. 307h—p, S. 505.

Sekt. 3. *Idacobatus* FOCKE, l. c., 147. — Stengel meist 2-jährig, aufrecht o. kriechend, Neb. klein, bleibend, im unteren Teile dem B.-Stiel angewachsen, Bl. , Gyn. ∞ , sich als Sammelfr. vom Gynophor ablösend. — Bes. in O.-As. durch ∞ Arten vertreten.

○○ s. S. 513. ○ B. unters. dicht weißfilzig.

Zw., Triebe, Bl.-Stiele, K. und B.-Stiele dicht beh., rot stieldrüsig und borstig, Bl. rosa. B. vgl. Fig. 307i, S. 505.

8. *R. phoenicolasius*: üppiger aufstrebend übergebogen verästelter b. bis 2 m. Zw. zuletzt oft nur borstig und hakenstachelig; B. durch die größeren rundlichen End-B. ausgezeichnet, die bis 10 cm Dm. zeigen, Lappung zuweilen mehr und länger plötzlich zugespitzt, ober. sattgrün, verstreut beh., Hauptstiel bis 5 cm, selten unterste B. 5-zählig; Blst. 10- o. mehrblütig, K. innen weißfilzig, lang spitzig, über doppelt so lang als die kleinen C., Fr. orangerot, essbar.

R. p. MAXIM., in Bull. Ac. St.-Petersbg. XVII. 160. 1872 — rotzottige Himbeere. Jap. (Kiuseiu bis Jesso) lichte Gebüsche, Uter. Blz. VI–VII. Frz. VIII–IX. — Auffällige, in Kultur jetzt häufigere Art.

✱✱ Pflzen. drüsenlos o. nur spärlich bedrüst.

- + Schößlinge kahl ausgenommen zuweilen bei *R. idaeus*-Formen).
 ± bereift, Bl. weiß, B. vgl. Fig. 307h—k und n—o, S. 505.
 △ Schößlinge zerstr. kurzstachlig o. wehrlos, o. ± dicht stachelborstig, nicht hakenstachlig, schwach o. kaum bereift, B. 3-zählig o. 5—7-zählig gefiedert.

9. *R. idaeus* *): durch Wurzelbrut lockere Gebüschbildender, 1–2 m hoher b, Zw. vgl. subspec., B. vgl. Fig. 307h—k. Größe und Umriß wechselnd, End-Bl. lang gestielt, herzeifg., eifg. o. länglich, bis 12:8 cm, Bl. Zw. aus den vorjährigen Blattachsen entspringend, kurz, beblättert, einen wenigbl. traubig-rispigen Blst. mit meist nickenden Einzelblüten tragend, sonst vgl. Fig. 309k—q, S. 512.

Fig. 308. *Rubus*: a—h *idaeus*: a ⊙ Zw.; b Kn. bei c die B.-N. im Schnitt (α—β), d B.-N. (2) auf der B.-Basis (3), darüber bei α die Kn. (1); e Wimperung der Kn.-Sch.; f Zw. mit Haarborsten; g 2 Kn. (1, 2) übereinander im L.-Schn. mit der B.-Basis (3); h Zw.-Q.-Schn. (1—6 vgl. Fig. 240t, S. 375); i Kn. (1) mit Bei-Kn. (2) und B.-Basis (3), bei α—β die B.-N. m im Schnitt; l (links neben α) die von B.-Basis verdeckte Kn. α, deren Beh. bei n angedeutet ist. p—t *phoenicolasus*: p ⊙ Zw.; q Kn.; r Kn.-Sch.; s B.-N.; t — (Orig. nach C. K. SCHNEIDER).

Es können folgende, in den Gärten vielleicht am besten als Arten zu führende Subspecies festgehalten werden**):

*) Beschreibung nach FOCKE 1902 und insbesondere nach Verb. Naturw. Ver. Bremen XIII. 473. 1893.

**) Immerhin ist es mir etwas zweifelhaft, ob diese von FOCKE 1893 aufgestellten Unterarten nicht doch ziemlich ungleichwertig sind. In mancher Hinsicht scheint es mir vielleicht richtiger, den *R. idaeus* nur in subspec. *vulgatus* und subspec. *strigosus* zu gliedern und diesen dann die übrigen Formen im einzelnen als var. zu subsumieren. FOCKE hat diesen Gedanken allerdings deshalb verwerfen zu müssen geglaubt, weil er in *melanotrachis* eine Verbindungsform von *vulgatus* und den *strigosus*-Typen sieht.

Subspec. a. *vulgatus* ARRHEN., Rub. Succ. Mon. 12. 1830. Schößlinge in der Mitte fast wehrlos o. zerstreut kurzstachelig, Bl.-Stiele kurz sichelstachelig, Disc. in den lebenden Bl. durch die Stb. nicht verdeckt, diese also nicht einwärts gebogen. — Hierher *f. denudatus* SCHIMP. et SPENN., Fl. Frib. 743. 1829 (var. *viridis* DOLL., Rhein. Flora 766. 1843), fast kahl, B. unters. grün; auf feuchtem humosem Waldboden (i. G. in Prov. Posen, Brandenbg., Schwarzwald, Steierm. beobachtet).

f. angustifolius SCHMIDELY, in Bull. Soc. bot. Genève 1888. 48. Bechen schmal, ei- bis langlich lanzettlich, ungleich grob- bis eingeschnitten gesägt (feuchte Gebirgslagen, bes. Vorberge der Alpen). — *f. maritimus* FOCKE, l. c. 446. 1902 (*R. idaeus marit.* ARRHEN., l. c. 13). Schößlinge auch an älteren Stöcken dicht borstenstachelig, Stb. einwärts gerichtet, den Disc. verdeckend (in Dünengehölzen am Ostseestrande in O.-Preuß., wahrscheinlich weiter verbreitet). Ferner die Kultur-

formen*): *f. semperflorens* FOCKE, l. c. 446. 1902. Schößlinge z. T. im 1. Jahre Bl. treibend, Fr. im Spätherbst, z. T. als sog. „immertragende Himbeere“ in den Gärten.

f. luteofructifer (= *f. fruct. luteus* FOCKE, l. c.), Fr. gelb, Stacheln und Borsten blaß, grünlich.

Schließlich noch die monstrosen spontan auftretenden. *f. phyllanthus* LANGE, Handb. 4. Udg. 768. 1888 (= *f. strobilaceus* FOCKE, l. c. 470. 1893), Blst. reich verzweigt, statt der Bl. kurze, quastähnliche, dicht mit schuppenartigen Hochb. bedeckte Zw. tragend. (I. G. beobachtet in Angeln, Holthorst bei Bremen, Petting in SO.-Bayern, Augsburg, ähnlich um Genf, auch in Schweden.)

— *f. obtusifolius* FOCKE, l. c. (*R. obtusif.* WILLD., Berl. Baumz., 2. Aufl., 409. 1811; *R. idaeus anomalus* ARRHEN. Rub. Succ. 14. 1839; *R. leesii* BABGT. in STEELE Handb. 60. 1847), B. der Blzw. und des unteren Teiles der Schößl. einfach, nierenförmig, grob gezähnt, oft gelappt; die der oberen Schößlingsteile 3-zählig mit breiten, sich mit den Randern deckenden Bechen, von denen das endständige kurz gestielt ist, Sa. meist früh verdorrend, also Fr. selten. (I. G. beobachtet in W.-Preuß., Posen, Pommern, um Bremen, Oldenburg, Hannover, Nürnberg, Freiburg i. B., ferner auch in Schwed., S.-Norweg., Engl., Krim.)

Subspec. b. *nipponicus* FOCKE, l. c. 473. 1893. Schößlinge wie bei a. Bl.-Stiele dgl., aber auch filzig beh., Bechen breiter, dgl. C., soll in Tracht noch abweichen, aber erst ungenau bekannt. Jap. (Hondo), von MAXIM. zu subspec. *strigosus* gerechnet. MATSUMURA führt jedoch beide Subspec. als Var. nebeneinander auf.

Subspec. c. *melanotrachys* FOCKE, l. c. Schößlinge dicht kurzborstig, Bl.-Stiele kleinstachelig, filzig, Stb. den Disc. verdeckend. Von *melanolasius* durch die filzige Beh. der Blzw. und Bl.-Stiele und die kürzeren Borsten abweichend. Soll aus NW.-Am. stammen.

Subspec. d. *strigosus* FOCKE, l. c. (*R. strigosus* MCHX., Fl. N.-Am. I. 297. 1807; *pennsylvanicus* POIR., in LAM., Encycl. VI. 242. 1804). Schößlinge locker o. dicht nadelborstig, Bl.-Stiele langborstig und stieldrüsig (dgl. Blzw., B.-Stiele und K.), ob Disc. bedeckt o. sichtbar^{*)}, Fr. hellrot, bei einer Kulturform weiß. FOCKE versteht hierunter nur die nordostamerikanischen Formen; wie sich aber diese und die folgende Subspec. geographisch abgrenzen, sagt er nicht. Beide zusammen kommen von Neu-Fundl. bis Labrador, New-Mex. und Brit. Col. vor. Nach MATSUMURA kommt *strigosus* auch in Jap. (Hondo, Jesso) vor!

Subspec. e. *melanolasius* FOCKE, l. c. Schößlinge, Blzw., Bl.-Stiele, K., B.-Stiele meist auch Nerven der B.-Unterseiten dicht borstig bis nadelstachelig, zwischen den Borsten bes. an Bl.-Stielen und B.-Stielen, häufig auch an Schößlingen: ~ Stieldrüsen, Färbung der Borsten und Nadelstacheln meist schwarzrot, B. heller und lebhafter grün, wie bei a. *vulgatus*, in Form veränderlich, doch vorherrschend Formen, die in eine verschmalerte Spitze auslaufen, Stb. den Disc. verdeckend; Fr. rot, scharf sauer. — Nach FOCKE WN.-Am. und O.-Sib.

R. idaeus L., Sp. pl. 492. 1753. — gemeine Himbeere. — I. G. durchweg verbreitet und fast überall hfg. (auf den Nordseemeilen nur eingeschleppt), aber im S. auf die Berggegenden beschränkt, dort bis 1800 m. ~ Waldungen, Gebüsch. Blz. V–VIc–VII im Gebirge ~ Frz. VIIc–VIII. ~ Allgemein als Fr.-b. angebaut. Für uns besonders die abweichenden Formen und die außereuropäischen Typen von Interesse.

9d ~ 10 *R. idaeus strigosus* ~ *R. occidentalis* *R. neglectus* PECK, in Rep. Reg. N. York St. Univ. XXII. 53. 1899. Von *idaeus* durch die auftretenden Haken-

*) Auf die vielen Kulturrassen kann hier natürlich nicht eingegangen werden.

**) Nach MATSUMURA sichtbar, denn er sagt: *stamina alba erecta*.

stacheln und die auffällige Bereifung der Zw., sowie die dunkelfarbigen, schwarz-roten Fr. abweichend, scheint nach Angaben BRITTONS (Manual 496 1901) dem *occidentalis* meist näherzustehen. Wild in N.-Amerika (Neu-Engl. bis Pennsylv.). Nach FOCKE (1902) auch als Gartenpflz. gebaut und von ihm selbst künstlich erzeugt. Ob er jedoch die Kreuzung *R. idaeus vulgatus* $\times$ *occidentalis* o. die oben genannte ausgeführt, sagt er nicht. Beide dürften kaum unter einem Namen subsumiert werden. — Ferner soll der Bastard *R. idaeus strigosus* $\times$ *leucodermis* künstlich gezüchtet sein und mit dem anderen zusammen die Stammform der sogenannten brombeerähnlichen Himbeeren d. Gärten bilden. Man beachte aber, daß ja *occidentalis* und *leucodermis* trotz der schwärzlichen Fr. gar keine „Brombeeren“ sind! — Über die Hybriden von *R. idaeus vulgatus* $\times$ *R. caesius* L., Sp. pl. 706. 1753, wolle man bei FOCKE, l. c. 411. 1902, nachlesen

△△ Schößlinge (Zw.) $\pm$ stark weiß bereift, mit Hakenstacheln $\mp$ besetzt, B. 3-zählig o. 5-zählig, dann gefiedert o. gefingert.

— C. $\pm$ aufrecht, $\pm$ schmal, sich nicht deckend, Blzw. $\pm$ verlängert, längere Stb. etwa so lang wie Gr.
— B. vgl. Fig. 307 o, S. 505, in Form wohl $\pm$ in n übergehend oder Zähnung relativ fein und flach.

10. *R. occidentalis* *): nach BRITTON stark bereifter b. Zw. stockartig, zurückgekrümmt, oft an Spitze wurzelnd, zuweilen 3—4 cm lang, spärlich hakenstachelig, selten im oberen Teile leicht drüsenborstig; B. 3-zählig, selten 5-zählig gefingert, B. chen eifg., zugespitzt; oben bis auf Nerven kahlend, lebhaft grün; End-B. chen etwa 5:3—9:5.5 cm an Blzw.; Stiel bis 5 cm; Blst. dicht doldenrispig, meist nur endständig. Bl. 8—10 mm Dm., C. aufrecht, K. geschwänzt, so lang wie C., zur Frz. aufr., Fr. schwarzpurpurn, flach halbkugelig.

R. o. L., Sp. pl. 493. 1753. — Quebec und Ontario bis Georgia, Alabama, Missouri und Kansas**). Ziemlich trockene steinige Böden. Blz. V—VI. Frz. VII—VIII. — In Kultur, aber nicht immer echt, da hgt. mit dem schöner blühenden *biflorus* verwechselt. Vgl. ferner das unter *leucodermis* Gesagte.

— B. vgl. Fig. 307 n, S. 505, wohl in Form $\pm$ in o übergehend, aber durch die tiefer kerbzähnige eingeschnittene doppelte Zähnung abweichend.

11. *R. leucodermis*: Zw. reicher bestachelt als bei vorigem, B. glänzender, nach GREENE: lower face of leaves very glaucous!. Blst. wenigblütig, K. länger als C., Fr. halbkugelig, bereift, schwarz und süß.

R. l. DOUGL., in HOOK. Fl. Bor.-Am. I. 178. 1833 (*occid. var. leucod.* HOOK., l. c.) weißästige Himbeere. NW.-N.-Am. (Oreg., WASH.). Die Form mit gelbrötlichen, säuerlichen Fr. (im H. d. D. D. G. 203 als var. *fructu luteo* C. A. PURP. erwähnt) dürfte nach GREENE die californische *R. glaucifolius* KELL., in Proc. Cal. Ac. I. 67. 1855 sein und vielleicht mehr als eine Form darstellen. HOWELL sagt von *leucodermis*: common in moist woods, Alaska to Calif. Ich glaube, daß vom Standpunkt des Monographen *leucodermis* nur eine Subspec. des *occidentalis* ist. KOCHNE sagt (1903), daß bei diesem der Gynophor doppelt so breit wie hoch, bei *leucodermis* nur eben so breit wie hoch sei, was ich nicht bestätigt finde. *R. leucodermis* der Gärten ist gewöhnlich *R. biflorus*.

*) An *R. occidentalis* bzw. *R. leucodermis* schließen sich nach Süden an mehrere noch der genaueren Untersuchung bedürftige Arten, wie *R. glaucus* BENTH., Pl. Hartw. 173. 1845, und *R. eriocarpus* LIEBM., in Knoch. Vid. Meddel. 1852. 162, die durch Mexiko bis Guatemala verbreitet sind. Der typische *occidentalis* kommt kaum südlicher vor als angegeben.

**) Nach MATSUMURA kommt er auch in Jap. vor: var. *japonicus* MIYABE, Fl. Kur. Is. 229 (*idaeus* var. *cynuca* FR. et SAV., Enum. pl. II. 334. 1879). Jesso, Hondo. MATSUMURA zieht hierher auch ein HENRYSches Expl. (n. 56230) aus China (Hupei). Mir ist diese Var. etwas fraglich.

Fig. 309. *Rubus*: *a—c² deliciosus*: *a* Bl.-Kn. und K.; *b* Bl.; *c* diese im L.-Schn.; *c¹* Frkn.; *c²* Stb. — *d—e¹ parviflorus (nutkanus)*: *d* Bl.; *d¹* K.; *e* Bl. im L.-Schn.; *e¹* Frkn.; *e²* Stb. — *f—f¹ rosaefolius*: *f* Bl.; *f¹* junge Fr. — *g—g¹ odoratus*: Bl. im L.-Schn. und Frkn. — *h—i palmatus*: *h* Bl.; *h¹* deren L.-Schn.; *i* B.-Stielgrund mit Neb. — *k—q idaeus vulgaris*: *k* Bl. im L.-Schn.; *l* Frkn. im L.-Schn.; *m* Stb.; *n* Frst. im L.-Schn.; *o* Fr. dgl.; *p* S.; *q* dieser im L.- und Q.-Schn. — *r crataegifolius*: Bl. von unten. — *s—t biflorus*: *s* offene und halboffene Bl.; *t* Frst. (*f—t*, *s—t* n. HOOKER, *q—k* n. PABST u. KOEHLER, *r* nach REGEL, sonst Original).

= C. $\pm$ ausgebreitet, rundlich, sich $\pm$ deckend (Fig. 309 s), Gr. länger als Stb., Blzw. kurz.

12. *R. biflorus*^{*)}: üppiger bis 4 m hoher, aufrechter b, Zw. stark bereift, mit Hakenstacheln $\cdot$ dicht besetzt; B. sehr variabel, hfg. *occidentalis* ähnlich, etwas mehr eingeschnitten gesägt, 3—5-zählig gefiedert, B. chen zuweilen 3-lappig, oben tiefgrün, fast kahl; Blzw. etwa 3—5 cm lang, in den Achseln ihrer B. die Bl. einzeln o. zu 2—3, nickend, Bl. vgl. Fig. 309 s, Fr. wie t, ambrafarben.

R. b. BUCH., apud SM. in REES Cycl. XXX. *Rubus* 9. 1819. — Himal. (from Sirmore, ca. 3000 m, bis Sikkim and Bhutan). — Blz. V—VI. — Frz. VIII—IX. — In den Gärten hier und da als *leucodermis*.

$\cdot$! Schößlinge, Blzw., B.- und Bl.-Stiele weich beh., unbereift, rotpurpurn, B. vgl. Fig. 307 m, S. 505.

13. *R. triphyllus*^{**)}: bis etwa 2 m hoher b, Zw. schlank, rundlich, $\pm$ mit kurzen z. T. feinen Hakenstacheln besetzt, Blzw. etwa 10—30 cm lang, B. 3-zählig, B. chen $\cdot$ breiter als lang, End-B. chen 3:3,5—6:7 cm, oben sattgrün, stark kahlend, unten weißgrau, Hauptstiel bis 6 cm; Blst. etwa 4—10-blütig, Bl. klein, 12—15 mm Dm., Bl.-Achse seidenzottig und fein bestachelt, K. außen dgl., innen weichfilzig, langspitzig, die kleinen verkehrt-eifg. ziemlich lang genagelten C. überragend, Stb. etwa so lang wie Gr., Frkn. $\cdot$ beh., Fr. breit halbkugelig, rund, K. aufrecht

R. t. THBG., Fl. jap. 215. 1784 (*R. parvifolius* AUCT., nec L., sensu stricto, cf. FOCKE, in ENGL. Jahrb. XXIX. 397. 1900). $\cdot$ FOCKE sagt l. c.: „zu dem Formenkreis des *R. triphyllus* gehört auch *R. purpureus* BGE., in Mém. Sav. Etr. Pétersbg. II. 98. 1835, nec HOOK., Fl. Brit. Ind. II. 237. 1878. Ferner gehören dahin *R. macropodus* SER., in DC. Prodr. II. 557. 1825, *R. ribesifolius* A. CUNN., in HOOK. Fl. Tasm. I. 112. 1860 und *R. zahlbrucknerianus* ENDL., Atakta t. 35. 1833 aus Australien. Im Himalaya kommen ähnliche Formen vor, insbesondere *R. foliolosus* DON, Prodr. Fl. Nep. 234. 1825, *R. hypargyryrus* EDGEW., in Trans. Lin. Soc. XX. 15. 1846 und *R. hoffmeisterianus* KTH. et BOUCHE, Ind. Sem. Hort. Berol. 1847. 14. Die letztgenannte durch Kultur im Garten besser bekannte Pflanze ist von dem Formenkreise der ostasiatisch-australischen *R. triphyllus* durch mehr elliptische nicht so tief eingeschnittene B. chen und durch die kurzgestielten in endständigen Trauben angeordneten Bl. verschieden. Ob daneben im Himalaya noch wirkliche Formen des *R. triphyllus* wachsen, bleibt zweifelhaft. Der eigentliche *R. triphyllus* hat, fährt FOCKE fort, tief eingeschnittene B. chen und lange, vorwiegend achselständige 1—3-blütige Bl.-Ästchen^{***}. Die Exemplare aus China (Schenst) tragen dagegen am Ende der Zw. mehrblütige traubige Blst. oberhalb des letzten Laubblattes (so auch an den oben von mir beschriebenen Pflz!). Durch längere Bl.-Stielehen und eingeschnittene Bezahnung unterscheiden sie sich von *R. hoffmeisterianus*; sie stehen jedenfalls dem eigentlichen *R. triphyllus* näher als dieser indischen Form.“

C C B. unterseits grün, $\cdot$ verstr. beh. Fig. 307 p, S. 505.

14. *R. rosaeifolius*^{†)}: schlanktriebiger, aufrechter, z. T. überhängender b, Zw. rundlichkantig, $\cdot$ hakenstachelig, wenigstens jung fein beh. und auch später gleich den B.-Flächen, den Bl.-Stielen und K. $\cdot$ mit feinen sitzenden goldigen Drüsen-schuppchen bekleidet!; B. vorwiegend 5—7-zählig gefiedert, $\cdot$ kurz beh. o. fast kahl, End-B. chen etwa 4:1,5—7:2,8 cm; Bl. und Fr. vgl. Fig. 309 f—g, zu 1—3 an seitlichen Kztr.

*) Beschreibung z. T. nach HOOKER, Bot. Mag. t. 4678. 1852.

**) Beschreibung nach japanischen Exemplaren von MAXIM., REIN, OLDHAM etc.

Ich kann mir über FOCKE nicht beistimmen, wenn er als Typ des *triphyllus* gerade die australischen Formen nimmt. Ein THUNBERG beschreibt japanische Pflz. und sagt ausdrücklich: flores in ramulis terminalibus, subpaniculatis. Meines Erachtens sollte man die japan.-chines. Formen als typischen *triphyllus* festhalten und die australischen so gut wie die himalayensischen abtrennen!

†) Beschreibung z. T. nach HOOKER, Ic. pl. IV. t. 349. 1841. — Man vergleiche übrigens MAKINOS Bemerkungen in Tok. Bot. Mag. XV. 49. 1901!

Besonders zu erwähnen: var. *coronarius* SIMS, Bot. Mag. t. 1783. 1816, Bl. gefüllt, dessen ältester Name *R. commersoni* POIR., in LAM. Dict. VI. 240. 1804, sein dürfte.

R. r. SM., Plant. Icon. 60. t. 60. 1789 (*R. sinensis* HORT.). — Ursprüngliche Heimat wohl China (Sz'tschwan, Fokien, Kwangsi), sonst von Jap. bis Java, Madagaskar, Mauritius und dem Kap, verbreitet, sowie nach W.-Indien, Brasilien.

Für uns, außer im Süden, wohl nur Kalthauspflze.! — Ihm steht nahe *R. sorbifolius* MAXIM. in Bull. Ac. Pétersbg. XVII. 158. 1872, aus Jap. (Kiuschiu), China (S.-Sz'tschwan) und Himal. (Khasia, Sikkim, ob noch weiter westlich?) im Gebirge bis 2000 m, abweichend vor Allem durch die stärkere Beh. der Zw. und die dichte Bekleidung dieser, der Blzw., Bl.-Stiele und K. mit feinen langen Stieldrüsen, in Bl. dem *rosaefolius* sonst sehr ähnlich, ebenso Fr., aber K. zur Frz. zurückgeschlagen. Die Drüsenpunkte fehlen, die Behen sind feinspitziger. Nicht in Kultur!). Hieran schließt sich ferner der einföhrungswerte *R. coreanus* MIQ., in Ann. Mus. Lugd. Bat. III. 34. 1867, aus dem Korea-Archipel und China (Kiangsi, Hupai, S.-Sz'tschwan). Nach dem mir vorliegenden Material: Zw. kahl, bereitt, nur hakenstachlig, Blzw. spärlich beh., B. 5-zählig gefiedert, Behen nur auf Nerven beh., unten heller, aus keiligem Grunde rhombisch-eifg. zugespitzt, End-Behen etwa 4:2 = 2,5 cm, eingeschnitten doppelt gesägt, Bl. zu 2—3, klein, ca. 1,5—2 cm Dm., K. lanzettlich, innen filzig, C. ?, Disc. und Gyn. beh., Gr. kahl, von den Stb. überragt. — Auch auf *R. taiwanianus* MATSUM., in Tok. Bot. Mag. XVI. 3. 1902 sei hingewiesen.

Ferner erwähne ich hier *R. niveus* THBG., Dissert. de Rubo 9. Fig. 3. 1813, nec WALL. (*lasiocarpus* SM., in REES Cycl. XXXII. No. 6. 1819), von dem die typische im Himal., den indischen Gebirgen, auf Ceylon und auf Sumatra, Java vorkommende Form zwar weißfilzige B.-Unterseiten hat und für uns kaum in Betracht kommt, von dem jedoch die von FOCKE, apud DIELS, in Engl. Jahrb. XXIX. 400. 1900, beschriebene Subspec. *inopertus* aus China (Hupai, Sz'tschwan) einföhrungswert scheint. Sie schließt sich in den lebersgrünen B. den eben genannten anderen Arten an. Die Bl. sollen größer als bei der Hauptart, die Zw. kaum bereitt sein. Hat Beziehungen zu der sikkimensischen *R. lasiocarpus* var. *rosaefolius* HOOK., Fl. Brit. Ind. II. 339. 1878.

2. B. immergrün, lederig, vgl. Fig. 311a, S. 519.

Sekt. 4. *Micranthobatus* FRITSCH, in Öster. Bot. Ztg. 1886. 259. kahle sparrige b, die größeren Arten klimmend, B. einfach o. 3-zählig o. gefingert 5-zählig, mit langgestielten End-Behen, Neb. klein, Bl. dioec., klein, in zusammengesetzten Blst.

15. *R. australis*: vielgestaltige Art, Zw. rundlich, kahl o. fast kahl, kaum bestachelt, B. kahl, o. nur auf Rippe fein beh., sehr variabel, mit hypodermalen Kollenchym, 3-5-zählig, Stiele und Stielchen lang reich hakenstachelig, Bl. in reichblütigen achselständigen Rispentrauben, die sich zu ansehnlichen rispigen Infloreszenzen am Zw.-Ende drängen, Achsen, Trgb. und K. filzig, Bl. bis 2 cm Dm., weißgellich, C. aus kurz genageltem Grunde breit eifg., 2mal so lang als K., Gyn. reduziert; Gr. kleiner, C. unansehnlich, kaum länger als K., Frkn. wenige, kahl, rudim. Stb. sah ich nicht. Es scheinen sich die verschiedenen Formen, deren genaues Studium noch nicht begonnen ist, verschieden zu verhalten.

R. a. FORST., Prodr. 40. 1786. spec. collect.! — Neu-Seeland. — Nur für die wärmsten Lagen im Schutz zu versuchen.

B. Fr. mit dem erweichenden Fr.-Träger verbunden abfallend (Brombeeren; Black-, Dew berries; Ronces).

Sekt. 5. *Eubatus* FOCKE, l. c. 148. — b-artige b mit kriechenden o. klimmenden, am Ende der Vegetationsperiode an der Spitze wurzelnden Zw., B. 3- oder 5-zählig gefingert mit langgestielten End-Behen und meist fädigen Neb. Formen durch Eur., W.-As., N. Afr., N.- und S.-Am. verbreitet. Für uns nur etwa folgende wichtig).

*) In Jap. nach MATSUMURA in Hondo, Schikoku und Liukiu, sowie in Formosa.

**) Der *sorbifolius* der Gärten ist *R. illecebrosus* FOCKE, in Abh. Ver. Bremen XVI. 278. 1899, eine kahle stachelige Staude! Heimat noch fraglich, wohl Japan.

***) In Anbetracht der geringen Zahl, die ich herausgreife, verzichte ich auf eine Anführung von Subsektionen.

I. B. unterseits deutlich weißfilzig. Zw. etc. nicht stieldrüsiger (vgl. II. s. S. 517. aber eventuell unter II).

C B. chen zieml. klein. Grund lang keilfg. (Fig. 311b, S. 519. Bl. zu 3—7 an kurzen Seitentrieben, deren oberste B. einfach sind.

16. *R. cuneifolius*: aufrecht o. aufsteigend vielästiger. 0,3—1 m hoher b. Zw. etwas kantig. feinfilzig. dgl. der Grund der zahlr.

Fig. 310. *Rubus*: *a—a'* *cuneifolius*: *a* Bl. im L.-Schn.; *a'* K. und C.; *a''* Frkn. — *b—b'* *ulmifolius* subspec. *anatolicus*: wie *a—a'*. — *c—c'* *laciniatus*: *c* wie *a*; *c'* C; *c''* K. — *d—d'* *enslenii*: wie *a—a'*. — *e—e'* *procumbens*: wie *a—a'*. — *f—f'* *trivialis*: wie *a—a'*. — *g—g'* *floridus*: wie *a—a'*. — *h—h'* *hispidus*: wie *a—a'* (Original).

Hakenstacheln. junge Triebe dicht graufilzig; B. 30—50-zählig. End-B. chen im Mittel 2,5:1,3—4:2 cm. ober. tiefgrün. fein beh.; Bl. 2—3 cm Dm., Stiele und K. beiderseits weißfilzig. Fr. braunschwarz. 1,5—2 cm lang, süßlich, sonst vgl. Fig. 310a—*a''*.

R. c. PURSH, Fl. am. sept. I. 347. 1814 — keilblättrige Brombeere. — ON.-Am. von Connecticut bis Florida, Louisiana, Missouri — In Sandboden. — Blz. V—VII. — Frz. VIII—IX. — In Kultur jetzt kaum vorhanden.

CC B.chen größer o. mehr rundlich (Fig. 311c—d, S. 519), Bl. in reichblütigen länger gestielten Rispen.

• Bl. weiß, • gefüllt, End-B.chen aus • keiligem Grunde schmal elliptisch o. breit elliptisch, vorn einfach spitz o. mit kurzer Zuspitzung.

17. *R. linkianus*: nach FOCKE (1902): Schößling kantig, kurz flaumig, gleich den Blzw., Bl.- und B.-Stielen hakenstachlig; B. ungleich grob gesägt, oft fast eingeschnitten, oberseits ziemlich kahl, sattgrün, unten auch im Schatten nicht ergrünend; Blst. ziemlich dichtrispig, nur am Grunde beblättert, nach oben zu kaum verjüngt, Bl. ca. 2,5—2,8 cm Dm., Fr. spärlich entwickelt.

R. l. SER., in DC. Prodr. II. 560. 1825 (*R. paniculatus* SCHLECHT., in LINK Enum. hort. Berol. 2. II. 61. 1822, non SM 1819). — Diese Form geht in den Gärten als *R. fruticosus fl. albo pl.*, ihre Herkunft unbekannt, sie stammt nach FOCKE wahrscheinlich aus Frankreich. — Blz. VII. — *R. linkianus* gehört in den Formenkreis der *R. pubescens* WH., in v. BÖNNINGH. Prodr. Fl. Monast. 152. 1824, auf den hier nicht eingegangen werden kann.

+ • Bl. rosa o. tiefrot, End-B.chen aus breit abgestutzter o. t. leicht herzfg. Basis eifg. bis ± rundlich.

+ oberer Teil der Blzw. sowie Blst.-Achsen dicht kurz weißfilzig, B.chen wie Fig. 311c—d, S. 519, Textur ± derb, End-B.chen ± rundlich.

18. *R. ulmifolius*: Schößlinge kräftig, bogig, kantig, • bereift, derb hakenstachelig, im oberen Teile ± filzig büschelhaarig; B. 3—5-zählig, oben tiefgrün, • beh., End-B.chen der Blzw. etwa 3:2,5 7:6,5 cm; Blst. schmalrispig, nur am Grunde durchblättert, Achse • bestachelt, Bl. etc. vgl. var.

Von dieser gemeinen vielgestaltigen, in der typischen Form als *R. rusticus* E. MERCI, in REUT. Cat. pl. Genève 2. ed. 279. 1861, von FOCKE geführten Art, interessieren uns hier nur 2 Typen. Zunächst var. *bellidiflorus* FOCKE, in Nat. Pfl. III. 3. 31. 1888 (*R. bell.* K. KOCH, Dendr. I. 293. 1869; *R. fruticosus fl. roseo pleno* HORT.) eine üppige reichblühende gefüllte Form, die mit ihren rosafarbenen Bl. den ähnlichen *R. linkianus* übertrifft.

Ferner der als Subspecies zu fassende *R. anatolicus* FOCKE, in Abh. Naturw. Ver. Bremen IX. 335. 1880 Bl. sattrosa-purpurn, etwa 2 cm Dm., C. außen kurz beh., Stbf. purpurn, A. beh., Frkn. am Gr.-Grunde mit langen und kurzen Haaren (vgl. Fig. 310b—b'), Fr. mittelgroß, schwarz. — I. G. Hercegowina, sonst Orient: Balkan, Ägypt., Syr., Mesopot., Kl.-As., Kaukasus; ob auch O.-Steil? Die Formen des Kaukasus scheinen einführungswert.

R. u. SCHOTT, in Isis 1818. 821. (*R. discolor* WH. et N., Rub. Germ. 46. 1825. ex parte). — Über Verbreitung der Art etc. siehe FOCKE, l. c. 501 ff. 1902. — Blz. VII—VIII. — Frz. VIII—IX.

++ oberer Teil der Blzw. und Blst.-Achsen ± kurz graufilzig, B.chen länglicher, spitzer, Textur dünn, Beh. unters. mehr grauweiß.

19. *R. armeniacus*: üppiger, 1—2 m hoher •, Schößlinge stark kahlend, kantig, mit kraftigen kantenständigen Hakenstacheln; B. 3—5-zählig, ungleich und etwas eingeschnitten schaut gesägt, oben bald fast ganz kahlend, lebhaft grün, End-B.chen eifg. o. elliptisch, selten rundlich, im Verhältnis zu unseren *ulmifolius*-Formen länger gestielt, (1,5—3,5 cm, 5,5:2,5—10:6 cm; Blst. langrispig nackte Rispen bis etwa 20 cm), Achsen • bestachelt, Bl. knapp 2 cm Dm., K. beiderseits filzig, zurückgeschlagen, C. • rot, etwas länger, Fr. schwarz, wohlschmeckend, ziemlich groß.

R. a. FOCKE, in Abh. Ver. Brem. IV. 183. 1874. — Transkaukasien, Armenien, W.-Ungarn. Blz. VII. Frz. VIII—IX. Diese Unterart gehört zur Hauptart *R. hedycarpus* FOCKE, Syn. Rub. Germ. 190. 1877, und insbesondere in den Formenkreis der *R. macrostemon* FOCKE, l. c., auf die hier nicht näher eingegangen werden kann. Wahrscheinlich ist es doch angezeigt für *macrostemon* den älteren Namen *armeniacus* zu setzen, da beide kaum zu trennen sind. Vgl. FOCKE, l. c. 509. 1902!

Im Anschluß an *armeniacus* sei noch erwähnt *R. persicus* BOISS., Fl. or. II. 693. 1872 (*R. raddeanus* FOCKE, in Abh. Brem. IV. 182. 1874, teste FOCKE!). Er scheint im wesentlichen durch noch zartere, kleinere, dünner beh. B., etwas größere, aber weniger zahlreiche, zu mehr ährigen Blst. vereinigte Bl. unterschieden zu sein, deren Stb. nur so lang als die Gr. und deren Frkn. kahl sind. Scheint nach v. SIVERS in Kultur zu sein. Ich sah ihn noch nicht.

II. B. unters. grün, sonst jedenfalls Stieldrüsen vorh.

- a. B. chen der 3--5-zähligen B. tief fiederspaltig bis doppelt gefiedert (Fig. 311 e, S. 519).

20. *R. laciniatus*: üppiger hochwüchsiger (bis über 3 m) b, Schößlinge olivpurpurn, kantig, fast kahl, mit ∞ , ziemlich derben kantenständigen Hakenstacheln. B. sehr variabel, obers. lebhaft grün, fast ganz kahl, unterseits weich grauhaarig und zottig gewimpert, zuletzt stark kahlend; Blzw. und Blst.-Achsen zottig büschelhaarig. Blütenrispen mäßig groß, im unteren Teile beblättert. Bl. rosa, etwa 2 cm Dm., K. geschwänzt, beiders. filzig, außen bestachelt, zurückgeschlagen, Fr. schwarz, wohlschmeckend, vgl. Fig. 310 c—c², S. 515.

R. l. WILLD., Enum. pl. hort. Berol. 550. 1809 (*R. vulgaris* var. *laciniatus* DIPP., Laubh. III. 529. 1893). — Diese Form, deren Herkunft noch nicht festgestellt ist, dürfte nach FOCKE (1902, S. 483) in den Formenkreis der *R. vulgaris* WH. et N., Rub. Germ. 38 (exkl. var. β , γ , δ) 1825, gehören. Es ist eine sehr ornamentale Kulturpflze. Nach BRITTON in N.-Am. in S.-New York, Pennsylv., Oreg. und Washington verwildert. — Blz. VI—VII. — Frz. VIII—X.

- b) B. chen weder tief fiederspaltig noch doppelt gefiedert.

1. Blst. vielblütige Rispen: Schößlinge, Blzw. und Blst. dicht drüsenborstig.

21. *R. platyphyllus*: nach FOCKE: üppiger, kräftig rankender b, Schößlinge rundlich, zerstr. beh., langborstig gerade bestachelt. B. meist 3-zählig, B. chen groß (12—14:6—9 cm), hautig, ungleich scharf und fast doppelt gesägt, beiders. + beh. und grün, End-B. chen verkehrt eifg. bis breit oblong, Grund leicht herzig, Spitze lang vorgezogen, mit 6—8 Paaren von Seitennerven. Blzw. lang, kräftig, verstreut bestachelt, Blst. unten beblättert, K. außen filzig und drüsenborstig, zur Frz. aufgerichtet (nach KOCH jedoch nicht), C. eifg., Stb. länger als Gr., Frkn. an Spitze beh.

R. p. K. KOCH, in Linnæa XVI. 348. 1842. — Kaukasus und Beschtan-gebirge (Pjatigorsk). Mir nur unvollkommen bekannte Art, auf die ich im Nachtrage zurückkommen werde, falls ich an dem vielleicht mit *caucasicus* identischen Kulturmateriale abweichende Beobachtungen machen sollte. Nach Angabe JENSENS in SPAETH, Katalog 116. 1904/05, sind die B. unters. weißgrau. Ihr schließt sich an *R. caucasicus* FOCKE, in Ver. Brem. IV. 183. 1874 (*R. scandiolicus* var. *cinereus* BOISS., Fl. or. II. 693. 1872, non *R. cinereus* DC.); der nach FOCKE im wesentlichen abweicht: durch filzige Blzw., behaartere Frkn., unters. fein weißfilzige B., deren End-B. chen je etwa 10 Seitennerven besitzen und 12—15:5—10 cm messen. Die Stacheln sollen leicht sichelig sein. Nach FOCKE, in Act. Hort. Petrop. XVI. 144. 1900, werden die B. chen zuweilen bis 19 cm lang und sind die Fr. groß, wohlschmeckend, Blz. VI, Frz. VII. Kaukasus (unter Lentechi et Tscholur). Wälder

2. Blst. wenig- (bis einblütig), traubig, Drüsenborsten nicht immer vorh.

○○ s. S. 521. ○ B. dünn, häutig, sommergrün*) (Fig. 311f—i, m).

* Schößlinge aufrecht, aufsteigend o. übergebogen**).

Infloreszenzachsen und B.-Stiele reichlich stieldrüsig, Blst. mehrblütig, traubig.

22. *R. nigrobaccus*: Zw. im Alter kantig, mit Hakenstacheln, 1—3 m lang; B. 3—5-zählig, B.chen, vgl. Fig. 311h—i, eifg. o. verkehrt eifg., 5—11 cm lang, spitz o. lang zugespitzt, grob und ungleich gesägt, wenigstens unten weich beh.; Bl.-Achse stieldrüsig, K. elliptisch-lanzettlich, 6—7 mm, lang zugespitzt, C. weiß o. rosa, 1—2 cm lang, verkehrt eifg. o. fast rundlich, Fr. eifg. bis kugelig eifg., 12—25 mm lang, schwarz, saftig.

R. n. BAILEY, Sk.-Ev. Nat. Fruits. 379. fig. 59, 60. 1898***) (*R. villosus* A. GR. et AUCT. PLUR., non ATT.). — Neu-Engl. bis Florida und Arkansas. — Trockene Böden, bes. in Gebüsch. — Blz. V. — Dieser Art steht nahe *R. allegheniensis* PORTER, in Bull. Torr. Cl. XXIII. 153. 1896, er soll etwas mehr aufrechten Wuchs, reichlicher drüsig beh. B. mit relativ schmalen, eilanzettlichen, eifg., elliptischen o. eilänglichen B.chen besitzen; Bl. bis 3 cm Dm., Fr. zylindrisch, 16—28 mm lang, mehr trocken, aber von eigentümlich aromatischem Geschmack. In trockenen, steinigen Böden von Ontario, New York und N.-Carolina; Blz. V—VI. — Beide Formen einfuhrungswert. Höchstwahrscheinlich gehört aber die als *R. n.* schon in Kultur befindliche Form zu einer von beiden, wenigstens kann ich sie nach RYDBERG kaum anders als *nigrobaccus* bestimmen. — An unsere Kulturform erinnert der Beschreibung nach auch etwas *R. ostryifolius* RYDBERG, in BRITT. Manual 497. 1901, an der Küste von New Jersey bis N.-Carolina, Flor., Louisiana: kriechender B., B. 5-zählig, B.chen eilänglich o. verkehrt eilänglich, 4—8 cm lang, ziemlich einfach gesägt, oben kahl, unten fein weich beh.; Blst. nur weich beh. (kaum drüsig), etwas stachelborstig, 1—5-blütig, K. eifg. etwas geschnäbelt, Bl. 1—2 cm breit, Fr. halbkugelig, unter 1 cm Dm., schwarz, ziemlich trocken.

++ Infloreszenzachsen zottig o. striegelhaarig o. fast kahl, spärlich (o. nicht) stieldrüsig.

Schößlinge reich hakenstachelig, B. 3(—1) zählig, B.chen kaum über 5 cm lang, unters. ± beh.

23. *R. floridus*: nach dem Originalexemplar†): Zw. kahl, purpurn, kantig, Stacheln kantenständig, kahl, flach; Blzw. seitlich, kurz, kaum 5 cm lang, mit wenigen B., deren untere 3-zählig, deren obere einfach sind, End-B.chen eifg., 1:0.5—3:2 cm, oben tiefgrün, fast kahl, unten, wenigstens auf Nerven beh., Zähnung ziemlich grob

*) Die folgenden Arten sind im wesentlichen nach RYDBERG in BRITTON, Manual 494. 1901 und in SMALL, Fl. south-east. States 516. 1903 beschrieben. Die amerikanischen Autoren beginnen jetzt ihre *Rubus*-Formen kritisch zu sichten, nur möchte ich dazu bemerken, daß sie wohl noch nicht so weit sind, die wirklichen „Artypen“ im Sinne FOCKES schon scharf herausgearbeitet zu haben und zur Zeit noch ziemlich ungleichartige Formen als Species nebeneinanderstellen. Immerhin lehrt mich schon das mir vorliegende Vergleichsmaterial, daß Begriffe wie *R. villosus*, *canadensis* etc. in der alten Umschreibung, wie bei FOCKE 1874, KOEHNE 1893 u. a. unhaltbar sind, d. h. höchstens Gesamtarten repräsentieren.

**) Ich hebe sehr ungern solche nur an der lebenden Pflanze nachweisbare Kennzeichen hervor, zumal ich glaube, daß eine genügend kritische Prüfung auch andere Kennzeichen geliefert hätte, allein da mir nicht von allen Arten amerikanisches Material mit den neuen Benennungen vorliegt, kann ich mich zu einer selbständigen Umarbeitung der RYDBERGSchen Bestimmungstabellen nicht entschließen. Es werden wohl noch Jahre vergehen, ehe wir über die *Rubus* von N.-Am. so gut orientiert sind, wie über die von Eur.

***) Leider konnte ich BAILEYs Arbeit nicht zu Gesicht bekommen. Sollte ein Leser in der Lage sein, sie mir auf kurze Zeit zu übermitteln, so wäre ich ihm sehr dankbar.

†) Die amerikanischen Autoren verkennen diese Form, denn weder die Angaben RYDBERGS, noch die Exsikkaten (det. BAILEY) stimmen mit dem Original TRATTINICKS. Ob dieses nun einer aufrecht wachsenden o. kletternd-kriechenden Form angehört, ist fraglich!

einfach o. doppelt, Stiel gleich Blzw. und Bl.-Stiel locker bis verstr. beh. und etwas fein drüsig, nicht drüsenborstig, Blst. etwa 4–6-blütig, untere Bl. in den Achseln der B., obere in denen von breit lanzettlichen Trgb., Bl.-Stiele etwa 1.5–2 cm, Bl.-Achse fein beh., K. außen kahl o. fast kahl, innen und am Rande weißfilzig, eilänglich, ca. 5–6 mm, C. weiß, etwa 15 mm, sonst vgl. Fig. 310, S. 515.

R. f. TRATT., Ros. Monogr. III. 73. 1823 (non RYDBERG vel BAILEY). — O.-N.-Am. (wo?). — Was RYDBERG aus Georgia und Florida beschreibt, weicht vor allem durch dicht seidig beh. Infloreszenzen ab, im übrigen sind seine Angaben für *Rubus* viel zu vag gehalten, um solche polymorphe Pflanzen nur halbwegs sicher zu identifizieren. Auch *R. frondosus* BIGEL., Med. bot. t. 38. 1826? (*R. villosus* var. *frondosus* TORR., in T. et GR. Fl. N.-Am. I. 454. 1840), von Prince Edwards Island bis Michigan und N. Carolina gehört in die nahe Verwandtschaft des *floridus*.

Fig. 311. *Rubus*: Blattformen von: *a australis*: End-B.chen — *b cuneifolius* — *c alpinifolius* subsp. *anatolicus* — *d ulmifolius* var. *bellidifolius*, End-B.chen — *e trinatus*, ein B.chen — *f caesus* — *g subungiflorus* — *h integrifolius* — *k hirsutus* — *l trivialis* — *m procumbens*. (Alles knapp $\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

Schößlinge fast oder ganz wehrlos, B. 5(–3)-zählig gefingert, B.chen 12–15:5 cm, beiders. kahl.

24. *R. canadensis*: Zw. rutig, aufsteigend, kahl o. die jungen Triebe schortig beh., 1.5–3.5 m; B. langgestielt, meist 5-fingrig, B.chen oval, dünn, spitz o. lang zugespitzt, rundlich o. verschmälert am Grunde, scharf, aber nicht sehr tief gesägt, End-B.chen 4–10 mm lang gestielt; Blst. locker-traubig, Bl.-Stiele schlank, aufstrebend, C. weiß o. rosa, 1.5–2.5 cm lang, Fr. oblong-zylindrisch, 1.5–2.5 cm lang, schwarz-saftig.

R. c. L., Sp. pl. 494. 1753. non AUCT. PLUR. (*R. mollispanghi* BRITT., in Bull. Torr. Cl. XVIII. 366. 1891). — Neu England, Adirondack Mts., Alleghenies bis Georgia, Alabama. Blz. VI—VIII. — Die sonst als *canadensis* gehenden Formen siehe unter *procumbens*. — An den *canadensis* schließen sich 2 reich bewehrte Formen an, die bei RYDBERG als *R. argutus* LINK. Enum. Hort. Berol. II. 60. 1822 und *R. betulifolius* SMALL. Fl. Southeast. States 518. 1903. figurieren. Der erste soll unterseits beh., doppelt gesägt, der letzte kahle, einfach gesägte B. haben. Ich vermag mit den gegebenen Diagnosen wenig anzutangen. Beide Formen sollen bes. in Georg. u. Alab. auftreten.

— — Schößlinge kletternd, kriechend o. niederliegend.

+ Blst. gewöhnlich mehr als 2-blütig.

— Bl. meist über 3 cm Dm., Blst. meist drüsenborstig. End-B. chen der Schößlings-B. am Grunde gerundet.

25. *R. invisus*: niedriger b., Zw. rundlich, mit schlanken, leicht gekrümmten Stacheln, B. kahl o. fast kahl, an Schößhugen 5-, an Blzw. 3-zählig; B. chen breit oval bis eilänglich o. eifg., einfach gesägt, 2—8 cm lang, lang zugespitzt, bes. an sterilen Trieben; Blst. wenigblütig, mit ziemlich verlängerten Bl-Stielen, K. geschwänzt, Fr. kugelig-oblong, 1—1,5 cm lang.

R. i. BAILEY, apud BRITT., Manual 498. 1901 (*R. canadensis* var. *invisus* BAIL., in Am. Gard. XII. 83. 1891). — New York bis Kansas und Alabama. Trockene Boden. Blz. VI—VII. — Ihm schließt sich eng an *R. roribaccus* RYDBERG, apud BRITT. l. c. (*R. canad. var. rorib.* BAIL., l. c.) aus Pennsylv., bis Virg. und N.-Carol., er soll mehr aufrecht sein (1—2 m), Bestachelung schwächer, B. weniger lang zugespitzt, doppelt gesägt, dünner und heller grün, Blst. reichblütiger, K. mehr lanzettlich, blattartig.

— — Bl. meist unter 3 cm Dm., Blst. nicht drüsenborstig. End-B. chen der Schößlings-B. keilig o. abgestutzt am Grunde.

26. *R. procumbens*: niederliegend, Zw. rundlich, kahl, mit verstreuten schwachen, leicht hakigen Stacheln, junge Triebe kaum beh., mit vereinzelt kleinen Drüsen, B. vgl. Fig. 311 m, meist 3-zählig, B. chen eielliptisch bis eirundlich o. mehr länglich und keilig, 2—8 cm lang, eingeschnitten gezähnt, spitz o. mit etwas vorgezogener Spitze, Bl. einzeln und langgestielt, o. in lockeren traubigen Blst., C. weiß o. rosa, verkehrt eifg. o. keilig, 10 mm lang, Spitze rundlich o. abgestutzt, Fr. halbkugelig o. eifg., 2—2,5 cm lang, schwarz, sehr süß und saftig.

R. p. MÜHLBG., Cat. ed. I. 50. 1813 (*R. canadensis* TORR. et GR., et AUCT. PLUR., nec L.). — Ont. bis Minnes., N.-Carol., Louisiana u. Ind-Terr. Blz. IV—V. — Unter dieser Form scheint RYDBERG das zu verstehen, was KOEHNE, FOCKE etc. als *canadensis* beschrieben. Ich finde allerdings an den mir vorliegenden von FOCKE bestimmten Expl. des *canadensis* nur Einzelblüten, man vgl. Fig. 310 e—e', S. 515. — Neben *procumbens* beschreibt RYDBERG, apud SMALL, Fl. south-east. States 516. 1903, noch einen *R. rhodophyllus* von Mississippi und Alabama und unterscheidet beide in der Hauptsache, wie folgt: *procumbens*: leaflets mostly acute or acuminate, glabrous or somewhat pubescent beneath; peduncles slightly villous. — *rhodophyllus*: leaflets mostly obtuse, tomentulose beneath; peduncles densely tomentulose or tomentose.

— + Blst. gewöhnlich 1—2-blütig (vgl. aber auch *R. procumbens* oben).

27. *R. subuniflorus*: habituell dem *procumbens* ganz ähnlich, aber bald durchaus kahl; seitliche B. chen am Grunde keilig, scharf gesägt mit 3-eckigen Zähnen, Bl. 3—4 cm Dm., meist einzeln, an langen achselständigen Stielen, diese zur Frz. so lang wie B., weiß; Fr. 1 cm lang o. kürzer, mit wenigen großen Fr. chen.

R. s. RYDBERG, apud BRITT., Manual 498. 1901 (*R. villosus* AIR., Hort. Kew. II. 210. 1780, non THURB. 1784). — Kuste von Maine bis S.-Carol. — Sandige trockene Boden. Blz. V—VII. Frz. VII—IX. — Mir scheint, daß die Identifikation dieser „kahlen“ Form mit dem typischen *villosus* nicht ganz richtig ist. Vielmehr halte ich das, was als *R. baileyanus* von BRITTON, in Mem. Torr. Club. V. 185.

1894 beschrieben worden ist und was dem *cillatus* var. *humifusus* TORR. et GR., Fl. N.-Am. I. 455. 1840, entsprechen soll, eher für den Typ des *cillatus*, also eine Form mit unters. beh. B. Außerdem soll nun neben dem *subumbellatus* noch die ebenfalls kahle *R. enslenii* TRATT., Ros. Monogr. III 63. 1823, treten, von dieser liegt mir das Original vor, welches ich, wie folgt, beschreiben möchte: Schößlinge sehr dünn, rundlich, kahl, fast wehrlos, mit wenigen sehr feinen Stachelchen, die anscheinend von den niederliegenden Schößlingen aufstrebenden 10—15 cm hohen Zw. jung beh., mit wenigen sehr feinen Drüsen und wenigen kleinen Stacheln. B. 3—4-zählig, jung beiderseits verstreut beh., später fast ganz kahl, beiders. grün. — dünnhäutig, B. chen aus keilfg. Basis — rhombisch eitzg., Zähnung einfach bis eingeschnitten lappig, nach Basis zu ganzrandig, End-B. chen 1,5 : 0,8—3,5 : 2,3 cm, Neb. lang lanzettlich; Bl. an den sehr kurzen 2—3-blättrigen Seitentrieben endständig, Stiel 2,5—4 cm, Dm. 2 cm, Bl.-Stiele und K. beiders. locker zottig, C. etwa 2mal so lang wie K., oblong, vgl. Fig. 310d—d¹, S. 515.

○○ B. ± derb, dünnlederig, ± wintergrün.

* Bl. 1—1,5 cm Dm., B. vgl. Fig. 311k, S. 519.

28. *R. hispidus*: aufrechter o. kletternder bis 3 m hoher b. Schosse dicht fein und lang hell stachelborstig (die Borsten sind kaum als Stieldrüsen anzusehen!), die ähnlichen Hakenstacheln z. T. wenig auffällig; B. meist 3-zählig, End-B. chen 3 : 2,5—4,5—5 : 3,5—4 cm, Basis ± keilig, darüber doppelt gesägt, Spitze stumpf o. kurz vorgezogen, zuletzt beiderseits fast ganz kahl und glänzend, Rippe unten und die Stiele stachelborstig; Bl. an kurzen seitlichen Trieben in achselständigen, langgestielten lockeren, wenigblütigen doldigen Rispen, weiß, Blst. beh., etwas stachelborstig und stieldrüsig, Trgb. — laubig, K. beiders. filzig, vgl. Fig. 310h—h², S. 515, Fr. ca. 1 cm Dm., mit wenigen Fr. chen, schwarz, sauer.

R. h. L., Sp. pl. 493. 1753 (*R. corymbosus* MCHX., Fl. Bor.-Am. I. 298. 1803). Neu-Schottl. bis Minnesota, Georg., Kansas — Wälder, Gebüsch, meist feuchte Orte. — Blz. VI—VII.

** Bl. 2—3,5 cm Dm., B. vgl. Fig. 311l, S. 519.

29. *R. trivialis*: kletternder o. niederliegender b. Schößlinge bis 3 m lang, rundlich, dicht stachelborstig (kaum drusig) und hakenstachelig; B. meist 3-zählig, bis ganz kahl, End-B. chen 2,5 : 1,3—4,5 : 2 cm, Stiele — beh. und bestachelt; Blzw. kurz (2—10 cm), — beh., z. T. bestachelt, hier und da mit Stieldrüsen, Bl. meist einzeln endständig, weiß, 2—3 cm lang gestielt, vgl. Fig. 310f—f¹, S. 515, Fr. oblong, 2,5 cm lang, schwarz, saftig.

R. t. MCHX., Fl. Bor.-Am. I. 296. 1803. — Virginia, südlich bis Flor. und Texas, in Sandböden. — Blz. in Heimat III, Frz. IV—V. — Bei uns im Freien kaum versucht. — Ob *R. flagellaris* WILD., Enum. Hort. Berol. 549. 1807, der nach FOCKE 1874 mit *enslenii* synonym sein soll, zu dieser Art (deren Name dann durch ihn ersetzt werden mußte) o. zu *trivialis* o. zu einer der 2 folgenden neuen gehört, ist mir unklar. RYDBERG erwähnt *flagellaris* nirgends und beschreibt im Anschluß an *trivialis* in SMALL'S Flora noch *R. persistens* und *R. rubrisetus*, beide sollen von *trivialis* vornehmlich durch meist corymbos verzweigte und mehrblütige Blzw. abweichen. Von *R. persistens* aus S.-Carol. bis Flor. und Mississippi sagt er: Bl.-Stiele nicht stachelborstig unter der Bl.-Achse, Zw. mit Hakenstacheln; dagegen von *R. rubrisetus* aus Miss. bis Louisiana: Bl.-Stiele dicht stachelborstig unter der Bl.-Achse und Zw. mit geraden Stacheln prickles und ∞ Stachelborsten (bristles). Ich sah im Herb. Bot. Wien, Expl. aus Louisiana (g. DRUMMOND) die leider nur sterile Schosse darstellen, und in der Bestachelung an *persistens*, in den 5-zähligen B. an *rubrisetus* erinnern; sie sind als *flagellaris* bezeichnet.

Gattung 135. *Potentilla**) L., Sp. pl. 495. 1753.

(*Dasiphora* RAF., Aut. Bot. 167. 1838.)

[Fingerkraut; Cinquefoil; Quinte feuille.]

Vgl. oben S. 500. 1. 2. selten $\varnothing$ bis kleine $\varnothing$. B. sommergrün. 3- bis vielzählig gefingert o. gefiedert, Neb. mit stengelumfassender B.-Basis verwachsen. Bl. einzeln o. in wenigblütigen Rispen endständig. weiß o. gelb. o. zuweilen mit Neigung zu Dioecie. K. und C. 5. Außen-K. vorh., Stb. 20-30. Gyn. ∞ mit je einer Sa., Gr. seitendständig. Fr. viele, nußartig hart, den S. eng umschließend, sich einzeln ablösend. E. ohne End. Von den über 300 Arten kommen für uns nur ca. 10-12 in Betracht**).

B. s. S. 525. A. Fieder-B. eben ganzrandig. Gr. kurz, nach oben verdickt (vgl. Fig. 313h, m, r).

1. B. eben oberseits lebhaft grün, fast stets kahl, auch auf der weißlich- o. bläulichgrünen Unters. hfg. kahl. Bl. weiß.

1. *P. davurica*: zwergiger o. bis 50 cm hoher, dicht kurz verzweigter, etwas niedergestreckter o. aufrechter $\varnothing$, Zw. jung lockerzottig beh., dann kahle. rissig, abfasernd: B. wie Fig. 313 (o) o. eher

*) Hinsichtlich der schwierigen Umgrenzung der Gattung sind die von POEVERLEIN bei ASCHERS. et GRAEB., Syn. VI. 665. 1904, gegebenen Darlegungen sehr interessant. Ferner sei vor allem auf A. RYDBERG, A monogr. of the North American Potentilleae (in Mem. Columb. Univ. II. 1898) verwiesen, der es versucht, durch Abtrennung bestimmter Sektionen als Gattungen, den Begriff *Potentilla* schärfer zu umgrenzen. Nach RYDBERG waren die für uns hier in Betracht kommenden $\varnothing$ -igen Arten, als Gattung *Dasiphora* zu fassen. Sie werden sonst als Sekt. *Trichothalamus* sensu FOCKE, Abh. N. V. Bremen X. III. 413. 1889, geführt. Da ich nur die $\varnothing$ -igen Arten näher untersucht habe, vermag ich nicht zu beurteilen, ob RYDBERGS, mir an sich sympathisches Vorgehen, auch genügend begründet ist.

**) Es sind außer den erwähnten Arten noch die folgenden 4, welche rasige, verholzende Zwerg- $\varnothing$ darstellen: *P. xylorrhiza* BOISS. et HORN., in Diag. p. X. 5. 1846, aus Cilic. und N.-Persien, äußerst knorrige, derbe Wurzelstöcke bildend, B. silbrig-seidig beh., Bl. klein, zu 1-2, weiß, Außen-K. kaum $\frac{1}{2}$, so lang wie K., Gr. fädig, fast zweimal so lang wie Stb.; ob Form der mir unbekannten *P. lignosa* W., in Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin VII. 293. 1813 (*Trichothalamus* 42. LEHM., in Nov. Act. Ac. Nat. Cur. X. 585. 1821) aus N.-Persien? *P. biflora* W., l. c. 297, aus dem Altai, Baikalseegebiet und arktischen N.-O.-Asien und N.-Amerika (Alaska, Wrangell-Inseln), winziger $\varnothing$ mit feinseidigen beh. B., Bl. gelblich, einzeln, ca. 15 mm Dm., Außen-K. von K.-Länge, Gr. fädig, den Stb. gleich lang. *P. eriocarpa* WALL., Cat. 1012. 1829, Kumaon, Nepal, Sikkim, China (Kansu, ex DIELS) mit kurzen schuppenblattigen Stichen, 3-zähligen, niedrig eingeschnittenen B., und meist einzelnen gelben Bl. bis 3 cm Dm., Außen-K. dem K. sehr ähnlich, Gr. und Stb. wie bei *biflora*. Ferner *P. inglesii* ROYLE, Ill. Him. Bot. I. 207. t. 41. 1839, in Kumaon und W.-Tibet, die den Eindruck einer Zwergform der *fruticosa* macht und von HOOKER, Flor. Brit. Ind. II. 348. 1878, auch als var. *inglesii* dazugestellt wird, sich aber wahrscheinlich ganz gut als Art halten läßt und der *P. rigida* näher steht (siehe bei *fruticosa*). Von *P. lindenbergii* LEHM., in OTTO Garten- und Blumenztg. VII. 339. 1851, sah ich keine Exemplare. HOOKER führt sie, l. c., als *fruticosa* var. *pumila* und außerdem noch eine var. *armerioides* aus Sikkim und Tibet, die mir ebenfalls fraglich ist. Alle diese Arten und Formen wurden interessante Kulturobjekte laden. VILMORIN führt in seinem eben erschienenen schönen und reichhaltigen Cat. prim. des Fruticet. Vilmoriniana 1904. 81, die nordamerikanische *P. tridentata* SOL., in ATT. Hort. Kew. II. 216. 1789 (*Sibbaldropsis* 62. RYDBERG., l. c. 1871) und die in M.- und S.-Eur. und dem Or. vorkommende *P. micrantha* RAM., in LAM. et DC., Fl. Fr. IV. 467. 1805, als $\varnothing$, beide aber sind reine 2. Das Gleiche gilt von VILMORINS *P. santalinoides* GREENE, in Pittonia I. 106. 1887 (*Desai sant.* GRAY, in Proc. Am. Acad. VI. 531. 1895; *Stellaropsis* sant. RYDBERG., l. c. 1851), die in der Sierra Nevada (W.-N.-Am.) vorkommt und durch ihre eher „Seidenboa“ nicht unähnlichen B. sehr auffällig ist.

kleiner, seltener 3-zählig. Neb. ziemlich grob: Bl. meist einzeln, etwa 1—2 cm Dm., nach LITWIXOW oberseits zuw. gelblich, sonst vgl. p—r.

S. d. NESTL., Comm. de Pot. 31. tab. I bis 1816 (*glabra* LODD., Bot. Cab. X. t. 941. 1824). — Dahurisches F. — Transbaikalien, wohl auch N.-China — steinige Berghänge etc. — Blz. V—VI. — In Kultur, aber noch selten.

1×2 *P. davurica* × *P. fruticosa*: *P. friedrichseni* SPÄTH [Cat. 1897]. In Mitt. d. D. D. G. 1896. 49 beschreibt KOEHNE diesen Bastard, der aus *S.* gefallen sein soll, den FRIEDRICHSEN im Hort. Bot. Copenhagen der *davurica* entnommen. Er sieht nach mir vorliegendem, von SPÄTH stammendem Material der *davurica* täuschend ähnlich, hat aber lebhafteres Laub und oberseits lichtgelbe, unterseits weißliche Bl. Wuchs, wie oft bei Bastarden, uppiger als bei den Eltern, bis über 1 m

Fig. 312. *a—d* *Acheranthus alpinus*: *a* ♂, Zw.; *b—c* Kn. (*a* mit Neb. N. (3) und B.-N. (2); *d* Zw. im Q.-Schn. (1—6, vgl. Fig. 240f, S. 375); — *e—l* *Potentilla fruticosa*: *e* ♂, Zw.; *f—h* die von der B.-Scheide (3) mit dem Neb. (1) umhüllte Kn., bei 2 die N. der B. Spindel; Kn. (*a*) ohne Scheidenhülle, *β* und 2 die B.-N.; *k* freie Kn. (1) vom unteren Zw.-Teil; *l* = *d*; — *m—p* *Peraphyllum ramosissimum*: *m* ♂, Zw.; *n—o* Kn.; *p* = *d*; — *q—t* *Amelanchier spicata* (*A. ovalis*): *q* ♂, Zw.; *r—s* Kn., *t* = *d* (Orig. nach C. K. SCHNEIDER).

II. B. chen trübgrün, oberseits kahl, unters. stark seidenzottig beh., Bl. gelb.

2. *P. fruticosa*: etwa bis 1 m hoher, aufrechter, in Tracht sehr variabler *b*, Zw. rundlich, zottig beh., bräunlich, Periderm bald stark abblätternd, Kztr. ∞. Kn. vgl. Fig. 312e—l; B. 5—7 zählig gefiedert, selten 3-zählig, in Form, Größe und Beh. sehr wechselnd, vgl. Fig. 313 a—c; Blst. ein- bis wenigblütig, vgl. d—h und var.

Der Formenkreis dieser Art bedarf noch einer eingehenden Untersuchung. Nach dem reichen von mir gesehenen Material bin ich überzeugt, daß sich eine Reihe guter Varietäten nachweisen läßt. Ich weise heute nur auf folgende hin.

var. *pyrenaica* W., in Mag. Ges. naturf. Fr. Berlin VII. 285. 1813 (*P. prostrata* LAPEYR., Hist. arb. Pyr. Suppl. 67. 1818), niedergestreckter, nur 20–50 cm hoher, kurzästiger B., B. schmallanzettlich bis länglich, Form der Gebirge, tritt in Eur. bis Sib. auf (ob aber diese Formen alle gleichwertig?). var. *tenuifolia* (LEHM., Monogr. 31. 1820) *P. t.* W., l. c., 284; *P. floribunda* PURSH, Fl. am. sept. 355. 1814; frut. var. *tenuiloba* SER., in DC. Prodr. II. 579. 1825) niedriger und stärker beh. als die typische Art, B. linealisch, gerollt, Gebirgsform aus O.-Asien und N.-Amerika, wohl auch Armenien; scheint sehr kulturwert und schließlich var. *grandiflora* W., l. c., 284, wie der Typ, B. relativ breit, Bl. sehr groß, ca. 3 cm Dm., vielleicht besser als Form der var. *vulgaris* W., l. c., 285, die den Typ darstellen würde, anzusehen. Scheint in deren Gebiet mannigfach aufzutreten. Das Gleiche gilt von *f. micrandra* *P. micrandra* KOEH., in Mitt. d. D. D. Ges. 1896. 48), die nur eine Form mit gynodynamen Bl. (Fig. 313i–l) darstellt, wie ich solche im Wiener Herbar wohl ein Dutzend Exemplare aus den verschiedensten Gebieten fand. Ebenso treten androdynamische Formen auf, deren Gyn. stark reduziert ist. Dies wird auch von ASCHERS. et. GRAEB., Syn. VI. 673. 1904, betont.

Fig. 313. *Potentilla*: a–h *fruticosa*: a–b B.-Formen; c B.-chen eines großen B.; d Bl.; e dgl. von rückwärts, ohne C., den Außen-K. und K. zeigend; f Bl. im L. Schn.; g C.; h Frkn. — i–l *fruticosa* f. *micrandra*: i halbe Bl. von außen mit einem C.; k wie f; l die staminodialen Stb.; m Frkn. — n *parvifolia*: B.; o Bl. von außen; p Bl. von außen; q Stb.; r Frkn. — s *saxatilis*: B.-chen; t Bl. von außen mit einem C.; u Frkn. im L.-Schn. (Original).

P. f. L., Sp. pl., 495. 1753 (*Dasiphora frut.* RAF., l. c.). — Strauch-F. — I. G. nur stellenweise verwildert (z. B. Elsaß, Schwaben, Franken, Fichtelgebirge), sonst spontan (nach ASCH. et Gr., l. c.), ital. Alp., Pyren., Engl., Irland, Insel Oeland, Kur- und Estland, Kauk., Ural, Sib., Inner-As. bis Himal., Jap. (die Gebiete in O.- und M.-As. z. T. unsicher, da mit anderen Arten vermengt!), in N.-Am. (nach RYDB., l. c.) von Labrad und Alaska bis New Jersey, Calif. und im Gebirge bis New Mex. u. Arizona. — Vorzüglich an steinigten Hängen, teilweise aber an feuchten Orten. — Blz. V–VII. — In Kultur nicht selten. — Nur eine var. der *fruticosa* ist nach LEHMANN, Rev. Pot. 17. 1856 *P. ochreata* LEDL., in WALL., Cat. No. 1028. 1829, von der ich Exemplare aus Ladak und W.-Tibet sah, die den Eindruck einer kleinen dicht seidig beh. Gebirgsart (4–5000), machen. In den Bl. scheinen gute Unterschiede zu fehlen. Der *fruticosa* steht sehr nahe *P. parvifolia*

*, Dieser Varietät steht sehr nahe die var. *humilis* RGL., apud SPATH, Catalog., welche nach Mitteilung des Herrn JENSEN von A. REGEL im Thianschan-Gebirge gefunden (vgl. Gartenfl. 1878. 37.), dann im Hort. Petersburg als var. *alpina* kultiviert und von E. REGEL in seiner russ. Dendrologie II. 516 als var. *humilis* kurz beschrieben wurde. Sie soll in mehreren Formen auftreten und bedarf noch des Vergleiches mit anderen Gebirgsformen. — Die von RYDBERG l. c. 190 geführte var. *monticola* mit den Synonymen var. *alpina* WATS. et ROTH., Cat. Pl. Wheel Surv. 1874 und var. *parvifolia* WATS., in Proc. Am. Ac. VII. 561. 1873 aus Nevada sah ich noch nicht.

Fisch., apud LEHM. Pugill. III. 6. 1831, aus dem Altai, ein zierlicher, bis etwa 40 cm hoher, ziemlich schlankästiger b., dessen 5-7-zählige B. meist nur halb so groß sind, wie auf Fig. 313n. Beh. ähnlich *fruticosa*, Bl. an dem mir vorliegenden Material 12-15 mm Dm., gelb, Außen-K. nur etwa $\frac{1}{2}$, so lang, wie K., sonst wie *fruticosa*. In Kultur kaum echt vorh.

An *fruticosa* schließt sich ferner an *P. rigida* WALL., Cat. No. 1009, ex parte, sensu LEHM., Rev. Pot. 19. 1856, von der mir Expl. aus Kamaon WALLICH, Gurhwa [FALCONER, 374] und Simla [THOMSON] vorliegen, die sämtlich 3-zählige B. haben, deren Behen im Mittel 1:0,4 cm messen, oben $\frac{1}{2}$ lang seidenzottig sind und unten meist ganz kahlen (unter dem Mikroskop leicht papillös!), Neb. groß, braunhäutig, Bl. gelb, ca 2 cm Dm., Außen-K. dem K. $\frac{1}{2}$ gleich, lte 2-teilig, Gr. $\frac{1}{2}$ gleich Stb. Eine Varietät der *rigida* scheint *P. arbuscula* DON., Prodr. Fl. Nepal. 256. 1835, zu sein, doch sah ich kein mit LEHMANN'S Angaben übereinstimmendes Material. Vielleicht ist dieser ältere Name allein beizubehalten.

B. Fieder-Bechen gezähnt, Gr. dünnfädig, nicht verdickt, Bl. weiß (Fig. 313s—u).

3. *P. salessowii*: bis meterhoher, einen rundlichen Busch bildender b., Ästchen dick, beschuppt, später abfasernd, Zw. beh.; B. 7-9-zählig gefiedert, bis 10 cm lang, Bechen bis 5,5:2,2 cm, oben sattgrün, kahlend, unten weißfilzig; Blst. 3-7-blütig, Bl. bis 4 cm Dm., zuw. leicht rosa.

P. c. STEPH., in Mém. Soc. Nat. Mosc. II. 6. t. 3. 1809 (*Comarum sal.* BGE., Ind. Sem. Hort. Dorpat 1830; *P. discolor* JACQ., Voy. d. d'Inde IV. 53. 1841-44). — Von Kaschmir (Ladak) durch W. Tibet und den Thian-Schan bis zum Altai. Gebirgshänge bis 4500 m. Blz. V-VI. — Schön, aber noch selten in Kultur.

An *Potentilla* schließt sich eng an die Gattung *Potania* MAXIM., in Bull. Acad. Pétersbg., XXVII. 466. (1881), die nur eine Art *P. mongolica* MAXIM., l. c., einen kaum 20 cm hohen, dichtästigen b. mit stark verholztem Wurzelstock umfaßt. Nach dem Autor sah ich noch kein Material dieses gewiß einführungswerten b. — sind die Zw. dicht bedeckt mit den bleibenden starren B.-Stielen, B. winzig, lederig, 3-5-zählig, Bechen 2:0,5 mm, Bl. achselständig, weiß, 3 mm Dm., überall seidig beh., K. 3, C. 3, Stb. 3, Gyn. 1, gleich Discus dicht seidig, Gr. grundständig, gegen Spitze allmählich verdickt, wenig länger als Frkn., Sa. 1, Fr. ? MAXIMO WICZ sagt: est in Asia (Centr. Mongolei) id quod *Purshia* cum affinis in desertis Americae borealis.

Gattung 136. *Dryas* L., Sp. pl. 501. 1753.

[Silberkraut; Mountain Avens.]

Vgl. oben S. 500; niederliegender Zwerg-b., B. immergrün, Neb. dem B.-Stiel angewachsen; Bl. meist 8-9(6-10)-zählig, weiß o. gelblich, anemonenähnlich, Stb. ∞ (über 40), 3-reihig, Gyn. ∞ , Fr. mit Federschweif. — 2 Arten*).

A. B. im Mittel 2:1 cm, Grund leicht herzfg., Bl. weiß, Stb. kürzer o. so lang wie K.

1. *D. octopetala*: Stämmchen bis ca. 30 cm lang, knorrig, mit hellgrauer, rissiger Rinde, Kztr. aufrecht, bis 10 cm, bräunlich, wie alle Zw. von Neb. zottig umhüllt; B. 1,5-3 cm lang, eilänglich, gleichmäßig kurzklappig kerbsäbig, oben sattgrün, kahl o. $\frac{1}{2}$ locker beh., unten weißfilzig-zottig, Stiele (ohne die Neb.) 0,5-1,5 cm; Bl. bis 8 cm lang gestielt, im Mittel 3 (bis über 4) cm Dm., Frst. bis über 12 cm lang gestielt, Fr. bis 4 cm, sonst vgl. Fig. 314o—s.

* Mir unklar und nach ASCHERS u. GRAEB., Syn. VI. 890. 1895, nur eben eine Zwergform von *D. octopetala* ist die *D. depressa* BAB., in Trans. Edinburgh Bot. Soc. I. 195. 1844, wo der Autor nur sehr unklare Angaben macht.

Man kann unterscheiden: var. *typica* BECK, Fl. Nied.-Öster. 763. 1892 emend.; B. eifg., durchweg kerbzählig, Bl. kaum unter 3 cm Dm.; hieher als Form 1. *lanata**) (*D. lanata* STEIN, apud CORR. in Gard. Chron. 1891. I. 340; var. *vestita* BECK, l. c.). B. oben zottigfilzig, bisher nur in Obersteiermark (zwischen Mühlsteg und Neuberg ca. 800 m., in N.-Tirol Kriental ad Kufstein, S.-Tirol (teste CORREYON) und im Unterengadin gefunden. var. *integrifolia* ZBL., in H. d. D. G. 209. 1903 (*D. integrifolia* VAHL, in Skriv. Naturh. Selsk. Kjöb. IV. 2. 171. 1768, B. mehr länglich bis eiförmig, ganzrandig o. höchstens im unteren Teil grob kerbzählig, kleiner und — gerollt, Bl. ebenfalls kleiner; nach BRITTON, Manual 1901, 509, Anticosti, Labrador, westlich durch das arkt. N.-Am. und Grönl., nach PURSH „White Hills“ (New Hampshire).

D. o. L., l. c. (*Geum chamaedrifolium* CRTZ., Stirp. austr. II. 7. 1863) — I. G. D. nur Alpengebiet der bayr. Hochebene, OC Alpengebiet von den Seealpen bis N.-Öster. und Küstenland, Kroat., Bosn., Herzegov., Karpat. des Banats und Sib., westlich nach ASCHERS. et GRAEB. bis zu Choč und Rožudec, Sch. durchs ganze Alpengebiet; sonst noch Montenegro, Balkan, Italien, Pyrenäen, Großbrit., Skandinav., Gebirge N. As. und arkt. Zone, sowie in N.-Am. in den Rocky Mts. südlich bis Utah und Color. In Felspalten, in Gerollen, auf Alpenwiesen, bes. auf Kalk. Blz. V—VI—VIII—IX. Frz. VII—X. Seit langem in Kultur.

B. im Mittel länglich, bis 3:1.5 cm, Grund keilig, Bl. gelblich, Stb. länger als K.

2. *D. drummondii*: von *octopetala* noch — abweichend durch: B.-Stiel hfg. eher länger als B., Bl.-Stiel zuw. 2-blütig, K. außen drüsig, Stbf. beh., Fr.-Stiel bis 20 cm; Fr.-Gr. bis 4 cm, vgl. Fig. 314t w.

D. d. RICH., in HOOK. Bot. Mag. t. 2972. 1830. — Nach BRITTON: N.-Am.: on gravel, Gaspé, Quebec, Anticosti and Labrad., throughout arctic Am. and south to Montana sowie auch in den Rocky-Mts. von Oregon, nach FOCKE auch O.-Sib. — Sonst wie vorige.

Gattung 137. *Fallugia* ENDL., Gen. pl. 1246. 1836 40.

Siehe oben S. 500 und Art. Nur diese bekannt.

F. paradoxa: b. 0.50—0.90 m, reich steif verästelt, buschig, aufrecht, — und — Zw. dicht weichflockig, weiß o. bräunlich (leicht drüsig), wollig, später kahl, hellweißgrau, Rinde rissig; B. zerstreut o. gedrängt sitzend, 7—15 mm lang, an Spitze 3—5(—7) fiederspaltig mit schmalmealer Basis, Fiedern etwas schmallänglicher als bei *Cocania* (Fig. 314a), Rand — umgebogen, Beh. wie bei den Zw. o. länger zottig und — drüsenlos; Bl. zu 1—3 (o. mehr?) am Ende seitlicher 5—20 cm langer beblätterter Zw., bis 3 cm Dm., gelblichweiß, — o. polygam, dann in — das rudim. Gyn. wie bei *Cocania* (b), Stb. in 3 Reihen (i) in — Frkn. sehr ∞, Frst. sehr an *Clematis* erinnernd, sonst vgl. g — n.

F. p. ENDL., l. c. (*Sieversia paradoxa* DON, in Trans. Lin. Soc. XIV. 575. 1823; *F. mexicana* WALP., Rep. II. 16. 1843). W.-N.-Am. Calif. im Gebiet der Providence Mts., sowie nordöstl. bis S.-Nevada und S.-Utah, südöstlich und südlich bis Arizona, New Mexico, W.-Texas. — Sonnige Gebirgshänge auf leichtem Kalk- und Sandboden. Blz. in Heimat IV—VII. Frz. VII—IX. In Kultur noch kaum erprobt.

*) Durch die Angabe ZABELS, l. c., und VILMORINS, Frut. Vilm. I. 81. 1905, daß eine *D. lanata* in Kultur sei, wurde ich auf die Notiz von CORREYON aufmerksam, die von ASCHERS. et GRAEB. untersucht wurde. Ich fand nun im Herb. Wien ein Expl. A. KERNERS aus N.-Tirol, das als var. *mexicanus* KERN. bezeichnet war, und mit BECKS var. *vestita* übereinstimmt. Die *lanata* STEIN aus S.-Tirol sah ich noch nicht, sie scheint aber ebenfalls mit diesen Formen identisch zu sein und von besonders sonnigen Standorten zu stammen, wo sie auffällig reich beh. ist.

Gattung 138. *Cowania* DOX. in Trans. Lin. Soc. XIV. 574. 1823.

[Felsenrose; Cliff-rose.]

Vgl. oben S. 500; b. B. immergrün, gelappt o. fiederzählig. Neb. bleibend. Bl. einzeln endständig an Kztr., hfg. polygam. K. imbrikat. 5. C. 5, ausgebreitet. Stb. ∞ (bei *mexicana* in 2 Reihen). Gyn. 4—12. Gr. mit endständiger N., an der Fr. als Federschweif. — Arten erwähnt*).

A. B. fiederig gelappt mit sitzenden Drüsen. Bl. weiß, wie Fig. 314a.

1. *C. mexicana*: reichästiger mit ∞ (nicht stechenden) Kztr. besetzter, 0.3—2 m hoher b. Zw. meist noch beh., Äste mit heller, reichlich rissiger, korkiger Rinde. Kztr. beh. (auch drüsig und dicht mit

Fig. 314. a—f *Cowania mexicana*: a Zw. mit B. und Bl.; b ♂ Bl. in L.-Schn., rechts die 2-reihige Anordnung der Stb.; c C.; d Stb.; e Fr.; f dgl. im L.-Schn. mit S. — g—n *Fallugia paradoxa*: g Bl. von unten; h C.; i 3-reihige Anordnung der Stb. schematisch; j Stb.; k Bl. im L.-Schn., oben N. vergr.; l Fr.; m E. — o—s *Dryas octopetala*: o Bl. im L.-Schn.; p K.; q C.; r Stb.; s Frkn. im L.-Schn. — t—w *D. drummondii*: t = o; u K.; v C.; w Stb. (a nach DOX, sonst Original).

den B.-Basen und bleibenden Neb. besetzt: B. lederig, meist gebüscht, bis ca. 1 cm lang, 3—7 fiedrig-lappig, oben sattgrün, drüsig, unten weißfilzig beh., Rand zurückgerollt: Bl. wie oben und Fig. 314 a—f, Fr. etwa zu 5—11.

*) Durch einfach linealische Rollblättchen (4—6 mm lang) von den anderen Arten abweichend ist die wohl sehr seltene, mir noch unbekannte *C. ericaefolia* TORR., Plant. Fren. 12 1850 et GRAY, Pl. Wright II 106 1853, ein kleiner, bis 0.5 m hoher, lederartige B. Bl. kleiner noch als bei *C. mexicana*, von bekannt von Presidio del Norte S. Texas (Grenze von Mexico). Mit dieser Art scheint sehr nahe verwandt *C. havardi* S. WATSON, in Proc. Acad. Boston XX. 364 1885, ein dem Autor nach bis fast 1 m hoher B. aus W.-Texas, der vielleicht nur eine uppige Form jener darstellt, obwohl WATSON auffälligerweise gar nicht auf *ericaefolia* hinweist.

C. m. DON, l. c. (*C. stansburiana* TORR., in STANSB. Exped. Utah 386. t. 3. 1852, teste S. WATS.) — Ich sah Expl. aus M.-Mexico (Guanajuato), nach S. WATS. tritt sie ferner in New Mexico bis N.-Utah und S.-Nevada auf. — Was in Kultur gekommen ist, stammt aus S.-Nevada, es scheint mir mit dem identisch zu sein, was GOODING in Bot. Gaz. XXXVII. 55. 1904 als *C. alba* beschreibt. Leider ist mein Material aus Nevada zu gering, um zu entscheiden, ob man wirklich die nördlichen Formen von denen Mexicos trennen kann und wie dann beide Arten geographisch sich abgrenzen. GOODING sagt: this elegant species cannot said to be closely related to any other. The number of the akenes, 2–3, and the shape of the leaves are very characteristic. Mein von PURPS in den Charleston Mts. gesammeltes Expl. hat 4-zählige Frst. und kaum scharf von denen der *mexicana* geschiedene B.

B. spatelig, : tief gezähnt, gleich den Zw. und Bl. mit gestielten Drüsen, Bl. purpurrot.

2. *C. plicata*: diese in der Tracht *mexicana* wohl ähnliche, durch ihre stiel-drüsige Bekleidung auffällige Art, besitzt B. bis 1,8:0,7 cm, Bl. bis etwa 3 cm Dm., deren C. bis 1,2 cm breit sind.

C. p. DON, in SWEET Flow. Gard. 2. ser. t. 400. 1838 (*C. purpurea* ZUCC., in Abh. Ak. Münch. IV. 2. 7. t. 2. 1843). Mexico (Coahuila). Wohl ebenfalls Standorte wie *Palluza*, Blz. Sommer. Anscheinend viel schöner als *mexicana* resp. *alba*, aber wohl empfindlicher.

D. s. S. 534. Unterf. *C. Cercocarpeae* FOCKE l. c. 38. — Sehr verschiedenartige b. B. fast stets immergrün, Bl. meist ♀, Bl.-Achse (bez. der Discus!) krugfg. bis röhrig, wenigstens teilweise an der Fr. bleibend, diese aber nicht völlig umschließend, Stb. 15—∞, Gyn. 1(—2), in Bl.-Achse grundständig mit end- o. seitenständigen Gr.

Gattung 139. *Purshia**) DC., in Trans. Lin. Soc. XII. 157. 1817.
(*Kunzia* SPRENGEL, Anleit. II. 2. 869. 1818.)

Vgl. oben S. 500: wehrlose b. B. klein, gebüschelt, immergrün (?), Neb. klein, Bl. an seitlichen beblätterten Kztr. meist einzeln, ♀, K. 5, bleibend, C. 5, Stb. 25 in einer Reihe, Gyn. 1(—2), gestielt, in den Gr. verschmälert, dieser mit herablaufender N., Sa. 1, aufsteigend, Fr. beh. Achaene, S. ohne End. — Nur folgende Art.

A. B. im Mittel 8–15 mm lang, : flach, ober. : , unters. weißgrau zottig beh., Drüsen nicht hervortretend, Fr. nur etwa $\frac{1}{2}$, vom Receptac. umhüllt.

1. *P. tridentata*: aufrechter, buschiger b. bis 3 m hoch, Zw. jung graufilzig, : bräunend und kahlend, zuletzt grau, rissig, vgl. Fig. 3151 p; B. breit spatelig, am Ende stumpf 3-kerblappig o. mehr fiederspaltig gelappt; Bl. lebhaft gelb, wie Fig. 317 a, meist aber kleiner, Bl.-Achse : drüsig, Fr. etwa 8–10 mm lang ohne den bis 5 mm langen Gr.-Schnabel.

P. t. DC., l. c. (*Tigaraea trid.* PURSH, Fl. Am. sept. I. 333. t. 15. 1814; *Kunzia trid.* SPRENG., l. c.). — Calif., eastern slope of the Sierra northward (nach GREENE), von wo sich ihr Gebiet durch S.-Nevada und Utah bis nach Colorado zu ziehen scheint. Vgl. folgende Art.

*) GREENE gibt in Pittonia II. 299. 1892 an, daß der Name *Purshia* schon 1813 bei RAFINESQUE „in print“ war. Also, da dieser Autor etwas anderes damit bezeichnete, *Kunzia* an seine Stelle treten müsse. Soviel ich erfahren konnte, ist RAFINESQUES *Purshia* erst 1890 publiziert worden. Die SPRENGELSche *Purshia* erschien 1817, im selben Jahre wie DC.s Name, allein SPRENGELS Name ist synonym von *Ostrya dum.* MCHX. 1803, also muß DC.s Name bleiben.

B. B. im Mittel kleiner, stark gerollt, so daß sie unters. kaum weißzottig aussehen, die Drüsenpunkte deutlich, Fr. $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{3}$ von Recept. umhüllt.

2. *P. glandulosa*: nach GREENE mehr ausgebreitet sparrig ästiger b, alles in allem etwas unansehnlicher, sonst vgl. Fig. 317 b—f, S. 533.

P. g. CURR., in Bull. Calif. Acad. I. 153. 1885 (*Kunzia gland.* GREENE in Pitt. II. 299. 1892). — GREENE gibt als Heimat an (Fl. francisc. I. 59. 1891): on the Mohave slope of the Kern Co Mts. in Calif. and eastward in Nevada Ich sah Expl. aus Calif. (Ventura, County [lg ELMER, No. 3736] und aus den Rocky Mts. GEYER n. 272, am unteren Platte-River, Color.). Alles in allem bin ich doch sehr im Zweifel, ob diese Art mehr als eine Form der vorigen ist. Alle Unterschiede scheinen schwankend und die geogr. Verbreitung scheint die gleiche Blz. Heimat VI, Frz. VII. — Nach PURPUS soll man diese Felsen-b in sandigen o. sandig-lehmigen, unbedingt durchlässigen Boden an recht sonnige freie Stellen pflanzen. Dann gedeihen, wie ich im Bot. Garten zu Darmstadt selbst sah, dieselben recht gut.

Fig. 315 a—f *Mespilus germanica*: a—c Zw.; b—c Kn.; d Kn.-Sch.; e Zw. mit Dorn-Kztr.; f Zw.-Qu.-Schn. (vgl. Fig. 240f, S. 375). g—h *Photina villosa*: g—h Zw.; i B.-N.; k—l f. m—p *Purshia tridentata*: l—m Zw.; n—o B.-Basis mit Neb.; p—f. = q—r *Cercocarpus* (*Nuttallia*) *cerastifolius*: q—r Zw.; r—s Kn. mit kurzen Stiel (a); t Wimperung der Kn.-Sch.; u—v Kn.-Kztr.; bei β — δ kleine Kn.; w=f (Orig. nach C. K. SCHNEIDER).

Gattung 140. *Cercocarpus* KUNTH, in H. B. Nov. Gen. pl. VI. 232. 1823.

[Schweiffrucht.]

Vgl. oben S. 500, b—h. B. meist immergrün, Neb. lanzettlich, abfällig; Bl. (zuweilen androgyn), Bl.-Achse röhrig, am Ende plötzlich

) Diese kleine, aber formenreiche Gattung konnte ich auf Grund sehr reichen Materials untersuchen, da Herr Prof. IRELAND die Güte hatte, mir das Herbar des

becherförmig erweitert, dieser Bechersaum zur Frz. abreißend, K. -- so lang. 5, C. fehl., Stb. 15-25, in 3 Reihen angeordnet, Gyn. 1, in Bl.-Achse eingeschlossen, nur Gr. mit N. herausragend, N. kurz herablaufend, Sa. 1, aufsteigend, Fr. von Bl.-Achse ganz o. zu $\frac{2}{3}$ umhüllt, mit langem Federschweif, S. ohne End. — Arten sämtlich erwähnt.

A. B. groß, kaum unter 3:2 cm und stets derblederig*).

I. Seitennerven auch an den kleinen B. 7 oder mehr, beiders. sehr scharf markiert (Fig. 318a, S. 534).

1. *C. fothergilloides*: $\bar{b}$ bis kleiner $\bar{b}$, Zw. anfangs filzig, später — beh., rissig, Stamm mit rissiger Borke; B. 2,5-4,5:1,5-3,5 cm, Seitennerven 7-10, jung beiders. filzig, dann oben lebhaft grün, -- kahlend, unten grau beh., auf den Nerven kahlend; Bl. zu 8-10 o. mehr gebüschelt, Röhre etwa 9 mm lang, Becher ca. 5 mm breit, Stiel 4-10 mm, Fr. vgl. Fig. 318b.

C. f. KUNTH, in H. B. I. c. 233. t. 559. — Mexico (Mexico, Guanajuato). Blz. IV in Heimat. — Noch nicht eingeführt. Ihm steht sehr nahe *C. macrophyllus* C. K. SCHN. (Sonderarbeit), dessen B. (4-5) 9:2-4(5) cm messen und 9-15 Seitennerven zeigen. Mexico (Orizaba, Oaxaca).

II. Seitennerven, auch der größeren, bis 7 cm langen B. nur 7-8, also entfernter, B. mehr eirundlich (Fig. 318c).

2. *C. traskiae*: kleiner $\bar{b}$ — $\bar{b}$, bis über 6:0,3 m, raubborkig, sonst vom vorigen noch abweichend durch: junge Zw., junge B. und Bl. weiß filziger beh., B. 2:1-6,5 cm, Zähnung gröber, aber Rand meist umgebogen, Stiel 3-6 mm; Bl. etwa zu 4-8, aber mehrere Büschel oft gehäuft, nicht alle, sondern z. T. androgyn., Röhre 8-9 mm lang, Becher 5-7 mm Dm., Stiel kaum 1 mm, Fr. ca. 1 cm, Schweif ca. 5 cm.

C. t. EASTW., in Proc. Cal. Ac. I. 136. t. XI. fig. 7a-e. 1898. — Calif. (Santa Catalina Island, auf vulkanischem Boden). — Blz. V. — Im Hort Bot. Darmstadt versuchsweise eingeführt. Wohl ziemlich empfindlich. — An ihn schließt sich eng an *C. mojadensis* C. K. SCHN. (Sonderarbeit) aus Mexico (Sierra Mojada Mts.), zu dem auch eine Form aus Oaxaca nahe Beziehungen zeigt. Die Gattung gliedert sich in kleine geographisch ziemlich eng lokalisierte Arten, die sich, wie ich in der Sonderarbeit ausführe, auf 3 Haupttypen zurückführen lassen dürften.

B. B. kleiner o. wenn nicht, so doch von mehr häutiger, dünner, nicht derblederiger Textur, sonst -- gerollt.

I. B. flach, -- eifg., eilänglich o. verkehrt eifg. **) (Fig. 318d-i, S. 534).

a) B. mit jederseits 5-6 Seitennerven, vgl. Fig. 318d-f. Textur ziemlich dünn und glatt, obers. lebhaft grün, (wenigstens fürs

Missouri Bot. Garden zu senden, wofür ich ihm zu großem Danke verpflichtet bin. An dieser Stelle muß ich mich auf die notwendigsten Angaben beschränken, weise daher die Leser auf meine Sonderarbeit hin, die in The Botanical Gazette erscheinen wird.

*) Meine Versuche, die Blattanatomie zur scharferen Unterscheidung der oft recht ähnlichen Arten heranzuziehen, ergaben keine brauchbaren Resultate. Ich möchte jedoch bemerken, daß der Bau der *Cercocarpus*-Blätter im allgemeinen eine eingehende anatomisch-physiologische Untersuchung verdient. Diese xerophytischen $\bar{b}$ bieten in mehrfacher Hinsicht sehr interessante Momente dar. So tritt regelmäßig unter der englamigen, von einer oft mächtigen Cuticula überzogenen Epidermis ein weitmaschiges hypodermiales Gewebe auf, was vielleicht ein Wasserspeichergewebe darstellt und meist auch auf der Unterseite wiederkehrt.

**) Zu dieser Gruppe gehört noch der durch winzige Blütchen (mit Becher nur 6-7 mm lang) ausgezeichnete *C. breviflorus* GRAY, Plant. Wright. II. 54. 1853, deren Typ aus New Mexico (El Paso) 8-14 mm lange, anliegend seidig beh. B. zeigt, während eine var. ? *eximius* C. K. SCHN. (Sonderarbeit), New Mexico (El Capitan Mts.) bis 28 mm lange filzig weichbeh. B. zeigt. Ferner *C. treleasei* C. K. SCHN. (Sonderarbeit), Mexico (San Louis Potosi), B. nur 5-11 mm lang, abstechend reichlich zottig beh., außerdem unters. weißfilzig.

Auge) kahlend, unten hfg. auch, Zähnung im allgemeinen feinkerbig, wenig auffällig.

3. *C. betulaefolius*: b o. bis 5 m hoher b, Borke dünn, flockig, Zw. jung — beh., ☉ hfg. kahl, purpurbraun, B. 1,2:0,8 - 5:2,5 cm, Stiel bis 1 cm; Bl. und Fr. vgl. Fig. 316a - e, Fr. bis 12 mm, und Stiel bis 1 cm.

Man kann unterscheiden: var. *typicus*: B. kaum unter 2 cm lang, bei f. *glabrescens* sehr stark kahlend. — var. *minor*: B. kaum über 1,5:1 cm, wie beim Typ beh.

Fig. 316. *Cercocarpus betulaefolius*: a Zw. mit Bl.; b Bl. im L.-Schn. und N.; c Stb.; d Fr.; e dgl. und S. im L.-Schn. — f *Adenostoma fasciculata*: f Zw. mit B. und Blst.; g Bl.; h Blattbüschel; i Bl. im L.-Schn.; k K.; l Trgb.; m Gyn. im L.-Schn.; n St. — p *Coleogyne ramosissima*: p Bl.-Kn.; q Zw. mit Bl.; r Bl. im L.-Schn.; s Trgb.; t Stb.; u Gyn. im L.-Schn. mit 1 und 2 Sa., sowie N; v S. im L.-Schn. (a nach HOOKER; f - g nach FOCKE; p - q nach TORREY, sonst Orig.).

C. b. NUTT., in HOOKER Icon. pl. IV. t. 332. 1846 (*C. betuloides* NUTT., in TORR. et GR., Fl. of N.-Am. I. 427. 1840; *parvifolius* NUTT. var. *glaber* WATS., Bot. Calif. I. 175. 1876; *parv.* var. *betuloides* SARG., in Gard. a. For. [teste GREENE]) — Birkenblättrige S. — W.-N.-Am., californisches Küstengebiet, jedenfalls typisch nicht außerhalb Calif. — Blz. III - V — Frz. VI - VIII, in Heimat — In Kultur, nur wohl minder hart als *parvifolius*. Diese beiden Arten sind gut geschieden, namentlich hinsichtlich ihres geographischen Vorkommens, so ähnlich sie in einigen Formen sein mögen. Aber gerade das mir vorliegende sehr gute und reiche Material zeigt, daß man bei einiger Vertrautheit mit den (schwer in präzise Worte zu fassenden) Blatteigenschaften sie stets auf den ersten Blick scheidet. Der von HOOKER wohl nur einige Wochen vor TORR. et GR. publizierte Name *betulaefolius* hat die Priorität vor *betuloides*. Bei *parvifolius* haben beide Autoren den echten Typ NUTTALLS aus den Rocky Mts. (Platte River) vermengt mit DORVILLE'schen Exemplaren aus Calif., die zu *betulaefolius* gehören und HOOKER hat auf Tafel 333 solch

ein DOUGLASSches Expl. fälschlich als *parvifolius* abgebildet^{*)}. Eine abweichende Form ist *C. paucidentatus* BRITT., in Trans. New York Acad. XIV 31. 1894 (*parvifolius paucidentatus* S. WATS., in Proc. Am. Ac. XVII. 353. 1882), die BRITTON „the common species in New Mexico and Arizona“ nennt. Nach einem mir vorliegenden Expl. aus den Mogollon Mts. (lg. RUSBY 125) zu urteilen, gehört diese Form als var. zu *betulaefolius*, erinnert aber in Beh. stark an *parvifolius*.

- b) B. mit jederseits nur 4-5 Seitennerven, dicklicher, oberseits trübgrün, stets zottig beh., unterseits filzig und etwas zottig, Zähnung besonders auch kleiner B. viel auffälliger. (Fig. 318g—i, S. 533).

4. *C. parvifolius*: von vorigem noch abweichend: stets b, Borke dick, rissig, nicht abschuppend (teste GREENE!); B. kaum über 3,5:1,8 (-2,5) cm, meist nach der Basis zu schärfer keilfg. (allein dies von GREENE**) so betonte Merkmal nicht immer zutreffend). Bl. ohne deutliche Unterschiede, bei beiden Arten (wie auch Fr.) in Größe etc. wechselnd.

C. p. NUTT., in HOOK., l. c. (sine tabula), et apud TORR. et Gr., l. c. ex parte. — Kleinblättrige S. — W.-N.-Am. (New Mex., Col., W.-Kansas, W.-Nebr., W.-S.-Dakota, Utah, Wyoming). Blz. V, Frz. VIII (Heimat). In Kultur, und wohl neben *ledifolius* härteste Form. Besonders stark beh. war eine Form aus Nebraska, die ich var. *hirsutissimus* nenne. Eine andere aus Utah (lg. SIMPSON-ENGELMANN) ist sehr zierlich, leider nur in sterilem Material vorliegend, ich stelle sie vorläufig als var. *minimus* hierher. B. nur etwa 5.5 mm, rundlich lächertg., zottig beh.

- II. B. völlig gerollt o. jedenfalls lanzettlich mit stark umgerollten zahnlosen Rändern. Textur derb lederig (Fig. 318l—m, S. 533).

5. *C. ledifolius*: b $\frac{1}{2}$, bis 5 m, Zw. jung beh., c kahl. c grau, glattrindig: B. im Mittel etwa 2-2,5:0,6-0,9 cm, nur Ränder ungerollt, oben lebhaft grün, fürs Auge kahlend, Nerven kaum zu sehen, unters. weißgrau filzig: Bl. zu wenigen gebüschelt, Röhre 4-7 mm, Becher ca. 5-6 mm Dm., K. relativ länger als sonst, zuw. länger als Becher, A. kahl (ob immer?), Fr. 8-12 mm, Schweif 3-5 cm.

C. l. NUTT., in HOOK., l. c. t. 334. — Porstblättrige S. — W.N.-Am. (in Calif. von den San Bernardino Mts. im S. bis zu den Siskiyou Mts. im N., Oreg., östlich bis Utah (Hauptzentrum), Col., Idaho). Blz. V-VI, Frz. VII-VIII.

Ihm steht sehr nahe der kahle o. fast kahle, überaus zierliche (B. wie Fig. 318k), niedrige, sparrige *C. intricatus* S. WATS., in Proc. Am. Acad. X. 346. 1875, aus Utah, der nach M. E. JONES, in Zoe II 14 1891, nur eine var. von *ledifolius* sein soll. JONES sagt, daß besonders im Gebiet der Wahsatch Mts. in Utah ∞ Formen auftreten, die beide Arten verbinden. Mir liegen ca. ein Dutzend solcher Formen aus diesem Gebiet vor, die aber doch nicht ohne weiteres als Mittelformen angesprochen werden können. Man vgl. hierüber meine Sonderarbeit, wo auch der mir heute noch fragliche *C. arizonicus* JONES, l. c., besprochen wird. *C. intricatus* ist angeblich in Kultur; da muß sich ja zeigen, ob er bloße Standortsvarietät ist und in *ledifolius* übergeht.

Gattung 141. *Chamaebatia* BENTH., Plant. Hartw. 308. 1849.

Vgl. oben S. 500 und Art. Nur diese bekannt.

Ch. foliolosa: 0,3-0,6 m hoher, ausgebreitet ästiger b, junge und c Zw. weich und drüsig beh., kahl, Äste glatt, braungrau; B.

*) Daher rührt wohl auch die falsche Annahme HOWELLS, Fl. of NW.-N.-Am., I. 172. 1898, wo er die Rocky Mts.-Pflze. als *betulaefolius* beschreibt.

**) In Flor. franciscana I. 59. 1891.

3-fach gefiedert Fig. 317 g) im Mittel 3:1.5 6:3.5 cm, sonst bis 12 cm lang, weich und drüsig beh.; Bl. weiß, in bis 8-blütigen von ziemlich großen, lanzettlichen, z. T. fiederigen Trgb. gestützten Ebensträußen, Bl.-Achse breit glockig, K. 5, etwa so lang wie Bl.-Achse, C. 5, Stb. über 40, etwa 3-reihig, Gyn. 1, Sa. 1, N. herablaufend, Fr. plötzlich kurz zugespitzt, S. mit schwacher End-Schicht (zwischen 5 und 6 in n Fig. 317).

Fig. 317. a *Purshia tridentata*: a Bl. — b—f *P. glandulosa*: b Bl. im L.-Schn.; c Gyn. im L.-Schn.; d N.; e Fr.; f S. im L.-Schn. (α—β = Testa, γ = E.). — g—n *Chamaebatia foliolosa*: g Fieder 2. Ordnung des B.; h Bl. im L.-Schn.; i C.; k Stb.; l Gyn. im L.-Schn.; m Fr.; n dgl. im L.-Schn. (1 = K., 2 = Bl.-Achse, 3 = Perikarp, 4—5 = Samenschale, 6 = E.) (α nach Bot. Reg., sonst Orig.).

Ch. f. BENTH., l. c. — Nach GREENE: Calif., western slope of the Sierra from Nevada Co. southward to Mariposa. — Kiefernwälder, 1—2000 m. — Sehr aromatisch duftend, daher „Tar-weed“ genannt.

Gattung 142. *Adenostoma* HOOK. et ARN., Bot. Beech. Voy. 139. 1840. [Scheinheide; Chamiso.]

Vgl. oben S. 500 und Art. Nur diese bekannt.

A. fasciculata: steif aufrechter reich verzweigter, meist nicht über 2—2.5 m, zuweilen aber bis 6 o. 7 m hoher B. Zw. anfangs rotbraun, später grau und rissig; B. gebuschelt nadelartig Fig. 316 f, h, Neb. klein, Bl. weißlich, unscheinbar, an kurzen Seitentrieben ährig gedrängt und diese Scheinähren zu großen rispigen, Blst. vereinigt, Trgb. lanzettlich, meist fadig zerschlitzt, K. 5, C. 5, Stb. 15, Gyn. 1, schneit-eutg., mit schwacher beh. Kuppe, Gr. knietg. gebogen, N. leicht 2-lappig, Sa. 1—2, hängend, anatrop., Fr. in die zur Frz. verfestigte Bl.-Achse eingeschlossen reife S. ?, vgl. 316 g—o.

var. *a. typica*: Bl.-Achse kahl, dgl. Zw., die z. T. eine undeutl. feine drüsige Beh. zeigen, B. kurzgestielt, 6—10 mm lang, spitz nadelig; hierher die Form *f. brevifolia* TORR. et GR., Fl. N.-Am. I. 450. 1840. *A. brevifolia* NUTT., apud T. et GR., l. c.; var. *obtusifolium* WATS., Bot. Calif. I. 184. 1876), Zw. ± beh., B. kürzer, stumpflicher, sitzend. — var. *b. hirsuta*: Bl.-Achse und Zw. beh., B. mehr wie bei *f. brevifolia*.

A. f. HOOK. et ARN., l. c. — Nach GREENE: Calif., one of the commonest and the most characteristic bushes of the summits and elevated slopes of the Coast Range from Lake Co. southward; also in the Sierra Nevada, but less common there. Blz. VI. Bildet Heiden ähnliche Formationen, die sog. „Chamiso“. In Kultur noch wenig versucht.

Gattung 143. *Coleogyne* TORR., Plant. Frem. 8. t. 4. 1850.

Vgl. oben S. 499 und Art. Nur diese bekannt.

C. ramosissima: bis 2 m hoher, dicht sparrigästiger, mit sehr ∞, z. T. verdorr. Kztr. besetzter B. Zw. bis 1 m anliegend hell beh. (Haare in der Mitte

festgeheftet), ζ feinrissig, hell silbergrau berindet; B. graugrün, dicklich linealisch, sitzend, gebüschelt, unters. 2(–4)-furchig, kaum bis 6:1–2 mm, wie Zw. beh., Neb. klein; Bl. an Kztr. endständig (Fig. 316 q), von 2–4 ziemlich großen, 3-lappigen B.chen gestützt (vgl. p), K. 1, C. fehlen, Stb. ∞ , am Grunde leicht verwachsen, den krugfg. ausgebildeten, innen seidig beh. Discus umgebend, welcher mit dem erweiterten unteren Teile das kahle Gyn. umschließt und aus dessen Halse der beh. fädige, eine rinnige N. tragende Gr. hervorragt (r), dieser entspringt seitlich und ist kniefg. gebogen, Fr. im Discus eingeschlossen, S. ohne End.

C. r. TORR., l. c. — S.-Calif. und angrenzendes Nevada, Arizona bis S.-Color. — Blz. in Heimat Frühjahr. — In Kultur wohl kaum erprobt.

Fig. 318. a–b *Cercocarpus fothergilloides*: a B.; b Fr. — c *C. traskiae*. B. — d–f *C. betulaefolius*: B. — g–i *C. parvifolius*: B. — k *C. intricatus*: B. — l–m *C. ledifolius*: B. — n–q¹ *Margyricarpus setosus*: n Bl. (1–3 Sch.-B., 4 Scheidenteil des gefiederten Haupt-B.); n¹ N.; o Bl.-L.-Schn. ohne N. und A.; p Fr. im Q.-Schn.; p¹ S.; q B.; q¹ ein Fieder-B.chen. — r–t *M. (Tetraglochin) strictus*: r Bl. mit Stütz-B.; r¹ Gyn. im Q.-Schn.; s Fr.; s¹ ♂ Bl.; t Fieder-B. — u–x¹ *Poterium spinosum*: u B.; v ♀ Bl. mit Trgb.; v¹ dgl. im L.-Schn. (α = schwammiges Gewebe); w Fr.; w¹ dgl. im Q.-Schn. (α wie vorher); x ♂ Bl.; x¹ Stb. (Original).

E siehe S. 536

Unterfamilie D. *Sanguisorbeae* FOCKE, l. c. 41. (unsere Genera: Xerophytische b. Zw. oder Spindeln der Fieder-B. verdornend, B. immer- o. sommergrün, unpaar gefiedert, Bl.-Achse verschieden, zur Frz. vergrößert, die Fr. fast umschließend, in 3 Bl. zuweilen sehr klein, C. hfg. fehlend, Stb. 1–8 o. ∞ , Frb. 1–2, Fr. hfg. mit Verbreitungsmitteln ausgerüstet.

Gattung 144. *Margyricarpus* R. et Pav., Prodr. 7. t. 33. 1794.

(*Tetraglochin* POEPP., Fragm. Syn. Plant. Dissertatio 1833. 26.)

Vgl. oben S. 500. niedergestreckte, sparrig verästelte, teils zwergige, teils bis 0.5 m hoch aufstrebende b. B. unpaar gefiedert, immergrün, Fieder-B. zuletzt abfallend, Spindel verdornend, bleibend, Neb. dem stengelumfassenden, scheidigen B.-Grund angewachsen: Bl. zu 1—3, von den Scheiden rudimentärer B. umhüllt, ♂ o. ♀ (dioec. o. subdioec.), K. 3—5-zählig, C. fehlen, Recept. röhrig, Stb. 1—3, Gyn. 1—2, mit je 1 hängenden Sa., N. pinselfg., Fr. mit bleibendem K., mit 1 erhabenen Längsleisten, 1 fleischig (nach verschiedenen Autoren eßbar) o. trocken mit häutigen Flügeln, S. mit häutiger Testa, E. ohne End. — Arten siehe unten.

A. Fiederblättchen fein gerollt, lange bleibend, Spindeldorne nur schwach dornig, Pflze. also dicht grün beblättert, Bl. ♂. Fr. nicht geflügelt.

1. *M. setosus*: niederliegender, dicht verworren verästelter, kaum über 30 cm hoher b. Zw. dicht mit B. und B.-Basen besetzt, B. ca. 1—2 cm, Fiedern 3—10 mm lang (vgl. Fig. 318q—q¹), diese an Spitze 1 wimperborstig, Borsten abfällig; Bl. und Fr. vgl. n—p*).

M. s. R. et P., Fl. per. I. 28. t. 8. d. 1798. — Anden von Ecuador, Peru, Boliv., Chile, Patagonien und chilen. Inseln. — Bl. und Fr. zur selben Zeit. — Im Hort. VILMORIN in Kultur. — Wahrscheinlich in dieser Fassung eine Sammelart, oder wenigstens eine Reihe von Varietäten umfassend. So scheint *M. imberbis* PRESL, Epimel. Bot. 200. 1849, soweit sie sich auf Expl. der Insel Juan Fernandez bezieht, eine charakteristische Form zu sein. *M. microphyllus* NIEDERL., Enum. plant. Exped. Roca, Buenos-Aires 1881. 215, aus Patagonien scheint ebenfalls dem *setosus* nahe zu stehen und ist kaum, wie der Autor angibt, identisch mit *Tetraglochin micr.* PHIL., siehe folgende Art.

B. Fiederblättchen 1 flach, bald abfallend, stark dornige Spindel stehend-bleibend, Pflze. also viel kahler, Bl. ♀ (ob immer dioec.?), Fr. geflügelt.

2. *M. alatus*: robuster als voriger, wohl bis 60 cm hoch, verdornete Spindeln 1—3 cm, in ihren Achseln Kztr. mit reduzierten Fieder-B., Bl. und Fr. etc. vgl. Fig. 318r—t.

M. a. GILL., in Hook. Bot. Misc. III. 305. 1833 (*Tetraglochin stratum* POEPP., l. c. [kurz nach HOOKER]; *T. buxifolium* PRESL, Epimel. Bot. 200. 1849). Chile bis Patagonien, Bolivien. — Andengebiet. — Blz. XI. Noch nicht eingeführt*). — Die Pflanze aus Bolivien hat BRITTON in Mem. Torr. Bot. Club III. 25. 1893 als *M. cristatus* beschrieben. Sie scheint aber kaum mehr als eine Form zu sein. Ebenso verhält es sich m. E. mit *Tetragl. microphyllus* PHIL., in Linnaea XXVIII. 687. 1856, aus Chile, wenigstens nach einer mir vorliegenden Pflze. von GAY zu urteilen. Über *Tetr. caespitosum* PHIL., l. c. XXXIII. 63. 1864, eine rasenartige Form aus Patagonien, konnte ich nichts Genaueres erfahren. Dagegen scheint *M. clarazii* BALL., in Journ. Lin. Soc. XXI. 217. 1844, aus C.-Patagonien durch abweichende Fr. von *M. alatus* unterschieden zu sein. Ich sah aber keine Exemplare bisher.

* Wirklich glatte, runde, stark fleischige Fr., wie sie BAILLON, Hist. Plant. I. Fig. 410. 1868 abbildet, konnte ich an dem mir vorliegenden Material nicht nachweisen.

Diese Art als *Tetraglochin* abzutrennen, scheint mir kaum gerechtfertigt. Aber vielleicht wurde doch eine eingehendere, vor allem auch anatomische Untersuchung beweisen, daß beide Gattungen gut abweichen und jede in mehrere Arten zerfällt. Ich prüfte nur die Blattanatomie flüchtig, ohne etwas Bemerkenswertes für die Systematik zu finden.

Gattung 145. *Poterium* L., Sp. pl. 994. 1753, sensu Focke, in Nat.-Pfl. III. 45. 1888.

Siehe S. 500 und Art.

P. spinosum: kleiner sparriger h., bis etwa 0,3 m; Äste -- niedergestreckt, Zw. anfangs -- beh., kniekig verdornend; B. (Fig. 318u) in Größe und Form wechselnd, Fiedern 7–15, oben graugrün, -- beh., unters. weißlich o. gelblich filzig; Neb. dem B.-Stielgrund angewachsen; Bl. $\pm$ 2, monoec., in Ähren, die unteren σ , oberen $\varnothing$, grünlich, sitzend in der Achsel eines Trgb., außerdem 2 kleine Vorb., K. 3–4, C. fehl., σ Bl.: Stb. ∞ , $\varnothing$ Bl.: Gyn. 2, mit je 1 hängenden Sa., N. pinselfg., Recept. dickschwammig (v¹a), sich rötend, Fr. kugelig, gelbrot, zuletzt ohne K. (vgl. v–x¹).

P. s. L., l. c. (*Pimpinella spin.* GAERTN., De fruct. I. 162. 1788; *Sanguisorba spin.* BERTOL., Fl. ital. II. 185. 1835). Strauch-Pimpernell. — l. G. nur Dalmat., sonst nach ASCHERS. et GRAEB., Sardin., Sizil., Ital., Balkan, Kl.-As., Cyp., Syrien, Paläst., Tunesien. Auf steinigten Abhängen, an Felsen im O.-Medit. oder ein wesentlicher Bestandteil niedriger Macchien. Blz. III–IV. Fund den h. nur im Hort. Bot. Darmstadt versuchsweise in Kultur.

Unterfamilie E. *Rosaceae* Focke, l. c. — Siehe Gattung.

Gattung 146. *Rosa* L., Sp. pl. 491. 1753.**

[Rose; Rose; Rosier.]

Vgl. oben S. 500: h., Äste und Zw. -- bestachelt, selten stachellos; B. unpaar gefiedert, sehr selten einfach; Neb. vorh., Blst. endständig, 1-blütig o. trugdoldige Rispen; Bl. σ , Bl.-Achse flaschenförmig, krugfg. o. kugelig, am verengerten Schlunde mit kegelig erhabenem o. flachem Discus, K. 5(–4) laubartig, ungeteilt o. meist die 2 äußersten beiderseits, das mittlere einseitig fiederspaltig, C. 5(–4), meist weiß o. rot, seltener gelb; Stb. ∞ , Gyn. ∞ , Frkn. am Grunde der Bl.-Achse sitzend o. kurzgestielt; Fr. einsamig, nußartig, von der -- fleischigen Bl.-Achse umschlossen, eine Scheinfr., Hagebutte, bildend. -- Bei weiter Fassung des Artbegriffs etwa 100 Arten, die fast sämtlich im folgenden erwähnt sind***).

Subgenus a. *Hulthemia* Focke, in Nat.-Pfl. III. 3. 47. 1888 (*Hulthemia* DUMORT., Note s. un nouv. gén. 13. 1824), B. einfach mit obs. Sp., Neb. fehlen. — Nur folgende Art.

*) Diese Gattung wird meist als *Sanguisorba* sens. lat. gefaßt und ich verkenne die Richtigkeit dessen, was ASCHERS. et GRAEB., Syn. VI. 435. 1902, anführen, nicht. Immerhin läßt sich im Fockeschen Sinne *Poterium* für diesen h. wohl aufrecht erhalten.

† Auch bei dieser polymorphen Gattung muß ich natürlich auf eine auch nur halbwegs eingehende Skizzierung des Formenkreises der europäischen Arttypen verzichten. Immerhin habe ich mich bemüht, die Rosen weit vollständiger als die *Rubus* (vgl. das S. 503 Gesagte) zu behandeln, verweise aber für die Formen der Arten des Gebietes ein für allemal auf die hervorragende Darstellung, welche R. KELLER in ASCH. et GR., Syn. VI. 32ff. 1900/02 gibt. Im übrigen bin ich bestrebt, soweit es irgend geht, auch auf KELLERS und GREPINS ausgezeichnete Arbeiten zu stützen und werde im einzelnen die spezielle Literatur zitieren. Vielleicht kann ich im Nachtrage noch auf einige Kulturformen zu sprechen kommen, doch bis heute war Herr Dr. KELLER leider nicht in der Lage, das von mir u. Hort. Murrer, Hort. Bot. Darmstadt etc. gesammelte Material durchzusehen. Ich selbst bin mit den Gattungen *Rosa* und *Rubus* viel zu wenig vertraut, um mir über viele Kulturformen ein sicheres Urteil bilden zu können.

**) Es sei bemerkt, daß allein für Mitteleuropa gut 500 „Arten“ beschrieben worden sind. Allein so sehr ich sonst in meinem Buche für eine nicht allzu weite Fassung des Artbegriffes eintrete, glaube ich doch, daß vom Standpunkt des Monographen KELLER mit dem, was er l. c. S. 33 sagt, sehr recht hat. In Lokalfloren und im Gartenbau scheint es allerdings erlaubt, auch Subspecies als Arten zu führen.

1. *R. persica* (*R. berberifolia*): niedriger, niedergestreckter b mit dünnen, aufstrebenden Zw., diese gelbbraun, fein beh. und reich mit leicht gekrümmten, hellen Stacheln o. geraden Stachelborsten besetzt. B. fast sitzend, beiderse. graugrün, eifg. bis elliptisch lanzettlich, 1,5:0,4—3:1,5 cm, Bl. einzeln, vgl. Fig. 319 a, S. 539. Tiefgelb mit purpurnem Nagelfleck. Gr.-Enden und Stb. rosa, sonst wie a'—a'. Scheinfrucht rundlich-elliptisch, etwa 12 mm lang, dicht lang stachelborstig.

R. p. MICH., in JUSS. Gen. pl. App. 452. 1786 (*simplicifolia* SALISB., Prodr. 359. 1786; *berberifolia* PALL., in Nov. Act. Acad. Petrop. X. 379. 1797, *Hulth. berb. DUM.*, l. c.). — Wüstengebiete von Pers., Afghan., chines. Tartarei, Songarei. — Im Gebirge bis 1300 m. — Blz. V—VIII. — Nach MASTERS, in Gard. Chron. 1889. II. S. sind die Kulturversuche in Kew fast regelmäßig fehlgeschlagen, wenigstens gelang es nie, die Pflze. länger als 1–2 Jahre zu erhalten. VILMORIN gibt sie als bei ihm in Kultur befindlich an.

? 1×74 *R. persica* × *clinophylla*: *R. hardii* PAXT., Mag. bot. X. 195. 1843. Vgl. CRÉPIN, in Bull. S. B. Belg. 1894, 127.

Subgen. b. *Eurosa* FOCKE, l. c. — B. 3-zählig o. unpaar gefiedert, Neb. vorh., meist bleibend.

Tabelle zum Bestimmen der Hauptsektionen*).

- A. Gr. die innere Einfüglungslinie der Stb. deutlich überragend (vgl. Fig. 319 b, f und 321 a).
 - I. Gr. zu einer den Discus überragenden schlanken Säule verwachsen, meist länger als innere Stb. (Fig. 319 f): Sekt. I. *Synstylae* (S. 538).
 - II. Gr. frei, etwa die halbe Länge der innersten Stb. erreichend (Fig. 321 a): Sekt. II. *Indicae* (S. 545).
- B. N. ein halbkugeliges Köpchen bildend, dessen Außenrand die innere Einfüglungslinie der Stb. nicht überragt***) (vgl. Fig. 321 b, e).
 - I. Mittlere B. der Blzw. 3–9-zählig.
 - a) Bl. 5-zählig.
 1. Neb. frei, pfriemlich, abfallend o. nur wenig angewachsen und am Rande in fadenfg. Fransen zerschlitzt, o. zu $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ ihrer Länge angewachsen und nur drüsig gezähnt.
 - α) Mittlere B. der Blzw. 5–9-zählig, Neb. ± kammfg. zerschlitzt.
 - 1!) Mittlere B. der Blzw. 5–7-zählig, Trgb. im Blst. sehr klein, pfriemlich, abfällig: Sekt. III. *Banksiae* (S. 546).
 - 2!) Mittlere B. der Blzw. 9-zählig, Trgb. im Blst. breit eingeschnitten: Sekt. XII. *Bracteatae* (S. 586).
 - β) Mittlere B. der Blzw. 3-zählig, Neb. zu $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ angewachsen, nur gezähnt: Sekt. XIII. *Laevigatae* (S. 588).
 2. Neb. alle hoch hinauf mit dem B.-Stiel verbunden, ohne Fransen, die der oberen B. meist breiter als die der mittleren.
 - α) Äußere K. fiederspaltig.
 - 1!) B.chen meist über 10 mm lang, wenn kleiner, so obers. beh.
 - a) Stamm mit gekrümmten Stacheln, welche mit geraden Nadelstacheln o. Borsten und Stieldrüsen gemischt sind; mittlere B. der Blzw. 5(–3)-zählig; Bl. groß, meist einzeln und dann hochblattlos†: Sekt. IV. *Gallicae* (S. 547).
 - β) Stacheln meist gleichfg., gerade, gebogen o. hakig gekrümmt; mittlere B. der Blzw. meist 7-zählig; Hochb. vorh., stark

* Man vgl. natürlich immer genau die detaillierten späteren Angaben, da diese kurz zusammenfassende Übersicht nur eine ungefähre Bestimmung ermöglicht. Bei der Ausarbeitung dieser Hauptmerkmale habe ich neben KELLER auch KOLHNE zu Rate gezogen.

**) Ausnahmen bilden die unter *R. sempervirens*, S. 544 und *R. arvensis*, S. 545 erwähnten Formen!

***) Ausgenommen bei *R. stylosa*, S. 561 und *R. elymaitica*, S. 553, bei Formen von *R. sylvestris*, S. 547, *R. rugosa*, S. 560 und *R. tomentosa*, S. 563. Sehr selten verlängern sich auch bei *R. canina*, S. 564 die Gr. ± säulenartig.

†) Vgl. auch *R. jundzilli*, S. 550.

verbreitert; K. nach Blz. zurückgeschlagen und abfällig o. aufgerichtet die Bl.-Achse bis Frz. krönend und dann abfallend o. bleibend: Sekt. V. *Caninae* (S. 550).

2!) B.chen nur 3—10 : 2,5—6 mm, obers. kahl, Bl. einzeln, Scheinfr. von den aufgerichteten bleibenden K. gekrönt: Sekt. XI. *Minutifoliae* (S. 586).

β) Alle K. ungeteilt, o. wenn die äußeren geteilt, nur mit 2 kleinen, spärlichen Fiedern.

1!) Blst. mehr-(3- bis viel-)blütig o. 1-blütig, mit Hochb., auch falls nur 1 Bl. ausgebildet, der Stiel mit 1 o. mehreren Hochb.

α!) Obere Neb. und die Hochb. schmal o. verbreitert; Bl.-Stiele, Bl.-Achse und K. fast stets stieldrüsiger; K. nach Blz. ausgebreitet o. etwas aufr., vor Reife abfallend, äußere ganzrandig o. mit spärlichen Anhängseln, Frkn. in Bl.-Achse nur grundständig: Sekt. VI. *Carolinae* (S. 568).

β!) Blzw. oft wehrlos o. $\pm$ dicht drüsiger-borstig; Stacheln gerade o. gekrümmt, unter den B. oft gepaart, selten fehlend; obere Neb. $\pm$ verbreitert, allmählich in die breiten vorgestreckten Öhrchen übergehend o. Neb. der Schößlingsb. eingerollt, mit röhrig zusammenneigenden Rändern; K. nach dem Verblühen aufgerichtet, auch an der reifen Fr. bleibend, ganzrandig: Sekt. VII. *Cinnamomeae* (S. 572).

2!) Bl. meist einzeln ohne Hochb. am Stiele.

α!) Stacheln gerade o. pfriemlich, zerstreut, oft mit Borsten vermengt, mittlere B. der Blzw. (7—)9(—11)-zählig, Neb. schmal mit plötzlich verbreiterten stark divergierenden Öhrchen, B.chen fast kreisrund bis breit-elliptisch, C. weiß: Sekt. VIII. *Pimpinellifoliae* (S. 583).

β!) Stacheln $\pm$ hakig, z. T. mit Borsten gemischt; mittlere B. der Blzw. 5—7-zählig, obere Neb. wenig verbreitert, B.chen aus keilfg. Grunde eifg.; C. gelb: Sekt. IX. *Luteae* (S. 584).

b) Bl. 4-zählig: Sekt. X. *Sericeae* (S. 586).

II. B. größtenteils 11—15-zählig, Frkn. nach KOEHNE nur auf einem in der Bl.-Achse grundständigen Höcker eingefügt (was ich nicht fand, wie Fig. 331, S. 587, in x zeigt): Sekt. XIV. *Microphyllae* (S. 588).

Sekt. I. *Synstylae* DC., Cat. Hort. Monsp. 137. 1813: Vgl. oben. Stamm kletternd o. kriechend, mit gebogenen o. gekrümmten Stacheln; Neb. meist hoch hinauf mit dem B.-Stiel. verwachsen, selten frei, abfällig; K. nach der Bl. zurückgeschlagen, vor Frz. abfallend, äußere fiederspaltig o. alle ungeteilt, Gr. fast stets zu einer den ebenen o. schwach kegelfg. erhabenen Discus überragenden, schlanken Säule verwachsen, welche $\pm$ so lang o. länger als innere Stb. ist, selten Gr. frei und so stark verkürzt, daß die N. ein die Mündung der Bl.-Achse schließendes Köpfchen bilden.

○ Neb. fädig, frei o. fast frei, abfällig, B. vgl. Fig. 320a, S. 543.

2. *R. microcarpa**): kletternder h, Zw. grau- o. olivbraun, kahl, mit sehr verstreuten Hakenstacheln (Fig. 319d¹), B. 3—7-zählig, vgl. Fig. 320a, beiderseits fast gleich grün, meist nur auf Rippe beh., End-B.chen 3 : 1,4—5 : 2 cm, Rachis kahl bis $\pm$ filzig beh., Blzw. jung $\pm$ beh., 5—10 cm lang, B. 5—3-zählig, Blst. doldenrispiger, Brakteen fädlich-lanzettlich, abfällig, Bl.-Stiele meist kahl, 10—14 mm, Bl. 15—20 mm Durchmesser, weiß, K. innen beh., zurückgeschlagen, sonst vgl. Fig. 319b—d.

R. m. LDL., Ros. Mon. 130. t. 18. 1820 (*cymosa* TRATT., Ros. Mon. I. 87. 1823 24; *amoyensis* HANCE, in Journ. of Bot. VI. 297. 1868; *indica* AUCT. NONN., an L.? — Kleinfrüchtige R. — China (Kangsu, Schekiang, Kiangsi, Fokien, Hupei, Kwangtung, Hongkong). — Blz. V. — In O.-As. kultiviert, mir aus unseren Kulturen

*) Vgl. CRÉPIN in Bull. Soc. Bot. Belg. XIII. 247. 1874 und XVIII. 276. 1879. Nach CRÉPIN ist dies die echte *R. indica* L., Spec. pl. 492. 1753.

Fig. 319. *Rosa*: *a* - *a'* *persica* (*iberica* folia): *a* Blzw.; *a'* Bl. im L.-Schn. und Stb. vergr.; *a''* Frkn. - *b* - *d'* *microcarpa*: *b* Bl. im L.-Schn.; *b'* C.; *b''* K.; *c* Frkn.; *c'* Stb.; *d* Fr.; *d'* Zw. mit Stacheln. - *e* - *g'* *multiflora*: *e* Bl. von oben; *e'* - *e''* K.; *f* - *b*; *f'* Fr.; *g* B.-Stielgrund mit Neb.; *g'* - *d'*. - *h* - *h'* *echinodonta*: *h* - *b*; *h'* K.; *h''* Fr.; *h'* - *d'*. - *i* *zeissoniana*: Stück vom Blst. - *k* - *l* *setigera*: *k* C.; *h''* K.; *h'* Fr.; *h'* - *d'*. - *m* *moschata*: Stück vom Blst. - *n* - *p* *sempervirens*: *n* - *b*; *n'* C.; *n''* K. - *o* - *q* *sempervirens*: *o* - *d'*; *p* Bl.-Kn.; *moschata*: *m* - *d'*; *n* - *b*; *n'* C.; *n''* K. - *r* - *s* *banksiae*: *r* Bl.; *s* dgl. im L.-Schn.; *s'* Frkn.; *s'* Stb.; *p'* C.; *p''* K.; *q* Fr. - *t* - *u'* *phoenicea*: *t* - *d'*; *u* Bl.-Kn.; *u'* C.; *u''* Fr. (a nach Gard. Chron., z nach Gard. a. For., r - s nach HOOKER, sonst Original)

nicht bekannt. An sie schließt sich die noch unvollkommen bekannte *R. colletti* CRÉP., in Bull. S. B. Belg. XXXVIII 2 49 1889, aus Upper Burma (Shan Hills), welche beide Arten durch ihre Neb. und die relativ kurzen Gr.-Säulen sich vor allen anderen *Synstylae* auszeichnen.

○ ○ Neb. — lang mit dem Bl.-Stielgrund verwachsen, bleibend.

✚ Neb. tief franzig eingeschnitten, Fig. 319g, B. wie Fig. 320b—b¹.

3. *R. multiflora*: bis 2 m hoch klimmender b, Zw. jung beh., später kahlend, — braunrot, Stacheln spärlich, meist unter B. gepaart (Fig. 319g¹). B. hfg. halbwintergrün, mittlere 5—7- o. bis 9-zählig, Blchen aus keilfg. Grunde verkehrt eifg. bis eilänglich, stumpf o. kurz zugespitzt, scharf gesägt, mattgrün, unters. — graugrün, meist weich beh., End-Blchen etwa 2:1—5:2.8 cm; Blzw. 8—20 cm, Blst. pyramidalrispig, reichblütig, untere Trgb. kammfg. eingeschnitten, wie die oberen lanzettlichen abfällig, Bl. meist weiß, Gr. meist kahl, sonst vgl. Fig. 319e—f¹.

FRANCHET et SAV. haben (Enum. pl. jap. I. 134. 1875) eine Anzahl Formen angeführt. Man vgl. hierüber CRÉPIN, in Bull. Soc. B. Belg. XVIII. 280ff. 1879 und XXV. 182. 1886. Leider sind die Typen meines Wissens nirgends scharf umgrenzt und da mir Material fehlt, so verzichte ich auf ihre Angabe. Es sei nur hingewiesen auf var. *platyphylla* THOR. et RED., Les Roses II. 69. 1821 (et in Bot. Reg. XVI. t. 1372), eine üppige Kulturform mit größeren lilarosenroten getüllten Bl.

R. m. THBG., Fl. jap. 214. 1784 (*polyantha* S. et Z., in Abh. Akad. Münch. IV. 2. 128 1844; *intermedia* CARR., in Rev. Hort. 1868 269, Fig. 29, 30; *enchitrac* K. KOCH, in Wochenschr. 1869. 201; *thysallora* LEROY, ex DES., in Bull. B. Belg. XV. 204. 1870. — Vielblütige R. China: Schantung, Shinking, Schekiang, Kiangsi, Fokien, Formosa, Hupei, Sz'tschwan, Corea-Archip.; Jap. (bes. Hondu, Philipp (Luzon). Gebüsch, waldige Hänge. Blz. VI—VII. Nicht selten in Kultur. VILMORIN bildet, in Frut. Vilm. Cat. I. 83. 1905, eine interessante, wie es scheint, neue Form aus Sz'tschwan ab. Bl. rosa.

3×9 *R. multiflora* × *moschata*: hierher stellt CRÉPIN*), in Bull. S. B. Belg. XXIII 1. 120. 1884, nicht ohne Zweifel *S. polyantha* var. *grandiflora* Hort. BERNAIX. Vielleicht ist diese aber *multiflora* × *sempervirens*.

3×14 *R. multiflora* × *chinensis*: hierher nach CRÉPIN, l. c. 118, einige *R. polyantha* Hort., non S. et Z.

3×16 *R. multiflora* × *gallica*: hierher nach CRÉPIN, l. c. 115, Gartensorten wie „Abondance“, „La Griffériaie“ etc.

3×53 *R. multiflora* × *californica*: wird von ZABEL, im H. d. D. D. G. 213. 1903 als Gartenzögling erwähnt.

3×66 *R. multiflora* × *rugosa*: *R. iwara* SIEB., Cat. rais. pl. Jap. 6. 1856: nach KELIER b von *rugosa*-Tracht, aber: Neb. kammfg. eingeschnitten, Blst. reichblütiger, Trgb. ebenfalls kammfg. eingeschnitten, Bl. klein, weiß, C. schmal: von *multiflora* außer in Tracht durch die viel- und ungleichstacheligen Zw. verschieden.

✚ Neb. nicht fransig eingeschnitten, höchstens gezähnt o. drüsig gewimpert.

+ mittlere B. 9-zählig, Fig. 320c, S. 543.

4. *R. wichuraiana*: niedergestreckter b, Zw. bis 5 m lang, z. T. wurzelnd, kahl, Stacheln verstreut (Fig. 319h¹). B. — wintergrün, beiderseits fast gleichgrün, kahl, Blchen verkehrt eifg. o. eirundlich, End-Blchen etwa 13:11—25:17 mm. Neb. ziemlich tief gezähnt: Blzw. ca. 5—10 cm, ihre B. 7—3-zählig, Blst. pyramidal, etwa 3—10-blütig, Trgb. mit laubiger Spitze, lange bleibend, Bl. schön weiß, etwa 4 cm Dm., K. innen beh., äußere wie Fig. 319h², sonst vgl. h—h³.

*) Man vgl. über angebliche Kombinationen, die hier nicht erwähnt sind, die Darlegungen CRÉPINS, l. c.

R. w. CRÉP., apud DÉS., in Bull. S. B. Belg. XV. 204. 1876 [nomen] et XXV. 2. 189. 1886 (*R. luciae* FR. et ROCH. ex parte; *R. sempervirens* S. et Z., l. c. 1844, non L.). — O.-China?, Jap., nähere Verbreitung mir unbekannt. — Blz. VIII—IX.

In den Gärten z. T. als *R. bracteata*. Eine prächtige Rose für die Bekleidung von Gräbern, Mauern etc. VILMORIN führt eine Form mit bunten B. an. Ferner wurde diese Rose in neuerer Zeit vielfach gekreuzt mit *R. rugosa*, mit „Crimson-Rambler“ HORT. und anderen Arten und Formen. Genauere Angaben hierüber sind mir nicht bekannt geworden. — Diese Art bildet mit *multiflora* und den im folgenden genannten eine besondere Gruppe der *Synstylae*. Am engsten schließt sich ihr an *R. luciae* FRANCH. et ROCHEBR., ex CRÉP. in Bull. S. B. Belg. X. 323. 1871 [sensu CRÉP., l. c. XXV. 184. 1886], sie weicht von *wichuraiana* insbesondere ab durch: mittlere B. der Zw. 7-zählig, B.chen oval, Bl.-Stiele am Grunde abgegliedert, Trgb. an Spitze nicht blattartig, schnell abfallend. Die Bl. sind kleiner, die äußeren K. meist ebenfalls anhanglos. Ich selbst sah diese Art noch nicht echt. VILMORIN führt sie als in Kultur befindlich an. Heimat Jap., China, da aber in den Angaben immer mit *wichuraiana* vermengt, so näheres Gebiet mir unklar. Beiden reiht sich an *R. tunquinensis* CRÉP., l. c. 192. 1886, die von *wichuraiana* insbesondere abweicht durch meist beh., 5—7-zählige B., sehr kurz gezähnelte Neb. und meist unter den B. gepaarte Zw.-Stacheln. Ihre Blst. sind vielblutiger, die Trgb. bleibend, lanzettlich, an Spitze — blattartig, durch die lanzettlichen, allmählich in eine lange Spitze auslaufenden K. von *wichuraiana* und *luciae* abweichend. China (Tonkin).

Im Anschluß an *wichuraiana* muß noch *R. maximowicziana* RGL., in Act. Hort. Bot. Petrop. V. 378. 1877, erwähnt werden, die in der SO.-Mandschurei aufgefunden wurde. In ihren 7—9-zähligen kahlen B. steht sie jener sehr nahe und scheint nach REGELS Angaben im wesentlichen durch die mit Stacheln und Stachelborsten besetzten Zw., gedungenen, aufrechten Wuchs und reichblutigere Blst. abzuweichen. CRÉPIN hielt sie anfangs für eine Var. der *multiflora*, stellte sie aber 1886 hierher, ohne sich bestimmt über ihren Wert zu äußern. Ich sah kein Material.

÷ + mittlere B. 7—3-zählig, nur bei *moschata* und *soulicana* zuw. bis 9-zählig.

• B.chen schmallanzettlich, ganzrandig, vgl. Fig. 320d.

5. *R. watsoniana*: ausgebreitet aufstrebender o. niederliegender b. Zw. kahl, olivgrün, nur sehr spärlich mit Hakenstacheln besetzt: B. 3—5-zählig, Rachis mit feinen Hakenstacheln. — zottig beh., auch B.chen beh., 2,5:0,4—9:0,9 cm. Neb. lang angewachsen, mit lanzettlichen abstehenden Öhrchen; Blst. reichblutig, breit-pyramidalrispig, Trgb. lanzettlich, abfällig, Bl. klein, hellrosa, vgl. Fig. 3191, S. 539, K. ganzrandig, schmallanzettlich, spitz, innen dicht beh., Gr.-Säule kahl, Fr.?

R. w. CRÉP., in Bull. Soc. B. Belg. XXVII. 96. 1888. — Vielleicht eine in Japan entstandene Kulturform. — Blz. VI. — Ich kenne die Pflanze nur steril von der Riviera (Hort. Mortola) und aus Hort. Plantières.

△△ B.chen breiter, gezähnt.

= mittlere B. der Bl.-Zw. 3-zählig, die der Zw. meist 5-zählig.

— B.chen wie Fig. 320e—e¹, Serratur fein und charf, Gr.-Säule beh.

6. *R. anemonaeflora*: nach KELLER: Kletterstrauch, Zw. mit spärlichen, fast geraden Stacheln, B. lange bleibend, ober. etwas glänzend dunkelgrün, unter. hellgraugrün, Neb. mit schwach lanzettlichen bis pfeilförmigen, aufrecht abstehenden Öhrchen, Blst. wenig-, zuweilen einblütig, Bl.-Stiele drüsig-borstig, Bl.-Achse, wie die länglich lanzettlichen meist ganzrandigen K. kahl, C. dunkelkarmoisinrot. Nur gefüllt blühend bekannt.

R. a. FORT., in Journ. Hort. Soc. II. 315. 1847 (*trophylla* ROXB., Fl. ind. II. 515. 1824, teste HEMSLEY). — China: Kiangsu, Fokien, nur kultiviert bekannt. Blz. VI—VII. In unseren Gärten sehr selten, nur für wärmere Lagen zu versuchen.

— B. chen wie Fig. 320f., Zähnung groß und tief, Gr.-Säule kahl.

7. *R. setigera*: Klimmstrauch mit mehrere m langen Zw., diese kahl, grünlich o. gerötet, Stacheln verstreut (Fig. 319k, S. 539); B. sommergrün, obers. sattgrün, kahl, unters. graugrün, ± beh., End-B. chen etwa 3,5:2–6,5:3,5 cm; Rachis und Neb. + fein-stieldrüsig, desgl. Blst.-Achsen, Blst. etwa 5–10-blütig, untere Trgb. laubig, wie die oberen abfällig, Bl. rosenrot o. weiß, ca. 6 cm Dm., sonst vgl. Fig. 319l–l³.

R. s. RICH., in MCHX. Fl. Bor. Am. I. 295. 1803 (*rubifolia* R. BR., in ART. Hort. Kew. ed. 2. III. 260. 1812). — Prärie-Rose. — Ontario bis Wisconsin, Kansas, W.-Virg., Flor., Texas, sonst in New Jersey und Virg. verwildert. — Prärien, Dickichte. — Blz. (VI)—VII—VIII. — Frz. IX—X. — Eine schöne Rose, von der auch eine gefüllt blühende Form in Kultur sein soll, die ich nicht kenne.

== mittlere B. der Bl.-Zw. 5-, die der Zw. meist 7—3-zählig.

— Blst. ± pyramidal, meist mehrblütig, B. chen grobgezähnt (Fig. 320h—h¹).

8. *R. phoenicea*: aufrechter Klimmstrauch, Zw. gelbgraugrün, kahl, Stacheln verstreut (Fig. 319t), B. oben hellgrün, — beh., unten wenig heller, + graugrün, etwas mehr beh., im Herbst schön rot, Rachis + zottig, sonst vgl. var., Neb. bandartig, mit kurzen abstehenden Spitzchen, drüsig-wimperig gezähnt; Blst.-Achsen + fein-stieldrüsig, untere Trgb. laubig, lanzettlich, + bleibend, Bl. weiß o. leicht gelblich, etwa 5 cm Dm., äußere K. mit 2—4, oft großen auffälligen Anhängeln, außen kahl, innen feinzottig, Gr.-Säule kahl, den längeren Stb. gleichlang, sonst vgl. Fig. 319t—u², S. 539.

var. *typica* [sensu CRÉPIN, in Bull. S. B. Belg. XXV. 198. 1886], B. chen eifg. + spitz (Fig. 320h), End-B. chen 2,5:1,6–5,5:2,5–3,5 cm, Scheinfr. blutrot. — var. *chlorocarpa* CRÉP., l. c. in textu (*R. chlor.* FENZL et H. BR., in Verh. Z. B. Ges. 1885. 63), B. chen rundlich o. rundl.-eifg., stumpflich (Fig. 320h¹), Fr. grünlich o. bleichgelbrot.

R. p. BOISS., Diag. ser. 1. X. 4. 1849. — Kl.-As. (cilic. Taurus, Syrien [Libanon]). — Blz. VI. — Frz. X. — In Kultur noch selten.

— Blst. doldenrispig und ± reich- o. 1-blütig.

> Blst. meist vielblütig, B. chen feingesägt (Fig. 320g und k).

▷ Trgb. im Blst. sehr bald abfallend, Bl.-Kn. sehr lang eifg., allmählich lang zugespitzt; B. meist unters. beh.

9. *R. moschata*: hoher b. Zw. kräftig mit starken flachen Stacheln (Fig. 319m), kahl, olivbraunrot, lfg. bereift; B. an Schossen 7–9-zählig, oben sattgrün, meist fast kahl, unten graugrün, wenigstens Rippe beh., Rachis bestachelt und + mit Stieldrüsen, sonst kahl o. beh., B. chen meist langspitziger als in Fig. 320g, End-B. chen bis 6,5:2,8 cm; Neb. mit lineal-lanzettlichen, abstehenden Öhrchen; Blst. reichblütig, Achsen zottig beh. und bedrüst, Bl. weiß, 5–6 cm Dm., sonst vgl. Fig. 319n—n³, S. 539.

Als eine sehr uppige, reichblutige, in Wien ganz harte Form sei var. *nastarana* CHRIST., in Boiss. Flor. or. Suppl. 229. 1888 genannt, von der eine Pflanze seit Jahrzehnten im Wiener Bot. Garten steht, bis über 3 m hoch wird und große, bis 6 cm breite, stark duftende, gelblichweiße Bl. bringt, die B. sind unters. grüner, aber nicht ganz kahl, B. chen mehr verkehrt eifg., kurz zugespitzt, an Blzw. 5-zählig; Gr.-Säule etwas kürzer, lockerer.

R. m. MILL., Gard. Dict. 1859. No. 13 (*longicuspis* BERT., Misc. Bot. XXI. 15. [Ind. Kew.]); *ruscinonensis* DESÉGL. et GREN., in Billotia I. 33. 1894). — Moschus-R.

In China (Hupei, Yunnan, Kwangtung), Nepal, Afghan. und in Abyssin. heimisch, im Or. und Medit. seit alters kultiviert und z. T. verwildert. Es gehören hierher die eben nur als Varietäten zu fassenden *R. brunonii* LDB., Ros. Monogr. 120. t. 14. 1820 (Nepal), *R. leschenaultiana* WIGHT et ARN., Fl. pen. Ind. or. I. 304. 1834 (O. Ind.), und *R. abyssinica* BROWN, ex LDB., l. c. 116. t. 13. (Abyssinien). Ferner ist zu erwähnen die *moschata* var. *yunnanensis* CREP., in Bull. S. B. Belg. XXV. 2. S. 1886, eine wie es scheint zierlichere, kleinblütige Form mit kahleren, lederigen B., K. zur Frz. bleibend? — Die var. *westarum* blühte in Wien im Juni, der Typ etwas später.

Fig. 320. *Rosa*: B.-Formen von: *a* *microcarpa*. — *b—b¹* *multiflora*. — *c* *weichuraiana*. — *d* *watsoniana*. — *e—e¹* *anemonaeiflora*: B.chen. — *f* *setigera*. — *g* *moschata*. — *h* *phoenicea*. — *h¹* *phoenicea* var. *chlorocarpa*: End-B.chen. — *i* *arvensis*. — *k* *sempervirens*. — *l* *chinensis*. — *m* *banksiae*. (Alles $\frac{1}{2}$ nat. Größe.) (Original.)

9—14 *R. moschata* — *hancensis* — *R. noisettiana* RÉD., Roses II. 76. 1829. Nach CREPIN ist die Annahme, daß die „Noisette-Rosen“ dieser Kombination entstammen, noch etwas fraglich.

(9—14) 16 *R. noisettiana* — *gallica*: dieser Kombination sollen nach FOCKE Pflanzenmischlinge 140. 1881, die sogen. „Noisette-Hybriden“ entstammen.

9×16 *R. moschata* × *gallica*: hierher nach KOEHNE, Dendrol. 279. 1893, die *gallica* var. *nitida* Hort. BEROL., nach CRÉPIN in Bull. S. B. Belg. XXIII. 1. 117. 1884, vielleicht eine Kreuzung entre la Rose moussue „Céline“ et la Rose musquée „Fringet“.

9×74 *R. moschata* × *clinophylla*: *R. lyelli* LDL., Ros. Mon. 12. t. 1. 1820. Vgl. hierüber CRÉPIN, in Bull. S. B. Belg. XIV. 143. 1875 und l. c. XXXIII. 119. 1894. Sehr interessante, uppige Rose, die ich im Hort. HANBURY zu La Mortala (Italien) sammelte.

▷▷ Trgb. im Blst. ± lang bleibend, Bl.-Kn. ± dick eifg., plötzlich kurz zugespitzt, B. meist ganz kahl.

|| Blst.-Trgb. aufrecht, B.chen eifg. o. rundl.-eifg.

10. *R. soulieana*: nach CRÉPIN: aufrecht ausgebreiteter b*), Stacheln verstreut, Zw. sonst wohl kahl, mittlere B. der Zw. und Blzw. 7-9-zählig, derb. kahl; B.chen am Grunde gerundet, an Spitze stumpflich bis rundlich, selten mit aufgesetzten Spitzchen, Neb. mit drüsigem Rande; Blst. reichblütig, untere Trgb. lanzettlich, obere klein, abfällig, Bl. weiß, mäßig groß, K. oval o. eilanzettlich, plötzlich kurz zugespitzt, äußere mit 1-2 kleinen Seitenanhängen, Gr.-Säule beh., Scheinfr. nach VILMORIN orange, nur etwa 4-5:3-4 mm groß.

R. s. CRÉP., in Bull. S. B. Belge. XXXV. 21. 1896. — O.-Tibet, W.-China. — Blz. VII. — Bisher wohl nur im Hort. VILMORIN in Kultur.

|| || Blst.-Trgb. ausgebreitet oder zurückgeschlagen, B.chen mehr länglich (Fig. 320 k).

11. *R. sempervirens*: üppiger Kletter-b, Zw. kahl mit verstreuten Stacheln (Fig. 319 o), diese unter B. zuweilen gepaart; B. der Zw. 5-7-zählig, beiders. glänzend grün, B.chen länglich-oval, Grund rundlich, Spitze fein vorgezogen, die größeren End-B.chen 3,5-6:1,5-2,5 o. bis 6,5:3 cm, zuweilen bis 8 cm lang; Neb. schmal, mit schmalen abstehenden Öhrchen; Rachis meist kahl, nur stieldrüsig o. auch stachelborstig wie die Blst.-Achsen; Blst. meist mehrblütig, selten 1-blütig, Bl. weiß, 3-5 cm Dm., sonst vgl. Fig. 319 p-q, S. 539 und var.

Von den Formen seien hervorgehoben: var. a. *typica* KELLER, in ASCHERS et GR. Syn. VI. 37. 1900, Gr.-Säule beh., Bl. Stiele, Bl.-Achse und K. stieldrüsig, Scheinfr. oval, hierher f. *scandens* DC., Fl. Fr. V. 533. 1815 *R. scand* MILL., Diet. No. 8. 1768, Form mit kugeligen Scheintr. b. *microphylla* DC., Cat. Hort. Monsp. 138. 1813, wie a, doch End-B.chen im Mittel nur 1-2 cm lang. c. *prostrata* DESV., Journ. Bot. II. 113. 1813 (*R. p.* DC., l. c.), Gr.-Säule kahl, B.chen wie bei b. d. *brachystyla* KELLER, l. c. 38, Gr. frei, ein kurzes kugeliges Köpfchen bildend, ± beh. In Montenegro beobachtet.

R. s. L., Sp. pl. 492. 1753 (*R. atrovirens* VIV., Fl. Ital. Frag. I. 4. 1808). — Immergrün-Rose. I G. nur OT., adriat. Küstengebiet, Herzegowina; sonst Küsten von Portugal, N.-Span., W- und S-Frankr. (nördlich bis zur Loire-Mündung), Ital., Balkan, Kl.-Asien (Troas., N.-Afr. — In Hecken und Gestrüpp der Macchien etc., im Gebirge bis 700 m. — Blz. VI-VII. — Auch gefüllte Gartentformen bekannt.

11-14 *R. sempervirens* × *chinensis*: Nach FOCKE, Pflanzenmischlinge 142. 1881, hierher die Sorte „Triomphe de Bollwiller“. CRÉPIN erwähnt einen solchen Bastard nicht.

(11×12)×31 *R. (sempervirens* × *arvensis*) × *agrestis*: *R. costei* DUFF., in PONS et COSTE, Herb. Ros. Fasc. IV. 46. 1898.

>> Blst. meist 1-blütig, B.chen grob-sägezählig (Fig. 320 i, S. 543).

*) Vgl. Habitusbild bei VILMORIN, Frut. Vilm. Cat. I. 1905. 85.

12. *R. arvensis*: niedergestreckter b. Zw. · hakenstachlig, selten stachellos o. mit Stieldrüsen und feinen Stachelborsten oft ziemlich dicht besetzt; mittlere B. der Blzw. meist 7-, selten 5-zählig, B. chen länglich bis rundlich oval, meist etwa $1\frac{1}{2}$:1, kahl o. meist unters. auf Nerven 7-dicht beh., weißlichgrün, oben matt tiefgrün, End-B. chen etwa 2:1,2—3,5:2,2 cm, Neb. gleichmäßig, schmal, drüsig-wimperig; Blst. mit kleinen lanzettlichen, aufrechten · bleibenden Trgb., Bl-Stiele kahl, z. T. stiel-drüsig, Bl. weiß, ca. 3—4,5 cm Dm., K. breit-oval bis eifg.-lanzettlich, meist plötzlich lang gespitzt, äußere meist fiederspaltig, drüsenlos, C. $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ mal länger als K., Gr.-Säule die inneren Stb. etwas überragend, kahl, selten Gr. stark verkürzt und frei, Scheinfr. kugelig, birnförmig o. längl.-eifg.

Diese Art ändert nach KELLER in bezug auf den Habitus, die Bestachelung, die Größe, Form, Beh. und Zähnung der B. chen, die drüsige Beh. der Bl-Stiele, die Form der Scheinfr. etc. mannigfaltig ab. Hier seien nur 2 auffällige Formen erwähnt: var. *brevistyla* GELMI, in D. Bot. Monatschr. II. 40. 1884; Gr.-Säule sehr kurz, bisweilen nur ein Köpfchen bildend. In S-Tirol gefunden. Ferner var. *bibracteata* SER., in DC. Prodr. II. 597. 1825 (*R. bib.* BAST., in DC. Fl. fr. 537. 1815), eine aufrecht wachsende Form mit ziemlich großen, derben, oben etwas glänzenden B. chen und meist reichblütigern Blst. Besonders im SW. des Gebietes der Art.

R. a. HUDS., Fl. angl. 192. 1762 (*silvestris* HERRM., Diss. inaug. d. Ros. 10. 1762; *repens* SCOP., Fl. carn. ed. 2. I. 355, 1772). — I. G. nur im südlichen und mittleren Teile hfg., im N. selten o. fehlend (Genaueres bei KELLER, l. c. 39). Wälder, Hecken, im Gebirge bis 11—1400 m. — Blz. VI—VII. Frz. VIII—IX. — Nach FOCKE, Pflz.-Mischlinge 141. 1881, stammen die Ayrshire-Rosen der Gärten z. T. von *arvensis* ab. Sonst vgl. Bastarde.

12×14 *R. arvensis* × *chinensis*: hierher nach FOCKE, Pflanzenmischlinge 142. 1881, *R. arvensis ruga* HORT.

12×16 *R. arvensis* × *gallica*: *R. polliniana* SPRENGEL, Pl. min. cogn. II. 66. 1813; hierher gehören nach KELLER, l. c. 364, ferner: *R. affabilis* VUK., in Rad Jugosl. Acad. 1886. 10; *assurgens* VUK., l. c. 1884. 14; *axmanni* GMEL., Fl. Bad. IV. 367. 1826, *boracana* BÉR., in Mém. Soc. Agr. Angers V. 353. 1842; *corallifolia* VUK., in Rad Jugosl. Acad. 1884. 16; *cymulifolia* BORB. et VUK., in O. B. Z. 1884. 449; *decipiens* BOR., Fl. centr. 3. éd. 218. 1857; *doljensis* BORB. et VUK., l. c. 9. 1886; *fasciculifolia* BOULL., in Bull. S. B. Lyon II. 74. 1884; *tenella* DÉS., in Mém. S. M. et L. 1873. 98; *geminata* RAT., Enum. ros. 98. 1866; *hybrida* SCHLEICH., Cat. 1815; *kalksburgensis* WIESB., in O. B. Z. 1879. 144; *microtypus* BORB. et VUK., l. c. 1884. 260; *mammulifolia* VUK., l. c. 13; *elagantia* BORB., Ros. Hung. 317. 1880; *hemibifolia* BOULL., in Bull. S. B. France 1876, S. LXIII; *subalbida* VUK., l. c. 21; *submissa* VUK., l. c. 17; *subrepens* BORB. et VUK., l. c. 13; *tenella* BOULL., in Bull. S. B. Dauph. 1886. 546.

12×24 *R. arvensis* × *tomentosa*: vgl. CRÉPIN, in Bull. S. B. Belg. XXXIII. 1. 137. 1894 und KELLER, l. c. 370. 1902.

Sekt. II. *Indicae* THORY, Prodr. gen. Rosae 1820. Vgl. S. 537. Stamm aufrecht o. kletternd, Hakenstacheln zerstreut; Neb. lang angewachsen, die oberen mit schmalen gespreizten Öhrchen, mittlere B. der Blzw. 3—7-zählig; Trgb. des Blst. schmal; K. nach dem Verblühen zurückgeschlagen, Gr. frei, etwa die halbe Länge der innersten Stb. erreichend.

○ Bl. 10—12 cm Dm., kremefarben o. hellgelb.

13. *R. gigantea*: üppiger Kaminstrauch; Zw. kahl, graugrün o. an Seiten- setze gerötet, Hakenstacheln verstr., unter B. oft gepaart, B. 5—7-zählig, kahl, oben tief glänzend grün, unten heller; B. chen elliptisch o. lanzettlich, rein und scharf gesägt, End-B. chen etwa 7,5:1 cm; Rachis etwas bestachelt und stieldrüsigt; Neb.

14. Beschreibung zumeist nach A. BERGER, in Gard. Chron. 1878. I. 376. Vgl. auch die Abbildung der Bl. in Gard. Chron. 1889. II. 13.

bis halb so lang wie B.-Stiel, drüsig gewimpert; Bl. einzeln, kurzgestielt, Bl. Achse kahl, halbkugelig-eifg., K. lang, ganzrandig, Spitze z. T. blattartig, innen beh., Rand drüsig; C. breit rundlich, fein gespitzelt, Gr. beh., Fr.?

R. g. COLL., apud CRÉP., in Bull. S. B. Belg. XXVII. 148. 1888. — Shan Hills zwischen Burma und Siam. — Blz. V (Riviera). — Auch in Engl. jetzt häufiger in Kultur. Bei uns kaum haltbar. Schon CRÉPIN meinte, daß sie für Hybriden wertvoller noch als *R. chinensis* sein dürfte. Ob bereits Erfahrungen vorliegen, ist mir nicht bekannt.

CC Bl. viel kleiner, kaum über 6 cm Dm., in roten oder gelblichen Farbentönen.

14. *R. chinensis*: vgl. auch Subspec.: B. lange bleibend, B. chen länglich, etwas zugespitzt, einfach kleingesägt, glänzend dunkelgrün, unters. hellgrün, die 2 unteren meist deutlich kleiner, das endständige größer; Bl. meist einzeln, seltener zu 2–3 auf schlanken, oft stiel-drüsigen Stielen; Scheinfr. lange grün bleibend, zuletzt schmutzig braun; vgl. var.

Subspec. a. *fragrans* MOUILLEF., Traité des arbres I. 557. 1898 (*R. fragr.* THORY et RÉD., Ros. I. 61. 1817; *R. indica* LDL.), Monogr. Ros. 106. 1827, an L.?; var. *indica* KOEH. Dendr. 281. 1893, Stengel grün, 1–2 m hoch, Stacheln rot, Bl. meist mehrere auf stiel-drüsigen Stielen (Fig. 321a, S. 348), bei den typischen „Teerosen“ gelblich, sonst zartrosa, — gefüllt. Hierher dürfte die monströse Form f. *undulata* *R. chin. semperflor. undul.* DIPP, Landb. III. 562. 1893 gehören vgl. Abb. in Flor. d. Serr. XI. t. 1136. 1856, deren Petalen vergrünt sind.

Subspec. b. *semperflorens* KOCH, Dendrol., I. 273. 1869 (*R. semp.* CURTIS Bot. Mag. t. 284. 1794; *diversifolia* VENT., Jard. Cels. 35. 1800; ? *bengalensis* PERS., Syn. pl. II. 50. 1807, niedriger, unter 1 m hoher b. Stacheln oft fast fehlend, Bl. oft einzeln, auf oft kahlen Stielen. Zu dieser Gruppe der „Monatsrosen“, welche heller o. dunkler rote, selten weiße Bl. besitzen und hgt. vom VI–X blühen, gehören eine Anzahl Formen, deren sichere Klarstellung noch nicht gelungen scheint. Eine auffallende Form ist jedenfalls var. *minima* CURT. Bot. Mag. t. 1762. 1815 (var. *lawranceana* LDL., Bot. Reg. VII. t. 538. 1821), die Liliput- oder Lawrance-Rose, eine sehr zierliche Zwergform, deren rosafarbene oder mehrfarbige Bl. 1,5–4,5 cm Dm. besitzen und auch gefüllt vorkommen.

R. ch. JACQ., Obs. bot. III. 7. t. 55. 1765 (*R. indica* FOCKE, Pflanzenmischlinge 139. 1887, an L.?). — Nach KELLER, dem ich hier folge, vermutlich in China einheimisch (die wilde Stammform unbekannt), dort seit uralten Zeiten in Gärten, wie auch schon längst in Japan und Indien; im 18. Jahrh. nach Europa und den Kolonien eingeführt, dort mit den europ. Edelrosen *R. gallica* und deren Abkömmlingen vielfach gekreuzt, woher die Mehrzahl der modernen Gartenrosen stammt. Man vgl. die Bastarde. Hart sind diese Formen nur in sehr warmen Lagen. Eine kritische zusammenfassende Darstellung dieser Rosengruppe wäre sehr erwünscht, da ja alle vorhandenen Arbeiten Bruchstücke sind. Im Rahmen dieses Buches war es aber unmöglich, näher darauf einzugehen.

(14×17)×67 *R. (chinensis × damascena) × spinosissima*: nach FOCKE, Pflanzenmischlinge 141. 1887, als „remontierende Pimpinellrose“ in den Gärten gehend.

14×57 *R. chinensis × blanda*: *R. aschersoniana* GRAEB., in Gartenfl. 1902. 561. t. 1594, Fig. 1. Scheint eine sehr empfehlenswerte Zierrose zu sein. Wurde von ZABEL in Hort. Münden gezüchtet.

14×61 *R. chinensis × pendulina*. *R. reclinata* THORY, in RÉD. Les ros. III. t. 157. 1824. In den Gärten als „Rose de Boursault“.

14×66 *R. chinensis × rugosa*: Kreuzung von BRUANT, in den Gärten als „M^{me}. Georges Bruant“. Vgl. CRÉPIN, in Bull. S. B. Belg. 1894. 122.

Sekt. III. *Banksiae* CRÉP., in Journ. Hort. Soc. XI. 3. 1889. Vgl. oben S. 537, Stamm kletternd; Neb. vom B.-Stiel frei, zeitig abfallend, am Rande in fädige Fransen zerschlitzt.

*) Im Journ. d. Roses 1891. 43 stellt CRÉPIN diese Formengruppe als *R. indica* LDL. als Art neben *R. semperflorens* CURT. (= *chinensis* JACQ.).

15. *R. banksiae**): bis 4 m kletternd, Stamm bestachelt, Zw. dünn, kahl, stachellos, B. immergrün, 3–5(–7)-zählig, beiders. glänzend, unten etwas heller, kahl o. auf Rippe beh.; B. chen vgl. Fig. 320 m, S. 543) länglich o. breit lanzettlich, End-B. chen etwa 2,5 : 1,2–6 : 2,3 cm; Rachis + beh.; Blst. doldenrispig, meist vielblütig; Bl.-Stiel 2,5–4 cm, kahl, zuweilen spärlich bedrüst, Bl. meist gelb und gefüllt, seltener weiß. K. eilanzettlich, zugespitzt, innen beh., ganzrandig, wenig bis doppelt länger als die halbkugelige Bl.-Achse. Fr. klein, kugelig, ohne K., sonst vgl. Fig. 319 r–s², S. 539.

R. b. R. BR., in AIT. Hort. Kew. ed. 2. III. 1811 (*R. inermis* ROXB., Hort. Bengal. 38. 1811) — in China (Hupei, Sutschwan, Yünnan) wild, aber auch vielfach wie in ganz O.-As. seit alters kultiviert. Soll etwa 1807 nach Eur. gekommen sein. Im nördlichen Teile unseres Gebietes, z. B. S.-Tirol (um Trient) verwildert. — Blz. VI–VIII.

15 × 75 *R. banksiae* × *laevigata*: *R. fortuniana* LDL. et PAXT., Flow. Gard. II. 71, Fig. 171. 1851/52. Ob diese seine Deutung zutrifft, möchte CRÉPIN in Bull. S. B. Belg. 1894. 127, doch nicht mit aller Bestimmtheit behaupten.

Sekt. IV. *Gallicae* CRÉP., in Bull. S. B. Belg. XXXI. 2. 70. 1892. Vgl. oben S. 537, aufrechte b, Stamm mit Hakenstacheln, welche mit Stachelborsten und Stieldrüsen gemischt sind: mittlere B. der Blzw. 5-, selten 3-zählig; Bl. groß, meist einzeln und dann ohne Trgo.; K. nach Blz. zurückgeschlagen, vor Frz. abfallend, äußere fiederspaltig.

♂ Zw. mit verstreuten Hakenstacheln und ∞ feinen Stachelborsten. B. chen mit breiten, stumpfen, einfachen, aber fein drüsig gezähnelten Sägezähnen, Bl. meist einzeln.

16. *R. gallica*: b mit unterirdischen Ausläufern, Zw. aufrecht, kahl, die Stacheln und Borsten leicht abfallend; Blzw. dicht stieldrüsig; B. vgl. Fig. 322 a, S. 552, oben tiefgrün, kahl, unten weißlich grün, leicht anliegend beh., Nerven scharf vortretend, Textur derb; B. chen breit elliptisch bis rundlich-eifg., Grund herzfg. o. rundlich, Spitze kurz o. abgerundet, Rachis beh. und stieldrüsig, hfg. etwas bestachelt; Neb. schmal, drüsig gewimpert, mit kurzen abstehenden Öhrchen; Bl. selten zu 2–3, ihre Stiele lang, stachelborstig und stieldrüsig, Bl.-Achse stieldrüsig und stachelborstig, dgl. K. außen, innen beh., kürzer o. länger als die großen rotpurpurnen, sammetigen C., Gr. meist beh., Fr. glatt, kugelig, birn- o. fast kreiselfg., orange o. bräunlich, sonst vergleiche Fig. 321 b–c, S. 548.

Als Hauptformen seien erwähnt: Subspec. a. *eristyla* KELL., l. c. 1877, Gr. stark beh. bis wollig filzig. Dieser Formenkreis tritt im Gebiete besonders häufig in ∞ Abänderungen auf. Subspec. b. *leiosyla* GELMI, Prosp. Fl. Trent. 18. 1893, Gr. kahl o. schwach beh., nicht wollig. Seltener und weniger formenreich.

Subspec. c. *centifolia* CRÉP., in Bull. S. B. Belg. XXXI. 73. 1892, in textu *R. celt.* L., Sp. pl. 491. 1753, nach KELLER abweichend durch: Grundachse weit weniger kriechend, Stacheln der Zw. mehr ungleichartig, die größeren stärker; B. chen dünnhäutiger Fig. 322 b, S. 552; Bl. mekend, fast stets gefüllt, meist schon rosa; Bl.-Achse eifg., K. länger und schmaler. In den Wäldern des O. Kauk. einheimisch, verhältnißl. seit alters im Or. und Meht., seit dem Mittelalter in M.-Eur. mit stets gezüchteten Bl. kultiviert, zuweilen verwildert (so um Nürnberg). Hierher als monstrose Form die *f. muscosa* SER., in Mus. Helv. I. 18. 1858 (*R. musc.* AIT. Hort. Kew. II. 283. 1790), Moosrose, Stieldrüsen an Bl. Stielen, Bl.-Achse und K. in moosartige B. chen umgewandelt. Ähnliche Formen nach KELLER auch bei typ. *gallica*.

R. g. L. Sp. pl. 492. 1753 (*R. austriaca* CRANTZ, Stirp. Austr. I. 86. 1768; *canina* JACQ., Fl. austr. II. 59. 1773). Essig-R. — l. G. — verbr., nördlich bis Elsaß, Rheinland, Hessen, Thüringen, Königl. Sachsen und Schlesien, ferner Frankr. ausgenommen im W. und N., Ital., Balkan, M- und S-Rußl., Kl.-As., Armen.

*) Beschreibung z. T. nach HOOKER, Bot. Mag. t. 7171. 1891.

W.-Transkaukas., in Tunesien nur verwildert. Lichte Waldungen, Waldränder. Raine; im Gebirge bis ca. 1300 m. — Blz (VI, VII. — Frz. VIII bis Winter.

Eine der schönsten Wildrosen, besonders durch ihre Beteiligung an Gartenformen (vgl. Hybriden) wertvoll.

Fig. 321. *Rosa*: *a chinensis*: Bl. im L.-Schn. — *b—c¹ gallica*: *b = a*; *b¹* K.; *b²* C.; *b³* Frkn.; *c* Scheinfr.; *c¹* Zw.-Stück. — *d—d¹ damascena*: *d* Scheinfr.; *d¹* Zw.-Stück. — *e—g¹ jundzillii*: *e* Bl. im L.-Schn., *e¹* K.; *f* Scheinfr.; *g* B.chen (Zählung); *g¹ = d¹*. — *h—i² rubrifolia*: *h* Bl. ohne C.; *h¹* C.; *i* B.chen; *i¹* Zw.-Stück; *i²* Scheinfr. — *k—n orientalis*: *k = c¹*; *l* halbes B.chen; *m = h*; *m¹* C.; *n* reife Scheinfr. — *o—q¹ edesa pomifera*: *o* Bl.-Kn. mit den Trgh. am Bl.-Stiel; *o¹* Bl. von oben; *p* dgl. im L.-Schn.; *q* ein Zw. Stachel; *q¹* ein halbes B.chen (Zählung) (Original).

16—18 *R. gallica* × *jundzillii*: *R. christii* M. SCHULZE. in Mitt. B. V. Ges. Thür. V. 47. 1887. Vgl. KELLER, l. c. 259. 1902.

16×23 *R. gallica* × *omissa*: Vgl. KELLER, l. c. 260. 1902.

16×24 *R. gallica* × *tomentosa*: hierher nach KELLER, l. c. 262: *R. therebinthinacea* BESS., Enum. Pod. et Volh. 21. 1820; *genevensis* PUG., apud DÉS., in Bull. S. B. Belg. XV. 567. 1876; *marcyana* BOULLU, apud DÉS., l. c. 556; *duffii* M. SCHULZE, in Mitt. Geogr. Ges. Thür. II. 226. 1884; *heimerli* BRAUN, in Verh. Z. B. Ges. Wien 1885. 129 und *wegmanni* SCHULZE, in Mitt. Thür. B. V. V. 44. 1887.

16×25 *R. gallica* × *rubiginosa*: *R. consanguinea* GREN., Fl. Jur. 225. 1864. Hierher ferner *R. chinoclada* BOULLU, in Bull. S. B. Lyon 1892 und *personata* RIP., apud CRÉP., in Bull. S. B. Belg. 1894. 1. 104.

16×29 *R. gallica* × *micrantha*: *R. sylvicola* DÉS. et RIP., in Mém. S. Acad. M.-et-L. 1875. 122. Vgl. KELLER, l. c. 267.

16×31 *R. gallica* × *agrestis*: hierher nach KELLER, l. c. 269: *R. klukii* GREN., Fl. Jur. 248. 1864, non BESS.; *formosula* GREN., in Mém. Soc. Eur. Doubs 4. Sér. IX. 439. 1874; *anisopoda* CHRIST, Ros. Schw. 120. 1873; *subdola* DÉS., in Bull. S. B. Belg. XV. 528. 1876; *infesta* KMET', in Sched. Fl. Aust.-Hung., II. 32. 1882.

16×35 *R. gallica* × *tomentella*: *R. kabathi* ANSORGE, apud KELLER, l. c. 272. — Hierher auch *R. costeana* HY, in Bull. Herb. Boiss. VI. 1898.

16×37 *R. gallica* × *canina*: Hierher gehören: *R. aunieri* CARIOT, Et. d. Fl. 4. éd. II. 180. 1865; *chaberti* DÉS., in CARIOT, l. c.; *amelium* KMET', in Oswald Almanach 167. 1893; *dryadea* RIP., apud DÉS., in S. B. Belg. XV. 502. 1876; *insidirosa* RIP., apud DÉS., l. c. 501.; *kosinskuana* BESS., Cat. Lem. H. Crem. 1819; *leveilii* BOULLU, in Bull. S. B. France 1876, S. LXV; *protea* RIP., apud DÉS., l. c. 503; *scotinophylla* BOULLU, in Herb. Ros. Fasc. I, No. 20. 1895; *timeroyi* CHAB., in CARIOT, l. c.; *transmota* CRÉP., in Bull. S. B. Belg. VIII. 268. 1869; *waitziana* TRATT., Mon. Ros. I. 57. 1825.

16×38 *R. gallica* × *dumetorum*: Hierher gehören: *R. alba* L., Sp. pl. 492. 1753 [vgl. hierüber KELLER, l. c. 284!]; *boreykiana* BESS., Cat. sem. H. Crem. 1820; *christii* WIESB., in Ö. B. Z. 1879. 146; *collina* JACQ., Fl. austr. II. 58 t. 197. 1774; *friedlaenderiana* BESS., Enum. Pl. Pod. et Volh. 63. 1821; *Hoydi* DÉS., in Bull. S. B. Belg. XV. 391. 1876; *macrocarpa* BOISS., Fl. or. II. 684. 1872; *gucpini* DÉS., Fl. d'Anjou 325. 1827; *superba* J. KERN. et V. KELL., in HAL. et BR. Nachtr. 263. 1882.

16×39 *R. gallica* × *glauca*: *R. waitziana* RCHB., Fl. Germ. exc. 621. 1832. Vgl. KELLER, l. c. 287.

16×40 *R. gallica* × *coriifolia*: Vgl. KELLER, l. c. 289.

? 16×52 *R. gallica* × *cinnamomea*: *R. turbinata* AIT Hort. Kew. II. 206. 1789 (*R. francofurtana* BORCKH., Forstbot. 312. 1790) nach KELLER kann diese Rose, die einen *gallica*-Bastard darstellt, deren 2. Elter aber noch nicht sicher nachgewiesen ist, wie folgt, gekennzeichnet werden: b, bis 2 m hoch, Zw. mit spärlichen, ungleichen, teils geraden, teils gebogenen, öfter fehlenden Stacheln, Blzw. meist wehrlos; B. meist 5–7-zählig, Bchen aus abgerundetem Grunde oval bis eifg., einfach gesägt, etwas lederig, oben kahl, glänzend, unters. graugrün, kahl o. Rippe beh., obere Neb. sehr verbreitert, dgl. Trgb., Bl. zu 1–3, ihre Stiele und die Bl.-Achse unterwärts stieldrüsig, diese breit-kreiselfg., K. ungeteilt, selten äußere mit Fiederchen, nach Blz. aufrecht, C. lebhaft rosa, Bl. meist gefüllt.

CC Zw. mit ∞ ungleich großen und derben Hakenstacheln (Fig. 321d¹). Bchen einfach drüsenlos gezähnt, Blst. meist 5–10-blütig.

17. *R. damascena*: höherer, kräftiger verzweigter b, B. vgl. Fig. 322c, S. 552, Bchen reichlicher, meist auch obers. auf Rippe beh., Neb. deutlicher drüsig gewimpert, die oberen eher etwas breiter: Bl. meist gefüllt, Fr. länglicher, rot, vgl. Fig. 321d.

R. d. MILL., Gard. Dict. ed. 8. No. 15. 1768. — Portland-R. — KELLER bemerkt hierzu folgendes: Der Ursprung dieser seit alten Zeiten in Kultur befindlichen, in M.-Eur. mit Sicherheit wohl erst im 16. Jahrh. eingeführten Art ist in Dunkel gehüllt. Daß sie in Vorder-As. aus *R. gallica* entstanden, ist höchst wahrscheinlich, ob aber durch Kreuzung *gallica* × *canina* (CRÉPIN) o. *gallica* × *moschata* (FÖCKE, CHRIST) ist sehr fraglich. — Blz. VI–VII, in manchen Formen (daher der Name *R. calendularum* BORCKH., Forstbot. 338. 1790 [nach dem älteren *R. munum calendarium*] und *R. centifolia bifera* POIR., in LAM. Encycl. VI. 276. 1804) bis in o. wieder im Herbst. — Von den Formen dieser Art ist interessant die jetzt fast verschwundene *f. variegata* KELLER, l. c. 52, die sogen. York- und Lancaster-Rose [ROESSIG, Rosen, t. 33], bei der auf einem Stöcke mitunter weiße, rote und

gemischte Bl. vorkommen. Ob ein wieder in seine Elemente zerfallender Pfropfbastard wie *Cytisus adami*? (KELLER). — Die C. der *R. damascena* liefern das kostbare Rosenöl, und zwar ist es die f. *trigintipetala* DIECK, in Gartenfl. 1889. 129, 160, eine durch stärkeren Geruch vom Typ abweichende Form, aus der in O.-Rumelien (Kazanlik), sowie in Schiras das Öl gewonnen wird. Diese Ölrose wird auch bei uns, z. B. um Leipzig, im großen nicht ohne Erfolg angebaut. (Vgl. DIECK, l. c.) und FLÜCKIGER, Pharmakogn. d. Pflanzenreichs, 3. Aufl. 167.

17×66 *R. damascena* × *rugosa*: Dies soll nach KOEHNE, Dendr. 283. 1896 die Rose „Souvenir de Yeddo“ der Gärten sein.

Sekt. V. *Caninae* CRÉP., l. c. — Vgl. oben S. 538, Stamm meist gleichartig bestachelt, Stacheln gerade, gebogen o. hakig; mittlere B. der Blzw. meist 7-zählig; Blst. meist mehrblütig. Trgb. vorh., stark verbreitert; K. nach Blz. zurückgeschlagen, vor Frz. abfällig o. aufgerichtet, die Bl.-Achse bis zur Frz. krönend und dann abfallend o. bleibend, die äußeren fast immer fiederspaltig.

A. Stacheln ziemlich schlank, gerade o. fast gerade, selten mit Stachelborsten gemischt, K. nach Blz. zurückgeschlagen.

Subsekt. a. *Jundzilliae* CRÉP., l. c. 80. — Vgl. Sekt. V, B. chen meist groß, etwas starr, mit reichlich zusammengesetzter Zähnung und scharf hervortretendem Adernetz; Bl.-Stiele mit Stiel- und Stacheldrüsen besetzt, denen oft Stachelborsten beigemischt sind.

18. *R. jundzillii*: 0,5–2 m hoher b, Zw. oft etwas bereift, bogig überhängend, B. 5–7-zählig (Fig. 322 f, S. 552), oben tiefgrün, zuweilen etwas bereift, unterseits blaß, hier und da weinrot angelaufen, kahl, selten und vielleicht nur jung über die ganze Fläche beh., Subfoliadrüsen selten fehlend, meist zerstreut, Rachis stieldrüsig und ± beh. bis kahl, B. chen mittelgroß bis groß, bis 7:4,5 cm, verlängert eifg. mit abgerundetem Grunde, oft in eine sehr scharfe Spitze auslaufend, Zähnung vgl. Fig. 321 g; Neb. breit, kahl, drüsenrandig, zuweilen mit Subfoliadrüsen, Bl. einzeln o. in mehrblütigen Blst. Trgb. öfter mit Blattanhängsel, Bl.-Stiel bis 4mal so lang wie Bl.-Achse, Bl. groß, bis 7 cm Dm., rosenrot, zuweilen fast purpurn, Gr. beh., Scheinfr. hfg. auch länglich oval, sonst vgl. Fig. 321 e–f, S. 548.

Eine in ∞ Abänderungen auftretende Art, in der CHRIST (in Bot. Centralbl. XVIII. 391. 1884) eine durch Hybridation entstandene Species *gallica × canina* sieht. Man vgl. das von KELLER, l. c. 54 Gesagte. Erwähnt sei nur, daß in den Formenkreis die als *R. trachyphylla* RAU, Enum. Ros. Wirceb. 124. 1816 und *R. hampeana* GRIESB., in GARCKE, Fl. N.- und M.-Deutschl., 4. Aufl. 113. 1858, beschriebenen Arten gehören.

R. j. BESS., Cat. Hort. Crem. 117. 1816 (*glandulosa* BESS., Cat. Hort. Crem. Supp. III. 20. 1811, non BELLARDI; *jundzilliana* BESS., Enum. Pod. et Vol. 46. 67. 1820–21). I. G. nur im südlichen und nördlichen Teile selten o. fehlend; sonst noch Frankr., S.-Rußl., Transkauk., Armen. — Blz. VI, Frz. VIII–IX. — Eine recht kulturwerte Form.

? 18×24 *R. jundzilli* × *tomentosa*: vgl. KELLER, l. c. 249.

18 × 37 *R. jundzilli* × *canina*: *R. naumannii* M. SCHULZE, in Mitt. B. V. Thür. N. F. IX. 38. 1896.

C. siehe S. 556. B. Stacheln schlank, gerade o. leicht gebogen, K. nach Blz. aufgerichtet, lange bleibend*).

Subsekt. b. *Rubrifoliae* CRÉP., l. c. 79. — Vgl. Sekt. V oben, B. chen meist völlig kahl, einfach gezähnt; K. schmal und lang, die äußeren mit kleinen fädlichen Fiedern o. gleich den inneren ungeteilt, C. rot, klein, kürzer als K., Scheinfr. kugelig, meist ziemlich klein.

19. *R. rubrifolia*: 1–3 m hoher b, Zw. und B. hechtblau o. rötlich überlaufen, Stacheln vgl. Fig. 321 i, S. 548, selten stärker gekrümmt,

*) Vgl. aber auch *R. sicula* und *R. glutinosa* S. 557.

an den Blzw. meist klein, wenig ∞ , o. fehlend: Schößlings-B. vorherrschend 9-zählig, die der Blzw. 5–7-zählig (Fig. 322 e, S. 552); fast stets kahl, selten an Rippe beh., meist ohne Subfoliadrüsen: B. chen mittelgroß bis grob, End.-B. chen bis etwa 5.6:3.3 cm, elliptisch bis länglich oval, Grund rundlich und ganzrandig, Zähnung vgl. Fig. 321 i, meist noch etwas grober und gleichmäßiger: Rachis meist kahl hfg. auch drüsenlos, Neb. oft sehr breit und meist kahl, mit drüsig-gezähneltem Rande: Blst. meist mehr- bis vielblütig: Bl.-Stiele so lang bis 2 mal so lang wie Bl.-Achse, von den breiten, rötlich angelaufenen oft laubigen Hochb. umhüllt, Bl. blaßrot, Bl.-Achse meist kahl, Gr. beh., Scheinfr. leuchtend gelb- bis scharlachrot.

Zum Formenkreise gehören auch *R. glaucescens* WULF., in ROEM. Arch. III. 37. 1805 und *gutensteinensis* JACQ., Cat. hort. Vind. 1821. 3 (früher Host, Fl. Austr. II. 25. 1831).

R. r. VILL., Hist. pl. Dauph. III. 549. 1789 (*R. glauca**) POUR., in Mém. Acad. Toulouse III. 326. 1788; *rubicunda* HALL. F., in RÖM. Arch. II. 6. 1799; *pendulina* CRÉP., in Bull. S. B. Belg. VIII. 334. 1869). Rotblattrige Rose. — I. G. durch SCH. und OU. verbreitet, in D. nur Elsaß, Baden, Württemberg, Bayern; sonst noch Pyrenäen, Cevennen, Auvergne, nördl. Apennin, Serbien. Buschige Waldstellen, Taler, im Gebirge zum Teil bis 1500 m. — Blz. VI–VII — Frz. IX. Recht kulturwerte Form.

19×37 *R. rubrifolia* × *canina*: hierher nach KELLER, S. 251; *R. scopulosa* BRIQ. in Bull. S. B. Genève. VII. 1892 94.

19×39 *R. rubrifolia* × *glauca*: vgl. KELLER, l. c. 252.

19×61 *R. rubrifolia* × *pendulina*: *R. brueggeri* KILLIAS, apud CRÉP., in Bull. S. B. Belg. 1889. 1. 174.

19×67 *R. rubrifolia* × *spinosissima*: vgl. KELLER, l. c. 320.

Subsekt. c. *Vestitae* KELLER, l. c. 63. 1900 umfaßt die Subsekt. *Orientales*, *Villosae* und *Tomentosae* von CRÉPIN, vgl. das bei *R. omissa*, S. 554, Gesagte. — Vgl. Sekt. V, S. 550, B. chen meist beiders. weichfilzig o. sammetartig beh., selten mit einfacher, meist mit doppelter o. reichlich zusammengesetzter Zähnung.

© Bl.-Stiele wollig beh., mit Stieldrüsen und feinen Nadelstacheln besetzt.

20. *R. orientalis*: niedriger o. zwergiger b., Stacheln spärlich o. reichlicher (Fig. 321 h), junge Zw. dicht beh., drüsenlos, B. 5–7-zählig (Fig. 322 g), ober- grün, dicht anliegend weich beh., unters. sammtthaarig, an Rippe spärliche Subfoliadrüsen; B. chen oval, am Grunde abgerundet, vorn stumpf abgerundet o. kurz zugespitzt, Zähnung vgl. Fig. 321 i; Rachis filzig, drüsig und meist etwas stachelborstig, Neb. gut entwickelt, beiders. beh., Öhrchen abstehend, länglich oval, Rand drüsig; Bl. einzeln, Hochb. lanzettlich, beh.; Bl.-Stiele ca. 1 cm, wenig länger als die stieldrüsig-stachelborstige Bl.-Achse, Bl. rosa, 3–4 cm Dm., Gr. wollig beh., reife Scheinfr. wie Fig. 321 n, S. 548, vgl. sonst auch m—m¹.

Ich habe KELLERS Beschreibung nach mir vorliegenden von CRÉPIN revidierten Exemplaren KORSCHYS (No. 293, 343 und 539) etwas modifiziert. Die Auffassungen über den Kreis der *Orientales*, wie überhaupt über die *Vestitae* sind so verschiedenartig, daß ich aus der Literatur kein klares Bild gewinnen konnte, über

* Obwohl dies r Name die Priorität hat, da *forma* nur VILL., Prosp. 46. 1779, ein unsicherer, jedenfalls nicht für diese Art gültiger Name ist, so folge ich doch KELLER und halte, um nomenklatorische Verwirrung zu verhüten, *glauca* im Sinne VILLARS fest (S. 565).

die Begrenzung von *orientalis* nahe stehenden Arten wie *R. vankeurckiana* CRÉP.*), in Boiss. Fl. or. II. 683. 1872 (*R. pulchella* SCHOTT et KOTSCHY, nec WILLD.) aus dem Cilic. Taurus, und *R. heckeliana* TRATT., Ros. monog. II. 85. 1823., aus Griechenland, S.-Ital. und Sizil. Diese letzte ist von BURNAT et GREMLI, Genre

Fig. 322. *Rosa*: Blattformen von: a *gallica* — b *gallica centifolia* — c *dama-*
scena — d *turbinata* — e *rubrifolia* — f *pandzili* — g *orientalis* — g¹ *dymaitica*
 — h *allosa (pomifera)* — i *mollis* — k *omissa* — l *tomentosa* — m *rubiginosa* —
 n *sicula* — o *glutinosa* (Alles $\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

* Im Bull. S. B. Belg. XXI. 37. 1882, sagt CRÉPIN von dieser Form: Il se distingue du premier = *orientalis* par ses folioles ovales-elliptiques et non suborbiculaires ou ovales-arrondies, celles des feuilles supérieures ordinairement assez longuement atténuées-aigues au sommet. Außerdem Bl.-Achse weniger dicht drusenborstig.

Rosa. Rev. d. groupe des orientales 71. 1887, ausführlich beschrieben worden und scheint nach dem mir vorliegenden Material ein sehr zierlicher *b* zu sein, der durch seine kleinen, nur 5–15 mm langen, $\pm$ rundlichen B.chen, durch reichere, relativ größere hakigere Bestachelung der Zw. und Blzw. und B.-Rachis, nur 1–4 mm lange, zuweilen kahle Bl.-Stiele und kleinere Bl. mit weniger bestachelten Bl.-Achsen abweicht.

R. orientalis DUP., in DC. Prodr. II. 607. 1825. — Sokogebirge in Montenegro, ferner Kl.-As., Assyrien, Persien. — Fels-hänge der Gebirge bis über 2000 m. — Blz. VI. — Frz. VIII–IX. — Mir bisher in Kultur nicht bekannt geworden.

○○ Bl.-Stiele nicht wollig beh., meist mit Stieldrüsen besetzt, denen nicht selten Stachelborsten beigemischt sind, selten völlig drüsenlos*.

* Achsen gerade, Stacheln vollkommen gerade, schlank, Öhrchen $\nearrow$ s. S. 554.

der Neb. meist sichelfg gegen den B.-Stiel gekrümmt; K. nach Verblühen aufgerichtet, die Scheinfr. bis zum Zerfall krönend.

B.chen meist groß (bis 5:3 cm), länglich-oval bis breit-elliptisch mit parallelen Seitenrändern (Fig. 322 h), meist mit ∞ Subfoliadrüsen; Stieldrüsen der Bl.-Stiele rauh; Scheinfr. meist kugelig, kirschgroß, von den langen K. gekrönt (Fig. 321 o–q¹).

21. *R. villosa* **) (*R. pomifera*): 0,30–1 m, seltener bis 2 m hoher, gedrungener, kurzästiger *b*, Stacheln (vgl. Fig. 321 q) meist gleichartig, nur in Größe etwas ungleich, selten deutlich ungleichartig, so an Blzw. z. T. mit Stachelborsten gemischt; mittlere B. 5–7-zählig, an Schossen bis 9-zählig, obers. anliegend beh. bis seidenglänzend filzig, selten kahl, unters. weichfilzig, Zähnung der B.chen vgl. Fig. 321 q¹, Rachis beh. und stieldrüsig, hfg. bestachelt, Neb. breit, Bl. einzeln, seltener in 3- bis mehrblütigen Blst., Hochb. vgl. Fig. 321 o, zuweilen länger als Bl.-Stiele, diese $\frac{1}{2}$ bis 2mal so lang als Bl.-Achse, diese kugelig-eifg. bis länglich-eifg., meist dicht stachel- und drüsenborstig, K. länger als C., in ein blattartiges, drüsenzähniges Anhängsel endend, äußere meist $\frac{1}{2}$ fiederspaltig, C. groß, rot o. purpurn, seltener blaßrot, Gr. wollig, Scheinfr. scharlachrot, breiig, von säuerlichem Geschmack.

Eine nach KELLER hauptsächlich in der Bekleidung mit Haaren und Drüsen, der Größe der B.chen, der Form, Größe und Bekleidung der Bl.-Achse veränderliche Art. Es gehören als Subspec. hierher die Arten: *R. recondita* PUG., in DES. Rev. sect. Toment. S.-A. 46. 1860; *resinosa* STERNBO., in Flora IX. 1. Beil. 74. 1826; *friburgensis* LAG. et PUG., in DES., in Bull. S. B. Belg. XV. 583. 1876; *murithii* PUG., in Bull. Soc. Murith. III. 55. 1874; *franzonii* CHRIST. Ros. Schw. 174. 1873 und *grenieri* DES., Ess. Monogr. 128. 1861, über welche und deren Formen man KELLER vergleichen möge.

R. v. L., Sp. pl. 704. 1753, ex parte (*R. pomifera* HERRM., Diss. inaug. d. Rosa 16. 1762; *villosa* var. *pomifera* DESV., in Journ. bot. II. 117. 1813). — Apfelrose; Rosier-Pomme. — Nach KELLER: hfg. Rose der Berg- und subalpinen Region

*) Hier ist nach CRÉPIN noch einzureihen: *R. elymaitica* BOISS. et HAUSSKN. in BOISS., Fl. or. II. 675. 1872, ein zierlicher *b* aus den Gebirgen Kurdistan, ich gebe nach HAUSSKNECHTS Originalen folgende Diagnose: Zw. kahl, rotbraun, $\nearrow$ stark bereift, $\nearrow$ bis dicht mit relativ großen, hellgelbbraunen, aus breiter Basis plotzsch zusammengezogenen, bogig-hakigen, sehr spitzen, bis 1 cm langen, sonst gleichfg. Stacheln bewehrt, selten Blzw. ganz stachellos, B. vgl. Fig. 322 g, End-B.chen bis 1,8:1,7 cm, obers. hellgrün, $\nearrow$ beh., unters. grauweißfilzig, Zähnung einfach, grob, Rachis nur filzig, Neb. mit dreieckigen abstehenden Öhrchen, wenig drüsig; Bl. zu 1–2, Stiel 5–7 mm, kürzer als Frgb., verstr. beh. und $\nearrow$ dicht stieldrüsig, Recept kugelig-eifg., länger, gleich den fiederspaltigen K. — stieldrüsig-borstig, K. kaum länger als C., Bl. 3–4 cm Dm., Gr. filzig, $\nearrow$ weit hervorragend, Fr. kugelig, ca. 1 cm Dm., K. zurückgeschlagen.

** Unter *villosa* L. werden jetzt meist die Formen der *pomifera* und der *mollis* zusammengefaßt. Ich schreibe mich bei Umgrenzung dieser schwierig zu trennenden Formengruppen ganz an KELLER an.

der Alpentäler, in den W.-Alp. bis 2000 m., in N.-Deutschl. nur: Hamburg, Danzig, Posen, Schles., sonst rhein. Schiefergebirge, Ardennen, Vogesen, Schwarzwald, Jura, Central- und O.-Alp.; ferner Engl., Schottl., Dänem., Skandinav., Central-Span., Pyren., N.-Apennin, Montenegro, Eur.-Türkei, W. und S. Rußl., Kl.-As., Armen., Kauk., Transkauk. — Blz. VII. — Frz. IX—X. — Vielfach wegen der ein wohl-schmeckendes Kompot gebenden Scheinfr. angebaut und aus den Gärten verwildert.

21×39 *R. villosa* × *glauca*: Vgl. KELLER, l. c. 253.

21×61 *R. villosa* × *pendulina*: Hierher *R. gombensis* PUG., in Bull. S. Murith. III. 54. 1874; vgl. KELLER, l. c. 321.

21×67 *R. villosa* × *spinosissima*: Vgl. KELLER, l. c. 326.

— Äste meist rötlich-purpurn, bläulich bereift; B. chen meist klein, rundlich bis länglich-oval (Fig. 322i, S. 552) mit stumpferen Zähnen; Bl.-Stiele mit zarten und meist spärlichen Stiel-drüsen besetzt; Scheinfr. klein, mit kurzen K.

22. *R. mollis*: meist niedriger, seltener bis 1,5 m hoher b. Stacheln am Hauptstamm oft bis 1,5 cm lang; B. 5—7-zählig, ober-s. dicht anliegend beh., unters. fast filzig, sammetig anzufühlen, meist seidenglänzend, Subfoliadrüsen in Beh. verborgen, Neb. kahl o. beh., drüsig; Bl. einzeln o. zu mehreren, Bl.-Achse oval o. kugelig, hfg. drüsenlos, selten weiß, meist wenig kürzer als größere K., Scheinfr. drüsen- und stachellos o. mit feinen Stieldrüsen, nicht weichstachelig.

R. mollis ist, sagt KELLER, ein sehr schwer zu umschreibender Formenkreis, der einerseits in enger Verbindung mit *villosa* (*pomifera*), andererseits auch die scharfe Trennung gegen *R. omisa* vermissen läßt. Von hierhergehörigen Arten seien nur erwähnt *R. andrzeivii* STEV., in BESS. Cat. Hort. Crem. Suppl. III. 19. 1862 und *arduennensis* CRÉP., in Bull. Ac. Belge 2. ser. XIV. 101. 1862.

R. m. SM. Engl. bot. XXXV. 2459. 1812 (*R. villosa* L., l. c. ex parte; *R. mollissima* FRIES, Novit. ed. 2. 51. 1828; *villosa* var. *mollissima* RAU, Enum. Ros. Wirz. 154. 1816; *clauto-petala* BESS. Fl. Pod. 66. 1821; *tomentosa* var. *mollissima* DCU., Prodr. Fl. Belg. 95. 1827.). I. G. nur nordl. Deutschl., Bosnien und sehr selten in den Alpen; ferner Frankr., Belg., Großbrit., Dänem., Skandinav., NW. Rußl., Montenegro, Kl.-As., Armen., Kurdist., Pers. — Blz. VI. — Frz. VIII—IX.

22×24 *R. mollis* × *tomentosa*: Vgl. KELLER, l. c. 90.

22×67 *R. mollis* × *spinosissima*: Vgl. KELLER, l. c. 328.

— Achsen, namentlich die blatttragenden oft zickzackfg., Stacheln gebogen bis gerade, wenn hakig gekrümmt, mit plötzlich ver-breitertem Grunde; Neb. mit kurzen 3-eckigen divergierenden Ohrrhen; K. nach Blz. aufr. o. ausgebreitet, lange bleibend, aber schließlich von reifer Scheinfr. abfällig.

— b gedrungen, kurzästig mit bläulich-grünem Laubwerk, B. chen oval bis länglich-oval (Fig. 322k, S. 552); Bl.-Stiele kürzer als die Trgb. so lang bis halb so lang wie die Scheinfr.; K. sich erst spät abgliedernd; C. intensiv rosenrot, Gr. beh. bis wollig.

23. *R. omisa*: 1—2 m hoher b. Stacheln oft lang (bis 2,5 cm), mit etwas herabgezogenem Grunde, bisweilen daneben kaum 2 mm lange Nadelborsten; B. 5—7-zählig, ober-s. dicht anliegend beh., drüsenlos, unters. wollig-filzig mit Subfoliadrüsen, B. chen etwa 2—3·1—2 cm, Zähnung vgl. Fig. 322k, Rachis filzig und drüsig und bestachelt; Neb. breit o. schmal, drüsig gewimpert, unters. beh. und drüsig; Blst. 1- bis mehrblütig, Bl.-Achse kugelig-eifg. o. oval, unter Discus oft engeschnürt, oft dicht mit ∞ Stieldrüsen besetzt, K. meist kürzer als C., auf dem Rücken dicht stieldrüsig, alle fiederspaltig, Scheinfr. kugelig, eifg. o. birntg.

KELLER sagt, eine noch hfg. dem Formenkreise der *R. mollis* zugezählte Rose, die wie wir mit CRÉPIN annehmen, zur *R. tomentosa* in näherer Beziehung steht als zur *R. mollis*. Sie kann als Bergform derselben aufgefaßt werden (vgl.

CRÉPIN, in Bull. S. B. Belg. XXXI. 2. 80. 1892). Uns ist sie das Bindeglied zwischen den *Villosae* und *Tomentosae* (CRÉPIN, l. c.), weswegen wir sie beide als Subsekt. *Vestitae* zusammenfassen (*Villosae* BOISS., Fl. or. II. 681. 1872). — Als wichtigste in ihren Formenkreis zu zählende Arten seien genannt: *R. gillotii* Dés. et Lac., in Ann. S. B. Lyon IX. 15. 1882; *resinosoides* CRÉP., in Bull. S. B. Belge XXI. 1. 98. 1882; *collivaga* COTT., apud CRÉP. l. c. 97 und *cujavica* SPIRIB., in Bot. Abh. N. V. Posen II. 5. 1895.

R. o. Dés., in Billotia I. 47. 1864. — I. G. nur D. Thüringen, Kgr. Sachs., Posen, Sch. hauptsächlich im Jura; ferner Frankr. (Dauphiné, Savoyen, Auvergne, Grosbrit. (etwas?), Skandinav. — Blz. VI—VII. — Frz. — VIII IX.

23×39 *R. omissa* × *glauca*: *R. alpestris* RAP., in REUTER Cat. Genève 68. 1861, ex parte. Vgl. KELLER, l. c. 253.

23×61 *R. omissa* × *pendulina*: *R. tredecim-arborum* BUSER, apud KELLER, l. c. 330.

23×67 *R. omissa* × *spinosissima*: vgl. KELLER, l. c. 330.

b mit verlängerten, nicht selten bogig überhängenden Ästen: Behen breit-oval bis elliptisch (Fig. 3221, S. 552); Bl.-Stiele bis 4mal länger als Bl.-Achse, K. meist vor Frz. abfallend, C. blaßrosa, Gr. beh. bis kahl.

24. *R. tomentosa*: 1—2 m hoher b. Zw. oft bläulich bereift, Stacheln gebogen bis fast ganz gerade, oft gepaart, aus breitem, etwas herablaufendem Grunde, kräftig (bis 1,5 cm); Blzw. unter Blst. bisweilen dicht beh. und stieldrüsig und stachelborstig; B. 5–7-zählig, ober. fein beh., bisweilen mit vereinzelt Drüsen, unters. grauhaarig-filzig, mit ∞ Subfoliadrüsen, B. meist reichlich über 1,5:1 cm, Zähne ziemlich groß, zusammenneigend, breit mit kurzer Spitze, Zähnelchen meist drüsig; Rachis filzig, drüsig und hakenstachelig, Neb. wie bei *omissa*; Blst. 1- bis mehrblütig, Bl.-Stiele mit o. ohne Stieldrüsen, Bl.-Achse oval o. kugelig, oft am Grunde stieldrüsig, hfg. bläulich bereift, K. auf Rücken und Rand oft drüsig, die äußeren fiederspaltig, nach Bl. ausgebreitet, dann aufgerichtet, C. meist kürzer als K., Scheinfr. dicht stieldrüsig, erbsen- bis kirschgroß.

Mannigfaltig abändernd; in den Formenkreis gehören insbesondere: *R. capnoides* KERN., apud Dés., in Bull. S. B. Belg. XV. 565. 1876; *cinerascens* DEMORT., Fl. Belg. 93. 1827; *dumosa* PUG., in Dés. Rév. sect. Tom. 10. 1866; *farinosa* BECHST., in RAT. Enum. Ros. Wirc. 117. 1810; *farinulenta* CRÉP., in Bull. S. B. Belge VIII. 246. 1866; *foetida* BAST., Suppl. Fl. Maine et Loire 28. 1812; *gisleri* PUG., apud Dés., l. c. 560; *hedevigae* BLOCK., in Östr. B. Zeit. XXXVII. 384. 1887; *herculis* BORB., Ros. Hung. 512. 1880; *intromissa* CRÉP., in Bull. l. c. 298; 1887; *micans* Dés., in Bull. S. B. Belg. XV. 550. 1876; *scabriuscula* SM., Engl. Bot. XXVII. t. 1896. 1824; *subglobosa* SM., Engl. Fl. II. 384. 1824; *zabelii* CRÉP., in Bull. S. B. Belg. XXI. 1. 94. 1882.

R. t. SM., Fl. Brit. II. 539. 1860. Filz-R. Durch das ganze Gebiet verbreitet, fehlt auf den Nordsee-Inseln; ferner Frankr., Großbrit., Dänem., Skandinav., Span., N. Itak., Serb., Belg., Rußl., Kauk., O. Kl.-As. — Blz. VI. — Frz. VIII IX.

24×28 *R. tomentosa* × *elliptica*: *R. maureri* M. SCHULZE, in Mitt. B. V. Thür. V. 21. 1887; vgl. KELLER, l. c. 255.

24×39 *R. tomentosa* × *glauca*: Hierher *R. marginata* RAP., in REUTER Cat. pl. Genève 2. éd. 66. 1861, non WALLER.; *cotteti* PUG., apud Dés., in Bull. S. B. Belg. 1876. 504. — Vgl. KELLER, l. c. 256.

24×61 *R. tomentosa* × *pendulina*: Vgl. KELLER, l. c. 331; hierher: *R. canescens* BORB., Ros. Hung. 508. 1880, *himpelanti* WIESB., in Ö. B. Z. 1880. 328; *latifolia* KMETZ, in KERN., Schedae Fl. exs. Austr. Hung. II. 38. 1883; *petrophila* BORB. et BR., in Ö. B. Z. 1880. 145; *spumilata* DEMATRA, Ess. mon. S. 1883; *umbellata* KIRSCHL., Fl. d'Alsace I. 247. 1852; *athensis* KMETZ, l. c. 28; *casta* GOD., Fl. Jur. 210. 1853; *wasserburgensis* KIRSCHL., l. c.

24×67 *R. tomentosa* × *spinosissima*: *R. involuta* SM., Fl. Brit. III. 1398. 1804; hierher: *R. braunii* V. KELL., in Ö. B. Z. 1882. 39; *coronata* CRÉP., in WIRTG. Herb. pl. crit. 270. 1858; *doniana* WOODS, in Trans. Lin. Soc. XII. 185. 1816; *sabini* WOODS, in Trans. Lin. Soc. XII. 188. 1816; *wilsoni* BORR., in HOOK., Brit. Fl. 231. 1835.

(24×67)×39 *R. (tomentosa* × *spinosissima*) × *glauca*: *R. sabauda* RAP., in Bull. S. Hallér. IV. 178. 1854/56. Vgl. KELLER, l. c. 357.

C. Stacheln — stark gekrümmt, meist hakig gebogen, allmählich in den scheibenfg. Grund verbreitert.

e siehe S. 561.

Subsekt. d. *Rubiginosae* CRÉP., in Bull. S. B. Belg. XXXI. 2. 91. 1892. B. chen klein bis mittelgroß, mit zusammensetzter Zähnung, unters. fast stets mit sehr ∞ (sehr selten fehlenden) wohlriechenden*) Subfoliadrüsen.

() ○ siehe S. 559.

○ K. nach Blz. aufrecht o. abstehend, bis zur Frz. bleibend o. wenig früher abfallend, Gr. stark bis wollig beh.

* * siehe S. 558.

* Bl.-Stiele stieldrüsig, B. chen oval o. rundlich, am Grunde abgerundet, seltener länglich und am Grunde verschmälert.

Stacheln hakig gekrümmt (Fig. 323k, S. 558), oft, namentlich im unteren und mittleren Teile der Zw., mit Stachelborsten gemischt; Bl.-Stiele lang o. meist länger als Bl.-Achse.

25. *R. rubiginosa*: 1—2,5 m hoher, aufrechter, meist gedrunken und kurzästiger b., selten flatterig mit rutenfg. verlängerten Ästen; Schößlinge steif aufrecht; B. 5—9- (am mittleren Teile der Zw. meist 7-) zählig, ober. kahl o. locker anliegend beh., meist nur mit vereinzelter Drüsen, unters. anliegend beh. bis filzig, selten kahl, Subfoliadrüsen ∞, selten spärlich, von angenehmem Apfelgeruch, Rachis kurz beh. und drüsig, selten reich stachelig, Neb. ziemlich breit, mit leicht divergierenden o. gerade vorgestreckten Öhrchen. — kahl o. beh., dichtdrüsig gewimpert; Blst. 1- bis 20-blütig, Bl.-Stiele dicht stieldrüsig, selten drüsenlos, Bl.-Achse kugelig o. oval, glatt o. stieldrüsig, selten stachelborstig, K. außen dichtdrüsig, etwas länger als C., äußere fiederspaltig, C. 1,3—2 cm lang, meist lebhaft rosenrot, Scheinfr. orange bis blutrot.

Stark abändernde Art, zu deren Formenkreise zu zählen sind: *R. apricorum* RIP. in DES., S. B. Belg. XV. 534. 1876; *bernardii* MONT., Bull. S. B. Dauph. XIII. 547. 1886; *braunii* J. B. VON KELLER, in Ö. B. Z. XXXII. 39. 1882; *comosa* RIP. in SCHULTZ Arch. Fl. Fr. 254. 1852; *comosella* DES. et OZ., Bull. S. B. Dauph. VIII. 327. 1881; *densa* TIMBAL-LAGRAVE, in Bull. S. B. France XI. 141. 1864; *dimorphacantha* MARTINIS, in Bull. S. B. Belg. VII. 248. 1868; *dolorosa* DES. et OZ., l. c. IX. 372. 1882; *echinocarpa* RIP., in DES., Mém. M. et L. 150. 1861; *gremlii* CHRIST. im GREMLI Exc. fl. Schweiz, 2. Aufl. 176. 1874; *rotundifolia* RECHB., Fl. Germ. 617. 1832; *rubiginella* BRAUN, in Fl. exsicc. Austr. Hung. n. 1670. Sched. V. 24. 1888; *umbellata* LEERS, Fl. Herb. 117. 1775.

R. r. L.**) Mant. II. App. 504. 1771. — Wein-R., Eglantier odorant. — I. G. verbreitet (auf den west- und ostfriesischen Inseln fehlend), sonst noch Span., Frankr., Großbrit., Skandinav., Ital. bis Sizil., Balkan, Rumän., S.-Rußl. In der Ebene und Hügellregion im S. bis 1400 m, hfg. auf Kalk. — Blz. VI VII. Frz. VIII IX. Htg. kultiviert. *R. rubiginosa* stellt die sogen. schottische Zaunrose (Sweet Briar) dar! In N.-Am. nach BRITTON von Neu-Schottl. bis Ontario, Kansas, Tennessee und Virginia an wüsten Plätzen verwildert!

*) Daher nach KELLER mehrere neusprachliche Bezeichnungen und auch der alemanische Name Herrgottsschweiß.

**) Nach KELLER wäre der älteste Name *R. eglanteria* L., Sp. pl. 491. 1753, nec L. 1762, non MILL. 1768, da aber über die Bezeichnung *eglanteria* doch keine Sicherheit zu herrschen scheint, behalte ich mit KELLER und den anderen Autoren den Namen *rubiginosa* hier und *R. lutea* dort bei (S. 584).

? 25×28 *R. rubiginosa* × *elliptica*; vgl. KELLER, S. 113.

25×29 *R. rubiginosa* × *micrantha*; vgl. KELLER, S. 132.

25×31 *R. rubiginosa* × *agrestis*: *R. maasii* M. SCHULZE, in Mitt. B. Ges. Thür. V. 17. 1887; vgl. KELLER, l. c. 132.

25×35 *R. rubiginosa* × *tomentella*; vgl. KELLER, l. c. 242.

25×44 *R. rubiginosa* × *montana*: *R. sanguisorbella* DE LA SOIE, apud KELLER, l. c. 244.

? 25×61 *R. rubiginosa* × *pendulina*; vgl. KELLER, l. c. 346 und CRÉPIN, in Bull. S. B. Belg. 1895. 1. 118.

25×67 *R. rubiginosa* × *spinosissima*; vgl. KELLER, l. c. 347.

25×69 *R. rubiginosa* × *lutea*: von Lord PENZANCE (in Gard. Chron. 1891. 671) gezüchtet, vgl. CRÉPIN, in Bull. S. B. Belg. 1894. I. 124.

+ Stacheln meist leicht gebogen bis gerade. b sehr niedrig (15—50 cm, sehr selten bis 1 m o. mehr).

— Stacheln fast durchweg gleichartig (Fig. 323b). B.chen oberseits glänzend, drüsenlos, kahl, unterm kahl o. Rippe beh., Subfoliadrüsen ∞, selten ± null.

26. *R. sicula*: Stacheln fast gerade, nadelförmig; B. 5—9 zählig (Fig. 322n, S. 552), B.chen 5—15:4—13 mm, breit-elliptisch bis kreistg., Rachis meist kahl, drüsig und stachelig; Bl. tiefrot bis weißlich, meist einzeln, selten zu 3—4, ihre Stiele 1—5 mm lang, meist kahl und z. T. bedrüst, K. nach Blz. aufrecht o. aufrecht abstehend, oft bis Frz. blühend, Scheinfr. kugelig, wenig über erbsengroß, vgl. sonst Fig. 323c—d, S. 558.

Sehr veränderlich, im Gebiete aber nur in wenigen Formen bekannt. Hierher vor allem *R. thuretii* BURN. et GRIMM, Ros. alp. mar. Suppl. 12 u. 78. 1883, durch welche der Formenkreis der *sicula* gleichsam mit dem der *glutinosa* verknüpft wird.

R. s. TRATT., Ros. Monogr. II. 86. 1823 (*seraphim* Guss., Syn. fl. Sicul. I. 564, 1842, non VIV.; *serafim* CHRIST, in Flora LX. 448. 1877, non VIV.). Sizilische *R.* I. G. nur Sch. Seealpen; terner Frankr. (Provence, Dauphiné), Ital., Sizil., Griechenl., Kl.-As., Algier, Marokko. Bergregion, 1000—1500 m. — Blz. VI—VII. — In Kultur erhielt ich diese reizende Art stets als *serafini*.

Stacheln ungleich, z. T. kräftig, z. T. borsten- o. nadel-förmig und drüsenköpfig, die Zw. dicht bedeckend (Fig. 323e), B.chen beiders. drüsig, wenn oben drüsenlos, dann stärker beh.

27. *R. glutinosa*: Stachelborsten an älteren Teilen oft abfällig, diese dann einfach bestachelt, B. 5—7-zählig (vgl. Fig. 322o, S. 552), End-B.chen etwa 15:12—30:20 mm o. auch kleiner, elliptisch o. verkehrt eiförmig, bis rundlich, vorn abgerundet o. kurz zugespitzt, Rachis beh., dichtdrüsig und bestachelt, Neb. ziemlich breit mit kurzen o. fast fehlenden Öhrchen, kahl o. beh. und drüsig; Bl. meist einzeln, selten zu 2—3, Stiele 2—6 mm, kahl o. beh., dicht stieldrüsig, Bl.-Achse oval bis kugelig, meist dicht stieldrüsig und borstig, K. 1—1,5 cm lang, nach Bl. aufrecht die Scheinfr. krönend, Bl. rot, Scheinfr. bis ca. 1 cm Dm., vgl. sonst Fig. 323e—g, S. 558.

Im Gebiete nur in der Abart var. *dalmatica* KELLER, l. c. 10. (*R. dalmatica* KERNER in Östr. Bot. Zug. XX. 10. 1877) in Dalmatien, vertreten; üppiger als der Typ, bis 1 m hoch, B.chen unterm kahl.

R. s. SIBTH. et SM., Fl. graec. prodr. I. 348. 1806 (*rubiginosa* var. *orientalis* SER., in DC. Prodr. II. 616. 1825, *balcanica* M. B., Fl. Taur. Cauc. I. 399. 1828; *pictulosa* BERT., Fl. It. V. 195. 1842, *libanotica* BOISS., Diagn. ser. 1. X. 4. 1846, *calabrica* HUTT., PORRY et RIGO, exsicc. 434, ex It. Ital. III. 6. 1877). I. G. nur O. Dalmatien, sonst noch M. und S.-Ital., Sizil., Montenegro, Maced., Albanien, Bulg., Griechenl., Kreta, Kl.-As., Syr., Armen., Kauk., Pers. — Blz. VI. In Kultur meist nicht viel unter 1 m hoch.

27×39 *R. glutinosa* × *glauca*: *R. veta* BURN. et GREMLI, Genre-Rosa 49. 1887; vgl. KELLER, l. c. 244.

- * * Bl.-Stiele meist drüsenlos. B.chen länglich o. länglich verkehrt eifg. mit keilfg. Grunde (Fig. 324a, S. 562) (vgl. eventuell auch *R. rubiginosa* S. 556).

Fig. 323. *Rosa*: *a rubiginosa*: B.chen und Zähnung. — *b—d sicula*: *b* Zw.-Stück; *c* Bl.; *d* dgl. im L.-Schn. — *e—g glutinosa*: *e* Zw.-Stück; *f, g* Bl. von oben und im L. Schn. — *h—i elliptica*: *h* Zw.-Stück; *i* Scheinfr. — *k—m mucronata*: *k=h*; *l* Bl. im L.-Schn.; *l^1* C; *l^2* K; *m* Scheinfr. — *n—o ferox*: *n* Zw.-Stück; *o* Bl.-Kn. — *p—q^1 azar*: *p* n. q. *q^1* Scheintr. — *r car-phylloea* Scheintr. — *s—s^1 villosa*: *s* Bl. im L.-Schn.; *s^1* K; *s^2* Zw.-Stück. — *t—t^1 tmentella*: *t* Zw.-Stücke (das Rechte steht verkehrt); *t^1* K; *t^2* Scheintr. — *u—u^2 dumetorum*: *u* Bl. im L.-Schn.; *u^1* K; *u^2* Frkn.; *v* Zw.-Stück (Original).

28 *R. elliptica* b. 1–2 m, selten höher, meist von zieml. gedrungenem Wuchs, mit dichter Verzweigung, Stacheln vgl. Fig. 323h, ziemlich gleichartig; B. 5–7 zahlg. B.chen meist mittelgroß, 1,8–2,5 (3,3); 1–1,5–1,8, selten bis 4 cm lang, vorn abgerundet o. scharf kurz zugespitzt, Rachis filzig bis kahl, drüsig und bestachelt, Neb. ziemlich schmal. Beh. und drüsig; Blst. 1- bis 17-blütig. Bl.-Stiele gewöhnlich so lang wie Bl.-Achse, selten länger o. kürzer in Hochb. ver-

steckt. K. außen meist drüsenlos, nach Blz. aufgerichtet, die Fr. krönend, Bl. 3–4 cm Dm., fleischrot o. weiß; Scheinfr. vgl. Fig. 323i.

Duftet strenger und weniger angenehm als *rubiginosa*. In den Formenkreis gehören: *aeduenensis* DES. et GILL., in Bull. S. B. Belg. XIX. 1–37. 1880; *billietii* PUG., Bull. S. B. Belg. VIII. 2. 337. 1869; *bouvieri* CREP., Bull. S. B. Belg. XXI. 1. 174. 1882; *jordani* DÉS., Ess. Mém. S. Ac. M.-et-L. X. 146. 1861; *klukii* BESS., Cat. hort. Crem. 18. 1816; *lugdunensis* DÉS., l. c. 141; *szaboi* BORB., in Ros. Hung. 1880; *vaillantiana* BORB., in DÉS. S. B. Belg. XV. 526. 1876 non CARIOT.

R. e. TAUSCH, in Floia II. 465. 1819 (*aspera* SCHLEICH., Cat. pl. Helv. ed. 4. 29. 1821; *graveolens* GREX., in GR. et GODR. Fl. Fr. I. 560. 1847 ex parte). — Nach KELLER: in der Bergregion durchs ganze Gebiet, vorzüglich auf Kalk; in den W.-Alp. zwischen ca. 500–2000 m. in Central Alp. zwischen 450 und 1535 m.; sonst noch Engl., Frankr. [im W. und N. sehr selten o. fehlend]. — Blz. VI o. im Hochgebirge VII, eher als *R. agrestis* der gleichen Standorte.

28×39 *R. elliptica* × *glauca*: *R. pseudoglauca* PINKWART, in Deutsch. Bot. Monatsschr. 1899. 24. Vgl. KELLER, l. c. 245

? 28×67 *R. elliptica* × *spinosissima*: *R. admista* BURN., Fl. des Alp. mar. III. 1. 37. 1899.

CC K. nach Blz. zurückgeschlagen o. abstehend, frühzeitig abfallend. Gr. kahl o. schwach beh.

• Bl.-Stiele stieldrüsig: Bechen oval o. rundlich, am Grunde abgerundet bis schwach herzfg., seltener länglich und nach dem Grunde verschmälert.

– Bestachelung gleichartig (Fig. 323k). Suprafoliadrüsen fehlen. Gr. etwas verlängert, säulenfg. hervortretend Fig. 323b.

29. *R. micrantha*: b. bis 2 m. flatterig, Jahrestriebe und Äste bogig überhängend, selten gedrunken, vom Wuchs der *R. rubiginosa*; Stacheln krummhakig, selten unter Blst. mit Borsten vermischt; junge Triebe und B. oft rötlich, B. 5–7-zählig, Bechen mittelgroß bis klein, 1.5–3:1–2, selten 3–4 cm lang, elliptisch, durchschnittlich 1¹:1, am Grunde verschmälert, abgerundet, selten etwas keilfg. (vgl. Fig. 324 b–d, S. 562), oben kahl o. zerstreut, selten dicht beh., unters. — beh., selten kahl, Subfoliadrüsen meist ∞; Rachis — beh., stieldrüsig und stachelig. Neb. und Hochb. bald schmal, bald breit, doch selten stark entwickelt, unters. meist dicht röth. drüsig; Blst. 1 bis mehrblütig, Bl.-Stiele 1.5–3 cm, zuweilen auch stachelborstig, Bl. fleischrot o. weiß, seltener dunkel, Scheinfr. oval bis kugelig, sonst vgl. Fig. 323l–m.

In den Formenkreis dieser Art gehören: *R. hirciana* BRAUN, in Ö. B. Z. XXXII. 6. 1882; *hungarica* KERN., Ö. B. Z. XIX. 234. 1866; *hystrix* LEMAN, Bull. Phil. 91. 1878, non LIDL.; *lactiflora* DES., S. B. Belg. XV. 516. 1876; *lanto-scana* BUR. et GR., Suppl. 12. 1882; *meridionalis* BUR. et GR., Ros. alp. mar. 75. 1876; *nemorosa* LIEB., in Lecomte Fl. Spa II. 311. 1873; *operta* PUG., in DÉS. S. B. Belg. XV. 519. 1876; *permixta* DES., S. B. Belg. XV. 538. 1876; *perparva* BORB., Ros. Hung. 490. 1880; *polyacantha* BORB., Ros. Hung. 491. 1880; *salvanensis* DE LA SOUL. in CHRIST, Ros. Schweiz. 112. 1875; *septicola* DES., Ess. non 149. 1867; *vaillantiana* CARIOT, Etude d. fl. II. 187. 1865.

R. m. SM., Engl. Bot. XXXV. t. 2490. 1872. — Kleinblütige R. — L. G. verbreitet, nur D. Schles. Mähr. selten und im nordwestl. Flachlande nicht bekannt, sonst noch Großbrit., Frankr., Medit., Marokko, Alger, Tunis, Kl.-As., Armen., Kauk. — Im Gebirge bis 13–1400 m. — Blz. VI. — Sehr reichblütig.

? 29×31 *R. micrantha* × *agrestis*: vgl. KELLER, S. 132.

• KELLER sagt bei *micrantha* eine sehr formenreiche Art, die im städ. Teile des Verbreitungsgebietes sehr häufig durch bes. kleine, kahl., öfter auch drüsenlose Bechen ausgezeichnet ist, die mit gewissen Formen der *R. pseudoglauc.* große Ähnlichkeit haben, es sind aber bei *micrantha* die Stacheln im allgemeinen stärker gebogen. Die Drüsen haben bei *R. micrantha* einen anderen Geruch als bei *R. pseudoglauc.*, sind auch größer, dort von dem charakt. Apfelgeruch, hier mehr balsamisch terpeninartig.

++ Bestachelung sehr ungleichartig (Fig. 323n). B. chen mit Subfoliar-, bisweilen mit Supra- und Subfoliadrüsen. Gr. kurz.

30. *R. ferox*: niedriger, reich und fein verzweigter b., große Stacheln flach, Zw. z. T. auch drüsenborstig; B. (Fig. 324e, S. 562) 5-7-zählig, B. chen eifg., rundlich eifg. o. elliptisch, obers. meist kahl, auch unten gewöhnlich nur drüsig, End-B. chen etwa 8:7-18:15 mm; Rachis bedrüst und bestachelt, Neb. unters. drüsig und drüsenwimperig; Bl. zu 1-3, etwa 2,5-4 cm Dm., weiß, Stiele 4-5-13 mm, stieldrüsig, Gr. kahl, Scheinfl. eifg. bis kugelig, etwa 12 mm lang, tiefrot, sonst vgl. Fig. 323o, S. 558.

R. f. M. B. Cent. pl. rar. ross. I. 1810 (provincialis M. B. Taur. Cauc. I. 396. 1808, non ART.; horrida FISCH., Cat. hort. Gorenk. 66. 1812). — I G. nur U Siebb. (bei Kronstadt, sonst Krim, Kauk., Kl.-As. — Blz. VI-VIII). — Frz. VIII-X. — In Kultur noch selten.

*+ Bl.-Stiel meist stieldrüsenlos (vgl. aber auch unter *micrantha*, S. 559), B. länglich o. länglich verkehrt eifg., meist mit keilfg. Grunde.

+ Bestachelung meist völlig gleichartig, Gr. kahl o. etwas beh., — säulenfg. verlängert, selten stärker beh. o. verkürzt, K. frühzeitig abfallend.

31. *R. agrestis*: b. 1-2, selten bis 3 m. Äste dünn, verlängert, rutig, Stacheln vgl. Fig. 323p, S. 558; B. 5-7-zählig (Fig. 324f-g), B. chen oft weit voneinander abstehend, 1,5-5:0,7-3 cm, meist doppelt so lang als breit, beiderends gleichmäßig verschmälert, beiders. kahl o. obers. kahl, unten - beh. o. beiders., oben zerstreut, unten dichter beh., mit kurzgestielten Subfoliadrüsen, Rachis meist nur drüsig und bestachelt; Neb. schmal bis mittelbreit, unten beh., — drüsig; Blst. 1- bis mehrblütig, Bl.-Stiele so lang bis 2mal so lang als Bl.-Achse (Fig. 323q), diese auch kugelig, K. außen drüsenlos, C. kürzer als K., 2-3 cm Dm., weißlich, selten fleischrot, Gr. selten beh., Scheinflr., wie q¹ o. mehr eifg.,

Von den ∞ Abänderungen sind nach KELLER im Gebiet die kahlen, relativ großblättrigen die verbreitetsten. Es gehören in den Formenkreis vor allem: *albiflora* OPIZ, in Flora V 268. 1882; *arvatica* PUG., in BAK Rev. Ros. 33. 1864; *beluensis* OZAN., Bull. soc. Dauph. VIII 326. 1881; *bohémica* BRAUN, in Verh. Z. B. G. Wien XXXV. Abh. 79. 1885; *gizellae* BORB., Ros. Hung. 186. 1880; *inodora* FRIES, Nov. Fl. Suec. I 9. 1814; *pseudosepium* CALLAY, in CRÉP., Bull. S. B. Belg. XXI 1. 183. 1882; *sepioides* OZAN., apud CRÉP., l. c.; *vinodora* KERN, Ö. B. Z. XIX. 329. 1869; *virgultorum* DÉS., Billotia I. 43. 1864.

R. a. SAVI, Fl. Pis. I. 475, 1798 (*sepium* THUILL., Fl. Paris ed. 2. 252. VII. 1798. 99) Feld-R. — In der Verbreitung i. G. fast mit *micrantha* zusammenfallend, etwas weniger weit nach N. (im nordwestlichen Flachlande nicht bekannt; ferner Frankr., Ital., Sizil., Marokko, Alger, Tunis; im N. (Dänem., Schwed.) selten. Im Gebirge nur bis etwa 12-1300 m. — Blz. (V-VI-VII). — Frz. VIII-IX.

? 31×36 *R. agrestis* × *pouzini*: *R. condaminea* BURNAT, apud KELLER, l. c. 248.

31-67 *R. agrestis* × *sp. v. s. s. m. a.*: *R. caviniacensis* OZANON, in MAGN. Schema Fl. select. 246. 1892.

Bestachelung fast stets sehr ungleich, neben größeren gekrümmten, wenigstens an den Blzw. feine Nadelborsten, oft Drüsenstacheln; Gr. meist nicht säulenfg. hervortretend.

b. mittelgroß, gedrunken, Stacheln der Zw. spärlich, ähnlich der Fig. 323p, eher gerader, Borsten der Blzw. meist sehr fein, hfg. fehlend^{*)}, B. chen mittelgroß, obers. kahl, mit ∞ Suprafoliadrüsen, unters. kahl bis dicht beh., Gr. dicht beh.

^{*)} So an dem mir vorliegenden Expl. von BESSER, ferner bei subspec. *vilana* und *typica* var. *flavescens* KMET, apud KELLER, l. c. 130.

32. *R. caryophyllacea*: $\wp$, 1–2 m, B. 5–7-zählig (Fig. 324h), B.chen ca. 2–2,5:1,2–1,7 cm, Grund $\perp$ keilig, Spitze kurz bis abgerundet, Rachis beh., bestachelt und drüsenreich; Neb. kahl, unters. drüsig, meist zieml. breit; Bl. zu 1–4, ihre Stiele etwas länger als Bl.-Achse, gleich dieser drüsenlos, K. etwa so lang, wie die am Original-Expl. 2,5 cm langen C., nach Blz. zurückgeschlagen, auch zur Frz. noch lange bleibend, außen bekrönt, äußere fiederspaltig, Scheintr. vgl. Fig. 323r, S. 558. o. mehr eifg.

Hierher *R. zalana* WIESB., in Östr. B. Z. XXIX. 142. 1879.

R. c. BESS., Cat. Hort. Crem. Suppl. IV. 18. 181? — I. G. ÖU. Nied.-Östr., Ung., Kroatien; ferner W.-Rußl. — Blz. VI. — Frz. VIII.

$\Delta\Delta$ $\wp$ niedrig (0,4–1 m), sehr dicht und ungleich bestachelt, B.chen klein, ohne Suprafoliadrüsen; Bl.-Stiele sehr kurz, Gr. fast kahl.

33. *R. serafini*: die größeren, z. T. stark gekrümmten, z. T. leicht gebogenen Stacheln plötzlich aus dem $\perp$ verbreiterten Grunde zusammengezogen, außerdem gleichgestaltete kleinere, die allmählich in feinere Stachelborsten übergehen; B. 5-zählig, B.chen 5–12:3–8 mm, mit offener, tiefer, reichlich zusammengesetzter Zähnung (Zähne schmal, Zähnechen drüsig), kahl, ober. glänzend, unters. mit ∞ Subfoliadrüsen, Rachis kahl, drüsig, $\perp$ bestachelt, Neb. breit, kahl, drüsig, gewimpert; Bl. einzeln, ihre Stiele ca. 3,5 mm, drüsenfrei, Bl.-Achse kugelig-eifg., unter Discus oft eingeschnürt, drüsenlos; K. kaum 1 cm, außen ohne Drüsen, äußere fiederspaltig, nach Blz. zurückgeschlagen, C. kaum 1 cm lang.

R. s. VIV., Fl. Lyb. spec. 67. 1824 (*seraphini* VIV., Fl. cors. 8. 1824; *apennina* Woods, Tourists Fl. 123. 1850). — Central-Medit.: Corsica, Sizil., Sardin., Ital.-Festl., nordl. bis Ligurische Seealpen; Rumelien. — Blz. VI. — Ich sah bis heute noch keine sicher echten Expl. Die *serafini* der Kulturen war stets *sicula*. Auch das, was HOOKER, in Bot. Mag. t. 7761. 1901, als *seraphina* beschreibt und abbildet, gehört zu *sicula*.

Subsekt. e. *Eucaninae* CRÉP., in Bull. S. B. Belg. XXXI. 2. 81. 1892: meist hohe $\wp$ mit bogig überhängenden Stämmen und Ästen; B.chen meist mittelgroß bis groß, kahl o. beh., Subfoliadrüsen fehlend o. nur am Mittelnerv, selten vereinzelt o. ∞ auf die Seitennerven übertretend, o. in größerer Zahl wie bei den *Rubiginosae*, S. 556 (über die Fläche verstr., dann aber nie den für die letzte Gruppe charakt. Wohlgeruch besitzend).

C Stacheln kräftig, hakig gekrümmt.

○○ s. S. 567.

K. nach Blz. zurückgeschlagen, frühzeitig abfallend, Gr. kahl o. beh., s. S. 565

– Discus meist stark kegelfg. erhöht; Gr. meist eine lange kahle Säule bildend (Fig. 323s, S. 558), doch meist kürzer als Stb.; Bl.-Stiele lang, stielfrüsig, Fiedern der äußeren K. ∞ .

34. *R. stylosa*: aufrechter kräftiger bis 3 m hoher $\wp$ mit überhängenden Ästen, Stacheln vgl. Fig. 323s?, B. 5–7-zählig (Fig. 324i–k), B.chen oval bis länglich-oval, 1¹/₂–3:1, mittelgroß bis groß (End-B.chen 1,5–4, selten bis 7 cm lang), Zähnung meist einfach, ober. glänzend, meist kahl, Unters. matt, $\perp$ bis dicht beh., selten ganz kahl, stets ohne Drüsen; Rachis $\perp$ beh., meist bestachelt und drüsenlos, Neb. bald schmal bald breit, mit geraden, vorgestreckten, scharfen Öhrchen, meist unters. beh.; Blst. 1–18-blütig, Trgb. lanzettlich kurzer als Bl.-Stiele, diese 2–4mal so lang als Bl.-Achse; K. auf dem Rücken gleich Bl.-Achse meist drüsenlos, Gr. bald mehr säulenfg. bald mehr kurzköpfig als in Fig. 323s, Scheinfr. meist oval.

Stark abändernde Art, deren Stellung im System viel umstritten ist. CRÉPIN faßt in Bull. S. B. Belg. VIII. 231. 1869) *R. stylosa* und ihre Verwandten zur Sekt.

stylata zusammen, die er der Sekt. *Systyla* anreihet. Man vgl. jedoch KELLERS Auseinandersetzungen, l. c. 139.

In den Formenkreis der *stylata* gehören vor allem: *R. australis* PUG. et RIP., in Soc. Dauph. 1874. No. 874; *fastigiata* BAST., Ess. Fl. M. et L., Suppl. 31. 1812; *immitis* DÉS., in Mém. Soc. Ac. de Maine-et-L. XXVIII. 17. 1873; *leucochroa* DESV. Journ. B. II. 316. 1809; *massilvanensis* ORG. et DUF., in MAGNIER Serin. XI. 249. 1892; *parvula* SAUZÉ et MAILL., in Cat. d. dép. des Deux-Sèvres 27. 1864; *pseudocorymbifera* RORY, Plant de France, No. 4304. 1876; *rusticana* DÉS., in Billotia 31. 1865; *virginica* RIP., apud DÉS., in Bull. S. B. Belg. XV. 226. 1877.

Fig. 324. *Rosa*: Blattformen von: a elliptica — b—d micrantha — e ferox — f—g agrestis — h caryophyllacea — i—k stylata — l tomentella — m pouzini — n canina subsp. lutetiana — o dumetorum — p glauca — q coriifolia. (Alles $\frac{1}{2}$ nat. Gr.) (Original).

R. s. DESV., Journ. Bot. II. 317. 1809 (*systyla* M. et K., Deutschl. Fl. III. 179. 1830). — L. G. nur D. Ober-Bader., Westfalen (Witten), Sch. Gent, Waad. Neuenburg, Solothurn, Basel; ferner franz. Alpen, Vogesen, übriges Frankr., S- $\frac{1}{2}$ nat. Gr.) Span., Island. — Blz. VI.

Discus flach o. wenig erhaben, selten kegelfg., Gr. ein halbkugeliges, die Mündung der Bl.-Achse deckendes Köpfchen bildend o. kurz säulenfg. hervortretend, kahl o. beh.

Stacheln kurz, mit stark verdicktem breitem Grunde seitlich zusammengedrückt (Fig. 323t. S. 558). Behen meist beh., oft $\pm$ reich an Subfoliadrüsen, K. mit ∞ breit-

lanzettlichen Fiedern, Gr. wollig beh. bis fast kahl, kurz säulenfg. hervortretend.

35. *R. tomentella*: ca. 1,5 m hoher $\wp$, mit abstehenden verlängerten stark hin- und hergezogenen Ästen und dicht stehenden kurzen Zweigen, jüngere Zw. oft rotbraun überlaufen: B. 5–7–9 zählig Fig. 324b. Bchen verkehrt eifg. o. meist eifg., rundlich bis länglich eifg., am Grunde abgerundet o. herzfg., selten $\pm$ keilig, kurz zugespitzt, dicklich, oben tiefgrün, oft glänzend, $\pm$ beh. bis kahl, unten meist scharf geadert, dicht o. $\pm$, selten nur auf Rippe beh., Rachis $\pm$ beh. drüsig und stachelig, Neb. ziemlich breit bis schmal, Öhrchen spitz, vorgestreckt; Blst. 1- bis mehrblütig, Bl-Stiele 1–2 cm, gleich den K. außen glatt o. stieldrüsig o. $\pm$ borstig, C. ziemlich klein, weiß o. blaßrötlich, Schemfr. kahl o. weichstachelig, scharlach- bis orangerot, vgl. Fig. 323t¹–t², S. 558.

Eine sehr formenreiche Art, deren Abänderungen nach KELLER die *Rubiginosae* mit den *Leucanthae* verbinden. So gehören in ihren Formenkreis *R. affinis* RAV. (Lamb. ros. Wirc. 79. 1816; *allionii* BURN. et GREM., Ros. alp. mar. Suppl. 16. 1882/83; *beatricis* B. et GR., l. c. 14; *friedländeriana* BESS., Cat. sem. Hort. Crem. 1819; *granensis* KMET, Sched. Fl. Austr.-Hung. II. 34. 1882; *halacsyi* BRAUN, in BECK, Fl. v. Herrnst. 396. 1884; *leucantha* BAST., Ess. Fl. M.-et-L. Suppl. 32. 1812; *obornyana* H. BRAUN, in Sched. Fl. Austr. Hung. II. 35. 1882; *obtusifolia* DESV., Journ. bot. II. 317. 1809; *sclerophylla* SCHEUTZ, Studier 20. No. 3. 1872; *tirolensis* KERN., in O. B. Z. XIX. 331. 1869.

R. t. LEM., in Bull. Soc. Philom. 94. 1818 (*inodora* HOOK., in CURTIS Fl. Lond. new ed. t. 117. 1817. — I. G. fast durchaus, aber nach dem N. seltener werdend, im nordwestl. Flachlande fehlend; sonst noch ganz Eur., im N. selten, z. T. fehlend. — Felsige und buschige Abhänge der Hügel und Bergregion, bis ca. 1400 m. — Blz. Ende V–VI. — Frz. VIII–IX.

? 35 $\times$ 40 *R. tomentella* $\times$ *coriifolia*: Vgl. KELLER, l. c. 219.

$\triangle\triangle$ Stacheln am Grunde nicht auffällig verbreitert, meist schlank, äußere K. weniger stark fiederspaltig mit linealischen o. lineallanzettlichen Fiedern, Gr. meist nicht säulenfg. hervortretend*).

= Zw. sehr schlank; Bchen klein bis mittelgroß, jung oft rötlich überlaufen; Zähnung meist zusammengesetzt, Zähne auffallend schmal und tief, vorgestreckt.

36. *R. pouzini*: niedriger, selten bis über 2 m hoher $\wp$, Zw. bogig, am Gipfel meist rot angehaucht; Stacheln ∞ , Stachelborsten fehlen; B. 5–7–9-zählig Fig. 324m, S. 562). Bchen jenen einer kleimblättrigen *leucantha* ähnlich, oft sehr klein (End-Bchen 1,8:1,2–2,5:1,6 cm o. kleiner), elliptisch, beiderseits verschmälert, oben oft glänzend, meist auch unten kahl und ohne Drüsen, nur jung bisweilen $\pm$ beh.; Rachis meist kahl o. nur zerstr. beh.; Neb. meist kahl, drüsig gewimpert, Blst. 1-mehrblütig, Bl-Stiele meist reichlich stieldrüsig, 1–3mal so lang als die reife Schemfr., K. außen meist drusenlos, nach Blz. zurückgeschlagen, vor Frz. abfallend, C. meist klein, blaß bis lebhaft rosa, selten weiß; Gr. treiköpfig, meist kahl o. mit vereinzelt Haaren; Scheintr. mittelgroß bis klein, elliptisch bis länglich.

Zum Formenkreis gehört auch *R. polyadena* BUR. et GREMEL, in Ros. alp. mar. Suppl. 26. 1882/83.

Ohne im geringsten daran zu zweifeln, daß für den wirklichen Rhodologen diese Angaben KELLERS sehr wertvoll sind, möchte ich doch Jeden, der nicht sehr vertraut mit den europäischen Hauptarten der Rosen ist, darauf hinweisen, daß es ihm nur durch genaue Vergleich der ganzen Diagnosen möglich sein wird, diese durch so viele Glieder verstandenen Arten wirklich zu unterscheiden. Ich habe im Herb. Hofm. Wien ein sehr reiches und von Kennern wie GREPIN, CHRIST etc. revidiertes Material verglichen und dabei immer wieder gesehen, daß nur ein langjähriges Studium an manchen Rosen vertraut machen kann. KELLERS vorzügliche Arbeit wird recht wenig dazu beitragen, unsere Kenntnis zu fördern, und indem ich ihre Grundzüge getreu übernehme, hoffe ich eine zur Bestimmung der Hauptarten völlig genügende Zusammenstellung zu geben.

R. p. TRATT., Ros. monogr. II. 112. 1823 (*hispanica* BOISS. et REUT., Pug. 44. 1852; *inconsiderata* DÉS., in Mém. S. A. M.-et-L. XXVIII. 117. 1873). — S.-Frankr. (Dauphiné, Provence, Riviera, S.-Eur., Marokko, Algier, Tunis. Im Gebirge bis 1400 m. — Blz. V—VI.

? *R. pouzini* × *glauca*: *R. amiliavensis* COSTE et SIMON, in Bull. S. B. France 1896. 506; vgl. KELLER, l. c. 220.

B. chen meist mittelgroß bis groß, Zahnung einfach o. zusammengesetzt, Zähne weder auffallend schmal noch tief.

> B. chen kahl, selten unters. am Mittelnerv mit einzelnen Haaren.

37. *R. canina*: starker. 2–3 m²), selten unter 1 m hoher b. St. sehr verlängert, bogig überhängend, mit kürzeren und längeren bogigen Zw., Stacheln gleichartig, an Schößlingen meist ∞, an Blzw. zuweilen ganz fehlend, meist breit hakig gebogen; B. 5–7-, sehr selten 9-zählig; B. chen meist entfernt stehend, von sehr veränderlicher Größe (Fig. 324n, S. 562), die größten ca. 4,5–5:2,5–3, die kleinsten etwa 1:0,6 cm; elliptisch, beiders. ziemlich gleichmäßig verschmälert, selten fast rund, am Grund abgerundet o. selbst schwach herzförmig, ausgerandet, selten länglich, – scharf spitz o. stumpflich, Zähne gerade nach vorn gestreckt, oft etwas geschlängelt; Subfoliadrüsen selten – vorh., Rachis kahl o. beh., drüsenlos o. – bedrüst und bestachelt, Neb. der Blzw. – verbreitert und meist stark entwickelt, Ohrchen gerade vorgestreckt o. abstehend; Blst. 1- bis mehrblütig, Trgb. – lanzettlich, Bl.-Stiele so lang o. 2–3mal so lang als Bl.-Achse, selten kürzer, meist drüsenlos gleich der ovalen bis fast flaschenförmigen, o. auch kugelförmigen Bl.-Achse, K. außen mit o. ohne Drüsen, äußere – fiederspaltig, nach Blz. zurückgeschlagen, vor Beginn der Fr.-Färbung abfallend; C. – groß, hellrosa o. weiß, selten tiefrot; Gr. frei, selten säulenförmig, – beh. bis kahl; Scheinfr. mittelgroß, scharlachrot.

Äußerst formenreiche und in viele „Arten“ gespaltene Species. Man vgl. die Gliederung des Formenkreises bei KELLER, l. c. 156ff. Es gehören hierher *R. aciphylla* RAT., Enum. Ros. Wire. 69. 1810, *agraria* RIP., apud DÉS. in Bull. S. B. Belg. XV. 312. 1870, *andegavensis* BAST., Ess. Fl. M.-et-L. 189. 1860; *blondaeana* RIP., apud DÉS. in Mém. Soc. A. M.-et-L. X. 133. 1861, *dumalis* BECHST., Forstb. 227. 1810; *carioti* CHAB., in CARIOT Etude d. fl. II. 677. 1865; *edita* DÉS., in Bull. l. c. 347; *exilis* CRÉP., in Bull. S. B. Belg. VII. 220. 1868; *glaberrima* DUM., Prodr. Fl. belg. 91. 1827; *glaucescens* DESV., in MERAT Fl. Paris 192. 1812; *hispidula* RIP., in DÉS. l. c. 1870 ex parte; *laxiflora* BORB., Ros. Hung. 421. 1880; *luletiana* LAM., Bull. Philom. 93. 1858, *medioxima* DÉS., in Mém. l. c. XVIII. 110; 1873; *myrtilloides* TRATT., Mon. Ros. II. 20. 1823, *nitens* DESV., in MERAT l. c.; *oreades* CORB. et CAST., Guide Cant. Frib. 119. 1887, *podolica* TRATT., l. c. 71; *rubescens* RIP., in DÉS., Ess. Mon. 70. 1861; *scabrata* CRÉP., in Bull. S. B. Belg. VIII. 241. 1869; *senticosa* ACHAR., Act. Holm. 91. 1813; *squarrosa* RAT., l. c. 77; *syntrichostyla* RIP., apud DÉS. in Bull. l. c. 312. 1870; *touranginiana* DÉS. et RIP., in Mém. l. c. 162. 1861; *venensis* KERN., in Ö. B. Z. XIX. 328. 1869; *vinealis* RIP., apud DÉS. in Billotia I. 36. 1865.

R. c. L., Sp. pl. 491. 1753. — Hundsrose. — I. G. verbreitet, bis in die Bergregion ansteigend; sonst fast ganz Eur., nur im hohen N. fehlend, W.-As., N.-Afr. — Blz. VI. — Frz. VII—VIII.

R. canina × *spinosissima*: *R. hibernica* SM., Engl. Fl. II. 39. 3. 1824; hierher ternier: *R. chuntii* RIP., in Arch. fl. Fr. 254. 1852 und *amiliavensis* DÉS. et RIP., in Mém. S. A. M.-et-L. 1873. 114.

*) KELLER gibt an, daß in einzelnen Fällen viel größere Dimensionen erreicht werden, so bei dem sogen. 1000jährigen (in Wirklichkeit nur ca. 300jährigen) Rosenstock, der an der Apsis des Doms zu Hildesheim ca. 13 m hoch gezogen ist.

>> B.chen beiders. o. doch unters. auf Rippe beh.

38. *R. dumetorum*: Bestachelung (Fig. 323v) und Wuchs der *canina*. B. 5–7-zählig (Fig. 324o), B.chen meist mit den Rändern sich berührend o. einander deckend, mittelgroß bis groß, rundlich-oval o. breit-eielliptisch, Grund meist abgerundet bis herzförmig, Spitze stumpflich; Zähne breit, zusammenneigend, meist etwas abgerundet und dadurch fast kerbig; Rachis dicht beh., bedrückt, spärlich bestachelt, Neb. meist ziemlich breit und beh.; Blst. 1- bis vielblütig, Trgb. klein, lanzettlich, beh., Bl.-Stiele mittellang bis lang, drüsig o. nicht, die Trgb. meist überragend, Bl.-Achse länglich-oval bis kugelig, meist drüsenlos, sonst wie vorige, vgl. Fig. 323u—u³, S. 558.

Nicht minder variabel als *canina*. Es gehören in ihren Formenkreis: *amblyphylla* RIP., apud DÉS., in Bull. S. B. Belg. XV. 372. 1876; *brachtii* BRAUN, Ö. B. Z. XLIV. 20. 1894; *caesia* BAK., in Journ. Lin. Soc. XI. 232. 1869; *cinerascens* CARIOT, Etud. d. fl. II. 185. 1865, non DUMORTIER; *cimerosa* DÉS., l. c. 380; *déséglisei* BOR., Fl. Cent. France éd. 3. II. 224. 1857; *globata* DÉS., in Bull. S. B. Belg. XV. 371. 1876; *hispidula* RIP. vgl. *canina* ex parte; *platyphylla* RAV., Enum. Ros. Wire. 82. 1816; *pyriformis* DÉS., l. c.; *ramealis* PUGET bei DÉS. S. B. Belg. XV. 372. 1876; *semiglabra* RIP., apud DÉS., l. c. 373. 1876; *sphaerocarpa* DÉS., l. c.; *solstitialis* BESS., Prim. Fl. Gal. I. 324. 1809; *submitis* (GREN., in SCHULTZ Arch. 332. 1852; *woloszczakii* J. B. v. KELLER, in HAL. et BR., Nachtrag Fl. Nied.-Östr. 282. 1882.

R. d. THUILL., Fl. Par. éd. 2. 250. 1799 (*collina* LAM. et DC., Fl. France IV. 441. 1805, non JACQ.; *subcinerea* GENTIL, Hist. Ros. Sarthe 30. 1897). — Heckenrose. — L. G. verbr., im allgemeinen eine Rose der Ebene, doch in den W.-Alp. bis 1600 m; sonst noch ganz Eur. (fehlt nur im hohen N.); W.-As., N.-Afr. — Blz. VI(—VII), immer etwas früher als die *canina* gleicher Standorte. — Frz. VIII—IX.

* — K. nach Blz. aufgerichtet, lange bleibend, Gr. ein großes, die Mündung der Bl.-Achse abschließendes wolliges Köpfchen bildend).

— B.chen meist drüsenlos, selten mit ~ Subfoliadrüsen, die meist auf die Rippe und die Nerven beschränkt sind.

Zw. oft bläulich bereift, Neb. breit; B.chen breit-eiförmig bis rundlich-eiförmig, meist bläulich bereift, kahl; Trgb. breit, die Bl.-Stiele und den Blst. umhüllend (vgl. Fig. 325a).

39. *R. glauca*: bis 2 m hoher, gedrungener b, Stacheln vgl. Fig. 325a², reichlich; mittlere B. 5–7-zählig (Fig. 324p, S. 562), B.chen meist so genähert, daß sie sich mit den Rändern berühren, mittelgroß bis groß, breit- bis rundlich-eiförmig, vorn oft zieml. lang und scharf zugespitzt, oben dunkel-, unten heller grün, Rachis kahl und stachelig, Neb. meist breit (Fig. 325a¹); Blst. 1- bis reichblütig, Bl.-Stiele meist sehr kurz und drüsenlos, Bl.-Achse meist kugelig und bereift, K. fiederspaltig, o. nicht drüsig, nach Blz. absteehend o. aufgerichtet, zur Frz. o. kurz zuvor abfallend, C. zieml. groß, lebhaft rosenrot, Scheinfr. vgl. Fig. 325a, S. 569).

Außerordentlich abändernd. Durch die Abänderungen einerseits mit *R. canina*, andererseits mit *R. corymbosa*, ferner mit *R. montana* verbunden. Auch mit *R. acerosa* und *rhomboides* durch Zwischenformen verknüpft. So gehören in ihren Formenkreis: *R. complicata* GREN., Fl. Jur. 239. 1804; *graveoli* CREP., in Bull. S. B. Belg. XXX. 1. 156. 1891; *inclinata* KERN., in Ö. B. Z. XIX. 326. 1894; *intricata* GREN., l. c.; *maritima* GREN., apud CREP., in Bull. S. B. Belg. XXI. 1. 54. 1882; *pseudomontana* R. KELLER, in B. Centralbl. 47. Bd. 323. 1891; *transiens* KERN., l. c. XX. 8. 1870.

*) An Übergangsformen zu *canina* sind nach KELLER die K. auch absteehend o. selbst zurückgeschlagen; Gr.-Köpfchen auch lockerer beh.

R. g. VILL., apud LOIS. in DESV. Journ. bot. II. 336. 1809 (*reuteri* GOD., in REUT. Cat. Genève éd. 2. 68. 1861). — I. G. in der Berg- und Alpenreg. verbreitet, im nordöstl. Flachlande selten; sonst noch ganz Eur. in den nördl. und gebirgigen Teilen, nach S. selten werdend), Kl.-As., Armen., Kauk., Transkauk. — Blz. VI—VII. — Frz. IX—X. — Hübscher Kultur-*b.*

39×44 *R. glauca* × *montana*: *R. permiscibilis* SCHMIDELY, in Bull. S. B. Genève IX. 133. 1898, 99. Vgl. KELLER, l. c. 241.

39×61 *R. glauca* × *pendulina*: Vgl. KELLER, l. c. 353. Hierher gehören: *R. salacensis* RAP., in Bull. S. Hallér. 178. 1856; *alpinoides* DÉS., in Bull. S. Sc. d'Angers 1878 (vgl. Index Kew); *pacheri* v. KELL., in D. B. M. 72. 1884; *perrieri* SOUGEON, in VERL. Cat. pl. dauph. 115. 1872; *asperifolia* BORB., Ros. Hung. 462. 1880.

△△ B.chen ± dicht beh., ziemlich starr, gegen den Grund meist verschmälert.

40. *R. coriifolia*: gedrungener, ca. 1,5 m hoher, dicht verzweigter *b.*, Zw. oft bläulich bereitt, Bestachelung gewöhnlich gleichfg., eher reicher und hakiger als bei *glauca*; B. 5—7-zählig (Fig. 324q, S. 562), B.chen mit den Rändern sich berührend o. deckend, mittelgroß bis klein, länglich o. breit oval bis rundlich, unterseits meist graugrün, filzig, selten kahlend, Rachis filzig, nicht o. bedrüst und bestachelt, Neb. ziemlich breit, beh., bes. unters., Bl. etc. im wesentlichen wie bei *glauca*, Scheinfr. bis 2,5 cm läng.

Ebenso variabel wie bei *glauca*. So gehören hierher: *R. albida* KMET', in Fl. Austr.-Hung. Sched. V. 16. 1888; *bovernieriana* LAGG. et DEL., apud DÉS., in Bull. S. B. Belg. XV. 392. 1876; *campicola* BR., in Schedae Fl. Austr. Hung. V. 16. 1888; *cerasifera* TIMBAL-LAGR., in Bull. S. B. France XI. 146. 1864; *cinerea* RAP., in GREN. Fl. Jur. 238. 1864; *dimorphocarpa* BORB. et BR., in Fl. exs. Austr.-Hung., No. 1646. Schedae V. 14. 1888; *friesii* LAG. et PUG., in Bull. S. Murith. IV. 2. 1874, non SCHRETZ; *frutetorum* BESS., Cat. Hort. Crem. Suppl. III. 20. 1812; *hirtifolia* BRAUN, in Abh. Z. B. G. Wien. XXXV. 109. 1885; *incana* KIT., in SCHULT. Österr. Fl. II. 70. 1814; *incanescens* BR., in Schedae l. c. 15; *kmetiana* BORB. Ros. Hung. 137. 1886; *kernerii* BRAUN, in Beitr. Z. B. G. Wien XXXV. 80. 1885; *patens* KMET', l. c. 17; *pseudopsis* GREMLI, Exkursionsth., 5. Aufl. 177. 1885; *saxetana* H. BR., Ros. Pol. in Spraw. Kom. fiz. Ak. Um. Krak. Sep. Abar. 37. 1886; *schemnitzensis* KMET', l. c. 17; *vagiana* CREP., in Verh. Z. B. G. Wien XX. 513. 1870.

R. c. FRIES, Novit. Fl. Suec. 33. 1814. — Lederblättrige R. — Nach KELLER: in der Bergregion des ganzen Gebietes, im südwestl. Teil meist in wenig typischen, Übergänge zu *R. dumetorum* bildenden Abarten, selten im nordl. Flachlande; ferner nördliche und gebirgige Teile von Eur., W.-As. — Blz. VI. — Frz. IX.

40×61 *R. coriifolia* × *pendulina*: Vgl. KELLER, l. c. 359. Hierher *R. mureti* RAP., in Bull. S. B. Belg. 1875. 236; *stenosapala* CHRIST, Ros. Schw. 319. 1873; *lereschii* RIP., l. c. 237 und *berneti* SCHMIDELY, in Ann. S. B. Lyon VII. 180. 1878, 79.

B.chen mit ∞ (oft wachsgelben) Subfoliadrüsen und ∞, die Fläche der B.chen dicht deckenden, selten fehlenden Suprafoliadrüsen.

41. *R. rhaetica*: 1,5—2 m hoher, gedrungener *b.*, neben kräftigen Hakenstacheln schwächere Nadelstacheln und Drüsenborsten, mit Übergängen in die Stieldrüsen der Blst. Achsen, welche selten fehlen, B. 5—7-zählig, B. sich meist mit den Rändern berührend o. deckend, ca. 2—2,5 cm lang, selten kleiner, kaum 1,0–1,5 o. größer über 1–3 cm, breit-oval, öfter verkehrt eifg., Grund abgerundet o. nicht selten scharf keilig, einen der *R. elliptica* (vgl. Fig. 324a, S. 562) ähnlich, vorn abgerundet o. kurz zugespitzt, Zähne meist tief, außen mit 2–6–10 sitzenden Drüsen, o. Drüsenzähnen, innen mit 0–2 Drüsenzähnen, obers. anliegend beh. bis kahl, unters. flaumig-filzig beh. bis völlig kahl, Rachis filzig-zottig o. kahl, drüsig, kaum bestachelt, Neb. mittelbreit, unters. beh. und reichlich bekrust., Bl. meist einzeln, Stiele meist sehr kurz, selten bis 2mal so lang wie Bl.-Achse, kahl o. stieldrüs., ihre Trgb. länger, K. außen meist dicht stieldrüs., fiederspaltig, nach Blz. aufrecht, zur Frz. bleibend, C. rot, G. ein wolliges Köpchen bildend, Scheinfr. kugelig o. eifg.

Über die verwandtschaftlichen Beziehungen und Formen dieser seltenen, sehr verschieden beurteilten, mir nur ganz unvollkommen bekannten Art vgl. KELLER, l. c. 215.

R. r. GREMLI, Exkursionsfl. 4. Aufl. 164. 1881, non KERNER*) (*caryophyllacea* CHRIST, Ros. Schw. 122. 1873 ex parte, non BESSER). — Nach KELLER: eine Rose der Bergregion mit sehr beschränktem Verbreitungsareal. Schw. Unterengadin; O. Tirol (oberes Inntal, Geschnitztal, ferner Veltlin (Bormio). — Blz. VI—VII.

⌋ Stacheln schlank, leicht gebogen, selten gekrümmt, Bl.-Stiele und meist auch Bl.-Achse mit ∞ Stieldrüsen.

⌋ K. nach Blz. zurückgeschlagen, später sich oft etwas aufrichtend und abstehend, vor Reife der Scheinfr. abfallend.

+ Stacheln (Fig. 325b¹) aus breitem Grunde plötzlich in eine leicht gebogene Spitze ausgehend, an den Blzw. fast gerade, B. oben entfernt stehend (Fig. 326a, S. 571), kahl, oft bläulich bereift, ohne Subfoliadrüsen: Bl. meist einzeln, Stiele dicht stieldrüsig, Gr. fast kahl o. $\pm$ dicht beh.

42. *R. chavini*: 2–3 m hoher $\bar{b}$ mit langen flattrigen Ästen, Zw. oft $\pm$ stark rötlich überlaufen; Stacheln gleich, nur oberste Teile der Blzw. bisweilen auch stachelborstig, B. oben mittelgroß, rundlich eifg. bis breit-elliptisch, gegen den Grund verschmälert, vorn langspitzig bis abgerundet, Rachis kahl, $\cdot$ bedrückt und bestachelt, Neb. meist breit, kahl, Blst. 1- bis mehrblütig, Bl.-Stiele 1.5–2 cm, Trgb. etwa gleichlang, zuw. laubartig, Scheinfr. vgl. Fig. 325b, S. 559.

Über die Formen und die verschiedenartige Beurteilung der Stellung dieser Rose vgl. KELLER, l. c. 221. Hierher gehört auch *R. laggeri* PUG. in Bull. S. B. Belg. XV. 362. 1876.

R. ch. RAP., in REUT. Cat. Hort. Genève éd. 2. 68. 1861 (*R. montana* f. *chavini* CHRIST, Ros. Schw. 180. 1873). Nur in folgendem Gebiet beobachtet: W. Alp.: Provence, Dauphiné, Savoyen, Grajische Alp., Valais, Uri, Tessin, Veltlin. — Blz. VI—VII. — Frz. IX.

+ Stacheln aus breitem, herablaufendem Grunde allmählich verschmälert (vgl. Fig. 323t, S. 558), B.-Rachis dick, locker o. meist dicht flaumigzottig, mit ∞ braunroten, sehr kurzgestielten Drüsen: B. oben dicht beh., selten verkahlend und nur unten auf Rippe beh., meist mit Subfoliadrüsen, Bl.-Stiele zieml. lang, stieldrüsig, Gr. fast stets etwas verlängert, kahl o. $\pm$ stark beh.

43. *R. abietina*: von *chavini* im wesentlichen nach KELLER noch abweichend durch: $\bar{b}$. nur 1.5–2 m hoch, gedrungen, mit geraden, schlanken Schoßlingen, stachelreich, Blzw. zuw. unbewehrt o. Stacheln hier fast gerade, B. 5–7(–9)-zählig, B. oben hfg. sich berührend o. etwas deckend, 1.5–4.5 $\times$ 1.3–2.8 cm: eifg. o. elliptisch, selten rundl.-eifg., Zahnung meist zusammengesetzt, Zähne breit, wenig tief, Neb. unters. beh. und $\cdot$ drüsig; Blst. 1- bis 2–8-blütig, Bl.-Stiele 2–3 cm, C. rosenrot, zieml. klein, Scheinfr. oval o. kugelig, nackt o. weichstachelig.

Über den Formenkreis dieser seltenen Art vgl. KELLER, S. 226.

R. r. GRENIER, in CHRIST Ros. Schw. 132. 1873 ex parte et GREN., Fl. Jur. III. 61. 1878 (*r. r.* GREN., Fl. Jur. 235. 1875, non BAST; *laureana* LAG. et PUG. in Bull. Soc. Murith IV. 32. 1874; *thomas* PUG. in Bull. S. Murith IV. 32. 1874). Nur bekannt aus Dauphiné und Schweiz (Waadt, Freiburg, Berner Oberl., Zug, St.-Gallen, Graubünden, Tessin). — Blz. VI.

** K. nach Blz. aufgerichtet, lange bleibend.

+ $\bar{b}$ flatterig, Stacheln fast gerade, fast plötzlich in den breiten, länglich-ovalen Grund übergehend (Fig. 325c), B. kahl, oft

*) KERNERS *rhaetica* (ein Herbarname) ist *glauca* var. *transiens* f. *rhaetica* KELLER l. c. 187.

bläulich-violett angelaufen: B. chen klein, rundlich verkehrt-eifg., Grund keilig, Spitze abgerundet (Fig. 325b). Bl. meist einzeln, ihre Stiele meist kürzer als Bl. Achse, sehr dicht mit ungleich langen schwarzroten Stieldrüsen und Nadelstacheln besetzt, Scheinfr. grob, längl.-oval (c¹).

14. *R. montana*: 0,6–3 m hoher b, B. 5–7-zählig, B. chen unters. meist nur auf Rippe mit schwarzroten, ziemlich großen Subfoliadrüsen, Rachis ähnlich bedrust, sonst kahl, oft dunkelrot, bestachelt, Neb. ziemlich breit, kahl, violett überlaufen; Trgb. dgl. hfg. laubig, Blst. ein- bis mehrblütig, K. so lang o. länger als C., diese fleischrot, im Verblühen verblassend, Gr. ein wolliges Köpfchen bildend, sonst vgl. Fig. 325c¹.

Eine nach KELLER schwer zu umgrenzende durch gewisse Abänderungen mit *glauca* verbundene Art, daher viele Autoren Formen davon zu *glauca* stellen. Vgl. KELLER, l. c. 229. Es gehören auch hierher: *R. burmiensis* CORNAZ, in GREMLI neue Beitr. Fl. Schw. III. 45. 1883; *pliniana* CORNAZ, l. c. V. 82. 1890; *ravaudi* BOULL., apud DÉS., in Bull. S. B. Belg. XV. 295. 1876.

R. m. CHAIX, in VILL. Hist. pl. Dauph. I. 346. 1786. Berg-R. I. G. nur Sch. Wallis, Graubünden, Seealp., cottiische, grajische Alp., O. Tirol, Veltlin; ferner Frankr. (Seealp., Provence, Dauphiné), Spanien, Algier, kanar. Inseln?, Apennin, M.-Ital. (Monte Velino), Sizil., Griechend. Blz. VII. — Frz. IX.

+ b gedrunken, Stacheln allmählich in den verbreiterten Grund übergehend (Fig. 325d), B. meist beh., B. chen oval, kurz zugespitzt (Fig. 326d, S. 571), Zahnung zusammengesetzt, Zähne zieml. breit, Blst. bald 1-, bald mehrblütig, Bl.-Stiele meist nur 1–1,5 cm, meist dicht mit ungleich langen Stieldrüsen und Stachelborsten besetzt, Scheinfr. meist oval bis kugelig.

15. *R. uriensis*: b, etwa 1–1,5 m hoch, dichtästig, meist reichlich bestachelt, Stacheln am B.-Grunde oft zu 3–4; B. 5–7-zählig, B. chen 1,5–2,5:1–2 cm o. bis 5:3,5 cm, entfernt o. genähert Subfoliadrüsen fehlend bis ~, Rachis meist dickflaumig beh., Neb. meist breit, kahl o. ~ beh.; Bl. rosenrot, 3–4 cm Dm., K. 2–3 cm lang, sonst wie *montana*.

Eine seltene, sehr ungleich bewertete Rose. Vgl. hierüber KELLER, l. c. 235.

R. u. LAG. et PUG., apud CRÉP. in Bull. S. B. Belge VIII. 246. 1866 (*conferta* PUG., in Bull. S. Murith. IV. 1874; *abietina* var. *uriensis* CHRIST, Ros. Schw. 135. 1873). Sch. Uri, Graubünden, St. Gallen, Tessin, Wallis und O. Tirol. Blz. VII.

Sekt. VI. *Carolinae* CRÉP., in Journ. d. Ros. 1891. 54. Vgl. S. 538, obere Neb. und die Trgb. schmal o. verbreitert, Bl.-Stiele, Bl.-Achse und K. fast stets stieldrüsig, K. nach Blz. ausgebreitet o. etwas aufrecht, vor Frz. abfallend, äußere ganzrandig o. mit spärlichen Anhängseln, Frkn. in Bl.-Achse nur grundständig

C B. chen fein und scharf sägezählig (Fig. 325e), Stacheln gleichartig, ~ hakig (f), meist nur unter B. gepaart, zuw. ganz fehlend.

16. *R. carolina*: 0,5–2,5 m hoher, schlankästiger b; B. (5–) 7–9-zählig (Fig. 326f, S. 571), B. chen eifg., oblong, eilanzettlich o. verkehrt eifg., B. chen 1,5–4:0,6–1,4 o. bis 5,5–7:2,5 cm, oberseits sattgrün, meist kahl, unters. hellgraugrün, kahl o. locker flaumig beh., Rachis ~ feinzottig, Neb. schmal, einwärts zusammengefaltet, Ohrchen kurz; Blst. meist doldenrispig, mehrblütig, selten 1-blütig, Bl. 4–7 cm Dm., sattrosa, Trgb. klein o. untere laubig, Bl.-Stiele ~ drüsig, etwa 10–15 mm lang, K. selten mit seithchen Fiederchen, meist wie Fig. 325g, Scheinfr. wie g¹.

R. c. L., Sp. pl. 492. 1753 [*virginiana* DUROI, Harbkesche Baumz. II. 353. 1772, non MILL.; *palustris* MARSH., Arb. Am. 136. 1785; *corymbosa* EHRH., Beitr. Naturk. IV. 21. 1798; *palustriana* MICHX., Fl. Bor. Am. I. 296. 1803; *hudsonia* RED. Ros. I. 95. 1817*]. — Sumpf-R.; Swamp R. — O.-N.-Am., Quebec und Ontario bis Minnes., Flor. und Mississippi. — Sumpfige, feuchte Orte. — Blz. VI—VIII. — Frz. IX—X. — Vgl. Hybriden. — SMALL unterscheidet, in Fl. South-east States 327. 1893, daneben eine *R. lancifolia* aus Central-Florida (about cypress swamps), sie soll vor allem durch lanzettliche, etwas lederige Behen abweichen.

Fig. 325. *Rosa*: *a—a'* *glauca*: *a* Scheinfr. mit Trgb.; *a'* oberes Neb.; *a''* Zw.-Stück. *b—b'* *hercynica*: *b* Scheinfr.; *b'* Zw.-Stück. *c—c'* *montana*: *c* Zw.-Stück; *c'* *b.* *d—d'* *manis*: wie *c*. *e* *s.* *carolina*: *e* ein halbes End Behen, um die Zähnung zu zeigen; *f* Zw.-Stück; *g* Bl. Kn.; *g'* Scheinfr. *h—h'* *canadensis*: *h* f.; *h'* *e.* *i—i'* *potidaea*: *i* f.; *i'* *e.* *j—j'* *lucida*: *j* Zw.-Stück; *j'* *e.* *k—k'* *g.* *k'* Scheinfr. *l—l'* *laxa*: *l* f.; *l'* *e.* *m—m'* *californica*: *m* f.; *m'* *e.* *n—n'* *canadensis*: *n* f.; *n'* *e.* *o* *gymnocarpa*: *o* Behen und stark vergr. Rand; *p* Scheinfr.; *p'* Zw.-Stück. *q—q'* *macrophylla*: *q* f.; *q'* *e.* *q''* *p.* *r—r'* *nutkana*: *r* f.; *r'* *e.* *s* *p.* (Original).

*) Diese Synonyme alle teste KELLER, l. c. 291.

46 $\times$ 47 b *R. carolina* $\times$ *virginiana lucida* *R. mariae-graebneria* ASCHERS., in Gartentfl. 1902. 565, t. 1504, Fig. 4 [et in ASCH. et GR., Syn. VI. 293. 1902] wurde von ZABEL in Hort. Münden gezogen. Scheint nach dem Autor sehr bemerkenswert; wegen der verschiedenen Blz. der Eltern blüht sie fast den ganzen Sommer, fruchtet sehr reich. Im Herbst färbt sich der kugelige b lebhaft rot und gelb, so daß er mit den roten Scheinfr. und zugleich mit Bl. besetzt sehr auffällt. Auch in der Heimat scheinen spontane Hybriden *carolina* $\times$ *humilis* aufzutreten.

46 $\times$ 57 *R. carolina* $\times$ *blanda*: scheint nach CRÉPIN, in Bull. S. B. Belg. 1894. 1. 123, in Heimat wild aufzutreten.

46 $\times$ 66 *R. carolina* $\times$ *rugosa*: *R. spaethiana* GRAEB., in Gartenfl. 1902. 563. t. 1504, Fig. 3. Vgl. das dort Gesagte. ZABEL ist der Züchter dieser Kreuzung

⌋ B. chen grob gezähnt, Stacheln gerade, hfg. mit Stachelborsten gemischt.

* Zw. nur verstreut und zieml. gleichartig bestachelt (Fig. 325f), hfg. nur unter den B. gepaarte Stacheln, o. fast ganz wehrlos, Stachelborsten nur an Schößlingen.

• B. 5–9-zählig, End-B. chen meist über 2,2:0,9 cm o. B. nur 5-zählig, Scheinfr. $\pm$ stielfrüsig.

47. *R. virginiana*: nach KELLER: Ausläufer treibender, meist nur bis 1 m hoher, schlankästiger b. Zw. rotbraun, B. chen meist 2–4:0,6–1,2 cm, aus keiligem Grunde verkehrt eifg.-elliptisch bis elliptisch, vorn stumpf o. spitz, ober. lebhaft bis gelblichgrün, $\cdot$ glänzend, unters. hellgrün, beh. bis kahl, sonst vgl. Subspec., Scheinfr. rundlich o. rundl.-eifg. 1,2–1,7 cm dick.

Subspec. a. *humilis* (*R. humilis* MARSH., Arb. Am. 136. 1785; *parviflora* EHRH., Beitr. Naturk. V. 11. 1789) meist unter 1 m hoch*, Grundachse weitkriechend, Zw. meist durchaus mit verstreuten Stachelborsten, Neb. schmal, mit schmalen divergierenden Öhrchen, Rachis stachelig und stielfrüsig, B. chen meist 5–7 (Fig. 326h, S. 571), ober. hellgrün, wenig glänzend, unters. hfg. $\cdot$ beh., Trgb. schmal, Bl.-Stiele langer, äußere K. hfg. mit Fiedern. Hierher var. *villosa* BEST, in Bull. Torr. Cl. XIV. 256. 1887, niedriger, reicher stachelborstig, B. chen derber, unters. beh. Verbreitung der Subspecies nach BRITTON: Maine und Ontario, bis Wisconsin, Georgia, Kansas, Labrador.

Subspec. b. *lucida* BEST, l. c. (*R. lucida* EHRH., Beitr. IV. 11. 1789; *caroliniana* MCHX., Fl. Bor. Am. I. 295. 1803; *flavinea* W., Enum., pl. Hort. Berol. Suppl. 37. 1813) bis 1,8 m hoch, weniger weit kriechend, Zw. nur bestachelt, Blzw. hfg. wehrlos, Neb. an Blzw. breiter, mit breiten, aufrechten Öhrchen, Rachis meist stachellos, B. meist 7–9-zählig (Fig. 326g, S. 571), ober. sattgrün, $\cdot$ stark glänzend, unters. kaum beh.; Trgb. der kürzeren Bl.-Stiele breiter, äußere K. meist ohne Fiedern. Nach BRITTON: New Jersey und Pennsylv., bis Ontario, Neufundland.

R. v. MILL. Gard. Diet. 1759, No. 10, nec AUCT. AL. Niedrige R.; low or Pasture R. Heimat vgl. oben. Meist trockene, steinige Böden. Blz. V–VII.

Frz. VIII–IX. Die verbreitetste Rosenform in O.- und NO.-Am. In Kultur nicht selten.

47 $\times$ 57 *R. virginiana* $\times$ *blanda*: dies soll nach FOCKE, Pflanzenmischlinge 142. 1881, die *neglecta* BRUHIN der Gärten (non *neglecta* RIPART) sein.

? 47 $\times$ 67 *R. virginiana* $\times$ *spinosissima*: *R. kochiana* KOEH., Dendr. 293. 1893 (*oxyacanthos* K. KOCH, Dendr. I. 232. 1869, non M. B.). Vgl. KOEHNE, l. c.

B. 7–11-zählig, B. chen kaum über 2,2 cm lang, meist viel kleiner (Fig. 326e), Bl.-Achse $\pm$ drüsenborstig.

48 *R. foliolosa* konnte bis 1 m hoher, buschiger b, Stacheln gleichartig, meist nur unter B. gepaart; B. chen derb, $\cdot$ schmal elliptisch, spitz, seltener oblong, ober. tiefergrün, meist kahl, unters. bleichgrün, meist nur auf Rippe beh., Rachis stachelborstig und etwas drüsig, sowie hfg. $\cdot$ beh., Neb. schmal, drüsig gezähnt, mit

* KELLER gibt die Höhenangaben für die 2 Subspec. gerade umgekehrt. Vgl. übrigens BEST, l. c., sowie REHDER, in BAILEY Cycl. Am. Hort. IV. 1554. 1902.

spitzen abstehenden Öhrchen; Bl. meist einzeln, 3–4 cm Dm., kurzgestielt (2–11 mm nach KOEHNE), Trgb. klein, lanzettlich, K. außen stieldrüsig, innen grau-zottig, äußere meist mit Fiederehen, Scheinfr. fast kugelig, rot, 8–10 mm Dm., meist glatt.

R. f. NUTT., in TORR. et GR. Fl. N.-Am. I. 460. 1840. — Arkansas und Ind.-Terr. bis Texas. — Ebenen und Prärien. — Blz. VI–VII. — In Kultur selten.

— Zw. durchweg sehr reich mit Stachelborsten besetzt — Fig. 325h).

49. *R. nitida*: meist nicht über 0,6 m hoher, buschiger b. Zw. gleich Neb. und B.-Stielen meist tief rotbraun; B. 5–9-zählig Fig. 326i).

Fig. 326. *Rosa*: B.-Formen von: *a* *chavini* — *b* *montana* — *c* *abietina* — *d* *canadensis* — *e* *johannesbaumi* — *f* *carolina* — *g* *h. virginiana* var. *lucida* und var. *humilis* — *h* *nitida* — *k* *beggeriana* — *l* *beggeriana* var. *lacerans* — *m* *laxa* — *n* *cinnamomea* — *o* *californica*. (Alles $\frac{1}{2}$ nat. Gr.) (Original).

B. chen schmal- bis eilänglich, vgl. auch Fig. 325h), S. 569, oben sattegrün, glänzend, unten heller, meist beiders. kahl, 12–30 mm lang. Rachis meist glatt, obere Neb. breiter, kahl, ganzrandig o. gezähnt, mit spitzen vorgestreckten Öhrchen; Blst. 1- bis wenigblütig, Bl. Stiele etwa

*) Wenn die Bestachelung der *virginiana* var. *humilis* ähnlich d. h. also die Stachelborsten seltener sind, so weicht *nitida* auch durch größere, glänzendere, schmal-länglichere B. chen und breitere Neb. ab.

15–20 mm, meist gleich der kugeligen Bl.-Achse drüsenborstig, Bl. 3–6 cm breit, K. ganzrandig, außen stieldrüsig, Scheinfr. ca. 8 mm Dm., tiefrot.

R. n. W., Enum. pl. Hort. Berol. 544. 1809 (*rubripina* Bosc, Nouv. cours. agric. XIII. 267. 1814). — Glanz-R. — Massachus. bis Neufundland [in low grounds]. — Blz. VI–VII. — Frz. VII–IX. — Schöner Zier-b.

49×53 *R. nitida* × *californica*: *R. scharnkeana* GRAEB., in Gartenfl. 1902. 562. t. 1504. Fig. 2. Vgl. das dort Gesagte.

Sekt. VII. *Cinnamomeae**) DC., apud SERINGE in Mus. Helv. I. 2. 1878. Vgl. oben S. 538; Blzw. oft wehrlos o. dicht drüsenborstig, Stacheln gerade o. gekrümmt, unter den B. oft gepaart, selten fehlend; obere Neb. verbreitert, allmählich in die breiten vorgestreckten Öhrchen übergehend o. Neb. der Schößlinge eingerollt, mit röhrig zusammenneigenden Rändern; K. nach Blz. (meist sofort) aufgerichtet, auch an reifer Scheinfr. bleibend, ganzrandig, sehr selten abfallend, C. rot, selten weiß.

○○ s. S. 574. ○ Stacheln der Zw. gekrümmt, außerdem aber meist gerade Stachelborsten und feine Nadelstacheln vorh. [Wenn nur wehrlose Zw. vorh., müssen die Arten im einzelnen verglichen werden**).]

* K. zur Zeit der Fr.-Reife mitsamt der Basis wie ein Deckel abfällig, so daß die Scheinfr. mit einem Loch geöffnet wird, Bl. weiß, Stacheln hellgelbgrau (Fig. 325i, S. 569), an Blzw. hfg. nur unter B. gepaart, B. vgl. Fig. 326k–l, obere Neb. meist schmal.

50. *R. beggeriana*: nach KELLER: 1–2,5 m hoher b. Achsen meist bereift, Schößlinge meist mit Stacheln und ∞ Borsten, Blzw. meist gleichstachelig, seltener auch mit Borsten o. ganz wehrlos; B. (5–7–9(–11)-zählig, B.chen im Mittel ca. 1,5:0,5, selten bis 4:2 cm, hfg. aber kaum 1:0,3 cm, elliptisch bis länglich-verkehrteifg., mit keiligem Grunde, seltener mehr rundlich eifg., oben tiefgrün, kahl o. beh., unters. bläulichgrün, meist dicht bis filzig beh., wie oben drüsenlos o. beiders. drüsig, Neb. kahl o. beh., drüsig gewimpert, Rachis kahl o. beh. und meist drüsig und stachelig; Blst. 1- bis fast 50-blütig, Bl. weiß, gelblichweiß, seltener rot, wohlriechend, 2–3,5 cm Dm., Stiele 0,5–2,5 cm, mit lanzettlichen Trgb., drüsenlos o. stieldrüsig, Bl.-Achse klein, meist kugelig, selten mehr flaschenfg., kahl o. beh., ohne o. mit Stieldrüsen, K. meist einfach, außen mit o. ohne Drüsen, innen filzig, nach Blz. zurückgeschlagen o. abstehend, später aufrecht, Scheinfr. ca. 7 mm lang, bisweilen erbsengroß, selten über 1 cm Dm., fast schwarzrot.

*) Bei der Behandlung der amerikanischen Arten dieser Sekt. stütze ich mich vor allem auf CRÉPINs Darstellung in Bot. Gaz. XXII. 1. 1896, wie ich auch den anderen Arten hauptsächlich CRÉPINs Auffassung zugrunde lege, da KELLER ja nur die wenigen in Eur. auftretenden eingehender bespricht; mit Ausnahme von *R. beggeriana*, deren Formenkreis von ihm in Verh. Bot. Ver. Brandenbg. 1904. 92, sehr ausführlich behandelt wird, von welcher Arbeit Herr Dr. KELLER so freundlich war, mir einen Sonderabdruck zu senden. Die amerikanischen Autoren (wenigstens Floristen, wie BRITTON, SMALL etc.) sind noch allzu geneigt, jede Form als Art zu behandeln. Jedenfalls ist unsere Kenntnis der wirklichen Formenkreise der amerikanischen, ja wohl der meisten *Cinnamomeae* noch ziemlich mangelhaft. — Es sei an dieser Stelle auch auf Das hingewiesen, was CRÉPIN, in Bull. Herb. Boiss. IV. 718. 1896 sagt, wobei er einen wesentlich anderen Standpunkt vertritt als z. B. KELLER.

**) Die hier an die Spitze gestellten Angaben scheinen mir noch die besten zu sein, konstant sind sie ebensowenig, wie alle anderen, die man angeben könnte; die Arbeit REHDEs kam mir erst während des Druckes zu Gesicht. Vergl. Anm. S. 582.

Man vgl. die ∞ Varietäten und Formen dieser vielgestaltigen Art bei KELLER (siehe Anm. S. 572). Es gehören hierher: *R. anserinaefolia* BOISS., Diag. Sér. I. 6. 51. 1845; *cabulica* BOISS., Fl. or. II. 48. 1872; *kotschyana* BOISS., Diag. ser. I. 10. 5. 1849; *lacerans* BOISS. et BUSE, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. XII. 84. 1860; *latispina* BOISS., Diagn. sér. II. 2. 49. 1850; *lehmanniana* BGE., Pl. Lehm 287. 1851; *mitis* B. et B., l. c. 85; *regelia* REUT., Cat. hort. Genev. 4. 1867 und *silver-hjelmii* SCHRENK, in Bull. Ac. Pétersbg. II. 195. 1844.

R. b. SCHRENK, in Enum. pl. nov. 73. 1841. — Persien, Balutschistan, Afghan., Transkasp., Chiwa, Buchara, Turkest., W.-Sib., Mongolei. — Blz. VI—VIII. Frz. IX—X. — In Kultur noch selten.

+ K. bleibend, aufgerichtet, die Scheinfr. krönend (vgl. aber auch *beggeriana*, da dort der K. oft erst sehr spät abfällt).

+ Bl. weiß.

51. *R. laxa*: 1—2,5 m hoher, buschiger b. Zw. kahl, grünlich, meist bläulich überlaufen, Stacheln — gebogen bis fast gerade, unter B. gepaart (Fig. 325l, S. 569) o. an Blzw. fehlend, bes. an Schößlingen mit Stachelborsten und Nadelstacheln gemischt; B. (5—)7—9-zählig (Fig. 326m), Bechen etwa 1,8:1,2—4,5:2—2,8 cm, eifg. o. elliptisch bis oblong, Grund und Spitze bald rundlich, bald stumpfkeilig o. spitz, Zähnung einfach (Fig. 325l¹), oben — lebhaft grün, unten mehr grau grün, kahl o. bei var. *pubescens* C. A. MEYER gleich der Spindel — beh., Neb. schmal, Öhrchen spitz vorgestreckt, Rand — gezähnt; Blst. meist mehrblütig, Bl.-Stiele ziemlich und — stieldrüsig o. gleich der flaschenfg. Bl.-Achse kahl und glatt, K. mit fädlichen Enden, etwa so lang wie die bis 2 cm langen C., Gr.-Köpfchen beh., Scheinfr. vgl. Fig. 325l² o. mehr eifg., ± lebhaft rot.

R. l. RETZ., in HOFFM., Phytogr. Beitr. 39. 1803, non LDL. — Turkestan, Dsungarei. — Blz. VI—VII. — Frz. X. — Die *R. songarica* BGE. in LEDER Fl. Alt. II. 226. 1830, weicht nach einem mir vorliegenden, von CREPIN allerdings als *laxa* bestimmten Originalexpl. durch ganz gerade, etwas nach oben gerichtete, relativ lange Stacheln, sehr kleine (15:8 mm), oben —, unters. gleich Rachen — fülzig beh. Bechen und kleinere Bl. mit reich stieldrüsigen Bl.-Stielen ab. Da ich aber von *laxa* nur wenig sicheres Material sah und diese auch mit lauter geraden Stacheln aufzutreten scheint, so vermag ich nicht zu sagen, ob sich *songarica* hier einreicht o. zu anderen Arten in näherer Beziehung steht. Die Rosenformen von W- und M.-Asien bedurften noch sehr der Klärung! — Von der *R. geble-riana* SCHRENK, in Bull. Acad. Pétersbg. I. 80. 1843, die KOLHNE ebenfalls als Synonym zu *laxa* stellt, sah ich noch kein Material. Sie soll gleich *songarica* im Altai vorkommen.

Im Anschluß an *R. laxa* muß ferner *R. algocensis* CRÉP., in Bull. Herb. Boiss. IV. 715. 1890, erwähnt werden, eine in Turkestan im Gebirge zwischen 2—3000 m von R. REGER entdeckte Rose, die CREPIN mit einer im Jardin de Valleyres kultivierten Form identifizieren zu können glaubt. Sie scheint *laxa* sehr ähnlich, doch sagt CREPIN: 'Mais je ne trouve pas dans le *R. laxa* de trace apparente de la particularité de donner la même année plusieurs générations de ramuscules florifères ou tobitères et la coexistence dans les inflorescences, qui sont moins florifères, de fleurs et de réceptacles fructifères avancés. Si cette différence de végétation existe bien et est constante entre les deux Roses, il y aura bien d'être rassuré sur leur distinction spécifique et dès lors on en arrivera avec des matériaux bien choisis à découvrir caractères distinctifs.'

++ Bl. rot.

Neb. der Blzw. — verbreitert, etwas gerollt, Zähnung der Bechen meist nach vorn gerichtet (Fig. 325n¹, S. 569).

52. *R. cinnamomea*: 0,5—1,5 m hoher b mit rutenfg., braunrot berindeten Ästen, Stacheln schwach, an Blzw. meist nur gepaart, an Schößlingen mit ∞ Stachelborsten gemischt; B. vgl. Fig. 326n, S. 571.

5- bis 7-zählig. Behen meist sich berührend, 1,5—4,5 cm lang, oval bis oblong o. verkehrt eifg., am Grunde nicht selten keilg., vorn abgerundet o. kurz zugespitzt, oberf. meist bläulichgrün, anliegend kurz beh., Unters. dicht anliegend grau, flaumigfilzig, ohne Drüsen, Rachis flaumig, hfg. bestachelt und etwas drüsig; Neb. der Schößlinge eingerollt; Blst. 1- bis mehrblütig, Bl.-Stiele 0,5—1 cm, Trgb. ziemlich groß, lanzettlich, K. meist einfach, mit laubartigem Ende, außen mit kleinen, in dem Flaum verborgenen Drüsen, länger als C., Gr.-Köpfchen wollig, Scheinfr. vgl. Fig. 325n², zuw. fast scheibenfg., frühreif.

Von Formen zu erwähnen: f. *foecundissima* KOCH, Syn. 224. 1837. (*R. foec.* MÜNCHH., Hausvater V. 279. 1770), Bl. gefüllt und var. *fulgens* CHRIST, in Flora LVIII. 273. 1875, eine nach KELLER im Aussehen sehr abweichende Form. p sehr kurzastig, B. groß wie bei typ. *glauca*, lebhaft grün, auch unters. blaß bis bläulichgrün, Bl.-Stiele ganz kurz, C. sehr groß, prächtig purpurn. In Wallis gefunden.

R. c. L., Syst. ed. 10. 1062. 1759 (*R. majalis* HERRM., Diss. 8. 1762, non AUCT. AL.) — Zimmetrose; *R. cannelle* — L. G. D. N.-Thüringen, S.-Harz (ob spontan?); OU. Böhmen (Mittelgebirge), Nied.-Östr., Tirol; Sch. Central-Alp.; sonst Piemont, Franz.-Lothr., Skandinav., Rußl., W.-Sib., Kaukasus, Armen. — Gebirgspflanze, an Ufern, Torfmooren, bis 2100 m. — Blz. VI—VII. — Frz. VII—VIII.

52×66 *R. cinnamomea* × *rugosa*: Von ZABEL in Münden aus Samen der *cinnamomea* erhalten. Man vgl. aber was CRÉPIN in Bull. S. B. Belg. 1894. 1. 123. über diese und andere Hybriden sagt! Ich erwähne hier nur solche, die mit ziemlicher Sicherheit nachgewiesen sind und deren Vorhandensein nicht nur „angenommen“ wird!

Neb. der Blzw. nicht verbreitert, flach, Zähnung der Behen meist deutlich breit abstehend (Fig. 325m, S. 569).

53. *R. californica**): aufrechter 0,8—2,5 m hoher b. Triebe blauröt. Stacheln nur im unteren Teile der Zw. und an Schossen mit Borsten gemischt, sonst nur unter B. gepaart o. fehlend, z. T. zieml. kräftig (Fig. 225m¹), B. tiefgrün, 5-7-zählig, Behen oft ziemlich derb. Beh. ähnlich *cinnamomea*, Form mehr oblong, Spitze meist rundlich, Grund stumpfkeilig, End-Behen 2:1,2—4:2,7 cm, Rachis und Neb. zottig und drüsig; Blst. wenig- bis mehrblütig, Bl. bis 6 cm Dm., Scheinfrucht kugelig, 8—12 mm Dm., sonst wie *cinnamomea*.

R. c. CHAM. et SCHLECHT., in Linnaea II. 35. 1827. — Brit.-Columb. bis Calif. — Häufigste Rose des pacif. Küstengebietes. — Blz. V—VI. — Frz. VIII—IV. — In Kultur noch selten, wie es scheint.

53×66 *R. californica* × *rugosa*: vgl. hierüber CRÉPIN, in Bull. S. B. Belg. 1894. 1. 122 und das, was GRAEBNER, in Gartenfl. 1902. 562 bei *R. scharnkianus* sagt.

CC Stacheln gleich den Stachelborsten gerade, höchstens vereinzelte leicht gebogen*, vgl. auf jeden Fall bei Zweifel unter C, S. 572.

*) Mit dieser Art scheint, soweit man es aus der sehr ungenügenden Beschreibung schließen kann, verwandt zu sein: *R. aldersonii* GREENE, in Pittonia V. 110. 1903, aus Calif. (San Diego Co.). — Auch *R. melina* GREENE, in Pittonia IV. 10. 1899, aus S.-Colorado, dürfte der Stacheln halber, die als „strongly recurved“ bezeichnet werden, sich an *californica* am nächsten anschließen. Sie soll sehr große Fr. haben und bisher für *nutkana* gehalten worden sein. Viele Anklänge in der Beschreibung an *melina* zeigt *R. unterwoodi* RYDBG., in Bull. Torr. Cl. 1904. 560, aus Color., die ich fast für synonym damit halten möchte. — Sehr nahe steht ferner *R. oreophila* RYDBG., l. c. 561, ebenfalls aus Color. Alle 3 Gebirgsformen!

**) Unter die *Cinnamomeae* mit geraden Stacheln wäre nach FOCKE, apud DIELS, in ENGL. Bot. Jahrb. XXIX. 405. 1900, auch *R. davidi* CRÉP., in Bull. S. B. Belg. XIII. 254. 1874, aus China (Sutschwan) einzureihen, die zwar in den weit herausragenden Gr. an die *Synstylae* gemahnt, aber nach der gesamten Tracht sich der *R. beggeriana*, *davurica* etc. nähert. FOCKE beschreibt 2 Formen: var. *subinermis* und var. *pungens*. Ich sah noch kein Material und glaube auch nicht, daß die Art schon in Kultur ist.

* K. sich ganz von der reifen Fr. ablösend, diese hfg. gleichsam entdeckelnd, vgl. im übrigen B. in Fig. 327 a, S. 576 und Fig. 325 o—p, S. 569.

54. *R. gymnocarpa*: schlank und dünnästiger, dichtzweigiger, 0,5—3 m hoher b, ⊙ Zw. oliv-, ⊙ purpurbraun, kahl, aber + durchweg mit ziemlich gleichartigen feinen Stacheln bekleidet, selten fast wehrlos: B. (5—7—9-zählig, oben hell- o. leicht blaugraugrün, unters. kaum heller, B.chen dünn, fast stets kahl, nur unten auf Rippe wie auf Rachis feindrüsig, elliptisch, oval o. fast rundlich, ca. 12—20:8—16 mm, selten viel größer, Neb. schmal, drüsig-zähnelig gewimpert, mit abstehenden Öhrchen: Blst. 1- bis mehrblütig, Bl.-Stiele zierlich, etwa 14—18 mm lang, meist fein stieldrüsig, Bl. rosa mit gelblichem Mittelton, 2—4 cm Dm., K. — kürzer als C., ganzrandig, außen wie Bl.-Achse wohl stets kahl und drüsenfrei; Fr. klein, ± kugelig, wenigsamig.

R. g. NUTT., in TORR. et GR. Fl. N.-Am. I. 461. 1840. — Brit.-Col. bis Wash., Oreg., Calif., Idaho und Montana. — Wälder, Gebüsch, schattige Ufer. — Blz. V—VI (in Heimat oft schon III—IV). — Frz. VII—VIII. — Zierliche, schöne Rose. — WATSON hat auch eine var. *pubescens*, mit feinbeh. B., beschrieben (in Proc. Am. Acad. XX. 1885), die nach GREENE (1891) in der Sierra Nevada vorkommt; CRÉPIN (1896) ist sie noch zweifelhaft in ihrer Zugehörigkeit.

* * K. bleibend, die reife Fr. krönend.

+ Blzw. wehrlos o. mit unter den B. gepaarten Stacheln o. mit ++ s. S. 580. ± gleichartigen Stacheln ± bekleidet, diese nicht mit viel feineren Stachelborsten gemischt (vgl. aber auch unter ++).

△ obere Neb. und gewöhnlich auch Bl.-Trgb. verbreitert o. △△ s. S. 578. Neb. durchweg breit*).

= B.chen am Grunde abgerundet, Spitze ± scharf, wenn Grund eher keilig und Spitze stumpf, so B.chen kaum über 20 mm lang und Zähnung ziemlich fein, nach vorn zusammenneigend.

> B. der Blzw. (7—)9-, an Langtrieben bis 11-zählig, eielliptisch (Fig. 327i, S. 576), Zähnung meist ziemlich fein und scharf nach vorn geneigt, Bl.-Achse ± länglich bis birnfg., selten drüsenlos.

55. *R. macrophylla* *): aufrechter b, Zw. braunrot, Stacheln im oberen Teile meist nur unter B. gepaart, die stärkeren wie Fig. 325q, S. 569, — hellbraun, o. fehlend: B. in Form und Größe sehr variabel, B.chen der typischen Form etwa 2:1,2—5,5:3,5 cm, Zähnung vgl. p!, obers. — tiefgrün, kahl o. fast kahl, unters. — graugrün, wenigstens auf Nerven beh. und meist reichlich bedrüst, hfg. durchweg fülzig, Rachis dgl. und bedrüst und — bestachelt, Neb. reich drüsig-zähnelig gewimpert, unters. — bedrüst, Öhrchen — breit; Blst. 1 bis mehrblütig, Bl. Stiele 2—3 cm, stieldrüsig und meist — beh., Trgb. kaum halb so lang, Bl. lebhaft rot, 4—7—9 cm Dm., K. ganzrandig, Ende — blattartig, außen hfg. bedrüst, Gr. dicht beh., hfg. ± herausragend, Scheinfr. vgl. q, o. auch schwächtiger.

*) Hier wäre auch noch die mir nur aus der Literatur bekannte *R. gratissima* GREENE, Bol. Francisc. I. 73. 1891, anzutragen, die den Habitus der *macrophylla* besitzen soll, aber durch die geraden Stacheln und die Neb. gut abweicht, nach CRÉPIN (1896) auch sonst mit keiner anderen Art identisch scheint. Calif., in the mountains of Kern Co., borders of wet meadows and about springy places. — Mit *gratissima* soll verwandt sein *R. pinetorum* HELLER, in Muhlenbergia I. 53. 1904, aus Calif. Monterey Co.

**) Vgl. CRÉPIN in Bull. S. B. Belg. XIII. 283. 1874. Ich beschreibe zumeist nach von CRÉPIN bestimmten Exemplaren aus dem Himalaya. Bei LINDLEY t. 6 sind die B.chen ganz verzeichnet. Man vgl. dagegen die exakteren Figuren bei KLOTZCH.

Die *R. hookeriana* WALL., Cat. 691. 1829, die von CRÉPIN (in Herb.) und HOOKER (Fl. Brit. Ind. II. 366. 1878) hierher gezogen wird, scheint nach den mir vorliegenden Originalen eine sehr distinkte Form zu sein. Sie ist von *R. hookeriana* BERT., Misc. Bot. XXIV. 11. t. 1. 1871, wohl verschieden. Beide bedürften noch der Untersuchungen. In den Formenkreis gehören auch *R. hoffmeisteri* KLOTZSCH, in Reis. Prinz. Wald. 153. t. 7. 1862; *R. guthriei-caldemarii* KLOTZSCH, l. c. t. 8.

R. m. IDL. Ros. Monogr. 35. t. 6. 1820. Himalaya von Mussooree ostwärts bis China (Yünnan, Tschili). — Im Gebirge bis 3500 m. — In Hort VILMORIN sollen eine ganze Reihe von Formen in Kultur sein. Vgl. Habitusbild in Frut. Vilm. Cat. I. 1905. 95.

Fig. 327. *Rosa*: B.-Formen von: *a* *gymnocarpa* — *b* *pisocarpa* — *c* *davurica* — *d—e* *pendulina* (*alpina*) — *f* *nutkana* — *g* *blanda* — *h* *woodsii* — *i* *macrophylla* — *k* *arkansana* — *l* *indiana* — *m* *maculata* subsp. *sayi* (Alles ¹, nat. Gr.) (*b* nach LINDLEY, sonst Original).

>> B. der Blzw. 5—7-, an Schossen bis 9-zählig (Fig. 327f), B.chen mehr eifg., Zähnung mehr abstehend, Bl.-Achse meist kugelig und gleich den Bl.-Stielen meist drüsenfrei.

56. *R. nutkana*: variabler 0,3—3 m hoher b. Schosse reich be-
wehrt mit kräftigen, meist gepaarten Stacheln und Stachelborsten (Fig.
325r, S. 569) Zw. hfg. ganz wehrlos, kahl; B. ober- + tief-, aber stumpf-
grün, unters. grau- bis blaugraugrün; B.chen z. T. rundlich-eifg. o. ver-
kehrt eifg., Serratur vgl. s. aber zuw. zusammengesetzt, End-B.chen etwa

3:2–5:3 cm, oben meist kahl, unters. beh. und drüsig, dgl. Rachis, und die — drüsig gezähnelten, breit spitzöhrigen Neb.; Blst. 1–3-blütig, Stiele 2–3 cm, vgl. var., K. ganzrandig, mit blattartigem Ende, Bl. rosa, bis 7 cm Dm., Gr. ein niedriges — beh. Köpfchen bildend, Fr. lebhaft gelbrot, vgl. t.

Eine besonders auffällige Form ist var. *hispida* FERNALD, in Bot. Gaz. 1894. 335, mit drüsenborstigen Bl.-Stielen und Bl.-Achsen, sowie K. — außen. Mit dieser ist wohl ziemlich identisch *R. macdougalii* HOLZINGER, in Bot. Gaz. XXI. 36, 1896.

R. n. PRESL., Epimel. Bot. 203. 1849. — Von Brit.-Columbien bis N.-Calif., östlich bis Montana, südöstlich bis Utah. — Blz. (V–)VI. — Frz. IX. — Hübsche Kulturart, von der ich besonders in Hort. Bot. Darmstadt schönes Material sammelte.

= = B.chen ± verkehrt eifg. nach der Basis zu keilig verschmälert, Zähnung stets ± grob abstehend (Fig. 327 g–h).

57. *R. blanda*): 0,8–1,2–2 m hoher b., mit weit kriechender Grundachse, Äste und Zw. schlank, blaugrün, später lebhaft braunrot, nur am Grunde und an Schößlingen borstig, Blzw. meist ganz wehrlos: B. 5–7-, o. an Schossen bis 9-zählig, B.chen 2–6:1–2,5 cm,

breit o. schmal verkehrt eifg. (Zähnung einfach, obers. matt bis etwas graugrün, z. T. locker beh., unters. —, grau, stärker beh., o. auch ganz kahlend, Rachis kahl o. beh., kaum drüsig, Neb. dgl., mit abstehenden o. aufrechten Öhrchen; Blst. (1–)2–8-blütig, Bl.-Stiele gleich der — kugeligen Bl.-Achse kahl und glatt, über 2 cm lang, Bl. bis 7 cm Dm., hellrosa o. weißlich, K. lanzettlich mit — blattartiger Spitze, auf der Scheinfr. meist ausgebreitet, diese ± kugelig,

Mit KOEHNE, Dendr. 299. 1893, unterscheide ich die Formen mit unters. beh. B. als var. *solandri* (*R. solandri*) TRATT. Monogr. Ros. II. 150. 1823) im Gegensatz zu den ganz kahlenden var. *typica*.

R. b. AIT., Hort. Kew. II. 202. 1789 (*R. fraxinifolia* GMEL., Fl. Bad. II. 413. 1796, non AUCE. AL.; *virginiana* AUCE., non MILL.). — Virginische R.; Meadow-R. — Neufundland bis Vermont, New Jersey, Ontario, Illinois *). — Besonders an feuchten steinigen Orten. — Blz. VI–VII. — Frz. IX. — Seit langem in Kultur. — Hieran schließt sich die vielleicht nur eine Form der *blanda* darstellende *R. woodsii* LDBL., Monogr. 21. 1820 (in Bot. Reg. t. 976. 1826) (*R. maximiliana* NEES, in NEUWIED Reise N.-Am. II. 434. 1877, in Bl. u. B. (vgl. Fig. 327 h und 328 a) scheint kaum ein Unterschied, doch sollen die B.chen nach BRITTON, Manual 513. 1901 nur 10–18 mm lang, unters. zuweilen etwas bläulich überlaufen, die Bl. kleiner (3–5 cm Dm.) und die gepaarten Stacheln an Blzw. regelmäßig vorhanden sein. Er gibt als Heimat die Prarien von Minnesota bis Missouri, N.-W.-Terr. und Neu-Mexico an. In der Flora of N.-Am. II. 230. 1897 zieht er *R. fendleri* CRÉP., in Bull. S. B. Belg. XV. 91. 1876, als Synonym hierher. Ein mir vorliegendes Expl. aus Neu-Mexico, welches mit CRÉPIN'S Angaben gut stimmt und auch mit BRITTON'S Fig. 1968 1877 über einstimmt, als diese mit LINDLEY'S *woodsii*, weicht aber durch bedeutend mehr gleichmäßig zugespitzte, länglich elliptische, etwas scharfer z. T. doppelt gesägte B.chen ab; die oberen Neb. sind nur mäßig breiter. Ich glaube, daß CRÉPIN sehr recht hat, wenn er 1896 den Artwert von *woodsii* und *fendleri* als noch zweifelhaft bezeichnet. Aus der von HOWELL, Fl. of N.-W.-Am., I. 169. 1898, gegebenen Diagnose für *fendleri*, ist wenig zu entnehmen. Rosen muß man schon etwas eingehender charakterisieren, als es die amerikanischen Floristen zu tun beliebten.

Im Anschluß hieran sei auch *R. macouni* GREENE, in Pittonia IV. 11. 1899, „the rather common rose of the middle and northern Rocky Mts.“ erwähnt, die vor-

*) Beschreibung zumeist nach KELLER; der Name *virginiana* MILL., gebührt, wie mir Herr REHDER noch während des Druckes mitteilte, der *humilis*, S. 570, sodaß unsere Art jetzt *blanda* heißen muß!

**) Was HOWELL Fl. of NW.-Am., I. 168. 1898, als *blanda* beschreibt aus Idaho dürfte das sein, was CRÉPIN 1896, S. 16 zu *nutkana* zieht.

wiegend 9—11-zählige B., kleine Bl. und große Scheinfr. besitzen soll. Kleiner kompakter, fast ganz kahler b .

$\triangle\triangle$ Obere Neb. nicht breiter als die schmalen unteren.

— Zwerg- b , kaum über 30 cm hoch, Bl. nicht über 2 cm Dm., Bl.-Achsen meist drüsenborstig.

58. *R. spithamea**): nach GREENE: spärlich verästelter und spärlich beblätterter b , kahl, Stacheln verstreut; B. 3—7-zählig, B.chen verkehrteifg. o. elliptisch, Grund keilg. 1,5—3 cm lang, doppelt drüsig gesägt, Neb. schmal, drüsig gewimpert, spitzohrig, flach; Blst. 1- bis wenigblütig, Bl.-Achse kugelig-eifg., K. mit laubartiger Spitze.

Hierher var. *sonomensis* CRÉP., 1896, in textu (*R. sonomensis* GREENE, Fl. Francisc. I. 72. 1891), die nach dem Autor durch mehr rundlich-eifg. B.chen zurückgerollte Neb., reichere Blst., schmalere, spitzere K. und mehr rundlich-birnentg. Bl.-Achsen abweicht.

R. s. WATS., Bot. of Calif. II. 444. 1880. — Zwerg-R. — Nach GREENE: Calif., very common in pine woods at middle elevations of the Sierra from Yuba Co. southward at least to the Soda Springs west of Donner Lake. Die var. at the Petrified Forest in Sonoma Co. — Wohl noch nicht in Kultur, aber gewiß sehr einführungswert. — Möglicherweise gehört in den Kreis der *spithamea* auch *R. gainacensis* GREENE, in Pittonia V. 109. 1903, aus SO. Oregon, allein aus der ungenügenden Beschreibung ist wenig Sicheres zu entnehmen.

= = 0,5 bis über 1 m hohe b , Bl. kaum unter 3 cm Dm., Bl.-Achsen meist drüsenlos.

> B.chen meist beiderseits $\pm$ gleichmäßig sich spitzend, Zähnung $\pm$ einfach, scharf, mittlere B. der Blzw. 5—7-zählig.

$\vee$ B.chen $\pm$ schmallänglich, Spitze $\pm$ scharf, Zähnung z. T. doppelt [Fig. 328b¹, S. 580**)], K. meist nicht unter 2,5 cm, länger als C.

59. *R. davurica****): reichlich 1 m hoher, ziemlich schlankästiger b , Zw. purpurbraun, hfg. bläulich überlauten, Stacheln hell, gepaart, auch an Blzw. hier und da reichlich Borsten vorh. (Fig. 328b); B. (Fig. 327c) an Schößlingen bis 9-zählig, obers. satt o. gelbgrün, meist kahl, unters. hell- o. hellgraugrün, beh. bis kahl, aber fast stets reich bedrüst, in Mittel 3—4:2 cm; Rachis beh. und bedrüst, Neb. unters. dgl. — zusammengerollt, spitzohrig; Blst. 1—3-blütig, Bl. rosa, vgl. Fig. 328c, ihre Stiele etwa doppelt so lang als die kugelig-eifg. Bl.-Achse, meist $\pm$ stieldrüsig, Gr. ein beh. Köpfchen bildend, Scheinfr. glatt, vgl. c¹.

R. d. PALL., Fl. ross. I. 2. 61, 1788 (*willdenowii* SPRG., Syst. II. 547. 1825; *cinnamomea* var. *davurica* MEYER, Über die Zimmtrosen 27. 1846). — Dahurien, Mandschurei, Amurgebiet, China (Tschili, Shingking). In Kultur noch selten.

$\vee\vee$ B.chen mehr eifg. bis elliptisch, weniger spitz, Zähnung einfach (Fig. 328d¹) K. die C. nicht überragend.

60. *R. pisocarpa*†): aufrechter, ausgebreitet verästelter, bis 2 m hoher b , Zw. olivgrün o. gerötet, bräunend, an Schößlingen gleich-

*) CRÉPIN erwähnt 1896, daß er früher eine hiermit wohl identische Form als *R. bridgesii* bekannt hat, das daher dieser Name wahrscheinlich an Stelle von *spithamea* treten müsse. Allein in Bull. S. B. Belg. XV. 51. 1876 spricht er nur von einem „Herbarnamen“, hat also *bridgesii* wohl nie wirklich publiziert.

**) Die Zeichnung ist leider nicht ganz genau.

***)) Beschreibung nach von CRÉPIN bestimmten Exemplaren, die von MAXIMOWICZ, TURCZANINOW, WILFORD und MAACK gesammelt wurden.

†) Beschreibung nach HOOKER, in Bot. Mag. t. 6857. 1886, sowie nach in Hort. Manden gesammelten Exemplaren, die genau mit HOOKERS Angaben und Bild stimmen, welches nach CRÉPIN ganz korrekt ist. Was ich als *pisocarpa* mit breiten oberen Neb. (vgl. KOHNEN, Dendr. 295. 1893) sammelte und aus N.-Am. sah, ist sicher verschieden!

mäßig feinstachelig, sonst an Blzw. nur mit gepaarten Stacheln (Fig. 238d) o. wehrlos: B. Fig. 327b) selten 9-zählig, oberse. lebhaft grün, aber nicht glänzend, fein beh. (ob ganz kahlend?), unterse. blaugrau, feinfilzig und wohl nur spärlich bedrüst, End.-Bchen etwa 22–30:13–16 mm. Rachis und Neb. dgl. beh., diese mit spitzen vorgestreckten Öhrchen: Bst. 1- bis wenigblütig, ca. 2,5–3 cm Dm. (Fig. 328e), Bl-Stiele etwa 10–12 mm, meist drusenlos, C. rosa, Scheinfr. bis 12 cm Dm., † kugelig, glatt, lebhaft orangerot.

R. p. GRAY, in Proc. Am. Acad. VIII. 382. 1872. — Erbsen-R. — Brit.-Columb. bis Oregon. Blz. VI. — Frz. IX. — CRÉPIN sagt 1896, daß *R. californica* var. *ultramontana* S. WATS., Bot. Calif. I. 187. 1876 — *R. ultramontana* HELLER, in Muhlenbergia I. 107. 1904, nicht zu *californica*, sondern zu *pisocarpa* Beziehungen habe. Allein das mir vorliegende Material von *ultramontana* (teste GRELNE) aus Nevada (lg. BAKER No. 1221, womit die Pflanzen von Cusick No. 257) (aus Oregon), die unter *pisocarpa* gehen, identisch zu sein scheinen, zeigt breite, obere Neb. und Trgb., viel größere Bl. und gröber sägezähne Bchen. *R. ultramontana* scheint also eine gute Art darzustellen, gehört jedenfalls nicht zum Formenkreis der *pisocarpa*. Vielleicht aber gehört *pisocarpa* KOEHNE, l. c., zum Teil zu *ultramontana*.

>>> Bchen meist mehr rundlich und stumpf, Zähnung fast stets mehrfach zusammengesetzt (Fig. 328f), mittlere B. der Blzw. hfg. 9-zählig.

61. *R. pendulina* (*R. alpina*): nach KELLER: aufrechter, 0,3–3 m hoher b., mit wagrecht abstehenden, meist kurzen Ästchen: Stamm unterwärts bewehrt, oberwärts nebst Zw. wehrlos o. dicht mit Stacheln und Borsten besetzt, B. 7–11-zählig, Bchen mittelgroß bis klein, selten mehrere cm lang und breit, oben dunkelgrün, unten blau, kahl o. beiders. unten stärker beh., und z. T. drüsig, Rachis meist kahl, nur drusig und stachelig, Neb. mit ziemlich breiten zugespitzten divergierenden Öhrchen: Bl. meist einzeln, lebhaft rosa bis purpurn, etwa 4–5 cm Dm., Stiele meist mehrfach länger als Bl.-Achse, meist drüsig, hfg. ohne Trgb., nach Blz. oft bogig gekrümmt, Bl.-Achse kugelig bis flaschenförmig, mit deutl. Hals, meist drusig, K. dgl., ungeteilt lanzettlich, so lang o. länger als C., Gr. wollig, Scheintr. kugelig bis flaschenfg., hellrot, zuletzt meist überhängend.

Eine außerordentlich veränderliche Art. Es gehören in den Formenkreis: *R. adenophora* KIT., in Linnaea XXXII. 87. 1863; *adjecta* DES., in Mém. Acad. M.-et-L. XXVIII. 104. 1873; *affinis* STERNBG., Flora IX. I. Berl. 80. 1826; *alpino-ormis* HAYN., in BOBB., Ros. Hung. 726. 1880; *balsamea* KIT., l. c. 590; *croatica* KIT., l. c. 589; *gentilis* STERNBG., l. c. 39; *intercalaris* DES., l. c. *lagenaria* VILL., Fl. Dauph. II. 553. 1789; *malvi* KERNER, in Ö. B. Z. XIX. 325. 1869; *pyrenaica* GOUAN, in ill. et obs. bot. 37. 1773.

R. p. L. Sp. pl. I. 492. 1753 (*R. cinnamomea* L., l. c. 491*), non L. 1759; *R. alpina* L., l. c. ed. 2. 703. 1762; *rupestris* CRANTZ, Stirp. austr. fasc. 2. 23. 1763; *glandulosa* BELL., App. fl. Pedem., in Act. Taur. 1790. 230, non KOCH). — Alpen-R. — I. G. Alpen, von den W.-Alpen bis nach Bosnien, Jura, Mittelgebirge von Vogesen bis Karpathen, nordl. bis Erzgebirge und Sudeten, fehlt im W. Mitteleuropa und im N. des Gebietes steigt bis 2500 m, ferner Auvagne, Pyren., N.- und M.-Span., Apennin, Serb., Bulg., Thessalien. — Blz. V (eine der frühesten), in höheren Lagen VI(–VII). — Frz. VIII–IX.

61×67 *R. pendulina* × *spinosissima*: *R. reversa* W. et KIT., Pl. rar. Hung. III. 293. 1812 (*R. gentilis* DES., in Bull. S. B. Belg. 246. 1876, non STERNBG. Vgl. KELLER, l. c. 311. — Hierher: *R. helikensis* KMEI, in Ö. B. Z. 1881. 18; *reversa* DES., in Mém., S. A. M.-et-L. X. 88. 1861; *protogenes* OZAN., in Bull. S. B. Belg.

*) Vgl. die Auseinandersetzungen KELLERS, l. c. 299 über die Nomenklatur.

1869. 261; *saucana* BOULL., in Bull. S. B. Lyon 2. sér. V. 3 1887, *simkianzu* KMET', in Ö. B. Z. 1884. 15; *villarsiana* SIEB., in Pl. exs. it. alp. 1829.

- Blzw. meist wie die übrigen neben den Stacheln reichlich mit Stachelborsten, die einen oft sehr ähneln, bewehrt (vgl. aber auch unter +, S. 575).

Fig. 328. *Rosa*: *a woodsii*: Blst. — *b—c¹ davurica*; *b* Zw.-Stück; *b¹* halbes Behen, um die Zähnung zu zeigen; *c* Bl von oben; *d¹* Scheinfr. — *d* *e pisocarpa*: *d—d¹* wie *b—b¹*; *e* Blst. — *f pendulina*: zusammengesetzte B.-Zähnung. — *g—t* *acbbiana*; *g—h* wie *b—b¹*; *i* *l* Scheintr. — *k—m¹ acuticarpa*: *k—l¹* wie *b—b¹*; *m* Bl. Kn.; *m¹* Scheintr. — *n—p pinnatifida*: *n* Bl im L.-Schn.; *n* K.; *o* Frkn.; *o¹* Stb.; *p* Scheintr. — *q—r¹ xanthina*: *q* Zw.-Stück, *q¹* Zw. mit B. und Bl.; *r¹* Frkn.; *r²* Scheintr. — *s* auch LINDLEY, *s¹* *s²* nach HOOKER, sonst Original.

△ Zw. und Stacheln nicht behaart.

— K. als Ganzes von der reifen Fr. abfällig, diese ± gleich einem Deckel öffnend (teste CRÉPIN 1896).

62. *R. alberti*: nach REBEL etwa 0,6–0,9 m hoher, stark verästelter b. die reiche gemischte Bestachelung wie bei *pinnatifida*, aber von dieser habituell

durch mehr rutentg., etwas überhangende Zw. verschieden. Bechen spitz eifg., scharf drüsig gesägt, oben kahl, unten angedrückt beh.; Rachis drüsig; Bl. und K. wie bei *spinosissima*, Bl.-Stiele, K. und Bl.-Ähren kahl, Bl. weiß, Scheinfr. länglich.

R. a. RGL., in Act. Hort. Petrop VIII. 1. 278. 1883 [et in Gartenfl. 1883. 15]. — Dsungarei, Turkestan. — Echte Expl. sah ich noch nicht. Was als solche in Kultur, ist fraglich.

— = K. auf Fr. bleibend.

> B.chen klein, meist $\pm$ rundlich o. verkehrt eiförmlich, kaum über 20:16 mm, Stacheln meist hell und ziemlich gleichartig.

63. *R. webbiana**): kleiner, zierlicher, ziemlich kurzästiger b , Zw. durchweg bestachelt (wie Fig. 328g) o. seltener im oberen Teile fast wehrlos, B. 5—7-, selten 9-zählig, obers. $\pm$ lebhaft grün, spärlich beh. o. kahl, unters. etwas blaugrau, $\pm$ reichlich beh. o. kahl, kaum drüsig, Zähnung vgl. h., Rachis bedrüst, z. T. beh., Neb. an Blzw. kaum verbreitert, klein, fein- und spitzöhrig; Bl. zu 1(—4), Stiele 2—2,5 cm, selten kürzer, meist kahl und nur $\pm$ drüsig o. ganz glatt, zuw. aber gleich den kugelig-eifg. Bl.-Achsen beh., Bl. etwa 4,5—6 cm Dm., weißlich-rosa, K. lanzettlich, meist kürzer als C., nach Blz. anfangs $\pm$ zurückgeschlagen, zur Frz. aufrecht (i^1), Gr. z. T. etwas hervorstehend.

R. w. WALL., Cat. No. 683. 1829 [et ROYLE, Illustr. II. t. 42, Fig. 2. 1839] (*unguicularis* BERT., Misc. Bot. XXII. 15. t. 3. [Kew. Ind.]). — Himal. (Kaschmir, Kumaon), W.-Tibet. — Trockene Hochebenen, 2—6500 m. — Blz. VI. — Frz. IX—X. — Sah ich echt bisher nur im Hort. Bot. Wien und aus Hort. FROEBEL, Zürich.

>> B.chen größer, nicht so rundlich, Stacheln und Stachelborsten, wenn an Blz. vorh., mehr ungleichartig.

✓ Blst. gewöhnlich mehrblütig, B. meist 9-zählig, B.-Grund meist $\pm$ keilig, K. zur Frz. meist ausgebreitet, obere Neb. kaum verbreitert.

64. *R. arkansana*²): nach BRITTON (1901): aufrechter, 0,3—0,6 m hoher b , Zw. dichtstachelig, mit feinen Borsten. B.chen eifg. o. verkehrt eifg. (Fig. 327k) mit stumpflicher Spitze, selten über 2,5 cm lang, einfach und scharf gesägt, kahl o. unters. fein beh., Bl. etwa 5 cm Dm., rosa, K. lanzettlich, spitz, verstreut drüsenhaarig o. kahl, Fr. kugelig, 10—12 mm Dm., glatt.

R. a. PORT., Syn. Fl. Col. 38. 1874 (*blanda* var. *arkansana* BEST, in Bull. Torr. Cl. 1870. 145). — Prärien von Minnesota und Iowa bis Nebraska, Color., Texas und Neu-Mex. — Blz. VI—VII. — Ich sammelte in dem so rosenreichen Müntener Garten im Juni 1904 und Sept. 1903 Bl- und Fr-Exemplare von 1,5—2 m hohen b , die echt zu sein scheinen. Nach dem mir aus der Heimat der *arkansana* vorliegenden Material zu urteilen variiert diese sehr, bez. werden zu viele Formen ihr subsumiert, wie denn BRITTON das Verbreitungsgebiet zu weit nordwestlich verlaufen läßt. So hat denn auch GREENE begonnen, die *arkansana*-Rosen zu zerlegen und beschreibt in Pittonia IV. 11—13. 1896: *R. manca*, aus S. Color., *R. suffulta*, aus Neu-Mexico und *R. pratincola*, aus O.-Kansas, Nebraska und dem oberen Mississippiale, Minnesota. Da ich von diesen Sachen nur vereinzelte Originalstücke sah, kann ich mir z. Zt. ein Urteil nicht bilden.

✓✓ Blst. gewöhnlich 1-blütig, B. meist 5- bis 7-zählig, o. wenn mehrzählig, Bl.-Stiele lang stieldrüsig, B.chen-Grund meist rundlich, K. zur Frz. aufrecht, obere Neb. $\pm$ verbreitert.

*) Vgl. CRÉPIN, in Bull. S. B. Belg. XIII. 274. 1874.

²) CRÉPIN sagt 1899 von dieser oft verkannten Art: annual stems often transformed into false flowerbearing branchlets with leaves 9—11 foliate or normal flowering branchlets densely setigerous.

65. *R. acicularis*: aufrechter, buschiger, meist nicht über 1 m hoher b. Zw. meist durchaus ähnlich wie auf Fig. 328k feinstachelig und borstig, sonst kahl; B. oben oberseits, hell-, unterseits, blaugraugrün, kahl o. beh., meist aus abgerundetem Grunde länglich, im Mittel 1.5–5:1–3 cm. Zähnung meist einfach o. wenig zusammengesetzt (d), Neb. meist drüsig gewimpert, mit divergierenden Öhrchen, Bl.-Stiele etwa 1.5–3 cm, kahl o. beh., o. kahl und drüsen- o. stachelborstig, Bl.-Achse länglich und kahl, o. rundlich und zuw. beh., K. lanzettlich, am Ende – laubartig, Bl. rosa-weißlich bis tief rosa-purpurn, 4–7 cm Dm., Fr. ± lebhaft rot.

Diese weit verbreitete Art gliedert sich wahrscheinlich in mehrere Subspecies, man vgl. z. B., was CRÉPIN 1896, S. 28, sagt. Soweit es mein Material gestattet, möchte ich auf folgende 3 hinweisen: a. *gmelini* (*R. gmel.* BGE., in LEDEB. Fl. att. II, 228, 1830; *amelica* FRIES, Summ. Veg. Scand. 171, 1846; var. *femina* LALLEMANT, apud KOEHNE, Dendr. 298, 1893); B. der Blzw. 5–7-zählig, Bl.-Stiele kahl, mit kurzen Stieldrüsen, Scheintr. länglich, birntg. (Fig. 328m–mh), N.-Eur. und N.-As. b. *nipponensis* KOEH., f. c. (et Hook., in Bot. Mag. t. 7646 1899), B. meist 6–9-zählig, B. oben im Mittel kleiner, stumpflicher, mit feiner, schärferer, mehr vorgeneigter Serratur, doch ist diese bei a. zuw. ganz analog (f.), Bl.-Stiele eher länger drüsenborstig, Scheintr. wie vorige. Japan. c. *sayi* REHDER (f.), in BAILEY, Cycl. Am. Hort. IV, 1555, 1906; (*R. sayi* SCHWEINITZ, in KEATING, Narr. Longs. Exped. II, 388, 1824; *bourgeana* CRÉP., in Bull. S. B. Belg. XIV, 19, 1875), B. meist 5–7-zählig (Fig. 327m, S. 576), Serratur zuw. doppelt, Bl.-Stiele kahl o. beh., meist ohne Drüsen, Fr. rundlich o. bei var. *engelmannii* (*R. engelmannii* WATS., in Gard. a. For. 1887, 376) länglich. Nach BRITTON: Anticosti bis Minnesota, N.-W.-Terr., Color., S.-Dakota, Texas.

R. a. IDL., Mon. ros. 44, t. 8, 1820. Nadel-R., prickly r. Verbreitung wie oben. Blz. V–VI. Frz. IX. Hierher wird teils als Synonym, teils als Varietät auch *R. oxyacantha* M. B., Fl. Taur.-Kauk. III, 338 1819, gezogen. Was ich am Herbar von CRÉPIN als *oxyacantha* bezeichnet sah, trug dessen Vermerk: an *pampinellifolia* ≈ *acicularis*? Und an diese Kombination erinnerten die Expl. auch

△△ Zw. und Stacheln beh.

66. *R. rugosa*: nach KELLER: meist 1–1.5, selten bis 2 m hoher b. Ausläufer treibende Äste, oft sehr kräftig, starr, Bestachelung ähnlich Fig. 328k, nur oft derber; B. 5–9-zählig (Fig. 330a, S. 585), B. oben meist 1.5–4–5:1–2.5 cm, breit, dick, fest, Zähnung meist einfach, oberseits kahl, sehr dunkel und glänzendgrün, wenig runzelig, unterseits grau-grün, beh. und oft mit glänzenden Drüsen, runzelig geadert, Rachis filzig und stachelig, obere Neb. stark verbreitert, mit dreieckigen, spitzen, aufrechten, etwas divergierenden Öhrchen; Bl. zu 1–3, o. an der Spitze von Lgtr. zu mehreren, ihre Stiele kurz, von den breiten Trgb. bedeckt, kahl o. filzig beh. und mit Borsten und Stieldrüsen, Bl.-Achse kahl und glatt, K. lanzettlich mit blattartigem Ende, Bl. groß, dunkelrosa, purpurn, o. weiß, bis 9 cm Dm., z. T. halbgefüllt, Scheintr. grob, bis 2.5 cm Dm., kugelig-flachgedrückt, scharlachrot.

Auf die durchaus noch nicht scharf gesichteten spontanen und Kulturförmn. dieser seit alters ihrer als Kompott verwerteten Hagebutten halber angebauten Rose kann hier nicht eingegangen werden. Man vgl. z. B. P. LAMBERT, Festkatalog Spec. Ros. Tier 1900, sowie REHDER, in BAILEY Cycl. Am. Hort. IV 1556, 1906.

R. r. THBG., Fl. jap. 213, 1784 (*ferox* LAWR., Coll. of ros. t. 42, 1797, non M. B., *seatsutiana* RLD., Roses I, 17, 1817; *ro. China* ANDRÉ, in Illustr. Hort.

Erst kurz vor Beendigung des Druckes meines Rosenmanuscripts erhielt ich durch die Güte des Herrn REHDER diese Cyclopedie zur Durchsicht. Ich weise jetzt für die amerikanischen Arten ganz besonders auf REHDER'S Beurteilung hin, die wir den Arbeiten dieses trefflichen Dendrologen größte Beachtung verdient.

**) SIEB. et ZUCC. bilden in Fl. jap. auf t. 28, bestachelte Scheintr. ab.

XVIII. t. 47. 1871). — Kartoffel-R. — O.-As. von China (Shinking, Schantung) und Corea bis Kamtschatka und Japan. Blz. IV, vereinzelt bis Herbst. — Frz. IX. — Vgl. auch die Hybriden S. 540, 570, 574 etc.

Sekt VIII. *Pimpinellifolia* DC., apud SER., in Mus. Helv. I. 3. 1878: vgl. oben S. 538, mittlere B. der Blzw. 7—11-zählig, obere Neb. schmal, mit plötzlich verbreiterten, stark divergierenden Öhrchen. K. ganzrandig, reife Scheinfr. schwärzlich.

Bl. milchweiß o. rosenrot, Bestachelung sehr dicht und ungleich (Fig. 329a—d), mittlere B. der Blzw. 9—11-zählig.

67. *R. spinosissima* (*R. pimpinellifolia*): nach KELLER: 10—40 cm, selten über 1 m hoher, stark unterirdische Ausläufer treibender

Fig. 329. *Rosa spinosissima*: a—f Zw.; a, 2, 3 Kn.; a, b B.-N.; c Kn.; d B.-N.; e dgl. im L. Schn.; f ein Stachel. — *Aronia arbutifolia*: g—o Lohden-Zw.; f dgl. Blzw.; g Stachel, h Kn. und B.-N.; i Zw.-Q.-Schn. (vgl. Fig. 261, S. 375). — k—o *Aronia arbutifolia*: k ♂ Zw.; l—m Kn.; n Rand der Kn.-Sch.; o = i (Orig. nach C. K. SCHNEIDER).

b, Stämmchen straff aufrecht, Zw. (Fig. 329) aufrecht bis wagrecht abstehend, Stacheln selten spärlich; B. 5—11-zählig, Behen (Fig. 330b—e, S. 585) klein, kaum über 2,5 cm lang, fast kreisrund bis elliptisch, Zähnung meist einfach, offen, kahl, ober-, tief-, unter-, hellgrün, Rachis meist kahl, zuw. bedrüst, gewöhnlich bestachelt, Neb. meist kahl und drüsenlos; Bl. meist einzeln und ohne Trgb., Stiel ca. 15—25 mm, drüsenlos o. dicht stieldrüsig, K. kürzer als C., Bl. bis 6 cm Dm., Gr. etc. vgl. Fig. 328n—p, S. 580, Scheinfr. selten länglich.

In den Formenkreis dieser Art gehören: *R. mathonni* CREP., in Bull. B. Belg. VIII. 263. 1860; ? *melanocarpa* LINK, Enum. Hort. Berol. II. 57. 1820.

? *microcarpa* BESS., Cat. Hort. Cron. Suppl. IV. 20. 1817; *mitissima* GMEL., Fl. Bad. IV. 358. 1820; *myriacantha* LAM. et DC., Fl. Fr. IV. 139. 1805; *poterifolia* BESS., Pl. Volh. 62. 1821; *ripartii* DÉS., Essai monogr. 47. 1861.

R. s. L., Sp. pl. 491. 1753 (*pimpinellifolia* L., Syst. nat. ed. X. 1759; *altaica* W., Enum. Hort. Berl. 513. 1809). — Bibernell-R. — I. G. D. Voges., Rheinpfalz. niederrhein. Bergland, Hessen, Baden, Württbg., Bay., Thür., Nordseeinseln; OU fehlt nur Salzbg., Schles.; Sch. Jura; ferner N.-Span., Frankr., Großbrit., Dänem., Norweg., S.-Schwed., Rußl. (nördl. bis Wina, Kiew, Poltawa), Kauk., Balkan, Ital. (Festland), Sib., Dsungarei, Turkestan., Mandsch., NW.-China (?). — Kalkliebende Felsenpflanze. — Blz. V—VI., zuw. VIII—X. — Frz. IX.

67×69 *R. spinosissima* × *lutea*: in Kultur nachgewiesen, vgl. KELLER, l. c. 313 und CRÉPIN, in Bull. S. B. Belg. 1894. 1. 125.

○○ Bl. goldgelb. Bestachelung mehr gleichartig (Fig. 328q, S. 580). mittlere B. der Blzw. 5—7-zählig.

68. *R. xanthina**): 0,8—1,2 m hoher, aufrechter, dicht verzweigter b, Stacheln bis 1,5 cm lang, mit breiter, zusammengedrückter Basis; B. klein, an Schößlingen auch 9-zählig, vgl. Fig. 328r, B. chen oblong bis rundlich, unters. drüsig; Bl. einzeln, bis 3 cm Dm., Stiel kahl o. stieldrusig, K. gegen Spitze zuw. gezähnt, kürzer als C., auf Scheinfr. ± zurückgeschlagen, vgl. sonst r¹, r².

R. x. LDL., Ros. monogr. 132. 1820 (*heteracantha* KAR. et KIRIL., in Bull. Soc. Nat. Mosc. XV. 350. 1842; *platyacantha* SCHRENK, in Bull. Acad. Pétersbg. X. 54. 1842; *ecae* ARTH., in Journ. Lin. Soc. XVIII. 54. 1880). — Goldgelbe R. — Afghan., Turkestan, Dsungarei, Altai, Mongolei, China (Tschili). — Blz. IV. In China seit langem in Kultur, auch mit gefüllten Bl. Kulturexemplare verdanke ich Herrn ZABEL. Sie ist aber bei uns noch sehr selten.

Sekt. IX. *Luteae* CRÉP., in Journ. d. Roses 1891. 76. — Vgl. oben S. 538, mittlere B. der Blzw. 5—7-zählig, obere Neb. wenig verbreitert, äußere K. meist mit einigen Fiedern, Scheinfr. ziegelrot.

○ Stacheln gerade (Fig. 331a, S. 587), Neb. drüsig-wimperig gezähnt, wie b, B. chen meist doppelt gesägt (c).

69. *R. lutea*: bis 4 m hoher b, Zw. im unteren Teile mit Stachelborsten gemischt; B. vgl. 330f., B. chen etwa 1,5—3:1,2—2,4 cm, aus abgerundet keilfg. Grunde eielliptisch, seltener eirundlich, oberseits hell- o. sattgrün, meist nur spärlich beh., bis kahl, unterm. hellgrün o. kaum heller, etwas mehr beh. o. kahl und nur verstreut drüsig, Rachis meist zottig und drüsig; Bl. zu 1—3, ihre Stiele kahl o. spärlich beh., seltener drüsenborstig, Bl.-Achse meist im oberen Teile und K. außen im unteren Teile stieldrusig o. beide glatt, K. vgl. Fig. 331d, Bl. bis 7 cm Dm., lebhaft gelb, Gr. ein beh., wenig vorragendes Köpfchen bildend, Scheinfr. kugelig, selten reifend.

Hierher gehört var. *punicea* KELLER, l. c. 312 (*R. punicea* MILL., Gard. Diet. No. 12. 1768; *R. bicolor* JACQ., Hort. Vindob. I. t. 7. 1776), C. innen sammetig grell ziegelrot, außen lebhaft gelb, mitunter rot gestreift. — Ferner sei die Form mit gefüllten Bl. erwähnt, die LAMBERT und ZABEL mit der Rose „Persian Yellow“ der Gärten identifizieren, wogegen KOLNE und KELLER diese zur folgenden Art ziehen.

R. l. MILL., Gard. Diet. ed. VIII. No. 4. 1768 (*R. eglanteria* L. Amoen. acad. V. 220. 1760, non L. 1753, siehe S. 556; *lutea* HERRM., Dis. Ros. 18. 1762, non BASI; *chrysophylla* EHRH., Beitr. Naturk. II. 138. 1788). — Armenien, Persien aber auch Tibet (vgl. HUGEL, No. 1094. 96, teste CRÉPIN, in Herb. Botm. Wien). Im Gebirge bis 3000 m. — Blz. VI. — Jetzt in den Gärten seltener als früher, aber im Gebiet schon z. T. verwildert. Sehr kulturwert.

○○ Stacheln gebogen (Fig. 331e, S. 587), Neb. grobzählig (f), B. chen einfach gezähnt (g).

*) Beschreibung z. T. nach HOOKER, Bot. Mag. t. 7666. 1899.

70. *R. hemisphaerica* (*R. sulphurea*): Diese Art weicht von *lutea* im wesentlichen noch ab durch: B. eher zierlicher (Fig. 330g), bläulicher, B.chen mit mehr keiligem Grunde, meist reicher beh., weniger drüsig: Bl. kleiner, hellgelber, Gr. etwas mehr hervorragend (Fig. 331h).

Fig. 330. *Rosa*: B.-Formen von: *a rugosa* — *b—e spinosissima* (*pimpinellifolia*) — *f lutea* — *g hemisphaerica* (*sulphurea*) — *h microphylla* — *i sericea* — *k laciniata* — *l bracteata* (Alles $\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

R. h. HERRM., Diss. Ros. 18. 1762 (*sulphurea* AIT., Hort. Kew. II. 201. 1789; *bracteata* BOISS. et BUNDE, Anzahl. 84 t. 6. *sulphurea* BOISS. et BAL., in Fl. or. II. 672. 1872. Phrygien, Armen., Cappadozien, Persien — Blz V in Heimat. — Mir lebend nicht bekannt geworden.

Sekt. X. *Sericeae* CRÉPIN, l. c. — Vgl. oben S. 538 und Art.

71. *R. sericea*: dichter, aufrechter o. ausgebreiteter, vielgestaltiger, in der Heimat bis 4 m hoher b, Stacheln glänzend purpurbraun, ganz flach (Fig. 331b), o. zuw. länger, kräftiger, dichter und leicht gebogen, daneben Zw. dicht schwarzrot, klebrig-stieldrüsig: B. 7—9-zählig (Fig. 330i), tief stumpfgrün, unters. wenig heller, Bechen schmal oblong, an Spitze meist rundlich, Zähnung (Fig. 331m) doppelt drüsig, overs. kahl, unters. meist beh., bis reichlich seidenzottig und dunkel klebrig bedrüst, bis 3 cm lang, Rachis beh. und drüsig, Neb. schmal und mit feinen gezähnelten Öhrchen: Bl. einzeln ohne Trgb., weiß o. ganz matt gelbweiß, vgl. Fig. 331i—k. Fr. kugelig-birnfg., kahl o. $\pm$ beh.

Der Formenkreis bedarf noch der Untersuchung.

R. s. LDL., Monogr. Ros. 105. t. 12. 1820 (*R. wallichii* TRATT. Ros. Mon. II. 293. 1823-24; *R. tetrapetala* ROYLE, Illustr. 208 t. 42. 1839). — Seidige R. — Himal. (von Kumaon bis Sikkim), China (Yünnan). — Blz. VI. — In Kultur noch selten, ich sah sie nur im Hort Bot. Wien in einer ziemlich kahlen, aber stark klebrigen Form, die chinesische soll dagegen sehr stark seidenzottig sein und würde einen hübschen Zierstrauch abgeben.

Sekt. XI. *Minutifoliae* CRÉPIN, l. c. — Vgl. oben S. 538 und Art.).

72. *R. minutifolia*: nach dem Autor: 0,6—1,2 m hoher, dichtzweigiger b, Schößlinge beh., dicht, mit geraden o. leicht gekrümmten Stacheln und Stachelborsten besetzt, an Blzw. ∞ , mehr rundliche, gebogene, z. T. gepaarte Stacheln; B. 5—7-zählig, Bechen klein (Fig. 331n), eifg., einfach eingeschnitten gezahnt, Neb. klein, schmal; Bl. einzeln ohne Trgb., 2—3 cm Dm., rosa purpurn o. weiß, äußere K. fiederspaltig, Bl.-Achse kugelig, drüsig-borstig*, Gr. wollig beh., Fr. kugelig, tief rotbraun drüsenborstig, vom bleibend auf rechten K. gekrönt.

R. m. ENGELM., apud PARRY, in Bull. Torr. Cl. IX. 97. 1882. — Lower-Calif. — In Kultur noch sehr selten. — Blz. VI—VII.

Sekt. XII. *Bracteatae* THORY, Prodr. Gen. Ros. 1820. — Vgl. oben S. 537, immergrüne b, Stacheln gerade o. gebogen, untere B. gepaart o. gedreit, K. nach Blz. zurückgeschlagen, ganzrandig.

Stachel hakig (Fig. 331o), Bechen an Spitze abgerundet o. mit ganz feinem aufgesetztem Spitzchen (Fig. 330l).

73. *R. bracteata*: üppiger $\frac{1}{2}$, Zw. olivgrün, grautüzig, Stacheln rotbraun, beh.; B. 7—11-zählig, overs. glänzend tiefgrün, kahl, unters. gelbgrün, vorwiegend auf Nerven beh., feines Nervennetz sehr scharf, Bechen im Mittel 2—4,2:4,5:2,3 cm, Rachis beh., Neb. vgl. Fig. 331p; Blst. 1 bis wenigblütig, die kurzen beh., Stiele von den transig-gezähnten, beh. Trgb. verdeckt, Bl.-Achse halbkugelig, dentilzig, K. filzig p^h, Bl. bis fast 7 cm Dm., weiß o. leicht gelblichweiß, C. länger als K., tief ausgerandet.

R. b. WENDL., Bot. Beob. 50. 1798 *macartnea* DUM., Bot. Cult. ed. 2, V 183. 1837. — Macartney-R. — China (Chekiang, Fokien, Formosa) — Blz. VIII — In N.-Am. (Virg. bis Florida und Mississippi) verwildert [teste SMALL].

*) PARRY sagt: densely setose-hispid, aber CRÉPIN (1896): with long silky pubescence.

Zu *R. minutifolia* tritt noch genau nur aus der Autors Beschreibung bekannt: *R. stellata* WOOTON, in Bull. Torr. Bot. Club 1878-1882, t. 335, aus New Mexico. WOOTON sagt von ihr, while closely related to *R. minutifolia*, it is easily separated from that species by its less numerous and larger hips with fewer and smaller spines. The stellate trichomes referred to in the name I have given it, are most unique and interesting in this genus.

***.) Beschreibung nach im August 1903 in Hort. La Mortola an der Riviera gesammelten Exemplaren. Außer *bracteata* erhielt ich dort durch meinen Freund, Herrn A. BERGER, auch noch *R. microphylla*, *lyalli*, *gigantea* und andere, bei uns kaum auskultivierende, seltene Rosenarten, wofür ich ihm auch dies hier herzlich danke.

Stacheln gerade Fig. 331q). Bechen oblong o. elliptisch, zugespitzt (r).

74. *R. clinophylla* (*R. involucrata*): von *bracteata* im wesentlichen noch abweichend durch: etwas weniger stark schlingend, Zw. mehr kahleud. Beh. zottiger, Bechen meist nach dem B-Ende an Größe etwas zunehmend, während es bei voriger litg. umgekehrt ist, unters. mehr beh., dgl. Rachis zottiger, Neb. noch feinstachliger.

Fig. 331. *Rosa*: a—d *lutea*: a Zw.-Stück; b Neb.; c halbes B. um die Zähnung zu zeigen; d Bl. Kn. — e—h' *clinophylla calphurni*: e wie a; f Bl. im L.-Schn.; h' K. — i—m *sericea*: i Bl. von oben, e dgl. im L.-Schn.; K: / Zw.-Stück; m B.-Rand. — n *minutifolia*: Zw. mit B. und Bl. — o—p² *bracteata*: o wie i; p¹ K. — q—r *clinophylla involucrata*: q Zw.-Stück; r ganzes und halbes Bechen — s—u *lutea*: s Zw.-Stück; t halbes Bechen; u Schemm. — v *clinophylla*: v wie s; t: x Bl. im L.-Schn.; v—z K. o nach CARD. a For. sonst Original).

Beh. der Trgh. und Bl. Stiele, zuweilen mit Drüsen gemischt, sonst zottiger beh., Gr. etwas mehr kopfig hervorstehend.

R. c. THORY, in RÉD. ROS. I. 43. 1817 (*involucrata* ROXBG., apud LDL. Mon. Ros. 8. 1826). — Behüllte R. O.-Indien (Gangesebene und Vorberge des Himalaya, von Kumaon bis Burma). — Gleich voriger nur für die südlichsten Lagen des Gebietes im Freien versuchswert.

Sekt. XIII. *Laevigatae* THORY, Prodr. Gen. Ros. 1820. — Vgl. oben S. 537 und Art.

75. *R. laevigata*: immergrüner, dünnästiger, kahler §, 2–4 m; Stacheln hakig (Fig. 331s); B. meist 3-zählig (Fig. 330k), etwas rhombisch-elliptisch, zugespitzt, fein gesägt (Fig. 331t), oberseits glänzend dunkel-, unterseits gelbgrün, kahl, Rachis dgl., Neb. schmallanzettlich, drüsig zähnelig, angewachsen, Bl. einzeln bis 7 cm Dm., weiß o. rosar., Blzw. drüsenborstig, dgl. die bis fast 3 cm langen Bl.-Stiele und Bl.-Achse, äußere K. borstig gewimpert, in blattartige Anhängsel auslaufend, zur Frz. $\pm$ ausgebreitet o. aufrecht (u).

R. l. MCHX., Fl. Bor.-Am. I. 295. 1803 (*ternata* POIR., in LAM. Encycl. VI. 284. 1804; *nica* DC., Cat. pl. Hort. Monsp. 157. 1813; *chiracensis* DONN, Hort Cantab. ed. VIII. 170. 1815; *sinica* LDL., Ros. Mon. 126. t. 16. 1820, non AIT.). — Sina-R. — China (Hupei, Sz'tschwan, Kiangsi, Chekiang, Fokien, Formosa, Kwangsi, Kwangtung), in Japan und in N.-Am. (Georgia bis Florida, Texas, nur seit langem verwildert. — Blz. V–VIII (in N.-Am. auch schon III). — Frz. X. — Bei uns sehr empfindlich.

Sekt. XIV. *Microphyllae* CRÉP., l. c. 1891. — Vgl. oben S. 538 und Art.

76. *R. microphylla*: immergrüner, aufrechter, bis 2,5 m hoher b, Zw. olivgrün, kahl, glatt, etwas schlankknickig, Stacheln hellbraun (Fig. 331v); B. 9–15-zählig (Fig. 330o), beiderseits lebhaft hellgrün, kahl o. unterseits locker beh., Behen 10:7–30:15 mm, beidendig, spitz o. am Ende stumpf, Zähnung scharf (Fig. 331w), Rachis beh. bis kahl, Neb. sehr schmal mit winzigen Öhrchen; Bl. meist einzeln ohne Trgb., Stiele 10–15 mm, rosa o. weiß, bis 6–7 cm Dm., in Kultur meist gefüllt, Bl.-Stiele γ , Bl.-Achse sehr stark stachelborstig, dgl. die K. außen γ , äußere K. wie z, sonst wie y, Scheinfr. nach DIPPEL groß, zusammengedrückt-kugelig, rot, vom aufgerichteten K. gekrönt.

R. m. ROXB., apud LDL. Ros. Mon. 9. et 146. 1820. — Kleinblättrige R. — Einfache Formen sah ich nur aus Japan, FORBES et HEMSLEY geben für China an: Kiangsi, Kweitschou, Sz'tschwan, Yünnan, aber in China wie ganz O.-As. und auch Indien seit alters kultiviert. — Blz. Sommer. — Jetzt häufiger in Kultur, härter als die vorhergehenden immergrünen Arten.

Familie 34. *Drupaceae* *), Steinobstgewächse.

DC., Fl. Franc. IV. 479. 1805.

(Unterfam. *Prunoidae* FOCKE, in Nat.-Pfl. III. 3. 50. 1888.)

Vgl. S. 359, b–h, B. ©, sommer- o. immergrün, einfach, ungeteilt, Neb. meist klein und abfällig; Bl. hfg. ansehnlich, weiß o. rötlich, selten grünlich, teils einzeln o. gebüschelt, teils in meist traubigen Blst., γ o. polygam-dioec., Bl.-Achse kreiselfg., flach o. röhrig, K. und C. meist 5, C. meist petaloid, selten fehlend, Stb. 10–20– ∞ , meist am Saume der Bl.-Achse inseriert, Gyn. 1, selten 2–5, frei, grundständig, 1-fächerig, Sa. 2, meist hängend; Fr. steinfruchtartig, mit saftigem, seltener lederigem Fruchtfleisch und steinhartem, o. bei *Prunopia* lederigem Endocarp, S. 1 (selten 2), bei Keimung 2-klappig aufspringend, Cot. fleischig, plankonvex, End. fehl.

*) Vgl. die Anmerkung S. 440. Wenn ich die Drupaceen zwischen die Rosaceen und Pomaceen einschalte, anstatt sie richtiger zwischen die Pomaceen und Leguminosen zu stellen, so geschieht dies lediglich aus dem Grunde, das Erscheinen des Werkes, so viel es geht, zu beschleunigen. Es war mir möglich, die Drupaceen früher abzuschließen, als ich meine Pomaceen-Untersuchungen beenden konnte; ich zogerte daher nicht, jene an die Rosaceen anzuschließen, um eine schnellere Ausgabe der Lictierungen zu ermöglichen. — Man vgl. übrigens für diese Familie die in vieler Hinsicht (zumal der Zusammenstellung der Formen halber) nicht unwichtige Arbeit ROEMERS, Fam. nat. reg. veget. Synop. monogr. III. 1847.

Gattungstabelle.

- A. Bl. ♂, Frb. gewöhnlich 1(—2), Cot. flach.
 I. B. wie in Fig. 356, Gr.-Ansatz an Fr. tief seitlich, Sa. etwas aufsteigend, Endocarp lederig. 150. *Prinsepia*.
 II. B. vgl. Fig. 333—355, Gr. stets endständig, Sa. hangend, Endocarp steinhart.
 1. Bl. einzeln o. zu mehreren scheindoldig o. doldentraubig o. kurztraubig (dann Trgb. ± deutlich und bleibend, Trauben selten bis 12-blütig. 147. *Prunus*.
 2. Bl. in langgestreckten, über 12-blütigen unten beblätterten Trauben o. diese in den Achseln meist immergrüner B.
 a) Blst. am Ende kurzer diesjähriger beblätterter Triebe. 148. *Padus*.
 b) Blst. in den Achseln vorjähriger B., am Grunde blattlos. 149. *Laurocerasus*.
 B. Bl. polygam-dioec., Frb. 5, Cot. eingerollt, vgl. Fig. 356. 151. (*Osmunda Nutt.* *)

Gattung 147. *Prunus* L.^{*)}, Sp. pl. I. 473. 1753.

Vgl. oben Familie und Gattungstabelle, sowie die nachstehende Übersicht der Subgenera. — Arten alle erwähnt.

Tabelle zum Bestimmen der Subgenera:

- 1a. B. im Kn. gefaltet (konduplikat), man untersuche eben ausbrechende Tribspitzen 2.
 1b. B. in Kn. gerollt (konvolut), Subgenus c. *Euprunus* (Fig. 345—350).
 2a. Fr. trocken und sammetig beh., wenn saftig o. kahl, so Bl. fast sitzend und lange vor B.-Ausbruch erscheinend, vgl. jedenfalls Fig. 332 bis 336, Subgenus a. *Amygdalus*.
 2b. Fr. stets saftig, Bl. mit o. nach Blattausbruch, meist langgestielt, sonst vgl. jedenfalls Fig. 337 bis 344, Subgenus b. *Cerasus* (vgl. aber auch unter *Euprunus* *).

Subgenus a. *Amygdalus* (L., Sp. pl. 472. 1753 als Genus) [Mandel; Almond; Amandier].

Vgl. oben: b o. kleine b, B. sommergrün, z. T. auch reduziert: Bl. rosa o. weiß, vor o. mit den B. erscheinend, sitzend o. kurzgestielt, einzeln o. gepaart, seltener zu 3—5 gebüschelt, Fr. meist trocken und aufspringend, seltener saftig und geschlossen bleibend, Steinkern gefurcht und löcherig o. ± glatt.

A. Bl.-Achse breitglockig, höchstens doppelt so lang als K.

I. Verzweigung langrutig, Zw. nie verdornend, B. schmallineal, ohne obs. Sp., vgl. im übrigen Fig. 332a—h.

Sekt. a. *Spartioides* SPACH, in Ann. Sc. nat. sér. 2. XIX. 107. 1843. Stb. ca. 30.

C. Zw. kantig, Petalen oblong, sonst vgl. Fig. 332a—d.

*) Aber inkl. *Amygdalus* und exkl. *Padus* und *Laurocerasus*. — Ich hatte Gelegenheit, von *Prunus* ein sehr reiches Herbarmaterial (ca. 1500 Spandblätter) durchzusehen. Konnte ich doch außer dem gewohnten Wiener Material noch solches aus Berlin, sowie die Herbare BOISSIER und BARBEY-BOISSIER, Gertf und die Sammlungen des Kgl. Bot. Museums in München, des Rijksherbarium in Leiden und des Missouri Bot. Garden in St. Louis vergleichen. Den Direktoren aller dieser Institute bin ich daher zu großem Danke verpflichtet. Ich möchte indes bemerken, daß ich aus dem Herbar BOISSIER die echten *Amygdalus* nicht mit erhielt und mich deshalb über mehrere der schwierigen orientalischen Formen nicht so genau informieren konnte, als ich es gern gewünscht hatte. Man vgl. im übrigen das in den Anmerkungen bei den verschiedenen Subgenera Gesagte. Die *Padus* und *Laurocerasus* habe ich abgetrennt, da sie sowohl unter sich, wie von *Prunus* im obigen Sinne als besondere Gattungen gut unterscheidbar sind.

1. *P. spartioides*: dicht und schlank rutig verästelter, habituell also dem *Spartium* ähnlicher b. 1—1.5 m; Zw. — gelbgrau o. sonnenseitig gebräunt, etwas glanzend, kahl, Kn. kaum sichtbar; B. im Mittel wie Fig. 332a, beiders. graugrün, Zähnung unregelmäßig; Bl. db. einzeln, sitzend, weißlichrosa (?), Fr. stark kahlend o.

P. s. (*Amygd. spart.* SPACH, l. c. 108). — Besenpfriemen-Mandel. — Ich sah Expl. aus Syrien, Mesopotamien, Armenien, Kurdistan, nach BOISSIER auch S. Persien. Trockene Hänge. — Blz. IV. — Frz. VIII (?). Ihr sehr ähnlich scheint zu sein *A. arabica* OLIV., Voy. II. 460, t. 47, 1804 et JACQ. et SPACH, Illustr. Or. III t. 226 B.], in deserto arabico ad Euphratem, haud procul ab Anah. Soweit ich Sicheres aus der Literatur entnehmen kann, besitzt sie kurzer gestielte B. und rundlichere Fr. Mir ist es aber fraglich, ob beide Arten wirklich hinlanglich verschieden sind. In Kultur ist bisher weder *spartioides* noch die folgende Art. Für den Süden des Gebietes aber gewiß versuchswert.

Fig. 332. *Prunus* (*Amygdalus*)-Arten: a—d *spartioides*: a B.; b Bl. im L.-Schn.; c Fr.; d S. — e—h *scoparia*: wie a—d. — i—k¹ *orientalis*: i Bl. im L.-Schn. und K.; k Fr.; k¹ S. — l—n *leiocarpa*: l B.; m Bl. im L.-Schn.; n junge Fr. — o—q *kotschyii*: o B.; p Fr.; q Bl. im L.-Schn. — r—r¹ *elaeagrifolia*: r Fr.; r¹ S. — s—t *laurocarpa*: s B.; t Fr.; u S. l, h nach JACQ. et SPACH [vergr. 7, sonst Original).

○○ Zw. rund, Petalen rundlich, sonst vgl. Fig. 332 e—h.

2. *P. scoparia*: bis über 5 m hoher b. von *spartioides* nach dem mir vorliegenden Material nur noch verschieden durch: B. schmal lineal, — länger, Zähnung — entfernter, Fr. eher reicher beh.

P. s. (*Amygd. scop.* SPACH, l. c. 109). — S.- und O.-Persien. — Trockene Berghänge. — Blz. II—III. — Frz. VI—VII. Was BOISSIER, Diag. Ser. II. 10, l. 1870, unter *A. agrestis* versteht ist mir unklar. Sie soll runde Zw. wie *spartioides* haben und sonst der *spartioides* gleichen. Ich sah nichts Derartiges. BOISSIER gibt außerdem an: b. 0.3—0.6 m, B. 3—4.5:0.4—0.5 cm. Hab. in agris derelictis Caelesyriae inter Balbeck et Zachle.

II. Verzweigung — sparrig, Seitenzw. hfg. verdorrend, wenn Zw. rutig, so B. wie in Fig. 333, o. Zw. — tiefbraun, obs. Sp. z. T. vorh. a Bl. und Fr. ziemlich groß, vgl. Fig. 332i—u und 334.

Sekt. b. *Euamygdalus* SPACH, l. c. 114, erweitert. Stb. ca. 20—30. Diese Sekt. ist in dieser Fassung wenig einheitlich und könnte vielleicht mit Recht in 4—5 Sektionen zerlegt werden.

B. ganzrandig o. nur ziemlich fein kerbzähmig o. gesägt, vgl. Fig. 3321, o, s und Fig. 333 a—b, d—f, h.

* B. + klein, wenn über 3,5 cm lang, so wenigstens unten dicht beh. und mit obs. Sp., vgl. Fig. 3321, o, s, und 333 b.

+ B. sehr klein (Fig. 3321), obs. Sp. fehlend, Fr. zeitig kahl.

3. *P. leiocarpa*: sehr sparriger bis 3 m hoher B., kurze Zw. reich und scharf verdornend, kahl, gelbbraun, rundlich: Kn. klein, rundlich: B. graugrün, kaum über 7:4 mm, τ ganzrandig, kahl, fast sitzend; Bl. sitzend, rosaweiß (?), vgl. Fig. 332 m, reife Fr.?

P. l. (*Amygd. leioc.* BOISS., Diagn. ser. I. 6. 52. 1845). — Kahlfrüchtige Mandel. — S.-Persien. — Felshänge, 1—2000 m. — Blz. IV. — Ich sah die von HAUSKNECHT und KOISCHY (No. 243) gesammelten Orig.-Expl. — Ihr steht sehr nahe die Form, welche BORNMÜLLER in SO.-Persien, Prov. Kerman No. 3486 gesammelt und als *A. kermanensis* var. *glabra* verbreitet hat. Sie hat ebenfalls keine obs. Sp., aber relativ größere B. (bis 1,5:0,5 im Mittel, Stiel 2—3 mm) und beh. Fr. Bl. noch unbekannt. Vgl. das im Anschluß an *P. orientalis* S. 591 Gesagte.

++ B. größer, meist über 1,5—2 cm lang, mit obs. Sp., Fr. bleibend $\pm$ beh.

Δ Zw. und B. (wenigstens unterseits) $\pm$ weiß- o. gelbgrau-filzig.

4. *P. orientalis*: in allen Teilen sehr variabler, bis etwa 3 m hoher, schlanktriebiger o. + sparriger, jedoch selten reicher verdornender B. Zw. dichtfilzig. allmählich kahrend, Kn. purpurbraun, eistumpfhch. 2—3 mm lang: B. vgl. Fig. 333 b, an Lgtr. bis 4:2 cm, in Form an *P. communis* gemahnend, nur stumpfer, Stiel bis fast 1 cm: Bl. und Fr. vgl. Fig. 332 i—k¹, Stein leicht furchig gestreift.

P. o. KOEHNE, Dendr. 315. 1893 (*Amygd. or.* MILL., Gard. Dict. 1759, No. 3; *Amygd. argentea* LAM., Encycl. I. 103. 1783). — Orient-Mandel. — W- und S.-Klein-As., östl. etwa bis türk. Armenien (Kurdistan), sowie Syrien. — Blz. IV. — Frz. Sommer. — Seit langem in Kultur, verlangt geschützte sonnige Lage und verkahlt meist bei uns ziemlich stark. SPACH, in Ann. sc. nat. ser. 2. XIX. 119. 1844, hat mit ? eine var. *discolor* beschrieben, die oben dunkelgrüne, kahle B. hat. Ich sah keines der von SPACH und BOISSIER zitierten Originale, aber die mir vorliegenden Expl. 1g. BOURGEAT, No. 123, Lycien (Elmalu) und 1g. Dr. FORSYTH MAJOR, No. 864, Archipel (Kalymnos), welche unter sich ganz übereinstimmen, auf die auch SPACHS kurze Diagnose ziemlich paßt, sind vom Typ durch die fehlenden obs. Sp., die kahleren Frkn. und die oben höchstens auf Rippe beh., kaum über 14:4—5 mm messenden, fast sitzenden B. gut abweichend. Die Pflanzen verdornen stark und scheinen mir am besten als Art *P. discolor* (1. d. d. d.) ROEMER, Syn. monogr. III. 12. 1847 anzusprechen. Weitere Beobachtung aber nötig. Dagegen gehören in E. zu *orientalis* die Formen, welche BORNMÜLLER unter No. 1038, 1039 und 1040 in Kurdistan gesammelt und teils als *orientalis* (1038), teils als *A. variabilis* (1040) und *variabilis f. latifolia* (1039) verbreitet hat. Da alle Expl. steril sind, so ist allerdings Sicheres nicht zu sagen, zumal nicht, ob eine Hybride vorliegt (sei es *orientalis* $\times$ *communis* o. etwa *chamae* $\times$ *A. communis*). Die B. sind allerdings für *orientalis* z. T. reichlich groß, zeigen aber in den obs. Sp. keine Abweichung. Erst die Vergleichung von Bl. und Fr. kann uns sichere Anhaltspunkte geben.

Im Anschluß an *P. orientalis* sind ferner folgende, z. T. noch sehr des Studiums bedürftige Formen zu besprechen. Zunächst *A. elaeagnifolia* SPACH, l. c. 120, deren Typ mir nur in so unvollkommenen Expl. vorliegt, daß ich die Unterschiede zu *orientalis* nicht beurteilen kann. Er soll aus S.-Persien stammen. Indes scheinen mir, nach der Abbild. bei JAVIER et SPACH, t. 239 B., wo allerdings die Fr. lauglicher sind, mit dieser Art die Exemplare identisch, welche BORNMÜLLER unter No. 3483, 3484, 3485 aus S.-Persien, Prov. Kerman, als *A. kermanensis* var. *velutina* angegeben. Die *kermanensis glabra* wurde bereits oben S. 590 erwähnt und dürfte eine gute Art darstellen, wogegen ich die *velutina*-Form vorläufig für die typische *elaeagnifolia* halte. Die B. messen 12—20:5—10 mm, kahlen z. T. wenigstens oben reichlich, unten stets $\pm$ zottig, ganzrandig, Fr. dünnchalig, beh., vgl. Fig. 332 r—r¹, S. mit 2 Riefen und einigen feinen Grübchen.

Die *A. kotschy* HOHENACKER, apud SPACH, l. c. 117, welche von BOISSIER, Flor. or. II. 643. 1872, als var. zu *elaeagnifolia* gezogen wird, zeichnet sich in dem mir vorliegenden Material aus Kurdistan (KOTSCHY, No. 338, BORNMÜLLER, No. 1037, HAUSSKNECHT, 1867) durch recht zottig-filzige, oft ziemlich gelbliche Beh., längliche B. (Fig. 332 o) und durch die deutlich gestielte rote Bl. gegen *elaeagnifolia* aus. Die länglichen Fr. (p) sind sehr dicknützig und dickschalig, enthalten aber keine reifen S. Wenn nun in der Tat die von mir oben als *elaeagnifolia*-Typ angesprochenen Expl. diese darstellen, so scheint mir *kotschy* doch soweit abweichend, daß es vorläufig besser ist, sie als Art aufrecht zu halten. Vielleicht ist aber *kermanensis velutina* BORNM. eine besondere Art und *kotschy* in der Tat nur eine Form der mir dann eben unbekannten *elaeagnifolia*. Zu *kotschy* zähle ich ferner vorläufig die Expl. lg. SINTENIS, No. 124 (Mesopotamien, HAUSSKNECHT 1867, Assyrien (Terek) und 1865 N.-Syrien (Aintab).

Jedenfalls sind diese Formen noch längst nicht genügend umschrieben. So ist mir *A. balansae* BOISS., Diagn. ser. 1. VI. 71. 1845, ganz unklar. Man vgl. das im Anschluß an folgende Art Gesagte.

△△ Zw. und B. kahl (o. fast kahl).

5 *P. haussknechti*: anscheinend ziemlich sparriger b. Höhe?, Zw. rundlich, oliv- bis rotbraun, kahl, + verdornend. Kn. klein, eitg., wenigschuppig; B. vgl. Fig. 332 s, variabel in Größe und Form, z. T. bis 3,5 : 1,5 cm, hellgelb-graugrün beiders, zuletzt recht dicklich, Stiel bis 8 mm; Bl.?, Fr. derbschalig, + fein beh., Stein fast ganz glatt, vgl. t—u.

P. h. C. K. SCHN. — Diese von mir vorläufig als Art angesprochene Form wurde von STRAUSS 1890 in den Bergen bei Sultanabad in Persien gesammelt. HAUSSKNECHT hat sie mit ? als *A. webbii* SPACH bezeichnet. Diese von SPACH, l. c. 117, beschriebene Art liegt mir leider in keinem der typischen Expl. vor, welche aus NW.-Klein-Asien (Troja) stammen sollen. Ich halte sie für eine der *P. communis* sehr nahe stehende Art, wenigstens gilt dies von *A. salicifolia* BOISS. et BAL., Diagn. ser. 1. VI. 71. 1845, die BOISSIER, Flor. or. II. 642. 1872, als var. zu *webbii* stellt. Von ihr liegt mir ein Expl. BORNMÜLLERS, No. 4470, aus Phrygien vor, dessen B. Fig. 333 h zeigt. Sie besitzen keine obs. Sp., die noch nicht ganz reifen, + sitzenden Fr. messen ca. 2,2 : 1,6 cm. Alles in allem erinnert die Form am ehesten an *communis*, aber wie schon BOISSIER sagt: ab ea ut videtur distincta ramis spinoscentibus, foliis angustioribus, brevius (nicht immer petiolatis, drupa breviter et paucè velutina nec dense tomentosa. Jedenfalls ist *haussknechti* nicht nur geographisch vom *webbii*-Formenkreis (sensu Boiss.) gut geschieden, sondern auch durch die breiteren, z. T. fast ganzrandigen, derben, kürzer gestielten B. mit den obs. Sp. und in der Fr.-Form recht abweichend.

Ob die schon oben erwähnte, in Phrygien an den gleichen Orten wie *webbii* *salicifolia* gefundene *A. balansae* mit (nach Boiss. oben kahlen, unten kraus beh., 1,5 : 2,4 : 0,4 : 0,8 cm messenden B. der *webbii* o. der *communis* o. vielleicht der *orientalis* näher steht, bleibt mir fraglich.

• • B. größer, kaum unter 4 cm lang, meist ganz kahl o. sehr bald kahlend, obs. Sp. nie vorh., vgl. Fig. 333 a—a², d—f.

Fr. trocken o. fast so, B.-Stiel länger als halbe B.-Breite (vgl. a - a², d).

B. sehr variabel (Fig. 333 a—a²), größte Breite der großen B. meist mehr o. wenig unterhalb der Mitte.

6. *P. communis*: b b, bis 6 m hoch. Wuchs aufrecht, anfangs pyramidal, später leicht überhängend, + Zw. leicht glänzend, oft etwas kantig-streifig, Lent. erst an z Zw. deutlich, später am Holze runzelig. Zw. kaum verdornend, Kn.*) länglich-eitg., Sch. zottig gewimpert; B. der wilden Form vorwiegend wie Fig. 333 a—a¹, an Kulturformen oft viel größer (a²), bis etwa 12 : 3 cm, Kerbzählung meist fein und gleichmäßig, Stiel bis 2 cm; Bl. + lebhaft rosa, meist gepaart. Fr. ganz trocken, vgl. sonst Fig. 334 a—c und var.

*) Vgl. meine Dendrol. Winterstudien, Fig. 184 q—t und S. 183.

Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde.

Charakteristik der in Mitteleuropa heimischen und im Freien angepflanzten angiospermen Gehölz-Arten und Formen mit Ausschluß der Bambuseen und Kakteen.

Von

Camillo Karl Schneider.

Mit 128 Abbildungen im Text.

Fünfte Lieferung.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.
1906.

Abgeschlossen am 1. Mai 1906.

Die Ausgabe erfolgt in Lieferungen zum Preise von je 4 Mark.

Lieferung 4 erschien am 30. Juni 1905.

Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde. Charakteristik der in Mitteleuropa heimischen und im

Freien angepflanzten angiospermen Gehölzarten und Formen mit Ausschluß der Bambuseen und Kakteen. Von Camillo Karl Schneider. Vollständig in etwa 9 Lieferungen. Die Ausgabe erfolgt in Lieferungen von je 4 Mark. Bisher erschien Lieferung 1—5.

Es erschien:

Seite	1—160	am 1. Juni 1904
„	161—304	„ 1. Sept. 1904
„	305—448	„ 2. Febr. 1905
„	449—592	„ 15. Juni 1905
„	593—810	„ 1. Mai 1906

Botan. Zeitung, 24. Sept. 1904 (Prof. Büsgen):

. . . Ein besonderer Vorzug des Buches ist, daß es den gesamten Formenkreis der einzelnen Arten (womöglich nach lebendem Material) bespricht und die Gartenformen nach ihrem wirklichen systematischen Wert einzuordnen versucht. . . . Botaniker, Forstleute und Gehölzzüchter werden das Buch mit gleichem Vorteil benutzen. . . .

Revue horticole, 16. Juli 1904:

Les personnes qui connaissent la langue allemande tiendront certainement à enrichir leur bibliothèque horticole de ce nouvel ouvrage. . . . Elle abonde en dessins analytiques excellemment faits et d'un très grand intérêt.

Gardener's Chronicle, 13. August 1904 (Dr. Masters):

. . . The value of the book is largely increased by the very numerous illustrations, which will be of great service in facilitating the determination of the species even in the absence of leaves. . . . In any case, there is every reason to praise the thoroughness of the work before us. . . .

Die Gartenwelt vom 10. Sept. 1904:

. . . Diese wenigen Proben mögen zeigen, für wie wichtig ich das Studium dieses wertvollen Werkes halte, wie reichhaltig und wie sorgfältig gearbeitet dasselbe ist. Das Werk ist jedem, der mit Gehölzkunde irgendwie zu tun hat, nur bestens zu empfehlen. Kein Gehölzzüchter, kein Landschaftsgärtner, auch kein Botaniker kann dieses Buch entbehren, das auch durch seine vortrefflichen Bestimmungstabellen gleich wertvoll ist für den Meister wie für den Gesellen, besonders für den Lernenden.

Papier und Druck sind gut; der Preis von 40 Pf. für einen Bogen ist mäßig zu nennen. Möge daher das vortreffliche Buch weiteste Verbreitung finden.

Revue des Eaux et Forêts, No. 5, 1er Mars 1905:

. . . Le plan en est presque entièrement nouveau: l'auteur, renonçant aux longues descriptions spécifiques, souvent très vagues, en tout cas pas différentielles, si j'ose m'exprimer ainsi, de la plupart des ouvrages de ce genre, ne donne qu'une brève caractéristique de quelques lignes, extrêmement nette et précise, et pourtant complète. Jamais de ces redites fastidieuses, comme celle qui consiste à répéter pour chaque espèce un caractère commun à toutes celles du genre. Un système particulier d'abréviations et de signes conventionnels a permis de condenser typographiquement les descriptions autant qu'il était possible de la faire. . . .

Österr. Forst- und Jagdzeitung, Nr. 9 vom 3. März 1904 (Prof. K. Wilhelm):

. . . Man kann es nur lebhaft wünschen, daß dem Verf. gelinge, die Arbeit in der begonnenen trefflichen Weise weiterzuführen und in absehbarer Zeit zu beenden. Dann wird ein mustergiltiges Werk geschaffen sein und die Gehölzkunde eine ganz wesentliche, ebenso erfreuliche wie nutzbringende Förderung erfahren haben.

Botan. Jahrbücher f. Systematik etc., 27. Febr. 1906 (Prof. E. Koehner):

Was ich schon bei Besprechung der beiden ersten Lieferungen bemerkte, kann ich nur wiederholen, nämlich daß das vorliegende Werk für den Dendrologen unentbehrlich ist, ebenso aber auch für den Systematiker, da eine Fülle von Stoff darin kritisch und auf Grund eigener Untersuchungen verarbeitet worden ist. . . .

Flora, 5. Dezember 1904 (Prof. K. Goebel):

. . . Hervorzuheben ist aber besonders die reiche Ausstattung mit vortrefflichen Abbildungen, welche das Werk unentbehrlich machen für jeden, der sich mit Gehölzen beschäftigt.

Es seien folgende Formen genannt: var. **a. typica**: Fr.-Schale hart: hierher die Formen *f. amara* DC., Fl. fr. IV. 486. 1805 (*A. amara* HAYNE, Arzn. Gew. IV, in nota ad t. 39. f. 1. 1805/46). S. bitter; *f. dulcis* DC., l. c., S. süß, hiermit wohl identisch *f. macrocarpi* SER. in DC. Prodr. II. 531. 1825; ferner die Gartenformen: *f. alba plena* ZBL., in H. d. D. D. G. 235. 1903, Bl. weiß-gefüllt, *f. rosea plena* ZBL., l. c., Bl. rosa-gefüllt; *f. purpurea* ZBL., l. c. Bl. purpurrosa; *f. marginata* ZBL., l. c. B. weißlich gerandet; *f. variegata* ZBL., l. c., B. $\pm$ weißlich gefleckt; *f. compacta* ZBL., l. c., gedrunken buschig wachsend und *f. pendula* ZBL., l. c. Wuchs $\pm$ deutlich hängend. — var. **b. fragilis** SER., l. c. (*A. frag.* BORKH., Handb. Forstb. II. 1377. 1803). Fr.-Schale leicht zerbrechlich, S. meist süß, bekannte Kulturform, deren spontanes Vorkommen noch fraglich.

P. c. FRITSCH, in Sitzb. Acad. Wien 1892. 632 (*Amygd. com.* L., Sp. pl. 473. 1753; *Pr. amygdalus* STOKES, Bot. med. III. 101. 1812) — gemeine Mandel; Almond; Amandier. Wohl nur im mittl. und S.-Kl.-As. (Syrien [bis S.-Persien?] heimisch, aber seit alters durch die Kultur im ganzen Mediterrangebiet verbreitet, ebenso nach Osten*). — Blz. IV. — Frz. Sommer. — Vgl. folgende Art.

? 6×9 *P. communis* $\times$ *persica*: *P. persico-amygdala* (*Amygdalo-Persica* DUH., Traité Arb. éd. 2. IV. 112. 1800; *Amygdalus communis* var. *persuoides* SER. in DC. Prodr. II. 531. 1825; *A. persico-amygdala* RCHB., Fl. germ. excurs. 647. 1830/32; *A. communis* var. *f. amygdalo-persica* SPACH, in Ann. Sc. nat. sér. 2. XIX. 115. 1843; *A. persuoides* ZBL., in H. d. D. D. G. 234. 1903). — Nach dem mir vorliegenden Material dieser in ihrer Abstammung zweifelhaften Form könnte sie wohl ein Bastard sein. Nicht nur die B. deuten in Stielung und Form auf beide Arten hin, sondern auch der Stein der hartfleischigen Fr. ist weder Pfirsich noch Mandel, erinnert aber etwas mehr an den der *persica*.

Δ B. am Grunde am breitesten, sich gegen die Spitze recht gleichmäßig verschmälernd (Fig. 333d).

7. *P. Fenzliana*^{*)}: der *communis* habituell recht ähnlicher, aber niedrigerer, buschigerer, sparrigerer $b - \bar{b}$, Zweige etwas übergebogen und mehr Neigung zum Verdornen; B. ca. 6–8:2 cm, etwas mehr bläulich graugrün, Stiele 1,2–2 cm; Bl. mehr weißlich, Fr. in Form mehr pfirsichartig, aber kaum fleischig, vgl. sonst Fig. 334d–f, S. 596.

P. f. FRITSCH, in Sitzb. Acad. Wien 1892. 632 (*A. dracunculata* HORT, PETROP. non LEDEB.). Kaukasien^{**) (Prov. Karabagh)} — Blz. Ende III. Anfang IV, ca. 10 Tage vor *P. communis*; Frz. Sommer. Sehr reich und frühblühende, schöne Art. In Wien ganz hart.

$++$ Fr. deutlich fleischig (z. T. kahl), B.-Stiele kürzer als halbe B.-Breite (Fig. 333f), o. B. mit $\pm$ auffällig vorgezogener Spitze (e).

Δ B.-Stiele kurz, B. wie f, K. $\pm$ beh.

8. *P. persica*: $b - \bar{b}$, bis 10 m, habituell der *communis* ganz ähnlich (hfg. als Spalier gezogen, Zw. meist stärker gerötet bis purpurn, Kn. vgl. Fig. 353n–s, S. 644; B. feinspitziger, meist feiner und schärfer gesägt und oberhalb der Mitte am breitesten, jung meist nur auf Rippe verstr. beh., bis ca. 15:3,5 cm, Stiel bis etwa 10–14 mm; Bl. meist einzeln, tiefrosa, vgl. *Davidiana*, Fr. vgl. var., Stein wie Fig. 334g, aber mehr und tiefer gefurcht.

*) FRANCHET beschreibt, in Ann. Sc. Nat. sér. 6. XVI. 281. 1883, eine *P. amygdalus* var. *ovalifolia* aus Turkestan (Bords du Pskème et sur les rochers, à Yovou [Kohistan]). Ich sah kein Material davon. Die var. *tangutica* BATAL., in Act. Hort. Petrop. XII. 163. 1892, aus China (Kansu), scheint eine eigene Art zu sein.

**) Da ich von jetzt ab mich in der Schreibung der Speciesnamen und in der Nomenklatur an die im Juni 1905 auf dem Wiener Kongreß gefaßten Beschlüsse halte, so vergleiche man das zu Beginn des Nachtrags in Bd. I Gesagte.

**) Die Exemplare die als *communis* von BORN-MÜLLER unter No. 1531 aus Anatolien in NO.-Kl.-Asien ausgegeben wurden, erinnern sehr an *P. Fenzliana*.

Von den ∞ Kulturformen seien nur hervorgehoben: var. **a. vulgaris** MAXIM., in Bull. Acad. Pétersbg. 1883. 668. Fr. feinfilzig beh., gemeiner Pflsich: hierher Formen mit weißen, tiefroten und gefleckten Bl. (f. *alba*, *camelliflora* FORT., *dianthiflora* FORT.), mit gefüllten Bl. in verschiedenen roten o. weißen Farbentönen (f. *alba-plena*, *rubro-plena*, *coccineo-plena*, *magnifica*, *versicolor*), mit braunrotem Laube (f. *atropurpurea*), terner pyramidal wachsende (f. *pyramidalis*) und hängende

Fig. 333. *Prunus* (*Amygdalus*): B.: a— a^2 *communis* — b *orientalis* — c— c^1 *nana* — d *Fenzliana* — e *Davidiana* — f *persica* — g *Prunus Simoni* — h *Webbii* var. *salicifolia* — i *Petzoldi* — k *triloba* (alles $\frac{2}{3}$ n. Gr.) (Original).

(f. *pendula*) Formen. var. **b. nucipersica** (*Amygd. pers.* var. *nu.* L., Sp. pl. 676. 1753; *Possia nucipersica* BORKH., Forstb. Beschrb. 205. 1760; *Pers. lucas* DC., Fl. fr. IV. 487. 1805; *A. nectarina* AIT., Hort. Kew. ed. 2, III. 191. 1811; *Prunus persica* var. *nectarina* MAXIM., l. c. 669). Fr. kahl, Nektarne, Aus O.-As. stammende Kulturform.

*. In Tok. Bot. Mag. XVI. 178. 1902 beschreibt MAKINO eine var. **densa**, welche einen etwa 1,6 m hohen, dichten, aufrechten, dicht beblätterten und dicht mit einfachen Bl. (ca. 4 cm Dm.) besetzten H bilden soll. Scheint daher einführens-wert.

P. p. S. et Z., in Abh. Ac. München 1846. 2. 122 (*Amygd. pers.* L., Sp. pl. 677. 1753; *Persua vulgaris* MILL., Gard. Diet. ed. VIII. 1768). — Pfirsich; Peach; Pêche. — Heimat wohl China*). Blz. IV–V. Frz. Sommer. — Vgl. das bei *P. Davidiana* und oben S. 593 bei *P. persico-amgdala* Gesagte. Allbekannte und sehr weitverbreitete Kulturart.

B.-Stiele länger als halbe B.-Breite. B. mit lang und fein vorgezogener Spitze und spitzkeiliger Basis (Fig. 333 e); K. ganz kahl.

9 *P. Davidiana*: b bis kleiner b, schlankkrutig verästelt. c Zw. kahl, olivgrün o. gebräunt, später braungrau, Kn. spitz eifg., ca. 5 mm lang, kastanienbraun, mit mehreren fein gespitzelten, zottig gewimperten Sch.; B. etwas blaugrün, etwa 6,5 : 2,5–11 : 4 cm, auch jung kaum beh., Zähnung ziemlich spitz vorgezogen, Stiel gewöhnlich drüsenlos, bis 2,5 cm; Bl. einzeln, zuletzt weiß o. ganz weiß (*f. albiflora*), Fr. feinfilzig, vgl. Fig. 334 h–k.

P. D. FRANCH., Plant. David. I. 403. 1884 (*Persua Davidiana* CARR., in Rev. Hort. 1872. 74) — China: Schensi, Kansu, Sz'tschwan. — Walder der Gebirge. Blz. meist III, Frz. VII. — Wegen seiner frühen Blütezeit geschätzter, von *Persua* gut unterschiedener Zier-b.

cc B. ziemlich auffällig grob gesägt, vgl. Fig. 333 i–k.

* B. vorwiegend angedeutet dreilappig (Fig. 333 k) o. Zw. und B.-Unters. $\pm$ beh., Stb. 25–30.

10. *P. triloba*: aufrechter, bis reichlich 2 m hoher, schlank verzweigter b, Zw. kahl o. auch fein beh., matt dunkelbraun, später grau, fein abblättrnd, Kn. von Neb. teilweise verhüllt^{*)}; B. bis 10 : 4,5 cm, ober. tiefgrün, meist kahlend, unters. heller grün o. etwas graublau, meist $\pm$ beh.; Bl. vgl. Fig. 334 n oben, etwa 2,5 cm Dm., hellrosa, o. gefüllt bis 3,5 cm Dm., Gyn. 1, zuweilen mehrere (bis 8), Fr. rot, vgl. l–m, Stein (nach MAXIMOWICZ) dünnschalig.

Ich fasse die von SPÄTH als *triloba* HORT. nec LDL. geführte einfach blühende Form als Typ auf. Spontanes Material lag mir sonst weder von dieser noch der folgenden Art vor. Beide scheinen in Beh. der Bl.-Teile zu variieren. Ob sich bei *triloba* je nach Beh. der B. und Zw. bez. deren Kahlsein Varietäten scheiden lassen, ist mir noch fraglich. Bei uns sind sonst fast nur geteilt blühende in Kultur. Farbige Tafeln in Rev. Hort. 1862. S. 91, III, Hort. 1861. S. 308 und Fl. d. Serr. N. t. 1532.

P. t. LDL., in Gard. Chron. 1857. 268 (*Amygdalopsis Lindleyi* CARR., in Rev. Hort. 1862. 91; *Prunopsis Lindl.* ANDRE, in Rev. Hort. 1883. 367). — 3 lappige Mandel. China (Tschih, Schantung). — Waldige Berghänge. — Blz. IV–V. Frz. VIII.

Htg. als Hochstämmchen veredelt in Kultur, liebt geschützte warme Lage.

* B. vorwiegend wie Fig. 333 i, ihre Unters. stets kahlend, Zw. kahl, Stb. 15–20.

11 *P. Petzoldi*: der *triloba* sehr ähnlich, B. selten etwas 3 lappig, etwas gleichmäßiger gespitzt; Bl. etwas kleiner, Stielehen ein wenig kürzer vgl. Fig. 334 n–o, Fr. nach MAXIMOWICZ kugelig, mit dickschaligem Stein.

P. Petzoldi K. KOCH, Dendr. I. 92. 1869 (*P. et Amygdalopsis variegata* HORT. NONN.). — Wahrscheinlich mit *P. baldschuanica* REGL., in Act. Hort. Petrop. XI. 314.

*) Man vgl., was BATAJIN, in Act. Hort. Petrop. XII. 104. 1862 über seine var. *Potanini* aus Kansu sagt, welche die wilde Form der *Persua* darstellen möchte. Leider sah ich noch kein Originalmaterial, doch scheinen seine Expl. (g. V. ROSTHORN, Herbst 1861, Sz'tschwan (Nan ch'uan) und Blzw. (g. GERALDI No. 959 N.-Schensi) hierher zu gehören.

**) Vgl. meine Dendrol. Winterstud. S. 141 und Fig. 185 a–h, S. 182.

1890, aus der Bucharei identisch*) Ob auch *P. ulmifolia* FRANCHET, in Ann. sc. nat. sér. 6. XVI. 281. 1883, hierher gehört, ist mir noch etwas fraglich. FRANCHET gibt für seine aus Turkestan (Ablatoume, chaîne des Tschotkal-Taou, 2200 m) stammende Pflanze die B. zur Frz. nur 3–5 cm lang an. Über die Zahl der Stb. sagt er nichts; vielleicht handelt es sich hier um eine 3. Art, doch bedürften alle 3 noch sehr der vergleichenden Untersuchung.

Fig. 334. *Prunus* (*Amygdalus*): a–c *communis*: a Bl. im L.-Schn.; b Fr. dgl. mit ganzem Stein; c S. im Längs- und Q.-Schn. — d–f *Fenzlana*: d Bl. im L.-Schn. und Frkn.; e Fr.; f Stein — g *persico-amygdala*: Stein — h–k *Davidiana*: h Bl. im L.-Schn.; i Fr.; k Stein — l–n *triloba*: l–m Fr. und Stein, n [oben] Bl. im L.-Schn. — n unten — o *Petcoudi*. Bl. im L.-Schn. und C. (b, c nach FOCKE; e–f nach FRITSCH; i–k nach CARRIÈRE, l–m nach ANDRÉ; n–o nach KOEHNE.)

b) Bl. und Fr. klein, vgl. alles Fig. 335.

Sekt. c. *Emplectocladus* [TORR., Pl. Frem. 10. 1854, als Genus] erweitert: kleine b, mit sitzenden o. kurz gestielten, oft sehr winzigen, glockig-röhrigen Bl., alles in allem sehr an die Zwergkirschen erinnernd,

*) Vgl. auch KOEHNE in Gartenfl. 1903. 141; ich bin Herrn Prof. KOEHNE für Übermittlung seiner Zeichnungen einiger *Prunus*-Arten zu Danke verpflichtet. — Wie LIPSKY, in Act. Hort. Petrop. XXIII. 106. 1904, die Formen bewertet, ist mir noch fraglich, da ich aus dem langen russischen Text nichts entnehmen konnte.

aber Fr. trocken, o. wenn außen etwas fleischig, mit hartem Endocarp und deutlichem Mandelkern*).

○ Bl.-Stiele $\perp$ so lang o. eher länger als Bl.-Achse, Stb. scheinbar einreihig, längste $\pm$ so lang wie Bl.-Achse. ○ siehe S. 598.

* B. deutlich reich und unregelmäßig gezähnt (Fig. 335 c, l), obs. Sp. fehlend, kurze Zw. nicht o. kaum verdornend.

+ Bl.-Stiele und Achse kahl, B. wie c, Zähnung nicht reich drüsig.

12. *P. pedunculata***): buschiger 0,5 bis über 2 m hoher b , ⊙ Zw. $\pm$ fein beh. bis filzig, dunkelbraun, ○ kahlend, etwas glänzend, Kn. kurz kugelig eifg., von den bleibenden fädig zerschlitzten kleinen Neb. überragt, B. trübgrün, unten heller, beiders. $\perp$ kurzhaarig, zuletzt z. T. stark verkahlend; kaum über 1·1,5 cm, Stiel bis 8(—10) mm; Bl. einzeln, vor o. mit B., weißlichrosa, ihr Stiel so lang bis doppelt so lang wie Bl.-Achse, vgl. Fig. 335 a, Fr. wie b, fein beh., rot, kaum fleischig, Stein glatt, 8—10 mm lang.

P. ped. MAXIM., in Bull. Ac. Petersbg. 1883. 663 (*A. p.* PALL., in Nov. Act. Petrop. VII. 355. t. 8 et 9 1798). — Gestielte Mandel. — Baikalgeb., NO.-Mongolei S.-Altai. — Wie es scheint in trockenem Gelände. — Blz. IV(—V). — In Kultur noch sehr selten. Soll z. T. als *A. prunifolia* gehen. — Ob die *Amygd. pilosa* TURCZ., in Bull. Soc. nat. Mosc. V. 189. 1832, aus der SO.-Mongolei, die nach MAXIMOWICZ fast nur durch kürzer gestielte Bl. und Fr. abweicht, wirklich verschieden, vermag ich aus Mangel an Material nicht zu sagen.

+ + Bl.-Stiele und Achse beh., B. wie Fig. 335 l, Zähnung reich drüsig.

13. *P. Hookeri****) (*P. glandulosa*): niedriger, vielleicht nicht über 0,5 m hoher, reich sparrig verzweigter b , (·) Zw. graufilzig, $\cdot$ zickzackfg. gebogen, zuweilen leicht verdornend, Kn. kurz eifg., Seh. braunrot, leicht beh.; B. 1 2,5:0,6 1,5 cm o. breiter, oben graugrün, kurz beh., unters. hellgrau filzig-zottig, Nervatur leicht runzelig, Stiel filzig, bis 1 mm; Bl. meist zu 1 2, kurz vor o. mit B., vgl. Fig. 335 i, Fr. wie k, fein beh.

P. H. (*A. glandulosa* HOOK., Icon. pl. III. t. 288. 1840) — Texas. — Prärien. — Blz. V?. — Noch nicht in Kultur.

+ + B.-Zähnung ziemlich fein, $\pm$ kerbig, o. B. ganzrandig, obs. Sp. vorh., kurze Zweige scharf dornig.

+ B. vgl. Fig. 335 v, Zähnung deutlich.

14. *P. Fremonti*: dorniger, sparriger b - b , bis 1,5 m, Zw. braunrot, $\cdot$ stark knickig, sehr fein beh. o. kahl; B. beiders. $\cdot$ glänzend hellgrün, jung $\pm$ beh., meist bald kahl o. fast kahl, feine Nervatur deutlich, Stiele gerötet, Bl. zu 1 3, Stiel und Achse (beiders.) meist kahl, K. kahl, breit-oval, tief winperzählig, C. oblong, Stb. ∞ , doppelt so lang als K., Gyn. (dfig. 2) und Gr. zu 2, dicht beh., Fr. mit dünnfleischiger Außenschicht, fein beh., vgl. Fig. 335 u, Stein etwas breit, rundlich, glatt, mit wenig erhabenem Längsschwulst.

P. F. WATS., Bot. Calif. II. 442. 1880. — S.-Calif., Küste. Blz. III—IV. — Frz. V—VI. Eine sehr interessante an *P. mucronata* gemahnende Art. B. anscheinend in Form sehr variabel, Kn.-Lage mir noch unklar. Sollte eingeführt werden!

+ + B. vgl. Fig. 335 e, meist ganzrandig.

*) Diese Sektion vereint gleich der vorigen noch recht differente Arten. Es wäre jedenfalls sehr erwünscht, daß sie alle in Kultur kamen, um sie am lebenden Material sicher beobachten zu können.

*) *A. Boissieri* CARR., in Rev. Hort. 1875. 352, die angeblich aus KL.-Asien stammen soll, kann ich nach der Beschreibung und Abb. des Autors von *pedunculata* nicht trennen. Wahrscheinlich handelt es sich auch nur um diese.

***) Da es bereits eine *Prunus glandulosa* THBG. 1784 gibt, nenne ich diese Art *P. Hookeri*. — BAILEY stellt diese Art zu *Emprunus*, allein wenn sie auch der *P. gracilis* z. B. auf den ersten Blick recht ähnelt, so gehört sie doch in den Kreis derer, die ich unter *Emplectocladus* führe.

15. *P. Andersonii*: sparriger, 0,8—1,8 m hoher $\bar{b}$, Zw. rotbraun, wie es scheint ganz kahl, später grau, etwas schlanker, aber auch stark dornig wie bei voriger Art; B. beiders. gelbgraugrün, kahl, fast sitzend, meist spitz, bis 3 cm lang; Bl. zu 1—3, mit B., ziemlich ansehnlich, rosa, bis 2 cm Dm., C. $\pm$ breit oblong, bis 1 cm, sonst vgl. Fig. 335 d—d¹, Fr. nach GREENE 1,5 cm lang, zugespitzt.

P. A. GRAY, in Proc. Am. Acad. VII. 337. 1868 (*Amygd. And.* GREENE, Fl. Francisc. I. 49. 1891). — Nevada, Calif. — Gebirge bis über 2000 m. — Blz. V. — Die blühenden Zw. erinnern sehr an eine Pflaume. Eine gewiß recht kulturwerte Art.

○○ Bl. γ sitzend, Stb. im Anfang der Blz. kaum länger als C., deutlich 3-reihig angeordnet.

γ B. sehr klein, schmal lineal (Fig. 335 h), C. außen beh., lineal (f), Bl.-Achse außen beh.

16. *P. fasciculata*: sparriger, 0,5—0,8 m hoher $\bar{b}$, Zw. kurz, schlank, z. T. dornspitzig, γ fein beh., rotbraun bis grau; B. γ gebüschelt, beiders. hell grau

Fig. 335. *Prunus* (*Amygdalus*): a—c *pedunculata*: a Bl. im L.-Schn.; b Fr.; c B. — d—e *Andersonii*: d Bl. im L.-Schn.; d¹ C.; e B. — f—h *fasciculata*: f Bl. aufgeschnitten und ausgebreitet, Stb. und C. gesondert; g Fr.; h B. — i *Hookeri* (*glandulosa*): i Bl. im L.-Schn. und K.; k Fr.; l B. und deren Zähnung. — m—p *minutiflora*: m = i; n Fr.; o dgl. im L.-Schn.; p B. — q—t *microphylla*: q junge Bl. im L.-Schn., daneben ein Stück einer älteren und K.; r Fr.; s dgl. im L.-Schn.; t B. — u—v *Fremonti*: u Fr.; v B. (Original).

grün, ganzrandig, fein beh.; Bl. sehr klein, grünlich-weiß, zu 2—5 gebüschelt, mit B., wie es scheint gleich denen der beiden folgenden Arten subdiöcisch; Fr. wie g, dicht fein zottig.

P. f. GRAY, in Proc. Am. Ac. X. 70. 1874 (*Emplectocladus fasc.* TORR., Pl. Frem. 10 t. 5. 1854; *Amygd. f.* GREENE, Fl. Francisc. I. 49. 1891). — Büschelblatt-Mandel. — Calif., Utah, Arizona? — Trockene Plätze, Wüsten, Gebirge bis 1500 m. Sehr interessanter Typ. In Kultur noch wenig versucht.

γ B. breiter, dgl. C., Bl.-Achse außen kahl o. fast kahl.

+ B. deutlich feinzählig (Fig. 335 t), obs. Sp. vorh.

17. *P. microphylla*: sparriger, aber γ schlanktriebiger, bis etwa 1 m hoher $\bar{b}$, Zw. fein beh., braungrau; B. jung γ beh., später γ bis fast ganz kahrend, graugrün; Bl. zu 1—3, vgl. Fig. 335 q, Fr. wie r—s, fein beh.

P. m. HEMSL., Biol. Centr. Am. Bot. I. 368. 1880 (*Amygd. m.* KUNTH, in H. B. Nov. gen. VI. 243. t. 564. 1823) — Kleinblättrige Zwergmandel. — Zentral-Mexiko. — Gebirge, 2—3000 m. Nicht in Kultur.

++ B. durchweg o. fast ganzrandig, mehr länglich oval (Fig. 335 p), obs. Sp. fehlend.

18. *P. minutiflora*: wie vorige, Zw. etwas knickiger, B. meist ganz kahle, bis 2 cm lang; Bl. wie m, Fr. wie n—o.

P. m. ENGELM., in Bost. Jour. Nat. Hist. VI. 185. 1850. — Winzigblütige Zwergmandel. — Texas. — Prärien. — Blz. III. — Noch nicht eingeführt.

B. Bl.-Achse langröhrig, meist nicht unter 3mal so lang wie K. (ausgenommen z. T. bei *A. nana*).

I. Verzweigung schlank aufrecht, Zw. nicht verdornend. B. meist über 3,5:1 cm, obs. ohne Sp.

Sekt. d. *Chamaeamygdalus* SPACH., l. c. 110. — Stb. 20—30.

19. *P. nana*: buschig-rutiger, zuweil. fast überhängender, 0,3—1,5 m hoher b. Zw. rundlich, kahl, glänzend grün o. olivbraun. Lent. ∞, bes. an den — silbergrauen Zw. und Ästchen. Kn. kahl, braun. Sch. 4—6, gewimpert^{*)}; B. lebhaft hellgrün, kahl, vgl. var.; Bl. einzeln o. zu 2—3 gebüschelt, lebhaft rosa, vgl. Fig. 336 b—d¹. Fr. dicht gelbgrau zottig-filzig (e—e¹).

Namentlich infolge ihrer variablen B.-Tracht und dem wechselnden Ausmaß der Bl.-Teile ist *A. nana* in viele Formen und Scheinarten gespalten worden. Ihr Formenkreis bedarf sicherlich einer eingehenden Bearbeitung und wir beschränken uns heute darauf, 2 Hauptformen festzuhalten, var. a. *georgica* DC., Prodr. II. 530. 1825 (inkl. var. *caucasica* DC., l. c. (*A. georgica* DESF., Arb. II. 221. 1800); B. im Mittel wie Fig. 333 e¹, Fr. eilänglich, besonders schmalblättrige Formen gehen auch als *f. angustifolia*, rein weißblütige als *f. alba* — var. b. *campestris* BESS., Enum. pl. Vol. 16. 1822 (*Amygd. Bessiana* SCHOTT 1818, Katalogname; *A. latifolia* HORT.), B. breiter, vgl. e, Fr. rundlich. Scheint eine sehr konstante Form zu sein. Auch hier eine weißblütige Form (*f. albiflora* [*latifolia alba* HORT.]).

P. n. FOCKE, in Nat.-Pfl. III. 2. 54. 1888 (*Amygd. n.* L., Sp. Pl. 473. 1753). — Zwerg-Mandel — l. G. nur OU. von Nieder Öst. ostwärts durchs Donaugebiet; ferner S. u. M.-Rußl., Kauk., Transkauk., bis O-Sib. — Vorzüglich Niederungen, Steppen, Berghänge — Blz. IV—V. — Frz. VIII — Seit langem in Kultur verbreitet. Die *f. Gessleriana* HORT., nach Angaben im Kat. SPÄTH schwächer wachsend als der Typ, ist im übrigen eine unbedeutende Form.

II. Verzweigung sehr sparrig, breit, Zw. stark verdornend. B. selten 3,5 cm lang und dann schmaler, stets mit obs. Sp.

Sekt. e. *Lycioides* SPACH, l. c. 120. — Stb. ca. 10—15. — Interessante xerophytische b., deren noch keiner bei uns in Kultur versucht scheint.

C B. im Mittel nicht über 14:6 mm, sonst unters. beh., vgl. Fig. siehe S. 600.

— B. kahl, an Spitze am breitesten (f), Bl. wie g—h, Stb. die K. nicht überragend.

20. *P. eburnea*: 0,8—1,5 m hoher b. Verästelung z. T. ziemlich lang und dünn, die Äste mit ∞ kurzen verdornenden Zw. besetzt. weißgrün, kahl, B. gebüschelt, graugrün, ganzrandig, kaum über 12:3 mm, Bl. sitzend, vgl. g—h, Fr. wie h¹ (ob immer ganz beh.?), reifer Stein? (nach BOISS. putamine carinato non foraminato basi sulcato).

^{*)} Die nach dem Autor durch ganzrandige B. ausgezeichnete *A. Stocksiana* BOISS., Diagn. ser. 2. II. 45. 1856, aus Balutschistan kenne ich nicht.

^{**) Vgl. meine Dendrol. Winterstudien, Fig. 184 a—g und S. 142.}

P. e. [? AITCH., in Journ. Lin. XVIII. 50. 1880] (*Amygd. e.* SPACH, in Ann. Sc. nat. ser. 2. XIX. 123. 1843). Elfenbein-Mandel. — S.-Persien [Afghanistan?].

Felshänge, bis 2000 m. — Blz. II — III (in Heimat). — Scheint stark zu variieren. Die Form mit bes. laxem Wuchs hat BOISSIER, Diagn. ser. 1. VI. 53. 1845, als *A. spathulata* beschrieben, den Namen in Flor. or. aber wieder eingezogen. Abänderungen mit auch außen kahlen Bl.-Achsen stellen die var. *furcata* (*A. furcata* SPACH, l. c. 124; *eburnea* var. *leiocalyx* BOISS., Fl. or. II. 646. 1872) dar. Wohl nur synonym mit dem Typ ist *A. scorpius* SPACH, l. c. 122, von der ich kein Expl. sah. — *P. eburnea* und die übrigen Arten in Sekt. *Lycioides* wären im S. des Gebietes gewiß für die Kultur versuchswert.

* B. wenigstens unten $\frac{1}{2}$ beh. (Mikroskop!), spitz-lineal (Fig. 336i), Bl. wie k, äußere Stb. länger als K.

21. *P. lycioides*: sehr dorniger, in B.-Tracht recht variabler, z. T. an *horrida* gemahnender b, B. bis 20:3–5 mm, Stiel bis 3 mm; Bl. sitzend, vgl. k, Fr.

Fig. 336. *Prunus* (*Amygdalus*): a–d' *nana*: a B.-Grund und Neb.; b Bl.-Kn.; c Bl. von oben; d dgl. im L.-Schn. und K.; d' Stb.; e Fr.; e' dgl. im L.-Schn. — f–h' *eburnea*: f B.; g Bl.; h dgl. aufgeschnitten; h' Fr. (ob reif?). — i–l *lycioides*: i B. und deren Zähnung; k Bl. im L.-Schn. und K.; l Fr. — m–o *horrida*: m B.; n Fr.; o Stein — p–q *spinosissima*: p Bl. im L.-Schn.; q Stein (Original).

länglich, fein beh. (l). Stein ? (nach Boiss. putamine reticulatim insculpto non foraminato carinulato).

P. l. (*Amygd. l.* SPACH, l. c. 120). — Boeksdorn-Mandel. — N.-Syrien bis Kurdistan. — Gebirgshänge bis über 2000 m. — Blz. III–IV. — Frz. VI–VII.

○○ B. im Mittel über 20:5 mm, fast stets kahl, vgl. Fig. 336 m, q.

* B. lineal-lanzettlich, wie m.

22. *P. horrida*: von *lycioides* außer in den meist deutlich größeren kahlen B. vor allem durch die rundlichen Fr. (n) noch abweichend. Bl. sah ich nicht, nach BOISSIER aber Stb. die K. nicht überragend.

P. h. (*Amygd. h.* SPACH, l. c. 121). — Stech-Mandel. — Von S.- bis N.-Persien. — Gebirgshänge bis fast 3000 m. — Eine Form mit besonders schmalen

B führen BOISS. et BUNSE. Aufz. 79. 1860. als var. *Reuteri*. Vielleicht gehören hierher die Bl.-Expl. lg. BORNMÜLLER. No. 3491, wo aber die Stb. die K. überragen.

✱✱ B. breit verkehrt-eilänglich, Fig. 336 q.

23. *P. spinosissima*: Tracht der *Lycioides* o. *horrida*, von beiden durch die relativ breiten abweichend geformten (unten hie und da beh.) B. und etwas ansehnlichere Bl. (vgl. p) verschieden, in den rundlichen Fr. (vgl. die Steine in r) sich an *horrida* anschließend.

P. s. FRANCH., in Ann. Sc. nat. sér. 6. XVI. 281. 1883 (*Amygd. s.* BGE., Pl. Lehm. 283 1848). Dorn-Mandel. N.-O.-Pers., Transkaspien, Turkest. (Karatau). — Gebirgshänge. — Blz. IV. — Frz. VII. — Gewiß kulturfähig!

Subgenus b. *Cerasus* (JUSS. Gen. 340. 1789, als Genus). [Kirsche; Cherry; Cerisier]. — Vgl. oben S. 589, b — d. B. sommergrün, Bl. mit B., weiß oder rosa, meist langgestielt, einzeln o. gebüschelt, doldentraubig o. in deutlich gestielten bis 12-blütigen Trauben, Achse breitglockig, seltener röhrig und dann Bl. zuweilen sitzend, Frkn. und Fr. meist kahl, Stein hartschalig, glatt oder grubig und gefurcht.

A. Bl. und Fr. sitzend, o. wenn deutlich gestielt, so B. mit obs. Sp., B siehe S 606. Bl.-Achse deutlich röhrig. 2 — 3 mal so lang wie K.*), Bl. einzeln, selten zu mehreren gebüschelt.

Sekt. a. *Microcerasus* WEBB. Phyt. Can. II. 19. 1836 50 (erweitert). Stb. 15 — 25, meist — ungleich hoch inseriert, Frkn. beh. o. kahl, Fr. selten und nur an Spitze $\pm$ beh.**).

○ Bl. und Fr. $\pm$ sitzend, Bl.-Stiel kürzer als halbe Bl.-Achse o. kürzer als Fr.

○○ siehe S. 604.

* B. ohne obs. Sp.

✱✱ siehe S. 604.

† B. kahl o. fast ganz kahl, vgl. Fig. 338 b, S. 605, jedenfalls nicht schmal lanzettlich.

24. *P. Jacquemontii*: sparriger, doch schlank abstehend verästelter, bis 3 m hoher b, Zw. kahl, rundlich, gelbbraun; Kn kurz eifg., schwach beh., von Neb.-Basen verdeckt; B. obers. lebhaft grün, unters. heller, bis 3,5:2 cm, Stiel bis 6 mm; Bl. rosa, meist gepaart, K. und Bl.-Achse innen beh., sonst kahl, Fr. eirundlich, etwa 1 cm lang, Stein neben der Naht mit feinen, gegen die Spitze $\pm$ verzweigten Linien, sonst glatt, vgl. Fig. 337 i—k.

P. J. HOOK. F., Fl. Brit. Ind. II. 314. 1878 (*Amygd. humilis* EDGEW., in Trans. Lin. Soc. XX. 44. 1840, non BGE.; *Cerasus Jacq.* BUSER, in BOISS. Fl. or. Suppl. 198. 1888). Afghan., N.-W.-Himal., bis Tibet. — Im Gebirge bis 4000 m. Blz. mit B.-Ausbruch. In Kultur noch seltene Art, die gleich *tomentosa* von den übrigen Zwergkirschen in mancher Hinsicht abweicht, aber doch wohl zunächst am besten hierher gestellt wird.

++ B. beiders. $\pm$ dicht o. wenigstens unters. beh. o. kleiner, bezw. schmal lanzettlich.

— B. ziemlich groß, im Mittel über 3,5:2 cm, vgl. Fig. 338 e. S. 605, Bl.-Achse kurz, kaum länger als K.

25. *P. tomentosa* **): kompakter, dicht sparrig-buschiger, in Kultur kaum über 1,5 m hoher b, in Heimat gelegentlich bis über 3 m; • und ☉ Zw. • dicht

*) Nur bei *P. tomentosa*-Formen ist der K. so lang wie Bl.-Achse.

**) Diese Arten stehen z. T. denen der *Amygdalus* Sekt. *Emplectoladus* sehr nahe und beide Gruppen bedürfen hinsichtlich ihrer Verwandtschaft noch vergleichender Untersuchungen.

***) An diese Art schließt sich nach MAXIMOWICZ, in Bull. Acad. Pétersbg. 1883. 689, dessen *P. stipulacea* aus China (Kansu) an; ich sah hiervon kein Material. Sie

gelbgrau filzig, leicht kantig, später kirschbraun, mit allmählich ablösender Außenrinde, Kn. spitz eitzg., tiefbraun, $\frac{1}{2}$ von den Neb.-Basen gedeckt, Sch. reich zottig gewimpert; B. gedrängt, im Umriß wie Fig. 338 e o. mehr breit elliptisch mit kürzerem aufgesetzten Spitzchen, bis etwa 7:4 cm, ober. trübgrün, -- reichlich beh., unters. grau- o. gelbgrau filzig, Neb. bis doppelt so lang, wie die bis 7 mm messenden Stiele; Bl. kurz vor B., meist einzeln, weiß, Stb. ca. 25, Fr. scharlachrot, an Spitze leicht beh., sonst vgl. Fig. 337 l—o.

Fig. 337. *Prunus* (*Cerasus*): a—d¹ *incana*: a B.-Grund und Neb.; b Bl.; c dgl. im L.-Schn.; d Fr.; d¹ Stein — e—h *prostrata* var. *bifrons*: e Bl. im L.-Schn.; f Fr.; g Stein; h Fr. und S. im L.-Schn. — i—k *Jacquemontii*: i Bl. im L.-Schn.; k Stein — l—o *tomentosa*: l Bl.; m dgl. im L.-Schn.; n Fr.; n¹ Stein; o Neb. — p—r *brachypetala*: p Bl. im L.-Schn.; q Fr. und Stein; r B. -- s—t *microcarpa*: s = p; t Stein — u—v *diffusa*: u = p; v B. — w—x¹ *microcarpa* var. *tortuosa*: w = p; x Fr.; x¹ Stein — y—z *brachypetala* var. *Bornmülleri*: y Bl. im L.-Schn.; z B. (Original).

P. tom. THBG., Fl. jap. 203. 1784 (*Cer. t.* WALL., Cat. No. 715. 1829; *Pr. trichocarpa* BGE., in Mem. Sav. Étr. Pétersbg. II. 96. 1835). Filzige Kirsche. China: Tschili, Schinking, Kansu, Sztschwan; in Japan nur kultiviert; die sehr ähnlichen Formen aus Kaschmir und dem nahen Tibet sah ich nur steril und kann sie in diesem Zustande von *tomentosa* nicht trennen. — Blz. IV—V, Frz. (VI—VII).

Es soll eine rosablutige Form geben, die ich aber noch nicht sah. In O.-As. scheint in der Kultur auch eine gefüllte Form aufzutreten, sowie eine solche mit schmälere B.

soll bis 5 m hoch werden und weicht nach dem Autor im wesentlichen ab durch: rami etiam hornotum glabriusculi, folia glabrata, lanceolata vel oblongolanceolata (4:1,8 o. 4,5:1,5—6,5:2,5 cm) duplicatoserrata, stamina sub 40, drupa glabra, putamen rugosum. — Man vgl. auch das von mir in FEDDE, Repertorium I. 52. 1905. Gesagte.

△△ B. im Mittel kleiner und anders geformt.

B. eilänglich bis länglich lanzettlich o. fast linealisch.
vgl. Fig. 338 a—c, S. 605.

26. *P. incana*: buschig schlank aufrecht verzweigter, bis etwa 1,5 m hoher b. ♂ Zw. d. dicht fein beh., später allmählich kahlend, graubraun, rundlich. Kn. klein, spitz-eifg., v. von Neb.-Basen bedeckt, braun. Sch. gewimpert: B. an spontanen Pflanzen etwa wie Fig. 338 b, an Kulturpflanzen hfg. wie a, bis 6:2,5 cm, sonst vgl. var.: Bl. zu 1—2, selten zu 3—4 gebüschelt), rosa, ansehnlicher als die der folgenden Arten. Bl.-Achsen außen ziemlich kahl, Fr. rot, Stein ziemlich glatt, vgl. Fig. 337 a—d¹.

Von SPACH, in Ann. Sc. nat. ser. 2. XIX. 126. 1843, sind (unter *Cerasus*) mehrere Varietäten beschrieben worden. Der Typ var. a. *vulgaris* zeigt obers. kahle o. fast kahle, unters. weißgraufilzige B. Zu var. b. *angustifolia* zitiert SPACH die Expl. von ATCHER ELOY n. 1849. Sie liegen mir vor und zeigen im Mittel 10:5—6 mm messende B., die auch obers. ziemlich reichlich locker beh. sind. Die var. *latifolia* SPACH scheint mir von a. kaum zu trennen. Bleibe noch var. c. *viridis* SPACH, l. c. Auch hiervon sah ich die von SPACH genannten Exsiccaten HOHENACKERS, wonach es sich um Formen handelt, die in den B. auch unters. bei ganz kahlen, aber kaum mehr als eine *f. viridis* von a. darstellen. Auffällig sind nun aber Expl. aus Armenien (dg. HUER ad Kassuku; und lg. SINTENIS No. 3494, Koesoe). Sie besitzen ganz schmal lineale (Fig. 338 c) von Anfang an so gut wie ganz kahle, hellgrüne B., in den Bl. und Fr. liegen aber keine durchgreifenden Unterschiede vor. Immerhin macht diese Form den Eindruck einer Art. Ich führe sie vorläufig als var. d. *Sintenisi*.

P. inc. STEV. in Mem. soc. nat. Mosc. III. 263. 1812 (*Amygdalus inc.* PALL., Flor. ross. I. 13. t. 7. 1784; *Ceras.* SPACH, l. c. 126). — Graublättrige Zwergkirsche. Von W.-Kl.-As. bis Armenien, Georgien*); die Exemplare des Himalaja, welche HOOKER l., Flor. brit. Ind. II. 313. 1878, mit Unrecht als *Prunus prostrata* führt, gehören teils in den Kreis der *incana*, teils der *P. Griffithii*, bedürften aber noch der Beobachtung. Vorzüglich Gebirge. Blz. V. — Frz. VII. — In Kultur ziemlich hart, doch noch nicht hfg. — Der *P. incana* steht sehr nahe *Ceras hippophaeoides* BORNM., in Östr. Bot. Ztg. 1890. 15 (*Amygdalus hipp.* BORNM., in Mitt. Thür. Bot. Ver. VI. 1894. 66). Die mir vorliegenden Fr.-Expl. (dg. BORNM., No. 3339, O.-Kappadozien in monte Dumiurudschu-dagh inter Siwas et Diwrigi) zeigen B., die denen der ebenfalls aus Kappadozien stammenden *incana* var. *angustifolia* sehr ähnlich, nur fast schmaler (mehr gerollt) und obers. dicht filzig sind. Nach dem Autor soll jedoch *hippophaeoides* von *incana* außerdem noch abweichen durch längere K., die halb so lang wie die Bl.-Achse sind. Da ich auch von var. *angustifolia* keine Bl. sah, kann ich nicht entscheiden, ob beide nicht doch sehr eng zusammenhängen und die letzte vielleicht zu *hippophaeoides* zu ziehen ist. — Immerhin sind alle die angegebenen Trennungsmerkmale mit Vorsicht zu bewerten, denn in den Expl. lg. BALANSA No. 963, bei Césarée in Kappadozien, liegt eine Form mit beiders. fast gleich beh. B. vor, die in der Form denen der typischen *incana* (etwa Fig. 338 b rechts) entsprechen. Jedenfalls ist der Formenkreis der *incana*, wie der aber noch schwieriger zu sichtende der *prostrata*, erst unzulänglich erforscht.

Nur kurz hinweisen kann ich auf *P. Griffithii* (*Ceras. Grif.* BOISS., Flor. or. II. 618. 1872) aus den Gebirgen Afghanistans, deren mir vorliegende, unvollkommene Bl.-Exemplare durch außen filzig beh. kleine Bl. in Form mehr an *prostrata* gemahnende, obers. kahle B. und schlanken Wuchs sich auszeichnen.

26—39 *P. incana pumila*: *P. Maureri* ZABEL, in Gartentf. 1888. 125. Hält ziemlich gut die Mitte zwischen den Stammarten. Von *incana* vor allem durch breitere, schwächer beh. B. (Fig. 338 n) und den C. gleichlange Stb., von *pumila* durch beh. B. und größere, mehr röhrige Bl. leicht zu scheiden. Nach MAURER am S. von *incana* gefallen. In Kultur noch ziemlich selten.

B. kurz eifg. bis eirundlich, selten länglich, dann aber klein, vgl. Fig. 338 k—m.

* BOISSIER gibt auch Songarei an, allein das in seinem Herbar liegende Expl. von dort gehört zu *Amygdalus pedunculata*.

27. *P. prostrata*: vielgestaltiger niedriger sparriger, oft sehr gewunden und knorrig verästelter, bis reichlich 1 m hoher b. Zw. kürzer und eher kahler als bei *incana* (vgl. aber var.), Kn. ebenfalls ähnlich: B. in Zähnung, Beh. und Form sehr variabel, vgl. var.: Bl. meist einzeln, rosenrot, K. und Bl.-Achse von wechselnder Länge und Beh., K. innen meist stark zottig, Fr. hfg. nicht größer wie bei *incana*, sonst vgl. Fig. 337 e—h.

Ich unterscheide: var. **a. *discolor*** RAULIN, L'île de Crète. Botanique. 446. 1869. B. unters. dicht graufilzig, oberseits beh. bis fast kahlend, Form und Größe etwa wie Fig. 338 l—m. — **b. *concolor*** BOISS., Flor. or. II. 648. 1872: B. oben ganz, unten $\pm$ bis fast kahlend, grün, meist klein.

c. *bifrons* (*P. bifrons* FRITSCH, in Sitzb. Acad. Wien 1892. 636. t. III. Fig. 1): B. größer, Fig. 338 k, Zähnung meist feiner und regelmäßiger, unters. dickfilzig, *) Zw. reicher beh., Fr. meist größer (Fig. 337 e—h). Diese Form, deren Orig. im Wiener botan. Garten steht, soll aus dem Himalaja stammen. Ich sah von dort nur ein einziges Expl. lg. DUTHIE, Kaschmir, Sindvalley, No. 11432, das vielleicht mit ihr identifiziert werden könnte. Im übrigen glaube ich nicht, daß man *bifrons* als Art abtrennen kann, denn die sehr variable *prostrata* kommt ihr in manchen Formen sehr nahe (vgl. z. B. Expl. von KOTSCHY, No. 536, SO.-Kl.-As., in montibus Müküs). Vom gärtnerischen Standpunkt kann man aber die *bifrons*-Form schon als Art führen.

P. p. LABILL., Dec. Syr. I. t. 6. 1791 (*Ceras. prost.* LOIS., in DUH., Traité ed. nov. V. t. 33. Fig. 2. 1812 et SPACH 1843). — Niedergestreckte Zwergkirsche.

I. G. nur Dalmatien; sonst von S.-Span., Sardin., Griechenl. (Epirus, Thessalia, Ätolia), Kreta, N.-Afr. (Algier), Kl.-As. östlich wohl kaum über N.-Pers. und Syrien, oder bis Kaschmir? (vgl. oben). Gebirge, steinige Hänge, bis 3000 m. Blz. V. — Frz. VII. — In Kultur noch selten. Die schönere *bifrons* ist erst in letzter Zeit von Wien aus weiter verbreitet worden.

* * B. mit obs. Sp., unregelmäßig eingeschnitten bis etwas lappig gezähnt (Fig. 337 r).

28. *P. brachypetala*: kleiner, niedergestreckter, sehr dicht gewunden knotig-sparrig verästelter b, (•) und (••) Zw. } feinfilzig-zottig, gelbgrau, sonst von *prostrata* im wesentlichen noch verschieden durch: B. im Mittel kleiner, mehr zottig-filzig, auch oberseits, z. T. beiders. + kahlend; Bl. zu 1—2, mehr glockig-röhrig, reicher beh., Fr. + beh., Stein mit feinen Langsriefen, sonst glatt, vgl. Fig. 337 p—q.

P. b. WALP., Ann. I. 272. 1848/49 (*Ceras. b.* BOISS., Diagn. ser. I. VI. 52. 1845; *C. incisa* BOISS., Flor. or. II. 648. 1872, non *Prunus incisa* THBG.; *C. Boissieri* HAUSSKN. in Herb. [ob publiziert?]) Knorrige Zwergkirsche. — S.-Persien, nach FRANCHET auch Turkestan (Karakyz). — Blz. V—VI. — Frz. VIII. Noch nicht in Kultur, denn ob die *Prunus Boissieri* in den Gärten hierher gehört, ist mir sehr fraglich.

Die von BORNMÜLLER No. 1036, Kurdistan (Sakri-Sakrau) gesammelten und als *Cer. Boissieri* HAUSSKN. ausgegebenen Expl. weichen vor allem durch deutlich lang-röhrige größere Bl. (Fig. 337 y) ab, zeigen auch im Mittel etwas regelmäßiger gezähnte B. (z). Ich halte sie vorläufig als var. *Bornmülleri* fest. Fr. ?.

○ ○ Bl. und Fr. gestielt, Stiele deutlich länger als halbe Bl.-Achse, B. mit obs. Sp.

29. *P. microcarpa* *): vielgestaltiger, etwa 1—3 m hoher, bald mehr schlank aufrecht, bald mehr kurz sparrig ausgebreitet verzweigter b, junge Zw. meist •, fein beh., (•) hfg. kahlend, • braunrot, rundlich, dgl. (••), mit oft ∞ hellen Lent.

*) Unbekannt ist mir *P. verrucosa* FRANCH., in Ann. Sc. nat. ser. 6. XVI. 280. 1883, aus Turkestan, entre Ansab et Varsaout, die dieser Art sehr nahe stehen soll, aber abweicht: pedunculis brevibus (3—5 mm), putamine verrucoso nec levi. Vielleicht gehören hierher Bl.-Expl. lg. AITCHISON, No. 134 et 143 NW.-Afghan. (Turkmenen) (Badchis, 1000 m. B. ganz kahl, ohne obs. Sp., Bl. zu 1—3 aus Kn., • gebuschelt, teils Stiel und Bl.-Achse am Grunde fein beh., teils ganz kahl. — In letzter Stunde sah ich noch das Original von *P. calycosus* AITCH. et HEMSLE. (Herbarname ?), No. 1059, aus Badchis mit unreifen Fr. Ich halte diese Art für synonym mit *verrucosa*.

später grau werdend; B. im Mittel eilänglich bis elliptisch, variabel, vgl. var.; Bl. kurz vor o. mit B., meist zu mehreren gebüschelt, hellrosa?, in Beh., Länge der Bl.-Achse, Form und Länge der K., Länge der Stiele sehr varierend, vgl. Fig. 337 s¹ t und w—x¹, sowie var.

Auf Grund des reichen mir vorliegenden Materiales, sehe ich mich außerstande, die folgenden Varietäten (obgleich anscheinend geographisch gut geschieden) als getrennte Arten zu behandeln. Von var. a. *typica* sah ich ein Original (C. A. MEYERS, mons Beschbarmak, Transcaucasiae ad Caspium), mit dem nur noch die Expl. lg. KOTSCHY, No. 201 (Elbrusgebirge) und lg. BUNGE (N.-Persien, prov. Astrabad pr. Siaret) und lg. RADDE (Dagestan, N.-Kauk.) gut übereinstimmen. Danach wäre unter *microcarpa* s. str. eine nordpersisch-kaukasische (kaspische) Form von, wie es scheint, mehr schlank aufrechtem Wuchse, kahlen B. und Fr.

Fig. 338. *Prunus* (*Cerasus*): B.-Formen von: a—c *montana* (vgl. Text S. 603). — d *Jacquemontii* — e *tomentosa* — f *microcarpa* — g — h *macrocarpa* var. *tortuosa* — i *diffusa* — k *prostrata* var. *bifrons* — l — m *prostrata* — n *Munziana*. (Alles nat. Gr.) (Original).

mit ziemlich schmallänglich-ovalen Steinen (Fig. 337 t) zu verstehen. MEYERS Blzw. ist z. T. fein beh., Bl. zieml. kurz gestielt, Frzw. kahl, Steine liegen getrennt bei, ähnlich BUNGES Expl. Viel besser sind die KOTSCHYSCHEN Expl., leider nur in Bl. Diese länger gestielt, sonst wie s (bei MEYER K. mehr wie s¹ und Bl.-Achse kürzer).

Wenn man nun aber die Formen, die ich hier als var. b. *tortuosa* (*C. tortuosa* BOISS. et HAUSSKN., Fl. or. II, 647, 1872) zusammenfasse, eingehend vergleicht, so bleibt schließlich (nach dem vorliegenden Material) nur die nie fehlende Beh. der B. als durchgreifender Unterschied. Die Autoren sagen, a. *C. microcarpa* specific distincta videtur ramis brevioribus divaricatis tortuosis, foliis pubescentibus brevius petiolatis angustioribus limbo 3—5 lineas tantum longo; frutex intricatus quadripedalis. Das trifft aber alles nur für wenige Formen zu, wogegen die Expl. lg. KOTSCHY, No. 70 (Antilibanus), die BOISSIER zu *microcarpa* zieht, in Beh. der B. etc. *tortuosa* gleichen, ebenso betont BORNMÜLLER (vgl. Öster. Bot. Ztg. 1899.

16), daß seine Expl. von *microcarpa*, No. 1030, aus Kurdistan sehr auf *tortuosa* weisen, ebenso No. 1301, die er ebenfalls *f. pubescens* der *microcarpa* nennt. Alles in allem scheint es mir, daß die beh. Formen unter sich sehr nahe zusammenhängen und auch in der geogr. Verbreitung (Antilibanon, Kappadoz., Kurdistan) sich von der *typica* scheiden. Vielleicht ist ihr Wuchs durchweg mehr sparrig buschig und lassen sich noch andere konstante Unterschiede finden, wenn erst von der *typica* mehr Material vorliegt. Die B. der *tortuosa* variieren, wie Fig. 338g-h zeigt, die Bl. und Fr. sind in 337w-x¹, S. 602 dargestellt, die Fr.-Stiele sind bald etwas kürzer, bald fast doppelt so lang wie Fr., ebenso variieren die B.-Stiele.

P. micr. C. A. MEY., Enum. Casp. 167. 1831; *Ceras. orientalis* SPACH, in Ann. sc. nat. ser. XIX. 128. 1843. ex parte; C. m. BOISS. Fl. or. II. 646. 1872. Kleinfrüchtige Kirsche. — Heimat wie oben. — Blz. IV. — Frz. VI. — Scheint noch nicht in Kultur, aber einführens-wert.

An *microcarpa* schließt sich ferner an, die, wie es scheint, eine gute Art darstellende und ganz kahle *P. diffusa* (Cras. dif. BOISS. et HAUSSKN., l. c. 647; *Prunus orientalis* SPACH, l. c. ex parte) aus SW.-Persien (Prov. Faristan). Zu ihr gehören außer KORSCHY No. 167 et 232, ATCHER-ELOY No. 4473, HAUSSKN. (Persepolis), auch HAUSSKN. 1868 [Kuh-Giluje und Kuh-Sawers (?), die BOISSIER zu *microcarpa* stellt, welche aber in diesem Gebiet fehlen dürfte. Ob auch STRAUSS. 1892 (Sultanabad) hierher gehört, ist mir noch fraglich, mein Exemplar zu unentwickelt. *C. diffusa* gleicht im Wuchs *tortuosa*, ist ausgezeichnet durch rundlich-eifg., zieml. langgestielte B. (Fig. 337v, 338i), Bl. wie 337u, Fr. wie *tortuosa*, Stiel bis fast 2mal Fr. Nach einem Expl. lg. STAPP, Kuh Tscharmekam b. Khane Zaenian 1885 scheint es allerdings, daß bei *tortuosa* sehr ähnliche B.-Formen auftreten. Vielleicht *diffusa*, also auch nur Varietät der *microcarpa*.

B. Bl. und Fr. deutlich gestielt, Bl. einzeln, gebüschelt o. - traubig, wenn Einzelblüten mit röhriger Bl.-Achse, dann B. ohne obs. Sp.

II. siehe S. 611. I. Bl.-Achse deutlich röhrig (nur bei gefüllten Bl. mehr glockig).

Sekt. b. *Pseudocerasus* KOEHNE, Dendrol. 305. 1893, erweitert. Blüten meist in wenigblütigen Trauben o. Doldentrauben. K. meist aufrecht o. abstehend, vgl. sonst die einzelnen Arten.

○ B. vgl. Fig. 340f. Textur zuletzt fast lederig. Serratur ziemlich kurz und gleichmäßig, Bl. wie Fig. 339a, Stein grubig gefurcht (c).

30. *P. cerasoides* (*P. puddum*). großer B. nach BEAN *) in Kew ca. 7 m. Tracht ähnlich *serrulata* oder *cerasus*, doch untere Zw. hängend, Zw. meist auch jung ganz kahl, - kirschbraun, mit ∞ feinen Lent., die an den grauen Zw. deutlicher als gelbliche Höckerchen vortreten; B. kahl, oben sattgrün, unten heller, 6; 2,2-9; 4 cm, Stiel mit 2 deutl. großen Drüsen am B.-Grund, bis 1,5 cm; Bl. rosa, in meist 3-blütigen, und - sitzenden, seltener bis 1 cm gestielten Doldentrauben. Trgb. mäßig groß, verkehrt eifg. o. länglich, spitz, reich gezahnt, - bleibend, Fr.-Stiel etwa 1,5-2 cm, alles kahl, Fr. ziemlich groß, länglich, vgl. Fig. 339a-c.

Exemplare WALLICHs aus Nepal weichen ab durch größere, bis 13,5 cm messende, mehr häutige beiders. auf Nerven verstr. beh. B. und etwas kleinere Fr. Vielleicht liegt eine gute Varietät vor***).

P. cer. DON, Prodr. 239. 1825 (*Ceras. phoshia* HAMILT., ex DON, l. c. [nomen]; *C. puddum* WALL., Cat. 714. 1826, *P. puddum* ROXB., apud WALL., Pl. As. rar.

*) Unklar bleiben mir z. Zt. 2 unter sich in den Bl. etwas verschiedene Expl. aus N.-Syrien (lg. POSE, No. 360 und 54), die nur in blühenden Zw. mit kaum entwickelten Blüten vorliegen, im Wuchs auf eine große Art hindeuten, aber den Bl. nach der *microcarpa* bzw. *tortuosa* am nächsten stehen.

**) Vgl. Gard. Chron. 1901. II. 310.

***). Über *P. puddum* var. *tibetica* BAT., in Act. Hort. Petrop. XIV. 168. 1895, aus O.-Tibet mit weißen Bl. vgl. meine in Ann. S. 602 zitierte Arbeit. Eine recht eigenartige schmalblättrige (B. 6-10; 2-2,5 cm) Form mit 14-18 Nervenpaaren, die den Fr. nach *cerasoides* sehr nahe steht, scheint *P. serrula* FRANCH., Pl. Delav. 196. 1889, aus Yunnan zu sein, von der ich noch kein Material sah. In die *cerasoides*-o. *rufa*-Gruppe scheint auch *P. Hosseusi* DIELS (in Herb.) aus Siam (Chieng-Mai, lg. HOSSEUS No. 260) zu gehören, mit breitglockigen hellrosa Bl., kurzem stumpfem K. und kahlem Gr. Ganze Pflze. kahl. B. lang gespitzt, ca. 14nervig, feinzahlig (noch jung).

II. 37. t. 143. 1831). — Himalaja-Kirsche. — Nepal bis Sikkim, Burma und West-China. — Im Gebirge 1—3000 m. — Bei uns noch nicht in Kultur. Blz. vor *pseudocerasus* und *serrulata*. Soll sehr schön sein.

Von der ihr nahe stehenden *P. campanulata* MAX., in Bull. Ac. Pétersbg. XXIX. 103. 1884. aus China (Fokien), die in Japan in Kultur sein und sich durch rote glockige Bl. auszeichnen soll, sah ich nur spärliche Blzw. (vgl. Fig. 339d—d'). Der Autor gibt für die B. an: 9:4,8 cm, beiders. ca. 8-nervig, Stiel 7—8 mm. Über die Steine konnte ich nichts erfahren. Ich glaube jetzt, daß es sich wohl nur um eine japanische Kulturform der *cerasoides* handelt.

CC B. mehr häutig, mehr oval und anders gezähnt o. unters. nebst Bl. deutlich beh., jedenfalls Stein nie tiefgrubig, Fr. kleiner.

* B.-Unters. $\pm$ beh. bleibend*).

✱✱ siehe S. 611.

+ B. auffällig grob doppelt eingeschnitten gezähnt, vgl. Fig. 340m—o.

Blst. meist einblütig, Bl. klein (Fig. 339 g), kahl, B. klein (Fig. 340 o), kaum über 5 cm lang.

Fig. 339. *Prunus* (*Cerasus*): a—c *cerasoides* (*puddum*): a Bl. im L.-Schn. und K.; a¹ C.; b Fr.; c Stein — d—d¹ *campanulata*: wie a—a¹. — e—f¹ *apetala*: e Bl. im L.-Schn.; e¹ C.; f Fr.; f¹ Stein. — g—g¹ *incisa*: wie a—a¹. — h—k *Herincquiana* (*pendula*): wie e—f¹. — l—m *Miqueliana*: l Bl. im L.-Schn.; l¹ C. (Kulturform); m (Original). — n—n¹ *rufa*: wie l—l¹. — o—o¹ *pseudocerasus*: wie l—l¹. — p—r *serrulata*: p Bl. im L.-Schn.; p¹ C.; q Fr.; r Stein. (i nach LAVALLÉE; l—l¹ nach KOEHNE, sonst Original).

31. *P. incisa*: b bis kleiner B., reich kurzästig, Zw. kahl, kirschbraun o. grau; B. oben eher etwas reicher beh., unten meist nur auf Nerven verstr., bis 1,5:2,7 cm; Stiele beh., dünn, bis 8—10 mm; Bl. mit B., Pedunculus 2—7 mm, unter Trgb. htg. beh., Bl.-Stiele kahl o. spärlich beh., 5—20 mm lang, Trgb. klein,

32. Wenn B. unters. mit ∞ Drüsenpunkten vgl. *Prunus glandulifolia* RUPR. et MAX., in Bull. Ac. Petersbg. XV. 130. 1857, exkl. Spec. fructif. Ich sah von dieser an *Laurocerasus Muck*, einnervigen Amurpflanze nur ein Bl.-Expl. mit einer ca. 7 mm lang gestielten Bl. Diese sollen zu 1—2 stehen und erscheinen kurz nach B.-Ausbruch. Fr. anscheinend ganz unbekannt, wie denn auch die systematische Stellung mir noch unklar.

breit verkehrt-eifg. eingeschnitten gezähnt, Bl. wie Fig. 339 g, Fr. ca. 6.5 mm, Stein vgl. *apetala*.

P. incisa THBG., Fl. jap. 202. 1784 (*Ceras. i.* LOIS., in Nouv. Duh. V. 33. 1812). Eingeschnitten gezähnte Kirsche. — S. et M.-Jap. — Noch nicht in Kultur, wie es scheint. — Vgl. MATSUMURA, in Tok. bot. Mag. 1901. 100. Dieser beschreibt hier S. 99 eine *P. nipponica*, wozu ein mir vorliegendes Expl. aus Jap. lg. FAURIE No. 2708 (Sommet de Chokkaisan) zu gehören scheint. Sie weicht ab durch länger gestielte (1.4–2.5 cm) Bl., größere bis 9:5 cm messende meist kahle B. und bildet hohe $\bar{h}$. Das FAURIESche Expl. hat allerdings die K. — „ $\frac{1}{3}$ so lang wie Bl.-Achse, während MATSUMURA sie als viel kürzer angibt. Die *nipponica* wurde von FAURIE im Juli mit Bl. gesammelt. Es scheint, daß beide Arten (o. Varietäten?) spät blühen.

FRANCHET beschreibt, Plant. Delav. 196. 1888, eine *P. caudatus* aus Yunnan, die zu *incisa* und *apetala* nahe Beziehungen haben soll. Der K. (inkl. Bl.-Achse) soll beiders. beh. sein, aber der Gr. kahl. FRANCHET hat wohl nur geringe Bl.-Expl. gesehen. Jedenfalls ist mir die Art noch unklar. Ich konnte sie mit keiner der von mir in der S. 602 Anmerk. zitierten Arbeit neu beschriebenen chinesischen Formen in Einklang bringen.

— Blst. meist 2–3-blütig. Bl. größer (Fig. 339 e), beh., B. im Mittel über 5 cm lang (Fig. 340 m).

32. *P. apetala*: $\bar{h}$, Höhe?, Zw. sehr bald kahlend o. auch $\odot$ fein beh. und erst $\odot$ kahl, kirschbraun, später grau, Kn. länglich-eifg., 3–4:1–1.5 mm, kahl; B. durch Form und Serratur sehr auffällig, zuletzt oft stark kahlend, oben tiefgrün, unten heller, bis 9.5 cm, Stiele 7–15 mm; Bl. wie Fig. 339 e–e', Fr. und Stein wie f–f', vgl. var.

Die vorliegenden Expl. von MAXIMOWICZ zeigen bald kahle Zw., und B., deren Stiele ganz und Flächen fast kahlen. Ich fasse sie als var. *typica* im Gegensatz zu var. *iwozana* (lg. FAURIE No. 5451, Jap. [Iwozan], 28. VI. mit halbreifen Fr., und No. 4181, Mont. de Shiobara, steril), deren B.-Stiele dick filzig-zottig, B. beiders. $\pm$ reichlich beh., dgl. $\odot$ Zw. — FAURIES No. 874, Sommet de Hakkoda, 8. VIII. mit reifen Fr., scheint eine Art Übergangsform zu sein.

Pr. apet. FR. et SAV., Enum. pl. II. 329. 1879 (*Cerasaidos apet.* S. et Z., in Abh. Akad. München III. 743. t. 5. 1843; *Pr. cerasaidos* MAX., in Bull. Ac. Pétersbg. XXIX. 103. 1884). — Japan (Hondo und oben zit. Orte). Blz. V. — Frz. VIII.

Ob echt in Kultur? Was ich sah und was ZABEL, in Mitt. d. D. D. G. 1904. 60. als *apetala* beschrieben, ist *P. Maximowiczii*!, die mithin auch gelegentlich „*apetal*“ auftritt.

++ B.-Zählung weniger auffällig doppelt bis einfach, vgl. Fig. 340 a–b, k.

— B.-Zähne nicht grannenspitzig (vgl. aber auch *C. pseudo-cerasus*).

= B. mit jederseits ca. 12–14 sehr eng parallelen Nerven, vgl. Fig. 340 a, Stb. deutlich länger als K.

33 *P. Herincquiana* (*P. pendula*): kleiner, 2–4 m hoher $\bar{h}$ mit hängenden Zw., diese ziemlich dünn, schlank, jung $\pm$ beh., bräunlich, später kahl, grau; B. ober. tiefgrün, fast o. ganz kahlend, unter. graugrün, verstr. beh., 4.2–11:4 cm, Stiel bis 2 cm; Bl. kurz vor B. in sitzenden 2–4-blütigen beh. Doldentrauben. Bl.-Achse und K. beh., C. fast stets ausgerandet, weißlich o. fleischfarben, vgl. Fig. 339 h–k, Stiele zur Frz. bis 2.5 cm, Fr. und Stein wie i–k.

Von Formen zu erwähnen var. *ascendens* MAKINO ex BAILEY, Cycl. Am. Hort. 1452. 1901, aufsteigend verzweigt. Hiermit scheint *P. subhirtella* Hook., in Bot. Mag. t. 7508. 1890, identisch. — Ob man eine Form mit besonders langen B., wie sie LAVALLEE abbildet und wie sie MAXIM. im Herbar als *P. oblongifolia* ausgegeben, von einer solchen mit kürzeren trennen kann, ist mir fraglich. Auf das Fehlen der Beh. des Gr., wie es LAVALLEE angibt, vermag ich kein Gewicht zu legen.

P. H. LAVALLEE, Arb. Segr. 117. t. 35. 1885 (*Cer. pendula* SIEB., Syn. pl. occ. n. 368. 1827 teste MAXIM.), *P. subhirtella* MIQ., in Ann. Mus. Lugd. Bat. II. 91. 1865 66 ex parte; *P. pendula* MAXIM., in Bull. Acad. Pétersbg. XXIX. 1884. 98, non DESF., 1815!; *P. pendula* HORT. ex parte). Hängekirsche. — Blz. IV–V. — Frz. VIII. — Vgl. das unter *Miqueliana* Gesagte.

△△ siehe
S. 610.

Durchlaufende B.-Nerven weniger ∞ , höchstens bis 10(—11) [Fig. 340b, k], Stb. kaum so lang o. kaum länger als K.

34. *P. Miqueliana*: von voriger Art noch abweichend durch: Zw. locker borstig beh., B. unters. reicher und rauher beh., 4,5 : 2—3 bis 7,5 : 3—3,5 cm, — gröber doppelt gesägt, Stiel 5—12 mm; Bl. weiß (ob immer?), Beh. meist lockerer, vgl. Fig. 339l—l', so wie m, Fr. mir unbekannt.

P. M. MAXIM., in Bull. Acad. Pétersbg. XXIX 98. 1884 (*P. subhirtella* MIQ., in Ann. Mus. Lugd. Bat. II. 91. 1865 66 ex parte; *P. pendula* KOEHNE, DIPPEL etc., non MAXIM!). Heimat wohl Japan, ob auch China? MAXIMOWICZ gibt für seine *pendula* ausdrücklich 12—15 Nervenpaare an. Seine Originale stimmen sehr gut mit LAVALLÉES *Hermiquiana*-Tafel. Was nun aber in den Gärten als *pendula* geht und z. B. von KOEHNE, Herb. Dendr. No. 147, ausgegeben worden ist, weicht (wenige Expl. z. B. im Hort. Bot. Darmstadt ausgenommen) gut ab und scheint mir vorerst nicht anders als *Miqueliana* zu deuten. Ich sah keine Originale mit B.; ein japan. Expl., lg. FAURIE, No. 1273 (Hirosaki) scheint sehr nahe zu stehen, hat aber ebenfalls keine B., ist stärker beh. und die Stb. sind deutl. länger als die K.

Ferner sind im Anschluß hieran noch folgende Arten kurz zu besprechen: Zunächst *P. pauciflora* BGE., in Mem. Sav. Etr. Petersbg. II. 97. 1835. Originale sah ich nicht. Doch scheint mir, nach MAXIMOWICZ' Angaben zu urteilen, ein steriles Expl. aus der S.-Mandschurei (Ninguta) damit identisch, dessen sehr kurz gestielte, am Grunde breit gerundete o. leicht herzförmige B. Fig. 340p zeigt. Der Stein soll scharf netzig gefurcht sein. Einführung erwünscht. Ob das was MATSUMURA, in Tok. Bot. Mag. 1900. 136. aus Shangtung als *pauciflora* beschreibt, wirklich diese ist, ist mir unklar, da wie ich in meiner in Anmkg. unten zitierten Arbeit hervorhebe, die chinesischen *Prunus* sehr formenreich und noch längst nicht genügend bekannt sind.

Charakteristische B. hat auch *P. rufa* HOOK. F., Fl. Brit. Ind. II. 314. 1878 (*C. rufa* WALL., Cat. No. 721. 1829) aus Nepal und Sikkim*) (Fig. 340h), die bes. durch die rostfarbene + filzige Beh. der jungen (und z. T. ♂) Zw. und der B.-Unters. (Rippe) auffällt. Bl. rosa, ihre Stiele kahl, bis 2,5 cm zur Frz., Achse kahl, Gr. beh. (Fig. 339n—n'). Es scheint aber eine Form mit reich rostig beh. Blst. und Bl. vorzukommen. Nach HOOKER: Fruit red, fleshy, stone rugged.

An *Prunus setulosa* BATAL., in Act. Hort. Petrop. XII. 165. 1892, aus O.-Kansu, erinnern, soweit die Beschreibung urteilen läßt, Expl. lg. HENRY No. 5308, Zentral-China. Indes sollen bei *setulosa* die B. nur 3,5—4,5 : 2,1—2,3 cm messen, die Bl.-Stiele nur 8 mm (dabei aber Pedunculus 10 mm), die Trgb. sollen zur Frz. bis 2,4 : 1,3 cm groß sein, Bl.-Achse außen und die nur ¹/₂ so langen K. beiders. feinborstig, Gr. dgl., Stein glatt, 7—4—5 mm. Die HENRYschen Fr.-Expl. haben B. wie Fig. 340i, 5 : 2,2—8 : 4 cm, oben spärlich, unten auf Nerven u. Fläche verstreut beh., Frst. 3—5-blütig, Trgb. abgefallen, Pedunculus bis 10 mm, Fr.-Stiele verstreut beh., 18—25 mm, halbreite Fr. ca. 9 : 4—5 mm, Stein wohl glatt (Fr. z. T. durch Insekten deformiert, wie es ja bei vielen Arten vorkommt), junge Zw. dünn, braun, locker feinborstig, ältere glatt, kahl, kirschbraun.

Eine auffällige Form ist *Pr. hirtipes* HEMSLEY, in Jour. Lin. Soc. XXIII. 218. 1887, aus Kiangsi (Kiukiang), deren Typ kahle Zw., 4—6-bl. Blst. und kahle Gr. haben soll. Ich sah nur ein Expl. lg. FABER, Ningpo, das durch nur 1—3-bl. Blst., locker zottige Zw. und beh. Gr. abweicht. B. noch ganz jung, unters. dicht, ober. locker beh., Zähnung fein mit Drüsen Spitze, Bl.-Achse langröhrig, ca. 5 mm, gleich den bis 15 mm langen Stielen und den zurückgeschlagenen, ca. 3—4 mm langen, innen kahlen, fast ganzrandigen K. dicht zottenborstig beh., Stb. ca. 25—30, C. länglich, 10—12 mm, tief ausgerandet o. eingeschnitten. Ohne B. und Fr. nicht sicher zu bewerten. HEMSLEY sah ebenfalls nur Blzw.

Als weitere verwandte, aber noch nicht genügend klargestellte Arten sind zu nennen: *P. litigiosa* C. K. SCHN., in FEDDE Repert. I. 1905. 65, aus Hupei (HENRY, No. 5295) und *P. Giralduana* C. K. SCHN., l. c., aus N.-Schenst (lg. GIRALDI, No. 3789). Ferner *P. yunnanensis* FRANCH., Pl. Delav. 195. 1886, aus Yunnan und die eben daher stammende var. *Henryi* C. K. SCHN., l. c. 66 (HENRY, No. 10629 und 10629 B), vgl. Fig. 343w—y, S. 619. Alle diese interessanten

*) *P. rufa* ähnliche Formen treten auch in China (Szechwan) auf. Vgl. *P. rufoides* C. K. SCHN., in FEDDE Repert. I. 55. 1905, und die var. *glabrifolia*, l. c. *P. rufoides* ist doch vielleicht nur Varietät von *rufa*.

chinesischen Formen sollten ein geführt werden. Erst wenn reichliches gutes Material vorliegt, kann man sie sicher einordnen. Viele Formen verwischen, wie ich, l. c. betont habe, die Grenzen zwischen der *Pseudocerasus*- und *Mahaleb*-Sektion.

△ B.-Zähne deutlich grannenspitzig (bes. an jungen B. auffällig) [vgl. Fig. 340 c].

35. *P. pseudocerasus*: aufrecht verästelter h h , bis etwa 6 m: Zw. derb, kahl, meist grau o. gelbgrau, mit großen hellbräunlichen Lent. Kn. denen von *cerasus* sehr ähnlich: B. meist zuletzt ziemlich derb.

Fig. 340 *Prunus* (*Cerasus*): B.-Formen von: a *Hermquiana* (*pendula*) — b *Miqueliana* (Kulturf. aus Deutschland) — c *pseudocerasus* — d—e *serrulata* — f *cerasoides* (*puddum*) — g *avium* — h *cerasus* — i *setulosa* (?) — k *Miqueliana* (Kulturform aus Amerika) — l *rufa* — m *n* *apetala* (n fraglich, vielleicht *inca* Lgtr.) — o *incisa* — p *pauciflora*? (Alles $\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

oben tiefgrün, + kahlend, unters. hellgrau, + weich beh., bis etwa 9:5 cm, Stiele bis 18 mm, Herbstfärbung schön violett o. braunrot: Bl. in gestielten 2–4-blütigen Doldentrauben, deren Trgb. im unteren Teil hfg. laubartig, + rundlich-fächerfg., Stiele bis etwa 3 cm, + locker beh., Bl. weiß o. rosa, meist gefüllt, vgl. Fig. 339 o—o¹, S. 607, Fr. mir unbekannt.

Auf die Kulturformen kann ich nicht eingehen. Sie bedürfen bei dieser, wie bei *serrulata* noch der vergleichenden Untersuchung. Vgl. z. B. KOEHNE, in Gartenfl. 1902, 2. und t. 1491. Außer den hier besprochenen f. *Watereri* gehört

zum Formenkreis der *pseudocerasus* noch: *Ceras. Sieboldi* CARR., in Rev. Hort. 1866. 371. c. tab. col.; ob auch *C. Lannesiana* CARR., l. c. 1872. 198 und *capronica fl. ros. pl. v.* HTE., in Flor. d. Ser. XXI. t. 2238/9 1875, non DC., ist mir fraglich, da über die Beh. der B. etc. nichts gesagt wird.

P. pseudoc. LDL., in Trans. Hort. Soc. VI. 90. 1826 [et MAXIM. ex p.] (*P. paniculata* KER., in Bot. Reg. t. 800. 1829). — Vgl. im übrigen unter *serrulata*.

✱✱ B. nur ganz jung beh. o. von Anfang an kahl. — grannen-zählig, vgl. Fig. 340d—e.

36. *P. serrulata*: habituell dem vorigen ähnlicher, aber mehr wagrecht abstehend verästelter, wohl kleiner bleibender ♀, Zw. kahl, B. weniger bronzefarben o. grün austreibend, dünner, glänzender, bis 16:6 cm, Serratur oft mehr gleichmäßig, Stiele meist etwas länger, dünner; Blst. kahl, meist schlanker, dgl. Bl.-Stiele, ebenso Bl.-Achse, K. und Gr. kahl, vgl. Fig. 339p—p¹, S. 607. Bl. der besten Sorten bis über 6 cm Dm., weiß, rosa o. tiefer rot o. fleischfarben getönt, Fr. vgl. q—r.

Diese die *pseudocerasus* an Reichtum der Kulturformen wohl übertreffende Art geht fast stets als *pseudocerasus**) (in Herbarien auch als *puddum*), da MAXIMOWICZ nur diese Art 1884 beschrieb. Die *serrulata* LDL.'s wußte er nicht zu deuten. Da aber *pseudocerasus* LDL. im oben präzisierten Sinne zu nehmen ist, so sind die kahlen Formen unter *serrulata* zu führen. Der spontane Typ ist kaum in Kultur, meist eine fast einfachblühende weiße Form mit rot abgetönten C., ferner weiß gefüllte (*f. albo-plena* [*serrulata fl. pl.* HORT.], rosa farbene (*f. hisakura*, vgl. Gartenfl. 1902. t. 1494. Fig. a) etc.

P. s. LDL., in Trans. Hort. Soc. VII. 238. 1830 (*Ceras. serratifolia* LDL., apud CARR., in Rev. Hort. 1877. 389. c. tab. col.; *P. pseudocerasus* MAXIM. et AUCT. PLUR. ex parte). — Jap., Sachalin, N.-China, wie weit dort nach Osten ist noch fraglich, in Zentral-China wohl ganz fehlend. — Blz. IV—V, meist etwas später als die Formen der *pseudocerasus*. — Frz. Sommer. — In Japan und China seit langem in Kultur. Die Japaner feiern die Tage der Kirschenblüte. — Es wäre sehr erwünscht, daß japanische Botaniker den Formenkreis von *serrulata* und *pseudocerasus* einmal genau untersuchten und den genetischen Zusammenhang zwischen den Kulturformen und den spontanen Typen feststellten. MATSUMURA beschreibt, in Tok. Bot. Mag. 1901. 100, eine *P. yedoensis* und sagt: a *pseudoceraso* (= *serrulata*;) floribus praecocibus, stylo piloso, petiolis pedicellisque plus minus pubescentibus differt. Da er noch angibt folia . . . adulta utrinque glabra, so kann er *pseudocerasus* in unserem Sinne nicht meinen, und da es sich bei ihm auch um eine Kulturform handelt, so ist über die spontanen Formen, von denen *pseudocerasus* herzuleiten, nichts angedeutet. Und diese Formen sind noch nicht gefunden. Von den Formenkreisen der *Hemiquiana* bez. *Miqueliana* scheiden sich die Formen der *pseudocerasus*- und *serrulata*-Gruppe auch noch durch die den Bl.-Achsen — gleich langen K. Auch MATSUMURA l. c. noch beschriebene *pseudocerasus* var. *parvifolia* scheint eine *serrulata*-Form zu sein, die durch ihre in den Herbst (X) fallende Blz. ausgezeichnet ist.

II. Bl.-Achse ± deutlich breitglockig.

a. Bl. einzeln o. gebüschelt o. in sehr verkürzten Doldentrauben. b siehe S. 617.

Sekt. c. *Eucerasus* KOEHNE, Dendrol. 306. 1893, erweitert**).

○ B. im Mittel nicht über 6—10(—12 mm lang gestielt, relativ klein o. wenigstens schmal (Fig. 342a—f, S. 615). ○○ siehe S. 614.

✱ B. kaum über 6—7 mm lang gestielt, vgl. Fig. 342a—b. Bl. meist rosa

+ B. kaum über 6:2 cm (a), meist auch — Zw. sehr fein beh., Fr. etwa 15 mm Dm.

*) Vgl. z. B. Abb. bei LAVALLÉE, Arb. Segr. t. 36. 1885; in Gard. a. For. 1897. Fig. 58; in Bot. Mag. 1905. t. 8012. Überall sind *serrulata*-, nicht *pseudocerasus*-Formen dargestellt.

** KOEHNE'S Sekt. *Spiracopsis* akzeptiere ich vorläufig nicht. Sie ist bei ihm ohne dies nicht einheitlich und eine genauere Kenntnis der *Cerasus*-Gruppe dürfte schließlich zu wesentlich anderen Sektionseinteilungen führen.

37. *P. humilis*: niedriger, aufrechter, 0,3–0,6 m hoher b, ☉ Zw. fein und schlank, hellbräunlich, ☉ grau, Kn. sehr klein; B. oberse. tief grün, + kurz beh. o. kahlend, unterm. heller, meist nur auf Nerven verstr. beh., Stiel fein beh.; Bl. zu 1–3, vgl. Fig. 341 a, die beh. Stiele zur Frz. bis 15 mm, Fr. und Stein wie b–c.

P. h. BGE., in Mém. Sav. Etr. Petersbg. II. 97. 1835 (*P. Bungei* WALP., Rep. II. 9. 1843). — China (Tschili, Schantung). — Blz. V. — Frz. Sommer. — Wohl noch sehr selten in Kultur. — Vielleicht Expl. lg. HENRY No. 3799, Hupei hierher.

++ B. länger o. jedenfalls breiter (Fig. 342 b–b¹, S. 615).
☉ Zw. meist kahl, Fr. kaum über 10 mm Dm.

38. *P. japonica*: im wesentlichen von *humilis* noch abweichend durch: Wuchs üppiger, bis 2 m hoch, Zw. mehr kirschbraun; B. meist zuletzt nur unterm. etwas achselbärtig, vgl. var.; Bl. bei uns meist gefüllt, rosa o. weiß, vgl. sonst Fig. 342 d–e.

Die var. *typica* MATSUM. in Tok. Bot. Mag. 1900. 135, hat B. wie Fig. 342 b¹ o. größer, bis 8,5:4 cm; die meist in Kultur befindliche var. *glandulosa* MAXIM., in Bull. Ac. Pétersbg. XXIX. 94. 1884 (*P. glandulosa* THBG., Fl. jap. 202. 1784; *Ceras. gland.* LOIS., in Nouv. Duh. V. 33. 1812) hat schmallängliche B. (b), bis 9:2,5 cm; die Länge der (zuweilen beh.) Bl.-Stiele wechselt bei beiden, ebenso treten gefüllte Formen hier wie dort auf. MATSUMURA gibt noch für den Typ „ramuli nigrescentes“ und für var. *glandulosa* „ramuli pallidi“ an. Ein mir fragliches Merkmal.

P. j. THBG., l. c. 201 (*Ceras. jap.* LOIS., l. c.; *P. sinensis* PERS., Syn. Pl. II. 36. 1807). — Japan, S.-Mandschur., China (nach HEMSLE: Schinking, Schekiang, Kiangsi, Fokien, Hupei, Schensi, sowie nach DIELS Sz'tschwan und MATSUMURA Schantung). — Blz. IV–V. — In Kultur und seiner Bl.-Fülle halber geschätzt. Die Kulturformen bedürfen noch der vergleichenden Untersuchung.

Im Anschluß an *humilis* und *japonica* sei noch auf folgende Formen hingewiesen. Zunächst *P. japonica* var.? *packangensis* C. K. SCHN., in FEDDE Repert. I. 53. 1905, aus W.-China (lg. WILSON No. 895, No. 27; ob auch HENRY No. 3598?) Gr. an Basis beh., z. T. baumartig, noch zu beobachten. Ob *P. formosana* MATSUMURA, in Tok. Bot. Mag. 1901. 86, wirklich von *japonica* verschieden, ist mir fraglich, da der Autor die Fr.-Größe nicht angibt. Junge Zw. kahl o. kahlend, Gr. kahl. Ferner *P. pogonostyla* MAX., in Bull. Soc. nat. Mosc. 1879. 11, O.-China (Fokien, Formosa), auch Gr. beh., B. denen von *P. sibirica* ähnlich geformt. Schließlich *P. consociiflora* C. K. SCHN., l. c. 54., Hupei (WILSON No. 683, HENRY No. 1309) Bl. an Spitze kurzer Seitentriebe gebüschelt, Gr. kahl, erst ungenügend bekannt. Alle einführens-wert.

✧ B. länger gestielt, o. sonst wie Fig. 342 c–f geformt, Bl. weiß.

+ B. wie Fig. 342 d–f, nur gegen Spitze gezähnt.

39. *P. pumila*: niedriger o. bis 2 m hoher, anfangs aufrechter, aufstrebend verzweigter, später — niedergestreckt ästiger b, ☉ Zw. schlankkrutig, kahl, seltener — fein beh., glänzend oliv- o. — purpurbraun, furchig kantig, später in Grau übergehend, Kn. meist zu mehreren nebeneinander, — eikugelig, leicht beh., zweifarben*); B. vgl. Fig. 342 d, meist ziemlich schmal länglich und —, deutlich zugespitzt, Zähnung verschieden scharf, oberse. tiefgrün, unterm. weißlichgrau, + leicht bereift, meist von Anfang an kahl, bis 8:2,5 cm, Stiel bis 1,7 cm; Bl. zu 2–5 mit B.-Ausbruch, vgl. Fig. 341 f–h, 8–10 mm Dm., weiß. Stiele im Mittel 1 cm, Fr. schwarzpurpurn, unbereift, 8–12 mm Dm., Fleisch dünn, bitter.

Außer der oben beschriebenen var. *typica* kann man noch unterscheiden: var. *cuneata* BAILL., Cycl. Am. Hort. III. 1451. 1901 (*P. c.* RAF., Ann. Nat. II. 1820); Wuchs durchaus aufrecht, B. oblong o. obovat, + stumplend, vgl. Fig. 342 e, Bl. ca. 10–15 mm Dm., Fr. 8–10 mm Dm., vornehmlich in feuchten Böden, von New Hampshire bis Minnesota, N.-Carolina und Wisconsin; ferner var. *Besseyi*

*) Vgl. meine dendrol. Winterstudien, S. 142 und Fig. 186 a–e, S. 183.

WAUGH, ex BAIL. l. c. (*P. Besseyi* BAIL., in Bull. Conn. Agric. Exp. Sta. LXX. 261. 1894), nur 0,3–1,2 m hoch, mehr niedergestreckt als der Typ. B. breiter*), dicklicher, elliptisch o. wie Fig. 342 f, Fr. bis 16 mm Dm., zuletzt meist eßbar. Prärien von Manitoba und Minnesota bis Kansas, Utah. BAILEY sagt. In its extreme form this plant looks to be distinct, but it seems to intergrade imperceptibly into *P. pumila*.

P. p. L., Mant. Pl. 75. 1767 (*Ceras. glauca* MOENCH, Meth. 672. 1794; *Cerasus pumila* MCHX., Fl. Bor.-Am. I. 286. 1803; *P. susquhanica* W., Enum. Pl. Hort. Berol. 519. 1809; *P. depressa* PURSH, Fl. Am. sept. I. 332. 1814. Sandkirsche; Sand-Cherry. Neubraunschweig bis Manitoba, Neu jersey, Michigan. Sandige und felsige Uferstrecken. Blz. IV–V. Frz. VIII. Seit langem in Kultur.

Fig. 341. *Prunus* (*Cerasus*): a–c *humilis*: a Bl. im L.-Schn. und K.; b Fr.; c Stein. — d–e *japonica*: d K. und Teil der Bl.-Achse mit Stb.; e Fr. — f–h *pumila*: f Bl. im L.-Schn.; f¹ C.; g Fr.; h Stein. — i–k *fruticosa* (*chamaecerasus*): i–i¹ wie f; f¹; k Stein. — l–n *emmens*: l Blst.; l¹ C.; l² K.; m Fr.; n B.-Grund, Stiel und Neb. — o–r *cerasus*: o Blst. (ohne Bl.); p Bl.-L.-Schn.; p¹ K.; p² C.; q Frst.; r Stein; s B.-Grund mit Drüsen a. — t–v *arum*: t wie o; u K.; v wie n, bez. s; w Stein (b, c nach CARRIÈRE; f–f¹ n. KOEHNE, sonst Original).

39–53 *P. pumila* var. *Besseyi* – *angustifolia* var. *Watsoni*: *P. utahensis* (DIECK) KOEHNE, Dendr. 315. 1893. Weicht von *Besseyi* im wesentlichen ab durch: Wuchs höher, z. T. $\mathfrak{H}$, Zw. mehr rundlich, schlanker, z. T. leicht knieig. B. in Form mehr wie Fig. 345 m–n, S. 626, – von Grund aus kerbzähmig, ober. glänzend-grün, kahl, unters. graugrün, – scharf netzaderig, Bl. fast 2 cm Dm., C. oblong; Fr. bis 2,0 cm Dm., – rundlich, schwarzrot, leicht bereift, Stein etwas hantend. Von *Watsoni* unterscheidet sie sich vor allem durch niedrigeren, weniger sparrigen Wuchs, stumpflichere B. und deutlich kirschenähnliche Fr. – Soll vor reichlich 40 Jahren von J. E. JOHNSON in Nebraska aus *Besseyi*-Samen erzogen und dann durch diesen in Utah verbreitet worden sein (vgl. BAILEY, Cycl. Am. Hort. III. 1451–1601).

*) Es scheint übrigens von var. *Besseyi* eine ziemlich schmal und kleinblattrige Form zu geben, denn Expl. aus Nebraska, Kansas etc. haben B., die zur Frz. nur 3:0,1–4:1,5 cm messen.

++ Bl. wie Fig. 342c, von Grund aus kerbzählig.

40. *P. fruticosa* (*P. chamaecerasus*): 0,2–0,8 m hoher, sparrig ausgebreitet verästelter, kurztriebiger b, junge Zw. leicht beh., ⊙ Zw. kahl, Kn. stumpf eispitzig*); B. der Blzw. und Kztr. kleiner, stumpflicher, kürzer gestielt als an den Lgtr., dort bis 4–5:2,5 cm, spitzer, Stiele bis 15 mm; Bl. zu 1–4 in sitzenden o. kurz gestielten Scheindolden, weiß, bis etwa 15 mm Dm., kahl, K. etwa halb so lang wie Bl.-Achse, breit, stumpf, vgl. Fig. 341i–i¹, Fr. bis 3 cm lang gestielt, plattkugelig, dunkelrot, bis 10 mm Dm., Stein wie k.

Man kann festhalten: var. a. *typica*, sensu BECK, Fl. Nied.-Öster. 821. 1892: B. der Kztr. und an den Bl. aus kurzkeiligem Grunde verkehrt-eifg. o. fast rundlich, oft kaum 2:1; jene der Lgtr. mehr elliptisch. — var. b. *dispar* BECK, l. c.: B. der Kztr. und an den Bl. aus langkeiligem Grunde verkehrt-eilänglich, oft 3:1, jene der Lgtr. mehr lanzettlich. Bei beiden, bes. bei a. tritt eine f. *umbelliflora* BECK, l. c., auf, wo die Blst. — deutlich gestielt sind. — c. *pendula* DIPP., Laubh. III. 615. 1893 (*P. chamaecerasus* var. *salicifolia* ZBL., in H. d. D. D. G. 239. 1903; *P. myrtifolia*, *pumila pendula*, *sibirica* HORT.) Form mit hängenden Zw., meist als Trauerbäumchen veredelt. Ich glaube, daß manche *pendula*-Formen zu dem Bastard *eminens* gehören! Sie weichen durch die schmalen langen K. und die B.-Form ab.

P. f. PAEL., Fl. ross. I. 19. t. 8. B. 1784 (*P. cerasus* var. *pumila* L., Sp. pl. 474. 1753, non *P. pumila* L., 1767; *P. chamaecerasus* JACQ., Collect. I. 133. 1786; *P. intermedia* POIR., in LAM. Encycl. V. 674. 1804; *Ceras. chamaec.* LOIS., Nouv. Duh. V. 29. 1812; *Ceras. humilis* HOST, Fl. austr. II. 7. 1831; *P. pumila* FRITSCH, Exkursionsfl. v. Österr. 307. 1897). — Zwergkirsche. — I. G. D. Rheingebiet (Mainz, Oppenheim, Nierstein), Thüringen (bes. um Halle), Posen (teste FOCKE, GARCKE); OU. Böhm., Mähr. Nied.-Österr., Südsteierm., Banat, Siebenb.; ferner Ital., nördl. Balkan, S.- und M.-Rußl., wohl auch Transk. bis Sib. — Vorzüglich warme sonnige trockene Hänge, zwischen lichten Gebüsch. — Blz. IV–V. — Frz. VII. Man vgl. das unter *eminens* und *cerasus* Gesagte.

40.×41 *P. fruticosa* (*chamaecerasus*) × *cerasus*: *P. eminens* BECK, Fl. v. Nied.-Österr. 821. 1892 (*C. intermedia* HOST, Fl. Austr. II. 6. 1831, non POIR.; *P. cerasus* var. *frutescens* NEILR. Fl. v. Wien 635. 1846, ex parte; *P. chamaecerasus* AUCT. ex parte); daß dieser Bastard existiert, glaube ich bestimmt, doch sind vielleicht nicht alle hierher gezogene Formen als Bastarde anzusprechen. Denn ich halte es nicht für ausgeschlossen, daß eine verwilderte *cerasus*-Form existiert, die der Hybride habituell und, soweit deren Formen der *cerasus* näher stehen, auch sonst sehr ähnelt. Doch kann die Frage, was Bastard, was Form o. Unterart, wohl nur durch Kulturversuche gelöst werden**).

Bei dem Bastard treten insbesondere 2 Formen auf, eine mit kürzeren breiteren, der *fruticosa* ähnlichen K., und eine solche deren K. so lang wie die Bl.-Achse und oft recht schmal sind. Der Wuchs ist aufrecht, 1–3 m o. etwas h-artig, die B. und Bl. sind meist länger gestielt, größer als bei *fruticosa*, ebenso die Fr. Vgl. Fig. 341l–n.

○○ B.-Stiele stets über 12 mm lang, B. im Mittel wie Fig. 340g–h S. 610.

* B. sehr bald ganz kahl, Stiel 1,2–2(–3) cm, Blst. am Grunde meist beblättert (Fig. 341o), innere Kn.-Sch. aufrecht.

41. *P. cerasus*: bis etwa 10 m hoher, dicht ausgebreitet, oft überhängend verästelter h–h mit —: kugeligter Krone, Kztr. — an den Enden der ∞ Lgtr. gehäuft, Zw. kahl, hellgrau, nach Abstoßung der

*) Vgl. meine Winterstudien, S. 184, Fig. 187a–g.

**) Ich glaube überhaupt, daß eine Klarstellung der *cerasus*-, *arum*-, *pumila*-Formen etc. und ihrer hybriden Verbindungen nur auf dem Wege des Experiments möglich ist. So sehr ich bestrebt war, durch Vergleich eines reichen lebenden und Herbar-Materials und eingehendes Studium der Literatur ein sicheres Bild der Formenkreise zu gewinnen, so sehr erkannte ich, daß die Auffassungen der alten und neuen Autoren z. T. so widersprechend und namentlich ihre Nomenklatur oft so verworren, daß mit dem mir zur Verfügung stehenden Material eine auch nur halbwegs sichere Grundlage nicht zu gewinnen war.

Epidermis rotbraun*): B. ziemlich steif, glänzend, bis 7:3,5 cm, Stiel z. T. ohne Drüsen: Bl. weiß, selten rötlich, bis 3 cm Dm., Stiele 2–4 cm, K. meist gezähnt, Fr. hell- o. dunkelrot bis schwärzlich, säuerlich, o. an Kulturformen mehr süßlich, vgl. Fig. 341 o–r, S. 613.

Von Formen seien erwähnt: var. *a. typica*: $\mathfrak{h}$, Verzweigung + überhängend, und var. *b. frutescens* [NEILR. ex parte, vgl. unter *emarginata*] (*P. acida* K. KOCH, Dendr. I. 112. 1869, ob auch DUMORTIER, KOEHNE?, non EHRH. et AUCT. AL. **) die mehr $\mathfrak{h}$ -artige, aufrechte, kleinerfrüchtige verwilderte Form. — Von var. *a* gibt es zahllose Kultursorten, auf die hier schon aus den in Ann. S. 614 erwähnten Gründen nicht eingegangen werden kann. Ich hebe nur hervor *f. marasca* (*Ceras. marasca* HOST, Fl. austr. II. 6. 1831; *P. marasca* RCHB. Fl. germ. excurs. 644. 1830–32), die in Dalmatien zum Zwecke der Gewinnung des „Maraschino“ kultiviert wird. Nach FRITSCH, in Sched. Flor. Austr.-Hung. No. 3205. 1902, weicht sie

Fig. 342. *Prunus* (*Cerasus*): B.: *a* *humilis* — *b* *b¹* *japonica* — *c* *fruticosa* (*chamucerasus*) — *d–f* *pumila*: *e* var. *cuneata*; *f* var. *Besseyi* — *g* *graeca* — *h* *mahaleb* — *i* *emarginata* — *k* *pennsylvanica* — *l* *mollis* — *m* *Maximowiczii* (alles ¹ n. Gr.) (Orig.)

insbesondere ab durch: relativ schwache Serratur der B., relativ lange bleibende Neb., gedrungene Blst. und ziemlich kurze Bl.-Stiele (bis ca. 2,5 cm). Sie bildet stark überhängende $\mathfrak{h}$, wird aber hfg. auf *P. mahaleb* veredelt; ferner die Formen

*) Vgl. sonst über Kn. etc. meine dendrol. Winterstudien S. 184 und S. 182, Fig. 185 o–s.

**) Der Name *acida* wird in sehr verschiedenem Sinne verwandt. M. E. bezeichnete EHRH., Beitr. VII. 130. 1792, als *acida* die Sauerkirschen mit farblosem Saft, die sog. Glaskirschen, Amarellen, das was LINNÉ, Sp. pl. 474. 1753, unter *P. cerasus* var. *caproniana* verstand. LINNÉ's *P. c.* var. *austera* (= *P. austera* EHRH., l. c. 129) sind die Weichseln mit dunklem, färbendem Saft. DC. faßte beide Formen unter *Ceras. caproniana*, Fl. fr. IV. 482. 1805, zusammen.

f. semperflorens *P. semp.* EHRH., Beitr. VII. 132. 1792; *Ceras. semperflorens* DC., Fl. fr. IV. 481. 1805), die spätblühende „Allerheiligenkirsche“ mit 4–8-blütigen, an der Spitze kurzer beblätterter Triebe erscheinenden Doldentrauben. Da die Blz. bis in den Sommer währt, treten Fr. und Bl. oft gleichzeitig auf; *f. semiplena* (*acida* var. *fl. pleno* KIRCHN., Arb. musc. 252. 1864), Bl. halbgefüllt; *f. rhexii* [KIRCHN., l. c.], Bl. reicher gefüllt; *f. aureo-variegata* (*acida* var. *fol. varieg.* KIRCHN., l. c.), B. gelblichweiß gescheckt; *f. cucculata* [KIRCHN., l. c.], B. + blasig aufgetrieben; *f. globosa* [SPÄTH, Cat. 1887/8], Krone bes. gedrungen kugelig.

P. cer. L., Sp. pl. 474. 1753 (*Ceras. vulgaris* MILL., Gard. Diet. ed. VIII. n. 1. 1768). — Sauerkirsche; Sour-cherry; Griottier. — Kaukasien, Anatolien, Mazedonien, auch im Gebiet Sch. S.- und W.-Schweiz, D. Maintal, Oberbaden, sowie wohl auch OU. scheinbar spontan, doch wohl nur verwildert und sehr hfg. angepflanzt — Blz. etwas nach *avium*, siehe sonst diese.

41×42: *P. cerasus* × *avium*: ein sicher vorhandener Bastard, wozu ich *P. effusa* (*Ceras. eff.* HOST, Fl. austr. II. 6. 1831) zähle, dessen Name m. E. vorangestellt werden muß, da sowohl der von BECK gebrauchte Name *P. aproniana*, wie ZABELS *caproniana*, soweit ich die ältere Literatur beurteilen kann, für Formen der *cerasus* vergeben sind. Jedenfalls verzichte ich für diesmal auf eine Besprechung, da gerade ZABELS gewiß sehr sorglich ausgearbeitete Übersichten im II. d. D. D. G. 339 ff. mich lehren, zu welch. differenten Anschauungen man kommen kann.

✱ ✱ B. unters. ⊖ bleibend beh., Stiele bis 5 cm lang, Blst. ohne B. am Grunde (Fig. 341 t, S. 613), innere Kn.-Sch. zurückgeschlagen.

42. *P. avium*: von *cerasus* im wesentlichen noch abweichend durch: Wuchs höher, bis 23: über 0,6 m, Borke längsrissig, schwärzlich, Krone mehr eig., aufstrebend verästelt*), Holz und Kn. sehr ähnlich**); B. (Fig. 340 g, S. 610) bis 15:7 cm, mehr schlaff, ober. etwas runzelig, Zähnung gröber, mehr ungleich, Stiele 2-drüsig; Bl. bis 3,5 cm Dm., K. meist ganzrandig, Fr. schwarzrot, auch bei wilden Formen süßlich, bis 5 cm lang gestielt, Stein vgl. Fig. 341 w.

Die spontane Form wäre als var. *actiana* L., Sp. pl. 474. 1753 (*Ceras. nigrescans* EHRH., Beitr. VII. 126. 1792) zu führen.

Von den Kulturformen seien nur hervorgehoben var. *juliana* L., Sp. pl. 474. 1753 (*Ceras. jul.* DC., Fl. fr. IV. 482. 1805) die weichfleischigen „Herzkirschen“ (fr. Guignes). — var. *duracina* L., l. c. 475 (*C. durac.* DC., l. c. 483) die hartfleischigen „Knorpelkirschen“ (fr. Bigarreux). *f. decumana* K. KOCH, Dendr. I. 106. 1869 (*C. dec.* DE LANN., in Bon. Jard., teste KOCH, früher als *P. macrophylla* POIR., Encycl. Suppl. IV. 584. 1816), B. abnorm groß werdend. *f. asplenifolia* KIRCHN., Arb. Musc. 254. 1864. B. tief zahnartig eingeschnitten, zuw. fast zerschlitzt. *f. plena* (var. *fl. pl.* KIRCHN., l. c.), Bl. prächtig dicht gefüllt, eine sehr schöne Form. *f. salicifolia* B. auffallend schmal. *f. pendula* KIRCHN., l. c., Form mit stark hängenden Zw.

P. av. L., Fl. suec. ed. II. 165. 1755 (*P. ceras. var. av.* L., Sp. pl. 474. 1753; *Ceras. nigra* MILL., Gard. Diet. 1759, No 2; *Ceras. a.* MOENCH., Meth. 672. 1794; *C. dulcis* GAERTN., Fl. Wett. II. 181. 1800). — Süßkirsche, Vogelkirsche; Wild or Crab Cherry; Merisier, Cerisier sauvage). — I. G. durchweg, bes. in den südlichen Gebirgszügen spontan auftretend, sonst noch — den höheren N. und NO. ausgenommen — wohl durch ganz Eur. (in Span. und Ital. selten, ob nur verwildert?), sowie Klein-Asien, bes. Kaukasus; außerdem auch in O.-As. und bes. N.-Am. viel kultiv. und dort z. T. verwildernd. Liebt mäßig feuchten, bes. etwas kalkigen Boden und sonnigwarme Lagen, wie er auch nach HEMPEL wenig Schatten verträgt. Im Gebirge bis 1500 m. — Alter bis 80–100 Jahre. — Holz mäßig dauerhaft, da aber sehr politurfähig, von Tischlern, Drechslern etc. gern benutzt. Daher die wilde Form auch forstlich mehr Beachtung verdient. Die Fr. dienen zur Bereitung von Branntwein, Essigwasser; in den Kultursorten als geschätzte Genußmittel jedermann bekannt. Blz. IV(–V). Frz. VI–VII. — Für Anlagen ist bes. die *f. plena* sehr empfehlenswert.

*) Vgl. Habitusbild. bei HEMP. et WILH., Baume u. Strauch. III. 90. Fig. 314.

**) Vgl. meine Winterstud. S. 184 und Fig. 185 i–n, S. 182. ☉ Lodentrieb zuweilen ± beh.

42×43 *P. avium* × *mahaleb*: *P. fontanesiana* (Cer. font. SPACH, Hist. Veget. I. 410. 1834; *P. gracca* DESF. nomen nudum; *P. mahaleb cerasifolia* HORT.): SPACH ist meines Wissens der erste, der diese Form beschrieben hat. Sie bildet hübsche $\text{h} \rightarrow \text{h}$ von der Tracht der *C. avium*, weicht von dieser ab durch Zw. fein zottig beh., B. aus gerundetem bis leicht herzförmig. Grunde wie Fig. 342 g o. länglicher, Blst. meist deutlich doldentraubig, 4–6 10-blütig; wogegen sie von *mahaleb* durch die mehr längeren, größeren (bis 10:5 cm) B., und größere Bl. (bis ca 2 cm Dm.) leicht zu scheiden ist. Die meist einzelnen, spärlichen Fr. sind denen von *P. fontanesiana* in Farbe, Größe, Form etc. ganz ähnlich, schmecken aber etwas bitterlich, doch weit besser als die von *mahaleb*.

b. Bl. in (3–)5–12(–14)-blütigen deutlich gestielten Trauben.

Sekt. d. *Mahaleb**) KOEHNE, Dendr. 306. 1893. — Wie schon früher betont, verbinden gewisse chinesische Formen diese Sekt. eng mit Sekt. *Pseudocerasus*.

○ B. + fein und gleichmäßig kerbsägezähmig, K. ± ganzrandig, Stein glatt.

* B. breit bis rundlich eiförmig, vgl. Fig. 342 h.

43. *P. mahaleb*: $\text{h} - \text{h}$, selten h^{***}), bis 13:1 m. fein und dicht, z. T. etwas überhängend verästelt, (○) Zw. rund, fein kurzborstig-filzig, grau o. olivgrün, später bräunend, Borke dunkel, sehr feinrissig, Kn. hellbraun, längl. eiförmig, + fein beh.; B. bis 8:6.5 cm, ziemlich dünn, oben glänzend grün, glatt, kahl, unters. heller, an Rippe meist + hellbräunlich beh., Stiel bis 2 cm, mit o. ohne Drüsen; Bl. duftend, weiß, vgl. Fig. 343 a–h, Fr. und Stein wie e–f, erst gelblich, dann sich rötend, reif schwarz, sehr herb schmeckend.

. Es gibt mehrere Kulturformen: eine gelbfrüchtige *f. chrysocarpa* ZBL., in H. d. D. D. G. 243. 1903; mit buntem Laube *f. albomarginata* DIPP., Laubholzsk. III. 621. 1893 und *f. variegata* ZBL., l. c., ferner Wuchstformen: *f. pendula* DIPP., l. c., + überhängend; *f. monstrosa* KIRCHN., Arb. muse. 258. 1864, sehr kurz und gedrängt knorrig wachsend, ähnlich wohl *f. globosa* DIECK, apud DIPP., l. c. und *f. compacta* SPÄTH, apud ZBL., l. c. — Von spontanen Formen sind zu erwähnen *f. transsilvanica* SCHUR, Enum. 180. 1866, die reicherblütige Blst. und kleinere Bl. mit zurückgebogenen C. besitzen soll (Siebb., nach WILLKOMM auch in Bayern beobachtet), sowie var. *Cupaniana* FIORI et PAOL., Fl. analyt. d'Italia I. 561. 1896 (*P. Cupaniana* GUSS., Flor. Sic. Syn. I. 553. 1842), kleiner, + niedergestreckter h , B. der nur vorlieg. Expl. nicht über 3:1.8 cm, Blst. kurz, 3–6-blütig, Bl. kleiner (Sizil., in Bergwäldern).

P. m. L., Sp. pl. 472. 1753 (*Ceras. m.* MILL., Gard. Dict. 1759. No. 4; *Padus mah.* BORKH., Handb. Forsth. II. 1434. 1803). — Steinweichsel, Felsenkirsche, St.-Lucienholz; St. Lucie cherry; bois de sainte Lucie. — I. G. D. Rheingeb., Elsaß, Oberbaden, Jura, Bayr.; OU. Nied.-Östr., Krain, S.-Tirol, Dalm., Ung., Sieb. und südlich angrenzende Teile; Sch. verstr.; ferner von M.-Frankr., Span. durch ganz S. und SO. Eur., Klein-As., bis Armenien, Kaukasus, Krim, Turkestan. Felsige, steinige, sonnige Hänge, gern auf Kalk, im Gebirge bis 700 m, liebt Weinklima. — Blz. (IV–)V. — Frz. VII. Die Steinweichsel ist

*) Vgl. z. B. die Abb. in Gartenwelt VII. 497.

**) Zu dieser Sektion gehören wohl noch: *P. tatsienensis* BAT., in Act. Hort. Petrop. XIV. 322. 1897, aus Sz'tschwan und die var. *pilosiuscula* C. K. SCHN., in FEDDE, Repert. I. 66. 1905. Der *P. Maximowiczii* im Laub ähnlich, aber kahl o. fast kahl, in Bl. und Blst. (Fig. 343 v–v¹) mehr eine *Pseudocerasus*. — Ferner *P. clarifolia* C. K. SCHN., l. c. 67, aus Sz'tschwan, B. bes. unters. deutlich glänzend und sehr hellfarben, Bl. noch unbekannt, ebenfalls in system. Stellung noch fraglich. — Endlich *P. szechuanica* BATAL., l. c. 167. 1895, aus Sz'tschwan. Ich möchte (vgl. meine Arbeit l. c.) die Expl. von WILSON No. 308 für diese Art halten, sie stellen aber doch vielleicht etwas Abweichendes vor. Vgl. Fig. 343 t–u.

*** Vgl. Gartenwelt VII. 499, die Borke dieses St. ist in meinen Winterstudien Fig. 41, S. 37 abgebildet. Vgl. dort auch S. 190 und Fig. 128 a–f die Kn. und Zw.

wegen ihrer nach Kumin duftenden Rinde beliebt. Auch das Holz nimmt beim Austrocknen diesen Geruch an. Zur Erzeugung der „Weichseltabakröhren“ wird sie auch (bes. in Niederösterreich) kultiviert und die Erträge guter Weichselgärten sollen hohe sein (vgl. z. B. HEMP. et WILH., Bäume und Sträucher III 91).

✱✱ B. länglich-oval bis länglich-lanzettlich (Fig. 342i—l, S. 615).

+ Blst., ⊙ Zw., B.-Unters. ± kurz weichhaarig.

44. *P. mollis*: 3—15:0,6 m hoher $\mathfrak{H}$ — $\mathfrak{H}$, Borke kirschenartig, junge Zw. + gelbrotbraun, später mit grauer Epidermis, dann tief kirschbraun, Kn. länglich-eifg.; B. wie Fig. 342i, bald stumpfer, bald spitzer, + trübgrün oben, kaum ganz kahlend, ohne obs. Sp., unters. ± graugrün, Haare länger zottig als oberseits, 3:1,3—8:3 cm, Stiel bis 14 mm, am B.-Grund meist 2 Drüsen; Blst. ca. 5—10-blütig, meist nur kurz gestielte, etwas doldige Trauben, Bl. ca. 13 mm Dm., etwas gelblichweiß, vgl. Fig. 343i, C. außen + beh., Trgb. meist wie k, selten wie k¹, Stiel zur Frz. bis ca. 12 mm, Fr. wie m, rot, zuletzt dunkler, Stein wie n.

P. mollis WALP., Rep. II. 9. 1843 (*Ceras. m.* DOUGL., apud Hook., Fl. bor.-Am. I. 164. 1833; *P. emarginata* var. *mollis* BREW. et WATS., Bot. Calif. I. 167. 1876; *P. emarginata* AUCT. ex parte). Weichhaarige Kirsche. Nach dem mir vorlieg. Mat. nur NW.-N.-Am. (Washington und Oregon). — Wälder. — Blz. V. — Frz. VIII. Von *emarginata* vor allem durch das Fehlen der obs. Sp. gut geschieden, wie auch diese in Beh. der B. und Blst. nur leichte Anklänge zeigt. Was SARGENT, Silva IV t. 557 abbildet, ist typische *mollis*, nicht *emarginata*. Die von SPAETH geführte *mollis* var. *angustior* KOEHNE kann ich von dem Typ, wie ich ihn fasse, nicht unterscheiden. Langverkehrt-eifg. B. sind gerade für diesen charakteristisch, denn die etwas breiteren Formen gehören der *emarginata* an. Siehe diese.

+ + Blst., ⊙ Zw., B.-Unters. kahl o. nur spärlich beh., wenn mehr beh., so B. mit obs. Sp.

△ B. mit obs. Sp., meist stumpflich, auch an Lgtr. selten über 5 cm lang, Stiele kaum über 10 mm, Blst. meist deutlich kurztraubig.

45. *P. emarginata*: $\mathfrak{h}$ o. $\mathfrak{H}$, 0,8—4 m, von *mollis* noch abweichend durch: Zw. nur ganz jung beh., B. beiders + lebhaft grün, hfg. ganz kahlend, vgl. var., Bl. kaum verschieden, in Trgb. kein sicherer Unterschied, Stein mehr eifg. (Fig. 343u).

Wie es scheint kann man in den B. mehrere Formen festhalten. So treten solche mit ziemlich schmalen, kaum 1,5 cm breiten B. auf (lg. LEMMON No. 58, Calif., lg. SONNE No. 69, Truckee in Calif.), während die des Typs im Mittel 1,8—2 cm breit und 4—4,5 cm lang sind; andererseits liegen mir auch sehr breitblättrige Expl. vor, 4,5:3—6:3,2 cm, z. B. lg. HALL et CHANDLER, No. 385, Calif. und H. E. BROWN, No. 117, Calif. — Gewisse Formen erinnern in Beh. an *mollis*, so lg. JONES 1897, Oregon (near the Dalles) und vor allem lg. LEMMON, No. 82, Calif. und lg. HANSEN, No. 797, sind aber durch die stets vorhandenen obs. Sp. leicht zu unterscheiden. Jedenfalls ist ein näheres Studium derselben erwünscht*).

P. e. WALP., Rep. II. 9. 1843 (*Ceras. e.* DOUGL., apud Hook. Fl. bor.-am. I. 169. 1833). — Ausgerandete K. — Ich sah Expl. aus Calif., S.-Oreg., Idaho, Nevada, Arizona**). — Blz. V—VI. — Frz. VII—VIII. In Kultur noch selten. Von *C. mollis* fiel mir im Leipziger bot. Garten ein älterer $\mathfrak{H}$ auf.

△△ B. ohne obs. Sp., wenigstens an Lgtr. stets fein spitzig (Fig. 342k, S. 615), Stiele über 10 mm, Blst. meist scheindoldig.

46. *P. pennsylvanica* $\mathfrak{h}$ — $\mathfrak{H}$, bis 13:0,5 m, eine schmale rundliche, breit verästelte Krone bildend, Borke zuletzt kleinbrüchig, Zw. meist stets kahl, + glänzend purpurbraun, Kn. klein, kurz eifg.; B. ziemlich variabel, lebhaft grün, unters. heller,

*) GREENE unterscheidet in Fl. Francisc. T. 50. 1891. die *Ceras. emarginata* DOUGL. (= *C. glandulosa* KELL. in Proc. Cal. Ac. I. 59. 1855) und die *Cer. californica* GREENE, l. c. Ich bin mir vorläufig über GREENES Auffassung nicht klar geworden.

**) Auffällig bleibt mir ein Expl. lg. WILLIAMS, No. 1005, Montana, das sehr an *emarginata* erinnert, aber keine obs. Sp. zu besitzen scheint, ziemlich verlängerte Blst. hat und vielleicht einem abweichenden Typ angehört.

meist bald ganz kahl, kürzer und breiter, ca. 8:4 cm o. langgestreckt bis 13:3—3.5 cm, Zähnung unregelmäßig feinkerbig, $\pm$ auffällig drusenkuppig, Stiel dünn, mit o. ohne Drusen, bis 2.5 cm; Blst ca. 1—5-blütig, oft mehrere gehäuft, Bl. weiß, ca. 12 mm Dm., C. außen am Grunde beh., Fr. klein, hell gelbbrot, vgl. Fig. 343 p—q¹.

P. p. L. F., Suppl. 252. 1781 (*P. lanceolata* W., Berl. Baumz. 240. t. 3. Fig. 3. 1796; *C. borealis* MCHX., Fl. bor. Am. I. 286. 1803; *P. bor.* POIR., in LAM., Dict. V. 674. 1804; *P. persicifolia* DESF., Hist. Arb. II. 205. 1809; *C. pers.* LOIS., Nouv.

Fig. 343. *Prunus* (*Cerasus*): a—h *mahaleb*: a Blst. und Trgb.; b Bl. im L.-Schn.; c C.; d K.; d Fr.; f Stein; g Neb.; h B.-Rand. — i—n *mollis*: i Bl. L.-Schn. und K.; k k¹ Trgb.-Formen; l C.; m Fr.; n Stein. — o *emarginata* Stein. — p—q¹ *pennsylvanica*: p Bl.-L.-Schn.; p¹ C. und dgl. halbiert von der Seite; p² K.; p³ Trgb.; q Fr.; q¹ Stein. — r—s¹ *Maximowiczii*: r Bl.-L.-Schn. und K.; r¹ C.; s Fr.; s¹ Stein. — t—u *szechuanica* (C.): t Blst. ohne Bl. (1 äußere, 2 innere Kn.-Sch., 3 untere, 4 obere Trgb.); t¹ obers. Trgb. vergr.; u Bl. im L.-Schn. und K. — v—v¹ *tatsienensis*: v Blst. ohne Bl., der sehr kurze Pedunculus durch die Trgb. (β) verdeckt; v¹ Bl. im L.-Schn. und K. — w—y *yunnanensis* var. *Henryi*: w Blst. ohne Bl. und Trgb.; x Bl. im L.-Schn. und K.; y C. (Original)

Duh. V. 9. 1812; *C. pers.* LOIS., l. c.). — Pin or Pigeon cherry. — Neufundl. bis Georgia, westlich bis O.-Color. und Tennessee — Bes. Berghänge, zuw. waldbildend. — Blz. (IV—V—VI. — Frz. VIII. — Inwieweit sich Formen abgrenzen lassen, ist mir noch fraglich. Jedenfalls weichen die östlichen durch relativ breitere mehr elliptische B. ab, doch sah ich auch aus New-Hampshire Ähnliches.

CC B. — grob doppelt eingeschnitten gezähnt (vgl. Fig. 342 m. S. 615), K. drüsig gezähnt, Stein $\pm$ grubig gefurcht.

47. *P. Maximowiczii*: hoher b b , bis über 7:0,6 m, Verästelung ausgebreitet, Zw. meist bis ins 2. Jahr beh., anfangs gelbbraun, dann dunkler, Kn. spitz-eifg., ziemlich wenigschuppig, beh.; B. z. T. mehr verkehrt eifg. mit plötzlich abgesetzter Spitze, an *apetala* erinnernd, oben sattgrün, zuletzt oft nur spärlich kurz beh., unten heller, meist mehr beh., etwa 6:4 o. auch bis 10:5 cm, Herbstf. schön braunrot, Stiel zottig beh., bis 13 mm; Blst. zottig borstig beh., ca 5-6 blütig, zur Frz. bis 8 cm, Trgb. ziemlich groß und lange bleibend, Bl. weiß, ca 16 mm Dm., Stiele bis 2 cm, sonst vgl. Fig. 343 r—s¹, S. 619.

P. M. RUPR., in Bull. Acad. Pétersbg. XV. 131. 1857 (*P. apetala* HORT. NONN.). — O.-Mandsch., Sachalin, Jap. (Kiuschiu bis Jesso) (ob auch Korea?).

Wälder Blz. V—VI. — Frz. VII—VIII — Hübsche harte Kulturpflanze. — Unbekannt ist mir *P. bracteata* FR. et SAV., Enum. II. 329. 1870, aus Nippon, von der auch MAXIMOWICZ glaubt, daß sie höchstens eine Form der *Maximowiczii* ist.

Auf *P. canescens* D. BOIS, in Frut. Vilm. Cat. I. 66. 1905, mit Abb., die der Autor „espèce voisine du *P. Maximowiczii*“ nennt, hoffe ich im Nachtrag zurückkommen zu können. Der Abb. und Beschreibung nach scheint es eher eine Form der *Pseudocerasus*-Gruppe zu sein.

Subgenus C. *Euprunus**) [Pflaume; Plum; Prunier]. Vgl. oben S. 589: b b , B. sommergrün, konvolut in Kn.-Lage o. selten b konduplikat, Bl. zu 1—7 scheindoldig, am Grunde mit kleinen (selten größeren) Kn.-Sch. o. diese zur Blz. abgefallen, C. weiß o. grünlich o. rosa, Bl.-Achse $\pm$ glockig, Stb. 15—50, Fr. $\pm$ länglich o. rundlich, kahl, seltener beh., Stein glatt o. grubig, rundlich o. $\pm$ abgeflacht.

B. siehe
S. 634.

A. Bl. deutlich bis langgestielt, wenn b sitzend, so jedenfalls B. nicht wie auf Fig. 349 a—e, S. 635.

Sekt. a. *Prunophora* FIORI et PAOL. Flor., d'Italia I. 2. 557. 1898 [excl. *Armeniaca*]: Frkn. und Fr. kahl, höchstens Gr.-Grund mit einigen Haaren, B. in der Kn.-Lage meist deutlich gerollt, seltener gefaltet**).

II. siehe
S. 634.

I. B. nicht wie in Fig. 333 g, S. 594, jedenfalls Nerven nicht so auffällig steil aufrecht verlaufend.

b) siehe
S. 628.

a) Blst. 3—7-blütig, scheindoldig o. ganz kurz doldentraubig, nur ausnahmsweise 2—1-blütig; B. vgl. Fig. 345 und 346 a—d.

2. siehe
S. 627.

1. B. nicht wie Fig. 346 c und außerdem Zähnung feinkerbig-knorpelkuppig, K. beiders. kahl, Stb. 30 o. mehr.

a) B. wie Fig. 346 b, S. 629, breit-eifg. o. rundlich und zugleich

⊙ Zw. (meist) beh. und Bl. wie in Fig. 347 a—c, S. 631.

48. *P. subcordata* **): kleiner reich breitverzweigter b o. b , bis 8 m, Borke aschgrau, kurze Zw. b verdornend; ⊙ Zw. rotbraun, etwas kantig, ⊙ grau; Kn.

*) Wie schon die vielen Bemerkungen bei den verschiedenen Arten zeigen, sind die *Euprunus* noch sehr wenig geklärt. Es wird noch manches Jahr vergehen, ehe die amerikanischen Typen gesichtet sind und die sud-osteuropäisch-vorderasiatischen sind noch wenig, die zentralasiatisch-chinesischen so gut wie nicht bekannt. Vieles in der hier gegebenen Darstellung kann demnach nur provisorisch sein, weshalb ich auch darauf verzichtete, viele Arten ordentlich einzureihen, da auf Grund unzulänglichen Materials scharfe Diagnosen sich nicht ablassen lassen. Doch finden die Leser hier, wie überhaupt bei *Prunus* zum ersten Male eine Zusammenstellung aller spontanen Formen. Von *P. praecox* ANDRE, in Rev. Hort. 1892, 488, sah ich kein Material. Ich bin mir über diese Hybride (?) noch ganz unklar.

**) KOEHNE faßt 1893 die Arten, welche konduplikate Kn.-Lage haben sollen, als Sekt. *Prunocerasus* zusammen. Mir ist bei vielen die wahre Kn.-Lage noch fraglich; SMALL, BRITTON u. A. geben für alle „konvolut“ an. Es bedarf weiterer Untersuchungen an frischem Material.

**) Was GRIENE, in Pittonia III. 21. 1896, als *P. oregona* aus SO.-Oregon beschreibt (vgl. auch HOWELL, Fl. of NW.—N.-Am.), kenne ich nicht. Die B. sollen kaum über 2,5 cm lang, beiders. beh. und derber sein, als bei der sehr nahe verwandten *subcordata*; von den Fr. heißt es: fruits in pairs or threes, on pedicels 6 lines long or more, densely tomentose when very young, more thinly so, yet distinctly tomentulose when half-grown.

kurz eifg., mehrschuppig, - kurz beh.; B. $\frac{1}{2}$ oberseits bald kahl, sattgrün, unters. $\frac{1}{2}$ heller, - beh. bis stark kahlend, Basis rundlich keilig bis leicht herzförmig, Spitze stumpf o. abgerundet, Zähnung gröber o. feiner doppelt kerbig, bis 6:8:5 cm; Stiel ca. 1 cm, drüsig; Bl. vor o. mit B., weiß, zuletzt rötlich, ca. 1,5 cm Dm., Stiel und Achse $\frac{1}{2}$ beh., K. lang, oblong; Fr. bis 2 cm lang gestielt, tiefrot und $\pm$ bereift, säuerlich, Fleisch am Stein haftend, sonst vgl. Fig. 347 a—c.

Zu erwähnen var. *Kelloggii* LEMMON, in Pittonia II. 67. 1890, größer, dünnzweigiger, kahler, Fr. größer, gelb, essbar, Stein löslich.

P. s. BENTH., Pl. Hartw. 108. 1849. — Herzblättrige Pflaume. — Oregon, N.- und M.-Calif.; wie es scheint aber bis Mexiko (Jalisco). — Trockene felsige Hänge, offene Wälder. — Blz. III—IV. — Frz. VIII—IX. — Besonders die Varietät in Am. der Fr. halber öfter angebaut; bei uns wohl nur Typ in Kultur.

β) Die unter α) gegebenen Merkmale nicht zutreffend.

○ K. beiders. kahl, B. vgl. Fig. 345 a, S. 626, Zähnung grob und breit doppelt gekerbt, nicht spitz, B.-Stiel mit Drüsen, Stein flach.

49. *P. nigra*: kleiner B., bis 10:0,3 m, Verzweigung steif aufrecht, Borke dünn; junge Zw. kahl (o. beh.), $\odot$ fast stets kahl, braun, Krztr. hfg. verdornend, Kn. $\frac{1}{2}$ kegelförmig, Sch. schwarzbraun mit $\frac{1}{2}$ hellerem Saum; B. bald mehr elliptisch, bald mehr länglich als in Fig. 345 a, oben etwas trübgrün, - verstr. kurz beh., unters. hellgraugrün, zuletzt nur auf den Nerven $\frac{1}{2}$ beh. und achselbärtig o. reichlicher und bes. längs der Rippe dicht zottig, ca. 8:4,5 o. 9:4—13, 15:7—9 cm, Stiel beh., 1,5—2,5 cm; Bl. vor B., weiß, im Verblühen rosa, 2,3—3 cm Dm., Stiele kahl, 1—2 cm, sonst vgl. Fig. 344 a—b¹, Fr. meist orangerot, nicht o. kaum bereift, Stein schwer löslich.

P. n. ART., Hort. Kew. II. 165. 1789. — Kanada-P. — Heimat nach BRITTON: New-Foundl. bis Manitoba, Mass., und Wisconsin (nach SMALL auch Alberta und Georgia). Ufer, Waldränder, Hügelgelände. — Blz. IV—V. — Frz. VIII. — In Kultur, aber nicht hfg. Nach BAILEY*) eine gefüllt blühende Var. vorhanden.

49×51 *P. nigra* × *americana*: scheint in N.-Am. vorzukommen..

○○ K. innen (o. beiders.) beh., sonst B. sehr feinzählig.

* B. mit $\frac{1}{2}$ lang vorgezogener, oft plötzlich abgesetzter Spitze. Zähnung nicht feinkerbig, o. B.-Stiel jedenfalls nicht unter 1, meist über 1,5 cm (Fig. 345 b—d, h, o, S. 626).

- K. ganzrandig, aufrecht abstehend, B.-Stiel mit 1—2 Drüsen, Zähnung mäßig scharf (b).

50. *P. orthosepala*: B., dicht verzweigt, bis 1,5 m (wohl aber höher werdend), z. T. dornig, Borke dickschalig, Zw. kahl, $\odot$ lebhaft rotbraun, später kirschbraun o. grau; B. kaum über 9:3 cm, - graugrün, oben ganz, unten bis auf winzige Achselbärte kahlend, Stiel ca. 1,5—2 cm; Bl. kurz nach B. o. mit diesen, ca. 13 mm Dm., weiß o. weißlichrosa, Stiel 8—15 mm, sonst vgl. Fig. 344 c—d¹, Fr. schwarzblau, $\pm$ bereift, Stein abgeflacht, ganz leicht runzelig.

P. o. KOEHNE, Dendr. 311. 1893 (*P. spec.* Texas DIPP., Laubh. III. 626. 1893). — Texas-P. — S.-Texas. — Blz. V. — Frz. IX. — Noch nicht hfg. in Kultur. Ich sah unter dem reichen amerikanischen Material aus Texas keine Form, die hierher gehört hätte**).

*) Herr A. REIDER war so gutig, mir BAILEY'S Cyclop. of Am. Hort. 1901 zu vermitteln, worin BAILEY, S. 1445 ff. die Gattung *Prunus* behandelt. Da BAILEY augenscheinlich die amerikanischen Formen eingehend durchgearbeitet hat, schließe ich mich z. T. an ihn an, kann aber in vielen Fällen ganz abgesehen von den europ. und asiat. Formen — seine Auffassung nicht unbedingt teilen und stütze mich daher in meinen Beschreibungen, wenn es irgend geht, auf spontane Expl. Erst während der Korrektur erhielt ich SARGENT'S Manual of the Trees of N.-Am. 1905, so daß ich zu dessen Angaben nur noch ganz knapp Stellung nehmen konnte.

**) Beschreibung z. T. nach SARGENT, in Gard. a. For. 1894. 184. Fig. 34. Ihr Artrecht ist mir übrigens doch noch etwas fraglich. BAILEY sagt über *orthosepala*: This plant must be further studied before its botanical position can be determined. Possibly it is a geographical form of the Sand Plum or the *hortulana*-group, although the hairiness of the leaves beneath distinguish it.

✱✱ siehe S. 623.

- ++ K. ganzrandig o. ± gezähnt, wagrecht o. zurückgebogen.
B.-Stiel meist drüsenlos, sonst Zähnung ausgesprochen scharf
und feinspitzig (Fig. 345 c, h, S. 626).

51. *P. americana*: $\mathfrak{P}$, bis 11:0,3 m, Krone schlank breitästig, zuletzt etwas überhängend*), Borke dünnchalig, Kztr. z. T. verdornend, (C) Zw. kahl o. leicht beh., rot- o. hellbraun, Kn. spitz-eifg.; B. wie Fig. 345 c o. am Grunde rundlicher, zuw. länglich verkehrt-eifg., ober. — sattgrün, unters. hell gelbgrün, fast von Anfang an ganz kahl o. wie bei *nigra* beh., Textur zuletzt ± derb, etwas runzelig, 5:2,3 12:4,5 cm, Stiel 0,3 1,5 cm; Bl. weiß, ca. 2 cm Dm., unangenehm duftend, Stiele 1 2 cm, sonst vgl. Fig. 344 e -f¹, Fr. zuweilen kaum 2 cm Dm., selten länglich, zuletzt hellviolettrot, ± hell betupft, meist ohne Reif.

ZABEL, in H. d. D. D. G. 247. 1903, erwähnt eine Kulturform mit gefüllten Bl. Vgl. sonst weiter unten.

P. a. MARSH., Arb. Am. 111. 1785 (*P. hiemalis* MICHX., Flor. Bor. Am. I. 284. 1803 ex parte). Amerika-P.; wild P. — New-York bis Montana, Flor., Color. Nach SARGENT (1905) aber auch New-Mex., Ariz., Arkansas, Texas. — Wälder, Gebüsche, hfg. an Ufern und feuchten Orten Dickichte bildend, seltener auf trockenen Böden. — Blz. V (nach *nigra*). — Frz. VIII IX. — Reich an spontanen und Kulturformen. Letzte z. T. Bastarde. Vgl. unter *P. hortulana*.

Von Iowa bis Texas, bes. in den Golfstaaten westlich vom Mississippi kommt eine durch reichliche Beh. der B. und Zw. ausgezeichnete Form vor, die in den B., bes. der Zähnung, z. T. der *nigra* sehr ähnelt und die TORREY zuerst als *P. mollis* beschrieben hat (Fl. U. S. I. 470. 1824). Später wurde sie dann von TORR. et. GR., Fl. of N.-Am. I. 407. 1840, die *nigra* und *americana* vereinigten, als *americana* var. *mollis* geführt. Ich sah wohl ein beträchtliches Material dieser Form, konnte aber über ihre Begrenzung nicht ins klare kommen. Zum Teil gemahnen die sterilen Triebe auch sehr an *americana*, nur sind die B. meist größer und die Zähnung ist breitspitziger. Aus neuen Floren ersehe ich, daß SUDWORTH die Form als *americana* var. *lanata* beschrieben hat und im Herb. des Missouri Bot. Gard. ist sie meines Erachtens nicht mit Unrecht als *P. lanata* (SUDW.) M. et B. (wo?) bezeichnet. Es scheint in der Tat eine gute Art vorzuliegen, deren Formenkreis aber noch ganz ungeklärt ist.

KOEHNE führt 1893 noch eine *P. acuminata* WILLD., die durch drüsenzähne K. und fast grannig-sägezähne B. von *americana* abweichen soll. Die mir vorliegenden KOEHNEschen Expl. können mich nicht davon überzeugen, daß es sich um mehr als eine Form der letzten handelt. Die so weitverbreitete und demgemäß sehr variable *americana* bedarf noch einer eingehenden Untersuchung ihres Formenkreises, wozu das mir zur Verfügung stehende Material nicht ausreicht. Was ich z. B. aus Hort. Plantières als *acuminata* erhielt, könnte fast als *nigra* × *hortulana* gedeutet werden.

51 - 53 *P. americana* × *angustifolia*: *P. hortulana* BAILEY, in Gard. a. For. V. 90. 1892. Ob wir es hier mit einer Art o. einem Bastard zu tun haben, ist immerhin noch etwas fraglich. Da aber nicht nur Kenner wie BAILEY**), REHDER und ZABEL zu dieser Auffassung neigen, sondern auch das mir vorliegende amerikanische Material deutlich intermediäre Formen zwischen den beiden Arten zeigt, die als *hortulana* gehen, so schließe ich mich dieser Annahme an. Allerdings spricht auch manches dafür, daß sowohl die Hybride, wie eine selbständige Art vorliegt, doch kenne ich BAILEYS Originale nicht. Eine Form aber, die sich mit SARGENTS Angaben in der Silva IV. 23. t. 551 völlig deckte, sah ich nicht. Man vgl. Fig. 344 g -h¹ und das B. in Fig. 345 d, das in der Zähnung sehr an *angustifolia* ge-

*) Vgl. Habitus in Forest Leaves VII. 88. 1901.

**) BAILEY, Cycl. of Am. Hort. 1450. 1901, sagt: a group of hybrids of *P. americana* and *angustifolia*, but occurring in the wild from Maryland and Virginia to Texas One branch of the species-group, var. *Mineri* BAILEY is near to *P. americana*, and represents the northward extension of the group: it is known by its thicker and duller leaves (vgl. B. in Fig. 345 o), which are veiny below and coarsely toothed and somewhat obovate in outline, and by a late firm fruit Another branch of the *hortulana* group, var. *Waylandii* BAILEY, l. c., is characterized by strong growth, straight dark-colored twigs, broad, heavy, coarsely toothed shining leaves with 2 - 6 glands on the petioles, late blossoming and thin skinned fruit of good flavor. This form is common in the middle South and Texas.

mahnt, aber in Form und Größe auf *americana* weist. Dieser näher stehende Formen weichen doch ab durch den deutlich gezähnelten K., dünneres, glatteres, glänzenderes Laub und oft mehrdrüsige Stiele. Siehe Anmerkung, S. 626!

(51×53) × 57 *P. hortulana* × *triflora*: nach BAILEY soll diese Hybride in N.-Am. in Kultur sein.

Fig. 344. *Prunus* (*Euprunus*): *a—b*¹ *nigra*: *a* Bl. im L.-Schn. und K.; *a*¹ C.; *b* Fr.; *b*¹ Stein. — *c—d*¹ *orthosepala*: wie *a—b*¹. — *e—f*¹ *americana*: wie *a—b*¹. — *g—h*¹ *hortulana*: *g* Bl. im L.-Schn.; *g*¹ C.; *h* Fr.; *h*¹ Stein. — *i—k*¹ *angustifolia*: wie *g—h*¹. — *l—m*¹ *angustifolia* var. *Watsoni*: wie *g—h*¹. — *n—o*¹ *maritima*: *n* K.; *n*¹ Fr.; *n*¹ Stein. — *p—q*¹ *allegheniensis*: *p* Bl. im L.-Schn.; *p*¹ C.; *q* Fr.; *q*¹ Stein. — *r—s*¹ *rivularis*: *r* Bl. im L.-Schn. und K.; *s* Stein. — *t—u*¹ *umbellata*: wie *r—s* (*b, f, h, k, m, o, q* nach SARGENT, *c—d*¹ n. KOEHNE, sonst Original).

B. stumpflich o. kurz gespitzt, wenn relativ lang gespitzt, so B.-Stiel unter 1 cm o. Zähnung feinkerbig.

Zw. : feinfilzig. B. eifg. o. obovat, stumpf o. kurz spitzig, unters. : bleibend beh., trübgrün, feinkerbsäbig (Fig. 345k), K. ganzrandig, ± abstehend.

52. *P. maritima*: in der typischen spontanen Form ein nur 0,5—3 m hoher b mit $\perp$ niedergestrecktem o. niedergebogenem St. und sparrigen aufstrebenden Zw. mit $\perp$ verdornen Kztr., in Kultur hfg. mehr schmal aufrechter b ; $\odot$ Zw. braunrot, etwas kantig, erst $\odot$ kahlend, kirsch- o. graubraun, feinwarzig; B. im Mittel 4:2—6:4 cm, am Grunde meist 2-drüsig, Stiele 5—8 mm, feinfilzig; Bl. kurz vor B., nicht ganz rein weiß, 10—16 mm Dm., sonst vgl. *allegheniensis*; Fr. wie Fig. 344o—o¹ meist tief purpurn, wenn reif, und $\perp$ bereift, süß, Stein loslich, seltener Fr. gelb, aber sonst in bezug auf Größe und Qualität variabel.

P. m. WANGH., Am. 103. 1781 (*pygmaea* W., Berl. Baumz. 248. 1796; *sphaerocarpa* MICHX., Fl. Bor. Am. I. 284. 1803; *pubescens* POIR., in LAM Encycl. Suppl. IV. 584. 1816; *littoralis* BIGEL., Flor. Bost. ed 2 II. 193. 1824.). — Strandpflaume; Beach P. — Nach BAILEY: Sands of the Seashore, New-Brunswick to Virginia, also at the head of Lake Michigan. — Blz. V, meist später als verwandte Arten, Frz. IX—X. — Seit langem in Kultur.

An diese Art schließt sich an *P. Gravesii* SMALL, in Bull. Torr. B. Club XXIV. 45. 1897, aus Connecticut. Nach mir vorliegenden Expl. zeichnet sie sich aus durch die rundlichen o. eirundlichen, zuweilen leicht obovaten, nur 1,5—3 cm langen B., die $\perp$ o. nur unten auf Nerven beh. sind, Bl. zu 1—3, mit B., Fr. 10—16 mm Dm., fast schwarz mit leichtem Reif, kugelig, Stein dgl., an Basis gespitzt.

Ferner *P. gracilis* ENGELM. et GRAY, in Bost. Jour. nat. Hist. V. 243. 1847 (*P. chucasa* var. $\neq$ *normalis* Torr. et GR., Fl. N.-Am. I. 407. 1840; *P. normalis* SMALL, Fl. south-east. States 572. 1903) die Sow Plum aus Kansas bis Tennessee und Texas (Sandboden), ein kaum über 1,3 m hoher, ausgebreitet und ziemlich fein verzweigter dornloser b , mit anfangs beh., im 2. Jahr kahlenden Zw., $\perp$ schmallänglichen (Fig. 345i) o. etwas obovaten B., die durch ihre grobere, z. T. etwas doppelte und abstehende Zähnung von *maritima* abweichen, obers. $\perp$ lebhafter grün, merklich beh. und unters. dichter beh. sind, 3:1,5—5:3 cm, o. bis 7:4 cm, Stiel 0,3—1 cm; Bl. klein, 6—8 mm Dm., vor B., Stb. länger als verkehrt eifg. C., Stiele bis 12 mm, gleich der Bl.-Achse und den K. (beiders.) $\perp$ beh., Stein fast rundlich, ca. 7:6—7 mm. Vgl. auch folgende Art. —

Es bleibt hier noch zu erwähnen *P. injucunda**) SMALL, in Bull. T. Bot. Club XXV. 149. 1898, aus Georgia und Alabama: b b , bis 8:0,2 m, $\perp$ ausgebreitet überhängend verästelt, $\odot$ und $\odot$, Zw. feinfilzig, B. ei-elliptisch, beiders. $\perp$ kurz zugespitzt, 4:2—7:3,5 cm, oben kurz beh., unters. feinfilzig, Zähnung ziemlich feinkerbig; Stiel 7—12 mm; Bl. klein, kurz vor B., ca. 14—20 mm Dm., $\perp$ beh., K. innen filzig, Fr. oblong, 10—15 mm, Stein spitz-eilänglich, 10:6 mm und 4 mm dick, glatt. — Durch die Form der Steine und die spitzlänglichen B. von *maritima*, durch die kleineren Bl. und Fr. und die größeren, anders gezähnten B. von *gracilis* gut geschieden. Doch kommt diese der *injucunda* in den B. wie es scheint zuw. sehr nahe, die B. der *gracilis* sind unten aber schärfer netzaderig.

$\perp$ $\perp$ $\odot$ Zw. (meist auch jüngste) stets kahl, B. $\perp$ deutlich spitz bis feinspitzig.

Bl.-Achse und K. beiders. o. wenigstens außen kahl.
B. oben ganz, unten fast ganz o. ebenfalls völlig kahlend.

B. vgl. Fig. 345e. Zähnung meist feinkerbig, Kztr. $\perp$ verdornend, Stein länglich, glatt (Fig. 344k¹).

53. *P. angustifolia*: b o. kleiner bis 8 m hoher b , $\perp$ schlank aufrecht verzweigt, Borke dickschalig, Zw. kahl, $\odot$, tief rotbraun, $\odot$ schwarzgrau; B. unters. wenig heller, ziemlich dünn und glatt, 3:1,2—6:2 cm, an Kulturexpl. meist etwas breiter und deutlicher gesägt als an den schmäler blättrigen, sehr feinkerbigen wilden Formen, Stiel meist fein, 6—15 mm, gleich Rippe rötlich, mit 2 Drüsen; Bl. weiß, vor B., ca. 10—15 mm Dm., Stiele kahl, ca. 1 cm, K. auf Fläche beiders. kahl o. innen $\perp$ beh., sonst vgl. Fig. 344i—k¹.

P. a. MARSH., Arb. Am. 111. 1785 (*P. chucasa* MICHX., Fl. Bor.-Am. I. 284. 1803). — Chicasa-P., Chickasaw or Cherokee-P. — SMALL gibt für den Typ an: in dry soil or thickets, New-Jersey to Florida Alabama and the lower Mississippi Valley und für die von SARGENT, in Gard. a. For. 1894. 134. Fig 25, als *P. Wat-*

*) SARGENT, Manual 519. 1905, führt sie als *umbellata* var. *injucunda*. Allein die Steine schon sind doch ganz verschieden an dem mir vorliegenden Material.

soni (Sand Plum) abgetrennte Form Nebraska to Arkansas. Diese letzte soll nur ein bis 3,5 m hoher $\bar{b}$ werden und sich unterscheiden in its thicker leaves, thicker skinned fruit and smaller stone. Der Wuchs ist mehr sparrig ausgebreitet, sonst habe ich mich vergeblich bemüht, Unterschiede zu finden. Die C. sind wohl schmaler (Fig. 344 l-m), die Steine (m!) dicklicher, allem ich kann gleich BAILEY (1904) die *Watsoni* nur als *angustifolia* var. *Watsoni* WAUGH führen.

Im Anschluß hieran ist zu besprechen *P. rivularis* SCHEELÉ, in *Linnaea* XXI, 594, 1848 (*P. texana* SCHEELÉ, l. c. 593, non DIETR. 1845) aus Texas: 1-2 m hoher $\bar{b}$, • Zw. kahl, • lebhaft rotbraun, z. T. leicht kantig, Kn. gedreit, klein, kurz eifg., Seh. leicht klaffend; B. (Fig. 346a) eifg. o. breit eifg., Grund • gerundet, Spitze meist ziemlich plötzlich abgesetzt und langspitzig!, oben kahl o. nur spärlich beh., unters. verstr. locker beh., bes. an Rippe, Serratur etwas grob ungleich aber stumpflichkerbig, Textur dünn, Nerven unters. scharf, 4,5:1,8—7:4,3 cm; Stiel dünn, 8—15 mm, meist mehrdrüsig, overs. locker beh.; Bl. klein, ca. 9—10 mm Dm., hfg. zu 4-5 doldenbüschlig, kahl, nur K. innen beh., fein gezähnt, spitz, C. schmal oblong, so lang wie Stb., Fr. rundlich, hellrot, 13-18 mm Dm., Stein etwa 11-9 mm und 6-7 mm dick, rundlich, aber beidendig plötzlich kurz gespitzt, bes. am oberen Ende scharf, Fläche ganz leicht netzgrubig.

53×57 *P. angustifolia* × *triflora*: nach BAILEY soll diese Hybride in N.-Am. in Kultur sein.

= = B. vgl. Fig. 346 d, S. 629, Zähnung ziemlich spitz und gleichmäßig, Kztr. selten verdornend, Stein mehr rundlich, ± leicht grubig getupft (Fig. 344 u).

54. *P. umbellata*: niedriger $\bar{b}$ o. auch kleiner bis 6.0,3 m messender $\bar{b}$. Verästelung reich, dünn, • ausgebreitet; (•) Zw. kahl, glänzend purpurbraun, selten verdornend, • kirschbraun bis grau; Kn. zweifarben, kurz eifg., hfg. gepaart; B. im Mittel nicht über 5:2,5 cm, vgl. Fig. 346 d, beiders. ziemlich gleich hellgrün, oben ganz, unten • kahlend (Haare oft sehr schwer zu sehen), Zähnung fein, ziemlich spitz und gleichmäßig, an Loden gröber und • doppelt; Bl. meist vor B., ca. 12 mm Dm., weiß, vgl. Fig. 344 t. Stiel zur Frz. bis 18 mm, dünn, Fr. kugelig, 12-15 mm Dm., gelb o. orange mit rotem Hauch, leicht bereift, • sauer, Stein löslich.

P. u. ELL., *Sketch of Bot.* I. 541, 1821 (*Ceras. umb.* TORR. et GR., *Fl. N.-Am.* I. 409, 1840). Dolden-Pflaumenkirsche; Black Sloe. Nach SMALL: about river swamps and hammocks, S. Carol. to Florida, Louisiana and Arkansas — Blz. (III-IV). Frz. VI (VII). Noch sehr selten in Kultur. Steril, wie alle diese Arten nicht leicht sicher zu bestimmen, von *angustifolia* aber durch die spitze Blattsähnung, von *allegheniensis* durch die gewöhnlich zahlreicheren Seitennerven (über 7 gegen meist 5-6) zu unterscheiden. Formenkreis erst unvollkommen studiert.

Bl.-Achse und K. meist außen beh., Stein kaum 10:5 mm, Fläche fast glatt (Fig. 344 p-q¹), B.-Unters. häufig ± beh.

55. *P. allegheniensis**): sparrig ausgebreiteter $\bar{b}$ o. kleiner bis 5 m hoher $\bar{b}$. Zw. kahl, • purpurn, später kirschbraun, grau werdend, kurze Zw. kaum verdornend, Kn. braun, eikegeltg., wenigschuppig, kahl; B. (Fig. 345 f) länglich-eielliptisch o. schmal verkehrt eifg.-elliptisch mit schwach abgesetzter Zuspitzung, 4.2:7:3 cm, oben etwas trübgrün, meist kahlend, unten heller, graugrün, o. Rippe hfg. gebartet bleibend, Zähnung ziemlich eng und gleichmäßig; Stiel • gerötet, beh., bis 1 cm, drüsenlos, nur am • rundlich-keihgen B.-Grund hier und da eine Drüse; Bl. mit B., weiß, ca. 12-14 mm Dm., Stiel bis 12 mm, Stb. — so lang wie C., Fr. tief purpurn, • bereift, etwas sauer, sonst vgl. Fig. 344 p-q¹.

P. a. PORTER, in *Bot. Gaz.* II, 85, 1877 [et in *Gard. a. For.* III, 428, 1890]. Gebirge von Pennsylvania. Blz. IV. Frz. VIII. Erst seit neuester Zeit vereinzelt in Kultur. Was ich aus Kultur steril sah, stimmt nicht mit PORTERS Originalen, sondern zeigt schärfere doppelte Zähnung und drüsiges B.-Stiele.

*) Beschreibung nach Original-Expl.

Im Anschluß an *allegheniensis* sind folgende 2 zu nennen: Zunächst *P. mitis* BEADLE (ex SMALL) aus Georgia und Alabama. Nach den vorliegenden Expl. de. F. et E. EARLE, No. 27: (•) Zw. kahl, schlank, dünn; K. klein, stumpflich, B.

Fig. 345. *Prunus* (*Euprunus*): B. *a nigra* — *b orthosepala* — *c americana* — *d hortulana* — *e angustifolia* — *f allegheniensis* — *g injuncta* — *h lanata* — *i gracilis* — *k maritima* — *l angustifolia* var. *Watsoni* — *m n utahensis* — *o hortulana* var. *Mineri* (Alles $\frac{2}{3}$ n. Gr.) (Orig.)

länglich-elliptisch, ca 6,5:3—9,5:3,5 cm, mit scharfer, an *americana* erinnernder Serratur, oben spärlich beh., unters. feinfilzig, Stiele 7—9(10) mm, filzig; Bl.-Stiele kahl, Bl.-Achseln nur gegen oben • beh., K. beiders., innen dichter, beh., eilänglich,

± ganzrandig, Bl. ca. 13—15 mm Dm., C. oblong, so lang wie die ca. 25 Stb., Fr. bis 2 cm langgestielt, länglich, purpurn, bereift, 10—14 mm, Stein am Grunde gerundet, eispitz, ca. 9:6 mm und 4 mm dick.

Ferner *P. tarda* SARG., in Bot. Gaz. XVIII. (1902). 108 aus Texas bis W.-Louis. und S.-Arkansas: ☉ Zw. kahl, glänzend purpurn, K. schmal, spitz, B. in Form der *injucunda* ähnlich, längl.-elliptisch, o. etwas oblong, beiders zugespitzt, Zähnung fein, etwas kerbig, gleichmäßig, mit kurzen Zahuspitzchen, obers spärlich beh., unten locker weich beh., 5:2,5—8:3,5 cm; Bl. sah ich nicht, nach SARGENT sind sie *mitis* ähnlich, Fr. eikugelig, ca. 14—15 mm Dm., Stiele kahl, 15 mm lang, Stein wie bei *injucunda* beidendig spitz, ca. 12:7 mm und 6 mm dick, glatt.

Von der sehr nahe stehenden *injucunda* außer in der Kahlheit der Zw. durch die glatteren dünneren B. mit der unters. kaum hervortretenden Nervatur und die mehr der Spitze zu gebogenen Seitennerven, wie durch die etwas größeren, mehr rundlichen Fr. abweichend.

2. B. wie in Fig. 346c auffällig verkehrt-eifg. o. lang obovat, Zähnung fein kerbig-knorpelkuppig, K. beiders. kahl, Stb. 30 o. mehr (vgl. Fig. 347d, S. 631).

57. *P. triflora*: kräftig wüchsiger kleiner B., (♂), Zw. schlank, kahl, rundlich, purpurn o. olivbraun, später etwas kirsehenähnlich, Kn. wenig schuppig, kurz eifg., meist zu mehreren beisammen; B. obers. lebhaft tiefgrün, auf Rippe spärlich kurz beh., unten hellgrün, meist ganz kahrend zuletzt, Textur derb, 5—3—9(—10) 5 cm; Stiele 1,2—2 cm, mehrdrüsig, o. beh.; Bl. mit B., meist zu 3, etwas gelblichweiß, ca. 2 cm Dm., Fr. (nach BAILEY) variabel, meist groß und fest, gelb o. leicht gerötet (wie blaupurpurn*), mit deutl. Naht und etwas zugespitzt am Ende, Stein eirundlich, etwa 13:11—12 mm und 8—9 mm dick, ganz leicht runzelig, einseitig etwas scharfkantig.

P. t. ROXBURGH., Hort. Bengal. 38. 1814. — Dreiblütige Pflaume. — Wahrscheinlich in China heimisch. — Blz. V. — Frz. vor *domestica*. — In N.-Am. der Fr. halber jetzt sehr hfg. angebaut. Bildet wahrscheinlich mit *P. Simon* und der im folgenden beschriebenen Art eine besondere Gruppe, zu der auch *P. ichangana* C. K. SCHN., in FEDDE Repert. I. 50. 1905, Beziehungen zeigt. Man vgl. das dort über die Pflaumen O- und Zentral-As. Gesagte. Die *P. thibetica* FRANCH., Pl. David. II. 33. 1888, ein B. mit sehr kleinen Bl. ist mir unbekannt.

Was HOOKER f., in Flor. Brit. Ind. II. 315. 1878 als *P. communis* var. *insititia* beschreibt, ist von den europäischen Formen gut verschieden. Ich fand ∞ Expl. unter dem Namen *P. bokhariensis* ROYLE. ROYLE gibt in Ill. Bot. Him. 205. 1839 keine Beschreibung. Nach den vorliegenden guten Exemplaren, die insbesondere aus Simla stammen und kultivierte Pflanzen darstellen, steht diese Form der *domestica* wohl nahe, weicht aber durch die länglich-obovaten (z. T. etwas an *triflora* gemahnenden) B. mit viel feinerer und engerer Kerbzähnung und unten bes. beim Ausbruch dick weißwolligen Rippen, welche Beh. an Rippe und den angrenzenden Seitennervstücken bis Frz. bleibt, gut ab. Die B.-Oberseiten sind wenig dunkler, verstr. beh. o. fast kahl, die Form der B. wechselt von elliptisch-lanzettlich 5:2—8:3 cm bis länglich-obovat mit aufgesetzter Spitze (bis 10:5 cm), Textur zuletzt — derb, Hauptseitennervenpaare ca. 8—11, Stiel beh., 6—13 mm. Bl. mit B., einzeln, aber an Kztr. zu 5—8(—13) gebüschelt, c. 1,5 cm Dm., gelblich-weiß?, Stiele 10—13 mm, gleich Bl.-Achse kahl, K. nur innen am Grunde beh., länglich-eifg., ± ganzrandig, C. oblong, Stb. ca. 10, 1/2, 1/2, so lang wie C., Gr. die C. überragend, am Grunde o. beh., Frkn. kahl; Fr., wie es scheint, wie eine kleine Zwetsche, Stein ziemlich flach, wie bei *domestica*-Formen, ca. 16:12 mm und 7 mm dick. ☉ Zw. kahl, olivgrün o. — gebräunt, Kn. klein, eikugelig, wenig schuppig, fein beh.

Es treten in N.-Indien aber auch Kulturformen auf, die mehr zu *cerasifera* bzw. *myrabilana* neigen, sich aber durch längere, wenig zahlreichere Stb. und rundliche C., kleinere, anders beh., gezähnte und geformte B. gut scheiden. Wo *bokhariensis* wild ist, bleibt mir z. Zt. noch fraglich. Vielleicht Kaschmir.

57—64 *P. triflora* × *Simon*: einige nordamerikanische Kultursorten sollen dieser Kreuzung entsprechen. Ich sah noch nichts Ähnliches.

*) ROXBURGH jedoch sagt: . . . the size of the common plum, and of the same purple colour, covered with a similar plum . . .

b) Blst. 1—2-, ausnahmsweise 3-blütig*), B. vgl. Fig. 346e—t und 349g—k.

○ ⊙ Zw. beh.

— Bl. meist einzeln, Früchte rundlich, aufrecht, Stein deutlich grubig, ± eirundlich; Kn. ± eirundlich.

— B. der kurzen Triebe im Mittel wie Fig. 346e, ca. 6:3 cm.

58. *P. curdica*: nach den vorh. lebenden Expl. von *spinosa* im wesentlichen abweichend durch Wuchs niedriger, ca. 1 m hoch, ausgebreitet sparrig verästelt, viel weniger verdornend; B. mehr wie *domestica*, jung beiders. beh., später oben fast, unters. kahl, Stiel bis 1 cm; Bl. meist mit B., weiß, ca. 22 mm Dm., fast stets einzeln, Stiele fein beh. bis fast kahl, zur Blz. 1—6 mm, Stb. ca. 20, vgl. Fig. 347o—o², Fr. etc. wie p—q, blauschwarz, bis 14 mm lang gestielt.

P. c. FENZL et FRITSCH, in Sitzb. Akad. Wien, Bd. CI. 1. 627. 1892. — S.-Armenien (lg. KOTSCHY, No. 534). Blz. IV. Frz. IX. — Die wilden Expl. sind reicher beh., in der Kultur scheint die Pflanze z. T. fast ganz an Zw. und Bl.-Stielen zu kahlen und nach einem Expl. im Wiener bot. Garten größere Bl. und größere B. (bis 9:4 cm) zu erhalten. Jedenfalls handelt es sich hier um eine Parallelart der *spinosa*, die noch sehr der näheren Untersuchung bedarf. Die Expl. lg. KOTSCHY, No. 535, die sonst zu *monticola* gehören dürften, scheinen aber z. T. eine der *curdica* sehr nahe stehende Form zu enthalten.

— B. der kurzen Triebe wie Fig. 346f—i, selbst an Lgtr. kaum über 5:2,5 cm.

59. *P. spinosa*: sehr vielgestaltiger, meist niedriger, dornig sparrig ästiger b, zuweilen mehr h, bis etwa 4 m, selten Dorne kaum entwickelt, ⊙ Zw. : kantig-rundlich, rötlichbraun, leicht glänzend, Beh. wechselnd, ⊙ z. T. fein grau überzogen, Kn.***) klein kugelig-eifg., beh.; B. oblong bis lanzettlich o obovat-länglich, 2,0:0,7—4:(1,2—1,5) o. bis 5:2,5 cm, meist zuletzt ziemlich stark bis fast ganz kahlend, o. auch beiders. : beh. bleibend; Zähnung etwas unregelmäßig gröber o. feiner kerbig, Stiel + beh., kaum über 8(—10) mm; Bl. vor o. mit B., weiß, 10—17 mm Dm., Stiele meist kahl, 2—10 mm, sonst vgl. Fig. 347f—i, S. 631.

Gute Varietäten sind vorläufig noch sehr schwer abzugrenzen***). Vielleicht kann man unterscheiden: var. a. *typica*, Bl.-Stiele und Bl.-Achse kahl; hierher *f. praeox* WIM. et GRAB., Fl. Siles. I. 2. 10. 1829 (*f. sessiliflora* BECK, Fl. Nied.-Östr. 819. 1890), Bl. vor B., Stiele meist nicht über 2—6 mm; *f. coactanea* W. et GR., l. c., Bl. mit den B., Stiele z. T. bis 10 mm; *f. plena* (*f. flore pleno* KIRCHN., Arb. Musc. 250. 1864), Bl. gefüllt, vor B.; *f. variegata* ZABEL, in H. d. D. D. G. 249. 1903, B. weiß gefleckt; *f. purpurea* ANDRÉ, in Rev. Hort. 1905. 481, B. purpurn getönt. var. b. *dasyphylla* SCHUR., Enum. pl. Trans. 178. 1866, Bl.-Stiele und Bl.-Achse ± beh. Formen vielleicht denen von a. analog. Hierher wohl *P. sinariensis* HAUSSKNECHT.

*) Bl.-Kn. hgt. zu mehreren gedrängt, sodaß Blst. anscheinend mehrblütig. Nur die (noch nicht in Kultur befindliche) *P. Ramburei* BOISS., Elench., 39. 1838, aus S.-Spanien, eine ganz kahle, niedrige dornig-sparrige Art scheint meist 3-blütige Blst. zu haben. Sie ist ausgezeichnet durch schmallanzettliche B. (Fig. 346p), kleine (1 cm Dm.) bis 1,5 cm lang dünn gestielte Blütchen und *spinosa*-ähnliche, eifg. kleine Fr. mit fein markierten Steinen (Fig. 347e).

**) Vgl. meine Dendrol. Winterstudien, S. 143 und Fig. 186o—u, S. 183.

)) Es scheint nicht ausgeschlossen, daß sich *spinosa* in eine Reihe von Unterarten auflösen läßt, doch machen alle die bisher beschriebenen Arten auf mich den Eindruck lokaler Formen und da es oft schwer ist, zu entscheiden, ob die Autoren *spinosa*-Formen oder solche, die man unter *spinosa* *insititia* einreihen könnte, meinen, so verzichte ich hier auf Aufzählung der Namen.

P. s. L., Sp. pl. 475. 1753. — Schlehe, Schwarzdorn, Black-Thorn; Prunellier
 1. G. überall verbreitet, fehlt in Eur. wohl nur im hohen Norden, geht südlich

Fig. 346. *Prunus (Euprunus)*: B. *a rivularis* — *b subcordata* — *c triflora*
d umbellata — *e curdica* — *f spinosa* — *g domestica* subsp. *incisa*
m—n cocomilia — *o pseudoarmeniaca* — *p Ramburei* — *q—r domestica* subsp. *occidentica* — *s—t ursina* (Alles $\frac{1}{8}$ n. Gr.) (Orig.).

wahrscheinlich bis N.-Afr. und östlich bis Vorderasien *) und Südrußland. Die
 Formen des Kauk. und Transkauk. sind mir z. T. noch fraglich, überhaupt ist die

*) Mir liegen noch folgende Formen vor, die in Bl., Fr., Kn. und dem dornigen
 Wachs am meisten an *spinosa* gemahnen, aber auch Beziehungen zu *pseudoarmeniaca* und
ursina andeuten: lg. ORPHANIDES, No. 422 (Griechenland) und Macedon. M. Athes

S. und O. Grenze heute noch nicht sicher ermittelt. — Liebt trockene steinige Orte, Waldränder, Hecken, seltener als Unterholz im lichten Walde und an mehr feuchten Orten. — Blz. (III—)IV—V. — Frz. VII—VIII. — Vgl. die Anmerkung!

59×60 *P. spinosa* × *domestica* subspec. *insititia*: *P. fruticans* WEIHE, Flora IX. 748. 1826 (*P. spinosa* var. *macrocarpa* WALLR., Sched. crit. 217. 1822). Indem ich an diesem Namen festhalte, schließe ich mich insbesondere an die Ausführungen von BOUTIGNY⁶⁾, Exsicc. No. 2444 (Bull. Soc. Dauph. 1880/82) an. Dieser präzisiert die Diagnose kurz wie folgt: aufrechter b, 3 m o. höher, jüngere Zw. dornlos, erst ältere z. T. verdornend, B. obovat, spitz o. stumpf, hgt. ei-elliptisch, spitzer, 4 : 5 : 2—3 cm im Mittel, Bl. zu 1—2, wenig bis doppelt größer als bei *spinosa*, Fr. kugelig o. fast so, 14—18 : 13—16 mm, schwarz-violett. Natürlich wechseln Beh., B-Form etc. außerordentlich und man kann gewiß hier wieder mehrere Formen auseinanderhalten. Die Kn. sind spitzlänglicher, die Zw. rundlicher, die Steine flacher und weniger grubig. Allein solange wir nicht sicher wissen, wie wir den Begriff *P. insititia* zu umgrenzen haben, solange uns die spontanen Formen der *domestica* noch unklar sind, ist es schwer, eine derartige Hybride sicher zu deuten. Vgl. das unter *domestica* Gesagte.

— Bl. meist gepaart, Fr. länglich, z. hängend, Stein glatt o. fast glatt, flacher, Kn. spitz eifg.

60. *P. domestica*^{*)}: b bis kleiner b, bald mehr, bald kaum oder nicht dornig, z. Zw. feinfilzig o. verkahlend, Kn. — beh.^{**)}; B. wie Fig. 346k l. q r. oberseits — bis ganz kahlend, unten wenigstens an Rippe — feinzottig beh. und gebartet bleibend, ca. 4 : 2.5—8 : 5 cm; Stiel 1—2 cm, beh., meist drüsig; Bl. meist zu 2, rein- o. grünlichweiß, ca. 2—2.5 cm Dm., Stiele z. beh., K. kahl o. innen spärlich beh., Bl.-Achse meist kahl, vgl. Fig. 347k, Fr. schwarzblau, etwas süß o. herb; Stein vgl. 1—n; im übrigen beachte man die var.

Ich unterscheide die Formen vorläufig wie folgt:

Subspec. a. *insititia* (*P. insit.* L., Amoen. IV. 273. 1755, Haterschlehe: hgt. b. meist z. dornig, z. Zw. gewöhnlich feinfilzig, Kn. dgl. — beh., B. ei-elliptisch, unters. bes. an Nerven beh., Stein nicht lösch: hierher f. *subsykestris* BOUTIGNY, in Bull. Soc. Dauph. fasc. VIII. 1881: Dorne reichlicher, Bl. reinweiß, K. kahl, und f. *pomariorum* BOUT., l. c., Bl. etwas grünlichweiß, Zw. kaum dornig, K. oben — beh. — Ferner gehören zu dieser Subspezies insbesondere wohl die Kulturformen var. *syriaca* KOEHNE, Dendrol. 316. 1893 (*P. syr.* BORKH., Handb. Forstb. II. 1406. 1863) die Mirabelle mit gelben Fr. und var. *italica* (*P. italica* BORKH., l. c. 1409; *P. claudiana* POIR., in LAM. Encycl. V. 677. 1804) die Reineclaudie mit kugeligen meist grünlichen Fr.

1862), sowie in m. Malevo Laconiae, Fr.-Zw. mit filzig zottiger Beh., elliptischen ca. 3 : 1.7 cm messenden, beiders. (unten mehr) filzigen Bl., und Fr. von ca. 1.3 cm Dm. mit einem der *spinosa* ähnlichen Stein. — lg. ? (Griechenl., Chrikelli?, Karithena?, und ganz analog: ad sepes inter Hag. Vlasios (m. Olenos) et Kalaoryta), sonst wie vorige, nur Steine der kleinsten Fr. mehr wie bei *pseudosarmeniaca*. — lg. SINTENIS, No. 272 (bei Troja, Kl.-As., dgl. No. 244, beides filzige Blzw. mit *spinosa*-ähnlichen Bl. (15 mm Dm., deren Stiele, Bl.-Achsen und K. — beh.; jüngste B. anscheinend den griechischen Formen analog. Ob es sich hier etwa um eine neue Art handelt, die bisher als *insititia* oder *spinosa* angesehen wurde, ist mir noch fraglich. Abweichend sind wieder die Expl. von Troja lg. SINTENIS, No. 294 (Bl.) und 442 (Fr.), die auf eine mehr dornlose, b-artige Form deuten mit langer gestielten, etwas größeren Bl. und kahleren B. Ohne reichliches Material, vor allem in allen Stadien vom selbstem b, ist nichts Sicheres zu sagen! Ich führe aber alle diese Formen an, um Andere anzuregen, bei günstiger Gelegenheit Material zu sammeln und das vorhandene vergleichend zu studieren.

Nach einem mir vorliegenden Original WEIHE'S (No. 664) bleibt es mir allerdings etwas zweifelhaft, ob WEIHE nicht doch nur eine *spinosa*-Form meint.

*) Den Nomenklaturregeln nach ist man leider genötigt, den Namen *domestica* als Hauptnamen zu verwenden, obwohl es dem Geist der Darstellung angemessener wäre, wenn man *insititia* dafür sagte. Jedenfalls wolle man sich durch die Namen nicht verleiten lassen, in *domestica* die phylogenetisch ältere, spontane Form zu sehen, denn was wir unter *domestica* zu verstehen pflegen, sind nur von *insititia* abzuleitende Kulturrassen.

*) Vgl. meine Dendrol. Winterstudien, S. 142 und 143 und Fig. 188, S. 185.

Subspec. b. *oeconomica* (*P. oec.* BORKH., l. c. 1401). Hauspflaume, Zwetsche: 6. Zw. kahl o. verkahlend, B. zuweilen stärker kahlend, oft noch größer als oben angegeben. Bl. grünlichweiß, K. innen — beh., Fr. oval o. rundlich, Stein glatt, loslich, flacher. — Eine verwilderte Form mit etwas verdornenden Ästen tritt hie und da auf, *f. silvestris* BORKH., l. c., doch bedürfen viele Formen noch sehr der Klärung.

P. d. L., Sp. pl. 475. 1753 [exkl. var. *myrobalana* et var. div.] (*P. communis* HRDS., Fl. angl. ed. II 1. 212. 1778). — Stammt höchstwahrscheinlich aus Vorderasien**) bez. O.-Europa (ob N.-Afrika?***). — Blz. IV—V. — Frz. VIII—IX. —

Fig. 347. *Prunus*: a—c *subcordata*: a Bl. im L.-Schn.; a' C.; b Fr.; c Steine. — d *triflora*. Bl. im L.-Schn. und K. — e *Ramburg*: Steine. — f—i *spinosa*: f f' Blst.; g Bl. im L.-Schn. und K.; h C.; h Fr.; i Stein. — k—l *domestica* subspec. *insitita*: k wie g; l Stein; l' Stein der in Anm.**) zitierten ersten Form. — m—n *domestica* subspec. *oeconomica*: m Bl.; m' C.; m'' K.; n Stein. — o—q *curdica*: o Bl. im L.-Schn.; o' C.; o'' K.; p Fr.; q Stein (p—q nach FRITSCH, sonst Orig.).

Durch Kultur seit alters weitverbreitet und verwildert. Ob im Gebiet überhaupt wilde Formen auftreten, ist mir sehr fraglich. — In O.- (und wohl auch M.-) Asien fehlt der *domestica*-Formenkreis. Vgl. meine bei *triflora* S. 627 zitierte Arbeit.

Auffällig sind Expl. der *insitita* var. *glaberrima* WIRTG., Rhein. Reise-Fl. 67. 1857 (F. SCHULTZ, Herb. Norm. III. No. 246) mit rundlich obovalen Laube, die m. E. mit dem *domestica*-Formenkreise nichts zu tun hat und vielleicht eine *spinosa* × (? *myrobalana*)-Form darstellt.

*) Die BECHSTEINschen (Forstbot. ed. V. 424. 1843) *P. exigua*, *lutea*, *avicularis*, *rubella*, *subrotunda* und *tinaria* sind alles nur Kulturformen, deren rechte Bewertung erst auf Grund exakter Kulturversuche möglich wäre. Mit der Gliederung, die ZABEL, im H. d. D. D. G. 250 51, 1903, den Formen der *domestica*, *insitita* etc. gibt, kann ich mich nicht befreunden, da ich Kulturformen, bzw. Rassen nicht als spontane Arten hinstellen möchte.

**) Vgl. z. B. SINTENIS, No. 5164, Paphlagonien.

*** Vgl. BALANSA, No. 949; REUTER, 1848, aus Algier.

○○ ⊙ Zw. kahl*).

* Bl.-Stiele meist 2—3mal so lang wie Bl.-Achse.

† Bl. meist zu 2, B. (Fig. 349 k) stets kahl. Stiele meist kaum $\frac{1}{6}$ so lang, K. meist ganz kahl, Stb. 30 o. mehr, ♀.

61. *P. monticola*: kaum dorniger, ziemlich schlank aufrecht verzweigter ♀, bis 4 m. ⊙ Zw. — olivbraun, Kn. kurz eifg.; B. aus rundlichem o. keiligem Grund länglich-eifg., etwas vorgezogen sich zuspitzend, Hauptnerven meist jeders. über 6, die kerbige Serratur etwas gröber und gleichmäßiger als bei *cerasifera*, 6—8:1—3,5 cm o. bis 11:5,5 cm vor o. mit B., weiß, wenig duftend, Stiel zur Frz. 12—18 mm, kahl, Fr. pflaumenrot, vgl. Fig. 348 a—c.

P. m. K. KOCH, Ind. sem. hort. berol. App. 1854. — KOCH gibt an: nördl. Kl.-As. und Armenien, ich möchte hierher ziehen KORSCHY, No. 535 ex parte (Kurdistan, Boglan [ob Bohtan?]), vgl. Stein Fig. 348 c, BOURGEAT, No. 272 (collines à Baibout) und SINTENIS, No. 7521 (Günnischkhane) und No. 3974 aus Paphlagonien.

Blz. IV. — Frz. VII. — Da das spontane Material der in den Herbarien liegenden *Prunus* immer nur Bruchstücke darstellt, deren Zusammengehörigkeit meist fraglich ist, so ist es sehr schwer, sich ein scharfes Bild der tatsächlich vorh. Arten zu machen**).

† † Bl. meist einzeln, B. wenigstens längs der Rippe unters. beh., Stiele meist über $\frac{1}{5}$ so lang, Stb. kaum 30, meist ♀ o. kleiner ♀.

62. *P. cerasifera*: ziemlich sparrig ausgebreitet feinästiger, z. T. etwas dorniger ♀ o. in Kultur mehr kleiner ♀ mit breit rundlicher Krone, ⊙ Zw. meist deutlich grün, ⊙ graubraun***; B. an Blzw. der spontanen Pflanzen meist nicht über 3:2,5 cm, Seitennerven meist kaum 6, an Loden z. T. rundl-eifg. bis 8,5:6 cm, Stiele † beh.; Bl. einzeln, mit B., weiß, ca. 22 mm Dm., K. innen am Grunde meist beh., vgl. Fig. 348 d—e, Fr. gelb. Siehe aber das Folgende.

Ich lege dem Typ die Expl. des Herb. Flor. Ross., No. 664 zugrunde. Augenscheinlich ist dieser im Kauk., Transkauk. und N.-Pers. bis Turkestan verbreitet und auch seit alters in Kultur genommen. Die Pflanzen aus Thessalien (lg. SINTENIS, No. 191), Bulgarien (lg. WAGNER, No. 37; BAENITZ, Herb. Eur., lg. STRBRNY) und Serbien (lg. BORN-MÜLLER, No. 120) sind kaum abzutrennen. In den Zwischengebieten scheint *divaricata* z. B. in Bithynien (Olymp) aufzutreten. Vgl. BORN-MÜLLER, No. 4471. Wenn ich dies als subspec. *divaricata* (*P. d.* LEDEB., Ind. sem. hort. Dorp. 6. 1824 [et Ic. Plant. Ross. I. 7. t. 13. 1829]) ansehe, so stelle ich ihr in subspec. *myrobalana* (*P. domest.* var. *myrobalana* L., Sp. pl. 175. 1753) die wahrscheinlich von ihr abzuleitenden Kulturformen gegenüber. Es spielen augenscheinlich auch hybride Formen etc. mit hier hinein, und es ist durchaus nicht leicht, das, was als Myrobalane oder als *P. cerasifera* in den Gärten geht, nur einigermaßen sicherzustellen. Eine auffällige rotblättrige Rasse ist die var. *Pissardi*†) KOCH., Dendr. 317. 1893 (*P. Pissardi* CARR., in Rev. Hort. 1881. 190; *cerasifera* var. *atropurpurea* DIPP., Laubh. III. 633. 1893). Die Myrobalanen-Fr. sind — lebhaft o. braunrot, vgl. Fig. 348 f—g. Eine Anzahl Gartenformen, die als *angustifolia pendula*, *elegans*, *gigantea* usw. gehen, vermag ich vorläufig nicht mit Sicherheit einzureihen.

P. cer. EHR., Beitr. Naturk. IV. 17. 1753 (excl. Heimat). — Sonst vgl. oben! — Blz. IV—V. — Frz. VIII.

*) Man vgl. auch unter ○ S. 628, da es ja von *domestica* kahle Kulturrassen gibt und auch *P. curdica* z. T. kahle Zw. besitzen könnte. K. KOCH schreibt seiner *monticola* fein beh. Zw. zu. Soweit ich diese Art kenne, hat sie ganz kahle Zw.

**) So liegen im Herb. BOISS. noch Expl. von HAUSSKNECHT, No. 1367 (Boelam Dagh, Abda Karabi) und 1895 (N. Syrien, bei Aleppo) die beide unter sich — verschieden am ehesten auf *monticola* deuten. Ebenso lg. POSE, No. 53. Ich möchte nur andeuten, daß sich *monticola* eng an die, wie es scheint, weitverbreitete *cerasifera* anschließt; vgl. das dort Gesagte.

***) Vgl. meine Dendrolog. Winterstudien, S. 183 (1903) sub *P. myrobalana*.

†) In Rev. Hort. 1905. p. 273 et 392 (c. tab. color.) beschreibt ANDRÉ eine auffällige *Pissardi* nahe stehende wohl hybride Form als *P. blireiana* fl. pl.

62×68 ? *P. cerasifera* subsp. *myrobalana* × *P. armeniaca*: *P. dasycarpa* EHRH., Beitr. VI. 90. 1791 (*Armeniaca dasyc.* BORCKH., Handb. Forsth II. 1392 1803; *P. Arm.* var. *dasycarpa* K. KOCH, Dendr. I. 88. 1869; *sibirica* HORT. NONN.); bis etwa 2.5 m hoher *h*, Verzweigung schlank, etwas sparrig, *•* Zw. olivbraun, kahl, Kn. eifg., mehrschuppig, kahl; B. vgl. Fig. 349f, durch ungleichmäßigere grobkerbigere Zähnung von *cerasifera*-Formen abweichend, mehr breit eifg., Zu- spitzung oft ähnlich *Armeniaca*, unters. an Rippe *•* zottig beh.; Stiel beh. und meist drüsig; Bl. auf recht kurzen, dicht beh. Stielen, weiß. Fr. schwärzlich purpurn, fein beh., von Aprikosengeschmack, sonst wie Fig. 348h—k. — Ursprung noch nicht ganz sichergestellt. Seit langem in Kultur.

•• Bl.-Stiele $\frac{1}{2}$ kürzer oder nur wenig länger als Bl.-Achse, vgl. Fig. 348l—n.

Fig. 348. *Prunus*: a—c *monticola*: Fr. und Stein, vgl. Text S. 632. — d *cerasifera* subsp. *divaricata*: d Bl. im L.-Schn. und K.; d' C.; e Steine. f—g *cerasifera* subsp. *myrobalana*. Fr. und Steine. h—k *dasycarpa*: h Bl. im L.-Schn.; h' C.; i Fr. im L.-Schn.; k Stein. — l—n *cocomilia* var. *brutia*. l Bl. im L.-Schn. und K.; l' C.; m Fr. im L.-Schn.; n Stein. — o *ursina*: Steine (h—k nach KOEHNE, sonst Original).

63. *P. cocomilia**): *h* bis kleiner *h*; ich sah Expl. bis ca. 5–0.25 m. Krone dicht kurztriebzig, breit eifg., etwas überneigende Verzweigung; Zw. kahl, *•* oliv- o. rotbraun, Kn. klein, *•* kugelig-eifg.; B. vgl. Fig. 346m—n, S. 629, o. etwas mehr rundlich-obov. an Blzw., an Lgtr. spitzlicher und deutlicher kerbzählig, kahl, o. auf der wenig helleren Unters. längs Rippe *•* spärlich zottig, LS 1.2–5:2.5 o. bis 7:4.5 cm, Stiel 7–13 mm, Bl. meist gepaart, kurz vor o. mit B., etwas grünlich-weiß, 8–10 mm Dm., kahl, Fr. gelb, ziemlich wohlschmeckend.

Man unterscheidet, je nachdem die Frucht mehr länglich eifg. o. rundlich (wie mo ist, eine var. *typica* FIORI et PAOL., Fl. anal. Ital. I. 568. 569 und var. *brutia*, l. c.

P. c. TENORE, Fl. neap. Prodr. suppl. 2. p. LXVIII. 1811. — Italienische Pflaume. Kalabrien, 600–1500 m. Gebüsch. — Blz. IV–V. Frz. VIII. In Wien ganz hart, reich tragend, die Bl. wenig auffallend.

*) Dies die erste Schreibweise, später (1830), in Fl. Neap. III. unter t. 104, hieß es *cocumilia* und IV. S. 272 *cocumiglia*.

Ganz außerordentlich nahe steht der *cocomilia* die *P. pseudoarmeniaca* HELDR. et SARF., in Boiss. Diag. sér. 2. V. 96. 1859 aus Epirus und Thessalien, von der mir leider keine Blzw. vorliegen. Die ∞ Fr. Expl. unterscheiden sich eigentlich nur durch im allgemeinen etwas spitzere B. (Fig. 346 o, S. 629) und kleinere, ca. 2 cm lange eiförmliche pflaumenrote Fr., deren Steine aber ganz ähnlich sind. Vielleicht doch nur als Varietät der *cocomilia* zu fassen. In Kultur kaum erprobt. Scheint Kalk zu lieben und geht im Gebirge bis 200 m. Die Expl. lg. SINTENIS, No. 1217 aus Thessalien stellen meines Erachtens eine beh. blättrige Form dar, denn sie weichen nur in der Beh. der B. ab, Fr. sonst ganz analog. Ich nenne sie var. *puberula*.

Hier wäre noch zu erwähnen: *P. ursina* KOTSCHY, in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 1864, S. 435. Die Art hat in der typischen Form filzig beh. ∞ Zw., im übrigen ist sie besonders durch folgende Merkmale gekennzeichnet. $\text{b} = \text{h}$, bis 3.5 m, Verzweigung kräftig, kaum verdornend, Kn. ziemlich spitz, langkegelig, vielschuppig; B. vgl. Fig. 346 s. t., 2:1.5—5:3 cm, Spitze abgerundet o. kurz. Textur zuletzt dicklich, ober. wenig dunkler, ∞ , unters. reichlich etwas gelbzottig beh., bes. an Rippe; Stiel dgl., 1—2 cm; Bl. vor B., wohl etwas gelblichweiß, ca. 18 mm Dm., lfg. recht kurz gestielt, Stiel, Bl.-Achse und K. (bes. am Grunde beider.) dicht zottig, Achse auch innen spärlich, K. aber länger als sie, z. T. gezähnt, C. oblong, Stb. über 30, den C. ∞ gleichlang, Frkn. spärlich beh.; Fr. fast kugelig, 3—8 mm lang gestielt, bis ca. 2.5 cm Dm., fast kahl, violettrot, Stein glatt, wie Fig. 348 o.

Diese Art scheint auch in einer kahlen o. fast kahlzweigigen Form mit kahlen Bl.-Stielen und Bl.-Achsen aufzutreten, wenigstens kann ich die Bl.-Zw. lg. Post, No. 362, sonst nicht vom Typ trennen. Bei beiden kommen die Bl. einzeln o. gepaart aus den Kn., nun liegt aber noch ein Expl. vor (lg. Post, No. 52), wo sie bis zu 3—4 aus jeder Kn. kommen. Sonst ist alles analog, nur Stb. etwas kürzer und C. etwas mehr obovat. Besondere Varietäten möchte ich vorläufig nicht aufstellen. BOISSIER, Flor. Or. II. 625 1872, erwähnt eine gelbfrüchtige var. *flava*.

Verbreitung Libanon, Antilibanon bis N.-Syrien. Doch scheinen noch mehrere höchst interessante Formen vorzukommen, deren genauere Kenntnis einst vielleicht Licht auf den Ursprung unserer Kulturformen werfen kann. Ich schließe *ursina* wohl am besten an *cocomilia* an. Sie erinnert auch an die ohnedies nur sehr schwer von *Euprunus* geschiedene *Armeniaca*-Gruppe.

II. B. wie in Fig. 333 g, S. 594, Nervatur auffällig steil aufrecht, Bl. und Fr. vgl. Fig. 350 a—c.

64. *P. Simonii*: aufrechter, schlanktriebiger, bis etwa 3 m hoher b , (∞) Zw. kahl, rotbraun o. etwas violett überlaufen, Laub-Kn. kurz eifg. stumpf; B. pfirsich-ähnlich, aber durch die Nervatur von allen *Prunus* verschieden, sattgrün, unters. etwas achselbärtig, Stiele gerötet; Bl. weiß, kurz vor o. mit B., ca. 2.5 cm Dm., Stiele ca. 7 mm; Fr. ziegelrot, wohlschmeckend, vgl. Fig. 350 a—c.

P. Sim. CARR., in Rev. Hort. 1872. 111. c. tab. col. — Aus China stammend aber spontan noch nicht aufgefunden. Eine Art die zur *triflora*-, aber auch zur *Armeniaca*-Gruppe Beziehungen hat, im Grunde aber isoliert steht. Der Fr. wegen jetzt mehr angebaut in N.-Am., wo, wie erwähnt, Hybriden mit *triflora* in Kultur sein sollen.

B. Bl. $\pm$ sitzend, B. wie in Fig. 349 a—e.

Sekt. b. *Armeniaca* W. D. J. KOCH, Syn. Fl. Germ. 205. 1837. Frkn. und Fr. meist beh., B. stets gerollt in Kn.-Lage (Aprikose: Apriecot: Abricotier).

○ B. ziemlich grob und ungleich gezähnt (Fig. 349 b, e).

* Frkn., Fr. und Bl.-Stiele kahl, Bl. mit B.-Ausbruch.

65. *P. brigantiaca*: b o h , 2—5 m, Verzweigung gestreckt, nicht dornig, (∞) Zw. kahl, oliv- o. rotbraun, Kn. kurz eifg., spitzlich; B. wie Fig. 349 b, ober. sattgrün, meist kahlend, unters. heller, ∞ zottig an Rippe o. auch Nerven beh. bleibend, 1:3—7.5:5 cm, zuletzt ∞ derb; Stiel bis 2 cm, drüsig; Bl. an Kztr. zu 2—5 gedrängt, weiß, ca. 1.5 cm Dm., Fr. von der Größe einer kleinen Reineclaudé, gelb, etwas herbe, kugelig, mit kurzen Spitzchen, Stein wie Fig. 350 e, Flächen glatt.

P. b. VILL., Fl. dauph. III. 535 1789 (*Armen. brig.* PERSOON, Syn. II. 36. 1807; *P. Armeniaca* subsp. *brig.* DIPPEL, Laubholz. III. 632. 1893. — Alpen-

Pflaume: — französ. Alpen, zwischen 13—1800 m, steinige Hänge, Gebüsche. — Blz. V. — Frz. IX. — Bei uns nur für geschützte Lagen. Aus den Fr. wird das „huile de marmotte“ gewonnen.

✱✱ Frkn., Fr. und Bl.-Stiele beh., Bl. vor B.

66. *P. mandschurica*: nach von mir gesehenen Expl. ein kleiner, bis ca. 5 m hoher, flachkroniger B., mit schlanker, ausgebreiteter leicht-überneigender Verzweigung; • Zw. kahl, grünlich o. olivbraun, Kn. eintg., mehrschuppig; B. satzgrün, unters. wenig heller, hier etwas achselbärtig o. kahl, Form wie Fig. 349c o. mehr

Fig 349. *Prunus*-B.: a *Mume* — b *brigantiaca* — c *sibirica* — d *Armeniaca* — e *mandschurica* — f. *disycarpa* — g. *disarcata* — h — i *disarcata* subsp. *macrobalana*; i var. *Pissardii* — k *monticola* (Alles ⁸/₅ n. Gr.) (Orig.).

rundlich, 5:3 o. 7:3 bis ca. 11:7 o. 13:6 cm, Stiel bis 3 cm, mit o. ohne Drüsen am Ende; Bl. einzeln, an Kztr. gedrängt, anfangs hellrosa, später weißlich, reichlich 2 cm Dm. Achse und K. sehr feinhaarig, sonst analog *Armeniaca*, Fr. klein, flach eirundlich, ca. 2,5 cm lang, grünlichgelb, wenig saftig kaum genießbar, Stein wie Fig. 350f.

P. m. KOEH., Dendr. 318 1893 (*P. Armen.* var. *mandsch.* MAX., in Bull. Acad. Imp. Sc. Pétersbg. XXIX. 87. 1884). — Mandschurei-Aprikose. — S-Mandschurei

— Blz. III—IV. — Frz. VII—VIII. — In Kultur noch selten, in Wien ganz hart, reich blühend und fruchtend.

CC B.-Zählung gleichmäßiger, feiner (Fig. 349 a, c d).

+ B. mit mehr allmählich ziemlich lang vorgezogener Spitze (c).
Stein $\pm$ glatt, fast flügelig kantig (Fig. 350 h).

67. *P. sibirica*: breit aufrecht verästelter $\mathfrak{H}$, bis etwa 5 m, Zw. kahl, $\bullet$ olivbraun o. $\bullet$ gerötet, ($\bullet$ hell- o. rotbraun, Laub-Kn. stumpflich, Bl.-Kn. spitz eigt.; B. jung schön gerötet, dann lebhaft grün, oben kahl, unten nur wenig o.

Fig. 350. *Prunus*: a—c *Simonii*: a Bl. im L.-Schn.; a' C.; b Fr. im L.-Schn.; c Stein. — d—f *brigantia*: d Bl. im L.-Schn. und K.; e Stein. — f *mandschurica*: Stein. — g—h' *sibirica*: g Bl.; g' C.; g' Gyn.; h—h' Steine. — i—l *Armeniaca*: i Bl. im L.-Schn.; k C.; l Stein. — m—o *Mume*: m Bl. im L.-Schn. und K.; m' C.; n Fr.; o Stein (a—c nach KOEHNE; n nach S. et Z., sonst Orig.).

kaum achselbärtig, ca 5:3—8:3.5 o. 7:5 cm. Adern und Stiele $\bullet$ gerötet, diese 1—3 cm; Bl. einzeln, anfangs leicht rosa, dann weiß, ca 3 cm Dm., Stiel, Achse und K. kaum beh., sonst vgl. Fig. 350 g o. *Armeniaca*; Fr. der *mandschurica* ähnlich, gelblich, wenig fleischig, kaum genießbar, Stein wie h o. h'.

P. L., Spec. pl. I. 474 1753 (*Armen. sib.* PERS., Syn. II. 36. 1807; *P. Armen. var. sibirica* K. KOCH, Dendrol. I. 88. 1869 [et MAX. 1884]). Sibirische Aprikose. — Dahurien, SO.-Mandsch. Blz. IV. — Frz. VII—VIII. Geht z. T. als *Mume* in den Gärten, siehe diese.

- * * B. mit mehr plötzlich abgesetzter Spitze (Fig. 349 a, d), Stein + leicht grubig-runzelig, wenn glatt, so jedenfalls Fr. deutlich saftig, Fleisch löslich und Stein einseitig scharfkantig.
- + B.-Unters. bis auf geringe Achselbärte o. ganz kahl, vorwiegend rundlich (Fig. 349 d), Fr. groß, saftig, Fleisch löslich, Stein einseitig scharfkantig (Fig. 350 l).

68. *P. Armeniaca*: $\text{b} - \text{h}$, bis 10 m, Krone breit aufrecht verästelt, Zw. kahl, $\odot$ rundlich, stark glänzend olivgrün bis cornusrot, Lent. später sehr auffällig, Rinde am $\odot$ Holze stark aufreißend, Kn. vgl. Fig. 353 g m, S. 644; B. etwas gröber, ungleichmäßiger und kerbiger gezähnt als bei *sibirica*, Grund zuw. h herzförmig, 4 - 10 : 3,5 - 7 cm, Stiel bis 3 cm; Bl. vor B., ca. 2,5 cm Dm., anfangs rötlich, dann weiß, sonst vgl. Fig. 350 i - l, Fr. gelb, gerötet, wohlschmeckend, ca. 5 cm im Mittel Dm.

Die ∞ Kultursorten können hier nicht besprochen werden. Es sei nur auf var. *pendula* DIPP, Laubholz k III, 631, 1893, mit hängenden Zw. und die *variegata* mit $\pm$ weißbunten B. hingewiesen.

P. A. L., Spec. pl. 474, 1753 (*Armeniaca vulg.* LAM., Encycl. I. 2, 1780). — Gemeine Aprikose. Dahurien, Mandschur., N.-China, sowie Kauk., Transkauk., in den Zwischengebieten spontanes Vorkommen noch unsicher, durch Kultur in O.-As., Indien, ganz Eur., N.-Afr. etc. seit alters verbreitet. — Blz. IV. — Frz. VII(—VIII).

- + + B.-Unters. wenigstens längs der Rippe v zottig, Form der B. wie Fig. 349 a, Fr. ähnlich voriger, aber Stein löcherig, h rundlich, mit haftendem Fleisch (Fig. 350 o).

68. *P. Mume*: habituell wie voriger, nur meist kleiner, B. mehr eiförmig o. oboval o. elliptisch, mehr wie *sibirica* in der Zuspitzung, doch Serratur ähnlich *Armeniaca*, 4 : 2,5 - 10 : 6 - 7 cm, jung auch oberseits v beh., später bis auf Rippe unters. meist kahlend, Stiel bis 22 mm, meist v beh. bleibend; Bl. rosa, duftend, ca. 2 cm Dm., Fr. bei uns meist kleiner als in Fig. 350 n, gelblich, v bräunlichrot überlaufen, kaum genießbar, sonst vgl. m—o.

Die von MAXIM., in Bull. Acad. Pétersb. XXIX. 85, 1884, geführte var. *pleiocarpa* mit 3—7 Erb. und stärker kahlenden B. bei uns kaum in Kultur.

P. M. S. et Z., Fl. jap. 29. t. 11, 1835 (*Armen. Mume* SIEB., Syn. oecon. n. 367, 1830). — Japan. Aprikose. S.-Japan; dort und auch in China seit alters kultiviert und mehrere Gartenformen vorhanden. — Blz. IV in Heimat oft Ende XII, Frz. VIII. Von der in den B. oft sehr ähnlichen *sibirica* durch die stärkere Beh. der B.-Unters. und die deutlich löcherigen Steine verschieden. Bei *sibirica* sind sie zuw. nur leicht runzelig wie in Fig. 350 h¹, jedenfalls aber scharfkantig, nicht seitlich durchweg gerundet wie in o.

Gattung 148. *Padus* BORCKH. in ROEM. Archiv I. 2, 38, 1797, ex parte.
[Traubenkirsche.]

Vgl. oben S. 589; $\text{b} - \text{h}$, B. in Kn. gefaltet, sommer-, o. selten immergrün, Bl. in vielblütigen, gestreckten, am Grunde beblätterten Trauben, ziemlich klein, weiß, Bl.-Achse glockig, Fr. kleine o. größere Kirsche mit glattem o. runzelig grubigem Stein. — Arten sämtlich erwähnt.

A. B.-Unterseiten deutlich papillös^{*)}, B. groß, vgl. Fig. 352 k, n, S. 641, B. siehe S. 639.

^{*)} Nachfolgende, noch nicht eingeführte, chinesische Arten haben ebenfalls bis deutlich papillöse B. *Padus Wilsoni* C. K. SCHN., in FEDDE, Repert. I. 60, 1905, aus Hupei (WILSON No. 2077), ein an *nepalensis* erinnernder h , aber von dieser verschieden durch die unters. weich beh., 9—13 : 4,5 - 6 cm messenden B. (Stiele 7 - 15 mm), die deutlich die C. überragenden Stb. und vor allem die kleineren Fr. die denen von *cornuta*

C B.-Stiel meist mit Drüsen, B.-Grund fast stets gerundet o. herzförmig, auch wenn sehr verschmälert, B.-Rand eng sägezahnig. Fr. 12–13 mm Dm., Stein leicht runzelig (Fig. 351 w—w²).

1 *P. cornuta*: kleiner, etwas sparrig ausgebreitet, locker verästelter B., Zw. dick, jung kahl o. feintilzig beh., dann kahl, glänzend kirschbraun, mit hellen Lent., Kn. kurz breit eiförmig; B. wie Fig. 352 n o. mehr verkehrt-eiförmig-elliptisch und Grund deut-

Fig. 351. *Padus* (*Prunus*): a—h *racemosa* (*Pr. Padus*): a Bl.; b dgl. im L.-Schn.; c K.; d C.; e Stb.; f Fr.; g Stein; h B.-Grund und Stiel mit Drüsen. — i—l *Ssiori*: i Bl. im L.-Schn. und K.; k Fr.; l Stein. — m—n² *Grayana*: m = t; m¹ C.; n Fr.; n¹ Stein; n² Serratur des B.-Randes. — o—q *virginiana*: wie i—l. — r—s *virginiana* var. *demissa*: r Fr.; s Stein. — t—t² *serotina*: wie i—l. — u—u² *capollin*: wie i—l. — v—v² *napaulensis*: wie i—l. — w—w² *cornuta*: wie i—l. — x *Laurocerasus undulata*: Bl. im L.-Schn. und K. (b n KOEHNE; n—n¹ n. SHIRASAWA; p, t¹ n. SARGENT, sonst Original).

ahneln, aber ganz glatte Steine haben. Außerdem weicht *cornuta* durch andere Beh. und längere Stielung der B. ab. — *Pad. velutina* C. K. SCHN., l. c. (*Prunus vel.* BATAL., in Act. Hort. Petrop. XIV 168 1895 aus Sz'tschwan und W.-Hupel (HENRY No. 5774, 5985, WILSON No. 1789). Zw. kahl, B. wie Fig. 352p, bis 11,5 : 5,8 cm, unters. hellbräunlich kurzzottig beh., Papillen hfg. schwer sichtbar, Zähnung fein mit relativ entfernten kurz aufgesetzten Zahnspitzen (charakteristisch); Blst. kahl o. rostig-zottig beh., bis 16 cm, K. 1, Recept. schmallänglich, langwimperzahnig, Stb. wenig länger als Recept., Fr. ca. 6—7 mm Dm., bis 5 mm lang gestielt, Stein glatt. — *Pad. brachypoda* C. K. SCHN., l. c. (*Pr. brach.* BAT., l. c. XII. 166. 1892) aus W.-China und O.-Tibet (HENRY No. 5763, 5988, 5591, 5739; GIRALDI No. 1141; ROSTHORN Nanchuan, Herbst 1891) B. wie in Fig. 352o, 8 : 10 : 4—5 o. bis 12 : 4 : 5 cm, Rand mit 1 verbogenen drüsigen Zahnspitzen, kahl o. unters. achselbärtig, Stiel bis 3 cm; Blst. bis 20 cm, Bl. ca. 6 mm Dm., K. wimperzahnig, Fr. ca. 5 mm Dm., ca. 4 mm langgestielt, Stein glatt. Hierzu var. *pubigera* C. K. SCHN., l. c. 70. ☉ Zw. und Blst. fein beh.

lieher gerundet, oben tiefgrün, ganz o. bis auf Nerven kahl, unten satt bläulichgrün o. mehr hellgrau, längs Rippe etwas rostfarben filzig, 12:5–20:8 cm, Textur zuletzt derb, Herbstf. rotbraun; Stiele bis 3,3 cm; Blst. fein beh., zur Blz. 10–15, zur Frz. ohne den bis 10 cm langen beblätterten Grund bis 30 cm lang, wagrecht o. leicht übergeneigt abstechend, Bl. weiß, ca. 8–10 mm Dm., dichtstehend, Stielchen zur Frz. bis 7 mm, K. drüsig gezähnt, sonst wie Fig. 351 w. w². Fr. zuletzt tiefbraunrot, nicht allzu unangenehm schmeckend.

Man kann festhalten var. *a. typica*: Zw. bis fast ☉ sehr fein beh., Blst. und Bl. reichlicher fein beh. als bei *b.*, dgl. B. — *b. glabra* FRITSCH, in Herb. Zw. stets kahl; nur diese letzte bisher in Kultur.

P. c. CARR., in Rev. Hort. 1869. 275 (*Cerasus c.* WALL., Cat. No. 716. 1829 [et apud ROYLE, Ill. 207. t. 38. Fig. 2]; *Prunus c.* STEUDEL, Nomencl. ed. 2. II. 403. 1841). — Gehörnte T. — Von Afghanistan bis Sikkim. — Gebirge 2–4000 m. — Blz. V. — Frz. VIII. — Bisher mir nur in Wiener Anlagen (und Plantières) echt bekannt, wo er ganz hart ist und alljährlich reich blüht und auch reife Fr. bringt. Zur Blz. mit seinen ~ aus dem jungen Laubwerk hervorstechenden Ährentrauben sehr auffällig, später wenig ansehnlich, da dünn belaubt.

CC B.-Stiele fast stets drüsenlos, B.-Grund meist spitz o. zugespitzt, Rand etwas entfernter gezähnt, Fr. über 16 mm Dm., Stein grob, ganz glatt (vgl. Fig. 351 v¹—v²).

2. *P. napaulensis*: von *cornuta* im wesentlichen noch abweichend durch: B. im allgemeinen schmal länglicher, bes. am Grunde der Blst., Nerven etwas enger, Zuspitzung schärfer, Unters. ganz kahle; Bl. vgl. Fig. 351 v. K. hfg. ganzrandig, Fr.-Stiel bis 13 mm, sehr verdickt.

Auch hier 2 Varietäten: var. *a. typica*: Blst.-Achsen und Bl.-Stiele und Bl. fein beh. — *b. distincta*. Blst. fast o. durchweg kahl. — Ferner die vielleicht eine Art darstellende *P. nap.* var. *sericea* (*Prunus nap.* var. *sericea* BAT., in Act. Hort. Petrop. XIV. 169. 1895) aus Sztschwan, vor allem durch die unters. (bes. jung) prächtig silbrig-weiß beh. B. abweichend. — Eine Art Mittelform scheint HENRY No. 10547 aus Yunnan zu sein. B. nur kurz seidig beh., nur ganz jung glänzend.

P. n. C. K. SCHN., in FEDDE Repert. I. 68. 1905 (*Cerasus napaulensis* SER., in DC. Prodr. II. 540. 1825; *C. glaucifolia* WALL., Cat. No. 707. 1829 et *Indiana*, l.c. No. 1008, *Prunus napaulensis* STEUD., Nomencl. ed. 2. II. 403. 1841). — Nepal T.

O-Bengal, Khasia, Sikkim, Nepal bis Kumaon und W-China. Wie vorige. Aber nicht in Kultur und wohl empfindlicher.

B. B.-Unterseiten nicht o. kaum papillös^{*)}, B. durchschnittlich kleiner.

C Stein grubig-gefurcht, C. meist fein gezähnt, Bl.-Achse innen beh. (Fig. 351 b, d, g). Blst. lockertraubig, meist ¹/₂ hängend.

3. *P. racemosa* (*Prunus Padus*): großer b o. b. bis 17:0,6 m. Krone länglich, dicht und z. T. etwas hängend verästelt, Borke matt schwarzgrau, Zw. meist nur am Ende noch fein beh., sonst o. oliv- o. kirschrotbraun, Lent. deutlich, Kztr. dünn, innere Rinde gelb, faulbaumartig riechend, Kn. lang kegelfg. ~²), nur Seh. gewimpert; B. meist elliptisch o. breit verkehrt-eifg. (Fig. 352 a), fein und scharf sägezähmig, obers. tiefgrün, unters. etwas blaugrau, Grund leicht herzförmig, Spitze kurz abgesetzt, 6:3–10:6 o. 12:5,5 cm, Herbstf. rot; Stiel meist 2-drüsig, 10–15 mm; Blst. überhängend, lockerblütig, inkl. des beblätt. Grundes ca. 10–15 cm lang, kahl, Bl. weiß, duftend, Fr.-Stielchen bis etwa 12 mm, Fr. glänzend schwarz, vgl. Fig. 351 a—h.

*) Herr ZABEL sandte mir jedoch ein Zw.-Stück seiner *Pr. pachylada* (1903), die m. F. mit *cornuta* identisch ist, sich aber in Hann.-Munden frostempfindlich gezeigt hat, auch in Berlin (*Pr. Padus cornuta* HORT.) nicht blühen soll.

**) *P. racemosa* zeigt hier und da unter dem Mikroskop deutlichere Papillen, doch sind sie immer nur relativ schwierig nachzuweisen. Aber auch bei *P. velutina* und *brachypoda* (S. 638) sind sie gelegentlich nur schwach entwickelt.

***) Vgl. meine Dendr. Winterstudien, S. 190 und Fig. 184 h—n, S. 181.

Von spontanen Formen seien erwähnt var. *petraea* (*Pr. petraea* TAUSCH, in Flora XXI. 719. 1831; *Pr. Padus* var. *transsylvanica* SCHUR, Enum. 180. 1866); Blst. und Frst. aufrecht, B.-Serratur etwas gröber, bige Gebirgsform aus Schles., Böhm., Siebb., die vielleicht mit der nordischen var. *borealis* (*Pr. bor.* SCHUEBELER, Pflz.-Welt Norw. 369. 1873 75) identisch ist. - var. *pubescens* (*Pr. Pad.* v. *pub.* RGL., Flor. Ussur. n. 149. ex MAXIM.); Triebe, Blst., B.-Unters. z. T. - rostfarben weichhaarig; ostasiatische Form (Mandschurei, um Peking, Sachalin). Ich sah 1 Fr.-Expl. lg. EHRENBERG 1829 im Altai; danach macht diese Form mit ihren länglicheren, spitzeren, alles in allem mehr an *Scort* erinnernden nur kleineren (bis 9 : 4,5 cm) B., aber typischen *racemosa*-Fr., die in anscheinend aufrechten Frst. stehen, mehr den Eindruck einer „Art“. Bl.-Expl. sah ich von KARO, No. 370, die sicher nur eine Form der *Padus racemosa* mit fein beh. Zw. und Blst. darstellen und von der eben genannten wohl verschieden sind. - Von var. *typica* mit ihren kahlen (•) Zw., unters. höchstens achselbärtigen B. und - hängenden Blst., gibt es eine Form mit gelblichgrünen, genießbaren Fr., etwas flaumigen Zw. *f. leucocarpa* (*Pr. Pad.* var. *leuc.* K. KOCH, Dendr. I. 120. 1869; *Pr. Salzeri* ZDAREK in Verh. zool.-bot. Ges., 1892. 17). - Ob *f. commutata* (*Pr. Pad.* var. *com.* DIPP., Laubh. I. 647. 1893; *Pr. Regeliana* ZABEL, in H. d. D. D. G. 244. 1903), eine sehr früh austreibende, aus O.-As. eingeführte Form, die als *Pr. Grayana* in den Gärten geht, eine Form des Typs o. eine selbständige Varietät, ist mir noch fraglich.

Von Kulturformen hebe ich hervor: *f. pendula* (*Pr. Prunus Padus* var. *pendula* DIPP., l. c.); Zw. hängend. - *f. aucubaefolia* (*Cer. Pad.* v. *aucub.* KIRCHN., Arb. Musc. 259. 1864); B. gelb gefleckt. - *f. aurea* (*Pr. Pad.* v. *aurea* ZBL., in H. d. D. D. G. 245. 1903). - *f. plena*: eine Form mit gefüllten Bl. - *f. bracteosa* (*Cer. Pad.* var. *bracteosa* SER., in DC Prodr. II. 539. 1825); eine Form mit stark ausgebildeten, die Bl. $\pm$ überragenden, $\pm$ spät abfälligen Bracteen.

P. r. (*Prunus Pad.* L., Sp. pl. 473. 1753; *Prunus racemosa* LAM., Fl. fr. III. 107. 1778; *Pad. vulgaris* BORCKH., Forstb. II. 1426. 1803; *Cerasus Padus* DC., Fl. franç. IV. 580. 1865). - Gemeine T. Faulbaum; Fowl-Cherry; Bois puant. - I. G. D. hfg., bes. im Norden, OC. verbreitet Sch. verbreitet; sonst noch ganz Eur., doch im Süden nur in den Gebirgen der nördlichen Teile (Nördl. ib. Halbinsel, N.-Italien, nördl. Balkan), ferner N.-Asien bis Sachalin, südlich vom Kauk. nur in der alpin. Region. - Feuchte Wälder, Gebüsch, Auen, zuweilen selbst waldbildend; im Gebirge bis nur bis 1500 m. - Treibt sehr früh aus, Blz. IV-V. - Frz. VII-VIII. - Ausschlagvermögen sehr stark, Alter kaum über 50-60 Jahre, Holzwert gering, mithin kaum von forstlicher Bedeutung; verträgt viel Schatten. - Als Parkpflanze ihrer Bl. und ihres in der Jugend üppigen Wuchses halber geschätzt.

23>6 *P. racemosa* $\times$ *virginiana* *P. Laucheana* (*Pr. Lauch.* BOLLE, in LAUCHE, Deutsche Dendr. 652 nach KOEHNE); B. der Blzw. verkehrt-eiförmlich, mit sehr schmalen meist vorwärts gerichteten Sägezähnen, unters. viel blasser und achselbartig. Stein schwächer grubig als bei *padus*, Fr. schwarzrot. - Der *Pr. Padus* var. *rotundifolia* ATCT. gehört wohl nur z. T. hierzu, z. T. zu *virginiana*, siehe diese. Nach ZABEL (1903) ist *Laucheana* überhaupt nur eine Form der letzten. Da ich nur wenig Material, jedenfalls keine reifen Fr. besitze, kann ich nichts Bestimmtes dazu sagen.

○○ Stein glatt o. nur leicht streifig gefurcht, Bl.-Achse innen kahl^{*)}, C. kaum deutlich gezähnt.

* B. fein borstig grannenzähmig (vgl. bes. junge B.).

- B.-Grund stumpf o. rundlich, Spitze - lang vorgezogen, Stiele höchstens 1 cm lang, Stein ganz glatt.

4 *P. Grayana****) hoher b bis h, bis 15 : 0,4 m, Zw. jung beh. o. kahl, sonst *racemosa*-ähnlich, Kn. kürzer; B. (Fig. 352 b) auf der sattgrünen Obers. ganz kahle, auf der hellgraugrünen Unters. +, bes. an Rippe beh., 7 : 3,5-14 : 7 cm, Stiel 6-8-10 mm; Blst. kahl, aufrecht abstehend, ohne die oft längere beblätterte

*) Blüht manchmal im Herbst (Ende IX) zum 2. Male und hat dann hfg. ganz verkürzte Doldentrauben.

**) Höchstens ganz am Grunde mit vereinzelt Haaren.

***) Der *P. Grayana* steht nahe *Pad. acrophylla* C. K. SCHN., in FEDDE, Repert. I. 70. 1905, aus Hupei (HENRY No. 4077), noch unvollkommen bekannt und vor allem durch gröber gezähnte, am Grunde $\pm$ herzförmig. B. abweichend.

Basis ca. 7—9 cm lang, Bl. weiß, S. 13 mm Dm., C. so lang o. ein wenig kürzer als Stb., sonst vgl. Fig. 351 m—n², Fr.-Stiele bis ca. 8 mm.

P. Gray. (*Pr. Padus* var. *japonica* MIQ. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. II. 92. 1865/6; *Prunus Grayana* MAXIM., in Bull. Ac. Petersbg. XXIX. 107. 1884). — Japanische T. — Jap. (Honsiu bis Hokkaido). Bergwälder, bis 1600 m. Blz. (IV—)V(—VI). Frz. VIII. — In Kultur noch selten.

B.-Grund deutlich herzförmig, Spitze kurz, Stiel meist über 2 cm lang, Stein leicht furchig gestreift.

Fig. 352. *Padus* (*Prunus*)-Blattformen: *a* *racemosa* (*Prunus Padus*) — *b* *Grayana* (*Prunus Grayana*) — *c* *Grayana* var. *demissa* — *d* *Grayana* var. *demissa* (auch das kleine B. gerade darüber) — *e* *Grayana* var. *demissa* — *f* *Grayana* var. *demissa* — *g* *Grayana* var. *demissa* — *h* *Laurocerasus Alcockii* — *i* *Laurocerasus Alcockii* — *j* *Laurocerasus Alcockii* — *k* *Laurocerasus Alcockii* — *l* *Laurocerasus Alcockii* — *m* *capollin* — *n* *cornuta* — *o* *brachypoda* — *p* *velutina* (1/2 n. Gr.) (Original).

5. *P. Ssiori* von *Grayana* noch abweichend. Zw. kahl, kräftiger, in der lebhaften kirschroten Färbung mehr *racemosa* ähnlich, ebenso in den Kn.: B. Fig. 352 g) bis auf spatuläre Aehselbarte o. ganz kahle, bis 14:5.7 o. 11:7 cm, Stiel bis 3.5 cm, mit 2 deutl. Drüsen, Blst. kahl, wagrecht abstehend, ohne die beblätterte Basis ca. 15 cm lang, Bl. vgl. Fig. 351 i, Stiele 0.6—1.2 mm, Fr. wie k. 1

P. S. (*Prunus Ssiori* SCHMIDT, Reis. Annal. 124. 1868). — Sachalin-T. — Jap. (Hondo, Yesso), Sachalin, S. Mandschurien, in W.-China wohl fehlend! Wälder. — Noch nicht eingeführt meines Wissens.

B.-Zählung z. T. wohl feinspitzig, aber nicht grannenborstig.

*) Diese Art ist wohl am besten neben *cornuta* zu stellen, worauf ja auch schon MAXIMOWICZ hinweist.

K. zur Frz. ganz o. bis auf einen kleinen Rest abfällig. B. vorwiegend elliptisch o. breit verkehrt-eifg., Zähnung feinspitzig, Hauptnerven scharf, Netznerven wohl deutlich, aber nicht hervortretend (Fig. 352 c—d).

6. *P. virginiana*: $\bar{\sigma}$ bis kleiner $\bar{\sigma}$ (ca. 10:0,3 m), St. kurz, Verästelung etwas unregelmäßig, aufrecht o. ausgebreitet, Borke grau, kleinschuppig, fest; Zw. jung kahl o. fein beh., σ meist kahl, hell, später küschbraun, Lent. ∞ , hell. Holz schwarzgrau, Kn. spitz o. stumpf eifg., Seh.-Ränder gewimpert; B. oberse. tief, unterse. hell o. grau grün, am Lztr. bis 12:6—8 cm, Stiele bis 2 cm, sonst vgl. var.; Blst. dichtblütig, σ wagrecht o. aufrecht abstehend, ohne den beblätterten Grund 5—13 cm lang, meist ganz kahl, Bl. weiß, 8—13 mm Dm., 3—14 mm lang gestielt, Bl. Achse innen am Grunde zuweilen mit einigen langen Zotten, sonst vgl. Fig. 351 o. Fr. purpurn, zuletzt schwarzrot, ganz reif oft genießbar, Stein glatt mit einem $\pm$ vorstehenden Längswulst (p—q).

Formenreiche Art σ . Man faßt gewöhnlich die westamerikanischen Formen als *P. demissa* zusammen. Diese Art wurde von NUTTALL, apud TORR. et GR. Fl. N.-Am. I. 411. 1847, vornehmlich unter Zugrundelegung von Expl. aus Oregon begründet. Formen mit unterse. σ beh., am Grunde herzförmig. B. Über die K. zur Frz. ist nichts gesagt, indes zeigen alle Expl. aus diesem Gebiet Fr. ohne K. (DIPPELS und KOHNES Auffassung der *demissa* ist somit unrichtig. Ihre Pflanzen gehören anscheinend zu *serotina*). Ich kann nun in den westlichen Formen sensu NUTTALL nur eine Varietät sehen, die übrigens auch ähnlich im Osten auftritt, anscheinend in trockeneren Lagen lebt und zuletzt derbere B. hat. Bl. und Fr. geben keine sicheren Anhaltspunkte zur Abtrennung (vgl. Fig. 351 r—s). BRITTONS Angaben im Manual 526. 1901 scheinen mir wenig exakt. Vielleicht ist es am besten, unter *demissa* die Formen festzuhalten, welche unterse. auch auf der Fläche bleibend beh. B., sowie reichlich beh. Blst. und bis in den ersten Winter beh. Zw. zeigen. Solche liegen bes. aus New-Mexiko vor. Wir finden dann die var. *typica* vorwiegend von Canada durch die östlichen und mittleren sowie nordwestlichen, die var. *demissa* (*Padus demissa* ROEMER, Fam. Nat. Syn. III. 87. 1847; *Pr. virg.* var. *demissa* TORR., Bot. Wilkes Explor. Exp. 254. 1879) vorwiegend von Brit.-Columbien durch die westlichen und südlichen Staaten verbreitet.

Von Formen sonst noch zu nennen *f. leucocarpa* (*Pr. virg.* var. *leucoc.* WATS., in Bot. Gaz. XIII. 233. 1888): in Massachusetts wild gefunden, Fr. amberfarben. — *f. Duerinckii* (*Ceras. Duer.* MARTENS, in Bull. Ac. Belg. 1841. I. 68; *Pr. virg.* var. *Duer.* ZBL., in H. d. D. D. G. S. 244. 1903): in den Gärten z. T. als *Pr. Padus rotundifolia* gehende Form mit breitrundlichen B. Das mir vorlieg. fruchtende Orig.-Expl. (aus Missouri) weicht eigentlich vom Typ so gut wie gar nicht ab. —

σ) Ich möchte wiederholt darauf hinweisen, daß ich die Wintermerkmale, soweit sie nicht in meinen Dendrol. Winterstudien behandelt sind, hier nur recht flüchtig mit verwerthen konnte. Einmal, weil ihre genaue Darstellung viel mehr Raum erfordert, als mir zu Gebote steht, zum anderen, weil das Herbarmaterial selten ausgereifte Winterzweige enthält und das Kulturmater. gerade bei kritischen Arten nur sehr vorsichtig herangezogen werden darf. Inwieweit ich in der Lage war, meine früheren Angaben zu ergänzen, wird aus der Haupttabelle für die Bestimmung im Winter ersichtlich. — SARGENT sagt über die Unterscheidung von *serotina* und *virginiana* im Winter, daß die innere Rinde der letzteren „a strong disagreeable odor“ (Faulraum), die der *serotina* „an aromatic and rather agreeable perfume“ (bittere Mandeln) besitzt.

σ) Auf Grund des von mir gesehenen reichen Materials möchte ich über diese und die folgende Art nachstehendes hervorheben. Wir haben in ihnen 2 sehr scharf geschiedene Formenkreise zu unterscheiden. Die *virginiana* sens. lat. hat abfallende K. und B. mit nicht hervortretenden, sondern ganz glattem feinsten Nervennetz, außerdem ist sie durch B.-Form und Zähnung von den meisten Formen der *serotina* sens. lat. zu scheiden. Auf deren beiderse. mehr ganz oder dem σ entfernter sagezahnigen Laube treten unterse. die feinen Adern zuw. so scharf hervor, daß die Hauptnerven fast verschwinden. Die K. bleiben zur Frz. stehen. Die B.-Form ist meist langgestreckter, spitzer.

Nun variieren beide Formenkreise sehr stark. Es ist aber außerordentlich schwer, zu entscheiden, ob gute Unterarten oder nur schwankende Varietäten vorliegen. Bei *serotina* glaube ich einige Typen zu erkennen, die sich als „Arten“ festhalten lassen, hier hat auch SMALL schon die S. 643 und 645 erwähnten herausgegriffen. Bei *virginiana* konnte ich bis heute nicht zu der Überzeugung kommen, daß die (meist als *demissa* zusammengefaßten) westlichen Formen sich scharf abtrennen lassen, trotzdem dies jetzt auch SARGENT in seinem Manual 523. 1905 tut.

f. monstrosifolia Form mit ganz unregelmäßig zerteilten, fadenlappigen B., die z. T. als *Pr. cistata* var. *asplenifolia* in den Gärten geht, in einigen mir vorlieg. Expl. gehören aber der Nervatur nach zu *serotina*. Die dieser zugeschriebene Hängeform (*Pr. serotina* var. *pendula* KIRCHN., Arb. Musc. 259. 1894) kenne ich noch nicht.

Pr. s. ROEMER, l. c. (*Prunus serotina* L., Sp. pl. 173. 1753 exkl. Syn.; *Padus rubra* MILL., Diet. ed. VIII. No. 2. 1768; *Prunus americana* de Roi, Harbkesche Baumz. II. 191. t. 4. 1772; *Pr. rubra* AIT., Hort. Kew II. 162. 1789; *Pr. blanda* MOENCH, Meth. 671. 1794; *Cerasus* L., Lois., in Nouv. Duh. V. 3. 1812. — Virginische T.; Choze Cherry. — Heimat oben. — Blz. (IV—V—VI—VII), nach *P. racemosa*, Frz. VII—VIII. — Typische Form in Kultur seit langem verbreitet.

K. zur Frz. bleibend, B. vorwiegend länglich, sich lang zuspitzend, auch die feinen Nervilen der Unters. — scharf hervortretend (Fig. 352 e, f, m).

△ ⊙ Zw. stets kahl, dgl. meist auch Blst.

= B. vorwiegend $1:1\frac{3}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ (—3), ziemlich plötzlich sich zuspitzend, wie Fig. 352 e o. noch mehr elliptisch, Fr. 8—10 mm Dm., Stein 6—7 mm lang.

7. *P. serotina*: seltener B. o. $\bar{h}$, meist $\bar{h}$, bis 33:1,5 m, Krone schmal oblong, kurz wagrecht verästelt, *) Zw. glänzend oliv- o. rotbraun, — schwarzgrau, Kn. vgl. Fig. 353 a—t; B. recht variabel, oben dunkler, beiders. — glänzend grün, ganz kahlend, o. unters. längs Rippe deutl. rostrilzig, zuweil. auch am Stiel noch, die breiteren Formen im Mittel bis 8:4—5, die längeren bis 12:5 cm, Herbstf. lebhaft gelb, Stiel 0,7—2 cm; Blst. ohne beblätterte Basis im Mittel 10:2—2,5 cm, — aufrecht o. wagrecht abstehend, zur Frz. etwas verlängert, — hängend, Bl. 8—10 mm Dm., 3—8 mm lang gestielt, vgl. Fig. 351 t, K. sehr variabel, Fr. wie t^1 — t^2 , zuletzt schwarz, essbar.

Von Formen erwähne ich hier nur var. *neomontana* SMALL, Fl. south-east States 574. 1903 (*Pr. serotina* var. *neom.* SUDW., ex SMALL): nach einem mir vorlieg. sterilen Expl. aus Alabama eine Form mit breit ellipt., derben, kurz-zugespitzten, unters. weißl.-grünen B. (bis 9:5,5 cm), die Blst. sollen wenigblütig sein und beh. K. und Stbf. besitzen; ein Fruchtexpl. aus SW-Virginien, lg. SMALL August 1892, hat lange, eifg. schmal grobzähmige B., an den wenigfr. Frst. sind die K. und Stbf., soweit noch da, kahl, Form wohl noch zweifelhaft. Synonym ist wohl *Pr. serotina* var. *Smallsii* BRITT., ex Manual 526. 1901 (Gebirgsform der Alleghemes. — In Kultur noch eine Hängeform (*Pr. serotina* var. *pendula* DIPP., Laubh. III. 645. 1893), eine pyramidale, sehr schmalblättrige Form (*Pr. serotina* var. *pyramidalis* ZBL., in H. d. D. D. G. 244. 1903) und eine zerschlitztblättrige *f. asplenifolia* (*Ceras. serotina* var. *asplenifolia* KIRCHN., Arb. Musc. 260. 1894). Wenn der Typ bes. schöne glänzende lorbeerartige B. hat, geht er als *f. cartlaginea* (*Pr. serotina* var. *cart.* DIPP., l. c.).

P. s. AGARDH, Theor. syst. t. 14. f. 8. 1858 (*Pr. s.* EHRH., Beitr. III. 20. 1788; *Cerasus serotina* LOIS., Nouv. Duh. V. 3. 1812. — Späte T.: Black or Rum Cherry. — Vom südl. Ontario bis Flor., Dakota, Kansas, Texas, und vielleicht bis S.-Mexiko*. — Am schönsten in tiefgründigen Böden, Berglehnen, aber fast in allen Böden und Lagen noch gedeihend. Gilt infolge seines Holzes, seiner Wüchsigkeit in der Heimat als wertvoller Wald- $\bar{h}$, dem auch bei uns Beachtung zu schenken ist. — Blz. V—VI. — Frz. VIII—IX. — Seit langem in Kultur. Beginnt zu verwildern.

Die *Pad. alabamensis* SMALL, Flora 574. 1903 (*Pr. alab.* MOHR, in Bull. Torr. Club 1899. 118) scheint mir eine lokale Form der *serotina* mit in der Jugend

*) Auffällig sind Expl. SMALLS aus den Gebirgen von SW-Virginia (on summit of white top mountain and at base of pine mt. 1892 mit B., die sehr an *capellen* gemahnen und 10:3—13:5 cm messen. Fr. und Bl. wie typ. *serotina*, Blst. bis 18 cm lang; jedenfalls var. *serotina* ganz außerordentlich und ihr Formenkreis bedarf noch sehr der genauen Untersuchung.

**) Z. B. die Expl. lg. PARRY et PALMER, No. 222, San Louis Potosi, SCHAFFNER, No. 161, eberda; HARTWEG, No. 48. Sie haben längere Blst. als *serotina* und die B. messen nur ca. 5—6:2—3 cm. Die Fr. sind ganz wie bei *serotina*. Im Herbar ist freilich oft nicht sicher festzustellen, ob die Fr. ausgereift, und es fehlen oft die charakteristischen Lgtr.-B.

beh. Zw. — Von *Pad. eximia* SMALL., l. c. 573, sah ich ein Expl. lg. TRACY et EARLE, No. 214, W.-Texas, was ich nicht von *serotina* abtrennen kann.

== B. vorwiegend 1:3—3½, jedenfalls sich allmählicher lang zuspitzend (Fig. 352 n), Blst. hfg. beh., Fr. ca. 15 mm Dm., Stein ca. 9—10 mm lang.

8. *P. capollin*: vielleicht nur als Varietät der *serotina* zu fassen, scheint im wesentlichen nur noch durch dünnere längere Blst. abzuweichen*; B. bis 12:3 cm. Sonst vgl. Fig. 351 u—u², S. 638.

Fig. 353. a—f *Prunus (Padus) serotina*: a ⊙ Zw.; b—c Kn.; d Kztr.; e Rand der Kn. Sch.; f Zw.-Querschnitt *1'* = Epidermis, *1* = Periderm, *2a* hypodermatisches Collenchym, *2* Rindenparenchym, *3* Innenrinde Weichbast, *3'* mechanische Elemente, *4* Cambium, *5* Holz, *6'* = Markkronen, *6* = Mark. *g* in *Prunus Armonia*; *h* Zw.; *i* Kn.; *j* Wimperung der Kn.-Sch.; *k* Kn. und B.-N.; *l* diese im Schnitt; *m* = *f*. *n*—*s* *Prunus chinensis* *pseudoceras* *n* Zw.; *o*—*r* Kn. und B.-N.; *s* = *f* (Original nach C. K. SCHNEIDER).

P. c. (*C. capollin* DC., Prodr. II. 539. 1825. Mexikanische T. — Da auch *serotina*-Formen bis S.-Mexiko vorkommen und zur Blz. eine Unterscheidung oft unsicher ist, so stelle ich hierher vorläufig nur die Expl. lg. BOURGEOIS, No. 52, vallée de Mexiko; GREGG, No. 623, Valley near Real del Monte, dgl. No. 102, East of Lerma; LINDEN, No. 705 pr. de ciudad real et No. 667, Miradores; BORTER, No. 1025, Orizaba; PRINGLE, No. 8052, Eslava; J. G. SMITH, No. 380, Chalchicomula.

*) Auf einem Expl. lg. HAHN 1868, Mexiko, steht: immense trees, 20—25 feet circumference.

comula; v. CHRISMAR, Anganguco; TRILEASE, No. 55, Mt. Ajusco; DE KARWINSKI 1832, ohne Ort; Guatemala: lg. HEYDE et LUX, No. 3323. — Seit neuerer Zeit in Kultur, doch ist es nicht ausgeschlossen, daß es sich bei den Kulturpfl. nur um eine schmalblättrige *serotina* handelt, da Fr. noch nicht vorliegen. Ob die typische *capollin* in eine kahle und beh. Form zu zerlegen, ist noch fraglich. Die meisten Expl. sind zur Blz. $\pm$ beh., aber von *P. Cuthbertii* sehr leicht in der B.-Form und Art der Beh. etc. zu scheiden. Vgl. sonst noch *P. salicifolia*. Nach dem Expl. G. JONES, No. 131, Volc. of Colima scheint es eine breitblättrige Form der *capollin* zu geben. B. bis 13:5 cm.

Im Anschluß hieran sei noch besprochen die vielleicht immergrüne *Padus salicifolia* (*Prunus salicifolia* KUNTH, in H. B. Nov. Gen. VI. 241. t. 563. 1823; *Cer. sal.* DC., Prodr. II. 540. 1825; *C. capuli* SER., apud DC. l. c. 541; *Laurocerasus salicifolia* ROEM., Fam. Nat. Syn. III. 89. 1847). — Von dieser Art sah ich Expl. aus Peru (Herb. PAVON, Huancoco, Bolivien, lg. MANDON, No. 676 bis), aus Ecuador (lg. KARSTEN, Quito, Dr. WAGNER 1858 Tacunga, dgl. Guaranda) und aus Columbien (lg. GONDET, Bogota, dgl. Holton, No. 49). Nach einem Expl. von GALEOTTI, No. 3086, geht sie vielleicht bei Mexiko (Oaxaca). Jedenfalls ist mir noch nicht klar, ob und wie sie sich von *capollin* sicher scheidet. Für einfach identisch kann ich aber KUNTH *salicifolia* aus Peru und Des *capollin* aus Mexiko durchaus nicht halten. Vielmehr dürfte GALEOTTI'S Expl. noch zu letzterer zu rechnen sein. Das Verhalten der Bl.-Trgd. bedarf noch der Untersuchung, da ja auch bei anderen *Padus*-Arten Formen mit abnorm lange bleibender Trgd. auftreten, und das bei *capollin* zitierte Expl. lg. V. CHRISMAR an jungen Blst. lange Trgb. zeigt. Reife Fr. von *salicifolia* sah ich nicht. B. vgl. Fig. 352f, S. 641.

$\triangle\triangle \odot$ und z. T. auch $\odot$ Zw. beh., dgl. Blst.-Achsen.

9. *P. Cuthbertii*: kleiner B., bis 6:1.5 m, Zw. + rostrot filzig; B. deutl. oboval o. oboval-oblong o. oboval-elliptisch, Spitze stumpf, 5:3.5—8:5.5 o. bis 10:4.5 cm, Zähnung kurz und wenig auffällig, Obers. sattgrün, alt nur Rippe noch spärlich beh., Unters. weißlich, matt, bereift, Nerv. verstr. beh., längs Rippe dick rostfilzig gesäumt; Stiele rostbraun beh., bis 8 mm; Blst.-Achse analog beh., Bl. und Fr. sah ich nicht, nach SMALL Fr. 8—9 mm Dm., rot.

P. C. SMALL, Flora 574. 1903 (*Pr. Cuthb.* SMALL, in Bull. Torr. Cl. XXVIII. 290. 1904). — Georgia (ich sah lg. R. M. HARPER, No. 1261, 1267). — Berghänge.

Unbekannt ist mir die *P. australis* BEADLE, ex SMALL, l. c. 574 (*Pr. austr.* BEADLE, teste SMALL) aus S.-Alabama, deren kurz zugespitzte, ovale o. ellipt. B.-Unters. als „densely and permanent clothed with tawny or rufous tomentum, not glaucous“ beschrieben werden, außerdem Zw. und Blst. beh., Fr.-K. bleibend.

Gattung 149. *Laurocerasus* ROEMER, Syn. monogr. III. 89. 1847.

[Kirschlorbeer; Cherry Laurel; Laurie Cerise.]

Vgl. S. 589, B. meist immergrün, Blst. aus den Achseln vorjähriger B., bez. am alten Holz, ohne B. am Grunde. Im übrigen wie bei *Padus*, S. 637. — Arten sämtlich erwähnt*).

$\odot$ B. sommergrün**) und fein gezähnt.

+ B. unters. mit ∞ Drüsenpunkten, Zähne mit sehr feinen, etwas abgebogenen Spitzen, K. zur Frz. fast ganz abfällig.

1. *L. Maackii*: B. $\pm$ bis 16 m, Zw. beh.; B. Fig. 352h—i, aus rundlicher Basis elliptisch o. oblong, bis 10:5 cm im Mittel; Blst. ca. 7 cm lang, Bl. ca. 10 mm

*) Die tropischen und subtrop. Formen bedurften recht sehr einer sorglichen Bearbeitung unter Berücksichtigung der B.-Anatomie. Mein Material war noch zu gering, um bes. die Formen mit M.- und S.-Am. näher zu studieren, die ohnedies nur unsere Zwecke hier nicht weiter in Betracht kommen.

*) Die sommergrünen Arten werden bei MAXIMOWICZ u. a. zu *Prunus* gezogen. Doch bin ich vgl. auch KOEHNE der Meinung, daß nur unter Rücksichtnahme auf die Blst.-Verhältnisse eine gute Trennung der Gattungen bez. Subgenera möglich ist.

Dm., K. spitz-eifg., drüsig gezähnt, Stb. länger als oblonge C., aber kürzer als beh. Gr., Fr. 5:4 mm, Stiel länger, Stein runzelig.

L. M. (*Prunus Maackii* RUPR., in Bull. Ac. Petersb. XV. 361, 1857). — O.-Mandschurei, Amurgebiet. — Mir nur steril bekannt. Angaben oben z. T. nach MAXIMOWICZ, in Kultur sehr selten*).

÷ ÷ B. unters. ohne Drüsenpunkte. Serratur anliegend, kaum fein borstig, K. zur Frz. vorh.

2. *L. Buergeriana*: $\bar{b}$ $\bar{b}$, bis 10:0.3 m; junge Zw. beh., o. kahlend, kirschbraun; B. vgl. Fig. 355 d, ganz kahlend o. auf der helleren Unters. achselbärtig. ca. 7:3,5–11:4,5 cm, Stiel 8–12 mm; Blst. einzeln, hangend, rein beh., bis ca. 10 cm lang zur Frz., Bl. ca. 7 mm Dm., Fr.-Stiele ca. 7 mm, sonst vgl. Fig. 354 a–c.

L. B. (*Prunus Buergeriana* MIQ., in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. 92. 1865, 66). — Jap. (Hondo). — Ebenen der südl. temp. Zone. — Blz. IV. — Frz. VIII. — Nicht in Freilandkultur bei uns. Ebensovienig die sehr nahe verwandte *L. undulata* ROEM., Fam. nat. Syn. III. 92. 1847 (*Prunus undul.* HAMILT., apud DOX Prodr. nepal. 239. 1825; *Ceras. undul.* SER., in DC. Prodr. II. 540. 1825; *C. capricida* WALL., Cat. No. 718. 1829); aus O.-Bengal. bis Nepal, deren B. unter o. in der Mitte, nicht über der Mitte am breitesten und vor allem mehr kerbig gesägt sind, die sonst aber in Bl. (Fig. 351 x, S. 638) und (den nur spärlich vorlieg. Fr. aum abweicht.

○○ B. immergrün, $\bar{c}$ derblederig, ganzrandig o. $\pm$ entfernt gezähnt.

× B. im Mittel nicht unter 10 cm lang (und meist nicht unter 4 cm breit), nie geschwänzt zugespitzt o. dornig gezähnt.

+ B. relativ eng und gleichmäßig gezähnt, Stiele meist über 18 mm lang, Blst. die B. $\pm$ überragend.

3. *L. lusitanica*: $\bar{b}$ bis kleiner $\bar{b}$ von der Tracht der *officinalis*, Zw. kahl, B. (8:2,5) o. 10:3,5(=5) bis 16:5 cm, oberseits + glänzend tiefgrün, unters. heller, $\bar{c}$ matt, kahl, auch ohne Drüsenpunkte gegen den Grund, nur hie und da am B.-Stiel Drüsen angedeutet, dieser bis 2,5 cm; Blst. bis 30 cm lang (selten kaum so lang wie B.), kahl, Bl. vgl. Fig. 354 d–e; die reifen Fr. sollen rundoval und schwärzlich sein.

L. l. ROEM., Fam. nat. Syn. III. 92. 1847 (*Pr. lus.* L., Sp. pl. 473. 1753; *Padus lus.* MILL., Diet. 1759. no. 5; *Padus eglandulosa* MOENCH, Meth. 672. 1794; *Cer. lus.* LOIS., in Nouv. Duh. V. 5. 1812). — Portugiesischer K. — Span., Portugal, Kanar. Inseln. — Sonst wie *officinalis*, aber seltener in Kultur. Die von ZABEL, in H. d. D. D. G. 1903. 246, aufgeführten Formen kenne ich nicht näher. Die grünblättrigen Gartenformen sind hier, wie bei folgender Art nur schwer zu unterscheiden, von buntblättrigen wären zu nennen *f. marginata* und *f. variegata* ZBL., l. c.

+ ÷ B. ganzrandig o. entfernter gezähnt, o. sonst jedenfalls Stiele kaum über 15 mm und Blst. viel kürzer bis kaum so lang als B.

— B.-Stiele drüsenlos, aber B. unters. gegen den Grund meist mit 1–4 Drüsenpunkten, ganzrandig o. ziemlich entfernt gezähnt (Fig. 355 b–c, S. 649).

4. *L. officinalis* (*Prunus Laurocerasus*): $\bar{b}$ o. kleiner ausgebreitet locker verästelter $\bar{b}$, Zw. kahl (selten jung sehr fein beh.), B. meist ganz kahl, sehr variabel in Umriß und Serratur, 5:1,8–14:4–5,5 o. bis 15:7 cm, Stiel meist unter 10 mm, sehr selten mit ange deuteten Drüsen; Blst. kaum über 10 cm lang, Bl. und Fr. vgl. Fig. 354 f–g¹.

Spontane Formen schwer zu scheiden. Als var. *schipkaensis* SPÄTH, apud DIPP. Laubb. III. 649. 1893, geht in den Gärten die europäische Form vom Balkan (Hodza Balkan, Ozan Dag, bis 1600 m), sie ist $\bar{b}$ -artig und härter als die großen asiatischen, ihre B. sind fast stets ganzrandig und, je nachdem sie breiter sind (3–5) cm o. schmaler (Fig. 355 b), unterscheidet SPÄTH *f. Mischcana* und *f. Zabeliana*, von letzter vgl. Habitusbild in Gartenwelt V. 177. 1901. Mit dieser Var. ist augenscheinlich die Form aus S.-Serb. identisch, die PANCIC, der Kirschlorbeer im S.-O.

*) Vgl. jedoch WILDEMAN, Icon. select. Hort. Thenen. I. 159, pl. XXXVII. 1900.

v. Serb. 1877, beschrieben und später als *L. serbica* verbreitet hat. Wahrscheinlich stehen die Gebirgsformen des Kaukasus, wie sie ALBOW in Fl. colchica 68 70 1895 als var. *brachystachius* MEDW. et ALB. und var. *laurifolius* ALB. beschreibt, der vorigen sehr nahe. Vornehmlich die var. *brachystachius*, deren B. 4,5—9,5:1,5—2,5—3,5 cm messen und deren Trauben 3,5—6,5 cm lang sind; Kalkgebirge, 1850—2100 m. Die var. *laurifolius* wird höher, kommt in tieferen Regionen vor und hat schmälere längere B. Ich sah von beiden die Originale. Junge Zw. z. T. beh. und Fr. fast sitzend. Doch kaum konstante Merkmale.

Über die Unterscheidung der Kulturformen des typ. *officinalis* vgl. z. B. Gard. Chron. 1889. I. 620 (var. *caucasica*, var. *colchica*, und deren beider *f. rotundifolia*, *f. angustifolia*). Außerdem buntblättrige Formen. Aber alles Gartennamen, die einer botanischen Klärung bedürfen.

L. o. ROEM., Fam. nat. Syn. III. 91. 1847 (*Pr. Laur. L.*, Sp. pl. 474. 1753; *Pad. Laur. MILL.*, Gard. Dict. 1759 No. 4; *Ceras. Laur. LOIS.*, in Nouv. Duh. V. 6. 1812). — Gemeiner K.; Cherry Laurel; Laurier Cerise. — Außer in S.-Serb., Bulgar. (siehe oben) noch Griechengl. (Lakonien), Kl.-As. (Thrazien, Bithynien, Pontus), Transkauk., N.-Pers., Kaukas. — Blz. IV—V. — Frz. VIII. — Bes. im S. des Gebietes, überhaupt in S.- und W.-Eur. vielfach angepflanzt. Die Balkanformen unter leichtem Schutz ganz hart.

△△ B.-Stiele mit deutlichen Drüsen. B. unters. wohl ganz ohne solche, Zähnung z. T. relativ eng (Fig. 355 l).

5. *L. macrophylla*: im wesentlichen von 4 noch abweichend durch: B. bis 10 m; B. im Mittel 10:4,5—19:7,5 cm, Zähnung ziemlich scharf, leicht vor- und

Fig. 354. *Laurocerasus* (*Prunus*): a—g *Buergeriana*: a Bl. im L.-Schn. u. K.; b Fr.; c Stein. — d—e *lusitanica* d = a; d¹ C.; e junge Fr. — f—g¹ *officinalis* (*Prunus Laurocerasus*): f = a; f¹ C.; g Fr., g¹ Stein. — h—k *ilicifolia*: h = a; i Fr.; k Stein. — l—n *caroliniana*: wie k—i (n schwach vergr.). — o—p *spinulosa*: o Bl. im L.-Schn. nebst K. und C.; p Stein. ¹/₃ und vergr. (m—n SARGENT, sonst Original).

einwärts gebogen; Blst. einzeln o. gepaart, nur 2—3, zur Frz. bis 5 cm lang, nebst Bl.-Achse und K. fein zottig beh., Stb. länger als C., Fr. eitg., bis 2 cm, reife Steine sah ich nicht.

Als Var. ist aufzufassen var. *oxycarpa* (*Pygeum oxycarpum* HANCE, in Journ. of Bot. 1870. 242; *Pr. oxy.* MAXIM., in Bull. Ac. Petersbg. XXIX. 111. 1884), die nur eben durch noch größere, ca. 17:8—20:9 cm messende B mit kürzeren, nur oben vom Rande etwas abgesetzten Zähnen abweicht. Bl. sah ich nicht, ebenso keine reifen Fr., die nach MAXIM. spitzer sein sollen. Heimat China. Kwangtung, wohl auch Hupeï (lg. HENRY, No. 4363).

L. m. (*Pr. mac.*) S. et Z., in Abh. Ac. Münch. 1843. II. 422). — Großblättriger K. — Japan (Kiuschiu, Hondo). — Blz. IX—X. — Frz. II—IV. — Kaum in Kultur, aber für die südlichen Teile des Gebietes erprobenswert.

Im Anschluß hieran sei auf folgende, habituell ähnliche, z. T. noch fragliche Arten kurz hingewiesen. Zunächst aus der Alten Welt *L. javanica* (*Pr. jac.* MIQ.

Fl. Ind. Bat. I. 1. 365. 1855) aus Java: B. der mir vorlieg. Expl. aus rundlichem Grunde breit eielliptisch sich lang zuspitzend (Fig. 355 m), ganzrandig, ca. 15 : 6,5 cm, Stiel nur 5–7 mm oberhalb mit kleinen Drüsen; Blst. halb so lang als B., beh., Gr. lang, Fr. länglich, ca. 22 : 10 mm. — Ihm steht nahe, wie es scheint, *L. martinicensis* (Ceras. martin. WALL., Cat. 1902. 1836; Pr. martin. KURZ, For. Flor. Brit. Burm. I. 434. 1877) aus S.-Birma. Vgl. Hook. f., Fl. Brit. Ind. II. 316; ich sah nur ein wenig gutes steriles Orig., das etwas abweicht von Hookers Angaben, B. ca. 12 : 4,3, Stiele ca. 1,5 cm.

Aus der Neuen Welt gehören zu den großblättrigen Arten *L. occidentalis* ROEM., l. c. 89 (*Prunus occid.* SWARTZ, Fl. ind. occ. II. 925. 1809; Kuba, Jamaika, wohl auch Trinidad, Dominica (vgl. GRISEB., Fl. Brit. West-Ind. Isl. 231. 1864). B. kahl, in Form an *Jacouea* gemahnend, aber tenspitziger, ca. 11 : 4,5–18 : 6 cm o. etwas breiter, Drüsenflecke unters. ganz am Grunde! Stiel 10–15 mm; Blst. bis 8 cm, nebst Bl. verstr. beh., Stielchen ca. 7 mm, Fr. eifg. ca. 20 : 16 mm. — *L. brasiliensis* ROEM., Fam. nat. Syn. III. 90. 1847 (*Cer. bras.* CHAM. et SCHL., in Linnæa II. 542. 1827; Pr. sphacelata Fl. Bras. et Auct. Al. ex parte, Brasilien z. B. POHL, No. 1915. 1862. 2568, 2811. 1846; RICHARDT, No. 124; GARDNER, No. 3709; SCHOTT ex parte). B. dero. nur oben leicht glänzend, im Mittel 14 : 7,5 cm, breit elliptisch, ganzrandig, Drüsenflecke unten ganz am Grunde; Stiele 9–11 mm, Blst. kahl, 4–8 cm; Fr. rundlich, 6–7 mm Dm; scheint mit kleinem B. zu variieren.

Ihm schließt sich eng an *L. Brittoniana* Tr. & Benth. RUSBY, in Mem. Torr. Bot. Cl. III. 24. 1893). Bolivia (BANG, No. 1619. 1958; MANDON, No. 675), die spitz-eifg. 16 : 13 mm messende Fr. hat. Wie sich von ihr, bez. *brasiliensis*, *Pr. Pearcei* RUSBY, l. c. II. 30. 1899, aus Bolivien (BANG, No. 1465) sicher unterscheidet und ob BANG, No. 1432, zur letzten Art gehört, ist mir noch fraglich, da ich die vorlieg. Expl. noch nicht eingehend untersuchen konnte.

Noch unklar ist mir *Cer. integrifolia* PRESL, Epimel. 194. 1899, aus Peru. Von dort, sowie aus Ecuador liegen mir noch andere großblättrige Formen vor, die z. T. *Brittoniana* sehr nahe stehen (z. B. SPRUCE, No. 5992).

++ B. im Mittel unter 10 cm lang, o. sonst geschwänzt zugespitzt, zuw. deutlich dornig gezähnt (vgl. aber auch unter + S. 646).

+ B. klein, vgl. Fig. 355 h, scharf dornzähnig.

3. *L. ilicifolia* v. kleiner b. h., bis 10 m; Zw. kahl; B. kahl, 1,5 : 1,2–6,5–1,2 cm; Blst. so lang o. aber länger als B., kahl, Bl. vgl. Fig. 354 h, Fr. wie i, Stein wie k.

L. i. ROEM., Fam. Nat. Syn. III. 92. 1847 (*Ceras. ilicifolia* NUTT., in HK. et ARN., Bot. Beech. 340, t. 83. 1841; Pr. i. WALP., Rep. II. 10. 1842). Ilex-K.: Islay. — Calif. von San Francisco südwärts. Blz. III–V. Frz. XI–XII. — Wohl nicht in Freilandkultur. Im Herb. Wien sah ich ein Expl. lg. MATTHEWS, Peru (Chachapoyas), mit ganzrandigen o. kaum gezähnelten, rundlichen B., 2 : 1,5 bis 3,8–3 cm, das der *ilicifolia* sonst täuschend ähnelt. Diese ist durch die großen Fr. auch in den ganzrandigen Formen sehr ausgezeichnet.

+ + B. größer, länglich, höchstens mäßig dornzähnig.

B. geschwänzt zugespitzt, mit vorwärts gerichteten spitzen Dornzähnen o. nur welliggerandet, ohne Drüsenflecken unters. am B.-Grunde (Fig. 355 f).

*) Die bisher als *Pr. ilic. v. integrifolia* SUDW. in Gard. a. For. IV. 51. 1891 (var. *occidentalis* BRANDEG., in Proc. Cal. Ac. ser. 2. I. 209. 1888, non *occid.* SW.) geführte Form mit ganzrandigen aber größeren (im Blzw. ca. 8 : 4 cm messenden) runden B., von der ich nur Expl. von Santa Catalina Isl., Calif., sah, ist, wie GIES SARGENT, Manual 531. 1905 (nahe besser als Art *L. integrifolia* Pr. i. SARG., l. c. zu fassen. Vgl. Abbild. in SARG., Silva IV. t. 413. An Loden messen die B. bis 13 : 6 cm. Nun liegt mir aber noch eine Form vor mit ausserordentlich runden, bis 10 : 9 cm messenden B., mit kurz aufgesetztem Spitzchen. Hier sind die B. leicht gezähnt, wenigstens z. T. Da es aber nur sterile Lgr., so kann ich nicht sicher sagen, ob sie eine Var. der *integrifolia* darstellen o. etwa eine mehr zu *ilicifolia* neigende Form.

6. *L. spinulosa*. habituell wohl *caroliniana* analoger b o. bis 10 m hoher b; junge Zw. gleich den Blst. meist fein beh., B beiders., oben stärker, glänzend, dünnlederig, kahl, 6. 1.5—10:3,3 cm, Stiel meist beh., 6—9 mm; Blst. ca. 7—8 mm, sonst vgl. Fig. 354 o—p, Fr. ähnlich m.

L. s. (*Pr. spinulosa* S. et Z., in Abh. Ac. Münch. 1843. II. 122). — Dornzähniiger K. Japan (Kiuschiu). Blz. Herbst. Frz. Frühjahr. Noch nicht in Kultur meines Wissens.

Fig. 355. *Laurocerasus* (Prunus): a *hustanica* — b—c *fiendula* (*Prunus* *auriculata*) — d *laurocerasus* — e *phacosticta* — f *spinulosa* — g *caroliniana* — h *laurocerasus* — i *acuminata* — k *phacosticta* — l *laurocerasus* kleines B. — m *laurocerasus* (1/2 n. Gr.) (Original).

Im Anschluß hieran zu erwähnen als altweltliche Arten: *L. phacosticta* *Pigeum phacostictum* HANF. in Journ. of Bot. VIII. 72, 187; *Pr. punctata* HOOK. F., Fl. Brit. Ind. II. 317, 1878; *Pr. phacosticta* MAX., in Bull. Ac. Petersbg. XXIX. 110, 1884; China (Kwangtung), O. Ind. (Khasia), B. wie Fig. 355k, unters. mit ∞ feinen über die ganze Fläche verstr. Drüsenpunkten. — *L. acuminata* ROEM., Fam. nat. Syn. III. 92, 1847 (*Ceras. acum.* WALL., Cat. No. 719, 1826; *Pr. acum.* HOOK. F., l. c.). Von Nepal bis Assam, ausgezeichnet durch relativ große (10—12:3.5

—4,5 cm im Mittel, B. wie Fig. 355 i, die unters. gegen den Grund hin meist 3–9 feine dunkle Drüsenflecke zeigen. Blst. und Gyn. beh., C. schmal länglich, Stb. ca. 15. — *Pr. Jenkinsii* Hook. F., l. c., aus Assam, weicht ab durch beiderseits glänzende, entfernt gezahnte, wellig randige B., bei denen ganz am B-Grunde unters. 2 größere Drüsenflecke sitzen, C. rundlich, Stb. über 30. Die Steine sollen „rugose“ sein, was ich aber in den Herbarien als *Jenkinsii* mit Fr. sah, war z. T. *Pr. cerasodes*. Jedenfalls wäre *Jenkinsii* durch die grubigen Steine in auffälliger Weise von allen *Laurocerasus* verschieden.

— B. kurz zugespitzt, meist ganzrandig, flach, unters. nahe dem Grunde mit 2 deutl. Drüsenflecken (Fig. 355 g).

7. *L. caroliniana*: kleiner $\mathfrak{b}$ bis 12:3 m; Zw. kahl, B. zuweilen entfernt spitz gezähnt, obers. glänzend grün, unters. + mattgraugrün, ca. 6:2,2–10:3,7 cm, kahl; Stiele 5–8 mm; Blst. kahl, ca. 3 cm lang, sonst vgl. Fig. 354 i–n, C. auffällig klein (nach SMALL kleiner als K., was ich nicht fand), Fr. bis zur Blz. im 2. Jahre bleibend.

L. c. ROEM., Fam. nat. Syn. III. 90. 1847 (*Padus carol.* MILL., Gard. Dict. ed. VIII. No. 6. 1768; *Pr. carol.* AIT., Hort. Kew. II. 163. 1789; *Cer. carol.* MCHX., Fl. Bor.-Am. I. 285. 1803; *Pr. sempervirens* WILLD., Enum. Suppl. 33. 1813). — Karolina-K.; Mock Orange. — N. Carol. bis Flor., Alab., Miss., Louis., Texas. — Besonders Flußtäler. — Blz. Winter und Frühling. — Kaum in Freilandkultur bei uns.

Im Anschluß hieran bleiben noch zu erwähnen: *L. sphaerocarpa* ROEM., l. c. 89 (*Pr. sphaer.* SWARTZ, Fl. Ind. Oec. II. 927. 1800) von den Antillen (Jamaica) und wohl auch Zentr.-Am. (ob aber nördlich bis Mex. und Florida?). Er soll B. ohne Drüsenflecke haben und inwiefern von ihm sich die auch in Brasil. auftretende — nicht mit *L. brasiliensis* identische! — *L. reflexa* ROEM., l. c. 91 (*Pr. reflexa* GARD., in Hook. London Journ. of Bot. II. 342. 1843; *Pr. pleuradenia* GRISB., Fl. Brit. W.-Ind. Isl. 231. 1804), sowie *L. samydoides* ROEM., l. c. 92 (*Pr. samyd.* SCHLECHT., in Linnaea XIII. 92. 1839) aus Mexiko, die beide Drüsen haben, sicher unterscheiden, ist mir heute noch nicht klar. Doch scheinen alle 3 gute Arten zu sein. — Über *Pr. laurifolia* SCHLECHT., l. c. 91, aus Mexiko, kann ich nichts sagen.

Die *L. guanaiensis* (*Pr. guan.* RUSBY, in Mem. Torr. Cl. VI. 31. 1896) aus Bolivien scheint eine gute Art zu sein. Allein eine vergleichende Prüfung der letzten Arten ist wohl noch sehr nötig und die sichere Identifikation der SWARTZschen *sphaerocarpa* dringend nötig.

Gattung 150. *Osmaronia* GREENE, in Pittonia II. 189. 1891.

(*Nuttallia* T. et GR., ex Hook. Bot. Beech. Voy. 336. t. 82. 1840, non BARTON 1823.)

Vgl. oben S. 589 und Art. Nur diese bekannt.

O. cerasiformis: $\mathfrak{b}$ — $\mathfrak{b}$, 0,8—5 m, aufrecht verästelt, als $\mathfrak{b}$ an *Exochorda* erinnernd, $\odot$ Zw. kahl, glänzend olivgrün o. gebräunt, Kn. vgl. Fig. 315 q–w, S. 529; B. sommergrün, häutig, breitlanzettlich, beidendig $\pm$ gleich zugespitzt, ganzrandig, oben tiefgrün, kahl, unters. graugrün, + locker weich beh., 5:1,8—11:4 cm,

Fig. 356. *Osmaronia* (*Nuttallia*) *cerasiformis*: a Blst.; b Bl. mit Trgb. und 2 Vorb.; c ♂; d ♀ Bl. im L.-Schn.; e Gyn. dgl.; f Frst.; g Stein von beiden Seiten; h E. ganz und im Q.-Schn. (a, f ex Gard Chron., sonst Orig.)

Stiel 8–10 mm; Neb. abfällig; Bl. an seitr. Kztr. in kurzen nickenden, 5–10-blütigen, kahlen Trauben, gelblichweiß, Stb. 15, 2-reihig, Fr. blauschwarz, bereift, dünnfleischig, bis 15:10 mm, Stein glatt, sonst vgl. Fig. 356.

O. c. GREENE, l. c. (*Antillia ceras.* TORR. et GR., l. c. 337. et Fl. N.-Am. I. 412. 1840). Oso-Berry. westl. N.-Am. (Brit.-Columb. bis Calif. Feuchte Gebüsch. — Blz. III–IV. — Frz. VII (Heimat). — Bei uns hfg. durch Spätfroste leidend, da zeitig austreibend. Erholt sich aber, wenn zurückfrierend, schnell.

Gattung 151. *Plagiospermum* OLIVER, in Hook. Ic. Plant. XVI. t. 1526. 1886.

Vgl. oben S. 589 *) (bez. Nachtrag!) und Art. Nur diese bekannt.

P. sinense: dorniger, bis über 2 m hoher, sparrigästiger b., junge Zw. braunlichgrau, glänzend. braun, St. mit heller papierartig abblättrnder Rinde; Dorne braun, 5–6 mm lang, leicht abwärts gebogen; B. ☉, an Kztr. gebüschelt, sommergrün, häutig, jung am Rande gewimpert, dann kahl, oben matt dunkelgrün, unten glänzend hellgrün, ganzrandig o. an Lgtr. etwas fein kerbzähnig, 1,5–2,4–6–10 cm (Fig. 357 a, g, Stiel 1–1,3 cm, Neb. klein, pfriemlich, bleibend; Bl. zu 1–4 an Krztr. gebüschelt, gestielt, lebhaft gelb, stark angenehm duftend, Bl.-Achse kreiselfg., kahl, Diskus der Bl.-Achse aufgewachsen mit gelblichem Wulstring, K. 5, breitreieckig gewimpert, grün, C. 5, genagelt, Stb. 10, 2-reihig, Gyn. kahl, Gr.

Fig. 357. *Plagiospermum sinense*: a Zw.-Stück mit B. und Blst.; b Bl. im L.-Schn.; c C.; d Frkn. im L.-Schn.; e Fr.; f Stein; g steril. Zw.-Stück mit Dornen (b–d vergr.) (a nach Mitt. D. D. Ges., b–d nach OLIVER, e–g nach KOMAROW).

tief seitenständig mit gelblicher Narbe, Fr. 1,5–1,75 cm Dm., eirundlich, scharlachrot, sehr saftig und schmackhaft, Stein ca. 12:10 mm und 5 mm dick, hartschalig, runzelig, S. weiß mit dünner Testa, ohne End., Cot. dick, sonst vgl. Fig. 357.

P. s. OLIV., l. c. — Mandsch., N.-China (Tschinking). — Sandiges Geröll der Flußbutter, trockene Flußbetten etc. — Blz. III–IV. — Frz. Anfang Sommer? Ich gebe die Beschreibung nach OLIVER und KOMAROW (in Act. Hort. Petrop. XXII. 556. 1904) bez. nach PURPUS, in Mitt. D. D. Ges. XII. 1903. S. 1, mit kolor. Tafel. Noch seltener winterharter b., Bl. aber durch Spätfroste leidend, treibt schon Ende II, Anfang III aus. In Heimat als Fr.-Strauch geschätzt. Bei uns hat der b. noch nicht gefruchtet. — Bildet mit *Prinsepia* (s. Anm.), an deren Lgtr. die Dorne wie bei *Plagiospermum* sind, eine besondere Gruppe der Drupaceen.

*) Die hier erwähnte Gattung *Prinsepia* ROYLE, Ill. Himal. Bot. 206. t. 38 f. 1. 1839, aus dem Himal. (Sikkim, Khasia 1500–2000 m) mit der einzigen Art *utilis* ROYLE, l. c., ist bei uns kaum in Freilandkultur. Sie bildet kahle b. mit kraftigen bis über 4 cm langen scharf verdornenden Kztr. B. mandelähnlich, bis 9:2,8 cm, lang zugespitzt, vom untern Drittel fein gezähnt, Stiel 5–12 mm; Bl. in kurzen, kahlen, überhängenden, 3–5-blütigen Trauben unterhalb der Dorn-Kztr. Bl. mit flacher breiter Bl.-Achse, Stb. ∞, mehrreihig, Fr. schief elliptisch mit lederigem Endocarp.

Familie 35. Pomaceae), Kernobstgewächse.

LOIS.-DESLONGCH., Manuel d. Plant. Usuelles I. 211. 1819.

(Unterfam. *Pomoidae* FOCKE, in Nat.-Pfl. III. 3 18. 1888.)

Vgl. S. 359, b. Φ , B. $\odot$, sommer- o. immergrün, einfach, - gelappt o. unpaar gefiedert, Neb. . entwickelt, selten bleibend; Blst. selten 1-, meist mehr- bis vielblütig, von sehr wechselndem cymösen Aufbau, scheindoldig, -traubig o. -rispig und meist . zusammengesetzt; Bl. klein bis ziemlich groß, weiß o. rot, vor o. meist nach B. erscheinend, . selten rein z. T., Bl.-Achse becher-, krug- o. röhrenfg., K. 5, C. 5, Stb. meist 20, selten 10 o. 5, zuweilen 25 o. mehr, Gyn. 2- 5, Frb. mit der zur Frz. (meist) fleischigen Bl.-Achse . und oft zu ganz unterständigem Frkn. verwachsen, mit meist je 2, selten je 1 o. bis 20 Sa., Fr. vgl. Trib., S. ohne End., Cot. fleischig.

Gattungstabelle:**A. B. gefiedert.**

I. Bechen ganzrandig, klein, mit Stachelspitzchen (Fig. 430 k—m, Frb. mit 1 Sa. (Fig. 431 i—r, S. 763). **166. Osteomeles** (S. 762).

II. Bechen fast stets . gezähnt, meist größer (Fig. 367, 369 und 371, 373), Frb. mit je 2 Sa. **154. Sabas** *Aucuparia*, *Cornus* . S. 667—683).

B. B. einfach, nur z. T. . gelappt, höchstens unterstes Lappenpaar als Fiedern abgetrennt.

I. Die 1—5 Frb. werden zu 1—5 Steinen, vgl. Fig. 418, S. 744 bis Fig. 460.

*) Man beachte bei dieser Familie ganz besonders die Anmerkungen bei den einzelnen Gattungen. Ich habe für die vorliegende Bearbeitung rund 11000 Spaltenblätter durchgesehen, darunter außer den beiden Wiener Herbarien Herbarien und Bot. Gärten, die Herbare BOISSIER und BARBEY-BOISSIER (Gerb., Bot. Mus. Berlin, Bot. Garten Petersburg, Bot. Garten Darmstadt inkl. Hb. DIPPEL, BECK (Prag), ferner Teile aus Herb. ZABEL (Gotha), DEGEN u. a. (Pest), sowie Sachen aus Hb. HEDLUND (Alnarp), V. HAYEK (Wien), Bot. Mus. München, Rijksherb. (Leiden), Hb. HAUSKNECHT (Wien), Hb. REHDER u. a., welchen Institutsdirektionen und Herren ich verbindlichst danke. Aus Mangel an Zeit und Raum konnte ich in der Darstellung nicht über eine gewisse Grenze hinausgehen und sehr oft nur Anregungen zu speziellen Untersuchungen geben, weil die Herausgabe dieser Bogen sich um Monat verzögert hatte, wenn ich die Gattungen wie *Mazonea*, *Phacelia*, *Crataegus*, der die Formkreise der *Sorbus* (Sekt. *Halmus*) usw. noch tiefer hätte bearbeiten wollen. Bei der Schwierigkeit, viele Gattungen dieser Familie recht zu umgrenzen und bei dem Reichtum an Arten, der immer mehr zunimmt, je mehr Material man sieht, aber auch infolge der Unmöglichkeit, gewisse Formkreise auf Grund so st. reichlicher Herbarstücke recht zu bewerten, mußte ich mich doppelt vor zu sicheren Schlüssen hüten. KOEHNE's ausgezeichnete Arbeit habe ich so genau als nur möglich verfolgt, kann aber nur sagen, daß im großen ganzen der Blüten- und Fr.-Bau mir nicht so konstant und für die Gattungsangrenzung maßgebend erscheint, wie man nach KOEHNE'S Darstellung denken konnte. Auf eine Diskussion dieser schwierigen Fragen konnte ich mich hier aber so gut wie nicht erlassen. Ich stelle alles so dar, wie es mich meine eigenen Untersuchungen gelehrt haben und spreche unter meine Auffassung noch etwas eingelenkter in einem Artikel im Bull. Herb. BOISSIER 1876 311. Auch Herrn Dr. FOLNER bin ich um viel Hinweise zu Danke verpflichtet. Er wird seine unten zitierte Arbeit über die geogr. Verbreitung und die Knospentage der Pomaceen durch weitere Untersuchungen, die er z. T. auf Grund des von mir revidierten Materials anstellt, in Kürze ergänzen und ich hoffe bei Abschluß des Buches im Hauptnachtrage noch seine Ergebnisse anzeigen zu können. Von Spezialliteratur sei zitiert außer BECK (1870), KOEHNE (1873); MAXIMOWICZ, in Bull. Ac. Petersbg. XIX. 168. 1874. *Pomaceae Sibiro-Asiaticae*; WENZIG, in Linnica 1874. I. *Pomaceae*; DECAISNE, in Nouv. Arch. Mus. Paris, X. 113. 1874. *Mémoire sur l'origine d. Pomaceae*; KOEHNE, in Wiss. Beih. Progr. Pfl.-Kongress Berlin 1890. Die Gattungen der Pomaceen; BURGERSTEIN, in Sitzb. Ac. Wien CIV. 757. 1895. (Vgl. hist. Unters. Holz d. Pomac.; FOLNER, in Ost. Bot. Zeitschr. 1897. [Beitr. z. system. u. pflanzengeogr. Verbr. d. Pomac.]; FREISCH. in Öster. Bot. Zeitschr. 1898. [Zur Syst. d. Gatt. *Sorbus*]; FOCKE, in Abh. Naturw. Ver. Bremen XVI. 455. 1900. [Über die Kemptz. d. Stein- und Kernobstgewächse] und HEDLUND, in Kgl. Svensk. Vet.-Ak. Handl. XXXV. 1901. [Monogr. d. Gatt. *Sorbus*]. Diese Arbeiten später hfg. nur mit Autor, l. c., zitiert!

- a) Bl. einzeln, ca. 5 cm Dm., Stb. 30—40. K. viel länger als Recept., Stein ganz vom Fr. Fleisch überzogen, vgl. Fig. 433a—c, S. 765. **167. *Malus*** (S. 764).
- b) Blst. mehr- bis vielblütig, sonst Bl. klein, Steine fast stets mit freiem Gipfel (Vorhemd).
1. B. ganzrandig (Fig. 418, S. 744 bis Fig. 429, S. 760), Zw. dornenlos, Frb. nur dorsal z. T. mit Bl.-Achse verwachsen, sonst unter sich frei, mit je 2 Sa. **164. *Cotoneaster*** (S. 744).
 2. B. (wenigstens an Spitze) gezähnt, gesägt o. gelappt, Zw. meist dornig.
 - a) B. klein, gekerbt-gesägt, vgl. Fig. 430a—i, S. 762, Frb. mit je 2 gleichen Sa. **165. *Pyracantha*** (S. 761).
 - β) B. etc. vgl. Fig. 435, S. 769 bis Fig. 460, Frb. mit 1 sitzenden und einer gestielten zuweil. fehlenden Sa. **168. *Crataegus*** (S. 766).
- II. Frb. nicht steinartig werdend, sondern zur Frz. häutig o. pergamentartig, vgl. Fig. 358, S. 654 bis Fig. 417, S. 742.
- a) Frkn. ganz unterständig, die freien Gr. von einem Diskuswulst eingeschnürt, wie Fig. 360a, c etc., S. 657 zeigt, B. wie Fig. 358 f, S. 654 bis Fig. 363, S. 662.
1. Bl. einzeln, Frb. mit ∞ Sa. (Fig. 358, S. 654). **152. *Cydonia*** (S. 654).
 2. Blst. mehrblütig, Scheindolde o. doldentraubig, Sa. je 2, vgl. Fig. 359, S. 656 bis Fig. 364, S. 664. **153. *Pyrus*** (S. 655).
- b) Gr. verwachsen o. doch nie von einem Ringwulst eingeschnürt, Frkn. halb- bis ganz unterständig.
1. Frb. mit ∞ Sa., Bl. meist einzeln (Fig. 405, S. 728). **163. *Chaenomeles*** (S. 728).
 2. Frb. mit nur je 2(—3) Sa., Blst. selten 1-blütig.
 - a) B. derblederig, immergrün.
 - Seitennerven 1. Ordn. scharf bis zum Rande durchlaufend, B. groß, meist über 12 cm lang (vgl. Fig. 386a, S. 692 und Fig. 391a—b, S. 712). **158. *Ersostrum*** (S. 711). (Vgl. eventuell auch *Micromeles*, S. 700.)
 - Seitennerven 1. Ordn. sich vor dem Rande auflösend o. sehr abschwächend.
 - Frkn. halbunterständig, Fr. mit bleibendem K. (vgl. Fig. 390a—f, S. 705 und Fig. 391a—h, S. 706). **157. *Potentilla*** (S. 706).
 - Frkn. ganz unterständig, Fr. ohne K., bzw. freien Teil der Bl.-Achse (Fig. 390h—i, S. 705). **156. *Aphelocya*** (S. 704). (Vgl. eventuell *Micromeles*, S. 700.)
 - β) B. (meist) sommergrün, höchstens dünnlederig.
- Seitennerven 1. Ordn. scharf bis zum Rande durchlaufend, Gr. 2—3(—4), $\pm$ verwachsen.
- * Fr. mit bleibendem K.
- + B. meist fein und scharf gesägt und $\pm$ geschwänzt gespitzt, nie unters. grau o. weißfilzig beh., vgl. Fig. 393c—q, S. 709. **157. *Photinia*** [*Pourthiaea*] (S. 708).
 - B. fein gezähnt o. lappenzählig, nie geschwänzt gespitzt, lfg. unters. dicht filzig, vgl. Fig. 377, S. 686 und Fig. 379, S. 690 etc. **154. *Sorbus*** [*Hahnia*] (S. 684).
 - Fr. ohne K., bzw. freien Teil der Bl.-Achse, vgl. Fig. 385—386 etc., S. 700. **155. *Micromeles***, S. 700 [und *Sorbus subfusca*, S. 685].
- Seitennerven 1. Ordn. sich gegen den Rand auflösend bzw. sehr abschwächend, Gr. 3—5, frei o. verwachsen.
- * Frkn. ganz unterständig, Blst. scheindoldig o. doldentraubig.
- Gr. frei, Zw. reich dornig, Bl. zu 1—3, vgl. Fig. 395, S. 714. **160. *Peraphyllum*** (S. 713).
 - Gr. verwachsen, Zw. dornenlos o. kaum verdornt.
 - △ Bl. klein, in Doldenrispen, B. sehr fein und dicht drüsenzählig, Fig. 382d—k¹, S. 696 und Fig. 384a—e, S. 699. **154. *Sorbus*** [*Aronia*] (S. 698).
 - Bl. $\pm$ ansehnlich, in Scheindolden, B. vgl. Fig. 397, S. 718 bis Fig. 404, S. 728.
 - > Fr. mit Steinzellen. **162. *Eriolobus*** (S. 725).
 - > Fr. ohne Steinzellen. **161. *Malus*** (S. 714). (Vgl. auch *Stranvaesia*, S. 712.)
- ** Frb. mit $\pm$ freiem Gipfel, Blst. meist mehr traubig.
- Fr. ohne falsche Scheidewände, vgl. Fig. 394c—m¹, S. 712. **159. *Stranvaesia***.
 - Fr. mit $\pm$ ausgebildeten falschen Scheidewänden, vgl. Fig. 407, S. 732 bis Fig. 417, S. 742. **164. *Amelanchier*** (S. 731).

II siehe S. 744.

Trib. I. *Sorbus* KOEHNE, l. c. 15. 1890. Fr. ohne Steine, selten mit einem aus 5 Frb. gebildeten dünnwandigen, durch häutige Scheidewände 5-fächrigem Stein (Gattung No. 152—164).

Gattung 152. *Cydonia* MILLER, Gard. Diet. ed. VIII. 1768.

[Quitte; Quince; Coignassier.]

Vgl. oben S. 653 und Art. Nur diese bekannt.

*C. oblonga**) (*C. vulgaris*): dornloser b. b. o. kleiner b. bis 6—8 m hoch, Krone sparrig, unregelmäßig, Borke zuletzt leicht korkig; junge Zw. filzig-zottig, c. locker-zottig, olivgrün o. rotbraun, leicht rundlich-eckig, Lent. ∞ , fein, erst am Holze deutlicher, Kn. locker und wenig schuppig, dicht beh.; B. aus rundl. o. leicht herzfg. Grunde breit eifg. o. ei-elliptisch (Fig. 358f), oben tiefgrün, nur jung verstr.

beh., unten weißgrau-filzig, ganzrandig, 5 : 3,5—10 : 7,5 cm, Stiel filzig, 10—18 mm; Bl. nach B., einzeln, achselständig, groß, weiß o. hellrosa, Stb. 20, einreihig, Gr. fünf, am Grunde beh., Sa. ∞ , Fr. groß, gelb, fein filzig, vgl. Fig. 358a—e und var.

Fig. 358. *Cydonia oblonga*: a Bl.; a¹ C.; b Bl. im L.-Schn.; b¹ Frkn. im Querschnitt; c Neb.; d Kn. - Querschnitt; e Fr.-Längsschnitt; f B. (ganze Figur nachträglich um $\frac{1}{3}$ verkleinert) (d nach FOLGNER, e nach KOEHNE, sonst Orig.).

var. a. *typica* (*C. vulg.* var. *pyriformis* KIRCHN., Arb. Musc. 311. 1864): Fr. birnförmig. — b. *maliformis* (*C. mal.* MILL., l. c.; *C. vulg.* var. *maliformis* KIRCHN., l. c.): Fr. apfelförmig. — c. *lusitanica* (*C. lusit.* MILL., l. c.; *C. Cydonia* var. *lusitanica* PERS., Syn. pl. II. 40. 1807): üppiger wachsend, B. breiter, Fr. birnfg., gerippt. — Eine bunte Form von a. bez. b. ist f. *marmorata* (*Cyd. vulg.* var. *marm.* DIPP., Laubholzsk. III. 357. 1893): B. gelb und weiß marmoriert; ferner sei erwähnt: var. *pyramidalis* (*C. vulg.* var. *pyram.* DIPP., l. c.): pyramidal wachsend.

C. o. MILL., l. c. No. 1 (*Pyrus Cydonia* L., Sp. pl. 480. 1753; *Cyd. Cydonia* PERS., Syn. pl. II. 40. 1807; *Cyd. vulgaris* PERS., l. c. in Corrigo. — Gemeine Q.

Heimat Asien (Persien, Turkestan), von da durch ganz S.-Eur. verbr., in M.-Eur. nur kult., hier u. da verwildernd. — Blz. V. — Frz. IX—X. — Altbekannter, der Fr. halber geschätzter Zierstr.

Auf den von DANIEL, in Rev. gen. Bot. XVI. 5, beschriebenen mutmaßlichen Ptropfbastard zwischen Quitte und Birne komme ich im Nachtrag des Buches zu sprechen, wenn ich Material erhalten habe.

*) Nach den geltenden Regeln muß dieser erste MILLERSche Name als Hauptname bleiben.

**) Vgl. meine Dendrol. Winterstud., S. 188 und Fig. 171a—d, S. 168.

**Gattung 133. *Pyrus* *) L. sensu MEDIC. (Gesch. d. Bot. 76. 1739.
[Birne; Pear; Poirier.]**

Vgl. oben S. 652 und S. 653: meist h . Krztr. z. T. verdornend; B. $\odot$, sommer-, selten wintergrün, meist einfach, selten gelappt, in Kn. gerollt; Blst. doldenartig o. doldentraubig, Bl. weiß, mit o. kurz nach B. A. meist rot, Gyn. (2—5), mit je 2 anatrophen Sa., Fächer zur Frz. ein zarthäutiges Kernhaus bildend, S. mit schwarzer Testa. — Die ca. 16 spontanen Arten sämtlich erwähnt.

A. B. mit ∞ obs. Sp. in Form wie Fig. 359 und 361 a—b, kahl, S. groß.

I. B. stets einfach, ganzrandig, wie Fig. 361 a, 659.

1. *P. glabra*: bis 10 m hoher, kurz abstehend verastelter h . Rinde grau, Zw. kahl, $\cdot$ purpurn, leicht kantig, feine helle Lent, später grau; Kn. klein spitz-eitg., kahl, nur Seh.-Ränder lose gewimpert; B. höchstens ganz jung spärlich beh., beiders., hellgrün, oben glatt, unten netznervig, ca. 1:1—9:2 cm, Stiel 0,6—2 cm; Blst. spärlich beh., nur K. innen gelbgraufilzig, Fr. nach Boiss. kugelig, Stiel nicht verdickt, sonst vgl. Fig. 360 a—a².

P. g. Boiss., Diagn. ser. 1. VI. 53. 1845. — Kahle B. — S.W.-Persien (Faristan, Laristan). — Blz. V. — Frz. Herbst? — Kaum in Kultur. Was VIL-MORIN, Frut. Cat. prim. 101. 1905, als *glabra* Syrien führt, dürfte *pyrena* sein.

II. B. fast stets — tieffertilig o. eingeschnitten, jedenfalls nicht ganzrandig (Fig. 359 c—i, 361 b).

2. *P. heterophylla*: h — h bis 10 m; Zw. stets kahl o. nur ganz jung leicht beh., $\cdot$ — $\cdot$ purpurbraun, Krztr. hfg. stark verdornend, Kn. stumpfer o. spitzer kurz eitg., meist kahl, lebhaft braun; B. sehr variabel, hellgrün, unten fast gleichfarbig, gewöhnlich nur ganz jung spärlich zottig, an Bl., bez. Frzw. fast stets fiederteilig (doch vielleicht auch zuw. alle einfach, dann ca. 5—7:1—2 cm, Stiel bis 2 cm, sonst Stiel bis 6 cm, vgl. Fig. 359 c—i und 361 a; Blst. kurz doldentraubig, lockertilzig, Bl. ca. 2—2,5 cm Dm., Stiel 1—1,5 cm, Achse und K. innen mehr. — filzig, sonst vgl. Fig. 360 b, C. kaum genagelt, am Grunde leicht beh., Stb. ca. 18, Gr. schwach beh.; Fr. wie b².

Ob man die besonders tieffertiligen B.-Formen, wie Fig. 359 g als var. *Koopmannii* SPÄTH, apud ZBL., im H. d. D. D. G. 184. 1903 o. f. *dissecta* HORR. KEW hervorheben kann, ist mir noch fraglich.

P. h. RGL. et SCHMALH., in Act. Hort. Petrop. V. 2. 581. 1878. — Wechselblatt-B. — Turkestan, Bucharei. — Flußtäler, Gebirgshänge bis 3500 m. — In Kultur noch sehr selten. Möglicherweise gehören gewisse Kulturlormen zu dem, was LITWINOFF, in Herb. Hort. Petrop., als *P. bucharica* o. *P. Korshinskyi* führt. Ich sah die Originale, die von *bucharica* alle im Sept. mit reifen Fr. gesammelte Expl. darstellen, deren B. zwischen den in Fig. 359 a—b dargestellten Formen schwanken. $\cdot$ Zw. fein gelbgraufilzig, dgl. Kn. (o. bräunlich-filzig), B. beiders., $\cdot$ locker fein zottig, z. T. stark kahlend, obs. Sp. spärlicher als bei *heterophylla*, Zähnung ziemlich grob- und ungleich-kerbig; Fr. wie Fig. 360 h, S. groß wie h¹.

Von *P. Korshinskyi* nun lagen lauter Bl.-Expl. (April) vor, deren junge B. an Stiel, Unters. und Rand $\cdot$ zottig, obers. — kahl sind. Form etc. stets einfach, wie *bucharica* (auch obs. Sp.), nur alles noch kleiner, Zähnung feiner kerbig; Blst. wie *heterophylla*, Bl. fast analog, nur etwas größer, C. $\cdot$ oblong und zieml. genagelt (vgl. Fig. 360 g—g²). Vorläufig bleiben mir die Zusammenhänge zwischen *bucharica* und *Korshinskyi* unklar. Die letzte scheint nur eine kahlere Form der

*) KOEHNE unterscheidet 1860 die beiden Sekt. *Achras*, Fr.-K. bleibend, und *Pashia*, Fr.-K. abfällig. Da ich glaube, daß man das Verhalten des Fr.-K. nicht so in den Vordergrund stellen darf, da z. B. *P. longipes* sich an *communis* sehr eng anschließt und doch den Fr.-K. abwirft, so halte ich eine engere Gliederung — ähnlich der von DECAISNE versuchten — für besser, möchte aber vorläufig neue Sekt. nicht schaffen, sondern nur in der gegebenen Anordnung meine Anschauungen über die genetischen Zusammenhänge andeuten. Spec. 11—15 würden KOEHNE'S *Pashia* ex p. entsprechen, während 1—10 wohl in mindestens 3 Gruppen zerfallen.

ersten. Aber auch zwischen *heterophylla* im typ. Sinne und diesen beiden anderen ist mir die Grenze noch traglich. Vielleicht sind alle Formen mit an den Bl-

bezw. Frzw. ungeteilten B. von *heterophylla* abzutrennen! Lgtr. können nicht maßgebend sein, bes. bei jungen noch nicht genügend charakterisierten Pflanzen. Diese interessante *Pyrus*-Gruppe bedarf mithin noch sehr der Beobachtung. Möglicherweise gehen diese Formen auch noch weiter nach Zentralasien hinein und ist die mysteriöse *Pyrus crenata* DON, Prodr. Fl. Nepal. 237. 1825, damit in Beziehung zu setzen, denn eine *Sorbus* ist sie sicher nicht!

Fig. 359. *Pyrus*-B.: a—b *bucharica*: a von sterilem Trieb; b von Fr.-Kztr. — c—e *heterophylla*: c—f B. von Kztr. wilder Pflzen., g Kulturform Lgtr. (var. *Koopmanni* o. *dissecta*), h—i vom selben Lgtr. eines Kultur-Expls., das vielleicht zu *bucharica* gehören könnte (vgl. Text oben) ($\frac{1}{2}$ nat. Gr.) (Original).

B. B. ohne obs. Sp., sehr selten fiederteilig und wenn schmallanzettlich, so beh. o. unters. papillös o. kerbzähnig.

I. B. ganzrandig, entweder jung seidig beh. und auch im Alter nicht ganz kahlend, Form wie Fig. 361 c, o. Unters. deutlich papillös. B.-Kn. zugespitzt.

a) B.-Unters. nicht papillös, $\pm$ beh., Form wie c.

3. *P. salicifolia*: bis etwa 8 m hoher $\varnothing$ mit überhängenden Ästen und Zw. und meist verdornenden Krztr., Zw. dicht anliegend weißgrau-zottig, erst kahlend, Kn. stark kahlend; B. wie Fig. 361 c, ober. zuletzt fast o. ganz kahlend, trübgrün, 3.5:0.7—10:2 cm im Mittel, Stiele 0.3—2 cm; Blst.-Achsen, Bl. Achsen und K. (beiders.) dicht weiß- o. leicht gelblich-grau filzig, Bl. 2—3 cm Dm., A. ohne Konnektivspitzchen, sonst vgl. Fig. 360 c—c', Fr. wie d o. länglicher, Stiel kürzer als Fr.

P. s. PALL., Itin. III. 734. tab. N. Fig. 3 A, B. 1776 [et L. F., Suppl. 255. 1781]. Weidenblatt-B Gebirgswalder, Transkauk., Armenien, Kaukasus, Krim. Blz. IV—V. Frz. X. Seit langem in Kultur. *P. salicifolia pendula* HORT ist nur der Typ. Er kommt in Blattform manchmal *elaeagnifolia* sehr nahe, aber durch die kahlenden spitzen braunen Kn. gut zu scheiden.

3—5 *P. salicifolia - nivalis* (bez. *elaeagnifolia*): nach ZABEL, in H. d. D. D. G. 182. 1903, in Kultur entstanden. Mir sicheres Material unbekannt, denn ZABEL's Expl. halte ich nur für *salicifolia*, doch scheint es mir nach SPACH's Originalen mit DECAISNE nicht ausgeschlossen, daß die *P. canescens* SPACH, Hist. vegt. II., 149.

*) Vgl. meine Dendr. Winterstudien, p. 192 und Fig. 178 a—f, p. 175.

1834. diesen Ursprung besitzt. Die *canescens* HORT. ist dagegen, wie es scheint, meist zu *salicifolia* s. m. zu ziehen.

3×7 *P. salicifolia* × *communis*: Vgl. FOCKE, Pflanzenmischlinge 143. 1881. Mir unbekannt.

b) Unters. der B. deutlich papillös, z. T. ganz kahlend (Fig. 361 d—i).

4. *P. amygdaliformis*: kleiner sparrig aufrecht ausgebreitet verästelter, bis ca. 6 m hoher B. · Zw. nur spärlich grauzottig, dann glänzend braun. · Bl. grau. Kn. kurzkegelig, stark kahlend, zuw. ziemlich stumpfspitzig^{*)}: B. recht variabel! ca. 2,5:0,8—5:2,5 o. 7:3 o. schmaler bis 6:2 cm, ober. fast von Anfang an kahl, zuletzt leicht glänzend tiefgrün, unters. jung abwischbar weichfilzig, später etwas bläulichgrau, kahl o. fast so, ganzrandig o. feinkerbig. Stiel 0,5—2 cm: Bl. 2—3 cm Dm., A. mit Konnektivspitzchen, Achsen der Blst., der Bl. und K. (beiders. o. nur innen) locker grau filzig. Fr. meist kugelig bis ca. 2,8 cm Dm., Stiel länger, kaum o. wenig verdickt, o. auch verdickt und kaum so lang als Fr., sonst vgl. Fig. 360 e—f.

Fig. 360. *Pyrus*: *a—a'' glabra*: *a* Bl.-L.-Schn.; *a'* C.; *a''* S. — *b—b'' heterophylla*: *b* Bl.-L.-Schn.; *b'* C.; *b''* Fr. — *c—d salicifolia*: wie *b—b''*. — *e—f amygdaliformis*: wie *b—b''*. — *g—g'* *Korshinskyi*: Bl.-L.-Schn. und C. — *h—h'* *bucharica*: Fr. und S. (Original).

Infolge der variablen Blatttracht in viele Arten gespalten. Bedarf einer vergleichenden Untersuchung. Vorläufig erscheinen mir die Abweichungen nur als verbundene Formen, eine abnorm schmal- und langblattrige dürfte *P. baccata* DECNE, Jard. Fruit I tab. X. 1871 72 *P. angustifolia* DECNE, in Ann. Sci. Nat. sér. 2 IV 359. 1835 sein, nach einem von DECAISNE bezeichneten Expl. in Herb. Wien zu urteilen. Sehr kleinblättrig ist *f. macrophylla* DECNE, l. c. (Fig. 361 f), eiförmliche B. zeigt *f. pyramidalis* DECNE, l. c. d. Ferner stellt *P. oblongifolia* SPACH, Hist. Veg.

^{*)} Siehe meine Dendrol. Winterstudien, S. 192 und Fig. 178 n—p, S. 175

^{**}) Was *P. pyramidalis* RAF., Giorn. II. 173 (1814?), ist, weiß ich nicht, da ich diese von ROUY et FOUC. zitierte Quelle nicht einsehen konnte. Nach FLORI e PAOLETTI identisch mit *cuneifolia* GUSS.

H. 128. 1834, wohl nur eine relativ breitblattrige kerbzähniige Form (Fig. 361 g) dar.), und die var. *lobata* DECNE., l. c., tab. VIII. fig. B. (? var. *triloba* BORNM., in Bot. Centralbl. XXXVI. 59. 1888 und *Prunus colluca* VEL., Fl. Bulg. Suppl. I. 97. 1898, *P. heterophylla* HORR.) zeigt das an uppigen Lgtr. gelegentliche Vorkommen lappig eingeschnittener B. (Fig. 361 h). Ob BORNMÜLLERS *triloba* nicht doch eine konstant gelappte besondere Var. darstellt, konnte ich nach den Originalen nicht entscheiden. Sie hatten kaum papillöse B. Im übrigen rangiere ich alle hierhergehörenden Namen einstweilen als Synonyme.

P. a. VILL., Cat. Jard. Straßb. 322. 1807 (*P. parviflora* DESF., Cor. Tourn. 78. t. 58. 1808; ? *sinaica* DUM.-COURS., Le Bot. cult. ed. 2. V. 435. 1811, 14 [et THOUIN, in Mem. Mus. Paris I. 1815. 170. t. 9]; ? *sinaï* Nouv. Duh. VI. 190. t. 57. 1815; *amirifolia* GUSS., Pl. Rar. 202. 1826; ? *cropleura* ROHB., Fl. Germ. excurs. 630. 1832). — Mandelblatt-P. I. G. nur Istrien, Dalmat., sonst S. Frankr. (Alpes marit.), Span., Ital., Serb., Thessal., Albanien, Maced., Balkan, Griechenl., aus Kl. Asien*) sah ich nur je 1 Expl. aus dem W. (M. Ida) und aus Armenien (Paschalik Musch). — Bos. trockene Gebirgshänge. Blz. V. Frz. X. Seit langem in Kultur.

4×5 *P. amygdaliformis* × *nivalis*: Es scheint mir ziemlich sicher, daß diese Hybride gar nicht so selten und seit langem in Kultur entstanden ist. Ich bin sehr geneigt, hierher die *P. Michauxii* BOSE, apud POIR. in LAM. Encycl. Suppl. IV. 452. 1810 und *P. oblongifolia* SPACH, vgl. S. 657, sowie vielleicht auch *P. persica* PERSOON, vgl. Anm. unten, ob auch die bei *amygdaliformis* als fragl. Synonyme geführte *P. sinaica*?) zu stellen. Leider fehlte mir die Zeit, die Blätter etc. aller Sorten genau anatomisch zu untersuchen, aber schon flüchtige Proben deuten an, daß meine Annahme viel für sich hat. Ein sehr alter als *Michauxii* bezeichneter H im Wiener Bot. Garten, den FENZL für *sinaica* in Herb.) erklärt, zeigt besonders an Sämlingen, die aus seinen Fr. (teste FENZL) erzogen wurden, an das was SPACH nach DECNE. unter *oblongifolia* verstanden, sehr viele Anklänge. Und spontane Formen, auf die diese drei Namen paßten, gibt es nicht, die Vaterländer der Autoren beruhen auf bloßen Mutmaßungen!

4×7 *P. amygdaliformis* × *communis*: tritt vielleicht auch in Kulturen auf. Vgl. *P. communis* var. *Sabauda* DECNE., l. c., sub tab. 1.

H. B. nicht wie in Fig. 361 d i. bezw. Unterseite nicht papillös und wenn B. ganzrandig, meist deutl. beh. bleibend.

C B. unters. filzig beh. bleibend, vorwiegend ganzrandig, Kn. beh. dick, ± eikugelig.

5. *P. nivalis*†): verdornender b o. kleiner H o. dornloser größerer H , bis etwa 17 m hoch. Verästelung breit ausladend, steif. Kztr. meist auffällig dick und oft verbogen, junge Zw. dickfilzig, erst schwarz-grau kahlend, Kn.-Sch. hfg. ziemlich locker††): B. lanzettlich bis elliptisch o. oboval, vgl. var.; Blst. stets dicht weißfilzig, dgl. Bl.-Achse und K. (beiders., innen bräunlich), sonst vgl. Fig. 362 a b. Fr.-Stiel meist so lang o. länger als die vorwiegend rundliche Fr.

Man kann mit Reserve festhalten: var. a. *elaeagrifolia* (*P. elaeagnifolia* PALL., in Nov. Act. Petrop. VII. 355 t. 19. 1793. Kztr. meist verdornend, b kleiner H , B. vorwiegend lanzettlich, wie Fig. 361 k, in Heimat unters. bleibend dicht, obers.

*) Falls es sich hier nicht um eine (vielleicht hybride) Kulturform handelt. Man vgl. auch tab. 14 bei DECNE., l. c., und den Hinweis oben bei 4×5.

Vielleicht tritt sie auch weiter östlich auf und gehört den de. obskuren *P. persica* PERS. Syn. II. 40. 1807 hierher. Doch vgl. unter 4×5.

†) Ich bin der Ansicht, daß *nitida* pers. str. nur eine aus der vordrussischen *elaeagnifolia* hervorgegangene Kulturform darstellt. Sie ist in kein nigerds wild, zwischen ihr und typ. *elaeagnifolia* als unmerklichen Übergänge, die eine scharfe Gabelung des Formkreises z. Z. ganz unmöglich machen. In obigen verweise ich auf die Arbeit von FR. WITASEK, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 1904, p. 621. Schon PALLAS hatte, wie aus seiner Beschreibung hervorgeht, die enge Verwandtschaft seiner *elaeagnifolia* mit JACQUINS *nitida* erkannt. Die nomenklatorisch notwendige Voraussellung dieses Namens darf uns aber nicht verleiten, in ihr die phylogenetisch ältere Form zu sehen.

††) Vgl. meine Dendrol. Winterstudien, S. 192 und Fig. 178 g—m, S. 175.

locker weißfilzig, in Kultur bei uns oben kahlend, unters. mehr graufilzig, ca. 1:1,3—7:2,5 cm, Stiel bis 2,5 cm, Fr. kugelig. — var. **b. Kotschyana** (*P. Kotschy.* Boiss. apud DUCNE, l. c., t. 18 1871/72; *elaeagr.* var. *Kotschyana* Boiss., Fl. or. II 654 1872; *P. elaeagr.* var. *pontica* HAUSSKN. et BORNM., in Herb. ex parte: vorwiegend ♂, dornlos, B. wie l. breiter, bis 6—9,3 cm, Stiel bis 3 cm, Beh. wie bei a. — var. **c. typica**: wie b, doch B. wie m, mehr oboval, Grund spitzkeiliger, bis ca. 8:4 cm, Beh. lockerer, Fr. größer, zuletzt genießbar, bis 5 cm Dm., rundlich o.

Fig. 361. *Pyrus*: normale B. mittlerer Größe: a *glabra* — b *heterophylla* — c *obcordata* — d—i *amygdaliformis* (vgl. Text S. 657/58) — k—m *nivalis*: k var. *elaeagrifolia*: l var. *Kotschyana*; m var. *typica* — n × *salvifolia* — o *syriaca* — p *Balsanae* — q *sinensis* ($\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

am Grunde — in Stiel vorgezogen. Eine reichlich, auch unters. fast ganz kahle Form ist *P. austriaca* (*P. austriaca* KERNER, Sched. Fl. exsicc. Austr.-Hung. No. 2437. 1866), falls diese Form nicht schon unter *P. culta* — *communis* fällt!!

Vielleicht eine weitere Varietät, die direkt von var. b abzuleiten ist, stellt *P. Armud* HAUSSKN. et BORNM., in Mitt. Geogr. Ges. Thür. IX Mitt. Bot. Ver. Thür. S. 17 1866—1867 dar. Herr BORNMÜLLER, dem ich auch für viele andere Mitteilungen zu Danke verpflichtet bin, hatte die Güte, mir sein ganzes Material zu

senden. Danach konnte ich die Überzeugung, daß hier ein Bastard von *elaeagrifolia*, sei es mit *communis* (also *salvifolia*), sei es mit *syriaca*, vorliege, nicht gewinnen. B. so gut wie ganzrandig, meist oboval mit sehr feiner Spitze, im Mittel 5:3 cm (mit nur kurz aufgesetzter Spitze) o. 7:2,5—4 cm (mit mehr vorgezogener Spitze), oberf. reichlich kahlend, unterf. gelbgrau filzig, Stiele 2,5—4 cm.

filzig, Fr. birnfg., ca. 4—4,5 cm lang gestielt (Bl. ?), Kn. etc. der *nivalis typica* ähnlich. Es gehören hierher: lg. BORNMÜLLER, No. 1027, 1766, 2381 aus dem S.-Pontus (Gebirge zwischen 1000—1500 m, ob auch No. 306, 1767 b, 1870 ist mir noch unsicher, da die Bewertung solcher Formen ohne genauere Kenntnis aller Teile sehr problematisch bleibt. Ich mochte aber die var. *pontica* HK. et B. aufteilen und einen Teil meiner var. a. und die kahleren Formen mit länger gestielten Bl. (locker beh. Bl.-Stielen), wie eben die letzten drei Nummern, zu var. *Armudensis* m. stellen. An diese gemahnen auch gewisse taurische Expl. CALLIER, so No. 89.

P. n. JACQ., Flor. Austr. II. 4. t. 107. 1774. — Schneebirne. — var. a. sah ich aus Cilic., Cappadoc., Anatolien, Armenien, Georgien, var. b. aus Armen. und Kurdistan, c. ist Kulturform, die bei uns hier und da im S.-O. des Gebietes verwildert. — Gebirge, Ebenen, zuweilen gestrüppartig, wie *Prunus spinosa* auftretend. — Blz. IV(—V). — Frz. X—XI. — Die *elaeagrifolia* der Kultur ist nicht selten anscheinend das, was ich im folgenden als *salvifolia* festhalte*). Sollte etwa, was nicht ganz ausgeschlossen ist, *nivalis typica* schon eine Hybride *elaeagrifolia* × *communis* sein, so müßte *elaeagrifolia* wieder Hauptname werden. Übrigens scheint aber PALLAS im Grunde nichts anderes beschrieben zu haben, als eine verwilderte bzw. kultivierte, unserer *nivalis* s. str. entsprechende Form! *P. nivalis* und *communis* sind wohl die Stammformen unserer Birnensorten.

5×6 *P. nivalis elaeagrifolia* × *syriaca*: scheint nach einem Expl. von FRIES aus dem Kaukasus (ohne Standort) im Herb. BARB.-BOISS. vorzukommen.

5×7 *P. nivalis* × *communis*: *P. salvifolia* DC., Prodr. II. 634. 1825. Ich glaube, man kann die *salvifolia* am besten so deuten. Die bei ihr auftretenden B.-Formen (Fig. 361 n) und die schon längst konstatierten Rückschläge zu *communis* (vgl. FOCKE, Pflanzenmischlinge 143. 1881) lassen diese Annahme am plausibelsten scheinen. Die Formen stehen im allgemeinen *nivalis typica* näher, weichen aber vor allem durch kahlende Blst.-Achsen und — gezähnte, kahlende, länger gestielte B. ab. Vielleicht kann man eine der *salvifolia* und eine *communis* näher stehende Form festhalten, denn viele der reicher beh. *communis* sind wohl schon hybrid. *P. salvifolia* tritt auch in Asien in Kultur auf (vgl. CALLIER, No. 590, Neusatz bei Simferopol), bei uns häufig verwildernd. Vgl. noch das oben unter *P. Armudensis* und unten unter *P. communis* Gesagte.

○○ B. stets o. wenigstens zuletzt ganz o. fast kahl, fast stets ringsum gekerbt oder gesägt.

*-siehe
S. 664.

+ Gyn. normal mit 5 Fächern und Gr., Stb. 20, K. bleibend o. sehr selten abfällig, B. wie Fig. 361 o—q o. Fig. 363 a—l.

+ + siehe
S. 663.

† Sägezähne der B. nicht grannenspitzig.

— B. kerbzähnig, wie Fig. 361 o, Bl.- bzw. Fr.-Stiele kaum unter 3—4 cm.

6. *P. syriaca*: b—h, bis 10 m, ziemlich steif, aufrecht verästelt, Zw. stets kahl o. nur ganz jung beh., — tiefbraunrot, später grau, B.-Kn. breit eifg., zugespitzt, kahl, nur Sch.-Ränder gewimpert, ihre Spitzen leicht klaffend, Kztr. verdornend o. nicht, dann kurz, dick; B. variabel, sehr bald o. stets kahl, oberf. leicht glänzend grün, unterf. wenig heller, 2,5:0,7 (bes. an b-Formen) bis 5:2 o. bis 7:10:2,8—3 cm, Stiel meist über 2 und bis 5 cm lang; Bl. bis 3 cm Dm., Achse und K. außen — graufilzig, K. innen bräunlich zottig, Fr. Stiel verdickt, sonst vgl. Fig. 362 e—f.

P. s. Boiss., Diagn. ser. 1. X. 1. 1849. — Syrische B. — Cypern, Syrien, S.-Kurdistan, Pontus, wohl bis W.-Pers. — Vorkommen ähnlich unserer Wild-

*) Das was KOEHNE, Herb. Dendrol. No. 129, als *elaeagrifolia* ausgegeben, ist sicherlich nicht typisch, erinnert z. T. sehr an *P. canescens* SPACH, siehe oben S. 656.

**) So scheinen mir sterile Expl. von BORNMÜLLER, 1902 N.-Pers., Mt. Elburs eher in den Formenkreis der *syriaca* als den der *communis* zu gehören. B. kahl, 4:2,2—6:3,8 cm, Stiele 1,5—4 cm. Immerhin bleibt diese Form zunächst recht fraglich.

birne, z. T. kleine Wälder bildend. Blz. IV V. Frz. Herbst. In Kultur
 sich erhielt ein Expl. von BORN-MÜLLER aus Weimar) noch sehr selten, B. da dünner,
 im Mittel größer, durch die
 langen Stiele gut gekenn-
 zeichnet. Fr. scheinen nicht
 auszureifen. Diese Art er-
 innert in den Blattvariationen
 am meisten an *amygdaliformis*,
 der sie vielleicht am
 nächsten steht, obwohl auch
 Beziehungen zu *communis*
 deutlich! Daß *P. Armud*, wie
 im H. d. D. D. G. 183. 1903
 steht, eine *communis* × *syriaca*,
 ist ausgeschlossen.

Fig. 362. *Pyrus*: a—d
nivalis: a—b var. *typica*: a
 Bl. im L.-Schn.; a' C.; b Fr.;
 c—d var. *elaeagrifolia*: wie
 a—b — e—f *syriaca*: wie
 a—b — g—k *communis*: g Bl.
 im L.-Schn. und K.; g' C.;
 h—i Frkn.-Querschnitte oben
 und unten; k Fr. im L.-Schn.
 (Gesamte Zeichnung nach-
 träglich um $\frac{1}{10}$ verkleinert)
 (Original).

△△ B. ± bis
 scharf sägezählig, wie
 Fig. 363 a—e.

7. *P. communis*: dorniger b o. $\bar{h}$ bis $\bar{h}$, bis 20 m hoch,
 Habitus breit pyramidal^{*)}. Verästelung sparrig, aufrecht, Zw. stets
 kahl o. nur jung beh., (•) glänzend oliv- o. gelbrotbraun, braungrau,
 Kztr. meist ∞, Kn. spitz eifg., kahl, nur Sch. gewimpert; B.
 variabel, ca. 2 : 1,8 bis 6 — 6,5 : 5 cm, stets kahl o. nur jung wenigstens unten
 beh. o. doch Rand filzig gewimpert, später kahl, beiders. lebhaft grün,
 dünn, Stiel dünn, 1,5 — 5 cm; Bl-Stiele meist nicht über 3 cm lang,
 kahl o. fast kahl, Bl-Achse und K. außen kahl o. graufilzig, K. innen
 rostig beh., Fr. bis 5 cm gestielt, kugelig o. birnfg., vgl. Fig. 362 g — k.

Man kann festhalten^{*)} var. *Pyraister* L., Spec. pl. 179. 1753. mel. var. *torreyana*
 WALLER., Sched. erit. I. 213. 1822 meist dornig, B. höchstens jung kurze Zeit beh.,
 Stiele meist länger als Spreite C. meist nicht über 10 mm lang, Fr. ca. 1,5 — 2 cm
 Dm., erst wenn teigig genießbar; hierher als Form mit deutl. herztig. B. / *cordata*
 (*P. cordata* DESV., Obs. pl. Aug. 152. 1818, non DECNE. wenigstens größtenteils)

*) Vgl. BLANCHE, apud DECNE., l. c., sub. t. II.

*) Siehe z. B. HEMP, et WIEH., Bäume u. Sträucher des Wald. III 76. Fig. 296.

*) Vgl. meine Dendr. Winterstudien, S. 178 und Fig. 179. I. S. 176.

*) Ich stehe ganz auf DECNE'S Standpunkt, der sagt: „J'ai réuni sous le nom de
Pyrus communis les deux variétés auxquelles les floristes ont donné le nom d'*Elaeagnus*
 (fructus turbinati) et de *Pyraister* (fruct. rotundati) par la raison que ces deux formes de
 fruits se rencontrent souvent sur le même arbre et que le caractère tiré de la villosité
 des feuilles n'offre rien de constant.“ Eine derartige Formenzusammenstellung, wie sie
 ROUY et CAMUS, Flor. de France VII. II. 1901, geben, scheint mir eine Vermengung
 von wilden und hybriden Formen zu sein. Ich bin außerstande, diese zu unterscheiden.

var. *b. mariana* WILLK., in *Linnaea* 1852. 25 (*P. Bourgaeana* DECNE., l. c., tab. 2): B. klem. kaum über 1:2,5 cm (Fig. 363 c). Zähnung relativ gröber, mehr kerbig. Stielung lang, F. kaum bis 1,5 cm Dm., besonders zierliche Form aus Spanien*), dorniger $\bar{b}$ bis kleiner $\bar{b}$, felsige Orte. — var. *d. sativa* DC., Prodr. II. 634. 1825 (var. *hortensis* BECK, Fl. Nied.-Österr. 709. 1890), dornloser $\bar{b}$, B. meist größer, kurzstieliger, Beh. z. T. erst spät verschwindend, Bl. größer, Fr. dgl. und saftiger, mit *a.* durch alle Übergänge verbunden bei verwilderten Formen. Oft von *salvi-*

Fig. 363. *Pyrus*: normale B. mittlerer Größe: *a—e communis*: *a—d* var. *piraster*; *e* var. *mariana* — *f longipes* — *g Boissieriana* — *h pashia* — *i—l kumaoni* — *m Kochneri* (junge B.) — *n Wilhelmii* (aus Hupei, siehe Text S. 665) — *o betulæfolia* — *p Calleryana* ($\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

folia-Formen schwer zu scheiden*). Hierher die Gartentformen: *f. pendula* KIRCHN., Arb. Muse. 311. 1864: Zw. hängend; *f. variegata* [var. *fol. variegatis* KIRCHN., l. c.], B. weißbunt gefleckt o. gerandet; *f. nana* DIPP., Laubh. III. 359. 1863: Zwergform. Die sog. gelappten Formen sind nur z. T. noch unklar in ihrem Ursprung.

P. c. L., Spec. pl. 479. 1753 (*Sorbus Pyrus* CRTZ., Stirp. Austr. II. 56. 1763; *P. Piraster* BORKH., Handb. Forsth. II. 1287. 1803; *P. achras* K. KOCH, Dendr.

*) Auffällig ist das Expl. lg. MÖLLER, No. 952, Portugal (Serra do Gerez) mit rostzottig beh. jungen Fr.-Ständen (Stiele, Bl.-Achsen, K.). B. breit elliptisch, sehr fein deutlich gezähnt, ca. 5:4 cm, Stiele nur bis 2 cm. Ob gute Varietät?

**) Hierher wohl auch var. *pubescens* KOEHNE, Herb. Dendrol. No. 391.

1. 215. 1869; *P. brachypoda* KERNER, in *Linnaea* XXXVIII. 17. 1874). — Holzbirne, Knödelbirne. — I. G. überall, in N.-Eur. und Großbritannien, z. T. fraglich ob spontan, sonst ganz Eur. (auch Marokko und Vorder-Asien), wohl bis Persien. Vgl. aber das Folgende. — Walder, Auen, Vorholzer, steinige Hänge im Gebirge bis 1000 m. — Blz. IV—V. — Frz. IX—XI. — Nebst *nivalis* Hauptstammart unserer Kulturbirnensorten. Das Holzbirnenholz ist mannigfach geschätzt, obwohl an und für sich der *h* ohne besondere forstliche Bedeutung. Aus den Fr. wird Most bereitet.

An *P. communis* schließt sich an *P. longipes* COSS. et DR., in *Bull. Soc. Bot. France* II. 319. 1855, die eigentlich wohl nur durch spitzere, spitzschuppigere Kn. und kleine Fr. mit abfallendem K. abweicht. B. wie Fig. 363 f, zuletzt derb, ganz kahl. Algier. Ufer der Gebirgsflüsse. — An sie erinnert sehr die *P. Boissieriana* B. et B., Aufzähl. Pilz. 87. 1860 (*P. cordata* DECNE., l. c. t. 3, zum größten Teil, aus N.-Persien, deren Fr. Fig. 361 d ganz ähnlich sind, doch verdicken bei *longipes* die Fr.-Stielenden $\pm$), und deren Bl. a zeigt (von *longipes* sah ich noch keine Bl.) B. wie Fig. 363 g. Beide *communis* sehr nahe, aber vielleicht doch 2 distinkte, eng lokalisierte Arten darstellend, die in dem Abfallen der K. an die *pashia-betulaefolia*-Gruppe gemahnen.

Weiter ist zu besprechen die *P. Balansae* DECNE., l. c. tab. 6, aus Persien (Laristan). Ich hielt sie erst nach DECNE's Abb. für eine *communis*-Form, aber ein steriles Expl. von BORNMÜLLER, No. 3514, aus Prov. Kerman (Kult.), das als *P. cordata* DESV. ausgegeben ist, zeigt deutlich die „dents très-aigues“, die DECNE. hervorhebt. An einem im Herb. Boiss. liegenden Original-Fr.-Zw. lg. BALANSA, No. 294 Khaba-Khor spontané sind die B. allerdings nur mit flach gewelltem Knorpelrande versehen, der beh. ist, sie messen nur bis 6–4,5 cm, Spitzen abgebrochen, Stiele bis 1 cm. Sonst bei BORNMÜLLER's Expl. Zw. im Spätsommer so gut wie kahl, Kn. leicht beh., spitz-eilg., wenigschuppig, B. groß, Spitze deutlich fein vorgezogen (Fig. 361 p o mehr wie das linke Blatt von *salicifolia* (n) neben dem von m), 5:3,5–10:5 o. 12:7 cm, zuletzt kahl o. fast ganz kahl, derb, Stiel 2–6 cm. Es treten aber auch kleinere, rundliche, *communis* sehr ähnliche B. auf Fr. an *sinensis* gemahnend, zu der diese Art die meiste Beziehung zeigt. Leider sah ich viel zu wenig Material, um mehr zu sagen. Möglicherweise stellt *Balansae* eine südpersische Art dar, die gleichsam die Mitte zwischen *sinensis* und *communis* hält. Junge Expl. im Hort. SIMON-LOUIS dürften echt sein.

8×9 *P. communis* × *sinensis*: vielleicht in Kultursorten vorhanden. Vgl. BAILEY, Cycl. Am. Hort. III. 1471. 1901.

Sägezähne der B. grannenspitzig (Fig. 361 q S. 659.)

8 *P. sinensis*: breiter aufrecht verästelter *h*, bis ca. 15 m. Krztr. wie scheint nicht verdornend, Zw. höchstens jung beh., l. lebh. sattbraun, später purpurn, dann braungrau, Kn. mittelgroß, spitz-eilänglich, kahl, Sch. locker, stachelspitzig, B. wie Fig. 361 q, z. T. auch wie p, meist nur jung beh., dann kahl, oben lebh. tiefgrün, unten heller, ca. 4:3–9:5 cm, Stiel bis 6 cm; Bl. gut 3 cm Dm., die bis 1 cm langen Stiele kahl o. rostgrau filzig, dgl. Bl.-Achse und K. außen, innen diese stets beh., Fr. wie Fig. 364 d o. mehr kugelig, sonst vgl. a–d¹.

P. s. IDL., in *Trans. Hort. Soc.* VI. 396. 1826 (et *Bot. Reg.* t. 1248. 1829); (*P. ussuriensis* MAXIM., *Prim. Fl. Amur.* 192. 1859; *P. Simonii* CARR., in *Rev. Hort.* 1872. 28 fig. 3; *P. Sieboldi* CARR., l. c. 1886. 119 tab. col.). Chinesische Sandbirne. Mandschurei, Korea, China (Tschih, Schinking, Kiangsi, ob auch Sz'tschwan?), in Jap. wie es scheint nur kult. — An ähnlichen Orten wie unser *communis*, bes. Flußthaler. — Blz. IV–V. — Frz. IX. — Seit alters in O.-As. kultiviert, dann Fr. größer, z. T. wohlschmeckend, gelblich mit rotbraunen Tupfen, sonst ähnlich den Schneebirnen. Formen mir nicht näher bekannt bisher.

*) Die von WITASEK, l. c. (Anm. S. 658), ausgesprochene Vermutung, daß *communis* in Asien fehlen konnte, ist unbegründet, ich sah ganz typische Expl. von dort, und Herr BORNMÜLLER hat mir versichert, daß sie nicht eben selten sei. Was ich aus Kaschmir sah, war zu schlecht, um es sicher zu identifizieren (vgl. bei *heterophylla* S. 650). Vgl. z. B. SINTENIS No. 1350, Paphlagonien. Im Herb. Petersbg. sah ich aus Turkestan (Pandschschucht oberhalb Puschcharf, lg. REGER, *h*, 30) auch steriles Material, das vielleicht eine Form der *communis* darstellt o. diese selbst.

**) Man beachte, daß die feinen Grannenspitzen später oft ganz abfallen.

†† Gyn. z. T. 2-fächrig und -grifflig, Stb. z. T. 30—35, Fr. stets ohne K.*) und punktiert**), B. vgl. Fig. 363 h—p.

+ Gyn. ([3—]5), Stb. 30—35, B. wie 363 h, l.

9. *P. pashia*: $\bar{h}$ bis kleiner $\bar{h}$ bis c. 8 m, Zw. nur jung filzig und $\odot$ kahl (o. dann noch Krztr. rostzottig, z. T. verdornend), tief braun, mit deutl. hellen Lent., $\wedge$ schwarzgrau, Kn. spitz eifg., seitliche abstehend, kahl o. locker beh., Sch. innen rostfilzig; B. junger Pflanzen hfg. fiederteilig (Fig. 363 l), jung wenigstens unten graufilzig, rasch ganz kahle, oben glänzend, unten mattgrün und heller, zu-

Fig. 364. *Pyrus*: a—b *Boissieriana*: Bl. im L.-Schn. und Fr. — c—d¹ *sinensis*: c Bl. im L.-Schn.; c¹ C.; d Fr. im L.-Schn.; d¹ S. — e—g *pashia*: e Bl. im L.-Schn. und K.; e¹ C.; f Frkn.-Q.-Schn.; g Fr. — h—i *kumaoni*: h K.; i Fr. — k—p *betulaefolia*, wie e—g; m unterer, n mittlerer, o oberer, Frkn.-Q.-Schn. — q—s *Calleryana*: q K.; r C.; s Fr. ganz und im Q.-Schn. — t—u *Koehnei*: t Bl.-L.-Schn., u C. — v *Wilhelmi*: Fr. (Original).

letzt derb, zuweilen wohl halbwintergrün, c. 6:3—12:4—5 o. auch breiter (bes. an Lohden) 6:3,5—11:7 cm, gleichmäßig fein spitz zählig o. kerbig; Stiele 1,5—4 cm; Blst.-Achsen wie Bl.-Achsen und K. (beiders) dick gelbgrau filzig, Bl. 2—2,5 cm Dm., K. spitz 3eckig, vgl. Fig. 364 e—f, Fr. rundlich, wie g o. bis reichlich 2 cm Dm., Stiel bis gut 3 cm, unverdickt (vgl. das unten Gesagte).

*) Dieser aber zuw. sehr spät o. vielleicht auch nicht abfallend!

**) Die *P. Jacquemontiana* DECNE., l. c. tab. 8, mit glatten Fr. aus Penjab ist mir so unklar geblieben, wie HOOKER, Flor. Brit. Ind. II. 375. 1878.

P. p. HAM., ex DON, Prodr. Fl. Nepal. 236. 1825 (*P. variolosa* WALL., Cat. No. 680 et 680a ex p. 1824; *P. verruculosa* BERT.^{*)}, Plant. nov. asiat. II tab. 2. 1865; *P. heterophylla* HORT.). Himalaya-B. Von Nepal ostwärts bis O.-Bengalen (u. wohl W.-China^{**}). Gebirge, bis 3000 m. Blz. in Heimat III-IV. Frz. VIII-IX. — In Kultur, aber selten echt. Sie ist sehr variabel und im W. Himalaya wie es scheint vertreten durch die habituell ganz ähnliche, vielleicht nur eine Varietät darstellende *P. kumaoni* DECNE., l. c. sub tab. 7, von der ich kein Original sah. Sie soll kahle Blst. und rundlappige K. besitzen, was nur aus Garhwal, Kamaon, Kaschmir vorliegt, hat allerdings kahle o. sehr kahlende Blst., aber K. wie Fig. 364 h, B. z. T. schmaler, 6:2—20:3—3.5 im Mittel (Fig. 363 i—l, gleich den jungen Zw. weniger beh., sonst wie *pashia*). Ich glaube, daß diese *kumaoni* bei uns als *pashia* in Kultur, die nach JORIN immer rot austreibt, sah aber noch keine Bl. von Kulturpfl., Fr. wie i. Der Formenkreis der *P. pashia* bedarf noch sehr der vergleichenden Untersuchung! Die Expl. aus Khasia hat schon DECNE., l. c. sub tab. 7, als var. *trigyna* geführt, sie scheinen in der Tat durch kleinere 2—4fährige Fr. abzuweichen. Kn. stumpfer als beim Typ. Es dürfte aber noch eine andere Form in Assam, Upper-Burma, Khasia auftreten, die in den Blst. und Bl. sehr an *betulaefolia* gemahnt, in B. aber an *pashia*, so die Expl. lg. GALLATLY, No. 216, SHAIK MOKIM, No. 67 (Bl. z. T. ganz wie *betulaefolia*, aber Stb. ca. 30, KINGS Collector, Assam 1893 [vielleicht var. *trigyna*], der letzten ähnlich WATT, No. 6282, 6407 [Manipur]. Hierunter vielleicht gute zwischen *pashia* und *betulaefolia* stehende Art.

Zwischen *pashia* und *betulaefolia* schalten sich ein 3 neue chinesische Arten, auf die ich hier nur kurz hinweise (nähere Beschreibung folgt in FEDDES Repertor. Ende 1906). Es sind erstens *P. Koehnei* aus O.-China (Tschekiang, Tientai Mt. lg. FABER). Fig. 363 m zeigt junge B. des Typs, die stets kahl o. nur jung beh., bzw. wimperzottig sind, Bl. wie Fig. 364 t—u, mit 2—5 Gr., bezw. Fr.-Fächern, auffällig die langen spitzen K. und die Art der Einschnürung der Gr. Diese neue Species weicht von *pashia* schon durch die nur 20 Stb. ab, von *betulaefolia* besonders durch die feine Zähnung und die ca. 3 cm breiten Bl. Bedarf aber noch der Beobachtung. Ihr steht die 2. Art, *P. kolupana*, in den gleich großen Bl. mit den 20 Stb. und 3 Gr. nahe. Die K. sind auch analog nur etwas kürzer, sodaß die kahlen Gr. und Stb. länger als sie sind, die Einschnürung ist etwa wie in Fig. 364 k. Blst. ca. 8-bl., kahl, Bl.-Stiele ca. 4 cm; B. zur Blz. so gut wie kahl, in Form etwa wie Fig. 360 n des B. rechts neben m, ca. 5—3.5 cm, Zähnung fein kerbig; Stiel 3—5 cm. Zw. stets kahl. So bei den Blzw. aus N.-Shensi (Ko-lu-pa), lg. GIRALDI, No. 1050 und 5105. Als Fr.-Expl. dürften zur selben Art gehören GIRALDIS, No. 1049 und 5106 aus N.-Shensi: Lu-san-huo. B. 5:3.6—9:6 cm, Stiel bis 6.5 cm, Fr. eiförmlich, ca. 10 mm lang, sonst wie bei *betulaefolia*, Stiel 3—4 cm; Kn. ca. 9 mm lang, spitz-spindelfg., wimperzottig. *P. kolupana* erinnert in Manchem an *P. Calleryana*, aber die größeren Bl. und B., welche letztere länger gestielt sind, sowie die K. etc. scheiden sie recht gut von HANCES Art.

Die dritte Art *P. Wilhelmi* ist aus Yünnan (HENRY, No. 10035 A), Gebirgswälder 1800 m, h. bis 20', dornig, breitästig. Blst. und Bl. wie bei *betulaefolia* in Größe, aber Gr. 3, Stb. 25—30, Bl.-Achse und K. (außen) kahl o. fast kahl, Stiel 1—2 cm, Zw. und B. zur Blz. kahl, diese rundl.-eifg. mit kurz aufgesetzter Spitze, ca. 4:3 cm, Stiel 2 cm; eine Fr. zur Blz. noch erhalten, etwa wie Fig. 364 v, stimmt somit mit HENRYS No. 5026 aus Hupei, deren bis 6:4.7 messende B. Fig. 363 n zeigt. Da diese in Form gut zu den Blzw. aus Yünnan passen, glaube ich die Frzw. zu *P. Wilhelmi* stellen zu dürfen. Ich widme diese Art Herrn Prof. WILHELM, Wien, dem ich für manchen Rat zu Danke verpflichtet bin.

++ Gyn. (2), Stb. stets 20, B. wie Fig. 363 o.

10. *P. betulaefolia*: kleiner h., bis 6 m, mit breit locker graziös überhängend verzweigter Krone, Zw. bis ins 2. Jahr fein graufilzig mit hellen Lant., Kztr. nicht verdornend, Kn. spindelförmig, mehrschuppig, teinfilzig; B. jung beiderseits oben schwächer, locker zottig beh., zuletzt oben kahl, glänzend olivgrün, unten heller, nur mit spärlichen Haarresten, ca. 5:3.3—7.5:4 cm, Zähnung grob, spitz, Stiel 2—3 cm; Bl. ca. 15—18 mm Dm., in ca. 8—10-blütigen teinfilzigen Doldentrauben.

^{*)} Im Text zitiert BERTOLONI ein Expl. [*Pyrus* (c) HK. F. et TH. Herb. Ind. Or.] was zu *Micromeles cuspidata* gehört.

^{**}) An Expl. lg. HENRY No. 4497 in Hupei maßen die B. der Fr.-Triebe bis 11:5.5 cm und die rundl.-eifg. Fr. ca. 3:2.5 cm, Stiele 5 cm. Ob etwa eine besondere Varietät?

Bl.-Achse und K. beiders. beh., Fr. klein, kugelig, ca. 2—3 cm lang gestielt, vgl. Fig. 364 k—p.

P. b. BGE., Enum. pl. chin. bor. 27. 1831. — Birkenblatt-B. — N.-China (was ich aus Zentr.-China sah, war nicht *betulaefolia*). — Flußufer, Auen. — Blz. V. — Frz. IX. — Jetzt schon mehr in Kultur.

An diese Art schließt sich mit ebenfalls 2-fächerigem Gyn., ganz ähnlichen Bl. und Fr. (Fig. 364 q—s) *P. Calleryana* DECNE., l. c., sub tab. 8 an, die nach

den Expl. von Amoy (Herb. HANCE, No. 1503) recht variable B. hat (Fig. 363 p), die hfg. einen spitzkeiligen Grund zeigen und bis auf Wimperung in Jugend hfg. kahl sind, Zähnung ziemlich grob kerbig, Fr. bis 5 cm lang gestielt, Kn. wie bei *betulaefolia* lang spindelförmig, mit spitzeren Sch., die meist nur filzig gewimpert sind. Doch bedarf es noch mehr Material, um festzustellen, wie *Calleryana* durchgreifend abweicht.

Ganz kurz sei noch hingewiesen auf eine neue reizende Art aus Corea, lg. FAURIE, No. 78, Mai 1901 (verblüht), in collibus aridis circa Seoul. Ich nenne sie *P. Fauriei*. Anscheinend dorniger B., B. winzig, etwa wie Fig. 363 d', bis 2,5 : 3 cm, oben kahl, unten wie an Rippe locker beh., dgl. der 1—2,5 cm lange Stiel, Ser-ratur sehr fein spitzkerbig; junge Fr. kelchlos, kahl, ca. 4 : 3 mm, Gr. 2, Stb. wie es scheint 20 : 30, K. anscheinend breit o. längl. eifg., drüsig gezähnt, innen und außen am Grunde beh. und gewimpert. Eine durch die Kleinheit aller Teile sehr auffällige Art.

Fig. 365. *Sorbopyrus auricularis*: a, d Bl.-L.-Schnitte; d¹ C.; b, e Frkn.-Q.-Schnitte; c, f Fr.-L.-Schnitte; g Fr.-Querschnitt; h—l B.-Formen [1/2 n. Gr.] (Original).

Bastardgattung. *Sorbopyrus**, Birnenmehlbeere.

Pyrus communis — *Sorbus aria*: *Sorbopyrus auricularis* (*Pyrus auric.* KNOOP, Pomol. II. 38. t. 4. 1763 [aber in der deutschen Aufl. 1766 II. 32. No. 38. t. IV. nur als Hahnbuttenbirne bezeichnet]; *Pyr. irregularis* MÜNCHH., Hausvat. V. 246.

* In Analogie zu *Crataego-mespilus*, *Lachocattleya* usw. gebildet, da man doch diesen Bastard nicht bei einer der beiden Gattungen *Pyrus* o. *Sorbus* einreihen kann — Vgl. über das Vorkommen dieses Bastardes etc. C. HAUSKNECHT, in Mitt. Thür. Bot. Ver. N. F. XVII. 102. 1902.

1770; *Pyr. Pollveria* L., Mant. II. 244. 1771; *Pyr. tomentosa* MOENCH, Meth. 608. 1794; *Azarolus pollvilleriana* BORKH., Handb. Forstb. II. 1251. 1803; *Pyr. Bollwylleriana* DC., Fl. fr. VI. 530. 1815; *Sorbus Bollwylleriana* ZABEL, im H. d. D. D. G. 197. 1905); Hahnbuttenbirne, dieser Bastard bildet schöne birnenähnliche Bäume und hält in fast allen Merkmalen gut die Mitte zwischen den Eltern. Man vgl. die B. in Fig. 365g -l und die Bl.- und Fr.-Analysen a—f, die Details d—f sind nach Originalen des angeblichen Pfropfbastardes *Pyr. communis* × *Crataegus monogyna* aus Torp i Borge (Norweg.), vgl. Gartenflora 1905, gezeichnet, die Herr Prof. WILLE die Güte hatte mir zu senden. Es handelt sich hier nur um *S. auricularis* auf *Crat. monogyna* gepfropft. Als interessante Varietät sei var. *bulbiformis* (*Pyrus Bollwylleriana* var. *bulb.* TATAR, in Wien. Obst- u. Gartenztg. 1878. 26. Fig. 8) genannt, bei der die Fr. birnengroß (ca. 4:4 cm) werden und viel saftiger sind; es handelt sich hier um einen Sausling des Typs, der einen Ruckschlag zu *Pyrus* zeigt. Auch die B. des mir vorliegenden Originalmaterials erinnern mehr an *Pyrus*, lassen aber den *S. aria*-Einfluß noch gut erkennen.

Gattung 154. *Sorbus* L., Sp. pl. 477. 1750.

[Eberesche; Mountain Ash; Sorbier.]

Vgl. oben S. 652 und S. 653; ♀—♂, B. sommer-, sehr selten halb- (o. ganz-) immergrün; Bl. in reichblütigen Doldentrauben, weiß o. gelblichweiß, seltener rosa, Stb. 15—25, Gyn. 2—5, mit je 2 Sa., Fr. meist rot gefärbte, kugelige o. ovalelliptische kleine Apfelfr., eingesenkter Teil bei Reife häutig, freier Teil ziemlich zäh, pergamentartig-knorpelig, sonst vgl. die Sekt. — Arten sämtlich erwähnt.

Sekt. 1. *Aucuparia* [MEDIC., Phil. Bot. I. 138. 1789, als Gat- Sekt. 2 siehe
tung], echte Eberesche, Vogelbeerbaum: B. stets unpaar gefiedert, S. 683.
Neb. zuw. bleibend: Frb. meist zu 2, mit Bl.-Achse und gewöhnlich
nur im unteren Teile zu einem fächerigen Frkn. verwachsen, darüber
meist in Mittellinie und nach oben auch in Scheidewänden frei, mithin
(fast stets) beh. Frb.-Gipfel nebst Gr. frei. Zuw. dringt aber die freie
Mitte von oben nur wenig ein und es kann auch ein völlig zentral
verwachsener Frkn. vorliegen, bei dem nur die Spitzen der Frb. dorsal
frei sind und freie, höchstens verklebte, Gr. tragen**).

A. B. im Mittel (3—4—7—8)-paarig, die Behen gleich groß o. B. siehe
sowohl oberste wie unterste kleiner als mittlere, Spindel nie S. 678.
deutl. geflügelt.

I. Behen ober-, tiefgrün, etwas wie lackiert glänzend, meist verstr.
beh., Form und Serratur wie Fig. 367a—b, Blst. klein, Bl. groß,
ca. 15 mm Dm., Fr. zieml. groß, mit aufrecht. K. (Fig. 366b).

1. *S. sambucifolia*: ♀—♂ (Höhe?), junge Zw. locker borstenzottig, ☉ fast
kahl, braungrau, Lent. ∞, deutl., länglich, Kn. langkegelig (ca. 1 cm^{***}), klebrig,
kahl, d. h. nur Sch. gewimpert, o. wie Zw. beh.; B. meist 4—5-paarig, inkl.
Stiel ca. 15—20 cm, Spindel zur Frz. meist nur an B-Knoten beh., Behen unters.
gelbgrün, ganz o. fast kahl, Serratur schart, grob, beiders fast vom Grund aus.

*) Ich verweise auch noch auf meine spezielle Arbeit über die Arten dieser
Sekt. in Bull. de l'Herb. BOISS. 1906, die in jeder Weise das hier Gebotene ergänzt.
Dort habe ich auch kurz meine Standpunkt über die Umgrenzung der Gattungen dar-
gelegt. Die Arten der Sekt. *Aucuparia* scheiden sich in mehrere Subsektionen, deren
sichere Umschreibung mir aber noch nicht möglich war, weshalb ich vorläufig davon absah.

**) Unbekannt blieb mir bisher *S. insignis* HEDL., Mon. I. c. 32. 1901 (*Pyr.*
insignis HOOK. F., Fl. Brit.-Ind. II. 377. 1878) aus Sikkim, von dem HOOKER sagt:
very robust, leaflets 4—6 pair 3—4 in. linear-oblong acutely obscurely crenulate very cori-
aceous glaucous beneath, fruiting corymbs excessively compound, branches very stout.

***) Diese Maße beziehen sich stets auf gut entwickelte End- oder oberste Seiten-
knospen an Fr.-Zw.

Zuspitzung allmählich, gleichmäßig, größte ca. 5 : 1,8 - 8 : 2,5 (3) cm, Neb. lanzettlich, meist abfällig; Blst. locker zottig, stark kahlend, Bl-Achse und K. so gut wie kahl, dieser nur gewimpert, sonst vgl. Fig. 366 a - a', Fr. ca. 12 : 8 mm, anscheinend hellgelbrot, sonst wie b.

Ich unterscheide: var. a. *typica*: wie oben (Amurgebiet, Kamtschatka, Sachalin, Japan [Jesso] und var. b. *pseudogracilis* C. K. SCHN., in Bull. I. c. 1906, eine kleinere Varietät, deren 3—4-paarige B. kaum über 10 cm messen, während die B. eben 3,5 : 1,8 - 5 : 2 cm groß und gleich den Kn. meist stärker beh. sind, Fr. ca. 1 : 0,8 cm, Bl. ?, (Jesso).

S. s. ROEM., Syn. mon. III. 139. 1844. non AUCT. AL. (*Pyrus samb.* CH. et SCHL., in Linnaea II. 36. 1827, non AUCT. AL.). — Hollunderblatt-E. — Heimat wie oben — Gebirgswaldungen, var. b. bis 1800 m. — Leider noch nicht in Kultur. In mancher Beziehung isoliert stehende Art. Ganz reife frische Fr. wären noch zu untersuchen, ob etwa Anklänge an *Cormus* sich finden.

II. die unter I. gegebenen Merkmale zusammen nicht zutreffend

a) B. meist 6—8-paarig, B. eben länglich lanzettlich (Fig. 367 d, g).
Stb. nur etwa halb so lang wie C.

1. Kn. beh., kaum klebrig, B. meist 6-paarig, Serratur der dichtstehenden B. eben wenig auffällig (d). Blst. oft klein.
Bl. groß, bis 2 cm Dm., etwas nickend.

2. *S. thianshanica*: aufrecht verästelter kleiner B., Zw. z. T. von Anfang an kahl, seltener auch ↗ verstr. beh., diese oliv- o. rotbraun, Lent. wenig o. fast null.

Fig. 366. *Sorbus* [Aucuparia]: a b *sambucifolia*: a Bl. im L.-Schn. und Stb.; a' C.; b Fr.-L.-Schn. — c—d *thianshanica*: c Bl.-L.-Schn.; d Fr. — e—f *Matsumurana*: e Bl.-L.-Schn.; e' C.; f Fr. — g—h *pumila*: wie e—f. — i—k *californica*: wie e—f. — l—m *discolor* (*pekinensis*): wie e—f (Original).

Kn. spitz eifg., bis 1,1 cm lang, reichlich beh. bis fast kahl; B. 10—14 zuw. bis 22 cm lang, ganz kahl o. Spindel und Unters. am Grunde der B. eben weißlich beh., B. eben schmallanzettlich, beiders. gleich hellgrün, vom unteren Drittel ab beiders. gesägt, kaum über 5 : 1,3 - 1,6 cm (doch bis 7,5 : 2,2 cm), Neb. lanzettlich, abfällig; Blst. kahl o. weißlich beh., Bl. vgl. Fig. 366 c, K. innen beh., Gr. 2—5, Stb. ca. 18, Fr. wie d, erst gelbrot, zuletzt bereift, bis ca. 12 mm dick.

Vielleicht sind die beh. Formen, die in Kultur fehlen, ich sah sie nur aus Turkestan, als besondere Var. abzutrennen.

S. z. RUPR., in Mem. Ac. St.-Petersburg, ser. 7. XIV. 1869. 46. (*Pyrus thian.* FRANCH., in Ann. Sc. nat. XVI. 267. 1883). — Thian-Schan-E. — Turkestan (Thian-Schan, Knurgin-Tur), Afghanistan, NW.-Kaschmir. — Gebirge bis 3000 m.

Blz. V. Frz. (VIII—IX). — In Kultur, doch noch selten. Sehr gut gekennzeichnete Typus.

2. Kn. kahl, klebrig, B. lfg. bis 8-paarig, B. eben entfernter. Serratur deutlicher (Fig. 367 g). Blst. groß, Bl. kleiner.

3. *S. discolor**): $\text{b} ?$, $\odot$ Zw. kahl, braunpurpurn; B. nur im Anfang auf Spindel und Unters. lockerzottig, bald kahl, bis etwa 20 cm lang, B.chen unters. weißlichgrün (bereift), mit dunklerem Adernetz, 4—6,5:1,2—1,6 cm, Neb. oft bleibend, fingerspaltig, gezähnt; Blst. 10—20 cm breit, Achsen im Anfang locker hellzottig, Bl. ca. 8 mm Dm., sonst vgl. Fig. 366 l—l', Gr. 3, Stb. 20, Fr. wie m, weißlichrosa o. hellgelbrot.

S. d. HEDL., l. c. (*Pyr. disc.* MAXIM., Prim. Fl. Amur. 103 [Anmerk.] 1859; *Sorb. pekinensis* KOEHNE, in Gartenflora 1901, 406). — China: um Peking. — KOEHNE kannte seine *pekinensis* nur aus Kulturpflanzen (ich sah im Herb. ZABEL, Bl. und Fr.-Zw. von Hort. GEBBERS). Er vermutete nur, daß die Expl. aus Hupel lg. HENRY, No. 6766 hierher gehören, doch stehen diese meiner *S. kochiana* (s. S. 681) am nächsten. Dagegen glaube ich, daß die Expl. aus N.-Sichensi, lg. GIRALDI No. 5129, hierher gehören können, die Fr. sind ganz hell, etwas kleiner, die B. meist 5-paarig, B.chen wie Fig. 367 g', die Kn. kahl, längl.-eifg., 9 mm lang.

b) die Merkmale unter a) insgesamt nicht zutreffend.

1. Stb. die Gr. kaum überragend, ca. $\frac{1}{2}$ so lang wie C., B. 3—5-paarig, B.chen nur gegen Spitze gezähnt Fig. 367 c, c', Blst. klein.

2. siehe S. 671.

a) junge Triebe, Blst.-Achsen und Kn. kahl, Bl. ca. 9—10 mm Dm., Fr. wohl nicht blau bereift, B.chen wie c.

4. *S. Matsumurana****): kleiner b , $\odot$ Zw. gelb- o. rotbraun; Lent. $\pm \infty$, Kn. spitz-eifg., bis ca. 15 mm; B. meist 4—5- o. 6-paarig, bis 17 cm lang (inkl. Stiel), gewöhnlich nur am Grund der B.chen und Rhachis dort an Knoten beh., oben sattgrün, unten hell- o. bläulichgrün, Textur dünn, im Herbst alles oft bereift und gerötet, B.chen bis 6:2 cm, Basis stielartig, Spitze stumpf, nur ganz fein kurz gespitzt, Serratur einfach, relativ grob; Neb. abfällig; Blst. ca. 5—10 cm Dm., Bl. vgl. Fig. 366 e—e', Gr. 5, Stb. 20(—18), Fr. wie f

S. M. KOEHNE, in Gartenflora 1901, 407 (*Pyrus Matsum.* MAKINO, in Tok. Bot. Mag. 1897, 71; *Sorb. et Pyr. sambucifolia* AUCT. ex p.). — Japan: Zentral-Hondo bis Jesso. — Gebirgswälder bis 3000 m. — Blz. VI—VII. — Frz. IX. — In Kultur noch ganz selten. Parallelart zu folgenden.

β) junge Triebe, Blst.-Achsen und Kn. (meist bis c) fein rostfilzig, Bl. ca. 13 mm Dm., Fr. blau bereift, B.chen wie Fig. 367 e.

5. *S. pumila* (*S. sitchensis*): b , ob über 3 m?, Tracht etwas übergeneigt, Zw. gelb- o. rotbraun, Lent. meist ∞ , langlich, Kn. anscheinend dicklich eifg., kurzspitzig, ca. 1 cm lang; B. 3—5-paarig, bis 15 cm lang, Spindel meist ∞ , o. nur an Knoten rostig o. weißlich beh., B.chen zuletzt ganz kahl o. nur unters. auf Rippe beh. und gewimpert, bis 4:1,5 o. auch 6:3 cm, Serratur zuw. von knapp unter Mitte ab, etwas schärfer als bei *Matsumurana* und B.chen stumpflicher, Basis

*) Nachdem ich aus Petersburg MAXIMOWICZ Original erhalten, muß ich doch die *pekinensis* KOEHNE'S damit identifizieren. MAXIM. spricht von einer *spec. labyrinthica*, damit stimmt auch ein Stück von den drei auf demselben Spannblatt befindlichen, aus Hb. FISCHER, Chin. bot., überein, das Herbstblätter zeigt, die ich in keiner Weise von denen von *pekinensis* scheiden kann, nur die Unters. ist weißlicher (aber nicht papillos!), die Netznerven sind nicht dunkel. Allein das scheint mir kein bedeutsamer Unterschied. Die B. messen inkl. Stiel bis 15 cm, die B.chen bis 4,2:1,3 cm, Neb. $\frac{1}{2}$ l. noch vorh., Kn. kahl, ca. 6 mm lang. In einer Kapsel liegen ganz gleiche B.chen und Bruchstücke eines Frst., der *pekinensis* ganz analog. Darauf steht lg. BRETSCHNEIDER, Peking, 1880, No. 1045. Was sonst noch auf dem Spannblatt, gehört zu *pohuashanensis*, siehe S. 672. Um Peking kommen augenscheinlich nur 2 Arten: eben *discolor* und *pohuashanensis*, vor.

**) Die Härchen obers. auf Spindel an Knoten treten fast bei allen *Sorbus* auf.

**) *Sorbus parviflora* HEDL., l. c. 39, soll nach schriftl. Mitteilung dieser Art am nächsten stehen. Ich fand keine jap. Exp., auf die HEDLUND'S Angaben recht gepaßt hatten, das erbetene Original aus Herb. Upsala erhielt ich jedoch bis zur Drucklegung dieser Zeilen nicht. Synonym damit ist *Pyrus marantha* FR. et. SAV., Enum. pl. jap. II, 351, 1879, welcher Name eventuell wohl bleiben kann, da ja die *S. marantha* DUM-COURS., 1811, ein Synonym der *americana* ist.

aber auch stielartig, unters. zuletzt oft weißlich, Herbst B. sich rötend; Neb. hftg. bleibend, lanzettlich o. halbmondfg. gezähnt; Blst. bis 8 cm Dm., Bl. wie Fig. 366 g.—g¹, Stb. 15—18, Gr. 3—5, Fr. kugelig, wie h.

S. p. RAF., Med. Fl. II. 265. 1830 [teste SARGENT] (*Sorb. sitchensis* ROEM., Syn. Mon. III. 139. 1847, non PIPER in Herb., *Pyr. occidentalis* WATS., in Proc. Am. Ac. Bost. XXIII. 263. 1888 ex p.; *Sorb. sambucifolia* var. *Grayi* WENZ., in Bot. Zentralbl. XXXV. 342. 1888; *S. occidentalis* GREENE in Pittonia IV. 131. 1900.

Fig. 367. *Sorbus* [*Aucuparia*]: je eines der größeren Seiten-B.chen von: *a* *ambucifolia*; *b* var. *pseudogracilis* Matsuura; *c* *thamshanica*; *d* *pumila*; *e* *californica*; *f* *decolor-picturata*; *g*¹ dgl. vgl. Text S. 669; *h* *h¹* *h²* *h³* *h⁴* *h⁵* *h⁶* *h⁷* *h⁸* *h⁹* *h¹⁰* *h¹¹* *h¹²* *h¹³* *h¹⁴* *h¹⁵* *h¹⁶* *h¹⁷* *h¹⁸* *h¹⁹* *h²⁰* *h²¹* *h²²* *h²³* *h²⁴* *h²⁵* *h²⁶* *h²⁷* *h²⁸* *h²⁹* *h³⁰* *h³¹* *h³²* *h³³* *h³⁴* *h³⁵* *h³⁶* *h³⁷* *h³⁸* *h³⁹* *h⁴⁰* *h⁴¹* *h⁴²* *h⁴³* *h⁴⁴* *h⁴⁵* *h⁴⁶* *h⁴⁷* *h⁴⁸* *h⁴⁹* *h⁵⁰* *h⁵¹* *h⁵²* *h⁵³* *h⁵⁴* *h⁵⁵* *h⁵⁶* *h⁵⁷* *h⁵⁸* *h⁵⁹* *h⁶⁰* *h⁶¹* *h⁶²* *h⁶³* *h⁶⁴* *h⁶⁵* *h⁶⁶* *h⁶⁷* *h⁶⁸* *h⁶⁹* *h⁷⁰* *h⁷¹* *h⁷²* *h⁷³* *h⁷⁴* *h⁷⁵* *h⁷⁶* *h⁷⁷* *h⁷⁸* *h⁷⁹* *h⁸⁰* *h⁸¹* *h⁸²* *h⁸³* *h⁸⁴* *h⁸⁵* *h⁸⁶* *h⁸⁷* *h⁸⁸* *h⁸⁹* *h⁹⁰* *h⁹¹* *h⁹²* *h⁹³* *h⁹⁴* *h⁹⁵* *h⁹⁶* *h⁹⁷* *h⁹⁸* *h⁹⁹* *h¹⁰⁰* *h¹⁰¹* *h¹⁰²* *h¹⁰³* *h¹⁰⁴* *h¹⁰⁵* *h¹⁰⁶* *h¹⁰⁷* *h¹⁰⁸* *h¹⁰⁹* *h¹¹⁰* *h¹¹¹* *h¹¹²* *h¹¹³* *h¹¹⁴* *h¹¹⁵* *h¹¹⁶* *h¹¹⁷* *h¹¹⁸* *h¹¹⁹* *h¹²⁰* *h¹²¹* *h¹²²* *h¹²³* *h¹²⁴* *h¹²⁵* *h¹²⁶* *h¹²⁷* *h¹²⁸* *h¹²⁹* *h¹³⁰* *h¹³¹* *h¹³²* *h¹³³* *h¹³⁴* *h¹³⁵* *h¹³⁶* *h¹³⁷* *h¹³⁸* *h¹³⁹* *h¹⁴⁰* *h¹⁴¹* *h¹⁴²* *h¹⁴³* *h¹⁴⁴* *h¹⁴⁵* *h¹⁴⁶* *h¹⁴⁷* *h¹⁴⁸* *h¹⁴⁹* *h¹⁵⁰* *h¹⁵¹* *h¹⁵²* *h¹⁵³* *h¹⁵⁴* *h¹⁵⁵* *h¹⁵⁶* *h¹⁵⁷* *h¹⁵⁸* *h¹⁵⁹* *h¹⁶⁰* *h¹⁶¹* *h¹⁶²* *h¹⁶³* *h¹⁶⁴* *h¹⁶⁵* *h¹⁶⁶* *h¹⁶⁷* *h¹⁶⁸* *h¹⁶⁹* *h¹⁷⁰* *h¹⁷¹* *h¹⁷²* *h¹⁷³* *h¹⁷⁴* *h¹⁷⁵* *h¹⁷⁶* *h¹⁷⁷* *h¹⁷⁸* *h¹⁷⁹* *h¹⁸⁰* *h¹⁸¹* *h¹⁸²* *h¹⁸³* *h¹⁸⁴* *h¹⁸⁵* *h¹⁸⁶* *h¹⁸⁷* *h¹⁸⁸* *h¹⁸⁹* *h¹⁹⁰* *h¹⁹¹* *h¹⁹²* *h¹⁹³* *h¹⁹⁴* *h¹⁹⁵* *h¹⁹⁶* *h¹⁹⁷* *h¹⁹⁸* *h¹⁹⁹* *h²⁰⁰* *h²⁰¹* *h²⁰²* *h²⁰³* *h²⁰⁴* *h²⁰⁵* *h²⁰⁶* *h²⁰⁷* *h²⁰⁸* *h²⁰⁹* *h²¹⁰* *h²¹¹* *h²¹²* *h²¹³* *h²¹⁴* *h²¹⁵* *h²¹⁶* *h²¹⁷* *h²¹⁸* *h²¹⁹* *h²²⁰* *h²²¹* *h²²²* *h²²³* *h²²⁴* *h²²⁵* *h²²⁶* *h²²⁷* *h²²⁸* *h²²⁹* *h²³⁰* *h²³¹* *h²³²* *h²³³* *h²³⁴* *h²³⁵* *h²³⁶* *h²³⁷* *h²³⁸* *h²³⁹* *h²⁴⁰* *h²⁴¹* *h²⁴²* *h²⁴³* *h²⁴⁴* *h²⁴⁵* *h²⁴⁶* *h²⁴⁷* *h²⁴⁸* *h²⁴⁹* *h²⁵⁰* *h²⁵¹* *h²⁵²* *h²⁵³* *h²⁵⁴* *h²⁵⁵* *h²⁵⁶* *h²⁵⁷* *h²⁵⁸* *h²⁵⁹* *h²⁶⁰* *h²⁶¹* *h²⁶²* *h²⁶³* *h²⁶⁴* *h²⁶⁵* *h²⁶⁶* *h²⁶⁷* *h²⁶⁸* *h²⁶⁹* *h²⁷⁰* *h²⁷¹* *h²⁷²* *h²⁷³* *h²⁷⁴* *h²⁷⁵* *h²⁷⁶* *h²⁷⁷* *h²⁷⁸* *h²⁷⁹* *h²⁸⁰* *h²⁸¹* *h²⁸²* *h²⁸³* *h²⁸⁴* *h²⁸⁵* *h²⁸⁶* *h²⁸⁷* *h²⁸⁸* *h²⁸⁹* *h²⁹⁰* *h²⁹¹* *h²⁹²* *h²⁹³* *h²⁹⁴* *h²⁹⁵* *h²⁹⁶* *h²⁹⁷* *h²⁹⁸* *h²⁹⁹* *h³⁰⁰* *h³⁰¹* *h³⁰²* *h³⁰³* *h³⁰⁴* *h³⁰⁵* *h³⁰⁶* *h³⁰⁷* *h³⁰⁸* *h³⁰⁹* *h³¹⁰* *h³¹¹* *h³¹²* *h³¹³* *h³¹⁴* *h³¹⁵* *h³¹⁶* *h³¹⁷* *h³¹⁸* *h³¹⁹* *h³²⁰* *h³²¹* *h³²²* *h³²³* *h³²⁴* *h³²⁵* *h³²⁶* *h³²⁷* *h³²⁸* *h³²⁹* *h³³⁰* *h³³¹* *h³³²* *h³³³* *h³³⁴* *h³³⁵* *h³³⁶* *h³³⁷* *h³³⁸* *h³³⁹* *h³⁴⁰* *h³⁴¹* *h³⁴²* *h³⁴³* *h³⁴⁴* *h³⁴⁵* *h³⁴⁶* *h³⁴⁷* *h³⁴⁸* *h³⁴⁹* *h³⁵⁰* *h³⁵¹* *h³⁵²* *h³⁵³* *h³⁵⁴* *h³⁵⁵* *h³⁵⁶* *h³⁵⁷* *h³⁵⁸* *h³⁵⁹* *h³⁶⁰* *h³⁶¹* *h³⁶²* *h³⁶³* *h³⁶⁴* *h³⁶⁵* *h³⁶⁶* *h³⁶⁷* *h³⁶⁸* *h³⁶⁹* *h³⁷⁰* *h³⁷¹* *h³⁷²* *h³⁷³* *h³⁷⁴* *h³⁷⁵* *h³⁷⁶* *h³⁷⁷* *h³⁷⁸* *h³⁷⁹* *h³⁸⁰* *h³⁸¹* *h³⁸²* *h³⁸³* *h³⁸⁴* *h³⁸⁵* *h³⁸⁶* *h³⁸⁷* *h³⁸⁸* *h³⁸⁹* *h³⁹⁰* *h³⁹¹* *h³⁹²* *h³⁹³* *h³⁹⁴* *h³⁹⁵* *h³⁹⁶* *h³⁹⁷* *h³⁹⁸* *h³⁹⁹* *h⁴⁰⁰* *h⁴⁰¹* *h⁴⁰²* *h⁴⁰³* *h⁴⁰⁴* *h⁴⁰⁵* *h⁴⁰⁶* *h⁴⁰⁷* *h⁴⁰⁸* *h⁴⁰⁹* *h⁴¹⁰* *h⁴¹¹* *h⁴¹²* *h⁴¹³* *h⁴¹⁴* *h⁴¹⁵* *h⁴¹⁶* *h⁴¹⁷* *h⁴¹⁸* *h⁴¹⁹* *h⁴²⁰* *h⁴²¹* *h⁴²²* *h⁴²³* *h⁴²⁴* *h⁴²⁵* *h⁴²⁶* *h⁴²⁷* *h⁴²⁸* *h⁴²⁹* *h⁴³⁰* *h⁴³¹* *h⁴³²* *h⁴³³* *h⁴³⁴* *h⁴³⁵* *h⁴³⁶* *h⁴³⁷* *h⁴³⁸* *h⁴³⁹* *h⁴⁴⁰* *h⁴⁴¹* *h⁴⁴²* *h⁴⁴³* *h⁴⁴⁴* *h⁴⁴⁵* *h⁴⁴⁶* *h⁴⁴⁷* *h⁴⁴⁸* *h⁴⁴⁹* *h⁴⁵⁰* *h⁴⁵¹* *h⁴⁵²* *h⁴⁵³* *h⁴⁵⁴* *h⁴⁵⁵* *h⁴⁵⁶* *h⁴⁵⁷* *h⁴⁵⁸* *h⁴⁵⁹* *h⁴⁶⁰* *h⁴⁶¹* *h⁴⁶²* *h⁴⁶³* *h⁴⁶⁴* *h⁴⁶⁵* *h⁴⁶⁶* *h⁴⁶⁷* *h⁴⁶⁸* *h⁴⁶⁹* *h⁴⁷⁰* *h⁴⁷¹* *h⁴⁷²* *h⁴⁷³* *h⁴⁷⁴* *h⁴⁷⁵* *h⁴⁷⁶* *h⁴⁷⁷* *h⁴⁷⁸* *h⁴⁷⁹* *h⁴⁸⁰* *h⁴⁸¹* *h⁴⁸²* *h⁴⁸³* *h⁴⁸⁴* *h⁴⁸⁵* *h⁴⁸⁶* *h⁴⁸⁷* *h⁴⁸⁸* *h⁴⁸⁹* *h⁴⁹⁰* *h⁴⁹¹* *h⁴⁹²* *h⁴⁹³* *h⁴⁹⁴* *h⁴⁹⁵* *h⁴⁹⁶* *h⁴⁹⁷* *h⁴⁹⁸* *h⁴⁹⁹* *h⁵⁰⁰* *h⁵⁰¹* *h⁵⁰²* *h⁵⁰³* *h⁵⁰⁴* *h⁵⁰⁵* *h⁵⁰⁶* *h⁵⁰⁷* *h⁵⁰⁸* *h⁵⁰⁹* *h⁵¹⁰* *h⁵¹¹* *h⁵¹²* *h⁵¹³* *h⁵¹⁴* *h⁵¹⁵* *h⁵¹⁶* *h⁵¹⁷* *h⁵¹⁸* *h⁵¹⁹* *h⁵²⁰* *h⁵²¹* *h⁵²²* *h⁵²³* *h⁵²⁴* *h⁵²⁵* *h⁵²⁶* *h⁵²⁷* *h⁵²⁸* *h⁵²⁹* *h⁵³⁰* *h⁵³¹* *h⁵³²* *h⁵³³* *h⁵³⁴* *h⁵³⁵* *h⁵³⁶* *h⁵³⁷* *h⁵³⁸* *h⁵³⁹* *h⁵⁴⁰* *h⁵⁴¹* *h⁵⁴²* *h⁵⁴³* *h⁵⁴⁴* *h⁵⁴⁵* *h⁵⁴⁶* *h⁵⁴⁷* *h⁵⁴⁸* *h⁵⁴⁹* *h⁵⁵⁰* *h⁵⁵¹* *h⁵⁵²* *h⁵⁵³* *h⁵⁵⁴* *h⁵⁵⁵* *h⁵⁵⁶* *h⁵⁵⁷* *h⁵⁵⁸* *h⁵⁵⁹* *h⁵⁶⁰* *h⁵⁶¹* *h⁵⁶²* *h⁵⁶³* *h⁵⁶⁴* *h⁵⁶⁵* *h⁵⁶⁶* *h⁵⁶⁷* *h⁵⁶⁸* *h⁵⁶⁹* *h⁵⁷⁰* *h⁵⁷¹* *h⁵⁷²* *h⁵⁷³* *h⁵⁷⁴* *h⁵⁷⁵* *h⁵⁷⁶* *h⁵⁷⁷* *h⁵⁷⁸* *h⁵⁷⁹* *h⁵⁸⁰* *h⁵⁸¹* *h⁵⁸²* *h⁵⁸³* *h⁵⁸⁴* *h⁵⁸⁵* *h⁵⁸⁶* *h⁵⁸⁷* *h⁵⁸⁸* *h⁵⁸⁹* *h⁵⁹⁰* *h⁵⁹¹* *h⁵⁹²* *h⁵⁹³* *h⁵⁹⁴* *h⁵⁹⁵* *h⁵⁹⁶* *h⁵⁹⁷* *h⁵⁹⁸* *h⁵⁹⁹* *h⁶⁰⁰* *h⁶⁰¹* *h⁶⁰²* *h⁶⁰³* *h⁶⁰⁴* *h⁶⁰⁵* *h⁶⁰⁶* *h⁶⁰⁷* *h⁶⁰⁸* *h⁶⁰⁹* *h⁶¹⁰* *h⁶¹¹* *h⁶¹²* *h⁶¹³* *h⁶¹⁴* *h⁶¹⁵* *h⁶¹⁶* *h⁶¹⁷* *h⁶¹⁸* *h⁶¹⁹* *h⁶²⁰* *h⁶²¹* *h⁶²²* *h⁶²³* *h⁶²⁴* *h⁶²⁵* *h⁶²⁶* *h⁶²⁷* *h⁶²⁸* *h⁶²⁹* *h⁶³⁰* *h⁶³¹* *h⁶³²* *h⁶³³* *h⁶³⁴* *h⁶³⁵* *h⁶³⁶* *h⁶³⁷* *h⁶³⁸* *h⁶³⁹* *h⁶⁴⁰* *h⁶⁴¹* *h⁶⁴²* *h⁶⁴³* *h⁶⁴⁴* *h⁶⁴⁵* *h⁶⁴⁶* *h⁶⁴⁷* *h⁶⁴⁸* *h⁶⁴⁹* *h⁶⁵⁰* *h⁶⁵¹* *h⁶⁵²* *h⁶⁵³* *h⁶⁵⁴* *h⁶⁵⁵* *h⁶⁵⁶* *h⁶⁵⁷* *h⁶⁵⁸* *h⁶⁵⁹* *h⁶⁶⁰* *h⁶⁶¹* *h⁶⁶²* *h⁶⁶³* *h⁶⁶⁴* *h⁶⁶⁵* *h⁶⁶⁶* *h⁶⁶⁷* *h⁶⁶⁸* *h⁶⁶⁹* *h⁶⁷⁰* *h⁶⁷¹* *h⁶⁷²* *h⁶⁷³* *h⁶⁷⁴* *h⁶⁷⁵* *h⁶⁷⁶* *h⁶⁷⁷* *h⁶⁷⁸* *h⁶⁷⁹* *h⁶⁸⁰* *h⁶⁸¹* *h⁶⁸²* *h⁶⁸³* *h⁶⁸⁴* *h⁶⁸⁵* *h⁶⁸⁶* *h⁶⁸⁷* *h⁶⁸⁸* *h⁶⁸⁹* *h⁶⁹⁰* *h⁶⁹¹* *h⁶⁹²* *h⁶⁹³* *h⁶⁹⁴* *h⁶⁹⁵* *h⁶⁹⁶* *h⁶⁹⁷* *h⁶⁹⁸* *h⁶⁹⁹* *h⁷⁰⁰* *h⁷⁰¹* *h⁷⁰²* *h⁷⁰³* *h⁷⁰⁴* *h⁷⁰⁵* *h⁷⁰⁶* *h⁷⁰⁷* *h⁷⁰⁸* *h⁷⁰⁹* *h⁷¹⁰* *h⁷¹¹* *h⁷¹²* *h⁷¹³* *h⁷¹⁴* *h⁷¹⁵* *h⁷¹⁶* *h⁷¹⁷* *h⁷¹⁸* *h⁷¹⁹* *h⁷²⁰* *h⁷²¹* *h⁷²²* *h⁷²³* *h⁷²⁴* *h⁷²⁵* *h⁷²⁶* *h⁷²⁷* *h⁷²⁸* *h⁷²⁹* *h⁷³⁰* *h⁷³¹* *h⁷³²* *h⁷³³* *h⁷³⁴* *h⁷³⁵* *h⁷³⁶* *h⁷³⁷* *h⁷³⁸* *h⁷³⁹* *h⁷⁴⁰* *h⁷⁴¹* *h⁷⁴²* *h⁷⁴³* *h⁷⁴⁴* *h⁷⁴⁵* *h⁷⁴⁶* *h⁷⁴⁷* *h⁷⁴⁸* *h⁷⁴⁹* *h⁷⁵⁰* *h⁷⁵¹* *h⁷⁵²* *h⁷⁵³* *h⁷⁵⁴* *h⁷⁵⁵* *h⁷⁵⁶* *h⁷⁵⁷* *h⁷⁵⁸* *h⁷⁵⁹* *h⁷⁶⁰* *h⁷⁶¹* *h⁷⁶²* *h⁷⁶³* *h⁷⁶⁴* *h⁷⁶⁵* *h⁷⁶⁶* *h⁷⁶⁷* *h⁷⁶⁸* *h⁷⁶⁹* *h⁷⁷⁰* *h⁷⁷¹* *h⁷⁷²* *h⁷⁷³* *h⁷⁷⁴* *h⁷⁷⁵*

sehr teinspitzig, namentlich an jungen B., aber stets einfacher und grober als bei *scopulina*, die darin sehr variiert.

An *pumila* schließt sich in mancher Hinsicht an die *S. californica* GREENE, in Pittoma IV, 131, *ana* soweit ich sie aus z. T. von GREENE selbst bestimmten Expl. aus Calif. und Nevada kenne. Sie weicht von *pumila*, der sie als Gebirgsstrauch sehr ähnelt, ab durch die Kahlheit aller Teile, denn es sind wohl nur die Knoten auf der Spindeloberseite beh., die klebrigen Kn., die gewöhnlich mehr ringsum und schärfer gesägten Bechen (3—6 Paar, je 2:1—5:2,2 cm) und die lebhaft roten nicht bereiften Fr., die Bl. vgl. Fig. 366 i—i', doch konnte ich nur 1 Expl. (lg. BAKER, No. 1281, Nevada) prüfen, sonst sah ich nur Frzw. Ein Expl. mit grau beh. Frst., Trieben und Kn., lg. CRANDALL, 1866, Colorado, mit größeren Fr. und Frst., steht zwischen *californica* und *scopulina*-Formen. Ob *californica* dieser oder *pumila* näher steht, ist mir noch fraglich, ich möchte glauben der *scopulina* (siehe diese).

2. Stb. $\pm$ so lang o. etwas länger als C., die übrigen Merkmale unter 1 nur z. T. zutreffend.

C B. 6—7-paarig. Bechen wie Fig. 367 h, unters. deutlich netzleistig-papillös, Bl. u. Fr. vgl. Fig. 368 n—o.

6. *S. Boissieri*: h (?), Zw. wohl anfangs hell beh., kahl o. mit Haarresten, braunrot. Lent. ∞ , hell, fein; Kn. spindelfg., kahl, klebrig, ca. 13 mm lang; B. ca. 20 cm lang (inkl. Stieb), nur spärlich hellborstig an Spindelknoten und unters. auf Blattrippe am Grunde etwas beh., Bechen oben sattgrün, unters. weißlichblau, nur über Mitte gesägt, Ende stumpflich o. kurz spitzig, c. 5:1,8—7:2,5 cm; Neb. abfällig; Blst. groß, ca. 15 cm Dm., kahl o. fast ganz kahl, Bl. ca. 10—12 mm Dm., Stb. 20, Gr. 4—5, Fr. 8—9 mm Dm., gelbrot (?).

S. B. C. K. SCHN., in Bull. Herb. Boiss. 1906. — Typ in Pontus, Lasistan, ganz ähnlich Form aus Abschasiën, nur Serratur gröber. Wälder, 700—1900 m.

— Blz. V. — Frz. IX. — Noch nicht in Kultur. Wahrscheinlich gehört auch ein Expl. aus Kartsch-Chal, Transkauk. hierher, dessen Serratur wieder etwas abweicht (Fig. 367 h').

Habituell ähnelt der *S. Boissieri* die *S. Wilsoniana* C. K. SCHN., l. c., aus W.-Hupei, Patung (lg. WILSON, No. 985), die aber abweicht durch beh. Blst., kleinere Bl. (Fig. 368 p—p') und sich allmählich zuspitzende Bechen (Fig. 367 k), die unters. hellblaugrau bereift (nicht papillös) und oben etwas glänzend hellgrün sind. Das B.chen Fig. 367 k² und die Bl. Fig. 368 q—q² sind von Expl. lg. PRATT, No. 223

Fig. 368. *Sorbus* [Aucuparia]: n—o *Boissieri*: n Bl.-L.-Schn.; n¹ C.; o Fr.-L.-Schn. — p—p¹ *Wilsoniana*: p Bl.-L.-Schn. und K.; p¹ C.; q—q² var.?, wie p—p¹; q² Frkn.-Q.-Schn. — r—r¹ *sibirica* (?): Bl.-L.-Schn. und C., vgl. Text S. 678 (Original).

Tachrenu, die eine besondere Varietät darzustellen scheinen, hier sind die Bechen stumpflicher, aber teinspitziger gezähnt, die Bl. haben meist 5 Gr. (nicht 4, am Grunde beh. C) und fast ganz unterständige durchaus verwachsene (ob immer?) Ftbl. q. Wieder etwas abweichend sind Expl. lg. HENRY, Hupei No. 3757, deren

Blst. noch zu jung sind und deren Behen Fig. 367 k¹ zeigt. Vgl. sonst die zit. Arbeit.

⊖ Die Merkmale unter ⊙ insgesamt nicht zutreffend.

Kn. deutl. beh., nicht eigentlich klebrig^{*)}. Serratur der Behen meist einfach, kurz und $\pm$ grob (Fig. 369).

Neb. halbeifg. o. rundlich, eingeschnitten gezähnt, bis zur Frz. bleibend.

7. *S. pohuashanensis*: nach REHDER^{†)}; Zw. rotbraun, B. 6–7-paarig, Spindel anfangs dünnwebig-filzig; Behen eilänglich bis länglich lanzettlich, 3,5–5 cm lang, im unteren Drittel meist ganzrandig, sonst einfach und scharf gesägt mit nach vorn gerichteten Zähnen, unters. weißlich mit deutl. dunklerem Adernetz, in Jugend wie Spindel beh.; Neb. bis 12 mm lang; Blst. 10–14 cm breit, locker spinnwebig-filzig, Bl.-Achse und K. filzig bis fast kahl, K. drüsig gezähnt, C. breit-eifg., etwas ausgegagt an Spitze, kurz genagelt, Stb. ca. 20, längste – so o. etwas länger als C., Gr. 3–4, Grund wollig, Fr. rot, ca. 7 mm Dm.

S. p. REHD., in Mitt. d. D. D. G. 1901, 117 (*Pyrus poh.* HANCE, in Journ. of Bot. 1875, 132, teste REHD.). Um Peking: Montes Pohuanshan (aus von BRETSCHNEIDER gesammelten *S.* erzogen im Arnold-Arbor). In den beh. Kn. wie auch wohl in den 6–8-paarigen B., deren Spindel noch zur Frz. beh., deren Behen bis 6:2 cm messen, oben sattgrün sind und fast ganz kahlen, unters. zuletzt nur am Grunde und Stielchen zottig beh. bleiben, steht *S. tapashana* C. K. SCHN., in Bull. l. c. 1906, aus N.-Scheni, Ta-pa-shan (GIRALDI, No. 1082, 5126), der *pohuashanensis* sehr nahe, so daß sie vielleicht nur eine Var. ist, doch fehlen die Neb. zur Frz. und die Fr. scheinen 8–9 mm dick zu sein. Serratur recht fein, fast vom Grund aus (Fig. 369 b).

Ob ein Expl. lg. GIRALDI, No. 5128, in N.-Scheni (Ngo-san) etwa in den Formenkreis dieser Art gehört, ist fraglich, da nur die bleib. Neb. und die (noch unreifen) aber wohl kleinen Fr. dahin deuten, doch Kn. so gut wie kahl, die B. am Grunde der Frst. nur 4-paarig, Behen bis 7,5:2 cm, fast vom Grund grob, aber ziemlich gleichmäßig scharf gesägt (Fig. 369 a), nur am Grunde an Rippe unters. zottig beh., Unters. weißlich, Adernetz nicht dunkler, Spindel – wollig-zottig, jedenfalls B. in Jugend wohl reich beh., Frst. kahl, c. 10 cm Dm. Ich habe es vorläufig *S. Giraldiviana* C. K. SCHN., in Bull. l. c. 1906 genannt.

++ Neb. zur Frz. abgefallen***).

8. *S. aucuparia*: b o. in typischer Form meist mittelgroß bis ca. 15 m hoher b mit kugeliger, etwas sparriger Krone†). Zw. jung meist beh., o. ganz kahl o. beh., matt grau- o. rotbraun, Kn. in Beh. ähnlich, kegelfg.††; B. 5–8-paarig, ca. 10–22 cm (inkl. Stiel); Behen vgl. Fig. 369 d–l, ober. satt- o. hellgrün, unters. grünlich o. grauweißlich, Zähnung meist einfach, ziemlich grob und kurz, Zuspitzung meist kurz; Neb. abfällig; Blst. meist groß, 10–18 cm Dm.,

*) Nur bei einer var. der *aucuparia* kahlen die Kn. ganz und sind auch etwas klebrig. Man vgl. aber stets unter $\gamma \div$, da bei gewissen Formen der *scopolina* und *decora* die Kn. vielleicht nicht ganz kahl sind.

†) Ich sah nur im Herb. Petrop. 2 hierher gehörige Bruchstücke, eines mit verblüht. Blst., lg. BRETSCHNEIDER, No. 1155, 1881, dessen B. 5-paarig, sonst analog sind, ferner ein zweites vom selben Sammler No. 3, 1874, wie es HANCE als Original hatte mit ganz jungen B. und Resten eines alten, sich also bis zum Frühjahr haltenden Frst.

***) Hier reihen sich den beh. Kn. nach noch ein die durch ihre Behen (Fig. 369 c), sowie vor allem durch deren papillos netzleartige Unters., die relativ großen bereiten Fr. (Fig. 371 a–b) und die rostig beh. Kn. gut gekennzeichnete *S. praemorsa* NYM., Syll. 265, 1855 (*Pyr. praem.* GLESS., Fl. sic. syn. I, 561, 1842; *P. aucuparia* var. *maderensis* LOWE, Man. fl. Madeira I, 259, 1868; *S. maderensis* DECNE., in Nouv. Arch. Mus. X, 158, 1874) aus Sizilien und Madeira (ob auch Corsica); ferner die mir noch unbekannte *S. subvestita* GREENE, in Pittonia IV, 130, 1900, aus Minnesota. Auch *S. dumosa* GREENE, l. c. 129, aus N.-Arizona kenne ich nur aus der Beschreibung.

†) Vgl. z. B. HEMP. et WILH., Bäume u. Sträucher d. Waldes, III, S. 79, Fig. 300.

††) Siehe meine dendrol. Winterstudien, Fig. 136 f–m, S. 133 und S. 157.

Bl. nach Wanzen duftend. 8–9 mm Dm., Stb. — C., Gr. 3–4, Fr. scharlachrot. kugelig, ca. 9 mm Dm., vgl. Fig. 371c–e², S. 676, sonst aber var.!

Man kann unterscheiden: var. a. *typica*: Kn. — beh., ♂ Zw. meist kahlend, B. jung bes. unten locker beh., zuletzt fast ganz kahlend, B. chen bis ca. 6,5:2 cm, Serratur etc. wie Fig. 369d–h wechselnd, an Lohden wie bei i; Blst. — locker filzig. Bl.-Achsen und K. meist reicher beh., zur Frz. jedoch ganz o. fast kahlend. Diese halte ich — im Gegensatz zu BECK — für den allgemeinen Typ im Sinne LINNÉs, der durch graduelle Übergänge mit b. und c. verknüpft ist. var. b. *lanuginosa* BECK, Fl. v. Nied.-Österr. 708. 1890, ex p. (S. L. KIT.), in SCHULT., Öst. Fl. ed.

Fig. 369. *Sorbus* [*Aucuparia*], je eines der größeren Seiten-B. chen von: a *Giraldiana* — b *tapashana* — c *praemorsa* — d–l *aucuparia*: d–i var. *typica* und *lanuginosa* [Lohdentrieb], k var. *glabrata*, l var. *dulcis* (♂, n. Gr.) (Original).

2. II. 50. 1814), Kn. stärker beh., ♂ Zw. — locker zottig, B. bleibend obers. verstr. beh., unters. — locker beh., Form der B. chen und Serratur, wie bei a. wechselnd, doch hfg. etwas kurzer, breiter und gröber gezähnt, Blst. auch zur Frz. noch — locker beh. Diese Var. scheint vorwiegend im südl. Mittel- und SO.-Eur. aufzutreten, wo sie die Ebene und Hügellregion bewohnt und der Typ oft ganz fehlt, während im Gebirge die var. c. dafür eintritt. var. c. *glabrata* (*S. glabra***) GIL., Fl. Lithuan. II. 233. 1781; *Pyr. auc.* var. *glabrata* WIM. et GRAB., Fl. v. Schles. II. 1. 21. 1821; *S. auc.* var. *alpestris* WIM., Fl. v. Schles. 127. 1841; ? var. *alpina* BLYTT, Om Veg. 174. 1869; var. *subcalva* SCHUR, in Verh. Naturf. Ver. Brunn. XV. 2. 200. 1877; var. *typica* BECK, l. c.): Kn. kahlend o. von Anfang an kahl und leicht klebrig, Zw. meist stets kahl, dgl. B. und Blst., die B. chen hfg. zieml.

*) Wieso HEDLUND die *lanuginosa* KIT., als Bastard anspricht, ist nur unklar, denn auch in der Beschreibung in *Linnæa* 1863: 584 deutet doch nichts auf eine derartige Annahme hin.

**) Möglicherweise hat ja GILBERT nicht diese typische Gebirgsform gemeint, sondern nur eine kahlere Form von a., HEDLUND hat indes in einer *S. glabrata*, Mon. l. c., 45. 1901, die Varietät ganz merkwürdig interpretiert, schreibt er doch der hoch-nordischen und alpinen Form dicht seidig-zottige Kn., beiders. zerstr. wollhaare B. chen, beh. Blst.-Achsen usw. zu. Scheint also eine Gebirgsform der *lanuginosa* o. *typica* vor sich gehabt zu haben, die etwas von var. c. ganz Verschiedenes darstellt.

schmallanzettlich, unters. mehr grünlich. Fr. z. T. mehr rundl.-elliptisch. Hierher Gebirgsformen aus dem Riesengebirge, Karpathen, Voralpen, Alpen, den Gebirgen der nordl. Balkanländer und wohl auch nordische Formen, z. B. auch auf Rügen!

Von Kulturformen, die sich wohl zumeist an var. a. anschließen, nenne ich: *f. Darkent* (var. *Darkent aurea* HORT.), B. stets gelb getönt; *f. Fjorana* var. *fruct. luteo* LOUD., Arb. II. 916, 1844, var. *f. f.* HORT., Fr. orange-gelb; *f. luteo-carinata* (var. *fol. luteo-carin.* HORT.-SPÄTH); B. gelbbunt; var. *pendula* KIRCHN., Arb. Musc. 293, 1864, Zw. hängend, hierher *f. carinata*, eine buntblättrige Form; var. *moravica* ZENGERLING 1889 [teste ZABEL], et DIPP 1893 var. *dulcis* KRAETZL., die süße Eberesche, 1890, eine ursprünglich in Mähren wild getundene Form mit etwas größeren, wohlschmeckenden Fr., die durch Kultur weiter veredelt wurde, die B. eben sind in Beh. dem Typ ziemlich analog und in Form wie Fig. 3691, also ziemlich schmallanzettlich und meist nur im oberen Drittel gezähnt. Sicher durch alle Übergänge mit Typ verknüpft. Eine *f. acunata* BEISSN., in Gartenwelt III. 267, 1899, e. tab. col., wurde im böhm. Erzgebirge angeblich wild getunden und dann durch Kultur verbreitet, sehr schöne Herbstfärbung. Ein Analogon zu *maritima* ist var. *rossica* SPÄTH-KOEHNE, in Gartenfl. 1901, 412, eine in Rußland aufgetundene Form mit wohlschmeckenden Fr., die bei *f. major* SPÄTH noch größer sind. Mir noch nicht genügend bekannt. Gewisse als *f. incisa*, *f. lacinata* (HARTM., Handb. i. Scand. Fl. ed. 2. 136, 1832, teste HEDLUND) usw. gehende Formen des Typs mit tief eingeschnitten gesägten B. eben erinnern an Lohdendrieb B. (Fig. 3691).

S. a. L., Sp. pl. 477. 1753 (Pyr. auc. GAERTN., De fruct. II. 45. 1791; Aucuparia silvestris MED., Gesch. Bot. 86. 1793). Gemeine E. Die typische Form wohl ganz N.- (bis Island) und Mittel-Eur., im Süden fraglich, wie weit im O. ebenfalls. Im Kauk. ist *aucuparia* wohl durch *S. Boissieri* vertreten, in Griechenland fehlt sie nach HALASCY. Aus Kl.-Asien sah ich nur vom Erdschias-dagh, zwischen 2200–2500 m hoch, von ZEDERBAUER gesammelte Formen, die der var. c. nahe stehen, aber in der Beh. abweichen und auch mit den anderen Formen der *aucuparia* nicht ganz übereinkommen. Vielleicht eine besondere Var. Erinnert aber an nordische Formen des Typs (*S. glabrata* HEDL. ex descript., excl. Syn. — Die *S. aucuparia* wächst auf Böden aller Art, liebt aber besonders fruchtbaren, lockeren, frischen Untergrund und gedeiht in Höhenlagen sehr gut, daher im Gebirge vielfach als Alleebaum angepflanzt. Forstlicher Wert gering. Rinde mit hohem Gerbstoffgehalt. Wertvoller Zierbaum. Die spontanen, wie Kulturformen bedürfen noch sehr der eingehenden vergleichenden Untersuchung. Über Bastarde siehe folgendes und S. 677 wie auch S. 688. Die Angaben, daß *aucuparia = domestica* vorkomme, beruhen vorläufig nur auf Mutmaßungen.

8—11 *S. aucuparia = americana = S. splendida* HEDL., Mon. I. c. 43., soll in Kultur existieren. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, doch dürfte solch eine Hybride in vieler Hinsicht der *S. decora* sehr ähneln.

8×22 *S. aucuparia × aria: S. decurrens* HEDL., l. c. 49. 1901 (*S. aucuparia × Aria nica × S. aucup.*, b. *decurrens* KOEH., Dendr. 248. 1893; *Sorb. hybrida* var. *superaucuparia* ZBL., im H. d. D. D. G. 196. 1903, ex p.; *S. lanuginosa* HORT., non KIT.). Die typische *decurrens* stellt eine der *aucuparia* sehr nahe stehende Form dieser Hybride dar, die aber durch stärkere Beh. und die zusammenfließenden End-B. eben auf *aria* weist (Fig. 370a). Eine Form davon ist vielleicht *S. aucuparia* var. *integerrima* KOEH., in Gartenfl. 1901, 411, die leider nur steril bekannt, aber in Beh. und den Enden der B. ganz *decurrens* ähnelt (Fig. 370b), nur sind die B. völlig ganzrandig. Ob anderen hybriden Ursprungs? Diejenige Formen-Gruppe des Bastardes, die zwischen den Eltern die Mitte hält und meist mit der ähnlichen nicht hybriden *S. hybrida* L. (S. 691) vermengt wird, ist in der Nomenklatur ganz verworren. BORKH., Handb. II. 1245, 1863 versteht unter *Aria las-pinnatifida* die gleichen Thüringer Formen (allerdings mit Einschluß der *hybrida*!), die ROTH, En. plant. II. 138, 1827, als *Pyrus semipinnata* (nach Zitat Fl. Dan. t. 301, ebenfalls inkl. *S. hybrida*) bezeichnet. HEDLUND hat diesen Namen als *S. semipinnata* 1901 aufgenommen. Ich behalte ihn bei, obwohl man vielleicht BORKH.'s *pinnatifida**) voranstellen müßte! Von *hybrida* im wesentlichen abweichend durch

*) Ich fand gewisse Gartentormen, die hierher zu gehören scheinen und als *S. americana* in den Gärten gehen mit z. T. ganzrandigen B. eben nebst normal gezähnten am selben Zw. So im Herb. BOISS. aus dem Genfer Botan. Garten 7. VI. 1823. Mir noch ganz unklar. Verschmelzungen der kleinen (3.5–4 : 1–1.4 cm) B. eben nicht zu sehen. Unters. sehr bereift, locker beh., Spitze sehr fein grannig; Blst. nur ganz locker beh.

*) *Pyr. pinnatifida* SMITH, Engl. Bot. XXXIII, t. 2331, 1812, ist *S. arranensis* HEDL.!

im Mittel nicht unter 10–12 cm lange B. mit ca. 10–14 Nervenpaaren, sonst vgl. Fig. 370 e–f. Stiel kaum unter 2 cm, Bl. und Fr. kleiner. Hierher vielleicht *Sorb. quercifolia* HEDL., l. c. 50, deren Eltern *S. aria* var. *edulis* $\times$ *aucuparia* sein sollen. Vgl. über die Unterschiede HEDLUND, p. 20. Mir ist diese Form noch zweifelhaft, ob da nicht *aucup.* $\times$ andere Art vorliegt. B. wie 370 h. — Der *aria* näher stehende Formen des Bastardes kann man als *S. thuringiaca*^{*)} (*Pyrus thur.* ILSE, Fl. Mittelthur. 99, 1896; *Sorb. semip.* var. *thur.* HEDL., l. c. 57) führen. Hier fehlt die Fiederung der B. an der Basis.

Fig. 370. *Sorbus*: B.-Stücke o. B. von: a $\times$ *decurrens* — b $\times$ *integerrima* — c *hybrida* — d $\times$ *dacica* — e–f $\times$ *semipinnata* — h $\times$ *quercifolia* — g $\times$ *Meinichii* ($\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

8~23 *S. aucuparia* var. *lanuginosa* $\times$ *umbellata* var.? [vel *aria* var.?]: *S. dacica* BORR., in Östr. Bot. Zeitschr. 1887, 404. Es handelt sich hier um Formen aus dem Banat. Solange aber die *aria*, bzw. *umbellata*-Formen dieser Gegend, die jetzt immer unzutreffend als *meridionalis* bezeichnet werden, ungeklärt sind, kann ich nichts Näheres über diese der *semipinnata* sehr ähnliche Hybride (Fig. 370 d) sagen. Daß es sich nicht um *aucuparia* $\times$ *Mougeot* handeln kann, geht nach einer Notiz DEGENS in seinem Herbar aus der Art des Vorkommens hervor.

8~25 *S. aucuparia* $\sim$ *hybrida*: *S. Meinichii* HEDL., l. c. 49 (*S. aucup.* var. *Mein.* LINDBG., in HARTM. Handb. Scand. Fl. ed. XI, 271 1879). Hier und da zwischen den Eltern vorkommender Bastard, mit fast völlig fiederteiligen B. (Fig. 370 g). Näheres bei HEDLUND, der neuerdings (briefl.) geneigt ist, *S. Meinichii* als „Art“ aufzufassen.

*) FRITSCH, Sched. Fl. Exsc. Austr. Hung. No. 2443, 1896, versteht unter *S. thur.* die *aria* $\times$ *aucuparia* allgemein. Allem wenn man nur einen Hauptnamen mit var. haben will, muß man doch *semipinnata* oder *pinnatifida* wählen.

8×28 *S. aucuparia* × *Mougeoti*: Wohl auftretend, sicherer Nachweis aber noch nicht erbracht. Vgl. unter *S. dacica* oben.

8×33 *S. aucuparia* × *arbutifolia*: *S. heterophylla* [ob RCHB., Fl. germ. excurs. 628. 1832?] (*Pyr. hybrida* MOENCH, Verz. Weissenst. 90. 1785, non *Sorb. hybr.* L.; *Azarolus heteroph.* BORKH., Handb. Forstb. II. 1248. 1803; *Sorb. spuria* PERS., Syn. II. 38. 1807; ? *Aronia orbifolia* SPACH, Hist. veg. II. 87. 1834; *Aronia spuria* ROEM., Ros. Mon. III. 158. 1847; *Aronia hybrida* ZBL., im H. d. D. D. G. 193. 1903), altbekannte Hybride, deren B.-Formen in Fig. 384k—m, S. 699 dargestellt sind, eine der *aucuparia* näher stehende Form var. *superaucuparia* (*S. hybr.* v. *superaucuparia* ZBL., l. c.) hat B. mehr wie n. Im übrigen muß ich aus Mangel an Raum auf eingehendere Schilderung verzichten.

8×34 *S. aucuparia* × *melanocarpa*: *S. fallax* (*Sorb. heterophylla* DIPP., Laubh. III. 372. 1893, an RCHB.?, *Aronia heterophylla* ZABEL., im H. d. D. D. G. 193. 1903). Von *S. heterophylla* schwer zu scheiden. Vgl. dort. Ich mußte wohl oder übel einen neuen Namen wählen.

Fig. 371. *Sorbus* [*Aucuparia*]: a—b *praemorsa*: a Bl.-L.-Schn. und C.; b Fr.-L.-Schn. — c—c² *aucuparia*: c Bl.-L.-Schn.; c¹ C; c² c³ Frkn.-Q.-Schn. (Grund und Spitze); d—d¹ Fr.-L.-Schn. und Q.-Schn. (Mitte); e—e² S. ganz und im Schnitt. — f—g *decora*: wie a—b. — h—i *americana*: wie a—b. — k—k² *commixta*: k—k² var. *typica*; l—l¹ var. *rufoferruginea*, wie a—b (Original).

✱✱ Winter-Kn. kahl o. fast kahl und + klebrig, Serratur und Zuspitzung der B.chen meist feiner und schärfer, vgl. Fig. 372.

! B.chen mit kurzer oder jedenfalls + abgesetzter und plötzlich vorgezogener feiner Spitze (Fig. 372 a—e). Bl. meist über 10 mm Dm. und Fr. nicht unter 9 mm dick.

— B. meist 6—7-paarig, B.chen über 2 cm breit, Serratur meist ziemlich einfach (Fig. 372 a—b).

9. *S. decora*: Von *americana* in der Hauptsache eben durch stärkere Beh. der jungen Teile, an Spitze + beh. Kn., weniger paarige B. (bis 25 cm) mit breiteren, kurz gespitzten, gröber gesägten B.chen (bis 7,5:3 cm), jung + beh. Blst mit größeren Bl. und größere Fr. geschieden. Vgl. Fig. 371 f—g.

S. d. C. K. SCHN., in Bull. l. c. 1906 (*S. americana* PURSH, Fl. Am. Sept. I. 341. 1814, non MARSH.; *Pyr. americ.* v. *decora* SARG., Silva XIV. 101. 1902; *S. americ.* v. *macrocarpa* ZBL., im H. d. D. D. G. 195. 1903, ex p.; *S. americana* var. *decora* SARG., Man. 357. 1905; *S. sambucifolia* AUCT. PLUR.). — NO.-N.-Am.; ich sah Expl. aus: Wisconsin, Michigan, New York, Vermont, New Foundland. — Blz. etwas vor *americana*. — Sicherlich in Kultur, aber selten echt und oft verkannt.

9×11 *S. decora* × *americana*: als diese Hybride möchte ich einige sog. Übergangsformen ansehen, die in Am. wild vorzukommen scheinen.

△△ B. meist 5—6-paarig, B.chen fast stets unter 2 cm breit, Serratur doppelt und viel schärfer (Fig. 372 c—e).

10. *S. scopulina*: $\text{h} - \text{h}$, ob über 3 m?; Zw. jung locker beh., ☉ meist kahl o. fast kahl, grau-olivbraun, Lent. mäßig ∞ und auffällig; Kn. längl. eifg., bis ca. 12 mm, grünlich, an Spitze oft beh.; B. bis etwa 20 cm (inkl. Stiel), B.chen zur Frz. ganz kahl o. gleich Spindelknoten unters. am Grunde beh., 4,5:1,5 bis 5:6:1,8—2 cm, unters. hellgrün, kaum bereift; Neb. abfällig; Blst. bis 15 cm Dm., jung meist wie Bl.-Achsen locker grau beh., zur Frz. kahl, K. meist nur innen beh., C. kaum länger als Stb., Gr. 3—4, Fr. korallenrot.

Der Formenkreis dieser Art bedarf noch sehr der genauen Untersuchung. So weichen insbesondere die Expl. aus Utah, die sehr an *americana* in den B. gemahnen, und die aus Idaho ab.

S. s. GREENE, in Pittonia IV. 130. 1890 (die westamerik. *sambucifolia* AUCT.). Ich sah Expl. aus New-Mex., Col., Wyoming, Utah, Idaho, Oreg., Washington. — Gebirge bis 3000 m. — Blz. VI(—VII). — Frz. IX(—X). — Ob in Kultur?

B.chen mit meist allmählich und deutlich lang vorgezogener Spitze (Fig. 372 g—i). Bl. meist unter 9 mm Dm. und Fr. kaum über 8 mm dick.

B. 6—8-paarig, B.chen sich allmählich lang zuspitzend, Serratur recht fein, scharf und ziemlich gleichmäßig (Fig. 372 g).

11. *S. americana*: $\text{h} - \text{h}$, bis ca. 9,5:0,25 m, Krone ausgebreitet verästelt, schmal rundlich, Zw. kahl o. nur ganz jung leicht beh., *) rotbraun, Lent. hell, ∞ , Borke glatt, grau, unregelmäßig kleinschuppig; Kn. lang kegelfg., bis 1,8 cm, kahl, klebrig; B. sehr bald kahl bis auf Haarbüschel an Spindelknoten und am Grunde der Rippe unters., meist nicht unter 18—20 cm, nackter Stiel davon bis 6 cm; B.chen breiter o. schmaler lanzettlich, an Basis ganzrandig, oben lebhaft, unten hellgrün, z. T. mit deutl. Stielchen, 6:1,8—8:2,3 cm, im Herbst gerötet, unters. zuw. bereift; Blst. 8—12 cm, nur jung verstr. beh., Bl. vgl. Fig. 371 h—h', Stb. ca. 20, zuw. kürzer als C., Gr. 3(—4), Fr. wie i, zuw. etwas langlich, glänzend rot.

S. a. MARSH., Arb. am. 145. 1785 et WILLD., nec PURSH (*S. micrantha* DUM.-COURS., Bot. éd. 2. V. 464. 1811; *S. microcarpa* PURSH, Fl. am. sept. I. 341. 1884; *Pyr. am.* DC., Prodr. II. 637. 1825; *Pyr. microc.* SPRGL., Syst. II. 511. 1825). — Von N.-Carolina bis durchs Gebiet der großen Seen, Ontario, New-Foundland. Im Gebirge in allen Teilen zierlicher, als h nach SARGENT in Ontario an den Seeküsten. — Blz. VI. — Frz. IX—X. Seit langem in Kultur, aber nicht hfg. echt. — Zu *americana* (nicht zu *decora*) scheint die arktische Form aus Grönland, var. *groenlandica* C. K. SCHN., l. c., zu gehören.

11×22 *S. americana* × *aria*: *S. plantiërensis*. Unter diesem Namen sammelte ich im Hort. SIM.-LOUIS Material einer Hybride, die Herr JOUTIN für diese Kombination halten möchte. Sie bedarf aber noch weiterer Beobachtung.

11×33 *S. americana* × *arbutifolia*: *S. monstrosa* (*Aronia monstrosa* ZBL., im H. d. D. D. G. 193. 1903). Mir noch sehr fraglich. Vgl. B. Fig. 384 o, S. 699.

11×34 *S. americana* × *melanocarpa*: *S. sorbifolia* HEDL., Mon. l. c. 114. 1901 (*Mespilus sorbifolia* POIR., in LAM. Encycl. Suppl. IV. 73. 1816; *Aronia Watsoniana* ROEM., Ros. Mon. III. 159. 1847; *Sorb. Sargentii* DIPP., Laubh. III. 373. 1893; *Aronia Sarg.* ZBL., im H. d. D. D. G. 193. 1903). Mir ebenfalls nur unvollkommen bekannt. Von *fullax* und *heterophylla* durch größere Kahlheit aller Teile abweichend.

B. meist 5—6(—7)-paarig, B.chen mehr geschwänzt lang zugespitzt, Serratur mehr ungleich doppelt, aber sehr feinspitzig (Fig. 372 h—i).

12. *S. commixta*: $\text{h} - \text{h}$, Höhe?, beim Typ Zw. wohl stets kahl, ☉ rotbraun, Lent. $\tau \infty$ o. wenige, Kn. kahl, klebrig, spitz kegelfg., bis 1,6 cm; B. sehr variabel,

meist kleiner als bei *americana* o. jedenfalls weniger paarig und Behen anders geformt und gesägt. Behen kahl (o. wie bei *americana* beh.), 5:1,3—8:2,3 cm, oberse. lebhaft hellgrün, unters. auch grünlich; Blst. meist kahl, meist kleiner, lockerer. Bl. aber größer. Gr. 3—4 (Fig. 371 k—k'), Fr. wohl ähnlich *americana*, K. wohl nur bei unreifen Fr. $\pm$ aufrecht (gegen HEDLUND).

Diese variable Art bedarf noch sehr der Beobachtung. Ich unterscheide vorläufig: var. a. *typica*. B. und Blst. zur Frz. ganz o. so gut wie kahl, Stb. aber länger als C., hierher f. *angustissima*: Behen auffällig schmallanzettlich, bis 6,5:1 cm (Fig. 372 i). var. b. *rufo-ferruginea* [SHIRAI, in Herb.]. B. an Spindel und Behen-Unters. zur Blz. auffällig hell rostig zottig, dgl. Blst., auch zur Frz. Beh. noch deutl. und reichlich (bes. Rippe unters.), Behen 3,5:1—6:1,5 cm, Stb. wie es scheint — deutl. kürzer als C., Gr. 5, Bl. überhaupt kleiner (Fig. 371 l—l'). Vgl. auch im Bull. Herb. Boiss. die Spezialarbeit. Var. b. vielleicht gute Art!

Fig. 372. *Sorbus Aucuparia*, je eines der größeren Seiten-Behen von: a—b *decora*; c—e *scopulina*; f dgl. Form von Idaho (vgl. Text S. 677); g *americana*; h—i *commixta*; j f. *angustissima*; k—k' *sibirica* (knapp 1/2 n. Gr.) (Orig.).

S. c. HEDL., Mon. l. c. 38. 1901 (*S. aucup.* var. *japonica* MAX., in Bull. Acad. Pétersbg. XIX. 173. 1874; *S. japonica* KOEHNE, in Gartentl. 408. 1901, non SIEB.). Gebirge von Zentral- und N.-Japan, wohl auch Sachalin. Blz. VI. Frz. IX—X. — Der Typ in Kultur, doch noch selten.

Im Anschluß an *commixta* möchte ich *S. sibirica* HEDL., l. c. 41 (*Pr. aucup.* var. *glabra* TRAUTV., in Bull. Mosc. XXXIII. 2. 533. 1860) erwähnen, von der ich nur ungenügendes Material aus W. Sib., Altai und vom Kolyma-Fluß sah, die ich ebenfalls für von *aucuparia glabrata* ganz verschieden halte, die vielleicht zu *commixta* Beziehungen hat. Vgl. Behen Fig. 372 k—k', von Bl.-Expl. 5—4-paarig, fast kahl, Serratur schwach, kurz, einfach. Bl. vgl. *commixta*, Fr. 1, Kn. beh. Die in Fig. 368 r—r', S. 671, abgebildeten Bl. und das Behen in Fig. 367 i, S. 670, stammen von einem unsicheren Amur-Expl., dessen Behen unters. weißlich und papillös sind. Da Fr.-Expl. nicht vorlagen, konnte ich mir kein Urteil über diese Form bilden.

B. B. im Mittel nur 3–4-paarig. B. eben von unten nach oben an Größe zunehmend, oberste 3 am größten o. aber B. im Mittel 8- o. mehr-paarig. B. eben gleichgroß, Spindel meist deutl. geflügelt.

I. B. im Mittel nur (3–) 4-paarig, die 3 obersten B. eben die größten. Blst. am Grunde von bleibenden hochblattartigen Neb. gestützt.

13. *S. gracilis*: $\varnothing$, bis 1,8 m, z. T. niederliegend, Zw. $\pm$ gewunden, junge Triebe beh., Kn., wie es scheint, kurz kegelfg., zuletzt kahl ($\varnothing$: B. kaum über 8 cm (selten 5-paarig und bis 10 cm), Spindel u. B. eben untersch. grau o. braunlich zottig, obers. nur spärlich beh., aber gewimpert, ob zur Frz. viel kahler², größte B. eben 3:0,8–3,5:1,5 cm, Form wie Fig. 374c, Serratur ziemlich fein und scharf, z. T. doppelt kerbsägg., meist vom unteren Drittel ab; Neb. der oberen B. bleibend halbkreis- o. halbherzfg., unter Blst. eine Art Involuerum bildend, kerbzähnig; Blst. klein, 2–4 cm Dm., Bl. recht klein, vgl. Fig. 373a, Gr. 2 ($\pm$ verklebt), Grund fast kahl, Stb. ca. 20, kürzer als C., Fr. ?

Fig. 373. *Sorbus* [*Aucuparia*]: a–b *gracilis*: a Bl.-L.-Schn. und K.; b Frkn.-Q.-Schnitte (a–d von unten nach oben, c–d⁵ *Schwerini*: c Bl.-L.-Schn. und K.; c¹ C.; d–d⁵ Frkn.-Q.-Schn. (d unten, d⁵ Gr.-Grund). — e–e¹ *Kurzii* wie c. — f–i *foliolosa*: f Bl.-L.-Schn.; g C.; h–h² Frkn.-Q.-Schn. von oben (Gr.) bis unten; i Fr.-L.-Schn. (Original).

S. g. K. KOCH, Hort. Dendr. 178. 1853 (*Pyr. gracilis* S. et Z., in Abh. Ac. Münch. IV. 2. 1843: 131; *Ilia gracilis* KOEHNE, Gatt. Pomac. 17. 1860). Japan. Kjusiu. Gebirgswälder. Blz. Juni. Noch nicht in Kultur. Zeigt im Bl. Bau Anklänge an *Ilia*, aber doch deutliche Übergänge zur *Aucuparia*-Gruppe, vgl. Fig. 373a–b, wohl mit *Schwerini* eine besondere Sektion bildend.

S. Schwerini C. K. SCHN., l. c., B. 3–4-paarig, größte B. eben bis 5:2 cm, Zahnung nur über Mitte, nicht spitzkerbig (Fig. 374b), hochblattartige Neb. sehr groß, bis 2 cm Dm., Bl. wie Fig. 373c–d, Gr. 3–4, am Grunde kahl, Stb. — c, Wuchs wohl schlanker, Beh. sonst wie *gracilis*, Japan: lg FAURIE 28. V. 1895, Buko-sun, Musushi.

Eine Art Mittelstellung zwischen dem Kreise der *gracilis* und den folgenden Arten, die sich um *foliolosa* bzw. *macrophylla* gruppieren, nimmt *S. Kurzii* (*Pyr. Kurzii* WATT, apud PRAIN in Journ. Ac. Beng. Soc. 1904: 203) aus Sikkin (Sandakphu, 3500 m) ein. Kleiner $\varnothing$, junge Triebe locker beh. o. kahl, Kn. ? B. bis 9 cm lang, wie immergrün, zur Blz. derb, obers. tiefgrün, glänzend, locker beh., unters. weißlich bereift (nicht eigentlich netzleistig-papillös), locker beh. u. gewimpert, meist 5-paarig, Spindel kaum geflügelt, B. eben unten und oben kleiner als in Mitte, dort ca. 2,2–3:1,2 cm (Fig. 374a), Serratur nur gegen Spitze, sehr feinzahnig, einfach, Neb. klein, unter Blst. nur am Grunde der letzten B., Blst. klein, locker, spärlich beh., Bl. kahl, auch die 3–5 Gr., Stb. 20, ca. 1, C. sonst vgl. Fig. 373e–e¹, Fr. nach PRAIN 5–6 mm Dm.

II. B. im Mittel 8–14-paarig), B. eben meist gleich groß, klein bis sehr klein, Spindel fast stets geflügelt, Neb. nie auffällig.

*) Nur bei *S. foliolosa*-Typ meist 6–8-paarig.

C B. unters. deutl. papillös*), B.chen 6—8—12 Paare, nur gegen Spitze gezähnt (Fig. 374 e- e¹). Beh. der jungen Triebe und Blst. weißlich, Gr. 3—4.

14. *S. foliolosa*: $\bar{b}$ bis kleiner $\bar{b}$. • Zw. kahlend, Kn.?, B. bis 15 cm, im Mittel 6—8-paarig, Spindel (meist undeutl. geflügelt) und die weißlichgrauen B. Unters. allmählich kahlend, die dunkelgrünen Obers. stets kahl o. fast kahl, zuletzt glänzend. Textur lederartig, B.chen zuw. ganzrandig, bis 4:1,2 cm; Blst. bis ca. 8 cm Dm., auch zur Frz. kaum ganz kahl, Bl. vgl. Fig. 373 f h², Stb 20, — C., Gr. 3—4, am Grunde beh., Frb. zentral ganz verwachsen ob immer?, Fr. (unreif) wie i.

Variable Art. var. a. *typica* wie oben; in den Expl. lg. WATT No 6882 (Manipur) scheint eine von Anfang an fast kahle Form vorzuliegen. Als var. b. *pluripinnata* C. K. SCHN., l. c., sehe ich vorläufig ein Fr.-Expl. aus Sz'tschwan, lg. HENRY, No. 8960, an, dessen B. 11—12-paarig, und nur bis 12 cm lang sind, B.chen wie Fig. 374 e¹, deutlicher gezähnt gegen Ende, gleich Rhachis zur Frz. unters. durchaus locker zottig, aber auch grau und papillös, Frst. — zottig, Fr. ca. 4—5:2—3 mm.

S. f. SPACH, Hist. veg. II. 96. 1834 (*Pyr. foliolosa* WALL.**), Pl. As. Rar. II. 81. t. 189. 1831 [et Cat. No. 677 ex p.], non HOOK. f.; *Pyr. Wallichii* HK. f., Flor. Brit. Ind. II. 376. 1878; *Photinia foliolosa* KOEH., Pomac. 19. 1890. — Ich sah Expl. aus: Nepal, Sikkim, Upper Burma — Gebirge bis 3000 m. Blz. V.

Noch nicht in Kultur. Steht den anderen Arten der Gruppe sehr nahe, so daß eine Abtrennung auf Grund des nur graduell (vielleicht auch nicht immer) etwas abweichenden Bl.-Baues, der auch sonst wiederkehrt, nicht gerechtfertigt scheint.

○○ B. unters. nicht deutl. papillös, stets 8- bis mehrpaarig und auch sonst abweichend.

* junge Triebe, Blst. und B. $\dagger$ rostig-filzig, zuw. $\pm$ mit grau untermischt, B. 9—11-paarig, B.chen wie Fig. 374 f—g. Kn. rostig beh., Bl. mit 5 Gr.

15. *S. ursina*: nach den Fr.-Expl. des Typs: $\bar{b}$, Höhe (?), ☉ Zw. kahlend, — dunkelgranbraun, Kn. eifg., $\dagger$ zugespitzt, ca. 1 cm lang; B. derb, bis 15 cm lang, Spindel $\dagger$ geflügelt, graubraun zottig, B.chen wie Fig. 374 f, ober. fast o. ganz kahl, leicht glänzend, unters. (trocken) gelbbraunlich, Rippe grau o. — braunlich zottig, papillöse Netzleisten kaum deutl., von Mitte o. fast vom Grunde ab fein und gleichmäßig sägezählig, bis 3,5:1,3 cm; Frst. $\pm$ wie Rhachis beh., Fr. gelbrot (?), kugelig, ca. 8 mm Dm.

Dies var. a. *typica* (*Pyr. ursina* WALL., Cat. No. 675. 1829). Diese Expl. stammen wohl aus Garhwal, Bl. sah ich nicht. var. b. *Wenzigiana* C. K. SCHN., l. c., weicht ab durch. Beh. aller Teile mehr rein rostfarben, nicht auffällig mit grau gemischt, B. bis 18 cm, B.chen mehr schmallanzettlich, bis 4(—4,5):1,1 cm, nur gegen Spitze sehr fein gezähnt, mit fein aufgesetztem Spitzchen, unters. hfg. — blaugrau, davon die rostige Beh. sehr abstechend; Bl. wie Fig. 375 k k¹, die Fr. I schien reif zu sein, HOOKER sagt: „bluish-red“. Scheint von Kumaon durch Nepal bis Sikkim verbreitet (*S. ursina* WALL., Cat. No. 675 A).

S. u. DECNE., in Nouv. Arch. Mus. Paris X. 159. 1874 ex p. (*S. foliolosa* var. *ursina* WENZ., in Linnaea 1874. 75). — Heimat oben. — Im Gebirge bis 4000 m. — Blz. V. — Frz. Herbst. — Scheint nirgends in Kultur.

An den Typ der *ursina*, von dem vielleicht besser die var. *Wenzigiana* als Art getrennt wird, schließt sich eng an die *S. cashmiriana* HEDL., in Mon. l. c. 35. 1901, von der ich nur Bl.-Expl. sah — so daß es nicht ausgeschlossen ist, daß sie mit typ. *ursina* zusammenfällt, welche dann eine von Afghanistan (var. *Aitchisoni*

*) Dies gilt auch — für die noch ungenugend bekannte *S. hupehensis* C. K. SCHN., in Bull. l. c. 1906, von der ich nur Bl.-Expl., lg. WILSON No. 2082, W.-Hupei, sah. Die zur Bl.-Zeit spärlich ober. beh. und gewimperten, 6—8-paarigen B. anscheinend sehr variabel, inkl. Stiel 10—15 cm lang, B.chen wie Fig. 374 r, die oberen größeren zwischen 3:0,8—3,8:1,3 cm schwankend, Bl. klein, 5—6 mm Dm., vgl. Fig. 375 n n¹.

**) Schon HEDLUND hebt mit Recht hervor, daß lt. Zeichnung und fast aller Textangaben WALLICH nur diese und nicht *ursina* gemeint haben kann, wie HOOKER glaubte.

C. K. SCHN., l. c., durch Kaschmir und das angrenzende Tibet bis Kamaon und Simla verbreitete Art, im Gegensatz zur osthimalayischen *Wenzigiana* darstellte. Die Expl. der *cashmiriana* zeichnen sich aus durch: B. 8–10 paarig, bis 15 cm, an Löhden bis 12 paarig, bis 17 cm; Behen in Form und Serratur wie Fig. 374h–l.

Fig. 374. *Sorbus* [*Aucuparia*], je ein größeres Seiten-Bechen von: a Kurat, b Schwerini, c, c' *gracilis*, e *foliolosa*, c' var. *pluripinnata*, f *ursina*, g var. *Wenzigiana*, h *cashmiriana*, i dgl. vgl. Text S. 680, k Lohdentrieb, l var. *Aitchisoni*, m–n *microphylla*, o *Koehneana*, p–q *rufopilosa*, r *hupehensis*, s *Valmorini*, t var. *setschwanensis*, u–v [*Cormus*] *domestica* (1), n. (Gr.) (Original).

wechselnd, Beh. meist viel schwächer bis ganz kahl, z. T. aber *ursina typica* sehr ähnlich, das Bräunliche in der Jugend sehr vortretend (DUTHIE, No. 1085), Blst. klein locker, spärlich bis kaum beh., Bl. bis auf K. innen meist kahl, bis 15 mm Dm. (Fig. 375 m–m'), Gr. 3–5, Stb. $\frac{1}{2}$ – $\frac{2}{3}$ so lang wie C. Sollte eingeführt werden!

✱✱ Die Merkmale unter ✱ insgesamt nicht zutreffend*).

+ Bechen fast vom Grund aus fein und scharf sägezählig (Fig. 374 m–n, p–q), Bl. ca. 8–9 mm Dm.

*) Hier ist auch *S. Koehneana* C. K. SCHN., in Bull. l. c., aus Hupei zu erwähnen, die ich aber nur aus Fr.-Expl. lg. HENRY, No. 6766 kenne. Sie steht anscheinend *S. microphylla*, wie ich sie auffasse, am nächsten. Kn. braunlich beh., B. 8–10 paarig, bis 15 cm inkl. Stiele, Bechen ca. 2,8 : 0,7–0,8 cm (Fig. 374 o), obers. kahl, unters. auf Rippe wie Spindel locker zottig beh., z. T. leicht bereift, Zahnung fast vom Grund ab, + einfach, ziemlich grob und spitz; Neb. klein, z. T. bleibend; Frst. locker beh., Fr. kugelig, 7–8 mm Dm., anscheinend gelbrot, K. 1 aufr., Gr. 5. Wie es scheint, variiert *Koehneana* sehr, denn die Expl. GIRALDIS, No. 1083–86, 5118–20, 5123–24, 5253, 7173, die mit Ausnahme des letzten (mit Bl.-Kn.) + reife Fr. zeigen und aus N.-Shensi stammen, erinnern mit ihren 8–10 paarigen B. und den zwischen 15 : 5–24 : 8 mm schwankenden Bechen wohl sehr an *microphylla*, scheinen aber sonst *Koehneana* näher zu stehen. Vielleicht sind *microphylla* s. m. und *Koehneana* nur Varietäten eines von Sikkim bis Shensi verbreiteten Typs, vielleicht ist auch die Form aus Shensi wieder als besondere Var. zu betrachten, die fast in der Mitte zwischen den beiden anderen steht.

16. *S. microphylla* v: Höhe? (HOOKER spricht von einer „subscandent plant“); Zw.?, erst purpurn, dann schwarzgrau, kahl; Kn. spitz-länglich, ca. 8–10 mm, Sch. wenige, kahl, braunrot, locker, an Spitze die rostig beh. Bechen vorguckend; B. meist 12-paarig, ca. 10–12 cm lang (inkl. sehr kurzer Stiel), Rhachis leicht geflügelt, locker zottig, oberhalb unter Bechen mit Drüsen, Bechen 9:4 12:5 mm, fast sitzend o. sehr kurz gestielt (Fig. 374 m–n), oben sattgrün, kahl, unten an Bl.-Expl. locker zottig beh. und gewimpert, an Rippe z. T. rostig beh., grau, bereift, zieml. spitz und gleichmäßig kerbzähnig; Neb. klein, abfällig; Blst. wenigblütig, locker borstig (zur Frz. kahl), Bl. wie bei *rufopilosa* (Fig. 375 o–p); Fr. kugelig, 8–10 mm Dm., bereift, K. aufrecht.

S. m. DECNE., l. c. 159. 1874 (*Pyr. microphylla* WALL., Cat. No. 676. 1829 et HOOK. F., Fl. Brit. Ind. II. 376. 1878). — Sikkim, W.-Sz'tschwan. — Gebirge 3–4000 m. Wohl noch nicht in Kultur. An sie schließt sich eng an die

Fig. 375. *Sorbus* [*Aucuparia*]: *k–l ursina*: *k–k'* var. *Wenzigiana*: Bl.-L.-Schn. und C.; *l* Fr.-L.-Schn. von var. *typica*. — *n–n'* *hupehensis*: wie *k–k'*. — *m–m'* *cashmiriana*: wie *k–k'*. — *o–p rufopilosa*: wie *k–l*. — *q–r Vilmorini*: *q* Bl.-L.-Schn. und K.; *q'* C.; *q'* Frkn.-Querschnitte von unten bis Gr.-Grund; links neben *q'* zwei analoge Schnitte ohne Andeutung eines Zentralraumes; *r* Fr.-L.-Schn.; *s–t* var. *setschwanensis*: *s–s'* wie *q–q'*, *t* wie *q''* (Original).

aber doch wohl als eigene Art aufzufassende *S. rufopilosa* C. K. SCHN., in Bull. l. c., die von Nepal bis Sikkim vorzukommen scheint. B. gewöhnlich kleiner, zierlicher, bis 14-paarig, Bechen variabel (Fig. 374 p–q), oberseits bleibend locker zottig, unters. wie bei *microphylla*; Blst. z. T. beh., z. T. rostig zottig, Bl. wie Fig. 375 o (doch vgl. meine Arbeit l. c.), Fr. (unreif) wie *o'*, ± locker beh.

B. chen nur gegen Spitze fein gezähnt (Fig. 374 s–t). Bl. kleiner.

17. *S. Vilmorini*, lockerer etwas überhängender B., Zw. grau o. etwas rostig zottig beh., auch braungraue noch mit Haarresten; Kn. wie es scheint spitz kegeltg., ca. 7 mm, untere Sch. kahl, sonst rostig beh., ob klebrig?; B. recht zierlich 9–14-paarig, mit dem bis 2 cm langen Stiel bis 13 cm lang, Spindel geflügelt, locker beh., Bechen wie Fig. 374 s, 1,2–0,4–2–0,8 cm, mit deutl. aufgesetztem feinen Spitzchen, oben sattgrün, kahl, unten wenig heller, anfangs an Rippe hell o. rostig zottig, später fast kahl, Zähnung nur längs breiterer oberer

(Diese Art ist mir, da ich WALLICHsche Originale nicht sah und HOOKER in Fl. Brit. Ind. II. 376) auch das, was ich als *S. rufopilosa* abtrennte, mit darunter begreift, nicht ganz klar geworden. Jedenfalls weiß ich nicht sicher, ob die kahlen Fr.-Expl. aus Sikkim sicher mit den Bl.-Expl., lg. PRATT No. 234, aus Tachienlu (Sz'tschwan) zusammengehören.

**) Abb. in Frutic. Vilm. Cat. prim. p. 103. 1904/05.

Hälfte, wechselnd, fein und ungleich, Neb. klein; Blst. ziemlich klein, lockerbl., Achsen wie Bl.-Achsen rostig zottig, Bl. weiß (o. etwas rosa?), vgl. Fig. 375 q—q², C. aufrecht?, Stb. ca. 18—20, Gr. 3—4; Fr. wie r lebhaft hell rosenrot, etwas transparent, K. zusammenneigend.

Die oben beschriebene var. *typica* kenne ich nur aus kult. Expl. aus Hort. VILMORIN seminat. 8 et No. 4240. Ihr steht sehr nahe var. *setschwanensis* C. K. SCHN., in Bull. l. c., aus Sz'tschwan, lg. HENRY No. 8975. Hauptsächlich abweichend durch: B. bei einer Länge von nur 10 cm bis 17-paarig, B.chen (zur Blz.) nicht über 1,3:0,45 cm (Fig. 374 t), Form mehr linealisch, Spitze stumpf o. rundlich, Rhachis $\pm$ kahl; Blst. kahl, Bl. wie Fig. 375 s—t, Fr.?

S. V. C. K. SCHN., in Bull. l. c. (*Cornus foliolosa* FRANCH., in VILM. Frutic. Cat. prim. 102. 1904/5). — Yünnan. — Blz. Anf. VI. — Frz. X. — Sehr interessante verbreitungswerte Art.

Sekt. 2. *Cornus* [SPACH. Hist. Veg. II. 96. 1834. als Gattung]. Speierling: B. unpaar gefiedert, Fr.-Bau wie bei Art angegeben.

18. *S. domestica*: Habituell der *Sorbus aucuparia* sehr ähnlicher, z. T. noch etwas höherer $\mathfrak{b}$, junge Triebe graufilzig, $\cdot$ Zw. kahl o. gegen Spitze noch beh., olivgrün bis rotbraun, grau, Kn. klebrig, gegen Spitze meist beh.); B. 7—10-paarig, bis ca. 20 cm (inkl. Stiel), B.chen im Mittel 3,5:1,2—5:1,8 cm, zuweilen schmal, ca. 5,5:1,3 cm, gelegentlich aber bis 9:3 cm, vgl. Fig. 374 u—x, obers. nur jung spärlich beh., sattgrün, unters. weißlichgrün, oft bereift, zuletzt kahlend, anfangs wie Spindel und Blst. locker graufilzig-zottig, an Lgtr. Beh. z. T. bleibend, Zähnung meist schärfer und gröber als bei *S. aucuparia*, Neb. z. T. bleibend und etwas fiederspaltig; Blst. ca. 10—15(—20) cm Dm., Bl. ca. 15 mm Dm., Frb., wie Fig. 376 a, a² zeigt, fast ganz zu einem unterständigen Frkn. verwachsen (Scheidewände ungespalten, aber mit deutlichem zentralem Hohlraum, in der Fr. b) ist dieser oft sehr undeutlich und der Kernhausgipfel bildet sich wie bei *Hahnua* zu einem härtlichen soliden Kegel aus; die beiden Sa. jeder Frb.s ungleich hoch nebeneinander; Gr. 5, zuweilen innig verklebt, stark zottig zur Hälfte, Stb. 20; Fr. wie Fig. 376 b o. mehr rundlich, meist kleiner, gelb mit roten Backen, wenn teigig, genießbar.

S. d. L., Sp. pl. 477. 1753 (*Pyrus dom.* SM., Engl. Bot. V. 550. 1796; *Cornus dom.* SPACH. l. c.). L. G. wohl nur im S. von OÜ. wild, sonst htg. angepflanzt, Heimat im übrigen ganz S.-Eur. (bis S.-Frankr.?) und N.-Afr., Balkan, Kl.-As. (ob bis Persien?) Bes. Gebirgswalder. Blz. IV—V. Frz. X—XI. ROEMER, Syn. Mon. III. 162, führt eine Anzahl Fr. Formen auf, sonst scheint *Cornus* ein wenig variabler Typ., der wohl zur *Aucuparia*- wie zur *Hahnua*-Gruppe enge Beziehungen zeigt, bei alledem aber z. Z. ziemlich isoliert steht. Sichere Bastarde mit mit Arten dieser Gruppen sind meines Wissens nicht bekannt.

Sekt. 3. *Cormoaria* ZBL., im H. d. D. D. G. 1903. Scheinspeierling: Provisorische Sektion. B. einfach, vom *aria*-Typus, Fr.-Bau siehe unten.

19. *S. cuspidata* $\mathfrak{b}$ bis mittelgroßer $\mathfrak{b}$, junge Triebe schneeweißfilzig, $\cdot$ Zw. bis ganz kahl, purpurbraun, Lent. ∞ , fein, hell; Kn. dick eifg., kahl, noch weiter zu untersuchen; B. an spontanen Expl. jung meist auch obers. dick abwischbar filzig, an Kulturpfl. oben nur locker filzig, unten stets dick schneeweißfilzig, vgl. Fig. 37, a, Grund z. T. breitkeiliger und Spitze kurzer (mehr wie b), 10—12:23:11 cm, Zähnung einfach bis doppelt, ungleich, z. F. nicht lappig, 6—8—12 Hauptnervenpaare; Stiel 1—3 cm $\cdot$ filzig; Blst. dick weißfilzig, ca. 8—10 cm Dm. (wohl größer werdend), Bl. weiß, zuweilen fast sitzend, vgl. Fig. 376 c—e¹, C. langzottig, K. beiders. filzig, dgl. die 13—15 Gr. im unteren Teil, Stb. 25, Bl.- und Fr.-Bau anscheinend *Sorbus* (*Cornus*) *domestica* ganz analog, doch noch an lebendem Material nachzuprüfen, Fr. wie c², kugelig.

*) Vgl. meine dendr. Winterstudien Fig. 136 a—e, S. 133 und S. 157.

S. c. HEDL., Mon. I. c. 89. 1901 (*Pyrus vestita**) WALL., Cat. 679. 1829, nom. nud. [et HOOK., Fl. Brit. Ind. II. 375. 1878; *Crataegus cusp.* SPACH, Hist. Veg.

II. 106. 1834; *Aria vestita et cuspidata* ROEM., Mon. Ros. III. 125. 1847; *Sorb. crenata* K. KOCH, Dendr. I. 196. 1869; *Aria lanata* DECNE., in Nouv. Arch. Mus. Paris X. 163. 1878; *Cormus lanata* KOEH., Gatt. Pomac. 23. 1890; *S. nepalensis* HORT. NONN.). — Garhwal, Nepal**). — Gebirge, 2 bis 3000 m. — In Kultur sehr selten. Vgl. LINDLEY, in Bot. Reg. t. 1655. 1835 (sub *Pyr. crenata* LDL., non DON) und Gard. Chron. 1874, p. 16. Ich sah nur Expl. in Herb. ZABEL, doch man vgl. FROEBELs Notiz in Mitt. D. D. Ges. 1905. 49.

19×22 *S. cuspidata* × *aria*: Soll nach HEDLUND (brieflich) im Bot. Garten in Kopenhagen vorkommen.

Fig. 376. *Sorbus*: a—b [*Cormus*] *domestica*: a Bl.-L.-Schn. und K.; a¹ C.; a² Frkn.-Q.-Schn. (Mitte); b Fr.-L.-Schn. — c—c² [*Cormoaria*] *cuspidata*: c Bl.-L.-Schn.; c¹ C.; c² Fr.-L.-Schn. — d—e [*Hahnia*] *Hedlundii*: d Bl.-L.-Schn.; d¹ C.; d² Frkn.-Q.-Schn. (Mitte); e Fr.-L.-Schn. — f—h¹ *subfusca*: f—g wie d—d¹; h Fr.; h¹ deren L.-Schn. (Original).

Sekt. 4. *Hahnia* [Medic., Gesch. d. Bot. 81. 1793 als Gatt.] (*Pyrus* Sekt. *Aria* DC., Prodr. II. 635. 1825 et Sekt. *Torminaria* DC., l. c. 636), Mehlbeerbaum: B. einfach, ungeteilt o. — lappenzählig o. gelappt, höchstens unterstes Lappenpaar völlig fiederartig abgetrennt. Gr. 2—5, fast stets an Basis verwachsen. Frb. meist zentral völlig verwachsen (seltener dort in verschiedener Höhe ein sich nach oben und abwärts schließender + entwickelter Spalt, vgl. Fig. 378i und 380s²), die Spaltung der Frb. beginnt in den Scheidewänden (Fig. 378b, d) oder zwischen je 2 Frb. und der Bl.-Achse (Fig. 378h), schreitet nach auf- und auswärts vor und umgreift von den Seiten allmählich dorsal die Frb., doch ist die dorsale Verwachsung mit Bl.-Achse variabel und kommen zuweilen

*) KOEHNE zieht die *Pyrus vestita* WALL., indem er sie mit *P. lanata* DON identifiziert, als *Cormus lanata* zu dieser Gattung. Ich fasse *P. lanata* (gleich HOOKER) anders auf (s. S. 691) und da *vestita* WALL. ein Nomen nudum, nehme ich gleich HEDLUND für vorliegende Form SPACHs *cuspidata* auf.

**) Zwei Expl. aus Sikkim, von denen das eine (Herb. Sikk. ANDERSON, No. 497) mit etwas schlechten Fr. versehen war, das andere mit noch schlechter erhaltenen Bl. auf einem Spannblatt mit einem Fr.-Zw. von *S. Hedlundii* sich befand (lg. HOOKER 9—10000'), gehören vielleicht zu einer im Bl.-Bau *Hedlundii* analogen, in den B., deren Nerven unters. schon zur Blz. stark kahlen, *cuspidata* sehr ähnlichen neuen Art. Sie maßen bis 20:14 cm, Stiel bis 1,5 cm.

völlig unterständige Frkn. zustande, freie Frb.-Spitzen demnach länger o. kürzer, meist eine solide Kuppe zur Frz. bildend*).

A. Gr. 3–5. B. groß (Fig. 377b), unten dick gelbweißfilzig. Rippe und Nerven aber rostbraun zottig beh., sich sehr scharf abhebend.

20. *S. Hedlundii*. Wohl ♂, habituell *S. cuspidata* recht ähnlich, junge Triebe weißgrau filzig, — fast kahlend, rotbraun; Kn. kugelig-eifg., ca. 8:6–7 mm (ob nur Bl.-Kn.?). B. derb, Grund — spitzkeilig o. mehr rundlich mit plötzlich vorgezogener Spitze, Spitze kurz zugespitzt, bis 16:10 o. 24:11 cm. Rand ungleich und z. T. etwas kurzlappig kerbsäsig, Nervenpaare 12–14, Obers. tiefgrün, jung etwas flockig rostfarben filzig, bald kahlend bis auf Nerven, die auch — drüsig, Unters. wie oben angegeben; Stiel anscheinend nur ca. 1 cm; Blst. (hell- und rostfarben filzig-zottig (zur Frz. stark verkahlend), dgl. Bl.-Achse und K. beiders., C. rosa (?), kahl, länger als die ca. 18 Stb., Gr.-Grund beh., Sa. — ungleich hoch inseriert, Fr. kugelig, anscheinend bereift und gepunktet, K. wohl zurückgebogen, sonst vgl. Fig. 376d–e.

S. H. C. K. SCHN. (*Aria crenata* DECNE., ex p.). — Sikkim (lg. HOOKER 9–10000', als *Pyg.* *Aria* var. *crenata* [ex p.]; lg. ?, Tonglo; lg. Dr. Kings Collector, Singalelah, June 1887). — Noch nicht in Kultur. Durch die zweierlei Beh. der B.-Unters. sehr gut gekennzeichnet.

B. Gr. 2–3. B. meist kleiner o. wenigstens Beh. anders und Nervenpaare meist kaum über 12**).

I. B. von Anfang an fast ganz kahl, mit plötzlich aufgesetzter kurzer Spitze und 10 Nervenpaaren im Mittel (Fig. 377c), Blst. höchstens im Anfang locker borstig beh.; freier Teil der Bl.-Achse und K. zur Frz. abfallend.

21. *S. subfusca*: ♂ (ob auch ♀?); ♂ Zw. kahl o. nur spärlich borstenhaarig, rotbraun, kantig, mit ∞ hellen feinen Lent.; Kn., wie es scheint, stumpf länglich eifg., kahl und etwas klebrig; B. an der sonst — gerundeten Basis kurz keilig vorgezogen, oben sattgrün, jung auf Nerven und bes. Rippe — locker zottig beh., dann kahl, nur verstr. drüsig, unten hellgrün, nur jung — achselbärtig, Textur dünn, Serratur über Mitte doppelt, spitz kurzlappig, mittlere Größe 10:6 cm (Frzw.), Stiel 10–14 mm, jung borstig beh.; Blst. ca. 5–6 cm Dm., Bl. weiß, vgl. Fig. 376f–g¹, Bl.-Achse oft kahl, K. nur innen beh., C. dgl. am Grunde, — mal länger als die 20 Stb., Gr. 2, bis fast zum behaarten Grunde frei, Frkn. fast unterständig; Fr. rot, mit feinen hellen Lent., unreif elliptisch, später wohl wie h–h¹.

S. s. BOISS., Fl. or. II. 658. 1872 (*Crataegus subf.* LEDEB., in Bull. Ac. Petersbg. II. 313. 1837; *Sorb. aria* var. *glabra* ALBOFF, Fl. colch. 71. 1895). — Transkauk.: Gourie (lg. ALBOFF, No. 224, 225 et 278; lg. ARDASENOFF 1893). — Gebirge 1850–2000 m. — Blz. VI. — Höchst interessante Art, die durch die ringnarbigen Fr. und auch sonst gut gekennzeichnet ist und deren verwandtschaftliche Beziehungen mir noch unklar sind. Vielleicht schließt sie sich an die *Micromeles*-Gruppe an. ALBOFF unterscheidet l. c. noch weitere Formen, die HEDLUND nicht gekannt hat, von denen ich noch 2 sah. So die *S. aria* var. *velutina* ALB., l. c. 71 (Circassien, Abchasien; lg. ALBOFF, No. 98, 99 et 448), ausgezeichnet durch sehr derbe, breit rundlich-elliptische o. rundlich obovale B., 8:5,5–10:8–8,5 cm (Fig. 377d), die oberseits nur anfangs auf den 8–11 Nervenpaaren und

*) Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, Subsekt nicht abzutrennen, deren man wohl mindestens 4 festhalten mußte. Allein die nach meinen Beobachtungen vorhandene Variabilität der hier unter *Hahnia* vereinigten Arten im Bl.- und Fr.-Bau läßt noch viele eingehendere Untersuchungen wünschenswert erscheinen, ehe wir feste Gruppen formulieren. Man beachte auch meine Anm. auf S. 667.

*) Bis 14 Nervenpaare finden wir bei der noch unvollkommen bekannten *S. Zahlbruckneri* C. K. SCHN., in Bull. Herb. Boiss. 1906, aus Sz'tschwan, HENRY, No. 7021. (♂) Zw. fast kahl, purpurn, Kn. spitz-spindelfg., ca. 7 mm; B. dünnlederig, oben glänzend grün mit spärlichen Resten einer zottig. Beh., unten weißlich graugrün, mit reichlicheren Haarresten, 10–14 sehr scharf hervortretenden Nervenpaaren (Fig. 379v, S. 690), Rand kurz und spitz lappenzähnig, 6,5:3,5–10:5 cm, Stiel 10–14 mm; Frst. noch locker beh., — warzig, klein, Fr. 2-fächerig, wie Fig. 380a–a², ihr Stiel — kurzer als Fr. Der K. dürfte nicht abfallen, da Fr. fast reif, sonst konnte man an eine *Micromeles* denken.

der Rippe lockerzottig und bedrüst, unters. aber bleibend dick gelb- o. weißgrau-
tlig sind. Serratur kaum lappig, o. teine Lappung und Zuspitzung mehr stumpf-
lich, Stiele dick, filzig, kaum über 12 mm; Bl. 2, Frst. filzig, Fr. anscheinend
in Form analog *subfusca*. Ich führe diese Form vorläufig als Art: *S. velutina*.
Ob sie durch *S. aria* var. *concolor* BOISS., Fl. or. II. 685. 1872, aus Laristan (lg.
BALANSA, Djemil, No. 296), zu der ALBOFF, l. c., auch Expl. aus Abchasien und
Samurzakamien zieht, sich mit *subfusca* verknüpft, ist mir noch unsicher. Ich gebe
zu, daß das Fr.-Expl. von BALANSA in Blattform, -Beh. etc. intermediär scheint und
möchte nicht gleich an eine Hybride denken, doch dürfte der Formenkreis von
subfusca sens. latiss. sich in Transkauk. vielleicht in eine größere Anzahl kleiner Arten

Fig. 377. *Sorbus*-B. (meist Sekt. *Hahnua*): a *cuspidata* — b *Hedlundii* — c *subfusca* — d *velutina* — e — o *aria*; e — g var. *typica*; h — i var. *adulsa*; k var. *incisa*; l var. *majestica*; m var. *cyclophylla*; n dgl.? (vgl. Text S. 688); o var. *salicifolia* — p *obtusifolia* — q — r *bellojonensis* — s — t *intermedia* — u — v *Mougeotii*; w var. *austriaca* ($\frac{1}{3}$ n. Gr.) (Original, nur p nach HEDLUND).

(o. Subspec.) spalten. Die B. der *S. concolor**), wie ich diese Form einstweilen
nenne, maßen ca. 10:7—11:8 o. 12:7.5 cm, Nervenpaare 8—11. In diesen Kreis
gehört wohl auch die kahle armenische *Aria Szovitsii* DEGENE, in Mem. l. c. 165.
1874, allein alle Expl. von SZOVITS, die ich bis heute sah, gehörten zu anderen
Arten.

II. die unter I gegebenen Merkmale insgesamt nicht zutreffend.

a) C. weiß, ausgebreitet, bez. zurückgeschlagen, kaum genagelt
(ausgen. die sehr seltene No. 26) (Gruppe *Aria* s. str.).

1. B. nicht wie in Fig. 383c—h, S. 697.

*) Wozu *S. aria* var. *subtomentosa* ALB., l. c., nach dem mir vorlieg. Expl.
No. 116 aus Circassien vielleicht als Synonym gehört.

C B. breiter o. schmaler elliptisch, meist beidendig kurz zugespitzt, selten rundlich und stumpf, unters. dicht weiß- o. grauweißfilzig. Zähnung ganz ungelappt o. die seichte Lappung wie bei i. k. Nervenpaare 8—12, ziemlich steil und genähert (Fig. 377 e—o).

22. *S. aria*: Pyramidal kroniger $\text{b} - \text{b}$, bis über 10 m; junge Triebe weißgrau filzig, $\odot$ Zw. meist nur gegen Ende noch beh. (Kztr. reichlicher), rund, rot-olivbraun, Lent. mäßig ∞ ; Kn. olivgrün o. $\pm$

Fig. 378. *Sorbus* [Habnia]: a—e¹ *aria*: a Bl.-L.-Schn. und K.; a¹ C.; b Q.-Schnitte durch Frkn. bis Gr. (a— η von unten nach oben) c dgl. mit Zentralspalt!; d dgl. bei 3-fäch. Frkn.; e Fr. im L.-Schn.; e¹ im Q.-Schn. — f—g *umbellata* var. *flabellifolia*: Bl.-L.-Schn., C. und Fr.-L.-Schn. — h—i *intermedia*: h Fr.-Q.-Schn. bis Gr.; i Fr.-L.-Schn. mit Spaltung β in Scheidewand α . — k—l *Mougeoti*: wie f—g (Original).

gebräunt, spitzeifg., meist nur Sch.-Ränder filzig. klebrig^{*)}: B. variabel, ca. 6:4—14:8—9 cm. Grund meist breitkeilig, ober. rasch bis auf die beh. und Drüsen tragenden Nerven kahlend, satt- und leicht glänzend grün. Textur derb, aber nicht zu dick: Stiel 1—2 cm. filzig: Blst. gleich Bl.-Achsen und K. (innen spärlicher) weißfilzig, zur Frz. verkahlend, Gr. 2, selten 3. Gyn. zuw. mit Spaltung der Scheidewand wie bei *terminalis* (Fig. 378 c), sonst Bau wie b o. d. Bl. vgl. a—a¹. Fr. e e¹, orange- o. scharlachrot, mit ∞ hellen Lent., Fleisch geädert, mehlig, fad.

Ich halte vorläufig fest: var. a. *typica*: B. höchstens 2:1, Form und Größe zwischen Fig. 377 e—g schwankend. Zähnung fast o. ganz lappenlos: hierher ? *parvula*: eine sehr kleinblättrige Kulturform, B. 3,5:2—6:4,3 cm, Stiel bis 1,8 cm. — var. b. *incisa* REHB., Fl. Germ. ex. 628, 1832 (*S. incisa* HEDL., Mon. 1 c. 82, 1900), B. von etwa Mitte ab nach oben zu seicht gelappt, Lappen gegen Spitze wieder kleiner werdend, also nach oben wie unten etwas abnehmend (Fig. 377 k), sonst wie a, wovon vielleicht bloße Form. Ich sah Expl. aus den allerverschiedensten Gegenden. — var. c. *edulis* WENZ. in Linnaea 1874, 54 (*Pyrus edulis* WILLD., Enum. pl. Berol. 527, 1800; *Pyr. aria* β . *acutifolia*), Prodr. II. 636 1825; *S. edulis*

*) Vgl. meine Dendr. Winterstudien, Fig. 167 e—i, S. 164 und S. 179.

*) WENZIG und auch KOEHNE (Herb. Dendr., No. 130) zitieren als Synonym *Pyr. intermedia* β . *angustifolia* DC., l. c., die mir unklar ist. Die *acutifolia* DC. dagegen ist durch die von DC. zitierte Abb. aus DICH., ed. 2. IV, t. 34, klargestellt.

K. KOCH, Dendr. I. 195. 1869; *S. longifolia**) HEDL., Mon. I. c. 82. 1901): B. auffallend in die Länge gezogen, über 2:1, von ca. 7:3,4—14:6 cm, bald seicht, bald ; kurzlappenzählig (Fig. 377 h—i), tritt ebenfalls an ganz verschiedenen Orten wild auf (z. B. Krain, Siebb., Pyrenäen). — d. *majestica* ZBL., im H. d. D. D. G. 198. 1903 (*Aria maj.* LAV., Arb. Segr. 98. 1877, nom. nud.; *Hahna aria* v. *maj.* DIPP., Laubholz. III. 374. 1893): B. breitelliptisch (Fig. 377 l), 12:6—15:10 cm, Stiel bis 2,5 cm, sonst wie Typ, doch Fr. etwas größer. Ich besitze Orig.-Zw. aus Hort. SIM.-LOUIS, soviel ich urteilen kann, handelt es sich nicht um eine Form aus Nepal, sie wird nur hlg. mit *S. cuspidata* verwechselt **. — e. *cyclophylla* (*Aria nivea* f. *cycl.* BECK, in Ann. Holmus. Wien 1896. 47): B. fast kreisrund (Fig. 377 m), 7—10,5 cm Dm.; von BECK, dessen Orig. ich sah, in Bosnien bei Sarajewo gefunden. Aus Ungarn. Com. Árva, lg. DEGEN, 7. V. 1904, sah ich recht Analoges, und ich glaube, daß auch die Expl. lg. RICHTER No. 480 (Krassó-Szörény megye) das gleiche darstellen. Noch näher zu beobachten. Ähnliche, wenn auch nicht ganz so großblättrige Formen treten in den Abruzzen (Majella) und in Spanien (Sierra Nev.), vgl. Fig. 377 n, auf. Ob diese nun zu *aria* o. zum *umbellata*-Kreise gehören, ist mir noch unsicher. — f. *salicifolia* MYRIN, in HARTM., Skand. Fl. ed. 3. 116. 1838 (*Sorb. salicif.* HEDL., Mon. I. c. 78. 1901): B. an var. *edulis* gemahnend, aber Grund + scharfkantiger, Zähnung gröber, fast nur über Mitte deutl., 6:2,5 bis 11,5:6—7 cm, Nervenpaare 7—9; Bornholm, S.-Schwed., S.-Norweg., sowie nach HEDL.***) Großbrit. — g. eine Reihe anderer Gartenformen, die als var. *lutescens*, *chrysophylla*, *aurea*, *nepalensis*, *carpinifolia* usw. gehen, konnte ich vorläufig nicht sicherstellen. Ebensowenig die *Pyrus aria* var. *undulata*, *angustifolia*, *rugosa* und *bullata* LDL., in Hort. Trans. VII. 234/6. 1830.

S. a. CRANTZ, Stirp. austr. fasc. I. 46. 1762, ex p. (*Crataegus aria* a L., Sp. pl. 475. 1753 ex p.; *Pyr. aria* EHRH., Beitr. Naturk. IV. 26. 1789; *Hahna aria* MED., Gesch. d. Bot. 81. 1793; *Aria nivea* HOST, Fl. austr. II. 7. 1813). — Gemeine Mehlbirne. — I. G. verbreitet, sonst fast ganz Eur. (ausgen. hohen N.), im SW. bis Teneriffa gehend, in Griechl. wohl fehlend, dgl. in As! Vgl. auch die var. — Liebt kräftige, bes. kulturreiche Böden und offene sonnige Standorte, bes. an steinigen Hängen der Hügel- und Bergregion, steigt bis ca. 1600 m, in den Voralp. und im Schweizer Jura durch *Mougeoti* vertreten. Blz. V(—VI). — Frz. IX—X. — Schöner Zier- β , aber forstlich fast ohne Belang. — Der Formenkreis†) bedarf noch sehr des Studiums, indem die von HEDLUND begonnenen Untersuchungen sehr erweitert und vertieft fortgesetzt werden müssen.

? 22 < 26 *S. aria* $\times$ *intermedia*. *S. Conwentzii* (*Pyr. Coma*, GRAEB., in Schr. Naturf. Ges. Danzig n. F. IX. 1. 368. 1896). Über diese von GRAEBNER als *aria* $\times$ *suecica* betrachtete Form bin ich mir noch im unklaren. Die Orig. im Hb. Berlin stammen aus dem Berl. Bot. Garten und zeigen keine Bl. GRAEBNER bemerkt dazu: Bl. gänzlich unfruchtbar, alle Frkn. abgefallen. Andere von ihm als *Conwentzii* bezeichnete Expl. gehören sicher zu *S. Mougeotii*.

22 > 28 *S. aria* $\times$ *Mougeoti*: dürfte vorkommen. Aber noch nicht sicher nachgewiesen. Ich sah in Herb. DEGEN eine *S. carpatica* BOBB., die vielleicht dieser Kombination entsprechen könnte. Nach HEDLUND (brieflich) soll auch seine *S. arioides* (non MICH.) solch ein Bastard sein. Er sandte mir Expl. von der Hohen Schnärz b. Kayzersberg (Lothr.).

22 < 30 *S. aria* $\times$ *terminalis*: *S. decipiens* HEDL., Mon. I. c. 98, exkl. Syn. ex p. (*Crat. hybrida* Bechst., Diana I. 81. 1797; *Pyr. decip.* BECHST., Forstb. ed. IV a I. 321. t. VII. 1821 [nach HEDL. schon 1810, p. 236 et 614]; *Pyr. acutiloba*

*) Was *Sorb. aria* β . *longifolia* PERS., Syn. II. 38. 1807 (styli 2—4) darstellt, weiß ich nicht. Jedenfalls muß der Name *edulis* W. vorangestellt werden. WENZIG und KOEHNE (siehe vorherg. Anm.) zitieren fälschlich *oblongifolia* PERS., doch gehört die *Sorb. oblongifolia* RCHB., Exs. No. 2252, hierher.

**) Sollte nicht die *Aria Decaisneana* LAV., Arb. Segr. 61. tab. 18. 1885, mit der *majestica* identisch sein?

***) Nach briefl. Mitt. stellt HEDLUND jetzt *S. oblongifolia* RCHB. nicht mehr hierher. — Von *S. obtusifolia* HEDL., I. c. 80 (*Pyr. aria* var. *obtus.* DC., Prodr. II. 636. 1825) aus S.-Skandinavien, die mir der typ. *aria* sehr nahe zu stehen scheint, konnte ich mir noch kein richtiges Bild machen. Vgl. Fig. 377 p (nach HEDL.) o. auch fast wie e. nur ; breitelliptischer. — Eine ziemlich lokale Form aus S.-Frankreich (cott. Alp., Cevennen 2200 m, lg. GANDOGGER 31. VIII. 1875) scheint *S. bellojocensis* GANDOG., Fl. Lyonn. 89. 1875, mit kleinen B. wie Fig. 377 q—r zu sein. HEDLUND identifiziert sie ohne weiteres mit der unklaren *S. aria* var. *carpinifolia* KIRCHN., Arb. Musc. 298. 1864, und nennt sie *S. carpinifolia*.

†) Ich weise noch auf die in Böhmen (Schloßberg Teplitz, Milleschauer) sich findende der *S. umbellata flabellifolia* auffällig ähnelnde, mir noch fragliche Form hin.

ILSE, Fl. Mittelthür. 100. 1866; *Pyr. latif.* var. *acut.* IRMISCH, in Jahrb. Bot. Gart. Berlin 1881. 2331. Soweit ich mir ein Urteil über diesen Bastard bilden konnte, weicht er von der *latifolia* (s. S. 694) ab durch unters. weißgrau beh., im Herbst dünnere, kahlere, größere, an Kztr. bis 18:15 cm messende, etwas länger und dünner gestielte [bis 3,5—4 cm] B., die 6—9 Paar Nerven haben und in der Form meist breit-oval sind (Fig. 381 l—m, S. 695). Leider verbietet mir der Raum, die fraglichen Hybriden und ihre verworrene Nomenklatur ausführlicher zu behandeln. Man kann *decipiens* als *aria typica* $\times$ *torminalis* auffassen und muß dann, wo andere *aria*-Formen auftreten, natürlich etwas abweichende Kombinationen erhalten. Was GREMLI unter seiner *P. confusa*, Fl. anal. Suisse éd. 5, 229 (trad. VETTER), ex ROUY et CAMUS verstanden, weiß ich nicht. In seinen Neue Beitr. Fl. Schw. III. 9. 1883 findet sich keine Beschreibung, und in seiner Exkursionstl. Schweiz, S. Aufl. 1896. 175, steht *confusa* als Synonym der als Bastard angesprochenen *latifolia*.

22 $\times$ 33 *S. aria* $\times$ *chamaemespilus*: wohl auftretend, aber meist werden *S. Hostii* und *S. chamaemespilus*-Formen als solche Hybriden ausgegeben.

22 $\times$ 31 *S. aria* $\times$ *arbutifolia*: *S. alpina* HEYNH., Nom. Bot. II. 684. 1846 (*Pyr. alp.* W., Enum. 527. 1809; *Aronia densiflora* SPACH, Hist. veg. II. 88. 1834; *Aronia Willdenowii* ZABEL, im H. d. D. D. G. 193. 1903). Von *aria* durch kleinere, drusig gezähnelte B., kleinere Bl. und Blst. etc. meist leicht zu scheiden: ihr näher stehende Formen, wie ich sie im Herb. ZABEL sah, weichen bes. in der B.-Nervatur ab: von *arbutifolia* durch z. T. größere, mehrnervige, weniger eng und drusig gezähnelte B. (Fig. 685 f—h, S. 699), meist nur 3—4 griffelige größere Bl. zu unterscheiden. Wird auch höher, Zw. kräftiger. Von *S. Dippelii* durch die rein-roten Fr. und die nicht verkahlenden B. und Frst. abweichend.

22 $\times$ 34 *S. aria* $\times$ *melanocarpa*: *S. Dippelii* ZABEL, im H. d. D. D. G. 193. 1903 (*S. alpina* et *Aronia alpina* AUCT. et HORT. ex p.). In 2 Formen bekannt: var. *typica*: B. etc. ähnlich *S. alpina*, aber zuletzt — bis fast ganz kahlend, dgl. Frst., Fr. schwarzviolett. — var. *superaria* (*Aronia alp.* var. *superaria* ZABEL, in DIPP. Laubh. III. 384. 1893): B. größer (Fig. 385 i, S. 699), an Lgtr. bis 12:6 cm, alles *aria* ähnlicher, doch Stiele kürzer, Nerven weniger ∞ , Charakter der Beh. abweichend, Blst. wie *aria*, aber vor allem Gr. meist 3(—4).

CC B. nicht wie unter O., entweder mehr rundl. o. stärker gelappt (vgl. Fig. 370 c, S. 675, sowie Fig. 379 a—n, Fig. 381 c—k, S. 695 und 383 a—b, S. 697).

B. — rundl. o. aus keiligem Grunde breit verkehrt-eifg., Stiele meist nicht über 10, jedenfalls nicht über 15 mm.

23. *S. umbellata*: b $\frac{1}{2}$, z. T. wohl kleiner $\frac{1}{2}$, Zw. und Kn. vgl. *aria*, nur filzige Beh. z. T. reichlicher; B. obers. bis auf die leicht zottig bleibenden, etwas bedrüsten Nerven sehr bald kahl, glänzend lebhaft olivgrün, unters. weiß- o. hellgrau filzig, Textur derb, sonst vgl. var.; Blst. bis etwa 8, zur Frz. bis über 10 cm Dm., erst weißfilzig, dann — verkahlend, Bl. weiß, K. beiders. filzig, C. innen am Grunde beh., sonst vgl. Fig. 378 f—g, Fr. rundlich o. rundlich elliptisch (g), orange- o. scharlachrot, vgl. var.

Ich unterscheide —: var. a. *flabellifolia* (*Crataegus flabellif.* SPACH, Hist. Veg. II. 103. 1834; *Ara flab.* ROEM., Syn. III. 127. 1847; *Sorb. flabellif.* SCHAUER, in Allg. Gartenztg. 1847. 84 teste HEDL.; *Sorb. aria* var. *flabellifolia* WENZ., in Linnaea 1874. 55; *Hahnia aria* var. *flab.* DIPP., Laubholzsk. III. 375. 1893). B. vgl. Fig. 379 a—d, Nervenpaare 4—7, fast sämtlich in kurze Lappen auslaufend, im

7. Nach briefl. Mitt. (7. I. 1906) halt HEDLUND *decipiens* jetzt für einen Bastard. Seine *S. rotundifolia*, Mon. I c. 104, wird also Synonym. Was er als *S. incana*, l. c. 105, ebenfalls als diesen Bastard führt, scheint mir nach Originaten eine der var. *cinerea* sehr annähernde *latifolia*-Form. Seine *S. dubia*, l. c. 96, die er im Herbar mit als *Mougeoti* $\times$ *decipiens* bezeichnet, möchte ich nur für *decipiens* nehmen.

**) ZABEL hat diese Form schon früher (1878) auch als var. *grandifolia* geführt, doch ist nur *superaria* mit Beschreibung publiziert.

1) Nach HEDLUND waren *umbellata* und *arctica grandifolia* durch eine ganze Reihe guter Merkmale geschieden, allein das reiche Material, was ich durchsah, brachte mich vorläufig nur zu der Überzeugung, daß wir hierin nur eine Art zu sehen haben, in der 2 Hauptformen vorherrschend auftreten, die aber wohl auch sonst noch enger lokalisierte, doch schwer zu charakterisierende Formen entwickelt. Weder in der Nervenzahl und Lappung der B., noch in Farbe und Form der Fr. o. dem Verhalten des Fr.-K. und Frb.-Gipfels fand ich konstante Verhältnisse.

Mittel ca. 5:3,5 - 7:5,8 cm; ich sah Expl. aus Istrien (fragl.), Albanien, Bulgar., Rumel., Griechl., Kreta, Sizil., Etrusk., Apenn., S.-Rußl. (Taurien), Cilic., Syrien, Phrygien, Taurus, Pontus, Tiflis. var. b. *cretica* (*Pyr. aria* var. *cretica* LODD., in Trans. Hort. Soc. Lond. VII. 236. 1830; *Crataegus graeca* SPACH, l. c. 102; *Aria graeca* ROEM., l. c. [et DECKE, 1874]; *Sorb. aria* var. *graeca* K. KOCH, Dendr. I. 102. 1869),

Fig. 379. *Sorbus* [*Hahnua*]: normale B. von Blzw.: a—d *umbellata* var. *flabellifolia*; e—k var. *cretica* [k die fragl. Form aus Ungarn!]; l—m var. *Baldacca*; n die Cappadocische Form, Text S. 691. — o *persica*. — p—q die fragl. *persica*, Text S. 694. — r *armeniaca*. — t die fragiliche pontische Form, Text S. 693; t—u *turkestanica*. — v *Zahlbruckneri* (alles knapp $\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

[et WENZIG, l. c. 1874, sed BOISS. 1872 tantum ex p.]; *Hah. aria* v. *graeca* DIPP., l. c.; *S. cretica* FRITSCH, Sched. ad Fl. exsicc. Austr.-Hung., No. 2448. 1896). B. vgl. Fig. 379 e—i. Nervenpaare 6—11, Lappung $\frac{1}{2}$ null, im Mittel 5:4—9:7,5 cm; ich sah Expl. aus Ungarn (vielleicht besondere Form [k], vgl. auch Anm.*), Bosnien

*) *Pyr. graeca* LODDIGES, Cat. 26. 1816, o. *Sorb. aria* v. *graeca* LODD. (teste KOEHNE), ist nur ein gartn. Katalogname, der nicht akzeptiert werden kann. Gemäß den Wiener Beschlüssen muß der Varietätsname *cretica* [den LODD. als den damals bekannteren Gartennamen akzeptiert hat] bleiben, wenn man, wie ich, diese Form nicht als Art führt. Als Art heißt sie *S. graeca* (SPACH) HEDL. Ich hatte das bei der Bestimmung der Herbarexpl. erst nicht beachtet und habe in Herb. Berlin u. a. viele Expl. als *S. umbellata* var. *graeca* etikettiert.

*) GRISEBACHS *Sorb. aria* v. *graeca*, Spicil. Fl. Rum. I. 93. 1843, bezieht sich auf var. a.; KOCH spricht von *graeca* nur als von einer Form, so daß man kaum (wie KOEHNE 1893) *S. graeca* K. KOCH zitieren kann. KOEHNE führt auch eine *Aria obtusifolia* DC., doch DC. beschreibt Prodr. II. 636. 1825, nur eine *Pyr. aria* var. *obtusifolia*, die laut Zitat Fl. dan. t. 302, nur eine *S. aria*-Form ist. Siehe auch S. 688.

**) Besondere Formen der var. *graeca* stellen vielleicht noch dar die Expl. lg. SINTENIS, No. 5128, Paphlagonien — ferner vor allem aus Transkauk., lg. ALBOFF, Tschernomorsky, No. 436, dgl. Mingrelien, No. 327 (B. z. T. breit fächerfg., fast breiter als lang), dgl. Adjarien, No. 283 und lg. LOMAKIN, Imeretien, No. 2, 17 — dann lg. POST, N.-Syrien, No. 310 — auch die sudspanische Form lg. HUT., PORT. et RIGO, No. 1098, ist ähnlich wie die ungarische wohl etwas abweichend — ebenso lg. BALANSA, Lasistan, No. 297.

(draglich), Albanien, Bulgarij, ob wie Ungarn?), Griechl., Sizil., Kreta²), Cypern, Troja, Paphlag., Bithynien, Pontus, Armenien. — var. c. *Baldaccii* (Sorb. *Bald.* DEGEN et FRITSCH in Herb.) aus den Gebirgen Albaniens (lg. BALDACCII, No. 128, summo jugo m. Cepin), B. wie Fig. 3791 m, aus keiligem o. fast rundl. Grunde ellipt. o. längl. ellipt., zugespitzt o. stumpflich, Nervenpaare ca. 6, grob, etwas stumpflich-lappig gezähnt, Textur und Beh. wie Typ. 3,5 : 1,8 : 6,5 : 4 cm, Stiel 9—13 mm, Bl. ?, Frst. nur 2—4-früchtig, Fr. unreif. Ähnlich aber im Mittel etwas breitblättriger ist lg. DEGEN, Croat. in jugo Oltare, 13. VI. 1892. Var. c. bedarf weiterer Beobachtung. Ähnliche B.-Form, aber spitzere B. (4 : 2—5,5 : 2,5 : 3,2 cm) mit spitzerer Zähnung (Fig. 379 n) und kürzere Stiele finden wir bei lg. SIEHE, Cappadoc., No. 319, Schlucht über Assendjik, 2000 m. Scheint auch lokale Var. Nervenpaare bis 8.

S. u. FRITSCH, in Sched. Fl. exsicc. Austr.-Hung., No. 2449, 1896 emend. (*Crataegus umb.* DESF., Cat. Hort. Paris ed. III. 408. 1829; *Pyr. meridionalis* GUSS., Syn. Fl. sic. II. 831. 1844; *Sorb. mer.* FRITSCH, in Sched. Fl. exsicc. Austr.-Hung., No. 2447. 1896). — Südliche Mehlbirne. — Heimat unter var. — Liebt ähnliche Orte wie *S. aria*. — Blz. V—VI. — Frz. IX—X. — Var. a und b seit langem in Kultur, doch selten.

- * * B. größer, l. elliptisch, vom unteren Drittel ab l. gelappt o. am Grund gefiedert (Fig. 370 c, S. 675 und Fig. 377 s—w, S. 686), o. mehr rundlich, z. T. kaum gelappt (381 e—k, S. 695), o. groß wie Fig. 383 a—b, S. 697, Stiele im Mittel länger.
- + B. wie Fig. 383 a—b, S. 697, im Mittel kaum unter 10—11 cm lang, Nervenpaare 10—14, C. ± lang genagelt, Fr. ca. 20 : 18 mm.

24. *S. lanata*: b o. mittelhoher $\mathfrak{H}$, junge Triebe graufilzig, *) kahl o. kahlend, kirschrotbraun, mit ∞ feinen hellen Lent., Kn. kurz und stumpf eifg. o. eirundlich, fast kahl, wenig schuppig; B. oberseits selbst jung spärlich beh., dann bis auf Nerven o. ganz kahl, tiefgrün, kaum glänzend, unterseits jung grauzottigfilzig, zuletzt wenig o. zieml. stark verkahlend, l. graugrün, vorwiegend breit elliptisch eifg., Grund breit abgestutzt, Spitze zugespitzt (etwa wie Fig. 381 b), zuw. auch j. länger, mehr wie a, dann bis 17 : 8—9 cm, sonst ca. 10 : 7—8 bis 16 : 12 cm, hfg. auch Grund mehr keilig und Spitze sehr stumpf, Nervenpaare 10—14, Zähnung und Lappung bald spitzer, bald stumpfer; Stiel 1—2,5 cm; Blst. ca. 8 cm Dm., grauzottig, Bl. weiß, vgl. Fig. 380 o—o', S. 695, oberer Teil der Bl.-Achse und K. außen l. kahl, Gr. 2—3, zur Hälfte zottig, Bau sonst wie typ. *aria*, Fr. — kahl, Stiele der wenigen Fr. dick, diese wie p.

S. l. C. KOCH, Dendr. I. 196. 1869 (*Pyr.* l. DOX, Prodr. Fl. Nep. 237. 1825; *P. kumaonensis* WALL., Cat. No. 678, 678a. 1829 [nom. nud.]; *Aria kumaonensis* ROEM., Mon. Syn. III. 130. 1847 [et DECNE., in Mem., l. c. 162. 1874]). — Himalaya-Mehlbirne. Simla, Garhwal, Kumaon. Blz. V. Frz. VIII. In Kultur bei uns noch sehr selten (Hort. München), hat wohl noch nicht geblüht und gefruchtet.

- + + B. kürzer o. sonst jedenfalls schmaler, Nervenpaare 6—11, C. kaum genagelt, Fr. kaum über 13 : 12 mm.

B. nicht zuletzt derblederig und oberseits deutl. glänzend und kaum so rundlich-oval wie Fig. 281 e—f, S. 695.

△△ siehe S. 694.

B. wie Fig. 370 c, S. 675 gewöhnlich die 2 untersten Lappenpaare zu deutlichen Fiedern entwickelt.

25. *S. hybrida*: b — $\mathfrak{H}$; junge Triebe locker filzig, *) kahl o. fast kahl, braun bis purpurn; B. oberseits sattgrün, bis auf Nerven o. ganz kahlend, unterseits dick weißgrau filzig, Nerven z. T. kahlend, Textur zuletzt l. derb, ca. 8—11 : 6—7 cm, Nervenpaare im Mittel 10, Stiel 1,5—3 cm; Blst. 6—10 cm Dm., — wie Bl.-Achse weißgrau filzig, K. gegen Spitze und innen kahler, Bl. ca. 16 mm Dm., vgl. Fig. 380 t—u, Gr. meist 3, fast getrennt (zuw. vielleicht Bau des Gyn. wie bei *S. amurensis*); Fr. nach HEDL. rot, kugelig, 10—12 mm dick, spärlich punktiert.

S. h. L., Sp. pl. ed. 2. 684. 1762 (*Crataegus hybr.* L.*), Fauna suec. ed. 2. 557. 1761; *Crataeg. fennica* KALM, Fl. fenn. pars I. Aboae 1765. 6; *Pyrus pinnatifida*

*) LINNÉ erwähnt diese Form zuerst als *Crataegus aria* γ . *Crataegus Fennica Kalmii* in seiner Fl. suec. ed. 2. 1755. 167, doch ist sie hier sichtlich nicht als Art publiziert, daher der Name *fennica* unanwendbar.

EHRH., Beitr. VI, 93. 1791; *Pyr. sempinnata* BECHSR., Forstb. ed. IVa, 325, t. VIII. 1821; *Sorb. fennica* FRIES, Summ. veg. scand. 12. 1846) Finnland-Mehlbirne.

Nach HEDL. SW.-Finnl., Schweden (bis 58° n. Br.), Norweg. (bis 65° n. Br.) Blz. V. Frz. X. Seit langem in Kultur. Von den meisten Autoren als *intermedia* $\times$ *aucuparia* angesprochen, zeigt aber bei Aussaat etc. und im Vorkommen kein hybrides Verhalten (vgl. HEDLUND) und wohl sicher gute Art, die wieder Hybriden bildet (vgl. S. 6745). Daß der Bl.-Bau zuw. mit *S. aucuparia* identisch sein kann, beweist m. E. für Hybridität im allgemeinen nichts, da ja *S. turkestanica* z. B. auch sich ganz wie *aucuparia* verhält.

>> B. wie Fig. 377 s—w, S. 686 o. Fig. 379 o—u, höchstens das unterste Lappenpaar ganz fiederig.

= B. mit meist nur 6—9 Nervenpaaren, unters. $\pm$ grau- o. gelbgrau filzig, wenn weißlich, so mehr wie Fig. 379 u.

— B. wie Fig. 377 s—t, unterstes Lappenpaar nie fiederig, Gr. meist 2, $\pm$ verwachsen, Frkn. bzw. Fr. sehr selten mit zentralem Hohlraum.

26. *S. intermedia*: b o. kleiner b, bis 7 m, Zw. und Kn. vgl. *aria* (sichere Unterschiede mir noch nicht bekannt): B. 6:3,5—11:6—8 cm, obers. glänzend grün, bis auf einige Haare und Drüsen auf Nerven kahl, Textur fest, aber dünn, Lappung im Mittel tiefer gehend als bei *Mougeoti*. Stiele kaum über $\frac{1}{4}$ so lang wie B.: Blst. weißfilzig, Bl. vgl. *Mougeoti*, Spaltung der Frb. meist (nicht immer *) zwischen diesen und Bl.-Achse beginnend, also nicht in den Scheidewänden: Fr. orange-rot, leicht durch Lent. gepunktet, ca. 12—13:11—12 mm.

S. i. PERS., Syn. pl. II, 38. 1807 (*Crataegus aria* β . *suecica* L., Sp. pl. 476 1753, ex p.; *Crat. aria scandica* L., Amoen. acad. II, 190. 1764; *Pyrus intermedia* EHRH., Beitr. IV, 20. 1789; *Sorb. scand.* FRIES, Fl. Halland. 38. 1817; *Aria scand.* ROEM., Syn. Mon. III, 127. 1847, ex p.; *Sorb. suecica* KROK et ALMQ., Svensk. Flor. ed. III, 132. 1888; *Aria suecica* KOEHNE, Dendr. 250. 1893; *Holmia suec.* DIPP., Laubh. III, 377. 1893, ex p.). — Oxeibirne, — I G. nur Hinterpommern, W.-Preuß., sonst noch Schwed., Norweg. Blz. VI. — Frz. IX—X. In Kultur nicht selten mit *hybrida* o. dem Bastard *sempinnata* verwechselt. Über *S. arranensis* HEDL., Mon. l. c. 60. 1901, von W.-Schottl. und *S. minima* HEDL., l. c. 61 (*Pyr. min.* LEY, in Jour. of Bot. 1895. 84, aus NS Wales vgl. man HEDL.; mir sind sie noch unklar.

— B. wie Fig. 379 t—u, unterstes Lappenpaar zuw. fiederig, Gr. meist 3, frei und auch Frb. zentral $\pm$ tief frei (Fig. 380 b—f).

27. *S. turkestanica*: b, ob b?, junge Triebe grauzottig beh., γ rot o. purpurbraun, ganz o. fast kahl, Kn. stumpf-eitg., kahl; B. an Blzw. im Mittel nicht über 6:3,5—7,5—4,5 cm, oben sattgrün, stets fast ganz kahl, unten bleibend filzig, Lappen stets deutlich, ziemlich spitz, Seitennerven oft nur 5—6—7, Stiel 1—1,5 cm, γ beh.; Blst. locker filzig-zottig, zur Frz. stark kahlend, ca. 17 cm Dm., Bl. im Herbar gelblich, vgl. Fig. 380 b—t, Achse und K. γ beh., erste zuw. fast kahl; Fr. wie d. bis 15:12 mm, zuletzt wohl purpurn und bereift.

Es liegt mir eine Form mit zur Blz. kahlen Blst. und Bl.-Achsen und K. (außen) sowie kahleren, recht spitzlappigen, unten bis 2 fiederpaarigen B. vor (dgl.

*) BECK setzt, in Annal. Hofm. Wien. 1896. 47, im Gegensatz zu MURBECK, Beitr. z. Flora v. Sudbosn. 129. 1891, auseinander, daß in den B. eine sichere Unterscheidung von *intermedia* und *Mougeoti* nicht immer gefunden werden kann. Er glaubt im Bl.- bzw. Fr.-Bau sie gefunden zu haben. Allein auch dieser ist schwankend. Es treten bei *intermedia* zuw. auch zentrale Spaltungen in den Scheidewänden auf, wie Fig. 378 i beweist. Im großen ganzen ist die B.-Form und Lappung ganz verläßlich.

= = siehe
S. 694.

REGEL, Turkest., Paß Kendyr, 20. V. 1880). Ob man hier an eine Hybride mit *Sorb. tianshanica* denken konnte, ist mir fraglich. Sonst ganz typisch, aber mitunter mit 1 Fiederpaar (Fig. 379m) tritt eine Form auf, die ich *S. unipinnata* nenne, aber kaum als Varietät ansehen kann.

Fig. 380. *Sorbus* [Hahnia]: *a—a'* *costata*: Fr. und im L.-Schn. — *b—f* *turkestanica* [*e—f* die kahlere Form, s. Text S. 692]; *b, c* Bl.-L. Schn.; *b'*, *d'* C.; *c, f* Frkn.-Q.-Schnitte; *d* Fr.; *d'* dgl. L.-Schn. freier Zentralraum quergestrichelt, darüber Stelle wo Gr. zuw. anscheinend verwachsen. — *g* *latifolia*: *g* Bl.-L.-Schn.; *g'* C.; *h* Frkn.-Quer-Schnitte; *h'* dgl.; *i* Fr.-L.-Schn.; *k* dgl. Q.-Schn.; *l* Fr.-Gipfel im L.-Schn. (Text S. 694). — *m—n* *persica*: Bl.-L.-Schn., C. und Fr.-L.-Schn. unreif. — *o—p* *lanata*: wie *m—n*. — *q—s* *torminalis*: *q* Bl.-L.-Schn. und K.; *q'* C.; *r* Frkn.-Q.-Schnitte; *s* Fr. L.-Schn.; *s'* dgl. Q.-Schn.; *s''* Fr.-L.-Schn. mit Spaltung in Scheidewand *a*. — *t—u* *hybrida*: *t* Bl.-L.-Schn.; *u* Frkn.-Q.-Schnitte (Orig., nur *u* nach KOEHNE).

S. t. HEDL., l. c. 69 (*Pyrus turkestanica* FRANCH., in Ann. Sc. Nat. sér. 6. XVI. 288, 1883). Turkestan, O.-Bucharei, Karatau, Boroldai etc. Gebirge bis 3000 m. Blz. V. Frz. IX—X. Ich sah aus Herb. Petrop. reiches Material und glaube sicher, daß FRANCHET diese Formen vor sich gehabt hat. Diese Art

*) An *S. turkestanica* bzw. *intermedia* schließen sich einige erst unvollkommen bekannte westzentralasiatische Formen an. So beschreibt HEDLUND, Mon. l. c. 69. 1901, aus Armenien Expl. lg. SZOVITS als *S. armeniaca*. Die B. dieser Fr.-Expl. sind ca. 6,5 : 4,5 cm, etwa wie Fig. 379s, mit 7—8 Nervenpaaren, rundl. Grund und rundl. Spitze, Lappung recht seicht. HEDL. bildet ein länglicheres B. (8,5 : 4,3 cm) mit schärferer Lappung (ob von Lgtr.) ab. Die Fr. (nur z. T. reif) maßen ca. 12 : 10 mm, auffällig ist ein Expl. mit unreifen Fr. aus dem Pontusgebirge, lg. K. KOCH, hier B. größer, ca.

steht der *hybrida* wohl am nächsten. Der Bl.-Bau ist ganz analog *S. amurensis*, was schlagend beweist, daß auf Grund der Bl.-Morphologie allein die Gruppen o. Gattungen sich nicht trennen lassen!!

= = B. mit meist 9—11 (also engeren) Nervenpaaren, unters. mehr weißgrau filzig (Fig. 377 u w), Frkn.-Bau meist wie Fig. 378 k³.

28. *S. Mougeoti*: voriger recht ähnlich, doch z. T. höher, b bis 20 m. • Zw. und Kn. • kahler: B. vgl. var., Bl. wie Fig. 378 k k. S. 687, Fr. wie l, rot, oft 3-fächerig, eßbar.

Man kann unterscheiden: var. **a typica** *Alia Mong. typica* BECK, Fl. Nied.-Östr. 714. 1890 • B. wie Fig. 377 u—v, fast 2:1, Grund meist z. T. rundl.-keilig, 7:3,5—4 bis 9:5—5,5 cm, Lappung seicht, Fr. meist nicht über 10—11 mm lang. **b. austriaca** *Alia Mong. v. aust.* BECK, l. c.: B. zum großen Teil breiter, etwa $P_1 : P_2 : 1$, Grund breit kurzkeilig (Fig. 377 w), Lappung etwas tiefer, sich z. T. deckend, 8:5,5—11:9,5 cm, Fr. 10—13 mm lang: im östl. Gebiete des Typs ± verbreitet.

S. M. SOY. et GODR., in Bull. Soc. Bot. France V. 447. 1858 (*Aria scand.* ROEM., l. c., ex p.; *Halmia succ.* DIPP., l. c., ex p.; *Halmia Mougeoti* C. K. SCHN., Dendr. Winterstud. 247. 1903; *Sorb. scandica* var. *Mougeoti* ZBL., im H. d. D. D. G. 198. 1903). — Südliche Oxelbirne. — I G. D. VOGES, Sch. bes. im Westen (Jura), OU. Voralp, Siebb., bosn. Gebirge; sonst noch O.-Frankr. (W.-Alp., Jura, Vogesen) und wohl auch Apenninen. — Gebirge, 7—1700 m, dann zwischen Krummholz. Sonst wie vorige. — In Kultur noch selten.

28 < 31 *S. Mougeoti* • *chamaemespilus*: *S. Hostii* HEDL., Mon. l. c. 112. 1900 [et K. KOCH 1869, ex p.] (*Aria Hostii* JACQ. F., Cat. Hort. Vindob. 1826 [et in Host. Fl. II. S. 1831; *Halmia Hostii* DIPP., Laubholzk. III. 378. 1893, ex p.); von *chamaemespilus* bes. durch größere, anders gezähnte B. (Fig. 381 a—b) mit z. T. längeren Stielen und größere, weißlichrosa gefärbte Bl. mit breiteren C. abweichend, von *Mougeoti* durch unters. locker filzige, etwas gelbgrüne kleinere B., mit milderer o. fehlender Lappung, und rosatarbene Bl. Abb. bei BECK, Fl. von Herrnst., t. X. Htg. mit der *S. sudetica* verwechselt, die vor allem ganz anders gezähnte B. hat. Vielleicht muß man die typische *Hostii* als *Mong. v. austriaca* • *chamaemespilus* von den westlichen Formen als *Mong. typica* × *cham.* scheiden.

— B. zuletzt derblederig, overs. glänzend grün, vgl. Fig. 381 c—d.

29. *S. latifolia*: b o. meist kleiner b, bis etwa 10 m hoch, junge Zw. zottig beh., • fast kahl, glänzend olivbraun bis purpurn, Kn. breit kegelfg., Sch. olivbraun mit dunkleren Rändern •; B. overs. bald ganz o. so gut wie kahl, unters. gelbgrau filzig, zuw. zieml. reichlich kahlend, vgl. var.!: Blst. ca. 7—10 cm Dm., filzig, Bl. weiß, ca. 1,5—1,8 cm Dm., vgl. Fig. 380 g—h¹, Gr. 2—3, bis kaum verwachsen, Zentralspalt im Frkn. bald vorh. (h¹), bald fehlend (k), Fr. braunrot, mit hellen Lent., rundlich o. elliptisch, vgl. i, zuweil. Gipfel mit getrennten Frb. wie l.

10:7,5 cm, tieflappig, wie t. Ganz ähnlich ist *Sorb. ar. a. m. s. s.* ALBOFF, Prodr. Fl. Colch. (Circassien, No. 97 und Mingrelien, No. 600). In welchem Zusammenhang diese Formen stehen, bleibt vorerst fraglich. Hierher neigen auch die Expl. lg. HAUSSKNECHT, Kurdistan, 1867, M. Kaliser. — *S. persica* HEDL., l. c. 70, ist begründet auf KOTSCHY, No. 187 in M. Elbrus (Bl.) und Suppl. No. 802, Karduclia (Bl.). Von No. 187 ist in Fig. 379 o ein B. abgebildet. Diese KOTSCHYSCHEN Formen scheinen sich sehr eng an die eben zitierten armenischen anzuschließen. Dagegen glaube ich, daß in den persischen Expl. lg. BUCHSE, No. 408 (Ort?) und lg. STRAUSS, 1886, Sultanabad, neue Formen vorkommen, deren Zusammengehörigkeit unter sich noch fraglich, da BUCHSE Bzw. (vgl. Fig. 380 m—m'), STRAUSS Zw. mit unreif. Fr. (no sammelte B. wie Fig. 379 p, Bzw. o—q (Frzw., z. T. bis 7 cm breit). Ich möchte durch diese Hinweise zu weiteren Nachforschungen anregen.

*) Vgl. meine Dendr. Winterstud. S. 180 und Fig. 170 i—l, S. 167.

**) Vgl. meine Dendr. Winterstud. S. 179 und Fig. 167 k—o, S. 164.

Ich betrachte vorläufig als in den Formenkreis dieser Art zu stellende Varietäten: var. **a. typica** (? *Pyrus rotundifolia* BECHST., Forstbot. ed. IVa. I. 316. t. V 1821; *Pyrus dentata* ILSE, Fl. Mittelthür. 100. 1866; *Pyr. latif.* var. *dentata* IRM., l. c. [siehe unten]): B. $\perp$ rundoval, wie Fig. 381 c—d, Lappung deutl., zieml. breit und stumpf o. Hauptzahn plötzlich kurz vorgezogen ad. Nervenpaare 8—10(—11), Beh. unters. $\pm$ gelbgrau, Größe im Mittel an Blzw. 7—9:6—8 cm, Stiele $\pm$ derb, $\pm$ filzig, bis 2.5 cm. Diese Form tritt im Gebiet wohl in SW.-Deutschl., der Rheingegend, Thüringen, Nieder-Östr., Steiermark, auch Schweiz (bei Zürich) auf, ferner Frankr. (vgl. ROUY et CAM., Fl. de France VII. 22. 1901!) und SW.-Engl. (HEDL.). — var. **parumlobata** (*Sorb. glabrata* KIRCHN., Arb. Muse. 299. 1864; *Pyr. paucicrenata* ILSE, l. c.; *Pyr. latif.* var. *b. parumlobata* IRM., in Jahrb. Bot. Gart. Berl. 1881. 233; *Sorb. parumlobata* FRITSCH, Sched. Fl. exsc. Austr.-Hung., No. 2451. 1896; *Sorb. aria* var. *glabrata* DIPP., Laubh. III. 376. 1893; *Sorb. paucicrenata* HEDL., l. c. 98: B. nicht (Fig. 381 g) o. nur schwach gelappt (Lgtr. ! h), unters. stark kahlend, an Blzw. im Mittel 7:4—9:6 cm, sonst wie **a**; hie und da mit **a** auftretend (? Thüring., Nied.-Östr., bei Zürich etc.). Seit langem in Kultur. Wohl Mutation von **a**. — var. **e. obtusata** (*Crat. obtusata* SPACH, Hist. Veg. II. 104. 1834; *Sorb. obtusata* HEDL., Mon. l. c. 92; *Pyr. vel Sorb. aria* var. *rotundifolia* HORT. NONN.): B. oboval, ellipt. o. rundl.-oboval, wie Fig. 381 i—k, Spitze $\perp$ stumpf o. abgerundet, dadurch, wie durch die unterseits stärkere Beh. von

Fig. 381. *Sorbus* [Hahnia]: B.-Formen von: a—b $\times$ *Hostia* — c—d *latifolia typica*; e—f *latifolia ? semiincisa*; g—h *latifolia parumlobata*; i—k *latifolia obtusata* — l—m $\times$ *decipiens* — n *dubia* (siehe Anm. S. 689) ($\frac{2}{3}$ n. Gr.) (Original).

var. **b.** der er in der Zähnung ähnelt, verschieden, doch Zähne mehr vorgezogen, aber nicht lappig. B. zuweil der *S. aria majestica* in Form recht ähnlich. Fr. rundlich-elliptisch. Wohl nur in Kultur bekannt und nicht hybrid! — ? var. **d. semiincisa** *Sorb. aria* var. *sem.* BOBB., in Öst. Bot. Ztschr. 1883. 130; *Aria semiincisa* BECK, Fl. Nied.-Östr. 714. 1892: eine wohl nicht hybride Form, die nach DEGEN in den Otener Bergen sehr verbreitet ist und nach Osten bis Nied.-Östr. (Hamburger Berge) geht. B. wie Fig. 381 e—f, von var. **a** durch spitzere scharf gesägte Lappen gut abweichend. Unters. weißgrau filzig.

S. l. PERS., SYN. II. 38. 1807 (*Crataegus latif.* LAM., Fl. France III. 186 1778; *Crat. dentata* THUILL., Fl. envir. Paris, éd. 2. 245. 1790; ? *Pyr. intermedia* BECHST., in Diana IV. 110, tab. 2, fig. 2. 1822; ? *Pyr. semilobata* BECHST., Forstbot. ed. IVa. I. 218, t. VI. 1821; *Terminalia latif.* DIPP., Handb. III. 308. 1893. Breitblättrige Mehlbirne. Heimat vgl. oben — Standort wie *aria* o. *terminalis*. Blz. V. Frz. X. Seit langem in Kultur. Zur Frz. sehr schön, da meist voller Fr. — Wird meist nur Bastard gehalten, aber wohl sicher mit Unrecht.

*) Hier mir doch noch fraglich. Die so zahlreichen Expl. der Herbarien stammen fast alle von wenigen Standorten und stellen $\times$ *S. decipiens* dar.

vgl. auch S. 688 u. 89. Interessant waren mir Stocktriebe aus Fontainebleau, die große eiförmige B. (bis 15, 10 cm) hatten und ganz und gar nicht an *terminalis* gemahten.

29-30 *S. latifolia* × *terminalis* diese wohl auftretende Hybride stellt vielleicht *S. fallacina* ROYER, in Bull. Soc. Bot. France 1883. 232, dar; Frankr., Bois de Quincy près Monbard. Ob auch in Thüringen? Man vgl. sonst die Bemerkung bei *S. decipiens* S. 689.

2. B. wie in Fig. 383 c g.

30. *S. terminalis*: $\varnothing$ $\varnothing$, bis gegen 20 m, Krone eiförmlich, junge Triebe locker filzig, $\odot$ olivgrün o. rotbraun, leicht kantig, Lent. ∞ , hell, fein; Kn. eikugelig, kahl, Sch. glänzend gelbgrün mit schmalen braunen Rande; B. variabel, oben kahl, lebhaft hellgrün, unten jung locker filzig, bald kahlend, glänzend gelbgrün, Nerven- Lappen- Paare 3-5, Zähnung fein, ungleich, ca. 5-8-10 cm breit (an Blzw.) und wenig o. bis $\frac{1}{2}$ mal länger; Stiele 2-5 cm, dünn; Blst. ca. 10-12 cm Dm., weißfilzig, bald verkahlend, Bl. weiß, wie Fig. 380 q-q', K. außen

± kahl, Gr. (meist) 2, Scheidew. der Frb. hfg. mit nach oben und unten sich schließendem, verschieden hoch sitzendem Spalt (r, s²), Fr. rundlich o. länglich (im Mittel ca. 15 mm), anfangs gelbrot, dann braun, hell gepunktet.

Fig. 382. *Sorbus*: a-b [*Hahnia*] *chamaemespilus*: a Bl.-L.-Schn.; a¹ C.; b Fr.-L.-Schn. — c *sudetica*: Spitze des Fr.-L.-Schn. — d-i [*Aronia*] *arbutifolia*: d Bl.-L.-Schn. und K.; d¹ C.; d² Stb.; e Frkn.-Q.-Schn.; f Fr.; g deren L.-Schn.; h S.; i Kn.-Q.-Schn. — k-k¹ *melanocarpa*: Bl.-L.-Schn. und C. (Original, nur i nach FOLGNER).

Von Formen nenne ich f. *mollis* (*Pyr. term.* f. *mollis* BECK, in Ann. Hofm. Wien II. 97. 1887; *Arct. term.* f. *mollis* BECK, Fl. Nied.-Östr. 713. 1890); B. unters. bis Frz. filzig bleibend, so Formen in Griechl., Syr., Taurien; terner var. *perincisa* (*Sorb. po.* BOBB. et FEK., in Östr. Bot. Zeitschr. 1889. 223); unterstes Lappenpaar fast o. völlig als Fiedern abgetrennt (Fig. 383 h), B. der Orig.-Expl. (Fr.) unters. wie bei f. *mollis*; Ungarn (Pester Comit.); Formen des Typs mit bes. tief fiederspalt B., wie e, g hat BOISS., Fl. or. II. 659. 1872, als var. *pinnatifida* bezeichnet.

S. t. CRANTZ, Stirp. austr. II. 45. 1767 (*Crataeg. term.* L., Sp. pl. 476. 1753; *Pyr. termin.* EHRH., Beitr. Naturk. IV. 92. 1780; *Hahnia term.* MED., Gesch. Bot. 81. 1793; *Terminalia Cusa* ROEM., Syn. Mon. III. 130. 1847; *Arct. term.* BECK, Fl. v. Nied.-Östr. 713. 1890, *Term. terminalis* DIPP., Laubholz. III. 38. 1869). Elsbeere. — I G. D. in Bergwäld zerstr., fehlt im NW., auch im N. und NO., selten (GARCKE: OU. verbr., Sch. fehlt Ct. Gb., W., T. U.; sonst noch ganz Eur., im N. bis mittl. Engl., Bornholm, mittl. Rußl. (vgl. HEDR. etc.), südlich bis Algier, im O. bis Transkauk. Liebt kräft., bes. Kalkboden und sonnige Lage, verträgt keine Nässe. — Blz. V-VI. — Frz. IX-X. Holz von Tischlern, Mechanikern, Drechslern etc. recht geschätzt, daher nach HEMPEL forstlich auf guten Kalkböden

Vgl. Habitusbild bei HEMP. et WILH., III. S. 82, Fig. 305, hier auch Borke. Meine Abb. in Dendrol. Winterstud., Fig. 18 ist nicht recht bezeichnend, vgl. aber dort S. 178 und Fig. 167 a-d, S. 164.

wohl anbauwert, wächst aber sehr langsam. Als Zier- $\text{\textcircled{P}}$ und der genießbaren Fr. halber oft angepflanzt.

- b) *C. rosa*. aufrecht. lang in Nagel verschmälert, B. wie Fig. 383i—r. bei No. 31 in Kn. gerollt (Sekt. *Chamaemespilus*).
1. B. unters. ganz kahl o. etwas locker flockig-filzig, aber gelbgrün (i—p).

31. *S. chamaemespilus*: aufrechter b, 1—2—3 m, junge Triebe locker beh., • oliv- o. rotbraun, Lent. mäßig deutl., Kn. kahl, nur die

Fig. 383. *Sorbus* [*Hahnia*], je ein größeres B. von einem Blzw!; a—b *lanata* — c—g *torminalis*; h var. *perincisa* — i—l *chamaemespilus*; m—p var. *discolor* — q—r *sudetica* (knapp $\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

olivgrünen o. rotbraunen Sch. $\text{\textcircled{P}}$ gewimpert^{*)}; B. — derb, 3—4:1.5 bis 7.5:3—4 cm, Zähnung ringsum o. nur 1. über Mitte, bald mehr kerbig, bald mehr ungleich spitz, Nervenpaare 6—8(—9), — ungleich, nicht scharf durchlaufend, Stiel 4—8—10 mm; Blst. — graufilzig, Bl. ziemlich klein, vgl. Fig. 382a—b, K. und oberer Teil der Bl.-Achse außen (meist) kahl, Stb. 20, Gr. 2, Fr. scharlachrot, 10—13 mm lang (b).

Ich unterscheide: var. *glabra* NEHR., Fl. Niederöstr. 887, 1850: B. stets kahl, wie Fig. 383i—l und var. *discolor* HEGETSCH., Fl. Schweiz 418, 1849. *Chamaeria-aria-chamaemespilus* REHB. —, Fl. Germ. excurs. 630, 1832: *Chamaeria ambigua*

*) Vgl. meine Dendr. Winterstudien, S. 179 und Fig. 170e—h, S. 167.

*) Ich behalte vorläufig diesen Namen als ältesten bei. Wenn HEGETSCHW., wie HEDELUND es wohl annimmt, eine *aria-chamaemespilus* vor sich gehabt, so hatte er sicherlich die Unterschiede besser betont. Vielleicht aber hat er eine *sudetica* gemeint.

*) Die Bezeichnung *aria-chamaemespilus* erscheint mir als Varietätsname nicht anwendbar, da REHB. darunter ausdrücklich *aria-chamaemespilus* verstanden wissen will.

DEGENE, Mem. l. c. 165. 1874; *Sorb. erubescens* KERN., in MAGN. Scrib. fl. sel. VIII. 148. 1889; *Aria Crantzii* BECK, Fl. Nieder-Österr. 712. 1890; *Sorb. ambigua* HEDL., Mon. l. c. 113. 1901, an AUCL. AL.?; var. *orbifolia* ROUY et CAMUS, Fl. France VII. 25. 1901. B. vgl. Fig. 383 m—p, unters. — locker filzig, mehr o. minder stark bis fast ganz verkahlend. Die beh. Form tritt augenscheinlich fast überall mit der typischen, wenn auch viel seltener, auf*).

S. ch. CRANTZ, Stirp. austr. fasc. II. 40. 1763 (*Mesp. cham.* L., Sp. pl. 479. 1753; *Pyr. cham.* EHRH., Beitr. IV. 19. 1789; *Hahnia cham.* MED., Gesch. Bot. 82. 1793; *Aria cham.* HOST, Fl. austr. II. 8. 1831. — Zwergmispel. — I. G. D. nur Voges., Bad., Bayr. Gebirge; Sch. Alp., Voralp., Jura; OÜ. Alp., Voralp., Geb. von Ung., Bosn., Herzeg., sonst noch Gebirge von S.- u. M.-Frankr., N. Span., Ital., im Balk. und Griechenl., wie es scheint, ganz fehlend. — Gebirge, namentlich unter Krummholz. — Blz. VI—VII. — Frz. IX—X. Nicht selten in Kultur.

2. B. unters. bleibend graufilzig (Fig. 383 q—r).

32. *S. sudetica*: diese vielleicht auch nur eine var. voriger darstellende Art hat im Mittel etwas größere (5.5:3—10:5 cm), meist etwas mehrnervige B. (bis 9—10 — gut durchlaufende Paare), Bl. auch ein wenig größer, rosenrot, z. T. reichlichere Beh.: Fr.-Gipfel mehr wie bei *aria* (Fig. 382 c).

S. s. NYM., Consp. Fl. europ. 242. 1878/82 (*Pyr. sud.* TAUSCH, in Flora. 1834. 76; *S. chamaemesp.* var. *discolor* NEHR., Fl. Nied.-Österr. 888. 1859). — I. G. D. und O. Riesengeb., ferner Baden (Feldbg.) wohl auch Tirol, Sch. Jura, dann Vogesen u. a. Orte. Jedenfalls weiter verbreitet und meist (ob mit Recht?) für *aria* = *chamaemespilus* genommen. Sonst wie vorige. In Kultur oft mit *S. Hostii* verwechselt.

Sekt. 5. *Aronia* PERS., Syn. II. 39. 1807, ex p. als Genus (*Adenorachis* DC., Prodr. II. 637. 1829, als Sekt. von *Pyrus*): B. einfach, feindrüsig gezähnt, in Kn.-Lage gerollt (Fig. 382 i). Gr. 5. unterwärts verwachsen. Frb. am Rücken $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ mit Bl.-Achse und sonst unter sich bis auf einen — entwickelten, zuweilen ganz fehlenden freien Mittelraum (vgl. Fig. 382 d, e) völlig verwachsen. Fr. sonst wie bei *Hahnia*.

C B. unters. bleibend graufilzig, Blst. und Bl.-Achsen sowie K. (beiders.) graufilzig, nur K.-Spitzen $\pm$ kahl, Fr. rot.

33. *S. arbutifolia*: aufrechter h., bis 2 m, zuw. veredelt kleiner h. mit — übergeneigter Verzweigung. — Zw. graufilzig, sonst glänzend olivgrün bis rotbraun. — schwarzgrün; Kn. zweifarben, kahl, länglich, zugespitzt (Fig. 329 k, o, S. 583); B. in Form wie Fig. 384 a—b wechselnd, bis etwa 9.3, 8 cm, ober. tiefgrün, später nur auf Nerven etwas zottig und auf Rippe bedrust. Herbstf. schön rot, Stiel 4—10 mm; Bl. in Doldenrispen, diese ca. 3—5 cm Dm., Bl. weiß o. rosa, 8—12 mm Dm., vgl. Fig. 382 d—e, Fr. wie f, bis 10 mm Dm., spät abfällig.

LINDLEY, in Trans. Hort. Soc. VII. 229. 1830, hat von seiner *Pyrus arbutifolia* 2 Formen, *intermedia* und *scroetina*, unterschieden, die mir aber recht unklar sind. Ich nenne heute nur var. *atropurpurea* (*Aron. atrop.* BRITT., Manual 517. 1901); Fr. schwarzpurpurn, oval o. kugelig, nicht glänzend rot, kurz birnfg. wie beim Typ. Ich sah nur ein von REHDER bestimmtes Expl. aus dem Arnold-Arboretum, das ich für eine besondere Art nicht halten kann. — var. *depressa* (*Pyr. depr.* LED., l. c. 236); Zwergform mit kleineren B. und Blst., wie sie auch wild aufzutreten scheint. Noch zu beobachten. — var. *Baenitziana*: eine, wie es heißt, im Göpperthain in Breslau aus *S. der arbutifolia* gefallene großblättrige Varietät, deren sonst ganz analog beh., gezahnte und genervte B. 9:4.5—13.6 cm messen. Form länglich oboval, Grund keilig, Spitze — rund mit plötzlich vorgezog. Spitzchen. Bl. ? Fr. wie beim Typ. Von hybridem Einfluß kann ich z. Z. nichts sehen.

* Man pflegt sie für eine *aria* = *chamaemespilus* zu halten (so KERNER, BECK). Schon KOEHNE sprach 1893 Zweifel aus. HEDLUND halt sie für eine Art. Ich kann den B., Bl. etc. nach nur eine Var. der *chamaemespilus* darin sehen. Die Unterschiede zwischen *ambigua* sensu BECK und dessen *Crantzii* sind mir zu gering, um *Crantzii* gesondert zu führen.

Es scheint eine Mutation zu sein, die noch der Beobachtung bedarf. Das Material sandte mir Herr Dr. BAENITZ.

S. a. HEYNHOLD, Nomencl. Bot. 772. 1840 (*Mesp. arb.* L., Sp. pl. 478. 1753; *Pyrus arb.* L. f., Suppl. 256. 1781; *Hahnia arbutif.* var. *rubra* MED., Gesch. Bot. 82. 1793; *Aronia arbutifolia* SPACH, Hist. veg. II. 89. 1834 [et PERS. 1807, ex p.]). — Rotfrüchtige Apfelbeere. — ON.-Am. (New York bis Florida). — Sümpfe, feuchte Gehölze. — Blz. V(—VI), in Heimat schon ab III. — Frz. Spätherbst, Winter. Seit langem in Kultur. Die spontanen Formen sind noch nicht genügend studiert.

Fig. 384. *Sorbus* [Sekt. *Aronia* und Bastarde]: *a—b arbutifolia* — *c—e melanocarpa* — *f—h* $\times$ *alpina* — *i* $\times$ *Dippelii* var. *superaria* — *k—m* $\times$ *heterophylla*, *n* var. *superaucuparia* — *o* $\times$ *monstrosa* ($\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

33 $\times$ 34 *S. arbutifolia* $\times$ *S. melanocarpa*: *S. floribunda* HEYNH., l. c. 773. 1840 (*Per. flor.* LDBL., in Bot. Reg. XII. 1006. 1826, *Aronia flor.* SPACH, l. c.) Eine, wie es scheint, in mannigfachen Formen auftretende Hybride, die in var. *typica* der *arbutifolia* in Beh. der B. und Blst. näher steht und vor allem durch schwarze Fr. abweicht, in var. *glabrescens* (*Aronia glabr.* SPACH, l. c. [et fide Spec. orig.]) in den später stark kahrenden B. und den fast kahlen Blst. und Bl.-Achsen sich *melanocarpa* nähert, aber violett-purpurne Fr. hat. Auch *Aronia depressa* SPACH, l. c. 90 (vgl. aber oben var. *depressa*), und *A. pubens* SPACH, l. c. (*Per. pubens* LDBL., l. c. 232), deren Originale ich nicht sah, scheinen solche Hybriden zu sein, ebenso *Sorb. pubescens* HEDL., Mon. l. c. 116. 1901. Ebenso scheint *Ar. nigra* var. *decumbens* ZBL., im H. d. D. D. G. 192–1903, nach den mir vorliegenden Originalen hierher zu gehören.

CC B. von Anfang an kahl o. nur jung beh., Blst. und Bl.-Achsen nebst K. (außen) ganz kahl o. nur ganz locker beh., Fr. schwarz.

34. *S. melanocarpa*: von *arbutifolia* noch abweichend durch: Zw. kahl (o. nur ganz jung beh.), Kn. dgl.; B. im Mittel meist kürzer und breiter (Fig. 384c–e), oben bis auf drüsige Rippe ganz kahl, sattgrün, unten hellgelbgrün, bis 6–7 : 3,5 cm

C B. nicht kurz lappenzähnig, sondern Serratur fein, gleichmäßig spitz o. kerbig (Fig. 386 b, c, i, k und 388 c: Discusring deutl. ausgebildet, Gr.-Grund meist kahl.

B. grob, im Mittel nicht unter 15 cm, Stiel nur 5–8 mm (Fig. 386 c), B.-Unters. und Blst. jung dicht gelbgrau filzig, später flockig kahlend.

1. *M. Griffithii*: kräftig verzweigter $\mathfrak{D}$, junge Zw. wie B. beh., diese jung häutig, dann derb, oberse. tiefgrün, so gut wie ganz kahlend, unterse. heller, flockig beh., Zähnung fein spitzkerbig, bis 20:9 cm, Nervenpaare 12–15; Blst. bis 10 cm Dm., Bl. wie Fig. 385 c–c², Fr. sehr klein (d).

M. G. DECNE., l. c. 170 (*Sorbus sikkimensis* var. *microcarpa* WENZ., in *Linnaea* 1874. 59; *Pyr. Griff.* HOOK. F., Fl. Brit. Ind. II. 377. 1878). — Sikkim, O.-Bengal. — Gebirge, 2–3000 m. — Blz. IV–V. — Frz. VII. — Kaum in Kultur. Wohl nur für den S. des Gebietes als Freilandpflanze geeignet. Die Blätter gemahnen an *Sorbus cuspidata* o. *Hedlund.*

✱✱ B. kleiner (Fig. 386 b, i–k und 388 c, S. 704).

+ B. 10–13(–14):4–5,5 cm, Nervenpaare 10–14 (b), Fr. ca. 6–7 mm lang.

2. *M. rhamnoides*: $\mathfrak{D}$, Zw. und B. höchstens ganz jung $\pm$ beh., sehr bald ganz kahl, B. unterse. wenig heller, Serratur sehr fein, aber scharfspitzig, Stiel 8–15 mm; Blst. klein, bis ca. 6 cm (an vorlieg. Expl.), $\pm$ grau zottig beh., Bl. ca. 1 cm Dm., wie Fig. 385 e–e², K. fast kahl, Fr. wie f.

M. r. DECNE., l. c. 169 (*Sorb. sikk. var. oblongifolia* WENZ., l. c; *Pyr. rham.* HOOK. F., l. c.). — Sikkim (2–3000 m) — Blz. V–VII. — Wohl versuchswert in Kultur.

++ B. 5,5:2,5–9:5 cm, Serratur kerbig, oft von Mitte bis Grund $\pm$ null, Nervenpaare 8–10 (Fig. 386 i–k), Fr. ca. 10–11 mm lang o. dick.

3. *M. Decaisneana*: $\mathfrak{D}$ (?), junge Triebe graufilzig, σ kahl o. auch erst verkahlend; B. oberse. jung locker zottig, später kahl, glänzend sattgrün, unterse. heller, am Grunde der Rippe $\pm$ bleibend filzig, Basis meist langkeilig, Spitze kurz vorgezogen; Stiel kaum über 5 mm; Blst. ca. 4 cm Dm., graufilzig, dgl. Bl.-Achse im unteren Teile, nach oben meist kahl, ebenso K. fast kahl, vgl. Fig. 385 g–g¹, Fr. wie h o. rundlicher, 3–4-fächerig.

M. D. C. K. SCHN., in Bull. Herb. Boiss. 1906. — China: Hupei (lg. WILSON, No. 593, HENRY, No. 5715 A). — Blz. V. — Wohl einführens-wert!

An diese Art schließt sich wohl eng an *M. Keissleri* aus Sutschwan, lg. HENRY, No. 7166 und W.-Hupei, WILSON, No. 593. Zw. kantig, kahl, rotbraun, mit $\sim$ hellen deutl. Lent., Kn. eifg., ca. 3 schuppig, Sch. nur gewimpert; B. größer (Fig. 388 e o. Spitze mehr vorgezogen), 9:5,5–13:7 cm, derb, oben glänzend tiefgrün, kahl o. mit verstr. Borsten, unten glänzend gelbgrün, nur an Rippe spärli. Haarreste erkennbar, Nervenpaare 7–10, Stiel 5–8 mm; Blst. und bes. Recept. im unteren Teile grau zottig, sonst kahl, Bl. ca. 8 mm Dm., K. σ , Recept. stumpf 3eckig, C. breit oval, kurz genagelt, Stb. 20, C. Discus deutl., Gr. 2, hoch verwachsen; Fr. ca. 15 mm Dm. (Fig. 389 d, S. 705), Fächer 3(–4?).

C C B. deutl. kurz lappenzähnig (Fig. 386 d–h, p–q und Fig. 388 a–b). Discus ganz flach, Gr.-Grund fast stets etwas beh.

B. zur Frz. unterse. hellgrün, nicht grau- o. weißfilzig, o. sonst wie Fig. 388 b, mit 13–16 Nervenpaar. u. winzigen Fr. Fig. 389 b).

✱✱ siehe S. 703.

6–8 Nervenpaaren kenne ich noch nicht. *M. Thomsoni* (*Pyr. Thom.* HOOK., l. c. 379): kahl, B. breit lanzettlich, Grund keilig, Spitze σ lang vorgezogen, 5:1,5–8:2,5 cm, Nervenpaare 8–12, Serratur oft erst von Mitte ab, sehr fein, wenig auffällig (Fig. 386 l), Stiel nur 5–10 mm; Bl. mit innen beh. C., 2–4 Gr. Sikkim.

- B. mit 13–16 Nervenpaaren, zur Blz. unters. silbergrau beh., Haare + senkrecht zu Seitennerven gelagert, Stiel 0.5–1 cm. Bl.-Achse und K. (außen, unten) + filzig. Fr. winzig.

4. *M. Schwerini*: ♀?, ♂?. junge Triebe fast kahl, ♀ purpurbraun, Lent. verstr.; B. ziemlich dünn, oben sattgrün, im Anfang mit verstr. Zotten, dann kahl, unters. wie es scheint zur Frz. ganz kahle, gelbgrün, Nerven schon zur Blz. fast

Fig. 386. B. von Blzw. von: a *Eriobotrya japonica* — b—q *Micromeles*: b *rhamnoides* — c *Griffithii* — d—e *alnifolia*; f var. *tiliaefolia* — g—h *japonica* — i—k *Decaisneana* — l *Thomsoni* — m *cuspidata* — n *granulosa* — o *ferruginea* — p—q *Folgeneri* (1/2 n. Gr.) (Original).

kahl, 8:4–12.5:6.5 cm; Kerbzähnung doppelt, kurz spitzlappig (Fig. 388b); Blst. + locker grauzottig-filzig, ca. 5 cm Dm., lockerblütig (?), Bl. ca. 8 mm Dm., vgl. Fig. 389 a—a¹, S. 705, Gr. 3, Stb. 20, Fr. wie b, rot?

Das Fr.-Expl. aus S.-Shensi, lg. GIRALDI, No. 986, sieht den Bl.-Expl. aus Sz'tschwan, lg. HENRY, No. 8957 so ähnlich, daß ich es unbedingt zuziehe, nur kahlen dann die B. ganz auffallend stark zur Frz. Ob also eine kahlere Var. bleibt fraglich.

M. S. — Heimat wie oben. — Blz.? — Fr. vom Juni. — Noch zu beobachten; einführenswert.

+ + B. auch zur Blz. unters. lebhaft hellgrün, bes. an den 6—10 Nervenpaaren + locker gelbgrau beh. bis ganz kahl (Fig. 386 d—e), Blst., Bl. kahl o. nur spärlich beh., Fr. wie Fig. 387 k.

5. *M. alnifolia*: b—h, bis 15:0,6 m, Zw. kahl o. jung locker beh., glänzend rot o. olivbraun, Lent. deutl., + rissig, Kn. ei-spindelfg., Sch. außen kahl +; B. breit-eifg. (o. aus herzf. Grunde + rundlich-eifg., var. b.), sommergrün, 6:4 o. 7:3,5 bis 8:4—4,5 cm, Stiel 1—1,4 cm; Blst. locker, bis 8 cm Dm., Bl. 10—12 mm Dm., vgl. Fig. 387 i—i¹, Fr. purpurrot mit gelb, wie k—k² o. mehr kugelig var. *typica*: B.-Grund nicht herzf., B. und Blst. wie Bl. kahler. var. *tiliaefolia* (*Aria tiliaefolia* DECNE., l. c. 166; *Mur. til.* KOEHNE, l. c. 20): B. breit rundlicher, Grund + herzf. (Fig. 386 f), bis 8:7 cm, gleich Blst. und Bl. (Fig. 387 l) + mehr beh.

M. a. KOEH., l. c. 20 (*Crataegus alnif.* S. et Z., in Abh. Ac. Münch. Kl. IV. 2. 130. 1846; *Sorb. alnif.* KOCH, in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. I. 249. 1863; *Aria alnif.* DECNE., l. c.; *Pyrus Miyabei* SARG., in Gard. a. For. 1893. 214; *Sorbus Miyabei* MAYR, Fremdl. Waldbäume, 191. 1906). Erlen-Zwergapfel. Japan (temp. Zone, bis 1300 m), N.-Korea, S. Ussuri-Gebiet. — Blz. IV—V. — Frz. X. — Jetzt schon häufiger in Kultur.

+ * B. unters. bleibend grauweiß o. silberweißfilzig, dgl. Blst. u. Bl.

+ B. 7:4,5—12:8 cm, spitzlappig (Fig. 386 g—h). Unters. grauweißfilzig, Nervenpaare ca. 11—13.

6. *M. japonica*: habituell wie *alnifolia*, sonst noch abweichend durch: junge Triebe weißgrau filzig, B. auch oberseits kaum ganz kahrend, Stiel 1—2 cm; Blst. eher reichblütiger, Bl. etwas kleiner, mehr kremweiß, vgl. Fig. 387 m—m¹, Fr. mehr karmin, + weiß gepunktet, wie m².

M. j. KOEHNE, l. c. (*Sorbus jap.* SIEB., Syn. No. 355. 1827, teste MAXIM., *Sorb. aria* var. *kamaonensis* MAX., in

Fig. 387. *Micromeles* i—k² *alnifolia*: i Bl.-L.-Schn.; i¹ C.; i² Stb.; k Fr. längs und quer geschnitten; k¹ L.-Schn. mit Spaltung β in Scheidewand α ; k² S. — l var. *tiliaefolia*: wie i. — m—m² *japonica*: m Bl.-L.-Schn. und K.; m¹ C.; m² Fr. — n—n² *Folgeri*: n Bl.-L.-Schn.; n¹ C.; n² Frkn.-Q.-Schn. (Orig.).

BULL. Petersbg XIX. 175. 1874; *Aria jap* DECNE., l. c. 165; *Sorb. Kochneri* ZABEL^{*)}, im H. d. D. D. G. 200. 1903. — Japan, im übrigen wie *alnifolia*, im Gebirge bis 1600 m. — In Kultur wohl noch sehr selten.

*) Vgl. meine Dendr. Winterstudien, S. 180 und Fig. 170 a—d, S. 167.

**) Selbst wenn man *Micromeles* zu *Sorbus* zieht, liegt kein Grund vor, den Namen *Sorbus japonica* zu ändern, auch wenn SIEBOLDS Name ein Nomen nudum sein sollte. Ich behalte daher meine *Sorbus Kochneriana* bei. Es geht m. E. nicht (vgl. Ann. S. 711) *Eriobotrya japonica* zu *Sorbus* zu ziehen!

An diese Art schließt sich an *M. Hemsleyi* aus Hupei, lg. HENRY, No. 6830 A, nur Frzw. vorliegend, Höhe?, ☉ Zw kahl, rotbraun, Lent ∞; Kn. spitz-eifg., locker- und wenigschuppig, kahl; B. wie Fig. 388 a, von *japonica* vor allem abwechselnd durch: Lappung kürzer, feiner, Obers. kahl, an Rippe leicht drüsig, Unterseits angepreßt silbergrau-filzig, Haare eine fein verwobene dichte aber dünne weiche Decke bildend, Nerven ganz kahl, 12—14 Paar, 8:5—14:7 cm; Stiel 1—1,6 cm; Frst.

Fig. 388. B. von: a *Micromeles Hemsleyi* — b *M. Schwerini* — c *M. Keissleri* — d—e *Photinia (Pourthiaea) Bergerae* — f *P. birmanensis* — g *Stranvaesia Rosthorni* — h—h¹ *Phot. (Pourth.) Beauverdiana*, i—m dgl. Form (vgl. Text S. 710) — n *Stranvaesia Henryi* (1/3 n. Gr.).

gedrungen, fast kahl, Fr. rot mit hellen Punkten, wie Fig. 389 c, wie bei *M. Keissleri* die eigentümliche scheinsteinige Struktur auffällig. B. sehr an *Sorbus Zahlbruckneri* erinnernd, aber durch Beh. sofort zu unterscheiden.

++ B. 4,5:1,7 = 7:3,8 cm, Lappung z. T. fast null, Unters. silberweißfilzig, Nervenpaare 8—9.

7. *M. Folneri*: b ?, junge Triebe locker weißfilzig, ☉ kahl, ∞ feine Lent., Kn. spitz-eifg., fast kahl; B. an Blzw. wie Fig. 386 q, kaum gelappt, an Igtr. wie p o. noch deutlicher, aber stumpf gelappt, ober. tiefgrün, so gut wie kahl, unters. kahlen nur die Nerven —, Stiel 5—12 mm; Blst. ziemlich dichtbl., 5—6 cm Dm., weißfilzig, Bl. 6—8 mm Dm., Stielehen 5—10 mm, Achse und K. (außen) beh., sonst vgl. Fig. 387 n—n¹, Gr. 3, Frkn. gut dreifächerig (ohne Zentral-spalt), Fr. elliptisch-oval, rot, ca. 14:10 mm.

M. f. C. K. SCHN., in Bull. Herb. Boiss. 1906. — China: Hupei (HENRY, No. 4065). — Sehr empfehlenswert!

Da bei *Sorbus subfusca* (S. 685) der K. abfällt, so halte ich es nicht für ausgeschlossen, daß es vielleicht richtiger ist, die letzten 5 Arten mit *subfusca* als Sekt von *Sorbus* zu führen und nur die erstgenannten bei *Micromeles* zu belassen, wie es DECAISNE tat. Man muß eben alle Merkmale in Betracht ziehen!!

Gattung 156. *Raphiolepis* LDL., in Bot. Reg. VI. 468. 1820.

[Traubenapfel.]

Vgl. oben S. 652 und S. 653. b o. kleine b. B. immergrün, einfach, derblederig, Blst. in ihrer Tracht corymbös oder mehr rispig-traubig, z. T. fast einfach traubig, Trgb. abfällig, lanzettlich o. lineal, lang, Bl. , weiß, Bl.-Achse weit becherfg. o. röhrig über Frkn. verlängert, dieser freie Teil zur Frz. abfällig, C. länglich, K. spitz dreieckig o. pfriemlich, oft gerötet, Stb. 20, Gyn. 2, mit je 2 Sa., Gr. kahl, am Grunde verwachsen, Fr. ± kugelig, mit trocken fleischigem Exo- und

dünnem Endocarp. S. wenn einzeln kugelig, sonst einseitig ganz flach, meist 2. — Es dürfte ca. 4 gute Arten geben*).

Fig. 389. *a—b*¹ *Micromeles Schwerini*: *a* Bl. im L.-Schn. und K.; *a*¹ C.; *b* Fr.; *b*¹ dgl. im L.-Schn. — *c—c*¹ *M. Hemsleyi*: Fr. im L- und Q.-Schn. — *d—d*¹ *Keissleri*: Fr. ganz und im L.-Schn. — *e—e*¹ *Photinia (Pourthiaea) Bergerae*: *e* Bl. im L.-Schn. und K.; *e*¹ C. — *f—g* *P. Beauverdiana*: *f* Bl. im L.-Schn.; *f*¹ C.; *g* Fr. *h—h*¹ var. (Text S. 710): wie *f—f*¹. — *i—i*¹ *Stranvaesia Davidiana* (Text S. 713): *i* Bl. im L.-Schn. und K.; *i*¹ C.; *i*² Fr.-Q.-Schn. (Original).

R. umbellata (R. japonica): *b—b*¹, bis 3 m, junge Zw. feinfilzig, ältere kahl; B. aus spitzkeiligem in den Stiel verschmälerten Grunde oval o. oboval, Spitze stumpf o. abgerundet (Fig. 391i—k), Rand vom unteren Drittel einfach säge-

Fig. 390. *a—g*¹ *Photinia*: *a—b serrulata*: *a* Bl.-L.-Schn. mit K.; *a*¹ C.; *b* Fr. *b*² *integrifolia*: *b—b*¹ wie *a—a*¹; *b*² Frkn.-Q.-Schn. (Mitte). *c—d glabra*: wie *a—b*. *e—f*² *arbutifolia*: *e* Bl.-L.-Schn.; *e*¹ C.; *f—f*¹ Fr. längs und quer geschnitten; *f*² E. *g—g*¹ *mexicana*: Bl. im L.-Schn. und C. — *h—h*¹ *Raphiolepis umbellata*: *h* Bl.-L.-Schn.; *h*¹ C.; *h*² Frkn.-Q.-Schn. (Mitte); *i* Fr.-L.-Schn. (Original).

zählig o. - ganzrandig, jung bes. unters. - feinfilzig, dann bald ganz kahl, ober. tiefgrün, - glänzend, unten heller, z. T. bereift, 4:2—8:3 o. 7:4 cm, Stiel bis 1,5 cm; Blst. zusammengesetzte endständige Doldentrauben, die ihre Grundblätter

*. Solange ich nicht genau weiß, was eigentlich LINNE unter *Crataegus indica*, Sp. pl. II. ed. 683 1762, verstand, worauf sich angeblich LINDLEYS *R. indica*, l. c., gründen soll, kann ich die übrigen beschriebenen Arten, bes. die von LDL., Coll. Bot. t. 3. 1824, *rubra*, *Phacostemon* und *salicifolia* nicht sicherstellen. Sie gehören augenscheinlich einer Gruppe mit linealen Trgb. und K., spitzen C. und röhrig verlängertem freien Teil der Bl.-Achse an. Blst. z. T. corymbos, - kurzer als Grundblätter (ob *indica* L.), z. T. mehr verlängert, - einfach traubig (*salicifolia* LDL. etc.) o. rispig (Pflanzen von Java, ? *R. spiralis* DON, Gen. Syst. II. 602. 1832).

meist überragen, Achsen wie Bl.-Achse und K. (beiders.) dicht feinfilzig, C. oblong, nicht spitz, K. $\pm$ so lang wie C., nicht pfriemlich, ebenso die Trgb., Fr. blauschwarz, bis ca. 12:10 mm, sonst vgl. Fig. 390 h—i.

Hierher *f. ovata* (*R. ovata* BRIOT, in Rev. Hort. 1870 71. 348) mit besonders breit obovalen B., die bis 9:5,5 cm messen; fast allein in Kultur.

R. u. (*Laurus umbellata* THBG., Fl. jap. 175. 1784; *R. japonica* S. et Z., Fl. jap. 162. t. 85. 1835). — Doldiger T. S.-Japan, wohl auch Korea- und Luchu-Archipel. Bonin-Isl. Felsige Küstenhänge, Flußufer. — Blz. V. — Frz. IX—X.

Nur für wärmste Lagen im Freien, sonst Kalthaus. — Es scheint eine kaum als Art abtrennbare Form vorzuliegen, die am oberen Rande kahle Bl.-Achsen und kahle o. kahlende K. hat. Vielleicht echte *indica*. Vgl. Anmerkung! Ob die ganzrandigen Formen von der Bonin-Isl. (*R. Mertensii* S. et Z., l. c. 144, bezw. *R. integerrima* HOOK. et ARN., Bot. Beech. Voy. 263. 1841 [ob früher?!]) zu *umbellata* gehören, ist mir noch fraglich.

Gattung 157. *Photinia* LDL., in Trans. Lin. Soc. XIII. 103. 1821
[sensu KOEHNE*].
[Glanzmispel.]

Vgl. oben S. 653, b—h, B. immer- o. sommergrün, einfach. Bl. in sehr reich- bis wenigblütigen Doldenrispen, C. weiß, Stb. 20(—25), selten

10, Gr. 2—3, am Grunde bis fast ganz verwachsen, Frb. zentral meist (nicht immer) ganz verwachsen, meist einen etwa halb unterständigen 2—3-fächerigen Frkn. bildend, doch schwankt die Höhe der dorsalen Verwachsung der Frb. mit der Bl.-Achse, Fr. rot mit bleibendem K., der freie Kernhausscheitel hohl (die S. in ihn hineinreichend).

Sekt. 1. *Euphotinia*:
B. immergrün, meist $\pm$ groß, Bl. in meist sehr reichbl. großen Doldenrispen, ihre Achsen nicht reich mit warzigen Lent. besetzt.

Fig. 391. a—h *Photinia*:
B. von Blzw.: a—b *serrulata*
— c—d *integrifolia* — e—f
glabra — g—h *arbutifolia* —
i—k *Raphiolepis umbellata* ($\frac{2}{5}$
n. Gr.) (Original).

*) Ich ziehe vorläufig also ebenfalls die Gattungen *Heteromeles*, die sich ganz sicher kaum abtrennen läßt, und *Pourthiaca* hinzu. Doch betone ich, daß *Pourthiaca* eine abweichende Blattnervatur zeigt, indem die Hauptnerven stärker hervortreten und in Bogen gegen oben bis fast zum Rande scharf durchlaufen. Das Nervennetz ist sehr fein. Bei *Photinia* (incl. *Heteromeles*) ist das Nervennetz 1. Ordn. mehr durch Maschenbildung mit

Man beachte auch die Anm. auf S. 706 wegen B.-Nervatur. Etwa 10—12 Arten*).

○ B.-Stiel 2—3.5(—4) cm, B. 10—18 cm lang im Mittel; C. kahl.

1. *P. serrulata*: kahler $\bar{p}$ bis kleiner $\bar{p}$, nur B.-Stiel-Oberseite und B.-Rippe oben jung grauzottig, später B. oberse. sattgrün, unters. hellgrün, zuw. etwas bereift, in Form wie Fig. 391 a—b o. Spitze etwas mehr vorgezogen, Grund rundlicher, Zähnelung zieml. fein und spitz, Textur derblederig, ca. 10:3—18:5.5 cm; Blst. kahl, 10—15 cm Dm., Bl. ca. 7 mm Dm., vgl. Fig. 390 a—a', Fr. wie b.

P. s. LDL., l. c. (*P. glabra* var. *chinensis* MAX., in Bull. Ac. Petersbg. XIX. 179. 1874). — China**): Chekiang, Fokien. — Blz. IV—V. — Frz. Sommer. — Nur im südlichen Teile des Gebietes für Freilandkultur geeignet. Eine sehr ähnliche Kulturpflz. mit aber dünneren, fast grannig gesägten, kürzer gestielten B. ist mir noch unklar.

In den Bl. (Fig. 390 b—b') fast ganz analog ist *P. integrifolia* LDL., l. c., die aber durch kürzer gestielte, meist spitzere, ca. 10:3—4 bis 15:5 cm messende B. (Fig. 391 c—d) abweicht; ich sah Expl. aus Nepal, Sikkim, Khasia. Sie wird hfg. mit *P. Notoniana* verwechselt.

○○ B.-Stiel ca. 6—12 mm, B. 5—10 cm lang im Mittel (Fig. 391 e—f), C. am Grunde zottig gewimpert.

2. *P. glabra*: in Heimat z. T. $\bar{p}$, bis 6:0.2 m, sonst von *serrulata* noch abweichend durch: B. (im Austrieb rot) kaum über 10:3.5 cm, gleich Stiel stets kahl; Blst. ca. 5—10 cm Dm., Bl. ca. 10 mm Dm., sonst wie Fig. 390 c—c', K. spitzer, $\pm$ drüsig gezähnel, Fr. wie d.

P. g. MAX., l. c. 178 [nur var. *typica*?] (*Crat. glabra* THBG., Fl. jap. 205. 1784; *Sorbus glabra* ZBL., im H. d. D. D. G. 200. 1903, ex p.). — Jap. (subtrop. Zone) und Nord-China. — (Gleich *serrulata* durch Kultur weitverbreitet, ob härter als diese?

Als für diese Sekt. neue Art muß ich noch anführen *P. Beckii* aus Yünnan, lg. HENRY, No. 9795 A, Mengtze, woods, 5500'. Steht der Beschreibung nach der in Anm. erwähnten *P. lasiogyna* nahe, aber durch die Art der Beh. der Zw. und Blst., die ganzrandigen B. und die kürzere Stielung derselben abweichend. Hauptmerkmale: $\bar{p}$, bis 5 m [HENRY!], junge Zw., Blst. (im unteren Teil bes.) und B.-Stiele dicht weich kurz seidenborstenfilzig, erst ○ Zw. kahlend; B. aus $\pm$ keiligem Grunde breit oblong, kurz zugespitzt, 5—8 cm lang und im oberen Drittel 2—3.5 cm breit, nur ganz jung feine aufgesetzte Drüsenzähnen zuw. vorh., Textur dünnlederig, oberse. hell glänzend grün, unters. mäßig heller, nur jung Rippe beiders. beh., Stiel nur 8—10 mm; Blst. reichbl., ca. 7:8 cm, Achsen nach Ende zu dünner beh., Bl. ca. 7 mm Dm., weiß, Recept. und K. kahl, dieser kurz halbkreisfg., fein drüsenzähnelig, C. rundlich, innen am Grunde $\pm$ beh., Stb. 20, bei Anthese so

dem 2. Ordn. verknüpft. Jedenfalls bedürfen diese Verhältnisse sehr der Beachtung, wie auch die Anatomie der B. für eine wirklich eingehende Untersuchung der z. T. noch sehr unvollkommen bekannten Arten unbedingt berücksichtigt werden muß. Eine solche Untersuchung konnte ich schon aus Mangel an Zeit nicht durchführen.

*) Außer den genannten scheinen noch gute Arten: *P. Lindleyana* W. et ARN., Prodr. Fl. ind. I. 302. 1834; *P. Notoniana* W. et A., l. c., beide in Sikkim, bezw. südl. Vorder-Ind. und Ceylon, sehr variabel; dann die beh., zieml. dunnblattrigen *P. Griffithii* DECNE., in Mem. l. c. 142. 1874 und (die mir unbekannte) *P. mollis* HOOK. F., Fl. Brit. Ind. II. 381. 1878, ferner die 2 Arten mit drusenpunktigen B., *P. prunifolia* LDL., in Bot. Reg. XXIII. 1956. 1837 und *P. melanostigma* HANCE, in Jour. of Bot. 1882. 5., beide O.-China. Wahrscheinlich auch *Eriobotrya lasiogyna* FRANCH., Pl. Delav. 225. 1889 aus Yunnan. Dagegen ist die *Eriob. prionophylla* FRANCH., l. c., aus Yunnan, von der er einen Blzw. auf tab. 46 abbildet, weder eine *Eriobotrya* noch eine Pomacee, sondern steht mit den 2 seitlich gar nicht mit dem Recept. verwachsenen Frb. mit je 2 Sa. der *Dichotomanthes tristaniaecarpa* KURZ, in Jour. of Bot. 1873. 194. cf. HEMSLEY, in HOOK. Icon. t. 2653. 1900] aus Yunnan, anscheinend nahe. Dürfte aber eine neue Gattung bilden. Ich komme im Hauptnachtrage auf beide Arten zurück.

**) Ob auch W.-China, Hupei und Sz'ischwan, ist mir fraglich, denn die Expl. HENRY, No. 5490 (Bl., sehr ähnlich!) und No. 1649 (Fr.) bleiben so lange unsicher, als nicht die himalayischen Arten scharf umgrenzt sind.

lang wie die 2 zur Hälfte verwachsenen Gr., Frb.-Spitzen $\frac{1}{2}$ frei, beh., Zentralraum deutlich.

Sekt. 2. *Heteromeles* [ROEM., Mon. Syn. III. 105. 1847. als Genus] wie *Euphotinia*, aber Stb. 10. Nur folgende Art*).

3. *P. arbutifolia*: $\text{b} - \text{b}^1$, bis ca. 8 m hoch, junge Zw. braungrau filzig, dann purpurbraun; B. wie Fig. 391 g—h, nur jung bes. an Rippe und Stiel $\pm$ filzig, dann kahl, ober. lebhaft sattgrün, unter. hell- o. leicht bläulichgraugrün, leicht papillös, Zähnelung scharf, $\pm$ entfernt, mit drüsigen Spitzchen, im Mittel 6 : 8 : 2—3 o. bis 9 : 3,5 cm, Stiel 1—1,8 cm; Blst. breitpyramidal, bis 15 cm Dm., Achsen locker filzig, Bl. weiß, ca. 8 mm Dm., Bl.-Achse meist im unteren Teil locker beh., sonst wie Fig. 390 e—e¹, Fr. purpurn (f—f²), spät abfällig.

P. a. LDL., in Bot. Reg. t. 491. 1820 (*Crataegus arb.* AIT. F., Arb. Kew. ed. 2. III. 202. 1811; *Heteromeles arb.* ROEM., l. c.). — Kalifornische Glanzmispel. TOLLON, Toyon. — Calif., bes. Inseln der Küste. — Flußtäler, trockene Hänge, bis 600 m. — Blz. VI—VIII. — Frz. IX—X. — Nur für den S. des Gebietes zur Freilandkultur geeignet.

Fig. 392. *Photinia* [*Pourthiaca*]: h—i villosa typica: h Bl.-L.-Schn.; h¹ C.; i Fr.-L.-Schn.; k—m² var. laevis: k Bl.-L.-Sch.; k¹ C.; k² K. und Stb.-Ansatz; k³ Frkn.-Q.-Schn.; l Fr.; m deren L.-Schn.; m¹ Q.-Schn.; m² S. im L.-Schn. — n arguta: junge Fr. im L.-Schn. — o—o¹ parvifolia: o Bl.-L.-Schn.; o¹ C. — p—p¹ Benthamiana: wie o—o¹ (Original).

Sekt. 3. *Pourthiaca* [DECNE., in Mem. l. c. 146. 1874. als Genus]. B. meist kleiner und zuw. sommergrün, meist schärfer und dichter gesägt (Fig. 393 c—r). Blst. meist klein, ziemlich wenigblütig (bis fast einzelblütig). Achsen meist $\pm$ deutlich warzig, Stb. 20. Man beachte auch Anmerk. S. 706 wegen der B.-Nervatur! — Arten sämtlich erwähnt.

○ Blst. büschelfg. verkürzt. Hauptachsen der Partial-Blst. kaum 1 cm lang, alles graufilzig beh., B. immergrün, lederig, wie Fig. 393 h—i.

4. *P. arguta*: b bis kleiner b^1 , junge Zw. graufilzig, c^1 $\pm$ bis ganz kahl, B. im Anfang ober. $\pm$ sehr locker, unter. bes. am Grunde der Rippe gleich Stiel grauzottig, bald so gut wie kahl, unten hellgrün, 5 : 2—8 : 3—3,5 cm, Hauptnerven ca. 10, Grund $\pm$ rundlich, nur in den bis 6 mm langen $\pm$ beh. Stiel vorgezogen; Blst. ca. 8—12-blütig, Bl. wie bei villosa typica (Fig. 392 h), Fr. (unreif) wie n, meist 3-fächerig.

P. a. LDL., in Bot. Reg. XXIII. ad t. 1956. 1837 [WALL., Cat. No. 672. 1829] (*Pourthiaca arg.* DECNE., l. c. 147. 1874; *Pourth. arguta* var. *Wallucha* HOOK. F., Fl. Brit. Ind. II. 382. 1878; *Sorb. arguta* ZABEL, in H. d. D. G. 200. 1903). Ich sah Expl. aus O.-Bengal., Khasia, Assam. — Gebirge bis 1800 m. — Blz. IV.

*) Von *Chamaemeles mexicana* BAILL., in Adansonia IX. 148. 1868/70, aus Mexiko, welche HEMSLE., Biol. Centr.-Am. I. 380. 1880, als *Phot. mexicana* führt, sah ich nur ein Blzw.-Stück (LINDEN, No. 382). Die Bl. zeigen 20 Stb., 2 ganz verwachsene Gr. (Fig. 390 g—g¹) und sehen sonst *arbutifolia* (wie auch die B.) recht ähnlich. Da ich aber keine Fr. kenne, bleibt mir diese Pflze. noch fraglich.

Kaum in Kultur und nur für den S. des Gebietes Freilandpflanze. — HOOKER unterscheidet, l. c., mehrere Varietäten, indem er *Pourth. salicifolia* und *P. Hookeri* DECNE., in Mem. l. c. 148, als solche hierher zieht und noch 3 neue aufstellt. *Photinia salicifolia* hat B. wie Fig. 393k und viel lockerere längerachsige Blst., die B. scheinen mehr beh. Doch sah ich nur Fr.-Expl. An sie schließt sich die wohl eine eigene Art darstellende *P. birmanensis* (*Pourth. arg. var. latifolia* HOOK., l. c.) nahe an, soweit ich es nach dem Expl. Herb. GRIFFITH. No. 2103, Birma, beurteilen kann. B. (ca. 6:2,5) bis 11:5 cm mit unters. lange bleibender flockig-filziger gelblicher Beh., vgl. Fig. 388f, S. 704. Jedenfalls bedarf der Formenkreis von *arguta* s. HOOK. sehr der Klärung.

○○ Blst. in lockereren, längerachsigen + zusammengesetzten o. in wenigblütigen kahlen Scheindolden, B. wie Fig. 393c—g, l—r und Fig. 388d—e, h—m, S. 704.

➤ Blst. über 10-bl., deutl. zusammengesetzt, B.-Stiele über 2 mm lang. ↔ siehe S. 711.

+ B. wie Fig. 388d—e, S. 704 und Fig. 393c—f mit 5—7 Hauptnervenpaaren, Stiel 2—7 mm.

B. breitlanceollich, stets kahl (Fig. 388d—e, S. 704), Stiel 5—7 mm, Bl.-Stiele 6—8(—10) mm.

5. *P. Bergerae*: B., bis 1,5 m [teste WILSON], Zw. kahl, glänzend rot- o. purpurbraun, Lent. deutl., aber mäßig ∞; Kn. eifg., zweifarben, nur Sch. gewimpert; B. zuletzt derb, schon zur Blz. kahl, ober. glänzend olivgrün, unters. mäßig heller, Serratur fein scharf gleichmäßig, 4:1—6:2 cm; Blst. kahl, feinwarzig, ca. 3 cm hoch und 4—6 cm Dm., Bl. etwa 1 cm Dm., vgl. Fig. 389e—e', S. 705, Gr. meist 3, Stb. 20—25; Fr. purpurn, ründlich-oval, ca. 7:6 mm.

P. B. — China: W.-Hupei, lg. WILSON, No. 86, Bl. im April; ferner wohl auch No. 1000 mit Fr. vom Oktober, nur hier mit nur 4—5 Nervenpaaren. — Einführens-wert. Ich widme diese Art der Gattin meines Freundes A. BERGER in La Mortola.

Fig. 393. B. von Blzw.: a *Stranvaesia Nussia* — b *St. undalata* (?) — c—q *Photinia* [*Pourthiaea*]: c—f *villosa*; c var. *typica*; d var. *Zollingeri*; e—f var. *laevis* — g *parvifolia* — h—i *arguta* — k *salicifolia* — l—m *Benthiana* — n—o *lucida* — p—q *Beauverdiana* ($\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

B. oboval mit aufgesetzter Spitze (Fig. 393c—f), Stiel 2—5 mm, Bl.-Stiele 10—20 mm.

6. *P. villosa*: $\bar{p}$, o. in Heimat wohl auch kleiner $\bar{p}$, Zw. bis ins erste Jahr + beh. (vgl. aber var.!) Kn. kurz kegelfg., + kahl^{*)}; B. variabel, 3:1,3 8:3 o. 9:4 cm, +- über Mitte am breitesten, deutliche Hauptnerven 5-7, oben satt-, unten hellgelbgrün, Beh. vgl. var.; Blst. zuw. doldentraubig, Bl. ca. 7-10 cm Dm., vgl. Fig. 392h-h¹, k-k³, Fr. rot o. gelbrot, bis 10:8 mm, eßbar, vgl. l-m² und i.

Ich unterscheide: var. *typica* (Pourth. *villosa* DECNE., l. c. 147). Zw. erst + kahlend, B. im Mittel nicht unter 7:3,5 cm, zur Frz. beiders. (oben spärlicher) locker beh., Blst. dicht graufilzig, zieml. reichblütig, Bl.-Achse und K. (beiders.) beh. - var. *Zollingeri* (Pourth. *Zollingeri* DECNE., Mem. l. c. 149): B. wenigstens unters. + lange locker beh., Blst. locker beh., Bl.-Achse kahl o. nur im unteren Teile beh. - var. *laevis* DIPP., Laubholzk. III. 380. 1893 (*Crataegus laevis* THUNB., Fl. jap. 204. 1784; *Phot. laevis* DC., Prodr. II. 631. 1825; Pourth. *corcana*, Thunberg, et *P. Oldhamii* DECNE.**), l. c.; *Sorbus villosa* var. *laevis* ZABEL, im H. d. D. D. G. 200. 1903): Zw., B. und Blst. kahl, höchstens ganz jung etwas beh.

P. v. DC., l. c. [sensu MAXIM. 1874] (*Stranvaesia digyna* S. et Z., in Abh. Ac. Münch. 1846. 131; *Phot. variabilis* HEMSLE., in Jour. Lin. Soc. XXIII. 263. 1887 ex p., *Sorbus villosa* ZBL., l. c.). - Jap., Korea - Im Gebirge bis 1000 m. Blz. V. - Frz. X. - In Kultur, bes. var. *laevis* und Übergangsformen, die ich als var. *Zollingeri* festhalte. DECAISNE ist in der Spaltung der Formen wohl viel zu weit gegangen, doch bedarf der Formenkreis einer Untersuchung auf Grund reichsten Materials.

++ B. mit 8-14 Hauptnervenpaaren, Stiel 7-10 mm o. jedenfalls sonst B. über 9 cm lang.

△ B. wie Fig. 393p-q und Fig. 388h-m o. auch etwas kürzer und breiter, aber höchstens 4,5 cm breit, Serratur dicht geschlossen, Blst. höchstens 5 cm Dm. und Bl.-Stiele nur bis 10 mm lang.

7. *P. Beauverdiana*: $\bar{p}$, bis 6 m [teste WILSON], kahl, nur B. an Rippe und Nerven zur Blz. - verstr. beh., 6,5:2-10:3,3-3,8 cm o. - breiter, ca. 7:3,5-10:4,5 cm, Serratur fein, kurz, drüsig, + anliegend, Unters. wenig heller, Blst. kahl, feinwarzig, ca. 2,5 cm lang und ca. 4-5 cm Dm., Bl.-Stiele 5-10 mm, Bl. 8-10 mm Dm., sonst wie bei *Bergerae*, Fr. purpurn, rundlich, ca. 6:5 mm.

P. B. C. K. SCHN., in Bull. Herb. Boiss. 319. 1906. - Ich beschrieb diese Art nach Bl.-Expl. lg. HENRY, No. 5599, Sz'tschwan. Ganz analog sind m. E. die Fr.-Expl. No. 7095. Auch die Bl.-Expl. von WILSON, No. 964 aus W.-Hupei weichen kaum ab und WILSON hat unter gleicher No. auch analoge Fr.-Zw. ausgegeben. Zur Frz. sind die B. stets derber (aber doch nicht dick) und die Nerven unters. mehr erhaben und kahl. Die Bl.-Expl. von HENRY, No. 5599A aus Hupei zeigen eine vielleicht noch feinere schärfere Sägung und ein wenig kürzere (7:3,5 9:4 cm) und mithin enger genervte B. Aber kaum besondere Form. Auch HENRYs No. 3768 und 4566 aus Ichang dürften hierherzustellen sein. - Eine gute Var. mit kleineren kurzspitzigeren B. (4:2,3-6:3,3 cm) stellen vielleicht die Expl. lg. WILSON, No. 794 et 1056 aus W.-Hupei und v. ROSTHORN, No. 1819 aus Sz'tschwan dar. Auch die Expl. lg. v. ROSTHORN, No. 1827, 1828 und 2291, aus Sz'tschwan (Nanschuan) gehören vielleicht einer besonderen Var. an. B. mehr gegen Spitze am breitesten, Nervenpaare im Mittel 8, Beh. reichlicher, bes. die bis 1,5 mm langen Stiele. Nur Bl. vorh.

Nahe steht nach einem Bl.-Expl. von OLDHAM, No. 99 wohl *Phot. lucida* (*Phot. villosa* var. *formosana* HANCE, l. c. 211 [unten]; Pourth. *luc.* DECNE., l. c. 148) von Formosa. Ganz kahle Art mit B. wie Fig. 393n-o, immergrün 5:2-9:4 cm, Stiel 5-8 mm; Blst. und Bl. etc. fast wie bei *villosa* var. *laevis*.

Was DECNE. unter seiner *Pourth. Calleryana*, l. c., versteht^{*)}, weiß ich nicht. Man könnte glauben, daß sie mit der *Phot. Benthamiana* HANCE, in Ann. Sc.

^{*)} Vgl. Fig. 315g-k, S. 529, aber auch meine Dendr. Winterstudien, p. 187.

^{**) Pourth. *Cotoneaster* DECNE., l. c., aus Japan (lg. ZOLLINGER, No. 549) ist mir noch unklar. - Zur Sekt. *Pourthaea* dürfte auch *Phot. pustulata* LED., in Bot. Reg. ad tab. 1956. 1837, von Kanton gehören. Zw. und Blst. dichtwarzig, B. derblederig, ca. 8:4 cm, eifg., beidendig zugespitzt, kahl, Stiel ca. 8 mm; Frst. ca. 6 cm Dm., Fr. elliptisch, 9:6-7 mm.}

Nat. sér. 5. V. 213. 1866, aus Kwangtung, zusammenfällt. Sie soll im Hort. VILMORIN in Kultur sein, was ich aber von Herrn VILMORIN erhielt, bleibt mir noch fraglich. HANCES Original (No. 1501) hat beh. Triebe, B. wie Fig. 3931—m, 4:2 9,5:4 o. 10,5:3,3 cm, ober. fast kahl, unters. auch fast nur an Rippe locker beh., Serratur — entfernt, Stiel 4—8 mm, beh.; Blst. locker, — graufilzig, ca. 7 cm Dm., 5 cm hoch, Bl. wie Fig. 392 p—p', Achse und K. (beiders.) dicht beh., Stielchen 3—5 mm, Gr. 2—3, Fr. ? — Vielleicht gehören zu *Calleryna* die Expl. HENRYS, No. 11296 und 12120A aus Yunnan, die aber von *Beaucardana* eigentlich nur durch am Grunde — spitzkeilige B. abweichen. Jedenfalls bedürften diese chinesischen Arten noch sehr der Beobachtung.

— B. breit länglich-elliptisch, beidendig fast gleichmäßig zugespitzt, 9—13:3,5—6 cm, Serratur fein aber ziemlich entfernt und abstehend zahnig. Blst. 8—10 cm Dm., Bl.-Stiele 1—1,8 cm.

8. *P. notabilis*: $\bar{h}$, bis 10 m [WILSON], ☉ Zw. sehr locker beh., braunrot mit feinen kahlen Lent., die später mehr auffallen; Kn. spitzeifg., B. für eine Pourthiaee sehr groß, Grund breitkeilig, spitz in Stiel vorgezogen, Seiten fast parallel laufend, Spitze — plötzlich vorgezogen, kurz aber fein, Nervenpaare ca. 12, ober. sattgrün, nur jung spärlich beh., unters. wenig heller, mit lockeren Kraushaaren — bestreut, zuletzt fast kahl, Blst. ca. 6 cm hoch, kahl, — warzig, feinästig, Bl. bis auf die breit dreieckigen K. (innen beh.) und die 2—3 beh. Frh.-Gipfel kahl, ebenso die rundovalen C. innen an Basis beh., Fr. purpurn, ca. 7:5 mm.

P. n. — China: W.-Hupei, lg. WILSON, No. 359. — Blz. IV. — Durch die großen B. auffallend, an *P. birmanensis* erinnernd, aber diese hat filzige Blst. und andere Beh. der B. wie S. 709 gesagt.

+ π Blst. 1—4(=8)-bl., Bl.-Stiele bis 3,5 cm, B.-Stiele nur 1—2 mm, B. vgl. Fig. 393 g.

9. *P. parvifolia*: wohl $\bar{h}$, kahl; B. bis 6:2,5 cm, in Mitte am breitesten, geschwänzt gespitzt; Blst. beim Typ 2—4-bl., Stielchen haardünn, zur Frz. aber dicklicher, deutl. verrucos, Bl. sonst wie Fig. 392 o—o', Gr. 2. An Fr.-Expl. HENRY, No. 3002 aus Hupei, v. ROSTHORN, No. 494 aus Sztschwan, und HENRY, No. 4064, Ichang sind die Blst. z. T. bis 8-bl., die Fr.-Stiele derber, deutl. verrucos, kaum über 2 cm lang, die länglichen Gr. messen ca. 10:6 mm, B. sonst analog. Ob besondere Formen abtrennbar, bleibt fraglich.

P. p. (*Pourthiaea parvifolia* PRITZEL, in ENGL. Jahrb. XXIX. 389 1900). — China: Hupei, lg. HENRY, No. 5830 und WILSON, No. 1001. — Sehr zierliche Art, die eingeführt werden sollte!

Gattung 158. *Eriobotrya* LDL. in Trans. Lin. Soc. XIII. 102. 1821.

[Wolltraube.]

Vgl. oben S. 653 und Art*).

E. japonica: $\bar{h}$ — $\bar{h}$. Triebe, wie B.-Unters. und Blst., dick rostgrau filzig, B. derblederig, vgl. Fig. 386 a, S. 702, bis 25:7—8 cm, ober. glänzend sattgrün, so gut wie ganz kahlend, Stiel fast null, da B.-Spreite sich spitz bis an den Grund herabzieht; Blst. breitpyramidal, bis ca. 17:17 cm, rispentraubig, Bl. vgl. Fig. 394 a—a', K. innen etwas schwächer filzig als außen, C. innen beh., Stb. 20, Gyn. 5, Frkn. fast ganz unterständig (was aber bei anderen Arten wechselt), Gr. am Grund verwachsen (ob immer?), Fr. groß; ohne K., Exocarp holzig, meist nur

*) Man vgl. betrefls der 5—6 anderen Arten vor allem HOOKER F., in Fl. Brit. Ind. II. 372. 1878, sie bedürfen noch sehr der vergleichenden Untersuchung. Gegen *Photinia* unterscheiden sie sich in dem Ausbau der Blst., in der viel größeren Fr., aber auch vor allem in der B.-Nervatur mit durchlaufenden Hauptnerven. Jedenfalls darf man den Bl.-Bau nicht als ausschlaggebend ansehen und die Arten mit 2—3 Gr., wie *E. dubia* DECNE., sensu HOOK. F., l. c. (*Phot. dubia* LDL., l. c.) nicht zu *Photinia* stellen, wie es KOCHNE will. *Eriobotrya* gar zu *Sorbus* zu ziehen, wie es ZABEL, im H. d. D. D. G. 200. 1903, andeutet, ist denn doch ganz unbegründet und führt nur zu Unklarheit!

wenige S. ausgebildet und Färbung dann nicht zu erkennen; ob Querschnitt b¹ richtig? *).

E. j. LDL., l. c. (*Mespilus jap.* THBG., Fl. jap. 206. 1784; *Sorb. jap.* ZABEL vgl. Anm., S. 703 und 711)]. — Soll in W.-China (Sz'tschwan etc.) wild sein,

Fig. 394. *a—b* *Eriobotrya japonica*: *a* Bl.-L.-Schn.; *a'* C.; *a''* Frkn.-Q.-Schn.; *b* Fr.; *b'* dgl. Q.-Schn. — *c—e* *Stranvaesia Nussia*: *c* Bl.-L.-Schn. und N.; *c'* C.; *d* Frkn.-Q.-Schn.; *e* Fr. im L.-Schn. — *f—i* *undulata* (?). *f—g* [HENRY, No. 1760] wie *c—d*; *h—i* dgl. [HENRY, No. 5698]. — *k—l* *amphidoxa*: wie *c—d*. — *m—m'* *Calleryana* (?) [WILSON, No. 301]: Bl.-L.-Schn. und C. (Original).

*) Die punktierten äußeren Lamien müssen nicht nach dem Stiel verlaufen, sondern sich unter dem Kernhaus vereinigen, da in dieser Grenze sich das gesamte Kernhaus gleichsam als „ein Samen“ herauslöst.

sonst in China, Indien, Jap. seit langem durch Kultur verbreitet, ebenso in S.-Eur. Blüht in Jap. IX—X und reift Fr. im Juni—Juli. Für uns nur im S. des Gebietes als Freilandpflz. brauchbar.

Gattung 159. *Stranvaesia* LDL., in Bot. Reg. XXIII, t. 1956. 1837.

Vgl. oben S. 652 und S. 653; *b* bis kleine *b*. B. immergrün (ob stets?), dünnlederig, einfach, Bl. in endständigen Doldenrispen, Trgh. abfällig, C. weißlich, Stb. 20, Gyn. (2—5), fast ganz bis halb unterständig, also dorsal Frb. kaum o. bis fast $\frac{1}{2}$ frei, Sa. je 2, N. ge-
lappt, Fr. von dem freien Teil der Bl.-Achse und den bleibenden K. bedeckt, das ganze Kernhaus sich als ein zarthäutig umhüllter „Schein-
stein“ herauslösend. — Nur etwa 5 Arten bekannt**).

*) DECNE. deutet freien Zentralraum an, was mir sehr fraglich. KOEHNE scheint keine Fr. untersucht zu haben, wenigstens erwähnt er den abfallenden K. nicht.

**) An *Str. Calleryana* DECNE., l. c. 179, aus Kanton, erinnert ein Expl. lg. WILSON, W.-Hupei, No. 301, das habituell allerdings der *Micromeles Decaisneana* (S. 701) recht ähnelt. Aber Gr. 5, N. seicht-gelappt, Discusring fehlend (Fig. 394m).

St. Nussia (*St. glaucescens*): kleiner b , junge Zw. — teinfilzig, dann kah-
lend, purpurbraun, warzige Lent. später sehr auffällig, B. variabel, breit länglich-
lanzettlich (Fig. 393a), durchweg gezähnt o. + bis fast durchaus ganzrandig, zuletzt
ziemlich derb, bis auf Rippe unters. o. ganz kahlend, obers. + bereift und sattgrün,
unten glänzend hellgrün, 5 : 1,5 — 14 : 5 cm, bei var. *angustifolia* (*glaucesc.* var. *ang.*
DCNE.) bis 12 : 2,5 cm, Stiel bis 3 cm; Blst. bis 10 cm Dm., anfangs Achsen, Bl-
Achsen und K. (außen) dicht filzig, zur Frz. — bis ganz kahlend, sonst Bl und
Fr. wie Fig. 394c—e.

St. N. DCNE., in Nouv. Arch. Mus. Paris X. 178. 1874, erweitert. (*Pyrus Nussia*
HAM., ex DON, Prodr. Fl. Nepal 237. 1825; *Crataegus glauca* WALL., Cat. 673.
1829; *St. glaucescens* IDL., l. c.; *St. glauca* BAILL., Hist. Pl. I. 411. 1868). — Kumaon,
Nepal bis O.-Bengalen. — Im Gebirge bis 2500 m. — Blz. VI (England). — Gleich
Raphiolepis nur für wärmste Lagen und den Süden des Gebietes.

Ich sah noch Expl. von *St. undulata* DCNE., l. c. 179, lg. HENRY, No. 1760,
Hupei (ob auch HENRY, No. 5698, Sz'tschwan u. Hupei): junge Bl wie Fig. 394t—i,
B. wie Fig. 393b, nur 2 : 1 — 5 : 2 cm, ganzrandig, jung beiders auf Rippe beh., Blst
nur ca. 2,5 cm Dm., + locker beh., K. beiders, meist kahl. Diese, wie auch
St. Davidiana DCNE., l. c., aus Tibet, mit ganzrandigen, 10—12 : 2,5—3,5 cm
messenden B., zur Kultur versuchswert. Vielleicht härter als *St. Nussia*. Im
übrigen bemerke ich, daß die *St. Henryi* DIELS, in ENGL. Jahrb. XXXVI. Beibl.
82. p. 52. 1905, die auf die von mir gesehenen Expl. aus N.-Shensi lg. GIRALDI,
No. 6158 gegründet ist und wozu DIELS auch HENRYs, No. 8953 an Sz'tschwan
zieht, mit *Davidiana* und *undulata* so eng verbunden scheint, daß man sie kaum
spezifisch abtrennen kann. An *undulata* schließen sich anscheinend noch an lg.
HENRY, No. 3179 (?) Ichang, lg. HENRY, No. 4080 Hupei, lg. v. ROSTHORN, No. 493
Sz'tschan, und Mittelformen zu *Dielsiana* bezw. *Davidiana* bilden die oben ge-
nannte No. 5698 und WILSONs No. 1067 aus W.-Hupei.

HENRYs No. 11325 aus Yünnan stellt vielleicht die noch unklare *St. glau-
cescens?* var. *yunnanensis* FRANCH., Pl. Delav. 226. 1889, dar. Doch hat das Expl.
normale 5-fächerige kugelige Fr. von ca. 1 cm Dm. B. ganzrandig, 7—9 : 3,5—4 cm,
die etwa 2 cm langen Stiele wie Rippe und Blst. fein bräunlich borstig.

Noch zu erwähnen *Str. amphidoxa* C. K. SCHN., in Bull. Herb. Boiss. 319
1906 (China: Sz'tschwan, lg. HENRY, No. 5565): b ?, junge Triebe gelbgrau filzig, B.
aus keiligem Grunde lanzettlich-oblong, — lang zugespitzt, 5 : 1,5—9 : 2,5 cm, in
o. über Mitte am breitesten, Serratur — entfernt, scharf, gleichmäßig, obers. fast
nur auf Rippe beh., unters. mäßig heller, + (auf Rippe dichter) gelbgrauzottig,
Nervenpaare 5—8, Stiel filzig, 2—5 mm; Blst. klein, ca. 1 cm Dm., dickfilzig, dgl.
Bl.-Achse und K. (innen weniger), Bl. ca. 12 mm Dm., Stielchen 1—1,5 cm, sonst
wie Fig. 394k—l. C. kahl o. fast so, Gr. 5, Frkn. mit — deutl. Zentralraum, Fr.
an dem wohl hierhergehörigen Expl. lg. v. ROSTHORN, Herbst 1861, Nanchuan, ca.
9 : 8 mm, K. — aufrecht. Bau normal, nur Frb. dorsal fast ganz mit Recept.
verwachsen, wie in Bl. Sehr nahe dürfte stehen WILSONs No. 714 aus W.-Hupei,
deren Bl. aber nur 2—3 Gr. zeigen. Soll bis 6 m hoher b sein.

Den Eindruck einer neuen Art, die sich an *amphidoxa* eng anschließt, aber
normal gebaute Fr. (also Frb. dorsal fast $\frac{1}{2}$ frei) hat, die bis 12 : 10 mm messen,
macht das Expl. lg. v. ROSTHORN, No. 445 aus Sz'tschwan: B. mehr lederig, bis
12 : 1,5 cm, obers. glänzend grün, unters. heller, nur an Rippe beh., Nervenpaare
bis 10, Stiel 2—3 mm; Frst. verrucos, mit Haarresten. Ich nenne sie *St. Rosthorni*.

Gattung 160. *Peraphyllum* NUTT., in TORR. et GR., Fl. N.-Am. I. 474. 1840.

[Sandbirne.]

Vgl. S. 653 und Art. Nur diese bekannt.

P. ramosissimum: sparrig starr verästelter, bis 1,5 m hoher b , junge Zw.
grau filzig, (o.) stark kahlend, rund, purpurbraun, — grauschwarz mit deutl. Lent.,
Kn. klein, beh., vgl. Fig. 312m—p, S. 523; B. ☉, sommergrün, an Kztr. gebüschelt,
lanzettlich (Fig. 395), 1,5 : 0,5—5 : 1,5 cm, beiders. hellgrün, jung beh., oben ganz,
unten reichlich kahlend, Stiel 0—4 mm; Bl. an seidl. Krztr. in 2—5-blütigen beh.
Büscheltrauben, weiß o. rosaweiß, ca. 1,5 cm Dm., C. am Grunde beh., Stb. 20.

2-reihig, Gr. 2–3, nach KOEHNE 3–4, Fr. kugelig, gelb mit braunroter Backe, ca. 6(–10) mm Dm., mit $\pm$ vollkommenen falschen Scheidewänden, vgl. Fig. 395.

P. r. NUTT., l. c. — NW.-Am. (Oreg. bis Calif., Color., Utah). — Trockene Hänge. — Blz. V. — Frz.

Fig. 395. *Peraphyllum ramosissimum*: a Bl.-L.-Schn. und K.; a¹ C.; b Frkn.-Q.-Schn.; c Fr. im L.- und bei d im Q.-Schn. (a echte, β falsche Scheidewände), e B. (Original).

IX. — In Kultur noch selten, aber wohl hart an sonnig-warmen Standorten in durchlässigem, sandigem Boden.

Gattung 161. *Malus) MILLER. Dict. ed. VIII. 1768 [et MEDIC. Gesch. Bot. 78. 1793].**

[Apfel; apple; pommier.]

Vgl. oben S. 652 und S. 653: b - $\bar{b}$, B. sommer- o. selten halbmimmergrün, einfach o. π , gelappt, in Kn. gefaltet o. gerollt; Bl. in Scheindolden o. Doldentrauben, weiß o. rosa bis rot, A. meist gelb, Gyn. unterständig, (3–5), mit π deutlichem (oft fast fehlendem) freien Mittelraum, Sa. je 2 (selten 3), Fr. mit o. ohne K., Kernhaus zäh, S. mit brauner Testa. — Alle Arten erwähnt.

B. siehe S. 721. A. B. erwachsener Pflanzen stets ungelappt, in Kn. π deutl. gerollt (vgl. Fig. 397, S. 718).

Sekt. 1. *Eumalus* ZABEL, im H. d. D. D. G. 185. 1903. Nur an Sämlingspflanzen treten $\pm$ gelappte B. auf.

II. s. S. 719. I. Fr. mit bleibendem K., B. wie Fig. 397 a–h, p–r, S. 718.

○○ siehe S. 718.

○ K. $\dagger$ länger als Bl.-Achse, lang zugespitzt, Fr. beidendig vertieft (Fig. 396 n, p), B. wie Fig. 397 a–h, Zähnung π grob kerbsäbig, π Bl.-Achse und K. außen ganz kahl o. Bl.-Achse nur am Grunde beh., B. zuletzt ganz kahl o. nur spärlich (bes. am Grunde) beh. (Fig. 397 a–b).

*) Die *Malus*-Arten und -Formen sind recht schwer zu scheiden, da in der Kultur Hybriden (und vielleicht Mutationen) eine sehr große Rolle spielen. Überdies sind die spontanen Formen erst recht ungenügend untersucht. Trotzdem ich bestreitet war, sehr viel Material aufzutreiben, konnte ich doch zu einer mich halbwegs befriedigenden Lösung vieler Fragen nicht kommen. KOEHNE hat 1890 bzw. 1893 vorgezogen, die *Malus* nach dem Bleiben bzw. Abfallen der Fr.-K. in die Sekt. *Calvomeles* und *Gymnomeles* zu trennen. Allein ich glaube, daß es den Verwandtschaftsverhältnissen besser entspricht, mit ZABEL die stets ungelapptblättrigen Arten einer- und die mit π F. gelappten B. andererseits zusammenzufassen. Diesem Verfahren entspricht auch die Kn.-Lage, wie es scheint, am besten, was aus FOLIGNERS, S. 652, angekündigter neuer Arbeit hervorgehen wird. Weitere Untersuchungen nötig; denn ehe es nicht möglich war, alle spontanen Formen (vor allem *M. spectabilis*) klar zu stellen, bleibt jede Deutung von Kulturformen problematisch. Wer meine zumeist provisorischen Hinweise eingehend vergleicht, wird finden, wie sehr jede Auffassung schwankenden Grundes ist und daß nur systematische Experimente den Deutungen eine halbwegs sichere Basis leihen können.

1. *M. sylvestris*: b—♂, bis 7 m, dicht buschig, breitkronig, Kztr. verdornend, Zw. kahl (höchstens ganz jung beh.), ♀ purpurbraun, Kn. kahl o. fast so, spitz-eifg.; B. aus rundl. o. leicht herzfg. Grunde breitelliptisch o. eirundlich, Spitze ± kurz aufgesetzt, Zähnung doppelt, spitzer o. stumpfer kerbsäbig, meist nur jung oberseits auf Nerven deutl. beh., dann sattgrün kahl, unten heller, Textur fest, im Mittel nicht über 3—5:2—4 cm, Stiel kahl o. verstr. beh., 1—2.5 cm; Blst. schein-doldig, Bl. im Aufblühen rosa, C. ca. 15 mm lang, oblong, mit langem Nagel, K. innen grau-filzig, länger als Bl.-Achse, Gr. meist ganz kahl, Fr. im Mittel 2 cm Dm., rundlich o. eirundlich, zuletzt gelbbrot, essig-sauer, herb, Stiel kürzer.

Wie es mir scheint, kann man außer der beschriebenen var. a. *typica* noch gewisse, weder bei *pumila* einreihbare, noch als Bastarde mit dieser anzusehende Kulturformen mit dornenloser, lockerer Krone, größeren B. und größeren Bl., deren Bl.-Achsen häutiger beh. sind, als var. b. *hortulana* unterscheiden.

M. s. MILL., Gard. Diet. ed. VIII. 1768 (*Pyrus Malus sylvestris* L., Sp. pl. 479. 1753; *M. communis* LAM., Ill. II. 545. 1793; *M. acerba* MÉRAT, Fl. Paris 187. 1812; *Pyr. Malus* var. *austera* WALLR., Schedae crit. 215. 1822; *Pyrus acerba* DC., Prodr. II. 635. 1825; *Pyr. Malus* var. *glabra* W. KOCH, Syn. Fl. germ. 235. 1837; *M. communis* var. *sylvestris* BECK, Fl. Nied.-Öster. 750. 1890). — Holzapfel. — I G. wohl überall verstr., sonst noch ganz Eur., im S. und SW. seltener, N.- und O.-Grenze z. T. fraglich. — Wälder, Gebüsch, im Gebirge bis 1300 m. — Blz V. Frz. VIII—IX. — Dürfte in Asien ganz fehlen. Neben *M. pumila* Hauptstammart der Kulturapfelsorten. (Vielleicht tritt in SO.-Eur. eine behaartere Form der *sylvestris* wild auf oder die *pumila* reicht bis hierher.)

1×2 *M. sylvestris* × *pumila*: wahrscheinlich gar nicht selten, aber von den Kulturformen der letzten oft kaum zu scheiden. Hierher vielleicht die meisten als *M. dasyphylla* gehenden Formen.

1×4 *M. sylvestris* × *baccata*: scheint zu existieren.

* * Bl.-Achse und K. (beiders.) ganz filzig, B. unters. auch auf Fläche bleibend ± weich beh. (Fig. 397 c—h).

2. *M. pumila*: b—♂, wie *sylvestris*, nur meist dornlos und lichter verästelt, Zw. jung ± filzig, ♀ dgl. (bes. Kztr. lange beh. bleibend, Kn. beh.*); B. mehr elliptisch, stumpfspitziger, Grund vorwiegend ± keilig (außer an Lohden), Serratur grobkerbiger, oben bis ganz kahlend, ca. 4:2.5—3:7—4 o. 10:5.5 cm, Stiel beh., dicklicher, bis 3 cm; Blst. filzig, Bl. meist größer als bei *sylvestris*, K. zuweilen innen stark kahlend, Gr. meist bis Mitte beh., eher länger als Stb., Fr. analog (spontan), Stiel eher länger.

Man kann vielleicht wie folgt gruppieren: var. a. *praecox* (*Pyrus praecox* PALL., Fl. ross. I. 22. 1784 [b; *P. Saversa* LEDEB., Fl. alt. II. 222. 1830 [♂; die *Mil. praecox* BORKH., Handb. Forstb. II. 1271. 1803, gehört wohl nur z. T. hierher, z. T. zu var. b); hierunter verstehe ich die in S.-Rußl., Vorder-Asien, Turkest und Sib. (wie weit östlich ist fraglich), ob auch W.-Himal.**, sowie vielleicht auch in SO.-Eur.***, (Serb., Maced., Griechenl.) spontan auftretenden Formen; sie sind bis heute nur ganz ungenau bekannt. Seit uralten Zeiten in Kultur genommen, haben sie sich zu dem entwickelt, was ich als var. b. *domestica* (*Malus dom.* BORKH., l. c. 1272), d. h. als unsere Gartenapfel, soweit sie auf *pumila* (und *sylvestris*) zurückzuführen, zusammenfasse (Fig. 396). Diese var. *domestica* nun ist in Mittel-, S.- und W.-Eur. wieder verwildert und stellt dann (oft doch eben wohl mit Unrecht) als spontan angesehen, die var. c. *paradisiaca* (*M. par.* MED., Gesch. Bot. 78. 1793; *M. dasyphylla* BORKH., l. c. 1269; *Pyr. Malus* var. *mutis* WALLR., Sched. crit. 215.

*) Vgl. meine Dendrol. Winterstudien, S. 126 und Fig. 151 a—h, S. 148.

**) Vgl. HOOKER, Bot. Mag. sub tab. 7430. 1895.

***) Manche Exemplare (schon solche aus Ungarn) machen den Eindruck, als ob sie *sylvestris* und *pumila* direkt verbinden, so daß beide eben doch nur Subspecies einer Art wären!!

1822; *Pyr. Mal.* var. *tomentosa* W. KOCH, Syn. 235. 1837; *Malus communis* var. *typica* BECK, Fl. Nied.-Östr. 716. 1890) dar. Selbstverständlich ist es sehr schwer, diese 3 so eng verbundenen Formen immer auseinander zu halten.

Zu var. *b. domestica* gehören noch als Kulturformen f. *apetala* (*Pyr. apetala* MÜNCHH., Hausv. V. 247. 1770; *Pyr. dioeca* MOENCH, Verzeichn. Weissenst. 87. 1785; *Mal. dioeca* LOIS, Nouv. Duh. VI. 171, t. 44. 1815): monströse, stark beh. Form ohne C. und Stb. mit samenlosen Fr., ternier f. *pendula* (*Mal. dasyphylla* var. *pendula* ZBL., in H. d. D. D. G. 186. 1903): Zw. + hängend; f. *translucens*: Bl. gefüllt; f. *aucubaefolia* (*Pyr. Mal.* var. *aucubaefolia* KIRCHN., Arbor. Muse. 320. 1864): B. gelb gefleckt u. a.

Ferner ist eine auffallende, wie es scheint in SW.-Sibirien und dem Kauk. spontan auftretende Form die var. *Niedzwetzkyana* (*Malus Niedzw.* DIECK, ex

Fig. 396. *Malus pumila* var. *domestica*: a Zw. mit Blst.; b—c Bl. ohne C.; d Gr.; e Stb.; f Frkn. im Q.-Schn.; g i S., ganz. im L.- und Q.-Schn.; l—m Pollenkörner (trocken und geweicht); n—p Fr. analog g—i (a, n—p, verkleinert; g¹, sonst schwach, nur l—m stark vergr.; nach BERG et SCHMIDT).

KOEHNE 1893), die sich durch Anwesenheit eines roten Farbstoffes (analog wohl *Prunus Pissardi*, siehe S. 632) in Rinde, B. und bes. den Bl. und Fr. auszeichnet. Sie wurde von DIECK eingeführt und ist vielleicht neben var. *a* zu stellen. B zuletzt in Dunkelgrün übergehend, Fr. 5–6 cm Dm. HEMSLEY beschreibt sie und bildet sie in Bot. Mag., t. 7975. 1904 als *Pyrus Niedzw.* ab, ohne ihre Verwandtschaft etc. klären zu können.

M. p. MILL., Gard. Diet. ed. VIII. 1768 (*Pyrus Malus* L., Sp. pl. 479. 1753. ex p.). — Johannisapfel, Paradiesapfel. — I.G. nur verwildert, sonst wie unter var. *a* oben. — Blz. etc. wie *M. sylvestris*. Seit alten Zeiten wohl auch in O.- und Zentral-Asien in Kultur.

? 2×3 *M. pumila* var. *×spectabilis*: dieser Kombination scheint mir *M. Ringo* SIEB., Cat. rais. 5. 1856, nach Expl. aus Hort. Plantières, die von SIEBOLD stammen

sollen und mit dem, was KOEHNE für *Ringo* (als Art) hält, übereinkommen, zu entsprechen. Danach hat *Ringo* B., die in Form zwischen c und q in Fig. 397 schwanken, bald gröber, bald feiner ziemlich scharf gesägt und unters. bleibend locker grauzottig beh. sind. Bl. außen gerötet, in den langen K. denen der *pumila* näher stehend, dies auch in den Fr., die im Mittel 15 mm Dm. haben, wachsgelb und 2—4,5 cm lang gestielt sind.

Erwähnenswert eine pyramidal wachsende Form *M. Ringo fastigiata b. f. f. v. a* HORT. DIECK, die nach KOEHNE (Cat. SPÄTH 1905 6) vielleicht *mitis* $\times$ *Ringo* entspräche. Soll sehr früh blühen. Fr. taubeneigroß, prächtig gelb und rot gefleckt. Auch *Malus* bez. *Pyrus Riversi* HORT. gehört z. T. in die Nähe von *Ringo*.

Ebenfalls dieser Kombination könnte *M. Kaido* WENZIG, in Monatschr. Gartenbau-Ver. preuß. Staat. 1874. 534 (ob auch SIEBOLD, Cat. rais. 5 1856) entsprechen und eine der *spectabilis* näherstehende Form darstellen, was bes. in den kürzeren K. sich zeigt. WENZIG hat in Herb. Berl. auch typische *Ringo* hierher gerechnet, andererseits auch Formen, die infolge z. T. abfallender Fr.-K. auf den Einfluß einer anderen Art noch deuten.

(2 $\times$ 3) $\times$ 5 *M. Ringo* $\times$ *baccata* hat KOEHNE in Herb. Dendrol. No. 57 ausgegeben. Ich möchte mich jedes Urteils enthalten, nur betonen, daß eine solche Hybride sehr wohl existieren kann.

2 $\times$ 4 *Malus pumila* var. $\times$ *baccata*: Da beide Arten in einem großen Gebiet gemeinsam auftreten, ist das Vorhandensein natürlicher Bastarde sehr wohl möglich. Daß in der Jahrhunderte langen Kultur Hybriden entstanden sind, ist sicher. Ich möchte folgende sog. Arten hier einreihen, wobei ich mir wohl bewußt bin, daß nur Experimente entscheiden können, ob diese Auffassung richtig, o. die Jener, die z. B. *prunifolia* als gute Art nehmen*).

a. *M. astracania*** DUM.-COURS., Bot. ed. 2. V. 429. 1811 (? *M. sibirica* BORKH., Handb. II. 1281. 1803; ? *M. hybrida* DESF., Arb. II. 141. 1809; *Pyrus astr.* DC., Prodr. II. 635. 1825; ? *Mal. Fontanesiana* SPACH, Hist. veg. II. 150. 1834; ? *M. adstringens* ZABEL, im H. d. D. D. G. 187. 1903); hierher diejenigen Formen, die *pumila* bes. in den Fr. und der Beh. der B. näher stehen, aber in der Form, Serratur, Textur der B., der längeren Stielung von Bl. und Fr. etc. auf *baccata* deuten. Vielleicht in S.-Rußl., W.-Sib. spontan auftretend.

b. *M. prunifolia* BORKH., Handb. II. 1278. 1803 (*Pyrus prunif.* WILLD., Phytogr. I. 8. 1794; *Mal. hybrida* LOIS., in Nouv. Duh. VI. 140. tab. 42 Fig. 1 1815); eine nie wild gefundene Form, die zwar sehr den Eindruck einer Art macht, aber doch wohl — wie auch BAILEY, Cycl. Am. Hort. III. 1472. 1901 annimmt — hybriden Ursprungs ist. Zuerst scheint sie MILLER, Fig. of pl. t. 269. 1770 (die Tafel datiert von 1758!) als *Crataegus cerasifolia* beschrieben und abgebildet zu haben. Sie soll aus Sib. stammen und ihre ursprüngliche Einführung aus dem Osten ist sehr wohl möglich, die typische *baccata* soll nach HOOKER, Bot. Mag. sub t. 6158. 1875. erst 1784 eingeführt sein. Die *prunifolia* ist oft nur durch die Fr. mit bleibenden K. von *baccata* zu scheiden; doch deuten z. B. die zitierten Abb. von HOOKER wie MILLER auf *pumila*-Einfluß hin. Zahlreiche Gartenformen, mit wechselnder Fr. Größe, -Farbe etc. Fr. wie Fig. 398b, o bis 3:2,6 cm und noch größer. B. vgl. Fig. 397 i—k.

c. *M. cerasifera* SPACH, Hist. Veget. II. 152. 1834 (*Mal. baccata* LOIS., in Nouv. Duh. VI. 139. t. 43. Fig. 2. 1815. teste SPACH). Gilt allgemein als *prunifolia* $\times$ *baccata* und stellt wohl nur eine Form der *prunifolia* s. m. dar, die *baccata* sehr nahe steht, was vor allem die z. T. o. sämtlich abfallenden Fr.-K. beweisen. Geht in den Gärten auch als *Mal.* o. *Pyrus microcarpa*, *odorata*, *paradisaca*, *sibirica* etc.

(2 $\times$ 4) $\times$ 3 *P. (pumila* $\times$ *baccata*) $\times$ *spectabilis*: dürfte vorkommen, doch kann ich nicht eher Sicheres sagen, ehe ich nicht die spontane *spectabilis* genau kenne.

? (2 $\times$ 4) $\times$ 8 *M. prunifolia* $\times$ *Torm.*: nach ZABEL in Kultur aus *Torm.*-S. getallen. Die Originale im Herb. ZABEL sind sehr eigenartig, und ich glaube, daß es sich in der Tat um diesen Bastard handelt. Ich hoffe später diese Form noch eingehend behandeln zu können.

Für nicht ganz ausgeschlossen halte ich, daß *M. floribunda* aus dieser Kombination hervorgegangen sein könnte. Doch vgl. man das S. 721 Gesagte.

*) Mutationen sind ja keineswegs ausgeschlossen.

**) Nomenklatur provisorisch, denn es ist oft kaum möglich, die alten Namen nur halbwegs sicher zu identifizieren.

2×8 *M. pumila* × *Toringo* . *M. dasyphylla* × *Toringo* ZBL., im H. d. D. D. G. 189. 1903, ist m. E. nach den Originalen des Autors z. T. sicher nur eine *Toringo*-Form. Andere Expl. nur in Bl. waren nicht sicher zu deuten.

2×11 *M. pumila domestica* × *M. ioensis*: *Malus Soulandi* BRITT., Manual 516. 1901 (*Pyr. Soulandi* BAIL., in Am. Garden. XII. 473. 18[99?]). Vgl. BAILEY, in Cycl. Am. Hort. III. 1474. 1901. BRITTON scheint sie für eine gute Art zu halten, die in Minnesota, Missouri und Texas vorkommen soll. Vgl. S. 719 bei *heterophylla*.

Fig. 397. *Malus*: normale B. mittlerer Größe: a - b *sylvestris* - c - h *pumila*; c - d var. *paradisiaca*; e dgl. Lohdentreib-B.; f - h var. *praecox* - i - k × *prunifolia* - l - n *baccata*; m var. *leostyla*; n var. *mandschurica* - o *Halliana* - p - p' *Prattii* - q - q' *spectabilis* [aus China: Peking]; r dgl. in Kultur - s *baccata* var. *himalaica* ($\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

○○ K. so lang o. kürzer als Bl.-Achse, allmählich kurz zugespitzt. Fr. nur unten vertieft. B. wie in Fig. 397 q - r, jedenfalls viel kahler als *pumila*, *praecox* und ganz anders in Form als bei *sylvestris*.

3. *M. spectabilis**): $\bar{h}$, bis 8 m, Wuchs?; $\odot$ Zw. rotbraun, spärlich beh. (Kztr. reichlicher), Kn. wohl dgl., spitzeifg.; B. an den Fr.-Zw. sehr variabel, meist ähnlich Fig. 397 q¹ o. aber kleiner und Grund rundlicher, je jünger jedoch, desto länglicher wie q, 2:1,2 4,5:3 o. 5:2,3 8:3,5 4 cm (an Kulturpflanzen 7:2,5 10:4,5—6 cm), auf der dunkleren Obers. fast o. ganz kahlend, auf der helleren Unters. wenigstens Rippe + beh. bleibend, Zähnung + eng kerbsäbig, Textur derb, Stiel 1—3 cm, beh.; Bl. bis 5 cm Dm., fleischfarben, Stiele bis Frz. + locker beh., Bl.-Achse dgl., C. + lang genagelt, K. außen kahl, sonst wie Fig. 398 c c¹, Gyn. (4—)5(—10), Fr. wie d (ob beiders. o. nur unten vertieft?), Stiel 2—3 cm.

M. s. BORKH.**), Handb. Forstb. II. 1279. 1803 (*Pyr. spect.* AIT., Hort. Kew. II. 175 1789; *Mal. sinensis* DUM.-COURS., Bot. ed. 2. V. 429. 1811). — Pracht-Apfel.

Bis jetzt nur aus N.-China anscheinend spontan bekannt, alles Zentralchinesische mir fraglich. — Blz. IV—V. — Frz. IX. — Seit langem in O.-As. (Japan!) und seit 1780 in Eur. in Kultur. Doch wie gesagt, typische spontane Form noch zweifelhaft.

Im Anschluß an diese Art ist noch zu nennen: *Malus Prattii* (*Pyr. Prattii* HEMSLEY, in Kew Bull. IX. 1895. 16), eine höchst bemerkenswerte Art aus W.-Sz'tschwan (Tachienlu, lg. PRATT, No. 93 et 824), ausgezeichnet durch große B. (Fig. 397 p p¹), die schon an Blzw. bis 11:7 cm messen und nur auf der helleren Unters. auf Nerven spärlich beh. sind, auffällig ferner die 8—10 Hauptnervenpaare, Zähnung ungleichmäßig doppelt, fein, aber wenig scharf, Kztr. relativ lang, Bl. klein, Stiele nur spärlich beh., Bl.-Achsen gleich K. (außen) kahl o. Achsen (im selben Blst.) reichlicher beh. als Bl.-Stiele, sonst vgl. Fig. 398 k m; Fr.-Stiel bis 2,5 cm. Sollte eingeführt werden!

3×4 *M. spectabilis* × *Halliana*. diesem Ursprung könnten gewisse japanische Kulturformen im Herb. Leyden entsprechen. Die *Halliana* scheint überhaupt genetische Beziehungen zu *spectabilis* zu haben.

3×5 *M. spectabilis* × *baccata*: scheint in Kultur vorhanden. So soll *Pyrus sphaerocarpa* WENDEROTH, in Linnaea 1837. Litt. 92, hierher gehören. Aber ich kann aus den Angaben des Autors absolut nichts entnehmen. Seine *ceratocarpa* (von 1831 Schrift. Naturf. Ges. Marburg II. 254) ist überhaupt ein Nomen nudum.

? 3×10a *M. spectabilis* × *coronaria* var. *typica*: als Hybride dieses Ursprungs gilt *M. heterophylla*: SPACH, Hist. Veget. II. 138. 1834. Nach Originalen SPACHS scheint es mir wahrscheinlicher, daß man auf *pumila* var. × *coronaria* schließen könnte, was ja auch SPACH andeutet, nur glaubt er, daß diese Hybride infolge verschiedener Blz. der Eltern nicht gut möglich sei. Nun soll aber *M. Soulardi* (siehe oben S. 718) dieser Kombination entsprechen, ob sie mit *heterophylla* stark übereinstimmt, konnte ich aus Mangel an genügendem Material beider nicht feststellen.

II. Fr. ohne K.***), B. wie Fig. 397 l—o, s.

○ B.-Stiel 0,8—1,5 cm, K. ± kürzer als Bl.-Achse, C. rosa-fleischfarben, Bl. zuw. rein ♂.

4. *M. Halliana*†): $\bar{h}$ — $\bar{h}$, bis 5 m, ausgebreitet verzweigt, breit offenkronig, Zw. sehr bald ganz kahl, $\odot$ braunrot, Kn. eikegeltg., kahl, nur Seh. gewimpert; B. vgl. Fig. 397 o o. länglicher und beiders. gleichmäßig gespitzt, jung spärlich beh., später fast nur auf Rippe ober. spärliche Härchen und Drüsen, tiefgrün, unten heller, 5:2—7:2,5 o. 7:4,5 cm, kurz sägezählig, Stiel gleich Rippe und Bl.-Stiel und Bl.-Achse gerötet; Blst. fast ganz kahl, nur roter K. innen beh., Bl. hfg. leicht gefüllt, Fr. 7—9 mm Dm., dunkelrot, sonst vgl. Fig. 398 e—f.

*) Die einzigen Exemplare, die ich mit einiger Sicherheit als „spontane“ *spectabilis* ansehen zu können glaube, sind WAWRAS No. 1080, bei Peking (Fr.). Danach z. T. meine Beschreibung.

**) Ob BORKH., AIT. etc. nicht schon eine (vielleicht hybride) Kulturform aus Japan beschrieben, bleibt dahingestellt.

***) Hierher gehört auch noch *Malus sikkimensis* KOEH., Gatt. Pomac. 27. 1890 (*Malus pashia* var. *sikk.* WENZ., in Linnaea 1874. 49; *Pyrus sikk.* HOOK. F., Fl. Brit. Ind. II. 373. 1878): ausgezeichnet durch langspitzige B. (Fig. 404 a S. 728), die unters. filzig beh. sind, Blst. locker beh., Bl. hell rosaweiß wie Fig. 398 n, Fr. ausgewachsen nach HOOKER, in Bot. Mag. t. 7430. 1895, oboval, bis 15. 13—14 mm, violettrot (o), Gr 5, Stb. 20. Sikkim, bis 3000 m. Interessant und noch zu beobachten. An lgtr. scheinen die B. viel breiter, bis 11:8 cm, zu werden.

†) Vgl. auch REHDER, in SARG. Trees a. Shrubs I. 35, t. 18. 1902. Nach REHDER pflegt die Endblüte des Blst. ♂ zu sein.

M. H. KOEHNE, Gatt. Pomac. 27. 1890 (*Pyr. Hall. Voss*, in *VILM. Blumeng.* ed. 3. I. 277. 1896; *Pyrus Parkmansii* H.T.). Wohl Kulturform japanischen Ursprungs*), die ich aber so lange als Art führe, bis mir ihre Herkunft einigermaßen klar geworden. Ob Mutation? — Blzw. V. — Frz. spät reifend. Sehr empfehlenswerter Zier- $\bar{b}$.

? 4×9 *M. Halliana* $\times$ *fusca*: hierher vielleicht nach KOEHNE (SPÄTH, Cat 1905/6) eine *Mal. (Pyr.) atrosanguinea* HORT.

Fig. 398. *Malus*: a—b *prunifolia*: a Bl. im L.-Schn.; b Fr. — c—d *spectabilis*: c Bl.-L.-Schn.; c' C. [kult. Pflze.]; d Fr. im L.-Schn. [lg. WAWRA, No. 1080]. — e—f *Halliana*: wie c—d. — g—i *baccata*: wie c—d, nur h Frkn.-Q.-Schn. — k—m *Pratin*: wie g—i. — n—o *sikkimensis*: n Bl.-L.-Schn.; n' C.; o junge Fr. (a—b nach KOEHNE, sonst Orig.).

○○ B.-Stiel 1.2—3 cm, K. so lang o. länger als Bl.-Achse. Bl. reinweiß, stets $\bar{z}$.

5. *M. baccata*: $\bar{b}$ bis kleiner $\bar{b}$, Krone rundlich, breit o. $\bar{z}$ aufstrebend verästelt, Zw. meist von Anf. an kahl, $\odot$ purpurbraun, Kn. spitz-eifg., nur Seh. gewimpert; B. wie Fig. 397 l—m, meist nur jung oben auf Rippe und Nerven $\bar{z}$ filzig, dann ganz kahl, glänzend olivgrün, unten heller, Textur zuletzt meist nicht so derb wie bei *Halliana*, 3:1.5—8:4 cm o. bis 10:5.5 cm; Blst., Bl.-Achse und K. (außen) gewöhnlich kahl, Bl. 2.5—4.5 cm Dm.***), Gr. $\bar{z}$ länger als Stb., leicht beh. o. kahl, Fr. gelb mit roten Backen, kugelig, ca. 10 mm Dm. (o. größer bei Kulturpflz.), vgl. Fig. 398 g—i.

Mit MAXIMOWICZ unterscheide ich folgende 3 Hauptvarietäten (die vielleicht Arten entsprechen), var. a. *sibirica* (*Pyr.* *bacc. sib* MAX., in Bull. Acad. Petersbg. XIX. 170 1874): wie oben, B. kahl, Serratur $\bar{z}$ fein o. grob kerbsäbig, nicht eigentlich spitz sägezähig. Vom Altai (weiter westlich fraglich) bis zum Amurgebiet.

*) Im Herb. BOISS. sah ich einen Blzw. von dem immer als *spectabilis* gedeuteten chinesischen Expl. lg. FORTUNE, No. 9. Er stimmt recht gut mit *M. Halliana*! Alle vorh. Bl. waren $\bar{z}$. Leider ist ein genauer Fundort nicht bekannt.

**) Über die Einreihung eines Expls lg. JÄSCHKE, Lahol mit recht kleinen Bl. locker beh. Bl.-Achse und K. (außen), das sonst kaum von var. *sibirica* abzuweichen scheint, bin ich mir noch unklar.

***) Auf die Größe der Bl., bez. C. ist bei allen *Malus* kein Gewicht zu legen, da das ganz außerordentlich variiert.

N.-China. — var. *b. mandschurica* (Pyr. bacc. v. mandsch. MAXIM., l. c.) B. breiter (Fig. 397 n), mehr eiförmig o. rundl.-eiförmig, z. T. ganzrandig, Stiele, B.-Grund und Rippe oberseits filzig beh. bleibend, dgl. Bl.-Stiele und Bl.-Achse (außen) + locker beh., Gr. kaum länger als Stb., und Fr. eiförmig, ca. 14:10 mm. SO.-Mandschurei (N.-China?). — var. *c. himalaica* (P. b. var. *b.* MAX., l. c. 171) B. wie Fig. 397 s, im allgemeinen breiter oval, Serratur sehr eng und feinspitzig, obwohl wechselnd, unters. an Rippe bleibend beh., sonst kaum von *a* abweichend. Ganzer Himalaya bis westl. Zentral-China (Hupei, HENRY, No. 7398 und GIRALDI, No. 5110 N.-Sz'tschwan). Übrigens scheint im Himalaya noch eine der var. *a* näherstehende Form aufzutreten mit etwas länglichen Fr. (Vgl. die Expl. lg. DUTHIE, Gahrwal, near Derali, No. 1061 und Nepal, near Kangra, No. 2867.)

M. b. BORKH., Handb. Forstb. II. 1280. 1803 (Pyr. bacc. L., Mant. 75. 1767; *Pyrus* vel *Malus sinensis* HORT. NONN.). — Beerenapfel. — Heimat wie oben. — Blz. IV—V. — Frz. VIII—IX. — Vgl. das oben unter *pumila* × *baccata* Gesagte. Die typ. *baccata* scheint durch ziemlich enge feine B.-Zahnung, kahle Blst. und Bl.-Achsen sowie K. (außen), die langen Gr. und die kleinen Fr. ausgezeichnet.

? 5×8 *M. baccata* × *Toringo*: nach ZABEL entspricht *M. floribunda* SIEB., apud VAN HOUTTE, in Fl. d. Serr. XV. 161. tab. 1585/89. 1862/65 (Pyr. florib. VOSS, in VILM. Blumeng. 3. Aufl. 277. 1896) dieser Kombination. KOEHNE ist geneigt, sie für eine gute Art zu halten, und es ist nicht unmöglich, daß sie — wie vielleicht auch *prunifolia* — eine Mutation darstellt. Ich schließe mich vorläufig ZABELS Deutung an, verweise aber auch auf die Bemerkung S. 717. Beide vermutete Elter, von denen *Toringo* der sicherere ist, kommen bei uns meist mit kahlen Blst. vor, doch tritt *Toringo* in Japan auch beh. auf, so daß man annehmen kann, die Beh. des Bastardes stamme von ihr.

Im übrigen kann als charakteristisch für *floribunda* gelten: *b* $\mathfrak{H}$, zuweil. dornig (BAILEY), Verastelung zierlich überhängend, B. aus rundl. o. keilförmigem Grunde breit- o. länglich-eiförmig o. oblong, 3:1,5—7:3 an Frzw. o. an Lgtr. bis 7,5:4 cm, Rand scharf und teinspitzig einfach o. doppelt gesägt, oben ganz, unten + o. auch ganz kahlend, Textur derb, Stiel meist nicht über 2,5 cm; Bl. ca. 3 cm Dm., in Kn. tiefrot, dann weißlichrosa, bis 4 cm lang gestielt, Stiele und Bl.-Achse + verstreut beh. bis kahl, K. länger als letzte, meist nur innen beh., Gr. meist länger als Stb., Fr. ca. 6–12 mm Dm., eher länger als dick, beiders. leicht vertieft, gelb mit braunroter Backe. Vgl. auch CARRIÈRES gute Farbentafel in Rev. Hort. 1870/1. 591.

Sehr nahe steht *floribunda* die *M. Scheideckeri* ZBL., H. d. D. D. G. 188. 1903 (Pyr. Scheid. SPÄTH, Cat. 1888). Seit KOEHNE halt man sie für *floribunda* × *prunifolia*. Wenn man nun beide als Hybriden auffaßt, so käme eine etwas komplizierte Kombination heraus. Ich möchte zunächst kein festes Urteil abgeben, sondern erwähne nur, daß *Scheideckeri* noch reicher als *floribunda* blüht, zum mindesten durch die größeren zarter geröteten Bl. vielleicht noch zierender ist. Fr. 10–16 mm dick, K. z. T. bleibend. Vgl. auch Gartenflora 1904, S. 417.

B. B. erwachsener Pflz. wenigstens an Lgtr. gelappt, in Kn. deutlich gefaltet.

Sekt. 2. *Sorbomalus* ZBL., l. c. 189.

I. Fr. ohne K., B. vgl. Fig. 399 a d² und Fig. 404 g h, S. 728. II siehe S. 724.

○ K. so lang o. länger als Bl.-Achse, Frkn. mit großem freien Mittelraum, Fr. rundlich, B. wie a–c: sind B. der Lgtr. und Blzw. deutl. gelappt, so vgl. No. 10, *florentina*, S. 728.

+ B. auch an Lgtr. nicht o. nur leicht und etwas stumpf gelappt, hfg. fast ganzrandig, vgl. b, ihre Stiele im Mittel 2–3 cm. Fr. über 1 cm Dm.

6. *M. Zumi*: mittelhoher $\mathfrak{H}$, Krone pyramidal, Zw. ganz jung lockerfilzig, dann kahlend, $\odot$ tiefpurpurbraun, Kn. klein, spitz eiförmig, Sch. gewimpert; B. oblong-eiförmig o. länglich-eiförmig, jung beiders. (unten mehr) beh., bald kahlend, oberseits

*) So z. B. GIRALDIS No. 5035, 5111, 5114 aus N.-Shensi.

lebhaft gelbgrün, unten mäßig heller, fast kahl, Seitennervenpaare 6–10; Bl. 2.5–4 cm Dm., ihre Stiele, Bl.-Achse und K. (außen) — beh. bis kahl, innen K. stets beh., C. anfangs $\pm$ gerötet, dann weiß, Fr. scharlachrot, sonst vgl. Fig. 400 a–c.

M. Z. REHD., in SARG. Trees a. Shrubs I. 191. 1905 (*Pyrus Zumi* MATS., in Tok. Bot. Mag. XIII. 1. 1899). — Jap., Nikko-, Hakone-Gebirge. Geht höher als *Toringo*. — Blz. V. — Frz. X. — Erst in neuester Zeit durchs Arnold-Arboretum verbreitet. Ich sah nur ein Blütenexemplar, das mir Herr REHDER sandte. Jedenfalls bedarf diese Art noch der Beobachtung.

Fig. 399. *Malus*: normale B. mittlerer Größe. *a* *Sargentii* — *b* *Zumi*. *c* *Toringo* (auch das kleine) — *d* — *d*² *fusca* — *e* — *f* *coronaria*; *g*–*h* var. *ioensis*; *i* *angustifolia* ($\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original, nur *b* nach REHDER).

✧ B. an Lgtr. stets — deutlich spitzlappig, nie ganzrandig, vgl. Fig. 399 a, c; B.-Stiele im Mittel 1–2 cm, Fr. meist unter 1 cm Dm.

— ungelappte B. ca. $1\frac{1}{4}$ – $1\frac{1}{2}$:1; Bl. 2.5 cm o. mehr Dm., Fr. 8–10 mm Dm.

7. *M. Sargentii*: sparriger b., 1–1.5 m, Kztr. zuw. verdornend; B. vgl. Fig. 399 a, im Mittel 5–8:3–6 cm, auf der helleren Unterseite bleibend locker beh., Bl. und Fr. wie Fig. 400 d–f, Stiel 1.5–3 cm; sonst wie *M. Toringo*.

M. S. REHD., in SARG. Trees a. Shrubs I. 71. 1903. — Von SARGENT in Jap., brackish marsh near Moronan gefunden. Mir als Art noch zweifelhaft, viel-

leicht nur Varietät von *Toringo*. Angaben oben z. T. nach REHDER. Ich verdanke diesem Bl.- und Fr.-Zweige, die alle Differenzen als sehr graduelle erscheinen lassen.

++ ungelappte B. ca. 2-3:1; Bl. ca. 2 cm Dm., Fr. 5—7 mm Dm.

8. *M. Toringo*: $\bar{h}$ bis kleiner $\bar{h}$, wild mit hfg. verdornenden Kztr., Tracht — überhängend, junge Triebe + filzig, $\odot$ kahl o. fast kahl, purpurbraun. Kn. klein, eifg., Sch. zottig gewimpert; B. vgl. Fig. 399c, einfache bis 6:3, gelappte bis 7:5 cm, Obers. sattgrün, ganz o. fast kahle, unters. heller, + verstr. locker beh. bleibend, schöne Herbstf., Stiel gelegentlich bis 3 cm; Bl. weiß o. außen + rosa, Stiele kahl o. + locker zottig, Bl.-Achse und K. (außen) meist ganz kahl, Fr. gelbbraun, vgl. Fig. 400g—h¹.

M. T. SIEB., Cat. rais. I. 4. 1856 (*Pyr. Sieboldii* REGEL, in Gartenfl. VIII. 82. 1859; *P. Toringo* K. KOCH, Dendrol. I. 212. 1869; *P. Mengo* SIEB., ex K. KOCH, l. c.). — Jap. (Jesso, Hondo). — Wälder, Gebüsch im Hügellande. — Blz. V. — Frz. VIII—IX. — Seit langem in Kultur.

Fig. 400. *Malus*: a—c *Lumi*: a Bl.-L.-Schn.; a¹ C.; b Frkn.-Q.-Schn.; c Fr. — d—f¹ *Sargentii*: wie a—c, nur f¹ Fr. im L.-Schn. — g—h¹ *Toringo*: wie d—f [ohne c]. — i—l *fusca (rivularis)*: i Bl.-L.-Schn.; i¹ C.; k Frkn.-Q.-Schn.; l Fr.-L.-Schn. — m—o *florentina*: wie i—l (Original).

○○ K. so lang o. ± kürzer als Bl.-Achse o. sonst B. stets deutl. gelappt (vgl. Fig. 399d d² und Fig. 404g—h. S. 728), Frkn. mit kaum deutl. freiem Mittelraum.

π B. kaum gelappt o. + deutl. dreilappig (d—d²). Gr. (2—)3—4, kahl, Fr. elliptisch.

9. *M. fusca*^{*)} (*M. rivularis*): $\bar{h}$ $\bar{h}$, bis 12:0,4 m, Zw. jung beh., + fast ganz kahle, Kn. klein, eifg., Sch. zottig gewimpert; B. aus rundl. o. keilfg. Grunde länglich elliptisch, 3:1,8 bis 9(—12):4,5(—5) cm o. auch + deutlich 3-lappig bis 10:10 cm, auf der sattgrünen Obers. + bis ganz kahle, unters. viel heller und locker beh. bleibend, Textur wie es scheint weechnd., schöne Herbstf., Stiel 1—3 cm; Bl. 1,5—2 cm Dm., weiß o. rosa, Fr. bis ca. 14:8 mm, Stiel bis 3 cm, gelbgrün, zuletzt rot überlaufen, dünnfleischig, sonst vgl. Fig. 400i—l und var.

^{*)} SARGENT behält auch 1900 den Namen *rivularis* bei, zitierte aber schon in der *Silva fusca* als Synonym. Wenn *fusca* also ein solches ist, so hat BAILEY recht, diesen älteren Namen voranzustellen.

Der Formenkreis bedarf noch der Untersuchung, ich halte vorläufig wie KOEHNE fest var. *levipes* (*Pyr. riv.* var. *levip.* NUTT., Sylva II. 24. 1842 54; *Pyr. subcordata* LEDEB., Fl. Ross. II. 96. 1845 6; *Mal. riv.* var. *levip.* KOEHNE, Dendr. 262. 1893): Bl.-Stiele und Bl.-Achse, sowie K. (außen) kahl o. fast kahl, und var. *diversifolia* (*Pyr. divers.* BONG., in Mem. Acad. Petersbg., ser. 6. II. 133. 1833; *Mal. riv.* var. *divers.* KOEH., l. c.): Bl.-Achse und K. (außen) dicht weißfilzig, oft auch Bl.-Stiele. Die *M. rivularis* t. *integrifolia* ZABEL, in H. d. D. D. G. 189. 1903, ist mir in ihrer Zugehörigkeit noch unsicher.

M. f. (*Pyrus f.* RAF., Med. Fl. II. 254. 1830; *Pyr. rivul.* DOUGL., apud HOOK. Fl. Bor.-Am. I. 203, t. 68. 1833; *Mal. riv.* ROEM., Fam. Syn. III. 215. 1847). — Ufer-A. — Nach SARGENT (1905): von den Aleuten südlich längs der Küste und Inseln von Alaska und Brit. Col. bis Sonoma und Plumas Co. in Calif. — Bes. in reichem tiefgründigem Uferlande, am größten in den Tälern von Wash. und Oreg. — Blz. (IV—)V. — Frz. (VIII—)IX. — In Kultur noch nicht allzu hfg.

✧✧ B. stets gelappt (Fig. 404g—h), Gr. 5, beh., Fr. rundlich.

10. *M. florentina*: b $\mathfrak{h}$, Zw. bis $\odot$ beh., dann rotbraun, kahlend; B. ober. glänzend olivgrün, Nerven + zottig-borstig, unters. leicht gelblichgrau filzig, 3,5:2,5–6:4,2 cm, Stiel 1–2,5 cm, beh.; Bl. in ca. 6–8-bl. Scheindolden, Stiele locker beh., ca. 2,5 cm, sonst vgl. Fig. 400m—o, Achse und K. (beiders.) weiß o. gelbgrau filzig, Stb. ca. 30; Fr. purpurrot, bis ca. 12:10 mm (o).

M. fl. (*Crataegus flor.* ZUCCAGNI, in ROEMER Collectanea 142. 1809; *Pyrus crataegifolia* SAVI, Tratt. degli alb. Tosc. ed. 2. I. 169. 1811; *Pyr. flor.* TARG., in Mem. fisic. soc. mod. XX. 302. 1835; *Torminaria flor.* ROEM., Fam. nat. syn. III. 130. 1847; *Sorb. flor.* NYM., Syll. fl. Eur. 266. 1855; *Cornus flor.* DECNE., l. c. 157. 1874; *Malus crataeg.* KOEH., Gatt. Pom. 27. 1890). — Ital. (Apennin bei Toscana, Bologna etc.), Serbien (bei Nisch). — Blz. V. — Frz. VIII. — In Kultur noch selten. Vielfach als Bastard *Sorbus torminalis* $\times$ *Malus sylvestris* gedeutet, was unbegründet. Eine echte *Malus*, keine *Sorbus*! Fr.-Fleisch ohne Steinzellen. Immerhin aber wohl eine Sonderstellung einnehmend. In Kultur selten, nur für geschützte Lagen.

II. Fr. mit K., B. vgl. Fig. 399e—i.

○ B. aus breit abgestutztem, gerundetem o. seicht herzförm. Grunde breit eiförm. o. elliptisch, o. wenn Grund spitz unters. bleibend $\pm$ beh., Bl. meist über 2,5 und Fr. über 3 cm Dm.

11. *M. coronaria*: dorniger b o. breit offenkroniger kleiner $\mathfrak{h}$, bis 10:0,5 m. Zw. jung dichter, $\odot$ spärlich beh. o. ganz kahl; Borke engschuppig, rotbraun; Kn. klein, stumpf eiförm., Sch. zottig gewimpert, B. vgl. Fig. 399e—h, jung beiders. $\pm$ beh., Textur bleibend häutig o. — derb, Herbstf. gelb; Bl. stark duftend (Veilchen!, dgl. Fr.), weiß o. rosa, K. knapp so lang bis länger als Bl.-Achse, Fr. gelbgrün, sonst vgl. var.

var. a. *typica*: B. unters. zuletzt nur spärlich beh. o. zuw. von Anfang an fast ganz kahl, Grund kaum spitzkeilig, 3:1,5–8:4–7 cm (an Lohd. wohl noch größer); Stiele 2–4 cm im Mittel; Bl.-Stiele, -Achse und K. außen kahl o. fast kahl (Fig. 401m—p¹); nach SARGENT [1905] von Ontario westwärts längs des Eriesees, südl. durch W.-New York, Pennsylv. bis zum Distrikt von Kolumbia und längs der Alleghanys bis Zentral-Alab., westl. bis N.-Missouri (feuchte Waldungen, oft Dickichte bildend, seltener trockenere Böden). var. b *ioensis* (*Pyr. cor.* var. *ioensis* WOOD., Cl. Book. rev. ed. 333. 1877; *Pyr. ioensis* BAILL., in Am. Gard. XII. 473. f. 7 8. 1877; *Mal. ioensis* BRITT., Manual 516. 1901): B. unters. bleibend locker weich beh., Grund hfg. spitzkeilig, Textur derber, Bl.-Stiele, Bl.-Achsen und K. (außen) $\pm$ filzig, vgl. Fig. 401q—r²; nach SARGENT [1905]: Minnesota, Wisc., Illin., W.-Kentucky, O.-Nebraska, Miss., Kans., Ind.-Terr., Louis., Texas [the common Crab Apple of the Mississippi basin].

M. c. MILL., Dict. ed. 8. No. 2. 1768 (*Pyr. cor.* L., Sp. pl. 480. 1753). — Duft-A., Kronen-A. — Heimat siehe oben. — Blz. (IV—)V—VI. — Frz. (IX—)X—XI. — Typ seit langem in Kultur. Die var. *ioensis* kann ich vorläufig nicht als Art abtrennen, wie es BAILEY und SARGENT (jetzt) tun. Auch *angustifolia* ist als Art abtrennen, wie es BAILEY und SARGENT (jetzt) tun. Auch *angustifolia* ist der *coronaria* sehr eng verwandt. Alle 3 sind, wie es scheint, durch ihre roten A. (ob immer?) und die in Fig. 401m, n, q, s etc. angedeutete Struktur des Frkns. gut von allen anderen *Malus* geschieden.

○ B. aus meist keiligem Grunde schmal länglich o. schmal elliptisch, unters. meist ganz kahlend (vgl. Fig. 399i*), Bl. und Fr. kaum über 2,5 cm Dm.

12. *M. angustifolia*: von *coronaria typica* eigentlich nur durch die Kleinheit aller Teile abweichend, insbesondere wohl noch durch die Form der C. und die etwas kürzeren K., vgl. Fig. 401 s—u.

Fig. 401. *Malus*: *m—p coronaria*: *m* Bl.-L.-Schn.; *m'* C.; *n* Frkn. nochmals im L.-Schn.; dazu die analogen Q.-Schnitte in *o—o'*; *p* Fr. im L.-Schn. — *q—r'* *coronaria* var. *ioensis*: wie *m—o'*. — *s—u angustifolia*: *s* Bl. im L.-Schn.; *s'* C.; *t* Frkn.-Q.-Schn.; *u* Fr. im L.-Schn. (Original).

M. a. MICHX., Fl. Bor.-Am. I. 292. 1803 (*Pyr. ang.* AIT., Hort. Kew. II. 176. 1789; *M. sempervirens* DESF., Hist. Arb. II. 141. 1809; *Pyr. semperv.* WILLD., Enum. Hort. Berol. Suppl. 35. 1813; *Pyr. cor.* var. *angustifol.* WENZ., in Linnaea XXXVIII. 41. 1874; *Chloromeles sempervirens* DECNE., in Fl. d. Serr. XXIII. 156. 1880. — Schmalblättriger Duft-A. — Nach SARGENT [1905]: von Pennsylv. und S.-Delaware bis Florida, Louis., M.-Tennessee. — Flußtäler, Kiefernländer. — Sonst wie *coronaria*. In Kultur seltener.

Gattung 162. *Eriolobus***) ROEMER, Syn. Mon. Ros. III. 216. 1847.

Vgl. oben S. 653, meist $\frac{1}{2}$. B. einfach, meist (wenigstens an Lgtr.) gelappt, sommer-, selten immergrün, Bl. in Scheindolden, sonst wie *Malus*, vgl. aber die Sektionen; Fr. stets mit Steinzellen. — Alle Arten erwähnt.

Sekt. 1. *Eucriolobus*: Frb. mit je 2 gleich hoch inserierten Sa., freier Mittelraum des Frkn. z. deutl.; B. sommergrün, an Lgtr. und Blzw. gleich, also stets tieflappig o. nur leicht lappenzähnig.

○ B. stets tieflappig, vgl. Fig. 402 a—d, Bl. und Fr. vgl. Fig. 403 a—c.

*) Die kleinen B. von spontanen Expl., das große von Kulturpfl.

**) Ich fasse *Eriolobus* im Sinne REIDERS, in SARG. Trees and Shrubs II. 1903. 74; reihe also *Docynia* ein. Die so vereinigten Formen schließen sich alles in allem eng an *Malus* an, so daß ich glaube, man wird sie später doch dazu ziehen müssen, es kann aber auch sein, daß man die echten *Docynien* doch als eigene Gattung beibehalten und nur die *Eriolobus*-Gruppe zu *Malus* ziehen muß. Vorläufig bleibt noch manches unsicher. Auch bei *Malus* scheinen Steinzellen vereinzelt aufzutreten!

1. *E. trilobata*: $\text{h} - \text{h}$, bis ca. 6 m; junge Triebe $\cdot$ beh., $\odot$ purpurn, kahl o. kahlend, Kn. stumpf-eifg., Sch. wenige, rostzottig gewimpert; B. variabel, jung unters. Γ lockerzottig, später oben glänzend grün, kahl, unten lebhaft hellgrün, fast o. ganz kahlend, Textur dünn, aber test, ca. 5:5—8:9 cm, Stiel 3—7 cm; Bl. ca. 3.5 cm Dm. in etwa 6—8-bl. Scheindolden, Stiele ca. 2 cm, locker beh., Recept. und K. (beiders.) weiß seidensfilzig, sonst vgl. Fig. 403 a, Stb. 20—30, Gr. 5, Fr. eilängl. (c) o. Γ rundlich, ähnlich wie *Sorbus terminalis*, K. bleibend.

Die Form mit spitzer gelappten, meist feiner geteilten B., wie Fig. 402 a—b, kann man als var. *oxyloba* (*Sorb. trilob. v. oxyloba* BOISS., Fl. or. II 657. 1872) führen.

E. t. ROEM., l. c. (*Crataegus tril.* LABIL, Ic. pl. Syr. IV. 15. t. 10. 1812; *Pyrus tril.* DC., Prodr. II. 636. 1825, *Sorbus tril.* BOISS., l. c.; *Cormus tril.* DECNE., Mem. l. c. 1874). — Libanon, Nord-syrien. Blz. VII. — Frz. Herbst. — Ich sammelte im Aug. 1903 in Hort. La Mortola schöne Frzw. und erhielt von meinem Freund, Kurator A. BERGER, auch Blzw., nach denen ich die Figur gebe. Sonst in M.-Eur. kaum in Kultur.

Zu den Erioloben mit tieflappigen B. dürfte auch *E. kansuensis* (*Pyrus kans. BATAL.**), in Act. Hort. Petrop. XIII. 94. 1893) aus China (Hupei) gehören, von

Fig. 402. *Eriolobus*: B.-Formen von: a—d *trilobata* — e—f *indica* — g *Delavayi* (alles $\frac{1}{2}$ n. Gr.) (g nach FRANCHET, sonst Orig.).

der ich die Expl. lg. HENRY, No. 6754 und 6754A mit reifen Fr. sah. Danach läßt sich, unter Ergänz. der Bl.-Merkmale nach BATALIN, folgende Beschreibung dieser sehr an *Malus* gemahnenden, von mir lediglich der Steinzellen im Fr.-Fleisch halber hierher gestellten Art geben: h (o. $\text{h}?$), junge Zw. beh., $\odot$ kahl, rotbraun; Kn. dgl., länglich, gespitzt, Sch. nur fein gewimpert; B. oben sattgrün, auf Nerven etwas drüsig, unten mäßig heller, kahl o. an Nerven locker beh., Form wie Fig. 404 d—e o. Seitenlappen noch etwas kürzer, ca. 6:4—8:6 cm, Stiel 1.5—4 cm; Blst. scheindoldig, 4—10-bl., Stiele zur Frz. kahl, ca. 3 cm; zur Blz. wie Recept. locker borstig beh., K. spitz, etwa $\sim$ C., diese rund, kurz genagelt, innen in Mitte $\sim$ beh., Stb. 20— $\sim$ C., Stbf. fein beh., Gr. 3, Grund verwachsen und beh., N. schrag, wenig verbreitert, Fr. purpurn, bis 11:9 mm, 3-fächrig (der freie Mittelraum scheint zu fehlen), S. je 2. Sehr einführenswert! Auch GIRALDIS No. 5038 et 7185 aus N.-Shensi gehört hierher. Fr.-Stiele bis 5 cm.

○○ B. nicht o. nur seicht gelappt, vgl. Fig. 404 b—c, f.

✱✱ Blst. ca. 6—12 (ob mehr?) -blütig, Bl. ca. 1.5 cm Dm., Fr. ca. 15 mm Dm., ohne K. (vgl. Fig. 403 g).

*) BATALIN beschreibt l. c. 95 noch eine *Pyrus transitoria*, die ich vorläufig für eine *Malus* (*M. trans. m.*) aus der Verwandtschaft der *Zorngo* halten möchte. Hauptmerkmale nach dem Autor: junge Zw., B., Blst. $\cdot$ filzig beh., B. $\cdot$ spitz 3-lappig, Hauptmerkmale nach dem Autor: junge Zw., B., Blst. $\cdot$ filzig beh., B. $\cdot$ spitz 3-lappig, 2.5—3:2—2.5 cm, Stiel 1.5—2 cm; Blst. 3—8-bl., Bl.-Stiele 1.5 cm, Recept. u. K. $\cdot$ filzig, beide $\cdot$ gleich lang, C. breit-oblong, etwas ausgerandet, schmal genagelt, 5mal länger als K., Stb. 15, Stbf. kahl, Gr. 5(—4), Γ verwachsen, kahl, Fr. kugelig, $\cdot$ beh., ca. 6 mm Dm., S. je 2. — China (O.-Kansu).

2 *E. yunnanensis*: $\mathfrak{h}$, bis über 6 m; junge Triebe filzig. kahl, purpurn. Kn. ?; B. wie Fig. 404b c, oben sattgrün, nur auf Nerven beh., unten gelbgrau filzig, Lappung wechselnd bis fehlend, 6–8 Hauptnervenpaare, 7: 4,5–11: 8 cm; Stiel bis 3,5 cm, filzig; Blst. dicht doldentraubig, ca. 5 cm Dm., graufilzig. Bl. vgl. Fig. 403e–g, K. z. T. lockerer beh., Stb. 20. C. Gr. 5, fast kahl, Fr. rot, mit ∞ hellen Lent., mit Steinzellen, Stiele ca. 2 cm.

E. y. (*Pyrus yunnanensis* FRANCH., Pl. Delav. 228. 1889). — Ich sah die Originale DELAVAYS aus Yunnan noch nicht, beschreibe vielmehr nach WILSON, No. 670, W.-Hupei (Bl. und Fr.) und HENRY, No. 5638, Sztschwan (Bl. hier B. alle gelappt). — Erinert in den ungelappten B. sehr an *E. Tschonoskii*. Einführens wert!

✱✱ Blst. 2–4-bl., Bl. 3–3,5 cm Dm., Fr. ca. 3 cm Dm., K. bleibend, aufrecht (vgl. Fig. 403i).

3. *E. Tschonoskii*: großer $\mathfrak{h}$, Krone etwas pyramidal, Zw. zuw. verdornend, jung graufilzig, (,) kahlend, olivbraun; Kn. spitz-eifig., Sch. wenige, hell gewimpert.

Fig. 403. a–c *Eriolobus trilobata*: a Bl. im L.-Schn. und N. und A.; a' C.; b Frkn. im Q.-Schn. (a Grund, β Mitte); c Fr. im L.-Schn. d–d' *kansuensis*, Fr. im L.- und Q.-Schn. e–g *E. yunnanensis*: e Bl. im L.-Schn. und K., e' C.; f Frkn. im Q.-Schn. (a Mitte, β oben); g Fr. im L.-Schn. h–i *E. Tschonoskii*: h–h' wie c–c'; i Fr. im L.-Schn. — k–m *E. (Docynia) indica*: k Bl. im L.-Schn., k' C.; l Frkn.-Q.-Schn. (a Mitte, β Ende, γ Griffelbasis); m Fr. im L.-Schn. (Original).

B. wie Fig. 404t o auch längl.-elliptisch, 7: 3,5–12: 6–7 cm, später oben sattgrün, bis auf Nerven kahlend, unten grau-grün, locker filzig beh. Nervenpaare 6–10. Stiel 2–3 cm, beh.; Bl. 2–2,5 cm lang gestielt, locker filzig, vgl. Fig. 403h–i, Stb. 10–50, Gr. z. T. fast frei, spärlich beh.; Fr. gelblich mit purpurnem Anflug, $\pm$ hell gepunktet.

E. T. REHDER, in SARG. Trees & Shrubs II. 73, t. 31, 1903 (*Pyr. T.* MAXIM., in Bull. Ac. St.-Petersbg XX 169, 1874). — Gebirge von Z.-Hondo in Japan Blz. V, nach B. Frz. X, Fr. bald fallend. — Noch selten in Kultur: ich verdanke mein Material Herrn A. REHDER. Wohl ganz hart.

Sekt. 2. *Docynia**) (DECNE., in Nouv. Arch. Mus. Paris X. 131. 1874 als Genus): Frb. mit je 4–5, zu je 2–3 übereinander inserierten

*) Sicher eine *Eriolobus* (*Docynia*) ist *E. Delavayi* (*Pyrus Del.* FRANCH., Plant. Del. 227, t. 47. 1889) aus Yunnan, die ich allerdings nur nach der Beschreib. und Abb.

Sa., Frkn. anscheinend ohne freien Zentralraum, N. tieflappig!, Stb. 30—50, B. z. T. immergrün, nur an Lgtr. gelappt.

4. *E. indica*: kleiner B , 3—5 m, Zw. hfg. verdornend, jung dicht weiß- o. gelbgrau filzig, $\odot$ kahle; B. an alten Pflz. wie Fig. 402 e, z. T. fast ganzrandig, jung — filzig, zuletzt oben ganz kahl, satt olivgrün, unten wenig heller, kahl o.

fast kahl, Textur ledrig, im Mittel 6:2—9:3,5 cm, Stiel 1—2 cm; an jungen Pflz. B. $\pm$ gelappt, wie Fig. 402 f; Bl. zu 1—3, fast sitzend, alles dicht gelbgrau filzig, vgl. Fig. 403 k—l, K. an Spitze kahle, Gr. 5; Fr. nach HOOKER fast rundlich, gelbgrün mit orange Tupfen, bis 4 cm Dm., die zurückgeschlagenen K.-Enden zuletzt abbrechend, vgl. m.

E. i. REHD., l. c. 74 (*Pyr. ind.* WALL., Pl. as. rar. II. 56, t. 173. 1831; *Docynia ind.* DECNE., l. c.). — Sikkim, Khasia, Birma. — Gebirge bis 2500 m. — Blz. in Heimat II, vor B. — Kaum in Kultur, aber für warme Lagen versuchswert! — Ich zeichnete die Bl. nach einem Expl. von WATT, No. 6157, Munipur, die Fr. nach einem Original HOOKERS. Die *Doc. Griffithiana* DECNE., l. c. und *Hookeriana* DECNE., l. c., kann ich vorläufig selbst als Formen nicht abtrennen.

Fig. 404. B.-Formen von Blzw. von: a *Malus sikkimensis* — b—c *Eriolobus yunnanensis* — d—e *E. kansuensis* — f *E. Tschonoskii* — g—h *Malus florentina* ($\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

Gattung 163. *Choenomeles* LDL., in Trans. Lin. Soc. XIII. 97. 1822.

[Scheinquitte.]

Vgl. oben S. 653, $\text{b}—\text{h}$, z. T. dornig, B. sommer- o. $\pm$ wintergrün, Bl. meist mit B., z , hfg. nur c , einzeln o. zu mehreren an Kztr. gebüschelt, ansehnlich, Stb. 20 in einer Reihe o. ∞ in 2 Reihen, Gr. am Grunde $\pm$ verwachsen, Frb. ohne o. mit kleinem, in den f Bl. besonders deutl. freiem Mittelraum, Frb. 5, Sa. ∞ , Fr. quittenartig. — Alle 4 Arten erwähnt.

des Autors kenne. Ich hoffe im Nachtrag darauf zurückkommen zu können. Hauptmerkmale: immergrüner, sehr verästelter, dorniger, 8—9 m hoher B , B. wie Fig. 402 g, 5—10:2—3 cm, obers. stark glänzend, unters. weiß, Stiel 1—2 cm; Bl. ca. 3 Dm., zu 2—4, mit B. (d. h. die vorjährigen B. sind auch noch da), fast sitzend, alles filzig, K. wimperzählig, C. $\frac{1}{2}$ rundoval, genagelt; Gr. etc. wie bei *E. indica* abgebildet, Sa. je 4, davon je 2 übereinander in einem Frb., Fr. eifg. (taubeneigroß), K. bleibend. — Höchstwahrscheinlich eine *Docynia* ist auch die mir noch unklare *Pyrus Doumeri* BOIS, in Bull. Soc. Bot. France 1904. 113, aus Annam mit oblong-lanzettlichen, langgespitzten, ganzrandigen, zuletzt oben kahlen, unten zottig beh. B. und glatten, kugeligen Fr. mit K. Ob eine *Malus*? Aber Steinzellen im Fr.-Fleisch.

I. K. lanzettlich. Stb. einreihig, 20. Bl. einzeln, B. wie Fig. 406a, mit relativ entfernten, aufgesetzten fädlichen Zahnsitzen.

Sekt. 1. *Pseudocydonia*. Sowohl in den angegebenen Merkmalen, wie in den nur kurz verwachsenen Gr. und dem etwas längeren, wenn auch engen schmalen freien Mittelraum im Gyn. an *Cydonia vulgaris* gemahnend.

Fig. 405. *Choenomeles*: a—g *sinensis*: a—b Bl.; c K.; d C.; e Gyn. im L.-Schn.; f Neb.; g B.-Knospe im Q.-Schn. — h—o *japonica*: h Bl.; i Gyn. im L.-Schn. und N.; k K. und Stb.; l C.; m—n Fr. im Schnitt; o S. ganz und im Q.-Schn.; o¹ E. — p—p² *cathayensis*: p Bl. im L.-Schn.; p¹ C.; p² S. — q—s *Maulb.*: q ♀ Bl. im L.-Schn.; q¹ Frkn.-Q.-Schn.; r ♂ Bl. im L.-Schn.; r¹ K.; r² C.; s B.-Kn. im Q.-Schn. (r nach KOEHNE, p² nach HEMSLEY, sonst Orig.).

1. *Ch. sinensis*: dornloser $\text{H}—\text{H}$, bis 5 m, alte St. platanenartig abschuppelnd, lebhaft gelb gefleckt junge Zw. locker zottig, ☉ kahl, purpurbraun. Kn. klein, flach, leicht beh., wenigschuppig, auf starkem Kissen*); B. jung unten reichlich zottig, ober. kaum beh., dann ober. lebhaft grün, unten deutl. heller, fast kahrend, 4.5:3–9:6 cm, breit- o. oboval-elliptisch, beidendig spitz, Herbstf. scharlach, Stiel beh., bis 1 cm, Neb. wie Fig. 405f; Bl. nach B., zart karminrosa, sehr angenehm

*) Vgl. meine Winterstudien, S. 116 und Fig. 128 p—u, S. 125.

fein duftend, ♂ o. ♀, C. innen am Grunde gebartet, sonst vgl. Fig. 405 a—e, Fr. nach Rev. Hort. 1889. 228. tab. col., bis 14,5 : 9 cm, beidendig vertieft, quittengelb, etwas bräunlich tupfig.

Ch. s. KOEHNE, Gatt. Pomac. 29. 1890 (*Pyr. sin.* POIR., in LAM. Encycl. Suppl. IV. 457. 1816; *Cyd. sin.* THOUIN, in Ann. Mus. Paris XIX. 145. t. 8. 1812). — Chinesische Sch. China (genaue Fundorte?), Jap. nur kult. — Blz. Anf. bis Mitte V (Wien). Fr. bei uns kaum reifend. — Liebt geschützte warme Lagen, aber in Wien ganz hart. — Seit langem in Kultur, doch wenig verbreitet.

II. K. breit rundlich, Stb. ∞, 2-reihig, Bl. zu 2—6 gebüschelt. B. mit engerer, z. T. deutl. kerbiger Zähnung (Fig. 406 b—e).

Sekt. 2. *Euchocnomeles*. Kn.-Lage der B. wie in Fig. 405 s. Neb. z. T. großlaubig, breitrundlich.

○ B. wie in Fig. 406 e—f o. mehr schmallanzettlich, unters. jung filzig beh., Gr.-Grund reich beh.

2. *Ch. cathayensis*: soweit mir bekannt von *japonica* noch abweichend durch. B. 7 : 1,5 bis 11,5 : 3,2 o. 10 : 4 cm, Serratur — schärfer, zuw. wenn die Spitzen abbrechen — kerbig; Stiel 1—1,5 cm, Bl. wie Fig. 405 p—p¹, C. deutlicher genagelt, Fr. größer, länglich, stumpfseitig, mit schmaler Einsenkung an beiden Enden, S. mehr breit dreieckig (p²).

Ch. c. (*Pyrus cath.* HEMSL., in Journ. Lin. Soc. XXIII. 256. 1887 excl. Synon; *Cyd. cath.* HEMSL., in HOOK. Ic. pl. t. 2657. 58. 1900). China: Changyang, Ichang (ob wild?), ich sah nur Expl. aus Shensi (GIRALDI, No. 5115, 5116, 5117) und kultivierte aus W.-Hupei (WILSON, No. 410); in Jap. kult. — Blz. IV. — In Kultur wohl noch sehr selten. Vielleicht nur Varietät der *japonica*. HEMSLEY gibt kahle K. an, ich fand sie wie bei *japonica* beh.

○○ B. breiter, bzw. an Spitze rundlicher, kahl, K. gewimpert.

* B. ca. 4,5 : 2,3 — 7 : 4 cm, beidendig ± spitz, Zähnung zieml. feinspitzig (Fig. 406 b), ⊙ Zw. glatt, C. breit rundlich.

3. *Ch. japonica*: sparriger, ± dorniger, bis 3 m hoher B., Zw. jung zottig beh., ⊙ ± kahl, braun o. olivgrün, Kn. sehr klein, beh.; B. halbwintergrün, zuletzt derb, oben glänzend dunkel-, unten hellgrün, Stiel 5—10 mm; Bl. zu 2—6, lebhaft mennigrot, Gr.-Grund meist kahl, sonst vgl. Fig. 405 h—o.

Von *japonica* gibt es jetzt eine ganze Anzahl Kultursorten**), die in Bl.-Größe und -Farbe und Fr.-Größe variieren.

Ch. j. LDL., in Trans. Lin. Soc. XIII. 97. 1822 (*Pyrus jap.* THBG., Fl. jap. 207. 1784; *Cydonia jap.* PERS., Syn. pl. II. 46. 1807; *Malus jap.* ANDREW, Bot. Repos. VII, No. 462. 1807). — Japanische Sch. — China (Tientai-Mts. FABER IV. 1889); Japan (Hondo, Kiuschiu). — Blz. (III—)IV(—V), zuw. vor B. o. auch z. 2. Male VIII—IX. — Frz. IX. — Altbekannter schönblühender, harter Zier-B. Fr. zur Geleebereitung.

Fig. 406. *Choenomeles*: B.-Formen von: a *sinensis* — b *japonica* — c *Maulei*, d var. *alpina* — e—f *cathayensis* (1/2 n. Gr.) (Orig.).

*) Vgl. meine Winterstudien, S. 158 und Fig. 128, S. 125.

**) Ein Verzeichnis guter Sorten gibt REHDER, in BAIL. Cycl. Am. Hort. I. 427. 1900.

3×4 *Ch. japonica* × *Maulei*: unter den Kultursorten beider Arten scheinen Bastarde zu sein. Sicherer Nachweis noch nicht gegeben.

✶✶ B. kaum über 5:3 cm, Spitze meist $\cdot$ rundlich, Zähnung kerbig (Fig. 406 e—d), $\odot$ (und $\cdot$) Zw. dicht feinwarzig und $\pm$ beh., C. oblong.

4. *Ch. Maulei*: niedriger, bis 1 m hoher, ebenfalls $\pm$ verdornender b , sonst von *japonica* im wesentlichen noch abweichend. B. relativ länger gestielt (4—5 mm), Bl. meist kleiner, häufiger f , beim Typ granatrot, Fr. gelb, kugehg., ca. 4—5 cm Dm., vgl. Fig. 405 q—s.

Ebenfalls ∞ Gartentformen. Neben der oben beschriebenen var. *typica* kann man von spontanen Formen noch festhalten var. *alpina* (*Chaen. japonica* var. *alpina* MAXIM., in Bull. Ac. Petersbg. XIX. 168. 1874; *Cyd. Sargentii* LEMOINE, ex REHDER; *Cyd. jap.* var. *alp.* REHDER, l. c. [siehe Anmkg., S. 730]); eine in allen Teilen kleinere alpine Zwergform, die in Kultur vielleicht allmählich in Typ übergeht.

Ch. M. (*Pyrus Maulei* MAST., in Gard. Chron. 1874. I. 756; *Cydonia Maulei* MOORE, in Fl. et Pomol. 1875. 49; *Choen. japonica* var. *Maulei* LAV., Arb. Segr. 110. 1877. *Chaenom. alpina* KOEHNE, Gatt. Pomac. 28. 1890). — Japan (Nippon, Kiuschiu). — Bergwälder, Gebüsch. — Blz. III—IV. — Frz. IX. — Jetzt viel angepflanzt. Reichblühend. — Was MAXIMOWICZ, l. c., unter seiner var. *pygmaea* versteht, ist mir noch unklar geblieben.

Gattung 164. *Amelanchier* MED., Phil. Bot. I. 155. 1789.

[Felsenbirne; June-berry; Amélanhier.]

Vgl. oben S. 653: b o. kleine b , B. einfach, fast stets sommergrün, allermeist $\cdot$ gezähnt o. gesägt, Neb. abfällig; Blst. wenig bis ca. 20-bl., $\cdot$ locker traubig o. etwas büschelig, Bl. weiß, zuw. außen rötlich, C. fast stets schmallänglich, Stb. 10—15 o. meist 20, Gr. 2—5, frei o. $\pm$ verwachsen, Frb. stets mit freiem Zentralraum und breitem freien Gipfel, Fr. rot o. schwärzlich, z. T. bereift, apfelartig, klein, mit meist deutl. ausgebildeten falschen Scheidewänden. Alle Arten erwähnt *).

Sekt. 1. *Euamelanchier*: C. stets länglich, 3—5:1, K. ebenfalls $\pm$ schmal- bis lineal-lanzettlich, sehr spitz. Sekt. 2 siehe S. 742.

A. Gr. stets 5, nur selten 4, B. vgl. Fig. 408, sowie 409, S. 734 und B. siehe S. 740. 412, S. 738.

I. Gr. stets frei, vgl. Fig. 407, C. außen $\cdot$ locker beh. und die B. II. siehe S. 733. wie Fig. 408.

C Gr. die innere Einfügelungsline der Stb. nicht o. kaum überragend, K. zur Frz. zurückgeschlagen, B. meist ca. $1\frac{1}{2}$:2:1, fast vom Grund aus zieml. eng gezähnt o. so gut wie ganzrandig.

✶ B. $\pm$ vom Grund aus eng gezähnt (Fig. 408 a—d), C. 10—15 mm $\cdot$ lang, K. $\pm$ lineal-lanzettlich.

1. *A. rotundifolia*: straff aufrechter b , 0.5—3 m, junge Zw. graufilzig, $\odot$ kahl o. fast kahl, glatt, glänzend purpurbraun, Kn. spitz,

) Die amerikanischen, wie die orientalischen Arten bedürfen noch sehr vergleichender Studien. Ich sah zwar viel Material, allein aus St. Louis konnte ich gerade diese Gattung nicht erhalten, da, als ich darum bat, Herr REHDER das Material hatte. Diesem war es aber einer Europareise halber bisher unmöglich, seine Arbeit zu beenden, ich muß daher die Leser in vielem auf REHDERs spätere Publikation vertrauen, auf die ich hoffentlich im Nachtrag zu sprechen kommen kann. Die amerik. Autoren, zumal GREENE, haben sehr viel neue Arten — und zumeist wohl mit Recht — aufgestellt, doch fehlt eine vergleichende Zusammenfassung und lassen die Diagnosen der Autoren vieles zu wünschen übrig. Meine Darstellung kann nur provisorisch sein, da mein Material für die Bearbeitung dieser polymorphen Arten denn doch zu knapp war. Vgl. die Anm. im einzelnen.

ei-spindelfg., Sch. locker, rotbraun. — beh.*): B. lebhaft grün ober., unders. meist weißlichgrün, + fein papillös**), zuletzt fest, aber dünner, im Mittel kaum über 4:2,5 cm an Kztr., vgl. var., Stiel bis 2,2 cm; Blst. meist über 6-blütig, + graufilzig, nur Bl.-Achse und K. (außen) + stark kahrend, sonst vgl. Fig. 407 a—b, Fr. zuletzt schwarz und bereift, wie c—c².

Man kann mit ROUY et CAM., Fl. France VII. 28. 1901, vielleicht festhalten: var. *genuina* R. et C., l. c., B. mit stumpfer o. abgerundeter Spitze, zuletzt ganz kahrend. — var. *tomentella* R. et C., l. c., B. unders. auch zur Frz. — beh., sonst wie vorige; die var. *grandifolia* R. et C., l. c., mit mehr rundlichen, *cretica* ähnlichen B., die bis 3:3,3 cm messen und zuletzt kahlen sollen, kenne ich ebensowenig wie var. *acutifolia* R. et C., l. c., mit + stumpfspitzigen, bleibend beh. B.; beide wohl nur gelegentliche Formen. In Dalmatien finden sich Formen mit zieml. großen ellipt. B. (Fig. 408 d), deren Kerbzählung fast nur über der Mitte ausgeprägt ist.

Vielleicht besondere Var., wie überhaupt die südost-europäischen Formen noch ungenau bekannt sind.

Fig. 407. *Amelanchier*: a—d *rotundifolia*: a Bl. von oben; a¹ dgl. im L.-Schn.; a² C. und K.; a³ K. und Stb.; b Frkn.-Q.-Schn.; c Fr.; c¹ deren L.-Schn.; c² deren Q.-Schn. (α echte, β falsche Scheidewände); d B.-Stiel-Grund mit Neb. a. — e—e¹ *integrifolia*: Bl. im L.-Schn. u. C. — f—g *cretica*: wie e—e¹ und g Fr. — h—h¹ *parviflora*: wie e—e¹; i—i¹ var. *pisidica*: wie e—e¹ (Original).

1. r. DUM.-COURS., Bot. Cult. ed. 2. V. 159. 1811 [teste KOEHNE; et K. KOCH, Dendr. I. 178. 1869] (*Mespilus Amelanchier* L., Sp. pl. 478. 1753; *Crataegus rotundifolia* LAM., Encycl. I. 83. 1783; *A. ovalis* MED., Gesch. Bot. 79. 1793; *A. vulgaris* MOENCH, Meth. 682. 1794). — Gemeine Felsenbirne. — I. G. D. Rhein-provinz, Hess., Thüringen; Sch. — verbreitet, dgl. OU. (fehlt aber Böhm., Mähr., Schles.), sonst noch M.- und SO.-Frankr., Span.**), N.- und M.-Ital. (Gebirge), nördl. Balkan [ob auch Kl.-As. ? Cilie, Paphlag.?), wohl auch S.-Rußl. bis Trans-kauk. — Felsige buschige Hänge, in lichten Wäldern (bes. auf Kalk) als Unterholz, im Gebirge bis über 1600 m. — Blz. IV—V. — Frz. VIII—IX. — Ein zur Blz. prächtiger b., htg. angepflanzt. — Vielleicht treten in Kultur Bastarde mit *asiatica* (vgl. KOEHNE *asiat.* in Herb. Dendr., No. 251), *canadensis* etc. auf.

*) Vgl. meine Dendrol. Winterstud., S. 187 und Fig. 171 m. q, S. 168.

**) Die Papillosität scheint ziemlich zu wechseln und tritt bei den europ.-orientalischen Formen fast stets — in Erscheinung, aber auch andere Arten zeigen unter dem Mikroskop leichte Papillenentwicklung (so *utahensis* und Verwandte). Ein brauchbares Merkmal zur Unterscheidung scheinen die Papillen nicht zu sein.

***) Die spanischen Expl. stellen gleich den suditalienischen vielleicht z. T. eine besondere Var. dar.

✱✱ B. so gut wie ganzrandig, grannenspitzig (Fig. 408 e-f), C. ca. 8—10 mm lang, K. mehr kurz dreieckig.

2. *A. integrifolia*: sonst von *rotundifolia* noch abweichend durch: B. derber, ober. mehr bläulichgrün, unters. zur Frz. noch abwischbar dickfilzig, feines Nervenetz unters. kaum vortretend, Stiel kaum über 1 cm; Blst. meist nur ca. 6-blütig, vgl. Fig. 407 e-e', Fr. wohl analog, nur der Gipfel dicker weißwollig

A. i. Boiss. et Hon., Diagn. ser. 1. III. 8. 1843 (*A. vulgaris* var. *integrifolia* Boiss., Fl. or. II. 667. 1872). Cappadoc., Armen., Kurdist. z. B. BORN-MÜLLER, No. 2857, KOTSCHY, No. 2851, HAUSSKNECHT Berytdagh 1895, KOTSCHY Gara Kurd. 1841, BALANSA, No. 586, 588. — Ob nur var. von *rotundifolia*? Geht im Gebirge bis fast 3000 m. Ganz analog scheint ein Fr.-Expl. lg. COSSON 21 VII. 1861, Algier!

○○ Gr. die Einfügelungsline der Stb. um etwa $\frac{1}{2}$ ihrer Länge überragend, B. mehr rundlich, 1—1 $\frac{1}{4}$:1 im Mittel, Serratur meist nur gegen Spitze, jedenfalls $\pm$ grobkerbig und entfernt (Fig. 408 g-i). K. zur Frz. aufr. (?).

3. *A. cretica*: weicht sonst noch von *rotundifolia* ab durch: Blst. meist wenigerbl., Bl. etwas kleiner, vgl. Fig. 407 f—f', Fr. etwa wie g, ebenfalls schwarz, bereift.

Man kann festhalten: var. *typica* HALACSY, Consp. Flor. graec. I. 542. 1901. B. im Mittel größer, bis 4,5:3,5 cm, zuletzt ganz kahl und var. *chelmea* HAL.,

Fig. 408. *Amelanchier*: B.-Formen von Blzw. von a—d *rotundifolia* — e—f *integrifolia* — g—i *cretica* — k—m *parviflora* ($\frac{2}{3}$) (Orig.).

l. e., B. kleiner, im Mittel nicht über 2:1,8 cm, auch zur Frz. unters. dick weißfilzig.

A. c. DC., Prodr. II. 632. 1825 (*Pyrus cret.* WILLD., Spec. pl. II. 1015. 1799; *Amel. suborbicularis* BORKH., Handb. Forstb. II. 1262. 1803). — Griechenl., Kreta. — Im Gebirge bis 2500 m. — Kaum in Kultur.

An diese Art schließt sich an *A. parviflora* Boiss., Diagn. ser. 1. III. 9. 1843, aus den Gebirgen SW.-Klein-Asiens (Carien etc.). Hierher z. B. lg. BALANSA, No. 396, PINARD, No. 1813, ARCHER-ELOY, No. 1421, BOISSIER Cadm., Cariae, Mons Sipylus; ausgezeichnet durch kleine ganzrandige o. nur an der stumpfen bis abgestutzten Spitze gezähnelte, kaum ganz kahle B. (Fig. 408 k-m), Blst. zieml. dicht und reichbl., C. nur 5—7 mm lang, z. T. oblong, sonst vgl. Fig. 407 h-h', reife Fr. sah ich nicht. Eine var. scheint zu sein var. *pisidica* Boiss., Fl. or. II. 668. 1872 (*A. p.s.* Boiss., Diagn. ser. 1. X. 2. 1849), lg. HELDREICH, 1845, Mt. Davros, Pisidien, Bl. noch kleiner (Fig. 407 i-i'), gleich den B. $\pm$ kahle z. T. Unvollkommen bekannt.

II. Gr. stets $\pm$ verwachsen, den Drüsenring weiter überragend, C. außen kahl o. kaum beh., B. vgl. Fig. 409 und Fig. 412 S. 738.

a) Gr. und Frkn.-Spitze kahl, B. vgl. Fig. 409.

b, siehe S. 736.

○ B. wie Fig. 409a—e. meist zugespitzt, jedenfalls Serratur fein, spitz, eng, Blst. meist über 6-blütig.

4. *A. canadensis*: $\bar{b}$ - $\bar{p}$, bis 18:0,4 m, Verästelung schlank, schmal rundkronig, Zw. dünn, stets kahl o. jung $\pm$ locker beh., (○) glänzend rotbraun o. olivgrün, Lent. ∞ : Kn. schlankspitzig, Sch. $\pm$ dunkel gerandet und gewimpert^{*)}; B. ober. lebhaft grün, kahl, unters. meist jung $\pm$ beh., aber beim Typ gewöhnlich sehr bald kahrend, $\pm$ hell bis weißgraugrün, sonst vgl. var.; Blst. beim Austrieb meist $\pm$ zottig beh., mit geröteten Brakteen, aufrecht o. übergeneigt, bis 10 cm lang, Bl. vgl. Fig. 410a—c, kahl o. nur K. innen $\pm$ beh. o. auch K. und Bl.-Achse außen $\pm$ beh., C. 10—20 mm lang, Fr. zuletzt purpurn und bereift, kugelig, ca. 6 mm Dm., K. zurückgeschlagen.

Ich halte vorläufig folgende, noch nicht recht geklärte, meist (und vielleicht mit Recht) als Arten getrennte Varietäten fest: var. *a. botryapium* TORR. et GR., Fl. N.-Am. I. 473. 1840 (*Pyrus botryapium* L. F., Suppl. 255. 1781; *Crat. racemosa* LAM., Enc. I. 74. 1783; *Mesp. canad.* var. *cordata* MCHX., Fl. Bor.-Am. I. 291. 1803; *Amel. botr.* BORKH., Forstbot. II. 1260. 1803; *A. intermedia* SPACH, Hist. Veg. II. 85. 1834, sec. spec. orig.!). *Pyrus Wangenheimiana* TAUSCH in Flora 1838. 714; *Amel. canadensis* AUCT. s. str.): wie oben. B. an Basis meist $\pm$ herzförmig, vgl. Fig. 409a—b; bis 10:4 cm, Stiele bis 2,5 cm, liebt mehr trockene Waldungen, nach SARGENT (1905) von Neufundland, Quebec, Ontario bis Minnesota, O.-Nebraska, S.-Arkansas und südlich bis Florida. Eine vielleicht nur als Form zu *a.* zu ziehende Var. ist

Fig. 409. *Amelanchier*: B.-Formen von: a—c *canadensis* var. *botryapium*; d—e var. *obovatis* (vel *oblongifolia*?) — f ? *Cusickii* — g—h *polycarpa* — i—l *siskiyouensis* ($\frac{2}{3}$ n. Gr.) (Original).

var. *b. tomentula* SARG., Manual 361. 1905. B. unters. bleibend beh.; Vermont bis Ontario und Delaware, C. Georgia, Miss., O.-Louis. — var. *c. obovalis* ^{**) SARG.} Silva IV. 128. t. 145. 1892 (*Mesp. canad.* var. *obovatis* MCHX., l. c.; *Am. canad.* var. *oblongifolia* TORR. et GR., l. c.; *A. spicata* DECNE., nec KOEH. non BRITT.; *Amel. botryapium* BRITT. SMALL et AUCT. AL.): $\bar{b}$, selten $\bar{p}$, bis 10 m, B. jung stets dichttützig, nicht rot austreibend, Grund gerundet bis spitzkeilig (Fig. 409d—e), im Mittel kleiner, z. T. oboval, auch zuletzt meist nicht ganz kahl unters.; Blst.

^{*)} Vgl. meine Dendrol. Winterstud., S. 178 und Fig. 171e—l, S. 168.

^{**) SARG.} Scheint zuw. als *oligocarpa* in Kultur zu sein; über die var. *oblongifolia* T. et GR. bin ich noch unklar. Im Hort. Bot. Berlin sammelte ich eine als var. *Scharnkeana* GRAB. bezeichnete Form, die vielleicht mit den relativ schmal-ellipt., nur 3,5:1,5—5,5:3,7 cm messenden B. die typische noch besonders aufzustellende *oblongifolia* darstellt. Vielleicht ist aber dieser Name für *obovatis* einzusetzen, denn ASHE, in Bot. Gaz. Bd. 35. 1903. 434, nimmt die *obovatis* als eigene Art. Hierher auch die nur als nomen nudum publizierte *Pyrus Neumanniana* TAUSCH, in Flora 1838 Beibl. 48, sec. spec. orig.

kürzer, straffer, mehr behaart, aber z. T. fast ganz kahlend, Bl. vgl. Fig. 410b—b', K. z. T. mehr breit dreieckig, C. 6—11 mm lang, Fr. eher größer; liebt mehr feuchte Orte, geht eher weiter nach N. und weniger weit nach S. (N.-Carol., Alab.)

A. c. MED., Gesch. Bot. 79. 1793 (*Mesp. canad.* L., Sp. pl. 478. 1753). — Kanada-Felsenbirne, Shad Bush. — Heimat wie oben. — Blz. III—IV—V. — Frz. VI—VII. — Seit langem in Kultur. Vielleicht hie und da bastardierend. Ehe die spontanen Formen nicht ganz geklärt, sind gewisse Gartenformen nicht sicher zu stellen.

○○ B. wie Fig. 409f—l, beidendig meist rundlich, Zähnung grob, z. T. kerbig, Blst. kaum über 6-blütig.

* B. schon zur Blz. kahl o. nur ganz spärlich beh., Blst. und Bl. auch kahl (nur K. innen z. T. beh.).

+ C. 18—20 mm lang, K. innen meist $\pm$ beh., Stb. nur 1_2 2_3 so lang, B. vgl. Fig. 409f.

5. *A. Cusickii*: b, 2—3 m hoch, Zw. kahl, ⊙ braunrot; B. z. Blz. ca. 3:2,5 cm, dünn, aber fest, bleichgrün, unters. wenig heller, Zähnung meist vom unteren Drittel ab, Stiel bis 2 cm; Blst. kurztraubig, Bl. groß, vgl. Fig. 410d—d', Stielchen 5—20 mm, Fr. sah ich nicht, nach Autor*) bis 1 cm Dm., scharlach, erst spät schwarz werdend.

A. C. FERNALD, Erythra VII. 121. 1899. — Oreg., Washington bis N.-Idaho. — Gebirgshänge. — Blz. V. — Sehr einführenswert.

++ C. ca. 10 mm lang, K. ganz kahl, Stb. 2_3 bis so lang wie K., B. vgl. Fig. 409g—h.

6. *A. polycarpa*: kleiner B., reich kurz verzweigt, ⊙ Zw. kirschbraun, sonst *Cusickii* sehr ähnlich, B.-Zähnung ziemlich spitz und grob, B. kaum über 3,5:2,5 cm, Stiel meist unter 1,5 cm, Blst. bis 5 cm, bis 8-blütig, Bl. etwa wie Fig. 410e, jedoch kahl, Fr. breitkugelig, bis ca. 8 mm Dm., zuletzt wohl schwarz und schwach bereift, K. zurückgeschlagen.

A. p. GREENE, in Pittonia IV. 127. 1900. — S.- und C.-Colorado. — Gebirge bis 2500 m. — Blz. V. — Frz. VII. — Ich beschreibe nach Orig. lg. BAKER, No. 379 (davon die B.) und den ganz analogen Expl. lg. BAKER, No. 19. — Von der gewiß sehr ähnlichen *A. glabra* GREENE, Fl. Francisc. I. 52. 1891 (lg. BONTÉ, Calif., Donner Lake Reg. VI. 1888) sah ich leider kein Orig.

** B. auch zur Frz. oben z. T., unten durchaus $\pm$ locker kurz beh. (Lupe!), Blst. und Bl. $\pm$ lockerzottig.

7. *P. siskiyouensis**) wohl b, Zw. nur jung spärlich beh., $\pm$ kahl o. fast so, kirschbraun, Lent. wenig auffällig; B. etwas graugrün, unters. wenig heller, zuletzt derb, aber wenig dick, vorwiegend aus rundl. Grunde breit ellipt., kaum über 3:2,2 cm, Stiel meist unter 8 mm; Blst. 3—5-blütig, kaum 2 cm lang, zieml. unansehnlich, Bl. vgl. Fig. 410e—e', C. etwa 5—8 mm lang, Stb. 20, Gr. 4—5. Fr. oft einzeln, 6—8 mm Dm., rundoval, schwarz, $\pm$ bereift, K. zurückgeschlagen.

P. s. C. K. SCHN. (*A. alnifolia* AUCT.). — Gebirge in Calif., bis 2000 m. — Blz. V(—VII). — Frz. VII—IX. — Noch zu beobachten.

*) Des Autors Orig. aus Oregon (CUSICK, No. 1858) sah ich nicht, ich beschreibe nach HELLER, No. 53 et 2988, N.-Idaho (B.), und ELMER, No. 135, Wash. (Bl.-Zeichnung).

Ich gebe die Abb. der Bl. nach HANSEN, No. 230 et 1088, die B. nach HANSEN, No. 230, PALMER, No. 2459, PRINGLE 1882 [Siskiyou Co.] und HILLEBRAND 1863 [Mariposa Co.]. Bei allen diesen Expl. ist die Ovarkappe kahl o. an der Fr. mit nur vereinzelten Harchen. Bei den Expl. lg. HELLER, No. 5794, 5961, HANSEN, No. 2037, die in der Beh. der B. ganz analog sind, zeigen die Fr. dicht beh. Ovarkappen. Was nun HELLER, in Muhlenbergia II. 59. 1905, als *A. gracilis* aus Calif. [lg. HELLER, No. 7970, Siskiyou-Co.] beschreibt, soll „glabrous except for some deciduous woolly hairs in the inflorescence“ sein, dann heißt es aber „ovary densely villose“. Jedenfalls hängt *gracilis* mit *siskiyouensis* eng zusammen und letztere ist vielleicht nur Var. davon. Ohne Orig. ist aber HELLERS unklare Beschreibung nicht zu deuten. Vielleicht schlichen sich beide Arten an *glabra* GREENE an!

b) Gr.-Grund und Ovarspitze beh.*), B. vgl. Fig. 412.

- B. fast vom Grund ab ringsum fein und spitz sägezählig o. nur : gegen das deutl. zugespitzte Ende gezähnt (Fig. 412a -d), Blst. reichblütig, C. schmallänglich, ca. 4-5:1, K. sehr schmallineal und lang, zur Frz. zurückgeschlagen.

8. *A. asiatica*: B. $\bar{b}$, bis 15:0,6 m; Verzweigung fein, schwank, zuw. nur jung + beh., ⊙ glänzend rotbraun, kahl; B. aus + rundlich, o. etwas herzförmig. Grunde eiförmig, o. längl.-elliptisch, Zuspitzung + ausgeprägt, jung unters. meist dick und etwas rosagraufilzig, gewöhnlich sehr bald ganz kahlend, Textur zuletzt + derb.

Obers. etwas glänzend sattgrün, Unters. hellgraugrün, ± fein papillös, sonst vgl. var.; Blst. beim Ausbruch ± gleich B. beh., aber bald stark o. ganz kahlend, so daß zuw. nur K. innen beh., vgl. Fig. 410f—i¹, C. zieml. variabel, ebenso auch

Fig. 410. *Amelanchier*: a *canadensis* var. *botryapium*: Bl. im L.-Schn.; a—c var. *obovatis* (vel var. *oblongifolia*?): b = a; b¹ C.; c Fr. — d—d¹? *Cusickii*: wie b—b¹ — e—e¹ *siskiyouensis*: wie d—d¹ — f—h *asiatica*: f Bl. im L.-Schn. und K.; f¹ C.; g Frkno.-Q.-Schn. (α echte, β falsche Scheidewände); h Fr.; i—i¹ var. *sinica*: wie f—f¹ (α nach KOEHNE, sonst Orig.).

Gr. bald ein wenig länger, bald — kürzer als die Stb., stets ± verwachsen [gegen KOEHNE], Fr. zuletzt blaugrau, 8-10 mm Dm (h).

Ich unterscheide: var. a. *typica*: B. ringsum gezähnt, im Mittel über 5 cm und an Blzw. bis 7,5:4 cm lang (Fig. 412a), Stiel bis 2,5 cm; so Japan** (Kiushiu, Sikoku, Honshiu), aber wohl auch China (z. B. FABER 1891 Tien-tai, 1500-1600 m). var. b. *sinica*: B. jung spärlicher, lockerer grau beh., später dünner, kaum über 4,5:2,8 cm an Frzw. (Fig. 412c—d), nur im oberen Drittel gesägt, Stiel bis 2 cm, sehr dünn, dgl. die Blst. und Bl- bzw. Fr.-Stiele, alles etwas zierlicher, kahler, aber kaum als Art abtrennbar, wenigstens in Bl keine durchgreifenden Unterschiede. Ich sah aus China: N.-Scheni***): lg. (GIRALDA, No. 968, 4966, 5058, 5060, 6133; diese var. scheint auch in Jap. (ob nur kultiviert?) aufzutreten.

*) Natürlich ist die hier gegebene Aneinanderreihung nur eine künstliche, vorläufig bis zur Klärung der Arten angenommene!

**) Eine etwas abweichende Form mit zur Frz. noch + beh. B.-Unters. und -Stielen hat FAURIE in Kubono, 4. IX. 1894, gesammelt, B. wie Fig. 412b, Serratur wohl ringsum, aber sehr wenig auffällig.

***)) Die Formen lg. HENRY, No. 5521 aus Sz'tschwan und WILSON, No. 515 aus W.-Hupei zeigen noch schmaler elliptische, oft beidendig spitze B. bis 5,5:2-2,5 cm, deren Zahnung wechselnd, zuw. fast null ist. Bl. vgl. Fig. 410i—i¹ (nach HENRY).

A. a. ENDL., in WALP. Rep. II. 55. 1843 (*Aronia as.* S. et Z., Fl. jap. 87. t. 42. 1835) Asiatische Felsenbirne. Heimat wie oben. Trockene Berghänge. — Blz. IV—V. — Frz. IX. — In Kultur noch relativ selten. Von *canadensis* jederzeit gut zu scheiden [gegen PRITZEL apud DIELS].

CC Die Merkmale unter O insgesamt nicht zutreffend.

- B. fast vom Grunde ab meist ziemlich feinspitzig sägezählig.

+ Bl. zu 1—4 in Büscheltrauben. B. jung höchstens spärlich beh., beidendig $\perp$ kurz zugespitzt, Serratur ungleich, etwas kerbartig (Fig. 412 e—f), Fr. fast birnfg., K. aufrecht^{*)}.

9. *A. oligocarpa*: b o. $\bar{b}$, bis 5 m; Zw. kahl, glänzend kirschbraun; B. dünn, oben satt-, unten hellgrün, 4:2,2 7:3,8—4,2 cm, Stiel bis 1,8 cm; Bl. vgl. Fig. 411 k k', nur K. innen beh., C. ca. 6—8 mm, zieml. breit oblong (k'), Fr. schwarzpurpurn, bereift, ca. 8—9:6—7 mm.

A. o. ROEM., Syn. Ros. III. 145. 1847 (*Mespilus canad.* var. *olig.* MCHX., Fl. Bor.-Am. I. 291. 1803; *Amel. canad.* v. *olig.* T. et GR., Fl. N.-Am. I. 474. 1840). — Labr. bis Ontario, Pennsylvan., Michigan. — Sumpfige o. feuchte

Fig. 411. *Amelanchier*: k—l *oligocarpa*: k Bl. im L.-Schn., k' C., l Fr. — m—n *spicata*: wie k—l — o—o' *alnifolia* ? var. *florida*: wie m—m'; p—q ? var. *typica*: wie m—n; r—r' var. *elliptica*: wie m—m' (Original).

felsige Orte. — Blz. V. — Frz. VIII. — In Kultur wohl selten echt. Ich fand ähnliche Formen, deren B. aber nur gegen die Spitze gesägt waren und die ich vorläufig nicht deuten kann.

++ Blst. reichblütiger, B. jung unters. dicht weiß- o. gelbgrau-filzig. Serratur meist etwas feiner, Grund rund bis $\perp$ herzförmig, Fr. rundlich, K. ?.

10. *A. spicata***) : von *oligocarpa* im wesentlichen noch abweichend durch: junge Triebe gleich B. — beh., diese vgl. Fig. 412 g—k, an Frzw. bis ca. 6,5:4,5 cm, Stiel bis 2 cm, gleich Unters. hfg. — beh. bleibend; Blst. kurz und dicht, ca. 5 cm lang, Brakteen $\perp$ braunrot, Beh. anfangs $\perp$ reichlich, dann kahlen alle Teile $\perp$.

*) So an Expl. mit Ende Juli o. später gesammelten Fr. Ob Merkmal immer zutreffend, bleibt fraglich.

**) Der Begriff der *spicata* ist noch nicht sicher umgrenzt. So verstehen KOEHNE und BRITTON wohl Ungleiches unter dieser Art. Von dem, was BRITTON als *rotundifolia* ROEM., l. c. 146 (*Mesp. canad.* var. *rot.* MCHX., l. c.) führt, konnte ich mir aus Mangel an Material kein richtiges Bild machen. Vielleicht ist das die echte *spicata* (Lam.) und die *spicata* BRITT., die eine Zwergform darstellt, davon nur eine Varietät o. falls das Expl. lg. FERNALD, No. 388 (Maine) mit Fr. mit zurückgeschlag. K. hierher gehört, als Art zu fassen und umzubenennen. Vgl. B. in Fig. 412 i—h. Nach Expl. Biltm. Herb., No. 5664, Ontario, möchte ich glauben, daß die *rotundifolia* AUCT. AM. nur eine Var. der *oligocarpa*! ist. Die *Pyrus sanguinea* PURSH, Fl. Am.-Sept. I. 340. 1814, zu der er MCHX.s *rotundifolia* zueit, scheint mir *spicata* s. str., ebenso *A. sanguinea* L.DL., Bot. Reg. t. 1171. 1828.

Bl. vgl. Fig. 411 m — m'), K. z. T. schmaler, C. ca. 8–12 mm lang, Stb. etwa K., Fr. blauschwarz (n).

A. s. KOEH., Dendr. 256. 1893 (*Crataegus spic.* LAM., Encycl. I. 84. 1783; *Pyrus ovalis* WILLD., Berl. Baumz. 259. 1796; *Amel. ovalis* BORKH., Forstb. II. 1259. 1803; *Amel. canad.* v. *spic.* SARG., Silva IV. 129. 1892, ex p.). Ähren-Felsenbirne.

Wohl von Quebec bis Saskatchewan, ferner Minnes., Michig., New York. — Wälder, Gebüsch. — Blz. IV–V. — Frz. VII. — Wie sie sich geographisch in Brit.-N.-Am. gegen die nordwestliche *alnifolia*-*florida*-Gruppe abgrenzt, ist mir noch unklar. Was ich (leider nur in Blzw.) aus Saskatchewan und Manitoba sah, scheint alles eher *spicata* als *alnifolia* zu sein. Vgl. aber SARGENT'S Manual. — Seit langem in Kultur, wo sie meist als *ovalis* geht, scheint im Gebiet schon hier und da zu verwildern.

✱✱ B. nur über der Mitte $\pm$ gezähnt, Zähnung oft breit offen.

11. *A. alnifolia*✱✱): h , ob kleiner h ?, Zw. jung, gleich B. (bes. unters.) und Blst. + weißgrau seidentilig, $\odot$ kahl o. fast kahl, kirschbraun; B. ober. sattgrün,

Fig. 412. *Amelanchier*. B.-Formen von Blzw. von: a — b *asiatica*, c — d var. *sinica*, e — f *obcordata* — g — h *spicata* — i — k ? *sanguinea* [*retundifolia* AUCT. AM., vgl. Text S. 737] — l — m *alnifolia* ? var. *typica*; n — p ? var. *florida* (oxydon' vgl. Text S. 739), q — r var. *elliptica*, s von Pflze. aus Alaska; t — u ? var. *pumila* (Text S. 739) ($\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

sehr bald kahl, unters. blaugraugrün, ganz o. fast verkahlend, zuletzt dünn, aber fest, Grund breit rundlich o. leicht herztig, Spitze abgerundet o. etwas abgestutzt, vgl. Fig. 412 l — m, an Blzw. kaum über 4,5 : 3 — 3,5 cm, Stiel bis 2 cm; Blst. wenn B. zieml. erwachsen, denen der *spicata* ähnlich, doch lockerer, schlaffer, Bl. kaum größer, C. aber mehr schmallänglich, Stb. meist kürzer als K., Fr. rundlich blauschwarz, K. angepreßt.

*) Nach Expl. lg. BOURGEOU, 1857, Lake Winipeg Valley.

**) Mein Bestreben, die westamerikanischen Formen zu sondern und die neuen Arten zu sichten, scheiterte daran, daß mir der Begriff *alnifolia* unklar blieb. Ohne Original kann man nicht sagen, was NUTTALL eigentlich meinte, und in der neuen Literatur ist *alnifolia* von SARGENT, BRITTON, HOWELL, NELSON etc. in der allerverschiedensten

Vielleicht kann man die Formen, die ich als *alnifolia* s. lat. fasse, wie folgt gliedern: var. *a. typica*: die reicher beh., kleiner blütige Form wie oben; Gebirge von Wyoming, Montana, Wash., Oreg. (z. B. lg. LYALL 1859, Oreg.; lg. HOWELL 1881, Pacif. Coast; lg. ALLEN, No. 214, ex p. Wash.). — var. *b. florida* (*A. flor.* LDL., Bot. Reg. t. 1589, 1833; *A. oxyodon**) KOEH., Gartenflora 1902, 609; B., Zw. und Blst.-Achsen von Anfang an kahl o. nur sehr spärlich beh., in Bl. auch meist nur K. innen 1- beh., C. über 12 mm lang, vgl. Fig. 411 o—o' (nach BEATTIE, No. 1819) und p—q (nach ALLEN, No. 214), ob in der Länge der Stb. und der Form der K. gute Unterschiede, mir noch fraglich. Wash., Idaho, südl. Brit.-Columb.***). — var. *c. elliptica* (*A. ellipt.* NELSON, in Bot. Gaz. XL, 1905, p. 66; *A. ulmifolia* GREENE, in Herb. ob beschrieben?): eigentlich nur durch relativ größere, an Frzw. bis 8:5,5 cm messende, vor allem breiter und kürzer, oft bis zum unteren Drittel gezahnte B. (Fig. 412 q—r) und lockere nur ca. 8-blütige Blst. mit kürzeren breiteren K. (Fig. 411 r—r') von *florida* abweichend; Beh. im allgemeinen an B. reichlicher als dort. Gebirge von Color. NELSONS Typen sah ich nicht, aber die als wohl hierher gehörig von ihm zitierten BAKER, EARLE, TRACY, No. 197 und BAKER, No. 47 und 260 [47 ist GREENES *prunifolia* Typ]. Wahrschein-

Fig. 413. *Amelanchier*: a—a' *rubescens*: Bl. im L.-Schn. und C.; b Fr. (ob *rubescens*?) vgl. Text S. 740, Anm. 1 — c—c' ? *prunifolia*: wie a—a' — d—d' *oreophila*: wie a—a' — e—e' *mormonica*: wie a—a'; f—f' dgl., vgl. aber Text S. 740/41 (Original).

lich gehören zu *elliptica* auch BAKERS No. 750, die GREENE mit Unrecht als *polycarpa* o. deren Form bestimmt hat. — var.? *d. pumila* (*A. canad.* var. *pumila* NUTT., in T. et Gr., 1 c.); diese mir unklare Form konnte das Expl. lg. LAMB, No. 1190 (W.-Wash.) darstellen: Zw. kahl, schlank, rotbraun, B. dicklich, kahl o. fast so (nur ganz jung beh.), zieml. hellgrün (trocken), wie Fig. 412 t—u, an Lgtr.

Weise interpretiert worden. Leider hat kein Autor in Amerika sich bemüht, diese Art scharf zu umgrenzen. Alle nehmen sie als „bekannt“ an und trennen ihre neuen Arten ab, ohne sich einen sicheren Überblick über die übrigen Formen verschafft zu haben. Jetzt kann nur auf Grund aller vorh. Exsiccaten die ganz verfahrenene Nomenklatur gesichtet werden. Vor allem muß man aber die Formen eingehend beschreiben und darf nicht z. B. die Zahl der Gr., der Stb. etc. einfach außer acht lassen, wie es NELSON (1905) tut. Ich hoffe, daß meine Darstellung die amerikanschen Autoren anregt, recht bald mal alle Arten vergleichend zu behandeln und alles, was hier fraglich bleiben mußte, zu klären. Im Nachtrag wurde ich dann meine Auffassung soweit als nötig berichtigen können!

*) REIDER halt (dieselb.) *oxyodon* ebenfalls für mit *florida* identisch. LINDLEY bildet eine zieml. langellipt. blättrige Form ab. Wenn man aber den ganzen Komplex dieser kahleren *alnifolia* des NW. übersteht, so scheinen prinzipielle Gegensätze zwischen Formen wie *oxyodon* s. KOEH. und *florida* in icon LDL. nicht zu bestehen. — Über PIPERS *A. cuneata*, in Bull. Torr. Bot. Club, 1900, 392, mit „pale twigs and cuneate leaves“, lg. PIPER, No. 2173, Wash., konnte ich noch nicht ins reine kommen. Vielleicht zu den Formen mit weniger als 5 Gr. gehörig, Stb. aber 20.

**) GREENE beschreibt aus Alaska eine *A. Gormanii*, in Pitt. IV, 129, 1900. Allerdings sehr unvollkommen. Ohne Orig. nicht zu klären. Ich sah aus Alaska nur 1 Bl.-Expl., lg. KRAUSE, No. 69, wonach diese Form mit meiner *florida* bzw. *oxyodon* zusammenfallen dürfte. Ein steriler Trch (KRAUSE, No. 556) hat B. wie Fig. 412 s, die wieder sehr an die var. *elliptica* (q) gemahnen.

bis 3,5 : 3 cm, Serratur zieml. fein und scharf, fast vom unt. Drittel ab, Stiel bis 12(—15) mm; Bl.?, verblüht mit kurzen spitz dreieckigen K., diese überragenden 20 Stb., 4—5 Gr., alles bis auf K.-Spitze innen so gut wie kahl, reife Fr.?

A. a. NUTT., in Journ. Philad. Ac. VII. 22. 1834 (*Aronia alnif.* NUTT., Genera I. 306. 1818; *Am. canad.* var. *alnif.* TORR. et GR., Fl. N.-Am. 473. 1840). Heimat wie oben. — Blz. V—VI. — Frz. VI—X. Die Angaben oben alle provisorisch. Vgl. Anm. S. 738!

Eine gute var., wenn nicht eine besondere Art, scheinen Expl. Ig. BOLANDER, No. 1674 [1867], Calif. (Herb. BOISS.) zu bilden. Es sind lange schlanke Blzw., deren junge Triebe wie die B. (beiders., unten dichter) locker fein beh. sind, ♂ rotbraun, kahl; B. dünn aber fest, aus meist herzfg. Grunde rundoval, 2,5 : 2—3,5 : 3 cm, zieml. graugrün, Zähnung von etwas unter Mitte ab breit dreieckig, etwa wie Fig. 412 o, Stiel 5—10 mm; Blst. büscheltraubig, ca. 10-blütig, lockerzottig beh., Bl. groß, C. ca. 2 cm lang, Recept. und K. außen lockerzottig, K. innen mehr beh., lanzettlich 3-eckig, Stb. 20, etwa K., Gr. 5, Ovarkuppe dicht beh. Erinnert am meisten in den Bl. an die, die ich als *Cuscuta* ansehe (aber K. kaum länger als Bl.-Achse). Einen Namen gebe ich vorläufig nicht.

B. Gr. 2—4 (selten 5), B. vgl. Fig. 414 und 416 a k [man vgl. aber im Notfalle auch unter A.!).

○ Stb. 10, kürzer als K., Gr. 3, verwachsen, C. ca. 8 : 2,5 mm, in Kn. außen gerötet, Recept. längl., etwas trichterig, B. länglich-ellipt., meist zugespitzt, Zähnung von unter der Mitte ab (Fig. 414 a—b).

12. *A. rubescens*: 1) — 2), bis 4 m, sparrig kurzästig, junge Zw. filzig, (—) rotbraun, kahlend; B. bleichgrün, beiders. (unten dichter) lockerfilzig, an Blzw. bis 2,5 : 1,4 cm, Stiel bis 8 mm; Blst. ca. 4—5-blütig, 1,5—2,5 cm lang, alles fein graufilzig, Bl. wie Fig. 413 a—a'; Fr. ? *).

A. r. GREENE, in Pittonia IV. 128. 1900. — N.-New-Mexico (BAKER, No. 380). — Blz. IV. — Steht der *utahensis* nahe, aber wohl gut verschieden.

An *rubescens***) schließt sich in mehrfacher Hinsicht an, wie es scheint, die *prunifolia* GREENE, in Pittonia IV. 21. 1899. GREENES Typ mit jungen Fr. ist BAKER, EARLE, TRACE, No. 665 aus S.-Color., der in B.-Form (Fig. 414 e—f) ähnlich ist, aber die B. sind größer, bis 3 : 1,8 cm, kahlen so gut wie ganz und Stiele bis 1,5 cm lang!, Blst. locker, bis 4,5 cm, hängend, Stb. anscheinend 15; nun hat GREENE auch BAKERS No. 163 aus Zentr.-Color. (Cerro-Summit) als *prunifolia* bestimmt. Bl. vgl. Fig. 413 c—c', Stb. 10, B. kürzer gestielt, mehr breit elliptisch, Zähnung auch nur gegen Spitze, zuw. — null (Fig. 414 g—h), Beh. noch reich (bes. Unters.). — Vom selben Standort wie No. 163 ist nun auch BAKERS No. 55 [B. wie i], die mit dessen No. 139 und 380 [B. wie k] zu *A. oreophila* NELS., in Bot. Gaz. XL. 66. 1905 gehört. Diese hat [No. 55 und No. 139] Bl. wie Fig. 413 d—d', Gr. 3—4, Stb. 12—15, B. auch zur Frz. unters. (auch oben —) beh. Ich glaube nun, daß BAKERS No. 163 zu *oreophila* gehört, die von *prunifolia* in den breiteren, mehr abgerundeten, zuw. tief eingeschnitten gegen Spitze gezähnten, bleibend beh. B. abweicht. Zu *oreophila* gehört m. E. auch BAKERS, No. 439 (Fig. 414 k) von GREENE im Herb. als *leptosepala* bezeichnet. Ferner ziehe ich zu *oreophila* BAKERS No. 210 und AUSTIN 1894, Col., Parkers, Prairie near Denver.

An diese *oreophila* schließt sich m. E. nahe an eine Form, die ich bisher nicht beschrieben fand und *mormonica* nennen will. Als Typ nehme ich MAC

*) GREENE hat auch BAKERS No. 438 aus M.-Color. mit unreif. Fr. als *rubescens* bestimmt. Die B. sind hier im Mittel kleiner, z. T. rundlich (Fig. 414 c—d). Mir vorläufig unsicher.

**) Der *rubescens* steht nahe ein Expl. Ig. JONES, No. 1447 [ex. p.! Hb. Berlin!], deren B. Fig. 416 c und dessen Bl. Fig. 415 e—f zeigt. Gr. auch 3, aber Stb. 18, C. ca. 12 : 3 mm, Fr. schwarz, kaum bereift, K. zurückgebogen, Fr.-Gipfel fast herauschauend; B. an Frzw. sehr schlecht erhalten, wohl breit-rundlich, kahl o. fast kahl, zur Blz. locker beh. Hiermit vielleicht identisch PALMERS Expl., No. 120 aus Arizona, dessen fast ganzrandige derbe B. bis 2,5 : 3,3 cm messen. Fr. analog. — Unter der gleichen No. 1447 fand ich im Herb. BOISS. neben denselben Fr. aber ganz andere Blzw., mit ganz kahlen B. wie Fig. 416 d, also abgestutzt, tiefzahnig, auch Zw. und die Blst. (3—5-bl. bis 3 cm) ganz kahl, Bl. wie Fig. 415 g—h, Gr. 4, je 2 verwachsen und sonst frei, Stb. 8—10, C. ca. 11 : 5 mm. Ich sah sonst nichts Analoges und möchte diese kahle Form fast für gute neue Art halten, die sich vielleicht mehr an *utahensis*-Bakerei anschließt.

DOUGLAS, No. 102 (Arizona, Mormon Lake, 6000', 12. VI 1898) mit spärlich beh. rundellipt., von etwas unter der Mitte ab grob gezähnten B. (Fig. 414 p), die 2,5:2—3,5:3 cm messen, Textur dünn, Obers. dunkelgraugrün, Unters. weißgrün, Stiel bis 1 cm, Blst. ca. 10-blütig, fast kahl, locker, Bl. vgl. Fig. 413 e—e', innen nur spärlich auf Ovar beh., Gr. 4—5, Stb. 18—20, nur $\frac{1}{2}$ K., C. ca. 10:3,5 mm. Dieser Form schließen sich nun sehr eng an HELLERS, No. 3679 aus New-Mexico mit jungen Fr. und B. wie Fig. 414 n, also wieder ganz analog PENARDS No. 141

Fig. 414. *Amelanchier*: B.-Formen von Blzw. von: a—b *rubescens typica*; c—d dgl.? (vgl. Text S. 740). e—f *prunifolia typica*; g—h dgl.? (vgl. Text S. 740) — i—m *oreophila* — n—q *mormonica* ($\frac{1}{2}$) (Original).

aus Color., der wiederum auch FENDLERS No. 213, New-Mex. (q) täuschend gleicht. JONES No. 5371 aus Utah, mit B. wie o o. auch n, weicht nur in den Bl. (Fig. 413 f—f') durch meist 3 Gr. und 15—18 Stb. ab. Auf die Zahl der Gr. und der Stb. darf man m. E. ein entscheidendes Gewicht nicht legen, da sich Formen mit stark wechselnden Zahlen doch viel näher stehen können, als solche mit gleichen Zahlen. Man muß alle Merkmale und vor allem auch das Vorkommen ganz genau untersuchen!

○○ Stb. 15—20, Gr. 2—3, z. T. frei. Recept. breit becherfg., B. — rundlich, nicht zugespitzt (Fig. 416 a)*).

13. *A. utahensis*: kleiner sparriger, teinfilziger Zwerg-b; B. grau, beiders. reich filzig beh., Zähnung unregelmäßig, etwa von Mitte ab, kaum über 2:1,5 cm, Stiel bis 6 mm; Blst. kurz büscheltraubig, 3—6 blütig, ca. 1,5 cm lang, gleich B. beh., Bl. winzig, C. kaum 6:1,5 mm, jung gerötet, sonst vgl. Fig. 415 a—a', Stb. $\pm$ = K., 15—18, Fr. ?.

*) Man vgl. aber die im Anschluß an *rubescens* behandelten Formen. Ein eigentümliches Ding scheint die sudketiforme *A. rennula* GREENE, in Pittoma, IV, 21, 1899, lg. PARISH, No. 453, Cushberry Springs. Leider sah auch GREENE nur Fr., aber den K. nach ist es keine Form der *Vaccinia*-Gruppe. B. gerb. wie Fig. 416 i, beiders. beh., Nervennetz bes. obers. scharf, Fr. zu 1—3, K. beiders. beh., ziemlich lang breit lanzettlich, Gr. ca. 3, Stb. ?

A. u. KOEHNE, Gatt. Pomac. 25. 1890 (*A. rubescens* var. *cinerea* GOODING, in Bull. Torr. Bot. Cl. 1904. 55). — Utah (lg. JONES, No. 1716, Typ!) und Arizona (JONES, No. 5082 d). — Gebirge, 1000–1500 m. — Blz. IV. — Ist nicht in Kultur, was *utahensis* HORT. darstellt, ist ohne Bl. überhaupt nicht zu bestimmen!

Im Anschluß an die *utahensis* sind noch folgende Arten o. Formen zu besprechen, deren gegenseitige Beziehungen vorläufig noch ganz unklar sind:

Zunächst *A. crenata* GREENE, in Pittonia IV. 125. 1900, aus New-Mex., lg. BAKER, No. 377, eigentlich nur durch mehr rundliche, flach kerbigere B. (Fig. 416 b), bis 2:2 cm, und Bl. wie Fig. 415 b mit kürzeren Stb. abweichend, diese 15–20, Gr. 2–3 (+ frei). Ob das Expl. PALMER, No. 121 aus Arizona, dessen Bl. in Fig. 415 c–c' dargestellt sind, mit *crenata* s. str. o. nicht viel mehr mit der kaum mehr als eine Varietät der *crenata* (bezw. *utahensis*) bildenden *A. Bakeri* (GREENE, l. c. 126, aus S.-Color. (lg. BAKER, No. 376) identisch, bleibt fraglich. Beide (PAL-

MERS Pflze. und *Bakeri*) scheinen einen höheren $\bar{\sigma}$ o. kleinen $\bar{\sigma}$ (teste GREENE) zu bilden, B. siehe Fig. 416 k, bis 3:3 cm, rundlich mit abgestutztem grob-

Fig. 415. *Amelanchier*: a–a' *utahensis*: a Bl. im L.-Schn. und K., a' C. — b *crenata*: wie a; c–c' *crenata* vel *Bakeri* vgl. Text oben), wie a–a' — d–d' *Bakeri*: wie a–a' — e–f *rubescens* affinis, vgl. Text S. 740; Bl. im L.-Schn., C. und Fr. — g–h spec. nov.? [lg. JONES, No. 1447, Herb. Boiss., vgl. Text S. 740. Anm.] (Original).

zähnigen Ende. Farbe, Beh. etc. wie *utahensis*, bez. *crenata*, Stiel bis 1 cm; Blst. bis fast 3 cm lang, alles beh., Bl. vgl. Fig. 415 d–d', Gr. 3–4, Stb. 15, $\frac{2}{3}$ – $\frac{1}{2}$ so lang wie K., Fr.?

Ferner *A. pallida* GREENE, Fl. Francise I. 53. 1891, aus N.-Calif.; ich sah nur 1 Expl. AUSTIN, 1894, Modoc Co., das mir die echte *pallida* darzustellen scheint. Davon B. in Fig. 416 i, bleichgrün, beiders. + beh., gegen Spitze unauffällig gezähnt, bis 2,5:1,5 cm, Stiel bis 7 mm; Blst. 3–4 cm, locker beh., 6–8-blütig, Bl. wie Fig. 417 i–i', Gr. 3, Stb. 15–18, kaum so lang als die relativ kurzen K., Fr. 2, (Zw. rotbraun*). — Sehr nahe steht der *pallida* die auch noch unvollkommen bekannte *A. subintegra* GREENE, in Pittonia V. 109. 1903, Lake Co., lg. BAKER, No. 2964, deren B. zumeist ganzrandig (etwa wie Fig. 416 e) sind, Bl. vgl. Fig. 417 k–k', Gr. 3 (z. T. fast frei), Stb. 20, Beh. alles in allem etwas reicher als bei *pallida*.

GREENE hat als *pallida* forme BAKERS No. 952, Nevada, bezeichnet. Hier aber die mehr spitz-ellipt. B. wie Fig. 416 g–h, bis 3:1,8 cm, Beh. analog; Blst. ähnlich, etwas kahler, K. sehr schmal und lang (Fig. 417 l–l'), Gr. 4, Stb. 20. Wohl an die *alnifolia*-Gruppe anschließend.

Sekt. 2. *Nagelia* [LINDL., in Bot. Reg. XXXI. 1845. Misc. p. 40, als Genus]: C. rund. 1–1 $\frac{1}{2}$; 1, K. breit, stumpfendig.

14. *A. Pringlei*: b, Höhe?, auch Zw. + rein beh., Kn. klein, kurz-eifg.; B. (ob wintergrün?) derb, ober. glänzend olivgrün, spärlich beh., Nervennetz scharf, Unters. hellgraugrün. + beh., 1,5:1–2:1,5 cm (Fig. 416 m), Stiel 2–3 mm; Bl. zu 3–5 gebüschelt, alles bis auf gewimperte K. und Trgb. kahl, sonst wie Fig. 417 m–m', Gr. 3, frei, Stb. 20; Fr. ? [siehe S. 744].

*) GREENE sagt übrigens nicht, daß die Zw. grau sind, sondern spricht nur von stems . . . with an ashy bark!

A. P. KOEHNE, Gatt. Pomae. 25. 1890. Mexiko. Chihuahua, PRINGLE, No 259, wohl auch SCHMITZ, No. 274 und BOURGEAU 1865, vallée de Mexico. — Blz Ende III. — Nicht in Kultur.

Zu dieser Gruppe, die LINDLEY, in Bot. Reg. XXXI. 1845, Misc. p. 40, wie mir scheint, doch wohl mit Recht als besondere Gattung*) *Nagelia* hinstellt, gehört vor allem noch *A. denticulata* KOEH., l. c. *Cotonaster dent.* KUNTH, in H. B. Nov. Gen. VI. 274, t. 556. 1823, deren Bl.-Achse und K. außen filzig sind, während die B. bis 2,5:1,5 cm messen. Ich sah vom Typ, der ca. 12 Stb. und 1–2 Gr.

Fig. 416. *Amelanchier*: B.-Formen von Blzw. von: *a utahensis* — *b crenata* — *c rubescens* Form?, vgl. Text S. 740 — *d spec. nov.?*, vgl. Text S. 740 — *e subintegra* — *f ? pallida* Typ — *g–h pallida* Form?, vgl. Text S. 742 — *i venulosa* — *k Bakeri* — *l–m (Nagelia) denticulata* var. *nervosa*; *o var. typica* (junges B.!) — *n (Nagelia) Pringlei* (²/₃) (Original).

hat, ein Original-Stück aus Hb. HUMBOLDT und KUNTH, sowie die Expl. lg. KERBER, No. 251, Maltrata; lg. UHDE [Ort etc. unleserlich]; ders. No. 1251; lg. EHRENBERG, No. 247 und ASCHENBORN, No. 366. — Eine Form mit kahlen Recept. und K., aber sonst beh. Blst. führe ich als var. *psilantha*: hierher lg. SCHAFFNER, No. 460, lg. GREGG, No. 599. Nach SCHIEDES Expl. vom VI. 1831 (inter Zimapan et S. José del Oro) scheint indes am selben Expl. die Beh. zu wechseln und da die Stb.-

Fig. 417. *Amelanchier*: *k–k'* *subintegra*: Bl. im L.-Schn. u. C. — *i–i'* *pallida*, vgl. Text S. 742 — *l–l'* vgl. Text S. 742 [BAKER, No. 952] — *m–n (Nagelia) Pringlei*: *m* Bl. im L.-Schn. und K.; *m'* C., *n* Fr. im L.-Schn. — *o–o'* (*Nagelia) denticulata* var. *nervosa* (Original).

Zahl auch variiert, so sind der Typ und seine 2 Formen wohl auch mit *Pringlei* eng verbunden. Die mir noch vorlieg. Expl. lg. GHIESBREGHT**), No. 508, Chiapas

*) Alles in allem kann ich KOEHNE (1890) nicht beistimmen, wenn er sagt, daß *Pringlei* und *utahensis* die *Nagelia* mit *Amelanchier* „in so zweifelsfreier Weise“ verbinden, „daß es kaum noch möglich sein dürfte, beide durch einigermaßen brauchbare Merkmale zu scheiden“. *A. utahensis* ist eine ganz typische *Amelanchier*, während *Pringlei* in den C. und K. völlig abweicht und an *denticulata* sich anschließt. Diese *Nagelia* s. str. kann ich in Bl. von *Cotonaster* nicht unterscheiden und lediglich die Fr., die ich aber auch nicht für mit denen von *Amelanchier* für identisch halte, stellen sie zur Gruppe der Sorbeen. Ich möchte deshalb doch eher vorschlagen, die *Nagelia* als eigene Gattung zu behalten!

**) GHIESBREGHTS No. 812 mit beh. Bl., die noch sehr jung sind, und noch sehr kleinen B. gehört den 12 Stb. nach zum Typ!

und LINDEN, No. 704, Comitán, mit beh. Bl. wie Fig. 417 o o', haben ca. 17 Stb. und die dicken B. wie Fig. 416 l m, 2:1,5–5,5:4, im Mittel ca. 3:2 cm. Ich halte dies für var. *nervosa* (*Cotoneaster nervosa* DECNE., l. c. 177. 1874; *Amel. nervosa* KOEH., l. c.). Hiermit stimmt auch ein Stück von PARRY et PALMERS No. 230 (San Louis Potosi) in Herb. Boiss. mit Fr., doch sind unter gleicher No. ein Blzw.- und ein Frzw.-Stück mit kahlen Bl. und 20 Stb. und B. von 1,8–2:0,8–1 cm, die ich zu *Pringlei* stellen muß, danach ist die Fr. in Fig. 417 n gezeichnet, deren K. aufr. zusammenneigen!

Trib. II. *Crataegeae* KOEHNE, l. c. 8. Jedes Frb. sich zu einem einfächerigen Stein ausbildend. (Gattung No. 165–169).

Gattung 165. *Cotoneaster**) MED., Gesch. Bot. 85. 1793.

[Zwergmispel.]

Vgl. oben S. 652 und S. 653. b, seltener kleine b, Zw. fast nie verdornend, B. einfach, stets ganzrandig, sommer- bis wintergrün. Neb. meist pfriemlich; Blst. ein- bis vielblütig, trugdoldig o. doldenrispig.

Fig. 418. *Cotoneaster*: a–b *Dielsiana*: a Fr.; b Stein von Rücken-, Bauch- und Schmalseite — c f *disticha*: c Bl. im L.-Schn.; c' K.; c' C.; d Fr.; e Fr.-K.; f Stein wie b — g–i *horizontalis*: g Bl. im L.-Schn.; g' C.; h Fr.; i = b; k–m var. *adpressa* wie g — n–q *adpressa*: n Bl. ganz; n' C.; o Bl. im L.-Schn.; p Fr.; q Stein von Rücken- und Bauchseite — r t *acuminata*: r Bl. im L.-Schn.; r' C.; s Fr. und Fr.-K.; t = b (e, g–i, n–q n. KOEHNE, sonst Original).

meist an kurzen beblätterten Seitentrieben endständig, Bl. klein, weiß o. rosa, Stb. 20–10, Gr. 1–5, Frb. gewöhnlich nur zu 2, am Rücken mit Recept. verwachsen, zuw. auch an den Bauchkanten vereinigt.

*) Spez. Lit. H. ZABEL, Die Gattung der Zwergmispeln, *Cotoneaster* MED., in Mitt. D. D. Ges. 1897. 14 und 1898. 37. Da mir sehr viel mehr Material und auch manche Literatur zu Gebote stand, konnte ich ZABELS Material hfg ergänzen und z. T. berichtigen. Sonst schließe ich mich, soweit es irgend geht, an seine schöne Arbeit an.

Sa. 2. gleich, einander die Raphe zuwendend, Fr. lebhaft- o. braunrot o. schwarz, klein, K. bleibend. Alle Arten erwähnt.

Sekt. 1. *Orthopetalum* KOEH., Dendrol. 224. 1893. C. zur Blz. Sekt. 2 siehe aufrecht. Bl. also wie Fig. 418n, meist - rosa~). S. 753.

A. Fr. gelb- o. scharlachrot.

B. siehe S. 750.

C B. klein, kaum 1,5 cm lang (Fig. 419a—e², Bl. einzeln o. gepaart.

4 aufr. Klein- β , B. beiders. mit verstr. Borstenhaaren, K. $\pm$ halbkreisfg., Fr.-K. fast wagrecht zusammenneigend (Fig. 418e).

1. *C. disticha*: halbbimmergrüner, zweizeilig verästelter und beblätterter β . Zw. (bes. jung) dicht goldig steifhaarig; B. obers. sattgrün, - beh., unters. hell- o. weißlichgrün, kahler bis kahl, vgl. Fig. 419a—b; Bl. einzeln, rosa, etwas nickend, kahl o. fast kahl, vgl. Fig. 418c—e¹, Gr. 3(2—4), Stb. 20; Fr. scharlach, wie d, Stein wie f.

Ich halte für var. *typica* (*rotundifolia* WALL. ex p., BAKER, in SAUND. Ret., t. 54. 1869, HOOK. F. et AUCT. al., non LDBL. s. str.) die Expl. lg. DUTHIE, No. 1061, Garhwal und 2871, Kumaon, lg. WALLICH, Cat. 663 ex p., Nepal und lg. HOOKER, Sikkim 9—11000', wonach diese Art also durch den ganzen Himalaya verbreitet scheint. Als var. *Duthieana*, mit größeren B., die 15:12—25:19 mm messen und bis fast 4 mm lang gestielt sind (Fig. 419c), führe ich die Expl. lg. DUTHIE, No. 2874, Kumaon, deren Bl. ich nicht sah. — Ferner als ? var. *tongolensis*, mit obers. lockerfilzigen, unters. dicht gelbgrau filzigen B., deren größte Form Fig. 419d zeigt, stelle ich einstweilen der (vielleicht nicht gut erhaltenen) Fr. halber hierher das Expl. lg. SOULÉ, O.-Thibet (Tongolo). Vielleicht besser zu *Simonsi* zu ziehen o. gute Art!

C. d. LGE., in Bot. Tidsk. VIII. 19. 1882 (*C. Reyleana* et *Hookeri* HT. ex p.; vgl. oben und Bemerkung bei *buxifolia* S. 753). — Heimat wie oben. — Blz. VI. — Frz. IX. — Seit langem in Kultur, aber erst jetzt häufiger.

* $\leftarrow$ wagrecht ausgebreitet verästelte. $\rightarrow$ niederliegende β , B. obers. o. beiders. ganz kahrend, K. mehr stumpf-dreieckig. Fr.-K. aufrecht (Fig. 418h, l).

2. *C. horizontalis*: von *disticha* sonst noch abweichend durch: mehr glänzende Belaubung, B. eben wie Fig. 419e, kaum über 11:10 o. gelegentlich bis 16:13 mm; Bl. wie Fig. 418g—g¹, spärlich beh., Stb. 10, Fr. mennigrot, wie h.

Man kann festhalten: var. *typica*: B.-Stiele zur Frz. beh., dgl. B. unters. meist -; Fr. länglichrund, Steine meist 3. var. *adpressa* (*C. adpressa* BOIS, in VILM. Frut. Cat. prim. 116. c. ic. 1904/1905): B.-Stiele kahrend, dgl. B., Fr. mehr kugelig, Steine meist 2; ich sah alles wie Fig. 418k—m und kann sonst *adpressa* nicht unterscheiden. Sie soll aber die rundlicheren Fr. (August) 3 Wochen früher reifen. — var. *perpusilla*: B. eben zur Blz. nur wie Fig. 419e¹, Bl. sehr winzig, nur halb so groß wie beim Typ, sonst ganz analog; Fr.? Hupei (lg. HENRY, No. 712). Ferner GIRALDI, No. 1680 (S.-Shensi), Fr. wie *adpressa*. Ein 2. Expl. lg. WILSON, No. 564, W.-Hupei 4800', ist in Blzw. ganz analog und besitzt Frzw., deren größte B. nicht über 8:6 mm messen (Form wie das untere B. von e in Fig. 419), Fr. nur 5—6:3 mm, mit 2 Steinen, alles dem Typ analog. Wohl durch Übergänge mit diesem bez. *adpressa* verbunden, wie ein Expl. lg. ROSTHORN, Sz'tschwan (Tsakulao) und No. 1808 (Nanchuan) zeigt.

*) Zu dieser Gruppe scheint die bisher verkannte *C. rosea* EDGEW., in Trans. Linn. Soc. Lond. XX. 46. 1851, zu gehören, als welche ich die Expl. lg. DUTHIE, No. 21041 ex p. und 22542 aus Tihri-Garhwal; Herb. FALCONER, No. 397 ex p. [siehe unten] aus Kaschmir (auch DUTHIE, No. 11427) und lg. AITCHISON, No. 337 und 782 aus Afghanistan (Karrum-Valley) ansehe. Kleiner β , Zw. dünn, nur ganz jung spärlich beh., - rotbraun; B. dünn, oben lebhaft grün, nur jung auf Rippe beh. und gewimpert, unters. weißgrau bereit, fast stets kahl, vgl. Fig. 424n, S. 755, bald spitzer, bald stumpfer, bis 5:2,5 cm, Stiel 4—6 mm; Bast locker 4—9-bl., 2—3 cm lang, locker beh. bis kahl, Bl. rosa, wie Fig. 423r—r¹, S. 753, Stb. 15—20, Gr. 2, unreife Fr. wie s, rot?. Zu bemerken ist, daß EDGEWORTH die jungen Studien aller Teile als „araneo-lanatis“ beschreibt, nun befindet sich auch auf DUTHIES No. 21041 ein noch unerblühter Zw., der reich beh. ist und kaum hierher gehört. FALCONERS No. 397 ist meist mit *buxifolia*- oder *Lindleyi*-Formen vermengt.

C. h. DECNE., in Fl. d. Serr. XXII. 168. 1877 (*C. acuminata* var. *prostrata* DIPP., Laubholz. III. 414. 1893, vix HOOK. vel DECNE.; *C. nanchuanica* R. RGL. [in HORT. NONN.]; *C. Davidiana* Ht. ex p.p. - Heimat nach DECNE China. Wohl westl. Zentralkina und gleich var. *adpressa* aus Sz'tschwan. — Blz. VI. — Frz. VIII—IX. — Jetzt häufiger in Kultur, ausgezeichnet für Felsanlagen.

○○ B. im Mittel gewöhnlich über 1,5 cm lang, Blst. meist mehr als 3-blütig.

— Bl.-Achse und K. außen angedrückt locker steifhaarig (nicht graufilzig), Blst. büschelig, mit sehr kurzem Pedunculus (1 -)2 -5-bl.

+ B. höchstens 3 cm lang, Form wie Fig. 419f. Gr. 3—4, Fr.-K. aufrecht.

3. *C. Simonsi*: etwas sparriger, aufstrebend breit verästelter B., bis ca. 1 m hoch, halbbimmergrün, Zw. fein borstentilzig, erst ☉ kahlend; B. ober. tiefgrün, spärlich beh. bis kahl, unters. hellgrün, locker zottenborstig, Stiel beh., 1—3 mm; Blst. meist 2—5-

Fig. 419. *Cotoneaster*: B.-Formen, meist von Frzw. und normalen Lgtr.: a—b *disticha*: a Kulturpflze.; b lg. DUTHIE, No. 1061, großes B. von Lgtr.; c var. *Duthieana*; d var. *tongolensis* (vgl. Text, S. 745) — e—e² *horizontalis*: e¹ von var. *adpressa*; e² var. *perpusilla* — f *Simonsi* — g—h *Francheti* — i *acuminata* — k *tomentosa*; l *parnassica* — m—n *integerrima* (*vulgaris*); o—p var. *uniflora* (knapp $\frac{2}{3}$ n. Gr.) (Orig).

selten 1-bl., vgl. Fig. 418n o¹, rosaweißlich, Stb. 20; Fr. lebhaft gelb- o. mennigrot, wie p, Stein wie q.

C. S. BAK., in SAUND. Ref. I, Tab. 55. 1869 (? *C. acuminata* var. *Simonsi* DECNE., l. c. 175. 1874; *C. acum.* var. *prostrata* KOEH.*), Dendr. 225. 1893). — Aus Sikkim*), Khasia (lg. CLARKE, No. 43911 et 45543C!) stammend, DECNE. gibt Simla und Kumaon an, doch sah ich seine Expl.***) noch nicht. — Zur Frz. sehr zierender B. Jetzt schon häufiger in Kultur.

++ B. größer, siehe Fig. 419i, Gr. meist 2, Fr.-K. zusammenneigend (Fig. 418s).

4. *C. acuminata*: schlanktriebiger, aufrechter, bis 4 m (teste HOOKER) hoher B. Zw. gelbgrau borstentilzig, erst ☉ kahlend; B. oben trübgrün, fast mehr als auf der nur verstr. borstigen hellgrünen Unters. beh. und gewimpert, größte Breite unter Mitte, Spitze mit aufgesetztem Nadelspitzchen, an üppigen Trieben bis 7,5:3,8 cm, sonst im Mittel ca. 5:2,3 cm; Stiel meist unter 5 mm; Blst. 1—5-bl; Bl. ziemlich groß, schwach rötlich, vgl. Fig. 418r r¹, Gr. 2—3, Stb. 20, sehr kurz; Fr. dunkelscharlachrot, wie s, Stein wie t.

*) Die KOEHNEschen Zitate *C. acum.* var. *prostrata* HOOK., *C. Simonsi* LOUDON und *C. montana* LGE., durften Herbarnamen sein. Ein so bezeichnetes HOOKERsches Expl. aus Sikkim 12—13000' könnte zu *Simonsi* gehören!

**) Ein Expl. aus Sz'tschwan lg. V. ROSTHORN, No. 1810 (und HENRY, No. 5701) erinnert in Bl. (C.) und den bis 2:1,8 cm messenden B. an *Simonsi*, aber Gr. 2, Stb. 10. Vielleicht *Zabeli* o. *Francheti* näher stehende Art.

C. a. LDL., in Trans. Linn. Soc. XIII. 101, tab. IX. 1821 (*Mespilus acum.* LODD., Bot. Cab. X, t. 919. 1824). — Ich sah Expl. aus Simla, Kumaon, Garhwal und Nepal, wie weit diese Art nach O. geht, ist fraglich, was ich aus W.-China kenne, gehört zu o. neben *pekinensis*.

* * Bl.-Achse und K. kahl o. erste nur am Grunde locker borstig beh., oder aber beide $\pm$ graufilzig.

+ Bl.-Achse kahl o. nur am Grunde beh., K. nur $\rightarrow$ gewimpert.

$\triangle$ B. wie Fig. 422 a, S. 751, zuletzt zieml. derb und $\pm$ runzelig, Blst. 4—12-bl., vgl. Fig. 420 a—b¹.

++ siehe S. 748.

5. *C. bullata**): aufrecht ausgebreitet verästelter b, Zw. feinfilzig, $\odot$ kah-
lend, purpurn; Kn. $\pm$ filzig, die 2 Außenschuppen $\rightarrow$ kahler; B. oben trüb dunkel-
grün, spärlich beh., Nerven $\pm$ eingesenkt, unters. hell graugrün, bes. auf den $\pm$
stark netzig hervortretenden Hauptnerven borstenfilzig, 4:2 bis 7(8):3,8(5) cm,
Stiel 2—3 mm; Blst. nebst Grund der Bl.-Achse $\rightarrow$ locker borstenfilzig, Bl. rosa-
weißlich, Gr. 4—5, Stb. 20, K. breit rundlich, nur gewimpert, wie Fig. 420 bei a,
Fr. wie b, rot, mit wagrecht schließendem K., Steine wie b¹.

C. b. BOIS, in VILM. Frut. Cat. prim. 119. c. icon. [1904/1905]. — Thibet.
— Blz. ? — Frz. IX—X. — Ich sah Originale aus Hort. VILMORIN, hatte doch
Herr VILMORIN die Güte, mir alle seine Formen zu senden.

$\triangle\triangle$ B. wie Fig. 419 m—p, Blst. 1—4-bl., vgl. Fig. 420 c—e.

6. *C. integerrima*: vielgestaltiger, meist aufrecht-sparriger bis
1.5 m hoher, selten niederliegender b; B. sommergrün, im Mittel nicht
über 3—4:2—2.4 cm, selten bis 5:3.5 cm, obers. von Anfang an
so gut wie kahl, sattgrün, unters. $\pm$ weiß- o. gelbgrau filzig und ge-
wimpert; Blst. $\rightarrow$ borstenfilzig, nickend, Bl. klein, blaßrot, Gr. 2—4,
Stb. 20, Fr. $\rightarrow$ hängend, scharlach- o. purpurrot, Steine meist 3.

An Formen kann man unterscheiden: var. *typica*: b $\rightarrow$ aufrecht, Fr. rot.
Hierher als Formen**) *f. oxyphylla* (Cot. vulg. var. *oxyphylla* ZBL., in Mitt. Dendr.
Ges. 1897. 17): Wuchs dicht aufr., B. spitz-oval, Fr. etwas größer (Schweiz: Bagne-
Tal) und *f. glabrescens* BECK, in Herb., B. 1.5:1—2.5:1.8 cm, unters. stark kah-
lend, blaugrau (Herzogow., Cinçer, 1600 m, unter Krummholz). — var. *depressa*
(*Mespilus cotoneaster* β . *depressa* FRIES, Nov. Fl. Suec. 9. 1814; *C. vulgaris* var. *lutea*
FRIES, Nov. Fl. Suec. ed. alt. 140. 1828; *C. vulg.* var. *depressa* DC., Prodr. II.
632. 1825): $\rightarrow$ niederliegend, B. schmaler, Zw. sparrig, fast verdornend, Fr. gelb
(Strandklippen bei Warberg in Schwed.). — var. *leucocarpa* (vulg. var. *leuc.*
ROEM., Syn. Mon. III. 222. 1847): Fr. weiß (Podolien). — var. *intermedia* (Cot.
vulg. var. *interm.* RGL., in Act. Hort. Petrop. II. 315. 1873, *C. vulg.* var. *minuti-*
folia ZBL., in Mitt. D. D. Ges. 1897. 17; *C. vulg.* var. *microphylla* in Herb. div.,
Blst. meist 1(—2)-bl., B. kaum über 2:1.3 cm, unters. reichlich beh. Diese im
Altai, Kauk. und wohl allen Gebirgen, in denen der Typ auftritt, sich findende
Form verbindet den Typ mit der Gebirgsform var. *uniflora* (Cot. unifl. BGE., in
LED. Fl. alt. II. 220. 1830 und LED. Ic. flor. ross. III, t. 269. 1831): Blst. 1(—2)-bl.,
ganz kahl, B. nur jung unters. beh., hfg. mehr länglich (Altai; ? Songarei. Ich
sah Originale!

*) Im Anschluß an *bullata* sind einige westchinesische Formen zu besprechen, die
ich vorläufig nicht recht klären konnte, da ich die Originale der nachstehend behandelten
Arten FRANCHETS nicht kenne. FRANCHET hat, in Plant. David. II. 42. 1888, aus
O.-Tibet (Moapine) eine *C. moupinensis* beschrieben, deren Beschreibung recht wohl
auf die *bullata*-Expl. paßt, nur sagt er „calyx . . . dentibus triangularibus acutis“ und
gibt an „limbo 3 poll. longo, usque 2 poll. lato, vel angustiore“, wichtig ist aber, daß
seine Art auch 5 Gr. und „folia . . . subtus plus minus elevato-nervosa“ hat. BOIS,
dem doch FRANCHETS Originale zugänglich sein mußten, vergleicht seine *bullata* leider
nur mit der total verschiedenen *fragata*. Der *bullata*, wie sie mir vorliegt, gleichen sehr
Expl. lg. HENRY, No. 8954, Sz'tschwan, größte B. wie Fig. 4261, S. 758 o. am Grunde
 $\rightarrow$ spitzkeilig, Bl. ganz analog, aber K. spitz breit dreieckig. Ein sehr ähnliches Expl. lg.
V. ROSTHORN, No. 989, Sz'tschwan hat in den unreifen Fr. 3 Steine. Vgl. im übrigen
auch die Bemerkungen bei *C. acutifolia* (*pekinensis*) S. 751.

**) Was DIPPEL als *C. vulgaris* var. *borealis* Laubholz. III. 411. 1893 beschreibt,
scheint mir zu *melancarpa* zu gehören, wie ein Bruchstück seines Herbars andeutet.

C. i. MED., Gesch. d. Bot. 85. 1793, var. *a* (*Mespilus Cotoneaster* L., Spec. pl. 479 1753 ex p.; *Mesp. cot.* var. *rubra* EHRH., Beitr. IV. 18. 1789; *C. vulgaris* LED., in Trans. Linn. Soc. XIII. 101. 1821; *Cot. vulgaris* var. *erythrocarpa* LED., Fl. alt. II. 219. 1830). — Gemeine Z. — I. G. verbr., sonst durch ganz M.- und N.-Eur., im SW. und S. nur in Gebirgen, im S.-O. Sudgrenze fraglich, ferner Kauk., Transkauk. (Formen aber z. T. fraglich), in N.-As. wohl nicht über Altai hinaus nach O., im zentralen Asien sicher fehlend, dgl. China. — Blz. IV—V. — Frz. VIII. — Nach dem Süden zu werden B. z. T. dicklicher, die Nerven treten unter mehr hervor. Es treten zuweilen Formen auf, die schwach beh. B.-Obers. haben. Studium notwendig.

Fig. 420. *Cotoneaster*: a—b¹ *bullata*: a Bl.-L.-Schn. u. K.; a¹ C.; b Fr.; b¹ Stein von Bauch-, Schmal- und Rückenseite — c—e *integrerrima* (*vulgaris*): c Bl.-L.-Schn.; c¹ C.; c² Gyn.-Q.-Schn.; d Fr.; d¹ Fr.-K.; e Stein wie b¹ — f—h Zabel. wie c—e (ohne c²) — i—l *tomentosa*: wie f—h — m *parnassica* Steine — m¹—m² *Atchisoni*: Fr. und Steine — n—p *Francheti*: n Bl.-L.-Schn.; n¹ C.; o Fr. und Fr.-K. z. T.; p wie b¹ (c, d, d¹, e nach KOEHNE, sonst Original).

6 7. *C. integrerrima* × *C. tomentosa*: eine solche Hybride soll die mir ungenügend bekannte *C. tomentoso-vulgaris* LAMOTTE, Prodr. pl. cent. I. 278. 1877 *C. tomentosa* β. *intermedia* LEC. et LAM., Cat. pl. cent. 162 [vor 1877]; *C. intermedia* COSTE, in Bull. Soc. Bot. Fr. 1893, p. CXXII) darstellen. Zentr.-Frankr. (Lozère, Aveyron).

++ Bl.-Achse und K. außen ± graufilzig*).

B. wie in Fig. 419k. Blst. meist nicht über 5-bl., Fr. meist ± beh., stumpf-ziegelrot.

7. *C. tomentosa*: b. bis 2 m, von *integrerrima* im wesentlichen noch abweichend durch: Zw. länger und stärker filzig**); B. oberseits

* Bei *Zabel.* ist allerdings beides oft nur spärlich beh., sie unterscheidet sich aber von der sonst ähnlichsten *integrerrima* schon durch oberseits beh. B.

** Kn. vgl. in meinen Dendr. Winterstud., S. 119 und Fig. 151 p—t. S. 148.

locker anliegend gelblich-zottig, nie ganz kahlend, trübgrün, unters. stark weiß- o. gelbgraufilzig und gewimpert, im Mittel nicht unter 3.5:2.3—3 cm, sonst bis 6.5:4.5 cm; Stiel bis 8 mm; Blst. dicht filzig, Bl. wie Fig. 420i—l, Gr. meist 3, Stb. 20.

Man kann als Kulturform ansehen *f. pluriflora**): Blst. reicherblütiger (ca. 8—17-bl.).

C. t. LDL., in Trans. Linn. Soc. XIII. 101. 1821 (*Mespilus orientalis* MILL.**), Diet. ed. VIII, No. 9. 1768 ex p.; *Mesp. tomentosa* AIR., Hort. Kew. II. 174. 1789; *Mesp. eriocarpa* DC., Fl. Fr. VI. 432. 1815; *Mesp. coccinea* W. et K., Pl. rar. III, t. 256. 1812; *Mesp. pygmaea* BAUMG., Enum. Stirp. II. 40. 1816; *Cot. coccinea* STEUD., Nomencl. ed. 2. 426. 1840). — Filz-Z. — I. G. D. nur Gebirge in Elsaß, Baden, Württembg., Bayern; Sch. verbr., OU. fehlt nördl. von Ober-Östr., östl. bis Karpath. (Ostgrenze!), ferner Süd.-Eur. (N.-Span., Apennin [bis Calabr.]), in SO. Balkan und Griechl. (Doris, Achaia), fehlt in Rußl. und As. — Blz. V—VI. — Frz. IX—X. — In Asien hfg. mit *racemiflora*-Formen verwechselt***).

An *tomentosa* schließt sich wohl an (doch Bl.?) *C. Aitchisoni* aus Afghanistan, Kuram-Tal, 2500 m, lg. AITCHISON, No. 277, mit Fr. im Juli. Kleiner $\wp$, junge Triebe filzig, $\odot$ kahlend, purpurn, B. etwa wie in Fig. 419m (nur Basis mehr wie bei i [links]), $\pm$ dünnlederig, Obers. hell olivgrün, nur Rippe spärlich beh., Unters. gleich Stiel dicht fein gelbgraufilzig, 3:2—5:3—3.6 cm, Stiel 4—8 mm; Fr. zu 2—3, trübbrot?, etwas beh., oben breit offen, 2 Steine, an Kuppe vom K. frei (Fig. 420m¹ m²). Erinnert ein wenig an *bacillaris*, was ja auch AITCHISON angibt. Die Bl. müssen die Stellung entscheiden.

$\triangle\triangle$ B. wie in Fig. 419g—h und 422i—k, S. 751, Blst. 3—5—15-bl.

= B. wie Fig. 422i—k, S. 751, also beidendig mehr abgerundet als spitz, dgl. K. stumpfendig, Gr. 2, Fr.-K. wie Fig. 420g.

8. *C. Zabeli*†): $\wp$?, Höhe?, Wuchs anscheinend schlanktriebig, junge Zw. kahl- o. gelbgraufilzig, $\odot$ kahlend, purpurn; B. im Mittel nicht über 2.5:1.5 cm, Obers. wohl stumpfgrün, durchweg locker beh., unters. grau- o. gelbgraufilzig; Stiel filzig, kaum über 3 mm; Blst. $\pm$ filzig, locker 4—10-bl., bis 2 cm lang, Bl. klein, rosa, vgl. Fig. 420f—h, Stb. 20, Fr. rot.

Es treten Formen mit kahleren Bl. (so GIRALDI, No. 5006) und solche auf, bei denen auch B. Obers. fast kahl (GIRALDI, No. 7163). Diese liegen nur in Bl. vor und erinnern stark an *integerrima*, aber Blst. meist über 4-bl. Noch zu beobachten.

C. Z. — China: N.-Shensi [lg. GIRALDI, No. 961—963, 972, 976, 5000, 5001, 5003, 5005, 5009]; vielleicht gehört ein Expl. lg. KOMAROW, Korea hierher, B. an Lgtr. bis 4:3 cm. — Blz. VI—VII. — Frz. IX. — Wohl sehr einführenswert, da sicherlich hart††).

*) Eine ganz merkwürdige Form sah ich im Herb. BOISS. bezeichnet mit Herb. PAVON, Hispania. Hier waren die gleichzeitig mit normalen Frst. vorh. (ob Herbst-) Blst. fast corymbös, bis über 30-bl. an den Enden uppiger kurzer diesj. Seitentriebe. Wohl ein abnormer Fall.

**) MILLER vermengt lt. Zitat Alp. exot. 5 die *Cot. tomentosa* und *Amelanchier cretica*, welche letzte am zit. Ort gut dargestellt ist. Daher ist die Beschreibung MILLERS unverständlich und dieser Name unannehmbar. Eine *M. tomentosa* hat MILLER nicht beschrieben.

***) Solchen ähnelt in den kleinen B. (Fig. 419l), die kaum über 2:1.5 cm messen, die *C. parnassica* BOISS. et HELDR., Diag. pl. ser. 2. II. 48. 1856, aus Griechl. (Epirus, Thessal., Ätol., Euböa) [und vielleicht Kl.-As.], die ich in den Bl. nicht unterscheiden kann, die Fr. kahlen ganz und die Steine sind wie Fig. 420m. Sonst Beh. aller Teile analog. Sparrig-miedriger Zwerg- $\wp$ der Gebirge. Von WENZIG, in Lannaea 1874. 186 vielleicht nicht mit Unrecht als *toment.* var. *parnassica* geführt. Wie sich der K. ganz reifer Fr. verhält, blieb mir fraglich.

†) Ich widme diese Art Herrn ZABEL und benutze diese Gelegenheit, ihm wiederholt herzlich für seine vielfache Unterstützung zu danken.

††) An *Zabeli* schließt sich anscheinend nahe an die *C. Dielsiana* PRITZ., in ENGL. Jahrb. XXIX. 385. 1900, deren Typ die Expl. lg. V. ROSTHORN, No. 492 aus Sz'tschwan (Nanchuan) bilden. Vgl. Fig. 429a, S. 760 und Fr. Fig. 418a—b, S. 744, rot, aber kaum ganz reif. Die B. sind zuletzt derb, oben trübgrün, locker beh., unters. gelbgraufilzig, Nerven oben eingeschnitten, unten vortretend, Fr. einzeln. Mir scheint nun

— B. wie in Fig. 419 g—h, S. 746, also beidendig mehr gleichmäßig zugespitzt, dgl. K. spitz, Gr. 3, Fr.-K. wie Fig. 420 o.

9. *C. Francheti*: aufrechter b, 1—1,5 m; Zw. dicht gelbgraufilzig, $\hat{c}$ kah-
lend, purpurn; B. an Krztr. 2 : 1,2—3 : 1,7 cm, Textur dicklicher als bei *Zabeli*, Haupt-

nerven auf der beh., aber lebhaft sattgrünen Obers. $\pm$ eingeschnitten, auf der weißgelbfilzigen Un-
ters. mehr hervortretend, Stiel filzig, 1—3 mm; Blst. (5—)8—15-bl., alles reichlicher gelbgraufilzig als bei *Zabeli*, sonst wie Fig. 420 n—p, Fr. orangerot, nach BOIS bis 10 : 6—7 mm, lange bleibend.

Fig. 421. *Cotoneaster* (B.-Formen wie Fig. 419):
a *acutifolia* (*pekinensis*), Typ aus Kultur; *b* die Pflze. von VILMORIN, vgl. Text S. 751 — *c* *lucida* — *d*—*e* [*? mucronata*] — *f*—*g* *melanocarpa*: *f.* var. *com- mixta* ($\frac{2}{3}$ n. Gr.) (Orig.)

C. F. BOIS, in Rev. Hort. 1902. 380. c. icon. — Gebirge von Tibet (und Yünnan teste BOIS). — Blz. VI. — Frz. X. — Wird jetzt in Kultur verbreitet.

B. Fr. schwarz (Färbung wohl anfangs immer rötlich, daher erst bei voller, oft spät eintretender Reife sicherzustellen).

○○ siehe S. 752.

○ B. $\pm$ scharf zugespitzt, vgl. Fig. 421 a—e und Fig. 422 b—h.

+ B. wie Fig. 421 a—c (o. Fig. 422 b—h), Hauptnervenpaare meist 5—6, Stiel (3—)4—8 mm.

+ B. oberseits — glänzend sattgrün, kahl (höchstens vereinzelte Zottenborsten). Form wie Fig. 421 c, Bl.-Achse und K. kaum beh. o. kahl, Gr. 3—4.

10. *C. lucida*: aufrechter, buschiger, bis ca. 2 m hoher b, junge Zw. beh., schon $\hat{c}$ stark kahl; B. bis ca. 6 : 4 cm, unters. hell- o. weißlichgrün, — locker beh., Stiel dgl.; Blst. locker beh., (2—)4—6—8-bl., Bl. hellrosa, Stb. 20, vgl. Fig. 423 a—c, S. 753.

C. l. SCHLECHT., in Linnaea 1854. 541 (*C. acutifolia* LDI., in LED. Fl. ross. II. 92 1844. non TURCZ.; *C. nigra* var. *acutifolia* WENZ., in Linnaea 1874. 183). — Glanzblatt-Z. — N.-Asien: Altai, Baikalgebiet. — Gebirge. — Blz. V—VI. — Frz. XI. — Seit langem in Kultur. Schön belaubter b.

WILSONS No. 1127 aus W.-Hupei (Bl. und Fr.) hierher zu gehören. (Ob etwa auch HENRYS No. 7468 aus Sz'tschwan?) Die B. messen bis 2 : 1,5 cm und sind — rundoval, gespitzt, Beh., auch der Zw. etc., wie beim Typ gelbgraufilzig, Bl. zu 3—5. Stielchen, Recept. und K. außen lockerzottig, K. kurz 3-eckig, C. rosa, rundl.-oboval, kurz genagelt, Stb. 20, wenig länger als K., Gr. 3—4, kaum die Mitte der Stb. erreichend, Fr. zu 1—3, rot, kugelig, ca. 5—6 mm Dm., K. zusammenwiegend, Stein 3—4. Von *Zabeli* durch derbere, kleinere relativ breitere B., kleinere wenigblütigere buschelge Blst. (ca. 1 cm lang) abweichend. Ob HENRYS No. 5463 und 5463A, aus Hupei, die in Bl. auf *Dielsiana* in den größeren B. (bis 3,2 : 1 cm) auf *Zabeli* weisen, hier o. dort einzureihen, bleibt fraglich. Nach Fr.-Expl., HENRY, No. 7201 aus Sz'tschwan könnte diese letzte Form eine besondere, zwischen *Zabeli* und *Dielsiana* zu stellende Art repräsentieren. Falls es sich nicht etwa um eine wenigblütige Form der *Francheti* handeln würde.

B. overs. stumpfgrün, τ locker zottenborstig, Form vgl. Fig. 421 a—b und Fig. 422 b—h. Bl.-Achsen und K. τ dicht beh., Gr. 2(—3).

11. *C. acutifolia (pekinensis)*: habituell wohl *lucida* sehr ähnlich, weicht aber noch ab durch: auch Zw. und B.-Unters. mäßig reicher beh., Blst. meist 1—3-blütig, reicher beh., sonst vgl. Fig. 423 d—e, Fr. nach ZABEL bis 14:10 mm.

C. a. TURCZ.*), in Bull. Soc. nat. Mosc. V (nec IV!) 190. 1832 (*C. acutifolia* var. *pek.* KOEHNE, Dendr. 225. 1893; *C. pekinensis* ZBL., in Mitt. d. D.

Fig. 422. *Cotoneaster*: B.-Formen: a *bullata* — b—d *pekinensis* vel. var.? (vgl. Text unten) [b—c Frzw., GIRALDI No. 4997, 4985; d Blzw. GIR. 4995]; e—f dgl. kahle var., [e GIR. 987 bez. 981, wenn letzte nicht zu h gehört, f ROSTHORN 1803] — g *acutifolia* var. vel spec. nov. [GIR. 4992, behaarte Form]; h dgl., kahle Form [GIR. 978] — i—k *Zabeli* — k—o *multiflora* aus Schensi; p dgl. GIRALDI 4989 (vgl. Text, S. 756) ($\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

Dendr. (Ges. 1898. 37). — Soll aus um Peking**) gesammelten Samen gezogen worden sein. — Blz. etc. wohl wie *acutifolia*. — In Kultur noch selten.

*) TURCZANINOW beschreibt seine Art sehr kurz, aber die Angaben „calycibus pedunculisque lanatis“ und der Ort „in lapidosis Mongoliae chinensis australis“ schließen *acutifolia* LED. = *lucida* aus. Wenn TURCZ. die im Juni—Juli gesammelten Fr. als „rot“ bezeichnet, so ist das nicht auffällig. Es liegen allerdings in Herb. Petersburg Expl. der *lucida*, die als *acutifolia* TURCZ. bezeichnet und 1833 von TURCZ. aber „ad bacalem“ gesammelt sind. Die Orig. von TURCZ. aus der S.-Mongolei sah ich nicht (doch z. B. DAVID, No. 2745 [?] Toumet, Oulachan), aber schon MAXIM. hat in Herb. Petersbg. Expl. aus dem Formenkreis der *pekinensis* als *acutifolia* TURCZ. bestimmt. Ob *pekinensis* s. str. eine besondere Varietät der *acutifolia* TURCZ. s. m. bleiben kann, ist noch fraglich. Jedenfalls variiert diese Art sehr und die Formen sind schwer zu bewerten.

**) Was ich von Herrn VILMORIN als No. 4484, bez. semis 2025 (aus Sz'tschwan, lg. FARGES, stammend) erhielt, kann ich von SPÄTHschen Expl. der *acutifolia* nicht unterscheiden (ganz analog ist v. ROSTHORNS No. 1805 aus Sz'tschwan), und ich gebe die Fig. 423 d—f nach VILMORINS Pflz. Nun liegen mir aus China viele (als *acuminata* geführte) Expl. vor, die sich sehr eng an *acutifolia* anschließen. Es sind dies vor allem GIRALDIS No. 979, 982, 4985, 4995, 4997 in Bl. und Fr. aus N.-Shensi, deren B. Fig. 422 b—d zeigt. Fr. meist 3-steinig und Steine auf Bauchseite (nach Aufkochen!) keine breiten roten Ränder zeigend (die trocken nur selten zu erkennen sind). Bei den Expl. No. 982, 4985, 4986 sind die B. (Juli!) overs. fast kahl, die Fr.-Farbe ist rötlich, aber Fr. noch unreif! In der Färbung der B., die overs. kahl sind und auch unders. fast kahlen, sowie in den viel schwächer bis fast nicht beh. Bl. erinnern sehr an *lucida* GIRALDIS No. 981 (N.-Shensi), 977 und 987 (S.-Shensi, vgl. B. in Fig. 422 e, besonders aber die sehr kahle blühende No. 1803 lg. v. ROSTHORN in Sz'tschwan, B. wie Fig. 422 f o. — schmallänglicher. — Die Expl. aber lg. GIRALDI No. 983 und 4992 (N.-Shensi), letzte mit schwarzen Fr. (Okt.), wie Fig. 423 g—h und B. wie Fig. 422 g erinnern in der oörsseitigen Beh. der B. sehr an *acutifolia*, die Steine zeigen aber beim Aufkochen an Bauchseite breiten roten Rand. Ein mir allerdings noch unklares Merkmal, das mir auch an No. 978 GIRALDIS aus N.-Shensi auffiel, deren fast ganz kahle B. Fig. 422 h zeigt. — Schließlich liegen mir noch einige schwarzfruchtige Expl. lg. WILSON, No. 669, 699 a, 969 h, W.-Haper, vor, die den Bl. nach *bullata* sehr gleichen und in

++ B. wie Fig. 421 d—e. Hauptnervenpaare meist (6—)7—8, Stiel 2—3 mm.

12. *C. mucronata?*: b, Höhe?, Wuchs?; junge Zw. gelbgrau filzig, kahl, purpurn; Kn. aus den lockeren Sch.- und jungen B. chen gebildet, doppelt so lang als B.-Stiel; B. zur Frz. derb, ober. tiefgrün, etwas trüb, verstr. beh., Hauptnerven eingeschnitten, unters. hellgraugrün, locker beh., besonders die scharf erhabenen Seitennerven, Form sehr bezeichnend, Spitze fast geschwänzt; Bl.?; Frst. ca. 5—8-fruchtig, fast kahl, Fr. wie Fig. 423 i, mit meist 4 Steinen wie k.

C. mucronata FRANCH., Plant. Delav. 223. 1889, vel spec. nov.!. — Erhielt ich aus Hort. VILMORIN sub No. 2112 (4481), lg. SOULIÉ in O.-Tibet. — Ich glaube kaum, daß FRANCHETS Name hierher gehört, allein seine Diagnose ist ohne Orig.-Expl. nicht zu deuten. Ich werde den Fall im Hauptnachtrag klarstellen.

○○ B. stumpfspitzig o. abgerundet, wie Fig. 421 f—g.

13. *C. melanocarpa*: ± aufrechter sparriger 0.5—2 m hoher b, Zw. jung ± locker filzig, ⊙ fast o. ganz kahl, glänzend olivgrün bis braunrot*); B. ober. matt dunkelgrün, bis zuletzt mit spärlichen Haaren o. zuw. so gut wie kahlend, unters. filzig weißgrau, Textur auch im Herbst mäßig derb, 2.3:1.8—6.5:4 cm, Stiele beh., kaum über 5 mm; Bl. hellrosa in ± nickenden, locker beh. bis fast kahlen Blst., Bl.-Achse meist nur am Grunde beh. o. kahl, Gr. 2—3, Stb. 20, sonst wie Fig. 423 l—n. Fr. bereift.

Man kann vielleicht festhalten var. *typica* (*nigra* var. *typica* ZBL., l. c. 21. 1897): B.-Spitze — stumpf o. rundlich, Blst. 3—9-bl., K. mehr 3-eckig (Fig. 423 bei l), hierher f. *pauciflora* (*nigra* var. *paucifl.* RGL., in Act. Hort. Petrop. II. 315. 1873): Blst. 1—2-bl., meist nordische und Gebirgsformen. — var. *laxiflora* (JACQ., ex LDL. in Bot. Reg. XV. ad t. 1229 et t. 1305. 1829, nec HOOK.; *nigra* var. *laxiflora* a ZBL., l. c. 21): B. etc. wie typ. *melanocarpa*, nur Blst. 12- bis vielblütig, ± länger als B. — var. *commixta* (*C. laxiflora* HOOK., in Bot. Mag. t. 3519. 1835 [et KOEHNE, Herb. Dendr. No. 122], nec JACQ. apud LDL.; *nigra* var. *laxiflora* ? ZBL., l. c. 22): B. mehr zugespitzt (Fig. 421 f), bis 5.7:3.3 cm, Blst. ca. 8—15-bl., Bl. vgl. Fig. 423 o—q; eine mir noch etwas unklare Kulturform, die vielleicht (wie auch KOEHNE glaubt) eine „Art“ darstellt. Bedarf aber noch der Beobachtung!

C. m. LODD., Bot. Cab. XVI. t. 1531. 1829 (*Mespilus Cotoneaster* L., Sp. pl. 479. 1753 ex p.; *Mesp. cot.* var. *nigra* EHRH., Beitr. IV. 19. 1789 [et WAHLBERG, Flora Gothob. 53. 1820]; *Cot. integerrima* MED., Gesch. Bot. 85. 1793, var. β; *C. vulgaris* var. *melanocarpa* LED., Fl. alt. II. 219. 1830; *C. peduncularis***) BOISS. et HOH., Diag. Pl. nov. ser. 1. III. 8. 1843; *Cot. nigra* FRIES, Sum. Veg. Scand. I. 175. 1846; *C. orientalis* KERNER, in Östr. B. Zeitschr. XIX. 270. 1869). — I. G. nur D. Westpreußen; U. O.-Galizien, Transsilv., Rumänien; ferner Skandinav., M. und S.-Rußl. bis Kaukasus, sowie Turkestan, Sib. bis Songarei, Dahurien, Mandschurei.

Blz. V—VI. — Frz. VIII. — Vgl. die folgende Art. Die ostasiatischen Formen, wie ich sie im Herb. Petersburg sah, bedürfen noch gründlicher Vergleichung, sie

Fr. 1—3 Steine zeigen, B. wie Fig. 426 l—m, S. 758, Textur zu Blz. dünn, dann aber derber, Obers. z. T. kahl, Unters. reichlich beh., Blst. 4—7-bl., Bl. mehr beh. als bei *bullata*. Ob neue, neben *acutifolia* zu stellende Art? Ähnlich auch HENRYs No. 7611 (vgl. auch No. 7426) aus Hupei und No. 5587 aus Sz'tschwan. Es scheint eine Art Parallelismus zwischen rot- und schwarzfr. Formen vorzuliegen. — Expl. HENRYs aus Hupei (No. 6003) mit ober. beh. B. (Fig. 426 k, S. 758) und unreifen beh. Fr. können ebenfalls in den Formenkreis der *acutifolia* gehören. Ähnlich HENRY, No. 6750. Auffällig schmal-, spitz- und langblättrig (5:1.5—9:3 cm) ist HENRYs No. 6649 aus Hupei, aber die jungen 2-steinigen roten Fr. gestatten keinen sicheren Schluß, ob eigene Art vorliegt, B. bis auf Stiel so gut wie ganz kahl, dieser ca. 5 mm.

*) Kn. vgl. meine Dendr. Winterstudien, S. 118 und Fig. 151 i o, S. 148.

**) An BOISSIERS Orig. ist die endgültige Fr.-Farbe noch nicht zu erkennen. In Fl. or. II. 602. 1872, führt er sie als *vulgaris* var. *peduncularis*, was im Suppl. dann von BUSER berichtigt wird. Das Vorkommen der *melanocarpa* hier in Bithynien (Olymp) wäre auffallend, ob diese Pflz. nicht etwa zur *parnassica*, siehe S. 749, gehören? Vgl. auch SINTENIS No. 5228 aus Paphlagonien.

sind z. T. sehr kleinblättrig und zeigen auch sonst Abweichungen. Manche erinnern übrigens auffällig an *lucida* (bes. aus dem Baikargebiet). Formen aus Turkestan machen den Eindruck einer zwischen *melanocarpa* und *integerrima* stehenden Art.

Auffällig waren einige Formen, wie z. B. lg. REGEL 1870. Sairam (Bl.) und 1880 3—15 VIII, Altyn-imel-Pass (Fr.) dadurch, daß aus den Fr. oben die noch gut erhaltenen C. sowie Stb. herausguckten. Ob sie etwa bis zuletzt erhalten bleiben und dies als gutes Merkmal für eine Var. anzusehen, bleibt fraglich. Die B. sind auch zur Frz. obers. relativ reich beh. Sonst kaum scharfe Unterschiede vorhanden.

Fig. 423. *Cotoneaster*: a—c *lucida*: a Bl. im L.-Schn. und K.; a¹ C.; a² Frkn.-Q.-Schn.; b Fr.; c Stein von Bauch- und Rückenseite — d—f *acutifolia*: wie a—c, aber Stein auch von Schmalseite — g—h ? *acutifolia* var. (GIRALDI, No. 1492), Fr. und Stein — i—k [? *mucronata*]: Fr. und Stein — l—n *melanocarpa*: wie a—c — o—q *melanocarpa* var. *commixta*: wie d—f — r—s *rosea*: r Bl. im L.-Schn. und K.; r¹ C.; s Fr. (a—a², c, l—q nach KOEHNE, sonst Original).

Sekt 2. *Chacnopetalum* KOEHNE, l. c. C. zur Blz. ausgebreitet, also Bl. breit offen wie in Fig. 427 a. S. 759, meist weiß.

A. B. unters. nicht papillös (vgl. aber auch *C. Dammeri*, S. 761, B. siehe S. 758. sommer- o. halbwintergrün, Zw. nie niederliegend und wurzelnd.

○ B. der Frzw. und normalen Lgtr. im Mittel nicht über 5 cm lang, vgl. Fig. 424 c—k und Fig. 422 k—p, S. 751, Fr. rot. ○○ siehe S. 756.

÷ Bl.-Achse und K. außen stets beh., wenn fast kahl, so doch Blst. kurz büscheltraubig und B. unters. bleibend filzig*).

* Hier reiht sich den nichtpapillösen B. zufolge em die echte *C. buxifolia* L.DL., in Bot. Reg. ad tab. 1229. 1829 [et WIGHT, Icones III. t. 992 1843 50] (*C. affinis* DC., Prodr. II. 632. 1825. ex p.; *C. lanata* DEXNE., l. c. 173. 1874 — ob auch *C. lanata* in Gartenfl. IX. 59. 1860 und bei KIRCHN., Arb. Musc. 307. 1864. 2p) aus dem Nilghiri-Gebirge im südl. Vorderindien, die bisher fast immer fälschlicherweise mit *buxifolia* WALL., Cat. No. 661. 1829, nomen nudum! — *C. rotundifolia* L.DL. (et WALL. ex p.), siehe S. 759] vermengt wurde. Sie ist halbummergrün, B. wie Fig. 429 b. S. 760.

14. *C. racemiflora*: eine der variabelsten und formenreichsten Arten, deren Typ ich kurz wie folgt skizzieren will: β , schlank aufrecht verästelt, bis etwa 2,5 m hoch (ob höher?), Zw. jung graufilzig, σ o. γ kahl, tiefpurpurn; B. etwa wie Fig. 424 g $\pm$ variierend, an Lgtr. wie das große bei g, ca. 3–4 (4,5):2,4–2,8 (3,2) cm, oberf. sattgrün, zuletzt kahl, unters. weißgraufilzig. Stiele 3–5 (–8) mm; Blst. ca. 5–16-bl., gleich Bl.-Achse und K. graufilzig, Bl. vgl. Fig. 425 d–d¹, Fr. wie e o. rundlicher, leuchtend rot, Spitze leicht offen, Steine 2 wie f o. ein rundlicher.

Dieser var. **a. typica** (*C. Fontanesi* SPACH, Hist. veg. II. 77. 1834; *C. Font.* var. *Desfontana* RGL., in Act. Hort. Petrop. II. 312. 1873; *C. nummularia* var. *racemiflora* WENZL., in Linnaea 1874. 189; *C. racemiflora* var. *Desfontanesi* ZBL., l. c. 23. 1897), von der ich var. *Meyeri* ZBL., l. c., nicht unterscheiden kann, scheinen Expl. aus Taurien, Kaukasus anzugehören.

Ich halte ferner vorläufig*) fest: var. **b. nummularia** DIPPEL, Laubholzsk. III. 415. 1893 (*C. Nummul.* FISCH. et MEY., Ind. sem. Ht. Petrop. II. 31. 1835 [et in Ann. Sc. nat. ser. 2. V. 182. 1836]; *C. Fontanesi* var. *num.* RGL., l. c. 313): mehr sparriger, wohl niedrigerer β , B. im Mittel kleiner, mehr rundlich und stumpf (an Blzw. des Orig. wie in Fig. 424 f), oberf. $\pm$ locker beh., sonst wie Typ. Ich sah Expl. aus Syrien, Cilicien, Armen., Kurdistan, Nordpersien, Kauk. und ?Algier**).

var. **c. songorica** (*C. Fontanesi* var. *song.* RGL., l. c.): B. mehr oval, Spitze meist stumpflich (Fig. 424 i), bis ca. 3:1,5 cm, Beh. aller Teile schwächer, Songarei (subalpin), aber wohl auch in Kaukasus, Alatau (ob etwa SOULIE, No. 684, Tongolo in O.-Tibet hierher?). Hierher gehört z. T. *C. num.* var. *ovalifolia* BOISS., Fl. or. II. 667. 1872, z. T. aber auch zur folgenden, nämlich var. **d. acutifolia** (*C. num.* var. *acutifolia* BORNEM., in Sched.). Eine wie es scheint auf S.-Persien beschränkte Form mit relativ spitzen B. wie Fig. 424 k. Noch zu beobachten. var. **e. Kotschyi*****): hierunter verstehe ich die klein- und rundblättrigen (Fig. 424 e¹) niedrigen, sparrigen, wohl zum Teil zwergstrauchartigen Formen†), wie sie besonders in den Gebirgen von ?Nepal, ?Kumaon, Kaschmir, W.-Tibet, N.-Persien, N.-Syrien, Cypern auftreten.

C. r. K. KOCH, Dendr. I. 170. 1869 (*Mespilus rac.* DESF., Pl. Hort. Paris éd. III. 409. 1829; *Pyrus nebrodensis* GUSS., Fl. sic. Syn. I. 569. 1842; *Cot. nebrod.* K. KOCH, Hort. Dendr. I. 179. 1853, teste DIPPEL). — Trauben-Z. — Heimat wie oben. Blz. V–VI. — Frz. IX. Fr. lange bleibend. — In der typischen Form sehr zu empfehlender Zier- β . — Ich betone, daß die hier gegebene Gruppierung nur ganz provisorisch ist und lediglich als Anregung zu weiterem Ausbau dienen soll.

Vielleicht nur als eine Varietät der *racemiflora* ist anzusehen *C. pannosa* FRANCH., Pl. Delav. 223. 1889, aus Yünnan, die durch Hort. VILMORIN jetzt ver-

jung auch auf der (nicht glänzenden?) Oberf. beh., unters. graufilzig, wie die Triebe, erst im 2. Jahre fast ganz kahrend; Blst. graufilzig, 2–4-blutig, Bl. klein, ca. 7 mm Dm., Achse und K. graufilzig, K. langspitzig, Gr. 2, Stb. 20 (vgl. Fig. 325 k–k¹), Fr.?, ich sah nur eine schlecht erhaltene Fr. mit 1 Stein wie l. Kaum in Kultur. Höchstens Kalthauspflze. Beschreibung nach Expl. PERROTET, No. 1752, Herb. WIGHT, No. 925, HOHENACKER, No. 1154. Nach Expl. Herb. FALCONER, No. 396 (im Herb. Berlin) käme diese Art auch in Kaschmir vor!

*) Diese Formengruppe, die hier als *racemiflora* s. l. gefaßt wird, bedarf sehr einer eingehenden Untersuchung. Als Art kann man m. E. abtrennen die typische *C. orbicularis* SCHLECHT., in Linnaea 1854. 544, d. h. die Expl. lg. SCHIMPER, No. 270, 445 Sinai-Halbinsel (St. Catharinae Mts.): B. wie Fig. 424 e o. mehr rundlich o. kaum größer, Bl.-Achse und K. fast o. ganz kahl, Blst. 3–4-blutig. Sehr zierliche, vielleicht mit *racemiflora* var. *Kotschyi* verbundene Art. Soll ein „Bäumchen“ bilden.

**) B. zur Blz. oberf. sehr beh., ob bes. var.

***) Ich habe in diversen Herbarien diese Formen als var. *Royleana* DIPP., l. c., etikettiert, weil ich glaubte, daß diese (bez. *C. Roylei* o. *Royleana* HT.) den spontanen Formen entsprechen könne. Allein das ist mir doch zweifelhaft und ich hebe die spontanen Formen als var. *Kotschyi* hervor. Die genannten Gartenformen bleiben noch ungeklärt.

†) Einen großen β o. kleineren β soll die Form aus Afghanistan, Paropamisus range, lg. AITCHISON, No. 396 (common on the hills where there is moisture, at 4000 feet altitude) bilden; ihre zur Blz. winzigen B. sind auch oberf. dicht weich beh., die kleinen Blütchen zu 2–5 ganz kurz gebuschelt. Ob neue var. o. gar Art? Hierher wohl auch AITCHISONs No. 170 et 363 und JÄSCHKE 1868, NW.-Himal., 10–13000' und STOKES 1851, Balutschistan.

breitet wird. In den Blst. und Bl. (Fig. 425 g—g¹) kann ich durchgreifende Unterschiede gegen var. a nicht finden, nur Gr. oft 1; die Fr., die ich (ob reif?) ähnlich wie Fig. 425 h, Steine wie 1, sah, scheinen (auch nach Abb. in Rev. Hort. 1902, 381, fig. 163 A) einen fest geschlossenen K. zu haben, dies nun ergäbe im Verein mit den B. wie Fig. 424 l am ehesten einen guten Unterschied. Allerdings sind die B. von var. *acutifolia* (oben) ihr recht ähnlich. B. anscheinend zuletzt derber, halb wintergrün, Fr. lange bleibend. Expl. aus Sz'tschwan, lg. v. ROSTHORN, No. 1806, 1829 dürften zu *pannosa* gehören. Hier B. zur Blz. z. T. bis 3,5:2,5 o. 4:2,1 cm, Blst. etwas lockerer 4—8-bl.

Fig. 424. *Cotoneaster*-B.-Formen (wie Fig. 420): a *Lindleyi*: Kulturpflz., b dgl. aus Kaschmir. c *multiflora* von BUNGES Originalen; d var. *granatensis*. e *orbicularis*. e¹ k *racemiflora*: e¹ var. *Kotschyi*; f von MEYERS Orig.; g von SPACHS Fontanesu; h KOTSCHY, No. 537, Frzw.; i CALLIER, No. 49 u. 87; k var. *acutifolia* BORNH. l *pannosa*. — m *glaucophylla*. — n *rosea* (so gut wie 1₁) (Orig.).

★★ Bl.-Achse und K. außen kahl (o. fast kahl) o. jedenfalls Blst. lockerer, gestreckter. B. unters. ganz o. fast kahlend, oft fast von Anfang an so gut wie kahl.

15. *C. multiflora*: ein der *racemiflora* sehr nahe verwandter b, bis über 2 m hoch, Verzweigung graziöser, lockerer, die dünnen, kahlen, glänzend purpurnen ♂ und ♀ Zw. überneigend, junge Triebe locker beh.; B. vgl. Fig. 424 c und Fig. 422 k—p, S. 751, oben stets ganz o. fast kahl, lebhaft grün, unters. meist stark bereift, weißl. graugrün, 2,5:1,6—4:2,5 3 cm, gelegentlich bis 6:4,7 cm, Stiel 5—8—10 mm; Blst. viel lockerer als bei *racemiflora*, ca. 10—20-bl., meist locker beh. bis fast kahl, vgl. Fig. 425 m—m¹, Gr. 2, Stb. 20, Fr. wie o o. q, Steine 2 (n, p), aber schwer zu trennen, o. meist einer (r).

C. m. BGE., in LEDEB. Fl. alt. II. 220. 1830 [et LED. Ic. pl. Fl. ross. III. 21, t. 269. 1831] (*C. reflexa* CARR., Rev. Hort. 1871. 520). — Vielblütige Z. — Kauk. (Talysch), O.-Turkestan, Songarei, Baikargebiet, N.-China, Kansu (N.-Shensi *). — Blz. V. — Frz. X. — Formenkreis noch zu beobachten; GIRALDIS No. 4989 hat bes. große B. (Fig. 422 p) und die noch nicht reifen Fr. sahen aus wie Fig. 425 t. Ähnlich ist ein Expl. POTANINS aus N.-Sz'tschwan vom 27. VII. 1885: B. bis 6:4 cm an Kztr., Frst. mit nur 1–5 Fr. Wie es scheint gute Var.

An diese Art schließt sich als var. *granatensis* WENZ., in Linnaea 1874. 191 (*C. granat.* BOISS., Elench. pl. nov. 41. 1838) die Form der Sierra Nevada Spaniens. b, bis 4 m, im wesentlichen abweichend durch noch lockerere, flatterige Blst. und in der Beh. derselben (auch Recept. z. T. $\uparrow$ beh.) oft sehr an *racemiflora songorica* erinnernd, Blst. sonst analog *multiflora*-Typ, Fr. wie Fig. 425 u, also oben $\uparrow$

Fig. 425. *Cotoneaster*: a–c *Lindleyi*: a Bl. im L.-Schn., a¹ C., b Fr., c Stein von Rücken-, Bauch- und Schmalseite (b–c von Expl. aus Kaschmir). — d–f *racemiflora*: wie a–c. — g–i *pannosa*: wie a–c. — k–l *buxifolia*: wie a–c ohne Fr. — m–n *multiflora* (von BUNGES Orig.): m Bl. im L.-Schn. und K., m¹ C., n¹ Stein wie c; o–p dgl. (lg. KUSCHAKEWICZ) Fr. und Stein; q–s dgl. lg. GIRALDI 5017, 5018; t dgl. lg. GIRALDI, No. 4989; u–v var. *granatensis*: Fr. und Fr.-K. und Stein (a–a¹, d–d¹ nach KOEHNE, sonst Orig.).

breit offen, Steine wie v; B. wie Fig. 424 d, Stiele bis 13 mm. Eine behaartere Form lag im Herb. BOISS. als *C. granatensis* BOISS. var. *tomentosa* COSS., sie ist möglicherweise mit der in Algier ja auftretenden *racemiflora*-Form identisch!! Unterschiede zwischen *multiflora* und *racemiflora* ohnedies sehr graduell.

CC B. der Frzw. und Lgtr. im Mittel über 5 cm lang, vgl. Fig. 426 a–e o. sonst Fr. schwarzblau, B. wie Fig. 424 a–b.

✱✱ siehe S. 758.

✱ Fr. schwarzblau o. schwarzbraun und $\uparrow$ bereift, oben $\uparrow$ offen (Fig. 425 b und Fig. 427 c, e), Blst. $\uparrow$ kurz doldentraubig, kaum

*) Diese chinesischen Formen scheinen mir kaum als var. abtrennbar, sie stellen die echte *reflexa* CARR. dar; ich zähle hierher lg. GIRALDI, No. 965, 967, 969, 971, 974, 975, 981, 1081, 4989, 4993, 5004, 5007, 5010, 5012, 5013, 5016, 5017, 5018, 5019, 5021 und 7184.

über 4—5 cm Dm., B. wie Fig. 424a—b o. 426b—e, an Kztr. im Mittel nicht über 6 cm lang.

+ Blst. ca. 5—10-bl., 2—2.5 cm Dm., B. rundlich, an Spitze hfg. etwas ausgerandet (Fig. 424a—b).

16. *C. Lindleyi* (*C. arborescens* *): Großstrauch bis kleiner $\mathfrak{h}$, Zw. jung filzig beh., später kahl, rot- bis dunkelbraun; B. halbwintergrün, obers. sattgrün, nur jung auf Rippe verstr. beh., unters. hellblaugraugrün, anfangs dichter, später nur noch lockertulzig, im Mittel 2.5:1.7 4:3 3.8, gelegentlich bis 5:4.8 cm, Stiel 4—7 mm; Blst. 5—10(—15)-bl., doldentraubig, nebst Bl.-Achse und K. (außen) graufilzig, Gr. 2, Stb. 20, vgl. Fig. 425a—a', Fr. kugelig-eifg., ca. 7 mm dick, blauschwarz, vgl. b—c, Steine 2[—1, dann $\pm$ rundlich].

C. L. STEUD. [siehe Anm.] (*C. nummularia* LDL. [siehe Anm.]; *C. nummularia* var. *Lindleyi* WENZ., in *Linnaea* 189. 1874; *C. arborescens* ZBL., l. c. 25 1897, nec WENZ. [siehe Anm.]. — NW.-Himal. (ich sah sie aus Kaschmir, Herb. FALCONER No. 397 ex p. [vgl. Anm. S. 745]). Hierher wohl auch AITCHISON'S No. 325 aus Afghanistan (Kuram-Tal). Wahrscheinlich gehören auch Expl. lg. REGEL, Bucharei, Darwas, Siehai-Paß unweit Kulab, 5—7000', mit reifen Fr. hierher. B. bis 6:4—4.5 cm, dünnlederig. — Blz. VI. — Frz. IX. — Blüht reich, aber friert im strengen Winter bei uns oft stark zurück. Schließt verwandtschaftlich direkt an *affinis* an, was zumal das AITCHISON'SE Expl. beweist!! Hier Blst. nur 3—5-bl., B. meist $\pm$ leicht ausgerandet. Recept. und K. kahler, Fr. wie *affinis*.

++ Blst. meist mehrblütig, ca. 3—5 cm Dm., B. länglicher, meist deutlich zugespitzt (Fig. 426b—e).

17. *C. affinis*: variabler aufrechter schlankästiger $\mathfrak{h}$ (o. kleiner $\mathfrak{h}$ in Heimat), junge Triebe gelbgrau filzig, $\odot$ kahlend, rotbraun; B. elliptisch, beidendig meist $\mp$ stumpflich (Fig. 426b—b'), obers. lebhaft grün, kahl o. fast kahl, unters. jung $\mp$ reichlich gelbgrau filzig, wohl nie ganz kahlend, an Lgtr. bis 9:4.5 cm, Hauptnervenpaare 5—7—8; Stiel bis 11 mm; Blst. $\mp$ dicht gelbgrau filzig, dgl. Bl.-Achsen und K., Gr. 2, Stb. 20, sonst vgl. Fig. 427d—f; Fr. bis 8 mm Dm.

Dies var. *typica* (*bacillaris* var. *affinis* HOOK. F., Fl. Brit. Ind. II. 385. 1878, excl. Syn. ex p.; *frigida* var. *aff.* WENZ., in *Linnaea* 1874. 191 pro max. part.). Von Nepal nach NW.-Himal. verbreitet. — Davon kann ich vorläufig spezifisch nicht unterscheiden var. *bacillaris***) (*C. bac.* WALL., in LDL., Bot. Reg. ad t. 1229. 1829 [et Cat. No. 659 et 660. 1829, nom. nud.]; *C. laevis* HORT. NONN.): B. zuletzt ganz kahlend, hfg. kleiner, wie Fig. 426d, sonst auch wie b', Blst. nur locker beh. bis fast kahl, Recept. und K. dgl., vgl. Fig. 427a—c. Stumpfer mehr an den Typ gemahnende B. hat *f. obtusa* DIPP, Laubholzk. III. 418. 1893 (*C. obtusa* WALL., in LDL. l. c. [et Cat. No. 659 a]). Die var. *bacillaris* scheint von Kumaon bis Sikkim zu gehen. Ob noch weiter östlich?

C. a. LDL., in Trans. Linn. Soc. XIII. 101. 1821. — Heimat wie oben. — Blz. V. — Frz. X. — In Kultur seit langem, doch ziemlich selten. Leidet durch strenge Winter, treibt aber wieder aus.

*) ZABEL hat diesen Namen neu gewählt, weil er diese Form (wie ich glaube, mit Unrecht) für verschieden von *C. nummularia* LDL., in LOUDON, Arb. brit. II. 872. 1838, hält und weil FISCHER et MEYER ihre *nummularia* bereits 1835 publiziert haben (s. S. 754). Nun soll allerdings LINDLEY seinen Namen schon in Hort. Trans. VI. 396. 1828 publiziert haben, doch fehlt das Zitat im Kew Index, und ich konnte in keinem Bande der Hort. Trans. den Namen finden. Es liegen aber im Herb. Berlin Expl. aus dem Jahre 1830?, die von LINDLEY stammen und als *nummularia* bezeichnet sind und sicher zur *arborescens* ZBL. gehören. STEUDEL hat, in Nomencl. I. 426. 1840, *nummularia* LDL. in *C. Lindleyi* umgetauft, dabei aber nach den zit. Synonymen noch 2 ganz andere Dinge hinzugezogen. ZABEL hat ferner bei Schaffung seines Namens überschen, daß eine *Cot. arborescens* WENZ., in *Linnaea* 1874. 203 — *Crataegus arbor.* ELLIOT schon existierte. Ich möchte deshalb *C. Lindleyi* doch voranstellen und muß betonen, daß diese Art *C. nummularia* LDL. heißen muß, wenn der Name tatsächlich vor 1835 publiziert wurde.

**) ZABEL'S *C. bacillaris* var. *floribunda*, l. c. 26. 1897 ist mir unklar. Ebenso die *bacillaris* var. *parvifolia* HOOK., l. c. 385, aus Bhotan. In Kultur sah ich auch kleinblättrige, mir noch fragliche Formen.

** Fr. lebhaft rot, oben geschlossen (Fig. 427 h). Blst. größer, ca. 6—8(—10) cm Dm., B. der Kztr. im Mittel nicht unter 6—8 cm (Fig. 426 a).

18. *C. frigida*: weicht sonst von *affinis* noch ab durch: Wuchs höher, in Heimat $\mathfrak{H}$, bis fast 7 m; B. mehrnervig (bis 11 Paare), oben kahl, unters. weißlichgrau, bes. Nerven fein gelbgrau filzig, zuletzt $\pm$ bis fast kahl, bis 9:3,8 o. 12(—14):5(—6) cm; Blst. dicht filzig, Bl. etwas kleiner, vgl. Fig. 427 g—h¹.

Fig. 426. *Cotoneaster*: B.-Formen: a *frigida*. — b—e *affinis*, davon d—e var. *bacillaris*. — f *rugosa*; g var. *Henryana*; h var. *Pritzeli*. — i spec.? (*bullatae* affinis, vgl. Text S. 747). — k—m spec.? (*bullatae* affinis, vgl. Text S. 752) (knapp $\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

C. f. WALL., in SPACH, Hist. Veg. II. 78. 1834 [in Cat. No. 657. 1829 et in LDL., Bot. Reg. ad t. 1229. 1829 nomina nuda!] (*C. affinis* HORT., *C. himalayensis* HORT. ex p., *C. compta**) HORT. NONN.). — Nepal, Sikkim, sowie Nilghiri-Gebirge (HOHENACKER, No. 1575). — Sonst wie vorige. Seit langem in Kultur, aber selten. Ich erhielt aus Hort. Plantières reife Fr. beider Arten.

B. B. unters. papillös o. Zw. z. T. niederliegend wurzelschlagend. B. meist immergrün.

○ B. groß^{**}). unters. scharf erhaben geadert (Fig. 426 f—h).

19. *C. rugosa*: $\mathfrak{H}$ (teste PRITZEL), ⊙—(⊙) Zw. $\pm$ locker flockig-filzig, B. sehr dick und steif, ober. sattgrün, bis auf die tief eingesenkten Hauptnerven kahl, auch Nervillen eingesenkt, unters. durchweg gelbgrau dick flockig-filzig, die scharf erhabenen 8—11 Nervenpaare und Rippe kahlen zuletzt, aber sonst auch älteste B. noch deutl. flockig-filzig, 4:1,8—7,5:2,8 cm, vgl. Fig. 426 f, Stiel dick, filzig, 4—6 mm; Bl. ?, Frst. ca. 6 cm Dm., locker grauflockig-filzig, Fr. wie Fig. 427 q—r, unreif, gelblich.

Ich betrachte [entgegen PRITZEL] nur diese von ROSTHORN, No. 680 in Sz'tschwan [Nanch'uan] gesammelte Form als var. *typica* und führe die von PRITZEL dazugezogene No. 1132 ROSTHORNS, nebst der (im Herb. Berlin ebenfalls als *rugosa* bezeichneten) No. 1384 WILSONS aus W.-Hupei als var. *Pritzeli*: hier sind die nie ganz so derben B. nur im Anfang unters. auf den Nerven borstentfilzig, kahlen dann ganz und sind unters. schön weißblau (Papillen stärker entwickelt), sie messen 2,5:1—6:3 cm (größte wie Fig. 426 h); Blst. filzig beh., 4—5 cm Dm., Bl. vgl. Fig. 427 m—m², o. K. mehr wie n, Gr. 2, Stb. 20, Fr. rot, wie o—p. — Ferner reihe ich noch an var. *Henryana*: B. schmallänglicher, wie Fig. 426 g, 4,5:1,5—10:3 cm, ober. zur Blz. locker beh., unters. dgl. etwas stärker auf Nerven, Textur noch wenig dicklich, aber Nerven unten schon gut vortretend, Stiel bis 1 cm, Blst. analog *Pritzeli*, ebenso Bl., Fr. ?. HENRY, No. 5752 (Sz'tschwan o. Hupei).

C. r. PRITZ., in ENGL. Jahrb. XIX. 385. 1900. — Heimat siehe oben. — Blz. ? — Frz. X. — Einführens-wert. PRITZEL hält var. *Henryana* für *frigida*.

*) *C. comptus* LEM., in Fl. d. Sen. IV. 338b, 1848, ist wohl *C. affinis* var. *bacillaris*. Die Angabe, daß die Samen vielleicht aus Mexiko stammen, dürfte falsch sein.

*) Hier ist auch *C. glaucophylla* FRANCH., Pl. Delav. 222. 1889, aus Yunnan zu erwähnen, den ich aus HENRY'S No. 9951 A, B, Mengtze, 1800 m, kenne. B. bis 2 m, B. lederig, wie Fig. 424 m, ober. glatt, glanzend olivgrün, kahl, unters. schon violettweiß papillös, nur anfangs Rippe beh., Nervenpaare ca. 10, fein aber scharf, 3,3:1,8—5,0:3,3 cm, Stiel 3—8 mm; Blst. 3—5 cm Dm., $\pm$ grau borstentfilzig, Bl. wie Fig. 427 i—i², Recept. nur am Grunde beh., Gr. 2, Stb. 20, A. violett!, Fr. rot wie K., Stein gespitzt, wie l.

WALL., allein schon die ober. beh. B. unterscheiden sie gut. Ob diese 3 Formen hier tatsächlich einer Art^{*)} angehören, bleibt noch fraglich.

Fig. 427. *Cotoneaster*: a—c *affinis* var. *bacillaris*: a offene Bl., b dgl. im L.-Schn., c Fr.; d—f *affinis typica*: d Bl. im L.-Schn. und K., d¹ C., e Fr., f Stein von Rücken-, Bauch- und Schmalseite. — g—h¹ *frigida*, wie d—f. — i—l *glauco-* von Rücken-, Bauch- und Schmalseite. — m—m¹ *rugosa* var. *Henryana*: m Bl. im phylla, wie d—f und in i² die Stb. — m² C.; n—p *rugosa* var. *Pritzels*: n K., o Fr., L.-Schn., dgl. m¹ ohne K. und Stbfl., m² C.; q—r *rugosa* var. *typica*: Fr. und Stein (a—c nach KOEHNE, sonst Orig.).

○○ B. klein, vgl. Fig. 429 c—k. Adern unters. kaum bes. deutlich.

* B. unters. papillös (graublau). Zw. nicht wurzelschlagend, Gr. 2.

+ B. wie Fig. 429 c—f, 1—1½:1.

20. *C. rotundifolia*: niederliegender, breit sparrig verästelter, seltener — aufstrebender b., junge Triebe + filzig, > kahl, purpurbraun; B. immergrün (gelegentlich wohl auch nur halbwintergrün), dünn lederig, sonst vgl. var.; Bl. zu 1—3, ziemlich ansehnlich (10—15 mm Dm.), Gr. 2, Stb. 20, vgl. Fig. 428 c—c', Fr. lebhaft rot, wie d, Steine wie e.

Man kann unterscheiden: var. *uva-ursi* (*C. microphylla* var. *uva-ursi* LDL., Bot. Reg. t. 1187, 1828; *C. prostrata* BAK., in SAUND. Ret. I, t. 53, 1860, *microph.* var. *rotundifolia* WENZ., in Linnaea 1874, 195); B. mehr rundoval, wie Fig. 429 c—d, unters. locker beh. o. fast kahlend, Fr. bis fast 10 mm Dm., Wuchs niederliegend. — var. *lanata* (*C. buxifolia* BAK., l. c. t. 52, an WALL.?, nec LDL.; *C. microph.* var. *buxifolia* f. *lanata* DIPP., Laubh. III, 420, 1893; *C. buxifolia* var. *lanata* ZBL., l. c. 29, 1897); B. länglicher, wie e—f, unters. reichlich borstenfilzig, Fr. etwas kleiner, Wuchs (ob immer?) mehr aufstrebend. Die ZABELSchen Varietäten *bux-*

*) Leider blieben mir die *C. coriacea* FRANCH., Pl. Del. 222, 1889 aus Yunnan und *C. salicifolia* FRANCH., Pl. Dav. II, 43, 1888, aus O.-Tibet (Moupine) unbekannt, die den Beschreibungen nach wohl *rugosa* sehr nahe stehen durften. Ich werde die Originale in Paris vergleichen und im Nachtrag darauf zurückkommen.

folia var. *typica* Blst. 2—3-bl. und var. *uniflora* Bl. einzeln, sind kaum als Formen fest zu halten.

C. r. WALL., in LDL. Bot. Reg. ad t. 1229. 1829 [et Cat. No. 663. 1829 nom. nud.] (*C. buxifolia* WALL., Cat. No. 661 teste BAK., HOOK. F., non LDL. siehe S. 753); *C. buxifolia*, AUCT. PLUR!!). — Rundblatt-Z. — Hochgebirge von Nepal, Kumaon (weitere Verbr. noch fraglich). — Blz. V VI. Frz. IX. —

Sehr schöner Zier- ϕ für Felsanlagen. Fast ganz hart. — Die von FRANCHET aus Yunnan, in Plant. Del. 224. 1889, beschriebenen *buxifolia* f. *cochleata*, f. *vellaea* und f. *melanotricha* sind nur auf Grund der Originale sicher zu bewerten. Man vgl. Nachtrag am Schluß des Buches.

Fig. 428. *Cotoneaster*; a—b *radicans*: Bl. im L.-Schn. und K., sowie C. — c—e *rotundifolia*: c Bl.-L.-Schn. und K., c¹ C., d Fr., d¹ Fr.-K., e Stein von Rücken-, Bauch- u. Schmal-seite. — f—h *microphylla*: f Bl. im L.-Schn., f¹ C., g Fr., h Stein; i—i¹ var. *thymaefolia*: Bl. im L.-Schn. und K., i¹ C. (Orig.).

++ B. wie Fig. 429 g, 2—3:1.

21. *C. microphylla*: wie *rotundifolia*, von der sie im Grunde nur Varietät ist, B. nur kleiner, unters. weißgrau filzig o. π kahlend, Bl. und Fr. kleiner, vgl. Fig. 428 f—h.

Hierher als besonders zierliche hochalpine Form var. *thymaefolia* KOEHNE, Dendr. 227. 1893 (*C. thym.* BAK., l. c. t. 50): Wuchs sehr zwerghaft, Bl. und Fr. noch kleiner, vgl. Fig. 428 i—i¹; ich sah sie nur aus Garhwal, lg. DUTHIE, No. 1062).

C. m. WALL., in LDL. Bot. Reg. t. 1113 1827 [et Cat. No. 662]. — Kleinblatt-Z. — Nepal, Simla, aber nach Herb. FALCONER, No. 2108 wohl auch im O.-Himal. *). — Blz. etc. wie *rotundifolia*.

Fig. 429. *Cotoneaster*: B.-Formen von a *Dielsiana*. — b *buxifolia*. — c—f *rotundifolia*: c—d var. *uva-ursi*, e—f var. *lanata*. — g *microphylla*. — h—k *Dammeri* (¹/₁) (Orig.).

* * B. unters. nicht papillös, $\pm$ grünlich, Nerven $\pm$ deutl. (Fig. 429 h—k), Bl. einzeln (seltener zu 2), Gr. 5, Zw. z. T. wurzel-schlagend.

*) Expl. aus Sikkim (Kinchington?, 16500') lg. GAMMIE scheinen mit der unters. auf den B. ganz kahlenden *micro.* var. *glacialis* HOOK. F., Fl. Brit. Ind. II. 387. 1878, aus Sikkim gut zu stimmen. Die kleinen ovalen B. messen ca. 8:4.5 mm und bringen diese Form der *rotundifolia* näher. Noch zu beobachten, da ich Bl. und Fr. nicht sah, aber anscheinend die *thymaefolia*-Form bei jener Art vertretend. Ganz ähnlich ist, nur mehr beh., PRATTs No. 543 aus W.-Sz'tschwan (Tachienlu). Ob mit *C. congesta* BAK., l. c. t. 51, identisch, ist mir noch unklar?

21. *C. Dammeri*: Habituell wohl *rotundifolia* analog, aber Zw. schwächer beh., B. bis 2,3—3 : 1,2—1,8 cm, Nervenpaare 5—6, Stiel bis 5 mm, alles zuletzt so gut wie kahl o. nur spärlich beh.; Bl. vgl. Fig. 428a—b, Recept. oft nur im unteren Teile lockerfilzig, K. z. T. mehr kurz dreieckig, Fr.?

Ich unterscheide var. *typica*: Wuchs?, Zw. nicht o. kaum wurzelschlagend und var. *radicans* DAMMER [*C. radicans* DAM. in Herb. Berol.] niederliegend mit wurzelschlagenden Zw. einer kleinen Ericacee täuschend ähnlich. W.-Sz'tschwan (Tachienlu), PRATT, No. 2, 90, 3—4000 m.

C. D. — W.-Hupei, lg. WILSON, No. 1966 und HENRY, No. 4930, Ichang. — Blz. VI. — Sollte eingeführt werden. Sehr auffälliger Typus.

Gattung 166. *Pyracantha**) ROEM., Syn. mon. III. 219. 1847. [Feuerdorn; fiery thorn.]

Vgl. oben S. 653, von *Cotoneaster* abweichend durch: Zw. dornig, B. halbhimmergrün, meist deutlich kerbsäsig. Neb. z. T. laubig werdend (Lgtr.), Bl. weiß, Stb. 20, Gyn. 5, Frb. höchstens am Grunde unter sich und dorsal nur zu $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ mit Recept. verwachsen, Sa. je 2, mit Naht nebeneinander. Nur folgende Arten bekannt.

○ Bl.-Achse und K. außen graufilzig, B. ganzrandig o. nur ganz an Spitze mit feinen Kerbzähnen, unters. bleibend weißgrau filzig.

1. *P. angustifolia*: niedriger sparrig und horizontal verästelter β^{**} , junge Triebe dicht braungelb-filzig, erst ○ kahrend, purpurn; B. wie Fig. 430a—b, ober. glänzendgrün, in Jugend ebenfalls weißlichzottig, dann kahl, 1,8:0,4—0,7 bis 4,5:0,9 cm; Stiel 1—2,5 mm; Blst. 6—15-bl., graufilzig, ∞ erscheinend, Bl. vgl. Fig. 431a—c, Fr. orangerot, im Winter bleibend.

P. a. (*Cotoneaster ang.* FRANCH., Pl. Delav. 221. 1889). — Yünnan. — Blz. nach *coccinea*. Frz. Spätherbst Winter. — Ich sah nur Expl. aus Hort. VIL-MORIN (No. 4494). In Kultur noch selten, bei uns wohl nur für wärmste Lagen geeignet.

○○ Bl.-Achse und K. kahl o. höchstens locker borstig beh., B. stets deutl. kerbzähnig, auch unters. zuletzt ganz kahl.

* B. wie Fig. 430c—d, stets $\perp$ lineallanzettlich. Spitze stets $\perp$ stumpf, Beh. in Jugend gleich jungen Trieben — bräunlich. Frb. innen ganz frei, Steine also an Bauchseite durchaus glatt wie Fig. 431c.

2. *P. crenulata*: analog *coccinea typica*, etwa noch abweichend durch: Blst. etwas wenigerblütig (aber gelegentlich bis 20-bl.), Bl. etwas kleiner, dgl. Fr., vgl. Fig. 431g—h, die länglicheren C. innen $\perp$ verstr. beh., Gr. mehr auseinander weichend.

In Beh. der Blst. hier wie bei *coccinea* alle Übergänge von kahl bis dicht borstenzottig (excl. Bl.). Ob gute Formen abtrennbar?

P. c. ROEM., l. c. 220 (*Mespilus cren.* DON, Prodr. Nep. 238. 1825; *Crataegus cr.* ROXBG., Fl. indica ed. CAREY II. 509. 1832 [die erste mir bekannte korrekte Publikation!; *Crat. pyracantha* var. *crenulata* LOUD., Arb. ed. 2. II. 814. 1844; *Cotoneaster cren.* KOCH, Dendrol. I. 175. 1869). — Von Garhwal bis W.-China [Yünnan, W.-Hupei, Kweitschou und wohl auch Schensi]. — Sonst wie *coccinea*. — In Kultur sehr selten echt! Empfindlich.

*) Hieran schließt sich die für uns kaum in Betracht kommende Gattung *Chamaemeles* LED., in Trans. Hort. Soc. XIII. 104, t. 11. 1821, mit der einzigen Art *Ch. coriacea* LED., l. c., aus Madeira (felsige Küstenhänge), ein immergrüner reichästiger β , Zw. nur ganz jung beh., B. — gebuschelt, sehr bald ganz kahl, oblong bis oboval-spatelig (Fig. 432a, S. 764), ober. tiefer, unters. heller glänzendgrün, ganzrandig o. undeutlich kerbig, 1,5:0,8—3,5:1,2 o. 3:0,8 cm, Stiel 3—5 mm, Bl. in an seidl. Kztr. endständigen, 1,5—2,5 cm langen Scheinähren, C. weiß, Stb. 10—15, Gyn. 11—21, sonst vgl. Fig. 432a—f.

**) Vgl. Habitusbild in Frut. Vilm. Cat. prim. p. 115. 1904/05.

τ τ B. wie Fig. 430 e—i. im Mittel immer deutl. zugespitzt o. kürzer und breiter: Beh. weißgrau: Frb. am Grunde — zentral und auch dorsal höher verwachsen. Steine an Bauchseite mit stumpfer Grundzone (a in Fig. 431 f).

3. *P. coccinea*: ± ausgebreitet sparrig verästelter b, bis 2 m, junge Triebe locker grau beh., ⊙ meist kahl, braunrot; B. ober. glänzend sattgrün, meist stets kahl, unters. glänzend hellgrün, höchstens jung leicht grau beh., sehr wechselnd in Form, Stiel bis

Fig. 430. B.-Formen von: a—b *Pyracantha angustifolia*. — c—d *P. crenulata*. — e—i *P. coccinea*. — k—l *Osteomeles anthyllidifolia*. — m *O. Schwerinae* ($\frac{2}{3}$ n. Gr.) (Original).

7 mm; Blst. meist 15—20- o. mehrbl., Bl. wie Fig. 431 d—d', Fr. lebhaft korallen- o. feuerrot*), wie e—f.

Hinsichtlich der Beh. des Blst. gilt fast das gleiche wie bei *P. crenulata*, nur sah ich nicht dichtfilzige und sie jung fast stets etwas locker beh. Sonst zu erwähnen var. *pauciflora* DIPP., Laubh. III. 421. 1893 (*Mespilus paucifl.* LAM., Encycl. IV. 441. 1797): niedriger, sparriger, dichter verästelt, Blst. wenigblütig; — ferner var. *Lalandi* DIPP., l. c. (*Crataegus*, *Cotoneaster* und *Mespilus Lalandi* HORT.), diese nach Herrn JOTINS Angabe etwa 1874 bei LALANDE in Angers aus S. gefallene Form weicht durch üppigeren, mehr aufrechten Wuchs ab, B. im Mittel breiter, Fr. etwas größer, mehr gelbrot. Warum ZABEL, im H. d. D. D. G. 168. 1903, diese Form *Pyr. cocc.* var. *latifolia* nennt, ist mir unklar.

P. c. ROEM., l. c. 219 (*Mespilus Pyracantha* L., Sp. pl. 478. 1753; *Crataegus Pyr.* MED., Gesch. d. Bot. 84. 1793; *Cotoneaster Pyr.* SPACH, Hist. Veg. II. 73. 1834). — I. G. O. Dalmatien (wild?), sonst Italien (ob auch SO.-Frankreich?, Maced., Kl.-As., bis N.-Syr., Armen., Transkauk., Taurien (im Medit. in Macchie etc. oft verwildert). — Blz. V—VI. — Frz. X bis Winter. — Wertvoll wegen der lange bleibenden Fr.

Gattung 167. *Osteomeles***) LDL., in Trans. Linn. Soc. XIII. 98. t. VIII. 1821.

Vgl. oben S. 652 sowie erste Art. Nur 2 bekannt.

○ B. wie Fig. 430 k—l, B. chen 8:3—20:8 mm, Blst., Recept. und K. dicht graufilzig.

1. *C. anthyllidifolia*: nach MAXIM. bis 0,5 m hoher, niederliegender b; junge Zw. fein grauzottig, auch ⊙ z. T. noch locker beh.; B. unpaar gefiedert.

*) Die *Cot. Pyracantha fructu albo* KIRCHN., Arb. Muse 309. 1864, mir nicht bekannt.

**) Zu *Osteomeles* hat DECAISNE auch die Gattung *Hesperomeles* LDL., in Bot. Reg. ad tab. 1956. 1837, gezogen. Allein wie schon KOEHNE dargetan hat, mit Unrecht. *Hesperomeles* ist eine sudamerikanische Gattung, die sich eng an *Crataegus* anschließt, aber in vieler Hinsicht erst unvollkommen bekannt ist. Der Unterschied in der Beh. des Discs ist nicht für alle Arten konstant. So fand ich ihn kahl bei einer *H. pernettyoides* WEDD. ähnlichen Form. Ich konnte die für uns wohl nur als Kalthauspflz in Betracht kommenden immergrünen ca. 12 *Hesperomeles*-Arten noch nicht eingehend untersuchen und bilde

immergrün (?), Fiedern ca. 13–19, sitzend, lanzettlich-elliptisch, gespitzelt, doch ziemlich variabel in Form, jung beiders. zottig beh., später wenigstens oben meist kahl, satt glänzend olivgrün, unten hellgrün, Spindel schmalflügelig, dgl. beh., Neb. lineal; Bl. in an bis 20 cm langen Seitentrieben endständigen Doldenrispen, weiß. Achsen, Bl.-Achsen und K. (außen) grauweißzottig, Gyn. 5, Frb. an Bauchnaht ganz verwachsen o. nur einen sehr schmalen, schwer sichtbaren freien Spalt lassend. vgl. Fig. 431 i–n, Fr. blauschwarz, bereift, süß, mehlig.

Fig. 431. *a–c* *Pyracantha angustifolia*: *a* Bl. im L.-Schn. und K., *a'* C., *b* Fr., *b'* dgl. im L.-Schn., *c* Stein in Seiten-, Bauch- und Rückenansicht. — *d–f* *P. coccinea*: *d* Bl. im L.-Schn. und K. nebst Stb., *d'* C., *e* Fr., *f* Stein wie *c* (a die von Fleisch bedeckte Zone, *γ* heller glatter Teil, *β* dunklerer Teil). — *g–h* *crenulata*: *g–g'* wie *a–a'*, *h* Fr. — *i–n* *Osteomeles anthyllidifolia*: *i* Bl. im L.-Schn., *i'* C., *k* K., *k'* Sa., *l* Frkn.-Q.-Schn., *m* Fr., *n* dgl. im L.-Schn. (unreif). — *o–r* *O. schwerinae*: *o* K., *p* je 2 Steine von Bauch- und Rückenseite, *q* ein Stein im Q.-Schn., *r* Fr. im Q.-Schn. (Original).

O. a. LDBL., l. c. = Steinapfel. = Hawai-, Bonin-, Lutchu-Inseln (ob auch S.-Japan?). — Bei uns noch sehr selten in Kultur und noch näher zu erproben.

○○ B. wie Fig. 430 m, B.chen nicht über 7:2 mm, Blst., Recept. und K. nur locker graufilzig.

2. *O. schwerinae*: b. 0,8–1,2 m [teste HENRY], der vorigen Art wohl sehr ähnlich, aber durch sehr zierliche B., die 8–11-paarig sind und dabei nicht über

nur in Fig. 432 g–k Analysen und B. von *H. glabrata* ROEM., Syn. III. 225 1847 (*Osteomeles glab.* KUNTH, in H.B. Nov. Gen. VI. 166, t. 553 1823) aus Kolumbien ab. Frb. 5 (ob immer?), Sa. meist je 1, Stb. 20. Diese Gattung bedarf einer Revision, doch standen mir nicht alle Originale DECAISNES zu Gebote.

Ferner ist *Crataegus Fortunei* zu besprechen, so nenne ich die etwas mysteriöse *Cotoneaster Fortunei* WENZL., in Linnaea 1874: 200; *Osteomeles pyracantha* DECNE., l. c. 183. 1874; *Photinia Fortuneana* MAXIM., in Bull. Ac. St.-Petersbg. XIX. 179 1874 aus N.-China [teste MAXIM., nach HEMSLEY in Fokien, Amoy, also SO.-China, lg. FORTUNE, No. A. 69]. Da *Cotoneaster* kann man sie, wie schon KOEHNE ausführt, der Verwachsungsverhältnisse des Gyn. halber, wie wegen der Frb. mit je 1 Sa. nach MAXIM. sollen es 2 sein, was ich nie fand nicht stellen, auch die gekerbten B. und die Dorne sprechen dagegen. Habituell steht sie *Pyracantha* sehr nahe und ist von *Osteomeles* schon durch die einfachen B. ein von KOEHNE sehr unterschätztes Merkmal! total abweichend. Dagegen schließt sie sich an gewisse *Crataegus*, was ja auch KOEHNE schon betonte, anscheinend ganz gut an. Ohne Fr. ist aber eine sichere Entscheidung kaum zu fallen. Vielleicht neue Gattung! Details der Bl. wie Fig. 432 l–n (ob Gr. am Grunde wirklich verwachsen?, ich glaube nicht!, der Zentralraum im oberen Frkn.-Teil [im oben. l.] ist stets deutlich!). Blst. ca. 10-bl., gleich B. so gut wie kahl, diese 2. 0,8–3,5:1,5 cm an Blzw.

2,5–3 cm lang werden, die etwas breiteren K. (Fig. 431 o) und etwas kürzere Stb. gut verschieden. Sonst analog. Steine vgl. p–r.

O. Schuermae C. K. SCHN. — China: Yünnan, lg. HENRY, No. 9315, 9315A Mengtze, 15–1800 m. — Sehr einführens-wert! Ich widme diese reizende Pflanze Frau Gräfin v. SCHWERIN, der Gemahlin des Präsidenten der Deutsch. Dendr. Gesellschaft, der mich durch so viele Unterstützungen zu größtem Danke verpflichtet hat.

Fig. 432. a–f *Chamaemeles coriacea*: a B., b Bl. mit 1 Gr. im L.-Schn., b' C., c Bl. mit 2 Gr. im L.-Schn., d davon Frkn. im Q.-Schn., e Fr., f Stein im Q.-Schn. den gefalteten E. zeigend. — g–k *Hesperomeles glabrata*: g Bl. im L.-Schn. und K., g' C., h Fr., h' deren Q.-Schn. (über Mitte), i Stein in Bauch-, Seiten- und Rückenansicht, k B. normaler Gr. — l–o *Crataegus* (vel genus nov.) *Fortunei*: l Bl. im L.-Schn. und K., l' C., m Frkn.-Q.-Schn. (α oben, β Mitte), n Sa., o B. (c nach KOEHNE, f nach DECAISNE, sonst Orig.).

Gattung 168. *Mespilus* L., Sp. pl. 478. 1753, ex p. [sensu MEDICUS].
[Mispel; Medlar; Néflier.]

Vgl. oben S. 653 und Art. Nur diese bekannt.

M. germanica: sommergrüner breitästiger B., bis 6 m, Zw. bis 3–4 zottig-filzig beh., dann kahle, oliv- o. rotbraun, dornlos o. Krztr. z. T. verdornend, Borke zuletzt ± abblätternd, Kn. *) spitz eifg., beh., B. vgl. Fig. 431 l–n, Textur dünn, Obers. trübgrün, ±, unters. wenig heller, + reicher beh. bis locker teinfilzig, bes. an Rippe; Zähnung + feinkerbig o. fehlend, bis 11:4 o. 13:6 cm; Stiel filzig, 5–7 mm; Bl. einzeln, sehr kurz gestielt, 4–5 cm Dm., weiß, Recept. und K. (außen) filzig-zottig, Stb. 30–40, A. rot, Gr. (4–5), Fr. zuletzt braun, nach Frost genießbar, sonst vgl. Fig. 433 a–c.

Von Kulturformen hebe ich nur hervor: *f. aureo-variegata* ZBL., im H. D. D. G. 180. 1903: B. + gelbbunt; *f. argenteo-variegata* ZBL., l. c., B. – weißbunt; *f. gigantea* KIRCHN., Arb. Musc. 288. 1864 (*f. macrocarpa* HORT.): Fr. größer; *f. abortiva* KIRCHN., l. c. (*M. abort.* DC., Fl. Fr. IV. 456. 1805; *M. apyrena* DELAUNY,

*) Vgl. Fig. 315 a–f, S. 529 und meine Dendrol. Winterstudien, S. 189.

in Bon Jard. 1808. 116; *M. germ.* var. *apyrena* K. KOCH, Dendr. I. 128. 1869). Fr. steinlos.

M. g. L., l. c. (*vulgaris* RCHB., Fl. Germ. excurs. II. 630. 1832). — Echte M. — Pontus, Armenien, Transkauk., N.-Pers. (ob Turkestan?), in Eur. seit alters kult. und verwildert, aber wohl nirgends wild. — Blz. V(—VI). — Frz. X—XI. Alte Kulturpflanze.

Fig. 433. *a—c* *Mespilus germanica*: *a* Bl.-L.-Schn. und K., *a¹* C., *b* Fr.-L.-Schn., *c* dgl. Q.-Schn. — *d—f* *Crataemespilus grandiflora*: *d* Bl.-L.-Schn. und K., *e* Fr. im L.-Schn., *f* Stein von Bauchseite und im Q.-Schn. (*α* Bauchkante). — *g—h* *Crataegomespilus Asnieresii*: *g* Bl.-L.-Schn. und K., *h* C. — *i—k* *C. Dardarii* wie *g—h* (Original).

Pfropf-Bastardgattung *Crataegomespilus)** SIMON-LOUIS, apud JOUIN, in Le Jardin, Januar 1899.

(*Mespilus germanica* veredelt auf *Crataegus monogyna*.)

Man vgl. die Angaben bei den Formen.

○ B. wie Fig. 434d—f, ungelappt, † ganzrandig, Stiele kaum 5 mm, Blst. 6—8(—12)-bl., Bl. bis 4 cm Dm., Gr. 2(—3), K. lang!

1. *C. Dardarii* SIMON-LOUIS, l. c. (*C. Dardarii* var. *mespiloides* ZBL., im H. d. D. D. G. 180. 1903): von der Mispel noch durch die reichlich bedornen Zw., die 1—3,5 cm langen Bl., bez. Fr.-Stiele und die nur 15—20 Stb. abweichend, Fr. ca. 17:12 mm, mit aufr. K.; vgl. Fig. 433i—k.

○○ B. wie Fig. 434a—c, meist ± gelappt, Stiel 5—16 mm, Blst. noch reichblütiger, Bl. nur ca. 2—2,5 cm Dm., Gr. 1(—2); K. † kurz dreieckig.

2. *C. Asnieresii* (*Crat. oxyacantha* × *Mesp. germanica* f. *Asnieresii* — *Crataegomespilus* „Jules d'Asnières“ SIM.-LOUIS, l. c. [ex KOEHNE]; *C. Dardarii* var. *crataeg-*

*) Man vgl. auch Rev. Hort. 1899 403, 482, 530 und KOEHNE, in Gartenfl. 1901. 628, wo die Geschichte dieser eigenartigen Pfropfhybriden klargelegt wird. Ich kann sie hier nur ganz kurz charakterisieren.

goides ZBL., l. c.: der *Crataegus monogyna* näher stehend, aber in Beh. etc. sehr an *Mespilus* erinnernd. Wuchs mehr *Crataegus*-artig.

Bastardgattung *Crataemespilus)** G. CAM., in Jour. de Bot. 1899 [Oct]. 326.

(*Mespilus germanica* $\times$ *Crataegus monogyna*.)

C. grandiflora CAMUS, l. c. (*Mespilus grandiflora* SMITH, Exot. bot. I. 33. 1804; *M. lobata* POIR., in LAM. Encycl. Suppl. IV. 71. 1816; *M. Smithii* DC., Prodr. II. 633. 1825; *Crataegus lobata* BOSC, in DC. l. c. 628; *Crataegus grandiflora* KOCH, Die Weißdorn-etc. 7. 1854; *Crataegus oxyacantho-germanica* GILLOT**), in Bull. Soc. Bot. France 1876, p. XIV): Diese Hybride weicht von *Crataegus*, der sie im Bl.- und Fr.-Bau (vgl. Fig. 433 d—f) mehr ähnelt, ab durch die größeren, meist einzeln stehenden Bl. und die, wie in Fig. 434 g—k dargestellt, variierenden B., die unters. $\pm$ reichlich beh. bleiben; von *Mespilus* ist sie durch die meist 2 Gr., die nur ca. 20—22 Stb., die kleinen rötlichen Fr. mit zurückgeschlagenen K. und

Fig. 434. B.-Formen von: a—c $\times$ *Crataegomespilus Asnieresii*. — d—f $\times$ *C. Dardari*. — g—k $\times$ *Crataemespilus grandiflora*. — l—n *Mespilus germanica* ($\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

auch in den kleineren meist z. T. gelappten B. gut zu scheiden. Frankreich: Saône-et-Loire, Gironde, Rhône.

Gattung 169. *Crataegus****) L., Sp. pl. 475. 1753.

[Weißdorn; Thorn, Haw; Epine.]

Vgl. oben S. 653; b—h, Zw. meist mit nackten Dornen, Krztr. hfg. ebenfalls verdornend; B. einfach, gezähnt, gelappt o. $\pm$ fiederteilig.

*) Schon in Rev. Hort. 1899. 530 wird von SIMON-LOUIS betont, daß man diese echte Hybride nicht mit dem Pfropfbastard *Crataegomespilus*, siehe oben, in eine Reihe stellen darf. Ich kann nicht, wie es ZABEL 1903 vorschlägt, die *C. grandiflora* zu *Crataegomespilus* ziehen. Nun hat schon CAMUS für *C. grandiflora* den oben genannten Gattungsnamen geschaffen, den ich wohl oder ubel akzeptieren muß, trotz seiner großen Ähnlichkeit mit dem um einige Monate älteren *Crataegomespilus*.

**) Auf diese Arbeit sei ganz besonders verwiesen, da sie alles Nähere über diese vieldeutige Pflanze enthält. Ich halte gleich KOEHNE [1906, brieflich] die Hybride für eine *Crataegus monogyna* $\times$ *Mesp. germanica*.

***) Diese Gattung ist die formenreichste und schwierigst zu klärende der Pomaceen. Die erste umfassendere Artenzusammenstellung verdanken wir KOCH, Die Weißdorn- und Mispelarten (*Crataegus* und *Mespilus*), erschienen in Verh. Ver. Bef. d. Gartenbaues Kgl. Preuß. Staaten, neue Reihe, I. 1854. Eine heute fast wertlose Arbeit. Nicht viel besser ist E. REGELS Rev. Spec. Generis *Crataegi*, im Act. Hort. Petrop. I. 1872. Einen bedeutenden Fortschritt stellt in vieler Hinsicht KOEHNE'S Bearbeitung, Dendr. 1893, dar. Ihn ergänzt in mancher Weise J. LANGE'S Rev. Spec. Generis *Crataegi*, Kopenhagen 1897. Jedoch haben KOEHNE wie LANGE sich in der Hauptsache mit den Kulturformen beschäftigt und zu der vor allem notwendigen Klärung der spontanen Formen nur mäßig beigetragen. Mir selbst standen von europ.-asiat. Material ca. 2000 Spannblätter spontaner Formen zur Verfügung. Allein ich fand sehr bald, daß man weit mehr Material braucht,

meist sommergrün, selten halb- o. ganz wintergrün. Neb. bes. an Lgtr. meist stark entwickelt, hfg. : bleibend; Bl. selten einzeln o. in wenigbl. Scheindolden, Blst. meist mehr- bis reichblütig; C. weiß o. rosa, selten gelblich, Stb. (5—)10 - 20, Gr. 1—5, frei o. : verwachsen, Frb. zentral nur am Grunde o. ca. $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$, sehr selten völlig bis Gr. verwachsen, dorsal mit Recept. halb- bis ganz verbunden, am Gipfel um Gr. fast stets frei, Steine deshalb am Gipfel mit freiem Teil (KOEHNES Vorhemd: Hypostyl), Fr. rot, gelb o. schwarz. — Man beachte die lange Anmerkung!!

Provisorische Sektionsübersicht.

A. Steine auf den Bauchseiten (ventral) o. etwas lateral deutlich grubig gefurcht**) [außerdem hfg. auf Rücken längsriefig, B. vgl. Fig. 435, 437, 440a—l und 441a—l, sowie 443, S. 780.

um auch nur halbwegs sich über die sudeurop.-vorderasiat. Formen klar zu werden. Ich kann heute nur Andeutungen geben, die so viel als möglich auf Originaten der Autoren basieren. Wohl noch reicher als der Formenreichtum der altweltlichen ist derjenige der neuweltlichen Arten. Ich hatte aus dem Herb. Miss. Bot. Garden, dank der Güte des Herrn Prof. FRILEASE, ca. 2000 Spannblätter zum Vergleich hier. Aber ich muß gestehen, daß es mir ganz unmöglich war, auch nur die Hauptlinien aus dem Formengewirr der amerikanischen Arten genügend scharf herauszuarbeiten. Man bedenke, daß in den letzten 8 Jahren, genauer besonders seit 1900, insbesondere von den unten zitierten Autoren, nicht weniger als rund 550 sog. „Arten“ (ich habe sie sämtlich, soweit erreichbar, bis Ende 1905 mir aus der Literatur zusammengestellt) beschrieben worden sind, die noch dazu zum größten Teil auf das östliche und mittlere N.-Am. sich beziehen, während die Formen aus dem Westen noch wenig bekannt sind. So führt BEADLE, in SMALL Fl. South-East. States 1903, allein 185 Arten in 23 Sekt. und SARGENT verzeichnet, im Manual of the Trees of N.-Am. 1905, nicht weniger als 132 baumartige Species. Ich will durchaus nicht leugnen, daß die Zahl der alten Arten, die sich bis Anfang der 90er Jahre auf ca. 20—25 belief, auf etwa 80—100 gute Arten in dem Sinne, wie ich sie hier in meinem Buche bewerte, erhöht werden muß (mit Einschluß der altweltlichen auf ca. 150), wie man aber z. B. die ca. 80 Arten der Sekt. *Flavae* sens. lat., deren Autor zumeist BEADLE ist, scharf auseinander halten will, ist mir unerfindlich. Ich habe genügend Material gesehen und Bl. und Fr. genug untersucht, um mir ein Urteil bilden zu können. Und ich betone, daß der Weg, den ASHE, BEADLE und SARGENT einschlagen, nicht geeignet ist, uns ein Bild der wahren Verwandtschaft und des Variationsvermögens der einzelnen Hauptarten zu geben. Die Gattung *Crataegus* muß in der Weise, wie es durch FOCKE, CRÉPIN, R. KELLER u. a. bei *Rubus* oder *Rosa* geschah, von Grund aus neu bearbeitet werden, wenn wir zu einer dem heutigen Standpunkt der (europäischen) Systematik entsprechenden Darstellung der Formenzusammenhänge kommen wollen. Und dazu möchte ich die Amerikaner recht sehr anregen. Die ewige schematische Angabe „anthers purple“, „anthers yellow“ o. „stamens 10“, „stamens 20“ genügt nicht, um Formen zu charakterisieren. Und vor allem müssen erst mal solche Merkmale auf ihre Konstanz bzw. Variabilität am Individuum und an der Species ganz genau untersucht werden. Ferner müssen zunächst die alten Arten und Formen, so weit es irgend geht, klargestellt und scharf umschrieben werden. Bei dem Chaos neuer Arten war ich gar nicht in der Lage, eine große Anzahl alter eingeburgerter Namen auch nur annähernd zu identifizieren. Wenn J. LANGE nicht so sehr wenig spontanes Material gesehen hatte, so hätte er eine wirkliche Basis für die Systematik schaffen können. Um nicht selbst halbe Arbeit zu machen und die Verwirrung noch zu erhöhen, habe ich mich auf das Notigste beschränkt und im Zweifelsfalle die Unterlagen zitiert. Von einer näheren Deutung der meisten Gartenformen, die als „Arten“ in unseren Garten oft eine Hauptrolle spielen, mußte ich begreiflicherweise absehen. Ich kann nur raten, in der Beschreibung neuer Arten und Formen recht vorsichtig zu sein, solange wir nicht die alte Literatur besser gesichtet haben. Die Beschreibungen der neuen amerikanischen Arten finden sich fast ausschließlich in folgenden Zeitschriften: ASHE, in Journ. E. Mitchell, Soc. XXVII. pt. 2. 1901, XVIII. pt. 1. 1902, XIX. pt. 1. 1903, XX. 1904; ders., in Ann. Carnegie Mus. I. 1902. — BEADLE, in Baltimore Bot. Studies I. 1901/02; ders., in Bot. Gaz. XXX. 1900. — SARGENT, in Bot. Gaz. XXXIII. 1902, XXXV. 1903; ders., in Proc. Rochester Ac. IV. 1903; ders., in Rhodora III. 1901, V. 1903, VII. 1905; sowie SARG., Silva XIII. 1902 und SARG., Trees a. Shrubs I. 1902/05. Vgl. auch die oben genannten Floren, wo aber nirgends die Quelle zitiert ist.

**) Bei der noch fraglichen *C. dsungarica*, S. 774 und bei *C. microphylla* fehlen diese Vertiefungen, bei den *Melanocarpae* sind sie hfg. recht schwach, was gelegentlich auch bei anderen, bes. einsteinigen Arten eintritt.

- I. B. höchstens an Lgtr. mit Buchtnerven (d. h. solchen Seitennerven, die von der Rippe aus direkt in die Buchten verlaufen), vgl. aber *C. altaica*, S. 773, *dahurica*, S. 773 und *dsungarica*, S. 774.
- a) Fr. schwarz, Stb. 10, Gr. 5—4, vgl. Fig. 439 a—h, S. 775 und Fig. 440 a—e, S. 776. Sekt. 3. *Douglasianae* (S. 775).
- b) Fr. rot o. gelb, Stb. 8—20, o. wenn Fr. schwarz, Stb. 20.
1. K. meist etwas länger als Recept. und — reich und fein (oft drüsig) gezähnt o. zerschlitzt, Steine mit schmalem, den Gipfel nur halb bedeckendem Vorhemd (vgl. Fig. 439 l—r, S. 775), B. wie Fig. 440 f—l, S. 776. Sekt. 4. *Tomentosae* (S. 776).
 2. K. meist $\pm$ kürzer als Recept., meist ganzrandig, sonst jedenfalls Steine mit breitem, den ganzen Gipfel überziehendem Vorhemd (vgl. Fig. 438, S. 774), B. wie Fig. 437, S. 772. Sekt. 2. *Sanguineae* (S. 771).
- II. B. auch an Krzt. fast sämtlich mit Buchtnerven (sonst jedenfalls klein bis sehr klein und nur $\pm$ 3-lappig). Vgl. auch die unter I genannten 3 Arten.
- a) Fr. rot o. gelbbrot, B. wie in Fig. 443, 445, S. 783 und Fig. 446 a—h, S. 784; Gr. und Steine 1—3. Sekt. 6. *Oxyacanthae* (S. 779).
- b) Fr. schwarz o. violett-schwarz, B. wie in Fig. 441 a—l, Gr. und Steine gewöhnlich 4—5. Sekt. 5. *Pentagynae* (S. 777).
- B. Steine auf den Bauchseiten (ventral) ebenflächig, höchstens dorsal $\pm$ längsriefig o. furchig. B. vgl. Fig. 440 m—p bis Fig. 776.
- I. B. mit Buchtnerven (vgl. besonders Lgtr.-B.).
- a) B. kahl (wenigstens sehr bald kahrend), in Form wie Fig. 440 m—p, S. 776 o. Fig. 453 a—c, S. 792; Fr. sehr klein, K. zuletzt sich hfg. abgliedernd, vgl. Fig. 452 a—i. Sekt. 8. *Microcarpae* (S. 789).
- b) B. $\pm$ beh. bleibend o. sonst größer o. jedenfalls Fr. kaum unter doppelt so groß.
1. B. klein, kahl (vgl. Fig. 453 d—i, S. 792), Bl. und Fr. wie Fig. 452 k—p, S. 791. Sekt. 9. *Brevispinae* (S. 791).
 2. B. größer o. $\pm$ beh.
 - a) B. wie Fig. 435, also im Mittel über 5—6 cm lang, $\pm$ tief gefiedert, Fr. rot $\pm$ punktiert, o. sonst wenn B. $\pm$ schwächer gelappt, Fr. groß, birnfg., vgl. Fig. 436. Sekt. 1. *Pinnatifidae* (S. 769).
 - β) B. wie in Fig. 448, S. 786 o. Fig. 450, S. 789, wenn $\pm$ kahl und tief fiederteilig, so Fr. kugelig o. länglich und dann kleiner, vgl. Fig. 449, S. 787 und Fig. 451, S. 790. Sekt. 7. *Orientales* (S. 786).
- II. B. ohne Buchtnerven*).
- B.-Stiele kurz und gleich B.-Rändern reich mit dicken schwärzlichen Drüsen besetzt, vgl. Fig. 453 m—p, Blst. wenigbl., vgl. Fig. 454 k—n¹: Sekt. 10. *Flavae* (S. 792).
- B.-Stiele drüsenlos o. $\pm$ länger und Blst. mehrblütig.
- * ○ und ⊙ Zw. dicht mit feinen Knötchen bedeckt, B.-Stiele kurz, Blst. 1- bis wenigbl., vgl. Fig. 453 k—l, s—v und Fig. 454 a—c, g—i.
- + Blst. meist 1(—3)-bl., vgl. Fig. 454 g—i und Fig. 453 k—l: Sekt. 11. *Uniflorae* (S. 793).
- + + Blst. 3—7-bl., vgl. Fig. 454 a—c und Fig. 453 s—v: Sekt. 12. *Cuneatae* (S. 793).
- * * ⊙ Zw. glatt, Blst. meist mehrbl.
- + B.-Stiele kurz, kaum über 1(—1,5) cm, B.-Grund $\pm$ scharfkeilig (man vgl. die zit. Figuren im einzelnen).
- B. vgl. Fig. 453 q—r, beiders. $\pm$ beh. Fr. sehr groß, vgl. Fig. 454 d—f. Sekt. 13. *Mexicanae* (S. 794).
- △△ Fr. kleiner.

*) Die hier folgenden Sektionen sind ganz besonders provisorisch. Ich greife aus SARGENTS und BEADLES Darstellung nur das Beste und Wichtigste heraus. Wer mal versucht hat, nach BEADLES Darstellung in SMALLS Flora zu bestimmen, wird finden, daß es nach den Angaben noch nicht einmal möglich ist, die Sektionen sicher zu unterscheiden, geschweige denn die zahllosen Arten.

- Bl. $\pm$ vor o. mit B. erscheinend, Blst. nur 2—5-bl., Beh. der B. $\pm$ mit Rostbraun gemischt, vgl. Fig. 455 a—c, S. 795 und Fig. 456 a—c, S. 796: Sekt. 14. *Aestivales* (S. 794).
- — Bl. $\pm$ lange nach B.-Ausbruch, Blst. $\pm$ mehrblütig, B. kahl o. jedenfalls nicht bräunlich beh. Vgl. Fig. 455 d—p und Fig. 456 d—n: Sekt. 16. *Crusgalli* S. 796 und Sekt. 15. *Punctatae* (S. 794).
- + + B.-Stiele im Mittel (bes. an Lgtr.-B.) länger (1,6—3 cm).
- △ B. beiders. $\pm$ reichlich, oft rauhlich beh., vgl. Fig. 457 g—l, auch Blst. und Bl. $\pm$ reich beh.
- Blst. meist 3-bl., B. kaum gelappt (Fig. 457 l), sonst vgl. Fig. 458 p—r: Sekt. 17. *Triflorae* (S. 797).
- — Blst. mehrbl., B. deutlich gelappt (Fig. 457 g—k), sonst vgl. Fig. 458 f—l: Sekt. 18. *Molles* (S. 797).
- △△ B. nur jung $\pm$ spärlich beh., später ganz o. fast kahl, Blst. meist kahl o. spärlich beh.
- B. vgl. Fig. 457 a—d, kaum o. wenig gelappt, Bl. vgl. Fig. 458 a—e, S. 799: Sekt. 19. *Virides* (S. 798).
- — B.-Lappung stets deutl. Man vgl. im einzelnen die Arten der Sekt. 20. *Pruinosae*, S. 798, 21. *Coccineae*, S. 799 und 22. *Intricatae*, S. 801.

Sekt. 1. *Pinnatifidae* ZBL., im H. d. D. D. G. 178. 1903, vgl. S. 768.

○ B π tief gelappt bis fiederspaltig (Fig. 435 a—h), Gr. 4—5, Steine mit kleinem, aber $\pm$ deutl. Vorhemd (vgl. Fig. 436 c—d, h), o. jedenfalls im Fr.-Qu.-Schn. sich im Zentrum berührend (g).

* B. wie Fig. 435 a—f, Fr. 1—1,5 cm Dm., rundlich oder etwas länglich, vgl. Fig. 436 c.

1. *C. pinnatifida*: π o. kleiner π , Triebe kahl, o. spärlich zottig, ○ Zw. $\pm$ gelbbraun, etwas kantig, ○ grau, Dorne fehlend o. kurz (1—2 cm); B. variabel, bald breiter, bald feiner fiederspaltig, Hauptlappenpaare meist 3; Obers. lebhaft grün, kahl o. fast kahl, unters. heller, bis auf kleine Härte kahlend (vgl. var.), an Krztr. bis ca. 8:6 cm, an Lgtr. bis 12:8 cm, Stiel 2—6 cm; Blst. ca. 7 cm Dm., kahl o. sehr locker beh., Bl. ca. 1,6 cm Dm.; Fr. rot mit hellen Punkten, sonst vgl. Fig. 436 a—d.

Nach Beh. halte ich fest: var. *typica*: Blst. locker zottig, bes. dicht am Bl.-Grunde, Bl. kahl (so BUNGES Orig. aus N.-China), ferner var. *psillosa*: Blst. und Bl. ganz kahl, bes. im Ussuri- und Amurgebiet, Korea, sowie var. *geholensis*: Blst., Recept. und K. $\pm$ reichlich grauzottig beh.,

Fig. 435. *Crataegus*: B.-Formen von Krztr.: a—f *pinnatifida*, e—f var. *geholensis*. — g—h *Korolkowi*. — i—l *Henryi* ($\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

dgl. B. bes. unters. mehr beh., z. T. feinfiederiger (Fig. 435e—f), dicklicher (N.-China, z. B. DAVID, No. 1773, Gehol; und Mandschurei).

C. p. BUNGE, in Mem. St. Petersb. II. 100. 1831 (*Mesp. pinnatifida* KOCH, Dendr. I. 152. 1869). — Fiederblatt-W. — Heimat wie bei var. — Blz. V—VI. — Frz. IX—X. — In Kultur, aber zuw. mit folgender Art verwechselt.

✧✧ B. wie Fig. 435g—h, Fr. groß, $\pm$ birnfg., bis 3:2,3 cm (Fig. 436e—h).

2. *C. Korolkowi*: von dieser Art sah ich noch keine Bl., sie bildet nach BRETSCHNEIDER bis 8 m hohe B., Zw. kahl, G. rot- o. purpurbraun, Dorne meist fehlend; B. derber, breiter und kürzer gelappt als bei voriger, an Kztr. bis 8:7 cm, sonst bis 12:9 cm, Beh. wie *pinnatifida typica*, Stiele dicker, straffer, bis 4,5 cm, Fr. stumpfrot, Vorhemd kaum zu erkennen o. fehlend.

Fig. 436. *Crataegus*: a d *pinnatifida*: a Bl.-L.-Schn., a' C., b K., c Fr.-L.-Schn., d Stein von Bauchseite und Q.-Schn. (a Ventralseite). — e—h *Korolkowi*: e Fr., f deren L.-Schn., g Q.-Schn., h Stein von unten und seitlich, sowie Q.-Schn. — i—n *Henryi*: i Bl.-L.-Schn. und C., k Fr., l—m deren L.- und Q.-Schn., n Stein ganz und im Q.-Schn. (Original).

C. K. RGL. in HORT. NONN. (*C. pinnatifida* var. *major* BROWN, in Gard. Chron. ser. 2. XXVI. 621, fig. 121, 1886; *C. tatarica* HORT. NONN.). — Ich sah Expl. von BRETSCHNEIDER, No. 285, 286 bei Peking, sowie von WAWRA, No. 1289, Tschifu. — Hält gut die Mitte zwischen *pinnatifida* und *Henryi*.

○○ B. nur ganz kurz- o. fast ungelappt (Fig. 435i—l), Gr. 2—3, Steine ohne Vorhemd, sich zentral nicht berührend (Fig. 436l—m).

3. *C. Henryi*: B., bis 6 m; kahl (bis auf Achselbärte der B.-Unters.), von *Korolkowi* noch abweichend durch: B. derber, 4,5—9(—10):3—6(—7) cm, Stiel bis 1 cm; Blst. ca. 15-blütig, Bl. ca. 15 mm Dm., Stb. 20, sonst vgl. Fig. 436i—n.

C. H. DUNN, in Jour. Linn. Soc. XXXV. 494. 1903. — Blz. IV. — Frz. Herbst. — DUNN gründet die Art auf Expl. aus Yunnan, lg. HENRY, No. 9426 und beschreibt die B. als ungelappt, „parte interiore saepe integra“. Ob meine Expl. aus W.-Hupei (lg. WILSON, No. 196 [Bl.] und HENRY, No. 2894 und A. 7522 und 1675 (o. 675?) [in Fr.] eine var. darstellen, bleibt fraglich. Dem Fr.-Bau nach eine echte *Mespilus*, wenn man bei dieser Gattung nicht eben doch mehr Wert auf die viel größeren Einzelblüten, die 30—40 Stb. u. a. Merkmale legt, die allen *Crataegen* fehlen.

Sekt. 2. *Sanguineae* ZBL., im H. d. D. D. Ges. 174. 1903, ex p. (*Eusanguineae* REHD., in Frut. Vilm. Cat. prim. 111. [1904] 1905). Vgl. S. 768. Alle Arten erwähnt*).

○ Blst., Bl.-Achsen, K. (außen) und junge Fr. $\pm$ reich borstig beh., dgl. B. auch zur Frz.

4. *C. Maximowiczii*: $\bar{\text{p}}$ o. kleiner $\bar{\text{p}}$, bis 7 m (teste MAXIM.), junge Triebe grau zottenborstig, $\odot$ reichlich kahlend, glänzend rotbraun, Dorne fehlend o. $\pm \infty$, kräftig, purpurn, 1,5—3,5 cm; Kn. kugelig-eifg., $\pm$ o. ganz kahl; B. vgl. Fig. 437 a—b¹, an Lgtr. $\pm$ tief 3-lappig, hier wie bei meisten Arten Neb.***) viel üppiger, Textur dünn, aber B. infolge Beh. $\pm$ derb und raublich sich anführend, Grund hfg. $\pm$ breitkeilig o. fast gerade abgestutzt, ca. 7:5—9:6 cm an Kztr., Nerven-(Lappenpaare) ca. 5—6, Stiel beh., 1,5—3 cm; Blst. dicht doldentraubig, bis ca. 5 cm Dm., Bl. ca. 1,5 cm Dm., Gr. 3—5, Stb. 20, sonst wie Fig. 438 a—c, Fr. rot, zuletzt kahl.

C. M. (*Cr. sanguinea* var. *villosa* MAXIM., Prim. Flor. Amur. 101. 1859). — Gebiet der Schilka, des unteren Amur, des Ussuri, N.-Mandschurei. Laubwald-ränder, Gebüsch. — Blz. V(—VI). Frz. VIII(—IX). — Als *sanguinea* in Kultur. Von LANGE irrtümlich zu *altaiica* gezogen. Nach den reichen und guten Originalien wohl distinkte Art***). Von der in Beh. ähnlichen *C. jozana*, S. 774, vor allem in den fast endständigen Gr. der Carpelle unterschieden.

○○ Blst., Recept., K. und Fr. kahl o. mit spärll. Haaren, B. meist kahl o. nur spärll. beh. (exkl. die S. 774 erwähnte *C. jozana*).

* Fr. rot o. gelb, B. wie Fig. 437 c—i, n—o.

+ B.-Grund $\pm$ spitzkeilig, vgl. c—h, n—o.

— B. wie c—h, an Blzw. stets $\pm$ deutl. gelappt und meist nicht unter 5 cm lang o. jedenfalls $\pm$ beh., Frb.-Gipfel beh., Fr. rot o. gelb, 10 o. mehr mm lang bzw. dick.

5. *C. sanguinea*: $\bar{\text{p}}$ o. kleiner $\bar{\text{p}}$, bis 7 m etwa, junge Triebe locker zottig o. kahl, $\odot$ glänzend purpurn, stets kahl, Dorne vorh. o. fehlend, wie bei voriger Art, von dieser noch abweichend durch: B. variabel, zur Blz. nur ober. o. beiders. + locker borstig beh., Lappennerven 3—5—7, Grund zuw. breit, aber $\pm$ plötzlich in Stiel vorgezogen, im Mittel an Kztr. 6:5—5,5 bis 8:5—6,5 cm, an Loden zuw. recht stumpflappig, Stiel 1—2 cm; Blst. lockerer, kahl o. nur Achsen locker zottig, sonst vgl. Fig. 438 d—f, Fr. leuchtend blutrot, vgl. var.

Man kann festhalten: var. a. *genuina* MAXIM., Prim. Fl. Am. 101. 1859: B. beiders. o. nur ober. $\pm$ beh., auch zur Frz. kaum ganz kahlend. Bes. im westl. Heimatsgebiete, siehe unten. — var. b. *glabra* MAXIM., l. c.: B. stets so gut wie kahl (höchstens winzige Achselbärte unters. vorh.). Dies die *sanguinea* der Kultur. Lgtr.-B. wie Fig. 437 h, Kztr. wie e—g. Bes. im östlichen Heimatsgebiete. — var. c. *chlorocarpa* (*Crat. chlorocarpa* KOCH, Ind. Sem. Hort. Berol. 1855. 17, teste Auct; *Mesp. sang.* var. *chloroc.* KOCH, Dendr. I. 152. 1869; *Cr. sang.* var. *vanthocarpa* RGL., in Act. Hort. Petrop. I. 1871 ex p.): B. wie var. a., aber Fr. gelblich und rundlicher. Ist nicht mit der kahlblättrigen *altaiica* zu verwechseln. Noch zu beobachten. Heimat, wie es scheint, O.-Rußl. (Perm).

C. s. PALL., Fl. Ross. I. 1. 25. t. XI. 1784 (*Mespilus purpurea* POIR., in LAM. Encycl. Suppl. IV. 73. 1816; *M. sang.* SPACH, Hist. Veg. II. 62. 1834). Blutroter W. — Von der Wolga im östlichen mittleren Rußl (Kasan, Simbirsk,

*) Hierher wohl auch *C. tenuifolia* BAT., in Act. Hort. Petrop. XVIII. 435. 1901, aus Korea, deren Originale ich noch nicht sah. Ich hoffe im Hauptnachtrag darauf zurückkommen zu können. Gr. 3—4, Frb.-Gipfel kahl, B.-Grund meist $\pm$ herzförmig. Reife Fr. unbekannt. Da BRITTON schon 1900 eine *C. tenuifolia* beschrieben hat, muß BATLINS Art, wenn gut, neu benannt werden.

*) Auf die Neb. habe ich vorläufig absichtlich kein Gewicht gelegt, da mir ihre Form und Größe allzu abhängig von lokalen Einflüssen zu sein scheint.

***). Immerhin kann die typ. *sanguinea*, wie es scheint, ähnlich beh. B. haben, dann aber Blst. kahl. Oder sollte bei diesen ostasiatischen Formen eine kahlere *Maximowiczii* vorliegen?

Perm, Samara) durch Sib. bis Sachalin und Kamtschatka*). — Blz. V. Frz. VIII—IX. — Seit langem in Kultur.

?5×16 *C. sanguinea* × ?*nigra*: nach KOEHNE könnte dieser Kombination diejenige Gartenform entsprechen, die LANGE, in Fortegnelse ov. Landb. 77. 1871 [et Rev. 58. 1897], als *C. Lambertiana* beschreibt. Die mir vorliegenden Original-

Fig. 437. *Crataegus*: B.-Formen von Kztr.: a—b¹ *Maximowiczii*. — c—h *sanguinea*: c—d var. *genuina*, e—g var. *glabra*, h dgl. an Lgtr. — i *altaiica* (vgl. aber auch k l. — k m *dsungarica*. — n—o *dahurica*: o von Lgtr. — p—q *chlorosarca* (knapp $\frac{2}{3}$ n. Gr.) (Original).

Frzw. sind kaum sicher zu deuten. Nach ihnen und LGE. gebe ich die Merkmale der Form, wie folgt: h, aufrecht ausgebreitet gewunden verästelt. Zw. jung beh., ♂ purpurn, Dorne 1–2 cm, B. der Frzw. wie Fig. 441 s—t, dünn, doch fest, Lappenpaare 2–4, Obers. satt olivgrün, kahl o. Nerven beh., Unters. mäßig heller, durchaus locker weich beh., 3:3–5:5 cm [bei KOEHNES Herb. Dendr. No. 47 an

***). Die spontanen Formen noch unvollkommen bekannt. Ich konnte, trotzdem ich, dank des gutigen Entgegenkommens des Herrn Geheimrat FISCHER v. WALDHEIM, viel Material aus Petersburg erhielt, doch nicht feststellen, ob geographische Varietäten sich abgrenzen lassen. Gewisse Formen aus Dahurien, Altai, Transbaikalien sind anscheinend von *dahurica* sehr schwer zu scheiden. Siehe diese. Aus N.-China (Kansu) sah ich relativ kleine und breitblattrige Formen, die vielleicht eine neue Var. darstellen. Leider nur in Bl. vorliegend.

Lgtr. bis 8:7 cm], Stiel $\pm$ kahl, bis 1,3(—2,5) cm; Blst. wenigblütig, Stiele und Recept. beh., K. stumpfeilänglich, ca. $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, Recept., Stb. 16—20, Gr. 3—5, Fr. $\pm$ schwarzpurpurn, gelbpunktig, Fleisch weißlich, sonst vgl. Fig. 442 p—q, S. 779.

— B. an Kztr. wie Fig. 437 n—n¹, kaum gelappt o. zieml. fein und spitzlappig wie n², jedenfalls kaum über 4,5 cm. lang, stets so gut wie kahl, Fr. nur ca. 6—8 mm Dm., orangerot.

6. *C. dahurica*: von *sanguinea*, wie es scheint, noch abweichend durch: Zw. noch lebhafter schwarzbraun, Dorne bis 4 cm, dgl.; B.-Austrieb früher (sehr früh). Textur zuletzt derber, Unters. relativ heller, Lappen spitzlicher, mehr aufwärts gerichtet, an Kztr. meist nicht über 7:5 cm, Herbstfr. sehr schön; Bl. ca. 12 mm Dm., sonst vgl. Fig. 438 g—i.

C. d. KOEH. [in Herb. Dendrol., No. 389] (*C. purpurea* Bosc, in DC. Prodr. II. 628. 1825 et in LOUD., Arb. ed. 2. II. 822. 1844, vor allem wohl die var. *altaica* sec. fig. 583, p. 858). — S.O.-Sib. (Irkutsk, Transbaikalien, wohl bis Amurgebiet). — Blz. IV—V. — Frz. VIII. Frühest austreibende aller kult. *Crataegus*. In der zierlicheren, spitzerlappigen B.-Tracht, den kleineren Bl. und Fr. trotz aller Ähnlichkeit wohl gut von *sanguinea* geschieden.

++ B.-Grund $\pm$ breit abgestutzt, zuw. fast seicht herzförmig, vgl. Fig. 437 i, o. an k—l gemahnend, an Lgtr. unterster Lappen meist tief eingeschnitten o. $\pm$ fiederig, Fr. $\pm$ gelb[rot], Frb.-Gipfel kahl o. nur spärlich beh.

7. *C. altaica**): diese in der Kahlheit, den kleinen Bl. und auch in den Fr. an *dahurica* gemahnende Art weicht von allen *Sanguineae* gut ab durch: B. sehr breitoval, an Kztr. 5:4—9:8 cm, Lappenpaare 4—5, Lappen $\pm$ kurz und breit, an Lgtr. bis ca. 11:9 cm, Neb. zuw. auch an Kztr. sehr groß, Stiel 1,5—3,5 cm; Blst. reichblütig, ca. 8 cm Dm., Bl. ca. 10—12 mm Dm., Gr. meist 5, K. kurz, sonst vgl. Fig. 438 k—m.

Ich möchte als Varietät führen var. *incisa* (*Cr. sanguinea* var. *incisa* RGL., in Act. Petrop. I. 116. 1871), Formen mit tiefer, spitzer, oft fast fiederig gelappten B., die denen der *dsungarica* (vgl. S. 774) oft sehr nahe kommen, aber Fr. wie Typ und ebenso Steine. Im Gebiet der Art, wie es scheint, verbreitet und in den Typ $\pm$ übergehend.

C. a. LGE., Revis. 42. 1897, excl. Syn. ex p. et var. (*C. songorica* RGL., Delect. Sem. Hort. Petrop. 1876. 36 [nom. nud.]; *C. sanguinea* var. *songorica* RGL., in Herb.; *C. sang.* var. *chlorocarpa* KOEH., Herb. Dendr., No. 125; *C. Korolkowii* HORT. NONN.). — Beschreibung nach REGEL'Schen Expl. aus dem Alatau- und Tien-shan-Gebiet, um Kuldja, sowie südlicher bei Karategin. — 2—3000 m. — Blz. IV—V. — Frz. VIII—IX. — Wohl nicht häufig in Kultur.

☆☆ Fr. schwarz (o. schwarzrot), B. wie Fig. 437 k—m, p—q.

+ B. vgl. Fig. 437 p—q, Lappen kurz und ziemlich plötzlich fein zugespitzt, Gr. der Frb. tief seith. inseriert, vgl. Fig. 438 m, Steine deutl. furchig-riefig (o).

8. *C. chlorosarca*: dichtästig, pyramidalwüchsig, Höhe?; Triebe höchstens spärlich beh., ⊙ schwarzpurpurn, Dorne (?), ich sah nur kurze, derbe; B. zieml. dünn, Grund — breit abgestutzt, beiders. sehr locker beh., auf der sattgrünen Obers. wohl ganz kahrend, unten deutl. heller, 4,5:3,5 bis 9:8—9 cm an Kztr., Lappenpaare 4—5, Stiel 1—2 cm; Blst. mäßig reichbl., kaum spärlich beh., nur gezählter K. innen mit verstr. Härchen, Gr. 5, Stb. 20, sonst vgl. Fig. 438 n—o.

C. c. MAXIM., in Bull. Soc. Nat. Moscou LIV. I. 20. 1879. — Ich sah MAXIM.'s Orig., die aus mandschurischen Samen stammen sollen. Die einzigen spontanen, wie ich glaube hierher zu stellenden Expl., die ich kenne, stammen aus N.-Japan (Hako-

*) Sehr nahe steht dieser Art die *C. Wattiana* HEMSLE. et LACE, in Journ. Linn. Soc. XXVIII. 323. 1891, aus Brit. Balutschistan. Irgendwelche durchgreifende Unterschiede konnte ich an dem Original in Herb. Kew nicht finden und höchst wahrscheinlich muß der ältere Name *Wattiana* an Stelle von *altaica* treten, die aber vielleicht eine Var. bleiben kann.

tade), lg. MIYABE, Aotsuke 11. VII. 84 und FAURIE, No. 5564, Côte de Nemuro. Ob manche Expl. aus Kamtschatka hierher o. zu *sanguinea glabra* gehören, bleibt ungewiß. — Die *sanguinea* var. *Schroederi* RGL. (wo?) *C. Schroederi* KOEH. in SPÄTH Cat. No. 118 1905 06, p. 90, scheint nur eine ganz kahle Form o. überhaupt nur die typ. *chlorosarca* zu sein.

Im Bl.-Bau, wie im B.-Umriss schließt sich eng an *chlorosarca* an die mir nur in Bl. bekannte neue *C. jozana* aus Hakodate (lg. MIYABE, Sapporo und FAURIE, No. 7138, Joza): Zw. jung locker borstig, + schwärzpurpurn; B. an Kztr. bis 10:9 o. schmaler oval bis 11:6.5 cm, Lappenpaare (5—7), Lappung noch kürzer als bei *chlorosarca*, Beh. der B., ihrer Stiele (bis 2.5 cm), der Blst. und Bl. wie bei *Maximowiczii* (S. 771, Blst. ca. 6 cm Dm., Bl. vgl. *chlorosarca*, nur Recept — reichl. beh., dgl. der oft ganzrandige K. außen, aber nicht innen).

Fig. 438. *Crataegus*: a—c *Maximowiczii*: a Bl.-L.-Schn. und K., a' C., b Fr., c Stein von unten, seitlich und im Q.-Schn. (a Bauchkante). — d—f *sanguinea*, wie a—c — g—i *dahurica*: wie a—c — k—m *altaica*: wie a—c — n—o *chlorosarca*: wie a—c — p—q *dsungarica*: wie a—c (d—i nach KOEHNE, sonst Orig.)

++ B. vgl. Fig. 437 k—m, Lappen tiefer, kurzspitziger, Gr. mehr nach Spitze zu inseriert, vgl. Fig. 438 p—q, Stein nicht o. nur zuw. undeutl. gefurcht an Bauchseite.

9. *C. dsungarica*: b, Höhe? Triebe kahl, (5) Zw. glänzend purpurn, Dorne dgl., 1—2 cm, kräftig; B. der Kztr. aus keiligem Grunde + spitz, 3—5(—7)-lappig, Lappen wenig- und spitzzahnig, an Lgtr. Grund mehr breitkeilig bis fast gerade abgestutzt, unterstes Lappenpaar + fiederig, bis ca. 3:8 cm, Beh. auch jung beiderseits recht spärlich, später nur auf der wenig helleren Unters. + deutliche Bärte vorh. Textur dünn; Stiel 1—3 cm; Blst. bis ca. 9 cm Dm., + locker, Achsen und Bl. kahl (o. fast kahl), Bl. ca. 13—15 mm Dm., Gr. 3—5, Stb. 20, A. weißgelb; Fr. glänzend schwarz, rundlich, bis ca. 12 mm Dm., vgl. Fig. 438 p—q.

C. d. ZABEL, in LGE. Rev. 43. 1897. — Gartenform unbekannter Herkunft, die ich vorläufig als Art führe. Beschreibung nach ZABELS Originalen und schönem Material in Hb. KOEHNE. Erinnert sehr an *altaica* var. *incisa* (S. 773), auch an *C. Fischeri* (S. 789), und ist vielleicht als Hybride anzusehen. Ich reihe sie trotz der fast stets glatten Steine in die *Sanguineae* ein, da sie dieser Gruppe ganz außerordentlich nahesteht.

Sekt. 3. *Douglasianae* REHD., in VILM. Frut. Cat. prim. [1904] 1905 (*Melanocarpae* SARG., Silva XIII. 32. 1902 ex p., non ZBL.), siehe S. 768.

○ B. wie Fig. 440a—c, breit oboval, von Mitte ab meist $\perp$ deutl. gelappt, Bl. und Fr. vgl. Fig. 441a—e.

10. *C. Douglasii*: $\text{h} - \text{h}$, bis 13:0,5 m. — dicht rundkronig, Zw. wie ganze Pflze. kahl, ⊙ glänzend braunrot, Dorne dgl., 1,5—3 cm. kräftig; B. ziemlich dünn, oben glänzend sattgrün, unten hellgrün und in Nervenwinkeln spärlich beh., im Mittel 5:3—7:5 cm, an Lohden bis 12:8 cm, dann häufig tiefer gelappt, Stiel 1—2 cm; Blst. ca. 10—20-bl., Bl. ca. 1,6 cm Dm., K. $\frac{3}{4}$ bis so lang wie Recept., typisch wie Fig. 439b, aber gelegentlich wie e, Gr. 5, Stb. 10; Fr. länglichrund, schwarz, mit etwas Reif, Steine mit glattem Rücken (d).

Fig. 439. *Crataegus*: a—d *Douglasii*: a Bl.-L.-Schn., a' C., b K., c Fr., d Stein von unten, seitlich und Q.-Schn. (α Ventralkante). — e dgl. K. (vgl. Text oben). — f—h *rivularis*: wie a—d. — i—l *tomentosa*: wie a—d. — m—r *sacculenta*: wie a—d. — p—r *macracantha*: wie a—d (m, p nach KOEHNE, sonst Orig.).

C. D. LDB., in Bot. Reg. XXI, t. 1810. 1836 (*punctata* var. *brevispina* DOUGL., in HOOK. Fl. Bor. Am. I. 20. 1833; *sanguinea* var. *Dougl* TORR. et GR., Fl. N.-Am. I. 464. 1840; *sanguinea* NUTT., Silva II, t. 44. 1854 [teste SARG.; *Anthomeles Douglasii* ROEM., Mon. Syn. III. 110. 1847; *Mespilus sang.* var. *Dougl* WENZ., in Linnaea 1874. 131). — Von Brit.-Columb. bis Calif., östlich bis Wyoming und N. Michigan. — Ufergelände. — Blz. V. — Frz. VIII—IX (Fr. bald fallend). — Seit langem in Kultur.

○○ B. wie Fig. 440d—e, beidendig zugespitzt, ungelappt, Bl. und Fr. wie Fig. 439f—h.

11. *C. rivularis*: sonst von *Douglasii* im besonderen noch abweichend durch h , selten h , bis 6 m; B. im Mittel nicht über 6:3 cm, an Lgtr. bis 9:4 cm, dicklicher; Blst. eher kleiner, sonst vgl. Fig. 439f—h, Gr. 4—5, Fr. + kugelig, Steine auch auf Rücken tieffurchig.

C. r. NUTT., in TORR. et GR. Fl. N.-Am. I. 464. 1840 (*Mespilus riv.* WENZ., in Linnaea 1874. 137; *C. Douglasii* var. *riv.* SARG., Silva IV. 87, t. 176 1902). — Von Wyoming bis SW.-Color. und W.-Utah. — Ufer der Gebirgsflüsse, oft Dickichte bildend. — Blz. V. — Frz. IX. — In Kultur selten echt.

Sekt. 4. *Tomentosae* SARG., Silva XIII. 34. 1902 (siehe S. 768).

○ Fr. $\mp$ elliptisch (birnfg.), durchscheinend orange-(gelb-)rot, Stb. meist 20, A. rötlich, Gr. 2—5, B. $\sqsubset$ eirhombisch (Fig. 440f—g).

12. *C. tomentosa*: breit- und flachkroniger $\mathfrak{B}$, bis 6 m hoch, Zw. jung $\pm$ kurzfilzig, $\odot$ dunkelorangebraun, $\ominus$ grauschwarz, Borke $\mp$ glatt; Dorne selten, bis 4 cm lang; B. ober. sattgrün, $\mp$ zerstr. beh. bis kahl, unters. heller, bes. auf Nerven locker kurzzottig, kaum über 10:6—6,5 cm, Herbstf. scharlachorange, Stiel bis ca. 1,5 cm; Blst. $\pm$ locker filzig, 20- o. mehrbl., ca. 8—10 cm Dm., Bl. ca. 13 mm Dm., sonst vgl. Fig. 439i—l.

C. t. L., Sp. pl. 476. 1753, teste Herb. [et DUROI Harbk. Baumz. I. 183. 1771] (? *C. leucophloea* MICHX., Bäume Weiss. 31. t. 2. 1785; *Mespilus Calpodendron* EHRH., Beitr. II. 67. 1788; *C. pyrifolia* AIR., Hort. Kew. II. 168 [excl. Syn.]; *Mespilus latifolia* LAM., Encycl. IV. 444. 1797; *Mesp. pyrifolia* WILLD., Enum. 523.

1809; *M. leucophl.* K. KOCH, Dendr. I. 136. 1869). — Filz.-W.; Pear Haw. — Zentr.-N.-Am., nach SARGENT: New-York bis O.-Pennsylv., westl. bis C.-Mich., S.-Minn., Iowa, Miss., O.-Kans., südlich bis N.-Georg. und C.-Tennessee. — Blz. VI. — Frz. X. (Fr. lange bleibend). — In Kultur, wie es scheint, nicht hfg.

Sehr eng schließt sich an *C. Chapmani* ASHE (wo?): die eigentlich nur durch kleinere kugelige, ca. 8—10 mm dicke Fr. abweicht. Stb. 20 an den mir vorliegenden von SARG. bestimmten Expl., dgl. nach BEADEL, SARGENT gibt 1905 nur 10 an.

Fig. 440. *Crataegus*: B.-Formen von: a—c *Douglasii*. — d—e *rivularis*. — f—g *tomentosa*. — h—i *succulenta*. — k—l *macracantha*. — m—n *cordata*. — o—p *apiifolia* ($\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Orig.).

○○ Fr. kugelig, leuchtendrot, Gr. 2—3, Dorne $\pm \infty$.

* Stb. 15—20, A. rötlich, Recept. $\pm$ beh., K. von Fr. $\pm$ abgehoben.

13. *C. succulenta*: $\mathfrak{B}$ o. $\pm$ aufsteigend verästelter, breit unregelmäßig kroniger $\mathfrak{B}$, bis 6 m Höhe; Zw. kahl, $\odot$ glänzend orange- bis purpurbraun, Dorne bis 7 cm lang, Borke $\mp$ schuppig; sonst wie *tomentosa*, doch B. derber, Nerven ober. mehr eingeschnitten, an Kztr. im Mittel nicht über 7:5 cm (Fig. 440h—i); Blst. etwas spärlicher beh., sonst vgl. Fig. 439m—o, Fr. scharlach.

C. s. LINK, Hand. II. 78. 1831 (*Mespilus succ.* SWEET, Hort. Brit. 76. 1827; *C. rotundifolia* var. *succ.* DIPP., Laubh. III. 441. 1893). — Von S.-Ontario, New-York bis N.-Illinois [SARGENT]. — Frz. IX (Fr. bis X abfallend). — In Kultur nicht zu selten, hfg. als *C. Douglasii* bezeichnet.

✧ Stb. 10(8—12), A. gelb, Recept. meist kahler o. kahl, K. der Fr. $\pm$ angepreßt.

14. *C. macracantha*: von *C. succulenta* noch abweichend durch: meist niedriger, Verästelung breiter, Zw. glänzender, Dorne bis 14 cm; B. im Mittel größer (Fig. 440 k—l); Bl. vgl. Fig. 439 p—r, Fr. glänzend karminrot.

C. m. KOEH., Dendr. 236. 1893 [excl. Syn. et Patria ex p.] (*C. glandulosa* var. *macr.* LDL., in Bot. Reg. t. 1912. 1836; *C. macracantha* var. *minor* LORD., Arb. II. 819, Fig. 573. 1838 fide SARG.; *C. coccinea* var. *macr.* DUDLEY, in Bull. Corn. Univ. II. 33. 1886; *C. rotundifolia* var. *minor* DIPP., Laubh. III. 440. 1893). Von Montreal durch New-Engl. bis O.-Pennsylv. und N.-Ill. — Sonst wie *succulenta*. Hfg. in Kultur.

Sekt. 5. *Pentagynae* (*Melanocarpae* ZBL., im H. d. D. D. G. 178. 1903, non SARG. 1902) siehe S. 768.

○ B. wie Fig. 441 a—f, Lappenpaare 2—3, Frkn.-Gipfel beh., Fr. länglichoval, Vorhemd klein (vgl. Fig. 442 a—c).

Fig. 441. *Crataegus*: B.-Formen von: a—f *pentagyna*. — g—l *nigra*. — m—n $\times$ *platyphylla*. — o—p $\times$ *rubrinervis*. — q—r $\times$ *Celsiana*. — s—t $\times$ *Lambertiana*. — u—v $\times$ *sorbifolia*. — w—x $\times$ *hiemalis* (gut $\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Original).

15. *C. pentagyna*: b—h, bis ca. 4 m, Zw. jung beh., ○ grau o. graubraun, kahl o. fast kahl; Dorne kurz, ca. 1 cm; B. obers. $\pm$ locker beh., zuletzt sattgrün und fast kahl, unters. heller, reichlicher weich beh., an Kztr. ca. 2:2—5:3.5 cm, an Lgtr. 7—8:8—9 cm, Stiel 1.5—3 cm; Blst. locker, bis ca. 6 cm Dm., grau zottig, dgl. Recept. und K. (innen nur Spitze), Bl. ca. 13—15 mm Dm., Gr. 4—5, $\perp$ verbunden o. frei, Stb. 20, A. rot, Fr. schwarzrot (nicht deutl. rot) o. schwarz. Furchung der Steine zuw. fast null, vgl. Fig. 442 a—c.

C. p. WALDST. et KIT., in WILLD. Spec. pl. II. 2, 1006. 1800 (*C. melanocarpa* M. B., Fl. Taur.-Cauc. I. 386. 1808; *Mesp. mel.* BESS., Cat. Hort. Krzem. 88. 1814 fide Kew-Ind.; et POIR., in LAM. Encycl. Suppl. IV. 68. 1816); *Mesp. pentag.* SPRG., Syst. II. 507. 1825; *C. atrofusca* STEV., in HOH. Enum. Talysch 130. 1836 [nomen], sec. specim. orig.!!; *C. oxyacantha* var. *Oliveriana**) LDL., in Bot. Reg. XXIII, t.

*) *C. Oliveriana* BOSC. in DC. Prodr. II. 630. 1825, ist mir unklar. Die Angaben „glaberrima? . . . Rami fusco-atr“ sprechen gegen *pentagyna*. Ob etwa zu *heterophylla*, S. 779 zu stellen? *Mesp. Oliveriana* POIR., in LAM. Encycl. Suppl. IV. 72. 1816, wohl Synonym mit BOSCs Art.

1933. 1837) — Fünfgriffel-W. — I. G. nur C.- und SO.-Ungarn, sonst N.-Balkan (Serbien, aber wo noch?), SW.-Rußl. (Podolien); dann Krim, Kauk., Transkauk. und wohl bis N.-Pers. — Wälder, Gebüsch. — Blz. (V—VI). — Frz. IX—X. — In Kultur.

? 15 × ? *C. pentagyna* × ? : *C. Celsiana* Bosc, in Nouv. Cours. Agric. 223. 1821. [teste KOEH. et LGE.] non DIPP. (*Mesp. Cels.* DUM.-COURS., Bot. Cult. Suppl. 286. 1814 [fide SPACH]); Diese in ihrem Ursprung ganz unsichere, aber wohl hybride Gartenform zeigt nach KOEHNES Herb. Dendr. No. 48 und LANGE folgende Hauptmerkmale: hoher h h , Verästelung ausgebreitet, Zw. kaum beh., $\odot$ grau; Dorne 1—2 cm; B. wie Fig. 441 q—r, obers. sattgrün, bald ganz kahl, unters. etwas heller, auf Nerven — locker o. kaum beh., Lappen — fein gezähnt, (3—4 bis fast 5 Paar, 4:2,5—9:7 cm (an Lgtr.), Stiel bis 3,5 cm, B.-Basis an ihm — weit herablaufend; Blst. locker, ca. 8 cm Dm., Achsen verstr. beh., Recept. und K. — lockerzottig, K. lineal-lanzettl., drüsig gezähnt, fast — Recept., Stb. 20, A. violett, Gr. 2 (selten 3—4), Grund beh., Fr. glänzend rot, vgl. Fig. 442 g—i.

? 15 × 12 *C. pentagyna* × *crusgalli*: *C. hiemalis* LANGE, in Bot. Tidskr. XIII. 20, tab. 2. 1882. Diese Gartenform, deren Ursprung nach KOEHNE wie angegeben sein könnte, läßt sich wie folgt skizzieren (nach LGE. und KOEHNES Herb. Dendr. No. 42): h h , ausgebreitet verästelt, Zw. anfangs locker beh., $\odot$ kahlend o. kahl, rotbraun; Dorne 1,5—2,5 cm, B. derb, in Form wie Fig. 441 w—x, 5:2—8:6 cm, o. gelegentlich etwas kürzer und breiter, obers. glänzendgrün, bes. auf Rippe zottig beh., unters. deutl. heller, bes. auf Nerven beh. (nach LANGE sind die B. nur jung beh.), Lappenpaare 3—4; Stiel 2—3,5 cm; Blst. 7—8 cm Dm., lockerfilzig, Recept. und K. (außen) kahl, der eilanzettliche K. innen beh., ca. $\frac{1}{4}$ Recept., Stb. 15—16, A. rot, Gr. 4—5, Grund beh., Fr. violett o. schwarzrot, vgl. Fig. 442 k—m. — Als Form gilt var. *pubescens* DIPP., Laubh. III. 449. 1893. B. beiders. stärker beh., Fr. dunkelrotbraun.

Ferner führt LANGE, in Bot. Tidskr. XIX. 263. 1895 [et Rev. 77. 1897] eine var. *erythrocarpa* mit roten Fr., die aus Samen des Typs erzogen wurde und nach LANGE vielleicht *C. hiemalis* × *C. Fontanesiana* (siehe S. 796) darstellen könnte.

○○ B. wie Fig. 441 g—l. Lappenpaare 5(4—6). Frkn.-Gipfel kahl, Fr. rundlich, Vorhemd größer (Fig. 442 e—f¹).

16. *C. nigra*: von *pentagyna* noch abweichend durch: junge Triebe und B. (bes. unters.) stärker beh. bis fast weißfilzig, $\odot$ bis $\odot$ Zw. rotbraun bis purpurn, Dorne $\dagger$ reichlicher: B. 5:4—8:7 cm, Stiel im Mittel kürzer, bis 3 cm; Blst. und Bl. reicher beh., C. im Verblühen rosa, A. weiß o. gelblich, Gr. 5, Fr. glänzend schwarz, saftiger, sonst vgl. Fig. 442 d—f¹.

LANGES (Rev. 60. 1897) var. *obtusiloba* mit größeren, kahleren, länger gestielten, stumpflappigeren, weniger gezähnten B. ist mir fraglich.

C. n. WALD. et KIT., Plant. rar. Hung. I. tab. 61. 1862 (*Mesp. nigra* WILLD., Enum. 524. 1809; ? *C. melanocarpa* var. *polyphylla* LGE., Rev. 57. 1897). — Schwarzfrucht-W. — I. G. C.- und SO.-Ungarn, sonst Serbien (ob weiter verbr. im N.-Balkan?). — Wälder, Gebüsch, Flußauen. — Blz. V(—VI). — Frz. VIII—IX. — In Kultur. — Vgl. den Hinweis auf *C. Clarkei* S. 788.

? 16 × 19 *C. nigra* × *monogyna*: *C. platyphylla* [? LDL., in Bot. Reg. XXII t. 1874. 1836]. — Ich glaube ohne Originale ist LINDLEYS Pflanze nicht zu klären. Ich beschreibe nach KOEHNES Herb. Dendr. No. 127 [doch bildet LDL. die B. nur mit 3, etwas stumpferen, stumpfer gezähnten Lappenpaaren und die Fr. mit aufrechten K. ab! LINDLEYS Fig. erinnert stark an *rubrinervis* LGE. (siehe unten), er bildet auch die B.-Stiele rot ab. Vielleicht handelt es sich bei *platyphylla* LDL. und der abweichenden Pflanze KOEHNES, die ich hier beschreibe, sowie bei *rubrinervis* unten um drei verschiedene Formen ähnlichen Ursprungs!]. — Zw. nur jung spärlich beh., $\odot$ purpurn, kahl, Dorne?; B. wie Fig. 441 m—n, auf der dunkleren Obers. nur Nerven spärlich beh., unters. dgl., Lappenpaare 4—6, Form und Serratur *nigra* ähnlich, 4,5:4,5—8:7 cm, Stiel 1,3—2,3 cm; Blst. ca. 7 cm Dm., locker beh., Recept. und der ca. $\frac{1}{2}$ so lange 3-eckige K. kahl, Gr. 2—3 (ob mehr?), Grund beh., Stb. 20, A. gelb (?); Fr. schwarzrot, etwas hellpunktig, vgl. Fig. 442 n—o.

? 16 × ? *C. nigra* × ? : *C. rubrinervis* LGE., in Bot. Tidskr. XIII. 25. 1882. Die Orig. dieser Form im Herb. Darmst. [DIPPEL] zeigen B. wie Fig. 441 o—p, Textur zieml.

derb, Nerven ober- und unters. beh. (zur Blz.), Unters. kaum heller, 2,5:2 - 4,5:4 cm, Lappenpaare 2-4, Stiel bis 1,5 cm, locker beh., wie junge Triebe. • Zw. purpurn (Dorne nach LGE. kurz, wenige; Blst. ca. 4 cm Dm., locker beh., oberer Teil des Recept. und die kurzen breit-dreieckigen K kahl. Stb. 20. A. rosa, teste LGE!), Gr. 3-5, Fr. nach LGE. kugelig, glänzend schwarz, gelb gepunktet, K. zurückgeschlagen, Stein mit gefurchter Rücken-, glatter Bauchseite, Vorh. bis zu deren Mitte herabreichend. LANGE (Rev. 45. 1897) beschreibt als var. *aberrans* eine rotfrüchtige Form. Vgl. die Bemerkung oben bei *platyphylla*.

Fig. 442. *Crataegus*: a-c *pentagyna*: a Bl.-L.-Schn. und K., a' C., b Fr., c Stein seitlich und im Q.-Schn. (a Bauchkante). — d-f' *nigra*: d-e wie a-b, f Stein von unten, seitlich und rückwärts, f' im Q.-Schn. — g-i *Celsiana*: g Fr., h Stein seitlich und von unten, i im Q.-Schn. — k-m *hiemalis*: wie g-i — n-o *platyphylla*: wie g-h — p-q *Lambertiana*: wie g-i (g-o nach KOEHNE, sonst Orig.).

? 16×1 *C. nigra* × *pinnatifida*: Dieser Kombination könnte vielleicht *C. pectinata* Bosc, in DC. Prodr. II. 630. 1825 [tide KOEHNE!!] (*M. pect.* DUM.-COURS., Bot. Cult. ed. 2. V. 454. 1811) nach LANGE entsprechen. Diese Kulturform zeichnet sich nach KOEHNE'S Herb. Dendr. No. 126 aus durch: junge Triebe locker zottig-filzig, ☉ kahl, olivbraun; Dorne?; B. wie Fig. 446i-k, S. 784, jung beiders. sehr locker beh., später oben sattgrün, kahl o. fast so, unters. hellgrün, - bärtig, 4:4-9:8 cm, Stiel 1-2,3 cm; Blst. locker beh., in Bl. nur K. + gewimpert und innen beh., sowie Frb.-Gipfel beh., K. ca. 1/4 Recept., breit länglich-dreieckig, Stb. 20, A. gelb, Gr. meist 3, Fr. schwarzrot, rundoval, ca. 12-13:10-11 mm, Steine mit schmalem langen Vorh. und ± deutl. Ventralfurchen.

Sekt. 6. *Oxyacanthae* ZBL., im H. d. D. D. G. 175. 1903. Siehe S. 768.

○ B. wie in Fig. 443y-z, wie die Blst. kahl, Fr. relativ groß, Gr. 1, Frkn.-Gipfel kahl (vgl. Fig. 444a-c).

17. *C. heterophylla*: ☐ o. kleiner ☐, ausgebreitet, + überneigend verästelt, junge Triebe kahl, -- bereift, ☉ gelb- o. rotbraun, dann grau; Dorne? (nach LAVALLEE selten), B. dünn, aber fest, ober- glänzend olivgrün, unters. ± heller, an Lgtr. wie Fig. 443z, bis 7:6 cm, Stiele 0,5-1,8 cm; Blst. locker, ca. 10-15-bl., Bl. wohlriechend (?), ca. 2-2,3 cm Dm., K. z. T. gezähnt o. gewimpert, Stb. 20, A. rot, Fr. lebhaft rot (o. fast schwarzrot?), bis 18:14 mm, sonst vgl. Fig. 444a-c.

C. h. FLUEGGE, in Ann. Mus. d'Hist. Nat. Paris XII. 423, t. 38. 1868 (*Myop. het.* POIR., in LAM. Encycl. Suppl. IV. 68. 1816). — Wechselblatt-W. — Ich stelle hierher die recht gut mit des Autors Angaben stimmenden Expl. lg. SINTENIS, No. 465, Türk.-Armenien, lg. HAUSKNECHT, Charput, 1865 (letzte aber nur z. T.) — Blz. V-VI. — Frz. X. — Seit langem in Kultur, aber selten echt. Vielleicht *C. azarolus* nächstverwandt.

○○ B. wie Fig. 443a-x o. Fig. 445a-p, Fr. meist kleiner, o. sonst Frkn.-Gipfel beh.

✱✱ siehe
S. 785.

— Steine 1—2, mit — deutlichen Furchen auf der Bauchseite o. am Rande derselben (lateral).

— Gr. und Steine meist 2(—3), B. — breit-, kurz- und stumpflappig, Lappen — fein gezähnt, vgl. Fig. 443 a—g, Bl. etc. vgl. Fig. 444 d—e¹, Blst. und Bl. gewöhnlich ganz kahl, nur K. innen ± beh.

18. *C. oxyacantha*: b. bis 3—4 m, junge Triebe leicht beh. o. kahl, ☉ beh., oliv- o. rotbraun*), Dorne bis 2,5 cm; B. ober. glänzend olivgrün, nur jung spärlich auf Nerven zottig, unters. heller, ein wenig mehr beh., dann kahl, Textur fest, meist aus ganzrandigem, keiligem Grunde ver-

kehrt-eifg., gelegentlich an Kztr. bis 6:5 cm, Stiel 1—2 cm; Blst. ca. 8—12-bl., Bl. unangenehm riechend, ca. 13—15 mm Dm., weiß o. etwas rosa, Stb. 20, A. rot, K. meist nur 1/2 Recept., Fr. rundl.-eifg., bis 10 mm lang, rot, sonst vgl. Fig. 444 d—e¹.

Fig. 443. *Crataegus*: B.-Formen von: a—g *oxyacantha* — i—o *monogyna*: o f. *decussata* — p—q *insegnae* — r—t *polyacantha* — u—w *granatensis* — x—x² *panachaica* — y—z *heterophylla* (1/2 nat. Gr.) (Original).

Von dieser augenscheinlich viel weniger als *monogyna* variierenden Art seien als Formen erwähnt: var. a. *vulgaris* DC., Prodr. II. 628. 1825 (var. *genuina* ROUY et CAM., Fl. de France VII. 4. 1901): B. deutl. 3—5-lappig, die gewöhnliche Form. Hierher eine Anzahl z. T. allerdings zweifelhafter Gartenformen, von denen ich als ziemlich sicher nenne: f. *auriculata* (var. *aur.* MÉRAT, ex LGE. Rev. 71. 1897 [et in DIPP. Laubh. III. 457. 1893]): Neb. stark ausgebildet, bleibend, B. ca. 5—6:4—4,5 cm, Fr. etwas größer; f. *macrocarpa* ROUY et CAM., l. c. 5 (*C. macroc.* HEGETSCH., Fl. Schweiz. 464. 1840; ox. var. *macrocarpa* LE GR., Stat. bot. Forez 119. 182. [fide ROUY et C.]): Fr. ca. 10—12:7—8 mm; f. *rubra*: Bl. tiefrot mit weißlicher Mitte; f. *splendens*: Bl. rot gefüllt (PAULS new double scarlet HORT.); f. *vernica* (var. *vernica* LGE., Rev. 71. 1897), ähnlich *auriculata*, B. aber — breit dreilappig, eher breiter als lang; f. *Gireoudi* SPÄTH: Austrieb auf weiß marmoriertem Grunde mit zartem Rosa getönt, Färbung lange anhaltend; noch zu beobachten; f. *aurea* (*C. oxyac.* var. *aurea* LOUD. Arb. II. 831. 1844, *Oxyacantha vulgaris* var. *xanthocarpa* ROEM., Syn. Mon. III. 110. 1847; *C. ox.* var. *xanth.* LGE., Rev. 71. 1897): Fr. gelb. — var. b. *integrifolia* WALLR., Sched. Crit. 219. 1822 (*Mespilus laevigata* LAM., Encycl. IV. 439. 1797; *Cr. oxyacanthoides* THUILL., Fl. envir. Paris ed. 2. 245. 1799; *C. ox.* var. *obtusata* DC., Prodr. II. 628. 1825; *C. laevigata* DC., l. c. 630; *C. ox.* var. *oxyacanthoides* RCHB., Fl. germ. excurs. 628. 1832; *C. ox.* var. *obtusiloba* SCHUR, Enum. pl. Trans. 295. 1866; *C. ox.* var. *laevigata* BECK, Fl. Nied.-Österr. 706. 1890; *C. ox.* var. *microphylla* LGE., Rev. 71. 1897): B. zieml. klein, ungelappt o. nur — leicht 3-lappig. Seltener als a, hie und da auftretend.

*) Vgl. meine Dendrol. Winterstudien, Fig. 174 h—r, S. 171 und S. 182.

C. o. L., Sp. pl. 477. 1753 [sensu JACQ., Fl. Austr. III. 50, t. 292, fig. 2. 1775] (*Mesp. oxyac.* ALL., Fl. Pedem. II. 241. 1785). — Zweigriffel-W. — I. G. verbreitet, aber meist seltener als *monogyna*, im übrigen bleibt die Abgrenzung des Gebiets unsicher; ob die echte *oxyacantha* in As. überhaupt vorkommt, ist mir sehr zweifelhaft. — Gebüsch, Waldränder, im Gebirge bis ca. 1000 m. — Blz. IV—V (—VI). — Frz. IX—X. — Viele Kulturformen gehören zu *monogyna* oder dem Bastard *media* (unten).

Recht nahe zu stehen scheint der *oxyacantha* die *C. polyacantha**) JAN., Elench. Hort. Parm. 8. 1826 (*Mesp. pol.* GRUSS., Prodr. Suppl. 154. 1832; *C. oxyacantha* var. *triloba* FIORI e PAOL., Fl. ital. I. 1. 596. 1896) aus Calabr. und Sicil., die nach Expl. von TODARO (Sicil., Val Demone) und HUT., PORTA et RIGO, No. 117 (Calabr.) wie folgt abweicht: junge Triebe, Blst., Recept. und B.-Stiele $\pm$ locker filzig, Dorne $\sim \infty$, kurz, spitz, ca. 1 cm; B. klein (Fig. 443r t), an Kztr. kaum über 3:3 cm, ober. $\perp$ verstr., unters. bes. auf Nerven locker borstig beh., 3-5-lappig, Lappen z. T. etwas spitzlich, Stiele 5—13 mm; Bl. 1,5—2 cm Dm., Gr. meist 2, Stb. 20, K. ca. so lang wie Recept., zuw. breiter als in Fig. 444f, Fr. tiefrot, Steine 1—2, vgl. g—g¹. Ob die *polyacantha* HORT., et LGE., Rev. 48, t. VI die echte südliche Art darstellt, bleibt mir fraglich.

18 $\times$ 19 *C. oxyacantha* $\times$ *monogyna*: Diese Hybride scheint im Gebiet der Eltern vielfach aufzutreten, es dürften auch Gartenformen beider hierher zu stellen sein. Man kann vielleicht drei Hauptformen festhalten: *C. media* BECHST., Diana I. 88. 1795 [sensu BECK₁; B. wie *oxyacantha*, doch die 3 Lappen spitz o. zugespitzt, reichlich sägekerbig, Gr. 2—1, Blst. und Bl. $\pm$ kahl, Fr. fast rundlich. — *C. ovalis* KRR., in Linnaea XXXII. 586. 1863 (*C. intermedia* SCHUR, En. pl. Trans. 205. 1866, non FUSS**). In allem mehr die Mitte zwischen den Eltern haltend. — *C. intermixta* BECK, Fl. Nied.-Österr. 706. 1890 (*Mesp. ox.* var. *interm.* WENZ., in Linnaea 1874. 163): B. etc. der *monogyna* ähnlicher, Gr. aber 2(—3).

++ Gr. und Steine meist 1, o. jedenfalls B. tiefer o. spitzer gelappt o. fiederteilig.

Δ Gr. und Steine meist 1, K. ca. $\frac{3}{4}$ so lang wie Recept., spitzer o. stumpfer, Fr. rundlich (Fig. 444h—l¹). B. vgl. Fig. 443i—o.

$\Delta\Delta$ siehe S. 785.

19. *C. monogyna*: äußerst variable Art, b o. $\bar{b}$, bis 10 m; von *oxyacantha* noch abweichend durch (vgl. auch var. !): B. 3—7-lappig, Lappen spitz o. zugespitzt, $\pm$ ganzrandig o. spitzzahnig; Bl. weiß, K. länglicher, vgl. Fig. 444h—l¹.

Ich hebe als Varietäten vorläufig folgende hervor, man beachte aber das im Anschluß an *monogyna* über die nächststehenden Arten Gesagte: var. a *typica* BECK, Fl. Nied.-Östr. 706. 1890. Blst. und Recept. kahl, B. ebenfalls kahl o. ganz kahrend; hierher oder zu b. die Gartenformen, welche hinter var. f. aufgezählt sind. — var. b. *lanigera* BECK, in Ann. Hofmus. Wien. II. 96. 1887 (*C. kyrt-styla* FINGERHUTH, in Linnaea IV. 372. 1829; *C. hirsuta* SCHUR, En. pl. Trans. 206. 1866; *C. mon.* var. *kyrtostyla* BECK, Fl. l. c.): Blst. und bes. Recept. $\pm$ zottenborstig, dgl. junge Zw. $\perp$ und B. reichlicher beh., besonders im S. und SÖ. des Gebietes. — var. c. *ferox* (*C. oxyac.* var. *ferox* CARR., in Rev. Hort. 1859. 348; *C. ox.* var. *horrida* CARR., in Fl. des Serr. XIV. 201, t. 1468. 1861; *C. mon.* var. *horrida* REHD., in BAILL., Encycl. Am. Hort. I. 396. 1900): Dorne zu mehreren gebuschelt; sehr auffällige Form. — var. d. *flexuosa* LOUD., Arb. III. 835. 1844: Kulturform, deren Zw. $\perp$ stark gewunden sind. — var. e. *pendula* LOUD., l. c. 832: Wuchs stark hängend. — var. f. *stricta* LOUD., l. c.: Wuchs steil pyramidal; bei der var. *fastigiata* DIPPEL, Laubh. III. 459. 1893, soll der Wuchs weniger ausgesprochen pyramidal sein.

Ferner zu nennen als Gartenformen: f. *albo-plena* [REHD., l. c., als var. $\perp$; Bl. weiß gefüllt (Fl. Serr. XV. t. 1509, fig. 2, wenn nicht *mediae* formae); f. *punicea*

*) Ob *C. tribola* PERS., Syn. II. 37. 1807 (*Mesp. tril.* POIR., Voy. en Barb. II. 177. 1789 [et in LAM. Encycl. IV. 439. 1797] aus N.-Afrika mit *polyacantha* identisch, bleibt mir noch etwas fraglich. Ist aber fast anzunehmen.

**) Die *intermedia* FUSS, Fl. Transsylv. excurs. 211. 1866, kann ich nur für kahle *monogyna* halten!

Ich bespreche nur eine Anzahl der *monogyna* sehr nahe stehende Arten, die z. T. vielleicht nur Varietäten davon sind. Es wurden noch mehr beschrieben (z. B. von GANDOGGER!), doch liegt es ganz außerhalb des Rahmens meiner Arbeit, allen diesen Formen nachzuspüren, die sich sehr schwer klären lassen und bisher noch niemals im Zusammenhange behandelt wurden. Ohne Originale ist nichts zu erreichen! Je mehr man sich hinein vertieft, desto deutlicher sieht man, daß die *Oxyacanthae* genau so variabel wie die amerikanischen Arten sind. Die Nomenklatur ist die denkbar verworrenste, denn auch Spezialisten wie LANGE haben sich keineswegs bemüht, da Klarheit zu schaffen. Ganz im Gegenteil!

Kaum von *monogyna* var. *lanigera* zu scheiden ist *C. azarella* GRISB., Spicil. Fl. rum. I. 88. 1843 (*C. laciniata* STEV., apud BESS. Enum. 58. 1822, non UCRIA), die eine etwas zierlichere südlichere Form darstellt, deren B.-Lappen $\pm$ ganzrandig

Fig. 445. *Crataegus*: B.-Formen von: a—d *ambigua* — e—h dgl. var. *Hohenackeri* — i—l *microphylla* — m—n dgl. var. *pinnatiloba* — o—p? *lasiocarpa* (vgl. Text unten) (ca. $\frac{3}{4}$ n. Gr.) (Orig.).

sind. Noch zierlicher, auch in Bl. und Fr. kleiner, ist *C. insignae* BERTOL., Fl. ital. VII. 629. 1847 (*Mespilus insignae* TIN., in Guss. Fl. Sic. Syn. II. 2. 830. 1844), eine südeuropäische Form, deren B. nach sizil. Expl. in Fig. 443 p—q dargestellt sind, Gr. 1—3?. Sie tritt auch in Spanien auf (z. B. lg. PORT. HUT. et RIGO, No. 355*). Diese beiden Formen mit beh. Blst. und Recept., deren Zusammenhänge untereinander und mit *monogyna* noch zu untersuchen — vielleicht lassen sie sich als geogr. Var. (*azarella*?) für SO.- und SM.-Eur., *insignae* für südlichstes S.-, bez. SW.-Eur.) aufrecht halten — sind nicht zu verwechseln mit der stärker beh. *C. panachaica* (*C. monogyna* var. *hirsutior* HAL., Conspect. Fl. Graec. I. 547. 1901. et AUCT. AL., nec. BOISS.), zu der ich die Expl. lg. HALACSY 1893, Achaia, Mt. Panachaicon, lg. BALDACCI, Albanien, No. 190 et 206, ders. aus Montenegro, Volubitza?, VI. 1880 und VII. 1880, sowie lg. SZYSZYLOWICZ, Montenegro, Medun, ziehe. Diese Art (?) hat locker zottig beh. junge Triebe, (rotbraun, kahl o. fast so, Dorne ∞ , fein, spitz, 10–20 mm; B. wie Fig. 443 x—x², o. $\pm$ feiner fiederig, anfangs beiders. reichl. kurzborstig, später auf der olivgrünen Obers. stärker

* Dies Expl. soll nach WILLK. die LANGESche *C. lasiocarpa*, in Vid. Meddel. 1881. 103, sein. Jedoch ist die Beh., bes. der Fr., viel schwächer, als WILLK., in Suppl. Fl. Hisp. 221. 1893, angibt. Sollte dagegen die *lasiocarpa* mit dem Expl. derselben Sammler, No. 562 von 1891 (Sierra Nevada, circa Cortijo de S. Geronimo) identisch sein, so dürfte sie eine der *panachaica* sehr analoge Form darstellen, deren B. aber (Fig. 445 o—p) sind und deren Fr. (unten!) auch größer zu werden scheinen, die Frst. sind länger, lockerer, Blst.?, anscheinend reichblutiger, Kztr. verdornend, außerdem nackte Dorne. Warum WILLK., l. c., eigentlich vorgeschlagen hat, diese Formen inkl. der von mir nicht gesehenen No. 172 PORTAS et RIGOS) *C. Boissieri* zu nennen, bleibt mir unklar.

Die *monogyna* var. *coriacea* PODP., in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 1902. 649, aus Ostrumelien bei Seimen, scheint mir mit *azarella* s. str. identisch. Indes sind die Angaben des Autors recht nichtssagend und vag.

kahlend, als auf der blaugrauen Unters., Lappen 3—5—7, Größe kaum über 2,5:2,5 cm, Blst. ca. 5-bl., dicht fein grauzottig, nur K. innen kahlend, Bl. ca. 1 cm Dm., gelblichweiß, Stb. 20, Gr. 1, Grund beh., Fr. bis 2 cm lang gestielt, eirundlich, ca. 8:6 mm, jung $\pm$ beh. Sonst wie *monogyna*. Die Expl. lg. LEONIS, Insel Jura (Sporaden) stellen vielleicht bes. Form dar.

Für eine gute Art möchte ich *C. granatensis* BOISS., Flenchus 41. 1838 [et Voyage, t. 61. 1839 45] aus der spanischen Sierra Nevada, die einen kleinen $\mathfrak{H}$ bildet und durch die in Fig. 443 u -w dargestellten langkeiligen 3 (bis $\pm$ 5)-lappigen B.

der Kztr. sich auszeichnet, die ober. verstr., auf der helleren Unters. ein wenig mehr locker beh. sind, $\odot$ Zw. kahl, Kztr. verdornend, Blst. wenigblütig, locker, Bl. etwas kleiner als bei *monogyna*, K. eher länger, z. T. gezähnt, innen $\pm$ beh., sonst Blst. und Bl. kahl o. kaum beh., Fr. wie Fig. 444 m o. eher größer, meist lang (bis 4 cm) gestielt, Stein wie n. Ich stelle hierher: lg. BOISSIER, Sierra Nevada VII et VIII. 1837 [Originale!], ferner: BOURGEAU, No. 1158. Sehr nahe stehen und sind wohl hier einzureihen (doch Beh. z. T. an Blst. und Recept. reichlicher, K. breiter, kürzer, Blst. mehrblütig) HUT., PORT. et RIGO, No. 354, HACKEL 29. VI. 1876 in valle Fl. Jenil [ex p., da mit *lasiocarpa* vermengt], GANDOGGER VI, 1898 Serroña de Cuenca [sub nom.

Fig. 446. *Crataegus*: B.-Formen von: a—c *brevispina*, d—f dgl. (vgl. Text unten) — g—h *ambigua* (kult. Expl. vgl. Text S. 785) — i—k $\times$ *pectinata* — l—n *orthosepala* (ca. $\frac{2}{3}$ n. Gr.) (Orig.).

C. villosa CARIOT; vielleicht nur typ. *monogyna*!]; REVERCHON, No. 66 annis 1889 et 1887 [sub nom. *C. brevispina*].

Etwas zweifelhaft bleibt mir die Umschreibung der *C. brevispina* KUNZE, in Flora 1846 737 [et WILLK., Illustr. Fl. Hisp. I, t. 47, 1881 85] aus S.-Span., deren Typ nach WILLKOMM No. 592, S. de Palma (Orig. KUNZE!) und No. 520 (Chiva) durch Kztr.-B. wie Fig. 446 a—c ausgezeichnet ist, kleine rundliche Fr. wie Fig. 444 p—p' auf kurzen 1—1,5 cm langen Stielchen trägt. Blst. kahl, ca. 6—10-bl., Bl. wie Fig. 444 o—o'. Nun sagt WILLK. bald kleiner b, bald bis 7 m hoher $\mathfrak{H}$, so besonders auf den Balearen. Die Expl. PORTAS et RIGOS vom April und Juni 1885, die mir vorliegen, zeigen aber an den Kztr. B. wie Fig. 446 d—e und an den Igtr. sehr abweichende wie f, die stark an *polyacantha* (S. 781) gemahnen. Ich glaube nun, daß die südspanische *brevispina* eine gute lokale Art darstellt, dagegen die Balearenform mehr der *granatensis* sich anschließt, da nach BOISSIER'S Tafel die Igtr.-B. dort ähnlich abweichen; muß mich aber mit diesen Hinweisen hier begnügen.

— Gr. und Steine meist 2. K. so lang o. eher länger als Recept., Fr. länglich (Fig. 447 a—f). B. wie Fig. 445 a—d.

20. *C. ambigua*: $\bar{\text{p}}$ (Höhe?), junge Triebe $\pm$ locker beh., $\odot$ kahl, $\pm$ purpurn, Dorne kurz, 1 cm (ob immer?); B. an Kztr. vgl. Fig. 445 a—d, meist ziemlich schmal 4—7-lappig, Lappen $\pm$ spitzzähnig, beiders. verstr. locker beh., z. T. fast kahle, unten wenig heller, 2:1,5—5,5:5 cm, Stiel 1—3 cm; Blst. locker, ca. 12—18-bl., sehr locker beh., Bl-Achsen und K. hfg. ganz kahl, Bl. ca. 1,5 cm Dm., Stb. 20, A. rot, $\pm$ gepunktet, vgl. Fig. 447 a—c.

C. a. C. A. MEY., Ind. sem. Hort Petrop. 1858 [et BECKER, in Bull. Soc. nat. Mosc. 1858, pt. 1. 12 et 34, nur kurze Bemerkungen!] (*C. laciniata* AUCT. PLUR., nec Stev. vel UCRAL. — SO.-Rußland (Land der Donschen Kosaken, CALLIERS No. 48 von Simferopol gehört wohl auch hierher. Blz. V. Vgl. unten!

Dies die typische *ambigua* nach Expl. BECKERS, No. 172 und aus Sarepta. — An sie schließen sich anscheinend eng an gewisse behaarte Formen, die als *pectinata* gehen. Da nun nach KOEHNE (vgl. S. 779) die *pectinata* Bosc eine hybride Kulturform ist (die kurze Dcsche Diagnose mit Angabe „Persia“ könnte auch auf die vorliegenden Formen passen!), so kann der Name *pectinata* HOHENACKER, in LEDEB. Fl. Ross. II. 1. 91. 1844 [in HOB. Enum. 130. 1838, nomen nudum] nicht bleiben, zumal auch LEDEB. nur Dcs Angaben reproduziert. Ich nenne diese Form der *ambigua* var. *Hohenackeri* und stelle hierher die Expl.: lg HOHENACKER 1836 Swant Georg. Cauc. [sub nom. *C. azarolus* var. distr.]; ders. 1838 prope Helendorf; ders. in frut. vallis fl. Gandscha [sub *C. heterophylla* distrib.]; ders. No. 3571, Karabagh; ferner lg. BÜHSE 1847 N.-Pers. Auch CALLIERS No. 47 von Simferopol dürfte hierher gehören, sowie SINTENIS No. 2143, Transkasp. (Karakala). Alle diese Expl. weichen von *ambigua* ab durch: Zw. und B. (auch zur Frz.) reichlicher zottig (bes. unten), Blst. locker filzig-zottig, bes. Recept., sonst vgl. Fig. 447 d—f und B. in Fig. 445 e—h. — Die Expl. der Kultur, die als *ambigua* o. als *ambigua* var. *pectinata* LGE., Rev. 16. 1897, gehen, halten zwischen *ambigua* und var. *Hohenackeri* etwas die Mitte*).

☆☆ Steine rundlich, ohne irgendwelche deutl. Furchen, Gr. 1(=2), vgl. Fig. 447 g—i, B. vgl. Fig. 445 i—l, S. 783.

21. *C. microphylla*: fein verzweigter $\bar{\text{p}}$, Triebe nur ganz jung beh., $\odot$ $\pm$ purpurn, Dorne fein, 10—15 mm; B. sehr zierlich, dünn, jung beiders. auf Nerven locker beh., später meist kahl, unten wenig heller, $\pm$ tief, aber relativ breit 3—5-lappig, 1,5:1—3:2,5 o. an Lgtr. bis 4,5:4 cm, Stiele 0,2—1,8 cm; Blst. 2—5-bl., kahl, höchstens Recept. spärlich beh., Bl. und Fr. mit langen dünnen Stielen, ca. 2—2,5 cm, Bl. ca. 13 mm Dm., Stb. 20, A. 3, Fr. relativ groß, tiefrot, vgl. Fig. 447 g—i.

Fig. 447. *Crataegus*: a—c *ambigua*: a Bl.-L.-Schn. und K., a' C., b Fr., c Stein von Bauchseite und im Q.-Schn. (a Bauchseite) — d—f dgl. var. *Hohenackeri*: wie a—c — g—i *microphylla*: wie a—c (Orig.)

Die *C. pinnatloba* LGE., in Bot. Tidskrift XIII. 22, t. III. 1882 (et Rev. 36, t. IV. 1897), deren S. von RADDE im Kauk. gesammelt sein sollen, ist vielleicht

*) Allein LANGES (von ihm mit dem Autor C. A. MEYER [wo?]) zit. Varietätsname scheint mir nicht für *Hohenackeri* in meinem Sinne annehmbar, da LGEs Beschreibung auf die typ. *Hohenackeri* nicht recht paßt, sondern mehr auf gewisse Formen der typ. *ambigua*.

ganz identisch, vielleicht als var. der *microphylla* anzusehen. B. vgl. Fig. 445m—n, etwas größer und in den zieml. breiten stumpfen Lappen an *oxyacantha* gemahnend. Doch Steine anscheinend ganz furchenlos. Ob man an *oxyacantha* × *microphylla* denken könnte? Die fast kugeligen Fr. messen ca. 12—13 : 11—12 mm!

C. m. K. KOCH, Die Weißdorn.- etc. 68, No. 53. 1854 (*C. lagenaria* FISCH. et MEY., in HOH. Enum. pl. Talysch 131. 1838, nomen nudum [et BOISS. Fl. or. II. 664. 1872]). — Kauk. bis N.-Pers., aber auch Paphlagonien (SINTENIS' No. 5029). Blz. V — Frz. Herbst. — Reizende, etwas an *apifolia* gemahnende Art, die ich trotz der ungefurchten Steine für den *Oxyacanthae* nächstverwandt halten möchte. Ob auf die Furchung bei einsteinigen Arten allzu hohes Gewicht zu legen ist, bleibt fraglich.

Eine sehr nahestehende Form aus dem Pontusgebiet (lg. BORNMÜLLER, No. 1764 et 1765) ist als *C. orthosepala* HSKN. et BORNM. bezeichnet. Sie liegt nur in unreifen, + beh. Fr. vor, die ca. 10 : 5 mm messen. Die B. sind größer als bei *microphylla*, selbst an Kztr. bis 5,5 : 5 cm (vgl. Fig. 446l—m), an Lgtr. wie n. Vielleicht gute Art (o. var. der *microphylla*).

Sekt. 7. *Orientales* ZBL., im H. d. D. D. G. 179. 1903. Siehe S. 768.

○ ○ siehe S. 788. ○ B. wie in Fig. 448, meist beiders. + reichl. beh., Gr. und Steine 5—3, wenn 2, so jedenfalls B. fein fiederig und reich beh.

+ B.-Lappen fein und reich drüsig gezähnel (Fig. 448a—c), Bl. vgl. Fig. 449a—d, Fr. gelb o. gelbrot.

22. *C. tanacetifolia*: h o. kleiner aufrecht verästelter h, Kztr. ± verdornend, junge Triebe dicht grauzottig, die rotbraunen ⊙ ± kahl; B. zieml. derb zuletzt,

Fig. 448. *Crataegus*: B.-Formen von: a—c *tanacetifolia* — d—k *orientalis* — l—m dgl. var. *flabellata* — n—o *pynoloba* — p—s *laciniata* — t—v *Heldreichii* — w—y *orientalis* var. *Tournefortii* (reichlich 1/2 n. Gr.) (Orig.).

obers. glänzend tiefgrün, + locker beh., unters. hellgraugelb, reichlicher zottig und gewimpert, an Lgtr. bis ca. 5 : 5 cm. Stiele 3—8 mm; Blst. dicht 4—8-bl., borstig-filzig, Bl. ca. 2 cm Dm., Stiel kurz, Gr. 5, Stb. 20, A. rot, Fr. ± beh., bis ca. 2 cm Dm., K. ± aufrecht, sonst vgl. Fig. 449a—d.

C. t. PERS., Syn. II. 38. 1807 (*Mesp. tan.* LAM., Encycl. IV. 440. 1797). Raintarn-W. — Ich sah Expl. *) aus Paphlagonien (SINTENIS 4465^b) und dem Pontusgebiet BORNMÜLLER 2711 et 1023^b) — subalpin und alpin. — Blz. VI—VII. — Frz. IX—X. — In Kultur, doch selten echt.

22 × 23 *C. tanacetifolia* × *orientalis*: *C. Bornmülleri* ZBL., in H. d. D. D. G. 179. 1903. So deutete HAUSSKNECHT die Expl. lg. SINTENIS, No. 5230 aus Paphlagonien. Soll auch in Kultur entstanden sein (ZABEL).

22 × 26 *tanacetifolia* × *azarolus*. So deutete HAUSSKNECHT die Expl. lg. SINTENIS' No. 5027 aus Paphlagonien. Ob mit Recht?

? 22 × 40 *C. tanacetifolia* × *punctata*. dieser Kombination könnte vielleicht (aber vorläufig??) die *C. Dippeliana* LGE., in Bot. Tidskr. XIX. 261. 1894/95 (*C. Celsiana* DIPP., Laubh. III. 452. 1893, non BOSCH.) entsprechen. b—h, junge Zw. filzig, + purpurbraun, kahlend, Dorne 1—1,75 cm; B. vgl. Fig. 457 n, S. 797, derb, obers. sattolivgrün, + locker verstr. beh., unters. hellgraugrün, + locker filzig, bis ca. 6:6 cm; Blst. dichtbl., graufilzig, Bl. ca. 2 cm Dm., K. spitzlancettlich, ganzrandig, etwa so lang wie das beh. Recept., Stb. 20, A. rot, Gr. 5, Fr. zieml. groß, braunrot, Steine seidl. ungefurcht.

* * B.-Lappen ± spitz-, nicht reich drüsig gezähnelte o. ± ganzrandig, wenn Lappen ± stumpf, so B. wie Fig. 448 t—v¹.

+ B.-Lappen bzw. -fiedern ± spitz, vgl. Fig. 448 d—s und w—y.

— Beh. grau- o. gelbgrauzottig, nicht schimmernd weißseidig. B. wie Fig. 448 d—m, p—s und w—y.

23. *C. orientalis*: b h. Wuchs breiter, Zw.-Enden z. T. überneigend, sonst von *tanacetifolia* noch abweichend durch: B. obers. trüber grün, unters., wenn wenig reich beh., oft kaum heller (vgl. var.), bis ca. 5:4—5 cm, an Lgtr. oft zieml. kurz und breit gelappt, Stiel bis 12 mm; Blst. bis 10-bl., eher dichter weißfilzig, Bl. nur ca. 1,5 cm Dm., Fr. rot, K. zurückgeschlagen, vgl. Fig. 449 e—g und h—k.

Ich halte fest: var. a. *typica*: ± baumartig, B. im Umriß meist deutlich länger

Fig. 449. *Crataegus*: a—d *tanacetifolia*: a Bl.-L.-Schn., a¹ C., b K., c Trgb., d Fr. — e—g *orientalis*: e—e¹ wie a—a¹, f Fr., g Stein — h—k *orientalis* var. *Tournefortii*: h—i wie c—f, k Stein von Bauchseite und im Q.-Schn. (a Bauchseite) — l—l¹ *pycnoloba*: wie a—a¹ (e—g n. KOEHNE, sonst Orig.).

als breit, Gr. und Steine 4—5. Macedonien, Thessal., Griechenl., Kl.-As. bis Transk., Kauk. wohl bis Krim — var. b. *Tournefortii* (*C. Tourn.* GRISEB., Spic. Fl. Rum. I. 90. 1843) wie a, doch reichlicher kahlend, B. wie Fig. 448 w—y, Gr. 2—4(3), vgl.

*) Die von BOISSIER, Fl. or. II. 660. 1872, für diese Art zitierten gehören nicht hierher, sondern stellen eine *azarolus*-Form dar.

LINDLEY, Bot. Reg. t. 1852. 1836, kommt, wie es scheint, in Albanien (z. B. vielleicht BALDACCIS No. 47 et 117), Macedonien, (Herb. maced. No. 124) (ob auch Kl.-As.?) vor. — var. *c. flabellata* BOISS., Fl. or. II. 661. 1872 (*C. flabellata* HELDREICH, in Exsicc.) stärker beh., dichter kürzästige h-Form mit kleineren breiteren B. (Fig. 448l—m), die in Tracht an *laciniata* und *pyncnoloba* gemahnt, aber von erster durch die 5 Gr. und Steine und von letzter in der nicht seidigen Beh. gut geschieden ist. Tritt in Griechenland, doch auch sonst im Gebiet der a auf.

C. o. PALLAS, in M. BIEB. Fl. taur.-cauc. I. 387. 1808 (*C. odoratissima* ANDR., Bot. Rep. IX. t. 590. 1810 [et LDB. Bot. Reg. t. 1855. 1836]; ? *Mesp. or.* POIR., in LAM. Encycl. Suppl. IV. 72. 1816; *C. tanacetifolia* var. *taurica* DC., Prodr. II. 629. 1825). — Orient-W. Heimat wie oben. — Sonst wie *tanacetifolia* — Seit langem in Kultur, doch nicht zu hfg.

Im Anschluß an *orientalis**) ist zu besprechen die in Sicil., S.-Span. und N.-Afr. (Marokko) auftretende *C. laciniata* UERL., in ROEM. Arch. I. pt. 1. 69. 1796 (*Mesp. pubescens* PRISL, Del. Prag. 53. 1822; *Mesp. lac.* GUSS., Prodr. Fl. sic. I. 556. 1827; *C. oxyacantha* var. *lac.* FIORI e PAOL., Fl. ital. I. 1. 596. 1896); B. klein, reich beh., fein und spitz tiefteilig (Fig. 448p—s), Bl. wie Fig. 451l—o, Gr. und Steine 2—3, kleiner sparriger h; kaum in Kultur.

— B. — schimmernd weißseidig beh., sehr schmal und eng parallel fiederteilig, Fiedern fast stets ganzrandig (Fig. 448n—o), Bl. wie Fig. 449l—l¹.

24. *C. pyncnoloba*: reizender kleiner sparriger h — h, die B. sehr charakteristisch, kaum über 2:2 cm, sonst wie *orientalis*, Bl. mit 5 Gr., Stb. 20, Fr. nach HALACSY, kugelig, beh., rot.

C. p. BOISS. et HELDR., in BOISS. Diagn. ser. 2. II. 46. 1856. — Griechische Gebirge (Achaia, Arcadien). — 800—1600 m, auf Kalk — Blz. VI—VII. — Wohl noch nicht in Kultur.

++ B.-Lappung ± stumpflich, B. klein, Grund ± breit abgestutzt, vgl. Fig. 448t—v¹, grün, mit grauzottiger Beh., Gr. 3—5, vgl. Fig. 451p—r.

25. *C. Heldreichii*: h o h, verdornende Kztr., Beh. etc. wie *orientalis*, B. kaum über 3:3 cm, Stiel bis 1,8 cm; Blst. aber reicher- und lockerblütig, Bl. ca. 10 mm Dm., A. rot, Fr. rot.

C. H. BOISS., l. c. 47 (LANGE, der diese Art als var. zu seiner *polyacantha* [Rev. 49. 1897] zieht, scheint sie verkannt zu haben). — Thessalien, Griechenland (Attica, Achaia, Arcadia, Argolis, Laconia). Gebirge. — Blz. VI. — Frz. VIII—IX. — Ob echt in Kultur?

○○ B. wie in Fig. 450, kahl o. wenn reich beh., so doch nicht zottig und Form wie e—g—i.

* Fr. deutl. rot, B. wie a—i.

+ Fr. groß, kugelig, vgl. Fig. 451t, B. meist — beh.

26. *C. azarolus*: sehr variable Art, h o. meist breit verästelter h — h, junge Zw. + feinfilzig, oft erst o. kahl, Kztr. — o. in Kultur kaum verdornend; B. aus keiligem Grunde meist 3—5-lappig, Lappen ziemlich ganzrandig, unterste ± spreizend (Fig. 450e—g), Textur zuletzt derb, oberseits + glänzend olivgrün, z. T. kahnd., Unterseits ± fein beh., wenig heller, feinstes Adernetz kaum deutlich maschig (vgl. aber var.), bis ca. 7:6,5 cm; Stiel 0,5—1,3 cm; Blst. fein beh., dichtbl., bis ca. 6—7 cm Dm., Bl. ca. 1,5 cm Dm., Recept. dichter o. nur verstr. beh., K. innen + kahl, Gr. 1—2—3, Stb. 20, A. rot (immer?), Fr. 1,5—2 cm Dm., orange o. gelbrot, zuw. fast weißgelb, eßbar, vgl. Fig. 451s—u.

Der Formenkreis**) bedarf noch der Untersuchung. Man vgl. über die Auffassung der hierher gehörigen *C. aronia* Bosc, in DC. Prodr. II. 629. 1825 (*Mesp.*

*) Der Beschreibung nach glaubte ich, daß die *C. Clarkei* Hook. f., Flor. Brit. Ind. II. 383. 1878, aus Kaschmir in die nächste Nähe von *orientalis* gehöre. Da ich nun die Korrektur dieser Zeilen in Kew las, konnte ich die Originale (Zw. mit unreifen Fr.) sehen und feststellen, daß *C. Clarkei* der *nigra* (S. 778) nächstverwandt sein dürfte.

**) Ob hierher etwa *C. triloba* Pers. (vgl. S. 781) und die etwas mysteriöse *C. Maura* L. f., Suppl. 253. 1781 (= *C. maroccana* Pers., Syn. II. 37. 1807; *Mesp. maura* et *maroccana* POIR., in LAM. Encycl. Suppl. IV. 73/74. 1816) gehören?

aroma WILLD., Enum. pl. Berol. Suppl. 35. 1813), sowie über die fast kahle *C. ruscinonensis* GREN. et BLANC, in Billotia I. 71. 1864 66, die Übersicht von ROUY et CAM., Fl. France VII. 6. 1901. Ich konnte den Wirrwarr der Formen und Nomenklatur noch nicht klären. So gehört die *monogyna* var. *hirsutior* BOISS., Fl. or. II. 664. 1872, nach dem Orig. lg. KOTSCHY, 189, Cilicien hierher, wie es scheint.

C. a. L., Sp. pl. 477. 1753 (*Mesp. azarolus* WILLD., Enum. I. 525. 1809; *C. pontica* KOCH, Weißdorn 49, No. 42. 1854). — Azarole. — I. G. nur in O. Küstenland hie und da verwildert, sonst wohl im ganzen Medit. durch Kultur verbreitet und z. T. verwildert, spontanes Vorkommen fraglich (außer wohl N.-Afr.), vielleicht erst von Kreta durch Vorder-As. bis Turkestan spontan. Aus Turkestan sah ich im Herb. Petrop. gutes Material, dessen B. oft schön fiedertheilig, wie Fig. 450 h—i, sonst kaum abweichend. Bl. und Fr. wie abgebildet! — Blz. V. — Frz. VIII—IX — In Kultur nur für wärmere und südlichere Lagen.

Fig. 450. *Crataegus*: B.-Formen von: a—d *sinaica* — e—g *azarolus*; h—i dgl. (vgl. Text oben) — l—n *Fischeri* ($\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Orig.).

++ Fr. klein (etwa wie Fig. 451 q). B. und Blst. kahl o. fast kahl (Fig. 450 a—d).

27. *C. sinaica*: von *azarolus* noch abweichend durch: B. meist stumpflappiger, bis ca. 5,5:5 cm; Stiele bis 3 cm; Gr. 1—2, sonst vgl. Fig. 451 v—x.

C. s. BOISS., Diagn. ser. 2. II. 48. 1856 (*C. maroccana* LED., in Bot. Reg. t. 1855. 1836, non AUCT. AL.). — Sinai, S.-Persien (ich sah die Orig. lg. SCHIMPER 271, 273; BOVÉ 181; KOTSCHY 648). Auch HAUSSKNECHTS No. 44, Charput möchte ich hierher ziehen. — Mir aus Kultur nicht bekannt. Bedarf der Beobachtung. Es treten in Kl.-As. Formen auf, die ziemlich in der Mitte zwischen *sinaica* und *azarolus* stehen. Die *sinaica* erinnert z. T. recht an *heterophylla*!

✱✱ Fr. [trocken] schwarzrot o. schwarz (Fig. 451 y—z). B. wie Fig. 450 l—n, auch an Kztr. 5—7-lappig, Lappennenden — gezähnt, Stiele der Kztr.-B. ca. $\frac{1}{2}$ so lang wie B.-Spreite.

28. *C. Fischeri* *): b (Höhe?). Zw. höchstens ganz jung mit verstr. Haarzotten, ☉ purpurn; B. nur anfangs beiders. auf Nerven — locker zottig o. auch bleibend ganz locker beh., bes. an Rippe unten etwas härtig, obers. satt olivgrün, unters. — heller, 3,5:2,8—6:6 cm o. an Lgtr. bis 6,5:7 cm, deren Stiele bis 3,5 cm und Neb. siehhg. reich fiederzählig, bis 2 cm lang; Blst. mehrbl. und locker, aber nicht so reichbl., wie bei der in Bl. ähnlichen *C. altaica incisa* und Bl. bei *Fischeri* auch größer, ca. 1,6 cm Dm., Gr. 2, Stb. 18—20, A. rosa (?), Fr. wie Fig. 451 z, leicht gepunktet, Steine 2, wie z¹.

C. F. — Nach von Regel 1876 — So gesammeltem Material aus Turkestan Bl.-Expl. bei Kuldscha V. 1877, Fr. im IX.—X. bei Werny, Suidun, Schlucht Ulatai, Darwas, Sevistan, Schuguan u. a. O.). — Gebirge 1—3000 m. — Wohl sehr kulturwert! Die *C. dsungarica* ZBL. (S. 774) erinnert etwas an diese Art, hat aber 3—5 Gr. und Steine und weicht auch in B. ab. Wenn *Fischeri* in Kultur wäre, könnte man *dsungarica* für *Fischeri* × spec. Sekt. *Sanguineae* nehmen.

*) Ich gestatte mir, diese gut charakterisierte neue Art Herrn Prof. FISCHER VON WALDHEIM in Petersburg zu widmen, dem ich für gutige Übermittlung von reichem Herbarmaterial zu größtem Danke verpflichtet bin.

Sekt. 8. *Microcarpae* KOCH, Dendr. I. 137. 1869 (*Cordatae* BEADLE, in SMALL, Flora 532. 1903). Siehe S. 768.

○ B. fein eingeschnitten fiederlappig, wie Fig. 440o—p, S. 776, Fr. länglich, K. schmallanzettlich, drüsig gesägt (Fig. 452a—c).

29. *C. apiifolia*: kleiner breit wagrecht verästelter, offenkroniger, bis 6 m hoher B., junge Triebe grauzottig, ⊙ noch ⊥ beh., bleichorange o. rotbraun, ⊙ grau; Dorne mäßig ∞, ziemlich dünn und schlank, bis 4 cm; Kn. klein, stumpf eiförmig; B. dünn, jung obers.

locker, unters. dichter grauzottig, später oben kahl, lebhaft grün, unten etwas heller, ganz o. fast kahnd, auch an Lgtr. kaum über 5:5—6 cm; Herbstf. leuchtend braunrot; Stiel 1,5—3 cm; Blst. locker grauzottig, ca. 10—12-bl., Bl. ca. 17 mm Dm., Recept. kahl o. ⊥ beh., K. kahl, Gr. 2(1—3), Stb. 20, A. rosa, Fr. glänzend scharlach, sonst vgl. Fig. 452a—c.

Fig. 451. *Crataegus*: l—o *laciniata*: l Bl.-L.-Schn. und K., m C., n Fr., o Stein ventral, dorsal und im Q.-Schn. (α Bauchseite) — p—r *Heldreichii*: wie l—o — s—u *azarolus*: wie t—o — v—x *sinai-ca*: wie l—o — y—z' *Fischeri*: wie l—o (Original.).

C. a. MCHX., Fl. Bor. Am. I. 287. 1803 (*Mesp. ap.* MARSH., Arb. Am. 89. 1785). — Sellerie-W., Parsley Haw. — Nach SARGENT: S.-Virg. bis Zentr.-Flor., westl. bis S.-Ark. und Texas. — Ufer, sumptige Stellen, feuchte Gebüsch. — Blz. IV—V. — Frz. X (Fr. bis Winter bleibend). — In Kultur noch ziemlich selten. Sehr gut gekennzeichnete Art.

○○ B. wie Fig. 440m—n, S. 776 o. Fig. 453a—c. Fr. kugelig. K. ⊥ breit dreieckig, kurz, ganzrandig.

* B. wie Fig. 440m—n, Stiel 1,2—2,5 cm.

30. *C. cordata*: b o. , aufrecht verästelter, längl. o. rundlichkroniger B., bis 9 m; Zw. kahl, ⊙ glänzend kastanienbraun, Dorne eher zahlreicher und etwas kräftiger, bis 5 cm, sonst von *apiifolia* noch abweichend durch: B. ein wenig fester, nur ganz jung auf der Obers. spärlich verstr. beh., unten mäßig heller, kahl, an Lgtr. bis 7:6—7 cm, Herbstf. scharlach-orangerot; Blst. kahl, bis 25-bl., Bl. ca. 15 mm Dm., Gr. 5(—2), Stb. 20, Fr. glänzend scharlach, sonst vgl. Fig. 452d—f.

C. c. AIT., Hort Kew. II. 168. 1789 (*Mespilus cord.* MILL., Diet. ed. VIII. No. 4. 1768; *Mesp. Phaenopyrum* LE., Syst. Suppl. ed. XIII. 254. 1781; *Crat. acerifolia* MOENCH, Bäume Weiss. 31. 1785; *Mesp. acerif.* BURGD., Anl. II. 147. 1787; *C. populifolia* WALT., Fl. Carol. 148. 1788; *Mesp. corallina* DESF., Tabl. Ecol. Bot. Mus. 174. 1804; *Phalacrox cord.* WENZ., in Linnaea 1874. 64) — Herzblatt-W.: Washington Thorn. — Nach SARGENT: von Virg. südl. bis N.-Georg. und Alab., westl. durch Z.-Teness. u. Kentucky bis Ill., S.O.-Miss. und N.W.-Kansas. — Ufer-

gelände. — Blz. V—VI (—VII). — Frz. IX—X (Fr. bis Frühjahr bleibend). — Seit langem in Kultur, aber nicht sehr hfg. Distinkte Art.

✱✱ B. wie Fig. 453 a—c, Stiel 2—8 mm.

31. *C. spathulata*: $\mathfrak{H}$ o. kleiner fein breit verästelter $\mathfrak{H}$, bis 8 m; Zw. sehr verbogen, kahl, $\odot$ braunrot, Dorne — fehlend o. ∞ , hfg. dünn, bis 4 cm; sonst von *cordata* noch verschieden durch: B. an Kztr. klein, spatelig, 1,5 : 0,6—4 : 2 cm, an Lgtr. wie Fig. 453 a, bis 5 : 3,5 cm, mit großen Neb.; Blst. ziemlich klein, 8—15-bl., Bl. ca 1 cm Dm., Gr. 5(—2), Stb. 20, Fr. noch kleiner, vgl. Fig. 452 g—i.

C. s. MCHX., Fl. Bor. Am. I. 288. 1803 (*Mesp. sp.* POIR., in LAM. Enc. Suppl. IV. 68. 1816; *C. microcarpa* LDL., in Bot. Reg. t. 1846. 1836; *Cotoneaster spath.* WENZ., in Linnaea 1874. 201). — Keilblatt-W. — Nach SARGENT: von S.-Virg. bis N.-Flor. und durch Golt-Staaten bis Ark., Texas. — Reiches Uferland, sumpfige Stellen. Blz. V—VI (in Heimat ab III). — Frz. X. — In Kultur ist diese zierliche Art noch selten.

Fig. 452. *Crataegus*: a—c *apifolia*: a Bl.-L.-Schn., a' C., b Fr., c Stein von unten, seitlich und im Q.-Schn. (a Bauchseite) — d—f *cordata*: wie a—c, nur in e' alte Fr. ohne K. — g—i *spathulata*: wie a—c — k—m *brachyacantha*: wie a—c — n—p *saligna*: wie a—c (Original).

Sekt. 9. *Brevispinae* BEADLE, in SMALL, Fl. 532. 1903 (*Melanocarpae* SARG., Silva XIII. 32. 1902, ex p.: *Brachyacanthae* SARG., Manual 366. 1905). Siehe S. 768.

☐ B. wie Fig. 453 d—f, Stb. doppelt so lang wie K., A. rot, Gr. — endständig, Frb.-Gipfel beh., Fr. 1—1,5 cm Dm., blauschwarz.

32. *C. brachyacantha*: meist mehrstämmiger $\mathfrak{H}$, bis 16 : 0,5 m, kompakt rundkronig, Zw. höchstens ganz jung $\pm$ beh., $\odot$ stumpf braunrot, bald grau; Dorne meist ∞ , derb und kurz, 1—1,5 cm, zuw. länger; B. $\pm$ lanzettlich-oblong, an Kztr. meist ∞ , klein, 1,5 : 0,8—4 : 1,7 cm, an Lgtr. wie Fig. 453 f, bis 5,5 : 3,5 cm, nur jung oben auf Rippe $\pm$ beh., dann glänzend grün, unten mäßig heller, kahl, kerbsäggig, zuletzt ziemlich derb, Stiel 2—10 mm; Blst. 8—15-bl., kahl, Bl. im Verblühen stark rotgelb, ca. 12 mm Dm., Gr. 3—5, sonst vgl. Fig. 452 k—m.

C. b. ENGELM. et SARG., in Bot. Gaz. VII. 128. 1882. — Blaufrucht-W.; Pomette Bleue. — Nach SARGENT: S.-Ark., W.-Louis., Texas. — Reiches Ufergelände. — Blz. IV—V. — Frz. VII (Fr. sofort fallend). — Durch die blauen Fr. gut gekennzeichnete, für warme Lagen bei uns wohl kulturwerte Art.

☉☉ B. wie Fig. 453 g—i, Stb. wenig o. kaum länger als K., A. gelb, Gr. tief seitenständig, Frb.-Gipfel kahl, Fr. ca. 8—9 mm Dm., tief weinrot bis glänzend schwarz.

33. *C. saligna*: b o. kleiner locker breit, $\neg$ überhängend verästelter b , bis 6 m; Zw. kahl, lebhaft purpurn, Dorne dgl., schlank, bis 2 cm; sonst von voriger noch verschieden durch: B. spitzlicher, länglicher, an Lgtr. spitzlappiger (Fig. 453 i), heller grün, Stiel deutlicher abgesetzt, 5–13 mm; Blst. 4–8-bl., C. nicht vertärend, Gr. 5, sonst vgl. Fig. 452 n–p.

C. s. GREENE, in Pittonia III. 99. 1896. — Weidenblatt-W. — Colorado, 2–3000 m, Ufer der Gebirgsflüsse. — Blz. VI. — Frz. IX–X. — Seit kurzem in Kultur [Hort. SPÄTH etc.]. — REHDER stellt diese Art, in VILM. Frut. Cat. prim. 112. 1904 [1905], zu den *Douglasianae*, aber die Steine sind höchstens ein wenig angedeutet grubig, weshalb ich diese Art mit SARGENT 1905 hier belasse.

Sekt. 10. *Flavae**) SARG., Silva XIII. 34. 1902. Siehe S. 768.

○ Stb. 10, A. gelb, sonst vgl. Bl. in Fig. 454 k–m und B. in Fig. 453 m–n.

34. *C. aprica*: b o. kleiner breit verästelter b , bis 7 m, junge Triebe $\pm$ locker zottig, $\odot$ $\pm$ purpurbraun, kahl o. fast kahl, bald grau werdend, Dorne schlank, gerade, bis 3 cm; Borkeschwartzlich, schuppig; B. rötlich austreibend, jung

Fig. 453. *Crataegus* B.-Formen von a–c *spathulata* — d–f *brachyacantha* — g–i *saligna* — k–l *uniflora* — m–n *aprica* — o–p *flava* — q–r *stipulosa* — s–v *cuneata* ($\frac{3}{4}$ n. Gr.) (Original.)

beiders. locker verstr. beh., zuletzt kahl, lebhaft gelbgrün, unters. wenig heller, Textur dünn, aber fest, Form variabel, Grund $\pm$ keilig o. rundl. mit kurz vorgezogener Basis, 1,5–5:1,5 cm, Stiel 7–20 mm; Blst. 3–5-bl., locker zottig, Bl-Stiele 1–2 cm, Bl. ca. 1,8 cm Dm., Recept. nur am Grund locker zottig, Gr. 3–5, Fr. rundlich, rot o. orangerot, 9–14 mm Dm., sonst vgl. Fig. 454 k–m.

C. a. BEADLE, in Bot. Gaz. XXX. 335. 1900. — Nach BEADLE: W.-N.-Carol., angrenzendes Tennessee bis Georgia; trockne sonnige Gebirgshänge, 500–1000 m. — Blz. VI (Arnold-Arbor.). — Frz. Spätherbst. — In jungen Pflanzen bei uns in Kultur. Ich beschreibe nach Blzw. aus Arnold-Arb. (dg. REHDER) und Angaben bei BEADLE, wie SARGENT (1905).

○○ Stb. 15–20, A. rot, sonst vgl. Bl. in Fig. 454 n–n¹ und B. in Fig. 453 o–p.

*) BEADLE hat diese Gruppe vgl. Bilt. Bot. Stud. I und in SMALL'S Flora) sehr erweitert und in 13 Sekt. gespalten, über deren Wert ich mir kein Urteil erlaube.

35. *C. flava*: von *aprica* noch abweichend durch: mehr aufrecht verästelt, Dorne dünner, Zw. kahl; B. nur ganz jung spärlich beh., zuletzt dünner, 2:1,5–6:4,5 cm; Blst. kahler, Gr. 3–4, Fr. rundlich-birnförmig, dunkelorangebraun.

C. f. AIT., Hort. Kew. II. 169. 1789 (Synonymie unklar!) — Nach SARGENT: Georgia, Florida. — Sandige trockene Gelände. — Nach BEADLE hat die echte *flava* (überhaupt seine Gruppe der *Euflavae*, siehe Anmkg.!) nur 10 Stb. Ich sah nur von SARGENT als *flava* bestimmte Expl. aus Florida, Chattahoochee, lg. SARGENT 8. IV. 1900. Danach B.- und Bl.-Abbildung.

Sekt. 11. *Uniflorae* BEADLE, in Bilt. Bot. Stud. I. 117. 1902 (Sekt. *Parviflorae* SARG., Silva XIII. 34. 1902). Siehe S. 768.

36. *C. uniflora*: niedriger B., seltener H., bis 3 m, junge Zw. grauzottigfilzig, (C) + kahlend, braunrot, sehr feinhöckerig, Dorne meist ∞, schlank, bis 3 cm; B. wie Fig. 453k–l, oberseits glänzend sattgrün, + verstr. kurzborstig, unters. hellgrün, bes. an Nerven mehr beh., 1,5–4:0,7–2,2 cm, Zähnung + grob kerbig, Stiel 2–5 mm; Bl. 10–15 mm Dm., meist einzeln, fast sitzend, Stielchen, Recept. und K. (beiders.) + grauzottig o. fast filzig, Stb. 20, A. weißlich, Gr. 3–5, Fr. gelb o. grünlichgelb, sonst vgl. Fig. 454g–i.

Fig. 454. *Crataegus*: a–c *cuneata*: a Bl.-L.-Schn., a' C., b Fr., c Stein von unten und seitlich — d–f *stipulosa*: wie a–c, nur Stein von unten und oben und im Q.-Schn. (a – Bauchseite) — g–i *uniflora*: wie d–f — k–m *aprica*: wie d–f — n–n' *flava*: wie a–a' (a–c nach KOEHNE, sonst Original).

C. u. MUENCHH., Hausvater V. 147. 1770 [et DUROI, Harbk. Baumz. I. 184. 1771] (*Mespil. xanthocarpa* L. F., Syst. ed. XIII. Suppl. 254. 1781; ? *M. flexispina* MOENCH, Bäume Weißenst. 62, t. 4. 1785; *Crat. parvifolia* AIT., Hort. Kew. II. 169. 1789; *Mesp. parvif.* WILLD., Enum. 523. 1800). — Einblütiger W. — Nach BEADLE von N.-New-York bis Flor. und Louis. — Wälder, Hänge, sandige Stellen. — Blz. (IV)V–VI. — Frz. X (dgl. Fr.-Fall). — In Kultur ist dieser kleine B. noch selten.

Sekt. 12. *Cuneatae* REHD., in VILM. Frut. Cat. prim. 105. [1904] 1905, ex. p.

37. *C. cuneata*: B., Höhe?, junge Triebe + zottig beh., (C) Zw. braunrot, mit feinen dichten Knötchen besetzt, Dorne kurz, fein, 5–10 mm; B. vgl. Fig. 453s–v,

bis 6,5 : 3,5 cm, auf der glänzend grünen Obers. fast kahlend, Unters. verstr. borstig, heller; Stiel 2–10 cm; Blst. 3–7-bl., beh., Bl. ca. 1,5 cm Dm., K. innen $\perp$ kahl, Stb. 20, A. rot, Gr. 5, Fr. karminrot, vgl. Fig. 454 a–c.

C. c. S. et Z., Abh. Ac. Münch. VI. 2. 130. 1843 (*Mesp. cuneata* KOCH, Hort. Dendr. 338. 1853 [ex LAVALLÉE, Arb. Segr. 13, t. V, — Keilbl.-W. — Jap. (Kiuschiu, Hondo) und wohl auch Z.-China, doch bedürfen die Expl. von dort noch der Beobachtung. — Blz. VI. — Frz. IX. — In Kultur, aber noch selten.

Sekt. 13. *Mexicanae* [sect. provis.]. Siehe S. 768.

38. *C. stipulosa*: kleiner $\mathfrak{H}$, junge Triebe $\perp$ grau zottig-filzig, $\odot$ und $\odot$ braunrot, allmählich kahlend, Dorne?; B. wie Fig. 453 q–r, ober. $\perp$ (bes. auf Rippe) lockerzottig, auch zur Frz. nicht kahl, sattgrün, unters. heller, $\perp$ stärker beh., Textur zuletzt dicklich, Hauptnervenpaare ca. 6–9, Serratur kerbig, z. T. ungleichmäßig, 3,5 : 1,5–8 : 3,3 cm an Kztr., Stiel 6–10 mm, Neb. zur Blz. vorh., 10–12 mm lang, lineallanzettlich, gegen Spitze breiter, drüsig gezähnt; Blst. 5–10-bl., grau filzig-lineallanzettlich, gegen Spitze breiter, drüsig gezähnt; Blst. 5–10-bl., grau filzig-zottig, Bl. 1–1,5 mm lang gestielt, ca. 15 mm Dm., Recept. und K. (außen) wie Bl.-Stiele beh., K. innen viel kahler, Stb. 20, Gr. 2–3, Fr. orangerot, sonst vgl. Fig. 454 d–f, Steine auf Rücken gerieft.

C. s. STEUD., Nom. Bot. ed. 2. I. 434. 1840 (*M. stipulosa* KUNTH, in H. B. Nov. Gen. VI. 217. 1823). — Beschreibung nach Expl. lg. SCHMITZ, No. 419, Mexiko (Herb. Hofm. Wien). Dies Expl. ist als *C. mexicana* DC., Prodr. II. 629. 1825, bezeichnet. Ob diese Art mit der *stipulosa* synonym, können nur Orig.-Expl. entscheiden. Jedenfalls ist *stipulosa* der ältere Name und die Beschreibung stimmt fast ganz mit dem Expl. überein, obwohl das Original der *stipulosa* aus Ecuador stammen soll. Die *C. pubescens* STEUD., l. c. 433 (*Mesp. pub.* KUNTH, l. c. tab. 555) blieb mir unklar, da ich kein Expl. mit „foliis supra glabris“ sah. Die von HEMSLEY, Biol. Centr. Am. I. 379 80. 1880, zitierten Expl. sah ich leider nicht. Nur die Orig. von BENTHAM'S *C. subserrata* (Pl. Hartw. 10. 1839.), die aber ohne Frzw. kaum sicher zu stellen. Was LINDL., in Bot. Reg., t. 1910. 1836, als *C. mexicana* mit breitrundlichen, rein gelben Fr. abbildet, kann ich nicht einreihen. Die Blüten zeigen bei ihm nur 10 Stb.

Sekt. 14. *Aestivales**) SARG., in Silva XIII. 35. 1902. Siehe S. 769.

39. *C. aestivalis*: $\mathfrak{H}$ - $\mathfrak{H}$, bis 9 m hoch, Zw. beim Austrieb rostig beh., $\odot$ kahl, glänzend purpurbraun. Dorne kräftig, gerade, 1–2 cm; B. jung beiders. (unten dichter) rostbraun mit etwas grau gemischt zottig, später oben sattgrün, kahl o. nur spärlich beh., unters. etwas heller, $\perp$ reichlicher (bes. an Rippe) beh., Textur derb, aber nicht sehr dick, Form wie Fig. 455 a–c, 2–7 : 1,5–4 cm, Serratur bald sehr fein entfernt, bald mehr kerbig, Stiel 2–10 mm; Blst. 2–5-bl., Bl. mit (o. fast vor B.), alles kahl, nur K. etwas beh. an Spitze, z. T. etwas gezähnt, Stb. ca. 20, A. rot, Gr. 3–5, Fr. rot, mit hellen Pünktchen, duftend, Apfelgeschmack, 12–15 mm Dm., vgl. Fig. 456 a–c, abgebildete Steine anscheinend reif, aber Fläche nicht glatt, wie die Autoren sonst angeben.

C. a. TORR. et GR., Fl. N.-Am. I. 468. 1840 (*Mespilus aest.* WALT, Fl. carol. 148. 1788). — Apfel-W.; May or Appel Haw. — Nach SARGENT (1905): N.-Flor. und durch die Golfstaaten bis S.-Arkans. und Texas. — Niedrige Utergelände, nasse Kieferngelände. — Blz. (II–)III. — Frz. V–VI. — Ich beschreibe nach Bl.-Expl. lg. CURTISS, No. 6745 und Fr.-Expl. lg. HILGARD 1859 (det. SARGENT).

Sekt. 15. *Punctatae***) SARG., Silva XIII. 33. 1902 [incl. *Collinae* SARG., l. c.]. Siehe S. 769.

$\odot$ A. rot, Fr. länglich, 1,5–2 cm lang, Gr. 2–5, K. $\perp$ ganzrandig, B. vgl. Fig. 455 d–f.

40. *C. punctata*: breit verästelter $\mathfrak{H}$ - $\mathfrak{H}$, bis 9 m, Zw. jung $\perp$ grau beh., $\odot$ kahl orangebraun o. $\perp$ grau, Lent. fein, $\sim$, Dorne dgl., gerade, kräftig, bis

*) Hierher noch die sehr ähnlichen *C. maloides* SARG., Trees a. Shrubs I. 9, t. V. 1902; *C. luculenta* SARG., l. c. II, t. 6 und *C. fruticosa* SARG., l. c. 13, t. 7.

**) Die noch in jungen Pflzen. in Kultur befindlichen *C. Lettermanni* SARG., in Bot. Gaz. XXXI. 220. 1901, mit 10 Stb., weißen A., gezähnten K., rundlichen orangefarbenen Fr., und *C. pratensis* SARG., l. c. 6, die von voriger fast nur durch rosa A. und etwas kleinere, scharlachfarbene (nicht orangerote) Fr. abweicht, schließen sich eng an *collina* an.

5 cm; B. jung ober. spärlicher, unters. verschieden beh., dann auf der sattgrünen Ober. fast ganz kahl, unters. graugrün, bes. Nervenpaare beh., Textur fest, 3—7 : 1,5—5 cm, Stiel 0,5—1,8 cm; Blst. ca. 15-bl., $\pm$ grau beh.. Bl ca. 1,5—2 cm Dm., K. außen kahl, sonst vgl. Fig. 456 h—k, Fr. stumpfrot o. gelblich, $\pm$ gepunktet.

C. p. JACQ., Hort. Vind. I. 10, t. 88. 1770 (*Mespilus punct* LOIS., Nouv. Duh. IV. 152. 1809). — Nach SARGENT (1905): Quebec, Ontario, durch New Engl. bis N.-Georgia, N.-Carol., Tennessee, westlich durch New York, Ohio bis S.-Mich., Ill. — Hügelgelände. — Blz. V—VI. — Frz. X (Fr. fallen mit Reife) — Seit langem in Kultur. — Ich fand bei von SARGENT selbst bestimmten Expl. nur 1—3 Gr., er gibt aber 5 an (BEADLE nur 2—3), dagegen soll *C. pausiaca* ASHE, in Ann. Carnegie Inst. 390 [May]. 1902 (cf. SARG., Trees a. Shrubs I. 105, t. LIII 1903) nur 2—3 Gr. haben. Ich kann sie nicht als Art abtrennen.

40×42 *C. punctata* × *crusgalli*: So deutet KOEHNE die *C. Carrièrei* VAUV., ex Kew Bull. 1892, app I. 24 (*C. berberifolia* HORT. NONN.): üppiger $\odot$ $\odot$. Zw. jung beh., $\odot$ braunrot, fast kahl, Dorne kräftig, bis 4 cm; B. vgl. Fig. 457 o, S. 797, ober. glänzend olivgrün, fast kahlend, unters. locker grauzottig beh., 5,5 : 2,3—10 : 5,5 cm; Blst. mehrbl., graufilzig, dgl. Recept. und K. $\pm$, dieser lineal, gezähnt, Bl. 1,8—2 cm Dm., Stb. 20, A. rosa (?), Gr. 1—3, Fr. elliptisch, ca. 1,5 : 1 cm, gelbrot, getupft; Stein glatt, Vorhemd schmal. Beschreibung zumeist nach KOEHNE, Herb. Dendr. No. 496. — Sehr ähnlich ist die *C. Lavalleyi* HER., in LAV. Arb. Segr. 21, t. 7. 1885, die LANGE damit vereinigt. Doch ist sie mir noch ungenügend bekannt und glaubt auch KOEHNE (briefl.), daß sie mit *Carrièrei* sich kaum deckt. Fr. bei LAVALLÉE ca. 2 : 1,8 cm.

Fig. 455. *Crataegus*: B.-Formen von: a—c *aestivalis* — d—f *punctata* — g—i *collina* — k—p *crusgalli* ($\frac{2}{8}$ n. Gr.) (Orig.).

○○ A. gelb, Fr. rundlich, ca. 1 cm Dm., Gr. 5, K. drüsig gezähnt. B. vgl. Fig. 455 g—i.

41. *C. collina*: von *punctata* nur noch abweichend durch: $\odot$ Zw. noch + leicht beh., Dorne etwas dünner, bis 6 cm; B. bes. an Lgtr. breitovaler, bis ca. 6 : 5 cm, kurze Lappen dann grobzähniiger, stärker kahlend, Stiel kaum über 8 mm, Blst. ca. 6—10-bl., Fr. stumpfrot, sonst vgl. Fig. 456 d—f.

C. c. CHAPM., Fl. South. Stat. ed. 2, Suppl. 2, 684. 1862 (*C. collicola* ASHE, in Jour. E. Mitch. Soc. XVI. 2. 75. 1900). — Nach SARGENT (1905): SW-Virg. bis Zentr.-Georg. und westlich bis Z.-Tennessee und Z.-Alab. [nach BEADLE auch Missouri]. — Blz. V. — Frz. IX. — In jungen Pflanzen in Kultur.

bis 2.5 cm; B. dünn, kahl, obers. glänzendgrün, unters. heller, bis 7 : 4 cm; Blst. vielbl. — beh., Bl. zieml. klein, Recept. kahl o. fast kahl, K. — länger, lineal, drüsig gezähnt, Stb. 16—18, A. gelblich, Gr. 2—3, Fr. oval, trübröt, ca. 11 : 10 mm, Steine am Rücken gerieft, Vorhemd schmal.

Sekt. 17. *Triflorae**) BEADLE, in SMALL Fl. S.-E.-States 533. 1903 [ob schon früher?]. Siehe S. 769.

43. *C. triflora*: $\bar{b}$ — $\bar{b}$, bis 7 m, junge Triebe zottenborstig, $\bar{b}$ — kahlend, rotbraun, Dorne schlank, purpurn, bis 5 cm; B. beiders. dicht zottenborstig, obers. zieml. rauhlich, wie Fig. 4571, Lappung kaum deutlich, an Kztr. 2—7, 1—5 cm, Stiele 0.8—3 cm, drüsig, beh.; Blst. meist 3-bl., wie Zw. beh., Bl. 2.5—3 cm Dm., Stb. 20 (o. etwas mehr), A. gelb (Gr. 5—3), Fr. rot, beh., 12—15 mm Dm., sonst vgl. Fig. 458p—r.

Fig. 457. *Crataegus*: B.-Formen von: a—b *nitida* — c—d *viridis* — e—f *pruinosa* — g—h *mollis* — i—k *submollis* — l *triflora* — m *tenuifolia* — n $\times$ *Dip-peliana* — o $\times$ *Carrièrei* — p—q $\times$ *Fontanesiana* ($1\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Orig.).

C. t. CHAPM., Fl. S. U. St. Suppl. II. 684. 1892. — Nach BEADLE: N.W.-Georg., Alabama. — Steinige Uterhänge. — Blz. VI. — Frz. IX. — Kaum in Kultur. Vertreter einer, wie es scheint, guten Formengruppe.

Sekt. 18. *Molles***) SARG., in Silva XIII. 33. 1902. Siehe S. 769.

*) An die *Triflorae* schließen sich an die *Bracteatae* SARG., Silva XIII 34. 1902 (Sekt. *Harbisonianae* BEADLE, l. c.), die eigentlich wohl nur durch reichblütigere Blst. abweichen! — Auch die Sekt. *Anomala* SARG., in Rhodora III. 29. 1901, dürfte hier in der Nähe einzureihen sein.

**) Ich gebe die kurzen Hinweise über diese Gruppe sehr nahestehender Arten nach SARGENT, bzw. von ihm revidierten Material. Ob er *mollis* im Sinne SCHEELES faßt, bleibt fraglich. Ich sah noch kein Original SCHEELES. Was SCHRADER, in WALP. Rep. II. 58. 1843, unter *subvillosa* verstand, blieb mir ebenfalls aus Mangel eines Originals unklar. Wenn dieser Name mit *mollis* identisch, so ist er als alterer Artname voranzustellen. — Ob BEADLE seine Sekt. *Biltmoreanae*, in Bilt. Bot. Stud. I. 121. 1902, mit Recht von den *Molles* abtrennt, bleibt mir fraglich.

○ Stb. 20, Fr. ± kugelig (vgl. Fig. 458f—h), braunrot, und B. wie Fig. 457g—h.

44. *C. mollis*: ausgebreitet verästelter $\mathfrak{H}$ — $\mathfrak{H}$, bis 13 m; junge Triebe dick weißgrau zottig-filzig, ☉ kahlend. rotbraun; Dorne bis 5.5 cm; B. jung reichlich beh., später auf tiefgrüner Obers. etwas rauhlich, unters. heller, ± weich zottig beh., an Kztr. bis 10:9 cm, Textur zuletzt ± derb, im Herbst dunkelbraunrot; Stiel 1—5 cm; Blst. weißgrau zottig-filzig, ca. 10—15-bl., Bl. 2—2.5 cm Dm., A. gelb, Gr. (3—)5, Fr. 13—18 mm dick, ± beh.

C. m. SCHEELE, in Linnaea XXI. 569. 1848 [sensu SARG., non AUCT. PLUR.] (*C. coccinea* s. ? *mollis* TORR. et GR., Fl. N.-Am. I. 465. 1840, ex p.; *C. tiliaefolia* KOCH, die Weid. etc. 27. 1854; *Mesp. til.* KOCH, Dendr. I. 151. 1869). — Weich-behaarter W.; Red Haw. — Nach SARGENT (1905): N.-Idaho bis O.-Dakota, O.-Nebr. und O.-Kansas. — Reiche Ufergelände. — Blz. V. — Frz. (VIII—)IX. — Seit langem in Kultur, und zwar jetzt unter dem Namen *tiliaefolia* o. auch als *pubescens*.

Hieran schließt sich eng die in jungen Pflzen. kultivierte *C. arkansana* SARG., in Bot. Gaz. XXXI. 223. 1901, die mir nur eine Form mit noch derberen, etwas kleineren B., glänzend roten Fr., die später reifen, X—XI, zu sein scheint. Die Fr. sollen lange bleiben und sehr zierend wirken. Die *C. texana* BUCKL., in Proc. Phil. Acad. 1861. 454, weicht, soweit ich sie kenne, nur durch rote A. ab.

○○ Stb. 10, Fr. ± oboval, vgl. Fig. 458i—l, glänzend rot, B. wie Fig. 457i—k.

45. *C. submollis*: sonst von *mollis* kaum verschieden, nur ☉ Zw. mehr glänzend, B. dünner, Steine dorsal tiefriefig (bei *mollis* sah ich sie glatt, ob immer?), Frz. IX.

C. s. SARG., in Bot. Gaz. XXXI. 7. 1901 [hierzu die Tafel 182 in Silva IV] (*C. coccinea* var. *subvillosa* LGE., Rev. 31. 1897; *C. mollis* AUCT. PLUR.). — Nach SARGENT (1905): Quebec, Maine, O.-Mass., New-York. — Die *mollis* vieler Gärten.

Ihr schließt sich, wohl nur als Form, an *C. Arnoldiana* SARG., l. c. 221, mit glatteren B. und ± kugeligen Fr. aus Massachusetts. In jungen Pflanzen in Kultur.

Sekt. 19. *Virides* SARG., Silva XIII. 35. 1902. Siehe S. 769.

○ Fr. ca. 4—7 mm Dm., Bl. ca. 10—12 mm Dm., B. vgl. Fig. 457c—d.

46. *C. viridis*: ausgebreitet verästelter $\mathfrak{H}$ — $\mathfrak{H}$, bis 10 m; Zw. kahl (o. an Lgtr. jung beh.), ☉ hell rot- o. graubraun, Dorne selten, bis 4 cm; B. nur jung spärlich beh., bes. unters. achselbärtig, lebhaft grün ober., unters. wenig heller, Textur ± dünn o. derber, 2—7:2—4 cm, Stiel 1—2 cm; Blst. 10—20-bl., kahl, Stb. 20, A. gelb, Gr. (2—)5, Fr. rot o. orangerot, K. oft abfallend, vgl. sonst Fig. 458a—c.

C. v. L., Sp. pl. 476. 1753 fide AUCT. AM.] (*C. arborescens* ELL., Sketch Bot. S. C. a. Ga. I. 550. 1821; *Mesp. viridis* SWEET, Hort. Brit. 134. 1827; *Mesp. arbor.* KOCH, in Wochenschr. V. 380. 1862 [ex Ind. Kew.]). — Nach SARGENT (1905): S.-Carol. bis W.-Flor., durch Golfstaaten bis Miss. und Texas. — Ufer, sumpfige Niederungen. — Blz. IV—V. — Frz. X—XI, Fr. bleiben ± hängen im Winter. — In Kultur, aber selten.

○○ Fr. ca. 12 mm Dm., Bl. ca. 15—16 mm Dm., B. vgl. Fig. 457a—b.

47. *C. nitida*: noch abweichend von *viridis* durch: Zw. glänzender, B. dgl., derber; Bl. sonst ganz analog; Gr. meist 2—4, Stb. 15—20; Fr. stumpf ziegelrot, bereift, mit einigen dunklen Tupfen.

C. n. SARG., in Bot. Gaz. XXXI. 231. 1901 (*C. vir.* var. *nitida* BRITT. a. BR., Ill. Fl. II. 242. 1897). — Nach SARGENT: Illinois (nach BR. et BR. Miss. und Ark.). — Sonst wie *viridis*. — In jungen Pflanzen in Kultur.

Sekt. 20. *Pruinosae**) SARG., in Silva XIII. 32. 1902. Siehe S. 769.

*) An diese schließt sich eng an die Sekt. *Tenuifoliae* SARG., l. c. 34, deren Arten im wesentlichen nur durch die saftig-, nicht fest- und trockenfleischigen Fr. abweichen. Die B. sollen auch im allgemeinen dünner sein. Vom Typ der *C. tenuifolia* BRITT., in Bull. N. Y. Bot. Gard. I. 448. 1900, ist in Fig. 457m ein B. abgebildet. Ich sah nur verblühte Expl.

48. *C. pruinosa*: $\bar{h}$ — $\bar{h}$, bis 7 m. breit flatterig verästelt, Zw. kahl, $\odot$ purpurbraun, Dorne dgl. ∞ , $\dagger$ gebogen, bis 5 cm; B. vgl. Fig. 457 e—f, rundoval o. ellipt, nur beim Ausbruch (rot) leicht verstr. beh., dann kahl, ober. sattblaugrün, unter. graublau, 3:2,2—7:6,5 cm, Herbstf. schön bunt, Stiel 1—2,5 cm; Blst. 6—15-bl., kahl, Bl. ca. 18 cm Dm., Stb. 20, A. rot, Gr. 5, Fr. zuletzt purpurn, glänzend, $\pm$ be-reift, oft getupft. vgl. Fig. 458 m—o.

C. p. C. KOCH, Die Weißdorn. etc. 26. 1854 (*Mespilus pruinosa* WENDL., Flora 1823. II. 701; *C. coccinea* var. *pruin.* DIPP., Laubh. III. 436. 1893). Be-reitter W. — Nach SARGENT (1905): SW.-Vermont, bis Zentr.-Ill. und Miss. — Blz. V. — Frz. X(—XI). — In Kultur, aber nicht zu hfg.

Fig. 458. *Crataegus*: a—c *viridis*: a Bl.-L.-Schn. und K., a' C., b Fr., c Stein seitlich und im Q.-Schn. (a=Bauchkante) — d—e *nitida*: Fr., Stein von unten, im Q.-Schn. und seitlich — f—h *mollis*: wie a—c — i—l *submollis*: wie a—c — m—o *pruinosa*: wie a—c — p—r *triflora*: wie a—c (Orig.).

Sekt. 21. *Coccineae**) SARG., Silva XIII. 34. 1902. Siehe S. 769.

$\odot$ B.-Grund spitzkeilig o. $\dagger$ rundlich, doch selbst an Lgtr.-B. nicht seicht-herzfg. (vgl. Fig. 459 f—h, n—o). Stb. (5—)7—10.

$\nrightarrow$ A. gelb. Stb. 10. B. wie Fig. 459 h—k, Fr. $\pm$ rundlich.

49. *C. coccinea*: $\bar{h}$ — $\bar{h}$, bis 7 m. buschig aufrecht verästelt, Zw. jung leicht beh., bald kahl, $\odot$ glänzend rotbraun, Dorne dgl., leicht gekrümmt, bis 3(—4) cm; B. jung spärlich beh., auf der Ober. etwas mehr, diese dann glänzend sattgrün, Unter. etwas heller, alles meist kahlend, meist nicht über 6:4 cm; Stiele bis 2 cm; Bl. locker 8—10-bl., $\pm$ beh., dgl. Recept., Bl. ca. 16 mm Dm., sonst ähnlich Fig. 460 h, nur eben Stb. 10, Gr. 3—4, Fr. ca. 12 mm Dm., scharlachrot.

Der im Blst. — leicht beh. Typ mit $\pm$ keiliger B.-Basis scheint mit der kahlen var. *rotundifolia* SARG., in Bot. Gaz. XXXI. 14. 1901 (*C. rot.* MOENCH, Bäume Weiß. 29, t. 1. 1785; *Mespilus glandulosa* EHRH., Beitr. III. 20. 1788 [teste SARG.]; *Mesp. rot.* DUROI, Harbk. Baumz. ed. 2. II. 607. 1795 [excl. Syn. ex p.

*) Ich vereinige hiermit die Sekt. *Dilatatae* SARG., l. c. 33, und *Lobulatae* SARG., l. c. 33 (*Plabellatae* SARG., in Rhodora I. 75. 1901), da die Charaktere der B. und Fr., auf denen fast allein die Trennung fußt, viel zu gering scheinen, um Sektionen zu machen. Ich führe einige bezeichnende Typen an.

fide SARG.]; *C. glandulosa* WILLD., Berl. Baumz. 84. 1796 [excl. Syn. ex p. teste SARG.], deren B. mehr wie Fig. 459i—k sind, durch alle Übergänge verbunden).

C. c. L., Sp. pl. 476. 1753 [vgl. auch SARG., Silva XIII, t. 683!]. — Scharlachdorn; Scarlet Haw. — Nach SARGENT (1905) New Foundland bis Connecticut und W.-Quebec; var. *rotundifolia* bes. in New-Engl. bis O.-Pennsylv. — Blz. V — Frz. X (IX) (Fr. dann fallend). — Seit langem in Kultur. Fr. sollen als Wildfutter gut sein. Die Formen, wie sie z. B. LANGE, Rev. 30. 1897, beschreibt, sind unklar.

☆☆ A. rot, Stb. 5—7, B. wie Fig. 459n—o, Fr. aus $\pm$ verschmälertem Grunde länglich (vgl. Fig. 460l—n).

50. *C. Holmesiana*: diese bis 10 m hohe Art weicht von typ. *coccinea* noch ab durch: B. bis 7:5 o. an Lgtr. bis 10:8 cm, Stiel bis 3 cm; Blst. kahl o. fast kahl, Bl. eher kleiner, Gr. 3—5, Fr. glänzend scharlach.

Junge Zw., B.-Stiele, Blst. und B.-Unters. sind bei var. *villipes* ASHE, in Journ. E. Mitch. Soc. XVII. 2. 11. 1901, $\pm$ beh.

C. H. ASHE, l. c. XVI. 2. 78. 1900. — Nach SARG. (1905): Montreal und S.-Ontario bis S.-Maine, Z.-und W.-Mass., W.-New York, Rhode Isl. und O.-Pennsylv. — Ufer, Sümpfe. — Blz. V. — Frz. Anf. Sept. (Fr. fallen gleich). — In jungen Pflz. in Kultur.

Fig. 459. *Crataegus*: B.-Formen von: a—b *Boyntoni* — c—d *intricata* — e *Sargenti* — f—k *coccinea*; i—k var. *rotundifolia* — l *coccinoides* — m *flabellata* — n—o *Holmesiana* ($\frac{1}{2}$ n. Gr.) (Orig.)

○○ B.-Grund (wenigstens an Lgtr.) leicht herzfg. (Fig. 459l—m). Stb. 10—20, A. hellrot.

✱ B.-Lappen mit sehr fein lang vorgezogener Endspitze (m) Blst. locker beh., Stb. 10—12 (nach SARGENT aber 20), Bl. unter 2 cm Dm., Fr. oval, ca. 12:10 mm.

51. *C. flabellata*: großer b—h, Zw. kahl, (.) olivbraun; Dorne bis 6 cm; B. an Kztr. mit $\pm$ gerade abgestutztem o. breitkeiligem Grunde, bis ca. 6:5, an Lgtr. bis 9:8 cm, Obers. anfangs $\pm$ verstr. beh., zuletzt kahl o. fast kahl, Unters. stets kahler, bald ganz kahl, Stiel 1—4 cm; Blst. ca. 10-bl., Recept. $\pm$ beh., Gr. 3—5, sonst analog Fig. 460h, Fr. rot.

C. f. LGE. Rev. 28. 1897 (*Mesp. flab.* BOSC**), in SPACH, Hist. Veg. II. 63. 1834). Nach SARGENT, in Rhodora III. 75. 1901, in Quebec wild gefunden. Weitere Verbreitung mir unklar. — Blz. V. — Frz. IX. — Sehr bezeichnende B.-Tracht, doch ist folgende Art wohl sehr ähnlich!

*) Ob dann guter Unterschied, daß bei letzter die Gr. nicht ganz endständig, sondern etwas unter Spitze sitzen ähnlich Fig. 460h? KOEHNE bildet in Herb. Dendr. No. 37 die Frb.-Gipfel bei *rotundifolia* kahl ab und hält diese für gute Art. Dorne $\pm$ länger; mehr h.

**) Bei DC., Prodr. II. 630. 1825, wird der Name *Crat. flabellata* BOSC als obskur nur ganz nebenbei erwähnt, SPACH schreibt ausdrücklich *Mespilus*, m. E. muß man LGE. als Autor zitieren bei *Crataegus*.

53. *C. intricata*: dicht buschig, Zw. kahl, ☉ glänzend purpurbraun, Dorne dgl.; schlank, bis 3 cm; B. nur jung oben spärlich beh., sattgrün, unten kaum beh., wenig heller, 3.5 : 2.2—7 : 6 o. 7.5 : 5.5 cm, Herbstf. : purpurbraun, Textur + dünn, aber fest, Stiel 1—2.3 cm; Blst. 4—8 bl., spärlich beh., Trgb. dicht drüsig gezähnt, Bl. ca. 1.5—2 cm Dm., Gr. 2—4, Fr. düsterrot, vgl. Fig. 460 a—c.

C. i. LGE., in Bot. Tidskr. XIX. 264. 1895. — Ich sah von SARGENT bestimmte Expl. aus W.-Vermont und Mass. — Blz. V—VI. — Frz. IX—X. — In Kultur noch nicht hfg.

↗ B. im Umriß mehr breit oval, z. T. fast breiter als lang (Fig. 459 a—b), K. ganzrandig o. nur gegen Spitze gezähnt, Fr. kugelig, $\text{p} \sim \text{p}$, 2—6 m.

54. *C. Boyntoni*: soweit ich diese Art (?) nach von SARGENT bestimmtem Material kenne, weicht sie noch ab durch: Dorne bis 5.5 cm, B. 2.5—6 : 2—5 cm, derber; Blst. kahl, (Gr. 3—) 4—5), Fr. gelbgrün mit rotem Hauch, vgl. Fig. 460 d—f.

C. B. BEADLE, in Bot. Gaz. XXVIII. 409. 1899. — Nach SARGENT S.-Virg. bis N.-Georg., Alab., S.O.-Kent. und Tennessee. — Gebirge 400—1000 m, Ufer, Wälder etc. — Blz. V. — Frz. X (Fr. fallen sofort). — Wohl in jungen Pflanzen in Kultur.

○○ Stb. 20, A. rot, B. vgl. Fig. 459 e.

55. *C. Sargentii*: aufrechter $\text{p} \sim \text{p}$, bis 7 m, von *intricata* noch abweichend durch: B. an Lgtr. mehr breitoval, 2—9. 1—6 cm, Stiele bis 3.5 cm; Blst. 3—5-bl., kahl, K. $\pm$ verlaubt, Gr. 3—5, Fr. $\pm$ kugelig, 10—13 mm Dm., gelb o. orange-gelb mit rotem Hauch, zuw. mit dunklen Tupfen. Vgl. Fig. 460 g.

C. S. BEADLE, l. c. 407. — Ich sah nur ein Bl.-Orig.; sonst nach SARGENT: N.-Georg., S.O.-Tenn. und N.-Alab. — Blz. V. — Frz. IX (Fr. fällt sofort). — In jungen Pflanzen in Kultur.

Nachträge und Verbesserungen*).

- S. 6 lies: 1. var. *typica* $\times$ var. *italica*: *P. nigra* var. *croatica* (*P. croatica* W. et K., ex BESSER in Flora 1832. Beibl. 2, p. 14).
- S. 7 lies: 2. var. *italica* $\times$ var. *hudsonica*: *P. nigra* var. *plantièreensis* (*P. plantièrensis* HORT. SIM.-LOUIS).
- S. 13 bei No. 8 lies: var. b. *longifolia* (*P. longifolia* FISCH., in Bull. Ac. St. Petersbg. IX. 343. 1842, teste specim. orig.!).
- S. 22 lies: var. b. *Bolleana* LACHE, in der Deutsche Garten 500. 1878 [ex Gard. Chr. 1878. II. 503], et MAST., in Gard. Chr. 1882. II. 556. Fig. 96, et WESM. am zitierten Orte; alles andere außer dem Zitat DIPPEL ist hier zu streichen.
- S. 23 in Anmerk. Zeile 6 von oben streiche den Namen *P. Brandegeei*, da *monticola* beibehalten werden kann.
- S. 72 ist *Gale gale* zu streichen und *Gale palustris* voranzustellen.
- S. 75 in Gattungstabelle lies: 7. *Carya*.
- S. 76 Gattung 7: der Name *Carya* ist voranzustellen; lies demgemäß Sekt. a. *Apocarya* und No. 1. *Carya pecan* C. K. SCHN.
- S. 77 ist in Fig. 34 zu lesen: *a* — *Carya pecan* und *k* — *C. cordiformis* und bei der Nomenklatur ebenfalls der Name *Carya pecan* voranzustellen.
- S. 78 lies: 2. *Carya aquatica* NUTT.; 3. *Carya cordiformis* C. K. SCHN.; ferner 1×3 *C. pecan* $\times$ *cordiformis*, 1×6 *C. pecan* $\times$ *alba*, 1×7 *C. pecan* $\times$ *laciniosa*; Sekt. b. *Eucarya*, sowie in Anmerk. *C. myristiciformis*.
- S. 79 lies: 4. *C. glabra* und var. b. *microcarpa* C. K. SCHN., sowie letzte Zeile *Carya borealis* C. K. SCHN. (*Hic. borealis* ASHE).
- S. 80 lies in Fig. 36: *Carya glabra*, dementsprechend in der Synonymie zuerst *C. g.* C. K. SCHN., sowie No. 5 *C. ovata* und in den Anmerkungen *Carya villosa* C. K. SCHN. (*H. vil.* ASHE . . .) und *Carya caroliniae-septentrionalis* C. K. SCHN. (*H. car.* ASHE . . .).
- S. 81 lies in Fig. 37 und Fig. 38 *Carya ovata* und in der Nomenklatur *C. o.* C. K. SCHN.
- S. 82 lies: 6. *C. alba* und in Fig. 39 *Carya alba*; in der Nomenklatur stelle voran *C. a.* K. KOCH.

*) Dieser Nachtrag beschränkt sich fast nur auf nomenklatorische Hinweise, um die Benennungen mit den neuen Wiener Kongreßbestimmungen (vgl. Anmerkung, S. 593) in Einklang zu bringen. Bezüglich der Schreibweise der Speciesnamen sei nur darauf hingewiesen, daß in den Beschlüssen des Kongresses „empfohlen“ wird, alle von Eigennamen oder von alten Gattungsnamen abgeleiteten Speciesnamen groß zu schreiben. Eine „Regel“ ist es mithin nicht, ich habe aber doch bereits auf S. 593 begonnen, mich diesem Vorschlag anzuschließen und werde auch weiterhin daran festhalten. Eine Korrektur der bisher klein geschriebenen Speciesnamen zu geben, halte ich jedoch nicht für nötig, da im Generalregister später alle Namen den Wiener Beschlüssen gemäß gedruckt werden.

- S. 83 lies: 7. *C. laciniosa*; in Fig. 40 *Carya*: *a—e C. laciniosa*, *f—k C. ovata* und *l—o C. alba*, sowie in der Nomenklatur *C. l. C. K. SCHN.*
- S. 84, Fig. 41 lies: *a—g Carya laciniosa* und *h—n C. glabra* var.
- S. 87, Zeile 1 lies: *b. Vilmoriniana* CARR. und in Fig. 44 *b—d Carya aquatica*.
- S. 102 lies: 4×15 *B. lenta* $\times$ *pumila*.
- S. 114 lies: 19×22 *B. pendula* $\times$ *alba*: *B. hybrida* BECHST., denn dieser Name kann bleiben.
- S. 119, Zeile 7 von oben lies korrekt: *B. a. L.*, Sp. pl. 982. 1753 ex p. [sensu ROTH, Tent. Fl. Germ. . . .].
- S. 122 lies: Fig. 66 *l sinuata*, *o pendula* und weiter 6. *A. sinuata*.
- S. 123 ist in der Nomenklatur zu No. 6 der Name *A. sinuata* RYDB. voranzustellen; ferner lies: 9. *A. pendula* und stelle diesen Namen in der Nomenklatur voran.
- S. 124 lies in Fig. 67: *d—d² pendula*, *k—k¹ sinuata*.
- S. 127 lies in Fig. 68: *f—f² rubra*, *oregona* ist zu streichen.
- S. 128 lies in Fig. 69: *s—s¹ hybrida*.
- S. 130 bei 17×23 ist *A. hybrida* A. BR. als Hauptname voranzustellen, *A. spura* wird synonym, ferner lies *a. pubescens* (TAUSCH) CALL., *A. Tauschiana* wird synonym, *b. intermedia* CALL. (*A. int.* CALL. . . .) und *c. subincana* (SIMK.) CALL., var. *ambigua* CALL., ist zu streichen.
- S. 131, Zeile 1 lies: *A. hybrida*, ferner in Fig. 72 *d—e rubra*.
- S. 132 lies 19. *A. rubra*, welcher Name somit in Nomenklatur voranzustellen.
- S. 133 lies in Synonymie von No. 20: *tenuifolia* var. *virescens* KOEH.
- S. 136 lies Zeile 20 von oben: 1. *pinnatifida* WAHLB. und streiche dafür *pinnata* CALL.
- S. 137 lies: 1. *C. japonica*, und in Fig. 75 *b C. japonica*, dieser Name auch in Nomenklatur voranzustellen.
- S. 138 lies in Fig. 76: *l japonica*.
- S. 142 in Fig. 80 lies: *a i C. japonica*; ferner ändere bei Gattung 13 das Zitat in: *Ostrya* SCOP., Flor. carn. 414. 1760 und lies statt *O. ostrya C. virginiana*.
- S. 143 lies: var. *a. carpinifolia*, der Name *italica* ist zu streichen, da nicht rite publiziert*); ferner *b. typica*, und in Fig. 81 *Ostrya virginiana*.
- S. 155 in Fig. 91 lies: *p—r sativa*, sowie *t crenata*.
- S. 156 lies: 2. *C. sativa*.
- S. 157 lies in Fig. 92: *Castanea sativa*, welcher Name demgemäß in der Nomenklatur voranzustellen ist.
- S. 158 lies in Fig. 93: *Castanea sativa*, sowie 3. *C. crenata*.
- S. 159 lies: *C. crenata* S. et Z., der Name *pubinervis* ist zu streichen.
- S. 165 lies: 1×7 *Q. phellos* $\times$ *ilicifolia*, ferner 1×8 *Q. phellos* $\times$ *cuneata*, sowie 2. *Q. cinerea*.
- S. 166 lies, Zeile 1: *Q. cinerea* MCHX. (*brevifolia* SARG. ist zu streichen, ferner 2×9 *Q. cinerea* $\times$ *catesbei*, und in Fig. 98 *a cinerea*, *h cuneata*.
- S. 169 lies: 6×7 *marylandica* $\times$ *ilicifolia*, ferner 6×8 *Q. marylandica* $\times$ *cuneata*, und 7. *Q. ilicifolia*, welcher Name in der Nomenklatur voranzustellen, sowie 7×8 *Q. ilicifolia* $\times$ *cuneata*, 7×11 *Q. ilicifolia* $\times$ *velutina*, 7×16 *Q. ilicifolia* $\times$ *coccinea*.
- S. 170 lies in Fig. 101: *b Q. Kelloggii*, *c Q. cuneata*, *d—d¹ Q. ilicifolia*; sowie 8. *Q. cuneata*.

*) Vgl. FRITSCH, in Mitt. Naturw. Ver. Steierm. 1904. 102. Ich selbst hatte, WINKLERS Angabe vertrauend, versäumt, die 1. Ausg. von SCOPOLIS Flora nachzuschlagen

- S. 171 lies, Zeile 1: *Q. cuneata* WANGH., ferner unter Fig. 102 *g—h cuneata*, *m—n stellata*, *o Kelloggii* und *q—r ilicifolia*; sowie 8×11 *Q. cuneata* × *velutina*.
- S. 172 lies: 6×13 *Q. cuneata* × *rubra*, ferner 10. *Q. Kelloggii*, welcher Name in der Nomenklatur voranzustellen, sowie 10—27 *Q. Kelloggii* × *Wislizeni*.
- S. 179 lies unter Fig. 108: *q bicolor*, *u Mühlenbergii*.
- S. 195, Zeile 10 von oben, lies: *robur* var. *lanuginosa* LAM.
- S. 200, zu No. 45 sei folgendes bemerkt: in Gartenflora LIII. 657. 1904, macht KOEHNE darauf aufmerksam, daß eine *Quercus pseudoturneri* VEITCH schon längere Zeit (seit 1896/97 im Cat. Hort. SPAETH) als Gartennamen existiert. Infolgedessen tauft er meine *Q. pseudoturneri* in *Q. aizoon* KOEHNE um. Ich hatte, als ich den Namen *pseudoturneri* neu bildete, keine Kenntnis davon, daß ein analoger Name VEITCHS existiere, da ich in VEITCHS Katalog den Namen übersehen hatte und in SPÄTHS Kat. No. 111, 113 der Name so gedruckt ist, daß man unwillkürlich nur *Turneri* liest. Da nun, soweit bis jetzt bekannt, die *pseudoturneri* VEITCH nirgends rite publiziert ist, so wird wohl mein Name, der sich lediglich auf die *austriaca sempervirens* HORT. SPÄTH bezieht, bleiben müssen. Weiteres siehe im Hauptnachtrag am Schluß des Werkes!
- S. 202 lies: 47. *Q. bicolor*, welcher Name in der Nomenklatur voranzustellen ist, ferner 47×49 *Q. bicolor* × *alba*.
- S. 203 lies: 49×53 *Q. alba* × *stellata*.
- S. 205 lies unter Fig. 131: *f bicolor*, *h stellata*.
- S. 206 lies: 53. *Q. stellata*, welcher Name in der Nomenklatur voranzustellen ist.
- S. 207 lies: 56. *Q. Mühlenbergii*, welcher Name in der Nomenklatur voranzustellen ist, da *castanea* MÜHL. wohl durch die ebenfalls 1801, aber wie es scheint etwas vor jener, publizierte *castanea* NÉE ungültig gemacht wird.
- S. 216, zu No. 6, wäre zu bemerken: Die Nomenklatur unserer europäischen Ulmen ist eine höchst verworrene. LINNÉ'S *U. campestris* umfaßt unsere beiden Arten, denn nach Zitat BAUH. Pin. 426. *Ulm. campestris* & Theophr. hat er *glabra* MILL. und nach dem Zweig im Herbar (teste KERNER, Sched. fl. austr.-hung. exs. I. 98, No. 264. 1881) *scabra* MILL. vereint. Da nun MILLER'S *U. scabra* nicht, wie ich fide DIPPEL glaubte, in der 7. Ausg. seines Gard. Diet. 1759, sondern erst gleich *glabra* in ed. VIII. 1768 rite publiziert wurde, bleibt als ältester Autor, der beide Arten trennt, HUDSON. Fl. Angl. 94. 1762. Dies Werk, auf das mich Herr REHDER zuerst hinwies, liegt vor mir. HUDSON versteht dort unter *campestris* das, was die meisten Autoren so nennen und ich hier, S. 219, als *U. glabra* MILL. führe. Unter seiner 2. Art, *U. glabra*, vermengt HUDSON dann aber die *U. scabra* MILL. (*Ulmus folio latissimo scabro* GERARD*), Hist. Plant. 1481. 1633) und als β die zu *campestris* (vel *glabra* MILL.) gehörende *U. folio glabro* GERARD, l. c. (= *glabra* MILL. sens. str., *nitens* MOENCH, *campestris* var. *laevis* PLANCH. [*campestris* ?; Orme lisse SPACH]). Mithin scheint es nicht angezeigt, die *U. glabra* HUDS. als ältesten Namen für *scabra* MILL. anzunehmen, sondern ich glaube, man kann *scabra* MILL. ganz gut beibehalten!
- S. 217 unter Fig. 137 lies: *a—g Ulmus campestris*.
- S. 219 unter Fig. 138 lies: *i—o campestris*.
- S. 220, Zeile 20 von oben, ergänze hinter *f. umbraculifera*: (*camp. var. umb.* REHD. in BAIL., Cycl. IV. 1882. 1902) sowie dann hinter *f. Berardii*: (*camp. var. Berardii* REHD., l. c.), ferner weiter unten hinter *f. monumentalis*: (*camp. var. mon.* REHD., l. c.) und hinter *f. antarctica*: (*camp. var. antarctica* REHD., l. c.)
- S. 221, Zeile 1 lies: *U. campestris* L. [sensu HUDS., Fl. angl. 94. 1762]. Die *glabra* MILL. und *nitens* MOENCH gehören wohl einer besonderen Varietät an, auf die ich im Hauptnachtrag noch zu sprechen komme.
- S. 223 unter Gattungen lies: 24. *Zelkova*.

*) Diese Aufklärungen über GERARDS Werk, das ich nicht sah, entnehme ich alle RAY (Rajus) Hist. plant. II. 1425 27. 1688, dessen Angaben sehr verständlich sind.

- S. 224 lies: Gattung 24. *Zelkova* und demgemäß 1. *Z. ulmoides*.
- S. 225, Zeile 1 ist *Zelkova ulmoides* C. K. SCHN. voranzustellen und muß es unter Fig. 142 *Zelkova ulmoides* und unter Fig. 143 *Zelkova hirta* heißen.
- S. 226, Zeile 20 von oben, streiche *Abelicea abelicea* und setze *Zelkova abelicea* BOISS. an erste Stelle, ferner lies unter Fig. 144: *Zelkova hirta* und dann 2. *Z. hirta*, welcher Name als *Z. hirta* C. K. SCHN. in der Nomenklatur voranstehen muß*). Dort lies hinter *Zel. keaki* statt DIPPEL MAYR, Aus den Wald. Japans p. 32 u. 48. 1891.
- S. 235, unter Gattungen, lies: 29. *Maclura*.
- S. 236 unter Fig. 150 lies: *e—i Sassafrastr variifolia*.
- S. 237 lies unter Fig. 151: *s—u Maclura pomifera*.
- S. 239 lies: Gattung 29. *Maclura* NUTT., dann demgemäß *M. pomifera* und in Fig. 153 *Maclura pomifera* und in der Nomenklatur stelle voran *M. p.* C. K. SCHN.
- S. 240 unter Fig. 154 lies: *Maclura pomifera*; ferner lies bei Gattung 30 das Zitat: VENT. Tabl. règn. vég. III. 547. 1799*), und dann bei LAM. III. t. 762. 1798, teste O. KTZE. Soviel ich aus den Werken ersah, erschien die Beschreibung LAMARCKs erst in Enc. XV. 3. 1804 und die Tafel erst 1825, in Rec. de Planch. de Bot. de l'Enc. IV. VENTENAT hat allerdings LAMARCKs Tafel gekannt, ob aber *Papyrius* rite vor *Broussonetia* publiziert wurde, ist mir noch nicht sicher.
- S. 248 lies unter Gattungen: 40. *Arceuthobium*.
- S. 251 lies: Gattung 40. *Arceuthobium* und demgemäß dann *A. oxycedri* und unter Fig. 103 *Arceuthobium oxycedri* und stelle diesen Namen in der Nomenklatur voran.
- S. 315 lies: 47. *B. Regeliana* und in der Nomenklatur *R. r.* KOEHNE, apud C. K. SCHN., in Mitt. Dendr. Ges. 1905. 119; *B. japonica* C. K. SCHN. ist zu streichen.
- S. 316 lies an Stelle von *B. Neuberti* Baum.: Bastardgattung *Mahoberberis*, mit der Art *M. Neuberti* (da es nicht angeht, einen Gattungsbastard einer der beiden Gattungen einzureihen).
- S. 325 unter Fig. 204 lies: *m—q Cocculus orbiculatus*.
- S. 326 lies: Gattung 70. *Cocculus* DC., und unter Fig. 205 *k n Cocculus orbiculatus*.
- S. 327 ist bei 1 *Cocc. carolinus* DC. voranzustellen, ferner lies unter Fig. 206 *Cocculus carolinus* und bei 2 *Cocc. orbiculatus*.
- S. 328, Zeile 1 lies: *Cocculus orbiculatus* C. K. SCHN.
- S. 332 unter Fig. 209 lies: *b denudata*, *l grandiflora*, *m virginiana*.
- S. 334 lies: 11×13 *M. tripetala* × *virginiana*, ferner: 12. *M. grandiflora* welcher Name in Nomenklatur voranzustellen ist.
- S. 335 lies unter Fig. 211: *Magnolia grandiflora*, ferner: 13. *M. virginiana* und unter Fig. 335 *Magnolia virginiana*.
- S. 336, Zeile 1, stelle *Magnolia virginiana* voran.
- S. 342, unter Fig. 220 ersetze stets *Butneria* durch *Calycanthus*.
- S. 343 ersetze stets *Butneria* durch *Calycanthus* und streiche in der Anmerk. den letzten Satz: Die Gattung etc.
- S. 344 ersetze unter Fig. 221 *Butneria* stets durch *Calycanthus*.
- S. 345 ersetze *Butneria* stets durch *Calycanthus* und *Malapocenna* durch *Litsea*.
- S. 349 unter Gattungen oben lies: 81. *Litsea*; ferner ganz unten *S. variifolium*.

*) MAKINO nennt, in Tok. Bot. Mag. XVII. 1903. 13, diese Art *Zelkova serrata*, wegen *Corchorus serratus* THBG., in Trans. Lin. Soc. II. 1794. 335, allein der älteste Name bleibt *Corch. hirtus* THBG.!

**) PRITZELS Angabe 1794 ist falsch.

- S. 350 setze an Stelle von *Sassafras sassafras* stets *Sass. variifolium* und an Stelle von *Malapoenna Litsea*.
- S. 351 lies anstatt *Malapoenna* stets *Litsea*, bzw. stelle diesen Gattungsnamen voran.
- S. 373 zu 27. *P. pallidus* sei bemerkt, daß nach KOEHNE'S Äußerungen (mündlich und in ENGL. Jahrb. XXXVII. Literaturb. p. 40. 1906) dieser Name doch richtiger durch *P. coronarius* L. ersetzt würde. Vielleicht erscheint es am besten, unter *coronarius* diese europ.-vorderasiat. Formen zusammenzufassen und *pallidus* als var. auf die Exemplare in Steierm. und Siebb. zu beschränken.
- S. 375. Statt *Jamesia* lies: *Edwinia* HELLER, in Bull. Torr. Bot. Cl. XXIV. 477. 1897, da RAFINESQUE schon 1832 eine *Jamesia* publiziert hat. Mithin in Nomenclatur E. a. HELLER, l. c. (*James. am. TORR. et GR., l. c.*).
- S. 382 füge hinter *D. Pringlei* als Synonym ein: (*Neodeutzia ovalis* SMALL, in North Am. Flora XXII. pt. 2. 162. 1905).
- S. 408 lies: 13. *R. montigenum*, welcher Name in der Nomenklatur voranzustellen ist.
- S. 410 unter Fig. 263 lies: *b montigenum*.
- S. 414 unter Fig. 265 lies: *r mogollonicum*.
- S. 416 unter Fig. 266 lies: *i mogollonicum*.
- S. 417, Zeile 6 von oben ergänze hinter ZABEL, im H. d. D. D. G. 143. 1903, und setze dahinter in Klammer das Zitat *R. leiobotrys* KOEHNE von Zeile 8; ferner lies: 32. *R. mogollonicum*, welcher Name in der Nomenklatur voranzustellen ist.
- S. 429 unter Fig. 274 lies: *m—p Fothergilla alnifolia*.
- S. 430 lies: 1. *F. alnifolia*, sowie unter Fig. 275 *c—e Fothergilla alnifolia* und stelle diesen Namen in der Nomenklatur voran.
- S. 432 unter Fig. 277 lies: *h—m Tetrathyrium subcordatum*, ferner *n Loropetalum chinense*.
- S. 433 zu Gattung 115 sei bemerkt: wenn man *Loropetalum* und *Tetrathyrium* vereinigt, muß der Name *Tetrathyrium* vorangestellt werden. Vorläufig lasse ich die Zusammengehörigkeit dahingestellt und bitte vor *L. subcordatum* zu ergänzen als Hauptname *Tetrathyrium subcordatum* BENTH., l. c. 133, sowie die 2. Anmerkung zu streichen.
- S. 435 unter Fig. 279 lies: *a—m Fothergilla alnifolia*.
- S. 441 in der Gattungstabelle lies: 119. *Physocarpus*.
- S. 442: die Gattung 119 muß *Physocarpus**) RAF. heißen, mithin lies: 1. *P. opulifolius*, zitiere hinter var. c. und d. die Autoren KIRCHN., bzw. ZBL. und stelle den Namen *P. opulifolius* in der Nomenklatur voran.
- S. 443 lies: 2. *P. capitatus*, in Fig. 284 statt *Opulaster Physocarpus* und stelle den Namen *P. capitatus* O. KTZE., Rev. gen. I. 218. 1891 in der Nomenklatur voran.
- S. 444 lies: *P. amurensis* und stelle diesen in der Nomenklatur voran; ferner setze an Stelle von *O. pauciflorus* HELLER, *Physocarpus paucifl.* C. K. SCHN., non ZABEL, sowie an Stelle von *O. intermedius* RYDB., *Physoc. intermedius* C. K. SCHN. und lies weiterhin: 4. *P. monogynus*.
- S. 445, Zeile 4 von oben, lies: *Physocarpus monogynus* O. KTZE., l. c. I. 219. 1891, welcher Name voranzustellen ist. Unter Fig. 285 ersetze *Opulaster* stets durch *Physocarpus*.
- S. 446, Zeile 3 von oben lies: var. *alternans* (*Neillia var. alt.* JONES, l. c. 42).
- S. 447 unter Fig. 286 ersetze stets *Opulaster* durch *Physocarpus*.
- S. 448 unter Fig. 287 lies: *g—l Rhodotypos tetrapetala*.
- S. 471, zu 34. *S. fastigiata* ist zu bemerken: dieser WALLICH'sche Name erscheint als Nomen nudum nun doch nicht mehr akzeptabel, folglich kann *expansa* K. KOCH an seine Stelle treten, *expansa* WALL. aber bleibt synonym von *bella*.

*) Ich behalte diese durch MAXIMOWICZ's eingebürgerte Schreibweise bei.

- S. 472 ersetze stets *S. fastigiata* durch *S. expansa*.
- S. 485 lies: *S. laevigata* an Stelle von *S. altaiensis*.
- S. 486, Zeile 7 von oben: der Name *S. laevigata* ist voranzustellen und *Sib. altaiensis* zu streichen*).
- S. 487 unter Fig. 297 lies: *e—f*¹ *Sibiraea laevigata*, *l—l*¹ *S. Aitchisoni* und *m—m*¹ *Sorbaria grandiflora*.
- S. 488 lies: 2. *grandiflora*, und stelle den Namen *S. grandiflora* MAX. in der Nomenklatur voran.
- S. 489 lies unter Fig. 298: *d—h S. grandiflora* und *i—p Sib. laevigata*.
- S. 491 lies: 7. *S. Aitchisoni* und stelle diesen Namen in der Nomenklatur voran, ferner lies unter Fig. 299 *f. Aitchisoni*.
- S. 526 oben lies: statt *f. lanata f. vestita*.
- S. 589 ändere in der Gattungstabelle wie folgt:
- I. B. wie in Fig. 357 (S. 651), Zw. mit kurzen Achseldornen, Gr.-Ansatz tief seitlich, Sa. etwas aufsteigend, Endokarp holzig. 151. *Plagiospermum* (S. 651).
 - II. B. vgl. Fig. 333—355, Achseldorne fehlend, nur Kztr. hfg. verdornend, Gr. . . .
- Ferner lies Zeile 14 von oben: 151. *Osmaronia (Nuttallia)*.
- S. 728 bis 731 lies statt *Choenomeles* immer *Chaenomeles*, da diese erst später von LINDLEY und anderen Autoren gebrauchte eingebürgerte Schreibweise die richtigere sein soll.

*) Nach ASCHERSON, in Sitzb. Ges. Naturf. Freunde Berlin 1905. 220 ist LAX-MANNs Arbeit im Juni 1771 nur der Akademie vorgelegt worden, die Publikation wohl aber erst nach dem Oktober, also später als die LINNÉsche, erfolgt. Ich ziehe deshalb meinen Namen wieder ein.

Alphabetisches Register der Familien und Gattungen.

(Ein genaues Register der Arten und Formen folgt nach Abschluß des ganzen Werkes.)

Abelicea RCHB. 224.
Adenostoma HOOK. et ARN. 533.
Aethionema AIT. 357.
Akebia DECNE. 296.
Alnus GAERTN. 119.
Alyssum L. 358.
Amelanchier NUTT. 731.
Amygdalus L. 589.
Anonaceae DC. 347.
Aphananthe PLANCH. 226.
Arceuthobium M. B. 251, 806.
Aria HOST 686.
Aristolochia L. 252.
Aristolochiaceae BL. 252.
Armeniaca PERS. 634.
Aronia PERS. 698.
Arthrocnemum MOÇ. 265.
Asimina ADANS. 347.
Atragene L. 283.
Atraphaxis L. 255.
Atriplex L. 261.
Aucuparia MED. 667.

Basilima RAF. 486.
Basteria MILL. 343.
Benzoïn FABRIC. 351.
Berberidaceae TORR. et GR. 297.
Berberis L. 297.
Betula L. 97.
Betulaceae AGARDH 96.
Beurreria EHRET 343.
Boehmeria JACQ. 246.
Broussonetia L'HÉR. 240.
Brunnichia BANKS 259.
Buckleya TORR. 248.
Butneria DUH. 343.

Calligonum L. 257.
Calycanthaceae LDL. 342.
Calycanthus L. 343.
Capparidaceae LDL. 354.
Capparis L. 354.
Cardiandra S. et Z. 383.
Carpenteria TORR. 361.
Carpinus L. 136.

Carya NUTT. 76, 803.
Caryophyllaceae RCHB. 267.
Castanea MILL. 156.
Castanopsis SPACH 159.
Cebatha FORSK. 326.
Celtis L. 228.
Cerasus JUSS. 601.
Cercidiphyllum S. et Z. 424.
Cercocarpus KUNTH 529.
Chaenomeles LDL. 729, 808.
Chamaebatia BENTH. 532.
Chamaebatiaria MAX. 491.
Chamaemeles LDL. 761.
Chamitea KERN. 40.
Chenopodiaceae LESS. 260.
Chimonanthus LDL. 346.
Clematis L. 273.
Cocculus DC. 326.
Coleogyne TORR. 533.
Comandra NUTT. 247.
Comptonia L'HÉR. 73.
Cornidia R. et P. 393.
Cormus SPACH 683.
Corylopsis S. et Z. 431.
Corylus L. 144.
Cotoneaster L. 744.
Cowania DON 527.
Crassulaceae DC. 359.
Crataegomespilus SIM.-LOUIS 765.
Crataegus L. 766.
Crataemespilus CAMUS 766.
Cruciferae JUSS. 355.
Cudrania TRÉC. 242.
Cyclobalanopsis OERST. 210.
Cydonia MILL. 654.

Dasiphora RAF. 522.
Decumaria L. 394.
Dendromecon BENTH. 354.
Deutzia THBG. 376.
Dichotomanthes KURZ 707.
Disanthus MAX. 425.
Distegocarpus S. et Z. 136.
Dystilium S. et Z. 428.
Docynia DECNE. 728.
Drupaceae DC. 588.
Dryas L. 525.

Edwinia HELLER 807.
Ercilla JUSS. 267.
Eriobotrya LDL. 711.
Eriogonum MCHX. 254.
Eriogynia HOOK. 485.
Eriolobus ROEM. 725.
Escallonia MUTIS 397.
Eucommia Oliv. 424.
Euptelea S. et Z. 270.
Eurotia ADANS. 263.
Exochorda LDL. 493.

Fagaceae A. BR. 151.
Fagus L. 151.
Fallugia ENDL. 526.
Fendlera ENGELM. et GR. 376.
Fendlerella HELLER 376.
Ficus L. 243.
Fortunaea LDL. 75.
Fothergilla MURR. 430.

Gale ADANS. 72.
Grayia HOOK. et A. 262.

Hahnia MEDIC. 684.
Hamamelidaceae LDL. 423.
Hamamelis L. 433.
Hemiptelea PLANCH. 224.
Hesperomeles LDL. 762.
Heteromeles ROEM. 708.
Hicoria RAF. 76.
Hollboellia WALL. 295.
Holodiscus MAX. 495.
Homoiceltis BL. 226.
Hulthemia DUM. 537.
Hydrangea L. 384.

Iberis L. 356.
Illicium L. 328.
Ioxylon RAF. 239.
Itea L. 395.

Jamesia TORR. et GR. 375, 807.
Juglandaceae LDL. 74.
Juglans L. 84.

Kadsura JUSS. 341.
Kelseya C. K. SCHN. 485.
Kerria DC. 501.
Kochia ROTH 264.
Kunzia SPRGL. 528.

Lardizabalaceae LDL. 294.
Lauraceae LDL. 348.
Laurocerasus ROEM. 645.
Laurus L. 352.
Lindera THBG. 351.
Lindleya KUNTH 492.
Liquidambar L. 427.
Liriodendron L. 339.
Litsea LAM. 350.
Loranthaceae DON 248.
Loranthus L. 248.
Loropetalum OLIV. 433.
Luetkea BONG. 485.

Maclura NUTT. 239, 806.
Magnolia L. 328.
Magnoliaceae ST.-HIL. 328.
Mahoberberis C. K. S. 806.
Mahonia NUTT. 316.
Malapoenna ADANS. 350.
Malus MILL. 714.
Margyricarpus R. et P. 535.
Menispermaceae DC. 324.
Menispermum L. 325.
Mespilus L. 764.
Michelia L. 328.
Micromeles DECNE. 700.
Moraceae (LDL.) ENGL. 234.
Morus L. 235.
Muehlenbeckia MEISSN. 259.
Myrica L. 70.
Myricaceae LDL. 70.

Nagelia LDL. 742.
Nandina THBG. 323.
Neillia DON 446.
Neviusia GR. 502.
Nothofagus BL. 151.
Nuttallia T. et GR. 650.

Opulaster MEDIC. 442.
Osmaronia GREENE 650.
Osteomeles LDL. 762.
Ostrya SCOP. 142, 804.
Ostryopsis DECNE. 143.
Osyris L. 247.

Padus BORCKH. 637.
Paeonia L. 271.
Papaveraceae JUSS. 353.
Papyrius LAM. 240.
Parrotia C. A. MEY. 428.
Parrotiopsis C. K. SCHN. 429.
Pasania OERST. 160.
Peraphyllum NUTT. 713.
Persea GAERTN. 349.
Petrophytum C. K. SCHN. 484.
Philadelphus L. 362.
Photinia LDL. 706.
Physocarpus RAF. 442, 807.
Phytolaccaceae LDL. 267.
Plagiospermum OLIV. 651.
Planera GMEL. 222.
Platanaceae LDL. 435.
Platanus L. 435.
Platycarya S. et Z. 75.
Platycrater S. et Z. 383.
Polygonaceae LDL. 253.
Polygonum L. 258.
Pomaceae LOIS. 652.
Populus L. 2.
Potentilla L. 522.
Poterium L. 536.
Pourthiaea DECNE. 708.
Prinsepia ROYLE 651.
Prunus L. 589.
Pterocarya KUNTH 91.
Pteroceltis MAX. 227.
Purshia DC. 528.
Pyracantha ROEM. 761.
Pyrularia MCHX. 247.
Pyrus (L.) MEDIC. 655.

Quercus L. 161.

Ranunculaceae JUSS. 270.
Raphiolepis LDL. 704.
Razoumofskya HOFFM. 251.
Rhodotypos S. et Z. 501.
Ribes L. 399.
Rosa L. 536.
Rosaceae JUSS. 499.
Rubacer SMALL 506.
Rubus L. 503.

Salicaceae LDL. 2.
Salicornia L. 266.
Salix L. 23.

Santalaceae R. BR. 246.
Sarcobatus NEES 266.
Sarcostyles PRESL 393.
Sassafras NEES 349.
Saxifragaceae DUM. 360.
Schisandra RICH. 340.
Schizonotus LDL. 486.
Schizonotus RAF. 495.
Schizophragma S. et Z. 393.
Scoria RAF. 76.
Sedum L. 359.
Sibiraea MAX. 485, 808.
Silene L. 268.
Sorbaria A. BR. 486.
Sorbopyrus C. K. S. 666.
Sorbus L. 667.
Spiraea (L.) MAX. 449.
Spiraeaceae MAX. 440.
Spiraeanthus MAX. 492.
Stauntonia DC. 295.
Stephanandra S. et Z. 448.
Stereoxylon R. et P. 397.
Stranvaesia LDL. 712.
Suaeda FORSK. 266.
Sycopsis OLIV. 433.

Tetraglochin POEPP. 535.
Tetranthera JACQ. 350.
Tetrathyrium BENTH. 433.
Toxylon RAF. 239.
Trochodendraceae PRANTI. 269.
Trochodendron S. et Z. 269.

Ulmaceae MIRB. 211.
Ulmus L. 212.
Umbellularia NUTT. 349.
Urticaceae (ENDL.) WEDD. 245.

Vauquelinia CORR. 492.
Vella L. 358.
Vesicaria ADANS. 359.
Viscum L. 248.

Whipplea TORR. 382.

Xanthorrhiza MARSH. 273.

Zanthorrhiza L'HÉR. 273.
Zelkova SPACH 224, 806.