UC-NRLF

B 3 879 050

R. KOLKWITZ

Pflanzenphysiologie

Zweite Auflage

Jena, Gustav Fischer

EX LIBRIS

MAIN LIBRARY-AGRICULTURE DEPT.

BIOLOGY
LIBRARY
G

Pflanzenphysiologie

Versuche und Beobachtungen
an höheren und niederen Pflanzen
einschließlich Bakteriologie und Hydrobiologie
mit Planktonkunde

Von

R. Kolkwitz

Zweite, umgearbeitete Auflage

Mit 12 zum Teil farbigen Tafeln und 153 Abbildungen im Text.

Jena
Verlag von Gustav Fischer
1922

70 1922
ANNUAL

QK711
K6

1922
BIOLOGY
LIBRARY
G

Alle Rechte vorbehalten.

MAIN LIBRARY - AGRICULTURE DEPT

Aus dem Vorwort zur I. Auflage (1914).

Die vorliegende Veröffentlichung hat sich aus meinen „Pflanzen-physiologischen Versuchen zu Übungen im Winter“ 1899 (1) entwickelt. Diese Übungen bezweckten seinerzeit, die Studierenden an der Berliner Universität und Landwirtschaftlichen Hochschule durch selbständige Kursusübungen, nicht durch bloße Demonstrationen, in die physiologische Botanik einzuführen.

Bei der Auswahl der Versuche wurde besonderer Wert darauf gelegt, aus der großen Fülle des zur Verfügung stehenden Materials dasjenige herauszufinden, dessen Durcharbeitung im Vergleich zur aufgewendeten Zeit die beste Belehrung bot und dabei doch den als Richtschnur gewählten Zusammenhang wahrte. Nur keine Mißerfolge beim Experiment, die im Objekt selbst liegen! Im Gegenteil, geschickt gewähltes Kursusmaterial soll bei gründlicher Untersuchung sogar neue wissenschaftliche Ergebnisse zeitigen können. Außerdem sollten die Versuche den Experimentator fortwährend beschäftigen und ihm das Resultat nach Möglichkeit sogleich oder in kürzester Zeit vor Augen führen.

Ähnliche Übungen hielt ich auch mit Studienräten und Assessoren des höheren Lehramtes ab, also mit Herren, welche das akademische Studium bereits beendet hatten. Diese Kurse fanden in amtlichem Auftrage in der Preuß. Hauptstelle f. d. naturw. Unterricht statt.

Bei diesen Studien wurden auch die niederen Pflanzen von Anfang an berücksichtigt, doch waren die Planktonorganismen und die Hydrobiologie dabei zunächst nur schwach vertreten.

Meine Tätigkeit an der Preuß. Landesanstalt für Wasserhygiene in Dahlem gab mir reiche Gelegenheit, das Gebiet der Hydrobiologie zu pflegen, wodurch es sich von selbst ergab, die Wasserorganismen mehr und mehr in meine Übungen einzubeziehen und auch in besonderen Kursen zu behandeln. Bei den Kryptogamen habe ich die systematische Anordnung gewählt, weil sich hierbei die Physiologie gerade dadurch besonders lehrreich gestaltet, daß man die ganze Gruppe überblickt.

Bezüglich der Nomenklatur bin ich aus praktischen Gründen der Regel in der Zoologie gefolgt, wonach alle Gattungsnamen groß, alle Artnamen klein geschrieben werden.

Vorwort zur 2. Auflage.

Zwischen der 1. und 2. Auflage liegt der lange Krieg. Die durch ihn geschaffene Lage läßt es gegenwärtig besonders erwünscht erscheinen, beim Unterricht Versuche so einfach wie möglich zu gestalten, ohne ihre Genauigkeit dadurch zu beeinträchtigen. Diesen Gesichtspunkt habe ich überall zur Durchführung zu bringen gesucht, oftmals mit dem Wunsche, daß die Versuche einem Kolumbus-Ei ähneln möchten.

Die vorliegende Bearbeitung enthält einige neue Abschnitte (besonders VIII und IX), durch welche das besprochene Gebiet vervollständigt wird, sowie eine Reihe neuer Abbildungen.

Die Behandlung des gesamten Stoffes geschah derart, daß das Buch als Vereinigung einer theoretischen und einer praktischen Physiologie gelten kann. Es ist also für diejenigen bestimmt, welche in dem Buch nicht nur lesen, sondern danach auch arbeiten wollen.

Der größte Wert ist auf eine genaue Angabe der Literatur gelegt worden, um dem Benutzer das Nachschlagen in den Originalarbeiten zu erleichtern. Das Schriftenverzeichnis wurde deshalb um rund 300 Nummern vergrößert.

Die niederen Pflanzen sind absichtlich wieder ausführlicher behandelt worden, weil an derartigen Darstellungen in der Literatur Mangel sein dürfte.

Zur Vermeidung einer wesentlichen Steigerung des Umfanges der neuen Auflage habe ich mich entschlossen, unter dem allgemein gehaltenen Titel „Pflanzenforschung“ einen laufenden Kommentar in Heften herauszugeben, durch den es möglich wird, ergänzende Versuche, Methoden usw. etwas ausführlicher in einer Art kleiner Monographien mitzuteilen, wie ich es in meinen „Einzeldarstellungen“ (2) z. T. schon getan habe. Auf diese Weise ist es leicht, neuere Untersuchungen verhältnismäßig schnell nachzutragen und bestehende Lücken auszufüllen.

Während der Fertigstellung der neuen Auflage haben mich zahlreiche meiner Kollegen mit wertvollen Ratschlägen aufs freundlichste unterstützt, wofür ich ihnen an dieser Stelle vielmals danken möchte. Ganz besonderen Dank schulde ich wieder Herrn Studienrat H. Bethge für seine freundschaftliche Mithilfe und für sein reges Interesse an der zweckmäßigen Ausgestaltung der Arbeit. Auch dem Verleger,

Vorwort.

Herrn Dr. Fischer, bin ich für sein freundliches Eingehen auf alle meine Pläne und Vorschläge wiederum zu lebhaftem Dank verpflichtet.

Der großen Liebenswürdigkeit des Herrn Dr. Clemens Müller verdanke ich die nach natürlichen Objekten gezeichnete Tafel III, welche an die Stelle einer farbigen getreten ist.

Die zahlreichen neuen Textfiguren stammen auch diesmal wieder aus der bewährten Feder des als Zeichner an der Preuß. Landesanstalt für Wasserhygiene tätigen Lithographen Herrn B. Grefrath.

Steglitz, im März 1922.

R. Kolkwitz.

Inhaltsübersicht.

	Seite
Teil A. Phanerogamen.	
I. Gruppe. Notwendige Elemente und Nährsalze	3
II. „ Das Chlorophyll und seine Funktion	4
III. „ Diffusion, Osmose und Turgor	19
IV. „ Zucker, Stärke, Reservezellulose, fettes Öl	33
V. „ Eiweiß	51
VI. „ Wasser und Luft	58
VII. „ Atmung	68
VIII. „ Bewegung, Wachstum und Reiz	75
IX. „ Fortpflanzung und Vererbung	94
Teil B. Kryptogamen.	
I. Gruppe. Myxomycetes (Schleimpilze)	107
II. „ Schizomycetes, Bacteria (Spaltpilze)	111
III. „ Eumycetes, Fungi.	
1. Hefen	138
2. Schimmelpilze	146
3. Parasitische Pilze	155
4. Höhere Pilze	160
IV. „ Lichenes, Flechten	172
V. „ Algen; Neuston, Plankton und Benthos	180
VI. „ Ökologie der Gewässer	232
VII. „ Charophyta (Characeae), Armleuchtergewächse	244
VIII. „ Bryophyta (Muscineae), Moose	245
IX. „ Pteridophyta, Farne	259

Teil A.

Phanerogamen.

I. Gruppe. Notwendige Elemente und Nährsalze.

Allgemeines. Für die Pflanzen sind, von einigen Ausnahmen abgesehen, zum Aufbau 10 chemische Elemente unentbehrlich, nämlich C, H, O, N, S, P, K, Ca, Mg, Fe.

Der Kohlenstoff (C) wird von den grünen Pflanzen aus der Kohlensäure der Luft aufgenommen, er ist ein Hauptbestandteil des pflanzlichen Körpers und durch Verkohlen leicht nachweisbar.

Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O) stehen im Wasser zur Verfügung, der zum Atmen nötige freie Sauerstoff in der Luft. C, H und O werden hauptsächlich zu dem Kohlenhydrat Zucker verbunden.

Stickstoff (N), Schwefel (S) und Phosphor (P), mit den drei ersten Elementen vereint, bilden in der Regel die unentbehrlichen Bausteine des Eiweißes.

Kalium (K), Calcium (Ca), Magnesium (Mg) und Eisen (Fe) endlich sind Elemente, welche mehr im Dienste der Bildung und Speicherung z. B. von Kohlenhydraten stehen, soweit ihnen nicht noch andere Aufgaben zukommen (Kolloïdbeeinflussung usw.).

Zu den nicht für alle Pflanzen unbedingt erforderlichen Grundstoffen gehören Natrium, Chlor, Silicium und einige andere.

Nachweis der Elemente. Analysiert werden entweder die ganzen Pflanzen oder einzelne Organe oder bestimmte Zellbestandteile (mikrochemischer Nachweis). Die Mehrzahl der genannten Elemente ist durch den Pflanzenkörper mehr oder weniger gleichmäßig verteilt, während z. B. K und Mg, oft auch P, vielfach lokalisiert sind; ihr Nachweis geschieht darum mit Vorliebe in besonderen Pflanzenteilen, vor allem in Speicherorganen. Wegen der Methoden muß hier auf die einschlägige Literatur verwiesen werden, z. B. auf Molisch (2).

Nährsalze. Die meisten der genannten Elemente werden mit dem Wasser in Form von Nährsalzen aufgenommen, eine Tatsache, die besonders anschaulich durch Wasserkulturen, aber auch durch Topfkulturen in präpariertem (geglühtem) Sand nachgewiesen werden kann.

Die Richtung, in der die Salze wandern und sich ausbreiten, wird durch die Stellen des Verbrauchs oder der Speicherung bestimmt. Bei der Kultur von Hyazinthen in Gläsern wandern die Salze beispielsweise von der Zwiebel, also von oben her, in die Wurzeln ein.

Die bekanntesten Nährsalzlösungen sind diejenigen von Knop, Sachs, Pfeffer, Tollens und v. d. Crone. Mit Rücksicht auf die praktischen Schwierigkeiten, die sich erfahrungsgemäß vielfach der Aus-

führung solcher Versuche mit Nährsalzlösungen entgegenstellen, habe ich neuerdings Nährsalz-Tabletten¹⁾ von je 1 g herstellen lassen, von deren Anwendung später noch die Rede sein wird. Ihre Zusammensetzung ist folgende:

KNO ₃	20	g =	56,980	Proz. =	0,57	g je Tablette
CaSO ₄	7	„ =	19,943	„	= 0,20	„ „ „
KH ₂ PO ₄	5	„ =	14,245	„	= 0,14	„ „ „
MgSO ₄	3	„ =	8,547	„	= 0,09	„ „ „
FeCl ₃	0,1	„ =	0,285	„	= 0,003	„ „ „

Ausgangsgemisch 100,000 Proz. 1,003 g

Dieses Salzgemisch läßt sich ohne Bindemittel zu Tabletten pressen. Gelöst wird 1 g je Liter Wasser (Leit. W. oder dest. W.). Etwa verbleibender geringer Bodensatz ist belanglos. Die Reaktion dieser Nährlösung ist neutral oder ganz schwach alkalisch, das Phosphorsalz allein reagiert sauer.

Diese Tabletten stellen die anorganischen Pflanzenbestandteile, gleichsam die Pflanzenasche, dar, die in der Trockensubstanz nur in wenigen Prozenten enthalten ist.

Bei intensiver Ackerkultur pflegt mit mineralischen Nährsalzen in Form von Superphosphat, Thomasmehl, Kainit usw. etwas reichlicher gedüngt zu werden.

Das vorstehend beschriebene Nährsalzgemisch ist natürlich nicht dazu bestimmt, bereits seit langem bewährte Nährsalzlösungen allgemein zu ersetzen, es erleichtert aber die Durchführung der Kulturen in vielen Fällen.

II. Gruppe. Das Chlorophyll und seine Funktion.

Allgemeines über Assimilation. Die synthetische Verkettung der Elemente Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff geschieht durch die Kohlenstoff-Assimilation. Diese ist einer der wichtigsten Lebensvorgänge; sie erfolgt im Licht (Photosynthese) unter Mitwirkung des Blattgrüns nach der Formel:

Hiernach wird also von der Kohlensäure Sauerstoff abgespalten und der verbleibende Kohlenstoff mit Wasser zu Zucker verarbeitet.

Da Kohlensäure in einer Lösung von Chlorophyll selbst unter dem Einfluß des Lichtes, praktisch gesprochen, beständig ist, entsteht die wichtige Frage, wodurch die an dem Assimilationsvorgang beteiligten Stoffe in der lebenden Zelle wirkungsfähig werden, d. h. wodurch hier die auffallende Reaktionsgeschwindigkeit bedingt ist. Nach den eingehenden Untersuchungen von O. Warburg (1) ist sie dadurch zu erklären, daß Kohlensäure und Wasser an den Oberflächen der festen Zellbestandteile (Chlorophyllkörper) einer kapillarchemischen Adsorption und damit der

1) Hergestellt von der Firma Paul Altmann, Berlin, NW, Luisenstraße 47. Preis 1921: M. 1.— für 10 Stück.

Umwandlung unterliegen. Zerstörung dieser Oberflächen (durch Absterben der Zellen) bedeutet Zerstörung der Reaktionsorte und damit Aufhebung des Assimilationsvermögens.

Ohne den Chlorophyllfarbstoff findet in der höheren Pflanze keine Kohlenstoff-Assimilation statt. Ausnahmen davon finden sich unter den Bakterien, bei denen insbesondere der Nitratbildner *Bacterium nitrobacter* [vgl. Pfeiffer (1), Bd. 1] und der Schwefelorganismus *Beggiatoa* [vgl. Keil (1)] autotroph sind [CO_2 (ohne Chlorophyll) verarbeitend]. Freilich liegen in beiden Fällen noch keine Messungen über die Bilanz der Nährstoffumsetzung vor.

Das erste nachweisbare Produkt der Assimilation dürfte Traubenzucker ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) oder auch ein Disaccharid sein, das erste sichtbare dagegen Stärke. Die Gattung *Allium* (Schnittlauch, Zwiebel) bildet im Freien in den Blättern fast nur Zucker.

Nach A. v. Baeyer entsteht als Zwischenprodukt bei der Bildung des synthetischen Zuckers Formaldehyd (CH_2O), das einfachste Kohlenhydrat (von niedrigsten Molekulargewicht). Wenn dieser Stoff auch von derselben Oxydationsstufe ist wie der Zucker, und wenn aus ihm auch Fruktose künstlich hergestellt werden kann, so ist diese ganze Vorstellung bisher doch immer noch Hypothese; vgl. dazu H. Schroeder (1), S. 104, 116 u. 160; ferner Willstätter u. Stoll (2), Arbeit 7: Untersuchung über Zwischenstufen der Assimilation.

Es ist trotz eingehender Untersuchungen noch fraglich, ob es nachweisbare Zwischenprodukte bei diesem Prozeß überhaupt gibt.

Alle sichtbaren Strahlensorten des Spektrums ermöglichen die Assimilation, aber in ungleicher Stärke; vgl. z. B. Kniep u. Minder (1).

Die langwelligen, an den Ultrabezirk grenzenden roten Strahlen ermöglichen keine oder nur äußerst schwache Photosynthese.

Bei der Assimilation wird das absorbierte sichtbare Licht in hohem Maße ausgenutzt, auf jeden Fall besser als bei photochemischen Reaktionen in unbelebten Systemen; der Nutzeffekt ist also beträchtlich.

Die Assimilationsgröße ist dem Licht innerhalb gewisser Intensitäts- und Zeitgrenzen proportional; deshalb konnte Molisch (1) auch Porträtnegative und Ursprung (1) das Spektrum auf verstärkten Blättern durch Lichtwirkung zur Abbildung bringen (Jodprobe).

Neben der Assimilation findet auch Atmung, die entgegengesetzt wirkt, statt, die aber bei größerer Lichtstärke wenig zur Geltung kommt. Man kann sich das Zusammenwirken beider Vorgänge durch folgendes Beispiel veranschaulichen:

Assimilation: $66 \text{ CO}_2 + 66 \text{ H}_2\text{O} = 11 \text{ C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 66 \text{ O}_2$

Atmung: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2 = 6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O}$

Es verbleiben trotzdem: $10 \text{ C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 60 \text{ O}_2$

Bläschenversuch mit *Elodea canadensis*. Die Versuchsanordnung dient zum Sichtbarmachen des bei der Assimilation abgeschiedenen Sauerstoffs. In einfachster Weise kann man den Versuch so gestalten, daß man in ein gewöhnliches mit Wasser gefülltes Glas einen 10—15 cm langen einfachen oder verzweigten Stengel von *Elodea* mit unverletzter Spitze und frisch hergestellter Schnittfläche (Schere, scharfes Messer) in umgekehrter Lage hineinwirft und durch einen Glasstab am Aufsteigen verhindert. Am besten wählt man dichtbeblätterte, recht kräftige Triebe; in Winterruhe befindliche Exemplare bewahre man erst einige Zeit im Zimmer auf.

Schon bei Beleuchtung mittels Petroleumlampe wird man deutlich Sauerstoffbläschen in schnellem Tempo (z. B. sekundlich) und in regelmäßigen Abständen aus der Schnittfläche der von Luftkanälen durchsetzten Stengel infolge eines natürlichen inneren Überdruckes hervortreten sehen. Direktes Sonnenlicht ist nicht erforderlich, beschleunigt aber den Prozeß. Im Mondlicht beobachtete Ursprung (1) keine Stärkebildung. Im Dunkeln hört die Assimilation natürlich auf, meist sofort, wenn nicht ein erst noch auszugleichender Innendruck vorhanden ist. Auch im tiefen Schatten erzeugen manche Blätter keine nennenswerte organische Substanz; sie produzieren nicht, sondern konsumieren (atmen) nur. Regelmäßige Perlenströme von Bläschen treten immer nur aus Wunden aus, auch in Fällen, wo man solche Ströme in der freien Natur oder in Aquarien (an *Elodea*, *Myriophyllum*, *Ceratophyllum*, *Potamogeton* usw.) beobachtet.

Gelingt der Versuch nicht sogleich, so erneuert man ein- oder mehrmals die Schnittfläche mittels Schere unter Wasser, zweckmäßig oberhalb des nächsten Wirbels, da das dort befindliche Diaphragma hindernd gewesen sein kann. In den seltenen Fällen, wo auch dann die Bläschen ausbleiben, verwerfe man das betreffende Exemplar.

Bei Verwendung flacher Gefäße läßt sich das Ganze leicht projizieren. Sind die Küvetten sehr flach (8—10 mm Plattenabstand), läßt sich der Glasstab zum Festhalten entbehren, aber zum Entfernen störender Luftbläschen an den Wänden gut benutzen.

Für Wasserpflanzen veranschaulicht die Bläschenmethode (O_2 -Erzeugung) die Belüftung des Wassers, für Luftpflanzen bringt auch der Verbrauch der Kohlensäure die „Verbesserung der Luft“ mit sich.

Für historische Studien vgl. Ingen-Houss (1).

Assimilation und CO_2 -Menge. Bringt man den Sproß von *Elodea* in 10 Minuten gekochtes und wieder abgekühltes Wasser, so unterbleibt die Assimilation auch im Licht, weil keine Kohlensäure zur Verfügung steht.

Gibt man umgekehrt einige ccm Selterwasser hinzu (ev. verdünnt oder abgestanden), so wird das Tempo des Bläschenaufsteigens sehr beschleunigt.

Indigoversuch (Taf. I, Abb. 1). Die Methode dient zum chemischen Nachweis des Sauerstoffs. Sie ist jetzt mit Hilfe von nur zwei pulverförmigen Reagenzien¹⁾ (s. Abb. 1) sehr leicht auszuführen. Das Indigokarmin²⁾ (indigoschwefelsaures Natrium) wird in Leitungswasser gelöst, so daß in etwa 1 dm dicker Schicht eine tief himmelblaue Farbe entsteht (ca. 0,1 g je 1 l). Von dem Natriumhydrosulfit ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$)³⁾, welches in fester Form jahrelang haltbar ist, wird eine kleine Menge in ein Reagensglas gegeben, mit der 5–10fachen Menge gewöhnlichen Wassers übergossen und durch Umschwenken gelöst. Mittels Glasstab⁴⁾ oder Planktonpipette in die blaue Lösung gebrachte Tropfen (ein oder mehrere auf 100 ccm) entfärben das Indigoblau zu Indigoweiß⁵⁾. Dieses wird durch Einwirkung des Luftsauerstoffs sogleich wieder blau, und zwar bei ruhigem Wasser nur an der Oberfläche, beim Schütteln in allen Teilen.

Abb. 1. Reagentien für den Indigoversuch in Form von blauem (links) und weißem Pulver (rechts). Inhalt der Flaschen 25–50 ccm; ca. $\frac{1}{3}$ nat. Gr. (Orig.)

Als Versuchsgefäße dienen Küvettenflaschen⁷⁾ nach L. Kny (s. Taf I) oder runde Flaschen (kein Korkstopfen!). Diese werden, vollkommen gefüllt, mit einem durch Blei oder Eisendraht beschwerten tiefgrünen und dichtbeblätterten Endstück von *Elodea*⁸⁾ oder mit einem Blatt⁹⁾ beschickt. Nach vorsichtiger Entfärbung (1 Tropfen zuviel kann den Versuch verderben) wird der (ev. angefeuchtete) Stöpsel unter Verdrängen der überschüssigen Flüssigkeit aufgesetzt. Tritt, was öfter vorkommt, bald eine allgemeine Bläuung durch noch locker gebundenen Sauerstoff auf, so muß noch einmal durch einen Tropfen der Reduktionslösung entfärbt werden.

1) Durch größere chemische Fabriken zu beziehen, z. B. von Kahlbaum, Adlershof bei Berlin.

2) Die Verwendung von Fuchsin, Nigrosin usw. ist nicht zu empfehlen.

3) Auch herzustellen durch Schütteln von Zinkstaub mit einer Lösung von Natriumbisulfit (Natrium bisulfurosum siccum, NaHSO_3); vgl. Kolkwitz (1).

4) Auch Hutnadeln mit schwarzem Glaskopf oder Stricknadeln mit Kork geeignet.

5) Indigoküpe der Färber (cupa = Behälter), Küpe im übertragenen Sinne = Indigoweißlösung.

6) In den Formeln sind die unwesentlichen Teile fortgelassen worden. Die Oxydationsgleichung ist verdoppelt, um atomistischen Sauerstoff auszuschließen.

7) Zur Projektion geeignet.

8) Verwendbar sind auch: *Ceratophyllum*, *Myriophyllum*, *Potamogeton*, *Rivularia*, *Spirogyra*- und *Cladophora*-Watten, *Fontinalis*, *Hylocomium* (naß) u. a. m.

9) Man könnte auch große Präparatengläser oder große Flaschen mit viel Pflanzenmaterial verwenden.

Das Gefäß (s. Taf. I) wird nun auf oder gegen eine weiße Fläche gestellt und nicht mehr berührt. Als Lichtquelle können die verschiedensten Beleuchtungsarten dienen, von der Kerze bis zum direkten Sonnenlicht. Der Effekt der Bläuung durch den bei der Assimilation erzeugten Sauerstoff ist auf der Tafel I zu erkennen; er tritt bei guter Beleuchtung nach 10—20 Minuten deutlich hervor.

Bläschenausscheidung ist bei Anwendung der Indigomethode nicht zu beobachten, weil die Indigoweißlösung den Sauerstoff begierig schon an den Blattflächen aufnimmt.

Der Prozeß ist nach Willstätter u. Stoll (1) nicht anaërob, weil latenter (locker gebundener) Sauerstoff in geringer Menge in der Lösung zur Verfügung steht.

Im Dunkeln tritt keine Bläuung ein, ebenso nicht im Licht bei Verwendung chlorophyllfreier, befeuchteter Objekte (Wurzeln, Kartoffelstücke usw.). Vorheriger Zusatz von einigen ccm Selterwasser kann günstig wirken. Nach Verlauf einer Stunde ist der Versuch nicht mehr anschaulich, weil sich die Flüssigkeit durchweg gebläut hat, wenn sie nicht schwach gelatiniert war.

Abb. 2. Auffangen des im Licht erzeugten Sauerstoffs. Der Apparat wird auf eine weiße Unterlage gestellt; rd. $\frac{1}{4}$ nat. Gr. (Orig.)

Massenversuch zum O_2 -Nachweis.

Die Versuchsanordnung, welche mannigfach geändert werden kann, geht ungefähr aus der Abb. 2 hervor. Es handelt sich um einen „Bläschenversuch“ unter reichlicher Verwendung von *Elodea*-Material (mit frisch erneuten Schnittflächen) oder von anderen Wasserpflanzen wie *Myriophyllum*, *Ceratophyllum* u. a. m. Ferner eignen sich für diesen Versuch auch Laubblätter (*Tilia*), *Cladophora*-Strähnen und *Spirogyra*-Watten, bei denen aber kein regelmäßiger Bläschenstrom emporperlt. Der Sauerstoff steigt oft erst nach Klopfen am Glase oder nach Rühren mit einem Draht hoch.

Bindet man die Enden von *Myriophyllum* zusammen, um sie in ein Glasrohr einschieben zu können, so ist der Trichter entbehrlich [vgl. Detmer (1), Noll, Mangin].

Zu den Versuchsbedingungen gehören: helles Licht (am besten direkte Sonne), CO_2 im Wasser (ev. Zusatz von nicht mehr perlendem Selterwasser) und längere Versuchsdauer, nicht unter 12 Belichtungsstunden.

Nach Herabdrücken des Trichters kann, wenn hinreichende O_2 -Mengen entstanden sind, unter gleichzeitigem Öffnen des Glashahns das Glas durch ein umgekehrtes, mit Wasser gefülltes Reagensrohr

aufgefangen und ein glimmender Holzspan durch den angesammelten Sauerstoff entflammt werden.

Bakterienmethode von Th. W. Engelmann. Zu diesem Versuch bedient man sich sauerstoffbedürftiger (aërotaktisch reizbarer) Bakterien [z. B. *Pseudomonas (Bacterium) fluorescens*], welche lebhaft beweglich sind, wenn Sauerstoff zutreten kann, dagegen zur Ruhe kommen, wenn er fehlt.

Übergießt man ein höchstens fingergliedgroßes, geschabtes, mageres Stück rohen Fleisches oder etwa 10 zerkleinerte Erbsen mit 100 ccm Leitungswasser, so entwickeln sich in dem Wasser sauerstoffbedürftige Bakterien aus vorhandenen Keimen in wenigen Tagen (bei höherer Temperatur schneller), vorwiegend an der Oberfläche (Rohkultur). Auch Kuhstalljauche mit darin befindlichen *Spirillum* kann verwendet werden. Bringt man einen Tropfen davon auf den Objektträger und legt ein *Elodea*-Blattstück oder einen Faden von *Spirogyra* dazu, so wird man, wenn das Deckgläschen so aufgelegt wird, daß keine Luftblasen entstehen, schon bei einer 250fachen Vergrößerung leicht wahrnehmen, daß die meisten Bakterien dieses Gemisches sich nur in unmittelbarer Nähe des assimilierenden Objektes bewegen, ein Beweis dafür, daß tatsächlich im Licht durch die grünen Zellen Sauerstoff erzeugt wird. Im Bedarfsfalle kann man das Deckgläschen mit einem Vasilinring umgeben. Stülpt man eine Papp- oder Blechpappe zwecks Verdunkelung über das ganze Mikroskop, so kommen nach kurzer Zeit die Bakterien zur Ruhe, um bei erneuter Belichtung durch Abheben der Kappe die Bewegung sofort wieder zu beginnen. Oft wird man auch in großer Entfernung vom Blatt noch vereinzelte Bakterien herumschwimmen sehen; diese gehören zu den Anaëroben und sind für den Versuch nicht geeignet, da sie ihre Beweglichkeit auch bei Mangel an Sauerstoff beibehalten.

Die Verwendung rein gezüchteten Bakterienmaterials erhöht natürlich die Exaktheit des Versuches, da störende Nebenerscheinungen fortfallen. Sollen brauchbare Reinkulturen längere Zeit zur Verfügung stehen, so sind die Bakterien alle 2—3 Tage in neue Kulturröhrchen überzuimpfen (vgl. den Abschnitt Bakteriologie).

Will man zeigen, daß es gerade die grünen Chromatophoren sind, welche den Sauerstoff ausscheiden, so kann man das *Elodea*-Blatt zerzupfen und das Wimmeln der Bakterien an den herausgetretenen Chromatophoren beobachten. Dann muß man aber die Vorsicht gebrauchen, die Zellen unter dem Deckgläschen in eine etwa 10%ige Rohrzuckerlösung zu legen, weil reines Wasser auf die Chromatophoren, welche in der intakten Zelle mit Zuckerlösung in Berührung sind, tödlich zu wirken pfllegt.

Sehr geeignete Objekte für vorliegende Versuche sind auch einzeln oder in Verbänden lebende Diatomeen, Oscillatorien, Spirogyren (s. dort) und viele andere mehr. Vgl. Th. W. Engelmann (1).

Zuckerbildung in Blättern. Zum Nachweis des synthetischen Zuckers empfiehlt sich vor allem die Verwendung der Blätter von *Allium* (Schnittlauch, Zwiebel und von anderen Liliaceen im frischen oder getrocknetem Zustand). *Elodea* ist als „Stärkepflanze“ weniger geeignet. Die Blätter werden in Stücke geschnitten und im Reagensglas unter mäßigem Erhitzen mit Wasser ausgelaugt. Der Nachweis des dabei ausgetretenen Zuckers geschieht durch Fehlingsche Lösung (s. Gruppe IV).

Die Zuckererzeugung läßt sich auch durch vermehrte Zufuhr von Kohlensäure und Licht, nicht über ein gewisses Maß steigern.

Der Nachweis von synthetischer Stärke erfolgt makroskopisch durch die Sachs'sche Jodprobe, die als bekannt vorausgesetzt wird.

Hier sei nochmals darauf hingewiesen, daß die Zuckerbildung durch Assimilation in Verbindung mit Nährsalzgaben die Entwicklung vieler grüner Pflanzen in Wasserkulturen restlos ermöglicht.

Assimilationsorgane. Größere Laubbäume tragen 100—200 000 Blätter, Nadelhölzer 10—40 Millionen Nadeln. Die gesamte Blattfläche eines Buchenwaldes ist etwa dreimal, diejenige eines Tannenwaldes 5—10mal so groß wie die entsprechende Bodenfläche (Standraum). Die starke Oberflächenvergrößerung der Pflanze ermöglicht ihr eine gute Ausnutzung der Kohlensäure und des Lichtes. Auch der feinere Bau des Assimilationsgewebes zielt zum Teil darauf ab.

Zur Veranschaulichung des anatomischen Baues der hauptsächlich assimilatorisch wirkenden Gewebe und zur Darstellung der Einwirkung des Lichtes auf die Blattstruktur ist in Abb. 3 je ein Querschnitt durch ein Schatten- und Sonnenblatt der Buche (*Fagus sylvatica*) nach L. Kny abgebildet.

Wegen anatomisch-physiologischer Einzelheiten im Bau des Assimilationsgewebes sei auf Haberlandt (1) verwiesen.

Allgemeines und Theoretisches über Chlorophyll. Dieser wichtige Farbstoff ist erst neuerdings durch die exakten quantitativen Untersuchungen von Willstätter u. Stoll (1) genauer bekannt geworden. Er findet sich in der lebenden Pflanze im fettähnlichen (lipoiden) Zustande, ohne merkliche Fluoreszenzerscheinungen.

Die genaue chemische Analyse hat das Vorhandensein von vier Pigmenten in den Chloroplasten ergeben, zwei grünen und zwei gelben, von folgender Natur:

1. $C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$ (Chlorophyllkomponente a, in Lösung grünblau),
2. $C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$ (Chlorophyllkomponente b, in Lösung reingrün),
3. $C_{40}H_{56}$ (Karotin, Kristalle orangerot),
4. $C_{40}H_{56}O_2$ (Xanthophyll, Kristalle gelb).

Die vier genannten Komponenten finden sich in allen grünen Pflanzen, gleichgültig, ob sie grasgrün, moosgrün oder tannengrün sind.

Der Gehalt der Blätter an Chlorophyll ($a + b$) beträgt etwa 0,8 % der Trockensubstanz, nämlich 0,6 % Chlorophyll a (bläulich) und 0,2 % Chlorophyll b. Die gelben Karotinoide (so benannt von Tswett) machen 0,1 bis 0,2 % vom Trockengewicht aus, wovon auf Karotin 0,03—0,08, auf Xanthophyll 0,07—0,12 % entfallen.

Das Chlorophyll verkohlt beim Erhitzen ohne zu schmelzen und hinterläßt beim Glühen 4,5 % Asche von reiner Magnesia (MgO), ohne Phosphor oder Eisen, obwohl Fe zur Bildung des Chlorophylls in

Schattenblatt

Sonnenblatt

Abb. 3. Querschnitte durch das Blatt der Buche (*Fagus sylvatica*). Im Schatten entwickeln sich Palisadenzellen und Schwammgewebe viel schwächer als in der Sonne. Vergr. mittelstark. (Nach L. Kny.)

der lebenden Pflanze nötig ist. Organische Magnesiumverbindungen sind überhaupt sehr reaktionsfähig und ermöglichen leicht komplizierte Synthesen.

Eine nahe chemische Verwandtschaft von Teilstücken (Pyrrolring) des Chlorophylls und Hämatins im Blut ist ohne Zweifel vorhanden. Daraus darf man aber nicht auf die gleiche Funktion beider Verbindungen schließen, denn die physiologischen Eigenschaften des Chlorophylls sind nicht durch die Pyrrolkerne, sondern durch deren Seiten

gliedert bedingt. Aber sowohl die assimilatorische Fähigkeit des Chlorophylls wie die respiratorische des Hämatins sind an die Gegenwart von Metallen (Mg bzw. Fe) geknüpft.

Die Hauptfunktion des Chlorophylls wird durch die Komponenten a und b bedingt, das Chlorophyll im engeren Sinne des Wortes (früher als Cyanophyll bezeichnet).

Nach E. Stahl (1) kommt dem Grün als solchem eine biologische Bedeutung zu, nämlich die, das Himmelslicht am besten ausnutzen zu können.

In der Dunkelheit nehmen die meisten grünen Gewächse gelbe Farbe an (Etiollement, Bleichsucht), die meist durch die Karotinoide (Komponenten 3 und 4), bei manchen aber durch Flavone bedingt ist. Bei Belichtung setzt die Chlorophyllbildung sofort ein. Viele Keimpflanzen der Nadelhölzer (auch viele Algen) bilden selbst im Dunkeln Chlorophyll [vgl. Pfeffer (1), S. 318]. Gelbe Farbtöne an sonst grünen belichteten Organen werden als Chlorose bezeichnet.

Diaphanoskop nach Kolkwitz. Durchleuchtete Blätter erscheinen in einfacher Lage grün, in dickeren Lagen (4 bis 6 übereinander) schön tiefrot.

Man befestigt den Halter des Apparates¹⁾ (Abb. 4) an einem Stativ und legt die Blätter auf das Loch der Blechhülle, welche die elektrische Lampe umgibt. Im dunkeln Zimmer ist dann die geschilderte Erscheinung leicht zu beobachten. Als Versuchsobjekt können alle grünen Blätter (frisch oder getrocknet) dienen; besonders empfohlen seien gut gesäuberte Blätter von:

<i>Aspidistra elatior</i>	<i>Sambucus nigra</i>
<i>Brassica oleracea</i>	<i>Sonchus oleraceus</i>
<i>Cochlearia armoracia</i>	<i>Spinacia oleracea</i>
<i>Fragaria vesca</i> (Adern eher rot werdend)	<i>Symphoricarpus racemosa</i>
<i>Hedera helix</i> (grüne B.)	<i>Syringa vulgaris</i>
<i>Nymphaea alba</i>	<i>Trifolium pratense</i> .

Statt des Diaphanoscops kann man auch eine frisch gefüllte Taschenlampe benutzen und auf diese die (größeren) Blätter direkt auflegen.

Das gleiche Rot erhält man, wenn man eine Flasche mit möglichst gesättigter, klarer Chlorophylllösung vor die runde Öffnung hält.

Die Erscheinung kommt dadurch zustande, daß die an das Ultrarot grenzenden langwelligen Teile des Spektrums (bei der Linie A) die Blätter oder die Chlorophylllösung passieren, während das kurzwelligere Rot, Orange, Gelb-Grün, Blau und Violett absorbiert werden, so daß ein im wesentlichen einfarbiges Licht entsteht. Betrachtet man eine verdünnte grüne und eine konzentrierte, tintenartige Chloro-

1) Gefertigt von der Firma Leppin u. Masche, Berlin SO, Engelufer 22.

phyllösung durch einen Apparat mit zwei übereinanderliegenden Vergleichsspektren, so erkennt man leicht, daß das Rot der satten Chlorophyllösung ultrarotwärts von dem bekannten Adsorptionsstreifen bei C, wie ihn die verdünnte Lösung zeigte, liegt. Dieses äußerste Rot ist bekanntlich der Bezirk, in welchem die Assimilationskurve schnell abfällt und in dem auch kaum ein Ergrünen etiolierter Pflanzen erfolgt. Wir haben es in dem durchgelassenen Rot also mit einer für die Pflanzen ziemlich wertlosen Strahlensorte zu tun, während das kurzwelligere Rot zwischen B und C die Assimilation bekanntlich sehr fördert. Beide Lichtbezirke erscheinen dem Auge aber so gut wie gleich und sind nur spektroskopisch sicher zu unterscheiden. Würde man die Fenster eines Gewächshauses aus Glas des einen Rotbezirkes, die eines zweiten aus Glas des anderen Bezirkes herstellen, so würden nur die mit kurzwelligerem Rot bestrahlten Pflanzen gut gedeihen. Das Rot des einen Gewächshauses, vom Innern des anderen her beobachtet, würde, wenn beide dicht beieinander liegen, naturgemäß schwarz ergeben, ebenso auch das tiefe Chlorophyll-Rot, wenn es mit Glas vom ungefähren Strahlenbezirk B bis C betrachtet würde.

Abb.4. Diaphanoskop. Dient zum Durchleuchten aufgelegter Gegenstände. Der Stiel wird angeschraubt und an einem Stativ befestigt. Die Lochweite beträgt 3 cm; rd. $\frac{1}{4}$ nat. Gr. (Orig.).

Die große Durchlässigkeit des Chlorophylls für äußerstes sichtbares Rot ist übrigens keine auf das Blattgrün beschränkte Erscheinung; wir finden sie auch bei anderen Lösungen besonders organischer Farbstoffe (z. B. Gentianaviolett, Indigo, Lackmus, Methylenblau, Methylgrün usw.), nicht aber bei Berliner Blau und Kupfersulfat. Rot wird ebenfalls durchgelassen durch dickere Lagen von Papier, Zeichenkarton, Holz, Kartoffelgewebe usw. Aus physikalischen Gründen besteht also keine Möglichkeit für die grünen Pflanzen, das langwellige Rot in nennenswertem Maße auszunutzen (Abfallstrahlen) [vgl. Kolkwitz (2)].

Die lichtfiltrierenden Eigenschaften des Chlorophylls bringen es mit sich, daß den Bodenpflanzen im dichten Waldesschatten nur ein gegenüber dem normalen verändertes Licht zur Verfügung steht. Vgl. auch Sachs (1). Trotzdem ist das Chlorophyll dieser Schattenpflanzen dasselbe, wie das aller übrigen.

Chlorophyll: Extraktion, Fluoreszenz, Spektrum. Übergießt man frische grüne Blätter mit Alkohol und zerreibt sie unter Zufügen von Sand in einer Porzellanschale, so erhält man eine Lösung des wirklichen Blattgrüns in seinem natürlichen, unzersetzten Zustand, dessen Spektrum dem im lebenden Blatt ähnlich ist. Schon nach kurzer Zeit

treten aber kleine Veränderungen ein, die für die folgenden Versuche indessen nicht von Belang sind.

- Man kann deshalb auch in der Weise verfahren, daß man die mit Alkohol (ev. Brennspiritus) übergossenen Blätter im Dunkeln einige (bis 24) Stunden stehen läßt. Erwärmen ist dabei nicht anzuraten. Dazu werden Blätter (nicht zu alte) der Brennessel (*Urtica dioica* oder *urens*) grob zerschnitten oder zerzupft, in eine weithalsige Flasche von etwa 60 ccm Inhalt dicht eingestopft (s. Abb. 6) und (ev. nach schwacher Befeuchtung durch Wasser) mit 80—98 % Alkohol übergossen (völlig durchtränkt). Nach 6—24 Stunden ist die Extraktion beendet. Die tief dunkelgrüne Lösung wird abgegossen, möglichst filtriert oder durch Absitzenlassen geklärt und in einer viereckigen Flasche (z. B. Pulverstandflasche) im Dunkeln aufbewahrt. Die extrahierten Pflanzenteile erscheinen mehr oder weniger weiß. Das Brennesselgrün ist besonders haltbar und kann als Extrakt noch nach Monaten [im Winter¹⁾] zu Versuchen verwendet werden. Dieser Echtheit wegen wird es auch technisch zum Färben von Likören u. a. benutzt. Es empfiehlt sich, eine zweite Lösung mit Aceton (Essiggeist) herzustellen.

Stellt man die Flasche auf den Kopf, so erscheint die Flüssigkeit im dünneren Halsteil grün, im dickeren Bauchteil im durchfallenden hellen Licht (z. B. einer guten Taschenlampe) dagegen rot (s. Diaphanoskop).

Die Fluoreszenz liefert im (seitlich) auffallenden Licht eine blutrote Farbe, besonders bei dunklem Hintergrund, am schönsten in einem Sonnenstrahl, der in eine dunkle Zimmerecke fällt; verdünnt man die Lösung und läßt mittels einer Linse einen Lichtkegel in die grüne Flüssigkeit einfallen, so erscheint dieser durch Fluoreszenz rot. Das Fluoreszenzrot liegt bei der Fraunhoferschen Linie C. Über das mikroskopische Studium der Chlorophyllfluoreszenz (in Kapillaren), vgl. Molisch (2).

- Das Spektrum konzentrierter Chlorophylllösungen ist so gut wie einfarbig, da es fast nur das langwelligste Rot enthält. Verdünntere Lösungen von Rohchlorophyll zeigen dagegen ein weit differenzierteres Spektrum. Man füllt diese Lösungen in Lindnersche Flaschen (s. unter diesen) oder in Küvetten und betrachtet diese je nach der Konzentration von der Schmal- oder Breitseite. Als Lichtquelle ist das Diaphanoskop mit mattgläseriger Birne zu empfehlen. Man erkennt Absorptionslinien in allen Farbbezirken des Spektrums, sehr deutlich im Rot bei der Fraunhoferschen Linie C, am schwächsten im Grün, während Blau und Violett vollständig ausgelöscht erscheinen. Einzelheiten s. bei Willstätter u. Stoll (1), S. 49 u. 169; (2), S. 266.

Nach Zusatz von Säure wird die Chlorophylllösung bräunlich (Phäophytin). Der Absorptionsstreifen im Grün tritt nun deutlich

1) Im Notfall sind im Winter auch grüne, gesäuberte Efeublätter (vor starkem Frost) zur Extraktion verwendbar.

hervor (schon in dünner Schicht bei Benutzung einer Planktonkammer), ein sicheres Kennzeichen für zersetztes Chlorophyll. Vgl. auch Molisch (2) S. 246 u. 247.

Im Spektrum des roten Blutes liegt der deutlichste Absorptionsstreifen im Gelb. Er ist leicht zu zeigen durch Unterlegen einer gut brennenden Taschenlampe unter die seitlich aneinandergelegten Finger einer Hand und Betrachten mit dem Spektroskop, am besten im verdunkelten Zimmer.

Statt mit Lösungen kann man das Spektrum des Chlorophylls auch an lebenden (ev. mit Wasser injizierten) Blättern studieren; vgl. Reinke (1), Kaiser (1).

Chlorophyll: Zerlegung. Die grünen und gelben Bestandteile lassen sich zu zwei und zwei leicht voneinander trennen. In die am besten frisch bereitete Chlorophylllösung hängt man einen Streifen guten Fließpapiers, so daß die Flüssigkeit frei verdunsten kann (Taf. I, Abb. 3). Schon nach kurzer Zeit ist in der Regel der gelbe Farbstoff kapillar, höher hinaufgezogen als der grüne (Goppelsroeder's Kapillaranalyse). Man kann auch den Streifen zu einem Winkel falten und den einen Schenkel in die Lösung stellen. Die Zerlegung in die vier Bestandteile bietet größere Schwierigkeiten, ist aber von Tswett durchgeführt.

Eine zweite Methode der Trennung besteht (nach G. Kraus) darin, daß man zwei Lösungsmittel benutzt, z. B. den alkoholischen Extrakt mit Benzin oder Petroläther im Röhrchen vermischt. Setzt man tropfenweise Wasser zu, so tritt eine Entmischung der Emulsion in zwei scharf getrennte Schichten ein (Taf. I, Abb. 2), eine obere dunkel- bis blaugrüne Benzinschicht [Cyanophyll¹⁾] und eine untere gelbe Alkoholschicht (Xanthophyll im weiteren Sinne); die gleiche, meist promptere Wirkung, erhält man durch Versetzen einer Aceton-Chlorophylllösung mit Benzin. Die obere Schicht fluoresziert blutrot, die untere nicht (ev. zunächst längeres Stehen im Dunkeln). Die Spektren beider Teile (vgl. Willstätter) sind ganz verschieden; nur die dunkelgrüne obere Schicht enthält noch den charakteristischen Absorptionsstreifen im Rot, während die untere, welche ihre Farbe den Karotinoiden verdankt, nur im Blau und Violett Absorptionsstreifen zeigt.

Grünkohlversuch. Beim Vergilben der Blätter wird der grüne Anteil farblos, während der gelbe zurückbleibt. Läßt man ein tiefgrünes ausgewachsenes Blatt vom Grünkohl (z. B. im November) gegen Austrocknen geschützt 1—2 Tage liegen, so wird es am Saum gelb, nach einigen weiteren Tagen ist es vollkommen vergilbt. Die Komponenten a + b sind also farblos geworden, ohne daß eine Ableitung ihrer Abbauprodukte stattfand. Das Verschwinden des grünen Farb-

1) Die konzentrierte ätherische Lösung der Chlorophyllkomponente a kann man (nach Willstätter) geradezu blau nennen.

stoffes, ist offenbar eine bloße Folge des Funktionsverlustes und steht mit dem Ableiten von Nährstoffen vor dem Blattfall nicht in Beziehung.

Herbstfärbung. Das Gelbwerden der Blätter im Herbst verläuft oft ähnlich wie im vorstehend beschriebenen Falle. Nährstoffe werden vor dem Blattfall zwar in Zweige und Stamm abgeleitet, es bleiben aber noch merkliche Mengen in den abgeworfenen Blättern zurück, so daß eine Ableitung der im Chlorophyll enthaltenen minimalen Stickstoffmengen nicht in Betracht kommt; vgl. Kolkwitz (3). Das Herbstgelb bzw. -braun wird öfter verstärkt durch Bräunung der Membranen (Färbung etwa wie bei der Zigarre). Die Rotfärbung wird häufig (z. B. beim wilden Wein) durch Anthocyan-Farbstoff bedingt, der im Zellsaft gelöst ist (wie in den Weinbeeren).

Abb. 5. „Kristallisiertes Chlorophyll“ im Blatt (mikroskopischer Schnitt) von *Heracleum*, nach der Borodinschen Methode gewonnen. (Neuzeichnung nach Willstätter u. Stoll.)

Chlorophyll: Kristalle. Das Auskristallisieren der grünen Komponenten $a + b$ kommt in der freien Natur nicht vor, gelang aber im Laboratorium und war für die Erforschung des Chlorophylls von großer Bedeutung.

Chlorophyllkristalle wurden zum erstenmal 1881 von J. Borodin (1) in St. Petersburg an mit Alkohol behandelten mikroskopischen Präparaten beobachtet. Unter 776 daraufhin geprüften Pflanzenarten lieferten 190 Arten (also 24 %) solche Kristalle. 1893 gelang es N. A. Monteverde (1) ebenda, die Natur dieser Körper durch eingehende Untersuchung des Spektrums an makroskopischen Proben als Chlorophyll näher zu kennzeichnen.

Von 1907 ab veröffentlichte dann R. Willstätter (1) mit seinen Mitarbeitern ausführliche chemische Untersuchungen unter Verwendung

1.
Indigomethode $\frac{2}{3}$.

2.
Chlorophyll-Zerlegung. $\frac{1}{4}$.

3.
Chlorophyll-Zerlegung $\frac{1}{1}$.

4.
Künstliche Zelle $\frac{1}{1}$.

großer Mengen von Material, wodurch wir mit der chemischen Natur dieser Kristalle ausgezeichnet bekannt geworden sind. Eine Abbildung aus seinen Arbeiten findet sich vorstehend (Abb. 5).

Nach Zusatz von Holzgeist oder Spiritus spaltet sich aus Chlorophyll unter Mitwirkung des Fermentes Chlorophyllase ein höherer Alkohol von glyzerinartiger Konsistenz, das Phytol ($C_{20}H_{40}O$), ab; an dessen Stelle tritt Methyl oder Äthyl, je nachdem man das erste oder zweite Lösungsmittel zum Ausziehen verwendet hat. Das Produkt der Kristallisation ist dann ein (phytolfreies) Methyl- oder Äthylchlorophyllid.

Obwohl das abgespaltene Phytol bei allen Pflanzen etwa $\frac{1}{3}$ des gesamten Chlorophylls ausmacht, kann man das Chlorophyll unbedenklich als „kristallisiertes Chlorophyll“ bezeichnen, da es dessen Haupteigenschaften an sich trägt. Die Herstellung der Kristalle gelingt am einfachsten auf folgende Weise: Man stopft Blattstücke des als Unkraut bekannten Doldengewächses Giersch (*Aegopodium podagraria*) in eine Flasche und gießt in diese Alkohol (Abb. 6). Nach spätestens 24 Stunden ist ein dunkelgrüner Extrakt entstanden, von dem eine kleine Menge auf mehrere Objektträger verteilt wird. Die Objektträger werden in einen zu verschließenden Behälter (Schachtel) gelegt

(Abb. 6), damit die Eindunstung langsam vor sich geht. Dabei entstehen zahlreiche mikrokristallinische dunkelgrüne Dreiecke oder Sechsecke (meist nesterweise verteilt) von höchstens 0,2 mm Durchmesser, welche bei mittlerer Vergrößerung gesucht und bei stärkerer (etwa $300\times$) beobachtet werden. Wahrscheinlich liegt hier das hexagonale System in einer trigonalen Hemiedrie

Abb. 6. Herstellung von Kristallen des Chlorophylls. Flasche mit Blattstücken des Giersch (*Aegopodium podagraria*) in Alkohol. Schachtel mit Objektträgern, auf welchen der Chlorophyllextrakt eindunstet. $\frac{1}{2}$ nat. Gr. (Orig.).

vor. Weitere besonders geeignete Versuchsobjekte sind: Hohlzahn (*Galeopsis tetrahit*), Waldziest (*Stachys silvaticus*), Wasserrminze (*Mentha aquatica*), Georgine (*Dahlia variabilis*), Spargelkraut (*Asparagus officinalis*) und Kalmus (*Acorus calamus*).

Karotin und Xanthophyll: Kristalle, Nachweis und Verbreitung. Neben den im vorigen Versuch beschriebenen Chlorophyllkristallen entstehen leicht auch die Kristalle der Karotinoide, meist in Form mehr oder weniger langgestreckter rhombischer Plättchen (Täfelchen), in Rhomboedern oder in Prismen mit schwalbenschwanzförmigen Einkerbungen

[Willstätter u. Stoll (1), Courchet (1), A. Zimmermann (1)]. Das Karotin ($C_{40}H_{56}$) zeigt außerordentliche Neigung zur Bildung

Abb. 7. Karotinkristalle, vorwiegend in Form rhombischer Tafeln, aus dem Blatt von *Elodea canadensis*, durch die „Kalimethode“ gewonnen. Vergr. mittelstark. (Nach H. Molisch.)

von Kristallen. Es findet sich in dieser Form reichlich in der Mohrrübe (*Daucus carota*) und kann dort bei stärkerer mikroskopischer Vergrößerung leicht nachgewiesen werden.

Nach Molisch [vgl. (2), S. 250] kann man die Karotinoide der grünen Blätter nach der „Kalimethode“ leicht zum Kristallisieren bringen (Abb. 7), wenn man Blattstücke (z. B. von *Elodea*, *Clivia* oder *Aspidistra*) 1 bis mehrere Tage in alkoholische Kalilauge bringt. Man kann eine Lösung von folgender Zusammensetzung wählen:

Wasser	15 Teile
Alkohol	10 „
Kalilauge	5 „

Um die Karotinoide aus den Pflanzenteilen zu extrahieren und nachzuweisen, verfährt man in folgender Weise:

Mohrrüben z. B. werden auf einem Reibeisen zerrieben, dann getrocknet und in einer Porzellanschale gepulvert. Beim Übergießen mit Schwefelkohlenstoff, einem guten Lösungsmittel für Karotin, färbt sich dieser sogleich tief gelbrot. Der Schwefelkohlenstoff wird abfiltriert (wobei das Filter nicht mit Wasser angefeuchtet werden darf) und spektroskopisch geprüft. Es zeigt sich dabei, daß im wesentlichen der blaue und violette Teil des Spektrums absorbiert wird.

Gießt man von der Flüssigkeit eine Probe auf ein Uherschälchen und läßt den Schwefelkohlenstoff verdunsten, so bleibt als Rückstand fast reines Karotin. Dieses färbt sich nach Zusatz von konzentrierter Schwefelsäure schön blau, ähnlich wie manche roten Käferflügel im trockenen Zustande, die zum Teil Karotinkristalle enthalten [vgl. Paul Schulze (1)]; nach Zusatz von Jodlösung tritt Grünfärbung ein. Besitzt der Karotinbeschlag eine zu große Dicke, so können die Reaktionen bisweilen versagen.

In gleicher Weise kann man mit herbstlich verfärbten Laubblättern, im Finstern gezogenen Gersten- oder Weizenpflanzen (Etiolin) usw. verfahren. Übergießt man getrocknete, zerriebene grüne Pflanzen mit Schwefelkohlenstoff, so wird nur der gelbe Bestandteil des Chlorophylls extrahiert.

Sehr schöne Resultate erhält man beim Studium der roten, Bakteriopurpurin-haltigen Schwefelbakterien (s. dort).

Zu den Karotinoiden rechnen auch:

- das Gelb vieler Blütenfarbstoffe (z. B. Löwenzahn),
- das Rot des sogenannten Veilchenmooses,
- das Gelbrot der Uredo-, Teleuto- und Äcidiosporen,
- die Augenflecke vieler Flagellaten und Schwärmsporen,
- das Rot der Goldfische und Krebse,
- das Gelb des Eidotters.

Über den gelben Farbstoff der Chromatophoren bei Diatomeen vgl. Teil B.

Die Bedeutung der Karotinoide ist verhältnismäßig wenig bekannt. Sie sind in ihrer Bildung vielfach von der Anwesenheit reichlicher Mengen von Reservestoffen, wie Stärke und Fett, abhängig. Möglicherweise sind sie ein Speichermaterial und gleichzeitig wahrscheinlich Sauerstoffüberträger.

Beim Assimilationsprozeß haben sie nur eine Nebenbedeutung, die wahrscheinlich im Schutz des Chlorophylls vor Photooxydation besteht.

III. Gruppe. Diffusion, Osmose und Turgor.

Allgemeines. Der durch den Assimilationsprozeß entstandene Zucker spielt im Pflanzenkörper als wichtiger Nährstoff eine hervorragende Rolle, doch kommt ihm auch, im Verein mit gelösten Salzen, in physikalischer Beziehung, vor allem bei der Erzeugung von Spannkraften in der lebenden Zelle, eine besondere Bedeutung zu.

Diffusion tritt bei mischbaren Flüssigkeiten ein und besteht darin, daß infolge von Molekularattraktion die einzelnen Komponenten das Bestreben haben, sich gegenseitig zu durchdringen, so daß zum Schluß ein homogenes Gemisch entsteht. Diese Erscheinung spielt eine wichtige Rolle bei der Stoffwanderung innerhalb der Pflanze, selbst wenn dieser Vorgang, wie bei Keimlingen, gegen die Wirkung der Schwerkraft erfolgt.

Unter Osmose (osmos = Antrieb) versteht man die Diffusion von Flüssigkeiten durch eine geeignete poröse Scheidewand. Gewisse Membranen beeinflussen nämlich die Diffusion derart, daß sie vorwiegend in einer Richtung erfolgt und dadurch bei Konzentrationsunterschieden ein Druckgefälle hervorruft. Dieses Druckgefälle verschwindet bei permeablen Membranen nach einiger Zeit, da hier nur die Geschwindigkeit des Durchtritts für Wasser und gelöste Stoffe eine verschiedene ist und deshalb allmählich ein Austausch der gelösten Stoffe durch die Membran hindurch stattfindet (Tierblase, Pergamentpapier . . .). Semi-permeable (halbdurchlässige) Membranen dagegen lassen nur Wasser (richtiger das Lösungsmittel), aber nicht die darin enthaltenen Kristalloide passieren (MolekülfILTER) (Ferrocyankupferhaut, homogene Oberflächenmembran des lebenden Protoplasmaschlauches . . .).

Dabei ist zu bemerken, daß das lebende Protoplasma die Fähigkeit besitzt, im Bedarfsfalle die Semipermeabilität vorübergehend mehr oder weniger aufzuheben. Durch eine solche regulatorische Fähigkeit wird beispielsweise die verhältnismäßig schnelle Ableitung wichtiger Bildungsstoffe, vielleicht unter Mitwirkung von Plasmaverbindungen (Speditionstätigkeit nach Pfeffer) aus den Blättern oder Speicherorganen verständlich. Diese Regulationsfähigkeit wird in vielen Fällen dadurch erleichtert, daß es der Pflanze spielend leicht möglich ist, den osmotisch wirksamen (gelösten) Zucker und die osmotisch unwirksame (ungelöste) Stärke wechselseitig ineinander überzuführen.

Unter Turgor (= Schwellung) versteht man die innere Spannung der Zelle, hervorgerufen durch die osmotische Wirkung des Zellsaftes. Sie äußert sich als Druck des Zellinnern auf die Wandung und bedingt die oft überraschend hohe Festigkeit selbst zarter Pflanzenteile. Durch Veränderung dieses Innendruckes können auffällige Kraftäußerungen zustandekommen, die sich z. T. als Bewegungen einzelner Pflanzenteile äußern (vgl. Gruppe VIII).

Diffusion. Überschiebt man in einem Becherglas eine gefärbte Zuckerlösung vorsichtig mit reinem Wasser, so beobachtet man, daß die anfangs scharfe Trennungsschicht zwischen beiden Flüssigkeiten sich allmählich verwischt. Nach längerer Zeit bildet sich auch bei völliger Ruhe in dem Glase eine einheitliche Mischung. Bei gegebenen Flüssigkeitsmengen ist natürlich die Geschwindigkeit des ganzen Vorganges in hohem Maße von der Größe der Berührungsfläche abhängig.

Mohrrübenversuch. Exosmose. (exo = außen.) Man höhle eine Mohrrübe oder einen Teil derselben (Abb. 8) krater oder muldenartig höchstens bis zu 1 cm tief aus, trockne die Innenwand ab, fülle in die Höhlung feinkörnigen Zucker und drücke diesen leicht fest. Die der Wand anliegenden kleinen Zuckerkristalle schmelzen und entziehen exosmotisch den Zellen durch deren Membranen hindurch Wasser (bei kurzer Versuchsdauer nicht Saft). Die peripheren Zuckerteile werden sehr schnell durchscheinend und schon nach $\frac{1}{2}$ Stunde pflegt ein Teil und bald die gesamte Zuckermasse verflüssigt zu sein [vgl. Pfeffer (1), Bd. 1, S. 263]. Rote Rüben, Kartoffeln u. a. m. können in ähnlicher Weise verwendet werden.

Nach einigen Tagen hat das Volumen der Zuckerlösung unter Schrumpfen der Rübe so stark zugenommen, daß die Flüssigkeit überläuft. Legt man die abgespülte welke Rübe in reines Wasser, so kommt natürlich die Saugkraft des Saftes in den Rübenzellen wieder zur Geltung und stellt durch Wasseraufnahme die alte Festigkeit von neuem her.

Osmotisch wirksam, wie der Zucker, sind die sog. kristalloiden Stoffe (Kochsalz, Kalisalpete u. a.), dagegen sind die Kolloide praktisch unwirksam; zu den letzteren gehören außer Stärke z. B. Eiweiß, Gummi,

Dextrin, Harze, Öle usw., die z. T. in der Pflanze eine weite Verbreitung besitzen.

Verwendet man bei einem zweiten Versuch zum Füllen der Höhlung Stärkemehl, so tritt kein Wasser aus den Rübenzellen aus, und die Stärke bleibt selbst nach Tagen trocken.

Wasserundurchlässige Membranen verhindern osmotische Prozesse. Überstreut man z. B. unverletzte pralle Kirschen mit Zucker, so geben sie kaum Wasser ab, weil ihre Oberhaut infolge der Einlagerung von Fett und Wachs (Kutinisierung) Wasser nicht passieren läßt.

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß die wasserentziehende Kraft des Zuckers auch in der Volksmedizin mehrfach benutzt wird. Man höhlt einen Rettig aus, durchsticht seinen Boden mittels eines Stiftes und füllt Zucker ein. Der Zuckersaft, welcher bald unten aus dem Loch herausfließt, schmeckt nach Rettig und wird als Hustenmittel verwendet. Dem Zucker hat sich schließlich Zell-

saft beigemischt, weil die die Höhlung umgebenden Zellen infolge der sehr hohen Konzentration des Zuckers abgetötet sind und deshalb den Zellsaft austreten lassen (s. auch Rotkohlversuch).

Ersetzt man den schmelzenden Zucker rechtzeitig wieder durch festen, so wird schließlich dem schrumpfenden Rettich osmotisch fast alles Wasser entzogen.

Abb. 8. Mohrrübe, Kopfteil. Zu einem osmotischen Versuch hergerichtet. Ungefähr nat. Gr.

Endosmose nach Dutrochet (endo = innen). Das Kugelrohr (Abb. 9) ist unten durch eine Schweinsmembran sorgfältig abgeschlossen. Man füllt von oben her starke (bis 70 %), mit Indigokarmin gefärbte Zuckerlösung, hochprozentigen Alkohol oder Kupfersulfatlösung ein und taucht das Ganze in ev. angewärmtes Wasser, so daß der Flüssigkeitsspiegel innen und außen gleich hoch steht. Endosmotisch tritt Wasser durch die Membran in das Innere des Rohres, so daß oft schon nach $\frac{1}{2}$ Stunde ein Steigen der Flüssigkeit im Innern des Rohres zu beobachten ist. Nach einigen Tagen tritt ein Sinken der Flüssigkeitssäule ein, weil die Membran in merklichem Maße auch Moleküle in umgekehrter Richtung, d. h. von innen nach außen, durchtreten läßt, wodurch die osmotische Saugkraft der Innenflüssigkeit nachläßt.

Nach Entleerung und Reinigung ist der Apparat für spätere Versuche ohne weiteres wieder gebrauchsfertig.

Künstliche Zelle nach Kolkwitz. In dem eben beschriebenen Experiment kommt die Wirkung der Osmose bei rein physikalischer Versuchsanordnung zum Ausdruck. Im folgenden sollen einige Versuche beschrieben werden, die sich mehr an die Verhältnisse in der Pflanzenzelle anlehnen. Wenn man die osmotisch wirksame Flüssigkeit allseitig abschließt, so muß sich die Wirkung der Wasseraufnahme durch die

Membran in einer Erhöhung des Druckes auf die Gefäßwand äußern. Ersetzt man z. B. in dem Versuch von Dutrochet das Steigrohr durch ein kurzes Ansatzstück mit Hahn [Abb. 10¹⁾], so macht sich bei Füllung mit nahezu sirupdicker (70—75 %) Zuckerlösung nach dem Schließen des Hahnes der osmotische Druck durch starke Hervorwölbung der Schweinsmembran nach außen schon nach weniger als 24 Stunden²⁾ bemerkbar. In diesem Zustand läßt sich die Membran mit dem Finger nur gewaltsam eindrücken. Für das Gelingen des Versuches ist ausschlaggebend die sorgfältige Befestigung der durch Waschen mit Seife entfetteten Membran. Das Hauptaugenmerk ist dabei auf die Beseitigung aller Falten unter der Befestigungsschnur zu richten. Man prüfe daraufhin mit der Lupe und beseitige selbst kleinste Mängel durch Ziehen des freien Randes nach rechts und links.

Abb. 9. Endosmometer. Durchmesser der Kugel ca. 4 cm, Länge und lichte Weite des Rohres rd. 40 cm bzw. 5 mm. Etwa $\frac{1}{4}$ nat. Gr.

Abb. 10. Künstliche Zelle nach Kolkwitz in der Seitenansicht. Oben rechts: Mittelteil des Hahnkegels nach einer Drehung von 90°, oben links: Kapillarrohr mit Schlauch zum Ansetzen an D. $\frac{1}{4}$ nat. Gr. (Orig.).

Der Hahn besitzt zwei Durchbohrungen A B und C D; die letztere dient als Spritzrohr. Da in der Zelle ein Überdruck von 1—1,5 Atm. erreicht wird, so ist der Hahn sorgfältig zu fetten (am besten mit Luftpumpenfett). Zu beachten ist, daß bei geschlossenem Hahn der Flügel unter 45° gegen die Vertikale geneigt steht³⁾.

Ist die Membran stark nach außen vorgewölbt, so entspricht dies dem Zustand einer turgeszenten Zelle. Der Überdruck läßt sich dadurch sehr einfach demonstrieren, daß man den Hahn wagerecht stellt; durch die Bohrung C D spritzt nunmehr ein Teil des Inhalts dieser „künst-

1) Der Apparat wurde von der Firma Bleckmann u. Burger, Berlin, Auguststraße 3a, gefertigt.

2) Einlegen in warmes Wasser beschleunigt die Wirkung.

3) Muß der Apparat zum Versuchsort hin gefüllt transportiert werden, so stellt man den Hahn quer und verzichte ev. auf das Ausspritzen.

lichen Zelle“ weit heraus¹⁾). Die Wurfweite der Parabel wird wesentlich vergrößert, wenn man bei *D* ein Ansatzstück mit nadelfeiner Öffnung aufsetzt. Die Höhe des Druckes bestimmt die Form der Parabel. Setzt man Kapillaren auf (10 Glieder zu je 1 m), so ergibt sich eine Steighöhe von 9—10 m (ca. 1 Atm. Druck) innerhalb 1—2 Tagen.

Nach der Entleerung wird beim Trocknen (Hahn öffnen!) die Membran wieder so straff wie ein Trommelfell; der Apparat kann dann von neuem benutzt werden.

Über osmotische Versuche an Hühnereiern vgl. A. Kühn (1), S. 15.

Künstliche Zelle nach Traube. In den Jahren 1864—1866 veröffentlichte Moritz Traube (1) „Experimente zur Theorie der Zellenbildung und Endosmose“. Diese Versuche behandeln die Herstellung neuartiger künstlicher Zellen; sie bedeuteten seinerzeit die wichtigste Entdeckung in der Erforschung der Osmose. Die im folgenden geschilderte Versuchsanstellung deckt sich nicht in allen Punkten mit der Traubes, da er Kupferacetat verwendete, während hier Kupfersulfat, das bessere Resultate liefert, benutzt wird.

Man geht von einer vorrätig gehaltenen konzentrierten (ca. 30 %) noch Kristalle als Bodensatz enthaltenden Kupfersulfatlösung in destilliertem Wasser aus. Eine Probe aus dieser Flasche wird abgegossen und mit dem mindestens zweifachen und höchstens etwa siebenfachen Volumen destillierten Wassers verdünnt. Man kann auch direkt die CuSO_4 -haltige Stammflüssigkeit der Fehlingschen Lösung (d. s. ca. 7 %) für den Versuch verwenden.

Wirft man ein stark hirsekorn- bis höchstens erbsengroßes, nicht verwittertes Stück gelben Blutlaugensalzes in die blaue Flüssigkeit, so bildet sich durch die Berührung beider chemischen Substanzen kolloidales Ferrocyan kupfer, das als feine, rotbraune, osmotisch wirksame Membran den am Boden liegenden Kristall von gelbem Ferrocyan kalium ringsum überzieht.

Kupfersulfat gelb. Blutlaugensalz Ferrocyan kupfer Kaliumsulfat

Das Kaliumsulfat kommt für diesen Versuch nicht in Betracht.

Der in die Kupfersulfatlösung geworfene Kristall umgibt sich unter der rotbraunen Haut mit einer konzentrierten Lösung seiner eigenen Substanz, durch welche der blauen Lösung schnell Wasser entzogen wird, aber nur Wasser, da es eine äußerst wichtige Eigenschaft der semipermeablen Ferrocyan kupfermembran ist, weder Kupfervitriolmoleküle zum Blutlaugensalz noch umgekehrt passieren zu lassen. Diese Membran zeigt also physikalisch dieselben Eigenschaften wie der lebende Protoplasmaschlauch der Zelle.

1) Verspritzen von Zellinhalt beobachtet man auch beim Abziehen der Epidermis von Zwiebelschuppen, von der Unterhaut der Blätter von *Lycium*, von Aurikeln, Dahlien, beim Platzen mancher Pollenkörner nach Einlegen in Wasser usw.

Laßt man das Versuchsgefäß ganz ruhig stehen, so wächst die künstliche Zelle in der blauen Flüssigkeit meist in Gestalt einer unregelmäßigen Keule oder eines Bäumchens mit rotbrauner Hülle und gelbem Inhalt empor (vgl. Taf. I, Abb. 4). Das Wachstum beginnt sogleich; nach etwa einer halben Stunde pflegt der Versuch dann beendet zu sein. Die treibende Kraft für das Wachstum der künstlichen Zelle ist der besonders zu Anfang bestehende große Konzentrationsunterschied zwischen der blauen und gelben Flüssigkeit.

Zur mikroskopischen Betrachtung kann man in der Weise verfahren, daß man bei schwacher oder mittlerer Vergrößerung auf einen kleinen Kristall von Ferrocyankalium einstellt, nachdem man ein Deckgläschen darüber gelegt hat, und unter Vermeidung von Luftblasen mittels Saugpipette die Kupfersulfatlösung zufügt. Man erkennt dann leicht, daß die rotbraune Membran bei ihrer Ausdehnung platzt und sich durch Neubildungen wieder schließt. In dieser Beziehung erfolgt das Wachstum etwas anders als das des schleimigen Plasmaschlauches.

In der unmittelbaren Umgebung des am Boden liegenden Kristalls ist die Konzentration der Blutlaugensalzlösung am größten, und dementsprechend zeigt hier die Ferrocyankupfermembran ein Maximum der Dicke. Da nun diese Haut an den Stellen geringster Festigkeit, also entsprechend dem Konzentrationsabfall in ihrem oberen Teil sich weitet, so zeigt die künstliche Zelle ein deutliches „Spitzenwachstum“.

Die Beobachtung kann auch in der Planktonkammer geschehen (Taf. I, Abb. 4 und Taf. X), bei vertikaler Stellung makroskopisch (mit Lupe oder in Projektion), bei horizontaler Lage unter dem Mikroskop bei 20—100facher Vergrößerung. Dreht man die vertikal stehende Kammer um 180°, so sinkt die konzentrierte Lösung von gelbem Blutlaugensalz im Innern der künstlichen Zelle herab, so daß, infolge der am Kopf der Zelle verstärkten Konzentration, von neuem ein Bäumchen (aus dem ersten) emporwächst.

Bei Verwendung konzentrierter Kupfersulfatlösung tritt begreiflicherweise so gut wie kein Wachstum der künstlichen Zelle ein, da dann beide Lösungen ziemlich gleich starke osmotische Saugkraft besitzen.

Ist die künstliche Zelle gewachsen, und wird dann die äußere Flüssigkeit durch konzentrierte Lösung ersetzt, so zieht sich die Zelle nicht merklich zusammen, da die Haut von weniger schleimig-zäher Beschaffenheit ist als der lebende Protoplasmaschlauch.

Die künstliche Zelle kann jederzeit leicht dargestellt werden, da der Versuch niemals mißglückt.

Über künstliche Silikatzellen vgl. man J. Reinke (2).

Mit Hilfe von Wasserglas und verschiedenen gefärbten Metallsalzen lassen sich gleicherweise farbenprächtige pflanzenähnliche Gebilde erzeugen.

Künstliche Zelle nach Pfeffer. Die Pfeffersche Zelle [1877 (1)] schließt sich zwar eng an die Traubesche an, bedeutete aber einen großen Fortschritt, da mit ihr quantitative Studien möglich waren. Der Bau der Zelle ergibt sich aus der untenstehenden Abb. 11. Die Traubesche Zelle erhielt dadurch eine feste Stütze, daß ihre Membran einer kleinen, porösen Tonzelle von innen angelagert wurde (Füllen mit Blutlaugensalz-, eintauchen in Kupfersulfatlösung). Mit der Tonzelle ist ein geschlossenes Manometer verbunden, das die Messung der auftretenden osmotischen Drucke gestattet.

Der Apparat wurde jedesmal mit der zu untersuchenden Lösung gefüllt und in ein Gefäß mit reinem Wasser gestellt. Die Versuche ergaben überraschend hohe Drucke, die man besonders von schwachen anorganischen Salzlösungen nicht erwartet hatte.

Der Turgordruck in den lebenden Pflanzenzellen ergab dabei, von Sonderfällen abgesehen, Werte von etwa 4–10 Atm.

Damit war eine der Hauptquellen der pflanzlichen Kraftleistungen

Die Pfefferschen Versuche können als Laboratoriumsversuch nicht wiederholt werden, da die Einlagerung einer einwandfreien Haut in das Tongefäß nur sehr schwer gelingt.

Abb. 11. Künstliche Zelle nach Pfeffer, vereinfacht gezeichnet. Etwa $\frac{1}{2}$ nat. Gr.

Abb. 12. Künstliche Zellen nach Leduc; rd. $\frac{1}{2}$ nat. Gr. (Orig.).

Künstliche Zelle nach Leduc. Diese Zelle ist im wesentlichen nur eine mit mehr als zwei Substanzen hergestellte Traubesche Zelle. Leduc (1) wendete fünf an, nämlich gelbes Blutlaugensalz, Kochsalz, Gelatine, Kupfersulfat und Zucker.

Um solche Zellen ohne große Mühe herzustellen, kann man folgendermaßen verfahren: Man löst in 100 ccm Wasser etwa 3,0 g Kochsalz, 1,5 g gelbes Blutlaugensalz und 1,5 g Gelatine. Diese Lösung läßt man abkühlen (15°C .) und in mindestens 10 cm hoher Schicht erstarren. Kurz vor dem Festwerden bringt man mittels Pinzette auf den Boden des Gefäßes ein schwach erbsengroßes Kügelchen aus etwa 2 T. Kupfersulfat und 1 T. Zucker (Bindemittel ev. Glycerin); dann entstehen in der Lösung innerhalb 24 Stunden Zellen ähnlich den hier abgebildeten (bei niedriger Temperatur breitere, bei höherer schmalere).

Die so emporgewachsenen „künstlichen Pflanzen“ sind noch kompliziertere Gebilde als die Silikatzellen.

Die Ähnlichkeit ersterer mit manchen lebenden Organismen ist natürlich nur rein äußerlich. Bemerkenswert ist aber immerhin, daß man durch ein in erster Linie physikalisches Verfahren so viele pflanzen- und tierähnliche Formen herstellen kann. Man ersieht daraus, daß für den lebenden Organismus die Fortpflanzung und Regulationsfähigkeit typisch ist und nicht die äußere Form.

Wegen näherer Einzelheiten über die Herstellung der Leducschen Zelle muß auf das Original verwiesen werden.

Isotonische Lösungen. Der Zellsaft der Pflanzen (z. B. Traubensaft) enthält ein oft sehr kompliziert zusammengesetztes Gemisch verschiedener osmotisch wirksamer Substanzen. Dieser Umstand macht die Bestimmung des Turgordruckes zunächst ganz unmöglich. Es war daher eine aufsehenerregende Entdeckung, als es H. de Vries gelang, den Turgordruck durch die wasseranziehende Kraft einer Kalisalpeterlösung von bestimmter Konzentration zu ersetzen und so für jede Zelle einen entsprechenden „Salpeterwert“ abzuleiten. Dadurch war es möglich, die vorher durch die künstliche Zelle von Pfeffer ermittelten osmotischen Drucke in einfacher Weise ungefähr mit dem Turgordruck zu vergleichen, ohne die Zellinhaltsstoffe zu kennen [Ursprung] (2).

Das Druckgefälle zu beiden Seiten einer semipermeablen Membran ist, wie bereits erwähnt, abhängig von der Konzentration und von der chemischen Natur beider Lösungen. Solche Lösungen, die keinen osmotischen Druck gegeneinander erzeugen, nennt man isotonisch (isos gleich, tonos=Spannung, Turgor). Beim Studium solcher Lösungen fand de Vries (1) wichtige Gesetzmäßigkeiten. Bei verdünnten Lösungen des gleichen Salzes ist der osmotische Druck proportional der Konzentration, d. h. der Anzahl der gelösten Moleküle. Bei höheren Konzentrationsgraden werden Abweichungen von diesem Gesetz beobachtet, da solche Lösungen sich auch sonst physikalisch anders verhalten. Ähnliche Gesetze gelten für gewisse Gruppen verschiedener Stoffe, z. B. Zuckerarten, für Salze der Alkalien mit gleicher Anzahl Metallatome im Molekül usw. Innerhalb jeder Gruppe ist der osmotische Druck direkt proportional der Molekülzahl. Isotonische

Lösungen sind also äquimolekular. Daraus folgt, daß die Moleküle verschiedener Substanzen mit derselben Kraft Wasser anziehen.

Vergleicht man aber Lösungen von Salzen, die nicht derselben Gruppe angehören, so erfährt dieses Gesetz eine gewisse Abänderung. Setzt man nämlich nach de Vries die Größe der Anziehung eines Moleküles $\text{KNO}_3 = 3$, so ist die entsprechende Kraft für je 1 Molekül

a) organischer metallfreier Verbindungen (z. B. Zucker, Oxalsäure)	= 2
b) der Salze der Alkalien mit je 1 Atom Metall im Molekül (z. B. Kochsalz, Kalisalpetat, Kaliumacetat)	= 3
c) der Salze der Alkalien mit je 2 Atomen Metall im Molekül (z. B. Kaliumsulfat)	= 4
d) der Salze der Alkalien mit je 3 Atomen Metall im Molekül (Kaliumcitrat $\text{K}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$)	= 5
e) der Salze der Erdalkalien mit je 1 Säurerest (z. B. Magnesiumsulfat)	= 2
f) der Salze der Erdalkalien mit je 2 Säureresten im Molekül (z. B. Chlormagnesium)	= 4

Diese Verhältniszahlen, welche abgerundete Werte darstellen, nannte de Vries „isotonische Koeffizienten“.

Vergleicht man also Salzlösungen mit der gleichen Anzahl Moleküle aus verschiedenen Gruppen (a bis f), so verhalten sich ihre osmotischen Drucke wie die oben angegebenen „isotonischen Koeffizienten“. Man kann auch sagen, daß bei den Metallsalz-Lösungen durch die Dissoziation die Anzahl der gelösten Moleküle im Verhältnis der isotonischen Koeffizienten gleichsam vergrößert ist. Daher verhalten sich in isotonischen Lösungen aus verschiedenen Gruppen (a bis f) die Konzentrationsgrade nicht wie die Molekulargewichte, sondern wie die Verhältniszahl zwischen Molekulargewicht und den oben genannten Koeffizienten.

So hat man z. B. gefunden, daß eine 1,5 % Lösung von Kalisalpetat, eine 0,8615 % von Kochsalz und eine 7,62 % von Rohrzucker isotonisch sind. Da Kalisalpetat und Kochsalz derselben Gruppe (b) angehören, so ist annähernd

$$\frac{1,5}{0,8615} = \frac{101}{58,5} = \frac{\text{Mol.-Gew. des Salpeters}}{\text{Mol.-Gew. des Kochsalzes}}$$

Für Kalisalpetat und Rohrzucker dagegen gilt folgende Gleichung:

$$\frac{7,62}{1,5} = \frac{342:2}{101:3} = \frac{171}{33,7}$$

Diese Gleichungen sind angenähert, da ja die Voraussetzungen streng nur für verdünnte Lösungen gelten. Immerhin ist leicht einzusehen, daß man mit Hilfe dieser Beziehungen das Molekulargewicht ziemlich genau feststellen kann, wenn man durch Versuche den Konzentrationsgrad einer Lösung bestimmt, die mit einer bekannten iso-

tonisch ist. Dieser Weg ist z. B. bei manchen Zuckerarten (Raffinose) eingeschlagen worden.

Mit Hilfe seiner künstlichen Zelle konnte Pfeffer (1) die osmotischen Drucke verschiedener Lösungen messen und dabei folgende Zahlen feststellen:

1 % Rohrzucker	= 0,69 Atm
1 % Traubenzucker	= 1,25 „
1 % Glycerin	= 2,54 „
1 % Kalisalpete $\ddot{r}$	= 4,50 „
1 % Kochsalz	= 6,09 „
1 % Gummi arabicum	= 0,085 „
(1 % = 1 g lösen und zu 100 ccm auffüllen).	

Als „Indikatorpflanze“ für seine Versuche benutzte de Vries hauptsächlich *Tradescantia (Rhoeo) discolor*¹⁾. Man säubere die Unterseite des Blattes und fertige zarte Oberflächenschnitte aus dem roten Gewebe über der Mittelrippe an. Legt man diese Schnitte teils in 2 % Kalisalpete $\ddot{r}$ lösung, teils in etwa 1,2 % Kochsalzlösung²⁾ (vollständig untertauchen!) und beobachtet sie dann unter dem Mikroskop, so erkennt man nach Verlauf von 10–20 Minuten, daß sich das Plasma schwach von den Ecken der Zellen zurückgezogen hat; man nennt diesen Vorgang Plasmolyse [lyo = lösen]³⁾. Die Beobachtung wird hier dadurch sehr erleichtert, daß der Zellsaft durch Anthocyan rot gefärbt ist. Die „plasmolytische Grenzlösung“ ist dadurch gekennzeichnet, daß ihre osmotische Kraft gerade hinreicht, um den Turgordruck der Pflanzenzelle aufzuheben. Es ist klar, daß man durch Ermittlung der Grenzkonzentration mit Hilfe der oben angegebenen Tabelle den Turgordruck in Atmosphären ausdrücken kann. Werden die Zellen von *Tradescantia discolor* sehr stark plasmolysiert, z. B. durch ein Gemisch von conc. Kalisalpete $\ddot{r}$ lösung (24–25 %) mit etwa dem gleichen Teil Wasser (vgl. Zuckerrübe), so tritt die Plasmolyse naturgemäß schneller und ausgiebiger ein. Der rote Farbstoff im Zellsaft verdichtet sich dabei mehr und mehr (etwa bis zur Farbe des Rotweins), während der farblose Plasmanschlauch infolge der Zusammenziehung dicker wird. Er ist dann bei rd. 300facher Vergrößerung und guter Beleuchtung mit doppelten Umrisslinien zu sehen.

Wie genauere Versuche ergeben haben, schwankt der Turgordruck der Pflanzenzellen innerhalb weiter Grenzen. So ergab sich bei ganz

1) Ähnliche Dienste leisten die Zellen der roten Rübe, der schwarzen Ligusterbeeren (auch nach Frost) u. a. m.

2) Genauer 1,5 % bzw. 0,8615 ‰. Die letztgenannte Lösung ist zufällig von ähnlicher Konzentration wie die physiologische Kochsalzlösung; vgl. Das Deutsche Arzneibuch (Pharmacopoea germanica), 1910, S. 483. — Der Inhalt der Blutkörperchen ist mit einer 0,9–1,0 % Kochsalzlösung isotonisch.

3) Von der Plasmolyse (= Plasma-Lösung) unterscheidet Balbiani die Kontraktion kompakten Plasmas, wie sie z. B. bei Myxomyceten vorkommt, als Plasmorhyse (rhyos = Schrumpfung).

jungen Zellen, wie sie in Meristemen vorkommen, bei dem Fehlen von Vakuolen kein wesentlicher Turgordruck, während die folgenden Beispiele höhere Werte zeigen.

Tabelle über den Atmosphärendruck in Pflanzenzellen.

Name der Pflanze	Organ	Turgordruck in Atmosphären
<i>Gunnera chilensis</i> (Chilenischer „Rhabarber“)	Blattstiel	3,5—5
<i>Rochea falcata</i> (Dickblatt)	Blattmark	4
<i>Solanum tuberosum</i> (Kartoffel)	Blattspreite	5,5
<i>Heracleum sphondylium</i> (Bärenklau)	Blattstiel	5,5
<i>Dipsacus fullonum</i> (Weberkarde)	Stengel	6
<i>Rheum officinale</i> (Rhabarber)	Blattstiel	6
<i>Carum carvi</i> (Kümmel)	Doldenstrahlen	6,5
<i>Rosa hybrida</i> (Rose)	Blumenblätter	8
<i>Sorbus aucuparia</i> (Eberesche)	junge Beeren	9
<i>Foeniculum vulgare</i> (Fenchel)	wachsende Sprosse	9—12 ¹⁾

Die größten beobachteten Turgordrucke befinden sich in den Knoten mancher Gräser (bis 50 Atmosphären) und in den Wurzeln einiger Wüstenpflanzen, wo der Druck bis auf etwa 100 Atmosphären ansteigt.

Die den Turgor erzeugenden Stoffe sind keineswegs bei allen Pflanzen dieselben. Bei *Rosa* und *Heracleum* wirkt vor allem Glucose, bei *Rheum* Oxalsäure, bei *Rochea* Apfelsäure, bei *Gunnera* Chlorkalium.

Eine kurze Erwähnung verdienen noch die Meerespflanzen und die Halophyten des Strandes. Um die Zellen dieser Gewächse zu plasmolysieren, bedarf es natürlich verhältnismäßig hoch konzentrierter Lösungen.

Das Plankton der Flüsse wird beim Eintritt in stark salzige Meere natürlich plasmolysiert und geht, falls sich nicht ein Teil dem Meereswasser anpaßt, zugrunde.

Umgekehrt werden die Zellen vieler Meerespflanzen, wenn man sie in Süßwasser bringt, platzen.

Einige andere Versuche über Turgor und Plasmolyse. Um den Turgor in Geweben makroskopisch zu zeigen, kann man in folgender Weise verfahren: Man spaltet ein etwa 6 cm langes Hypokotyl der Keimpflanze von *Lupinus albus* auf und legt die beiden Hälften zum Plasmolysieren in eine starke, mehr als 4 % Kalisalpeterlösung. Nach etwa $\frac{1}{2}$ Stunde tritt eine Verkürzung von 6—8 % ein. Legt man die Gewebehälften nachher in reines Leitungswasser, so werden

1) Der Druck im Dampfkessel einer starken Lokomotive beträgt etwa 15 Atm.

sie wiederum prall und dehnen sich auf ihre ursprüngliche Länge und darüber wieder aus. Sollten sich die Objekte bei diesen Versuchen stark krümmen, so empfiehlt es sich, sie vorher zu schälen.

Übrigens kann man die plasmolysierte Hypokotylhälfte statt durch osmotische Kräfte auch durch Anhängen von Gewichten wieder auf ihre ursprüngliche Länge dehnen. Dann entspricht die Größe der Zugkraft (abgesehen von Fehlern, die etwa durch Verzerrung des Zellnetzes bedingt sind) dem osmotischen Druck in den Zellen. Die Gewichte werden zweckmäßig in der Weise angebracht, daß man über die Enden des Hypokotyls dünne Gummischlauchstücke zieht und diese durch Klemmschrauben unverrückbar befestigt.

Die beschriebenen Versuche kann man mit demselben Erfolge auch an lebhaft wachsenden Stengeln der Sonnenblume anstellen. Man schält zu diesem Zweck die Rinde und den Holzkörper ab und behandelt den derart freigelegten Markzylinder in der oben angegebenen Weise; freilich steht geeignetes Material nur im Frühling und Sommer zur Verfügung.

In den bisher genannten Beispielen bewirkte die Änderung des Turgors eine Verlängerung oder Verkürzung in der Längsrichtung. Es sind aber auch Fälle bekannt, wo diese Veränderung in der Querrichtung wirkt, nämlich bei Wurzeln. So zeigen z. B. die jungen Wurzeln von *Hyacinthus*, *Narcissus*, *Carum carvi* (Kümmel), *Conium maculatum* (Schierling), *Lappa tomentosa* (Klette) und *Taraxacum* (Löwenzahn) beim Einlegen in Wasser überraschenderweise Zusammenziehung, bei der Plasmolyse Verlängerung, weil die parenchymatischen Zellen solcher Wurzeln bei Zunahme des Turgors eine Dehnung senkrecht zur Längsrichtung des Organs erfahren, vgl. auch Detmer (1).

Da diese Kräfte Verkürzungen bis zu 70 % hervorrufen können, so ist z. B. die Tatsache leicht zu verstehen, daß die Blätter der Rosettenpflanzen trotz des Längenwachstums des Stengels stets dem Boden angedrückt bleiben und daß Zwiebeln bis zu einer gewissen Tiefe in den Boden eindringen können.

Gewebespannung. Trennt man im Frühjahr von einem 70 cm langen Stengelstück eines jungen lebenskräftigen Wurzelschoßes des Hollunders (*Sambucus nigra*) durch (vier) Längsschnitte Rinde und Holz ringsum ab, so verlängert sich das Mark um etwa 4 mm. Es war also im Gewebeverbande gestaucht, während Rinde und Holz dementsprechend gedehnt waren. Ähnlich verhalten sich junge Stengel der Sonnenblume (*Helianthus annuus*) und des Tabaks (*Nicotiana*), während Blattstiele von *Begonia* und Stengel von *Impatiens* weniger gut geeignet sind, aber als Zierpflanzen auch im Winter zur Verfügung stehen.

Legt man die vier abgetrennten Stücke von *Sambucus* in Wasser, so steigt der Turgor in den parenchymatischen Gewebeteilen; infolge des durch den Holzteil bedingten Widerstandes tritt dabei Krümmung ein.

Im Gegensatz dazu tritt Verkürzung bzw. Wiedergeradestreckung ein, wenn man mit rund 4 %, Kalisalpeterlösung plasmolysiert. Der freie Markteil bleibt beim Einlegen in Wasser gerade, verlängert sich aber. Sein Turgor nimmt dabei wesentlich zu.

Die Dehnung der jungen Hollundermarkzellen beträgt im normalen Zustand rd. 8 %. Bei den älteren Markzellen ist im Gewebeverbande infolge von Wachstum im Laufe des Sommers Entspannung der Membranen eingetreten. Dem Turgordruck wird dann im unverletzten Stengel durch den Holzkörper das Gleichgewicht gehalten.

Bekannt zur Ausführung von Versuchen über Gewebespannung sind auch die Blütenschäfte des Löwenzahns (*Taraxacum*).

Die Rinde ist übrigens nicht nur in der Längsrichtung, sondern auch quer dazu gedehnt. Löst man z. B. an Weidenzweigen (am besten im Frühling) ein ringförmiges Stück Rinde los, so verkürzt es sich quer zur Richtung des Organes. Versucht man es wieder in seine ursprüngliche Lage zu bringen, so muß man es dabei um 4—5 % dehnen. Diese Rindenspannung ist im Verlauf einer Wachstumsperiode keinen wesentlichen Änderungen unterworfen, so daß der früher behauptete Einfluß auf die Bildung von Frühlings- und Herbstholz (Jahresringe) nicht nachweisbar ist; vgl. Pfeffer (1), Bd. 2, S. 275. Die Rindenspannung kann bei Bäumen einen Druck bis zu 10 Atmosphären erzeugen.

Eine Ausnutzung der Gewebespannung zur Hervorbringung von Bewegungen findet in vielen Gelenkpolstern der Blätter statt. Hier durchziehen die Gefäßbündel die Mitte der Polster, während die parenchymatischen Zellen peripherisch gelagert sind. Steigt nun der Turgor in der unteren oder oberen Polsterhälfte, so findet infolge Gewebespannung gegen den Mittelstrang ein Heben oder Senken der Blattorgane statt. Näheres s. im Kap. Reizbewegung.

Permeabilität des abgetöteten Plasmaschlauches. Tötet man die vorher (S. 28) erwähnten Zellen von *Tradescantia discolor*, z. B. durch Erwärmen, Gifte oder den Induktionsstrom, so gerinnt das Plasma, und die Zellen lassen, wie die mikroskopische Beobachtung zeigt, den Farbstoff austreten¹⁾.

Auch makroskopische Versuche lassen sich zur Darlegung des eben Gesagten ausführen, z. B. mit Blättern von Rotkohlköpfen²⁾.

Man fülle zwei Bechergläser oder Reagensgläser mit destilliertem Wasser (nicht Leitungswasser, da dieses alkalische Reaktion besitzt), schneide Rotkohlblätter in Stücke und bringe diese in die beiden Gläser. Wird das Wasser in dem einen auf mehr als 50—60° C. erwärmt, so tritt wegen des Abtötens der Plasmaschläuche der rote, im

1) Bezüglich Lebendfärbung vgl. man Pfeffer (1), S. 103 und Abderhalden.

2) Man halte die Blätter gegen helles Licht. Je deutlicher dabei die rote Farbe hervortritt, um so geeigneter sind sie für den Versuch.

Zellsaft gelöste Farbstoff aus (besonders stark nach 24 Std.), während das Wasser des nicht erwärmten Kontrollgefäßes farblos bleibt.

Der gleiche Versuch gelingt auch sehr gut mit roten Kirschen, etwa in der durch nebenstehende Abbildung angegebenen Form. Im Bedarfsfalle könnte man auch die äußeren Teile von Radieschen benutzen. Anthocyanhaltige Laubblätter sind im allgemeinen weniger gut verwendbar, dagegen dunkle Blumenblätter der Georgine geeignet.

Abb. 13. Kirschenversuch zur Veranschaulichung der Durchlässigkeit abgetöteter Plasmасhläuche. Links: Wasser von Zimmertemperatur, farblos. Rechts: Heißes Wasser, rot durch Kirschsafft.

Der ausgezogene Farbstoff zeigt meist ähnliche Reaktionen wie Lackmus: Durch mäßigen Zusatz von Alkalien wird er blau¹⁾ [daher Anthocyan (Blütenblau) genannt], durch Zusatz einiger Tropfen von Säuren rot. Der Umschlag der Reaktion kann zu wiederholten Malen vorgenommen werden.

Bei der Empfindlichkeit dieser Reaktion läßt sich der Farbumschlag unter günstigen Umständen auch in der lebenden Zelle hervorrufen. Läßt man verdünntes Ammoniak einwirken, so verfärbt sich das Anthocyan im Zellsaft in Blau, umgekehrt bei Einwirkung von Kohlensäure in Rot [z. B. bei *Ipomoea*-(*Calystegia*-)Blüten].

Näheres über die Eigenschaften des Anthocyans siehe bei Molisch (2), S. 261 ff.

Auch durch Kältewirkung können saftige Zellen unter Turgoränderung zum Absterben (Erfrieren) gebracht werden, wie es scheint dann, wenn im Zellsaft ein Gemisch von Eis und Salzen entsteht [Kryohydratpunkt]²⁾. Die verschiedenen Organe desselben Individuums können bei sehr ungleichen Temperaturen erfrieren, ein Apfel z. B. bei -3°C , ein Apfelbaumstamm erst unter -20°C .

1) Zu starker Zusatz bedingt Grünfärbung.

2) Dieser Punkt wird erreicht, wenn der Zellsaft zu einem Gemisch von Salz und Eis erstarrt.

IV. Gruppe. Zucker, Stärke, Reservezellulose, fettes Öl.

Allgemeines. Man kann mit gutem Grunde die Behauptung aufstellen, daß das Produkt der Kohlenstoff-Assimilation (S. 4), die Glukose (Traubenzucker), für die Pflanzen, speziell die höheren, eine ähnliche Bedeutung hat, wie das Geld im menschlichen Leben. Aus Glukose verschafft sich die Pflanze spielend leicht eine große Zahl wichtiger anderer Substanzen, wie Stärke (aufbau- und abbaufähig), Rohrzucker, Zellulose, Eiweiß (unter Anfügen von Stickstoffverbindungen) usw. Die einzelnen Zuckerarten, wie Glukose, Saccharose, Trehalose, Melicitose, Mannose, Xylose, Arabinose u. a. m. ineinander überzuführen, ist im gegebenen Falle für die Pflanze eine Kleinigkeit.

Die Zuckerarten sind die ersten Oxydationsprodukte mehrwertiger Alkohole von Aldehyd- oder Ketoncharakter.

Zucker, Stärke und Zellulose (Zellstoff) gehören zu der großen Gruppe der Kohlehydrate, d. h. sie bestehen aus C, H und O und enthalten die beiden letzteren in demselben Verhältnis wie das Wasser (2:1); sie reagieren weder sauer noch basisch und sind teils Kristalloide, teils Kolloide.

Nur bei ganz wenigen einfachen Zuckerarten ist die künstliche Synthese bisher auf umständlichen Wegen gelungen. Das Material für die Weltproduktion der Kohlenhydrate wird daher wohl noch lange Jahre hindurch von der Land- und Forstwirtschaft geliefert werden [Zuckerrüben, Zuckerrohr, Getreide, Kartoffeln, Fichten (geben Zellstoff), Baumwolle]. Von den vielen Kohlenhydraten kommen nur verhältnismäßig wenige in größerer Menge im Pflanzenreich vor. Unter den Zuckern finden sich hauptsächlich von den Monosacchariden Glukose ($C_6H_{12}O_6$), von den Disacchariden Rohrzucker ($C_{12}H_{22}O_{11}$) allgemein verbreitet. Der Stärke schreibt man als einem Polysaccharid (wahrscheinlich gekoppelter Anhydro-Malzzucker) vorläufig die Formel $(C_6H_{10}O_5)_6$ zu; sie bildet in den Speicherorganen der Pflanzen, vor allem in Samen bis zu etwa $\frac{3}{4}$ des Gesamtgewichts. Bekanntlich liefert sie in Gestalt von Mehl unser wichtigstes Nahrungsmittel.

Nach Pictet (1) u. Sarasin (Genf 1919) sind Stärke und Zellulose Polyosen des Lävoglukosans, einer gelben, dickflüssigen, öligen Substanz von Kohlenhydratnatur, welche in Wasser und anderen Flüssigkeiten löslich ist.

Reservezellulose spielt demgegenüber in der Natur nur eine untergeordnete Rolle als Speicherstoff. Sie stellt gewissermaßen ein Mittelding dar zwischen Stärke und Holzstoff, indem sie physiologisch mehr der Stärke, physikalisch mehr der gewöhnlichen Zellulose nahe steht. Reservezellulose findet sich z. B. in Dattelnkernen

sowie in den Samen der Palme *Phytelephas*, wo sie als „vegetabilisches Elfenbein“ technische Bedeutung erlangt hat.

Die gewöhnliche Zellulose bildet dagegen das Ausgangsmaterial für die Herstellung von Baumwolle, Papier, Kunstseide, Zelluloid, Kollodiumwolle, Stapelfaser usw.¹⁾.

Fette Öle spielen als Nährstoffe ebenfalls im Pflanzenreich eine Rolle. Sie dürfen nicht mit den ätherischen Ölen (Duftstoffe) verwechselt werden, die einer ganz anderen chemischen Gruppe angehören. Die in der Natur vorkommenden Fette sind vorwiegend Glycerin-Ester höhermolekularer Fettsäuren, von denen besonders Palmitin-, Stearin- und Ölsäure in Betracht kommen. Die Pflanzenfette sind im Gegensatz zu den tierischen meist flüssig, was auf einen höheren Gehalt an Ölsäure zurückzuführen ist. Beispiele hierfür sind Olivenöl, Rüböl, Leinöl, Mohnöl und Nußöl, während Kakaobutter, Palmkernöl und Muskatbutter fest sind²⁾.

Das Öl macht in Fettsamen meist $\frac{1}{3}$, bisweilen fast $\frac{3}{4}$ der gesamten Trockensubstanz aus.

Die künstliche Darstellung der Fette ist im großen bisher noch nicht gelungen.

Nachweis des Zuckers. Zum Nachweis des Zuckers können folgende, meist leicht zu beschaffende Objekte dienen:

1. Küchenzwiebeln. Diese sind besonders geeignet, da man bei ihnen den Zucker (3—6 %) nicht schon ohne weiteres durch den Geschmack nachweisen kann. Die Zerkleinerung geschieht durch Schaben mit dem Messer, auf dem Reibeisen oder durch die Zitronenpresse. Gelegentlich kommen ziemlich stark sauer reagierende Zwiebeln vor, bei denen der Zuckernachweis nur unter Verwendung größerer Reagensmengen gelingt³⁾.

Tulpen- und Hyazinthenzwiebeln enthalten Stärke statt Zucker.

2. Mohrrüben (*Daucus carota*); sie enthalten etwa 4 % Zucker.

3. Fleischige Früchte, z. B. Äpfel, Birnen, Pflaumen (an Backpflaumen findet sich Zucker an der Außenseite der Frucht als ascheartiger Überzug), Kirschen, Weinbeeren (auch Rosinen), Mandarinen und Apfelsinen (etwa gleichzeitig vorhandene Säure pflegt in diesem Fall die Reaktion nicht zu stören), Feigen u. a. m.

1) Gute Watte und gutes Filtrierpapier bestehen aus Baumwolle.

2) Das bekannte Palmin (Pflanzenbutter) stammt aus den Samen der Kokospalme, das sogenannte Palmöl von der Fruchtschale der Ölpalme (*Elaeis*).

3) Junge Oberhautzellen der Zwiebel (*Allium cepa*) eignen sich übrigens ausgezeichnet zum Demonstrieren des Zellkerns. Er ist so groß, daß man ihn in den Zellen abgezogener Häute im durchfallenden Licht mit einer 40fach vergrößernden Lupe gut erkennen kann. Junge Epidermiszellen der Zwiebel lassen sich im mikroskopischen Gesichtsfeld besser überblicken als ältere, die wiederum leichter zu präparieren sind. Junge Zellen sind kurz und verhältnismäßig plasmareich, ältere langgestreckt und inhaltsarm.

4. Kokosnuß (*Cocos nucifera*). Man überzeuge sich durch Schütteln, daß sie Milch enthält, bohre dann mit Messer oder Schere den Keimporus heraus und lasse die Milch in ein Becherglas laufen. Hierauf kann man durch einige Hammerschläge die Nuß in freier Hand leicht in zwei Hälften zerlegen und das Fleisch für den Versuch entnehmen. Das Fleisch ist auch geraspelt käuflich.

5. Kohlrüben, Runkelrüben, Zuckerrüben. Der Zucker tritt in den Rüben vorwiegend als Traubenzucker (Glukose, 6 Kohlenstoff-Zucker) und Rohrzucker (Saccharose, 12 Kohlenstoff-Zucker) auf.

Der Nachweis des Traubenzuckers (Glukose) geschieht am einfachsten durch Fehlingsche Lösung. Diese hält man in zwei Stammlösungen¹⁾ vorrätig:

Fehling I (mit Glasstopfen) enthält Kupfersulfat,

Fehling II (mit Gummistopfen) enthält stark alkalische Lösung von Seignettesalz (weinsaures Kaliumnatrium).

Beide Stammlösungen werden, wenn es sich um quantitative Bestimmungen handelt, zu genau gleichen Teilen gemischt; 10 ccm verbrauchter Lösung entsprechen dann 0,05 g Traubenzucker. Für qualitative Untersuchung genügt Abmessen nach Augenmaß.

Zur Auslaugung der zu prüfenden Teile werden 1—2 ccm der zerkleinerten Pflanzenmasse mit etwa 5 ccm Wasser über der Gas- oder Spiritusflamme zum Abtöten des Plasmas gelinde erwärmt; man gießt die Lösung vom Bodensatz ab und versetzt sie in einem Reagensglas mit so viel Fehlingscher Lösung (I+II), daß die Flüssigkeit deutlich blau erscheint. Beim Kochen (Vorsicht, stößt!) findet ein Farbumschlag aus Blau in Rot statt, indem durch die reduzierende Wirkung des Traubenzuckers rotbraunes Kupferoxydul oder rotgelbes Kupferoxydulhydrat entsteht.

Ein anderes, wichtiges Verfahren, Traubenzucker nachzuweisen, wenn er in größeren Mengen vorhanden ist, besteht darin, daß man möglichst dicken Saft, z. B. aus der Mohrrübe, im Reagensrohr etwa 20 Minuten lang auf dem Wasserbade mit essigsaurem Phenylhydrazin erhitzt. Es bilden sich dann Kristallbüschel von gelbem, nadelförmigem Glukosazon, deren Form unter dem Mikroskop studiert werden kann. Vgl. dazu Strasburger-Koernicke (1), S. 182.

Zur quantitativen Ermittlung des Zuckers in kleinen Flüssigkeitsmengen bis zu 10 % Konzentration (z. B. von ausgepreßten Pflanzensäften, Harn usw.) dient die Gärmethode, welche sehr genaue Resultate liefert (s. unter Hefe).

1) I: 34,639 g reines Kupfersulfat werden in dest. Wasser gelöst und zu 500 ccm aufgefüllt.

II: 173 g Seignettesalze werden in 400 ccm dest. Wasser gelöst und mit 100 ccm einer 51,6 % NaOH-Lösung vermischt.

Fehlingsche Lösung ist in Apotheken käuflich.

Brauchbar für diese Zwecke ist das Gärungssaccharometer von Lohnstein (1), Abb. 14. Der Gang der Untersuchung ist etwa folgender:

Die zu untersuchende Flüssigkeit wird unter Zusatz einer kleinen Menge lebender Hefe an die Stelle a gebracht und der kurze Schenkel unter Einstellen auf den Nullpunkt dann verschlossen. Die bei der Vergärung des Zuckers bei 20° C oder 35° C entstehende Kohlensäure drückt das Quecksilber im Kugelschenkel herab, wodurch die Säule in dem langen, offenen Schenkel steigt; an den Skalen, welche für die Gärungstemperaturen 20° bzw. 35° C gelten, kann dann der Prozentgehalt der Flüssigkeit an Zucker direkt abgelesen werden. Eine genauere Gebrauchsanweisung liegt jedem Gärungsmesser bei.

Abb. 14.
Lohnsteinsches
Saccharometer
zur quantitativen
Bestimmung von
Zucker in Flüssig-
keiten.

Endlich können quantitative Zuckerbestimmungen auch unter Anwendung von Polarisationsapparaten ausgeführt werden, wie es in großem Maßstabe in der Zuckerindustrie geschieht.

Der Zuckernachweis durch Fehlingsche Lösung, wie oben beschrieben, gelingt in der einfachsten Weise mit der Milch der Kokosnuß, wenn man 10 ccm Milch mit etwa 1 ccm Lösung erhitzt. Bei der Verwendung des Kokosfleisches versagt dagegen (ebenso wie bei Zuckerrübe) die Reaktion, obwohl für den Geschmack Milch und Fleisch etwa gleich süß erscheinen.

Das Fleisch enthält nämlich Saccharose (Rohrzucker), die auf Fehlingsche Lösung nicht wirkt. Dieses Disaccharid muß erst in zwei reduzierend wirkende, rechts und links drehende Monosaccharide invertiert (zerspalten) werden nach der Formel:

Die Zerlegung geschieht in der Weise, daß man den aus dem geschabten Fleisch der Nuß unter Zusatz von Wasser gewonnenen zuckerhaltigen Saft etwa eine Minute lang mit einigen Tropfen Salzsäure erhitzt und diese dann durch Soda abstumpft. Hierauf tritt mit Fehlingscher Lösung Reduktion ein.

War die benutzte Nuß noch unreif, was verhältnismäßig selten vorkommt, so enthält auch das Fleisch Traubenzucker. Das gleiche ist der Fall, wenn das Fleisch stellenweise verschimmelt ist (durch *Penicillium*), weil der Pinselschimmel an den Stellen seiner Entwicklung zur Inversion befähigt ist. Diese erfolgt durch das Ferment Invertase, welches im Pflanzenreich auch sonst häufig vorkommt; vgl. Lafar (1), Bd. 4, S. 407.

Rohrzucker ist neben der Glukose im Pflanzenreich weit verbreitet, da viele höhere Pflanzen ihn in geringerer Menge enthalten, wenigstens in einzelnen Organen und in gewissen Vegetationsperioden. So enthält z. B. der im Frühling reichlich auftretende Birken-saft neben Traubenzucker und Eiweißsubstanzen auch Rohrzucker.

Bei den Versuchen über den Nachweis des Zuckers hat man gute Gelegenheit, die Erscheinung der sogenannten Brownschen Molekularbewegung zu studieren. Es handelt sich dabei um die 1827 von dem englischen Botaniker Brown gemachte Beobachtung, daß kleine unbelebte Körperchen ($< 3 \mu$), welche im Wasser schweben, sich zitternd und wimmelnd hin und her bewegen, tanzenden Mückenschwärmen vergleichbar. Diese Erscheinung zeigen auch die Körnchen des roten Kupferoxyduls, die im vorliegenden Falle nicht mit kleinen lebenden Organismen untermengt sein können, da die Flüssigkeit zuvor gekocht werden mußte (Vergr. 300 u. mehr).

Je kleiner die Körperchen sind, um so lebhafter ist die zitternde Bewegung, je größer sie sind, um so plumper. Die Bewegungen lassen nicht mit der Zeit nach, außer wenn die Körnchen am Glase festhaften. Auch die Aufschwemmungen von chinesischer Tusche zeigen die Erscheinung bei starker Vergrößerung (z. B. bei Ölimmersion) sehr schön, ebenso die Gipskriställchen in den sogenannten Endvakuolen (Tanzstübchen) von *Closterium*.

Nach den Untersuchungen der Physiker, die sich dabei zum Teil des Ultramikroskops bedienen, handelt es sich bei diesen Erscheinungen um dieselben Gesetze, welche die molekularkinetische Theorie für die Moleküle in Lösungen annimmt. Mit steigender Temperatur nimmt die Bewegung in dem Grade zu, wie es die kinetische Gastheorie erwarten läßt; näheres vgl. man z. B. bei J. Perrin (1).

Lebende Bakterien bewegen sich unter dem Mikroskop wesentlich anders; während sie durch das Gesichtsfeld z. T. geradlinig fortschwimmen, bleiben die der Brownschen Bewegung unterliegenden Körper innerhalb eines engen Bezirks, wenn man Strömungen in der Flüssigkeit ausschließt.

Zuckerrübe und Zuckerrohr. Im großen wird der Zucker vorwiegend aus zwei Pflanzen gewonnen, der Zuckerrübe (*Beta maritima* var. *altissima*) und dem Zuckerrohr (*Saccharum officinarum*). Die erstgenannte gehört zur Familie der Melden (*Chenopodiaceae*), die letztere ist eines der schönsten und kräftigsten Gräser (*Gramineae-Andropogoneae*) der Tropen und Subtropen. Beide sind aus wilden Stammformen hochgezüchtete Kulturgewächse. Der Zucker findet sich in beiden in größerer Menge aufgespeichert, bei der ersten in der verdickten Wurzel, beim Zuckerrohr hauptsächlich im Mark des Stengels. Der Zuckergehalt des Rübenzellsaftes beläuft sich gewöhnlich auf 17—18 %, beim Rohr im Mittel auf 15—17 %. Vgl. Abb. S. 38.

Wie in der Rübe ist auch im Zuckerrohr der Zucker ungleich verteilt; die älteren, unteren Teile des Rohrs sind rohrzuckerreicher und traubenzuckerärmer als die jüngeren.

Die chemische Analyse der frischen Zuckerrübe ergibt etwa folgende Werte:

Cellulose (und Gummiarten)	4—6 %
(davon Pektin)	1 %)
Zucker	12—18 %
„	selten bis 25 %
Wasser	75—80 %
Nichtzuckerstoffe, mineralisch	0,8 %
„ organisch	0,5—1 %

Abb. 15. Verteilung des Zuckers in der Rübe. Der Höchstgehalt findet sich unter dem Kopfteil. Zuckerrübe in der Längsansicht dargestellt. (Nach Proskowetz.)

Die letztgenannten Stoffe¹⁾ [vgl. Wehmer (1) S. 181] bestehen aus:

Eiweiß,	Oxalsäure,
Betain,	Gerbsäure,
Glutamin,	Apfelsäure,
Asparagin,	Weinsäure,
Fett,	Zitronensäure.

Die in der Zuckerrübe überhaupt vorkommenden Kohlenhydrate sind nach W. Ruhland (1):

1. Stärke, 2. Raffinose, 3. Rohrzucker, 4. Glukose, 5. Fruktose.

Das natürliche Pektin, welches in fleischigen Wurzeln und Früchten besonders reichlich vorkommt, ist nach F. Ehrlich meist ein Ca-Mg-Salz einer Arabinose-Galaktose-Galakturonsäureverbindung.

Isotonisch mit dem Zellsaft der Rübe sind rd. 4—5 % KNO_3 . Man wird also zur wirksamen Plasmolyse der Zuckerrübenzellen nicht unter 5 % KNO_3 anwenden. Am bequemsten zur Erzielung der Plasmolyse (Abb. 16) ist die Verwendung von leicht vorrätig zu haltender konz. KNO_3 -Lösung (d. h. 24—25 %), unter deren Einwirkung die Plasmaschläuche mit ihrem Inhalt sich zu deutlichen Kugeln zusammenziehen, die das Licht verhältnismäßig stark brechen, weil der Zuckersaft fast zu sirupartiger Beschaffenheit eingedickt ist.

In manchen, besonders in angeschnittenen Zellen, ist der Zellkern gut sichtbar. Der zarte Plasmaschlauch als solcher läßt sich dagegen meist erst nach Anwendung von Färbemitteln leicht beobachten.

1) Diese wirken im Verein mit anderen Stoffen in den Abwässern der Zuckerfabriken zum Teil als Nährstoffe für *Leptomit* (s. dort).

Die Schnitte durch die Zuckerrübe dürfen nicht zu dünn gemacht werden, da sonst die ziemlich großen Zellen durch das Messer verletzt werden. Für plasmolytische Beobachtungen (auf dem Objektträger) sind noch kleine Schnitte, welche mit dem Taschenmesser gemacht worden sind, gut verwendbar. Trotz einer gewissen Unregelmäßigkeit der Zuckerrübenzellen liefern Schnitte für mittlere (100—200fache) mikroskopische Vergrößerungen ein ziemlich regelmäßiges Bild, bei durchfallendem sowohl wie auffallendem Licht.

Nach eingetretener Plasmolyse kann man schließlich den ursprünglichen Zustand der Zellen von neuem herstellen, wenn man wieder vorsichtig Wasser zusetzt.

Wegen des Studiums der isotonischen Lösungen sei auf S. 26 verwiesen.

Die ausgesprochene Semipermeabilität der Plasmaschläuche in der Zuckerrübe ist wichtig für deren Aufgabe als Speicherorgan. In den Monaten August und September sind die Rüben auf den Feldern schon zuckerreich und doch tritt der Zucker bis zur Erntezeit im Oktober trotz hoher Turgorspannung der Zellen nicht in den Boden aus. Freilich wirkt neben den Plasmaschläuchen die

Außenhaut der Rübe beim Zurückhalten des Zuckers unterstützend mit. Durch Einmieten über Winter verlieren die Zuckerrüben unter allen Umständen mindestens $\frac{1}{2}$ % Zucker infolge von Atmung.

Bei dem zur Zuckergewinnung eingeleiteten Diffusionsprozeß werden die Plasmaschläuche durch Erhitzen der Rübenschnitzel abgetötet, worauf der Zucker leicht austreten kann. Das Zuckerrohr wird hauptsächlich mechanisch ausgepreßt.

Die Zuckerrübe enthält, wie verschiedene andere Chenopodiaceen, z. B. *Chenopodium album*, deutliche Mengen von Salpeter, welche chemisch leicht nachgewiesen werden können; die Nitrate sind geeignet, die osmotische Saugkraft des Zellsaftes erhöhen zu helfen. Vgl. Molisch (2). Beide, Rübe und Rohr, sind verhältnismäßig reich an Kali.

Abb. 16. Zellen aus der Zuckerrübe, plasmolysiert. Man erkennt leicht die mehr oder minder regelmäßige Zurückziehung des den Zuckersaft umschließenden Plasmaschlauches von der Zellwand. Vergr. mittelstark. (Orig.)

Infolge ihres spezifischen Saftgehaltes gefriert die Zuckerrübe erst bei rd. -1°C (wobei der Zuckergehalt unverändert bleibt), während sie erst unter -5°C erfriert; die Blattstiele der Pflanze ertragen nur etwa -3°C .

Legt man Stengelstücke des Zuckerrohres in 98 % Alkohol¹⁾, so kristallisiert der Rohrzucker in Form von kleinen, monoklinen Kristallen aus. Er kann auf in Alkohol eingelegten oder ausgetrockneten Schnitten unter dem Mikroskop (bei etwa 300facher Vergrößerung) leicht beobachtet werden.

Ueber weitere Literatur vgl. H. de Vries (2), Strasburger-Koernicke (1), Knauer-Hollrung (1), Krüger (1), Wohryzek (1), Kny Taf. 9.

Bildung von Stärke aus Zucker. Die meisten grünen Pflanzen sind nach 1—2tägigem Aufenthalt im Dunkeln frei von Stärke, außer wenn es sich um stärkepeichernde Organe handelt²⁾. Belichtet man sie wieder, so tritt von neuem Assimilation ein, und ein Teil des dadurch erzeugten Zuckers wird infolge der Konzentrationssteigerung der Zuckerlösung in Stärke umgewandelt. Die Grenze, bei der die erträgliche Zuckermenge überschritten wird (Umwandlung des überschüssigen Zuckers in Stärke) liegt bei manchen Pflanzen (z. B. vielen Monocotyledonen) sehr hoch. So ist es erklärlich, daß bei diesen in der freien Natur in den Blattzellen (ausgenommen Spaltöffnungen) nur Zucker nachweisbar ist, während bei künstlicher, reicherer Zufuhr von CO_2 Stärke auch bei diesen Pflanzen auftritt (S. 5).

Man kann die Bildung von Stärke statt durch höhere CO_2 -Gaben im Licht in gleicher Weise durch künstliche direkte Zufuhr von Zucker hervorrufen, z. B. durch Auflegen stärkefreier Blätter auf mehrprozentige Zuckerlösung (auch Glyzerin kann unter Umständen verwendet werden; dann bildet sich Stärke auch im Dunkeln. Bei diesen Versuchen handelt es sich um sogenannte transitorische Stärke, deren Körner verhältnismäßig klein sind und durch Auflösung leicht wieder verschwinden können (daher auch Wanderstärke genannt). Der Nachweis kleiner Stärkemengen geschieht unter dem Mikroskop am besten mit Hilfe von stark konzentrierter Chloralhydratlösung (5:2), die quellend wirkt, und nachträglichem Zusatz von Jod-Jodkaliumlösung, wodurch Blaufärbung eintritt. Bei größeren Stärkekörnern genügt bloßer Zusatz von verdünnter Jod-Jodkaliumlösung³⁾.

1) Als Kursusmaterial vorrätig zu halten und jahrelang brauchbar.

2) Über Verdunkelungsversuche durch Auflegen von Filzstückchen, Korkscheiben oder Stanniolstreifen vgl. Detmer (1) u. a. m.

3) Als Jod-Jodkaliumlösung benutzt man sehr zweckmäßig die Normaljodlösung der chemischen Laboratorien (127 g J im l), die zum Färben der Stärke mit Wasser bis etwa zur Farbe des Portweins verdünnt wird.

Die Reservestärke in den Knollen der Kartoffeln, Tulpen, Hyazinthen usw. ist natürlich ebenfalls durch Umwandlung aus Traubenzucker, der als Assimilationsprodukt in den Blättern entstanden und nach den unterirdischen Organen abgeleitet ist, gebildet worden.

Unreife Weizenkörner u. a. m. schmecken noch süß, weil der Zucker in ihren Speicherzellen noch nicht in Stärkemehl umgewandelt ist. Die von gequollenen Gerstenkörnern mitsamt dem Schildchen abpräparierten Embryonen enthalten anfänglich Rohrzucker, nach 3—4 Tagen kleine transitorische Stärkekörner.

Jedes Stärkekorn bedarf zu seiner Entstehung eines eigenen Organs, des Stärkebildners, der aber in den meisten Fällen nur schwer zu sehen ist, besonders bei grobkörniger Reservestärke.

Ein ausgezeichnetes Objekt zum Studium der Stärkebildner ist nach A. Dodel (1) die Urticacee *Pellionia daveauana*. Die Pflanze stammt aus Cochinchina und wird in den Gewächshäusern der botanischen Gärten gezogen, wo sie während des ganzen Jahres ohne besondere Pflege wuchert.

Man fertigt Querschnitte durch den Stengel an und betrachtet bei starker Vergrößerung (rd. 300) die Rindenzellen. Man erkennt chlorophyllhaltige Kappen, welche den Stärkekörnern aufsitzen, wie die Ab-

Abb. 17. Stärkekörner mit grünen Stärkebildnern, aus dem Stengel von *Pellionia daveauana*. Vergr. mittelstark. (Orig., gez. nach A. Dodel.)

bildung zeigt. Nach Arth. Meyer (1), S. 253, zeigt sich nach Auflösen des Stärkekornes, daß von dieser Kappe eine feine Plasmahaut ausgeht, die das gesamte Stärkekorn umschließt. Infolge der Tätigkeit des Stärkebildners werden durch Apposition (Anlagerung) Schichten von Stärke erzeugt, die dann wahrscheinlich durch Intussuszeption (Einlagerung) in die Dicke wachsen, wodurch der konzentrische Bau der Stärkekörner verständlich wird.

Setzt man zu dem Präparat (nach Abheben des Deckglases) verdünnte Jodlösung, so heben sich die blauviolett gefärbten Stärkekörner

(vgl. die Abbildung bei den Florideen) wirkungsvoll von dem grünen¹⁾ Stärkebildner ab.

Man kann die Stengel in Wasser unter Zusatz von Formalin im Dunkeln aufbewahren. Zur Herstellung mikroskopischer Dauerpräparate können die Stengelquerschnitte in Glyzeringelatine²⁾ eingelegt werden.

Sehr geeignet zum Studium der Stärkebildner sind auch die jungen Scheinknollen der Orchidee *Phajus grandifolius* (käuflich) und die Wurzelstöcke der Schwertlilie (*Iris germanica*); s. Strasburger-Koernicke S. 165.

Stärke (von zum Teil knochenförmiger Gestalt) wird auch in Milchsaftschläuchen gebildet (neben Kautschuk, Guttapercha, Harzen, ätherischen Ölen, Alkaloiden, Gerbstoffen usw.). Beispiele für milchsaftführende Pflanzen finden sich in den Familien der Papaveraceae, Euphorbiaceae, Asclepiadaceae, Compositae usw.

In den unterirdischen Organen verschiedener Korbblütler wie *Inula* (Alant), *Helianthus tuberosus* (Topinambur), *Dahlia* (Georgine), *Taraxacum* (Löwenzahn) u. a. m. findet sich im Herbst und Winter als häufiger Reservestoff das Inulin, ein der Stärke, richtiger dem Amylodextrin, verwandter Körper [wahrscheinlich $(C_6H_{10}O_5)_3$]. Dieses Inulin verhält sich insofern dem Zucker ähnlich, als es im Zellsaft gelöst ist. Nach mindestens achttägigem Einlegen in 50 % Alkohol fällt es in den Zellen aus und bildet farblose Kugelkristalle, die sich durch Jod gewöhnlich gelb färben. (Nicht zu verwechseln mit Kugelkristallen von Calciumphosphat.) Wie Stärke zeigen die Inulinkugeln im polarisierten Licht ein dunkles Kreuz. Vgl. auch Strasburger-Koernicke (1), S. 185.

Wichtig ist, daß als Abbauprodukt des Inulins Fruchtzucker auftritt. Das käufliche Inulin wird Zuckerkranken verordnet.

Beobachtungen an der Kartoffel. Die Stärkebildner (Leukoplasten) in den Kartoffelknollen sind verhältnismäßig klein und gewöhnlich schwer sichtbar zu machen. Sie werden mit Säurefuchsin gefärbt; vgl. die Abbildung nach A. Zimmermann (1)³⁾. Die farb-

1) Die assimilatorische Tätigkeit dieser grünen Stärkebildner ist bedeutungslos; diese Zellorgane sind bei den meisten übrigen Pflanzen farblos; vgl. Strasburger-Koernicke, S. 165 u. ff.

2)	Gelatine	7 g
	Wasser	42 „
	Glyzerin	50 „
	Thymol oder Karbolsäure	1 „
		100 g

(Vgl. Strasburger-Koernicke, S. 751.) Glyzeringelatine kann käuflich bezogen werden. Man halte sich für jedes Präparat ein Würfelchen davon bereit. Durch zu vieles Hineinstecken in eine kompakte Masse erhält man Luftblasen in den Präparaten.

3) S. auch unter Eiweiß.

losen Stärkebildner haben indessen die Eigenschaft, durch längere Belichtung zu ergrünen, wenigstens in den peripheren Teilen der Kartoffelknolle. Setzt man möglichst dünnchalige Knollen mehrere Wochen lang hellem Tageslicht aus, so nehmen die äußeren Teile eine mehr oder minder deutlich grüne Farbe an. Macht man nun durch die am stärksten ergrüneten Teile etwas unter der Korkschicht zarte Schnitte, so treten die nun grün erscheinenden Stärkebildner deutlich hervor, wenn auch meist nicht so schön wie bei der vorher erwähnten *Pellionia*.

Der chemische Nachweis der Stärkekörner durch Färbung kann makroskopisch geschehen. Man schneidet die Kartoffel durch oder nimmt Stücke davon und betupft die Schnittflächen mit verdünnter Jod-Jodkaliumlösung (vgl. S. 40). Dadurch färben sich die Schnittflächen roher Kartoffeln dunkel schwarzblau, diejenigen gekochter, bei denen die Stärkekörner gequollen sind, blau. Die gefärbten Körner auf den Schnittflächen roher Kartoffeln kann man im auffallenden Licht bei

Abb. 18. Stärkebildner in der Knolle der Kartoffel (*Solanum tuberosum*). Der abgebildete Zellinhalt stammt aus einer Parenchymzelle, welche wenige Schichten von der Korkhülle entfernt war. Fixierung mit Sublimat-Alkohol, Färbung mit Säurefuchsin. *l* Stärkebildner (Leukoplast); *s* Stärkekörner; *k* Eiweißkristall; *z* Zellkern. (Nach A. Zimmermann.)

Abb. 19. Stärkekörner der Kartoffel im polarisierten Licht bei mittelstarker Vergrößerung. (Orig.)

schwacher mikroskopischer Beobachtung deutlich sehen. Natürlich kann der Nachweis auch unter dem Mikroskop geschehen, wenn man die Schnittflächen auf dem Objektträger unter Zusatz von wenig Wasser abtupft, wobei man die einzelnen Körner beobachten kann. Das Zellgewebe tritt nach dem Verquellen der Körner durch Erwärmen des Objektträgers über einem brennenden Streichholz oder einer Spiritusflamme deutlich hervor.

Die achatartige, exzentrische Schichtung der einzelnen Stärkekörner ist nicht bei allen Kartoffelsorten gleich deutlich. Die Quellung der Stärkekörner mit allen Uebergangsstadien beobachtet man am besten dadurch, daß man den Objektträger mit dem Präparat vor der mikroskopischen Betrachtung der Körner nur an einer Seite erhitzt, oder dadurch, daß man den Vorgang des Quellens unter seinen Augen auf einem heizbaren Objektisch, den man auch provisorisch herstellen kann, verfolgt.

Der physikalische Nachweis der Stärke geschieht mit Hilfe des Polarisationsmikroskops (vgl. Kap. Quellung S. 83). Beigekreuzten Prismen (Nikols) erscheinen die Stärkekörner; wie die Abb. 19 zeigt, auf schwarzem Grunde weiß mit dunklem Kreuz. Dieses Kreuz wird bedingt durch die symmetrische Lagerung der doppelbrechenden Micellen zu den Polarisationsebenen, die Arme des Kreuzes fallen mit den Schwingungsrichtungen der beiden Nikols zusammen. Für die Beobachtung unter dem Polarisationsmikroskop können die Stärkekörner herausgeschabt oder in Schnitten betrachtet werden. Es können Schnitte mit einem scharfen Taschenmesser genügen, wenn man auf die Randteile einstellt. Man untersuche sie im Wasser und lege ein Deckglas auf. Bei Benutzung des Hohlspiegels kann man bei etwa 300facher Vergrößerung mit Okular 1 genügend lichtstarke Bilder erzielen.

Legt man Schnitte durch die Kartoffel (zu mikroskopischen Präparaten) in Glyzerin¹⁾ oder Glyzeringelatine ein, so bleiben bei geeignetem Material die Schichten sichtbar. In jeder Zelle wird man etwa 20 Körner beobachten.

Die Zusammensetzung der Kartoffel ergibt sich aus folgender Uebersicht:

Frische ungekeimte Kartoffeln, Mittelwerte in Prozenten.

Wasser	75,0
Stärke, Dextrin usw.	21,0
N-haltige Substanzen	2,0
(Amidoverbindungen u. Eiweiß)	
Fett	0,2
Rohfaser	0,7
Asche (besonders K und P)	1,1
Solanin (in kleinen Mengen ungiftig)	0,01

rd. 100,0

Die Schliffigkeit der Kartoffel beruht auf höherem Wassergehalt und der teilweisen Umwandlung der Stärke zu Dextrin.

Das Süßwerden besteht in dem Entstehen von Zucker (über 2,5 %) bei niederer Temperatur (auch ohne Gefrieren). Bei Zimmertemperatur tritt wieder Rückbildung des Zuckers zu Stärke ein.

Das Mehligwerden beim Kochen oder Rösten mancher Kartoffelsorten beruht, wie die mikroskopische Beobachtung lehrt, auf dem unförmlichen Aufquellen der Stärkekörner, Trennen der Zellen und teilweisem Platzen der Zellhäute. Lit. Wagner (1), Märcker-Delbrück (1), Muspratt (1), Saare (1), de Vries (3).

1)	Glyzerin	75 ccm
	Wasser	25 „
	Alkohol	einige Tropfen.

Abschließender Rand durch Goldsize, venetianisches Terpentin, Kanadabalsam u. dgl.

Rückbildung des Zuckers aus der Stärke. Die Umwandlung der Stärke in Zucker bedeutet eine Molekülverkleinerung; es handelt sich aber weniger um einen tiefgreifenden Abbau, als um einen Umbildungsprozeß unter Anlagerung von Wasser (Hydrolyse, analytischer Zucker).

1. $(C_6H_{10}O_5)_6$ (S. 33) wird zu $C_{12}H_{22}O_{11}$ durch das Enzym Diastase¹⁾,
 Stärke Maltose
 (intermediär können Dextrine entstehen.)
2. $C_{12}H_{22}O_{11}$ wird zu $C_6H_{12}O_6$ durch das Enzym Maltase.
 Maltose Traubenzucker

Vgl. v. Lippmann (1), O. Emmerling (1), Jos. Klein (1), Biedermann (1), Euler (1).

Die Enzyme finden sich reichlich im Malzkorn, d. h. in Gerste, die in bestimmter Weise gekeimt und wieder getrocknet ist¹⁾. Man kann zu den Versuchen auch gequollene und eventuell wieder getrocknete Körner benutzen, ja selbst im ungequollenen Korn (auch in Laubblättern) können sich geringe Mengen von Fermenten finden. Der Hauptsitz der Diastase¹⁾ ist das Schildchen, mit welchem der Gerstenembryo dem Mehlkörper anliegt.

a) Man bereite unter Erwärmen eine Pseudo-Lösung (Stärkekleister) von Kartoffel- oder Reis-Stärke (2 %) und überzeuge sich an einer kleinen Probe, daß diese Lösung sich nach Jodzusatz deutlich blau färbt. Hierauf füge man zweckmäßig 10 % Gelatine hinzu und gieße das Ganze in dünner Schicht in ein Petrischälchen oder in eine flache Schale aus. (Vgl. den Abschnitt über Bakteriologie.) Dann schneide man sich aus Malzkörnern einige Quer- oder Längsscheiben und lege etwa vier von diesen in Abständen von mindestens 4 cm voneinander auf die inzwischen erstarrte Gelatineschicht.

Die Schale bzw. Schalen stelle man unter eine Glasglocke und füge, wenn möglich, ein kleines Gefäß mit Chloroform bei, dessen Dämpfe sterilisierend wirken und dadurch die Entwicklung von Bakterien verhindern, während die Wirksamkeit der Diastase, welche aus den Schnitten in die Gelatine übergeht, nicht beeinträchtigt wird. Nach einigen Tagen übergieße man die Gelatine mit Jodlösung. Man wird dann leicht erkennen, daß jedes Malzkornstück von einem etwa pfenniggroßen hellen Hof umgeben ist, während die übrigen Teile der Platte sich blau färben. In der Umgebung der Malzkornstücke bleibt die Blaufärbung aus, weil die Stärke in Zucker verwandelt worden ist. Bisweilen entsteht außer dem hellen Hof noch ein mit Jod sich gelb färbender Ring, und zwar dadurch, daß hier die Stärke erst bis zum Dextrin abgebaut ist [vgl. Beijerinck (1)]. Statt durch Malzkornschnitte kann man die Verzuckerung auch durch auskeimende Schimmelpilzsporen erhalten.

1) diástasis = Trennung. — Vorrätige Malzkörner sind für immer haltbar.

Die Versuchsdauer läßt sich auf $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunde abkürzen, wenn man fein zermahlene Malzkörner mit wenig Wasser unter mehrfachem Umschütteln (nicht kochen!) auslaugt und davon nach kurzem Stehen einen Tropfen auf sehr dünne Kleister- oder besser Kleistergelatine-schicht bringt. Schon nach 15 Minuten läßt sich meist die Wirkung der Diastase mittels der Jodreaktion nachweisen.

Dieselbe auflösende Wirkung wie die Diastase zeigt auch der menschliche Speichel (Ptyalin!), der eine große Bedeutung für die Verdauung hat.

b) Man zermahle Malzkörner in einer Kaffemühle und übergieße das Pulver mit der gleichen oder doppelten Menge Leitungswasser, so daß ein nicht zu dicker Brei entsteht. Nach tüchtigem Durchschütteln wird abfiltriert und das die Diastase enthaltende Filtrat im Reagensglas zu dünner, aber sich mit Jod noch deutlich bläuender Stärkelösung gesetzt. Nach etwa 5 Minuten Einwirkung tritt nach Jodzusatz Violettfärbung, nach rd. 10—20 Minuten wegen Bildung von Erythrodextrin Braunfärbung, zuletzt Farblosigkeit ein.

c) Man ziehe etwa 1—10 cm hohe Keimpflanzen von Weizen (*Triticum vulgare*) oder Gerste (*Hordeum vulgare*) in Erde, Sägespänen, zwischen Watte oder zwischen Fließpapier (S. 61). Die gekeimten Körner riechen wegen Bildung von Dextrin nach Gurke. Sie enthalten eine milchige Flüssigkeit, die sich leicht zwischen zwei Fingern auspressen

läßt; man kann sie auch ohne Wasserzusatz direkt unter dem Mikroskop betrachten. Man sieht in ein und demselben Gesichtsfeld alle Stadien des Angriffs durch Diastase; angefressene, halbkorrodierte und fast zerfallene Stärkekörner (vgl. die Abbildung). Was durch die Fermente gelöst worden ist, ist zu Dextrin oder Zucker geworden. Die korrodierten Körner ähneln, wie die Abbildung zeigt, Erbsen, welche durch Käfer angefressen sind. Im ungekeimten Korn findet sich natürlich keine korrodierte Stärke.

Abb. 20. Korrodierte Stärkekörner aus dem gekeimten Gerstenkorn. 1, 2, 3, 4 aufeinanderfolgende Stadien der durch Diastase erfolgenden Auflösung, wie sie sich nebeneinander vorfinden. (Nach F. Noll.)

Es empfiehlt sich, nicht zu hohe Keimpflanzen zum Versuch zu wählen, weil sich allmählich Bakterien zwischen die Stärkekörner mischen und dadurch unter Umständen das Bild reiner Diastasewirkung verwischt werden kann.

Zu den Untersuchungen kann auch Alkoholmaterial verwendet werden.

d) Die Keimblätter der Erbse sind voll von Stärke; ist der Keimling dagegen erst zu einer etwa spannehohen Keimpflanze herangewachsen, so ist der Stärkegehalt nur noch gering oder gleich Null. Auch das spezifische Gewicht der Kotyledonen wird mit der Entleerung geringer, wovon man sich durch Hineinwerfen in Wasser überzeugen kann.

Ungekeimte Zwiebeln der Hyazinthe und Tulpe enthalten Unmassen von Stärke, deren Menge mit dem Erscheinen der Blätter abnimmt, um nach dem Entfalten der Blüten vollkommen oder beinahe ganz zu verschwinden. Die Stärkekörner sind also in Zucker umgewandelt, und dieser ist zum Aufbau der Pflanzen verwendet worden. Die Tatsache, daß ein Teil des Zuckers veratmet worden ist, soll hier unberücksichtigt bleiben.

Umwandlung der Reservezellulose. Die Reservezellulose wird nicht so wesentlich durch die chemische Natur als durch die leichte Löslichkeit bei Einwirkung verschiedener Stoffe gekennzeichnet. Man hat sie deshalb auch passend als Hemizellulose bezeichnet.

Querschnitte durch die Kotyledonen der Kapuzinerkresse (*Tropaeolum majus*) zeigen, daß die Zellwände ziemlich dick sind und sich nach bloßem Zusatz von Jodlösung blau färben. Solche Zellulose hat man auch als Amyloid bezeichnet. Derartige Querschnitte eignen sich zu Dauerpräparaten, wenn auch die blasse Färbung nicht haltbar ist. Die chemische Zusammensetzung der Reservezellulose ist nicht in allen Fällen genau die gleiche.

Auch die Samen der Dattelpalme (*Phoenix*), von *Phytelephas* (bildet Mannose), *Allium*, *Coffea* und vielen anderen besitzen Reservezellulose, die sich aber durchaus nicht in allen Fällen nach Zusatz von Jodlösung blau färbt. Die hauptsächlichste Eigenschaft der Reservezellulose bleibt, wie gesagt, ihre leichte Umwandelbarkeit in Nährstoffe [*Phoenix*, *Phytelephas* (auch *Strychnos*) mit Plasmodesmen].

Nach dem Auskeimen der Samen von *Tropaeolum* wird man beobachten, daß die Zellen nur noch dünne Wände aufweisen, welche sich durch Jodlösung nicht mehr blau färben; der größte Teil der Wand ist in Zucker übergeführt und zum Aufbau des Keimlings verwendet worden.

Physiologie der Keimung von *Ricinus*. An dieser Stelle beschäftigt uns *Ricinus* wegen des physiologischen Verhaltens seines Fettes bei der Keimung. Durch den hohen Ölgehalt seines Samens (70 %) unterscheidet sich seine Keimungsgeschichte wesentlich von derjenigen der Gerste, Erbse usw. Der Same von *Ricinus* erinnert wegen der Speicherung von Fett und Eiweiß an tierische Gebilde, z. B. an das Hühnerei.

Legt man einen trockenen Samen von *Ricinus* (das Material ist in jeder Samenhandlung käuflich) auf ein Drahtnetz und hält ihn so lange in die Bunsenflamme, bis er brennt, so wird man leicht beobachten, daß er nun von selbst weiter brennt; oft schießen förmliche Flammen-

zungen unter starker Rußentwicklung hervor, und an manchen Stellen quillt das siedende Öl heraus. Stärkehaltige Samen und reines Mehl entwickeln bei gleicher Behandlung auf dem Platinblech oder auf einem Glimmerblättchen ruhig brennende, nicht rußende Flammen.

Man kann das Öl auch mit Alkohol ausziehen, denn Ricinusöl gehört zu den wenigen in Alkohol löslichen Ölen.

Beim Zerreiben zwischen den Fingern fühlt sich das Nährgewebe fettig an.

Schnitte durch den trockenen Samen oder Stücke davon lege man auf einen Objektträger und setze konzentrierte Chloralhydratlösung hinzu; dann wird man das Öl seitlich in Menge hervortreten sehen. Wie bereits bemerkt, löst es sich bei Zusatz von Alkohol auf.

Die Asche eines auf dem Drahtnetz verbrannten Samens benutzen wir zum Phosphornachweis. Sie wird in einer Reibschale mit etwas Salpetersäure verrieben, diese dann abfiltriert und nach Zusatz von Ammoniummolybdat schwach erwärmt. Es fällt ein reichlicher, gelber Niederschlag von molybdänphosphorsaurem Ammon aus. Phosphor ist gewöhnlich ein Bestandteil der Reservematerial speichernden Samen, läßt sich bei *Ricinus* dazu noch um so mehr vermuten,

Abb. 21. Zelle aus dem Nährgewebe (Endosperm) von *Ricinus communis*. Die sieben großen Aleuronkörner enthalten Eiweißkristalle und phosphorhaltige Globoide. (Nach E. Strasburger.)

Abb. 22. Keimpflanze von *Ricinus communis*. 1 Keimblätter ganz vom Nährgewebe umgeben, 2 von Resten des Nährgewebes umgeben, 3 nach Verbrauch des Nährgewebes. Fast nat. Gr. (Orig.).

als die bekannten Globoide seines Endosperms (Abb. 21 u. 22) phosphorhaltig sind. Eiweißkristalloide s. auf der Abb. 21 und in der Gruppe „Eiweiß“.

Zum Keimen legt man (höchstens 2jährige) Samen ungequollen in feuchte lockere Sägespäne. Dieses Keimbett genügt, da man höchstens fingerhohe Keimpflanzen für die vorliegenden Versuche erzielen will (vgl. Abb. 22). Es vergehen oft 3 Wochen, bis die Pflänzchen hervorbrechen.

Beim Keimen kommt, wie gewöhnlich, zuerst die Wurzel aus dem Samen hervor. Hat sie mit dem Hypokotyl eine Länge von 6—8 cm

erreicht, so trenne man das Ganze an der Basis ab, zerhacke es, bringe es in ein Reagensglas und koche es mit etwas Wasser gelinde aus. Die Fehlingsche Probe wird reichliche Menge von Zucker anzeigen. Ähnliches ist bei den ölhaltigen Samen des Kürbis (*Cucurbita pepo*) und der Küchenzwiebel (*Allium cepa*) zu beobachten. Dieser Zucker ist aus dem fetten Öl entstanden. Stärke ist, wie bereits betont, im ungekeimten Samen niemals vorhanden, ebensowenig natürlich Zucker, deshalb bleibt auch die Fehlingsche Probe mit ungekeimten Samen ergebnislos. Vgl. Sachs (2).

Man könnte die Süßigkeit in der jungen Wurzel vielleicht schmecken, wenn nicht gleichzeitig Bitterstoffe vorhanden wären. Während die Wurzel auf etwa Fingerlänge auswächst, fällt der Ölgehalt im Samen, bezogen auf Trockensubstanz, von 70 % auf 60 %, während der Zuckergehalt dementsprechend in der Pflanze steigt; vgl. Leclerc du Sablon (1).

Die Kotyledonen der gekeimten Samen bleiben einstweilen noch im Endosperm stecken (vgl. die Abb. 22) und nehmen aus diesem das Öl auf. Sie besitzen noch keine Spaltöffnungen. Die Oberhaut ist, entsprechend ihrer Aufgabe als Aufnahmeorgan, sehr zart; die Kotyledonen vertrocknen in 10–15 Minuten, wenn man sie heraus-trennt und frei liegen läßt.

Der aus dem Öl entstandene Zucker kann sich in der Pflanze zu transitorischer Stärke umwandeln. Wir finden solche sehr reichlich im Hypokotyl, besonders in der sogenannten Stärkescheide, wo die Stärke auch mit Jodlösung, am besten nach vorheriger Quellung durch Chloralhydrat, leicht nachzuweisen ist.

Mit dem Öl nimmt auch das gespeicherte Eiweiß, welches in großer Menge in Form von Aleuronkörnern vorhanden ist (Abb. 21 u. 23), beim Keimprozeß im Samen ab.

Das Vorhandensein von Eiweiß läßt sich durch zwei einfache chemische Reaktionen leicht nachweisen. Mit Millons Reagens¹⁾, das man ohne Zusatz von Wasser einwirken läßt, werden Schnitte durch trockene Samen, die dick sein können, oder Stücke davon in der Kälte langsam, in der Wärme schnell ziegelrot, zerriebene Teile mit Fehling-scher oder ähnlich zusammengesetzter Lösung violett (Biuret-Reak-tion auf peptonartige Stoffe).

Eine dritte Reaktion ist die Xanthoprotein-Reaktion, bei der durch konzentrierte Salpetersäure und nachfolgenden Zusatz von Ammoniak orangefarbene Färbung eintritt.

Ist die Wurzel erst etwa fingerlang, dann sind die Aleuronkörner aus dem Endosperm verschwunden, wenigstens an den Stellen, wo letzt-genanntes etwas wässerig erscheint; zuletzt enthält das Endosperm, da es ausgesogen wird, weder Öl noch Aleuronkörner.

1) Eine Lösung von Quecksilbernitrat, welche freie Salpetersäure und salpetrige Säure enthält.

Durch welche Enzyme diese Körner bei der Keimung der Samen von *Ricinus* gelöst werden, ist wenig bekannt.

In Betracht käme vielleicht Pepsin (als Pulver käuflich), das aber im Innern von Geweben nicht vorzukommen pflegt, weil es einer zu konzentrierten Säurelösung ($\frac{1}{3}$ % Salzsäure) bedarf, um wirken zu können. (Die käufliche Salzsäure [Dtsch. Arzneibuch] enthält etwa 25 % HCl.) Wo Pepsin im Pflanzenreich beobachtet worden ist, wird es nach außen abgeschieden, z. B. beim Sonnentau (*Drosera*) und bei der Kannenpflanze (*Nepenthes*). Das Trypsin (enthalten in dem in den Apotheken käuflichen Pankreatin der Bauchspeicheldrüse) wirkt am besten in alkalischer Lösung (0,5—1,5 % Soda). Es findet sich sehr häufig bei Hefen und Bakterien, baut nur bestimmte Polypeptide ab und verflüssigt wie Pepsin die Gelatine; vgl. P. Lindner (1) und W. Pfeffer (1) S. 511.

Wie Diastase auf Stärke, so wirkt also Pepsin oder Trypsin auf Eiweiß.

Die Vorgänge beim Transport des Öles in der keimenden Pflanze beanspruchen ganz besonderes Interesse. Die meisten Öle bestehen aus Glycerin und Fettsäuren. Sie können in diese beiden Bestandteile leicht zerspalten werden; man spricht dann vom Ranzigwerden des Öles. Im tierischen Körper besorgt ein Ferment des Pankreassaftes diese Spaltung, im Pflanzenreich sind fettspaltende Enzyme (Lipasen) ebenfalls beobachtet worden; vgl. W. Benecke (1), C. Flüge (1), R. H. Schmidt (1), Pfeffer (1), S. 510 u. Czapek (1).

Alles Öl, welches als solches wandern soll, muß vorher fein zu Tröpfchen zerteilt (emulgiert) werden. Dieser höchst lehrreiche Zerteilungsprozeß ist ohne Fettspaltung und gleichzeitige Gegenwart von Alkalien nicht möglich. Er vollzieht sich folgendermaßen: Zunächst wird durch ein Ferment oder durch die Tätigkeit des Plasmas ein Teil des Fettes in Glycerin und Fettsäure zerspalten. Das Glycerin ist für unsere Betrachtungen unwesentlich, die Fettsäure aber sehr wichtig, denn sie verbindet sich mit dem Alkalikörper (der sich z. B. im Plasma befinden kann) zu einem Salz (Seife). Dieses bewirkt infolge der veränderten Oberflächenspannung ein Auflösen der Fettmasse in kleine Kügelchen, deren jedes von einer feinen Seifenmembran umgeben ist.

Um diesen Prozeß zu veranschaulichen, verfähre man folgendermaßen: Man vermische Ricinusöl oder Olivenöl, um es sauer zu machen, mit etwa 10 % käuflicher, gewöhnlicher Ölsäure und bringe davon einen Tropfen auf den Objektträger; daneben trage man eine kleine Menge ca. $\frac{1}{2}$ % iger Sodalösung auf und bringe beide Flüssigkeiten zur Berührung. Betrachtet man dann die Berührungszone unter dem Mikroskop, ohne ein Deckgläschen aufzulegen, so wird man in günstigen Präparaten sehr schön das Abschnüren der feinen Öltröpf-

chen wahrnehmen und somit den Emulsionsprozeß in anschaulicher Weise sich in seinen Feinheiten unmittelbar abspielen sehen. Durch das Hinzufügen freier Ölsäure ist die Tätigkeit des ölspaltenden Enzymes ersetzt worden; mit nicht sauer gemachtem Öl würde der Versuch mißglücken. Makroskopische Versuche s. bei A. Kühn (1).

Ob nun in der Pflanze die feinen Öltröpfchen als solche von Zelle zu Zelle wandern oder erst in ihre Bestandteile zerlegt und dann wieder verbunden werden, ist ungewiß. Sicher ist aber, daß das Öl ziemlich schnell von Zelle zu Zelle befördert wird [vgl. Pfeffer (1), S. 85]. Von den nackten Plasmodien der Myxomyceten wird Öl leicht aufgenommen.

Um das Wandern des Öles in der Pflanze zu zeigen, mache man an einer an sich ölfreien Keimpflanze einen Einschnitt und ziehe nach R. H. Schmidt einen mit Mandelöl getränkten Streifen Fließpapier durch. Nach einigen Tagen kann man dann massenhaft Öl in den Zellen mittels Osmiumsäure, besonders beim Erwärmen, nachweisen.

Das Glycerin konnte beim Wandern der Fette in den Pflanzen bisher weniger sicher als die freie Säure nachgewiesen werden. Offenbar wird das Glycerin zur Bildung von Zucker verbraucht. Beim Faulen ölhaltiger Substanzen scheinen die Verhältnisse ähnlich zu liegen.

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß das Ricinusöl selbst für Menschen und Tiere nicht giftig¹⁾ ist, wohl aber das im Samen enthaltene (Toxalbumin?) Ricin, von dem schon winzige Spuren ein Meerschweinchen töten können.

Bezüglich Spezialliteratur sei verwiesen auf: Jul. Sachs (1), van Tieghem (1) und Mesnard (1), Wehmer (1) S. 428.

V. Gruppe. Eiweiß.

Allgemeines. Für die „Assimilation des Stickstoffs“ (N) erschließt die Pflanze im Gegensatz zur „Assimilation des Kohlenstoffs“, (von bestimmter Bakterientätigkeit abgesehen), die Atmosphäre nicht. Der Grund dafür liegt in der geringen Bindungsfähigkeit des Stickstoffs.

Die Bezugsquelle für N ist demnach, außer z. B. für Parasiten, der Boden und das Wasser. Die hauptsächlichsten Stickstoffdüngemittel sind für die Landwirtschaft der Salpeter und Ammoniaksalze; auch an Kalk gebundener Stickstoff kommt in Betracht.

Der Hauptverbrauch des Stickstoffs findet zur Bildung von Eiweiß, insbesondere des Protoplasmas statt; $\frac{1}{7}$ bis $\frac{1}{5}$ des komplizierten Eiweißmoleküls besteht aus N. Der Weg zu dessen Aufbau scheint über die Aminosäuren zu gehen. Euler (1), Bd. 3, S. 134.

1) Die Beschleunigung der Darmperistaltik wird durch den Glycerinester der Rizinusölsäure (Rizinolsäure) hervorgerufen. Vgl. auch Wiesner (1), Bd. 1, S. 686.

Die Stätten der Eiweißbildung scheinen nicht besonders lokalisiert zu sein. Sie findet u. a. auch in den Blättern statt, doch ist Licht direkt zur Eiweißsynthese nicht erforderlich.

Die Schmetterlingsblütler (Leguminosen) und einige andere Pflanzen können in der N-Ernährung abweichen. Sie gedeihen zwar auch bei Düngung des Bodens mit Nitraten, beziehen aber bei Mangel daran, z. B. auf magerem Sandboden, freien Stickstoff aus der Luft, und zwar mit Hilfe von Knöllchenbakterien (s. dort).

Erwähnung verdienen hier die gut untersuchten bakteriellen Prozesse, durch welche die Eiweißmoleküle wieder in ihre einfachsten anorganischen Bestandteile abgebaut werden. Auch im Stoffwechsel der höheren Pflanzen findet neben der Bildung von Eiweiß gleichzeitig auch dessen fortgesetzte weitgehende Zerspaltung statt (im Gegensatz zum Tier keine Harnstoffbildung). Ammoniak wird frei aus *Chenopodium vulvaria*, Blüten von *Sorbus* u. a. m.

Werden organische N-Substanzen als Nahrung geboten, so müssen sie oft erst bis zu NH_3 zertrümmert werden, da zur Bildung von Eiweiß verschiedene Aminosäuren aufgebaut werden müssen [Neubau eines Hauses aus alten Steinen, nicht aus Räumen (Zimmern)].

Die Eiweißsubstanzen können in der Pflanze gelöst (z. B. Zirkulationseiweiß), und ungelöst (z. B. Reserveeiweiß) vorkommen, letztgenanntes in Kristalloiden, amorph und als lebendes Protoplasma.

Die Leitung des Eiweißes findet hauptsächlich in den Siebröhren der Gefäßbündel statt.

Reaktion des Eiweißes. Eiweiß an sich dürfte im allgemeinen neutral reagieren, doch sind ihm häufig gelöste Salze beigemischt, welche Alkaleszenz verursachen; auch das Plasmodium der Schleimpilze reagiert, soweit bekannt, alkalisch. In den Blüten vieler Boraginaceae steht das Protoplasma mit saurem roten oder alkalischem blauen anthocyanhaltigen Zellsaft in Berührung.

Zu Versuchen werde das leicht zu beschaffende Hühnereiweiß verwendet. Dieses reagiert auf Lackmus alkalisch. Wird es aber in einem Pergamentpapierschlauch unter der Leitung 24 Stunden lang gewässert, so treten die alkalischen Salze durch die Schlauchwand heraus; das zurückbleibende Eiweiß reagiert neutral und seine Gerinnung tritt bei etwas niedrigerer Temperatur ein.

Trockene Samen der weißen Bohne geben schwache amphotere (amphóteros = beide) Reaktion, wenn man sie quer durchschneidet und auf feuchtes Lackmuspapier (blau u. rot) legt. Diese Reaktion wird, wie in der Milch, offenbar durch Phosphorsalze bedingt.

Gelöstes bzw. pseudogelöstes Eiweiß. Man zerreibe auf einem Reibeisen eine mittelgroße rohe Kartoffel mit Schale, presse den verdünnten Saft mittels eines Tuches ab und filtriere ihn durch Fließpapier. Der klar abfließende Saft (meist gegen 10 ccm) ist frei von

Stärke. Seine (belanglose) Umfärbung in Rotbraun rührt von oxydierten Phenolverbindungen her. Beim Erhitzen des Saftes im Reagenrohr entsteht ein käsig-flockiger Bodensatz von geronnenem Eiweiß. Zum Hervorrufen der „Biuret-Reaktion“ (Violett-färbung) (S. 49) kann man Fehlingsche Lösung verwenden. Der Gehalt der Kartoffeln an Eiweiß ist im Vergleich zu ihrer Gesamtmasse gering (unter 1 %); vgl. S. 44; deshalb sind auch die Schlempen aus Stärkefabriken gehaltarm.

Wegen des Vorkommens von Eiweißkristallen in der Kartoffel vgl. S. 43. Der erwähnte Bodensatz von geronnenem Eiweiß färbt sich nach Aufbringen auf Fließpapier (zur Entziehung der Hauptwassermenge) mit Millons Reagens ziegelrot, besonders beim Erwärmen. Jod ruft Braunfärbung hervor. Lit. Strasburger-Koernicke, S. 140.

Ungelöstes Eiweiß. Kotyledonen ungekeimter Erbsen färben sich, hauptsächlich wegen ihres reichlichen Gehaltes an amorphen Aleuronkörnern, auch ohne Erhitzung stark rot mit Millons Reagens.

Abb. 23. Schnitt durch das Nährgewebe von *Ricinus*. Vier Aleuronkörner mit Eiweißkristallen und Globoiden. Die Öltröpfchen sind aus dem Cytoplasma mit Alkohol herausgelöst. Vergr. rd. 2500. Nach Arth. Meyer.

Während des Austreibens der Keimpflanzen nimmt, wie die Reaktion lehrt, der Eiweißgehalt der Kotyledonen mehr und mehr ab. Eiweiß ist hier im Samen ähnlich wie die Stärke Speichermaterial. Neben der Millonschen Probe kann man auch die Xanthoprotein-Reaktion anwenden (vgl. S. 49), wie überhaupt zum Nachweis von Eiweiß eine einzelne Reaktion nicht genügt; vgl. Molisch (2).

Eiweißkristalle finden sich bei Vertretern aller (auch der niederen) großen Gruppen des Pflanzen- und Tierreiches. Sie kommen vor im Cytoplasma, im Zellkern, in den Chlorophyllkörpern, Aleuronkörnern usw.

Molisch (2) betont die bemerkenswerte Tatsache, daß der Zellkern im Gegensatz zum Cytoplasma außer Eiweißkristallen keine Einschlüsse wie Stärke, Kalkoxalat, Farbstoffe oder Gerbstoffe führt, also, nach den letzten drei zu urteilen, vor allem keine Exkrete.

Künstlich zum Auskristallisieren gebracht wurden Eiweiße aus der Paranaß, Kokosnaß, aus Milch, Hühnereiern, Blut usw.

Die Eiweißkristalle sind quellbar (daher Kristalloide!) und schwach doppelbrechend. Beim Erhitzen gerinnen sie unter Verlust der Doppelbrechung.

Das Kristallsystem ist meist schwer zu bestimmen; es dürften überwiegend das reguläre (Kartoffel S. 43) und hexagonale in Betracht kommen. *Ricinus* besitzt Kristalle der tetraedrischen Hemiedrie des regulären Systems (s. Abb. 23).

Die Eiweißkristalle sind gespeichertes Reservematerial. Ob beim Lösen Enzyme wirksam sind, ist wenig bekannt. Näheres s. bei Czapek (1).

Die Synthese des Eiweißes. Man kultiviere höhere grüne Pflanzen, z. B. *Tradescantia viridis*, Cinquante-Mais (*Zea mays*) oder Buchweizen (*Polygonum fagopyrum*) in mineralischer Nährlösung [vgl. S. 4 und Detmer (1), Molisch (1), Jost (1)].

Bei diesen Versuchen, wo Landpflanzen gleichsam als Wasserpflanzen gezogen werden, wird als Stickstoffquelle Nitrat (oder auch Ammoniaksalz) geboten, während der Zucker von den Pflanzen selbst durch Lufternährung synthetisch hergestellt wird. Es wird demnach folgende Synthese vollführt:

Nitrate oder Ammoniaksalze + Glukose = Eiweiß.

Ähnliche Versuche lassen sich mit Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen anstellen, worüber in den einschlägigen Kapiteln nachgelesen werden mag. Aufgebaut werden durch diese zu Eiweiß:

- 1) Weinsaures Ammon + Glukose.
- 2) Doppeltphosphorsaures Ammon + Glukose.
- 3) Salpetersaures Ammon + Rohrzucker.
4. Asparagin + Rohrzucker.
- 5) Nur Asparagin (vgl. *Bacterium fluorescens*).

Eine Synthese des Eiweißes durch Asparagin + Zucker findet auch bei höheren Pflanzen statt, z. B. bei *Lupinus*.

Um das Asparagin auskristallisieren zu lassen, lege man etwa fingerlange, am besten im Dunkeln gezogene Keimpflanzen von *Lupinus albus* in starken Alkohol. Nach mehreren Tagen findet man dann die Kristalle auf der Oberfläche der hypokotylen Glieder in Form von

rhombischen Tafeln (ev. unter dem Mikroskop rollen!). Wegen der Reaktionen auf Asparagin sei verwiesen auf A. Zimmermann (1) und Molisch (2).

Rhombische Tafeln erhält man bisweilen, wenn man käufliches Asparagin im Reagenrohr mit wenig Wasser löst und durch starken Alkohol wieder fällt. Gefördert wird dabei die Bildung der Kristalle in bekannter Weise durch Reiben mit einem Glasstabe an der Wand.

Höchst bemerkenswert sind die Eiweißsynthesen aus NH_3 , CO_2 und H_2O durch Salpeter- und Schwefelbakterien (vgl. S. 5), von denen später noch die Rede sein wird.

Abweichende Ernährung einiger Pflanzen. Im Anschluß an die vorstehenden Darlegungen sind im folgenden anhangsweise einige Beispiele von ernährungsphysiologisch bemerkenswerten höheren Pflanzen zusammengestellt, welche ihre organischen Nährstoffe ganz oder zum Teil von außen beziehen, also nicht autotroph, sondern mixotroph oder heterotroph¹⁾ sind.

Orchideen-Keimlinge. Die Samen wohl der meisten Orchidaceae keimen nur in Symbiose mit bestimmten Fadenpilzen auf Moos, Baumrinde, Löschpapier usw. Zur Orientierung diene die umstehende Abbildung einer tropischen Orchidee mit „endotrophem“ Pilz nach Burgeff (1). Bei vielen unserer heimischen Orchideen sind Mycorrhizen²⁾ beobachtet worden, d. h. Pilzwurzeln, durch welche der Orchidee die Aufnahme von organischer Stickstoff- und anderer Nahrung, wohl auch von Kali und Phosphor aus dem Humusboden des Waldes, der Wiesen usw. möglich wird. Siehe später unter Mycorrhiza-Pilz, ferner Kny u. Magnus, Wandtafel Nr. 117, Erläuterung S. 543.

Fichtenspargel (*Monotropa hypopitys*). Diese im Humus der Wälder wachsende, blattgrünfreie Pirolacee besitzt eine ektotrophe Mycorrhiza, bei welcher der Pilz also die Wurzel nur außen umhüllt. Es scheint die Pflanze demnach auf dem Pilz zu schmarotzen oder mit ihm in Symbiose (s. Flechten) zu leben, so daß man sie nicht als Saprophyt bezeichnen dürfte. Bonner Lehrbuch, 1921, S. 231; vgl. auch Kny, Wandtafel Nr. 116.

Sonnentau (*Drosera rotundifolia*). Legt man frisch gesammelte Blätter von *Drosera* in eine Planktonkammer, so kann man die Schleimabscheidungen am Kopf der für die Sonderernährung wichtigen Tentakeln mit Lupen sehr gut erkennen, mit 40fach vergrößernden sogar die einzelnen Zellen der Tentakeln. Diese sind reizbar und legen sich über aufgeflogene Insekten. (s. Abb. 26) (insektenfressende, fleischfressende oder karnivore Pflanzen). Über die bei der

1) autos = selbst, heteros = anders, miktos = gemischt, trophe = Nahrung.

2) Für mikroskopische Studien sind Querschnitte durch die (wurmartigen) Wurzeln der Nestwurz (*Neottia nidus aris*), Sumpfwurz (*Epipactis palustris*) u. a. m. zu empfehlen.

Reizung sich vollziehende Vakuolenbildung im Plasma der Tentakelzellen vgl. de Vries (4). Man sammle größere Torfmoospolster mit daraufsitzendem Sontentau ein, lege das Material zur Kultur in eine Schale und bedecke das Ganze mit einer Glocke. Die Pflanzen müssen

Abb. 24. Keimling eines Bastardes der Orchidee *Cattleya*, im Innern mit symbiontischen Wurzelpilzen. Mikroskopisches Bild. (Nach H. Burgeff).

Abb. 25. Sämlinge eines Hybriden der Orchidee *Odontoglossum*, in den Reinkulturen eines Wurzelpilzes (*Mycorrhiza*-Pilz). Die Pflänzchen sind bewurzelt und 6½ Monate alt; sie wurden wiederholt auf ein neues Substrat übertragen. (Nach H. Burgeff.)

sonnig gehalten und am besten mit weichem (oder abgekochtem) Wasser begossen werden, da Kalk die Reizbarkeit lähmt. Vgl. auch Kap. Reiz.

Für Fütterungsversuche wähle man frisch entfaltete Blätter mit Drüsotropfen. Als Nahrung empfehlen sich 1—2 cbmm große Stücke von rohem Fleisch, gekochtem Eiweiß, weißem Käse usw. (kein Brot).

Die Verdauung erfolgt in 12—24 Stunden. Bei Betrachtung mit einer Lupe sieht man die ersten Krümmungen sich schon nach einigen Minuten regen. *Drosera* kann die Fleischnahrung (nach Stahl spielen mehr die Kali- und Phosphorsalze im Fleisch eine Rolle) entbehren, wird aber gerade durch diese Nahrungszufuhr gefördert. Die Blätter gut ernährter Pflanzen pflegen mehr nierenförmig als rund zu sein (s. Abb. 26). In der Tat besteht auf den Torfmoospolstern im Freien begreiflicher Mangel an Nahrung (Kny, Wandtafel 101).

Vgl. auch die Venusfliegenfalle (*Dionaea*) (Kny, Wandtafel 106 u. 107), den Wasserschlauch (*Utricularia*), das Fettkraut (*Pinguicula*), die Kannenpflanze (*Nepenthes*) u. a. m.

Abb. 26. Blätter des Sonnentaus (*Drosera rotundifolia*). Linkes Blatt mit eingefangenen Käfer. Statt lebender Objekte werden auch feine Fleischstückchen verdaut. Ebenfalls gute Studienobjekte sind *Drosera longifolia*, *intermedia* und *Drosophyllum*. Etwa fünffach vergrößert. (Orig.)

Sommerwurz (*Orobanche speciosa*) (Orobanchaceae). Samen dieser *Orobanche* wurden mit denen von *Vicia faba* Ende April 10 cm tief in die Erde gebracht. Anfang Juni blühte die Wirtspflanze *Vicia*, Mitte Juli der Parasit *Orobanche*. Vgl. Heinricher (1) und die Abbildung im Bonner Lehrbuch, 1921, S. 614¹⁾. Obwohl *Orobanche* ganz geringe Mengen von Chlorophyll besitzt, ist sie doch als Parasit zu bezeichnen, der seine gesamte Nahrung von der Wirtspflanze bezieht. Vgl. auch Goebel (1), S. 1310.

Typisch für viele Parasiten ist die Anpassung an bestimmte Arten und Rassen des Wirtes, eine Erscheinung, die offenbar durch die Besonderheit des Plasmas bedingt wird.

1) *O. speciosa* ist in den Mittelmeerländern und Ägypten eine Plage der Saubohnenfelder.

Ähnliches gilt für viele Uredineen (s. dort). Über Gallen (zeigen abweichende Ernährungserscheinungen) vgl. Küster (1).

Kleeseide (*Cuscuta europaea*). Die Samen von *Cuscuta* keimen leicht auf feuchtem Fließpapier und auf Erde. Obgleich die ausgebildete Pflanze ein Parasit ist, besitzen die Keimlinge (s. Abb. 27) reichlich Chlorophyll (sind grün), während die erwachsene Pflanze fest frei davon ist. Die Organe des Parasiten sind stark zurückgebildet, mit Ausnahme der Saugwarzen (Haustorien). Die keimende Pflanze verhält sich ungefähr wie ein windendes Gewächs (nutierend), die erwachsene wie eine Ranke (reizbar). Vgl. Kny, Wandtafel Nr. 104, Brendel, Modell; Goebel (1) S. 1304 u. 1311.

Abb. 27. Keimlinge des Schmarotzers Seide (*Cuscuta europaea*). Keimblätter fehlen. Die Spitze der Pflänzchen beschreibt langsam kreisende Bewegungen und kommt dadurch in Berührung mit einer Wirtspflanze (Brennnessel, Hopfen, Hanf, Weide u. a.), in welche sie Haustorien entsendet. (Nach O. Schmeil.)

Cuscuta keimt bezeichnenderweise später als die meisten anderen Pflanzen.

Über die Schuppenwurz (*Lathraea*) vgl. Heinricher (1).

Halbschmarotzer (mit normalen grünen Blättern!) sind der Klap-pertopf [*Alectorólophus* (*Rhinanthus*)], der Augentrost (*Euphrasia*), der Wachtelweizen (*Melampýrum*), das Sandelkraut (*Thesium*) u. a. m.; sie schmarotzen auf sehr verschiedenen Pflanzen.

Die Mistel (*Viscum*) entnimmt dem Wirt im wesentlichen nur Wasser und Nährsalze; vgl. Moewes (1), v. Tubeuf, Flugblatt der Biol. Reichsanstalt Nr. 32.

VI. Gruppe. Wasser und Luft.

Allgemeines über Wasser in der Pflanze. Diese Gruppe beschäftigt sich mit dem Träger der bisher behandelten Nährstoffe im Pflanzenkörper, dem Wasser, und im zweiten Teil mit den das Zellgewebe durchsetzenden Luftwegen.

Lebhaft wachsende Pflanzenteile pflegen wasserreich zu sein, während z. B. stoffspeichernde Organe wie Samen wasserarm sind. So

enthalten beispielsweise junge Salatköpfe rd. 94 %, Walnüsse nur rd. 3 % Wasser. Im letzteren Falle sind lebhaft chemische Prozesse nicht mehr möglich, weil dem Plasma, das sonst etwa 75 % H_2O enthält, das Lösungswasser fehlt.

Das wichtigste Aufnahmeorgan für das Wasser und die in ihm gelösten Stoffe ist bei Landpflanzen die Wurzel. Sie ist oft weitgehend verzweigt und zeigt (bei manchen) eine so starke (Luxus-)Entwicklung, daß man der Pflanze einen Teil der Wurzeln [10(—20 %)] nehmen kann, ohne das Gewächs sichtlich zu schädigen. Ein üppiges Wurzelwerk sichert der Pflanze natürlich eine mehr wie genügende Wasseraufnahme. Diese erfolgt durch die feinen Wurzelenden und wird in vielen Fällen noch durch die Entwicklung von Wurzelhaaren unterstützt. Die treibende Kraft für die Aufnahme ist die Endosmose (s. S. 21). Dieselbe Kraft erzeugt auch den das „Bluten“ bedingenden Wurzeldruck, durch den ein Heben des Wassers, für hohe Bäume freilich bei weitem nicht ausreichend, bedingt wird. Dieses Aufsteigen findet in kapillaren, langgestreckten, leblosen Zellgebilden (Gefäßröhren und Tracheiden) statt, von denen Wasser an die benachbarten lebenden Parenchymzellen, auch senkrecht zur Richtung der Leitungsbahnen, abgegeben werden kann.

Durch osmotische Kräfte könnte das Wasser bis in die Blätter der höchsten Bäume steigen, der Prozeß vollzieht sich aber sehr langsam, so daß ein Welken der verdunstenden Blattflächen nicht zu verhindern wäre. Diese Verdunstung erfordert in vielen Fällen einen gewaltig großen Wassernachschub, der durch Wurzeldruckkraft nicht im entferntesten gedeckt werden kann. Die „Transpiration“, also die Saugkraft, erweist sich aber als zu schwach, um auf bedeutende Höhen zu heben¹⁾, es sei denn, sie würde mit der starken Kohäsionskraft des Wassers gepaart, deren Mitwirkung jedoch umstritten ist. Auch Annahme der Wirksamkeit wechselnder Quellung der Zellmembranen als wasserhebende Kraft ist bloße Vermutung (Bechhold).

Die dauernde Durchspülung der Pflanze mit einem aufsteigenden lebhaften Wasserstrom kann für die Versorgung mit Nährsalzen und für die Kühlung der Blätter von Nutzen sein. Für die Pflanzen trockener und heißer Gegenden, bei denen das Offensein der Spaltöffnungen nur dem Eintritt der Kohlensäure dient, wird die Verdunstung aber als ein notwendiges Übel aufgefaßt.

Lepidium-Versuch. Wurzelhaare. Die Wurzeln der Keimpflanzen der Gartenkresse (*Lepidium sativum*)²⁾ eignen sich vorzüglich zur Beobachtung der Wurzelhaare, welche als Ausstülpungen der Epidermiszellen die Wurzeloberfläche wesentlich vergrößern, oft

1) Dasselbe gilt von der kapillaren „Dochtwirkung“.

2) Im Gegensatz zu *Nasturtium officinale*, Brunnenkresse, und *Tropaeolum majus*, Kapuzinerkresse.

um das 6—12fache. Auf 1 qmm Wurzeloberfläche können Hunderte von Wurzelhaaren kommen.

Die Versuchsanstellung geht im wesentlichen aus der beigefügten Abbildung hervor. Die Samen, welche überall im Handel käuflich sind, werden trocken beiderseits auf das die Glasscheibe (z. B. photographische Platte 9×12 cm) bedeckende, stark feuchte Fließpapier¹⁾ außerhalb des Behälters aufgelegt, mit der Wurzelspitze, welche durch die Samenschale hindurch schon mit der Lupe erkennbar ist, nach unten gerichtet. Sogleich fangen die Epidermiszellen der Samenschale an, wie man auch mikroskopisch gut beobachten kann, gallertartig aufzuquellen, so daß schnell eine willkommene Klebmasse entsteht, die das Herabfallen der Samen verhindert.

Abb. 28. *Lepidium*-Versuch. Dient hauptsächlich zur Demonstration der Wurzelhärchen. (Orig.)

Gießt man in das Gefäß etwas Wasser und stellt es verdeckt fort, so beginnt bald das Hervorbrechen der Wurzeln. Spätestens nach Verlauf einer Woche bietet sich ein lehrreiches Bild. (Die ersten Keimungserscheinungen sind bequem in der Planktonkammer, die hier als feuchte Kammer wirkt, zu beobachten.)

Man erkennt bei dem Wurzelversuch folgende zum Teil später zu besprechende Einzelheiten:

- 1) Die Wurzelhaare²⁾ bilden vom 2. Tag an ein weißes „Höschen“ um die Wurzel. (Gefäß möglichst nicht öffnen!)
- 2) Die Hauptwachstumszone der Wurzel ist frei von Wurzelhaaren (Spitzenwachstum der Wurzel).
- 3) An den unversehrten Keimblättern werden bisweilen Tröpfchen ausgeschieden; diese zeigen den Wurzeldruck an.
- 4) Die Wurzeln (Hauptwurzeln) sind positiv geotropisch infolge des Schwerkraftreizes (s. dort).

1) E. G. Pringsheim (1) benutzte gut gewässertes graues Pflanzenpreßpapier. Bei guter Feuchthaltung sind auch Schieferplatten geeignet.

2) In einfachster Weise bilden zwischen feuchtem Fließpapier gute Wurzelhaare: Raps, Senf, Hafer, Gerste usw. Die am schnellsten keimenden Samen (meist Cruciferen) brauchen rd. 8 Stunden bis zum ersten Hervorbrechen der Hauptwurzel.

5) Auf der Unterseite der schräg stehenden Scheibe wachsende Wurzeln zeigen positiven Hydrotropismus, da sie bei richtigem Auflegen lebenskräftiger Samen dem Fließpapier angeschmiegt bleiben.

6) Die stengelartigen Teile sind negativ geotropisch und lassen bei einseitiger Beleuchtung positiven Phototropismus erkennen.

Durch verschiedene Lagerung des Gefäßes kann man den Versuch mannigfach ändern. Die Versuche gelingen stets sehr gut. Die Samen können 4 Jahre alt sein.

Wie sehr Wurzeln imstande sind, den Boden zu erobern und dem Wasserbedürfnis der Pflanze zu entsprechen, beweist die Tatsache, daß das Wurzelsystem einer Weizenpflanze etwa 15 Wurzeln erster Ordnung, etwa 3000 Wurzeln zweiter, fast ebenso viele dritter und etwa 500 Wurzeln vierter Ordnung haben kann.

Die Wurzelhaare schmiegen sich dicht an die Bodenpartikel an und wirken angreifend auf feine kalkhaltige Gesteinsteilchen, hauptsächlich durch Ausscheiden von Kohlensäure (Korrosionsversuche an geschliffenen und polierten Marmorplättchen, die dabei angeätzt werden).

Die Wurzeln verhalten sich den ihnen als Nahrung im Boden gebotenen mineralischen Nährstoffen gegenüber nicht wahllos (nehmen also die im Wasser gelösten Stoffe nicht rein physikalisch auf), sondern treffen je nach Bedarf eine Auslese.

In Anpassung an den Standort wurzeln viele Wüstenpflanzen ganz besonders tief. Andererseits zeigen Wasserpflanzen (untergetauchte Hydrophyten) vielfach eine starke Rückbildung der Wurzeln, da die Verdunstung fehlt und die Blätter zur Wasseraufnahme befähigt sind. *Lemna arrhiza* (Tafel VII Abb. 108) besitzt überhaupt keine Wurzeln, obgleich sie nicht völlig im Wasser untergetaucht lebt [Göebel (1)].

Tränen. Guttation. Gerstenkörner (5—10 an Zahl) werden zur Aussaat gebracht. Als Gefäße dienen 1—2 Vogelnäpfe, kleine Tonzylinder oder dgl., mit feuchten Fließpapierschnitzeln von der Größe eines in kleine Stücke zerrissenen Briefes fast bis obenhin gefüllt.

Zum Feuchthalten der Luft wird eine mit nassem Fließpapier ausgekleidete Glasglocke übergestülpt.

Nach etwa einer Woche sind die Keimpflanzen zur Beobachtung geeignet¹⁾. Man sieht an ihren Spitzen große Wassertropfen, welche aus sogenannten Wasserspalten (vgl. z. B. Haberlandt, Hydathoden) ausgeschieden sind. Bedingt wird diese Ausscheidung durch den osmotischen Druck des gegenüber dem oberirdischen Keim stark entwickelten Wurzelsystems.

Guttation zeigen auch die Blätter des Frauenmantels (*Alchemilla*), der Balsamine (*Impatiens*) usw. Stahl (2) sieht die Tröpfchenausscheidung als eine Art Drüsentätigkeit an.

1) Die Körner können zur Beobachtung der korrodierten Stärke (S. 46) verwendet werden.

Wurzeldruck, Blutungsdruck. Zur unmittelbaren Vorführung des Wurzeldruckes eignen sich gut entwickelte Topfpflanzen der Sonnenblume (*Helianthus annuus*) und der *Fuchsia*, nach W. Detmer auch im Winter besonders gut die Acanthacee *Sanchezia nobilis*, ferner *Urtica macrophylla* und *Boehmeria utilis*. Man setze in der Art, wie es die Abbildung zeigt, auf den Stumpf mittels Gummi-

Abb. 29. Demonstration des Wurzeldruckes an einer dekapitierten *Fuchsia*-Pflanze. Der ausgeschiedene Saft sammelt sich in einem aufgesetzten Kugelrohr. (Orig.)

schlauch ein Kugelsteigrohr und beobachte den Austritt des Saftes ¹⁾. Seine besonders in der Wärme reichliche Ausscheidung (rd. 50 ccm in 1 Woche) kommt hauptsächlich dadurch zustande, daß durch osmotische Saugkraft das Wasser aufgenommen und an den Stellen geringerer Filtrationskraft (Gefäße) wieder ausgepreßt wird. Der hierbei entwickelte Druck beträgt meist $\frac{3}{4}$ —2 Atmosphären, also verhältnismäßig wenig ²⁾.

Die Birke (*Betula verrucosa*), welche im Frühjahr vor Entfaltung der Blätter aus Schnitten oder Bohrlöchern in der Nacht und vormittags stark „blutet“, treibt den Saft mit etwa 1,5 Atmosphären Druck hervor und scheidet dabei in 24 Std. rd. 1 l Saft ab, wenn das Bohrloch eine Weite von knapp 1 cm besitzt.

Die an tropischen Holzgewächsen beobachteten Blutungsdrucke von 8 Atmosphären sind nach Molisch (1) durch Wundreiz bedingt, also nicht das Ergebnis des gewöhnlichen Wurzeldruckes.

Zur künstlichen Nachahmung des Wurzeldruckes dient die Hofmeister-Sachs'sche Zelle; vgl. Kolkwitz (4) u. S. 22.

Leitungsbahnen des Wassers. Setzt man Stengel von *Impatiens noli tangere*, *parviflora* u. a. Species mit frisch erneuter Schnittfläche in Eosinlösung (rote Tinte oder Lösung von Indigokarmin), so gewahrt man bei der Durchsichtigkeit der Stengel, daß die rote bzw. blaue Flüssigkeit in den Gefäßbahnen aufsteigt.

Bei weißen Blüten werden unter solchen Umständen die Nerven rot oder blau gefärbt.

1) Man bringe zu Beginn des Versuches etwas Wasser auf die Schnittfläche und stelle den Topf eventuell in einen Untersatz mit Wasser. Derartige Versuche werden in sehr verschiedenen Formen angestellt.

2) Der (ganz anders geartete) „Blutdruck“ in einer starken Aorta beträgt meist weniger als 0,5 Atmosphären.

Als Versuchsobjekte sind zu empfehlen:

Abendlichtnelke (*Melandryum album*), weißes Alpenveilchen (*Cyclamen*), Nieswurz (*Helleborus niger*) (bei frisch geöffneten Blüten Versuchsdauer rd. 2 Stunden), Schneeglöckchen (*Galanthus nivalis*) (bei hängenden Bl. Versuchsdauer rd. 2 Std.), Maiglöckchen (*Convallaria maiialis*), Narzisse (*Narcissus poeticus*).

Bei Ringelungsversuchen an belaubten Baumzweigen, durch welche an einer ringförmigen Stelle die Rinde entfernt wird, sieht man, wenn die Zweige im Wasser stehen, kein Vertrocknen der Blätter, ein Be-Zweigs; daß das Wasser im Holzkörper aufsteigt.

Transpirationsnachweis durch die Kobaltprobe. Nach E. Stahl (3) benutzt man Kobaltochlorid = Kobaltchlorür ($\text{CoCl}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$;

Abb. 30. Stahlsche Kobaltprobe zum Nachweis der Verdunstung von Wasser aus Blättern. Die blauen Papierflächen werden an der Stelle, wo das verdunstende Blatt liegt, rosa gefärbt. (Orig.)

Kobaltnitrat ist nicht zu empfehlen) zum Nachweis der Verdunstung von Wasser unter Benutzung des Umstandes, daß das wasserhaltige Salz rot, das wasserfreie dagegen blau ist.

Man tauche Stücke von Fließpapier in der Größe der photographischen Platten 9×12 cm in rd. 5%ige Lösung des Salzes und trockne sie freihängend. Es lassen sich auch größere Streifen durch ein bis zwei-

maliges Einlegen in die Flüssigkeit tränken, zum Trocknen aufhängen und vorrätig halten. Man vermeide es nach Möglichkeit, mit den Fingern auf die Papierfläche zu fassen.

Das gut getrocknete Papier ist blau. Legt man das Blatt einer Pflanze zwischen zwei solcher Bogen oder einen Doppelbogen und bedeckt sie mit trockenen Glasplatten, wie es die Abbildung zeigt, so bildet sich das Blatt infolge von Verdunstung seines Wassers schon nach einigen Minuten rot ab. Als Versuchsobjekte eignen sich alle (vorher belichteten) weichen Blätter mit nicht stark hervortretender Mittelrippe, z. B. *Ribes*, *Philadelphus*, *Sambucus*, *Galinsoga*, im Winter die *Acanthaceae Justicia*, ferner *Pelargonium*, *Chlorophytum* (jung), *Bellis perennis* u. a. m.

Aus der Beobachtung, daß in der Regel nur die Unterseite innerhalb kurzer Zeit rötend wirkt, erkennt man, daß die Verdunstung durch die Haut gegenüber der durch die Spaltöffnungen wenig in Betracht kommt.

Wiederholt man den Versuch mit welken Blättern oder solchen, welche längere Zeit im Dunkeln aufbewahrt sind, so wird die Rötung des Kobaltpapiers ausbleiben oder lange Zeit erfordern, weil in beiden Fällen die Spaltöffnungen sich geschlossen hatten.

Der Schutz sehr junger Blätter gegen Verdunstung geschieht nicht durch die Kutikula, sondern vielfach durch Knospenschuppen und Haare.

In gleicher Weise wie die Kutikula wirkt natürlich auch Korkgewebe verdunstungshemmend. Die Kartoffel ist hierfür ein gutes Beispiel.

Xerophyten (Bewohner trockner Standorte), bisweilen auch Halophyten (Salzpflanzen) zeigen infolge besonderer Einrichtungen Beschränkung der Verdunstung. Hydrophyten (soweit sie zartblättrig sind) verwelken in trockner Luft schnell. Vgl. Schimper (1), Warming-Graebner (1).

Quantitativer Verdunstungsversuch. Laubzweige von Buche, Linde usw. mit 10 und mehr Blättern stellt man in ein Gefäß mit Nährlösung, deren Oberfläche man mit Petroleum, flüssigem Paraffin oder Öl überschichtet hat, und läßt die Blätter im Freien verdunsten. Durch Wägen stellt man den Wasserverlust innerhalb bestimmter Zeiträume fest. Der Versuch kann in sehr verschiedener Form angestellt werden; vgl. Detmer (1), Linsbauer (1) u. a. m. Um die Verdunstung rein physikalisch zu zeigen, kann ein mit Tierblase überbundener Topftrichter oder das S. 22 abgebildete Rohr in umgekehrter Stellung benutzt werden (Heben einer Hg-säule). Über Askenasys Versuch vergleiche man Detmer (1), Jost, S. 86.

Welken bei Kälte im Boden. Pflanzen von *Calla*, *Nicotiana* Goldlack usw. werden mit dem Topf in zerkleinerte Eisstücke gestellt und dadurch stark abgekühlt. Die Lebenstätigkeit der Wurzeln erlahmt

zunehmend, und die Blätter beginnen wegen zu starker Verdunstung zu welken (Linsbauer S. 51).

Allgemeines über Luft in der Pflanze. Alle höheren Pflanzen sind von feinen Lufträumen (Interzellularen) durchsetzt, welche fast jede Zelle begrenzen und somit einen ungehinderten Gasaustausch gestatten, der bei den Luftpflanzen durch vorgebildete Öffnungen (Spaltöffnungen, Korkwarzen) direkt mit der Atmosphäre stattfindet. Bei Wasserpflanzen sind größere innere Lufträume vorhanden.

Der Austausch der Gase erfolgt durch Diffusion, in ausgiebigerem Maße auch durch Wind- und Temperaturwirkungen.

In solchem Austausch mit der Atmosphäre stehen besonders Kohlensäure (für die Assimilation) und Sauerstoff (für die Atmung). Organe für die Verarbeitung der ersteren sind vor allem die Blätter, während sich die Atmungstätigkeit über die lebenden Zellen des gesamten Pflanzenkörpers erstreckt. Besondere Atmungsorgane sind selten [Atemwurzeln (s. Abb. 31), saugen Luft auf, finden sich auch bei *Taxodium*; Kolben der Arongewächse (örtliche Wärmebildung)].

Abb. 31. Exemplar eines der Charakterbäume aus einem Moore auf Sumatra mit großen Brettwurzeln, mit horizontal wachsenden „besenförmigen Luftwurzeln“ und aufrecht wachsenden, spargelförmigen Pneumatophoren (Atemwurzeln). (*Calophyllum*, *Eugenia*, *Canarium*, *Myristica*.) (Orig. von Koorders.)

Spaltöffnungen [Stomata] ¹⁾. Sie sind die in ihrer Weise regulierbaren Ausmündungen der Interzellularen an der Oberfläche der Blätter und vielfach, wenn auch in weit geringerer Menge, der Stengel. Sie sind besonders auf der Unterseite der Blätter so zahlreich, daß sie die Epidermis gleichsam siebartig durchlöchern. An hellen warmen Tagen ist der Einstrom der Luftkohlensäure besonders ergiebig, so daß man Blattflächen mit absorbierenden Lösungen von Kalilauge verglichen hat. Vielfach finden sich Einrichtungen, durch welche die Spaltöffnungen

1) stoma = Öffnung.

gen gegen Verstopfen durch Wassertropfchen geschützt sind (Haare, Wachsüberzug); vgl. Haberlandt.

Die Mechanik der Schließzellenbewegung [vgl. Schwendener (1)] kann unter dem Mikroskop studiert werden. Plasmolyse bewirkt Verschuß, erhöhter Turgor Öffnung (s. Abb. 32) infolge ungleicher Dehnung der verschieden stark verdickten Wände (Problem der Zellspannung). Für die Beobachtung sind folgende Objekte zu empfehlen: *Tradescantia*, *Tulipa*, *Cyclamen*; vgl. auch Strasburger-Koernicke (1).

Injektion. Ein Zweig von *Tradescantia zebrina* mit 4—5 Blättern wird mit verkitteter Schnittfläche in ein Glasgefäß unter Wasser ge-

Abb. 32. Offene Spaltöffnung von *Tradescantia virginica*. Epidermis der Blattunterseite. Den Kernen der die Spaltöffnung umgebenden Oberhautzellen sind rudimentäre, farblose Chromatophoren (Leukoplasten) aufgelagert. Spaltweite 7—8 μ . (Orig.)

Abb. 33. Fliederblatt (*Syringa*) unterseits (u) mit Petroleum infiltriert, oberseits (o) wegen Mangel an Spaltöffnungen kein Eindringen. Schwach verkl. (Orig.)

bracht und dann die Luft im Gefäß (mittels Wasserstrahlpumpe) ausgesaugt. Dabei dehnt sich die Luft im Innern der Blätter aus und verläßt diese durch die Spaltöffnungen. Nach Herstellen des ursprünglichen Luftdruckes tritt auf demselben Wege Wasser in die Blätter ein und macht sie mitsamt den hellen Streifen sogleich durchsichtig. Besonders durchscheinend werden auch so behandelte Blätter von *Impatiens*.

Infiltration. Belichtete Blattflächen haben offene Stomata. Sie saugen leicht Flüssigkeiten wie Petroleum, Xylol, Alkohol usw. ein und werden dadurch an den (mittels des Stopfens) bestrichenen Stellen

durchsichtig (Abb. 33 bei *u*). Es genügt, mit dem Flaschenstöpsel quer über die untere Blattfläche zu fahren, um die Erscheinung sofort eintreten zu sehen. Ist die Oberfläche frei von Spaltöffnungen, wie bei *Syringa* (s. Abb. 33 bei *o*), so tritt keine Änderung der Durchsichtigkeit ein, ebenso nicht bei unterseits bestrichenen welken oder verdunkelten Blättern; vgl. Molisch (1). Weitere geeignete Blätter für diese Versuche liefern:

<i>Alchemilla</i>	<i>Galeopsis</i>	<i>Populus</i>
<i>Bryonia</i>	<i>Heracleum</i>	<i>Solanum</i>
<i>Brassica</i>	<i>Papaver</i>	<i>Sonchus</i>
<i>Caltha</i>	<i>Plantago</i>	<i>Taraxacum</i> .
<i>Chenopodium</i>	<i>Polygonum</i>	

Korkwarzen oder Rindenporen [Lenticellen] ¹⁾. An etwa 1 cm dicken Zweigen von Hollunder (*Sambucus nigra*), Flieder (*Syringa*), Roßkastanie (*Aesculus, Pavia*) sieht man ziemlich reichlich kleine Höcker, welche die in Rede stehenden Organe darstellen. Sie bilden luftdurchlässige, oft ziemlich verwickelt gebaute Wucherungen in der sonst luftdicht abschließenden Korkhaut und stellen die Mündungen der Interzellularräume dar. Bezeichnenderweise pflegen Korkwarzen unterhalb von Spaltöffnungen zu entstehen. Lit. Klebahn (1), Haberlandt (1), Strasburger-Koernicke (1), Detmer (1).

Lenticellen haben im Gegensatz zu Spaltöffnungen keine regulierbaren Einrichtungen zum Öffnen und Schließen, noch weniger solche zum energischen Einatmen (Inspiration) und Ausatmen (Expiration) wie die Lungen. Sie sind, wie die mikroskopische Beobachtung lehrt, durch das Vorhandensein von Luftlücken zwischen den Zellen immer offen, falls sie nicht durch sekundäre Vorgänge verstopft werden. Die Durchlässigkeit dieser Gebilde kann durch den Versuch leicht gezeigt werden, da Luftbläschen aus ihnen hervorperlen, wenn man in die Zweige Luft preßt.

In der Abb. 34 habe ich eine einfache und sicher gelingende Versuchsanordnung dargestellt. Ein reichlich fingerlanges Zweigstück wird

Abb. 34. Korkwarzen des Hollunders mit austretenden Luftbläschen. Im Gummischlauch Preßluft. $\frac{1}{6}$ nat. Gr. (Orig.)

1) lenticula = kleine Linse, wegen der Form der Korkwarzen.

ohne alle Zurichtung an einer Seite luftdicht verklebt, während über die andere nach Anfeuchten ein Gummischlauch gezogen und festgeschnürt wird. In diesen läßt sich, unter Weitung um einige mm, mittels einer kleinen Radfahrerluftpumpe ganz leicht Luft pressen¹⁾. Schließt man hierauf den Schlauch mit einer Holz- oder Metallklemme ab, so kann man das Zweigstück bequem unter Wasser tauchen. Sogleich sieht man meist mehr als 20 Perlenströme aus den Korkwarzen hervortreten und aufsteigen, aus jeder Warze in Ein-, seltener in Zweizahl. Die Erscheinung zeigt, daß die Preßluft im Schlauch an der Schnittfläche in die Interzellularräume eintritt und zunächst deren eigene CO₂-haltige, später die nachdrückende Luft zu den Lenticellen hinauspreßt. Umgekehrt dringt unter normalen Verhältnissen der zum Atmen nötige Sauerstoff zu den Korkwarzen herein. In bezug auf den Gasaustausch kann man diese Gebilde also mit den Lungen vergleichen.

Das Aufsteigen von Bläschen pflegt bei der geschilderten Versuchsanstellung und bei einer Schlauchlänge von rd. 20 cm $\frac{1}{2}$ —1 Stunde zu dauern.

VII. Gruppe. Atmung.

Allgemeines. Neben dem Nahrungsstoffwechsel, wie er in den vorhergehenden Gruppen geschildert worden ist, findet in der Pflanze auch ein chemischer Betriebsstoffwechsel statt, der unter Verlust von Stoff auf Gewinn von nutzbarer Energie (für chemische, elektrische, osmotische und thermische Arbeit) abzielt (Energesis). Hierzu rechnen die Atmung und die Gärungen (s. Teil B) in ihren verschiedenen Formen.

Die Atmung äußert sich hauptsächlich in der Form der Oxydation (Verbrennung), doch brauchen die energiespendenden Vorgänge nicht immer Oxydationsprozesse zu sein. Vgl. Pfeffer (1), Jost (1), Nathanson (1), Handwörterbuch (1), Czapek (1) Bd. 3 u. a. m. Von den bei der Assimilation (II. Gruppe) erzeugten organischen Stoffen wird nur ein Teil zum Aufbau und zur Speicherung verwendet, der übrige Teil wird abgebaut, in den meisten Fällen bis zur vollständigen Mineralisation, bei Dunkelkulturen unter Verlust von organischen Substanzen bis zu 50 %.

Die gewöhnliche Atmung der höheren Pflanzen ist ein der Kohlenstoffassimilation entgegengesetzt verlaufender Vorgang, der unter Freiwerden von Kalorien nach der Formel verläuft:

1) Druckerzeugung durch Quecksilber ist viel umständlicher.

Hierbei ist angenommen, daß Traubenzucker veratmet wurde, es können aber auch Apfelsäure (Crassulaceen), fettes Öl oder Eiweißbestandteile in Frage kommen. Bei der „Zuckeratmung“ ist der respiratorische Quotient $\frac{\text{CO}_2}{\text{O}_2} = 1$, bei der „Säureatmung“ und „Ölatmung“ < 1 .

Die Atmung findet bei allen Pflanzen und Tieren Tag und Nacht in allen Teilen des Protoplasmas statt, die Assimilation in blattgrünen Organen dagegen nur im Licht und nur in den Chlorophyllkörpern (unter Abgabe von O_2). Über das Wechselspiel zwischen beiden Vorgängen vgl. S. 5.

Zu Atmungsversuchen kann man alle lebenden Pflanzenteile benutzen (z. B. keimende Samen, Blüten, Wurzeln, Pilze), doch muß bei Verwendung chlorophyllhaltiger Objekte (Blätter, Zweige usw.) Belichtung vermieden werden.

Die Atmung wird durch das Licht nicht merklich beeinflusst, im Gegensatz zur Assimilation, welche ganz davon abhängt.

Die Stärke der Atmung geht im allgemeinen mit der Lebhaftigkeit der Entwicklung Hand in Hand (junge Triebe, Blüten, junge Früchte usw. atmen am lebhaftesten, trockne Samen am schwächsten).

Nach O. Warburg (2) ist die Atmung, besonders nach dem Verhalten gegenüber Narkoticis zu urteilen, ein kapillar-chemischer Prozeß wie die Assimilation (vgl. S. 5). Analog werden z. B. gelöstes Alanin, Cystin und Leucin bei Adsorption durch fein verteilte Kohle (Blutkohle) auch bei gewöhnlicher Temperatur ergiebig oxydiert, ohne diese Verteilung aber nicht. Bei der lebenden Pflanze wirken die kapillare Struktur des Plasmas oder von ihm gebildeter Enzyme in entsprechender Weise.

Nachweis der Kohlensäureausscheidung. Vorversuch. Man fülle in eine sogen. Gaswaschflasche etwa 5—6 cm hoch konz. klare Barytlauge¹⁾, die man sich in einer Standflasche dauernd vorrätig hält²⁾. Der so hergerichtete Apparat dient zum einfachen Nachweis der Lungenkohlendure. Zunächst wird die Zimmerluft durch einen Atemzug eingesaugt (die Lauge trübt sich nicht merklich), dann der Mund an das andere Rohr der Waschflasche angesetzt (weil sie sonst als Spritzflasche wirken würde) und dann dieselbe Luft durch dieselbe Flüssigkeit geblasen (die Lauge trübt sich stark wegen Bildung von Karbonat). Hiermit ist die Kohlensäure in der Atemluft nachgewiesen.

1) Wirksamer als Kalkwasser.

2) Die Flasche faßt zweckmäßig $\frac{1}{2}$ —1 l und hat ständig einen Bodensatz von Baryumhydroxyd. Die Lösung wird nach teilweisem Verbrauch immer wieder mit destilliertem Wasser aufgefüllt. Durch längeres Stehen klärt sie sich von selbst. Zwischen Glasstöpsel und Hals muß ein Papierstreifen eingeklemmt werden.

Vergleich der ausgeatmeten Luft mit der reinen Luft:

	Kohlen- säure	Sauerstoff	Stickstoff	Raummenge
„Expirationsluft“	4	16	79	99 % (+ 1 % Wasser)
atmosphärische Luft	0,03	21	79	rd. 100 %

$$\text{Atmungsquotient } \frac{\text{CO}_2}{\text{O}_2} = \frac{4}{5} = 0,8.$$

Nicht aller Sauerstoff wird hier zur Bildung von Kohlensäure benutzt.

Die in 24 Std. vom Menschen ($37\frac{1}{2}^{\circ}\text{C}$) ausgeatmete Kohlensäure enthält 240 g Kohlenstoff (= Gew. von etwa $\frac{1}{2}$ Preßkohle¹⁾), die in 1 Std. ausgeatmete also 10 g.

70 kg Weizenkeimpflanzen (Gewicht des erwachsenen Menschen) verlieren an Kohlenstoff durch Atmung innerhalb 24 Std.:

rd. 170 g bei 17°C und rd. 500 g bei $37\frac{1}{2}^{\circ}\text{C}$.

**Nachweis der Kohlensäureausscheidung bei normal atmen-
den Pflanzen.** Eine weithalsige Glasflasche von rd. 300 ccm Inhalt mit Korkstopfen wird zu $\frac{1}{4}$ mit höchstens 100 g Erbsen²⁾ gefüllt (vgl. Abb. 39), die mit Wasser überschichtet werden. Nach 12—24 Stunden werden sie in der Flasche zur Entfernung von Bakterien mit reinem Wasser unter Umschwenken abgespült und bei vorgehaltenem Korken von überschüssigem Wasser befreit. Die nassen Erbsen füllen nun das Gefäß bis zur Hälfte und sind von sauerstoffhaltiger Luft umspült. Das Glas bleibt nunmehr gut verschlossen 12—24 Std. stehen, wobei die Erbsen lebhaft atmen³⁾. Hin- und Hertragen des Gefäßes beeinträchtigt den Versuch nicht. Wegen des Verbrauchs von O_2 und der Erzeugung von CO_2 , die bald den ganzen Innenraum erfüllt, erlischt ein brennendes Streichholz⁴⁾ sofort, wenn man es mit der Hand in das ruhig stehende, geöffnete Gefäß schon oberflächlich taucht (in einer Kontrollflasche brennt die Flamme weiter). Hierauf

1) Die C-Menge kann auch durch einen Teller mit Holzkohlenstücken anschaulich gemacht werden. Kohlenstoff, der bei vollkommener Verbrennung zu CO_2 oxydiert würde, ist von blakenden Lampen und rußenden Flammen her bekannt.

2) Ferner können verwendet werden: Bohnen, Getreidekörner, Rapssamen, Rüben usw., ohne Wasserzusatz auch Blüten (atmen lebhaft), Blätter (dunkel halten), junge Früchte usw. Im Bedarfsfalle setze man mehrere Versuche an. Von Pilzen verwende man beispielsweise rd. $\frac{1}{2}$ Pfd. Pfefferlinge (*Cantharellus*) oder den Champignon. Bei Benutzung eines zylindrischen Glases genügt Abdeckung mittels befeuchteter Glas-
scheibe. Der CO_2 -Nachweis kann bereits nach $\frac{1}{2}$ Stunde gelingen.

3) Muß man äußerer Gründe wegen auf das Ausspülen verzichten, so überschichtet man die Erbsen nur mit so viel Wasser, als sie zum Quellen benötigen, und lasse sie in der von vornherein abgeschlossenen Luft atmen.

4) Verwendung einer Kerze ist überflüssig.

gießt man die schwere Kohlensäure vorsichtig in ein kleines Becherglas über, welches $\frac{1}{4}$ mit klarer Barytlauge gefüllt ist. Bei schwachem Schwenken tritt sofort starke Trübung der Lauge ein¹⁾.

Bei ungekeimten, trockenen Samen (z. B. der Gerste) ist die Atmung äußerst gering, so daß sie keine leicht nachweisbare Menge Kohlensäure ausscheiden; 1 kg lufttrockener Körner erzeugt in 24 Std. 1,5 mg Kohlensäure. [Versuchsordnung s. bei Kolkwitz (5)]. Bei Veratmung von Zucker ist die Raummenge verbrauchten Sauerstoffs gleich derjenigen der erzeugten Kohlensäure (s. S. 69), so daß in dem Versuchsgefäß kein Überdruck entsteht. Bleiben die Erbsen mehrere Tage in dem verschlossenen Gefäß, so tritt Überdruck ein infolge intramolekularer Atmung (s. dort).

Abb. 35. Sauerstoffverbrauch durch atmende Pflanzenteile. $\frac{1}{5}$ nat. Gr. (Orig.)

Abb. 36. Intramolekular atmende Erbsen in-Barometerröhre und in Reagenzglas. Rd. $\frac{1}{15}$ nat. Gr. (Orig.)

Nachweis des Sauerstoffverbrauches. Wie die Abb. 35 zeigt, man mit 20—40 cm Wasser, in welches man ein Stückchen Ätzkali wirft, läßt sich der Versuch sehr einfach gestalten. Das äußere Glas füllt das innere²⁾ mit sperrigem Pflanzenmaterial (z. B. *Taxus*-Zweigen, Efeu-Blättern u. dgl. [im Dunkeln halten]³⁾). Nach 1—2 Tagen ist die Flüssigkeit in dem Hals des inneren Gefäßes emporgestiegen infolge des O_2 -Verbrauchs durch die Pflanzen. Die Kohlensäure wird

1) An dieser Stelle seien einige lehrreiche Experimente erwähnt, die an dem vertieften Vorraum der Dunsthöhle des Bades Pyrmont, welche Kohlensäure enthält, gezeigt werden:

- Steigt man einige Stufen herab, so stellt sich das Gefühl des Erstickens ein.
- Seifenblasen bleiben längere Zeit an der Berührungsfläche zwischen Kohlensäure und Luft freischwebend stehen.
- Ein glimmendes Strohbüschel erlischt, wenn man es in die Kohlensäureschicht eintaucht.

2) Es kann auch eine Medizinflasche oder dgl. verwendet werden.

3) Gleichzeitige Verwendung von Quecksilber zum Abschluß ist bei kurzer Versuchsdauer (einige Tage) unnötig.

durch die Kalilauge gebunden. Wird nun Leitungswasser verwendet, tritt kein Aufsteigen ein ($\frac{\text{CO}_2}{\text{O}_2}$ meist = 1). Will man schnelles Aufsteigen bewirken, muß man ein schmales Steigrohr einschalten.

Die vorstehend geschilderte Versuchsanstellung ist der Methylenblaumethode (Entfärbung infolge Reduktion) vorzuziehen.

Intramolekulare Atmung. Pflüger-Bonn fand, daß Frösche viele Stunden lang in vollkommen sauerstofffreier Luft leben können und dabei CO_2 ausscheiden. Der zur Bildung dieser Säure nötige Sauerstoff stammt aus organischen Verbindungen des Froschkörpers (intramolekular). Ähnliche Vorgänge beobachtet man auch bei Pflanzen, z. B. Erbsen, wie schon S. 71 angedeutet worden war¹⁾. CO_2 -erzeugung findet z. B. auch statt, wenn man Erbsen in durch Auskochen luftfrei gemachtem Wasser oder in Öl atmen läßt.

Anschaulicher sind die Versuche, welche in der Abb. 36 wiedergegeben sind. In diesen läßt man 10 kleine gekeimte, angefeuchtete Erbsen atmen: 1. im Vakuum einer Barometerröhre²⁾ und 2. im Quecksilber eines damit vollkommen gefüllten Reagenzglases (nach Fr. Darwin). Zu beiden Versuchen sind insgesamt 2—2,5 kg Hg erforderlich. In der Barometerröhre ist das Hg nach $\frac{1}{2}$ Std. um rd. 1 cm gesunken, nach mehreren Tagen um etwa 30 cm, so daß der Barometerdruck (größtmögliche Schwankung 6 cm) vernachlässigt werden kann. Nach Beendigung des Versuches wird ein erbsengroßes, befeuchtetes Stück Ätzkali in die Röhre eingeführt, wodurch die CO_2 absorbiert wird (besonders schnell beim Neigen der Röhre) und das Hg wieder steigt.

Beim Reagenzrohr-Versuch tritt die Wirkung wegen des Gegendruckes der Atmosphäre nicht sogleich sichtbar hervor. Nach einer Reihe von Tagen sinkt aber auch hier das Quecksilber (oder Öl) um etwa 15 cm. Die nachträgliche Absorption der CO_2 erfolgt zweckmäßig durch Einführen von KOH-Lösung. Der Versuch mit der Barometerröhre verdient den Vorzug.

Bei der intramolekularen Atmung tritt (nicht notwendigerweise) neben CO_2 auch Alkohol (z. B. bei Birnen) auf, wie diese Atmung überhaupt mit der Gärung (s. Hefen) große Ähnlichkeit hat. Im Gegensatz zu dieser scheinen bei der intramolekularen Atmung aber bisweilen auch organische Säuren, Pepton und Glycerin in den Stoffwechsel gezogen zu werden. Die normale Atmung dürfte den

1) Die dort benutzten Erbsen können für diesen Versuch weiter verwendet werden.

2) Länge zweckmäßig 85 cm, Wandstärke fast 2 mm, lichte Weite 13 mm. Die im Hg aufsteigenden Erbsen dürfen sich auf keinen Fall festklemmen. Der größte Durchmesser einer gequollenen Erbse beträgt etwa 12 mm. Zur Vermeidung von Hg-Verlusten setze man einen Schubkasten oder dgl. beim Füllen unter.

ersten Anfängen der intramolekularen gleich sein, dann aber durch Weiteroxydation abzuweichen.

$C_6H_{12}O_6 = 2 CO_2 + 2 C_2H_5O$ (bei normaler Atmung weiter oxydiert zu CO_2 u. H_2O)
 Traubenzucker Alkohol

Bei den vorstehenden Versuchen über intramolekulare Atmung war kein Wachstum der Erbsen zu bemerken, also auch kein Fortschreiten der Keimung. Überhaupt kann die höhere Pflanze nur kurze Zeit O_2 frei atmen. Bringt man Samen in verhältnismäßig wenig Wasser und überschichtet dieses mit Paraffinöl oder dgl., so tritt keine Keimung ein, und die Samen ersticken schließlich. Vgl. auch Godlewski (1).

Abb. 37. Blüten der Primulacee *Soldanella pusilla*, welche mittels Atmungswärme eine Eisdecke durchschmolzen haben. Von der Pastura di Lagalb beim Berninahospiz, bei 2500 m am 2. August 1910 aufgenommen. Bei den Blüten an der linken Seite ist das Eis 4 cm dick. (Nach E. Rübel.)

Wärmebildung bei der Atmung. Die gewöhnliche Atmung führt zur Wärmebildung, da sie ein der Verbrennung vergleichbarer Prozeß ist. Wir können diese Atmungswärme an unserem eigenen Körper sehr leicht beobachten, bei Pflanzen dagegen tritt die Eigenwärme meist erst bei Massenanhäufungen deutlich hervor (Malzkörner, Grashaufen, aufgeschichtete Tabakblätter). Kräftige, sich entfaltende Knospen können ein Stückchen aufgelegtes Eis schmelzen, selbst wenn die umgebende Temperatur $-1^{\circ}C$ beträgt.

Die Blüten des Alpenglöckchens *Soldanella* (Abb. 37) können das Eis durchdringen, allerdings wohl meist unter Mitwirkung der Wärmestrahlen, die sie als farbige Körper physikalisch verschlucken¹).

1 Ähnlich bewirkt Kohleschüttung auf Wegen schnellere Schneeschmelze.

Bedeutende Temperaturerhöhung entsteht in dem Blütenstand von *Arum*¹⁾ u. a. m., wenn bei der Blütenreife die Stärkemassen in der Keule verarbeitet werden; vgl. Deick (1 u. 2).

Abgesehen von solchen besonderen Beispielen ist aber das thermische Verhalten des Pflanzenkörpers, verglichen mit der seitens des Körpers höherer Tiere erzeugten Wärme wenig bemerkenswert. Gewöhnlich beträgt der Temperaturüberschuß im günstigsten Falle 0,1 bis 0,3° C. Infolge von Verdunstung kann sich eine Pflanze bei sonst warmer Witterung sogar kühl anfühlen.

Abb. 38. Thermosflasche mit keimenden, wärmeerzeugenden Samen (Erbsen); rd. $\frac{1}{4}$ nat. Größe. (Orig.)

Ein einfacher und lehrreicher Versuch zum deutlichen Nachweis der Atmungswärme ist in Abb. 38 wiedergegeben. Sie stellt eine Thermosflasche ($\frac{1}{2}$ —1 l Inhalt)²⁾ dar, welche mit gekeimten Erbsen gefüllt ist³⁾. Das durch einen Wattebausch festgehaltene Thermometer zeigt nach etwa 12 Stunden eine Zunahme der Temperatur um mindestens 5° C an⁴⁾. Statt des normalen Thermometers kann man auch ein Luftthermometer mit beweglichem Wassertropfen benutzen.

Verwendet man nach Molisch (1) Blütenköpfe der Kamille oder der Schafgarbe (dicht gestopft), so erhält man bei deren starker Atmungs-tätigkeit einen noch bedeutenderen Temperaturanstieg.

Der geringen überschüssigen Wärme im Pflanzenkörper scheint keine besondere biologische Bedeutung zuzukommen. Ein Gewinn an Kalorien (exothermischer Vorgang) ist an sich aber von Bedeutung. O. Ohmann (1) hat durch einen einfachen Versuch den hohen Wärmewert der Kohlenhydrate veranschaulicht. Ein Stärkestück (Weizen) von 1 g wurde angezündet und dann lediglich durch Anblasen mit reinem Sauerstoff weiter verbrannt. Dabei wird eine langdauernde Wärmeerzeugung beobachtet.

* * *

Zusammenfassung über die bisher behandelten Gruppen.

An dieser Stelle mag noch einmal kurz darauf hingewiesen sein, daß nach unseren Versuchen der organische Stoffumsatz der Pflanzen sich

- 1) Findet sich in der Sammlung Brendelscher Modelle.
- 2) Die Flasche muß vor der Verwendung die Temperatur des Versuchsraums angenommen haben.
- 3) Man kann dabei dieselben Erbsen verwenden, welche bei dem S. 70 beschriebenen Atmungsversuch übrig bleiben.
- 4) Bei Anwendung gewöhnlicher Flaschen, die man in Holzwolle oder dgl. verpackt, ist der Temperatureauschlag weit geringer.

in folgender Weise abspielt: Zuerst sahen wir, wie aus der Kohlensäure das Kohlenhydrat Zucker entsteht und wie die osmotischen Prozesse in der Pflanze wesentlich durch das Vorhandensein von Zucker bedingt sein können. Dann behandelten wir die Umwandlung des Zuckers in Stärke, Öl, Zellulose usw.

Endlich erkannten wir, daß Zucker ein wesentlicher Bestandteil bei der Eiweißsynthese ist und schlossen dann, nach Erledigung des Abschnittes: „Wasser und Luft in der Pflanze“, mit dem Kapitel Atmung, durch welche die aufgebauten Moleküle schließlich wieder bis zur Kohlensäure, von der wir ausgingen, zertrümmert wurden.

Die folgenden Gruppen haben die bisher geschilderten Vorgänge zur Voraussetzung und behandeln hauptsächlich die besonderen Fähigkeiten des Protoplasmas in bezug auf Gestaltung, Reizvorgänge und Verjüngung.

VIII. Gruppe. Wachstum, Bewegung und Reiz.

Allgemeines über Quellung und Wachstum. Die Vorgänge beim Wachstum sind besonders leicht verständlich, wenn man zuvor die Erscheinung des Quellens (an Stärke, Holz, Eiweißkristalloiden usw.) näher betrachtet hat. Besonders genaue Untersuchungen in dieser Richtung liegen an Stärkekörnern und Zellulosehäuten vor.

Die Bausteine der Membranen sind kristallinisch und werden nach Naegeli als Micellen bezeichnet¹⁾.

Die Micellen sind nach röntgenphotographischen Studien von Herzog u. Janke (1) [vgl. auch Zsigmondy (1)] experimentell nachgewiesen und als zum rhombischen System gehörig erkannt worden. Sie werden auf etwa $\frac{1}{100} \mu$ (= 0,00001 mm) Breite und vielleicht gegen 1μ Länge geschätzt.

In den wasserdurchtränkten Membranen nimmt man nach Naegeli u. Schwendener die Micelle als allseitig von Wasserhüllen umgeben an. Beim Wasserverlust verschmälern sich diese Hüllen oder verschwinden ganz, während sie sich bei der Quellung wieder einstellen.

Die Quellung ohne Strukturveränderung kann bis zur Herstellung des ursprünglichen Zustandes rückgängig gemacht werden.

Beim Behandeln mit heißem Wasser oder sonstigen Quellungsmiteln tritt bei manchen Objekten Quellung mit Strukturveränderung ein, z. B. bei Stärke, wenn sie verkleistert. Dieser Vorgang ist nicht rückgängig zu machen.

Bei der Quellung findet keine Gewichtszunahme der festen Bestandteile statt, im Gegensatz zum Wachstum der Zellen. Bei manchen Quellungsvorgängen überwiegt das Wasser so erheblich, daß förm-

1) micella = Diminutiv von mica, Krümchen.

liche Verflüssigung erfolgt (Quittenschleim), die feste Masse also stark gegen das Wasser zurücktritt.

Die Kraft der Quellung kann Hunderte bis Tausende von Atmosphären betragen. Sie wird bedingt durch die starke Anziehung der Micellen für Wasser. Das Zurückgehen der Quellung äußert sich drastisch z. B. im Schwinden und Reißen der Hölzer.

Beim Wachstum werden ähnlich wie bei der Quellung Stoffe eingelagert, aber nicht flüssige, sondern feste und wesensgleiche (Intussuszeption); vgl. Traubesche Zelle u. S. 41. Außerdem kommt Anlagerung durch Lamellenbildung vor (Apposition). Der erste Fall tritt hauptsächlich beim Flächenwachstum, der zweite öfter beim Dickenwachstum ein. Die Fähigkeit, feine Membransculpturen zu bilden, geht letzten Endes auf die inneren Eigenschaften des Protoplasmas zurück.

Die Membranen lebender Zellen enthalten nach Hansteen-Craner (1) zwischen den Micellen Phosphatide (wasserlösliche und wasserunlösliche organische Phosphorverbindungen), welche zwar sehr veränderlich, aber an sich von großer Bedeutung sind. Von den Grenzschichten des Protoplasmas ausgehend, durchsetzen sie als ein maschiges System das Membrangerüst aus Cellulose (und Hemicellulose). Schütteln, Druck, Plasmolyse usw. wirken stark auf die Phosphatide ein.

Unsere Vorstellung von der im wesentlichen rein mechanischen Aufgabe der Zellhäute ist danach falsch.

Da diese Stoffe zuckerführend sind, haben sie nach genanntem Autor einen großen Einfluß auf das Flächen- und Dickenwachstum, wegen des Gehaltes mancher Phosphatide an Fettsäuren auch auf die Kutinisierung (Verkorkung).

Reizstoffe und Hormone¹⁾ (durch innere Sekretion gebildete Anregungsstoffe) sind vielleicht mit den Phosphatiden gleichbedeutend. Wahrscheinlich üben sie auch eine stark kapillaraktive (durch Oberflächenkräfte bedingte) Wirkung in den Zellkernen, besonders bei deren Teilung, aus. Vgl. hierzu Haberlandt (2).

Wohl zu unterscheiden vom Zellwachstum ist die Zellteilung, welche ein bloßes Abteilen oder Fächern darstellt. So findet z. B. in der Wurzelspitze hauptsächlich Teilung in dem daran anschließenden Gewebe vorwiegend Wachstum statt.

Je kleiner die Zellen sind, um so größer ist meistens ihre Teilungsgeschwindigkeit. Bei Bakterien kann eine Zellteilung in 10 Minuten beendet sein, bei Hefe eine Sprossung in einigen Stunden. Bei Tieren kommen derartig schnelle Teilungen wie bei Bakterien nicht vor.

Gesetzmäßige Beziehungen zwischen der Geschwindigkeit des Längenwachstums und dem Maß der Turgorausdehnung bestehen nicht. Gelegentlich können beide aber Hand in Hand gehen. Die Abnahme

1) hormao = setze in Bewegung.

in der Dehnbarkeit und damit auch in der Turgorausdehnung der Zellwände ist nicht die Ursache der Wachstumsverminderung, sondern umgekehrt eine Begleit- oder Folgeerscheinung der veränderten Intussuszeption.

Außer dem im Vorstehenden gekennzeichneten Wachstum im engeren Sinne unterscheidet man noch ein solches im weiteren, gleichsam volkstümlichen Sinne des Wortes. Danach versteht man unter Wachstum die Zunahme und Formgebung der ganzen Organismen und ihrer Teile. [Entwicklung und Gestaltung (Vegetationspunkt,

Abb. 39.

Abb. 40.

Abb. 39. Ungequollene und gequollene Erbsen. In jeder Flasche dieselbe Zahl Samen. Rd. $\frac{1}{2}$ nat. Gr. (Orig.)

Abb. 40. Apparat zum Messen der Quellungskraft. Die Samen befinden sich in dem Metallgefäß mit durchlöcherntem Boden. Zum Anfeuchten wird über dieses ein Gefäß mit Wasser von unten her geschoben. Das Laufgewicht am Hebelarm wirkt dem Quellungsdruck entgegen. Rd. $\frac{1}{10}$ nat. Gr. (Nach Groult.)

Streckungszone, Organbildung, Korrelation), Chemomorphose nach Pfeffer.] Dementsprechend sind z. B. Bakterien einfache, Bäume verwickelte Wachstumsformen.

Wachstum kann mit Abnahme des Rohgewichtes des ganzen Organismus verbunden sein, z. B. beim Keimen der Samen, das Reingewicht des Keimlings selbst zeigt aber eine Zunahme (Vermehrung des Trockengewichts). Hierin liegt der Kernpunkt für die Begriffsbestimmung des Wachstums. Näheres s. bei Jost (1), S. 337 ff., Warmin-Johannsen (1), S. 406.

Quellung der Samen. Trockene Bohnen oder Erbsen werden in gleicher Menge in gleiche Flaschen gefüllt (Abb. 39). Bedeckt man

sie in einer der Flaschen gerade mit (weichem) Wasser, so quellen sie etwa zum doppelten Rauminhalt auf. 100 g Samen wiegen dann rd. 200 g. Besonders die Hülsefrüchte liefern stark quellungsfähige Samen. Bei *Lupinus luteus* ist die Quellung zwar ergiebig, aber unregelmäßig, wenn man die Samenschale nicht verletzt.

An der Quellung sind hier vorwiegend die Membranen und die Stärkekörner beteiligt. Wachstum tritt erst mit Hervorbrechen der Wurzeln ein. Will man es ganz sicher ausschalten, so benutze man alte, nicht mehr keimungsfähige Samen. Über schleimiges Verquellen von Membranen vgl. *Lepidium* S. 60.

Quellungskraft. Trockene Erbsen (rd. 100 g) werden in eine Medizinflasche von etwa 150 ccm Inhalt bis zu deren (offenbleibendem) Hals gefüllt. Hierauf wird die Flasche vollkommen mit (ev. angewärmtem) möglichst weichem Wasser gefüllt und sich selbst überlassen. Nach ungefähr 8—10 Stunden sind die Samen so stark gequollen, daß sie unter gegenseitigem Abplatten die Flasche mit mäßig starkem Knall zersprengen. Der hierbei entwickelte Druck beträgt im Augenblick des Zersprengens schätzungsweise einige Atmosphären. In ähnlicher Weise können durch quellende Samen die Knochen von Schädeln auseinandergetrieben werden.

Genaue quantitative Werte können mit dem Quellungsmesser (Physometer) von Groult gewonnen werden (Abb. 40).

Entspannungswachstum. In jungen Wurzelsprossen des Hohlunders (vgl. S. 30) sind die Zellulosehäute der lebenden Markzellen, wie die Plasmolyse lehrt, um etwa 8%, in älteren oft kaum noch gedehnt. Sie werden im Gewebeverbande allmählich durch Wachstum entspannt, ähnlich jungen Wurzeln, die eingegipst worden sind und durch Entspannungswachstum den Zelldruck auf die Gipshülle übertragen.

Wachstum der Keimlinge. Beim Fortschreiten der Samenkeimung (z. B. zwischen feuchtem Fließpapier in Petrischälchen) beobachtet man sehr gut das Wachstum der Wurzeln und die Entfaltung der Plumula (s. auch *Lepidium* S. 60 u. *Ricinus* S. 48).

Den Ort stärksten Wachstums an Wurzeln, z. B. von Erbsen, Feuerbohnen oder *Vicia faba*¹⁾, ermittelt man in der Weise, daß man mit einem Pinsel 10—12 schwarze Tuschestriche in Abständen von etwa 1 mm aufträgt und deren allmähliches Auseinanderweichen beobachtet. Die Samen werden mittels Nadel an der Innenseite des Korken eines Gefäßes von etwa 6 cm Durchmesser befestigt; vgl. Detmer, S. 219. Die Wurzel kann durch wiederholtes Eintauchen in Wasser feucht gehalten werden. Man beobachtet, daß nicht die

1) Aufzucht s. unter Chemotropismus der Wurzeln.

äußerste Spitze, sondern der dicht anschließende Teil am stärksten wächst. Mit einem Horizontalmikroskop könnte man das Wachstum direkt verfolgen, durch einen „Zeiger am Boden“ oder einen „Spiegel am Hebel“ sogar noch weit stärker vergrößert zur Anschauung bringen.

Sehr geeignet zum Studium des Wachstums sind auch Pollenschläuche (S. 97) und Pilzfäden.

Wachstumskraft. Durch das Dickenwachstum der Wurzeln oder Stämme von Bäumen können Blöcke gehoben oder Felsspalten erweitert werden. Der dabei entwickelte Druck, bedingt durch Turgorkraft und (zum kleineren Teil) durch Dickenwachstum der Membranen, beträgt 10—20 Atm. Starke Eisenringe werden nicht gesprengt, sondern überwallt; vgl. Pfeffer (1).

Hervorwachsen neuer Organe. Zweigstücke der Weide (z. B. *Salix fragilis*) bilden, besonders im Februar oder März, sehr leicht reichlich Wurzeln (vor allem an ihrem natürlichen unteren Ende) und Seitentriebe (hauptsächlich am oberen Ende); vgl. Detmer, S. 295 und Vöchting (1).

Allgemeines über Bewegung und Reiz. Bei den festwurzeln-den Pflanzen findet, abgesehen von Fortrücken durch unterirdische Wurzelstöcke u. dgl. (Wandern der Dünengräser), kaum Ortswechsel statt, dagegen können Krümmungsbewegungen (bei Stengeln, Blattstielen, beim Entfalten der Blüten usw.) in so großer Fülle und Mannigfaltigkeit vorkommen, daß man dabei in gewissen Fällen sogar psychische Vorgänge vermutet hat; doch entbehren solche Vermutungen bisher jeder sachlichen Begründung.

Die genannten Bewegungen sind 1) physikalische, vorwiegend hygroscopische (*Selaginella lepidophylla* auch lebend!) und 2) vitale (lebenäußernde) Bewegungen, die meist durch äußere Einflüsse angeregt werden.

Über sogenannte „lokomotorische Bewegungen“ (ortswechselnde) s. Teil B.

Diejenigen Kräfte, welche die vitalen Bewegungen hervorrufen, sind entweder Wachstumskräfte, wie in den meisten Fällen, oder Turgorkräfte (s. Blattgelenke).

Muskelkräfte kommen bei Blütenpflanzen nicht vor, nur die Cilienbewegungen niederer Pflanzen erinnern daran.

Zu den allgemein bekannten Bewegungen gehören ferner die Plasmaströmungen in den Zellen, welche dauernde (primäre) sein können oder erst durch Verletzung entstehen oder beschleunigt werden (sekundäre).

Als Ursache für solche Bewegungen betrachtete man Änderungen in der Oberflächenspannung des Plasmas, neuerdings sieht sie A. Meyer (1) aber als durch innere Molekularkräfte bedingt an (s. später).

Reizerscheinungen sind bei den Pflanzen weit verbreitet und eingehend erforscht (Schwerkraftreiz, Lichtreiz, Berührungsreiz, chemischer Reiz, Wundreiz usw.).

Sehr viele Bewegungen sind durch Reize verursacht, d. h.: die Pflanze selbst besitzt in dem unsichtbaren, kunstvollen inneren Bau ihres lebenden Plasmas die Spannkraft für die Ausführung der Bewegung, und nur die Auslösung wird durch äußere Einflüsse bewirkt. Nach Pfeffer trägt die Mehrzahl der Lebensäußerungen den Charakter von Auslösungsvorgängen. Solche induzierten oder paratonischen Bewegungen (im Gegensatz zu spontanen oder autonomen) sind mit Beispielen in der Tabelle S. 81 zusammengestellt.

Die pflanzlichen Reizerscheinungen sind zwar verbreitet, aber gegenüber denen bei Tieren (mit Nerven) sehr einfach. Vgl. auch Hesse-Doflein 1914. Diese Einfachheit zeigt sich schon in der geringen Geschwindigkeit der Reizleitungen. Sie beträgt z. B. für

geotropisch gereizte Wurzeln . . .	0,003 mm je Sekunde
haptotropisch gereizte Ranken . . .	0,06 „ „ „
Mimosa	bis 10 cm „ „
Nerven beim Menschen	10—120 m „ „

Bezeichnend auch für die pflanzlichen Reizvorgänge und ihre Zergliederung sind gewisse Erscheinungsformen und Gesetze, welche wir zum Teil an unserem eigenen, mit Nerven und Sinnesorganen ausgestatteten Körper (freilich in weit größerer Mannigfaltigkeit) kennen (Reizursache, Auslösung, Reizleitung, Reaktion, Reizschwelle, Präsentationszeit, Weber-Fechnersches Gesetz usw.). Zum Studium von Einzelheiten muß auf die Sonderarbeiten hingewiesen werden (Pfeffer, Jost, Handwörterbuch, Pringsheim (1), v. Guttenberg (1), Buder (1), Stark (1), sofern nicht bei Beschreibung der Versuche noch Angaben gemacht sind.

Die Zweckmäßigkeit der Reizreaktionen leuchtet in vielen (nicht allen) Fällen ein.

Sorgfältige Studien sind außer über die Zergliederung der einzelnen Reizvorgänge auch über das Wechselspiel zwischen gewissen Tropismen angestellt worden, worüber ebenfalls auf die Sonderarbeiten verwiesen werden muß. Übrigens ist S. 61 schon ein Fall beschrieben, wo der Hydrotropismus den positiven Geotropismus überwiegt.

Hygroskopische Bewegungen [Imbibitions- (Quellungs-) mechanismen)]. Als vorzügliches Versuchsobjekt sind Köpfe der Eberwurz oder Wetterdistel (*Carlina acaulis*)¹⁾, auch diejenigen von *Carlina vulgaris*, zu empfehlen. Nach Abtrennen der Laubblätter können die Hüllblätter der Köpfe sich ungehindert hygroskopisch bewegen. Beim Eintauchen in heißes Wasser tritt sofort Schließen ein,

1) Beim Transportieren anfeuchten!

Tabelle über Reizbewegungen.

Bewegungsart		auslösender Reiz	Beispiel
seismonastisch ¹⁾ ²⁾	S. 85	Erschütterung	Mimose <i>Berberis</i> <i>Mahonia</i> Cynareen } Staubblätter
geotropisch ³⁾	„ 86	Schwerkraft	Lotlage der Stengel und Wurzeln. Stellung der Fichten u.s.w. an sehr steilen Hängen
{ phototropisch oder heliotropisch ⁴⁾	„ 88	Licht	Stellung der Stengel und Blätter zum Licht
{ photonastisch ⁴⁾ ²⁾	„ 89	„	Blätter von <i>Sempervivum</i> . Blütenköpfe von <i>Calendula</i> , <i>Bellis</i> usw.
nyktinastisch ⁵⁾	„ 89	Licht (und Elektrizität?)	Tag- und Nachtstellung der Blätter und Blüten
phototaktisch ⁶⁾	„ 90	Licht	Bewegung der Chloroplasten; s. auch Algen
haptotropisch oder thigmotropisch ⁷⁾	„ 90	Berührung mit einem festen Körper	Ranken
thermotropisch	„ 91	Wärme	(nebensächlich) <i>Anemone</i> -Blütenstiele
thermonastisch ²⁾	„ 91	„	Öffnen und Schließen der Tulpen- und Krokosblüten u. a. m.
chemotropisch	„ 91	chemische Stoffe (Salze, Säuren usw.)	Wurzeln, Wurzelhaare, Pollenschläuche, Pilzhyphen, <i>Drosera</i>
chemonastisch ²⁾	„ 93	gasförmige Stoffe	(nebensächlich) <i>Urtica</i> -, <i>Mercurialis</i> -Blätter u. a. m.
chemotaktisch ⁶⁾	„ 93	chemische Stoffe	s. Bakterien, Spermatozoiden
aerotropisch ⁸⁾	„ 93	Luft	(nebensächlich) Wurzeln
aerotaktisch ⁶⁾	„ 93	„	s. Bakterien
traumatotropisch ⁹⁾	„ 93	Verletzung	Wurzeln
hydrotropisch	„ 93	Wasser	„
rheotropisch ¹⁰⁾	„ 93	strömendes Wasser	(nebensächlich) Wurzeln

1) seismos = Erschütterung.

2) nastisch sind solche Bewegungen, welche von der Richtung des Reizangriffes unabhängig sind. Wärme kann z. B. auf Ober- und Unterseite eines dorsiventralen Organes gleich sein und doch verschiedenes Wachstum auslösen.

3) ge = Erde, tropos = Wendung.

4) phos (Genitiv photos) = Licht, helios = Sonne.

5) nyx (Genitiv nyctos) = Nacht.

6) taxis = Einstellung, Ordnung (des ganzen Körpers).

7) haptο = ergreifen, anhaften. thigma = Berührung.

8) aer = Luft.

9) trauma = Wunde.

10) rheo = fließe.

beim Trocknen Öffnen [xerochastisch]¹⁾. Das Erwärmen des Wassers beschleunigt den Vorgang, ohne die Membranen zu schädigen.

Die Rose von Jericho (*Anastatica hierochuntica*) zeigt langsamere Bewegungen ($\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ Std. bei Verwendung warmen Wassers) und ist als Bewohner trockener Klimate hygrochastisch.

Abb. 41. Hygroskopischer Mechanismus an der Kapsel der Abendlichtnelke (*Melandryum album*). Links im trockenen Zustande. Rechts nach Eintauchen in (warmes) Wasser. (Orig.)

Weitere Beispiele sind: Reiherschnabel (*Erodium cicutarium* *gruinum* usw.), Abendlichtnelke (*Melandryum album*), (Abb. 41), Kornrade (*Agrostemma githago*) u. a. m.; vgl. Jost S. 539.

Bei der Bewegung der Klappen an den Staubblättern (Abb. 42) wirkt neben der Hygroskopizität auch Schrumpfung (terminus technicus!) infolge der Kohäsion des Wassers (s. Farne) mit (Kohäsionsmechanismus infolge von Zug des verdunstenden Füllwassers).

Abb. 42. Kohäsionsmechanismus in den Staubblattzellen des Fingerhutes (*Digitalis purpurea*). A Längswände einer Faserzelle ungefaltet. B Längswände der Faserzelle gefaltet. C Tangentialschnitt durch zwei Faserzellen der Antherenwand. Radialwände wellblechartig verbogen. Vergr. 900. (Nach C. Steinbrinck.)

Bestimmung der Lage der Quellungs- bzw. Schrumpfungsachsen. Die ungleichmäßige Quellung hängt mit der anisotropen (optisch ungleichen) Struktur der Membranen zusammen, wie sie sich u. a. auch in deren Doppelbrechung äußert.

Da die Längsachsen der Micellen (S. 75) in den Membranen gestreckter Zellen meist in steilen Schraubenlinien in Richtung der Poren angeordnet sind (Steilstruktur), so ist verständlich, daß solche Zellen

1) xeros = trocken, chaino = klaffen.

in der Richtung der Längsachse weit weniger quellen und schrumpfen als senkrecht dazu (umgekehrt bei Flachstruktur).

Die hygroskopischen Krümmungen von Organen beruhen zum Teil darauf, daß Zellenmembranen ungleicher Art einander gegenübergestellt sind, so daß die Micellarreihen der einen annähernd rechtwinklig zu denen der Gegenseite gerichtet sind. Antagonistisch können Membranen oder Gewebe sein.

Die Lage der Micellen läßt sich in der Regel leicht mittels der am Mikroskop anzubringenden Polarisations-einrichtung unter gleichzeitiger Verwendung eines Gipsplättchens¹⁾ Rot I bestimmen (Abb. 43).

Fallen die Längsachsen der Micellen mit denen des Gipses zusammen, so erhöht sich die Farbe zunächst auf blau oder grün (Additionsfarben), kreuzen sie sich, so erniedrigt sich die Farbe auf rotgelb bis weiß und grau (Subtraktionsfarben), vgl. Steinbrinck (1), Ambrohn (1).

Als Beobachtungsobjekte dienen z. B. (Dauer-)Präparate von Flankenschnitten der Äste von *Anastatica*, von Fruchthaaren der Waldrebe (*Clematis*) u. a. m.²⁾

Abb. 43. Mikroskop mit Polarisation und Gipsplättchen. *a* Polarisator. *b* Objekt, diagonal zu orientieren. Der Polarisator kann auch hier eingehängt oder festgebunden werden. Deckgläschen ev. entbehrlich. *c* Gipsplättchen, Hauptachse diagonal zu orientieren, d. h. Schrift in gewöhnlicher Lage zum Beobachter. *d* Analysator, Zeiger am besten zum Beobachter gekehrt, *a* (Polarisator) dazu gekreuzt (Gesichtsfeld dunkel). Rd. $\frac{1}{3}$ nat. Gr. (Orig.)

Näheres s. b. Jost (1) und Strasburger-Koernicke, S. 29 u. 116—118.

Vitale Bewegungen ohne Reiz. Das bekannte Zurückschlagen der Blätter beim Entfalten der Knospen im Frühling ist eine Entfaltungsbewegung aus rein inneren Gründen (autonom, selbständig). Auch das Aufspringen der Früchte von *Impatiens* und der Spring- oder Spritzgurke *Momordica*, sowie die Schleuder-

1) Im Bedarfsfalle nach Anleitung selbst herzustellen.

2) Man betrachte zum Vergleich auch Stärkekörner unter Benutzung von Rot I.

bewegung der Staubblätter von *Urtica* dürfte ohne Reiz erfolgen (vgl. Jost).

Autonom sind im allgemeinen auch die Plasmaströmungen (Zirkulations- und Rotationsbewegung) in den Zellen, z. B. in Haaren (*Tradescantia virginica*, *Stellaria media* usw.), *Elodea* u. a. m.

Zur Erklärung der Plasmabewegungen wird vielfach die „Oberflächenkräfte-Theorie“ herangezogen, nach Arth. Meyer (1) liegt jedoch der Sitz der Bewegung an sich schon in jedem kleinsten

Abb. 44. Zellen der Blattoberseite von *Elodea canadensis*. Ca. 600mal vergr. Die lange schmale Zelle zur Linken befindet sich über der Mittelrippe. *a*–*c* Kerne in Seiten- und Flächenansicht; *f* Plasmastrang; *g*–*i* Chlorophyllkörner in Teilung. (Nach L. Kny, Bot. Wandtafel 1.)

Plasmateilchen selbst, und die Gesamtbewegung wird bedingt durch eine Ordnung der Bewegung von Molekülen des Zytoplasmas (Spumoid) [gerichtete Brownsche Molekularbewegung (s. S. 37)].

In manchen Fällen wird die Plasmabewegung durch Verwundung bedeutend verstärkt, z. B. bei *Elodéa* (Abb. 44); vgl. Kny, Wandtafel 1.

Die Blätter von *Elodéa* zeigen in den Zellen deutlich die Bewegung des Protoplasmas. Da es sich dabei um einen Verletzungsreiz (auch chemische Reize wirken) handelt, wird die Strömung erst nach

rd. 10 Minuten deutlich. Schwaches Erwärmen kann den Vorgang etwas beschleunigen.

Die lebhafteste Plasmaströmung zeigen in der Regel die Zellen an der Mittelrippe auf der Unterseite der Blätter.

Beispiele für unabhängige Bewegungen finden sich in größerer Zahl in der einschlägigen Literatur [vgl. z. B. die Schwingungen der Blättchen bei der Telegraphenpflanze *Desmodium (Hedysarium) gyrans*.] Viele bekannte Bewegungen im Pflanzenreich werden aber, wie bereits hervorgehoben, nicht durch innere Gründe bedingt, sondern durch Reize ausgelöst (s. Tab. S. 81).

Das schönste und anschaulichste Beispiel für Reizvorgänge im Pflanzenreich zeigt uns die Mimose (Kny, Wandtafel 102).¹

Seismonastie (s. S. 81). *Mimosa pudica*¹⁾ u. a. Species, wie *M. spegazzini*, senken bei Erschütterung (Stoßreiz), Ansengen mittels Streichholz oder Sammellinse usw. in den Gelenken rasch ihre Blätter und legen die Fiederchen zusammen, wobei man deutlich eine Fortleitung des Reizes beobachtet. Umkehren der Pflanzen beeinträchtigt nur das Ausmaß, nicht die Art der Bewegungen. Die Bewegung dürfte dadurch zustande kommen, daß der Turgordruck (in den unteren Hälften der Hauptgelenkpolster) infolge vorübergehender Durchlässigkeit des Plasmaschlauches sinkt. Nach einiger Zeit kehren die Blätter in ihre ursprüngliche Lage zurück. Äther, Chloroform, höhere Wärme usw. versetzen die Pflanze in einen Starrezustand.

Die Fortleitung des Reizes scheint durch physikalische Kräfte (hydrostatische Druckschwankungen) zu erfolgen, doch sind auch chemische dafür genannt worden. Schneidet man Blättchen mit der Schere ab, so treten Wundtröpfchen heraus. Die Reizleitung erfolgt entweder in den wasserleitenden oder in besonderen eiweißleitenden Röhren (Haberlandt), Sicheres darüber steht noch nicht endgültig fest. Nach Goebel (2) sind bisher keine Beweise für einen bestimmten Zweck bei den Bewegungen der Sinnpflanzen erbracht worden.

Weitere Beispiele für Stoßreiz sind Sauerklee (*Oxalis acetosella*), *Bellis* [Goebel (2)], Staubblätter der Flockenblume (*Centaurea jacea*), *Cirsium lanceolatum* (Abb. 45), *Carduus crispus*, *Berberis*, *Mahonia*, *Sparmannia*, *Biophytum* usw. Kny, Taf. 102 u. 105–108.

Der Versuch mit der Distel (*Cirsium* u. *Carduus*) läßt sich in folgender Weise leicht ausführen: Ein Stengel, z. B. von *Cirsium lanceo-*

1) *Mimosa pudica* läßt sich schon verwenden, sobald bei der Keimpflanze das erste Fiederblatt entwickelt ist. Die Keimung der Samen erfolgt in Warmhäusern ziemlich rasch (nach 1–2 Wochen). Die jungen Pflanzen kann man in größeren Aquariumgläsern im Zimmer weiterziehen. Man bedecke diese Gläser und Sorge durch Bestreuen des Bodens mit feuchtem Kies und durch Hineinstellen von Schalen mit Wasser für die nötige Feuchtigkeit. Das Ganze stellt man am besten in direktes Sonnenlicht.

latum, mit gerade zur Entfaltung reifen Blütenknospen wird in Wasser gestellt. Am folgenden Tage haben sich die randständigen Blüten entfaltet. Beim Hinwegstreichen über diese ist deutliche Bewegung wahrnehmbar, weil die Fäden der Staubblätter reizbar sind. Schneidet man die randständigen Blüten ab (Abb. 45 bei *a*), so entfalten sich neue, und der Versuch kann wiederholt werden. Nach Goebel (2) ist ein Zweck auch für diese Bewegungen bisher nicht ermittelt.

Geotropismus (S. 81). Ein in Erde oder Sägespänen gekeimter Same mit verhältnismäßig starker, einige cm langer Wurzel (Feuerbohne, Pferdebohne, Erbse, weiße Lupine) wird mittels Nadel innen am Korken einer weithalsigen, zweckmäßig kantigen, Flasche befestigt¹⁾ (s. auch

Abb. 45.

Abb. 46.

Abb. 45. *Cirsium lanceolatum*. Blüten mit reizbaren Staubfäden. Bei *a* Stümpfe der abgeschnittenen randständigen Blüten. Fast nat. Gr. (Orig.)

Abb. 46. Wirkung der Zentrifugalkraft auf Wurzeln. Sie entspricht der Stellung des oben befestigten Pendels und kommt durch Wachstum zustande. Die Neigung von etwa 45° tritt dann ein, wenn die Zentrifugalkraft gleich der Schwerkraft ist. Rd. $\frac{1}{10}$ nat. Gr. (Neuzeichnung nach Pfeffer.)

Lepidium-Versuch). Diese wird mit 10—20 ccm Wasser gefüllt und horizontal umgelegt. Durch zeitweiliges Schwenken kann die Wurzel hinreichend benetzt werden. Sie krümmt sich durch Wachstum (positiver Geotropismus) im vorderen Teil abwärts. Dabei vermag die Wurzel, wie besondere Versuche lehren, in das spezifisch schwerere Quecksilber aktiv einzudringen. Der Schwerkraftsreiz wird hauptsächlich von der Spitze perzipiert (aufgenommen), die Krümmung erfolgt aber an weiter zurückliegenden Teilen: Abschneiden der Spitze behindert die Reizaufnahme. Ob der Druck beweglicher Stärkekörner in der Wurzelhaube den Reiz auslöst (Statolithentheorie), ist

1) Es empfiehlt sich, mehrere Versuche gleichzeitig anzustellen, da manche Wurzeln mehr oder weniger versagen. Von kleineren Samen ist Radieschen geeignet.

durch sorgfältige Untersuchungen zu entscheiden versucht und wahrscheinlich gemacht; vgl. Haberlandt (1), Jost (1), Zollikofer (1).

Die mittelbar physiologisch wirkende Schwerkraft kann durch Zentrifugalkraft (Schleuderkraft) ersetzt werden (Abb. 46).

Langsame Drehung um eine horizontale Achse [Klinostatenbewegung]¹⁾ hebt naturgemäß die Wirkung der Schwerkraft auf, ebenso periodisches (halb- bis einstündiges) Umlegen der Flasche (S. 86) um jedesmal 180° (antagonistische Reizung!). Seitenwurzeln (Beobachtung in geneigt aufgestellten, mit Erde gefüllten Akkumulatorengläsern) wachsen unter dem physiologischen Einfluß der Schwerkraft schräg nach unten²⁾ (Beweisführung durch lehrreiche Umkehrversuche) Klinogeotropismus), Grundstöcke oft horizontal (Transversal-Geotropismus). Bei schräger Lage der Hauptwurzel unterliegt die Reizbewegung dem Sinusgesetz. Beim Aufrichten des Blütenstieles vom Mohn (*Papaver*) u. a. m. tritt Umstimmung der geotropischen Reizbarkeit ein, von + in — geotropisch. Das Eigengewicht der Knospe spielt keine ausschlaggebende Rolle. Geotropismus bewirkt auch die Drehung des Fruchtknotens der Blüten von Orchideen u. a. m.

Aufrichtung der Grashalme. Während sich die Stengel durch negativen Geotropismus im allgemeinen im Bogen lotrecht stellen, richten sich die Grashalme an den Blattknoten im Winkel auf (Abb. 47). Die Aufrichtung geschieht durch Wachstum der Unterseite [vgl. de Vries (5)]. Auch *Tradescantia* ist für diesen Versuch geeignet.

Abb. 47. Gelenkartige Aufrichtung eines Halmstückes vom Roggen an einem Knoten. Schwach vergr. (Orig.)

Winden der Pflanzen. Die kreisende Bewegung der Sproßgipfel windender Pflanzen (Bohne, Hopfen, Winde) scheint von der Schwerkraft abzuhängen [s. besonders Gradmann (1)]. Auf dem Klinostaten hört dementsprechend diese Bewegung der Hauptsache nach auf, und der Stengel streckt sich mehr oder weniger gerade (Autotropismus). Die mannigfaltigen Gestaltungen, welche diese kreisende Bewegung beim Winden hervorbringt, sind formveränderlich und tragen nicht den Charakter des Fertigen an sich. Da die endgültigen Windungen im Gegensatz dazu sehr regelmäßig und bleibend sind, erfordert ihr Entstehen noch weitere, fixierende Kräfte: spannende durch Krümmungen (Schwendener) und schnürende durch

1) Über einfache Klinostaten vgl. Claussen (1).

2) Seitenzweige (z. B. bei vielen Nadelhölzern) schräg nach oben. Wird die Spitze der Hauptachse entfernt, so richtet sich einer der Seitenwände auf (Umstimmung der Reizbarkeit).

Torsionen (Kolchwitz). Über Einzelheiten vergleiche man die einschlägige Literatur.

Phototropismus (Heliotropismus) (S. 81). Die allgemein bekannte Einstellung der Blätter und Stengel zum einseitigen Lichteinfall ist bis in seine Einzelheiten verhältnismäßig gut untersucht und in den Lehrbüchern eingehend geschildert.

Die phototropischen Krümmungen sind Wachstumserscheinungen (Tuschepunkte!), die durch ungleich starke Reaktion auf den verschieden belichteten Seiten bedingt werden (Licht-Schattenwirkungen, Oltmanns' Glaskeilversuche). Hierbei pflegen die blauen und violetten Strahlen am stärksten zu wirken. Wie beim Geotropismus lassen sich auch hier unterscheiden: Reizaufnahme, Reizleitung und Reizwirkung. So sind z. B. gewisse Blattflächen reizaufnehmend, während die Stiele die Einstellung bewirken (Transversal-Phototropismus). An sehr sonnigen Standorten kommt auch Profil(Kanten-)stellung solcher assimilierenden Organe vor.

Abb. 48. Phototropische Kammer mit Keimpflanzen, im Innern mit mattschwarzem Papier ausgekleidet. *R* Ansatzrohr, *b* Spalt, *c* Verengung; rd. $\frac{1}{4}$ nat. Gr. (Nach Detmer.)

Durch Klinostatenbewegung (S. 87) werden die einseitigen Lichtwirkungen naturgemäß ähnlich wie beim Geotropismus aufgehoben. Narkotika bedingen auffällige Reizhemmungen. Umstimmung in der phototropischen Reizbarkeit findet sich beispielsweise bei den Blütenstielen des Cymbelkrautes (*Linaria cymbalaria*), die zunächst positiv, nach der Befruchtung der Blüten aber negativ phototropisch sind.

Phototropische Kammer. Diese Vorrichtung (Abb. 48) bietet durch die scharfe Strahlenbegrenzung und das Fehlen von reflektiertem Licht den Vorteil einer schnellen und ausgesprochenen Reaktion.

Als Versuchsobjekte dienen junge Keimlinge von Hafer, Hirse, Weizen usw., Wicke, *Lepidium sativum*, *Sinapis*. Gute Wirkungen können schon nach einigen Stunden beobachtet werden. Manche Keimlinge sind bei schwächerem Licht positiv, bei sehr grellem negativ phototropisch. Um schon kleine Ausschläge bei der Krümmung beobachten zu können, stecke man ev. eine Stopfnadel oder ähnliches so neben die Pflanze in den Boden, daß ihre Spitze unmittelbar neben den Gipfel der Pflanze zu stehen kommt.

Präsentationszeit, Reaktionszeit und Reizmengengesetz (vgl. Jost) können durch geeignete Versuche näher studiert werden.

Reitzleitung. 1) *Avena*-Keimlinge von etwa 2 cm Länge werden mit feiner lockerer Erde so weit eingeschüttet, daß nur die Spitzen (rd. 3 mm) der Koleoptile (Scheidenblatt) aus dem Boden hervorragen. Bei einseitiger Beleuchtung krümmt sich die ganze Koleoptile zum Licht, obwohl dieses nur die Spitze getroffen hat.

2) Junge Keimlinge von *Panicum* oder *Setaria* werden an der Spitze (Koleoptile) durch kleine Stanniolkappen verdunkelt. Es tritt keine Reaktion bei einseitiger Beleuchtung ein. Die Keimlinge werden durch dieses Verdunkeln gleichsam blind.

3) Die Spitzen werden abgeschnitten und durch eine dünne Gela-
tineschicht (0,1 mm) wieder aufgeklebt. Es tritt bei ausschließlicher

Abb. 49. Blätter der Feuerbohne (*Phaseolus multiflorus*), links in Tag-, rechts in Nachtstellung. Am Grunde der Blättchen erkennt man deutlich die Gelenkpolster. Zu Versuchen können Pflanzen in Töpfen verwendet werden. Rd. $\frac{1}{2}$ nat. Gr.

Lichtreizung der Spitzen trotz dieses Eingriffes Krümmung ein, da wahrscheinlich chemische Reizstoffe durch das Gelatineplättchen hindurch zu der wachstumsfähigen Krümmungszone weitergeleitet werden.

Photonastie (S. 81) ist eine Krümmung bei Beleuchtungswechsel, die ausschließlich durch den Organbau bedingt wird und von der Lichtrichtung unabhängig ist. Vgl. Thermonastie. (Linnés Blumen-
uhr). Handwörterbuch (1).

Nyktinastische (Schlaf-)Bewegungen (S. 81). Die bekannte Erscheinung der Tag- und Nachtstellung besonders der Blätter schließt sich an die Photonastie an, doch werden die Bewegungen dabei durch Turgorschwankungen in Gelenkpolstern bewirkt (Variationsbewegungen) im Gegensatz zu nyktinastischen Wachstumsbewegungen¹⁾. Nach

1) In jungen Gelenkpolstern wirken aber auch Wachstumsvorgänge mit.

den Untersuchungen von Rose Stoppel (1) scheinen auch tagesperiodische Änderungen in der elektrischen Leitfähigkeit der Luft den Vorgang zu beeinflussen. Als Versuchsobjekt können dienen: *Phaseolus* (Abb. 49) (im Gelenkpolster 20 Atm. Druck), junge Pflanzen von *Trifolium pratense*, *Acacia lophanta*, *Oxalis stricta* u. a. m.

Über den etwaigen Nutzen der Schlafbewegungen (Schutz gegen Betauung, Kältestrahlung usw.) sind die Ansichten sehr geteilt; vgl. z. B. Goebel (2).

Phototaxis (hier Bewegung der Chlorophyllkörper). In den Zellen der untergetauchten Wasserlinse (*Lemna trisulca*) (Abb. 50) bewirkt starke Belichtung, daß die Chromatophoren von den parallel zur Oberfläche gerichteten Wänden auf die Seiten übergehen, wie aus der Abbildung erschen werden kann. Man nimmt an, daß dadurch das Chlorophyll vor einer gewissen Zersetzung durch das Licht geschützt wird. Eine entgegengesetzte Gruppierung der Chlorophyllkörner beobachtet man an Exemplaren, welche 1—2 Stunden im Dunkeln gehalten worden sind. Die bewegende Kraft liegt wahrscheinlich im farblosen Plasma.

Abb. 50. Lagerung der Chlorophyllkörner. a bei starker Belichtung, b im Schatten bzw. im Dunkeln. Die Figuren stellen Querschnitte durch die blattartigen Teile der untergetauchten Wasserlinse (*Lemna trisulca*) dar. (Nach E. Stahl.)

Zur Beobachtung können Stücke der *Lemna trisulca* direkt auf den Objektträger gebracht werden. Lit. Stahl (3), Senn (1).

Weitere geeignete Untersuchungsobjekte hierfür sind nach E. Stahl (3) die im Schatten entwickelten Blätter vom Hollunder (*Sambucus nigra*), vom Drehmoos (*Funaria hygrometrica*) und von grünen Prothallien der Farne. S. auch Algen.

Haptotropismus oder **Thigmotropismus** (S. 81). Berührungsreiz wird hauptsächlich bei Ranken, nach P. Stark (1) auch an Keimpflanzen, z. B. der Kornrade (*Agrostemma githago*) u. a. m. beobachtet.

Ein vorzügliches Objekt zum Studium der Reizbarkeit der Ranken ist in unserer Flora die Zaunrübe (*Bryonia*), welche nicht selten an Gebüschrändern wächst. Streicht man längs über eine gerade, lebenskräftige, safterfüllte Ranke ein oder einige Mal zart entlang, so krümmt sie sich bei warmer Witterung schon in einigen Minuten kreisförmig ein¹⁾. Die Ranken von Gurke und Kürbis krümmen sich oft

1) Unter den Gewächshauspflanzen liefert *Passiflora* geeignete Ranken.

erst nach etwa $\frac{1}{2}$ Stunde, während wilder Wein sehr träge reagiert. Bei diesem kommen auch häufig Ranken mit Haftscheiben vor (Abb. 51).

Ein Wasserstrahl, Quecksilberstrahl oder ein weiches Gelatinestäbchen vermögen keinen Reiz zu verursachen. Näheres siehe bei Pfeffer (1), Jost (1), Detmer (1) u. a. m.

Thermotropismus (S. 81) kann, im Gegensatz zu Themonastie, als nebensächlich übergangen werden.

Thermonastie (S. 81). Sie umfaßt die bekannte Erscheinung des Öffnens und Schließens der Tulpen- und Krokos-Frühlingsblüten im warmen (über 25°C) bzw. kühlen Zimmer. Auch die Blütenköpfe vom Löwenzahn (*Taraxacum*) können verwendet werden. Die Bewegungen erfolgen im wesentlichen durch Wachstum.

Abb. 51. Haftscheibenranken von *Parthenocissus* (*Ampelopsis*) *radicantissima*. (Orig.)

Chemotropismus (S. 81). Die Wurzeln passen sich im Boden in vielen Beziehungen den günstigsten Lebensbedingungen an, wozu sie durch eine Reihe von Reizreaktionen befähigt sind.

Der hier zu besprechende Chemotropismus vollzieht sich in einem wasserhaltigen Medium, im nachstehend beschriebenen Falle in (3-) 6-%iger Gelatine.

Abb. 52. Chemotropismus der Wurzeln. *a* Richtung der Wurzeln zu Anfang des Versuches; *b* Hinkrümmen der Wurzeln zur Ammonphosphatlösung; *c* Fortkrümmen der Wurzeln von der Kochsalzlösung. Zum Feuchthalten genügt auch bloßes Überdecken mit nassen Tüchern; rd. $\frac{1}{4}$ nat. Gr. (Orig.)

Die in destilliertem Wasser gelöste Gelatine wird in runde Glasgefäße von etwa 15 cm lichter Weite und etwa 12 cm Höhe oder in Bechergläser u. dgl. eingefüllt. Solange die Gelatine noch flüssig ist, wird in den mittleren Teil ein Glasrohr von etwa 3 cm lichtigem Durchmesser (weites Reagenzrohr, Lampenzylinder o. a. m.) eingestellt, das

später, nach Herumfahren mit einer langen Nadel zum Zwecke der Lockerung, zur Herstellung einer zentralen Höhlung herausgenommen wird. (Nadel während des Herausziehens stecken lassen!) In diese Höhlung wird die chemotropisch wirkende Lösung eingefüllt. Man bereite vier Schalen vor und beschrifte sie paarweise mit einer Lösung von (1-) 2%igem Ammoniumphosphat $[(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4]$, alkalisch) bzw. (1-) 2%igem Kochsalz in destilliertem Wasser. Diese beiden Substanzen eignen sich für die vorliegenden Versuche besonders gut [vgl. M. Lilienfeld (1) und die beigefügte Abbildung].

Als Versuchsobjekte dienen zweckmäßig Wurzeln von *Lupinus albus*, wenn sie 1,5—4,0 cm lang sind. Die Samen werden am besten zuvor zwischen nassem Fließpapier 24 Stunden lang angequollen und dann in gut durchfeuchtete, durch Reiben zwischen den Händen gelockerte Sägespäne in einer größeren Saatschale (vgl. Abb. 53) wagerecht flach eingelegt und mit einer dünnen Schicht von Sägespänen überdeckt. Nach 4—5 Tagen pflegen die Wurzeln bis zu der gewünschten Länge herangewachsen zu sein. Man legt am besten einige Dutzend Samen ein und wählt später zum Versuch nur schnurgerade

Abb. 53. Unglasierte Tonschalen für Pflanzenkulturen. Seitenlängen 5—20 cm; rd. $\frac{1}{20}$ nat. Gr.

gewachsene Wurzeln aus¹⁾. Diese werden in Wasser abgespült und zu etwa je sechs rings um die Höhlung der Gelatine in dem aus der Zeichnung ersichtlichen Abstand in die weiche Masse senkrecht direkt hineingesteckt. Hierauf werden die Schalen in ein größeres, mit nassem Fließpapier ausgekleidetes Gefäß gestellt und durch Überdecken eines dunklen Tuches (vgl. Abb.) gegen Licht geschützt, um die Dunkelheit des Bodens nachzuahmen, was aber für den Ausfall des vorliegenden Versuches von keiner Bedeutung ist, da die Wurzeln von *Lupinus albus* — im Gegensatz zu denen von *Raphanus sativus*, *Sinapis alba* und *Hedera helix* — nicht lichtempfindlich sind.

Nach einigen Tagen zeigt sich positiver Chemotropismus der Wurzeln nach der Ammonphosphatlösung, welche in die Gelatine hineindiffundiert ist, während sich die Wurzeln von der Kochsalzlösung fortgebogen haben. Die Phosphate sind gute Lockmittel, während die Chloride, Nitrate und Sulfate in höherer Konzentration abstoßend wirken.

Nach etwa einer Woche können Bakterienkolonien und Schimmelpilze in der Gelatine aufzutreten; nach etwa 14 Tagen pflegt das Bild besonders anschaulich zu sein: Im einen Falle sind die Wurzeln so

1) Gerade Wurzeln von besonderer Lebensfrische erhält man nach E. Tiegs bei Verwendung von lockeren Buchen-Sägespänen, auch dann ist aber bisweilen nur etwa jede vierte Wurzel besonders gerade; solche von Kiefernholz sollen wegen ihres Harzgehaltes das Wachstum mancher Wurzeln beeinträchtigen. Claussen (1) empfiehlt Späne von Weißtanne.

weit vorgewachsen, daß sie sich in der Mitte berühren, im anderen fliehen sie bis zur Glaswand. Allmählich sind auch kleine Seitenwurzeln hervorgewachsen und die Keimblätter frei geworden. Deutlich chemotropische Reaktion (neben mechanischer und thermischer Reizbarkeit) zeigen auch die Tentakeln vom Sonnentau (*Drosera*); vgl. S. 57 u. Kny, Taf. 101. Es handelt sich dabei um Chemotropismus, nicht um Chemonastie, wenigstens nicht ausgesprochene, da die Drüsenhaare sich auch nach der Seite (nicht zur Mitte) krümmen können. Die Reizaufnahme findet besonders im Drüsenkopf, die Krümmung hauptsächlich an der Stielbasis statt. Nach dem Aufhören der Reizung strecken sich die Tentakeln allmählich wieder gerade.

Wegen des Verhaltens der Pollenschläuche (reagieren besonders auf Eiweißstoffe und Zucker) sei auf die Literatur verwiesen.

Chemonastie (S. 81). Bringt man einen in Wasser gestellten Zweig der Nessel (*Urtica*) unter eine Glocke und legt (trocken genügt) ein Stück Calciumkarbid dazu, so entstehen geringe Mengen von Acetylen, durch dessen Einwirkung sich die Blätter senken, um sich nach Übertragen in normale Luft wieder zu heben (nach E. G. Pringsheim).

Chemotaxis (S. 81) s. Teil B.

Aërotropismus (S. 100) ist der durch Sauerstoff hervorgerufene Chemotropismus. Er kommt bei Wurzeln und Pollenschläuchen vor. Aerotaxis s. unter Bakterien.

Traumatotropismus (Schädigungskrümmung). Bewegungen infolge von Wundreiz kommen bei Wurzeln und auch bei einzelnen Zellbestandteilen vor. Vgl. Jost (1), Stark (1).

Die Frage über die Beziehungen des Traumatotropismus (Krümmung infolge von Verletzung durch Brand-, Ätzwunden usw.) zum Chemotropismus ist zurzeit noch nicht völlig geklärt.

Wie besondere Versuche von Otto Günther gezeigt haben, befähigt der Traumatotropismus die Wurzeln nicht, spitzen und scharfkantigen Steinen im Boden geschickt auszuweichen; dazu müßten die Steine schon ätzende oder sonst giftige Substanzen ausscheiden.

Hydrotropismus (S. 81). Durch Feuchtigkeitsverhältnisse hervorgerufene Bewegungen sind ziemlich verbreitet. So wachsen Wurzeln meist feuchten Stellen zu (*Lepidium*-Versuch S. 60), während übermäßig nasse bei manchen Wurzeln entgegengesetzt wirken können. Über Hydrotaxis vgl. Teil B, besonders Myxomyceten.

Das Hineinwachsen von Wurzelzöpfen in Drainröhren dürfte auf Hydrotropismus und Trophotropismus (Hinwenden zur Nahrungsquelle) beruhen.

Rheotropismus (S. 81), d. h. Krümmung gegen strömendes Wasser wird (nicht häufig) bei Wurzeln beobachtet. Über Rheotaxis vgl. Myxomyceten.

IX. Gruppe. Fortpflanzung und Vererbung.

Omnipotenz der Zellen (weitgehende Entwicklungsmöglichkeit). Viele Lebewesen vermögen durch ihre Keimzellen ungeheure Mengen von Nachkommen hervorzubringen, weit mehr als auf der Erde zum Leben überhaupt Platz haben. Die meisten müssen deshalb schon als Keime zugrunde gehen. Außerdem gilt überhaupt jede lebenskräftige Zelle als „omnipotent“, d. h. auch ihrerseits zur Erzeugung von Nachkommen befähigt. Diesen Satz darf man natürlich nicht zu extrem fassen, vor allem nicht auf Zellen mit besonders weitgehender Arbeitsteilung anwenden. So wird man nicht aus einem fertig gebildeten Brennhaar eine Brennessel (*Urtica*) oder aus einer Bastzelle, die ihrer endgültigen Ausbildung nahe ist, eine Leinpflanze (*Linum*) zu voller Entwicklung bringen wollen. Auch scheint bei gewissen Gruppen, z. B. den Nadelhölzern, die Omnipotenz der Zellen nicht in allen Teilen der Pflanze gleich groß zu sein. Gleichwohl gilt aber für viele Organismen der Satz, daß sie in der Tat vermöge ihres zelligen Baues aus zahllosen solchen Keimen zur Bildung von Nachkommen bestehen, daß diese aber niemals in ihrer Gesamtheit zur Entwicklung gelangen.

Gene (nach Johanssen-Kopenhagen; Stamm gen = entstehen). Diese eben erwähnten „Keime für Nachkommen“ bestehen ihrerseits wiederum aus einem Mosaik von „Anlagen für Einzeleigenschaften“ (z. B. zur Bildung von Wurzeln, Stengeln, Blättern von bestimmter Gestalt). Diese Anlagen machen die Vererbungsstruktur aus und heißen Gene. Die Gene als Stoff- und Wirkungszentren scheinen ihren Hauptsitz in den Zellkernen zu haben. Cytoplasma-Gene sind bisher noch nicht nachgewiesen worden, vielleicht gelingt es aber später, solche zu finden, z. B. in den Plastiden, aus denen sich bekanntlich Chlorophyllkörner, Stärkebildner usw. entwickeln.

Die Gene, so bedeutungsvolle Anlagen wichtiger Eigenschaften sie sind, können selbst bei stärkster mikroskopischer Vergrößerung nicht wahrgenommen werden, es ist aber nach den Untersuchungen von Morgan an der Frucht- oder Essigfliege *Drosophila* anzunehmen, daß die Gene in den Kernschleifen nebeneinander angereiht sind, so daß man wenigstens das Substrat sehen kann, in dem sie besonders massenhaft vorhanden sein müssen.

Wegen der Kleinheit der Gene braucht es nicht wunderzunehmen, daß viele Fortpflanzungszellen sehr winzig (und doch omnipotent) sind, z. B. Eizellen, Spermatozoiden und Sporen.

Bei der reichlichen Ausstattung der Organismen mit Genen darf es nicht überraschen, daß es die mannigfaltigsten Formen von Fortpflanzungsorganen außer in Blüten auch an anderen Stellen des Pflanzenkörpers gibt, z. B. Brutknospen, Brutzwiebeln, Adventivsprosse usw.

Sie alle bergen Erbanlagen in sich, welche die Erzeugung neuer Individuen ermöglichen.

Genotypus und Phaenotypus. Der Inbegriff aller Gene eines Organismus ist der Genotypus. Dieser stellt eine ideelle Konstruktion dar; er tritt als solcher nie rein in die Erscheinung, sondern in dem, was er aus sich heraus zu bilden vermag, immer nur durch die Umgebung beeinflusst, als sogenannter Phaenotypus (= Erscheinungsform = Entwickeltes = Kleid der Pflanze). Der Genotypus geht also im Phaenotypus auf. Zur Erläuterung des eben Gesagten sei ein Beispiel aus der Chemie herangezogen, das Indigokarmin (S. 7). Der Genotypus wird weder durch die Strukturformel der Indigoblausubstanz noch durch diejenige der Indigoweißsubstanz dargestellt, sondern nur durch den (nicht selbständig existierenden) Grundstamm der Formel. Indigoblau und Indigoweiß stellen den Phaenotypus dar.

Vererbt wird nicht der Phaenotypus, sondern der Genotypus.

Ungeschlechtliche (vegetative) Fortpflanzung. Diese bedeutet eine bloße Neubildung des Mutterorganismus ohne Hinzutreten neuer Eigenschaften. Sie ist im Pflanzenreich sehr weit verbreitet und scheint, soweit bisher bekannt, nur wenigen Pflanzen zu fehlen, hauptsächlich einjährigen wie dem Hirtentäschelkraut (*Capsella bursa pastoris*). Doch ließe sich bei folgerichtiger Durchführung von Versuchen vielleicht auch bei diesen ungeschlechtliche Fortpflanzung finden. Den höheren Tieren fehlt sie dagegen allgemein, wohl wegen deren besonders komplizierten Organisation.

Bryophyllum calycinum u. *crenatum*, Pflanzen, die etwa unserer Fetthenne (*Sedum marimum*) in den wärmeren Ländern entsprechen, liefern lehrreiche Beispiele für überraschende Ausgiebigkeit der ungeschlechtlichen Fortpflanzung. Legt man ein Blatt in eine Schale mit Wasser (am besten mit Deckel), so wachsen aus den Winkeln der Blattzähne, in denen sich kleine „schlafende Augen“ finden, in 8—14 Tagen bewurzelte Pflänzchen hervor (Abb. 54). Vgl. Goethe (1), Kerner (1), Goebel (1), „Bruchblätter“ S. 1488 und (3)].

Cardamine pratensis (Wiesenschaukraut) gestattet ähnliche, aber weniger schlagende Versuche mit den Rosettenblättern.

Dentaria bulbifera (Zahnwurz), die besonders in Buchenwäldern anzutreffen ist, besitzt in den Blattachseln (Abb. 55) zwiebelartige Knospen, aus denen neue Pflanzen hervorgehen. Man kann die reifen Brutkörper trocken aufbewahren und später einpflanzen; sie treiben auch während des Winters sehr bald Wurzeln, selbst wenn sie bereits stark geschrumpft waren. Weitere Beispiele s. bei Kerner (1).

Nach unseren bisherigen Erfahrungen liegen keine zwingenden Gründe zu der Annahme vor, daß die Organismen sich ohne Geschlechtlichkeit nur begrenzt fortpflanzen können. So wissen wir, daß Schilf (*Phragmites*), Zuckerrohr (*Saccharum*), Kalmus (*Acorus*)

usw. so gut wie nie reife Samen bilden, Schattenblume (*Majanthemum*), Einbeere (Paris) u. a. m. nur selten. Und doch vegetieren die genannten Gewächse an günstigen Standorten sehr üppig. Scheinbar widersprechende Beispiele wie Pyramidenpappel und Wasserpest (*Elodea*) sind in bezug auf diese Frage noch nicht gründlich genug untersucht.

Abb. 54. *Bryophyllum crenatum*. Nach Auflegen auf Wasser sind aus den Winkeln der Blättzähne Brutpflänzchen hervorgewachsen; $\frac{1}{2}$ nat. Gr. (Orig.)

Abb. 55. *Dentaria bulbifera* (Zahnwurz). Brutzwiebeln gesammelt im Mai. Rechts: In Erde gekeimte Brutzwiebel mit Würzelchen. (Orig.)

Geschlechtliche Fortpflanzung. Diese könnte im Gewächsreich überflüssig erscheinen, da so gut wie alle Pflanzen mit ungeschlechtlicher Fortpflanzung begabt sind. Gleichwohl ist auch die geschlechtliche Fortpflanzung fast durch das ganze Pflanzenreich verbreitet. Die oft merkwürdigsten und verwickeltsten Einrichtungen werden geschaffen, um zwei Zellen verschiedener Individuen zum Verschmelzen zu bringen (Geschlechtsakt). Selbstbetäubung wird, soweit möglich, oft vermieden. Nach den bestehenden Ansichten zielt diese Verschmelzung darauf ab, in den Nachkommen neue Gene hinzuzufügen und Eigenschaften zu vermischen, was bei der ungeschlechtlichen Fortpflanzung nicht möglich ist. Vielleicht sprechen aber auch andere, bisher unbekannte Gründe mit. Erfolgreiche Sexualakte finden nur zwischen nahestehenden Formen statt.

Da, wie gesagt, bei der Geschlechtlichkeit zwei Zellen und damit die Kerne miteinander verschmelzen, so würden diese schließlich ins Endlose an Größe zunehmen, wenn nicht vor dem jedesmaligen Geschlechtsakt eine Verringerung der Kernmasse durch Reduktionsteilung eintreten würde. H. Winkler hat durch Verschmelzung vegetativer Zellen Pflanzen mit großen Kernen (Burdonen¹) ge-

1) burdo = Maultier (Hengst $\times$ Eselin).

züchtet, wobei Individuen mit abweichenden Merkmalen entstanden sind.

Malva silvestris ist ein ausgezeichnetes Objekt zur Beobachtung der Narbenbestäubung mit Pollen. Man entfernt von Blüten mit reifen Narben die Hülle und legt sie, so hergerichtet, in eine trockene Planktonkammer. Schon mit 14fach vergrößernder Lupe wird man sehr deutlich die großen (feinstacheligen) Pollenkörner auf den Narben wahrnehmen. (Reichlicher Insektenbesuch durch Bienen usw.)

Impatiens noli tangere u. *parviflora* eignen sich vorzüglich zur Beobachtung der (sofort eintretenden) Pollenkornkeimung und des Auswachsens der Pollenschläuche; es genügt, besonders bei der erstgenannten Pflanze, bloßes Einlegen in Wasser, vor allem bei Benutzung von Pollen aus Blüten, die kurz vor dem Öffnen stehen. Es empfiehlt sich Beobachtung im hängenden Tropfen unter Verwendung der Planktonkammer, doch genügen im Notfall auch Objektträger. *Narcissus tazetta* (u. a. m.) ist für Studien im Winter zu empfehlen. Die Pollenkörner keimen in einigen Stunden in 3—5 %iger Rohrzuckerlösung mit $1\frac{1}{2}$ % Gelatine; vgl. auch Strasburger-Koernicke S. 594.

Monótropa hypópitys (Fichtenspargel) liefert, am besten frisch, doch auch nach Einlegen in Alkohol (aber vgl. Strasburger-Koernicke, S. 611) sehr gutes Material zum Beobachten der Embryosäcke und ihrer Kerne in den sehr durchsichtigen Samenanlagen, zu denen die Pollenschläuche hinwachsen; vgl. Kny, Wandtafel 10, 19, 20.

Man kann bei der großen Durchsichtigkeit der Samenanlagen die Befruchtung des Eies und in günstigen Fällen auch die zweite Befruchtung, welche den Ausgangspunkt für die Bildung des Nährgewebes (Endosperms) darstellt, beobachten (Doppelbefruchtung).

Weitere geeignete Objekte sind Orchideen, Narzissen und vor allem der Rachenblütler *Torenia asiatica*, bei dem das Vordringen der Pollenschläuche zur weiblichen Anlage besonders leicht zu beobachten ist. Auf nähere Einzelheiten soll hier nicht eingegangen werden.

Honigbienen sind als fleißige Pollenüberträger an schönen Tagen für die Befruchtung wichtig. Eine Biene besucht in der Minute etwa 10 Blüten und bestäubt, bei fast 7 Arbeitsstunden im Freien, gegen 4000 Blüten an einem Tage. Mindestens zwei Drittel bis drei Fünftel der jährlichen deutschen Obsternte verdanken wir den Bienen.

Bei der Omnipotenz der Zellen und der weiten Verbreitung der ungeschlechtlichen Fortpflanzung im Pflanzenreich ist es nicht zu verwundern, daß gelegentlich Eier auch ohne Befruchtung [Parthenogenese¹), Jungfernzeugung] bei Pflanzen zur Entwicklung kommen. Nach diesem Gesichtspunkt wären auch die „Nucellarembryonen“ zu beurteilen. Jungfernfrüchte (Parthenocarpie) ent-

1) parthenos = Jungfrau, genesis = Erzeugung.

stehen dann, wenn trotz ausbleibender Samenbildung das Fleisch der Samen und Früchte sich ausbildet. Beispiele hierfür sind: Korinthen-Rosinen (*Vitis vinifera* var. *apyrena*), manche Birnen, z. T. Gurken, Bananen u. a. m. (Handwörterbuch d. Naturw., Bd. 4, S. 262), So-rauer (1).

Aufspaltungsgesetze (Mendeln). Diese Gesetze sind von größter Wichtigkeit, da sie 1. ein genaues Studium der Kern-Gene gestatten und 2. die experimentelle Herauszüchtung „reiner Linien“ (s. unten) ermöglichen.

Die Spaltungsgesetze wurden 1865 durch den Benediktinerabt Gregor Mendel in Brünn (daher der Ausdruck Mendeln) zuerst gefunden, dann längere Zeit nicht beachtet und erst gegen 1900 von Correns, Tschermak und de Vries neu entdeckt. Bei den Kreuzungsversuchen geht man von Eltern aus, die sich durch bestimmte Merkmale etwas voneinander unterscheiden (nahestehende Formen) und beobachtet dann die folgenden Generationen unter strenger Anwendung von Selbstbestäubung. Solche Inzucht führt, wenigstens nach den bisherigen etwa 20jährigen Erfahrungen bei planmäßigen Untersuchungen an Pflanzen nicht zur Entartung (Degeneration).

Im Pflanzenreich gibt es auch in der freien Natur viele Selbstbestäuber.

Bekannte, in den Lehrbüchern anschaulich behandelte Beispiele sind: Erbse (*Pisum*) mit gelben bzw. grünen Samen, Löwenmaul (*Antirrhinum*) mit weißen und roten Blüten, Wunderblume (*Mirabilis*) mit weißen und rosafarbenen Blüten und Nessel (*Urtica*) mit scharf gesägten und schwach gezackten Blättern. Es tritt bei einem bestimmten Teil der Versuchspflanzen ein gesetzmäßiges Aufspalten der Vererbungsmassen in den Kernen auf (daher die Möglichkeit des Studiums der Gene) und als Folge davon eine Kernreinheit unter den Nachkommen, die ihrerseits wieder in großer Formbeständigkeit ihren Ausdruck findet.

Die Versuche fangen mit heterozygotischem¹⁾ Material an und enden mit homozygotischem¹⁾, wenn die nebenbei wieder entstehenden heterozygotischen Exemplare ausgemerzt werden. Diese nur durch sorgfältige Züchtungsversuche zu erzielenden homozygotischen Pflanzen geben die berühmten reinen Linien.

Die Ursachen der Aufspaltung liegen im Kern; das von der Natur damit verfolgte Ziel ist zurzeit unbekannt.

Reine Linien, Elementararten. Die reinen Linien erhält man, wie vorstehend geschildert wurde, bei den Aufspaltungsversuchen (Mendeln). Nicht die Linnéschen Spezies, sondern diese reinen Linien sind die letzten systematischen Einheiten. Rei-

1) heteros = anders, homos = gleich, zygon = Geschlechtszelle.

ner als in den reinen Linien kann der Genotypus nicht zum Ausdruck kommen. Beim Fortzüchten der reinen Linien kommen, wie bei der ungeschlechtlichen Fortpflanzung, keine neuen Merkmale hinzu, es sei denn durch Mutation (s. dort).

Die Elementararten, von denen z. B. beim Hungerblümchen (*Eróphila verna*) gegen 200 vorkommen, sind z. T. noch mehr aufspaltbar, während ein anderer Teil rein sein wird. Der Begriff der Elementararten ist, weil darunter auch unreine Formen verstanden werden, noch viel zu grob; die Spezies *Eróphila verna* wird sich also in über 200 reine Linien aufteilen lassen.

Die Herauszüchtung reiner Linien hat für die Landwirtschaft und Gärtnerei naturgemäß ein großes praktisches Interesse.

Mischlinge (Bastarde, Hybride) im gewöhnlichen Sinne des Wortes (also mit besonders ausgeprägten Kennzeichen) können mit mehr als einem Merkmalspaar mendeln, wodurch das Studium wesentlich erschwert wird.

Sogenannte Pfropfbastarde (Chimären)¹⁾ sind (nach E. Baur u. H. Winkler) nur Verwachsungs-, nicht Verschmelzungsgebilde. Sie entstehen selten, nämlich beim Pfropfen (Kopulieren) von zwei verschiedenen Pflanzen an den Wundstellen. Hier können Vegetations Scheitel aus verwachsenen Bestandteilen zweier Organismen entstehen. Der eine Organismus kann den anderen wie ein Mantel den Kern als Haut überziehen (Periklinalchimäre, *Cytisus adami*) oder Längsstreifen an ihm bilden (Sektorialchimäre, Tomate $\times$ Nachtschatten).

Entstehung neuer Formen. Bei der Bildung von Bastarden werden bestimmte Anlagen verschiedener Arten in den Nachkommen verteilt. Vorübergehend entsteht durch die Kreuzung ein neuer Typus, aber keine neue Art, ein neues Mosaik, aber kein absolut neues Gen.

Die Erfahrung lehrt nun aber, daß tatsächlich neue Anlagen entstehen und damit neue Arten. Über die Vorstellung betreffs der Art und Weise ihres Zustandekommens stehen sich zwei Richtungen gegenüber, welche den artbildenden Faktor sehen 1) in der Mutation²⁾ (betont durch de Vries; auch die Darwinsche Lehre steht auf dem Boden der Mutation), 2) in der direkten Bewirkung (betont durch Naegeli; auch die Lehre von Lamarck steht bis zu einem gewissen Grade auf diesem Boden).

Durch Mutation entstehen sprunghaft plötzlich neue Gene und damit richtungslose, erbliche Veränderungen; für die Anhänger dieser Richtung ist die Mutation die Allmacht der Neubildung.

1) Chimaera == sagenhaftes Ungeheuer mit Löwenkopf, Ziegenleib und Schlangenschwanz.

2) mutatio = Veränderung.

Durch direkte Bewirkung unter dem Einfluß der Außenbedingungen bilden sich nach den Anhängern der zweiten Richtung Umprägungen des Genotypus, wodurch bestimmte Anpassungen fixiert werden, gleichgültig, ob sie zweckmäßig sind oder nicht.

Für den reinen Selektions-Standpunkt ist es unwesentlich, welche dieser beiden Ansichten zutrifft. Die Selektion (= Auswahl und Erhaltung) bringt in jedem Falle in das neu Entstandene die Richtung hinein.

Die Veränderung der Arten erfolgt ungleich schnell und ausgiebig. Schon innerhalb historischer Zeit scheinen gewisse Wandlungen im Aussehen der Pflanzen stattgefunden zu haben, z. B. bei den Getreiden, da die ägyptischen Mumienformen gegen die heutigen Getreide kleine Abweichungen zeigen.

Wegen Literatur über die IX. Gruppe sei auf E. Baur (1) u. Handwörterbuch (1) verwiesen, wo sich auch Angaben über weitere Arbeiten finden.

Teil B.

Kryptogamen.

Vorbemerkungen.

Die physiologischen und ökologischen Versuche und Beobachtungen bei den Kryptogamen sind absichtlich unter Zugrundelegung einer systematischen Disposition behandelt worden. Eine solche bietet den Vorteil, daß an jeder Stelle die Stoffanordnung leicht überblickt werden kann und daß verwandte Typen in größerer Zahl nebeneinander verglichen werden können.

Eine gewisse Kenntnis der Physiologie der Kryptogamen bietet ein wertvolles Rüstzeug auch für das Studium der höheren Pflanzen und vor allem auch für das Verständnis des Kreislaufes der Stoffe in der freien Natur.

Über Lupen und Mikroskope.

Den Besprechungen über die Physiologie der Kryptogamen seien einige Erörterungen über Lupen, Mikroskope und Nebenapparate vorausgeschickt.

1. Lupen haben vor Mikroskopen den Vorzug eines unvergleichlich größeren Gesichtsfeldes und einer bemerkenswerten Tiefenwirkung, während Mikroskope hauptsächlich nur in einer bestimmten Horizontalebene abbilden.

Lupen vom Aplanattypus nach Steinheil wendet man in der Regel für schwächere, solche vom Anastigmattypus mehr für stärkere Vergrößerungen an¹⁾. Die anastigmatische Planktonlupe von C. Zeiß vergrößert 40mal linear. (Taf. X.)

2. Sehr starke Lupen, die auf Exkursionen schon ein schwach vergrößerndes Mi-

Abb. 56. Planktonkammer mit Lupe auf Gestell. Rechts Schattenwerfer, unten Halter, das Ganze kann leicht zusammengeklappt und in ein Etui gelegt werden. Originalkonstruktion in fast nat. Gr.

1) Nach meinen Erfahrungen ist für kleine Objekte eine 10—15fache Vergrößerung ein besonders gangbares Mittelmaß, dann folgt ca. 25- und endlich ca. 40fache Vergrößerung. Auf Ausflügen führe ich stets drei solcher Lupen mit.

Alle größeren Mikroskopfirmen fertigen Aplanatlupen in ausgezeichneter Qualität als Exkursionslupen bis zu beträchtlichen Vergrößerungen.

Mikroskop teilweise ersetzen können, machen es erwünscht, die sie haltende Hand aufzulegen oder an eine (eventuell mit Wasser zu füllende) kleine Beobachtungsglaskammer mit planparallel geschliffener Grund- und Deckscheibe (Planktonkammer¹⁾) anzulegen oder beide, Lupe und Kammer, auf einem Gestell zu befestigen (vgl. Abb. 56). S. auch Taf. I u. X.

3. Bei Benutzung stark vergrößernder Lupen hat man im allgemeinen nicht das richtige Empfinden von ihrer Leistungsfähigkeit. Es erklärt sich das aus psychologischen Gründen. Die durch Annäherung des Auges an das Objekt bewirkte Vergrößerung wird nicht genügend nachhaltig wahrgenommen, weil der Vergleich fehlt.

4. Mikroskope erzeugen durch ihre Objektive im Gegensatz zu Lupen reelle, linsenverkehrte Bilder. Die Abb. 57 stellt links ein kleines, mit dem Rücken der Schreibfeder auf einen trockenen Objektträger gezeichnetes F dar. Das Bild dieses Gegenstandes,

Abb. 57. Darstellung der vergrößernden (rd. 10mal) und bildumkehrenden Wirkung des Objektivs. (Orig.)

welches in 9-facher Vergrößerung abgebildet ist, wird bei guter Beleuchtung im Mikroskop sichtbar, wenn man das Okular herausnimmt, Ölpapier auf den Rand des Tubus auflegt, die Einstellung etwas regelt, das Auge in etwa 25 cm Entfernung vom Ölpapier bringt und zur Abhaltung auffallender Strahlen die Hand vor das Papier hält. Man kann dann auf dem Pauspapier bequem zeichnen, wenn man einen Objektträger als Stütze unter dieses legt.

Das Mikroskop wirkt also wie ein Skioptikon. Das Okular kann man zum Auge rechnen, da es als Lupe für die Betrachtung des Bildes dient. Auf Reisen ist die Mitnahme eines Exkursionsmikroskops und -besteckes in einer Form, die kein besonderes Gepäckstück bedingt (Abb. 58 u. 59), sehr zu empfehlen, da sich allenthalben Gelegenheit zu seiner Benutzung bietet. Das Instrument wiegt etwa 600 g und löst *Pleurosigma* (Abb. 60) auf.

5. Zur ungefähren Orientierung über den notwendigerweise geringen Durchmesser des Gesichtsfeldes bei schwachen mikroskopischen Vergrößerungen kann geeignetes mm-Papier verwendet werden, falls man kein Objektmikrometer zur Hand hat. Bei rd. 100-facher Vergrößerung pflegt das Gesichtsfeld nur etwa den Durchmesser eines mittleren Stecknadelkopfes oder von vier dicht zusammenliegenden Feingrießkörnern aufzunehmen. Durch Anwendung schwacher Objektive und sehr starker Okulare (z. B. Kom-

1) Solche Planktonkammern liefern bzw. beschaffen alle großen Mikroskopfirmen oder Werkstätten für Chemie und Bakteriologie.

pensation Nr. 12), kann man für bestimmte Fälle bei ziemlich starker Vergrößerung ein verhältnismäßig großes Gesichtsfeld erhalten. Da auch der Arbeitsabstand bedeutend ist, braucht man, was oft erwünscht sein kann, kein Deckgläschen auf das Präparat zu legen.

Abb. 58.

Abb. 59.

Abb. 60.

Abb. 58. Reise(Exkursions-)mikroskop. Das Instrument besteht aus Aluminium-Nickellegierung (Fuß, Säule, Tisch). Die Optik ist die normale. Vergr. 100 u. 400. Rd. $\frac{1}{3}$ nat. Gr.

Abb. 59. Kleines Besteck zum Reisemikroskop. Mit Objektträgern, Deckgläschen, Pinzette und Pipette. Rd. $\frac{1}{3}$ lin. nat. Gr. Orig.

Abb. 60. *Pleurosigma angulatum*, Ausschnitt aus der Schale (links ein Stück der Raphe). Bei Ölimmersion aufgenommen. (Nach Rich. Volk.)

6. Das Zeichnen der vergrößerten Objekte, so weit es nicht freihändig vorgenommen wird, geschieht zweckmäßig mittels Spiegelzeichenapparates nach Abbe oder unter Verwendung des mit elektrischem Licht beleuchteten Zeichenprojektionsapparates nach Edinger, der nach Art eines Skioptikons wirkt. Vgl. außerdem Strasburger-Koernicke (1).

Durch Bilder, welche mittels Zeichenapparate gewonnen sind, kann auch leicht die Vergrößerung bestimmt werden. Die direkte Größenbestimmung der Objekte muß durch Meßokulare geschehen. Die Leistungsfähigkeit der Mikroskope kann bei starken Vergrößerungen leicht nach der Auflösung des Testobjektes *Pleuro-*

sigma angulatum (Abb. 60) und noch feiner strukturierter Kieselalgen, wie sie auf J. D. Möllers Diatomeen-Typenplatte enthalten sind, beurteilt werden; je nach der Leistung der Objektive erkennt man Streifen, Punktreihen, Felder oder Sieblöcher auf den Schalen von *Pleurosigma*. Die genaue Form der Sieblöcher ist in der Regel erst bei Anwendung von Ölimmer-sionssystemen, deren Frontlinse nach innen zu halbkugelig ist, sichtbar zu machen. Vgl. auch Testplatte nach Abbe.

7. Farbenerscheinungen an tatsächlich farblosen Objekten vermeidet man am besten durch Anwendung von Apochromatobjektiven in Verbindung mit Kompensationsokularen.
8. Strukturierte mikroskopische Objekte wirken als Beugungsgitter, ähnlich wie ein Planktonsieb (Phosphorbronze Nr. 260) eine brennende Kerze zerlegt. Zur Aufnahme der Beugungsbilder

Abb. 61. Vereinigung der Lichtstrahlen durch einen Abbeschen Kondensor. Die Strahlen gehen durch den Objekttträger (schraffiert) und vereinigen sich an der Stelle, wo sich das Objekt befindet. Vergr. ca. 8fach. Näheres siehe bei W. Scheffer (1), Schmehlick (1).

sind ein großer Öffnungswinkel des Objektives oder schiefe Beleuchtung nötig. Die Abb. 61 zeigt den Strahlengang nach Durchgang durch einen Abbeschen Kondensor, aufgenommen beim Passieren der Lichtstrahlen durch Uranglas. Dieser

Strahlenkegel ist in voller Intensität, bei teilweiser Abblendung und in Schiefstellung ein wichtiges Hilfsmittel in den Händen des Mikroskopikers.

9. Die modernen Dunkelfeldbeleuchtungen unter Verwendung von Mikro-Nernstlampen oder ähnlichen starken Lichtquellen (kleinen Bogenlampen) lassen die mikroskopischen Objekte auf dunklem Grunde auch bei starken Vergrößerungen hell erscheinen. Die Dunkelfeldbeleuchtung mit ihren seitlich und von oben her auffallenden Lichtstrahlen entspricht den natürlichen Verhältnissen mehr als die Beleuchtung der Objekte im durchfallenden Licht. Auch das polarisierte Licht kann bei Verwendung eines drehbaren Objektisches sehr charakteristische Bilder mit vielen Feinheiten liefern; vgl. auch S. 83.
10. Die äußerste Grenze, bis zu welcher kleine Objekte in ihren natürlichen Umrissen noch erkannt werden können, beträgt bei Anwendung von ultravioletten Strahlen und Mikrophotographie etwa $0,11-0,15 \mu$. (Größe Kolloidpartikel.)

11. Zum Beobachten kleinster Suspensionen, besonders in Flüssigkeiten, dient das mit sehr starken Lichtquellen arbeitende Ultramikroskop von Siedentopf und Zsigmondy. (Kleinste Kolloidpartikel rd. $1\ \mu\mu$.) ($1\ \mu\mu = \frac{1}{1000}\ \mu$).
12. Zum Studium der Mikroskope und ihrer Nebenapparate ist die Durchsicht der Firmenkataloge sehr geeignet. Näheres siehe bei W. Scheffer (1), R. Schmehlick (1), Strasb.-Koern. (1).

I. Gruppe. Myxomycetes (Mycetozoa, Phytosarcodina) (Schleimpilze).

Fuligo varians = **Aethalium septicum** (Name von fuligo = Ruß und aithale = Ruß) Lohpilz, Lohblüte. Der Schleimpilz der Lohblüte ist durch sein auffälliges, gelbes, bei kompakter Gestalt rührerähnliches Plasmodium allgemein bekannt. Er findet sich sehr verbreitet in Wäldern und auf Gerberlohe, in der man den Pilz im Laboratorium längere Zeit in Rohkultur züchten kann, auf Moos am Boden, auf Baumstümpfen usw., entsprechend seinem Feuchtigkeitsbedürfnis meist im Innern des Substrates. *Fuligo* bildet, wenn man sie sich auf dem Objektträger ausbreiten läßt, ein vorzügliches Objekt zum Studium der Bewegungen nackter Plasmamassen, zumal hier die Bewegung eine ziemlich rasche ist (vgl. Abb. 62).

Abb. 62. *Fuligo varians*. Lohpilz. Rand eines Plasmodiums, an dem die Bewegung nackter Plasmamassen gut studiert werden kann. Vergr. schwach. (Nach L. Kny.)

Nach kolloidchemischen Begriffen wird man derartiges, leicht bewegliches Plasma am richtigsten als Sol, bei etwas festerer Konsistenz wohl auch als Spumoid [Rhumbler (1)], schwerlich aber als Gel bezeichnen.

Die Reaktion des lebenden Plasmodiums ist alkalisch.

Legt man Stücke des Schleimpilzes auf die Mitte einer Glasscheibe unter eine feuchte Glocke, so breitet er sich nach allen Seiten flach aus

und liefert so bis tellergroße Präparate¹⁾. Die Plasmodien besitzen in hohem Maße die Fähigkeit, umherzukriechen. Manche tropische Formen steigen sogar bis in die Kronen der Bäume empor.

Junges Plasmodium ist (vgl. S. 93)

1. negativ phototaktisch,
2. bei einer Temperatur bis etwa 35° C positiv thermotaktisch,
3. für Loheextrakt positiv chemotaktisch,
4. für Kochsalz negativ chemotaktisch,
5. für mäßige Wasserströmung positiv rheotaktisch,
6. positiv hydrotaktisch (vgl. S. 81). Mit beginnender Sporenbildung pflegt Umstimmung in negative Hydrotaxis einzutreten.

Die Sporen eignen sich zu Keimungsversuchen, doch versagen meist mehr als die Hälfte. Vgl. Kienitz-Gerloff (1). Näheres über die Weiterentwicklung der Keimprodukte bei Myxomyceten siehe unter *Reticularia* und bei Strasburger-Koernicke (1), z. B. S. 533.

Weiteres über experimental-physiologische Untersuchungen an Myxomycetes-Plasmodien siehe bei E. Küster (1) und L. Kny (1), Nr. 115.

Reticularia lycoperdon. Bovist-Schleimpilz. Die Sporangien dieses Schleimpilzes haben, wie schon der Name sagt, bovistartiges Aussehen (Durchmesser etwa 3—5 cm) und finden sich in Wäldern an den unteren Partien der Bäume auf der Rinde, auf Baumstümpfen, auf altem Holz usw., besonders in den Monaten April und Mai. Die Sporangien sind im Innern dicht erfüllt von Kapillitium und den umbrabraunen Sporen, welche nach den Darstellungen von E. Jahn (1) besonders leicht keimen.

Frisch gesammelte, trockene Sporen²⁾ können in destilliertem oder Leitungswasser schon nach 15 Minuten bei Zimmertemperatur im Licht oder im Dunkeln keimen, doch darf man nicht immer mit so schneller Keimung rechnen. Bringt man frisch gesammeltes Material aus dem Walde mit, so kann solches ohne weiteres verwendet werden. Die Sporen werden (in nicht zu geringer Menge) mit gewöhnlichem Wasser auf dem Objektträger verrührt, damit sie gut benetzt werden und dann mit einem Deckgläschen bedeckt. Man beobachtet nun bei mindestens 300—400facher Vergrößerung und bemerkt bald, daß die Sporen, soweit sie durch Schrumpfen etwas zusammengefallen waren, sich in kurzer Zeit durch Wasseraufnahme abrunden. Erfolgt die Keimung nicht sehr bald, so setzt man an der Seite des Deckgläschens von Zeit zu Zeit etwas Wasser zu, falls man das Präparat nicht in eine feuchte Kammer legen will. Mehr als 2 Stunden wird man auf die Keimung wohl nie zu warten brauchen (Abb. 63, *Didymium*).

1) Diese Präparate können durch Antrocknen konserviert und mit einer schützenden Deckscheibe versehen in einem Rahmen aufgestellt werden.

2) Am besten keimen diejenigen Sporen, welche bei heißem Sonnenschein zu trockenem Pulver ausgereift sind.

Zu Beginn der Keimung tritt durch einen Riß der Membran ein hyalines Plasmaknöpfchen hervor, und im Verlauf von etwa 5 Minuten drängt sich aus der runden braunen Spore ein farbloses, längliches, nacktes Plasmagebilde hervor, welches sich zunächst zitternd umherbewegt. Die vollkommen entleerten Sporen erscheinen dann ein wenig durchsichtiger als die noch ungekeimten. Will man die Skulptur (auf der einen Hälfte) der Membranen studieren, muß man Ölimmersion bei der mikroskopischen Beobachtung verwenden.

Die mehr am Rande des Deckgläschens liegenden Sporen keimen am reichlichsten.

Eine sehr einfache makroskopische Versuchsanstellung besteht darin, daß man auf den Boden eines Wasserglases eine nur etwa 1 mm hohe Schicht von gewöhnlichem Was-

Abb. 63. *Didymium difforme*. *a* eine trockene, zusammengefaltete Spore, *b* eine geschwollene Spore, *c* und *d* Austritt des Inhalts aus der Spore, *e*, *f* und *g* Schwärm-sporen, *h* Übergang des Schwärmers zur Myxamöbe, *i* jüngere, *k* ältere Myxamöben, *l* aneinanderliegende Myxamöben kurz vor der Verschmelzung zweier, *m* ein kleines Plasmodium, *n* Teil eines ausgewachsenen Plasmodiums, *a*—*m* 540 mal, *n* 90 mal vergrößert.

(Nach Strasburger.)

ser bringt und auf dieses die Sporen wie Zimmt aufstreut. Nach spätestens 2 Stunden ist sehr reichliches Keimen zu beobachten.

Das entstandene Keimprodukt ist nicht wie bei vielen anderen Pilzen ein Faden, sondern (wie bei *Fuligo*) ein bewegliches, ziemlich stark lichtbrechendes Gebilde, an dem man bald eine Geißel und am hinteren Ende eine pulsierende Vakuole erkennt; vgl. Abb. 63 betreffend *Didymium*, das sich ähnlich verhält. Im Plasma findet sich häufig Glykogen in Form von Kügelchen.

In einer Rohrzuckerlösung von ca. 4% (= 2,5—3,0 Atm. osmotischem Druck) ist keine Keimung mehr möglich, leicht aber nach Überführen dieses Materials in Leitungswasser.

Die trockenen Sporen kann man in Papier oder in einem mit Watte verschlossenen Gläschen aufbewahren. Haben sie 6—8 Monate lang trocken gelegen, so können sie bei etwa 21° C in destilliertem Wasser in ungefähr 30 Minuten keimen, werden sie aber in solchem Wasser 5 Minuten lang in einen Thermostaten von 37° C gelegt, so keimen sie schon in etwa 11 Minuten aus. Die Sporen bleiben gegen 4 Jahre lang keimfähig (Abb. 63).

Nach einiger Zeit nehmen die *Myxomonaden* die Gestalt von Amöben an (*Myxamöben*). Zwei solcher Amöben verschmelzen (Geschlechtsakt nach Jahn) und bilden bei ihrer Weiterentwicklung ein Plasmodium (Abb. 63).

Amaurochacte atra. Dieser Schleimpilz, welcher sich auf Holz und Rinde der Kiefer findet, besitzt ebenfalls leicht keimende Sporen.

Stemonitis splendens, confluens u. a. m. erzeugen Schwärmer, die sich einige Stunden nach dem Ausschlüpfen teilen.

Lycogala epidendron. Die großen Fruchtkörper bilden sich, in kleinen Herden zusammenstehend, auf altem Holz, besonders Baumstümpfen. Sie enthalten Sporen, welche zu Keimungsversuchen nicht geeignet sind.

Badhamia utricularis. Dieser Schleimpilz besitzt ein chromgelbes Plasmodium, welches im Herbst auf sich zersetzenden Pilzen (besonders *Stereum hirsutum* und *Polyporus versicolor*) lebt; es hat die Fähigkeit einzutrocknen (z. B. auf Fließpapier) und nach dem Anfeuchten wieder aufzuleben. Schon nach rd. 20 Stunden kann man dann bei Versuchen das Plasmodium in einem Glase umherkriechen sehen (in 1 Stunde mehrere Millimeter weit). Bei Ernährung mit Pilzabkochung kann es lange in Entwicklung gehalten werden.

Wegen Abbildungen von Schleimpilzen vgl. Lister (1) und A. Kerner, Bd. 1, S. 102; wegen Nahrungsaufnahme Pfeffer (3).

* * *

Wegen der Ähnlichkeit gewisser Entwicklungszustände der *Myxomycetes* mit Amöben (und Rhizopoden überhaupt), sei hier kurz darauf hingewiesen, wie und wo man diese letztgenannten finden kann.

Fundorte von Amöben und anderen Rhizopoden.

1. In normalem Schlamm (bisweilen vermischt mit Heliozoen); auch im organischen Filz biologischer Körper (siehe die später folgenden Abbildungen und zugehörigen Erläuterungen).
2. In Flüssen, deren Schlamm durch starke Strömung aufgerührt ist (z. B. in der strömenden Elbe).
3. Zwischen sowie auf Schilf und anderen Sumpf- und Wasserpflanzen an flachen, schlammigen Ufern. Beim Fischen mit dem Planktonnetz unter Berühren der Pflanzenstengel und -blätter erhält man in der

Regel *Diffugia* u. dgl., auch Heliozoa (vgl. die Abbildungen tierischer Wasserorganismen).

4. In Uferbesatz (organischem Filz) in der Emersionszone von Gewässern verschiedener Art, besonders an Bohlenwerken u. dgl.
5. An Deckgläschen, welche man an der Oberfläche geeigneter Aquarien schwimmen läßt. Das Einfetten des Gläschenrandes ist in der Regel unnötig. Auch am Grunde der Aquarien und an den Glasscheiben (Objektträger einhängen!), besonders ganz nahe der Wasseroberfläche.
6. In Erde, auf Stroh usw., in der Regel als Cysten.
7. Nach Kienitz-Gerloff (1) erhält man Amöben leicht, wenn man Wasserpflanzen von normalen Standorten in eine Schale mit Wasser bringt, an deren Boden Objektträger liegen. Auf diesen finden sich die Amöben nach einiger Zeit.

Näheres über die Kultur der Amöben siehe bei Kisskalt u. Hartmann (1). Abbildungen von Rhizopoda s. Tafel: Tiere des Wassers.

II. Gruppe. Schizomycetes, Bacteria (Spaltpilze).

Art der Beobachtung. Mit bloßem Auge im Freien sichtbar z. B.:

1. Rote Überzüge von Schwefelbakterien (z. B. *Chromatium*, *Lamprocystis*, *Thiopolyoccus*), auf zersetzlichem, schwefelwasserstoffhaltigem Schlamm, verrotteten Blättern und morschem Holz unter Wasser oder auf Fladen an der Oberfläche.
2. Schleierartige, weiße Schlammüberzüge und zarte Uferbesätze von Schwefelbakterien (*Beggiatoa*, *Thiothrix*) in nach Schwefelwasserstoff riechendem Wasser.
3. Fellartige Besätze von Abwasserbakterien (*Sphaerotilus*).
4. Ablagerungen von Eisen- und Manganbakterien in Wiesengräben und Brunnen (*Chlamydothrix*, *Gallionella*, *Crenothrix*, *Clonothrix*).
5. *Zoogloea*¹⁾-Klumpen, d. h. Massenanhäufungen von Bakterien zu Schleimklumpen oder -häuten. — Die Abb. 64 zeigt den *Zoogloea*-Test²⁾, d. h. die Bildung einer mehr oder weniger schleimigen Schwimmschicht, wie sie auch im Freien öfter beobachtet wird.

Bei etwa 300facher Vergrößerung gut sichtbar, z. B.:

1) Wörtlich: Lebender Schleim.

2) Dieser Test ist dadurch wichtig, daß er in einem halbgereinigten nicht mehr fäulnisfähigen Abwasser das Vorhandensein unvollkommen zersetzter Nährstoffe andeutet. Durch Rieselböden oder Oxydations- (biologische) Körper gut gereinigte Abwässer sollen eine solche Schicht nicht bilden.

Abb. 64. *Zoogloea*-Test. Schwimmschicht auf unvollkommen gereinigtem, gestandenen Abwasser; ca. $\frac{1}{2}$ nat. Gr. (Orig.)

1. Essigsäure- und Milchsäurebakterien (*Bacterium*) aus Weißbiersatz,
2. Schraubenbakterien (*Spirillum*) aus fauligem Wasser,
3. Tafelkokken (*Lampyrodia*) und Paketkokken (*Sarcina*) aus Schlamm usw.

Bei etwa 1000facher Vergrößerung gut sichtbar:

Fast alle Bakterien. Geißeln müssen fast immer gefärbt oder bei guter Dunkelfeldbeleuchtung betrachtet werden.

Man pflegt die meisten Präparate erst bei mittlerer Vergrößerung einzustellen, um die besten Stellen herauszufinden.

Ultramikrobien, d. h. Lebewesen von solcher Kleinheit, daß sie mit unseren stärkst vergrößernden Mikroskopen nicht mehr sichtbar gemacht werden können, sind mit absoluter Sicherheit bisher noch nicht nachgewiesen worden.

Dagegen ist es möglich, mit dem Ultramikroskop von Siedentopf und Zsigmondy unbelebte Teilchen, z. B. kleinste Goldteilchen, von einer Größenordnung nachzuweisen — wenn auch nicht der Form nach zu erkennen —, wie wir sie nach der kinetischen Gastheorie großen Molekülen zuschreiben müssen (gegen 1 $\mu\mu$).

Bei Dunkelfeldbeleuchtung, z. B. mittels Paraboloidkondensors, kann man sehr instruktive Bilder von Bakterien erhalten. Die Zellen erscheinen hell auf schwarzem Grunde, und bei beweglichen Formen sind die Geißeln mit aller Schärfe, ebenfalls hell, zu erkennen. Diese weitgehende Definition (optische Auflösung) mikroskopischer Objekte überrascht um so mehr, als sonst die Geißeln nur in seltenen Fällen an getrockneten Exemplaren direkt, sonst nur durch sorgfältige Färbung nach voraufgegangener Beizung wahrzunehmen sind.

Zur Beleuchtung dienen bei solchen Beobachtungen, wie bereits bemerkt, Nernst- oder Mikrobogenlampen.

Sollen viele Personen hintereinander das mikroskopische Bild beobachten, empfiehlt sich das Umstellen einer gläsernen Schutzhülle um das Mikroskop, dessen Mikrometerschraube dann (durch Übertragung) von außen hin und her bewegt wird. (Firma Rockhausen, Waldheim i. Sa.)

Schnelle und einfache Beschaffung von Bakterienrohmaterial.

1. Aus Weißbiersatz.
2. Aus Kanal-, Stalljauche usw.
3. Aus Sumpfwasser usw., nach Einwerfen von Erbsen, Brotkrümeln, Semmelstückchen, toten Pflanzenteilen, toten Flußschwämmen usw., ferner aus dem Wasser der Blumenvasen, das auch viele Infusorien enthalten kann. Schwimmschicht mit dem Deckgläschen abschöpfen!
4. Durch Faulen einer Bohne (mit Schale) im Reagensglas mit Wasser, das eine Spur Schlamm enthält. (Vgl. *Bacterium fluorescens*).
5. Durch Abdrücken einer durchschnittenen Kartoffel oder von Mohrrübenscheiben auf den Fußboden oder durch Bestreichen der Kartoffel mit Brot, das mit schlammigem Sumpfwasser durchtränkt ist

(nachheriges Feuchthalten zwecks Kultur unter einer Glocke); es stellen sich auch Schimmelpilze ein.

6. Durch Stehenlassen toter Daphnien in Wasser usw.

Sterilisation. Die Sterilisation bezweckt allgemeine Abtötung oder Zurückhaltung von Keimen, die Desinfektion speziell die Vernichtung pathogener Bakterien. Sterilisieren kann man durch:

1. Kochen (Pasteurisieren geschieht bei 55—60° C); s. Abb. 65.
2. geeignetes Filtrieren; s. Abb. 66. Neuerdings sind „Membranfilter“ mit abgestuften Porenweiten von der Firma de Haën in den Handel gebracht.
3. Alkohol, der in einer Konzentration von 70 % am besten wirkt.
4. starkes Trocknen und Belichten.
5. Ozon.
6. Formalin usw.

Abtötung von Sporen erfordert meist ganz besonders energisches oder wiederholtes Sterilisieren.

Abb. 65.

Abb. 65. Historisch berühmte Sterilisationsversuche. Die mit Wasser und Erbsen gefüllten Kölbchen werden erhitzt. Sodann wird *a* (nach Spallanzani, 1785) der Hals zugeschmolzen, *b* (nach Schröter und Dusch, 1857) mit Watte verstopft, *c* (nach Pasteur, 1862) der in eine dünne Röhre ausgezogene Hals hakenförmig umgebogen. Es bilden sich weder Bakterien, noch tritt Fäulnis ein. (Nach Ferdinand Cohn.)

Abb. 66.

Abb. 66. Bakterienfilter, Tonfilter nach Pukall oder Kieselgurfilter nach Berkefeld zum keimfreien Filtrieren von Flüssigkeiten von außen nach innen. *a* keimfrei filtrierte Flüssigkeit; *b* Filter; *c* Verbindungsrohr; *d* Anschlußstück für die Vakuumpumpe; *e* bakterienhaltige Flüssigkeit.

Kulturmedien.

Nährbouillon.	Wasser	100 ccm
	Peptonum siccum (Witte)	1 g
	Liebig's Fleischextrakt	1 g
	Kochsalz	0,5 g
	Zur Erreichung schwacher Alkaleszenz	wenig Soda
		(Lackmuspapier!)

Wenn es nicht auf genaue Innehaltung der Vorschrift für diese Nährbouillon ankommt, kann Fleischextrakt durch die S. 4 erwähnte Tablette ersetzt und Kochsalz fortgelassen werden.

Die Flüssigkeit wird am besten im Dampftopf sterilisiert. Nähere Einzelheiten siehe bei Abel (1), Ohlmüller u. Spitta (1), Strasb.-K. (1).

Die meisten Bakterien bevorzugen im Gegensatz zu Schimmelpilzen alkalischen Nährboden.

Pepton kann in solchen Fällen, wo man Eiweiß synthetisieren lassen will, durch Asparagin, milchsaures Ammon u. a. m. ersetzt werden. [(Vgl. *Pseudomonas (Bacterium) fluorescens.*)]

Nährgelatine. Nährbouillon 100 ccm
 Gelatine 10 g
 Nährgelatine schmilzt bei etwa 28° C.

Nähragar. Nährbouillon 100 ccm
 Agar 1,5—2 g
 Nähragar schmilzt bei fast 100° C und erstarrt
 bei etwas über 40° C.

Agar (aus Florideen gewonnen) wird im Gegensatz zu Gelatine durch Bakterien nicht verflüssigt (mit Ausnahme von *Bacterium gelaticum* und wenigen anderen).

Über weitere Nährböden vergleiche man die einschlägigen Hand- und Lehrbücher. Es mag nur noch kurz erwähnt werden, daß ein gutes Substrat für Bakterienwachstum auch Bierwürzegelatine liefern kann, und zwar wegen der unvergleichlich gut ernährenden Malzpeptone.

Abb. 67. Bakterienkulturen in Reagensgläsern. a Gelatine-Stichkultur; b dgl., Gelatine bereits stark verflüssigt; c Agar-Stichkultur; d Agar-Stichkultur; e Kartoffelkultur. (Nach R. Kolkwitz.)

Reinkulturen in Röhrchen. Man unterscheidet (s. Abb. 67):

Agar-Strichkulturen	Gelatine-Stichkulturen,
Agar-Stichkulturen	Gelatine-Rollkulturen,
Kartoffelkulturen	Bouillon-Kulturen,
Gelatine-Strichkulturen	Lackmus-Molke-Kulturen usw.

Die Herstellung solcher Kulturen kann nur schwer beschrieben werden; sie wird am besten in Kursen erlernt. Betreffs Herrichtung der Kartoffelnährböden vergleiche man die nebenstehende Abbildung.

Für schwieriger zu kultivierende Bakterien gilt im allgemeinen der Grundsatz, daß man sie zunächst auf denjenigen Nährböden zu züchten versucht, auf denen sie in der Natur besonders gut wachsen.

Abb. 68. Herstellung von Kartoffelnährböden. Die Kartoffeln werden gebürstet, gewaschen, für Herstellung von halbierten Zylindern mittels abgeflammten Messers geschält und dann sterilisiert. (Nach L. Heim.)

Kultur durch Plattenguß. Die Gelatineplatten müssen in den Kulturschälchen [Petrischälchen, nach Petri, Bakteriologe am Reichsgesundheitsamt] gut erstarrt sein. Um die Verbreitung der Bakterien in der Natur zu erläutern, seien einige praktische Beispiele angeführt.

	beobachtet nach Tagen	Zahl der Keime (entsprechend den gewachsenen Kolonien)
Kopfhaar von etwa 2 cm Länge (s. Abb.) . . .	8	ca. 50
Zungenberührung	8	0—2
Hauch ¹⁾	8	0
Kupfermünze	8	0—2
Nickelmünze	8	einige
Leitungswasser ²⁾ , 1 ccm (bei Rollröhrchen 0,25 bis 0,5 ccm verwendet)	2 oder mehr	9 in 1 ccm (Berlin) (gezählt mit schwach vergrößernder Lupe)
Gestandenes Wasser aus Tischtrinkglas; 1 ccm (zum Plattenguß 0,1—0,2 ccm verwendet)	2 oder mehr	ca. 1800 in 1 ccm

1) Flüge hat nachgewiesen, daß bei Hustenstößen ein äußerst feiner Sprühregen entstehen kann, welcher als eine Art Nebel zum Teil stundenlang in der Luft schweben und dadurch etwaige Krankheitskeime verbreiten kann, ähnlich wie durch infektiösen Staub.

2) Vgl. Ohlmüller-Spitta (1), H. Klut (1).

	beobachtet nach Tagen	Zahl der Keime (ent- sprechend den ge- wachsenen Kolonien)
Luft (nach $\frac{1}{2}$ —1stündigem Offenstehen der Platte)	ca. 20	je nach der Staubmenge 4 bis einige hundert (Bakterien und Schim- melpilze) ¹⁾
Kontrollplatte	8	0

Vgl. hierzu die Abbildungen auf Taf. II.

Abb. 69.

Abb. 69. Bakterienkolonien an einem menschlichen Haar, auf Nährgelatine gezüchtet. Nat. Gr. (Orig.)

Abb. 70. Reinkultur in F-Form, hergestellt durch Ausstreichen nicht verflüssigender Bakterien (von einer der abgebildeten Petrischälchenkulturen auf einer Gelatineplatte) mittels Platinnadel. Nat. Gr. (Orig.)

Abb. 70.

Zu diesen Versuchen waren erforderlich:

- ca. 12 Petrischälchen (trocken sterilisiert in einer Kupferbüchse²⁾),
- ca. 12 Röhrchen mit 10 ccm Nährgelatine (für Rollkulturen 5 ccm),
- ca. 3 Pipetten à 1 ccm (keine Auslaufpipetten), trocken oder durch Auskochen sterilisiert,

2 sterile, leere Reagensröhrchen für Wasserentnahme³⁾.

Staub-Bakterien-Platten. Die vorstehend erwähnten, auf Taf. II abgebildeten Platten (am besten mit Agar hergestellt) sind ein vorzügliches Mittel, um Bakterien, Schimmelpilze und manchmal auch Hefen für die Beobachtung leicht einzufangen.

Material für Sammlungen. Um zu Demonstrationen Bakterienkulturen vorrätig zu haben, kann man solche in verhältnismäßig starkwandigen Gläsern von Reagensrohrform auf festem Nährboden züchten, durch Zusatz von einigen Tropfen Formalin konservieren und die Röhrchen zuschmelzen lassen. Die Röhrchen können dann in ähnlicher Weise

1) Unter den Fadenpilzen können *Penicillium* und *Cladosporium herbarum* häufig sein. Sie wachsen trotz der alkalischen Reaktion des Nährbodens.

2) Eisenbüchsen sind nicht zu empfehlen, da sie leicht rosten. Im Notfall sind die Büchsen auch entbehrlich. Statt normaler Petrischälchen können für qualitative Untersuchungen im Bedarfsfalle kleinere Doppelschälchen verwendet werden.

3) Für Probeentnahmen aus tieferen Schichten eines Gewässers kann man den im Abschnitt der Algen erwähnten Abschlagapparat benutzen.

Keime aus Wasser (Bakterien).

Keime aus Straßen- oder Zimmerluft (Bakterien und Schimmelpilze).

Zwei Petrischälchen mit Bakterienkolonien. Oben: Verflüssigende und nichtverflüssigende Kolonien aus 0,1 cem Wasser, welches eine Woche lang in einem Trinkglase gestanden hat. Unten: Bakterien und Schimmelpilzkolonien auf einer Gelatineschicht, welche $\frac{1}{2}$ Stunde lang der Luft ausgesetzt war. Nat. Gr. (Orig.)

in Etuis aufbewahrt werden, wie es für das Plankton empfohlen ist. Man kann auch gewöhnliche Kulturröhrchen in ein mit Stöpsel verschlossenes Glas setzen, welches am Boden etwas Formalin enthält.

Nichtverflüssigende Kolonien (z. B. von *Bacterium coli*) kann man auf Gelatine in Petrischälchen züchten, die Innenseite des Deckels zum Abtöten des Materials mit etwas Formalin bestreichen und den Spielraum zwischen Deckel und Boden mit Paraffin ausgießen¹⁾. Solche Präparate sind vorzüglich haltbar, lassen sich auch in flachen runden Büchsen, am besten aus Kupfer, sehr bequem in der Tasche transportieren.

Zum Färben von Bakterien streiche man die zu behandelnden Objekte in dünner Schicht auf reinem Objektträger oder Deckgläschen aus (mit Platindraht oder Deckgläschenkante) und lasse sie antrocknen. Hierzu und zu dem Folgenden vgl. Abel (1).

Hierauf wird mit frisch bereiteter Fuchsinflüssigkeit (destilliertes Wasser 50 ccm, konz. abs. alkoholische Fuchsinlösung 5 ccm) [oft genügt auch sehr einfach das Färben mittels Kopierstift nach Friedberger und Einar Naumann] unter gelindem, kurzem Erwärmen gefärbt, abgespült, getrocknet und in Kanadabalsam oder Zedernöl eingebettet²⁾. *Bacterium tuberculosis* (s. dort) muß ebenso wie Sporenmaterial seiner schweren Färbbarkeit wegen in wirksamerer Weise behandelt werden.

Das Färben der Bakterien zur bloßen Sichtbarmachung der äußeren Form hat oft nur dann Wert, wenn man Dauerpräparate anlegen will.

Man kann nach Burri auch in der Weise verfahren, daß man die Bakterien mit chinesischer Tusche (Pelikantusche) vermischt, auf dem Objektträger in dünner Schicht ausstreicht und dann antrocknen läßt. Die Bakterien erscheinen dann hell auf schwarzem Grunde. Vgl. Abel (1).

Zur Geißelfärbung bei Bakterien ist in der Regel vorheriges Beizen mit Tanninlösung u. a. m. erforderlich [vgl. Abel (1), C. Günther (1)].

An gutem, lebendem Material, das am besten nicht über 20 Stunden alt ist, kann man die Geißeln, wie bereits erwähnt, bei Dunkelfeldbeleuchtung sehen (Paraboloidkondensor).

Viel leichtere und einfache Geißel- und Wimperstudien lassen sich an lebenden Ciliaten und Flagellaten machen.

1) Schalen von hierfür besonders geeigneter Form sind im Handel zu haben.

2) Will man auf die Objektträger direkt schreiben, so tauche man die betreffenden Stellen zuvor in eine Lösung von etwas Zelloidin in Alkohol-Äthergemisch. — Neuerdings verwendet man auch flüssiges Paraffin statt Zedernöl zum Einbetten der Präparate.

System der Schizomycetes (Bacteria)¹⁾.

(Abbildungen siehe auf Tafel VII „Pflanzen des Wassers“ und im Text.)

1. Coccaceae, Kugelbakterien.

Streptococcus mesenterioides, *Lampropedia hyalina*,
Micrococcus phosphoreus, *Sarcina ventriculi*.

2. Bacteriaceae, Stäbchenbakterien.

A. Geißeln fehlend oder peritrich.

I. Ohne Sporen *Bacterium*

II. Mit Sporen *Bacillus*

B. Geißeln polar, einzeln oder in Büscheln; Zellen nicht schraubig.
. *Pseudomonas*.

<i>Bacterium aceti</i>	<i>Bacillus subtilis</i>
„ <i>lactis acidii</i>	„ <i>amylobacter</i>
„ <i>coli</i>	„ <i>calfactor</i>
„ <i>prodigiosum</i>	„ <i>cellulosae</i>
„ <i>vulgare</i>	<i>Pseudomonas fluorescens</i>
„ <i>denitrificans</i>	„ <i>violacea</i>
„ <i>nitrobacter</i>	„ <i>europaea</i>]
„ <i>radicicola</i>	
„ <i>tuberculosis</i>	

3. Spirillaceae, Schraubenbakterien.

Microspira desulfuricans
Spirillum undula.

4. Chlamydobacteriaceae, Scheidenbakterien.

Crenothrix polyspora
Sphaerotilus natans.

5. Beggiatoaceae, farblose Schwefelbakterien.

Beggiatoa alba.

6. Rhodobacteriaceae, Purpurbakterien (mit und ohne Schwefel).

Chromatium okenii
Rhodospirillum.

Besprechung von zahlreichen Beispielen siehe bei R. Kolkwitz (6),
Lehmann und Neumann (1) u. a. m.

Streptococcus mesenterioides. Froschlaichpilz. Bildet Kugelnketten mit dicken Gallerthüllen in Baumflüssen; kann Dextrangärung des Zuckerrübensaftes verursachen.

Micrococcus (Bacterium) phosphoreus. Leuchtbakterie. Zur Kultur lege man ein kleines Stück käuflichen, nicht faulen Seefischfleisches in eine Doppelschale und übergieße es so weit mit einer 3%igen Kochsalzlösung, daß der obere Teil des Fleisches noch aus der Flüssigkeit emporragt. Schon am nächsten Tage wird man im Dunkeln ein deutliches Leuchten des Fleisches wahrnehmen. Unter Umständen kann es vorteilhaft sein, die Schale in den Eisschrank zu stellen, sie besonders im Sommer auf nicht mehr als etwa 6° C zu halten, um die gleich-

1) Die Verwandtschaft vieler Spaltpilze mit den Spaltalgen unterliegt keinem Zweifel, doch stehen serologische Versuche zur experimentellen Ermittlung der Verwandtschaft zwischen beiden Gruppen nach den Methoden von Friedenthal, W. Magnus und C. Mez noch aus.

zeitige Entwicklung anderer Bakterien, besonders Fäulnis bewirkender, zu hemmen. Der Pilz ist auf gekochte Salzkartoffeln übertragbar.

Reinkulturen [vgl. Kolkwitz (2)] sieht man besonders bei Betrachtung mit 3—14fach vergrößernden Lupen in schön grünlichem Licht erstrahlen, auch im Halbdunkel. Die Übertragung des Sauerstoffes auf die zu oxydierende Substanz geschieht durch ein Ferment. Man vergleiche Lafar (1) und Molisch (2). Abb. s. auf der Tafel „Pflanzen des Wassers“.

Das Leuchten scheint meist eine chemische Begleiterscheinung gewisser physiologischer Vorgänge zu sein. Beim Johanniskäfer (*Lampyris*) dürfte es als Erkennungsmittel der Geschlechter dienen. Das Leuchten vieler Tiefseefische, z. B. von *Melanostomias*, unterstützt offenbar die Funktion der Augen.

Wegen Meeresleuchten vergleiche auch *Ceratium tripos* und *Noctiluca miliaris*. Das Leuchten der Nordsee wird vielfach durch *Bacterium phosphorescens* bedingt. Die östliche Ostsee leuchtet selten.

Lampropedia hyalina. Farblose Tafelkokken. Bildet zierliche farblose Täfelchen oder größere Flächen von in einer Ebene gelagerten Kokken. Diese Anordnung ist dadurch bedingt, daß die Zellen sich, ähnlich wie bei der blaugrünen Spaltalge *Merismopedia*, nach zwei Richtungen des Raumes teilen. Vgl. Tafel VII: Pflanzen des Wassers.

Die Täfelchen können planktonisch sein, während größere Häute Überzüge auf Schlamm oder auf der Wasseroberfläche über dem Schlamm bilden.

Der Organismus ist geeignet, die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Spaltpilzen und Spaltalgen zu zeigen. Die Parallelförmigkeit unter den Schwefelbakterien ist *Thiopedia rosea*.

Lampropedia gehört zu den verhältnismäßig wenigen Spaltpilzen, zu deren sicherem Erkennen die Morphologie genügt.

Sarcina ventriculi. Magen-Paketkokken.

(Name von *sarcina* = Paket, nicht von *sarx* [Fleisch]. Verdeutschte Sarcinen betont).

Diese zuerst (1842) im kranken Magen gefundene Sarcine ist wahrscheinlich keine einheitliche Species. Sie zeichnet sich bekanntlich durch ihre besondere Größe aus und bildet deshalb ein geschätztes Beobachtungsobjekt.

Es ist im allgemeinen wenig bekannt, daß sie sich in Rohkulturen leicht vermehren läßt.

Beijerinck hat in Gemeinschaft mit Goslings und Moll das folgende Kulturverfahren angegeben. Man fügt zu Nährbouillon 3 bis 10% Malzextrakt und säuert mit Milch- oder Phosphorsäure an (6 bis 10 ccm Normalphosphorsäure auf 100 ccm Bouillon). Die Flüssigkeit wird in ein offenes Gefäß (z. B. Erlenmeyer-Kolben) gefüllt und mit einer größeren Menge Erde beimpft, so daß ein Bodensatz von

mindestens 5—7 mm Höhe entsteht. Bei 37° entsteht schon nach 12 Stunden eine lebhaft Gärung unter Überquellen von Schaum. In der am Boden des Gefäßes abgesetzten Erde hat sich *Sarcina ventriculi* in ungeheurer Menge vermehrt und ist zu großen Zellpaketen ausgewachsen. Etwaiges Überimpfen müßte erfolgen, solange noch die volle Gärung im Gange ist. Das bei der Gärung entstehende Gas besteht zu etwa drei Viertel aus Kohlensäure und zu etwa ein Viertel aus Methan.

Nach meinen eigenen Erfahrungen kann man statt Erde mit bestem Erfolg auch Schlamm nehmen, und zwar solchen, der schlecht belüftet und schwefeleisenhaltig ist. Am geeignetsten ist halb ausgefauter, von Natur etwas teerig riechender, schwarzer Schlamm. Solcher ist der am meisten typische Fundort für *Sarcina paludosa* Schroeter, die offenbar nichts weiter als eine Kümmerform von *Sarcina ventriculi* ist und durch die genannte Nährlösung zu üppiger Entwicklung angeregt werden kann. Eine gute Fundstelle für diese Sarcinen ist auch der normale Schlamm der Emscherbrunnen (Abwasser-Kläranlagen). Vgl. Tafel VII: Pflanzen des Wassers.

Weitere Vertreter der Gattung sind *Sarcina aurantiaca* und *lutea*, häufig im Staub der Luft, *S. viscosa*, verdirbt Bier, *S. maxima* usw.

Bacterium aceti. Essigpilz, Essigstäbchen. Der Essigpilz kann in Gemeinschaft mit Hefe und Milchsäurebakterien leicht im Bodensatz von Weißbier aufgefunden und bei etwa 300facher Vergrößerung beobachtet werden. Die Form der Zellen ist rund, kurz- oder langstäbchenförmig, nicht selten fädig oder auch unregelmäßig. Bisweilen findet sich Bewegungsvermögen, niemals Sporenbildung (Abb. 71).

Abb. 71. *Bacterium aceti*, Essigsäurepilz, an einer Stelle zu einer Haut zusammengeklagert. 1000fach vergr. (Nach E. Chr. Hansen.)

Gute Unterscheidungsmerkmale bieten das Säuerungsvermögen der verschiedenen Zuckerarten und die Ansprüche an die Ernährung.

Man unterscheidet unter den vielen Arten nach Henneberg: Maische- bzw. Würzeessigbakterien, ferner Milch-, Bier-, Weinessig- und Schnellessigbakterien. Alle verlangen zu ihrem günstigen Wachstum Sauerstoff, Zucker und Alkohol, dabei meist eine Temperatur von 20—35° C (Maximum 40° C). Die Schnellessigbakterien sind sehr anspruchslos im Gegensatz zu den Bieressigbakterien.

Die Essigsäurebildung ist ein Oxydationsprozeß und verläuft nach der allgemeinen Formel:

Wenn man in einem Petrischälchen Gelatine-Traubenzucker-Kreideplatten gießt und mit wenig Weißbiersatz vermischt, so bilden sich um die Kolonien der Essigsäurebakterien durchsichtige Höfe, da sich hier der ungelöste kohlensaure Kalk in gelöstes essigsäures Kalzium umwandelt.

Diejenigen Arten, welche stark (6—14,5%) und aromatisch (Esterbildung) säuern und den blanken Essig erzeugen, finden in den Essigfabriken Anwendung.

Vielfach sind die Essigpilze arge Schädlinge, z. B. in den Brauereien, Hefefabriken und vor allem in den Weinkeltereien („Essigstich“). Essigsäure ist ein starkes Hefegift.

Viele Arten oxydieren die Essigsäure weiter zu Kohlensäure und Wasser, eine in den Fabriken gefürchtete Erscheinung.

Während bei manchen Arten die Hautbildung (Essigmutter) auf Flüssigkeiten eine lederartig feste ist (*Bact. xylinum*, Abb. 72), erscheinen sie bei anderen Arten staubartig, schleierartig oder seidenpapierähnlich.

In der Natur finden sich manche Arten an Bäumen mit Schleimflüssen, an Früchten usw. neben und nach der alkoholischen Gärung durch Hefe. Lit. Henneberg (1 u. 2), Lafar (1), Bd. 5.

Bacterium xylinum. Schleim-Essigpilz.

Dieses in Abb. 72 dargestellte Bakterium bildet eigentümliche, lederig-gallertige Gebilde, welche der Reaktion nach der Cellulose nahe stehen. Lafar (1), Bd. 5, S. 562—568; Cbl. Bakt., II. Abt., 1921, Emmerling (1).

Es ist in Asien, Ost- und Westeuropa verbreitet und wird in manchen Gegenden dem schwach gesüßten (2—3%) Tee zugesetzt, um dadurch ein die Darmtätigkeit günstig beeinflussendes Getränk zu erhalten [Batschinskaja (1)].

Man kultiviert den Pilz in solcher Flüssigkeit oder in 2% Glyzerin (unter Zusatz von Nährsalzen). Wird die Nährflüssigkeit öfter gewechselt, entwickelt er sich in einigen Wochen gut.

Bacterium lactis acid. Milchsäurebakterium. Es gibt viele Arten, die sich morphologisch (rund, eiförmig, kurz- und langstäbchenförmig) und vor allem physiologisch (Temperatur, Säuerungsvermögen, Nebensstoffe) unterscheiden. Sie finden sich sehr oft mit Hefen zusammen in der freien Natur (und im Haushalt), wo Zucker vorhanden ist (z. B. an „blutenden“ Bäumen, in Komposthaufen, Zuckerfabriken, Rübenschnitteln, verunreinigtem Wasser, Molkereien, Sauerfutter, Sauerkohlfabriken, Sauergurkenfabriken). Nur die Arten, welche Milchsäure säuern, spielen in der Milch und bei deren Verarbeitung (Butter, Käse) eine Rolle. Die gewöhnliche Art der sauren Milch ist *Bact. lactis acid* Leichmann (auch *Streptococcus acid* *lactici* genannt), eine rundliche, eiförmige Art, oft in kurzen Ketten, bewegungslos und sporenlos wie alle eigentlichen Milchsäurepilze; Wachstumstemperatur etwa 10—35 ° C.

Abb. 72. *Bacterium xylinum*, Schleim-Essigpilz.
(Figurenerklärung siehe nächste Seite oben.)

1. *Zoogloea*-Haut, lederlappenartig entwickelt. 2. Gummiartige Gebilde, in einer Flasche mit 5% Himbeersaft gewachsen. 3. Ein Stück von 2, am Boden eines Gefäßes mit gezuckertem Tee, nach der Oberfläche zu eine zartere *Zoogloea* entwickelnd. Oben verunreinigt durch Kolonien des Pinselschimmels *Penicillium*. 4. Reinkultur (nach Batschinskaja). im Gegensatz zur Rohkultur (Nr. 3). 5. Kunstleder (Buchleder) aus *Bact. xylinum*. (Fast natürl. Größe, Original.)

Die Milchsäurebildung ist in der Hauptsache eine Spaltungsgärung:

Gewisse Milchsäurebakterien des Käses bilden nach F. Ehrlich aus Aminosäure die entsprechenden Amine unter CO_2 -Abspaltung (wie Fäulnisbakterien). So ist p-Oxyphenyläthylamin ein regelmäßiger Bestandteile des Käses, besonders des Emmentaler.

In der Milch bei 40–45° C kommt eine langgestreckte Art (der sogenannte *Bacillus lactis acidi* Leichmann) zur Entwicklung, die in der Käseerei und in manchen Milchsäurefabriken ausgenutzt wird. Ähnlich ist der *Bacillus bulgaricus* im Yoghurt, der Sauermilch der Balkanvölker. In Maltose und Dextrose enthaltenden Maischen (Kartoffelbrennerei, Kornbrennerei, Hefefabrik, Milchsäurefabrik) wird der *Bacillus delbruecki*, dessen Säuerungstemperatur bei 50° C liegt, angewandt. Man benutzt die Milchsäurebakterien zum Reinhalten der Hefegärung, da deren Schädlinge gegen die Säure meist empfindlicher sind als die Kulturhefe. Die in Milchsäurefabriken hergestellte Milchsäure findet in der Technik vielfache Verwendung (Lederfabrik, Limonadenfabrik, Färberei).

Schädlich sind manche Arten in der Brauerei und Weinkelerei („Milchsäurestich“), eine bestimmte Art ist in der Weißbierbrauerei erwünscht. Lit. Henneberg (1), Henneberg u. Bode (1), Lafar (1), Bd. 2.

Bacterium coli. Darmbakterie. Lebt im Darm des Menschen und sehr vieler, besonders warmblütiger Tiere; aber auch im Darm von Fliegen. Die Stäbchen dieses beweglichen *Bacterium* können leicht in Ausstrichen von Fäzes auf Objektträger beobachtet werden, besonders nach Färbung mit Fuchsinlösung. Ist äußerlich dem *Bacterium typhi* ähnlich. Über die Gärungsprobe bei 46° C auf *B. coli* als Hilfsmittel bei der Trinkwasseruntersuchung vergleiche man C. Eijkman (1).

B. coli vergärt lebhaft die verschiedensten Zucker unter Erzeugung von organischen Säuren, Kohlensäure und Wasserstoff. Lafar (1), Bd. 3.

Bacterium phytophthorum. Pflanzenzerstörendes Bakterium. Erreger der Schwarzbeinigkeit der Kartoffel, durch welche Kraut und Knollen geschädigt werden können. Vgl. Taf. IV, Abb. 2. Die Pflanzen pflegen plötzlich von unten her abzusterben und umzufallen; ist auch pathogen für Tomate (*Solanum lycopersicum*), Lupinus, Gurke (*Cucumis sativus*), Mohrrübe (*Daucus carota*) u. a. m.

Die günstigste Entwicklung findet dieser Erreger und der ihm verwandte Formenkreis in feuchtwarmen Jahren auf dem Felde und zur Winterszeit in den Kartoffelmieten. Bezüglich der Bekämpfung vgl. O. Appel (1).

Bacterium prodigiosum. Wundermonade, Hostienpilz. Dieser Spaltpilz wird seiner intensiv roten Farbe und deshalb meist leichten Erkennbarkeit wegen vielfach als Versuchsobjekt verwendet. Er wächst gut auf Längsschnitten halbgar gekochter Kartoffeln, Polenta und 10 % Gelatine mit Kartoffelwasser und 0,02 % Magnesiumsulfat. Lit. Lafar (1), Lehmann u. Neumann (1).

Bacterium vulgare (= *Proteus vulgaris*). Fäulnisbakterium. Findet sich in fauligem Fleischwasser, Erbsenwasser, Kanaljauche usw. verursacht stinkige Zersetzung der Eiweißkörper unter reichlicher Bildung von Schwefelwasserstoff; wächst aerob und anaerob.

Es bildet schlanke, bewegliche Stäbchen von mannigfaltiger Form, Abb. s. Taf. VII, Nr. 17. *Bacterium termo* ist ein Sammelname für Gemische verschiedener Fäulnisbakterien.

Aus Harnstoff wird Ammonkarbonat gebildet. Füllt man bakterienhaltige Stalljauche in eine Kristallisierschale und bedeckt diese vollständig mit einer Glasplatte, so macht sich nach einiger Zeit ein intensiver Ammoniakgeruch bemerkbar (wohl auch unter Mitwirkung von *Micrococcus ureae*). Lüftet man die Glasplatte ein wenig und bringt einen Glasstab mit konzentrierter Salzsäure in die Nähe, so entwickeln sich weiße Salmiakdämpfe. Vgl. auch *Pseudomonas (Bacterium) fluorescens* und Lafar (1), Bd. 3.

Bacterium denitrificans. Salpeterfresser. Bildet aus Nitraten und Nitriten freien Stickstoff und kann dadurch unter anderem den Wert des Dinges beeinträchtigen.

Bacterium nitrobacter. Salpeterbakterie. Wiewohl die Salpeterbakterien des Chlorophylls entbehren, sind sie doch keine Saprophyten, sie vermögen sich autotroph zu ernähren (vgl. S. 5). Den Gewinn ihrer Betriebsenergie ermöglichen sie durch Oxydation von anorganischen Stickstoffverbindungen zur höchsten Oxydationsstufe, den Nitraten, z. B.

Andere Bakterien sind imstande, den elementaren Stickstoff zu, Salpeter zu oxydieren, während einige nur Ammoniakverbindungen in Nitrite umzuwandeln vermögen, z. B. *Pseudomonas europaea*.

Salpeterbildung als Endprozeß organischer Zersetzungen findet reichlich in Rieselböden und biologischen Körpern statt (Abb. 73–75), in welchen gleichzeitig eine komplizierte biologische Oxydationsreinigung stattfindet, Absorption und Regeneration wechseln

Abb. 73. Schematischer Querschnitt durch ein Rieselfeld mit vorgeschaltetem Absatzbecken. Am Zulauf: Abwasser, vorwiegend Eiweiß- und ammoniakhaltig. Im Vorbecken: Abwasser, Sinkstoffe und Schwimmschicht. Auf dem Rieselfeld: Graskulturen. Im Boden: Drainröhren; über diesen der reinigende und filtrierende Sand. Am Auslauf: Nitrathaltiges Drainwasser. Das aufgeleitete Wasser braucht zum Passieren des Bodens etwa 1 Stunde. (Orig.)

Abb. 74. Biologischer Tropfkörper. Das fäulnisfähige Abwasser wird durch einen Drehsprenger über einen Schlackekörper verteilt und beim Durchrieseln desselben durch Organismen-tätigkeit in etwa 10 Minuten fäulnisunfähig gemacht. Die Menge und Mannigfaltigkeit der vorhandenen Lebewesen ist sehr groß.

Abb. 75. Biologische Tropfkörper von Berlin-Wilmersdorf (bei Stahnsdorf). Der Durchmesser jedes Körpers beträgt 20,0 m seine Höhe 2,5 m. (Nach R. Kolkwitz.)

bei intermittierendem Betrieb miteinander ab¹⁾. In den Drainabflüssen beider gelingt leicht der Nachweis von Ammoniakverbindungen und Nitraten, vgl. H. Klut (1), Molisch (2).

Salpeterplantagen sind mit Jauche übergossene Kalkhaufen.

Rezept für Rohkulturen von Salpeterbakterien

Wasser	100 ccm
$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	0,05 g
KH_2PO_4	0,1 g
MgCO_3	1 g
Erde (z. B. von Rieselfeld oder biologischem Körper)	kleine Menge
Wartezeit	bis einige Monate
Kulturgefäß	Erlenmeyerkolben o. dgl.

Bacterium radiculicola. Knöllchenbakterium. Die Knöllchenbakterien finden sich besonders in knotigen Wurzelanschwellungen der Leguminosen (Abb. 76) (unbewegliche Form). Sie sammeln den elementaren Stickstoff der Luft, der dann den be-

Abb. 76. *Bacterium radiculicola*. Bakterienknöllchen der Lupine, daneben 1000fach vergrößerte Bakterien (unbewegliche Form) und Bakteroiden.

wohnten Pflanzen zugute kommt (1886). Hierauf beruht der Wert von Gründüngung durch Lupinen. Die Keime dringen durch die Wurzelhaare ein.

Die Wurzeln mit den Knöllchen eignen sich zu Alkohol- oder Formolpräparaten. Lit. Jost (1), Lafar (1), Bd. 3, S. 34.

Bacterium (*Mycobacterium*) tuberculosis. Tuberkelbakterie; s. Abb. Sputumschleim wird zum Färben in dünner Schicht auf den Objektträger oder auf das Deckgläschen ausgestrichen, antrocknen gelassen und dreimal kurz durch die Flamme gezogen. Hierauf wird käufliche Ehrliche Anilinwasser-Farbstofflösung oder Ziel'sche Karbolfuchsinlösung auf das Präparat aufgetropft, das Ganze über der Gasflamme etwa eine halbe Minute lang bis zum Aufwallen erhitzt und noch eine Minute lang warm gehalten. Dann wird abgespült, mit rd. 3%igem Salzsäurealkohol (100 ccm abs. Alkohol, 3 ccm Salzsäure) eine Minute lang ausgewaschen, wieder abgespült und mit schwacher, meist wässriger Methylenblaulösung nachgefärbt. Hierauf wird das Präparat getrocknet und in Kanadabalsam oder Zedernöl eingebettet, nachdem man es vorher ohne Deckgläschen durchmustert hat. Die schwere Färbbarkeit beruht auf dem Gehalt der Stäbchen an wachsartigen Stoffen. Die Tuberkelbakterien

1) Biologische Körper können für Laboratoriumsversuche auch im kleinen hergestellt werden.

(Abb. 77) des Präparates erscheinen rot, die Gewebepartien blau; man benutze zur mikroskopischen Betrachtung Ölimmersion; vgl. auch Abel (1), C. Günther (1), Lehmann u. Neumann (1). Die Tuberkelbakterien scheinen mit der Gattung *Actinomyces* verwandt zu sein, welche verzweigte Fäden bildet. Lieske (1).

Abb. 77. Tuberkelbakterien aus einem gefärbten Schnitt durch eine Bronchialdrüse, in situ am Rand einer kleinen Arterie. Vergr. 500 fach. (Nach Rob. Koch.)

Bacillus subtilis. Heubazillus. Dieser weit verbreitete Bazillus findet sich im Boden, im Abwasser, in Jauche, auf Mist usw. An der Oberfläche von Jauche kann er Häute bilden. Bei 30° C wächst er reichlich auf ungehopfter Würze, findet sich auch in dünnen Bieren, die in der Regel einen muffigen Himbeergeruch bekommen und dann „Limonadenbiere“ genannt werden. Heubazillus heißt er deshalb, weil er auf Wasser, in welchem Heu¹⁾ abgekocht wird, Häute bildet. Seine sehr widerstandsfähigen, ovalen Sporen ertragen die Siedehitze. Gerade darauf beruht die Gewinnung reiner Kulturen durch Kochen von Heuinfus. Vgl. Lafar (1).

Nach den Untersuchungen von A. Nestler (1910) werden die Sporen des Heubazillus über 92 Jahre alt; sie fanden sich noch lebensfähig in der Erde von Moosen aus alten Herbarien.

Sporenpräparate werden — ähnlich wie Tuberkelbakterien in Schleim oder Gewebe — doppelt gefärbt, nur koche man 5—6 mal mit der Fuchsinlösung auf. Die vegetativen Partien erscheinen im Präparat blau, die Sporen rot (Doppelfärbung).

B. subtilis gehört zu den schnell beweglichen Spaltpilzen; er legt 5—6 μ pro Sekunde zurück. Abb. s. Taf. VII, Nr. 18.

Bacillus amylobacter. Buttersäurebazillus. Diesen Organismus erbeutet man sehr sicher, wenn man eine Nährlösung mit 5% Zucker, 5% Fibrin²⁾ und $\frac{1}{2}$ —1 Tablette (S. 4) herstellt (modifiziert nach Beijerinck, Cbl. Bakt., Bd. 2) und unter Zufügen von Erde oder Schlamm bei Bruttemperatur hält. Bei kurzer Versuchsdauer kann vorheriges Kochen und Zusatz von Karbonat unterbleiben. Sporen (Vergr. mindestens 400 $\times$) (Abb. 78) treten nach einigen Tagen auf. Typisch ist Geruch nach Buttersäure (wie bei ranziger Butter). Ihre Bildung erfolgt wahrscheinlich nach der Formel:

1) Sehr geeignet ist Heu von Überschwemmungswiesen in Flußtälern.

2) Käuflich in Chem. Fabriken, z. B. Kahlbaum, Berlin-Adlershof, Preis 1922 = 7,50 M. für 20 g.

Nach O. Emmerling (2) koche man Milch und bringe sie in fest verschlossene Flaschen. Beim Aufbewahren bei ca. 37 °C tritt eine sehr lebhaft Buttersäuregärung ein, deren gasförmige Produkte bisweilen die Flaschen zertrümmern. In diesem Falle wird die Buttersäure aus Milchsäure ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$) gebildet. (Methode nach Botkin.)

Der Buttersäurebazillus findet sich in den meisten Erdbodenarten. Er entwickelt sich obligat anaerob, d. h. ohne Gegenwart von Sauerstoff. Es scheint aber auch Arten zu geben, welche aerob Buttersäure erzeugen.

Anaerobe Bakterien scheiden vermutlich Stoffe aus, welche begierig Sauerstoff anziehen und dadurch eine chemische Schutzhülle für die Zellen bilden.

Die Stäbchen des *Bacillus amylobacter* sind beweglich und chemotaktisch (z. B. positiv für Fleischextraktlösung); bei der Sporenbildung

Abb. 78. *Bacillus amylobacter*. Zelle mit Geißeln (nach Löffler gefärbt), mit beginnender Sporenbildung. Verschiedene Formen sporenhaltiger Zellen bei sehr starker Vergrößerung. (Nach Bredermann.)

(die allen Arten der Gattung *Bacillus* eigentümlich ist) werden sie, wie Abb. 78 zeigt, meist spindelförmig, keulig oder trommelschlägelförmig. Sie vermögen den freien Stickstoff der Luft zu assimilieren und sind vielleicht im Verein mit *Azotobacter* an der stickstoffberei-

chernden Wirkung der Brache des Bodens beteiligt. Bei der Flachsrötte nehmen sie an der Zersetzung der Pektinsubstanzen teil (s. S. 38).

Wegen Herstellung von Reinkulturen der Anaerobien vgl. Abel (1).

Nach Herzfeld und Paetow sind Butter- und Milchsäureerreger Schädiger von Zuckersirupen. Man kann nach den genannten Autoren ihre schädigenden Wirkungen durch Zusatz von Flußsäure, Fluorammonium und Fluornatrium hemmen.

Bacillus calfactor. Heizungs-bazillus. Dieser Spaltpilz ist in erster Linie an der Selbsterwärmung des Heus (Miehe) beteiligt, in welchem er bei 70 °C vegetieren kann.

Bacillus cellulosa methanica. Sumpfgasbildner. Der Erreger der Sumpfgasbildung ist durch die intensive Gasbildung bekannt, welche er durch Zersetzung von Zellulose erzeugt. Das brennbare Methan wird in Sümpfen, Teichen, Faulkammern (s. Abb. 79 und K. Thumm) oft in großen Mengen beobachtet, findet sich auch in dem Darm von Wieder-

käuern. Reine Baumwollzellulose (z. B. Fließpapier) wird leichter angegriffen als Holzzellulose. Vgl. Näheres bei Omelianski in Lafar (1).

Abb. 79. Zwei hintereinander geschaltete Faulräume (englisch: septic tanks) im Querschnitt. Stark verkleinert. Das einströmende Abwasser entledigt sich im ersten Becken seiner größeren Sinkstoffe und bildet unter dem Schutze zweier Eintauchbretter eine feste Schwimmdecke; im zweiten Becken sind die Ablagerungen nur noch relativ gering. Aus dem Schlamm bildet sich unter dessen teilweiser Verzeherung viel Methan, aus den gelösten, oft weitgehend zersetzten Faulstoffen des Wassers viel Ammoniak infolge Mineralisation durch Bakterien.

Pseudomonas¹⁾ (*Bacterium*) **fluorescens**. Fluoreszierender Spaltpilz. Dieser sehr weit verbreitete Organismus ist nach Kolkwitz (2) allenthalben aus Wasser sehr leicht und sicher in Massenanhäufungen zu gewinnen, und zwar durch Zufügen eines Nährsalzes²⁾ von folgender Zusammensetzung:

Asparagin	4 Gewichtsteile
Monokaliumphosphat	1 Teil
Magnesiumsulfat	1 „

Man füllt ein Glas (z. B. Honigglas) oder eine weithalsige offene Flasche mit etwa 200 ccm Wasser, (aus der Leitung, aus einem Oberflächen-gewässer, Regenwasser usw.) und fügt $\frac{1}{2}$ —1 % des genannten Nährsalzgemisches, das sich ohne Erwärmen bald löst, hinzu.

Die im Wasser befindlichen Keime beginnen sich in der farblosen Flüssigkeit bald zu entwickeln und trüben sie in einigen Tagen (bei Zimmertemperatur). Hierbei treten *Bacterium vulgare* (= *Proteus*) und *Bacterium fluorescens* (meist *liquefaciens*) reichlich auf. Nach 4—6 Tagen entsteht in den oberflächlichen Schichten die bekannte grünliche Farbe des *B. fluorescens*, die in den folgenden Tagen an Stärke und Umfang noch zunimmt. Die Flüssigkeit und die darüber befindliche Luft reagieren durch das aus dem Asparagin entstandene Ammoniak auf Lackmuspapier deutlich alkalisch.

Manche Formen sind besonders stark aerotaktisch (S. 81).

Das Färben unter dem Mikroskop gelingt leicht mittels Kopierstift. Vgl. auch Bakterienmethode S. 9.

Pseudomonas (*Bacterium*) **violacea**. Veilchenblauer Spaltpilz. Nach den Untersuchungen von Beijerinck (*Folia microbiologica*) erhält man diesen bekannten Farbstoffbildner leicht auf folgende Weise:

1) *Pseudomonas* ist, wie schon vorher bemerkt, polar begeißelt, *Bacterium* und *Bacillus* diffus, wenn überhaupt mit Cilien versehen.

2) Dosierte Pulver zu 1 g unter dem Namen Fluorescens-Nährsalz liefert die Firma Paul Altmann, Berlin NW. 6, Luisenstraße 47.

Man wäscht und schüttelt zermahlene Gerstenkörner tüchtig mit Wasser, bis alles anhängende Mehl völlig verschwunden ist. Die Körner werden dann auf feuchtes Filtrierpapier gelegt, welches in einem großen, mit Leitungswasser gefüllten Becherglas treibend gehalten wird (z. B. mittels Korkring). Der Rand des Papierees hängt in das fließende Wasser. Die Grützekörner werden nach 2—3 Tagen tief violett.

Einen noch einfacheren Versuch schildert Beijerinck nach H. C. Jacobsen. Man legt ein Stück Weißbrot unter den Hahn einer Wasserleitung, welche langsam tropft, und zwar so, daß das Wasser erst auf den Boden des Beckens aufschlägt und von da auf das Weißbrot spritzt. Das Wasser laugt das Brot aus und entfernt die Exkretionsprodukte der Bakterien. Nach einigen Tagen tritt eine tief violette Färbung des Brotes auf.

Nach meinen eigenen Erfahrungen gelingt der Versuch auch mit Berliner Leitungswasser, aber nicht immer absolut sicher.

Ein weiteres für *B. violaceum* günstiges Substrat ist folgendes:

Destilliertes Wasser	100 ccm
Agar	2 g
trockenes Fibrin oder Eiereiweiß	1—2 „
Chlorkalium	0,02 „

Der Nährboden wird mit Wasser übergossen, in welchem Gartenerde geschüttelt und zum Absetzen gebracht worden ist. Das nun bei 22—25° entstehende *B. violaceum* erzeugt reichlich Farbstoff.

Pseudomonas (*Nitrosomonas*) **europaea**. Nitritbildner. Bildet aus Ammoniaksalzen Nitrite und ernährt sich autotroph.

Ammoniakverbindung

(Nitrit)

Vgl. Lafar (1), Bd. 3.

Microspira desulfuricans. Gipszerstörer. Wenn Gips unter Wasser „fault“, handelt es sich dabei nach den Untersuchungen von Beijerinck (3) um die Reduktionswirkungen durch diese im Sumpf, besonders in Küstengebieten, verbreitete *Microspira*:

Reduktionsmittel

Man kann den Prozeß im Laboratorium, besonders bei Brutwärme, leicht nachahmen.

Spirillum undula. Schraubenbakterie.

(spira = Windung, unda = Welle.)

Tritt fast stets auf, wenn man frisches städtisches Abwasser eine Zeitlang (einige Tage und mehr) stehen läßt. Solches Wasser pflegt eine wahre Fundgrube für Bakterien und Protozoen, besonders farblose Flagellaten und Ciliaten, zu sein. Ferner in Tümpeln mit stark zersetztem Laub und in Jauche aus Kuhställen, auch zwischen *Saprolegnia* zu finden.

Berührt man mit der Fläche eines Deckgläschens die oberflächliche Schicht einer solchen Flüssigkeit, so erhält man meist ausgezeichnete Klatschpräparate. Lit. Lehmann und Neumann (1).

Eisenbakterien.

Crénothrix polyspora. F. Cohn. Brunnenfaden (s. Abb. 81, Nr. 12).
(Name von crene = Quelle, Brunnen und thrix = Haar.)

Der Brunnenfaden gehört zu den *Chlamydobacteriaceae* (Scheidenbakterien), bei denen die Zellfäden in einer Scheide stecken. Er rechnet mit *Chlamydothrix ochracea*, *Gallionella ferruginea*, *Clonothrix fusca* und *Siderocapsa treubii* zu den Eisen- und Manganbakterien, welche sich gern an Lokalitäten finden, die einen gewissen Gehalt an Ferrobikarbonat $[\text{Fe}(\text{HCO}_3)_2]$ aufweisen, z. B. Wiesengräben und Grundwässer.

In Wasserwerken, Brunnen usw. entwickeln sich Eisenbakterien oft massenhaft und können dann zu Kalamitäten beitragen. Diese werden in der Regel dadurch vermieden, daß man die Eisenverbindungen durch Rieseln unter Belüftung (Enteisenungsanlagen) ausfällt (Kontakt und Prellwirkung) und dann abfiltriert. (Abb. 80, Enteisenungseinrichtung.) Hierbei findet O_2 -zehrung statt. Die Berliner Wasserleitung wurde besonders in den Jahren 1877 und 1878, in denen man Enteisenungsverfahren noch nicht kannte, von einer schweren *Crénothrix*-Kalamität heimgesucht.

Über die Reinkultur von Eisenbakterien vergleiche man besonders die Arbeiten von Molisch (4). Danach gelingt es, diese Organismen auch ohne nachweisbare Mengen von Eisenverbindungen zu normaler Entwicklung zu bringen, doch ändern solche Versuche mit Reinkulturen nichts an der Tatsache, daß die hier behandelten Bakterien in der freien Natur eisenhaltige Standorte bevorzugen. Wahrscheinlich

Abb. 80. Enteisenungsanlage für Brunnenwasser, bestehend aus Rieselkörper (mit Koks, Schlacke oder Steinen) und Sandfilter. Es werden Eisenverbindungen und zum Teil auch organische Substanzen entfernt. (Nach Dr. R. Haack.)

Abb. 81. Eisenbakterien. (Orig.)

- 1 *Chlamydothrix ochracea*, Scheiden und Flöckchen von Eisenoxydhydrat.
- 2 " " Scheiden mit und ohne Gallert, im Innern einzelne Zellen.
- 3 " " Faden mit deutlich inkrustierter Scheide.
- 4 " " alte Scheide mit starken Einlagerungen von Eisenoxydhydrat.
- 5 " " zwei mit ihren Scheiden verklebte alte Fäden; mit Ein- und Auflagerungen von Eisen- und Manganoxxydhydrat.
- 6 *Gallionella ferruginea*, zwei verklebte Fäden (*Spirophyllum*?).
- 7 " " mutmaßlicher junger Faden.
- 8 " " gekrümmte und verschlungene Fäden.
- 9 " " verschlungener Faden, stark vergrößert.
- 10 *Clonothrix fusca*, Faden mit feinen Verzweigungen. 11 *Siderocapsa treubii*, Vergr. ca. 700-fach. 12 *Orenothrix polyspora*, Fäden in verschiedenen Entwicklungsstadien.

verwenden sie hier Eisenazetat und ähnliche Verbindungen [vgl. Kolkwitz (6)], oder leben bei Mangel an organischen Nährstoffen autotroph, bei Energiegewinn aus Eisenverbindungen (Bonner Lehrb. S. 343).

Fäden von Eisenbakterien erhält man oft, wenn man 100 l und mehr Leitungswasser in starkem Strahl durch ein Planktonnetz oder Planktonsieb abfiltriert. Diese Methode, sich schnell Eisenbakterien zu verschaffen, ist an vielen Orten überraschend einfach.

Gute Exemplare der Eisenbakterien eignen sich ausgezeichnet zur Anfertigung von mikroskopischen Dauerpräparaten in Glyceringelatine. Die Bräunung der Scheiden von *Crenothrix* durch Eisen- oder Manganverbindungen ist meist schwach, doch geben die Präparate gute Bilder von der Form und Entwicklung dieses hochdifferenzierten fast größten aller Spaltpilze. Die Vermehrung geschieht durch Fadenteilung, große und kleine unbewegliche Sporen.

Chlamydothrix ochracea. Gemeine Eisenbakterie (Abb. 81, No. 1).
(chlamys = Mantel, Scheide und thrix = Haar.)

Sehr häufig in ockerhaltigen Wiesengraben, Grundwasserwerken usw. Zellen ohne Scheide meist ca. 1 μ dick. Scheide in der Jugend dünn und wenig gefärbt, später sich verdickend und gelb bis braun werdend. Knorrige, alte Fäden sind bisweilen mit Stielen von *Anthophysa* verwechselt worden. Lit. Winogradsky, Lafar (1) u. Lieske (1919).

Ein *ar. Naumann* versenkte Glasplatten, z. B. photographische Platten vom Format 8×8 cm, in Schweden zur Untersuchung der verschiedensten Gewässer (Glasscheibenmethode), und erbeutete dadurch besonders Eisenbakterien, die sich nach meinen Erfahrungen übrigens auch in Deutschland auf diese Weise leicht einfangen lassen, auch aus Wasserleitungswasser.

Gallionella ferruginea. Gedrehte Eisenbakterie.

(Name nach Gaillon, Zolleinnehmer in Dieppe.)

Besonders in Eisenquellen häufig und unter dem Mikroskop durch seine gewundene Gestalt auffallend (Abb. 81). Fäden häufig auch gestreckt. *Gallionella* ist noch ungenügend erforscht. Näheres siehe bei Lieske (1).

Clonothrix fusca. Verzweigte Eisen- und Manganbakterie
(Name von clonos = Zweig.)

Eine stattliche und besonders durch ihre Verzweigung charakteristisch aussehende Eisenbakterie in Grundwässern und in der Uferregion von Oberflächengewässern (Abb. 81). Scheide stets deutlich wahrnehmbar; im Gegensatz zu *Crenothrix* stark inkrustiert.

Kann braun bis schwärzlich erscheinende, mehr oder weniger flockige Schlammabsätze in Brunnen und Hochbehältern von Wasserleitungen

bilden. Oft in Gesellschaft von *Crenothrix*. Anhäufungen von manganhaltigen Fäden erscheinen dunkel wie Kaffeegrund, manchmal fast schwarz (dann meist abgestorben).

Abb. 82. *Sphaerotilus natans*, Besatz auf einem Schilfblatt. Nat. Gr. (Orig.).

mit ernährenden organischen Abwässern (aus Städten, Zellulosefabriken, Zuckerfabriken usw.) vermischten, fließenden (mindestens 20 cm/sek)

Das Mangan läßt sich leicht und einfach dadurch nachweisen, daß man eine Probe solchen Materials auf dem Platinblech mit einem trockenen Soda-Salpetergemisch in der bekannten Weise schmilzt. Es entsteht dann eine sehr deutliche blaugrüne Farbe.

Clonothrix ist physiologisch noch wenig untersucht.

Siderocapsa treubii. Eisen-Kugelbakterie.

(Name von sideros = Eisen, capsa = Kapsel, Hülle und Treub, holländ. Botaniker [1851–1910], früher Direktor des botanischen Gartens in Buitenzorg auf Java).

Die Gattung ist neuerdings von Molisch beschrieben. Bildet kleine (bis 30 μ große) braune Flecken auf *Elodea*, *Vaucheria*, *Cladophora* u. a. m., welche in der Planktonkammer mit Lupen leicht beobachtet werden können. Bisweilen entstehen auch durch Verschmelzen von Kolonien förmliche Überzüge. Zellen kugelig. Kolonien nicht mit Haftscheiben von Fadenalgen verwechseln! Die Physiologie ist noch nicht studiert.

Sphaerótilus natans, wichtigste Abwasserbakterie.

(Name von sphaera = Kugel und tilos = Flocke.)

Zellen etwa 2 μ dick und 4 bis 6 μ lang, wegen der Scheiden zu langen Fäden zusammengehalten. Taf. VII, Fig. 21.

Der Pilz bildet, wie Abb. 82 zeigt, fellartige, weißliche Überzüge in

oder durch den Wind bewegten Gewässern von p- bis α m-Charakter (vgl. auch *Leptomitus* und die Abbildung auf Taf. VII. Die zottigen, schleimigen Besätze erscheinen bei besonders guter Ernährung weiß-opak wie Stärkekleister, bei Festkleben von Eisenoxydhydrat und Detritus auch gelblich und grau. Bei guter Durchmischung und Verdünnung der düngenden Zuflüsse kann die Entwicklung des Pilzes verhindert werden. Er findet sich festsitzend an Faschinen, Holzbohlen, Weidenzweigen, Schilf, Steinen usw. Sandufer bieten ihm keine genügenden Anheftungspunkte. Bei sehr starker Strömung kann er sich zwar am Ufer und stellenweise am Grunde entwickeln, wird aber durch die Schärfe der Strömung ständig in feinen Fetzen abgeschoren. Wenn in ein verunreinigtes stehendes Gewässer eine größere, reine Wasserader einfließt, kann in der Nähe dieser Stelle infolge der stattfindenden Bewegung und Belüftung trotz gleichzeitig eintretender Verdünnung der latent vegetierende Pilz lokal zu üppigerer Entwicklung angeregt werden.

Sphaerotilus wächst auch bei niedriger Temperatur des Wassers schnell, falls die nötigen Nährstoffe vorhanden sind. Werden reichlich entwickelte Zotten entfernt, so wächst er im Verlauf einiger Wochen zu früherer Üppigkeit heran, selbst wenn die Temperatur des Wassers nur 4° C oder noch weniger beträgt. Seine zum Teil klumpigen Flocken können sich in Fischernetzen festsetzen und diese verschleimen, auch an Stellen mit schwacher oder fehlender Strömung absinken und faulen (sekundäre Verunreinigung).

Unter ungünstiger werdenden Ernährungsbedingungen treten die Scheiden und Pseudodichotomien (*Cladothrix dichotoma*) deutlicher hervor. Näheres s. bei Kolkwitz (6) und Linde (1). Bei mittlerer Vergrößerung erscheinen die Fäden wie feine Linien.

Zoogloea ramigera (s. Taf. VII, Abb. 23) kann durch Vergallertung von Fäden entstehen; oft in Gemeinschaft mit *Sphaerotilus*.

Sphaerotilus ist einer der wichtigsten Organismen zur Beurteilung der Gewässer; in nährstoffreichen Vorflutern ist er oft massenhaft entwickelt, in mineralisierten, reinen fehlt er.

Beggiatoa¹⁾ *alba*. Weiße Schwefelbakterie. Taf. VII, Abb. 25. *Beggiatoa* bildet kriechend bewegliche Zellfäden, welche im auffallenden Licht weiß erscheinen, hauptsächlich wegen des Vorhandenseins feiner Schwefeltröpfchen, welche im Zellinnern durch Oxydation aufgenommenen Schwefelwasserstoffs entstehen. Bei H₂S-Hunger verschwinden die Schwefeltröpfchen wieder. Die Querwände, welche die Fäden gliedern, sind bei gewöhnlicher mikroskopischer Beobachtung meist nicht zu sehen, wohl aber bei Dunkelfeldbeleuchtung auf nicht ganz abgeschattetem Untergrund.

1) Nach F. S. Beggiato, Arzt in Vicenza. (Der Name kann so gesprochen werden, wie er geschrieben wird.)

Bei Massenentwicklung bildet *Beggiatoa* in stehenden oder langsam fließenden Gewässern mehr oder weniger dichte weiße Häute, welche in der Regel dem Schlamm aufliegen, wie Abb. 83 zeigt. Sie kann nur da gedeihen, wo freier Schwefelwasserstoff vorhanden ist, da sie, wie Winogradsky zuerst fand [vgl. Lafar (1) Bd. 3], aus dessen Oxydation Betriebsenergie gewinnt.

Abb. 83. Stück eines Schleiers von *Beggiatoa* in natürlicher Größe, auf schwefeleisenhaltigem Schlamm ausgebreitet. Die Löcher sind durch Hervorbrechen von Gärblasen erzeugt. (Nach A. Engler.)

Der Schwefel wird weiter oxydiert zu Schwefelsäure, die durch Kalzium- oder Natriumsalze gebunden wird.

Nach den Untersuchungen von F. Keil (1) an reinen Kulturen können sich *Beggiatoa* und die verwandte *Thiothrix* rein autotroph ernähren, also ohne Aufnahme organischer Nahrung. Den Kohlenstoff liefert dann die Kohlensäure, während der Stickstoff aus Ammoniaksalzen aufgenommen wird.

Im Freien findet man fädige Schwefelbakterien in Schwefelquellen (H_2S aus Sulfaten!) oder auf fauligem Schlamm (H_2S durch Fäulnis!)

Rezept für Rohkulturen von Schwefelbakterien:

Wasser	1 l (Schichthöhe rd. 5 cm)
Lockerer Schlamm (mit Fäden von <i>Beggiatoa</i>) . . .	rd. 50–100 cm
Zerkleinerte Wasserpflanzen oder Salatblätter u. dgl.	1 Eßlöffel
Gips (zu unterst) als H_2S -Quelle	knapp 1 Teelöffel
Gefäßform	Kristallisierschale oder Blumentopf-Untersatz
Wartezeit	einige Wochen.

Eine sehr große, bis 45μ dicke Spezies, *Beggiatoa mirabilis*, findet sich an den Küsten, z. B. des Meeres am Grunde des Kieler Hafens, und im Solgraben von Artern.

Chromatium okenii. Rote Schwefelbakterie. Die Zellen sind durch Geißeln beweglich, von roter Farbe und normalerweise mit deutlichem Gehalt an Schwefeltröpfchen. Der Organismus findet sich planktonisch in schwefelwasserstoffhaltigen Sümpfen, zwischen Algenfladen und an der Oberfläche von im Wasser zersetzten Substanzen; öfter in

Gemeinschaft mit *Oscillatoria chlorina*, *Chloronium mirabile* Buder und *Thiospirillum* [Buder (1, 2)]. Auf Teichen, welche städtische Abwässer enthalten, bildet er nicht selten größere Flecken von der Farbe des Rotkohls. Manche Tümpel färbt er rot, daß sie wie mit Kirschsaft erfüllt erscheinen (pro 1 ccm mehrere tausend Exemplare). *Chromatium* fängt sich in Lichtstellen bei sonst dunklem Gesichtsfeld, wenn es zufällig nach einer solchen Stelle schwimmt (Lichtfalle, „Schreckbewegung“ beim Versuch, ihr zu entfliehen). [Engelmann (3)].

Abb. 84. a Positive Chemotaxis von *Chromatium weissii*; die Kapillare enthält 0.3% Ammonitrat; gezeichnet unmittelbar nach dem Einschieben der Kapillare. b Negative Chemotaxis von *Chromatium weissii*; die Kapillare enthält 0.5% Apfelsäure. (Nach Miyoshi.)

Nach den Studien von Skene (1) scheinen sich die roten Schwefelbakterien autotroph zu ernähren; vgl. auch Buder (1, 2).

Chromatium weissii, das dem *Chr. okenii* ähnlich, aber etwas kleiner ist, wird nach den Untersuchungen von Miyoshi durch verdünnte Lösungen von Schwefelwasserstoff, Ammoniumtartrat, Ammoniumphosphat und Kaliumnitrat positiv, dagegen durch höhere Konzentration dieser Stoffe und durch 0.5% Apfelsäure negativ chemotaktisch beeinflusst (vgl. Abb. 84). Der rote Farbstoff schlägt nach Zusatz von konz. Schwefelsäure in blau um (Karotinreaktion, S. 18).

Lamprocystis roseo-persicina. Pfirsichblütfarbene Schwefelbakterie. Dieser Spaltpilz ist eine unbewegliche rote Schwefelbakterie, deren Zellen zu Kolonien von oft charakteristischer Form vereinigt sind; vgl. Taf. VII, Abb. 27.

Purpurbakterien. Rohkulturen von diesen schwefelfreien Spaltpilzen verschafft man sich im allgemeinen leicht in der Weise, daß man Faulflüssigkeiten oder Leitungswasser mit Schlamm unter Zugabe eines frischen Knochens (nach H. Molisch) — in hohen, schmalen Gefäßen (Glaszylinder, Präparatengläser, hohe Biergläser usw.) — längere Zeit (bis monatelang) belichtet stehen läßt (Abb. 85). Die hohen Gefäße werden gewählt, um den Luftzutritt zu erschweren.

Abb. 85. Kultur von Purpurbakterien. Im Gefäß, das mit einer halben Petrischale zugedeckt ist, Wasser, Schlamm und ein Stück Knochen. An der dem Licht zugekehrten Seite hat sich ein Besatz von Purpurbakterien gebildet. Etwa $\frac{1}{4}$ nat. Gr. (Orig.)

III. Gruppe. Eumycetes, Fungi.

1. Hefen.

Vorkommen der Hefen. In der freien Natur kann man wilde Hefen vor allem da finden, wo zuckerhaltige Flüssigkeiten ausgeschieden werden, z. B. an Wundstellen süßer Beeren, in Baumflüssen und in den Honig¹⁾ sezernierenden Organen der Blüten.

Als Nektarorganismen sind bekannt: Etwa 10 Hefen, gegen 20 Bakterien und zwei *Oidium*-ähnliche Pilze.

Nektarhefe fand sich z. B. bei: *Anthyllis vulneraria*, *Lathyrus silvester*, *Delphinium ajacis*, *Lamium album*, *Epilobium angustifolium* u. a. m.

Das Überwintern und längere Ausdauern der Hefen findet in der Regel im Boden statt.

Hefen finden sich häufig auch im Darm des Menschen und höherer Tiere, ferner auch in Insekten und Kleinkrebschen.

Ganz allgemein bekannt ist die Verbreitung der Kulturhefen in Weinmost und Bier. Ihre Reinzüchtung im großen hat sehr viel zur Sicherheit des Betriebes bei der Bereitung von Getränken durch Gärung beigetragen. Sehr leicht kann man sich schöne Sproßbäumchen von Hefen (s. d. Abb.) aus

Abb. 86.

Abb. 87.

Abb. 86. Typen sparriger Hefe-Sproßverbände. Keimungsbilder von Preßhefen in der Lindnerschen Tröpfchenkultur.

Abb. 87. Typen lockerer Hefe-Sproßverbände. Keimungsbilder von untergärigen Bierhefen in der Lindnerschen Tröpfchenkultur (nach 24 Stunden). Die einzelnen Glieder sind nur noch in lockerem Zusammenhang.

Weißbiersatz verschaffen. Die käufliche Preßhefe enthält in der Hauptsache nur Einzelzellen. (Färbung in der Regel mit Eosin oder Kopierstift.)

1) Bienenhonig ist in der Hauptsache mit Blütennektar identisch, doch sind noch Enzyme aus dem Bienenkörper beigemischt.

System und Verwandtschaft der Hefen. P. Lindner unterscheidet eine Reihe von durch wichtige Charaktere abgegrenzten Gruppen in der Ordnung der Saccharomycetinae.

1. Gruppe: Die Zellen bilden in zuckerhaltigen Nährflüssigkeiten sofort Bodensatzhefe. Die Sporen sind glatt, rund oder oval. Die meisten Arten dieser Gruppe rufen Alkoholgärung hervor. Hierher gehört die bekannte, von Meyen 1838 aufgestellte *Saccharomyces cerevisiae* und die durch Kopulation der Zellen ausgezeichnete *Zygosaccharomyces*.
2. Gruppe: Die Zellen bilden in zuckerhaltigen Nährflüssigkeiten sehr rasch eine Kahlhaut, also eine Oberflächenhaut (von stumpfem Aussehen). Die Sporen sind halbkugelig, eckig, hut- oder zitronen-

Abb. 88. Darstellung verschiedener Hefearten.

a <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (Bierhefe).	g <i>Saccharomyces cerevisiae</i> mit Sporen.
b <i>Saccharomyces pastorianus</i> .	h <i>Saccharomyces pastorianus</i> mit Sporen.
c <i>Saccharomyces ellipsoideus</i> I (Weinhefe).	i <i>Saccharomyces ellipsoideus</i> I mit Sporen.
d <i>Saccharomyces ellipsoideus</i> II	k <i>Saccharomyces ellipsoideus</i> II mit Sporen.
e <i>Saccharomyces ellipsoideus</i> I als Haut wachsend.	l <i>Saccharomyces ludwigii</i> , Sporenkeimung nach 18, 20, 26, 28, 29, 30 $\frac{1}{2}$ und 33 Stunden. Die Verschmelzung zweier Keimlinge ist fakultativ.
f <i>Saccharomyces ellipsoideus</i> I als Sproßmycel wachsend.	
- 1000fach vergrößert. (Nach E. Chr. Hansen.)

förmig. Die meisten Arten zeichnen sich durch ihre Esterbildung aus, einige rufen keine Gärung hervor. Viele wachsen, aber gären nicht. Sie verbrauchen Alkohol, bilden ihn aber nicht. Hierher gehört z. B. *Willia anomala* (Syn. *Saccharomyces anomalus*).

3. Gruppe: Den Zellen fehlt das Merkmal der Sprossung; sie vermehren sich durch Teilung und heißen deshalb Spalthefen, *Schizosaccharomyces* (s. S. 152). Sie finden sich ausschließlich in wärmeren Gegenden. *Sch. pombe* z. B. im Negerbier.
4. Gruppe: Sporenbildung fehlt.

Mycoderma hat langgestreckte bis ovale Zellen mit Fetttropfchen.

Torula hat runde Zellen mit Fetttropfchen. Hierher gehören rote Hefen. Ihr Farbstoff ist ein Karotin vgl. H. Will (1).

* * *

Die meisten Hefen haben ihren Ausgangspunkt in der Reihe der *Endomycetes* (s. dort), in Formen ähnlich dem *End. fibuliger* [Abb. bei P. Lindner (2)]. Die *Endomycetes* finden sich an blutenden Birken- und Eichenstümpfen, Baumrinden usw. Sie bilden ein schimmelartiges Mycel mit seitlichen Schlauchsporen bildenden Zellen, mit Oidien und mit Chlamydosporen. Vgl. später.

Als Inhaltsbestandteile der Hefen kommen vor allem in Betracht: Eiweiß, Fett und Glykogen.

Kulturmedien und Kulturgefäße. Die Reinkultur der Hefen kann in ähnlicher Weise vorgenommen werden wie bei Bakterien, nur wird man einen anderen Nährboden nehmen, z. B.:

Abb. 89. Riesenkolonien von vier verschiedenen Hefen, aus einem kleinen Impftropfchen entstanden. Das Alter beträgt etwa 4 Wochen. Die Kolonie in der ersten Flasche hat die als Nährsubstrat dienende Gelatine verflüssigt. $\frac{1}{2}$ der natürlichen Größe. (Nach P. Lindner.)

Malzextrakt	5 g
Pepton	0,2 g
Gelatine	10 g
Wasser	100 ccm

Pepton enthält Stickstoff und Kohlenstoff als organische Nahrung, ferner Phosphor, oft auch Kali, aber meist keinen Schwefel. Der Malzextrakt ergänzt in geeigneter Weise die bei alleiniger Gabe von Pepton

Abb. 90. Riesenkolonien von drei verschiedenen Hefen auf Würzegeatine, etwa 4 Wochen alt. Nat. Größe. Die Riesenkolonien geben sehr charakteristische Merkmale zur Unterscheidung der Arten ab. (Nach P. Lindner.)

fehlenden oder ungenügend vorhandenen Stoffe. Zum Herstellen von Reinkulturen auf Malz- oder Würzeagar verwendet man zweckmäßig Lindnersche Flaschen (Abb. 89) an Stelle der Reagensröhrchen.

Abb. 91. Impfstrichkulturen von sieben verschiedenen Hefen auf Würzegeatine, etwa 4 Wochen alt. Die Kolonien sind nicht aus einer Zelle entstanden, sondern aus nebeneinanderliegenden Zellen, welche durch Ziehen eines Striches mit der Platinnadel aufgetragen worden sind. Nat. Größe. (Nach P. Lindner.)

Als Kulturflüssigkeiten kommen unter anderen in Betracht:

1. Kartoffelpreßwasser (sogenanntes Fruchtwasser) mit Zuckerzusatz.
2. Sehr gut gärende Nährlösungen, enthaltend: Malzextrakt oder Malzbonbon ohne Fenchel, Rohrzucker, Pepton.
3. Pasteursche Nährlösung (zur Demonstration der Synthese des Eiweißes; s. S. 54) enthaltend: Traubenzucker, weinsaures Ammon und Nährsalze; vgl. Pasteur (1) u. (2) und Naegeli (1).

Die Lösung soll rein weiß, nicht gelb sein. Hier findet Eiweißsynthese aus weinsaurem Ammon und Traubenzucker statt. Das Ei-

weiß in der sich entwickelnden Hefe gibt gute Rotfärbung mit Millons Reagens (S. 49). Der Eiweißgehalt der Hefe ist hoch, ähnlich dem des frischen Fleisches.

4. Beijerincks Nährlösung, enthaltend: Traubenzucker, Biammonphosphat und Nährsalze. Hier wird Eiweiß aus Biammonphosphat und Traubenzucker gebildet.
5. Hayducksche Nährlösung, enthaltend: Rohrzucker, Asparagin und Nährsalze; vgl. P. Lindner (1).
6. E. Chr. Hansensche Nährlösung, enthaltend: Zucker (verschiedene), Pepton Witte und Nährsalze.

Als Kulturgefäße können verwendet werden:

1. Glaskolben von $\frac{1}{2}$ —1 l Inhalt.
2. Erlenmeyer-Kolben von 100—200 ccm Inhalt.
3. Hohle Objektträger mit Verschuß durch flüssiges Paraffin am Rande des Deckgläschens. Oft wird man dabei die für viele wissenschaftliche Arbeiten unentbehrliche Tröpfchenkultur von P. Lindner anwenden können, da sich in derselben die ungestörte Entwicklung der Organismen wochenlang verfolgen läßt und höchst charakteristische Habitusbilder entstehen.

Die Lindnersche Adhäsionskultur (dünne Nährlösungslamellen an dem Deckglächen des hohlen Objektträgers) gibt streng ebene Kolonien, welche für Mikrophotographie sehr geeignet sind und zum Studium von Vegetationsgemischen im natürlichen Nährsubstrat (Speichel, Milch, Blut usw.) dienen.

4. Gärflaschen von verschiedener Konstruktion [s. Abb. 95¹⁾].

Gärversuche.

1. Eine kräftige und schnelle Gärung kann man zum Studium des Gärprozesses erzielen, wenn man rd. 20 g Zucker in etwa 200 ccm lauwarmem Wasser löst (am besten in einer Kasserole) und bei höchstens 40° C darin mit der Hand 10 g Preßhefe (die kleinste käufliche Menge) verrührt. Statt Zucker könnte man auch Pflaumensaft, Apfelsaft (Pomril), Malzextrakt (Würze), Sirup u. a. m. verwenden. Vgl. auch S. 36. Zusatz einer Nährsalz-Tablette (S. 4) oder von Pepton (N-Quelle) ist nur dann erforderlich, wenn Wachstum der Hefe erwünscht ist. Die hergestellte Menge reicht zur gleichzeitigen Ausführung der meisten folgenden Versuche.

Die Alkoholgärung ist in der Hauptsache ein Spaltungsprozeß, welcher, wenn man nur die Endprodukte berücksichtigt und von Nebenreaktionen absieht, nach der Formel verläuft:

1) Von Ehrhardt und Metzger in Darmstadt, Ph. Braun in Mainz usw. Flaschen von mehreren Litern Inhalt kosten einige Mark.

Rohrzucker wird erst durch Invertase in Monosaccharide verwandelt werden müssen, ehe die Zymase ihn angreift.

Werden Hefen durch Einwerfen in Azeton getötet, so bleibt die von E. Buchner 1896 entdeckte Zymase (Gemisch von Enzymen) als wirksamer Bestandteil zurück, nachdem das Azeton verdunstet ist. Vgl. Lafar (1), Onslow (1920).

2. Nach 10–20 Minuten beginnt die Gärung bei 25–35° C; nach $\frac{1}{2}$ Stunde ist sie bereits sehr lebhaft. Man gießt nun nach dem Umschwenken der Flüssigkeit einen Teil derselben in ein Becher- oder Wasserglas und stellt ein mit der gärenden Flüssigkeit bis zum Rand gefülltes Reagensglas hinein. Nach etwa 30 Minuten wird dieses sich bereits bis etwa zur Hälfte mit Kohlensäure gefüllt haben, obgleich bei weitem nicht die ganze Kohlensäure hineinsteigt, welche in dem Becher- bzw. Trinkglas entsteht.

Das ganze Reagensglas kann sich nach einiger Zeit mit Kohlensäure füllen, dadurch hochgehoben werden und herausfallen.

Abb. 92.

Abb. 93.

Abb. 94.

Abb. 92. Einfache Gärröhre, mit gärender Flüssigkeit gefüllt. Biegungsstelle durch ein Stück Gummischlauch ersetzt. Beim Füllen und Entleeren wird der Apparat gerade gestreckt. Rd. $\frac{1}{4}$ nat. Größe. (Orig.).

Abb. 93. Gärflasche unter Wasser, mit Vorrichtung zum Auffangen der Kohlensäure. Rd. $\frac{1}{4}$ nat. Größe. (Orig.).

Abb. 94. Apparat zum Messen des Gärdruckes. Beim Aufsteigen des Hg infolge des Druckes der Gärungskohlensäure bis zum oberen Strich wären 8 Atm. Gesamtdruck erreicht. $\frac{1}{3}$ nat. Größe. (Orig.).

3. Einen einfachen Gärversuch kann man auch in der Weise anstellen, daß man in ein Reagensglas Gärlösung füllt und dieses mit einem Gummistopfen verschließt, durch den ein rechtwinklig gebogenes Glasrohr geführt ist. Dreht man das Ganze um, so tropft aus dem Rohr, in dem Maße wie sich Kohlensäure bildet, Flüssigkeit heraus.
4. Sehr einfach und anschaulich gestaltet sich der Versuch in der Form, wie ihn Abb. 92 wiedergibt. Füllung und Reinigung sind sehr leicht. Schnelle Absorption der CO_2 erfolgt (bei Neigen) durch ein Stück Ätzkali.
5. Nach Abb. 93 läßt sich die gebildete CO_2 leicht sehen, hören und auffangen. Das nach unten gebogene Glasröhrchen kann mittels Stopfen, Gummischlauch oder nassem Papier auf die kleine Flasche *a* (50—150 g) aufgesetzt werden. Soll der Versuch quantitativ sein, muß das Wasser in den großen Gefäßen *b* u. *c* gleich zu Beginn mit CO_2 gesättigt werden.
6. Um den entstehenden Gärdruk zu messen, bediene man sich des in Abb. 94 wiedergegebenen Apparates¹⁾ [vgl. auch Kolkwitz (7)].

Die druckfesten Kugeln werden mit rd. 100 ccm Gärflüssigkeit gefüllt. Nach Schließen des gut gefetteten Hahnes (ev. noch durch Leukoplastheftpflaster zu befestigen), wird durch die entstehende CO_2 das Hg im geschlossenen Schenkel emporgedrückt. Die mögliche Steighöhe beträgt 12 cm; bei 6 cm herrscht 1 Atm. Luftdruck + 1 Atm. CO_2 -Druck = 2 Atm., bei 9 cm = 4 Atm. Hier wird der Hahnkegel meist herausgetrieben. Bei guter Be-

Abb. 95. Gärflasche mit hydraulischem Gärverschluß. Etwa $\frac{1}{6}$ nat. Größe.

festigung des Kegels können 8 Atm. (höchstens) erreicht werden. Bei Ventilverschlüssen entstehen über 60 Atm. Druck.

7. Gärversuche in etwas größerem Maßstab kann man in der Flasche Abb. 95 ausführen²⁾. Man benutze z. B. Malzextraktlösung mit Zucker und Weinsteinsäure, füge zwei Nährsalztabletten (S. 4) hinzu und bewirke die Gärung (rd. 8 Wochen) in vollkommen gefüllter Flasche durch (käufliche) südländische Hefe. Nach Lagern von mehreren Monaten auf Flaschen entsteht ein klarer, aromahaltiger Wein.
8. Setzt man zuckerhaltige Nährlösungen mit nektarienführenden Blüten an, so beginnt bei genügendem Luftzutritt zunächst ein Wachstum

1) Angefertigt von der Firma Bleckmann und Burger, Berlin N, Auguststraße 3a.

2) Im Großbetrieb wird Alkohol erzeugt in Brennereien, Brauereien, Weinkeltereien und manchen Zellstofffabriken (Zellulosesprit aus 2—3 % Zucker der Kocherlaugen)

der Nektarhefen. Führt man dann die Gärung unter Luftabschluß und ev. Druck weiter, so entstehen kohlensäurehaltige, aber alkoholarme Getränke von besonderem Aroma.

9. Kleingärmethode nach Lindner. Man bringe eine kleine Menge gärender Nährlösung auf einen hohlgeschliffenen Objektträger und schiebe unter Vermeidung von Luftblasen ein Deckgläschen über. Man wird sogleich Bläschen von Kohlensäure entstehen sehen, welche man durch seitliches Zufügen von Kalilauge wieder absorbieren kann. Man beobachte diese Absorption unter dem Mikroskop.

Die weiter ausgebaut Kleingärmethode macht die Prüfung der Vergärbarkeit der verschiedenen Zuckerarten überaus leicht und hat für die Kennzeichnung der einzelnen Gärungserreger besondere Bedeutung erlangt.

Bei nichtgärenden roten Hefen entstehen naturgemäß bei dem Versuch mit dem hohlgeschliffenen Objektträger keine Kohlensäurebläschen. In diesem Falle wird Zucker nur zum Wachstum der Hefezellen verbraucht, aber nicht durch enzymatische Wirkung zerstört.

10. Den bei der Gärung entstandenen Alkohol kann man mit Hilfe der Jodoformmethode feststellen. Man füge zu diesem Zwecke zu der filtrierten Flüssigkeit reichlich metallisches Jod unter schwachem Erwärmen und setze dann etwas nicht alkoholische Kalilauge hinzu. Beim Abkühlen wird man einen Niederschlag von gelbem, typisch riechendem Jodoform erhalten. Die einzelnen Kristalle haben im allgemeinen die Form sechsseitiger Plättchen.

Der Alkohol läßt sich auch leicht durch Hitze austreiben und anzünden. Will man nicht einen Glaskolben mit langem aufgesetztem Rohr benutzen, so kann man die Apparat Abb. 96 verwenden.

Abb. 96. Versuchsanordnung zum Austreiben des durch Gärung entstandenen Alkohols. [Aluminium-, Emaille- und Kupfergefäß (sog. Dampferzeuger).] Die Gefäße werden zu etwa $\frac{1}{8}$ gefüllt. Rd. $\frac{1}{6}$ nat. GröÙe. (Orig.)

Bei Verwendung von Wein (oder starken Bieren) erhält man lange Flammen, die in günstigen Fällen einige Minuten brennen.

11. Nach Neuberg und Reinfurth (1) wandelt sich bei der Gärung der Zucker schrittweise in Brenztraubensäure (hierbei Abspaltung von CO_2), Acetaldehyd und Alkohol um. Das Zwischenprodukt Acetaldehyd läßt sich leicht binden (Abfangmethode) wenn man etwa 10 % möglichst frischen Kalziumsulfits (CaSO_3) zusetzt. Nach etwa 10–60 Minuten fülle man ein Reagensglas nur etwa ein

Abb. 97. Reagentien zum Nachweis des Zwischenproduktes Acetaldehyd bei der Hefegärung. Rd. $\frac{1}{8}$ nat. Größe. (Orig.)

Viertel mit dieser Flüssigkeit voll und füge die aus Abb. 97 ersichtlichen Reagentien zu. Es tritt bei Gegenwart von Acetaldehyd deutliche Blaufärbung ein.

Bei der intramolekularen Atmung (S. 72) treten ähnliche Stoffe auf.

Bisweilen wird vielleicht nur bis zur Brenztraubensäure abgebaut.

12. Alkoholische Gärung der Aminosäuren. Nach F. Ehrlich (1) bereite man folgende Lösung:

Wasser	100 ccm
Zucker (unentbehrlich)	10 g
Leucin	rd. 0,25 g
Preßhefe	2 g
Nährsalze	ev. zusetzen.

Es bildet sich optisch inaktiver, auf Zusatz von Isoleucin optisch aktiver Amylalkohol (Fuselöl). Die Hauptbestandteile der Fuselöle sind als Produkte des normalen Eiweißstoffwechsels der lebenden Hefen anzusehen. Außer bei Gärungen finden sich Fuselöle in der Natur noch in geringen Mengen in ätherischen Ölen vieler Pflanzen meist in Form von Estern; beim Schälen der Bananenfrüchte z. B. verbreitet sich ein deutlicher Geruch nach Amylacetat.

Aus Tyrosin bilden Hefen Tyrosol (p-Oxyphenyläthylalkohol) und Tryptophol (β -Indolyläthylalkohol), neben Glycerin, Bernsteinsäure und Fuselöl regelmäßige Produkte der alkoholischen Zuckerhefegärung (F. Ehrlich, Biochem. Zeitschr. 1917).

2. Schimmelpilze.

Rohkulturen einfachster Art. Das unvermeidliche Verschimmeln vieler feuchter Substrate beweist, daß eine Reihe von Schimmelpilzen leicht ausreichende Ernährungsbedingungen findet.

Rohkulturen verschiedenster Art kann man sich in der Regel schnell verschaffen, und zwar auf folgende Weise:

1. Man tränke Brot, Semmel oder Pflanzenpreßpapier mit Zuckerwasser, verdünntem Sirup, Pflaumendekott, Malzextrakt oder

dergleichen und bewahre sie feucht auf. Dann werden in fast allen Fällen Schimmelpilze zu reichlicher Entwicklung gelangen, oft so reichlich, daß das ganze Laboratorium durch die massenhafte Verbreitung der Sporen gleichsam verseucht werden kann.

2. Frischer Pferdemist, unter einer Glasglocke aufbewahrt, ist ohne jede Zutat ein vorzügliches Nährsubstrat, besonders für *Mucor* (S. 149).
3. Man drücke eine halbgar gekochte Kartoffel mit der Schnittfläche auf dem Fußboden oder auf der Erde ab und lege sie unter eine Glocke, welche mit etwas feuchtem Fließpapier ausgekleidet ist und in einer wasserhaltigen Schale steht.
4. Man bewahre eine durchschnittenen Zitrone (am besten feucht) auf. Man kann dann mit Sicherheit die Entwicklung von *Penicillium* auf den Schnittflächen meist nach etwa einer Woche erwarten. Dabei ist zu bemerken, daß frische Zitronen schwerer schimmeln als alte, bereits gedrückte. Vgl. auch S. 152.

Schimmelpilze bevorzugen im Gegensatz zu den meisten Bakterien saure Substrate. Sie scheiden häufig auch selbst Säuren aus und vermögen dementsprechend Marmorplatten zu korrodieren.

Reinkulturen und Kulturgefäße. Es lassen sich folgende Verfahren anwenden:

1. Petrischälchen mit Bakteriennährgelatine (S. 116) geben die Möglichkeit auch zur Entwicklung von Schimmelpilzen, wenn man die Platten einige Zeit (z. B. eine halbe Stunde lang) der Luft aussetzt. Es entwickelt sich dabei in der Regel bald *Penicillium*.

Läßt man die Platte nach einer etwa halbstündigen Exposition noch 1—2 Wochen stehen, so entwickelt sich oft noch das *Cladosporium herbarum* (S. 154).

2. In gleicher Weise kann man statt Bakteriennährgelatine solche mit Malzextrakt, Pflaumendekokt oder dergleichen anwenden.

Pflaumendekokt bereitet man in der Weise, daß man Backpflaumen mit so viel Wasser übergießt, daß alle Früchte gerade untertauchen. Der mit den Nährsalzen aus den Pflaumen auskristallisierte Zucker löst sich in diesem Wasser. Nach 24 Stunden gieße man dieses Wasser ab, ohne die Pflaumen auszudrücken, da sich sonst Schleimsubstanzen beimischen könnten. Hierauf filtriert man die Lösung zweckmäßig und dickt sie dann auf dem Wasserbade zu einem Sirup ein. Dieser ist seiner Konzentration wegen unbegrenzt haltbar.

Um eine Nährlösung herzustellen, wird einfach ein Teil dieses Sirups mit Wasser verdünnt. Die Konzentration kann, wenn sie nicht übermäßig groß ist, ganz nach Belieben gewählt werden, da viele Schimmelpilze in bezug auf diesen Punkt absolut nicht wählerisch sind. Die Lösung reagiert sauer und ist deshalb, wie bereits angedeutet, für die Kultur der meisten Bakterien wenig geeignet.

3. Diakonowsche Nährlösung:

Wasser	1 l
Chinasäure (unvergärb.)	50 g
Ammoniumnitrat	1,0 g
Monokaliumphosphat	1,5 „
Magnesiumsulfat	0,5 „
Chlorkalzium	0,1 „

Gießt man von dieser farblosen Flüssigkeit, welche die Synthese von Eiweiß aus Chinasäure und Ammoniumnitrat zu demonstrieren gestattet, in flacher Schicht in eine Kulturschale aus, so kann man darin Schimmelpilze sehr leicht kultivieren.

4. Raulinsche Nährlösung: Sie enthält Rohrzucker, Weinsäure, Ammoniumnitrat und andere Nährsalze, außerdem Reizstoffe, wie Zinksulfat. Diese Nährlösung nach Raulin (1) liefert ein gutes Substrat, ist aber unnötig kompliziert zusammengesetzt (vgl. Benecke).

5. Kultur in Lindnerschen runden Pilzgläsern auf Würzelgelatine.

Diese Lindnersche Methode erinnert in manchen Punkten an die in der Bakteriologie erwähnten Esmarchschen Rollkulturen in Reagensröhrchen.

Zahlreiche Photographien von in Reinkultur gewachsenen Schimmelpilzen finden sich in dem von P. Lindner (2) veröffentlichten Atlas, Kulturmethoden von großer Einfachheit bei vollkommener Exaktheit in seiner „Mikroskopischen Betriebskontrolle“.

Übersicht über die Schimmelpilze. (Taf. III.)

Phycomycetes:

- Tafelfig. 1. *Mucor* (*mucedo*),
 „ 2. *Rhizopus nigricans*,
 „ 3. *Syzygites megalocarpus* (*Sporodinia grandis*),
 „ 4. *Thamnidium elegans*,
 S. 150. *Phycomyces nitens*,
 Tafelfig. 5. *Pilobolus longipes*,
 „ 6. *Saprolegnia monoica*,
 S. 151. *Leptomitus lacteus*.

Ascomycetes:

- S. 152. *Endomyces decipiens*,
 Tafelfig. 7. *Aspergillus niger*,
 „ 8. *Penicillium glaucum*.

Erläuterungen zu Tafel III.

1. *Mucor* (*mucedo*) im opt. Querschnitt. Vgr. rd. 200. 2. *Rhizopus nigricans*. Vgr. rd. 150. 3. *Sporodinia grandis*. Vgr. 120 u. 70. 4. *Thamnidium elegans*. Vgr. 100. 5. *Pilobolus longipes*. Vgr. rd. 40. 6. *Saprolegnia monoica*. Vgr. 250. 7. *Aspergillus niger* im opt. Querschnitt. Vgr. 200 u. 600. 8. *Penicillium glaucum*. Vgr. 250. 9. *Botrytis cinerea*. Vgr. 250 u. 500. 10. *Cladosporium herbarum*. Vgr. rd. 250.
 (Original von Clemens Müller nach Präparaten von M. O. Reinhardt.)

Schimmelpilze.
Erläuterungen s. im Text.

Hyphomycetes (Fungi imperfecti):

S. 153. *Oidium* (Oospora) lactis,„ 154. *Monilia* sitophila,Tafelfig. 9. *Botrytis* cinerea,„ 10. *Cladosporium* herbarum,S. 154. *Mycorrhiza*-Pilz.

1. **Mucor (mucedo).** (Sammelart.) Köpfchenschimmel (Phycomycetes). Es wurde bereits erwähnt, daß man *Mucor* sehr einfach und sicher auf frischem Pferdemist ziehen kann, doch wächst er auch auf anderen in Zersetzung befindlichen Substraten, auf Brot und auf gezuckerten Nährböden.

Die schwärzlichen Köpfchen sind von verschiedener Größe (Fig. 1); ihre Membran zerfließt bei Wasserzusatz leicht, wodurch Sporen und Kolumella frei werden.

Diese Köpfchensporen sind unmittelbar nach erfolgter Reife keimfähig. In Mistdekokt, Malzagar oder dergl. übertragen, schwillt die Spore zunächst an und bildet dann den Keimschlauch, der sehr rasch in die Länge wächst, sich verzweigt und ein so gut wie querwandfreies Mycel bildet.

Bildung von Zygosporen aus diöcischen (heterothallischen) Mycelien ist bei Wachstum auf Pferdemist usw. beobachtet worden. [O. Brefeld (1), Bonner Lehrbuch S. 391.]

Während *M. mucedo* ein Luftschimmel ist, können *M. racemosus* und *M. (xygorrhynchus)* (Azygosporen) Wasserschimmel sein, welche die Ufer nährstoffreicher Gewässer wie mit Schaffellen auszukleiden vermögen; vgl. Gruppe VI.

2. **Rhizopus nigricans** (= *Mucor stolonifer*). Dieser bekannte Köpfchenschimmel bildet Ausläufer (Stolonen) mit büscheligen Haftfäden (Fig. 2). Sein Mycel wächst sehr rasch. Die Köpfchensporen sind eckig; die Kolumella sinkt oft schirmartig ein (Fig. 2). Auch hier entstehen die Zygosporen aus heterothallischen Mycelien.
3. **Syzygites megalocarpus** (Ehrenberg, nach den Zygosporen) = **Sporodinia grandis** (nach den Sporangien). Der Pilz wächst saprophytisch auf den verschiedensten fleischigen Pilzen (*Boletus*, *Lepiota*, *Lactarius*, *Russula* usw.). Er ist leicht reinzuzüchten. Klebs (1) zeigte die weitgehende Beziehung der Fortpflanzungsformen zur Beschaffenheit des Substrates [vgl. auch Falck (1)]. In Fig. 3 ist ein Ast eines Sporangiumträgers, die beginnende Kopulation (homothallisch) und eine Zygospore dargestellt; auch Azygosporen kommen vor, wie überhaupt eine Rückbildung der Geschlechtlichkeit bei den Phycomycetes nicht selten eintritt. Die (zahlreichen) Zygotenkerne verschmelzen paarweise miteinander. Die Zygosporen keimen schon im destillierten Wasser, wenn sie vorher nicht völlig ausgetrocknet waren. Kny, Wandtaf. 109 und 110.

Nach Kniep ist die geschlechtliche Fortpflanzung keine physiologische, wohl aber eine ökologische (Gruppe VI) Notwendigkeit (vgl. auch S. 96). Morphologische Geschlechtsgleichheit ist mit physiologischer Geschlechtsverschiedenheit verbunden.

4. **Thamnidium elegans.** Der Pilz findet sich häufig auf Mist und verschiedenen zersetzlichen Substanzen. An demselben Träger finden sich gewöhnlich ungleiche Sporangien, vielsporige am Ende und wenigsporige (Nebensporangien) an seitlichen Verzweigungen (Fig. 4). Auch hier sind Zygosporien (ähnlich denen bei *Mucor*) beobachtet worden.

— **Phycomyces nitens.** Dieser durch seine großen, stark phototropisch empfindlichen Sporangienträger [Sierp (1), Buder (2)] bekannte Pilz bildet nach Blakeslee ebenfalls +-Mycelien und --Mycelien, bei

Abb. 98.

Abb. 99.

Abb. 98. *Phycomyces nitens*, die Sporangienträger infolge einseitiger Beleuchtung zum Licht gekrümmt. Glocke rechtsseitig innen matt geschwärzt. Rd. $\frac{1}{6}$ nat. Größe. (Neuzeichnung nach Pfeffer.)

Abb. 99. *Phycomyces nitens*, +- und --Mycelien beim Zusammentreffen geschlechtlich Zygosporien bildend. Rd. $\frac{1}{3}$ nat. Größe. (Orig.)

deren Zusammentreffen Zygosporien (Abb. 99) leicht auf dem Substrat entstehen. Das (wahrscheinlich weibliche) --Mycel verarbeitet den Zucker besser als das +-Mycel. Der Pilz findet sich besonders in Ölmühlen und Stearinfabriken an Fässern. Er läßt sich leicht auf Bierwürze-, Pflaumenagar usw. züchten. Die Zygosporien keimen schwer; sie liefern ein zwitteriges Mycel mit ♂, ♀ und ♀ Sporangiosporien.

Absidia glauca ist ebenfalls heterothallisch und erzeugt die Zygoten in der Luft. Der Pilz läßt sich auf Bierwürzeagar züchten.

5. **Pilobolus crystallinus.** Hutwerfer. Man sammle frische [noch glänzende¹⁾] Hirsch- oder Rehlosung im Walde und bewahre sie unter einer Glasglocke oder in einer Doppelschale in feuchter Luft auf. Es wird sich nach meinen bei Berlin gesammelten Er-

1) Stumpf und mehr grau erscheinendes Material kann schon mehrere Jahre alt sein.

fahrungen mit absoluter Sicherheit der zierliche *Pilobolus crystallinus* entwickeln, an dem experimentelle Beobachtungen über Phototropismus der köpfchentragenden Hyphen (Fig. 5, *P. longipes*) und über die Schleuderkraft infolge hydrostatischer Entspannung angestellt werden können.

Näheres s. bei O. Brefeld (1) und Jost (1).

6. **Saprolegnia monoica** (u. a. Species). Wirft man tote Fliegen oder halbe Mehlwürmer (welche durch heißes Wasser getötet wurden) in eine große Schale mit Wasser und etwas Sumpfschlamm, so entwickelt sich an den Wundstellen des Nährkörpers bei über 12°C der Wasserschimmel *Saprolegnia* in Form von weißen ausstrahlenden Büscheln [Taf. VII und Kolkwitz (2)].

Die Gattungen *Saprolegnia*, *Achlya*, *Aphanomyces* u. a. m. befallen auch Fische und Krebse; dabei liegt aber meist fakultativer Parasitismus vor, da vollkommen gesunde Tiere in infiziertem Wasser pilzfrei und lebenskräftig zu bleiben pflegen.

Fig. 5, Taf. III, stellt ein junges und ein reifes Schwärmsporangium mit Durchwachsungen dar; außerdem die Befruchtung. Der Pilz ist leicht reinzuzüchten.

- **Leptomitius lacteus** = (*Apodya lactea*). Der Pilz wächst ebenfalls auf Mehlwürmern; man muß aber in der Regel eine kleine Probe

Abb. 100. *Leptomitius lacteus*. Verzweigter Faden mit Gemme, Sporangium mit reifen Schwärmsporen, gekeimte Schwärmsporen. Vergrößerung mittelstark. (Orig.)

des Mycels direkt auf die Schnittfläche aufimpfen. Er ist die einzige *Saprolegniacee*, welche in Massenbeständen im Freien vorkommt, und zwar als schaffellartiger Besatz in fließenden Gewässern mit

organischen, ernährenden Substanzen. Näheres s. unter Nr. 102 der pflanzlichen Wasserorganismen.

Die nebenstehende Abbildung zeigt ein verzweigtes Fadenstück mit Gemme, ein Sporangium mit reifen Schwärmsporen und junge Keimpflänzchen. Geschlechtsorgane sind zuverlässig nicht bekannt.

- **Endomyces decipiens** (Ascomycetes). Der weiße Pilz Abb. 101 lebt in der freien Natur im gärenden Schleimfluß der Eichen und

auf zersetzten Hutpilzen. Er bildet Oidien, gemmenartige Chlamydosporen und Askosporen (Abb. 101 rechts).

E. magnusii zeigt Beziehungen zu den Spalthefen, *E. fibuliger* zu den Sproßhefen. Vgl. S. 140.

Abb. 101. *Endomyces decipiens*, rechts mit Askussporen, links mit Chlamydosporen und abgegliederten Oidien. Vergrößerung rd. 300-fach. (Nach Brefeld.)

7. **Aspergillus niger**. Kolbenschimmel. Der Pilz gedeiht sehr gut in Diakonowscher Nährlösung u. a. m., eignet sich auch zur Kultur in Lindnerschen Rundgläsern. Sein Mycel ist weiß, während die Sporen schwarze Farbe besitzen (welche in Ammoniakwasser löslich ist). Er scheidet krystallisierte, dendritische Stoffwechselprodukte aus, wahrscheinlich Amine (vgl. Oidium). Ein Habitus- und Detailbild s. Fig. 7, Taf. III.

A. herbariorum entsteht, mit Askusfrüchten, ziemlich häufig zwischen feuchtem gebrauchten Pflanzenpreßpapier.

8. **Penicillium glaucum**. Grüner Pinselschimmel (u. a. Species). Der Pilz ist 1874 von O. Brefeld besonders sorgfältig beschrieben und abgebildet worden. Die Sporen, welche überall verbreitet sind, keimen mit 1—6 Keimschläuchen. Das entstehende Mycel ist reich gegliedert, benachbarte Äste können miteinander fusionieren. Die Form der pinselförmigen Konidienträger geht aus der Abbildung hervor. Fig. 8 der Tafel zeigt einen Sporenträger mit länglichen Kernen. Die Bildung der Askusfrüchte scheint selten stattzufinden.

Man kann den Pilz auf Gelatineplatten leicht aus Luft einfangen, wie S. 147 bereits bemerkt wurde. Solange seine Konidienträger noch etwas unreif sind, d. h. noch wenig grüne Färbung angenommen haben, eignen sie sich ausgezeichnet zum Studium der Verzweigung der pinselartigen Träger. Man legt zweckmäßig ein Deckgläschen auf und bringe die Petrischale mit der Kultur unter das

Mikroskop. (Vergrößerung 200—300-fach; eventl. Kompensationsokular 12.) Lit. Westling (1), Tiegs (Wasserschimmel).

P. glaucum und *Aspergillus niger* sind in ungewöhnlichem Grade befähigt, auf konzentrierten Lösungen unter Bewahrung der Turgeszenz zu gedeihen. Die lebenden Zellen speichern Kongorot.

Abb. 102. *Penicillium glaucum*, Pinselschimmel. A 120-fach, B 730-fach vergrößert. A stellt ein kleines Mycel des Pilzes mit ungeschlechtlichen Sporenträgern *t* dar. Bei *a* die Keimspore. B zeigt den oberen Teil des Sporenträgers stärker vergrößert; *b* sind dessen Basidien, *c* stellt eine Konidien-(Sporen-)Kette dar. Die jüngsten Sporen liegen an der Basis der Ketten. (Nach O. Brefeld).

P. luteum (käuflich) besitzt ein rotes Mycel und gelbe Sporen. Es eignet sich gut zu Kulturen in Lindnerschen Gläsern.

P. brevicaulis dient zum Nachweis von Arsen; vgl. Abel und Buttenberg (1) und Lafar (1), Bd. I, Johan-Olsen (1).

Bei Kulturen in Gläsern und Petrischalen beobachtet man öfter ringförmiges Wachstum nach Art der Hexenringe. Bei manchen Schimmelpilzen, z. B. *Penicillium luteum*, entstehen diese Ringe unter dem Einfluß der Belichtung beim Wechsel von Tag und Nacht.

- **Oidium** (*Oospora*) **lactis**. Milchschiimmel (Hyphomycetes). Dieser Pilz findet sich häufig im Rahm saurer Milch, erregt aber nicht die Milchsäuregärung. Er gedeiht auch auf frischer süßer Milch, Brot, Mist usw. (vgl. auch *Endomyces*). Bei Kultur in Lindnerschen Gläsern tritt der Seidenglanz seiner Kolonien besonders deutlich

hervor. Der Pilz wächst ausgezeichnet in mineralischen Nährlösungen mit Alkohol als alleinige Kohlenstoffquelle. Er spaltet, wie auch *Penicillium* u. a. m., nach F. Ehrlich (2) Aminosäuren, bildet aus Hordenin Tyrosol (S. 146) und aus Betain Glykolsäure.

- **Monilia sitophila** (= *Oidium lupuli*). Dieser Pilz zeichnet sich durch sein schnelles Wachstum aus. Er ist käuflich und zu Kulturen in Lindnerschen Gläsern geeignet. Das Mycel enthält nach Went Karotinoide.

M. fructigena und *M. cinerea* können auf Obstbäumen parasitären Charakter tragen (S. 159).

9. **Botrytis cinerea**. Grauer Schimmel. Der Pilz lebt meist saprophytisch auf Pflanzenteilen und ist weit verbreitet. Ein Habitus- und Detailbild ist auf Taf. III dargestellt. Bei einigen Arten der Gattung finden sich ebenso wie bei der vorliegenden Sklerotien, welche an diejenigen von *Sclerotinia fuckeliana* erinnern. Er kann leicht auf Gelatinenährboden gezüchtet werden.

B. bassiana tötet die Seidenraupen.

10. **Cladosporium herbarum** (= *Dematium pullulans* = *Hormodendron cladosporioides*, wahrscheinlich auch = *Mycosphaerella tulasnei*). Der Pilz entwickelt sich oft auf (längere Zeit aufbewahrten) Gelatineplatten in Petrischalen, welche staubiger Luft ausgesetzt waren (S. 147), in Form schwarzgrüner Kolonien (mikrosk. Bild s. Taf. III). Die jüngsten Sporen entwickeln sich an der Spitze. In der freien Natur lebt er meist saprophytisch (selten parasitisch) auf Pflanzenteilen.

Nach neueren Untersuchungen von Ch. Ternetz und H. Froehlich scheint er den freien Stickstoff der Luft zu assimilieren.

Ein bekannter Schimmel unter den Fungi imperfecti ist auch *Trichothecium roseum*, z. B. auf faulenden Tomaten.

- **Mycorrhiza**. Wurzelpilz. Verschiedene höhere Pflanzen haben Pilzwurzeln, besonders Orchidaceae, Pinaceae, Fagaceae (Abb. 103) und Ericaceae. *Mycorrhiza*-Pilze von Orchideen sind von H. Burgeff in Reinkulturen gezogen worden (vgl. auch S. 56). Die Pilze scheinen bei uns, wenigstens zum Teil, zum Röhrling (*Boletus*) und zur Lorchel (*Gyromitra*) zu gehören.

Abb. 103. Pilzwurzel der Buche. Das Pilzgeflecht auch den Boden durchziehend. Schwach vergrößert. (Nach Kienitz-Gerloff.)

Abbildungen ektotropher und endotropher Mycorrhizen s. bei L. Kny und W. Magnus, Wandtafeln Nr. 116 und 117.

Zum näheren Studium der niederen Pilze sei noch verwiesen auf G. Lindau (2) u. (3), P. Lindner (1) u. (2) und Handwörterbuch (1).

3. Parasitische Pilze.

Die durch Pilze an Pflanzen und Tieren erzeugten Krankheiten bzw. Umbildungen beanspruchen ein ernährungsphysiologisches Interesse in ähnlicher Weise wie die Parasiten unter den Phanerogamen, welche im Teil A kurz behandelt sind. Die feinere Physiologie der Ernährung ist bei den Schmarotzerpilzen noch verhältnismäßig wenig erforscht, wir sind deshalb in erster Linie auf die Schilderung solcher Erscheinungsformen in dieser Gruppe angewiesen, welche physiologische Ausblicke gestatten; vgl. auch H. Klebahn (1).

Bezüglich der Bekämpfungsmethoden krankheitserzeugender Pilze sei auf die von der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft in Dahlem herausgegebenen Flugblätter verwiesen, ferner auf die a. a. O. genannte Literatur, auch auf G. Lindau (1). Die Abbildungen sind sämtlich Neuzeichnungen, teils Originale, teils nach den Arbeiten von Aderhold, Appel, Eriksson, Laubert u. a.

Eine kurze, aber inhaltsreiche Übersicht über die durch Pflanzen und Tiere erzeugten Krankheiten unserer Kulturpflanzen findet sich in der mit zahlreichen Abbildungen ausgestatteten Arbeit von O. Appel (1). Ausführlicheres s. im Handwörterbuch (1), bei Eriksson (1) und P. Sorauer (1).

Übersicht über einige Typen parasitischer Pilze.

Myxomycetes (wohl richtiger zu den Chytridineen zu rechnen).

Tafelfig. 1. Plasmodiophora brassicae.

Schizomycetes (s. dort).

Tafelfig. 2. Bacterium phytophthorum.

Phycomycetes.

Tafelfig. 3. Empusa muscae,

„ 4. Cystopus (Albugo) candidus,

„ 5. Peronospora viticola.

Ascomycetes.

Tafelfig. 6. Exoascus pruni,

„ 7. Rhytisma acerinum,

„ 8. Sphaerotheca mors uvae,

„ 9. Cordyceps militaris,

„ 10. Claviceps purpurea,

„ 11. Nectria cinnabarina.

„ — Monilia (Sclerotinia) cinerea.

Basidiomycetes.

Tafelfig. 12. *Ustilago avenae*,„ 13. *Puccinia graminis* (*Aecidium berberidis*),„ 14. *Exobasidium vaccinii*.

Fungi imperfecti.

Tafelfig. 15. *Phoma rostrupii*.

1. **Plasmodiophora brassicae.** Hernie¹⁾ der Kohlarten. Die Abbildung stellt eine Erkrankung der weißen Rübe dar.

Plasmodiophora lebt als Schmarotzer in Form von Schleimkörpern in lebenden Zellen der Wurzeln von Kreuzblütlern, an denen er gallenähnliche Bildungen hervorruft. Hauptsächlich werden Kohlpflanzen (*Brassica*) befallen. Es entstehen Anschwellungen an Haupt- und Nebenwurzeln, durch welche die Pflanze stark leidet (siehe Abbildung auf Taf. IV).

Die Krankheit ist außerdem an einer Reihe anderer Kreuzblütler beobachtet worden, z. B. *Raphanus*, *Sinapis*, *Camelina*, *Capsella*, *Thlaspi*, *Cardamine*, *Cheiranthus*, *Iberis*.

Wenn im Spätherbst die Sporen nach Verfaulen der erkrankten Wurzeln frei werden, infizieren sie den Boden. Im Frühling tritt aus der Spore ein Schwärmer heraus, der sich in junge Wurzelfasern einbohren und dadurch neue Erkrankungen hervorrufen kann.

Die Krankheit wird durch feuchten Boden begünstigt, durch trockneren kalkreichen gehemmt. *Chrysophlyctis* s. Flugbl. 53.

2. **Bacterium phytophthorum.** Erreger der Schwarzbeinigkeit der Kartoffel. Näheres siehe im Abschnitt Bakterien und im Flugblatt Nr. 28.

Die Krankheit wird dadurch bekämpft, daß man die befallenen Pflanzen vernichtet und für gesundes Saatgut sorgt, das vor dem Legen nicht zerschnitten werden darf. Die zur Aussaat bestimmten Kartoffeln müssen im Winter trocken und kühl lagern.

3. **Empusa muscae.** Schimmel der Stubenfliege. Der Pilz ist besonders auffällig an Fliegen, welche an Fensterscheiben verendet sind. Man erkennt deutlich einen weißen Hof von Pilzsporen um die toten, aufgedunsenen Tiere; dieser Hof entsteht auch, wenn man matte Fliegen tötet und auf den Objektträger legt.

Empusa ist stark pathogen und infiziert gesunde Tiere, welche man mit kranken unter eine Glocke bringt (Brefeld). Die keimenden Sporen durchdringen die Chitinhaut und durchwuchern den Fliegenkörper. Die Kultur des Pilzes als Saprophyt auf geeignetem Nähragar ist möglich, aber schwierig.

4. **Cystopus (*Albugo*) candidus.** „Weißer Rost“. Die Abbildung zeigt den Pilz als weißen, Deformationen bedingenden Überzug an dem

1) Hernie bedeutet die beim „Bruch“ entstehenden Vorwölbungen.

Parasitische Pilze.
Erläuterungen im Text.

Fruchtstand des Hirtentäschelkrautes (*Capsella bursa pastoris*.) Er befällt außerdem auch die Stengel und Blätter. Andere Cruciferen, wie *Sinapis*, *Thlaspi* usw., werden ebenfalls von dem Pilz bewohnt. Der durch ihn hervorgerufene landwirtschaftliche Schaden ist nur gering. Näheres siehe bei de Bary (1) und im Handwörterbuch (1). Die Wirtsspezialisierung ist wenig weitgehend.

5. **Peronospora** (*Plasmopara*) **viticola**. Falscher Mehltau des Weinstocks. Der Pilz erzeugt weißliche Schimmelrasen besonders auf der Unterseite der Blätter, welche dadurch erkranken und abfallen. In den Trauben erzeugt er „Lederbeeren“. Unter dem Mikroskop erscheinen diese Rasen zusammengesetzt aus bäumchenförmigen Konidienträgern, welche aus den Spaltöffnungen hervorragen. Die Keimprodukte der Sporen infizieren, besonders bei regnerischer Witterung, die Weinstöcke von neuem.

Der falsche Mehltau stammt aus Nordamerika; er ist fast noch gefährlicher als der echte (*Oidium tuckeri* = *Uncinula spiralis* = Aescherig), der in erster Linie Beerenkrankheiten, aber auch Blattbefall verursacht. Seine Bekämpfung geschieht durch Bespritzen der Weinstöcke mit Kupferkalkbrühe, während gegen *Oidium* hauptsächlich Schwefeln angewendet wird. Man vergleiche Flugblatt Nr. 41.

Phytophthora infestans, ein schmutziggrauer Blattschimmel, bewirkt die Krautfäule der Kartoffelpflanzen. Über seine einfache Kultur vgl. Kolkwitz (2).

- **Olpidium luxurians** (nicht abgebildet). Parasitiert auf im Wasser schwimmenden Pollenkörnern, besonders der Kiefer. Läßt sich durch Aufstreuen von Pollen auf Oberflächenwasser einfangen. Eine gute Übersicht über die Substrate, auf denen Chytridineen und Ancylistineen leben, findet sich bei M. v. Minden (1). Über *Chytridium olla* vgl. *Oedogonium*. Vgl. auch Zopf.

6. **Exoascus pruni**. Taschenkrankheit der Pflaumen. Der Pilz verunstaltet die Früchte bestimmter Pflaumensorten. Das Mycel durchzieht parasitisch auch Teile der Zweige und erzeugt Askuslager als gelbgrauen Reif auf den kranken Früchten unter der Kutikula.

Dürre Witterung hemmt seine Entwicklung. Er wird in der Weise bekämpft, daß man die kranken Früchte unschädlich macht (z. B. durch Verbrennen oder Eingraben) und die befallenen Zweige zurückschneidet (s. im Flugblatt Nr. 30).

7. **Rhytisma acerinum**. (rhytis = Runzel.) Teerfleckkrankheit der Ahornblätter, Runzelschorf. Das Bild zeigt die Krankheit auf einem Blatt des Spitzahorns (*Acer platanoides*). Die Membranen der Pilzfäden sind schwärzlich gefärbt. Askuslager entstehen auf den schwarzen Partien erst im Frühjahr, nachdem die abgefallenen Blätter während des Winters auf dem Boden gelegen haben.

Der Pilz ist kein besonderer Schädling. Man beseitigt ihn leicht, wenn man die kranken, abgefallenen Blätter verbrennt oder vergräbt (s. Flugblatt Nr. 29).

8. **Sphaerotheca mors uvae.** Erzeuger des amerikanischen Mehltaus des Stachelbeerstrauches. Der Pilz befällt die Blätter, Triebe und Früchte des Stachelbeerstrauches. Auf den Beeren erzeugt er braune, derbe Flecken, auf welchen Askusfrüchte entstehen (s. Flugblatt Nr. 35).

9. **Cordyceps militaris.** Der Pilz vermag, wie Versuche gezeigt haben, auch gesunde Raupen zu befallen und zu töten. Sein weißes Mycel verbreitet sich in dem Körper der Raupe und treibt aus dieser die Askusfrucht in Form gelbroter, auffälliger Keulen von mehreren, bis 6 cm Höhe.

Man findet den Pilz in manchen Jahren ziemlich häufig in Wäldern; die Raupen liegen flach unter der Erde, während die gelbroten Keulen hervorragen.

10. **Claviceps purpurea.** Mutterkorn. Der Pilz erscheint zunächst als sogenannter „Honigtau“ an den Blüten mancher Gräser, besonders des Roggens, in seiner Konidienform. Mit dem Reifen der Ähren verdichtet sich das Mycel in den Fruchtknoten zu dem „Mutterkorn“. Dieses „Sklerotium“ (Hartmycel) enthält Gifte [z. B. das Alkaloid Ergotin (C₃₅H₄₀N₄O₆)], sonst aber, wie alle Speicherorgane, auch wertvolle Nährstoffe, wie Phosphor, Lecithin und Fett (bis 35 %).

Die Sklerotien können zum Austreiben gebracht werden, wenn man sie bald nach der Getreideernte auf feuchten Sand oder feuchte Erde legt und damit nur teilweise bedeckt. Nach Verlauf von drei oder mehreren Monaten beginnen die in der Abbildung wiedergegebenen Stiele mit einem Köpfchen, in dem Perithezien mit Askus-schläuchen eingesenkt sind, sich zu entwickeln. Kny, Taf. 41–44. Die Keimung gelingt auch mit *Clav. microcephala* (auf *Molinia*).

Der Pilz wird dadurch bekämpft, daß man die Mutterkörner beseitigt und zur Saat möglichst reines Material verwendet; vgl. auch Flugblatt Nr. 21.

11. **Nectria cinnabarina.** Rotpustelkrankheit der Bäume. Dieser Pilz macht sich besonders durch rötliche Knötchen auf meist abgestorbenen Ästen vieler Gehölzarten bemerkbar; die Polster treten nach Sprengen der Rindenpartien hervor.

Die Konidienlager sind hellrot, die Askusfrüchte dunkelrot. Die Farbstoffe, welche ihren Sitz in den Membranen haben, sind mit Schwefelkohlenstoff extrahierbar.

Der Pilz kann außer als Saprophyt auch als Wundparasit auftreten.

Nectria ditissima erzeugt Krebs bei manchen Apfelsorten (Gravensteiner sind fast krebsfrei). Vgl. Flugblatt Nr. 17 und 25.

Weitere Baumschädiger siehe unter *Polyporus*.

- **Monilia** (*Sclerotinia*) **cinerea**. Abb. 16. Diese *Monilia* befällt besonders Kirschen und macht die Früchte faul. *Scl. fructigena* findet sich mehr auf Kernobst (Abb. 104). *Monilia* eignet sich ausgezeichnet zu Infektionen, besonders bei Kirschen und Birnen; Kolkwitz (2).

Die Bekämpfung der Krankheit geschieht dadurch, daß man alles Kranke verbrennt oder vergräbt (s. im Flugblatt Nr. 14).

12. **Ustilago avenae**. Flugbrand des Hafers. Das Mycel des Brandpilzes wächst mit der sich entwickelnden Pflanze empor und zerstört die Blüten, in denen sich die bekannten verstäubenden dunklen Brandsporen entwickeln.

Die Fig. 12 zeigt einen Teil einer Haferrispe, in der die Zerstörung an den unteren Partien der Spelzen sichtbar ist. Der Pilz kann die ganzen Ährchen in eine schwärzliche Masse verwandeln. In No. 48: Flugbrand v. Gerste u. Weizen.

Man bekämpft ihn durch vorsichtiges Behandeln des Saatgutes mit Formalin oder Heißwasser, wodurch die Sporen abgetötet werden; vgl. Flugblatt Nr. 38.

Tilletia caries verursacht den Stinkbrand (Trimethylamin!) des Weizens. Die Sporen keimen leicht im Wasser. Näheres siehe im Flugblatt Nr. 26.

13. **Puccinia graminis**. Rost der Getreidepflanzen. (Nach Thomas Puccini, Professor der Anatomie am Lyzeum zu Florenz.) Der Pilz findet sich auf allen Getreidesorten und auf vielen anderen Gräsern; er erzeugt hier rotgelbe Uredosporen und braune Teleutosporen. Die Aecidiumbecher entstehen auf den Blättern der Berberitze (Wirtswechsel) oder auf denen von *Mahonia aquifolium* als Berberitzen-Fleckenrost oder -Becherrost (siehe die Abbildung).

Schon mit etwa 14-fach vergrößernden Lupen kann man oft ausgezeichnet beobachten, daß die Teleutosporenlager (z. B. auf Schilfblättern) unter der Epidermis hervorbrechen.

Will man von solchen Sporen mikroskopische Dauerpräparate anfertigen, so befeuchte man sie zuvor mit Alkohol und kratze sie dann mit einer Nadel oder dergleichen ab.

Abb. 104. *Monilia fructigena*; nach Impfung durch Stich auf einer Birne gewachsen. Rechts: mumifizierte, vom Pilz durchwucherte Frucht. Etwas verkleinert. (Orig.)

Die *Aecidium*-Becher¹⁾ eignen sich sehr gut zu mikroskopischen Trockenpräparaten auf schwarzen Objektträgern mit aufgekittetem Ring. Die Präparate liefern bei schwacher mikroskopischer Vergrößerung sehr gute Bilder, wenn man sie von oben her mit einer hellbrennenden elektrischen Taschenlampe beleuchtet. Auch Teleutosporen, besonders von *Phragmidium rosarum*, lassen sich auf diese Weise gut beobachten.

Klima und Boden sind von Einfluß auf die Heftigkeit, mit welcher die Krankheit auftritt.

Die bekannte Umgestaltung der Wolfsmilch (*Euphorbia cyparissias*) wird durch das *Aecidium*-Stadium von *Uromyces pisi* (von ura = Schweif, nicht von uron = Harn) bewirkt.

Näheres s. bei H. Klebahn (1) u. (2).

14. **Exobasidium vaccinii.** Der Pilz schmarotzt auf den Arten der Gattung *Vaccinium*, besonders auf den Preiselbeeren (*V. vitis idaea*), deren Blätter und Stengel er befällt und fleischig auftreibt. Die weißen Lager der Basidien (Hymeniumschicht) entstehen unter der Epidermis und brechen durch diese hervor.

15. **Phoma rostrupii.** Dieser Pilz befällt die Mohrrübe (*Daucus carota*) an Wurzeln und Stengeln. Die geschädigten Stellen bilden die Herde zur Entwicklung von Pykniden in Form von kleinen Knötchen. Die Sporen treten aus diesen als wurstartige Gallertmassen aus.

Die durch den Pilz befallenen Mohrrübenpflanzen setzen in der Regel keine Früchte an. Die Krankheit tritt hauptsächlich in Gegenden mit Seeklima auf.

16. **Monilia cinerea.** Siehe unter Ascomycetes S. 159.

— **Fusicladium dendriticum** (nicht abgebildet) erzeugt die bekannten schorfigen, harten Flecken, besonders auf Äpfeln, ohne sie eigentlich zu verderben. Auf der Birne findet sich *F. pirinum*; s. Flugblatt Nr. 1, 5. Aufl., 1911.

4. Höhere Pilze.

Die Physiologie der höheren Pilze ist zurzeit noch wenig erforscht, jedenfalls nicht so gründlich wie ihre Morphologie und zum Teil auch Entwicklungsgeschichte. Die Standortsverhältnisse und sonstige Lebens- und Formeneigentümlichkeiten dieser Gruppe bieten aber so viele Hinweise auf ihre Ernährung und ihren Stoffwechsel, daß sich immerhin ein einigermaßen abgerundetes Bild von ihrer Lebensweise in Beziehung zum ernährenden Medium geben läßt.

Die Hauptentwicklung der höheren Pilze findet in der freien Natur im Spätsommer und Herbst statt, wenn vorwiegend feuchtes und warmes Wetter herrscht. Durch die um diese Jahreszeit im Boden erfolgenden

1) Solche Becher finden sich in der Sammlung Brendelscher Modelle.

Zersetzungsprozesse werden die Ausbreitung des Mycels¹⁾ im Boden und das Hervorbrechen der Pilzkörper wesentlich begünstigt. Viele Pilze zeigen eine sehr schnelle Entwicklung, da sie über Nacht empor-schießen können, sie sind vielfach aber auch rasch vergänglich, besonders dadurch, daß sie von den Maden der verbreiteten Pilzmücke (*Mycetophila*) und von Nacktschnecken (*Arion subfuscus*) zerfressen oder von Bakterien zersetzt werden. Die zur Herbstzeit lebhaften Vermoderungsprozesse kommen vor allem im Buchenwald zum Ausdruck.

Die näheren Beziehungen zum Standort treten vor allem bei mist-bewohnenden Pilzen hervor, ferner bei solchen auf morschem Holz; auch hier zeigen sich offensichtlich die Beziehungen zu organischen Substanzen. Die Ernährung der sandbewohnenden Pilze bedarf noch eines weiteren Studiums.

Typisch sind im Pilzkörper einige Zucker und verwandte Stoffe:

Trehalose²⁾ (Pilzzucker, $C_{12}H_{22}O_{11}$) findet sich neben Traubenzucker vielfach bei Pilzen (besonders höheren), während Rohrzucker und Stärke fehlen [Czapek (1)].

Mannit³⁾ (Zuckeralkohol, $C_6H_{14}O_6$) entsteht außerordentlich leicht und schnell aus Trehalose.

Glykogen (sogen. tierische Stärke) ist bei Pilzen ebenfalls häufig. Vgl. auch Abderhalden (2) S. 96.

Übersicht über die höheren Pilze.

Für die Besprechung hauptsächlich physiologischer und ökologischer Fragen sollen die folgenden Vertreter etwas näher behandelt werden. Alle Abbildungen sind Neuzeichnungen, teils Originale, teils nach den Arbeiten von Cooke, Hennings und Michael.

Nach Kniep sind die höheren Pilze vielfach heterothallisch (vgl. S. 149 u. 150).

Ascomycetes.

- Tafelfig. 1. *Peziza aurantia*,
 „ 2. *Morchella conica*,
 Tuber melanosporum,
 „ 3. *Xylaria hypoxylon*.

Basidiomycetes — Keulenpilze.

- Tafelfig. 4. *Clavaria pistillaris*,
 Clavaria botrytis,
 Sparassis crispa.

Basidiomycetes — Stachelpilze.

- Tafelfig. 5. *Hydnum auriscalpium*,
 Hydnum imbricatum.

Basidiomycetes — Löcherpilze.

- Tafelfig. 6. *Merulius lacrymans*,
 „ 7. *Polyporus versicolor*,
 „ 8. *Boletus bulbosus*.

Basidiomycetes — Blätterpilze.

- Cantharellus cibarius,
 Tafelfig. 9. *Coprinus comatus*,
 „ 10. *Marasmius alliatus*,
 Marasmius oreades,
 „ 11. *Nyctalis parasitica*,
 „ 12. *Lactaria deliciosa*,
 „ 11. *Russula adusta*,

1) Mycelium = Pilzmutter, Nahrung aufnehmender Teil des Pilzes.

2) Nach der Manna Trehala (Puppengehäuse auf persischen *Echinops*-Arten).

3) Sehr verbreitet in der Manna-Esche. Dulcit und Sorbit (dem Mannit stereoisomer) finden sich ebenfalls bei Pilzen.

- Tafelfig. 13. *Galera (Derminus) hypni*,
 „ 14. *Omphalia fibula*,
 „ 15. *Mycena sanguinolenta*,
 „ 16. *Collybia tuberosa*,
 „ 17. *Tricholoma equestre*,
 Hypholoma fasciculare,
 Cortinarius species,
 Psalliota campestris,
 „ 18. *Armillaria mellea*,
 Lepiota procera,

- Tafelfig. 19. *Amanita mappa*,
 Amanita muscaria,
 Rozites gongylophora.

Basidiomycetes — Bauchpilze.
Phallus impudicus,

- Tafelfig. 20. *Lycoperdon gemmatum*,
 „ 21. *Scleroderma vulgare*.

Abb. 105. *Peziza repanda*, Fruchtformen. Links: Askus mit 8 Sporen; rechts: Konidienträger. (Nach O. Brefeld.)

1. ***Peziza aurantia***. Orange-Becherpilz. Die *Pezizen* wachsen meist herdenweise auf bloßer Erde oder auf verschiedenen zersetzlichen Pflanzenteilen. Die Fruchtkörper sind in der Regel fleischig weich und kahl. Die *Asci* sitzen auf der Innenseite der Becher. Die reifen *Askussporen* werden in weißen Wölkchen ausgestoßen, sobald man den Pilz in trockene Luft bringt.

Einige Verwandte von *Peziza* leben im Wasser.

Peziza ist ein hochstehender Ascomycet mit zwei Fruchtformen (siehe Abb. 105).

2. ***Morchella conica***. Spitzmorchel. Die Fruchtkörper dieses Pilzes entwickeln sich besonders vom März bis Mai, selten vom August bis Oktober.

Helvella (Gyromitra) esculenta, die Lorchel, kann in rohem Zustande bisweilen deutliche Mengen der sehr flüchtigen *Helvella-säure* ($C_{12}H_{20}O_7$) enthalten, welche giftige (hämolytische) Eigenschaften besitzt. Durch Erhitzen und Trocknen des Pilzes wird das Gift zerstört. [Vgl. Lafar (1), Bd. 1, S. 276.]

Tuber melanosporum. Perigordtrüffel. Die als Trüffeln bekannten *Askusfrüchte* finden sich meistens 5–6 cm tief unter der Oberfläche im Humus der Laubwälder, besonders auf kalkhaltigem Boden. Das Mycel des Pilzes steht mit den Wurzeln der Bäume in Verbindung.

Die sehr aromatische Perigordtrüffel, eine Form von *Tuber brumale*, findet sich besonders in Frankreich und Italien, sehr vereinzelt auch in den Rheinwäldern Badens.

3. ***Xylaria hypoxylon***. Geweihförmiger Holzpilz. Das Stroma des Pilzes mit den eingesenkten *Peritheci*en ist meist schwarz, an-

Höhere Pilze I.
Erläuterungen im Text.

Höhere Pilze II.
Erläuterungen im Text.

fangs durch die Konidien weiß bestäubt. Er wächst hauptsächlich auf Baumstümpfen.

4. **Clavaria pistillaris.** Herkuleskeule. Der Pilz trägt die Basidien auf der Oberfläche der Keule. Er findet sich meist einzeln auf grasigem Boden, besonders in Laubwäldern, und wird bis 25 cm hoch. **Clavaria botrytis.** Hirschkornpilz, Korallenpilz. Die Gestalt dieses Speisepilzes erinnert an Blumenkohl. Er wächst besonders in Buchenwäldern zwischen Moos und Gras.

Sparassis crispa. Krauser Ziegenbart, Glucke. Die Fruchtkörper von *Sparassis* gleichen in der Form einem großen Schwamm oder Schwammkorallen mit blattförmig zusammengedrückten Ästen. Sie können bis 60 cm Durchmesser erreichen. Man findet sie hauptsächlich an Stümpfen von Kiefern.

5. **Hydnum auriscalpium.** Ohrlöffelpilz. Dieser Stachelpilz wächst auf in Zersetzung befindlichen Kiefern- und Tannenzapfen.

Hydnum imbricatum (jung essbar) gedeiht auf Erde, besonders in Kiefernwäldern. Sein Aussehen von oben hat zur Bezeichnung Habichtspilz, sein Anblick von unten zur Bildung des Namens Rehpilz Anlaß gegeben.

6. **Merulius lacrymans.** Hausschwamm. Der Pilz ist mehrfach als Saprophyt reingezüchtet worden. Lebenskräftige Sporen des *Merulius* keimen bei 25° C innerhalb 24 Stunden in ca. 2,5 %iger Malzextraktlösung mit 1 % Mono-Ammoniumphosphat.

Der Hausschwamm ist als gefährlicher Holzzerstörer berüchtigt. Er macht wie verschiedene andere Pilze das Holz mürbe und rissig. Sein Mycel bildet weiße Watten mit derben Leitsträngen (Nährmycel), wie sie die Abbildung zeigt. Er dringt auch in Mauerwerk ein (O₂-Entzug tötet ihn nicht ab) und kann sich von dort aus wieder auf Holzteile weiter ausbreiten. Schließlich bilden sich lappige Fruchtkörper mit brauner, grubiger Oberfläche. Ausgezeichnete Abbildungen des Hausschwammes finden sich bei R. Falck (1). Vgl. auch A. Möller (1), v. Tubeuf (1) und Lafar (1).

An mikroskopischen Schnitten durch befallenes Holz erkennt man, daß der Pilz die Zellulosemembranen durchdringt. (Cytase-wirkung). Vgl. F. Czapek (2). Der Pilz enthält auch Diastase.

7. **Polyporus versicolor.** Bunter Löcherpilz. Die perennierenden, lederig-holzigen, mit bunten Zonen versehenen Fruchtkörper dieses Pilzes finden sich sehr häufig an Baumstümpfen, meist in dachziegelartiger Anordnung; er lebt saprophytisch. Andere Polyporeen sind Baumzerstörer und vielfach echte Parasiten. Näheres siehe bei R. Hartig (1), A. Möller (1), Engler-Prantl (1). Nach den eingehenden Untersuchungen von H. Münch (1) ist

wassersattes und dabei luftarmes Holz ziemlich immun gegen den Befall durch zahlreiche Pilze.

Über das Verhalten der inkrustierenden Holzsubstanzen (Hadromal und Lignin) gegenüber Pilzen vergleiche man z. B. J. Lindroth (1).

8. *Boletus bulbosus*. (*edulis*). Steinpilz.

(Name von bolites, bei den Griechen ein eßbarer Pilz.)

Der Steinpilz ist an seiner Form, der Netzzeichnung am Stiel und an den braunen Sporen, welche an den Wänden der Löcher sitzen, kenntlich (Versuch s. S. 172). Fehlt das Netz, so liegt in der Regel *Boletus* (= *Suillus*) *castaneus* mit weißem Sporenpulver vor.

Der Steinpilz enthält, wie viele andere Speisepilze und frisches Gemüse, ca. 87—90% Wasser¹⁾. Neben Eiweiß sind durch die Analyse nachgewiesen: Mannit, Traubenzucker, Fett, außerdem ziemlich reichlich Kali und Phosphorsäure; vgl. A. König (1).

Die Blaufärbung des Fleisches mancher *Boletus*-Arten scheint durch laccase-ähnliche Oxydasen bewirkt zu werden.

Wenn im Steinpilz Gifte entstehen, handelt es sich um alte, zersetzte Exemplare, in welchen sich durch Eiweißzerfall Putrescin bildet.

Cantharellus cibarius. Pfefferling.

[Diminutiv von cantharus, Name für ein becherartiges, weitbauchiges Trinkgefäß (Humpen).]

Der Pilz, welcher allgemein genossen wird, wächst mit Vorliebe in Kiefernwäldern. Im rohen Zustande hat er einen schwach pfefferartigen Geschmack. Vgl. auch S. 70.

9. *Coprinus comatus* (= *porcellanus*). Tintenpilz.

(Name von copros = Dung, Mist.)

Der Pilz zerfließt, wie auch die Abbildung zeigt, beim Absterben zu einer schwarzen, tintenartigen Masse, an deren Bildung auch Mikroben beteiligt sind, welche dem *Bacterium chitinovorum* nahe stehen. Die Membranen zeigen nach der chemischen Analyse chitinartige Bestandteile. Das Zerfließen findet auch bei jungen, festen Exemplaren statt, wenn man sie vom Substrat abtrennt und in ein Glas legt.

Die schwarzen eiförmigen Sporen der zerflossenen Exemplare dieser Art, auch von *Coprinus atramentarius* (atramentum = Tinte), kann man in größerer Menge in mit Formalin versetztem Wasser aufbewahren und zu mikroskopischen Sporenpräparaten in Glycerin-gelatine verwenden.

Coprinarius (*Panaeolus*) *campanulatus* und andere schwarzsporige Pilze (Atrosporeae) mit kleinen Hüten kann man zum Nachweis

1) Rindfleisch enthält ca. 75% Wasser.

des Ausfallens der Sporen auf einen Objektträger legen. Auf diese Weise gewinnt man lehrreiche makroskopische und zugleich mikroskopische Sporenbilder (s. Abb. 107).

Manche *Coprinus*-Arten scheiden in feuchter Luft nach F. Knoll (1) mittels Hydathoden am Stiel Wassertröpfchen aus, welche Kaliumoxalat, das bei Pilzen nicht selten ist, enthalten.

Coprinus stercorearius, ein typischer Mist-Tintenpilz, entwickelt sich auch im Winter leicht, wenn man frischen Pferdemist einige Zeit unter einer Glocke stehen läßt. Er bildet Sklerotien, bei deren Austreiben man die Abnahme von Eiweiß leicht feststellen kann.

10. **Marasmius alliatus** (= *M. scorodonius*). Musseron.

(Name von marasmos = Verwelken, da der Pilz meist vertrocknet und nicht verfault.)

Der Pilz riecht und schmeckt nach Knoblauch und dient als Gewürz an Speisen. Die Spezies *M. alliaceus* (auf morschen Buchenstümpfen) riecht noch weit stärker.

Der Musseron wächst besonders an Waldrändern auf Graswurzeln, auf abgefallenen Zweigen und an Baumstümpfen.

M. rotula, der dem Musseron ähnlich sieht, aber nicht riecht, wächst herdenweise an dünnen Zweigen und zeigt deutlich geotropische Krümmungen der Hutstiele.

Tricholoma graveolens, der Maischwamm, wird ebenfalls als Musseron bezeichnet.

11. **Nyctalis parasitica** (nyctalos = schläfrig, schlaff). Der Pilz wächst, wie die Abbildung zeigt, auf Hüten von *Russula adusta* und auf den verhältnismäßig widerstandsfähigen Fruchtkörpern von *Russula nigricans* (enthält Tyrosin).

12. **Lactaria deliciosa**. Echter Reizker. Dieser Speisepilz enthält reichliche Mengen eines lebhaft gelbroten Milchsaftes. Dieser findet sich in durch Fusionen gebildeten Röhren von verhältnismäßig weitem Durchmesser.

Die Milchsafttröhren der Pilze scheinen wie bei den höheren Pflanzen zum Teil der Leitung plastischer Baustoffe zu dienen. Der Pilz ist ziemlich reich an Fetten (5–6 %); nach Em. Bourquelot enthalten die Lactarien auch ziemlich viel Mannit.

Lactaria piperata enthält einen bei Verletzung milchig ausfließenden Saft von scharf brennendem Geschmack, von dem keine Giftwirkung bekannt ist. Das Brennen auf der Zunge wird nicht durch Rhaphiden erzeugt. *L. torminosa* (Birkenreizker) gilt als schwach giftig.

Russula Species. Abbildung siehe unter *Nyctalis*. Täubling. Die Gattung der Täublinge ist sehr artenreich. Sie ist anatomisch ge-

kennzeichnet durch zwei Hyphengewebe (wie *Lactaria*), aber es fehlt der Milchsafte. Außerlich fallen die *Russula*-Arten durch die straffen Lamellen auf, welche sich gut zum Beobachten der Basidien an groben Querschnitten eignen (Planktonkammer, Lupe!) (Abb. 106). *Russula* hat weiße, *Russulina* gelbliche Sporen.

Abb. 106. *Russula rubra*,
Lamellenschnitt.

sh subhymeniale Schicht,
b Basidien,
s Sterigmen,
sp Sporen,
p Paraphysen,
c Cystide.

(Nach Strasburger.)

Sporen einer jeden Basidie nach Kniep (1922) wahrscheinlich in vielen Fällen geschlechtlich differenziert.

Der bei *Russula* weit verbreitete rote Farbstoff der Hutoberfläche läßt sich in Wasser oder verdünntem Alkohol ausziehen; vgl. Zopf (1).

Russula-Arten, soweit sie bisher untersucht sind, enthalten das Ferment Tyrosinase, welches Aminosäuren angreift.

13. *Galera (Derminus) hypni*. Haubenpilz.

(Name von galërum = Kappe.)

Hut sehr dünnfleischig, fast nur häutig, ohne Schleier am Rande (*Evelatae*). Sporenpulver und Pilz braun. Gern auf feuchter Erde zwischen Moos wachsend, bis ins Hochgebirge verbreitet.

14. *Omphalia fibula*. Nabelpilz.

(Name von omphalos = Nabel, Buckel und fibula = Heftnadel, Bolzen.)

Die gelblichen kleinen, zarten Pilze wachsen an feuchten Waldstellen zwischen Moos.

15. *Mycena sanguinolenta*. Purpurschneidiger Helmpilz.

(Name wahrscheinlich von mykes = Pilz, sanguinolentus = blutig.)

Der zarte Pilz wächst in Wäldern zwischen Blättern, Moos usw. Er enthält einen blaßschmutzigroten Saft.

Mycena galericulata: büschelweise an Baumstümpfen.

„ *alcalina* u. *ammoniaca*: riechen stark laugenartig.

„ *leptocephala*: riecht laugenartig, auch an salpetrige Säure erinnernd.

„ *pura*: riecht rettichartig; vgl. Ricken (2).

16. **Collybia tuberosa.** Knolliger Rübling.

(Name von kollybos = kleine Münze, wegen Ähnlichkeit der oft kleinen und flachen Hüte mit Geldstücken.)

Der Stiel der *Collybia*-Arten hat eine knorpelige Haut und ist innen hohl oder mit schwammigem Mark erfüllt. Die Fruchtkörper der vorliegenden Art wachsen aus Sklerotien (Hartmycel) hervor.

17. **Tricholoma equestre.** Grünling. Der Stiel, das Fleisch und die Lamellen dieses Pilzes sind gelb, oft mit einem Stich ins Grünliche.

Der Pilz wächst in sandigen Kiefernwäldern und bricht meist erst nach ziemlich weiter Entwicklung aus dem Boden hervor. Er ist ein guter Speisepilz.

Hypholoma fasciculare. Schwefelkopf. Der Pilz wächst in Büscheln an Baumstümpfen, morschem Holz usw. Seine purpurschwarzbraunen Sporen fallen leicht aus.

Cortinarius Species. Haarschleierling.

(cortina = Hutsaum, Randschleier.)

Die Arten der Gattung *Cortinarius* sind braunsporig (Phaeosporeae), haben ein mehr oder weniger haarschleierartiges Velum partiale und zeichnen sich häufig durch Schleimbildung aus.

Psalliota campestris (= *Agaricus campestris*), Champignon. Der Champignon besitzt dunkelpurpurne Sporen (Amaurosporeae), welche in Masse gebildet werden und reichlich ausfallen (Abb. 107).

Abb. 107. *Psalliota campestris*, Champignon. Links: Sporen aus dem Kopf auf Papier ausgefallen; rechts: Längsschnitt durch den Pilz, nach einem Herbarexemplar. $\frac{1}{2}$ nat. Größe. (Orig.)

Ein Exemplar kann einige Kubikzentimeter Sporenmasse erzeugen. Der Stiel trägt einen Ring (Annulatae). Der Pilz wird im großen kultiviert. Ebenfalls kultivierbar (meist aus in Wasser aufgeschwemmten Sporen) sind von höheren Pilzen noch:

<i>Morchella esculenta</i> ,	<i>Pleurotus ostreatus</i> ,
<i>Helvella esculenta</i> ,	<i>Clitopilus prunulus</i> ,
<i>Russula virescens</i> ,	<i>Pholiota mutabilis</i> ,
<i>Collybia Species</i> ,	<i>Armillaria mellea</i> ,
<i>Russuliopsis laccata</i> ,	<i>Amanita rubescens</i>

Nebenstehend ist das Champignonhaus der Gärtnerlehranstalt zu Dahlem abgebildet¹⁾, welches sich durch gut durchdachte Konstruktion auszeichnet.

Abb. 108. Blick in das Champignonhaus der Gärtnerlehranstalt zu Dahlem.

Abb. 109. Querschnitt durch das Champignonhaus, die Kulturbette und die Ventilationseinrichtungen zeigend.

Zu erfolgreicher Kultur ist die Innehaltung einer Reihe von Bedingungen unerlässlich:

1) Die Abbildungen sind dem mir freundlichst von Herrn Direktor Ökonomierat Th. Echtermeyer zur Verfügung gestellten Bericht der Gärtnerlehranstalt zu Berlin-Dahlem für die Jahre 1906 bis 1907 entnommen worden.

- a) Die Innentemperatur des Hauses soll nicht unter $+10^{\circ}\text{C}$ und nicht über $+17^{\circ}\text{C}$ betragen; gewöhnliche Zimmertemperatur ist in der Regel schon zu warm.

Für den Winter muß eine Heizvorrichtung vorgesehen sein, wenn man während dieser Zeit Pilze züchten will. Bei primitiven Anlagen sind Frühling und Herbst die besten Kulturzeiten.

- b) Der Raum muß sich in allen Teilen gut lüften lassen. Das Kulturhaus muß mindestens $2-2\frac{1}{2}$ m hoch und darf nicht naß sein.
- c) Der Raum wird vor Beginn der Kultur gründlich gescheuert und mit frischer Kalkmilch ausgespritzt, welcher zur Bekämpfung der sogenannten Champignonfliege etwas Alaun zugesetzt ist.
- d) Der für die Kulturbete benutzte Pferdemist wird mit Stroh (Mycelleiter) und Lehm vermischt. Er muß abgären, darf also nicht mehr stechend riechen, und muß noch eigene Feuchtigkeit besitzen.
- e) Champignonbrut kann im Freien gesammelt werden, wird aber besser von guten Firmen gekauft, da man in diesem Falle bestimmte, bewährte Sorten ziehen kann.

18. **Armillaria mellea** (= *Agaricus melleus*). Hallimasch.

(Name von *armilla* = Armband, Manschette.)

Der Hallimasch ist außer am Habitus sehr leicht kenntlich an der charakteristischen fleckigen Beschuppung seiner oft honiggelben Hutoberfläche. Der Saft des Hutes reagiert deutlich sauer. Das Mycel des Pilzes wächst im Holz und in der Rinde hauptsächlich von Bäumen, besonders von Kiefern, und tötet diese allmählich ab. Nach Münch ist der Befall eines Baumes vom Luftgehalt seines Holzes abhängig. Durch Beschädigung der Holzkanäle entstehen Harzergüsse nach außen.

Die *Rhizomorpha subterranea*, eine strangartige, außen schwärzliche, derbe Mycelform, besitzt in ihren jungen Teilen (Spitzen) die Fähigkeit, im Dunkeln zu leuchten, ebenso das Mycel des Holzes. Rhizomorphen können auf Wiesen in Drainröhren eindringen und diese durch Bildung armstarker Bündel verstopfen.

Der Pilz ist bei geeigneter Versuchsanstellung im Laboratorium z. B. auf Brot kultivierbar; vgl. v. Tubeuf (1). Siehe auch Flugblatt Nr. 22. Über die Beobachtung der Basidien vgl. S. 166.

Lepiota procera. Parasolpilz.

(Name von *lepio* = kleine Schuppe, wegen der Schuppen auf seiner Oberfläche.)

Der erwachsene Pilz besitzt die Gestalt eines aufgespannten, bis 30 cm breiten Schirmes. Er ist unter den *Annulatae* der stattlichste deutsche Vertreter. Er wächst in Wäldern, Gebüsch, auf Feldern usw. Auf zersetzten Exemplaren findet sich *Sporodinia* (S. 149); selten mit Zygosporen.

19. **Amanita mappa.** Gelber Knollenblätterpilz. Bei *Amanita* finden sich eßbare (*A. pustulata* = *rubescens*) und giftige Arten (*A. pantherina*). Unter diesen ist der Phallin und andere Gifte enthaltende grüne Knollenblätterschwamm der gefährlichste; der Genuß zweier Exemplare dieses Pilzes kann schon einen Menschen töten. Die Sporen des Pilzes sind weiß. S. auch L. Klein (1).

Die Erscheinung, daß in ein und derselben Gattung eßbare und giftige Arten vorkommen, ist nichts Seltenes. Unter den Bakterien z. B. beobachtet man ähnliches; so ist *Bacterium typhi* pathogen, das nahe verwandte *Bacterium coli* dagegen in den meisten Formen nicht.

Amanita muscaria. Fliegenpilz.

(Frisch Fliegen tödend.)

Die Gifte dieses Pilzes, das Alkaloid Muskarin ($C_5H_{15}NO_3$) und ein Toxin, scheinen an manchen Standorten und in manchen Gegenden zu fehlen.

Aus der roten, abgezogenen Oberhaut kann der Farbstoff mit Wasser teilweise ausgezogen werden; besser noch wirkt Alkohol. Der extrahierte Farbstoff fluoresziert grün.

Der Pilz läßt besonders gut die Eigentümlichkeiten der *Volvatae* erkennen, bei denen die Gesamthülle (Velum universale) nach der Entfaltung teils am Grunde als Scheide (volva), teils auf dem Hut als Fetzen zurückbleibt. Die Kraft, mit der sich der Hut entfaltet, ist ziemlich erheblich, da er kleine Gesteinplatten emporheben kann. (Vgl. S. 79.)

Rozites gongylophora. Ameisenpilz.

(Name von gongylis = Kohlrabi.)

Der Pilz wird nach den Angaben von A. Möller in Brasilien von Ameisen auf zu Brei zerkleinerten Blattstückchen kultiviert. Die Tiere ernähren sich von kohlrabiähnlichen Gebilden (Pilzkohlrabi), welche am Mycel des Pilzes entstehen. Vgl. Neger (1), S. 490.

Phallus impudicus. Stinkpilz. Die Abbildung des Pilzes ist die photographische Wiedergabe einiger von G. Herpell für das Herbar präparierter Exemplare (vgl. auch S. 172).

In der Jugend besitzt der Pilz ungefähr die Gestalt und Farbe eines Hühnereies. Er sitzt der Erde auf und entnimmt seine Nährstoffe durch starke, wurzelähnliche Mycelstränge. Legt man ein solches eiartiges (völlig reifes) Jugendexemplar, das man ohne Verletzen der Basis vom Substrat losgelöst hat, in ein Wasserglas mit feuchtem, weißem Sand oder Moos, so kann sich der Stiel des innerhalb der gallertigen Hülle vorgebildeten Pilzes im Verlauf einiger Stunden unter leisem Knistern zu seiner vollen Länge strecken (manchmal erst nach tagelangem Liegen). Während das eiartige

Stadium geruchlos ist, verbreitet der entwickelte Pilz einen widerlichen Duft, der Insekten, welche die Sporen verbreiten, anlockt.

Während in dem „Hexenei“ Zuckerstoffe fast fehlen, finden sich 6—8 Stunden nach dem Aufbrechen rd. 2% Trehalose, 1% Mannit

Abb. 110. *Phallus impudicus* Linn. Herbarexemplare aus den Wäldern bei St. Goar. Herbst 1898. Junge und entwickelte Exemplare in der Aufsicht und im Querschnitt. $\frac{1}{2}$ nat. Größe. (Nach G. Herpell.)

und 10 % Traubenzucker. Auch Glykogen ist beobachtet (vgl. Errera).

Die Familie der Phallaceae hat ihre Hauptverbreitung in den Tropen.

20. **Lycoperdon gemmatum.** Bovist. Die Bovistpilze sind bis in das Hochgebirge weit verbreitet. Ihr Inneres ist im Alter trocken und mit Kapillitium und Sporen erfüllt. Diese verstäuben durch einen Riß am Scheitel bei trockenem Wetter.

Lycoperdon (Globaria) bovista (Riesenstaubkugel) erreicht einen Durchmesser bis zu 50 cm.

21. **Scleroderma vulgare.** Hartbovist, falsche Trüffel. Der Fruchtkörper dieses Sand-Xerophyten mit dicker korkähnlicher Haut wächst auf der Erde oder halb unterirdisch. Der Pilz gilt als giftig.

Präparieren der höheren Pilze, Sporenausfall. Viele höhere Pilze lassen sich, was vielfach nicht bekannt ist, ähnlich den höheren Gewächsen und größeren Algen, in Pflanzenpressen trocknen (veranschaulicht den Wassergehalt der Pilze!). Besonders die Hutpilze eignen sich dazu vielfach ausgezeichnet. Ein naturgetreues Bild der Lamellen bzw. der Röhren mit ihren Sporen erhält man durch Auflegen des vom Stiel befreiten Hutes auf Papier, einen Teller, Objektträger oder dergleichen. Die Sporen sind nach etwa 10 Stunden und mehr auf die Unterlage reichlich ausgefallen und haben dadurch auf dieser den Verlauf der Lamellen abgebildet (vgl. *Coprinus* und *Psalliota*). Sie werden nicht nach oben geschleudert (S. 162).

Nähere Angaben über die feineren Einzelheiten der Methode finden sich bei Herpell (1) und 1. Aufl. S. 129.

Literatur über höhere Pilze.

Cooke (1),	Zopf (1),
Gillet (1),	Lindau (1)
Hennings (1),	Michael (1),
Schroeter (1),	Gramberg (1),
Ricken (1) u. (2),	Herter (1).

Zur kurzen Orientierung sei noch verwiesen auf das:

Pilzmerkblatt. Bearbeitet im Reichs-Gesundheitsamt. Hierzu eine Pilztafel mit farbigen Abbildungen. Verlag von Jul. Springer, Berlin.

IV. Gruppe. Lichenes (Flechten).

Allgemeines. Flechten sind nach den Untersuchungen von Schwendener (2) u. (3) Doppelwesen, zusammengesetzt aus Fadenpilzen und meist einzelligen Algen [*Cystococcus*, *Protococcus*, Pascher (1)]. Beide leben in Symbiose [de Bary (2)] miteinander. Symbiose im weiteren

Sinne umfaßt auch den Parasitismus, im engeren Sinne, in dem das Wort jetzt allgemein gebraucht wird, versteht man darunter eine Lebensgemeinschaft zu gegenseitigem Vorteil. Der Pilz bezieht von der Alge meist reichlich organische Nährstoffe, die Alge vom Pilz anorganische, aber wahrscheinlich auch gewisse spezifische organische [z. B. nach Beijerinck (5) peptonartige Stoffe, nach Tobler (2) organische Säuren], wenigstens bei einer größeren Zahl von Flechten. In einzelnen Fällen dringen die Pilzfäden in das Innere der Algenzellen ein und schmarotzen somit in diesen. Die Bildung der farbigen Flechtensäuren (mit Gerbstoff verwandt) scheint erst durch das Zusammenleben beider Komponenten bedingt zu sein. Ihre physiologische Bedeutung ist unbekannt; man vermutet in ihnen ein Schutzmittel gegen Tierfraß.

Als Beispiel zur Kennzeichnung des Lebens der Flechten ist die weitverbreitete und häufige Rentierflechte, *Cladonia rangiferina*¹⁾ (trotz mancher komplizierter Verhältnisse) besonders geeignet.

Abb. 111 stellt einen Thallus verticalis dar, während der Thallus horizontalis bereits vergangen ist.

Die Bekleidung der unebenen Oberfläche des sich entwickelnden Fruchtkörpers geschieht hauptsächlich durch die bei *Cladonia* sehr häufigen Soredien²⁾ (welche zahlreich besonders durch den Wind angeweht werden), in selteneren Fällen wohl auch durch anfliegende Algen (Protococcaceae). Die Oberfläche wird dadurch allmählich körnig rauh. Bei manchen Arten (z. B. *Cl. squamosa*) wachsen diese soredialen Bildungen zu Thallusschüppchen aus, welche gleichsam als Blätter erscheinen; bei *Cl. rangiferina* bilden sie nur eine Art grüner Rinde, die durch seitliches Verwachsen der Soredienbruthäufchen entsteht. Soweit bisher bekannt, entwickeln sich auf einer bestimmten *Cladonia* immer nur die Soredien der gleichen Art, doch können artgleiche Algen wohl auch von anderen Flechten stammen.

Die Soredien und Thallusbildungen an der Peripherie der Fruchtkörper sind als Assimilationsorgane von hoher ernährungsphysiologischer Wichtigkeit.

Diese Funktion ist gerade für *Cl. rangiferina* von ausschlaggebender Bedeutung, weil hier nicht bloß der Thallus horizontalis, sondern auch

Abb. 111. *Cladonia rangiferina* (silvatica). Habitusbild. Nat. Größe. [Nach G. Krabbe (1).]

1) Die Namen der Flechten gelten dem Pilz.

2) Name von soros = Häufchen. Soredien sind Thalluskrümel, welche aus Pilz und Alge bestehen.

die Basis des Fruchtkörpers abstirbt. Der Basalteil vermag dann nur solche Nährstoffe aus dem Substrat zu beziehen, welche innerhalb des abgestorbenen Teiles mit dem Wasser kapillar emporsteigen. Eigene Stätten zur Bildung organischer Nährstoffe sind deshalb für die Fruchtkörper von *Cl. rangiferina* unerlässlich. Diese wachsen lange (jährlich etwa 3—5 mm), sicher über 100 Jahre lang, wenn sich an den Spitzen der Fruchtkörper nicht Askushymenien bilden.

Mikroskopisches Bild. *Cladonia*-Soredien sind zum Beobachten der beiden Flechtenbestandteile vorzüglich geeignet. An der Rinde von Bäumen (Birken, Linden usw.) beobachtet man oft patinagrüne (feucht) oder weißgrünliche (trocken) Überzüge, welche meist aus Soredien des Thallus horizontalis von Cladonien bestehen. (Reingrüne Überzüge stammen von *Pleurococcus vulgaris*.)

Sind solche Soredienlager zu einem lockeren Pulver (nicht Plättchen; vgl. *Psora*) zerfallen, liefern sie gutes Beobachtungsmaterial, das unbegrenzt lange aufbewahrt werden kann. Bringt man eine kleine Menge davon mit Wasser auf den Objektträger und zerreibt sie durch mäßigen Druck auf das Deckgläschen zu einer grünlichen Wolke, so erhält man ohne weiteres die in Abb. 112 dargestellten Bilder.

Abb. 112. Symbiose zwischen Alge und Pilz aus Soredien der Flechte *Cladonia*. Vergrößerung ca. 400-fach. (Orig.).

Man erkennt leicht die beiden Bestandteile Pilz und Alge in charakteristischer Vereinigung (Stadium der Umspannung, Umwindung, Krallen-, Berührungs-, Einhüllungsstadium usw.).

Die **Standorte** der Flechten sind Erde, Baumrinden, Holz, Steine, Felsen. Sie lieben in der Regel einen hellen, den Witterungseinflüssen ausgesetzten Standort, z. B. die Wetterseite der Bäume. Gewisse Steinflechten sind, stellenweise in Gemeinschaft mit manchen Laubmoosen, die letzten Pioniere des pflanzlichen Lebens bis an die Schneegrenze und darüber hinaus. Sie ertragen dort große Kälte, Trockenheit und intensive Sonnenbestrahlung.

Die Gesteinsflechten dürften, nach ihrem Standort zu urteilen, ganz besonders auf die von ihren Algen produzierte organische Nahrung angewiesen sein. Durch Abscheidung von Kohlensäure und Flechtensäuren tragen sie zur Verwitterung des Gesteins, vor allem zur Lösung des Kalksteins, bei. [Otto Warburg (1)], Kny, Taf. 68—73.

Übersicht über Habitustypen der Flechten. Die hier gegebene Einteilung nimmt auf die verwandtschaftlichen Verhältnisse keine Rück-

sicht. Die einzelnen Gruppen sind durch Übergänge miteinander verbunden.

Strauchflechten	Blattflechten	Gallertflechten	Krustenflechten
<i>Cladonia</i> <i>Evernia</i> <i>Usnea</i>	<i>Xanthoria</i> <i>Parmelia</i> <i>Peltigera</i>	<i>Collema</i> <i>Ephebe</i> <i>Lichina</i>	<i>Lecanora</i> <i>Rhizocarpon</i> <i>Graphis</i>

Die Blattflechten unterscheiden sich von den Krustenflechten durch eine weniger innige Verschmelzung ihres Thallus mit dem Substrat.

Sämtliche Figuren der nachfolgend behandelten Flechten (Taf. VI) sind nach der Natur gezeichnet. Auf genauere physiologische Einzelheiten konnte nur an einigen Stellen hingewiesen werden, da die Ernährung der Flechten gegenwärtig noch wenig eingehend studiert ist.

— **Cladonia rangiferina.** Renttierflechte. (Abb. 111.)

(Name *Cladonia* Diminutiv von *clados* = Sproß, Zweig. Dem Renttier [*Cervus rangifer*] nützlich.)

Diese Spezies ist im Vorstehenden ausführlich besprochen. Sie ist über die ganze Erde verbreitet.

1. **Cladonia macilenta.** Säulchenflechte.

(*macilentus* = mager.)

Die Podetien ¹⁾ haben stiftförmige Gestalt, sind bisweilen etwas verzweigt und tragen hochrote Apothecien; die Farbe hat ihren Sitz in der Membran der Paraphysen. Die Flechte ist auf Holzstümpfen und Erde weit verbreitet. An der Zeichnung ist auch der Thallus *horizontalis* deutlich kenntlich.

2. **Cladonia pyxidata.** Becherflechte.

(*pyxidatus* = mit Becher versehen.)

Die Podetien sind becherförmig. Die Art wächst vorwiegend auf Sand- und Waldboden. Vgl. auch Kerner (1) Bd. I, Taf. bei S. 234.

— **Cetraria islandica.** Sog. „isländisches Moos“.

(Name von *cetra* = kleiner, lederner Schild.)

Der aufrechte, glänzende Thallus ist großblappig, flach, geweihartig und bis 10 cm hoch. Er enthält Dextrane und Galaktane.

Die Flechte wächst auf dem Boden zwischen Moosen und Heidekraut und überzieht oft weite Strecken. Sie ist besonders in Gebirgen und in arktischen Gegenden verbreitet.

3. **Evernia prunastri.** Bandflechte.

(Name von *euernes* = schön sprossend. *prunastrum* = Pflaumenbaum.)

Der mit Haftscheibe befestigte Thallus ist strauchig und meist hängend; seine einzelnen Lappen sind flach. Die Farbe ist ober-

¹⁾ *podetium* = Gestell, d. s. die aus dem Thallus *horizontalis* hervorwachsenden, die Apothecien tragenden Teile

seits weißgrün, unterseits weiß. Apothecien werden nur sehr selten gebildet.

Die Flechte ist an der Rinde von Laub- und Nadelbäumen überall gemein, von der Ebene bis ins Gebirge. Sie enthält Evernsäure ($C_{17}H_{16}O_7$) u. a. m. [Czapek (1)].

Parmelia furfuracea ist ihr in manchen Jugendstadien ähnlich, doch auf der Unterseite schwarz.

Die Flechte kann, wie Flechten im allgemeinen überhaupt, ohne ihre Lebensfähigkeit zu verlieren, vollkommen austrocknen, so stark, daß sie sich zwischen den Fingern zu Pulver zerreiben läßt.

4. *Usnea barbata*. Bartflechte.

(usnea vielleicht abgeleitet von uson = Strick.)

Der Thallus bildet, besonders an den Zweigen alter Tannen, wehende, phantastische Flechtengehänge, findet sich aber auch an Birken, altem Holzwerk usw.

Die von der Bartflechte befallenen Zweige sterben oft ab; es handelt sich dann aber um Zweige, welche durch Lichtmangel oder sonstige ungünstige Einflüsse bereits geschwächt waren.

Die Bartflechte enthält die auch bei vielen anderen Flechten verbreitete, chemisch wohlcharakterisierte Usninsäure ($C_{18}H_{16}O_7$); vgl. E. Abderhalden (1) und Fr. Czapek (1).

— *Roccella tinctoria*. Lackmusflechte.

(*rocce* aus dem französischen Worte *roche* = Felsen von Linné gebildet.)

Der strauchige Thallus enthält die Alge *Trentepohlia*; er liefert den Lackmusfarbstoff ($C_7H_7NO_4$).

Die Flechte findet sich auf Felsen an den Küsten Afrikas, der Kanaren und an anderen Orten wärmerer Gegenden.

5. *Xanthoria parietina*. Gelbe Wandflechte.

(Name von *xanthos* = gelb; *paries* = Wand.)

Der durch *Physciol*¹⁾ ($C_{16}H_{12}O_5$, früher Chrysophansäure genannt) gelbe Thallus ist blattartig ausgebreitet und liegt dem Substrat an; bisweilen nimmt er etwas krustige Beschaffenheit (früher *Lepra* genannt) an. Die Apothecien sind meist reichlich entwickelt. Die Anlage der Schlauchfrüchte erfolgt, wie wohl bei den meisten Flechten, zur kalten Jahreszeit. Vgl. auch Hillmann.

Die gelbe Wandflechte ist überall gemein an Rinden, Zäunen, Mauern usw.

Die Apothecien von *Xanthoria* eignen sich gut zur Beobachtung der Asci. Man bettet sie zum Schneiden in Stearin oder Paraffin ein, das man von einer brennenden Kerze auf sie tropfen läßt. Im Bedarfsfalle kann man das Paraffin (z. B. durch ein brennendes

1) Dieser gelbe Farbstoff (Parmélgelb), welcher in Form von Körnchen auf den Hyphen abgelagert ist, läßt sich durch Einlegen der Flechten in Alkohol ausziehen.

Typen charakteristischer Flechten.
Erläuterungen im Text.

Nachtlicht) längere Zeit flüssig erhalten. Vgl. auch Strasburger-Koernicke S. 525.

6. *Parmelia physodes*. Blasige Schüsselflechte.

(Name von *parme* = runder Schild, wegen der Gestalt der Apothecien. *physodes* gebildet aus *physa* = Blase und *eidos* = Ansehen, nach dem Hohlraum zwischen Rindenschicht und Mark.)

Der Thallus bildet die allgemein bekannten, grauen, rundlichen und gelappten Gebilde auf Kiefern, Tannen, Brettern usw. Er bleibt infolge meist reichlicher Bildung von Soredien in der Regel steril, wenigstens im Flachlande. Die Flechte ist sehr lebenszäh und in Nadelwäldern sehr häufig. Sie enthält Physodin ($C_{20}H_{12}O_{15}$).

7. *Peltigera canina*. Schildflechte.

(Name von *pelte* = kleiner Schild.)

Peltigera ist eine typische, leicht kenntliche große Laubflechte, welche als lappenförmiges, im feuchten Zustand oberseits bräunliches bis grünliches Gebilde als Schattenpflanze am Boden von Wäldern, z. B. Buchenwäldern, gedeiht, besonders an Wegrändern. Die Abbildung zeigt die Flechte zwischen Moos und Buchenknospenschuppen.

Die Askusfrüchte entstehen in Form brauner Scheiben am Rande des Thallus. Die Asci mit ihren langgestreckten, fadenförmigen Sporen (6–8 in einem Askus) sind an Querschnitten durch die Apothecien leicht zu beobachten.

Die Arten von *Peltigera* führen als Algen *Nostoc* oder *Cystococcus*.

8. *Gyrophora cylindrica*. Kreisblattflechte, Felsblatt.

(Name von *gyros* = Kreis und *pherein* = tragen.)

Die in trockenem Zustand schwarzgraue Flechte wächst, meist zu Gruppen vereinigt, an nacktem, sonnigem, fast immer kieselhaltigem Felsgestein und ist auf diesem mit einem mehr oder weniger zentralen, etwa 4 qmm großen Nabel befestigt. Sie scheint ihren N-Bedarf aus dem Staub zu decken.

Die auf der Fläche stehenden Apothecien, welche an den abgebildeten Exemplaren fehlen, entwickeln sich besonders reichlich auf Gebirgshöhen.

Die gezeichneten Exemplare stammen von der Schneekoppe.

9. *Psora ostreata*. Krätzelflechte.

(Name von *psora* = Krätze.)

Der Thallus besteht aus kleinen, schinnenartigen Schuppen, welche dachziegelig gedrängt stehen (s. die vergrößerte Abbildung) und eine gewisse Ähnlichkeit mit Austernschalen (*Ostrea* = Auster) haben können. Die Farbe ist meist stumpf olivgrün. Die Apothecien werden ziemlich selten gebildet.

Psora ist besonders auf der Borke am Grunde alter Kiefern häufig. Sie enthält Lecanorsäure ($C_{16}H_{14}O_7$).

Die Flechte eignet sich gut zu Dauerpräparaten in Luft auf schwarzen Objektträgern (s. später). Als Beleuchtung dient zweckmäßig eine gut brennende elektrische Taschenlampe.

Psora darf nicht mit Soredienanflügen verwechselt werden.

— **Collema pulposum.** Gallertflechte.

[Name von colla = Leim, Gallert, pulposus = wie weiches Fleisch (pulpa).]

Der rosettenförmige, ziemlich dicke, in feuchtem Zustand gallertartige Thallus (Abb. 113) ist meist von grünlich-schwarzer Farbe.

Abb. 113. *Collema pulposum*. Links trocken, rechts durch Feuchtigkeit gequollen. Bei *Collema* tritt der Askomycet an Masse gegen die Alge zurück. Schwach vergrößert. (Orig.)

Er enthält *Nostoc* als Alge. Die Flechte findet sich an Baumstümpfen, Moosen, Mauern, auf Erde usw. An *Collema* lassen sich oft leicht die Geschlechtsorgane der Flechten beobachten (Abb. 114).

Ephebe (im Gebirge) enthält *Stigonema*, *Lichina* (an Granitblöcken im Meer, z. B. Ostküste von Rügen) die Rivulariacee *Calothrix* als Alge.

10. **Lecanora subfusca.** Tellerflechte.

(Name von lecan = Teller, Schüssel.)

Eine der gemeinsten Flechten, die sich auf der ganzen Erde findet; an Bäumen, auf Holzwerk und an Gestein. Sehr variabel. Der meist weißlich-graue Thallus ist krustenförmig. Die braunen 0,5(—1) mm großen Apothecien sind kreisrund und deutlich berandet.

Abb. 114. *Collema crispum*. A Karpogon *c* mit Trichogyn *t*. Vergrößerung 405. B Spitze des Trichogyns mit Spermatium *s*. Vergrößerung 1125. (Nach E. Baur.)

Lecanora esculenta, die Mannaeflechte der Wüste, hält in der freien Natur im heißen Sand Erhitzung bis zu 70° C aus (Xero-Gel-Struktur des Plasmas). Abbildung der Flechte s. bei Kerner, Bd. II, S. 537.

Lecidea (Scheibenflechte) ist eine krustenförmige, in verschiedenen Species echte Steinflechte (zum Teil endolithisch) mit

schwarzen Apothecien; sie wächst z. B. auf Granit, Porphyr und Basalt. Die Steinflechten können mit ihren Rhizinen sogar in Glas eindringen. Farbige Abbildungen von Steinflechten auf Felsen finden sich bei Kerner, Bd. II, Tafel bei S. 643.

11. *Rhizocarpon* (*Lecidea*) *geographicum*. Landkartenflechte.

(Name von *rhiza* = Wurzel und *carpos* = Frucht, weil die Früchte auf dem unteren Thallusteil entspringen; *geographicus* wegen der Ähnlichkeit des gefelderten Thallus mit einer Landkarte.)

Rhizocarpon wächst fast immer auf kieselhaltigem Gestein, besonders an Felsen, seltener auf Kalk (hier verblässend) oder auf Dachziegeln, im Gebirge und in der Ebene. Sie steigt am Monte Rosa bis ca. 4638 m Höhe. (Dringt bis 3 cm tief in Risse.)

Die Flechte kann ganze Felsen wie mit einer weithin sichtbaren, durch Usninsäure gelben bis gelbgrünen, nicht abwischbaren Kruste überziehen. Der Thallus ist durch das Hervortreten des schwarzen Hypothallus fein gefeldert. Die Apothecien sind zwischen den Feldern als schwarze Fleckchen eingesprengt.

Abb. 115. *Rhizocarpon geographicum*, erster Thallusanflug. Die Ausstrahlungen sind die blauschwarzen Pilzfäden des „Prothallus“, welche im Weiterwachsen auf dem Gestein Algen zur Flechtensynthese finden. Im Zentrum hat sich die erste grüngelbe „Thallusareole“ bereits gebildet. Viele solcher „Areolen“ bilden schließlich, wenn sie zusammengestoßen sind, den Gesamtthallus. Vergr. 500-fach. [Nach P. Beckmann in C. Schroeter (1).]

12. *Graphis scripta*. Schriftflechte.

(Name von *graphis* = Griffel zum Schreiben. Also die mit Griffel Geschriebene.)

Die Schriftflechte enthält nicht *Cystococcus* oder *Protococcus* als Flechtenkomponente, sondern *Trentepohlia*¹⁾. Sie wächst wie diese auf der Rinde von Bäumen, namentlich der glatten von Buchen und Eschen. Der Thallus entwickelt sich erst unter der Rinde, so daß die Algen zunächst keine wesentliche Rolle spielen können, und bricht dann später zum Teil hervor, meist als sehr zarter, weißgrauer Schorf. Die schwarzen Apothecien sehen wie Schriftzeichen aus.

Die Flechte ist besonders an den Zweigen, weniger an den Stämmen der Bäume häufig.

1) Die Gattung *Trentepohlia* ist farbig abgebildet (an ihrem Standort im Freien) bei Kerner, Bd. II, Tafel bei S. 605 (in einer anderen Species als bei *Graphis*).

— **Pertusaria communis** und andere Arten.

(Name von *pertusus* = durchlöchert, wohl wegen der wie Poren erscheinenden Apothecien.)

Die soredienlosen *Pertusarien* und soredienbildenden *Variolarien* (*variola* = Blattern) finden sich besonders an den Stämmen der Buchen in Form weißer, anstrichähnlicher, oft auffallender Überzüge.

Die gelben oder grüngelben lockeren Krusten von *Coniocybe chlorina* finden sich häufig an Sandsteinfelsen.

Literatur. Engler-Prantl, I. Teil, Abt. 1* 1907, bearbeitet von M. Fünfstück und A. Zahlbruckner. — G. Lindau (1). — Joh. Leunis (1). — Otto Warburg (1). — Weitere Zitate finden sich in den genannten Werken.

V. Gruppe. Algen; Neuston, Plankton und Benthos.

Algen.

Die Ernährung der Algen ist in neuester Zeit erfolgreich und eingehend studiert worden, vorwiegend nach der physiologischen Seite in Reinkulturen. Dabei ist zu beachten, daß das physiologische Verhalten im Laboratorium sich mit dem hier mehr betonten ökologischen in der freien Natur nicht in allen Punkten zu decken braucht. Ein gutes Beispiel zur Erläuterung von in dieser Hinsicht bestehenden Differenzen ist für die Eisenbakterien (vgl. auch S. 133) bekannt. Gewisse Arten können in Reinkultur das Eisen (in irgendwie nennenswerter Menge) entbehren, kommen aber in der freien Natur ausgesprochen an eisenhaltigen Standorten vor, nehmen es hier auch auf. Viele Algen ernähren sich an ihren natürlichen Standorten mit Vorliebe mixotroph, während sie in künstlichen Reinkulturen autotroph leben können. Dieser Unterschied dürfte sich leicht dadurch erklären, daß sie in der freien Natur oft mit Bakterien und anderen Organismen in Konkurrenz treten und diesen die organischen Stoffe wegzunehmen genötigt sind, wenn sie nicht von den Bakterien, welchen meist wirksame Kampfenzyme zur Verfügung stehen, unterdrückt werden wollen.

Die meisten Algen leben im Wasser; sie finden aber, wie schon ihr Vorkommen in Flechten beweist, auch außerhalb dieses Mediums Existenzbedingungen, z. B. manche Vertreter unter den *Oscillatoriaceae*, *Nostocaceae*, *Bacillariaceae*, ferner *Pleurococcus* (als Anflug an Bäumen), *Hormidium*, *Trentepohlia*, *Botrydium* und manche Arten von *Vaucheria*.

System der Algen.

Schizophyceae (*Cyanophyceae*, Spaltalgen). Anhang: Schizomycetes. **Flagellatae**¹⁾ mit Chlorophyll.

1) Die chlorophyllführenden Flagellaten sind aus physiologischen Gründen zu den Algen gerechnet.

Peridinales (Peridineen).

Zygophyceae { **Bacillariales** (Diatomeen),
 { **Conjugatae**.

Chlorophyceae { **Protococcales**,
 { **Confervales**,
 { **Siphoneae**.

Phaeophyceae (Braunalgen, Tange).

Rhodophyceae (Rotalgen, Florideen).

An die Besprechung der Algen schließt sich die einiger höher organisierten Pflanzen, um den Blick auf die Gesamtvegetation im Wasser zu lenken.

Über das System der Wasserorganismen nach ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten vergleiche man Kolkwitz und Marsson (1), sowie die farbigen Tafeln in Rubners Handbuch, E. Naumann (1). Über die Ökologie der marinen Saprobien vergleiche man J. Wilhelm (1), Hayrén (1922).

Pflanzen (vorwiegend Algen) des Wassers, s. Taf. VII.

Die Abbildungen sind durchgehends Neuzeichnungen, ebenso wie die der anhangsweise besprochenen Tiere. Es handelt sich teils um Originale, teils um Zeichnungen nach den Werken von Blochmann, Ehrenberg, Lampert, Lemmermann u. a. m.

Ich legte Wert darauf, das zu behandelnde Material so weit zu sichten, daß es auf je einer Tafel vereinigt werden konnte.

Schizophyceae = Spaltalgen (schizein = spalten), **Cyanophyceae** = blaugüne Algen, **Myxophyceae** = Gallertalgen.

Der Name leitet sich von schizein = spalten ab, da die Vermehrung der Zellen durch Zweiteilung erfolgt. Sie leben im Wasser und an feuchten Orten in der Luft. Fast alle planktonischen Vertreter dieser Gruppe sind unbeweglich.

1. Chroococcus limneticus.

Name von chroa = Farbe.

Zellen blaugrün, zu mehreren in einer Gallerthülle vereinigt. Durchmesser der Zellen etwa 6–12 μ . Planktonisch.

— bei Geringproduktion 0 — 1)

2. Microcystis (Polycystis) aeruginosa.

Name von aerugo = Grünspan.

Zellen klein, sich nach drei Richtungen des Raumes teilend, mit Schweb(?) (Pseudo-)vakuolen, zu Kolonien vereinigt, welche schon makroskopisch wie Staubklümpchen, Kringel u. dergl. erscheinen, häufig auch gitterartig durchbrochen sind (daher früher

1) Wegen der Bezeichnungen p , αm , βm und o vergleiche man Gruppe VI, Ökologie der Gewässer. Bei dieser ökologischen Einordnung ist zwischen Gering- und Hochproduktion zu unterscheiden. Es sind also qualitative und quantitative Merkmale zu beachten.

Pflanzen des Wassers

(Entsprechende Abbildungen von Tieren s. Taf. VIII)

Schizophyceae:

1. *Chroococcus limneticus*.
2. *Microcystis aeruginosa*.
3. *Merismopedia glauca*.
4. *Oscillatoria agardhii*.
5. — *limosa*.
6. *Spirulina (Arthrospira) jenneri*.
7. *Phormidium uncinatum*.
8. *Nostoc species*.
9. *Anabaena spiroides*.
10. *Aphanizomenon flos aquae*.
11. *Tolypothrix lanata*.
12. *Rivularia (Gloietrichia) echinulata*.

Schizomycetes (als Anhang):

13. *Micrococcus phosphoreus*.
14. *Lamprospedia hyalina*.
15. *Sarcina ventriculi*.
16. *Azotobacter chroococcum*.
17. *Bacterium vulgare*.
18. *Bacillus subtilis*.
19. *Pseudomonas fluorescens*.
20. *Spirillum undula*.
21. *Sphaerotilus natans*.
22. *Cladotrix dichotoma*.
23. *Zoogloea ramigera*.
24. — *uva*.
25. *Beggiatoa alba*.
26. *Thiothrix nivea*.
27. *Lamprocystis roseo-persicina*.
28. *Chromatium okenii*.

Chrysomonadales:

29. *Mallomonas acaroides*.
30. *Synura uvella*.
31. *Uroglena volvox*.
32. *Dinobryon sertularia*.

Silicoflagellata:

33. *Distephanus speculum*.

Coccosphaerales:

34. *Pontosphaera huxleyi*.

Cryptomonadales:

35. *Cryptomonas erosa*.

Euglenales:

36. *Euglena viridis*.
37. *Phacus longicauda*.
38. *Trachelomonas hispida*.
39. — *volvocina*.

Peridinales:

40. *Ceratium hirundinella*.
41. *Ceratium tripos*.
42. *Peridinium divergens*.
43. — *tabulatum*.

Bacillariales (Diatomaceae):

44. *Melosira granulata*.
45. — *varians*.
46. *Stephanodiscus hantzschianus*.
47. *Triceratium fuvus*.
48. *Fragilaria crotonensis*.
49. — *capucina*.
50. *Synedra ulna*.
51. — *acus*.
52. *Asterionella formosa*.
53. *Diatoma elongatum*.
54. *Tabellaria flocculosa*.
55. — *fenestrata*.

56. *Rhoicosphenia curvata*.

57. *Cocconeis pediculus*.

58. *Navicula (Pinnularia) nobilis*.

59. — — *viridis*.

60. *Navicula cryptocephala*.

61. — *atomus*.

62. — *cuspidata*.

63. *Stauroneis phoenicenteron*.

64. *Amphipleura pellucida*.

65. *Pleurosigma acuminatum*.

66. *Gomphonema acuminatum*.

67. *Cymbella lanceolata*.

68. *Amphora ovalis*.

69. *Epithemia turgida*.

70. *Nitzschia sigmoidea*.

71. — *acicularis*.

72. *Hantzschia (Nitzschia) amphioxys*.

73. *Cymatopleura solea*.

74. *Surirella biseriata*.

Conjugatae:

75. *Closterium moniliferum*.

76. *Cosmarium botrytis*.

77. *Staurostrum gracile*.

78. *Mougeotia genuflexa*.

79. *Spirogyra porticalis*.

80. *Zygnema stellinum*.

Protococcales:

81. *Chlamydomonas species*.

82. *Polytoma uvella*.

83. *Pandorina morum*.

84. *Eudorina elegans*.

85. *Volvox aureus*.

86. *Rhaphidium polymorphum*.

87. *Scenedesmus acutus*.

88. — *quadricauda*.

89. *Pediastrum boryanum*.

90. *Actinastrum hantzschii*.

91. *Richteriella botryoides*.

Confervales:

92. *Ulothrix zonata*.

93. *Conferva bombycina*.

94. *Stigeoclonium tenue*.

95. *Oedogonium rivulare*.

96. *Cladophora fracta*.

97. *Vaucheria species*.

Florideae:

98. *Lemanea fluviatilis*.

99. *Chantransia chalybaea*.

Eumycetes:

100. *Fusarium aquaeductum*.

101. *Saprolegnia monoica*.

102. *Leptomitus lacteus*.

103. *Mucor (zygorhynchus)*.

104. *Nitella flexilis*.

Bryophyta:

105. *Fontinalis antipyretica*.

Pteridophyta:

106. *Isoetes lacustris*.

Monocotyledoneae:

107. *Hydrocharis morsus ranac*.

108. *Lemna arrhiza*.

Dicotyledoneae:

109. *Myriophyllum spicatum*.

110. *Ceratophyllum demersum*.

Pflanzen (vorwiegend Algen) des Wassers.

Clathrocystis genannt). Bildet bei üppiger Entwicklung zur warmen Jahreszeit besonders in der Uferregion der Gewässer dicke grünschwarzfarbige Überzüge auf der Wasseroberfläche. (In Planktonkammer beobachten!) Kolonien bisweilen mit Vorticelliden und kleinen Kieselalgen besetzt. Sehr häufig; im Winter meist nur ganz vereinzelt im Plankton. — meist o, in Hochproduktion bis β m —

3. **Merismopedia glauca.** Tafel-Blaualge.

Name von merisma = Teil, und pedos = Platte, Tafel.

Parallelförmig zu *Lamproedia*. Zellen blaugrün, 3–6 μ dick. Zellteilung nach zwei Richtungen des Raumes. Wohl meist nur erratisch planktonisch. — o —

4. **Oscillatoria agardhii.** Benannt nach dem scheinbaren Pendeln der Spitze beim Kriechen der Grundformen. Planktonisch in Seen, Flüssen usw., das Wasser besonders zur warmen Jahreszeit oft trübgrün verfärbend. Vgl. *Aphanizomenon* u. a. m. Mit Schwebevakuolen.

In 1 ccm oft über tausend Fäden. Beim Absterben geben angehäuften Massen, ebenso wie bei anderen Spaltalgen, leicht einen wasserlöslichen blauen Farbstoff (Phycocyan) ab, unter Umständen bei manchen Spaltalgen so massenhaft, daß das Wasser wie mit Indigo gefärbt erscheint. Die physiologische Bedeutung des Farbstoffes ist unbekannt. — o, bei Hochproduktion β m —

5. **Oscillatoria limosa.** Fäden gegen 15 μ dick, mit niedrigen Zellen wie Talerrollen; von trübgrüner Farbe, unter Drehung kriechend.

Versuch: Man bringe Fäden auf den Objektträger in einen mit chinesischer Tusche (festes Stück, dessen Reibfläche nach Benutzung wieder getrocknet wird!) verriebenen Wassertropfen. Die Tuschepartikel werden bald festkleben und, auch wenn der beobachtete Faden still liegt, entsprechend der Bewegung des extramembranösen Plasmas, in Spiralwindungen um den Faden herumwandern.

Häufig in Gemeinschaft mit kriechenden Kieselalgen sogenannte Oscillatorien-Diatomeen-Filze bildend, welche als Fladen, durch Assimilations- oder Gärungsgase getragen, an die Oberfläche steigen können. Über Kulturversuche mit *Osc. limosa* vgl. B. Schindler (1); s. auch E. G. Pringsheim (1). — β m —

6. **Spirulina (Arthrospira) jenneri.** Blaugrüne, unter Drehen kriechende Spaltalge, welche in die polysaprobe Zone vorrückt. Meist in Gemeinschaft mit *Beggiatoa*. — p bis α m —

7. **Phormidium uncinatum.**

Name von phormos = geflochtene Matte.

Bildet oft dunkle häutige Lager, Zellen mit Scheiden. — α m —

8. **Nostoc species.** (Von dem deutschen Wort Nostok für solche gallertige Klumpen. Herkunft des Namens völlig unbekannt.)

Fäden perlschnurartig mit Heterocysten. Gewisse Arten treten (oft periodisch) auf feuchtem Boden auf; andere sind Wasseralgen und bilden dann oft große Bestände in der Sub- und Elitoralzone der Seen. Manche Arten kommen auch endophytisch in Cycadeen-Wurzeln und als Flechtengonidien vor.

Ähnlich gallertig sind *Ophrydium* und *Rivularia*.

— **Nodularia spumigena.**

(Name von nodulus = Knoten.)

Fäden mit kurzen, scheibenförmigen Zellen, Grenzzellen, und zu Zeiten auch Sporen, 8–12 μ breit. Im Plankton der Ostsee, bisweilen Vegetationsfärbung verursachend; Sjöstedt 1922. Auch in süßem Wasser.

9. **Anabaena spiroides.** Das Löckchen.

(Name von anabainein = sich erheben.)

Typisch planktonisch. Korkzieherartig gedreht. Mit deutlichen Grenzzellen und Schwebevakuen. Die Grenzzellen (Heterocysten) sehen zwischen den übrigen Fadenzellen wie helle Öltröpfchen aus. Im mikroskopischen Präparat bzw. in der Planktonkammer schweben die Fäden meist dicht unter dem Deckgläschen. *A. flos aquae*, *circinalis*, *solitaria* u. a. sind die bekanntesten Arten. Kann Wasserblüte bilden, auch in Gemeinschaft mit *Polycystis* und *Aphanizomenon*.

— bei Geringproduktion o —

10. **Aphanizomenon flos aquae.** Sägespan-Alge.

(Name von aphanizein = unsichtbar machen; weil die Wasserblüte schnell erscheint und dann schließlich wieder für das Auge ganz verschwindet.)

Fäden meist mit Grenzzellen und oft mit Sporen, bei typischer Entwicklung zu sägespanähnlichen Bündeln paketartig vereinigt. Mit Pseudovakuolen. Unter normalen Verhältnissen unbeweglich. Farbe graugrün, abgestorben blaugrün. Sehr wichtiger Planktonorganismus. Bildet bisweilen eine Sahne von Wasserblüte. In Haffen neben anderen als Haffblüte bezeichnet. Vgl. auch die Farbentafel. Die Farbe der konservierten Probe ist unbegrenzt haltbar.

Osc. agardhii ist vielleicht identisch mit *Aphanizomenon*.

— o, bei Hochproduktion β m —

11. **Tolypothrix lanata.**

(Name von tolype = Knäuel.)

Fäden (ca. 10 μ dick) mit Basis und Spitze, von einer Scheide umgeben. Pseudodichotomie unter einer Grenzzelle erfolgend. Ähnliche Pseudodichotomie besitzt *Cladothrix*. An untergetauchten Pflanzen festsitzend.

— o —

12. Rivularia (Gloiotrichia) echinulata.

(Name von rivulus = Bächlein, weil einige Arten der Gattung in Bächen leben.)

Kolonien etwa 1 mm groß, durch Teilung und Verzweigung der Fäden entstehend, meist graugrün, von der Gestalt eines gekugelten Igels. (Planktonkammer!) Fäden peitschenförmig mit Endknopf (Grenzzelle) und Spore wie Handgriff (manubrium).

Besonders in Seen mit grüner Eigenfarbe des Wassers. Tritt meist erst von August an auf und verschwindet nach der Sporenbildung im Herbst. Die Sporen sinken zu Boden. Deshalb sehr ausgeprägt periodisch planktonisch. Betreffs der Biologie vgl. auch O. Plümcke (1). — meist o —

R. natans bildet weiche, im Alter schwimmende Gallertmassen (braun bis oliv) von Walnußgröße und darüber. Vgl. *Nostoc*.

R. haematites speichert Kalk. Über Ca-Ablagerungen s. E. Naumann (Arch. f. Hydrobiol., 1921).

Schizomycetes (als Anhang zu den Spaltalgen).

— **Streptococcus mesenterioides.**

(Name von streptos = Halskette.)

Vgl. Gruppe Bakterien S. 118.

13. Micrococcus phosphoreus. Leuchtbakterie. Vgl. S. 118. Weitere Arten sind von H. Molisch (2) beschrieben.**14. Lampropedia hyalina.** Tafelkokken.

(Name von lampros = glänzend, und pedos = Platte.)

Vgl. S. 119. Im Plankton, wohl auch auf Schlamm. — β m —

15. Sarcina ventriculi. Paketkokken. Vgl. S. 119 auch betreffs *S. paludosa*. Die Abbildung zeigt eine entwickelte Kolonie. Größe der einzelnen Zellen einige μ . — meist p, anaerob —**16. Azotobacter chroococcum.**

(Name von azote = Stickstoff.)

Besitzt die Fähigkeit, reichlich freien Stickstoff zu assimilieren. Heftet sich auf planktonischen und benthonischen Schlamm- und Uferorganismen fest. Auch im Boden. Größe der Zellen meist gegen 4 μ .

17. Bacterium vulgare. Eine der häufigsten Fäulnisbakterien. Vgl. Gruppe Schizomycetes s. 124.**18. Bacillus subtilis.** Heubazillus. Bewegliche Fäden, 0,8—1,2 μ im Durchmesser, für Bakterien also ziemlich dick. Vgl. Kap. Bacteria.**19. Pseudomonas fluorescens.** Vgl. Kap. Schizomycetes S. 129.**20. Spirillum undula.** Häufig in verdorbenem Wasser. Vgl. Kap. Schizomycetes. — α m, bei Massenentwicklung p —

- **Eisenbakterien** s. unter Kap. Schizomycetes. Über Eisenerz-Ablagerungen s. E. Naumann, Arch. f. Hydrobiol. 1921, Über die Eisenbakterien des Planktons und Neustons 1922.

21. **Sphaerotilus natans.**

(Name von *sphaera* = Kugel, und *tile* = Flocke.)

Typischer Abwasserorganismus. Fäden 2 μ breit, also viel dünner als *Leptomitus*. Vgl. auch Kap. Schizomycetes.

— p bis α m —

Sph. roseus ist von rosenroter Farbe, nicht, wie bisweilen *Fusarium*, ziegelrot.

22. **Cladotrix dichotoma.** Farblos. Mit Pseudodichotomien. Entwicklungsform von *Sphaerotilus* bei Nahrungsabnahme. — meist β m —

23. **Zoogloea ramigera.** Bildet weißliche, hirschgeweihartige Kolonien von 1—1,5 mm Länge. — bei Massenentwicklung p —

24. **Zoogloea uva.** Traubenförmige Zoogloea. Tritt an untergetauchten Wurzeln, Halmen usw. in Form von etwa erbsen- bis kirschengroßen, traubig gehäuftten, meist ungefärbten Gebilden auf. Stäbchen in der Schleimmasse meist langgestreckt und etwas über 1 μ dick. — meist p —

25. **Beggiatoa alba.** Fäden nach Art der *Oscillatoria* auf (schwefelwasserstoffhaltigem) Schlamm usw. kriechend. Vgl. auch S. 135. — p bis m bis o —

26. **Thiothrix nivea.** Bildet weiße Besätze in schwefelwasserstoffhaltigen Gewässern (auch in Wasserleitungen). Fäden im Gegensatz zu *Beggiatoa* unbeweglich. Die Abbildung zeigt die Fäden auf *Cladophora* festsitzend.

27. **Lamprocystis roseo-persicina.** Kolonien pfirsichblütenrot (in Planktonkammer beobachten!), oft gitterartig durchbrochen. Parallellform unter den Schwefelbakterien zu *Microcystis* (*Polycystis*) *aeruginosa*. In schwefelwasserstoffhaltigen Gewässern.

28. **Chromatium okenii.** Kirschrote Schwefelbakterie, meist ca. 8 μ lang. Oxydiert Schwefelwasserstoff. Vgl. Kap. Bacteria, S. 136.

- **Rhodospirillum.** Purpurspirillum. Zellen rot, schwefelfrei. In Sumpfwasser. Über Kultur der Purpurbakterien vgl. das Kapitel Schizomycetes, S. 137.

Chrysomonadales. Goldgelbe Monaden.

Zu dieser Gruppe, welche bewegliche Formen umfaßt, gehören viele Vertreter des Planktons; größere seit langem bekannte, und kleinere (Nannoplankton), erst in neuerer Zeit studierte. Viele besitzen charakteristisch gestaltete Gehäuse. Die Ernährung erfolgt

pflanzlich oder tierisch. Als Assimilate treten Fett oder fettähnliche Bestandteile auf. Die *Chrysomonadales* sind häufig und weit verbreitet. Ihre sehr vergängliche Natur erfordert meist, wenn es sich nicht um skelettführende Formen handelt, ein Studium am lebenden Objekt.

29. **Mallomonas acaroides.** Pelzmonade.

(Name von mallos = Zotte, Haar und acarus = Milbe.)

Planktonisch; meist ca. 25 μ lang, gelb. Pro 1 ccm bisweilen Dutzende. Stacheln mit feinen Blättchen festsitzend. Präparation der nadelartigen Gewächse am besten durch Eintrocknen. (E. Naumann 1917, mit Tafel.) — meist o —

— **Chromulina rosanoffii.** (Nicht abgebildet.) Vermag auf die Wasseroberfläche emporzukriechen und als Neuston (s. S. 222) durch Lichtreflex Goldglanz zu erzeugen. Nach einer Mitteilung von E. Naumann findet man je Quadratmillimeter des *Chromulina*-Neuston 1000—2000 Teilungsstadien. Vorwiegend in Tümpeln und Wasserkübeln.

— bei Geringproduktion o —

30. **Synura uvella.** Kolonien freischwimmend, rundlich (ca. 60 μ) oder länglich. Farbe gelb, Geruch nach frischen Gurken. Entwickelt sich mit Vorliebe in der kälteren Jahreszeit.

— o (bei Hochproduktion β m) —

31. **Uroglena volvox.** Kolonien gelblich, echt planktonisch, bis 300 μ groß. (Mit Planktonkammer beobachten!) Geruch unangenehm fischig-tranig, sich bisweilen der umgebenden Luft mitteilend. In 1 ccm Wasser bis gegen 25 Kolonien (trübend!). Meist in Seen; in den oberen Wasserschichten.

— o —

32. **Dinobryon sertularia.** Trichterbäumchen¹⁾. Die umherschwimmenden Trichterbüschel (meist buschiger als abgebildet) sind für das Plankton vieler Gewässer charakteristisch. Bei Massenentwicklung (Dutzende von Kolonien in 1 ccm Wasser) erscheinen die Netz- oder Siebfänge gallengelb mit einem Stich ins Grüne. Eine Vegetationsfärbung des Wassers zeigt sich schon bei einer Frequenz von 1000 auf 1 ccm (E. Naumann, Bot. Not. 1919). Die Trichter bestehen vorwiegend aus Zellulose. Systematik s. bei Pascher (1).

— bei Geringproduktion o —

Silicoflagellata.

33. **Distephanus speculum.** Gehäuse aus Kieselstäben gebildet. Nannoplankton; marin. Gattung auch fossil (Lim Fjord).

1) Nach frdl. Vorschlag von Frau Dr. L. V. Meyer. Von Ehrenberg seiner Zeit als Wirbel-Moostierchen bezeichnet.

Coccosphaerales.

34. *Pontosphaera huxleyi*. Zellen mit Kalkplatten (Coccolithen). Nanoplankton; marin. Einzelplatten im Bodenschlamm.

Cryptomonadales.

35. *Cryptomonas erosa*. Länge 15–32 μ . Farbe meist olivgrün. Bildet Stärke. Schwimmbewegung oft durch Springen unterbrochen. Überall verbreitet; besonders typisch bei Hochproduktion als β -mesosaprober Planktont. Wird von vielen Rädertieren u. a. m. gefressen. In 1 ccm Wasser sehr oft Hunderte und viel mehr Exemplare. Lit. A. Pascher (1). — in Hochproduktion β m —

Euglenales.

36. *Euglena viridis*. Mit Augenfleck (*Euglena* = schönes Auge). Bildet bei massenhaftem Vorkommen als Neuston saftgrüne Überzüge auf der Wasseroberfläche; kann auch grüne Verfärbung des Gesamtwassers bewirken. Besonders in verunreinigten Dorfteichen und Abwasserpfützen. — p bis α m —

Sehr geeignet zu phototaktischen Versuchen. Körper metabolisch. Im Zimmer hält sich diese Spezies leider meist nicht lange; *Euglena* pflegt widerstandsfähiger zu sein.

Versuch: Bringt man ein gewöhnliches Objektträgerpräparat mit zahlreichen, lebhaft beweglichen Exemplaren von *Euglena viridis* unter das Mikroskop, so wird man leicht beobachten, daß alle normalen Individuen direkt nach der dem Lichte zugekehrten Seite des Deckgläschens hinschwimmen. Nach E. Naumann können zu solchen Versuchen mit Vorteil auch Zentrifugate der verschiedensten Flagellaten und Chlamydomaden gebraucht werden. Dreht man den Objektträger um 180°, so wird dessen vorher dunklere Seite stärker belichtet und die *Euglena* kehren sämtlich um; vgl. auch das Kapitel Assimilation. Hat man reichliche Mengen von Material zur Verfügung, so kann man diesen Versuch auch makroskopisch anstellen, am besten unter Verwendung einer parallelwandigen Glasküvette, deren Schmal- oder Längsseite man dem Licht zukehrt. Die Phototaxis wird durch den CO₂-Gehalt des Wassers beeinflusst.

Durch Zusatz starker Jodjodkaliumlösung zu mikroskopischen Präparaten kann man bei *Euglena viridis* leicht die Geißel nachweisen. Als Assimilationsprodukt tritt Paramylum auf, das sich mit Jodlösung nicht blau färbt [vgl. Pascher (1)].

Der sogenannte Augenfleck am vorderen Teil der Zellen ist für die Perzeption des Lichtes nicht maßgebend; es finden sich gänzlich farblose Flagellaten, welche ebenfalls phototaktisch sind.

P. Rabbas hat von grünen Flagellaten Lumière-Momentaufnahmen gemacht, an denen der rote Augenfleck gut sichtbar ist.

Euglena sanguinea siehe auf der Farbentafel IX. Der Farbenton des Organismus spielt öfter ins Braunrote. Bildet als Neuston rote Massenfärbungen; Produktion dann gegen 400 Organismen je Quadratmillimeter (E. Naumann 1915).

37. **Phacus longicauda.**

(Name von phakos = Linse.)

Zellen flach, grün, gegen 100 μ lang, mit einer Geißel. Par-
amylumkorn scheibenförmig. — o, in Hochproduktion β m —

38. **Trachelomonas hispida.**

(Name von trachelos = Hals.)

Die Gehäuse haben bisweilen einen kragenartig aufgesetzten Hals. Sie sind meist braun, 20—30 μ lang und enthalten innen grüne Chromatophoren. — in Hochproduktion β m —

39. **Trachelomonas volvocina.** Zellen meist kugelig, in der Regel gegen 10 μ im Durchmesser. Membran oft schwarzbraun. Nach E. Naumann (Bot. Not. 1918) bisweilen bis 175 000 Zellen in 1 ccm Wasser. — in Hochproduktion β m —

Peridinales.

Zellen mit zwei Geißeln, von denen die eine äquatorial verläuft. Chromatophoren gelbbraun. Rein planktonisch. Die *Peridinium*-Arten verursachen öfter Vegetationsfärbungen. Das Minimum dürfte für kleinere Formen bei etwa 2000 im Kubikzentimeter liegen. Vgl. Sjöstedt 1921, Lindemann (1).

— **Gymnodinium palustre.** Ähnlich manchen Arten von *Peridinium*, aber ohne Panzer. Im Süßwasser und im Meere finden sich ziemlich häufig kleine farblose Arten, welche noch wenig studiert sind. — in Seen o —

40. **Ceratium hirundinella.** Schwalbenschwanzalge. Sehr charakteristisch gestaltet. Durch Längs- und Äquatorialgeißel beweglich. Mit gefältem, vorwiegend aus Zellulose bestehendem Panzer. Besonders im Plankton der Seen. In eutrophen Seen (Gruppe VI) oftmals eine Vegetationsfärbung verursachend. — o —

41. **Ceratium tripos.** Marin, auch in der Ostsee (Herbst). Einzeln oder in Verbänden. Erzeugt wie *Noctiluca* und manche Bakterien Meeresleuchten. Wichtiger Vertreter im Vegetations-Maximum.

42. **Peridinium divergens.** Marin. Oft häufig, z. B. acht Zellen in 1 ccm Wasser. Ernährung pflanzlich. Wahrscheinlich kosmopolitisch.

43. **Peridinium tabulatum.** Gelbbraun, lebhaft und wackelnd beweglich, mit gefeldertem, vorwiegend aus Zellulose bestehendem Panzer. Körper etwas flach gedrückt. — bei Geringproduktion o —

Bacillariales (Diatomaceae). Kieselalgen.

Membranen stark kieselensäure- und auch pektinhaltig. Zellen von Schachtelbau, aus zwei Schalenhälften bestehend (Bonner Lehrbuch S. 352). Chromatophoren meist gelb bis gelbbraun, assimilierend, erstes sichtbares Assimilationsprodukt meist Öl. Ausgeschiedene Sauerstoffbläschen sieht man über Diatomeenüberzügen oft in großer Menge wie silberne Kügelchen stehen.

Die Rhaphe bildet den Austrittsspalt für das bewegende Plasma. Fast alle planktonischen Kieselalgen sind rhaphefrei und unbeweglich. Das Präparieren der Kieselshalen robusterer Formen geschieht durch Glühen möglichst reinen Materials auf dem Platinblech oder durch Kochen in Schwefelsäure unter Zufügen von Salpeter zum Oxydieren der organischen Substanzen. Planktonformen enthalten meist weniger Kieselensäure, dagegen findet man die Schalen benthonischer (S. 223) Vertreter, von der Natur selbst präpariert, häufig im Schlamm. Als Einbettungsmittel dient am besten Styresin. Vgl. Strasburger-Koernicke (1). Luftblasen entfernt man unter der Luftpumpe. Diatomeentypenplatten sind im Handel käuflich. Die Rohkultur geschieht am besten in flachen Schalen bei niedriger Wasserschicht und kühler Temperatur. Man kann dem Wasser einige Grasstücke, andere Pflanzenreste oder Schlamm beifügen.

Für Reinkulturen, z. B. von *Naviculeen*, benutzt man folgendes Nährmedium:

Wasser	1000	cem
Gelatine ¹⁾ oder Agar	100	g bzw. 15 g
K ₂ HPO ₄	0,2	„
MgSO ₄	0,2	„
FeSO ₄	Spur	
Alkaleszenz	nötig	
Silikat	nicht nötig.	

Als Stickstoffquelle gibt man 0,2 g KNO₃ oder Asparagin; vgl. auch O. Richter (1). Verwendbar sind auch die Nährstofftabletten (S. 4).

44. Melosira granulata. Faden-Kieselalge des Süßwassers.

(Name von melos = Glied und seira = Schnur.)

Zellwände mehr oder weniger deutlich punktiert. Schlußzellen mit Stachel. *M. binderiana* besonders zartwandig. In 1 cem Wasser bisweilen einige tausend Fäden, die das Wasser etwas verfärben. — bei Geringproduktion o —

45. Melosira varians. Uferorganismus oder erratisch planktonisch. Die dünnen Fäden verhältnismäßig häufig Auxosporen bildend. Leicht kenntlich an den Einkerbungen der Fadenaußenwände zwischen zwei Zellen. Kann braune Überzüge bilden. Kennzeichnet die Zone abklingender Selbstreinigung. — bei Hochproduktion typisch β m —

1) Die Gelatine muß von feinsten Qualität, der Agar 2—3 Tage gewässert, zuletzt mit destilliertem Wasser ausgespült sein.

46. **Stephanodiscus hantzschianus**. In Norddeutschland die Form *pusillus* im Plankton besonders häufig. Bisweilen mit langen, sehr zarten Randstacheln, welche besonders bei Dunkelfeldbeleuchtung gut zu sehen sind. Manchmal zu Fäden vereinigt. In 1 ccm Wasser nicht selten gegen 6000 Zellen der kleinen, etwa 10 μ im Schalendurchmesser betragenden Form (Vegetationsfarbe).

— bei Hochproduktion typisch β m —

- **Rhizosolenia semispina**. Häufiger Planktont der Meere; in der Ostsee, Nordsee und besonders den nordischen Meeren.

Rhizosolenia- und *Attheya*-Arten sind auch im Süßwasser häufig, aber ihrer Zartheit wegen oft übersehen. Der Nachweis gelingt leicht durch Trockenpräparate oder (nach Einar Naumann) unter Anwendung der Tintenstiftmethode. Die Schalen färben sich dann schwach blau.

- **Chaetoceras whighamii**. Zwischen den Stacheln Gallerthäute, welche die Schwebefähigkeit erhöhen können. *Chaetoceras* ist ein charakteristischer Planktont, besonders im Frühjahr in nördlichen Meeren.

Abb. 116. *Chaetoceras whighamii* mit Hüllgallerte (sichtbar nach Einlegen in Tusche. Vergr. 700-fach. (Nach Br. Schröder, 1911.)

47. **Triceratium favus**. Marin. Nicht im Plankton. Wird auch fossil gefunden.

48. **Fragilaria crotonensis**. Kammalge. Zellen zu einer Art Doppelkamm aneinander gereiht. Häufig im Plankton der Flüsse und Seen. Oft mit regelmäßig angeordneten Öltröpfchen.

— o (bis β m) —

49. **Fragilaria capucina**. Bildet flache, auch bei ziemlich starker Vergrößerung ebene (kaum gewölbte) Bänder, die überraschend lang werden können. Im Plankton häufig.

— o —

50. **Synedra ulna.** Die Elle.

(synedra = zusammensitzend.)

Sehr häufig, in mesosaprobem Wasser bisweilen braune Überzüge bildend. Mit ihren Varietäten: — o bis m —

51. **Synedra acus.** Die Nadel. Unbeweglich. Häufig im Plankton; in 1 ccm Wasser bisweilen mehrere tausend, das Wasser dann trübend. Passiert leicht die Maschen des Planktonnetzes und -siebes. Lang nadelförmig gestreckte Formen werden als *S. delicatissima* bezeichnet. — o, in Hochproduktion bis β m —

52. **Asterionella formosa.** Sternalge; lebt perennierend im Plankton. Die Kolonien sind 4—17- (und mehr-)strahlig. Im letztgenannten Falle sind sie in flacher Schraubenlinie angeordnet, welche drei Umgänge haben kann. Normale dreistrahlige Kolonien scheinen nicht vorzukommen; beobachtet man sie, so handelt es sich um zerbrochene mehrstrahlige oder um die der *Asterionella* bisweilen ähnliche *Diatoma elongatum*. Strahlen in den Lücken (nach A. Voigt) oft durch Gallertfäden verbunden. In selteneren Fällen tritt *Asterionella* auch in Form von Zickzackketten oder kurzen Bändern auf. In Auflösung begriffene Zellen zeigen oft gebogene Form [E. Naumann (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1919)]. In 1 ccm Wasser können mehrere Tausend, das Wasser verfärbende Kolonien von *Asterionella* vorkommen, besonders bei Beginn der wärmeren Jahreszeit (Frühlingsmaximum). Nicht selten mit *Diplosiga* u. a. besetzt. Bezüglich der Reinkultur von *Asterionella* vgl. man O. Richter (1).

Bringt man mit dem Planktonnetz oder -sieb gewonnene Anhäufungen von *Asterionella*, *Diatoma* oder *Melosira* in ein dem direkten Sonnenlicht ausgesetztes Gefäß (z. B. Planktonglas), so steigen infolge der Assimilation Sauerstoffblasen empor, meist in Abständen von einigen Sekunden. Das in den Zellen vorhandene Chlorophyll kann man dadurch sichtbar machen, daß man die gelbliche Kieselalgen-Planktonmasse erwärmt, wodurch sie deutlich grün wird. [Vgl. Molisch (2).]

Von der Sternalge kann man in einfacher Weise durch Antrocknenlassen auf dem Objektträger oder Deckgläschen befriedigende Dauerpräparate in Luft herstellen (vorher in destilliertes Wasser!). Wegen Photographien auf Gaslichtpapier vgl. E. Naumann. — o, bei Hochproduktion β m —

53. **Diatoma elongatum** (= *Diatoma vulgare* var. *elongatum*). Längswände fein punktiert. Planktonisch. In der Spree und Havel besonders häufig. In 1 ccm oft Dutzende und mehr.

— o, bei Hochproduktion β m —

54. **Tabellaria flocculosa.** Zellen ähnlich der *T. fenestrata*, aber gedrängener. Im Plankton. — bei Geringproduktion o —

55. **Tabellaria fenestrata.** Zellen im Innern mit unvollkommenen Scheidewänden, gestreckt. Statt im Zickzack auch in sternförmigen Verbänden (var. *asterionelloides*). Im Plankton, besonders der Seen.
— bei Geringproduktion o —
56. **Rhoicosphenia curvata.**
(Name von rhoicos = krumm und sphen = Keil.)
Zellen, von der Gürtelseite aus betrachtet, gekrümmt.
— typisch β m bis α m —
57. **Cocconeis pediculus.** Schildlaus-Kieselalge.
(Name von coccus = Korn und naus = Schiff.)
Häufig; festsitzend auf vielen Fadenalgen, besonders *Cladophora*.
— o bis β m —
58. **Navicula (Pinnularia) nobilis.** Große Schlamm-Diatomee. Bis etwa 400 μ lang. Auch an Bruchstücken erkennbar. In der Seitenlage ist oft die Schachtelstruktur gut sichtbar.
— meist o —
59. **Navicula (Pinnularia) viridis.** Ziemlich große Schlamm-Diatomee. Bis 125 μ lang. Oft von grünlicher Farbe im Gegensatz zu den sonst meist braungelben Vertretern dieser Gruppe.
— meist o —
60. **Navicula cryptocephala.** Meist nur gegen 25 μ lang. Im Verein mit anderen kleinen *Navicula* und *Nitzschia* oft massenhaft auf Schlamm. Beweglich, wie alle Arten von *Navicula*.
— β m —
61. **Navicula atomus.** Kleinste (atomhafte) Naviculee. Länge 5—17 μ .
— β m —
62. **Navicula cuspidata.** Schön gestaltete Uferdiatomee; bis 140 μ lang. Enden der Schalen etwas vorgezogen.
— β m —
63. **Stauroneis phoenicenteron.** Charakteristisch durch das weiße Kreuz auf der Schale. Im Schlamm.
— β m —
64. **Amphipleura pellucida.** Leicht kenntlich an den Verdickungen auf den Flächen der Enden. Benthonisch.
— o bis β m —
65. **Pleurosigma acuminatum.** Meist Ufer-Diatomee, aber auch planktonisch.
— meist o —
Pl. angulatum dient als Testobjekt bei der Prüfung der Mikroskope (s. 105).
66. **Gomphonema acuminatum.**
(Name von gomphos = Nagel, Keil.)
Festsitzende Uferdiatomee von charakteristischer Form. — o —
67. **Cymbella lanceolata.**
(Name von cymbe = Kahn.)
An Gallertstielen festsitzende Uferdiatomee.
— o —

68. Amphora ovalis.

(amphora bedeutet Gefäß.)

Uferdiatomee von charakteristischem Aussehen. Mit Öl und Volutin. — o —

69. Epithemia turgida.

(Nach epithema, das Aufgesetzte.)

Schalen- und Gürtelansicht. Mit der konkaven Seite auf Algen und anderen Wasserpflanzen festsitzend. Querrippen in der Mitte konvergierend. Länge etwa 25–100 μ . — o —— **Bacillaria paradoxa.** (Nicht abgebildet.) Stabförmige Zellen zu bandförmigen Ketten verbunden. Beim Kriechen werden die Zellen wie die Glieder einer Feuerwehreiter gegeneinander verschoben. In Brack- und Süßwasser. Hier besonders zur kälteren Jahreszeit. Die Zahl der Permutationen durch Lageänderung der Zellen gegeneinander ist als endlos zu bezeichnen. — o —**70. Nitzschia sigmoidea.**

[Nach C. L. Nitzsch (Halle).]

Große Schlamm-Diatomee, bis $\frac{1}{2}$ mm groß. — o bis β m —**71. Nitzschia acicularis.** Bis 70 μ lang; beweglich. Die etwas ähnliche *Synedra acus* ist unbeweglich. — β m —**72. Hantzschia (Nitzschia) amphioxys.**

[Nach C. A. Hantzsch (Dresden).]

Ziemlich leicht kenntlich an der einseitigen schwachen Konkavität und den meist ein wenig vorgezogenen Enden. Länge bis gegen 100 μ , aber meist erheblich kleiner. — typisch α m —**73. Cymatopleura solea.** Pantoffel-Diatomee.

(Name von kyma = Welle, und pleura = Seite.)

Schlamm-Diatomee, von schwankender Größe, wie die Abbildungen zeigen. 300 μ und mehr lang. — o —**74. Surirella biseriata.**

(Herkunft des Namens unbekannt.)

Große Schlamm-Kieselalge, bis gegen 300 μ lang. — o —

Conjugatae. In den Klar- und Humusgewässern vom oligotrophen Typus (VI. Gruppe) spielen eine ganze Reihe von Desmidiaceae, welche in den Gewässern des eutrophen Typus nicht vorkommen, eine ganz besondere Rolle. [S. West und E. Naumann (1917).]

75. Closterium moniliferum. Spindelalge. Zellen bis $\frac{1}{2}$ mm lang, jedoch meist kürzer. Häufig in der Uferregion. Auch im Plankton, z. B. mancher Flüsse; an den Enden der Zellen wie bei vielen Desmidiaceen Bläschen mit zitternden Gipskristallen (Tanzstübchen).

Weitere bekannte Arten sind: *Cl. acerosum*, *lunula*, *dianae* und *setaceum*. — o —

76. *Cosmarium botrytis*.

Name von kosmos = Schmuck.

Zellhälften schwach trapezförmig. Membran etwas warzig. Farbe der Chromatophoren rein grün. In Teichen, Torfgewässern u. dgl.
— β m —

77. *Staurostrum gracile*.

(Name von stauros = Pfahl, Kreuz, und astron = Stern.

Eine der wenigen Desmidiaceae des Planktons. — o —

78. *Mougeotia genuflexa*.

[Nach dem Arzt und Botaniker Mougeot (1776–1858).]

Fäden gegen 30 μ dick. Bildet auf Teichen und in Gräben oft Fladen von meist hell- und gelbgrüner Farbe und weichsträhniger Konsistenz. Jede Zelle mit plattenförmigem Chromatophor, welches sich bei starker Belichtung hochkant stellt (Versuch!). Im Plankton finden sich bisweilen sehr feinfädige Arten (z. B. *M. quadrangulata*). Kopulation meist in der Weise, daß sich zwei Fäden knieartig gegeneinander biegen (genu = Knie). [Oltmanns (1).] — o —

79. *Spirogyra porticalis*. Schraubenalge. Die Alge ist als Objekt für physiologische Versuche, z. B. solche betreffend Assimilation, und für mikroskopische Zellstudien sehr bekannt. Die Zahl der Chlorophyllbänder beträgt je nach der Spezies 1–6. *Sp. porticalis* (= *Sp. quinina*) hat in jeder Zelle ein Chlorophyllband. Der Zelldurchmesser beträgt ca. 40 μ . Die Beobachtung gestaltet sich beim Vorhandensein nur eines Bandes am einfachsten. Der Kern kann unter einem solchen Band liegen und ist dann ohne Färbung schwer zu sehen, oder er ist an Plasmafäden, welche ihn mit den Stärkeherden (Pyrenoiden)¹⁾ verbinden, in der Mitte der Zelle aufgehängt und dann ohne Anwendung von Färbungsmitteln ausgezeichnet zu sehen. Man findet sie in der Regel in der Form schwimmender Watten in der Uferregion von Teichen, Wasserbecken, in Flußbuchten und in Gräben mit vorwiegend stehendem Wasser. In Rieselfeld-drainwasserteichen kommt sie, besonders in der Spezies *crassa* (etwa 100 μ dick), in zentnerschweren Anhäufungen vor. Über Assimilationsversuche vgl. Teil A, S. 9.

Die bekannte Kopulation zwischen zwei Fäden, wobei der eine der aufnehmende ist (Abb. 117), ist in der freien Natur nicht überall häufig zu beobachten; sie kann aber im Laboratorium künstlich hervorgerufen werden, indem man kleine Watten in flache Schalen mit Wasser oder 2–4-proz. Rohrzuckerlösung bringt und, was wichtig ist, gut belichtet [vgl. Klebs (2)]. Manchmal findet Kopulation zwischen zwei benachbarten Zellen eines und desselben Fadens statt (früher *Rhynchonema* genannt).

1) Bei allen Arten von *Spirogyra* tritt als erstes sichtbares Produkt der Assimilation Stärke auf.

Fäden mit reifen Zygosporen können in Schalen einfrieren und nach dem Auftauen im gleichen Wasser auskeimen, wobei die Sporenhaut aufreißt.

Abb. 117. *Spirogyra* (*nitida*), zwei Fäden in Kopulation. Links oben Zygospore. Vergr. ca. 400fach. (Nach L. Kny.)

Die *Spirogyra*-Zelle ist in der Sammlung Brendelscher Modelle vorhanden. *Spirogyra setiformis* ist auf der Wandtafel No. 103 von L. Kny dargestellt.

80. **Zygnema stellinum.**(Name von *zygon* = Joch.)

Unverzweigte Fäden, mit je zwei sternförmigen Chromatophoren in jeder Zelle. Breite der Fäden oft etwa 50 μ . Farbe blaßgrün.

— o bis β m —

Protococcales.

81. **Chlamydomonas species.** Häufig in Massen in Regenpfützen, Tümpeln, Dorfteichen u. a. auftretend. Sowohl im Plankton wie im Neuston vorkommend. Nach E. Naumann (1) bisweilen 240 000 Zellen in 1 ccm Wasser. Liefert, wenn reichlich Material zur Verfügung steht, instruktive Bilder bei Dunkelfeldbeleuchtung. Alle *Volvocaceae* sind planktonisch und mit Geißeln ausgestattet.

— in Hochproduktion m —

82. **Polytoma uvella.** Zellen farblos, etwa 25 μ lang. Häufig in gestandenem städtischen Abwasser sich entwickelnd. Bevorzugt nach E. G. Pringsheim (1) Amido-Essigsäure. — in Hochproduktion p —

83. **Pandorina morum.** Kolonien meist 16zellig, mit ziemlich deutlich abgegrenzter Gallerte. Zellen in der Mitte der (meist etwas ovalen) Kolonien zusammenstoßend. In 1 ccm Wasser bisweilen zahlreiche Kolonien.

— o bis β m —

84. **Eudorina elegans.** Kolonien beweglich, meist mindestens 32zellig; Zellen peripher. Verbreiteter Planktonorganismus. Kolonien viel kleiner als diejenigen von *Volvox*. In 1 ccm Wasser bisweilen Dutzende von Kolonien. Vgl. auch die Farbentafel IX.

— o, β m —

85. **Volvox aureus.** Kugelalge. Kolonien mit tausenden von peripher gelagerten, begeißelten Zellen. (In Planktonkammer beobachten!) Oospore glatt, wie die Abbildung zeigt. Im Innern der Kolonien bisweilen Enkelblasen. Zellen durch feine Plasmafäden, bei *V. globator* durch dicke Plasmastränge, verbunden. Die Abbildung zeigt die Kolonie bei geringer Vergrößerung. Phototaktisch, wahrscheinlich auch geotaktisch.

--- o bis β m —

— **Botryococcus braunii.** Kolonien unbeweglich, dem bloßen Auge als Körnchen erscheinend, bisweilen siegellackrot durch ölartige Substanz. Spezifisches Gewicht oft kleiner als Wasser, daher an der Oberfläche schwimmend, bisweilen Wasserblüte verursachend. Zellen selbst grün, radiär angeordnet, Vermehrung durch Schwärmer. Vgl. auch Abb. 124.

— bei Geringproduktion o —

— **Chlorella species.** Kleine grüne Kugelzellen, welche manche gedüngte Wässer grün färben. In 1 ccm Wasser dann 4—10 Millionen Zellen (E. Naumann, Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1919). Weil diese nur einige Mikromillimeter im Durchmesser haben, passiert solches

Wasser das Planktonnetz ebenso grün, wie es hineingegossen wird. Chlorellen leben auch in *Spongilla*, *Hydra viridis*, *Ophrydium*, im Flechtenthallus, in Trinkwasserkaraffen, Lösungen in chemischen Laboratorien usw. Meist mixotroph. In Reinkultur gezogen.

— in Hochproduktion meist α m —

86. **Rhaphidium polymorphum.**

(Name von raphidion = kleine Nadel.)

Zellen gerade oder gekrümmt, nadelförmig, einige Mikromillimeter dick, zu Büscheln vereinigt. Im Plankton der Uferregion.

— o, in Hochproduktion β m —

87. **Scenedesmus acutus** (= *Sc. obliquus* = *Dactylococcus infusumum*).

(Name von skene = Hütte und desmos = Band.)

Zellen zu Kolonien vereinigt, an beiden Enden zugespitzt. Nach E. Naumann (1919) bei Vegetationsfärbung gegen acht Millionen Kolonien im Kubikzentimeter.

— o, in Hochproduktion β m —

88. **Scenedesmus quadricauda** (= *caudatus*). Zellen zu vier und mehr vereinigt. Sehr häufig. Meist im Plankton in der Uferregion. Bis gegen 50 000 Kolonien im Kubikzentimeter.

— o, in Hochproduktion β m —

89. **Pediastrum boryanum.** Tafelsternalge.

[Name von pedos = Platte, und dem französ. Reisenden Bory (1780—1840).]

Meist 32- bis 64-zellig. Zellen, aus denen die Schwärmer (welche sich zu neuen Kolonien zusammenlegen) ausgetreten sind, lassen meist deutlich ein langgestrecktes Loch in der Membran erkennen. Meist nicht typisch planktonisch, sondern mehr der Uferregion angehörig.

— o, bei Hochproduktion β m —

P. duplex, dessen Platte netzartig durchbrochen ist, typischer planktonisch.

P. boryanum ist in der Sammlung Brendelscher Modelle vertreten.

90. **Actinastrum hantzschii.** Kolonien meist 4- oder 8-zellig. Zellen schwach kegelförmig. Charakteristischer Planktonorganismus.

— bei Geringproduktion o —

91. **Richteriella botryoides.**

(Nach P. Richter, Algologe in Leipzig.)

Im Plankton. Leicht kenntlich an den ziemlich derben, nach dem Ende zu verjüngten Stacheln. Erscheint bei etwa 1000-facher Vergrößerung wie ein grünes Heliozoon. Nur in β -mesosaprobem Wasser üppig entwickelt, sonst mehr einzeln.

Golenkinia radiata bei Hochproduktion in etwa 50 000 Individuen je Kubikzentimeter.

Ulotrichales (früher Confervales).— **Ulva lactuca.** Meersalat. (Nicht abgebildet.)

(ulva = Name einer Sumpfpflanze bei Virgil.)

Bildet salatblattartige grüne Flächen, welche an Steinen usw. festgeheftet sind, im Laufe der Entwicklung sich aber loszulösen und frei am Boden zu liegen pflegen. *Ulva* bedarf nach Angaben in der Literatur zu seinem Wachstum des Natriums. Verbreitet im nördlichen Eismeer, an der Küste von Nordamerika, in der Nordsee, Ostsee, an der englischen, französischen und spanischen Küste, im Mittelmeer. Die Entwicklung dieser Pflanze wird durch ins Meer geleitete organische Abwässer begünstigt.

— **Enteromorpha intestinalis.** Darmalge. (Nicht abgebildet.) Bildet unregelmäßig-darmartig gestaltete grüne Schläuche, von mehreren Millimetern Durchmesser, öfter zu schwimmenden Massen vereinigt. Vgl. Hayrén (1922).

Ent. linza u. a. m. im Meere an Steinen und Holzpfehlen.

92. **Ulothrix zonata.** Kraushaaralge.

(Name von ulos = kraus.)

Fäden unverzweigt, bisweilen sehr dick (75 μ). Chromatophor sattelförmig, in der Einzahl in jeder Zelle. Oft schlüpfen unter den Augen des Beobachters die Schwärmsporen aus.

Manche Arten von *Ulothrix* bevorzugen abwasserführende Gewässer. — meist o —

93. **Conferava (*Tribonema*) bombycina.**

[Name von einer Wasserpflanze bei Plinius, welche gebrochene Knochen zusammenheilen soll (confervēre).]

Fäden von 5—15 μ Dicke, unverzweigt, an der H-Struktur und den Öl erzeugenden Chromatophoren kenntlich. Bildet schwimmende oder schwebende, öfter an Wasserpflanzen festhaftende grüne Watten. Teiche, welche durch diese Fadenalge verkrauten, können unter geeigneten Verhältnissen durch Einsetzen von Schwänen rein gehalten werden. — β m —

94. **Stigeoclonium tenue.** Die etwa 10—15 μ dicken Fäden bilden fest-sitzende, saftgrüne Rasen, manchmal auch nur eine sogenannte *Stigeoclonium*-Sohle. — α m bis β m —

Sehr polymorph, z. B. verzweigt und unverzweigt. Trotzdem meist daran kenntlich, daß jede Zelle ein sattelförmiges Chromatophor enthält, welches die Mitte der Zelle einnimmt, während der freie Teil weiß bleibt, daher *Stigeoclonium*, d. h. gefleckter Zweig, genannt. Die Schwärmsporen besitzen vier Geißeln. Man erhält sie meist leicht, wenn man das eingesammelte Material auf einen weißen Teller in Wasser legt und an das Fenster stellt. Am nächsten Tag wird man einen grünen Saum von Schwärmsporen an der dem Licht

zugekehrten Seite des Tellers beobachten. Eine der häufigsten Fadenalgen.

Draparnaldia und *Chaetophora* sind mit *Stigeoclonium* verwandt.

95. *Oedogonium rivulare*.

(Name von *oidao* = anschwellen.)

Fäden unverzweigt, ziemlich dick (bis etwa 45 μ), die männlichen etwas zarter als die (hier abgebildeten) weiblichen. Fäden an Kappen und Scheiden (wie alle *Oedogonium*-Arten) meist leicht kenntlich. Diese hochorganisierte Alge lebt in der Regel festsitzend auf Schilf u. a. m. Auf den Oogonien schmarotzt *Chytridium olla*.

— bei starker Entwicklung β m —

Losgelöste Watten können beim Zurücktreten des Wassers eintrocknen und ausbleichen. Sie sind in dieser Form (ähnlich *Cladophora*) als Meteorpapier, Wiesenleder, Oderhaut usw. beschrieben worden.

Die Gallerte der *Oedogonien* ist oft sehr reich an gefälltem Eisenoxydhydrat, eine Erscheinung, die auch sonst bei gallertführenden Algen häufig vorkommt. Die Physiognomie (der Ausdruck der Erscheinungsform) kann hierdurch besonders gekennzeichnet sein. E. Naumann, welcher diese Verhältnisse in kalkarmen Urgebirgsgewässern studiert hat, bezeichnete 1922 (Abderhaldens Handbuch) diese Erscheinung als Sideroplastie (Eisenbildung). Über diesen Vorgang bei Meeresalgen vgl. Sjöstedt (Bot. Not., 1921).

96. *Cladophora species*. Diese Fadenalgen bilden mehr oder weniger auffällige grüne, nicht schleimige Besätze in Flüssen, Gräben, an Meeresküsten usw.; sie sind im allgemeinen daran leicht kenntlich, daß die Fäden ziemlich fest sind und dementsprechend dem Zerreißen einen gewissen Widerstand entgegensetzen. Jungbrut von Fischen kann sich in dem festen Algenfadengewirr verfangen und darin absterben. In Flüssen können sie unter Umständen abseihend auf das Plankton wirken, vergleichbar den Barten des Wales. Infolge der Anhäufung kann dann allmählich eine geringe Zersetzung eintreten, welche eine stärkere Entwicklung mancher Rädertiere zur Folge hat.

Während *Cl. glomerata* meist ziemlich kurze Besätze bildet, kann *Cl. crispata* an Wehren und in Rieselfeldgräben in riesenhaften Strähnen von 9—10 m Länge auftreten. Bildet Meteorpapier (siehe *Oedogonium*).

Cl. profunda tritt als bemerkenswert wenig lichtbedürftige Alge in kurz-büscheligen, straffen Besätzen in 10 und mehr Metern Tiefe in großen klaren Seen auf.

Cl. (Aegagropila) sauteri bildet in manchen Seen grüne, massige, nicht schleimige Kolonien bis zur Größe einer kleinen Kegelkugel.

Diese Alge wurde im Botanischen Garten in St. Petersburg in mit Wasser gefüllten großen Blumentöpfen, deren Boden mit Sand bedeckt ist, im Licht mit bestem Erfolg kultiviert.

Cl. rupestris bildet fellartige, zottige Besätze an Steinen und Felsen der Meeresküsten, was auf Festigkeit der Anheftung und der Fäden schließen läßt, wie sie im Süßwasser kaum beobachtet wird.

Die Fäden von *Cladophora* sind häufig mit Kieselalgen, wie *Cocconeis*, *Rhoicosphenia* und *Gomphonema*, besetzt.

97. *Vaucheria*.

[Nach dem Botaniker Vaucher in Genf (1763—1841).]

Die „Schlauchalge“ findet sich im Wasser und auf feuchter Erde. Im Drainwasser von Rieselfeldern und in manchen Bächen kommt sie oft zu derartig massenhafter Entwicklung, daß sie zentnerweise eingesammelt werden könnte. Die Fäden stehen dann vom Substrat

Abb. 118. *Vaucheria ungeri*. Schwärmospore, aus dem Sporangium hervortretend. Schwärmospore frei beweglich. Schwärmospore keimend. ca. 200mal vergrößert. (Nach L. Kny).

oft wie die Haare eines straffen Fuchsfelles ab. Auf feuchtem Torfmull (Korngröße möglichst nicht über 5 mm) können manche Arten leicht kultiviert werden, wenn man für genügende Feuchtigkeit sorgt und die Kulturgefäße mit einer Glasscheibe überdeckt.

Die Erzeugung von Geschlechtsorganen gelingt in der Regel leicht bei Kultur in 2—4%iger Rohrzuckerlösung. [Vgl. Klebs (2) und Heering (1), ferner F. v. Wettstein (1).]

Bringt man auf Exkursionen Fäden von *Vaucheria* in eine Planktonkammer, so kann man sie mit einer etwa 25mal vergrößernden Lupe in bezug auf Einzelheiten sehr gut beobachten. Die Fäden sind bisweilen mit Eisen- und Mangankrümeln bedeckt, welche durch die Eisenbakterie *Siderocapsa* erzeugt sein können.

Caulerpa ist eine reichgegliederte Gattung der Siphoneen in den wärmeren Meeren [vgl. Oltmanns (1)].

Phaeophyceae. Braunalgen.

- **Laminaria saccharina.** Zuckertang. Reich an Mannit, der beim Trocknen an der Oberfläche der Alge als weißliches Pulver auswittert.

Abb. 119. *Laminaria* Species. a *L. digitata*. b *L. hyperborea* (alt und jung). c *L. saccharina*. ca. $\frac{1}{15}$ nat. Größe. (Neuzeichnung nach P. Kuckuck.)

In Beständen lebend und bei Ebbe hervortauchend. Die Laminarien sind Charakterpflanzen der nördlichen Meere; sie fehlen dementsprechend in den Tropen. Die Fortpflanzung findet im Winter statt. Sie wurden früher zur Jodbereitung verwandt. Abbildung s. beistehend.

- **Laminaria digitata** (= *Lam. flexicaulis*). Fingertang). Beim Durchschneiden des Stieles quillt keine Gallerte hervor. Bei Helgoland häufig, in der westlichen Ostsee nicht selten.
- **Laminaria hyperborea** (= *Lam. cloustoni*). Palmentang. Beim Durchschneiden des Stieles tritt in Menge Gallerte hervor.

Laminarien eignen sich gut zum Nachweis von Jod in Meeresalgen. Nach H. Molisch (2) werden dünne Späne getrockneter *Laminaria* in eine Glaskammer (z. B. Planktonkammer) gebracht und mit einigen Tropfen konzent. HCl befeuchtet. Auf die Unterseite der Deckscheibe bringt man mit einem Tröpfchen Wasser etwas Stärke, legt die Platte auf und beobachtet die Bläuung der Stärke durch das freiwerdende Jod. Die stattfindende Umsetzung kann man sich durch folgende Formel veranschaulichen:

aus dem HJ wird Jod leicht frei. Ähnlich wird die Umsetzung verlaufen, wenn das Jod in der Pflanze organisch gebunden ist. Vgl. J. Babiy (1). Will man größere Stücke von Tang (auch *Fucus*, Nordsee, Mittelmeer!) verwenden, so koche man etwa fingerlange Stücke im Reagenzrohr aus und mache das Jod durch etwas rauchende Salpetersäure frei. Stärkekleister wird jetzt tief blau gefärbt; Chloroform oder Schwefelkohlenstoff nehmen violette Farbe an.

Trockene *Laminaria*-Stiele, welche auch in Apotheken käuflich sind, eignen sich sehr gut zu Quellungsversuchen (S. 76). Sie vermehren nach Einlegen in Wasser ihr Volumen sehr bedeutend, wie auch das mikroskopische Bild zeigt.

Abb. 120¹⁾ stellt eine Vegetation mariner Algen (hauptsächlich Laminariaceae) von der Küste der Aläuteninseln nach Postels und

Ruprecht dar. Es zeigt links *Iridaea* (Florideae) und *Laminaria*, in der Mitte *Constantinea rosa marina* (Florideae), *Alaria* und *Agarum*, rechts *Macrocystis*, *Nereocystis* und *Thalassiophyllum*.

- **Fucus vesiculosus**. Gemeiner Blasentang.

[fucus = Tang. (Nicht abgebildet.)]

Die mit wenigen Ausnahmen marinen Brauntange weisen sehr mannigfach gestaltete Vertreter auf; einfach-fadenförmige, wie *Sphacelaria* und *Ectocarpus*, aber auch massig entwickelte, hochgegliederte,

Abb. 121. Eizelle von *Fucus*, umschwärmt von Spermatozoiden. Stark vergrößert. (Nach Thuret.)

1) Ich verdanke die Vorlage zu dem Bild der Freundlichkeit des Herrn Professor Dr. Nadson in St. Petersburg.

Abb. 120. Vegetationsbild von Meeresalgen, vom Ufer der Sitka-Insel (Aläuteninseln bei Alaska). (Nach Postels u. Ruprecht.)

wie *Fucus*, *Ascophyllum* u. a. m. Der Blasentang ist in der Nord- und Ostsee häufig und oft bestandbildend, z. B. auf steinigem Substrat und an Holzwerk.

In der Ostsee nimmt er mit fallendem Salzgehalt des Wassers ostwärts mehr und mehr ab. Für seine Verbreitung in vorwiegend oberflächlichen Schichten ist das Licht maßgebend. Die Vegetation der Blasentange wird im Winter nicht unterbrochen.

Läßt man lebende fertile Thallusteile von *Fucus*, z. B. *Fucus serratus*, ein wenig eintrocknen, so tritt aus den männlichen Konzeptakeln eine orangefarbige Schleimmasse, welche makroskopisch deutlich sichtbar ist, hervor. Sie besteht aus zahllosen, aerotaktischen Spermatozoiden. Die umstehende Figur gibt ein Bild von der Art, wie die männlichen Befruchtungskörper ein Ei von *Fucus* umschwärmen. Nach Befruchtung durch einen Schwärmer bildet das Ei eine Hülle und beginnt mit Teilung und Wachstum.

— **Sargassum bacciferum.** Golfkraut.

(sargasso im Portugiesischen = Seegras.)

Im Sargassomeer zusammengeschwemmt.

Florideae, Rotalgen.

[floridus = von lebhafter Farbe]. Vgl. Oltmanns (1), Bonner Lehrbuch S. 380.

Zarte Rotalgen präpariert man für das Herbar in der Weise, daß man sie in einer Schale oder einem Teller mit Wasser (auch Süßwasser) in ihrer natürlichen Lage über einem untergetauchten Bogen Papier oder einem Karton ausbreitet. Dann hebt man sie vorsichtig heraus und preßt sie gelinde zwischen Fließpapier.

Johnstone und Croell (1) haben zarte Meeresalgen auf Zinkstöcken festtrocknen und die geätzten Platten direkt zum Druck (einer Art Naturdruck) verwenden lassen.

98. **Lemanea fluviatilis.** Borsten-Floridee.

[Nach dem französischen Botaniker S. Leman (1781—1829).]

Die Fäden dieser Alge sind meist gegen 10 cm lang und im mittleren Teil etwa 2 mm dick. Sie leben mit Vorliebe in den Kaskaden der Gebirgsbäche, aber auch an Wehrabstürzen in Flüssen. Ausgiebige Belüftung ist die Hauptbedingung für ihre Entwicklung. Manche *Chantransia* sind Jugendstadien von *Lemanea*. — o —

— **Batrachospermum moniliforme.** Froschlaichalge. (Nicht abgebildet.) Diese Alge bildet schlüpfrige zottige Besätze in Teichen, Bächen usw., an Stengeln, Holz, Schnecken, Schneckengehäusen und Steinen. Wegen der büscheligen Wirtel erscheinen die Fäden perlschnurartig und im Verein mit der gallertigen Beschaffenheit froschlaichartig.

Die Farbe der Rasen ist häufig purpurrot oder blaugrün; im letztgenannten Falle erinnern sie makroskopisch kaum noch an

Florideen. Die ungleiche Färbung wird, wie auch bei anderen Florideen, durch Kombination verschiedener Farbstoffe bedingt, die entsprechend den wechselnden chemischen und physikalischen Ernährungsbedingungen bald in dieser, bald in jener Nüance überwiegen. Es sind das nach den Untersuchungen von H. Kylin:

1. Chlorophyll, der alkohollösliche Assimilationsfarbstoff;
2. Phycoerythrin, das wasserlösliche Rot der Florideen,
3. Phycocyan, das wasserlösliche Blau der Spaltalgen.

Man nimmt an, daß die Farbstoffe 2. und 3. bei schwächerer Beleuchtung Lichtstrahlen absorbieren, die dem Chlorophyll bei seiner assimilatorischen Tätigkeit zugute kommen. — meist o —

99. *Chantransia chalybaea*.

(Nach dem französischen Algologen G. Chantrans in Besançon.)

Die Fäden dieser besonders in Gebirgsbächen häufigen, aber auch in Flüssen verbreiteten Alge bilden kurze Rasen (auf Stengeln und Steinen) von stahlblauer (*chalybaeus*) bis bräunlicher Farbe.

Abb. 122. *Delesseria sanguinea*. Thallus eines neu ausgeschlagenen Frühlingsexemplares. Nat. Größe.

Auf der alten Rippe sitzen außer den jungen „Blättchen“ die im Lauf des Winters zur Reife gelangten Cystokarprien. Pflanzen mit Tetrasporen sehen sehr ähnlich aus, nur treten an die Stelle der kugeligen, gestielten Früchte Blättchen von ähnlicher Größe. Die männlichen Organe entstehen ebenfalls an solchen kleinen Thalluslappchen, sind aber im Frühling längst vergangen, da sie nach Befruchtung der Karpogone absterben.

Winterexemplare bestehen nur aus alten Rippen, Sommerpflanzen entfalten die „Blätter“ fast bis zu Spannweite.

Die alten, zweigartigen Rippen zeigen einen so reichlichen Vorrat an Stärke, daß

diese dem Querschnitt durch die Rippe ein elfenbeinweißes Aussehen verleiht. (Nach R. Kolkwitz.)

Die Seitenäste sind aufgerichtet und den Hauptästen parallel gestellt. Mit dieser Alge kann das mesosaprobe *Carchesium* vergesellschaftet sein, wenn nur genügender Sauerstoff vorhanden ist.

— meist o bis β m —

— **Delesseria sanguinea.**

[Nach dem französ. Botaniker B. Delessert (1773—1847).]

Hochentwickelte Rotalge der Nordsee usw., reichlich z. B. bei Helgoland. Der Thallus erscheint in Stamm und Blatt gegliedert. Die „Blätter“ werden im Winter abgeworfen.

Nebenstehend sind außer der Alge verschiedene Reaktionen des Jod auf Florideenstärke, die von der gewohnten Blaufärbung vielfach abweichen, im Vergleich zu denen von Kartoffel und Macis abgebildet. Die Abweichungen sind auf verschiedene chemische Zusammensetzung der Stärkekörner zurückzuführen. Vgl. Kolkwitz (8).

Abb. 123. Stärkereaktion mittels Jod-Chloralhydratlösung. a *Myristica fragrans*. Muskatnußarillus (Amylodextrin). b *Laurencia pinnatifida* (Tetrasporen), *Cystoclonium*. c *Delesseria*, *Furcellaria*. d *Solanum tuberosum*, Kartoffel. (Nach R. Kolkwitz.)

- **Ceramium rubrum.** Horn-Rottang. (Nicht abgebildet.) Die festsitzenden, verzweigten, bis 1 dm langen, fädigen Büschel dieser Floridee sind von hell oder dunkel braunroter Farbe. *Ceramium deslongchampii* besitzt schwärzlich grüne Färbung. Die paarweise stehenden Endzweige sind zangenförmig einander zugekrümmt. Der Horn-Rottang ist während des ganzen Jahres an den Meeresküsten weit verbreitet und fast überall sehr häufig. Er findet sich in den oberen sowohl als auch in den tieferen Wasserschichten.

- **Corallina officinalis.** Korallenalge. (Nicht abgebildet.) *Corallina*, *Lithothamnion* und *Melobesia* bilden die Kalkalgen unserer heimischen Meere. Sie besitzen steinharte Konsistenz infolge Einlagerung von kohlensaurem Kalk in ihre Membranen. Die Aufnahme des Kalkes geschieht aus dem Wasser unter allmählicher Anreicherung. Das Meerwasser ist durch seinen Gehalt an Gips und Magnesiumchlorid sehr hart. Vgl. auch das Kap. Plankton.

Manche Kalkalgen, besonders *Lithothamnion*, sind an der Bildung fossiler Kalkablagerungen beteiligt. Sie bilden starre Kalkmassen, welche wie Korallen aussehen.

Eumycetes.

100. **Fusarium aquaeductuum** und andere Spezies. Bildet ausgedehnte fell- und troddelartige Besätze von weißlicher oder rötlicher Farbe in Bächen mit Faschinen, an Wehren usw., wenn die Vorfluter Abwässer aus Zellstoffabriken u. a. m. aufnehmen. Verträgt schwach saure Abwässer. Manche Arten scheinen Kohlenhydrate, andere

mehr eiweißartige Stoffe zu bevorzugen. Vgl. auch Appel u. Wollenweber (1). — α m —

101. **Saprolegnia monoica.**

[Name von *sapros* = faul und *legnon* = Saum (weil einen Saum um tote Tiere bildend.)] Näheres s. S. 151.

102. **Leptomitus lacteus** (= *Apodya lactea*). Besonders in Vorflutern mit städtischen und Zuckerfabrikabwässern entwickelt, hauptsächlich zur kalten Jahreszeit. Vgl. S. 151. — α m —

103. **Mucor (zygorhynchus).** Wasser-Mucor.

(*mucor* = Schimmel; zusammenhängend mit *mucus* = Schleim.)

Während die meisten *Mucor* (z. B. *M. mucedo*) hauptsächlich kohlenhydratliebende Luftschimmel sind, vegetieren einige unter Wasser, vielleicht unter Bevorzugung von mehr eiweißartiger Nahrung; dabei bilden sie weißliche fellartige Besätze (z. B. an Faschinen) von erheblicher Ausdehnung. Makroskopisch dem *Leptomitus* ähnlich; auch *Mucor racemosus* kann solche Felle bilden. Dicke der Fäden häufig ähnlich wie bei *Leptomitus*, aber Einschnürungen fehlen. — α m —

Charales. Armleuchtergewächse. Stellung im System etwas unbestimmt.

104. **Nitella flexilis.**

(Name von *nitella* = Glanz.)

Zellen im Gegensatz zu *Chara* ohne Berindungsfäden. Jedes Glied einzellig. Zellen also sehr groß (bis 12 cm lang). In Gräben, Teichen und der Uferpartie von Seen festgewurzelt. Vgl. Gruppe VII.

Bryophyta.

105. **Fontinalis antipyretica.** Quellmoos. Wächst meist in dunkelgrünen oder braun erscheinenden Büschen, welche oft viele Detrituspartikel und Organismen zwischen ihren Zweigen beherbergen; an Steinen, Bohlen usw. Vgl. auch das Vegetationsbild und den Abschnitt Moose. — meist σ bis β m —

Pteridophyta.

— **Salvinia natans.**

(Name nach A. M. Salvini in Florenz.)

Im Herbst besonders zwischen Floßhölzern an der Oberfläche des Wassers schwimmend. Vgl. Gruppe IX.

106. **Isoetes lacustris.** Brachsenkraut.

(Name von *isos* = gleich und *etos* = Jahr, weil das ganze Jahr hindurch gleichbleibend.)

Einziges heimisches Farnkraut, welches ganz untergetaucht lebt. In reinen Seen bisweilen förmliche Wiesen bildend. Mit Makro- und Mikrosporen. — σ —

Monocotyledoneae.

- **Potamogeton perfoliatus.** Laichkraut. Abb. auf Vegetationsbild.
In Ufernähe oft dichten Krautbestand bildend.
- **Zostera marina.** Seegras. (Nicht abgebildet.)
(zoster = Name einer Pflanze bei Theophrast.)
Zu den Potamogetonaceae gehörig. Ist der einzige Vertreter der höheren Pflanzen in unseren nordischen Meeren. Es pflegt große unterseeische Wiesen zu bilden.
- **Alisma plantago.** Froschlöffel. Vgl. das Ufervegetationsbild unter „Ökologie“.
- 107. **Hydrocharis morsus ranae.** Froschbiß. Abb. s. auch auf Vegetationsbild. In der Uferregion stehender Gewässer. Überwintert durch ruhende Knospen.
- **Elodea canadensis.** Wasserpest.
(Name von elodes = sumpfig. S. Tafel I bei: Assimilation.)
- **Phragmites communis.** Schilf. Vgl. Vegetationsbild im Kap. Ökologie.
- **Glyceria aquatica.** Schwadengras. Vgl. Vegetationsbild.
- **Carex vulgaris.** Sumpfsegge.
(Name von carere = kratzen, weil das Kraut zum Blankmachen dient. Vgl. Vegetationsbild.)
- **Lemna trisulca.** Tauch-Wasserlinse. Vgl. Vegetationsbild und das Kapitel über Phototaxis. — meist o —
- 108. **Lemna arrhiza.** Eine der kleinsten Phanerogamen. Bildet 1 bis 2 mm große, grüne Polsterchen, welche an der Oberfläche des Wassers schwimmen. Selten. Vgl. das Kapitel über Wasseraufnahme durch Wurzeln.

Dicotyledoneae.

- **Callitriche vernalis.** Wasserstern. In Gebirgsbächen lang flutend, in stehenden Gewässern mit sternförmiger Blattrosette. Gelegentlich auch auf feuchtem Schlamm als niedrige Landpflanze in reicher Entwicklung. — meist o —
- 109. **Myriophyllum spicatum.** Tausendblatt. Uferpflanze stehender Gewässer. Blütenähre über Wasser sich entfaltend. Stengel bis 2 m lang.
- 110. **Ceratophyllum demersum.** Hornkraut. Uferpflanze stehender Gewässer. Bei üppiger Entwicklung Blattwirtel quastenartig.
Lit. Glück (1), Neger (1), Warming-Graebner (1).

Tiere des Wassers.

(Entsprechende Abbildungen von Pflanzen s. Taf. VII.)

Rhizopoda:

1. *Amoeba proteus*.
2. *Amoeba* (*Hyalodiscus*) *limax*.
3. *Diffugia pyriformis*.
4. *Arcella vulgaris*.
5. *Cyphoderia margaritacea*.
6. *Euglypha alveolata*.
7. *Trinema enchelys*.
8. *Diplophrys archeri*.

Heliozoa:

9. *Actinophrys sol*.
10. *Actinosphaerium eichhorni*.

Flagellata:

11. *Diplosiga frequentissima*.
12. *Monas vivipara*.
13. *Bodo ovatus*.
14. *Anthophysa vegetans*.
15. *Spirochaete plicatilis*.

Ciliata:

16. *Coleps hirtus*.
17. *Lionotus* (*Loxophyllum*) *fasciola*.
18. *Colpidium colpoda*.
19. *Chilodon cucullulus*.
20. *Glaucoma scintillans*.
21. *Paramaecium caudatum*.
22. *Halteria grandinella*.
23. *Spirostomum ambiguum*.
24. *Stentor roeseli*.
25. *Stylonychia mytilus*.
26. *Euplotes charon*.
27. *Vorticella microstoma*.
28. *Epistylis plicatilis*.
29. *Carchesium lachmanni*.

Suctorina:

30. *Acineta grandis*.

Spongiae:

31. *Spongilla* (*Euspongilla*) *lacustris*.

Hydroidea:

32. *Hydra fusca*.

Vermes:

33. *Planaria gonocephala*.
34. *Nepheleis vulgaris*.
35. *Tubifex rivulorum*.

Rotatoria:

36. *Callidina elegans*.
37. *Rotifer actinurus*.
38. *Philodina aculeata*.
39. *Asplanchna priodonta*.
40. *Synchaeta tremula*.
41. *Polyarthra platyptera*.
42. *Euchlanis dilatata*.
43. *Colurus species*.
44. *Brachionus urceolaris*.
45. *Anuraea aculeata*.
46. *Anuraea cochlearis*.

Bryozoa:

47. *Plumatella repens*.

Mollusca:

48. *Limnaea stagnalis*.
49. *Limnaea* (*Gulnaria*) *auricularia*.
50. *Planorbis corneus*.
51. *Paludina vivipara*.
52. *Bythinia tentaculata*.
53. *Valvata piscinalis*.
54. *Sphaerium* (*Cyclas*) *corneum*.
55. *Dreissensia polymorpha*.

Crustacea:

56. *Asellus aquaticus*.
57. *Gammarus pulex*.
58. *Cyclops leuckarti*.
59. *Nauplius*.
60. *Diaptomus graciloides*.
61. *Cypris fusca*.
62. *Daphnia pulex*.
63. *Hyalodaphnia cucullata*.
64. *Bosmina longirostris*.
65. *Bosmina coregoni*.
66. *Chydorus sphaericus*.
67. *Leptodora hyalina*.

Hydrachnidiae:

68. *Hydrachna globosa*.

Tardigrada:

69. *Macrobiotus macronyx*.

Thysanura:

70. *Podura aquatica*.

Orthoptera:

71. *Perla bicaudata*.
72. *Cloë diptera*.
73. *Agrion puella*.

Neuroptera:

74. *Phryganea grandis*.
75. *Hydropsyche*.
76. *Sialis lutaria*.

Hemiptera:

77. *Notonecta glauca*.
78. *Corixa striata*.

Diptera:

79. *Eristalis tenax*.
80. *Stratiomys chamaeleon*.
81. *Simulium ornatum*.
82. *Chironomus plumosus*.
83. *Ceratopogon communis*.
84. *Corethra plumicornis*.
85. *Culex pipiens*.

Coleoptera:

86. *Dytiscus marginalis*.
87. *Acilius sulcatus*.

Pisces:

88. *Alburnus lucidus*.

Amphibia:

89. *Rana esculenta*.
90. *Triton taeniatus*.

Tiere des Wassers.
(Algen-, Bakterien-, Detritusfresser usw.).

Tiere des Wassers (als Anhang).

An dieser Stelle seien in einem besonderen Kapitel einige ökologisch wichtige Tiere des Wassers abgebildet, weil sie als Algen-, Bakterien- und Detritusfresser usw. großen Einfluß auf das Schicksal der Kleinpflanzen haben und dadurch ein wichtiger Faktor für die Ökologie der Gewässer sind. Sie kommen auch als Zerstörer pathogener Keime im Wasser in Betracht. Ferner spielen sie als Schlammverzehrter zum Teil eine wesentliche Rolle, regeln das ökologische Gleichgewicht und sind wichtig bei Aquarienstudien [vgl. E. Bade (1)]. Es sind auch höher organisierte Tiere berücksichtigt worden, um den ökologischen Charakter in der Darstellung zu betonen.

Die normalerweise chlorophyllführenden Flagellaten sind aus physiologisch-ökologischen Gründen zu den Pflanzen gerechnet worden.

Ausführungen zu Taf. VIII.

Rhizopoda. Wurzelfüßler.

1. **Amoeba proteus** (= *A. princeps*). Der nackte, etwa $\frac{1}{2}$ mm große Körper ist durch Formveränderung der Pseudopodien amöboid beweglich. Lebt mit Vorliebe in krautreichen Gewässern auf Schlamm. Stengeln usw. Vgl. S. 110. — o —¹⁾
2. **Amoeba (Hyalodiscus) limax**. Meist langgestreckt und regelmäßig gestaltet wie eine Nacktschnecke. Sammelspezies. Länge gegen 100 μ . In Abwässern, biologischen Tropfkörpern²⁾ und nährstoffreichen Gewässern, z. B. im organischen Filz. — p bis β m —²⁾
3. **Diffugia pyriformis**. Gehäuse aus Fremdkörpern aufgebaut, mehr oder weniger flaschenförmig. Länge bis $\frac{1}{2}$ mm. Vorwiegend in krauthaltigen Gewässern. — o bis β m —
4. **Arcella vulgaris**. Obere Schalenseite uhrglasförmig, untere flach, Schale meist bräunlich, areoliert, bis etwa 150 μ breit. Lebt mit Vorliebe auf Schlamm verkrauteter Gewässer und in Wasser von biologischen Tropfkörpern, das man einige Zeit stehen läßt. — β m, bei Massenentwicklung α m —
5. **Cyphoderia margaritacea** (= *C. ampulla*). Schale retortenförmig, aus feinen Plättchen zusammengesetzt. Länge 100—170 μ . — o —
6. **Euglypha alveolata**. Schale farblos, aus rundlichen Platten bestehend. Mündung gezackt. Hinderende mit und ohne Stacheln. Länge gegen 100 μ . — β m —

1) Über die Bedeutung dieser Bezeichnungen vergleiche man den Abschnitt über Ökologie der Gewässer u. S. 181.

2) Näheres siehe im Abschnitt Schizomycetes.

7. **Trinema enchelys.** Schale mehr oder weniger deutlich gefeldert, bis 100 μ lang. Die Öffnung der Schale befindet sich an der Seite. Der Organismus ist typisch für reinere Partien von Rieselböden und Tropfkörpern. — meist α m —
8. **Diplophrys archeri.** Schale kugelig. Körper innen mit großem Öltropfen, der dem Beobachter bisweilen das ganze Objekt als Öltropfen erscheinen läßt. — α m —

Heliozoa. Sonnentierchen.

9. **Actinophrys sol.** Körper etwa 50 μ im Durchmesser. Entwickelt sich, häufig in Gemeinschaft mit *Arcella vulgaris*, oft reichlich in biologisch gereinigtem Wasser, wenn dieses einige Zeit steht. Häufigstes Sonnentierchen. — β m, bei Massenentwicklung α m —
10. **Actinosphaerium eichhorni.** Erreicht einen Durchmesser von 1 mm, ist also größer als *Actinophrys*. Lebt von anderen Kleintieren. Findet sich in Gewässern mit lockerem, belüftetem Schlamm. — α m bis β m —

Flagellata.

11. **Diplosiga frequentissima.** Doppelkragenmonade. Dieser Organismus ist durch sein Vorkommen bemerkenswert. Er sitzt oft massenhaft den Strahlen der Sternalge *Asterionella* auf und bewegt diese oft durch das Schlagen seiner Geißeln fort (passiv planktonisch). Größe gegen 12 μ . — meist o —
12. **Monas vivipara.** Bis etwa 30 μ lang. Freibeweglich und festsitzend. — α m —
13. **Bodo ovatus.** Mit drei kontraktile Vakuolen an der Geißelbasis. Mit anderen Bodonen häufig in Aufgüssen und halbmineralisiertem Wasser. Bakterienfresser, wie experimentell ermittelt. Bodonen sind im Wasser sehr verbreitet. — α m —
14. **Anthophysa vegetans.** Stiele der Kolonien meist braun (durch Eisenoxydhydrat, auch durch Humate). Können mit Eisenbakterien verwechselt werden, sind aber von ihnen durch ihre seilartige Struktur verschieden. Zellkolonien farblos. *Anthophysa* entsteht in großer Menge fast regelmäßig, wenn städtisches, nicht stark faulendes Abwasser einige Zeit steht, besonders in der darauf sich bildenden *Zoogloea*-Schwimmschicht. Kann im Freien an geeigneten Stellen leicht unter Anwendung der Glasscheibenmethode von E. Naumann nachgewiesen werden. Gut in der Planktonkammer zu beobachten! Vgl. S. 215. — typisch α m —
15. **Spirochaete plicatilis.** Sumpf-Spirochaete. Körper sehr biegsam und beweglich. Häufig in unteren Schichten biologischer Tropfkörper

und in Schlamm, welcher nach H_2S riecht, aber von reinerem Wasser bedeckt ist. Systematische Stellung noch etwas unsicher. Vgl. auch Kraus-Uhlenhuth (1). — meist α m —

Ciliata.

16. **Coleps hirtus**. Tönncheninfusor. Körper von tönnchenartiger Gestalt; Bewegung schwankend. Mundöffnung mit sägenartigem Saum. Sehr gefräßig. Kann sich reichlich in mesosaprobem Wasser entwickeln, dem man einige Semmelkrümel oder dgl. zusetzt.
— β m, bei Massenentwicklung α m —
17. **Lionotus (Loxophyllum) fasciola**. Bis 200 μ lang, abwechselnd vorwärts und rückwärts schwimmend. — β m bis α m —
18. **Colpidium colpoda**. Körper etwas nierenförmig, gegen 100 μ lang. Sehr häufig in fäulnisfähigem Wasser. Kann schlecht gereinigtes Grabenwasser milchig trüben. — α m —
19. **Chilodon cucullulus**. Körper abgeplattet. Die fischreusenartigen Schlundstäbe sind charakteristisch. Frißt besonders Kieselalgen.
— β m bis α m —
20. **Glaucoma scintillans**. Der eiförmig gestaltete Organismus ist an den ständig sich bewegenden undulierenden Membranen des Mundsaumes kenntlich. Findet sich in Gesellschaft von *Bodo* und vielen anderen sehr häufig im Wasser der Blumenvasen usw.
— α m bis β m —

Viele Protozoen kann man in Rohkultur erhalten, wenn man temperiertem Teich-, Flußwasser oder dgl. eine der aufgezählten Substanzen hinzufügt:

Pflanzenstengel,	Milchtropfen,
Bananenschale,	Bluttropfen, Mist,
Heu,	Abwaschwasser von Fleisch,
Salat (getrocknet),	Fleischextrakt (vgl. Jollos).

Von Zeit zu Zeit impft man in neu zubereitete Flüssigkeiten über.

21. **Paramaecium caudatum**. Pantoffeltierchen. Mund in der Mitte der Bauchseite, die Nahrung in Vakuolen befördernd, welche die unverdauten Partikel an der Oberfläche wieder entleeren. Hinterseite des Körpers mit längeren Zilien. In der Planktonkammer mit Lupe Form zu erkennen. Im Plankton nährstoffreichen Wassers.
— α m —
22. **Halteria grandinella**. Kleiner (30—40 μ), ziemlich häufiger Planktonorganismus; passiert meist die Maschen des Planktonnetzes. Typisch ist für diesen Organismus die springende Fortbewegung.
— meist β m —

23. **Spirostomum ambiguum.** Größtes Wimperinfusor, bis mehrere Millimeter lang. Körper sehr flexil.
— β m, bei reichlichem Vorkommen α m —
24. **Stentor roeseli.** Trompetentierchen. Meist festsitzend, bis $\frac{1}{2}$ mm lang. Kern langgestreckt, nicht rosenkranzförmig. Die Trompetentierchen fressen *Cryptomonas* und andere Kleinorganismen.
— α m bis β m —
- **Stentor coeruleus.** (nicht abgebildet). Blau bis blaugrün. Negativ phototaktisch. Erträgt H_2S .
— typisch α m —
25. **Stylonychia mytilus.** Körper mehr oder weniger keilförmig. Bewegung meist laufend, oft stoßweise.
— α m bis β m —
26. **Euplotes charon.** Länge 70—80 μ . Körper flach. Die Tiere pflegen auf den starken Cirren zu laufen und zu stehen. Die Seitenansicht ist in der Abbildung bei stärkerer Vergrößerung wiedergegeben als die Flächenansicht.
— β m bis α m —
27. **Vorticella microstoma.** Glockentierchen. Körper auf nicht verästelten, kontraktile Stielen, mehr oder weniger eiförmig, am Peristomende verengt. Typisch für mehr oder weniger faulige Wässer. Frißt Bakterien.
— p bis α m —
- Vorticella nebulifera* findet sich in reinem Wasser.
- Betrachtet man Glockentierchen, welche auf einem Pflanzenrest festsitzen, mit Lupe in einer Planktonkammer, so kann man schon bei 40-facher Vergrößerung das Herbeistrudeln der Nahrungspartikel beobachten, wenn man durch geeignetes Abschatten mittels des Fingers eine Art Dunkelfeldbeleuchtung erzeugt. Vgl. S. 103.
28. **Epistylis plicatilis.** Körper kontraktile, Stiele nicht kontraktile. Länge der Zellen gegen 100 μ . Lebt oft auf den Gehäusen von Schnecken.
— α m bis β m —
29. **Carchesium lachmanni.** Sehr leicht kenntlich. (Planktonkammer!) Kontraktile Stiele der Kolonien verzweigt; jeder Nebenzweig mit besonderem Muskel. Frißt Bakterien, ernährt sich aber wohl auch durch gelöste organische Substanzen. Sehr typisch für mittelstark verschmutzte Gewässer; hier oft weiße, kurzrasige Überzüge an Stengeln, Blättern usw. bildend. Abgerissene, treibende Fladen wie bei Abwasserpilzen werden nicht beobachtet.
— α m —

Zum Studium der Gewässer und Aquarien werden oft zweckmäßig feste Gegenstände (Teller, Holzteile usw.) am Ufer oder am Grunde der Gewässer befestigt, um die allmähliche Ansiedlung von Organismen zu studieren. Mit solchen Studien ist besonders Hentzschel planmäßig vorgegangen, indem er Schieferplatten (Dachschiefer) von ca. 30 cm Länge und 15 cm Breite in der Elbe

bei Hamburg versenkte und die hier rasch erfolgende Besiedlung (mit *Carchesium*, *Vorticella*, *Acineta*, *Sphaerotilus* usw.) studierte. Die Platten wurden durch Einritzen gefeldert, und die Besatzorganismen durch Auszählen, meist mittels eines binokularen Mikroskopes registriert. Diese „Schieferplattenmethode“ gestattet aus der Art und Stärke der Besiedlung der Platten Schlüsse auf die Produktionskraft der Gewässer. — Vgl. S. 133 u. 212. — α m —

- **Ophrydium versatile** (nicht abgebildet). Bildet bis faustgroße, wässerig-gelatinöse Kolonien (durch *Chlorella* meist grün gefärbt), welche in der Uferregion in der Nähe der Wasseroberfläche schwimmen; auch am Boden. Wird bisweilen mit *Nostoc* verwechselt, doch können die glockentierähnlichen Einzelorganismen an Ort und Stelle in der Planktonkammer leicht erkannt werden.

Suctoria.

30. **Acineta grandis**. Sauginfusor. Fängt mit seinen Tentakeln andere Protozoen und saugt sie aus. An Pflanzen, Detritus usw. festsitzend. — β m —

Spongiae.

31. **Spongilla** (*Euspongilla*) **lacustris**. Süßwasserschwamm. Stöcke gelblich oder durch Algen grün. Larven frei umher schwimmend, weiß, fast mit bloßem Auge erkennbar. — oft β m —
Auf der Tafel ist auch eine Nadel (*Spongiolin* und Kieselsäure) abgebildet. — meist β m —

Hydroidea.

32. **Hydra fusca**. Brauner Süßwasserpolymp. Fängt mit seinen Armen und Nesselkapseln häufig *Daphnia* u. a. m. Verbreitet, besonders an Wurzeln von Wasserlinsen.
Hydra viridis ist grün durch *Chlorella*. — o bis β m —

Vermes.

33. **Planaria gonocephala**. Strudelwurm. Körper mit feinen Wimpern überzogen, die in ständiger Bewegung sind. Leben zwischen Wasserpflanzen, unter Steinen im Wasser usw. Kriechen an die Glaswände, wenn man Kraut in ein Gefäß tut. Eikapseln kugelig, gestielt. — o —
34. **Nephele vulgaris**. Schlammegel. Meist einige Zentimeter lang, von grauschwärzlicher Farbe. An vielen Stellen sehr häufig in sich frisch zersetzendem Schlamm. Sehr widerstandsfähig. Ernährt sich von Protozoen und Crustaceen, soll auch *Paludina* aussaugen.
— meist β m, bei Massenentwicklung α m —
- **Haplotaxis gordioides** = **Phreoryctes menkeanus**. (Nicht abgebildet.) Drahtartig starrer, rötlicher Wurm von etwa 1 Fuß Länge, welcher bisweilen durch feuchten Boden in Grundwasserleitungen, besonders

in Gebirgsgegenden gelangt und aus den Zapfhähnen der Leitungen hervorkommen kann. Er ist hygienisch unschädlich und kann durch geeignetes Spülen entfernt werden. — o —

35. **Tubifex rivulorum.** Schlammwurm. Die in etwa natürlicher Größe abgebildeten Tiere stecken mit dem Kopfteil im Boden und bewegen den frei ins Wasser ragenden hinteren Teil hin und her. Sie fressen den Schlamm durch ihren Körper. In fauligem Schlamm oft so massenhaft, daß sie Überzüge von roter Farbe bilden. Stampft man am Ufer kräftig mit dem Fuß, ziehen sie sich plötzlich zurück. Kann einige Zeit in sauerstofffreiem Wasser leben. Eine ausführliche Darstellung der Ökologie der Tubificiden gab 1922 G. Alsterberg. (Lund's Univ. Arsskrift) — p bis β m —

— **Nematoden.** Fadenwürmer. (Nicht abgebildet.) Vom Aussehen des Essigälchens. Sehr verbreitet im Schlamm und organischen Detritus; bei reichlicherem Auftreten auch erratisch im Plankton. Vielfach irrtümlich als *Anguillula* bezeichnet. — α m bis β m —

Rotatoria. Rädertiere. Die Nahrung wird durch das Räderorgan herbeigestrudelt.

Viele Rädertiere fressen Algen. Da ihr Körper durchsichtig ist, erkennt man die Farbe der Algen im Darminhalt. Dieser kann erscheinen:

grünlich durch *Chlorella* und *Cryptomonas*,
gelblich durch *Stephanodiscus*,
schwarzbraun durch *Trachelomonas*,
weinrot durch *Chromatium*.

Nach E. Naumann sind in ernährungsbiologischer Hinsicht unter den Rädertieren des Limnoplanktons folgende Typen zu unterscheiden:

1. Formen, welche das Meso- und Mikroseton (S. 222) aufnehmen, z. B. *Asplanchna* und *Synchaeta*

2. Formen, welche das feinste Nanno- und das Ultraseton einstrudeln. Sie arbeiten dabei z. T. mit, z. T. ohne Auswahl, wie *Amuraca* und *Conochilus*.

Für die Mehrzahl der Formen spielt der staubfeine Detritus nebst Nannoplankton demnach als Nahrung die Hauptrolle.

36. **Callidina elegans.** Lebt vorwiegend in der Ufer- und Schlammregion. Augen fehlend. Häufig. — α m —

37. **Rotifer actinurus.** Körper lang teleskopartig ausziehbar. Vermag in sehr sauerstoffarmem Wasser zu leben, verträgt H_2S .

— α m bis p —

38. *Philodina aculeata*. Augen im Nacken, nicht am Rüssel wie bei *Rotifer*. Räderorgan bei dem abgebildeten Tiere eingezogen. Vorwiegend in der Uferregion. — o bis β m —
39. *Asplanchna priodonta*. Körper ziemlich hyalin, bis 1 mm lang. Frißt Algen, Rädertiere (z. B. *Anuraea cochlearis*; s. Abbild.) und Kleinkrebschen. Echt planktonisch. — o bis β m —
40. *Synchaeta tremula*. Planktonisch. Länge 0,1—0,2 mm. (Die ähnliche *S. pectinata* ist etwa 0,3 mm groß.) — β m bis o —
41. *Polyarthra platyptera*. Bewegt sich schwimmend und stoßweise fortschnellend. Im Plankton häufig. — β m bis o —
42. *Euchlanis dilatata*. Planktonisch, vorwiegend in der Uferregion. Länge 0,3—0,4 mm. — o bis β m —
43. *Colurus species*. Körper mit Panzer. Fuß mit zwei Zehen. — β m bis α m —
44. *Brachionus urceolaris*. Der Vorderrand des etwa 0,3 mm großen Tieres trägt sechs Dornen. Planktonisch. In der Kammer mit Lupen gut zu erkennen. Häufig im Plankton von β m-Wässern.
45. *Anuraea aculeata*. Sehr verbreitet im Plankton. Frißt u. a. *Cryptomonas*. — o bis β m —
46. *Anuraea cochlearis*. An ähnlichen Orten wie *A. aculeata*. Sehr charakteristischer Planktonorganismus. — o, bis β m —

Bryozoa.

47. *Plumatella repens*. Moostier. Bildet oft dicke, filzartige Überzüge von knolliger und lappiger Form an Brückenpfeilern, Pfählen, und Steinen. Kann Rohrleitungen verstopfen. Die ungeschlechtlich entstehenden Statoblasten (mit Schwimmring) im Plankton. Die Kotkrümel enthalten viel Kleinplankton. — β m —

Mollusca.

48. *Limnaea stagnalis*. Schlamm Schnecke. Frißt besonders Wasserpflanzen und weidet ihren Algenbesatz ab. — o, bis β m —
49. *Limnaea* (*Gulnaria*) *auricularia*. Ohrschnecke. Lebt mesosaprob. Ist ziemlich widerstandsfähig. — β m —
50. *Planorbis corneus*. Posthornschncke. Häufig in Sümpfen. — o bis β m —
51. *Paludina vivipara* (= *Vivipara vera*). Sumpfschnecke. Gehäuse gebändert, durch einen Deckel verschließbar. Lebt gern auf nährstoffreichem Schlamm. Kann Abwasserpilze fressen. — β m bis α m —

52. **Bythinia tentaculata.** Höhe der Schale 10 mm. Häufig im Schlamm der Flüsse usw. Verwandt mit *Paludina*. Junge Exemplare in der Planktonkammer beobachten! — β m bis α m —
53. **Valvata piscinalis.**
(piscina = Fischteich.)
Höhe der Schale 6–8,5 mm. Lebt auf schlammigem Grunde. — β m —
54. **Sphaerium (Cyclas) corneum.** Kugelmuschel. Lebt im Schlamm, besonders an nährstoffreichen Stellen. — meist α m —
- **Anodonta mutabilis.** Teichmuschel. (Nicht abgebildet.) Länge bis ca. 11 cm. Verträgt auch sauerstoffarmen, schwefeleisenhaltigen Schlamm. Strudelt das Wasser durch das Innere der Schalen. — o bis β m —
55. **Dreissensia polymorpha.** Wandermuschel, Dreikantmuschel oder Schafklaumuschel. Lebt meist gruppenweise auf Holz, Schilfstengeln, Steinen usw. Larven beweglich, planktonisch. Sehr bezeichnend für die gute Beschaffenheit eines Wassers. — o —

Crustacea. — Isopoda.

56. **Asellus aquaticus.** Wasserassel. Kann in der α -mesosaproben Zone zu üppiger Entwicklung kommen. Frißt vorwiegend Detritus und Pflanzenreste. Skelettiert verrottete Blätter. Lebt meist auf Schlamm und zwischen Kraut. Gut in der Planktonkammer zu beobachten. Dient Fischen zur Nahrung. — α m bis β m —

Crustacea-Amphipoda.

57. **Gammarus pulex.** Flohkrebs. In natürlicher Größe abgebildet. Rücken ohne Dornen. Lebt besonders in sauerstoffreichen Gewässern. *G. fluviatilis*, am Rücken mit Dornen, ist widerstandsfähiger als *G. pulex*.

Der Flohkrebs läßt sich sehr gut in der kleinen Planktonkammer beobachten, wo er in dem engen Raum mit der Lupe in allen Teilen leicht übersehbar bleibt.

Der verwandte Strandfloh, *Orchestia littorea*, der im Nord- und Ostseegebiet verbreitet ist, lebt gern zwischen ausgeworfenem Tang und nährt sich zum Teil von diesem. — o bis β m —

Copepoda.

Nach E. Naumann kommen in ernährungsbiologischer Hinsicht folgende Typen unter den Ruderfüßern des Planktons vor:

1. Raubtiere, wie *Heterocope* und *Cyclops*-Arten; auch grob filternd.
2. Feinfiltratoren, welche teils Algen, teils den feinen Detritus abfiltrieren, wie die *Diaptomus*-Arten.

58. **Cyclops leuckarti**. Hüpferling. Mit anderen Spezies häufig und weit verbreitet. Gefräßig; verzehrt Organismen und Detritus. Ziemlich widerstandsfähig. — β m —
59. **Nauplius**. Krebschenlarve. Meist Larve von *Cyclops*. Sehr häufig in der planktonischen Region. Ziemlich widerstandsfähig. — meist β m bis α m —
- **Canthocamptus staphylinus**. (Nicht abgebildet.) Krebschen von ca. 1 mm Länge. Meist umherlaufend, nicht schwimmend. Lebt besonders in der Uferregion; häufig auch in den Sandschichten mancher Trinkwasserfilter, durch diese sich hindurcharbeitend. — meist β m —
60. **Diaptomus graciloides**. Schnurrbartkrebchen. Ausgezeichnet durch lange Fühler. In großen Sätzen umherschwimmend. Mit Lupen sehr gut erkennbar. Im Plankton (in Kammer beobachten!). *D. gracilis* in Gebirgsseen. In Meeren *Calanus*. — o —
61. **Cypris fusca**. Muschelkrebchen. Länge ca. 1,5 mm. Lebt auf Schlamm und in den Uferregionen; vgl. Alm (1). — o bis β m —

Cladoceren.

Nach E. Naumann können die Wasserflöhe des Planktons ernährungsbiologisch folgendermaßen angeordnet werden:

1. Raubtiere, wie *Bythotrephes*, *Leptodora* und *Polyphemus*.
2. Filtratoren, welche das Wasser auf Nanno- und Ultraseston abfiltrieren; hierher gehören alle übrigen Formen.

Die Technik des Nahrungserwerbs läßt sich unter Anwendung von Cladoceren besonders gut zeigen (E. Naumann, 1921). Nach demselben Autor eignen sich frisch gesammelte Cladoceren sehr gut zu Versuchen über Phototaxis, Geotaxis und Rheotaxis (1921). — Vgl. auch Nordqvist.

62. **Daphnia magna** und **pulex**. Der gemeine Wasserfloh. Liefert die bekannte Fischnahrung. In Dorfteichen, Tümpeln usw. oft in solchen Schwärmen, daß er das Wasser rötlich färbt, wobei oft mehr als 10 Exemplare im ccm vorkommen. In Planktonkammer beobachten! — α m bis β m —

Bringt man Wasserflöhe in ein Gefäß, das durch Bakterien getrübbtes Wasser enthält (d. h. pro 1 ccm weit mehr als 1 Million), so machen diese das Wasser bis zum nächsten Tage klar. Die Daphnien filtrieren das Wasser auf das feinste Seston wahllos ab und verwenden das so erhaltene Filtrat als Nahrung (E. Naumann, 1921).

Massenkulturen von Daphnien gewinnt man durch Zusatz von frischem Kuh- oder Taubenmist; vgl. z. B. v. Depp (1). Nach

Sjöstedt (1921) liegt die günstigste Konzentration für Wasservogelmist bei rd. 2,5 ‰; für Pferdemit bei 2–2,5 ‰ (Naumann).

63. **Hyalodaphnia cucullata**. Helm-Wasserfloh. Vorwiegend in Seen. Euplanktonisch. Variiert mit der Jahreszeit; ist mit *Daphnia pulex* durch Übergänge verbunden. — o —
64. **Bosmina longirostris**. Rüsselkrebsechen. Häufig im Plankton. Variabel. Vgl. Brauer (1). Frißt Algen, Detritus u. a. (In der Planktonkammer beobachten!) — o bis β m —
65. **Bosmina coregoni**. Buckelkrebsechen. Euplanktonisch in Seen. Während *B. longirostris* mehr Uferform ist, bevorzugt *B. coregoni* das freie Wasser großer Seen. Beide Spezies können sich ähneln, doch sind die extremen Formen von *B. coregoni* leicht kenntlich; vgl. auch die Arbeiten von Rühle. — o —
66. **Chydorus sphaericus**. In der Uferregion und auf Schlamm, aber auch pelagisch; vgl. Apstein (1896) und O. Plümcke (1). — β m —
67. **Leptodora hyalina** (= *L. kindtii*). Glaskrebs. Größtes Süßwasserkrebsechen (bis 1 cm lang). Äußerst durchsichtig. Kann durch seine kräftigen Schwimmbewegungen leicht dem Fang durch das Planktonnetz entgehen. Sehr räuberisch. — o —

Hydrachnidae.

68. **Hydrachna globosa**. Rote Wassermilbe. Planktonisch in der Uferregion meist stehender Gewässer. Erscheint wie eine blutrote Kugel, bis 5 mm groß. — β m —

Tardigrada.

69. **Macrobiotus macronyx**. Wasserbärchen oder Bärtierchen. Bis 1 mm lang. Zwischen Algen und anderen Wasserpflanzen. — β m —

Thysanura.

70. **Podura aquatica**. Wasser-Springschwanz. Schwarzblau ca. 1 mm lang. Auf stehendem Wasser. — meist β m —

Orthoptera.

71. **Perla bicaudata**. Larve der After-Frühlingsfliege. Räuberisch. — o —
72. **Cloë diptera**. Vertreter der Eintagsfliegen. Larve mit kräftigen Mundwerkzeugen und mit flimmernden Kiemenblättchen. An Wasserpflanzen und unter Steinen, schwimmen aber auch sehr behende. — o bis β m —
73. **Agtrion puella**. Räuberische Larve der Wasserjungfer. — o —

Neuroptera.

74. **Phryganea grandis**. Sprock. Larve der Köcherfliege. Links Gehäuse aus Sand, rechts aus Pflanzenresten (Schilf, Erle, *Chara* usw.), die längs und quer liegen können. — o bis β m —
75. **Hydropsyche**. Larven in der Uferregion. In manchen Flüssen häufig, z. B. im Mittellauf der Elbe. — β m —
76. **Sialis lutaria**.
(lutum = Schmutz.)
Larve der Wasserflorfliege. Sehr widerstandsfähig. — meist α m —

Hemiptera.

77. **Notonecta glauca**. Rückenschwimmer. Mordlustiger Fleischfresser; sticht empfindlich. Greift auch Fischbrut an. Kann umherfliegen. — meist o —
78. **Corixa striata**. Ruderwanze. Fleischfresser, fliegt auch umher. — o —
- **Nepa cinerea**. Skorpion-Wasserwanze. Ergreift andere Insekten und saugt sie aus. — o —
- **Hydrometra lacustris**. Wasserläufer. Auf der Wasseroberfläche. Nährt sich von anderen Insekten. — o —

Diptera, Fliegen, Mücken.

79. **Eristalis tenax**. Rattenschwanzlarve. Larven der sogenannten „Schlammbiene“. Leben in schmutzigem Wasser. Führen ihre teleskopartig ausziehbaren Atemröhren an die Oberfläche des Wassers empor. Ertragen bis 16 % Kochsalz. — p bis α m —
80. **Stratiomys chamaeleon**. Larve der Waffenfliege. Meist im Schlamm von Gräben und Tümpeln. — α m —
81. **Simulium ornatum**. Larve der Kriebelmücke. Festsitzend nur in fließendem Wasser. Strudelt sich als Nahrung Kieselalgen, Detritus u. a. herbei. Wilhelmi (2). — β m bis α m —
82. **Chironomus plumosus**. Zuckmücke. Die kirschroten Larven dieser Zuckmücke sind besonders in stinkigem, sauerstofffreiem oder -armem Schlamm häufig. Können Flocken von *Sphaerotilus* in ihren Röhrenbau verweben. Kleinere, gelbliche Larven finden sich in reineren Gewässern. *Chironomus* (= *Tendipes*)-Larven bilden eine gute Fischnahrung. Sehr eingehende Studien über *Chironomus* (*Tendipes*) verdanken wir A. Thienemann. — p bis m —
83. **Ceratopogon communis**. Larve der Bartmücke. In der Uferregion der Gewässer. — β m —

84. **Corethra plumicornis**. Larve der Büschelmücke. Mit zwei Luftsäckchen zur Erhaltung der Horizontallage. Sehr gefräßig.

— o, aber widerstandsfähig —

85. **Culex pipiens**. Larve und Puppe der Stechmücke. Die Larven leben von pflanzlichen Stoffen. Larven und Puppen werden durch Fische vertilgt.

— meist β m —

Coleoptera, Käfer.

86. **Dyticus marginalis**. Gelbrand. Larven und Käfer sehr räuberisch; saugen ihre Beute aus.

— o bis β m —

87. **Acilius sulcatus** und Verwandte. Räuberische Larve eines Schwimmkäfers. Der zugehörige Käfer ist 15—16 mm lang. $\frac{1}{2}$ nat. Größe. Saugt Mollusken, Insekten, junge Fische und Amphibien aus.

— o —

Pisces, Fische.

88. **Alburnus lucidus**. Uekelei. Junges Fischchen (Brut) in nat. Größe. Frißt, wie Fischbrut überhaupt (und wie Stint, kl. Maräne und Renken), Plankton.

— meist β m —

Amphibia.

89. **Rana esculenta**. Kaulquappe des Wasserfrosches. Weidet mit Vorliebe Algen- und Detritusbesätze ab.

— meist β m —

90. **Triton taeniatus**. Kleiner Wassermolch. Die Larven leben in der Uferregion.

— o —

* * *

Zur Kenntnis des lebenden Sēstons ¹⁾ [Neuston ²⁾ u. Plankton].

Abb. s. Taf. VII—XI.

1. Plankton ³⁾, d. h. nach V. Hensen (1887) die Gesamtheit der im freien Wasser willenlos umhertreibenden Schwebewesen, wird genauer definiert als:

Natürliche Lebensgemeinschaft derjenigen Organismen, welche im Wasser, bei stärkerer Strömung willenlos treibend, freilebend normale Existenzbedingungen haben.

Algen, Protozoen, Rädertiere und Kleinkrebschen bilden die Hauptbestandteile des Planktons; Quallen und Fischbrut einerseits, Bakterien andererseits rechnen, streng genommen, ebenfalls dazu ⁴⁾.

1) Seston (Abgesiebt, Absiebbares) = alles, was im Wasser aktiv oder passiv schwebt, lebend oder tot, groß oder klein.

2) Neuston (naus, neos = Schiff) = Lebensgemeinschaft des Oberflächenhäutchens.

3) planktos = in die Irre getrieben, umherschweifend.

4) Als Gegenstück zu Plankton bezeichnet R. H. Francé (1) die Gesamtheit der im Boden lebenden Kleinorganismen als Edaphon (edaphisch nach F. Schimper = den Boden betreffend), auch Geobios genannt.

Gegen schwächere Strömung kann Rheotaxis stattfinden.

Benthos (d. h. Grund, Tiefe) umfaßt die festsitzenden oder kriechenden Ufer- und Grundorganismen (Bodenbesiedelung).

2. Plankton wird qualitativ und quantitativ erbeutet mit feinen Netzen (s. später), Sieben, dichten Filtern und durch Schöpfen von Wasserproben (direktes Beobachten, Sedimentieren, Zentrifugieren). Grundsätzlich gilt die Regel: Kleine Formen werden geschöpft, große abgesiebt.

Zur Beurteilung der Fangmethoden.

Methode	Vorteil	Nachteil
Netz	ergibig, wenig zeitraubend	Verluste
Sieb	haltbar, sterilisierbar, faserfrei	„
Fließpapier	wenig Verlust	zeitraubend
Feinsand	„	„
Kohlefilter	„	„
Berkefeldfilter	fast kein Verlust	„
Zentrifuge	Gewinnung von Kleinplankton	bisweilen kleine Verluste
Sedimentation nach Konservieren	meist Verlust	abtöten, zeitraubend
Sedimentation des lebenden Materials	Gewinnung auch von Kleinplankton	nur teilweise Sedimentation
Schöpf-(Plankton)kammer	kein Verlust	kleine Wassermenge

Das Neuston wird einfach durch Abheben des Oberflächenhäutchens durch die Deckscheibe der Planktonkammer erbeutet. Aus vorstehender Übersicht ergibt sich, daß es eine Einheitsmethode, welche allen Anforderungen gerecht wird, nicht gibt und daß deshalb, wenn es sich um die Gewinnung des Gesamtplanktons handelt, verschiedene Methoden kombiniert werden müssen. Näheres s. bei E. Naumann in Abderhaldens Handbuch 1922.

Das in größerer Menge eingesammelte Material kann folgendermaßen behandelt werden:

Lebend	Konserviert	Gefärbt
a) sogleich untersucht	a) durch 0,5–1,0 ccm käuflichen Formalins (fast allgemein angewendet) auf 10–20 ccm Wasser	a) durch Hämatoxylin (für feinere Kernstudien)
b) nach ca. 24 Std. untersucht (Sammelflasche kühl halten, z. B. bei 10° C)	b) durch Alkohol	b) durch Nigrosin, Eosin usw. (rohe Färbungen)
c) Lebendfärbung durch Methylenblau, Lebendfärbung durch Chrysylviolett	c) durch die üblichen Fixierungsmittel (z. B. Pikrin-Essigsäure)	c) durch mehrere Farbstoffe (Doppelfärbung usw.)
d) stark bewegliche in Quittenschleim gebracht		d) durch Farbstifte. Gegenfärbung durch chines. Tusche.

3. Das Studium des Planktons und Neustons wird dadurch sehr erleichtert, daß man das Material mühelos erbeuten und für viele Studien, ohne zu schneiden oder zu präparieren, direkt betrachten kann, oft zweckmäßig zunächst mit guten Lupen, dann mit dem Mikroskop. Das Plankton kommt meist allgemein vor, während das Neuston weniger auffallend ist. Die vorstehende Darstellung bezieht sich deshalb vorwiegend auf das Plankton.
4. Die Bedeutung der planktonischen Algen liegt vor allem darin, daß sie die Ernährung in den Meeren ausmachen. Auch im Süßwasser spielen sie (ev. indirekt) als Nahrung eine Rolle, außerdem als Faktor der Selbstreinigung und bei Beurteilung der Beschaffenheit der Gewässer. Im Süßwasser kommt dazu der allochthone (anders-erdige) Detritus (griech. Tripton).
5. Die moderne Planktologie hat gezeigt, daß in methodischer, physiologischer und ökologischer¹⁾ Hinsicht nahe Beziehungen zwischen Planktonkunde und Bakteriologie bestehen (Methoden, Reinkultur, Verbreitung).

Tabelle zur Veranschaulichung der ökologisch-physiologischen Beziehungen zwischen Planktonalgen- und Bakterienentwicklung in der freien Natur.

	Polysaprobien ²⁾	Mesosaprobien	Oligosaprobien
Organische Nahrung	obligatorisch	meist obligatorisch	fakultativ
Chlorophyllfunktion	fakultativ?	obligatorisch	obligatorisch
Beisp. von Organismen	<i>Euglena viridis</i>	<i>Stephanodiscus hantzschianus</i>	<i>Asterionella formosa</i>
Davon Zellen pro ccm	bei Wasserblüte über 100 000	bis 58 000	bis 6000
Bakterien pro ccm	ca. 1 000 000	meist < 100 000	meist < 500

Kein Kubikzentimeter normalen Oberflächenwassers kann frei sein von Kleinplankton, da ein kleiner Planktonorganismus ($10 \mu^3$) in 1 ccm ebensoviel Platz hat wie ein mittelgroßer Fisch (1 dm^3) in einem See von 1 Million Kubikmeter Inhalt:

$$\frac{10 \mu^3}{1 \text{ ccm}} = \frac{1 \text{ dm}^3}{1\,000\,000 \text{ cbm}}$$

Auch der Staub der Luft wird pro 1 ccm gemessen; vgl. Köhler (1).

6. Die Schwebefähigkeit der Planktonten wird gewährleistet durch geringes spezifisches Gewicht, Erhöhung der Reibung gegen das Wasser und durch aktive Bewegungen, also durch:

1) Ökologie = Lehre vom Genossenschafts- und Wirtschaftsleben.

2) Vgl. Gruppe VI Ökologie.

Spezifisches Gewicht	Reibung	aktive Bewegungen
Öl und Fett,	Kleinheit ¹⁾	Zilien,
Gallert,	Borsten,	Geißeln,
Luftvakuolen,	Bandform, Fallschirm,	Ruderfüße.
	Übergewicht	
Sinkgeschwindigkeit = $\frac{\text{Übergewicht}}{\text{Formwiderstand} \times \text{Viskosität}}$		

7. In nährstoffarmen Gewässern, S. 243, ist das Plankton der Menge nach viel weniger reichlich entwickelt (manchmal mit Ausnahme der Zeit der Frühlingsumwälzung der Wassermassen) als in nährstoffreichen Tümpeln und langsam fließenden Flüssen. Schnellfließende, kurze Gebirgswässer sind planktonarm, da es zur Entwicklung von Schwebewesen an Zeit fehlt (24 Stunden genügen bei fließendem Wasser nicht). Vgl. auch Abb. 124.

Trinkwasser ist gut geschönt (geklärt), wenn es pro 1 cbm weniger als 1 ccm Abgesiebtes²⁾ (Sëston) enthält. Abwasser ist mechanisch gut geklärt, wenn es pro 1 cbm möglichst unter 100 ccm (pro 50 l unter 5 ccm) Abgesiebtes (nicht durch Stehenlassen der Gesamtwassermenge Abgesetztes) enthält.

Abb. 124. Planktonröhrchen in nat. Größe. (Schreibflächen matt geätzt.) Links: auf dem Wasser *Botryococcus*, am Boden vorwiegend *Crustaceen*, wenig Detritus. Im ganzen 2,5 ccm; mit Planktonnetz erbeutet. Konserviert. Rechts: vorwiegend Detritus, mehr vereinzelt Kieselalgen und Kleinkrebsechen. 0,6 ccm. Die Befunde lassen sich bequem auf Millimeterpapier eintragen, bezogen auf Röhrchen von 16 mm lichtem Durchmesser. Vgl. auch Kraus-Uhlenhuth (1). (Original.)

1) Das Volumen eines kugeligen Körpers nimmt ab nach der dritten Potenz (Kubus), die Oberfläche nach der zweiten Potenz (Fläche).

2) Abgesiebt werden im vorliegenden Falle hauptsächlich diejenigen Partikel, welche größer sind als $\frac{1}{15}$ mm, d. h. im Minimum mit bloßem Auge einzeln noch gerade wahrgenommen werden können.

pro 50 l	also pro 1 ccm	Bezeichnung
0,2 ccm	4 ccm	sehr wenig Plankton oder Seston
0,6 „	12 „	wenig Plankton oder Seston
1,0 „	20 „	nicht viel Plankton oder Seston
2,0 „	40 „	mäßig viel Plankton oder Seston
3,0 „	60 „	ziemlich viel Plankton oder Seston
4,0 „	80 „	viel Plankton oder Seston

Auch bei schnell strömenden Flüssen, welche mehr Schlick als Organismen führen, liegt die Menge des Abgeseihten meist unter 4,0 ccm pro 50 l Wasser.

Abb. 125. Netz- oder Siebplankton bzw. -Seston aus 50 l Oberflächenwasser; am Grunde von mit Wasser gefüllten Normalplanktongläsern abgesetzt. 1 cm Höhe = 2 ccm Inhalt. (Nat. Größe. (Original.)

Das Verhältnis beträgt im ersten Falle $\frac{1}{1\,000\,000}$, im zweiten $\frac{1}{10\,000}$.

Tabelle zur Veranschaulichung der Beziehungen zwischen physikalischen, chemischen und biologischen Faktoren.

	Maximale Sichttiefe	Farbe im durchfallenden Licht	Kaliumpermananganatverbrauch pro 1 l	Planktonmenge pro 1 ccm
Genfer See	21 m	blau	1—3 mg	ca. 1 ccm
Barmer Talsperre	9,5 m	grün	ca. 6—7 mg	Jahresdurchschnitt ca. 4,0 ccm
Tegeler See	3 m	gelb	25—40 mg	bei Wasserblüte über 100 ccm

8. Im Winter kann Plankton auch unter dem Eis gesammelt werden, in der Regel aber in geringerer Menge und in einförmigerer Zusammensetzung als im Sommer. In nährstoffreichen Teichen kann aber auch im Winter ein reicher Gehalt an Plankton vorhanden sein. Überhaupt scheint der chemische Einfluß der Ernährung weit häufiger eine ausschlaggebende Rolle zu spielen als der physikalische Faktor der Temperatur (S. 229).

9. Seen mit blauer Eigenfarbe des Wassers (reines H_2O ist in dicker Schicht im durchfallenden Licht blau; s. Taf. IX) und blaue Meere sind im Vergleich zu solchen mit grüner oder gelber Eigenfarbe (blaues H_2O + gelbe Huminstoffe + farblose begleitende Nährstoffe) häufig (nicht immer) planktonarm. Vgl. auch Kolkwitz (10).

Wasser- und Planktonfarben.

1. Genfer See.

3. *Euglena sanguinea*.

2. Tegeler See.

4. *Eudorina elegans*.

5. *Aphanizomenon flos aquae*.

Die mit Plankton gefüllten Röhrechen sind in natürlicher Größe wiedergegeben.

Streng wissenschaftliche Vergleiche der verschiedenen Gewässer untereinander, z. B. zwischen tropischen und arktischen Meeren, sind zurzeit nur unvollkommen durchgeführt, da vergleichende Werte fast nur für abgesiebtetes, nicht auch für geschöpftes Plankton vorliegen. Und gerade das geschöpfte Kleinplankton kann für die Beurteilung des Chemismus der Gewässer der Meere sowohl wie des Süßwassers, besonders wichtig sein.

Vergleichende Untersuchungen über die biologische Produktionskraft der verschiedenen Meere sind auch dadurch schwierig, daß man öfter nicht sicher weiß, ob die Planktonten sich ständig rasch vermehren und fortwährend auch absterben und zu Boden sinken.

Wasserströmungen können aus der Tiefe Nährstoffe in die oberen Schichten führen und dadurch die Entwicklung der Planktonorganismen beeinflussen. Vgl. dazu Nathanson.

10. Die Zusammensetzung des Planktons ist meist derart, daß man von einem Mischplankton sprechen kann. Wird eine Mengentfaltung für das bloße Auge durch eine Verfärbung des Wassers sichtbar¹⁾ (vgl. die Farbentafel), so spricht man von Neuston- oder Planktonfärbungen. Häuft sich die Masse in der Wasseroberfläche an, so spricht man von einer typischen Wasserblüte. Es gibt Neuston- und Planktonfärbungen in allen Farben des Spektrums. Bekannte Beispiele sind

Polycystis aeruginosa,

Aphanizomenon flos aquae,

Anabaena flos aquae,

Rivularia echinulata,

Euglena viridis,

Euglena sanguinea,

Lamprocystis roseo-persicina,

Daphnia magna.

Ziemlich häufig beobachtet man, daß Organismen, denen man im Plankton in der Regel vereinzelt begegnet, an Stellen mit für sie günstigen Ernährungsbedingungen zur Massenentwicklung gelangen.

Die blaugrünen Wasserblüten im besonderen können neben der Durchsetzung der oberen Wasserschichten wegen ihres geringen spezifischen Gewichtes auch eine Art Sahne an der Oberfläche bilden, welche wie grüne Ölfarbe erscheint.

11. Die Hauptentwicklung des Planktons findet im Süßwasser in den oberen 10–40 m statt, im Meere bis zu einigen 100 m Tiefe. Maßgebend für diese Verteilung ist hauptsächlich das Licht, welches auch für die mit zunehmender Tiefe verbundene Abnahme der Ufervegetation bestimmend ist (Abb. 126).
12. Über die Verteilung und Anpassung in den verschiedenen Tiefen der Hochsee gibt die folgende Tabelle eine Übersicht.

1) Man kann Planktonproben in größeren Mengen mit 1–2 ccm käuflichen Formalins konservieren, in Gläsern einschmelzen, wie es die Farbentafel zeigt, und in Eteis aufbewahren. (S. 223.)

Tiefe	Organismen
0—150 m Lichtzone	1. Plankton 2. Salpen, Quallen, Fische usw. (meist hyalin oder blau gefärbt) 3. Jugendformen, auch der Tiefseetiere
150—500 m Schattenzone	1. Krebse, Tintenfische, Fische usw. (meist grau oder silberfarbig) 2. Leuchtorgane, große Augen (in den Tropen Planktonalgen)
über 500 m (Tiefsee) Dunkelzone	1. Krebse, Medusen, Tintenfische, Fische usw. (schwarz oder rot) 2. Augen meist klein oder fehlend (blind) (nach Hjort)

Die tieferen Zonen erhalten mehr oder weniger veränderte Planktonnahrung aus den oberen.

13. Beispiele.

Mischplankton (nach Netzfängen) aus dem Kleinen Wannsee bei Berlin; 20. Juli 1913.

<i>Lampropedia hyalina</i>	<i>Selenastrum bibraianum</i>
<i>Polycystis aeruginosa</i>	<i>Scenedesmus quadricauda</i>
<i>Microcystis ichthyoblabe</i>	„ <i>opoliensis</i>
„ <i>stagnalis</i>	„ <i>obliquus</i>
<i>Merismopedia glauca</i>	„ <i>acuminatus</i>
<i>Aphanizomenon flos aquae</i>	<i>Pediastrum boryanum</i>
<i>Anabaena spiroides</i>	„ <i>duplex</i>
<i>Phacus longicauda</i>	„ <i>ehrenbergii</i>
<i>Melosira helvetica</i>	<i>Actinastrum hantzschii</i>
„ <i>binderiana</i>	<i>Richteriella botryoides</i>
<i>Cyclotella kuetzingiana</i>	<i>Coelastrum microporum</i>
<i>Stephanodiscus h. pusillus</i>	<i>Crucigenia rectangularis</i>
<i>Asterionella formosa</i>	<i>Kirchneriella lunata</i>
<i>Synedra acus</i>	<i>Brachionus pala</i>
<i>Closterium acerosum</i>	<i>Anuraea cochlearis</i>
<i>Staurastrum gracile</i>	„ <i>aculeata</i>
<i>Pteromonas alata</i>	<i>Cyclops, Nauplius</i>

Im ganzen 34 Spezies.

50—80 und mehr verschiedene Spezies in einer Probe sind verhältnismäßig selten zu finden.

Ententeich bei Wendisch-Wilmersdorf.

Kammerplankton in 1 cm Wasser (α m). Mitte Juli 1910.

<i>Chromatium okenii</i>	ca. 2000
<i>Thiospirillum sanguineum</i>	ca. 600
<i>Lamprocystis roseo-persicina</i> , kleine Kolonien . . .	ca. 700
<i>Thiopedia rosea</i> , Kolonien	ca. 400
<i>Phacus caudata</i>	} ca. 1000
<i>Euglena acus</i> var. <i>rigida</i>	

Das Wasser erschien in der Flasche rot wie dünner Kirschsaft.

Kreuzpfuhl bei Berlin.

In 1 ccm Wasser (α m).

18. März 1910.

Chlamydomonas deba-

ryana ca. 300

Chlorella ca. 1 000 000Das Wasser erschien auch in der
Planktonkammer grünlich getrübt.

Freilandbecken im Botani-

schen Garten in Lund.

In 1 ccm Wasser (α — β m).

18. Mai 1912.

Ankistrodesmus (Rha-
phidium) falcatus var.

spirilliformis . . . ca. 10 000 000

Derartige Hochproduktionen zählt man am besten mit der
Thoma-Kammer (vgl. E. Naumann 1919, und Abderhalden,
Lfg. 43 S. 183).

Plankton des Nils bei den Pyramiden von Gizeh (bei Kairo).

5. Juli 1908.

Nach konservierten Proben, die mir Herr Prof. Bitter (Kairo)
freundlichst gesandt hatte. Das Plankton war nicht durch Netze er-
beutet, sondern durch Berkefeldfilter abfiltriert worden. Es konnte dem-
nach nichts Konservierbares verloren gehen. Es bestand hauptsächlich
aus organischem und mineralischem Detritus. Die Algen fanden sich
mehr vereinzelt.

Detritus reichlich.

Aphanizomenon flos aquae,*Anabaena spiroides*,„ *solitaria*,*Melosira granulata*,*Amphora ovalis*,*Synedra delicatissima*,*Gomphonema angustatum*,*Surirella ovalis*,*Coelastrum microporum*,*Scenedesmus quadricauda*,*Pediastrum simplex*.

Dieses Beispiel zeigt, daß die bekannten Planktonorganismen weit
über die Erde verbreitet sind.

Toma-See, Quellsee des Vorderrheins. 27. August 1911.

In 1 ccm des geschöpften Wassers:

Gesteinssplitterchen, sehr fein Tausende

Chrysomonadinen 8*Gymnodinium* 1

Kleine Protozoen vereinzelt.

Bodensee, zwischen Romanshorn und Friedrichshafen. 28. August 1911.

In 1 ccm des geschöpften Wassers:

Tonartige Körperchen, äußerst fein Hunderte

Detrituspartikel, kleine ca. 30

(Coccon-)Zoogloea 1

Cryptomonas 3*Uroglena volvox* 0—1*Gymnodinium* } 4*Peridinium* }*Glenodinium* 1*Ceratium hirundinella* 1—2*Cyclotella*-Zellen, in talerartiger Rolle 8*Schroederia setigera* 1

Bildliche Darstellungen von Kammerplankton pro 1 ccm siehe bei E. Nitardy (1).

Rhein bei Koblenz. Oberhalb der Stadt bei der Eisenbahnbrücke.
Linke Stromseite. 1. September 1911.

In 1 ccm des geschöpften Wassers:

Sphaerotilus-Fäden	einzel	Synedra actinastroides, Kolo-	
Anabaena-Fäden	1	nien zu 6 und 12 Zellen . .	2
Cryptomonas erosa	1	Dictyosphaerium }	10
Flagellaten, klein	Dutzende	Hariotina }	
Gymnodinium	1	Scenedesmus obtusus } Kolo-	
Chlamydomonas	1	„ caudatus } nien	6
Phacotus lenticularis	1	„ acutus }	
Lepocinclis ovum	1	Conferva (depauperata), Fäden	2
Stephanodiscus	20	Anthophysa mit Kopf . . .	1
Nitzschia acicularis	6	Detritus, gröbere Partikel . .	Dutzende
„ communis	2	„ feinere Partikel . .	einige 100

Nordsee an der Mündung des Rheins (zur Zeit der Flut).

5. September 1911.

In 1 ccm des geschöpften Wassers:

Ceratium tripos	2	Coscinodiscus	2
„ fusus	2	Cyclotella-Schalen	2
Peridinium divergens	1	Pleurosigma	1
Chaetoceras, lebend	8	Navicula	2—4
„ Schalen	2	Tintinnopsis	1
Rhizosolenia	2	Protozoen, klein	vereinzelt.
Eucampia-Zellen	3		

Atlantischer Ozean (freies Meer).

Pro 1 ccm:

Coccolithophoridae 8—15
(nach H. Lohmann).

Christianiafjord.

Pro 1 ccm:

Coccolithophoridae 5000
(nach H. H. Gran).

Mittelländisches Meer bei Monaco. 22. März 1911.

Pro 1 ccm in 100 m Tiefe:

Chrysomonadinen, nackt	25
Coccolithophoride	1
Mineralische und organische Detrituspartikel	Dutzende
Holzfaserreste	2
Eisenoxydhydratpartikel	1
(nach R. Kolkwitz).	

14. Die Sauerstoffproduktion durch das assimilierende Plankton ist von wesentlicher Bedeutung für die Durchlüftung des Wassers. Bestimmungsmethode für im Wasser gelösten Sauerstoff nach L. W.

Winkler [vgl. H. Klut (1)] Abbildung der Meßinstrumente s. Taf. X No. 11 und 12.

In biologischer Beziehung sind solche Bestimmungen besonders für die mesosaprobe Zone wichtig, da in dieser beachtenswerte Zunahme und Abnahme an Sauerstoff stattfinden kann. Ist der Gehalt an pflanzlichem, chorophyllführendem Plankton in einem Gewässer nicht zu groß, so kann die durch die chemische Untersuchung ermittelte Sauerstoffzehrung und das Sauerstoffdefizit in bezug auf Sättigung einen Anhalt für die Menge der im Wasser vorhandenen organischen zersetzbaren Stoffe liefern.

Sättigungsmenge des Sauerstoffs pro 1 l Wasser.
(Erhalten durch Schütteln mit Luft; L. W. Winkler.)

t	ccm	mg	t	ccm	mg
0° C	10,19	= 14,56	13° C	7,35	= 10,50
1° "	9,91	= 14,16	14° "	7,19	= 10,28
2° "	9,64	= 13,78	15° "	7,04	= 10,06
3° "	9,39	= 13,42	16° "	6,89	= 9,85
4° "	9,14	= 13,06	17° "	6,75	= 9,65
5° "	8,91	= 12,73	18° "	6,61	= 9,45
6° "	8,68	= 12,41	19° "	6,48	= 9,26
7° "	8,47	= 12,11	20° "	6,36	= 9,09
8° "	8,26	= 11,81	21° "	6,23	= 8,90
9° "	8,06	= 11,52	22° "	6,11	= 8,73
10° "	7,87	= 11,25	23° "	6,00	= 8,58
11° "	7,69	= 10,99	24° "	5,89	= 8,42
12° "	7,52	= 10,75	25° "	5,78	= 8,26

Die Volumina beziehen sich auf 760 mm Druck.

Auf gelegentlich von der Norm abweichende Schwankungen im Sauerstoffgehalt der Gewässer, welche nicht durch Organistentätigkeit bedingt werden, haben O. Krümmel (1), K. Dost (1) und Grosse-Bohle (1) hingewiesen.

15. Für Planktonstudien im Brackwasser und im Meere ist es häufig von Bedeutung, die Menge der im Wasser vorhandenen Chloride (gemessen als Cl) festzustellen; s. H. Klut (1), Ohlmüller-Spitta (1).

Beispiele für Cl-Zahlen. Vgl. auch H. Klut (1).

Spree bei Berlin	30—60	mg Cl	pro 1 l
Oder bei Stettin	ca. 22	" "	" 1 l
Elbe bei Altona	150—250	" "	" 1 l
Ostsee bei Rügen	8—10	g NaCl	" 1 l
Nordsee, Oberfläche	35	g "	" 1 l
Bodensee	0,4	mg Cl	" 1 l
Leitungswasser Groß-Berlin	ca. 22—48 ¹⁾	" "	" 1 l

1) Etwa 180 mg Cl (ca. 300 mg NaCl) können unter Umständen schon durch den Geschmack wahrgenommen werden. Mehr soll ein gutes Kesselspeisewasser auch nicht enthalten.

Ist nur Chlornatrium vorhanden, wird umgerechnet nach der Gleichung

$$\text{mg Cl} \times 1,65 = \text{mg NaCl}$$

Schwankungen im Salzgehalt eines Wassers werden besonders leicht und schnell durch die elektrische Leitfähigkeit ermittelt, bestimmt durch die Pleißnersche Tauchelektrode [vgl. H. Klut (1)]. Ohlmüller-Spitta (1).

16. Die Härte des Wassers kann für das Vorkommen gewisser Planktonen, besonders auch mancher Ufer- und Grundbewohner, von Bedeutung sein.

Die Härte des Wassers wird durch die Gegenwart von Kalk- und Magnesiumsalzen bedingt. Meereswasser ist sehr hart, da es einen ziemlich hohen Gehalt an Gips und vor allem an Magnesiumchlorid aufweist.

Die Bestimmung der Härte durch Schütteln mit Seifenlösung gibt weniger genaue Werte als die neuerdings von C. Blacher veröffentlichte Titriermethode unter Verwendung einer $\frac{1}{10}$ n-glyzerin-äthylalkoholischen Kaliumpalmitatlösung (in chemischen Fabriken käuflich). Nähes darüber s. u. a. bei H. Klut.

Härteskala.

1 deutscher Härtegrad = 10 mg CaO in 1 l Wasser

Deutsche Härtewerte.

0—4° Gesamthärte = sehr weich	12—18° Gesamthärte = ziemlich hart
4—8° „ = weich	18—30° „ = hart
8—12° „ = mittelhart	über 30° „ = sehr hart.

Als Beispiele seien genannt:

Oder bei Stettin = 9—10° Härte,

Trinkwasser von Berlin = ca. 12° Härte,

Talsperre bei Remscheid = 1—4° Härte.

Literatur.

Fr. Blochmann (1).

B. Eyferth (1).

F. A. Forel (1).

H. Glück (1).

O. Kirchner (1).

Kolkwitz, Reichle, Schmidt-
mann, Spitta, Thumm (1).

K. Lampert (1).

O. Lemmermann (1).

C. Mez (1).

W. Migula (1).

Neger (1).

A. Pascher (1).

P. Regnard (1).

Ad. Steuer (1).

R. Volk (1).

Wesenberg-Lund (1).

Woltereck (1).

O. Zacharias (1 u. 2).

VI. Gruppe. Ökologie der Gewässer.

Die Ökologie¹⁾ gibt uns einen vertieften Einblick in das Zusammenleben der Organismen in der freien Natur. Dieses Studium ist sehr

1) Ökologie (Haus, Lehre); vgl. S. 224.

reizvoll, aber wegen des Ineinandergreifens zahlreicher Faktoren ziemlich schwierig.

Die hier zu behandelnde Ökologie der Gewässer ist indessen immer noch einfacher und übersichtlicher als diejenige der Landorganismen, da das Wasser das Reich des Gleichmaßes, das Land das der Gegensätze ist (Simroth). Dementsprechend haben viele Studien allgemeine Geltung, zumal zahlreiche Wasserorganismen Kosmopoliten sind. Vgl. auch Warming-Graebner (1), Schroeter (2).

Die Regionen der Gewässer.

Um den Zustand eines Gewässers zu charakterisieren, ist nach Möglichkeit die Berücksichtigung der drei Regionen des freien Wassers, des Ufers und des Grundes geboten. Um diese drei Regionen kurz charakterisieren zu können, sei auf die Abb. 126 verwiesen, welche den Querschnitt durch einen Teich, eine Flußbucht od. dgl. zur Darstellung bringt.

Die Planktonregion (das freie Wasser), welche hier von größerer Flora und Fauna frei ist, dagegen zahlreiche Vertreter niederer Organismen, die ihrer Kleinheit wegen in diesem Übersichtsbild nicht wiedergegeben werden konnten, zu enthalten pflegt, ist an der rechten Seite zu erkennen. Auf der Oberfläche des Wassers sieht man eine schmale Schicht (Neuston-Zone) der wasserblütebildenden Spaltalge *Microcystis aeruginosa*.

Die Uferregion, die litoralen Zonen umfassend, zeigt auf vorstehendem Bilde sumpfige Partien (die eulitorale, periodisch trocken gelegte Zone) mit *Carex vulgaris* und *Alisma plantago*, an den flachen Wasserstellen schwimmende Watten von *Spirogyra crassa*, *longata* u. a. m. Hierauf folgt die dauernd unterseeische Litoralzone oder das Sublitoral. Sie umfaßt einen oberen Teil, welcher durch die Rohrgewächse gekennzeichnet ist, und einen unteren, durch die Schwimmblattformation gebildeten.

Vertreter des oberen Sublitorals sind z. B. das Schwadengras, *Glyceria aquatica*, und Schilf, *Phragmites communis*. Die Rohrsumpfgewächse mit ihren meist horizontal fortwachsenden Grundstöcken können im Verein mit anderen Pflanzen zur Verlandung beitragen und durch ihren dichten Wuchs den Wellenschlag des offenen Wassers am Ufer abschwächen. So werden für die hier schwimmenden Wasserpflanzen, wie Wasserlinse, *Lemna trisulca*, und Froschbiß, *Hydrocharis morsus ranae*, günstige Lebensbedingungen geschaffen, ebenso für Schilfstengel bewohnende Algen und Tiere. Weiter in der Tiefe wurzeln dann Laichkräuter, wie *Potamogeton perfoliatus*, Teichrosen u. a. m.

Verfolgt man dann in dem Bilde die Vegetation weiter abwärts, so hören die höheren Gewächse auf und an ihrer Stelle finden sich Quellmoos, *Fontinalis antipyretica*, und Armleuchtergewächse, *Chara fragilis*, sowie andere mehr. Dazwischen und weiter abwärts können im orga-

nischen Filz des Hanges mikroskopisch kleine Algen, meist *Diatomaceae*, und dünne Häute bildende Spaltalgen, *Schizophyceae*, auftreten. Durch diese Elitoralzone gehen die litoralen Zonen in das wenig oder gar nicht belichtete Profundal über.

Die Grundregion endlich, auch Tiefen- und Schlammregion genannt, enthält, wie die Abb. 126 zeigt, zum größeren Teil Reste abgestorbener und abgesunkener Pflanzen und Tiere, an deren Zersetzung weder ein sehr mannigfach gestaltetes Heer von lebenden Schlammorganismen beteiligt sein kann.

Abb. 126. Querschnitt durch die Randpartie eines Gewässers. Stark verkleinert. (Zeichnung von E. Nitardy.)

Zur Untersuchung der drei Regionen der Gewässer sind eine Reihe von Instrumenten erforderlich, deren Besprechung und bildliche Wiedergabe hier eingeschaltet sein möge. Lit. E. Naumann, Abderhaldens Handb., 1922, Steiner (1).

Planktonnetz. Netze von Riesendimensionen werden für quantitative biologische Meeresuntersuchungen, kleinere für das Studium der Süßwässer angewendet. Der Stoff der Netze besteht aus Seidenstoff (meist Müllergaze Nr. 20 oder 25). Die Maschenweiten betragen ca. $\frac{1}{15}$ — $\frac{1}{20}$ mm. Mit Netzen kann man nur einen Teil des Planktons er-

Entnahme- und Untersuchungs-Instrumente.

1. Ausziehstock $\frac{1}{4}$.	7. Netz mit Wassermesser $\frac{1}{14}$.	13. Schilfmesser $\frac{1}{3}$.
2. Planktonkammer $\frac{1}{11}$.	8. Planktonsieb $\frac{1}{4}$.	14. Pfahlkratzer $\frac{1}{4}$.
3. Planktonlupe $\frac{1}{11}$.	9. Aluminiumbecher $\frac{1}{4}$.	15. Schlammheber $\frac{1}{6}$.
4. Sichtscheibe $\frac{1}{4}$.	10. Formalinflasche $\frac{1}{4}$.	16. Dreischeibe $\frac{1}{6}$.
5. Schnurrbrett $\frac{1}{10}$.	11. Sauerstoffflasche $\frac{1}{5}$.	17. Sieb $\frac{1}{8}$.
6. Planktonnetz $\frac{1}{6}$.	12. Sauerstoffpipette $\frac{1}{4}$ (Original.)	

beuten. Bei größeren Gewässern durchfischt man die Planktonregion am besten vom Boot aus, wobei das Netz an einer Schnur oder am Ausziehstock befestigt wird. Tiefenfänge werden mittels Schließnetz oder Planktonpumpe ausgeführt. Der Rückstand des Netzbechers wird (nach Naumann zum Beobachten mit Lupen eventuell zweckmäßig aus Glas, falls man nicht in die Kammer füllt) in ein Planktonglas gefüllt und im Bedarfsfalle mit $\frac{1}{2}$ —1 ccm Formalin konserviert. F. Romijn hat ein Planktonnetz konstruiert, welches in der oberen Hälfte grobmaschig, in der unteren feinmaschig ist. Dadurch entgehen größere Organismen weniger leicht dem Fange (S. 220).

Planktonsieb. Ähnlich dem Planktonnetz dient das Planktonsieb zum Abfangen von Planktonorganismen und ihren Beimengungen. Bei einem Kupfersieb Nr. 260 enthalten die an gegenüberliegenden Seiten aufgelöteten Siebflächen à 50 qcm im ganzen eine Million Maschen à $\frac{1}{15}$ mm Seitenlänge, fast doppelt so viel als die gleiche Fläche Netzseide enthält. Man kann auch Siebe mit nur einer filtrierenden Fläche mit Vorteil verwenden. Die Siebe lassen sich mit Stücken von Ätznatron und eventuell Salzsäure reinigen (und durch Alkohol oder Hitze sterilisieren). (Abgesiebtes = Sëston, S. 222). Die Siebe finden in erster Linie für quantitative Fänge Verwendung, können aber auch für qualitative Fänge und zum Auswaschen von Algenwatten u. dgl. benutzt werden.

Der Bodensatz in den kleinen Sieben wird durch Umkippen in Planktongläser (S. 225) eingefüllt.

Literbecher aus Aluminium. Der Becher besitzt eine verstellbare Ansatzhülse für den Ausziehstock und einen konkaven Wulst als Aichungslinie.

Mit dem Literbecher schöpft man Wasser (meist am besten 50 l) bis zu etwa 1 m Tiefe und gießt es durch ein Netz oder Sieb. Das Kupfersieb wird beim Transport in den Becher gesteckt.

Ausziehstock. Der aus Messing gefertigte Stock ist teleskopartig ausziehbar (Glieder neuerdings feststellbar) und zum Aufstecken einer Reihe von Instrumenten bestimmt. Das bequemste Format dieses Stockes ist ausgezogen 1,2 m, zusammengeschoben etwa 30 cm lang.

Planktongläser. Die Planktongläser (Abb. 124) besitzen im allgemeinen reagensglas-ähnliche Form. Ihre Länge beträgt 14 (oder 28) cm, ihr lichter Durchmesser 16 mm. Dabei ist 1 cm Höhe = 2 ccm Inhalt. Sie dienen dazu, das abgesiebte, konservierte Setzvolumen aus möglichst 50 l (auch umgerechnet auf 1 cbm) Oberflächenwasser (bzw. Abwasser) oder aus möglichst 1 cbm Trinkwasser zu bestimmen. (Vgl. S. 225, Formalinkonservierung S. 223.)

Da sich das Absetzen in zylindrischen Gläsern am einwandfreisten vollzieht, wählt man konisch zugespitzte Gläser zweckmäßig nur

zum Abmessen kleiner Volumina. Die Röhrchen sind von 1—5 ccm graduirt.

Für den Transport bestimmte Proben sollen fast bis zum Korken mit Wasser gefüllt sein.

Planktonkammer. Die 1 ccm-Planktonkammer besteht aus einer flachen Glasküvette von 22 mm Durchmesser und 2,63 mm Höhe mit planparallel geschliffenen Scheiben. Die Deckscheibe kann mit Teilstrichen versehen sein, um das Auszählen der umgekehrt gelegten Kammer zu erleichtern. Sie ist in eine Messinghülse eingepaßt, an der ein Stift oder Bügel das Hinausgleiten verhindert. Taf. I u. S. 103.

Die automatische Entnahme eines Kubikzentimeters Wassers geschieht durch einfaches Untertauchen (samt Hülse, ohne den Stift herauszuziehen) bei genügend weit zurückgeschobener Deckscheibe. Diese hält nach der Füllung durch Adhäsion von selbst fest und schließt so dicht ab, daß sich das Wasser wochenlang darin hält.

Die Kammer wird auf ihren Inhalt im durchfallenden Licht (Abb. 56) zunächst mit guten Steinheil- oder Anastigmatlupen von ca. 14facher Vergrößerung (zur Orientierung), 25facher (zum teilweisen Bestimmen) oder 40facher (als Mikroskop) durchmustert und dann bei stärkerer Vergrößerung unter das Mikroskop gelegt. [Vergr. 100—250fach (eventuell Apochromate und Kompensationsokulare!); auch Projektion.] Hat die Kammer etwa 10 Minuten lang horizontal gelegen, so sinken die meisten Organismen allmählich auf die Bodenscheibe ab; bewegliche kann man in Wärmestarre versetzen oder nach E. Naumann narkotisieren. Manche Spaltalgen, deren spezifisches Gewicht kleiner ist als das des Wassers, sammeln sich unter der Deckscheibe an. Einen gewissen Grad von Dunkelfeldbeleuchtung kann man schon auf einfache Weise dadurch erzeugen, daß man den Finger über die Mitte des Spiegels legt.

Bei solchen Planktonfängen beobachtet man die Organismen und ihre Beimengungen unter den natürlichsten Verhältnissen gleichsam in einem Mikroaquarium. Will man das Kleinplankton (Nannoplankton Lohmanns) konzentrieren, so wird es aus den Wasserproben aus-zentrifugiert. Bei sehr großem Reichtum an Kleinplankton kann man zum Zählen auch eine $\frac{1}{20}$ ccm-Kammer (Tropfenkammer) oder Thoma-Kammer (S. 229) benutzen. Die bildliche Darstellung der Assoziationen erfolgt am besten für 1 qmm, und zwar unter einer Produktionstiefe (Wassersäule) von 1 m, 1 mm und $\frac{1}{10}$ mm. Vgl. E. Naumann, Arch. f. Hydrobiol.

Das Reinigen der Planktonkammer geschieht mechanisch am einfachsten durch ein gut zugespitztes Streichholz.

Für das quantitative Studium größerer Organismen (z. B. *Gloietrichia* und *Daphnia*) kann eine 20 ccm-Planktonkammer verwendet werden, wofern nicht Netzfänge besser sind. Vgl. Granvik (1919) u. Sjöstedt (1922).

Beide, die kleine und die große Kammer, werden zweckmäßig auch zum Beobachten konzentrierten Planktons (Eingießen, ohne Pipette!) ferner von Moosen, Insekten und dergleichen im durchfallenden, manchmal auch auffallenden Licht benutzt [vgl. H. Bethge (1)], und zwar unter Verwendung von Lupen, Projektionsapparaten oder des Mikroskops (Grob-schraube!). Die Bilder werden nicht verzerrt, da man durch planparallele Scheiben sieht, vertragen also gut starke Lupenvergrößerung. Man kann sie leicht ständig bei sich führen, so daß man stets ein Sammel- und ein Beobachtungsgläschen zur Hand hat.

Zur Entnahme von Wasserproben von Brücken und hochbordigen Dampfern (auch während der Fahrt) kann man mit bestem Erfolg ein Fläschchen von 25—30 ccm Inhalt mit weitem Hals (an Schnur) benutzen.

Um Wasserproben zu planktologischen Untersuchungen aus großer Tiefe zu entnehmen, bediene man sich der in der Bakteriologie üblichen Abschlagapparate, der R. Volkschen Planktonpumpe oder des bei Meeresuntersuchungen angewendeten Richardschen Wasserschöpfers.

Weiße Sichtscheibe. Für marine Untersuchungen wurden Scheiben von 1—3 m Durchmesser mit Beschwerungsgewicht benutzt, für solche im Süßwasser sind erheblich kleinere, meist aus Porzellan gefertigte, im Gebrauch. Schon Scheiben von 9×12 cm Größe (mit Messingkette und Teilmarken in 20 cm Abstand) können gute Dienste leisten. Bei Untersuchung in strömendem Wasser steckt man die Spitze des Ausziehstockes durch das seitliche Loch der Scheibe, um deren Seitwärtstreiben zu verhindern.

Das Instrument dient zur Bestimmung der Farbe des Wassers im durchfallenden Licht und zur Ermittlung der Sichttiefe, d. h. derjenigen Entfernung unter der Wasseroberfläche, bei welcher die Scheibe für das Auge verschwindet.

Die Sichttiefe kann von folgenden Faktoren abhängen: 1. gelöste Farbstoffe, 2. Planktonorganismen, 3. feine unbelebte Trübungskörper, 4. größere unbelebte Trübungskörper.

Beispiele für Sichttiefen s. S. 226.

Pfahlkratzer. Rahmen und Schneide dieses wichtigen Instrumentes bestehen aus Messing, der Beutel aus Kongreßstoff. Er dient zum Abkratzen bewachsener Pfähle, von Bohlenwerk und Steinen, kann aber auch mit bestem Erfolg zum Einsammeln von Schlamm, Krautmassen, Algenwatten, Kleinkrustern und Fischbrut sowie zum Aussieben von Schlamm verwendet werden. Für manche Untersuchungen ist ein größerer und fester gebauter Pfahlkratzer zu empfehlen [Kraus-Uhlenhuth (1)].

Schilfmesser. Dieses Instrument besteht in seinem Hauptteil aus einer kräftigen Stahlklinge und wird am Ausziehstock befestigt. Es

kann mit bestem Erfolg dazu verwendet werden. Schilf-, Rohrkolben-, Seerosenstengel usw., deren Besatz an Algen, Schwämmen u. a. m. eingesammelt werden soll, tief unter Wasser mit einem kurzen Ruck abzuschneiden. Das so gewonnene Material wird oft zweckmäßig ohne Zugabe von Wasser transportiert.

Schlammheber. Der etwa 250 ccm fassende Metallbecher wird an eine feste Schnur geknüpft und zur Entnahme von Grundproben (meist der oberen Schichten) eine Strecke weit über den Boden hingezogen.

Scharnetz (Dretsche) und Sieb. Die viereckige Klappdretsche dient zur Entnahme größerer Grundproben. Wegen ihrer Schwere (2,6 kg) greift sie auch tieferliegende Schlammportionen und liefert deshalb einwandfreiere Proben als der Schlammheber. Die Gleitbügel halten das Scharnetz während des Ziehens in der richtigen Lage und gewährleisten so eine große Greifsicherheit.

Das erbeutete Material kann teils direkt untersucht, teils auf geeigneten Schlammsieben ausgewaschen werden. Näheres über Fangmethoden siehe auch bei Heymons, Kolkwitz, Lindau, P. Magnus und Ulbrich (1), Steiner (1).

Quantitative Aufschlüsse über Besiedelung und Bau der Unterwasserböden können indessen erst durch eine Profillotungstechnik ermittelt werden. Über derartige Apparate (Ekman-Birge), ebenso wie über die limnische Schlammkunde im allgemeinen vgl. E. Naumann (Arch. f. Hyg., 1922), Gunnar Alm (2).

Kehren wir zu dem am Anfang dieses Kapitels besprochenen Vegetationsbilde zurück, so werden wir ihm an seinen Organismen sogleich ansehen, daß es sich um einen relativ stationär gewordenen Zustand handelt, in dem die Organismenbestände ihr Bild innerhalb gewisser Zeiträume nicht wesentlich ändern werden.

Ganz anders werden sich die Verhältnisse gestalten, wenn einer der wichtigsten Faktoren, die Ernährung, eine wesentliche und durchgreifende Änderung erfährt, z. B. durch nachhaltige organische Düngung (Experimentalökologie). Ist diese stark, z. B. durch Abwässer, so kann sich eine Fäulniszone mit Überwiegen von Fäulnisorganismen und ihnen nahestehenden Lebewesen bilden.

Eine solche Zone ist immer nur im Gleichgewicht, solange die Nahrung zufließt. Hört die Zufuhr der organischen Nährstoffe auf, so beginnen die Fäulnisbewohner zurückzutreten und den früheren normalen Beständen wieder Platz zu machen. Schließlich tritt ein neues biologisches Gleichgewicht ein, letzten Endes der Art, wie es vorher war.

Man nennt diesen wichtigen Prozeß: die biologische Selbstreinigung, chemisch gesprochen die Mineralisation, weil Eiweißsubstanzen zu Kohlensäure, Ammoniak usw. abgebaut werden; man vgl. auch M. Marsson (1).

In diesem Prozeß lassen sich in ausgeprägten Fällen drei wichtige Phasen (nach Studien in der paläarktischen Region) unterscheiden:

1. die Phase der überwiegenden Reduktion,
2. die Phase der Überwindung der Reduktion und des lebhaften Einsetzens der Oxydation,
3. die Phase der (möglichen) Vollendung der Oxydation.

Der Vorgang kann auch sogleich mit der zweiten Phase einsetzen.

Diese Prozesse und einige ihrer Begleiterscheinungen seien an dem beigegeführten Schema auf Taf. XI erörtert. Die Erläuterungen zu den verschiedenfarbigen Feldern sind dem Bilde beigegeführt. Die drei Zonen stellen Querschnitte dar durch drei aufeinanderfolgende Teiche, welche durch Gräben verbunden sind, oder drei aufeinanderfolgende, dann durch Übergänge verbundene Flußstrecken.

- I. Zone der Reduktionen (chemisch definiert),
Zone der Polysaprobien¹⁾ (biologisch definiert),
Zone der Düngung (Abwässer) (praktisch definiert),
p = polysaprob.

In dieser Zone finden ausschließlich oder vorwiegend Fäulnisprozesse durch Reduktionen und Spaltungen statt. Zersetzt werden hauptsächlich Eiweißstoffe, Polypeptide und ihre höheren Abbauprodukte²⁾, Kohlenhydrate usw. An der Oberfläche, welche in dem Schema die obere Reihe bildet, findet man oft reichliche Besätze von Abwasserorganismen, am Grunde dunklen Schlick und schwarzes Schwefeleisen (FeS) und endlich im Wasser (in der Mitte) zahlreiche Bakterien, unter Umständen mehr als eine Million im Kubikzentimeter Wasser. Der Sauerstoffgehalt des Wassers ist Null oder sehr niedrig. Sedimentation findet meist reichlich statt.

Beispiele von Vertretern dieser Zone sind im Vorstehenden genannt in

<i>Bacterium vulgare,</i>	<i>Polytoma uvella,</i>
<i>Bacillus subtilis,</i>	<i>Colpidium colpoda,</i>
<i>Chromatium okenii,</i>	<i>Zoogloea ramigera.</i>

Chlorophyllführende Organismen treten in der Regel zurück. *Sphaerotilus* leitet schon zu Zone II über.

- II. Zone der einsetzenden Oxydation (chemisch definiert),
Zone der Mesosaprobien (biologisch definiert),
Zone des Übergangs.
m = mesosaprob.

Mit dieser Zone beginnen lebhaftere Oxydationsprozesse, vorwiegend biologischer Natur, infolge reichlichen Auftretens chlorophyllführender Belüfter, aber auch rein chemische Oxydationen, z. B. Überführung von schwarzem Schwefeleisen in gelbbraunes Eisenoxydhydrat, wie es in der Schlammregion angedeutet ist. Die Mesosaprobien vollführen den eigent-

1) poly = viel, sapros = Zersetzung, bios = Leben.

2) *Beggiatoa* ist auf H₂S (hier Produkt der Fäulnis) angewiesen.

lichen spezifischen Prozeß der Selbstreinigung, die Bio-Oxydation im Gegensatz zur Bio-Reduktion, der Fäulnis. Die Bio-Oxydation bewirkt weitgehende Entfaulung ohne starkes Auftreten stinkiger Gerüche, ähnlich der Bodenwirkung und der Wirkung von Oxydationskörpern, also Mineralisation unter Ausschaltung der Fäulnis.

Über die geschichtliche Entwicklung in der Erforschung des Problems vergleiche man Lafar (1).

Die Zone der Mesosaprobien, in welcher die Mineralisation bis zu einer mittleren Stufe fortgeschritten ist, zeigt dadurch eine deutliche Asymmetrie, daß der in der Figur nach links gelegene Teil (α) naturgemäß stärkere Zersetzungen aufweist als der nach der Reinwasserzone gekehrte β -Teil.

α -mesosaprob = αm ist im allgemeinen vorwiegend die Zone der beim Abbau hochmolekularer Verbindungen entstehenden Aminosäuren u. a. m.

β -mesosaprob = βm ist im allgemeinen die darauffolgende Zone der (einen weiteren Abbau bedeutenden) Ammoniakverbindungen der Fettsäuren usw.

In der Abbildung ist die Asymmetrie durch die Abnahme der Bakterienzahl angedeutet.

Sind zwar noch Anklänge an die p-Zone geblieben, so sieht man auf einen Blick die veränderte Sachlage. Das lebenspendende Atmungs-gas Sauerstoff hat das Auftreten eines reichen Lebens an Tieren (niederen und höheren) ermöglicht, die wegen ihrer Freßtätigkeit ein wichtiger Faktor der Reinigung sind, teils durch Verdauung, teils durch Inkarnation des Gefressenen. Im α -Teil können Fische leben, aber in warmen, dunklen Nächten kann durch Sauerstoffmangel Atemnot eintreten. Angesammelte Drainwässer von Rieselfeldern pflegen mesosaproben Charakter zu tragen. Sie sind reich an Fischnahrung.

Die Uferbesätze, welche im p- und αm -Teil mehr zottiger und schleimiger Natur sein können, pflegen vom βm -Teil an mehr erdig-filzigen Überzügen Platz zu machen.

Im Laboratorium kann man die p-, αm - und βm -Wässer angenähert nachahmen:

p-Wasser ist z. B. Wasser mit mehr oder weniger stark wahrnehmbarer Fäulnis (Infusionen),

αm -Wasser ist Wasser, das mit Heu, etwas zersetzten Algenwatten usw. einige Zeit gestanden hat (schwache Infusionen) s. Abb. 64,

βm -Wasser ist z. B. solches, welches in dünner Schicht über normalem Schlamm steht.

Alle diese Wässer reinigen sich bei längerem Stehen selbst, wenn nicht von neuem sekundäre Zersetzungsherde entstehen.

Als Vertreter (bei Hochproduktion) seien für die II. Zone genannt:

Normale biologische Selbstreinigung

Gestörte biologische Selbstreinigung

Erläuterungen

Schema betr. den Verlauf der biologischen Selbstreinigung. (Original.)

<i>Oscillatoria limosa,</i>	<i>Arcella vulgaris,</i>
<i>Cryptomonas erosa,</i>	<i>Vorticella campanula,</i>
<i>Melosira varians,</i>	<i>Brachionus pala,</i>
<i>Stephanodiscus hantzschianus,</i>	<i>Gammarus fluviatilis.</i>

- III. Zone der vollendeten Oxydation (Mineralisation)
 (chemisch definiert),
 Zone der Oligosaprobien¹⁾ (biologisch definiert),
 Zone des Reinwassers (praktisch definiert),
 o = oligosaprob²⁾.

Diese Zone wird durch das rechte Bild des Schemas dargestellt. Der Schlamm ist vollkommen oxydiert, die Bakterien sind stark zurückgetreten (wenn auch nicht verschwunden), normales Pflanzen- und Tierleben ist reichlich entwickelt. Alle stürmisch verlaufenden Zersetzungsprozesse haben im Wasser aufgehört, doch kann naturgemäß der Schlamm als Ablagestelle aller natürlichen Abfallprodukte stellenweise noch mesosaprobien Charakter tragen.

Den Organismen dieser Zone stehen vorwiegend mineralisierte Stickstoffverbindungen u. a. m. zur Verfügung.

Das Wasser dieser Zone ist, wenn nicht vegetationsgefärbt, meist klar und sauerstoffreich. Viele biologische Seenstudien fallen unter diesen Abschnitt. Über die Physik der Seen vergleiche man Forel (1), Penck (1) und Merz (1) und (2).

Beispiele für diese Region siehe bei Kolkwitz und Marsson (1)

Katharobien³⁾ endlich, eine Bezeichnung in dem das Wort sapros fehlt, kann man die Organismen des ganz reinen Wassers nennen, doch ist dabei zu bemerken, daß es diesen Organismen mehr auf kühle Temperatur oder hohen Sauerstoffgehalt des Mediums als auf Vermeidung organischer Substanzen anzukommen pflegt.

Auf die oberen Figuren des Schemas folgen noch einige Beispiele für gestörte biologische Selbstreinigung, nämlich:

1. Sekundäre Verunreinigung: durch Abreißen von Pilzfladen usw. und deren Absinken nach Passieren von Zonen, in denen die Stadien der Mineralisation schon durchschritten sind.
2. Selbstverunreinigung: durch Absterben von Pflanzen im Herbst und durch Absinken von Tieren. (Massenhaft absinkendes Plankton z. B. kann zu ziemlich starken Zersetzungen im Schlamm führen). Die erstgenannte Verunreinigung pflegt stärker zu sein als die Selbstverunreinigung. Sehr bekannt sind die vom Meeresstrande durch ausgeworfenen Tang entstehenden Zersetzungen. Beide Prozesse kommen oft in Kombination vor.

1) oligos = wenig.

2) Die Bezeichnungen p, α m, β m und o sind mehr für das ökologische als für das physiologische Verhalten geprägt.

3) katharos = rein.

3. Die Einwirkung von Hochwasser endlich pflegt die biologische Formationsgliederung zu stören und die Wucht mechanischer Faktoren zur Geltung zu bringen.

Die oben angeführten Mineralisationsstufen sind indessen auch unter natürlichen Voraussetzungen zu finden.

Abb. 127. Unbelebte Bestandteile des Sestons bei mikroskopischer Betrachtung.

1. Stengel- oder Wurzelrest.	7. Wollfaser.	13. Fleischmuskelfaser.
2. Blattrest.	8. Rattenhaar.	14. organischer Detritus.
3. Spiralfaser.	9. Vogelfederstrahl.	15. Gesteinssplitter.
4. Nadelholzfasern, zersetzt.	10. „	16. Kohlepartikel.
5. Hanffaser.	11. Leibesring.	17. Eisenoxydhydrat.
6. Baumwollfaser.	12. Chitinrest.	18. Sandkörnchen.

(Original.)

Die in der freien Natur als Abfall auftretenden organischen Stoffe unterliegen nicht allgemein so weit der Mineralisation, daß mit ihnen reiner Tisch gemacht würde. Wir sehen deshalb Schlammanhäufungen auftreten, die zur Kohlenbildung [vgl. Potonié (1)] führen können, ferner Verlandungsprozesse sich abspielen und Torfmassen in Mooren entstehen.

In den Meeren und großen reinen Seen pflegen Sedimente (Radiolarien, Globigerinen, Diatomeen) von ihren organischen Substanzen ziemlich weitgehend befreit zu werden, da die relative Armut

an Plankton in diesen Gewässern an die biologische Selbstreinigung keine sehr großen Anforderungen stellt.

Gewässertypen. Auf der Grundlage regional durchgeführter Untersuchungen, die auch durch Versuche geprüft sind, hat Naumann (4) folgendes System aufgestellt:

Die heterotrophe Formation. Die Urproduktion ist prinzipiell heterotroph (vgl. S. 55). Die Assoziationen sind p oder αm (S. 239). Beispiele sind: kleinere, verkrautete Gewässer nährstoffreicherer Gegenden und das Bodenwasser der Seen.

Die autotrophen Formationen. Die Urproduktion ist grundsätzlich mehr oder minder autotroph (S. 55). Die Assoziationen gehören dem Typus βm , o und k an (S. 241). Hierbei werden zwei Arten der Ausbildung unterschieden:

a) **Die eutrophe Formation.** Gewässer, welche mit Rücksicht auf das Wasser als eutroph ($eu = \text{gut}$) zu bezeichnen sind, treten unter natürlichen Voraussetzungen nur in den (agrikulturchemisch gesprochen) besseren Gebieten auf. Stickstoff und Phosphor sind als mg/l nachweisbar. Die Produktion an Phytoplankton ist eine hohe. Vegetationsfärbungen sind häufig; Wasserblüte ist von großer Bedeutung. Die Assoziationen schwanken zwischen βm und o .

b) **Die oligotrophe Formation.** Gewässer, welche mit Rücksicht auf das Wasser als oligotroph ($oligos = \text{wenig, gering}$) zu bezeichnen sind, treten vor allem in den Urgebirgsgegenden auf. Der Gehalt an Stickstoff und Phosphor ist minimal. Die Produktion an Phytoplankton ist eine sehr geringe. Eigentliche Vegetationsfärbungen kommen nicht vor. Die Wasserblüte ist ohne Bedeutung.

Die geschilderte Forschungsrichtung hat sich bereits zu einer Lehre von den Gewässertypen entwickelt. Vgl. auch A. Thienemann und H. Nordqvist.

Zusatz. Neben den Organismen spielen im Haushalt eines Gewässers auch die unbelebten Bestandteile wie Detritus, Sandpartikel, Gesteinssplitter usw. (Abb. 127) eine Rolle. Ihr Einfluß ist vor allem in den Mündungsgebieten von Flüssen auffällig. Die Menge und das Schicksal dieser Stoffe lassen sich im Verein mit den Organismen des Wassers besonders leicht in schnellströmenden Flüssen ohne nennenswerte Sedimentation (außer in eingeschalteten Seen) quantitativ und qualitativ studieren.

Berücksichtigt man in der Hauptsache diejenigen Bestandteile, welche im Wasser durch gute Augen gerade noch einzeln wahrgenommen werden können ($> \frac{1}{15} \text{ mm}$), so kann man sie durch Netze oder Siebe schnell aus größeren Wassermengen (z. B. 50 l) absieben und in Gläsern sedimentieren lassen (Abb. 124).

Auf solche Weise Abgeseiebtes (Sēston, S. 222) ist in Abb. 128 für den Rhein aus dem regenarmen Sommer 1911 dargestellt. Man

Abb. 128. Sestonkurve und Rheinlauf mit den Untersuchungsstellen. Die eckigen Felder sind senkrechte Ausschnitte aus den Bodensätzen der Planktongläschen in nat. Größe. (Original.)

erkennt leicht den Einfluß gesteinsführender Gebirgswässer, des Bodensees mit seiner Sedimentierwirkung, der Industrie- und Wohnzentren mit ihren Abfallstoffen und die Beseitigung dieser durch Verdünnung und biologische Selbstreinigung. Bei Wesel war die Sēstonmenge nicht wesentlich anders als bei Andernach; eine merkliche Addition fand also nicht statt. Im Mündungsgebiet mit seiner Stauwirkung durch die Flut des Meereswassers endlich findet neben der Sedimentation auch eine wesentliche Beeinflussung des Planktons statt. Näheres siehe bei R. Kolkwitz (9).

Ein reiner See ist ein Mikrokosmos, der sich selbst genügen würde, da Produkte und Bedürfnisse (besonders O_2 und CO_2) bei Pflanzen und Tieren entgegengesetzt sind. Ein belichteter, dicht verschlossener größerer Glasbehälter bewahrt sein Leben jahrelang.

Die organisierte Materie geht von einem Wesen zum anderen und macht eine Reihe von Inkarnationen durch, ehe sie in die fundamentale Masse der toten Materie zurückkehrt; diese kann dann von neuem in den Kreislauf gezogen werden.

VII. Gruppe. Charophyta (Characeae) Armleuchtergewächse.

Früher bezeichnete man diese Gruppe auch als „Röhrenalgen“, doch besteht bei dem eigenartigen Baue ihrer Vertreter weder ein direkter Anschluß an die Algen noch an die Moose. Dieser Bau wird hier als bekannt vorausgesetzt [vgl. z. B. Bonner Lehrbuch (1), Engler-Gilg (1), Oltmanns (1)].

Während *Nitella* (Taf. VII, Fig. 104) meist kleinere (reine) Gewässer bevorzugt, findet sich *Chara* (Abb. 126) vielfach auch in großen Seen und brackigen Meeresbuchten, oft in großen Beständen (Bodensee, rügener Bodden). Ihr Sauerstoffbedürfnis, bei manchen Arten auch das Lichtbedürfnis, ist im allgemeinen ziemlich gering.

Alle Gattungen und Arten, die Charen stärker, die Nitellen schwächer, sind ganz oder teilweise mit Kalk inkrustiert, der nach Zusatz von HCl meist stark aufbraust. (Characeen-Kalklager).

Die Zellen von *Nitella*, weil ohne Berindungsäden, sind sehr geeignet zum Studium der Plasmaströmung (S. 84), die hier nicht erst durch Verletzungsreiz ausgelöst wird. Umgibt man das Deckgläschen mit Eisenstaub, so kommt die Strömung des Plasmas infolge Mangels an Sauerstoff bald zum Stillstand, um nach Entfernen des Eisenpulvers wieder zu beginnen. Der wandständige „Indifferenzstreifen“, welcher zwischen dem aufsteigenden und absteigenden Plasmastrom liegt, ist frei von Chlorophyllkörnern.

Bei *Chara* läßt sich diese Strömung meist am besten an den Knospen wahrnehmen (auch im Winter).

Die Fortpflanzungsorgane der Armleuchtergewächse lassen sich sehr gut in der Planktonkammer mit Lupen (10—25mal) beobachten. Dabei erscheinen die Antheridien rot, die Oogonien grün oder braun.

Die „Früchte“ (berindete Oosporen) sind reich an Stärke, die sich mit Jod blau färbt.

Sammelt man Schlamm, auf dem Charen wachsen, ein, so kann man die in ihm befindlichen „Früchte“ leicht mit grünen Fäden (Vorkeim) unter Wasser austreiben sehen. Wegen der Verkorkung ihrer äußeren Hülle erhalten sie sich leicht in fossilem Zustande (Jura).

Bei *Chara crinita* kommt somatische (d. h. nicht durch echtes Keimplasma bedingte) Parthenogenese (s. S. 97) vor.

Vegetative Vermehrung findet durch Wurzelknöllchen, Stengelknöllchen, isolierte Knoten und Vorkeime statt.

VIII. Gruppe. Bryophyta (Muscineae) Moose.

Systematische Übersicht.

1. Klasse. Hepaticae (Lebermoose, Schleudermoose),	2. Klasse. Musci (Laubmoose),
Marchantiales,	Sphagnales,
Anthocerotales,	Andreaeales,
Jungermanniales.	Bryales.

Die Moose wachsen im allgemeinen unter ziemlich ähnlichen Lebensbedingungen wie die Flechten. Man findet sie deshalb vielfach miteinander vergesellschaftet. Absterbende Moose sieht man häufig von

Flechten überwuchert und umgekehrt. An besonders freiliegenden Stellen jedoch, wie z. B. auf den höchsten Alpenspitzen, in heißen Wüsten, an den Enden dünner Baumzweige usw. nehmen es die Moose im Wettstreit mit den Flechten meist nicht auf, da die Moose immer etwas Detritus (in Ritzen) nötig haben und nie auf ganz glattem Gestein wachsen. Doch dringen einige, z. B. *Grimmia alpestris* und *Andreaea nivalis* (meist kieselliebend) weit auf die Gipfel der Alpen in die Schneeregion vor. Auf Strohdächern machen die Flechten den Moosen meist keine Konkurrenz, weil das Substrat für die sehr langsam wachsenden Flechten zu wenig dauerhaft sein dürfte.

In den arktischen Gegenden ist die Moosvegetation verhältnismäßig einförmig; *Sphagnum* und *Racomitrium hypnoides* (= *Rh. lanuginosum*) sind hier bekannte Vertreter, besonders in den Tundren.

In den Tropen und antarktischen Regenwäldern dagegen kommen die Moose nach Gattungen und Arten vielfach zu sehr üppiger Entwicklung, vor allem in nebeligen Bergwäldern (Hängemoose). Auch bei uns sind feuchte Schluchten, Buchenwälder usw. ergiebige Fundstellen für Moose.

An gedüngten Stellen und in schlechter Stadtluft fehlen Flechten, nicht aber Moose, unter denen es ausgesprochene Saprophyten gibt, z. B. *Splachnum ampullaceum* auf Kuhmist in feuchten Waldmooren und die hochalpine *Voitia nivalis* auf Mist an Lagerstätten von Schaf- und Rinderherden. Die Sporen solcher Moose werden durch Schmeißfliegen verbreitet; diese werden durch Duftstoffe (Indolverbindungen) angelockt, welche von dem Urnenhals ausgeschieden werden. Moose von so ausgesprochenem Saprophytismus, daß sie chlorophyllfrei würden, gibt es nicht.

Im Wasser treten die Flechten hinter den Moosen so vollkommen zurück, daß sie hier so gut wie als fehlend zu bezeichnen sind, während die Moose oft üppige Bestände bilden können. Sie fruchten aber nicht unter Wasser. Während indessen die Flechte *Lichina* im Meerwasser gedeiht, fehlen hier Moose vollständig.

Die Kultur der Moose auf Agarnährboden unter Zufügen mineralischer Nährsalze wird von P. Janzen (1) und (2) geschildert. Die Verwendbarkeit des Tablettensalzes (S. 4) ist noch nicht ausprobiert. (Die Brutkörper von *Aulacomnium androgynum* keimen hierbei sehr gut.)

Die Keimung der Sporen erfordert, wenn die Aussaat in den ersten Monaten des Jahres vorgenommen wird, nach den bisherigen Wahrnehmungen 4 Tage bis etwa 4 Wochen. Als bestes Versuchsobjekt gilt nach genanntem Verfasser zurzeit das sehr kleine, xerophytisch auf Mergel- und Lehm Boden wachsende *Phascum curvicolium*.

Das Wachstum des Protonemas der Moose ist in der Regel sehr von der Wahl einer richtigen Beleuchtung für die Kulturplatten abhängig. Man vergleiche außerdem C. Servettaz (1).

Wegen der „Blütezeit“ der Moose s. Grimme (1).

Weitere Feststellungen, welche bei den Moosen wesentliche Gesichtspunkte bieten, mögen im folgenden bei den einzelnen als Typen herausgegriffenen, bekannten Vertretern besprochen werden.

— **Marchantia**¹⁾ **polymorpha**. Brunnenmoos.

(Von Linné nach N. Marchant († 1678), Gartendirektor des Herzogs Gaston v. Orléans in Blois, benannt.)

Dieses diöcische hochorganisierte Moos (s. die Abbildungen) gedeiht am besten an feuchten Felsen, Mauern (Stein und Holz) an Quellen, an Bächen, auf nassen Wiesen usw. Es scheint eine gewisse Vorliebe für nitrathaltige Standorte zu haben. Kultivieren

Abb. 129. *Marchantia polymorpha*. Männliche Pflanze, mit Brutkörbchen. (Nach L. Kny.) Teilfiguren stärker vergrößert.

1) *Marchantia* findet sich in der Sammlung Brendelscher Modelle.

läßt sich *Marchantia* auf lehmiger Rasenerde, welcher man Kuhdung und etwas Sand zusetzt. Die Gärtner können sich stellenweise seines Wucherns kaum erwehren.

Abb. 130. *Marchantia polymorpha*. Weibliche Pflanze. Vergrößert. (Nach L. Kny.)

Die Geschlechtsreife tritt mehr im Frühling, die Sporenreife meist im Hochsommer ein. Die Anlockung der Spermatozoiden scheint durch Proteinstoffe zu erfolgen. Die vegetative Vermehrung geschieht durch flache Brutkörper, welche ihre Rhizoiden aus besonders vorgebildeten Zellen an der dem Licht abgekehrten Seite entwickeln, was sich experimentell leicht zeigen läßt [vgl. L. Kny (1) und W. Pfeffer]. Das Assimilationsgewebe (Abb. 131) ist gut ausgebildet. Das Innere eines jeden der kleinen Thallusfelder steht durch eine Öffnung mit der Atmosphäre in Verbindung.

Außer *Marchantia* gibt es bei uns noch zwei besonders stattliche Lebermoose:

Fegatella conica (Name nach fegato = Leber) mit sehr deutlichen, bei Lupenbetrachtung fast warzenartigen Belüftungs-Poren auf den Thallusfeldern. Riecht beim Reiben terpenartig.

Preissia commutata [benannt nach Balthasar Preiß (1765—1850, Regimentsarzt in Prag)]. Mehr im Gebirge lebend, mit klein und zart gefeldertem Thallus.

Abb. 131. *Marchantia polymorpha*. Längsschnitt durch eine Luftkammer des Thallus, mit Assimilationszellen und Atemöffnung. Die Gestalt der Luftkammern hängt von der Beleuchtung ab. Vgl. Stahl. Mittelstark vergr. (Nach L. Kny.)

1. *Riccia fluitans*.

(Von Micheli 1729 nach Pietro Francesco Ricci, Senator und Mitglied der Botan. Ges. in Florenz, benannt.)

Dieses an seiner regelmäßigen Gabelung leicht kenntliche Lebermoos lebt häufig im Wasser untergetaucht, meist zwischen Schilf und anderen Uferpflanzen, und ist bei solcher Lebensweise stets steril. Geschlechtsorgane und Rhizoiden werden nur von der etwas derberen Schlammform gebildet [Goebel (1)]. Die Pflanze wird häufig in Aquarien gehalten.

R. natans schwimmt auf dem Wasser, andere Arten sind Landbewohner.

2. *Lophocolea* [früher *Jungermannia*¹⁾] *heterophylla*.

(Name von lophos = Hahnenkamm und koleos = Scheide, wegen der gelappten und kammartig gezackten Kelchmündung; *heterophylla* wegen der ungleichen Gestalt der basalen und der näher an der Spitze des Stengels stehenden Blätter.

Dieses zierliche Lebermoos wächst dem Substrat meist dicht angeschmiegt, mit besonderer Vorliebe auf morschen Baumstümpfen

1) Von Linné benannt nach Ludw. Jungermann (1572—1653), aus Leipzig, Professor der Botanik in Gießen. Die beblätterten Zweige der Jungermanniaceen erscheinen im Gegensatz zu denen der meisten Laubmoose in der Regel flach, gleichsam *Selaginella*-artig.

der Fichte (*Picea*). Man findet es fast immer mit Sporogonen, deren schwarze Kapseln auf weißen Seten stehen. Bei Kultur unter einer feuchten Glocke entwickeln sich die Fruktifikationsorgane besonders reichlich. Wie die Abbildung eines vergrößerten Zweiges zeigt, decken sich die Blätter dachziegelig. Die dritte Blattreihe, an der Unterseite, ist in der Zeichnung nicht sichtbar.

Die unter Wasser konservierten Kapseln eignen sich nach Kolkwitz (2) vorzüglich zum Studium des Kohäsionsmechanismus (S. 82) der Schleuderzellen. Kamerling (1), Steinbrinck (1), Goebel (1).

Lepidoxia reptans (Name von lepis = Schuppe und ozos = Zweig) ist eines der zartesten und zierlichsten Lebermoose auf Waldboden, zersetzten Baumstümpfen usw. Es ist mit bloßem Auge kaum noch als echtes Moos zu erkennen.

Frullania dilatata (1820 benannt nach dem Geh. Staatsrat Leonardo Frullani in Florenz) lebt als Xerophyt an Rinden, besonders an Buchenstämmen. Die Farbe ist dunkelgrün oder braun [K. Müller (1)]. Die Oberblätter haben beutelförmige Lappen und werden bisweilen von Rädertieren bewohnt. Vgl. Kerner, Bd. I, S. 243.

— Metzgeria furcata.

(Von Raddi 1820 nach dem ihm befreundeten Kupferstecher J. Metzger aus Staufen i. Br. benannt.)

Dieses xerophytisch lebende Lebermoos erinnert in seiner Gestalt an *Riccia fluitans*. Es findet sich besonders an der Rinde von Buchen und Eichen.

3. **Sphagnum cymbifolium.** [Die Moosbezeichnung *Sphagnos* bei Plinius leitet sich wahrscheinlich von spongos (Schwamm) ab.] Torfmoos. Die Torfmoose, welche die Hochmoore charakterisieren, zeichnen sich durch ihre Fähigkeit, besonders große Mengen von Wasser aufzusaugen, in bemerkenswerter Weise aus. Beim Ausdrücken üppig entwickelter Polster fließen überraschend große Wassermengen ab, welche kapillar durch die perforierten Wasserzellen der Stengel und Blätter festgehalten waren. Die Pflanze besitzt keine Rhizoiden. Die Torfbildung der *Sphagnen* beruht auf ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Zersetzung, wohl infolge ihres Gehaltes an Säure (Lackmuspapier!); vgl. Paul (1).

Die meisten Torfmoose verlangen weiches (nicht alkalisches) Wasser. Die Wasserstellen zwischen ihren Polstern sind an regenfreien Tagen meist reich an Desmidiaceen.

Bemerkenswert ist bei *Sphagnum* der Mechanismus beim Aufspringen der Sporenkapsel [vgl. Nawaschin (1)]. Wenn man Polster von *Sphagnum* mit gut entwickelten Sporangien (im Juli und August) aus dem Freien ins trockene Zimmer oder in die direkte Sonne bringt, wird man die Deckel von den Kapseln mit

deutlichem, knipsendem Geräusch abfliegen hören und eine Sporenstaubwolke aus jeder Kapsel hervorpuffen sehen.

Nawaschin kommt mit Schimper zu der Ansicht, daß die infolge des Eintrocknens im Innern der Kapsel komprimierte Luft das Platzen bewirke, und die Sporen wie aus einem Tesching hervorschießen. Er hat ermittelt, daß die eingeschlossene Luft bis auf mindestens 3 Atmosphären komprimiert wird. Das Abspringen des Deckels wird noch dadurch

Abb. 132. *Sphagnum cymbifolium*. Wasserzellen und chlorophyllführende Zellen bei 120facher Vergr. nach H. Schenck. Desgl. bei 30facher (Lupen-)Vergr. nach H. Bethge. (Neuzeichnungen.)

Abb. 133. *Sphagnum cymbifolium*. Kapsel in rund 10facher Vergr. (Orig.).

erleichtert, daß dieser durch verdickte Parenchymzellen starr ist und deshalb der Kontraktion der übrigen Kapselteile nicht folgen kann.

— **Andreaea petrophila**. Spaltkapsel-Moos.

(Nach dem Apotheker Andreae in Hannover.)

Vgl. Taf. XII. Abbild. 8 und K. Osterwald (1). Fossil im Devon.

4. **Dicranum scoparium**. Besenmoos.

(Name von dikranos = zweiköpfig, zweizinkig, wegen der meist in zwei Schenkel gespaltenen Peristomzähne. scop = Besen.)

Die stattliche Pflanze wird 10–18 cm hoch; die Blätter sind meist sichelförmig nach einer Seite gebogen. Sie wächst in trockenen Kiefern- und Laubwäldern am Boden, oft bestandbildend.

D. maius wächst fast ausschließlich in Laubwäldern.

5. **Ceratodon purpureus**. Hornzahnmoos.

(Name von keras = Horn und odus = Zahn; wegen der widerhornartigen Peristomzähne.)

Die Blätter sind in charakteristischer Weise gekielt (wie ein Schiff). Die Seta ist meist rot, die Kapsel rötlichbraun. Im Frühling

fallen die jungen, glänzend purpurroten Kapselstiele in den Rasen dieses Moores besonders in die Augen. Die Pflanze ist variabel, allenthalben gemein und weit verbreitet (kosmopolitisch) auf Sandboden, Strohdächern, Mauern, in Sümpfen usw.; sie steigt bis hoch in die Gebirge auf.

Die Sporen frisch entdeckelter Kapseln werden nach Steinbrinck durch die (sich in ihren Bewegungen hemmenden und dann zurückschnellenden) Schenkel der Peristomzähne umhergeschleudert.

Die Abbildung stellt einen fruchtenden Rasen auf Boden und ein steriles Polster von einem Strohdach dar.

6. *Leucobryum glaucum*. Weißmoos.

(Name von leucos = weiß und bryon = Moos.)

Die Pflanze wächst in dichten, mehr oder weniger halbkugelig gewölbten, bis 15 cm hohen Rasen, welche oben bläulich grün, innen weißlich sind. Die sehr dicht gestellten Blätter haben Wasser- und Chlorophyllzellen, ähnlich *Sphagnum*, doch von etwas anderem Bau. Abbild. siehe bei Kerner, Bd. II, S. 208; vgl. auch C. Warnstorf (1). *Leucobryum* lebt am Boden von Nadelwäldern, Erlenbrüchen, Heiden usw. Seine Lebensweise kann oft als hemixerophytisch bezeichnet werden. Es scheint Kalkboden zu meiden.

Barbula unguiculata. Bartmoos.

(Name von barba = Bart, wegen der langen fadenförmigen, gewundenen Peristomäste.)

Die Rippe der Blätter tritt als kurze Stachelspitze am Blattende aus, die Rasen sind gelbgrün. Die Pflanze gedeiht besonders an Wegrändern und auf festgetretenen Gartenwegen (wie *Bryum argenteum* und *Ceratodon purpureus*), auch auf Tuffsteingrotten in Gärten.

Verwandt mit *Barbula* ist die Gattung *Tortula*. Von dieser wächst die sehr verbreitete *T. muralis* besonders auf alten Mauern, *T. ruralis* auf Sandfeldern und auf alten Strohdächern in Dörfern.

7. *Grimmia pulvinata*. Zwergmützenmoos.

(Name nach Dr. K. Grimm, Leibarzt in Gotha, † 1821.)

Das Moos lebt echt xerophytisch weitverbreitet auf Steinen, Mauern usw., oft mit Kapselfrüchten förmlich übersät (Mai, Juni). Die Spezies von *Grimmia* finden sich auch auf erratischen Blöcken. (Die Annahme, daß sich auf solchen Steinen bei uns Relikte aus der Eiszeit gehalten haben, erscheint unhaltbar.) Es besitzt die Fähigkeit, stark auszutrocknen und beim Befeuchten wieder aufzuleben. In diesem Punkte verhalten sich die Moose graduell verschieden.

Die Peristomzähne von *Grimmia* verschließen, wie bei den meisten Moosen, bei Feuchtigkeit die Kapsel, während sie bei Trockenheit spreizen; Abb. s. bei Kerner, Bd. II, S. 568. Der Mechanismus steht im Dienste der Sporenverbreitung. Die hygroskopischen

Moose.

Erläuterungen im Text.

Bewegungen der Zähne an den Mooskapseln (vgl. S. 82) lassen sich bei schwächerer Vergrößerung und auffallendem günstigem Licht ausgezeichnet beobachten (Taschenlampe).

8. **Rhacomitrium sudeticum.** Zackenmützenmoos.

(Name von rhacos = zerschlitz und mitra = Mütze.)

Die Pflanze wächst mit Vorliebe an kalkfreien Felsen. Neben ihr ist ein Rasen von *Andreaea* angesiedelt. Das Material stammt von der Schneekoppe im Riesengebirge.

9. **Funaria hygrometrica.** Drehmoos.

[Name von funis = Seil, wegen der seilartig gedrehten Fruchstiele (Seten).]

Das Moos lebt meist truppweise auf feuchtem Sand, an Waldplätzen (mit veraschtem Holz), auf porösem, steinigem Substrat usw. an belichteten Partien. Es fällt durch seine im unreifen Zustand saftgrünen, in der Reife rotbraunen Sporogone mit hygroskopischer, gedrehter Seta auf (Versuche mit Polstern).

Die Blätter eignen sich zu Versuchen über den Einfluß des Lichtes auf die Lage der Chlorophyllkörner (S. 90 u. Stahl) und zu Beobachtungen über die Teilung dieser Körner; vgl. Strasburger und Koernicke (1), S. 156—159.

Über die Kultur von *Funaria* s. P. Janzen (2).

— **Schistostega osmundacea.** Leuchtmoos. Dieses bemerkenswerte Moos wächst mit Vorliebe in engen Felshöhlen der Sandsteingebirge

Abb. 134. *Schistostega osmundacea*. Vorkeim bei schwacher Vergrößerung. (Neuzeichnung nach F. Noll.)

(Fichtelgebirge, Sächsische Schweiz usw.) und zeichnet sich durch ein auch in seinem oberirdischen Teile bleibendes Protonema mit rundlichen Zellen aus, welche, ähnlich den Katzenaugen, das

Licht auf die hintere Wand konzentrieren und von dort wieder reflektieren. Dadurch strahlen sie ein überraschend mildes, chlorophyllgrünes Licht, das natürlich mit Phosphoreszenz nichts zu tun hat, zurück; vgl. Abb. 135 und *Chromulina*.

Abb. 135. *Schistostega osmundacea*. Verlauf der Lichtstrahlen in einer Proto-nemazelle bei Brennpunktlage der Chloroplasten. A Zentralstrahl, B Randstrahl. Die Strahlen treffen an der hinteren Wandpartie unter größerem Einfallswinkel auf, als der Grenzwinkel der Totalreflexion (hier 45°) beträgt. Die Randstrahlen in B können wegen der Kleinheit des links gelegenen Winkels aus der Zelle seitlich entweichen. Vergr. 1500-fach. Neuzeichnung nach G. Senn.

Eine farbige Abbildung von Leuchtmoos-Protonema in einer Felshöhle findet sich bei Kerner, Bd. I, S. 374. Zum Gedeihen der Vorkeime gehört eine richtige Abstimmung von Licht und Feuchtigkeit.

Die Kultur des Protonemas auf Agarnährboden ist P. Janzen (1) bis jetzt nicht gelungen, doch haben Versuche im Botanischen Garten in München gezeigt, daß man es lange Zeit in Saatschalen im Gewächshaus ziehen kann, wenn man es mit Mutterboden aushebt.

10. *Bryum argenteum*. Silbermoos.

Name von bryon, bei Dioscorides Bezeichnung für Moos (auf Rinden).

Die niedrigen Rasen sind in trockenem Zustand silberweiß glänzend. Sie bestehen aus dicht anliegend beblätterten, kätzchenförmigen Sprossen. Die vegetative Vermehrung erfolgt reichlich durch Brut- und Bruchknospen. Die hängenden Kapseln haben ein kompliziertes Peristom, welches eine ganz allmähliche Ausstreuung der Sporen gewährleistet; man vergleiche dazu L. Loeske (2), S. 117.

Das Moos ist auf der ganzen Erde verbreitet; z. B. gemein auf festgetretenen Wegen, zwischen Pflastersteinen, auf Äckern usw. Es ist oft erster Pionier in frischen feuchten Sandausstichen, da es sehr genügsam und zählebig ist, nach C. Warnstorf darin dem *Polygonum aviculare* vergleichbar. Auf Rieselfeldern verträgt es Berieselung mit Abwasser.

Weitere Pioniere auf kahlen Sandflächen sind *Bryum pendulum*, *Br. caespiticium*, *Ceratodon purpureus* u. a. m. Die Sporen und Brutorgane werden nach Ausstichen usw. auf weiten Strecken besonders durch Vögel, auf kürzeren auch durch Wind verbreitet.

11. *Mnium punctatum*. Sternmoos.

Name von mnion, im Altertum Bezeichnung für Moos oder Alge.

Die Blätter sind rundlich und von ansehnlicher Größe, ihre Zellen groß und punktförmig erscheinend (daher *punctatum*, Planktonkammer!). Die Blätter eignen sich sehr gut und leicht zum Studium der Chlorophyllkörner. Man braucht nur ein Blatt unter Zugabe eines Wassertropfens unter das Mikroskop zu legen und kann dann die Chloroplasten ohne weiteres betrachten. Das Moos gedeiht an Waldbächen, auf feuchtem Boden der Laubwälder usw. Vgl. die farbige Tafel in Kerner, B. II S. 57.

Mn. cuspidatum ist synöcisch.

Mn. undulatum ist eines der stattlichsten und schönsten unserer heimischen Moose. Es hat eine gewisse Ähnlichkeit mit *Catharinaea undulata*¹⁾, welche aber im vegetativen Zustande durch die relativ stumpfe Blattspitze und durch das Fehlen der Assimilationslamellen auf den Blättern von ihm unterschieden werden kann.

Viele Moose am Grunde schattiger Laubwälder (Waldmoose) gedeihen am besten bei mäßiger Belichtung.

Der Generationswechsel der Moose ist in einem Brendelschen Modell an *Mnium* dargestellt.

12. *Buxbaumia aphylla*. Schorfmoos.

Nach Prof. J. C. Buxbaum in Petersburg († 1730) benannt.

Die große Kapsel steht auf dickem Stiel und ist verkehrt hufähnlich gestaltet. Wächst xerophytisch, besonders an kahlen Wegabstichen in Kiefernwäldern. Die Blätter sind sehr vergänglich und daher selten zu finden; sie können demnach zur Ernährung der Pflanze, wie sonst bei Moosen, wenig beitragen. Vgl. dazu Haberlandt (3), S. 480. Das Protonema kann auf Agarnährboden kultiviert werden.

13. *Polytrichum commune*. (Wegen der langbehaarten Kalyptra als vielhaarig bezeichnet.) Widerton-Moos²⁾. Dieses stattliche, hochorganisierte Moos (s. die Abb.) ist ein Hygrophyt (*Polytrichum juniperinum* dagegen ein Xerophyt); es vermag auf Moorboden und sonstigen feuchten Stellen in schwellenden, dunkelgrünen Rasen weite Strecken zu überziehen, auch an triefenden Felsen ausgedehnte Rasen zu bilden. Die Pflanze kann zur Torfbildung beitragen.

1) Benannt nach der Kaiserin Catharina II. von Rußland.

2) Bedeutet: Wider das Antun, Behexen.

Beim Trocknen führen die Blätter mehr oder weniger ausgesprochene Verbiegungen und Drehungen aus, bei deren Zustandekommen Kohäsionsmechanismen im Spiel zu sein scheinen.

Abb. 136. Männliche und weibliche Geschlechtsorgane eines Laubmooses. Nach Hedwig, Gesammelte Abhandl., Leipzig 1793.

Die Blätter zeigen auf der Oberfläche zahlreiche, längsverlaufende Lamellen, durch welche die Assimilationsflächen vergrößert werden.

Die aufrechten Kapseln besitzen Spaltöffnungen, welche sich in der Einschnürung zwischen Hals und Urne befinden. Das Peristom ist einfach gestaltet, wie bei aufrechstehenden Kapseln überhaupt (gleichsam Mohnkopftypus).

Die Pflanze besitzt eine Art inneren Leitgewebes für Wasser, scheint aber nach Oltmanns auch äußerlich, wie viele andere Moose, das Wasser kapillar aufzusaugen und für ihre Zellen zu verwerten.

Die Sporenreife fällt auf Ende Mai und Juni, die Geschlechtsreife in den Hochsommer, doch findet man, wie bei vielen Moosen überhaupt, gut entwickelte Geschlechtsorgane schon im Monat Mai. (Beobachtung der Spermatozoiden.)

P. juniperinum wächst xerophytisch auf Sandboden und an anderen Orten. *Pogonatum* (*Polytrichum*) *nanum* hat ein sehr üppig entwickeltes Protonema, das ausgedehnte, smaragdgrüne Rasen auf

Erdabhängen bildet. Protonemen finden sich häufig auch auf Blumentöpfen, namentlich in Gewächshäusern; man vergleiche *Schistostega*, *Hypnum cupressiforme* und die Abb. 152.

- **Fontinalis antipyretica.** Quellmoos. [Antipyreticus = gegen Feuersbrunst schützend, weil früher die Blockhäuser mit diesem Moos gefügt wurden.] W. Ph. Schimper (1). Die Pflanze ist Taf. VII, No. 105 abgebildet. Sie bildet meist kräftige, unter Wasser lebende Büschel von dunkelgrüner bis bräunlicher Farbe. Die Stämmchen können bis 50 cm und mehr lang werden, besonders in fließenden Gewässern. Das Moos wird häufig in Aquarien gehalten.

Amblystegium riparium wächst mehr in der Emersionszone, auch in Brunnentrögen, an Wassermühlen usw.; auch *Rhynchostegium rusciforme* siedelt sich gern auf hölzernen Mühlrädern an.

14. *Brachythecium rutabulum*. Kurzbüchsen-Moos.

Name von brachys = kurz, und theke = Büchse, wegen der meist dicken, kurzen Kapsel, rutabulum = Ofenkrücke, wegen der gekrümmten Äste.

Die breiteiförmigen, zugespitzten Blätter sind ziemlich locker gestellt, oft fast wagerecht abstehend. Das Moos wächst in Gebüsch und Waldungen, häufig auch in wenig besonnten Gärten (z. B. in nach Norden gelegenen Hausgärtchen), in denen es den Wuchs des Rasens unterdrückt.

Überhaupt gedeihen viele Laubmoose gut im Schatten, wodurch sie befähigt sind, an weniger belichteten Stellen den Rasen, der meist lichtbedürftig ist, zu unterdrücken oder ihn mit Moos zu durchsetzen.

Rhynchostegiella tenella, ein in West- und Süddeutschland besonders an Kalk, Sandsteinmauern und trockenen Felsen verbreitetes Moos, findet sich nach Veröffentlichungen von Fr. Thomas-Ohrdruf in der var. *cavernarum* bei dem verhältnismäßig schwachen Schein einer elektrischen Glühlampe in der Dechenhöhle bei Iserlohn in fruchtendem Zustand. Das elektrische Licht vermochte also das Sonnenlicht zu ersetzen.

Amblystegium juratzkanum, das im gleichen Rasen vorhanden war, fruchtete ebenfalls.

Bryum capillare gedeiht in der Hermannshöhle bei Rübeland im Harz, nach den Feststellungen von G. Lindau, ebenfalls im elektrischen Licht.

— *Hypnum (Steréodon) cupressiforme*. Zypressen-Astmoos.

(hypnos = Moosname im Altertum. — stereos = fest, odús = Zahn.)

Dieses nächst *Ceratodon* gemeinste Moos [C. Warnstorf (1)] bildet mit Vorliebe teppichartige, ausgedehnte Überzüge auf Baumstämmen-, stümpfen usw. Die Überzüge haben im trockenen Zustand hellgrünes seidiges Aussehen.

Seine weite Verbreitung und die Fähigkeit, an trockenen Baumstämmen u. dgl. zu leben, verdankt das Moos als Xerophyt seiner Widerstandsfähigkeit gegen Austrocknen. Ähnliches gilt von den Moosen auf den Strohdächern der Bauernhäuser, z. B. von *Ceratodon purpureus*.

Wie Abb. 137 zeigt, kann man aus der Seta von *H. cupressiforme* das Protonema (stellenweise schiefe Querwände) durch geeignete Kultur hervorbringen, also die beblätterte Moospflanze (Geschlechts-generation) unter Umgehung der Sporen unmittelbar aus dem Gewebe der Sporogongeneration erzeugen; vgl. auch das Kapitel Farne, Marchal (1) u. Stahl (7).

— **Hypnum schreberi.**

(Mit rotem Stengel.)

Lebt xerophytisch und bildet, besonders in Kiefernwäldern, sehr ausgedehnte Bestände.

Abb. 137. Protonema von *Hypnum cupressiforme* aus einem Stück in feuchten Sand eingepflanzter brauner Seta hervorstwachsend. In diesem Falle entsteht das Protonema aus der Sporengeneration unter Überspringen der Sporen. Vergr. ca. 30fach. (Nach N. Pringsheim.)

15. **Hypnum purum.**

(Mit grünem Stengel.)

Wächst ähnlich, ist aber ein weniger ausgesprochener Xerophyt. *H. (Calliergon) cuspidatum* ist vorwiegend Hygrophyt (Charaktermoos der sauren Wiesen und Moore). *Hypnum (Ctenidium) molluscum* ist für Kalkgebiete charakteristisch.

Kalkmoose, welche in ähnlicher Weise wie die Armleuchtergewächse Kalk in ihren Membranen ablagern, gibt es nicht, wohl aber können sich aus hartem Wasser Kalkinkrustationen auf Moosen niederschlagen.

— **Hylocomium squarrosum.** Sparrigblättriges Waldmoos.

(Name von hyle = Wald und kome = Haar, Laub.)

Das Moos lebt in feuchten Gebüschern und Wäldern, oft in ausgedehnten Beständen. *H. triquetrum* ist als Kranzmoos bekannt.

— **Hylocomium splendens.** Etagenmoos.

Die Pflanze bildet neben *Hypnum purum* und *H. schreberi* häufig Massenbestände in trockenen Laub- und Nadelwäldern. Dadurch,

daß es jährlich einen neuen aufstrebenden Ast bildet, entgeht es leicht der Eindeckung durch abfallendes Laub [Goebel (1)].

Literatur und Sammlungen.

E. Bauer (1), Europäisches Laubmoosherbar.

Joh. Hedwig (1), Prachtwerk mit farbigen Tafeln.

V. Schiffner (1), Europäisches Lebermoosherbar.

(Vgl. auch Engler-Prantl.)

W. Ph. Schimper (1), Prachtwerk mit schwarzen Tafeln.

Trocken gewordene Moose kann man meist mit bestem Erfolg wieder zu ihrer natürlichen Form aufweichen; Jungermanniaceen z. B. durchgehends, wenn auch manchmal erst nach längerer Zeit. Riccien lassen sich mit Wasser nicht aufweichen, Marchantien nur schlecht.

Brotherus u. a. (1).

Correns (1).

Giesenhagen (1).

Goebel (1 und 2), betr. Moose und Farne.

Haberlandt (3).

Limpricht (1).

Loeske (1), Anordnung nach Standorten.

Lorch (1).

Migula (1).

Warnstorff (1).

Wünsche (1), Anordnung nach Standorten.

IX. Gruppe. Pteridophyta, Farne.

1. Die Sporengeneration der Farne.

Die Einteilung der Farne geschieht nach der Sporengeneration in folgende vier hier in Betracht kommende Klassen:

a) Filicales:

Hymenophyllaceae,

Cyatheaceae,

Polypodiaceae,

Osmundaceae,

Marsiliaceae,

Ophioglossaceae,

Pecopterides (u. a. m.), fossil.

b) Sphenophyllales:

Salviniaceae,

Sphenophyllaceae, fossil.

c) Equisetales:

Equisetaceae.

Calamariaceae, fossil,

d) Lycopodiales:

Lycopodiaceae,

Selaginellaceae,

Lepidodendraceae, fossil,

Sigillariaceae, fossil,

Isoëtaceae.

Umstehend ist eine Sumpflandschaft fossiler Farne abgebildet, welche ein Bild von mächtig entwickelten Sporengenerationen vergangener Zeiten gibt und an die physiologischen und chemischen Prozesse erinnern soll, welche durch die Assimilation im Licht und dann durch Zersetzung der Pflanzensubstanz, Bildung von Faulschlamm (mit FeS) usw. zur Entstehung von Steinkohle Anlaß gegeben haben¹⁾; vgl. Potonié (1).

1) Es sei daran erinnert, daß nach neueren Anschauungen Reste von Wasser- und Sumpfpflanzen auch an der Bildung von Petroleum beteiligt sind.

Im Laufe der Entwicklung unserer Erde sind die Riesenfarne der Vorzeit, offenbar infolge Änderung der klimatischen Verhältnisse, mehr und mehr zurückgegangen. Besonders die Bärlappgewächse, auch die Schachtelhalme, stellen gegenwärtig nur noch kleine Formen einst bedeutungsvoller Geschlechter dar. Nach H. Bruchmann scheinen bei den *Lycopodiales* in dem lockeren, humosen Boden in der Vorzeit, der durch verrottende Stämme bei der Üppigkeit der Vegetation immer von neuem aufgefüllt wurde, die Bedingungen für die Entwicklung der unterirdisch sich entwickelnden Geschlechtsgeneration ganz besonders günstig gewesen zu sein.

Abb. 138. Waldmoor der Steinkohlenzeit. Links: Vorn ein *Lepidodendron*, ein Farnbaum (*Pecopteris*) und eine kletternde *Sphenopteris*. Am Boden liegend ein *Megaphyton*-Stamm. Mitte: Im Wasser *Sphenophyllum cuneifolium*. Rechts: Vorn *Sigillaria*-Baum und kletternde Farne, dahinter große und kleine *Cordaites* (bandförmig-blättrig und fächer-blättrig). Zum Teil im Wasser *Calamites ramosus*. [Nach Potonié (2), Wandtafel betr. eine Landschaft der Steinkohlenzeit.]

Gegenwärtig haben wir in den tropischen Baumfarnen (z. B. *Cyathea* und *Alsophila*) noch einigermaßen hochstämmige Formen. Von den in Europa wachsenden Gattungen vermag nur noch der Königsfarn (*Osmunda regalis*) dicke kurze Stämme zu bilden (im Kaukasus).

* * *

Die Wedel der Farne tragen die Sporangien mit den darin enthaltenen Sporen an lokal begrenzten Stellen auf ihrer Unterseite oder am Rande, z. B. *Aspidium* (*Dryopteris*) *filix mas*, *Scolopendrium vulgare*, *Pteris aquilina* und *Polypodium vulgare*. Bei anderen dagegen führt die Bildung der Sporangien zum Verschwinden der grünen Blattspreite und damit zu wesentlichen Veränderungen in der Ernährung dieser Wedelteile.

Beispiele hierfür sind in der folgenden Zusammenstellung genannt:
Umbildung sporangienbildender Wedelteile.

Beispiele	Sterile, grüne Wedel	Fruchtbare Wedel
<i>Struthiopteris germanica</i>	doppelt fiederspaltig	ähnlich, aber zu einer Art brauner Straußenfeder umgebildet
<i>Blechnum spicant</i>	fiederteilig	ähnlich, aber die Flächenteile fast bis auf die Hauptnerven reduziert
<i>Osmunda regalis</i>	doppelt gefiedert	ähnlich, aber zu einer Art brauner Risse umgebildet
<i>Marsilia quadrifolia</i>	mit vier Blättchen	außerdem mit bohnenförmiger „Sporenfrucht“ ¹⁾
<i>Ophioglossum vulgatum</i>	zungenförmig	außerdem mit ährenförmigem Teil
<i>Botrychium lunaria</i>	meist einfach gefiedert	außerdem mit meist doppelt gefiedertem, spreitenlosem, sporentragendem Teil
<i>Equisetum arvense</i>	scheidenförmig	schildförmig
<i>Lycopodium clavatum</i>	schmales Blättchen	breites, gelbliches Blättchen mit einem Sporangium ²⁾ (Oberseite)

Zum näheren Studium der zu Sori vereinigten Sporangien eignen sich *Aspidium filix mas* (s. die Abb.), *Polypodium vulgare*, *Scolopendrium officinale* u. a. m. Man halte sich Herbarmaterial (nicht unreif!) in ge-

Abb. 139. *Aspidium filix mas*. Querschnitt durch einen Sorus, die Sporangien unter dem Indusium zeigend. Mittelstark vergrößert. (Nach L. Kny.)

1) Öffnet man eine solche (ev. viele Jahre alte) „Sporenfrucht“, so quillt beim Einlegen in Wasser ein Gallertstiel mit den daran sitzenden Sporangien hervor.

2) Die Sporen von *Lycopodium* (fast 50 % Fett) dienen in den Apotheken zum Einbetten von Pillen.

nügender Menge vorrätig. Um zunächst ein Übersichtsbild über die Sporangienhäufchen zu gewinnen, verfähre man folgendermaßen:

Man lege Teile des Blattes von *Polypodium vulgare* (bei dem die Sporangien nicht durch ein Indusium bedeckt sind), trocken auf den Objektträger und betrachte sie bei schwacher (40—100facher) Vergrößerung im auffallenden Licht, bei Beleuchtung mit einer hell leuchtenden elektrischen Taschenlampe. Man wird ausgezeichnet in situ die braunen Sporangien, den braunroten, wie eine Raupe erscheinenden Annulus und die umherliegenden gelblichen Sporen sehen, besonders wenn das Material nicht überreif war¹⁾; Strasburger-Koernicke, S. 548.

Die Sporangien zeigen einen sehr bemerkenswerten Mechanismus zum Fortschleudern der Sporen, welcher nachstehend besprochen werden soll.

Der Öffnungs- und Schleudermechanismus der Farnsporangien.

Die reifen Sporangien von *Aspidium filix mas*, *Polypodium vulgare* *Scolopendrium officinale* u. a. m. besitzen eine im wesentlichen übereinstimmende Einrichtung zum Fortschleudern der Sporen.

Um diese zu beobachten, verfährt man in folgender Weise:

Man schabt das Sporangienmaterial²⁾ vom Wedel ab und weicht es auf einem Objektträger ein (bei frischem Material nicht nötig), ohne ein Deckgläschen aufzulegen. Es wird zunächst bei schwacher (20maliger oder noch schwächerer) mikroskopischer Vergrößerung betrachtet, weil man dann ein großes Gesichtsfeld hat. Infolge der Befuchtung sind die Sporangien geschlossen; sobald das Wasser aber verdunstet, streckt sich der Annulus zusehends, krümmt sich, wie die Abbildung zeigt, zurück und springt dann plötzlich in seine ursprüngliche Lage. Dabei werden Sporangien und Sporen fortgeschleudert (bei im Sorus festsitzenden Sporangien werden diese naturgemäß nur erschüttert, die Sporen aber auch hier umhergeschleudert). Das Springen auf dem Objektträger ist so lebhaft, daß manche Sporangien aus dem Gesichtsfeld verschwinden, andere, die vorher nicht sichtbar waren, hineinspringen. Die Sporen fliegen allenthalben umher.

Das Springen kann erst beginnen, wenn auf dem Objektträger kein blankes Wasser mehr zu sehen ist. Man saugt deshalb mittels Fließpapiers das Wasser zweckmäßig von vornherein so weit ab, daß das Präparat stumpf erscheint. Wenn das Wasser in den Zwischenräumen der Sporangienmasse ruckweise verdunstet, ist der Moment des Springens ziemlich nahe. Man kann den Prozeß dadurch beschleunigen, daß man vorher gelinde erwärmt.

1) Stücke solcher sporangientragenden Wedel können sehr gut zur Anfertigung von Trockenpräparaten auf schwarzem Objektträger dienen.

2) Die Sporangien eignen sich zu Dauerpräparaten in Glyze ingelatine. Modelle finden sich in der Brendel'schen Sammlung.

Während man das Springen beobachtet, hält man zweckmäßig den feuchten Atem durch die Hand oder einen Hauchschirm ab.

Der Versuch kann an demselben Material durch erneutes Befeuchten wiederholt werden.

Der Mechanismus, welcher der vorliegenden Erscheinung zugrunde liegt, ist besonders durch Schrodtt (1) und Steinbrinck (2) studiert worden. Das Wasser verdunstet durch die dünnen Membranstellen des Annulus. Dadurch verringert sich das Volumen der Zellen, wobei durch Adhäsion des Wassers an der Wand und durch seine Ko-

Abb. 140. *Aspidium filix mas.* Vergrößerte Sporangien. 2. Bei Beginn des Öffnens. 4. Vollständig geöffnet. 5. Nach dem Springen. (Nach Leclerc du Sablon).

häsion der Ring sich zurückkrümmt. Ist ein Maximum der Spannung überschritten, so reißt das Wasser auseinander und es entstehen luftverdünnte Räume, welche unter dem Mikroskop wie Luftblasen erscheinen (s. die Abb.). Das Auftreten solcher Räume erklärt sich dadurch, daß das Wasser durch Verdunsten heraus, die Luft durch die Wände der Annuluszellen aber nicht hinein kann. Sobald das Wasser reißt, schlägt der Ring zurück und bewirkt durch die plötzlich eingetretene Erschütterung das Umherschleudern der Sporen.

Ungestielte Sporangien, z. B. diejenigen von *Botrychium*, besitzen keinen Schleuder-, wohl aber einen Öffnungs- und Schließmechanismus. Bei feuchtem Wetter sind die Sporangien geschlossen; Abbildung siehe bei Kerner, Bd. II, S. 568.

Bei der Bewegung der Schleuderbänder an den Sporen des Schachtelhalms (*Equisetum*) handelt es sich wie bei den Zähnen an der Mooskapsel (S. 252) um rein hygroscopische Bewegungen [de Bary (3)].

Abb. 141. *Equisetum arvense.* Sporenhäufen trocken (links) und feucht. (Nat. Gr.). Einzelne Sporen trocken u. feucht (schwach vergr.). Vgl. auch Kerner, Bd. II, S. 569. (Orig.)

2. Die Prothallien generation der Farne.

Die Prothallien der Farne bilden als Träger der Antheridien (δ) und Archegonien (φ) die Geschlechtsgeneration.

Die Prothallien entwickeln sich:

- a) oberirdisch bei *Aspidium*, *Polypodium*, *Equisetum* u. a. m. und haben dann Chlorophyll;
- b) unterirdisch bei *Lycopodium*, *Ophioglossum* und *Botrychium* und sind dann chlorophyllfrei;
- c) in der Spore, wenigstens zum größeren Teil, z. B. bei *Salvinia*, *Selaginella* und *Isoetes*.

Näheres zeigen die Abbildungen.

Abb. 142.

Abb. 143.

Abb. 142. *Lycopodium clavatum*. Prothallien und junges Pflänzchen in nat. GröÙe. (Orig.)

Abb. 143. *Ophioglossum vulgatum*. Links: Größere Prothallien in nat. GröÙe, einfach, verzweigt und zum Teil von der Basis her absterbend. Rechts: Keimpflanze mit entfaltetem grünem Blatt in natürlicher GröÙe. (Neuzeichnungen nach H. Bruchmann.) (Handwörterbuch, Bd. 3, S. 974.)

Die Prothallien von *Aspidium filix mas* und verwandten Vertretern findet man im Freien am leichtesten an feuchten Felswänden farnreicher Täler, am Boden von Wäldern, auf Erlenstümpfen usw., meist in Form kleiner, herzförmiger Blättchen von etwa LinsengröÙe. In Gewächshäusern erscheinen sie häufig auf der Oberfläche von Blumentöpfen in Farnhäusern.

Die saprophytischen Prothallien des Bärlapps (*Lycopodium*) finden sich nach H. Bruchmann (1) etwa in $\frac{1}{2}$ —10 cm Tiefe im Waldboden, bisweilen so häufig, daß in 1 l Erde etwa 10 Exemplare zu finden sind, am besten an solchen Stellen, wo die Sporen durch Erdarbeiten im Walde eingedeckt sind. Die Ausbildung der Prothallien von *L. clavatum* erfordert im Freien schätzungsweise 7—12 Jahre. Sie sind, wie die Abbildung zeigt, unregelmäßig wulstig gestaltet und von gelblich-weißer

Farbe. Die Geschlechtsorgane sind mehr oder weniger tief in die Peripherie des Gewebes eingesenkt.

Die Prothallien der Natternzunge (*Ophioglossum vulgatum*) fand H. Bruchmann (2) etwa 2—10 cm tief unter der Erdoberfläche, unter 1 qm Boden durchschnittlich acht Exemplare. Sie stellen in der Regel wurmförmige Gebilde von bräunlicher Farbe dar, welche mehr oder weniger vertikal gerichtet sind. Die Dicke beträgt ca 1 mm, die Länge höchstens 6 cm. Die Prothallien sind monöcisch, ihre Antheridien und Archegonien in großer Zahl in das Gewebe eingesenkt. Ihr Alter beträgt schätzungsweise 3—20 Jahre; Symbiose mit Wurzelpilzen ist wahrscheinlich.

Abb. 144. *Botrychium lunaria*. Rechts: Prothallien und Keimpflanzen in nat. Größe an ihrem Standort im Freien. Links: Geschlechtsreife Prothallien bei schwacher Vergrößerung. (Neuzeichnungen nach H. Bruchmann.)

Botrychium lunaria (s. die Abbildung) erzeugt Prothallien, welche 1—3 cm tief zwischen Wurzelgeflecht unter der Erdoberfläche wachsen. Sie finden sich bisweilen gleichsam nesterweise in Form kleiner eiförmiger, mitunter auch herzförmiger Körper von etwa 1—2 mm Länge

Abb. 145. *Salvinia natans*. Pflanze von oben betrachtet und in der Seitenansicht (mit Sporangienbehältern). Nat. Größe. Rechts: Makrospore mit Prothallium und Keimpflanze, schwach vergrößert. (Links: Nat. Größe, Original; Mitte: nach G. W. Bischoff; rechts: nach Pringsheim.)

und $\frac{1}{2}$ —1 mm Breite, von weißlicher oder schwach hellbrauner Farbe und sind allseitig mit Rhizoiden besetzt. Die Prothallien sind monöcisch und tragen die Geschlechtsorgane auf der der Erdoberfläche zugekehrten Seite.

Die Mikrosporen von *Salvinia natans*¹⁾ sind eigentlich nur die Behälter für die Spermatozoiden, während die Makrosporen dicht mit Proteinkörnern, Öl und Stärke erfüllt sind; sie enthalten gleichsam die Dottermasse für den heranwachsenden Embryo [Goebel (1)]. Die Befruchtung und nachfolgende Keimung kann schon im Februar beginnen, wenn die Pflanzen den Winter über im geheizten Zimmer gehalten werden. Die Keimpflanze schwimmt auf dem Wasser (Abb. 145). Auch die Sporen der verwandten *Pilularia* keimen leicht.

* * *

Als Studienobjekt für physiologische Beobachtungen wählen wir die Prothallien von *Aspidium (Dryopteris) filix mas* (s. Abb. 146—148).

Abb. 146. Beginn der Prothallienbildung nach der Sporenkeimung.
(Nach L. Kny.)

Um günstiges Sporenmaterial zur Anzucht von Prothallien zu erhalten, sammelt man gut entwickelte Farnwedel (Sporangien mit der Lupe prüfen!) im Freien (möglichst nicht aus Gärten), weil man auf diese Weise am sichersten gut keimfähige Sporen erhält. Man legt die Wedel auf weißes Papier und läßt die Sporen bis zum nächsten Tag von selbst ausfallen. Das eingesammelte Sporenmaterial wird dann in mit Datum versehenen Papierhüllen einige Wochen aufbewahrt. Ein eigentliches Nachreifen findet nicht statt; sie sind (nach Trocknen) ohne weiteres keimfähig. Die Keimkraft der Sporen bleibt etwas über ein Jahr erhalten.

Die Sporen werden zur Anzucht der Prothallien auf zerkleinertem, am besten durch ein Sieb von etwa 5 mm Maschenweite gesiebten Torfmull²⁾ in Saatschalen von etwa 20 cm Durchmesser und ca. 8 cm Höhe dünn ausgesät und durch Eingießen von Wasser in den Untersatz ständig feucht gehalten. Die Schale bleibt von Anfang bis zu Ende mit einer Glasscheibe bedeckt. Besteht die Gefahr einer Infektion mit *Vaucheria*, wird das Substrat vorher durch Übergießen von heißem Wasser sterilisiert.

Die Entwicklungsdauer bis zur Entstehung geschlechtsreifer Prothallien kann sich je nach der Zeit der Aussaat erstrecken vom August bis Oktober, Oktober bis Januar, Januar bis März usw. Vgl. auch Strasburger-Koernicke (1).

1) *Salvinia natans* ist eine einjährige, wurzellose Wasserpflanze. Die diöcischen Sori sitzen an den wurzelähnlichen Wasserblättern. Fundort: z. B. Potsdam-Kietz.

2) Torfmull kann aus Samenhandlungen bezogen werden.

Man kann die Prothallien auch leicht in Wasserkulturen bis zur völligen Reife ziehen [vgl. H. Fischer (1) und Abb. 148], am einfachsten unter Verwendung der Tabletten (S. 4). Man erspart dann das lästige Begießen.

Abb. 147. *Aspidium filix mas*. Entwickeltes, geschlechtsreifes Prothallium bei mittelstarker Vergrößerung. (Nach L. Kny.)

Haben die grünen Prothallien eine gewisse Reife erlangt, so pflegen sie reichlich Antheridien (σ) und Archegonien (φ) zu erzeugen, die bei *Aspidium filix mas* nicht immer auf demselben Prothallium vorhanden zu sein brauchen. [Bei *Equisetum*¹) ist die Zweihäusigkeit der Prothallien die Regel.] Die Ausbildung der Prothallien und ihrer Geschlechts-

Abb. 148. Schalen zur Kultur von Prothallien. Links: auf Torf. Der Untersatz wird mit etwas Wasser gefüllt, die Saatschale mit einer Glasscheibe bedeckt; rund $\frac{1}{8}$ nat. Größe. Rechts: auf wässriger Nährlösung; rund $\frac{1}{8}$ nat. Größe. (Original.)

1) Die Prothallien von *Equisetum* entwickeln sich ebenfalls auf Nährlösungen. Die Sporen müssen frisch (nicht eingetrocknet) sein. Vgl. auch Buchtien (1), Stahl (8).

organe ist abhängig von der Dichtigkeit der Sporenaussaat, von eventuellem Pikieren, von der Belichtung usw.; man vergleiche dazu O. Schlumberger (1).

Kurz vor der Untersuchung halte man die Kulturen nicht zu naß, weil sonst die Spermatozoiden aus den Antheridien vorzeitig ausschlüpfen können.

Zur Untersuchung nehme man ein Prothallium mit der Pinzette heraus und entferne (z. B. mittels einer Nadel) die zwischen den Rhizoiden haftenden Torfpartikelchen. Für die mikroskopische Beobachtung wird das Prothallium mit der Unterseite nach oben unter Zusatz von Wasser auf den Objektträger gebracht. Man sucht nun bei mittlerer Vergrößerung nach Geschlechtsorganen und führt dann die genauere Untersuchung bei stärkerer mikroskopischer Vergrößerung aus.

Die Geschlechtsorgane sind manchmal so häufig, daß fast eines das andere berührt; das ganze Gesichtsfeld kann bisweilen voll von Antheridien oder Archegonien sein. Im Durchschnitt pflegen sich einige Dutzend ♂ und ♀ Organe am Pro-

Abb. 149. *Aspidium filix mas*. Reifes Antheridium (♂), geöffnetes Antheridium und freies Spermatozoid bei starker Vergrößerung. (Neuzeichnung nach L. Kny.)

thallium zu finden; die männlichen Organe überwiegen aber in der Mehrzahl der Fälle die weiblichen.

Die männlichen Organe (sehr lebenszäh) sind von kugeligter Gestalt. Kurz vor der Reife sieht man deutlich die Spermatozoidmutterzellen in ihnen. Am deutlichsten erkennt man den Bau des Antheridiums, wenn dieses am Rand des Prothalliums steht und darüber hinausragt. Die schmalen, keulenförmigen Gebilde am Rande der Prothallien sind Harzdrüsen, welche mit der Fortpflanzung nichts zu tun haben. Die erwachsenen Antheridien sind farblos. Nach 5–10 Minuten wählender Berührung mit dem Präparatwasser pflegen die Spermatozoiden herauzutreten und dann sehr bald in Schrauben-(Sprungfeder-)form umherzuschwimmen. Ein gelinder Druck auf das Deckgläschen kann bisweilen das Platzen der Antheridien etwas beschleunigen. Sehr schön lassen sich die männlichen Befruchtungskörper beobachten, wenn sie vereinzelt im Antheridium zurückgeblieben sind.

Alte Antheridien sind meist braun und erscheinen wie runde Boviste mit Scheitelöffnung.

Die weiblichen Organe haben eine gedrungene wulstige Form (nicht flaschenförmige wie bei Laubmoosen, wo sie leichter zu beobachten sind) und zeigen eine schwache Krümmung. Sie pflegen den mittleren mehrschichtigen Teil des Prothalliums, gleichsam die Rippe, einzunehmen (Abb. 147). Im erwachsenen Zustande sind die Archegonien ebenso wie die Anthe-

Abb. 150. *Aspidium filix mas.* Reifes geöffnetes Archegonium (♀) in der Seitenansicht und Halszellen im optischen Querschnitt. Stark vergrößert. (Neuzeichnung nach L. Kny.)

ridien farblos; der Hals besteht, wie die mikroskopische Betrachtung lehrt, aus vier Längsreihen von Zellen, in denen die Kerne oft sehr deutlich und klar erscheinen können. Blickt man direkt von oben auf ein Archegonium, so erkennt man die charakteristische Kreuzteilung, welche zur Entstehung der Halszellen führt.

Abb. 151. *Asplenium bulbiferum.* Bei diesem paläotropischen Farn entwickeln sich auf den Wedeln Knospen, aus denen kleine Adventiv-Pflänzchen hervorgebrochen sind. (Original nach Gewächshausmaterial.)

Im gleichen Gesichtsfeld sieht man hin und wieder geschlossene und offene Archegonien nebeneinander, an letztgenannten die Mündungszellen bisweilen gerade im Stadium des Klaffens. Im Halskanal beobachtet man häufig einen meist körnigen Schleimpfropf. Das Ei im Bauchteil ist ohne Präparation nicht deutlich zu erkennen.

Abgestorbene (nicht befruchtete) Archegonien erscheinen innen braun.

Ist ein Ei durch Eindringen eines Spermatozoids in das Archegonium infolge der Anlockung durch Äpfelsäure und ihre Salze (nach W. Pfeffer, Bd. 2, S. 800) befruchtet worden, so wächst sehr bald eine junge Farnpflanze (die sporentragende Generation) heran.

Vom vegetativen Teil des Prothalliums verdienen noch die als Ausstülpungen von ziemlich beträchtlichem Durchmesser erscheinenden Rhizoiden, welche die Bodennahrung aufnehmen, Erwähnung, ebenso die in den Prothallienzellen reichlich vorhandenen Chlorophyllkörner mit ihren Teilungsstadien: rund, eiförmig, eingeschnürt, doppelscheibig.

Das Chlorophyll der Prothallien entsteht auch bei völligem Lichtabschluß, was als Anpassung an das Waldesdunkel gedeutet werden kann.

Die Prothallien eignen sich zu Dauerpräparaten in Glycerin und Glyzeringelatine.

Abb. 152. Entwicklung der Cormophyten und der Homologien ihrer Organe. Schematische Darstellung. Neuzeichnung nach R. v. Wettstein (1).

Der Generationswechsel zwischen Prothallium- und Sporenpflanze ist im allgemeinen obligatorisch, doch gibt es auch Ausnahmen. So entstehen z. B. bei *Asplenium bulbiferum* (s. die Abbild.) und bei *Cystopteris bulbifera* (s. Kerner, Bd. II, S. 33 u. 572) auf den Wedeln unter Überspringen der Geschlechtsgeneration neue Pflänzchen; vgl. auch Abb. 137.

An der Hand der Abb. 152 können wir ersehen, wie bei der Luftgeneration die Prothalliumentwicklung mehr und mehr zurückgegangen ist.

Bei den Cycadeen (und einigen mehr) sind bereits normale Pollenschläuche ausgebildet, aber in diesen entstehen noch typische Sperma-

tozoiden, wie sie Abb. 153 zeigt. Ihre Übertragung ist nicht mehr vom Meteorwasser abhängig. Bei den Blütenpflanzen endlich ist auch dieses Kennzeichen der Kryptogamen zum Verschwinden gekommen, die Biologie der Blüten aber in besonderer Weise entwickelt worden.

Abb. 153. *Zamia floridana*. Pollenschläuche mit Spermatozoiden (in Entwicklung) und frei schwimmendes, reifes Spermatozoid. Vergr. 150 $\times$.
Links: *Ginkgo biloba*, Längsschnitt durch die Samenanlage (Makrosporangium).
(Nach Coulter und Chamberlain und H. J. Webber.)

Literatur.

- Abderhalden, E. (1), Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Urban u. Schwarzenberg, 1920 u. ff. Vielbändiges reichhaltiges Nachschlagewerk.
- (2), Biochemisches Handlexikon, Bd. VII. Berlin, J. Springer, 1912.
- (3), Physiologisches Praktikum. Chemische und physikalische Methoden. Berlin, J. Springer. 2. Aufl., 1919.
- Abel, Rud. (1), Bakteriologisches Taschenbuch. Die wichtigsten technischen Vorschriften zur bakteriologischen Laboratoriumsarbeit. 20. Aufl., Würzburg 1917.
- Abel, Rud. u. Buttenberg, Paul (1), Über die Einwirkung von Schimmelpilzen auf Arsen und seine Verbindungen. Der Nachweis von Arsen auf biologischem Wege. Zeitschr. f. Hyg., Bd. 32, S. 449—490. 1899.
- Abel, R. u. Ficker, M., Einfache Hilfsmittel zur Ausführung bakteriologischer Untersuchungen. 3. Aufl., Leipzig 1921.
- Alm, Gunnar (1), Monographie der schwedischen Süßwasserostracoden. Upsala 1915.
- (2), Bodenfauna und Biologie der Fische im Yxtasee. Zugleich eine vergleichende Studie über Bodenfauna und Fischproduktion der Seen. K. Landtbruksstyrelsen, Stockholm 1922 (Schwedisch).
- Alsterberg, G., s. S. 216.
- Ambronn, H. (1), Anleitung zur Benutzung des Polarisationsmikroskops, 1892.
- Appel, O. (2), Beispiele zur mikroskopischen Untersuchung von Pflanzenkrankheiten. 3. Aufl., mit 63 Abb. Berlin, J. Springer, 1922.
- Appel u. Wollenweber (1), Grundlagen einer Monographie der Gattung *Fusarium* (Link). Arb. a. d. Biol. Anst. f. Land- u. Forstwirtschaft, Bd. VIII, 1910.
- Babiy, J. (1), Über das angeblich konstante Vorkommen von Jod im Zellkern. Ber. d. Deutschen Bot. Ges., Bd. XXXI, S. 35. 1913.
- Bade, E. (1), Die Praxis der Aquarienkunde (Süßwasseraquarium, Seewasseraquarium). Mit 185 Textabbildungen, 9 schwarzen und 1 Farbentafel. 203 Seiten. Magdeburg, Creutzsche Verlagsbuchhandlung.
- Bary, A. de (1), Vergleichende Morphologie und Biologie der Pilze, Mycetozoen und Bakterien. Leipzig 1884.
- (2), Die Erscheinung der Symbiose. Vortrag, gehalten auf der Vers. Deutsch. Naturf. u. Ärzte zu Kassel. Straßburg 1879.
- (3), Über die Ausstreuung der Sporen von *Equisetum palustre*. Bot. Ztg. 1881, Bd. XXXIX, S. 781 u. 782.
- Batschinskaja, A. (1), Über die Verbreitung des „Tee-Kwass“ und des *Bacterium xylinum* Brown. Ztschr. f. Mikrobiologie, Petersburg, Medizinische Hochschule f. Frauen, 1914, Bd. I, S. 73—85.
- Bauer, Dr. Ernst (1), Musci europaei exsiccati. Die Laubmoose Europas. Selbstverlag, Prag-Smichow, Palackygasse 43.
- Baur, E. (1), Einführung in die experimentelle Vererbungslehre. Berlin, 4. Aufl., 1919. 5. Aufl. im Druck. Hierin weitere Literatur zitiert. Vgl. dazu Baur u. Goldschmidt, Wandtafeln zur Vererbungslehre. Berlin. Vgl. auch Zeitschrift (1).
- (2), Untersuchungen über die Entwicklungsgeschichte der Flechtenapothecien. Bot. Ztg. 1904, Bd. LXII, S. 21.

- Bechhold, H., Die Kolloide in Biologie und Medizin. 2. Aufl. Dresden u. Leipzig 1919. — Vgl. Freundlich, Kapillarchemie 1922.
- Behrens, W. (1), Tabellen zum Gebrauch bei mikroskopischen Arbeiten. 4. Aufl., von E. Küster. Leipzig, S. Hirzel, 1908.
- Beijerinck, M. W. (1), Über Nachweis und Verbreitung der Glukase, das Enzym der Maltose. Cbl. Bakt. II. Abt. 1895, Bd. I, S. 222. — Vgl. Wysman (1).
- (2), Verfahren zum Nachweise der Säureabscheidung bei Mikroben. Cbl. Bakt., 1891, Bd. IX, S. 781.
- (3), Über *Spirillum desulfuricans* als Ursache von Sulfatreduktionen. Cbl. f. Bakt., II. Abt. 1895, Bd. I, S. 1.
- (4), Schwefelwasserstoffbildung in den Stadtgräben und Aufstellung der Gattung *Aerobacter*. Cbl. Bakt., II. Abt. 1900, Bd. VI, S. 193—206.
- (5), Kulturversuche mit Zoochlorellen, Lichenengonidien und anderen niederen Algen. Bot. Ztg. 1890, Bd. XLVIII, S. 725.
- Benecke, Wilh. (1), Bau und Leben der Bakterien. B. G. Teubner, 1912.
- (2), Über *Bacillus chitinovor*, einen Chitin zersetzenden Spaltpilz. Bot. Ztg. 1905. — Vgl. Hdwörterbuch, 1912, Bd. 1.
- (3), Beiträge zum Problem der Kohlensäureassimilation. Ztschr. f. Botanik, 1921, Bd. 13, S. 417—460.
- Bethge, H. (1), Das Havelplankton im Sommer 1911. Ber. d. Deutschen Bot. Ges. 1911, Bd. XXIX, S. 496—504. Vgl. auch Arch. f. Hydr. 1914.
- (2), Über die Verwendung der Planktonkammer im Unterricht. Monatshefte f. d. naturw. Unterricht 1912, Bd. V, S. 461—465.
- Biedermann, W. (1), Natur und Entstehung diastatischer Fermente. Münch. med. Wochenschr. 1920, Bd. 67, S. 1429—1431.
- Blakeslee, vgl. S. 150.
- Blaauw, A. H., vgl. Sierp.
- Blochmann, Fr. (1), Die mikroskopische Tierwelt des Süßwassers. Hamburg 1895.
- Bonner Lehrbuch (1), 1921, s. Fitting usw.
- Borodin, J. (1), Über Chlorophyllkristalle. Bot. Ztg. 1882, Bd. XL, S. 608 u. S. 622.
- (2), Über kristallinische Nebenpigmente des Chlorophylls. Mélanges biologiques du Bull. de l'Ac. Imp. des sc. de St. Pétersbourg, 1882—83, Bd. XI.
- Botkin, vgl. S. 128.
- Brandt u. Apstein, Nordisches Plankton. Von 1901—1909. 12 Lieferungen.
- Brauer, A. (1), Die Süßwasserfauna Deutschlands. Eine Exkursionsfauna in ca. 20 Hefen, 1909 u. ff. Vgl. Pascher.
- Brefeld, O. (1), Botanische Untersuchungen über Schimmelpilze, Heft 1, 1872.
- Brotherus, Müller, Ruhland u. Warnstorf, Musci (Laubmoose) in Engler-Prantl, Die natürlichen Pflanzenfamilien, Teil I, 1909.
- Bruchmann, H. (1), Über die Prothallien und die Keimpflanzen mehrerer europäischer Lycopodien. Gotha, Perthes, 1898.
- (2), Über das Prothallium und die Keimpflanze von *Ophioglossum vulgatum* L. Bot. Ztg. 1904, Bd. LXII, S. 227—248. Mit 2 Taf.
- (3), Über das Prothallium und die Sporenpflanze von *Botrychium lunaria*. Flora 1906, Bd. 96, S. 203—230. Mit 2 Taf.
- Buchner, Paul (1), Tier und Pflanze in intrazellulärer Symbiose. Berlin, Gebr. Bornträger, 1921.
- Buchtien (1), Bibliotheca botanica, 1887, Heft 8. Freiburg, Th. Fisher.
- Buder, Joh. (1), 1. Bakteriospektrogramme von Purpurbakterien. 2. Die Inversion des Phototropismus bei Phycomyces. Ber. d. Deutschen Bot. Ges., 1918, Bd. XXXVI, S. 103—105.

- (2), Aus der Biologie der Purpurbakt. — Die Naturwissenschaften, 1920. Bd. VIII, S. 261.
- (3), Neue phototropische Fundamentalversuche. Ber. d. Deutschen Bot. Ges. 1920, Bd. XXXVIII, S. 10—19. Enthält wichtige Versuche mit der „Lichtsonde“.
- Burgeff, Hans (1), Die Wurzelpilze der Orchideen. Ihre Kultur und ihr Leben in der Pflanze. Jena 1909.
- Burri, vgl. S. 117.
- Bütschli, O. (1), Protozoa in Bronns Klassen und Ordnungen d. Tierreichs. 1. Abt., 1880—1889.
- Chodat, R. (1), Algues vertes de la Suisse. 1899. Cultures pures 1913.
- Christiansen, Marie, Bibliographie von Geotropismus, Thermotropismus, Thermotaxis u. Themonastie d. Pflanzen. Mitt. a. d. Inst. f. allg. Bot. Hamburg 1918 u. 1919.
- Claussen, P. (1), Pflanzenphysiologische Versuche und Demonstrationen für die Schule, 2. Aufl. Leipzig 1910. Neuauflage in Vorbereitung.
- Cohn, F. (1), Untersuchungen über Bakterien. Beitr. z. Biologie d. Pflanzen, 1872 u. ff.
- Cooke, M. C. (1), Illustrations of british fungi. London 1881—1891.
- Correns, C. (1), Untersuchungen über die Vermehrung der Laubmoose durch Brutorgane und Stecklinge. Jena, Gustav Fischer, 1899.
- Courchet, M. L. (1), Recherches sur les chromolécites. Annales des sciences naturelles, 7. série, Botanique 1888, Band VII.
- Czapek, Fr. (1), Biochemie der Pflanzen. 2. Aufl., 1913—1921.
- (2), Zur Biologie der holzbewohnenden Pilze. Ber. d. Deutschen Bot. Ges. 1899, Bd. XVII, S. 166—170.
- Dengler, A. (1), Eine neue Methode zum Nachweis der Spaltöffnungsbewegungen bei den Koniferen. Mit 1 Tafel und 1 Textfig. Ber. d. Deutschen Bot. Ges. 1912, Bd. XXX, S. 452—462.
- Depp, N. von (1), Mittel zur Vermehrung der Daphnien (*Daphnia pulex*) für die Ernährung der Fischbrut. Blätter f. Aqu.- u. Terr.-Freunde, 1893, Bd. IV, S. 181—183.
- Detmer, W. (1), Das kleine pflanzenphysiologische Praktikum, 4. Aufl. Jena 1912.
- Diakonow, N. W., vgl. S. 148 u. 152.
- Dodel, Arnold (1), Beitrag zur Morphologie und Entwicklungsgeschichte der Stärkekörner von *Pellionia Daveauana*. Flora 1892, Bd. LXXV, S. 267—280.
- Dost, K. (1), Die Löslichkeit des Luftsauerstoffes im Wasser. Mitt. a. d. Kgl. Prüfungsanstalt f. Wasservers. u. Abwässersbes. 1906, Heft 7.
- Dunbar (1), Leitfaden für die Abwasserreinigungsfrage, 2. Aufl., 1913.
- Dutrochet, Mémoires pour servir à l'histoire des végétaux et des animaux, 1837.
- Ehrenberg, Chr. G. (1), Die Infusionstierchen als vollkommene Organismen. Mit Atlas. 1838.
- Ehrlich, F. (1), Die Pektinstoffe, ihre Konstitution und Bedeutung. Chem. Ztg., 1917, No. 28, S. 197.
- (2), Methoden zur biologischen Spaltung racemischer Aminosäuren durch lebende Organismen. Abderhalden, Hdbuch, 1922.
- Eijkman, C. (1), Die Gärungsprobe bei 46° als Hilfsmittel bei der Trinkwasseruntersuchung. Cbl. f. Bakt., II. Abt., 1913, Bd. XXXIX, S. 75—80.
- Emmerling, O. (1), Die Enzyme. In Roscoe-Schorlemmer, Lehrbuch der Chemie, IX., Organ. Chem. 1901.
- (2), Die Zersetzung stickstoffreier organischer Substanzen durch Bakterien, Braunschweig 1902.

- Engelmann, Th. W. (1), Die Erscheinungsweise der Sauerstoffausscheidung chromophyllhaltiger Zellen im Licht bei Anwendung der Bakterienmethode. Pflügers Archiv, 1894, Bd. LVII, S. 375—386.
1881 Entdeckungsjahr.
- (2), Zur Biologie der Schizomyceten. Bot. Ztg., 1882, Bd. XL, S. 321.
Bact. chlorinum scheidet O_2 aus.
- (3), Die Purpurbakterien und ihre Beziehungen zum Licht. Bot. Ztg., 1888, Bd. XLVI, S. 661.
- Engler, A. u. Gilg, E. (1), Syllabus der Pflanzenfamilien. Mit Abb. Berlin, Gebr. Bornträger, 8. Aufl., 1919.
- Engler-Prantl (1), Die natürlichen Pflanzenfamilien. Leipzig, Wilh. Engelmann, 1889—1909.
- Eriksson, Jacob (1), Die Pilzkrankheiten der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Deutsch von Grevillius. Leipzig 1913.
- Ernst, Bastardierung als Ursache der Apogamie im Pflanzenreich. Jena 1918.
- Esser, Dr. P., Das Pflanzenmaterial für den botanischen Unterricht, 2. Aufl. Verlag u. Druck von J. P. Bachem, Köln 1903.
- Euler, H. (1), Grundlagen und Ergebnisse der Pflanzenchemie, Teil 1 (1908), Teil 2 (1909) u. Teil 3, Die chemischen Vorgänge im Pflanzenkörper (1909), S. 128 ff.
- Eyferth, Schoenichen, Kalberlah (1), Einfachste Lebensformen des Tier- und Pflanzenreiches. Naturgeschichte der mikroskopischen Süßwasserbewohner, 4. Aufl., Braunschweig 1909.
- Falck, Rich. (1), Die Bedingungen u. die Bedeutung der Zygotenbildung bei *Sporodinia grandis*. Cohn's Beiträge z. Biol. d. Pfl., 1902, Bd. VIII, S. 213.
- (2), Die Merulius-Fäule des Bauholzes. Aus A. Möller, Hausschwammforschungen, 1912, Heft 6. Jena, Gust. Fischer.
- (3), Anweisung z. Edelpilzkultur (*Psalliotia campestris*). Ztschr. f. Forst- u. Jagdwesen, 1914, Heft 11, S. 639—645.
- Figdor, vgl. S. 62.
- Fischer, Alfred, Vorlesungen über Bakterien. 2. Aufl., 1903. Jena, Gustav Fischer.
- Fischer, Emil (1), Organische Synthese und Biologie, 2. Aufl. Berlin, J. Springer, 1912.
- Fischer, Hugo (1), Wasserkulturen von Farnprothallien. Beih. z. Bot. Cbl. 1911, Bd. 27, I.
- Fitting, H., Die Wasserversorgung und die osmotischen Druckverhältnisse der Wüstenpflanzen. Ztschr. f. Bot., 1911, Bd. 3, S. 209—273.
- Fitting, Jost, Schenck, Karsten (1), Lehrbuch der Botanik (früher Strasburger, Noll, Schenck u. Schimper), Jena, 15. Aufl., 1921.
- Flugblätter (1) der Biolog. Anstalt f. Land- u. Forstwirtschaft, 1905 u. ff.
- Flügge, Carl (1), Die Mikroorganismen, 2. Aufl., 1896.
- Forel, F. A. (1), Le Léman. Monographie limnologique, Bd. I (1892), Bd. II (1895), Bd. III (1902).
- Handbuch der Seenkunde. Stuttgart 1901.
- Francé, R. H. (1), Das Edaphon. Untersuchungen zur Ökologie der bodenbewohnenden Mikroorganismen. München 1913.
- Fröehlich, Herm., vgl. S. 154.
- Fünftück u. Zahlbruckner, Lichenes (Flechten). Die natürlichen Pflanzenfamilien von A. Engler. I. Teil. Leipzig, Wilh. Engelmann, 1907.
- Giesenhagen, K. (1), Lehrbuch der Botanik, 8. Aufl., 1920.
- Gillet, C. C. (1), Les champignons qui croissent en France. Paris 1878—1896.
- Glück, Hugo (1), Biologische u. morphologische Untersuchungen über Wasser- u. Sumpfgewächse. Jena 1905—1911.

- Godlewski, E. (1), Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der intramolekularen Atmung der Pflanzen. Bull. Ac. Sc. Cracovie 1904, S. 115—158.
- Goebel, K. (1), Organographie der Pflanzen. 2. Aufl., Bd. 1—3, 1913—22.
- (2), Die Entfaltungsbewegungen der Pflanzen. Ergänzungsbd. zur „Organographie der Pflanzen“. Jena 1920.
- (3), Einleitung in die experim. Morphologie d. Pflanzen. Naturw. u. Technik, Leipzig u. Berlin, 1908.
- Goethe (1), Mit einem Blatt von Bryophyllum calycinum. Gedichte an M. v. Willemer, 1826 u. 1830.
- Goppelsroeder, Friedr. (1), Kapillaranalyse. Mit 59 Tafeln. Basel 1901. Vgl. Kolkwitz, Pflanzenforschung, 1922.
- Gradmann, H. (1), Die Bewegungen der Windepflanzen. Ztschr. f. Botanik, 1921, Bd. 13, S. 337—393.
- Grafe, Victor, Ernährungsphysiol. Praktikum höherer Pflanzen. Berlin, P. Parey, 1914.
- Gramberg, E., Pilze der Heimat. Schmeils naturwissenschaftliche Atlanten, 2 Bände. Leipzig, Quelle u. Meyer, 3. Aufl., 1921.
- Granvik, vgl. S. 236.
- Grimme, A. (1), Über die Blütezeit deutscher Laubmoose und die Entwicklungsdauer ihrer Sporogone. Hedwigia, 1903, Bd. XLII, S. 1—75.
- Grosse-Bohle, H. (1), Untersuchungen über den Sauerstoffgehalt des Rheinwassers. — Mitt. aus der Landesanst. f. Wasserhygiene, 1906, Heft 7.
- Grüß, J. (1), Biologie und Kapillaranalyse der Enzyme. Berlin, Gebr. Bornträger, 1912.
- Günther, Carl (1), Einführung in das Studium der Bakteriologie, 6. Aufl., 1906.
- Guttenberg, H. v. (1), Die Bewegungserscheinungen im Pflanzenreich. Kultur d. Gegenwart, 1917, 4. Abt., Bd. III, S. 153—280.
- (2), Wachstum u. Entwicklung der Pflanze. Kultur d. Gegenwart, 1917, 4. Abt., Bd. III, S. 126—152.
- Haberlandt, G. (1), Physiologische Pflanzenanatomie, 5. Aufl., Leipzig 1918.
- (2), Die Entwicklungserregung der Eizellen einiger parthenogenetischer Kompositen. Sitzb. d. Akad. d. Wiss., Berlin 1921, Bd. LI, S. 861—881. Vgl. auch 1920.
- (3), Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Laubmoose. Pringsheims Jahrb., 1886, Bd. XVII, S. 359—498.
- Handwörterbuch (1), der Naturwissenschaften. 10 Bde. Jena 1912—1915.
- Hansteen-Cranner, B. (1), Zur Biochemie und Physiologie der Grenzschichten lebender Pflanzenzellen. Meldinger fra Norges Landbrukshoiskole, Christiania 1922, Bd. II, S. 1—160. Vgl. auch Pringsh. Jahrb., 1914 u. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges., 1919.
- Hartig, Rob. (1), Lehrbuch der Baumkrankheiten. Mit 11 Tafeln. Berlin 1882.
- Hartig, Th., Anatomie u. Physiologie der Holzpflanzen, 1878.
- Hayrén, vgl. S. 181 u. 199.
- Hedwig, Johann (1), Species muscorum frondosorum. 6 Bände mit 325 farbigen Tafeln. Supplemente von Prof. Fr. Schwägrichen. Leipzig 1801—1842.
- Heering, W. (1), Die Süßwasseralgen Schleswig-Holsteins, 2. Teil. Chlorophyceae. Hamburg, L. Gräfe u. Sillem, 1907. Vgl. Pascher.
- Heim, Ludwig (1), Lehrbuch der Bakteriologie, 5. Aufl., Stuttgart, Ferd. Enke, 1918. Vgl. S. 115.
- Heinricher, E. (1), Die Aufzucht und Kultur der parasitischen Samenpflanzen. Jena 1910.
- (2), Methoden der Aufzucht und Kultur der parasitischen Samenpflanzen. Abderhaldens Hdb. d. biolog. Arbeitsmethoden, 1921, Abt. XI, Lfg. 50.

- Henneberg, Gärungsbakteriologisches Praktikum und Pilzkunde. Verlag Parey.
- Hennings, P. (1), Hymenomycetinae. In Engler-Prantl, Natürliche Pflanzenfamilien, I. Teil, Abt. 1**, S. 105, 1900.
- Hentzschel. Vgl. S. 214.
- Herpell, G. (1), Das Präparieren und Einlegen der Hutzpilze für das Herbarium. Verh. d. naturhist. Vereins d. preuß. Rheinlande und Westfalens, 37. Jahrg., 4. Folge 7. Jahrg., Bonn 1880. Vgl. auch Lindau (4).
- Herter, W. (1), Pilze. Kryptogamenflora d. Mark Brandenburg, Bd. VI. Berlin, Gebr. Bornträger, 1910 u. ff.
- Herzfeld u. Paetow (1), Über die Anwendbarkeit der Fluorverbindungen zur Verhinderung der Invertzuckerbildung in Zuckersirupen. Ztschr. f. Zuckerindustrie, 1891, Bd. XLI, S. 678.
- Herzog u. Jancke, Über den physikalischen Aufbau einiger hochmolekularer organischer Verbindungen. Ber. d. Deutsch. Chem. Ges., 1920, Jahrg. 53, S. 2162—2164.
- Heymons, Kolkwitz, Lindau, P. Magnus, Ulbrich (1), Richtlinien zur Untersuchung der Pflanzen- und Tierwelt, besonders in Naturschutzgebieten. Conventz, Naturdenkmäler, Heft 1. Berlin, Gebr. Bornträger, 1913.
- Hillmann, Joh. (1), Beiträge zur Systematik der Flechten. Annales mycologici. Berlin 1920. Formenkreis von Xanthoria (Schattenpfl., Lichtpfl.).
- Höber, R., Physikalische Chemie der Zelle und der Gewebe. 4. Aufl., 1914.
- Jaeger, H. (1), Die Bakteriologie des täglichen Lebens. In 18 gemeinverständlichen Vorträgen. Hamburg 1909.
- Jahn, E. (1), Myxomycetenstudien. Die Keimung der Sporen. Ber. d. Deutschen Bot. Ges. 1905, Bd. XXIII, S. 489—497. Bis 1920.
- Janzen, P. (1), Die Jugendformen der Laubmoose und ihre Kultur. 35. Ber. d. Westpr. Bot.-Zool. Vereins. Danzig 1912.
- (2), Funaria hygrometrica. Ein Moosleben in Wort und Bild. Schriften d. Naturf. Ges., Danzig 1909, Bd. XII.
- Jngen-Houss (1), Versuche mit Pflanzen. Deutsch von Scherer, Wien 1788.
- Johan-Olsen (Sopp) (1), Monographie der Pilzgruppe Penicillium. Skrifter utgit av Videnskaps-Selskapet i Kristiania 1912. Kristiania 1913, Bd. I, No. 11. Math.-naturw. Klasse.
- Johannsen, W. (1), Elemente der exakten Erblchkeitslehre. 2. Aufl., Jena 1913.
- Johnstone u. Croell (1), The Nature printed British Sea Weeds. London 1859—1860.
- Jollos (1), Archiv f. Protistenkunde, 1921.
- Jost, L. (1), Vorlesungen über Pflanzenphysiologie, 3. Aufl., Jena 1913. Neuauf. im Druck.
- Junge, Fr. (1), Der Dorfteich als Lebensgemeinschaft. Kiel 1885.
- Kähler, K., Staubmessungen in Potsdam, auf dem Brocken und auf der Schneekoppe. Veröff. d. Preuß. Meteorol. Inst. 1912, S. 137—148.
- Kamerling (1), Der Bewegungsmechanismus der Lebermooselateren. Flora 1898.
- Kayser, H. (1), Handbuch der Spectroskopie, Bd. IV. Leipzig, S. Hirzel, 1908.
- Keil, Friedr. (1), Beiträge zur Physiologie der farblosen Schwefelbakterien. Beitr. z. Biol. d. Pflanzen, 1912, Bd. XI, S. 335—372.
- Kerner v. Marilaun (1), Pflanzenleben, 2. Aufl., 1896—1898, 3. Aufl., 1913/14.
- Kienitz-Gerloff, F. (1), Botanisch-mikroskopisches Praktikum. Leipzig 1910.
- Kirchner, O. (1), Die mikroskopische Pflanzenwelt des Süßwassers, 2. Aufl., 1891.
- Kirchner, Loew u. Schroeter, Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas, 1906, Bd. I u. ff.
- Kisskalt u. Hartmann (1), Praktikum der Bakteriologie und Protozoologie, 1. Teil: Bakteriologie, 2. Teil: Protozoologie, 3. Aufl., 1915.

- Klebahn, H. (1), Ber. d. Deutschen Bot. Ges., 1883 u. Jenaische Ztschr. f. Nat.-wiss., 1884.
- (2), Grundzüge der allgemeinen Phytopathologie. Berlin, Gebr. Bornträger, 1912.
- (3), Uredineae. Kryptogamenflora d. Mark Brandenburg, Bd. Va, 1913.
- Klebs, G. (1), Über das Verhältnis der Außenwelt zur Entwicklung der Pflanzen. Sitzungsber. d. Heidelberger Akad. d. Wiss., math.-naturw. Klasse, 1913.
- (2), Die Bedingungen der Fortpflanzung bei einigen Algen und Pilzen. Jena 1896.
- (3), Zur Physiol. d. Fortpflanzung einiger Pilze. Pringsh. Jahrb., 1898, Bd. XXXII, S. 1 und Bot. Ztg., 1902, S. 177.
- Klein, Jos. (1), Organische Chemie, 3. Aufl. Sammlung Göschen, Leipzig 1905.
- Klein, L. (1), Gift- u. Speisepilze. Verlag Carl Winter, Heidelberg 1921.
- Klut, Hartwig (1), Untersuchung des Wassers an Ort und Stelle. Mit 30 Textfiguren. 4. Aufl. Berlin, J. Springer, 1922.
- Knauer-Hollrung (1), Der Rübenbau. Thaer-Bibliothek, 1906, 9. Aufl.
- Knauthe, Karl (1), Das Süßwasser, Chemische, biologische und bakteriologische Untersuchungsmethoden. Vom fischereilichen Standpunkt aus geschrieben. Neudamm 1907.
- Kniep, H. (1), Über morphologische u. physiologische Geschlechtsdifferenzierung. Verh. d. Physikal.-med. Ges. zu Würzburg 1919. — Vgl. auch 1922.
- Kniep, H. u. Minder, F. (1), Über den Einfluß verschiedenfarbigen Lichtes auf die Kohlensäureassimilation. Ztschr. f. Bot., 1909, Bd. I, S. 619—650.
- Knoll, F. (1), Über die Abscheidung von Flüssigkeit an und in den Fruchtkörpern verschiedener Hymenomyceten. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges., 1912, Bd. XXX, S. (36)—(44).
- Kny, L. (1), Botanische Wandtafeln mit erläuterndem Text. Berlin 1874—1906. Enthält auch zahlreiche physiologische Angaben.
- Kolkwitz, R. (1), Pflanzenphysiologische Versuche zu Übungen im Winter. Potoniés Naturwissenschaftl. Wochenschr., 1899, Bd. XIV, No. 5—8.
- (2), Pflanzenphysiologie in Einzeldarstellungen (No. 1—10). „Aus der Natur“, Leipzig, Quelle u. Meyer, 1919—1921, Bd. XVI u. XVII. Vgl. Pflanzenforschung 1922.
- (3), Über das Schicksal des Chlorophylls bei der herbstlichen Laubverfärbung. Ber. d. Deutschen Bot. Ges., 1919, Bd. XXXVII, S. 2—5.
- (4), Die künstliche Zelle. Ber. d. Deutschen Bot. Ges., 1920, Bd. XXXVIII, S. 136—140.
- (5), Über die Atmung der Gerstenkörner. Bl. f. Gersten-, Hopfen- u. Kartoffelbau, Nov. 1901. Vgl. auch Ber. d. Deutschen Bot. Ges., 1901, Bd. XIX, S. 285.
- (6), Schizomycetes, Spaltpilze, Bacteria. Kryptogamenfl. d. Mark Brandenburg, 1909, Bd. V, S. 1—186.
- (7), Über den durch Hefegärung entstehenden Druck. Ber. d. Deutschen Bot. Ges., 1921, Bd. XXXIX, S. 219—223.
- (8), Beiträge zur Biologie der Florideen. Wissensch. Meeresunters., 1900, Bd. IV, Abt. Helgoland, S. 31—62.
- (9), Quantitative Studien über das Plankton des Rheinstroms, von seinen Quellen bis zur Mündung. Berlin, Hirschwald, 1912. Mitt. a. d. Preuß. Landesanst. f. Wasserhygiene, Heft 16 u. Ber. d. Deutschen Bot. Ges., 1912, Bd. XXX, S. 205.
- (10), Die Farbe der Seen und Meere. Deutsche Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspflege, 1910, Bd. XLII, S. 305—317.
- Kolkwitz, Reichle, Schmidtman, Spitta, Thumm (1), Wasser und Abwasser. Mit 111 Abb. u. 3 farb. Tafeln. Leipzig, S. Hirzel, 1911. Vgl. auch Rubner, Handb. Neuauflage im Druck.
- Kolkwitz u. Thiesing, Chemische und biologische Untersuchungen über Talsperrren. Mit 112 Abb. im Text u. 11 Tafeln. Berlin, Aug. Hirschwald, 1911.

- Kolkwitz, R. u. Marsson, M. (1), Ökologie der pflanzlichen Saprobien. Ber. d. Deutschen Bot. Ges., 1908, Bd. XXVIa, S. 505—519.
- (2), Ökologie der tierischen Saprobien. Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie, 1909, Bd. II, S. 126—152.
- König, J. u. Bömer, A. (1), Chemie der menschl. Nahrungs- u. Genußmittel. 4. Aufl., 2 Bde. Berlin, Jul. Springer, 1903—1904.
- Krabbe, G. (1), Entwicklungsgeschichte und Morphologie der polymorphen Flechtengattung *Cladonia*. Leipzig 1891.
- Kraus-Uhlenhuth (1), Handb. d. mikrobiologischen Technik. Urban u. Schwarzenberg, 1922 u. ff.
- Krüger, W. (1), Das Zuckerrohr und seine Kultur. Magdeburg u. Wien 1899.
- Krümmel, O. (1), Handb. d. Ozeanographie, 1907—1911, 2 Bde., 2. Aufl.
- Kruse, W. (1), Allgemeine Mikrobiologie. Leipzig 1910.
- Kuckuck, P. (1), Der Strandwanderer. München, J. F. Lehmann, 1905.
- Kühn, A. (1), Anleitung zu tierphysiol. Grundversuchen. Leipzig 1917.
- Kühner, H., 100 pflanzenphysiologische Versuche. Reutlingen 1921.
- Küster, E. (1), Lehrbuch der Botanik f. Mediziner. Leipzig 1920.
- (2), Anleitung zur Kultur der Mikroorganismen. Leipzig, B. G. Teubner, 3. Aufl., 1921.
- (3), Die Gallen der Pflanzen. Mit 158 Abb. Leipzig 1912.
- Kylin, H. (1), Über die Farbe der Florideen u. Cyanophyceen. Svensk Botanisk Tidskrift, 1912, Bd. VI, S. 532—544.
- Lafar, Franz (1), Handbuch der Technischen Mykologie. 5 Bde., 1904 ff.
- Lampert, Kurt (1), Das Leben der Binnengewässer. Leipzig 1910 ff. Erscheint neu.
- Leclerc du Sablon (1), Recherches sur la germination des graines oléagineuses. Revue générale de Botanique, 1885, p. 150.
- (2), Recherches sur la dissémination des spores chez les cryptogames vasculaires. Ann. d. sc. nat., 1895, VII. sér., Tome II.
- Leduc, St. (1), Das Leben in seinem physikalisch-chemischen Zusammenhang. Deutsch von A. Gradenwitz. Halle a. S. 1912. Vgl. auch Prometheus, 1917, Bd. XXVIII, S. 795 u. 811.
- Lee, A. B. u. Mayer, Paul (1), Grundzüge der mikroskopischen Technik, 3. Aufl. Berlin, Friedländer u. Sohn, 1907.
- Legahn, A., Physiologische Chemie (Assimilation u. Dissimilation). Sammlung Göschen, No. 240 u. 241, 1919.
- Lehmann, K. B. u. Neumann, R. O., Atlas und Grundriß der Bakteriologie, 5. Aufl. München, Verlag von J. F. Lehmann, 1912.
- Leick, Erich (1), Untersuchungen über die Blütenwärme der Araceen. Greifswald, Bruncken u. Co., 1910.
- (2), Die Temperatursteigerung der Araceen als blütenbiologische Anpassung. Greifswald, Jul. Abel, 1911.
- (3), Beiträge z. Wärmephänomen der Araceenblütenstände. Mitt. d. naturw. Vereins f. Neuvorpommern u. Rügen, 1921, Bd. 48.
- Lemmermann, E. (1), Algen. Kryptogamenflora der Mark Brandenburg, 1910 u. ff.
- Leunis, Joh. (1), Synopsis der Pflanzenkunde. 3. Aufl. von A. B. Frank, Hannover 1886, Bd. III.
- Lieske (1), Jahrb. f. wiss. Bot., 1911, Bd. 49, S. 91. — Cbl. Bakt. 1919, Bd. 49.
- (2), Morphologie und Biologie der Strahlenpilze (Actinomyceten). Berlin 1921.
- Lilienfeld, Maurice (1), Über den Chemotropismus der Wurzeln. Beih. z. Bot. Zbl., 1905, Bd. XIX, Abt. 1, Heft 1, Originalarbeiten.
- Limpricht, K. G. (1), Die Laubmoose Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Leipzig 1885—1904.
- Lindau, G. (1), Hilfsbuch für das Sammeln parasitischer Pilze. Berlin, Gebr. Bornträger, 1901.

- (2), Aus der Sammlung: Kryptogamenflora f. Anfänger. Berlin, Jul. Springer, 1912—1914.
- (3), Fungi imperfecti in Engler-Prantl, Die natürlichen Pflanzenfamilien, I. Teil, 1900.
- Linde, P. (1), Zur Kenntnis von *Cladothrix dichotoma* Cohn. Cbl. Bakt., II. Abt., 1913, Bd. XXXIX, S. 369—394.
- Lindemann, E. (1), Unters. über Süßwasserperidineen und ihre Variationsformen. Arch. f. Naturgeschichte, 1918, Bd. LXXXIV, S. 121—194.
- Lindner, P. (1), Mikroskopische Betriebskontrolle in den Gärungsgewerben, 5. Aufl., 1909. Dazu Atlas, 2. Aufl., 1910.
- (2), Atlas der mikroskopischen Grundlagen der Gärungskunde, 2. Aufl., 1910.
- Lindroth, Ivar (1), Beiträge zur Kenntnis der Zersetzungserscheinungen des Birkenholzes. Naturw. Zeitschr. f. Land- u. Forstwirtsch. von v. Tubeuf, 1904, Bd. II, S. 393—406.
- Linsbauer, L. u. K., Vorschule der Pflanzenphysiologie. Wien, 2. Aufl., 1911.
- Lintner (1), Stärke. Muspratt's Handbuch der technischen Chemie. 4. Aufl., 1900, Bd. VII, S. 1882—2019.
- Lippmann, E. v. (1), Die Chemie der Zuckerarten, 3. Aufl. Braunschweig 1904.
- Lister, A. u. G. (1), A monograph of the Mycetozoa, 2. Aufl. London 1911.
- Löhnis, F. (1), Landwirtschaftlich-bakteriologisches Praktikum, 2. Aufl. Berlin 1920.
- Loeske, Leop. (1), Zur Morphologie und Systematik der Laubmoose. Berlin, Verlag von Max Lande, 1910.
- (2), Die Moosvereine im Gebiete der Flora von Berlin. Abh. d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenburg, 1900, Bd. XLII, S. 75—164.
- Lohmann, K. (1), Über das Nannoplankton und die Zentrifugierung kleinster Wasserproben zur Gewinnung desselben in lebendem Zustande. Internat. Rev. d. ges. Hydrobiol. u. Hydrographie, 1911, Bd. IV, Heft 1. Vgl. ferner: Untersuchungen zur Feststellung des vollständigen Gehaltes des Meeres an Plankton. Wissenschaftl. Meeresuntersuchungen, Abt. Kiel, 1908, Bd. X, S. 131—370.
- Lohnstein, Theod. (1), Über Gärungs-Saccharometer. Münch. med. Wochenschrift, 1899, Bd. XLVI, S. 1671—1675. D.R.G.M. No. 119945.
- Lorch, Wilh. (1), Die Laubmoose. Mit 265 Figuren im Text. Berlin, Jul. Springer, 1913. Aus G. Lindau, Kryptogamenflora f. Anfänger, Bd. V.
- Maereker-Delbrück (1), Spiritusfabrikation, 8. Aufl. Berlin, Parey, 1903.
- Magnus, W., vgl. Kny, Wandtafel 116 u. 117.
- Marchal, El. u. Em. (1), Aposporie et sexualité chez les mousses. Bull. Acad. Royale de Belgique, 1907—1912.
- Marsson, M. (1), Die Bedeutung der Flora und Fauna der natürlichen Gewässer für ihre Reinhaltung sowie ihre Beeinflussung durch Abgänge von Wohnstätten und Gewerben. Mitt. a. d. Prüfungsanstalt f. Wasservers. u. Abwässerbes., 1910, Heft 14.
- Mathuse, Otto (1), Bau und Lebenstätigkeit der Pflanzen. Wissenschaftl. Beil. z. 10. Jahresh. des Jahn-Realgymn. zu Boxhagen-Rummelsburg. Ostern 1912.
- Matzdorff, C. (1), Biologie. Mit 300 Abb. im Text, 18 ein- und mehrfarbigen Tafeln und 3 farbigen Karten. Breslau, F. Hirt, 1910.
- Meisenheimer, Joh., Geschlecht u. Geschlechter im Tierreiche. Bd. I. Die natürlichen Beziehungen. Jena 1921.
- Mendel, Gregor, Ostwalds Klassiker, 1901, No. 121.
- Merz, Alfr. (1), Berliner Seenstudien und Meeresforschung. Zeitschr. d. Ges. f. Erdkunde, 1912.
- (2), Die schottische Seenforschung. Zeitschr. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin, 1912. No. 8.

- Mesnard, M. Eugène (1), Recherches sur la formation des huiles grasses. Ann. d. sc. nat., 7. sér., 1893, Tome XVIII.
- Meyer, A. (1), Analyse der Zelle. Bd. I u. II. Jena 1920 u. ff.
- (2), Erstes mikroskopisches Praktikum, 3. Aufl. Jena 1915.
- (3), Die Zelle der Bakterien. Jena 1912.
- (4), Praktikum der botanischen Bakterienkunde. Jena 1903.
- Mez, C. (1), Mikroskopische Wasseranalyse, 1898.
- Michael, Edm. (1), Führer für Pilzfreunde, 6. Aufl. Zwickau 1917—1919.
- Miehe, H. (1), Die Selbsterhitzung des Heus. Jena 1907.
- Migula, W. (1), Kryptogamen-Flora. Tafelwerk. 6 Bde. Verlag von Köhler, Gera, 1904 u. ff.
- Mikrokosmos, Zeitschr. f. prakt. Arbeit auf d. Gebiet d. Naturwissenschaften. Stuttgart.
- Minden, M. v. (1), Chytridiineae in Kryptogamenfl. der Mark Brandenburg, 1911 u. ff., Bd. V, S. 445—456.
- Miyoshi, vgl. S. 137.
- Molisch, H. (1), Pflanzenphysiologie als Theorie der Gärtnerei, 3. Aufl. Jena 1920.
- (2), Mikrochemie der Pflanzen, 2. Aufl. Jena 1921.
- (3), Leuchtende Pflanzen. Eine physiolog. Studie. 2., verm. Aufl. Jena, G. Fischer, 1912. Vgl. M. Reutter, Prometheus, 1919—1920, Bd. XXXI, S. 6.
- (4), Die Eisenbakterien. Jena, G. Fischer, 1910.
- (5), Die Purpurbakterien. Jena 1907.
- (6), Das Warmbad als Mittel zum Treiben der Pflanzen. Jena, G. Fischer, 1909.
- Möller, A. (1), Hausschwammforschungen. Jena 1907—1913 u. ff.
- (2), Über die Kultur flechtenbildender Ascomyceten ohne Algen. Unters. a. d. Bot. Inst. Münster i. W., 1887.
- (3), Über eine Thelephoree, welche die Hymenolichenen: *Cora*, *Dictyonema* und *Laudatea* bildet. Flora, 1893, Bd. LXXVII, S. 254—278.
- Moewes, F. (1), Die Mistel. Vorträge u. Aufsätze über Naturdenkmäler. Bd. II, Heft 16 u. 17. Berlin, Gebr. Bornträger, 1918.
- Monteverde, N. A. (1), Das Absorptionsspektrum des Chlorophylls. Acta Horti Petropolitani, 1893, Bd. XIII, No. 9, S. 123.
- Müller, Karl (1), Über Anpassungen der Lebermoose an extremen Lichtgenuß. Ber. d. Deutschen Bot. Ges., 1916, Bd. XXXIV.
- Müller, Karl Otto (1), Untersuchungen z. Entwicklungsphysiologie des Pilzmycels. Beitr. z. wiss. Bot. Berlin 1922.
- Müller, Otto (1), Abh. über Kieselalgen in Englers Bot. Jahrb., 1903—1910 u. Ber. d. Deutschen Bot. Ges., Bd. I—XIX.
- Münch, Ernst (1), Untersuchungen über Immunität und Krankheitsempfänglichkeit der Holzpflanzen. Naturw. Zeitschr. f. Land- u. Forstwirtschaft. von v. Tubeuf, 1909, Bd. VII, S. 54 ff.
- Muspratt's Chemie (1), Braunschweig 1900, Bd. VII, S. 1882: Stärke.
- Nabokich, A., Wie die Fähigkeit der höheren Pflanzen zum anaëroben Wachstum zu beweisen u. zu demonstrieren ist. Ber. d. Deutschen Bot. Ges., 1901, Bd. XIX, S. 222—236.
- Nadson, G. A., vgl. S. 203.
- Naegeli, C. v. (1), Untersuchungen über niedere Pilze, 1882.
- Nathanson, A. (1), Der Stoffwechsel der Pflanzen. Leipzig 1910.
- (2), Allgemeine Botanik. Leipzig 1912.
- Naumann, Einar (1), Über die Ursachen einer braunen Färbung des Wassers in einem Teiche der Fischereiversuchsstation Aneboda in Südschweden. Internat. Rev. d. ges. Hydrobiol., 1913.
- (2), Über das Neuston des Süßwassers. Biol. Cbl., 1917, Bd. XXXVII, S. 98—106.

- (3), Über einige besonders auffallende Hochproduktionen aus Nannoplankton im Süßwasser. Ber. d. Deutschen Bot. Ges., 1919, Bd. XXXVII, S. 40—50.
- (4), Einige Grundlinien der regionalen Limnologie. Lund u. Leipzig 1921.
- vgl. S. 181—243.
- Nawaschin (1), Über die Sporenausschleuderung bei den Torfmoosen. Flora 1897, Bd. 83, S. 151.
- Neger, Fr. W. (1), Biologie der Pflanzen auf experimenteller Grundlage. Stuttgart 1913.
- Die Krankheiten unserer Waldbäume. Stuttgart 1919.
- Némec, B., Studien über die Regeneration. Berlin, Gebr. Bornträger, 1905.
- Das Problem der Befruchtungsvorgänge. Berlin, Gebr. Bornträger, 1910.
- Nestler, A., vgl. S. 127.
- Neuberg, C. (1), Die Vorführung der Acetaldehydstufe bei der alkoholischen Gärung im Vorlesungsversuch. Zeitschr. f. Bot., 1919, Bd. XI, S. 180—186.
- Neuberg u. Reinfurth (1), Die Festlegung der Aldehydstufe bei der alkoholischen Gärung. Biochem. Ztschr., 1918, Bd. LXXXIX, S. 365—414 u. 1920, Bd. CVI.
- Nitardy, E. (1), Zur bildlichen Darstellung des Kammerplanktons. Mitt. a. d. Landesanst. f. Wasserhyg., 1913, Heft 17.
- Nordqvist, H., vgl. S. 219 u. 244.
- Nußbaum, M., Karsten, G., Weber, M., Lehrbuch der Biologie für Hochschulen. Leipzig, W. Engelmann, 1911.
- Oels, Dr. Walter, Pflanzenphysiologische Versuche, für die Schule zusammengestellt, 2. Aufl. Braunschweig, Vieweg u. Sohn, 1907.
- Ohlmüller, W. u. Spitta, O. (1), Die Untersuchung und Beurteilung des Wassers und des Abwassers, 4. Aufl. Berlin 1921.
- Ohmann, O. (1), a) Aus der Natur, 1915; b) Natur u. Schule, 1915; c) Ztschr. f. biol. Technik u. Methodik. Leipzig, Joh. Ambros. Barth, 1914.
- Oltmanns, Fr., Morphologie und Biologie der Algen. Jena, G. Fischer, 1904, Bd. I; 1905, Bd. II. — Neuauflage im Druck.
- Omelianski, vgl. S. 129. — Onslow, S. 143.
- Oppenheimer, Carl (1), Die Fermente und ihre Wirkungen. 4. Aufl. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1913.
- Ostenfeld, C. H. (1), Das Plankton der dänischen Meere. Mém. de l'Acad. Royale des sc. et des lettres de Danemark. Kopenhagen 1913.
- Osterwald, K. (1), Neue Beiträge zur Moosflora von Berlin. Zugleich ein Verzeichnis sämtlicher im Umkreis von 7 Meilen um Berlin bisher beobachteten Moose. Verh. d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenburg, 1908, Bd. XL, S. 23—48.
- Palladin, W. (1), Pflanzenphysiologie. Bearbeitet auf Grund der 6. russischen Auflage. Deutsch bei Jul. Springer, Berlin 1911.
- Pascher, A. (1), Die Süßwasserflora Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Jena, G. Fischer, 1913 u. ff.
- Pasteur, L. (1), Die in der Atmosphäre vorhandenen organisierten Körperchen. Prüfung der Lehre von der Urzeugung, 1862. Ostwalds Klassiker, No. 39.
- (2), Etudes sur la bière. Paris 1876.
- Paul, H. (1), Die Kalkfeindlichkeit der Sphagna und ihre Ursache, nebst einem Anhang über die Aufnahmefähigkeit der Torfmoose für Wasser. Mitt. Bayr. Moorkulturanst., 1908, No. 2.
- Penck, Morphologie der Erdoberfläche, 1894.
- Perrin, J. (1), Die Brownsche Bewegung und die wahre Existenz der Moleküle. Dresden 1910. Vgl. auch Schütt, Naturw. Wochenschr., 1918, S. 321.
- Pfeffer, W. (1), Pflanzenphysiologie. 2 Bde. Leipzig 1897, 1904.
- (2), Osmotische Untersuchungen. Studien z. Zellmechanik. Leipzig 1877.

- (3), I. Über Aufnahme u. Ausgabe ungelöster Körper. II. Zur Kenntnis der Plasmahaut und der Vakuolen. Abh. d. math.-physikalischen Klasse der Sächs. Ges. der Wiss. Leipzig 1890, S. 129—344.
- Pflüger, E. F. W., Über die physiologische Verbrennung in den lebenden Organismen. Arch. f. d. ges. Physiologie, Bonn 1875, Bd. X, S. 251.
- Pictet, A. (1), Helv. Chim. Acta, 1918, Bd. 1, S. 87.
- Pleißner, vgl. S. 232.
- Plümcke, O. (1), Zur Biologie mecklenburgischer Gewässer. Arch. f. Hydrobiologie u. Planktonkunde, Bd. IX, 1913/14.
- Postels u. Ruprecht, vgl. S. 203.
- Potonié, H. (1), Die Entstehung der Steinkohle und der Kaustobiolithe überhaupt wie des Torfs, der Braunkohle, des Petroleums usw., 5. Aufl., 1910.
- (2), Eine Landschaft der Steinkohlenzeit. Erläuterung zu der Wandtafel. Leipzig, Gebr. Bornträger, 1899.
- Prantl-Pax (1), Lehrbuch der Botanik, 13. Aufl. Leipzig 1909.
- Pringsheim, Ernst G. (1), Die Kultur von Wurzeln auf Löschpapier als physiologisches Hilfsmittel. Ztschr. f. biolog. Technik u. Methodik, 1911, 1911, Bd. II, S. 119—125. Leipzig, Joh. Ambros. Barth.
- (2), Die Reizbewegungen der Pflanzen. Berlin, Jul. Springer, 1912.
- (3), Kulturversuche mit chlorophyllführenden Mikroorganismen. Beitr. z. Biologie d. Pflanzen, 1912, Bd. XI.
- (4), Zur Physiologie von *Polytoma uvella*. Ber. d. Deutschen Bot. Ges., 1920, Bd. XXXVIII, S. (8).
Vgl. auch Beitr. z. allg. Bot., 1921, Bd. II, S. 88.
- Pringsheim, Hans (1), Über die Vergärung der Zellulose durch thermophile Bakterien. Cbl. f. Bakt., II. Abt., 1913, Bd. XXXVIII, S. 513—516.
- (2), Die Variabilität der niederen Organismen. Eine deszendenztheoretische Studie. Berlin, J. Springer, 1910.
- Pringsheim, N. (1), Über Sprossung der Moosfrüchte und den Generationswechsel der Thallophyten. Jahrb. f. wissensch. Bot., Bd. XI, 1877.
- Prowazek, S. v., Einführung in die Physiologie der Einzelligen (Protozoen). B. G. Teubner, 1910.
- Raulin (1), Etudes chimiques sur la végétation. Ann. d. sc. nat., 5. sér., 1869, Tome XI, p. 201.
- Regnard, P., La vie dans les eaux. Paris, G. Masson, 1891.
- Reinke, J. (1), Die optischen Eigenschaften der grünen Gewebe und ihre Beziehungen zur Assimilation des Kohlenstoffs. Ber. d. Deutschen Bot. Ges., 1883, Bd. 1, S. 395—425.
- (2), Notiz über das Wachstum anorganischer Zellen. Bot. Ztg., 1875, Bd. XXXIII, S. 425—437.
- Rexhäuser, L. (1), Über die Bedeutung d. ektotrophen Mykorrhiza für die höheren Pflanzen. Diss. Halle 1920. Beitr. z. Biol. d. Pfl., 1920, Bd. XL, S. 19—59.
- Rhumbler (1), Methodik der Nachahmung von Lebensvorgängen durch physikalische Konstellationen. Abderhaldens Handb. d. biolog. Arbeitsmethoden, 1921, Heft 33.
- Richter, O. (1), Die Ernährung der Algen. Monographien u. Abhandlungen z. Int. Rev., 1911.
- (2), Reinkulturen der Diatomeen. Ber. d. Deutschen Bot. Ges., 1903, Bd. XXI, S. 493—506.
- Ricken, Adalbert (1), Die Blätterpilze (Agaricaceae) Deutschlands usw. Leipzig, Osw. Weigel, 1910—1915.
- (2), Vademecum für Pilzfreunde. 2. Aufl. Leipzig 1919.
- Roux, W., Terminologie der Entwicklungsmechanik der Tiere und Pflanzen. Leipzig 1912.

- Rubner, v. Gruber u. Ficker (1), Handbuch der Hygiene. Leipzig, S. Hirzel, 1911, Bd. II, 2. Abt. Wasser u. Abwasser.
- Rühe, F. E. (1), Monographie der Daphniden Deutschlands und der benachbarten Gebiete. 4^o. Leipzig 1912. W. Klinkhardt.
- Ruhland, W. (1), Untersuchungen über den Kohlenhydratstoffwechsel von *Beta vulgaris* (Zuckerrübe). Jahrb. f. wiss. Bot., 1911, Bd. L, S. 200—257.
- Rümpler, A. (1), Die Nichtzuckerstoffe der Rüben. Braunschweig 1898.
- Saare, O. (1), Die Fabrikation der Kartoffelstärke. Berlin, Jul. Springer, 1897.
- Sachs, Jul. (1), Handbuch der Experimental-Physiologie der Pflanzen, 1865.
- (2), Vorlesungen über Pflanzenphysiologie, 2. Aufl., 1887.
- (3), Über das Auftreten der Stärke bei der Keimung ölhaltiger Samen. Bot. Ztg., 1859, S. 178 mit Taf. VIII. Ges. Abh., 1892, Bd. I, S. 557—573.
- Scheffer, Wilh. (1), Wirkungsweise und Gebrauch des Mikroskops und seiner Hilfsapparate. B. G. Teubner, 1911.
- (2), Das Mikroskop. 2. Aufl., 1914. — Bd. XXXV aus „Natur u. Geisteswelt“, Leipzig.
- Schiemenz, P. (1), Vergleichung der Fruchtbarkeit von Seen und Flüssen. Aus deutscher Fischerei, Uhles-Heft, S. 75—82. Neudamm 1911.
- Schiffner, Victor, Prof. (1), *Hepaticae europaeae exsiccatae*. Selbstverlag, 1901 u. ff.
- (2), *Hepaticae* (Lebermoose) in Engler-Prantl, Die natürlichen Pflanzenfamilien, 1909.
- Schimper, F. (1), Pflanzengeographie auf physiologischer Grundlage, 2. Aufl. Jena 1908.
- Schimper, W. Ph. (1), in Gemeinschaft mit Bruch u. Gümbel, *Bryologia europaea*. Stuttgart 1836—1855. Suppl. 1864—1866, 6 Bde. mit 680 Tafeln.
- (2), *Mémoire pour servir à l'histoire naturelle des Sphaignes* (*Sphagnum* L.). Paris 1857. Mit 24 Tafeln.
- Schindler, B. (1), Über den Farbenwechsel der Oscillarien. Zeitschr. f. Bot., 1913, Bd. V, S. 497.
- Schlechtendal, R. v., Die Gallbildungen (Zooecidien) der deutschen Gefäßpflanzen. Zwickau 1891. Aus d. Jahresber. d. Ver. f. Naturk. zu Zwickau f. d. Jahr 1890, besonders abgedruckt. Enthält leicht benutzbare Bestimmungstabellen.
- Schleichert, F., Anleitung zu botanischen Beobachtungen und pflanzenphysiologischen Experimenten. Unter Zugrundelegung von Detmers Pflanzenphysiol. Praktikum, 7. Aufl., 1909. Langensalza, H. Beyer u. Söhne.
- Schlumberger, Otto (1), Familienmerkmale der Cyatheaceen und Polypodiaceen und die Beziehungen der Gattung *Woodsia* und verwandter Arten zu beiden Familien. Flora 1911, Bd. CII, S. 383—414.
- Schmehlick, R. (1), Die Anwendung des Mikroskopes. Photographische Bibliothek, 1922, Bd. XXXI. Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart.
- Schmeil, O. (1), Leitfaden der Pflanzenkunde, 100. Aufl. Leipzig, Quelle u. Meyer, 1921.
- (2), Naturwissenschaftliche Atlanten. Eugen Gramberg, Pilze der Heimat. Quelle u. Meyer, Leipzig 1913, 2 Bände.
- Schmid, B., Biologisches Praktikum für höhere Schulen, 1909. Mit 75 Abb. u. 9 Tafeln.
- Handb. d. naturgeschichtl. Technik. B. G. Teubner, 1914.
- Schmidt, R. H. (1), Über Aufnahme und Verarbeitung von fetten Ölen durch Pflanzen. Flora 1891, S. 360.
- Schnegg, H. (1), Die Edelpilzzucht (Champignonkultur), 2. Aufl.

- Schoenichen, W. (1), Das biologische Schullaboratorium. Vorschläge und Mitteilungen aus der Praxis. Mit 31 Abb., 67 Seiten. Leipzig, Quelle u. Meyer, 1910.
- (2), Einführung in die Biologie. Ein Hilfsbuch für höhere Lehranstalten und für den Selbstunterricht. Mit 6 farbigen Tafeln und zahlreichen Abbildungen im Text. Leipzig, Quelle u. Meyer, 1910.
- Schrodt, J. (1), Neue Beiträge zur Mechanik der Farnsporangien. Flora 1887, S. 177. Vgl. auch Ber. d. Deutsch. Bot. Ges., 1897.
- Schroeder, H. (1), Die Hypothesen über die chemischen Vorgänge bei der Kohlensäure-Assimilation. Jena 1917.
- Schroeter, C. (1), Das Pflanzenleben der Alpen. Eine Schilderung der Hochgebirgsflora. Zürich, Verlag von Alb. Raustein, 1908.
- (2), Die Schwebeflora unserer Seen (das Phytoplankton). 99. Neujahrsbl. d. Naturf. Ges. in Zürich, 1897. Zürich 1896.
- Schroeter, J., Pilze in F. Cohns Kryptogamenflora von Schlesien, Bd. III. Breslau 1889.
- Schulz, Georg E. F., Natururkunden. Biologisch erläuterte photographische Aufnahmen frei lebender Tiere und Pflanzen. Berlin, Verlag von Paul Parey, 1908 u. ff.
- Schulze, Paul (1), Studien über tierische Körper der Karotingruppe. Sitzungsber. d. Ges. naturf. Frde., 1913, S. 1—22. Mit ausführlichem Literaturverzeichnis.
- Schwalbe, Carl G. (1), Die Chemie der Zellulose unter besonderer Berücksichtigung der Textil- und Zellstoffindustrie. Berlin, Gebr. Bornträger, 1911.
- Schwendener, S. (1), Über Bau und Mechanik der Spaltöffnungen. Berl. Akad., 1881, S. 833. Siehe auch Gesammelte Mitt., 1898, Bd. I.
- (2), Vorlesungen über mechanische Probleme der Botanik, bearbeitet und herausgegeben von C. Holtermann. Leipzig 1909.
- (3), Untersuchungen über den Flechtenthallus. Nägelis Beitr. z. wissensch. Botanik, Heft 2—4. Leipzig 1860; München 1862—1868.
- (4), Die Algentypen der Flechtengonidien. Basel 1869.
- Seligo, A., Hydrobiologische Untersuchungen. Kommissionsverlag von L. Saunier in Danzig, 1890 u. ff.
- Selk, H. (1), Beitr. z. Kenntnis d. Algenflora d. Elbe u. ihres Gebietes. Jahrb. d. Hamb. Wiss. Anst., 1907, Bd. XXV.
- Senn, Gust. (1), Die Gestalts- und Lageveränderung der Pflanzen-Chromatophoren. Leipzig 1908. Weitere Arbeiten 1909 u. 1917.
- Servettaz, C. (1), Recherches expérimentales sur le développement et la nutrition des mousses en milieux stérilisés. Ann. d. sc. nat. Bot., 9. sér., 1913, T. 17, p. 111—224.
- Sierp, H. (1), Neuere Arbeiten über Photo- und Geotropismus. Ztschr. f. Bot., 1919, Bd. XI, S. 510—537. Mit Literaturverzeichnis.
- Sjöstedt, Gunnar (1), Om de ökologiska förutsättningarna för Högrproduktioner av *Daphnia magna*. Sveriges Fiskeriförening, 1921. — Vgl. S. 184 u. 236.
- Skene, M. (1), A contribution to the physiology of the purple sulphur bacteria. The New Phytologist, 1914, Bd. XIII, S. 1—17.
- Smalian, Grundzüge der Pflanzenkunde, 2. Aufl. Leipzig, Verlag von G. Freytag, 1910.
- Sorauer, P. (1), Handbuch der Pflanzenkrankheiten, 2 Bde., 4. Aufl., 1921.
- Spitta, O. (1), Die Wasserversorgung. In Kolkwitz, Reichle, Schmidtman, Spitta, Thumm, Wasser und Abwasser. Leipzig, S. Hirzel, 1911. Zugleich Bd. II, 2 von Rubner, Handbuch der Hygiene.
- Stahl, Ernst (1), Zur Biologie des Chlorophylls. Landfarbe und Himmelslicht, Vergilbung und Etiolement. Jena 1909.
- (2), Zur Physiologie und Biologie der Exkrete. Flora 1919, Bd. XI, S. 1—132.

- (3), Einige Versuche über Transpiration und Assimilation. Bot. Ztg., 1894, Bd. LII, S. 117—146.
- (4), Über den Einfluß von Richtung und Stärke der Beleuchtung auf einige Bewegungserscheinungen im Pflanzenreich. Bot. Ztg., 1880, Bd. XXXVIII, S. 297.
- (5), Über den Einfluß des sonnigen oder schattigen Standortes auf die Ausbildung der Laubblätter. Ztschr. f. Naturw., Bd. XVI, N. F. IX, 1. 2. Jena 1883.
- (6), Beiträge z. Entwicklungsgeschichte der Flechten. Leipzig 1877.
- (7), Über künstlich hervorgerufene Protonemabildung an dem Sporogonium der Laubmoose. Bot. Ztg., 1876, Bd. XXXIV, S. 689.
- (8), Einfluß d. Beleuchtungsrichtung auf die Teilung der Equisetumsporen. D. B. G., 1885, Bd. III, S. 334.
- Stark, Peter (1), Experimentelle Unters. über das Wesen u. die Verbreitung d. Kontaktreizbarkeit. Jahrb. f. wiss. Bot., 1918.
- (2), Beiträge z. Kenntnis des Traumatotropismus. Pringsh. Jahrb., 1917, Bd. LVII, S. 461—552.
- (3), Neuere Erfahrungen über das Wesen pflanzlicher Reizleitungsvorgänge. Monatshefte f. d. naturw. Unterricht, 1921, S. 101—110.
- (4), Studien über traumatotrope und haptotrope Reizleitungsvorgänge. Pringsh. Jahrb., 1921, Bd. LX, S. 67—134.
- Steinbrinck, C. (1), Grundzüge der Öffnungsmechanik von Blütenstaub- und einiger Sporenbehältern. Botanisch. Jaarboek, Gent 1895—96, Bd. VII, S. 223—356.
- (2), Der Öffnungs- und Schleudermechanismus des Farnsporangiums. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges., 1897.
- Steiner, G. (1), Untersuchungsverfahren und Hilfsmittel zur Erforschung der Lebewelt der Gewässer. Stuttgart 1919.
- Steuer, Adolf (1), Planktonkunde. Leipzig und Berlin 1910.
- Stockhausen, Ferd. (1), Ökologie, „Anhäufungen“ nach Beijerinck. Berlin 1907. Inst. f. Gärungsgewerbe.
- Stoklasa, Julius, Biochemischer Kreislauf des Phosphat-Ions im Boden. Jena, G. Fischer, 1911.
- Stoppel, R. (1), Die Pflanze und ihre Beziehung zur atmosph. Elektrizität. Ztschr. f. Bot., 1920, Bd. XII, S. 529—575. Ebenda 1916. Vgl. auch Ges. d. Wiss. zu Göttingen, 1919.
- Strasburger, Ed. u. Koernicke, Max (1), Das Botanische Praktikum, 6. Aufl. Jena 1921.
- Tangl, Ed. (1), Über offene Kommunikationen zwischen den Zellen des Endosperms einiger Samen. Pringsh. Jahrb., 1879—81, Bd. XII, S. 170—190, mit Taf. V u. VI.
- Ternetz, Charlotte, vgl. S. 154. — Thienemann, S. 221 u. 244.
- Thumm, K. (1), Über Anstalts- und Hauskläranlagen. Ein Beitrag zur Abwasserbeseitigungsfrage. 2. Aufl. Berlin, Verlag von Aug. Hirschwald, 1913.
- Tieghem, Ph. van (1), Recherches physiologiques sur la germination. Ann. d. sc. nat., 1873.
- Tiegs, Ernst (1), Beitr. z. Ökologie d. Wasserpilze. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges., 1919, Bd. XXXVII, S. 496—501.
- Tobler, G. u. F. (1), Zur Bildung des Lycopins und über Beziehungen zwischen Farb- und Speicherstoffen bei Daucus. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges., 1912.
- F. (2), Zur Ernährungsphysiologie der Flechten. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges., 1911, Bd. XXIX, S. 3. — Ebenda, 1920, Bd. XXXVIII, S. (10).
- Traube, Moritz (1), Gesammelte Abhandlungen. Berlin, Verlag von Mayer u. Müller, 1899.
- Tswett, vgl. S. 11 u. 15.

- Tubeuf, C. v. (1), Die Mistel (*Viscum album*). Text z. pflanzen-pathol. Wandtafeln. Stuttgart, Ulmer, 1906. Separat.
- (2), Holzzerstörende Pilze und Haltbarmachung des Holzes. Lafars Handb. d. Techn. Mykologie, Bd. III, 1904—1906.
- Ursprung, A. (1), Über die Bedeutung der Wellenlänge für die Stärkebildung. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges., 1918, Bd. XXXVI, S. 86—100.
- (2), Über die Stärkebildung im Spektrum. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges., 1917, Bd. XXXV, S. 44—69.
- Ursprung u. Blum (1), Dürfen wir die Ausdrücke osmotischer Wert, osmotischer Druck, Turgordruck, Saugkraft synonym gebrauchen? Biol. Zentralbl., 1920, Bd. XL, S. 193—216.
- Vöchting, Herm. (1), Organbildung im Pflanzenreich, 1879.
- Vogel, Müllenhoff, Röseler (1), Leitfaden für den Unterricht in der Botanik, 21. Aufl., 1902.
- Voigt, Max (1), Die Praxis der Naturkunde, 2 Bde. Leipzig, Dieterichs Verlag, 2. Aufl., 1913.
- Volk, R. (1), Hamburgische Elbuntersuchung, 1901—1908. Mitt. a. d. Naturhist. Museum in Hamburg.
- Vries, H. de (1), Eine Methode z. Analyse der Turgorkraft. Opera, 1918, Bd. II, S. 137—296. Pringsh. Jahrb., 1884.
- (2), Keimungs- und Wachstumsgeschichte der Zuckerrübe. Opera, 1918, Bd. III, S. 377—522. Landw. Jahrb., 1879.
- (3), Keimungs- und Wachstumsgeschichte der Kartoffel, Opera collata, 1918, Bd. III, S. 176—376.
- (4), Über die Aggregation im Protoplasma von *Drosera rotundifolia*. Opera collata, 1918, Bd. II, S. 447—480.
- (5), Über die Aufrichtung des gelagerten Getreides. Opera collata, 1918, Bd. III, S. 523—588.
- (6), Über Verkürzung pflanzlicher Zellen durch Aufnahme von Wasser. Opera collata, 1918, Bd. I, S. 498—502. Vgl. auch 1918, Bd. II.
- Wagner, B. (1), Biologische Untersuchungen an der Kartoffelpflanze. Biologische Arbeit, Verlag Fisher (Freiburg i. B.), 1917, Heft 2 u. 3.
- Wagner, Maximilian, 100 physiologische Schulversuche über das Leben der Gemüsebohne. Leipzig, B. G. Teubner, 1912.
- Warburg, O. (1), Über die Geschwindigkeit der photochemischen Kohlensäurezersetzung in lebenden Zellen. Biochem. Ztschr., 1919, Bd. C und 1920, Bd. CIII. Vgl. auch „Die Naturwissenschaften“, 1921.
- (2), Physikalische Chemie der Zellatmung. Festschr. d. Kaiser-Wilhelm-Ges. Berlin, Springer, 1921, S. 224—235.
- , Otto (1), Die Pflanzenwelt, 3 Bde. Leipzig 1913—1922.
- Warming-Graebner (1), Ökologische Pflanzengeographie, 3. Aufl., 1918.
- Warming-Johannsen (1), Lehrbuch d. allgem. Botanik. Berlin 1909.
- Warnstorf, C. (1), Moose. Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Berlin, Gebr. Borntraeger, 1903 u. 1906.
- Wehmer, C. (1), Die Pflanzenstoffe. Jena 1911.
- Wesenberg-Lund (1), Plankton investigations of the danish lakes. Spezieller Teil (1. Text, 2. Tafeln). Kopenhagen 1904. Allgemeiner Teil, 1908. Dieses Werk ist nach den Angaben des Verfassers als planktologisches Pendant zu Forels limnologischer Monographie über den Genfer See zu betrachten.
- West, W. u. West, G. S. (1), A monograph of the British Desmidiaceae. The Ray Society, Vol. I—III. London 1904—1908.
- Westling, R. (1). Über die grünen Species der Gattung *Penicillium*. Arkiv för Botanisk, 1911, Bd. XI, S. 1—156.

- Wettstein, F. v. (1), Künstliche haploide Parthenogenese bei *Vaucheria* und die geschlechtliche Tendenz ihrer Keimzellen. Ber. d. Deutschen Bot. Ges., 1920, Bd. XXXVIII, S. 260—266.
- Wettstein, R. v. (1), Handbuch der systematischen Botanik, 2. Aufl. Leipzig u. Wien 1911.
- Wiesner, Jul. v. (1), Die Rohstoffe des Pflanzenreiches. Wilh. Engelmann, 3. Aufl., 3 Bde., 1914—1920.
- Wilhelmi, Jul. (1), Die makroskopische Fauna des Golfes von Neapel, vom Standpunkte der biologischen Analyse des Meerwassers. Mitt. a. d. Kgl. Prüfungsanst. f. Wasservers. u. Abwässerbes., 1912, Heft 16, S. 47—166. Mit 78 Textfiguren.
- (2), Die Kriebelmückenplage. Jena 1920.
- Will, H. (1), Beiträge zur Kenntnis rotgefärbter niederer Pilze. Cbl. f. Bakt., II. Abt., Bd. XXXV, S. 81—118.
- Wille, N. (1), Conjugatae und Chlorophyceae in Engler-Prantl, Die natürlichen Pflanzenfamilien, I. Teil. Leipzig 1897.
- Willstätter, Rich. (1), Untersuchungen über Chlorophyll. Liebigs Annalen der Chemie, 1907, Bd. 358, S. 267 u. folg. Bände.
- Willstätter u. Stoll (1), Untersuchungen über Chlorophyll. Methoden u. Ergebnisse. Berlin, Verlag von Jul. Springer, 1913.
- (2), Untersuchungen über die Assimilation der Kohlensäure. Berlin, Jul. Springer, 1918.
- Winkler, H., Verbreitung und Ursache der Parthenogenese im Pflanzen- und Tierreich. Jena 1920. Betr. Pfropfbastarde s. Ztschr. f. Bot., 1909 u. 1910.
- Winkler, L. W., vgl. S. 231.
- Winogradsky (1), vgl. S. 136.
- (2), Recherches sur les organismes de la nitrification. Ann. de l'Institut Pasteur, 1890. Erste Abhandlung.
- Wohryzek, Oskar (1), Chemie der Zuckerindustrie. Berlin, Springer, 1914.
- Woltereck, R. (1), Internationale Revue d. ges. Hydrobiologie u. Hydrographie, 1908 u. ff.
- Wossidlo, Leitfaden der Botanik. Berlin, Weidmannscher Verlag.
- Wünsche, Otto (1), Die Kryptogamen Deutschlands. Leipzig, B. G. Teubner, 1875.
- Wysman (1), De Diastase Gemenge = Maltase u. Dextrinase. Amsterdam (Spin & Co), 1889, vgl. Beijerinck (1).
- Zacharias, O. (1), Archiv f. Hydrobiologie u. Planktonkunde.
- (2), Das Süßwasserplankton. Aus Natur und Geisteswelt, 2. Aufl. B. G. Teubner, 1911.
- Zimmermann, A. (1), Die botanische Mikrotechnik. Tübingen 1892. 2. Aufl. von Schneider, Jena 1922.
- Zollikofer, Clara (1), Über das geotropische Verhalten entstärkter Keimstengel u. der Abbau der Stärke in Gramineen-Koleoptilen. Beitr. z. allg. Bot., 1918, Bd. I, S. 399—448.
- Zopf, Wilh. (1), Die Pilze. In Schencks Handb. d. Bot., Bd. IV, 1890.
- (2), Über einige niedere Algenpilze (Phycomyceten) und eine neue Methode, ihre Keime aus dem Wasser zu isolieren. Abh. d. naturf. Ges. zu Halle. Bd. XVII, Heft 1 u. 2, S. 79—107.
- Zeitschrift (1) f. induktive Abstammungs- und Vererbungslehre.
- Zsigmondy, R. (1), Kolloidchemie. Leipzig 1920, S. 408.

Register.

- Abbe, Kondensor 106.
 —, Zeichenapparat 105.
 Abendlichtnelke, hygroskopische Kapseln 82.
 —, Saftleitung in Blüten 63.
 Abschlagapparat 237.
 Absidia glauca 150.
 Absitzbecken 125.
 Absorptionsspektrum des Chlorophylls 14.
 Abwasser, Seston 225.
 Acer platanoides, Blattkrankheit 157, Taf. IV.
 Aceton 14, 143.
 Achlya, fakult. Parasitismus 151.
 Aciilius sulcatus 222, Taf. VIII.
 Acineta grandis, Nahrung 215, Taf. VIII.
 Actinastrum hantzschii, Plankton 198, Taf. VII.
 Actinophrys sol 212, Taf. VIII.
 Actinosphaerium eichhorni 212, Taf. VIII.
 Additionsfarben 83.
 Adhäsionskultur nach Lindner 142.
 Aecidiosporen, Farbe 19.
 —, Rostpilz 159.
 Aecidium berberidis 156, 159, Taf. IV.
 Aegopodium, kristall. Chlorophyll 17.
 Aërotaxis bei Spermatozoiden 205.
 Aërotropismus 93.
 Aethalium septicum, Lebensweise 107.
 Agar, Stichkulturen 114.
 —, Strichkulturen 114.
 Agaricus campestris 167.
 —, melleus 169, Taf. V.
 Agrion puella 220, Taf. VIII.
 Agrostemma 82, 90.
 Ahorn, Blattkrankheit 157, Taf. IV.
 Albugo candida 156, Taf. IV.
 Alburnus lucidus 222, Taf. VIII.
 Algen, Lebensweise 180.
 —, Sägespan- 184, Taf. VII.
 —, System 180.
 Algenfresser 211.
 Aleuronkörner 49, 53.
 Alisma plantago 209.
 Alkoholgärung 142.
 Allium, Reservezellulose 47.
 —, Zucker in der Zwiebel 10, 34.
 Amanita mappa 170, Taf. V.
 — muscaria 170.
 — pustulata 170.
 — rubescens 170.
 — pantherina 170.
 Amaurochaete atra 110.
 Amaurosporeae 167.
 Amblystegium riparium 257.
 Aminosäuren bei Russula 166.
 —, Gärung 146.
 —, in Gewässern 240.
 Ammoniakverb. d. Fettsäuren 240.
 Ammoniummolybdat, Phosphornachweis 48.
 Ammoniumphosphat, Chemotropismus 92.
 Amoeba proteus 211, Taf. VIII.
 Amöben, Fundorte 110.
 Ampelopsis, Ranken 91.
 Amphipleura pellucida 193, Taf. VII.
 Amphora ovalis 194, Taf. VII.
 Amyloid 47.
 Anabaena Spezies 184, Taf. VII.
 Anaërobe Atmung 72, 146.
 —, Bakterien 128.
 —, Würmer 216.
 Anastatica hierochuntica 82, 83.
 Anastigmatlupen 103, Taf. X.
 Ancylisteene 157.
 Andraea petrophila 251, Taf. XII.
 Anemone, thermotropisch 81.
 Annulatae 167, 169, Taf. V.
 Annulus der Sporangien 262.
 Anodonta mutabilis 218.
 Anpassung, Halophyten 64.
 —, Wasserpflanzen 61.
 —, Wüstenpflanzen 61.
 —, Xerophyten 64.
 Antheridien, Aspidium 28.
 Antheridien, Moose 256.
 Anthocyan 16, 28, 32.
 Anthophysa, Lebensweise 212, Taf. VIII.
 Anuraea aculeata 217, Taf. VIII.
 — cochlearis 217, Taf. VIII.
 Apfel, Zuckernachweis 34.
 Apfelsäure, Chemotaxis 269.
 —, Zuckerrübe 38.
 Apfelsine, Zuckernachweis 34.
 Aphanizomenon flos aquae 184, Taf. VII.
 Aphanomyces 151.
 Aplanatlupen 103.
 Apochromat-Objektive 106.
 Apodya lactea 151, 208, Taf. VII.
 Apothecien 167.
 Apposition, Wachstum 41, 76.
 Arabinose 38.
 Arcella vulgaris, Vorkommen 211, Taf. VIII.
 Archegonien der Farne 269.
 Arion subfuscus, Pilzfresser 161.
 Armillaria mellea 169, Taf. V.
 Armlauchergewächse 244.
 Arsennachweis durch Penicillium 153.

- Arthrospira 183, Taf. VII.
 Arum maculatum, Wärmebildung 74.
 Ascomycetes 148, 161.
 Asellus aquaticus 218, Taf. VIII.
 Askogene Hyphen 178.
 Askus-Hymenien 174.
 Asparagin in Lupinus 54.
 —, Nahrung der Hefen 142.
 — in Zuckerrübe 38.
 Aspergillus niger 152, Taf. III.
 Aspidium filix mas 261.
 Asplanchna, Nahrung 217, Taf. VIII.
 Asplenium bulbiferum 269.
 Assimilation 4.
 —, Gewebe 11.
 —, Stärke 5, 40.
 —, Wirkung der Spektralfarben 5, 12.
 Assimilationslamellen 256.
 Asterionella, Assimilation 192, Taf. VII.
 Astmoos 257.
 Atemnot durch Sauerstoffmangel 73, 240.
 Atemwurzeln, Funktion 65.
 Atmosphärendruck osmotisch wirksamer
 Lösungen 28.
 Atmung 68 ff.
 —, Nachweis 69.
 —, intramolekulare 72.
 —, Wärmebildung 73.
 —, anaërobe 72, 128.
 Atrosporeae 164.
 Aufspaltungsgesetze 98.
 Augenfleck der Flagellaten und Schwärmer
 19, 188.
 Austrocknen der Moose 256, 259.
 Ausziehstock 235, Taf. X.
 Autonome Bewegungen 80, 83, 85.
 Autotrophe Ernährung 55, 124, 133.
 Autotrophe Formation 243.
 Autotropismus 87.
 Azeton, siehe Aceton.
 Azotobacter 128, 185.

 Bacillaria paradoxa, Bewegung 194.
 Bacillariales 190.
 Bacillus amylobacter 127.
 — calfactor 128.
 — cellulosa methanica 128.
 — subtilis 127, 185, Taf. VII.
 Bacteriopurpurin 18, 137.
 Bacterium aceti 120.
 — chitinovorum 164.
 — coli 123.
 — denitrificans 124.
 — fluorescens 9, 129, Taf. VII.
 — gelaticum 114.
 — lactis acidi 121.
 — nitrobacter 5, 124.
 — phosphorescens 118.
 — phytophthorum 123, 156, Taf. IV.
 — prodigiosum 124.
 — radicola 126.
 — termo 124.
 — tuberculosis 117, 126.
 — typhi 123.
 — violaceum 129.
 — vulgare 124, 185, Taf. VII.
 — xylum 121.

 Badhamia utricularis 110.
 Baeyers Hypothese 5.
 Bakterien, Begeißelung 118.
 —, Färbung 117.
 —, Filter 113.
 —, Fundorte 111, 112.
 —, Kultur 113 ff.
 —, sauerstoffbedürftige 9.
 —, System 118.
 Bakterienfresser 211.
 Bakteroiden 126.
 Bandflechte 175, Taf. VI.
 Barbula unguiculata 252.
 Bärklaue 16, 29.
 Bartflechte 176, Taf. VI.
 Bärtierchen 220, Taf. VIII.
 Bartmoos 252.
 Barytlaug, Kohlensäurenachweis 69.
 Basidien bei Russula 166.
 Basidiomycetes 156, 161.
 Bastarde (Mischlinge) 99.
 Batrachospermum moniliforme, Farbe 205.
 Baumfarne 260.
 Baumwollfaser 242.
 Baumzerstörende Pilze 158, 163.
 Becherflechte 175, Taf. VI.
 Becherpilz, Peziza 162.
 Becherrost 159.
 Beggiatoa alba 111, 135, 186, Taf. VII.
 — mirabilis 136.
 Begonia, Gewebespannung 30.
 Beijerincksche Methode, Diastasewirkung
 45.
 Bellis, Erschütterungsreiz 85.
 — perennis, Öffnen und Schließen der
 Blütenköpfe 81.
 Benthos 223.
 Berberis, Reiz 85.
 Berberitze, Aecidien des Rostpilzes 159.
 Berkefeldfilter 113.
 Besenmoos 251, Taf. XII.
 Beta maritima 37.
 Betain, Zuckerrübe 38.
 Betula, Blutungsdruck 62.
 —, Saft 37, 62.
 Beugungsbilder 106.
 Bewegung, Allgemeines 79 ff.
 Bewegung, autonome 83.
 — der Chlorophyllkörner 90.
 — durch mechanische Reize 81, 85.
 —, phototaktische 90.
 —, nyktinastische 81, 89.
 —, vitale 83.
 Bierwürzelatine 114.
 Bio-Oxydation 240.
 Bio-Reduktion 240.
 Biologische Selbstreinigung 238.
 Biologische Tropfkörper 125.
 Biophytum, Reiz 85.
 Birke, Blutungsdruck 62.
 —, Saft 37, 62.
 Birne, Zuckernachweis 34.
 Biuretreaktion, Eiweißnachweis 53.
 Bläschenmethode, Assimilationsnachweis 6.
 Blasentang 203.
 Blattflechten 175.
 Blattschimmel 157.

- Blattstruktur, mikroskopische 11.
 Blüten, Farbstoffe 19.
 Blüten, Öffnen und Schließen 81.
 Blutkörperchen, Osmose 28.
 Bodensee, Plankton 229.
 Bodo ovatus in Aufgüssen 212, Taf. VIII.
 Bohnen, Quellung 77.
 Boletus bulbosus (= edulis) 164, Taf. V.
 — castaneus 164.
 Borodinsche Methode für Chlorophyllkristalle 16.
 Bosmina, Plankton 220, Taf. VIII.
 Botrychium lunaria 265.
 Botryococcus braunii, a. d. Oberfl. schwimmend 197.
 Botrytis cinerea 154, Taf. III.
 Bouillonkulturen 113.
 Bovist, Bauchpilz 172.
 — -Schleimpilz 108.
 Brachionus urceolaris 217, Taf. VIII.
 Brachsenkraut 208, Taf. VII.
 Brachythecium, unterdrückt Gras 257, Taf. XII.
 Brandpilz 159.
 Brassica, Atmung 70.
 Braunalgen 202.
 Brettwurzeln 65.
 Brownsche Molekularbewegung 37, 194.
 Bruchblätter 95.
 Brunnenfaden 131.
 Brunnenmoos 247.
 Brutzwiebeln 94, 96.
 Bryonia alba, Ranken 90.
 Bryophyllum calycinum, crenatum 95.
 Bryophyta 245.
 Bryum argenteum 254, Taf. XII.
 — capillare 257.
 Buchweizen, Eiweißsynthese 54.
 Burdonen 96.
 Burri, Bakterienfärbung 117.
 Buttersäure, Bazillus 127.
 —, Gärung 128.
 Buxbaumia, Lebensweise 255, Taf. XII.
 Bythia tentaculata 218, Taf. VIII.
 Calanus, Plankton 219.
 Calendula, Bewegung d. Blüten 81.
 Callidina elegans 216, Taf. VIII.
 Callitriche vernalis 209.
 Calophyllum 65.
 Calothrix 178.
 Caltha, Infiltration 67.
 Canarium 65.
 Cantharellus cibarius 70, 164.
 Canthocamptus, Lebensweise 219.
 Capsella bursa pastoris, Wirtspflanze des weißen Rostes 156, Taf. IV.
 Carchesium lachmanni α m 214, Taf. VIII.
 Cardamine, Adventivbildungen 95.
 Carduus crispus, Reiz 85.
 Carex vulgaris 209, 233.
 Carlina, Hygroskopizität 80.
 Catharinaea undulata 255.
 Cattleya, Keimling 56.
 Caulerpa 202.
 Cellulose, siehe Zellulose.
 Centaurea jacea, Reiz 85.
 Ceramium rubrum, Farbe 207.
 Ceratium hirundinella, Schwalbenschwanzalge 189, Taf. VII.
 Ceratium tripos 119, 189, Taf. VII.
 Ceratodon purpureus, Lebensweise 251, Taf. XII.
 Ceratophyllum demersum 209, Taf. VII.
 Ceratopogon communis 221, Taf. VIII.
 Cetraria islandica 175.
 Chaetoceras whighamii, Gallerthaut 191.
 Champignon 167.
 —, Brut 168.
 —, Fliege 169.
 —, Haus 168.
 Chantrelia chalybaea 206, Taf. VII.
 Chara crinita 245.
 — fragilis 233.
 Chara, Plasmaströmung 245.
 Charophyta 244.
 Chemomorphose 77.
 Chemonastie 93.
 Chemotaxis 93.
 — bei Chromatium 137.
 — bei Farnen 269.
 — bei Fuligo 108.
 Chemotropismus bei Wurzeln 91.
 Chenopodium enthält Nitrate 39.
 Chilodon cucullulus 213, Taf. VIII.
 Chimären (Pfropfbastarde) 99.
 Chinesische Tusche, Bakterienfärbung 117.
 —, Molekularbewegung 37.
 —, Oscillatoria-Bewegung 183.
 Chironomus 221, Taf. VIII.
 Chitinrest 242.
 Chlamydomonas species, pro 1 ccm 197, Taf. VII.
 Chlamydosporen bei Endomyces 140, 152.
 Chlamydothrix 133.
 —, Fundort 111.
 Chloralhydrat, Stärkenachweis 40, 207.
 Chlorella, Menge 229.
 —, Spezies 197.
 Chloride, im Wasser 231.
 Chlorophyll 4 ff.
 —, Extraktion 13.
 —, Fluoreszenz 13.
 —, Kapillaranalyse 15.
 —, Komponenten 10.
 —, Körner 11, 84, 255, 270.
 —, Kristalle 16.
 —, Lösung 13.
 —, Spektrum 14.
 —, Zerlegung 15.
 —, Zersetzung 14, 15, 90.
 Chlorophyllase 17.
 Chlorophyllid 17.
 Chloroplasten 10, 81, 255.
 Chlorzahlen 231.
 Chromatium okenii 111, 136, 186, Taf. VII.
 —, Farbstoff 18, 137.
 — weissii 137.
 Chromatophoren 9.
 Chromulina rosanoffii 187.
 Chroococcus limneticus 181, Taf. VII.
 Chrysomonadales 186.
 Chrysophansäure 176.
 Chrysophlyctis, Kartoffelkrebs 156.

- Chydorus sphaericus 220, Taf. VIII.
 Chytridineen 155, 157.
 Chytridium olla 157, 200.
 Cirkulationsbewegung bei Tradescantia 84.
 Cirsium lanceolatum, Reiz 85, 86.
 Cladonia macilenta 175, Taf. VI.
 — pyxidata 175, Taf. VI.
 — rangiferina 175.
 — Soredien 174.
 — squamosa 173.
 Cladophora, Assimilation 8.
 —, Vorkommen und Kultur 200, Taf. VII.
 Cladosporium herbarum 116, 147, 154, Taf. III.
 Cladotrix dichotoma 135, Taf. VII.
 Clathrocystis 183.
 Clavaria botrytis 163.
 —, pistillaris 163, Taf. V.
 Claviceps purpurea 158, Taf. IV.
 Clivia nobilis, Karotin 18.
 Cloë diptera 220, Taf. VIII.
 Clonothrix 133.
 —, Fundort 111.
 Closterium acerosum 194.
 Closterium, Spezies 194, Taf. VII.
 —, Tanzstübchen 37, 194.
 Coccolithen 188.
 Coccolithophoridae 230.
 Coccoeius pediculus, Schildlaus-Kieselalge 193, Taf. VII.
 Cocos nucifera, Zuckernachweis 36.
 Coelastrum microporum 228.
 Coffea, Reservezellulose 47.
 Coleps hirtus, Lebensweise 213, Taf. VIII.
 Collema pulposum 168.
 Collybia tuberosa 167, Taf. V.
 Colpidium colpoda, Lebensweise 213, Taf. VIII.
 Colurus species 217, Taf. VIII.
 Compositen, Inulin 42.
 Conferva bombycina 199, Taf. VII.
 Coniocybe chlorina 180.
 Coprinarius campanulatus 164.
 Coprinus atramentarius 164.
 — comatus 164.
 — stercorarius 164.
 Corallina officinalis, Kalk 207.
 Cordyceps militaris 155, 158, Taf. IV.
 Corethra plumicornis 222, Taf. VIII.
 Corixa striata 221, Taf. VIII.
 Cortinari, Schleim 167.
 Cosmarium botrytis, reingrün 195, Taf. VII.
 Crenothrix 131.
 —, Fundort 71.
 Crocus, Öffnen und Schließen der Blüten 81.
 Cruciferen, Nährpflanzen der Plasmodio-
 phora 156.
 —, Nährpflanzen des weißen Rostes 156.
 Crucigenia rectangularis 228.
 Crustacea 218.
 Cryptomonadales 188.
 Cryptomonas, Lebensweise 188, Taf. VII.
 Cucumis sativus, Ranken 90.
 Cucurbita pepo, Ranken 90.
 —, Öl in Samen 49.
 Culex pipiens 222, Taf. VIII.
 Cuscuta europaea 58.
 Cyanophyceae 181.
 Cyanophyll 15.
 Cycadeen, Nostoc 184.
 —, Spermatozoiden 271.
 Cyclas 218, Taf. VIII.
 Cyclops leuckarti 219, Taf. VIII.
 Cyclotella kuetzingiana 228.
 Cymatopleura solea 194, Taf. VII.
 Cymbella lanceolata, Gallertstiele 193, Taf. VII.
 Cyphoderia, Schale 211, Taf. VIII.
 Cypris fusca 219, Taf. VIII.
 Cystiden bei Russula 166.
 Cystococcus in Flechten 172.
 Cystokarpian 206.
 Cystopus candidus 156, Taf. IV.
 Cytase, Wirkung 163.
 Dampftopf 114.
 Daphnia, Nahrung 219, Taf. VIII.
 Darmalge 199.
 Daucus carota, Glukosenachweis 34.
 —, Karotin 18.
 —, Osmose 20.
 —, Pilzkrankheit 160.
 —, Zuckernachweis 34.
 Delesseria sanguinea, Stärkeumsatz 207.
 Dentaria bulbifera, Brutzwiebeln 96.
 Derminus hypni 166, Taf. V.
 Desinfektion 113.
 Desmidiaceen, zwischen Torfmoos 250.
 Desmodium gyrans, Blattbewegung 85.
 Detritusfresser 211.
 Dextrane bei Cetraria 175.
 Dextrangärung 118.
 Dialyse d. Eiweiß 52.
 Diaphanoskop 12.
 Diaptomus graciloides, Plankton 219, Taf. VIII.
 Diastase 45.
 Diatoma elongatum 192, Taf. VII.
 Diatomeen, Assimilation 9.
 —, Farbstoff 19, 192.
 —, Lebensgeschichte 190 ff.
 —, Reinkultur 190.
 —, Typenplatte 106.
 Dicranum scoparium 251, Taf. XII.
 Dictyosphaerium 230.
 Didymium difforme 109.
 Diffugia, Fundorte 111.
 — pyriformis 211, Taf. VIII.
 Diffusion 19.
 Digitalis purpurea, Antheren 82.
 Dinobryon Species 187, Taf. VII.
 Dionaea muscipula 57.
 Diplophrys, α m 212, Taf. VIII.
 Diplosiga, passiv planktonisch 212, Taf. VIII.
 Diptera 221.
 Direkte Bewirkung 99.
 Disaccharide 33, 36.
 Distephanus speculum 187, Taf. VII.
 Doppelbrechung der Membranen 82.
 Drainröhren 125.
 Drainwasser 240.
 Drehmoos 253, Taf. XII.
 Dreissensia polymorpha 218, Taf. VIII.

Dretsche 238.
 Drosera, Halbsaprophyt 57.
 —, Kultur 56.
 —, Pepsinabsonderung 50.
 Dünengräser, Wandern 79.
 Dunkelfeldbeleuchtung 106.
 —, Bakterienbeobachtung 112.
 Dyticus marginalis 222, Taf. VIII.

Edaphon 222.
 Edinger, Zeichenapparat 105.
 Eisenbakterien 132 ff.
 Eisenoxydhydrat 242.
 Eiweiß 51 ff.
 — bei Hefen 142.
 —, Dialyse 52.
 —, Kristalle 43, 48, 53.
 —, Nachweis 49, 53.
 —, Reaktion 49.
 —, Synthese 54.
 Elastizität der Zellmembran 28, 30.
 Elateren, hygroskopisch 250.
 Elementararten 98.
 Elemente, unentbehrliche 3.
 Elitoralzone der Gewässer 234.
 Elle (Synedra) 192 Taf. VII.
 Elodea, Assimilation 6, 209, Taf. I.
 —, Karotin 18.
 Empusa muscae 156, Taf. IV.
 Emulsion, Fett 50.
 endolithisch 178.
 Endomyces 152.
 Endomycetes 140, 152.
 Endosmose 21.
 Endosperm bei Ricinus 48.
 Engelmanns Bakt. Methode 9.
 Enteisenung 131.
 Enteromorpha intestinalis 199.
 Spannungswachstum 78.
 Enzymwirkungen bei Pilzen 163.
 Eosinlösung, Nachweis der Saftleitung 62.
 Ephebe 178.
 Epistylis auf Gehäusen v. Schnecken 214,
 Taf. VIII.
 Epithemia turgida auf Wasserpflanzen 194,
 Taf. VII.
 Erbsen, Quellung 77.
 Erfrieren der Pflanzen 32.
 Eristalis tenax 221, Taf. VIII.
 Ergotin 158.
 Erodium, Grannen 82.
 Erythroextrin 46, 207.
 Essigmutter 121.
 Essigpilz 120.
 Essigsäure, Bakterien 120.
 —, Gärung 120.
 Etagenmoos 258.
 Etiollement 12.
 Eucampia-Zellen 230.
 Euchlanis dilatata 217, Taf. VIII.
 Eudorina elegans 197, Taf. VII.
 Eugenia (Myrtaceae) 65.
 Euglena acus var. rigida 228.
 — viridis 188, Taf. VII.
 Euglena, Phototaxis 81, 188.
 Euglypha alveolata 211, Taf. VIII.
 Eulitorale Zone der Gewässer 233.

Eumycetes 138 ff.
 Euphorbia cyparissias, Rostkrankheit 160.
 Euplotes charon 214.
 Euphrasia officinalis 58.
 Eutrophe Formation 243.
 Evelatae 166.
 Evernia prunastri 175, Taf. VI.
 Eversäure 176.
 Exkursionsbesteck 105.
 Exkursionsmikroskop 105.
 Exoascus pruni 157, Taf. IV.
 Exobasidium vaccinii 160, Taf. IV.
 Experimentalökologie 238.
 Extraktion des Chlorophylls 13.

Fadenwürmer 216.
 Farbe, Wasser 226.
 Farne 259.
 Faulschlamm 239, 259.
 Farnsporangien, Mechanismus 262.
 Faulkammer 129.
 Fäulnisbakterium 124, 129, Taf. VII.
 Fegatella conica 249.
 Fehlingsche Lösung, Zuckernachweis 35.
 Fermente, fettspaltende 50.
 —, oxydierende 53, 164.
 —, stärkelösende 45.
 Ferrocyanidfermembran 23.
 Fett, bei Diatomeen 190, 191.
 — bei Hefen 140.
 — in Ricinussamen 48.
 —, Petroleumbildung 259.
 Filze, Algen 183.
 —, organische 234.
 Fingerhut, Antheren 82.
 Fingertang 203.
 Fischbrut frisst Plankton 222, Taf. VIII.
 Fischnahrung 240.
 Flechten 172.
 —, Band- 175, Taf. VI.
 —, Bart- 176, Taf. VI.
 —, Becher- 175, Taf. VI.
 —, Blatt- 175, Taf. VI.
 —, Gallert- 175, 178.
 —, Gonidien 174.
 —, Krätze- 177, Taf. VI.
 —, Kreisblatt- 177, Taf. VI.
 —, Krusten- 175.
 —, Lackmus- 176.
 —, Landkarten- 179, Taf. VI.
 —, Manna- 178.
 —, Säulchen- 175, Taf. VI.
 —, Säuren 178.
 —, Scheiben- 178.
 —, Schild- 177, Taf. VI.
 —, Schrift- 179.
 —, Schüssel- 177, Taf. VI.
 —, Standorte 174.
 —, Stein- 178.
 —, Strauch- 175.
 —, Synthese 172, 174.
 —, Teller- 178.
 —, Verwitterung v. Gestein 174.
 —, Wand-, gelbe 176, Taf. VI.
 Fleischmuskelfaser 242.
 Fliegenpilz 170.
 Flohkrebs 218, Taf. VIII.

- Florideae 205.
 Flugbrand d. Hafers 159, Taf. IV.
 Fluoreszenz d. Chlorophylls 13.
 Fluoreszierender Spaltpilz 129.
 Flußplankton 230.
 Fontinalis antipyretica 7, 208, 233, 256, Taf. VII.
 Formaldehyd, Assimilationsprodukt 5.
 Fortpflanzung 94.
 Fragilaria capucina, Bänder 191, Taf. VII.
 — crotonensis 191, Taf. VII.
 Froschbiß 209, Taf. VII.
 Froschlaichalge 205.
 Froschlaichpilz 118.
 Froschlöffel 209.
 Fruktose in Zuckerrübe 38.
 Frullania dilatata 250.
 Fuchsia, Wurzeldruck 62.
 Fucus serratus, Spermatozoiden 205.
 —, vesiculosus, Befruchtung 203.
 Fuligo varians 107.
 Funaria hygrometrica 90, 253, Taf. XII.
 Fungi 138.
 Fusarium aquaeductuum 186, 207, Taf. VII.
 Fusicladium dendriticum 160.
 — pirinum 160.
 Galaktane bei Cetraria 175.
 Galeopsis tetrahit, Chlorophyll 17.
 Galera hypni 166, Taf. V.
 Gallenbildungen 58.
 Gallertflechte 178.
 Gallionella 133.
 —, Fundort 111.
 Gammarus pulex 218, Taf. VIII.
 Gärflasche 144.
 Gärmethode, Zuckernachweis 36.
 Gärung, Alkohol 145.
 —, Buttersäure- 127.
 —, Dextran- 118.
 —, Druck 143.
 —, durch Bakterien 119 ff.
 —, durch Hefen 142 ff.
 —, Essigsäure- 120.
 —, Methan- 128.
 —, Milchsäure- 121.
 —, Salpeter- 124.
 —, Schwefelwasserstoff- 136.
 Gebirgswässer, Plankton, 225, 229.
 Geißeln, Bakterien 112, 118, Taf. VII.
 —, Färbung 117, 188.
 Gelatine, Plattenkulturen Taf. II.
 —, Rollkulturen 115.
 —, Stickskulturen 114.
 —, Strichkulturen 114.
 Gelbrand 222, Taf. VIII.
 Gelenkpolster, Mechanismus 31.
 Gene, Vererbungsanlagen 94.
 Generationswechsel 257, 270.
 Genotypus 95.
 Geotropismus 86.
 Gerbsäure in Zuckerrübe 38.
 Gerstenkörner, Atmung 70.
 —, transitorische Stärke 41.
 —, Wärmeentwicklung bei Atmung 73.
 Geschlechtsakt 96.
 Getreiderost 159, Taf. IV.
 Gewässertypen 243.
 Gewebespannung 30.
 Gipszerstörer, bakterielle 130.
 Glaskrebs 220, Taf. VIII.
 Glaucoma, Kultur 213, Taf. VIII.
 Globigerinen 242.
 Glockentierchen 214, Taf. VIII.
 Globoide bei Ricinus 48, 53.
 Gloeotrichia, planktonisch 185, Taf. VII.
 Glukosazon 35.
 Glukose, in Zuckerrübe 38.
 —, Nachweis 34.
 Glutamin, in Zuckerrübe 38.
 Glyceria aquatica 209, 233.
 Glycerin, zum Einbetten 44.
 Glyceringelatine, zum Einbetten 42.
 Glycogen, Hefen 140.
 —, Myxomyceten 109.
 —, Phallus 172.
 Goldglanz bei Algen 187.
 Golfkraut 205.
 Gomphonema acuminatum 193, Taf. VII.
 Goppelsroeders Kapillaranalyse 15.
 Graphis scripta 179, Taf. VI.
 Grashalm, Knoten 87.
 Grenzzellen bei Spaltalgen 184.
 Grimmia pulvinata 252, Taf. XII.
 Größenbestimmung, mikrosk. Objekte 105.
 Grundregion 234.
 Gründüngung durch Lupinen 126.
 Grünkohlversuch, Chlorophyllzersetzung 15.
 Grünling (Tricholoma) 167.
 Gulnaria 217, Taf. VIII.
 Gymnodinium palustre 189.
 Gyrophora cylindrica 177, Taf. VI.
 Habichtspilz 163.
 Hafer, Flugbrand 159, Taf. IV.
 Haffblüte 184.
 Hallimasch 169, Taf. V.
 Halophyten, Osmose 29.
 —, Anpassung 64.
 Halteria grandinella, Plankton 213, Taf. VIII.
 Hanffaser 242.
 Hantzschia amphioxys, Ernährung 194, Taf. VII.
 Haptotaxis gordioides 215.
 Haptotropismus 90.
 Hartbovist 172.
 Härte des Wassers 232.
 Härtebestimmung 232.
 Härteskala 232.
 Harzergüsse, durch Pilze hervorgerufen 169.
 Hausschwamm 163, Taf. V.
 Haustorien 58.
 Hedysarum gyrans 85.
 Hefen 138 ff.
 —, System 139.
 —, untergärtige 138.
 Heizungsbazillus 128.
 Helianthus annuus, Wurzeldruck 62.
 Helio(Photo-)taxis bei Euglena 188.
 —, bei Fuligo 108.
 Heliotropismus, s. Phototropismus 88.
 Heliozoen, Fundorte 110.

- Heliozoen, Lebensweise 212.
 Helvella esculenta 162.
 Helvellasäure 162.
 Hemizellulose 47.
 Hepaticae (Lebermoose) 245.
 Heracleum sphondylium 16.
 Herbarium für Pilze 172.
 Herbstblätter, Färbung 16.
 Herkuleskeule 163, Taf. V.
 Hernie, Kohl, 156, Taf. IV.
 Heterocysten 184.
 Heterotrophe Ernährung 55.
 Heterotrophe Formation 243.
 Heterozygotische Keimzellen 98.
 Heu, Selbsterwärmung 128.
 Heubazillus 127, 185, Taf. VII.
 Hexenringe bei Penicillium 153.
 Hirschpilz (Clavaria) 163.
 Hirtentäschelkraut, Wirtspflanze d. weißen
 Rostes 156, Tafel IV.
 Hochwasser, Einwirkung 242.
 Hohlzahn, Chlorophyll 17.
 Holunder, Chlorophyllkörner 90.
 Holzfasern, zersetzt 242.
 Holzkörper, Saftleitung 62.
 Holzpilz (Xylaria) 162.
 Homothallische Mycelien 149.
 Homozygotische Keimzellen 98.
 Honigtau der Gräser 158.
 Hopfen, Winden 87.
 Hordeum, Atmung d. Samen 70.
 —, Wärmebildung bei Atmung 73.
 Hormone, Reizstoffe 76.
 Hornkraut 209, Tafel VII.
 Hornzahnmoos 251, Taf. XII.
 Höschen d. Wurzelhaare 60.
 Hostienpilz 124.
 Hüpfertling 219, Taf. VIII.
 Hutwerfer (Pilobolus) 150.
 Hyalodaphnia, euplanktonisch 220,
 Taf. VIII.
 Hyalodiscus limax 211, Taf. VIII.
 Hybride (Mischlinge) 99.
 Hydathoden 165.
 Hydnum auriscalpium 163, Taf. V.
 — imbricatum 163.
 Hydra, frisst Daphnien 215, Taf. VIII.
 Hydrachna globosa 220, Taf. VIII.
 Hydrocharis morsus ranae, Froschbiß 209,
 Taf. VII.
 Hydrolyse der Stärke 45.
 Hydrometra lacustris 221.
 Hydrophyten 64.
 Hydropsyche 221, Taf. VIII.
 Hydrotropismus bei Wurzeln 93.
 Hydrochastisch 82.
 Hygroskopische Mechanismen 80, 263.
 Hylacomium squarrosum 7, 258.
 — splendens 258.
 Hypholoma fasciculare 167.
 Hyphomycetes 149.
 Hypnum cupressiforme 257.
 — cuspidatum 218.
 — molluscum 258.
 — purum 258.
 — schreberi 258.
 Imbibitionsmechanismen 80.
 Impatiens, Nachweis d. Leitungsbahnen 62.
 —, — Springfrucht 83.
 Impfstrikkulturen bei Hefen 141.
 Indigomethode 7.
 Indusium 262.
 Infiltration der Blätter 66.
 Injektion der Blätter 66.
 Interzellularräume 65.
 — bei d. Zuckerrübe 39.
 Intramolekulare Atmung 72.
 Intussusceptionswachstum 76.
 Inulin bei Kompositen 42.
 Inversion des Rohrzuckers 36.
 Invertase 36.
 Jod, Stärkenachweis 203.
 Jod-Jodkalium, Stärkenachweis 40.
 Jodoform, Nachweis v. Alkohol 145.
 Iris, Stärkebildner 42.
 Isländisches Moos 175.
 Isoetes lacustris 208, 264, Taf. VII.
 Isosmotische Lösungen 26.
 Isotonischer Koeffizient 27.
 Isotonische Lösungen 26.
 Jungermannia 249, Tafel XII.
 Justicia carnea, Verdunstung d. Blätter 64.
 Kahlhaut beim Heubazillus 127.
 — bei Hefen 139.
 Kalimethode für Karotin 18.
 Kalkalgen 207.
 Kalkmoose 258.
 Kammalge 191, Taf. VII.
 Kammerplankton 228.
 —, Bilder davon 230.
 Kampfenzyme 180.
 Kannenpflanze, Pepsinabsonderung 50.
 Kapillaranalyse d. Chlorophylls 15.
 Kapillitium 108, 172.
 Karotin, 10, 17.
 — bei Hefen 140.
 —, Kalimethode 18.
 —, Kristalle 18.
 Karotinoide 11.
 — bei Schimmelpilzen 154.
 Karpogon 178.
 Kartoffel, Korkgewebe 43.
 —, Kulturmedium für Bakterien 113 ff.
 —, Schwarzbeinigkeit 156.
 —, Stärke 43.
 —, Substrat für Schimmelpilze 147.
 Katharobien 241.
 Kaulquappe 222, Taf. VIII.
 Keimlinge, Wachstum 78.
 Keimung, Moossporen 246.
 —, Myxomycetensporen 108.
 —, Pollenkörner 97.
 Kieselalgen 190 ff.
 Kirchneriella lunata 228.
 Kirschen, Krankheit 159.
 —, Osmose 32.
 —, Zuckernachweis 34.
 Klatschpräparate 131.
 Klee, Schlafstellung d. Blätter 90.
 Kleingärmethode 145.
 Klinostatenbewegung 87, 88.
 Knöllchenbakterium 126.

- Knollenblätterpilz 170, Taf. V.
 Knopsche Nährlösung 3.
 Kobaltprobe, Nachweis der Transpiration 63.
 Köcherfliege 221, Taf. VIII.
 Kochsalz, Chemotropismus 92.
 —, Wirkung auf Plankton 29.
 Kohäsion d. Wassers 56, 222.
 Kohäsionsmechanismen 262.
 Kohl, Hernie 156, Taf. IV.
 Kohlenhydrate in Zuckerrüben 38.
 — als Nährstoffe 141, 142.
 Kohlenbildung 259.
 Kohlensäure, Assimilation 4.
 —, Ausscheidung 69.
 —, bei Gärung 142 ff.
 —, Nachweis 69.
 Kohlenstoffassimilation 4, 190.
 Kohlepartikel 242.
 Kokosnuß, Zuckernachweis 36.
 Kolbenschimmel 152.
 Kolloidales Ferrocyanokupfer 23.
 Kompensations-Okulare 106.
 Konidien bei *Penicillium* 153.
 —, Konidienträger bei *Peziza* 162.
 Koniferen, Keimlinge 12.
 Königsfarn, 260, 261.
 Kontraktion durch Plasmolyse 31.
 Kopier (Tinten-) stift-Methode 117.
 Korallenalge 207.
 Korallenpilz (*Clavaria*) 163.
 Korkgewebe, Verdunstungshemmung 67.
 Korkwarzen 67.
 Korrelation 77.
 Korrosion der Stärkekörner 46.
 — von Marmorplatten durch Wurzeln 61.
 Kötyledonen d. Erbse, Stärkegehalt 53.
 Krankheiten der Kulturpflanzen 155.
 Krätzeflechte 177, Taf. VI.
 Kraushaarialge 199, Taf. VII.
 Krebschenlarve 219, Taf. VIII.
 Krebspanzer, Farbstoff 19.
 Kreisblatfflechte 177, Taf. VI.
 Kreislauf der Materie 244.
 Kreuzblütler, Nährpflanzen der *Plasmodiophora* 156.
 Kriebelmücke 221, Taf. VIII.
 Krustenflechten 175.
 Kryohydratpunkt 32.
 Küchenzwiebel, Zuckernachweis 34.
 Kugelialge, 197, Taf. VII.
 Kugelmuschel, 218, Tafel VIII.
 Kugelkristalle von Inulin 42.
 Kultur, Bakterien 113 ff.
 — höherer Pilze 167 ff.
 —, Diatomeen 190.
 —, Farnprothallien 264.
 —, Tonschalen 92.
 Kulturgefäße für Schimmelpilze u. Hefen 147 ff.
 Kulturhefen 139 ff.
 Kulturmedien für Bakterien 113.
 — für Hefen 141.
 — für Algen 190.
 Kürbis, Ranken 90.
 —, Öl in Samen 49.
 Kutikuläre Transpiration 64.
 Laccase 164.
 Lackmusflechte 176.
 Lackmus-Molke-Kulturen 115.
Lactaria deliciosa 165, Taf. V.
 — *piperata* 165.
 Laichkraut 7, 209, 233.
Laminaria, Abbild. 202.
 —, Jodnachweis 203.
 — *saccharina*, Mannit 202.
 —, Quellung 203.
Lamprocystis roseo-persicina 137, 186, Taf. VII.
 —, Farbstoff 137.
 —, Standort 111.
Lampropedia 119, 185, Taf. VII.
 —, Fundort 112.
 Landkartenflechte 179, Taf. VI.
Lathraea squamaria 58.
 Laubmoose 245.
 Lebermoose 245.
Lecanora esculenta 178.
 — *subfusca* 178, Taf. VI.
Lecanorsäure 178.
Lecidea 179.
 Lederbeeren bei Trauben 157.
 Leguminosen, Knöllchen 126.
 —, Schlafstellung 90.
 Leitungsbahnen d. Saftes 62.
Lemanea fluviatilis in Kaskaden 205, Taf. VII.
Lemna arrhiza, Anpassung 61, 209.
 — *trislula* 90, 209, 233.
 Lenticellen 67.
Lepidium, sativum 60.
Lepidozia reptans 250.
Lepiota procera 169.
Lepocinclis ovum 230.
 Lepra, Flechten 180.
Leptodora, räuberisch 220, Taf. VIII.
Leptomitus lacteus 151, 208, Tafel VII.
 Leuchtbakterien 118, Taf. VII.
 Leuchtmooos 253.
Leucobryum glaucum 252, Taf. XII.
 Leukoplasten 66.
 Lichenes 172.
Lichina 178.
 Lichtlage der Blätter 88.
Limnaea auricularia 217, Taf. VIII.
 — *stagnalis* 217, Taf. VIII.
 Limonadenbiere 127.
Linaria cymbalaria, Phototropismus 88.
 Lindnersche Flaschen 140.
 — Tröpfchenkultur 142.
Lionotus 213, Taf. VIII.
 Literbecher aus Aluminium 235, Taf. X.
 Litorale Zone der Gewässer 233.
 Löcherpilz (*Polyporus*) 163.
 Lohnsteins Saccharometer 36.
 Lohpilz 107.
Lophocolea 249, Taf. XII.
Loxophyllum fasciola 213, Taf. VIII.
 Luftströme in der Pflanze 65.
 Luftwurzeln 65.
 Lupen 103 ff, Taf. X.
Lupinus albus, Asparaginnachweis 54.
 —, Chemotropismus 91.
 —, Gewebespannung 29.

- Lupinus albus, Plasmolyse 29.
 — luteus, Quellung d. Samen 78.
 Lycogala epidendron 110.
 Lycoperdon bovista 172.
 —, gemmatum 172, Taf. V.
 Lycopodium 264.
 — clavatum 264.

 Macrobiotus macronyx 220, Taf. VIII.
 Macrocystis 203.
 Magnesiumchlorid, Meerwasser 207.
 Mahonia, Reiz 85.
 Mais, Eiweißsynthese 54.
 Maischwamm (Tricholoma) 165.
 Makrosporen 266.
 Mallomonas acaroides 187, Taf. VII.
 Maltase 45.
 Maltose 45.
 Malva silvestris, Bestäubung 97.
 Malz, -Agar 141.
 —, -Körner, Diastasewirkung 45.
 —, -Peptone 114.
 —, -Zucker 45.
 Mannaflechte 178.
 Mannit bei Pilzen 161, 171.
 —, bei Tangen 202.
 Mannose 47.
 Manubrium 185.
 Marasmius alliaceus 165.
 — alliatus 165.
 — rotula 165.
 — scorodoni 165.
 Marchantia polymorpha 247.
 —, Kultur 248.
 —, Assimilationszellen 249.
 Mark, lebendes 30.
 Marsilia quadrifolia 261.
 Mechanismus der Farnsporangien 262.
 Meeresdiatomeen 191.
 Meerespflanzen, Osmose 29.
 Meer, Sedimente 242.
 Meersalat 199.
 Mehltau d. Stachelbeere 158.
 — d. Weins 157.
 Melampyrum 58.
 Melandryum, hygroskopische Kapseln 80.
 —, Saftleitung in Blüten 62.
 Melicitose 33.
 Melosira Species 190, Taf. VII.
 Mendel-Gesetze 98.
 Mercurialis, Chemonastie 81.
 Merismopedia glauca 119, 183, Taf. VII.
 Merulius lacrymans 163, Taf. V.
 Mesosaprobien 239.
 Metzgeria, xerophytisch 250.
 Micellen 75.
 Micrococcus phosphoreus 118, 185, Taf. VII.
 — ureae 124.
 Microcystis aeruginosa 181, Taf. VII.
 Microspira desulfuricans 130.
 Mikrokosmos, Seen 244.
 Mikrophotographie 106.
 Mikroskope 103 ff.
 Mikroskop, horizontales 79.
 Mikrosporen 266.
 Milchsäure bei Pilzen 165.
 — in höheren Pflanzen 42.
 Milchsäure 121.
 Milchsäurebakterium 121.
 Millons Reagens, Eiweißnachweis 49.
 Mimosa pudica 85.
 —, Geschw. d. Reizleitung 80.
 Mineralisation 238.
 Mischplankton 228.
 Mittelmeer, Kammerplankton 230.
 Mixotrophe Ernährung 55, 180.
 Mnium, Chlorophyllkörner 255, Taf. XII.
 Mohrrübe, Glukosenachweis 34.
 —, Karotin 18.
 —, Osmose 20.
 —, Pilzkrankheit 160.
 —, Zuckernachweis 34.
 Molekulargewicht, bestimmbar durch isotonische Lösungen 27.
 Möllers Diatomeen-Typenplatte 106.
 Momordica, Springfrucht 83.
 Monaden, goldgelbe 186.
 Monas vivipara 212, Taf. VIII.
 Monilia cinerea 159, 160, Taf. IV.
 — sitophila 154.
 Monosaccharide 33.
 Monótropha hypópitys 55, 97.
 Moos, Moose 245.
 —, Ast- 257.
 —, Austrocknen 256, 259.
 —, Bart- 252.
 —, Besen- 251, Taf. XII.
 —, Dreh- 253, Taf. XII.
 —, Etagen- 258.
 — auf Gartenwegen 252.
 —, Geschlechtsorgane 255.
 —, Hornzahn- 251, Taf. XII.
 — in Höhlen 257.
 —, isländisches 175.
 —, Kalk- 258.
 —, Keimung d. Sporen 246.
 —, Kultur 246.
 —, Lebensbedingungen 246.
 —, Leucht- 255.
 — als Pioniere 254.
 —, Quell 256.
 —, Saprophyten 246.
 —, Torf- 250, Taf. XII.
 —, Wasserzellen 250.
 —, Tropen- 246.
 —, Wald- 255.
 —, Wasserleitung der 256.
 —, Weiß- 252, Taf. XII.
 Moostier 217, Taf. VIII.
 Moosvegetation, Arktis 246.
 —, Tropen 246.
 Morchella conica 162, Taf. V.
 — esculenta 162.
 Mougeotia genuflexa, Chromatophorenstellung 195, Taf. VII.
 Mucor, Luftschimmel 149, Taf. III.
 —, Wasserschimmel 149, 208, Taf. VII.
 Mündungsgebiete d. Flüsse 29, 244.
 Muscarin 170.
 Muschelkrebschen 219, Taf. VIII.
 Musci 245.
 Muscineae 245.
 Musseron 165.
 Mutation 99.

- Mutterkornpilz 158, Taf. IV.
 Mycel 161.
 Mycelleiter 169.
Mycena Species 166, Taf. V.
Mycetophila 161.
Mycoderma 140.
Mycorrhiza 154.
 — bei Saprophyten 55.
 —, ektotrophe 155.
 —, endotrophe 155.
Myriophyllum spicatum 7, 209, Taf. VII.
Myristica 65, 207.
Myxamöbe 109.
Myxomycetes 107.
 —, Ölgehalt 51.

 Nabelpilz 166, Taf. V.
 Nacktschnecken als Pilzfresser 161.
 Nähragar 114.
 Nährboden für Bakterien 113 ff.
 — für Hefen 140.
 — für Diatomeen 190.
 Nährbouillon 113.
 Nährgelatine 114.
 Nährlösung für Hefen 141.
 — für Schimmelpilze 147.
 — nach Beijerinck 100.
 — nach Diakonow 148.
 — nach Hansen 142.
 — nach Hayduck 142.
 — nach Kolkwitz 142.
 — nach Pasteur 141.
 — nach Raulin 148.
 Nährsalz, mineralisch, Lösungen 3, 4, 54, 267.
 —, Tabletten 4.
 Nannoplankton 187, 223, Taf. VII.
Narcissus, Keimung d. Pollenkörner 97.
 Naturselbstdruck 205.
Nauplius 219, Taf. VIII.
Navicula Species, Standorte 193, Taf. VII.
Nectria cinnabarina 158, Taf. V.
 — ditissima 159.
 Nektarorganismen 138.
 Nematoden 216.
Neottia nidus avis 55.
Nepa cinerea 221.
Nepenthes als Halbsaprophyt 57.
 —, Pepsinabsonderung 50.
Nephele, Nahrung 215, Taf. VIII.
 Neuston, Definition 222.
Nitella, Plasmaströmung 245.
 —, Ökologie 208, 245, Taf. VII.
 Nitratbildner 124—126.
 Nitrate in *Chenopodium* 39.
 Nitritbildner 130.
Nitrosomonas europaea 130.
Nitzschia acicularis 194, Taf. VII.
 — sigmoidea 194, Taf. VII.
Noctiluca miliaris 119.
Nodularia spumigena, Ostsee 184.
 Nordsee, Plankton 230.
Nostoc in Flechten 177, 178.
 — punctiforme 184.
 — verrucosum 184, Taf. VII.
Notonecta glauca 221, Taf. VIII.
Nucellar-Embryonen 97.

 Nutation, revolute 87.
Nyctalis parasitica 165, Taf. V.
 Nyktinastische Bewegungen 89.

 Objektträger, schwarze 262.
Odontoglossum mit Wurzelpilz 56.
Oedogonium rivulare 200, Taf. VII.
 Ökologie der Gewässer 232.
 Öffnungsmechanismus der Farnsporangien 262.
 Ohröffelpilz 163, Taf. V.
 Ohrschnecke 217, Taf. VIII.
Oidium lactis 153.
 — tuckeri 157.
 Öl, in Rizinusamen 48.
 —, Nachweis 51.
 —, Transport 50.
 —, Umwandlung in Zucker 49.
 —, Zerspaltung 50.
 Oligosaproben 241.
 Oligotrophe Formation 243.
Olpidium luxurians 157.
 Omnipotenz der Zellen 94.
Omphalia fibula 166, Taf. V.
Ophioglossum vulgatum 264.
Ophrydium versatile, gelatinös 184, 215.
Orchestia litorea 218.
 Orchidaceen, Symbiose 56.
 Orchideen, Drehung des Fruchtknotens 87.
 Organischer Detritus 242.
 — Filz 234.
Orobanche speciosa 57.
Oscillatoria agardhii 183, Taf. VII.
 — limosa 183, Taf. VII.
 Oscillatorien, Ökologie 183.
 Osmiumsäure, Nachweis von Fett 51.
 Osmose 19 ff.
Oxalis, Stoß-(Erschütterungs-)reiz 85.
Oxalsäure in Zuckerrübe 38.
Oxydasen 164.
 Oxydationsreinigung 125.
 Ozean, Plankton 230.
 Ozon zum Sterilisieren 113.

 Paketkokken 119.
 Palisadenzellen 11.
 Palmentang 203.
Paludina vivipara 217, Taf. VIII.
Panaeolus campanulatus 164.
Pandorina morum 197, Taf. VII.
 Pantoffel-Diatomee 194, Taf. VII.
 Pantoffeltierchen 213, Taf. VIII.
 Paraboloidkondensor, Bakterienbeobachtung 112.
 Paraffin, Einbettung 176.
Paramaecium caudatum α m 213, Taf. VIII.
 Paraphysen bei *Russula* 165.
 Parasiten, höhere Pflanzen 57, 58.
 —, Pilze 155 ff.
 Parasolpilz 169.
 paratonische Bewegungen 80.
 Parenchym im Schwammgewebe 11.
 — in der Zuckerrübe 39.
 Parmélgelb 176.
Parmelia physodes 177, Taf. VI.
 Parthenocarpie 97.
 Parthenocissus, Ranken 91.

- Parthenogenesis 97.
 Pasteurisieren 113.
 Pediatrum Species 198, Taf. VII.
 Pellionia daveauana, Stärkebildner 41.
 Peltigera canina 177, Taf. VI.
 Pelzmonade 187, Taf. VII.
 Penicillium breviaule, Arsenprobe 153.
 — glaucum 153, Taf. III.
 — — in Kokosnuß 36.
 — —, Keime in Luft 116.
 Pepsin 50.
 Peridinium divergens 189, Taf. VII.
 — tabulatum 189, Taf. VII.
 Perigordtrüffel 162.
 Periodisch planktonisch 185.
 Peristom 256.
 Peristomzähne 252.
 Perla bicaudata 220, Taf. VIII.
 Permeabilität des Plasmaschlauches 20, 31.
 Peronospora viticola 157, Taf. IV.
 Pertusaria communis 180.
 Petrischalen 115, Taf. II.
 Petroleumbildung 259.
 Peziza aurantia 162, Taf. V.
 Pfahlkratzer 237, Taf. X.
 Pfefferling 164.
 Pferdemit für Kultur von Mucor 147, 149.
 Pflanzenzerstörendes Bakterium 156,
 Taf. IV.
 Pflaume, Zuckernachweis 34.
 Pflaumendekokt 147.
 Pflropfbastarde 99.
 Phacotus lenticularis 230.
 Phacus longicauda 189, Taf. VII.
 Phaenotypus 95.
 Phaeophyceae 202.
 Phaeosporae 167.
 Phajus grandifolius, Stärkebildner 42.
 Phallus impudicus 170.
 Phascum curvicolle 246.
 Phaseolus multiflorus, Schlafstellung d.
 Blätter 30.
 Phenylhydrazin, Zuckernachweis 35.
 Philadelphus, Verdunstung d. Blätter 64.
 Philodina aculeata 217, Taf. VIII.
 Phoenix, Reservezellulose 47.
 Phoma rostrupii 160, Taf. IV.
 Phormidium uncinatum 183, Taf. VII.
 Phosphatide 76.
 Phosphorbronze 235.
 Phosphor in Rizinussamen 48.
 —, Nachweis 48.
 Photonastie 89.
 Phototaxis 90.
 Phototropismus 88.
 Phragmidium rosarum 160.
 Phragmites communis 209.
 Phreoryctes menkeanus 215.
 Phryganea, Gehäuse 221, Taf. VIII.
 Phycocyan 183.
 Phycoerythrin, Bedeutung 206.
 Phycomyces nitens 150.
 Phycomycetes 148.
 Physiol 176.
 Physodin 177.
 Phytelephas, Reservezellulose 47.
 Phytol, in Chlorophyll 17.
 Phytophthora infestans 157.
 Picea excelsa, Papierfabrikation 33, 34.
 Pilobolus 150, Taf. III.
 Pilze, höhere 138 ff.
 —, parasitische 155 ff.
 —, Schimmel- 146 ff.
 —, Schleim- 102 ff.
 —, Spalt- 111 ff.
 Pinguicula vulgaris 57.
 Pinnularia 193, Taf. VII.
 Pinselschimmel 152.
 — in Kokosnuß 36.
 Planaria, animalische Nahrung 215, Taf.
 VIII.
 Plankton, Definition 222.
 —, Fangmethoden 223.
 —, Gläser 235.
 —, Hauptbestandteile 222.
 —, Kammer 103, 236, Taf. 1, X.
 —, Konservierung 223.
 — -Kunde u. Bakteriologie 224.
 — -mengen 225, 229.
 — -nahrung 228.
 — -netz 234.
 —, Osmose 29.
 —, Ökologie 233.
 — -pumpe 237.
 — -region 233.
 — -Röhrchen 225.
 —, Sauerstoffproduktion 230.
 —, Schwebefähigkeit 224.
 — -sieb 106, 235, Taf. X.
 — -zusammensetzung 227.
 — in 1 ccm 229 ff.
 —, Misch- 228.
 —, Seen- 225.
 —, Tiefen- 228.
 —, Winter- 226.
 — u. Wasserbeschaffenheit 226, 240.
 —, Ernährung 224.
 —, Bodensee 229.
 —, Rhein 230, 244.
 —, Mittelmeer 230.
 —, Nordsee 230.
 —, Atlantischer Ozean 230.
 —, Gebirgsseen 229.
 —, Gebirgsbäche 225.
 Planorbis corneus 217, Taf. VIII.
 Plasma, extramembranös 183.
 —, Strömung 79, 84, 245.
 Plasmodiophora brassicae 156, Taf. IV.
 Plasmodium 107.
 Plasmolyse 28, 31.
 Plasmopara viticola 157.
 Plasmorhyse 28.
 Plattengießen 115.
 Pleurosigma, Testobjekt 105, 193.
 — acuminatum 193, Taf. VII.
 Plumatella repens 217, Taf. VIII.
 Pneumatophoren 65.
 Podetien 175.
 Podura aquatica 220, Taf. VIII.
 Polarisation, Mikroskop 83.
 —, Zuckernachweis 36.
 Polarität d. Zweige 79.
 Pollen, bei Cycas 270.
 —, Keimung 97.

- Polyarthra platyptera 217, Taf. VIII.
 Polycystis aeruginosa 181, Taf. VII.
 Polygonum fagopyrum, Eiweißsynthese 54.
 Polyp (Hydra) 215, Taf. VIII.
 Polypodium vulgare 262.
 Polyporus versicolor 163, Taf. V.
 Polysaprobien 239.
 Polyoma uvella, farblos 197, Taf. VII.
 Polytrichum, Bau u. Leben 255, Taf. XII.
 Pontosphaera huxleyi 188, Taf. VII.
 Posthornschncke 217, Taf. VIII.
 Potamogeton perfoliatus 7, 209, 233.
 Präparieren, höhere Pilze 172.
 Preiselbeeren, Pilzkrankheit 160, Taf. IV.
 Preissia commutata 249.
 Preßhefe 142.
 Primordialschlauch 28, 39.
 Produktionskraft der Gewässer 227.
 Profundal der Gewässer 234.
 Proteus 124.
 Prothallien, Anzucht 267.
 — von Aspidium 267.
 — von Botrychium 265.
 — des Bärlapps 264.
 — -generation 264.
 — der Natternzunge 264.
 Prothallium, geschlechtsreif 267.
 Protococcus in Flechten 174.
 Protonema 253.
 — aus Seten 258.
 — bei Pogonatum 256.
 Protoplasma 84.
 — -Schlauch 28, 39.
 Psalliotia campestris 167.
 Pseudodichotomie 135, 184.
 Pseudomonas europaea 130.
 — fluorescens 9, 129, Taf. VII.
 — violacea 129.
 Psora ostreata 177, Taf. VI.
 Pteridophyta 259.
 Pteromonas alata 228.
 Puccinia graminis 159, Taf. IV.
 Purpurbakterien 137, Taf. VII.
 Purpurspirillum 186.
 Putrescin 164.
 Pykniden auf Mohrrübe 160.
 Pyramidenpappel, Wipfeldürre 96.
 Pyrenoide 196.

 Quellmoos 208, 256, Taf. VII.
 Quellung, Allgemeines 75.
 — der Stärkekörner 43.
 Quellungsdruck, -kraft 76, 77, 78.
 Quellungsmesser (Physometer) 78.

 Rädertiere 216.
 Radiolarien 242.
 Raffinose in Zuckerrübe 38.
 Rana esculenta 222, Taf. VIII.
 Rauken 90.
 Rattenhaar 242.
 Rattenschwanzlarve 221, Taf. VIII.
 Reduktionsteilung 96.
 Rehpilz (Hydnum) 163.
 Reine Linien 98.
 Reinkulturen, Bakterien 113 ff.
 —, Hefen 140 ff.

 Reinkulturen, Schimmelpilze 147 ff.
 —, Diatomeen 190.
 Reiz, Allgemeines 79.
 Reizbewegung bei Mimosa 85.
 — bei Ranken 90.
 Reizbewegungen, Tabelle 81.
 Reizleitung, Geschwindigkeit 80.
 —, Gräser 89.
 —, Mimosa 85.
 —, Ranken 80, 90.
 Reizker (Lactaria) 165.
 Reizmechanismus bei Mimosa 85.
 Reizschwelle 80.
 Reizstoffe, Hormone 76.
 Renntierflechte 175.
 Reservestärke 43, 207.
 Reservecellulose 47.
 Reticularia lycoperdon 108.
 Revolute Nutation 87.
 Rhacomitrium sudeticum 253, Taf. XII.
 Rhaphidium polymorphum 198, Taf. VII.
 Rhein, Plankton 230, 244.
 —, Seston des 244.
 Rheotaxis 108, 223.
 Rheotropismus 93.
 Rhinanthus 58.
 Rhizocarpon geographicum 179, Taf. VI.
 Rhizoiden 270.
 Rhizomorpha subterranea 169.
 Rhizopoden, Fundorte 110.
 Rhizopus nigricans 149, Taf. III.
 Rhizosolenia semispina 191, 230.
 Rhodospirillum 186.
 Rhoicospheia curvata, Ernährung 193, Taf. VII.
 Rhynchostegium rusciforme 257.
 Rhytisma acerinum 157, Taf. IV.
 Ribes, Verdunstung der Blätter 64.
 Riccia fluitans 249, Taf. XII.
 Richteriella botryoides, Ernährung 198, Taf. VII.
 Ricin 51.
 Ricinus communis, Gewebespannung 30.
 —, Globoide 48, 53.
 —, Keimung 47.
 —, Ölgehalt des Samens 48.
 Riesenfarne der Vorzeit 260.
 Rindenspannung 31.
 Ringelungsversuche, an Zweigen 63.
 Rivularia, Lebensweise 185, Taf. VII.
 Roccella tinctoria 176.
 Rohrzucker, in Zuckerrübe 38.
 —, Kristalle 40.
 Rollkulturen nach Esmarch 115.
 Romijns Planktonnetz 235.
 Rost des Getreides 159.
 —, weißer an Cruciferen 156.
 Rotalgen 205.
 Rotationsbewegung des Plasmas 84.
 Rotatoria, Nahrung 216.
 Rotifer actinurus 216, Taf. VIII.
 Rotkohl, Anthocyan 31.
 Rotpustelkrankheit der Bäume 158, Taf. IV.
 Rottanne, Papierfabrikation 33.
 Rozites gongylophora 170.
 Rübenschnitzel, Diffusion 39.
 Rübsen, Atmung 70.

- Rückenschwimmer 221, Taf. VIII.
 Runkelrübe, Zuckernachweis 35.
 Rüsselkrebschen 220, Taf. VIII.
 Russula adusta 165, Taf. V.
 — nigricans 165.
 — rubra 165.
 Russulina 165.

 Saccharometer 36.
 Saccharomyces 139.
 Saccharose 36.
 Saft, Leitungsbahnen 62.
 Sägespan-Alge 184, Taf. VII.
 Salix fragilis, Austreiben 79.
 Salpeterbakterien 124.
 —, Eiweißsynthese 5.
 —, Rohkultur 126.
 Salpeterfresser 124.
 Salpeterplantagen 126.
 Salvinia natans 208, 265.
 Sambucus nigra, Chlorophyllkörner 90.
 —, Gewebespannung 30.
 —, Lentizellen 67.
 —, Verdunstung der Blätter 64.
 Sanchezia nobilis, Wurzeldruck 62.
 Saprobien, Ökologie 181.
 —, marine 181.
 Saprolegnia monoica 151, 208, Taf. III u. VII.
 Saprophyten, Moose 246.
 Sarcina, 119, 185, Taf. VII.
 Sargassum bacciferum 205.
 Sauerstoff, Ausscheidung 4.
 —, Bestimmung 231.
 —, Produktion durch Plankton 230.
 —, Sättigungsmenge 231.
 —, Überträger 19.
 —, Verbrauch bei Atmung 71.
 Sauginfuser 215, Taf. VIII.
 Säulchenflechte 175, Taf. VI.
 Scenedesmus Species 198, 228, Taf. VII.
 Scharrnetz 238, Taf. X.
 Schattenblatt 11.
 Schaumstruktur des Zellgewebes 39.
 Scheibenflechte 178.
 Schildflechte 177, Taf. VI.
 Schilf 234.
 Schilfmesser 237, Taf. X.
 Schimmel der Stubenfliege 156.
 Schimmelpilze 146 ff.
 Schistostega osmundacea 253.
 Schizomycetes, Färbung 117.
 —, Fundort 111 ff.
 —, Geißeln 112.
 —, Kultur 113 ff.
 —, System 118.
 Schizophyceae 181.
 Schizosaccharomycetes 140.
 Schlafbewegungen 89.
 Schlammegel 215, Taf. VIII.
 Schlammheber 238, Taf. X.
 Schlamm Schnecke 217, Taf. VIII.
 Schlamm Sieb 238, Taf. X.
 Schlammwurm 216, Taf. VIII.
 Schlauchalge 201, Taf. VII.
 Schleier, bei Beggiatoa 136.
 —, bei Pilzen 167.
 Schleimfluß, Organismen 152.
 Schleimpilze 107.
 Schleudermechanismus der Sporangien 262.
 Schlingpflanzen 87.
 Schmarotzer, höhere Pflanzen 57, 58.
 —, Pilze 155 ff.
 Schraubenalge 195, Taf. VII.
 Schraubenbakterien 118.
 —, Fundort 112.
 Schriftflechte 179, Taf. VI.
 Schrumpfung bei Antheren 82.
 Schüsselflechte 177, Taf. VI.
 Schwadengras 209, 233.
 Schwammgewebe 11.
 Schwammnadel 215.
 Schwarzbeinigkeit d. Kartoffel 156, Taf. IV.
 Schwebevakuiolen 181—184.
 Schwefelbakterien 135.
 —, Eiweißsynthese 5.
 —, Fundorte 111.
 —, Rohkulturen 136.
 Schwefelkopf (Hypholoma) 167.
 Schweinsblase, Osmose 22.
 Schwimmschicht 129, 183.
 Scleroderma vulgare 172, Taf. V.
 Sclerotinia cinerea 159, Taf. IV.
 Seismonastie 85.
 Sekundäre Verunreinigung 241.
 Seegras 209.
 Seenplankton 225.
 Seenstudien 241.
 Selaginella 79, 264.
 Selektives Verhalten der Wurzeln 61.
 Selbstverunreinigung 241.
 Selektion 100.
 Selenastrum bibraianum 228.
 Semipermeable Membranen 19.
 — bei Zuckerrübe 39.
 Sempervivum, Blattbewegung 81.
 Septic-tank 129.
 Seston 222, 225.
 —, Abbildung, S. 242.
 — des Rheins 244.
 Sialis lutaria 221, Taf. VIII.
 Sichtscheibe 237, Taf. X.
 Sichttiefe 226, 237.
 Siderocapsa treubii 134, 202.
 Silbermoos 252, Taf. XII.
 Silicoflagellata 187.
 Silikatzellen 24, 26.
 Simulium ornatum 221, Taf. VIII.
 Sinkstoffe 129.
 Sklerotium des Mutterkorns 158.
 — bei Schimmelpilzen 154.
 Skorpion-Wasserwanze 221.
 Solanum tuberosum, s. Kartoffel.
 Soldanella, Wärmebildung 73.
 Sonnenblatt 11.
 Sonnenblume, Wurzeldruck 62.
 Sonnentau, Kultur 56.
 —, Pepsinabsonderung 50.
 Sonnentierchen 212, Taf. VIII.
 Soredien 173.
 Sori der Farne 261.
 Spaltalgen 181.
 Spalthefen 140.
 Spaltöffnungen, bei Tradescantia 16.

- Spaltöffnungen, Funktion 66.
 Spaltpilze, Begeißelung 118.
 —, Färbung 117.
 —, Fundorte 111, 112.
 —, Kultur 113 ff.
 —, System 118.
 Sparassis crispa 162.
 Sparmannia, Reiz 85.
 Speichel, Wirkung auf Stärke 46.
 Spermatozoiden bei Cycadeen 271.
 — bei Farnen 268.
 Sphaerium corneum 218, Taf. VIII.
 Sphaerotheca mors uvae 158, Taf. IV.
 Sphaerotilus 134, 186, Taf. VII.
 — roseus 186.
 Sphagnum cymbifolium 250, Taf. XII.
 Sphagnum, Säure 250.
 —, Sporangienmechanismus 251.
 Spindelalge 194, Taf. VII.
 Spiralfaser 242.
 Spirillum undula 130, 185, Taf. VII.
 Spirochaete plicatilis 212, Taf. VIII.
 Spirogyra nitida 196.
 —, porticalis 195, Taf. VII.
 Spirogyra, Assimilation 7.
 —, Kopulation 195.
 —, Stärkebildung 195.
 Spirostomum ambiguum 214, Taf. VIII.
 Spirulina, Lebensweise 183, Taf. VII.
 Spitzmorchel 162, Taf. V.
 Spongilla lacustris 215, Taf. VIII.
 Spontane Bewegungen 80.
 Sporangien, Springen 262.
 —, Schleudermechanismus 262.
 Sporen, bei Bakterien 127, Taf. VII.
 —, bei Hefen 139.
 —, Keimung bei Myxomyceten 108.
 —, Präparate 165.
 —, bei Farnen 261 ff.
 Sporenfarbe der höheren Pilze 172.
 Sporenfrucht 261.
 Sporengeneration 259.
 Sporenkapsel, Mechanismus 251.
 Sporodinia grandis 149, Taf. III.
 Springschwanz 220, Taf. VIII.
 Sproßhefen 138.
 Sputumschleim, Tuberkelbakterien 126.
 Stachelbeere, Mehltau 158, Taf. IV.
 Stahlische Kobaltprobe, Nachweis der Transpiration 63.
 Stärke, in Florideen 207.
 —, in Getreidekörnern 46.
 —, in Zuckerrüben 38.
 —, in Zwiebeln 34.
 —, Korrosion 46.
 —, Nachweis 43, 44.
 —, Polarisation 43, 83.
 —, Quellung 43.
 —, transitorische 40, 41.
 —, Umwandlung in Dextrin und Zucker 45.
 Stärkebildner 41.
 Stärkeherd 196.
 Stärkereaktionen 43, 44.
 Stärkescheide 49.
 Starrezustand 85.
 Stäboblaster 217.
 Statolithentheorie 86.
 Staurastrum gracile, planktonisch 195, Taf. VII.
 Stauroneis phoenicenteron 193, Taf. VII.
 Stechmücke 222.
 Steinflechte 178, Taf. VI.
 Steinheillupen 103.
 Steinkohle, Entstehung 259.
 Steinkohlenzeit, Waldmoore 260.
 Steinpilz 164, Taf. V.
 Stellaria media, Plasmaströmung 84.
 Stentor coeruleus, α m 214.
 Stentor roeseli, Ernährung 214, Taf. VIII.
 Stephanodiscus hantzschianus 191, Taf. VII.
 Sterigmen bei Russula 166.
 Sterilisation 113.
 —, Versuche 113.
 Sternalge 192, Taf. VII.
 Stickstoff, Assimilation 51.
 Stigeoclonium tenue, Schwärmsporen 199, Taf. VII.
 Stigonema 168.
 Stinkbrand des Weizens 159.
 Stinkpilz 170.
 Stomata 66.
 Stoßreiz 85.
 Stomatäre Transpiration 64.
 Strandfloh 218, Taf. VIII.
 Stratiomys chamaeleon 221, Taf. VIII.
 Strauchflechten 175.
 Streptococcus mesenterioides 118, 185, Taf. VII.
 Strömungen und Plankton 223.
 Strudelwurm 215, Taf. VIII.
 Strychnos nux vomica, Plasmaverbindungen 47.
 Stylonychia mytilus 214, Taf. VIII.
 Sublitoral der Gewässer 233.
 Subtraktionsfarben 83.
 Sumpfgasbildner 128.
 Sumpf-Segge 233.
 Sumpfschnecke 217, Taf. VIII.
 Surirella biseriata, Schlamm-Kieselalge 194; Taf. VII.
 Symbiose bei Flechten 172.
 — bei Orchideen 56.
 Synchaeta tremula 217, Taf. VIII.
 Synedra acus, Plankton 192, Taf. VIII.
 Synedra ulna, braune Überzüge 192, Taf. VII.
 Synthese, des Eiweiß 54.
 — der Flechten 172, 174.
 Synura uvella, Gurkengeruch 187, Taf. VII.
 Syringa vulgaris, Lentizellen 67.
 Syzygites megalocarpus 149, Taf. III.
 Tabellaria fenestrata. Planktonisch 193, Taf. VII.
 — flocculosa 192.
 Tafelkokken 119, Taf. VII.
 —, Fundort 112.
 Tafelsternalge 198, Taf. VII.
 Tanzstübchen bei Closterium 37, 194.
 Taraxacum, Gewebespannung 31.
 Taschenkrankheit der Pflaume 157, Taf. IV.
 Täubling (Russula) 165.
 Tausendblatt 209, Taf. VII.

- Teerfleckenkrankheit des Ahorns 157,
 Taf. IV.
 Teichmuschel 218.
 Telegraphenpflanze 85.
 Teleutosporen, Farbe 19.
 —, vom Rostpilz 159, Taf. IV.
 Tellerflechte 178, Taf. VI.
 Tendipes 221.
 Testobjekt für Mikroskope 105.
 Tetrasporen 206.
 Thallusareole 179.
 Thallus horizontalis 173.
 — verticalis 173.
 Thamnidium elegans 150, Taf. III.
 Thermotropismus 91.
 Thermotaxis bei Fuligo 108.
 Thigmotropismus 90.
 Thiopodia rosea 119.
 Thiospirillum sanguineum 137, 228.
 Thiothrix nivea 187, Taf. VII.
 Tiefenplankton 228.
 Tilletia caries 159.
 Tintinnopsis 230.
 Thiopolycoccus 111.
 Thiothrix 186, Taf. VII.
 Tintenpilz 164, Taf. V.
 Tolypothrix lanata 184, Taf. VII.
 Tönncheninfusor 213, Taf. VIII.
 Tonschalen f. Pflanzenkulturen 92.
 Torfbildung 210.
 Torfmoos 250, Taf. XII.
 Torsionen bei Windepflanzen 88.
 Torula 140.
 Trachelomonas, Bau 189, Taf. VII.
 —, Häufigkeit 189, Taf. VII.
 Tradescantia, Spaltöffnungen 66.
 —, Zellsaft 28.
 —, Zirkulationsbewegung des Plasmas 84.
 Transpiration, Nachweis 63.
 —, kutikuläre 64.
 —, stomatäre 64.
 Transversalgeotropismus 87.
 Traubes künstliche Zelle 23.
 Traubenzucker 4, 34.
 —, Abbau durch Zymase 143.
 Traumatotropismus 93.
 Trehalose 161, 171.
 Trentepohlia iolithus 19, 179.
 — in Flechten 176, 179.
 Tribonema (= Conferva) 199.
 Triceratium favus 191, Taf. VII.
 Tricholoma equestre 167, Taf. V.
 — graveolens 165.
 Trichothecium roseum 154.
 Trifolium pratense, Schlafstellung der
 Blätter 90.
 Trinema enchelys, Vorkommen 212,
 Taf. VIII.
 Trinkwasser, Seston 225.
 Triton taeniatus 222, Taf. VIII.
 Trompetentierchen 214, Taf. VIII.
 Tropaeolum majus, Zellulose 47.
 Tropenmoose 246.
 Tröpfchenkultur nach Lindner 142.
 Tropfenkammer 236.
 Tropismen, Wechselspiel 80.
 Trüffel 162.
 Trüffel, falsche 172, Taf. V.
 Trypsin 50.
 Tuber brumale 162.
 — melanosporum 162.
 Tuberkelbakterien 126.
 Tubifex rivulorum, Lebensweise 216,
 Taf. VIII.
 Tulipa, Öffnen und Schließen der Blüten 81.
 —, Reservestärke 34, 47.
 Turgor 20 ff.
 —, künstlicher 22.
 Tyrosin 165.
 Tyrosinase in Russula 166.
 Uekelei 222, Taf. VIII.
 Uferregion 233.
 Ulothrix zonata, Schwärmsporen 199,
 Taf. VII.
 Ultramikroben 112.
 Ultramikroskop 106.
 Ulva lactuca, Ernährung 199.
 Uncinula spiralis 157.
 Untergärige Hefen 138.
 Uredosporen, Farbe 19.
 —, vom Rostpilz 159, Taf. IV.
 Uroglana volvox, Geruch 187, Taf. VII.
 Uromyces pisi 160.
 Urtica, Bewegung d. Stblblätter 84.
 Urtica macrophylla, Wurzeldruck 62.
 Usnea barbata 176, Taf. VI.
 Usninsäure 176.
 Ustilago avenae 159, Taf. IV.
 Utricularia 57.
 Vaccinium, Pilzkrankheit 160, Taf. IV.
 Valvata piscinalis 218, Taf. VIII.
 Variolarien 180.
 Vaucheria, Ernährung 201, Taf. VII.
 Veilchenblauer Spaltpilz 129.
 Veilchenmoos, Farbstoff 19.
 —, Standort im Freien 179.
 Velatae 167.
 Vererbung 94.
 Verletzungsreiz 79.
 Viscum album 58.
 Vogelfederstrahlen 242.
 Voitia nivalis, auf Mist 246.
 Volvatae 170.
 Volvox aureus, Plasmaverbindungen 197,
 Taf. VII.
 Vorticella, Ernährung 214, Taf. VIII.
 Wachstum, Allgemeines 75 ff.
 Wachstumskraft 79.
 Waldmoose 255, 258.
 Wandermuschel 218, Taf. VIII.
 Wandflechte, gelbe 176, Taf. VI.
 Wärmebildung bei Atmung 73.
 Wasser als Nährstoff 58 ff.
 Wasserassel 218, Taf. VIII.
 Wasserbärchen 220, Taf. VIII.
 Wasserbeschaffenheit und Plankton 226.
 Wasserblüte 184, 226, Taf. IX.
 Wasser, Eigenfarbe 226, Taf. IX.
 Wasserentziehung durch Osmose 21, 28.
 Wasserfloh 219, Taf. VIII.
 Wasserläufer 221.

- Wasserlinse 90, 209, 233.
 Wassermilbe 221, Taf. VIII.
 Wasser-Mukor 149, 208, Taf. VII.
 Wasserpest 209, Taf. I.
 Wasserschimmel 207, 208.
 Wasserschöpfer nach Richard 237.
 Wasserstern (Callitriche) 209.
 Wasserzellen bei Torfmoos 251.
 — bei *Leucobryum* 252.
 Weber-Fechner'sches Gesetz 80.
 Wedel der Farne 261.
 Weiden, Nachweis der Polarität der Zweige 79.
 Weißmoos 252, Taf. XII.
 Wein, Ranken 91.
 Weinbeere, Zuckernachweis 34.
 Weinsäure in Zuckerrübe 38.
 Weizen, Stinkbrand 159.
Willia anomala 140.
 Windepflanzen 87.
 Winter-Plankton 226.
 Wollfaser 242.
 Wundermonade 124.
 Würzeagar 141.
 Würzegeatine 141.
 Wurzel, Atem- 65.
 —, Brett- 65.
 —, Chemotropismus 91.
 —, -Druck 60, 62, 61.
 —, Geotropismus 86.
 —, Haare 60.
 —, Hydrotropismus 93.
 —, Luft- 65.
 —, Phototropismus 92.
 —, Reizleitung 80.
 —, selektives Verhalten 61.
 —, Spitzenwachstum 60, 78.
 Wurzelhaare, Chemotropismus 81.
 Wurzelpilz s. *Mycorrhiza*-Pilz.
 Wurzelwachstum 78.
 Wüstenpflanzen, Wasserversorgung 29, 64.
 Xanthophyll 10.
 Xanthoproteinreaktion zum Eiweißnachweis 49, 53.
Xanthoria parietina 176, Taf. VI.
 Xerochastisch 82.
 Xerophyten 64.
Xylaria hypoxylon 162, Taf. V.
 Xylose 33.
 Yoghurt 123.
Zea mays, Eiweißsynthese 54.
 Zeichenapparat 105.
 Zeiger am Bogen 79.
 Zelle, Demonstration 34, 84, 196, 254.
 —, künstliche 21–25.
 Zellkern 43, 66, 84.
 —, Vorkommen in Zwiebel 34.
 — bei *Spirogyra* 196.
 Zellteilung 76.
 Zellulose, Zersetzung durch Bakterien 128.
 Zellulosehaut der Zellen 39.
 Zellsaft, Osmose 20, 39.
 Ziegenbart 163.
 Zitronensäure in Zuckerrübe 38.
 Zone der Reduktionen 239.
 Zone des Reinwassers 241.
Zoogloea ramigera 186, Taf. VII.
 — uva 186, Taf. VII.
Zoogloea-Test für Wasserprüfung 111.
Zostera marina 209.
 Zucker, Bildung aus Stärke 45 ff.
 —, osmotische Wirkung 20–22.
 —, Vergärung 142.
 Zuckerrohr 37.
 Zuckerrübe, Osmose 39.
 —, Zuckernachweis 36.
 Zuckertang 202.
Zygnema stellinum 197, Taf. VII.
Zygosaccharomyces 139.
 Zymase 143.

Druckfehlerberichtigung.

- S. 30, lies Wurzelschosses statt Wurzelschoßes.
 S. 35, „ Seignettesalz statt Seignettesalze.
 S. 58, „ *Lathraea* statt *Lathraca*.
 S. 74, „ Leick statt Deick.
 S. 78, „ *Vicia* statt *Victa*.
 S. 79, „ Zeiger am Bogen statt Zeiger am Boden.
 S. 89, „ Reiz statt Reitz.
 S. 173, „ neben anderen Arten, hinter *Cladonia rangiferina*.
 S. 176, „ *Physcion*-Parietin statt *Physciol*.
 Taf. X, „ Schnurbrett statt Schnurrbrett.

Die Süßwasser-Flora Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz.

Bearbeitet von Prof. Dr. G. Beck v. Mannagetta und Lerchenau (Prag), Dr. O. Borge (Stockholm), J. Brunnthaler † (Wien), Dr. R. Grönblad (Helsingfors), Dr. W. Heering † (Hamburg), Prof. Dr. R. Kolkwitz (Berlin-Steglitz), Dr. E. Lemmermann † (Bremen), Dr. J. Lütkemüller † (Baden b. Wien), W. Mönkemeyer (Leipzig), Prof. Dr. W. Migula (Eisenach), Dr. M. von Minden (Hamburg), Prof. Dr. A. Pascher (Prag), Dr. H. Printz (Drontheim), Prof. Dr. V. Schiffner (Wien), Prof. Dr. J. Schiller (Wien), Prof. Dr. A. J. Schilling (Darmstadt), H. von Schönfeldt (Eisenach), C. H. Warnstorf (Berlin-Friedenau), Prof. Dr. F. N. Wille (Christiania), Kustos Dr. A. Zahlbruckner (Wien).

Herausgegeben von

Prof. Dr. A. Pascher

Prag

- *) Heft 1: **Flagellatae I.** Allgemeiner Teil von A. Pascher; Pantostomatinae, Protomastiginae, Distomatinae von E. Lemmermann. Mit 252 Abbildungen im Text. IV, 138 S. 1914 Mk 42.—, geb. Mk 63.—
- *) Heft 2: **Flagellatae II.** Chrysomonadinae, Cryptomonadinae, Eugleninae, Chloromonadinae und gefärbte Flagellaten unsicherer Stellung. Von A. Pascher und E. Lemmermann. Mit 398 Abbildungen im Text. IV, 192 S. 1913 Mk 60.—, geb. Mk 81.—
- *) Heft 3: **Dinoflagellatae (Peridineae)** (Flagellatae III). Von A. J. Schilling. Mit 69 Abbildungen im Text. IV, 66 S. 1913 Mk 21.60, geb. Mk 42.—
- Heft 4: **Volvocales** (Flagellatae IV, Chlorophyceae I.) mit dem allgemeinen Teile der Chlorophyceae. Von A. Pascher und H. Printz.
- *) Heft 5: **Tetrasporales, Protoceceales.** (Chlorophyceae II.) Von E. Lemmermann, J. Brunnthaler und A. Pascher. Mit 402 Abbildungen im Text. IV, 250 S. 1915 Mk 76.80, geb. Mk 99.—
- *) Heft 6: **Ulotrichales, Microsporales, Oedogoniales.** (Chlorophyceae III.) Von W. Heering. Mit 385 Abbildungen im Text. IV, 250 S. 1914 Mk 72.—, geb. Mk 93.—
- *) Heft 7: **Siphonales, Siphonocladiales** (Chlorophyceae IV.) Von W. Heering †, Hamburg. Mit 94 Abbildungen im Text. IV, 103 S. 1921 Mk 30.—, geb. Mk 50.—
- Heft 8: **Desmidiaceae.** Von J. Lütkemüller und R. Grönblad.
- *) Heft 9: **Zygnemales.** Von O. Borge und A. Pascher. Mit 89 Abbildungen im Text. IV, 51 S. 1913 Mk 18.—, geb. Mk 39.—
- *) Heft 10: **Bacillariales (Diatomeae).** Von H. v. Schönfeldt. Mit 379 Abbildungen im Text. IV, 187 S. 1913 Mk 48.—, geb. Mk 69.—
- Heft 11: **Heterokontae.** Von A. Pascher. — **Phaeophyceae.** Von A. Pascher. — **Rhodophyceae.** Von J. Schiller. — **Charales.** Von W. Migula.
- Heft 12: **Schizophyceae.** Von F. N. Wille.
- Heft 13: **Schizomyceetes.** Von R. Kolkwitz. — **Fungi.** Von M. v. Minden. **Lichenes.** Von A. Zahlbruckner.
- *) Heft 14: **Bryophyta** (Sphagnales, Bryales, Hepaticae). Von C. H. Warnstorf, W. Mönkemeyer, V. Schiffner. Mit 500 Abbildungen im Text. IV, 222 S. 1914 Mk 67.20, geb. Mk 90.—
- Heft 15: **Pteridophyta, Anthophyta.** Von G. Beck v. Mannagetta.
- Heft 16: **Phytoplankton.** Von A. Pascher.

Die mit *) versehenen Hefte sind bereits erschienen. — Jedes Heft ist einzeln käuflich.

Hedwigia 1914, Heft 1/2: . . . eine Fülle von vorzüglichen charakteristischen Abbildungen, teils Originale und teils Kopien aus oft unzugänglicher, neuester Literatur, übersichtliche Tabellen für Gruppen, Gattungen und Arten, nicht zuletzt Hinweise auf verwandte Formen, kritische Bemerkungen über systematische Stellung derselben und Literaturnachweise, liefern dem Benutzer ein Material von noch nie gebotener Vollständigkeit, so daß die praktische Arbeit, das Bestimmen und Untersuchen auch der schwierigsten Formen Freude und Genuß bieten muß. . . . E. Irmischer.

Die botanische Mikrotechnik. Ein Handbuch der mikroskopischen Arbeitsverfahren. Von Dr. **Hans Schneider**. Zweite Auflage des gleichnamigen Werkes von Prof. Dr. A. Zimmermann. Mit 220 Abbild. im Text. XII, 458 S. gr. 8° 1922 Mk 120.—, geb. Mk 155.—

Das in Fachkreisen hoch geschätzte Werk von Zimmermann war lange Zeit vergriffen. Anstelle des Verfassers hat Dr. H. Schneider eine Neubearbeitung übernommen, aus der infolge des großen Zwischenraumes zwischen der ersten und dieser neuen Auflage ein fast völlig neues Buch geworden ist. Das Buch ist kein bloßes Praktikum, in welchem der Stoff die Anordnung bestimmt, sondern es ist aufgebaut auf dem leitenden Prinzip der Technik. Ein auf solcher Grundlage bearbeitetes Werk fehlte bisher für die Botaniker.

Einführung in die botanische Mikrotechnik. Von **Hubert Sieben**, Techniker am Botanischen Institut der Universität Bonn. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 22 Abbildungen im Text. IX, 114 S. kl. 8° 1920 Mk 20.—, geb. Mk 48.—

Zeitschrift für Botanik. Bd. V. (1913): Sieben gehört zu den Mikrotechnikern, welche über die reichste Erfahrung in der Herstellung botanischer Präparate verfügen. Seine „Einführung“ zeigt, daß er außerdem auch die Gabe besitzt, den Anfänger in klarer und knapper Darstellungsweise theoretisch und praktisch anzuleiten. Jeder Student wird sich nach diesen Anleitungen die wesentlichen Handgriffe der Mikrotechnik, d. h. des Fixierens, Einbettens, Schneidens und Färbens leicht zu eigen machen können. Abgesehen von Einzelheiten und Winken, die vom Verf. herrühren, sei auf die von ihm angegebene „Einbettetrommel“ besonders hingewiesen. Sehr nützlich sind schließlich die „praktischen Anweisungen für den Anfänger“, welche die geeignetsten Objekte für das Studium der haploiden und diploiden Kernteilungen, der Befruchtungsvorgänge usw. anführen.

Das Werkchen, welches die Traditionen des Strasburgerschen Institutes lebendig erhalten wird, kann für die Einarbeitung in die zytologische Mikrotechnik aufs beste empfohlen werden. Hannig.

Das botanische Praktikum. Anleitung zum Selbststudium der mikroskopischen Botanik für Anfänger und Geübtere, zugleich ein Handbuch der mikroskopischen Technik. Von **E. Strasburger**†. Sechste Auflage, bearbeitet von Dr. **Max Koernicke**, Professor der Botanik an der landwirtschaftlichen Hochschule Bonn-Poppelsdorf und der Universität Bonn. Mit 247 Holzschnitten und 3 farbigen Abbildungen im Text. XXVI, 873 S. gr. 8° 1921 Mk 240.—

Aus der Natur, 1913, 9. Heft: . . . ein Werk, das für den Anfänger wie für den Geübteren in gleicher Weise unentbehrlich ist und das in jedem biologischen Laboratorium (auch in höheren Lehranstalten) seine Stätte finden muß. Sn.

Das kleine botanische Praktikum für Anfänger. Anleitung zum Selbststudium der mikroskopischen Botanik und Einführung in die mikroskopische Technik. Von **Eduard Strasburger**. Neunte, verbesserte Auflage, bearbeitet von Dr. **Max Koernicke**, Professor der Botanik an der landwirtschaftlichen Hochschule Bonn-Poppelsdorf und der Universität Bonn. Mit 138 Holzschnitten und 3 farbigen Abbildungen im Text. X, 272 S. gr. 8° 1921 Mk 80.—, geb. Mk 112.—

Pharmazeutische Zeitung, 1913, Nr. 101: . . . für den Anfänger die denkbar beste Einleitung in die Botanik als Wissenschaft, die sich mit lebenden Dingen und nicht nur mit Pflanzenleichen beschäftigt, gedacht. Dem Lehrer und dem Pharmazeuten gibt sie ein überaus klares Bild dessen, was er von der Botanik als allgemeiner Disziplin wissen soll.

Das Buch wird gerade jenen eine Freude an der Botanik wecken, die nur zu leicht geneigt sind, diese Wissenschaft als etwas Trockenem zu betrachten. Ander Hand dieses Buches ist jeder Lernenwollende fähig, sich allein eine vorzügliche botanische Bildung zu schaffen und sich die mikroskopische Technik anzueignen. Dr. **Reno Muschler**.

Pflanzenphysiologie als Theorie der Gärtnerei. Von Dr. **Hans Molisch**, o. ö. Prof. und Direktor des pflanzenphysiologischen Instituts an der Universität Wien. Für Botaniker, Gärtner, Landwirte, Forstleute und Pflanzenfreunde. Vierte, neubearbeitete Auflage. Mit 150 Abbild. im Text. X, 337 S. gr. 8° 1921 Mk 80.—, geb. Mk 104.—

Inhalt: I. Ernährung. 1. Die Wasserkultur. 2./3. Die unentbehrlichen und die entbehrlichen Aschenbestandteile. 4. Stickstoff. 5. Der Boden. 6. Die Düngung. 7. Die Kohlensäureassimilation. 8. Das Wasser und seine Bewegung. 9. Die Transpiration und der Transpirationsstrom in Beziehung zu gärtnerischen Arbeiten. 10. Die Wanderung der Assimilate. 11. Die Ernährung der Pilze. 12. Ernährungsweisen besonderer Art. — II. Atmung. — III. Wachstum. 1. Allgemeines. 2. Wachstum und Außenbedingungen. 3. Wachstumsbewegungen. 4. Organbildung. 5. Ruheperiode, Treiberei und Laubfall. IV. Vom Erfrieren und Gefrieren der Pflanzen. — V. Die ungeschlechtliche und die geschlechtliche Fortpflanzung. — VI. Die Keimung der Samen. — VII. Variabilität, Vererbung und Pflanzenzüchtung. — Sachregister.

Das Erscheinen von vier Auflagen innerhalb 5 Jahren ist wohl die beste Empfehlung für dieses Buch; es nimmt bereits einen ehrenvollen Platz in der gärtnerischen und in der botanisch-fachwissenschaftlichen Literatur ein.

Erstes mikroskopisches Praktikum. Eine Einführung in den Gebrauch des Mikroskopes und in die Anatomie der höheren Pflanzen. Zum Gebrauch in den botanischen Laboratorien und zum Selbstunterrichte. Für Botaniker, Zoologen, Studierende des höheren Lehramtes, Pharmazeuten und Chemiker. Von Dr. **Arthur Meyer**, o. ö. Prof. der Botanik und Direktor des botanischen Gartens an der Universität Marburg. Dritte, vervollständigte Auflage. Mit 110 Abbildungen im Text. V, 255 S. gr. 8° 1915 Mk 78.—, geb. Mk 120.—

Das Buch soll Anfänger in die Methoden der mikroskopischen Beobachtung einführen. Als Objekt der mikroskopischen Arbeiten wird der anatomische Bau der höheren Pflanzen benutzt. Das Buch belehrt deshalb den Anfänger zugleich über die Anatomie der Pflanzen, welche auf Grundlagen der neuesten Forschungen vorgetragen wird. Durch seine genauen Anleitungen für die Arbeiten und durch die allgemeinen Erläuterungen aus dem Gebiete der Anatomie ist das Praktikum nicht nur als Leitfaden in den wissenschaftlichen Instituten, sondern auch zum Selbstunterricht brauchbar und wird allen denen, welche eine Erziehung zur pflichtgetreuen Arbeit als ein wichtiges Ziel eines jeden Unterrichts betrachten, willkommen sein. Die neue Auflage ist durch eine Anzahl Kapitel, welche nur von denen bearbeitet werden sollen, die sich später noch weiter mit Botanik beschäftigen wollen, und ferner noch einige Abschnitte, welche in die Mikrotom- und in die Färbetechnik einführen sollen, vermehrt worden.

Praktikum der botanischen Bakterienkunde. Einführung in die Methoden der botanischen Untersuchung und Bestimmung der Bakterienspezies. Zum Gebrauche in botanischen, bakteriologischen und technischen Laboratorien sowie zum Selbstunterrichte. Von Dr. **Arthur Meyer**, o. ö. Prof. der Botanik und Direktor des Botanischen Gartens an der Universität Marburg. Mit 31 Abbild. im Text und einer farbigen Tafel. VII, 157 S. 1913 Mk 54.—, geb. Mk 84.—

Kompodium der biologischen Beurteilung des Wassers. Von Prof. Dr. **Julius Wilhelm**, Wissenschaftl. Mitglied der Landesanstalt für Wasserhygiene Berlin-Dahlem. Mit 148 Abbildungen im Text. IV, 66 S. gr. 8° 1915 Mk 31.20, geb. Mk 60.—

Inhalt: I. Allgemeines, kurze historische Uebersicht und die wichtigere Literatur. — II. Binnengewässer und Abwässer. — III. Brack- und Meerwasser und die Einwirkung von Abwässern auf dasselbe. — IV. Bedeutung der Biologie für die Trinkwasserversorgung.

Zeitschrift für Medizinalbeamte vom 20. November 1915: . . . Ueberall tritt der erfahrene Fachmann hervor, der nicht bloß über reichliches wissenschaftliches Können, sondern über ebenso reiche praktische Erfahrungen verfügt und daraus höchst wertvolle Schlüsse zieht. Die Ausstattung des Kompodiums durch zahlreiche Abbildungen trägt wesentlich zum besseren Verständnis seines Inhaltes bei.

R pd.

Anatomie der Pflanze. Von Dr. **Hans Molisch**, o. ö. Prof. und Direktor des pflanzenphysiologischen Institutes an der Universität Wien. Zweite, neu bearbeitete Auflage. Mit 139 Abbildungen im Text. VI, 153 S. gr. 8° 1922 Mk 24.—, geb. Mk 34.—

Molischs „Anatomie“ hat in kurzer Zeit weiteste Verbreitung und großen Anklang gefunden, weil es bisher an einer kurzen und übersichtlich gefaßten Zusammenstellung der wichtigsten pflanzenanatomischen Grundlagen gefehlt hat. Die vorliegende neue Auflage ist sorgfältig überprüft und an zahlreichen Stellen ergänzt worden. Wer sich über den Bau der Pflanzen schnell unterrichten will, ohne zu den größeren Lehr- und Handbüchern zu greifen, findet in diesem Buch das Wissenswerteste zusammengefaßt. Vor allem wird den Studierenden der Botanik und Biologie die neue Auflage wider willkommen sein.

Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. Begründet 1894 von **Ed. Strasburger**, **F. Noll**, **H. Schenck**, **A. F. Wilh. Schimper**. Bearbeitet von Prof. Dr. Hans Fitting, Bonn; Prof. Dr. Ludwig Jost, Heidelberg; Prof. Dr. Heinrich Schenck, Darmstadt; Prof. Dr. George Karsten, Halle a. S. Fünfzehnte, umgearbeitete Auflage. Mit 849 zum Teil farbigen Abbild. im Text. VIII, 701 S. 8° 1921 Mk 88.— geb. Mk 125.—

Monatshefte für den naturwiss. Unterricht, Bd. X, Heft 10/11: ... Es erübrigt sich, über das an erster Stelle aller Lehrbücher der Botanik stehende Buch und seine vollendete Abrundung und große Reichhaltigkeit noch weiteres zu sagen. Bastian Schmid.

Pharmazeutische Zeitung. 15. Juni 1921: ... Ueber dieses Werk, das zu den wesenhaftesten der botanischen Unterrichtsliteratur gehört, kann kein Lob gesagt werden, das nicht Wiederholung früherer Anerkennung wäre.

Morphologie und Biologie der Algen. Von Dr. **Friedrich Oltmanns**, Prof. der Botanik an der Universität Freiburg i. Br. Zweite, umgearbeitete Auflage.

Erster Band: **Chrysophyceae — Chlorophyceae.** Mit 287 Abbild. im Text. VI, 459 S. gr. 8° 1922 Mk 100.—, geb. Mk 130.—

Inhalt: 1. Chrysophyceae. 2. Heterocontae. 3. Cryptomonadales. 4. Euglenaceae. 5. Dinoflagellata. 6. Conjugatae. 7. Bacillariaceae. 8. Chlorophyceae (Volvocales, Protococcales, Ulotrichales, Siphonocladiales, Siphonales). Charales.

Mit dem vorliegenden ersten Band erscheint das seit längerer Zeit vergriffene Buch über die Algen in zweiter, völlig umgearbeiteter Auflage. Aus praktischen Gründen wird das Werk diesmal in drei Bänden, die in rascher Folge erscheinen werden, herausgegeben. Der erste Band enthält die Flagellaten im weitesten Sinne und das, was sich unmittelbar an sie anschließt, wie auch die grünen Algen. Der zweite Band soll Phaeophyceen und Rhodophyceen bringen, der dritte Band wird die allgemeinen Fragen behandeln. Was in den letzten Jahrzehnten an Erkenntnis über die niedersten Algen und über die Flagellaten gewonnen wurde, ist in der neuen Auflage berücksichtigt. Im übrigen sind die Grundsätze, nach denen gehandelt wurde, im wesentlichen dieselben geblieben. Die meisten Kapitel sind unter Verarbeitung der Literatur aus den Jahren 1914—1921 vollkommen umgearbeitet worden.

Morphologische und physiologische Analyse der Zelle der Pflanzen und Tiere. Grundzüge unseres Wissens über den Bau der Zelle und über dessen Beziehung zur Leistung der Zelle. Von Dr. **Arthur Meyer**,

o. ö. Prof. der Botanik u. Direktor des botan. Gartens a. d. Universität Marburg.

Erster Teil: **Allgemeine Morphologie der Protoplasten, Ergastische Gebilde. Zytoplasma.** Mit 205 Abbild. im Text. XX, 629 S. gr. 8° 1920 Mk 152.—

Zweiter Teil: 1. Liefg.: **Die Bewegung des normalen Zytoplasma. Die Metabolie des Zytoplasmas. Die alloplasmatischen Gebilde und die Muskelzelle.** Mit 69 Abbild. im Text. S. 631—792. gr. 8° 1921 Mk 50.—

Das Buch ist für Botaniker wie für Zoologen und Anatomen von großer Bedeutung. Der Verfasser behandelt Morphologie und Stoffkunde der Zelle in enger Verbindung. Er nennt seine Arbeit eine Analyse der Zelle, denn sie sucht die mikroskopisch erkennbaren Bestandteile der Zelle in ihrer allgemeinen Bedeutung für die Lebenserscheinungen zu sichten und zu ordnen und ebenso die Stoffe, welche die Protoplasten zusammensetzen, ihrer chemischen, physikalischen und biologischen Natur und Bedeutung nach zu erforschen und zu bewerten.

THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE
STAMPED BELOW

AN INITIAL FINE OF 25 CENTS

WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN
THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY
WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH
DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY
OVERDUE.

BIOLOGY LIBRARY

MAY 26 1941

JAN 26 1942

APR 24 1947

APR 16 1947

DEC 11 57

JAN 5 1958

AUG 12 1958

AUG 28 1958

SEP 11 1958

SEP 11 58 MS

U.C. BERKELEY LIBRARIES

C026304362

527305

QK711

K6

1922
BIOLOGY
LIBRARY
G

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY