QL
737
R666
M49
1913
MAMM

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE BERICHTE AUS UNGARN

MIT UNTERSTÜTZUNG
DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN UND DER
KÖNIGLICH UNGARISCHEN NATURWISSENSCHAFTLICHEN GESELLSCHAFT

HERAUSGEGEBEN VON

ROLAND BARON EÖTVÖS UND JULIUS KÖNIG

REDIGIERT VON

JOSEF KÜRSCHÁK UND FRANZ SCHAFARZIK

MITGLIEDER DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

NEUNUNDZWANZIGSTER BAND · 1911

LEIPZIG
DRUCK UND VERLAG VON B.G. TEUBNER
1913

[IN WIEN BEI KARL GRAESER & K^{LE}.]

DL
737
1149
1913
MAMM

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE BERICHTE AUS UNGARN

MIT UNTERSTÜTZUNG
DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN UND DER
KÖNIGLICH UNGARISCHEN NATURWISSENSCHAFTLICHEN GESELLSCHAFT

HERAUSGEGEBEN VON

ROLAND BARON EÖTVÖS UND JULIUS KÖNIG

REDIGIERT VON

JOSEF KÜRSCHÁK UND FRANZ SCHAFARZIK

MITGLIEDER DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

NEUNUNDZWANZIGSTER BAND · 1911

GERRIT S. MILLER JR. GIFT

LEIPZIG
DRUCK UND VERLAG VON B.G. TEUBNER
1913

[IN WIEN BEI KARL GRAESER & K^{IE}.]

ALLE RECHTE, EINSCHLIESSLICH DES ÜBERSETZUNGSRECHTS, VORBEHALTEN.

SPECIES GENERIS SPALAX

DIE ARTEN DER BLINDMÄUSE IN SYSTEMATISCHER
UND PHYLOGENETISCHER BEZIEHUNG

VON

PROF. DR. LUDWIG V. MÉHELY

SEKTIONSDIREKTOR DES UNGARISCHEN NATIONALMUSEUMS
MITGLIED DER UNGAR. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

B. TAFELN

LEIPZIG

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER

1913

Library Mammals & Birds of Central & South America
2 May 56

AVIS.

Den Text enthält Band XXVIII.

599,32

• M49

\$77 Ammels

SPECIES GENERIS SPALAX.

DIE ARTEN DER BLINDMÄUSE IN SYSTEMATISCHER UND PHYLOGENETISCHER BEZIEHUNG.*

(Mit 33 Tafeln und 10 Textfiguren.)

Von Prof. Dr. LUDWIG VON MÉHELY,

Sektionsdirektor des Ungar. Nationalmuseums, wirkl. Mitgl. der Ungar. Akademie der Wissenschaften.

Erklärung der Tafeln.

Tafel I.

Schädel verschiedener *Spalax*-Arten von oben betrachtet, in natürlicher Größe.

- Fig. 1. *Spalax Ehrenbergi* NHRG. Altes ♀ Exemplar. Jaffa.
- Fig. 2. *Spalax monticola Nehringi* SAT. Altes Exemplar. Zor.
- Fig. 3. *Spalax monticola anaticus*. Altes ♂. Paradisos.
- Fig. 4. *Spalax monticola turcicus*. Altes ♂. Makrikeni.
- Fig. 5. *Spalax monticola heregorinensis*. Altes Exemplar. Ulog Obrnja.
- Fig. 6. *Spalax monticola syriensis*. Altes Exemplar. Ö.-Pazua.
- Fig. 7. *Spalax hungaricus hungaricus* NHRG. Altes ♂. Makó.

Tafel II.

Schädel verschiedener *Spalax*-Arten von oben betrachtet in natürlicher Größe.

- Fig. 1. *Spala graecus graecus* NHRG. Junges Exemplar. Griechenland?
- Fig. 2. *Spalax graecus graecus* NHRG. Altes Exemplar. Czernovitz.
- Fig. 3. *Spalax graecus antiquus*. Altes ♂. Begräbnisstätte von Apahida.
- Fig. 4. *Spalax isticus*. Mittelaltes Exemplar. Horesu Poenar.
- Fig. 5. *Spalax microphthalmus* GÜLDENST. Mittelaltes Exemplar. Südrubland.
- Fig. 6. *Spalax microphthalmus* GÜLDENST. Altes Exemplar. Sarepta.
- Fig. 7. *Spalax giganteus* NHRG. Altes Exemplar. Petrowsk.

Tafel III.

Linke Unterkieferhälfte verschiedener *Spalax*-Arten von der Außenseite.

- Fig. 1. *Spalax Ehrenbergi* NHRG. Altes ♀. Jaffa. Vergröß. 1,6.
- Fig. 2. *Spalax monticola dolbrogeae* MILL. Altes Exemplar. Ciulnita Vergröß. 1,6.
- Fig. 3. *Spalax hungaricus hungaricus* NHRG. Altes ♂. Makó. Vergröß. 1,6.
- Fig. 4. *Spalax graecus graecus* NHRG. Junges Exemplar. Griechenland? Vergröß. 1,6.
- Fig. 5. *Spalax graecus antiquus*. Altes ♂. Begräbnisstätte von Apahida. Vergröß. 1,6.
- Fig. 6. *Spalax isticus*. Mittelaltes Exemplar. Horesu Poenar. Vergröß. 1,48.
- Fig. 7. *Spalax microphthalmus* GÜLDENST. Altes Exemplar. Sarepta. Vergröß. 1,6.
- Fig. 8. *Spalax giganteus* NHRG. Altes Exemplar. Petrowsk. Vergröß. 1,7.

* Ungarisch erschienen im Auftrage der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in Budapest im Jahre 1909. Von der Ungarischen Akademie der Wissenschaften mit dem Marczibányi-Preise gekrönt im Mai 1910.

Tafel IV.

Linke Unterkieferhälfte verschiedener *Spalax*-Arten von hinten betrachtet bei senkrecht gestelltem Kronfortsatz. Sämtliche Figuren dreifach vergrößert.

- Fig. 1. *Spalax Ehrenbergi* NHRG. Altes ♀. Jaffa.
 Fig. 2. *Spalax monticola syriensis*. Altes ♂. Ó-Pazua.
 Fig. 3. *Spalax hungaricus hungaricus* NHRG. Altes ♂. Mezőhegyes.
 Fig. 4. *Spalax graecus graecus* NHRG. Junges Exemplar. Athen?
 Fig. 5. *Spalax graecus antiquus*. Altes ♂. Begräbnisstätte von Apahida.
 Fig. 6. *Spalax isticus*. Mittelaltes Exemplar. Horesu Poenar.
 Fig. 7. *Spalax microphthalmus* GÜLDENST. Altes Exemplar. Sarepta.
 Fig. 8. *Spalax giganteus* NHRG. Altes Exemplar. Petrowsk.

Tafel V.

Die Kauflächen der linken Molaren von *Spalax Ehrenbergi* NHRG, achtfach vergrößert.

- Fig. 1—4 = m 1 sup. Fig. 8—13 = m 3 sup. Fig. 18—22 = m 2 inf.
 Fig. 5—7 = m 2 sup. Fig. 14—17 = m 1 inf. Fig. 23—28 = m 3 inf.

Die Mehrzahl der Exemplare stammt aus Jaffa, nur die Molaren 9, 10, 15, 16, 18, 21, 26 u. 27 gehören zu Exemplaren aus Jerusalem.

Tafel VI.

Die Kauflächen der linken Molaren von *Spalax Ehrenbergi* var. *kirgisorum* NHRG (Fig. 1—10) und von *Sp. Ehrenbergi* var. *aegyptiacus* NHRG (Fig. 11—12), achtfach vergrößert.

- Fig. 1, 3, 5, 7, 9 u. 11 = obere Molaren.
 Fig. 2, 4, 6, 8, 10 u. 12 = untere Molaren.
 Fig. 1 u. 2 = Typus von *Spalax kirgisorum* NHRG.
 Fig. 3—6 = Typus von *Spalax intermedius* NHRG. (Beiruter Exemplare).
 Fig. 7 u. 8 = Syrisches Exemplar des Petersburger Museums.
 Fig. 9 u. 10 = Syrisches Exemplar der Universität zu Neapel.
 Fig. 11 u. 12 = Männliches Exemplar aus Mariut (Mus. Nat. Hung.).

Tafel VII.

Die Kauflächen der linken Molaren von *Spalax monticola Nehringi* SAT. (Fig. 1—6) und *Spalax mont. armeniacus* (Fig. 7—12), achtfach vergrößert.

- Fig. 1, 3, 5, 7, 9 u. 11 = obere Molaren. Fig. 5 u. 6 = Kasikoporan (altes ♂).
 Fig. 2, 4, 6, 8, 10 u. 12 = untere Molaren. Fig. 7 u. 8 = Göl (junges ♀).
 Fig. 1 u. 2 = Zor (mittelaltes ♀). Fig. 9 u. 10 = Göl (altes ♀).
 Fig. 3 u. 4 = Zor (altes ♀). Fig. 11 u. 12 = Göl (altes ♂).

In Fig. 7 ist der zweite Zahn das verkehrt gezeichnete Bild des entsprechenden rechtseitigen.

Tafel VIII.

Die Kauflächen der linken Molaren von *Spalax monticola anatolicus* (Fig. 1—36) und *Sp. mont. hellenicus* (Fig. 37—40), achtfach vergrößert.

- Fig. 1—5 = m 1 sup. Fig. 11—18 = m 3 sup. Fig. 25—31 = m 2 inf.
 Fig. 6—10 = m 2 sup. Fig. 19—24 = m 1 inf. Fig. 32—36 = m 3 inf.

Die Mehrzahl der Exemplare stammt aus Paradisos, nur die Molaren 1, 6, 11, 19, 25 u. 32 gehören zu Exemplaren aus Burnabad.

- Fig. 37 = obere Molaren (Parnassus). Fig. 39 = untere Molaren (Parnassus)
 Fig. 38 = obere Molaren (Lamia). Fig. 40 = untere Molaren (Lamia).

Tafel IX.

Die Kauflächen der linken Molaren von *Spalax monticola turcicus*, achtfach vergrößert, nach Exemplaren aus der Umgebung von Makrikeui.

Fig. 1—4 = m 1 sup.

Fig. 9—13 = m 3 sup.

Fig. 18—22 = m 2 inf.

Fig. 5—8 = m 2 sup.

Fig. 14—17 = m 1 inf.

Fig. 23—27 = m 3 inf.

Tafel X.

Die Kauflächen der linken Molaren von *Spalax monticola dolbrogeae* MILL., achtfach vergrößert. Die Exemplare stammen aus verschiedenen Gegenden der Dobrudscha.

Fig. 1—3 = m 1 sup.

Fig. 7—9 = m 3 sup.

Fig. 14—17 = m 2 inf.

Fig. 4—6 = m 2 sup.

Fig. 10—13 = m 1 inf.

Fig. 18—21 = m 3 inf.

Tafel XI.

Die Kauflächen der linken Molaren von *Spalax monticola monticola* NURG (Fig. 1—18) und *Sp. mont. hercegovinensis* (Fig. 19—24) achtfach vergrößert.

Fig. 1—3 u. 19 = m 1 sup.

Fig. 10—12 u. 22 = m 1 inf.

Fig. 4—6 u. 20 = m 2 sup.

Fig. 13—15 u. 23 = m 2 inf.

Fig. 7—9 u. 21 = m 3 sup.

Fig. 16—18 u. 24 = m 3 inf.

Fundort der Exemplare von *Sp. mont. monticola*: Kupres; derjenigen von *Sp. mont. hercegovinensis*: Ulog Obrnja.

Tafel XII.

Die Kauflächen der linken Molaren von *Spalax monticola syrmensis*, achtfach vergrößert.

Fig. 1—5 = m 1 sup.

Fig. 11—17 = m 3 sup.

Fig. 24—29 = m 2 inf.

Fig. 6—10 = m 2 sup.

Fig. 18—23 = m 1 inf.

Fig. 30—36 = m 3 inf.

Die Mehrzahl der Exemplare stammt aus Ó-Pazna, nur die Figuren 5, 10, 17, 23, 29 u. 36 sind nach den Zähnen eines senilen Exemplars aus Ruma gezeichnet.

Tafel XIII.

Die Kauflächen der linken oberen Molaren von *Spalax hungaricus hungaricus*, achtfach vergrößert.

Fig. 1—8 = m 1 sup.

Fig. 9—17 = m 2 sup.

Fig. 18—24 = m 3 sup.

Fundorte: 1. Ungarn, 2. Kúnágota, 3. Kúnágota, 4. Kúnágota, 5. Makó, 6. Mezőhegyes, 7. Budapest, 8. Kúnágota, 9. Ungarn, 10. Dabas, 11. Dabas, 12. Kúnágota, 13. Dabas, 14. Makó, 15. Mezőhegyes, 16. Budapest, 17. Kúnágota, 18. Ungarn, 19. Dabas, 20. Dabas, 21. Kúnágota, 22. Dabas, 23. Budapest, 24. Kúnágota.

Tafel XIV.

Die Kauflächen der linken unteren Molaren von *Spalax hungaricus hungaricus* NURG, achtfach vergrößert.

Fig. 1—8 = m 1 inf.

Fig. 9—14 = m 2 inf.

Fig. 15—24 = m 3 inf.

Fundorte: 1. Dabas, 2. Dabas, 3. Kúnágota, 4. Kúnágota, 5. Kúnágota, 6. Kúnágota, 7. Banat, 8. Mezőhegyes, 9. Dabas, 10. Kúnágota, 11. Ungarn, 12. Kúnágota, 13. Mezőhegyes, 14. Kúnágota, 15. Dabas, 16. Mezőhegyes, 17. Kúnágota, 18. Dabas, 19. Kúnágota, 20. Dabas, 21. Dabas, 22. Kúnágota, 23. Fejérttelep, 24. Budapest.

Tafel XV.

Die Kauflächen der linken Molaren von *Spalax hungaricus transsylvanicus* (Fig. 1—29) und *Sp. monticola syrmensis* (Fig. 30 u. 31), achtfach vergrößert.

Fig. 1—9 = m 1 sup.

Fig. 15—21 = m 3 sup.

Fig. 10—14 = m 2 sup.

Fig. 22—29 = m 3 inf.

Die Mehrzahl der Exemplare stammt aus Puszta-Szt.-Miklós, nur die Figuren 6, 8, 9, 13, 14, 18, 20, 28 u. 29 sind nach den Zähnen von Exemplaren aus Szamosujvár und Fig. 7 und 27 nach solchen aus Apahida gezeichnet.

Fig. 30 = obere Molarreihe,

Fig. 31 = untere Molarreihe eines jungen Exemplars aus Lelle.

Tafel XVI.

Die Kauflächen der linken Molaren von *Spalax graecus graecus* NUNG (Fig. 1—8) und *Spalax isticus* (Fig. 9—20), achtfach vergrößert.

Fig. 1 = obere Molarreihe } Junges Exemplar aus Athen(?)

Fig. 2 = untere Molarreihe } Typus des *Sp. graecus* NUNG.

Fig. 3 = obere Molarreihe } Junges Exemplar aus Czernowitz.

Fig. 4 = untere Molarreihe }

Fig. 5 = obere Molarreihe } Mittelaltes Exemplar aus Athen(?)

Fig. 6 = untere Molarreihe }

Fig. 7 = obere Molarreihe } Altes Exemplar aus Czernowitz.

Fig. 8 = untere Molarreihe }

Fig. 9 u. 10 = m 1 sup.

Fig. 15 u. 16 = m 2 inf.

Fig. 13 u. 14 = m 2 sup.

Fig. 19 u. 20 = m 3 inf.

Fig. 17 u. 18 = m 3 sup.

9, 13, 17, 11, 15 u. 19: Barza.

Fig. 11 u. 12 = m 1 inf.

10, 14, 18, 12, 16 u. 20: Horesu Poenar.

Tafel XVII.

Die Kauflächen der linken Molaren von *Spalax graecus antiquus* (Fig. 1—14) und *Spalax polonicus* (Fig. 15 u. 16), achtfach vergrößert.

Fig. 1—3 = m 1 sup.

Fig. 11—13 = untere Molarreihen.

Fig. 4—6 = m 2 sup.

Fig. 14 = m 3 inf.

Fig. 7—9 = m 3 sup.

Fig. 15 = obere Molarreihe.

Fig. 10 = m 1 inf.

Fig. 16 = untere Molarreihe.

Fundort von *Sp. gr. antiquus* ist Apahida, Fig. 2, 5 und 8 jedoch sind nach Exemplaren aus Maroslekenze und Fig. 11 nach solchen aus Szamosfalva gezeichnet.

Die Molarreihe des *Sp. polonicus* ist nach einem Exemplar aus der Umgebung von Lemberg gezeichnet.

Tafel XVIII.

Die Kauflächen der linken Molaren von *Spalax microphthalmus* GÜLDENST., achtfach vergrößert.

Fig. 1—4 = m 1 sup.

Fig. 10—19 = m 3 sup.

Fig. 25—29 = m 2 inf.

Fig. 5—9 = m 2 sup.

Fig. 20—24 = m 1 inf.

Fig. 30—33 = m 3 inf.

Fundorte: 1. Ost-Rußland, 2. Charkow, 3. Sarepta, 4. Sarepta, 5. Charkow, 6. Charkow, 7. Sarepta, 8. Sarepta, 9. Woronez, 10. Ost-Rußland, 11. Süd-Rußland, 12. Sarepta, 13. Eka-terinoslaw, 14. Sarepta, 15. Sarepta, 16. Sarepta, 17. Sarepta, 18. Charkow, 19. Woronez, 20. Charkow, 21. Sarepta, 22. Charkow, 23. Piatigorsk, 24. Sarepta, 25. Charkow, 26. Sarepta, 27. Charkow, 28. Sarepta, 29. Sarepta, 30. Charkow, 31. Sarepta, 32. Piatigorsk, 33. Sarepta.

Tafel XIX.

Die Kauflächen der linken Molaren von *Spalax giganteus* NUNG, achtfach vergrößert.

Fig. 1—4 = m 1 sup.

Fig. 9—12 = m 3 sup.

Fig. 17—20 = m 2 inf.

Fig. 5—8 = m 2 sup.

Fig. 13—16 = m 1 inf.

Fig. 21—24 = m 3 inf.

- Fig. 1, 5, 9, 13, 17 u. 21 = Transsural (LEHMANN).
 Fig. 2, 6, 10, 14, 18 u. 22 = Uralfluß-Gebiet (PEROWSKY).
 Fig. 3, 7, 11, 15, 19 u. 23 = Kirgisensteppen (EVERSMANN).
 Fig. 4, 8, 12, 16, 20 u. 24 = Petrowsk.

Tafel XX.

Die linken Molaren von *Spalax Ehrenbergi* NHRG mit ihren Wurzelwaben, fünffach vergrößert.

Fig. 1—4 = m 1 sup.	Fig. 18—21 = m 2 inf.
Fig. 5—8 = m 2 sup.	Fig. 22—25 = m 3 inf.
Fig. 9—12 = m 3 sup.	Fig. 26 = die Wurzelwaben der unteren Molaren
Fig. 13 = die Wurzelwaben der oberen Molaren	Fig. 27 u. 28 = der linke m 3 sup. und die Wurzelwaben von <i>Sp. Ehrenbergi</i> var. <i>aegyptiacus</i> .
Fig. 14—17 = m 1 inf.	

Hier und auf sämtlichen ähnlichen Tafeln bezeichnet:

- a = die linguale Wurzel und Wabe des m 1 sup.
 b = die vordere labiale Wurzel und Wabe des m 1 sup.
 c = die hintere labiale Wurzel und Wabe des m 1 sup.
 d = die linguale Wurzel und Wabe des m 2 sup.
 e = die vordere labiale Wurzel und Wabe des m 2 sup.
 f = die hintere labiale Wurzel und Wabe des m 2 sup.
 g = die linguale Wurzel und Wabe des m 3 sup.
 h = die vordere labiale Wurzel und Wabe des m 3 sup.
 i = die hintere labiale Wurzel und Wabe des m 3 sup.
 j = die vordere Wurzel und Wabe des m 1 inf.
 k = die hintere Wurzel und Wabe des m 1 inf.
 l = die vordere Wurzel und Wabe des m 2 inf.
 m = die hintere Wurzel und Wabe des m 2 inf.
 n = die vordere Wurzel und Wabe des m 3 inf.
 o = die hintere Wurzel und Wabe des m 3 inf.

Tafel XXI.

Die linken Molaren von *Spalax Ehrenbergi* var. *kirgisorum* NHRG mit ihren Wurzelwaben, fünffach vergrößert.

Fig. 2 u. 10 = m 1 sup.	Fig. 7 u. 15 = m 2 inf.
Fig. 3 u. 11 = m 2 sup.	Fig. 8 u. 16 = m 3 inf.
Fig. 4 u. 12 = m 3 sup.	Fig. 5 u. 13 = die Wurzelwaben der unteren Molaren
Fig. 1 u. 9 = die Wurzelwaben der oberen Molaren	Fig. 1—8 = Typus des <i>Sp. kirgisorum</i> NHRG
Fig. 6 u. 14 = m 1 inf.	Fig. 9—16 = Typus des <i>Sp. intermedius</i> NHRG (Beirut).

Tafel XXII.

Die linken Molaren von *Spalax monticola Nehringi* SAT. (Fig. 1, 3, 5, 8, 10 und 12) und *Sp. mont. armeniacus* (Fig. 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13 und 14) mit ihren Wurzelwaben, fünffach vergrößert.

Fig. 1 u. 2 = m 1 sup.	Fig. 8 u. 9 = m 1 inf.
Fig. 3 u. 4 = m 2 sup.	Fig. 10 u. 11 = m 2 inf.
Fig. 5 u. 6 = m 3 sup.	Fig. 12 u. 13 = m 3 inf.
Fig. 7 = die Wurzelwaben der oberen Molaren	Fig. 14 = die Wurzelwaben der unteren Molaren
- Fundort von *Sp. m. Nehringi*: Zor, von *Sp. m. armeniacus*: Göl.

Tafel XXIII.

Die linken Molaren von *Spalax monticola anaticus* (Fig. 1—8) und *Sp. mont. hellenicus* (Fig. 9—16) mit ihren Wurzelwaben, fünffach vergrößert.

Fig. 2 u. 10 = m 1 sup.	Fig. 6 u. 14 = m 1 inf.
Fig. 3 u. 11 = m 2 sup.	Fig. 7 u. 15 = m 2 inf.
Fig. 4 u. 12 = m 3 sup. [Molaren.	Fig. 8 u. 16 = m 3 inf. [Molaren.
Fig. 1 u. 9 = die Wurzelwaben der oberen	Fig. 5 u. 13 = die Wurzelwaben der unteren
- Fundort von *Sp. m. anaticus*: Paradisos, von *Sp. m. hellenicus*: Lamia.

Tafel XXIV.

Die linken Molaren von *Spalax monticola turcicus* (Fig. 1—8) und *Sp. mont. dolbrogeae* MILL. (Fig. 9—16), fünffach vergrößert.

Fig. 2 u. 10 = m 1 sup.	Fig. 6 u. 14 = m 1 inf.
Fig. 3 u. 11 = m 2 sup.	Fig. 7 u. 15 = m 2 inf.
Fig. 4 u. 12 = m 3 sup. [Molaren	Fig. 8 u. 16 = m 3 inf. [Molaren.
Fig. 1 u. 9 = die Wurzelwaben der oberen	Fig. 5 u. 13 = die Wurzelwaben der unteren
- Fundort von *Sp. m. turcicus*: Makrikeui, von *Sp. m. dolbrogeae*: Cernavoda.

Tafel XXV.

Die linken Molaren von *Spalax monticola monticola* NHRG (Fig. 1—8) und *Sp. mont. symiensis* (Fig. 9—16) mit ihren Wurzelwaben, fünffach vergrößert.

Fig. 2 u. 10 = m 1 sup.	Fig. 6 u. 14 = m 1 inf.
Fig. 3 u. 11 = m 2 sup.	Fig. 7 u. 15 = m 2 inf.
Fig. 4 u. 12 = m 3 sup. [Molaren	Fig. 8 u. 16 = m 3 inf. [Molaren.
Fig. 1 u. 9 = die Wurzelwaben der oberen	Fig. 5 u. 13 = die Wurzelwaben der unteren
- Fundort von *Sp. m. monticola*: Kupres, von *Sp. mont. symiensis*: Ó-Pazua.

Tafel XXVI.

Die linken Molaren von *Spalax hungaricus hungaricus* NHRG mit ihren Wurzelwaben, fünffach vergrößert.

Fig. 2 u. 10 = m 1 sup.	Fig. 6 u. 14 = m 1 inf.
Fig. 3 u. 11 = m 2 sup.	Fig. 7 u. 15 = m 2 inf.
Fig. 4 u. 12 = m 3 sup. [Molaren	Fig. 8 u. 16 = m 3 inf. [Molaren.
Fig. 1 u. 9 = die Wurzelwaben der oberen	Fig. 5 u. 13 = die Wurzelwaben der unteren
- Fig. 1—8 = mittelaltes ♂ aus Kúnágota, Fig. 9—16 = altes ♂ aus Makó.

Tafel XXVII.

Die linken Molaren von *Spalax graecus graecus* NHRG mit ihren Wurzelwaben, fünffach vergrößert.

Fig. 2 u. 10 = m 1 sup.	Fig. 6 u. 14 = m 1 inf.
Fig. 3 u. 11 = m 2 sup.	Fig. 7 u. 15 = m 2 inf.
Fig. 4 u. 12 = m 3 sup. [Molaren	Fig. 8 u. 16 = m 3 inf. [Molaren.
Fig. 1 u. 9 = die Wurzelwaben der oberen	Fig. 5 u. 13 = die Wurzelwaben der unteren

Fig. 1—8 = mittelaltes Exemplar, angeblich aus Athen (im Besitz der Universität zu München; Cotypus des *Sp. graecus* NHRG.), Fig. 9—16 = junges Exemplar aus Czernowitz (im Besitz der dortigen Universität).

Tafel XXVIII.

Die linken Molaren von *Spalax graecus antiquus* (Fig. 1—8) und *Sp. istricus* (Fig. 9—16) mit ihren Wurzelwaben, fünffach vergrößert.

Fig. 2 u. 10 = m 1 sup. Fig. 6 u. 14 = m 1 inf.
 Fig. 3 u. 11 = m 2 sup. Fig. 7 u. 15 = m 2 inf.
 Fig. 4 u. 12 = m 3 sup. [Molaren Fig. 8 u. 16 = m 3 inf. [Molaren.
 Fig. 1 u. 9 = die Wurzelwaben der oberen Fig. 5 u. 13 = die Wurzelwaben der unteren

Fig. 1—8 = nach einem Exemplar der Begräbnisstätte zu Apahida;
 Fig. 9, 11, 13, 14, 15 u. 16 = nach einem Exemplar aus Horesu Poenar;
 Fig. 10 u. 12 = nach einem Exemplar aus Prundu.

Tafel XXIX.

Die linken Molaren von *Spalax microphthalmus* GÜLDENST. mit ihren Wurzelwaben, fünffach vergrößert.

Fig. 2 u. 3 = m 1 sup. Fig. 9 u. 10 = m 1 inf.
 Fig. 4 u. 5 = m 2 sup. Fig. 11 u. 12 = m 2 inf.
 Fig. 6 u. 7 = m 3 sup. [Molaren Fig. 13 u. 14 = m 3 inf. [Molaren.
 Fig. 1 = die Wurzelwaben der oberen Fig. 8 = die Wurzelwaben der unteren
 Fig. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11 u. 13 = mittelaltes Exemplar aus Sarepta;
 Fig. 3, 5, 7, 10, 12 u. 14 = altes Exemplar aus Woronez.

Tafel XXX.

Die linken oberen Molaren von *Spalax giganteus* NHRG mit ihren Wurzelwaben, fünffach vergrößert (Fig. 1—13).

Fig. 1—4 = m 1 sup. Fig. 5—8 = m 2 sup. Fig. 9—12 = m 3 sup.
 Fig. 13 = die Wurzelwaben der oberen Molaren.
 Fig. 1, 5 u. 9 = nach einem Exemplar aus den transuralischen Steppen;
 Fig. 2, 6 u. 10 = nach einem Exemplar aus dem Uralflußgebiet;
 Fig. 3, 7, 11 u. 13 = nach einem Exemplar aus Petrowsk;
 Fig. 4, 8 u. 12 = nach einem Exemplar aus den Kirgisensteppen;
 Fig. 14 = Schädel eines jungen Exemplars des *Spalax giganteus* NHRG, von oben betrachtet, in natürlicher Größe (transuralische Steppen).

Tafel XXXI.

Die linken unteren Molaren von *Spalax giganteus* NHRG mit ihren Wurzelwaben, fünffach vergrößert (Fig. 1—13).

Fig. 1—4 = m 1 inf. Fig. 5—8 = m 2 inf. Fig. 9—12 = m 3 inf.

Fig. 13 = die Wurzelwaben der unteren Molaren.

Fig. 1, 5 u. 9 = nach einem Exemplar aus den transuralischen Steppen;
Fig. 2, 6 u. 10 = nach einem Exemplar aus dem Uralflußgebiet;
Fig. 3, 7, 11 u. 13 = nach einem Exemplar aus Petrowsk;
Fig. 4, 8 u. 12 = nach einem Exemplar aus den Kirgisensteppen;
Fig. 14 = junger Schädel eines *Spalax hungaricus hungaricus* NERO aus Kúnágota, von oben betrachtet in natürlicher Größe.
Fig. 15 = Junger Schädel eines *Spalax monticola Nehringi* SAT. aus Zor, von oben betrachtet, in natürlicher Größe.

Tafel XXXII.

Die Kaumuskeln des *Spalax Ehrenbergi* NHRG, dreifach vergrößert.

Fig. 1 = die Kaumuskeln von oben betrachtet,
Fig. 2 = die Kaumuskeln von unten betrachtet,
Fig. 3—6 = die linken Kaumuskeln von außen betrachtet und schichtenweise abgetragen.

Erklärung der Buchstaben:

<i>tp</i> = <i>Temporalis Portio parietalis</i> ,	<i>mma</i> = <i>Masseter medialis Portio anterior</i> ,
<i>x</i> = Sehne desselben (Fig. 6),	<i>mma</i> ₁ = hinteres Bündel desselben,
<i>tl</i> = <i>Temporalis Portio lambdoidea</i> ,	<i>mmi</i> = <i>Masseter medialis Portio intermedia</i> ,
<i>tsz</i> = <i>Temporalis Portio suprazygomata</i> ,	<i>mmp</i> = <i>Masseter medialis posterior</i> ,
<i>y</i> = dessen Insertion am Kronfortsatz,	<i>mmex</i> = <i>Masseter medialis Portio extrema</i> ,
<i>ml</i> = <i>Masseter lateralis</i> ,	<i>pti</i> = <i>Pterygoideus internus</i> ,
<i>mls</i> = <i>Masseter lateralis Portio superficialis</i> ,	<i>tm</i> = <i>Transversus mandibulae</i> ,
<i>mls</i> ¹ = oberer Teil desselben,	<i>dg</i> = <i>Digastricus</i> ,
<i>mls</i> ² = Randteil desselben,	<i>pj</i> = <i>Processus paroccipitalis s. jugularis</i> ,
<i>mlp</i> = <i>Masseter lateralis Portio profunda</i> ,	<i>c</i> = <i>Condylus occipitalis</i> ,
<i>glH</i> = <i>Glandula Harderiana</i> *, in der Mitte mit dem rudimentären Auge.	

Tafel XXXIII.

Fig. 1 Schädel des *Spalax Ehrenbergi* NHRG, von unten aus gesehen, dreifach vergrößert.

<i>pte</i> = <i>Pterygoideus externus</i> ,	<i>tm</i> = <i>Transversus mandibulae</i> .
---	---

Fig. 2. Die Stellung der Molaren des *Spalax Ehrenbergi* NHRG von hinten gesehen, fünf-fach vergrößert.

<i>d</i> = die obere und untere Molar-	<i>lm</i> = <i>Lamina medialis</i> ,
reihe in natürlicher Lage,	<i>ll</i> = <i>Lamina lateralis</i> ,
<i>co</i> = <i>Condylus occipitalis</i> ,	<i>pte</i> = <i>Pterygoideus externus</i> ,
<i>mx</i> = <i>Maxilla</i> ,	<i>b</i> = <i>Bulla tympani</i> ,
<i>ppt</i> = <i>Processus pterygoideus</i> ,	<i>md</i> = <i>Mandibula</i> .

Fig. 3. Die linke Unterkieferhälfte mit den Kaumuskeln von *Spalax Ehrenbergi* NHRG, von hinten gesehen, dreifach vergrößert.

<i>pte</i> und <i>pte</i> ₁ = <i>Pterygoideus externus</i> ,
<i>pti</i> = <i>Pterygoideus internus</i> ,
<i>mlp</i> = <i>Masseter lateralis Portio profunda</i> .

Fig. 4. Magen von *Spalax Ehrenbergi* NHRG, von außen, in natürlicher Größe.

Fig. 5. Derselbe im Tangentialschnitt.

Fig. 6. Magen von *Spalax hungaricus hungaricus* NHRG, im Tangentialschnitt, in natürlicher Größe.

Fig. 7. Derselbe von außen.

Buchstabenbezeichnung an den Abbildungen des Magens.

<i>oe</i> = <i>Oesophagus</i> ,	<i>st</i> = <i>Sulcus transversalis</i> ,
<i>p</i> = <i>Pylorus</i> ,	<i>dp</i> = <i>Duplicatura</i> ,
<i>it</i> = <i>Intestinum tenue</i> ,	<i>tr</i> = <i>Trabeculum</i> ,
<i>pc</i> = <i>Pars cardiaca</i> ,	<i>sc</i> = <i>Stratum corneum</i> ,
<i>pb</i> = <i>Pars basalis</i> ,	<i>ag</i> = <i>Area glandulosa</i> .
<i>pp</i> = <i>Pars pylorica</i> ,	

* Vgl. SZAKÁLL GYULA, A földi kutya szeme; Állattani Közlemények I, 1902, p. 89

Species generis Spalax.

Tab.I.

Species generis Spalax.

Tab. VI.

Species generis Spalax.

Tab. IV

Species generis Spalax.

Tab. VI.

Species generis Spalax.

Tab. VII

Species generis Spalax.

Tab. VIII.

Species generis Spalax.

Tab. IX

Species generis Spalax.

Tab. XVI.

Mamm.

Species generis Spalax.

Tab. XVII.

Species generis *Spalax*.

Tab. XIX.

Ausz. del. Mehely

Druk. és nyom. Grund V utódai Budapesz

Species generis Spalax.

Tab. XX.

Spalax

Species generis Spalax

Tab. XXI

Species generis Spalax.

Tab. XXII.

Species generis Spalax.

Tab. XXIII

Alamne.

Species generis Spalax.

Tab. XXV

Species generis Sparax

Tab. XXVI

Maxim.

Species generis Spalax.

Tab. XXVII

McMinn

Species generis *Spalax*.

Tab. XXVIII

Mamm.

Species generis Spalax.

Tab. XXIX

Mamm.

Species generis Spalax.

Tab. XXX.

Tab. XXXI.

Species generis Spalax.

Tab. XXXII

Mamm.

Species generis Spalax.

Tab. XXXIII.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00713 7219