S F

752

.G.18

LIBRARY OF CONGRESS.

— SF 752 —
Chap. — Copyright No. —

Shelf. G18 —

UNITED STATES OF AMERICA.

Farmerens Veileder

i

Dyrlægemedicinen.

—
Beskrivelse over 100 af de vigtigste Dyrmediciner, deres
Virkning, Forekomst, Sammensætning, Dosis og An-
vendelse i alle forekommende Sygdomstilfælde.

10
4 3 3 5

—
Af
H. Galtung,
Norsk-amerikansk Dyrlæge.

—
Med fuldstændig Fortegnelse over Lægemidlernes Navne paa
norsk, engelsk og latin.

—
Chicago.

Scandinavens Boghandel, 183-187 N. Peoria St.
1884.

Entered according to Act of Congress, in the year 1884, by
JOHN ANDERSON & COMPANY,
In the Office of the Librarian of Congress, at Washington, D. C.

12-32399

SF 152
.G18

Scandinavens
Bog- og Accidentstrykkeri.

Indbunden i
Scandinavens Bogbinderi.

Farmerens Veileder

i

Dyrlægemedicinen.

No. 1. Aloe.

Største Dosis 1—1½ Dounce.

Latin: Aloë. Engelsk: Aloe.

Dette i Medicinen saa velkjendte og hyppig brugte Stof faaes af en Plante, som hører hjemme i det sydlige Afrika. Den er haard, mørkbrun af Kulør, glindsende i Bruddet og af skarp Lugt, opløselig i Spiritus og dels i Vand. Dens Anvendelse er udstrakt, saavel til indvortes som udvortes Brug.

Indvortes

anvendes den mod Forstoppelse og dels som fordøielsesstyrkende Middel, men i sidste Tilfælde anvendes kun et Par Drakmer opløst i Brændevin.

Udvortes

bruges den helst som Tinctur, der kjøbes under Navn af "Tincture of Aloe." Den er udmærket som Gronicsmiddel for rene Saar paa Heste og Kjør, og

ansees for en af de bedste Tincturer, man har. Den maa for at være ægte, have en fortladen Kulør og en frisk Lugt næsten som af Portvin. Aloen er et gammelt Medicinstof, der kjendtes oppe i den graa Oldtid, hvor den var brugt som Røgelsesmid'

No. 2. Raa Alum.

Dosis $\frac{1}{2}$ Dounce.

Latin: Alumen. Engelsk: Alum.

Dette er et saakaldt Dobbeltfalt med svovlsure Sammensætninger. Dets Virkninger ere standsende og sammensnerpende.

Indvortes

er som nævnt dens største Dosis almindeligst $\frac{1}{2}$ Dounce, og bruges da mod Diarrhoe, slappede Slimhinder, dels mod Blodpis og forresten hvor det gjælder om at sammensnerpe og ophæve stinkende Sammensætninger.

Udvoortes

anvendes den dels i Pulverform, dels opløst i Vand til at holde Saar friske med, samt for at hindre en altfor hurtig Groning.

No. 3. Arsenik.

Største Dosis 12 grains.

Latin: Acidum arsenicosum.

Dette Stof udvindes i thdske Bjergværker i raa Tilstand. Det er en stærk Gift, tæt, tungt, hvidt af

Farve, opløseligt i Vand og fordunster paa Gløder. Den er et virksomt Giftstof og maa behandles med Forsigtighed.

Indvortes

bruges den til Oplivelse af Nervesystemet, mod svag Drikke- og Vedehyst, tørre Slimhinder, Magerhed og Indvoldsorm.

Udvides

mod Kræft, Mug, Skab, Ringorm, Skabmid og Kræftsaar i Pulverform. De omliggende Dele oversmøres med Fedt og Dyret maa forhindres fra at slukke det. Arsenik og varmt Jern virker tildels temmelig ens paa det udvendige Dyrlegeme. 1 Del Arsenik og 20 Dele Jernvitriol fortyndet med Vand er udmærket mod gammel Skab. Mod gamle Hævelser er den virksom, naar der gjøres et Indsnit i samme og indsættes 20—30 grains Arsenik, hvorefter Snittet stoppes med Stry eller Bomuld.

No. 4. Chinabark.

Største Dosis 1—1½ Dounce.

Latin: Cortex Chinā. Engelsk: Bark of China.

Denne faaes af et Træ, som vokser i Syd-Amerika.

Indvortes

virker den sammensnerpende, oplivende og styrkende paa Nervesystemet og Livskraften, uden at efterlade Slappelse og ligesom bevirker en Forøgelse af Organismens Sammenhæng. Man kan bruge den i

Pulverform og som Dekokt. I sidste Tilfælde tages 1 Del Bark til 16 Dele Vand, der indkoges til en Trediedel.

Den har ingen udvortes Anvendelse. Ren China-bark maa være i tynde, rørdannede Stykker, udvendig brun, indvendig gulbrun, af sammensnerpende Smag og glat i Bruddet.

No. 5. Cassarilla-Bark.

Største Dosis 1 Dounce.

Latin: Cortex cascarillæ.

Denne faaes af et Træ, der vokser i det sydlige Amerika og erholdes i Stykker, er graa af Farve, fast, tung, dels graa udvendig og dels hvid. Den virker vanddrivende og sammensnerpende, men store og ofte gjentagne Doser kan dog i Længden blive skadelige idet de afstedkommer Betændelse.

No. 6. Egebark.

Største Dosis $\frac{1}{2}$ Dounce.

Latin: Cortex quercus. Engelsk: Bark of Oak.

Denne Bark faaes af det bekjendte Træ, Egen. Denne Barks Egenskab er stærkt sammensnerpende paa Grund af dens Indhold af Garvesyre. Den henføres til de sammensnerpende Midler.

Indvortes

mod Forraadnelsesfebre og Miltbrand, samt mod Diarrhoe. Mod Miltbrand og Leversyge kan man

tage 4 Dunces Egebart og 2 Dunces Kamfer, blande og pulverisere det. Derpaa deles det i 6 lige Dele, og en Portion indgives Morges og Aften.

U d v o r t e s

bruges den som Middel mod udflydende Materier i Forbindelse med andre Midler, samt mod bløde Hævelser, brandagtige Raadsaar og ildelugtende. I de sidste Tilfælde kan man bruge følgende Sammenfætning:

Egebart.....	1 Dunc.
Træful.....	1 do.
Kamfer	$\frac{1}{2}$ do.
Myrrha.....	$\frac{1}{4}$ do.

Pulveriseres og blandes.

No. 7. Pilebart.

Største Dosis 2 Dunces.

Latin: Cortex salicis.

Denne Bart faaes af den bekjendte Pil, der vokser saavel i den gamle som nye Verden. Den indeholder Garvesyre, samt et særeget Biterstof (Silicin). Dens Virkninger ere sammensnerpende og styrkende.

I n d v o r t e s

bruges den mod Svækkelse, Febre, Forraadnelses sygdomme, samt til Standzning af Diarrhoe og for hurtig Urinladning.

U d v o r t e s

bruges den som Pulver at strø i gamle Raadsaar og til at stille raadagtigt Udflod.

No. 8. Belladonna.

Største Dosis 1 Unce.

Latin: Folia belladonna.

Dette er en fleraarig Plante, der findes blandt andre Steder ogsaa i det sydlige Norge og hører til dette Lands giftigste Planter. Bladene ere store og stilkede og af lysgrøn Farve. Dens Anvendelse er temmelig udstrakt.

Indvortes

anvendes den mod Hundegalskab, Stivkrampe, krampagtig Hoste, almindelig Krampe, Kolik og Tarmbetændelse. Ligeledes mod Snive ("glanders,") som Bademiddel mod Vienbetændelser, mod Kræftsaar og lignende.

No. 9. Ruffeblade.

Største Dosis 2—4 Unces.

Latin: Folia menyanthis.

Dette er en fleraarig Plante der er udbredt over en større Del af Europa. Den er trebladet og indeholder et rent, kraftigt Bitterstof.

Indvortes

anvendes den mod Slappelse, Diarrhoe, manglende Vedehst og sættes gjerne i Forbindelse med andre lignende Stoffer, saasom Gentian, Calamus m. fl. Man kan ogsaa anvende den som Infus, nemlig ved at overgyde de tørrede Blade med kogende Vand og saaledes udtrække Bitterstoffet.

No. 10. Bulmeurt.Største Dosis $\frac{1}{2}$ —3 Dunces.

Latin: Folia hyoscyami.

Denne Plante vokser blandt andre Steder ogsaa i det sydlige Norge, og sees helst voksende paa Grusdynger og langs Veikante. Bladene ere spidse. Dens virksomme Stoff — hyocyanin — lader sig let udtrække i Alcohol, er ikke flygtigt, og taaler ellers en jevn Røgning, uden at tabe sin Kraft.

Indvortes

er den anvendt som en af de bedste Plantemediciner mod Blodurin, sammen med andre Midler, saasom Bljsukker. I Betændelsessygdomme maa den aldrig bruges.

Udvortes bruges den sjældnere.

No. 11. Digitalis.Største Dosis 1— $1\frac{1}{2}$ Drachma.

Latin: Folia digitalis.

Denne Plante findes næsten overalt i Norge og andre europæiske Lande. Den benævnes i Norge i daglig Tale "Rævehjelde." Den er høit anskreven som et skarpt narkotisk Middel.

Indvortes

er den et ypperligt Middel mod haardnakkede rheumatiske Tilfælde i Forbindelse med Kamfer, idet den giver de angrebne Organismer et større Ligevægtsfor-

hold. Sammen med Aloe i smaa Doser har den ogsaa vist sig fortræffelig mod Dreiesyge hos Faar.

No. 12. Krusemynte.

Største Dosis 1—2 Unces.

Latin: Flores crusemintæ.

Denne Plante findes paa mange Steder i Norge og andre Lande. Den indeholder en ætherisk kamferagtig Olje, samt et Bitterstof.

Udnyttes

anvendes den meget som Omslag paa betændte Steder, saasom Overbetændelse og anvendes ellers der, hvor Kamfer er anbefalet.

Pebermynte (*Folia pipermintæ*) anvendes ligesom den førstnævnte.

No. 13. Salvie.

Største Dosis 1—2 Unces.

Latin: Folia salviæ.

Denne Plante har sit Hjem i det sydlige Europa og indsamles til medicinsk Brug i Juli Maaned.

Indnyttes

forbedrer den en svækket Fordøjelse ved at hæve Krampe og Opblæsninger samt mod Diarrhoe, Efterbyrdens manglende Bortgang, Slimflod, Betændelser, Battersot og Febre.

Udnyttes

anvendes den i Pulverform at strø i gamle, raadnende Saar, samt til Indsprøitninger og som Rensemiddel.

No. 14. Tobak.

Største Dosis 1—1½ Unces.

Latin: Folia Nicotiana.

Denne saa velkjendte Plante har, anvendt paa rette Maade, god medicinsk Værd. Den indeholder et stærkt Giftstof—Nicotin—en af de stærkeste Gifte.

Den virker omtrent som Digitalis, men langsommere og især paa Blodkarrene.

Indvortes

anvendes den mod tabt Vædelyst, Forstoppelse, Vattersot, Krampe, Asthma og Vindkolik, samt bruges som Aflyster i frampagtig Kolik.

Udvortes

som Badskemiddel mod Kløe, Udslet, Skab, Ringorm; ligeledes i Salvesform mod disse Sygdomme.

No. 15. Arnika-blomster.

Latin: Flores arnicæ.

Disse ere Blomsterne af en Plante, der vokser saavel i som udenfor Europa. Blomsterne udmærke sig ved en fin, aromatisk Duft, og har et lysegult, blødt Udseende. Dens Anvendelse er fornemmelig

Udvortes,

hvor den bruges som Jusus ved at overgødes med kogende Vand. Den anvendes som Badskemiddel mod saavel nye som gamle Saar og har ved Siden af ogsaa en god lægende Egenkab. Anusninger og

Forhærdelser anvendes den ogsaa imod i nævnte Form, ligeledes i Omslag. Den saa kaldte Arnica-tinctur er et Produkt af Blomsterne. Mere om denne senere.

No. 16. Kamilleblomster.

Latin: Flores chamomillæ.

Ogsaa disse ere Blomster af en Plante, der har været længe kjendt som Lægemiddel. Deres Egenskaber er ganske lig Arnica-blomsternes, skjøndt de dog bruges mere

Indvortes

mod Krampekolik, Bind og uregelmæssige Fødselsveer, dels ogsaa mod Diarrhoe i Forbindelse med andre Midler, saasom Alun, Gentian, Enebær med flere.

No. 17. Hyldeblomster.

Største Dosis 2—3 Unces.

Latin: Flores sambuci.

Disse faaes af Hylde træet, der er temmelig kjendt, ikke alene i Skandinavien, men mange andre Steder; mindre kjendt er maaske Blomsternes lægende Egenskaber.

Indvortes

bruges de mod Sygdomme, der hidrøre fra undertrykt Hududdunstning og Forkjølelse, saasom Koldfeber, Halsbetændelse, Lungebetændelse, Brystbetændelse, Rheumatisme, Krampe og Kolik, enten i For-

bindelse med Kamfer, Spiritus, Kamilleblomster eller alene, alt efter som Sygdomsanfaldene ere stærkere eller svagere.

Udvortes

anvendes den mod de samme Sygdomme som Kamilleblomsterne.

No. 18. Regnfang.

Største Dosis 1 Unce.

Latin: Flores tanaceti.

Denne vokser foruden i andre Lande ogsaa i Skandinavien, hvor den findes paa Gaardsrum og tørre Steder. Den indeholder en ætherisk Olje samt et kraftigt Bitterstof. Den virker flygtigt oplivende paa Nervesystemet, og anvendes forresten altid hvor bitre Plantemidler anbefales.

Indvortes

er den i Forbindelse med andre Midler eller alene et meget godt ormdrivende Middel, og bruges i hvilken som helst Form, baade som Piller, Pulver og Infus. Sammen med andre Midler er den ofte brugt som et godt Middel til at holde Faar friske og raske, især naar de beiter paa raalændte Steder, for Exempel i følgende Sammensætning:

Regnfang.....	4	Unces.
Kalmusrod.....	4	do.
Almindeligt Træjod.....	2	do.
Rjøffensalt.....	2	do.
Terpentinolje.....	$\frac{1}{2}$	do.
Havremel.....	2	Pounds

Dette blandes og fordeles paa 10 Aar, og er passende Dosis for en Dag.

Udvortes

bruges den som Pulver paa stinkende Raadsaar, og i flydende Form som Badste- og Bademiddel mod Skurv og Utøi.

No. 19. Bly sukker.

Største Dosis $\frac{1}{4}$ Dounce.

Latin: Acetas plumbicus. Engelsk: Sugar of Lead.

Dette Stof er et Blypræparat og henregnes til Giftstoffene. Det er af hvid Farve, fast og tungt, og har en stærkt kjølende Egenskab.

Indvortes

anvendes det sammen med den tidligere nævnte Bulmeurt som et godt Middel mod Nyrebetændelse og Blodurin, samt forresten mod Betændelser, der angriber Baglivsorganerne.

Udvortes

anvendes Blysukkeret dels i Salveform og dels i opløst Tilstand med Vand, og er hyppeligt for alle Dyr, naar det gjælder om at borttage Hede, Ømhed og Opsvulmen, da det som nævnt har en stærk kjølende og nedstemmende Egenskab. Da det er giftigt, maa det selvfølgelig behandles med Forsigtighed.

No. 20. Blyhvidt.

Latin: Hydrato-carbonas plumbicus.

Engelsk: White lead.

Ogsaa dette er et Blypræparat, der har en Del medicinsk Anvendelse, dog kun udbortes, og da helst i Salveform. Det har en stærk tørrende og opslugende Egenskab. Strøet som Pulver i vædskefulde, sletgroende Saar er det udmærket.

No. 21. Borax.

Latin: Borax.

Dette Stof, hvis Udseende og Former i Krystaller ligner Alun, benyttes mere i Tekniken end i Medicinen. Dens Anvendelse er omtrent ens med Alun, dog kun som udbortes Middel, da dens indvortes Anvendelse er sjældnere.

No. 22. Enebær.

Største Dosis 2—3 Uncies.

Latin: Fructus juniperi. Engelsk: Juniper berries.

Disse faaes af det bekjendte Træ, Eneren, og indeholder en skarplugtende, harpiksagtig Olje. De anvendes enten i Form af Pulver eller og som Olje — Enebærolje. De ere et godt Lægemiddel

Indvortes

mod Urintrang og Bindansamlinger. Den anvendes mod Sygdomme i Tarmkanalen, til Vædsfernes Stimuleringen, naar en uheldig Blanding af disse er

tilstede, til Ophjælpelse af en undertrykt Hudad-
dunstning, i Svækkelses- og Slaphedstilstande, Bat-
tersot og Forkjølelse med flere Sygdomme. Den er
god at give Hestene om Høsten, naar Overgangen
fra ferskt til tørt Foder indtræder, da enkelte Heste
da tidt viser Upasselighed.

Udvortes

kan Bærrene bruges i Pulverform som Omslag paa
Hævelser og Svulster.

No. 23. Kamfer.

Største Dosis $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Dounce.

Latin: Camphora.

Dette velkjendte Stof faaes af tvende Slags
Træer, som vokser i Japan og China, og udvindes
af disse enten direkte ved Udsvedning eller ved Ud-
dragning. Det er baade et meget brugt og meget
virksomt Middel. Det er af hvid Farve og fast
Sammenhæng. Det kan pulveriseres, naar det
overdryppes med Alcohol.

Indvortes

anvendes det som et oplivende Middel paa Nerve-
systemet, idet det ophjælper en nedstemt Livskraft.
Mod alle Sygdomme, der har sin Oprindelse fra
Forkjølelse er det altid paa sin Plads, og bruges da
opløst i Alcohol eller som Pulver sammen med an-
dre Midler eller alene.

Udvortes

bruges det helst i Form af Kamferspiritus (1 Del Kamfer til 12 Dele Alcohol) og dels som Kamferolje ($\frac{1}{8}$ Duncen Kampher, $\frac{1}{2}$ Pint Bomolje og 2 Spiseskeer Salmiaspiritus) samt som Salve (1 Del Kamfer til 8 Dele Lard). Disse Sammenfætninger bruges overalt, hvor der er Stivhed og Værk tilstede, saasom i Sener, Muskler og Led.

No. 24. Collodium.

Latin: Collodium.

Dette bestaar af den saakaldte Skydebomuld, der er opløst i Ether og Vinaand. Det er lyst af Farve, tyktflydende og af en frisk Lugt. Det har ingen indvortes Anvendelse, men

Udvortes

er den et ypperligt Middel til at standse Blødninger fra friske Saar, da det limer Saarlæberne sammen; i dette Tilfælde dyppes en Stript i Olien og paalægges Saaret. Mod brændte Skader er det et uovertræffeligt Middel, da det fuldstændig udestænger Luften fra Stedet, og Hæling af Saaret vil gaa hurtigt for sig. Man maa vogte sig for ikke at bringe det i Nærheden af brændende Lys.

No. 25. Dyvelsdræf.

Største Dosis $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Duncen.

Latin: Asa foetida.

Dette faaes af Roden paa en Plante, der vokser i de persiske Provindser og bestaar af sammenflæbede Farmerens Veileder. 2.

små Korn, udbendig rødbrune, muslingsformede, runde og fedtglindsende, bløde i Varmen og haarde i Kulden, af en løgagtig Lugt og en ubehagelig Smag. Det indeholder Harpiks, Gummi og en ætherisk Olje.

Indvortes

er den god mod Svækkelse og nervøse Forstyrrelser, Vindkolik, Indvoldsorm, Krampekolik og krampeagtig Urintrang.

Udvortes

bruges den sjældnere, og da almindelig i Form af Dyvelsdræktinctur.

No. 26. Spanske Fluer.

Største Dosis $\frac{1}{4}$ Dounce.

Latin: Cantharides.

Denne kjendte Medicin er intet andet end Insekter (Fluer) af en smuk grønagtig Farve. De samles efter at være dampede tildøde, og forekomme i Spanien og flere andre Middelhavslande. Pulveriserede — i hvilken Form de helst faaes hertillands — maa de være af en graagrøn Farve, ikke for fint pulveriserede, lugte svagt kamferagtigt, samt ikke efterlade Fedtpletter paa Papir.

Indvortes

anvendes de til at fremkalde Irritation i Baglivsorganerne, og anvendes ofte til Parrethstens Fremkaldelse. Tillige ere de i høi Grad pirrende, for-

høier Livskraften, virker paa Hududdunstningen og bruges i smaa Indgifter mod Snive ("glanders") eller i det hele taget, hvor man vil vække et Organ til Liv, men som Betingelse maa de aldrig bruges paa betændte Steder.

Udvortes

har de en udstrakt Anvendelse og er som saadan et Middel værd at lægge Mærke til. De bruges baade i Salveform og flydende som Tinctur. De ere et udmærket fraløbende Middel i Lungebetændelse og Nyrebetændelse, i første Tilfælde ved at indgives i Brysteguen, i sidste over Ryndjet, dog aldrig over Benknokler; mod gamle Hævelser og gammel Batteredot, Udvækster, og forresten overalt, hvor det gjælder om at fordele eller fraløbe, og da altid i saadanne Tilfælde, hvor ingen Hede eller Tidsighed findes. Man maa saa meget som mulig besøgte de Steder paa Kroppen, hvor denne Medicin anvendes, til Forebyggelse af, at Dyret slikker derpaa; thi Stoffet fortører under Gifistoffene, og maa som saadant behandles med Forsigtighed.

No. 27. Anisfrø.

Største Dosis $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Duncce.

Latin: Fructus anisi.

Dette faaes af en Plante, som vokser vild i Ægypten og Italien, men dyrkes som Kulturplante ogsaa i flere europæiske Lande. Frøene ere rundagtige,

lidt fladtrykte paa Siderne, af lysgraa Farve, og maa være fri for Stilke. De indeholder en ætherisk Olje af oplivende Egenskab, og virker som saadan paa Aandedræts- og Fordøjelsesorganerne, er slim-drivende og anvendes mod Svækkelse, Opblæsning og Urinrang.

No. 28. Bukkehornfrø.

Største Dosis $\frac{1}{2}$ —1 Dounce.

Latin: Semina foeni græci.

Dette faaes af en Plante, som vokser i det sydlige Europa. Den henhører til de slimede Midler, idet den indgives sammen med andre Midler, forat de ikke skal virke altfor hurtigt, naar dette ikke ønskes. Frøet har en graagtig Farve og en Lugt, der nærmer sig Erter eller Bønner. Beslægtede med Bukkehornfrø er Fennikelfrø (Latin Fructus foeniculi) samt Korianderfrø (Latin Fructus coriandri), idet de omtrent bruges i samme Diemed, dog med den Forskjel, at Fennikelfrø har mere Egne til at forhøje Mælkemængden hos Gølhopper og Kjør, og Korianderfrøet er mere mavesyrkende.

No. 29. Karve.

Største Dosis 1—2 Dunces.

Latin: Fructus carvi.

Dette faaes af en Plante, som findes i vild og dyrket Tilstand i Skandinavien. Frøerne bør være aflange, fra Siden sammentrykte, glatte og af en frisk

kyndret Lugt, samt fri for Stille og andre Indblandinger. Sammen med andre skreslugende Midler er den hypperlig mod Trommesyge hos Hornkvæget og Vindkolik hos Hesten, samt mod undertrykt Fordøjelse (indigestion).

No. 30. Ormesro.

Største Dosis $\frac{1}{2}$ Dounce.

Latin: Floris cinæ.

Dette faaes af en Plante, der vokser vild i Persien og Arabien. Den er sammen med andre orm-drivende Midler, saasom Glandsrod, Aloe og Regnfang, meget god i dette Niemed. Bruges ikke udvortes.

No. 31. Krotonro.

Største Dosis $\frac{1}{8}$ Dounce.

Latin: Semina crotonis.

Disse faaes af Krotonplanten, hvilken er en Buskvæxt, der vokser i Ostindien og Java. De ere ovale, af forskjellig Farve, og indeholder Krotonsyre, et stærkt Gifstof, der er skarpt og flygtigt. I den senere Tid er det helst Brugt saavel indvortes som udvortes, som Olje. Frøets Egenskaber er afførende, og er som saadant det skarpeste af alle aromatiske Midler. Det fremkalder livlig Tarmbevægelse, naar denne er slappet efter haardnakket Kolik.

No. 32. Glaubersalt.

Største Dosis 3—4 Unces.

Latin: Sulphas natricus.

Dette er svovlsurt Natron eller Soda, behandlet med Svovlsyre, og er saaledes et chemisk Præparat. I Krystaller er det hvidt, gjennemsigtigt og tungt, og opløseligt i varmt Vand.

Indvortes

er det et godt Middel mod Febre, da det er temmelig kjøligt, samt et godt Middel mod Kolik hos Heste og Hornkvæg. Det indgives ofte som Pulver eller ogsaa opløst, i sidste Tilfælde rettest for Hornkvæg. Ligeledes er det godt som Alnstermiddel.

Særlig udvortes Anvendelse har det ikke.

No. 33. Salpeter.

Største Dosis $\frac{1}{2}$ Unce.

Latin: Nitrum.

Dette findes i naturlig Tilstand i Sydamerika og Ostindien, og præpareres i Rogerier. Det maa være rent og hvidt af Farve og ganske gjennemsigtig, naar det er i Krystaller, samt have en skarp, bitteragtig og kjølende salt Smag og ingen Lugt. Køstet paa gloende Kul maa det fordampe hurtigt uden at knitre.

Indvortes

er det et udmærket Middel mod Febre og sættes gjerne sammen med Glaubersalt, da det er det mest kjølende Middel, man har. Ligeledes sættes det

ofte i Forbindelse med Glaubersalt i Koliktilfælde. Alene er det ogsaa et blodrensende Middel, og anvendes derfor ofte i forraadnelsesagtige Sygdomme.

No. 34. Salmiak.

Største Dosis $\frac{1}{2}$ Dounce.

Latin: Chloretum ammonicum.

Dette er en kemisk Sammensætning, bestaaende af Ammoniak og Saltsyre og krystalliseres naaleagtigt. Den maa være af lys Farve, sviende Smag og syrlig Lugt, skjönt i aldeles uforfalsket Tilstand skal den igrunder være uden baade Farve og Lugt, men det er som oftest umuligt at erholde den saaledes.

Indvortes

virker den forøgende paa Slimhinderne's Afsondring, er pirrende og forraadnelsestridig, hindrer Blodets Fortykning, er stærkt slimaffondrende enten der er Feber tilstede eller ikke. I alle Slags Forkjølelsssygdomme er den derfor et hypperligt Middel, og forresten altid, naar det gjælder om at fordrive og opløse oversflødige Vædske i Dyrlegemet.

Udvortes

bruges den som Saarmiddel i Pulverform mod gamle, sletgroende og af dovent Kjød opfyldte Saar.

No. 35. Harpiks.

Største Dosis $\frac{1}{2}$ Dounce.

Latin: Resina pini flava.

Dette bekjendte Stof faaes af visse Naaletræer, idet den udvindes af disse ved Destillation. Det

maa være af gulagtig Farve, ikke saa mørkt som det, der bruges i andre Diemed, og af en frisk Lugt.

Indvortes

bruges det som et virksomt urindrivende Middel, samt mod Battersot og vandagtigt Blod, eller i det Hele taget, hvor det gjælder om at fortynde og ud-drive overflødigt Vand.

Udvortes bruges det sjeldnere i fast Form.

No. 36. Selvebessten.

Latin: Lapis infernalis.

Dette Stof, der bestaar af Salpetersyre og Sølv, har adskillig udvortes Anvendelse. Den faaes i Stænger, nedsænkede i Frø, og taaler ikke Dagslyset ved at udsættes for det længe. Stængerne ere af en Pennesjæers Tykkelse og af hvid Farve.

Udvortes

bruges den, da den er et godt Vtzmiddel, mod Raadsaar og Gjærnelse af Udværster, saasom Borter og andre lignende. Saaret fugtes med Vand og Stangen føres rundt det, indtil der synes at danne sig et hvidagtigt Overtræk. Den er et udmærket Middel, især at rense Hestesaar med, da den hurtigt danner en Brandskorpe, ved hvis Afjalden der dannes en god Forboldning.

Indvortes anvendes den sjelden.

No. 37. Jernvitriol.Største Dosis $\frac{1}{2}$ Dounce.

Latin: Sulphas ferrosus.

Dette Stof er krystalliseret svovlsurt Jern, grønagtigt af Farve og halvt gjennemsigtigt. Det bruges meget ogsaa i Tekniken under Navn af "Svæerte."

Indvortes

er det et godt Middel mod Diarrhoe enten alene eller sammen med andre sammensnerpende Midler. Ligeledes mod Blodgang i Endetarmen og daarlig Fordøjelse, i sidste Tilfælde sammen med bitre Urter, saasom Bukkeblade og Regusfang, eller bitre Rødder, saasom Gentian m. fl.

No. 38. Jodine.

Latin: Jodium.

Dette er et chemisk Stof, uddraget af Tangsodaens Lud, har en metalglindsende sort Farve, og er opløseligt i Vinaand og Ether.

Udvortes

har det sin egentlige Anvendelse, da det er et stærkt fordelende Stof, og bruges fornemmelig i Form af Tinctur, skjøndt som Pulver bruges det meget til at strø i Raadsaar og til Indplumringer i gamle Bylder.

No. 39. Jodkalium.

Latin: Jodetum kalicum.

Dette Stof har omtrent samme Virkning som Jod eller Jodine, men er noget mildere i sine Virkninger. Det bruges helst i Salveform.

No. 40. Svovlsurt Kali.Største Dosis $\frac{1}{2}$ —1 Dounce.

Latin: Sulphas kalicus.

Dette er Potaske behandlet med Svovlsyre. Det er lyst af Farve, tæt og tungt. Det er lokalt i sine Virkninger og er meget pirrende, men har ikke den nedstemmende og kjølende Egenskab som andre Salte. Dets Egenskab er forresten som de andre Salte.

No. 41. Vetsende Kali.

Latin: Hydras kalicus.

Dette er et kemisk Præparat, som faaes ved Inddampning af Kalilud til en krystallinsk Masse. Dets Anvendelse er omtrent som Helvedessten, idet det er et temmelig virksomt Vetsmiddel. Indvortes er dets Brug sjældnere.

No 42. Brændt Kalk.

Latin: Calx viva.

Dette bekjendte Stof har ogsaa lidt medicinsk Anvendelse helst til udvortes Brug, enten som Pulver at strø i Raadsaar eller i Form af Kalkvand til Pensling af vædskesulde Saar, ligeledes mod Saar og Udslæt paa Kvæns Over og Spener.

No. 43. Blaasten.Største Dosis $\frac{1}{4}$ Dounce.

Latin: Sulphas cupricus. Engelsk: Blue vitriol.

Blaasten eller Kobbertitriol er et Bjergkrystal og et mineralsk Produkt. Den er opløselig i varmt Vand, blaa af Farve, haard og krystalliseret.

I ndv ortes

anvendes den i haardnakkede Tilfælde af Diarrhoe, Tarmbetændelse, Blodpis og Kværkesygdomme, og forresten altid, naar den forudbestrevne "Jernvitriol" viser sig for svag.

U dv ortes

er den meget anvendt som ætsende Middel mod alle Slags Raadsaar, ligeledes som Pulver i friske Saar, hvor der er slet Groning, ellers bruges den opløst i Vand, 1 Del til 20 Dele Vand, som er et virksomt Middel i urene Saar. Ligeledes anvendes den opløst i Vand som Diemiddel, f. Ex. et Stykke af et Bygkornes Størrelse til en halv Dounce Vand, hvilket bringer Pletter og Dunkelheder paa Diets Hornhinde til at forsvinde.

No. 44. Rjostfensalt.

Største Dosis 2 Dounces.

Dette er et temmelig kjendt Stof, der har adskillig medicinsk Brug. Det maa være rent og hvidt og af en frisk Smag.

Indvortes

virker det oplivende paa Fordøielſen, bevirker en bedre Blanding af Spyt- og Mavekjertlernes Indhold og beliver Organismen.

Udvortes

anvendes det opløst i Vand ſom Rhyſtermiddel og til Badſkning af urene Saar, beſt under Sommer-tiden.

No. 45. Kreosot.

Størſte Doſis 30 Draaber.

Latin: Creosotum.

Dette er et chemiſt Præparat og et Produkt af Stenfulsformationerne, ſamt den vigtigſte Hovedbeſtanddel af Røgen. I fuldkommen ren Tilſtand er den en farveløs Vædſke, ſom ved Lyſets Indvirkninger antager en mere brunrødlig Farve. Den er tungere end Vand, af en gjennemtrængende røgagtig Lugt og opløſelig i Alcohol. Den maa beſkyttes mod Lyſets Indvirkninger.

Indvortes

anvendes den ſom et omſtemmende Middel paa de dyriſke Vædſker, fornemmelig i ſlimaffondrende Sygdomme, ſom Battersot, Sukkersyge, Betændelſer med Slimaffondring og tillige ſom et godt Middel mod Orm, fortyndet i Vand.

Udvortes

bruges den ſom Saarmiddel og tilberedes for dette Brug med 1 Del Kreosot til 30 Dele Vand ſamt

som Badste- og Rensmiddel af en Styrke af 1 Del Kreosot til 80 Dele Vand.

No. 46. Kridt og Træful.

Lidt medicinsk Virkning har ogsaa disse velkjendte Stofte, idet Kridt bruges at sammensættes med de Midler, der er foreskrevne mod Diarrhoe, da det har en snæreslugende Egenskab og neutraliserer Mavesyrerne. Træful bruges mod raadnende Saar og mod stinkende Udtømmelser, dels ogsaa til at stoppe Blødning i friske Saar.

No. 47. Magnesia.

Største Dosis 2—4 Spisestæer.

Latin: Hydrato-carbonas magneticus.

Magnesia er et kemisk Præparat, som har megen Anvendelse til indvortes Brug. Den har Kridtets Egenskaber, men i langt høiere Grad. Den maa være aldeles hvid, meget let og uden Lugt. Den faaes altid fint pulveriseret.

Indvortes

er den et hyppeligt Mididdel mod sure Mavevædsfer, stinkende Udtømmelser og suragtig Mande, og sættes ogsaa ofte i Forbindelse med en eller flere af de Midler, som ere anbefalede mod Diarrhoe. Den maa opbevares paa et luftigt og tørt Sted.

No. 48. Malurt.Største Dosis $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Dounce.

Latin: Herba absinthii.

Denne er Bladene af en Plante, som vokser vild i det sydlige Europa, og som i de nordligere Dele af samme dyrkes som Kulturplante. Den er af graa-grøn Farve, fedtet at føle paa, har en skarp Lugt og en ualmindelig bitter Smag. Som bittert Plante-stof er den en af de allerbedste.

Indvortes

bruges den mod svækket Fordøjelse og til Nervesystemets Oplivelse. Den kan efter Omstændighederne enten bruges alene eller i Forbindelse med andre fordøjelsesstyrkende og syreslugende Midler.

Udvortes

som Pulver paa stinkende, stygge Raadsaar, dels i Grødomslag paa værkende Steder, og som Badsthemiddel (i Infus).

No. 49. Melbrøier.Største Dosis $\frac{1}{2}$ Dounce.

Latin: Secale cornutum.

Dette Stof er en Udvækst paa Rugaks eller en svampagtig Udsvedning paa disse. Af Udseende ere de sorte og langagtige, men hvide i Bruddet, af en bitteragtig Smag og muggen Lugt. De ere giftige og i rugdyrkende Lande afstedkommer de tidt Forgiftninger.

Indvortes

er det et ypperligt Middel mod svage Fødselsveer hos Husdyrene, idet det virker paa Livmoderen, samt løsner Efterbyrden, naar denne paa Grund af for- tidlige Fødsler ikke vil afgaa. Det fremkalder ogsaa Abort (Kastning af Fosteret). Det maa behandles med Forsigtighed.

Det har ingen særlig udvortes Anvendelse.

No. 50. Amerikansk Olie.

(Kastorolie.)

Latin: Oleum ricini.

Denne Olie udpresses af Frøene af en Plante. Uforsølfet har den en slau Smag, og en hvidagtig Farve. Den bør opløses i Vinaand (Alcohol). Den guleagtige er i almindelighed enten gammel eller forfalsket.

Indvortes

er den meget brugt som et mildt Afføringsmiddel, der ikke irriterer eller angriber Fordøjelsesorganerne i den Grad som mange andre Afføringsmidler.

Nogen særlig udvortes Anvendelse har den ikke anderledes end andre fede Planteoljer.

No. 51. Kamferolie.

Latin: Oleum camphoratum.

Dette er Kamfer opløst i Bomolie, og naar den faar Navn af tyk Kamferolie, er det i Forbindelse

med Salmiakspiritus. Den sidste er bedst og mest i Brug i de gamle Lande. Thy Kamferolje kan man selv tilberede ved at tage $\frac{1}{2}$ Pint Bomolje (Oli-venolje), dertil sætte 2 Spiseskeer Salmiakspiritus, og saa $\frac{1}{8}$ Dounce af Kamferpulver. Det hele om-rystes godt. Den maa være af hvidagtig Farve, tykflydende og af frisk, kamferagtig Ammoniaklugt.

Ud v o r t e s

er den et meget brugt Middel mod rheumatiske Smer-ter, Forstuvninger og Forvridninger, Hævelser, Overbetændelse, Stivhed i Sener og Led, opsvul- mede Kjertler og Knuder og i mange andre lignende Tilfælde.

Indvortes har den ingen Anvendelse.

No. 52. Krotonolje.

Største Dosis 20—24 Draaber.

Latin: Oleum crotonis.

Denne presses ud af det tidligere omtalte Kroton- frø. Den er af mørk Farve, noget tykfladen og har i varmere eller koldere Veirlig forskjellig Lugt.

Ud v o r t e s

anvendes den omtrent som spanske Fluer, da den har en stærk fordelende Egenskab, og paasmøres Mus-lerne for at fordele indvortes Sygdomme, da den har en stærk og sikkert virkende Kraft.

Indvortes

indgives den i Tilfælde af at Tarmbevægelsen i Kolik- eller andre Tilfælde er standset, da den temmelig

snart bringer Indvoldsorganerne til Liv og Virksomhed igjen.

Det er en stærk Gift og maa behandles med Varsomhed.

No. 53. Enebærølje.

Største Dosis $\frac{1}{4}$ Dounce.

Latin: Oleum juniperi.

Denne udpresses af Enebær. Den er uden Farve, det vil sige, vandklar, men antager under Luftens Indslydelse et gulagtigt Udseende, samt fortykkes. I de gamle Lande er det en velkjendt Medicin.

Indvortes

er den god i Urintrang og Vindkoliktilfælde, samt i Battersot og i for rigelig Blodmængde.

Udvortes

anvendes den mod rheumatiske Tilfælde, Senefnuder og Seneslag, Forstrækninger, Lamheder og Stivheder i Led og Sener.

Til indvortes Brug maa den ikke anvendes vedholdende og længe, da den ijaafald afftedkommer Svækkelse.

No. 54. Stinkende Hjortetatafolje.

Latin: Pyroleum animale crudum.

Dette Stof er et kemisk Præparat og en Efterbestanddel af en foregaaende Proces. Denne Olje

er fort af Farve, temmelig tykflydende og af en ualmindelig stng Lugt, der ligner den af brændte Horn.

Udvortes

anvendes den fornemmelig som et godt Middel mod Skab, Lus og Kløe, enten alene eller blandet med andre Midler, der virke i samme Retning.

Indvortes er den ialmindelighed ikke brugt.

No. 55. Raa Linolie.

Største Dosis 1 Pint.

Latin: Oleum lini.

Denne Olje er udpresset af Linets Frø. Den, der anvendes i Medicinen, er ikke kogt, saaledes som Maleren bruger den, men raa eller ukogt. Den maa være lys af Farve, noget tykfladen samt af en mild Lugt.

Indvortes

bruges den som Kæstorolie mod Kolik og Tarmbetændelse.

Udvortes

bruges den som Tilfætningsmiddel til Klysterer og dels lunken mod Forhærdelser som blodgjørende Middel, ligeledes mod brændte Skader og lignende.

No. 56. Bomolie.

Dosis som Kæstorolie.

Latin: Oleum olivarum commune.

Denne er Casten, der er udpresset af Oliventræets Frugter, der vokser i de sydligere Lande. Den

maa være klar og lys af Farve, lidt tykflydende og uden særlig Lugt og Smag.

Indvortes

bruges den som andre fede Planteoljer mod Koli og Forstoppelse. Ellers bruges den til at opløse forskjellige andre Medicinstoffe i som Blandinger.

Særlig udvortes Anvendelse har den ikke anderledes end som andre Olier af samme Virkning.

No. 37. Serpentinolje.

Største Dosis 1 Dounce.

Latin: *Ætheroleum therebinthinæ.*

Denne faaes ved at destillere forskjellige Naaletræsorters Harpiks med Vand. Den maa være vandklar af Farve, og have en stærk gjennemtrængende Lugt.

Indvortes

bruges den som urindrivende Middel, mod Svækkelse i Tarmkanalen, svag Vedehist, svækket Fordøjelse, Tarmslim, Ormsygdomme, Battersot og andre lignende Sygdomme.

Udvortes

er den et godt Saarmiddel, da den virker irriterende paa slappe Saar, samt angrebne Sener og Brusk, mod Hævelser og Forhærdelser, mod Betændelser og Krampe. Mod Urinsygdomme maa man altid begynde med smaa Doser af Terpentin, f. Ex. $\frac{1}{8}$ til $\frac{1}{4}$ Dounce, og om fornødiges øge dem.

No. 58. Opium.

Største Dosis $\frac{1}{4}$ Dounce.

Latin: Opii. Engelsk: Laudanum.

Dette bekjendte Giftstof faaes ved Udpressning og Udfogning af Balmueplantens Frøcapsler og hører hjemme i de sydligere Lande. Det eiendommelige Giftstof, det indeholder, benævnes Morphin. Det forekommer i Handelen som sammenflæbede Klager af lysebrun Farve og blødgjøres alene ved Fingrenes Varme, er mørk i Bruddet og glindsende, naar den gnides, af sammensnerpende Lugt og bitter Smag.

Indvortes

er det et meget godt smertestillende Middel, og anvendes mod Betændelser, smertefulde Diarrhoer, mod Svækkelser og hvor et Organs Følsomhed er forhøiet, mod Stivkrampe, hvis Sygen stammede fra Nerveidelse, Krampekolik og Trængninger paa Endetarmen.

Udvortes

er den sammen med andre i lignende Diemed foreskrevne Midler god som Tinctur i forskjellige Dien sygdomme, saasom Dientbetændelse og andre Dient sygdomme, der ledsages af Værk og Kløe. Ligeledes som Blanding i Saarmidler, naar Saarene ere meget smertefulde og foraarsage Dyrene store Lidelser.

No. 59. Kviksølv.

Latin: Hydrargyrum crudum.

Dette er et mineralisk Grundstof og et Giftstof, der har en hel Del andre Præparater, som ere udsprungne af det. Indvortes bruges det sjelden i oprindelig Form, medens det udvortes spiller en vigtigere Rolle i Salveblandinger.

I indvortes Tilfælde bruges mest det saakaldte

No. 60. Korsødet Kviksølv (Calomel.)

Største Dosis $\frac{1}{4}$ Dounce.

Latin: Chloretum hydrargyrosi mite.

Dette er et kemisk Præparat af Kviksølv og Klor. Det er mørkt af Farve og tungt i Vægt.

Indvortes

er det meget brugt mod Betændelser og andre varmeudviklende Sygdomme, samt mod Diarrhoe og Lever sygdomme og dels i Kolikttilfælde, samt virker løsende paa Njertlerne.

Særlig udvortes Anvendelse har det ikke. Det har dog ogsaa været brugt som Middel mod tør Hud og undertrykt Hududdunstning.

No. 61. Althæarod.

Latin: Radix althæa.

Dette er Roden af en i sydligere Lande vildtvoksende Plante. Den er hvidagtig og suret med brune

Ur, indvending melet og skjør og af sød, slimet Smag. Den er god mod Smerter i Tarmkanalerne og er heldig mod slet Fordøielse, men ellers bruges den helst som Blandingsmiddel for andre Mediciner, som man ønsker ikke skal virke altfor pludselig, da man altid bruger at tilsætte saadanne Midler Slimstoffer i dette Diemed.

No. 62. Angelicarod.

Største Dosis 1—1½ Dounce.

Latin: Radix angelicæ.

Rvannerod eller Angelicarod er temmelig bekjendt, og vokser paa de skandinaviske Fjelde. Den faaes af den prægtige Plante, Rvannen, der er de ensomme Fjeldes Prind. Den er af hvidgul Farve, af stærk aromatisk Lugt og bitter Smag. Dens lægende Virkninger er oplivende og styrkende.

Indvortes

bruges den som et godt virkende Middel mod svækket Fordøielse og Slappelse i Maven og Tarmkanalen, idet den gjerne sættes i Forbindelse med Gentianrod og i Diarrhoetilsælde sammen med sammenhængende Midler, saasom Alun, Jernvitriol eller Egebarf. Denne, saavel som de fleste Rodder til indvortes Brug, bør helst bruges i Pulverform.

Særlig udvortes Anvendelse har den ikke.

No. 63. Baldrianrod.Største Dosis $\frac{1}{2}$ —1 Dounce.

Latin: Radix Valeriana.

Denne Rod faaes af en Plante, der vokser blandt Krat og paa fugtige Steder. Den er mørk udvendig og indvendig hvid, af bitter Smag og en smør-agtig, indtrængende Lugt. Dens Virkninger ere næsten lig Kamferens, idet den virker oplivende og styrkende.

Indvortes

virker den oplivende og styrkende paa Nervesystemet, og er ypperlig til at hæve Kramper og Træksninger og virker i denne Retning ofte bedre end mange andre aromatiske Midler.

Udvortes bruges den sjelden.

No. 64. Kalmusrod.

Største Dosis 1—2 Duncer.

Latin: Radix calami.

Denne Rod faaes af en Plante, som vokser i Skandinavien og flere andre europeiske Lande, og almindelig findes ved Bredder og Aaer. Den er hvid, faaes i kantede Stænger, er af frisk aromatisk Lugt og bitter Smag.

Indvortes

er dens Virkninger lig Angelicarod, eller Gentianarod, idet den forbedrer Fordøjelsen og virker op-

livende paa Slapheder og sygelige Tilstande i Fordøielsesorganerne.

Isen særlig udbortes Anvendelse.

No. 65. Genticianrød.

Største Dosis $\frac{1}{2}$ —2 Dunces.

Latin: Radix gentiana.

Denne Rod faaes af en Plante, der vokser paa de skandinaviske Fjelde og flere Steder. Den er af rødbrun Farve, stærk Lugt og ualmindelig bitter Smag, der kjendes længe efter, at man har smaget paa den.

Indvortes

bruges den omtrent mod de samme Sygdomme som de førnævnte bitre Rødder, nemlig mod Sygdomme i Fordøielsesorganerne og slappede Tilstande i samme, og betragtes med Rette som det bedste bitre Middel, man har, imod ovennævnte Sygdomme. Udbortes anvendes den sjelden.

No. 66. Lakritzrod.

Største Dosis $\frac{1}{2}$ —1 Dunce.

Latin: Radix glycyrrhizæ.

Af denne gives her to Sorter, nemlig spansk og russisk. Den sidste bruges mest, og faaes i Pulverform. Den er af mørk Farve og sødagtig, lidt sammenfnerpende Smag.

Indvortes

anvendes den helst i Slimfebre og Hostesygdomme, da den virker pirrende og slimopløsende. Den kan tilføjes med Vand eller laves i Pilleform.

No. 67. Rhabarberrod.

Største Dosis 1—2 Dunces.

Latin: Radix Rhei media.

Denne Rod faaes af den bekjendte i Haverne dyrkede og i Husholdningerne meget anvendte Plante, Rhabarber. Den er af mørk Farve og syrlig Smag.

Indvortes

er den mavestyrkende idet den forbedrer Fordøjelsen og er god mod Ansamlings af Vinde, samt andre Uorden i Fordøjelsessystemet.

No. 68. Nævefage.

Største Dosis $\frac{1}{3}$ Dunce.

Latin: Semina nucis vomicæ.

Dette Stof faaes saavel i smaa runde Kager som i Pulverform, hvilket sidste er det almindeligste. Det er en stærk Gift af hvidgraa Farve og bruges, foruden i Medicinen, ogsaa meget til Roddyrs Odelæggelse.

Indvortes,

hvor det egentlig har sin Anvendelse, bruges det mod Rhygmarsygdomme, Krampe, Kolik og Svækkelser og forresten alle Sygdomme, der staar i For-

bindelse med Nervesystemet. Mod Mælte- og Rævningsfeber hos Bjør er det et udmærket Middel, ligejaa hvor der er Samhed tilstede, forbundet med synkende Livskraft.

Dets Behandling fordrer Forsigtighed.

No. 69. Sævenbom.

Største Dosis $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Dounce.

Latin: *Ramula sabinæ*.

Dette Stof faaes af en Plante, som vokser i det sydlige Europa. Det faaes helst i Pulverform, er af gulagtig Farve, stærk enebæragtig Lugt og harpiksagtig Smag. Den henhører under de giftige Midler. Den indeholder Harpiks og en flygtig Olie.

I n d v o r t e s

opvækker den en kraftig Virksomhed i Baglivsorganerne, idet den virker paa Urin- og Njønssdelene og bruges i enkelte Tilfælde som Abortmiddel; den forbedrer Fordøjelsen, er urindrivende, løsner Efterbyrden sammen med "Meldrøier," beforder Slimaffondring og dræber Indvoldsorm.

U d v o r t e s

bruges den dels til Rensningsmiddel for Raadsaar, i Infus (Thee), samt til Badskning af gammelt Skab, gamle Rensninger og Forhærdelser.

No. 70. Glandsfod.Største Dosis $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Dounce.

Latin: Fuligo splendens.

Dette er et temmeligt bekjendt Stof og en nærmere Beskrivelse over dets Forekomst og Udseende er overflødig. Kun maa det bemærkes, at det, som bruges i Medicinen, maa være glindsende og tages fra et høit Sted i Skorstenen, ligesaa maa det være efter brændt Træ—ikke Kulstof. Det indeholder et skarpt Stof, forbundet med Kulsyre og Kresot.

I n d v o r t e s

er det et hyppeligt Middel mod Orm enten alene eller helst i Forbindelse med Kresot, Regnsfang, Malurt, Aloe eller flere ormdrivende Midler. Udvortes benyttes det sjældnere.

No. 71. Sennep.Største Dosis $\frac{1}{2}$ —1 Dounce.

Latin: Sinapis albæ.

Dette bekjendte Stof er Sennepsplantens Frø; det er gult af Farve og af bitter Smag.

I n d v o r t e s

bruges det meget sammen med andre Midler af samme Egenskab, som et afførende og fordøielsesstyrkende Middel.

U d v o r t e s

er det kjendt som et godt Træfmiddel i mildere Tilfælde, og bruges dels til at indsmøre trommesyge Dyr's Bug med, i opløst Form.

No. 72. Blyhvidtsalve.

Latin: Ungventum cerrussæ.

Denne Salve er af hvid Farve og uden Lugt. Den tilberedes af pulveriseret Blyhvidt og Svinesfedt i følgende Forhold: 1 Del Blyhvidt til 4 Dele Svinesfedt (s. Ex. 1 Dounce Blyhvidt til 4 Dounces Svinesfedt.)

Denne Farve har en stærk tørrende Egenskab, og anvendes derfor meget i vædskesfulde Saar og paa hudløse Steder, paa Brandsaar og lignende.

No. 73. Blysuikersalve.

Latin: Ungventum saturninum.

Denne Salve er af hvid Farve og ganske lugtfri. Den tilberedes almindelig i følgende Forhold: 1 Del pulveriseret Blysuiker (Sugar of lead) og 10 Dele Svinesfedt (lard). Denne saavel som Blyhvidtsalven tilberedes paa den Maade, at Fedtet først smeltes ved svag Varme, hvorefter Blysuikerpulveret tilføjes. Blandingen maa omrøres, indtil den er kold.

Denne Salves Egenskab er kjølende, og er derfor god til at paasmøre betændte Steder eller overalt, hvor en forhøiet Varmendvifling finder Sted. Den er giftig og maa behandles forsigtigt.

No. 74. Kamfersalve.

Latin: Ungventum camphoratum.

Denne er ogsaa af hvid Farve og maa have en frisk Kamferlugt. Den tilberedes i følgende For-

hold: Knust Kamfer 1 Del og Svinesfedt 8 Dele. Det maa erindres, at Kamfer kun lader sig knuse og støde, naar Alcohol er dryppet over den.

Denne Salve har en god fordelende Egenskab og anvendes overalt, hvor man vil fordele Hævelser og Bylder, hvor der er Stivhed tilstede i Led og Sener, og hvor man vil tilbagetrænge en frembrydende Hævelse i Muskelsystemet.

No. 75. Jod eller Jodinesalve.

Latin: Ungventum jodetum.

Denne Salve er af mørk Farve og uden gennemtrængende Lugt. Den bestaar af Jod eller Jodine og Svinesfedt i følgende Forhold: Jod eller Jodine 1 Del og Svinesfedt 12 Dele. Det hele blandes vel ved at udrides i en Morter eller paa en Glasplade.

Denne Salve har ogsaa en fordelende Kraft, stærkere end Kamfersalvens. Den bruges helst i mere haardnakkede Tilfælde, og udmærker sig ved den Hurtighed, hvormed den virker. Den bruges saaledes mod gamle, ondartede Hævelser og Svulster under Huden, som Føledningsmiddel mod indre Sygdomme, saasom Lungebetændelse og Nyrebetændelse osv.

Den maa behandles med Forsigtighed.

No. 76. Jodkaliumsalve.

Latin: Ungventum jodeti calici.

Denne Salve er lysere af Farve og uden særegen Lugt. Den tilberedes af Jodkalium og Svinesfedt i

følgende Forhold: Jodsalium 1 Del og Svinesfedt 6 Dele. Den har forsaavidt Jodsalvens Egenskab som ogsaa denne virker fordelende, men den virker spagere og maa bruges i mindre stærke Tilfælde. Den tilberedes som de førnævnte Salver, idet den udrides i en Morter.

No. 77. Terpentinoljesalve.

Latin: Ungventum therebenthinatum.

Denne Salve har et hvidtgult Udseende og maa lugte friskt af Terpentin. Den laves af Oxfetalg og Terpentinolje i følgende Forhold: Terpentinolje 1 Del og Oxfetalg 2 Dele. Talgen smeltes først og derpaa tilføjes Terpentin. Massen maa omrøres, indtil den er kold.

Denne Salve har en blødgjørende Egenskab og bruges saaledes mod Hævelser i Led og Ledkappler og ellers overalt hvor en Blødgjørelse eftertrages. Den kan ogsaa med god Nytte bruges for Saar, der ere uvirksomme og sletgroende.

No. 78. Tjæresalve.

Latin: Ungventum piceum.

Denne Salve har et mørkladent Udseende og maa lugte friskt af Tjære og Olje. Den bestaar af Tjære og Grønsæbe eller i Mangel af Sæbe, da dens Forhold af Kastorolje, tilsat med lidt Potaske. Dens Sammensætning er: 1 Del Tjære til 1 Del Grønsæbe, altsaa lige Dele af hvert. Blandingen maa omrøres godt, idet den sagte opvarmes.

Denne Salve er meget god mod gammelt Skab og Kløbe, Ringorm og alskens Ruolrer og Udslæt i Huden.

No. 79. Tobakssalve.

Latin: Ungventum nicotianæ.

Denne Salve er af mørkebrun Farve og har en stærk, gennemtrængende Lugt. Den tillaves af Tobaksblade, Potaske, Tjære og Grønslæbe i følgende Forhold: Smaa hakkede Tobaksblade 2 Dele, Potaske 1 Del som koges sammen $\frac{1}{2}$ Time i 8 Dele Vand, hvorefter Blandingen sies og tilsættes: 1 Del Tjære og 1 Del Grønslæbe, hvorefter det hele indkoges, indtil det har erholdt en Salves Tykkelse.

Denne Salve er stærkt blødgjørende og fordelende, og benyttes ellers, hvor man finder Tjæresalven for svag.

No. 80. Ægyptisk Salve.

Latin: Ungventum ægyptiacum.

Denne Salve er af blaabrun Farve og er en Blanding af Spanskgrønt, Eddike og Honning, hvis Sammensætning er følgende: Pulveriseret Spanskgrønt 1 Del, Eddike 2 Dele; som koges, indtil Spanskgrøntet er opløst, hvilket da sies og tilsættes 3 Dele Honning. Blandingen inddampes til en tynd Salve. Den er giftig og maa behandles forsigtigt.

Da det er en god tørrende og absorberende Salve, er den meget brugt mod gammel Mug og ligeledes

mod urene Saar, der holder sig fugtige i Randene, samt ellers, hvor Blyhvidtsalven viser sig for svag.

No. 81. Spanskfluesalve.

Latin: Ungventum cantharides.

Denne Salve har en mørkgrønlig Farve og bestaar af pulveriserede spanske Fluer og Svinesedt. Dens Styrke er forskjellig altesfterjom der er brugt en større eller mindre Tilfats af spanske Fluer. Forholdet kan variere fra 1—8 Dele og 1 til 12—16 Dele. Det er bedst at bruge den ren uden anden Tilfætning.

Denne Salve er en af de bedste fordelende, opløsende, trækkende og blistrende Salver man har, hvorfor den bruges meget mod gamle Hævelser og Forhærdelser, mod gamle brustagtige Udvækster og som et godt Fraledningsmiddel mod indre Betændelser. Da den er giftig, udfordres Forsigtighed ved dens Brug.

No. 82. Aloetinctur.

Latin: Tinctura aloës.

Denne er af sortbrun Farve og maa lugte friskt, næsten lig Lugten af friskt Portvin. Den bestaar af grovstødt Aloe og Brændevin i følgende Forhold: Grovstødt Aloe 1 Del og Brændevin 5 Dele. Blandingen ophedes sagte i en Skaal og holdes ganske svagt kogende i $\frac{1}{2}$ Time. Naar Massen er kold sies den.

Denne Tinctur er en af de hypperligste Saarmid-
ler, man har, idet den frembringer hurtig Groning
af friske Saar.

No. 83. Arnifatinctur.

Latin: Tinctura arnicæ.

Er af mørkebrun Farve og en frisk aromatisk
Lugt. Den bestaar af Arnica-blomster og Brænde-
vin i følgende Forhold: 1 Del Arnica-blomster og 5
Dele Brændevin. Den tilberedes paa samme Maade
som Aloetinctur.

Denne Tinctur er meget god baade som Rens-
ningsmiddel og Gromiddel i Saar, da den baade
holder dem rene og bevirker, at de hurtigere læges.

No. 84. Dyvelsdræftinctur.

Latin: Tinctura asa foetida.

Denne er af lysbrun Farve og en gjennemtræn-
gende lugagtig Lugt. Den tilberedes af grovstødt
Dyvelsdræf og Spiritus, hvis Styrke maa være 65
Procent. Den tilberedes forresten omtrent paa
samme Maade som Aloetinctur.

Denne er ogsaa et Saarmiddel, og er mest tjenlig
i friske Saar, der viser Uvirkksomhed under Gro-
ningen.

No. 85. Myrrhatinctur.

Latin: Tinctura myrrhæ.

Denne er af lysbrun Farve og en frisk aromatisk
Lugt. Den tilberedes af grovknust Myrrha og
Farmerens Beileder. 4.

Brændevin i følgende Forhold: 1 Del Myrrha til 5 Dele Brændevin. Den tilberedes paa samme Maade som Aloetinctur.

Denne Tinctur er et udmærket Middel mod sletgroende Saar, enten alene eller i Forbindelse med Aloetinctur, f. Ex. 1 Del Aloetinctur og 1 Del Myrrhatinctur, altsaa lige Dele, sammenrystet.

No. 86. Opiumtinctur.

Latin: Tinctura opii.

Denne er af mørkebrun Farve og en egen tørvagtig Lugt. Den bestaar af grovstødt Opium og Brændevin i følgende Forhold: Opium 1 Del og Brændevin 10 Dele. Dens Tilberedelse er lig Aloetincturens.

Denne Tinctur er smertestillende, hvorfor den dryppes i Saar, som smerter meget, ligesom den ogsaa ofte anvendes i denne Form til indvortes Brug under smertefulde Diarrhoer. Den er giftig og maa behandles forsigtigt.

No. 87. Spaniskfluetinctur.

Latin: Tinctura cantharides.

Denne er af lysbrun Farve og frisk Lugt. Den tilberedes af pulveriserede spanske Fluer og Brændevin i følgende Forhold: Spanske Fluer 1 Del og Brændevin 15 Dele. Den tilberedes ellers paa samme Maade som Aloetinctur. Den er giftig og maa behandles med Forsigtighed.

Denne Tinctur har Spanjfflue-Salvens Egenſkaber, idet den er bliſtrende og fordelende; men den virker hurtigere og mere irriterende. I de paagjældende Tilfælde gjælder det da om at benytte det, der hurtigſt ſynes at naa Diemedet.

No. 88. Arſenikedife.

Latin: Acetum acidi arsenicosi.

Det er et Giftſtoſ, ſom i fortyndet Tilſtand bruges meget. Det er en Blanding beſtaaende af pulveriſeret hvid Arſenik og Edike, der prepareres i følgende Forhold: Pulveriſeret hvid Arſenik 1 Del, Vand 120 Dele. Dette koges i et Verkſar indtil Arſeniken er opløſt, medens det bortdampende Vand jævnlig erſtattes. Derefter ſættes til den endnu varme Oploſning 30 Dele Edike, hvorefter det henſættes til Afkjøling. Den klare Vædſke afhældes.

Dette er det bedſte Badſkemiddel, ſom haveſ mod Skab, Udſlet og Ringorm, ſamt Kløe og Luſ, men Kvantumet maa altid fortyndes med lige Dele Vand, førend man bruger det. Det maa nemlig erindres, at det er en ſtærk Gift endog udtyndet ſaaledes, hvorfor man under Badſkningen maa iagttage Forſigtighed. Det er et meget ſikkert virkende Badſkemiddel i ovennævnte Tilfælde.

No. 89. Salpetersyre (Skedevand.)

Størſte Doſis $\frac{1}{3}$ Unce.

Latin: Acidum nitricum.

Dette er et chemiſk Præparat af Salpeter og Svovlsyre. Den er flydende, hvid, ryger i Luften,

har en ætsende Virkning og sur Smag. Den bliver fornemmelig brugt i udvortes Tilfælde som et kraftigt Ætzmiddel for Udvækster, mod dybe og urene Saar og Bid af gale Hunde. Den paaasmøres med en Pensel, og Stedet maa skarpt begrændses. Det er en stærk Gift.

No. 90. Saltsyre.

Største Dosis $\frac{1}{2}$ Unce.

Latin: Acidum hydrochloratum.

Denne bestaar af Salt med Svovlsyrehydrat; den har samme Udseende og Smag som Salpetersyren, men har ikke dennes stærke ætsende Virkning.

Indvortes

er den et hyppeligt Middel, udthundet med Vand, da den opliver Nervesystemet, forstærker Blodkarrenes Energi og opliver Virksomheden i Fordøielse-Redskaberne. Den anvendes altid i forraadnelseagtige og smitsomme Sygdomme, som fra Tid til anden kan hjemløge Husdyrene.

Udvortes

anvendes den som Ætzmiddel paa samme Maade som Salpetersyren, idet den har de almindelige stærke Mineralsyrers ætsende Virkning. Den er giftig.

No. 91. Svovlsyre (Vitriololje.)

(Dosis som Salpetersyre.)

Latin: Acidum sulphuricum venale.

Denne er et Svovlspræparat af lys Farve, stærk sur Lugt og sur Smag, samt ryger i Luften. Den har de to førnævnte Syrers Egenskaber som ætsende Middel, men er stærkere i denne Retning end Saltsyren. I concentreret Tilstand bruges den udvortes paa samme Maade som Salpetersyren. Den er et stærkt Giftstof, og maa behandles forsigtigt.

No. 92. Blyvand.

Latin: Aqua saturnia.

Dette tilberedes af Blysukker (Sugar of Lead) og Vand i følgende Forhold: $\frac{1}{8}$ Duncen Blysukker opløses i 1 Pint Vand. Det bruges blot udvendig, da det er et udmærket kjølende Middel mod Forbrændinger, Betændelser, Stød, Slag og opsvulmede Led. Det har stor Anvendelse i ovennævnte Sygdomstilfælde, og overgaar alle andre kjølende Midler.

No. 93. Blister.

Latin: Linimentum cantharidum euphorbia.

Dette er et af de stærkeste Blister, man har, og er et Stof, som har megen Anvendelse. Det bestaar af pulveriserede spanske Fluer, 4 Dele, grovstødt Euphorbium 3 Dele, overgødes med: Terpentinolje 10 Dele og Linolje 65 Dele. Det hele maa af og til

omrøres i 3 Dage. Det maa behandles med Forsigtighed. Det er et meget godt Blister, der bruges overalt, hvor Blister findes nødvendigt. Kun maa det aldrig anvendes hvor der er Betændelse tilstede.

No. 94. Forkjølelsepulver (Nimløsende.)

Latin: Pulvis anticatarrhalis.

Dette Pulver er godt mod Forkjølelser og bestaar af Salmiak, Alantrod og Bukkehornfrø i følgende Forhold: Alantrod 2 Dele, Salmiak 1 Del og Bukkehornfrø 2 Dele, som blandes. Tænker man sig, at hver Del betegnes som Dunces, saa deles Pulveret i 4 lige Dele og hver Del indgives 1 Gang daglig i Klid eller opløst.

No. 95. Feberpulver.

Latin: Pulvis refrigerans.

Dette Pulver indgives i Febertilfælde, naar en forhøiet Varme er tilstede, da det virker kjølende. Det bestaar af Salpeter, Glaubersalt og Althæarod i følgende Forhold: Salpeter 2 Dele, Glaubersalt 8 Dele og Althæarod 1 Del. Beregnes disse Forholdsdele lig Dunces, saa deles det hele i 4 lige Dele og hver Del er en Dosis, der indgives 2 Gange daglig.

No. 96. Vand- og svæddrivende Pulver.

Latin: Pulvis eqvarum.

Dette Pulver er meget virksomt og bestaar af: Bukkehornfrø 1 Del, Svovlspidsglands (Antimo-

nium crudum) 1 Del, Enebær 3 Dele, Althæarod 3 Dele. Blandes, og om disse Dele tænkes som Dunces, deles det hele i 4 lige Dele og hver Del er en Portion, der indgives 1 Gang daglig.

No. 97. Kamferliniment.

Latin: Linimentum volatile.

Dette saa almindelig kjendte og brugte Liniment bestaar af efternævnte Stofse i følgende Forhold: Kaustisk Amoniak 1 Del og Kamferolje 2 Dele, som blandes og omrystes.

Dette Middel er noksom bekjendt i sine Virkninger, saa al videre Anbefaling er overflødig. Som det sees, kan man billigere og mere usorfaltet tilberede det selv.

No. 98. Flygtigt Liniment.

Latin: Linimentum volatile.

Dette Liniment er mindre kjendt end det førnævnte, men ikkedestomindre er det under visse Omstændigheder fortrinligere, idet det virker flygtigere, og er i det heletaget mildere i sine Virkninger, hvorfor det helst anvendes paa ømfindtligere Legemsdele. Det bestaar af kaustisk Ammoniak 1 Del og Bomolje 3 Dele, som blandes og omrystes.

No. 99. Gummipلاster.

Latin: Emplastrum gummosum.

Plastre bliver saa ofte brugte og er saa uundværlige, at det ikke turde være af Veien at beskrive,

hvorledes de tilberedes til veterinært Brug, for at Enhver, der maatte ønske det, selv kan tilberede dem. Dette Plaster, der er af gul Farve, er sammensat som følger: Gult Bøx 8 Dele, Oxfetalg 6 Dele, Harpiks 2 Dele; dette blandes og sammensmeltes. Medens det afkjøles tilføjes under stadig Omrøring pulveriseret Ammoniak-Gummi (Gummi-resinæ ammoniaci) 3 Dele. Derefter kan det Hele gives den Form man ønsker.

No. 100. Sort Hestplaster.

Latin: Emplastrum adhæsivum nigrum.

Dette Plaster bliver mest brugt til Sammenheftning af større og grovere Saar og Åbninger. Det er temmelig let at tillave, idet det bestaar af lige Dele Bøx og thf Terpentin, der sammensmeltes saaa nøiagtig som muligt.

Til Farmeren!

Brug nu dine Øine ret,
Saa Du ei bedragen bliver.
Hush: er Medicinen slet
Daarligt Udfald tidt det giver.
Søg saa godt som Du formaar
Kun at bruge friske Sager—;
Da om lidt Du Lysning faar
J, at man det slette vrager.
Er Du paa Tingen selv lidt flog
Da Humbug, hvor du svag er dog!

Sægemidlernes Navne.

Norſk.

	Side.		Side.
Aloe.....	3	Glauberſalt.....	22
Alloetinktur.....	48	Gummiplaſter.....	55
Althæarod.....	37	Harpir.....	23
Alun, raa.....	4	Heftplaſter, ſort.....	56
Angelikarod.....	38	Helvedeſſten.....	24
Anisfrø.....	19	Hjortetafolje, ſtinkende.....	33
Arnikablomſter.....	11	Hyldeblomſter.....	12
Arnikainktur.....	49	Jernvitriol.....	25
Arſenik.....	4	Jod eller Jodineſalve.....	45
Arſenikedife.....	51	Jodine.....	25
Baldrianrod.....	39	Jodkalium.....	26
Belladonna.....	8	Jodkaliumſalve.....	45
Blaaſten.....	27	Kali, ſvobljurt.....	26
Bliſter.....	53	Kali, ætſende.....	26
Blyhvidt.....	15	Kalk, brændt.....	26
Blyhvidtſalve.....	44	Kalmusrod.....	39
Blyſukker.....	14	Kamfer.....	16
Blyſukkerſalve.....	44	Kamferliniment.....	55
Blyvand.....	53	Kamferolje.....	31
Bomolje.....	34	Kamferſalve.....	44
Borax.....	15	Kamilleblomſter.....	12
Bukkeblade.....	8	Karve.....	20
Bukkehornfrø.....	20	Kjøſſenſalt.....	27
Bulmeurt.....	9	Kollodium.....	17
Calomel.....	37	Kreoſot.....	28
Caſſarilla=Barf.....	6	Kridt.....	29
Chinabarf.....	5	Krotonfrø.....	21
Digitalis.....	9	Krotonolje.....	32
Dyvelsdræf.....	17	Kruſemhynte.....	10
Dyvelsdræftinktur.....	49	Kvikſolv.....	37
Egebarf.....	6	Kvikſolv, forſodet.....	37
Enebær.....	15	Lakritsrod.....	40
Enebærolje.....	33	Liniment, flygtigt.....	55
Feberpulver.....	54	Linolje, raa.....	34
Forkjøleſeſpulver.....	54	Magneſia.....	29
Gentianrod.....	40	Malurt.....	30
Glandsjod.....	43	Meldrøjer.....	30

	Side.		Side.
Myrrhatinctur.....	49	Salvie.....	10
Olje, amerikansk.....	31	Sennep.....	43
Opium.....	36	Skedeband.....	51
Opiumtinctur.....	50	Spanske Fluer.....	18
Ormesrød.....	21	Spanstfluesalve.....	48
Pilebark.....	7	Spanstfluetinctur.....	50
Pulver, vand- og sveddrivende.....	54	Svovlsyre.....	53
Regnsfang.....	13	Sævenbom.....	42
Rhabarberrod.....	41	Terpentinolje.....	35
Røbefage.....	41	Terpentinoljesalve.....	46
Salmiak.....	23	Tjæresalve.....	46
Salpeter.....	22	Tobak.....	11
Salpetersyre.....	51	Tobakssalve.....	47
Saltsyre.....	52	Træful.....	29
Salve, ægyptisk.....	47	Vitriololje.....	53
		Ægyptisk Salve.....	47

Latin.

	Side.		Side.
Acetas plumbicus.....	14	Creta.....	29
Acetum acidi arsenicosi.....	51	Emplastrum adhæsivum	
Acidum arsenicosum.....	4	nigrum.....	56
Acidum hydrochloratum.....	52	Emplastrum gummosum.....	55
Acidum nitricum.....	51	Flores arnicæ.....	11
Acidum sulphuricum venale.....	53	Flores chamomillæ.....	12
Alumen.....	4	Flores cinæ.....	21
Aloë.....	3	Flores crusemintæ.....	10
Aqua saturnia.....	53	Flores sambuci.....	12
Asa foetida.....	17	Flores tanacetæ.....	13
Borax.....	15	Folia belladonna.....	8
Calx viva.....	26	Folia digitalis.....	9
Camphora.....	16	Folia hyoscyami.....	9
Cantharides.....	18	Folia menyanthis.....	8
Carbo ligni.....	29	Folia nicotianæ.....	11
Chloretum ammonicum.....	23	Folia salviæ.....	10
Chloretum hydrargyrosom mite.....	37	Fructus anisi.....	19
Collodium.....	17	Fructus carvi.....	20
Cortex cascarilla.....	6	Fructus juniperi.....	15
Cortex China.....	5	Fuligo splendens.....	43
Cortex quercus.....	6	Herba absinthii.....	30
Cortex salicis.....	7	Hydrargyrum crudum.....	37
Creosotum.....	28	Hydras kalicus.....	26
		Hydrato-carbonas magnesiæ.....	29

	Side.		Side.
Hydrato-carbonas plum-		Secale cornutum	30
bicus	15	Semina crotonis	21
Jodetum kalicum	26	Semina foeni græci	20
Jodium	25	Semina nucis vomicæ	41
Lapis infernalis	24	Sinapis alba	43
Linimentum canthari-		Sodii chloridum	27
dum euphorbia	53	Sulphas cupricus	27
Linimentum volatile	55	Sulphas ferrosus	25
Nitrum	22	Sulphas kalicus	26
Oleum camphoratum	31	Sulphas natricus	22
Oleum crotonis	32	Tinctura aloës	48
Oleum lini	34	Tinctura arnicæ	49
Oleum juniperi	33	Tinctura asa fœtida	49
Oleum olivarum com-		Tinctura cantharides	50
mune	34	Tinctura myrrhæ	49
Oleum ricini	31	Tinctura opii	50
Opium	36	Ungventum camphora-	
Pulvis anticatarrhalis	54	tum	44
Pulvis eqvarum	54	Ungventum cantharides	48
Pulvis refrigerans	54	Ungventum cerussæ	44
Pyroleum animale cru-		Ungventum jodeti calici	45
dum	33	Ungventum jodetum	45
Radix althæa	37	Ungventum nicotianæ	47
Radix angelicæ	38	Ungventum piceum	46
Radix calami	39	Ungventum saturninum	44
Radix gentianæ	40	Ungventum therebinthi-	
Radix glycyrrhizæ	40	natum	46
Radix rhei media	41	Ungventum ægyptiacum	47
Radix valeriana	39	Ætheroleum therebinthi-	
Ramula sabinæ	42	næ	35
Resina pini flava	23		

Engelf.

	Side.		Side.
Adhesive Plaster	55	Blister	48
Aloe	3	Blistering Plaster	48
Alum	4	Borax	15
Angelica Root	38	Blue Vitriol	27
Anise Seed	19	Buck Bean	8
Arnica Flowers	11	Calomel	37
Arsenic	4	Camphor	16
Asafetida	17	Camphor Liniment	55
Belladonna Leaves	8	Cantharides	18
Black Plaster	56	Caraway	20

	Side.		Side.
Cascarilla Bark.....	6	Oil of Vitriol.....	5
Castor Oil.....	31	Peruvian Bark.....	5
Catarrh Powder.....	54	Quicksilver.....	37
Caustic Potash.....	26	Rhubarb.....	41
Chalk.....	29	Rosin (Resin).....	23
Chamomile Flowers.....	12	Sage.....	10
Charcoal.....	29	Salammoniac.....	23
Collodium.....	17	Salt, Common.....	27
Creosote.....	28	Saltpetre.....	22
Croton Oil.....	32	Salve of Camphor.....	44
Croton Seed.....	21	Salve of Iodide of Potas-	
Curled Mint.....	10	sium.....	45
Egyptian Suppuration		Salve of Iodine.....	45
Salve.....	47	Salve of Sugar of Lead..	44
Elder Flowers.....	12	Salve of Tar.....	46
Ergot.....	30	Salve of Tobacco.....	47
Fenugreek Seed.....	20	Salve of Turpentine.....	46
Fever Powder.....	54	Santonica.....	21
Foxglove.....	9	Savine Tops.....	42
Gentian (Gentian Root)..	40	Solution of Sugar of Lead	53
Glauber Salt.....	22	Soot.....	43
Henbane Leaves.....	9	Spanish Flies.....	18
Hydrochloric Acid.....	52	Spanish Fly Blister.....	48
Iodide of Potassium.....	25	Sugar of Lead.....	14
Iodine.....	25	Sulphate of Iron.....	25
Juniper Berries.....	15	Sulphate of Potash.....	26
Laudanum.....	36	Sulphuric Acid.....	53
Licorice Root.....	40	Sweating Powder.....	54
Lime.....	24	Sweet-Flag.....	39
Linseed Oil.....	36	Sweet Oil.....	34
Magnesia.....	29	Tansy.....	13
Marshmallow.....	37	Tincture of Aloe.....	48
Mercury.....	37	Tincture of Arnica.....	49
Muriatic Acid.....	52	Tincture of Asafetida...	49
Muriate of Ammonia....	23	Tincture of Cantharides..	50
Mustard, White.....	43	Tincture of Myrrh.....	49
Nitrate of Silver.....	24	Tobacco Leaves.....	11
Nitric Acid.....	51	Valerian Root.....	39
Nux Vomica.....	41	Vinegar of Arsenic.....	51
Oak Bark.....	6	White Lead.....	15
Oil of Camphor.....	31	White Lead Salve.....	44
Oil of Deerhorn.....	33	Willow Bark.....	7
Oil of Turpentine.....	35	Wormwood.....	30

— Paa —

Skandinabens Boghandels

Forlag er udkommet:

Nyeste Dyr lægebog om Hesten,

med flere nyttige Tillæg.

Af H. Galtung, norsk-amerikansk Dyr læge.

Med et Billede. Nyt Dplag.

Pris: { Indb. i høieligt Bind.....\$0.50
 { Indb. i smukt Shirtingsbind......75

Aug. Herm. Francke.

De fattiges og Forældreløses Ven og Forsørger. Efter det
Indste. Udgivet af Pastor Storjohann. Ny Udgave.

Med 16 Illustrationer.

Pris: { Indb. i høieligt Bind.....\$0.50
 { Indb. i smukt Shirtingsbind......75

Fra Mørke til Lys.

Vidnesbyrd fra Guds Rige i 25 opbyggelige Fortællinger for
Folket. 304 Sider.

Pris: { Indb.....\$0.75
 { Indb. elegant.....1.00

Kongeriget Norges Grundlov,

med Tilføielse af dens oprindelige Text. Med Billede af
Gidsvoldsbygningen og Portrætter af W. F. A. Christie, C. M.
Falsen, J. C. H. Wedel-Jarlsberg, J. Hal, G. P. Blom, H. J.
Groggaard, D. Hegermann, Theis Lundegaard, S. Løvenskjold,
J. Mein, G. Sverdrup, N. Wergeland. Nyt Dplag.

Pris: Indb.....\$0.25

Onkel Toms Livshistorie.

En Selvbioграфи af Pastor J. Benson (Mrs. Harriet
Beecher Stowe's "Onkel Tom") 1786-1876. Fra Engelsk ved
H. C. Knutsen.

Pris: { Hefstet.....\$0.50
 { Godt indb......75

Male- og Farvebog

for Landmanden. Nyt Dplag, med fuldstændig engelsk Navnefortegnelse. Ny Udgave.

Pris: Hefstet.....\$0.25

Norsk-amerikansk Haandbog.

En fuldstændig Haandbog for Farmere, Kjobmænd, Haandværkere, Arbeidere, o. s. v., indeholdende Regler for praktisk Bogholderi for Farmere, Kjobmænd og Andre; norsk-dansk Sproglære; fuldstændige Formularer for alle Slags Breve og Dokumenter (paa Norsk og Engelsk), samt Uddrag af de for disse gjældende Lovregler; Norges, Danmarks og de Forenede Staters Mønt, Maal og Vægt; Beregningstabel for Løn o. s. v. o. s. v. Med et Tillæg, indeholdende fuldstændigt Bogholderi for Farmere. Nyt Dplag.

Pris: Indb. i smukt Shirtingsbind.....\$1.00

Rosa af Tannenburg.

En Fortælling fra Middelalderen, for Børne og Børn, fortalt af Forfatteren til Genovefa, (C h r i s t o p h v o n S c h m i d.)

Ny Udgave med 31 Illustrationer.

Pris: { Indb. i smukt Bind.....\$0.50
 { Indb. i Shirtingsbind......75

Hvermands Tabelbog,

indeholdende Pristabeller, Rente- og Rentesrente-Tabeller. Forklaring over Mønt, Maal og Vægt samt et stort Antal tabellarike og andre Oplysninger for Farmere, Haandværkere o. s. v. Ny og forøget Udgave af Hvermands Regnebog.

Pris: Indb.....\$0.50

Kortfattet norsk Sproglære,

indeholdende Rettskrivningslære, Formlære og Sætningslære, tilligemed Exempler og Øvelser samt Anvisninger til at anvende.

Pris: { Indb.....\$0.35
 { Indb. i Shirtingsbind......50

Bøgerne faaes portofrit tilsendt ved Modtagelse af den vedføjede Pris.

Adresse:

Skandinavens Boghandel,

183—187 N. Peoria St., = = = Chicago, Ill.

Fuldstændig Katalog sendes frit til Enhver.

LIBRARY OF CONGRESS

0 002 825 507 A