179
184
V.
C.

SYNOPSIS

MUSCORUM FRONDOSORUM

OMNIUM HUCUSQUE COGNITORUM.

AUCTORE

Dr. CAROLO MÜLLER.

PARS PRIMA.

MUSCI VEGETATIONIS ACROCARPICAE.

BEROLINI

SUMPTIBUS ALB. FOERSTNER.

1849.

STUDIOSIS

MUSCORUM FRONDOSO

OMNIUM HUCTIQUE COGNITORUM

ALCANTARA

Muscorum familia phylogeographiae est fundamentum et
bryologiae progressus illam quoque scientiam aedificat.

PAULUS R. R. R. R. R.

ALCANTARA R. R. R. R. R.

BEROLINI

ALCANTARA R. R. R. R. R.

1848

VIRIS CLARISSIMIS

DE STUDIIS BRYOLOGICIS NOSTRIS MERITISSIMIS

G. KUNZE

ET

D. F. L. DE SCHLECHTENDAL

HANC SYNOPSIS MUSCORUM FRONDOSORUM

D. D. D.

GRATUS AUCTOR.

AMERICAN MUSEUM

OF NATURAL HISTORY

G. R. KUNZE

AT

D. F. L. DE SCHRECHTER

HAB. SYLVESTRIS MUSCULUM PROPOSITUM

IN

GAULT'S FACTORY

PRAEFATIO.

Post editionem bryologiae universae Bridelii anni viginti praeteriti sunt. Ex illo tempore omnino mutata est scientia amabilis, nam anatomia et physiologia in systematis principia radices profunde egerunt. Bryologia quoque progressibus hisce gaudet et hoc quidem primum argumentum est, quod bryologiae concordiam cum fructibus temporis vehementer postulabat.

Nunc temporis magis quam prius permulta itinera in terras longinquas facta sunt, unde scientia eximie locupletata est; bryologia quoque progressibus hisce gaudet, nam ex Bridelii temporibus speciebus mille et ultra augebatur et hoc secundum est argumentum optandi, omnes muscos hucusque detectos in synopsis colligendos.

Dubitari non potest, quin hi progressus insignes nominandi sint, quo factum est, ut hodie bryologiae literae amplissimae reperiantur; species novas auctores in libris saepe pretiosissimis, rarissimis vel minus cognitis descripserunt, quos scrutator solitarius vix accipit. Quod est argumentum scribendi operis de muscis universalis tertium.

Opus igitur finis duplicis partes implere oportebat, nempe species omnes ad huc descriptas colligere et ad artem redigere. Praecipue propter phytogeographiam, muscorum frondosorum scientiae tantopere egentem, bryologia prorsus immutanda erat, qua re auctor in diario botanico *Botanische Zeitung* dicto 1849. No. 13—15 accuratius scripsit. Ad hunc finem necesse fuit, species et patriam optima fide examinare, quam ob rem loca multa ab aliis saepissimime false indicata auctor neglexit.

Quantum e materia bryologiae hodierna duci poterat, tantum egisse auctor sibi conscius est, quum in fundamento bene intellecto systema totum constanter condide-

rit. Sin vero sibi consentiens non erat, posteri corrigant et ad finem adducant, sed in dijudicando libro difficultatum, in scribendo principia nova bryologiam universam reformanda continente opere auctori obviarum, memores sint. Principia autem nova haec:

„Axis duplex est, primaria et secundaria; itaque musci vegetationis *acrocarpicae* et *pleurocarpicae* distingui possunt, dum Bridelius muscos *acrocarpicos*, *pleurocarpicos*, *cladocarpicos*, *rhizocarpicos*, *entophyllocarpicos* et *hypophyllocarpicos* nominavit. Musci acrocarpici illi appellandi sunt, in quibus axis primariae vita fructu definitur, etsi nonnunquam innovatione nova lateraliter ponitur (*Cladocarpi*), ut *Leucobryaceae*, *Rhizogonia*, *Orthotrichaceae* et *Mielichhoferiae* ostendunt. Species sunt pleurocarpicae, quarum fructus e gemma laterali semper oritur. Saepe accidit, e. g. in *Hedwigia ciliata*, *Fontinali*, *Cinclidodonte*, *Cryphaea* et aliis muscis, ut axis haecce lateralis maxime elongetur et plantae habitus acrocarpicus videtur (*Cladocarpi*). Exemplum optimum praebet *Hedwigia ciliata*, in cujus cauli gemma lateralis apici proxima oriunda videtur. De *Conomitriis* observationes recentiores optandae sunt.

Musci acrocarpici et pleurocarpici secundum thecae dehiscentiam, a Bridelio et posteris jam rationem habitam, in tres partes: *Schistocarpos*, *Cleistocarpos* et *Stegocarpos* dividuntur, dum Bridelius *Schistocarpos* tantum et *Olocarpos* distinxit.

E foliorum dispositione notae tres gravissimae, caulis habitum prominentem efficientes, duci possunt: folia *disticha*, *polysticha* et *tristicha*; sed series haec ulterior sectiones proprias format, si folia seriei hujusce tertiæ stipuliformia inveniuntur, ut *Hypopterygii* folia, *Selaginellas* in memoriam referentia, ostendunt.

Nota gravissima tribum sistens folii areolatio est, ubique typice constans et in subtribu tantum singula mutata, sed etiam hic typum pristinum saepe prae se ferens, ut areolatio *Orthotrichi Sprucei*, *Zygodontis conoidei* et al. ad *Pottias* ipsissimas rediit. Areolatio duplex est, paren-

chymatica et *prosenchymatica*. Cellulae *parenchymaticae* illae sunt, quarum plana horizontalia supraposita sunt, dum cellularum *prosenchymaticarum* plana in apices plus minus perpendiculares producuntur. Puncta vegetationis retis folii propria tribus discrimina sequentia constituunt, ut *Dicranaceae* a *Leptotrichaceis* cellulis alaribus distinguuntur. Pari modo ductus intercellulares *Sphagnorum* et *Leucobryorum* notae novae excellentes sunt.

Calyptrae facies autem et peristomium tribum non immutant, sed genera constituunt. Calyptra est dimidiata, si totum thecae apicem circumcirca obtegit (*calyptra conica, mitraeformis, campanulata*). Calyptra glabra vel plicata notae quoque generibus distinguendis idoneae observantur; nam in congeneribus proximis constantes sunt. Sed ciliae basis calyptrae vel papillae s. verrucae superficiei nullius momenti sunt; in *Polytricho* tantum calyptra dimidiata indumento villoso campanulata formatur, quam ob rem auctor notam distinguendi habuit. Calyptrae facie procul dubio habitus eximie prominet; nam vidimus in generibus *Encalyptae*, *Calymperis*, *Schlotheimiae*, *Orthotrichi*, *Polytrichi*, *Funariacearum* et aliis, quare hujus auctores semper rationem habere oportet etiam illic, quo minus perspicue prominet, ut in generibus: *Acaulon*, *Schistidium*, *Gümbelia*, *Grimmia* et aliis. *Gümbelia calyptrata* igitur et *Grimmia laevigata*, habitu simillimae, semper separandae sunt. Similitudo illa, species hasce ambas ad genus unicum revocandas esse, non ostendit, sed legem combinationum in genere saepe species analogas aliis generis in memoriam referre.

Peristomium eximie varium et nota admodum separans, si deest, aboriturum tantum putari potest, quum in speciebus gymnostomis plurimis peristomium minute evolutum observetur, ut in *Cinclidodonte*, *Physcomitrio*, *Pottia* et aliis. Quae species gymnostomae ad illas igitur revocandae sunt, quibus habitu externo et fabrica interna proximae. Sin e gr. accidit, ut posterius *Sphagnum* novum peristomatatum invenirent, genus proprium peristomium non constitueret."

Fundamentis hisce novis explicatis facillimum est, auctorem ubique acute persequi. Minoris momenti est, sin auctor, in describendis foliorum angulis scala Wahlenbergiana usum esse, indicat. Quoad scalam hancce ab axi divergunt folia erecta 10° , erecto-patentia 30° , patentia 50° , patenti-divergentia 70° , divergentia 90° (igitur horizontalia). Infra lineam verticalem divergunt folia divergenti-divaricata 20° , divaricata 40° , divaricato-reflexa 60° , reflexa 80° . — Porro signum † post diagnosin speciei, nobis speciem non visam esse, indicat.

Hoc nunc tantum superest, ut clarissimis viris, qui auctorem tam libris quam muscis adjuverunt, gratias maximas agamus. Quibus praesidet omnibus clarissimus de Schlechtendal, laudis nostrae haud indigens. Post eum nominamus clarissimos viros G. Kunze Lipsiae, Hampe Blankenburgensem Hercynicum, Montagne Parisiis, operis nostri adiutorem indefessum, W. P. Schimper Argentorati, W. Meissner Halae Saxonum, Sendtner Monachii, Sullivant Ohioensem Americae sept., Spruce Britannicum, Schwägrichen Lipsiae — primum adjuvantem, nunc avarum — de Notaris Genuae, Miquel Amstelodami, de Łoborzewski Vindobonae, Klotzsch Berolini, de Martius Monachii, Itzigsohn Neodami Neomarchici Borussiae, Rabenhorst Dresdae, Blytt Christianiae, Beneken Naumburgi ad Salam sit., Haro Bergen Emdae, Kegel, peregrinatorem Surinamensem, Wagner, hortulanum Halensem, nunc Columbianam peregrinantem, Pabst, hortul. Halens., nunc insulam St. Catharinae Brasiliae scrutantem, Crüger, pharmacopolam insulae Antillarum Trinidad. Gratiis nostris cl. Bruch maturius mortuus est.

Auctor volumen primum finiens, laborem haud exiguum non frustra fuisse, *Synopsin* ad commoditatem atque gaudium bryologorum scriptam et scientiae muscorum amabili amicos novos et scrutatores indefessos adducere, optans, iudicium severum, sed justum, scientiae causa, expectat.

Scribebam Halae Saxonum

Carolus Müller.

Idibus Septembris anni 1849.

PLANTAR AGARICARUM

SYNOPSIS

MUSCI FRONDOSI

MUSCORUM FRONDOSORUM.

SYNOPSIS

MISCELLANEOUS

1853
1854

PLANTAE AGAMAE.

ORDO :

MUSCI FRONDOSI.

Plantae cellulares. Folia sessilia. Fructus: theca unilocularis (Sporangium) calyptra tecta. Sporangium e partibus tribus essentialibus compositum: Pars I centralis s. columella (plus minusve perfecta); pars II s. sporangidium, in quo semina nascuntur; pars III s. epidermis. — Inflorescentia ex antheridiis archegoniis et paraphysibus formata. Pedunculus basi vagina cinctus.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHILOSOPHY

PHILOSOPHY 101

LECTURE 1

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PHILOSOPHY
LECTURE 1
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PHILOSOPHY
LECTURE 1

CLASSIS I.

SCHISTOCARPI.

Theca longitudinaliter in valvulis dehiscens inoperculata.

Trib. I. **ANDREAEACEAE.**

Pulvinato cespitosae colore intense viridi v. brunneo-fusco. *Folia e cellulis parenchymaticis cum incrassatis parietibus subpapillosis composita (Areolatio densa plerumque rotundata).* Theca in valvulis 4—8 dehiscens brunnea decidua, tela cellulosa interna carens, basi collo pallido apophysiformi instructa, recta vix apiculata, valvulis apice cohaerentibus. Antheridia clavaeformia tenera albida. Paraphyses confervoideae opacae gelatinosae haud nodose articulatae sed ex cellulis internis moniliformibus constructae.

E thecae forma habitum Jungermanniacearum referentes et nulla tribu alia comparabiles.

Patria. E planitiibus Europaeis (rarissime tamen) usque ad nives aeternas utriusque hemisphaerae ascendentes, zonas frigidas autem praeferentes et rupium incolae.

Gen. I. **Andreaea** Ehrh.

Ehrhart in hann. Magaz. 1778. — Brid. bryol. univ. II. p. 725—32. — Hooker et Wilson in Lond. journ. of bot. 1844. p. 537—8., quos huc sequimur.

Nomen ab Ehrharto hujusce generis conditore illi in memoriam *Andreae* inclyti pharmacopoli Hannoverani naturaeque perito scrutatori impositum.

Calyptra thecam totam primum tegens, dehinc horizontaliter rumpens, mitraeformis s. campanulata tenerrime-membranacea flavida fugacissima. Inflorescentia dioica vel monoica. Flos masculus in ramo proprio terminalis. — Perichaetium plerumque exsertum turgidum clausum. Pedunculus mollis plerumque pallidior brevis.

Sect. I. **Andreaea.** Theca in valvulis 4 dehiscens.

A. *Folia enervia.*

a. *Folia ovato-oblonga obtusa margine reflexo.*

1. **A. nitida** Hook. et Wils. (l. c. p. 535.); caulis suberectus laxe cespitosus parce ramosus; folia erecto-patentia ovato-oblonga obtuse-apiculata concava *nidida*; perichaetialia paulo longiora erecta. Auct. l. c. †.

Patria. Insula Aucklandi: J. Hooker.

b. *Folia e basi erecta amplexicaulia patenti-incurva.*

2. **A. rupestris** Hedw. (opp. posth. p. 47. tab. 7.), dioica; folia e basi oblonga lanceolata acutiuscula submucronata valde papillosa integerrima *fulcato-secunda*; perichaetialia oblonga lata obtusiuscula erecta laevia; theca $\frac{2}{3}$ fissa, seta pallida instructa.

A. petrophila Ehrh. Dec. No. 67. prope Upsaliam lecta e specimenibus authenticis huc, neque ad sequentem, pertinet. — Brid. II. p. 726. — *Jungermannia rupestris* Linn. Sp. Pl. p. 1601. — *Lichenastrum alpinum, nigricans, foliis capillaceis reflexis.* Dill. Musc. p. 507. tab. 73. fig. 40. A.

Patria. In montibus altioribus totius Europae et in Brasiliae tractu montis: Serra dos Orgãos: Gardner No. 1. Vere — Auct. 4.

3. **A. alpina** Hedw. (l. c. p. 49.); *dioica*; folia *panduraeformia*, e basi lata oblonga latere excavata denticulata longiusculo-acuminata acuta laevia bigibba substricta, basi lato, apice rotundato-areolata; perichaetialia majora latissima oblonga, apicem versus albo-marginata acutiuscula erecta laevissima; omnia fusca; seta crassa purpurea; theca $\frac{2}{3}$ fissa.

Brid. H. p. 728. — Hook. et Tayl. M. Brit. p. 1. tab. VIII. (folia male delineata). *Jungermannia alpina*, surculis teretibus, foliis oratis patentibus, calycibus imbricatis Linn. Spec. Pl. p. 1601. — *Lichenastrum alpinum atro-rubens*, teres, calycibus squamosis. Dill. Musc. p. 506. tab. 73. fig. 39. C. D. Vera species!

Patria. Ab auctoribus in totius Europae montibus altioribus praecipue alpinis et in America arctica indicitur. Nobis hucusque tamen e Scotiae tantum alpidibus visa. Vere. 4.

Praecedentes duae species, sub nomine unico *A. petrophilae* Ehrh. saepe connexae, notis datis distinctissimae. An Hedwigius ipse auctor hasce species duas recte cognoverit, nescimus. Dubitamus. In Bructero, quo indicit, non vidimus.

4. **A. marginata** Hook. et Wils. (l. c. p. 535.); Caulis laxo cespitosus subramosus; folia erecto-patentia incurva ovata longe-acuminata infra medium contracta, marginibus inferne pallidis, caulina majora laxa, superiora conferta; perichaetialia longiora late lanceolata convoluta; theca exserta. Auct. l. c. †.

Patria. Insula Eremitae ad Cap. Horn Americae antarcticae: J. Hooker.

5. **A. acutifolia** Hook. et Wils. (l. c. p. 535.); caulis fastigiatis ramosus, rami apice ramulosi; folia erecto-patentia incurva rigida lanceolato-subulata acuta v. ovalia longe acuminata concaviuscula basi gibbosa, siccitate erecta; perichaetialia longiora lanceolata convoluta; theca subexserta. Auct. l. c.

Patria. Insula Eremitae, Falklandi, Aucklandi et Campbelli: J. Hooker. E Groenlandia habemus sterilem.

c. *Folia suberecta, subsecunda basi non amplexicaulia.*

6. **A. mutabilis** Hook. et Wils. (l. c. p. 536.); caules cespitosi ramosi *elongati gracillimi*; folia conferta *laxiora* erecto-patentia rarius falcato-secunda lanceolata v. ovali-lanceolata concaviuscula siccitate appressa; theca —? Auct. l. c. †.

α . *microphylla*, foliis ovali-lanceolatis minutissimis.

β . *subsecunda*, foliis laxioribus, inferioribus secundis, superioribus ut in var. α .

γ . *uncinata*, foliis dissitis falcato-secundis.

Patria. Var. α . in insula Aucklandi et Campbelli, β . et γ . in insula Falklandi: J. Hooker.

7. **A. laxifolia** Hook. et Wils. (l. c. p. 536.); caules laxi cespitosi parce ramosi; folia lanceolato-subulata obtusiuscula concava, ramulina falcato-secunda, caulina erecta subsecunda laxi imbricata; perichaetia *elongata* ovali-lanceolata convoluta; theca exserta ovato-oblonga. Auct. l. c. †

β . *minor*, theca subexserta.

Patria. Insula Eremitae: J. Hooker.

B. *Folia nervosa.*

8. **A. subnervis** Hook. et Wils. (Lond. journ. of bot. 1847. p. 289. tab. 10.); caulis elongatus parce ramosus; folia *laxe patentia oblongo-elliptica obtusiusculo-acuta subnervia*, nervo valde obscuro lato vix ad medium producto; perichaetia majora erecta; theca exserta. Auct. l. c. †

Patria. Granada nova Americae meridionalis: Paramo of Ruiz in societate *Polytrichi trichodontis* eorum: Purdie ad nives aeternas in cinere vulcanico legit.

Praecedenti *A. laxifoliae* affinis, sed foliis latioribus ellipticis non subulatis differt. E forma thecae *Acroschismati Wilsoni* proxima.

— **9. A. nivalis** Hook. (in Transact. of Linn. Soc. X. p. 395. tab. 31.); laxe cespitosa; caulis elongatus gracilis ramis brevibus *laxe foliosus apice incurvus*; folia caulina *lanceolata angusta concava mucronata, valde papillosa, erosa, apice papillis scaberrima, falcato-secunda*, nervo continuo angusto; perichaetialia *conformia*; theca exserta $\frac{2}{3}$ fissa.

Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 2. tab. 8. — Engl. Bot. tab. 2507. — Brid. II. p. 732.

Patria. In rupibus verticis Ben Nevis Scotiae ad extremitatem orientalem Hooker et Borrer primi detexerunt. In alpihus Helvetiae (Grimsel et al.) et in Norvegiae prov. Tellemarken: Ångström. Raro fructifera! *Aestate.* 4.

Foliis perichaetialibus conformibus ab omnibus ceteris speciebus jam recedit.

10. A. Rothii Web. et Mohr (bot. Taschb. p. 386. tab. XI. fig. 7. 8.); *monoica*, densiusculo-cespitosa; caulis erectus parce ramosus apice subincurvus; folia laxe imbricata *e basi latiuscula concava ovali subulata acuta falcata secunda subintegra*, nervo basi latiusculo continuo; perichaetialia *latissima convoluta subito acuminata acutiuscula* nervo latissimo continuo; omnia sublaevia; pedunculus pallidus, theca exserta $\frac{2}{3}$ fissa.

β. papillosa, folia apice cellulis magis papillosis eroso-denticulatis, perichaetialibus (junioribus) longius acuminatis apice inflexo, nervo folii apicem totum occupante. *Andr. falcata* Schimp. in Hb. Hampeano.

γ. grimsulana, foliis lanceolatis acutis confertioribus magis falcatis, perichaetialibus elongatis convolutis (Hook. et Wils. l. c. p. 537.). *Andr. grimsulana* Bruch mst.

Brid. II. p. 730. — Schwägr. suppl. II. p. 19. tab. 106. — *A. rupestris* Wahlenb. Fl. Lapp. p. 306. et al. auct. — *Lichenastrum alpinum nigricans foliis capillaribus reflexis*. Dill. Musc. p. 507. tab. 73. fig. 40. B.

Patria. In Europae totius montibus altioribus alpi-
busque. In planities descendit e. gr. Germaniae septen-

trionalis, ubi in ducatu Bremensi Cl. Roth primus legit. — In montibus Carolinae superioris: Sullivan t. — Var. β . in unica rupe ad „Bernina Gletscher im Engadin”: W. P. Schimper. Aug. 1846. Dom. Lesquereux (e litt. *Hampeanis*) in hercynia superiore observavit. — Var. γ . in Helvetiae alpe Grimsel. Vere. 2+.

Flos masculus in ramulo proprio (in ramo proprio lateraliter posito) terminalis.

— 11. **A. crassinervia** Bruch (in litt.); *dioica*, dense cespitosa; caulis elatus simplex v. subfastigiatus ramosus apice incurvus; folia e basi vaginante ovali-lanceolata falcato - secunda obtusiuscula, *nervo crasso lato subexcurrente*; perichaetia lata-ovalia obtusa v. acuminata, omnia integerrima; theca exserta oblonga subapophysata.

β . *Heinemanni*, humillima simplicissima inferne subnuda, superne foliosa, saepe reclinata; foliis perichaetialibus saepe oblique acuminatis, nervo tenuiori occulto instructis, theca elliptica apophysata. *A. Heinemanni* Imp. et C. Müll. in bot. Zeit. 1846. p. 324. tab. 2. — Varietas excellentissima, partibus omnibus tenerrima et, nervo constanter tenuissimo observato, species distinctissima!

Patria. In Helvetiae alpe Grimsel. — In Norvegia (Renoë Finmark): Ångström. — Var. β . in summis rupibus alpis Grimsel, ubi ad nives aeternas legit amicus Heinemann, pharmacopola ac muscorum scrutator indefessus 1844. 8. Sept.

12. **A. subulata** Harv. (Hook. in pl. rar. III. tab. 201.); caulis pusillus subsimplex, apice uncinato-falcatus; folia e basi vaginante longa subulata obtusiuscula latinnervia integra, falcata secunda; perichaetia convoluta late elliptica apiculata, theca exserta.

Schwägr. suppl. IV. tab. 301. a. — Hook. et Wils. monogr. l. c. p. 536. c. variet. sequentibus:

β . *rigida*, foliis minus falcatis crassioribus luridis.

γ . *perichaetialis*, theca foliis perichaetialibus minoribus immersa. *A. perichaetialis* Hook. fil. mst. l. c. p. 538.

Patria. In rupibus ad extremitatem faucium ad montem Tabularem ducentium, dictarum „the Port” ad promont. bon. spei. Mensi Martio fructifera: Harvey. — Var. β . in insula Eremitae et var. γ . ibidem et in insula Falklandi: J. Hooker.

Sectio II. **Acroschisma** Hook. et Wils. Theca in valvulis 4—8 dehiscens.

13. **A. Wilsoni** J. Hook. (l. c. p. 536 et 538.); theca cylindrica e basi ad medium et ultra indehiscens, apicem tantum versus in valvulis 4—8 fissa. Auct. l. c.

Patria. In Insulis Aucklandi et Campbelli: J. Hooker.

CLASSIS II.

CLEISTOCARPI.

Theca inoperculata disrumpendo dehiscens.

Trib. I. BRUCHIACEAE.

Pusillae gregariae vel cespitosae terrestres, acrocarpicae, pleurocarpicae vel cladocarpicae. Caulis humilis simplex vel innovationibus ramosus. *Folia e basi plus minusve ovali lanceolata v. subulata, e cellulis parenchymaticis, basi folii majoribus interdum laxis, apicem versus minoribus quadrato-arcolatis composita et nervo lato applanato instructa, setaceo-stricta, perichaetialia basi latiora vaginantia; omnia firmo-membranacea nitida glabra.* Theca ovalis vel globosa plerumque recto-rostellata. Antheridia clavaeformia parva. Archegonia angusta. Paraphyses tenuissimae filiformes brevi-articulatae.

Ex habitu *Leptotrichaceis* (praesertim *Garckeae* generi) proximae sed operculo deficiente distinctissimae.

Patria. Per totam Europam et in America ac Africa praesertim, solum argillosum praecipue, interdum stercus animale amantes; e planitiibus in regiones nivales ascendentes.

Phascaceae Bryol. Europ.

Gen. I. **Archidium** Brid.

Brid. br. univ. I. p. 747. — *Phascum* nonnull. — *Evaginulati* s. *Cladocarp*i Brid. I. p. 747. — *Diarrhagomitria* Hmp. Linn. 1847. p. 66. — *Archidiaceae* C. Müll. bot. Zeit. 1847. p. 97.

Nomen a graeca voce ἀρχιδιον primordium huic generi totius muscorum gentis primordio (ex auctoris ratione!) impositum.

Calyptra *thecam totam* (globosam) *includens*, *dehinc disrumpens*. Inflorescentia monoica gemmiformis.

Plantae procumbentes cespitosae innovantes Astomis affinissimae sed calyptra basi thecae persistente distinctissimae nunc cladocarpicae nunc pleurocarpicae. — Ob notas hasce excellentes congeneres tribum propriam (*Archidiaceas*) formare l. c. putavimus. Nunc hanc sententiam errorem habemus, quum ex observationibus ulterioribus eluceat, nec calyptram nec fructus situm tribus formare posse.

1. **A. phascoides** Brid. (I. p. 747.); folia caulina lanceolata remota, perichaetialia majora e basi ovali subulata, superne *undulato-denticulata* conferta; theca globosa immersa *in ramulo terminalis*.

Phascum alternifolium Hook. et Tayl. Musc. Brit. tab. 5. — Grev. et W. Arnott new arrang. of the genera of Mosses. — *Phascum globiferum* Bruch in diario bot. Flora 1825. p. 281. tab. I. — *Ph. Bruchii* Spr. syst. veget. IV. p. 142. — *Archid. phascoides* Br. Europ. fasc. I. c. tab.

Patria. Germania australis prope Bipontem: Bruch. Sardinia, Gallia occidentalis in ericetis regionis „Perigord”; Anglia et in America septentrionali ubi in pascuis siccis prope Harper's Ferry Virginiae legit Sullivant. Musc. Allegh. pag. 51. — Per totum annum thecis maturis et immaturis occurrit.

2. **A. capense** Hsch. (Linnaea 1841. p. 135.); caulis *brevissimus erectus*, *interdum innovationibus brevissimis elongatus*; folia *integerrima*, caulina remota lanceolata acuminata, perichaetialia majora e basi latiore ovali concava lanceolata longe-acuminata, minute subquadrato-

areolata, nervo lato laxo percurrente; theca globosa in ramulo terminalis.

Patria. Prom. b. spei inter fruticeta in terra loci Löwenrücken dicti. *Mensi Octob. 1827: Ecklon. 24.*

A praecedente tam surculis et innovationibus multo brevioribus quam foliis integerrimis distinctissimum.

3. A. laterale Bruch (in diario bot. Flora 1846. No. 9. p. 132.); subramosum, ramis conformibus; folia patentia lanceolato-subulata carinata integerrima tenuinervosa laxe-areolata; theca globosa lateralis.

Patria. Africa in faucibus sylvarum primitiv. prope flumen Umslutie terrae Natal: Krauss. Inter muscos Capenses Ecklonianos invenit Cl. Hampe. 24.

Ab *A. phascoide* proximo differt ramificatione conformi, foliis longioribus et fructu laterali.

Gen. II. **Astomum** Hmp.

Hmp. in Linnæa 1832. — *Pleuridium* Brid. II. p. 160. — *Phascum* al.

Calyptra dimidiata. Theca aequalis. Inflorescentia monoica gemmiformis axillaris vel hermaphrodita.

1. A. subulatum Hmp. (l. c.); caulis erectus innovans; folia caulina patula lanceolata, perichaetialia e basi oblonga subulata nervo sub apice evanescente; theca ovalis pallide-fusca; calyptra basi subintegra; antheridia foliis perichaetialibus libera.

Phascum subulatum Linn. Sp. pl. p. 1570. — Brid. I. p. 37. — Bryol. Europ. fasc. 1. *Phascum* p. 15. tab. 7. — *Bryum ericetorum* Neck. Meth. Muscor. p. 231. — *Sphagnum acaulon trichodes* Dill. Musc. p. 251. tab. 32. fig. 10.

Patria. Per totam Europam et in America septentrionali in solo argilloso arenario. *Martio — Apr. 24.*

2. A. alternifolium Hmp. (l. c. et mst.); caulis declinatus innovans, innovationes procumbentes fructiferae v. steriles; folia caulina lanceolata patula, perichaetialia e basi ovali subulata, nervo longe-excurrente: theca ova-

lis; calyptra obliqua uno latere usque fere ad apicem fissa; flos masc. *gemmaceus* parvus axillaris.

Phascum alternifolium Dicks. crypt. fasc. I. p. 2. tab. I. fig. 2. — Bryol. Europ. I. c. p. 15. tab. 7. — *Pleuridium alternifolium* Brid. II. p. 161 et 749.

Patria. Britannia. Gallia occidentalis: Normandia. Alsatia. Tirolis. Hercynia. *Majo. Junio. 24.*

Ab antecedente notis illustratis distinctissimum sed rarius occurrens.

3. **A. nervosum** C. Müll. (bot. Zeit. 1847. p. 98.); caulis erectus innovans; folia caulina infra *julaceo-denticissime-imbricata* lanceolato-subulata breviora; perichætalia *e basi oblongo-lanceolata subulata stricta* longiora cava angusta, nervo *tenui excurrente* instructa; theca immersa *ovalis parva brevis et acuta rostellata fusco-nitens*; calyptra angusta tenuissime membranacea basi subfissa in apicem longissimum producta fugacissima; flos masculus *ad caulis basin gemmaceus exsertus perigonio dense clauso ovato longe-acuminato.*

Phascum nervosum Hook. Musc. exot. Vol. II. tab. 105. — Brid. I. p. 36. — *Ph. capense* Sprengel in schedulis. — *Ph. Robinsoni* Mont. in ann. d. sc. nat. tom. IV. sec. ser. p. 96. foliis brevioribus.

Patria. Prom. bon. spei: Menzies primus legit. Ecklon, Mundt, Pappe serius copiose miserunt. — Chile respublica prope Quillotam: Bertero. *Aug. 24.*

A. Pappeano quam maxime simile, sed cf. adnotationes in speciem hanc sequentem. Innovationes saepe fructiferae.

4. **A. Pappeanum** C. Müll. (mst.); caulis erectus subsimplicissimus; folia caulina *patula*, e basi ovali latissima longe et lineari-subulata integerrima nervo lato excurrente instructa *laxissime imbricata*; theca *globosa brevi-apiculata brevi-pedunculata fusco-nitens*; calyptra dimidiata basi integra membranacea subcompressa; flos masculus *gemmaceus* in foliis inferioribus sessilis parvus *foliis perigonalibus patulis parvis.*

Patria. Prom. b. spei prope Zwellendam inter *A. nervosum* legit Pappé. In terra sylvarum prope eundem locum legit Ecklon. Hb. Kunzeanum 24.

A. nervoso quam maxime simile sed foliis caulinis patulis laxissime non julaceo-imbricatis et flore masculo illustrato facillime distinguitur. Ab *A. subulato*, e foliis patulis affini flore masculo et theca globosa valde refugit.

5. *A. Krauseanum* Imp. (in litt.); folia *subsecunda* e basi ovali-lanceolata subulato-setacea solidinervia integerrima; theca *latere subexserta nutans subglobosa* apiculata; calyptra theca brevior integra v. latere fissa rufo-brunnea.

Phascum exiguum Hook. et Wils. in Hook. ic. pl. rar. tab. 737. B. — *Bruchia exigua* C. Müll. in bot. Zeit. 1847. p. 99.

Patria. Nova Hollandia ad flumen Swan River dictum: J. Drummond. — In ericetis prope Kowimanila Novae Hollandiae australis in vicinia loci Port Adelaide dicti: Dr. Behr.

Ex adnotationibus ulterioribus in Lond. journ. of bot. 1846. p. 450. cl. auctores putavere, hanc speciem forte ad eorum genus *Eccremidii* pertinere, quum cujus theca matura nondum nota sit. E speciminibus, a Dr. Behr e Nova Hollandia relatis et ab amicissimo Hampe benevole mecum communicatis *Astomum* verum calyptra dimidiata longe apiculata. *A. nervoso* valde affine, sed notis illustratis distinctissima. Flores masculi saepe creberrimi ad basin caulis gemmacei exserti ut in *A. nervoso*.

6. *A. globiferum* C. Müll. (bot. Zeit. 1847. p. 98.); caulis *repens filiformis ramosus*; folia *approximata, superiora conferta ovali-lanceolata acuminata*; theca *globosa subsessilis*. †.

Pleuridium globiferum Brid. II. p. 162.

Patria. In insulae Franciae uliginosis in terra nuda, lichenibus crustaceis adhaerens caulibus valde implexis non facile extricandum habitat. 24.

A. alternifolio proximum ut foliis nec alternis nec subulatis sed approximatis ovali-lanceolatis saepius ita confertis, ut caulis inconspicuus sit, ut et perichaetialibus latissimis conniventibus, theca perfecte globosa longioribus distinctum. — Saepe foliis perichaetialibus humiditate corruptis, theca sese totam fere conspiciendam praebet, lutescens, *Sinapeos albae* semini similis, decies minor. *Brid. ibid.*

7. *A. nitidum* Hmp. (Linnaea 1832.); *hermaphroditum*, *elatio*r simplex vel innovando ramosum; folia erecto-patula *lineari-lanceolata*, *subsubulata acuta evanidinervia*, *pellucida vel amoene viridia velutino-nitida*, *laxe areolata* subconcava; theca *elliptica brevi-pedunculata* (innovationum causa) plerumque lateralis, longiusculo et oblique apiculata pallide-fusca, sporis ferrugineis et calyptra firma breviori.

Phascum nitidum Hdw. Stirp. I. tab. 34. et ejusd. Musc. Frond. I. p. 92. tab. 34. — *Brid. I. p. 35 et 755.* — *Bryol. Europ. I. c. p. 12. tab. 6.* — *Phascum axillare* Dicks. crypt. fasc. I. p. 2. tab. I. — *Brid. I. p. 35.* — *Ph. strictum* Dicks. I. c. fasc. IV. p. 1. tab. 10. fig. 1. — *Brid. I. p. 34.* Foliis angustioribus strictis, statura humiliori. — *Ph. stagninum* Wallr. Linn. 1840. p. 680. e speciminibus herbarii Schwägricheniani certe huc pertinet. Folia non sunt enervia, ut auctor dixit. Eandem formam cespitose crescentem prope Allstadium Thuringiae in piscina exsiccata observavimus.

Patria. In locis argillosis humidis cespitose et in arenosis humidis gregarie per totam Europam crescens. *Autumno.* ☉.

Gen. III. **Bruchia** Schwägr.

Schwägr. suppl. II. p. 91. tab. 127. — *Bryol. Europ. Fasc. I. Bruchia c. tab.* — *Saproma* *Brid. I. p. 52.* — *Voitia* Hsch. in Moug. et Nestl. stirp. cr. vogeso-rh. fasc. VIII. No. 706. — *Sporledera* Hmp. Linn. XI. p. 279. — *Phascum* al.

Nomen a Cl. Schwägrichen in honorem bryologi maturius mortui meritissimi Bruch, pharmacopolae Bipontini impositum.

Calyptra campanulata. Inflorescentia dioica vel monoica.

Sectio I. **Sporledera** Hmp. l. c. Subacaules; theca subaequalis s. pyriformis.

Sporlederae genus amicissimus **Hampe** in litteris contumax defendit. Nescimus, quibus notis a *Bruchia* certe distingui possit. Theca quidem *Bruchiae* longe apophysata invenitur, e theca autem *Bruchiae elegantis* pyriformi proximitas dubitari nequit. Calyptra *Sporlederae* plerumque major quam illa *Bruchiae*; in *Bruchia Eckloniana* autem ut in *Bruchiis* veris parvam vidimus.

1. **Br. Beyrichiana** C. Müll. (bot. Zeit. 1847. p. 99.); folia e basi elongato-lata longissime subulata apice obscure denticulata brevi-acuminata solidinervia; theca oblonga; calyptra magna in lacinias latas nonnullas fissa laevis.

Sporledera Beyrichiana Hmp. l. c. — *Phascum Beyrichianum* Schw. suppl. IV. tab. 301.

Patria. America septentrionali prope Baltimore: **Beyrich** primus legit. 2?

2. **Br. Hampeana** C. Müll. mst.; monoica; folia e basi latiuscula attenuato-subulata obscure denticulata brevi-acuminata solidinervia; theca obovalis; calyptra media in lacinias pluries subaequales fissa papillis magnis verrucosa.

Phascum brevipes Schwägr. suppl. IV. tab. 303. b, sed calyptra false epapillosa delineata! — *Sporledera Schwägrichenii* Hmp. in litt.

Patria. E regno Chilensi **Cl. Schwägrichen** nobiscum prius benevole communicavit. 2?

Flos masculus in ramo proprio ad caulis basin posito.

3. **Br. brevipes** Hook. (ic. pl. rar. Vol. III. tab. 231.); monoica; folia e basi lata longissime subulata apice obscure denticulata brevi-acuminata solidinervia; theca globoso-oralis pyriformis apiculata subexserta; calyptra media basi in lacinias plures profunde crenatas fissa laevis.

Phascum elegans Hsch. in Linn. (1841) XV. p. 114. — *Sporledera brevipes* Hmp. in litt.

Patria. Prom. bon. spei in solo argilloso lateris borealis montis diaboli ad summos hortos: Ecklon. Road side prope Newlands Aug. 24?

Flos masculus in ramo proprio basilari. Folia perigonia e basi latissima irregulariter crenata subito subulata nervosa.

Astomo nervoso simillima, sed notis multis diversa.

4. **Br. Eckloniana** C. Müll. mst.; *dioica*; folia e basi latiuscula lanceolato - subulata minutius areolata integerrima nervo excurrente lato acutiuscula; theca elliptica (apice et basi attenuata) longiusculo - et acute - apiculata recta vix emersa; calyptra parva $\frac{1}{3}$ thecae apiculatae tegens basi in lacinias fissa glabra lurida.

Phascum nerrosus Sprengel in hb. proprio, Hampeano et Meissneriano. — *Sporledera Eckloniana* Hmp. in litt.

Patria. Prom. bon. spei: Ecklon. 24.

Flos masculus in planta propria terminalis gemmaceus. In eadem planta interdum flores plures: flores laterales autem in ramulis propriis semper terminales.

Br. eleganti ex habitu proxima, sed inflorescentia dioica thecae et calyptrae forma ac foliis integerrimis distinctissima.

5. **Br. palustris** C. Müll. mst.; *monoica*; caulis erectus innovans; innovationes fructiferae; folia caulina lanceolata patula, perichaetia e basi lato - ovali subulata, nervo in cuspidem longam excurrente; theca magna ovali - pyriformis; calyptra mitraeformis parva basi pluries profunde fissa.

Phascum palustre Br. Europ. l. c. p. 15. tab. 7., sed calyptra false dimidiata delineata. — *Sporledera palustris* Hmp. in litt.

Patria. In locis uliginosis et turfosis ad fossarum margines Thuringiae; in Vogesis prope Bipontem, ubi Bruch detexit et Caesaream Lutram nec non prope Baerenthal Alsaciae et prope Zell am See dition. Salisburgensis. Majo. Junio. 24.

Flores masculi gemmascentia in longitudinem totius caulis positi.

Astomo subulato et alternifolio simillima, notis autem illustratis certe distincta.

Sectio II. **Eubruchia.** Caulescentes; theca *exserta longe-apophysata* pyriformis longe-apiculata; calyptra $\frac{2}{3}$ thecae tegens.

6. **Br. Vogesiaca** Schw. (suppl. II. p. 91. tab. 126.); *dioica*; caulis *e basi decumbente* erectus subsimplex; folia *e basi ovali* subulata, summo apice denticulata; perichaetialia *e basi latissima longissime subulata*, omnia *nervo ante apicem evanescente*, patula *sublaxe areolata*; theca ovali-pyriformis.

Saproma Vogesiacum Brid. I. p. 53. *Voitia Vogesiaca* Hsch. I. supra cit.

Patria. In praeruptis frigidis nivosis montis Hohen-eck et Kastelberg tract. Vogesorum ad terram in stercore vaccino: Mougéot hanc primam *Bruchiam* detexit 1822 d. 24. Septbr. 24. E rarissimis!

Flos masculus in planta propria terminalis magno-gemmaceus foliis perigonalibus latissime vaginantibus.

7. **Br. flexuosa** C. Müll. (bot. Zeit. 1847. p. 99.); *dioica*; caulis *flexuoso-erectus* simplex; folia *e basi oblonga lata* longe subulata *acuta*; summo apice denticulata, perichaetialia latiora; omnia *nervo excurrente*, patula *densiusculo-areolata*; theca ovali-pyriformis.

E spec. Drumm. musc. sub. nom. *Bruchiae Vogesiacae* var. edit.

β . *minor*; in partibus omnibus minor, foliis brevioribus strictioribus angustioribus acutioribus apice hyalino.

Phascum flexuosum Schw. suppl. II. tab. 101. — Brid. I. p. 38. — *Bruchia Vogesiaca* var. Drumm. ex hb. Hampeano. — *Sporledera flexuosa* Hmp. in litt. et *Sporledera Drummondii* ej. ib.

Patria. America septentrionalis in terra nuda Pennsylvaniae, ubi primus legit Mühlenberg. — Louisiana: Drummond. — β . Florida: Schimp. sub nom. *Bruchiae brevipedis* Hook. in hb. Hampeano. 24.

Br. Vogesiaca quidem proxima, sed foliis apice multo latioribus multo laxius areolatis evanidinerviis a *Br. flexuosa* differt.

Haec species in omnibus partibus, theca praesertim ac calyptra, cum *Bruchia Vogesiaca* adeo convenit, ut ab eadem proxima nunquam removeri possit.

Trib. II. PHASCACEAE.

Pusillae interdum elatae, gregariae vel cespitosae acrocarpicae. Caulis simplex vel ramosus. Folia *oblonga, ovalia, lanceolata s. spathulata* cava, nervo tereti crasso instructa. Areolatio *parenchymatica basi laxior, apicem versus sensim densior*. Cellulae *plerumque papillosae*. Theca plerumque oblique-apiculata. Antheridia, Archegonia et paraphyses ut in tribu praecedente.

Ex habitu *Pottiaceis* proximae, sed operculo deficiente distinctissimae.

Patria. In solo argilloso arenario per totam orbem terrarum e planitiibus in regiones alpinas ascendentes.

Phascaceae auct. ex parte.

Gen. I. **Acaulon** C. Müll.

(in bot. Zeit. 1847. p. 99.); *Phascum* al.

Nomen ob humilitatem congenerum magnam impositum.

Plantae humillimae gregariae. Theca perichaetio clauso immersa. Calyptra *mitraeformis* tenera. Inflorescentia monoica (flos masculus in ramo proprio ad basin caulis), vel dioica (flos masculus gemmiformis in planta propria terminalis).

1. **A. Flörkeanum** C. Müll. (l. c.) *dioicum*; folia conferta apice patula ovalia brunnea, nervo excedente crassiusculo brunneo cuspidata, margine revoluta subcre-

nulata; theca sphaerico - ovalis brevi - apiculata recta, fusco - brunnea.

Phascum Flörkeanum Web. et Mohr bot. Taschb. p. 70 et p. 451. — Brid. I. p. 26. — Br. Europ. fasc. I. Phascum. p. 8. tab. 3. — *Ph. minutum* Röhl. Ann. d. Wett. Ges. I. p. 185.

β . foliis longioribus angustioribus e cellulis majoribus pallidioribus compositis: *Ph. badium* Bryol. germ. I. p. 53. tab. 5.

Patria. In terra argillosa prope Jenam Flörke primus legit. In iisdem locis prope Naumburgum ad Salam sit.: Beneken. Prope Argentoratum, Bipontem et in Normandia prope Falaise. Var. β . in iisdem locis per annos humidiores. *Sero autumno et primo vere.* ☉.

Nervus in foliis interioribus perichaetialibus laxius reticulatis saepe obsoletus. Plantula mascula minuta gemmiformis. Paraphyses nullae.

Colore brunneo jam ex habitu a sequentibus primo momento distinguitur.

2. A. muticum C. Müll. (l. c.); *dioicum*; folia *confertissima late ovalia concava conniventia*, inferiora minora subintegra excurrentinervia, superiora (perichaetialia) *latissima apice dentata v. multoties repanda undulata v. crenata lurida*; theca globosa brevissime apiculata rufo - fusca; calyptra campanulata basi in lacinias tres latas fissa.

Phascum muticum Schreb. de Phasco pag. 8. tab. 1. — Brid. I. p. 22. — Br. Europ. l. c. p. 8. tab. 2. — *Ph. globosum* Schleich. ex adn. Br. Europ. — *Sphagnum acaule bulbiforme minus* Dill. Musc. p. 252. tab. 32. fig. 12. A. B. C.

Patria. In solo argilloso totius Europae. E promontorio bonae spei societate *Astomi Pappeani* habemus. *Autumno et vere.* ☉.

Flos masculus eparaphysatus.

3. A. triquetrum C. Müll. (l. c. p. 100.); *monoi-cum*; folia *exacte trifarie disposita conniventia lato - ovalia carinato - concava*, margine reflexa, nervo excurrente cuspidata, *plerumque fere e basi usque ad apicem denti-*

culata, apice recurvo, pellucida; theca magna sphaerica vix apiculata; calyptra parva tubulose-campanulata a medio ad basin subdimidiata integra tenerrima.

Phascum triquetrum Spruce in Lond. journ. of bot. Vol. IV. (1845) p. 189. — *Ph. muticum* Drumm. musc. Americ. No. 8. — *Ph. muticum* Bruch in musc. Sardois Müllerianis un. itin. — *Ph. muticum* Moug. et Nestl. stirp. Vogeso-Rhen. 1820. No. 802. — *Ph. carinatum* Wils.?

Patria. Germania: Naumburgum ad Salam sit.: Beneken. In Vogesis: Moug. et Nestler. Sardoia: Fr. Müller. Britannia in locis nudis inter gramina humilia ad summitates rupium inter Brighton et Newhaven: Apr. 1844. Borrer legit. America septentrionalis: Drummond. ☉.

A. mutico simillimum, sed notis illustratis distinctissimum.

Planta mascula eparaphysata.

4. **A. carniolicum** C. Müll. (l. c. p. 100.); *monoi-cum, subcaulescens; folia oblongo-lanceolata subreflexa patula integra, nervo excurrente crasso brunneo acuta, amoene viridia, basi laxiusculo, apicem versus dense minute areolata, concava; theca subglobosa brevissime apiculata et pedunculata.*

Phascum carniolicum Web. et Mohr bot. Taschb. p. 69. et 450. — Brid. I. p. 26. — Bryol. Europ. l. c. p. 12. tab. 5.

Patria. In terra limosa nuda Carnioliae prope Nussdorf: Dr. Wagner primus legit. In tractu Rhenano circa Neowidam: Breutel. In alpib. Salzburg. prope Zell am See: Sauter. Sardinia: Fr. Müller. Vere. ☉.

Flos masculus paraphysibus instructus.

Gen. II. **Phascum** Hmp.

Linnaea 1832. — C. Müll. bot. Zeit. 1847. p. 100. — *Phascum* auct. ex parte.

Nomen Linnacenum at graecae originis, *Usneam barbata*m Theophrasti designans. Hedwigius retinuit et sancivit pro muscis inoperculatis omnibus. Hampe pro parte eorum imposuit.

Plantae elatiores cespitosae. Perichaetium apertum. Theca longius pedunculata et plerumque oblique apiculata. Calyptra *dimidiata*. Inflorescentia monoica (flos masculus in ramo proprio laterali terminalis gemmiformis vel in ramo fructifero axillaris nudus) v. dioica.

a. Folia lanceolata.

1. Ph. crispum Hdw. (Musc. frond. I. p. 25. tab. 9.); *monoicum*; caulescens, *apice fastigiato-ramosus*, ramis aequalibus; folia caulina lanceolata, perichaetialia lanceolato-subulata *carinato concava siccitate crispa acutissima*, madefacta subflexa integra, basi e cellulis angustis quadratis pellucidis longioribus apicem versus multo minoribus densius areolatis papillosis viridibus composita; theca subsphaerica *immersa*; calyptra tenera basi integra pellucida.

Brid. I. p. 46. — Bryol. Europ. I. c. p. 13. tab. 6. — *Phascum multicapsulare* Sm. Fl. Brit. III. p. 1152. Brid. I. p. 48. — *Astomum crispum* Hmp. I. c. C. Müll. bot. Zeit. 1847. p. 98.

Patria. In locis campestribus argillosis siccioribus per totam Europam temperatiorem et in America septentrionali. *Martio. Aprili.* 2|.

Flos masculus axillaris triphyllus in ramo fructifero. Rami saepe thecis pluribus praediti.

2. Ph. polycarpum Br. et Sch. (Bryol. Europ. Phascum p. 14. tab. 6.); caulescens; caulis ramosus; folia *majora ligulato-lanceolata siccitate non tortilia*; theca magna subsphaerica *lateraliter emergens*. †.

Astomum polycarpum Hmp. C. Müll. in bot. Zeit. 1847. p. 98.

Patria. In terra lutoso-arenaria prope Wertheimium ad Moenum sit.: Wibel. *Vere.* 2|?

A praecedente foliis majoribus non crispis et theca longius pedunculata differt. Inflorescentia?

3. Ph. rostellatum Brid. (Mant. musc. p. 11. et br. univ. I. p. 46.); *monoicum*; caulescens subsimplex, folia

superiora *anguste lanceolata longissima*, perichaetialia interiora basi vaginante latiora interdum repanda, omnia *nervo excedente acuta*, carinato-concava, *siccitate crispa*, papillis valde asperula, integra; theca *longipedunculata ovalis longe et oblique apiculata*; calyptra longe apiculata angusta basi integra lurida.

Bryol. Europ. l. c. p. 13. tab. 6.

Patria. In terra argillosa humida in Britannia primum detectum. Prope Herbipolin et Bipontem Germaniae. *Sero autumno.* ☉.

Flos masculus in ramo laterali terminali gemmiformis paraphysibus nonnullis instructus. Foliorum structura ut in *Ph. crispo*.

Folia *Ph. crispi* et *rostellati* (*Ph. polycarpum* ex adnot. Br. Europ. proximum nobis hucusque haud visum) *Weisiae* generis congeneribus ex habitu, forma et structura adeo similia, ut putemus, praecedentes species ad tribum propriam revocandas esse. Folia nervo carinato carinato-concava linearia acuta excellentia! Nos vero nondum separare ausi sumus.

b. *Folia ovalia.*

a. *Theca immersa.*

4. **Ph. cuspidatum** Schreb. (de Phasco p. 8. tab. 1.); *monoicum*; caulis subsimplex; folia ovali-lanceolata *nervo excedente cuspidata v. pilifera* concava integerrima margine plerumque reflexa, e cellulis majoribus a basi usque ad apicem pellucido-reticulata; theca sphaerico-ovalis brevi-pedunculata v. in pedunculo elongato arcuato latere emersa.

Brid. l. p. 41. — Bryol. Europ. l. c. p. 10. tab. 4. — *Ph. acaulon*, acaule, anthera sessili, foliis ovatis acutis conniventibus Linn. Sp. Pl. p. 1570. — *Sphagnum acaulon bulbiforme majus* Dill. Musc. p. 252. tab. 32. fig. 11.

β. *Elatius subdichotomum*, foliis inferioribus remotis: *Ph. Schreberianum* Dicks. Fasc. Cr. IV. tab. 10. — Brid. l. p. 42. — Bryol. Europ. l. c. tab. 4. fig. γ 1. et γ 2. — *Ph. macrophyllum* Wib. Fl. Werth. p. 282.

γ. Foliis lineari-lanceolatis erecto-patulis subrecurvis, inferioribus latioribus nervo excurrente aristatis, theca immersa conspicua: *Ph. affine* Fr. Nees ab Es. bryol. germ. I. p. 74. tab. 7. fig. 19. — Brid. I. p. 43. — Bryol. Europ. l. c.

δ. Caulescens, foliis oblongis piliferis: *Ph. piliferum* Schreb. de Phasco p. 8. tab. I. fig. 7. — Brid. I. p. 38. — Br. Europ. l. c. fig. δ.

ε. Pedunculo incurvo: *Ph. curvisetum* Dicks. Fasc. IV. p. 3. tab. IV. fig. 4. — Brid. I. p. 42. — Br. Europ. l. c. fig. ε. —

ζ. Alte erectum, divisum, ramis basi attenuatis, foliis oblongis, perichaetialibus conniventibus maximis, theca subnutante conspicua: *Ph. elatum* Brid. I. p. 45. — Bryol. germ. I. tab. VII. fig. 20. — Br. Europ. l. c. tab. IV. fig. ζ. — *Ph. grandiusculum* Brid. Sp. Musc. I. p. 9.

η. Caulibus gregariis simplicissimis brevissimis oligophyllis, foliis imis obsoletis, reliquis ovatis latescentibus concavis hyalinis nervo exarato abrupte in acumen praelongum tenuissimum hyalinum obsolete denticulatum excurrens inscriptis, theca globosa sessili apice mamillata tenui coronata (rubra), seminibus sphaericis asperulis mediocriter magnis: *Ph. trichophyllum* Wallr. Linnaea 1840. p. 679.

Patria. In locis argillosis totius orbis terrarum per regiones temperatiores. *Vere.* ☉.

Flores masculi foliis caulinis axillares, folio unico perigoniali enervo obtecti, paraphysibus antheridiis longioribus, apice incrassatis.

Species e locis natalibus valde polymorpha.

β. *Theca emersa.*

5. **Ph. subexsertum** Hook. (in Musc. Americ. Drummond. No. 9.); *dioicum*, pusillum, folia e basi oblonga lato-ovalia nervo crasso excedente longe cuspidata, carinato-concava pellucida patula, cellulis crenulatis denticulata; theca globosa longiusculo et oblique apiculata brevi-exserta; calyptra angusta.

Schwägr. Suppl. IV. tab. 302.

Patria. America septentrionalis prope Carlon House Saskatchewan: Drummond. ☉.

Forsan *Ph. cuspidati* (proximae speciei) varietas memorabilis? Cl. Wilson in Lond. journ. of bot. 1841. p. 443. quaesivit. Non credimus; nam foliis valde pellucidis crenulatis inflorescentia et thecae forma sat differt.

6. *Ph. curvicollum* Hdw. (Musc. frond. I. p. 32. tab. XI.); *monoicum*, brevicaule; folia e basi oblonga lanceolata nervo excedente crasso cuspidata acuta concava integerrima brunnea; theca ovalis breve et oblique apiculata, pedunculo arcuato nutans fusco-brunnea; calyptra tenera basi semel fissa flavescens tandem candida.

Brid. I. p. 24 et 754. — Bryol. Europ. l. c. p. 11. tab. 4. — *Pyxidium pendulum* Ehrh. Beitr. IV. p. 44. — *Phascum cernuum* Gmel. syst. Nat. II. p. 1323.

Patria. In locis argillosis subsiccis per totam Europam et in alpes ascendens. *Autumno et primo vere.* ☉.

Flos masculus axillaris in ramo fructifero nudus, paraphysibus nullis v. paucis instructus.

7. *Ph. rectum* Sm. (Flor. Brit. III. p. 1153.); *monoicum*, brevicaule; folia conferta erecto-patula oblongo-lanceolata nervo excurrente brevi-acuta lurida valde papillosa, margine reflexa; theca sphaerico-ovalis brevi-et oblique apiculata fusco-brunnea, calyptra basi subinflexa apice asperula et seta recta instructa.

Brid. I. p. 25 et 754. — Br. Europ. l. c. p. 11. tab. 5.

Patria. In locis calcareo-argillosis in societate *Pottiae minutulae* et *Desmatodontis Starckeani* in Alsatia prope Mutzig, ubi in campis montis Dreispitz rarius occurrit; copiose in Gallia occidentali, in Gallia septentrionali, Anglia et Irlandia, in Sardinia et Tyroli. *Autumno et primo vere.* ☉.

Flos masculus in ramo fructifero axillaris nudus.

8. *Ph. splachnoides* Hsch. (Hor. phys. Berol. p. 57. tab. 12.); *dioicum*, cespitosum humile subsimplex; folia ovalia lata nervo crasso excedente brevissime cuspidata

subobtusa conferta valde concava integerrima glauca, e cellulis magnis superioribus subquadratis, inferioribus ex hexagono parallelogrammis composita; theca ovalis aequalis erecta fusca breve apiculata obtusa; calyptra latere fissa straminea apice fuscescens.

Schwägr. suppl. III. tab. 203. — *Physedium splachnoides* Brid. I. p. 51. C. Müll. in bot. Zeit. 1847. p. 102. *Bridelium errantem* sequens, nam folia e speciminibus Ecklonianis haud splachnoidea —, sed pottiaceo-areolata pellucida.

Patria. Prom. b. spei prope „De Kankerbay”: *Bergius* primus legit. *Ecklon* in locis non indicatis. *Julio.* ☉.

A *Ph. recto* caule subramoso, foliis ovalibus latis dense imbricatis, theca oblongo-cylindrica subapophysata, a *Ph. bryoide*, cujus praesertim formis minoribus foliis ovalibus latis glaucis magno-areolatis et theca differt.

9. *Ph. bryoides* Dicks. (Fasc. crypt. IV. p. 2. tab. 10.); *monoicum*, caulescens saepe elatus subsimplex; folia sensim majora superiora *ovali-oblonga lata nervo crasso excedente cuspidata*, in omnibus partibus amoene viridia integra, e cellulis basi majoribus laxioribus pellucidis, apicem versus regulariter parenchymaticis *magnis* composita concava margine reflexa; theca *longi-pedunculata elliptica crassa longe et oblique apiculata nigrescens*; calyptra dimidiata robusta.

Brid. I. p. 754. — Br. Europ. I. c. p. 11. tab. 5. — *Phascum elongatum* Schultz in Fl. Stargard. p. 273. — Brid. I. p. 49. — *Ph. gymnostomoides* Brid. I. p. 48. — *Ph. pusillum* Schleich.

Patria. In locis argillosis, calcareis et arenariis incultis siccis vel humidioribus per totam Europam. *Vere et ultra.* ☉.

Species ut *Ph. cuspidatum* e locis natalibus diversis polymorpha, nunc humilis, nunc elata, foliis cuspidatis v. piliferis, dense imbricatis v. patulis, theca autem (interdum subimmersa) nigrescenti-nitida magna valde obliquo-apiculata et foliis magnis erectis confertioribus facile distincta, ex habitu *Desmatodontis lanceolati*. Flos masculus gemmiformis axillaris.

10. **Ph. tetragonum** Harv. (in Hook. bot. Misc. I. p. 124. tab. 31.); *dioicum*, caulescens ramosum, *rami apice stelligero-foliosi*; folia *ovali-lanceolata* nervo excedente crasso brunneo acuta *crassissima* basi laxius areolata membranacea, apicem versus *e cellulis minimis valde papillosis densissime reticulata carnosae intense viridia* (adeo ut vix areolas videas) integra breviter siccitate subinflexa; theca brevi-pedunculata exserta *oblongo-elliptica brevi-et crasso apiculata curviuscula quadrangulata fusco-colorata*; calyptra subulata basi in lacinias plures fissa.

Schwägr. suppl. IV. tab. 303.

β. cylindricum; caule breviori foliis siccitate magis tortilibus obtusis apiculatis thecaque haud angulata: *Ph. cylindricum* Tayl. in Lond. journ. of bot. 1846. p. 42. Ex adnotationibus Cl. Wilsoni (l. c. p. 447.) huc pertinet, quum formae intermediae inveniantur.

Patria. Prom. b. spei: Tiger-Bay ubi primus legit Harvey. Tigersberg: Pappe. Prope Zwellendam: Ecklon. Var. *β.* in Nova Hollandia ad flumen *Swan River* dictum: J. Drummond. 24.

Ob folia densissime areolata carnosae intense viridia basi pellucidiora siccitate subconvoluta Cl. Hampe (in litteris!) genus *Tetrapterum* imposuit, quod *Hyophyllas* referat. Ab hac sententia aversi non sumus, credimus vero, nunc temporis muscos cleistocarpos satis divisos esse. Speramus, fore, ut congenere mox inveniantur.

Species dubiae.

1. **Ph. stellatum** Bridel (br. univ. I. p. 24.); subacaule macrorhizon, foliis ovato-lanceolatis acuminatis undique patentibus subaequalibus, theca ovata subsessili immersa. †.

Patria. In Anglia circa *Salapiam* gregarie habitat. Vere. ☉.

Pusillum tenerrimum. Radices longiusculae, simplices. Caulis vix ullus. Folia omnia fere longitudine aequalia, humiditate undique expansa, stelliformia, ovato-

lanceolata, acuminata, nervo valido. Theca ovata, subsessilis, intra folia latitans.

A. *Ph. cuspidato* non tantum habitu diverso, sed etiam foliis omnibus expansis nec superioribus conniventibus differt, dubitante tamen Sprengelio. N. Entd. II. p. 203.

2. **Ph. dubium** La Pyl. (Journ. Bot. 1813. p. 274. t. 19. et Brid. I. p. 43.); caulescens; basi ramosum; foliis imbricatis erecto-patulis lucidis, pedicelli vagina conica et calyptra ore contracto campanulato-elongata. †.

Patria. Circa Parisios Persoon legit.

Forsan *Ph. cuspidati* varietas!

3. **Ph. Nepalense** Brid. (I. p. 755.); subacaule divisum, foliis congestis paucis lanceolato-subulatis canaliculatis incurvis. †.

Patria. In Nepal Indica regione habitat. Inter muscos inde in Europam a Wallichio missos neglectum auctor vidit. 24.

Plantula fructu carens obscura, e toto habitu *Phasco* adscribenda, *cuspidatum* proxime referens, foliis speciosis pro stirpis exiguitate, latioribus quam in *Ph. subulato* praedita. Areolatio vix satis conspicua.

Trib. III. EPIHEMEREAE.

Pusillae vel elatae, gregariae vel cespitosae acrocarpicae. Caulis subsimplex. Folia plus minusve ovalia s. lanceolata paullum cava pellucida nervosa vel enervia. Areolatio parenchymatica ubique laxa. Cellulae elongatae epapillosae. Theca, antheridia et paraphyses ut in praecedente tribu. Archegonia laxe cellulosa crassiuscula.

Elatiores congeneres ex habitu *Funariacearum*; humiliores *Acaulon* genus referentes.

Patria. In solo argilloso per regiones temperatas totius Europae et Americae septentrionalis et in Australia.

Phascaceae auct.

Gen. I. **Ephémerum.**

Hmp. in Linnaea 1832. C. Müller bot. Zeit. 1847. p. 101.

Nomen ob vitam congenerum tenerorum brevem impositum, ab ἐφήμερος *diurnus* ductum.

Calyptra campanulata. Inflorescentia dioica vel monoica (flos masculus in ramo proprio ad caulis basin sito humillimo).

Sectio I. **Enervia.** Plantae humillimae foliis ovali-lanceolatis plerumque profunde dentatis.

1. **E. serratum** Hmp. (l. c.); *dioicum*; basi filis prothalli instructum; folia *lanceolata profunde dentata acuta* primum viridia, tandem pellucida; theca subsessilis *ovali-globosa* subapiculata recta, *puniceo-fusca*; calyptra tenerima latere fissa.

Phascum serratum Schreb. de Phasco p. 9. tab. 2. — Brid. I. p. 28. 754. — Bryol. Europ. l. c. p. 6. tab. 1. — *Ph. stoloniferum* Dicks. crypt. fasc. 3. tab. 7. fig. 2. Brid. I. p. 50.

Patria. Per totam fere Europam in terra argillosa humida ad margines viarum et fossarum etc. In alpes ascendens. *Sero autumno et primo vere.* ☉.

Planta mascula ad pedem vel in vicinia femineae. Columella thecae obsoleta.

2. **E. tenerum** Hmp. (l. c.); *dioicum*, basi filis prothalli instructum; folia *ovali-lanceolata vix dentata tenerrima* pellucida; theca subsessilis *subsphaerica vix apiculata pallide ochracea*; calyptra thecam arcte adhaerens vix fissa.

Phascum tenerum Br. Eur. l. c. p. 6. tab. 1. — Schwägr. suppl. IV. tab. 302.

Patria. In terra uliginosa stagni exsiccati prope *Niesky Lusatae*: Breutel. ☉.

Columella thecae obsoleta.

Sectio II. **Nervosa.** Plantae humillimae vel elatiores foliis ovalibus latioribus nervosis.

a. *Acaulia.*

3. **E. cristatum** C. Müll. (bot. Zeit. 1847. p. 101.); *monoicum*, exiguum, basi filis protothalli instructum; folia *spathulato-lanceolata* acuminata *inciso-dentata*, *laciniiis* *dentato-ciliatis*, *dorso ciliato-cristata*; theca immersa subsessilis ovali-globosa acutiuscula; calyptra campanulata rufo-fusca. †.

Phascum cristatum Hook. et Wils. in icon. plantar. rar. Hookeri tab. 737. a.

Patria. Nova Hollandia ad flumen *Swan River* dictum: **James Drummond**. ☉.

E. cohaerenti simile, sed ab eo ceterisque congenerebus foliis supra descriptis jam distinctissimum. — Species pulcherrima foliis erectis subsecundis concaviusculis supra medium dilatatis (quorum nervus basi pallidus evanescens), superne validioribus dorsoque ciliato-cristatis laete viridibus laxae areolatis. Planta mascula ad pedem femineae gemmiformis.

4. **E. cohaerens** Hmp. (l.c.); *dioicum*; basi filis protothalli instructum, subacaule; folia *ovali-lanceolata serrata*, nervo *evanescente* (raro excurrente), *acuminata*; theca *globoso-ovalis* recto-apiculata obtusa immersa superne brunneo-purpurea; calyptra tenerrima basi lacerata longi-apiculata.

Phascum cohaerens Hedw. Spec. musc. p. 25. tab. I. fig. 1—6. Brid. I. p. 29. — Bryol. Europ. l. c. p. 6. tab. 1. — *Ph. Flotowianum* Fk. in litt. foliis angustioribus, nervo breviori. Brid. I. p. 754. — *Ph. Lucasianum* Bryol. germ. I. p. 44. tab. V. foliis majoribus latioribus, nervo sub apice evanescente. Brid. I. p. 32. — *Ph. heterophyllum* de Not. Spicil. p. 23. et Syllab. muscor. p. 313!

Patria. In *Pensylvania* **Mühlenberg** primus legit. In terra argillaceo-arenosa ad *Rheni* ripas prope *Confluentes*, *Argentoratum* et *Landsbergam* ad fl. *Wartham* sitam. In agro *Pedemontano* legit *de Notaris*. *Primo vere*. ☉.

E. serrato assimile, sed foliis nervosis magis ovalibus differt. Interdum nervi obsoleti.

5. **E. sessile** C. Müll.; *dioicum*, subacaule basi filis protothalli instructum; folia *lanceolata angusta nervo crasso lato excedente crasso cuspidata, apice flexuoso saepe longo, densius* (quam praecedent.) *areolata denticulata* viridia; theca *parva* subsphaerica recta brevissime apiculata; calyptra majuscula.

Ph. crassinervium Br. Europ. l. c. p. 7. tab. 2. cum forma *Ph. stenophylli* Voit in Sturm Deutschl. Fl. crypt. fasc. 14.; foliis brevioribus, lineari-lanceolatis, vix serrulatis. Br. Europ l. c. fig. β. *Ephem. crassinervium* Himp. C. Müll. in bot. Zeit. 1847. p. 101. — *Ph. sessile* Br. et Sch in adnotationibus in „Zweiter Jahresbericht der Pollichia“ p. 49. et in diario bot. Flora 1845.

Patria. E locis argillosis humidis prope *Bipontem* a Cl. Bruch lectum, et e *Sardinia* a Cl. Fr. Müller communicatum habemus. Europae species tantum hacce esse videtur, nam *Ph. crassinervium* Schw. cum ea hucusque semper commutatum revera longe distare videtur. *Autumno.* ☉.

Plantula mascula in vicinia femineae gemmiformis.

6. **E. crassinervium** C. Müll.; *dioicum?* basi filis protothalli instructum, subacaule; folia *e lanceolata subulata vage dentata crassa rigida, apice subflexa areolis reticuli magnis parcisque, albido-viridia v. lutescentia, nervo ad apicem pertingente crasso latissimo, basin versus minus conspicuo viridi; theca globosa brunnea; calyptra* ut in congeneribus ceteris, *parva.*

Phascum crassinervium Schwägr. Suppl. I. p. 4. tab. 2.

Patria. In terra argillosa *Pensylvaniae*: *Mühlenberg.* *Novbr.* ☉.

E speciminibus authenticis a praecedente simillimo foliis *laxius reticulatis repando-denticulatis* longius subulatis valde flexuosis nervoque crassiore differt.

b. *Caulescentia.*

7. **E. patens** Himp. (l. c.); *monoicum*; folia *spathulata obtuse-acuminata serrata e cellulis crassis magnis laxissime areolata, nervo ante apicem evanescente instructa, pellucida; theca immersa brevi-pedunculata subsphaerica,*

brevissime et obtuso-apiculata recta; calyptra angusta campanulata basi subintegra.

Phascum patens Hedw. Stirp. I. t. 10. Ejusd. Musc. Frond. I. p. 28. tab. 10. — *Ph. Megapolitanum* Schultz Suppl. Fl. Stargard. p. 2. tab. 1.; foliis angustioribus tenerioribus thecisque exsertis.

Patria. In locis argillosis humidis praesertim ad fluminum ripas per totam Europam temperatiorem rarius. *Autumno et primo vere.* ☉.

Planta mascula minutula ad pedem femineae. — Planta pulchella in omnibus partibus laxissime reticulata ex habitu *Funariaceis* simillima et nulla alia hujus generis specie confundenda, sed quoque areolatione laxissima foliorum subheterogenea et cum *Voitiis* maxime congruens.

Gen. II. **Ephemerella** C. Müll.

Phascum al. — *Physedium* Brid. Müll. bot. Zeit. 1847. p. 101.

Calyptra *dimidiata*. Inflorescentia dioica vel hermaphrodita.

1. **E. pachycarpa** C. Müll.; *dioica*; subacaulis *basi filis protothalli instructa*; folia *lanceolata subconcava flexa recurvata apice denticulata nervo excedente brevi-subulata densius areolata* intense viridia; theca ovalis subsessilis; calyptra firma magna.

Phascum pachycarpum Schw. Suppl. I. p. 6. tab. II. Bryol. Eur. I. c. p. 8. tab. II. — *Ph. recurrifolium* Brid. I. p. 31. — *Ephemerum recurrifolium* Hmp. I. c. exclusis speciminibus in ejus Vegetabil. cellular. Germ. sept. etc. No. 42. ad *Ephemerum patens* pertinentibus.

Patria. In campestribus et pratis Thuringiae, Palatinati Rhenani, Alsaciae et Galliae. *Autumno* ☉.

Plantula mascula ad pedem vel in vicinia femineae.

Gen. III. **Voitia** Hornsch.

Hornsch. Comment. de Voitia et Systylio p. 5. tab. 1. — Brid. I. p. 54—56. — Bryol. Europ. Fasc. I.

Nomen in memoriam Doctoris Suevofurtensis *Voit*, viri de muscis meriti, impositum.

Calyptra dimidiato-cucullata, thecam longe et oblique apiculatam multo superans membranacea lurido-alba. Inflorescentia monoica discoidea in ramulo proprio terminalis.

Ex habitu modoque crescendi i. e. in stercore vac-
cino Splachnaceis similis.

Voitiaceae C. Müll. bot. Zeit. 1847. p. 102. Hoc loco tribum hancce optime distinctam putavimus. Congeneribus autem ex novo examinatis, nonnullis notis contentis, ad *Ephemereas* ducendi videntur. Ex his notis quidem Splachnaceis simillimi inveniuntur, areolatio tamen foliorum, nota pro tribu imponenda essentialis, tota est illa Ephemerearum e. gr. *Eph. patentis* parenchymatica, e cellulis amplissimis laxae areolatis formata. Quod autem ad Ephemereas ipsissimas pertinet, fatendum est, huc pluribus congeneribus detectis mutationes novas faciendas esse.

1. **V. nivalis** Hsch. (l. c.); *elata* dense cespitosa robusta; folia *laxe* imbricata erecto-patentia lato-ovalia v. oblonga *longe cuspidata membranacea magis minusve plicato-concava*, nervo apice *crasso excurrente*, integerrima; perichaetialia *longissima* cuspidata *subflexuosa* nervo excurrente; vaginula longa membranacea; pedunculus *elongatus*; theca *oblongo-ovata aequalis* apice curvirostri *crasso*; calyptra basi granuloso-membranacea; semina *parva* laevia.

Patria. In summis alpibus *Carinthiae*: Glockner, Pasterze; nec non in *Lapponia*, ni fallimur, detecta. Cl. Ångström tamen in sua synopsi muscorum (in El. Fries: Summa Vegetab. Scandinaviae 1846) non memoriam fecit. *Versus finem Augusti thecas maturat.* 4

2. **V. hyperborea** Grev. et Arnott. (new arrangement. of the genera of mosses in Act. soc. Wernerian. IV. p. 109. tab. 7.); *humilior* gracilior; folia *dense* imbricata erecto-appressa, lato-ovalia *subrotundata brevius acuminata firma aequabiliter valde concava*, nervo apice *evanido*, integerrima; perichaetialia *longe* cuspidata nervo

excurrente; vaginula longa membranacea; pedunculus humilior; theca ovali-globosa basi subangulata apice curviusculo tenuiori; calyptra basi granuloso-membranacea; semina minima laevia.

Schwägr. Suppl. II. tab. 126.

Patria. Insula *Melville*: *Sabine* navarchus. Ad fretum *Sinjawin* Asiae septentrionalis (Hb. Acad. Scient. Petrop.) sec. *Weinmann* syllab. musc. p. 433. 4

Nonnulli auctores hanc speciem formam prioris minorem putavere. Speciei utriusque diagnoses negant. — Cetera ut in praecedente specie.

CLASSIS III.

S T E G O C A R P I.

Theca operculo dehiscens.

SUBCLASSIS I.

A c r o c a r p i *).

Fructus terminalis, tantum innovatione lateralis. Axis vita fructificatione finita.

I. Distichophylla.

Folia in series duas rectas disposita.

α. Exacte verticalia.

Trib. V. SCHISTOSTEGEAE.

Plantae gregariae acrocarpicae. — *Caulis inferne nudus, superne foliosus dimorphus: nunc frondiformis flicoides foliis verticaliter insertis basi connexis, e cellulis prosenchymaticis rhomboidalibus dense areolatis pellucidis v. viridibus compositis, nunc muscis ceteris similis foliis horizontalibus minutis comalibus, quincuncialiter insertis. Omnia folia enervia*

*) Nonnullae familiae c. congeneribus cladocarpicis inter Acrocarpos enumerantur, quum plurimi earum congeneres plantae acrocarpicae sint. Cf. praefationem.

plana. Theca exannulata minutissima globoso-ovalis operculo minimo convexo. Archegonia crassiuscula eparaphysata; antheridia parva eparaphysata.

Habitus proprius memorabilis ita, ut tribus haecce nulla alia confundi possit, polypodii vulgaris instar ob folia verticalia basi confluentia.

Patria. In cavernis et locis occultis aliis limoso arenariis vel arenariis per fere totam Europam rarius. ☉.

Gen. I. **Schistostéga** Mohr.

Mohr obs. p. 26. Web. et Mohr botan. Taschb. p. 92. tab. VI. — Brid. I. p. 109. — Bryol. Europ. Fasc. XVII. c. tab. — *Mnium* (*osmundaceum*) Dicks. Pl. Cr. p. 3. tab. I. — *Gymnostomum* (*pennatum*) Hedw. Musc. frond. I. p. 77. tab. 29. *Gymn.* (*osmundaceum*) Hoffm. Deutschl. Fl. II. p. 28. — *Dicksonia* (*pusilla*) Ehrh. Crypt. Dec. No. 65. — *Bryum* (*pennatum*) With.

Nomen graecae compositionis a *σχιστός* fissus et *στέγη* operculum, ex errore auctoris, qui, operculum in lacinias lacerari, observasse monuit, impositum. Ii, quorum interest, ut nomina ubique apta sint, cogitent, nomina plurima mutanda esse.

Calyptra *cylindrico-campanulata* subintegra. Inflorescentia dioica. Planta mascula femineae similis. Flos masculus laxo gemmiformis terminalis.

1. **Sch. osmundacea** Web. et Mohr (botan. Taschenb. p. 92.); caulis simplex interdum, raro tamen, ex axillis foliorum innovans; folia quincuncialiter inserta lanceolata; disticha ovali-rhomboidalia acuminata; omnia integerrima.

Patria. Hercynia. Mons piniferus. Lusatia superior. Ducatus Badensis. Tractus Sudetorum. Ager Halensis. Norvegia. Anglia et Scotia. *Junio et Julio.*

Protothallus plantae germinantis (*Catoptridium smaragdinum* Brid. I. Tab. suppl. I.) memorabiliter lucens.

b. Folia subverticalia.

Trib. VI. DREPANOPHYLLEAE.

Laxissime cespitosae acrocarpicae; caulis frondiformis ramosus; folia *verticalia basi paulum amplexicaulia inaequalia falcata, nervo non in medio folii sed latere percurrente instructa, basi e cellulis longioribus angustioribus apicem versus prosenchymatico-rhomboidalibus parvis areolata, laevissima nitida*. Theca ovalis erecta obtuso-operculata. Anthridia —? Archegonia breves crassiusculae intense fuscae paraphysibus paucis filiformibus aureis.

Habitus proprius memorabilis hic *Fissidentibus*, illic *Phyllogoniaceis* similis, sed ab his duabus foliorum forma distinctissima tribus.

Patria. In arboribus regionum tropicalium et hucusque Indiae occidentalis. 4.

Gen. I. **Drepanophyllum** Rich.

Rich. in Hook. Musc. exotic. II. tab. 145. — Schwägr. Suppl. II. p. 85. tab. 125. — Brid. II. p. 668—670. — *Dicranum (falcifolium)* Hook. Musc. exot. I. tab. 82. — *Fissidens (falcifolius)* Schwägr. Suppl. I. 2. p. 9.

Nomen graecae compositionis a verbis *δρεπάνη falx* et *γύλλον* (ob folia falciformia) deductum.

Calyptra ignota. Inflorescentia dioica.

1. **Dr. fulvum** Rich. (l. c.); folia caulina apice denticulata lato-falcata nervo excurrente acuta, perichaetia longiora angustiora; theca operculo conico-obtuso.

Patria. In insulis Bourbonis: Richard; Hispaniola: Thuillers, et ex Surinamo: Weigelt.

Frons fertilis apicem versus crescens, frons sterilis decrescens; caulis in fila articulata stricta longiora brunnea productus.

c. Folia horizontalia

Trib. VII. DISTICHIACEAE.

Dense cespitosae, acrocarpicae v. pleurocarpicae; caulis apicem versus crescens simplex v. ramosus rigidus; folia *nervo dorso carinato equitanti-concava dense imbricata se invicem tegentia; parenchymatico-areolata. Areolatio e cellulis minutis (crassis parietibus) subpapillosis composita densissima subquadrata. Theca ovalis aequalis. Antheridia longa angusta. Archegonia longissime apiculata et paraphyses tenerrimae.*

Habitus fissidentoideus, sed foliis elamellosis ab hac tribu valde recedit.

Patria. E montibus in regiones alpinas utriusque hemisphaerae ascendentes, rupes ac terram amantes. 24

Gen. I. **Distichium** Br. et Sch.

Bryol. Europ. Fasc. XXX. *Trichostomaceae*. — *Cynontodium* Hedw. Sp. Musc. p. 57. — *Swartzia* Hedw. Stirp. crypt. p. 76. — *Cynodontium* Schw. Suppl. I. Tom. I. p. 110. — *Didymodon* auct. — *Cynodon* Brid. I. p. 500.

Nomen ob folia disticha ab auctoribus Br. Europaeae impositum.

Calyptra *dimidiata*. Theca annulata. Peristomium simplex dentibus 16 aequidistantibus basi liberis *semel v. pluries, regulariter vel irregulariter a basi usque ad apicem fissis trabeculatis intense purpureis homogeneis laevibus v. asperis.* — Inflorescentia monoica.

1. **D. capillaceum** Br. Europ. (l. c. p. 4.); late et dense cespitosum; folia e basi oblonga vaginante subito longe subulata patentia laete viridia tandem flavescentia nitentia integerrima; perichaetialia tenuinervia; theca *erecta ovali-cylindrica; operculo conico brevi;*

peristomii dentes breves irregulariter et pluries fissi angusti.

Didymodon capillaceus Web. et Mohr bot. Taschb. p. 155. Brid. I. p. 504. — *Cynodontium capillaceum* Schw. Suppl. I. I. p. 114. — *Cynodontium cap.* Hedw. Sp. Musc. p. 57. — *Trichostomum cap.* Sm. Fl. Brit. III. p. 1236. — *Swartzia cap.* Hedw. Musc. Frond. II. p. 72. tab. 26. — *Didym. distichus* Brid. I. p. 507. — *Did. subulatus* Schk. Deutsch. Moos. p. 63. tab. 28.

Patria. E montibus usque ad alpes ascendens per totam Europam, Asiam, Africam (in Abyssiniae monte Silke: Schimper) et Americam septentrion.

Antheridia in foliorum superiorum axillis nuda.

2. D. inclinatum Br. Europ. (l. c. p. 5. tab. 2.); laxe cespitosum; folia ut in praecedente; theca *inclinata ovalis* operculo conico brevi; peristomii dentes *latiusculi regulariter fissi longi*.

Cynodontium inclinatum Hedw. Sp. Musc. I. p. 155. — *Cynodontium incl.* ej. ibid. p. 58. — *Swartzia inclinata* ej. Musc. Frond. II. p. 74. tab. 27. — *Didymodon inclinatus* Sw. Musc. Suec. p. 28. — *Cynodon inclinatus* Brid. I. p. 501. — *Grimmia inclinata* Sm. Fl. Brit. III. p. 1193. — *Afzelia inclinata* Ehrh. Crypt. 193. — *Bryum inclinatum* Dicks. Fasc. II. p. 9.

Patria. Ad rupes madidas, rarius ad terram humosam regionum alpinarum totius Europae, rarius tamen quam praeced. E Terre Neuve inter *Did. fragile* Hook. a Cl. La Pylaie lectum habemus. *Aestate.*

Antheridia foliis 1 — 3 perigonalibus cincta.

Gen. II. **Eustichia** Brid.

Brid. II. p. 674. — *Diplostichum* Montagne in ann. des sc. nat. 1845. Vol. IV. p. 116. — *Pterigynandrum* Brid. — *Didymodon* Schw. — *Phyllogonium Eustichia* Brid. l. c.

Nomen e verbis graecis εὖ et στίχος ob folia disticha deductum.

Calyptra *dimidiata cucullata*. Theca *basilaris lateralis* aequalis striata exannulata. Peristomium simplex: dentibus 16 aequidistantibus *planis lanceolatis trabeculatis longitrorsum* (grammice) *lineolatis*

apice interdum perforatis aureis. — Inflorescentia dioica.

Genus c. antecedente nunquam conjungi potest, quum forma ac structura dentium peristomii illis generis *Distichii* dissimillimae.

1. **E. longirostris** Brid. (l. c.); dense cespitosa subulata superne ramosissima, rami tenues simpliciusculi rigidi; folia ovalia nervo excedente brevi-acuta denticulata, perichaetialia longiora subserrata, laxius areolata, theca ovalis ore angusta subrecta, pedunculo longo tenero flavo et operculo e basi conica oblique subulato instructa.

Pterigynandrum longirostrum Brid. II. p. 195. — *Didymodon distichus* Schw. Suppl. II. tab. 183. ubi *D. compressus* appellatur. — *Diplostichum longirostre* Mont. l. c.

Patria. Insula Madagascar: Cl. Aubert du Petit Thouars in arboribus putrescentibus primus legit. — Chile ad Antuco: Pöppig 1829 collect. Chil. N. 29. 4.

Flores feminei c. 3. unico cauli basilares, sed unicus fertilis, archegoniis perpaucis (c. 3.) elongatis et paraphysibus perpaucis longis tenerrimis hyalinis instructus. Flores masculi (quos deciduos inter plantas pulvinatas invenimus) forsan basilares antheridio ut videtur unico globoso-ovali membranaceo tenero hyalino et paraphysibus perpaucis brevibus filiformibus flavescentibus.

Species non satis nota.

2. **E. Norvegica** Brid. (l. c. p. 674.); dense cespitosa erecta simplicissima; folia confertissima, inferiora breviora, superiora oblonga rotundato-obtusa subcomplicata, nervo crasso excurrente mucronata, laxius vel pellucidius praecedentibus areolata.

Fissidens imbricatus Desv. in Brid. II. p. 674.

Patria. Norvegia in solo limoso. — Ex Islandia habemus. — In America septentrionali: in collibus rupestribus umbrosis circa Lancaster Ohionis a Sullivant (an vera?) indicitur. 4.

Planta elegantissima tenella habitu *Fissidentis*, obscura, e foliorum distichorum areolatione ac forma huc pertinens, juvenilis smaragdina, senilis nigrescens. Vehementer optandum est, fructum mox inveniri.

Trib. VIII. FISSIDENTEAE.

Gregariae v. cespitosae, humillimae v. elatae, simplicissimae v. ramosissimae, acrocarpicae v. cladocarpicae. Folia amplexicaulia e cellulis parenchymaticis minutis dense areolatis saepe valde papillosis composita, dorso et apice in laminam ultra folii apicem producta, quare in folio tres partes distinguuntur: 1. folii lamina vera horizontalis; 2. lamina dorsalis, e nervi dorso nata verticalis; 3. lamina apicalis, lamina praecedens ultra folii laminam veram horizontalem in utroque nervi latere anceps producta. Antheridia et archegonia parva eparaphysata. Theca aequalis raro annulata.

Habitus proprius lamina folii triplici speciosissimus distinctissimus.

Patria. In terra, arboribus et aquis, saepe amphibie, viventes per orbem terrarum totum in locis humidis vix nivalibus. In promontorio bonae spei Africae plurimae species inveniuntur. ☉ et 24.

E forma calyptrae genera nova imponenda sunt. Nos autem dividere haud ausi sumus; quum congenerum plurimorum calyptra ignota reperiatur. Formae autem calyptrae tres observantur: conica s. campanulata; mitraeformis basi lobata et dimidiata. E prima genus *Conomitrium*, e secunda *Fissidens*, tertia tandem *Schistophyllum* formari possit.

Gen. I. *Fissidens* Hedw.

Hedw. Fund. Musc. II. p. 91. — Brid. Br. Un. II. p. 679 — 708. — Bryol. Eur. Fasc. XVII. — *Dicranum* auct. mult. — *Skitophyllum*

La Pylaie. — *Fuscina* Schrank. — *Luida* Adans. — *Octodicer-
as* Brid. et Br. Europ. — *Conomitrium* Mont.

Nomen ob dentes fissos ab Hedwigio impositum.

Character ac idem tribus. — Inflorescentia mo-
noica v. dioica gemmiformis, in caule primario v. in
ramis brevibus secundariis terminalis.

Sectio I. **Hydrofissidens.** Plantae aquaticae fluitantes
elongatae ramosissimae cladocarpicae. Theca in ramo proprio axil-
lari terminalis minuta brevi-pedunculata.

Octodiceras Brid. II. p. 675. et Bryol. Europ. l. c. — *Conomi-
trium* Mont. in ann. des sc. nat. Tom. VIII. (1837) p. 250. et in Vo-
yage dans l'Amérique mérid. par d'Orbigny Tom. VII. Crypt. p. 99
— 107. — *Fontinalis* Savi.

a. Fructus in ramo longiusculo.

1. **F. Julianus** Schimp. (in Regensb. Fl. olim);
monoicus; folia lanceolata *obtusiuscula* nervo evanido;
theca minutissima obconica dentibus *praemorsis irregu-
laribus*, *bi-*, *vel tri-fidis*; operculum conicum *rectum*
thecam aequans v. subsuperans; calyptra conica integra,
operculo brevior.

Fontinalis Juliana Savi. Poll. Fl. Veron. III. p. 385. — *Skio-
tophyllum fontanum* La Pyl. Journ. Bot. Desv. 1813. n. V. p. 52.
tab. 34. — *Octodiceras Julianum* Brid. II. p. 678. Br. Europ. l. c.
tab. 1. — *Conomitrium Julianum* Mont. l. c. Schwägr. Suppl. IV.
tab. 313. — *Fissidens debilis* Schwägr. Suppl. I. P. II. p. 11. Brid.
II. p. 706. e speciminibus Bridelianis huc pertinet.

Patria. In fontibus et rivulorum parietibus lapideis
per Europam calidiorem et temperatam: In Etruria ubi
ad radicem montis S. Juliani Savi detexit; prope Me-
diolanum ubi fontis parietem domus campestris cujusdam
obducit; in insulae Armoricae Ouessant fonte quadam La-
negrach dicta a clar. de La Pylaie et per totum littus
Galliae occidentalis a multis botanicis observatus; in
alveis aquariis Pirnae Saxoniae et in fonte frigida prope
Pforzheim Duc. Bad.; in Americae septentrionalis rivulis
saxis immersis adhaerens haud rarus: Beyrich, Sul-
livant. *Vere et aestate.* 4.

Flos masculus in ramulo brevissimo axillari terminalis,
rarius subsessilis. *Conomitrium* verum.

2. **F. Hedwigii** C. Müll.; *monoicus*; folia lanceolata acuta, nervo fere ad apicem excurrente; theca obovata, operculo conico acuminato curviusculo multo minori, dentibus profunde bifidis; calyptra fissa et ideo subdimidiata.

Octodiceras fissidentoides Brid. II. p. 676. — *Skitophyllum semicompletum* La Pyl. l. c. p. 51. tab. 39. — *Cecalyphum?* *semicompletum* P. B. Prodr. p. 57. — *Fissidens semicompletus* Hdw. Stirp. Cr. 3. p. 34. tab. 13. ex parte. — *Conomitrium Hedwigii* Mont. l. c.

Patria. Chile prope Valparaíso: Bertero. 24.

Ex habitu *Conomitrium* quidem, calyptra tamen ad illam *Fissidentis* accedens.

b. Fructus in ramo brevissimo.

3. **F. Dillenii** C. Müll.; caulis frondiformis erectiusculus subsimplex; folia alterna oblongo-lanceolata uniformia pedunculis axillaribus cauligenis (ex ic. Dillen. in ramo brevi); thecae ovalis operculum cuspidatum incurvum. †.

Octodiceras Dillenii Brid. II. p. 677. — *Fissidens semicompletus* Hedw. l. c. ex parte. — *Conomitrium Dillenii* Mont. l. c. — *Skitophyllum Dillenii* La Pyl. — *Fontinalis parva*, foliis lanceolatis Dill. Musc. p. 259. tab. 33. fig. 4.

Patria. E Patagoniae et insulae Providentiae aquis ex Dill. adnot. p. 260. a Guil. Sherardo Dillenio communicatus. 24.

4. **F. Berterii** C. Müll.; caulis filiformis ramis superioribus subfasciculatis, folia angustissima linearia patentia, suprema longissima, pedunculi 1 — 3, thecae erectae operculum acuminatum.

Conomitrium Berterii Mont. ann. d. sc. nat. 1837. p. 250. et in Voyage du M. d'Orbigny. p. 104.

Patria. Ad saxa in scaturiginibus collium editorum Chilensium: Bertero. — Ad prom. b. sp. peregrinator meritus Drège copiose legit et sub No. 9379 a. et b. edidit. 24.

A praecedente satis differt?

Sectio II. **Pachyfissidens.** Plantae elatae terrestres innovando ramosae. Folia c. lamina verticali rigida, nervo latissimo dilatato e stratis cellularum pluribus constructa.

5. **F. grandifrons** Brid. (II. p. 701.); cespitosus elatus; caulis erectus subincurvus valde ramosus; folia approximata, *lamina dorsali folio brevior lineali-lanceolata, submutica*, margine integerrima.

Skitophyllum congestum La Pyl. l. c. p. 57. tab. 39. — *Fissidens grandifrons* Br. Europ. l. c. p. 11. tab. 6.

Patria. In Nova Anglia, ubi detectus est et unde Cl. Swartz habuit et ad Niagarae cataractam in rupibus irroratis: Sullivan; praeterea in insula Bourbonis et in Gallia australi, ubi circa Avenionem Requien legit; serius etiam in Gallia occidentali: Guépin. 4.

Flores feminei laterales; archegoniis 30 — 60. Fructus desiderantur. Planta memorabilis haud enervis ut Bridel l. c. dicit sed nervo in laminam folii veram ac verticalem dilatato.

6. **F. linealis** Br. Europ. (l. c. p. 12. tab. 6.); *monoicus*; folia conferta se invicem tegentia lanceolata, *lamina dorsali in medio folio desinente, lamina apicali angusta lineali-lanceolata nervosa integerrima folio ipso longiore*; folia perigonialia subobcordata latissima, lamina apicali vix in folii dorsum producta angustissima longa; perichaetia caulinis angustiora, caeterum similia.

Patria. In prom. b. sp.: Zeyher et Ecklon. 4.

Flores monoici terminales eparaphysati.

Praecedenti paulo humilior, foliis confertioribus et angustioribus, lamina verticali folio longiore et perangusta diversus.

Sectio III. **Areofissidens.** Folia valde pellucido reticulata.

7. **F. splachnifolius** Hsch. (Linn. 1841. p. 145.); subacaulis 2 — 4 jugis, folia *erecto-patentia late-ovalia*; lamina folii vera ultra medium producta; *lamina apicalis acutiuscula nervo supra medium dissoluto laxo concolore instructa*; omnes laminae immarginatae integerrimae lurido-virides pellucidae; pedunculus erectus brevis, theca *erecta minuta oblonga operculo convexo breviter oblique rostellato*; calyptra conica minuta basi incisa. †.

Patria. In vertice septentrionali montis *Tafelberg* dicti prom. bon. sp., ubi in edito secundo mense Aug. 1827 legit Cl. Ecklon. ☉.

Caulis sterilis clatior 2 — 4 lin. longus, apicem versus attenuatus, foliis apice recurvis lamina apicali vix nata. Folia perichaetialia duplo longiora quam caulina, lamina apicali exacte lanceolata acutiuscula. Calyptra minuta basi incisa glabra ferrugineo-straminea apice fusca. — Inflorescentia?

8. **F. pellucidus** Hsch. (l. c. p. 146.); caulis brevissimus simplicissimus 4jugus ascendens; folia erecto-patentia, lamina apicalis *lanceolata obliqua subensiformis*, omnes laminae immarginatae integerrimae nervo *crasso ferrugineo* infra apicem laminae apicalis dissoluto; pedunculus *basi geniculatus inde adscendens*, theca *erecta* oblonga *operculo convexo-subulato recto*; calyptra conico-subulata minuta basi irregulariter lacera angusta. †.

Patria. Surinam: Weigelt? ☉.

Caulis sterilis brevior foliis apicem versus leviter denticulatis pallide ferrugineis e cellulis circularibus minimis densis composita. Folia perichaetialia maxima. Calyptra minuta operculum tegens basi irregulariter lacera glabra ferrugineo-straminea angusta. Inflorescentia?

9. **F. Zollingeri** Mont. (in ann. des sc. nat. 1845. 4. p. 114.); *hermaphroditus*; cespitosus; caulis decumbens minimus subsimplex basi polyrhizus; folia flabellatim expansa, folii lamina ultra medium producta, *lamina dorsalis lanceolato-acuminata marginata nervo crasso cuspidato*, omnes laminae *integerrimae*; pedunculus *basi geniculatus ascendens flexuosus*, theca *erecta pyriformi-clavata fere aequalis* operculo conico oblique rostellato. †.

Patria. In terra turfosa insulae Javae: Zollinger collect. No. 1604.

Folia perichaetialia majora, lamina folii ventricosa.

10. **F. hyalinus** Hook. et Wils. (Lond. journ. of bot. Vol. III. p. 89. tab. II.); pumilus subgregarius ere-

ctus simplex; folia pro plantulae altitudine *latissima*; lamina folii vix medium folii aequans; lamina dorsalis *verticalis lato-oblonga acuta*; omnes laminae hyalinae *enerves integrae*; pedunculus crassiusculus albidus semipellucidus; theca *erecta orata operculo conico-acuminato*; calyptra mitraeformis-conica. †.

Patria. Americā sept.: Cincinnati in terra humida sylvarum umbrosarum humidarum, ubi collegit F. G. Lea. ☉.

An species revera enervis? Memorabilis esset, quum putent, laminam verticalem e nervo oriri.

11. **F. palmatus** Hedw. (Musc. Frond. III. p. 69. tab. 30 A.); *dioicus*; humillimus simplicissimus decumbens; folia subsexjuga lato-lanceolata subimbricata; folii lamina $\frac{1}{2}$ producta angusta, complicata *tenuissime emarginata*; l. dorsalis basi angusta apicem versus lata crassius *marginata*; l. apicalis *lata nervo excurrente cuspidata fere usque ad apicem crassius marginata*; omnes l. *integerimae*; pedunculus e basi *geniculatus adscendens longus*, theca *oblonga horizontalis*; operculo conico subulato *subincurvo*; calyptra subulata minutissima.

Dicranum palmatum Sw. Fl. Ind. Occ. III. p. 1774. — *Hypnum palmatum* ej. Prodr. p. 141. — *Skitophyllum palmatum* La Pyl. l. c. p. 36. tab. 35. fig. 6. — Brid. II. p. 680.

Patria. In umbrosis argillaceis ad radices palmarum Jamaicae. Lectus quoque in caudice alto *Arecae oleraceae* latere excavato, humo quisquiliisque foliorum putrefactorum repleto. Swartz detexit.

Speciem saepissime commutatam e spec. Swartz. descripsimus. Folia e cellulis inde a nervo in seriebus obliquis arcolatis laxis pellucidis composita. — Fl. masc. in planta propria terminalis.

b. Sublaxe reticulati.

12. **F. cuspidatus** C. Müll. (Linn. 1843. p. 588.); *dioicus*; caulis subcespitosus simplicissimus humilis erectus; folia lanceolata angusta; folii lamina e basi *latiuscula ventricosa flexuosa* $\frac{2}{3}$ et ultra producta aequalis; lamina verticalis basi obsoleta apicem versus latior; la-

mina apicalis lanceolata nervo *crasso ferrugineo excedente longe cuspidata*; omnes laminae *flavo-marginatae integerrimae*; ped. *elongatus rectus subflexuosus*; theca *oralis horizontalis operculo conico-subrecto*.

Patria. Prom. bon. spei, ad sylvas primaevas *Krakakammae* (Distr. Uitenhage), ubi in terra argilloso-humosa legit Ecklon. Var. foliis angustissimis longe cuspidatis in locis non indicatis legit Mundt.

Flos masculus minimus in ramulo proprio plantulae masculae elatioris brevissimo terminalis. Antheridia minima obovata crassa. Folia perichaetialia: lamina folii latissima ovalis ad medium producta, lamina verticalis et apicalis angustissima longissima nervo excurrente.

13. **F. Kegelianus** C. Müll. (Linn. 1848. Fasc. II.); *dioicus*, caulis subcespitosus simplicissimus humilis decumbens; folia latiuscula c. 6-juga, folii lamina *infra medium evanescens ventricosa subaequalis crasso-marginata basi e cellulis magnis laxe-, apice cellulis minoribus densius areolata*; l. dorsalis ad nervi basin enata, basi angusta apicem versus latior c. l. apicali lanceolata, nervo crasso viridi flexuoso excurrente *brevi-cuspidata, tenuissime marginata densiusculo-areolata*; omnes l. integerrimae; ped. e basi *geniculata* rectus tenuis, theca *erecta obovalis minuta*, operculo e basi *conica longe subulato recto thecam superante*.

Patria. Surinam prope Paramaribo in locis humidis umbrosis cespitose-gregarius. *Junio, Julio 1844: Kegel Hb. No. 1226.* In insulis Antillis vulgaris. ☉.

F. cuspidato proximus sed ped. geniculato, theca erecta et operculo longissimo jam sat distinctus. *A. F. palmato* foliis multo densius areolatis, theca recta, operculo recto longissimo certissime differt. *A. F. Zollingeri* inflorescentia jam distinguitur. *A. F. pellucido* denique ac *F. splachnifolio* foliis marginatis valde recedit.

Folia perichaetialia lamina folii vera flexuosa instructa.

var. β . foliis longioribus magis cuspidatis, folii lamina vera stricta ultra medium producta aequalis acutissima, tenuius marginata; setae saepe geminatae.

C. Müller: *Synops. musc. frond.*

Sectio IV. **Eufissidens.** *Folia dense et ideo rotundato-areolata.*

A. Fructus lateralis.

14. F. taxifolius Hedw. (Spec. Muscor. p. 155. tab. 39.); *monoicus*; humilis basi *fasciculato-ramosus ascendens vel declinatus*; folia approximata; lamina folii ultra medium producta, lamina dorsalis e basi latiori *folio longiori undulata* cum lamina apicali *lato-lanceolata nervo diaphano crasso excedente mucronata vel cuspidata*; omnes laminae *dense et minute obscure areolatae e basi usque ad apicem cellulis pellucidioribus dense-serrulatae*; theca radicalis, ped. elongato flexuoso instructa *oralis inclinata operculo longirostri obliquo*; calyptra dimidiata.

Brid. II. p. 692. Bryol. Eur. l. c. p. 9. t. 4. — *Skitophyllum taxifolium* La Pyl. l. c. p. 60. tab. 35. — *Dicranum taxifolium* Sw. Musc. Suec. p. 31. — *Fuscina taxifolia* Schrank. Baiers. Fl. II. p. 451. — *Hypnum taxifolium* Linn. Sp. Pl. p. 1587. *H. laxif. minus basi capsulifera* Dill. p. 263. tab. 34. fig. 2.

Patria. In solo argilloso in nemorosis graminosis humidiusculis per totam Europam, in America septentrionali et insulis Mascarenis. *Autumno et hyeme.* 24.

Flos masculus ad caulis basin in vicinia feminei et quasi plantulam propriam efficiens vel in foliorum axillis gemmiformis.

15. F. subbasilaris Hedw. (Spec. Muscor. p. 155. tab. 39.); *dioicus?* subsimplex humilis; folia confertissima; lamina folii ad medium producta *tenuissime denticulata* complicata; lamina dorsalis e basi angusta tenuissime denticulata latior; lamina apicalis *apice erosodenticulata acuta nervo basi crasso apicem versus attenuato ante apicem cranido*, omnes partes minutissime et obscure viridi-areolatae; theca in ramulo brevi basilari terminalis, ped. adscendente brevi instructa *cylindrica s. cylindrico-oralis ore constricta*, operculo longirostro obliquo.

Skitophyllum subbasilare La Pyl. l. c. p. 62. tab. 35. — Brid. II. p. 694.

Patria. In America septentrionali in umbrosis ad terram et truncos arborum haud raro. Mühlenberg in Pennsylvania circa Lancaster primus legit. 24.

F. taxifolio proximus sed notis illustratis distinctissimus.

16. *F. adiantoides* Hedw. (Musc. frond. III. p. 62. tab. 26.); *monoicus*; ramosus elatus; folia ut in *F. taxifolio* sed multo latiora majora apice eroso-, basi minutiusculo-serrata, nervo crasso plerumque colorato flexuoso ante apicem + — acutiusculum evanido, immarginata sed cellulis nonnullis flavioribus quasi marginata majus areolata; theca in caulis medio in ramulo brevi axillaris oblonga cernua crassa, ped. elongato flexuoso crasso et operculo longe rostellato obliquo; calyptra dimidiata.

Brid. II. p. 702. Br. Europ. l. c. p. 10. tab. 5. — *Fissidens taxifolius* β. Wahlenb. Fl. Lapp. p. 332. — *Skitophyllum adiantoides* La Pyl. l. c. p. 55. tab. 36. — *Dicranum adiantoides* Sw. Musc. Suec. p. 31. — *Hypnum adiantoides fronde pinnata ramosa erecta medio pedunculifera* L. Sp. Pl. p. 1588. — *Hypnum taxiforme palustre majus at erectum* Dill. p. 264. tab. 34. f. 3. — *Fissidens polyphyllus* Wilson ex herb. Schwägricheniano nobis communicatus ab adiantoide distingui nequit. Folia apice minus dentata margine non hyalino.

Patria. In terra lapidosa, ad muros antiquos muscosos, ad arborum radices, in sylvis siccioribus et uliginosis umbrosis per Europam et Americam septentrionalem. *Hieme et primo vere.* 24

Flores utriusque sexus in axillis foliorum nidulantes; flos masculus gemmiformis. — Saepe elatissimus setisque aggregatis statura polymorpha.

Species e locis natalibus valde polymorpha foliis margine nunc hyalinis nunc homomorphis; nunc toto ambitu nunc apice tantum serratis; nunc nervo genuflexo nunc stricto ferrugineo vel viridi, lamina dorsali nunc supra basin nunc ad basin nervi lato undulata erecta.

17. *F. glaucescens* Hsch. (Linn. 1841. p. 154.); *dioicus*? caulis adscendens innovationibus ramosus; folia

subconferta 15—25-juga erecto patentia apice homomalla glauca; lamina folii ultra medium producta tenera, lamina dorsalis e basi usque ad apicem angusta et c. l. apicali lanceolata oblique mucronulata perangusta apice erosa, nervo flexuoso diaphano mucronulum attingente, omnes laminae subintegrae v. cellulis paullo prominulis vix denticulatae, subpellucidae; ped. planta paulo longior infra medium situs, theca oblongo-cylindrica inclinata, operculo conico rostellato thecam subaequante incurro.

Patria. Prom. bon. sp., in editis diversis montium Tafelberg et Teufelsberg dictorum: Ecklon. In locis non indicatis legit Zeyher: collect. No. 41. c. ex parte. *Septbr. 24.*

Folia perichaetialia multo longiora.

18. F. polypodioides Hedw. (Musc. frond. III. p. 63. tab. 27.); *dioicus, dense gregarius simplicissimus elatus; caulis filicoideus apicem versus crescens basi subnudus; folia caulina sublaxe imbricata latissima; lamina folii lata ad medium producta apice inaequalis; lamina dorsalis basi rotundata angustior; lamina apicalis lato-lanceolata apice subdenticulata nervo crassissimo ante apicem evanido; omnes laminae rotundato-arcolatae firmae integrae; ped. supra medium positus brevis adscendens, theca obovata subpyriformis, operculo conico longe rostrato subobliquo; calyptra conico-dimidiata.*

Hypnum polypodioides Sw. prodr. p. 140. — *Dicranum polypodioides* Sw. fl. Ind. Occ. III. p. 1772. — *Skitophyllum polypodioides* La Pyl. l. c. p. 45. tab. 35. — Brid. II. p. 695.

Patria. In montibus excelsis Jamaicae terram locis umbrosis muscosis declivibus incolentem primus Swartz legit. E Dominica Bridel habuit. In Columbiae colonia Tovar germanica in altitud. 5500' Moritz sterilem legit. 24.

Planta rigida basi polyrrhiza ab omnibus congeneribus caule pro plantae altitudine memorabiliter simplicissimo filicoideo gregario et notis ceteris illustratis excellentissima. Folia perichaetialia lamina dorsali vix ulla, apicali angustissima lanceolata. Folium ipsissimum e basi lata

attenuata. — Archegonia numerosa eparaphysata. Flores feminei ad caulis apicem plures.

Fissid. filicinus Dz. et Molkb. toto habitu proximus. Planta in pueris rigidissima stoloniformis foliis basi brevissimis densissime imbricatis cauli appressis latissimis amplexicaulibus lamina dorsali subcarentibus laxe areolatis fuscopurpureis, apicem versus foliis perichaetialibus magis similibus viridescens rotundato - areolatis longioribus apice caulis valde incurvatis.

19. **F. anomalus** Mont. (in annales des sc. nat. 1841. p. 267.); *grandis* caulis adscendens? simplex basi nudus; folia alterna *subremota homomalla* c. 50-juga, siccitate apice crispula, lamina folii ultra medium producta, lamina apicalis *suberanidinervia* acuta, omnes laminae margine non incrassatae *albidae* tenuissime - denticulatae; ped. *seriati brevissimi*; theca (ut in *Grimmia*) *ovali-subrotunda*. †.

Patria. In montibus Nilgheriensibus Indiae orientalis: Perrottet. Inter surculos Hypni serrato. 24.

Folia perichaetialia caulina parum superantia. Peristomii dentes 16 fusci profunde bifidi, *saepe ad basin lacunosi*, cruribus filiformibus articulatis varioque modo simul concretis.

Nulli congenerum affinis et eximia species.

20. **F. maschalanthus** Mont. (ann. d. sc. nat. 1845. p. 115.); *dioicus*, cespitosus; caulis erectus innovationibus ramosus *subdichotomus*; folia sub 30-juga dense imbricata erecta *linearia*, lamina apicali *obtusae acuminulata*, ubique *integerrima nervo subcontinuo albo* instructa stricta, siccitate crispato - inflexa; theca *inclinata oblongo-cylindrica operculo convexo rectirostro*. †.

Patria. Ad terram in Chile australiori: Gay. 24.

Flores *terminales et laterales* in axilla foliorum v. in dichotomia. Calyptra brunnea coriacea cuculliformis. Dentium crures articulati punctato - asperi non trabeculati.

B. *Fructus terminalis.*I. *Folia marginata.*a. *Folia crispa.*

21. F. rufescens Hsch. (Linn. 1841. p. 153.); *monoicus?* assurgens superne simplex interdum basi ramosus, 6—10-jugus et ultra, apice subfalcatus; folia *remota* lanceolata brevia; folii lamina basi latiuscula apice *inaequalis marginata*, margo *flavus crassus integerrimus ad basin folii in ejusdem laminam evanescens*; lamina dorsalis basi angusta flavo-marginata, lamina apicalis folio *subbrevior* nervo *flavo crasso* excurrente brevi-cuspidata *reflexiuscula* flavo-et crasso-marginata integerrima; omnes partes minutissime areolatae flavescenti-virides; theca ovalis *inclinata* collo brevi instructa parva, ped. oblique-erecto substricto rufescente operculoque *conico subulato recto*; calyptra junior conica, tandem dimidiata?

C. Müll. bot. Zeit. 1847. p. 39.

Patria. In promont. b. spei locis multis vulgaris sed saepe sterilis: Ecklon, Papp. — Port Natal: Guerin-zius. Hb. Kunzeanum. Septbr. — Debr. 24.

22. F. Hornschuchii Mont. (in ann. d. sc. nat. Tom. XIV. et in Lond. journ. of bot. 1845. p. 196. memorat.); *monoicus* humilis simplicissimus 8—10-jugus apice subfalcatus; folia lanceolata brevia; folii lamina basi latiuscula, *apice et basi cellulis prominulis serrulata medio tenui-marginata*, margo *flavus vix et remote serrulatus* ad basin in *folii laminam evanescens*, marginibus flexuosis; lamina dorsalis basi angusta cellulis prominulis serrulata; lamina apicalis foliis brevior, nervo *flavo crassiusculo* excurrente brevi-cuspidata *reflexiuscula serrulata*; omnes partes minutissime areolatae *flavescenti-virides*; theca ovalis recta collo brevi subverrucoso instructa, minuta tenera, seta curviuscula adscendente operculoque *conico recto brevi*; calyptra cucullata.

Fissidens serrulatus Hsch. in flora Brasiliensi fasc. I. p. 91. tab. II. non Brid. — *F. serrulatus* Bruch in litt. ad Hampe. — *F. Martianus* Hmp. in litt.

Patria. Brasilia: in Sierra d'Estrella et in prov. Minas legitt Martius. 24.

Archegonium ut videtur unicum. Planta mascula ad basin femineae. Antheridia pauca paraphysibus carentia. Folia perigonia truncato-repanda laxae areolatae, lamina dorsalis supra medium folii enata c. apicali acuta cuspidata, omnibus partibus immarginatis serrulatis nervo sub apicem evanescente crasso.

F. semimarginato, rufescenti et submarginato affinis sed notis editis diversus.

23. *F. semimarginatus* C. Müll. (bot. Zeit. 1847. p. 38.); *hermaphroditus*, humilis simplicissimus, 8—10-jugus apice subfalcatus; folia lanceolata brevia; folii lamina basi latiuscula usque ad apicem et ultra crasse-albido-marginata, marginibus flexuosis, integerrima; lamina dorsalis basi angusta, cellulis prominulis serrulata; lamina apicalis folio brevior, nervo excurrente tenui albescente brevi-cuspidata reflexiuscula serrulata; omnes partes albescenti-virides minutissime areolatae; theca ovalis recta collo brevi subverrucoso instructa, minuta tenera, ped. curviusculo adscendente operculoque conico rostrato obliquo.

Patria. Columbia: Cocollar inter Leucobrya ad radices arborum. Cl. Moritz legit. ☉?

Basi (foliis minutis) subnudus, apicem versus crescens, apice interdum innovans. Archegonia angustissima brevia c. 6—8, paraphysibus carentia. Antheridia pauca majora ellipsoidea. Folia floralia intima laminis carentia convoluta laxius areolata profunde repanda cuspidata integra.

F. Hornschuchii proximus sed notis illustratis distinctissimus. A. *Fissid. submarginato* Bruch caule apice subfalcato, foliis madefactis apice reflexiusculis, lamina dorsali et apicali serrulata sat recedit.

24. F. intermedius C. Müll. (Linnaea 1848. fasc. II.); *monoicus*, humillimus gregarius simplicissimus; folia caulina angusta lanceolata patentia falcata; lamina folii vera flexuosa flavo-marginata integra; lamina dorsalis cellulis prominulis denticulata immarginata; lamina apicalis folio brevior cellulis prominulis denticulata immarginata nervo flavo excurrente; theca ovalis erecta aperta urceolata operculo subulato recto.

Patria. Surinam prope Paramaribo in locis umbrosis humidis: Kegel. Januar. 1844. No. 501.

Flos masculus in feminei vicinia gemmaceus. Antheridia parva pauca eparaphysata. Folia perigonialia parva pellucida lato-ovalia convoluta, apice subulata integerima v. crenata.

Inter *F. semimarginatum* et *submarginatum* medium tenens. A primo differt: infloresc. monoica, foliis flavo-marginatis grandius areolatis vix papillosis. A secundo distinguitur: foliis angustis apice caulis falcato crispis et inflorescentia androgyna (i. e. flore masculo in vicinia feminei).

25. F. submarginatus Bruch (in Flora 1846. p. 133.); *monoicus*, pusillus, plantulae 2—3 lineas longae, innovando subramosae declinatae; folia 6—10-juga patentia siccitate deflexa late-lanceolata acuminata v. costa excurrente mucronata; folii lamina $\frac{2}{3}$ producta marginata; cet. laminae immarginatae; theca ovali-ellipsoidea recta, operculo rostellato, calyptra conica margine crenulato. †.

Patria. In faucibus sylvarum Natalensium prope litus: Kraus.

Peristomium *Fissid. bryoidei*. Flos masculus sessilis. — E diagnosi folia integra et hac nota a *F. semimarginato* nobis jam diversus.

26. F. minutulus Sulliv. (Musc. Allegh. p. 44.); *dioicus*; perpusillus subsimplicissimus folia 5—12 juga remotiuscula superiora lanceolata latiuscula; folii lamina ventricosa basi crasso-marginata aequalis (raro inae-

qualis); lamina dorsalis *longe supra basin folii enata vix vel tenuissime marginata*; l. apicalis (foliorum superiorum) *lanceolato - acuta vix vel tenuissime marginata*, nervo ante apicem evanido; omnes laminae *subintegrae* saepe repando-flexuosae; seta tenuissima erecta longa, theca (aperta) cylindrica erecta aequalis ore suburnigera tenera parva; calyptra cuculliformis (ex obs. Sulliv.).

Patria. America septentrionalis: Rocky Mountains, et prope Carlton House: Drummond. Musc. Amer. sub nom. *Fissid. bryoidei* Hdw. ☉.

Planta mascula minuta. Flos masc. terminalis. Folia perigonialia *intima* caulinis dissimilia: folii lamina aequalis vaginante-latissima apice rotundato sinuata subintegra; l. dorsalis ut in caulinis; l. apicalis e basi sinuata lanceolato acuta, nervo flexuoso ante apicem evanido. — Pl. masc. juvenilis stolonif. diaph.

F. minutulus Sulliv. annuus dioicus; floribus terminalibus; caule simplici; foliis 5—12-jugis superioribus lineari-lanceolatis margine limbo subrepando haud incrassato plus minus circumductis, costa sub apice evanida; capsula erecta ovali; operculo elongato-conico; calyptra cuculliformi. — In sylvis ad rivulorum exsiccatorum lapides prope Columbus Ohionis Americae septentrionalis rarius.

Descripta species in partibus tam multis cum planta Sullivantiana convenit, ut persuasissimos habeamus, utramque plantulam, sprete diagnosi auctoris pauperrima, synonymam esse. In planta nostra folia certe crispabilia.

27. F. androgynus Bruch (l. c. p. 134.); *androgyno-monoicus*; caulis decumbens v. superne declinatus uncialis simplex v. innovatione una alterave subramosus; folia multijuga remotiuscula patenti-deflexa, siccitate apice tortilia; folii lamina $\frac{1}{2}$ producta, lamina apicalis *nervo excurrente mucronata*; omnes laminae *marginatae*; theca ovalis truncata. †.

Patria. Prom. bon. spei ad latera montis Duyvelsberg: Kraus.

Interdum 2—3 thecae ex unico flore. — Diagnosis auctoris pauperrima.

b. Folia stricta.

28. F. bryoides Hdw. (stirp. cr. III. p. 67. tab. 29.); *monoicus*; humilis basi fasciculato-ramosus, rami subsimplicissimi; folia remota *lato ovalia*, *toto ambitu marginata* integerrima nervo excurrente instructa; folii lamina vix $\frac{1}{2}$ producta apice saepe inaequalis; l. dorsalis basi angusta apicem versus latior c. apicali *lanceolato-acuta*; omnes l. amoene virides; theca longisetacea ovalis *recta operculo conico obliquo*; calyptra conica latere fissa.

Brid. II. p. 686. — Br. Europ. l. c. p. 8. tab. II. — *F. exilis* Hdw. Spec. Musc. p. 152. tab. 38. planta annua ex parte. — Brid. II. p. 683. — *F. viridulus* Wahlbg. Fl. Carp. p. 342. et Fl. Lapp. p. 334. — *Skitophyllum bryoides* La Pyl. l. c. p. 42. tab. 35. — *Dicranum bryoides* Roth. Fl. Germ. III. p. 181. — *D. viridulum* Sw. Musc. Suec. p. 32. (sub nom. D. bryoidei) et p. 84. tab. II. fig. 3. — *Fuscina bryoides* Schrank Baiers. Flora II. p. 451. — *Hypnum bryoides* L. Sp. Pl. p. 1588. — *Hypnum tariforme exiguum versus extremitatem capsuligerum*. Dill. p. 262. tab. 34. fig. 1. —

Patria. In locis humidis umbrosis praecipue argillosis per totam Europam utramque Americam. *Hieme et Vere.* 4.

Folia perigonialia minima lato-vaginantia repanda lamina dorsali infra carentia, lamina apicali angustissima nervo evanescente, tenera. Antheridia pauca parva. Folia perichaetialia multo majora, folii lamina minima ovalis ventricosa; l. dorsalis e medio folii nascens c. apicali apicem versus lato-lanceolata nervo excurrente.

Flores masculi *F. exilis* (plantae juvenilis) parci vel nulli, in innovationibus plantae annuae creberrimi.

29. F. incurvus Schwägr. (suppl. I. P. II. p. 5. et P. I. tab. 49.); *monoicus* humilis subsimplex vel basi fasciculato-ramosus, rami subsimplicissimi; folia remota *lato-ovalia*; folii lamina $\frac{1}{2}$ producta apice aequalis marginata; l. dorsalis vasi angustissima apicem versus latior marginata; l. apicalis *lanceolato-acuta nervo, ante apicem*

evanescente marginata, margo ante apicem evanidus integer, partes ceterae integerrimae amoene virides; theca longisetacea ovalis inclinata operculo conico recto subulato; calyptra conica latere fissa.

Br. Europ. l: c. p. 6. tab. I. — *Dicranum incurvum* Web. et Mohr bot. Taschb. p. 162. — *Dicranum bryoides* β . Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 49. — *D. tamarindifolium* Turn. Musc. Hib. p. 55? — *Fissidens tamarindifolius* Brid. II. p. 684.

β . *fontanus*, major, foliis latius marginatis, obtuse dentatis; theca minori, brevius pedunculata; dentibus peristomii saepe trifurcatis.

Patria. In umbrosis, ad latera viarum humidarum in solo argilloso per totam Europam utramque Americam. Var. β . prope Durlach Ducat. Badensis: A. Braun.

Folia floralia a caulinis haud diversa. Ex habitu antecedenti simillimus sed notis descriptis distinctissimus.

30. F. curvatus Hsch. (Linn. 1841. p. 148.); *dioicus?* *pygmaeus* simplex vel basi innovando - assurgens rufus; folia *indistincte disticha*; folii lamina ultra medium producta *ventricosa*; l. apicalis *obliqua lanceolato-acuminata*, nervo *infra apicem dissoluto*; omnes l. *marginatae integerrimae*, minute - areolatae; ped. *brevissimo curvato*, theca *obovalis erecta* operculo conico *brevissime* rostellato, thecae dimidiam partem longitudine subaequante, *subrecto*; calyptra cucullata.

Patria. Prom. bon. spei ad muros: Ecklon legit 24. October 1827. ☉.

Folia perichaetialia duplo majora acuminata; folii lamina $\frac{1}{3}$ producta nervo subexcurrente lurido - viridia. Dentes peristomii cruribus inaequalibus subulatis tenerrimis pallide luteis.

31. F. Ceylonensis Dz. et Molkb. (ann. des sc. nat. 1844. p. 304.); *dioicus?* basi ramosus flexuosus; folia in ramis fertilibus subdecemjuga, erecto - patentia; erecto - curvata, folii lamina $\frac{2}{3}$ producta *marginem albescentem submarginato*; lamina dorsalis e basi angustissima subcrescens c. apicali *lanceolata acuta immarginata nervo diaphano*

excurrente instructa, omnes l. minutissime et obscure-areolatae virides *subintegrae*, subundulatae; theca recti-setacea *oblongo-cylindrica* operculo conico - rostellato curvulo.

Patria. Ceylon.

F. submarginato Bruch affinis sed foliis siccitate non deflexis sed patentibus angustioribus et inflorescentia dioica differt.

32. *F. remotifolius* C. Müll. (mst.); dense gregarius, caulis foliis 10—20-jugis *laxe dispositis* gracilis tener; folia plantae senilis stricta patula, innovationum juniorum crispa; folii lamina $\frac{1}{2}$ producta integerrima flavo-marginata, *apice inaequalis*, *alae haud connatae sed ala unica rotundata obtusa patens* ad nervum connata; lamina dorsalis e basi angusta longe decurrente latior marginata integerrima; l. apicalis *ante apicem immarginata denticulata nervo crasso excurrente mucronata*; omnes laminae undulatae, minute sed pellucidius areolatae; seta *e basi geniculata* erecta, theca *horizontalis oblongo-cylindrica*.

Patria. Prom. bon. spei: Zeyher collect. Cap. No. 41. C. ex parte in societate *Fissid. glaucescentis*.

Inflorescentia, operculum et calyptra ignotae.

E diagnosi *F. androgyno* Bruch affinis, sed notis illustratis distinctissimus.

II. Folia immarginata.

a. Folia crispa.

33. *F. osmundioides* Hdw. (Sp. Musc. p. 153. tab. 40.); *dioicus*; dense cespitosus; caulis erectus innovationibus vage dichotome ramosus; folia sublaxe-imbricata latiuscula; folii lamina $\frac{2}{3}$ producta *inaequalis*, *ala unica in medio laminae apicalis connata obtusa*; l. dorsalis e basi attenuata lata; l. apicalis *lato-lanceolata acuminato-acuta nervo cranio genuflexo*; omnes l. cellulis *prominulis serrulatae* minute dense et pellucide areolatae; theca *obovalis subobliqua* parva operculo longe rostrato *rectiusculo*; calyptra *e basi lobata (submitraeformis) recte rostrata*.

Brid. II. 689. — Br. Europ. l. c. p. 8. tab. 3. — *Skitophyllum osmundioides* La Pyl. l. c. p. 38. tab. 25. fig. 5. — *Dicranum osmundioides* Swartz. Act. Holm. 1795. p. 240. — *Fissidens dicarpus* Brid. II. p. 698. c spec. authenticis, thecis geminatis, foliis crassinerviis huc certe pertinet.

Patria. In pratis uliginosis et turfosis hic illic per Germaniam, Angliam, Sueciam, Lapponiam et Helvetiam, raro. *Vere.* 24.

Planta mascula feminea gracilior. Flos masculus terminalis. Folia perigonialia interna vaginantia, in laminam verticalem angustissimam desinentia. Antheridia paraphysibus nonnullis mixta oblonga. Folia perichaetialia aut perigonialia caulinis angustiora et longius alata.

34. **F. crispus** Mont. (in d'Orbigny Voyage Tom. VII. Crypt. p. 97.); caulis subsimplex erectus filiformis longiusculus flexuosus, innovationibus divisus; folia 15 — 20-juga siccitate madoreque crispatissima secunda; folii lamina ultra medium producta; lamina apicalis oblongo-lanceolata; omnes partes integerrimae margine incrassato hyalino nervoque excurrente instructae viridi-lutescentes tenuissime areolatae; ped. flexuoso-erecto, theca ovali-oblonga inaequalis horizontalis operculo conico-acuminato recto. †.

Mont. in ann. des sc. nat. 1837. p. 57.

Patria. In America meridionali, Prov. Corrientes, ad terram arenosam in collibus sylvaticis, secus flumen Sanctae Luciae societate *Physcomitrii Orbigniani* Mont.: d'Orbigny. *Junio mense.* 24.

Folia perichaetialia intima subscalpelliformia undulata, magis acuta elamellosa. Theca olivacea tandem brunnea, ore purpureo.

35. **F. capitatus** Hook. et Wils. (Lond. journ. of bot. 1844. p. 547.); *monoicus*; caulis subsimplex apice subdivisus; folia 15-juga conferta; lamina apicalis lineari-lanceolata siccitate incurva nervo subcontinuo diaphano; omnes laminae rotundato subpunctiformi-areolatae; theca ovalis cernua. †.

Patria. In sinu insularum (Insel-Bay) Novae Seelandiae.

Caulis apice plerumque setis 2, seta in ramulo proprio. Antheridia 8—10 eparaphysata. Flos masculus ad basin perichaetii (inflorescentia androgyna).

E diagnosi pauperrima nec affinitas nec substantia speciei intelligi potest.

36. F. oblongifolius Hook. et Wils. (l. c. p. 547.); *monoicus*; caulis subramosus; folia 24-juga *linearia obtusa* siccitate incurva, nervo subcontinuo pellucido, guttulato-areolata; theca ovalis cernua. $\frac{1}{4}$.

Patria. Ibidem ac praecedens.

Flos masculus *axillaris*.

Ab antecedente differt foliis linearibus obtusis firmioribus, colore flavido-viridi et floris masculi situ. — Diagnosis ut praecedens vaga.

37. F. Mangarevensis Mont. (voyage au pôle Sud. Crypt. p. 344.); *cespitosus*; caulis *procumbens* simplex vel innovationibus fasciculato-ramosus, rami subflabelato-ramulosi; folia dense imbricata erecto-patentia sicca in plano involuto-cinclinata; folii lamina ad medium producta; l. apicalis *lineari-lanceolata*, omnes l. integriusculae nervo ante apicem evanido. $\frac{1}{4}$.

Ann. d. sc. nat. 1845. 4. p. 113.

Patria. In insula *Manga Reva* (Archipel Gambier), ad rupes humiditas nec non ad ramos dijectos locis irriguis, imprimis ad radices montis eodem nomine ac insula ipsa nuncupata, hancce speciem, cujus cespites caulibus primariis vel rhizomatibus *Neckerae undulatae* procumbunt, invenit Cl. Hombron ad altitud. 220 metra supra mare.

38. F. flabellatus Hsch. (fl. Bras. fasc. I. p. 91. tab. II. fig. II.); *dioicus*; *decumbens brevissimus subfasciculatim ramosus*, rami adscendentes innovationibus brevissimis ramulosi flexuosi basi nudi superne magis magisque dense foliosi; folia 8-juga versus apicem magis patentia et longiora linearia; folii lamina sub $\frac{2}{3}$ producta; l. dorsalis longe supra basin enata angustissima; l. apicalis

linearì-lanceolata obtusa summo apice subcrenulata, nervo crasso pallido, evanescente, omnes l. intense lurido-virides subtilissime areolatae; ped. e basi geniculata adscendens; theca suberecta parva cylindrico-oblonga parum curvata inaequalis operculo convexo-rostrato recto luteo, theca brevior; calyptra cucullata. †.

Patria. In humidis umbrosis supra Serro dos Orgãos terrestres: **Beyrich.** *Januario.* 24.

Planta mascula brevissima, flore terminali. Folia perigonialia basi vaginantia lata lamina dorsali ultra folii laminam enata c. apicali lanceolata. Antheridia eparaphysata. Peristomii dentes normales cruribus ferrugineis. Calyptra cucullata straminea apice fusca.

b. Folia stricta (plantae femineae).

a. integra.

39. F. pygmaeus Hsch. (Linn. 1841. p. 147.); *dioicus?* *subacaulis*; folia obsolete disticha 3-juga; folii lamina ultra medium producta *ventricosa*; l. apicalis *ovalis obliqua acuta nervo evanido pallidior*; omnes l. *integerrimae* lurido-virides laxae et irregulariter rotundato-areolatae; seta crassa erecta; theca *oblonga erecta* aequalis pallida ore purpurea, operculo *hemisphaerico brevissime rostellato*; calyptra cucullata. †.

Patria. Prom. b. spei, ad monumenta lapidea hortorum summorum in vertice boreali montis tabularis et in terra loci *Löwenschwanz* dicti: **Ecklon.** *Junio.* ☉.

Folia perichactialia 2 maxima teneriora pallidiora, nervo excurrente. Peristomium normale cruribus subulatis inaequalibus.

40. F. laxifolius Hsch. (l. c. p. 149.); *dioicus?* *caulis brevissimus simplicissimus rufus*; folia obsolete disticha apice recurra lato-ovalia; folii lamina usque ad apicem producta obliqua; l. apicalis *acuminulata* nervo diaphano supra medium folii dissoluto; omnes l. circulariter areolatae integerrimae, intense virides; ped. erecto.; theca *oblonga obliqua cernua* parum curvata operculo convexo

breviter rostellato, dimidia thecae longitudine, *recto*; calyptra conico-subulata. †.

β. *breviseta*, setis brevissimis.

Patria. Prom. b. spei, ad montem tabularem et diaboli haud raro inter rupes, in sylvis quercinis. Var. β. in terra loc. umbrosorum montis tabularis: Ecklon. *Jun.* — *Aug.* ☉.

Folia perichaetialia duplo majora lanceolata longe acuminata; obliqua lamina folii ultra medium producta ventricosa *marginata* nervo excurrente; omnes partes intense virides. Peristomii dentes normales usque ad basin fissi cruribus filiformibus. Calyptra minuta rostellum vix tegens, conico-subulata, basi fissa glabra straminea apice fusca.

41. **F. exiguus** Sulliv. (Musc. Allegh. p. 44.); *dioicus*; caulis simplex foliis 5—9, jugis *oblongo-lanceolatis* integerrimis nervo sub apice dissoluto; theca *subobliqua* v. erecta, operculo *conico-rostellato*; calyptra cuculliformis.

Patria. In sylvis ad rivulorum exsiccatorum lapides, prope Columbus Ohionis copiosissimus. ☉.

Calyptra cuculliformis. Flos masculus terminalis. —
Diagn. pauperrima!

42. **F. obtusifolius** Wilson (Lond. journ. of bot. IV. 1845. p. 196. tab. IX. B.); *dioicus*; caulis *simplicissimus humillimus*; folia 6—10 (in caule sterili 20) parva; *subovalia brevissima*; lamina folii ultra medium producta; l. dorsalis angustissima; l. apicalis latior *rotundato-obtusa evanidinervis*; ped. sublinearis; theca erecta *subelliptica* basi obconica sicca sub ore constricta, operculo *conico brevi* rubello; calyptra dimidiata.

Patria. Ad dumeta rupis humidae prope Cincinnati: J. G. Lea 1843. ☉.

Folia perichaetialia longiora oblonga siccitate subincurva laete viridia, minutissime rotundo-areolata. Flos masc. terminalis.

43. F. Taylori C. Müll.; *monoicus, humillimus, simplex* laxè aggregatus; caulis sterilis flexuosus foliis 7—8 jugis infra laxis superne confertis erecto-patentibus oblongis obtusissimis nervo apiculatis; lamina dorsalis supra basin desinens; planta fertilis foliis 2—3-jugis erectis adpressis amplexantibus acuminatis; seta subflexuosa, theca ovalis inclinata operculo rostrato breviori. †.

F. pygmaeus Tayl. n. sp. non Hornsch. in Lond. journ. of bot. 1846. p. 66. — Wilson l. c. p. 454. — Nomen mutandum erat, quum *F. pygmaeo* Hsch. supra descripto jam impositum fuerit.

Patria. Swan River Novae Hollandiae: J. Drummond.

Folia plantae sterilis sicca crispa. Peristomii dentes inaequaliter divisi.

F. pygmaeo Hsch. affinis, sed firmior et theca inclinata, foliis indistincte obtusis et inflorescentia diversus.

44. F. longifolius Brid. (II. p. 682.); cespitosus *pusillus simplicissimus decumbens filiformis*, foliis 5—6-jugis dissitis patentibus superioribus (pro plantulae exiguitate) longissimis, l. folii ad medium producta; l. apicalis lineari-lanceolata nervo continuo pellucido acuta; omnes l. amoene virides arctissime areolatae; seta filiformis, theca inclinata ex ovali subrotunda, ore contracta exigua.

Skitophyllum longifolium La Pyl. l. c. p. 40. tab. 35. fig. 3.

Patria. In Hispaniola, unde Poiteau retulit. ☉.

Perichaetia ut caulina.

β. *denticulata*.

45. F. serratus C. Müll. (bot. Zeit. 1847. p. 804.); *monoicus*; humilis simplicissimus (c. 8-jugus); folia stricta cuspidato-lanceolata minuta areolata; folii lamina angusta brevis grosse serrata; lamina dorsalis basi angusta, apicem versus latior et serrulata; nervus excurrentes crassus flavus flexuosus; theca ovalis recta aequalis minuta longisetacea et (e spec. capensib.) operculo conico obliquo subulato instructa; calyptra conica.

Patria. Javae insula: Zollinger No. 2100. c. Barbu-lae specie incompleta mixtus. Ad ligna putrida sylvar. pri-

mitiv. prope Krakakammam prom. b. spei collectum communicavit am. Hampe.

Archegonia c. 3. Flores masculi axillares gemmiformes *numerosi*. Folia perigonialia *subciliato-serrata*.

Fissid. Hornschuchii Mont. affinis sed foliis patentibus ubique et grosse-, saepe cristato-serratis immarginatis distinctissimus. Flores masculi ac feminei in eodem caule creberrimi.

46. **F. amoenus** C. Müll. (bot. Zeit. 1847. p. 38.); *dioicus?* brevissimus simplicissimus foliis 3 — 5-jugis latiusculis *planissimis lanceolatis* longis; folii lamina vera *brevis*; lamina dorsalis basi angusta; l. apicalis *longissima obtusiuscula*; omnes partes *amoene virides*, cellulis saepe pellucidis, *tenerae* minute hexagono-areolatae, *cellulis ubique prominulis serrulatae*; nervus *crassus flavus subexcurrent*; theca *cylindrico-ovalis subinclinata minutissima* tenera, dentibus brevibus setaque curviusculo - adscendente; operculo —?

Patria. Columbia, prope Caripe inter *Mnium rostratum*: Moritz. ☉?

47. **F. campylopus** Mont. (ann. d. sc. nat. 1845. 4. p. 116.); *monoicus*; caulis *decumbente-simplex*, foliis c. 15-jugis *dense imbricatis linearibus*; lamina apicalis *lanceolata incurva*; omnes (?) partes *subcrenato-denticulatae*; theca *resupinata ovalis inaequalis cernua*, seta *basi geniculata apice curva operculoque convexo recte rostrato*. †.

Patria. Chile australis in terra: C. Gay. ☉?

Flores masculi axillares.

48. **F. Bloxami** Wils. (Lond. journ. of bot. IV. 1845. p. 195. tab. 9. A.); *monoicus*; perpusillus tenerrimus *subcespitoso-gregarius simplicissimus declinatus*, foliis *remotis squarrosis patentibus*; folii lamina ad medium usque producta; l. dorsalis *longe supra basin enata c. apicali lato-ovalis acuta*, nervo valido viridique sub apicem dissoluto; omnes l. praecipue folii l. vera *valde denticulatae*; pedunculus *e basi geniculata adscendens subflexuosus*;

theca annulata erecta oblongo-elliptica basi attenuata minima, operculo e basi conica oblique-subulato rostrato thecam subaequante; calyptra subulato-conica. †.

Patria. Anglia: Orton Wood, prope Twycross (Leicestershire) solo argilloso societate *F. taxifolii*. April. 1844. A. Bloxam invenit. — *Januar.* ☉.

Lamina dorsalis quasi undulata; omnes partes amoene virides laxè hexagono-, subinde pentagono-areolatae. Flos masculus ad basin caulis gemmiformis tetraphyllus. Theca ore vix contracta, sicca sub ore constricta olivacea. Operculum e cellularum seriebus erectis 32 conflatum, dentibus translucentibus rubrum, margine annulo majusculo albido mox revolubili fimbriatum. Peristomii dentes rubri normales cruribus inaequalibus dense articulatis superne papilloso-scabris. Calyptra conico-subulata, uno latere fissa, operculi longitudinem aequans fuscidula. Sporae minutae olivaceae.

F. Hornschuchii Mont. affinis, sed notis laudatis distinctus. Annulo ab omnibus congeneribus differt.

49. **F. prionodes** Mont. (ann. des sc. nat. II. ser. Tom. III. p. 200. tab. 3. fig. 1.); caulis simplicissimus ascendens, foliis sub 12-jugis erecto-patentibus lineari-bus; *supremis falcato-secundis*; lamina apicalis lanceolata, nervo crasso excurrente mucronata; omnes l. tenuissime serrulatae; theca oblonga operculo conico-subulato. †.

Patria. Guiana Gallica: Leprieur. ☉?

c. *Folia homomalla haud crispa.*

50. **F. fasciculatus** Hsch. (Linn. 1841. p. 155.); dioicus; caulis procumbens *prolifero-innovans fasciculato-ramosissimus* elongatus polyphyllus *rigidus glaucus siccitate varie flexuosus*, humificatus substrictus; folia longissima subulata densissime imbricata rigida; folii lamina vera $\frac{1}{3}$ producta; l. dorsalis basi angustissima; l. apicalis lineari-acuminata nervo crasso apice evanido; omnes partes integerrimae minutissimae et densissime areolatae; theca ovalis *parva oblongo-cylindrica curvata ore majore,*

operculo e basi conica rostrato theca parum breviori, pedunculo rigido purpureo.

Patria. Prom. bon. spei: Dutoitskloof prope Schönfeld altitud. 1800 ped. mense Martii 1828 Drège legit. In locis non designatis leg. Zeyher. 24.

Flos masculus terminalis globulosus in acumen attenuatus. Folia perigonialia basi ventricoso-vaginata in acumen longum lineari-lanceolatum planum folio caulino simile producta, viridia, nervo hyalino in basi ventricosa laxo, in acumine conferto, infra apicem evanido; retis arcolae in basi ventricosa lineares laxissimae, in acumine ut in foliis caulinis. Antheridia 30 maxima oblongo-cylindrica eparaphysata. Folia perichaetialia longissima caulinis similia. Dentes peristomii lato-lanceolati usque ad medium fissi, cruribus inaequalibus saepe perforatis.

51. *F. plumosus* Hsch. (Linn. 1841. p. 151.); *dioicus*; *decumbens subsimplicissimus* glaucescens rigidissimus arctissime eleganter flabellatus, apicem versus crescens foliis *strictissimis planissimis longissimis angustissimis siccitate homomallis* 15—18-jugis; folii lamina ultra medium producta inaequalis, ala unica in medio laminae connata acutissima integra; l. dorsalis *supra basin anguste enata* integra; l. apicalis *obtuse-lanceolata summo apice serrulata*, nervo crasso ante apicem evanido flexuoso striato; omnes l. minute arcolatae firmae glaucae; pedunculus *basi valde geniculatus adscendens brevis*; theca *inclinata obovalis subcernua* pallida substrumosa, operculo conico-rostrato longo obliquo purpureo; calyptra longa cucullata operculum totum tegens.

Patria. Prom. bon. spei: Mundt et Maire. 24.

Foliorum perichaetii internorum lamina latissima undulata complicata; l. dorsalis supra eam enata c. apicali quam maxime angusta.

Descriptio nostra ab *Hornschuchiana* paulum diversa, non dubitamus tamen, quin nobis species vera sit. — *Fiss. flabellato* Hsch. affinis, sed caule subsimplicissimo (basi interdum innovante), foliis oblique-acuminatis lon-

gioribus subexcurrentinervibus, pedunculo longiore geniculato - adscendente, theca substrumosa (i. e. collo incrassato praedita) et operculo e basi conica longiore distinguitur.

52. F. serrulatus Brid. (II. p. 704.); *dioicus; frondiformis subsimplicissimus crassus elatus*, foliis sub 20-jugis *latissimis laxe imbricatis* strictis homomallis superioribus longioribus; folii lamina ultra medium producta, e basi oblonga latior, apice inaequalis: ala unica in medio laminae connata obtusiuscula, cellulis prominulis *serrulata*; l. dorsalis ad basin folii enata, c. l. apicali lato-lanceolata obtusiuscula, cellulis prominulis *serrulata*, *apice serrata*, nervo crassissimo flexuoso ante apicem evanido; omnes l. grandius areolatae firmac; pedunculus flexuosus; theca ovali - oblonga *subrentriosa obliqua vel subinclinata*, operculo e basi *convexa longirostro*.

Montagne in Hist. nat. d. Il. Canaries par Barker, Webb et Berthelot p. 22. tab. 2. c. icone. Fructus inde noti et optime illustrati.

Patria. In Teneriffae insula Bory St. Vincent primus legit.

F. polypodioidi Hedw. proximus, sed fructu terminali notisque ceteris illustratis diversissimus. Sequenti haud dissimilis sed partibus omnibus multo robustior.

53. F. asplenioides Hedw. (Musc. Fr. III. p. 65. tab. 28.); *dioicus; frondiformis subsimplicissimus angustus subelatus*, foliis sub 20-jugis *angustis arcte imbricatis* strictis homomallis (falcatis haud crispis), superioribus longioribus; folii lamina ad medium producta inaequalis: ala unica in medio laminae connata rotundato-obtusa; l. dorsalis supra basin folii enata c. l. apicali angusto - lanceolata, nervo evanescente crasso; *omnes l. subintegerrimae minute areolatae* firmac; pedunculus brevis rectus; theca obovata recta aequalis operculo conico *acuminato recto*; calyptra cuculliformis.

Brid. II. p. 697. — *Skitophyllum asplenioides* La Pyl. l. c. p. 47. tab. 36. fig. 8 et 9. — *Dicranum asplenioides* Sw. Fl. Ind. Occ. III. p. 1770. — *Hypnum asplenioides* cj. Prodr. p. 140.

Patria. Ad latera muscosa rupium in montibus altis Jamaicae australis: Swartz.

Species steriles notae.

54. **F. filicinus** Dz. et Molkb. (in ann. d. sc. nat. 1844. 2. p. 304.); *dioicus*; erectus flexuosus subsimplex foliis 20 — 25-jugis, erecto - patentibus lato-lanceolatis; folii lamina ad medium producta, *marginē incrassato subserrulato* apice subaequalis; l. dorsalis ad folii basin enata basi lata undulata, *marginē incrassato subserrulato*; l. apicalis acuminata *marginē incrassato serrato*, nervo crassissimo ante apicem evanido.

Patria. Java. 4.

Folia perichaetialia brevia elamellata, *marginē incrassato* integra, intima membranacea acuminata. Archegonia pauca eparaphysata. Flores feminei in planta creberrimi. — *Fissid. polypodioidi* ex habitu similis, sed notis demonstratis ab omnibus congeneribus hucusque cognitis distinctissimus.

55. **F. genunervis** C. Müll. (mst.); subcespitosus subsimplex gracilis elatiusculus, foliis siccitate valde crispulis densiusculo imbricatis; folii lamina ad $\frac{1}{2}$ producta, e basi oblonga, medio latior, apice attenuata integerrima *aequalis*, *ala unica rotundato-obtusa ad flexuram nervi cum eo connata*; l. dorsalis ad basin nervi enata, apicem versus crescens integerrima; l. apicalis *lanceolato-obtusa*, *apice crenulato-denticulata*; nervus crassus semel genuflexus, ante apicem evanidus diaphanus; omnes laminae e cellulis minutis, granulis obscure viridibus impletis, areolatae.

Patria. Columbia in granitaceis: Moritz sub collect. Thoreyanae No. 54. 4.

F. osmundioidi ex habitu simillimus, sed foliis apice laminae apicalis obtuso crenulato-dentato distinctissimus.

56. **F. ovatus** Brid. (II. p. 696.); tenellus simplicissimus frondiformis *ambitu eleganter longe oratus*, siccitate introrsum convolutus, humiditate applanatus; folia

20—30—juga dense disticha patula, linearia lanceolata, media longiora, a basi ad medium usque parallela, inde ad apicem versus paulum divergentia, nervo tenui albo viridi continuo exarata. †.

Patria. In rupibus et speluncis madidis insularum Franciae et Bourbonis: Bory St. Vincent. 24.

Plerumque folia media quae ceteris longiora sunt, humiditate corrupta, solo nervo superstite, multo breviora apparent, hinc incautius observanti caulis non ovatus sed linearis videtur. — Forma caulis ovata huic soli inter congenere propria, teneritate ac elegantia a *F. asplenioides*, qui omnino linearis est, distinctus. Folia etiam forma ac directione aliquantulum recedunt. Hinc fructu ignoto et patria diversissima conjungere noluimus. An mera *F. asplenioidis* varietas sit, fructus inspectio nos quondam edocebit. Brid. l. c. p. 697.

57. **F. linearis** Brid. (II. p. 691.); simplicissimus planissimus erectus *sublinearis*; folia sub 10—juga approximata subaequalia oblonga *sublinearia minima*.

Patria. Nova Hollandia: Hb. Desfont. ☉.

Habitus *Fissid. osmundioidis*, statura exilis. Folia sicca nec corrugantur nec crispescunt.

Species incertae sedis.

F. acacioides Brid. (II. p. 705.); simplex vel ramosus erectus infra et supra decrescens, foliis ultra 40—jugis ovalibus acutis, seta terminali brevissima, theca erecta urceolata sub ore constricta.

Skitophyllum acacioides La Pyl. l. c. p. 45. tab. 35. fig. 7. — *Hypnum acacioides*, fronde pinnata ramosa apice pedunculifera Linn. Sp. Pl. p. 1588.

„*Hypnum pinnulis Acaciae*, setis brevissimis. — Surculis tenues, alii simplices, alii ramosi, pinnulis opacis crebris *Acaciae* similibus, paulo brevioribus, alati, colore ex obscure viridi nigricante. Inter extremas pinnulas setae omnium (praeter quasdam species, quas ex America nuper nactus in Appendicem hujus libri con-

tuli *), quae vidi, Hypnorum, brevissimae fuscae egrediuntur, in quibus capsulae exiguae subrotundae fuscae, urnae per microscopium urceolatae, ora laevi, exiguo annulo cincta, ciliis inconspicuis, forte quoniam introversae sunt. Ob exiguitatem perichaetium non comparet. Opercula abierant et calyptrae.

Inter Muscos e Patagonia delatos inveni. Videbatur arboribus adnasci, cum quibusdam exemplaribus ad basin subduri quid, velut e cortice avulsum, adhaereret." Dill. p. 265 et 266. tab. 34. fig. 4.

„E sola analogia et caulis frondiformis indole hucce retulimus, cum genus non satis luculentum sit; nam, utrum folia fissura feminea genitalia fovente gaudeant dentesque peristomii bifidi sint, jure ambigitur.

In Herbario Dilleniano muscus iste nunc desideratur, in cujus locum, testa oculatissimo Turnero autopta, *Fissid. osmundioides*, nescio quo casu, subiit, a quo toto coelo diversum esse monuimus, idem sentiente Pylaesio nostro." Brid. II. p. 796.

Omnes auctores speciem hucusque *Fissidentem* habuere. Dillenianis autem iconibus accuratissime examinatis et ejus descriptione comparatis nobis persuasum est, muscum dubium non ad *Fissidentes* referri posse. Folia a Dillenio (in figura citata a. et b.) enervia delineata inveniuntur, dum folia *Fissidentium* verorum constanter nervosa depinxit. Hanc notam, monemus, contra affinitatem *Fissidentis* generis testimonium nobis perhibere. Ad quod genus autem muscus iste adducendus sit, nobis incertum est. *Drepanophyllo* maxime similis appellandus est. Specimen fore, ut in Patagonia ex novo mox reperiatur.

Species delenda.

F. Thunbergii Brid. (II. p. 699.); caule subramoso erecto lineari, apice pedunculifero, thecis incurvis.

*) Auctor. e. gr. Cryphaeam nervosam, Lasiam Trichomitriam etc. delineavit. C. M.

Hypnum asplenoides Thunb. Prodr. Fl. Cap. II. p. 175.

Ad Cap. b. spei: Thunberg.

Ex adnotationibus Hornschuchii (Linnaea 1841. p. 157.) in hancce speciem elucet, eam in hb. *Thunbergiano* non inveniri. Clarissimus ille bryologus ideo putat, speciem *Thunbergianam* *F. asplenoidem* verum, in prom. b. spei inventum, forsán fuisse.

Species nobis nomine tantum notae.

1. *F. lanceolatus* Bruch, in prom. b. spei ad latera montis diaboli, in solo granitaceo a Cl. Krauss lectus. Regensb. bot. Zeit. 1846. p. 134.

2. *F. leptophyllus* Mont. In ann. d. sc. nat. 1845. 4. p. 113. memoratus.

II. Polystichophylla.

Folia in series tres et plures, pro primo adpectu plerumque spiraliter disposita.

A. Folia (in sectione transversali) ductibus intercellularibus instructa.

Trib. IX. LEUCOBRYACEAE.

Late cespitosae elatiusculae acrocarpicae, cladocarpicae vel pleurocarpicae. Folia albescentia fragilissima, e cellulis dimorphis constructa: 1. cellulis *parenchymaticis columnaribus crassis inanibus, in strata plura connexis*, perforatis; 2. ductibus intercellularibus, inter illas cellulas *in serie unica curvata* interpositis, 3—4-angularibus, granulis chlorophyllaceis impletis. Ductus 1—2, in medio folii siti, e serie curvata educti. Pedunculus rigidus valde hygrometricus purpureus. Theca olivacea, brunnea vel tandem purpurea. Peristomium itidem coloratum fir-

mum. Archegonia longissima fusca angustissima vix paraphysata. Antheridia magna clavata tandem brunea paraphysibus brevibus mixta.

Habitus proprius e foliis albescenti-glaucis et, si in angulo acuto vides, *iricoloribus*, *Sphagnaceis* proximus distinctissimus speciosissimus.

Patria. In terra plerumque ericetorum et in arboribus per totum orbem terrarum praecipue in insulis Archipelagi Indici, cespites maximas saepe densissimas formantes.

Leucophaneae Hmp. in Linnaea XIII. p. 42. Nomen in Leucobryaceas a nobis (Linnaea XVII. p. 315.) mutatum est, quum Leucobryi generis congenere plures et per zonas omnes terrarum inveniantur. *Leucophanis* genus autem intra fines angustissimos dispositum et in Europa nulla specie gaudens.

Tribus certe distincta et nulla alia confundi potest.

Gen. I. **Leucóbryum** Hmp.

Linn. XIII. p. 42. — C. Müll. Linn. XVII. p. 314 — 322. et in Linn. XVIII. p. 687 — 90. — *Dicrana glauca* auct. — *Oncophorus* Bryol. Europ. Fasc. XLI.

Nomen graecae compositionis a verbis *λευκός albus*, et *βρύον muscus* ob folia albescentia impositum.

Calyptra *dimidiata* cuculliformis thecam superans straminea. Theca *inaequalis* saepe *strumosa*, siccitate plicata, innovatione saepe lateralis, terminalis vel distincte lateralis. Peristomii dentes **16** *dicranoideo bifidi dense trabeculati purpurei*. Ductus intercellulares quadrangulares; unicus in medio folii situs plerumque triangularis. Folia enervia. Inflorescentia monoica v. dioica.

Congenere terram habitantes.

1. L. vulgare Hmp. (Linnaea XIII. p. 42.); *dioicum*; *densissime compactum*; *caulis elongatus brevi-ramosus*, *densissime foliosus*; *folia longiuscula lata erecto-patentia*

glauca oblongo-lanceolata stricta, apice obtuso-cuspidata integerrima, ultra medium latiusculo-marginata; perichaetialia *convoluta longius cuspidata ultra medium marginata*; theca *innervatione lateralis*, mediocriter pedunculata, ovali-cernua vix strumosa, operculo longe subulato oblique rostrato.

C. Müll. Linn. XVIII. p. 687. — *Dicranum glaucum* Hedw. Sp. Musc. p. 135. — Schwägr. Suppl. I. P. I. p. 187. tab. 48. (exclusis locis natalibus Jamaica et Teneriffa?). — *Fuscina glauca* Schrank Baiers. Flora II. p. 457. — *Bryum glaucum* Linn. Sp. Pl. p. 1582. — *Bryum albidum et glaucum*, fragile majus, foliis erectis, setis brevioribus. Dill. Musc. p. 362. tab. 46. fig. 20. — *Hypnum glaucum* Weis Crypt. Goett. p. 208. — *Oncophorus glaucus* Br. Europ. I. c. p. 5. t. 1.

β. minus, gracilius foliis brevioribus densissimis. *Leucobr. minus* Hmp. Linn. XVIII. p. 42. — *Dicranum albidum* Web. et Mohr e Brid. br. univ. I. p. 409. — *Bryum albidum et glaucum*, fragile, minus, foliis erectis, setis oblongis. Dill. Musc. p. 546. tab. 83. fig. 8.

Patria. Per totam Europam in terra ericetorum et in pinetis raro fructiferum. In America sept. ad arborum radices in humidiusculis a Marylandia usque ad Georgiam: *Sullivant.* Var. *β.* in Pennsylvania, Virginia, Massachusetts, Georgia, Alabama, et Ludoviciana Americae septentrionalis.

Colore intense glauco jam a sequentibus differt. — Folia perichaetialia plerumque non exserta, in aliis specimenibus; si fructus exacte terminalis observatur, distincte exserta convolutacea inveniuntur.

2. L. sediforme C. Müll. (mst.); *dioicum*; *humile* parce ramosum; folia *brevissima latissima densissime imbricata sediformi-squarrosa exacte octosticha* oblongo-lanceolata acuta, apice valde concava reflexiuscula, integerrima ultra medium latiusculo-marginata stricta; perichaetialia *multo longiora acutiora angustiora valde exserta convoluta*; theca (pro plantulae exiguitate) longipedunculata ovalis cernua inclinata brevis vix strumosa *exacte terminalis*.

Dicranum glaucum β. albidum Brid. Hb. Reg. Berol.

Patria. Insula St. Dominici.

Praecedenti proximum, sed foliis lurido albis non glaucis exacte octostichis Sedi acris instar dispositis squarrosis brevissimis et pro brevitae latissimis fructuque exacte terminali distinctissimum. Operculum et calyptra deerant.

3. L. brachyphyllum Hmp. (l. c.); laxiusculo cespitosum; caulis breviusculus ramosus; folia breviter stricta oblongo-lanceolata vix falcata apice (cellulis dorso valde prominulis) valde serrata basi vix marginata; perichaetia subbreviora caulinis similia stricta vel subundulata maxime serrata, intima laevissima longiora cuspidata e basi usque fere ad apicem lato-marginata longiora subexserta integerrima; theca lateralis longipedunculata obconica cernua exacte strumosa ore dilatata operculo longirostrato obliquo purpureo instructa brevis olivacea.

C. Müll. Linn. XVIII. p. 688. — *Dicranum candidum* Brid. I. p. 409. — Schwägr. (suppl. II. 2. p. 119. tab. 187 a.) An β . huc certe pertineat? — *Dicr. brachyphyllum* Hsch. in Musc. Sieberianis e Nova Hollandia relatis. — *Bryum candidum fragile foliis recurvis* Dill. Musc. p. 364. tab. 46. fig. 22. sed gracilius elatius densius imbricatum.

Patria. Nova Hollandia: Dampier primus collegit et Dillenio communicavit; R. Brown et Sieber tandem retulerunt.

Var. β . e *Schwägricheni* observationibus monoicum, sed forsitan species propria? — Folia inferiora apice radiculosa.

4. L. Martianum Hmp. (l. c.); laxiusculo cespitosum; caulis breviusculus ramosus; folia laxiusculo imbricata breviter perfecte falcata stricta (i. e. non flexuosa) oblongo-lanceolata secunda acuminata integerrima basi vix marginata; perichaetia vix breviora e basi latissima ovali angustiore linearia acuta a basi usque ad medium lato-marginata integerrima immersa; theca longipedunculata ovalis cernua perfecte strumosa, purpurea, operculo longirostrato subulato.

C. Müll. Linn. XVIII. p. 689. — *Dicranum Martianum* Hsch. Fl. Bras. p. 11.

Patria. Brasilia in prov. Minarum Gener. ad Ouro preto, prope Sebastianopolin in montosis et ad ripas fluminis Amazonum in cortice arborum: Martius. Surinam: Miquel hb. Guiana anglica: Rich. Schomburgk pulcherrime fructiferum legit.

A sequentibus foliis perfecte falcatis distinctissimum. Dioicum.

5. **L. longifolium** Hmp. (l. c.); laxiusculo cespitosum; caulis breviusculus brevi-ramosus; folia *longissima acute-cuspidata linearì lanceolata* apice (cellulis prominentibus) *scabra, basi tenui-marginata subflexuosa*; perichaetialia *subbreviora apice linearia acuta e basi usque ad medium lato-marginata integerrima immersa*; theca innovatione lateralis longipedunculata ovalis cernua *perfecte strumosa* magna operculo longo subulato.

C. Müll. Linn. XVIII. p. 687. — *Dicranum albicans* Schwägr. Suppl. II. 2. p. 122. tab. 186. — *Dicr. megalophyllum* Raddi Critt. Bras. p. 3. — ? *Sphagnum macrophyllum* Brid. I. p. 753. non p. 10. quod *Sphagnum* verum distinctissimum! — *Sphagn. iridans* Brid. Sp. Musc. p. 20. Mant. Musc. p. 67. Bryol. univ. p. 19.

Patria. Brasilia ubi in locis permultis ad radices arborum inventum est. Prope Tijuca in vicinia Sebastianopoleos et in sylvis primaevis ad flumen Paquaquer, in Serra dos Orgaões, *Januarii mense* fructiferum legit primus omnium: Beyrich. In prov. Geraës: Martius.

Forsan dioicum. Archegonia multa. Dentes peristomii longissimi latissimi ad medium fissi valde trabeculati nodosi. — Foliis longissimis laxissimis ab affnibus praecedente et sequente distinctissimum.

6. **L. sanctum** Hmp. (l. c.); laxiusculo cespitosum; caulis breviusculus ramosus; folia *breviora oblongo-lanceolata linearia basi tenuissime marginata valde flexuosa* apice (cellulis prominulis) *scabra valde radiculosa*; perichaetialia *multo breviora e basi latissima orali subito linearia longe cuspidata*; in medio folii tantum *lato-marginata integerrima, immersa*; theca longipedunculata in-

novatione lateralis ovalis cernua *brevis parva perfecte strumosa*, operculo rostrato subobliquo.

C. Müll. Linn. XVIII. p. 688. — *Dicranum sanctum* Nees in Schwägr. Suppl. II. 2. p. 121. tab. 186.

Patria. Ad sepulcra sancta Javae insulae. E Singapore relatum Cl. Kunze benevole communicavit.

A praecedente foliis brevioribus magis flexuosis valde radiculosis, et perichaetialibus, theca minori et habitu multo humiliori diversum.

7. L. Cladopodanthus C. Müll.; *dioicum*; *caulis prostratus elongatus ruge et subpinnatim ramosus*; rami breves conferti adscendentes turgidi; folia densissime imbricata erecta oblonga *acuminato-cuspidata*, *flexuoso-pilifera* integerrima concava; theca lateralis breve pedunculata *cylindrica angusta aequalis*; dentes congenerum. †.

Cladopodanthus pilifer Dz. et Molkb. Musc. Archipel. Ind. p. 80. tab. 28.

Patria. Java ad arborum corticem in monte Gédé: Zippelius.

Calyptra, operculum et flores masculi desunt. Sectiones transversae ab auctoribus neglectae. E ramificatione *Leucobryis* dissimile quidem, sed notis caeteris ab iisdem non recedens.

Species steriles notae.

8. L. juniperoideum C. Müll. (Linn. XVIII. p. 689.); dense cespitosum erectum ramis aequalibus erectis; folia *glauca dense imbricata erecto-patentia ovali-lanceolata juniperoidea acuta integerrima e basi usque ad medium latiusculo marginata canaliculata*.

Dicranum juniperoideum Brid. I. p. 409.

Patria. Insula Teneriffa et Bourbonis.

E speciminibus Bridelianis a *L. glauco* proximo habitu juniperoideo foliis angustioribus subulatis diversum.

9. L. crispum C. Müll. (mst.); laxiusculo cespitosum *humile*; folia *laxe imbricata* (pro plantulae exigui-

tate) *longissima valde flexuosa et ideo crispa e basi oblonga linearia longe cuspidata immarginata integerrima.*

Leucobryum Martianum Hmp. Linn. 1847. XX. p. 67.

Patria. Columbia: Cocollar ubi legit Moritz. Ex Hb. Reg. Berol. communicatum. Moritz collect. No. 131.

Notis illustratis habitu proprio c. *L. longifolio* et *santo* comparandum sed certe distinctum foliis angustissimis longe cuspidatis integerrimis immarginatis.

10. **L. falcatum** C. Müll. (mst.); laxiusculo cespitosum *valde elatum robustum; folia dense imbricata sed valde patula recurvo-flexuosa mollissima valde robusta falcato-secunda latissima valde iricoloria longissime oblonga flavo-mucronata, basi cellulis longissimis angustissimis tenero-marginata, apicem versus dorso cellulis prominentibus serrata.*

Sphagnum Javense Schwägr. Suppl. II. 1. p. 4. tab. 102. — Brid. I. p. 19.

Patria. In sylvis alpinis Javae insulae ad montem coeruleum et Sasere anno 1768 mense Octobri Commersonus detexit. E prov. Buitenzorg ejusdem insulae Cl. Miquel benevole communicavit.

Species speciosissima ac distinctissima sed hucusque saepissime commutata, cum sequente proxima congenerum gigantes. Ex habitu c. gr. *Dicran. majus* optime foliis falcatis referens, sed foliorum structura e familia distinctissimum.

11. **L. giganteum** C. Müll. (mst.); laxe cespitosum *maxime elatum et robustum, folia basi densissime imbricata vaginantia apice valde patula maxima latissima oblongo-lanceolata canaliculata apice obtusiuscula integerrima, a basi usque ad medium tenero-marginata, margo e cellulis angustissimis longissimis parietibus interruptis constructus; perichaetialia brevissima caulinis dissimilima.*

Leucobr. longifolium Hmp. in Linn. 1847. XX. p. 68. non *Dicranum albicans* Schwägr. quocum e Cl. Hampe ratione synonymum esse dicitur. Ab hacce specie ultima toto coelo differt et quidem adeo, ut genus proprium in futuro formet.

Patria. Columbia: in montibus nivosis provinciae Meridae, ubi Cl. Moritz cum aliis muscis quam maxime memorabilibus collegit et Hb. Reg. Berol. sub No. 134. a. communicavit.

Folia caulina subglauescentia undique disposita non falcata s. secunda ut praecedentis. Caulis elongatus ramis basi itidem elongatis simplicibus instructus. Rami juniores graciliores attenuati foliis brevioribus magis albidis s. candidis angustioribus linearibus. — Perichaetia in longitudine caulis numerosa distincte lateralialia et pro plantae speciosae altitudine brevissima triquetra bulboso-gemma-scentia. Folia perichaetialia e basi latissima vaginali alata ultra medium subito lanceolata flavo-acuta brevissima, basi latissime et tenerrime membranacea et marginata, ultra medium valde subtruncato-crenata vel usque ad apicem integra v. integerrima; margo alaris e cellulis excavatis irregularibus parenchymaticis constructus. — Archegonia eparaphysata longissima fusco-brunnea s. ferruginea.

Species modo descripta inter *Leucobrya* locum excellentissimum tenet. E floris situ distincte laterali putamus, muscum in futuro forsitan genus proprium constructurum esse.

Gen. II. **Schistomitrium** Dz. et M.

In Musc. Archip. Ind. p. 67. — *Syrrhopodon* cor. olim.

Nomen graecae compositionis a verbis *σχίστος fissus*, et *μίτρον* ob calyptram basi fimbriatam deductum.

Calyptra campanulata cylindrica basi fimbriata. Theca aequalis. Peristomii dentes 16 simplices trabeculati integri. Ductus intercellulares ut antea. Folia e stratis cellularum duobus composita enervia. Inflorescentia dioica terminalis. Vita arborea.

Genus e calyptrae forma *Encalyptas* Pottiacearum referens speciosum *Leucobryaceus* congeneribus revera locupletans.

1. **Sch. apiculatum** Dz. et Molkb. (l. c. p. 68. tab. 24 et 25.); laxe cespitosum humile ramosiusculum; folia dense imbricata subsecunda brevia oblongo - lanceolata longe et fusco - mucronata vix marginata integerrima, apice involuta; perichaetialia angustiora basi ad medium latiusculo - marginata; theca brevipedunculata cylindrica parva angusta erecta aequalis et (ex obs. Dz. et M.) spiraliter striata, operculo conico subulato recto; calyptra firma nitens straminea apice fusca.

Syrrhopodon apiculatus Dz. et Molkb. in ann. d. sc. nat. 1844. II. p. 315.

Patria. Java in agro Bogoriensi ad trunc. Arengae sacchariferae mense Febr. fructif. legit Zippelius. In monte Pangerang et Tjikoerai: Kühl et van Hasselt. In monte Papandajang: Korthals. — Sumatra in sylva montis summi Merapie ad cortic. Thiebaudiae lucidae: Korthals.

Archegonia eparaphysata pauca fusca. Calyptrae fimbriae breves flexuosae. Theca e nostris observationibus stricte striata. Folia costata esse auctores l. c. descripserunt; nos vero etiam in sectione transversali enervia invenimus. — Theca innovatione lateralis v. terminalis.

Gen. III. **Leucóphanes** Brid.

Br. univ. I. p. 763. — *Syrrhopodon* Nees et Schwägr. — *Mielichhoferia* et *Spirula* Dz. et Molkb. — *Didymodon* W. Arn.

Nomen graecae compositionis a λευκός *albus*, et γαίω *ob colorem albicantem impositum*.

Calyptra *dimidiata* cucullata. Theca aequalis. Peristomii dentes 16 aequidistantes *breves lineares lanceolati vix trabeculati*. Inflorescentia dioica vel monoica? Folia e stratis cellularum duobus composita. Ductus intercellulares ut antea.

Congeneres tam terram quam arborum corticem incolentes.

a. *Folia nervosa.*

1. **L. octoblepharoides** Brid. (I. p. 763.); *dioicum*; caulis erectus ramosus *laxissime foliosus gracilis*; folia caulina *vaginali - conferta lanceolata angusta carinato-concava* e basi usque ad apicem tenue marginata apicem versus denticulata nervo excurrente acuta; perichaetialia caulinis similia; theca brevissime pedunculata ovalis *angusta* erecta, operculo *conico subulato recto*.

Syrrhopodon octoblepharis Nees in Schwägr. Suppl. IV. tab. 311. a.

L. Korthalsii Dz. et Molkb. (in Musc. Archipel. ind. p. 65. tab. 23.); *dioicum*; caulis humilis erectus compressiusculus simpliciusculus; folia subbifaria e basi subvaginante squarrosula glauca linearia acutiuscula apice denticulata marginata, nervo ante apicem evanido, carinato-concava; theca brevipedunculata oblonga erecta subapophysata, operculo *oblique-rostrato*. †.

Patria. Java in monte Gédé: Zippelius. Borneo prope pagum Martapaera: Korthals. Amboina: Zippelius.

Flos masculus terminalis. Calyptra laevis apice cellulis protuberantibus rugulosa. Dentes peristomii linea longitudinali media destituti obscure trabeculati, granulosi.

Species huc inclusa notis fere omnibus ad praecedentem accedens adeo, ut ab eodem distinguere nequeamus.

Patria. Javae insula, ubi haud rarum sed sterile colligitur, et in regione Nepal Indiae.

Folia apice interdum radiculos efficientia e cellulis parvis composita candida.

2. **L. Reinwardtianum** C. Müll. (mst.); *dioicum*; laxiusculo-cespitosum erectum fastigiato-ramosum *densissime foliosum*; folia erecto-patentia *subrecurrata* ovali-lanceolata carinata *obtusiuscula* nervo *excedente tenui brevi-cuspidata*, e basi usque ad apicem tenue-marginata apicem versus serrata mollia; perichaetialia caulinis similia; theca mediocriter pedunculata terminalis vel innovatione lateralis oblonga, ferruginea ore purpurea, operculo convexo-rostrato obliquo thecam aequante. †.

Syrrhopodon candidus Hsch. in Nov. Act. Acad. Leopold. XIV. 2. Suppl. p. 701. tab. 39. fig. b. — Schwägr. Suppl. II. 2. p. 105. tab. 183.

Patria. In Archipelagi Indici insula Saparuria (e Schwägr. l. c. Japoma) legit Cl. Reinwardt.

Archegonia 6 — 10 solito crassiora. Peristomii dentes thecae diametro paullo longiores erecti lineari-lanceolati transversim striati et linea media e basi ascendente, superius oblitterata. Calyptra cucullata laevis straminea basi integra apice subulata nigra.

A praecedente tam ex habitu multo robustiori et foliis densissime imbricatis quam notis ceteris illustratis valde diversum.

3. **L. cuspidatum** C. Müll. (mst.); *dioicum*; late et compacte cespitosum humile densissime foliosum subramosum, rami breves; folia caulina e basi ovali oblonga lanceolata flexuosa carinata, a basi usque ad apicem tenero-marginata apicem versus denticulata, nervo viridi excedente apice *hyalino serrato pilifero-cuspidata*; perichaealia multo minora ovali-lanceolata integerrima nervo vix conspicuo; theca innovatione saepe lateralis cylindrico-ovalis fusca, operculo e convexo rostrato recto theca breviori concolori.

Syrrhopodon glaucus Schwägr. Suppl. II. 2. p. 103. tab. 181. — *Didymodon sphagnifolius*? W. Arnott. — *Arthrocormus Hookeri* Hmp. in bot. Zeit. 1847. p. 922.

Patria. Insula Rauwack Moluccarum et cum Octoblephoro albido in insulis Marianis: Gaudichaud.

Sterilem vidimus. — Peristomii dentes lineari-lanceolati e simplici cellularum serie compositi rigidi, thecae diametro dimidio breviores, ferruginei. Calyptra junior subulato-campanulata latere late fissa, theca paullum longior pellucida laevis straminea. — Paraphyses nullae.

A praecedente specie foliis pilifero-cuspidatis rigidis jam distinctissimum.

4. **L. fragile** Brid. (Bryol. univ. I. p. 765.); caulis erectus ramosus *fragilissimus*, ramulis *subteretibus* superne *incrassatis apice acutis*; folia *densissime imbricata erecta subappressa stricta* (nec madore mutata) *lineari-lanceolata* carinato-concava, nervo crasso subcontinuo

acuminata integerrima glauco-albida, cellulis magnis laxissime reticulata; perichaetia caulinis similia; theca oblonga terminalis v. innovatione axillaris longiusculo-pedunculata. †.

Patria. In insula Australiae Ualan ad terram cespitosum: Dumont d'Urville.

Calyptra elongato-subulata angustissima integra bicolor, inferne albicans, apicem versus brunnea et *scabriuscula*. — An revera nervosum?

b. *Folia enervia.*

5. *L. speciosum* C. Müll.; *monoicum*? dense cespitosum; caulis erectus *crasso-julaceus teres* dichotome ramosus; rami fastigiati apice subfasciculatim innovantes; folia densissime imbricata erecta *alveata toto apice margine cochleariformi-concava involuta*, margo involutus *hippocrepico-excavatus*, *obtusissima apice subito longissime acuminata flexuoso-pilifera recurva*, integerrima immarginata glauca basi brunnea; perichaetia longiora exserta lanceolata pilifera apice subplana; theca *distincte lateralis* cylindrica angusta longiuscula, operculo conico-subulato subobliquo, calyptra conico-subulata basi incisula.

Schistomitrium speciosum Hmp. bot. Zeit. 1847. p. 922. Genus e calyptra non verum habemus. — *Syrrhopodon speciosus* Dz. et Molkb. in ann. d. sc. nat. 1844. 2. p. 315. — *Spirula speciosa* eor. in Musc. Frond. Archip. Ind. p. 72. tab. 26.

Patria. Java insula in monte Gédé: Zippelius.

Species quam maxime memorabilis. Folia e cellulis majoribus crassioribus quam in praecedentibus formata. Folia innovationum juniorum subsecunda. Peristomii dentes 16 lanceolati breves conniventes. Inflorescentia forsitan monoica. Gemmulam minimam e foliis duobus lato-ovalibus brevi acuminatis minimis brunneis compositam sed antheridiis carentem invenimus, quam florem masculum antheridiis abortivis esse putamus. — Nulla alia specie confundendum.

Species sterilis nota dubia.

1. **L. Gardnerianum** C. Müll. (Bot. Zeit. 1844 p. 741. et 1845. p. 103.); dense cespitosum pusillum gracile simpliciusculum; folia e basi latiori oblonga cava anguste lanceolata mucronata integerrima stricta canaliculata glauca enervia basi submarginata subrigida.

Patria. Brasilia: Gardner collect. No. 94. c. *Leskea cespitosa* mixtum.

Gen. IV. **Arthrocórmus** Dz. et M.

Musc. Archipel. Ind. p. 75. — *Mielichhoferia* eor. olim. — *Leucophanes* Brid.

Nomen a verbis graecis ἄρθρον *articulus*, et ζογμός *caulis*, ob caulem prolifero-ramosum derivatum.

Calyptra conico-subulata integra dein latere fissa. Peristomii dentes 16 brevissimi lanceolati obtusi margini thecae intus adnati geminati tenuiter trabeculati hyalini erecti. Folia e stratis multis ut in *Octoblepharo* composita, ductibus intercellularibus autem quadrangularibus ut in generibus praecedentibus igitur inter eadem et *Octoblepharum* intermedium. Folia pulcherrime trifaria. Inflorescentia dioica terminalis. Flos masculus in ramulo proprio brevissimo.

1. **A. Schimperi** Dz. et Molkb. (l. c. p. 76. tab. 27.); caulis adscendenti-innovando-ramosus; rami fragilissimi flexuoso-erecti fastigiati; folia e basi vaginante lato-membranacea densissime imbricata erecto-patentia integerrima enervia apice subplana cuspidato-acuminata s. mucronata; perichaetialia erecta lanceolata v. linearia subulato-acuminata, theca erecta subcylindrica annulata subapophysata, operculo conico subulato subobliquo.

Mielichhoferia Schimperi Dz. et Molkb. in ann. d. sc. nat. 1844. 2. p. 312. — *M. trifaria* eor. in Hb. Lugd. Batav. — *Leucophanes trifarium* Hmp. mst. — *L. squarrosum* Brid. l. p. 764. nobis

olim in Hb. Brideliano visum, sed l. c. nervosum false descriptum. Cl. Dozy et Molkenboer in eundem errorem inducti sunt. In sectione transversali error facile intelligitur. Folia Cl. Bridel etiam disticha false dixit.

Patria. In insula Amboina, unde Clar. Dumont d'Urville primus retulit, cespitose ad terram habitat. — Ex insulis Philippinis Cl. Montagne accepit (cf. Lond. Journ. of. bot. 1845. p. 8.). — Ex insula Borneo, ubi in *Arenga saccharifera* inventus est, Cl. Dozy et Molkenboer c. Cl. Hampe communicavere.

Muscus quam maxime memorabilis e cauli perfecte et late triquetro vix alio similis candidissimus. — Ductus intercellularis unicus medius e serie curvata a ceteris ductibus formata eductus quadrangularis.

Gen. V. **Octoblepharum** Hdw.

Musc. Frond. III. p. 15. tab. 6. — *Octoblepharis* Schreb. Gen. Pl. n. 1640. — *Bryum* P. B. Prodr. p. 26. Dill. Linn. Gmel. — *Luida* Adans.

Nomen graecae compositionis, ab ὀκτώ et βλέφαρον *palpebra*, ob dentes peristomii dentes octo huicce generi ab Hedwigio conditore impositum.

Calyptra *dimidiata cucullata*. Peristomii dentes 8 *erecti breves lato-lanceolati flavo-diaphani e cellularum seriebus duabus constructi remoti aequidistantes*. Folia *e stratis cellularum compluribus formata*. Ductus intercellulares *triangulares; duo medii e serie curvata*, a ceteris ductibus efformata, *educti*. Inflorescentia monoica gemmacea.

Congeneres in arboribus viventes.

1. **O. albidum** Hdw. (l. c.); erectum ramosum densissime cespitosum; folia caulina e basi latiore erecta lato-marginata membranacea saepe valde emarginata oblonga obtusiuscula apiculata canaliculata apice denticulata recurva; basi alis inaequalibus instructa; perichaetia caulinis similia; theca *brevipedunculata oralis parva operculo e planiusculo longe rostrato subobliquo*.

Bryum Octoblepharis Gmel. Syst. Nat. II. p. 1331. — *Bryum albidum* antheris erectis, foliis lingulatis obtusis patulis. Linn. Sp. Pl. p. 1583. — *Bryum nanum lariginis foliis albis* Dill. Musc. p. 364. tab. 46. fig. 21.

Patria. Per regiones omnes tropicas Asiae, Africae et Americae vulgare, cespites maximas efficiens.

Peristomii dentes polymorphi nunc ut supra illustrati, nunc 16 e serie cellularum unica formati nodosiusculi, nunc compositi et simplices, lati vel angusti. Planta humilis vel elata. — Flos masculus in feminei vicinia minimus e foliis c. 3 formatus antheridis ferrugineis eparaphysatis. Folia perigonialia minima oblongo-lanceolata acuta submembranacea. Flos femineus paraphysibus flavis instructus. Folia saepe e candidissimo v. subglaucio violascentia.

2. O. cylindricum Schimp. (in hb. Hampeano); caulis *flaccidus*, foliis ut in praecedente specie formatis acutis subintegris longioribus magis recurvis, theca *longe pedunculata longe cylindrica angusta* erecta operculo e planiusculo longe subulato subobliquo; dentes peristomii *linea media flava incrassata* instructi; calyptra longior et angustior.

Patria. In Guiana anglica primus legit Rob. Schomburgk. In Surinamo prope Paramaribo legit Kegel pulcherrime fructiferum in societate praecedentis. In Columbia prope Caripe legit Moritz.

Praecedenti quam maxime simile, sed, notis illustratis distinguuntibus inventis, species distinctissima. Folia saepe violascentia radiculosa. Inflorescentia, folia et habitus praecedentis.

Trib. X. SPHAGNACEAE.

Late cespitosae elatiusculae saepe quam maxime elatae cladocarpicae. Folia albescentia (seniora rufescentia) e strato unico cellularum crassarum *prosenchymaticarum modo vario excavatarum diapha-*

narum chlorophyllo carentium perforatarum saepe fibris annularibus impletarum composita enervia. Inter cellulas ductus intercellulares granulis chlorophyllaceis impleti modo vario compositi. Pedunculus: ramus elevatus nudus, Hepaticarum pedunculum referens viridis. Theca globosa in apice pedunculi veri subcupulari vel disciformi sessilis operculo hemisphaerico fugacissimo parvo et columella brevissima instructa. Archegonium unicum eparaphysatum. Antheridia globosa longistipitata.

Habitus quam maxime proprius speciosus distinctissimus.

Patria. Loci aquosi praecipue turfosi planitierum atque editorum alpinorum orbis totius terrarum.

Ex hisce notis excellentissimis et calyptra infra describenda scrutatores permulti, hanc tribum distinctissimam e muscorum classi educendam esse, putarunt. Fibrac annulares autem foliorum non essentiales sunt, quum in nonnullis speciebus nullae inveniantur. Calyptra basi persistens dehinc disrumpens in *Archidii* genere etiam observatur et *Archidia* ceteris partibus omnibus cum *Bruchiis* atque *Astomis* adeo conveniunt, ut genera haecce tria dividi nequeant, qua nota denique dispositio inter muscos frondosos elucet. Pedunculus quidem Sphagni ramulus intelligitur, sed haecce nota unica separatione non satis idonea appellanda est. Notae autem sejunctionis aliae desiderantur.

Diarrhagomitria Hmp. Linn. 1847. p. 66.

Gen. I. **Sphagnum** Dill.

Musc. p. 240. — Hedw. Fund. Musc. II. p. 85. — Bryol. Germ. I. p. 1. — Brid. Br. univ. I. p. 1. — Fürnrohr in Flora 1833. I. p. 1.

Nomen antiquum, a Plinio lichenibus muscisque nonnullis arborcis datum, a Dillenio huicce generi impositum, a Linnaeo et Hedwigio sancitum. Cf. Dill. Musc. p. 240.

Calyptra thecam juniorem totam includens dehinc disrumpens. Theca eperistomata. Inflorescentia dioica.

Species permultae hucusque ab auctoribus impositae sunt, sed bene distinctae paucae tantum inveniuntur. Notas hactenus eas optimas habuerunt, quae ex habitu deduci possunt. Vagas intelleximus et aliis melioribus, e structura foliorum caulinorum, rameorum et peduncularium ductis, usi sumus. Sequentes sunt:

1. *Folia caulina.* In cauli primario plerumque squamaeformia scariosa lingulata membranacea et structura peduncularium simili inveniuntur. Basi omnes cellulis parvis plus minus rotundatis instructa.

2. *Folia ramea* semper fere structura propria, basi cellulis elongatis semper instructa.

3. *Folia peduncularia.* Perichaetialia nominari nequeunt, quum in longitudine rami totius fructiferi axillaris, saepe creberrima, posita sint. Structura plerumque valde propria basi cellulis elongatis constanter instructa.

4. *Cellulae ramorum* in longitudine rami, tegmenti instar, positae, constanter elongatae, hyalinae, laxae cohaerentes.

5. Omnes hae partes fibris annularibus instructae vel iis carentes, quo factum est, ut termini plures, brevitatis causa, imponendi sint:

a. *cellulae inanes*: fibris annularibus carentes.

b. *cellulae repletae*: fibris annularibus instructae.

6. *Ductus intercellulares*; inter foliorum cellulas omnium reperiuntur.

a. *ductus homomorphi*: angusti simplices (i. e. haud iterum reticulati) ideo parietibus cellularum tecti.

b. *ductus heteromorphi*: parietibus cellularum latiores et ideo ab iis non obtecti. Sunt:

α. *simplices*, i. e. haud iterum reticulati.

β. *cellulosi*, i. e. cellulis pluribus reticulati articulati.

Ductus heteromorphi simplices ac cellulares vel chlorophyllo instructi (*repleti*) vel eo carentes (*inanes*).

7. *Cellularum forma.* Diversissima, brevis vel elongata, angusta vel ampla, exacte prosenchymatica (*hypnoidea* vel *angulata*) parietibus strictis composita vel pluries flexuosa (*serpentina*). Formae intermediae facile derivari possunt.

Speramus fore, ut hisce notis ac terminis *necessarie* imponendis species Sphagnorum facile atque feliciter distinguantur.

Fructificationis tempus omnium congenerum Europaeorum, reg. temperatae, arcticae et calidioris: aestate, mensib. *Julii* et *Augusti*. 24.

I. Folia fibris annularibus nullis.

1. **Sph. sericeum** C. Müll. (in bot. Zeit. 1847. p. 481.); laxe cespitosum; caulis erectus longus apicem versus sensim crescens; rami tenues flexuosi protensi longi attenuati plerumque bini, comales breves erecti v. horizontales *julaceo-cuspidati*; folia caulina *cuspidata* planissima subundulata tenuissime membranacea; ramea flavescentia *sericea lanceolata acuminata* immarginata integerrima, carinato-concava, basi *laxe*, apicem versus *sensim densissime areolata e cellulis breviusculis semel perforatis, ductibus heteromorphis cellulosis* instructis composita.

Patria. Sumatra insula septentrionalis in terrae Batta dictae monte altissimo Lubu Radja, ubi in altitudine c. 4000' cespitibus immaniter dilatatis luxuriat: Junghuhn legit.

Cellulae ramorum *inanes*.

Planta speciosissima atque ex toto fibris annularibus carens a fere omnibus congeneribus distinctissima. Si quis autem, nota hacce excellentissima rationem confirmari, speciem e Sphagnis excludendam esse, diceret: folia peduncularia nunc fibris, nunc nullis instructa esse significamus. — Foramina in angulis cellularum posita.

Ex habitu *Sph. cuspidato* simile sed ramis julaceis et cellulis, ductibus apicem versus valde cellulosis incras-

satis, minimis et densissime areolatis fere homogeneis amoene sericeis facile distinguitur.

2. Sph. macrophyllum Bernhardi (in Brid. Bryol. univ. I. p. 10.); caulis erectus firmus subsimplex; ramulis binis ternisve fasciculatis, fasciculis alternis remotis; folia caulina appressa parva lato-ovalia rotundata, quarum cellulae breves inanes ductibus subheteromorphis interpositis, immarginata integerrima; ramea *longa canaliculata subulata truncatula e cellulis longissimis angustissimis hypnoideis foraminibus c. 9. seriatis*, ductibus subheteromorphis interpositis composita, *basi vaginato-imbricata apice patula*. Caetera desunt.

Sphagnum macrophyllum Brid. I. p. 753. excludendum et ad *Leucobryum longifolium* revocandum.

Patria. America septentrionalis prope Philadelphiam. — Ex adnotationibus Sullivantii (p. 50.) juxta Wilmington in Carolinae superioris paludosis arenosis. An verum?

Ab omnibus congeneribus notis editis distinctissimum ex habitu *Leucobrya* subreferens.

II. Folia fibris annularibus instructa.

a. Folia apice rotundata.

3. Sph. cymbifolium Ehrh. (in Hannov. Mag. 1780. p. 235.); compacte cespitosum perrobustum, ramis 1—4 remotiusculis patentibus strictis v. rarius curviusculis crassis brevi-cuspidatis, comalibus brevissimis obtusis densissime positis; folia caulina latissime-ovalia apice rotundata basi e cellulis longiusculis angustis apice oblique-quadratis valde serpentinis amplis *inanibus* composita; ramea ovalia breviter apice involuta obtusa immarginata integra erecto-patentia, e cellulis breviusculis angulato-serpentinis subamplis composita; peduncularia latissime ovalia *truncato-obtusa* integerrima immarginata, quarum cellulae *basilares* longiusculae angustae ductibus homomorphis, *mediae* ductibus heteromorphis, *apicales* valde serpentinae ampliores ductibus homomorphis *utrinque cellularum mediarum inanium et apice repletae*; pedunculus foliis multis laxè imbricatis *concoloribus*.

Brid. Bryol. univ. I. p. 2. — Bryol. Germ. I. p. 6. tab. I. fig. 1. — *Sph. cymbifolium* β . *Magellanicum* Brid. I. p. 4. *Sph. Magellanicum* ej. l. c. — *Sph. cymbifolium* γ . *patens* Brid. I. p. 4. in hb. Brid. ex insula Bourbonis relatum! — *Sph. oblongum* P. B. Prodr. p. 15. Brid. I. p. 6. e spec. auth. herb. Brid. *Sph. cymbifolii* typus! — *Sph. cymbifolium* β . *Bourbonense* P. B. Prodr. p. 88. et Brid. I. p. 4. sub nom. *Sph. cymbifol.* γ . *patens* ex insula Bourbonis ex habitu spec. authent. huc pertinet. In hb. Bridelii sterile vidimus et ideo certe nescimus, an huc pertineat. — *Sph. sedoides* Brid. I. p. 750. forma juvenilis e sporis forsan enata foliis rufescentibus quorum cellulae parietibus crassis coloratis instructa, caulis principalis foliis caulinis nondum formatus. Ex insula Terre Neuve primum retulit Cl. La Pylaie, serius legit Cl. Sullivan in montib. Alleghaniensibus. — *Sph. Pylaesii* Brid. I. p. 749. forma juvenilis magis quam praecedens evoluta cauli principali jam saepe instructa sed tenella gracilis foliis minimis rufescentibus vel nigrescentibus, e reliquis a *Sph. cymbifolio* minime recedens. Ex insula Terre Neuve pariter a Cl. La Pylaie relatum. — *Sph. cymbifolioides* Breut. Bot. Zeit. 1824. p. 435. — *Hypnum cubile* Neck. Musc. p. 188. — *Sph. palustre*, molle, deflexum, squamis cymbiformibus Dill. Musc. p. 240. tab. 32. fig. 1.

α . *pycnocladum* ramis remotis elongatis cuspidatis attenuatis laxe foliosis flaccidis gracilibus. *Sph. obtusifolium* β . *pycnocladum* Mart. Fl. Erl. p. 17.

β . *condensatum* ramis brevissimis turgidis cuspidatis densissime foliosis et compacte approximatis humile vel elatius. *Sph. imbricatum* Hsch. in Hb. Reg. Berol.

γ . *squarrosulum* foliis acutioribus patentioribus nonnullis subsquarrosis. Bryol. Germ. I. p. 8.

Patria. Per totam Europam vulgatissimum.

Cellulae ramorum repletae.

Species e statura polymorpha sed formis supra illustratis tribus facile distinguenda.

4. ***Sph. erythrocalyx*** Hmp. (in litt.); compactum, ramis confertis crassis erectis; comales ceteris similes; folia ramea breviter ovalia lata valde concava apice toto involuto-obtusa immarginata integerrima; peduncularia rotundato-ovalia valde convoluta pauca rameis multo majora membranacea rufescentia, basi e cellulis longiusculis fuscis ductibus subheteromorphis instructis inanibus et solitarie sed grande perforatis, utrinque supra basin folii et apice toto e cellulis tenuioribus repletis brevioribus

amplioribus parvo-perforatis composita obtusissima immarginata cellularum parietibus productis subdenticulata.

Sph. cymbifolium Hsch. in Fl. Bras. Fasc. I. p. 3.?

Patria. Brasilia: Beyrich.

Cellulae ramorum *inanes*.

Sph. cymbifolio et *compacto* ex habitu simillimum sed a primo differt foliis peduncularibus maximis rufescentibus fere julaceo-convolutis calyciformibus, eorum textura cellulis mediis *Sph. cymbifolii* aliter constructis deficientibus, foliis rameis dorso apicis sublaevissimis et cellulis ramorum inanibus. A secundo differt foliis rameis non truncatis et fol. peduncularibus obtusis aliter constructis.

5. **Sph. perichaetiale** Hmp. (in litt.); humile; caulis robustus ramis 1 — 3 approximatis brevibus patentibus, comalibus brevioribus erectis dense imbricatis; folia caulina rotunda integerrima immarginata quorum cellulae *subinanes* basi longiusculae, apice dense areolatae parvae, ductibus subheteromorphis instructae; ramea squarrulosa, e basi ovali oblonga obtusa integerrima immarginata apice involuta strictiuscula e cellulis brevibus angulato-serpentinis, ductibus homomorphis interpositis, composita; peduncularia *oblonga curviusculo-acuminata obtusiuscula* immarginata integerrima, e cellulis omnibus angustis, ductibus heteromorphis angustis inanibus hyalinis interpositis, *tenerrimis apice minimis, ante apicem tantum amplioribus repletis* composita, *plicato-undulata*.

Sph. compactum Hsch. in Fl. Bras. Fasc. I. p. 3.?

Patria. Brasilia prope Rio Janeiro: Beyrich.

Cellulae ramorum *repletae*.

Ex habitu *Sph. compacto* maxime simile sed notis illustratis distinctissimum. A *Sph. cymbifolio* foliis peduncularibus e cellulis fere ex toto inanibus tenerrimis ductibus heteromorphis inanibus interpositis compositis plicato-undulatis acuminatis distinctissimum.

b. *Folia truncata.*

a. *Folia peduncularia fibris annularibus nullis.*

6. **Sph. molluscum** Bruch (in bot. Zeit. 1825. p. 613.); laxe cespitosum elatum *gracillimum molluscum*

amoene flavidum, ramis remotis tenuibus parce geminatis laxe foliosis subdeflexis flaccidis curviusculis; folia caulina magna ovalia *apice subinvoluta* acutiuscula e cellulis parvis rhomboidalibus brevibus, ductibus heteromorphis latis repletis cellulosi interpositis, senioribus inanibus, junioribus apice subrepletis composita; ramea ovalia acuminata truncatula subinvoluta e cellulis brevibus serpentinis subamplis formata; peduncularia lata *longe-acuminata acuta*, e cellulis brevibus inanibus, ductibus heteromorphis repletis *valde cellulosi* interpositis, composita tenerrime membranaceo-marginata integra; theca *omnium minima obconica rufo-purpurea sporis sulphureis* instructa.

Brid. Br. un. I. p. 753. *Sph. squarrosum* Fk. in Sched. — *Sph. squarrosum* β . *tenellum* Hüb. Muscol. Germ. p. 23. *Sph. tenellum* Bryol. Germ. I. p. 8. tab. I. fig. 2.

Cellulae ramorum *inanes*, foliorum omnium inanes elegantissime areolatae, ut in *Sph. sericeo* tantum observantur.

Patria. In locis paucis ericetorum Europae hucusque detectum: in paludibus Vogesorum et prope Bipontem legit primus Bruch; pr. Lausigk Saxoniae: Fr. Müller; pr. Jeveram Duc. Oldenburgensis: C. Müller; in Sudetorum paludosis loci Koppenplan: Funk et pr. Krageroe Alp. Norvegiae: Boek in Hb. Reg. Berol. E rarissimis!

Planta speciosissima elegantissima caulibus molluscis amoene flavescentibus et theca rufo-purpurea sporis sulphureis primo intuitu distinctissima! Variat paulisper ramis densius v. laxius foliosis.

7. *Sph. squarrosum* Pers. (in litt. ad P. B.; cf. ej. Prodr. p. 88.); compactum robustum elatum, ramis subapproximatis elongatis deflexis julaceis *squarroso-foliosis* curviusculis, comalibus densissimis *stellato-squarrosis*; folia caulina magna *lato-ovalia rotundata*, e cellulis rhomboidalibus *amplis inanibus*, ductibus subhomomorphis interpositis, constructa immarginata integerrima; ramea e *basi lato-ovali acuminata truncatula* tenue marginata, e cellulis brevibus *amplis angulato-serpentinis* formata;

peduncularia latissime ovalia *maxime truncata*, basi e cellulis elongatis, ductibus subheteromorphis instructis, apicem versus *brevioribus amplissimis rhomboidalibus valde flexuosis*, summo apice minimis tenuissimis marginantibus, omnibus inanibus composita immarginata integerrima.

Brid. I. p. 5. — Bryol. Germ. I. p. 9. tab. 1. fig. 3.

Patria. Per totam Europam et Americam septentrionalem et arcticam vulgare, sed rarius quam ceteri congeneres Europaei fructiferum.

Cellulae ramorum *inanes*.

Ab omnibus congeneribus ramis robustis teretibus valde squarrossis primo intuitu distinctissimum.

8. **Sph. Meridense** C. Müll. (mst.); compacte cespitosum elatum subrobustum, ramis remotis mollibus subgracilibus attenuatis deflexis, comalibus densissimis brevissimis obtusis dense imbricato-foliosis; folia caulina oblonga *apice rotundata vix involuta*, e cellulis basi utrinque densissime areolatis, ductibus heteromorphis angustissimis inanibus interpositis, medio basis laxioribus ductibus subhomomorphis, omnibus longis, apicem versus brevioribus amplioribus valde serpentinis inanibus vel raro ex parte subrepletis, utriculo primordiali plicato multiplicatis composita immarginata integerrima; ramea ovalia acuminata *apice truncatula subinvoluta immarginata integerrima stricta erecto-patentia laxiusculo-imbricata*, e cellulis serpentinis subamplis composita; peduncularia latissima, inferiora truncatula, superiora acuminata, e cellulis laxis majoribus, basi longioribus, ductibus subheteromorphis interpositis, apice illis fol. caul. similibus, ductibus subhomomorphis interpositis, omnibus inanibus composita.

Sphagnum subsecundum C. Müll. in Linnaea XIX. p. 209. — *Sph. acutifolium* var. *Meridense* Hmp. in Linn. XX. p. 66. — *Sph. cymbifolium* ♂. *patens* Brid. Br. univ. I. p. 4. in hb. Bridelii ex Hispaniola relatum excl. synonym. *Sph. cymbifolium Bourbonense* P. B. Prodr. p. 88.

Patria. Hispaniola: Desvaux in Brid. hb. — In montibus nivosis Meridae Columbiae: Moritz No. 179.

Cellulae ramorum *inanes*.

Inter *Sph. subsecundum* et *acutifolium*. A primo differt jam foliis peduncularibus e cellulis inanibus compositis; a secundo ramis non capillaceis sed crassiusculis patenti-foliosis, comalibus brevibus obtusis non capillaceis acutis et structura foliorum. — Notis hisce et colore viridescenti-rufescente cum albescente mixto facillime distinguitur. Specimina ex insula Hispaniola relata cum Meridensibus maxime conveniunt.

9. *Sph. cuspidatum* Ehrh. (Crypt. No. 251.); laxe cespitosum elatum; caulis gracilis ramis 1—5 remotis divaricatis curvatis attenuatis, comalibus superioribus in coma densa positis brevissimis dense et squarroso-foliosis obtusis; folia caulina lato-ovalia obtusissima, e cellulis basis utrinque angustissimis densissimis, medio basis et apicem versus laxioribus brevioribus, ductibus heteromorphis cellulosis interpositis, composita; ramea laxe imbricata erecta oblonga cuspidata truncatula cymbiformia tenuissime marginata stricta integerrima anguste et serpentino-areolata; peduncularia latissimo-ovalia oblonga concava obtuso-acuminata vix marginata, e cellulis multo laxioribus, ductibus lato-heteromorphis hyalinis inanibus interpositis, constructa.

Bryol. Germ. I. tab. 4. fig. 9. — Brid. I. p. 14. — *Sph. pentastichum* Brid. I. p. 13. e speciminibus Herb. Bridelii huc, non ad *Sph. recurvum*, quod ad *Sph. acutifolium* pertinet, revocandum est. — *Sph. cuspidatiforme* Breut. Bot. Zeit. 1824. p. 407. — *Sph. palustre*, molle, deflexum squamis capillaceis Dill. Musc. p. 243. tab. 32. fig. 2 A.

Patria. In profundis turfosis per fere totam Europam septentrionalem et in America septentrionali.

Cellulae ramorum *inanes*. — Rami comales, saepe quoque laterales fructiferi.

Primo intuitu caule longissimo gracillimo, ramis comalibus brevibus densis squarroso-foliosis et lateralibus longis deflexis laxe foliosis facile distinguitur.

10. *Sph. acutifolium* Ehrh. (Dec. crypt. No. 72.); densiusculo cespitosum elatum gracile; caulis flaccidus

ramis 1 — 4 remotiusculis elongato-flexuosis deflexis capillaceo-attenuatis appresso-foliosis, comalibus superioribus paucis in coma parva laxiusculo positis brevissimis tenuibus subcuspidatis; folia caulina parva lato-ovalia appressa, e reliquis peduncularibus similia; ramea oblonga acuminata apice truncatula, angulato-flexuoso-areolata; peduncularia latissimo-ovalia truncato-obtusa apice repando-marginata, apicem versus e cellulis rhomboidalibus amplis, utriculi primordialis plicaturis multiplicatis, constructa.

Sph. acutifolium β. *capillifolium* Bryol. Germ. I. tab. 3. fig. 8*. — *Sph. capillifolium* Ehrh. Hannov. Magaz. 1780. p. 35. Brid. I. p. 11. — *Sph. intermedium* Hoffm. D. Fl. II. p. 22. — *Sph. capillifolioides* Breut. Bot. Zeit. 1824. p. 438. et Brid. I. p. 751. — *Sph. Ascherbachianum* Breut. l. c. p. 459. et Brid. I. p. 751. — *Sph. recurvum* Brid. I. p. 13. excl. syn. *S. pentastichum*. — *Sph. subulatum* Brid. I. p. 18. — *Sph. gracile* Rich. Fl. Am. Bor. Mich. II. p. 285. — *Sph. alpinum* Ruehl. — *S. palustre* β. *capillaceum* Weis. Crypt. Gött. p. 265. — *Sph. nemoreum* Scop. Fl. Carn. p. 161. — *Hypnum cubile* β. Neck. Meth. Musc. p. 189.

β. *robustum*, ramis confertissimis brevibus plurimis patentibus, foliis rubicundis. Bryol. Germ. I. p. 21. tab. III. fig. 8**.

γ. *tenue*, ramis recurvis reflexis, summis longioribus attenuatis, foliis viridibus apice subulato-reflexis. Bryol. Germ. I. p. 22. tab. III. fig. 8****. *Sph. intermedium* Hoffm.

Patria. Per totam Europam et Americam septentrionalem atque arcticam vulgatissimum.

Cellulae ramorum *inanes*.

Ramis capillaceis foliis appressis vix patentibus facillime distinguendum.

β. *Folia peduncularia fibris annularibus instructa.*

11. *Sph. laxifolium* C. Müll. (mst.); laxe cespitosum elatum; caulis gracilis flaccidus ramis 1 — 4 remotis divergenti-divaricatis attenuatis, comalibus laxis paucis; folia caulina lato-ovalia obtusissima marginata reflexa, e reliquis peduncularibus similia; ramea laxissime plumoso-imbricata patula e basi oblongâ angusta attenuata subfalcata truncatula involuta marginata, margine infra api-

cem breviter planum evanido basi latiore, anguste et serpentino-areolata; peduncularia latissimo-ovalia apice valde involuto breviter acuminato-obtusa multo laxius areolata, ad apicem lato-marginata, apice tantum cellulis repletis.

Sph. cuspidatum β . *plumosum* Nees et Hsch. Bryol. Germ. I. p. 24. tab. 4. fig. 9*. — *Sph. cuspidatum* Funk Crypt. No. 347. fertile et Crome. Crypt. No. 5 sterile. — *Sph. palustre*, molle, deflexum, squamis capillaceis. Dill. Musc. p. 244. tab. 32. fig. 2. B.

β . *hypnoides*; humile simpliciusculum, ramis praesertim comalibus fere, et foliis caulinis ex toto carens, foliis uncinatis mollibus margine undulato-excavatis. *Sph. hypnoides* A. Braun in bot. Zeit. 1825. No. 40. et in Brid. I. p. 752. Forma juvenilis e sporis enata. — Primo adspectu *Hypn. uncinatum* imo et molluscum referens sterile, interdum tamen praesertim in umbris virgultis aliisque locis ejus perfectiori evolutioni magis faventibus ad formam normalem redux et fructificans.

Patria. In profundis turfosis Germaniae praesertim septentrionalis haud raro, sed sterile plerumque invenitur. — Var. β . ad ripas lacus Hornsee in Hercynia Suevica inferiore quas saepe ingentibus stratis obducit, habitat, ubi Cl. Braun detexit.

Cellulae ramorum *inanes*.

Species hucusque ab auctoribus c. *Sph. cuspidato* semper commutata. Ab eodem foliis rameis valde plumosis longioribus laxissime imbricatis falcatis latiusculo-marginatis, et peduncularibus apice fibris annularibus instructis distinctissima!

E locis diversis valde varians, siccioribus humilior compactius rigidius, ramis rigide cuspidatis, foliis apice plerumque valde subulatis fere piliferis; humidioribus gracilioribus, saepe quam maxime elongatum filiforme laxissime foliosum valde plumosum ramis valde remotis. E foliis autem laxè imbricatis primo adspectu facile distinguitur.

12. *Sph. compactum* Brid. (Sp. Musc. I. p. 18 et Br. univ. I. p. 16.); compacte cespitosum elatum; caulis robustus ramis dense approximatis *patentibus strictis crassis*, comalibus brevioribus *conformibus* densis; folia caulina *minima*, e cellulis rhomboidalibus, ductibus homomorphis interpositis, fibris annularibus *quam maxime obsoletis* in-

structis, composita integerrima immarginata; ramea e basi ovali suboblique oblonga apice *valde truncata*, e cellulis angulato serpentinis, ductibus homomorphis interpositis, amplis formata; peduncularia latissima *longe-acuminata apice falcata undulata tenuiter marginata* integerrima, e cellulis summi apicis inanibus angustissimis densissime areolatis tenerrimis hyalinis, ceteris e reliquis caulinis similibus, constructa.

Bryol. Germ. I. p. 13. tab. II. fig. 5. — *Sph. humile* Br. et Sch. in Hb. Hamp. foliis maxime truncatis peduncularibus apice truncatiusculis, e reliquis autem a *Sph. compacto* non recedens. — *Sph. praemorsum* Zenk. et Dietr. Musc. Thuring. Fasc. I. No. 15. et Brid. I. p. 17. var. *compacti*. — *Sph. tristichum* Schultz in Bot. Zeit. 1826. — *Sph. immersum* Nees et Hsch. *Bryol. Germ.* I. p. II. tab. II. fig. 4. et Brid. I. p. 9. — *Sph. ambiguum* Hüb. Muscol. Germ. p. 25. — *Sph. Helveticum* Schk. Deut. Moos. p. 12. tab. 5. e spec. Hb. Schkuhriani! — *Sph. condensatum* Schleich. Cent. II. n. 3. — *Sph. obtusifolium* β . *condensatum* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 73.

β . *robustum* ramis densissimis brevibus, statura humiliore, foliis confertis.

γ . *rigidum* ramis remotiusculis patentibus longioribus, statura elatiore, foliis patulis. Br. *Germ.* I. p. 14. tab. II. fig. 5*.

δ . *ramulosum*, humillimum, densissime compactum, innovatione ramulis elongatis, foliis peduncularibus apice acutis vix cuspidatis haud falcatis.

Patria. In ericetis humidis per totam Europam et Americam septentrionalem. Var. β . in locis siccioribus, var. γ . in locis humidiusculis; δ . in ericetis compactis gelatinoso-humidiusculis Jeverae Duc. Oldenburg. — *Sph. humile* in Carolina et Florida.

Cellulae ramorum *inanes*.

Foliis peduncularibus, apice tantum e cellulis inanibus angustissimis tenerrimis densissime areolatis e reliquis autem caulinis similibus compositis ab omnibus congeneribus facile distinguendum.

13. *Sph. molluscoides* C. Müll. (mst.); compacte cespitosum elatiusculum robustum; caulis mollis ramis brevibus crassis dense approximatis rigidis valde *patulifoliosis* saepe capillaceo-cuspidatis, comalibus brevissimis

densissimis conformibus; folia caulina *magna e basi latissima lanceolato-ovalia truncata* vix marginata, basi infima e cellulis longis laxis inanibus, ductibus subhomomorphis interpositis, *apicem versus rameis ex toto similibus valde repletis*, composita; ramea ovali-oblonga acuminata truncatula subinvoluta immarginata, e cellulis valde serpentinis subamplis constructa; peduncularia lata longe *acuminata subtruncata recta undulata, e cellulis laxis tenuibus, ductibus heteromorphis inanibus hyalinis angustis interpositis, apice laxioribus inanibus v. ante apicem interdum repletis* formata; thecae in coma caulis creberrimae.

Sph. compactum β . *rigidum* nonnullor.?

Patria. In ericetis humidis prope Jeveram Duc. Oldenburgensis copiose fructiferum legimus 1840.

Cellulae ramorum *inanes*.

Sph. compacto simillimum sed foliis caulinis magnis truncatis acuminatis, e cellulis valde repletis compositis et peduncularium structura, e cellulis fere ex toto inanibus tenerrimis minimis constructa, distinctissimum! Primo intuitu caulibus rigidiusculis molluscoideis, valde patulofoliosis et ramis comalibus valde fructiferis, pedunculis exsertis, facillime intelligitur.

14. *Sph. subsecundum* Nees ab Es. (in Bryol. Germ. I. p. 17. tab. III. fig. 7.); compacte cespitosum elatum robustum, caulis rigidus ramis subapproximatis brevibus crassis attenuatis cuspidatis recurvatis, comalibus erectis brevioribus densis; folia caulina e basi latissima ovalia apice rotundata subtruncata, e cellulis longis angustis basi laxioribus *ex toto repletis* composita, tenue marginata membranacea; ramea ovalia apice involuta *subfulcata* in ramis curvatis saepe secunda subtruncata tenue marginata, e cellulis teneris angustis serpentinis constructa; peduncularia latissima ovalia, *apice truncata marginata, basi infima e cellulis longis laxis inanibus, apicem versus repletis normalibus* formata; theca comalis et lateralis.

β . *contortum*, ramis circinatis, foliis longioribus falcatis. *Sph. contortum* Schultz Fl. Starg. p. 64.

γ. turgidum, ramis turgidis cuspidatis, foliis apice valde truncatis emarginato-5-dentatis latissimis. — Planta si haecce aquas fluitans habitat, folia latissima remotiuscula, e cellulis longiusculis submarcidis hypnoideis formata, observantur. *Sph. denticulatum* Brid. l. p. 10. e spec. Hb. Brideliani pessimis!

δ. gracile, omnibus partibus tenerioribus ramis lateralibus remotis curviusculis, comalibus densissimis. *Sph. tenellum* Pers. e spec. authentico Hb. Bridelii.

Patria. Per totam Germaniam (et forsam quoque Europam) haud raro. — Var. *β.* pr. Neobrandenburgum Duc. Mecklenburgensis: Schultz; pr. Bipontem: Bruch; pr. Adersbach tract. Rhen. et in Vogesis. — Var. *γ.* in Hb. Reg. Berol. a Cl. Funk in locis non indicatis collecta. — Var. *δ.* prope Berolinum: Thiele in Hb. Reg. Berol., et in Duc. Mecklenburgensi: Blandow. In Hercynia legit Persoon.

Cellulae ramorum *inanes*.

Habitus inter *Sph. cymbifolium* et *compactum*. A primo jam differt foliis omnibus truncatis marginatis falcatis. A secundo foliis peduncularibus truncatis, eorum structura et toto habitu facillime distinguitur.

15. *Sph. Pappeanum* C. Müll. (mst.); elatum robustum, ramis dense approximatis patentibus strictis crassis, comalibus densissimis brevibus; folia caulina ovalia suboblunga, e cellulis ex parte repletis, ductibus homomorphis interpositis, angulato-serpentinis amplis formata; ramea e basi ovali erectâ suboblique oblonga subinvoluta, *laxe imbricata squarroso-patula*, apice valde truncata 5—7 dentata, e cellulis angulato-serpentinis amplis brevibus composita; peduncularia maxima latissime-ovalia apice valde truncata c. 7 dentata, latere et basi e cellulis inanibus elongatis, ductibus subhomomorphis interpositis, apicem versus caulinis similibus repletis constructa; theca comalis.

Patria. Prom. bon. spei prope Zwellendam ubi legit Pappe 1838. Hb. Kunzeanum.

Cellulae ramorum *inanes*.

Sph. compacto ex habitu maxime simile sed foliis laxius imbricatis et peduncularibus truncatis notisque ceteris valde refugiens.

Species incertae sedis.

16. *Sph. Trinitense* C. Müll. (in litt. ad Cl. Crüger, detectorem Trinitensem); compactum humile; caulis gracilis tenuissimus ramis *subulatis capillaceis*; folia caulina *longe oblonga erecta apice rotundato-truncata marginata concava, tenuissime membranacea, e cellulis longissimis angustis, ductibus heteromorphis latiusculis interpositis, textura rameorum, serpentinis formata, non scariosa; ramea longissima strictissima tenuissima e reliquis caulinis simillima, suprema valde truncata planissima* laxè imbricata. Caetera desunt.

Patria. Insula Trinitatis: Crüger No. 14. 1847 misit.

Cellulae ramorum *inanes*.

Sph. laxifolio proximum, foliorum autem caulinorum structura et foliis rameis valde truncatis longissimis aliter reticulatis distinctissimum.

17. *Sph. pulchricoma* C. Müll. (in Hb. Brideliano inter *Sph. squarrosum*); elatum gracile; ramis remotis attenuatis elongatis curvatis deflexis laxè foliosis, comalibus squarroso-foliosis obtusis; folia caulina oblonga latissima apice rotundato-obtusa, *utrinque basis e cellulis angustissimis dense, medio basis et apicem versus cellulis amplioribus brevioribus rhomboidalibus, omnibus inanibus, utriculo primordiali plicato multiplicatis, ductibus heteromorphis interpositis, reticulata; ramea e basi ovali subcava attenuato-acuminata truncatula valde plana tenuissime marginata integerrima, e cellulis angulato-serpentinis vermiformibus angustioribus tenuibus formata.* Caetera desunt.

Sph. squarrosum Brid. Hb. et Hsch. in Fl. Bras. Fasc. I. p. 4. Spec. a Cl. Desvaux lecta.

Patria. Brasilia: Desvaux.

Cellulae ramorum *inanes*.

Sph. cuspidato quam maxime simile sed foliis caulinis utriculo primordiali multiplicatis et foliis rameis longioribus non usque ad apicem concavis sed e medio planis excavato-acuminatis distinctissimum.

18. **Sph. ericetorum** Brid. (l. p. 17.); caulis erectus simplex, ramulis uniformibus undique confertis deflexis tereti-attenuatis; foliis rameis ovatis concavis *acutiusculo-truncatulis apice involutis* integerrimis immarginatis patulis.

Sphagnum condensatum Brid. l. p. 18. forsan huc pertinet. In Hb. Bridel. deficit.

Patria. Insula Bourbonis in ericetis et humidiusculis planitie des Chicots. In Hb. Bridel. a Cl. Bory de St. Vincent communicat.

Cellulae ramorum *inanes*.

Species ex habitu inter *Sph cymbifolium*, ob ramos crassos robustos et *Sph. molluscum*, ob ramos molluscos flavescences, ponendum. A primo differt foliis truncatis, a secundo partibus robustis compactis. Species certe distincta sed valde incomplete nota.

Species nobis haud visae, incomplete descriptae.

1. **Sph. Capense** Hsch. (in Linn. XV. p. 113.); caulis erectus inferne nudus sublignosus rigidus superne ramulosus, ramulis subulatis fasciculatis quinis inaequalibus attenuatis, duobus longioribus recurvis, reliquis deflexis, foliis laxè imbricatis lato-ovatis apice subtruncatis tri-, rarius quinquedentatis concavis submarginatis, retis areolis oblongis.

Patria. Prom. bon. spei monte tabulari ad fontem: Ecklon; Dutoitskloof ad cataractam 1600' alt.: Drège.

2. **Sph. truncatum** Hsch. (l. c. p. 114.); caulis erectus laxissimus, ramulis 4—5 inaequalibus, 2 crassioribus erecto-patentibus julaceis, reliquis deflexis, foliis arcte imbricatis lato-ovatis truncatis apice 8—12 duplicato-dentatis profunde concavis submarginatis, retis

areolis serpentinis angustis basi latioribus apice brevioribus.

Patria. Prom. b. spei: in humidiusculis loci Dutoitskloofberg, alt. 3000': Drège.

Sph. cymbifolio ex habitu simile, caulibus autem flaccidis, foliis truncatis denticulatis et cellulis longis serpentinis valde diversum.

3. *Sph. strictum* Sulliv. (Musc. Allegh. p. 49.); caulis erectus subsimplex rigidiusculus, ramulis 4 — 5-natim fasciculatis, 2-aequalibus strictis obtusis horizontaliter patentibus, reliquis deflexis, fasciculis confertis; folia oblongo-acuminata recurva apice eroso-6 — 9-dentata.

Patria. In Carolina superiore ad summum scopulum mirabilem Devil's Court-House dictum.

Sph. compactum var. *humile* (*Sph. humile* Br. et Sch.)?

4. *Sph. tabulare* Sulliv. (l. c. p. 49.); pusillum; caulis erectus, ramulis substrictis aequalibus 3 — 4-natim fasciculatis; fasciculis approximatis; folia ovato-lanceolata reflexiuscula apice truncato-3 — 5-denticulata.

Patria. In locis irriguis ad latera scopuli Table Mountain dicti, Carolinae superioris, altitudine c. 2500 ped.

5. *Sph. molle* Sulliv. (l. c. p. 50.); tenellum, dense cespitosum; caulis erectus subindivisus, ramulis erecto-patientibus confertissimis indistincte fasciculatis, foliis oblongo-ovatis apice eroso-3 — 5-dentatis.

Patria. In eodem loco ac praecedens.

6. *Sph. Chinense* Brid. (l. p. 750.); caulis erectus simplex, ramulis fasciculatis 3 aequalibus attenuatis deflexis recurvis, foliis imbricatis ovato-lanceolatis acutis patentiusculis subrecurvis.

Sphagnum. Herb. Candoll.

Patria. In Chinae aquis: Staunton.

Elegans, subpendulum, 8 — 10 unc. longum. Ramuli breviores, fasciculati, terni, fasciculis distantibus. Foliorum reticulatio *Sph. capillifolii*.

Sph. squarroso proximum, forte illius forma peculiaris. — In Hb. Brideliano deficit.

Praecedentes species e promontorio bonae spei ac regno Sinensi descriptae forsitan, Americanae vix novae. Nulla species acute distingui potest nisi e foliorum structura descripta.

B. Folia ductibus intercellularibus nullis.

I. Folia epapillosa.

1. *Laxe areolata.*

Trib. XI. FUNARIOIDEAE.

Folia *lato-ovalia* *spathulata*, *nervo laxo tereti praedita*, e *cellulis omnibus parenchymaticis magnis basi laxissimis parallelogrammis*, *apicem versus hexagonis v. polygonis laxis*, *granulis chlorophyllaceis saepe valde repletis*, *plus minus pellucidis composita*. Theca *pyriformis apophysata*, *cujus collum stomatiis plerumque praeditum*. Plantae *acrocarpicae*.

Subtrib. I. FUNARIACEAE.

Laxe cespitosae v. gregariae terrestres, *caulis laxifolius simpliciusculus*. Inflorescentia *monoica*. Flos *masculus disciformis plerumque in ramo proprio radicali terminalis*. Antheridia *parva ovalia*. Archegonia *parva anguste apiculata*. Paraphyses *basi filiformes apice clavato-articulatae*. Peristomium *sin adsit, cartilagineum rubrum striatum, dentibus obliquis trabeculatis solitariis*.

Habitus proprius, hic et illic *Pottiacearum*, e thecae coloratae forma *pyriformi foliisque plerumque amoene viridibus mollibus speciosus*.

Patria. Per orbem terrarum totum, e *planitiibus ad Alpes*, sed raro, *ascendentes*, solum *argillosum, arena-*

rium vel carbone vegetabilium mixtum vel turfosa praeferentes.

Funariaceae auctor. et Bryol. Europ. fasc. XI.

Gen. I. **Funária** Schreb.

Schreb. Gen. Pl. n. 1650 — Hedw. Spec. Musc. et auct. rec. — *Koelreutera* Hedw. Fund. Musc. II. p. 95. tab. 10. fig. 58—61. — *Strephedia* P. B. Prodr. p. 89. — *Mnium* Linn. — *Bryum* Dill.

Nomen *Schreberianum* a *fune* desumptum, quod pedunculus in *F. hygrometrica* humiditate funis instar contorquetur.

Theca *asymmetrica arcuata*, orificio obliquo minimo; seta *valde arcuata* elongata maxime tortilis *hygroscopica*. Calyptra *ventricoso-dimidiata* (basi *rotundato obtusa theca brevior* vel *major basi truncata*. — Peristomium duplex *erectum*; dentes externi 16 obliqui, lato-lanceolati subulati, trabeculati, apicem versus *appendicibus instructi*, apice disco reticulari frenati; interni totidem externis oppositi et basi adnati lanceolati granulati, linea longitudinali exarati. Operculi cellulae apice *circinato-reticulatae*.

1. *Peristomium internum imperfectum*.

1. **F. microstoma** Br. et Sch. (Br. Europ. Funariaceae. Funaria. Fasc. XI. p. 9. tab. 4.); gregarie cespitosa; folia ovalia acuminata, superiora conniventia majora *longe acuminata*, integerrima valde concava evanidinervia; theca *substriata rufa subnitens microstoma*, pedunculo valde incurvo *crassiusculo* operculoque minimo subconico instructa annulata; peristomium *internum vix conspicuum* dentibus externis adglutinatum nonnunquam in processus productum.

Patria. Locis arenosis humidis: ad viam Splügenstrasse prope Andeer Rhætiæ: Al. Braun primus detexit. Ad rivulum Tamina retro Vättis Rhætiæ: Br. et Sch. — Normandia prope Falaise: de Brébisson. — *Versus finem aestatis*. ☉

Habitus formae minoris *F. hygrometricae* sed notis illustratis constanter differt.

2. *Peristomium exacte duplex.*

a. *Theca striata.*

2. **F. hygrometrica** Hedw. (Sp. Musc. p. 172.); subsimplex, densiusculo cespitosa; folia caulina inferiora sparsa recurva, perichaetialia conniventia imbricata lato-orali-lanceolata concava integerrima, nervo excurrente, perigonialia apice denticulata; theca magna valde incurva pyriformis striata, sicca plicata in pedunculo valde tortili, annulata, operculo conico-hemisphaerico.

Brid. II. p. 51. — Bryol. Europ. l. c. p. 8. tab. 3. — *Strephedum hygrometricum* P. B. — *Koelreutera hygrometrica* Hedw. Fund. Musc. I. tab. V. fig. 21. 26. II. p. 95. tab. 3. fig. 11. tab. 5. fig. 25. 26. tab. 6. fig. 27. tab. 10. fig. 58—61. — *Mnium hygrometricum* acaule anthera nutante, calyptra reflexa tetragona Linn. Sp. Pl. p. 1575. — *Bryum hygrometricum* Neck. Method. p. 221. — *Bryum bulbiforme aureum*, calyptra quadrangulati, capsulis pyriformibus nutantibus. Dill. Musc. p. 407. tab. 52. fig. 75. — *Funaria androgyna* Brid. II. p. 58. Vix varietas nominari potest, quum inflorescentia monoica sit generis vera. — *Fun. campylopus* Brid. l. c. p. 739. — *Fun. ramificans* Brid. l. c. p. 738. — *Fun. angustifolia* Brid. l. c. p. 58. — *Fun. ...*

β. patula; caule gracilescente ramoso; foliis comalibus patentibus, margine flexuoso-undulatis, siccitate contortis.

Patria. Per totum orbem terrarum praeprimis locis exustis, in muris, ad rupes et saxa umbrosa. Var. *β.* in locis humidis. *Aestate.* ☉ — ☿.

3. **F. calvescens** Schwägr. (Suppl. I. P. II. p. 77. tab. 65.); laxe cespitosa; folia inferiora remota, perichaetialia patula longe spathulata acutiuscula, marginibus flexuosis, integra nervo ante apicem evanido instructa; perigonialia obtusa brevissime acuta apice subdenticulata; theca in pedunculo longo stricto e collo angustissimo oblique pyriformis erecta parva, operculo (pro theca parva) magno hemisphaerico instructa annulata.

Brid. Br. univ. II. p. 53 et 739. — *Fun. hygrometrica γ. calvescens* Bryol. Europ. l. c. p. 9. tab. 3. fig. γ. et auct. mult. recent. — *F. flavicans* Hb. permult. *Fun. ...*

β. crispa; gracilis foliis siccis ac madidis crispatissimis acutis evanidinervibus.

Patria. Per terras tropicas vulgare. Var. *β.* in Chiles republica: Pöppig. Hb. Kunzeanum. ☉ et ☿?

Praecedenti maxime similis sed theca constanter erecta angusta pedunculo stricto praedita parva ab eadem recedit. Bene scientes, auctores plurimos hancce speciem praecedentis formam tropicam putasse, ex novis observationibus tamen nobis persuasum est, comprobendam esse, quum notae illustratae constantes et in regionibus tropicis Funaria hygrometrica ipsissima quoque observentur.

4. **F. flavicans** Michaux (Richard flor. boreal. Amer. II. p. 303); laxe cespitosa gracilis; folia caulina inferiora remota, superiora perichaetialia spathulato-ovalia lata subconniventia integerrima *nervo excedente longissime cuspidata, e cellulis densiusculis minus amplis basi longissimis angustissimis apice multo minoribus formata*; perigonialia apice subdenticulata; theca pedunculo longissimo flavido substricto et collo brevissimo praedita *subglobosa nutans flavida ore purpurea*, operculo conico hemisphaerico flavido parvo.

Schwägr. Suppl. I. P. II. p. 75. tab. 65. — Brid. II. p. 54.

β. humilis; foliis valde conniventibus, pedunculo brevi et theca minori. Schwägr. l. c. fig. 1. specimina duo ad dextram depicta.

Patria. Carolina: Fraser, Michaux et Bosc primi legerunt. In Florida. In herbariis vera raro occurrit!

F. hygrometricae similis quidem, sed tamen characteribus illustratis optima species. Theca non, ut illa pedunculo arcuato, pendula sed in pedunculo stricto nutante primo adspectu facillime distinguitur.

Species nobis haud visa.

1. **F. obtusifolia** Weinm. (Syllab. Muscor. p. 438.); caule erecto ramoso: ramis confertis; foliis omnibus imbricatis, inferioribus lanceolatis acutiusculis, superioribus e latiuscula basi *lineari-lingulatis obtusis integerrimis*;

nervo crasso subcontinuo; theca pyriformi incurva laevi; operculo convexo brevi-mammillato.

Weinmann in Syllab. Muscor. frondosorum hucusque in imperio Rossico collectorum in Bulletin de la soc. impér. des naturalistes de Moscou 1845.

Patria. In turfosis humidis ad fretum Sinjavin (Asiae septentrionalis) et in iisdem locis, sed parum major, in Gubernio Olonetziano. Hb. Ac. Sc. Petrop.

Caulis 3—6''' longus s. parum altior. Rami simplices, dense foliosi. Folia saepe convoluta plus minus obtusata, *lineari-areolata*. Nervus nunc excurrent, nunc subito infra apicem evanescens, satis crassus obscurius coloratus. Perichaetia interdum paulo longiora, ceterum caulinis similia. Seta ex apice ramulorum solitaria 1—1½'' longa stricta, sicca parum tortilis brunnea aut versus apicem aurantiaca. Theca obliqua pyriformis, parum arcuata laevis, *senior tantum irregulariter corrugata* flavescens, maturitate nitida. Peristomium duplex; externum: dentes 16 anguste lanceolati horizontaliter trabeculati brunnei incurvi; interius: totidem paulo breviores, fere lineares obtusiusculi, dilute colorati. Operculum convexum breve mammillatum.

E theca seniore irregulariter corrugata *ad Funarias thecis striatis* pertinere videtur, nobis tamen dubia.

b. *Theca laevis.*

5. **F. Mühlenbergii** Schwägr. (Suppl. I. P. II. p. 78. tab. 66.); densiusculo cespitosa humilis; folia inferiora remota, perichaetia rosulata lato-ovalia *subito longissime acuminata pilifera nervo infra apicem evanido apicem versus obsolete denticulata*; theca clavato-pyriformis erecta collo et pedunculo brevi stricto sicco dextrorsum torto praedita pallida ore purpurea, exannulata, operculo conico pallido.

Brid. II. p. 55. — Bryol. Europ. I. c. p. 6. tab. 1. — *Funaria calcarea* Wahlenb. in Nov. Act. Holm. 1806. tab. 4. fig. 2. — *Bryum funarioides* Brid. Mant. Musc. p. 120. et Bryol. univ. II. p. 55. —

β. *patula*, foliis brevi-acuminatis patulis subintegerimis. *F. neglecta* De Notaris mst. *F. Fontanesii* Bruch olim in Musc. Sard. Müllerianis.

γ. flaccida, foliis longioribus flexuoso-tortilibus.

Patria. In America septentrionali: Pennsylvania; Mühlenberg primus detexit. In muris calcareis argillosis vinearum prope Durlach mag. Ducat. Badensis: A. Braun; locis similibus prope Zillisheim Alsatie sup.: Mühlenbeck. In Tirol prope Klausen: Sendtner. — In Scandinaviae Gottlandia ex obs. Cl. Ångström in El. Fries Summa Veget. Var. *β.* et *γ.* in Sardinia: Fr. Müller; in Gallia meridionali: Salzmann; prope Vacluse: C. Schimper; in Mauritania prope Tanger: Salzmann; in Asia minori prope Smyrnam: Fleischer. Vere. ☉.

Dentes peristomii minus obliqui quam in praecedentibus. Sequentibus proxima sed notis editis facile cognoscitur.

6. F. Hibernica Hook. (in Fl. Lond. ed. 2. c. ic.); cespitulosa humilis; folia inferiora remota, perichaetialia lato-ovalia *sensim longissime acuminata evanidinervia argute serrata*; theca *exannulata clavato-pyriformis* erecta collo brevi, pedunculo sicco *sinistrorsum* torto, brevi stricto operculoque conico praedita pallida.

Hook. et Tayl. Muscolog. Britannic. Lond. 1818. p. 70. tab. 20. — Brid. II. p. 56. — Bryol. Europ. l. c. p. 7. tab. 2. — *Funaria Mühlenbergii* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 380. — *Fun. dentata* Crome 3. 12.

Patria. In editis Zippendorfsibus prope Schwerinum, ubi in locis umbrosis arenariis primi legerunt Weber et Mohr. — In rupibus arenariis Franconiae: Funk; in iisdem locis prope Gressweiler Alsatie: Kneiff; in olivetis prope Varennam ad lacum Comensem vulgatissima: W. P. Schimper; in monte „au vieux château” prope Martigny Valesiae: Idem; in monte Salève, loco praerupto „pas de l’échelle” dicto prope Genevam: Mühlenbeck. In tuguriorum tectis Hiberniae loci Blarney prope Cork: Drummond. In Hercynia inter Rübeland et Königshütte: Hampe. Incunte aestate. ☉.

F. Mühlenbergii proxima, differt autem magnitudine proceriore foliis sensim acuminatis longioribus, argute serratis, serraturae dentibus acutis, pedunculo siccitate om-

nino sinistrorsum torto sinistrorsumque convoluto, theca longiore minus inflata. An characteres constantes?

7. **F. serrata** Pal. Beauv. (in Brid. Bryol. univ. II. p. 57. et in Mant. Musc. p. 124.); folia inferiora oblongo-acuminata, superiora spathulato-acuminata, acute serrata subtortilia; theca exannulata *subarcuata*, sporangio *globo*so, collo longiore, operculo *plano-converso*, pedunculo *sicco dextrorsum torto*, peristomio *subdepresso*. †.

Bryol. Europ. I. c. p. 8. tab. 3.

Patria. Ad fossarum margines Sardiniae: Fr. Müller. In Pensylvania Palisot de Beauvois detexit. *Ineunte aestate.* ☉.

Præcedenti simillima, sed thecae forma, sporangio, operculo plano non conico acuto et peristomio subdepresso distincta.

8. **F. physcomitrioides** Mont. (in ann. d. sc. nat. Tom. XVI. 1841. p. 253.); *dioica*; caulis erectus simplex; folia erecta oblonga acuminata, acumine filiformi tertiam folii partem aquante breviorique, nervo ad apicem percurso, integerrima tenerrima flaccida, grosse reticulata, siccitate crispula; pedunculus flexuose erectus apice dextrorsum tortus; theca exannulata erecta pyriformis basi plicata caeterum laevis, operculo planissimo; peristomii exterioris dentes *apice non cohaerentes irregulares constricto-articulati*, interioris punctulati. †.

Funaria subnuda Tayl. in Lond. journ. of bot. 1846. p. 57. ex observationib. Cl. Wilson (l. c. p. 451.) huc pertinet varietas foliis minus acuminatis.

Patria. Ad terram circa Koitie in montium Nilaghiiriensium sylvis siccis: Perrottet. — E Nova Hollandia ad flum. Swan River lectum habuit Taylor.

Folia fere *F. flavicantis*, sed theca erecta exannulata aliaeque notae ab ea hancce speciem remove suadent. A *F. Fontanesii* differt imprimis ut *Physcomitrium Bonplandii* a *Ph. fasciculari*, operculo scilicet planissimo.

An inflorescentia revera dioica?

9. **F. Fontanesii** Schwägr. (Suppl. I. P. II. p. 80. tab. 66.); folia inferiora remota, superiora rosulata oblonga *acuta serrata* margine flexuosa tenerrima, nervo infra apicem evanido, laxissime areolata; theca erectiuscula *elongato-pyriformis* laeviuscula forsan exannulata.

Brid. II. p. 56 et p. 739. — Schwägr. Sp. Musc. 1830. p. 46.

Patria. In Barbaria lectam Schwägrichenio communicaverunt Desfontaines, ex Aegypto allatam Persoon, Lusitanicam Sprengel. E regno Chilensi Bruch et Schimper habere dicunt Bryol. Europ. l. c. p. 5. — Specimina Brasiliensia a Cl. Persoon communicata in Hb. Bridelii vidimus. Differunt autem operculo valde conico, dum auctor parum convexum (Suppl. I. P. II. p. 80.) descripsit. ☉.

F. Mühlenbergii proxima sed foliis acutis, non longe acuminatis, serratis; theca longiore et peristomio brevior differt. An hi characteres sat distinguentes sint, dubitamus. Forsan forma *F. Mühlenbergii*? Auctor tamen (Spec. Muscor. p. 46.) thecam maturam et siccam sulcatam descripsit. Theca immatura per siccitatem ita contrahitur, ut omnino erecta et potius Splachno similis videatur.

10. **F. glabra** Tayl. (Lond. journ. of bot. 1846. p. 57.); folia superiora in rosulam congesta erecta oblongo-obovata apiculata serrulata evanidinervia; theca brevi-pedunculata glabra ovata, hinc gibba illinc declinata elongate apophysata, operculo plano mammillato praedita exannulata. †.

Patria. Nova Hollandia ad flumen Swan River: J. Drummond.

Peristomium interius brevissimum e laciniis valde irregularibus 16 formatum. *F. Fontanesii* proxima, foliis autem latioribus longius acuminatis praecipue peristomio interno brevissimo distinctum.

Species nobis nomine tantum nota.

1. **F. mucronata** Hartm. in Summa Vegetabil. Scandinaviae auctore El. Fries a Cl. Ångström in Norvegia lecta memorata (p. 88.).

Gen. II. **Pyramidium** Brid.

Bryol. univ. I. p. 107. — *Pyramidula* Brid. Mant. Musc. p. 20. —
 Bryol. Germ. I. p. 85. — *Physcomitrium* Fürnrohr. Hampe. —
 Bryol. Europ. Funariaceae. Fasc. XI. — *Physcomitrium* *Pyrami-*
dula C. Müll. in Linn. XVIII. p. 694. — *Gymnostomum* Schwägr.
 et mult. al. auct. prior.

Nomen Bridelianum, e forma calyptrae pyramidalis de-
 sumptum.

Calyptra tetragona pyramidata apiculata, basi integra, thecam longe superans totam obtegens inflata persistens, medio latere rumpens magna. Theca symmetrica erecta pyriformis eperistomata. Operculum regulariter areolatum.

Ex omnibus partibus *Funariacearum* habitum refe-
 rens, e calyptrae forma autem inflato-persistente medio
 latere rumpente *Calymperium* congeneres in memoriam
 redigens et nota hacce excellentissima a *Physcomitriis* at-
 que *Entosthodontibus* distinctissimum.

1. **P. tetragonum** Brid. (l. c. p. 108.); gregarium
 humillimum subacaule; folia densissime imbricata e basi
 latissima concava lato-cuspidata, nervo crasso longe
 subexcurrente praedita, integra arctius areolata; theca
 brevissime pedunculata, operculo conoideo obtuso.

Pyramidula tetragona Brid. Mant. Musc. p. 20. — Bryol. Germ.
 l. c. p. 86. tab. 8. fig. 1. — *Gymnostomum tetragonum* Schwägr.
 Suppl. I. P. I. p. 22. tab. 8. — *Gymn. pyriforme* juvenile Voit. Musc.
 Herbipol. p. 17. — *Physcomitrium tetragonum* Fürnr. Hmp. Bryol.
 Europ. l. c. *Physcomitrium* p. 9. tab. 1.

Patria. In Thuringiae agris suburbicis circa Gotham
 et Erofurtum: Bridel primus detexit. Ad pedem Mon-
 tis Piniferi Franconiae prope Berneck: Funk. Pr. Ra-
 tisbonam: Emmerich; pr. Neovidam tract. Rhen.: Breu-
 tel. Prope Blankenburgum Hercyniae ad ped. loci Re-
 genstein: Hampe. — In Smolandia (Gothiae) et prope
 Upsalam Sueciae: Ångström. — In agro Taurinensi:
 De Notaris. — Species in iisdem locis per plures (sic-
 ciores) annos interdum non occurrens. — *Primo vere.* ☉.

Planta mascula ad pedem femineae parva gemmacea foliis patentibus imbricatis. — Calyptra decidua planta ex habitu *Physcomitrico sphaerico* v. *acuminato* valde similis sed quoque calyptra deficiente foliis multo densius areolatis, e cellulis granulis chlorophyllaceis valde repletis compositis longe cuspidatis excurrentinervibus primo intuitu cognoscenda.

Gen. III. **Physcomitrium** Brid. emend.

Br. un. I. p. 97. — Hmp. Bot. Zeit. 1837. — Bryol. Europ. Funariaceae. Fasc. XI. — *Gymnostomum* auct. permult. prior.

Nomen a verbis graecis *γύσκη* vesica, et *μίτρον* calyptra ob calyptram primam vesiculiformem; a Bridelio congeneribus tam hujus generis quam *Entosthodontibus* eperistomatis impositum, a nobis speciebus sequentibus servatum.

Calyptra *mitraeformis* basi in pluries lacinias latas inferne integras fissa, theca multo brevior, longe apiculata. Theca *symmetrica* recta pyriformis eperistomata. Operculum *regulariter areolatum*.

Congeneres omnes huc in genus proprium redacti ab omnibus auctoribus prius cum speciebus, calyptra dimidiata instructis eperistomatis, generis sequentis conjuncti sunt. Genus igitur hucusque confusum fuit. Qua de causa nomen *Physcomitrii Bridelianum* praeferimus, quum nec Bridel, nec auctores ceteri genus clare intellexerint, primus autem, *Physcomitria* a ceteris *Gymnostomis* distinctissima esse, jam optime observaverit et (Bryol. univ. I. p. 103.) hanc sententiam acute extulerit, indice tandem (p. 815.) nomen *Physcomitrii* proprium dederit.

1. **Ph. acuminatum** Br. et Sch. (in Bryol. Europ. Funariac. Phyc. 1844. p. 11. tab. 3.); parce ramosum humile; folia ovato lanceolata nervo crasso longe excurrente *acuminata stricta* integerrima vel subdenticulata; theca *brevi subgloboso-pyriformis* orificio lato, operculo convexo recte apiculato.

Gymnostomum acuminatum Schleicher Catal. Plant. Helvet. p. 40. — *Gymn. latifolium* Hook. in Drumm. Musc. Amer. No. 16. et Schwägr. Suppl. IV. tab. 304. — *Physcomitr. Hookeri* Hmp. in excurs. in *Physec. Thieleanum* in Ic. Musc. Frond. nov. v. min. cognitor. — *Gymnostomum eurystoma* N. ab Es. mst. — *Physcomitr. eurystoma* Sendtn. in Denkschriften der Königl. Baierischen bot. Gesellschaft. zu Regensburg. 3. Bd. 1841. p. 142.; variet. foliis distincte sed obtuse denticulatis.

Patria. In limosis Helvetiae (ubi?) Schleicher primus detexit. — In fossis ad piscinas Giersdorfenses in valle Cervimontana Silesiae: Nees ab Es. legit Sept. 1834. plantam fructificantem. — Prope Vratislaviam: Wimmer. — Prope Cervimontium Silesiae: v. Flottow. — Prope Niederleipe in vicinitate Javorii in piscina exsiccata: Sendtner. — In America septentrionali: Low points of the River Saskatchewan pr. Carlton House: Drummond No. 16. — *Auctumno.* ☉.

Ph. pyriformi proximum, foliis autem longius cuspidatis plerumque integerrimis angustioribus excurrentinervis, theca sicca ore amplissima sporisque duplo majoribus differt. E rarissimis!

2. Ph. sphaericum Brid. (I. p. 97.); humile; folia ovali – oblonga subspathulata *obtusae-acuminata* margine crenulata patentia; theca *obsolete pyriformis hemisphaerica parva stomate amplissimo*, operculo magno convexiusculo brevi acuminato et pedunculo *tenuissimo* siccitate sinistrorsum torto praedita.

Gymnostomum sphaericum Schwägr. in Schraders Journal IV. p. 15. c. ic. et in Suppl. I. P. I. p. 21. tab. 8. Bryol. Germ. I. p. 124. tab. 9. fig. 3. — *Gymnost. Physec. sphaericum* Brid. I. p. 97. — *Physcomitrium sphaericum* Hmp. Regensb. bot. Zeit. 1837.

β. caulescens, foliis patulis remotis latioribus, caule graciliore.

Patria. In solo argilloso prope Dresdam primus legit Ludwig. Per totam Europam temperatam sed nusquam vulgare! *Auctumno.* ☉.

Ex habitu *Pottiae truncatae* maxime simile sed notis illustratis facillime cognoscendum. E locis diversis magnitudine partium omnium valde varians.

3. Ph. Thieleanum Hmp. (in Ic. Muscor. Fr. nov. v. min. cognit. tab. 30.); subsimplex; folia *amplissime cellulosa* oblongo-ovata lanceolata acuta dentata, nervo crasso ante summum apicem evanido; theca *brevi-pyriformis*, deoperculata *amplissime cupularis maxime truncata et articulato-apophysata* operculo conico apiculato; calyptra junior mitraeformis.

Patria. Brasilia: Monte Video ubi legit Sellow.

E theca maxime truncata hemisphaerica ad *Ph. sphaericum* accedens sed foliis acutis jam distinctum. A *Ph. acuminato* statura robustiore folisque evanidinervibus acutis, non longe acuminatis, valde dentatis cellulis amplissimis laxissimis instructis valde refugit. Ex habitu *Ph. pyriformi* simile sed foliis acutioribus et cellulis, tandem thecae forma distinctissimum. Inter *Ph. sphaericum* et *Ph. pyriforme* intermedium.

4. Ph. pyriforme Brid. (Br. univ. I. p. 98.); late cespitosum robustum; folia caulina inferiora remota ovato-lanceolata, superiora *spathulato - vel elongato-lanceolata* *evidenter serrata* concava, nervo ante apicem evanido; theca *ampla* pyriformis, operculo *e basi subplana obtuse apiculato*.

Bryol. Europ. l. c. p. 11. tab. 2. et Hmp. Regensb. bot. Zeit. 1837. — *Gymnostomum Physcomitrium pyriforme* Brid. l. c. p. 98. — *Gymnostomum pyriforme* Hew. Fund. Musc. II. p. 87. et Bryol. Germ. I. p. 144. tab. 10. fig. 11. — *Gymnostom. splachnoideum* P. B. Prodr. p. 59. — *Gymn. Physc. splachnoideum* Brid. I. p. 99. — *Gymn. dilatatum* P. B. Prodr. p. 59. — *Gymn. turbinatum* Rich. in Mich. Fl. Amer. sept. II. p. 286. — *Gymn. Physc. turbinatum* Brid. I. p. 100. — *Gymn. Physc. tortipes* Brid. I. p. 100. — *Pottia pyriformis* Ehrh. Beiträge I. p. 188. — *Phascum pyriforme* Linn. jun. Meth. Musc. p. 361. — *Bryum pyriforme*, antheris erectis obovatis, calyptra subulata, surculis acaulibus, foliis ovatis muticis. Linn. Sp. Pl. p. 1580. — *Bryum serpyllifolium*, pellucidum, capsulis pyriformibus. Dill. Musc. p. 345. tab. 44. fig. 6. L.

Patria. In limosis, agris et pratis humidis totius fere Europae et Americae septentrionalis. Vere. ☉.

Species calyptra ignota igitur incerti generis.

1. Ph. Perrottetii Mont. (in ann. d. sc. nat. Tom. XVI. 1841. p. 256.); parvulum *subacaule*; folia ovata *acuminata in bulbum oratum conniventia*, exteriora breviora seminervia, intima longiora *nervo excurrente cuspidata*; theca concinne pyriformis erecta laevis ore angusto operculoque plano. †.

Patria. Juxta vias et semitas ad terram humidam circa Koitie in montibus Nilaghiriensibus: Perrottet.

Folia radicalia apice quandoque grosse dentata, ac si erosa fuissent, exteriora minora, nervo dimidiato insignia, interiora s. perichaetialia grandiora nervo crasso viridi excurrente cuspidato. Retis areolae elongato-quadratae, limitibus crassis. Pedunculus brevis dextrorsum tortilis. Calyptra generis, straminea. (An dimidiata? An mitraciformis?). Folia perigonialia caulinis simillima.

Ph. Bonplandii quam proximum, sed caule subnullo, foliis excurrentinervibus cuspidatis nec non aliis notis certe diversissimum.

2. Ph. Orbignianum Mont. (Voyage dans l'Amérique mér. par d'Orb. Tom. VII. Cryptog. p. 87. c. ic.); caulis erectus *longissimus* cespitosus simplex v. ramosus; folia e basi amplexicauli *elongato-lanceolata acuminata dentato-spinosa carinata undulata erecta v. reflexa*, siccitate *crispato-involuta*, nervo ultra medium subcontinuo; thecae turbinato-obconicae operculo plano v. convexiusculo-mammillato. †.

Gymnostomum Orbignianum Mont. in ann. d. sc. natur. 1837. Vol. VIII. p. 51.

Patria. America meridionalis in provincia Corrientes ad terram arenosam in collibus sylvaticis secus flumen Sanctae-Luciaae: d'Orbigny. 24? Junio.

Ph. pyriformis formae elongatae Ph. turbinato simile ab eodem autem et omnibus congeneribus altitudine foliis fere ut in *Mnio spinoso* dentato-spinosis, siccis crispato-

inflexis operculoque plano mammillato nec convexo-umbonato diversum.

3. Ph. Bonplandii Brid. (l. p. 101.); caulis humilis subsimplex gregarius; folia inferiora remota, superiora et perichaetialia rosulato-patentia *flarescentia* oblongo-ovalia apice carinato-concava acute acuminata, nervo evanido crasso *ferrugineo* ante apicem abrupto praedita, e cellulis-laxis *sed minoribus* reticulata, apice dentata reflexiuscula s. inflexiuscula; theca *anguste-pyriformis* stomate parvo praedita, longe-pedunculata omnino rufa; operculum (ex observ. Bridelii) *planiusculum*.

Gymnostomum Physcomitrium Bonplandi Brid. l. c.

Patria. America meridionalis ubi in locis non designatis legerunt Humboldt et Bonpland. E regno Chilensi in terra arenosa crescens misit Philippi: Hb. Reg. Berol. ☉.

Species optima ex habitu *Entosthod. ericetorum* simillima sed foliis immarginatis distinctissima. Ab omnibus congeneribus theca subcylindrico-pyriformi ore angusta et arcte apophysata igitur obovata *E. ericetorum* perfecte simili facillime distinguenda. — Folia interdum subintegra seu obsolete denticulata. Calyptra verisimiliter dimidiata quum planta cum *Ent. ericetorum* valde conveniat; *Entosthodon* igitur erit.

4. Ph. spathulatum C. Müll. (Linn. XVIII. p. 695.); caulis subramosus erectus; folia inferiora remota superiora laxissime imbricata haud rosulata *longe-spathulato-ovalia* acuminata evanidinervia e cellularum serie unica valde elongatarum *flarescentium* submarginata apicem versus denticulata; theca inaperta *globoso-pyriformis* operculo hemisphaerico-brevi pedunculoque brevi praedita, aperta *cyathiformis* ore amplissimo instructa sublongicolla.

β. *brevicollum*; foliis latissimis valde dentatis laxissime areolatis theca brevicolla amplissima. *Gymnostomum spathulatum* verum Hornschuchii in Linn. 1841. p. 115. descriptum.

Patria. Prom. bon. spei: Philippstown: Pappé, Ecklon. Var. β . in iisdem locis. Inter Key et Bosche in locis humidis umbrosis in rivulo exsiccato legit primus omnium Drège Junio 1832. ☉. Hb. Kunz.

Ph. pyriformi simillimum foliis autem submarginatis thecaque minori maxime truncata amplissima cyathiformi operculo obtuso-conico instructa distinctissimum.

5. **Ph. Jamesoni** Tayl. (Lond. journ. of bot. 1847. p. 329.); caulis *brevissimus* erectus subsimplex; folia erecta ovato-lanceolata acuminata *concava margine incurva integerrima* evanidinervia; theca erecta obovata subapophysata operculo minuto plano, *ore membrana opaca* rufo-brunnea, e cellulis irregularibus formata, praedita. $\frac{1}{4}$.

Patria. In Pichincha prope Quito Andium: W. Jameson Novbr. 1846.

Entosth. apophysato proximum sed foliis magis erectis brevioribus latius acuminatis differt.

Species nobis incerta.

1. **Gymnostomum Jamesoni** Walk. Arnott. (in Wern. Transact. V. p. 200.); folia late lineari-lanceolata margine convoluta integerrima, siccitate incurvo-tortuosa; nervo excurrente; theca turbinata ore amplo, operculo rostrato urna longiore praedita exannulata. $\frac{1}{4}$.

Walk. Arn. Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Paris I. p. 347. Disposit. method. des Espèces de Mousses p. 10. — Hornsch. in Fl. Bras. Fasc. I. p. 4.

Patria. Brasilia in collibus prope Sebastionopolin: Jameson.

Cl. Montagne (Ann. d. sc. nat. Tom. VIII. 1837. p. 51.); *Physcomitrii Orbigniani* affine nominavit, ex qua ratione, hanc speciem ad Funariaceas adducendam esse, elucere videtur. Cl. Hornschuch (l. c.) *Gymnostomi tortilis* varietatibus majoribus sat similem at foliorum thecae et operculi figura distinctam descripsit. An huc pertineat? Judicium non habemus.

Gen. IV. **Entósthodon** Schwägr. emend.

Suppl. II. P. I. p. 44. — Brid. Br. univ. I. p. 378 et 779. — Bryol. Europ. Funariaceae. Fasc. XI. Entosthodon. — *Gymnostomum* auct. — *Physcomitrium* al. — *Weisia* Hooker et Tayl. Hornsch. — *Bergia* Fürnrohr. — *Desmostomum* Hsch. — *Funaria* Engl. Bot. Smith.

Nomen ab ἐντοσθεν *intus*, et ὀδοὺς *dens* ob dentium peristomii insertionem deductum.

Calyptra vesiculari-dimidiata longe apiculata, integra rotundata seu truncata fissilis. *Theca symmetrica* pyriformis recta vel pedunculo arcuato declinata peristomata vel peristomio nullo. *Peristomium*, sin adsit, *horizontale* siccum erectum, simplex, internum nullum vel vix conspicuum e laciniis brevissimis constructum. *Dentes* lanceolati *exappendiculati*, simplices vel gemelli, extus plani, inter trabeculati apice plerumque obliqui conniventes sed non connati. — *Operculum* regulariter areolatum.

Congeneres eperistomati prius *Physcomitria* nominati sunt; e calyptrae forma autem ab Entosthodontibus nunquam discerni nequeunt.

I. **Eperistomati.**

1. **E. fasciculare** C. Müll. (mst.); gregarius; folia inferiora remota, superiora subrosulata *ovato-oblonga* acuminata vel late lanceolata margine serrata nervo ante apicem evanido; *theca perfecte pyriformis ampla* erecta operculo convexo; *calyptra inflato-cucullata* basi rotundata.

Physcomitrium fasciculare Bryol. Europ. l. c. p. 13. tab. 4. — Hampe in Regensb. bot. Zeit. 1837. — *Gymnostomum Physcomitrium fasciculare* Brid. I. p. 101. — *Gymn. fasciculare* Hedw. Sp. Musc. p. 38. tab. 4. fig. 5—8. — *Bryum fasciculare* Dicks. Fasc. III. Pl. Crypt. p. 3. tab. 7. — *Br. Aegypti* Hasselq. It. p. 502. e Smithii auctoritate, Mohro negante. — *Hyssopus Salomonis* Hasselq. It. p. 614. Herb. Linn. — *Bryum serpyllifolium* pellucidum, capsulis pyriformibus. Dill. Musc. p. 345. tab. 44. fig. 6. A—K.

Patria. In campis et aggeribus argillosis per totam Europam. *Vere.* ☉.

Locis siccioribus pedicello incurvo vel arcuato occurrit. *Bryol. Europ.* p. 10.

2. E. curvisetus C. Müll. (mst.); cespitosus; folia inferiora remota, superiora subrosulata *spathulato-acuminata* serrata, nervo ante apicem evanido; theca pyriformis *longicolla in pedunculo arcuato pendula*, operculo convexo - plano, et calyptra *longiore basi truncata inflata*.

Physcomitrium curvisetum *Bryol. Europ.* l. c. p. 10. tab. 4. — Hampe in *Regensb. bot. Zeit.* 1837. — *Gymnostomum Physcomitrium curvisetum* Brid. I. p. 103. — *Gymnostomum curvisetum* Schwägr. *Suppl. II. P. I.* p. 17. tab. 105.

Patria. In terra argillosa praeprimis novalium Sardiniae, Siciliae, agri Neapolitani et Romani, Normandiae, Franconiae prope Kulmbach: Funk. In Algeria ad terram collium occidentalium mense Februarii legit W. Schimper. *Primo vere.* ☉.

Species optima, ab omnibus congeneribus ceteris theca pedunculo arcuato declinata distinctissima.

3. E. Rottleri C. Müll. (mst.); cespitosus; folia inferiora remota, perpauca, superiora subrosulata patula erecta *spathulata nervo ferrugineo excedente longe-cuspidata* denticulata; perigonia longissime cuspidata subintegra angustiora undulata; theca *pedunculo subarcuato brevi clavato-pyriformis longicolla*, operculo planiusculo parvo calyptra basi truncata.

Physcomitrium Rottleri Hmp. C. Müll. in *Linnaea* XVIII. p. 696. — *Rottleria gymnostomoides* Brid. I. p. 105. — *Gymnostomum Rottleri* Schwägr. *Suppl. I. P. I.* p. 24. tab. 3.

Patria. In muris lutosi Tranquebariae primus legit Rottler. In promontorio bonae spei non raro: Ecklon, Mundt, Pappe. ☉.

E. curviseto proximus, foliis autem longe cuspidatis excurrentinervibus thecaque subarcuata longiore longicolla ab eodem ceterisque *Entosthodontibus* sat diversus.

4. **E. ericetorum** C. Müll. (mst.); gregarius; folia inferiora remota, superiora patula *ovali-lanceolata acute interdum longe acuminata marginata dentata flavescentia* evanidinervia; theca parva ovalis *vix pyriformis ore angusto operculoque convexo interdum mammillato praedita*; calyptra basi rotundata.

Physcomitrium ericetorum Bryol. Europ. l. c. p. 13. tab 3. — *Physcom. Bonplandi* De Notaris Syllab. Musc. p. 283. — *Gymnostomum Ahnfeltii* Fries Novit. et in Hartm. Skand Fl. ed. III. p. 263. — *Gymnost. fasciculare* Hook. et Tayl. Muscol. Brit. p. 23. tab. 7. — *Gymnost. obtusum* Savi Bot. etr. 3. p. 32 *. — *Gymnost. ericetorum* Bals. et De Not. Pugill. n. 27.

Patria. In ericetis humidis. Germania: prope Jeve-ram Ducat. Oldenburg., Bonnam, tract. Rhen., in Hassia superiore. Alsatia prope Gebweiler. Italia: prope Mediolanum, in agro Taurinensi, in Etruria. Corsica. Sardinia. Hibernia. Skandinavia. Gothia (Smålandia): Ahnfelt. — *Junio.* ☉.

Ab omnibus congeneribus ceteris foliis perfecte marginatis valde differt. Species foliis flavescentibus thecaque parva pulchre rufa perbella.

5. **E. Taylora** C. Müll. (mst.); caulis abbreviatus subsimplex; folia oblonga tenera concava apiculata subserrulata, nervo ante apicem evanescente; theca ovata longius obconica apophysata, operculo plano calyptraque tumida apice subulata. †.

Gymnostomum apophysatum Tayl. (in Lond. Journ. of bot. 1846. p. 43. — *Physcomitrium apophysatum* Wils. l. c. p. 448.: foliis ovatis acuminatis subintegris evanidinervibus theca clavata.

Patria. Nova Hollandia ad flumen Swan River: J. Drummond.

Ex habitu *Funariae*; folia perichaetialia rosulata tumido-congesta; setae c. unc. un. longae. *E. Rottleri* proximus sed apophysi longiore et nervis evanescentibus differt.

II. Peristomati.

6. **E. radians** C. Müll. (mst.); caulis simplex; folia terminalia octonia spathulato-ovalia *apice denticulata* nervo

rubente ante apicem evanido praedita; theca subcernua urceolata apophysii obconica. —

Eremodon radians Brid. I. p. 236. — *Weisia radians* Hedw. Op. posth. p. 73. tab. 13. — *Bryum radians* Pal. Beauv. Prodr. p. 49.

Patria. In insulis Australiae.

A sequente, quocum commutatus, notis illustratis certe distinctus. Ex iconibus Cl. Schwägricheni supra laudatis *Entosthodon* verus esse videtur. Dentes lanceolati acuti, tenuissime trabeculati rubentes. Pedunculus *erectus* tortilis splendens basi ater superne laete rubicundus. Ex analogia specierum peristomatarum huc referimus.

7. E. curvipes C. Müll. (mst.); caulis simplex laxe cespitosus; folia inferiora perpauca, superiora in coma imbricata posita *lato-oblonga acute acuminata valde concava integra* laxissime areolata, nervo crasso evanido concolore; pedunculo sicco dextrorsum torto *valde arcuato*; theca pyriformis *ampla* operculo conico-hemisphaerico; dentes externi 16 lanceolati trabeculati et linea media instructi purpurei apice pallidiores nodosiusculi; intus sporangidii membrana in lacinias obtusas dentibus alternas producta.

Physcomitrium Entosthodon curvipes C. Müll. in Linnaea XVIII. p. 697.

β . *robustior*, caule inferne subnudiuseculus apicem versus foliis latioribus magis patulis planiusculis obtusioribus, dentibus latioribus robustioribus longioribus intensius coloratis. *Funaria radians* Bruch et Sch. in Muscis Abyssin. Schimperian. Un. itiner. An notis species propria?

Patria. Abyssinia: in regione boreali montis Silke ad fines arborum et fruticum 11,000 pedes supra mare inter *Solorinam Simensem* Hochst. No. 1393. Un. itin. 22. Febr. 1840 legit W. Schimper. Var. β . in locis nobis ignotis Abyssinae ejusdem collectionis.

Entosth. curviseto proximus sed pedunculo funarioideo-arcuato, foliis integris vix obsolete denticulatis thecaeque peristomata valde recedit. Calyptra quidem ignota, sed tamen ex analogia specierum peristomatarum huc pertinere videtur.

8. **E. Mathewsii** J. Hook. (ic. pl. rar. Hook. Vol. IV. 1841. tab. 245. B.); cespitosus simplex; folia superiora erecta late oblongo-lanceolata acuminata serrata, evanidinnervia; theca *anguste-pyriformis* operculo convexiusculo subconico praedita *erecta*, *pedunculo stricto*, dentibusque peristomii linea media exaratis articulatis.

β . *latifolius*; foliis obovatis acuminatis serratis, theca lato-pyriformi, operculo planiusculo, dentibus peristomii latoribus. *Entosth. latifolius* J. Hook. l. c. tab. 245. C.

γ . *integer*; dense cespitosus foliis superioribus rosulato-imbricatis obsolete denticulatis v. integriusculis; theca anguste pyriformi brunnea, dentibus peristomii angustis brevibus subrugulosis minus articulatis linea media vix exaratis; intus membrana sporangidii in lacinias obtusas brevissimas producta praedita, calyptra basi truncata inflata.

Physcomitrium (Entosth.) *Mathewsii* C. Müll. in *Linnaea* XVIII. p. 697. pro α . et β .

Patria. In locis humidis „Lomas of Amancoes” dictis prope Limam regn. Peruviani; Mathews. Var. β . prope Limam. Var. γ . Chile: Pöppig. 1829. Hb. Kunzeanum.

Entosthodon Templetoni proximus sed foliis serratis magis attenuato-acuminatis et dentibus linea media praeditis ab α . et β . differt. Var. γ . jam calyptra basi truncata distincta. — Si variet. α . et β . calyptra basi rotundata inveniatur, var. γ . species propria erit.

9. **E. Templetoni** Schwägr. (Suppl. II. P. I. p. 44. tab. 113.); simplex; folia superiora rosulata patula late obovato-acuminata nervo sub apice evanido, margine crenata; theca anguste pyriformis *aurantiaca longicolla* dentibus *subulato-lanceolatis in articulationibus nodosis* *linea longitudinali nulla vel obsoletissima*, operculo plane convexo calyptraque *basi rotundata*.

Brid. Bryol. univ. I. p. 379. — Bryol. Europ. Funariac. Entosthodon. l. c. p. 3. tab. 1. — *Weisia Templetoni* Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 42. tab. 14. — *Funaria Templetoni* Sm. Engl. Bot. tab 2524. — *Physcomitrium latifolium* Brid. Br. univ. I. p. 760. huc forsā pertineat? Caule erecto simplici, foliis apice confertis late ovatis apiculatis, thecae erectae subpyriformis pedunculo triplo longiore,

operculo planissimo. In insula Corsica cum *Funaria Mühlenbergii* promiscuum legit Thomas. Hb. Cand. *Entosth. curriseto* theca pyriformi et operculo planissimo simillimum distinctum tamen, ut videtur, foliis duplo latioribus brevius acuminatis *polygono-nec parallelogrammi-arcolatis* et pedunculo theca erecta triplo longiore cauleque inferne folioso nec nudo.

Patria. Ad terram humidam Hiberniae, Scotiae, Italiae et insularum mediterranearum. Sardinia. Sicilia. Corsica. In agro Tingitano. Arabia monte Sinai ubi ad fontes viget: W. Schimper. In Aegypto et in insula Teneriffa. — *Primo vere.* ☉.

10. **E. marginatus** C. Müll. (mst.); laxe cespitosus simplex, folia superiora rosulato-patula e basi oblonga quam *maxime laxe-arcolata lato-oralia obtuso-acuminata late et incrassato-marginata crenulata crispato undulata apicem versus arctius arcolata* nervo ante summum apicem evanido; theca brevi-pyriformis ampla aurantiaca ore parvo et operculo convexiusculo; calyptra basi truncata; dentes peristomii aurantiaci irregulariter trabeculati, linea media longitudinali nulla, subulati.

Patria. Promont. bon. spei prope Zwellendam: Ecklon. Hb. Kunzeanum. ☉.

Antheridia parva paraphysibus maxime clavatis cincta. Folia perigonialia amoenae rosulaceae horizontalia. *Ent. Templetoni* ex habitu similis sed ab eodem ceterisque congeneribus foliis obtusissimo-acuminatis incrassato-lato-marginatis valde refugit.

11. **E. obtusifolius** J. Hook. (in Hook. ic. pl. rar. tab. 245. A.); dense cespitosus simplex; folia e basi caulis usque ad apicem crescenti-imbricata elliptico-lanceolata obtusa integerrima; theca anguste pyriformis operculo convexiusculo, calyptra basi rotundata. $\frac{1}{4}$.

Physcomitrium Entosthodon obtusifolium C. Müll. in *Linnaea* XVIII. p. 697.

Patria. In locis humidis „Lomas of Amancoes” dictis prope Limam regni Peruviani: Matthews.

Foliis obtusis elliptico-oblongis ab omnibus congeneribus recedit. — Dentes peristomii linea media longitudinali praediti articulato-trabeculati latiusculi.

12. E. Bergianus Br. et Sch. (Bryol. Europ. l. c. p. 4. tab. 1.); humilis subacaulis vel elatior dense cespitosus; folia superiora rosulata conferta oblongo-ovalia longe acuminata evanidinervia, inferiora ovalia nervo excurrente mucronata omnia integerrima; theca pyriformis brevicolla parva operculo subconvexo; peristomii dentes lineali lanceolati obtusi breves linea longitudinali pallidior exarati fissiles trabeculato-nodulosi; calyptra (ex ic. Hornsch.) basi truncata.

Physcomitrium Entosthodon Bergianum C. Müll. Linn. XVIII. p. 696. — *Desmostomum* Hornsch. Linn. 1841. p. 116. — *Bergia* Fürnrohr in Regensb. bot. Zeit. 1829. Ergänzungsblatt p. 26. — *Weisia Bergiana* Hsch. in Hor. phys. Berolinens. p. 59. tab. 12.

Patria. Prom. bonae spei ubi ad montem leonis c. fructibus maturis primus legit Berg pharmacopola 15. Sept. 1816. — In terra argillosa ochracea locis humidis montis diaboli, nec non in muris hortorum circa urbem Capitis bonae spei: Ecklon. Drège. ☉.

Ex humilitate partium omnium ac foliis longe acuminatis late ovalibus arctius areolatis ab *Entosthodontibus* ceteris peristomatis facile distinguitur. Dentium forma variare videtur. In nostris speciminibus (c prom. b. sp. in terra prope van Campsbai lectis) subirregulares linea longitudinali carentes invenimus.

Gen. V. **Amblyodon** Pal. Beauv. emend.

Amblyodum P. B. Prodr. p. 41. ex parte. — Bryol Europ. Fasc. X. Meesiaceae. *Amblyodon*. — *Meesia* auct. al. — *Bryum* auct. antiq.

Nomen graecae compositionis ab ἀμβλὺς obtusus, et ὀδοῖς dens ob dentes externos breves obtusos impositum.

Calyptra cucullata angusta fugacissima longiuscula tenerrima apice e cellulis incrassatis minimis quadratis composita. Theca asymmetrica pyriformis recta peristomata annulata. Peristomium duplex; externum: dentes 16 breves lanceolati obtusi erecti trabeculati linea longitudinali tenera praediti

rufi; internum: *dentes totidem lanceolati subulati medio longitudinaliter fissiles laeves externos longitudine multo superantes flavescentes in membrana brevi sulcata positi.* Operculum regulariter areolatum. — Inflorescentia monoica polygama. Flos masculus discoidens, femineus et hermaphroditus gemmacei. Antheridia, archegonia et paraphyses ut in caeteris.

E structura foliorum *Funariaceis* simillimus, e forma thecae *Meeseis* proximus, e peristomio *Bryaceis* (*Pohliis*) affinis. Genus memorabile certe huc, minime ad *Meesiaceas* pertinens hucusque vi tantum peristomii ad eas relatum. Ab iis foliorum structura toto coelo differt et nunquam cum iis conjungi potest.

1. A. dealbatus P. B. (Prodr. p. 41.); humilis dense cespitosus simpliciusculus; folia oblongo-ovata subangusta acuminata obsolete denticulata evanidinervia, e basi et ultra medium e cellulis longis parellogrammis laxis valde viridibus, apice polygonis composita; theca e collo erecto pyriformis subobliqua vel curvata, pedunculo longo et operculo conico obtuso praedita rufa.

Bryolog. Europ. I. c. p. 5. tab. 1. — *Meesia dealbata* Hedw. Sp. Musc. p. 174. tab. 41. — Brid. II. p. 63. — *Bryum dealbatum* Dicks. Fasc. II. Pl. Crypt. p. 8. tab. 5. fig. 3.

Patria. E planitiibus ad alpes adscendens; in paludosis et turfosis per alpes Europae fere totius, omnis Scandinaviae atque Daniae, Scotiae et Iriae, Hispaniae, Helvetiae et Germaniae. In Germaniae planitie septentrionali prope Neodamum legit Itzigsohn. — *Julio.* 4.

Subtrib. II. SPLACHNACEAE.

Late-dense-cespitosae, *stercus animale plerumque habitantes*; caulis laxifolius valde ramosus. Inflorescentia hermaphrodita, dioica, rarius monoica. Flos masculus *gemmaeo-capituliformis* terminalis. Antheridia *magna clavaeformia curviuscula.* Archegonia angusta longiusculo-apiculata. Paraphyses

basi filiformes apice *subclavatae*. Peristomium, sin adsit, dentibus *regulariter lanceolatis nec obliquis nec trabeculatis geminatis rufescentibus carnosulis*. Columella *pro more exserta*. Thecae apophysis stomatiis plerumque praedita.

Habitus *Funariaceis* similis, e ramificatione autem plantarum crebra atque thecae *symmetricae* apophysi plerumque ventricosa saepe pulcherrime colorata proprius speciosissimus.

Patria. Per orbem terrarum totum *ex alpidibus in planities*, sed rarius, *descendentes*, locos humidos nivales v. turfosos amantes. 24.

Splachnaceae auctor. et Bryol. Europ. Fasc. XXIII et XXIV. Monographia eximia quam partim libenter sequimur.

Gen. VI. **Oedipódium** Schwägr.

Suppl. II. P. I. p. 15. tab. 105. — *Gymnostomum* Smith. — *Splachnum* Pal. Beauv. — *Bryum* Dicks.

Nomen graecae compositionis ab οἶδος *intumescencia* et ποῦς *pes*, ob pedunculum apicem versus incrassatum.

Calyptra *mollis longiusculo-angusta usque ad apicem fere fissa obtusa* basi sublacera. Theca subglobosa laxissime reticulata mollis collo longissimo, e pedunculo sensim incrassato, orto, praedita, stomate nudo. Columella *apice dilatata*. Omnes partes mollissimae. Inflorescentia monoica: Flores fertiles hermaphroditi patuli, antheridiis majusculis oblongis haud curviusculis, paraphysibus subclavatis mixtis; archegoniis brevioribus paraphysibus filiformibus mixtis. Flores steriles tantum masculi.

Ex habitu *Mniadelphearum* congeneribus simillimum, e partibus omnibus mollissimis calyptraeque forma bonum.

1. **Oed. Griffithianum** Schwägr. (l. c.); dense gregarium v. cespitosum innovationibus annotinis ramosum pulcherrime viridulum; caulis crassus mollis filis longis

teneris articulatis hyalinis obtectus; folia e basi angustissima, e cellulis longissimis laxissimis pellucidis tenerrimis composita, spathulato - lingulata rotundato - obtusissima integerrima, apicem versus e cellulis multo densioribus minoribus, granulis chlorophyllaceis repletis, subpolygonis, parietibus tenuibus instructis, formata, interdum filis, caulinis similibus, basi praedita subconcava, nervo laxissimo molli lato ante apicem obtuso - evanido; pedunculus brevis flavescens, theca ovali - globosa aurantiaca, operculo parvo conico.

Brid. II. p. 83. — Bryol. Europ. l. c. Oedipodium. p. 4. tab. 1. — *Gymnostomum Griffithianum* Smith. Fl. Brit. III. p. 1162. — Hook. Tayl. Musc. Brit. p. 11. tab. 7. — *Splachnum Froelichianum* Brid. Mant. Musc. p. 105. — *Splachnum Griffithianum* With. et Hull. e Musc. Brit. modo laudata p. 11. — *Bryum Griffithianum* Dicks. Crypt. Fasc. 4. p. 8. tab. 10. fig. 10.

Patria. In Angliae, Cambriae et Scotiae montibus editioribus alpinis, ubi rupium fissuras et loca humida petrosa tenet: ad latus orientale cacuminis montis Snowdon, ubi Griffith detexit; in rupibus praeruptis montis Ben Nevis; prope Ingleborough in Yorkshire: Dalton et Hooker, et prope Forfar in Angushire: Don. — Novis temporibus in districtu Bergensi Norvegiae detectum. — *Aestate.* Junio ad Augustum.

Planta notis permultis memorabilis, e characteribus essentialibus generi sequenti proximum quidem, ex illis tamen singularis.

Gen. VII. **Tetráplodon** Br. et Sch.

Bryol. Europ. l. c. Tetráplodon. — *Splachnum* auct. — *Pycnophyscium* Rehb. prioratum quidem tenet, sed genus ab auctore diagnosi non praeditum.

Nomen a verbis graecis τετραπλοῦς *quadruplex* et ὀδοῦς *dens* ob dentes quaternatim approximatos deductum.

Calyptra parvula cucullata usque ad medium fissa apiculata tenera. Theca apophysata ovali - cylindrica. Apophysis obconica, obovalis v. subovalis. Columella apice haud dilatata. Inflorescentia monoica.

Flos masculus gemmaceo-capituliformis in foliorum axillis sessilis v. in ramulo proprio terminalis. Flos femineus eparaphysatus. Peristomii dentes 16 duplices quaternatim approximati, lanceolati e cellularum seriebus duabus formati, basi per paria connati, siccitate reflexi, humiditate erecto-incurvi theca multo breviores.

Habitus inter *Tayloriam* et *Splachnum* intermedius.

1. **T. angustatus** Br. et Sch. (l. c. p. 4. tab. 1.); cespitosus elatus; folia *remota* erecto-patentia late lanceolata longissime acuminata siccitate subtorta *obsolete vel distincte dentata*; theca *in pedunculo brevi vix exserto* ovalis, apophysi multo majore oblongo-obconica; peristomii dentes quaternatim conferti.

Pycnapophyscium angustatum Rehb. Ic. Crypt. — *Splachnum angustatum* Linn. fil. Descr. Meth. Musc. p. 33. — Hedw. Musc. Frond. II. p. 37. tab. 12. — Brid. Br. univ. I. p. 248. — *Splachnum setaceum* Mich. Fl. Amer. Sept. II. p. 788. — Brid. l. c. p. 250. Drumm. Musc. Amer. I. No. 27?

Patria. Per totum alpium tractum Europae centralis, Scotiae et Scandinaviae, nusquam tamen copiose, et praecipue in stercore animali. *Julio et Augusto.*

Sequenti e caulibus foliisque similis, sed ab omnibus congeneribus theca vix exserta jam primo adspectu distinctissimus. — Flores masculi nunc ad basin innovationum, nunc in ramulis propriis terminales. Folia perigonialia, e basi lata concava intense lutescente, anguste acuminata obsolete nervosa subintegra. Folia perichaetialia fructu maturo comalibus similia subintegra.

2. **T. mnioides** Br. et Sch. (l. c. p. 5. tab. 2.); dense cespitosus; folia *subimbricata* vel erecto-patentia, oblonga et oblongo-ovata, *subito tenuissime acuminata* valde concava *integerrima* sicca subtorta, *nervo in apiculum plus minus productum excurrente*; theca ovali-cylindrica apophysi crassiuscula suffulta *longe exserta*, operculo obtuse conico; peristomii dentes *octo-gemini*.

Splachnum mnioides Hdw. Musc. Frond. II. p. 35. tab. 11. — Brid. l. p. 240. — *Spl. urceolatum* Dicks. Fasc. II. Pl. Crypt. p. 2.

et Hedw. Musc. Frond. p. 39. tab. 13. et Dav. Crantz Hist. Groenl. III. p. 284? *Spl. bryoides* Zoega Fl. Isl. p. 239. adnexa Olafsen's Reise durch Island. 2 Th. Copenh. 1775. 4.? — *Spl. urceolatum* β . minus Wahlenb. Fl. Lapp. p. 309. — *Spl. arcticum* Rob. Br. Fl. Ins. Melville (Capit. Parrys Voyage) 301. — *Spl. propinquum* Rob. Br. ibid. — *Spl. exsertum* Rob. Br. ibid. — *Spl. paradoxum* Rob. Br. ibid. — *Phascum mnioides* Linn. Meth. Musc. p. 6. — *Phascum pedunculatum* acaule anthera pedunculata Linn. Syst. Veget. p. 944.

β . *Brewerianus*; ramis gracilescentibus laxius foliosis, foliis angustioribus late lanceolatis patentibus. *Spl. Brewerianum* Hdw. Musc. Frond. II. p. 105. tab. 38. — Brid. I. p. 251. — *Spl. fastigiatum*, foliis lanceolatis acuminatis, receptaculo oblongo Dicks. Fasc. III. Pl. Crypt. p. 2. — *Spl. mnioides* β *majus* Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 20. — *Spl. canescens* Pal. Beauv. Prodr. p. 88? — *Bryum canescens* Vill. Pl. Dauph. III. p. 883? — *Bryum ampullaceum* Dill. Musc. p. 345. t. 44. fig. 5. Herb. Dill. e Brid.

γ . *Adamsianus*; theca pyriformis pallida flava ampla collo angusto breviori instructa. *Spl. Adamsianum* Hsch. in Hor. phys. Berol. p. 58. tab. 12. — Schwägr. Suppl. II. P. II. tab. 178.

Patria. Locis subhumidis in stercore animali corporibusque animalium putridis per partem sylvaticam et subsylvaticam totius alpium tractus et Germaniae septentrionalis torfaceis, raro tamen et valde sporadice; in Scandinavia et Lapponia multo frequentior. In Groenlandia et Labradore copiosissimus et pulcherrimus. — Var. β . In iisdem locis. — Var. γ . e Caucaso ab Adams relata.

E theca senectute nigrescenti-purpurea parva apophysi longa theca multo majore et pedunculo purpurascente juvenili flavescente a ceteris speciebus facillime distinguitur. — Fructus numerosissimi. Flores masculi nunc in perichaetii vicinia sessiles, nunc in ramulis propriis elati gemmaceo-capitati et gemmaceo-discoidei. Folia perigonialia e basi concava anguste lanceolata atque patula.

3. T. urceolatus Br. et Sch. (l. c. p. 7. tab. 3.); *compacte pulvinatus*; folia late obovato-oblonga ex apice obtuso apiculata inflato-imbricata maxime concava, nervo sub apice evanescente; theca pedunculo crassiore basi valde attenuato praedita, subcylindrica, apophysi bre-

viore obovata vel ovali-globosa; peristomii dentes breviores angustiores.

Splachnum urceolatum Brid. Bryol. univ. I. p. 242. ex parte.

Patria. In fimo bovino summarum alpium Helvetiae, Carinthiae et Salisburgiae, locis perpauca. In alpe Salmshöhe ad pedem montis Grossglockner Carinthiae: Hornschuch, Hoppe, Fr. Müller; in monte Albula Rhaetiae: Mühlenbeck, Mougeot; in summo Faulhorn Helvetiae: W. P. Schimper; in summa alpe Speiereck Lungaviae: Sauter, W. P. Schimper; in monte Radhausberg Salisburgiae: Noë. Loca cetera ab auctoribus designata dubia. — *Julio.*

Inflorescentia praecedentis. — Dentes peristomii secundum originem atque directionem omnino ut in *T. mnioides* sed angustiores et breviores aurantiaci. Ab omnibus plantis compacte pulvinatis, ramis densissime foliosis, pedunculo brevi flavescente atque thecae forma primo intuitu distinguitur.

Gen. VIII. **Taylória** Hook. emend.

in Journ. of Science and the Arts, No. 3. p. 144. *T. splachnoidi* imposita. — Bryol. Europ. l. c. *Taylória*. — *Hookeria* Schwägr. Schleich. — *Raineria* De Notaris.

Nomen ab Hookero in honorem botanici et bryologi Taylor meriti impositum.

Calyptra inflato-conica erecta uno latere fissa basi constricta, margine toto ambitu lacera vel erosa. *Peristomium infra thecae orificium ortum*, 16- et 32-dentatum, dentes singuli per paria approximati vel coadunati, saepe longissimi, *humiditate incurvi et involuti*, *siccitate* (in theca supra matura) *reflexi thecae adpressi vel tortuoso-defluentes summopere hygroscopici*. Inflorescentia monoica. Flores masculi nunc ad basin innovationum, nunc in ramulis propriis capituliformes. Flores feminei paraphysibus brevibus

vel nullis. Columella thecae maturae plerumque longe exserta planiusculo-apiculata.

Habitus e plantis elatis gracilibus laxe cespitosis ac theca magno-cylindracea longicolla colorata, peristomio saepe longissimo hygroskopico proprius speciosus.

A. Peristomii dentes 16 per paria 8 conferti.

1. **T. serrata** Br. et Sch. (l. c. p. 6. tab. 1.); laxe cespitosa; folia elongato-obovata acuminata *superne grosse dentata*, nervo sub apice evanido; theca collo oblongo brevior ovalis, operculo *convexo-conico obtuso*; peristomii *dentes e duplici cellularum serie compositi lutescentes siccitate infra thecae orificium incurvi*; sporae minutae sulphureae.

Splachnum serratum Hedw. Sp. Musc. p. 53. tab. 8. — Brid. I. p. 246.

β. flagellaris; ramis gracilescentibus fructum superantibus; theca subcernua. *Spl. flagellare* Brid. I. p. 247. — *Spl. tenue γ. flagellare* Roehl. Deutschl. M. III. p. 43. — *Spl. Helveticum* Schleich. Cent. II. n. 9. — *Spl. serratum* Schwägr. Suppl. I. P. I. p. 49. — Bryol. Europ. I. c. tab. 2.

γ. tenuis; foliis brevioribus latioribus, theca minori in pedunculo tenuiori, siccitate valde retracta columella exserta. *Splachn. tenue* Dicks. Fasc. II. p. 2. — Brid. I. p. 247. — *Spl. longicollum* Dicks. Fasc. IV. Fl. Crypt. p. 4. tab. 10. fig. 9. ex Hookeri sententia. — *Spl. attenuatum* Brid. Mant. Musc. p. 106. et Bryol. univ. I. p. 248. — *Spl. lingulatum* Hoffm. Fl. Germ. p. 23. n. 4. — *Spl. serratum* Schwägr. Suppl. I. p. 49. — Bryol. Europ. I. c. tab. 2.

Patria. Per alpina et subalpina totius Europae in sylvis abietinis, plantis putredine decompositis vel stercore vaccino insidens vetusto, socio *Splachno gracili*, haud raro occurrit. Var. *β.* locis valde umbrosis et humidis. Var. *γ.* una cum forma vulgari vel locis siccioribus inque ipsa terra arenosa praecipue Hercyniae atque Sudetorum. — *Junio, Julio*, in editioribus *Augusto*.

Flores in eadem planta monoici: masculi nunc in ramulo proprio per plures annos innovando terminales, dis-

coideo-capituliformes. Folia perigonialia late ovato-lanceolata e medio patula, margine integra. Folia perichaetialia comalibus minora sed tamen similia. Theca flavescens demum brunnea.

2. T. Moritziana C. Müll. (Linn. XIX. p. 201.); laxissime cespitosa, caulis erectus simplex v. basi ramo instructus; folia remota e basi angustissima lato-rotundato-spathulata *lobato-ciliata*, *ciliis longis inaequalibus articulatis*, nervo flexuoso sub apice evanido praedita sicca undulato-crispula; theca *breviusculo-pedunculata erecta cylindrico-oblonga*, *collo brevissimo instructa*, aperta urnigera, operculo conico brevi- et obtuso-apiculato; dentes crassi rigidi longi intense purpurei lato-lanceolati 16 per paria (igitur 8) positi *apice acuto-convexi*, madefacti erectiusculi apice subreflexi, siccitate inflexi, seniores forsitan valde reflexi.

Patria. Columbia in montibus nivosis provinciae Meridae inter *Hypopterygium tamariscinum*, ubi legit Moritz. No. 70.

Tayloriae species vera e foliorum forma distinctissima elegantissima. — Folia perigonialia et perichaetialia perpauca minus dentata. Folia caulina laxissime areolata valde remota. Pedunculus purpurascens. Theca pallida, aperta ore planiusculo undulato-reflexo constricta. Columella exserta apiculata. Inflorescentia monoica. Flos masculus in ramo proprio ad radicem plantae femineae terminalis antheridiis brevibus crassiusculis et paraphysibus ejusdem formae numerosis praeditus. Archegonia longiora perpauca intense brunnea. Calyptra ignota. Annulus nullus.

3. T. spathulata C. Müll. (mst.); humilis subsimplex; folia *argute serrata* evanidinervia siccitate undulato-crispata, pedunculus breviusculus, theca cylindrica exapophysata, operculo conico-apiculato brevi, calyptra mitraeformi *hirta* basi appendiculata; dentes peristomii 16 per paria approximati horizontales *pallidi* siccitate non reflexi. Annulus nullus. Inflorescentia monoica: flos masculus capituliformis. †.

Eremodon spathulatus Hook. et Wils. in Lond. Journ. of bot. 1846. p. 448. Tab. XV. B.

Patria. America meridionalis: Lobb. No. 105.

Species nobis haud visa e descriptione atque icone Wilsoni ad praecedentem adeo accedens, ut, synonymam esse, putemus. Folia tamen argute serrata non lobato-ciliata appellantur et operculum conicum, dentes lato-lanceolati e basi usque ad apicem coaliti delineantur, in contextu diagnosis pallidi tandem nominantur.

4. **T. Jamesoni** C. Müll. (mst.); laxe cespitosa elongata erecta subsimplex; folia remota vix imbricata spatulato-ovata *obtusa excurrentinervia* margine incrassata (the margins thickened) *apice denticulata*; perichætalia caulinis similia; pedunculus erectus apice crassus; theca subaequalis oblonga erecta, operculo conico apiculato recto; dentes 16 aequidistantes lanceolati erectiusculi persistentes; calyptra elongato-conica basi fissà *scabra* (ex ic. Wils.) basi inflata inflexa vix constricta. $\frac{1}{4}$.

Brachymitrium Jamesoni Tayl. Lond. Journ. of bot. 1846. p. 44. — Wilson ibidem p. 448. tab. XV. A., ad Eremodontem vel Tayloriam pertinere monens.

Patria. In sylvis montis nivosi Pichinchae prope Quito Andium tract.

Ex observationibus Cl. Wilsoni (l. c.) *Tayloriae Rudolphianae* affinis, calyptra scabra autem ab omnibus notis congeneribus distinctissima. Forsan ad sectionem secundam pertinens?

B. Peristomii dentes per paria conjuncti demum omnes fere liberi.

5. **T. splachnoides** Hook. (Journ. of Science and the Arts No. 3. p. 144.); laxa cespitosa, elata; folia inferiora oblonga, superiora *obovato-acuminata et elongato-lanceolata, ad medium usque grosse dentata, nervo sub apice evanido*; theca in pedunculo *elongato tenuis erecta v. subobliqua oblonga v. subcylindrica, collo longissimo angustiore*, operculo *longe conico* instructa; peristomii dentes *longissimi* humiditate involuti, siccitate reflexi, cir-

rhati; columella longe exserta; calyptra *basi integra* latere fissa.

Hook. Musc. Exot. II. tab. 173. — Bryol. Eur. l. c. p. 8. tab. 2. — Brid. l. p. 266. — *Hookeria splachnoides* Schleich. in litt. et Brid. l. c. et Schwägr. Suppl. l. P. II. p. 340. tab. 100. — *Hookeria acuminata* Schleich. in litt. — *Tayl. acuminata* Hornsch. in Regensb. bot. Zeit. 1826. I. p. 78. — *Tayl. obliqua* Nees ab Es. Seudtn. in litt., theca longissima obliqua.

β. obtusa; humilior; theca brevior, operculo convexo-conico obtuso, peristomii dentibus brevioribus siccitate reflexis, thecae subadpressis nec cirrhatibus. *Raineria splachnoides* De Notaris Syllab. Musc. p. 275.

γ. cuspidata; foliis longius cuspidatis et thecae partibus omnibus brevioribus. *Tayl. cuspidata* Hartm. Fl. Skandin.

Patria. Locis umbrosis subhumidis, corporibus animalium putridis insidens, per alpes et subalpinos Germaniae, Helvetiae et Scandinaviae, sylvas acerinas praeter caeteris amans; valde sporadica, nusquam copiose occurrens. In Americae septentrionalis Rocky Mountains: Drummond Musc. Am. No. 47. — Var. *β.* in locis editioribus ad fines regionis sylvaticae. — *Ad aestatis finem.*

Flores monoici raro hermaphroditi; masculi subdiscoideo-capituliformes. Folia perigonia ovato-lanceolata basi valde concava erecta dehinc patentia.

6. T. Rudolphiana Br. et Sch. (l. c. p. 10. tab. 4.); dense cespitosa elata robusta; folia erecto-patentia oblongo-acuminata *nerro excedente longe cuspidata apice anguste serrata margine reflexa*; theca in pedunculo breviusculo crasso oblongo-elliptica brevicolla robusta sicca sub ore constricta, operculo conico obtusiusculo; calyptra *basi profunde laciniata* latere fissa.

Eremodon Rudolphianus Nees et Hornsch. in Bryol. Germ. II. p. 176. tab. 40.

Patria. In truncis vetustis atque ramis muscis, praecipue *Leucodonte sciuroide*, obtectis *Aceris Pseudoplatani* secus viam in faucibus prope pagum Untertauern ad jugum Radstadter-Tauern Alp. Salisburgiae; Rudolphi primus legit; in trunco putrido dejecto ad locum superiorem mont. Dürrenstein Austriae superioris: W. P.

Schimper. Ex alpebus Carinthiae (Pasterze?) a Cll. Hoppe et Funk lectam habemus. E rarissimis. — *Julio. Augusto.*

Flos masculus in ramulo proprio triphyllus. Folia perigonia comalibus similia. — Species e partibus omnibus robustissimis speciosissima ac nulla alia confundenda.

Gen. IX. **Dissodon** Grev. et Arnott.

in Ann. Soc. Linn. 1826. p. 229. Tent. Meth. Musc. et Walk.-Arnott Dispos. méthodique des espèces des Mousses 1825. p. 13. — *Eremodon* Brid. ex parte. — *Systylium* Hsch. — *Splachnum* auct. — *Weisia* auct. ex parte.

Nomen graecae compositionis a verbis δίς duo et ὀδόνς dens ob dentes geminatos.

Calyptra inflato-conica erecta uno latere fissa basi constricta lacera vel crosa. Peristomium ad thecae orificium ortum. Dentes 32 in dentes 8 bigeminatos, vel 16 geminatos connati lanceolati plani transverse articulati, humidi in conum depressum conniventes sicci subincurvi. Inflorescentia hermaphrodita vel monoica. Flores masculi discoideogemmacei; feminei gemmacei paraphysibus filiformibus. Columella immersa v. exserta, planiuscula.

Habitus foliis viridescens, thecis pyriformibus glavis dentibusque erectis rigidis proprius *Tayloriis* similis.

Sectio I. **Systylium**. Operculum in columella siccitate exserta persistens; peristomii dentes geminati truncati et irregulares.

1. **D. Hornschuchii** Grev. et Arn. (Tent. Meth. Musc. fasc. III.); *monoicus*; humilis dense cespitosus, fastigiato-ramosus; folia inferiora valde remota minuta, superiora congesta sublaxe imbricata ovalia concava nitida obtusa integerrima nervo sub apice evanido; theca in pedunculo brevi crasso pyriformis longicolla, operculo subconico.

Walker-Arnott Dispos. méthod. p. 13. — Bryol. Europ. l. c. p. 7. tab. 1. — *Systylium splachnoides* Hornsch. Comment. de Voittia et Systylia p. 19. tab. 2. — Regensb. bot. Zeit. 1820. p. 176. c. ic. — Brid. I. p. 264.

Patria. In summis alpidibus Carinthiae et Salisburgiae. Locis schistaceis alpidibus Pasterze prope Heiligenblut, ubi Cl. Hornschuch anno 1817 detexit; similibus locis in alpe Ochsenalpe dicta in der Gössnitz: Hoppe, Funk; in summo Radhausberg Gastuniae: Mielichhofer; ad latus septentrionale summi cacuminis alpidibus Speiereck prope St. Michael Lungoviae (Salisburgiae orientalis), ubi una cum *Tetraplod. urceolato*, *Bryo demisso* et *Desmatod. Laureri* ad terram humosam degit: W. P. Schimper. — In summis Rocky Mounts non raro ex observ. Cl. Drummond in turfosis reperitur: *Spl. Fröhlichianum* Drumm. Musc. Amer. No. 44 et 46. ex parte. Sub No. 44. *Dissod. Fröhlichianum* tantum vidimus. — *Ad aestatis finem.*

D. Fröhlichiano proximus sed dentibus irregularibus fissis, columella operculo apice insidente longe exserta, inflorescentia monoica pedunculisque brevibus facillime cognoscitur. — Flores masculi terminales laxè gemmacei. Folia perigonialia comalibus similia. Flores feminei paraphysibus nullis.

Sectio II. **Cyrtodon.** Operculum deciduum, columella siccitate retracta; peristomii dentes 16 gemelli, per paria conferti vel aequidistantes.

a. *Folia obtusa.*

2. **D. Fröhlichianus** Grev. et Arn. (l. c. p. 122.); floribus hermaphroditis vel polygamis; humilis densiusculocespitosus; folia inferiora remotiuscula linguaeformia; superiora laxè imbricata oblonga vel ovato-oblonga obtusa vel subacuminata, integerrima; theca in pedunculo longiusculo pyriformis subbrevicolla, operculo obtuse conico; peristomii dentes gemelli regulares per paria conferti.

Walker - Arn. Dispos. p. 13. — Bryol. Europ. l. c. p. 9. tab. 2. — *Splachnum Fröhlichianum* Hedw. Musc. Frond. III. p. 99. tab. 40. — Brid. l. p. 244. — *Spl. reticulatum* Swartz. Musc. Suec. p. 24. — *Bryum reticulatum* Dicks. Fasc. 2. Pl. Crypt. p. 4. tab. 4. fig. 6.

Patria. In toto alpium tractu usque in Austriam orientalem, nec non in alpinis Norvegiae et Sueciae, raro Scotiae. Loca petrosa, humosa amat. In Americae septen-

trionalis Rocky Mounts Drummond legit: Musc. Amer. No. 44. ex parte? — *Julio. Augusto.*

Praecedenti proximus. De affinitate ac differentiis observationes in *D. Hornschuchii* comparentur. — Flores cujusque sexus in innovationibus diversis vel hermaphroditi. Flos masculus gemmaceo-discoideus paraphysibus clavatis numerosis. — Flores feminei atque hermaphroditi paraphysibus paucis filiformibus.

3. *D. splachnoides* Grev. et Arn. (Tent. III. p. 121. tab. 13. No. 39 — 44.); *elatus* valde ramosus densiusculo-cespitosus; folia erecto-patentia *siccitate torta linguaeformia* obtusa integerrima inferiora nigricantia, superiora laete-viridia; theca in pedunculo elongato tenui erecto *pyriformis brevicolla parva*, operculo obtuse conico; dentes peristomii *aequidistantes lanceolati acuti subsubulati*.

Walker Arnott. Disp. Méth. p. 13. — Bryol. Europ. l. c. p. 10. tab. 3. — *Eremodon splachnoides* Brid. I. p. 234. — Bryol. Germ. II. p. 173. tab. 39. — *Cyrtodon splachnoides* R. Brown in Parry I. Voyage. Verm. bot. Schriften I. p. 442. — *Weisia splachnoides* Schwägr. Suppl. I. P. I. p. 63. tab. 17. — *Weisia turbinata* Drumm. Musc. Amer. Fasc. I. No. 64. — *Splachnum lingulatum* Dicks. Pl. Crypt. Fasc. IV. p. 4. tab. 10. fig. 6. — *Grimmia splachnoides* Engl. Bot. tab. 2164.

Patria. In alpium uliginosis frigidis, Hypno revolvente et Caricibus diversis vulgo intermixtus per totam Europam et in America septentrionali. — *Augusto.*

Inflorescentia praecedentis. Ab omnibus congeneribus caulibus elongatis dentibusque aequidistantibus longe acuminatis distinctissimus.

4. *D. Jacquemonti* Br. et Sch. (in Bryol. Europ. l. c. p. 6. memoratus.).

Patria. In sylvis piniferis humidis montium Himalayae altitud. 9000 ped. prope Deorah, ubi Jacquemont plantulam tenellam in terra laxa cespitosam detexit. — *Octobr.*

D. Fröhlichiano ex inflorescentia, foliorum, calyptrae ac dentium forma proximus, tamen gracilior et foliis viridescentibus mollibus siccis tortis, theca parva cylindrica

brevicolla alutacea, operculo convexo parvo pedunculoque tenui stramineo basi rubescente praedita distinctus. Tomentum pulchre rubiginosum. Caetera non descripta.

5. **D. scabrisetus** Grev. et Arn. (Tent. Méth. Musc.); *monoicus*; laxe cespitosus adscendens inferne tomentosus; folia *spathulato-linguaeformia* rotundato-obtusa subintegerrima evanidinervia sicca torta; theca *cylindrico-oblonga brevicolla* operculo convexo parvo, pedunculo breviusculo verrucis magnis hyalinis scabro et calyptra basi inflata inflexa haud constricta praedita.

Walk. Arnott. Dispos. méth. des esp. d. Mousses. p. 13. — *Splachnum scabrisetum* Hook. Musc. Exot. I. tab. 32. ubi calyptra false delineata. — Schwägr. suppl. III. P. II. tab. 263. — Brid. I. p. 245.

Patria. In umbrosis temperatis Americae aequinoctialis in provincia Jaen de Bracomoros inter Gonzanamam et Luzarque; ubi Humboldt et Bonpland in altitud. 1060 hexapodum legerunt.

Ab omnibus *Dissodontibus* seta scaberrima differt. — Flores masculi discoidei in ramulo proprio brevi plantulae femineae terminales. Paraphyses numerosissimae clavatae. Folia perigonialia comalibus similia. Peristomii dentes bigeminati flavescentes plani tenues fugaces.

?6. **D. rotundifolius** C. Müll. (mst.); *dioicus*; *gregarius* humilis *simplicissimus*; caulis *gracillimus tenerri- mus* subflexuosus; folia a basi usque ad apicem valde remota tenera subrotunda obtusa tenero-membranacea integerrima arctius areolata; theca in seta brevi innovatione laterali anguste cylindrica parva basi subaequalis, operculo convexo-conico parvo.

Amblyophyllum splachnifolium C. Müll. mst. — *Wetsia obtusa* Brid. I. p. 358. — *W. obtusifolia* Rich. in Schwägr. Suppl. II. P. 2. p. 106. — *Syrrhopodon obtusus* Schwägr. I. c. tab. 182. — *Didymodon?* *splachnifolius* Hook. Musc. Exot. I. tab. 76.

Patria. In Hispaniola, Dominica aliisque Antillis in terra nuda habitat. 24.?

Flores masculi in planta propria axillares vel terminales paucifolii. Antheridia eparaphysata oblonga majuscula. Folia perigonialia elliptica e reliquis caulinis similia.

Flores feminei eparaphysati. Peristomii dentes ex iconibus *Schwägrichenianis* geminati lanceolati longe acuminati e decem cellulis compositi, infra orificium thecae interno lateri adnati ferruginei, madore intus vegentes, siccitate semi-erecti, thecae diametro dimidio paulum breviores. Calyptra perfecta ignota, junior ex obs. *Schwägricheni* subulata (?).

E foliorum forma huc pertinet sed toto habitu ceteris congeneribus alienus et dum calyptra dentesque ignoti sint, dubius.

b. *Folia cuspidata.*

7. D. serratus C. Müll. (mst.); *dioicus*; laxe cespitosus erectus elatiusculus simpliciusculus inferne radiculis amoene purpureis tomentosus; folia erecto-patentia oblongo-ovata nervo excedente longissime cuspidata e medio usque ad apicem sublobato-arguto-serrata sicca torta; theca ovalis erecta brevicolla ochracea in pedunculo brevi rufescente, operculo conico apiculato dentibusque 16 latis geminatis planis obtuso-acutis obscure flavidis valde erectis; calyptra magna inflata basi constricta lacerata apice papillis majusculis erectis scaberrima.

Orthodon serratus Bory St. Vincent in litt. ad Richard et in Schwägr. Suppl. II. p. 23. tab. 106. — Brid. I. p. 232. — *Octoblepharum serratum* Brid. Sp. Musc. I. p. 86. et Mant. Musc. p. 27. — *Bryum orthodontum* P. B. Prodr. p. 48. — *Octoblepharum serratum* Hook. Musc. Exot. II. tab. 136. s. *Splachnum squarrosum* ej. in Transact. of Linn. Soc. Lond. IX. p. 308. tab. 26. fig. 2.?? Cl. Hooker calyptram basi quadrifidam non constrictam, pilis longis flexuosis albidis articulatis hirtam non scabram, et folia fere e basi serrata descripsit et delineavit. An recte? An propria species?

Patria. E regno Nepalensi Indiae orientalis benevole dederunt Cl. Gottsche, a Wallich lectum, et Schwägrichen. In insula Bourbonis: Bory St. Vincent.

Flores masculi in ramulis propriis brevibus axillares subsessiles discoidei, antheridiis magnis, paraphysibus valde clavatis vel acuminatis numerosis foliisque perigynialibus integerrimis evanidinervibus. Planta mascula feminea gracili robustior densius foliosa. — Folia caulina,

praesertim plantae masculae, madefacta quoque valde undulata crispa plus minus argute seu lobato-serrata. Species memorabilis, *Dissodon* verus, e foliorum forma argute serrata *Tayloriae Moritzianae* nostrae similis, nulla alia specie *Dissodontium* confundendus. — Cl. Schwägrichen plantam false monoicam descripsit.

7. *D. cuspidatus* C. Müll. (mst.); *dioicus* sublaevis cespitosus subramosus inferne tomentosus; folia oblongo-ovata *nervo excurrente longe cuspidata integerrima* patula; theca cylindracea apophysi subsimili; peristomii dentes bigeminati; columella exserta. †.

Splachnum octoblepharon Hook. Musc. Exot. tab. 167. — Schwägr. Suppl. II. P. 2. p. 105. tab. 129.

Patria. In truncis arborum emortuarum insulae Van Diemen dictae: Rob. Brown.

Flos masculus terminalis sed ob innovationes non raro lateralis discoideus (Hook.). Calyptra (junior) campanulata basi inflexa (Schwägr.). Peristomium paulo intra marginem thecae insertum, e dentibus 16 geminatis (8) siccitate subincurvis, madore erectis vel etiam reflexis (?) flavo-fuscis integris, transversim striatis atque lineis tribus longitudinalibus obscure notatis compositum. — Folia perigonia lanceolata acuminata reflexa (Hook.) — Ex his notis secundum observationes Hookeri ad *D. serratum* accedens. E calyptrae autem forma dentibusque erectis huc forsitan certe pertineat.

Dissodontes?

1. *Splachnum purpurascens* Hook. et Wils. (in Lond. journ. of bot. 1844. p. 529.); caulis elongatus; folia patentia obovato-acuminata apice recurva integerrima undulata evanidinervia; theca ovali-oblonga superne angustata, apophysi obconica theca angustiore, operculo conico. †.

Patria. Insula Aucklandi et Campbelli: J. Hooker.

D. cuspidato affine sed majus et foliis remotioribus apice brevius acuminatis siccitate minus crispatis, theca et apophysi magis angustata differt.

2. Spl. plagiopus Mont. (in Ann. d. sc. nat. 1845. 4. p. 121.); caulis cespitosus erectus apice innovationibus fasciculato-ramosus; folia lanceolata vel obovata acuminata nervo conspicuo longe cuspidata integerrima; pedunculus brevissimus basi geniculatus; theca oblongo-cylindracea una cum apophysi obconica clavata, operculo convexo-conico. $\frac{1}{4}$.

Patria. Insula Aucklandi: **Hombro**n.

D. cuspidato et *Spl. purpurascenti* certe proximum. A primo auctor columella immersa distinguit. An a secundo distet, ut cl. **Hooker** fil. putat, dubium est.

Præcedentes species duas huc retulimus, quum *D. cuspidati* proximæ nominentur.

Gen. X. **Spláchnum** Linn. emend.

Hedw. Fund. Musc. II. p. 88. tab. VII. fig. 33. — Schwägr. Suppl. I. P. 1. p. 46. — Bryol. Europ. *Splachnaceae*. *Splachnum*. — *Splachnum* et *Eremodon* Brid. — *Splachnum* et *Aplodon* Rob. Brown.

Nomen graecum (*Σπλάγχνον*) *Dioscorideum lichenes pulmonarias* nunc *Stictas* designans, a *Linnaeo* *Splachnaceis* omnibus impositum et ab *Hedwigio* sancitum.

Calyptra conica parvula integra vel basi hic illic lacera. Peristomii dentes **16** e duplici cellularum serie compositi lanceolati majusculi lutescentes per paria approximati et partim conglutinati, siccitate reflexi thecae adpressi, humiditate erecti apice incurvi. Inflorescentia dioica rarius monoica. Flores masculi capituliformes. Flores feminei plerumque eparaphysati. Columella pro more emergens capitata.

Habitus pedunculis longissimis, apophysi magna saepe pulcherrime umbraculiformi et theca parva cylindracea proprius speciosus, *Tetraplodontibus* proximus. Ab his genus *Splachnum* calyptra conica valde recedit.

Sect. I. **Ampullaria.** Apophysis ampullacea.

1. S. Wormskioldii Hornem. (Fl. Danic. tab. 1659.); *monoicum*; cespitosum elatum gracillimum valde ramosum inferne tomentosum; folia remota ovalia obtuse acuminata

concava integerrima evanidinervia; theca ovalis apophysii simili paulo majore et subconcolore praedita in pedunculo longo tenuissimo flavo brunnea, operculo convexo parvo; peristomii dentes 16 breves liberi subaequidistantes; columella immersa.

Bryol. Europ. l. c. p. 7. tab. 4. — Schwägr. Suppl. II. P. I. p. 27. tab. 108. — *Aplodon Wormskioldii* Rob. Brown. Vermischte Schr. I. p. 442. — *Eremodon Wormskioldii* Brid. I. p. 237.

Patria. In turfosis Norvegiae, Lapponiae et Americae arcticae Groenlandia et Labradore, ubi vulgatissimum lectum est. In fissuris rupium prope Gothal Groenlandiae primus legit Wormskiold. — *Aestate.*

Splachno sphaerico e thecae forma proximum sed inflorescentia, habitu multo graciliore, dentibus brevioribus aliter conformatis et columella immersa jam sat distinctum. — Flores masculi creberrimi in ramis propriis elongatis tenerrimis subnudis terminales. Folia perigonialia e basi vaginante fusco-colorata ovali longe et obtuse acuminata reflexa. Paraphyses subclavatae. Flores feminei eparaphysati. — Plantae quoad magnitudinem variantes, dense vel compacte-cespitosae.

2. *S. sphaericum* Linn. fil. (Method. Muscor. p. 33. tab. 1. fig. 1.); *dioicum*; laxè cespitosum molle robustius amoene viride; caulis laxè foliosus tener subelatus inferne subtomentosus; folia e basi angusta latissimo-ovalia longe acuminata acuta integra vel obsolete denticulata, nervo in acumine evanescente; theca subcylindrica apophysii rutilante nitida globoso-obovali, operculo convexo mammillari praedita; dentes peristomii thecae longitudinem dimidiam et ultra aequantes submarginati aurantiaci; pedunculus elongatus crassiusculus flexuosus rubellus; columella exserta.

Bryolog. Europ. l. c. p. 8. tab. 5. — Hedw. Musc. Frond. II. p. 46. tab. 16. — Brid. I. p. 256. — *Splachn. intermedium* Drumm. Musc. Amer. I. No. 39. peristomio breviori. — *Spl. viride* Vill. Fl. Dauph. p. 861. tab. 44. — *Spl. ovatum* Hedw. Sp. Musc. p. 43. tab. 8. — Brid. I. p. 253. — *Phascum pedunculatum* Huds. Fl. Angl. ed. II. p. 397. — *Bryum ampullaceum*, foliis serpylli pellucidis collo crassiore. Dill. Musc. p. 344. tab. 44. fig. 4. — *Spl. gracile* Schwägr. Suppl. I. P. I. p. 52. tab. 15. — Brid. I. p. 254. et *Spl. refractum* ej.

Sp. Musc. I. p. 145. *Spl. longisetum* Schrank Baiers. Fl. II. p. 441. *Spl. bavaricum* Schrank e Brid. obs. huc pertinet. — *Spl. pusillum* P. B. Prodr. p. 89. et Brid. I. p. 257.?

Patria. Locis umbrosis humidis in stercore bovino per regiones subalpinas et alpinas totius Europae haud rarum. *Aestate.*

Inflorescentia in junioribus plantis monoica, in fructiferis dioica. Planta mascula feminea gracilior. Flos masculus capituliformis terminalis, foliis perigonalibus e basi lata concava fuscescente vaginante longe apiculatis obsolete denticulatis v. integris reflexiusculis et paraphysibus longis apiculatis haud clavatis. — De affinitate praecedentis observationes in antecedentem speciem conferantur.

3. S. vasculosum Linn. (Spec. Pl. ed. II. p. 1572.); *dioicum*; humile subsimplex laxe foliosum late cespitosum; folia e basi angusta late ovato-acuminata obtusissima integerrima evanidinervia; theca cylindrica, apophysi amplissima ventricosa pulcherrime purpurea, operculo hemisphaerico, columella exserta; dentes peristomii immarginati.

Bryol. Europ. I. c. p. 11. tab. 7. — Brid. I. p. 257. — Hedw. Musc. Frond. II. p. 44. tab. 15. — Greville Scottish Crypt. Flora. tab. 179. et 311. — *Spl. rugosum* Smith. Fl. Brit. 3. p. 1173. — *Spl. heterophyllum* Drumm. Musc. Amer. No. 37. varietas theca brevipedunculata apophysi parva ovali haud vix sphaerica differt. E reliquis autem notam nullam a *Spl. vasculoso* essentialiter et acute distinguentem invenire potuimus.

Patria. Locis spongiosis et turfosis alpium Scotiae, et Scandinaviae. In turfosis montis Bructeri Hercyniae fructiferum legisse Ehrhart dixit. Nuperius nisi sterile a cl. Hampe inventum est. In America septentrionali in stercore animali crescens legit Drummond.

Planta mascula feminea gracilior; folia perigonalia e basi lato-ovali vaginante longe acuminata obtusa evanidinervia integerrima. Antheridia magna valde curvata paraphysibus longis acuminatis mixta. Peristomii dentes geminati lato-lanceolati. — Ab omnibus congeneribus apophysi amplissima pulcherrime purpurea jam primo ad-

spectu distinctum. Theca matura siccitate rugulosa. — *Aestate.*

4. **S. ampullaceum** Linn. (Spec. Pl. p. 1572.); *monoicum* et *dioicum*; laxe cespitosum subhumile parce ramosum densiusculo foliosum; folia e basi brevi-angustalato-ovalia *longissime acuminata versus apicem remote sed argute saepe ciliato-dentata*; nervo ante apicem evanido; theca cylindrica majuscula, apophysi *longicolla vesiculoso-ampla* pulchre colorata lutea vel purpurascente et operculo conico-convexo praedita; dentes peristomii praecedentis sed longiores.

Bryol. Europ. l. c. p. 10. tab. 6. — Brid. I. p. 259. — Hedw. Musc. Frond. II. p. 41. tab. 14. — *Spl. Turnerianum* Dicks. II. Pl. Crypt. p. 3. tab. 10. fig. 11. et Brid. I. p. 260. *Spl. sagittaeifolium* With. p. 791. tab. 18. fig. 2. — *Bryum ampullaceum*, foliis thymi pellucidis, collo strictiore Dill. Musc. p. 342. tab. 44. fig. 3.

Patria. In turfosis planitierum copiosissime, in editioribus raro; per totam Europam et Americam septentrionalem fimo animali insidens. — *Julio.*

Inflorescentia monoica vel dioica. Flores masculi in ramulis vel ramis gracillimis terminales. Folia perigonialia e basi lato-ovali longissime linealia subulata denticulata evanidinervia. Paraphyses longae subclavatae. — Peristomii dentes praecedentis. — Ab omnibus *Splachnis* apophysi longa vesiculari ampla distat.

Sect. II. **Umbracularia.** Apophysis umbraculiformis.

5. **Spl. rubrum** Linn. (Fl. Succ. p. 963.); *dioicum*; humile laxe cespitosum, subsimplicissimum; folia obovata longissime acuminata, nervo subexcurrente praedita, e medio denticulata, apicem versus *serrata*, magna undulato-complicata; theca in pedunculo longissimo purpurascente *obovata* minuta sicca cylindrica, operculo convexo, apophysi *pulcherrime purpurea*; peristomii dentes *dorso membrana cancellata praediti*.

Bryol. Europ. l. c. p. 11. tab. 8. — Linn. Amoenit. Acad. ed. 2. II. p. 250. tab. 3. fig. 2. — Hedw. Musc. Frond. II. p. 51. tab. 18. — Brid. I. p. 262. — *Muscus norvegicus* umbraculo ruberrime insignitus Dill. Musc. p. 547. tab. 83. fig. 9.

Patria. In turfosis humidis atque sylvaticis, Norvegiae, Lapponiae, Finnoniae, Sibiriae nec non totius Americae arcticae. Anno 1695 a Rich. Wheler in Norvegia prope Portsgrund detectum. Prope Gatschinam et Nowogorodium Rossiae indicit cl. Weinmann. — *Aestate.*

Apophysis junior vesicularis oblonga pallida dehinc umbraculiformis pulcherrime purpurea. De colore cl. Wahlenberg (in Fl. Lapon. p. 307.) verba sequentes fecit: Color umbraculi adeo saturatissimus et elegantissimus, ut nihil in natura pulchrius esse queat; qui color adfuso acido ex gr. nitrico quidem dilutior fit et ab alkali obscurior, sed a neutro prorsus mutatur, ut inter constantiores colores vegetabiles numerandus est. A prima infantia saturatissime purpureum est umbraculum, nec in senectute mutatur. — Planta mascula feminea multo gracilior, foliis remotis. Folia perigonialia e basi latissima concava convoluta longe acuminata angusta valde serrata evanidinervia. Paraphyses longae clavatae. Antheridia majuscula curvata. — Peristomii dentes dorso membrana cancellata obtecti quibus et theca obovata apophysi purpurea praedita, foliis magis serratis sporisque minoribus a sequente refugit.

6. *S. luteum* Linn. (Fl. Suec. n. 964.); *dioicum*; humile laxe cespitosum subsimplicissimum; folia obovata longissime acuminata, nervo subexcurrente praedita *integra vel apice denticulata* magna undulato-complicata; theca in pedunculo longissimo purpurascente *oralis* sicca cylindrica minuta, operculo convexo *conico*, apophysi *lutea* *sicca magis expansa planiusculo-umbraculiformi*; peristomii dentes *dorso membrana cancellata carentes*.

Bryol. Europ. I. c. p. 12. tab. 9. — Linn. Amoenit. Acad. ed. 2. II. p. 254. tab. 3. fig. 1. — Hedw. Musc. Frond. II. p. 48. tab. 17. — Brid. I. p. 260.

β. melanocaulon; partibus omnibus minor, pedunculo perbrevis crassiusculo intense purpureo, apophysi pallidiore. *Spl. melanocaulon* Schwägr. Suppl. II. P. I. p. 28. tab. 109. Brid. I. p. 261.

Patria. In iisdem locis antecedentis sed saepius occurrens et in Gothia Sueciae. Ad lacum Ladoga imperii

Rossici lectum cl. Weinmann designavit. — Anno 1740. a P. ab Adlerheim in Westrobothnia, a Montin serius in monte Snirak detectum. Var. β . in Kamtschatka a cl. Tillesio lecta. — *Julio. Augusto.*

Inflorescentia, folia perigonialia, antheridia et paraphyses antecedentis. — De affinitate observ. in *Spl. rubrum* conf.

Splachnaceae suspectae.

1. **Eremodon Magellanicus** Brid. (I. p. 236.); caulis erectus subdivisus folia *oblongo-lanceolata acuminata serrata* evanidinervia pedunculis aggregatis, thecae oblongae ovatae apophysis obconica, operculum convexum, peristomii dentes octo. †.

Splachnum Magellanicum Schwägr. Suppl. I. P. I. p. 47. tab. 14.

Patria. In freto Magellanico: Commerson.

Peristomii dentes solitarii aequidistantes e basi latissima lanceolati subtriquetri, apice acuto incurvi, madore conniventes, minime reflexiles, linea media longitudinali apicem non pertingente exarati trabeculati, pallide e luteolo rubelli. — Calyptra deest. — Forsan Dissodon?

2. **Splachnum longicollum** Schwägr. (Suppl. II. P. 2. p. 87. tab. 178. excl. syn. Dicks.); caulis simplex; folia spathulato-oblonga acuta ruptinervia denticulata; theca subglobosa apophysi attenuata. †.

Patria. In Africae promont. bon. spei: A. Menzies.

Peristomii dentes 16 aequidistantes erecti. Forsan *Entosthodon*?

3. **Splachnum Juressi** Schwägr. (Suppl. I. P. 1. p. 55.); „elegans species, ut videtur Lusitanica, cujus peristomium vero mihi deest.” †. Caetera desiderantur *).

*) Praecedentes species tres ex autopsia cognoscere, ad hb. Schwägrichenianum iter fecimus. Possessor autem Schwägrichen, professor scientiarum naturae atque bryologus dictus, hb. Hedwigii, sed minime animi patris bryologorum, heres, inspectionem quam maxime inhumanus nos recusavit.

Trib. XII. DISCELIACEAE.

Gregariae humillimae acaules in protothallo viridi positae terrestres. Folia *vaginantia appressa oblonga acuminata enervia*, e cellulis basi et apice laxis *rhomboidali-prosenchymaticis chlorophyllo carentibus fuscescentibus inanibus* composita. Theca subglobosa inclinata collo brevi praedita annulata longe pedunculata. Inflorescentia dioica. Flos masculus et femineus in unico filo protothalli. Antheridia minuta ovalia. Paraphyses breves, ex articulis brevibus apice subclavatis constructae. Archegonia breviter crassiuscula.

Plantae habitu proprio, *Ephemerorum* vegetatione, *Catoscopii* theca, *Trematodontis* peristomio. ☉.

Patria. Terra argillosa ad rivulos in turfosis hemisphaerae borealis.

Disceliaceae Bryol. Europ. Fasc. XXIX et XXX. *Discelium*. — *Funariaceae* C. Müll. Bot. Zeit. 1843. p. 505.

Gen. I. **Discélium** Brid.

Bryolog. univ. I. p. 365. — Bryolog. Europ. l. c. — *Weisia* Schwägr. Hook. Wahlenb. — *Coscinodon* Brid. Mant. — *Grimmia* Turn. Brid. Sp. Musc. — *Bryum* Dicks.

Nomen graecae compositionis a δίς et σκέλος *'crus*, ob dentes in crura duo e basi ad medium usque fissos.

Calyptra longiuscula angustissima fere usque ad apicem fissa medio latior, basi margine utrinque involuta. Peristomium simplex e dentibus 16 lanceolatis medio fissilibus trabeculatis striatis cartilagineis rufescentibus vel aurantiacis formatum.

1. **D. nudum** Brid. (I. p. 366.); folia dense imbricata integra v. denticulata; theca in pedunculo elongato dextrorsum valde torto subglobosa, operculo conico obtusiusculo instructa; annulus tenerrimus pellucidus e cellulis magnis duplicibus conformatus.

Bryol. Europ. l. c. p. 4. tab. 1. — C. Müll. l. c. p. 505. tab. 2. — *Coscinodon nudus* Brid. Mant. Musc. p. 48. — *Weisia nuda* Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 43. tab. 14. — *W. incarnata* Schwägr. Suppl. l. P. l. p. 66. tab. 18. — *W. rosea* Wahlenb. Fl. Lapp. p. 325. — *Grimmia nuda* Turn. Musc. Hib. p. 25. — *Bryum nudum* Dicks. Fasc. IV. Pl. Crypt. p. 7. tab. 10. fig. 15.

Patria. Per Galliam septentrionalem, Britanniam et Scandinaviam totam. E rarioribus. — *Primo vere.*

Trib. XIII. BUXBAUMIACEAE.

Gregariae quam maxime humiles acaules microscopicae in tomento radiculorum fusco positae. Folia parva plana, e cellulis parenchymaticis minutiusculis hexagonis vel polygonis paucis fuscis chlorophyllo carentibus inanibus composita. Theca in pedicello elongato crasso carnosio valde scabro omnium muscorum maxima obliqua, uno latere maxime ventricosa, altero latere dorsali oblique erecta, basi cyathi-formis et articulate in pedunculo posita, e toto habitu fungoidea, operculo conico-obtuso recto carnosio praedita peristomata. Inflorescentia monoica. Archegonia minuta crassiuscula 3 — 4 terminalia. Paraphyses nullae.

Nulla alia tribu comparabiles memorabiles valde speciosae, ab auctoribus olim *Fungis* adnumeratae maxime solitariae. E thecae forma *Diphyscio* subaffines.

Patria. Ad declives humidos praecipue massa organica gelatinosa obtectos sylvarum umbrosarum vel in ligno putrido utriusque hemisphaerae rarae. ☉

Buxbaumiaceae Bryolog. Europ. Fasc. I. *Buxbaumia*; excl. *Diphyscium* genere, cujus folia structura maxime aliena praedita sunt.

Gen. I. *Buxbaumia* Hall.

Haller Hist. Stirp. Helvet. 2. p. 83. n. 27. — Buxbaum, Centur. Plant. min. cogn. Petrop. 178. etc. — Bryolog. Europ. l. c. — Brid. l. p. 328. — *Saccophorum* Pal. Beauv. Prodr. p. 29. — *Hippopodium* Fabric.

Nomen in honores medici *Burbaum*, botanici meriti qui ora terrarum orientalium indefessus peregrinavit tandem plantarum imperii Rossici centurias editit, floram Hallensem quoque haud malam scripsit, impositum. Genus in memoriam patris *Buxbaumiam* primum nominare ipse voluit, sed, dicit, venit mihi in mentem vulpes, qui deridebatur ab aliis, quod uvas non pro se, sed pro aegrota posceret matre.

Calyptra cylindrico-campanulata parva operculum tegens fugax coriacea, interdum latere fissa. Peristomium duplex: exterius nunc membrana solida irregulariter inciso-emarginata e strato cellularum duplici conformata opaca et obscure rufescens, nunc dentes inaequales moniliformi-articulati vallorum instar angusti solidi; interius membrana albida tenerrima in conum tubulosum producta valde acute-angulato-plicata, siccitate leviter tortuosa angulosa. Columella in operculum exserta et cum eodem decidua.

1. **B. aphylla** Haller (l. c.); folia inferiora ovata profunde dentata, superiora palmato et longissime ciliata; theca nitida, latere ventrali membranacea, dorsali firma, peristomio exteriori *membranaceo*.

Bryolog. Europ. l. c. tab. 1. — *Burb. vulgaris* Brid. l. p. 329. — *Burb. caulecens*. Schmid. Diss. de Buxbaumia p. 25. l. c. ic. — *Hippopodium aphyllum* Fabric. Fl. Butish. p. 31. — *Saccophorus aphyllus* P. B. Prodr. p. 30. et 87. — *Muscus capillaceus, aphyllus*. Buxb. Cent. II. p. 18. tab. 4. fig. 2. et Dill. Musc. p. 477. tab. 68. fig. 5.

Patria. Terrestris per regiones temperatiores totius Europae, Asiae finitimae et Americae septentrionalis. Prope Astracenum in vado Volgae primus omnium invenit *Burbaum*. — *Majo. Junio.*

2. **B. indusiata** Brid. (l. p. 331. tab. Suppl. II.); folia praecedentis; theca longiore oblonga acutiore, latere ventrali membrana tenerrima *revolubili*; peristomio externo *dentato valliformi pallido*.

Bryol. Europ. 1. c. p. 6. tab. 2. — *Buxb. aphylla* β . *viridis* Mougl. et Nestl. Stirp. Crypt. VIII. No. 724.

Patria. In ligno putrido vel terrestris, in iisdem locis praecedentis. In alpibus Sanensibus Helvetiae anno 1796 Cl. Bridel primus legit; in Calabria, in Vogesis, Alsatia, prope Caesaream Lutram, Hanoviam, in agro Manhemensi et in Hercynia superiore. — *Majo. Junio.*

A praecedente peristomio certe distat. et rarior.

3. B. Javanica C. Müll. (mst.); folia oblonga subacuminata angusta subintegra nunquam dentata vel ciliata; theca minore, latere ventrali ac dorsali solida, peristomio externo dentato valliformi aurantiaco.

Buxb. aphylla β . *minor* Hmp. in litt.

Patria. Java insula: Junghuhn.

A praecedentibus notis illustratis valde differt. Operculum et calyptra desunt. Species sui generis tertia excellentissima.

2. Folia dense areolata.

Trib. XIV. MNIOIDEAE.

Plantae acrocarpicae vel pleurocarpicae. Folia lato-ovalia spathulata vel ovalia vel lanceolata planiuscula, nervo crasso dorso valde prominente praedita, Areolatio basis: cellulae subparallelogrammae, apicem versus rotundato-hexagonae vel parietibus aequalibus praeditae, chlorophyllo valde repletae, vel utriculo primordiali plerumque valde conspicuo, vel valde incrassatae, firmae, rarissime papillosae.

Subtrib. I. MNIACEAE.

Laxe et laxe cespitosae elatiusculae vel humillimae stolonibus repentibus foliosis plerumque praeditae acrocarpicae vel pleurocarpicae. Folia e basi plus minus oblonga lato-ovalia vel spathulata vel lingulata vel ovalia. Theca ovalis, pyriformis vel cylindrica annulata.

Habitus *bryoides*, sed foliis firmis rigidis saepe amoene undulatis et plantis apicem versus plerumque pulcherrime crescentibus speciosus proprius. — Plantae *Bryaceis* ex habitu proximae quidem, sed tamen areolatione foliorum propria distinctissimae.

Patria. Loci humidi saepe turfosi profundi tam planitierum quam montium atque alpium utriusque hemisphaerae. Vita terrestris atque arborea. 2/.

Bryaceae auct. Bryol. Europ. Fasc. V. *Mnium*. — *Tetraphideae* Bryol. Europ. Fasc. XVII. — *Rhizocarpi* Brid. II. p. 663. — *Aulacomniaceae* C. Müll. olim portentae.

Gen. I. **Cinclidium** Swartz.

Sw. in Schrad. Bot. Journ. 1801. I. p. 25. tab. 2. Brid. I. p. 714. — *Mnium* Br. et Sch. Bryolog. Europ. Fasc. V. — *Amblyodon* P. B. Prodr. — *Meesia* Brid. Musc. Rec. II. 3. p. 172.

Α κυκλὶς *cancelli*, ob peristomii interni foramina ductum.

Habitus, vegetatio, calyptra et inflorescentia *Mnii* generis, sed peristomium internum; *membrana cupuliformis, foraminibus sedecim dentibus externis oppositis, apice aperta, 16 plicata. Dentes externi breves truncati.*

1. **C. stygium** Sw. (l. c.); *hermaphroditum*; dense cespitosum elatum gracile, ramis fructiferis atque sterilibus erectis tomentosus; folia inferiora remota rotundato-ovata subobtusa purpurascencia, summa in rosulam congesta, e basi brevissima angusta latissime ovata rotundato-obtusa, nervo excurrente in mucronulum brevem producta, *laxe marginata densius et firme areolata*; theca pendula ovalis brevis *basi subapophysiformis crassa*, operculo *hemisphaerico mamillato*; peristomii interni dentes *breves lati pallidi*; interni membrana aurantiaca, *columnis laevibus.*

Brid. I. p. 714. et auct. prior. — *Mnium Cinclidium stygium* Bryol. Europ. l. c. p. 17. tab. 1. — *Meesia stygia* Brid. Musc. Rec. II. 3. p. 175. — *Amblyodum stygium* P. B. Prodr. p. 41.

Patria. In turfosis profundis Germaniae septentrionalis sparsim sed raro fructificans. Bavaria prope Moosach

hucusque tamen sterile: Sendtner. In paludosis turfo-
sis alpium Tirolis, Carinthiae et Salisburgiae frequentius
fructiferum. In iisdem locis totius Scandinaviae, Daniae,
Gothiae, Norvegiae, Sueciae, Lapponiae atque Finlandiae
haud raro et, ut videtur, frequenter fertile. Prope Upsa-
liam a Cl. Swartz primum detectum. E Labradore
fructibus creberrimis gaudens inter Hypna adunca legi-
mus. — *Julio*. In alpibus superioribus *Augusto* et *Sep-
tembri*.

Per longa tempora generis pulcherrimi species unica
nota, sequenti proxima quidem, sed tamen distinctissima. —
Cespites lati maxime tomentosi, inferne nigricantes, superne
viridescentes vel purpurascens. Antheridia maxima,
paraphysibus maximis clavatis. Archegonia magna pa-
raphysibus filiformibus sed crassis. Folia perichaetialia
lanceolata integra vel apice denticulata immarginata ex-
crescentinervia. Fructus raro geminati. Annulus imperfectus,
in operculi basi persistens. Dentes externi siccitate re-
flexi, dein inflexi, humiditate erecti, cupulae foramina
claudentes.

2. **C. arcticum** Br. et Sch. (Bryol. Europ. Fasc.
XXXI. Mnum. Tab. Suppl. I.); *dioicum*; ex habitu prioris
sed foliis obovato-orbicularibus apiculatis, margine *tumido*
nitidis integerrimis, siccitate subundulatis laxè imbricatis;
theca *exannulata elliptica longicolla, operculo alte convexo*
papillato; dentibus peristomii externi *longioribus angustio-
ribus*, interni membrana columnis *appendiculatis valde*
pertusis.

Patria. In Norvegiae alpe Dovrefjeld, ubi loca uligi-
nosa retro Kongsvold ad montem Knudshöe, sociis *Meesea*
uliginosa, *Paludella squarrosa*, *Hypno nitente* et *Disso-
donte splachnoide*, aestate 1844. W. P. Schimper detexit. —
Ad finem Julii.

Planta mascula femineae intermixta gracilior, caule sub
flore discoideo foliis destituto. Pulcherrima species!

Gen. II. **Mnium** Dill. Linn. emend.

Mnium Dill. Linn. — *Mnium*, *Bryum* et *Arrhenopterum* Brid.
Hedw. — *Gymnocephalus* Schw. — *Fusiconia* P. B. — *Orthopyxis*

P. B. — *Hypnum* Web. et Mohr. — *Polla* Brid. — *Aulacomnion* Schwägr. et Bryol. Europ. — *Rhizogonium* Brid. et al.

Nomen *Mnion* a botanicis antiquissimis scriptum a *μνίον muscus* ductum. *Dillenius* in Hist. Musc. p. 229 *Mnium* scripsit et nomine hocce pro *Aulacomniis* et aliis muscis usus est. *Linnaeus* primus muscos nonnullos, *Mnia* nunc temporis appellatos, hocce nomine designavit.

Calyptra conico-dimidiata parva fugacissima. Peristomium duplex. Exterius: dentes 16 lanceolati cuspidati extus trabeculati linea longitudinali praediti, intus lamellosi carnosuli flavescentes. Interius: membrana carinato-plicata, in dentes 16 lanceolatos latos carinatos grandi-pertusos cupuliformi-conniventes, dentes externos superantes, ciliis filiformibus 2—4 interjectis producta. Inflorescentia terminalis dioica vel monoica. Flos masculus discoideus paraphysibus clavaeformibus ut in *Funarioideis*, basi infima pluries brevissime articulatis; femineus et hermaphroditus gemmiformis paraphysibus filiformibus.

Sectio I. **Eumnium.** *Theca* pyriformis, clavaeformis, oralis plerumque pendula laevis. Folia e cellulis majoribus composita. Inflorescentia terminalis.

A. *Folia marginata.*

a. *Folia integra.*

1. **Mn. punctatum** Hedw. (Sp. Musc. p. 193.); *dioicum*; subsimplex erectus; folia orbiculari-spathulata e cellulis pellucidis teneris basi majusculis apicem versus ad latera minoribus arctioribus rhomboidali-hexagonis conformata lato-marginata integerrima *obtusissima* vel brevissime apiculata vel apice emarginata, nervo crassissimo purpurascente ante apicem evanido praedita remota patula subhorizontalia; theca ovalis inclinata pallescens, operculo conico rostrato subrecto.

Bryolog. Europ. l. c. p. 19. tab. 1. — *Bryum Polla punctata* Brid. l. p. 706. — *Mn. serpyllifolium* Hoffm. Deutschl. Fl. II. p. 58;

forma humilior, in omnibus partibus minor tenella, theca subglobosa. — *Bryum serpyllifolium* Swartz. Musc. Suec. p. 51. — *Bryum punctatum* Schreb. Spic. Fl. Lips. p. 85. — *Hypnum punctatum* Schrank. Prim. Fl. Salisb. n. 847. — Web. et Mohr bot. Taschb. p. 296. — *Bryum pendulum* serpylli folio rotundiore pellucido, thecis ovatis. Dill. Musc. p. 416. tab. 53. fig. 81. A. — O. — *Bryum Polla elliptica* Brid. I. p. 705. Caulis sterilis!

Patria. In locis humidis rupestribus, ad fontes rivulosque sylvestres praesertim, rarius in paludibus; per totam Europam, Americam septentrionalem ac regiones temperatas Asiae atque Africae sat copiose. — *Primo vere.*

Caulis sterilis plerumque erectus rarius descendens. Planta mascula gracilis paucifolia. Folia perigonialia interiora angusta lanceolata obtusiuscula reflexa tenuiter marginata.

2. Mn. subglobosum Br. et Sch. (Bryol. Europ. Fasc. 31. Suppl. I. Mnium. p. 3. tab. Suppl. III.); *hermaphroditum*; e reliquis praecedenti perfecte simile *foliis autem laxius reticulatis*; theca subglobosa minor.

Mn. punctatum var. *subglobosum* Hmp. hb. — *Mn. pseudopunctatum* Br. et Sch. in Lond. journ. of bot. Vol. II. 1843. p. 669. — *Bryum mnioides* Wils. in Lond. journ. 1843. Fasc. mens. Decemb. et 1844. p. 427. — *Mnium punctatum* Drumm. Musc. Amer. No. 253.

Patria. In turfosis montis Bructeri ad Heinrichshöhe: Hampe. Anglia prope Todmorden comit. Lancashire: J. Nowell. In Alpe Dovrefjeld Norvegiae: Blytt, W. P. Schimper. In Canada et Rocky Mounts: Drummond.

Sporae duplo majores quam illae *Mnii punctati*.

3. Mn. hymenophylloides Hüb. (Muscol. germ. p. 416.); *dioicum*; caulis ascendens ramosus humilis tenellus ater; folia *remota vix imbricata* erecta rotundo-ovalia parva subplana, nervo crassiusculo purpurascente ante apicem breviter acuminatum evanido praedita, tenuiter marginata amoene viridia v. flavescentia coriacea.

Bryolog. Europ. Fasc. V. p. 37. tab. 15.

Patria. Ad rupes abruptos humidos, *Anoetangii compacti*, *Mnii orthorrhynchi*, *Mn. Hymenophylli* et *Desmatod. latifolii* societate in alpe Dovrefjeld Norvegiae prope

Kongsvold, ubi aestate anni 1828. legit Hübener. In Lapponia: Ångström. In alpidibus Tyrolensibus: Funck. In rupibus calcar. humid. montis Splügen Rhaetiae: W. P. Schimper.

Planta tenella elegantissima omnium minima filicoidea sequenti proxima. Theca ex observationibus auctoris, tamen dubitabilibus, „pendula oblongo-ovata, operculo hemisphaerico umbonato.”

4. **Mn. Hymenophyllum** Br. et Sch. (Br. Europ. Fasc. 31. Suppl. I. Mnum. p. 5. tab. Suppl. V.); *dioicum*; *dense cespitosum robustius minus fragile*; folia *approximata decurrentia erecto-patentia submarginata late ovato-acuminata basi minus angustata, e glaucescente laete viridia inferne rufescentia.* †.

Patria. In Norvegiae alpe Dovrefjeld prope Kongsvold, ubi in rupium fissuris et ad terram sub rupibus sociata *Timmia Megapolitana* cespitibus pulcherrimis occurrit: W. P. Schimper 1844.

A praecedente vegetatione dense-cespitosa et foliis angustius marginatis, basi latiori valde decurrentibus primo intuitu monente *Schimpero* distinguitur. — Flores masculi discoidei.

b. *Folia dentata.*

5. **Mn. Blyttii** Br. et Sch. (Br. Europ. Suppl. cit. p. 6. tab. 5.); *dioicum*; *dense cespitosum elatum gracile*; folia *ovali-oblonga et spathulato-acuminata e cellularum unica serie marginata, inferiora integra superiora apicem versus molle dentata madefacta aeruginosa, parva.*

Patria. Ad terram umbrosam locis rupestribus in Norvegiae alpe Dovrefjeld inter Kongsvold et Drivstuen, praeprimis ad Vaarstien: W. P. Schimper 1844.

Mn. stellari ex habitu proximum, e foliorum forma autem longinquum. — Flos femineus *Mnii stellaris*. Flos masculus ignotus. E distinctissimis.

6. **Mn. Drummondii** Br. et Sch. (Lond. journ. of bot. Vol. II. 1843. p. 669.); *hermaphroditum*; *dense ces-*

pitosum subsimplex elatum; folia caulina e basi angusta oblonga *laxe areolata latissime ovalia mucronato-acuminata tenuiter marginata* e medio usque ad summum apicem *inaequaliter saepe ciliato-dentata*, nervo ante apicem *evanido*; theca ovalis pendula breviuscula, operculo conico brevi acuto.

Mn. spinosum Hook. in Drummond, Musc. Americ. No. 257. —

Mn. affine Sulliv. Musc. Allegh. p. 26.

Patria. America septentrionalis in sylvis prope flumen Smoking dictum: Drummond.

Mn. spinoso ex habitu affine, foliis autem tenuioribus, anguste marginatis, dentibus marginis longis inaequalibus ciliato-acutis simplicibus tenuibus haud mucronatis theca tandem valde distans. — A *Mnio affini* differt foliis e cellulis basi laxiusculis apicem versus minoribus, parietibus crassis viridescentibus praeditis, pellucidis, composita, et inflorescentia. Folia perichaetialia intima angustiora longe acuminata et longe ciliato-dentata, e reliquis caulinis similia. Paraphyses filiformes acutae.

7. *Mn. rostratum* Schwägr. (Suppl. I. P. 2. p. 136. tab. 79.); *hermaphroditum*; ex innovationibus longe repentibus adscendens laxe cespitosum subhumile, robustum; folia apice rosulato-congesta ovali-oblonga latissima basi subangusta *flare et lato-marginata brevissime mucronata excurrentinervia*, remote et breviter denticulata dense areolata; thecae solitariae vel aggregatae nutantes ovaes, operculo *conico-rostrato* ore purpureo-annulato e reliquis flavescente praedita pallida, olivacea, aperta dein ochracea.

Bryolog. Europ. Fasc. 5. p. 27. tab. 7. — *Bryum Polla rostrata* Brid. I. p. 700. — *Bryum rostratum* Schrad. Sp. Fl. Germ. p. 72. — *Br. longirostrum* Brid. Mant. Musc. p. 119. — *Hypnum rostratum* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 296. — *Bryum serpyllifolium* β. Huds. Fl. Angl. p. 492. — *Mn. cylindricum* Hoffm. Deut. Fl. p. 52. e Syn. Dill. monente Bridelio. — *Mn. ellipticum* ej. monentibus Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 296. — *Bryum pendulum* serpylli folio longiore pellucido, thecis oblongis cuspidatis. Dill. Musc. p. 415. tab. 53. fig. 80. A. B. C. — *Mn. ramosum* Hook. ic. pl. rar. tab. 20. fig. 2. et Lond. Journ. of bot. 1840. Vol. II. d. 11. var. β. foliis acuminatis angustioribus. — *Mn. rhynchophorum* Hook. ic. pl. rar.

tab. 20. fig. 3. et Lond. journ. of bot. 1840. Vol. II. p. 11. var. γ . robustior foliis latissimis suborbicularibus.

Patria. In umbrosis ad terram et saxa per totam Europam vulgare. E regno Nepalensi, ex insula Java, Chile et Columbia (Jagi prov. Merida, ubi Moritz legit) habemus. Var. β . e Nepal; γ . e Penang et India boreali: Wallich. — *Vere.*

Calyptra omnium maxima per longum tempus persistens. — Sequenti affine, sed foliis obtusis et operculo longirostri jam primo adspectu distinctissimum.

8. **Mn. affine** Bland. (Musc. exsicc. Fasc. III. No. 153.); *dioicum*; erectum subsimplex elatiusculum; folia caulina e basi breviter oblonga latissima ovalia nervo *excurrente longiusculo - cuspidata* lato marginata undulata *argute serrata*; cellulae ad nervum longiusculae in seriebus obliquis reticulatae rhomboidales, latera versus minores, *omnes parietibus tenuibus praeditae flavescentes inanes subcompressae*; perichaetialia c. 4, exteriora spathulato-angusta undulata marginata serrata, intima integra, omnia nervo excurrente longe-cuspidata, e cellulis longiusculis areolata; theca longe-pedunculata ovalis pendula, operculo *hemisphaerico-conico brevi-acuto vel mammillato*.

Bryol. Europ. Fasc. V. p. 30. tab. 9. — *Bryum Polla affinis* Brid. I. p. 704. — *Mnium cuspidatum* β . Hedw. Sp. Musc. p. 193. tab. 45. — *Muscus squamosus* foliis latis subrotundis. Tourn. Dill. Musc. p. 414. tab. 53. 79 M.

β . *ciliare*; folia caulina ciliato-serrata; perichaetialia c. 5, exteriora angusta spathulata apice undulato-plicata marginata serrata, intima immarginata dentibus subrecurvis praedita vel obsolete-denticulata. *Bryum ciliare* Grev. Annals of the Lyc. Nov. Evaborac. 1825. p. 275. tab. 23.

γ . *elatum*; flores feminei discoidei, paraphysibus clavatis, steriles, foliis involucralibus perichaetialibus plantae fertilis similibus. Bryol. Europ. Fasc. V. tab. 10.

δ . *Rugicum*; humilior compactior; foliis obtuse serratis; folia caulis sterilis subcircularia. *Mn. Rugicum* Laurer

in Regensb. bot. Zeit. 1827. p. 292. — *Mn. affine* γ . *Rugicum*.
Bryolog. Europ. Fasc. V. tab. 11.

Patria. In nemorosis humidis Europae mediae, rarius tamen fructiferum et in Caucaso. Var. β . in Canada prope Montreal; prope Albany lectum in herbario asservamus. Var. γ . in locis humidis graminosis Vogesorum. Var. δ . in humidis ad „Herdasee” insulae Rugae: *Laurer.* — *Aprili. Majo.*

Caulis sterilis decumbens reptans. Thecae saepe geminatae. — A *Mnio cuspidato* inflorescentia dioica, foliis excurrentinervibus e basi usque ad apicem serratis et habitu robustiore differt.

9. *Mn. medium* Br. et. Sch. (Bryol. Europ. Fasc. V. p. 32. tab. 12.); *hermaphroditum*; rami fertiles elongati simplices rarius ramos steriles graciles emittentes; folia inferiora remota majuscula ovato-acuminata, terminalia oblongo-acuminata, basi angustata, omnia angusta marginata, argute serrata; pedunculi solitarii vel geminati; theca ovata oblonga, inclinata pendula, operculo subconico recto.

Patria. In sylvis spongiosis Montis piniferi prope Gefrees: *Funk*; in iisdem locis *Hercyniae* in valle flum. *Bode* dicti: *Hampe*; in *Vallesia*: *Thomas*; in *Succiae* *Sättna*: *Ångström*; in *Alpibus Julicis*: *Sendtner.* — *Majo. Junio.*

Inter *Mn. affine* et *cuspidatum* intermedium. A primo differt inflorescentia; a secundo foliis e basi jam argute dentatis majoribus undulatis tenuius marginatis laxius areolatis et operculo conico. E ceteris *Mnio affini* simillimum.

10. *Mn. cuspidatum* Hedw. (Sp. Muscor. p. 192. tab. 45. fig. 5 — 7.); *hermaphroditum*; caulis erectus densiusculo cespitosus; folia ramorum fertilium patula decurrentia planiuscula, inferiora late obovato-acuminata, superiora majora angustiora; folia caulium reptantium rotundato-acuminata; omnia dense et minute areolata, granulis chlorophyllaceis valde repleta, marginata e medio us-

que ad apicem acute-dentata, nervo crasso obscuro viridi praedita, mollia viridissima; theca aperta valde ochracea ovalis crassa, operculo convexo interdum mamillato praedita nutans; peristomii interni membrana aurantiaca valde perforata.

Bryolog. Europ. Fasc. V. p. 29. tab. 8. — *Bryum Polla cuspidata* Brid. I. p. 702. — *Bryum cuspidatum* Schreb. Spic. Fl. Lips. p. 84. — *Br. polymorphum* Neck. Meth. Musc. p. 218. — *Br. serpyllifolium* γ. Huds. Fl. Angl. p. 492. — *Br. pendulum*, foliis variis pellucidis, thecis ovatis. Dill. Musc. p. 412. tab. 53 fig. 79. A—L. — *Mn. serpyllifolium* β. *cuspidatum* Linn. Sp. Pl. p. 1577. — *Hypnum cuspidatum* Schrank. Baiers. Fl. II. p. 471. — *Hypn. aciphyllum* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 295 excl. *Mn. affini* Bland. syn.

Patria. In sylvis humidis, ad radices arborum per totum orbem terrarum late cespitosum vulgatissimum. — *Vere.*

Ab omnibus congeneribus peristomii interioris membrana constanter perforata recedit. Nervus excurrentes vel ante apicem dissolutus.

11. *Mn. undulatum* Hedw. (Sp. Muscor. p. 195.); *dioicum*; latissime et laxissime cespitosum longissime repens, ramis erectis ascendentibus simplicibus vel apice dendroideo-divisis; folia ligulata valde undulata reflexiuscula patula apice obtusiuscula vel nervo excurrente brevissime cuspidata, densissime et minutissime areolata argute serrata; thecae valde aggregatae ovales inclinatae pendulae purpureae, operculis conico-acutis pedunculisque purpureis praeditae.

Bryolog. Europ. Fasc. V. p. 20. tab. 3. — *Bryum Polla ligulata* Brid. I. p. 708. — *Br. ligulatum* Schreb. Spic. Fl. Lips. p. 84. — *Br. undulatum* Roth. Fl. Germ. III. P. I. p. 249. — *Br. dendroides*, polycephalum, phyllitidis folio undulato pellucido, thecis ovatis pendulis. Dill. Musc. p. 410. tab. 52. fig. 76. A E. — *Hypnum undulatum* Schrank. Baiers. Fl. II. p. 474. — *Hypn. ligulatum* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 298. — *Polytrichum undulatum* Schrank. Prim. Fl. Salisb. n. 825.

Patria. In umbrosis humidis graminosis etiam cultis totius Europae. In insula Borbonis et ad Prom. bon. spei lectum est. — *Primo vere.*

Ab omnibus congeneribus habitu elegantissimo dendroideo folisque ligulatis utrinque transverse undulatis distinctissima ac pulcherrima species.

c. *Folia duplicato-serrata.*

12. Mn. spinosum Schwägr. (Suppl. I. P. 2. p. 130. tab. 78.); *dioicum*; caulis erectus subsimplex; folia decurrentia, oblongo-lanceolata, nervo excurrente cuspidata, e basi usque ad apicem dense areolata, firma, dentibus fusciscentibus e medio argute serrata, incrassato-marginata; perichaetia intima lanceolata angusta longiusculo-cuspidata, vix marginata, dentibus pellucidis valde serrata; theca breviusculo-pedunculata inclinata v. nutans ovalis, operculo conico acuto subobliquo.

Bryolog. Europ. Fasc. V. p. 26. tab. 6. — *Bryum spinosum* Voit. in Sturm. Fl. Germ. Crypt. XI. tab. 16. — *Br. Polla spinosa* Brid. I. p. 701. — *Mn. cuspidatum* β. Hedw. Sp. Musc. p. 193. tab. 45. fig. 7. — *Mn. serpyllifolium* β. *cuspidatum* Linn. Sp. Pl. p. 1577.

Patria. In sylvis praeprimis pinetis humidis montium; in monte pinifero prope Gefrees; in valle alpestri Carinthiae prope Heiligenblut; in Saxonia et Helvetia. E rarioribus. — *Vere*, in alpibus m. Augusto et Septembri.

Caulis sterilis simplicissimus erectus. — Ex habitu *Mn. orthorrhyncho* simile, sed areolatione foliorum dense rotundato-hexagona firma et forma, fructibus tandem plerumque aggregatis facillime distinguitur.

13. Mn. spinulosum Br. et Sch. (Bryol. Europ. Fasc. 31. Suppl. p. 4. tab. 4.); *hermaphroditum*; e reliquis notis *Mnio spinoso* simillimum; folia infima basi tenuius areolata late obovata basi valde angustata decurrentia, perichaetia oblongo-spathulata, omnia margine tumido purpureo e medio usque ad apicem argute serrato instructa, nervo excurrente acute cuspidata teneriora; fructus saepe aggregati, theca evacuata pallidiore peristomio intense rufo, operculo conico-rostrato subobliquo.

Patria. In terra sylvatica prope Iglau Moraviae: Dr. Gruner. Tirolis. — *Junio*.

Caulis sterilis e basi fertilis natus erectus v. apice subincurvus. — A praecedente proximo vegetatione densius cespitosa, foliis minus viridibus tenuius spinosis tumido-marginatis et inflorescentia hermaphrodita differt.

14. *Mn. orthorrhynchum* auct.; *dioicum*; caulis simplex apicem versus crescens; folia *ovato-lanceolata subspathulata angusta*, nervo excurrente brevi-cuspidata, incrassato-marginata supra basin usque ad apicem remote et brevi-dentata, *omnium congenerum hujus divisionis minutissime areolata*; *cellulae granulis chlorophyllaceis constanter circum latera interiora densissime positae impletae*; theca brevipedunculata *horizontalis brevicolla ovalis operculo magno e basi convexa obtuse conico-rostellato*.

Bryolog. Europ. Fasc. V p. 25. tab. 5. — *Mnium serratum* β. Schwägr. Suppl. I. P. II. p. 129; foliis ovatis latioribus, paraphysibus clavatis, flore dioico et tab. ? — *Bryum marginatum* var. *tenella* thecis oblongis attenuatis. Drumm. Musc. Amer. No. 259.

Patria. In alpibus Carinthiae, Tirolis, Helvetiae et Norvegiae (Dovre) hic illic cum *Mn. serrato* occurrit. In America sept.: Drummond. E rarioribus. — *Ad aestatis finem.*

Ex habitu *Mnii serrati*, inflorescentia tamen, areolatione foliorum minore et foliis confertioribus propria species. — Folia perigonialia lato-ovalia, intima parva subcordata, marginato-serrata, basi valde laxa, apicem versus densius areolata, acuminata excurrentinervia. — *Bryum Polla orthorrhyncha* Brid. non est eadem species hujus nominis auctorum sed *Catharinea tenella*, ut e speciminibus Megapolitanis hb. Bridel. elucet! An vera species in Ducatu Megapolitano inveniatur, dubii sumus; in Synopsi der Laubmoose Mecklenburg's auct. Fiedler p. 63. indicatur quidem; an auctor ipse vero collegerit?

15. *Mn. serratum* Brid. (Sp. Musc. III. p. 44.); *hermaphroditum*; caulis fertilis erectus *humilis* subsimplissimus; folia ovato-vel oblongo-acuminata, incrassato-et albido-marginata, nervo excurrente longiusculo-cus-

pidata, e cellulis parvis firmis parietibus incrassatis praeditis conformata, inferiora integra, superiora brevi-serrata; perichaetia intima lanceolata minima caulinis similia; theca brevicolla ovalis subnutans, operculo brevirostro acuto subobliquo.

Bryolog. Europ. Fasc. V. p. 24. tab. 5. — *Bryum serratum* Schrad. Spic. Fl. Germ. p. 71. — *Br. Polla serrata* Brid. I. p. 689. — *Br. marginatum* Dicks. Fasc. II. Pl. Crypt. p. 9. tab. 5. fig. 1. — Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 126. tab. 31. — *Mn. crudum* Lightf. Fl. Scot. II. p. 712. e *Smithii* fide. — *Hypnum marginatum* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 292.

Patria. In montosis atque regionibus alpinis, inter frutices ad rupes vel ad terram lapidosam humidiusculam per totam Europam, sed rarius. — *Majo. Junio.*

Praecedenti proximum, primo adspectu tamen statura humiliore, operculo brevi-rostrato, basi purpureo-limbato et peristomio thecae apertae pallidae brunneo-purpureo intelligitur.

16. *Mn. heterophyllum* Schwägr. (Suppl. II. P. II. p. 22. tab. 159.); *dioicum*; caulis declinatus radicans demum ascendens breviramosus; folia remota, infima subrotunda evanidinervia, superiora lanceolato-acuminata nervo evanido vel continuo cuspidata, purpurascenti-marginata brevi-serrata; theca brevi-pedunculata badia horizontaliter inclinata ovata parva, operculo convexo mucronulato, e lutescente badio.

Bryum heterophyllum Hook. in Transact. of Linn. Soc. IX. p. 318. tab. 28. fig. 1. et Hook. Ic. Pl. tab. 20. fig. 2.

Patria. E regno Nepalensi habuit Hooker a Wallich lectum. Ex adnot. Bryol. Europ. Fasc. V. p. 24. et in Caucaso atque America septentrionali.

Ex habitu *Mnio stellato* proximum, inflorescentia tamen, thecae forma et operculo recedens. Folia innovationum saepe simpliciter dentata et ut in *Mnio stellato* subbifaria.

17. *Mn. lycopodioides* Schwägr. (Suppl. II. 2. p. 24. tab. 160.); *dioicum*; caulis simplicissimus elatiusculus erectus; folia remota anguste-spathulata longiuscula, nervo

purpurascente excurrente breviter cuspidata; purpurascen-
ti-marginata supra basin usque ad apicem sensim argute
et tenuiter serrata, basi e cellulis longioribus pellucidio-
ribus, apice densioribus valde viridibus formata; theca
*longipedunculata pro plantulae magnitudine maxima cla-
vato-cylindrica* brevicolla obliqua horizontalis pallida,
operculo conico oblique rostrato flavido basi purpureo.

Bryolog. Europ. Fasc. XXXI. Mnum Tab. Suppl. 2. — *Bryum lycopodioides* Hook. in litt. ad Schwägr. — *Mnum lycopodioides* Hook. in Lond. journ. of bot. 1840. II. p. 11. An species haecce Nepalensis eadem sit tota ac Bryologiae Europaeae, dubii sumus. Ex iconibus Schwägrichenianis folia jam e basi infima serrata sunt, dum peristomii quoque interni dentes ciliis solitariis delineantur. E ceteris notis species Europaea Indicae simillima.

Patria. E regno Nepalensi Cl. Hooker primus ac-
cepit. In sylva Aceris ad pedem montis Gamskaar Ga-
stuniae: W. P. Schimper; in alpibus Julicis prope Sla-
tenig: Sendtner; in monte Gemmi Helvetiae: Mühlen-
beck. — *Augusto.*

Peristomii interni dentes ciliis ternis interpositis; den-
tes externi acuti, apice valde rugulosi. Folia valde de-
currentia. Planta mascula gracillima. E reliquis notis
Mnio serrato simillimum. Plantae Schwägrichenianae ha-
bitus *Bryi crudi* dicitur.

18. *Mn. hornum* Hedw. (Sp. Muscor. p. 188.); *dioi-
cum*; caules basi maxime cespitosi tomentosi *nudiusculi
vel foliis minimis remotis praediti*, apicem versus sensim
densius foliosi crescentes; folia omnia *angusta longiuscula
spathulato-oblonga amplexicaulia* anguste purpurascenti-
marginata dense serrata mucronato-acuminata, nervo sub
apice abrupto dorso spinoso, irregulariter areolata pellu-
cida, sicca subcrispa erecta; theca *longe pedunculata
maxima oralis nutans pallida*, operculo hemisphaerico-
conico *brevi aurantiaco*.

Bryolog. Europ. Fasc. V. p. 22. tab. 4. — *Bryum Polla horna*
Brid. I. p. 695. — *Br. hornum* Swartz. Musc. Suec. p. 48. — *Mn.
integrifolium* Brid. Musc. Rec. II. 3. p. 89. — *Bryum stellare* hor-
num sylvarum, capsulis magnis nutantibus. Dill. Musc. p. 402. tab.
51. fig. 71. — *Hypnum hornum* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 293.

Patria. In paludosis sylvaticis spongiosis planitiarum Germaniae septentrionalis, prime in montosis et ad alpes ascendens per totam Europam, rupes madidas vel terram humidam cespitibus maximis habitans. — *Ab Aprili in Junium thecas maturat.*

Planta speciosa distinctissima. Dentes peristomii externi *maxime pallidi flavescentes*. Theca prima pallida, demum ochracea in paludosis fusca nitens, ore purpurcolorata. Plantae utriusque sexus numerosissimae intermixtae. Flos masculus eleganter rosulato - discoideus. Folia perigonialia intima parva basi lato - ovalia ventricosa axe areolata pellucida, subito acuminata densius areolata, obsolete marginata acuta simpliciter denticulata subexcurrentinervia. Rami steriles erecti illis *Mnii stellaris* ex habitu simillimi.

B. *Folia immarginata.*

19. *Mn. stellare* Hedw. (Sp. Musc. p. 191. tab. 40. fig. 1 — 4.); *dioicum*; caules *graciles humiles*, basi dense cespitosi tomentosi foliis parvis apicem versus majoribus remotis instructi; folia subdecurrentia oblongo - ovalia, perichaetialia angustissima elongata, *omnia e medio simpliciter inaequale et remote dentata, acutissime vel cuspidato - acuminata* pellucide areolata abruptinervia; theca solitaria longipedunculata ovalis *cernua horizontalis pallida*, operculo *hemisphaerico pulcherrime aurantiaco*; dentes externi brunnei.

Bryolog. Europ. l. c. p. 33. tab. 12. — *Bryum Polla stellaris* Brid. l. p. 691. — *Bryum stellare* Roth. Fl. Germ. III. p. 240. — *Br. stellatum* La Marck et Dec. Fl. Franç. I. p. 507. — *Br. stellare* roseum pendulum minus, capsulis et setis longioribus. Dill. Musc. p. 413. tab. 52. fig. 78. — *Hypnum stellare* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 294.

Patria. In umbrosis sylvaticis plerumque montanis humidiusculis, declives praeferens per totam Europam usque ad borealem Scandinaviam sparsim et in America septentrionali. — *Majo. Junio.*

Caulis sterilis erectus gracillimus subbifarie foliosus. Planta mascula feminea gracilior, basi valde tomentosa, foliis inferioribus parce dentatis, superioribus perigonialibus e basi lata concava ovato-lanceolata, intima breviora obtusiora, omnia apice denticulata. — Folia omnia flavido-viridissima, siccitate obscure viridia, madefacta aeruginosa circulari-arcolata pellucida parietibus crassis maxime viridibus praedita. Theca sicca nigrescens.

Habitus proprius *Mnio Blyttii* affinis et ramis sterilibus subbifarie foliosis plumosis facillime cognoscitur.

Dubia.

1. **Bryum Donianum** Grev. (Transact. of the Linn. Soc. XV. 2. p. 345. tab. 3. fig. 6.); caulis breviusculus robustus, innovationibus brevibus ramosus; folia dense summitate praecipue aggregata, erecto-patentia, obovata acuta marginata, apice denticulata excurrentinervia; theca longe pedunculata clavata pendula, operculo brevi conico. †.

Patria. In insulis Ionicis.

Caulis c. $\frac{1}{2}$ unc. alt., robustus, radiculis brunneis tomentosus, ramosus. Folia inferiora laxa disposita, superiora patienti-imbricata lata obovata, innovationum angustiora, apiculata, subconcava, apicem versus denticulata, margine incrassato, nervo crasso plus minusve excurrente sed nunquam piliformi v. hyalino. Folia inferiora rubescentia, superiora viridescencia, sub microscopio amoene viridia, basi saepe intense rubra. Nervus et margo incrassati saepe rubri. Reticulatio rotundata parva (smale) basi cellulis longioribus. Pedunc. c. 2. unc. alt., intense ruber. Theca pendula brunneo-rubra crassa clavata, operculo brevi obtuso conico. Thecam maturam auctor non vidit. Perist. int. ext. aequans. Dentes 3—5-costati (3tos ribs) apiculati transverse trabeculati. Cilia interposita auctor non vidit.

Ex iconib. auctoris *Mnium* verum! Forsan *Mn. rostratum* vel proximum? Ex observationibus auctoris *Bryo*

ventricosus (*Br. pseudotriquetus*) ex habitu, praecipue thecae proximum, sed differt foliis latioribus crassissime marginatis, nervo excurrente et innovationibus aliis. Cum nulla specie alia confundi potest (auct.)

2. Hypnum Freycineti Schwägr. (Suppl. III. 2. tab. 279.); „ascendens simplex, foliis patentibus oblongis acuminatis obliquis marginatis ruptinerviis integerrimis. †.

Mnium giganteum Schwägr. in *Freycinet*. Itin. per orbem I. p. 227.; caule simplici praealto (4—6 poll.) foliis patentibus ovatis: terminalibus stellatis.

Habitus aliquo modo *Hypni acicularis*. Caulis spithameus ascendens simplex, foliis et basin versus etiam radiculis tectus. Folia recto angulo patentia, densa oblonga, in acumen sextuplo brevius quam folium reliquum attenuata, propter basin inaequalem obliqua, margine crasso et lato integerrimo undulato cincta, amoene viridia: nervo crasso ante apicem evanescente concolori: cellulis hexagonis, basilaribus paulum elongatis.

Musci de cujus genere dubitari potest, foliorum cellulis *Mniis*, foliorum forma irregulari potius *Neckeris* similis. Maneat inter *Hypna*, usque dum fructus innotescant. Si vel maxime genericum nomen mutandum sit, servabitur tamen specificum in memoriam viri de re nautica, geographica et historia naturali meritissimi *Freycineti*, navarchi.”

Sectio II. Aulacomnion. Schwägr. Suppl. III. I. 1. Theca ovalis vel oblonga subcylindracea cernua brevicolla, regularis vel incurva *striata sicca costata*. Folia e cellulis minoribus composita, nitida. Inflorescentia terminalis.

Notas essentielles, *Aulacomnia* a *Mniis* veris discernentes invenire nequivimus. Areolatio foliorum eadem est ac *Mnii*, cellulis tantum minoribus. Peristomium typice non distat. Calyptra illa *Mniorum*. Theca quidem sulcata, sed in *Orthotrichaceis* nunc sulcata nunc laevis observatur. In *Polytrichis* tandem thecae forma maxime variabilis reperitur. Ex inflorescentia genera nunquam conformari possunt, quum nota ista maxime variet. Notae aliae autem discernendi non restant.

1. *Folia secunda.*

20. **Mn. heterostichum** Brid. (Bryol. univ. II. p. 12.); *monoicum*; late et laxe cespitosum ascendens humile; folia octosticha nitidissima obovato-ovalia dentato-ser-rata obtusa, apice acuto, nervo ante apicem dissoluto; perichaetialia intima multo minora laxius areolata subito acuminata denticulata vel integerrima; theca oblongo-cylindrica incurva angusta, operculo conico oblique ro-stellato.

Arrhenopterum heterostichum Hedw. Sp. Musc. p. 198. tab. 46. fig. 1—9. — *Aulacomnion heterostichum* Br. et Sch. Bryol. Europ. Fasc. X. — *Orthopyxis heterosticha* P. B. Prodr. p. 79. — *Bryum heteropterum* pellucidum Dill. Musc. p. 362. tab. 45. fig. 11. — *Mnium membranaceum* Brid. II. p. 13. *Bryum membranaceum*, foliis mem-branaceis obtusis. Dill. Musc. p. 551. tab. 85. fig. 19. Varietas hu-milis.

Patria. In terra humosa Americae totius septentrio-nalis vulgaris. — *Vere.*

Flores masculi in caulis fertilis parte superiore soli-tari vel plures gemmiformes sessiles basi radicales, fo-liis inferioribus minimis ovato-acuminatis, superioribus e basi lata concava lanceolatis integerrimis vel apice denta-tis, intimis obcordatis acuminatis, omnibus nervosis.

2. *Folia patentia erecta.*a. *F. denticulata.*

21. **Mn. palustre** Hedw. (Sp. Musc. p. 188.); *dioi-cum*, flore masculo discoideo; late et laxe cespitosum in-ferne valde tomentosum *elatum* ramosum; folia elongato-lanceolata angusta undulato-flexilia, sicca tortilia subpa-pillosa vel laevia, apice denticulata, inferne margine re-voluta, evanidinervia; perichaetialia intima lanceolata longe acuminata, e cellulis angustioribus longioribus teneris com-posita; theca ovalis cylindrica cernua valde sulcata, lon-gipedunculata, operculo conico brevi obtuso.

Brid. II. p. 7. — *Aulacomnion palustre* Schwägr. Suppl. III. I. 1. tab. 216. et Bryol. Europ. Fasc. X. p. 9. tab. 3. — *Gymnoce-phalus palustris* Schwägr. Suppl. I. II. p. 87. — *Orthopyxis palu-stris* P. B. Prodr. p. 79. — *Bryum palustre* Sw. Musc. Suec. p. 46. — *Hypnum elodes* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 282. — *Mnium*

majus, ramis longioribus bifurcatis. Dill. Musc. p. 233. tab. 31. fig. 3. — *Mnium inordinatum* Brid. II. p. 7. Mnium, ramis brevibus inordinate progredientibus. Dill. Musc. p. 239. tab. 31. fig. 8.

β. *imbricatum*; foliis latioribus imbricatis integerrimis, siccitate haud tortilibus. Bryol. Europ. I. c.

γ. *fasciculare*; plantae ramosissimae, innovationibus brevibus, fasciculatim foliosis, ramulis sub coma florali egredientibus flagelliformibus. *Mnium fasciculare* Brid. II. p. 733. Bryol. Europ. I. c.

δ. *polycephalum*; decumbens ramosum, pseudopodiis elongatis numerosis. *Mnium polycephalum* Brid. Bryol. univ. II. p. 10. Bryol. Europ. I. c. — *Mn. ramosum* Huds. Fl. Angl. p. 403. — *Mn. majus*, minus ramosum, capitulis pulverulentis crebrioribus. Dill. Musc. p. 235. tab. 31. fig. 4. — *Orthopyxis ramosa* P. B. Prodr. p. 79. — *Bryum androgynum* β. *prolixum* Roth. Fl. Germ. III. p. 229.

Patria. In paludosis turfosis et uliginosis omnium regionum per totam Europam, Americam septentrionalem, usque ad arcticam et in Sibiria australi vulgatissimum. — *Vere.*

Caulis apice *pseudopodiis* (caule longe producto nudiusculo apice foliis minimis gemmiformibus) saepe praeditus. Flos masculus discoideus, foliis e basi lata concava lineari-lanceolatis, antheridiis copiosissimis brevissime stipitatis paraphysibus clavatis.

22. *Mn. androgynum* Linn. (Syst. Pl. p. 1574.); *dioicum*, flore masculo terminali gemmiformi; late et laxe cespitosum inferne valde tomentosum *humile* ramosum; folia elongato-lanceolata, illis praecedentis duplo breviora et angustiora, apice denticulata magis papillosa, inferne margine revoluta evanidinervia magis acuminata; perichaetia intima lanceolato-subulata; theca ovali-oblonga cernua longipedunculata, operculo e basi inflata acute conico.

Brid. II. p. 5. — *Aulacomnion androgynum* Schwägr. Suppl. III. I. 1. tab. 215. — Bryol. Europ. I. c. p. 11. tab. 4. — *Gymnocephalus androgynus* Schwägr. Suppl. I. II. p. 87. — *Fusiconia androgyna* P. B. Mem. Soc. Linn. Par. I. tab. VII. fig. 5. — *Bryum*

androgynum Hedw. Sp. Musc. p. 178. — *Orthopyxis androgyna* P. B. Prodr. p. 78. — *Hypnum androgynum* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 280. — *Mnium perangustis et brevibus foliis*. Dill. Musc. p. 230. tab. 31. fig. 1.

Patria. In nemorosis praeprimis arenaceis montosis Europae mediae et totius fere Scandinaviae ad terram et rupes sed rarissime fructiferum. — *Junio.*

Planta semper *pseudopodiis* invenitur. Flos masculus terminalis gemmiformis, foliis externis e basi lata lineari-lanceolatis, interioribus late lanceolato-subulatis, antheridiis haud copiosis, paraphysibus filiformibus.

b. *F. integra.*

23. Mn. turgidum Wahlenb. (Flor. Lappon. p. 351. tab. 23.); *dioicum*, *flore masculo discoideo*; late et laxe cespitosum elatum stramineo-nitidum, interrupte ramosum inferne tomentosum, ramis apice caulis fructiferi dichotomis aequalibus praeditum, turgido-foliosum fragilissimum; folia caulina octosticha dense imbricata, apice incomam patulam congesta, e basi oblonga lingulato-ovalia concava apice cochleariformia plus minus plicata, margine plana vel reflexa, plerumque laevia raro papillosa, nervo basi crasso superne tenui evanescente concolori praedita, basi plus minus exacte gibboso-concava, omnino minute areolata integerrima; perichaetialia longiora angustiora margine valde reflexa plicata, exteriora lingulata, interiora lanceolata plus minus acuta longius areolata; theca in pedunculo brevi stricto ovalis brevis cernua basi subgibbosa erecta pallida dein fuscidula, operculo conico brevi mammillato aurantiaco.

Brid. II. p. 11. — *Aulacomnion turgidum* Schwägr. Suppl. II. I. 1. p. 7, et Suppl. I. II. p. 123. tab. 27. sub nomine *Mnii turgidi* Wahlenb. — Bryolog. Europ. I. c. p. 8. tab. 2. — *Arrhenopterum turgidum* Wahlenb. sec. Web. et Mohr ex Brid. I. c. — *Hypnum illecebrum* Linn.

Patria. In praeruptis irrigatis et in turfosis Norvegiae, Sueciae, Lapponiae, Groenlandiae, Labradoris et in insula Melville, raro tamen fructus proferens. In alpibus

Helvetiae, ubi e Cl. Funk et Bridel inveniri dicitur, hucusque frustra quaesiverunt. — *Aestate*.

Planta masculae feminea similis; flores terminales discoidei dodecaphylli; folia perigonialia erecto-patentia caulinis similia basi concava, undulato-plicata; antheridia numerosa brevi-stipitata, paraphysibus filiformibus vel subclavatis lutescentibus mixta. Peristomii dentes e lanceolato subulati lutescentes, siccitate apice incurvi, intus valde trabeculati, interni in membrana altiuscula hyalina valde sulcati et hiantes saepe apice fissi et divergentes, ciliis binis vel quaternis longis tenuibus hyalinis interpositis. — Ex adnotationibus Hübeneri pseudopodiis illis *Georgiae pellucidae* similibus inveniri dicitur.

Sectio III. **Rhizogonium** Brid. II. p. 664. Theca ovalis, obconica, oblonga, cylindracea cernua laevis brevicolla. Folia e cellulis minoribus composita. Inflorescentia plerumque distincte lateralis subbasilaris.

Ab *Aulacomniis* theca laevi laterali distinctae plantae. Nos forsitan vituperabunt, *Rhizogonia* ad *Mnia* revocasse, quum inflorescentia distincte laterali gaudeant; *Fissidentes* et *Leucobrya* igitur in memoriam redigere volumus. A muscis *vegetationis pleurocarpicae Rhizogonia* toto coelo distant. E theca *Rhizogonii spiniformis* congeneres hujus divisionis ad *Mnia* valde appropinquant, e thecis ceterorum *Aulacomnia* referentes. Foliis bifariis *Rhiz. bifarii* et *Norae Hollandiae* caules steriles et fertiles *Mnii hymenophylloidis* et *stellaris* iterantur. Nervi tandem plurimarum specierum *Rhizogonii* ut in *Mnio horno* dorso spinosi observantur ita, ut ex omnibus his notis, forma atque structura peristomii, foliorum et calyptrae, affinitas intima inter *Mnia*, *Aulacomnia* et *Rhizogonia* eluceat. In *Polytrichis* quoque folia, et eodem modo, maxime variabilia inveniuntur.

1. *Folia subbifaria*

24. *Mn. bifarium* C. Müll.; *dioicum*; humile, basi infima tomentosum, erectum apice ramosum, ramis aequa-

libus; folia indistincte trifaria remota, inferiora *elongata angusta longe acuminata vel nervo crasso excedente cuspidata parce serrata*, superiora ovali-lanceolata, nervo crasso dorso *parce spinoso* excurrente acuta, supra basin usque ad apicem remote et simpliciter serrata; perichaetialia *e basi lata amplexicauli, alta nervo excedente sensim longissime cuspidata vel pilifera integra*, intima duo brevissima ovalia; theca distincte lateralis longipedunculata ovalis cernua brevis, operculo conico rostrato.

Rhizogonium bifarium Schimp. Bot. Zeit. 1844. p. 125. — *Hypnum bifarium* Hook. Musc. Exot. tab. 57. et Schwägr. Suppl. III. II. 1. tab. 257. — *Isothecium bifarium* Brid. II. p. 356.

Patria. In sinu Dusky-Bay Novae Seelandiae in terra cespitose habitat: Menzies anno 1791 detexit.

Archegonia longissima intense brunnea angustissima paraphysibus longis filiformibus luteis cincta. De affinitate sequentis vide in exc. in *Mn. distichum*.

25. *Mn. distichum* C. Müll.; *dioicum*; humile, basi infima tomentosum, erectum *simplicissimum*; folia inferiora ovato-acuminata, superiora oblonga, omnia *evandinervia* apice dentata; perichaetialia *acuminata exteriora seminervia, interiora enervia*; theca in pedunculo *perfecte basilari* erecto apice deflexo cylindrica aequalis horizontalis. †.

Rhizogonium distichum Brid. II. p. 665. — *Hypnum distichum* Swartz in Schrad. Journ. IV. p. 179. tab. 3. fig. A. excl. Syn. Brid.

Patria. In Novae Seelandiae sinu Dusky-Bay, ubi Menzies detexit cespitosum.

E descriptione modo data a praecedente vix differt. Species ab auctoribus forsan leviter examinata est.

26. *Mn. Novae Hollandiae* C. Müll.; *dioicum*; humile, basi infima tomentosum, erectum *simplicissimum*; folia indistincte trifaria remota, inferiora ovali-lanceolata parva brevi-cuspidata integra, superiora ovali-lanceolata latiora, nervo crassissimo dorso laevi excedente brevi-cuspidata, apice serrulata; perichaetialia exteriora ovato-acuminata seminervia, interiora lato-lanceolata longe

subulata enervia; theca in pedunculo perfecte radicali cylindracea aequalis ascendens.

Rhizogonium Novae Hollandiae Brid. II. p. 664. Suppl. II. Rhizogonium ad sinistram delineat. fig. 1. 2. 3. — *Leskea Novae Hollandiae* Schwägr. Suppl. I. II. tab. 83. — *Hypnum fissidentoides* Brid. Sp. Musc. II. p. 89. — *Fissidens Novae Hollandiae* Brid. Musc. Rec. II. I. p. 143. tab. 6. fig. 11. — *Skitophyllum Novae Hollandiae* La Pyl. in Journ. Bot. Desv. 1813. n. V. p. 59. tab. 36. fig. 17. — *Rhizopelma Novae Hollandiae* C. Müll. in bot. Zeit. 1847. p. 803. e peristomio leskeoideo conditum genus. Congeneribus ex novo examinatis, putamus, peristomium ab auctoribus false leskeoideum observatum esse, quum omnes thecae apertae operculis carentes fuerint.

Patria. Nova Hollandia: La Billardièrè.

Species nobis sterilis tantum visa, a penultima certe diversa notis supra datis.

27. Mn. subbasilare C. Müll.; *monoicum*; elatius, basi infima tomentosum erectum subsimplex; folia indistincte trifaria *remotiuscula erecta subappressa* oblongo-lanceolata *angusta canaliculato-concava*, grosse et argute serrata, nervo ad summum apicem evanescente fusco-viridi praedita; perichaetialia oblonga longe cuspidata; theca brevipedunculata subbasilaris horizontalis vel pendula oblonga inaequalis sub ore contracta, annulo crasso et operculo thecae dimidia longitudine conico *obtusio mamillato*. †.

Rhizogonium subbasilare Schimp. l. c. — *Hypnum Stereodon subbasilaris* Brid. II. p. 559. — *Hypnum subbasilare* Hook. Musc. Exot. I. tab. 10. et Schwägr. Suppl. III. II. 1. tab. 216.

Patria. In Terra Statuum prope Promontorium Horn in terra uliginosa cespitosum: Menzies anno 1787 legit.

Folia perigonialia ovato-acuminata valde concava integerrima, nervo ad apicem fere perdurante. Antheridia truncata pallida paraphysibus filiformibus.

Dubiae species.

1. Hypnum reticulatum Hook. et Wils. (Lond. Journ. of bot. 1844. p. 553.); caule erecto simpliciusculo, foliis

distichis patentibus ovato-lanceolatis acuminatis vix pili-feris submarginatis reticulatis, apice serrulatis, nervo tenui subexcurrente. †.

Patria. Insula Eremitae ad Cap. Horn ubi sterile legit J. Hooker.

A *Mnio subbasilari* differt foliis acuminatis distichis, nervo subexcurrente. Habitu *Hypno denticulato* simile.

2. *Folia imbricata.*

a. *Fructus distincte lateralis.*

28. *Mn. spiniforme* C. Müll.; *hermaphroditum*; elatum, basi infima tomentosum, erectum simplex vel ad medium caulis ramosum, ramis aequalibus, apice incurvum, gracile laxissime foliosum; folia caulina fusca elongata angusta lanceolata, margine duplicato-serrata, apice valde et grosse serrata, nervo excedente apicem versus dorso argute serrato-cuspidata; perichaetialia exteriora *e basi latissime ovali vaginali cuspidata simpliciter et argute serrata*, interiora sensim minus serrata, excurrenti-nervia intima brevissima pauca lato-ovalia integra evanidinervia, omnia basi laxius areolata membranacea; theca *longissime pedunculata radicalis obconica inclinata ore dilatata truncata brevis, operculo conico-obliquo.*

Rhizogonium spiniforme Bruch in Flora 1846. p. 134. — *Hypnum Stereodon spiniformis* Brid. II. p. 557. — *Hypnum spiniforme* Linn. Sp. Pl. p. 1587. et Hedw. Musc. Frond. III. p. 59. tab. 25. — *Hypnum erectum*, non ramosum, spinarum halecum aemulum. Dill. Musc. p. 332. tab. 43. fig. 68.

Patria. Ex insula Jamaica primus retulit Sloane. In insulis Antillis minoribus, et per totam Americam aequinoctialem, in insula Java et in Promontorio bonae spei, ubi in sylva Grootvaterbusch dicta legit Mundt. Vulgatissima species sed minus variabilis.

Partibus omnibus, antheridiis, archegoniis, paraphysibus (clavatis), foliis et theca robustum et ab omnibus notis laudatis facillime distinguitur. — Dentes externi peristomii longissimi, basi lati rufi, apice albidi rugulosi. Membranae internae flavidae dentes apice rugulosi albidi,

ciliis dentibus externis subbrevioribus tenuissimis interpositis.

29. Mn. polycarpum C. Müll.; *dioicum*; elatum subsimplex erectum inferne valde tomentosum subflexuosum gracile laxissime foliosum; folia caulina viridia subfalcata elongata anguste lanceolata *sed praecedente latiora*, margine *tenuius* duplicato-serrata, *minute-arcolata*, nervo ante apicem evanido crasso, dorso argute serrato, acuta; perichaetia exteriora *e basi latissima vaginali subito sinuate longissime acuminata*, serrata, interiora *filiformi-acuminata*, omnia evanidinervia *remote serrulata* laxae areolata, intima pauca brevissima ovalia integra obtusiuscula; thecae *in longitudine caulis numerosae longe pedunculatae cylindricae lunulato-cernuae basi attenuatae*, operculo conico brevi.

Rhizogonium mnioides Schimp. in bot. Zeit. 1844. p. 125. — *Aulacomnion Chilense* C. Müll. Bot. Zeit. 1843. p. 649. tab. 3. — *Hypnum mnioides* Hook. Musc. Exot. tab. 77. et Schwägr. Suppl. III. II. 1. tab. 257. sed male delineatum! — *Hypnum Stereodon mnioides* Brid. II. p. 559.

Patria. In terra Statuum prope Promontorium Horn in uliginosis legit Menzies anno 1787. In monte ignivomo Antuco regni Chilensis, in scopulis madidis torrent. legit secundus Pöppig (Coll. Pl. Chil. No. 50.). E locis non designatis regni Chilensis pulcherrime fructiferum Hb. Reg. Berol. misit Philippi.

Peristomium praecedentis speciei proximae.

b. *Fructus terminalis.*

30. Mn. microphyllum Dz. et Molkb. (Musc. Archip. Ind. p. 26. tab. 12.); *dioicum*; cespitosum inferne tomentosum; caulis erectus inferne *nudiusculus*, apice *ramulosus*, ramis gracilibus densius foliosis, ad perichaetium orientibus; folia caulina remota, infima minima integerriima, reliquis latiora et teneriora evanidinervia, superiora longiora erecto-patentia oblongo-lanceolata, margine recurva serrata; ramulina comalibus duplo fere minora, suprema minima, patentia uti reliqua siccitate contorta; co-

malia s. perichaetialia *lineari-lanceolata elongata grossius serrata, margine recurva nervo carinata, interiora breviora et angustiora*; theca inclinata vel horizontalis *ovata brevicolla rubro-fusca, operculo hemisphaerico mamillato*. †.

Patria. Japonia: a Siebold.

Planta sterilis gracilior e basi caulis fertilis nascens erecta simplex filiformis. Planta mascula simplex erecta, apice in comam foliosam inclinatam terminata, foliis caulinis illis plantae fertilis similibus, perigonalibus valde concavis, exterioribus ovato-subrotundis apiculatis, mediis ovato-cuspidatis paullo longioribus, intimis minimis teneris pellucidis lanceolatis evanidinervibus, unica serie cellularum quadratarum majorum marginatis. Antheridia numerosa paraphysibus clavatis.

31. Mn. Menziesii C. Müll.; *dioicum*; caulis fertilis erectus strictus elatus *inferne simplex, apice dendroideo-ramosus*, basi tomentosus, usque ad apicem foliis remotis *appressis squamaeformibus scariosis lanceolatis longe acuminatis, nervo infra apicem evanido, e medio usque ad apicem ciliato-dentatis, albidis*; folia ramulina ovali-lanceolata acuminata acuta, supra basin ad apicem usque simpliciter et breviter serrata, nervo infra apicem abrupto, dorso spinosa subcomplicato-concava; perichaetialia latissime ovalia, exteriora late et longissime acuminata, basi rhomboideo-, apice rotundato-hexagono-areolata, interiora subpilifera, omnia excurrentinervia, apice serrulata, tenerrima rufescenti-albida, basi laxissime et rhomboideo-areolata; pedunculi terminales *plures longi erecti*; theca *cylindrico-ovalis ore dilatata pendula*; peristomium perrobustum, magnum.

Rhizogonium acanthoneuron C. Müll. Bot. Zeit. 1847. p. 803. —
Hypnum acanthoneuron Schwägr. Suppl. III. II. 1. tab. 258. —
Bryum Menziesii Hook. Botanic. Miscell. I. 1830. p. 36. tab. 19.

Patria. In Americae borealis ora occidentali pr. Nootkam: Menzies. In loco „Observatory Irlet” dicto ejusd. partis terrarum: Scouler.

Praecedenti ramificatione affine, sed notis laudatis distinctissimum; ambo tamen e ramificatione *Mnium undulatum* referentia et, contempto fructu terminali, *Rhizogoniis* proxima et congeneres hujus divisionis *Mniis* veris conjungentia. — Archegonia longissima angustissima, apice laxe cellulosa fusco-purpurea, paraphysibus longissimis rufescentibus, crassiusculis mixta. Species pulcherrima!

Gen. III. **Hyménodon** Hook. et Wils.

Lond. Journ. of bot. 1844. p. 548. — C. Müller in bot. Zeit. 1847. p. 802 — 4. — *Mielichhoferia* Dz. et Molkb. — *Rhizogonium* Hook. et Wils.

Nomen ab *ὑμὴν* membrana et *ὀδοὺς* dens, ob membranam peristomii in dentes productam ductum.

Calyptra dimidiata. Peristomium simplex internum. Dentes 16 in membrana subcarinato-plicata cellulosa positi, lanceolati stricti plani hyalini cellulosi plus minusve perforati. Inflorescentia dioica gemmacea lateralis basalis. Vita arborea.

Rhizogoniis ex habitu congeneres affines, et inter ea atque *Georgiae* species intermedii, caulibus simplicibus apicem versus sensim crescentibus gracillimis teneris.

1. **H. sericeus** C. Müll. (l. c. p. 803.); caulis basi valde tomentosus dense cespitosus; folia caulina e basi anguste longe ellipsoidea *latiuscula* tenera lutescentia nitida, margine crenulata, papillis parvis, nervo longissime excedente ante apicem folii flexuoso, apice laminae saepe *inaequalia*, inferiora minora, superiora sensim majora; perichaetialia lato-lanceolata longe cuspidata stricta, nervo subexcurrente, intense brunnea, integerrima; perigonia-lia latiora convoluta; theca in pedunculo flexuoso purpureo tenero longissimo ovalis *brevicolla* annulata, operculo longe rostrato obliquo.

Mielichhoferia sericea Dz. et Molkb. in Musc. Archip. Indic. p. 85. tab. 29.

Patria. Java in cavis arborum vetustarum regionis paludosae summi montis Gédé, mense Februarii fructificans: Korthals, Zippelius. Borneo supra arbores carie consumtas: Korthals.

Archegonia pauca elongata brunnea, paraphysibus longis luteo-sericeis mixta. Antheridia pauca parva crassa ellipsoidea brunnea, juniora hyalina tenerrime membranacea, paraphysibus brevibus luteo-sericeis intermixtis. Vaginula cylindrica.

2. H. aeruginosus C. Müll. (l. c. p. 804.); caulis basi valde tomentosus dense cespitosus; folia caulina e basi angusta ellipsoidea *angustiora valde papillosa*, margine crenulata *aeruginosa*, nervo *stricto longiusculo-excedente*; inferiora minora, superiora sensim majora, *sicca subflexuosa*; perichaetialia lato-lanceolata *longiuscula plerumque oblique cuspidata denticulata fuscescentia*, nervo subexcurrente; perigonialia latiora convoluta; theca in pedunculo flexuoso purpureo tenero longo *ovalis*. Caetera desunt.

Rhizogonium aeruginosum Hook. et Wils. in Lond. Journ. of bot. 1844. Fasc. Martii.

Patria. Brasilia in Sierra dos Orgãos ad scap. filicum dendroidium collect. Gardneri. No. 33. ex parte.

Antheridia, archegonia et paraphyses ut in praecedente. Ab hoc statura humiliori graciliori, colore aeruginoso, foliis caulinis multo angustioribus valde papillosis firmioribus, nervo brevius piliferis, nervo stricto, foliis perichaetialibus et perigonialibus denticulatis valde differt.

3. H. piliferus Hook. et Wils. (l. c. p. 548); caules frondiformes, dense fasciculati erecti, foliis *subdistichis* aeruginosis papillosis, humorum repellentibus; theca alte pedunculata, suberecta subcylindracea.

Rhizogonium piliferum Hook. et Wils. l. c. p. 538. in exc. in *Euclad. complanatum* memoratum?

Patria. Terra Diemenii et in Nova Seelandia.

Species dubiae.

1. *Brachymenium?* *ovatum* Hook. et Wils. (l. c. p. 545.); caulis dense cespitosus, inferne valde tomentosus purpureus subsimplex, folia laxè imbricata, inferiora remotissima minuta acuminata planiuscula, superiora confertiora, suprema in comam laxiusculam rotundato-gemmaceam congesta, omnia quinquefaria erecto-patentia, e basi rotundata ovato-oblonga carinato-concava, nervo flavido flexuoso crassiusculo in cuspidem brevem producta mucronata, integerrima, lutescentia, ut in praecedentibus areolata, laevissima nitida.

Patria. Insulae Falklandi ubi sterile legit J. Hooker.

Ex habitu *Georgiae Mnemosyno* Ehrh. simillimum et a *Brachymeniis* longissime distans, huc certissime pertinens, sed ob fructum deficientem *Hymenodon* dubius. A praecedentibus speciebus tribus etsi simillimis foliis apiculatis lamina aequali instructis apice caulis veluti secunde dispositis facillime distinguitur.

Gen. IV. *Georgia* Ehrh.

Hann. Magaz. 1780. p. 931, quod nomen, prioratum tenens, retinendum est. Nomen *Hedwigianum* „*Tetraphis*” in Fund. Musc. II. p. 87. tab. 7. fig. 32. impositum male quoque formatum est, ut Cl. Bridel (Bryol. univ. I. p. 130.) docet. — *Tetracis* Ehrh. olim. — *Tetracmis* Brid. I. p. 129. — *Tetrodontium* Schwägr. — *Orthotrichum* Sm. Brid. — *Mnium* Linn. — *Bryum* Web. — *Mnion* Adans.

Maximo Botanices Promotori, *Georgio tertio*, magnae Britanniae Regi, cui Hedwigius quoque opus splendidissimum „*Descr. et Adumbr. microscopico-analytic. Muscorum Frondosorum etc.*” dedicavit, Ehrhartus consecravit in Beitr. I. p. 176. 188. et III. p. 116. Nomen, ab Ehrharto gratissimo animo impositum, dein ab Hedwigio ex arbitrio deletum, e magni botanici Ehrharti reverentia retinendum esse, persuasissimum habemus.

Calyptra mitraeformis plicata. Peristomium simplex e dentibus quatuor pyramidalibus cellularibus

conformatum. Inflorescentia monoica terminalis gemmiformis.

Sectio I. **Tetrodontium** Schwägr. Suppl. II. p. 102. Plantae humillimae gregariae rupincolae, annotinae, subsimplices, annosiores multicaules. Caulis flore femineo polyphylo terminatus, ramulos laterales flagelliformes foliis lanceolatis imbricatis vel folia longissima lineari-cuneata integerrima s. incisa proferens. Calyptra majuscula basi pluries fissa, interdum uno latere ad apicem usque dilacerata fusca.

1. **G. repanda** C. Müll.; *ramuli steriles flagelliformes dense foliosi; foliis minutissimis lanceolatis enerviis integerrimis; folia perichaetalia ovato-lanceolata concava enervia vel obsoletinervia; theca ovalis, orificio in dentium interstitiis plus minus repando vel emarginato et operculo conico erecto acuto.*

Tetrodontium repandum Schwägr. l. c. — Bryol. Europ. Fasc. XVII. *Tetraphideae. Tetrodontium*; p. 4. tab. 2. — *Tetraphis repanda* Funk in Sturm. Fl. Germ. crypt. P. II. Fasc. 17. et Schwägr. Suppl. II. p. 21. tab. 107. — Brit. I. p. 132.

Patria. In rupibus silicosis Montis Piniferi: Funk; in Hercyniae superioris valle Ilsethal dicta et ad „Rehfelder Graben”: Hampe; in rupibus schistosis valde umbrosis alpis Gaisstein Pinzgoviae: Sauter et in Sudetis (Heuscheuergebirge in der Grafschaft Glatz auf Sandstein: Sendtner). — *Auctumno.*

Flos masculus solitarius gemmam brevem crassiusculam referens, foliis late ovato-acuminatis enervibus, internis majoribus; antheridiis crassiusculis paraphysibus brevioribus stipitatis mixtis. — Ramuli interdum quoque foliis cuneiformibus gaudentes.

2. **G. Browniana** C. Müll.; *rami steriles nulli sed ad vicem folia multa cuneiformia valde elongata basi teretia, bi-vel trifida; theca ovalis, orificio vix repando, operculo conico obliquo.*

Tetrodontium Brownianum Schwägr. Suppl. II. p. 102. tab. 128. — Bryol. Europ. l. c. p. 4. tab. 2. — *Tetraphis Browniana* Brid. I. p. 133. — *Orthotrichum Brownianum* Sm. Fl. Brit. III. p. 1269. — *Grimmia Browniana* Engl. Bot. tab. 1422. — *Bryum Brownianum* Dicks. Fasc. IV. Pl. Crypt. p. 7. tab. 10. fig. 16. — *Tetraphis ovata*

Funk in Hopp. Deut. Taschb. 1802. p. 41. Forma minor in locis sic-
cioribus nata. — Brid. I. p. 131 et 762. — *Tetrodontium oratum*
Schwägr. Suppl. II. p. 102. — *Tetraphis rigida* Hedw. Fil. Obs. Bot.
Fasc. I. p. 7. tab. 2.

Patria. In rupibus arenaceis et graniticis umbrosis,
praecipue ad latera versus terram spectantia Angliae,
Scotiae et Hiberniae; in Gothia et Suecia Scandinaviae;
in Germaniae Monte Pinifero ad radicem m. Ochsenkopf:
Funk, prope Bipontem: Bruch et im Amsel Grunde
Saxoniae: Hübner. — *Aestate et autumno.*

Caetera ut in praecedente.

Sectio II. **Tetracmis** Brid. I. p. 134. Plantae cespitosae ere-
tae graciles, caule apicem versus ut in *Hymenodontibus* sensim
crescente dense folioso. Calyptra minor, ut in praecedentibus albida
irregulariter et multoties plicata basi plus minus lacera.

3. G. Mnemosynum Ehrh. (l. c.); folia caulina tri-
sticha vel pentasticha, inferiora minuta late lanceolata
erecta, superiora majora ovato-lanceolata patentia flexuosa
integerrima subcomplicato-concava, evanidinervia acumi-
nata; perichaetia multa longiora angustiora longe acu-
minata subvaginantia basi laxius areolata; theca in pedun-
culo stricto longiusculo cylindrica angustississima curvius-
cula, operculo conico alto apice obliquo.

Tetraphis pellucida Hedw. Sp. Musc. p. 43. tab. 7. fig. 1. a — f.
— Bryol. Europ. Fasc. XVII. *Tetraphideae*. *Tetraphis*. p. 6. tab. 1. —
Brid. I. p. 134. — *T. cylindrica* Voit. Musc. Herbig. p. 17. — *T. ob-*
longa Turn. Musc. Hib. p. 12. — *Mnium pellucidum* Linn. Sp. Pl.
p. 1574. — *Mnium serpylli* foliis tenuibus pellucidis. Dill. Musc. p. 232.
tab. 31. fig. 2. — *Bryum pellucidum* Abbot. 237. — *Br. diaphanum*
Web. Sp. Fl. Gött. p. 190.

Patria. In udis umbrosis planitieis, pinetis montanis
et alpinis ericetisque udiusculis ad truncos dejectos, in
lignis morbidis et ad terram cespitosa totum hemisphae-
rium boreale habitat. — *Vere.*

Flores masculi in ramulis plurimo tempore binatis et
e flore femineo sterili egredientibus terminales, gemmam
polyphyllam sistentes. Dentes peristomii longi longe su-
pra orificium oriundi. Columella in theca matura quater
lacerata dentibus adglutinata. Caulis apice saepissime

discoideo-capituliformis, e foliis amorphis gemmiformibus formatus.

Hymenodontibus et *Mnii androgyni* formis minoribus ex habitu simillima.

Gen. V. **Leptotheca** Schwägr.

Suppl. II. II. p. 135. tab. 137.

Nomen a *λεπτός* *tenuis* et *θήκη* ob thecam angustam ductum.

Calyptra in *Lept. speciosa subulata torta*. Peristomium duplex. Externum: dentes sedecim lanceolato-lineares erecti thecae parieti interiori adnati. Internum: membrana tenera in cilia totidem linearia cum ciliolorum interjectorum rudimentis fissi. Theca aequalis, terminalis. Inflorescentia hermaphrodita vel dioica.

Genus nobis dubium, melius forsitan ad *Leptostomum*, cujus habitum referre dicitur, revocandum.

1. **L. Gaudichaudi** Schwägr. (l. c.); *hermaphrodita*; laxa cespitosa basi infima tomentosa; caulis erectus initio simplex post flores innovando aliquoties divisus, interdum dichotomus; rami florigeri speciosiores, steriles cuspidati; folia caulina laxa imbricata, in ramis fructiferis longiora, interdum paullum secunda, patulo-erecta, in sterilibus decussata magis erecta, vel apicibus coarctata, caeterum elongate oblonga, parum carinata, apice grosse dentata, e lutescente viridia, nervo crasso, longam cuspidem formante, apice foveolis quasi exasperato, *cellulis quadrato-oblongis basilaribus, terminalibus quadratis, annulos simulantibus*; perichaetia ovato-acuminata integerrima, nervo continuo, in externis paullum emergente; theca in pedunculo erecto badio gracili cylindrica erecta gracilis badia. †.

Brid. Bryol. univ. I. p. 838. — *Bryum Gaud.* Spr. Syst. Veg. IV. p. 212.

Patria. In Nova Walesia meridionali prope portum Jacksonis ad terram arenoso-humosam legit in itinere cum Navarcho Freycinet Cl. Gaudichaud.

Membranam internam auctor imperfectam tantum vidit.

2. L. speciosa Hook. et Wils. (Ic. Pl. Rar. Hookerian. tab. 748.); *dioica*; caulis erectus innovando ramosus; folia dissita patula subsecunda subacuminata ovato-lanceolata marginata serrata evanidinervia, inferne margine reflexa, siccitate torta saturate viridia, areolis *elongato-hexagonis majusculis* praedita; theca in pedunculo erecto alto gracili rubro subflexuoso subcylindrica elongata, basi et apice attenuata, pallide brunnea, ore rubro, annulata, operculum theca dimidio brevius erectum rubrum. †.

Patria. Maracaybo in sylvis humidis montium Jamaicae: W. Purdie. Septbr. 1844.

Peristomii dentes externi longissimi angustissimi, vix trabeculati rubri. Interni membrana brevis flava, processibus irregularibus brevibus praedita.

An praecedenti revera affinis?

Gen. VI. **Leptostomum** R. Br.

Act. Soc. Linn. X. p. 130. tab. 32. fig. 2. — *Gymnostomum* Hook. — *Bryum* Hedw. — *Orthopyxis* P. B.

Α λεπτός *tenuis* et στόμα *os*, ob stoma membrana peristomata ornatum impositum.

Calyptra *dimidiata* fugacissima. Peristomium *simplex internum*: membrana plus minus alta *sedecies plicata albida tenerrima cellularis*, apice *nec in dentes nec in cilia producta*. Theca ovalis, elliptica vel cylindrica, ore angustato limbato, plerumque exannulata. Inflorescentia *monoica vel dioica terminalis*.

Congeneres inter sese affluissimi e foliis atque thecis hic et illic *Timmias* referentes.

1. L. splachnoides Hook. et Arn. (in Capit. Beechey's Voyage p. 53.); *dioicum*; inferne compacte cespitosum humile; caulis subjulaceo-foliosus apice cuspidatus vel attenuatus; folia caulina ovalia apice subito pilo longissimo flexuoso nodoso flavo praedita, planiuscula subintegerrima, nervo ante apicem evanido; perichaetialia sensim acuminata et nervo flavo in pilum quam maxime longum geniculato-flexuosum nodosum excurrente instructa angustiora obsolete denticulata; theca in pedunculo brevi maxima ovalis horizontalis aequalis crassa, operculo hemisphaerico.

Schwägr. Suppl. IV. tab. 305. — *Leptostomum sulcinerre* Kze. in Pöppig. Coll. Pl. Chil. III. No. 52. (269.) prioratum tenet, sed diagnosi hucusque ab auctore non descriptum igitur delendum.

Patria. In cortice arborum, rarius ad rupes, tamen haud frequens prope Talcahuano Chiles primus legit Pöppig 1828. Septbr. Prope Conception Chiles leg. Lay et Collic.

Pedunculus dein nigrescens ut in *Timmis*, quarum thecae illi *Leptostomi splachnoidis* simillimae.

2. L. inclinans R. Br. (Act. Soc. Linn. X. p. 302.); *dioicum*; inferne compacte cespitosum humile; caulis subjulaceo-foliosus apice cuspidatus vel attenuatus; folia caulina oblonga obtusa vel immarginata, nervo crasso in pilum hyalinum flexuosum laevem producto, integerrima non raro revoluta, flavo-viridia sub lente punctata; perichaetialia angustiora marginibus magis reflexis, pilo longiore terminata; theca in pedunculo brevi orato-oblonga horizontaliter inclinata, operculo conico brevi. †.

Schwägr. Suppl. III. I. 1. p. 6. tab. 213. — Brid. I. p. 126. — *Gymnostomum inclinans* Hook. Musc. Exot. II. tab. 168.

Patria. Rupes et saxa ad latus orientale prope summitatem Montis Tabularis insulae Van Diemen, Lat. Austr. 43°, elevatione supra mare 3000 ad 3500 ped.: R. Brown.

Praecedenti ex habitu proximum notis autem datis distinctissimum. Peristomium ut in praecedente membrana

alta plicata. Archegoniis similibus angustissimis longissimis, paraphysibus paucissimis praeditis.

3. L. macrocarpum R. Br. (l. c. p. 322.); *dioicum*; inferne compacte tomentosum humile; caulis dense-foliosus; folia erecto-patentia dense-imbricata lato-oralia crasso-membranacea mollia margine e basi usque ad apicem valde revoluta obtusa, subito nervo crasso flexuoso excedente in pilum brevem hyalinum denticulatum vel longum apice ciliato-fissum producta; perichaetialia longissime pilifera, pilo hyalino valde ciliato; theca in pedunculo longo stricto maxima ovalis crassa erecta laevissima badia, operculo obtuse conico dilutius colorato.

Brid. I. p. 125. — Schwägr. Suppl. III. I. 1. pag. 2. — *Bryum macrocarpum* Hedw. Musc. Frond. III. p. 28. tab. 10. — *Orthopyxis macrocarpa* P. B. Prodr. p. 79.

Patria. In insulis Australibus, praesertim in Otaheiti, ubi primus legit Banks.

Peristomium ut in praecedentibus. Foliorum areolatio ut in *Mniis* ipsissimis perfecte hexagona pulcherri-
ma, utriculo primordiali eximie conspicuo. Cellulae magnae, parietibus usque ad apicem teneris haud incrassatis, perfecte *mnioideae* adeo, ut ex hacce specie affinitas generis *Leptostomi* et *Mnii* clare eluceat. Theca ut in *Mnio* horno formata. Ex imbricatione ad sequentem accedens.

4. L. Menziesii R. Br. (l. c. p. 321.); *dioicum*; inferne compacte cespitosum humile; caulis *laxiusculo-foliosus*; folia erecto-patentia rigida flavescentia straminea oblonga angusta longiuscula acuminata, nervo flexuoso crasso excedente longissime, flavo-et flexuoso-pilifera apice denticulata; perichaetialia longius pilifera angustiora crenulata flexuosa; theca in pedunculo brevi elongata cylindrica, ore angustata, erecta valde incurva; operculo conico brevi obliquo.

Brid. I. p. 128. — Schwägr. Suppl. II. I. p. 11. tab. 104. — Schwägr. Suppl. III. I. 1. p. 6. — *Gymnostomum Menziesii* Hook. Musc. Exot. I. tab. 6.

Patria. In terra Statuum prope Promontorium Horn: Menzies 1787. In Eremitae insula vicina: J. Hooker.

Ex imbricatione foliorum *Timmiis* subsimile, e forma thecae solitarium sed *Mielichhoferiam basilarem* vel *campylothecam* subreferens. Species memorabilis.

5. **L. gracile** R. Br. (l. c. p. 321.); *dioicum*; inferne compacte cespitosum humillimum; caulis *laxiusculo-foliosus*; folia erecto-patentia rigida flavescentia oblonga acuminata, *apice laminae inaequalia*, *marginē revoluta*, nervo excedente flavo-et flexuoso-pilifera *integerrima*; perichaetia longius pilifera; omnia flexuosa; theca in pedunculo longissimo flexuoso oblongo-cylindrica longicolla subpendula vel inclinata, operculo hemisphaerico mutico.

Brid. I. p. 127. — Schwägr. Suppl. I. I. p. 12. tab. 104. — *Gymnostomum gracile* Hook. Musc. Exot. I. t. 21.

Patria. In sinu Dusky-Bay Novae Seelandiae: Menzies 1791. In insula Campbelli: J. Hooker.

Ex imbricatione foliorum cum praecedente *Timmiis* subsimile.

6. **L. erectum** R. Br. (l. c. p. 320.); *monoicum*; inferne compacte cespitosum humile; caulis dense-foliosus; folia erecta *siccitate in spirulam contorta* oblonga obtusa subemarginata, nervo crasso excedente mucronata vel longe flexuoso-tenui-pilifera, *marginē valde reflexa*, cellulis subpellucidis non incrassatis mollia; perichaetia longissime pilifera; omnia integerrima intense viridia; theca in pedunculo longo stricto *elliptica erecta* ore angustissimo, operculo hemisphaerico minutissimo.

Brid. I. p. 125. — Schwägr. Suppl. III. I. 1. p. 3. tab. 212. — *Gymnostomum Leptostomum* Hook. Musc. Exot. II. tab. 169.

Patria. In Novae Hollandiae ora orientali, extra tropicum, in rupibus prope fluviorum ripas in regione montana, ad fluvios Hawkesbury et Grose: R. Brown; dein legit Sieber in locis Novae Hollandiae non designatis.

Flores masculi ex observationibus Schwägricheni subglobosi, foliis caulinis dimidio breviores, foliis ovatis acutiusculis piliferis; antheridiis parvis compluribus epa-

raphysatis. — Membrana peristomii in dentes densissime approximatos veluti connatos producta flava cellulosa.

Ex imbricatione foliorum, siccitate in spirulam contortorum, bryoideum, peristomio omnium maxime evolutum. E thecae forma Georgias minores in memoriam redigens.

? 7. *L. pusillum* Hook. et Wils. (Lond. journ. of bot. 1844. III. p. 154.); caule breviusculo, foliis imbricatis erectis ovato-lanceolatis acutis, nervo subcontinuo, theca annulata clavato-pyriformi nutante, operculo hemisphaerico-apiculato brevi. †.

Patria. Brasilia in Serra dos Orgãos: Gardner No. 30.

Formis angustioribus *Bryi polymorphi* Br. et Sch. haud dissimile, sed peristomio nullo et sexu distincto. Ex habitu hic *Brya illic Mielichhoferias* referens.

Gen. VII. **Timmia** Hedw.

Musc. Frond. I. p. 83. tab. 31. — *Mnium* Hoffm. Spreng. — *Orthopyxis* P. B. — *Bryum* Hall.

Nomen huic generi in memoriam Cl. Timm, Consul olim oppidi Malchin Megapolitani, stirpium Megapolitanarum acris investigatoris, impositum.

Calyptra dimidiato-cucullata fugacissima perfecte mnioidea. Peristomium duplex. Externum: dentes ut in *Mnio* genere formati, planissimi tenues membranacei pellucidi, apicem versus valde rugulosi, trabeculati, haud lamellosi, siccitate geniculato-incurvi. Internum: membrana hyalina in cilia numerosa filiformia nodosa valde appendiculata vel rugulosa, initio inter se anastomosantia, dein libera, producta. Theca perfecte mnioidea ovalis inclinata annulata. Inflorescentia monoica gemmiformis.

Ex habitu caulis *Polytrichis* plantae simillimae et inter *Mniaceas* atque *Polytrichaceas* pulcherrime intermediae,

illis e gr. *Leptostomo splachnoidi* e theca, *Lept. Menziesii* e caulis habitu, his e foliis basi vaginatis peraffines.

1. **T. Megapolitana** Hedw. (l. c.); antheridia longe stipitata; laxe cespitosa; caulis elongatus innovando ramosus; folia e basi subvaginante pallida breviora lanceolata apice denticulata flexuosa vel undulata, margine inflexa, nervo subexcurrente; comalia longiora; perichætalia breviora concava lanceolata; theca in pedunculo breviusculo stricto maxime ovalis crassa horizontalis brevis pallida, operculo hemisphaerico depresso vix mamillato raro subconico, aurantiaco; peristomii cilia appendiculis numerosis praedita.

Brid. II. p. 69. — Bryol. Europ. Fasc. X. *Bryaceae*. *Timmia*; p. 6. tab. 1. — *Timmia Bararica* Hessler Comment. de *Timmia* p. 19. fig. 3. — *T. Megapolitana* β. *Bararica* Brid. I. p. 71. — *T. polytrichoides* Brid. Mant. Musc. p. 122. — *T. cucullata* Mich. Rich. Fl. Am. Bor II. p. 304. — *Orthopyxis Megapolitana* P. B. Prodr. p. 79. — *Mnium Timmia* Hoffm. Deut. Fl. II. p. 53. — *Mnium Megapolitanum* Gmel. Syst. Nat. II. p. 1327. — *Bryum* foliis lanceolatis falcatis, setis alaribus, capsula ovata inclinata, operculo mammillari. Hall. Hist. St. Helv. n. 1779.

Patria. In Germania septentrionali prope Malchin Duc. Megapolit. in pratis humidis rarissima. In Franconiae monte Waldstein: Funk; in alpibus Tirolis, Carinthiae, Salzburgiae et Helvetiae haud rara. In Halicia, hucusque in agro tantum Leopoliensi Podolico, in rupibus Lisienicensibus, ubi in fissuris umbrosis parcissime habitat, a Cl. Łobarzewski lecta. In Scandinaviae W. Gothia, Norvegia et Suecia boreali. In Scotiae Ducatu Forforshire. In America septentrionali et insula Melville. Crypta amat et loca luci hominibusque impervia. — *A mense Junii ad mensem Septembris.*

Flos masculus in axillis foliorum comalium, foliis e basi ovali subito acuminatis evanidmervibus serrulatis minute areolatis, antheridiis longe et crasse stipitatis, paraphysibus filiformibus interpositis.

2. **T. Austriaca** Hedw. (Sp. Musc. p. 176. tab. 42. fig. 1. 7.); antheridia elongato-cylindrica brevi-stipitata; laxe cespitosa; caulis elongatus innovando ramosus; folia

e basi longe vaginante fusca lineali-lanceolata grosse dentata, flexuosa vel undulata, margine inflexa, nervo subexcurrente, dorso subspinoso; perichaetialia e basi longiore ceteris similia, omnia minute areolata; theca in pedunculo longo flexuoso pyriformi-oralis horizontalis, operculo hemisphaerico-conico mammillato; peristomii dentes longiores, ciliis granulosis haud appendiculatis.

Brid. l. p. 71. — Bryol. Europ. l. c. p. 7. tab. 2. — *T. Megapolitana* Flörke, Schleich. et al.

Patria. In Germaniae montibus hucusque tantum in Hercynia inferiore detecta, ubi in valle fluminis Bode dicti a domino Clasen pharmaceuta lecta est. In alpibus Austriae, ubi in monte Schneeberg Cl. Fröhlich detexit; in alpib. Salisburgiae et Carinthiae; in monte Branson prope Martigny Valesiae et in ascensu septentrionali montis Simplon longe et late cespitosa; in Pyrenaeis et alpib. Scandinavicis, Gothiae borealis, Sueciae atque in Finlandia rarior. — *Junio.*

A praecedente notis datis distinctissima. Caetera ut antea.

Genus incertae sedis.

Gymnostomum (Eucladon) complanatum Hook. et Wils. (Lond. journ. of bot. 1844. p. 538.); surculis erectis fasciculatis complanatis, foliis trifariis lateralibus patentibus verticalibus elliptico-lanceolatis acutiusculis integris nervo subcontinuo, dorsalibus erectis apice recurvis subrotundis apiculatis, nervo subcontinuo, perichaetialibus longioribus erectis linearibus, theca erecta elliptico-oblonga, ore angustato annulato, operculo longirostrato, calyptra dimidiata. †.

Patria. Nova Seelandia in truncis filicis dendroidis, societate *Rhizogonii piliferi* Hook. et Wils.

Musculus memorabilis, *Hypopterygio* analogus, forsan novum genus, cui auctores clarissimi nomen *Eucladon* dederunt. Theca matura hucusque nondum observata sed annulata; an peristomata? Ex habitu *Georgiae* atque *Schistostegae* genus affine, qua de causa huc ex analogia revocavimus. Inflorescentia dioica terminalis.

Subtribus H. POLYTRICHACEAE.

Folia *Mniacearum* instar forma valde variabili praedita basi plerumque vaginata membranacea, congenerum fere omnium lamina interna lamellosa. Lamellae e cellularum strato unico constructae in longitudine nervi positae plures. Theca epiphragmate clausa, exannulata, saepissime angulata, apophysata, inaequalis. Antheridia muscorum fere omnium maxima clavata. Paraphyses floris masculi plerumque apice valde cellulosae subclavatae.

Longe cunctati sumus, *Polytrichaceas* cum *Mnioideis* conjungere, quum illis sit habitus maxime proprius. Ex observationibus autem permultis elucet, a *Mnioideis* nec foliorum areolatione, nec ulla nota acuta separari posse. *Polytrichaceis* multis folia sunt basi quidem vaginata, quibus habitus *polytrichoides* maxime procedit, *Catharineae* tamen hac nota nunc carent, nunc gaudent, et in genere perfecte *mnioideo*, *Timmia* dicto, species altera foliis basi maxime altera *vix* vaginatis observatur. *Catharineae* caeterum sectionis *Atrichi* ad *Mniaceas* ex habitu valde accedunt et *Catharinea Callibryon Mnio undulato* e foliis, *Mnio polycarpo* e thecis procul dubio per-similis appellanda est. *Oligotricha* et *Psilopila*, minus similia, ab *Atrichis* separari non possunt, quum *Atrichum angustatum* ad *Oligotrichum* transeat. *Polytrichaceae* tandem foliis cirrhatis *Rhizogonia* iterant, quorum folia, dorso saepe serrata, *Polytrichaceis* permultis proxima cognoscuntur. Ut ut sit, persuasum habemus, *Polytrichaceas Mniaceis* proximas esse.

Patria. Loci humidi vel sicci omnium regionum utriusque hemisphaerae, omnium muscorum gigantes et vita longa gaudentes.

Gen. VIII. **Catharinea** Ehrh.

Beitr. I. p. 178. — Brid. II. p. 97. — *Atrichum* P. B. et Bryolog. Europ. Fasc. XXI. *Polytrichaceae*. — *Oligotrichum* Dec. et

Bryol. Europ. ibid. — *Psilopilum* Brid. — *Polytrichum* Hedw. et al. — *Bryum* Dill. Linn.

Nomen in honorem *Catharinae* II. Russiae imperatricis ab Ehrharto, forsitan grato, datum.

Calyptra anguste-cucullata, apice subscabra, interdum hirtiuscula. Peristomium simplex *polytrichoides*. Dentes 32, e membrana basilari angusta cellulosa ligulati membranacei albidi, filis rufescentibus pluribus inarticulatis percurrentibus, subincurvi haud hygroscopici firmi. Columella apice in epiphragma tympaniforme dilatata, stoma claudens. Theca aequalis. Inflorescentia monoica vel dioica. Flos masculus cyathiformis vel gemmacens.

Sectio I. **Atrichum**. Folia latiora majora perfecte mnioidea basi haud vaginata theca exacte cylindrica arcuata.

1. **C. Callibryon** Ehrh. (Beitr. I. p. 189.); *monoica*, flore masculo in caule annuo terminali, antheridiis parvulis, cyathiformi; caulis basi repens erectus ramosissimus gracilis laxe foliosus; folia apicem versus sensim majora confertiora longa lingulato-lanceolata, e medio ad apicem undulata, margine anguste limbato dentato, dentibus saepe binis, nervo dorso spinoso subexcurrente; perichaetialia angustiora; perigonialia externa comalibus similia, paulo breviora et latiora, interna e basi lata concava brevi-lanceolata, intima obcordato-acuminulata, apice crenulata; theca longe-cylindrica arcuata, operculo longissime rostellato curvulo.

Atrichum undulatum P. B. Prodr. p. 42. — Bryolog. Europ. I. c. p. 8. tab. 1 et 2. — *Callibryum polytrichoides* Wieb. Fl. Werth. p. 290. — *C. undulatum* Zenk. et Dietr. Musc. Thur. Fasc. II. n. 41. — *Catharinea undulata* Röhl. Deutsch. Fl. III. p. 61. — Brid. Bryol. univ. II. p. 102. — *Polytrichum undulatum* Hedw. Musc. Frond. I. p. 43. tab. 16 et 17. — *Oligotrichum undulatum* Lamarck et Decand. Fl. Franç. I. p. 492. — *Mnium undulatum* Linn. jun. Meth. Musc. p. 364. — *Bryum undulatum* Linn. Sp. Pl. p. 1532. — *Bryum phyllitidis* folio rugoso acuto, capsulis incurvis. Dill. Musc. p. 360. tab. 46. fig. 18.

β. attenuata; foliis angustioribus tenerioribus, siccitate magis crispatis, nervo angustissime lamellato, theca graciliori. *Polytrichum undulatum* var. I. Hook. et Wils. Drumm. Musc. Americ. Fasc. II. No. 66. — Bryol. Europ. I. c. p. 8.

γ. abbreviata; pedunculo, theca et peristomii dentibus brevioribus. Bryol. Europ. I. c. p. 8.

δ. brevilamellosa; folia lamellis fere carentia; planta caeterum robusta, thecis aggregatis.

ε. subserrata; foliis subintegerrimis, apicem versus serratis. *Pol. undulatum γ. subserratum* Hook. Lond. Journ. of bot. 1840. p. 3.

Patria. In locis umbrosis graminosis totius Europae. Var. *β.* in America septentrionali. Var. *γ.* in terra nuda arenosa. Var. *δ.* in regno Mexicano: Schiede prope Jalapam, Leiboldt in locis non designatis. Var. *ε.* in Nepal et Himalaya Indiae orientalis. — *Sero auctumno et hyeme.*

Folia perigonialia tenera, haud lamellosa laxius areolata. Antheridia parvula, paraphysibus pallidis paulo longioribus mixta.

2. C. androgyna C. Müll.; *monoica*, flore masculo in feminei vicinia, antheridiis maximis clavatis praedito gemmiformi; habitus praecedentis, sed folia caulina margine crassius limbata, perfecte bispinosa; folia floralia e basi latiore caulinis similia; perigonialia externa lanceolata spinoso-acuta, simpliciter dentata, interiora basi latiora reflexa integerrima; theca praecedentis. Operculum deest.

Patria. Promont. bon. spei prope Swellendam in nemoribus ubi m. Octobr. c. thecis deoperculatis legit Ecklon. Hb. Kunzeanum.

Cactera ut in praecedente, a qua notis datis facile distinguitur. Archegonia longissima.

3. C. angustata Brid. (Bryol. univ. II. p. 105.); dioicum; habitus *Cath. Callibryi* sed gracilior; folia angustiora firmiora angustissime limbata; breviora, nervo lamellis numerosioribus, minutius areolata, lamellae ple-

rumque totum folii apicem occupantes, omnes partes facile emollientes; theca erecta tenui-cylindrica subarcuata, maturitate sanguinea, operculo brevius rostellato.

Atrichum angustatum Br. et Sch. l. c. p. 9. tab. 3. — *Atr. controrsum* P. B. Prodr. p. 42. — *Polytrichum angustatum* Hook. Musc. Exot. tab. 50. — *Pol. controrsum* Brid. Sp. Musc. l. p. 78. — *P. undulatum* β . *minus*, thecis foliisque erectioribus. Hedw. Musc. Frond. I. p. 48. — *Bryum juniperi* foliis rugosis, capsulis rectioribus. Dill. Musc. p. 362. tab. 46. fig. 19.

Patria. In terra arenosa et argillacea collium subumbrosorum totius fere Europae praecipue Germaniae septentrionalis et in America tota septentrionali vulgarissima. *Sero auctumno.*

Folia perigonialia plerumque late lamellosa. A *C. Callibryo* notis laudatis distinctissima.

4. **C. tenella** Röhl. (Annal. der Wetterauer Gesellsch. III. p. 234.); *dioica*; caulis brevis; folia *late-lanceolata* subundulata, nervo *parce lamellosa*, margine infra medium dentato; theca *brevissima cylindrico-oralis ore amplo fuscescens subarcuata*, operculo conico subulato rectiusculo, calyptra apice obsolete hirsuta; peristomio magno.

Atrichum tenellum Br. et Sch. l. c. p. 9. tab. 4. — *Cath. tenella* Brid. II. p. 104. — *Polytrichum undulatum* β . *minus* Funk. Moostaschb. p. 70. — *Polytrich. undulatum* β . *minus*: foliis brevioribus obtusioribus. Wahlenb. Fl. Lapp. p. 349. — *Mnium orthorrhynchum* Brid. Sp. Musc. III. p. 45. — *Bryum Polla orthorrhyncha* Brid. II. p. 691. e speciminibus herbarii auctoris huc pertinet!

Patria. In solo limoso et turfáceo: in Vogesis prope Bipontem aliisque locis; in Lusatia prope Maffersdorf; prope Francofurtum Neomarchiae; in Austria prope Gmünden; in Norvegia prope Drontheim et in Gothia ac Suecia. — *Augusto. Septembri.*

Praecedenti proxima sed primo adspectu theca brevissima vix cernua discernibilis.

Sectio II. **Psilopilum.** Folia angustiora polytrichoidea, basi haud vaginata, sed amplexicaulia; theca compressiuscula, apice subincurva asymmetrica.

5. **C. glabrata** Hook. (Iter Island I. p. 24.); *dioica*; humilis simplicissima laxe cespitosa; folia remota laxe imbricata quadrifaria, oblonga valde concava *obtusae vel obtuse brevi-acuminata margine crenulata*, nervo lamellis undulatis creberrimis praedito dorso laevi; theca basi crassa ventricosa apice attenuata curvula inaequalis, rufa, basi stomatiis instructa, siccitate rugulosa, operculo e basi convexa breve et incurvo-rostellato; calyptra apice obsolete papillosa, caeterum nuda; dentes peristomii pallidi.

Oligotrichum laerigatum Br. et Sch. Bryol. Europ. Fasc. 21 — 22. Polytrichaceae. *Oligotrichum*; p. 5. tab. 6. — *Psilopilum arcticum* Brid. II. p. 96. — *Polytrichum laerigatum* Wahlenb. Fl. Lapp. p. 349. tab. 22. — *P. glabratum* Wahlenb. olim in Web. et Mohr. Ind. Musaei. — *P. marginatum* Schwägr. Suppl. I. II. p. 329.

Patria. In apricis alpinis et borealibus Lapponiae Tornensis, Islandiae, Labradoris et in insula Melville. — *Aestate.*

Folia perigonialia obcordato-acuminata, nervo apice lamelloso.

6. **C. compressa** C. Müll.; caulis subsimplex; folia erecto-patentia *lanceolato-subulata* concava carnosae *sub-serrata*; theca inclinata ovata compressa, microstoma, operculo conico rostrato, calyptra *apice subpilosa*. †.

Polytrichum compressum Hook. et Wils. Lond. Journ. of bot. 1844. p. 539.

Patria. Insula Eremitae ad Caput Horn.

Praecedenti affine, sed theca compressa foliisque angustioribus jam differt.

7. **C. trichodon** C. Müll.; *dioica*; caulis humilis subsimplex; folia erecta ovato-lanceolata *valde acuta canaliculata integerrima dense imbricata*; apice lamellosa brunnea; theca in pedunculo breviusculo crassiusculo obliqua suberecta ovalis seu rotundo-compressa majuscula microstoma, operculo rostrato; *dentes peristomii 16 pallidi longi subulati*; calyptra glabra apice scabriuscula s. pilosiuscula. †.

Polytrichum trichodon Hook. et Wils. in Lond. Journ. of bot. 1847. p. 289. tab. 10.

Patria. Nova Granada prope Paramo of Ruiz in cinerib. vulcanic. ad nives aeternas: Purdie legit Julio 1846.

Praecedenti affinis, differt autem peristomio, e lamina duplici, externa et interna (e sporangidio orta) formato, dentibus subulatis.

Sectio III. **Oligotrichum.** Folia praecedentis sectionis. Theca cylindrica urnigera v. ovalis, haud incurva sed erectiuscula.

8. **C. Hercynica** Ehrh. (Beitr. I. p. 190.); *dioica*; humilis simplicissima gregarie cespitosa; folia erecto-patentia subarcuato-incurva, siccitate tortuosa, rigidiuscula, e basi amplexicauli lanceolata concava, margine inflexa remote serrata, apicem versus lamellis undulatis creberrimis, dorso cristato-dentata; theca erecta ovato-cylindrica symmetrica, operculo conico apiculato; calyptra pilis erectis paucis apice subhirta.

Brid. II. p. 99. — *Oligotrichum Hercynicum* Dec. Flor. franç. II. p. 492. — Bryol. Europ. I. c. p. 4. tab. 5. — *Atrichum Hercynicum* P. B. Prodr. p. 42. — *Polytrichum Hercynicum* Hedw. Musc. Frond. I. p. 48. tab. 15. — *Orthotrichum Hercynicum* Hoffm. Deut. Fl. II. p. 25. — *Cath. Sudetica* Presl. (*Pogonatum intermedium* Opitz.). Brid. II. p. 106?

Patria. In subalpinis et alpinis Germaniae septentrionalis, centralis (Sudetorum et Montis aeriferi), Helvetiae, Vogesorum, Sueciae, Norvegiae, Lapponiae et in Islandia fide Steenstrup. Inter Oderbrück et Andreasberg Hercyniae superioris primus omnium legit Ehrhart. — *Aestate.*

Folia perigonialia e medio patula latissime ovalia minora colorata acuta, apice parce lamellosa, dorso laevia, integerrima pellucida.

9. **C. Javanica** Imp. (Ic. Musc. tab. 22.); *dioica*; praecedenti simillima; sed folia longiora angustiora subulata subacuta, inferiora integra, superiora apice remotissime serrata, nervo dorso apicis cristato-dentata; perichaetialia valde amplexicaulia basi valde pellucida, apice multo angustiora; theca minor oblique erecta, operculo

convexo conico; calyptra usque fere ad apicem fissa apice pilis erectis paucis subhirta.

Hmp. in Ic. Muse. Frond. tab. 22.; icone ab ipso auctore, haud manib. nostris delineata.

Patria. Java, ubi in cacumine montis Sindoro, locis humidis mense *Aprilis* legit Junghuhn.

Dentes peristomii 32 filis rufescentibus praediti ut in praecedente.

10. C. Riedeliana Hmp. (Linn. XX. p. 79.); *dioica*; laxe cespitosa *elatiuscula* simplicissima; folia *remotiuscula*, inferiora minora oblonga, superiora oblongo-lanceolata majora latiora; omnia *marginē undulato-flexuosa*, *tenera viridia valde pellucida*, *nervo apicem versus undulato-lamelloso* dorso breviter cristato-dentato praedita, *apice crenulata concava haud amplexicaulia*; perichaetia maxima, basi longe vaginata laxe et majusculo-reticulata valde pellucida, apice densius areolata magis crenulata, nervo dorso longe cristate et argute serrato, acutiora et ut praecedentia siccitate involuto-cirrhata; theca in pedunculo longiusculo stricto ovalis *crassa brevis*, *ore truncato* et operculo e basi conica longe rostrato praedita erectiuscula; dentes peristomii brevissimi pallidi angusti.

Polytrichum Riedelianum Mont. Ann. d. sc. nat. II. Tom. XVI. 1841, p. 269. — *P. nigricans* Hook. et Wils. Lond. journ. of bot. 1844. p. 151.

Patria. Brasilia: Riedel primus legit. Ex herbario Lucaeano a Luschnath lectam quoque habemus. Prope Rio Janeiro: Gardner No. 10.

Planta mascula multo gracilior, flore discoideo maximo instructa. Folia perigonialia interiora latissima obcordato-acuminata brevia, integerrima, nervo apice parce lamellosa, exteriora angustiora sublongiora, apice crenulata, basi in nervi tantum vicinia concava. Antheridia maxima creberrima, paraphysibus paucis hyalinis, apice clavatis coloratis mixtis. Calyptra perfecte glabra. — Ex habitu plantae emollitae *Atrichis* persimilis, sed theca distans et *C. tenuirostri* magis affinis, caule autem

elongato, foliis viridibus valde contortis et theca truncata crassa brevi primo intuitu distinguitur.

11. C. tenuirostris Brid. (II. p. 101.); *dioica*; laxa cespitosa *humilis* simplicissima; folia *confertiora* patula, *e basi subvaginante tenerima* oblonga obtusiuscula *integerrima*, *apice minutissime areolata* nervo *lamellis perpaucis brevissimis strictis praedito*; theca in pedunculo elongato ovata basi punctata *ore angusta*, operculo e basi convexiuscula longirostro obliquo; dentes peristomii **32** breves *rufescentes*; calyptra glabra.

Polytrichum tenuirostre Hook. Musc. Exot. tab. 75. — Schwägr. Suppl. II. II. p. 16. tab. 157.

Patria. In sinu Dusky-Bay Novae Seelandiae: A. Menzies 1791.

12. C. Molinae C. Müll.; cespitosa simplex elongata; folia ovato-lanceolata obtusa *basi quadrata membranacea hyalina amplexicaulia*, *marginē erecto undulato, supra medium patenti-incurva*, canaliculata integerrima, *nervo sensim dilatato percursa, a medio ad apicem multilamellata, siccitate uncinato-incurva*; theca primo ovata subinaequalis tandem oblongo-cylindrica subinclinata, operculo e basi conica rostrato, dimidiam thecam vix aequante; peristomii dentes **32** breves; calyptra laevissima fusca fere ad apicem fissa. †.

Polytrichum Molinae Mont. Ann. des sc. nat. 1845. 4. p. 102. et in Hist. de Chile; Bot. Crypt. tab. 4. fig. 3.

Patria. Chile australis, ubi frequenter legit C. Gay.

C. canaliculatae proxima, differt autem statura quater majore, foliis obtusis, theca primum ovali dein cylindracea et operculo thecam dimidiam vix aequante. A *C. tenuirostri* foliis multilamellosis, a *C. semilamellata* foliis obtusis et multilamellosis, theca erecta et operculo distinguitur. — Dioica?

13. C. semilamellata Himp. (Linn. XX. p. 79.); dense cespitosa *humilis* simpliciuscula; folia lanceolata concava integerrima subcoriacea, *laxe imbricata*, siccitate contorta, *nervo superne latiore lamellato*, lamellis

undulatis; theca in pedunculo longiusculo *inclinata sub-cylindracea*, operculo longirostrato *recto*. $\frac{1}{4}$.

Polytrichum semilamellatum Hook. fil. in Ic. Plant. rar. tab. 194 A. fig. 1.

Patria. In montibus Himalayae: Dr. Royle.

Ex affinitate hujus speciei et *C. tenuirostris* atque *Molinae* forsan huc pertinet. Calyptra ab auctore non observata. Dioica? Folia ex ic. basi haud amplexicaulia.

14. **C. canaliculata** C. Müll.; *dioica*; laxe cespitosa humilis simplicissima; folia inferiora e basi haud vaginata tenuiore oblongo-lanceolata obtusata integerrima, ubique laevia, apicem versus e cellulis incrassatis minutiusculis composita carnosula, nervo e medio ad apicem usque *dense lamellosa crasso totum apicem occupante*; perichaetia *basi longe vaginantia* multo laxius areolata; theca in pedunculo longiusculo *teres majuscula ore angustior*, operculo longe rostrato; calyptra laevissima fusca; dentes peristomii 32 lineares obtusiusculi.

Polytrichum canaliculatum Hook. in Capt. Beechey's Voyage p. 54. — Schwägr. Suppl. IV. tab. 324.

Patria. Conception Chiles: Lay et Collic. In iisdem locis, sed non designatis legit Pöppig. Hb. Kunzeanum.

Ex habitu *Cath. tenuirostris*, sed notis laudatis sat discernibilis.

Sectio IV. **Dendroligotrichum.** Folia basi longe vaginata, cirrhata. Theca sectionis praecedentis. Plantae saepe giganteae.

15. **C. dendroides** Hmp. (Linn. XX. p. 78.); *dioica*; *caulis e basi rhizomatoidea radiculoso-tomentosa maxime elongatus triqueter strictus, foliis squamiformibus densissime appressis amplexicaulibus aristatis brunneis praeditus, apice dendroideo-ramosus*; rami plantae femineae dichotomi, masculae fasciculati, simplices elongati; folia octosticha, siccitate patula flexuosa, madefacta patentia stricta, amplexentia, e basi lata membranacea lineari-areolata denticulata lanceolato-subulata longissima, grosse

serrata, apice serrato, nervo crasso excurrente dorso apicis serrato; theca in pedunculo breviusculo flexuoso aequalis ovata brevis maxime truncata, aperta horizontalis; dentes peristomii 64, e membrana alta sulcato - plicati lanceolati latiusculi obtusiusculi involuti; calyptra subglabra, basi pilis longissimis nonnullis nodosiusculis, apice papilloso - scabra.

Polytrichum dendroides Hedw. Sp. Musc. p. 102. et Suppl. II. II. p. 1. tab. 151. — *Pogonatum dendroides* Brid. II. p. 112.

Patria. In sylvis, quae Alpibus subsunt Commersonianis, in sinu Baie Française de Bougainville et in Port Galant Freti Magellanici, ubi Commerson Decembri 1767 detexit; praeterea in sinu Dusky-Bay Novae Seelandiae: Menzies. E regno Peruviano, a Cl. Philippi lectam et Hb. Reg. Berol. missam benevolentiae Cl. Klotzsch debemus.

Flores masculi in planta unica, sed ramis diversis creberrimi, e centro proliferi, cyathiformes. Antheridia maxima clavata, paraphysibus numerosissimis longissimis filiformibus interdum apice celluloso - incrassatis. Flores feminei creberrimi (in specimine unico c. 30 numeravimus), terminales, dein innovationibus laterales in ramis brevibus. Archegonia quam maxime elongata pallida laxissime cellulosa, apice maxime infundibuliformia tripartita, nucleo parvo, paraphysibus longissimis filiformibus. — Omnium muscorum pulcherrima species dendroidea, nulli ali nisi sequenti comparabilis.

? 16. *C. squamosa* C. Müll.; caulis elongatus squamosus, superne fastigiatis ramosus, rami patentes *breves densi curvati*; folia dense imbricata suberecta lanceolato - subulata stricta serrata. †.

Polytrichum squamosum Hook. et Wils. Lond. Journ. of bot. 1844. p. 539.

Patria. Insula Eremitae ad promontorium Horn: J. Hooker.

An forma sterilis alpina praecedentis? auctores l. c. quaerunt. Habitu autem valde recedens.

Sectio V. **Polytrichadelphus.** Folia juniperoidea densissime imbricata. Theca sectionis praecedentis.

17. C. ciliata C. Müll.; *dioica; maxime elata funiformis* crassa simplex, e basi usque ad apicem foliosa; folia erecta, basi vaginantia ovato-subulata carinata *apice ciliata*, nervo e medio dense et stricte lamellosa; theca in pedunculo breviusculo semicylindrica aequalis vel ovato-oblonga erecta, dein horizontalis, innovatione plerumque lateralis, operculo conico apiculato; calyptra dimidiata basi valde truncata, *apice pilis paucis brevibus, erectis, basi pluribus longis descendentibus hirsutiuscula, flavescenti-brunnea.* †.

Polytrichum ciliatum Hook. et Wils. Lond. journ. of bot. 1847. p. 290. tab. 10.

Patria. Nova Granada prope Paramo de Pamplona raro: Purdie, *Septbr.* 1845.

Planta speciosissima sequenti affinis, sed solitaria. Planta mascula e centro floris saepe prolifera. Dentes e membrana brevi latiusculi breves.

18. C. Magellanica Brid. (II. p. 106.); *dioica; simplex* dein apicem versus semel vel bis innovans erecta stricta, basi nudiuscula; folia densa, humida subpatula, siccitate appressa, e basi latiore amplexicauli *longe subulata* canaliculata, *cartilagineo-serrata*, pungentia, lineata, crassinervia, e viridi spadicea, inferiora decolora; perichaetia interna cordiformia latiora, margine pellucido; theca in pedunculo terminali erecto longiusculo ex ovato cylindrica erecta fusco-pulla, operculo *e basi conica in rostrum longum incurvum educto*; calyptra *pilis brevibus exasperata*; dentes peristomii 64 breves erecti albicantes.

Polytrichum Magellanicum Linn. Suppl. p. 449. — Hedw. Sp. Musc. p. 101. tab. 20. fig. 1. 2. — Menzies in Trans. of Linn. Soc. 4. p. 71. tab. 6. fig. 1. — *Catharinea Pseudopolytrichum* Radd. in Memor. di matemat. et fis. della Soc. Ital. Moden. Tom. 18. p. 443. tab. 18. fig. 1. — *Pogonatum Magellanicum* P. B. Prodr. p. 84. — *Pogonatum semiangulatum* Brid. II. p. 744. theca in ramis brevissimis quasi lateralis, aperta horizontalis. *Pogonatum semiangulatum* Brid. II. p. 744.

Patria. Ad fretum Magellanicum primus omnium legit Commerson; in Nova Seelandia: Menzies; in montosis Jozé Dio: Beyrich, Augusto; et in Serra do Frade prope Rio Janeiro Brasiliae: Beyrich, Augusto. In Serra de Piedados Brasiliae: Gardner No. 14.

Gen. IX. **Polytrichum** Dill. emend.

Hist. Musc. p. 439. — *Mnium* Linn. fil. Hall. — *Pogonatum* Brid. II. p. 107. — *Catharinea* Röhl.

Nomen graecae compositionis, apud *Apulejum* primum occurrens et *Polytrichum commune* designans, a πολὺς *multum* et ῥίζα *capillus*, propter calyptrae indumentum villosum, forte etiam ob pedunculorum capillorum instar copiam aut radicis crines longos imitantes, ei inditum, toti generi a *Dillenio* impositum, a *Linnaeo* et *Hedwigio* sancitum.

Calyptra *dimidiata*, capillis autem *descendentibus creberrimis indumentum villosum longum formantibus quasi campanulata*. Caetera ut in praecedente genere.

Sectio I. **Aloidella**. Plantae humillimae. Folia laxiuscula pauca siccitate plus minus involuta aloidea. Theca aequalis parva ore plus minus coarctata.

1. **P. aloides** Hedw. (Stirp. I. p. 40. tab. 14.); caulis femineus e perichaetio, masculus e perigonii centro innovans, laxe cespitosus; folia e basi laxe vaginante late lanceolata *obtusata*, *supra basin remote denticulata*, *apicem versus argute et breviter serrata*, nervo e medio multilamelloso folium fere totum occupante, *dorso plus minus serrato*; theca in pedunculo stricto longiusculo ovalis erectiuscula vel subinclinata ore parum angustiore, operculo convexo-conico brevi praedita, *papillosa*, *columnella quadrialata*.

Pogonatum aloides Brid. II. p. 119. — Bryol. Europ. p. 6. tab. 8. — *Polytrichum aloefolium* Scop. Fl. Carn. p. 134. n. 1. — *P. laterale* Crome. — *P. subrotundum* β. Huds. Fl. Angl. p. 400. — *P. mnioides* Neck. Meth. Muscor. p. 128. — *P. nanum* Weis. Crypt.

Gött. p. 173. — *P. parvum* Aloes folio serrato capsulis oblongis Dill. Musc. p. 429. tab. 55. fig. 7. — *P. rubellum* Menz. Trans. of Linn. Soc. 4. p. 79. tab. 7. fig. 3. — *P. Dicksoni* Turn. Muscol. Hib. p. 88.

β. defluens, caule et pedicello brevioribus, calyptrae pilis sub theca confluentibus. *P. defluens* Brid. Mant. Musc. p. 200. Br. univ. II. p. 121. var. aloidis. — Br. Europ. I. c.

γ. magna, partibus omnibus robustior innovationibus elongatis, foliis latioribus rigidioribus, dorso valde serratis siccitate vix tortilibus et theca maxime papillosa majuscula valde truncata.

Patria. In ericetis, ad rupes humidas et in rupium fissuris per totam Europam, Americam septentrionalem atque aequinoctialem et Asiae regiones septentrionales. Var. *β.* ubique occurrit, praesertim in solo arenario. Var. *γ.* in limos. sylvestr. Oenipont., ubi Heufler legit. — *Vere.*

Planta mascula gracilior, foliis brevioribus, externis obovato-acuminatis, internis obcordato-apiculatis, intimis e basi angusta dilatatis acuminatis. Paraphyses filiformes vel subclavatae. Dentes peristomii 28, 32, 36.

2. *P. Capense* Hmp. (Ic. Musc. tab. 21.); brevissimum paucifolium simplex; folia e basi diaphana vaginante latiore ovato-lanceolata *acutiuscula*, siccitate convoluta incurva, in parte superiore nervo lamellato latissimo obducta, margine valde diaphano *remote inciso-dentata*; theca in pedunculo breviusculo *ovato-cylindrica laevis erecta* operculo brevi conico incurvo; calyptra brevis; dentes peristomii brevissimi lanceolati obtusi saepe paria connati.

Patria. Prom. bonae spei: Gueinzius, pharmacopola. Hb. Kunzeanum.

Inter *Polytr. aloides* et *nanum* intermedium. A priori differt: foliis apice remote inciso-dentatis, theca evacuata opaca laevi, operculo breviori conico obtuso, peristomii dentibus ter brevioribus. A secundo proximo foliis brevioribus ad basin magis diaphanis nervoque tenuiore attenuato, theca ovato-cylindrica, deoperculata utrinque sub-

attenuata texturae firmioris cellulis duplo majoribus hexagonis dentibusque peristomii latioribus brevioribus et solidioribus saepe binis confluentibus distat.

3. P. nanum Hedw. (Stirp. Crypt. I. p. 37. tab. 13.); caulis *haud ex apice innorans, subgregarius*; folia rigida patentia, e basi laxe vaginante lanceolata, *apice minute et remote denticulata*, superiora obtusiuscula; perichae-tialia longiora, tenero - membranacea, intima acuminata subnervosa integra clamellosa; theca in pedunculo longiusculo *globoso - urceolata subcurva erecta vel nutans* pallide olivacea, ore valde truncato, operculo e basi convexiuscula rostellato recto conico; dentes peristomii magni, *amoene purpurei*.

Pogonatum nanum Brid. II. p. 117. — Bryol. Europ. l. c. p. 5. tab. 7. — *Polytrichum pumilum* Sw. Musc. Suec. p. 77. tab. 9. fig. 19. — *Pogonatum pumilum* Brid. II. p. 116. — *Pol. semidiaphanum* Brid. Mant. Musc. p. 200. — *Pol. intermedium* Brid. Mant. Musc. p. 117. — *Pol. subrotundum* Menz. Trans. of Linn. Soc. 4. p. 68. — *Pol. ericoides* Hoffm. Deut. Fl. II. p. 24. — *P. aloefolium* β. *foliis integerrimis* Scop. Fl. Carn. II. n. 1290. — *Catharinea nana* Röhl. Moosg. Deut. p. 188. — *Mnium polytrichoides*, calyptra villosa α Linn. Sp. Pl. p. 1576. — *Polytrichum nanum*, capsulis rotundis galeritis, aloes folia non serrat Dill. Musc. p. 428. tab. 55. fig. 6. — *Pogonatum pusillum* B. Prodr. p. 119. et Brid. II. p. 119?

β. *longisetum* Himp., foliis longioribus, lineali-lanceolatis, pedunculo valde elongato, theca ovali-oblonga. Bryolog. Europ. l. c. p. 5. tab. 7. β. 1.

Patria. In locis argilloso-arenariis sterilibus humidis per totam Europam, Asiam et Americam borealem. Var. β. prope Halam Saxonum. — *Hyme.*

Planta mascula humilior, flore gemmaceo-cyathiforme foliisque perigonalibus externis late ovato-acuminatis, nervo crassiusculo apicem versus lamellosa, interiora angustiora obovato-lanceolata tenuinervia rubella, intima minima lanceolata, obsolete nervosa tenerrima. Paraphyses filiformes tenerrimae.

4. P. brachyphyllum Rich. (Mich. Fl. Amer. Bor. II. p. 295.); *dioicum; brevissimum simplicissimum; folia pauca e basi vaginante pellucida latiore breviter lingulata*

obtusissima integerrima, nervo lamellis numerosissimis crassissimo totum folii apicem occupante, valde carnosulae, sicca et madefacta stricta; perichaetia basi longiore pellucidiora tenuiora; theca in pedunculo elongata ovalis erecta papillosa, operculo e basi tumida convexa breviter conico; dentes peristomii longiusculi rufi.

P. vaginans Brid. Sp. Muscor. I. p. 68. — *Pogonatum brachyphyllum* P. B. Prodr. p. 84. — Brid. II. p. 113. — Schwägr. Suppl. II. II. I. tab. 156.

Patria. In argillosis Carolinae et Pennsylvaniae: Richard. Georgia, Alabama, Ludoviciana: Sullivan.

5. **P. Pennsylvanicum** Hedw. (Sp. Musc. p. 96. tab. 21. fig. 1 — 6.); *dioicum*; humile simplicissimum paucifolium; folia erecta strictissima elongata, e basi longe vaginante latiore sensim acuminata, nervo apice dense lamelligero dorso cristato-dentato folii apicem fere totum occupante, crenulata apice dentata; perichaetia longiora cuspidata crenulata basi longissima pellucida; theca in pedunculo elongata ovalis cylindrica sub ore coarctata subarcuata, operculo e basi tumida convexa breviter conico; dentes peristomii longiusculi medio rufi; calyptra thecam superans albescens apice subbrunnea.

Schwägr. Suppl. II. II. I. p. 14. tab. 156. — *Pol. acaulon capillaceum*, capsulis cylindricis. Dill. Musc. p. 434. tab. 55. fig. 12. — *Pol. tenue* Menz. Trans. of Linn. Soc. IV. p. 68. — *Pogonatum brevicaule* P. B. Prodr. p. 84. — Brid. II. p. 114. 743.

β. Torreyanum, caule brevissimo, foliis e basi ovata longe subulata tenera diaphana integerrima, apice valde incurva. *Pogonatum Torreyanum* Brid. mst. II. p. 115.

Patria. In terra argillosa secundum viarum latera Americae totius septentrionalis a Marylandia usque ad Georgiam, Pennsylvania, Carolina, Nova Scotia, Massachusetts et in Brasilia unde prope Tejuca a Cl. Gardner lectum habemus.

Sectio II. **Cephalotrichum.** Plantae elatiores sed simplices, basi nuda, apice comoso-vel rosulato-foliosae. Folia juniperi-idea stricta. Theca aequalis.

6. **P. oligodus** Kze. (Pl. Chil. Pöpp. Coll. I. No. 271.); *dioicum*; folia laxiusculo - imbricata, e basi latiusculo - vaginante pellucidior subito lato - lanceolata *longiuscule et intense brunneo-cuspidata*, remote et parce denticulata, dorso laevia, nervo supra basin diaphanam multilamellosa totum folii apicem occupante, crasso; perichaetia interiora multo minora, intima subelamellosa, e basi laxe areolata valde lata subito longe et anguste flexuoso-cuspidata brunnea integra laevia; thecae saepe geminatae tenuiter flexuose et longiusculo - pedunculatae *longiusculo-cylindricae rugulosae* erectae, operculo e basi tumido - conica breviter rostellato obliquo; calyptra subaurantiaca tenuiter villosa; dentes peristomii primum 16 latiusculi simplices rufi dein geminati, igitur 32 in membrana basilari brevissima vel vix ulla.

Cephalotrichum oligodus Br. et Sch. Bryol. Europ. Fasc. 21—22. Pogonatum; p. 4. — *Polytrichum aloides* γ. caule di-, tricarlo, dentibus subinde sedecim. Schwägr. Sp. Musc. P. I. p. 13.

Patria. Chile: Pöppig.

Planta mascula perfecte rosulato - foliosa, perigonio subdiscoideo. Antheridia pauca maxima, paraphysibus fere carentia. Species distinctissima gracilis interdum valde elata sed basi longa nudiuscula foliis minimis praedita.

7. **P. Simense** Br. et Sch. (Pl. Abyss. Schimper.); *hermaphroditum*; folia dense et magis rosulato - imbricata valde firma *apice subincurva*, madefacta erecto - patentia minora quam praecedentis speciei, e basi breviusculo - vaginante pellucidior *laxiusculo - areolata lanceolata latiuscula breviter et intense brunneo-cuspidata integerrima*, dorso laevia, nervo supra basin breviter et multilamellosa apicem folii fere totum occupante praedita crassa rigida; perichaetia e basi *longissima vaginante tenerri- ma longiora*, subito et longius cuspidata; omnia carinata; theca in pedunculo *brevi oblongo-cylindrica* longiusculo - subrugulosa, erecta *crassiuscula*, operculo e basi convexa breviter apiculato; dentes peristomii ut in praecedente specie.

Cephalotrichum Simense Br. et Sch. in Bryolog. Europ. I. c.

Patria. In alpibus Simensibus Abyssiniae, ubi in monte Silke 10,000 ped. supra mare legit societate *Solorinae Simensis* Hochst. W. Schimper.

Praecedenti proximum, sed notis laudatis distinctissimum.

8. **P. perichaetiale** Mont. (Ann. d. sc. nat. XVI. 1841. p. 252.); *dioicum*; folia *laxe imbricata* valde firma *apice sicca atque madefacta subincurva*, erecto-patentia, e basi breviusculo-vaginate *laxiuscula pellucida superne margine densius et brunneo-areolata* fere subito lanceolata *latiuscula breviter et intense brunneo-cuspidata integerrima*, dorso laevia, nervo supra basin breviter et multilamelloso apicem folii totum fere occupante praedita, crassa rigida; perichaetialia externa e basi longissima vaginate *tenerrima longiora multo angustiora, sensim et longius cuspidata, interna angustissima basi longissima tenerrima laxe areolata, subito cuspidata plus minus crenata*; omnia carinata; theca in pedunculo brevi *oblongo-cylindrica laevis erecta crassiuscula*, operculo e basi convexa breviter apiculato; dentes peristomii ut in praecedentibus speciebus.

Patria. Ad terram nudam in montibus Nilgheriensibus: Perrottet.

Calyptra thecam superans, basi longe descendente pedunculum arcte includens villosissima aurantiaca. Praecedenti proximum, notis autem laudatis distinctissimum. A *P. oligodo* jam calyptra thecam superante differt.

9. **P. subulatum** Menz. (Trans. of Linn. Soc. IV. p. 303.); *dioicum*; simplex raro subramosum; folia lanceolata carinata *margine et dorso serrata margine albican-tia, fragilia tenera siccitate haud stricta fusco-rubella, obtusiuscula*, nervo tenui e basi ad apicem usque breviter lamellosa; theca in pedunculo breviusculo cylindrica angusta erecta subaequalis, operculo conico-subulato theca paullo longiore; dentes peristomii 32 ad 40; calyptra pilosa parva canescens. †.

Schwägr. Suppl. II. II. I. p. 13. tab. 155. — *Pogonatum subulatum* Brid. II. p. 122.

Patria. In Nova Seelandia, unde Nelson retulit et cum Menziesio communicavit.

Sectio III. **Pogonatum.** Elatae plantae ramosae vel simplices haud rosulato-foliosae, sed e basi usque fere ad apicem caulis elongatum foliis juniperoideis praeditae. Theca ut antea.

a. *Humiliora.*

10. **P. dentatum** Menz. (Trans. of Linn. Soc. IV. p. 80. tab. 7. fig. 4.); *dioicum*; caulis erectus plerumque divisus in ramos duos vel quatuor, laxe foliosus; folia erectiuscula, inferiora patula rigida, ex ovata amplexicauli basi duplo latiore lanceolata, planiuscula, margine dentibus longis angustis antrorsum curvatis spinarum forma, terminalia *lanceolato-cuspidata*, badia, basi latescente, nervo crasso in basi, in angustiore folii parte fere totum folium replente, dorso aliquot denticulis notato, perichaetialia terminalibus similia in cylindrum convoluta; theca in pedunculo longiusculo ovata subaequalis erectiuscula laevis, apicis margine protuberante badia, operculo planiusculo apiculato; dentes peristomii longi 32 lineari-lanceolati lutei, filis fusco-badiis; calyptra thecae fere longitudine griseo-lutea. †.

Schwägr. Suppl. II. II. I. p. 12. tab. 155. — *Pogonatum dentatum* Brid. II. p. 122 et 744. — *Pol. urnigerum* W. Arn. Disp. p. 71.

Patria. In pinetis orae occidentalis Americae septentrionalis: A. Menzies.

Sequenti proximum adeo, ut nobis videatur varietas tantum *Pol. urnigeri*.

11. **P. urnigerum** L. (Sp. Pl. 1573.); *dioicum*; caulis plus minus divisus plerumque fasciculato-ramosus, laxe cespitosus, basi foliis minutis appressis; superiora dense imbricata stricta patentia e basi breviter vaginante lanceolata acuta, margine dense acute et fusco-dentata, nervo supra basin multilamellosa, apicem folii fere totum occupante, dorso parce serrato; perichaetialia longius vaginantia angustiora nervo supra lamellosa; theca in pedun-

culo longiusculo gracili *ovali-cylindrica erectiuscula medio subconstricta, ore angustiore sed majusculo*, operculo e basi tumido-convexa subulato breviusculo erectiusculo; calyptra thecam aequans ferruginea; dentes peristomii longiusculi 32 medio valde rufi.

Hedw. Sp. Musc. p. 100. tab. 22. fig. 5—7. — *Pol. pulverulentum* Reynier. Act. Lausann. 2. p. 11. tab. 2. et *Pogonatum pulverulentum* P. B. Prodr. p. 84. et *Catharinea pulrerulenta* Röhl. Deut. Moos. p. 216. — *P. fasciculatum* Mich. Fl. Am. Bor. 2. p. 294. et *Pogonatum fasciculatum* P. B. Prodr. p. 84. — *Pol. axillare* Lam. Fl. franç. I. gen. 1264 — *Pogon. urnigerum* Brid. II. p. 124. et Bryol. Europ. I. c. p. 8. tab. 9. — *Pog. intertextum* Brid. II. p. 742. forma simplicior e spec. auth. — *Catharinea urnigera* Roehl. Moosg. Deut. p. 210. — *Polytrichum ramosum* setis ex alis urnigeris. Dill. Musc. p. 427. tab. 55. fig. 5. — *Pol. capillare* Rich. in Mich. Fl. Am. II. p. 294. statura minore, caule brevi, theca ovata subcernua et foliis longioribus apice incurvis a *Pol. urnigero* differt, igitur forsan varietas. Huc pertinet *P. capillare* Wahlenb. Fl. Lapp. p. 347.

Patria. In petrosis, pinetis arenosis et aliis locis sterilibus, sed tamen humidiusculis per totam Europam atque Americam septentrionalem, in alpes ascendens. — *Hyme et primo vere.*

Planta mascula gracilior, flore cyathiformi, paraphysibus interdum spathulatis. Folia perigonialia latissima ovata brevi-acuminata. — E locis natalibus ramificatione, thecae forma atque statura valde polymorphum, nunc simplicius, nunc valde ramosum, tamen notis laudatis facillime cognoscitur.

12. *P. campylocarpum* C. Müll.; *dioicum*; gregarie cespitosum elatum simplicissimum, habitu *P. urnigeri*; folia erecto-patentia sicca *flexuosa subcrispa*, e basi vaginante brevi laxiuscule areolata superne dense et firme areolata fusca *latiusculo-lanceolata breviter acuta*, apicem versus parce serrata, nervo totum fere apicem occupante multilamelloso praedita, perichaetialia basi longissima membranacea elongate areolata; theca in pedunculo longiusculo laevi *cylindrica valde curvata et maxime papillosa* pallide olivacea dein fusca, operculo depresso au-

rantiaco apiculato; dentes peristomii 32, simplices vel saepe obsolete geminati, aurantiaci.

Patria. Columbia, prov. Caracas pr. Galipan in terra arenaria, altit. 5000 ped., ubi leg. Funck et Schlim. Coll. Linden. No. 379. — *Januario.*

A *P. urnigero* proximo differt: notis cursive impressis prime theca valde papillosa, dum illa *P. urnigeri* minute papillosa observatur.

13. *P. patulum* Harv. (Hook. Ic. Pl. tab. 18. fig. 1.); caulis *simplex* gracilis inferne saepe nudus; folia distantia lanceolata serrata plana laxa imbricata siccitate stricta patentia, nervo crasso; theca *brevis subturbinata majuscula* erecta, operculo *rostrato*. †.

Patria. Nepal.

Ex icone auctoris praecedenti proximum. An propria species?

14. *P. microstomum* R. Br. (Trans. of Linn. Soc. XII. p. 569.); *dioicum*; caulis simpliciusculus vel apice innovatione brevi — ramosus, statura *Pol. urnigeri*, sed *folia multo latiora magis obtusa, firmiter areolata*, intense brunnea, nervo multilamellosa, dorso serrato; perichaetia e basi longiore vaginante angustiora breviora quam caulina; theca innovatione lateralis, in pedunculo breviusculo *cylindrico-ovalis majuscula* erectiuscula, *dentibus 64* et operculo convexo-conico brevi; calyptra ferruginea.

Schwägr. Suppl. II. II. I. p. 10. tab. 154. — *Pogonatum microstomum* Brid. II. p. 745. — *Pog. minutum* Brid. II. p. 127.?

Patria. In regno Nepal et in Himalaya Indiae orientalis.

Pol. urnigero quam maxime simile, notis designatis tamen diversum esse videtur.

b. *Elata.*

15. *P. alpinum* L. (Sp. Pl. 1573.); *dioicum*; dichotome valde ramosum, basi nudiusculum foliis squamiformibus scariosis dense appressis minutiusculis latis subito plicate plus minus acuminatis serratis, basi longe va-

ginante anguste et flexuoso - areolatis; caulina lineali-lanceolata *serrata*, nervo multilamellosa dorso serrato, basi ut antea areolata, margine hyalina tenerrima; theca in pedunculo ascendente flexuoso crasso ovali-cylindrica erecta vel obliqua, collo *brevi tumido instructa, laeris, tenero - membranacea, pallida, stomatiis basi praedita, ore truncata, aperta plerumque arcuata, operculo e basi conica longe subulato tenui subobliquo; dentes valde variabiles.*

Pogonatum alpinum Brid. II. p. 129. — Bryolog. Europ. I. c. p. 9. tab. 10. — *Catharinea alpina* Röhl. Moosg. Deut. p. 184. — *Pol. alpinum ramosum*, capsulis e summitate ellipticis. Dill. Musc. p. 427. tab. 55. fig. 4. — *Pol. Norvegicum* Hedw. Sp. Musc. p. 99. tab. 22. fig. 1—5 e Schwägrichen Sp. Musc. p. 120. in Indice huc pertinet. *Pog. Norvegicum* P. B. Prodr. p. 84. excl. syn. *Pol. Oederi* Brid.

β. brevifolium; foliis brevioribus carina laevibus, madore erectis, theca obovata, collo subnullo; dentes peristomii 40 aequali spatio ab invicem remoti, interstitiis angustiores. *Pol. brevifolium* R. Br. Suppl. Append. It. Parrayan. p. 494. — Brid. II. p. 131.

γ. arcticum; theca oblonga subcylindrica, collo nullo. Bryol. Europ. I. c. p. 9. — *Polytr. arcticum* Sw. Musc. Suec. p. 76 et 109. tab. 8. fig. 17. — *Pogonatum arcticum* Röhl. Ann. Wett. Ges. III. p. 226. — *Pol. sylvaticum* Menz. Trans. of Linn. Soc. IV. p. 83. tab. 7. fig. 6. — *Pol. ambiguum* Mich. Fl. Am. Bor. II. p. 297.

δ. campanulatum; humile, fastigiato-ramosum, foliis brevioribus, theca globoso-ovata, calyptrae indumento albedo totam thecam obtegente. Bryol. Europ. I. c. p. 9. — *Polytrich. campanulatum* Hsch. Hor. Phys. Berol. p. 67. tab. 13. — *Pogonatum campanulatum* Brid. II. p. 133. — *Pog. Pylaesii* Brid. II. p. 744.

ε. furcatum; collo thecae valde conspicuo, elatius, e basi dichotome valde ramosum. *Pol. furcatum* Hsch. Hor. Phys. Berol. p. 67. tab. 13. — *Pogonatum furcatum* Brid. II. p. 133.

Patria. Locis petrosis abruptis graminosis regionum subalpinarum et alpinarum totius Europae, Asiae et Americae septentrionalis. Var. *β.* Insula Melville: Sabine. Var. *γ.* in alpihus editioribus. Var. *δ.* Unalaschka:

Chamisso. Var. ε . In Sinu Schismaroff Americae occidentalis frigidissimae: Chamisso. — *Aestate*.

Valde polymorpha quidem, theca tamen tenero-membranacea laevi pallida collo praedita subgibboso-ovali vel cylindrica facillime cognoscitur.

16. P. giganteum Hook. (Musc. Exot. tab. 65.); dioicum; maxime elongatum pedale crassum rigidum flexuosum, basin versus indivisum, sursum subfastigiatim ramosum; folia arcte imbricata erecta, intense fusca, lineari-subulata rigida basi vaginata, apice solummodo margine parum involuto dorsoque scabra, nervo totum apicem folii occupante multilamelloso; thecae numerosae terminales, sed ob caulis innovationes saepissime laterales, in pedunculis triuncialibus crassiusculis rubris magnae inclinatae ovato-cylindricae fuscae; operculum rostratum curvatum theca duplo brevius; dentes peristomii ut in *Pol. communi*. †.

Pogonatum giganteum Brid. II. p. 123. — Schw. Suppl. IV. tab. 325.

Patria. In devexo montis Quindiu, ad radices *Ceroxyli andicolae*, in temperatis usque ad altitudinem 1450 hexapodum: Humboldt et Bonpland.

Pol. alpino ex habitu simillimum, notis tamen distinctissimum.

17. P. flexuosum C. Müll. (Linn. XIX. p. 208.); dioicum; caulis e basi repente curvatus ascendens elongatus erectus simplicissimus flexuosus apice recurvus; folia rigida siccitate dispositionibus variis falcata subsecunda, madefacta erecto-patentia falcato-stricta, e basi densiusculo-, apicem versus parce serrata; perichaetia ochreato-vaginantia obtusa membranacea dorso scabra; pedunculus brevis minute scaber, theca basi aequalis cylindrico-oblonga minute scabra; peristomii dentes e membrana brevissima altitudinis mediae longi obtusiusculi.

Patria. Columbia in Silla de Caracas ad rupes humidiusculas: Moritz Coll. No. 135.

Præcedenti affine, differt autem caule simplicissimo flexuoso apice reflexo, foliis e basi dense serratis, thecis, pedunculis et perichaetiis scabris.

Sectio IV. **Catharinella.** Folia latiuscula squarroso-patula Catharineis similia plerumque viridissima siccitate crispatisima cirrhata. Theca præcedentis sectionis, interdum subbicarinata. A Catharineis calyptra villosa diversa.

18. **P. convolutum** Linn. fil. (Meth. Musc. p. 374. tab. 4. fig. 3.); *dioicum*; alte elatum flexuosum simplicissimum, summo apice interdum semel divisum, basi caulis trigoni nudum vel foliis minutissimis *scariosis squamiformibus dense appressis* obtectum, superne foliis sensim majoribus, supremis maximis, siccitate secundis madefactis valde patentibus, *e basi brevi vaginante tenera et e cellulis angustis longiusculis pellucidis formata*, longa late et perfecte lanceolata, apice argute et lobato-spinosa, nervo in folii laminam dilatato, dorso apicis fusco-spinoso; perichaetia *maxime minuta, interiora lanceolata evanidinervia fusca acuta laxè areolata, intima linguulate obtusa enervia basi non vaginantia*; omnia lamellis carentia, rigida; theca in pedunculo breviusculo cylindrica sub ore dilatato coarctata; calyptra villosissima parva ferruginea; dentes peristomii maximi lati medio lato-purpurei margine anguste pallidi.

Schwägr. Suppl. I. II. p. 326. tab. 96. — *Pogonatum convolutum* Brid. II. p. 110. et P. B. Prodr. p. 84. intermixto tortili. — *Polytrich. pachyneuron* Hmp. Linn. XX. p. 80.

β. cirrhatum; humilius gracilius tenerum, foliis tenerioribus crispatisimis angustioribus haud secundis. *Polytrichum cirrhatum* Sw. in Schrad. Bot. Journ. IV. p. 176. tab. 4. — *Pogonatum cirrhatum* Brid. II. p. 110. — *Pol. leucomitrium* Hsch. Nov. Act. XIV. II. Suppl. p. 732. ex observationibus Schwägrichenii (Sp. Musc. p. 17.) forma minor huc pertinet. — Specimina nostra *Pol. cirrhati*, a Cl. Schwägrichen accepta, partibus, exceptis foliis haud secundis, omnibus cum *P. convuluto* conveniunt. Caeterum putamus, *Pol. cirrhatum* Sw. a specie Schwägricheniana diversum esse. „Surculis simplicibus basi tomentosis, foliis linearibus serrulatis, siccitate incurvis tortisque, capsulis cylindricis erectiusculis. — Differt a *P. tortili*, fere ut *P. aloides* a *P. nano*. Folia tenuiora, surculi basi ferrugineo-tomentosi, et fructus diver-

sae figurae et situs, diagnosin praebent." Swartz. Fl. Ind. Occ. III. p. 1841.

Patria. In sylvis humidis iusulae Bourbonis: Thouin. In Java insula frequens esse videtur. Var. β . planta *Schwägricheniana* in montibus caeruleis insulae Javae, ubi haud raro legitur. E Schwägrichen quoque in insulis Sandwicensibus legit Gaudichaud. Planta *Swarziana* in prom. b. spei a *Thunbergio* lecta.

Planta mascula femineae intermixta. Perigonium perfecte discoideum. Folia perigonalia exteriora e basi latissima subito lanceolata supra basin ad apicem argute serrata, interiora latissime subcordata brevi-acuminata integra, intima omnium minima apice ovato-acuminata acuta, omnia nervosa. Antheridia maxima clavata, paraphysibus elongatis filiformibus apice subclavatis. — Planta speciosissima atque distinctissima *Mniaceis* ex habitu maxime similis. *Lycopodio linifolio* quoque haud dissimilis.

19. P. semipellucidum Hmp. (Linn. XX. p. 80.); *dioicum*; elatiusculum simplicissimum vel apice innovando semel divisum, basi caulis trigoni nudum vel foliis minutis *et ut ceteris mollibus* haud scariosis lato lanceolatis brevi-acutis apice argute serratis obtectum, superne foliis sensim majoribus, supremis maximis siccitate tortilibus, madefactis valde patentibus, *e basi breviter amplexicauli e cellulis longiusculis angustioribus formatâ longiuscula lato-lanceolata, sed medio latiora*, apice argute et inaequaliter lobato-serrata, nervo dorso apicis fusco-spinoso, *parce et breviter lamelloso*; perichaetialia maxima, *foliis supremis maximis similia basi laxè areolata*; theca in pedunculo breviusculo *angulato madefacto quoque torto* ovalis majuscula suboblique posita *subbicarinata*, operculo e basi conica brevi-apiculato; dentes peristomii ut antea; calyptra villosissima albida.

Polytrichum convolutum Hook. in Kunth. Synops. Pl. Aeq. I. p. 48. — *P. tortile* C. Müll. Linn. XIX. p. 208.

Patria. In montosis frigidis et opacatis Andium Quinduensium, prope La Garita del Paramo de Quindiu, alt. 1760. hexap. (Regno Novo-Granatensi): Humboldt

et Bonpland. Columbia, in montibus nivosis prov. Meridae: Moritz. No. 188.

Planta mascula femineae intermixta et huic similis; flore perfecte discoideo. Folia perigonialia exteriora et interiora quam maxime lato-cordata brevi-acuminata integerrima, sed cellulis margine prominentibus, basi laxe apice minute areolata. Antheridia maxime elongata, paraphysibus filiformibus hyalinis mixta. — Planta *Pol. convoluto* ex habitu simillima sed notis laudatis distinctissima.

20. P. contortum Menz. (Trans. of Linn. Soc. IV. p. 78. tab. 7. fig. 2.); *dioicum*; caulis erectus praelongus innovationibus fertilibus brevissimis pluries ramosus; folia remotiuscula laxe tortilia, ad innovationes densiora, *linearilanceolata*, *paullum involuta*, *toto margine folii et superiori basis vaginantis argute serrata*, obscure viridia, seniores fusco-brunnea, nervo obscuriori ad apicem perdurante crassiusculo et (ex ic. *Schwägricheni*) dorso parce serrato; perichactialia caulinis similia; theca in pedunculo *innovatione laterali* longiusculo cylindrica subcurvata erectiuscula fusca, operculo *conico mucronato acutissimo curvulo*; dentes peristomii 32 — 40; calyptra pilosa straminea. †.

Schwägr. Suppl. I. II. p. 325. tab. 96. — *Pogonatum laterale* Brid. II. p. 112.

Patria. In ora occidentali Americae borealis: Menzies.

Caule ramosiusculo et pedunculis pseudolateralibus a sequente differt. A praecedente foliis linearibus non medio latioribus jam differt.

21. P. tortile Sw. (Fl. Ind. Occ. III. p. 1839.); *dioicum*; caulis erectus basi subnudus; folia e basi tenera subvaginante *lanceolata acuta* planiuscula, apicem versus *tenue serrulata*, dorso superne spinulosa, suprema longiora confertiora, omnia siccitate fusco-ferruginea, nervo crasso multilamellosa folii fere totum apicem occupante; theca *breviusculo-pedunculata*, *primum ovata*, *maturitate subrotunda subcernua* fusca, *basi papillosa* operculo co-

nico-apiculato obtuso brevi; peristomii dentes 32 lineares brevissimi obtusi rubri; calyptra ferruginea.

Hedw. Sp. Musc. p. 94. tab. 20. fig. 3—5. — *Pol. convolutum* Sw. Prodr. Fl. Ind. Occ. p. 139. — *Pogonatum tortile* P. B. Prodr. p. 85. — Brid. II. p. 108. et β . *Domingense* ibid. —

Patria. Ad fossas macras argillosas in montibus excelsis Jamaicae australis, in insula Dominici et Franciae: Swartz, Menzies, Bertero, Gaudichaud.

Planta mascula plantae Domingensis feminea altior, densius foliosa. Flos masculus discoideus. Folia perigonia e basi oblonga valde membranacea latissimo-cordata brevi-acuminata, apice dense lamellosa, usque ad apicem crenulata. Antheridia maxima, paraphysibus filiformibus interpositis. — Sequenti affine, sed notis designatis distinctissimum.

22. P. subtortile C. Müll.; *dioicum*; humile subsimplicissimum; folia siccitate apice involuta patentia laxè imbricata, basi subvaginantia vel amplexicaulia *laxè arcuata*, *latiusculo-lanceolata*, madefacta apice incurva et remote denticulata, dorso parcissime denticulata, acutiuscula, nervo multilamellosa apicem folii fere totum occupante, perichaetia *basi longius vaginata*; theca in pedunculo *longiusculo* cylindrico-ovalis sub ore dilatato subcoarctata, *valde papillosa*, operculo e basi conica *longe et oblique rostrato*; calyptra ut antea.

Polytr. aloides Hsch. et Reinw. Nov. Act. XIV. II. Suppl. p. 732? — *P. aloides* Duby. Pl. Zolling. No. 853. — *P. tortile* Mont. in Hb. Miqueliano.

Patria. In Java insula, ut videtur, haud rarum.

Planta mascula feminea gracilior humilior simplicissima, saepe e flore masculo discoideo prolifera, igitur altior. Folia perigonia externa latissime cordato-ovalia breviter acuminata caeterum illis praecedentis speciei simillima, sed apice cellulis prominentibus denticulata; interiora minora. Caetera ut antea. — A praecedente proxima specie primo adpectu foliis latioribus laxius imbricatis apice tantum involutis et operculo longirostro distinguitur. Planta mascula *Catharineae angustatae* valde affinis.

Sectio V. **Eupolytrichum.** Theca perfecte 2, 4, 5, 6 angularis.

a. *Theca biangularis.*

23. P. longisetum Hook. (Musc. Exot. tab. 66.); *dioicum*; caulis erectus rigidus simplex vel divisus; folia arcte imbricata patentia, siccitate erecta, rigida, nigro-fusca, lanceolato-subulata margine plana omnino integerima, nervo stricto totam partem folii occupante; pedunculus palmaris et ultra, flexuosus flavo-ruber ob caulis innovationes saepe lateralis; theca erecta vel demum horizontaliter inclinata, operculo longe rostrato, thecam subaequante curvato. †.

Schwägr. Spec. Muscor. p. 5. et Suppl. II. II. p. 4. tab. 152. — *Pogonatum longisetum* Brid. II. p. 128.

Patria. In monte Quindiu, regione temperata, Andium de Cunamara: Humboldt et Bonpland.

Ex observationibus Schwägricheni theca non, ut dicit Hooker, tetragona sed „apophysi minuta, tereti; ipsa basi semiteres, inferiore superficie convexa, superiore planiuscula; exoritur ejus e medio dorso linea elevata et ampliatur capsula, ut orificium orbiculare sit Peristomii dentes 64. Capsulae forma Dawsoniam aemulatur.” Sp. Musc. p. 6.

b. *Theca quadrangularis.*

a. *Folia margine integerrimo.*

24. P. piliferum Schreb. (Spic. Fl. Lips. p. 74.); *dioicum*; caulis humilis inferne subnudus apicem versus crescenti-foliosus; folia caulina brevia dense imbricata stricta e basi vaginante colorata margine membranacea hyalina subito lanceolata in pilum longum hyalinum plus minus serratum producta, nervo folii totum apicem occupante dorso laevi; perichaetialia longiora vaginata parce vel obsolete lamelligera; theca ovato-tetraëdra brevis apophysi disciformi purpurea praedita, aperta inclinata, operculo purpureo conico acute apiculato; dentes peristomii 64 in membrana altiore breves; calyptra junior apice purpurascens, dein ferruginea.

Bryolog. Europ. Fasc. XXI—XXII. Polytrichaceae. Polytrichum; p. 11. tab. 14. — Brid. II. p. 142. — *P. commune* γ . Linn. Sp. Pl. p. 1573. — *P. commune* β . *pilosum* Ehrh. Hann. Mag. 1780. p. 235. — Polytrichum quadrangulare minus, juniperi foliis pilosis. Dill. Musc. p. 426. tab. 54. fig. 3. — *Pol. Hoppii* Hsch. Regensb. bot. Zeit. II. p. 106 et VI. p. 16. — Brid. II. p. 143 et 747.

β . *hyperboreum*; elatum, gracilius, apice ramis fertilibus pluribus divisum. *Pol. hyperboreum* R. Br. Append. It. Parrayan. p. 194. — Schwägr. Suppl. II. II. p. 8. tab. 153. — Brid. II. p. 144 et 747.

Patria. In locis sterilibus per totam Europam, Asiam et Americam septentrionalem ad alpes ascendens. Var. β . in insula Melville: Sabine. — *Vere.*

Planta mascula laxius foliosa, foliis minus pilosis; perigonialia externa e basi lata breviter lanceolata, superne marginibus inflexis, interiora late obcordata brevissime acuminata, nervo apice lamelloso. Antheridia magna paraphysibus apice cellulosus coloratis interpositis.

25. *P. juniperinum* Hdw. (Sp. Musc. p. 89. tab. 13.); *dioicum*; caulis plus minus elatus ramosiusculus basi subnudus, apicem versus dense foliosus; folia caulina elongata, e basi longe vaginante oblonga inferne angustissime et elongato-areolata superne margine hyalino-membranacea lineari-subulata, *plus minus et brunneo-aristata, involuta*, integerrima; perichaetialia longissime vaginantia convoluta membranacea, nervo crasso brunneo in aristam longissimam et, ut in caulinis, serratam producto elamellosa; theca *rhomboideo-quadrangularis majuscula, aperta horizontalis*, operculo e basi convexo-plana brevi-rostellato; dentes peristomii 64 in membrana vix conspicua breviusculi pallidi dorso flavido-carinati.

Bryolog. Europ. l. c. p. 12. tab. 15 et 16. — Brid. II. p. 136.

β . *strictum*; caule gracilescente stricto, foliis erecto-patentibus strictis; theca subcubica. Bryol. Europ. l. c. p. 12. — *Pol. strictum* Menz. Trans. of Linn. Soc. VI. p. 77. tab. 4. fig. 1. — Brid. p. 139.

γ . *alpestre*; dense cespitosum, foliis brevioribus, dorso scabriusculis, theca cubica. Bryol. Europ. l. c. p. 12. — *Pol. alpestre* Hoppe Bot. Taschb. 1801. p. 198. — Brid. II. p. 140.

— *Pol. affine* Fk. Moos Taschb. p. 88. tab. 54. foliis latius albo-membranaceis, longis setaceis, caule elatiore graciliore. Brid. II. p. 141. — Bryol. Europ. l. c. p. 13.

δ. integrum; foliis longe aristatis, aristis apice summo tantum obsolete denticulatis.

Patria. In locis humidis praecipue spongiosis ericetorum vel sylvarum totius fere terrarum orbis. Var. *β.* regiones boreales praefert. Var. *γ.* in alpibus. Var. *δ.* Chile: Pöppig. — *Ad veris finem, in alpibus aestate.*

Planta mascula feminea gracilior, foliis brevioribus.

26. P. Antillarum Rich. (in Brid. II. p. 138 et 747.); *dioicum*; ex habitu praecedenti simillimum; folia caulina maxime patentia, praecipue superiora *dorso apicis dentibus lobatis cellulosi acutis vel rotundato-acutis permultis scaberrima, margine involuto pellucidior, in aristam longam plus minus scabram fuscam producta*; perichaetia interna longissima et convoluto-vaginantia, omnino membranacea diaphana elamellosa, longissima cuspidata laevissima; theca *longiore angustiore*, operculo e basi planiuscula oblique mucronato; calyptra ferruginea; dentes peristomii 64.

P. appressum Schwägr. Suppl. I. II. p. 311. et II. II. p. 5. tab. 152. et Linnaea XIV. p. 521. — *Pol. scabriusculum* Brid. Mant. Musc. p. 195.

Patria. In America meridionali et Antillis vulgare.

27. P. appressum Brid. (II. p. 141 et 747.); caulis erectus strictus semipedalis longior basi subnudus; folia inferiora distantia, tomento obducta, superiora imbricata breviuscula, e basi latiuscula semiamplexicauli lineari-lanceolata, margine integerrima, membrana plicata nulla, nervo obscuro exarata, apice alba, vix superne carina scabriuscula lineari-areolata, *omnia humiditate ad angulum acutissimum stricto-patentia, siccitate cauli adeo arcte appressa, ut tota stirps inde teres fiat*, colore nigricantia; perichaetia convoluto-vaginantia *margine albo-membranacea*, in cuspidem setaceam educta; theca in pedunculo longiusculo breviter tetragona erecta dein nutans aureo-purpurea, apophysi distincta, parva, sub-

globosa; dentes 64; calyptrae indumentum purpurascens. †.

Patria. In insulae Bourbonis planitie des Chicots: Bory St. Vincent.

Habitu *Pol. elati* sed ab eo atque *P. Antillarum* et *juniperino* notis laudatis differt.

28. P. glabrum Brid. (II. p. 141.); simplex; folia erectiuscula *plana* integerrima apice scabriuscula, *nervo totum folium occupante*; theca sphaerico-depressa paulum rugosa praedita, apophysi parallelepipedata, operculo e basi planiuscula brevissime mucronato obtuso. †.

Schwägr. Suppl. I. II. p. 311. — Sp. Musc. p. 3. — *Pol. Appuleii* Commers. mst.

Patria. In insulae Bourbonis montibus altissimis, in ea parte, quae Plaine des Caffres dicitur, et in fossis exsiccatis: Commerson 1771 Augusto legit. In Brasilia auctores nonnulli indicant; an recte, dubii sumus.

Ex obs. *Schwägricheni* *P. juniperino* simillimum, sed diversum foliis toto fere nervo expletis et margine non inflexis, caeterum integerrimis: nervo parum scabro, non serrato.

β. *Folia margine serrato.*

29. P. commune L. (Sp. Pl. II. p. 1573.); *dioicum*; caulis simplex elatus erectus inferne nudus, superne crescens; folia e basi oblonga erecta *longe vaginante* anguste et elongate areolata *superne margine diaphano-membranacea* subito fere horizontalia vel apice recurva, lanceolata plana, superne et dorso argute serrata dense areolata cuspidata; perichaetia convoluto-vaginantia, membranacea elamellosa, nervo in cuspidem producto fusco; theca in pedunculo longo crasso erecta *crasso-tetraëdra*, dein horizontalis, operculo e basi convexiuscula margine tumida conico *brevi-rostellato* recto; dentes peristomii 64 breves; calyptra majuscula ferruginea.

Bryolog. Europ. I. c. p. 13. tab. 17. — Brid. II. p. 148. quo nomine plerumque forma maxime elongata designatur. — *Pol. yuccaefolium* Ehrh. Pl. Crypt. Exsicc. 214. — *Pol. subpilosum* P. B.

Prodr. p. 86. — *Pol. Commersonianum* Brid. II. p. 153. — *Pol. propinquum* R. Br. Suppl. ad it. Parryan. p. 194. et Brid. II. p. 150. — *Pol. quadrangulare* vulgare, *Yuccae* foliis serratis. Dill. Musc. p. 420. tab. 54. fig. 1.

β. perigoniale; minus, foliis perichaetialibus externis longioribus membranaceis aristatis. *Pol. perigoniale* Rich. Mich. Fl. Am. Bor. II. p. 295. — Bryolog. Europ. I. c. p. 13. — Brid. II. p. 150.

γ. minus; caule humiliore, foliis perichaetialibus externis comalibus similibus, pedunculo brevior, theca minore, calyptrae tomento pallescente.

Patria. Per totam Europam, Asiam temperatam atque Americam septentrionalem per omnes regiones, loca uliginosa praecipue spongiosa praeferens. Var. *β.* locis minus humidis, calidioribus. Var. *γ.* locis siccis hic illic per Europam et in Prom. bon. spei. — *Initio aestatis.*

Folia perigonia maxime lata cordato-ovalia plus minus acuminata, superne lamelligera denticulata valde membranacea colorata. Paraphyses apice maxime dilatatae cellulosa coloratae longissimae. Antheridia et cetera generis.

30. P. elatum P. B. (Prodr. p. 85.); *dioicum*; elatum simplex inferne nudum superne praecedenti simillimum; folia caulina e basi multo brevius vaginante, superne margine haud diaphano sed colorato praedita, lanceolata breviora plana, nervo totum folium occupante, margine anguste diaphano et dorso apicis subciliato - et hyalino-dentata, brevius cuspidata, madefacta vix horizontalia; perichaetialia longiora convoluta - vaginantia membranacea caeterum illis *Pol. communis β. perichaetialis* similia; theca pro plantae altitudine brevi-pedunculata erecta cubica brevis discoideo - apophysata, dein horizontalis, operculo convexiusculo mammillato; dentes peristomii 64; calyptra aurea.

Brid. II. p. 152. — *Pol. purpurascens* ej. Mant. Musc. p. 197. — Schwägr. Suppl. II. II. p. 4. tab. 151.

Patria. Ad crateres montium ignivomorum insularum Mascarenium Franciae et Bourbonis.

Praecedenti simillimum, sed omnino purpurasens et notis datis distinctissimum.

31. P. remotifolium P. B. (Prodr. p. 86.); caulis praelongus strictus, inferne nudiusculus gracilis simplex; *folia inferiora remota, superiora copiosiora, erecta, basi folii trientem efficiente totum fere caulem vaginantia* lanceolato-linearia planiuscula, margine et apice dorsi argute serrata, ferruginea; perichaetialia caulinis paullo latiora et latius membranacea; theca tetraëdra brevis erecta, dein subnutans fusca, apophysi subrotunda concolore, operculo planiusculo breviter et obtuso-mucronato, dentibus 64 albis et calyptra canescente praedita. †.

Schwägr. Suppl. I. II. p. 320. et II. II. p. 10. tab. 154. et Spec. Musc. p. 7. — Brid. II. p. 147.

Patria. Insula Bourbonis: Commerson.

De specie nobis haud visa Cl. Schwägrichen in Spec. Musc. p. 7. verba fecit sequentia: „Licet simile sit *communi*, separatum tamen servare malui, quoniam non vidi *P. communis* folia, si ab invicem remota sunt, ita brevia, ut spatium intrafoliaceum dupla tantum longitudine superent.” Ex ic. caeterum habitu diverso. „Species valde memorabilis foliis basis caulis, basi lato-membranaceis caulem vaginantibus, remotis alternis.” P. B. l. c.

Species obscura.

1. P. elongatum P. B. (Prodr. p. 85.); caulis erectus gracilis longus simplex et divisus; folia linearia subserrulata, flores terminales, theca erecta. †.

Brid. II. p. 156. — Schwägr. Sp. Musc. p. 7.

Patria. Ad fretum Magellanicum.

Caule elongato gracili, theca erecta et apophysi speciosa distincta, majore intervallo a sporangio distante a congeneribus e ratione auctoris dignoscitur.

c. *Theca quinquangularis.*

32. P. Belangeri C. Müll.; *dioicum*; caulis fertilis humilis, sterilis multo longior gracilis flexuosus; folia caulina siccitate tortilia, madefacta stricta, e basi am-

plexicauli vix vaginante usque ad apicem densiusculo-areolata carinato - lanceolata acutiuscula vel mucronata, apicem versus dentata s. brevissime serrata, nervo multamellosa dorso carinato parce serrato; theca longipedunculata ovalis longiuscula suberecta, aperta subinclinata, dentibus 32 longiusculis, medio rufis.

Catharinea intermedia Bél. Voy. d. l'Ind. or. Bot. II. Crypt. p. 101. tab. 11. fig. 3.; ex auctoris ratione inter *Cath. tenellam* et *angustatam* quasi medium tenens.

Patria. In terra inter lapides montis Pouce insulae Mauriti: Bélanger. Hb. *Kunzeanum*.

Calyptra ignota quidem, sed *Catharinea* nunquam sit.

d. *Theca sexangularis*.

33. P. septentrionale Sw. (Musc. Suec. p. 77. tab. 9. fig. 18.); *dioicum*; subhumile ascendens simplex, basi nudum; folia dense imbricata *secunda e basi vaginante laxius areolata carnosula latiuscula, superne margine tenuissime membranacea hyalina, subito sed non plicato - lanceolata breviter acuta, brevia rigida carnosula concava, margine involuta integerrima, dorso laevia, dense areolata, nervo densissime lamellosa*; perichaetia longius vaginata; theca in pedunculo crasso rubello prae-terque hexagona, raro tetraëdra vel pentagona, ovata, brevis apophysi obsoleta, operculo longe rostrato obliquo, calyptra theca brevior dentibusque brevibus pallidis linea media aurantiaca exaratis.

Ex animadversionibus Cl. Schwägrichen in Spec. Musc. p. 5. et Ångström in Fries Summa Vegetab. p. 90. *Pol. septentrionale Swartzianum* idem atque *Pol. sexangulare* Hopp. Bot. Taschb. 1800. p. 150. dicitur. — *Pol. sexangulare* Bryolog. Europ. l. c. p. 7. tab. 11. — Brid. II. p. 145 Auctores posteriores speciem *Swartzianam* ad *Pol. alpinum* revocarunt, an recte, dubitamus, quum ille bryologus Suecicus Ångström cum *P. sexangulari* synonymam appellaverit. Swartzius auctor speciem suam apice dentatam dicit: an varietatem observaverit? — *Pol. crassisetum* Lam. et Dec. Fl. Franç. II. p. 436. — *P. Helveticum* Schl. Cr. Helv. Exs. Cent. III. No. 16. — *Pol. hyperboreum* Wahlenb. in Web. et Mohr. Ind. Musaei: Fl. Lapp. p. 347. — *Pol. Oederi* Brid. Musc. Rec. II. I. p. 99.

Patria. In summarum alpium locis depressis humidis, ubi cespites densos, laete virides, longe lateque extensos efformat; praeprimis in nivium regione viget: per alpes Helvetiae, Tirolis, Salisburgiae, Carinthiae; in Sudetis (Hb. Schkuhr.), Carpathis, Scotia, Scandinavia tota, Kamtschatka, in sinu Schismaroff (*Chamisso*) et in insula Melville. — *Augusto. Septembri.*

Planta mascula humilior, foliis perigonalibus omnibus latissime ovalibus brevissime et subrecurvo - acuminatis integerrimis apice lamellosis coloratis, internis basi laxissime et majusculo - areolatis. Paraphyses paullo cellulosae.

34. P. formosum Hdw. (Sp. Musc. p. 92. tab. 19.); *dioicum*; elatum, *habitu Pol. communis*, inferne nudum; folia superiora e basi lata vaginante longe lineali-lanceolata acuta, argute serrata plus minus plana; theca plerumque sexangularis raro tetraëdra vel pentagona tenui-membranacea pallide ochracea erecta, dein horizontalis, apophysi obsoleta, operculo conico ora purpurea praedito, calyptra theca minore; dentes peristomii 64 in membrana vix emersa aurantiaca breves.

Bryol. Europ. l. c. p. 9. tab. 12. — Brid. II. p. 151. — *Pol. attenuatum* Menz. Trans. of Linn. Soc. IV. p. 72. tab. 6. fig. 2. — *Pol. commune* β . *attenuatum* Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 26. — *Pol. serratum* Schrank. Baiers Fl. II p. 446. — *Pol. stans* Thuill. Hb, — *Pol. superbum* Schz. Syllog. in Ephemerid. bot. Ratisb. p. 152. — *P. marginatum* Hedw. Suppl. I. II. p. 329. exclusis synonymis et mentione calyptrae glabrae, quae haud dubie pilosa fuit, sed deficit in speciminibus. Schwägr. Sp. Musc. p. 8. — *P. coronatum* Brid. II. p. 748. ex eodem auctore huc pertinet: „*P. coronatum* Brid. sunt in ejus herbario fructus formosi delapsi, mixti cum caulibus *P. formosi* et *juniperini*. Descriptio foliorum l. c. *juniperino*, descriptio fructus *formoso* convenit.” Schw. Sp. Musc. p. 8. — *Pol. pallidisetum* Fk. Moos Taschb. No. 55; caule humiliore, foliis brevioribus, thecae angustioris pedunculo stramineo brevior. — *Polytrichum quadrangulare*, Juniperi foliis brevioribus et rigidioribus. Dill. Musc. p. 424. tab. 54. fig. 2. comparato Dillenii herbario e Schwägrichen Sp. Musc. p. 8. huc pertinet.

Patria. In sylvis montosis nunquam in turfosis usque in regionem subalpinam, per totam Europam et Americam septentrionalem. — *Aestate.*

A *Pol. communi*, quocum saepe commutatum est, theca ochracea pentagona vel hexagona obsolete apophysata longiore et operculo conico haud planiusculo mucronato differt.

35. P. gracile Menz. (Trans. of Linn. Soc. IV. p. 73. tab. 6. fig. 3.); *dioicum*; ex habitu praecedentis proximi; folia e basi breviter vaginante margine tenuissime et hyalino-membranacea e majusculis cellulis plus minus laxis pellucidis areolata lanceolata breviter et brunneo-cuspidata, margine *latiore* pellucido argute serrata, nervo totum fere folii apicem occupante praedita, plana intense viridia; theca ovata *obtuse-angulata*, ore angustata, *operculo basi rubro-marginato longe et oblique rostrato*; dentes peristomii in membrana basilari subnulla 32 regulares vel 64 irregulares; calyptra theca brevior aurantiaca.

Bryolog. Europ. l. c. p. 10. tab. 13. — Brid. II. p. 154. — *Pol. longisetum* Sw. Musc. Suec. p. 76. tab. 8. fig. 16. — *Pol. aurantiacum* Hoppe. Bot. Taschb. 1800. p. 131. — *Pol. nigrescens* Cand. Fl. Franç. II. p. 490.

Patria. In paludosis turfosis planitierum usque ad alpes totius Europae atque Americae septentrionalis. — *Ad veris finem.*

A praecedente foliis brevioribus, margine latioribus, theca obtusangulari operculoque longius rostellato differt. Varietas forsan tantum praecedentis e locis turfosis nata.

Gen. X. **Dawsonia** R. Br.

Transact. of Linn. Soc. Lond. X. p. 316. tab. 23. fig. 1. — *Triplocoma* Bachelot de la Pylaie Journ. Bot. Devaux. 1813. n. 5.

Nomen huic generi in honorem clarissimi et acuratissimi naturae, praesertim plantarum agamarum investigatoris *Dawson Turner* impositum.

Calyptra dimidiata, pilis erectis serratis villosissima capillamenti instar conica. Peristomium simplex *penicillatum*, ciliis numerosissimis capillari-bus rectis aequalibus inarticulatis, basi planis apicem versus in cylindrum convolutis, his e the-

cae parietis interni protuberantia annulari, illis e columella sub apicem. Theca inaequalis, dorso rotundata, supra planiuscula. Inflorescentia dioica. Flos masculus more Polytrichorum discoideus.

E toto habitu *polytrichoidea*, e forma autem thecae *Buxbaumias* vel *Diphyscium* in memoriam redigens.

1. D. polytrichoides R. Br. (l. c.); caulis triqueter elatiusculus simplicissimus, inferne quasi nudus, foliis minutissimis squamaeformibus scariosis membranaceis, e cellulis elongatis apice minoribus subrhomboidalibus reticulatis, superne dense foliosus; folia caulina e basi longe vaginante tenerrima membranacea angustissime et longe areolata lanceolata stricta acuta, latissime lamellosa, margine dentibus acutis fuscis e medio ad apicem usque serrata, nervo dorso parce serrato; theca in pedunculo brevi, operculo conico cylindraceo basi incrassato subrecurvo-mucronato.

Hook. Musc. Exot. tab. 162. iconibus optimis. — Schwägr. Suppl. II. p. 175. tab. 150. — Brid. II. p. 156. — *Triplocoma polytrichoides* La Pyl. l. c. p. 7.

Patria. Ripae subumbrosae rivulorum ad radices montium, in vicinitate Portus Jackson, Novae Hollandiae: R. Brown primus, dein Sieber in locis non designatis legit. Formam minorem a Cl. Chamisso peregrinatore e locis non dictis accepisse Cl. Schwägrichen l. c. scripsit.

Calyptrae pili erecti stricti latiusculi ferrugineo-purpurei longissimi valde serrati, illi basis calyptrae filis longissimis valde tortuosis hyalinis nodosis ramulosi, speciosissimi, apice calyptrae breves.

2. D. superba Grev. (Ann. and Mag. of nat. Hist. 1847. p. 226. tab. 12.); *procera; folia uncialia, sublaxe patentia, illis praecedentis ter majora, lineari-subulata rigidiora, spinuloso-dentata, nervo dorso apicis summi dentato, basi latissima membranacea purpurascentia; pedunculus breviusculus; theca et operculum praecedentis.*

Polytrichum longifolium Br. et Sch. in Bryol. Europ. Fasc. 21 — 22. *Polytrichum* p. 2. memoratum?

Patria. Australia, unde misit *Augustus Erskine*.

Planta altissima c. 14 unc. longa, foliis 1 unc. longis, Peristomium ignotum. Ex icone auctoris *Dawsonia* vera esse videtur. — Musco auctorum Bruch et Schimper altit. ped. plur. esse, l. c. dicitur.

Gen. XI. **Lyellia** R. Br.

Trans. of Linn. Soc. Lond. XII. II. p. 561.

Nomen in honorem D. Lyell, botanici Britannici acutissimi conditum.

Calyptra dimidiata nuda. Peristomium *nullum*, clausum epiphragmate (crasso depresso) cujus discus circularis a limbo (latiori) persistente secedens, cum columella remanenti inclusa cohaeret. Theca superne plana, inferne convexa, *Buxbaumiae*, *Diphyscii* vel *Dawsoniae* instar conformata. Inflorescentia dioica. Flos masculus discoideus.

Vi tantum stomatis nudi atque thecae figura genus proprium inter *Oligotrichum* et *Dawsoniam* intermedium.

1. **L. crispa** R. Br. (l. c. p. 562.); caulis triqueter *elatusculus simplicissimus*, inferne nudiusculus foliis squamaeformibus minutissimis scariosis appressis obtusiusculis apicem versus sensim acuminatis, superne dense foliosus; folia superiora e basi longe vaginante purpureo-fuscescente subito lanceolata, madefacta erecta patentia, sicca valde crispa, apicem versus brevi-serrata, nervo dorso apice lamellato-serrata, totum folii apicem summum occupante, lato-lamellosa; perigonialia e basi latissima subito acuminata, lato-lamellosa nervosa, apice serrata colorata; theca in pedunculo longiusculo erecta, basi stomatiis praedita; calyptra apice scabra.

Brid. II. p. 94. — Hook. Musc. Exot. tab. 161. optima. — Schwägr. Suppl. II. II. tab. 149.

Patria. In regione Nepal Indiae orientalis, ubi D. Gardner in vicinia oppidi Kathmandu detexit.

Antheridia maxima clavata, paraphysibus apice cellulosi hyalinis mixta.

? 2. **L. bifurcata** Bél. (Voy. dans l'Indie orient. Bot. II. Crypt. p. 99.); caule erecto *longissimo bifurcato*; folia subverticillata, e basi lata vaginante anguste lanceolata serrata, siccitate tortilia. †.

Patria. In locis altioribus circa locum Gâtes dictum in peninsula Indiae orientalis: Bélanger.

A praecedente ex adnotationibus auctoris differt: caule longiore, foliis latioribus apice densioribus supra ramos verticillate plus minus approximata. — Auctor ut nos quoque, plantam sterilem tantum legisse, vehementer commiseratur. An revera *Lyellia*?

Trib. XV. BRYACEAE.

Cespitosae raro gregariae humiles vel elatae plerumque innovando ramosae acrocarpicae vel pleurocarpicae. Folia lanceolata, ovalia, rotunda et spatulata, *inferne e cellulis parallelogrammis superne rhomboideo - prosenchymaticis plus minus densis chlorophyllosis vel utriculo primordiali instructis vel dein inanibus areolata, laevissima*. Theca plus minus pyriformis, clavata, ovalis vel cylindrica, operculo hemisphaerico vel conico praedita, erecta, nantans vel pendula. Peristomium externum molle lamellosum, internum membranaceum. Archegonia nucleo magno instructa. Antheridia clavata. Paraphyses filiformes.

Habitus proprius hic illic mniioideus, theca plerumque pyriformi distinctus.

Patria. Per orbem totum terrarum, regionum omnium incolae, arbores, paludes, rupes atque terram diversissimam ornantes et distributione latissima gaudentes.

Bryaceae omnium auct. et *Mielichhoferiae* Bryol. Europ. Fasc. XXIV.

Gen. I. **Mielichhoferia** Hsch.

Br. Germ. II. p. 179. — Br. Europ. Fasc. XXIV. — *Weisia* Hsch. olim, Hook. et al. — *Oreas* Brid. — *Schizhymenium* Hook. et Schwägr. *Apiocarpa* Hüb. Musc. Germ. p. 154.

Nomen in honores Cl. Mielichhofer, a consiliis superioribus fodinarum Salisburgiae ditionis, muscorum plerumque alpinorum nonnullorum pulchellorum detectoris nunc mortui conditum.

Calyptra conico-dimidiata latere fissa. Peristomium nullum vel *simplex*: *dentes 16 aequidistantes filiformes subplani articulati pallidi interdum in membrana basilari sulcata reticulata brevi positi. Theca lateralis annulo duplici praedita. Inflorescentia hermaphrodita vel dioica.*

Mielichhoferiae Bryis proximae adeo, ut ab hisce discerni nunquam possint, quum foliorum structura interna, *Bryo elongato*, *crudo* etc. plerumque affinis, perfecte similis observetur et a *Bryis* peristomii vi simplicis atque fructificatione laterali, nota non discernente, distinguantur.

1. *Theca eperistomata*.

1. **M. hymenostoma** Br. et Sch. (in Musc. Abyss. No. 469.); *hermaphrodita*; pusilla, densissime cespitosa; caulis fertilis basi tenerrimus nudiusculus, apice densissime gemmiformi-foliosus, foliis perichaetialibus *lanccolatis apice denticulatis, nervo infra apicem dissoluto*, basi brunneis supra coloratis viridescens; innovationes cauli fertili subsimiles, foliis *ovali-lanccolatis acute acuminatis obsolete denticulatis, basi laxiuscule, supra dense areolatis, nervo ante apicem evanido*; theca breviter pedunculata clavato-ovalis parva angusta nutans, ore rubella, operculo conico acuto parvo; stoma *columella cupuliformi-exserta acuta laxa reticulata clausum*.

Patria. In Abyssiniae alpe Deggen, ubi in altit. 12000 ped. supra mare legit W. Schimper d. 3. Mart. 1840. Un. itin. No. 469.

Archegonia 2—3. Antheridia 2. Paraphysis 1.

2. M. Schiedeana C. Müll.; *hermaphrodita*; pusilla basi densissime cespitosa; caulis fertilis basi tenerrimus nudiusculus apice densissime gemmiformi-foliosus, foliis perichaetialibus *lanceolatis longe acuminatis acutis subdenticulatis tenerrimis obsoletinervibus*; innovationes cauli fertili subsimiles, foliis *lanceolatis, nervo tenui flexuoso excurrente longe et tenuissime cuspidatis tenerrimis subintegrissimis*; theca breviter pedunculata clavato-ovalis parva angusta nutans, operculo conico acuto parvo; stoma *columnella vix exserta acuta vix clausum*.

Pohlia minor Hsch. in Musc. Mexicanis a Cl. De p p e et Sch i e d e collectis No. 1078. ex parte.

Patria. Mexico in monte Orizaba vulcanico.

Praecedenti ex habitu toto simillima sed gracilior et notis laudatis distinctissima.

2. *Theca peristomata*.

a. *Theca cylindrica curvata*.

3. M. basilaris Br. et Sch. (in Musc. Abyss.); *hermaphrodita*; innovationes simplicissimae erectae elatae basi nudae apicem versus sensim crescentes, densissime foliosae, foliis lanceolatis angustis *longissime cuspidatis evanidinervibus firmis*, e medio sensim distincte denticulatis, comalibus brevioribus mollioribus; caulis fertilis subbasilaris brevissimus, foliis perichaetialibus basi laxius areolatis fuscescentibus *longiusculo-acuminatis denticulatis, intimis minoribus lanceolatis latioribus subintegrissimis, omnibus obsoletinervibus*; theca longe pedunculata angustissime cylindrica elongata *longicolla*, operculo brevi conico acuto; dentes peristomii *tenui filiformes e membrana immersa orti, longiusculi, basi latiusculi, linea media distincte praediti tenuiter articulati subrugulosi*.

Patria. In Abyssinia alpibus legit W. Schimper.

Antheridia 5 — 10. Archegonia 3 — 6. Paraphyses c. 3.

4. M. Eckloni Hsch. (Linn. 1841. p. 118.); *hermaphrodita*; innovationes simplicissimae erectae elatae basi

nudae apicem versus sensim crescentes densissime foliosae, foliis *lanceolatis* angustis *brevi-acutis evanidinervi-
bus tenero-membranaceis submollibus*, fere e basi sensim
distincte denticulatis, comalibus brevioribus similibus;
caulis fertilis subbasilaris brevissimus, foliis perichætia-
libus *omnino laxius areolatis* fusciscentibus *acuminatis
obsolete denticulatis*, *intimis minoribus lanceolatis latio-
ribus subintegris*, *omnibus obsolete tinerviis*; theca longe
pedunculata *angusta cylindrico-clavata paullisper cur-
vata*, operculo brevi conico acuto; dentes peristomii *te-
nue filiformes e membrana elate exserta sulcata orli
longiusculi basi latiusculi*, *linea media praedita v. saepe
nulla*, *subplani laeves fissiles saepe subramosi irregu-
lares*.

Schizhymenium bryoides Harv. in Hook. Ic. Pl. rar. III. tab. 202.
et Schwägr. Suppl. IV. tab. 317. — *Oreas Capensis* Bruch in litt.
et collect. Zeyheri.

Patria. In promontorii bon. spei locis multis e. gr.
loco Löwenrücken, in cacumine montis Hottentots-Hol-
lands-Berg in terra arenosa ochracea: Ecklon, Zey-
her, Harvey. — *Aug. Septbr.*

Archegonia 3. Antheridia 1—2. Paraphyses 1—2. —
Planta inter *M. basilarem* et *campylothecam* medium te-
nens et notis laudatis distinctissima.

5. ***M. campylotheca*** C. Müll.; *hermaphrodita*; in-
novationes simplicissimae erectae elatae basi nudae api-
cem versus sensim crescentes densissime foliosae, foliis
lanceolatis angustis *longissime cuspidatis subpiliferis ex-
currentinerviis* e medio obsolete denticulatis, comalibus
brevioribus exacte denticulatis; caulis fertilis subbasilaris
brevissimus, foliis perichaetialibus *basi laxius areolatis*
fusciscentibus *longe acuminatis*, *nerco medio dissoluto*,
denticulatis, tenuioribus; theca longe pedunculata *angu-
stissime cylindrica*, *elongata longicolla valde curvata*, oper-
culo brevi conico acuto; dentes peristomii *tenuissime fili-
formes e membrana immersa orli breves basi aequales li-
nea media vix praediti sublaeves*.

Weisia campylocarpa Hook. et Arn. in Ic. Pl. rar. tab. 136? —
Pohlia minor Hsch. in Musc. Mexic. a Deppe et Schiede lectis
 No. 1078. ex parte.

Patria. Mexico in monte Orizabae vulcanico. E regno Peruviano prope Surucucho a cl. prof. W. Jamcson lectam Cl. Hooker habuit.

M. basilaris ex toto habitu simillima, notis illustratis tamen propria species. — Antheridia 2. Archegonia 2 — 3. Paraphysis 1. — Praecedentes species hujus divisionis quatuor inter sese affinissimae, ex habitu innovationum apicem versus crescentium comali-foliosarum Weberis nonnullis similes.

b. *Theca pyriformis aequalis.*

6. *M. clavata* Br. et Sch. (in Musc. Abyss.); *dioica*; densissime compacte cespitosa pusilla valde nitida; innovationes breves densissime foliosae, inferne nudiusculae apice crescentes, caule rubello, foliis ovalibus lanceolatis cavis bryoideis laxiusculo-areolatis, nervo crasso ante apicem evanido, subintegerrimis margine subrevolutis, pellucidis inferioribus purpurascentibus; caulis fertilis brevissimus basilaris, foliis perichaetialibus illis innovationum similibus; theca pro plantulae exiguitate longe pedunculata clavato-pyriformis horizontalis; dentes peristomii regulares e basi lata alta pallida subtrabeculata fere subito longe cuspidati subarticulati conniventes, siccitate horizontales, madefacti inflexi.

M. pellucida Hmp. Ic. Muscor. Dec. III. tab. 27. var. ramis gracilioribus, foliis nervo flaccidiore praeditis; theca maxime clavato-pyriformis, operculo conico obtuso minimo. Capensis. — *Weisia reticulata* Hook. Bot. Miscell. I. 1830. p. 121. tab. 29.

Patria. Abyssinia: W. Schimper in collect. un. it. Prom. b. spei prope Swellendam: Pappe in hb. Kunzeano. Ibidem ad Cap Town: Mundt in hb. Hookeriano.

Planta mascula feminea robustior, flore gemmiformi. Antheridia majuscula clavata brevistipitata, paraphysibus bryoideis pluribus coloratis cincta. Folia perigonia illis

innovationum similia, nervo ad medium dissoluto. Arche-gonia plura paraphysibus c. 10. praedita.

7. M. pleurogena Mont. (in ann. d. sc. nat. 1845. 4. p. 117.); *hermaphrodita*; caulis erectus dense radiculosus innovationibus ramosus; foliis imbricatis ovato-lanceolatis *integerrimis*, *nervo sub apicem evanido*, inferioribus minutis; caulis fertilis basilaris lateralis brevissimus, foliis perichaetialibus *apice dentatis*; theca *inclinata oblonga*, *uno latere basin versus amplior*; peristomii *dentes lineares apice trabeculatis conjuncti*; operculo convexo-conico brevissimo; annulus simplex.

Patria. Chile australis: C. Gay.

8. M. Jamesoni Tayl. (Lond. journ. of bot. 1847. 4. p. 331.); caulis brevissimus cespitosus erectiusculus *rubellus*, innovationibus clavatis; folia arcte imbricata erecta, ovalia acuta subintegerrima; pedunculi caule 4plo longiores apice incurvi; theca *rotundato-oralis*, *apophysi obconica*, *siccitate rugosa*; *peristomii brevissimi* albidii *dentes lanceolati per paria subapproximati saepe truncati*. Tayl. l. c.

Bryum turbinatum β . minus Kunth. Syn. Pl. Aeq. 1. p. 57. — *Bryum annotinum* Brid. l. p. 848! — *Didymodon megalocarpus* W. Arn. Disp. Meth. Mouss. p. 36. et Schwägr. Suppl. III. P. II. tab. 265. — *Splachnum turbinatum* Brid. l. p. 780! — E descriptione Taylori huc pertinet! E speciminibus authenticis, a Cl. Humboldt et Bonpland lectis species *Mielichhoferia* vera, distinctissima, hermaphrodita, haud dioica, ut dicit Schwägrichen; innovationes humiles inferne nudaе, apice comoso-foliosae clavatae gracillimae, foliis lanceolatis angustis, nervo excurrente brevi-acutis, obsolete denticulatis; caulis fertilis basilaris brevis, foliis longioribus angustioribus remote sed acute denticulatis v. integriusculis, intimis multo minoribus latioribus ovalibus laxius areolatis integris, omnibus coloratis evanidinervibus; theca longe et tenuissime apice arcuato-pedunculata, longicolla ovalis vix cernua pyriformis parva laevissima nitida; dentes peristomii ex iconibus Schwägrichenianis et descr. Cl. W. Arnott (l. c.) et Taylor per paria approximati latiuscule sensim cuspidati linea longitudinali exarati transverse trabeculati flavescentes. Antheridia brevissima c. 7 — 8. Archegonia c. 3. Paraphyses c. 2. — Ex habitu toto ad *M. basilem*, *Ecklonianam*, *campylothecam*, et *longisetam* accedens.

Patria. In monte Pichincha Andium Quitensium: W. Jameson Nov. 1846. — In convallibus Andium Novo-Granatensium inter Almaguer et Pasto altitud. 1200 — 1500 hexapod. cespitosam leg. Humboldt et Bonpland.

Ex habitu *M. macrocarpae* sed innovationibus magis clavatis, pedunculis longioribus, theca magis rotunda. Ab omnibus congeneribus dentium forma toto coelo distat, sed *Melichhoferia vera*!

9. *M. brevicaulis* Hsch. (in Fl. Bras. Fasc. I. p. 8. tab. 1. fig. 2.); *hermaphrodita*; innovationes breviusculae densiusculo foliosae inferne nudiusculae apice crescentes *rufae* filiformes v. clavatae, foliis *lanceolatis latioribus acutis evanidinervibus subdenticulatis*; caulis fertilis brevissimus basilaris, foliis perichaetialibus *lanceolatis acutis apicem versus remote serrulatis, nervo ante apicem evanido*, parum concava luteo-viridia; folia innovationum angustiora; theca *pyriformis erecta longicolla*, operculo conico mammillato; dentes peristomii *e membrana brevi reticulata filiformes basi latiores linea media sulcati, apice simplices articulati rugulosi.* †.

Patria. Brasilia in Monte Video: Sellow. Chile: C. Gay sec. Cl. Montagne.

Antheridia plura. Archegonia pauca. Paraphyses paucissimae filiformes.

10. *M. nitida* Hsch. (in Bryol. Germ. II. p. 183. tab. 41.); *dioica*; innovationes erectae gracillimae filiformes fere e basi usque ad apicem aequaliter filiosae, foliis erecto-patentibus confertis *ovali-lanceolatis apice dentatis acutis evanidinervibus*; caulis fertilis *brevis* basalis vel medius, foliis perichaetialibus *majoribus obtusiusculis laxius areolatis subintegris evanidinervibus*; theca brevipedunculata *eleganter pyriformis suberecta parva*, operculo brevi conico; dentes peristomii *basi confluentes, e basi latiuscula subito anguste lineales subplani articulis transversalibus numerosis, prominulis, ex unica cellularum serie conformati, granulati obscure flavescentes vix hygroscopici.*

Bryolog. Europ. I. c. tab. 1. — *Weisia Mielichhoferiana* Funk in Hoppe et Hornsch. Crypt. Cent. I. Dec. IV. et Regensb. bot. Zeit. 1819. p. 86. — *Oreas Mielichhoferi* Brid. I. p. 381.

β. gracilis; densius cespitosa, foliis brevioribus magis confertis subimbricatis; thecae erecto-pedunculatae. Bryol. Europ. I. c. p. 6. tab. 2.

γ. intermedia; dense cespitosa, foliis erectis angustioribus; theca in pedunculo arcuato demissa, illa formae typicae minori, matura pallide olivacea. Bryol. Europ. I. c. p. 6. tab. 2.

δ. elongata; compacte cespitosa uncialis et semipedalis, ad innovationes usque fusco-atra, foliis imbricatis, theca in pedunculo brevissimo flexuoso arcuato saepe inter innovationes demissa, crassiuscula olivacea. Bryol. Europ. I. c. p. 6. tab. 2 *δ.* — *Mielichhoferia elongata* Nees et Hsch. Bryol. Germ. II. p. 186. tab. 41. fig. 2. — *Weisia Mielichhoferi β. elongata* Schwägr. Suppl. II. 1. p. 47. tab. 114. — *Weisia elongata* Hook. Musc. Exot. II. tab. 102. — *Oreas elongata* Brid. I. p. 382.

ε. macrocarpa; foliis obtusioribus et innovationibus densius foliosis magis clavatis. *Weisia macrocarpa* Hook. in Drumm. Musc. Amer. No. 74. — *Mielichhoferia macrocarpa* Br. et Sch. in Lond. journ. of bot. II. 1843. p. 665.

Patria. In rupibus micaceo-schistosis ad fodinam Schwarzwand dictam in valle Salisburgensi Grossarl ubi Cl. Mielichhofer anno 1817 detexit; in der Leiter prope Heiligenblut Carinthiae: Hornschuch, Hoppe, Funk; an der Messerlingwand prope Windischmattrey, in valle Tefereggen Tirolis: Funk, Hornschuch; in valle de Lio Pyrenaeorum orientalium: Thomas; ad vallis Velberthal initium prope Mittersill Pinzgaviae: Sauter, W. P. Schimper. In alpe Dovrefjeld Norvegiae et in Suecia (Åreskut): Ångström. Var. *β.* ad fodinam Schwarzwand, ubi locis humidis (sub ponte) sensim in var. *δ.* transit. Var. *γ.* in rupibus micaceis semidecompositis haud irroratis ad fodinam Schwarzwand et in muro ferrugineo fodinae secus viam, quae a pago Hüttschlag per montem Throneck in Gastuniam ducit, et in valle di Furba versus mont. Zebbru Vallis-Tellinae: W. P. Schimper. Var. *δ.* in rupibus decompositis, rivulo

e fossa Schwarzwand proveniente irrigatis, cespitibus ingentibus, longe lateque extensis. Var. η . in America septentrionali ubi in Rocky Mountains legit Drummond. — *Augusto et Septembri*.

Planta mascula feminea paullisper gracilior, ramosior polyantha; flores in ramulis brevibus e caule primario egredientibus gemmiformes polyphylli, foliis intimis mollioribus subnervibus. Antheridia 1 — 2, paraphysi 1. Archeogonia c. 10, paraphysibus filiformibus pluribus. E pulcherrimis muscis alpinis!

11. *M. longiseta* C. Müll.; *hermaphrodita*; innovationes simplicissimae erectae subhumiles basi nudae apicem versus sensim crescentes dense foliosae, foliis lanceolatis acuminatis nervo tenui excurrente breviter cuspidatis angustis parum falcatis flavescentibus apice obsolete denticulatis; perichaetia latiora acute acuminata evanidinervia subintegerrima, intima multo minora hyalina inaequaliter dentata; theca in pedunculo longissimo gracili flexuoso pyriformis brevicolla crassiuscula, sicca erecta, madefacta inclinata, operculo conico mammillato brevissimo; dentes peristomii in membrana brevi longi erecti angusti parum sulcati linea longitudinali exarati flavidi, interdum apice subappendiculati.

Bryum nutans β . minus Kunth Synops. Pl. Aeq. I. p. 58.

Patria. In jugis Andium, regione temperata: Humboldt et Bonpland.

Mielichh. Jamesoni proxima, theca autem longissime pedunculata et peristomio distincta. A. *M. pleurogena* et *brevicauli* notis editis certe differt.

Gen. II. **Leptochlaena** Mont.

Annales des sc. nat. 1845. 4. p. 105.

A λεπτός *gracilis* et χλαίνα *laena*, tenuitatem calyptrae denotans.

Calyptra lineari-subulata longa fugacissima viridis apice fusca, basi lateraliter fissa. Peristomium duplex. Externum: dentes 16 breves lineari-lan-

ceolati articulati, madore erecti hyalini. Internum: membrana brevissima, in cilia totidem filiformia cum dentibus alternantia fissa. Theca lateralis. Inflorescentia monoica.

Genus *Mielichhoferiis* ex toto habitu proximum et peristomii vi duplicis distinctum, sed futuro forsanelius ad illas revocandum.

L. Chilensis Mont. (l. c. p. 106.); *monoicum*; *cespitosum*, basi subnudum, apice interrupte comoso-foliosum erectum, innovationibus plerumque binis infra perichaetium enatis fertilibus ramosum; folia ovato-lanceolata, nervo basi crassiore superne tenui flexuoso excurrente acuta, paulum flexuosa, subdenticulata, margine paullisper revoluta, e cellulis basi laxis superne angustissimis densissimis inanibus areolata, lutescentia, superiora majora in comam densiusculam imbricata; theca cylindracea erecta vel inclinata anapophysata, pedunculo gracillimo flexuoso et operculo conico-acuminato brevissimo praedita.

Mont. in Gay: Hist. de Chile, Bot. Crypt. tab. 4. fig. 1.

Patria. Ad truncos arborum prope St. Jago reipublicae Chilensis. — *Martio*, 1829: C. Gay.

Anthheridia in axillis foliorum floralium sessilia libera oblonga fusca et cum archegoniis floris feminei intermixta. Flos femineus in ramulo apice comoso terminalis gemmiformis. — Fructum non vidimus.

Gen. III. **Orthodontium** Schwägr.

Suppl. II. P. II. 2. p. 123. — Bryol. Europ. Fasc. XXIV. *Orthodontium*. *Bryum* auct. nonnull.

Ab ὀρθός *rectus* et ὀδούς *dens*, ob dentes erectos ductum.

Calyptra parvula cuculliformis fugax. Peristomium *infra thecae orificium oriens duplex*. Externum: dentes externi 16 *lanceolati-subulati*, *Bryi generis*, *siccitate infra thecae orificium deflexi*,

madefacti erecti. Internum: cilia dentibus externis alternantia duplo breviora vel subaequalia, e membrana brevi subcarinata filiformia. Foliis longis lanceolato-subulatis angustissimis subcrispis apice caulibus comalibus plantae graciles cespitosae. Theca annulata vel exannulata, sublongicolla. Inflorescentia monoica vel dioica.

1. *Folia valde patula.*

1. **O. gracile** Schwägr. (in litt. ad Wilson); *monoicum*; humile, laxius cespitosum; folia longissime subulata angustissima, *basi laevae, apicem versus densiusculo-areolata*, flexuosa integriuscula, nervo in subulam evanescente subcarinato-concava; perichaetia *intima minora colorata omnino laxius areolata*; theca in pedunculo inaequaliter longo tenuissimo *suberecta ovalis longicolla pyriformis angustissima laevis*, operculo conico rostellato; peristomii dentes externi *breviusculi angusti* dense trabeculati madefacti aurei, interni *dimidio breviores filiformes articulati*.

Bryolog. Europ. l. c. p. 4. tab. 1. — *Bryum (Pohlia) gracile* Wils. in Gardner Muscol. Brit. tab. 34. App.

Patria. In rupibus arenariis prope Helsby Comit. Cheshire Angliae, ubi Cl. W. Wilson anno 1833 detexit. In Abyssiniae alpibus Simensibus: W. Schimper. — *Martio.*

Plantae tenellae fragiles parce ramosae. Antheridia sub flore femineo in foliorum comalium axillis per paria disposita numerosa, paraphysibus filiformibus mixta. Theca exannulata. *Orth. lineari* Schwägr. simillimum, species haecce tamen differt: inflorescentia, foliis multo laxius areolatis, dentibus externis latioribus, internis externos aequantibus et theca basi subaequali horizontali. — Planta Abyssinica foliis laxius areolatis, caeterum Europaeae simillima.

2. **O. lineare** Schwägr. (Suppl. II. P. II. p. 124. tab. 188.); *monoicum*; humile, laxius cespitosum; folia

longissime subulata angustissima, *laxius areolata*, flexuosa integriuscula, nervo in subulam evanescente subcarinato-concava; theca in pedunculo *apice inclinato horizontalis basi subaequalis oralis*, operculo conico subobliquo acuto breviori; peristomii dentes *externi latiores* dense trabeculati, interni *externos aequantes* filiformes tenuissimi articulati. †.

Patria. In prom. b. spei: Menzies.

Flos masculus *gemmaformis, foliis perigonalibus minimis obtusis enervibus*. Theca exannulata.

3. **O. sulcatum** Hook. et Wils. (in Hook. Ic. Pl. tab. 739. B.); *monoicum*; humile, *laxius cespitosum*; folia *longa subulata, basi angustiora, apicem versus latiora, apice subulato-acuta, angustissime areolata* integriuscula subconcava, nervo supra medium evanido; folia perichae-tialia intima minora angustiora; theca in pedunculo elongato tenuissimo *erecta* vel vix inclinata *oralis brevicollis, aperta sulcata*, operculo conico *rostellato obliquo*; dentes peristomii externi *oblongi obtusiusculi breves* trabeculati ferruginei, interni *externos dimidio superantes* concolores articulati *tenuissime* filiformes.

O. infractum Dz. et Molkb. in ann. d. sc. nat. III. 2. 1844. p. 313; et in Musc. Archip. Ind. Fasc. II. *Orthodontium* p. 31. tab. 14.

Patria. Nova Hollandia ad flumen Swan River dictum: J. Drummond primus legit. In Javae insulae monte Gédé, ubi in cacumine mont. Sedaratoc legit Korthals.

Flos masculus axillaris *gemmaformis minutus, foliis perigonalibus lato-ovatis convolutaceis, integerrimis acuminatis enervibus brunneis laxae areolatis*. Antheridia breviter ellipsoidea, paraphysibus brevibus luteis cincta. Theca exannulata. — Praecedentibus ex habitu simillimum, notis tamen laudatis distinctissimum.

4. **O. australe** Hook. et Wils. (in Lond. journ. of bot. 1844. p. 545.); *monoicum*; caulis humilis, fastigiato-ramosus; folia *erecto-patentia erectave subrecurva linearia flexuosa*, nervo *subcontinuo praedita*, angustissime

elongate et densissime areolata, theca laevis *suberecta oblonga brevicolla*, operculo *brevirotrato*.

Patria. Insulae Falklandi atque Eremitae et in terra Van Diemenii.

Orth. gracili proximum, sed differt theca, peristomio minori pallido et nervo distinctiore. Ab *Orth. lineari* autem valde diversum.

5. **O. pellucens** Br. et Sch. (Bryol. Europ. Fasc. XXIV. Orthod. p. 3.); *elongatum robustum valde ramosum cespitosum*; folia patentia flexuosa linearia acuta integerrima, nervo gracili evanescente carinato-concava, *laxe et pellucide reticulata*, siccitate nitidiuscula, flavo-virescentia; *thecae numerosae in pedunculis brevibus gracillimis fulvis subinclinatae pallidae pyriformes apophysatae, dein subsulcatae, operculo e basi conica sublonge rostrato praeditae, ore subcontractae*; peristomii dentes externi angusti, dense trabeculati, interni externos aequantes e basi latiuscula subulati articulati. †.

Bryum (Pohlia) pellucens Hook. in Ic. Pl. rar. I. tab. 34.

Patria. Peruvia in monte Surrucucho prope Cuença: Jameson.

Notis designatis ab omnibus congeneribus distinctissimum.

b. *Folia appressa erecta.*

6. **O. tenue** C. Müll.; *dioicum; pusillum simplex, gregarie cespitosum*; folia caulina lanceolata angusta longiuscula acuta integerrima flexuosa caviuscula, nervo *excurrente*; perichaetia longiora; theca minima horizontalis inclinata ovalis aperta cylindracea brevicollis, operculo conico brevissimo, annulo parvo et pedunculo brevissimo *flexuoso* praedita; dentes peristomii externi breves, transverse trabeculati angusti pellucidi, interni ciliiformes *bifidi, e basi ad medium tantum secedentes*.

Bryum (Pohlia) humile Mont. in Ann. des sc. nat. 1845. 4. p. 104.

Patria. Chile australis: Pöppig 1828. Hb. Kunzeanum. Ibidem: Gay in hb. Mont.

Archegonia longissima 5—6, paraphysibus nonnullis teneris mixta. Flos masculus ignotus. — Omnium congenerum humillimum, pygmaeum, *Orthodontium* verum et distinctissimum exiguitate, inflorescentia, theca annulata et dentibus peristomii. Species tenella.

Gen. IV. **Bryum** Dill. emend.

Hist. Musc. p. 338. Br. Europ. Fasc. VI—IX. — *Acidodontium* Schwägr. *Megalangium* Brid. — *Peromnion* Schwägr. — *Brachymenium* Hook. — *Mnium* auct. nonn. — *Webera* Hdw. — *Pohlia* Hdw. — *Hemisynapsium* Brid. — *Ptychostomum* Hsch. — *Cladodium* Brid. — *Cynodontium* Hdw. — *Hypnum* et *Leskea* Web. et Mohr.

Nomen antiquum in *Dioscoride* et *Plinio* occurrens, a *Dillenio* huicce generi affinibusque impositum, ab *Hedwigio* sancitum.

Calyptra dimidiata parvula cuculliformis. Peristomium duplex. Externum: dentes 16 lanceolati molles flavescentes aequidistantes, dorso plani transversim trabeculati, linea media longitudinali flexuosa exarati, intus lamellati hygroskopici. Internum membrana tenera sedecies carinata magna in dentes lanceolatos plus minus perfectos producta, ciliis saepe interjectis vel nullis. Inflorescentia hermaphrodita, monoica, dioica vel androgyna. Theca plerumque annulata.

Clavis annalyticus e peristomio ductus.

A. **Acidodontium** Schwägr.

Suppl. II. II. p. 152.

Dentes externi longissimi lati, apice subito subulati incurvi, latere valde hyalino-lamellosi. Membrana interna altissima in dentes 16 lanceolatos carinatos, apicem versus secedentes, summo apice connatos dein bifidos, ciliis binis brevissimis interjectis, e basi usque ad apicem densissime transverse trabeculatos producta.

1. Br. megalocarpum Hook. 30.

2. - seminerve C. Müll. 31.

3. - Taylora C. Müll. 32.

B. Brachymenium Hook.*Schwägr. Suppl. II. I. p. 131.*

Dentes externi ut in *Bryis* ceterisque sectionibus una cum interno peristomio e sporangidii membrana oriundi. Membrana interna dentibus rudimentariis, vel nullis et ciliis perfectis seu rudimentariis.

1. Folia julaceo-imbricata.

- 4. Br. splachnoides C. Müll. 75.
- 5. - pulchrum C. Müll. 135.
- 6. - Koratranum C. Müll. 136.

2. Folia plus minus patula.**a. Folia marginata.**

- 7. Br. Abyssinicum Br. et Sch. 34.
- 8. - flexifolium Br. et Sch. 35.
- 9. - Peromnion C. Müll. 131.
- 10. - Hornschuchianum C. Müll. 132.
- 11. - brevicaule Hmp. 133.
- 12. - Hookeri Spr. 134.

b. Folia immarginata.**α. Denticulata.**

- 13. Br. Montagneanum C. Müll. 33.
- 14. - Systylium C. Müll. 129.
- 15. - leptostomoides C. Müll. 130.
- 16. - microstomum C. Müll. 137.
- 17. - Weisia C. Müll. 138.

β. Integra.

- 18. Br. Mexicanum C. Müll. 10.
- 19. - Meyenianum C. Müll. 86.
- 20. - Harveyanum C. Müll. 116.
- 21. - Sellowianum C. Müll. 127.
- 22. - Martianum C. Müll. 128.

C. Ptychostomum Hsch.*Regensb. bot. Zeit. 1822. Syll. I. p. 62.*

Peristom. internum externo adglutinatum, dentibus lanceolatis plus minus perforatis ciliisque inermibus vel nullis praeditum.

- 23. Br. cernuum Br. et Sch. 36.
- 24. - Gayanum Mont. 37.
- 25. - Melvilleanum C. Müll. 38.

D. Pohlia Hedw.*Musc. Frond. I. p. 96. t. 36.*

Peristom. internum: dentes lanceolati plus minus perforati, ciliis rudimentariis interpositis vel nullis.

1. *Inflorescentia hermaphrodita.*

- 26. Br. lacustre Bland. 39.
- 27. - inclinatum Br. et Sch. 40.
- 28. - arcticum eor. 41.
- 29. - purpurascens eor. 42.
- 30. - Archangelicum eor. 43.
- 31. - Indicum Dz. et M. 117.

2. *Inflorescentia monoica.*a. *Folia lata.*

- 32. Br. uliginosum Br. et Sch. 44.
- 33. - Warneum Bland. 45.
- 34. - leptophyllum Br. et Sch. 46.
- 35. - Brownii eor. 47.
- 36. - latifolium Br. et Sch. 68.
- 37. - orthodontioides C. Müll. 81.

b. *Folia angusta.*

- 38. Br. acuminatum Br. et Sch. 139.
- 39. - cucullatum Schw. 143.
- 40. - polymorphum Br. et Sch. 144.

3. *Inflorescentia dioica.*a. *Theca irregularis.*

- 41. Br. Zierii Dicks. 71.
- 42. - demissum Hook. 72.

b. *Theca regularis.*α. *Folia evanidinervia.*

- 43. Br. compressidens C. Müll. 74.
- 44. - platyphyllum C. Müll. 77.
- 45. - clavatum Schimp. 79.
- 46. - tenuicaule Mont. 80.
- 47. - papillosum C. Müll. 140.
- 48. - brachydontium Hmp. 141.

β. *Folia excurrentinervia.*

- 49. Br. rutilans Brid. 48.
- 50. - Gilliesii Hook. 78.
- 51. - microcarpum C. Müll. 82.
- 52. - imbricatum Schw. 100.

4. *Inflorescentia ignota.*

- 53. Br. calophyllum R. Br. 70.
- 54. - ambiguum Dub. 83.
- 55. - flexuosum C. Müll. 142.

E. **Webera** Hdw.

Hist. Musc. p. 95.

Peristomium internum ut antea, ciliis perfectis nudis interpositis.

1. *Inflorescentia hermaphrodita.*

56. Br. pyriforme Hdw. 145.

2. *Inflorescentia monoica.*a. *Antheridia in gemmis inclusa.*

57. Br. subrotundum Brid. 49.

58. - paradoxum Schw. 73.

59. - doliolum Dub. 102.

60. - Nepalense Spr. 112.

61. - multiflorum C. Müll. 160.

b. *Antheridia in axillis foliorum libera.*

62. Br. nutans Schreb. 153.

63. - longicollum Sw. 154.

64. - elongatum Dicks. 155.

65. - leptoblepharon C. Müll. 156.

66. - integridens C. Müll. 157.

3. *Inflorescentia dioica.*a. *Folia nervo excurrente vel evanido.*

67. Br. cinclidioides Blytt. 8.

68. - carneum L. 84.

69. - albicans Wahlenb. 85.

70. - orthocladon Br. et Sch. 124.

71. - Sphagni Brid. 146.

72. - annotinum Hdw. 147.

73. - pulchellum Hdw. 148.

74. - Ludwigii Spr. 149.

75. - crudum Schreb. 150.

76. - Schimperii C. Müll. 151.

b. *Folia nervo in cuspidem exeunte.*

77. Br. Decaisnei Dz. et M. 9.

78. - macropelma C. Müll. 50.

79. - dichotomum Hdw. 101.

80. - dicranoides Hsch. 110.

81. - Preissianum Hmp. 111.

82. - exile Dz. et M. 113.

83. - coarctatum C. Müll. 114.

84. - megalacrion Schw. 115.

85. - microtheca C. Müll. 119.

86. - leucophyllum Dz. et M. 120.

87. - semiovatum Brid. 122.

Incertae sedis.

88. Br. geniculatum Brid. 51.

89. - nitens Hook. 158.

90. Br. soboliferum Tayl. 161.

91. - Bridelianum C. Müll. 165.

F. *Bryum* Dill. emend.

Bryol. Europ. Fasc. VI—IX.

Peristom. internum ut antea, ciliis perfectis appendiculatis interjectis.

1. *Inflorescentia hermaphrodita.*

92. Br. bimum Schreb. 20.

93. - nivale C. Müll. 28.

94. - torquescens Br. et Sch. 52.

95. - Philippianum C. Müll. 53.

96. - intermedium Brid. 54.

97. - cirrhatum H. et Hsch. 55.

98. - microstegium Br. et Sch. 56.

2. *Inflorescentia monoica.*

99. Br. pallescens Schw. 57.

100. - Sauteri Br. et Sch. 58.

101. - Sandii Dz. et M. 92.

3. *Inflorescentia dioica.*

a. *Folia julaceo-imbricata.*

α. *Mollia.*

102. Br. Blindii Br. et Sch. 89.

103. - conicum Hsch. 94.

104. - bulbillosum Mont. 95.

105. - Funkii Schw. 103.

106. - argenteum L. 118.

β. *Rigida.*

107. Br. julaceum Sm. 121.

108. - prostratum C. Müll. 123.

b. *Folia apice caulis in rosulam congesta latissima spathulata.*

109. Br. roseum Schreb. 1.

110. - giganteum Hook. 2.

111. - Umbraculum Burch. 3.

112. - grandifolium C. Müll. 7.

113. - Beyrichianum C. Müll. 5.

114. - Commersoni Brid. 4.

115. - patens Hook. et Wils. 6.

c. *Folia patula in caulis longitudin. sparsa.*

α. *Folia confertius imbricata.*

1. *Folia stricta.*

116. Br. australe Hmp. 65.

117. - alpinum L. 66.

- 118. Br. Mühlenbeckii Br. et Sch. 67.
- 119. - erythrocarpum Schw. 87.
- 120. - marginatum Br. et Sch. 88.
- 121. - Tozzeri Grev. 90.
- 122. - pachypoma Mont. 91.
- 123. - Crügeri Hmp. 93.
- 124. - atropurpureum Wahlenb. 104.
- 125. - pachythea C. Müll. 105.
- 126. - coronatum Schw. 106.
- 127. - apiculatum Schw. 107.
- 128. - versicolor A. Br. 108.

2. *Folia plus minus torta.*

- 129. Br. Canariense Schw. 11.
- 130. - capillare Hdw. 59.
- 131. - platyloma Schw. 60.
- 132. - obconicum Hsch. 61.
- 133. - creberrimum Tayl. 62.
- 134. - cavum C. Müll. 63.
- 135. - cespitium L. 64.

β. *Folia laxè imbricata.*

- 136. Br. truncorum Brid. 15.
- 137. - Ehrenbergianum C. Müll. 16.
- 138. - Neelgheriense Mont. 17.
- 139. - pallens Sw. 19.
- 140. - pseudotriquetrum Hedw. 21.
- 141. - Neodamense Itzigs. 22.
- 142. - turbinatum Hdw. 23.
- 143. - Duvalii Voit. 24.
- 144. - gracilescens C. Müll. 25.
- 145. - rigidum C. Müll. 29.
- 146. - cyclophyllum Schw. 69.

Brya incertae sedis.

Ad. F. 3. c. β. ?

- 147. Br. andicola Kth. 18.
- 148. - Auberti Brid. 27.
- 149. - erythrocaulon Brid. 26.

Ad. F. 3. c. α. 2. ?

- 150. Br. Billardieri Schw. 12.
- 151. - leptothecium Tayl. 14.
- 152. - campylothecium ej. 13.

Ad. F. 3. a. α. ?

- 153. Br. pugens Tayl. 96.
- 154. - inaequale ej. 97.
- 155. - multicaule ej. 98.

Cujus sectionis?

- 156. *Br. blandum* Hook. et Wils. 125.
- 157. - *laevigatum* eor. 126.
- 158. - *gracilisetum* Hsch. 159.
- 159. - *angustifolium* Brid. 109.
- 160. - *recurvifolium* Tayl. 163.
- 161. - *cellulare* Hook. 76.
- 162. - *tenuifolium* H. et W. 152.
- 163. - *teretiusculum* Hook. 99.
- 164. - *Zollingeri* Dub. 162.
- 165. - *palmifolium* Brid. 164.

Spec. sec. affinit. natur. dispositae.

Sectio I. *Platyphyllum*. Plantae laxifoliae mniioideae clatae robustae. Folia latissima spathulata, nervo basi crassissimo, superne tenuiter evanido praedita, e cellulis maximis utriculo primordiali plerumque valde evoluto praeditis constructa, planiuscula, margine basi tantum revoluta; thecae cylindricae plus minus majusculae saepe valde aggregatae.

1. *Br. roseum* Schreb. (Spic. Fl. Lips. p. 84.); *divicium*; caulis apice interdum innovationibus brevibus stellato-foliosis ramosus; folia e basi *breviter lato-spathulata* lato-ovalia acuminata, nervo basi crasso tenuiter evanescente fuscidulo praedita, inferne margine revoluta, *e medio usque ad apicem simpliciter et brevi-serrata*, e cellulis utriculo primordiali plerumque maxime evoluto praeditis majusculis viridibus composita; perichaetialia multo minora angustiora, longissime acuminata, *denticulata* nervo excurrente cuspidata; thecae solitariae vel aggregatae longipedunculatae *subgibboso-cylindrica pendula*, *ore aequali*, operculo convexo-conico mammillari, peristomio magno *Bryi*.

Br. Europ. l. c. p. 56. t. 25. — *Br. Polla rosea* Brid. l. p. 696. — *Mnium roseum* Hdw. Sp. Musc. p. 194. — *Hypnum roseum* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 207. — *Mn. proliferum* Gmel. Syst. Nat. II. p. 1330. — *Bryum stellare roseum majus*, capsulis ovatis pendulis. Dill. Musc. p. 411. t. 52. fig. 77.

Patria. Per orbem totum fere terrarum in locis humidis praecipue graminosis sed raro fructiferum. — *Auctumno*.

Flos masculus gemmiformis, foliis ovato-lanceolatis evanidinervibus integerrimis. Planta e perigonio saepe prolifera.

2. **Br. giganteum** Hook. (in Schwägr. Suppl. II. II. 1. p. 20. tab. 158.); *dioicum*; folia caulina e basi longe et anguste spathulata latissimo-ovalia acuminata, nervo tenui evanido purpurascente praedita, inferne margine revoluta, medio simpliciter apice vero argute et flave duplicato-serrata, e cellulis utriculo primordiali plerumque maxime evoluto praeditis majusculis viridibus composita; perichaetialia multo minora angustiora, interna plus minus lanceolata longissime acuminata simpliciter serrata excurrentinervia; thecae solitariae vel aggregatae longipedunculatae elongato-cylindricae curviusculae horizontales, ore ampliores, operculo conico, peristomio magno.

Bryum Polla rosea γ. *gigantea* Brid. I. p. 854.

Patria. Nepal: Wallich. Java in monte Patsia: Reinwardt, caeterum quoque in montibus Gédé, Salak, Megamedong, in sylva Burangrang et in Borneo teste Korthals, vulgare.

Br. roseo proximum, sed notis illustratis certe distinctum.

3. **Br. Umbraculum** Burch. (Hook. Musc. exot. tab. 133.); *dioicum*; simplex basi purpurascens; folia caulina e basi lato-spathulata lato-ovalia acuminata, inferiora evanidinervia, superiora nervo excurrente basi crasso purpurascens superne tenui praedita, inferne margine revoluta, e basi tenuiter et laxius purpurascenti-marginata, e medio simpliciter sed argute serrata, e cellulis crassiusculo-rhomboideis minus elongatis utriculo primordiali plus minus evoluto praeditis composita, majora planiuscula, angustiora margine valde undulata; perichaetialia interna minora longius acuminata excurrentinervia; theca solitaria longiusculo-pedunculata cylindrica, ore ampliori, pendula intense rufo-fusca.

Mnium Umbraculum Schwägr. Suppl. II. II. 1. p. 22. t. 159. — *Br. Polla Umbraculum* Brid. I. p. 698. — *Mn. spathulatum* Hsch. Linn. XV. p. 135. forma sterilis prolifera gracilis foliis minus plicatis argute serratis.

Patria. Prom. bon. spei: Ad terram in umbrosis sylvarum densarum Antennigualand, ubi Burchell de-

textit. Port Natal in sylva prope Omblas in terra: Drège sterile legit. Prope Philippstown in sylvis montanis: Ecklon sterile.

4. **Br. Commersoni** Brid. (Mant. Musc. p. 119.); *dioicum*; elatum subsimplex proliferum, e basi usque ad apicem laxè, apice stellatim foliosum; folia e basi longe et anguste spathulata lato-ovalia acuminata, nervo crasso purpurascente excurrente, e *cellulis crassis aequalibus plus minus pellucidis composita, cellulis angustioribus veluti laxè marginata*, dentibus inaequalibus argutis *basi non confluentibus* ciliato-serrata; perichaetalia lanceolata vel ovato-acuminata acutissima, remote et quasi spinoso-ciliata.

Mnium Commersoni Schwägr. Suppl. I. II. p. 134. tab. 80. — *Bryum Polla Commersoni* Brid. I. p. 710.

Patria. Insula Bourbonis: Commerson.

A *Br. Umbraculo* proximo foliis crassius areolatis vix marginatis, vix plicatis jam statu sterili differt. *Br. Beyrichianum* simillimum foliis dentibus basi confluentibus quasi limbatis distat.

5. **Br. Beyrichianum** C. Müll.; *dioicum*; elatum subsimplex proliferum, e basi usque ad apicem laxè, apice stellatim foliosum; folia e basi lato-spathulata lato-ovalia acuminata, nervo crasso purpurascente excurrente, e *cellulis majusculis longioribus quam latis utriculo primordiali valde conspicuo praeditis composita, cellulis angustioribus veluti laxè marginata*, dentibus inaequalibus argute vel ciliato-serrata; perichaetalia multo minora ovato-longo-acuminata immarginata breviter serrata subexcurrentinervia; theca longipedunculata *elongato-cylindrica longicolla curvata arcuato-horizontalis* pallida, operculo convexo breviter rostellato subobliquo aurantiaco.

Mnium Beyrichianum Hsch. Fl. Bras. Fasc. I. p. 45. — *Bryum roseum* Walk. Arn. in Act. Soc. Wern. V. p. 201.

Patria. Brasilia, ubi Beyrich legit, in locis pluribus et, ut videtur haud rarum. In Chile: Pöppig. Columbia: Moritz. In Cordilleribus: Humboldt.

Br. Commersoni et *Umbraculo* proximum; ab ambo-
bus jam differt foliorum dentibus confluentibus, ab ulteriore
quoque thecae forma.

6. **Br. patens** Hook. et Wils. (Lond. Journ. of bot.
1844. p. 155.); caulis ramosus, ramis brevibus inferne
subnudis; folia in rosulam congesta patula obovata sub-
plana apiculata, margine plano, superne serrulata, sicci-
tate erecta subcrispata, nervo subexcurrente; theca *cla-
vato-obovata* cernua, operculo conico-mammillato. †.

Patria. Brasilia in Serra da Araripe, rupes habitans:
Gardner, Oct. 1838. Coll. No. 39.

Br. roseo ex auct. proximum sed gracilius, theca an-
gustiore ad insertionem pedunculi attenuata, horizontali
haud pendula et pedunculo semper solitario differt.

7. **Br. grandifolium** C. Müll.; caulis elongatus ere-
ctus subsimplex; folia inferiora distantia, superiora in ro-
sulam congesta patentia elongate obovata apiculata *sub-
immarginata subdenticulata*; thecae subbinac *inaequales
lineari-obovatae cernuae subapophysatae*, operculo conico
acuminulato. †.

Mnium grandifolium Tayl. Lond. Journ. of bot. 1847. p. 336.

Patria. In Andibus Quitensibus, monte Pichincha:
W. Jameson. Oct. 9. 1827. et Nov. 1846.

Bryo roseo ex auct. animadv. proximum, sed differre
dicitur caulibus magis tomentosius et elongatis, foliis ma-
gis marginatis subintegris et theca longiore angustiore.
Inflorescentia forsan dioica.

8. **Br. cinclidioides** Blytt. (in schedulis!); *dioicum*;
elongatum parce ramosum; folia caulina inferne remota,
apicem versus densiora *lato-ovalia vel oblonga vel subor-
bicularia*, retis cellulae inde a nervo in seriebus obliquis
positae, longiusculo-rhomboidales tenues, utriculo primor-
diali maxime evoluto praeditae, cellulae marginales an-
gustiores longiores in seriebus circularibus positae, folia
igitur *submarginata, remote denticulata, vel integerrima,
apice obtusa vel emarginata vel brevissime acuminata*,
nervo basi crasso tenuiter evanescente flavo; perichaetia-

lia *spathulata* minora plus minus acuminata; theca plerumque solitaria longipedunculata *oralis crassa brevis pendula* operculo convexo apiculato; peristomium internum *Weberae mnioideum* exappendiculatum robustum.

Mnium cinclidioides Hüb. (non Blytt, ut dicit Br Europ. Fasc. 31. Suppl. Mnium, p. 6.) Muscol. Germ. p. 416. et Br. Europ. Fasc. V. p. 34. t. 14.

Patria. Norvegia, ubi primus omnium detexit Blytt non Hübener mendax, in paludosis Nordlandiae: in Hedemarken, Rommerige et Ringeriget; Suecia in palude umbroso sylvae Sunerstaskag supra Wårdsätra ditionis Upsaliae: Lindgren; Finlandia ex Ångström et in monte Meissner Germaniae, ut ex hb. Hampeano elucet. E rarioribus.

Planta mascula tenerior, flore discoideo foliisque perigonialibus e basi ovata concava ligulato-ovalibus, interioribus quadrato-obovatis brevissime apiculatis minoribus nervosis, paraphysibus mnioideis apice subclavato-articulatis. — Planta ex habitu omnino mnioidea, e. gr. formis majoribus *Mnii punctati* haud dissimilis, sed foliorum areolatione *Bryum* verum et a *Mniis* toto coelo distans. E distinctissimis.

9. **Br. Decaisnei** Dz. et M. (Musc. Archip. Ind. p. 19. t. 9.); *dioicum*; caulis e basi ascendente radiculosa erectus subnudus *simplex* subhumilis, e coma prolificans; folia in comam rosaceam patulam congesta, inferioribus adpressis majora, spathulato-ovata acuminata, versus apicem plicatum reflexiusculum remote denticulata, *marginē e cellulis flavis densissimis elongatis incrassate et lato-marginata*, basi infima margine subreflexa, superne plana, *e cellulis minutis densis inanibus firmis* basi laxioribus areolata; nervo tenui excurrente breviter cuspidata; theca *cylindrica angusta currula* subnutans, ore dilatato, operculo brevi conico obtuso; peristomii dentes *interni membrana alta breves* valde hiantes, *ciliis ternis inermibus interpositis*.

Br. conicum cor. in Ann. d. sc. nat. 1844. p. 300.

Patria. Java ad fissuras corticis arborum putrescentium montis summi Gédé.

Pl. mascula gracilior apice amoene rosulata inferne nuda, foliis ovatis cuspidatis haud spathulatis minoribus. Ab omnibus congeneribus theca angusta cylindrica atque habitu pusillo facillime distinguitur.

Sectio II. **Eubryum.** Plantae dense et late cespitosae plerumque tomentosae plus minus elatae saepe muioideae. Folia lato-ovalia basi vel omnino margine distincte revoluta, e cellulis latis (haud laxis), chlorophyllosis vel utriculo primordiali instructis areolata, nervo basi crassiore praedita, theca forma pyriformi variabili inclinata horizontalis vel pendula.

1. *Folia apice caulis densiora in rosulam congesta lata. Plantae elatae.*

10. **Br. Mexicanum** C. Müll.; *dioicum*; densiusculo-cespitosum, *basi compactum*, *superne laxe cohaerens*, *pluries proliferum*, *rosaceo-foliosum*, *innovationibus crassiusculis ovoideo-comosis dense foliosis binis praeditum*, *rigidum erectum subhumile*; folia dense imbricata e basi oblonga saepe constricta ovato-acuminata, nervo crasso viridi excedente crasso-cuspidata, margine medio folii reflexa, e cellulis densis viridibus plus minus pellucidis areolata, integerrima; perichaetia interna longius cuspidata e basi latiuscula perfecte lanceolata, intima multo minora lata planiuscula subito acuminato-cuspidata crenulata excurrentinervia; theca in pedunculo stricto breviusculo pallescente gracili subapophysata, operculo convexo-conico minimo; peristomium *Brachymenii*.

Brachymenium Mexicanum Mont. Ann. d. sc. nat. 1838. IX. p. 54. — *Br. erectum* Hook. in Kunth. Syn. Pl. Aeq. p. 58? et in Brid. l. p. 626. theca cylindracea elongata suberecta ut in *Br. elongato*.

Patria. Ad terram in prov. Oaxaca regni Mexicani: Andrieux. *Br. erectum* leg. Humboldt et Bonpland in locis excelsis apricis temperatis pr. Arjo r. Mexicani, alt. 1000 hexapod.

Ex habitu caulium prolificantium *Campylop. pudico* haud dissimile.

11. Br. Canariense Schwägr. (Suppl. III. I. 1. tab. 204.); *dioicum*; laxe cespitosum veluti prolifero-ramosum; folia inferiora remota, superiora in rosulam densam siccitate gemmiformem congesta, erecto-patentia haud tortilia rigida, ovato-acuminata lata, margine revoluta, apice dentata, nervo in mucronem rigidiusculum producto, intense viridia concava, e cellulis densis firmis statu emolliendi mollioribus composita; theca obconico-pyriformis in pedunculo superne arcuato pendula fusca, operculo convexo breviter apiculato pulcherrime aurantiaco vel purpureo nitido.

Brid. I. p. 672. — *Br. Billardierii* Bryol. Europ. I. c. p. 58. t. 26. et De Notaris. Syllab. Musc. p. 131.

β. flaccidum; caulis coma foliosa minus densa sed flaccida, folia e basi longius oblonga parum torta, inferne veluti marginata. *Br. subtorquatum* Hsch. in hb. Kunzeano.

Patria. In gramineis arenosis insulae Teneriffae: Rudley detexit. Prope Pirano Istriae et in monte Santo Sardiniae: Fr. Müller; Romae ad Colossaeum: Friedrichsthal. Prom. h. spei: Ecklon, Mundt copiose legerunt. Var. *β.* pariter loc. iisdem ad Groodvaterbosch: Ecklon. *Septbr. Octbr.*

A *Bryo capillari* proximo notis cursive impressis diversissimum; a *Br. Billardierii* foliis stricte mucronatis rigidis et thecae forma distat.

12. Br. Billardierii Schwägr. (Suppl. I. II. p. 115. t. 76.); caulis mediocris bifidus; folia inferiora remota, superiora in rosulam congesta concava carinata patula oblonga oblique cuspidata absque margine notabili (igitur ex auct. immarginata), siccitate undulata et paulum complicata, apice dentata, amoene viridia, nervo crasso ferrugineo in mucronem producto; theca in pedunculo fusco-brunneo apice ad horizontem curvato oblonga incurva et per curvaturam pendula, ore vix contracta fusco-brunnea, operculo plano-converso mucronulato concolori. $\frac{1}{4}$.

Brid. I. p. 667.

Patria. In Novo Belgio: La Billardiere.

A *Br. capillari* proximo notis designatis differt.

13. Br. campylothecium Tayl. (Lond. journ. of bot. 1846. p. 52.); caulis cespitosus erectus ramosus, basi tomentosus, apice incrassatus, folia in rosulam aggregata erecto-patentia, siccitate adpressa atque paululum torta, oblongo-ovata acutiuscula *marginata*, apice serrulata, *nervo in mucronem elongatum excurrente*; theca ex apophysi angustiore ovato-cylindracea incurva, operculo conico mammillato. †.

Patria. Nova Hollandia ad fl. Swan River: J. Drummond.

Differt a *Br. Billardieri* Schw. foliis magis concavis longius acuminatis et latius areolatis.

14. Br. leptothecium Tayl. (Phytologist. 1844. No. 41. p. 1094.); laxe cespitosum erectum e basi perichaetii innovationibus paucis ramosum, inferne subnudum, superne dense foliosum, *humiditate stellatum*; folia obovata *oblique cuspidata marginata* dentata sicca torta, madefacta recurvata *et stellato-posita*; theca in pedunculo apice curvato *lineari-oblonga curvata*, operculo conico acuminulato. †.

Patria. Norfolk insula: Allan Cunningham. Nova Seelandia: Menzies 1814.

Br. Billardieri differt: foliis immarginatis atque theca pendula oblonga. A *Br. campylothecio* nervo foliorum breviter excedente et theca e basi tenui curvata sensim incrassata distat.

15. Br. truncorum Brid. (Mant. Musc. p. 119.); *dioicum*; apice innovationibus paucis brevibus stellato-foliosis ramosum; folia caulina e basi breviter oblonga lato-ovalia acuminata, nervo tenui excurrente purpurascente longe et acute cuspidata, *e basi usque ad apicem cellulis angustissimis latissime marginata*, apice simpliciter argute sed tenui-serrulata, *e cellulis minutiusculis sed angustis* utriculo primordiali plus minus plicato et conspicuo praeditis composita; perichaetia perfecte lanceolata, nervo basi crassissimo apicem versus crasso fusco excurrente longissime cuspidata concava marginata,

remote denticulata, longius et angustius areolata; theca solitaria longipedunculata elongato - cylindrica inclinata, operculo conico acuto brevi.

Mnium giganteum Schwägr. Sp. Musc. p. 28. ex parte. — *Bryum Polla truncorum* Brid. l. p. 699. — *Br. roseum* β. *Domingense* Brid. l. p. 698!

Patria. Insula Bourbonis in sylvis editioribus ad pedem truncorum muscosorum: Bory St. Vincent.

Species notis distinctissima.

16. Br. Ehrenbergianum C. Müll.; *dioicum*; laxe cespitosum elatum ascendens, apice innovationibus compluribus ramosum robustum; caulis crassus usque ad apicem tomentosus, foliis torquescentibus dense foliosus; folia caulina e basi breviter oblonga latiusculo - acuminata, apice undulato, nervo flavo decurrente et ultra apicem breviter excurrente cuspidata, inferne margine revoluta, anguste et flavo-marginata, superne remote et flavo-dentata, e cellulis submagnis, utriculo primordiali parietis instar evoluti praeditis, viridibus composita; perichaetia longiora angustiora pellucidiora apice madefacta magis torta; theca longipedunculata humiditate inclinato - pendula e collo breviusculo elongato - cylindrica subincurva fuscidula, operculo conico acuto brevi atro - purpureo; perist. *Bryi*.

Patria. Mexico: C. Ehrenberg.

Ex habitu speciminibus majoribus *Bryi torquescentis* haud dissimile sed multo robustius et altius.

17. Br. Neelgheriense Mont. (in litt.); *dioicum*; laxe cespitosum elatum plus minus erectum, apice innovationibus compluribus ramosum robustum; caulis crassus usque ad apicem tomentosus, foliis subtorquescentibus densiuscule apice subrosulato - foliosus; folia caulina e basi breviter oblonga latiusculo - acuminata, apice reflexo, nervo inferne purpurascente apice purpureo decurrente et ultra apicem longiusculo - excurrente cuspidata, inferne margine revoluta, latiusculo - et purpureo-marginata, superne purpureo - et arguto-serrata, e cellulis submagnis,

utriculo primordiali parietis instar evoluto *serpentino-flexuoso* praeditis, *subpallidis* composita; perichaetialia angustiora longiora pellucidiora stricta longe cuspidata; theca in pedunculo elongato flexuoso gracili pendula, e collo breviusculo elongato – cylindrica fuscidula; perist. *Bryi*.

Patria. In montibus Neelgheriensibus: Perrottet.

Br. Ehrenbergiano ex habitu simillimum, sed notis cursive impressis distinctissimum.

Obscuriora.

18. **Br. andicola** Hook. (Kunth, Synops. Pl. Aeq. p. 58.); caule breviusculo; foliis patentibus obovato-oblongis, marginatis apiculatis, apice serratis, nervo excurrente; theca cylindracea cernua. $\frac{1}{4}$.

Brid. I. p. 667.

Patria. In frigidis Toluccae et Islahuacae, alt. 1330 hexapod., regni Mexicani.

Habitus *Bryi capillaris*, sed caules longiores, folia ad apicem evidentissime serrata, non pilifera. — *Br. Ehrenbergiano* affine?

2. *Folia patula laxa imbricata. Plantae longiscentes plus minus mnioidae.*

19. **Br. pallens** Sw. (Musc. Suec. p. 47 et 98. t. 4. f. 12.); *dioicum*; laxe cespitosum, inferne valde radiculosum, ramis gracilibus plus minus elongatis erectis, foliis remotis paucifariis rufescentibus, erecto patentibus *decurrentibus* ovato-acuminatis, nervo crasso purpurascente mucronatis, semper anguste marginatis, apice denticulatis, margine basi subrevolutis, e cellulis majusculis utriculo primordiali valde conspicuo praeditis viridibus mollibus compositis; folia perichaetialia longius cuspidata longiora angustiora subflexuosa, interiora minora evanidinervia; theca in pedunculo elongato purpureo obovato-vel clavato-pyriformis longicolla incurva, nutans vel pendula ore haud vel vix constricta; pallida, operculo conico breviter acuminato laevi nitente, dein fusco-brunnea laevis nitens; perist. *Bryi*.

Bryol. Europ. l. c. p. 68. t. 33. — Brid. l. p. 642. quod hb. ex parte! — *Br. turbinatum* Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 122. ex parte. — *Hypnum pallens* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 286. — *Br. speciosum* Voit. Sturm. Fl. Germ. Crypt. Fasc. 14. theca aequali subclavata ore angustiore. Br. Eur. l. c. p. 69. et Brid. l. p. 666. — *Br. elegans* Grev. Trans. of Linn. Soc. XV. p. 344. t. 3. f. 5. ? — *Br. obscurum* Sendtn. in sched., *Ptychostomum cernuum* Hüb. Musc. Germ. p. 493; e spec. *Sendtnerianis* peristomio, ut videtur, obsoleto. — *Br. attenuatum* Brid. l. p. 638. e Sudetis huc pertinet.

Patria. In locis paludosis saepe una cum *Br. turbinato* associatum per totam fere Europam e planitiibus usque ad alpes ascendens. — *Aestate.*

Bryo turbinato, quocum saepe commutatum, simillimum, sed thecae serius maturae forma distat.

20. **Br. bimum** Schreb. (Spic. Fl. Lips. p. 83?); *hermaphroditum*; *laxe et late cespitosum humile vel elongatum*, innovationibus erectis plus minus dense foliosis ramosum; folia decurrentia patentia ovato-lanceolata majuscula carinata, nervo crasso flavo flexuoso purpureo-decurrente excedente mucronato-cuspidata, *marginē e basi usque ad apicem subdenticulatum revoluta submarginata*, e cellulis densis viridi-pellucidis subparvis amoene arcolata; perichaetia intima angustiora magis revoluta longius acuminata haud cuspidata; theca in pedunculo elongato crassiusculo purpureo apice arcuato pallidiori pendula ovato-pyriformis plus minus elongata, pallida dein fusca, operculo majusculo conico brevissime acuto laevi subnitido; perist. *Bryi*.

Bryolog. Europ. Fasc. 6 — 9. p. 50. tab. 21. — *Br. pseudotriquetrum* Brid. et al. ex parte. — *Webera affinis* Bruch in Brid. l. p. 848. — *Bryum hybridum* Bruch in schedulis. — *Pohlia paradoxa* Hüb. Musc. Germ. p. 479. e spec. hb. Göppertiani huc pertinet.

Patria. In locis humidis prime turfosis ad terram et rupes totius Europae atque Americae septentrionalis. — *Ad finem veris et aestate.*

A *Br. pseudotriquetro* inflorescentia hermaphrodita, innovationibus gracilioribus et cespitibus laxioribus differt. In locis siccioribus plantae valde humiles et magis cesp-

tosae et *Bryo pallescenti* similiores reperiuntur. Flores exacte feminei interdum, sed steriles, occurrunt. Peristomii dentes interni latissimi densissime trabeculati et maxime hiantes subrugulosi ciliis 3 — 4 longissimis robustis appendiculatis interjectis.

21. Br. pseudotriquetrum Hdw. (Sp. Musc. p. 190.); *dioicum; densiusculo-cespitosum elongatum*, habitu et foliis *Bryo bimo* perfecte simile; folia perigonialia lato-oralia subito longiusculo-acuminata revoluta, interiora evanidinervia vix revoluta; theca *Bryi bimi* semper elongato-pyriformis; perist. *Bryi*.

Br. Europ. l. c. p. 54. tab. 24. — Brid. l. p. 676. partim huc, partim ad *Bryum bimum* pertinet. — *Mnium pseudotriquetrum* Hdw. Musc. Fr. III. p. 19. tab. 7. ex parte. — *Br. ventricosum* Dicks. Fasc. I. 4. et mult. al. — *Br. cubitale* Dicks. Fasc. II. t. 5. et Brid. l. p. 677 ex parte. — *Br. subobliquum* Lindgr. Bot. Notis. 1842. p. 118. — Cognitionem *Bryi bimi* et *pseudotriquetri* auctores plurimi quam maxime confusam fecerunt adeo, ut synonyma vix recte intelligi possint. In herbario e. gr. *Brideliano* sub nomine *Br. pseudotriquetri*, *Br. bimum*, *Schleicheri*, *uliginosum*, *alpinum* quin etiam *Mnium* horum et alia *Brya* reperiuntur. — Synonymia autem *Schwägricheni* in Sp. Musc. sub *Br. ventricosum* p. 54 data maxime dubia est.

Patria. In locis humidis praeprime turfosis cum *Br. bimo* per totam Europam atque Americam septentrionalem usque ad alpes ascendens. — *Vere, aestate.*

Br. bimo locis uliginosis enato proximum.

22. Br. Neodamense Itzigsohn (in Regensb. Fl. 1841. I. p. 360.); *dioicum; dense cespitosum et tomentosum subelongatum; caulis ruber inferne nudiusculus, apice dense foliosus; folia inferiora minora orbicularia, seu oblonga rotundato-obtusissima, apice involuto, alveato-concava, nervo crasso tenuiter usque ad apicem evanescente intense purpureo, e cellulis minutis quadrato-rhomboideis apice minoribus pellucidis areolata, margine involutaceo, late et flavo-marginata, superiora majora amoene lutescentia, suprema in comam veluti truncatam congesta, e basi haud decurrente sed ventricoso-inflata brevissima oblonga breviter acuta margine basi revoluta, e cellulis*

parvis firmis viridescentibus subchlorophyllosis omnino rhomboideis areolata; perichaetialia seniora pellucide reticulata, intima immarginata minora lanceolata acuta; omnia integra; theca in pedunculo elongato pendula oblongo-pyriformis angusta fusca; peristomium *Bryi*.

Patria. Prope Neodamum Neomarchiae Germaniae septentrionalis: Dr. Itzigsohn detexit, in turfosis.

Ex habitu *Br. pseudotriquetro* vel *bimo* affine, notis autem laudatis distinctissimum. Pulcherrima species et observationibus bryologorum dignissima. — Peristomii interni dentes in membrana alta subpallida angusti valde compressi, ciliis solitariis basi fissis tenuissimis parce appendiculatis interjectis.

23. *Br. turbinatum* Hdw. (Schwägr. Suppl. I. II. p. 110.); *dioicum*; inferne compactum, superne ramis gracilibus plus minus elongatis cespitem laxiusculum formantibus; folia *subdecurrentia* remotiuscula ovato-acuminata, concava, basi margine subrevoluta, integerrima vel apicem versus denticulata, nervo crasso flexuoso flavo breviter cuspidata, e cellulis majusculis utriculo primordiali valde conspicuo praeditis viridibus mollibus composita; perichaetialia magis acuminata; theca in pedunculo stricto purpureo apice tenuissimo *perfecte pendula crasse ventricoso-pyriformis ore valde constricta pallida*, operculo conico mammilla aurantiaca praedito subconcolori lutescente nitente, dein aperta fusca vel purpurea; perist. *Bryi*.

Bryol. Europ. l. c. p. 65. t. 32. — Brid. I. p. 681. — *Bryum palustre complicatum rubens*, capsulis turbinatis pendulis. Dill. Musc. p. 406. t. 51. f. 74. — *Mnium turbinatum* Hdw. Sp. Musc. p. 191. — *Hypnum turbinatum* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 282. — *Br. nigricans* Dicks. Fasc. IV. Pl. Cr. p. 15. tab. 11. f. 10. et Brid. I. p. 682. ex Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 122. — *Mnium nigricans* Brid. Musc. Rec. II. III. p. 90.

β. praelongum; laxe cespitosum, caule ramisque elongatis basi radicantibus, ramulis innovationibus similibus, e coma nascentibus, foliis remotis teneris pallide viridibus, theca majuscula ventricosa. Br. Eur. l. c. — *Br. Schlei-*

cheri β . *tenerius* Schwägr. Suppl. I. II. p. 113. — *Br. glaciale* Schl. ex parte; ibid.

γ . *latifolium*; procerum, cespites ingentes nitidos efficiens; caule elongato, fructifero declinato, innovationibus ramulisque erectis basi radicanibus robustis, foliis majoribus late ovato-acuminatis valde concavis subimbriatis solidioribus nitidis conspicuo-marginatis, nervo in acumen breve producto; pedunculo basi geniculato, theca magna. Br. Eur. I. c. p. 66. — *Br. Schleicheri* Schwägr. Suppl. I. II. p. 113. tab. 73. — Brid. I. p. 683. ex parte. — *Mnium latifolium* Schleich. mst. — *Bryum Polla latifolia* Brid. I. p. 710.

Patria. Ad saxa et terram humidam in locis paludosis e planitiibus usque ad nives alpium ascendens per totam Europam haud vulgare occurrit. In monte Sinai: W. Schimper. In Himalayae monte Kamoun: Jacquemont. Var. β . in subalpinis et alpinis, ubi ad scaturigines atque nives aeternos cespites longe et late extensos efficit sed rarius fructificat. Var. γ . ad fontes frigidos et rivulos alpium editiorum Tirolis, Helvetiae, Scandinaviae et Pyrenaeorum.

Planta mascula femineae intermixta vel gregarie crescens gracilior, flore gemmiformi foliisque lato-ovalibus breviter acuminatis evanidinervibus. — Species polymorpha et formis majoribus β . et γ . speciosissima, thecae forma primo intuitu discernibilis.

24. Br. Duvalii Voit. (Sturm Deutschl. Fl. Crypt. Fasc. 12.); *dioicum*; laxe cespitosum, *maxime elongatum*, *gracillimum* remotifolium; folia ovato-acuminata, *maxime decurrentia*, *nervo ante apicem evanido*, tenuissime marginata, ut in *Bryo turbinato* arcolata, emollita cyanescentia; perichaetia intima minora lanceolata; theca longipedunculata, forma *Bryi turbinati* sed minore; perist. *Bryi*.

Bryolog. Europ. I. c. p. 64. t. 31. — Brid. I. p. 679. — *Mnium Duvalii* Schwägr. Suppl. I. II. p. 126. tab. 179. — *Br. ventricosum* var. Schwägr. Sp. Musc. p. 54.

Patria. In locis humidis, pratis uliginosis prope Ratisbonam, ubi primus legit Duval; in Carinthiae alpe

Pasterze: Funk in hb. Brid. in Silesia, Franconia, Thuringia, Sylva nigra, Vogesis, Norvegia, Finlandia et in Terre Neuve. E rarioribus! — *In depressis ineunte aestate, in montosis Augusto, Septembri.* Raro fructificat.

Planta mascula femineae similis, flore gemmaceo. — *Bryo turbinato* simile quidem, sed caule foliis decurrentibus alato ab eodem ceterisque congeneribus maxime differt. Specimina Carinthiaca multo minora densius foliosa, apicem versus crescentia.

25. Br. gracilescens C. Müll.; *dioicum; elongatum gracillimum* laxe cespitosum apice innovationibus gracillimis ramosum *valde remotifolium*, caule purpureo substricto; folia caulina oblongo-lanceolata acuminata longiuscula subangusta medio paullo latiora, nervo inferne purpureo superne flavo et tenui-excurrente brevi-cuspidata, *e basi usque ad apicem flavo-marginata et dentibus flavis inaequalibus e medio argute serrata carinato-subconcaeva*, e cellulis angustis plus minus pellucidis parvis amoene areolata; perichaetialia interna multo minora angustiora lanceolata immarginata longe cuspidata; theca in pedunculo longissimo purpureo erecto elongato-cylindrica curviuscula horizontalis humida nutans pallide fusca, operculo conico acuto brevi brunneo nitido; perist. *Bryi.*

Mnium schistoneuron Kze. in Pl. Pöppig Chil. No. 234.

β. densifolium; humilius igitur densifolium subtomentosum. *Bryum Polla densifolia* Brid. I. p. 855. e spec. — *Br. Auberti* Schwägr. Sp. Musc. p. 54, planta fertilis e spec. et Suppl. II. II. 2. tab. 195.

γ. decumbens; caule decumbente ascendente gracili; caeterum formae typicae simillimum. *Br. Auberti* Hsch. Fl. Bras. p. 45. t. 2. f. 1.

Patria. Peru, Auchero: Pöppig 1829. Var. *β.* in Andibus: Humboldt; in Brasiliae sylvis umbrosis ad Rio de Janeiro et Serra dos Orgãos: Beyrich. Var. *γ.* pr. Rio de Janeiro: Hagendorf.

Planta mascula femineae simillima, flore masculo discoido. Folia perigonialia externa e basi lata subplicata acuminata caulinis similia, interna multo minora lato-ova-

lia vaginantia teneriora integerrima immarginata nervo excurrente breviter cuspidata. Antheridia magna numerosa, paraphysibus longis cuspidatis cincta. Archegonia magna longe apiculata. — E distinctissimis et *Br. erythrocaulo* proximum.

26. *Br. erythrocaulon* Brid. (Mant. Musc. p. 119.); cespitosum *subhumile* subsimplex subgracile; caulis erectus purpureus strictus remotifolius; folia *subspathulato-acuminata medio latiora complicato-concava*, nervo decurrente *crassiore* excedente cuspidata, e basi usque ad apicem *latius sed subindistincte flavo-marginata*, margine *revoluta et remote denticulata*, basi *multo laxius areolata*.

Mnium erythrocaulon Schwägr. Suppl. I. II. p. 127. tab. 80. — *Bryum Polla erythrocaula* Brid. I. p. 711.

Patria. Insula Franciae: Commerson.

Br. gracilescenti proximum, sed notis cursive impressis distinctissimum.

27. *Br. Auberti* Brid. (Mant. Musc. p. 119.); elatum gracile subsimplex caule flexuoso purpurascente remotifolio; folia e basi *oblonga lato-acuminata* medio latiora, nervo tenuiter excurrente, e medio *argute inaequaliter serrata*, immarginata, inferne *revoluta*, superne *subconvoluta*, basi *laxe* et parallelogrammo-areolata, superne e cellulis perfecte rhomboideis utriculo primordiali valde evoluto elliptico attenuato praeditis composita.

Br. Polla Auberti Brid. I. p. 711. — *Mnium Auberti* Schwägr. Suppl. I. II. p. 132. t. 80.

Patria. Insula Franciae: Aubert Du Petit Thouars.

Br. erythrocaulo prime *gracilescenti* proximum sed notis designatis facillime distinguitur.

28. *Br. nivale* C. Müll.; *hermaphroditum*, laxo cespitosum; cespites magni; caulis elongatus ascendens innovans, inferior foliis nigrescentibus, superior foliis flavescentibus, purpureus; folia caulis inferioris senioris *lato-lanceolata acuta firma*, nervo *crasso* excurrente, margine cellulis nonnullis angustioribus submarginatis, sub-

convoluta; folia caulis superioris seu innovationis *multo latiora plana*, inferiora *obtusissima firmiora*, superiora *acuta membranacea*, apice caulis convolutacea; omnia laxe areolata, nervo crasso plerumque excurrente basi purpureo apicem versus flavescente; perichaetialia longiusculo - cuspidata; omnia apice interdum subdentikulata.

Patria. Chile australis in rivulis niveis in jugis Andium inter montem ignivomum Antuco et la Sierra velada. Muscus omnium altissime in Andibus crescens: Pöppig, 16. Febr. 1829. Hb. Kunzeanum.

Br. turbinato var. *Schleicheri* proximum, sed inflorescentia hermaphrodita et foliorum forma sat differt. Antheridia et Archegonia magna paraphysibus robustis coloratis mixta. Seta elongata tenuis. Caetera desunt. Species pulcherrima.

29. *Br. rigidum* C. Müll.; *dioicum*; erectum breve simplex innovans, inferne remote, superne dense foliosum, comam laxam formans; folia erecto-patentia, inferiora minora latiora, superiora oblongo-lanceolata canaliculata marginata serrato-dentata, nigro-viridia in innovationibus juvenilibus amoene viridia, nervo rufo excurrente, e cellulis parvis et angustis areolata; perichaetialia in rosulam parvam congesta patentia oblonga, interiora minora lanceolata argute serrata, intima minuta tenera ovato-acuminata concava obtuse serrulata subdiaphana, omnia nervo valido excurrente, e cellulis subquadratis reticulata; theca in pedunculo solitario erecto apice incurvo purpurascens superne flavescente nitido pendula, oblongo-cylindrica brunnea laevis, operculo convexo brevissime apiculato purpureo. †.

Mnium rigidum Hsch. in Fl. Bras. Fasc. I. p. 46.

Patria. Monte Video Brasiliae: Sellow.

Peristomii dentes externi apice hyalino bifidi, interni in membrana lutescente pertusi, ciliis brevioribus interpositis. Cui affine? *Br. gracilescens*?

3. *Folia dense imbricata. Plantae humiles innovationibus tantum gracilescentes.*

a. *Peristomium Acidodontii.*

30. Br. megalocarpum Hook. (in Kunth. Syn. Pl. Aeq. p. 59.); *dioicum*; caulis elongatus inferne tomentosus innovationibus ramosus; folia patentia — erecta ovata integerrima, e nervo excurrente pilifera laxius areolata; theca longe pedunculata ovata horizontalis longicolla clavata majuscula, operculo alte convexo apiculato.

Acidodontium Kunthii Schw. II. II. p. 152. t. 196. — *Megalangium Kunthii* Brid. II. p. 29. in ic. sub *Macrothecio*; tab. Supp. III.

Patria. In crepidinibus Andium, inter Tulcam et Quito, ubi Humboldt et Bonpland densissime cespitosum legerunt.

Icones dentium externorum a *Bridelio* recte latere lamellosae, a *Schwägrichenio* false clamellosae, interni peristomii a *Bridelio* et *Schwägrichenio* ex parte rectae delineatae sunt. Primus cilia interposita recte cognovit, sed dentes male depinxit; secundus dentes recte delineavit, sed cilia interposita praetervidit. Peristomium a *Bryis* ceteris typice non refugit. — Flos masc. terminalis gemmaceus, foliis oblongis breve acuminatis evanidinnervibus, intimis enervibus.

31. Br. seminerve C. Müll.; *dioicum*; longius, dense cespitosum; folia erecta ovato-lanceolata acuminata subintegra seminervia; pedunculus elongatus apice decurvus; theca pyriformi-clavata horizontalis, operculo hemisphaerico, peristomio albido. †.

Acidodontium seminerve Hook. et Wils. Lond. Journ. of bot. 1846. p. 451. t. 16. J.

Patria. In sylvis Andium, ubi in monte Pichincha fructu immaturo legit Prof. W. Jameson.

Folia nitenti-viridia subpilifera siccitate non crispata.

32. Br. Taylori C. Müll.; caulis cespitosus erectus subramosus; folia laxè imbricata erecto-patentia, siccitate torta, ovato-oblonga longius apiculata, apice serru-

lata marginata, nervo percurrente; pedunculus elongatus apice decurvus; theca *ex angusta basi subrotunda*, operculo conico *brevi*. †.

Acidodontium subrotundum Hook. et Wils. Lond. Journ. of bot. 1846. p. 451. tab. 16. H. — *Brachymen. subrotundum* Tayl. l. c. p. 56.

Patria. In monte Pichincha Andium pr. Quito: W. Jameson, 1826. Febr.

Ex ic. Cl. Wilsoni *Acidodontium* verum, ex habitu praecedenti simillimum, notis autem distinctissimum.

b. *Peristomium Brachymenii.*

33. Br. Montagneanum C. Müll.; *dioicum*; dense cespitosum ascendens robustum, ramis brevibus erectis dense foliosis acutis, folia ramorum *e basi ovali perfecte lanceolata majuscula robusta*, nervo *crassissimo rubro excedente crasso-cuspidata*, margine revoluta, apice inaequalia subdenticulata, lurido-viridia, perichaetia caulinis similia apice aequalia; theca in pedunculo elongato purpurascente ascendente pyriformis *crasso-clavata longicolla ochracea nitida pendula*, operculo hemisphaerico mammillato.

Brachymenium pendulum Mont. Ann. d. sc. nat. Tom. XVI. 1841. p. 254.

Patria. In terra nuda ad imos arborum truncos sylvarum humidarum prope Dodabett Indiae orientalis Neelgheriensis: Perrottet.

Perist. dentes externi ultra medium trabeculati fusci, apice cellulosi, cellulis moniliformi-articulatis pellucidis; membrana interna lutea in cilia obsoleta vel irregularia divisa. — *Br. alpino* maxime simile, sed e peristomio jam distans.

34. Br. Abyssinicum Br. et Sch. (Musc. Abyss. Schimp. II. No. 434.); *hermaphroditum*; dense cespitosum humile apice comoso-densiusculo-foliosum; folia e basi oblonga ovata latiuscula minutiuscule et densiusculo-areolata, nervo tenui excedente brevi-cuspidata, latiusculo-marginata, apice exacte denticulata caviuscula; pe-

richaetialia angustiora; theca *cylindrico-pyriformis*, aperta nutans angusta *longicolla*, operculo umbonato-apiculato.

Br. (Brachymenium) Abyssinicum Br. et Sch. l. c.

Patria. In Abyssiniae monte alpestri Silke, ubi 20. Febr. 1840. legit W. Schimper.

Dentes peristomii externi longi cuspidati tenues valde trabeculati laeves, humiditate usque ad thecae membranam reflexi; membrana interna alta in dentes breves luteos vel apice hyalino-membranaceos producta.

35. Br. flexifolium Br. et Sch. (Musc. Abyss. Schimp. II.); *dioicum*; densiusculo-cespitosum robustum humile laxe foliosum; folia e basi oblonga lato-ovalia concava *siccitate torquescentia*, *marginē hic illic revoluta*, *plus minus lato-marginata*, basi purpurascentia, apice denticulata, nervo excurrente purpurascente breviter cuspidata, apice minute et dense basi laxius areolata, inferiora apice flexuosa angustiora; perichaetialia intima multo minora angustiora ovato-lanceolata immarginata nervo excurrente cuspidata tenera integra; theca e collo longiusculo pyriformis ore constricta, aperta nutans, operculo conico acuto brevissimo.

Br. (Brachymenium) flexifolium Br. et Sch. l. c.

Patria. Abyssinia: W. Schimper.

Dentes peristomii externi humiditate subreflexi et medio subgeniculato-inflexi angusti, dense trabeculati rubri; membrana interna subalta, dentibus obsoletis ciliis solitariis interdum interpositis.

c. *Peristomium Ptychostomi.*

36. Br. cernuum Br. et Sch. (Br. Europ. Bryum; p. 14. t. 1.); *hermaphroditum*; compacte cespitosum humile ramosum, ramis ascendentibus dense foliosis apice incrassatis; folia caulina patula lato-ovalia, nervo crasso plus minus flexuoso excedente longe cuspidata, margine revoluta, carinato-concava, integerrima vel apice denticulata; perichaetialia caulinis similia; theca in pedunculo crasso rigido *clavato-pyriformis crassiuscula*, *siccitate ore coarctata pendula*, operculo parvulo convexo acuto;

peristomii dentes externi *lati lanceolati*, interni *externis adglutinati subulati perforati rugulosi in membrana brevi firma positi, ciliis inermibus interpositis*.

Br. Europ. l. c. — Brid. l. p. 600. — *Cynontodium cernuum* Hdw. Sp. Musc. p. 58. t. 9. — *Cynodontium cernuum* Schw. Suppl. l. l. p. 110. — *Cynodon cernuus* Brid. Mant. Musc. p. 99. — *Didymodon cernuus* Sw. Musc. Suec. p. 28 et 83. tab. 1. f. 2. — *Swartzia cernua* Poir. — *Sw. radiculosa* Hedw. sen. non fil. e Schwägr. Sp. Musc. p. 77. sub nom. *Ptychostomi radiculosi* Brid. l. p. 838. — *Ptych. pendulum* Hsch. in Regensb. bot. Zeit. 1822. Syll. l. p. 64. et Brid. l. p. 837. ex ejus spec. auth. pariter huc revocandum est. — *Ptych. compactum* Hsch. l. c. p. 62. et Brid. l. p. 598.

Patria. Per omnes regiones totius fere Europae, societate *Bryi inclinati et cespiticii*, quibuscum saepe commutatum. — *Aestatis initio*.

A *Br. inclinato et cespiticio* primo intuitu theca, operculo conico acuto sensim acuminata distinguitur.

37. Br. Gayanum Mont. (in litt.); *hermaphroditum*; compacte cespitosum, elongatum gracile, innovationibus gracilibus erectis dense foliosis ramosum, luteo-viride; folia oblongo-acuminata, nervo flexuoso crasso ferrugineo basi purpurascente decurrente cuspidata, elongata, e basi usque fere ad apicem margine reflexa, e cellulis submagnis basi laxioribus superne utriculo primordiali tenerrimo flexuoso plus minus praeditis areolata, apice obsolete denticulata; floralia intima multo minora latiora ovata subito acuminato-cuspidata excurrentinervia crenulata; theca in pedunculo *stricto* apice paulum inclinato nutans vel pendula *minuta rix pyriformis ovalis pallida*, ore non constricta, operculo depresso apiculato aurantiaco; peristomii dentes *externi angustissimi subulati, interni in membrana fugacissima diaphana ciliiformes externis adglutinati fugacissimi*.

Patria. Chile: Gay.

Bryo lacustri et cernuo proximum, sed notis illustratis praecipue peristomio distinctissimum.

38. Br. Melvilleanum C. Müll.; folia ovato-lanceolata acuminata integerrima, theca sphaerico-obovata,

operculo hemisphaerico mutico, dentibus peristomii exterioris apice liberis basi mediante membrana cohaerentibus. †.

Ptychostomum pulchellum R. Br. App. ad It. Parrayan. p. 197. et in Brid. I. p. 601.

Patria. Insula Melville.

Cui affine?

d. *Peristomium Pohliae.*

α. Inflorescentia hermaphrodita.

39. Br. lacustre Bland. (in Brid. Musc. Rec. p. 121.); *gregarium vel laxe cespitosum* plus minus elongatum, inferne tomentosum, *gracile, basi remotifolium superne subcomosum, innovationibus brevibus gracillimis* ramosum, *amoene lutescens*, caule purpureo; folia inferiora ovato-acuminata, superiora ovato-lanceolata, *valde concava*, margine basi valde superne paulum revoluta, integerrima, *nervo plerumque in apicem brevem excurrente*, e cellulis subparvis densis *inanibus pellucidis* areolata; floralia intima multo minora longe cuspidata; theca in pedunculo elongato gracili flexuoso purpureo pendula *pyriformi-ovalis parva crassiuscula, firme membranacea, ore dilatata, fuscescens, operculo parvulo convexo apiculato.*

Br. Europ. I. c. p. 16. t. 2. — *Br. Webera lacustris* Brid. I. p. 637. — *Br. cernuum* Brid. I. p. 851. sub nom. *Pohliae cernuae* Bruch in hb. Bridel. — *Mnium lacustre* Bland. Musc. exs. Fasc. 3. n. 132. et in Sturm Fl. Germ. Crypt. Fasc. 10. — *Hypnum lacustre* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 285. — *Pohlia lacustris* Hüb. Musc. Germ. p. 483. non Bruch in Schwägr. Sp. Musc. p. 73. — *Br. cespitium* var. Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 121.

β. alpinum; foliis angustioribus, theca graciliore subhorizontali, peristomii interni processus angustiores, rarius pertusi. Br. Europ. I. c. p. 16.

Patria. In graminosis humidis arena suffusis prope Waren ad lac. Müritz dict. Sept. 1804. legit Blandow; locis similibus prope Bipontem: Bruch; in Anglia, Gothia atque Finlandia. Var. *β.* in alpe Salisburgensi Pasterze. — *Majo, Junio.*

Br. annotino ex habitu simile, notis autem illustratis facile discernibile. Dentes peristomii interni valde hiantes, ciliis vix rudimentariis interpositis.

40. **Br. inclinatum** Br. et Sch. (Br. Europ. l. c. p. 17. t. 3.); humile compacte cespitosum innovando ramosum; folia ovato-lanceolata, longe acuminata nervo crasso viridi cuspidata, toto margine revoluta, *immarginata*, integra e cellulis *leniter emollientibus* submagnis densis chlorophyllosis areolata; floralia intima multo minora; theca in pedunculo erecto elongato rigido brunneo pendula *ventricosopyriformis crassa regularis brevicolla fusca laevis, microstoma*, operculo minuto conico *apiculato*.

Pohlia inclinata Sw. Musc. Suec. p. 45 et 96. t. 5. f. 11. — *Cladodium inclinatum* Brid. l. p. 621. — *Bryum turbinatum* var. Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 122. — *Leskea inclinata* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 244 et sub *Hypn. intermedio* p. 482. — *Br. longisetum* Bland. in Brid. l. p. 673. et Schwägr. Suppl. l. II. p. 105. tab. 74.

Patria. In saxis humidis et terra umbrosa per totam Europam non rarum; e turfosis profundis planitierum in alpes editiores ascendit. — *Majo, Junio.*

A *Br. uliginoso* notis cursive impressis facile distinguitur, et habitu *Br. cespiticio* affine. — Peristomii dentes interni in membrana altiuscula angusti longiusculi externos aquantes rugulosi pertusi, ciliis plus minus rudimentariis interpositis. — Species e locis natalibus polymorpha, interdum quoque floribus dioicis.

41. **Br. arcticum** Br. et Sch. (Br. Eur. Fasc. XXXII. Suppl. p. 2. t. 2.); laxo cespitosum subhumile; folia inferiora remota late lanceolata, superiora plus minus conferta acuminato-ovalia vel lineali-lanceolata, *limbo e cellularum seriebus duabus angustarum formato ferrugineo marginata*, integra margine revoluta, nervo crasso ferrugineo plus minus excurrente *in cuspidem brevem hyalinam producta*, apice subdenticulata, e cellulis *laxis crassiusculis plerumque valde chlorophyllosis reticulata*; folia floralia intima multo minora ovato-acuminata subcrenulata evanidinervia densius areolata; theca in pedun-

culo *breviusculo* superne arcuato pendula elongato-pyriformis paullo incurva pallida mollis, operculo parvulo, e basi humidiuscula conico mammillato subaurantiaco, peristomio parvo apice ruguloso, interno dentibus *arcte adhaerente* ciliis abbreviatis.

Pohlia arctica R. Br. Suppl. App. ad iter Parrayan. p. 196. — *Hemisynapsium arcticum* Brid. l. p. 606. — *Br. nutans* var. Drumm. Musc. Amer. No. 263 B.

Patria. Locis humidis ad terram et in rupium fissuris regionis alpinae et subalpinae: in summo jugo inter alpes nivasas Faulhorn et Wildgerst Helvetiae et in Norvegiae alpe Dovrefjeld: W. P. Schimper; in Gestricia prope Gevaliam ad mare Bothnicum: Thedenius; in Jurasim, Chasseron: Lesquereux; Manhard in alpib. Julicis: Sendtner. In America boreali: Drummond. — *Julio.*

Ex habitu speciminibus *Bryi uliginosi* minoribus simile sed ab eo atque *Br. purpurascens* notis illustratis diversissimum.

42. *Br. purpurascens* Br. et Sch. (Br. Europ. Fasc. Suppl. XXXII. p. 2. tab. 3.); cespitosum; folia caulina decurrentia ovato-acuminata concava remotiuscula, apicem versus in comam laxiusculam congesta, comalia majora longius acuminata subcarinata, margine reflexa, perichaetialia lanceolata, omnia mollia purpurascens, reticulo tenui rhombo-hexagono, anguste marginata integerrima, nervo in mucronem brevem producto; theca longipedunculata nutans vel pendula elongato-pyriformis aequalis brunnescens, operculo majori convexo apiculato siccitate dilatato.

Pohlia purpurascens R. Br. Suppl. App. ad iter Parrayan. p. 197. — *Pohlia arctica* β . *purpurascens* Schw. Sp. Musc. p. 74. — *Hemisynapsium arcticum* β . *purpurascens* Brid. l. p. 606.

Patria. In Norvegiae alpe Dovrefjeld, ubi praecipue prope Fogstuen in arena secus rivulum sub *Salice Lapponum* copiosissime legit W. P. Schimper 1844. et sec. Cl. Ångström in Gothia atque Finlandia pr. Uleåborg. In Groenlandia et Labradore.

Br. arctico proximum sed differt: plantis late cespitosis gracillimis saepe valde ramosis, foliis purpurascensibus mollioribus angustius marginatis et brevius acuminatis, theca symmetrica firmiore operculo atque peristomio majori.

43. Br. Archangelicum Br. et Sch. (Br. Europ. Fasc. XXXII. p. 1. t. 1.); *hermaphroditum vel dioicum*; dense cespitosum; caulis brevis tomentosus *fragilis*; folia *longe acuminata concavo-carinata, margine plana vel hic illic reflexa*, solo apice denticulata; nervo in aristam viridem dentatam excurrente, hexagono-rhombeo-areolata; theca longiusculo pedunculata *obovata vel oblonga*, operculo parvo, annulo lato, peristomio brevi pallido, dentibus 15-articulatis. †.

Patria. Ad mare album prope Kipinä ditionis Archangelicae: Ångström. — *Aestate.*

Flores hermaphroditi fertiles graciles, masculi incrassato-gemmiformes, foliis perigonalibus internis ovato-acuminatis evanidinervibus. — A *Br. purpurascens* proximo differt: cespitibus densioribus tomentosis, foliis longius mucronatis haud purpurascensibus, inflorescentia polygama, theca brevior et peristomio multo minore; ex habitu modoque crescendi *Br. cernuo* haud dissimile.

β. Inflorescentia monoica.

44. Br. uliginosum Br. et Sch. (Br. Europ. l. c. p. 18. t. 4.); dense cespitosum humile, innovationibus brevibus ramosum, robustum dense et comoso-foliosum; folia caulina elongata, ovali-lanceolata longe acuminata, e cellulis angustis elongatis concoloribus latiusculo-marginata, e basi usque fere ad apicem margine revoluta subintegerrima, nervo excurrente crasso sordide viridi longe cuspidata, e cellulis submagnis chlorophyllosis viridibus firmis areolata, perichaetia intima et perigonia multa minora immarginata tenuinervia; theca in pedunculo elongato stricto rigido purpureo *arcuato-inclinato-pendula subclavato-pyriformis irregularis*, pallida dein fusca nitida, collo subarcuato, ore dilatato, operculo co-

nico parvo mammillari; dentibus internis valde compressis latiusculis rugulosis externos aequantibus, ciliis rudimentariis interpositis.

Br. Europ. l. c. p. 18. t. 4. — *Pohlia uliginosa* Bruch in sched. — *Cladodium uliginosum* Brid. l. p. 841. — *Br. cespiticiu*m syn. Schw. Sp. Musc. p. 60 !!! — *Br. turbinatum* v. *pallens* Drumm. Musc. Americ. No. 267.

Patria. In turfosis ad Rhenum prope Karlsruhe sociis *Br. inclinato*, *Amblyod. dealbato* et *Bartram. Marchica*: Cl. Braun detexit. In pratis humidis pr. Argentinam: Kneiff. In Neomarchia pr. Neodamum: Itzigsohn. Gothia et Suecia Scandinaviae. In Angliae nonnullis locis observatum. E Terre Neuve retulit *La Pylaie*. In Rocky Mountains: Drummond.

Ex habitu *Br. intermedi*i et *inclinati*; a primo autem theca et peristomio, a secundo thecae forma facile distinguitur.

45. **Br. Warneum** Bland. (in Brid. l. p. 675.); laxe cespitosum erectum innovatione ramulis plerumque apice flagelliferis, seu elongatis foliosis teretibus divisum, folia caulis fertilis ovato-lanceolata acuminata, nervo crasso purpurascente excedente cuspidata; margine paullum revoluta (veluti marginata), e basi ad apicem e cellulis laxiusculis summo apice obsolete denticulato densis angustis areolata; f. innovationum flagelliformium minora tenuiora evanidinervia; theca in pedunculo rigido longo stricto pendula ventricoso-pyriformis brevis microstoma interdum longicolla, operculo conico mammillari, atque peristomio longo.

Bryol. Europ. l. c. p. 20. t. 5. — Brid. l. p. 675. — *Pohlia Varrenensis* Schw. Suppl. III. l. 2. tab. 236. — *Bryum cespiticiu*m β . *Warneum* Schwägr. Suppl. l. II. p. 109. — *Hypnum cespiticiu*m Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 285. ex parte. — *Br. flagellare* Brid. Mant. Musc. p. 118. — *Pohlia cirrhifera* De Not. Mant. Musc. No. 9.; forma compacta valde et pulcherrime purpureo-cirrhifera, foliis densius et minutius areolatis longius cuspidatis, caeterum a musco Megapolitano haud recedit.

Patria. In udis limosis fluminumque ripis Megapolitanae ditionis Sept. 1704. detexit Blandow prope Wa-

ren. In arena humida inter gramina prope Neodamum Neomarchiae Borussiae Sept. 1842. legit Itzigsohn. In spongiosis ad nives deliquescentes montis Sempronii Italiam versus: mense Aug. 1834 lg. De Notaris. In Gothia et in Lapponia.

Dentes perist. ext. longi lato-lanceolati subulati fusciduli; interni membrana dentibus adhaerens, in processus angustos parce pertusos producta, ciliis plus minus imperfectis instructa. Flos masc. gemmaceus. — *Br. lacustris* Brid. ex habitu proximum, notis datis autem diversum.

46. Bryum leptophyllum Br. et Sch. (in Musc. Abyss. II. No. 451 et 460.); laxe cespitosum humile et laxe foliosum; folia caulina *siccitate torta* latiusculo-oblonga, *nervo excedente basi crasso apicem versus tenui flexuoso longe et flare cuspidata, majusculo-areolata, tenuissime marginata flexuosa* integerrima; perichaetialia pellucidiora maxime areolata; theca pro plantulae brevitate longipedunculata clavato-pyriformis crassa longicolla, siccitate aperta ochracea collo inclinante subnutans.

Patria. Abyssinia in prov. Schoata, 15. Juli 1838 c. fruct. mat. ad truncos arbor. lgt. W. Schimper.

Flos masc. in feminei vicinitate gemmaceus, foliis perig. caulinis similibus sed minoribus magis ovalibus immarginatis evanidinervibus, antheridiis paucis et paraphysibus vix ullis. Peristomii dentes externi latiusculi densissime trabeculati, apice albidi; interni apice secedentes subrugulosi albidi.

47. Br. Brownii Br. et Sch. (Br. Europ. Fasc. XXXII. Suppl. p. 3. tab. 4.); dense cespitosum gracile ramis compluribus elongatis gracilibus ramosum; folia innovationum subdecurrentia ovali-acuminta nervo excedente cuspidata, apice denticulata, margine revoluta, *emollita aëruginea*, inferiora obtusiora, *e cellulis majusculis utriculo primordiali valde conspicuo repletis* raro flavidis inanibus composita; perichaetialia omnibus partibus robustiora subinnata, intima angusta longiora lanceolata longius acuminata; theca in pedunculo longo gracili purpureo anguste pyri-

formis longicolla pendula regularis pallida dein fuscescens, operculo e basi subtumida alte convexo apiculato, peristomio magno, processibus angustis ciliis perfectis dentibus externis adhaerentibus binis conglutinatis subrugulosis.

Pohlia bryoides R. Br. App. ad it. Parrayan. p. 196. — *Hemisympsium bryoides* Brid. I. p. 605 et 840. Planta ex hb. Brideliano vera in Terre Neuve lecta.

Patria. Insula Melville: Sabine. Terre Neuve: La Pylaie. Norvegia in alpe Dovrefjeld prope Fogstuen et Jerkin sociis *Br. purpurascente* et *Ludwigii* var. *gracili* copiose legit W. P. Schimper 1844. Julio. In Labradore prope Okak vulgare.

Flores monoici in ejusdem innovationis apice approximati; flos masculus crassiusculus triphyllus, foliis laxe areolatis margine areolatis. — *Br. purpurascenti* proximum, notis autem laudatis diversum. Foliis cyanescentibus facillime cognoscitur.

γ. Inflorescentia dioica.

48. *Bryum rutilans* Brid. (I. p. 684. ex ej. hb.); dense cespitosum; caulis ramosus *quam maxime fragilis*; folia *rufo-aenea patula rigida orato-acuminata concava* firma minutiuscule sed dense areolata margine inferne valde revoluta, integerrima, veluti marginata, nervo crassissime purpureo in mucronem pallidiorem excurrente flexuoso; perichaetialia multo minora; theca longiusculo-pedunculata nutans clavato-pyriformis subincurva fusca mollis, collo angusto sporangium longitudine aequante, operculo parvo convexo-conico; peristomium *Bryi arctici*.

Br. aeneum Blytt in Br. Europ. Fasc. 32. Suppl. p. 4. tab. 5.

Patria. Ex insula Melville sterile lectum Bridelius descripsit; dein a Cl. Blytt in turfosis alpis Dovrefjeld Norvegiae inter Fogstuen et Jerkin raro legit. In Norvegia legit quoque Cl. Lessing ad Torfield (?) pulcherrime fructiferum. — *Aestate*.

Colore et nervo siccitate flexuoso crassissimo atque fragilitate caulium maxima primo adspectu facillime co-

gnoscutur. Species memorabilis. — In axillis foliorum fila articulata oriunda. Flos masc. ignotus.

e. *Peristomium Weberae*.

49. **Br. subrotundum** Brid. (l. p. 687.); *monoicum*; humile cespitosum; caulis ramosissimus, innovationibus brevibus gemmiformibus; folia imbricata obovato-acuminata, superiora oblongo-lanceolata et lanceolata, omnia concava, nervo excedente mucronata et breviaristata, margine plana, solo apice obsolete serrulata; perichaetia- lia minora mollia valde concava, juniora laete viridia dein purpureo-fusca, nervo nigricante; theca pro plantulae exiguitate longipedunculata nutans vel pendula, e globoso pyriformis rarius oblongo-pyriformis, brunnea, operculo parvo e basi tumidiuscula depresso-conico intense aurantiaco.

Br. Europ. Fasc. XXXII. Suppl. p. 9. tab. 9. — *Br. pallescens* var. δ . *subrotundum* Br. et Sch. Fasc. VI—IX. p. 52. tab. 23. δ . — *Br. brunnescens* Schl. mst. — *Br. pohliaeforme* Brid. l. p. 687.

Patria. Ad terram humosam et in rupium fissuris alpium Tirolis et Helvetiae vix in arborum regionem descendit. — *Aestate.*

Flos masculus ut in *Bryo pallescente*. Peristomii dentes ad mediam longitudinem lineali-lanceolati, e rufo lutescentes, dehinc subulati pallide lutescentes, processus pallide lutescentes in carina valde hiantes, cilia *Weberae*.

50. **Br. macropelma** C. Müll.; *dioicum*; dense cespitosum tomentosum subhumile erectum densifolium, innovationibus gracilioribus longioribus sed tomentosis; folia erecto-patentia oblonge vel ovato-acuminata non decurrentia elongata nervo crasso flexuoso ferrugineo purpureo-decurrente longe flexuose et *acutissimo-cuspidata*, e cellulis angustissimis flavis e basi fere lato-marginata integerrima vel obsolete denticulata, basi e cellulis majusculis elongatis parallelogrammis apicem versus multo minoribus rhomboideis pellucidis formata; perichaetia- lia intima minima angustiora longius cuspidata margine in-

ferne revoluta; theca in pedunculo quam maxime elongato substricto *elongato-pyriformis apice paullo attenuata ore subconstricta pendula majuscula* pallida, operculo majusculo conico breviter acuto aurantiaco nitido.

Patria. Chile australis in Andibus de Antuco: Pöppig. Hb. Reg. Berol.

Flos masculus terminalis subdiscoideo-gemmiformis, folia perigonialia e forma perichaetialium intimorum, sed immarginata. Antheridia maxima numerosa paraphysibus longis cuspidatis flavis numerosis cincta. — Ex habitu *Br. gracilescens* var. *densifolio* simile sed foliis integerimis lato-marginatis latioribus longioribus et theca maxima pyriformi longissime elongata ab eo ceterisque congeneribus recedit. *Br. bimi* formis robustioribus ex habitu caulium atque thecae forma quoque simile, sed notis datis facile discernibile. Peristomium *Weberae* magnum, ciliis binis interjectis.

Obscuriora.

51. **Br. geniculatum** Brid. (l. p. 842.); caulis erectus innovando ramosus, ramis brevibus teretibus acutis, folia laxiuscula ovato-lanceolata concava brevissime mucronata subintegerrima, e lurido squalide viridia, suprema paulo lactius colorata; theca in pedunculo infra medium geniculato-flexuoso badio-purpureo superne pallidior pendula, oblongo-pyriformis, e rubello badia, operculo convexo-obtuso submammillato; perist. *Bryi cespiticii*. †.

Br. Webera geniculata Brid. l. c.

Patria. In Tirolis montibus Schleerngebirg: Funk.

Weberam lacustrem habitu et foliorum forma atque areolatione refert; at theca nullatenus ventricosopyriformis elongata ut in *Br. cespiticio*, a quo seta in medio flexo-geniculata et intense purpurea, operculum lutescens et folia concava integerrima abunde distinguunt. — In Hb. *Brideliano* non vidimus.

f. *Peristomium Bryi*.

α. Inflorescentia hermaphrodita.

52. Br. torquescens Br. et Sch. (Br. Europ. Fasc. VI—IX. p. 49. t. 20.); dense cespitosum apice ramosum subhumile, inferne tomentosum; folia inferiora ovato-lanceolata cuspidata, superiora ovata cuspidata, *integerrima vel subdenticulata*, margine reflexa, siccitate dextrorsum spiraliter incumbencia, angustissime marginata, nervo plus minus excedente; theca *elongato-cylindrica magna* inclinato—pendula fuscidula, operculo conico—apiculato *aurantiaco nitente*.

Patria. In muris antiquis propugnaculi Argentinensis; iisdem locis Monspeliae, in Anglia, Hispania, Sardinia, Istria, Dalmatia, prope Smyrnam, in prom. bon. spei vulgare, in insula Chiloë et Nova Hollandia. — *Junio*.

E theca *Br. obconico*, ex habitu et foliatione *Br. capillari* proximum sed inflorescentia jam differt.

53. Br. Philippianum C. Müll. (Linn. XVIII. p. 701.); compacte cespitosum; caulis breviusculus, innovationibus ramosus basi radiculosus s. tomentosus; folia *oblonga angusta*, longiusculo—cuspidata, *apice denticulata flexuosa s. undulata spiraliter incumbencia* caviuscula, *laxe areolata* pellucida nervo crasso excurrente; folia floralia *evanidinervia*; theca *longissime pedunculata oblongo-cylindrica longa pendula*, operculo conico *atro-purpureo nitente*; dentes externi longissimi lato—lanceolati in apicem filiformem pallidiorem rugulosum linea media exaratum producti, interni e membrana alta valde sulcato—plicata compressi latissimi et majusculo—hiantes, filiformes, ciliis 3 tenuissime filiformibus nodoso—appendiculatis interjectis.

Patria. Chile: Philippi.

Anthridia basi bulboso—celluloso—incrassata stipitata magna clavata creberrima; archegonia magna numerosa, paraphysibus numerosis cincta. — *Br. torquescenti* proximum, foliis autem semper denticulatis multo laxius areolatis minus torquescentibus vix marginatis distat.

54. **Br. intermedium** Brid. (Mant. Musc. p. 120.); humile cespitosum robustum et habitu *Bryi bimi* formae humilis sed *gracilius*; folia caulina ovato-lanceolata, nervo crasso excedente longe cuspidata, *immarginata* e basi usque ad apicem obsolete denticulatum vel integrum margine reflexa, *angustiora*; floralia intima perfecte lanceolata multo minora sed longissime cuspidata; theca in pedunculo elongato subrigido *inclinato-pendula clavato-pyriformis inaequalis longicolla*, ore aequali non constricto, brunnescens, operculo convexo-conico plus minus apiculato.

Bryol. Europ. l. c. p. 47. tab. 19. — *Br. Webera intermedia* Brid. l. p. 632. ex herb. ej. partim ad *Br. pseudotriquetrum* perti-
nens. — *Webera intermedia* Schwägr. Suppl. l. II. p. 67. t. 75. — *Br. pallescens* Schwägr. Sp. Musc. p. 61. — *Br. turbinatum* var. Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 122. — *Hypnum intermedium* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 283. — *Mnium intermedium* Ludw. Cent. Musc. l. n. 81. — *Pohlia intermedia* Brid. Musc. Rec. II. III. p. 144. t. 2. f. 12. sed false delineatum.

Patria. In rupibus, muris praecipuis arenariis et in arenosis humidis passim per Europam. — *Toto fere anno thecis maturis et immaturis.*

Peristomii minuti dentes interni angustissimi valde sulcati, ciliis 2—3 tenuibus strictis minute appendiculatis. — A *Br. bimo* thecae forma et peristomio longe distat.

55. **Br. cirrhatum** Hoppe et Hsch. (Regensb. bot. Zeit. 1819. p. 70.); dense cespitosum plus minus elatum ramosum, *ex apice arcte folioso ramulosum*; caulis erectus radiculoso-tomentosus; folia erecto-patentia ovato-et oblongo-lanceolata, ramulina latiora breviora, irregulariter carinata, margine integro e basi usque ad apicem valde revoluta, nervo crasso brunneo excedente cuspidata, *minute et pellucide areolata*, lamina folii in aristam denticulatam longe producta; theca breviusculo-pedunculata pendula obconica *exacte regularis*, *parva crassiuscula*, operculo magno hemisphaerico breviter conico aurantiaco.

Bryol. Europ. Fasc. 32. Suppl. p. 8. t. 11. — Brid. I. p. 672. — *Br. intermedium* β . *cirrhatum* Br. Europ. Fasc. 6 — 9. p. 47. — *Br. cespiticiu*m Schwägr. Sp. Musc. p. 59.

Patria. Locis humidis graminosis alpium Helvetiae, Germaniae et Scandinaviae: in Rhaetiae valle Engadin prope moles glaciales Bernina dictas una cum *Br. Ludwigii* et *nutante* longe lateque cespitans, in summo Radstadter Tauern: W. P. Schimper; in Norvegiae alpe Dovrefjeld: Kurr, W. P. Schimper; in rupibus faucis Lueg Tirolis: Hornschuch et Hoppe detexerunt. — *Aestate.*

Inter *Br. intermedium* et *bimum* medium tenens. A primo proximo theca brevi crassa haud clavato-ventricosa primo adspectu distat. Plantarum altitudo valde variat. Peristomii dentes interni angusti valde hiantes, ciliis binis tenuissimis valde appendiculatis.

56. ***Br. microstegium*** Br. et Sch. (Br. Eur. Fasc. XXXII. Suppl. p. 7. t. 8.); *humile* cespitulosum, innovationibus *perbrevis* gemmiformibus ramosum; folia subimbricata, inferiora ovato-acuminata, superiora cuspidata, summa oblongo-acuminata cuspidata, carinato-concava, margine plana limbo angusto; theca in pedunculo superne arcuato nutans oblonge et clavato-pyriformis, operculo minuto convexo conico apiculato, peristomio parvo. $\frac{1}{4}$.

Patria. In terra sicciore ad latera viae prope Kongs-vold in alpe Dovrefjeld Norvegiae: W. P. Schimper. — *Julio.*

Formis minoribus *Bryi pallescentis* simile, e theca *Br. polymorpha* var. *brachycarpo* seu *Br. subrotundo*, ex operculo parvo *Cladodiis* affine.

β . Inflorescentia monoica.

57. ***Br. pallescens*** Schwägr. (Suppl. I. II. p. 107. t. 75.); dense cespitosum plus minus compactum, inferne tomentosum ramosum subhumile; folia e basi rotundata ovato-lanceolata longe acuminata, nervo excedente cuspidata, subintegerrima, margine e basi usque ad apicem reflexa, e cellulis subinanibus subparvis viridibus basi

purpurascentibus composita; perichaetialia intima multo minora evanidinervia; omnia immarginata tenera; theca in pedunculo flexuoso plus minus elongato crassiusculo *horizontalis inclinata elongato-pyriformis sublongicolla ore vix constricta pallide ochracea dein fusca, operculo acute et longiusculo-acuminato concolori.*

Br. Europ. l. c. p. 51. t. 22. — Brid. l. p. 645. — *Br. rupin-colum* Schleich. — *Br. boreale* Schwägr. Suppl. l. II. p. 96. t. 69. — *Hypnum boreale* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 287. forma valde ramosa, foliis comalibus patulis, theca minore nutante vel suberecta Br. Europ. l. c. p. 52. et Brid. l. p. 643. — *Br. contextum* Hsch. in Regensb. bot. Zeit. 1819 l. p. 91. forma elongata compacta, theca crassa subventricosa vix nutante longipedunculata. Br. Europ. l. c. p. 52. et Brid. l. p. 646.

Patria. Ad rupes et muros in montanis atque alpinis totius Europae passim copiose. — *Majo, Junio, in alpibus Augusto et Septembri.*

Peristomii dentes interni in membrana pallida latiusculi valde hiantes remote trabeculati, ciliis subtenuibus appendiculatis binis interpositis. Flos masc. in ramulo proprio terminalis, foliis perigonalibus intimis obcordato-acuminatis. — A *Br. cespiticio* cespitibus pallescentibus haud sericeis et notis cursive impressis distinguitur.

58. **Br. Sauteri** Br. et Sch. (Br. Eur. Fasc. XXXII. Suppl. p. 10. t. 10.); cespitulosum valde ramosum; folia erecto-patentia ovato-acuminata oblongo-et elongato-lanceolata valde concava, margine plano integra, nervo crassiusculo in mucronem excedente, *alis tenuibus hyalinis*; perichaetialia angustiora tenuinervia; theca in pedunculo cygneo pendula gracilis leviter incurva solida sanguinea, operculo majusculo brevi-conico. †.

Patria. Ad terram humidam jugi Bormiensis prope Trafoi, ad ripas arenosas fl. Salzach pr. Mittersill et ad viam praeruptam inter Hof- et Bad-Gastein Salisburgiae inferioris: W. P. Schimper annis 1840 et 1843 legit. — *Julio.*

Planta pulchella, *Br. pallescenti* ex habitu caulium foliis diversis affinis, vel *erythrocarpo* e thecae forma et colore subsimilis.

γ. Inflorescentia dioica.

59. Br. capillare Hdw. (Sp. Musc. p. 182.); innovando ramosum subhumile dense cespitosum tomentosum; folia caulina plus minus patula, *superne in comam laxiusculam plus minus tortam congesta* viridissima, e basi elongate oblonga subspathulato-ovalia acuminata, *nervo tenui excedente raro evanido longissime capillaria, e basi usque ad apicem tenuiter marginata, apicem versus denticulata, siccitate torquescentia*; perichaetialia multo laxius areolata teneriora; theca in pedunculo longiusculo horizontalis, inclinata vel pendula, plus minus cylindrico-pyriformis vel ovalis, dein brunnea, operculo conico acuto.

Br. Europ. l. c. p. 60. tab. 28. — Brid. I. p. 665. — Bryum foliis latiusculis congestis, capsulis longis nutantibus. Dill. Musc. p. 398. t. 50. f. 67. — *Br. squalidum* Vill. Fl. Dauph. III. p. 889. t. 54. — *Mnium capillare* L. Syst. Veget. p. 947. — *Hypnum capillare* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 286. — *Br. insulare* De Not. Spic. p. 7. et Syllab. p. 128?

β. compactum; compacte cespitosum caule ramisque gracilescentibus, foliis obsolete marginatis. *Br. capillare* var. *Carinthiacum* Br. Europ. l. c. p. 61. et *Br. Ferchelii* Fk. in sched. ex parte.

γ. cochlearifolium; compactum crassum, habitu *Bryi Funkii*, foliis cochleariformibus grandius areolatis marginatis. *Br. Ferchelii* Fk. in Brid. I. p. 847. et var. *cochlearifolium* Br. Europ. l. c. et Brid. I. p. 666. — *Br. Funkii* var. *Ferchelii* Schwägr. Sp. Musc. p. 69. — *Br. elegans* Nees ab Es. in Brid. I. p. 849.

δ. Capense; ramis elongatis laxissimis, foliis remotissimis flaccidis viridissimis; thecis laevissimis. *Br. Capense* Hmp. in litt.

ε. Domingense; humile tomentosum, foliis breviter cuspidatis marginatis. *Br. Domingense* C. Müll. Linn. XVII. p. 594. — *Br. tomentosum* Brid. I. p. 618. — *Br. flaccidum* Brid. I. p. 667.

Patria. In locis humidis praecipue humosis atque lignis putrescentibus vel vetustis per totum fere orbem terrarum. Var. *β.* in alpibus Carinthiae. Var. *γ.* in al-

pibus Salisburgiac. Var. δ . in Promont. b. spei. Var. ϵ . in Hispaniola.

Flos masculus gemmaceus terminalis, foliis perigonialibus e basi concava late obovatis lanceolatis apiculatis nervosis, e medio paulo reclinata ita, ut flos subaper-tus sit.

60. Br. platyloma Schwägr. (Suppl. I. II. p. 116. t. 76.); habitus *Bryi capillaris*; folia caulina oblongo-ovata lata acuminata viridissima, *marginē crasse et flavo-limbata remote denticulata, nervo crasso flavo excedente crasso-mucronata*; perichaetia interna multo angustiora minora marginē valde revoluta; theca in pedunculo longiusculo purpurascente apice arcuato elongato-cylindrica ore coarctata fusca, operculo conico acuto concolori nitido.

Br. Europ. l. c. p. 59. tab. 26. — Brid. I. p. 668.

Patria. Insula Madera. Dalmatia: Pappafava. Italia: De Notaris, Rabenhorst. Sardinia: Fr. Müller. Sicilia. Corsica: Soleirol, Thomas. Algiria: W. Schimper. Insulae Canarienses: Webb.

A *Bryo capillari* foliis crassissime limbatis valde refugit.

61. Br. obconicum Hsch. (in Bryol. Europ. l. c. p. 59. t. 27.); humile cespitosum innovando ramosum; folia ovata, oblongo-ovata, acuminata, nervo excedente longe cuspidata submarginata, marginē non incrassato revolutorecurva subintegra, apice obsolete denticulata, concava, apicem versus carinata, erectiuscula, sicca vix tortilia, theca pendula longicolla clavata, operculo hemisphaerico papillato.

Patria. In rupibus et muris humidiusculis hic illic in valle rhenano; prope Bipontem ad rupes arenarias sociis *Br. inclinato* et *cespiticio*: Bruch. In Anglia prope Barnard Castle: Spruce. E rarioribus. — Junio.

Peristomium magnum, illi *Bryi bini* simillimum. — Plantarum habitus et magnitudo medium tenet inter *Br. capillare* et *cespiticium*, huic praeprimis coma florifera

gemmaeformi modoque innovandi persimile, theca autem longicolla elongata, plurimo tempore perfecte pendula, primo adspectu discernibile. A *Br. platylomate* foliis margine haud incrassatis, superne in comam subclausam confertis, theca longiore, collo sporangium fere aequante satis superque recedit.

62. *Br. creberrimum* Tayl. (Lond. journ. of bot. 1846. p. 54.); aggregato-cespitosum rufescens erectum ramosum; folia pallide olivacea, perichaetia pauca in rosulam coarctatam congesta ovata, innovationum *elongatarum* magis distantia lanceolata acuminata margine subreflexa flexuosa subintegerrima; omnia nervo in cuspidem excurrente; thecae in pedunculis elongatis flexuosis creberrimae nutantes *ex angusta rugosa apophysi cylindraceae*, operculo convexo mammillato. †.

Patria. Nova Hollandia ad flum. Swan River: J. Drummond.

A *Br. obconico*, cujus varietatem Cl. Wilson (l. c. p. 451.) putet, ex obs. auctoris innovationibus longioribus, foliis angustioribus et theca magis elongata differt.

Dioicum?

63. *Br. cavum* C. Müll. (bot. Zeit. 1845. p. 94.); densiusculo-cespitosum subhumile innovationibus paucis gracilibus erectis ramosum; folia innovationum *cymbiformi-currata concava anguste acuminata ovato-oblonga, marginibus reflexis flexuosis, integerrima*, amoene viridia, nervo ferrugineo crasso in cuspidem longam apice acutissimam hyalinam producta, *angustissime marginata*, siccitate torquescentia, humectata *imbricato-patentia, minutiuscula subquadrato-rhomboideo-areolata*; perichaetia longissime cuspidata; theca in pedunculo gracili plus minus longo flexuoso fusco obconica nutans parva fusca, operculo e basi tumida conico brevissimo concolori.

Bryum capillare? var. *cymbisolum* Hook. et Wils. Lond. Journ. of bot. 1844. p. 155.

Patria. Brasilia in muris antiquis prope Arrayas: Gardner No. 36. b. Martio 1840.

Inter *Br. obconicum* et *capillare* et notis designatis distinctissimum.

64. *Br. cespiticiu* L. (Sp. Pl. p. 1586.); dense cespitosum inferne radiculosum tomentosum innovans ramosum, *ditissime fructiferum*, ramis plus minus gracilibus intense viridibus vel lutescentibus magis minusve sericeis; folia *e basi rotundato-ovata* lato-ovalia acuminata, nervo crasso sordide viridi excedente *longe et acute cuspidata*, *immarginata* obsolete denticulata, e cellulis minutis chlorophyllo repletis vel inanibus viridibus composita, margine revoluta; theca in pedunculo *purpureo rigido substricto crassiusculo pendula*, e collo *brevissimo ovalis crassiuscula*, ore tumido pallidiore subconstricta, coriacea subbrunnea, operculo subdepresso conico purpureo.

Bryol. Europ. l. c. p. 70. tab. 34. — Brid. l. p. 669. et 850. — *Br. pendulum ovatum cespiticiu et pilosum*, seta bicolori. Dill. Musc. p. 396. t. 50. f. 66. — *Mnium cespiticiu* Brid. Musc. Rec. II. III. p. 96. — *Hypnum cespiticiu* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 283. — *Br. badiu* Bruch in Brid. l. p. 850. var. γ . *Bryi cespiticii*. — *Br. Kuntzii* Hoppe et Hsch. in Regensb. bot. Zeit. 1819. I. p. 90. — *Br. tectorum* De Not. in schedulis.

Patria. In muris, tectis vetustis, arborum truncis putrescentibus in siccis vel humidis per totam Europam vulgatissimum, montes autem editiores refugiens; in Asia minore, et in partibus diversis Africae occidentalis et meridionalis atque Americae septentrionalis et australis. — *Majo, Junio.*

Valde varians, e cespitibus autem densis sericeis viridibus vel lutescentibus, foliis capillaribus praeditis atque thecis creberrimis rigido-pedunculatis ovali-oblongis coriaceo-coloratis primo adspectu facile discernibile. — Peristomium ut in *Bryo bimo*. Planta mascula multo gracilior, ex annuis innovationibus ramificationes complures exhibens, cespitulos proprios efficiens vel femineis intermixta, inferne subnuda, apice capituliformis. Folia perigonia interna late subrotundato-ovalia, e cellularum serie unica elongatarum veluti marginata obsolete denti-

culata longe cuspidata, e reliquis caulinis similia. Anthridia numerosa, paraphysibus innumeris acutis cincta.

65. Br. australe Hmp. (Ic. Musc. tab. 26.); dense cespitosum; caulis erectus tomentosus superne parce ramosus; folia caulina inferne remota superne comam formantia *subovali-lanceolata stricta*, omnia nervo crasso excurrente cuspidata *quasi pungentia*, integerrima immarginata; theca in pedunculo *elongato gracili flexuoso* anguste ovato-cylindrica *ascendens horizontalis*, operculo conico mammillato obtuso; dentes magni robusti.

Patria. Nova Hollandia ad flumen Swan River dictum: Preiss.

Inter *Bryum pallescens* (var. *boreale*) et *Br. cespitium*. Ab ulteriori proximo differt: foliis angustioribus immarginatis integerrimis, nervo duplo crassiore cuspidatis, cellulis minoribus, pedunculo gracili elongato atque theca ascendente horizontali.

66. Br. alpinum Linn. (Mant. Musc. II. p. 309.); *pulvinato-cespitosum*, ramis apice attenuatis robustis *densissime foliosis*; folia innovationum *oblongo-acuminata* valde concava *erecto-appressa olivacea nitentia*, nervo crasso *purpureo mucronato-cuspidata*, margine valde revoluta, apice saepe subinaequalia *subdenticulata*, e cellulis *angustis densis homogeno-olivaceis composita*; perichaetialia fuscescentia, interiora multo angustiora; theca in pedunculo longiusculo purpureo gracili tenui basi geniculato-ascendente ovalis crassiuscula *subatro-purpurea*, ore purpureo, subrugulosa pendula, operculo e basi paullo tumida convexo-conico breviter acuto aurantiaco laevissimo-nitente.

Br. Europ. Fasc. VI—IX. p. 76. tab. 39. — Brid. I. p. 663. — Br. hypnoides pendulum sericeum, coma insigni atro-rubente. Dill. Musc. p. 394. t. 50. f. 64. — *Mnium alpinum* L. jun. Meth. Musc. p. 366.

Patria. In montanis, subalpinis et alpinis totius Europae, loca lapidosa humida praeferens. In insulis Canariensibus inventum esse Cl. Montagne indicavit. — *Aestate.*

Planta mascula femineae simillima perigonio clauso.

67. Br. Mühlenbeckii Br. et Sch. (Br. Europ. Fasc. XXXII. Suppl. p. 11. tab. 13.); ex habitu *Bryi alpini*; folia ramorum inferiora ovalia breviter et obtusiusculo-acuminata, evanidinervia, superiora magis acuminata ex-currentinervia sed semper obtusiuscula, omnia latiora; perichaetialia interiora magis acuminata laxius areolata; omnia integerrima fusco-olivacea haud nitentia; theca oblongo-pyriformis fusca pendula.

Patria. In saxis irroratis jugi montis St. Gotthard versus Airolo: Mühlenbeck 1839. Ex alpe Grimsel a W. P. Schimper lectum misit am. Hampe. — *Septbr.*

A *Br. alpino* differt: plantis fusco-olivaceis, foliis latioribus apice subincurvis, e cellulis majoribus formatis atque theca ferruginea.

Sectio III. Amblyophyllum. Plantae gregarie vel dense cespitosae Folia laxè imbricata, orbicularia usque ad apicem valde quin imo fere patelliformi-concava, e cellulis quadrato-rhomboideis laxis areolata, basi raro margine revoluta, superne plerumque involuta, abruptinervia, theca pendula plus minus pyriformis.

68. Br. latifolium Br. et Sch. (l. c. p. 19. t. 4.); monoicum; gregarium humile, foliis laxis siccitate tortis, parce ramosum et radiculosum; folia inferiora orbicularia, superiora late ovata majora, valde quin imo cochleariformia, e cellulis brevibus crassis obsolete rhomboideis subpellucidis composita, evanidinervia, margine inferne subplano-reflexiuscula superne subinvoluta; perichaetialia ovato-lanceolata; theca in pedunculo longo crasso stricto pendula obovalis brevicolla crassiuscula brevis, operculo minutissimo convexiusculo apiculato longe thecae adhaerens; peristomium *Pohliae* per longum tempus existens.

Pohlia latifolia Bruch in schedulis. — *Br. obtusifolium* Turn. in Musc. Hüb. p. 116. t. 11. f. 1. e Brid. I. p. 639?

Patria. In terra arenosa humida prope Bipontem ad Neuhäuseler-Weiher: Bruch. Nusquam alias repertum, igitur rarissimum. — *Majo.*

Flores masculi solitarii vel per paria ad perichaetii basin dispositi, foliis perigonalibus ovato-oblongis acu-

minatis ultra medium nervosis concavis; antheridiis minoribus. Peristomii dentes externi lineari-lanceolati ferruginei, apice pallidi siccitate incurvi, interni illos subaequant, e membrana altiore pallida angusti hiantes, ciliis imperfectis. — Pulcherrima species, ex areolatione foliorum *Br. cyclophyllum* simillima.

61. *Br. cyclophyllum* Br. et Sch. (Br. Europ. Fasc. VI—IX. p. 63. tab. 30.); *dioicum*; laxe cespitosum subhumile, basi et apice ramulosum tenerum remotifolium, pallide viride; folia caulina *lato-ovalia suborbicularia obtusissima integerrima, e serie cellularum simplici marginata, laxiusculo-areolata, nervo ante apicem abrupto*; perichaetia multa minora oblonga; theca in pedunculo caulium longitudine solitario ovato-pyriformis pendula parva pallida, sicca ore constricta, operculo parvo convexo mammillato subaurantiaco; perist. *Bryi*.

Mnium cyclophyllum Schwägr. Suppl. II. II. p. 160. tab. 194. — *Br. obtusifolium* Turn. Musc. Hib. p. 116. tab. 11. f. 1. et Brid. I. p. 639? In hb. *Brideliano* sub hocce nomine occurrit. — *Br. tortifolium* Brid. I. p. 844.

Patria. In limosis humidis, graminosis: in piscina exsiccata Franconiae prope Gefrees: Funk detexit; pr. Bipontem: Bruch; in turfosis prope dem Wildbade sylvae nigrae et pr. Reichenbach in valle Murgthal dicto: Al. Braun. E rarissimis et rarissime fructificans. — *Vere.*

Planta mascula e *Schwägricheni* observationibus feminea gracilior, flore discoideo, foliis perigonalibus quatuor ovato-acuminatis. In axillis foliorum fila articulata ramosa saepe observantur.

70. *Br. calophyllum* R. Br. (Suppl. App. ad It. Parayan. p. 196.); dense cespitosum intricatum elongatum erectum subsimplex laxifolium filiforme vel robustius; folia e basi subdecurrente ovalia inferiora valde obtusa, superiora vix vel brevissime acuta, juniora *marginem revoluta veluti marginata integerrima, seniora latiora marginem haud revoluta, e cellulis densis angustis flavis elongatis marginata*, apice parce et obsolete denticulata,

omnia nervo ante apicem abrupto flexuoso fuscescente praedita, e cellulis superne et inferne sublaxis crassiusculis rhomboideis basi parallelogrammis laxioribus fuscis inanibus areolata, *marginē undulato instructa*; theca in pedunculo elongato solitario sesquiunciali apice incurvo pendula *obovalis basi vix attenuata acutiuscula*, operculo concolori *hemisphaerico minute papillato*, perist. *Pohliae*.

Cladodium calophyllum Brid. I. p. 622. — *Pohlia calophylla* Schwägr. Sp. Musc. p. 75. — *Br. intricatum* Brid. I. p. 680.

Patria. Insula Melville.

Fructum non vidimus. — Peristomii dentes externi rufescentes superne pallidiores, interni in membrana alta leviter carinata imperforati, interstitiis subdenticulatis. — *Br. cyclophylo* proximum, notis autem laudatis facile distinguitur.

Sectio IV. **Areodictyon.** Plantae cespitosae humiles. Folia subdense imbricata ovalia valde concava, margine e cellulis pellucidis teneris plerumque basi purpurascentibus laxis rhomboideis areolata, nervo basi crasso evanescente purpurascente praedita, theca plus minus pyriformis et inclinata.

a. *Theca irregularis.*

71. **Br. Zierii** Dicks. (Pl. Crypt. Fasc. I. t. 4. f. 10.); *dioicum*; compactum subhumile *innovationibus fragilibus julaceis* compluribus ramosum; folia innovationum appressa, e basi oblonga brevi ovalia *cochleariformi-concava*, majusculae et pellucide areolata, nervo ante apicem acuminatum subrecurvum evanido; perichaetialia majora minus concava tenuiora; omnia integerrima; theca in pedunculo breviusculo purpurascente e collo longissimo gibboso pyriformis funaroideo – arcuata pallida dein fusca, operculo conico brevi acuto recto aurantiaco; dentes peristomii externi basi pulcherrime aurantiaci apice hyalini, interni subaurei liberi ciliis brevissimis interjectis, omnes fragiles cartilaginei; perist. *Pohliae* sequentis.

Br. Europ. I. c. p. 29. tab. 9. — Brid. I. p. 641. — *Pohlia Zierii* Schw. Sp. Musc. p. 76. — *Mnium Zierii* P. B. Prodr. p. 77. — *Hypnum Zierii* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 275.

Patria. In rupium fissuris humidis umbrosis totius Europae in subalpinis et alpinis Sudetorum, Franconiae, Helvetiae, Norvegiae, Sueciae, Lapponiae, Carpathorum et totius Britanniae, nusquam vulgare. — *Auctumno et ineunte hyeme.*

Ex habitu caulium *Bryo argenteo*, e theca *Bryo demisso* simile, notis autem discernentibus maxime speciosum. — Flos masc. gemmaceus.

72. Br. demissum Hook. (Musc. Exot. tab. 99.); *dioicum*; humillimum densiusculo-cespitosum innovationibus *brevissimis gemmiformibus* compluribus ramosum; folia innovationum appressa parva *valde concava* ovalia integerrima, nervo excedente crasso purpureo longiusculo-cuspidata; perichaetia lanceolata; omnia purpurascentia omnino fere e cellulis parallelogrammis crassiusculis laxis pellucidis areolata; theca asymmetrica, in pedunculo brevissimo demissa, subgibboso-pyriformis longicolla pallida dein fusca, ore oblique posito angusto operculoque conico parvo acuto; dentes externi breves basi aurantiaci apice hyalini, interni in membrana subaurantiaca longiores carinati apice irregulariter connati fragiles laeves hyalini, ciliis brevissimis interjectis.

Bryol. Europ. l. c. p. 31. tab. 9. — *Meesea demissa* Hopp. et Hsch. Regensb. bot. Zeit. 1819. p. 106. — Brid. II. p. 64. — *Pohlia demissa* Hüb. Muscol. Germ. p. 466. — *Bryum curvulum* Schl. mst. et *Timmiae* n. sp. Schmidt ex Hookeri Musc. Ex.

Patria. In summis alpibus, ubi ad terram et in rupium fissuris inter plantulas alpinas viget. In monte Cenisio supra 7000 ped. elevation. Cl. Hooker 1814 detexit et in monte Faulhorn. In alpibus Carinthiae (Pasterze), Tirolis, Scotiae et Norvegiae. Raro! — *Augusto, Septembri.*

E theca *Br. Zierii* similis quidem, e cujus forma autem asymmetrica et notis ceteris laudatis species solitaria. Foliorum areolatio basi *funarioidea*, sed apice *rhomboidea*, igitur *bryoidea*. — Flos masculus gemmaceus.

b. *Theca regularis.*

73. Br. paradoxum Schwägr. (Suppl. III. I. 1. tab. 224.); *monoicum*, flores masculi ad basin ramorum vel ad caulem axillares; caulis procumbens, ramis erectis simplicibus; folia superne densiora erectiuscula, ovato-acuminata marginata integerrima lurido-viridia, nervo crasso in cuspidem crassiusculam producto, basi e cellulis quadratis multis superne longioribus rhomboideis areolata; perichaetia lanceolato-acuminata; theca in pedunculo breviusculo arcuato-nutans elongate pyriformis curvula laevis badia, ore haud constricta, operculo convexo obtuse mucronato; perist. *Weberae*.

Patria. India orientalis, unde primus accepit Hooker.

Peristomii dentes externi lanceolati transversim sulcati ferruginei, interni in membrana lutescente lati valde hiantes, ciliis binis capillaribus inermibus interpositis. Folia perigonia ovata longe acuminata. E florum masculino situ et ramificatione ab omnibus congeneribus differre videtur, ex auctore (Sp. Musc. p. 59.) *Bryo capillari* proximum.

74. Br. compressidens C. Müll.; *dioicum*; dense cespitosum rufo-badium; caulis erectus apice curvatus innovando ramosus teres badius; folia ovato-oblonga, inferiora magis elongata, apice mucrone minimo praedita, integerrima limpida in consortio badia, dense imbricata, nervo apicem versus evanescente, e cellulis praegrandibus hexagonis areolata; theca in pedunculo apice curvato breviusculo ferrugineo inclinata subparva e collo breviusculo pyriformis, ore amplo, laevis ferrugineo-badia, operculo convexo mammillato concolori vel rufescente; peristomii *Pohliae* dentes externi superne albidi inferne lutei, interni in membrana brevi valde sulcata lutescente maxime compressi angustissimi. $\frac{1}{4}$.

Pohlia turbinata Schwägr. Suppl. II. II. 2. p. 150. t. 194.

Patria. Ad terram argillosam regni Nepal inter Marchantias.

Folia perigonialia fere enervia. — *Br. Warneo* e structura interna proximum.

75. *Br. splachnoides* C. Müll.; caulis elongatus inferne dense cespitosus subramosus *obtusus*; folia *dense imbricata appressa lato-ovalia*, *nervo rubro excurrente subacuta*, *concava integerrima* laxe reticulata pallida; theca erecta ovata *apophysata pyriformis crassa brevipedunculata*; perist. *Brachymeniü*. $\frac{1}{4}$.

Brachym. splachnoides Harv. in Hook, Ic. Pl. Rar. tab. 19. f. 2. et in Lond. Journ. of bot. 1840. II. p. 10.

Patria. Nepal: Wallich.

Peristomium hucusque imperfecte ab auctore observatum.

76. *Br. cellulare* Hook. (in Schwägr. Suppl. III. 1. 1. t. 214.); *dioicum*; laxe cespitosum aliquoties innovans humile; folia caulina *sublaxa patula*, suprema erecta oblonga acuta planiuscula integerrima pallide badia, solitarie lustrata limpida, nervo crasso ante apicem abrupto praedita, grosse areolata tenerrima; perichaetialia intima lanceolata; theca *in pedunculo longiusculo apice parum curvato suberecta tereti-pyriformis parva*, operculo convexo mucronato rufo-badio. $\frac{1}{4}$.

Patria. Nepal Indiae: Royle.

Sectio V. **Apalodictyon.** Plantae humiles dense imbricatae graciles. Folia stricta ovato-lanceolata, margine vix vel paulisper revoluta, carinato-concava, pellucide, minute et tenello-, interdum laxiusculo-areolata, nervo crasso plerumque flavo evanido, excurrente vel in aristam crassam flavam producta, theca pendula dolioformis vel plus minus oblonga vel pyriformis.

1. *Nervo evanido vel excurrente.*

a. *Peristomium Pohliae.*

77. *Br. platyphyllum* C. Müll.; *dioicum*; compactum humillimum inferne nudiusculum, superne densissime foliosum, crasso-comosum, innovationibus terminalibus tenuissimis brevissimis nonnullis ramosum; folia appressa, inferiora et innovationum *lato-ovalia concava obtusa*, brevissime acuminata, nervo crasso purpurascente ante api-

cem evanido, margine integerrimo revoluta, dense sed pellucido-areolata amoene viridia, superiora longiora oblonga subacuminata, perichaetialia sublanceolata; theca pro plantulae brevitate longipedunculata *clavato-pyriformis crassa collo longiusculo* praedita inclinata horizontalis purpureo-fusca, operculo longissime conico; *subhemisphaerico*.

Pohlia platyphylla Schwägr. Suppl. IV. tab. 324.

Patria. Chile in rupibus madidis ad Antuco 1828: Pöppig. Hb. Kunzean.

Dentes peristomii externi lato-lanceolati breves, interni apice albidi medio secedentes albidi laeves.

78. Br. Gilliesii Hook. (Bot. Misc. I. 1830. p. 3. tab. 2.); *dioicum?* cespitosum humile apice et infra apicem innovans rubicundum; folia subarcte imbricata erecta exacte ovata concava *obtusissima* integerrima mollia grosse reticulata pallide viridia, nervo valido usque ad apicem excurrente; theca breviter pedunculata inclinata vel nutans una cum apophysi subaequali pyriformis viridis dein luteo-fusca, operculo conico-hemisphaerico obtuso; peristomii dentes externi breviusculi aureo-fusci acuminati, membrana interna flava dentibus remotis erectis angustis strictis ciliis interpositis carentibus.

Pohlia Gilliesii Mont. in Voyage dans l'Amérique méridion. par d'Orbigny, VII. II. p. 93. et VII. p. 18.

Patria. In terra ad radic. mont. in Andibus prope Mendozam: Gillies detexit. Supra saxa in terra inundata prope flum. Rio Negro: d'Orbigny.

Br. platyphylo proximum, sed foliis obtusissimis multo minoribus et peristomio differt.

79. Br. clavatum Schimp. (Pohlia. Ann. des sc. nat. 2. VI. p. 148. t. 11.); *dioicum?* dense cespitosum; caulis erectus ramosus; folia erecto-patentia patulave ovato-lanceolata obtusiuscula subconcava integerrima, nervo sub apice evanescente; theca in pedunculo elongato recurvato inclinato-horizontalis *claviformis angusta*, operculo convexo papillato. †.

Patria. Chile ad scaturigines collium prov. Quillotae: Bertero.

Species pulchella, thecae forma atque toto habitu *Pohliis* simillima, peristomio autem interiori, cujus cilia, numerus et forma valde variabilia denticulis carent internis, ad *Bridelii Cladodia* accedit.

80. **Br. tenuicaule** Mont. (Ann. des sc. nat. 1845. 4. p. 104.); *dioicum?* caulis tenuis brevissimus innovando ramosus, innovationibus hypogyneis vel e ramis repetitoproliferis gracilibus basi subnudis apice comoso-foliosis; folia caulina ovata acuta concaviuscula margine subrecurva integerrima patentia, innovationum obtusa, nervo evanescente, pellucida, theca in pedunculo erecto horizontalis *pyriformis*, operculo convexo absque apiculo.

Patria. Chile prope Valparaiso: Gaudichaud.

A praecedente nobis haud viso distinctum?

81. **Br. orthodontioides** C. Müll.; *monoicum*; *humile compactum subjulaceum*, ramis brevibus; folia *appressa oblongo-ovalia* valde concava *obtusiuscula vel brevissime acuminata*, integerrima margine plana non reflexa, e cellulis subparvis utriculo primordiali tenerrimo serpentino-flexuoso praeditis pellucidis areolata, *nervo flavo ante apicem abrupto*; perichaetalia multo minora; theca in pedunculo brevi erectiuscula *obconica parva*, ore dilatata *pallida*, operculo breviter conico *majusculo fusco*; peristomii dentes externi *lineari-lanceolati integri pallidi tenerrimi linea longitudinali carentes*, interni in membrana *brevissima ciliiformes basi lati haud pertusi pallidi*, ciliis interjectis nullis.

Orthodontium julaceum Schwägr. Suppl. II. II. 2. p. 123. t. 188.

Patria. Brasilia.

Flos masculus ovatus, foliis oblongis acutis, nervo infra medium evanido praeditis et paraphysibus tenuissimis diaphanis. Ex habitu *Bryo megalacrio* affine, foliis autem obtusis evanidinervibus jam distinctissimum; *Br. clavato*, ut ex ic. elucet, e structura foliorum proximum.

82. Br. microcarpum C. Müll.; *dioicum*; humile gracile erectum infra apicem innovationibus aequalibus; folia inferiora dissita erecto-patentia ovata acuta, superiora in comam fastigiatam conferta imbricata lato-lanceolata acuminata canaliculata integerrima pallide viridia, *nervo excurrente*, ramea appressa lato-ovata obtusa concava *nervo crasso viridi in apiculum brevissimum excurrente*, *laxe areolata*; theca in pedunculo longiusculo erecto parum flexuoso curvato purpurascente pendula *parva pyriformis fusca*, operculo conico breviter apiculato. $\frac{1}{4}$.

Pohlia microcarpa Hsch. in Fl. Bras. Fasc. I. p. 38.

Patria. Prope Sebastianopolin Brasiliae ad terram nudam: **Merkel.** — *Augusto.*

Cui affine?

83. Br. ambiguum Dub. (Moritzi, Systemat. Verz. p. 132.); cespitosum minutum; caulis brevissimus innovando ramosus, innovationibus simplicissimis tenuibus foliosis brevibus; folia imbricata erecta lineari-lanceolata acuminata integerrima immarginata, nervo apicem attingente; perichaetia similia sed basi latiora et nervo magis excurrente; theca in pedunculo elongato tenui flexuoso horizontalis v. cernua pyriformis sicca sub ore constricta, operculo convexo conico absque apiculo. $\frac{1}{4}$.

Patria. Java, ad lapides in Tjapus.

Affine *Br. tenuicauli* Mont. An revera nova species, auctor ignorat. — Peristomii interni dentes plerumque lacunoso-perforati sine ciliis interjectis.

b. *Peristomium Weberae.*

84. Br. carneum L. (Sp. Pl. p. 1587.); *dioicum*; laxo cespitosum vel gregarium, erectum vel basi decumbens humile simplex apicem versus innovans; folia inferiora lanceolata, margine parum revoluta, omnia *anguste elongate sed laxiusculo-areolata pellucida*, apice serrulata evanidinervia; theca in pedunculo longiusculo flexuoso purpurascente vel flavesciente apice *arcuato incrassato carnosulo inclinato-nudans oralis parva crassa*, *aperta valde truncata ore saepe coarctata exannulata subsan-*

guinea, operculo hemisphaerico conico plus minus mammillato; peristomii dentes externi longi angusti lutescentes dein purpurei, interni in membrana alta *amoene flava* valde hiantes *serrati*, *ciliis binis* nodosis interjectis.

Br. Europ. I. c. p. 43. — Brid. I. p. 652. — *Br. delicatulum* Hdw. Musc. Frond. I. p. 52. t. 20. — *Br. pallidisetum* Brid. Mant. Musc. p. 117. — *Bryum compactum* Dicks. Fasc. IV. p. 15. t. 11. f. 11. et Brid. I. p. 686. — *Br. melanodon* Brid. I. p. 845. ex hb. Brid.! — *Br. couretatum* Schultz. Ephem. bot. Regensb. Syll. Pl. II. p. 91. e Schwägr. huc pertinet. — *Bryum lanceolatum* pellucidum, capsulis subrotundis, pedunculis carneis. Dill. Musc. p. 400. t. 50. f. 69. A—F. — *Mnium carneum* Linn. jun. Meth. Musc. ap. Ludw. p. 366. — *Mn. rubellum* P. B. Prodr. p. 76. et? *Br. rubellum* Brid. I. p. 650. e spec. pessimo hb. Bridel. a P. B. misso. — *Hypnum carneum* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 278.

Patria. In terra arenoso-argillacea humida sterili per totam Europam. — *Vere usque in aestatem.*

Planta mascula simplex, e ceteris *Br. pulchello* similis.

85. **Br. albicans** Wahlenb. (in Web. et Mohr ind. mus. cf. Fl. Lapp. p. 353. 1812.); *dioicum*; laxe cespitosum plus minus elongatum erectum vel declinato-erectum simplex vel apice innovans; folia lanceolata, superiora angustiora, *omnia subdecurrentia anguste et densiusculo-areolata pellucida* evanidinervia apice serrata; theca in pedunculo longo flexuoso purpurascente *tenui pendula breviter pyriformis exannulata* subsanguinea, operculo hemisphaerico-conico plus minus mammillato; peristomii dentes externi longi angusti lutescentes dein fusci, interni in membrana alta *pallida* valde hiantes *haud serrati*, *ciliis solitariis vel binis* nodosis tenuissimis interjectis.

Brid. I. p. 656. — *Mnium albicans* Wahlenb. Fl. Lapp. p. 353. — *Br. Wahlenbergii* Schwägr. Suppl. I. II. p. 92. t. 70. 1816. Br. Europ. I. c. p. 44. t. 17. — *Hypnum Wahlenbergii* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 280.

β. glaciale; elatum gracile robustum ramosissimum, longe pedunculatum, foliis laxius et grandius areolatis subglaucescentibus vel albescentibus majoribus latioribus.

Br. glaciale Schleich. in Brid. l. p. 852. — *Br. Europ.* l. c. p. 45. — *Mnium glaciale* Schleich. Cent. III. 41. — *Br. Schleicheri* Schw. Sp. Musc. p. 55. — Varietas *Bryo Schleicheri* analoga robusta alpina.

Patria. In terra arenosa humida plerumque inundata planitierum, montium atque alpium totius fere Europae et Americae septentrionalis. Insula Falklandi et Kerguelen: J. Hooker. E Nova Hollandia accepisse *Br. et Sch.* dicunt. — *In depressis Majo, in alpinis Augusto.*

Planta mascula gracilis inferne nuda, apice comosa innovans, flore crasse gemmaceo. Folia perigonialia externa e basi lata ventricoso-vaginante laxae areolata fusca lanceolata recurva serrulata evanidinervia densius areolata, interiora multo minora sed lato-ovalia apice tantum recurva omnino laxae areolata purpurascens integerrima. Antheridia numerosa paraphysibus elongatis purpurascens mixta. — *Bryo carneo* e formis minoribus, *Bryo Schleicheri* e formis majoribus simile, primo proximum, a quo foliis decurrentibus arctius areolatis, praesertim thecae forma differt.

c. *Peristomium Brachymenii.*

86. *Br. Meyenianum* C. Müll.; *dioicum*; dense cespitosum humillimum ramosum; folia latiusculo-ovalia concava parva subacuminata, integerrima pellucido-tenera, nervo tenui ante apicem evanido; perichaetia interna angustiora longiora acuminata, nervo purpureo; theca in pedunculo longiusculo tenui *clarata longicolla angustissima parva arcuata erecta*, operculo conico brevissimo.

Webera Meyeniana Hmp. Linn. XI. p. 278. — *Mielichhoferia Chilensis* ej. in Hb. Reg. Berol.

Patria. Chile: Meyen.

Perist. dentes externi e basi angusta remote trabeculata lutca brevi subito longe subulati laeves hyalini articulati; membrana interna tenerrima vix conspicua fugacissima plicata apice valde irregularis, quibus notis ab omnibus congeneribus differt. Ex habitu *Mielichhoferias* in memoriam redigens, peristomio externo *Orthodontiis* simile, interno autem ad *Brachymenium* pertinens.

d. *Peristomium Bryi.*

87. **Br. erythrocarpon** Schwägr. (Suppl. I. II. p. 100. t. 70.); *dioicum*; subgregarie cespitosum humile ramis plus minus elongatis; folia erecto-patentia vel patula lanceolata, nervo sordide viridi excedente breviter cuspidata integra vel obsolete denticulata, margine paulisper reflexa, minute anguste et dense areolata; theca oblongo-pyriformis brevicolla inclinato-pendula colorata coriacea fusca vel sanguinea, operculo conico acuto magno purpureo nitido.

Br. Europ. I. c. p. 72. t. 36. — Brid. I. p. 655. — *Br. sanguineum* Brid. I. p. 671. — *Br. radiculosum* Brid. I. p. 655. — *Br. Morisii* Bruch in Musc. Sardois Müllerianis.

Patria. In solo argillaceo vel arenario humidiusculo per totam Europam passim et in Africa, Asia et America meridionali. — *Junio, Julio.*

Pl. mascula femineae exacte similis vel gracilior, perigonio crassiusculo terminata gregaria vel femineae intermixta, foliis perigonalibus externis e basi lata anguste lanceolatis concavis, internis late obovatis cuspidatis. — In axillis foliorum corpuscula gemmiformia rotunda purpurascencia inveniuntur. — Peristomii dentes externi longissimi subulati apice pallidi fissiles, interni valde sulcati et hiantes, ciliis dentes aequantibus tenuissimis valde appendiculatis binis vel ternis.

88. **Br. marginatum** Br. et Sch. (Br. Europ. I. c. p. 74. tab. 38.); *dioicum*; dense pulvinato-cespitosum *rufo-viride auro-nitens*; caulis innovando ramosus; folia conferta erecto-patentia ovalia acuminata, comalia interna oblongo-elongata, omnia margine integerrima vel apicem versus obsolete serrulata, *limbo angusto rufescente circumducta*, nervo solido cum apice evanido; theca in pedunculo collum cygneum sistente pendula, clavato-oblonga longicolla purpurascens; peristomii interni processibus siccitate dentibus depressis.

Patria. In rupibus arenariis tam siccis quam irroratis: prope Bipontem late cespitosum sed rarissime fructificans detexit Bruch; pr. Andegaviam Galliae occidenta-

lis: Guépin et in ditione urbis Gallicae Bar-sur-Seine. E rarissimis! — *Junio*.

Pl. mascula gracilior, innovationibus ramosa, cespitulos propios efficiens. Folia perigonialia late ovalia brevi-acuminata, intima enervia teneriora; antheridia numerosa, paraphyses superantia. — *Br. erythrocarpo* proximum, differt autem cespitibus multo densioribus, foliis magis nitentibus apice rufo-brunneo-coloratis, omnino auro-nitentibus et theca in pedunculo cygneo-arcuato magis pendula.

89. Br. Blindii Br. et Sch. (Br. Europ. Fasc. XXXII. Suppl. p. 11. t. 12.); *dioicum*; laxè cespitosum vel gregarium, *laxè imbricatum* julaceum *gracile subfastigiato-ramosum*; folia caulina *ovali-oblonga cymbiformi-concava*, pellucide et longiusculo-rhomboideo-areolata tenera, nervo *flavo tenui ante apicem obtusiusculum cranido*, vix carinata, immarginata integerrima; perichaetialia longiora angustiora *sed obtusiuscula*, *marginè subinvoluta*, longius areolata; theca in pedunculo elongato stricto rigido sub thecae collo subito incurvo pendula, *globoso-pyriformis atro-sanguinea*, operculo *e basi maxime tumida igitur ora prominente instructo conico mammillato concolori nitido*.

Br. Funkii var. Br. et Sch. in Br. Europ. Monogr. Bryi p. 77.

Patria. In ascensu septentrionali Rhaetiae M. Bernardino: Blind 1839. detexit et in valle St. Nicolai pr. Bormio; ad ripas arenosas flum. Salzach prope Mittersill Pinzgoviae: Sauter, W. P. Schimper. — *Aestate*.

Br. Funkii e forma caulis proximum, sed notis cur-sive impressis diversissimum. E thecae forma ad *Br. atropurpureum*, *versicolor* praesertim *pachylthecam* accedens. — Inflorescentia *Bryi Funkii*. Planta pulcherrima.

90. Br. Tozzeri Grev. (Scot. Fl. V.); *dioicum*; *gregarium* humile simplex erectum; folia inferiora remota obovato-lanceolata, superiora late obovata apiculata, summa comam paucifoliam formantia majora latiora apiculata, *omnia integerrima*, nervo *rubello ultra medium*

evanido praedita, e cellulis elongato-octaëdriis laxis composita, pallide viridia dein rubella, *marginè limbo latiusculo haud incrassato rubello e cellulis angustis elongatis formato instructa* planiuscula vel hic illic reflexa; theca *ovali-pyriformis* brevipedunculata nutans *annulata*, aperta ore saepe constricta pallide fusca, operculo rufo convexo-conico breviusculo; peristomium *Br. carnei*, dentibus lutescentibus et processibus *marginè minus dentatis*. †.

Br. Europ. l. c. p. 41. tab. 16. — *Br. marginatum* Bruch in sched.

Patria. Ad terram argillosam secus rivulos: in Anglia ad flum. Dart, Devonshire: Tozzer detexit. Prope Torquay ex animadv. Ephemerid. Phytologist 1843. VIII. No. 22. p. 260. a Miss Cl. Griffiths lectum esse dictur, in Sardinia prope Sto. Angelo in solo arenaceo-argilloso: Fr. Müller. E rarissimis. — *Vere.*

A *Br. carneo* proximo notis laudatis distinctissimum.

91. ***Br. pachypoma*** Mont. (Ann. des sc. nat. 1845. 4. p. 104.); *dioicum*; late et densiusculo-cespitosum subhumile, *ramis elongatis flexuosis apice dense folioso incurvis flaccidis plumoso-foliosis lutescentibus nitidis*; folia oblongo-lanceolata angusta elongata integerrima, nervo excurrente tenui flexuoso breviter cuspidata, carinato-concava, basi e cellulis quadratis magnis rufescentibus superne elongatis angustis subpellucidis viridibus areolata; theca in pedunculo longiusculo flexuoso purpureo arcuato-nutans, primum obconica dein pyriformis, tenero-membranacea pallida, operculo majusculo *conico-hemisphaerico obtusissimo* aurantiaco praedita, dehinc fusca nitens.

Br. Lereilleanum Dz. et M. Musc. Archip. Ind. p. 16. tab. 8. caule fructifero breviusculo, innovationibus tenuibus rectis, operculo conico crasso. — *Br. plumosum* Dz. et M. l. c. p. 16. tab. 7. foliis apice obsolete denticulatis, quibus a praecedente forma differt.

Patria. Java in terra et, ut videtur haud rarum.

Pl. masc. femineae similis sed gracilior, flore minute gemmaceo terminali, antheridiis et paraphysibus paucis parvis, foliis perigonalibus internis quam maxime teneris diaphanis enervibus laxè areolatis ovalibus plus minus

acuminatis convolutis. Peristomii dentes interni valde hiantes ciliis valde appendiculatis interpositis. — *Br. erythrocarpo* proximum, notis autem laudatis diversissimum.

92. *Br. Sandii* Dz. et Molkb. (Musc. Archip. Ind. t. 10); *monoicum*; caulis brevis erectus ramosus; *rami erecti superne incrassati*; folia imbricata erecto-patula oblonge vel ovato-lanceolata, nervo crassiusculo sordide flavo excurrente brevissime cuspidata, integerrima apice obsolete denticulata, minute dense pellucide basi paulum grandius areolata, margine haud reflexa, paulisper concava; perichaetialia longiora flaccida longius acuminata, laxius areolata tenera; *theca pendula oblongo-cylindrica*, operculo *convexo apiculato*.

Patria. Java in monte Megamedong.

*Br. cespiticiu*m affine differt: inflorescentia dioica, foliis omnibus ex ovato-lanceolatis, eorundem areolatione et theca subpyriformi. *Br. pachypoma* proximum inflorescentia et toto habitu primo adspectu et notis cursive impressis distinguitur.

93. *Br. Crügeri* Hmp. (in litt.); *dioicum*; laxe cespitosum *humile rufescens* gracile, innovationibus *brevibus acutiusculis* laxifoliis ramosum; folia oblongo lanceolata angusta longiuscula acuta carinato-concava, nervo rufescente excurrente in mucronem brevissimum producta, margine integerrimo paulisper reflexa vel plana, e cellulis elongatis pellucidis utriculo primordiali tenuissimo praeditis areolata; theca in pedunculo elongato purpurascente pendula obconica pallida operculo aurantiaco majore *conico nitido praedito*, *dein inclinato-pyriformis* subparva; peristomii dentes interni breves ciliis binis tenuissimis appendiculatis interpositis.

Patria. Insula Trinitatis: Crüger. Surinam prope Paramáribó in locis apricis: Kegel, *Julio*. Coll. No. 503.

Br. pachypoma proximum, sed *Br. Crügeri* differt habitu multo humiliori graciliori, ramis strictis apice non comoso - secundis rufescentibus, foliis obtuse acutis et operculo conico-acuto.

94. Br. conicum Hsch. (Fl. Bras. I. p. 43.); caulis fertilis erectus brevissimus, ramis brevibus *julaceis* densissime foliosis fastigiato-ramosus; folia caulina vel perichaetialia *lato-lanceolata* cuspidata laxae areolata, intima tenera subhyalina; f. innovationum oblonga apiculata canaliculata carinata integerrima flavo-viridia, nervo crasso carinato ferrugineo in apiculum exeunte, e cellulis parallelogrammis minus laxis composita; theca in pedunculo semunciali erecto parum flexuoso vel curvato basi purpurascente apicem versus pallide luteo *horizontalis* parva *angusta oblongo-cylindrica* luteo-brunnea ore purpurea, operculo brevissimo *conico obtuso purpureo*. $\frac{1}{4}$.

Br. Funkii Br. Eur. l. c. p. 77. et Schwägr. Sp. Musc. p. 69. sub *patria* memoratum?

Patria. Brasilia ad latera rivorum prope Novo-Friburgum: Beyrich; *Decbr.*

A *Br. Funkii*, cui summopere affine, differt: statura humiliore, caule brevissimo fastigiato-ramoso, foliis appressis flavo-viridibus, perichaetialibus lato-lanceolatis, theca horizontali oblongo-cylindrica, operculo conico obtuso. De *Br. bulbilloso* affini excurs. in hanc speciem conferatur.

95. Br. bulbillosum Mont. (Ann. des sc. nat. II. XVI. p. 268.); *dioicum?* caulis fertilis brevissimus purpureus flaccidus dense tomentosus, innovationibus *julaceis* vel gracilescentibus subfastigiato-ramosus; *nonnulli ramuli et caulis fertilis ex axillis foliorum superiorum bulbillos confertos obovatos dein purpurascentes tenerrimos gerentes*; folia caulina remota, sensim conferta oblonga acuminata *concava* tenera viridia *integerrima* nervo cuspidata; folia innovationum dense imbricata *appressa* minus acuminata evanidinervia; omnia minute, pellucide, tenero-et elongato-areolata; perichaetialia interiora breviora triangularia; theca in pedunculo semunciali rubro flexuoso ovoidea *aequalis* nutans vel pendula basi subattenuata, sicca suburceolata rufo-brunnea, operculo *convexo brevissimo mammillato concolori*.

Patria. Brasilia, ad terram prope Rio Janeiro: Riedel.

Peristomii dentes externi subulati rufi, apice pallidi tenuissime punctulato-scabriusculi; interni ciliolis subbinis uncinatis interpositis. — *Bryo Ludwigii* proximum, sed differt foliis concavis integerrimis, theca regulari, operculo paulum longiore atque ciliis peristomii interni appendiculatis. — *Br. conico* Hsch. e descript. auctoris peraffine, sed bulbillis descriptis et theca ovoidea haud cylindrica differre videtur.

Peristomium non satis notum vel ignotum.

96. **Br. pungens** Tayl. (Lond. journ. of bot. 1846. p. 342.); laxe cespitosum erectum *gracile* subfastigiatum apice incrassatum; folia arcte imbricata erecta cordato-triangularia longius et tenuiter acuminata *integerrima* excurrentinervia; perichaetialia brevissima; theca *longiusculo-pedunculata lata elongate pyriformis subhorizontalis*; peristomii dentes interni ciliis solitariis interjectis. †.

Patria. In locis siccis montis Pichinchae prope Quito Andium: W. Jameson.

Ex obs. Cl. Wilsoni (l. c. p. 450.) sequentibus inter sese affinibus speciebus duabus proximum.

97. **Br. inaequale** Tayl. (l. c. p. 53.); subcespitosum *gracile humillimum* erectum subramosum olivaceum; folia madefacta in capitulum imbricata, erecta adpressa ovata acuminata *subserrulata*, basi margine reflexa, excurrentinervia; theca flexuose et breviusculo-pedunculata *cylindraceo-pyriformis subcernua*, operculo conico mammillato. ‡.

Patria. Nova Hollandia ad flumen Swan River: J. Drummond.

A *Br. Funckii* differt: foliis magis acuminatis densius imbricatis, nervo ad apicem tantum excurrente praeditis.

98. **Br. multicaule** Tayl. (l. c. p. 53.); cespitosum nitidum pallide virescens elongatum basi ramosum sursum

incrassatum; folia imbricata erecta apice patentia cordata acuminata serrulata, basi margine recurva, excurrentinervia; theca cylindraceo-pyriformis subnutans, operculo conico. †.

Patria. Nova Hollandia ad flumen Swan River: J. Drummond.

Ex habitu *Br. elongato* vel innovationibus gracilibus dense foliosis *Hypno* simile.

Præcedentes species tres huc retulimus, quum auctor *Br. inaequale Bryo Funkii* simile et Cl. Wilson omnes species inter sese affines nominaverint.

99. **Br. teretiusculum** Hook. (in Wallich Catal. n. 7597 et Harv. in Lond. Journ. of bot. 1840. II. p. 9; ic. in Hook. Ic. Pl. t. 20. f. 1.); laxe cespitosum humile erectum ramosum, folia erecto-patentia subconcava ovato-lanceolata stricta obtusiusculo-acuta integerrima, margine recurva, excurrentinervia; theca in pedunculo erecto substricto mediocri inclinata *crassiuscula subrotundato-orata, operculo minuto apiculato.* †.

Patria. Nepal.

Ex obs. *Harveyanis Br. turbinato* proximum, sed thecae forma distinctum.

2. *Nervo in aristam producto.*

100. **Br. imbricatum** Br. et Sch. (Br. Europ. l. c. p. 29. t. 5.); *dioicum*; humile compactum ramosum, ramis sterilibus subulaceis, floriferis comosis; folia imbricata ovato-acuminata concava integerrima, margine recurva, nervo sordide viridi *excedente mucronata*, e cellulis submagnis polygono-rhomboides pellucidis areolata sordide viridia; theca in pedunculo erecto superne arcuato horizontalis vel pendula *elongato-pyriformis* fusca, collo *aequali vel breviori*, operculo e basi *convexa acute conico*; peristomium minutum, dentes externi angusti subulati, interni in membrana dimidio breviori angusti vix hiantes externis breviores parce serrulati, ciliis rudimentariis vel nullis interpositis.

Pohlia imbricata Schwägr. Suppl. I. II. p. 71. t. 64. — *Br. marginatum* Brid. I. p. 849. e spec. hb. Brid. foliis non marginatis sed perfecte revolutis.

Patria. In alpinis Helvetiae: Schleicher. Carinthia in Windischmattreyer Tauern et in der Leiter ut in Gastonia: Hoppe et Hornschuch? E rarissimis. — *Aestate.*

Ex habitu *Br. marginato* Bruch simillimum sed foliis nervo excurrente mucronatis vel pungentibus atque peristomio *Pohliae* differt.

a. *Peristomium Weberae.*

101. **Br. dichotomum** Hdw. (Sp. Muscor. p. 183. t. 42.); *dioicum*, erectum subelongatum gracile, *dichotome ramosum ramis elongatis gracilibus*; folia arcte imbricata subdecurrentia, e basi igitur cordata ovato-acuminata integerrima, nervo subdecurrente flavo excedente flavo-pungentia, inferiora involutaceo-, superiora latius concava, basi utrinque e cellulis multis quadratis crassiusculis latiusculis superne angustis minutis flavo-viridibus arcolata; theca in pedunculo longiusculo flexuoso apice arcuato subgloboso-ovalis pendula, dein purpurascens, operculo hemisphaerico conico; peristomii dentes externi latiusculi fusci apice subulato pallidi subrugulosi linea tenuissima hyalina exarati, interni integri vix hiantes e basi latiuscula subulati pallidi subrugulosi, ciliis solitariis sed linea longitudinali obsoleta exaratis tenuibus interpositis.

Brid. I. p. 646. — *Mnium dichotomum* P. B. Prodr. p. 74.

Patria. Nova Seelandia: Banks.

E theca *Bryo carneo*, ex areolatione atque forma foliorum *Bryo dicranoidi* affinibusque ceteris affine, sed notis illustratis distinctissimum.

102. **Br. doliolum** Dub. (Moritzi, Syst. Verz. p. 133.); *monoicum*; dense cespitosum sed laxè cohaerens radiculosum; caulis fertilis brevis innovationibus ascendenti-bus subhumilibus subramosis; folia densiusculo-imbricata, illa innovationum lanceolata, nervo crasso flavo-viridi in

aristam elongatam subintegram acutam producta, integerrima; margine paulisper revoluta, e cellulis subparvis brevibus utriculo primordiali serpentino-flexuoso praeditis subpellucidis areolata; perichaetia longiora margine magis et exacte reflexa, intima minora angustiora; theca in pedunculo brunneo fragili stricto ad insertionem thecae inserto horizontalis vel nutans *dolioliformi-oblonga* brunnea parva *basi haud collosa sed aequalis*, ore aequali et operculo convexo-mammillato.

Patria. Java ad terram prope Pandar peté et ad rupes calcareas pr. Kuripan: Zollinger collect. No. 1533 et 1538.

Peristomii dentes interni angusti pertusi, ciliis paucis nudis interjectis. — *Br. coronato* e forma thecae simile sed notis laudatis distinctissimum.

b. *Peristomium Bryi.*

103. **Br. Funkii** Schwägr. (Suppl. I. II. p. 89. t. 69.); *dioicum*; laxe cespitosum dense imbricatum julaceum *crassum breviter ramosum*; folia caulina *ovalia, cochleariformi-concava*, plus minus pellucide et minute rhomboideo-areolata, tenera, nervo *crassissimo flavo in mucronem crassum producto, veluti pungentia*, carinata, immarginata integerrima; perichaetia *multo angustiora longiora, margine revoluta, longius areolata complicato-concava*; theca in pedunculo longiusculo gracili purpurascente apice paulo curvato pendula *crasse ovalis, dein ore constricta, pallida ore aurantiaca*, operculo conico hemisphaerico *brevissime acuto aurantiaco nitido*.

Br. Europ. l. c. p. 77. t. 44. — *Brid* l. p. 660. — *Br. articulatum* Sendtn. in sched., forma gracillima compacta e speciminibus prope „Mertenstein bei Kaufung im Schönauer Kreise“ Silesiae lectis huc pertinere videtur.

Patria. Ad muros vetustos et in terra argilloso-arenaria: in arce delapsa Grünstein dicta prope Gefrees Franconiae: Funk detexit; in rupibus arenariis pr. Bippontem: Bruch; prope Burgdorf Helvetiae ad vias et rupes: Märker; ad viam septentrionalem montis Bernhar-

dino Rhaetiae: Schimper, Blind et Mühlenbeck; pr. Mariaeinsidl dit. Monachii: Sendtner; in declivibus prope Schiffersruh Florae Francofurtanae: Itzigsohn; in Hercynia inferiore: Hampe. — *Majo et Junio*, in alpidibus *Augusto*.

Flos masculus dense gemmaceus foliis ovato-acuminatis.

104. Br. atropurpureum Wahlenb. (in Web. et Mohr. Ind. Mus. Vid. Fl. Lapp. p. 360.); *dioicum*; humile compacte cespitosum amoene viride dense imbricatum ramosum, ramis brevibus aequalibus; folia e basi latiuscula ovali-lanceolata valde concava, nervo crasso flavo excedente mucronata vel longius cuspidata integerrima, margine recurva, inferne e cellulis parvis multis subquadratis superne rhomboideis inanibus areolata; theca in pedunculo longiusculo flexuoso purpureo *ventricosus-ovalis vel oblonga crassiuscula parva atro-purpurea*, collo brevissimo ruguloso praedita, operculo magno hemisphaerico-conico pallidius purpureo nitido.

Br. Europ. l. c. p. 73. t. 37. — *Br. pulchellum* β . *atropurpureum* Wahlenb. Fl. Lapp. l. c. — *Br. carneum* β . *atropurpureum* Schwägr. Sp. Musc. p. 67. — *Br. erythrocarpum* Brid. l. p. 654. — *Br. bicolor* Turn. Musc. Hib. p. 121. t. 11. f. 2. — *Br. erythrocarpon* β . *bicolor* Brid. l. p. 655. — *Mnium bicolor* P. B. Prodr. p. 74.

Patria. In terra arenoso-argillacea subhumida sociis *Br. argenteo*, *erythrocarpo*, *Funaria hygrometrica* et al. per totam Europam passim, sed alpes refugens; in insulis et ad oras maris mediterranei atque atlantici; in monte Sinai: W. Schimper. — *Vere*.

Br. coronato proximum, notis tamen laudatis distinctissimum. — Flos masc. subglobose gemmaceus, foliis perigonialibus late ovatis acuminatis nervo mucronatis. Dentes peristomii externi longe subulati lutei apice hyalini margine valde lamellosi, interni in membrana alta pallide aurantiaca breviusculi, valde hiantes, ciliis tenuissimis appendiculatis 2—3 hyalinis interpositis.

105. Br. pachythea C. Müll.; *dioicum*; habitus omnino *Bryi atropurpurei*; folia *minora* sed lato-ovali-acuminata, nervo crasso flavo longe excedente cuspidata, valde concava, *inferne e cellulis quadratis pluribus, e toto majoribus areolata, margine subplano, non revoluta*; thecae forma parva ventricoso-ovalis crassiuscula illi *Bryi atropurpurei* simillima, *sed ut in Bryo coronato pedunculo in collum thecae brevissimum inserto praedita, basi torosa rugulosa atropurpurea, operculo breviusculo hemisphaerico-conico pallidius purpureo nitido.*

Bryum coronatum β . *minus* Hmp. in Pl. Preiss. p. 117.

Patria. Nova Hollandia prope York: Preiss. India orientalis: Hb. Gottscheanum.

Inter *Br. coronatum* et *atropurpureum* medium tenens. A primo differt foliorum forma et areolatione atque thecae partis inferioris forma et colore atropurpureo; a secundo foliis minoribus majus areolatis margine non revolutis et thecae parte superiore *Br. coronato* simili valde distat. — Peristomium *Bryi atropurpurei*.

106. Br. coronatum Schwägr. (Suppl. I. II. p. 103. t. 71.); *dioicum*; laxe cespitosum inferne tomentosum amoene viride ramosum, ramis *gracilibus flaccidis laxifoliis*; folia caulina erecto-patentia *elongata oblongo-lanceolata*, nervo *subtenui* excedente mucronata vel longe cuspidata, *subplana, e cellulis inferne parallelogrammis longiusculis latiusculis utriculo primordiali valde instructis igitur valde chlorophyllaceis composita, margine haud revoluta, subintegerrima*; perichaetialia *e basi lata subito perfecte lanceolata, longe cuspidata excurrentinervia*; pedunculus elongatus gracilis purpureus *apice parum incurvus et in collum thecae brevissimum insertus*; theca pendula oblonga ore coarctata *basi torosa rugulosa fuscescens, operculo majusculo acuto basi tumido purpureo nitido.*

Brid. I. p. 650.

Patria. Cuba: Pöppig detexit. Brasilia: Gardner No. 35. Chile: Pöppig. Guyana: Richard. Hispaniola: Bertero.

Areolatio foliorum *Bryi carnei*, theca propria illi *Br. atropurpurei* similis sed ad insertionem pedunculi torosa veluti coronata. Species pulcherrima. — Peristomium ut in *Br. atropurpureo*.

107. *Br. apiculatum* Schwägr. (Suppl. I. II. p. 102. t. 72.); *dioicum*; compactum subrobustum subhumile erectum sordide viride; folia ovato-lanceolata latiuscula inferne margine subrevoluta, integerrima nervo crasso flavo dein purpureo breviter sed crasse cuspidata; theca in pedunculo breviusculo flexuoso e collo longiusculo elongate-pyriformis brunnescens inclinata, operculo brevissimo conico atro-purpureo nitente; peristomium ciliis internis binis appendiculatis.

Brid. l. 644. — Hornsch. Fl. Bras. p. 44. — P. B. Prodr. p. 73. quod Schwägrichen synonymum in Spec. Musc. p. 63. citavit, alia species esse videtur, ut jam e patria (Insula Franciae) putemus.

Patria. America meridionalis. E Montevideo Brasiliae a Sellow lectum habemus.

Cellulae basilares subrotundae, aequali-quadratae.

108. *Br. versicolor* A. Br. (in Br. Europ. l. c. p. 75. t. 38.); *dioicum*; laxe cespitosum humile sordide viride rigidum densissime imbricatum ramosum, ramis brevibus subteretibus; folia ovato-lanceolata, nervo crassissimo in cuspidem longam rigidam crassam producta, margine e basi usque ad apicem revoluta, perichaetia majora robustiora fuscescentia; theca in pedunculo elongato stricto badia subito inclinato-pendula, ovalis crassa badia, collo brevi crassiusculo saepe toroso ruguloso, operculo majusculo conico mammillato concolori nitido basi tumido, peristomio magno.

Br. turbinatum var. Schwägr. Sp. Muscor. p. 56 !! quibus ex notis?

Patria. In humidis argillaceo-arenosis praecipue in fluviorum vicinia, sociis *Dicrano vario* et *Metzgeria pingui*: ad pagum Istein prope Basileam in Rheni ripis: A. Braun detexit; pr. Salisburgum et Meran: Funk; pr. Taurinum: De Notaris; pr. Argentoratum in Rheni

ripis: W. P. Schimper; pr. Steyr Austriae superioris in iisdem locis: W. P. Schimper. — *Junio, in alpidibus Augusto, ineunte Septembri.*

A *Br. atropurpureo* notis cursive impressis differt, habitu proprio. — Pl. mascula flore crassiusculo subscoideo; foliis perigonalibus internis e basi maxime lata convoluta amoene aurea laxiuscule areolata subito et breviter acuminata excurrentinervia, paraphysibus elongatis aureis et antheridiis numerosis majusculis. Peristomium *Bryi atropurpurei.*

Peristomium ignotum.

109. **Br. angustifolium** Brid. (l. p. 685.); *dioicum*; laxe cespitosum humile gracile; folia erecto-patentia superne densius conferta, elongata lanceolata longe acuminata subplana, nervo crasso flavo longe cuspidata, angusta integerrima margine plana, inferne e cellulis laxiusculis magnis quadratis pellucidis superne multo densioribus elongatis viridibus areolata, perichaetia interna angustiora; pedunculus strictus.

Patria. Hispaniola: Green in hb. Brideliano.

Sectio VI. **Dicranobryum.** Plantae gracillimae tenellae. Folia dense imbricata lanceolata, margine haud revoluta, minute et dense areolata, carinato-concava, nervo aequaliter crasso flavo pungentia, integerrima, theca erecta dicranoidea, ore coarctata, plus minus urceolata.

110. **Br. dicranoides** Hsch. (Linn. XV. p. 134.); *dioicum*; densiusculo - cespitosum humile; caulis fertilis brevissimus basilaris, innovationibus brevibus erectis gracilibus compluribus viridibus ramosus; folia ovato-lanceolata integerrima vel summa obsolete denticulata immarginata, nervo crasso in perichaetialibus ferrugineo decurrente crasso - cuspidata, minute et pellucide areolata; theca in pedunculo longo gracillimo flexuoso suburceolata oblongo-cylindrica annulata pallida dein fusca, basi crassa, ore constricta, dein inclinata, operculo e basi latiore tumida conico-acuto concolori; dentes peristomii externi longissimi angusti tenuissime subulati inferne fusci apice

pallidi *rugulosi*; membrana interna subcarinata *breviuscula* pallida, in dentes longos *rugulosos* angustos subulatos *nodiusculo - articulatos* vix carinatos externos aequantes pallidos, ciliis solitariis filiformibus brevibus hyalinis interjectis, producta.

Patria. Prom. bonae spei: ad muros et valla lapidosa ad montem tabularem: Ecklon. *Octobr.* — Prope Swellendam in umbrosis: Pappe.

Ex habitu *Br. erythrocarpo* et e theca *Ceratodontibus* simile, notis autem laudatis a primo diversissimum. — In axillis foliorum corpuscula gemmiformia viridia dein fusca ut in *Br. erythrocarpo* atque *Preissiano* reperiuntur. Perigonia perichaetiis e forma et foliis simillima, antheridiis crassis majusculis numerosis, longiusculo stipitata, apice ramosa, plantis femineis parce intermixta.

111. **Br. Preissianum** Hmp. (Ic. Musc. tab. 25.); laxe cespitosum humile; caulis fertilis brevissimus basilaris, innovationibus *elongatis* erectis *quam maxime gracilibus* compluribus velutino-viridibus ramosus; folia ovato-lanceolata integerrima immarginata, nervo crasso decurrente crasso-cuspidata, minute et pellucide areolata; theca in pedunculo longo gracillimo flexuoso oblongo-cylindrica annulata *pallida* parum curvata, basi crassiore, ore angustiore, dein inclinata *ore vix coarctata*, operculo conico breviter subulato erectiusculo *aurantiaco*; dentes peristomii externi *laeves* longissimi anguste tenuissime subulati subpallidi; membrana interna subcarinata *brevis* hyalina, in dentes longos *laeves* subulatos angustos subhiantes subcarinatos externis breviores pallidos tenues, ciliis solitariis filiformibus brevioribus hyalinis interjectis, producta.

Patria. In rupibus calcareis Novae Hollandiae prope Freemantle legit Preiss.

Br. dicranoidi Hsch. simillimum sed thecae oris et operculi diametro aequali atque peristomio interno differt. An ejus varietas? In axillis foliorum ut in *Bryo erythrocarpo* et *dicranoide* corpora gemmiformia viridia dein fusca inveniuntur. Dioicum?

112. Br. Nepalense Spreng. (Syst. Veget. IV. 1. p. 211.); *monoicum*; dense cespitosum humile *prostratum*; caulis fertilis brevissimus basilaris, innovationibus brevibus erectis subsimplicibus *dense foliosis*; folia ovato-lanceolata *medio latiora* erecta integerrima sordide viridia marginata (?), nervo crasso cuspidem tertiae folii parti aequalem formante lutescente; theca annulata in pedunculo longiusculo *ovata erecta basi et apice attenuata*, operculo conico obtusiusculo diametro oris thecae aequali concolori; dentes peristomii externi lineari-subulati, albedo-lutescentes transverse sulcati; membrana interna dimidio brevior in dentes *ciliiformes nodosiusculo-articulatos vix hiantes*, ciliis brevissimis irregularibus interjectis, producta. $\frac{1}{4}$.

Brachymenium bryoides Hook. in Schwägr. Suppl. II. 2. p. 134. t. 135. et Brid. I. p. 603. — *Brach. herpocaulon* Brid. mst. l. c.

Patria. Ad terram in sylvaticis Nepalensibus.

Br. exili proximum, notis autem designatis distinctissimum.

113. Br. exile Dz. et Molkb. (Musc. Archip. Ind. p. 13. t. 6.); *dioicum*; dense cespitosum humile; caulis fertilis brevissimus basilaris, innovationibus erectis *subteretibus* gracilibus compluribus lutescentibus ramosus; folia erecto-patentia *siccitate subappressa*, ovato-lanceolata integerrima immarginata, nervo crasso decurrente crasso cuspidata, minute et pellucide areolata; theca in pedunculo longe gracillimo *ovali-urceolata ore perangusta erecta fusca annulata*, operculo *e basi latiore tumida breviter conico-acuto* concolori; dentes peristomii externi angustissimi lanceolato-subulati linea media exarati et e cellularum serie duplici formati subcarinati pallidi; membrana interna dimidio brevior in dentes *externis adglutinatos* tenuissimos, ciliis binis brevissimis interjectis, *rugulosos* pallidos producta.

Patria. Java in monte Patocha et Simpai et in Sumatra.

Br. dicranoidi, *Preissiano* et *Nepalensi* affinissimum, sed foliis longius cuspidatis, innovationibus subteretibus.

theca perfecte urceolata erecta atque peristomio differt. — Corpuscula in axillis foliorum parce tantum observantur.

114. Br. coarctatum C. Müll.; *dioicum?* densiusculo-cespitosum humillimum; caulis fertilis brevissimus basilaris, innovationibus brevibus erectis *dense foliosis*; folia innovationum *e basi breviter oblonga ovali-lanceolata* nervo crasso *constanter ferrugineo longiusculo-cuspidata summo apice pili acuta hyalina*, integerrima immarginata, *perfecte rhomboideo-prosenchymatico-et laxo-areolata*; perichaetialia *majora longiora angustiora intima angustissima et e cellularum serie subduplici angustarum angustissime marginata pellucidiora longius cuspidata apice subdenticulata*; theca in pedunculo elongato gracili flexuoso *oval-cylindrica utrinque attenuata ore constricta erecta fusca*, operculo e basi tumidiuscula sublatiori breviter conico acuto; peristomii dentes externi *breviusculi inferne fusci apice hyalini*; membrana interna dimidio brevior *in dentes externis adglutinatos, ciliis irregularibus interjectis*, producta.

Br. exile var? Hmp. in litt.

Patria. Java.

Ex habitu *Bryi exilis*, sed foliorum innovationum et perichaetialium forma et textura ab eo ceterisque congeneribus differt.

115. Br. megalacrion Schwägr. (Suppl. I. II. p. 104. t. 71.); *dioicum*; humillimum, innovationibus erectis brevibus; folia perichaetialia conferta, innovationum remota, lanceolata nervo crasso flavo longe et crasse cuspidata, parum concava erecta stricta integerrima e cellulis minutis densis areolata, pallida vel luteo-viridia; theca in pedunculo brevi flexuoso erecta *obconica ore amplior pallida*, operculo conico *brevi aurantiaco*; peristomii dentes externi lanceolati remote trabeculati solidi angusti breves, interni in membrana lutea *lanceolati latiusculi imperforati, ciliis solitariis interjectis*. †.

Brid. l. p. 640, quod e spec. unico hb. *Bridetii* novum videtur, excludendum.

Patria. Insula Franciae: Aub. Du Petit Thouars.

Br. dicranoidi proximum, sed notis cursive impressis distat.

116. Br. Harveyanum C. Müll.; caulis breviusculus, innovationibus longis erectis ramosus; folia *ovato-lanceolata acuminata acuta, integerrima excurrentinervia, tenero-membranacea late-cellulosa*; theca erecta oblongo-pyriformis operculo conico; perist. *Brachymenii*. $\frac{1}{4}$.

Brach. acuminatum Harv. in Hook. Ic. Pl. Bar. t. 19. f. 3. et in Lond. Journ. of bot. 1840. II. p. 10.

Patria. Penang Indiae orientalis: Wallich.

Ex ic. et speciminibus *Montagneanis* (an authenticis ipsissimis?) *Br. exili* proximum.

117. Br. Indicum Dz. et Molkb. (Musc. Archip. Ind. p. 22. t. 11.); *hermaphroditum*; densiusculo-cespitosum humile; caulis fertilis brevissimus basilaris, innovationibus longiusculis erectis subgracilibus dense foliosis sordide viridibus ramosus; folia erecto-patentia *siccitate in spiram obsoletam congesta*, ovata, nervo crasso sordide flavo excedente crasso-cuspidata, integerrima, siccitate cellulis marginalibus exsiccatis veluti dentata, apice tantum obsolete denticulata, e cellulis submagnis brevibus utriculo primordiali hic illic praeditis pellucidis composita; theca in pedunculo flexuoso *cylindrica ore vix constricta erecta subcurvula fusca annulata*, operculo conico brevissimo concolori; dentes peristomii externi *Br. exili* similes fusci; membrana interna in dentes solitarios fugacissimos rugulosos ciliis rudimentariis interpositis fissa.

Patria. Java et Amboina in solo calcareo.

Br. exili proximum, sed inflorescentia, arcolatione foliorum laxiore et theca aequali-cylindrica, operculo basi aequali oblecta, distat.

Sectio VII. **Argyrobryum.** Plantae plus minus cespitosae plerumque julacco-foliosae. Folia dense imbricata minute arcolata mollia argentea, chlorophyllo superne destituta, theca pendula ovalis.

118. **Br. argenteum** L. (Sp. Pl. p. 1586.); *dioicum*; cespitosum subhumile erectum ramis julaceis *argenteis* vel glaucis plus minus elongatis et clavatis; folia caulina latiusculo-ovalia subito acuminata valde concava, inferne viridescencia dense areolata, superne decoloria tenerrime membranacea, nervo infra apicem veluti evanido sed obsolete hyaline in cuspidem excurrente, subtenui flavido; perichaetialia sensim et longius acuminata; omnia integerrima; theca longiusculo-pedunculata pendula *oblongo-ovalis subventricosa* parva ore *coarctata* colorata, operculo e basi tumidiuscula conico acuto majusculo concolori; peristomium *Bryi*.

Br. Europ. l. c. p. 78. t. 41. — Brid. I. p. 667. — Br. pendulum julaceum argenteum et sericeum. Dill. p. 392. t. 50. f. 62. — *Mnium argenteum* Hoffm. Deut. Fl. II. p. 51. — *Hypnum argenteum* Schrank. Baiers. Fl. II. p. 469.

β. lanatum; ramis magis clavatis foliis longe crinitis apice reflexiusculis albido-argenteis. Br. Europ. l. c. — *Br. lanatum* Brid. I. p. 659. — *Mnium lanatum* P. B. Prodr. p. 75.

γ. majus; elongatum, foliis brevissime acuminatis submuticis virescentibus. Br. Europ. l. c. p. 79. — *Br. julaceum* Schrad. Spic. Fl. Germ. p. 70. n. 2. et Brid. I. p. 659. ex maxima parte.

Patria. Planta cum var. *γ.* per totum orbem terrarum occurens. Var. *β.* imprimis regiones intra zonam tropicam positas praeferens. — *Hyeme et vere.* Var. *β. Septembri.*

Species e colore et magnitudine partium singularum valde polymorpha, sed foliis plus minus argenteis julaceo-imbricatis facile distinguitur. — Planta mascula gracilior, foliis perigonalibus e basi late ovali valde concava apiculatis.

119. **Br. microtheca** C. Müll.; *dioicum*; habitus omnino *Bryi argentei*; folia caulina *parva cochleariformi-concava* ovalia subito longe cuspidata pilifera, nervo inferne flavo, superne hyalino obsolete veluti evanescente sed tenuiter excurrente praedita, inferne minute et dense areolata viridia, superne sublaxius reticulata decoloria te-

nerrime membranacea; perichaetia sensim et longius acuminata; omnia integerrima; theca in pedunculo longiusculo apice *valde descendente arcuato pendula minutissima obconico-subglobosa ore dilatato haud constricta flavescens*, operculo *perfecte hemisphaerico nec basi tumido, nec apice mammillato aurantiaco*; peristomium internum *Weberae, ciliis brevibus*.

Patria. Manila: Meyer.

A *Br. argenteo* simillimo notis cursive impressis atque peristomio parvo distinctissimum.

120. *Br. leucophyllum* Dz. et Molkb. (Musc. Archip. Ind. p. 15.); *dioicum*; habitus *Bryo argenteo similis sed planta multo humilior amoene sericea nitida*; folia imbricata erecta ovato-lanceolata acuminato-cuspidata, *cuspidate serrata, basi infima colorata*, superne omnino decoloria, nervo obsoleto in cuspidem producto; perichaetia lanceolato-acuminata cuspidata omnia *parum concava subplana*; theca longiusculo-pedunculata nutans *oval-oblonga fuscidula operculo conico-obtuso aurantiaco*; peristomii interni dentes angusti, ciliis *fugacissimis irregularibus articulatis fragilibus 1—3 interpositis*.

Patria. Java in terra: a Junghuhn lectum habemus. Oahu: Meyen.

A *Bryo argenteo* colore pulcherrime nitido sericeo, peristomio et foliis planiusculis atque caulibus humillimis valde differt. A *Br. microtheca* notis iisdem et thecae forma longe distat.

Sectio VIII. *Sclerodictyon*. Plantae laxae cespitosae valde ramosae; Folia valde concava fere cymbiformia, e cellulis firmis (partim vel omnino) inanibus rhomboideis plus minus latis non angustis areolata, coriacea, nitida rigida, theca pendula plus minus oblongo-pyriformis.

a. *Folia julaceo-imbricata.*

121. *Br. julaceum* Sm. (Fl. Brit. III. p. 1357.); *dioicum*; *elongatum cespitosum gracilescens, ramis inaequalibus tereti-julaceis filiformibus rigidis*, folia densissime appressa, illa ramorum *ovalia acutiuscula, arcte et*

minutiuscule basi tenerius pellucidius superne magis flavescenti - areolata, rigida integra subcarinato - concava, nervo flavo infra apicem dissoluto, perichaetialia angustiora acutiora basi purpurascentia; theca in pedunculo breviusculo flexuoso subpendula pallida oblonga, operculo conico brevi mammillato aurantiaco; perist. *Bryi*.

Br. Europ. I. c. p. 79. t. 40. — Brid. I. p. 659. e minima parte huc pertinet. — Schwägr. Suppl. II. II. 2. t. 195. — Br. filiforme Dicks. Fasc. IV. Pl. Crypt. p. 16.

Patria. In subalpinis et alpinis locis irriguis Angliae, Scotiae, Hiberniae, Norvegiae, Sueciae, Lapponiae, Tirolis in valle Oetzthal dicta: Sendtner; in Gastunia: Funk; in alpibus Salisburgensibus ad catarractam Krimmler-Fall dictam alt. 4000': Sauter, W.P. Schimper, pr. Purtschinsk ditionis Meranensis: F. Braun. E rarioribus et raro fructiferum. — *Aestate.*

Pl. mascula femineae intermixta, et huic simillima, subsimplex, e basi usque ad apicem dense foliosa; flore terminali gemmaceo minuto; foliis perigonialibus externis e basi lata ovata concavis angustatis obtusiusculis, internis angustioribus minoribus acuminatis enervibus; antheridiis minutiusculis numerosis, paraphysibus filiformibus mixtis. Dentes peristomii externi lanceolati basi ferruginei, apice hyalini, interni in membrana alta aurantiaca valde sulcati et hiantes pallidi vix serrulati, ciliis 1—2 hyalinis laevissimis vix appendiculatis nodosis interpositis. Pulcherrima species.

122. Br. semiovatum Brid. (I. p. 846.); *dioicum; humillimum compactum apice ramis gracilibus brevibus tereti-julaceis rigidis filiformibus compluribus praeditum; folia densissime appressa, illa innovationum lanceolata, arcte et minute areolata, subpellucida rigida integerrima subcarinato - concava, nervo crasso flavo excedente apice saepe recurviusculo crasse mucronata, perichaetialia e cellulis longioribus laxioribus sed firmis composita; theca in pedunculo elongato stricto cylindraco - oblonga subpendula fusca, operculo hemisphaerico - conico obtuso; perist. Weberae.*

Br. julaceum Kunth. Synops. Pl. Aeq. p. 56.

Patria. In sylvis opacis humidis prope Pasto, regione frigida, alt. 1350 hexap. et in jugis Andium, regione temperata: Humboldt et Bonpland.

Peristomium magnum; dentes externi fusci apice hyalini, interni ex obs. *Bridelii* pulchre hiantes ciliolis singulis brevissimis interpositis. Pl. mascula humilis inferne nuda superne ad florem capituliformem ramis binis brevissimis praedita. Folia perigonialia externa perichaetialibus e forma et areolatione similia sed basi latiora, nervo ferrugineo praedita, interna convoluto-vaginantia-ovalia minora obsoletinervia laxius areolata. Antheridia elongata paraphysibus multis mixta. — Ex habitu *Br. julaceo* simile, sed foliis crassinervibus mucronatis, operculo et floris masculi structura longinquum.

123. *Br. prostratum* C. Müll.; *dioicum*; habitus Bryi julacei, sed prostratum *altius et omnibus partibus robustius rigidissimum*, foliis rameis similibus minutissime crenulatis, perichaetialibus denticulatis, *perigonialibus autem maxime latis convolutis plicatis ovalibus breviter acuminatis, e cellularum serie unica veluti marginatis*, evanidinervibus laxae areolatis aureo-coloratis, *intimis obtusatis minoribus, antheridiis maximis cylindricis instructum*; theca in pedunculo *quam maxime elongato gracili purpurascete flexuoso apice parum arcuato horizontaliter nutans elongate pyriformis longicolla ore constricta fusca*, operculo conico *majusculo acuto concolori*; peristomii *siccitate valde depressi maximi dentes externi lati longissimi latere valde appendiculati, interni illos aequantes in membrana alta pallida lati et lato-hiantes apice in cilia bina tenuissima bifidi, ciliis 3 longissimis valde appendiculatis hyalinis interpositis.*

Patria. Columbia, prov. de Merida in Serra Nevada altit. 9000 ped., 1846. Sept. in arboribus putridis leg. Funck et Schlim. Collect. Lindenian. No. 1081.

A *Br. julaceo*, primo adspectu proximo notis cursive impressis distinctissimum et pulcherrima species.

b. *Folia laxè imbricata.*

124. Br. orthocladum Br. et Sch. (Musc. Abyss. No. 589.); *dioicum*; compacte cespitosum elongatum robustum erectum nitidum inferne purpurascens superne flavescens ramosum, *ramis crassis foliis dense appressis julaceo-teretibus*; folia caulina oblongo-ovalia obtusa vel acutiuscula valde concava integerrima, e cellulis ubique firmis subinanibus viridibus coriaceo-firma, nervo subtenui evanido viridi, basi crasso pulcherrime purpureo praedita immarginata; perichaetia externa oblonga, subplana veluti elongato-ligulata s. caviuscula, intima multo minora ovali-acuminata crenulata, omnia basi vel omnino pulcherrime purpurea evanidinervia, e cellulis longis angustis parietibus flexuosis praeditis formata; theca in pedunculo e basi ascendente purpureo apice arcuato tenuiore pendula eleganter pyriformis exacte symmetrica purpurascens parva subangusta, operculo conico brevissime acuto basi purpureo nitente; perist. *Weberae*.

Patria. Abyssinia ubi legit W. Schimper.

Planta pulcherrima, *Br. laevigato* proxima, sed differt jam foliis immarginatis omnino e cellulis firmis parietibus tenuioribus, compositis, partibus omnibus purpurascentibus et notis ceteris illustratis. — Archegonia et paraphyses creberrima purpurea. Peristomium ex obs. auct. *Weberae*.

125. Br. blandum Hook. et Wils. (Lond. journ. of bot. 1844. p. 546.); laxè cespitosum erectum subsimplex robustum purpurascenti-nitens ramis veluti truncato-obtusis; folia laxè appressa lato-elliptica obtusa valde concava, integerrima, inferne e cellulis elongatis angustiusculis pellucidis, apice multo minoribus firmissimis parietibus incrassatis flavis praeditis composita, nervo tenui ferrugineo subcontinuo instructa.

Patria. Insula Campbellii: J. Hooker.

Bryo cellulari Hook. ex habitu simile sed notis illustratis ab eo ceterisque congeneribus distinctissimum.

126. **Br. laevigatum** Hook. et Wils. (Lond. journ. of bot. 1844. p. 546.); compacte cespitosum elongatum robustum erectum ramosum; folia dense imbricata erecta laxe appressa oblongo-ovalia obtusa vel acutiuscula valde concava integerrima s. summo apice subcrenulata, *basi margine parum revoluta, e cellulis infima basi laxis superne firmis parietibus incrassatis praeditis subinanibus viridibus areolata coriaceo-firma, margine e cellulis longioribus veluti incrassato-marginata, nervo subtenui ante apice meranido fuscescente praedita nitida*; theca pendula obovato-oblonga, operculo conico obtuso.

Patria. Insulae Eremitae, Falklandi ad Cap. Horn sterile; in terra Van Diemen fertile, quibus speciminibus ad fructum describendum usi sumus.

Ex habitu *Bryo pseudotriquetro* haud dissimile, e structura autem foliorum et ex habitu, praesertim speciminum valde compactorum, *Bryo orthoclado* Br. et Sch. **simillimum.**

Sectio IX. Orthocarpus. Plantae dense cespitosae vel compactae. Folia acuminata plerumque pilifera elongate angusta et paullisper laxe areolata mollia, margine raro revoluta plerumque plana concava saepe cochleariformia, theca erecta pyriformis. Peristomium omnium congenerum *Brachymenii*.

1. *Folia patula erecto-appressa.*

a. *Folia immarginata.*

127. **Br. Sellowianum** C. Müll.; *dioicum*; erectum apice fastigiato-ramosum; folia erecta subappressa oblonga superne latiora carinato-concava, *nervo crasso flavo excedente crasse et breviter mucronato, margine apicis cellulis minoribus veluti marginantibus prominentibus repando-denticulata, e cellulis rhomboidalibus pellucidis utriculo primordiali instructis areolata*; theca in pedunculo elongato flavo strictiusculo ovali-cylindrica erecta flavida, operculo concolori conico brevi et collo brevissimo praedita.

Didymodon Klotzschii Schwägr. Suppl. IV. tab. 310.

Patria. Brasilia: Sellow.

Peristomium nobis ignotum ex ic. Schwägr. externum tantum observatum, e dentibus pallidis lato-lanceolatis constructum. Internum verosimiliter *Brachymenii*.

128. Br. Martianum C. Müll.; densiusculo-cespitosum; caulis erectus *apice fasciculatim et breviter ramosus*, inferne nudus; folia erecto-patentia, siccitate appressa, subtorta inferiora remota oblongo-lanceolata acuminata canaliculata, superiora *lato-ovalia in acumen producta*, nervo crasso rufescente supra folii medium dissoluta, subquadrate et laxissimo-areolata; perichaetia majora oblonga, margine involuta, intima duplo minora angustiora lanceolata plana amoene viridia; theca *erecta crassa ovata, ore angusto*.

Brachymenium pulchellum Hsch. Fl. Bras. Fasc. I. p. 36.

Patria. Brasilia in Minis generalibus ad cortices arborum: **Martius**.

Peristomii dentes externi humiditate erecto-patuli, siccitate conniventes lanceolato-lineares solidi articulati subnodosi, inferne ferruginei, superne albidi; membrana interna albida dentibus exterioribus dimidio brevior, apice dilacerata, in processus 16 irregulares producta. — *Br. Hornschuchiano* simile, notis tamen laudatis distinctissimum. Dioicum?

129. Br. Systylium C. Müll.; *dioicum; dense intertextum* lato-cespitosum viride erectum gracile; folia erecta subappressa, innovationum inferiora ovalia oblonga integra, nervo excedente cuspidata, concava, superiora longiora basi angustiora pilifera planiuscula subintegra; perichaetia multo longiora angustiora margine revoluta longe acuminata pilifera, nervo ferrugineo ante pilum obsoleto, summo apice subdenticulata; theca in pedunculo elongato torto *cylindrico-oblonga brevicolla majuscula erecta fusca*, operculo conico brevissimo atro nitido, dein columella subexserta elevato.

Acidodontium Kunthii Hsch. in Musc. Mexic. a Deppe et Schiede collectis.

Patria. Mexico prope Xalapam.

Peristomii dentes externi lanceolati breviusculi crassiusculi fusci, apice rugulosi albescentes; membrana interna dimidio brevior flavescens, apice laciniato-dentata vel interdum in membranam tenerrimam hyalinam, ciliis nonnullis filiformibus fugacissimis dentibus externis adglutinatis praeditam, producta. — *Br. leptostomoidi* proximum, differt autem: colore viridi, nervo omnium foliorum apice multo tenuiori, in perichaetialibus ante pilum obsoleto, foliis perichaetialibus margine revolutis, theca brevicolla fusca et operculo atro.

130. *Br. leptostomoides* C. Müll.; *dioicum*; compactum intense brunneo-tomentosum lato-cespitosum lutescens nitidum erectum subcurvum, foliis planiusculis subappressis sciuroideum; folia caulina superiora ovali-lanceolata, nervo crasso flavo in pilum longissimum *flavum apice tantum summo hyalinum sublaevem* flexuosum producto, superne subdenticulata; perichaetialia multo longiora angustiora longe acuminata nervo crasso excedente cuspidata e cellulis valde angustis elongatis pellucidis areolata firmiora subintegerrima margine flaviora; theca in pedunculo longiusculo ex ochraceo purpurascente ascendente *erecta pyriformis subbrevicolla clavata aurantiaca*, operculo conico minuto brevissimo convexo *purpureo nitido*.

Brachymenium pulchrum Hmp. in litt. — *Brach. ciliare* Mont. in litt.

Patria. India orientalis: Hb. Hamp. E montibus Neelgheriensibus: Hb. Montagn.

Plantae masculae femineis intermixtae. Flos masc. terminalis femineo similis. Folia perigonialia perichaetialibus simillima sed multo breviora et magis concava. Antheridia pauca eparaphysata. Membrana interna brevis apice dentato-laciniata. *Br. Systylio* proximum, *Br. pulchro* et *Koratrano* e cespitibus maxime compactis et ferrugineo-tomentosis affine, sed haud julaceum.

b. *Folia marginata.*

131. *Br. Peromnion* C. Müll.; *dioicum*; laxo cespitosum; caulis erectus *prolifero - elongatus*, inferne nu-

diusculus, *superne rosulatus* simpliciusculus; folia comalia erecta elongata angusta acuminata, *nervo crasso excedente longissime cuspidata*, *marginē flexuoso-undulata*, e medio ad apicem usque tenuiter et flavo-marginata subdenticulata, basi e cellulis maximis laxis pellucidis vel rubescentibus, apice minoribus angustis viridibus densioribus areolata; theca in pedunculo elongato stricto *longe cylindrica angusta suberecta longicolla*, annulata, operculo conico acuminato brevissimo.

Peromnion radiculosum Schwägr. Suppl. III. 1. 2. tab. 250. cum peristomio false delineato. —

Patria. In sylvis antiquis Brasiliae prope Novofriburgum: Beyrich ad truncos arborum legit.

Peristomii dentes externi angusti subulati elongati opaci. Membrana interna exacte sulcata plicata in cilia tenuissima filiformia producta. Planta mascula femineae similis; flore discoideo foliisque ovalibus acuminatis nervo ante apicem evanido praeditis immarginatis integerrimis parvis valde pellucidis.

132. Br. Hornschuchianum C. Müll.; *dioicum*; dense cespitosum gracile; folia caulina oblongo-lanceolata *pilifero-acuminata* undulata *laxiusculo-areolata* et imbricata, tenuissime marginata apice subdenticulata, *nervo ante apicem evanido*; perichaetialia *perfecte lanceolata* longiora et longius pilifera, e cellulis laxioribus et multo longioribus areolata evanidinervia integerrima immarginata pellucidiora; theca longiusculo-pedunculata erecta *crassa ovato-pyriformis* ore constricta annulata pallida, operculo conico brevissimo recto obtuso.

Brachymenium Hornschuchianum Mart. Ic. Crypt. Bras. 36. tab. 20. f. 4. et in Fl. Bras. Fasc. I. p. 36.

Patria. Brasilia in praeruptis viarum, nec non in radice arborum annosarum in prov. Minarum passim: Martius. Gardner No. 32. — *Primis anni mensibus.*

Peristomii dentes externi breves rugulosi valde trabeculati. Membrana interna brevis in dentes interdum altiores asperrimos obtuso-articulatos producta, ciliis omnino carens.

133. Br. brevicaule Imp. (in Hb. Gottscheano); *monoicum*; laxiusculo – cespitosum humillimum robustum simplicissimum; caulis brevissimus dense et comoso-foliosus; folia caulina oblongo – ovata valde concava lata nervo crasso ferrugineo excedente longiusculo – cuspidata, basi laxe apicem versus minute et dense areolata, margine saepe revoluta late et flavo – marginata *subintegerima*; perichaetialia *intima lanceolata longissime cuspidata multo minora et angustiora*, longe areolata; theca longipedunculata clavaeformi – pyriformis longicolla erecta dein nutans.

Br. Nepalense Dz. et Molkb. Musc. Ind. Archip. p. 12.?

Patria. Java insula.

Dentes peristomii externi subreflexi angusti carnosuli dense trabeculati; membrana interna alta in dentes irregulares breves rugulosos ciliis carentes producta. Flos masculus in feminei vicinia terminalis gemmaceus. Folia perigonialia caulinis similia, longius cuspidata, *intima minora laxissime areolata enervia immarginata integerrima*. Omnes partes rufescentes. Areolatio foliorum ut in *Br. flexifolio* et *Abyssinico*. Forsan sequentis varietas.

134. Br. Hookeri Spr. (Syst. Veget. IV. p. 212.); *monoicum*; laxe cespitosum robustum *innovationibus apice ramosum inferne nudiusculum*; folia ovata lingulata vel obovato – lingulata marginata *serrata* amoene viridia, nervo excedente rufo cuspidata parum concava; perichaetialia, excepto intimo, caulinis similia; theca pyriformis recta, orificio duplo angustiori, badia, operculo conico brevissimo.

Brach. Nepalense Hook. in Schwägr. Suppl. II. II. p. 131. tab. 135. — Brid. I. p. 602.

Patria. In Nepal Indiae in terra humosa.

Peristomii dentes externi reflexiusculi angusti breves linea media exarati subfusei; membrana interna lutea in dentes carinatos utrinque repandos brevissimos, ciliis irregularibus interjectis, producta. Folia perigonialia ovata acuminata, nervo mucronata, *intima nervo vix conspicuo, rufo – viridia*.

2. *Folia julaceo-imbricata.*

135. Br. pulchrum C. Müll.; *dioicum*; maxime compactum lato-pulvinatum erectum subhumile; caulis inferne maxime tomentosus, summo apice tantum liber, densissime et julaceo-foliosus teres; folia caulina *ovato lanceolata*, perichaetialia *basi latissima perfecte lanceolata*, omnia longissime hyalino-pilifera, subintegerrima, pilo denticulato, *concura*, nervo crasso ante pilum evanido praedita, flavescenti-albida nitida, immarginata, dein margine subpellucida, laxe areolata pellucida; theca *brevipedunculata* pyriformis *rotundata* crassa *brevicolla erecta* annulata, operculo conico obtuso.

Brach. pulchrum Hook. Botanic. Miscell. 1830. I. p. 136. t. 38.

Patria. In nemoribus prope Swellendam prom. bon. spei: Mundt.

Peristomii dentes externi angustiores; interna membrana dimidio brevior apice dentato-laciniata, hic illic perforata. — Sequenti quam maxime simile, sed foliis angustioribus sublanceolatis longioribus margine minus pellucidis et theca brevipedunculata brevicolla sat differt.

136. Br. Koratranum C. Müll.; *dioicum*; maxime compactum lato-pulvinatum erectum subhumile; caulis inferne maxime et ferrugineo-tomentosus, summo apice tantum liber, densissime et julaceo-foliosus teres; folia caulina *maxime ovalia ventricoso-vel cochleariformi-concava breviora latissima*, nervo crasso in pilum longissimum denticulatum hyalinum excedente, apicem versus leviter serrulata, *margine lato-pellucida* laxe areolata; perichaetialia interiora lato-lanceolata, longissime pilifera evanidinervia; theca *longe pedunculata*, pyriformis *clavata* longicolla erecta.

Brach. julaceum Hsch. Linn. XV. p. 133.

Patria. Africa australis, Outniqualand prope Koratra in arboribus sylvarum, ubi in altitud. 800 ped. 24. Sept. 1831. fructibus deoperculatis legit Drège. Ad flum. Kat-Rivier dictum pr. Philippstown legit sterile Ecklon: Hb. Kunzeanum.

Innovationes juniores graciliores inferne tenues, apice truncato-clavatae breves. Dentes externi ut in *Br. pulchro* humidi reflexi, siccitate conniventes lanceolati obtusi rufescentes; membrana interna brevis hic illic pertusa lutescens, apice in processus plures irregulares cerosos producta. — A *Br. pulchro* simillimo notis cursive impressis certe distat.

Sectio X. **Senodictyon.** Plantae plus minus humiles laxe cespitosae. Folia superne in comam plerumque apertam congesta, angusta plus minus lanceolata, e cellulis angustissimis densissimis firmis plerumque elongatis et inanibus viridibus areolata, medio margine revoluta, nervo tenui evanido vel excurrente, firma, plerumque nitida et serrulata, carinato-concava, theca inclinata angusta plus minus cylindrica et longicolla, vel ovalis pendula.

1. *Peristomium Brachymenii.*

137. *Br. microstomum* C. Müll.; caulis gracilis breviusculus subramosus; folia lanceolata acuta supra basin usque ad apicem subserrata erecta, siccitate stricta, excurrentinervia; theca *longissime pedunculata erecta ovata, ore angusto, operculo plano.* †.

Br. microstomum Harv. in Hook. Ic. Pl. Bar. t. 19. f. 4. et in Lond. Journ. of bot. 1840. II. p. 10.

Patria. Nepal Indiae: Wallich.

Habitus *Bryi annotini* et affinium, differt autem jam peristomio.

138. *Br. Weisia* C. Müll.; gracile breviusculum, inferne dense cespitosum; folia lanceolato-subulata stricta e basi usque ad apicem serrata, excurrentinervia; theca brevi-pedunculata erecta ovata crassa brevicolla, operculo conico. †.

Brach. Weisia Hook. Harvey in Lond. Journ. of bot. 1840. II. p. 10. et in Hook. Ic. Pl. t. 19. f. 1.

Patria. Nepal Indiae orientalis: Wallich.

Dentes peristomii externi angusti dense trabeculati subulati; membrana interna alta, dentibus et ciliis obsoletis. — E ratione Cl. Wilson (in litt. ad Cl. Montagne) species fallax et per se non existens. Quid autem? Ex ic. *Br. polymorpho* affine videtur.

2. *Peristomium Pohliae.*

139. Br. acuminatum Br. et Sch. (Br. Europ. Bryum; p. 21. t. 6.); *monoicum*, flore masculo gemmaceo ad basin feminei; dense cespitosum simplex vel innovationibus ramosum; folia caulina inferiora remota minuta ovato-lanceolata, superiora lanceolato-acuminata, *marginē valde revoluta*, complicato-concava, apice serrata, nervo subcrasso fuscescente excurrente in cuspidem brevem producto praedita, anguste dense et *longiuscule infima basi laxius areolata*, viridissima submollia; perichaetialia intima multo minora haud revoluta integra; perigonialia e basi vaginante lato-ovali multo laxius areolata subito acuminata, interiora haud revoluta, omnia denticulata; theca in pedunculo longiusculo apice arcuato *cylindrico-pyriformis longicolla* horizontalis pallescens, operculo longiuscule conico-acuminato subobliquo aurantiaco.

Pohlia acuminata Hpp. et Hsch. in Regensb. bot. Zeit. 1819. II. p. 94. et in Brid. I. p. 610. — *Webera elongata* β. *acuminata* Schwägr. Sp. Musc. p. 49 — *Pohlia elongata* γ. *acuminata* Hüb. Muscol. Germ. p. 473 — *Pohlia arcuata* Hpp. et Hsch. Regensb. bot. Zeit. 1819. II. p. 98. et Brid. I. p. 614, forma minutissime areolata. *Pohlia vegeta* et *patens* Hpp. et Hsch. l. c. p. 101. et Brid. I. p. 620. e spec. auth. nostris suspectissimae species, ex obs. Br. Europ. ex parte huc et ad *Br. nutans* atque *polymorphum* pertinent. Varietates omnes ceterae Bryol. Europ. ad *Br. polymorphum* revocandae sunt, ut e speciminibus nostris inflorescentia androgyna gaudentibus authenticis elucet.

Patria. In alpinis et subalpinis totius Europae. — *Versus aestatis finem.*

Primo adspectu theca elongato-cylindrica acuminato-operculata angusta distinguitur.

140. Br. papillosum C. Müll.; *dioicum*; *subsimplissimum humile*; folia imbricata parum secunda et *madefacta paullisper torta obliqua*, lanceolato-acuminata, nervo ante apicem evanido instructa carinata, apice serrulata longiuscule anguste et dense areolata viridia; theca in pedunculo elongato gracillimo flexuoso apice arcuato nutans, ventricoso-pyriformis ore constricta tenuissime membranacea subglauca, dein fusca, *valde papillosa* oper-

culo breviter conico ora aurantiaca praedito; dentes peristomii externi et interni ut in *Br. brachydontio* ciliis nullis interpositis.

Patria. Columbia, prov. de Caracas ad Galipan alt. 5000': Funck et Schlim mense Januar. Collect. Lindenian. No. 346.

Br. brachydontio simillimum, forma caulis et structura foliorum *Br. nutanti* affine, sed notis laudatis facillime distinguitur.

141. *Br. brachydontium* Hmp. (in litt.); *dioicum*; diviso-ramosum inferne radiculosum laxe cespitosum, ramis gracilibus laxe foliosis; folia *lanceolata longe acuminata* angusta, margine revoluta, nervo ante apicem evanido ferrugineo, apice serrulata, anguste, *laxiuscule et pellucido-areolata*; theca in pedunculo elongato gracillimo flexuoso apice arcuato nutans, ventricoso-ovalis suburceolata, basi et ore constricto attenuata fuscescens, operculo breviter conico; peristomium *brevissimum*: dentes externi *basi latissima tenera dense trabeculati et densissime approximati*, *breves obtusi pallidi*, *superne valde rugulosi et obsolete articulati*, interni *in membrana brevissima hyalina tenerrima longiores irregulariter subulati vix hiantes valde rugulosi pallidi*, ciliis rudimentariis vel nullis interpositis.

Patria. Java in saxis sylvarum montis Merapi meridionalis alt. 3—4000': Junghuhn. — *Aprili*.

Br. nutanti ex habitu fruct. affine, ex areolatione autem foliorum ad *Br. carneum* magis accedens, notis laudatis peristomio praesertim ab omnibus congeneribus distinctissimum. — Planta mascula gracillima saepe ramosa et floribus 1—3 gemmaceo-capituliformibus praedita. Folia perigonialia e basi latissima ventricoso-vaginantе fusca sensim subulata subexcurrentinervia integerrima laxe areolata. Antheridia multa crassa, paraphysibus paucis brevibus cincta.

142. *Br. flexuosum* C. Müll.; laxe cespitosum subgregarium humillimum simplex; folia lineari-subulata,

superne denticulata, nervo tenui excurrente; theca in pedunculo elongato valde et arcuato-flexuoso inclinata vel suberecta cylindracea angusta brevicolla operculo rostrato-subulato praedita. †.

Pohlia flexuosa Hook. in Wallich Cat. n. 7591. et Harvey in Lond. Journ. of bot. 1840. II. p. 9; ic. in Hook. Ic. Pl. t. 19. f. 5.

Patria. Nepal: Wallich.

Ex ic. *Br. elongato* quoad structuram foliorum affine. Inflorescentia androgyna?

143. *Br. cucullatum* Schwägr. (Suppl. I. II. p. 94. t. 68.); monoicum, antheridia in axillis foliorum superiorum libera majuscula; caulis humilis laxe cespitosus erectus vel basi declinatus radiculosus ramulosus inferne remotifolius, superne dense comosus; folia inferiora latiusculo-orato-lanceolata obtusiuscula integerrima, superiora lanceolata angustiora longiora, margine revoluta, apice denticulata; omnia parva nervo crassiusculo subferrugineo evanido praedita valde concava, anguste sed laxiusculo-arcolata viridissima mollissima; perichaetia intima multo minora acuminata obsolete denticulata; theca in pedunculo breviusculo flexuoso crassiusculo purpurascens pendula ovalis crassiuscula brevicolla fuscescens, operculo hemisphaerico-conico obtuso parvo.

Br. Europ. l. c. p. 27. t. 7. — *Brid* I. p. 649. — *Pohlia cucullata* Schwägr. Sp. Musc. p. 73. et Bruch Regensb. bot. Zeit. 1826. p. 274. *Brid.* I. p. 840. — *Pohlia laetevirens* De Not. Mant. n. 7. et Syllab. p. 111. forma robusta.

Patria. In alpinis et subalpinis ad terram humidam. E Finmarkia prius habuit Hedwig; praeterea in monte Hoheneck Vogesorum: Mougeot, Blind, W.P. Schimper; in alpibus Penninis, Tirolis et Carinthiae: Comba, Funk, Hoppe, Helvetiae: Thomas, Schleicher, Salisburgiae, Norvegiae, Sueciae, Lapponiae et in Groenlandia ubi primus legit Giseke. E rarissimis! — *Aestate.*

Ex habitu *Br. nutanti* simile, sed peristomio, cujus dentes interni angusti teneri ciliis rudimentariis fugacissimis interpositi, foliorum arcolatione omnino laxiore, fo-

liis inferioribus obtusioribus latioribus, theca microstoma atque operculo parvo differt.

144. Br. polymorphum Br. et Sch. (Bryol. Europ. l. c. p. 25. t. 8.); *monoicum*, *antheridia in axillis foliorum superiorum libera per paria disposita*; habitus *Bryi acuminati*, sed densius cespitosum humile coma densiore subclausa; folia oblongo-lanceolata, parum revoluta, apice serrulata, evanidinervia, minutissime angustissime et densissime infima basi quadrato-areolata; theca *oblongo-pyriformis brevicolla*, horizontalis, operculo plus minus conico-acuminato; perist. *Bryi acuminati*.

Pohlia polymorpha Hpp. et Hsch. Regensb. bot. Zeit. 1819. p. 95. — Brid. l. p. 619. — *Pohlia minor* Schleich. Cent. IV. n. 19. et Brid. l. p. 611. — *Pohlia polyseta* Hpp. et Hsch. l. c. p. 99. Brid. l. p. 617. — *Br. acuminatum* γ. *polysetum* Br. Europ. l. c. p. 21. — *Pohlia polymorpha* γ. *polyseta* Hüb. Musc. Germ. p. 470. — *Pohlia brachycarpa* c. *polyseta* Schw. Sp. Musc. p. 72. — *Pohlia pulchella* Hpp. et Hsch. l. c. Brid. l. p. 613. — *Bryum acuminatum* γ. *polysetum* Br. Europ. l. c. p. 21. — *Pohlia gracilis* γ. *pulchella* Hüb. Musc. Germ. p. 472. — *Webera elongata* β. *minor* Schwägr. Sp. Musc. p. 49. — *Pohlia xanthocarpa* Hpp. et Hsch. l. c. p. 97. Brid. l. p. 617. — *Br. acuminatum* γ. *polysetum* Br. Europ. l. c. p. 21. — *Pohlia gracilis* β. *xanthocarpa* Hüb. l. c. p. 472. — *Pohlia brachycarpa* Schw. Sp. Musc. p. 72. — *Pohlia tenella* Hpp. et Hsch. l. c. p. 95. Brid. l. p. 614. — *Br. acuminatum* δ. *tenellum* Br. Europ. l. c. p. 21. — *Pohlia polymorpha* δ. *tenella* Hüb. l. c. p. 470. — *Pohlia brachycarpa* Schwägr. Sp. Musc. p. 72. — *Pohlia dimorpha* De Not. Spic. n. 4. et Syllab. p. 112. — *Pohlia affinis* Hpp. et Hsch. l. c. p. 97. — *Pohlia minor* δ. *affinis* Brid. l. p. 612. — *Webera elongata* β. *minor* Schwägr. Sp. Musc. p. 49. — *Pohlia gracilis* H. et Hsch. l. c. p. 100. Brid. l. p. 618. Hüb. Musc. Germ. p. 472. — *Pohlia brachycarpa* Schwägr. Sp. Musc. p. 72. — *Br. polymorphum* δ. *gracile* Br. Europ. l. c. p. 25. — *Pohlia brachycarpa* H. et H. l. c. p. 96. Brid. l. p. 616. Schwägr. l. c. p. 72. — *P. polymorpha* ε. *brachycarpa* Hüb. M. Germ. p. 470. — *Br. polymorphum* ε. *brachycarpum* Br. Europ. l. c. p. 25. — *P. curviseta* H. et Hsch. l. c. p. 98. Brid. l. p. 618. — *Meesia curviseta* Schwägr. Suppl. III. l. tab. 234. — *Br. polymorphum* ε². *curvisetum* Br. Europ. l. c. p. 25. — *P. clavata* Sendtn. in schedulis. var. *robusta*.

Patria. In subalpinis atque alpinis ad terram et in rupium fissuris per totam fere Europam. — *Versus aestatis finem.*

Species maxime polymorpha et nomine digna, habitu *Br. acuminato* saepe similis, sed inflorescentia atque theca brevicolla plerumque crassiore et operculo hemisphaerico conico praedita certe distincta.

3. *Peristomium Weberae*.

a. *Inflorescentia hermaphrodita*.

145. *Br. pyriforme* Hdw. (Hist. Musc. I. t. 3. f. 12.); laxe cespitosum simplicissimum, raro apice innovans, erectum subelatum velutino-viride gracillimum, inferne foliis minutissimis, *apice longissimis e basi latiore setaceis subcrispis nervo latissimo crasso in laminam folii dilatato excurrente cuspidatis, basi sublaxe, superne angustissime areolatis denticulatis* comosum; theca in pedunculo elongato gracillimo *inclinato-nutans e collo longo vesiculari-pyriformis tenerrime membranacea laevissima nitida* primum pallida, dein fusca, operculo concolori vel aurantiaco conico-acuto.

Br. Europ. l. c. p. 45. t. 18. — *Br. Webera pyriformis* Brid. I. p. 631. — *Webera pyriformis* Hedw. Musc. Frond. I. p. 5. t. 3. — *Br. aureum* Schreb. Spic. Fl. Lips. p. 81. — *Br. pendulum* Ehrh. Crypt. exs. n. 163. — *Br. mnioides* Gmel. Syst. Not. II. p. 1330. — *Br. trichodes aureum capitulis pyriformibus nutantibus.* Dill. Musc. p. 391. t. 50. f. 60. — *Mnium pyriforme* L. Spec. Pl. p. 1576. — *Hypnum pyriforme* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 274.

Patria. In locis valde humidis in fissuris rupium atque murorum et in terra turfosa per Europam, Asiam et Americam septentrionalem. — *Majo, Junio.*

Peristomii interni dentes maxime sulcati et hiantes valde serrati igitur veluti (sed non) appendiculati hyalini, ciliis solitariis brevibus non appendiculatis hyalinis interpositis. Formam peristomii hancce in speciminibus per multis examinatis invenimus, et Bryol. Europ. indolem non vidimus. Planta igitur ad *Weberas* veras pertinet et vicinitatem *Bryi elongati* tenet, e reliquis autem solitaria.

b. *Inflorescentia dioica*.

146. *Br. Sphagni* Brid. (l. p. 852.); caule longissimo gracillimo ramoso remote folioso fragilissimo; folia

inferiora minuta ovato-acuminata, superiora sensim magis conferta et majora, dein comam polyphyllam formantia, oblongo-elongato-et lineali-lanceolata, apice serrata nitida, omnia e cellulis pachydermis densis minutis flavis areolata, nervo crasso plus minus flexuoso purpurascente ante apicem abrupto praedita; perigonialia intima tenuissima subnervia laxè areolata; perichaetialia anguste lanceolata; theca in pedunculo longissimo gracillimo nutans oblongo-obconica, operculo magno convexo aurantiaco mammillato, peristomio magno pallido.

Br. sphagnicola Br. et Sch. Br. Europ. Fasc. XXXII. Suppl. p. 6. tab. 7. ex ic. et descript. cum planta *Brideliana*, nobis in ej. hb. visa, omnino convenit. Folia horum speciminum magis obtuso-acuminata.

Patria. In sphagnosis turficeis insulae Terre Neuve sterile legit: La Pylaie. In locis iisdem ad lacum Lysager prope Christianiam Norvegiae meridionalis: W. P. Schimper 1844. — *Julii initio.*

Inter *Br. nutans* et *crudum* intermedium, sed notis laudatis pulcherrima species, inter *Sphagna* gregarie degens. — Flos masculus illi *Bryi crudi* similis subcapituliformis.

147. *Br. annotinum* Hdw. (Sp. Musc. p. 184. t. 43.); dense gregarium subsimplex vel inferne innovationibus ramosum, in axillis foliorum plerumque gemmis foliaceis praeditum, erectum humile gracile; folia caulina patentia, inferiora lato-lanceolata evanidinervia concaviuscula stricta, superiora longiora acuminata margine parum revoluta, apice denticulata, e cellulis angustis densis sed inanibus viridibus composita submollia; perichaetialia intima multo minora; theca in pedunculo longiusculo flexuoso nutans oblongo-pyriformis parva pallida, operculo conico breviter acuto aurantiaco.

Br. Europ. l. c. p. 40. t. 15. — Brd. l. p. 662. — *Webera annotina* Schwägr. Sp. Musc. p. 52. — *Mnium annotinum* L. Sp. Pl. p. 1576. — *Hypnum annotinum* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 280. — *Trentepohlia erecta* Roth in Usteri Annal. bot. X. p. 52. — *Bryum annotinum lanceolatum pellucidum* capsulis oblongis

pendulis. Dill. Musc. p. 399. t. 50. f. 68. — *Br. decipiens* Brid. I. p. 687.?

Patria. Per totam Europam in arenosis et argillosis humidis. — *Majo, Junio.*

Planta mascula elongata gracillima laxifolia, flore crassiusculo - gemmaceo. Folia perigonialia externa, e basi lata vaginante laxiusculo - areolata subito acuminata angusta valde revoluta serrulata evanidinervia, interiora multo minora denticulata. Antheridia numerosa, paraphysibus aureis cincta. Peristomium *Weberae* parvum.

148. *Br. pulchellum* Hdw. (Musc. Frond. III. p. 95. t. 38.); laxe cespitosum simplex humile; habitus *Bryi carnei*; folia inferiora lanceolata, superiora acuminata longiora, omnia *angustissime elongate et densissime areolata viridissima*, margine revoluta, apice serrulata evanidinervia; theca in pedunculo longiusculo flexuoso purpurascente apice arcuato subito pendula regularis ovali-pyriformis brevicolla exannulata, operculo hemisphaerico-conico breviter mammillato; peristomium *Bryi carnei*.

Br. Europ. l. c. p. 42. t. 15. — Brid. I. p. 651. — *Mnium pulchellum* P. B. Prodr. p. 76.

Patria. Ad terram alpium Tirolis, Helvetiae, Salisburgiae, Carinthiae, Gothiae Scandinaviae, Lapponiae et Islandiae e Schwägrichen. — *Aestate.*

Planta mascula gracilior ramosa, flore gemmaceo et foliis perigonialibus ovato - lanceolatis, internis apicem versus recurvis, omnibus apice serrulatis. A *Br. carneo* notis cursive impressis distinctissimum.

149. *Br. Ludwigii* Spreng. (Schwägr. Suppl. I. II. p. 95. t. 68.); *caulis fertilis decumbens innovationibus ascendentibus*; folia inferiora lato - ovalia, media late ovali-lanceolata ut summa lanceolata apice serrulata, omnia concava margine reflexa plicata evanidinervia, subanguste et subdense areolata plus minus viridia; perichactialia intima lanceolata multo minora; theca in pedunculo geniculato-ascendente tenuissimo pendula oblongo-pyriformis parva pallida, dein fuscescens vel atropurpurea, operculo hemisphaerico-conico obtuso vel mammillari.

Br. Europ. l. c. p. 38. t. 14. — Brid. l. p. 647. — *Br. Weigelia* Spreng. Cent. Pl. p. 42. — *Mnium turbinatum* β . *Ludwigii* Roehl. Dent. Fl. III. p. 95.

β . *gracile*; elongatum gracile subfiliforme foliis appressis parvis minoribus lanceolatis, coma clausa, theca brevior et bulbillis in axillis foliorum numerosis. *Br. gracile* Schleich. Br. Europ. l. c. p. 39.

Patria. In subalpinis et alpinis ad loca aquosa frigida Sudetorum ubi Ludwig am Schneeegraben et am Weisswasser detexit, Hercyniae, Vogesorum, Helvetiae, Norvegiae, Sueciae atque Lapponiae. — *Aug., Sept.*

A *Br. cucullato* inflorescentia, peristomio atque thecis tenuissime pedunculatis parvis differt. — Planta mascula femineae similis, flore gemmaceo et foliis perigonalibus externis e basi dilatata lanceolatis obsolete denticulatis, interioribus brevioribus dilatatis acuminatis integris nervo ultra medium producto praeditis. Antheridia per paria in axillis fol. intim. disposita. Peristomium *Weberae*; dentes interni valde hiantes apice serrati hyalini ciliis tenuissimis 2—3 inaequalibus nodosiusculis interjectis.

150. **Br. crudum** Schreb. (Spic. Fl. Lips. p. 83.); *rarius hermaphroditum*; cespitosum erectum subulatum flavo-nitens, caule atro fragili, amoene foliosum, apicem versus crescens, gracile; folia caulina *latiusculo-orata acuminata evanidinervia subintegerrima, angustissime et longissime areolata*; perichaetialia *externa multo longiora et angustiora flexuosa remota dentata*, intima minuta lanceolata, omnia nervo purpurascente praedita; theca in pedunculo gracili arcuato-flexuoso cylindrico-pyriformis curviuscula erecta, horizontalis vel inclinato-pendula fuscescens, operculo brevissime conico concolori.

Br. Europ. l. c. p. 37. tab. 13. — *Bryum Polla cruda* Brid. l. p. 693. — *Bryum pendulum* horum molle foliis et lanceolatis et gramineis. Dill. Musc. p. 401. t. 51. f. 70. — *Mnium crudum* Hdw. Musc. Frond. l. p. 99. t. 88. — *Webera cruda* Schwägr. Sp. Musc. p. 50. — *Web. intermedia* Schleich. Cent. IV. n. 18. forma foliis omnibus angustioribus longioribus cuspidatis. — *Hypnum crudum* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 290.

Patria. Per totam Europam praecipue in montosis ad declives umbrosas humidias haud raro. — *Vere*, in alpidibus *Julio* et *Augusto*.

Flores hermaphroditi polyphylli, antheridiis in axillis foliorum involucralium dispositis. In inflorescentia dioica flos masculus terminalis crasse gemmaceus subcapituliformis, folia perigonialia externa perichaetialibus externis similia, interna e medio arcuato-recurva remote denticulata, interna multo minora latiora vaginantia cuspidata apice crenato-dentata, multo laxius areolata purpurascencia. Antheridia maxima elongata clavata paraphysibus carentia. — Peristomium ut in *Br. longicollo*.

Br. longicollo ex habitu simillimum, notis autem illustratis distinctissimum.

151. **Br. Schimperi** C. Müll.; dense cespitosum; caulis *gracilescens* e foliorum axillis radicans; folia *rufa*, *inferiora remota minuta* ovato-acuminata, superiora et summa in comam subimbricatam conferta, oblongo-et elongato-lanceolata, *apice subserrulata*; theca *breviusculo-pedunculata* nutans vel pendula, oblongo-pyriformis mollis, operculo convexo mammillari; peristomium pallidum dentibusque multoties articulatis, processibus hyalinis, multoties pertusis, ciliis nodosis.

Br. rutilans Br. et Sch. Br. Europ. Fasc. XXXII. Suppl. p. 5. t. 6. — Nomen mutandum erat, quum *Bryo aeneo* Blytt a *Bridelio* jam prius impositum fuerit.

Patria. In uliginosis prope Jerkin alp. Dovrefjeld Norvegiae: W. P. Schimper. In uliginosis infra finem betulae ad orient. Jättafjeld Norvegiae primus omnium legit Cl. Lessing, Composit. monogr. — *Junio, Julio*.

Flos masculus ut in *Bryo crudo*. — *Br. nutanti* proximum sed differt foliis rufis densius areolatis, inflorescentia dioica atque peristomio minori. — In speciminibus *Lessingianis* thecam minutam rugulosam invenimus. — Species maxime pulchella et primo adpectu partibus tenellis minutis, omnibus caulibus gracillimis tenerrimis foliisque rufescentibus facile distinguitur. Planta mascula simplicissima gracillima, flore crasso capituliformi terminata.

Obscuriora.

152. Br. tenuifolium Hook. et Wils. (Lond. journ. of bot. 1844. p. 546.); *dioicum*; caulis humilis simplex; folia erecto-subsecunda lanceolato-subulata acuta integerrima margine reflexa evanidinervia; perichaetialia longiora attenuata; theca subpendula oblonga curvula basi obconica subapophysata, operculo conico. †.

Patria. Ad Insel-Bay Novae Seelandiae: J. Hooker.

Minutum, *Bryo polymorpho* Br. et Sch. simile, capsula autem valde diversa, peristomio interno ciliato.

c. Inflorescentia monoica.

153. Br. nutans Schreb. (Spic. Fl. Lips. p. 81.); *hermaphroditum*; *vel androgynum*, antheridia in axillis foliorum perichaetialium per paria disposita libera; habitus *Bryi elongati*, sed dense cespitosum, humile; folia inferiora ovato-lanceolata obsolete denticulata, superiora elongato-acuminata angustia flexuosa, margine parum revoluta, apice serrulata, nervo crassiusculo subexcurrente, praedita, omnino elongate et subanguste basi autem subpellucide et laxiusculo-areolata, viridissima mollia, perichaetialia intima multo minora sed angusta lanceolata acute acuminata subdenticulata; theca in pedunculo elongato flexuoso pendula ovali-pyriformis crassiuscula plus minus brevis brunneo-fusca, operculo majusculo conico.

Br. Eur. l. c. p. 34. t. 12. — *Bryum Webera nutans* Brid. I. p. 634. — *Webera nutans* Hedw. Musc. Frond. I. p. 10. t. 4. — *Hypn. nutans* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 289. — *Mnium nutans* P. B. Prodr. p. 75. — *Bryum trichodes* Hdw. Fund. Musc. I. t. 4. f. 16—20. — *Webera trichodes* Hdw. Fund. Musc. II. p. 95. — *Br. trichodes* laete virens capitalis cernuis oblongis. Dill. Musc. p. 391. t. 50. f. 61. — *Webera mutabilis* Hdw. Fund. Musc. II. p. 104. t. 6. f. 28. — *Bryum Webera fasciculata* Brid. I. p. 627. e Schwägr. Sp. Musc. p. 51. — *Webera cespitosa* Hsch. et Hpp. Regensb. bot. Zeit. II. p. 102. — *Bryum Webera cespitosa* Brid. I. p. 629. et Br. Europ. l. c. var. β. — *Bryum Webera subdenticulata* Brid. I. p. 634. et Br. Eur. l. c. var. δ. — *Br. Webera pendula* Brid. I. p. 636. e Schwägr. Sp. Musc. p. 51. — *Webera bicolor* Hpp. et Hsch. l. c. p. 102. — *Br. Webera bicolor* Brid. I.

p. 630. Br. Europ. l. c. var. γ . — *Br. Webera longiseta* Brid. l. p. 636. foliis longiacuminatis. — *Webera strangulata* Nees ab Es. in Hüb. Muscol. Germ. p. 428. e spec. *Sendtnerianis* forma robustior.

Patria. Ad saxa, rupes, in terra sicca, humida, ericetorum et turfosorum per totam Europam. In America septentrionali atque arctica et Asia boreali. — *Vere, in editioribus alpinis aestate vel versus auctumni initium.*

Species polymorpha, plantis *Bryo elongato* similibus sed dense cespitosis atque thecis crasso-ovalibus pyriformibus pendulis brunneo-fuscis brevicollis primo adspectu facillime cognoscitur. — Peristomii interni dentes longi valde hiantes pallidi tenuissime subulati appendiculato-serrati, ciliis binis apice subconnatis longissimis tenuissimis nodosiusculis interjectis.

154. Br. longicollum Sw. (Musc. Suec. p. 49. t. 6.); *monoicum, antheridia elongata clavaeformia*, in axillis foliorum superiorum libera; habitus *Bryi elongati*, sed *plantae dense cespitosae elatae robustae* apice innovantes, dense foliosae; folia nitentia majora latiora laxius et longius areolata molliora magis concava; theca robusta collo breviori crassiori perfecte subgibboso-inclinata; dentes peristomii externi robusti valde et furcato-trabeculati flavi apice rugulosi, interni robustiores exacte serrati hiantes perfecte sulcati ciliis binis longissimis tenuissimis nodosis lacriusculis interpositis.

Br. Eur. Fasc. XXXII. Suppl. p. 7. icon. in Fasc. VI — IX. t. 11. var. β . — *Webera longicollis* Hdw. Sp. Musc. p. 169. t. 41. — *Bryum Webera* Brid. l. p. 625. vix hb. — *Web. alpina* Hsch. Regensb. bot. Zeit. 1819. l. p. 104. et Brid. l. p. 626. — *Web. Grimsulana* Brid. l. p. 628. — *Br. elongatum* β . *alpinum* Br. Eur. Fasc. VI — IX. p. 32. — *Hypnum longicollum* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 291. — *Orthopyxis longicolla* P. B. Prodr. p. 79. — *Webera pennina* De Not. in sched. s. *Bryum Boissieri* ej. Syllab. p. 134. e spec. forma minor huc pertinet.

Patria. In alpibus Carinthiae, Tirolis atque Helvetiae. — *Auctumno.*

155. Br. elongatum Dicks. (Fasc. II. Pl. Crypt. p. 8.); *monoicum vel androgynum, antheridia copiosa majuscula*

per paria in axillis foliorum libera; gregarie cespitosum; caulis humilis simplex rarissime apice innovans, inferne subnudus superne crescens, apice foliis erectis patentibus comam apertam efficiens; folia caulina e basi subrotundata lanceolato-acuminata, nervo crassiusculo fuscescente excurrente breviter cuspidata, margine revoluta, *plerumque subfalcata, apicem versus serrata subnitida firma*, angustissime areolata *plus minus pellucida*; perichaetialia intima minora e basi latiuscula lanceolato-cuspidata, *inferne integra, apice serrata, firma*; theca longiuscule pedunculata elongato-cylindrica angustissima pallida, suberecta vel horizontalis longicolla, operculo conico brevi aurantiaco; peristomii dentes externi lanceolato-subulati subangusti pallidi *laeviusculi*, interni in membrana hyalina *trienti-breviore angusti tenuissime subulati apice serrulati vix sulcati plerumque hiantes vix rugulosi, ciliis 1—2 brevibus irregularibus rugulosis interpositis.*

Br. Europ. l. c. p. 32. — *Webera elongata* Schwägr. Sp. Musc. p. 48. — *Pohlia elongata* Hedw. Musc. Frond. l. p. 96 tab. 36. et Brid. l. p. 608. — *Leskea elongata* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 243. — *Pohlia cylindrica* Hsch. et Hopp. Regensb. bot. Zeit. 1819 l. p. 93. — *Pohlia elongata* β . *cylindrica* Brid. l. p. 610. et *Bryum cylindricum* Dicks. Crypt. Fasc. IV. p. 12. t. 11. f. 4.

β . *macrocarpum*; theca brevior pro magnitudine crassiore, sicca deoperculata sub orificio constricta, peristomii interni processibus longioribus, saepe apice cohaerentibus, ciliis plurimo tempore regularibus. Br. Europ. l. c. var. γ . — *Webera macrocarpa* Hsch. in Regensb. bot. Zeit. 1819. l. p. 104. — Br. *Webera macrocarpa* Brid. l. p. 628.

Patria. Per totam Europam in montosis ad terram humidam umbrosam. — *Augusto, Septembri.*

156. Br. leptoblepharon C. Müll.; *monoicum, antheridia et archegonia crassiora quam longa numerosa, paraphysibus carentia, foliis floralibus intimis multo minoribus acuminatis evanidinerviis tenerioribus crenulatis interpositis*; gregarie cespitosum, habitus et theca *Bryi elongati*; folia caulina confertiora latiora magis falcata serrulata *vix nitida*; peristomii dentes externi apice

valde rugulosi, interni in membrana trienti-breviore angusti tenuissime subulati apice serrulati exacte sulcati latiores rugulosi, ciliis binis longissimis dentes aequantibus tenuissimis rugulosis nodosiusculis interpositis.

Patria. Prom. bon. spei prope Zwelleudam et ad Grootvadersbosch: Ecklon. *Octobr. 1826.* Hb. Kunzeanum.

A *Br. elongato* notis laudatis differt et primo adspectu caulibus densius foliosis partibusque omnibus robustioribus distinguitur.

157. *Br. integridens* C. Müll.; *monoicum, vel androgynum, antheridia paucissima minuta solitaria in axillis foliorum superiorum libera paraphysibus paucis praedita; gregarium; habitus Bryi elongati; folia caulina e basi utrinque rotundata lanceolato-acuminata, nervo crassiusculo fuscescente excurrente breviter cuspidata, margine revoluta, apicem versus denticulata, vel serrulata, haud nitida mollia, angustissime areolata, viridissima; perichaetia intima multo minora lato-lanceolata acuminata excurrentinervia teneriora, apice denticulata, inferne crenulata; theca longiusculo-pedunculata, elongato-cylindrica angustissima pallida suberecta vel horizontalis longicolla, operculo conico brevi aurantiaco; peristomii dentes externi lanceolato-subulati angusti pallidi apice rugulosi, interni in membrana hyalina dimidio breviore angusti subulati omnino rugulosi vix sulcati, haud hiantes, ciliis 2—3 brevibus irregularibus valde rugulosis fugacissimis interpositis.*

Patria. Mexico: C. Ehrenberg.

A *Br. elongato* notis cursive impressis differt.

Inflorescentia ignota.

158. *Br. nitens* Hook. (in Wall. Cat. n. 7592. et Harv. in Lond. Journ. of bot. 1840. II. p. 9.; ic. in Hook. Ic. Pl. t. 20. f. 6.); *gracile erectum subhumile laxe cespitosum; folia ovata acuta quadrate et majusculo-areolata, e basi usque ad apicem serrulata, nervo crasso excur-*

rente praedita, excellentissime viridia splendentia; theca brevi-pedunculata oblonga cernua subhorizontalis, operculo conico-acuminato. †.

Patria. Nepal: Wallich.

Dentes peristomii externi angusti, interni valde hiantes angusti illos aequantes, ciliis binis brevioribus interpositis.

Obscuriora.

159. **Br. gracilisetum** Hsch. (Fl. Bras. Fasc. I. p. 44.); caulis brevissimus innovationibus brevibus apice incrassatis; folia caulina erecto-patentia, inferiora remota lanceolata, superiora conferta lanceolata cuspidata canaliculata integerrima amoene viridia, nervo valido ferrugineo in cuspidem brevem excurrente, retis areolis parallelogrammis angustissimis, perichaetialia exteriora caulinis similia, interiora longiora angustiora longius cuspidata; theca in pedunculo erecto gracili purpurascente parum flexuoso pendula oblongo-cylindrica flavo-brunnea dein atropurpurea, operculo brevissimo conico-apiculato purpureo apiculo fusco. †.

Patria. In solo argilloso humido inter *Trematodontes* prope Novo-Friburgum: Beyrich.

Br. longiseto Schwägr. proxime accedit, differt autem: statura duplo minore, foliis breviter cuspidatis, pedunculo duplo brevior, theca oblongo-cylindrica, operculo conico-apiculato.

160. **Br. multiflorum** C. Müll.; *monoicum; flores masculi gemmiformes axillares numerosi, antheridiis atque archegoniis sterilibus nonnullis intermixtis; dense cespitosum humile, basi fastigiato-ramosum; folia imbricata erecto-patentia oblongo-ovata acuminata carinata integerrima lurido-viridia, nervo crasso carinato fusco excurrente; perichaetialia et perigonialia interiora longiora angustiora longius acuminata; theca in pedunculo parum flexuoso apice reflexo purpurascente pendula, cylindrica laevis viridi-brunnea, sicca et deoperculata angustata, ore amplo purpureo, operculo conico apiculato rufescente;*

peristomii dentes interni in membrana lutescente, ciliis binis tenerrimis interpositis. †.

Webera pulchella Hsch. Fl. Bras. Fasc. I. p. 43.

Patria. In muris pr. Sebastianopolin: Merkel, pr. Tijuca: Olfers. — *Julio et Augusto.*

Cui affine?

161. Br. soboliferum Tayl. (Lond. Journ. of bot. 1846. p. 51.); *dioicum*; laxe cespitosum brunneo-viride; caulis fertilis brevissimus foliis congestis, innovationibus elongatis filiformibus erectis, foliis distantibus erecto-patentibus margine planis subserrulatis; theca elongate pyriformis nutans, operculo conico; peristomium internum ciliis solitariis. †.

Patria. In Pichincha prope Quito: W. Jameson, 1842.

162. Br. Zollingeri Dub. (Moritzi, Systemat. Verz. p. 133.); *dioicum?* cespitosum erectum subdichotomum, caulis basi foliis antiquioribus marcescentibus onustis; folia erecto-patula laxe sed ad apicem rami densius imbricata, siccitate crispa, serrata, lanceolata vel ovato-lanceolata acuminata, juniora angustiora vix marginata; theca in pedunculo terminali sed innovationibus laterali stricto erecto elongato horizontalis v. subcernua pyriformis, operculo conico brevi. †.

Patria. Java ad rivulos montis Pangerango alt. 5000—6000': Zollinger collect. No. 1944. Non accepimus.

163. Br. ? recurvifolium Tayl. (Edinb. Trans. of the Bot. Soc. 1845. II. I.); caulis erectus subsimplex subflexuosus; folia oblongo-ovata acuta laxa ex amplexante basi recurvantia margine flexuosa minutissime serrulata. †.

Patria. Hibernia apud montem Knocka vohila prope Dunkerron in Comit. Kerriensi.

Ex habitu *Dicrani squarrosi* et e structura *Br. cuspidato* simile.

164. **Br. palmifolium** Brid. (I. p. 687.); caulis tenuis apice ramosus, folia linearia oblonga acuta remota alterna solidinervia, nervo viridi. †.

Mnium palmifolium P. B. Prodr. p. 76.

Patria. In insula Bourbonis sterile lectum, suspectissimum. Forte *Fissidens* e *Bridelio*.

165. **Br. Bridelianum** C. Müll.; caulis erectus, innovationibus ramosus; folia ovato-lanceolata, e nervo crasso colorato excurrente longe acuminata, acumine subpiliformi, margine integerrima sicca subcrispula, obscure viridia, lineari-areolata, patenti-erecta; theca in pedunculo flexuoso-erecto gracili dilute castaneo nutans, oblonga, cum apophysi nigricante basilari anguste obconica subrugosa pyriformis badia; operculo convexo-apiculato; peristomii *Weberae* dentes externi profunde rubri, interni albidi pulchre perforati, ciliis 2 duplo brevioribus interjectis. †.

Br. Webera flexuosa Brid. I. p. 843.

Patria. Insula Terre Neuve in uliginosis: La Py-laië.

Ex observ. auctoris *Br. longicollo* e theca affine, forte hermaphroditum. In hb. auct. non vidimus.

Trib. XVI. DICRANACEAE.

Cespitosae rarissime gregariae acrocarpicae innovando ramosae vel ramis fertilibus apice pluries divisae. Folia lanceolata vel subulata, canaliculato-concava, nervo plerumque dilatato applanato rarius tenui, vix terete praedita. Retis cellulae *prosenchymaticae parenchymaticis saepe mixtae*, raro papillosae, plerumque inanes, saepe superne incrassatae, igitur rotundatae vel ellipticae; *basilares ad margines folii aggregatim dispositae, distincte diversae: parenchymaticae laxae crassae magnae*

planæ vel ventrum plus minus crassum et paleliformem efficientes, teneræ vel robustæ, hyalinae, fuscae, brunneae vel purpureae, dein marcescentes, plerumque maxime conspicuae (cellulae alares). Theca ovalis vel cylindrica, nunc arcuata nunc stricta, basi apophysata vel strumosa, operculo subulato. Peristomia purpurea, dentibus trabeculatis. Archegonia longissime apiculata, nucleo parvo praedita. Antheridia clavata. Paraphyses filiformes.

Leptotrichaceis ex habitu proximæ, sed cellulis alaribus ab his ceterisque muscis *acrocarpicis* distinctissimæ et facillime discernibiles.

Patria. Per orbem totum terrarum, regiones omnes atque loca diversissima habitantes. 24.

Weisiaceae Hmp. ex parte. — *Dicranaceae* Br. Europ. ex parte.

Gen. I. **Blindia** Br. et Sch.

Br. Europ. Fasc. 33 — 36. — *Weisia* auct. — *Grimmia* Turn. — *Schistidium* Brid. — *Anoetangium* Schwägr. — *Gymnostomum* Web. et M. — *Stylostegium* Br. et Sch.

In honores pastoris Blind Monasterii Vogesorum bryologi indefessi nomen impositum.

Calyptra *dimidiato - cucullata*. Peristomium nullum vel simplex: *dentes 16 aequidistantes lanceolati remote articulati laeves tenues intus leviter trabeculati purpurei cartilaginei*. Theca exanulata. Antheridia oblonga paraphysibus filiformibus mixta.

1. **Bl. acuta** Br. et Sch. (l. c. *Blindia*, c. tab.); *dioica*; laxæ et late cespitosa erecta elata gracilis ramossissima lutescens rigidiuscula; folia caulina conferta erecto-patentia interdum secunda oblongo-lanceolata *linearisubulata acuta tenuinervia subintegerrima convolutaeo-concava*; perichaetialia e basi lato-vaginate sublonga subito et plicato-subulata; theca brevi-pedunculata py-

riformi – ovalis peristomata pallida erecta, operculo depresso longe subulato obliquo aurantiaco.

Weisia acuta Hdw. Musc. Frond. III. p. 85. t. 35. — *W. rupestris* Hdw. Sp. Musc. p. 72. t. 14. — *W. fastigiata* Bryol. Germ. II. II. p. 120. t. 35. f. 31. forma humilior brevius pedunculata. — *Grimmia acuta* Sm. Fl. Brit. III. p. 1192. — *Bryum acutum* Dicks. Herb. Sicc. Fasc. XVII. 20. Br. pilosum sphagni subulati facie. Dill. Musc. p. 374. t. 47. f. 34.

Patria. Ad rupes madidas per regionem alpinam et subalpinam totius Europae, in America septentrionali et in insula Eremitae prope Cap. Horn: J. Hooker. — *Aestate.*

Flos masc. terminalis gemmaceus ovalis fuscus, foliis perigonalibus lato-convolutis breviter acuminatis obsoletinervibus.

2. Bl. stricta C. Müll.; *dioica*; laxa et late cespitosa parce ramosa erecta flexuosa flaccida haud rigida, apice convolutaceo-foliosa incurva gracilis lutescens; folia caulina conferta secunda latiora oblongo-lanceolata subulata integerrima falcata obtusiuscula crassinervia; perichaetialia longe vaginantia; theca breviter pedunculata peristomata subrotunda longius operculata, calyptra maxime lata dimidiata.

Weisia stricta Hook. et Wils. in Lond. Journ. of bot. 1844. p. 540.

Patria. Insula Kerguelen antarctica: J. Hooker.

A praecedente simillima notis cursive impressis differt.

3. Bl. tortifolia C. Müll.; *dioica*; laxa cespitosa subhumilis densifolia inferne nigrescens superne lutescens parce et breviter ramosa; folia caulina ubique patentia, siccitate torta, madefacta stricta, apice parum falcata, lanceolata angusta integerrima obtusiuscula, minutissime quadrato-areolata, cellulis alaribus parvis quadratis robustioribus fuscis, nervo latiusculo fuscidulo vel concolore; perichaetialia e basi lato-ovata firma inferne tenera convolutacea subito fere et breviter acuminata, e reliquis caulinis similia; theca paullo exserta innovatione lateralis rotunda longe et oblique operculata glaberrima fusca ni-

tida; perist. dentes breves lanceolati aurantiaci; calyptra maxime lata dimidiata.

Weisia tortifolia Hook. et Wils. Lond. Journ. of bot. 1844. p. 540.

Patria. Insula Kerguelen: J. Hooker.

A *Bl. stricta* affine notis cursive impressis primo adspectu distinguitur. E foliis crispatis *Bl. antarcticae* similior.

4. **Bl. antarctica** C. Müll.; *monoica*; laxe cespitosa elatiuscula atro-virens ramosa densifolia erecta; folia caulina crispula ubique patentia lanceolato-subulata angusta integerrima acuta canaliculato-concava, e cellulis angustissimis incrassatis inferne elongatis superne minutissime quadratis areolata, amoene flavida vel fuscescentia angustinervia, cellulis alaribus ventricosis permultis parvis brunneis firmis; perichaetia cylindraceo-convolutacea subito acuminata, intima subobtusa, angustinervia; theca *longiuscule pedunculata oralis parva*, longe et oblique operculata, fusca nitida.

Weisia crispula Wils. in schedulis.

Patria. Insula Campbelli et Eremitae ad Cap. Horn: J. Hooker.

Bl. tortifoliae ex habitu caulium similis sed thecae forma jam primo intuitu diversa. *Weisiae crispulae* similima, sed e foliorum structura aliena. — Flos masculus ad basin perichaetii parvus, foliis lato-convolutis coloratis brevi-acuminatis integerrimis tenuinervibus angustissime et elongate areolatis; antheridiis elongatis angustis, paraphysibus parum longioribus fuscis.

5. **Bl. contecta** C. Müll.; *dioica?* laxe cespitosa erecta elata parce ramosa stricta rigida inferne fusca, superne lutescens nitida; folia caulina erecto-patentia subappressa rigida elongata, convolutacco-subulata latinnervia, *inferiora in pilum hyalinum producta*, omnia apice summo denticulata; theca *peristomata brevissime pedunculata immersa turbinata*, operculo rostrato praedita.

Weisia contecta Hook. et Wils. Lond. Journ. of bot. 1844. p. 540.

Patria. In insula Campbelli antarctica.

Fructum non vidimus.

6. Bl. Stylostegium C. Müll.; *monoica*; habitus *Bl. acutae* sed humilior et dense cespitosa erecta flexuosa fastigiato-ramosa rigida lutescens; folia caulina erecto-patentia conferta ex oblongo subulata in acumen brevissimum hyalinum producta integerrima tenuinervia; perichaetialia vaginantia multo latiora et majora; theca *immersa obovato-globosa truncata gymnostoma* pallescens, operculo aurantiaco e depresso oblique subulato, *columellae adnato*.

Stylostegium cespitium Br. et Sch. Br. Europ. Fasc. 33 — 36. *Stylostegium*, cum icone. — *Schistidium cespitium* Brid. Mant. Musc. p. 21. — *Anoetangium cespitium* Schwägr. Schrad. Neu bot. Journ. IV. p. 13. t. 2. A. — *Gymnostomum cespitium* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 77 et 452.

Patria. In summis alpibus Helvetiae, Germaniae et Scandinaviae rupes humidus habitans. — *Aug.*

Flos masc. terminalis gemmiformis minutus, foliis perigonalibus parvis lato-ovalibus breviter acuminatis obsoletinervis.

Gen. II. **Eucamptodon** Mont.

Ann. des sc. nat. 1845. 4. p. 120. t. 14. f. 3. *Weisia* (*Eucamptodon*) *perichaetialis* ej. ibid. p. 119. — Comptes rendus 1845. Septbr.

Ab εὖ perfecte, καμπτός incurvus et ὀδοῦς dens, obdentes peristomii madefactos perfecte incurvos nomen ductum.

Calyptra *dimidiata*. Peristomium simplex: dentes 16 aequidistantes lati carnosissimi linea hyalina longitudinali et lineis transversalibus nonnullis exarati purpurei, madefacti horizontaliter incurvi, integri.

Ad *Dicnemon* ex habitu accedens calyptra et peristomio autem diversus.

1. E. perichaetialis Mont.; *monoicus*; cespitosus subhumilis robustus ramosus; folia caulina erecto-patula conferta stricta oblongo-lanceolata acuminata acuta paulisper convolutaceo-concava integerrima, e cellulis elongatis *pachydermis* prosenchymaticis flavidis, alaribus vix ventricosis, areolata, nervo *vel nullo, vel partim obsoleto*; perichaetialia e basi longe vaginante convoluta *superne sinuato-rotundata subito longe flexuose et loriformi-acuminata*; theca brevipedunculata *ovalis* erecta longe rostrata.

Patria. Ad terram nudam Chiles australioris: C. Gay.

Flos masc. infra perichaetium dispositus parvus gemmaceus oblongus, foliis convuluto-ovatis breviter acuminatis enervibus, antheridiis elongatis stipitatis paraphysibus filiformibus mixtis. Gemmulae thecae, quas Cl. Montagne in *Compt. rend.* descripsit, cellulae sunt primordiales seminum juniorum.

2. E. macrocalyx C. Müll.; cespitosus valde robustus elatiusculus dichotome ramosus lutescens; folia caulina erecto-patula stricta conferta *lata* convolutaceo-acuminata integerrima, *marginibus valde involutis, obtusiuscula, perfecte enervia*, e cellulis elongatis *in membranam subhomogeneam firmam luteam veluti conflatis* areolata, cellulae alares haud ventricosae pachydermae fuscae multae; perichaetialia *in cylindrum longissime exsertum* convoluta vaginantia *lineari-lanceolata in acumen plus minus loriforme longissimum sensim attenuata*; theca erecta *cylindrica*, operculo subulato recto.

Holomitrium enerve Dz. et Molkb. Musc. Archip. Ind. t. 3. — *Dicranum enerve* Hmp. hb. — *Dicr. macrocalyx* A. Br. hb.

Patria. In locis paludosis montis Gédé insulae Javae.

E foliorum enervium structura simillima, habitu plantae et perichaetio huc retulimus. Peristomium ignotum. Dioicus ut videtur. Calyptra dimidiata.

Gen. III. **Dicnémon** Schwägr.

Suppl. II. II. 1. p. 72. — *Leucodon* Hook. — *Eucnemis* Brid. — *Iyellia* Hook.

Nomen a *δίς bis* et *κνήμη crus*, ob peristomii dentes bicerures ductum.

Calyptra campanulata. Peristomium simplex: dentes 16 basi connati, ultra medium bipartiti.

E foliis strictis involutaceo-concavis latis, caulibus turgidis et perichaetiis longissimis *Eucamptodontibus* affine, e reliquis notis *Dicranis* nonnullis simile et caulibus repentibus excellens.

1. **D. calycinum** Schwägr. (l. c. p. 74.); decumbens ramis simplicibus erectis vel ascendentibus dense foliosis; folia conferta ovato-lanceolata integerrima rigida firma nitida e luteo viridia badia vel fusca, nervo crasso apicem versus evanescente, e cellulis linearibus seriatis ad nervum rectis versus marginem divergentibus areolata; perichaetia in cylindrum longum convoluta vaginantia, externa ovato-lanceolata, interna oblonga basi et apice attenuata, nervo brevi vel obsoleto praedita; theca oblonga cernua basi strumosa sub ore contracta ferrugineo-fusca, operculo e basi conica obliqua gibbosa in rostrum longum lenissime curvatum educto, dentes peristomii rubri profunde bifidi, cruribus linearibus acuminatis inflexis sulcatis rigidis trabeculato-nodulosis; calyptra basi subsexfida apice scabra pallide fusca. †.

Brid. II. p. 215. — *Leucodon calycinus* Hook. Musc. Exot. tab. 17. Schwägr. Suppl. II. I. p. 82. t. 124. — *Eucnemis calycina* Brid. olim.

Patria. In Sinu Dusky - Bay Novae Seelandiae: Menzies 1791.

Inflorescentia? Species genus bonum constituens. An et sequens huc certe pertineat?

2. **D. rugosum** Schwägr. (Suppl. II. II. 1. t. 174.); monoicum; procumbens ramis simplicibus teretibus obtusis fuscis; folia caulina densa erectiuscula ovato-lanceolata, margine involuta igitur veluti ovato-lanceolata, transversim rugosa, integerrima fuscescentia, nervo angusto excurrente apiculata; perichaetia insignia, exteriora minora, late ovata anguste attenuata, interiora lon-

gissima longe acuminata, *omnia cranidinervia*; theca cylindracea *subaequalis* subinclinata rufo-fusca; peristomii dentes dicranoideo-bifidi. †.

Brid. II. p. 216. — *Leucodon rugosus* Hook. Musc. Exot. tab. 20. — *Eucnemis rugosa* Brid. olim.

Patria. Nova Hollandia, unde Dickson habuit.

Calyptra? Flores masculi in brevissimo ramulo, folii caulini ne quintam partem aequantes, gemmiformes, fere terminales in ramulo suo florifero, innovando fiunt axillares. Folia perigonialia ex ovato acuminata, apicis margine involuto, ut ovata subulata esse videantur, nervia lutescentia. Antheridia valde turgida, paraphysibus filiformibus hyalinis mixta.

Gen. IV. **Pilopogon** Brid.

Bryol. univ. I. p. 519. — *Didymodon* Hook. Musc. Exot.

Nomen a *πίλος pileus* et *πώγων barba*, ob calyptram margine basilari barbatam ductum.

Calyptra *dimidiata*. Peristomium simplex: dentes 16 *aequidistantes erecti longi in conum dispositi filiformes rugulosi integri interdum linea media hic illic exarati homomorphi haud trabeculati*.

1. **P. gracilis** Brid. (l. c.); *dioicus*; dense cespitosus elatus rigidus subgracilis, inferne nigricans superne flavescens, subsimplex, ad perichaetium ramo geniculato-patente longe attenuato bifidus; folia caulina erecta appressa rigida stricta elongata angusta convolutaceo-concava, in subulam producta, apice summo in denticulos nonnullos dissoluto, nervo lato et excurrente plano; perichaetialia longissima cylindrum tenuissimum pedunculi diametrum aequans formantia, nervosa, longe et perfecte cylindrico-convolutacea, superne subito vel sensim longe subulata, apice denticulato, exteriora parva ovalia; theca in pedunculo gracili superne scabro parum flexuoso cylindrica curvata erecta angusta, operculo longirostrato erecto; calyptra basi longe ciliata.

Didymodon gracilis Hook. in Kunth Syn. Pl. Aeq. p. 51. et Musc. Exot. t. 5. Schwägr. Suppl. III. II. 1. t. 265.

Patria. In monte Quindiu regionis temperatae Andium de Cundinamara: Humboldt et Bonpland.

Habitus *Campylopodibus* nonnullis rigidis simillimus. — Flores masculi 5 aggregati gemmacei crassiusculi. Folia perigonialia externa e basi latiusculà acuminata subulata apice denticulata latinervia, interiora lato-ovalia convolutacèa breviter et obtuso-acuminata obsoletinervia integerrima. Antheridia longissima, paraphysibus lutescentibus illa aequantibus mixta.

Gen. V. **Holomitrium** Brid.

I. p. 226. sub nomine false scripto *Olomitrii*. — *Trichostomum* Hook. Musc. Exot. — *Weisia* Schwägr.

Ab ὅλος *integer* et μίτριον *calyptra* ob mitram integerrimam, notam sentiente *Bridelio* discernendi necessariam, nomen ductum.

Calyptra dimidiata. Peristomium simplex: dentes 16 aequidistantes madefacti recurvi lanceolati subulati, inferne trabeculati linea media in crura duo cohaerentia raro secedentia filiformia rugulosa fissi, longe infra orificium oriundi. — Archegonia longissime apiculata. Folia basi e cellulis elongatis superne parvis incrassatis subquadratis occultis reticulata. Inflorescentia monoica.

Holomitriaceae Hmp. Linn. XX. p. 70.

1. **H. Olfersianum** Hsch. (in Fl. Bras. p. 18.); dense cespitosum humile, inferne simplex tomentosum, superne fastigiato-ramosum *rigidum valde fertile*; folia caulina e basi amplexante oblonga superne latiore *lanceolata acuta* canaliculato-concava *brevia*, nervo subtenui et subapplanato in apiculum vix recurvatum excurrente, apice grosse serrata, dorso parce denticulata; perichaetialia cylindrum *crassiusculum* longum flavidum nitidum formantia, exteriora e basi superne crenulata convoluta subito longe acu-

minata grosse serrata excurrentinervia, interiora sensim attenuata; theca in pedunculo paullo exserto erecta e basi *crassiuscula conica* ore attenuata laevis; operculo longirostrato obliquo; dentes perist. longiusculi.

Patria. Brasilia: Martius primus legit. — *Primis anni mensibus fructificat.*

Flos masculus ex ic. Fl. Bras. in ramo (axillari?) breviusculo terminalis, foliis parvis gemmaceo-vaginantibus latis acuminatis.

2. H. crispulum Mart. (Ic. Pl. Crypt. Bras. p. 35. t. 18. f. 2.); densiusculo-cespitosum erectum *flaccidum* elatum dichotome ramosum inferne radiculosum; folia caulina e basi longiusculo-vaginate plus minus crenulata superne subundulata *subulato-acuminata acuta elongata valde crispata angusta* canaliculata, superne dorso parce dentata, margine remote et grosse serrata, tenuinervia; perichaetialia longissime vaginantia; theca in pedunculo paullo exserto erecta *cylindrica aequalis* ore angustato, operculo longirostrato erecto; dentes perist. longiusculi.

Holomit. Moritzianum Hmp. Linn. XX. p. 70. — *Weisia Sellowii* Schwägr. Suppl. IV. t. 309. — *Dicranum calycinum* Sw. Fl. Ind. Occ. III. p. 1768. *Bryum calycinum* ej. Prodr. Fl. Ind. p. 139. *Weisia calycina* Hdw. Sp. Musc. p. 70. t. 14.

Patria. Brasilia et Columbia hic ex altitud. c. 6000' ped. prope Tovar coloniam Germanicam: Moritz. No. 181. et pr. Caracas: Coll. Linden. No. 377.

3. H. vaginatum Brid. (I. p. 227.); dense cespitosum rigidum suberectum brevi-ramosum; folia caulina dense imbricata erecta paullo patentia e basi amplexante *convolutaceo-lanceolata firma brevia integerrima* arctissime arcolata; nervo in apiculum *reflexum* excurrente subapplanato; perichaetialia cylindrum *breviter exsertum* formantia pauca, e basi longe vaginante subito vel sensim attenuata breviter subulata integerrima tenuinervia; theca in pedunculo longiusculo-exserto erecta *cylindrico-ovalis* ore attenuata, operculo longirostrato recto; dentes perist. breviusculi.

Trichostomum vaginatum Hook. Musc. Exot. t. 64. et Schwägr. Suppl. IV. t. 309. — *Dicranum calycinum* Brid. I. p. 452. excl. syn. Hedwig., Schwägrichenian. et Swartzianis. — *Dicr. cylindraceum* Brid. I. p. 458. *Cecalyphum* P. B. Prodr. p. 51. *Weisia vaginans* Brid. I. p. 807.

Patria. In insula Otaheite maris pacifici: **Menzies 1792** detexit. Ex insula Bourbonis olim communicavit Schwägrichen. In prom. bonae spei inter Omsamwubo et Omtata inter rupes fructibus maturis **15. Maj. 1832** et prope Outniqualand circa Koratram in sylvis altitud. 800 ped. **15. Oct. 1831.** fructib. vetustis: **Drège.**

Specimina haec Capensia a Bourbonensibus statura robustiore et praesertim ramis gracilibus filiformibus ex apice caulis oriundis subulaceis remotifoliis et foliis apice plerumque valde recurvato et marginibus minus convolutaceis praeditis paullo recedunt. An propria species?

4. H. perichaetiale Brid. (I. p. 227.); dense cespitosum erectum robustum subhumile breviter et parce ramosum, infima basi tomentosum; folia caulina *e basi oblonga lanceolato-acuminata subsubulata acuta longiuscula crispata*, madefacta erecto-patentia, *integerrima flexuosa subfalcata*, nervo subtenui applanato instructa, canaliculata; perichaetialia in cylindrum brevem exsertum convoluta, longe vaginantia longe subulata integerrima; theca in pedunculo longe exserto erecta conico-ovalis, operculo longirostrato obliquo; dentes peristomii breviusculi saepe irregulariter fissi.

Sprucea perichaetialis Hook. et Wils. in sched. musc. antarct. — *Trichostomum perichaetiale* Hook. sen. Musc. Exot. t. 73.

Patria. In Sinu Dusky-Bay Novae Seelandiae legit **Menzies 1781.** In insula Campbelli antarctica novissimis temporibus legit **J. Hooker.**

Gen. VI. **Dicranum** Hdw. emend.

Fund. Musc. II. p. 91. — *Dicranodontium* Br. et Sch. *Campylopus* Brid. et al. — *Didymodon* nonn. — *Arctoa* Br. et Sch. — *Cecalyphum* P. B. — *Fuscina* Schrank. — *Luida* et *Polla* Adans. — *Bryum* et *Hypnum* L. et al.

Nomen a graeca voce *δίκρανον fuscina*, ob dentes peristomii fuscinae instar bifurcos.

Calyptra dimidiata. Peristomium simplex: dentes *basi connati in membrana plus minus emersa vel aequidistantes infra orificium oriundi, in crura duo raro plura libera plus minus profunde saepe interdum usque ad basin fissi purpurei inferne trabeculati superne nodosi*. — Cellulae foliorum raro papillosae, nunc molles inanes vel chlorophyllosi rhomboideo-prosenchymatici vel parenchymatici, nunc incrassati quadrati inanes obscuri; cellulae alares nunc planae nunc ventricosae; cellularum parietes regulares vel interrupti veluti moniliformes.

Sectio 1. **Leucoloma**. Brid. II. 218. Plantae subhumiles tamen robustae, plus minus *fragiles*, molles et cespitosae. Cellulae foliorum alares planae vel ventricosae laxae; *margo folii albescens e cellulis longissimis tenuissimis hyalinis compositus*; cellulae superiores subpapillosae minutae quadratae, infimae longiusculae omnes incrassatae. Nervus *tenuis flavidus*. Inflorescentia omnium dioica?

1. **D. Sieberianum** Hsch. (Musc. Sieber. Nov. Holl. No. 16.); dense cespitosum erectum, in axillis foliorum tomentosum, ramosum *teretiuseculo-gracile*, dense sed paulisper remote foliosum, flavidum; folia caulina *sicca erecto-incumbentia subappressa, madefacta patentia*, e basi latiuscula convolutaceo-concava plus minus flexuosa acuminata, *superiora in acumen hyalinum producta, papillis truncatis valde scabra, tenuissime marginata*, evanidinervia cellulis alaribus valde fuscis praedita, integerrima vel apice obsolete denticulata; perichaetia *in cylindrum breviusculo-exsertum maxime convoluta superne margine flexuosa* plus minus sensim longe acuminata subulata pallida facile marcescentia; theca longipedunculata *ovalis cernua parva*, operculo longirostrato obliquo; calyptra glabra; dentes perist. summo apice et irregulariter fissi intense purpurei.

Schwägr. Suppl. III. II. 1. t. 252. Spreng. Syst. Veget. IV. 2. p. 322. *Dicr. hypnoides* R. Br. in litt. ad Schwägr.

Patria. Nova Hollandia.

2. D. Sprengelianum C. Müll.; dense cespitosum sed laxè cohaerens inferne tomentosum, humile ascendens flexuosum ramosum *apice comoso incurvum firminusculum*; folia caulina e basi convolutaceo-concava perfecte convoluta-subulata acutiuscula, falcata, *integerrima vix rugulosa, tenuissime marginata evanidinervia*, cellulis alaribus *subventricosis* robustis praedita secunda; perichaetialia pauca longius vaginantia et subito subulata parum longiora tenuinervia; theca in pedunculo breviusculo innovatione laterali *erecta cylindrico-ovalis parva aequalis*, dentibus perist. angustis.

Dicranum fasciatum Spreng. Syst. Veget. IV. II. p. 322.

Patria. Prom. bonae spei. Hb. Sprengel.

Ex habitu *D. congesti* formis minoribus simillimum.

3. D. Zeyheri C. Müll.; dense cespitosum sed laxè cohaerens inferne parce radiculosum flexuosum robustum *submolle* densifolium subcrispatum *apice vix incurvum*; folia caulina subsecunda e basi convolutaceo-concava convoluta-subulata falcata *subintegerrima laevia tenuissime marginata evanidinervia*, cellulis alaribus *subventricosis* robustis praedita; perichaetialia e basi breviter vaginante subito subulata parum longiora, nervo excurrente tenui; calyptra brevis firma basi pluries et breviter laciniata inflexa apice scabriuscula.

Weisia n. sp. Zeyher: Coll. Pl. Cap. No. 496.

Patria. Prom. bon. spei.

A *D. Sprengeliano* proximo primo adspectu differt: caulibus multo mollioribus tenerioribus, apice non vel vix incurvis, foliis magis crispatis; an et fructus adhuc ignotus distet, latet.

4. D. Commersonianum C. Müll.; procumbens dichotome ramosum ramis ascendentibus *elongatum parce foliosum flaccidum*; folia caulina *laxa patentia*, apice *incurriusculo subsecunda*, e basi lanceolata longe linearia

nervo excurrente subulata acuta integerrima *canaliculato-concava* haud vel parum convolutacea, *latiusculo-marginata*, cellulis alaribus planis; perichaetialia *oblongo-lanceolata*, caulinis parum minora; theca in pedunculo innovatione laterali *parum exserto* erecta ovalis parva fusca, operculo conico subulato incurvo; perist. dentes profunde fissi.

Leucoloma bifidum Brid. II. p. 218. — *Hypnum bifidum* Brid. Musc. Rec. II. II. p. 51. t. 1. f. 4. — *Dicranum brevisetum* Brid. I. p. 467. — *Trichostomum bifidum* Brid. Mant. Musc. p. 54. — *Trich. leucoloma* Schwägr. Suppl. II. I. p. 76. tab. 122. — *Leucoloma angustifolium* Brid. I. p. 752?

Patria. Insula Bourbonis: Commerson. In Madagascar: Du Petit Thouars.

5. D. Bridelianum C. Müll.; laxe cespitosum *molliissimum* ascendens humile parce ramosum pallidum densifolium, apice *longiuscule attenuato suberecto capillari*; folia caulina *erecto-patentia madefacta valde patula elongata*, e basi *latissima canaliculato-concava* sensim subulata acuta, *excurrentinervia*, apice minute serrulata, *latissimo-marginata*, cellulis alaribus planis teneris.

Leucoloma serrulatum Brid. II. p. 752.

Patria. Hispaniola: Desvaux. Brasilia.

6. D. molle C. Müll.; laxe et late cespitosum *molliissimum* ascendens humile parce ramosum pallidum *parce foliosum gracilius*, apice *valde incurvo comoso*; folia caulina *secunda e basi canaliculato-concava longissime subulata*, nervo excurrente acuta, apice minute serrulata, *latiuscule marginata*, cellulis alaribus planis teneris praedita.

Patria. Java inter muscos alios a Cl. Junghuhn lectos.

7. D. sinuosum Brid. (I. p. 427. excl. syn.); caulis ascendens ramosus robustus, densifolius; folia caulina *maxime falcato-secunda longiuscula*; e basi *latiuscula margine undulata lanceolato-subulata*, nervo angusto excurrente canaliculato, involutaceo-concava fragilissima, margine *tenuiter albo*, summo apice *denticulata*, dorso

superne aspera vel *laeviuscula*, e cellulis ellipticis vel apicem versus rotundis valde incrassatis areolata, pallida, cellulis alaribus *maxime ventricosis et robustis* intense brunneis magnis praedita; perichaetialia vaginantia basi laxae areolata tenuinervia e reliquis caulinis similia; thecae binae vel solitariae *in pedunculis elongatis strictis tenuibus* cylindricae erectae, operculis longirostratis.

Trichostomum longifolium Brid. I. p. 496. et var. β . *humile*, *Tr. pallido* haud dissimile. Folia laeviora.

Patria. Insula Madagascar et var. β . in insula Francia: Aubert du Petit Thouars. Insula Bourbonis: Bory St. Vincent.

Sectio II. **Oncophorus.** Brid. I. p. 389. Plantae humiles vel elatae robustae cespitosae. Cellulae foliorum alares planae vel ventricosae; cellulae superae omnes elongatae, rarius minutae incrassatae subquadratae prosenchymaticae, parietibus saepe interruptis veluti moniliformibus praeditae, raro chlorophyllosae et papillosae. Nervus tenuis interdum obsoletus vel latus deplanatus. Folia immarginata. Theca inaequalis cernua, basi plus minus strumosa vel strumoso-apophysata, annulata vel exannulata. Inflorescentia monoica vel dioica. Calyptra basi integra.

1. *Nervo serrato.*

a. *Folia undulata.*

8. **D. undulatum** Turn. (Musc. Hib. p. 59.); dense cespitosum elatum ascendens valde tomentosum, ramis dichotomis elongatis paucis; folia caulina plus minus secunda patula e basi lata lanceolata falcata, *plus minus plicata, inferne margine revoluta*, superne et dorso grosse serrata, *plus minus complicato-concava*, nervo applanato pro foliorum latitudine angusto praedita, valde undulata; perichaetialia latissima in cylindrum laxum convoluta, in subulam loriformem flexuosam superne grosse serratam producta, tenuiter vel obsolete nervosa; omnia *elongate areolata*; thecae *aggregatae* obconico-arcuatae cylindricae basi ventricosae, operculo conico longirostrato; dentes perist. maximi bifidi.

D. rugosum Brid. I. p. 414. — *D. polysetum* Sw. Musc. Suec. p. 34 et 87. tab. 3. f. 5. et Brid. I. p. 413. ex parte. — *Bryum rugosum* Hoffm. Dent. Fl. II. p. 39.

Patria. In sylvaticis glareosis et in ericetis tam siccis quam turfosis per totam Europam et Americam septentrionalem. — *Julio, Aug.*

Pl. mascula ignota. Florem masc. invenerunt Br. et Sch. in tomento minutum gemmaceum, foliis ovato-lanceolatis apice dentatis, internis ovato-acuminatis nervibus.

9. **D. Drummondii** C. Müll.; dense cespitosum elatum ascendens valde tomentosum, innovationibus erectis; folia caulina *undique patentia recurva et sursum curvata vel secunda, siccitate apice tortilia*, e basi lata robusta in subulam latiusculam producta falcata convolutaceo-concava, omnino fere e cellulis minutis incrassatis plus minus rotundatis areolata, nervo applanato pro foliorum latitudine angusto excurrente, parce undulata, apicem versus denticulata dorso scaberrima; perichaetia in cylindrum brevem densum convoluta plus minus subito longe et anguste subulata inferne elongate areolata; thecae aggregatae breviter pedunculatae obconico-arcuatae cylindricae basi ventricosae, operculo conico longirostrato; dentes perist. subirregulariter bifidi.

D. robustum Blytt in Br. Europ. Fasc. 37 — 40. p. 43. tab. 36. (1847.). — *D. undulatum*, var. foliis angustioribus subtortuosis Drumm. Musc. Amer. No. 86. Forma minor.

Patria. In sylvaticis montosis loco Bogstadaas prope Christianiam Norvegiae: Blytt. In sylvis umbrosis Canadae superioris vulgare: Drummond.

• Flos masc. ut in praecedente.

10. **D. spurium** Hdw. (Musc. Frond. II. p. 32. t. 30.); laxe cespitosum tomentosum sed laxe cohaerens erectum vel ascendens dichotome ramosum plerumque interrupte foliosum; folia caulina conferta patentia, *inferiora minuta, superiora multo robustiora comam polyphyllam sistentia*, late lanceolata et elongate lanceolata acuta, valde undulata, margine eroso-denticulata dorso ubique valde et minute scabra, ut in praecedente areolata, convuluto-concava, superne madefacta tortilia, nervo pro latitudine fo-

lii tenui applanato sub apice evanido praedita; perichaetialia *patula superne rotundata vel sinuato-truncata subito breviter acuminata* omnino fere elongate areolata evanidinervia; theca *solitaria* in pedunculo flavo flexuoso longo obconico - arcuata cylindrica basi ventricosa subparva, operculo conico longirostrato obliquo; dentes peristomii ut antea.

Bryol. Europ. Fasc. 37 — 40. p. 41. t. 33. — Brid. I. p. 416. — *Oncophorus conglomeratus* Brid. I. p. 405. — *Oncoph. fragilis* Brid. I. p. 403. — *Dicranum fragile* ej. Mant. Musc. p. 55. — *D. condensatum* Hdw. Sp. Musc. p. 139. tab. 34. et Brid. I. p. 421; forma humilis, foliis vix undulatis et *D. longirostratum* Brid. Mant. Musc. p. 55. — *Oncophorus longirostris* ej. I. p. 403. — *Cecalyphum longirostratum* P. B. Prodr. p. 51; forma foliis laevioribus.

Patria. In ericetis arenosis, ad sylvarum margines et in sylvarum glareosis, et in turfosis per totam Europam prime borealem et in America septentrionali. — *Aprili et Julio.*

Planta mascula ignota, ejus loco gemmulae e tomento caulino enascentes.

11. D. Bergeri Bland. (Musc. Fr. Exs. III. n. 114; nomen antiquissimum); dense cespitosum elongatum erectum valde tomentosum, ramis elongatis; folia caulina dense imbricata erecto - patentia superiora subsecunda, *lato-lanceolata obtusiuscula complicato-seu canaliculato-concava parce undulata, superne eroso-denticulata et e cellulis robusto-incrassatis plus minus rotundatis inferne elongatis, omnibus in membranam dorso laevissimam firmam nitidam flavidam confluentibus areolata*, nervo apice parce denticulato applanato tenui evanido praedita; perichaetialia *patula* minora ut in praecedente formata, sed e cellulis robustioribus minus elongatis areolata et longius acuminata atque saepe undulato - flexuosa; theca praecedentis *solitaria* longe et flavide pedunculata, peristomio minori.

Dicr. Schraderi Web. et Mohr. Bot. Tasehb. p. 177.; nomen sentiente ipso Mohrio posterius (in litt. ad Blandow!). Br. Europ. I. c. p. 40. tab. 32. — *Dicr. undulatum* Schrad. Spicil. Fl. Germ.

p. 59. et Brid. l. p. 415. — *D. falcatum* Schrad. ol. mst. et Schleich. Crypt. Helv. n. 15. — *D. intermedium* Crome, Samml. Crypt. Gew. n. 66. p. 21. — *D. affine* Funk. Fasc. Crypt. VI. n. 136. — *D. fastigiatum* Schultz. Fl. Starg. p. 300. — *Cecalyphum undulatum* P. B. Prodr. p. 52. — Nomen *Blandowii* in memoriam centurionis de Berger Megapolitani Senkowiensis, scrutatoris olim indefessi et hujus musci in turfosis Sültzenianis detectoris impositum.

Patria. In turfosis tam planitierum quam regionis montanae et alpinae per totam Europam et Americam septentrionalem. — *Aestate et autumno.*

A *D. spurio* proximo notis cursive impressis distinctissimum. — Planta mascula ignota, gemmulae masculae in tomento nascentes plus minus copiosae.

b. *Folia aequalia, i. e. non undulata.*

12. *D. convolutum* Hmp. (in litt.); compactum usque ad apicem fere maxime tomentosum apice ramis fertilibus brevibus divisum elongatum erectum sordide lutescens; folia caulina *erecto-palentia substricta, sicca apice incumbentia, brevia*, lanceolato-acuminata, nervo subapplanato angusto, apicis margine denticulata, dorso breviter serrulata, cellulis alaribus planis teneris repletis fuscidulis, inferne e cellulis angustis sublongis, parietibus tenuibus praeditis superne parvis subquadratis mollioribus areolata; perichaetia immersa cylindraceo-convoluta vaginantia, e cellulis longioribus laxioribus areolata; theca annulata in pedunculo substricto rubescente *cylindracea parum arcuata basi vix inaequalis laevissima fuscescens*, operculo conico-subulato subobliquo rubente; calyptra longa tenerrime membranacea pallida magna supra fusca; perist. dentes fragiles amoene purpurei ad medium usque fissi.

Patria. In Sibiriae regione transbaicalensi, loca ut videtur uliginosa habitans.

D. spurio praesertim var. *condensato* proximum, differt autem foliis laevibus dorso tantum scabris, nervo latiore, cellulis laxioribus mollioribus et theca basi haud ventricosa.

13. *D. scoparium* Hdw. (Fund. Musc. II. p. 92. t. 8. f. 41. 42.); *diolcum*; dense cespitosum valde tomentosum ascendens elatum, ramis gracilescentibus dichotomis elongatis apice comoso curvatis; folia caulina secunda e basi plus minus ventricosà lanceolata subulata acuta latiuscula, e cellulis elongatis parietibus valde interruptis praeditis robustis areolata, canaliculato-concava, nervo excurrente applanato pro latitudine folii angusto dorsi apice serrato, apice serrata dorso laevia; perichaetialia interiora majora in cylindrum vix exsertum patulum convoluta, superne subito longe et reflexo-acuminata loriformia serrata; theca solitaria exannulata cylindrica basi subinaequalis coriacea arcuata crassa, operculo longirostrato obliquo; dentes perist. maximi robusti bifidi.

Br. Europ. I. c. p. 34. t. 26 et 27. — Brid. I. p. 410. — *D. recurvatum* Schultz. Fl. Starg. p. 295. — *D. reflectens* Brid. ol. I. p. 412. — *D. condensatum* Spr. in sched. — *D. Dillenii* T. Tayl. Ann. and Mag. of nat. Hist. 1843. p. 113. et bot. Zeit. 1843. p. 695. — *Cecalyphum scoparium* P. B. Prodr. p. 51. — *Fuscina scoparia* Schrank. Baiers. Fl. II. p. 452. — *Bryum scoparium* L. Sp. Pl. p. 1582. — *Bryum reclinatum*, foliis falcatis, scoparum effigie. Dill. Musc. p. 357. t. 46. f. 16. A. B. C.

Patria. Ad terram, rupes, arborum radices et in tectis stramineis per totam Europam, Americam et Asiam. — *Julio, Augusto.*

Planta mascula in cespite femineo vel proprio, gracilior foliisque brevioribus, flore terminali. Folia perigonialia ex ovata basi anguste linearia, apice denticulata interna breviora integra. — Planta e locis natalibus polymorpha.

14. *D. pallidum* Br. et Sch. (in Br. Europ. Fasc. 37—40. p. 39 memoratum); *monoicum*; habitus *D. scoparii*, sed pallidius; folia caulina e cellulis elongatis et angustis, parietibus haud vel vix interruptis tenuissimis praeditis areolata; perichaetialia superne maxime rotundato-sinuata crenulata itidem sed laxius reticulata; theca solitaria cylindrica valde arcuata basi subaequalis pallescenti-ochracea exannulata, operculo longisubulato concolori basi rubente.

D. scoparium Sulliv. Musc. Allegh. No. 155.

Patria. America septentrionalis: Beyrich, Sullivant in sylvaticis ad terram.

Flos masculus in ramo axillari brevi gracillimo, foliis externis patulis basi ovalibus brevibus acuminatis apice obtusiusculo parce dentata obsoletinervia, internis lato-ovalibus convolutis brevissime acuminatis enervibus, antheridiis paucis brevibus ovatis. — A *D. scopario* simillimo inflorescentia notisque ceteris cursive impressis distinctissimum.

15. ***D. congestum*** Brid. (Mant. Musc. p. 57 et l. p. 418.); *dioicum*; laxè et dense cespitosum, tomentosum plerumque molle et saepe crispum ramosum, apice curvato-secundum; folia caulina secunda lanceolato-subulata subfalcata basi tenera, e cellulis rotundatis parvis parietibus teneris areolata, superne margine serrulata canaliculato-concava, nervo excurrente angusto applanato, superne dorso scabriusculo; perichaetia basi vaginantia convolutacea subito longe acuminata subulata acuta margine et dorso serrulata excurrentinervia immersa; theca breviter pedunculata parva obovata curvula annulata subgibbosa et parce ventricosa, operculo longirostrato, obliquo flexuoso; dentes perist. ut antea.

Br. Europ. l. c. p. 36. t. 29. — *D. rupestre* Brid. l. p. 419. — *D. longirostrum* Schwägr. Suppl. l. l. p. 170. tab. 44. — *D. fuscescens* Smith, Fl. Brit. III. p. 1204. — *D. scoparium* β . *fuscescens* Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 58. — *D. flexicaule* Brid. l. p. 421. — *D. fuscescens* Hsch. in litt. ad Brid. ibid.

Patria. Per montes usque ad alpes totius Europae et in America septentrionali. — *Aestate.*

A *D. scopario* proximo notis cursive impressis distinctissimum.

16. ***D. majus*** Sm. (Fl. Brit. III. p. 1202.); laxè cespitosum molle elatum ascendens flexuosum dichotome et vage ramosum subgracilescens apice incurvum; folia caulina elongata secunda, e basi lata robusta lanceolato-subulata falcata convolutaceo-concava, nervo angusto applanato excurrente superne dorso serrato praedita, acuta,

margine superne serrata, e cellulis omnino elongatis parietibus vix interruptis praeditis angustis in membranam plus minus homogeneam nitidam conflatis non pellucidis areolata; perichaetialia in cylindrum robustum exsertum dense clausum convoluta latissima, subito et brevius acuminato-subulata apice serrulata excurrentinervia, textura caulinorum; thecae aggregatae obovales subparvae crassiusculae curvatae exannulatae, operculo longissime rostrato subobliquo; perist. dentes robusti intense purpurei.

Br. Europ. l. c. p. 43. t. 37. — Schwägr. Suppl. l. l. p. 163. t. 40. — *Dicr. polysetum* Brid. l. p. 413. ex parte. — *D. scoparium* var. a. Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 58. t. 18. fig. dextera? — *D. scoparium* T. Tayl. Ann. and Mag. of nat. Hist. 1843. p. 113. et bot. Zeit. 1843. p. 695. — *Bryum reclinatum*, foliis falcatis, scoparum effigie. Dill. Musc. p. 357. tab. 46. fig. 16. D.

Patria. In montosis sylvaticis subhumidis Europae mediae in planitie sylvatica septentrionalis. — *Aestate.*

Flores masculi: gemmulae in tomento caulino nidulantes. — A *D. scopario* proximo fructibus aggregatis et foliorum areolatione facillime jam distinguitur.

17. *D. robustum* Hook. et Wils. (Lond. Journ. of bot. 1844. p. 542.); habitus praecedentis; folia caulina elongata secunda, e basi lata robusta flexuosa lanceolato-subulata falcata convolutaceo-concava, nervo angusto applanato haud canaliculato concolore excurrente superne dorso denticulato praedita, acuta, marginis apice argute et tenuiter serrata, e cellulis omnino elongatis parietibus magis conspicuis vix interruptis praeditis angustis non pellucidis areolata; perichaetialia in cylindrum dense clausum emersum angustum convoluta lata, externa multo minora, interna longe vaginantia superne valde obtusa et subito setacea, nervo tenuiore excurrente instructa et e cellulis laxioribus robustioribus parietibus valde interruptis areolata, apice serrulata; theca solitaria perfecte cylindrica curvata basi magis strumulosa angusta, operculo longirostrato.

Patria. Insula Eremitae ad Cap. Horn: J. Hooker.

A *D. majori* Sm. simillimo notis cursive impressis distinctissimum.

18. *D. dichotomum* Brid. (Mant. Musc. p. 55.); *dioicum*; elatum *flexuosum* dichotome et *breviter* ramosum *flavescens* apice incurvum; folia caulina lata perfecte secunda minus *falcata*, e basi lata cellulis alaribus robustis brunneis praedita *lanceolata brevia* valde concava, nervo *tenuissimo conspicuo excurrente*, e cellulis angustissimis parietibus maxime incrassatis *arcolata*, *superne margine argute et tenuiter dorso nervi parce denticulata*; perichaetialia in cylindrum breviter exsertum convoluta, exteriora breviter aristata, interiora longiora mutica *enervia*; theca breviter pedunculata subcylindracea cernua basi substrumulosa coriacea glabra, operculo curvirostro *mediocri*.

Oncophorus dichotomus Brid. I. p. 401. — *Dicr. Boryanum* Schwägr. Suppl. II. I. p. 71. t. 121. — *Cecalyphum dichotomum* P. B. Prodr. p. 51.

Patria. Insula Bourbonis, in planitie des Chicots, terram uliginosam habitans: Bory St. Vincent.

A *D. Kerguelensi* notis cursive impressis certe differt.

19. *D. assimile* Hmp. (Ic. Musc. tab. 24.); habitus penultimi; folia caulina elongata secunda, e basi lata robusta flexuosa lanceolato-subulata falcata convolutaceo-concava, nervo applanato angusto *vix canaliculato* flaviore excurrente superne dorso serrato praedita acuta, margine apice argute et grosse serrata, ut in *D. majori* *arcolata*; perichaetialia in cylindrum dense clausum exsertum *robustum* convoluta latissima, longe vaginantia fere subito setacea excurrentinervia *subintegerrima vel summo apice parce denticulata*, e cellulis elongatis parietibus strictis haud interruptis praeditis *arcolata*; thecae aggregatae longiusculo-pedunculatae *erectae elongatae cylindricae angustae laevissimae subaequaliter teretes arcuatae basi flexuoso-apophysatae annulatae*, operculis longirostratis pallidioribus subobliquis; dentes perist. *longissimi tortuoso-capillares*, cruribus inaequaliter latis sulcato-dispositis maxime trabeculatis fuscis.

Patria. Java: Junghuhn: 1851: 11

D. majori simillimum, sed thecae forma primo aspectu discernibile, speciosum.

20. *D. dicarpum* Hsch. (Musc. Sieber. Nov. Holl. No. 10.); *monoicum*; densiuscule cespitosum *humile* densifolium breviramens ascendens inferne tomentosum, apice subfalcatum; folia caulina secunda, e basi lata *reflexa auriculata* cellulis alaribus magnis brunneis praedita lanceolata subulata falcata, nervo *superne profunde canaliculato* angusto dorso valde serrato excurrente acuta, inferne e cellulis *elongatis angustissimis usque ad medium folii margine productis superne rotundatis ad nervum descendentes parvis areolata*, apicem versus dentibus pallidis grosse et argute serrata; perichaetia in cylindrum exsertum dense clausum convoluta vaginantia, medio margine obtusato crenata, subito longe subulata excurrenti-nervia; thecae *binae brevissime pedunculatae obovatae subcurvatae, superne crassiores, basi courctato-apophysatae annulatae*, operculis longirostratis erectis; perist. dentes breviusculi normales.

Sprengel, Syst. Veget. IV. II. p. 322. — Schwägr. Suppl. III. II. 1. t. 251. — *Dicr. subaggregatum* R. Br. mst. ibid.

Patria. Nova Hollandia: Sieber. Terra Diemenii: R. Brown.

Flores masculi (e Schwägrichen) minuti terminales aetate laterales ovati ferruginei, foliis ovato-acuminatis, exterioribus obscure uninerviis, interioribus enerviis, concavis integerrimis et antheridiis turgidis. — Formis minutissimis *Dicr. scoparii* haud dissimile, sed nulla specie alia confundi potest.

2. *Nervo laevi.*

a. *Folia integra.*

21. *D. falcatum* Hdw. (Sp. Musc. p. 150. tab. 32.); *monoicum* flore masculo in vicinia feminei posito; cespitosum sed laxè cohaerens humile ascendens gracile, inferne denudatum superne dichotome et fastigiato-ramo-

sum, apice falcatum; folia caulina secunda falcata lanceolato-subulata convolutaceo-concava *subintegerrima* minutissime areolata, nervo angusto maxime applanato haud canaliculato excurrente *et cellulis alaribus parcissime quinimo fere obsolete evolutis* praedita; perichaetialia e basi latiore subvaginante superne fere subito setacea; *omnia viridissima crispata*; theca breviuscule pedunculata obovata cernua parva *laevis*, collo tumido-strumoso praedita unicolor fusca, operculo e basi lata oblique rostellato purpureo, annulo angustissimo; peristomii dentes angusti *intense purpurei*.

Br. Europ. l. c. p. 27. t. 18. — *Oncophorus falcatus* Brid. l. p. 393. — *Cecalyphum scrophulosum* P. B. Prodr. p. 51. — *D. Sendtneri* Flotow in schedulis.

Patria. In alpinis, raro subalpinis ad rupes madidas atque terram humidam per Europam totam, *D. Starckii* saepe associatum. — *Augusto, Septembri.*

Folia perigonialia externa caulinis similia, sed basi convolutaceo-vaginante latiora, *interna brevissime acuminata* fusca. — Notis cursive impressis a sequente proximo facile distinguitur.

22. *D. Starckii* Web. et Mohr. (Bot. Taschb. p. 189.); *monoicum*, flore masculo in vicinia feminei posito; habitus prioris, *sed folia caulina magis falcata haud crispata latiora, cellulis alaribus perfecte evolutis subrobustis praedita, perichaetialia sensim subulata, omnia magis elongate areolata, theca stricta oblonga vel oblongo-cylindrica gibbosa et arcuata, perfecte strumosa, annulo duplici revolvibili atque peristomio rubello praedita, operculo conico longirostrato obliquo; foliis perigonialibus internis longe acuminatis.*

Br. Europ. l. c. p. 27. t. 17. — *Oncophorus Starckii* Brid. l. p. 394. — *Dicr. curvifolium* Schleich.

Patria. Ad rupes et terram in regione subalpina et alpina praesertim loca granitacea habitans per totam Europam. — *Aestate.*

23. *D. Blyttii* Br. et Sch. (Br. Europ. l. c. p. 26. t. 16.); *monoicum*, flore masculo longe infra perichaetium

posito; dense cespitosum, habitus prioris, sed fragilius, folia caulina undique magis flexuoso-patentia minus secunda, elongate areolata sed amoene pellucida tenera, cellulis alaribus amoene fuscis laxis diaphanis praedita, perichaetialia multo laxius areolata et cellulis basilaribus pariter amoene fuscis laxis instructa; theca ovata laevis subcernua plus minus incurva sicca strumosa, operculo conico longirostrato obliquo, annulo simplici; folia perigonialia interna breviter acuminata.

Patria. In summo monte Sempione Helvetiae cespitibus ingentibus ad rupes Rhododendro umbratis: W. P. Schimper 1840.; in alpe Nassfelder Tauern Gastuniae et in summo m. Gemmi Helvetiae: W. P. Schimper 1842 et 1843. In Norvegiae alpibus legit Blytt et prope Holmiam Thedenius.

A praecedente notis cursive impressis certe distat.

24. D. tenuifolium Hook. et Wils. (Lond. Journ. of bot. 1844. p. 542.); dense cespitosum sed laxè cohaerens humile valde ramosum tenue apice incurvum nigrescens nitidum; folia *angustissima lanceolata longissime subulata integerrima, nervo lato perfecte concolori igitur vix conspicuo excurrente, e cellulis maxime angustis elongatis areolata* et cellulis alaribus minutis diaphanis praedita; theca suberecta turbinata, operculo longirostrato.

Patria. Insula Eremitae ad Cap. Horn: J. Hooker.

Praecedentibus proximum, notis autem cursive impressis distinctissimum. Fructum non vidimus.

25. D. elongatum Schleich. (Cent. III. n. 27.); *dioicum; dense cespitosum compactum elongatum gracile erectum pluries dichotomum; folia caulina parva erecto-patentia vel secunda lanceolata et breviter subulata acuta, convolutaceo-concava subintegerrima, nervo lato applanato, inferne elongate superne minute et plus minus rotundato-areolata; perichaetialia pauca cylindraceo-vaginantia immersa subito subulata tenuinervia; theca brevipedunculata obovalis obliqua subcernua et subgibbosa basi*

collo instructa haud strumosa, lenissime striata, operculo longirostrato angusto praedita annulata.

Schwägr. Suppl. I. l. p. 171. tab. 43. — Bryol. Europ. I. c. p. 35. t. 28. — Brid. I. p. 429.

β. orthocarpum, foliis brevioribus, theca subcylindrica erecta. Br. Eur. l. c. — *D. Sphagni* Wahlenb. Fl. Lapp. p. 337. et Brid. I. p. 461. excl. syn. Dillen. — *D. Groenlandicum* Brid. I. p. 460. e speciminibus hb. *Brideliani* sterilibus.

Patria. In alpinis supra rupes humidas et ad terram umbrosam, praecipue in regione *Pini Pumilionis*. Var. *β.* in turfosis regionis septentrionalis et arcticae. — *Ad aestatis finem.*

Pl. mascula femineae intermixta vel in cespite proprio, gracillima. Flores in eodem ramo secundi, capituliformes, foliis externis e basi ovata lineari-subulata, internis apiculatis lutescentibus.

26. D. Labradoricum C. Müll.; *dioicum*; pulvinatum subhumile parce dichotome ramosum; folia caulina erecto-patentia substricta *multo latiora breviora perfecte lanceolata, inferiora acuta, superiora valde obtusa, omnia supra basin latiora, apice valde convolutacea, nervo tenui evanescente*, e cellulis robustioribus arcolata, integerima; perichaetia longius vaginantia et subito brevius acuminata, nervo tenui excurrente; theca breviter pedunculata *parva cylindracea curvata basi aequalis stricta*, operculo longirostrato subulato obliquo.

D. Groenlandicum C. Müll. in sched.

Patria. Labrador: Kurr in hb. Kunzeano.

A praecedente proximo notis cursive impressis valde distans.

Incertae sedis.

27. D. imponens Mont. (Ann. des sc. nat. Tom. XVI. 1841. p. 241.); erectum dichotome ramosum fastigiatum, ramis cuspidatis, flavescens nitidum apice paulisper incurvum rigidum; folia caulina undique imbricata erecto-patentia, e basi amplexicauli lata robusta cellulis alaribus valde brunneis multis robustis praedita lanceolata stricta

superne convolutacea obtusa, nervo tenui applanato haud canaliculato ante apicem evanido, omnino e cellulis elongatis parietibus subinterruptis areolata.

Patria. In freto Magellanico, loco Baie de Saint-Nicolas dicto: Jacquinet.

Obscuriora.

1. **D. Mörkianum** Hsch. (Regensb. Flora 1825. I. p. 78.); folia subfalcata lanceolato-lineararia; perichaetialia erecta lanceolato-subulata; pedunculus brevis apice strumosus, theca subimmersa rotundato-ovata, operculo conico oblique rostellato subulato. †.

Patria. Inter *Weisiam crispulam* insulae Island: Mörk.

2. **Oncophorus strigosus** Brid. (I. p. 405.); erectum subramosum; folia laxiuscula patentissima subreflexa et quasi in globum expansa, colore infra obscure viridi, superne pulcherrime viridi flavicante, linear-lanceolata acutissima siccitate undequoque contorta crispata carinata, margine incrassato integerrima, nervo crasso continuo in acumen excurrente. †.

Patria. Hispaniola: Bertero?

E colore (monente auctore) facile discernibilis; sed generis suspectissimi.

b. *Folia denticulata.*

28. **D. pungens** Hook. et Wils. (Lond. Journ. of bot. 1844. p. 541.); dense cespitosum sed laxè cohaerens robustum elongate dichotomum erectum flavesceus, apice falcatum; folia caulina robusta secunda brevia pungentia subrigida, lanceolato-subulata, convolutaceo-concava, basi reflexiuscula fragili, cellulis alaribus planis aequaliter hexagonis parvis permultis partem totam infimam occupantibus teneris hyalinis vel flavidis, superne ubique e cellulis angustis elongatis parietibus interrupte obsoletis praeditis reticulata, nervo tenuissimo subobsoleto, superne margine parce denticulata; perichaetialia pedunculum bre-

vem rufum arcte cylindrico-amplexantia longissime exserta, interna subito capillacea, e reliquis caulinis similima; theca cylindrico-oblonga obsolete strumulosa curvula longirostrata laevissima fuscescens.

Patria. Insulae antarcticae Aucklandi, unde solo fertile vidimus, Kerguelen, Eremitae et Falklandi: J. Hooker.

D. setoso proximum.

29. *D. setosum* Hook. et Wils. (Lond. Journ. of bot. 1844. p. 541.); *dense cespitosum sed laxè cohaerens robustum elongate dichotomum erectum stramineum, apice dense et stricte foliosum*; folia caulina robusta stricta longiora latiora fragilia lanceolato-subulata minus convolutaceo-concava, basi vix reflexiuscula cellulis alaribus inaequalibus ad marginem infimam elongatis laris magnis fuscis robustis praedita, e reliquis foliis *D. pungentis* similima; perichaetia in cylindrum arctum immersum convoluta, e basi lato-vaginate superne rotundata subito tenuissime subulata, externa breviora et subintegra, interna longius capillacea et denticulata, omnia nervo obsoleto tenui excurrente, ut in caulinis areolata; theca in pedunculo brevi *basi geniculato* cylindrico-oblonga obsolete sed magis strumulosa curvula longirostrata laevissima fuscescens.

Patria. Insulae antarcticae Campbelli et Aucklandi: J. Hooker.

A *D. pungente* notis cursive impressis distinctissimum. Ex habitu *D. Billardieri* quoque simile. — In axillis foliorum gemmulae foliis minutis convuluto-orbicularibus densius areolatis coloratis inveniuntur. An flores masculi steriles?

30. *D. Billardieri* Schwägr. (Suppl. II. p. 70. tab. 121.); *dense cespitosum laxè cohaerens robustum densifolium stramineum apice tenuiore falcato*; folia caulina erecto-patentia breviora secunda, e basi lata planâ acuminata acuta apice semel torta concava parcissime denticulata, nervo maxime tenui veluti filiformi excurrente,

omnino e cellulis elongatis parietibus stramineis areolata, cellulis alaribus, parum ventricosus robustissimis permultis intense brunneis dein marcescentibus hyalinis totam basin folii occupantibus; perichaetia in cylindrum breviter exsertum convoluta, *latissime vaginantia margine membranacea* e reliquis caulinis similia, externa breviora superne rotundata subito et breviter acuminata acuta integerrima, intima sensim longius acuminata obsolete denticulata; theca in pedunculo rubro crasso solitario cylindrico-ovalis *perfecte strumosa* arcuata, operculo longirostrato; perist. dentes robusti intense purpurei *perfecte trifidi*.

Brid. I. p. 401.

Patria. Nova Hollandia: La Billardiere; prom. b. spei: Zeyher; insulae Aucklandi et Falklandi: J. Hooker.

31. D. Bonjeani De Not. (Syllab. Musc. 1838. p. 213.); dense cespitosum fragile erectum vel ascendens fastigiatis breviter-ramosum robustum dense foliosum, apice substricto vel subcuspidato; folia caulina *paulisper secunda vel erecto-patentia, e basi lata planâ lanceolata latiusculo-acuminata dentibus acuta, apice subplano loriformi, superne argute serrata et leviter transversim undulata*, nervo angustissimo evanido, omnino e cellulis longis robustis parietibus crassis valde interruptis flavidis praeditis areolata, cellulis alaribus planiusculis paucis robustis brunneis dein marcescentibus; perichaetia in cylindrum convoluta late vaginantia superne sinuato-rotundata subito acuminata integra obsoletinervia; theca oblongo-cylindracea erecto-curvata subapophysata laevis exannulata fuscescens, operculo longisubulato; perist. dentes angusti pallide purpurei bifidi.

D. palustre Br. Europ. (hand La Pyl.) Fasc. 37—40. p. 39. t. 31. — *D. juniperifolium* Sendtn. in Flora 1840. I. p. 59. et in Denkschriften der k. bot. Gesellsch. zu Regensb. III. p. 144.

β. polycladum, innovationibus valde ramulosis, ramulis gracilibus minute et imbricato-foliosis. Br. Europ. l. c. p. 39.

Patria. In turfosis montis Cenisii: Bonjean; in sylvis prope Taurinum: De Notaris; in Sudetis: in monte Altvater im mährischen Gesenke: Diaconus Kramer 1839., im Kessel auf der Janowitzer Haide ad fontes declivos: Sendtner; pr. Christianiam: Blytt. Var. β . in valle Rhenana sterilis. — *Aestate.*

Pl. mascula ignota. — *D. Schraderi* et spurio primo praesertim proximum, notis illustratis autem facillime discernibile.

32. D. Kerguelense C. Müll.; laxe cespitosum elatum erectum *substrictum fragile* apice valde incurvum dichotome et elongate ramosum *fuscescens*; folia caulina lata perfecte secunda valde falcata, e basi lata cellulis alaribus multis mollibus pallescentibus praedita *in subulam longam planam summo apice parce denticulatam producta*, nervo tenuissimo obsoleto, e cellulis quam maxime angustis parietibus maxime incrassatis areolata, valde concava.

Dicr. Boryanum Hook. et Wils. in sched. musc. antarctic.

Patria. Insula Kerguelen: J. Hooker.

A *D. dichotomo* simillimo foliis longe subulatis obsoletinerviis aliter reticulatis et dorso laevibus, denique statura robustiore strictiore atque colore fuscescente certe distat.

33. D. Mühlenbeckii Br. et Sch. (Br. Europ. Fasc. 37—40. p. 38. t. 30.); compacte cespitosum erectum valde ferrugineo-tomentosum dichotome et elongato-ramosum e fulvello lutescenti-viride; folia caulina *undique patentia flexuosa apice torta sicca crispata*, lanceolato-subulata concava *marginibus conniventibus*, apice remote denticulata, nervo solido laevi deplanato-convexo, ut in *D. congesto* areolata; perichaetia in cylindrum convoluta, interna subito acuminata, excurrentinervia; theca in pedunculo longo tenui pulchre stramineo stricto cylindracea erecta arcuata subaequalis pallide castanea annulata obsolete striata pachyderma, operculo e basi convexa rubella longirostrato; perist. *D. congesti*. $\frac{1}{4}$.

Patria. In arborum truncis emortuis faucium inter Tuis Rhaetiae et Tiefenkastel retro der Sägemühle: Mühlenbeck, 1844.

Species ex animadv. auct. pulcherrima, ex habitu *D. pallido* affinis. — Pl. mascula ignota.

Incertae sedis.

34. *D. fasciatum* Hdw. (Sp. Musc. p. 127. t. 28.); depressum assurgens subdivisum, divisionibus simplicibus, radiculosum, obscure coloratum; folia caulina confertissima longa canaliculata heteromalla absque nervo evidente, basi modice lata fusca reticulata (cellulae alares), pallide viridia; perichaetia cylindraco-convoluta; pedunculi gemelli raro solitarii brevissimi; theca pyriformis cernua, dentibus bifidis. †.

Brid. l. p. 432. non hb. excl. syn. Palis.

Patria. Insulae maris pacifici.

Sectio III. **Orthodicranum.** Cespites et folia ut in *Onco-phoris*. Theca erecta cylindrica aequalis annulata. Inflorescentia dioica vel monoica.

a. Folia falcata.

α. Inflorescentia monoica

35. *D. fulvellum* Sm. (Fl. Brit. III. p. 1209.); dense cespitosum pulchre fulvellum, humile erectum vel e basi decumbente ascendens; folia caulina densa subsecunda et falcato-secunda longe subulata, basi latiore viridia nitida, subula fusca apice denticulata, elongate areolata, cellulis alaribus laxis planis paucis; perichaetia externa e basi oblonga vaginante longe subulata, intima angustiora setacea, erecta vel ad unum latus dejecta; theca in pedunculo paulo exserto erecta aequalis vel subcernua et dorso convexa, ferruginea estriata, operculo rubello oblique conico-subulato; perist. dentes anguste lanceolati, longe et pallide subulati bifidi, cruribus apice conglutinatis, siccitate patulis, in theca evacuata e basi patula incurvis. †.

Brid. l. p. 813. — *Arctoa fulrella* Br. Europ. Fasc. 33 — 36. *Arctoa*, p. 4. t. 1. — *Weisia flexuosa* Nees et Hsch. Bryol. Germ. II. p. 121. t. 35. — *Dicr. Seligeri* Brid. l. p. 429?

Patria. In rupium fissuris et ad terram humidam alpium summarum et regionis arcticae. In Scotiae monte Ben More: Dickson, Ben Nevis: Borrer, Snowdon: Wilson; in Norvegiae Dovrefjeld ad pedem m. Sneehättan ad nives aeternas: Kurr, W. P. Schimper, in alpe Fillefjeld: Blytt; ad mare album: Ångström; in Carinthiae alpibus Malnitzer Tauern: F. Müller et Pasterze: A. Braun. — *Julio.*

Flores masculi in ramulis propriis vel in innovatione, e qua feminei egrediuntur, terminales; folia perigonialia externa e basi ovata concavâ longe subulata, interna breviora ovata acuminata subnervia. Paraphyses et antheridia pauca. — *D. hyperboreo* proximum.

36. *D. hyperboreum* Sm. (Fl. Brit. III. p. 1227.); *cespitosum, e rufo viride, fragile, D. fulvello simile, sed robustius; folia caulina patentia et subsecunda siccitate incurva subflexuosa lanceolata et e basi lanceolatâ lanceolato-subulata, subula vix aspera, densius areolata; perichaetialia e basi longe vaginante aristata tenuinervia; theca in pedunculo paulo exserto erecta vel subcernua ovata, collo tumidulo, substriata, sicca evacuata cyathiformis plicata; perist. dentes latiores brevius subulati distinctius strigillosi, apice 2—3-fidi et ad medium pertusi, siccitate e patenti basi erecti, apice conniventes.* †.

Brid. l. p. 458. — *Arctoa hyperborea* Br. Eur. Fasc. 33—36. *Arctoa*, p. 5. t. 2. — *Bryum hyperboreum* Gunnerus Fl. Norveg. No. 1060. et Oeder Fl. Dan. tab. 538. No. 3. — *Dicran. fulvellum* Grev. Scott. Fl. Vol. IV. t. 188. ex parte.

Patria. In Norvegiae alpe Dovrefjeld prope Kongsvold versus Drivstuen in rupium siccarum fissuris: Oeder, Kurr 1825., W. P. Schimper 1844. — *Julio.*

Flores masculi crassiores, ad pedem perichaetii fertilis; folia perigonialia ovato-acuminata nec subuligera, subnervia et enervia. Paraphyses et antheridia longiora.

β. Inflorescentia dioica.

37. *D. longisetum* Hook. (Musc. Exot. tab. 139.); *late et dense cespitosum pulvinatum subhumile depressum*

nitidulo-flavescens basi innovando ramosum, ramis aequalibus; folia caulina secunda in comam subfalcatam longisetaceam congesta parum crispata, e basi latiuscula ad nervum e cellulis laxis diaphanis ad marginem angustioribus tenuioribus flavis areolatâ lanceolato-subulata, apice summo margine serrulata, nervo lato laxo totam partem supremam occupante, cellulis alaribus planis paucis fuscis submarginalibus; perichaetialia basi latiora laxius reticulata; theca in pedunculo elongato plus minus torto erecta anguste ovalis sulcata operculo longirostrato obliquo; perist. dentes ad medium fissi, cruribus binis purpureis superne rugulosis.

Brid. I. p. 428. — *Dicranodontium?* Br. et Sch. Br. Europ. Fasc. 41. p. 2.

Patria. In sylvis regni Novae Granadae prope Fusagasaga et in apricis frigidis montis Chimborazo, alt. 1430 hexapodum: Humboldt et Bonpland. Brasilia in cacumine tractus montis Serra dos Orgaôs dicto: Gardner Coll. No. 21. Columbia: Sierra nevada de Merida: Moritz, ex altitud. 8000 ped., Funck et Schlim in Coll. Linden. No. 996. Septbr. 1846.

38. **D. reflexum** C. Müll.; *laxe cespitosum radiculosum elatum ramosum ascendens vel reduncum apice falcatum sordide viride; folia caulina secunda e basi lata reflexiuscula lanceolato-falcata maxime plicato-concava breviter margine et dorso argute et dense serrata, cellulis alaribus permultis fuscis planis magnis laxis, omnino e cellulis angustis elongatis veluti in membranam conflatis tenerrimis areolata, nervo angusto in plica percurrente; perichaetialia in cylindrum exsertum dense clausum convoluta longe vaginantia tenerrime membranacea subhyalina rotundato-sinuata subito subulata, nervo flavo tenui excurrente, e reliquis caulinis similia, haud plicata; thecae in unico perichaetio geminatae longe cylindrico-orales robustae longiusculo-pedunculatae pallidae aquales, operculis longe et oblique subulatis; perist. dentes breves lanceolati subintegri, apice in comam congesti cohaerentes hyalini irregulariter fissi basi valde conflati.*

D. reduncum Duby in Zollinger Coll. Pl. Jav. No. 2101.

Patria. Java.

Ex habitu *D. scoparii* s. *pallidi*, sed theca erecta cylindrica jam primo adspectu diversum. — Calyptra longa, $\frac{2}{3}$ thecae aequans.

39. *D. macropus* Kze. (Pöpp. Pl. Chil. Coll. III. No. 271.); dense cespitosum *flavidum* ascendens dichotome ramosum subgracile, *apice longe falcato-comosum* robustius, flexuosum; folia caulina secunda lanceolato-subulata acuta canaliculato-concava falcata, *summo apice solummodo margine denticulata, sed dorso e basi fere ubique tenuiter scaberrima* latinervia, cellulis alaribus laxis fuscidulis planiusculis, inferne e cellulis angustis elongatis parietibus parum interruptis superne minutissimis areolata; perichaetialia cylindrico-convoluta immersa longe vaginantia, e cellulis valde angustis et elongatis, parietibus flexuosis perdurantibus areolata, sensim subulata laeviora; theca in pedunculo *elongato flavo flexuoso longe cylindrico-elliptica pallida* laevis, operculo erecto longirostrato pallidiore praedita.

Patria. Chile australis, in truncis et rupibus ad Antuco: Pöppig. *Novbr.*

Pl mascula multo gracilior falcata, flore crassiusculo terminali et infra perigonium innovationibus masculis novis. Folia perigonialia lato-convoluta subito plus minus subulata obsoletinervia, dorso subulae scaberrima apice margine denticulata, basi laxae areolata colorata. Antheridia maxima clavata arcuata, paraphysibus parum majoribus flavidis. — *D. longifolio* ex habitu proximum sed aureo-flavidum et notis laudatis praesertim foliis dorso ubique scaberrimis distinctissimum.

40. *D. longifolium* Ehrh. (Dec. Crypt. No. 114.); laxae et late cespitosum molle *sericeum pallide vel glaucoviride* ascendens pluries dichotomum, apice falcatum; folia caulina secunda falcata lanceolata canaliculate et *loriformi-subulata, superne dorso ubique et margine valde serrulata, nervo latissimo totum folium superum occu-*

pante, basi e cellulis parvis parallelis tenuibus angustis parietibus parum interrupte obsoletis inanibus areolata, cellulis alaribus parum ventricosus laxis fuscidulis; perichaetialia longissima e basi convolutacea *lato-vaginantia* tenera laxius areolata *superne sinuata parum crenatâ* flexuose et canaliculato-subulata et caulinis simillima, tenuinervia; theca in pedunculo breviusculo suberecto elliptico-cylindrica erecta, operculo longe subulato obliquo pallido; perist. dentes parvi, cruribus profunde bifidis irregularibus superne flavescentibus laevibus.

Br. Eur. Fasc. 37—40. p. 32. tab. 25. — Brid. I. p. 430. — Hedwig Musc. Frond. III. p. 24. t. 9.

Patria. Prope Upsaliam primus legit Ehrhart; praeterea e planitiebus editioribus Germaniae septentrionalis Megapolitanae ubi ad lapides viget, per regiones montanas usque ad alpes ascendens totius Europae et in America septentrionali. — *Auctumno.*

Pl. mascula gracilior, floribus in eadem innovatione compluribus. Folia perigonialia maxime falcata, externa subito subulata, intima breviter acuminata obsolete nervosa.

41. **D. Sauteri** Br. et Sch. (Br. Europ. Fasc. 37—41. p. 33. t. 24.); late cespitosum molle *laete viride nitidum*; habitus *D. longifolii*, sed folia caulina *nerro multo angustiore alis igitur latioribus praedita, apice summo margine denticulata vel integra, dorso ad carinam tantum apice denticulata*; perichaetialia *angustius vaginantia sensim fere subulata parcissime denticulata*; caetera ut in *D. longifolio*.

Patria. In regione infraalpina et subalpina, ubi ad fagorum truncos cespitibus latissimis viget: in sylva densa ad montem Dörenberg prope Gaming Austriae superioris: Sauter; in monte Feldberg et Bölchen Sylvae nigrae: A. Braun; Helvetia: Schleicher; Moresh in alpibus Julicis: Sendtner. — *Aug., Septbr.*

42. **D. brevisetum** Dz. et Molkb. (Ann. d. sc. nat. 1844. II. p. 302.); late et laxo cespitosum elongatum fle-

xuosum dichotomum robustum dense foliosum, apice falcato plerumque reflexo, stramineo-fuscescens; folia caulina falcato-secunda longa, e basi reflexiuscula amplexicauli cellulis alaribus robustissimis planis intense brunneis dein marcescentibus hyalinis *infima parte valde incrassatis longioribus* praeditâ lato-lanceolata subulata convolutaceo-concava, margine et dorso argute serrata, nervo angusto excurrente, e cellulis *elongatis angustis parietibus in membranam veluti conflatis albescentibus* areolata; perichaetialia dense imbricata basi multo latiora vaginantia sensim capillacea, e reliquis caulinis simillima immersa; theca innovando lateralis *brevissime pedunculata plerumque solitaria brunnescens nitida* ovalis laevissima, operculo conico-subulata obliquo; perist. dentes longissimi *inaequaliter profunde 2—3-fidi* cruribus *valde nodoso-trabeculatis* purpureis.

Didymodon brachypus Hmp. in schedulis.

Patria. Java in monte Pangerango: Reinwardt, in locis aliis nobis ignotis Junghuhn et alii legerunt.

Habitus *D. scoparii*, sed notis laudatis planta distinctissima. E theca brevissime pedunculata et foliorum areolatione *D. Blumii* affine.

b. *Folia patentia.*

43. **D. strictum** Schleich. (Cent. III. No. 26.); dense cespitosum laete vel e lutescente viride subnitidum subhumile radiculoso-tomentosum, erectum breviter ramosum; folia caulina *erecto-patentia, juniora subsecunda, siccitate stricta fragilissima*, lanceolato-subulata, apice obsolete denticulata, superne marginibus subconniventibus convolutaceo-concava semel torta, nervo angusto excurrente, *dorso laevia*, cellulis alaribus teneris paucis planiusculis fuscis, basi e cellulis elongatis angustis superne ellipticis areolata; perichaetialia convolutaceo-vaginantia sensim subulata subintegerrima, e reliquis caulinis similia; theca in pedunculo stricto stramineo ovato-elongata subcylindrica, operculo oblique subulato; perist.

dentes angusti cruribus tenuissimis pallidis liberis vel conglutinatis conferte articulatis.

Br. Europ. Fasc. 37 — 41. p. 28. t. 19. — Brid. I. p. 459.

Patria. Ad terram, radices arborum et truncos putridos per regionem alpinam Helvetiae, ubi in sylvis supra Moriles Vallesiae detexit Schleicher, in iisdem locis ascensus septentrionalis montis Sempione: W. P. Schimper et in monte Pindus Thessaliae. E rarioribus. — *Aestate.*

Pl. mascula feminea gracilior minus tomentosa. Folia perigonialia externa e basi ovata concavà lineari-subulata, interiora latiora tenuiora acuminata. Antheridia parva, paraphysibus longioribus teneris superne breviter articulatis mixta.

44. **D. fragile** Hook. (Musc. Exot. t. 134.); dense cespitosum *fragile elatum erectum* aliquoties ramosum dichotomum radiculoso-tomentosum; folia caulina erecta, terminalia paullum secunda, e brevi lineari vel lanceolata basi *sensim longissime acuminata* concava, *subtiliter sed argute serrata*, pallide viridia, nervo valido concolore excurrente, e cellulis basi oblongis, superne elongatis areolata, cellulis alaribus quadratis ferrugineis; perichae-tialia e basi breviter vaginante fere subito longius subulata; theca in pedunculo breviusculo lutescente stricto erecta *cylindracea teres* flavo-fusca; perist. dentes breves rubri ultra medium fissi interdum inferne pertusi, cruribus subinaequalibus. †.

Brid. I. p. 419. — Schwägr. Suppl. III. II. 1. tab. 254.

Patria. Nepal: Wallich 1791.

45. **D. macrodon** Hook. (Ic. Pl. Rar. t. 349.); *humile* cespitosum erectum subramosum; folia caulina undique inserta erecto-patentia subulata paululum falcata integerrima, nervo mediocri infra apicem evanido; theca *in pedunculo elongato erecta angusto-pyriformis*, operculo e lata basi subulato-obliquo; peristomii dentes *elongati profunde bipartiti* in conum approximati. †.

Patria subdubia, forsan Pillzhum in provincia Cuença dicta, ubi W. Jameson collegit.

Ex ic. *D. longiseto* haud dissimile.

46. **D. aciphyllum** Hook. et Wils. (Lond. Journ. of bot. 1844. p. 541.); *compacte cespitosum tomentosum erectum ramosum subulatum densifolium subrobustum flavescens; folia caulina erecto-patentia stricta rigida parum flexuosa perfecte et longe lanceolata subulata canaliculato-concava integerrima, nervo lato maxime concolore, igitur veluti enervia, basi e cellulis parallelis parietibus flavidis valde interruptis praeditis laxioribus superne minutis valde incrassatis areolata, cellulis alaribus tenerrimis hyalinis fugacissimis planis, dorso laevia; perichaetialia intima pauca vaginantia, ut basis caulinorum areolata, subito loriformi-subulata; theca in pedunculo crasso rigido stricto purpurascente erecta oralis crassiuscula dein fusco-nitida, operculo subulato obliquo; perist. dentes angustissimi subintegri parum bifidi, cruribus arcte cohaerentibus rugulosis subhyalinis.*

Patria. Cap. Horn, insulae Eremitae et Falklandi: J. Hooker.

D. stricto subaffine, notis autem facile discernibile.

47. **D. speciosum** Hook. et Wils. (Lond. Journ. of bot. 1847. p. 291. t. 11.); *caulis longissimus robustissimus subsimplicissimus dense foliosus erectus; folia erecto-patentia longissima apice caulis vir secunda robusta lata e basi ovato-lanceolata lineari-attenuata apice subserulata siccitate spiraliter convoluta, nervo latiusculo basi folii distinctiore flavido, dorso laevia, parum concava; perichaetialia convoluta latiora; theca solitaria in pedunculo flavescente brevi ovato-subcylindracea erecta, operculo thecam aequante subulato; perist. dentes angusti intense purpurei ad medium usque fissi, sed cruribus apice connatis. †.*

Patria. Novo-Granada: Purdie.

Omnium congenerum gigas, statura robustissima, quibus notis ab omnibus facillime distinguitur. *D. speiro-*

phyllo Mont. (ubi descripto?) secundum auctores affine, sed foliis remotis sparsis divaricatis lanceolatis apice serrulatis et nervo angustissimo differre dicitur.

48. **D. Blumii** Nees ab Es. (Nov. Act. Leop. XI. I. p. 131. t. 15.); caulis tenello - gracillimus erectus *longissimus* dichotome divisus *ater laevis et remote foliosus fragilis flexuosus*; folia caulina *angustissima longissima patentissima* straminea, apice caulis *in comam elongatam tenuissimam substrictam congesta, e basi reflexa valde amplexicauli lanceolato-subulata acuta maxime intorto-et cylindrico-convoluta, apice canaliculato-concava* et margine denticulata, dorso laevia, nervo tenuissimo filiformi excurrente, omnino e cellulis angustis elongatis parietibus maxime incrassatis et interrupte obsoletis flavidis praeditis stramineis areolata, cellulis alaribus robustissimis intense brunneis permultis; perichaetia dense imbricata, e basi lata superne rotundata subito et patulo-capillacea; theca innovando lateralis *brevissime pedunculata* ovalis solitaria laevis ore constricta, operculo conico-subulato subobliquo; perist. dentes longi cruribus binis tenuissimis apice hyalinis.

Brid. I. p. 453. — Schwägr. Suppl. II. II. 2. p. 116. t. 185.

Patria. Java in montibus excelsis partim ignivomis Salak et Gédé: Blume.

Planta speciosissima rariflora, quacum nulla alia confundi potest. Fructum non vidimus.

c. *Folia crispa.*

41. **D. montanum** Hdw. (Sp. Musc. p. 145. t. 35.); *pulvinato-cespitosum amoene subgramineo-viride molle humile*, dichotome ramosum radiculosum, *vix falcatum*; folia caulina lanceolato-subulata *undique patentia vix secunda siccitate crispatissima* canaliculato-concava, nervo angusto superne tenuiore carinato excurrente, dorso ubique levissime scabra, *basi e cellulis elongatis angustis superne minutissime quadratis areolata*, cellulis alaribus paucis teneris parvis fusciculis planiusculis, superne margine crenulato-denticulata; perichaetia cylindrico-con-

voluta longe vaginantia *superne truncato-sinuato-rotundata* crenulata subito longius subulata, inferne e *cellulis angustissimis tenerrimis plus minus elongatis vermiformibus massa granulosa grisea repletis* ad subulam quadratis areolata; theca in pedunculo stricto longiusculo flavo dein fusco cylindrico-ovalis olivacea dein fusca obsolete striata sicca late sulcata, operculo longirostrato obliquo pallidior; perist. dentes bifidi cruribus angustissimis cartilagineis tenuissimis laevibus.

Br. Europ. Fasc. 37—41. p. 29. t. 20. — Brid. I. p. 454. — *Dicran. Scottianum* var. *montanum* Hook., et Tayl. Musc. Brit. p. 56.

Patria. Ad arborum praesertim Pinuum et Betularum truncos per totam Europam satis vulgare, rarissime tamen fructiferum. — *Aestate.*

Pl. mascula femineae intermixta, floribus *D. stricti*. — Colore amoene viridi atque foliis crispatissimis ubique patentibus primo adspectu facile distinguitur.

50. **D. interruptum** Brid. (I. p. 438.); laxe cespitosum *obscurè et olivaceo-viride duriusculum* erectum vel ascendens rufo-tomentosum *interrupte foliosum breviter ramosum, apice parum falcatum*; folia caulina lanceolato-subulata *falcato-secunda siccitate crispata canaliculato-concava, nervo lato superne tenuiore carinato dorso scabro* excurrente, omnino e *cellulis minutissimis viridibus quadratis* areolata, cellulis alaribus teneris quadratis flavidis dein albescentibus parvis, parum ventricosis praedita, summo apice obsolete denticulata; perichaetia cylindrico-convoluta longe vaginantia *nitida superne truncato-sinuato-rotundata* crenata longius subulata elongate et angustissime areolata; theca in pedunculo stricto breviusculo rigido stramineo dein fusco cylindrica fusca longiuscula striata, operculo oblique subulato fusco; peristomii dentes irregulariter fissi pertusi, cruribus apice pallidis.

Br. Europ. Fasc. 37—41. p. 30. t. 22. — *Dicr. fulrum* Hook. et Wils. in Drumm. Musc. Amer. No. 49. et Sullivant Musc. Allegh exsicc. II. No. 159.

Patria. In rupibus arenaceis et graniticis umbrosis Vogesi, Sylvae nigrae, Tirolis, Pyrenaeorum et in America septentrionali. — *Septembri.*

Pl. mascula cespites proprios efficiens vel femineis intermixta. Flores *D. flagellaris*. — Ex habitu ad *D. longifolium*, magis autem ad *D. flagellare* accedens.

51. *D. flagellare* Hdw. (Musc. Frond. III. p. 1. tab. 1.); dense cespitosum lacte viride rufo-tomentosum erectum vel ascendens breviter ramosum, *flagellis axillaribus rigidis filiformibus*, apice parum falcatum; folia caulina lanceolato-subulata falcato-secunda *siccitate crispata marginibus conniventibus convolutaceo-concava parum torta*, nervo subangusto superne tenuiore carinato dorso serrulato excurrente, omnino e cellulis minutissimis basi parum majoribus pallescenti-viridibus quadratis areolata, cellulis alaribus *D. interrupti* sed pluribus, summo apice serrulata; perichaetia cylindrico-convoluta longe vaginantia sensim fere subulata, elongate angustissime et flexuose areolata, summo apice dorso et apice serrulata; theca in pedunculo *elongato strictiusculo gracili* pallescente longe cylindrica olivacea striata, operculo longirostrato obliquo fusco; perist. dentes angusti dense trabeculati bifidi.

Br. Europ. Fasc. 37—41. p. 30. t. 21. — Brid. I. p. 422. — *Bryum flagellare* Dicks. Crypt. III. p. 6.

Patria. E planitiebus turficeis usque ad montes altiores, ad arborum radices et in truncis putridis vicens, per totam Europam, Asiam et utramque Americam. — *Junio, Julio.*

Pl. mascula feminea gracilior, flore crassiusculo. Folia perigonialia e basi lato-convoluta ventricosa laxius areolata coloratâ subito et breviter et latiusculo-acuminata obsoletinervia summo apice parum denticulata dorso laevia. Antheridia magna clavata curvata, paraphysibus parum longioribus flavidis. — Ex habitu *D. interrupto* proximum.

52. *D. Scottianum* Turn. (Musc. Hibern. p. 75. t. 6. f. 1.); dense et subpulvinato-cespitosum pluries dichotomum.

tomum basi intertextum, e fulvello pallide viride vel omnino fulvellum, erectum vel ascendens robustum densissime foliosum; folia caulina patentia et subsecunda, siccitate incurva vel apice subtortilia longa lanceolato-subulata concava margine integerrima angustinervia, basi latiore elongate superne minute quadrato-areolata, cellulis alaribus laxis quadratis ferrugineis; perichaetialia latiora vaginantia subito subulata; theca in pedunculo longiusculo elongato-elliptica recta vel subarcuata flavida vel pallide ferruginea estriata, sicca cylindrica subplicata, operculo conico-subulato obliquo pallido; perist. dentes breves infra thecae orificium oriundi lineari-lanceolati integri vel apice 2—3-fidi, rubelli apice pallidi, fragiles.

Br. Europ. Fasc. 37—40. p. 31. t. 23. — *D. Hostianum* Schwägr. Suppl. I. I. p. 177. t. 44. e spec. auth. hb. Brid. foliis brevioribus denticulatis magis crispatis.

Patria. In rupibus umbrosis Scotiae, Normandiae, Helvetiae prope Interlacken, Austriae inferioris in monte Schneeberg et in alpibus Julicis (Mogenza). — *Auctumno.*

Pl. mascula in cespite proprio gracilior et magis ramosa. Perigonia numerosa. Folia perigonialia externa lanceolato-subulata, interna e basi lata acuminata. — *A D. interrupto* et *flagellari* differt: cespitibus densioribus pulvinatis leviter nitentibus, foliis densioribus subrigidis vix crispatis, nervo angustiore et crassiore, theca pallida saepe subarcuata et peristomii forma.

d. *Folia reflexa.*

53. *D. reflexifolium* C. Müll.; late et laxe cespitosum elatum ramosum ascendens vel reduncum, viride vel flavo-nitens, inter foliorum axilla maxime albido-tomentosum, folia caulina igitur madefacta perfecte horizontalia, sicca reflexa ubique patentia, apice caulis comosa et parum secunda, e basi lata reflexiuscula cellulis alaribus permultis magnis fuscis laxis praedita lanceolata apice subfalcata, e cellulis parvis angustis inaequalibus parietibus saepe interruptis pellucidis areolata, margine

et dorso dense et argute serrata, plicata, nervo angusto in plica percurrente; perichaetialia in cylindrum dense clausum exsertum terminale convoluta, late et longe vaginantia anguste et elongate basi laxe areolata, superne rotundato-sinuata crenata subito subulata obsoletinervia, ad subulam margine et dorso argute serrata; thecae in unico perichaetio plures breviter pedunculatae cylindricae brevicollae, caetera ut in *D. reflexo*?

Patria. Java: Hb. Miquelianum.

D. undulato ex habitu simile, e sectione tamen et notis laudatis ceteris diversissimum. E structura interna foliorum *D. reflexo* affine.

Sectio IV. Campylopus. Plantae cespitosae raro gregariae. Folia latinervia, inferne laxius superne minutius plerumque incrassato-areolata. Nervus applanatus, ad paginam superiorem s. interiorem e cellulis laxis plus minus latis, ad paginam exteriorem s. inferiorem e cellularum stratis compluribus incrassatarum compositus vel omnino incrassatus, dorso plerumque ad paginam interiorem raro lamellatus. Pedunculus thecae junioris ad axilla foliorum plerumque decurvatus et ibidem calyptra radices efficiente fixus, rarius erectus. Calyptra basi fimbriata vel integra. Inflorescentia dioica.

Sectio pulcherrime naturalis, sed nunquam genus proprium, quum a *Dicranis* pedunculo, non autem semper arcuato et calyptra non autem semper ciliata, notis igitur nec essentialibus nec constantibus distet.

1. *Folia epilifera.*

A. *Nana.*

54. *D. nanum* C. Müll.; *gregarium, pusillum simplex seu subramosum*; folia caulina e basi oblonga subulata parum secunda firma; perichaetialia e basi convoluta membranacea lata subulata; perigonialia e basi latissima convoluta ventricosa brunnea tenero-membranacea subulata; omnia nervo lato excurrente, *integerrima brevia*; theca *solitaria in pedunculo brevi et pro plantulae exiguitate crasso*, primum valde curvato tandem substricto flavo laevi oblonga *minuta* aequalis rufescens annulata, oper-

culo conico subulato obliquo; calyptra dimidiata *basi integra*; dentes perist. breves angusti bifidi, cruribus hyalinis dense approximatis vix conspicue secedentibus.

Campylopus nanus C. Müll. Bot. Zeit. 1847. p. 804. — *Dicran. flexuosum* var. *calyptra cucullata basi integra* Hsch. Linn. XV. p. 124.

Patria. Prom. bon. spei: Gnadenthal in monte 3800' alt. in rupibus, Novbr. 28 legit Drège. Java in monte Salak inter *Catharineam Javanicam* Hmp.: Junghuhn, Aprili; et in collectione *Zollingeriana Javanica* inter muscos alios.

Pl. mascula feminea humilior; antheridia magna clavata, paraphysibus teneris flavis paucis intermixtis. Anulus multiplex. — A *D. flexuoso* notis illustratis distinctissimum.

55. **D. humile** C. Müll.; *caulis vix ullus basi decumbens*; folia dense imbricata fulva lanceolato-subulata falcato-secunda, nervo tenui, apice denticulata; theca obovata inaequalis, madida brevis, sicca tenuissime striatula, calyptra basi *albo-fimbriata*. †.

Campylop. humilis Mont. Ann. d. sc. nat. 1845. 4. p. 110.

Patria. Ad ligna putrida in Brasilia: Blanchet.

A *D. nano* calyptra fimbriata differt.

56. ? **D. Nepalense** C. Müll.; *gregarium tenuissimum humillimum simplicissimum albido-virens*; folia caulina homomalla *angustissime lanceolato-subulata falcata* latinervia apice denticulata omnino minutissime areolata, cellulis alaribus maxime teneris hyalinis laxis fugacissimis ventricosis praedita.

Didymodon Nepalensis Brid. I. p. 821.

Patria. Nepal inter muscos *Wallichianos* exemplaria pauca invenit Bridel.

E tenuissimis. *Campylopus* videtur.

B. *Elata.*

1. *Caulis inferus foliis appressis teres.*

57. **D. exasperatum** C. Müll.; *basi cespitosum purpureo-tomentosum, caulibus elongatis solitarie ascenden-*

tibus flexuosis simplicibus partim filiformibus julaceis partim laxe foliosis, flavescentibus nitidis, apice fertili rosulatis, masculis interruptis infra perigonium cyathiforme julaceo-innovantibus; folia caulina lato-oblonga, cellulis alaribus robustis brunneis praedita, superne convolutacea flavida, inferiora obtusissima tenuissime crenulata, superiora acuta vel acuminata summo apice margine et dorso denticulata, omnia nervo latissimo concolore linea media exarato instructa; perichaetialia multo angustiora subito setacea erecto-patentia vaginantia, inferne laxe areolata, apice dorso et margine denticulata, tenuinervia; theca in pedunculo brevi arcuato superne maxime verrucoso exasperato ovalis vix sulcata, annulo magno multiplici praedita, operculo conico brevi erecto; perist. dentes angustissimi longissimi rugulosi intense purpurei cruribus 2 tenuissimis; calyptra haud fimbriata sed cellulis brevissimis basi limbata.

Campylopus exasperatus Brid. l. p. 473. — *Thysanomitrium exasperatum* Nees ab Es. in Act. Acad. Nat. Leop. XI. II. p. 134. t. 15. f. 2. a — c. — *Trichostomum exasperatum* Schwägr. Suppl. II. II. 2. p. 112. t. 184.

Patria. Java in montibus Salak et Gédé: Blume 1820. Zollinger, Collect. No. 1806.

Flos masculus e gemmis minutis fuscis c. 20 compositus. Folia perigonialia parva subconvolutacea oblonga vel ovalia breviter acuminata tenera integerrima, nervo inferne angustato superne dilatato praedita vel obsoletinervia fuscescentia. Antheridia magna clavata curvata fusca, paraphysibus fuscis filiformibus mixta. — Thecae aggregatae.

58. **D. Dozyanum** C. Müll.; *caulis erectus subsimplex gracilis teres, apice attenuatus vel in capitulum fructiferum proliferumve incrassatus; folia dense imbricata erecto-patula stricta lineari-lanceolata subulato-acuminata subintegerrima apice involuta, nervo lato excurrente, dentata; thecae plures in capitulum foliis numerosis rosaceo-congestis latioribus planioribus cinctum congestae, pedunculi brevis apice scabri curvatura ad*

fructus maturitatem usque intra folia perichaetialia reconditae, *orales basi asperulae* siccitate plicatae, operculis conico-acuminatis subincurvis; calyptra *lacero-fimbriata*. †.

Trichostomum Blumii Dz. et Molkb. Ann. d. sc. nat. 1844. 2. p. 316.

Patria. Java, Borneo.

Dentes peristomii forsitan profunde fissi rugulosi?

59. D. Surinamense C. Müll.; *inferne dense cespitosum, caulibus ascendentibus subhumilibus solitariis substrictis tenuissime filiformibus subjulaceis apice stellato-comosis infima basi laxe foliosis*; folia caulina infra perigonium disposita *lanceolata breviter latiuscula valde plicata et igitur varie concava, apicem versus eroso-denticulata, nervo ante apicem evanido pro latitudine folii tenui, partim medio brevissime lamellosa, partim superne dorso scabro*; folia inferiora lanceolata valde canaliculata angusta igitur latinervia haud plicata, e reliquis superioribus similia; omnia e cellulis parvis inanibus rhomboideis pellucidis areolata, alaribus teneris hyalinis praedita.

Campylopus Surinamensis C. Müll. Linn. XXI. p. 186.

Patria. Surinam prope Paramaribo inter fruticeta, terram arenariam humidam cespitose habitans: Kegel. Aug. 1844.

Pl. feminea ignota. Flores masculi e gemmis 1—12 compositi. Folia perigonialia exteriora e basi lato-convoluta breviter acuminata plicata apice denticulata excurrentinervia, intima brevissima acuminata tenuissime nervosa colorata. Antheridia crassa clavata, paraphysibus flavis mixta. — *D. exasperato* ex habitu et structura interna proximum, notis autem illustratis facile discernibile. Planta tenella pulchella.

60. D. Guadalupense Brid. (I. p. 463.); *cespitosum sed laxè cohaerens simplicissimum strictum rigidum subhumile parce tomentosum flavescent, inferne gracile filiforme, superne patulo-comosum*; folia caulina erecto-appressa stricta breviter perfecte lanceolata dorso vix la-

mellosa concava latinervia *summo apice denticulata*, cellulis alaribus subventricosis *perfecte conspicuis* teneris fuscidulis, inferne e cellulis subquadratis superne minutissimis areolata; flos masculus compositus; folia perigonialia externa lato-convoluta sublonge acuminata integerrima tenuinervia, intima obtusiuscula haud acuminata obsoletinervia, omnia colorata.

Patria. Insula Guadaloupe: Badier, serius Bertero.

De *D. Grateloupii* affinitate cf. exc. in hanc speciem. — Pl. feminea ignota. Antheridia elongata, paraphysibus filiformibus flavidis mixta.

61. *D. Grateloupii* C. Müll.; *maxime elatum simplicissimum filiforme flexuosum, tomentosum apice perichaetis compluribus rosulatum flavescens nitidum*; folia caulina erecto-appressa stricta brevia perfecte lanceolata dorso vix lamellosa concava latinervia summo apice denticulata, cellulis alaribus *nullis*, inferne e cellulis pellucidis viridescentibus *angustis elongatis parallelis* superne minutissimis areolata; perichaetialia paulisper vaginantia subito fere et longius subulata, cellulis alaribus *paucissimis tenerrimis hyalinis* praedita.

Campylop. elongatus Brid. l. p. 815.

Patria. Circa Dax Aquitaniae: D. Grateloup. Hb. Bridel. et Candoll.

A *D. Guadalupensi* proximo notis cursive impressis certe distat. Planta speciosa et observationibus bryologorum Gallicorum dignissima.

62. *D. leucogaster* C. Müll.; *laxe cespitosum erectum elatiusculum simplicissimum veluti caudatum flexuosum molle flaccidum flavescens gracile subfiliforme sed laxifolium*; folia caulina subappressa apice in comam longiusculam erectam patulam parvam congesta, erecto-patentia, e basi latiuscula lanceolato-subulata parum curvata summo apice dorso et margine serrulata, caeterum laevissima tenera, cellulis alaribus *valde laxis magnis et maxime ventricosis albis tenerrimis*, basi e cellulis laxis

teneris superne minutissimis areolata, nervo latissimo, folii partem totam fere superam occupante praedita.

D. filiforme Hsch. in Musc. Mexicanis a Deppe et Schiede lectis.

Patria. Mexico prope Xalapam: Deppe et Schiede.

Caulibus caudatis *D. porphyreodictyi* simile, notis autem illustratis ab omnibus congeneribus differt. Forsan caulibus dimorphis?

2. *Caulis foliis ubique patulis heteromorphus.*

a. *Folia heteromalla.*

α. *Remota.*

63. *D. arcuatum* Brid. (l. p. 463.); *elongatum erectum vel flexuosum simplex robustum rigidiusculum apicem versus perichaetiis compluribus incrassatum ramis infra perichaetium oriundis strictis longe cuspidatis plerumque binis, laxifolium, in axillis foliorum usque ad apicem radiculosum pallescens interdum proliferum*; folia caulina erecta apice patula latiuscula lanceolato-subulata, concava, nervo latissimo laxo dorso laevi excurrente, omnino minute areolata, cellulis alaribus permultis robustis purpureo-brunneis maxime quin imo patelliformi-ventricosis praedita, apice obsolete denticulata; perichaetia multa angustiora breviora inferne laxa superne minutissime areolata, sensim subulata, basi purpureo-brunneo-colorata.

• *Cecalyphum fasciatum* P. B. Prodr. p. 51. — *Dicran. fasciatum* Brid. hb.

Patria. Insulae maris pacifici: Hb. Palis. de Beauv. Insula Bourbonis, in monte excelso Piton des Neiges et in planitie des Chicots, altit. 1000 hexapodum: Bory St. Vincent.

Perichaetia compluria in coma caulis subrosulata.

64. *D. cygneum* Hedw. (Sp. Musc. p. 148. t. 37.); *caulis cespitosus simplex erectus subtenuis valde conspicuus igitur remotifolius purpureus subvillosus*; folia caulina aequabiliter patentia vel distantia plura unum latus

spectantia, ex amplexiuscula basi sensim in acumen subulatum longum canaliculatum producta, rigida integerrima subfalcata, cellulis alaribus permultis praedita; thecae binae in pedunculis solitariis siccitate exporrectis madore perfecte cygneis ovatae subgibbosae aequales, operculis conico-subulatis basi amoene rubentibus; perist. dentes haud profunde fissi. †.

Campylop. cygneus Brid. I. p. 475.

Patria. In insulae Hispaniolae montibus des Grandes Anses dictis: Swartz.

Caule simplici remotifolio facile discernibile. — Flos masc. e gemmis 10 compositus, foliis perigonialibus e basi lato-covolutacea subito acuminatis acutis. — Commentator Schwägrichen folia enervia forsan false et speciem male descripsit.

β. Imbricata.

† Patula.

65. **D. holomitrium** C. Müll.; *caulis elongatus subramosus gracilis; folia caulina dissita patula e basi dilatata vaginante longicapillacea flexuosa integerrima solidinervia; perichaetialia longiora erecta, theca in pedunculo arcuato elliptica striata strumosa, operculo rostrato, calyptra basi integra.* †.

Camp. capillaceus Hook. et Wils. Lond. Journ. of bot. 1844. p. 543.

Patria. Ad Insel-Bay Novae Seelandiae: J. Hooker.

D. filifolio Hsch. ex auct. animadversionibus affine.

66. **D. trachyblepharon** C. Müll.; *erectum strictum interrupte comosum rigidum valde tomentosum subsimplex vel breviter ramosum; folia caulina erecto-patentia, sicca subappressa breviuscula paulisper recurva anguste lanceolata acuta, e cellulis ubique minutis rotundatis basi quadratis arcolata, cellulis alaribus ventricosis fuscidulis mollibus et nervo lato canaliculato lamelloso praedita, apice margine et dorso valde serrata; perichaetialia vaginantia longe flexuose et firmo-setacea, inferne elongate*

laxiuscule areolata, nervo basi tenui elamelloso apicem versus latiore lamelloso praedita, haud cylindraceo-congesta, superne margine et dorso serrata; theca in pedunculo cygneo ovalis gibbosa basi strumulosa olivacea subsulcata, operculo conico subulato recto fusco; perist. *D. lamellinervis*; calyptra ciliis permultis *albis nodosis* flexuosis longiusculis fimbriata.

Patria. Brasilia.

Ex habitu *D. clavato* proximum, *D. lamellinervi* e nervo lamelloso magis, quoad staturam minus affine. A primo simillimo differt foliis nunquam piliferis lamellinervis apice valde serratis et perichaetialibus longe setaceis. — Thecae aggregatae.

67. *D. lamellinerve* C. Müll.; *laxe cespitosum erectum strictum* albescenti-tomentosum *submolle magis rigidum* robustum, *ubique foliis reflexis dense foliosum* viridescens vix nitidum; folia caulina inferiora maxime reflexa, superiora sensim erecta, suprema substricta, lato-lanceolata subulata falcata, cellulis alaribus teneris ventricosis haud constrictis praedita, *basi e cellulis elongatis parietibus interruptis superne minutissimis rotundatis mollibus areolata*, nervo *latissimo maxime lamelloso superne dorso scaberrimo, dense et argute serrata*; perichaetialia cylindraceo-convoluta sensim fere subulata, basi e cellulis laxis parietibus normalibus areolata; theca in pedunculo *tenello-cygneo subascendens obconica subarcuata subgibbosa basi strumulosa* valde sulcata olivacea, operculo conico acuto subulato fusco; perist. dentes angusti longissimi cruribus tenuibus inferne fusco-striatulis superne hyalinis subrugulosis; calyptra longe et albo-fimbriata.

Dicr. concolor C. Müll. Bot. Zeit. 1844. p. 709. et Hsch. Fl. Bras. p. 11.?

Patria. Brasilia, ut videtur haud rarum. Gardner No. 7 et 25. in Corcovado lectum.

Thecae aggregatae. Pl. mascula gracilior, infra perigonium innovans. Flos masc. e gemmis compluribus

ovatis compositus. Folia perigonialia e basi latissima concava convolutacea colorata plus minus acuminata, intima minuta, exteriora canaliculata, nervo superne breviter lamelloso, intima obsoletinervia laxe areolata. Antheridia elongata clavata, paraphysibus filiformibus flavis mixta. — A *D. concolori* simili notis cursive impressis facillime distinguitur.

68. **D. concolor** Hook. (Musc. Exot. t. 138.); *laxe et late cespitosum mollissimum fuscidulo-tomentosum robustum, inferne remotifolium, superne dense et crasse comosum et paulisper incurrum, stramineo-nitidum concolor, flaccidum flexuosum; folia caulina erecto-patentia magis minusve appressa sed laxe imbricata apice falcata lanceolato-subulata, superne margine et dorso serrulata, nervo latissimo laxe reticulato et cellulis alaribus robustis ventricosis praedita, minute basi margine albescenti-areolata; perichaetialia basi magis vaginantia et laxius reticulata; omnia viridescencia tenera; theca in pedunculo brevi arcuato torto oralis superne gibbosa basi perfecte strumosa sulcata olivacea, operculo conico subulato obliquo fusco; perist. dentes bifidi cruribus hyalinis rugulosis; calyptra fimbriata dein ciliis brevibus destituta.*

Campylopus concolor Brid. I. p. 476.

Patria. In locis frigidis regni Novi Granatensis, in Alto de Aranda prope Pasto, alt. 1560 hexap., ubi leg. Humboldt et Bonpland. Columbia, prov. de Caracas in Colonia Tovar Germanica alt. 5600 ped.: Funck et Schlim in Coll. Linden. No. 469. *Januario*, in trunc. arbor. vetust.

Thecae aggregatae. Planta notis illustratis speciosissima.

69. **D. Jamesoni** Hook. (Ic. Pl. Rar. t. 179.); *digitale cespitosum superne ramosum robustum dense foliosum; folia erecto-patentia secunda nitida plus minus flexuosa, e basi lata planiuscula lanceolato-subulata, apice ad marginem et carinam serrulata nervo latissimo laxo; pedunculi aggregati flexuosi ob innovationes caule bre-*

viores; theca oblonga inclinata sulcata basi strumosa, operculo conico-subulato; perist. dentes longiusculi rubri ultra medium fissi. †.

Patria. Columbia, monte Surrucucho: W. Jameson.

Quibus notis a *D. concolori* ex icone simillimo distinctum?

†† *Stricta.*

70. *D. bicolor* Hsch. (in Musc. Sieber. No. 9.); dense cespitosum humile robustum rigidissimum *subtruncatum* inferne nigrescens superne flavidum, nitidum; folia caulina erecta subappressa dense imbricata *brevia stricta, oblonga perfecte cymbiformia, superne usque ad apicem obtusum dorso scabrum margine convolutacea*, latissime nervosa, basi utrinque laxè anguste et tenero-membranacea, hyalina, omnino integerrima, inferiora apice canescentia, cellulis alaribus perpauca vix conspicuis praedita; perichaetia omnino fere tenera vaginantia superne subsubito acuminata acutiuscula apice dorso scabra tenuinervia immersa; theca in pedunculo brevi valde arcuato paulisper emerso superne *verrucoso* rigido ovalis, operculo curvirostro, calyptra brevis basi ciliis brevibus flavidis crassis flexuosis acutis fimbriata.

Patria. Nova Hollandia: Sieber.

Pulcherrima species et foliis obtusis brevibus summo apice involutaceo crasso scabris veluti erosis et caulibus subtruncatis bicoloribus facile discernibilis. — Thecae aggregatae.

71. *D. Funkii* C. Müll.; pulvinato-cespitosum *humile pallide viride fragile subsimplex strictum, inferne fuscidulo-tomentosum tenuius, superne crassius foliosum, parce fructificans*; folia caulina erecto-patentia *stricta e basi longa tenera laxissime et pellucide areolata lanceolato-acuminata* latinnervia, dorso scabra, apice denticulata, cellulis alaribus raro conspicuis, paucissimis tantum marginalibus hyalinis; folia ramorum sterilium apicis angustissime lanceolata linearia laxè quadrate et amoene pel-

*lucide areolata valde canaliculata strictissima laxinervia crassa; perichaetia vaginantia basi laxius sed superne ut in caulinis minute et incrassato-areolata; thecae paucae solitariae in pedunculis valde cygneis ovaes subpyriformes leviter sulcatae olivaceae, operculis conico-subulatis rubentibus obliquis; calyptra parce fimbriata; peristomium *D. turfacei*.*

Camp. penicillatus Brid. I. p. 478. — *Camp. fragilis* Br. Europ. Fasc. 41. p. 4. t. 2. — *Dicran. flexuosum* β . *fragile* Turn. Musc. Hib. p. 74 — *D. densum* Fk. Cent. No. 634.

Patria. In locis humidis rupestribus per Europam temperatam raro. In turfosis circa Bex in pago Lemaniensi Helvetiae Roger primus legit et Bridelio communicavit. — *Sero auctumno et primo vere.*

A *D. turfaceo* proximo ceterisque congeneribus Europaeis notis laudatis distinctissimum. — Pl. mascula *D. turfacei*.

72. *D. Schleicheri* C. Müll.; dense cespitosum, *lutescenti-viride sericeo-nitens plus minus elatum pluries dichotomum ramulis tenuibus persistentibus* basi et in ramorum axillis rufo-tomentosum; folia caulina conferta erecto-patentia, sicca erecta stricta, inferiora anguste lanceolata, superiora comantia, e basi lanceolata anguste lanceolato-subulata, laxinervia, apice dentata, dorso scaberula, basi laxe areolata. †.

Campylop. densus Br. Europ. Fasc. 41. p. 6. tab. 5.

Patria. In petrosis Helvetiae: Schleicher, in Palatinatu: Gumbel.

Ex animadversionibus auct. quoad formas majores *D. flexuoso*, minores *D. turfaceo* simile dicitur.

73. *D. nivale* C. Müll.; dense cespitosum sed laxe cohaerens subhumile substrictum rigidiusculum pallescens; folia caulina erecto-patentia *stricta in comam angustam densiusculam sublongam congesta* breviter, e basi lanceolata valde concava subito fere marginibus involutis convolutaceo-setacea *integerrima* acuta, nervo maxime lato partem folii superiorem ex toto occupante dorso scabro,

inferne elongate laxiusculo-areolata, cellulis alaribus teneris paucis; perichaetialia subvaginantia, patula non cylindraceo-convoluta, intima inferne tenuinervia tenerrime laxe et elongate areolata, e reliquis caulinis similia; theca solitaria in pedunculo pseudolaterali dein substricto breviusculo fuscescente ovalis parva ore coarctata *glabra* sulcata fuscescens, operculo longe subulato obliquo purpureo; perist. *parvum, ad basin usque fere fissum*, cruribus teneris hyalinis sublaevibus; calyptra —.

Campylop. Perrottetii Mont. in litt. et *C. flexuosus* ej. pro parte olim. — *Camp. nivalis* Brid. I. p. 477! — *Weisia nivalis* Brid. Mant. Musc. p. 48.

Patria. India orientalis, in montibus Neelgheriensibus, loca humida prope Neddoubetta habitans: *Perrottet.* — Insula Bourbonis, monte Piton des Neiges, in altit. 1200 hexapodum: *Bory St. Vincent* primus omnium legit.

A *D. areodictyo* simili notis laudatis distinctum; *D. Turneri* pariter affine.

74. *D. areodictyon* C. Müll.; compactum pulvinatum subhumile substrictum rigidiusculum sordide viride; folia caulina erecto-patentia *strictissima in comam patulam scopariam congesta* breviter, e basi lanceolata valde concavà subito fere marginibus involutis convolutaceo-setacea, *summo apice viridi obtusiusculo denticulato*, nervo *maxime lato partem folii superiorem ex toto occupante dorso incrassato scabro laxissimo*, inferne elongate laxiusculo-areolata, cellulis alaribus teneris paucis; perichaetialia *vaginantia patula non cylindraceo-convoluta, inferne tenuinervia tenerrima et laxissime areolata*, superne longius setacea subflexuosa, e reliquis caulinis similia; theca solitaria in pedunculo valde arcuato dein strictiusculo longiusculo fuscescente ovalis crassiuscula ore coarctata *basi scabriuscula* sulcata fuscescens, operculo longe subulato obliquo purpureo, calyptra *basi integra inflexa sublacinata*; perist. dentes angusti cruribus tenuissimis hyalinis rugulosis.

Patria. Columbia, prov. Merida, e Sierra Nevada alt. 9000 ped.: Funck et Schlim in Coll. Linden. No. 1082., in arborib. putrescentibus mense *Septbr.* 1846.

D. flexuosi formis compactis vel *D. nivali* simile, notis autem laudatis propria species. — In apice caulis ramuli saepe reperiuntur firmi brevissimi subjulacei, foliis oblongis subobtusis integris.

75. *D. chlorophyllum* C. Müll.; dense cespitosum elongatum pluries et *elongate ramosum gracile flaccidum subcompressum sordide viride nitens apice subcuspidato*; folia caulina erecto-patentia perfecte lanceolata *obtusiusculo-acuta* substricta canaliculata, summo apice obsolete denticulata, nervo lato excurrente *dorso valde lamelloso*, cellulis alaribus *maxime teneris hyalinis ventricosis et inferne margine e cellulis tenerrimis hyalinis, ceteris quadratis, laxiusculis, superne rhomboideo-ellipticis chlorophyllosis viridissimis minutis* reticulata.

Patria. Prom. b. spei: Gueinzus 1842., Hb. Kunzean.

A *D. atro-virente* proximo notis illustratis distinctum. Foliis praecipue superioribus chlorophyllosis cum praecedente inter *Campylopodes* solitarium.

b. *Folia homomalla.*

α. *Falcata.*

76. *D. porphyrodictyon* C. Müll.; inferne cespitosum caulibus ascendentibus plus minus solitariis flavescens parce tomentosis, *dimorphum, fertile humile proliferum, proliferationibus brevibus oblique positis inferne nudiusculis apice sparse vel falcato-comosis, sterile simplex elongatum caudatum curvatum arctissime foliosum subteres*; folia caulina plantae fertilis e basi brevissima latiusculà lanceolato-subulata, nervo latiusculo valde canaliculato, inferne e cellulis elongate superne minute ellipticis densis viridibus arcolata, cellulis alaribus *amoene purpureis*, apicem versus margine et dorso denticulata; perichaetia vaginantia subpatula subito fere subulata

laxe areolata, basi cellulis purpureis multis saepe solitariis praedita, nervo inferne purpurascente; folia plantae sterilis latiora breviora acutiora cellulis alaribus ventricosis purpureis; theca in pedunculo breviusculo torto tenui obovalis subcernua basi strumulosa sulcata olivacea operculo conico subulato obliquo rubro; calyptra ciliis angustis flexuosis flavidis paucis fimbriata; perist. dentes ad medium fissi, cruribus hyalinis rugulosis.

Dicr. arctocarpum C. Müll. Linn. XIX. p. 203. — *Thysanomit. arctocarpum* β . *Moritzianum* Hmp. Linn. XX. p. 75.

Patria. Columbia in Silla de Caracas: Moritz. No. 144 a.

Thecae rarius aggregatae. — Pl. mascula gracilis flore e gemmis compluribus composito. Folia perigonialia externa subito acuminata basi lato-convoluta purpurascentia, interna breviora, omnia obsolete nervia, subintegerrima sublaxe areolata. Antheridia clavata, paraphysibus fuscidulis mixta. — A *D. arctocarpo* proximo notis cursive impressis planta cellulis splendidissime purpureis speciosa certe refugit.

77. *D. capillaceum* Brid. (I. p. 400.); dense cespitosum humile erectum rigidiusculum omnino densifolium apice paulisper falcatum, ramo fertili stricto innovans; folia caulina lanceolato-acuminata falcata subbrevia latinnervia apice obsolete denticulata, dorso sublaevia, inferne e cellulis angustis pellucidis elongatis superne minutissimis areolata, cellulis alaribus paucis laxis fuscidulis planiusculis; perichaetia stricta paulo vaginata; theca solitaria in pedunculo superne cygneo oblonga cernua sulcata basi paulo strumulosa, operculo e basi conica rostellato; perist. dentes ad medium usque fissi, cruribus hyalinis rugulosis.

Patria. Insula Madagascar.

Ex habitu *D. clavato* affine sed gracilius.

78. *D. reduncum* Hsch. et Reinw. (Nov. Act. Leop. XIV. II. Suppl. p. 703.); ascendens semipollicare sub apice innovans dense foliosum; innovationes basi laxe fo-

liosae vel nudiusculae apice patulo-comosae; folia caulina patentia homomalla, sicca parum flexuosa; *e latiore basi longe capillaria* acuta, dorso convexa et laevia superne canaliculata, apicem versus sparsim serrata, pallide viridi-lutescentia, nervo medio crasso, s. potius plaga lata e cellulis angustis elongatis exstructa, praedita, *areolis baseos lateralibus laxis saepe rubro-tinctis, marginalibus minutis rotundatis seriatis*; perichaetialia *basi magis dilatata oblonga laxius reticulata vaginantia, intima e basi lata fornicata purpureo-fusca* subulatà stricta erecta; thecae plerumque plures in pedunculis longiusculis tenuibus pallide stramineis madefactis undatis siccitate tortilibus erectae subgibboso-obconicae striatae pallidae parvae; perist. sequentis. †.

D. concolor Nees et Blume in Nov. Act. Leopold. XI. I. p. 133. t. 16. — *D. sinuosum* Brid. I. p. 427. ex parte. — *D. Auberti* Bél. Voy. d. l'Ind. p. 104.

Patria. Java: Blume; ibidem in terra humida sylvarum distr. Buitenzorg altitud. hexapod. legit Bélanger.

Ex ic. et descr. inter praecedens et sequens intermedium.

79. *D. comosum* Schwägr. (Suppl. II. II. 2. p. 114. t. 184.); gracile *rigidum* erectum fusco-tomentosum, *innovationibus tenuibus gracillimis filiformibus foliis densissime appressis rigidis fere julaceis cuspidatis strictis infra perichaetium comosum oriundis* ramosum; folia caulina *e basi ovali angusta minute areolata lanceolato-subulata rigida ad comam parum falcata breviora* latinervia, apicem versus serrulata lurido-viridia; perichaetialia longiora *e basi lanceolata subito in acumen subulatum longissimum subfalcatum producta*, apice serrata; theca in pedunculo longiusculo dein stricto torto oblonga incurva *basi aliquantulum exasperata* sicca sulcata brunnea, operculo obliquo subulato; peristomium *D. caudati*; calyptra *basi laciniata*. †.

Thysanomitrium comosum R. et Hsch. Nov. Act. Leop. XIV. II. Suppl. p. 706. t. 39. f. c.

Patria. Java: Reinwardt.

Thecae aggregatae. Flos masc. e gemmis 6 — 8 compositus; folia perigonialia universalia in discum congesta, e basi latiore concava subulata, ceterum caulinis similia; propria exteriora dimidio minora, basi ad medium latiora, apice breviter subulata, subintegerrima, angustinervia et laxius areolata; interiora minuta ovato-acuminata integerrima evanidinervia laxissime areolata. Antheridia oblonga truncata ferruginea, paraphysibus filif. flavescentibus mixta. — A *D. caudato* notis cursive impressis differt.

80. ***D. chionophilum*** C. Müll.; caulis erectus ramosus fusco-tomentosus, apice dense foliosus parum falcatus stramineus; folia caulina *erecto-potentia* lanceolato-capillaria, siccitate parum torta, madefacta parum falcata, *nerro lato laxo ubique omnino elamelloso summo apice solo denticulato*, cellulis alaribus planiusculis fuscidulis laxis, e cellulis *ubique minutis* areolata, superne margine obsolete denticulata, canaliculato-concava; perichaetalia convolutacea elongate et laxius areolata, longius capillaria et acutius serrata; thecae apice caulis plerumque plures in pedunculis valde cygneis gibboso-ovales olivaceae *perfecte strumosae* sulcatae, operculis *purpureis* subulatis; calyptra ciliis longiusculis acutis plus minus flexuosis albidis fimbriata; perist. dentes cruribus binis rugulosis hyalinis.

Patria. Columbia in Sierra nevada de Merida altit. 8000 ped., ubi inter *Dicr. longisetum* nives habitat: Funck et Schlim in Coll. Linden. No. 996. intermixt. Septbr. 1846.

A *D. lamellinervi* ex habitu proximo notis cursive impressis facile distinguitur. Statura *D. flexuoso* haud dissimilis.

81. ***D. arctocarpum*** Hsch. (Fl. Bras. p. 12.); *monomorphum*, humile proliferum, proliferationibus brevibus inferne nudiusculis apice sparse vel falcato-comosis; folia caulina lanceolato-subulata latinervia valde concava

apicem versus margine et dorso denticulata, inferne e cellulis *elongatis laxiusculis diaphanis et alaribus brunneis*, superne minutis subquadratis rhomboideis viridibus areolata; perichaetia similia subvaginantia patula subito fere subulata, inferne *laxius areolata tenera margine angustissime albescentia basi brunnescentia*; theca in pedunculo longiusculo torto tenui obovalis apice incrassata basi strumulosa olivacea, sicca arcte cylindrica sulcata, operculo conico subulato subrecto rubro; calyptra *ciliis longis tortis angustis albis* eleganter fimbriata; perist. *D. porphyreodictyi*.

Patria. Brasilia in campis Montevicensibus: Sellow. — Coll. *Blanchetianae* No. 3855.

A *D. porphyreodictyo* proximo notis cursive impressis differt. — Theca plerumque solitaria.

82. ***D. flexifolium*** Hsch. (Schwägr. Suppl. II. II. 2. p. 115. t. 185.); *humile falcatum subsimplex vel perichaetiis pluribus apice divisum vel innovationibus infra perichaetium oriundis comosis falcatis proliferum*; folia caulina secunda, e basi lanceolatâ lineari-subulata falcata integerrima viridi-lutea latinervia, inferne elongato-quadrata superne minutissime areolata; perichaetia longiora caulinis similia; theca in pedunculo tenui pallido tortuoso-arcuato oblonga *laevis*, calyptra *latere fissa*. †.

D. flexuosum Hsch. in Nov. Act. Leop. XIV. II Suppl. p. 703?

Patria. Java insula.

D. flexuoso proximum, differt autem planta mascula, foliis integerrimis, calyptra et thecis laevibus. — Planta mascula robustior, floribus aggregatis compluribus in capitulum congestis parvis gemmaceis coloratis. Folia perigonia lato-convoluta breviter acuminata tenuinervia. Antheridia numerosa tereti-ovata, paraphysibus tenuissimis albidis mixta.

83. ***D. turfaceum*** C. Müll.; dense cespitosum *humile inferne interdum divisum erectum haud tomentosum viride substrictum, inferne nudiusculum, superne longe comosum, haud falcatum*; folia caulina erecto-patentia apice

paulisper falcata, lanceolato-subulata *longius capillacea* canaliculata latinervia, dorso scabra, summo apice denticulata, cellulis alaribus minus *conspicuis parvis laxis teneris paucis planis* praedita, e cellulis inferne *quadratis* pellucidis *parvis* superne minutissimis areolata; perichaetia intima cylindraco-convoluta, e basi longe vaginante magis sensim subulata, inferne laxe pellucide superne minute areolata, longiora, apice denticulata; theca plerumque solitaria in pedunculo valde arcuato ovalis basi vix apophysata glabra sulcata pallida, operculo conico-subulato obliquo *longiori rubente*; perist. dentes ad medium fissi, cruribus tenuissimis hyalinis *rugulosis haud nodosis*; calyptra ciliis albis inaequalibus flaccidis fimbriata.

Camp. torfaceus Br. et Sch. Br. Europ. Fasc. 41. *Campylopus*. p. 4. t. 3. — *C. flexuosus* Brid. l. p. 469. ex parte. — *C. pyri-formis* Schultz. Fl. Starg. Suppl. p. 73. et Brid. l. p. 471. *Dicran. flexuosum* var. Schultz. Fl. Starg. p. 298.

Patria. In turfosis regionum tam planitierum, quam montanarum, totius Europae. — *Vere.*

A *D. flexuoso* notis cursive impressis certe distat. — Pl. mascula nana, floribus pusillis solitariis. Folia perigonia intima e basi lata breviter acuminata tenuinervia.

84. **D. flexuosum** Hedw. (Sp. Muscor. p. 146. t. 38.); dense cespitosum *subhumile*, *infra perichaetium ramis tenuissimis interdum divisum*; erectum inferne tenue superne crassius foliosum *rufo-tomentosum flavidum*, apice *subfalcato*; folia caulina erecto-patentia apice paulisper falcata, lanceolato-subulata canaliculata latinervia, dorso scabra, summo apice denticulata, cellulis alaribus *perfecte conspicuis laxis fuscis planis permultis*, praedita, e cellulis inferne *subquadratis* pellucidis *sublaxis* superne minutissimis *elliptico-incrassatis areolata*, perichaetia intima cylindraco-convoluta, e basi longe vaginante subito subulata, inferne tenuiter, pellucide et laxe, superne minute reticulata, longiora, apice denticulata; thecae aggregatae in pedunculis valde cygneis ovatae basi subapophysatae gla-

brae sulcatae pallidae, operculis conico-subulatis obliquis *concoloribus*; perist. dentes ad medium fissi, cruribus tenuibus hyalinis valde nodosis sublaevibus; calyptra ciliis longis griseis flaccidis fimbriata.

Campylop. flexuosus Brid. l. p. 469 ex parte. — Br. Europ. Fasc. 41. *Campylopus*; p. 3. tab. 1. — *Dicr. palustre* La Pyl. in Brid. l. p. 814. e spec. auth. forma elongata uliginosa, certe ad *Campylopodes* pertinens. — *Bryum pilosum molle*, setis intortis. Dill. Musc. p. 373. t. 47. f. 33. F. G.

Patria. In regionibus montanis totius Europae, rupes habitans. — *Vere.*

A *D. turfaceo* saepe commutato habitu jam valde refugit. Pl. mascula *D. turfacei*, floribus parvis interdum pluribus.

85. ***D. smaragdinum*** C. Müll.; humile *intertextum gracile decumbens ramis ascendentibus teneris smaragdinis attenuatis veluti caudatis*; folia caulina in ramis crassioribus substricta, in teneris falcata, brevia angusta lanceolata vel lanceolato-subulata canaliculata latinervia, dorso sublaevia, apice denticulata, omnino minute areolata, cellulis alaribus *paucis hyalinis paulisper ventricosis* praedita.

Didymodon smaragdinus Brid. l. p. 819.

Patria. Insula Ascensionis ad terram: Dumont d'Urville.

D. caudato ex habitu affine, sed notis cursive impressis distans.

86. ***D. caudatum*** C. Müll.; *gracile flaccidum flexuosum fusco-tomentosum, innovationibus tenuibus gracillimis caudatis curvatis inferne nudis superne longe-foliosis infra perichaetium comosum oriundis interrupte ramosum*; folia caulina secunda e basi latiuscula plus minus *laxe areolata* et cellulis alaribus ventricosus fuscis multis instructa lanceolato-subulata *hand rigida falcata*, inferne remota superne comosa, latinervia, apice minute areolato denticulata, viridescencia, angusta; perichaetialia cylindraceo-convoluta *superne sinuata crenulata* plus minus

subito subulata falcata summo apice denticulata; theca in pedunculo longiusculo arcuato tandem rectiusculo flavido ovalis sulcata flavida annulata, *glabra*, operculo purpureo *conico* obliquo; peristomii dentes dense conniventes purpurei cruribus hyalinis tenuissimis laevibus; calyptra *primum fimbriata dein ciliis destituta*.

Camp. flexuosus Mont. in Ann. d. sc. nat. 1842. Crypt. Neelgher. No. 52.

Patria. In locis humidis prope Neddoubetta mont. Neelgheriens. ad terram: Perrottet. Hb. Montagn. Java: Blume primus legit.

D. comoso ex habitu quoad icones simillimum, differt autem textura haud rigida sed molli, innovationibus gracillimis nec cuspidatis nec julaceis sed caudatis flexuosis, foliis sparse imbricatis basi latioribus valde falcatis longius setaceis et theca glabra. Thecae aggregatae.

87. *D. macrophyllum* Kze. (in Pöpp. Coll. III. No. 231.); laxissime cespitosum tenellum gracillimum *crispatum* nudum *sed tomentosum flaccidum* apice tantum sparse comosum, innovationibus proliferis similibus supremis caudatis subgeniculato-elongatum igitur interrupte foliosum *sordide viride*; folia caulina anguste lanceolata longe subulata subfalcata latissime nervosa canaliculata, cellulis alaribus magnis fuscidulis ventricosis diaphanis, basi e cellulis sublongis angustis viridibus teneris superne minutissimis areolata, dorso scabra, margine apicem versus denticulata; perichaetialia similia patula vaginantia sensim longe subulata; theca in pedunculo sicco stricto, humido apice arcuato *cylindrica valde curvata* basi strumulosa superne incrassata ore dilatata haud sulcata laevissima, operculo conico subulato subrecto; peristomium *D. filifolii*, calyptra breviter parce et inaequaliter ciliata.

D. filifolium C. Müll. Linn. XVIII. p. 691. ex parte.

Patria. Peru ad Cuchero: Pöppig.

A *D. filifolio* simillimo notis cursive impressis distat. — Thecae rarius aggregatae.

β. Uncinata.

88. **D. filifolium** Hsch. (Fl. Bras. p. 12.); *luxissime cespitosum tenellum gracillimum rigidum maxime nudum haud tomentosum apice tantum sparse comosum, innovationibus proliferis similibus supremis subcaudatis subgeniculato-elongatum igitur interrupte foliosum flavesceus; folia caulina anguste lanceolata longe subulata subfalcata latissime nervosa canaliculata, cellulis alaribus magnis fuscidulis diaphanis, basi e cellulis elongatis angustis viridibus teneris superne minutissimis areolata, dorso scabra, margine apicem versus denticulata; perichaetialia similia patula vaginantia superne subsinuata igitur subito fere longe subulata; theca solitaria in pedunculo sicco stricto, humido apice arcuato erecta oboralis basi strumulosa superne incrassata ore dilatata haud sulcata laevissima, operculo conico subulato obliquo; perist. dentes ad medium usque fissi; calyptra ciliis longis teneris strictis hyalinis fimbriata.*

Patria. Brasilia, in truncis demortuis sylvarum primaevarum prope Novam Friburgam, *Januarii* mense: Beyrich; ad Sincora et Rios dos Contas, *Octobri*: Martius; *Corcovado*: Gardner.

89. **D. denudatum** Brid. (Sp. Musc. I. p. 184.); *dioicum; laxe et late cespitosum inferne parce tomentosum erectum vel ascendens plus minus elatum viride capilla-ceum; folia caulina e basi oblonga latiuscula omnino e cellulis parvis mollibus viridi-pellucidis tenuibus areolata longe subulata, superne parce denticulata, nervo lato applanato excurrente, involutaceo-concava, cellulis alaribus subventricosus totam partem baseos infimam occupantibus hyalinis teneris praedita, dorso laevia; perichaetialia intima e basi longe vaginante subito subulata, inferne multo laxius areolata; theca in pedunculo primum cygneo-incurvo dein ascendente tenui subcylindracea tenella erecta, operculo longirostrato stricto; calyptra integra.*

Dicranodontium longirostrum Br. et Sch. Bryol. Europ. Fasc. 41, p. 2. tab. 1. — *Didymodon longirostris* Web. et Mohr. Bot.

Taschb. p. 155. et Schwägr. Suppl. 1 I. p. 111. tab. 29. — Brid. I. p. 512. — *Cynodontium longirostrum* Mart. Fl. Erl. Crypt. p. 94. — *Bryum pilosum molle*, setis intortis. Dill. Musc. p. 373. tab. 47 f. A—E.

Patria. In terra sylvatica umbrosa vel in truncis putridis per regionem montanam totius Europae et in regione temperata Asiae atque Americae septentrionalis.

Planta mascula femineae similis, flore gemmaceo. Folia perigonia parva e basi convolutacea ovata breviter acuminata sub-vel omnino enervia. — *Camp. flexuoso* ex habitu simile.

90. **D. uncinatum** C. Müll.; *dioicum*; laxe et late cespitosum elatum flexuosum molle dichotome et elongate ramosum apice maxime falcatum *aureo-nitens rubenti-tomentosum*; folia caulina maxime secunda falcata, e basi lata *ad nervum e cellulis laxis parietibus flavidis incrassatis praeditis magnis pellucidis quadratis margine autem densissimis flavidis elongatis angustis areolatâ* longe subulata, nervo lato supra basin totum folium occupante, canaliculato-concava, dorso et margine apicem versus denticulata, e reliquis laevissima, cellulis alaribus totam partem baseos infimam occupantibus planiusculis magnis laxis emarcidis hyalinis; perichaetia e basi breviter vaginante latiore ubique laxe areolata superne subsinuata sensim capillacea; theca solitaria innovando lateralis in pedunculo flexuoso erecta oblongo-ovalis aequalis leviter sulcata glabra; perist. dentes subulati longi purpurei ad basin usque fissi leviter trabeculati rugulosi, infra orificium oriundi.

Thysanomitrium uncinatum Harvey in Hook. Ic. Pl. Rar. t. 22. f. 5. et Lond. Journ. of bot. 1840. II. p. 6.

Patria. Nepal: Wallich. Java: Junghuhn. Hb. Gottscheanum.

Operculum sec. Harvey longirostratum. Calyptra ignota. — Planta pulcherrima colore aureo-nitente ceterisque notis laudatis facillime discernibilis.

91. **D. stenopus** C. Müll.; erectum *gracile elongate ramosum geniculato-flexuosum flaccidum apice genicu-*

lato-reflexum incurvum, laxe foliosum, interrupte fructiferum; folia caulina inferiora patentia subsecunda, superiora comoso-falcata lanceolato-linearia canaliculata, apice argute serrulata, nervo latiusculo, inferne minute quadrato-superne elliptico-areolata, cellulis alaribus brunneis ventricosis praedita; perichaetialia basi convolutacea tenuinervia; pedunculus solitarius *superne scaber erectus haud arcuatus*, theca solitaria *subcylindrico-ovalis parva angusta* sulcata, recta vel curvata glabra annulata, operculo conico subulato recto; calyptra fimbriata; perist. dentes angusti bifidi, cruribus filiformibus tenuissimis pallidis laevibus.

Thysanomitrium stenocarpum Hmp. Ic. Musc. t. 23 A. et *Th. scabrisetum* ej. ibid. t. 23 B. forma robustior theca curviuscula.

Patria. Brasilia, in Monte Video: Sellow.

D. concolori ex habitu affine, ab omnibus congenerebus autem pedunculo stricto distinctum.

2. *Folia pilifera.*

a. *Pilo reflexo.*

91. *D. introflexum* Hdw. (Sp. Musc. p. 147. t. 29.); *laxe cespitosum humile, inferne tenue, apice dense foliosum comosum breviter ramosum* flavescens; folia caulina *lanceolata*, in pilum hyalinum denticulatum plus minus reflexum producta, superne marginibus conniventibus convolutacea et minute areolata, basi elongate pellucide et tenero-reticulata, cellulis alaribus tenerrimis pallidis praedita, nervo lato superne dorso breviter lamelloso; perichaetialia subvaginantia ex apice sinuata vel sensim pilifera inferne multo laxius et tenerius areolata; theca in pedunculo valde arcuato flavo *globoso-ovalis basi perfecte strumosa* glabra olivacea, operculo conico obliquo fusco; perist. dentes angusti, cruribus tenuissimis hyalinis rugulosis; calyptra ciliis *albidis teneris nodulosis* fimbriata.

Patria. Nova Hollandia, unde primus Hedwig habuit; temporibus novissimis peregrinator Preis inde retulit; insulae Falklandi et Campbelli: J. Hooker.

Planta mascula humillima simplicissima apice flore composito. Flos masculus gemmaceus, foliis externis caulinis similibus angustis integerrimis epiliferis acutiusculis, internis coloratis lato-convolutis brevi-acuminatis obsoletinervibus. Antheridia elongata, paraphysibus filiformibus flavis mixta. — Thecae aggregatae.

92. D. aureo-nitens C. Müll.; habitus et color *D. grisei*; folia caulina latiuscula lanceolato-subulata, nervo lato interius incrassato dorso valde lamelloso in pilum elongatum hyalinum reflexum valde et argute serratum producta, *apice laminae folii aureae margine canescente integro, basi usque ad medium tenero-hyalino- et laxiusculo-superne minute aureo- et incrassato-areolata*, cellulis alaribus intense brunneis robustis; perichactialia minora, inferne tenuiora pallidiora laxius areolata, superne aurea plus minus vaginantia et incrassato-reticulata, nervo tenui subito fere in pilum longum flexuosum tenue apice hyalinum parce denticulatum producta; theca in pedunculo brevi arcuato tortuoso ovalis *basi scabra* sulcata, operculo conico subobliquo, calyptra ciliis brevibus substrictis albis laevibus inaequalibus fimbriata.

Campylop. introflexus Brid. ex parte Br. univ. I. p. 472.

Patria. Insula Bourbonis: Bory St. Vincent. Hb. Bridelian.

A *D. griseo* simillimo notis parallelis longe distat. — Thecae aggregatae.

93. D. griseum C. Müll.; dense cespitosum sed laxè cohaerens, *elatum subsimplex vel elongate ramosum densifolium gracile suberectum, aureo-flavens foliis piliferis griseum, sterile coma elongata pilifera, fertile perichactiis compluribus apice rosulatum*; folia caulina latiuscula lanceolato-subulata, nervo lato dorso valde lamelloso in pilum elongatum hyalinum reflexum valde et argute serratum producta, *apice laminae folii aureae dentibus hyalinis brevibus amoene serrata*, omnino fere minute areolata, cellulis alaribus intense brunneis robustis; perichactialia multo minora et tenuiora pallida laxè areolata te-

nuinervia longius subulata sed in pilum breve denticulatum producta, cellulis alaribus tenerrimis hyalinis.

Thysanomit. griseum Hsch. in Fl. Bras. p. 16. — *Campylop. introflexus* hb. nonnull.

Patria. Brasilia in campis Montevideosibus: Sellow.

D. aureo-nitenti simillimum. — Thecae aggregatae.

94. *D. lepidophyllum* C. Müll.; *humile strictum* inferne tenue superne *elongate comosum* rigidum simplex compactum sed laxè cohaerens polycarpum; folia caulina *perfecte ovali-lanceolata latissima squamaeformi-plana et tenerrima*, nervo latissimo superne *dorso breviter lamelloso* et paulisper canaliculato in pilum hyalinum plus minus reflexum denticulatum producto, cellulis alaribus tenerrimis albescentibus, basi latissima elongate pellucide tenerrime et rhomboideo-, superne elliptico-areolata viridia; perichaetia multa angustiora longiora vaginantia sensim fere pilifera in cylindrum convoluta tenuinervia; pedunculi apice caulis creberrimi *concolores pallidi* varie arcuati rigidi; theca *obconica arcuata parva* olivacea sulcata, operculo *conico subrecto fusco praedita basi aequalis vel paulisper strumulosa*, calyptra ciliis acutis albidis substrictis laevibus fimbriata.

Dicr. pudicum Hsch. in Drège Musc. Capensibus.

Patria. Prom. bon. spei; in cacum. montium ad flum. Paimut-Rivier dictum: Ecklon. In collibus formicosis antiquis editi secundi prope Gnetpagar district. Caledon: Ecklon. Hb. Kunzeanum. — *Julio*.

A *D. introflexo* simillimo caulibus non incrassato-comosis sed tenerioribus elongate-comosis, foliis squamaeformibus planis latis atque thecae forma longe distat.

95. *D. pudicum* Hsch. (Musc. Sieber. Nov. Holl. No. 24.); dense cespitosum sed laxè cohaerens *fuscidulo-tomentosum ascendens rigidiusculum flexuosum* inferne nudiusculum superne subcomosum, interrupte innovans, *innovationibus filiformibus infra perigonium oriundis solitariis subcuspidatis*; folia caulina lanceolata in pilum hyalinum plus minus reflexum denticulatum producta cana-

liculata angusta superne marginibus conniventibus convolutacea, dorso parce scabra; *cellulis alaribus fere carentia, nervo lato elamelloso*, basi elongate pellucide tenuiter superne minute elliptico - areolata; flos masc. e gemmis compluribus angustis compositus; folia perigonialia externa caulinis similia, interna plus minus acuminata latiuscula apice parce denticulata tenuinervia intima latoconvoluta brevia colorata laxae areolata obsoletinervia.

Patria. Nova Hollandia: Sieber.

Antheridia angusta elongata, paraphysibus filiformibus flavis mixta. — Ex habitu *D. lamellato* simile, sed minus rigidum, tenuius, pallidius, foliis reflexo-piliferis elamellosis facile discernibile. Pl. feminea ignota. — A *D. introflexo*, quocum commutatum in herbariis vidimus, statura alta gracillima interrupte innovante, foliis elamellosis et perigonialibus longe distat.

96. **D. erectum** C. Müll.; basi densissime cespitosum; caulis *strictissimus*, inferne foliis brevioribus dense appressis madefactis erecto-patentibus appressis filiformis, apice *glomerato-foliosus simplex v. prolifer valde rigidus*; folia caulina inferiora *anguste lanceolata involuto-concava* integerrima, nervo lato longicuspido s. piligero apice fuscescente s. hyalino denticulato, dorso *cellulis valde prominulis*; suprema *lato-oblonga apice breviter acuminata acuta margine crenulata vel denticulata nervo latissimo ante apicem evanescente*; theca elliptico-oblonga stricta annulata, operculo conico recto, calyptra eleganter fimbriata.

Campylopus strictus C. Müll. Linn. XIX. p. 207. — *Thysanomit. introflexum* Hmp. Linn. XX. p. 74.

Patria. Columbia pr. Galipan: Moritz Collect. No. 145.

A *D. introflexo* proximo longe distat. — Thecae aggregatae.

b. *Pilo stricto.*

97. **D. incrassatum** Kze. (in Pöpp. Pl. Chil. No. 22.); dense cespitosum omnino pallescens elongatum ramosum

strictum rigidum, *albido-tomentosum*; folia caulina e basi latissima longissima subulata falcata vaginantia, nervo latissimo excurrente, basi *laxissime areolata alba tenerime membranacea*, medium versus laxe areolata *marginē albido*, integerrima, apicem versus minute areolata scabra, apice hyalino subpilifero scabro; perichaetialia latissima convoluta membranacea subulata pilifera; theca ovalis sulcata glabra aequalis *parva* annulata, pedunculo arcuato tandem recto torto sublongo, operculo conico subulato subrecto, calyptra laevis basi *ciliis brevibus flexuosis*, thecae magnitudinem subaequante; dentes peristomii longissimi tenuissimi angusti basi fusci cruribus albescens-
tibus longissimis laevibus nodosis binis interdum ternis praediti basi connati.

Campylopus incrassatus Kze. C. Müll. in Linn. XVIII. p. 686.

Patria. Chile in sylvis ad Talcahuano: Pöppig 1826 et 1829.

D. griseo e descriptione simile. Ex habitu *D. introflexo* affine. A prima specie differt: foliis caulinis laxissime reticulatis, perichaetialibus caulinis longioribus; secunda species foliis retroflexis facile distinguitur. — Thecae aggregatae.

98. *D. laeve* C. Müll.; cespitosum strictum subfasciculatim ramosum, ramis rigidis erectis, stramineum, inferne brunnescens; folia imbricata erecta lineari-lanceolata, *late nervosa* concava pilifera; theca elongate ovata ore angustata *laevis* haud sulcata inaequalis minute nigrescenti-apophysata, pedunculo brevi arcuato, operculo elongate conico, calyptra *basi piloso-hirsuta*. †.

Campylopus laevis Tayl. Lond. Journ. of bot. 1846. p. 47.

Patria. In Andium monte Pichincha prope Quito: W. Jameson, 1827. 9. Octbr.

A *D. flexuoso*, quocum auctor comparavit, notis cur-sive impressis differre dicitur.

99. *D. rigidum* C. Müll.; *pulvinatum ascendens*, fertile subsimplex proliferum, proliferationibus gracilioribus remote et parce foliosis ad apicem comosis, sterile ramo-

sum, dense foliosum; folia caulina erecto-patentia sicca appressa lanceolato-acuminata canaliculata involutaceo-concava integerrima rigida atro-fusca suprema luteo-viridia, nervo latissimo concolore striato, laxè areolata; perichaetia in pilum serratum producta; thecae flavo-brunneae aggregatae in pedunculis inflexis oblongo-cylindricae basi exasperatae, operculis purpureis breviter subulatis, calyptra elegantissime fimbriata; perist. dentes cruribus filiformibus in spiram fere contortis pallide luteis. †.

Thysanomit. rigidum Hsch. Fl. Bras. p. 15.

Patria. Brasilia in Minis Generalibus ad urbem Ouro preto, *Aprili: Martius.*

Flos masculus disciformis compositus. Folia perigonialia minuta, externa late ovata ventricosa acuminata integerrima fusco-viridia, nervo lato excurrente, interna brevius acuminata. Antheridia numerosissima maxima curviuscula truncata, paraphysibus filiformibus lutescentibus mixta.

100. D. truncatum C. Müll.; compacte cespitosum; caulis strictus prolifero-elongatus rigidus; folia erecto-patentia laxè imbricata stricta rigida, e basi lata angustâ *superne sinuosa vel perfecte truncata*, cymbiformi-concava, marginibus involutis; nervus latissimus obscurus in acumen longissimum hyalinum denticulatum productus, dorso papillosus; perichaetia lanceolato-piliformia apice denticulata; perigonialia lato-ovata complicato-vaginantia apice denticulata s. integra, nervo excurrente, dorso scabro; theca in pedunculo valde arcuato ovalis interdum subcernua sulcata, operculo conico obliquo; calyptra basi fimbriata; perist. dentes *longissimi lanceolati basi adnati apice in crura duo interdum adnata filiformia laevia hyalina fissi.*

Camp. truncatus C. Müll. Linn. XVIII. p. 687. — *Camp. ranthophyllus* Mant. Ann. d. sc. nat. 1845. p. 111. et in Gay Hist. de Chile, Bot. Crypt. tab. 4. fig. 2., forma foliis minus truncatis.

Patria. Chile australis: Philippi et C. Gay.

Thecae aggregatae. Flos masc. disciformis terminalis e gemmis 6 oblongis rigidis aggregatis constructus. Antheridia perlonga clavato-elliptica curvata, paraphysibus filiformibus mixta. — *D. longipilo* proximum, sed foliis caulinis truncatis nervo excurrente piliferis facile distinguitur.

101. *D. lamellatum* C. Müll.; dense cespitosum strictum rigidum inferne purpureo-tomentosum et foliis appressis remotis filiforme nudiusculum, apice foliis in rosulam densam congestis, flores femineos permultos includentibus, infra rosulam innovatione solitaria stricta cuspidata densissime imbricata filiformi; folia caulina inferiora anguste lanceolata valde canaliculata apice marginibus conniventibus involutacea, in pilum hyalinum serratum producta, superiora breviter pilifera, basi elongate pellucide et laxe, superne minutissime rotundato-areolata, cellulis alaribus fere carentia, brevia stricta; folia perichaetii universalis breviora latissima squamiformia subplana breviter pilifera, cellulis alaribus flavis incrassatis; perichaetia caulinis similia in mucronem denticulatum flavum producta, cellulis alaribus paucis ventricosis laxissimis teneris, intima convolutaceo-vaginantia breviora acuminata integerrima tenuinervia et elamellosa, folia omnia cetera nervo latissimo lamellosa praedita.

Camp. lamellatus Mont. Ann. d. sc. nat. 1838. IX. p. 52. et D'Orbigny Voyage p. 90.

Patria. In sylvis densis ad margines viarum prope Chupé regni Peruviani, prov. Yungas late cespitosum: D'Orbigny.

Thecae aggregatae.

102. *D. longipilum* C. Müll.; dense cespitosum humile robustum densifolium rigidissimum erectum plus minus strictum dichotome ramosum fuscescens polytrichoidum, sterile cuspidatum, fertile rosulatum; folia caulina lanceolata, nervo latissimo dorso valde lamellosa in pilum hyalinum strictum serratum producta, subintegerrima, basi

planiuscula e cellulis tenerrimis pellucidis quadratis laxis, superne minutissimis incrassatis areolata, cellulis alaribus laxis fuscis paucis planis; perichaetialia *latiora basi maxime tenera pellucida squamaeformia tenuinervia*, intima *epilifera integerrima*.

Camp. pilifer Brid. Mant. Musc. p. 72. — *Camp. longipilum* ej. l. p. 477. ex parte; Bryol. Europ. Fasc. 41. *Campylopus* p. 6. t. 5. — *Camp. polytrichoides* De Not. Syllab. Musc. p. 222!

β. elongatum, ramis elongatis proliferis viridescentibus; foliis dorso maxime lamellosis.

Patria. In sylva prope Fontainebleau: Bridel; prope Falaise Normandiae: de Brebisson; Hispania: W. P. Schimper; in ericetosis collinis montanisque Italiae superioris vulgare, etiam ad rupes, in Sardiniae australis montanis: De Notaris. Insula Ischia: Bridel. Var. *β.* prope Andegavum Galliae occidentalis in collibus schistosis: Guépin.

Flores feminei creberrimi aggregati. Pl. masculae et thecae ignotae.

103. D. brevipilum C. Müll.; *gracilescens fragile dense et fasciculato-foliosum*; folia caulina breviora superne in comam densam imbricata lanceolata vel oblongo-lanceolata acuminata, *mucrone hyalino dentato terminata, margine reflexa*, nervo *angustiore dorso laevi*, juniora laete et aureo-viridia, seniora atro-rufa, areolis basilaribus haud ferrugineis. †.

Camp. brevipilus Br. et Sch. l. c. p. 7. t. 4.

Patria. Prope Fontainebleau, praecedenti intermixtum: A. Braun.

A praecedente notis laudatis differre videtur. Forsan planta mascula futura?

104. D. clavatum R. Br. (in Schwägr. Suppl. III. II. 1. t. 255.); *dense cespitosum erectum strictum interrupte comosum rigidum* valde tomentosum breviter ramosum; folia caulina erecto-patentia, sicca subappressa breviuscula paulisper recurva anguste lanceolata acuta, *e cellulis ubique minutis plus minus quadratis areolata*, nervo

lato concolore *elamelloso* praedita, *quaedam pilifera apice denticulata* fere cylindrico-concava flavo-aurea; perichaetialia *oblongo-acuminata cuspidata*; theca in pedunculo valde arcuato ovalis *aequalis* leniter sulcata, peristomio *D. trachyblephari*. †.

Patria. Terra Diemenii: R. Brown et Sieber.

Operculum et calyptra desunt. Pl. mascula flore e gemmis compluribus ovatis composito. Folia perigonialia ovato-acuminata solidinervia colorata; antheridia teretia lutea, paraphysibus tenuissimis hyalinis mixta. A *D. trachyblepharo* notis laudatis differt. Folia revera *elamellosa*? Thecae aggregatae?

105. **D. Richardi** C. Müll.; caulis erectus *subflexilis* inferne foliis dense *appressis nigrescentibus*, superne *viridescentibus* comosis, breviramosus submollis; folia caulina inferiora oblongo-lanceolata integerrima, *apice brevissimo hyalino denticulato*, concava, nervo lato excurrente s. cuspidato dorso cellulis prominentibus, superiora magis acuminata subulata, perichaetialia longe subulata; theca in pedunculo brevi flexuoso oblonga *basi aequalis verrucosa* striata annulata; operculo conico recto; calyptra *latissima basi pluries laciniata truncato-inflexa eleganter fimbriata veluti campanulata*.

Camp. Richardi Brid. I. p. 474. — *Thysanomitri. Richardi* Schwägr. Suppl. II. I. p. 61. t. 118. — *Weisia Richardi* Schwägr. mst. — *Camp. leptodus* Mont. Ann. d. sc. nat. 1845. 4. p. 111. et Hist. de Chile auct. Gay, Bot. Crypt. t. 3. f. 3.

Patria. Ad terram saxaque montis sulphuriferi Guadelupae dense cespitosum: Richard. Funck et Schlim in Coll. Linden. No. 229. Columbia ad Caracas: Moritz No. 141. Chile: C. Gay.

Specimina Guadelupensia a Columbianis statura robustiore altiore magis flexuosa et colore splendidiore paulisper distant. — Flos masc. terminalis e gemmulis nonnullis minimis constructus. Antheridia brevia, paraphysibus filiformibus apice breviter articulatis cincta. Folia perigonialia e basi latissima acuminata integra, exteriora subulata apice hyalino denticulato. Dentes longissimi te-

nuissimi usque ad basin fere in cilia duo filiformia fissi pallescentes rugulosi. — Thecae aggregatae.

106. **D. atro-virens** C. Müll.; dense cespitosum elongatum pluries et *elongate ramosum gracile flaccidum subcompressum atro-virens nitidum apice tenerrime comoso parce falcato*; folia caulina erecto-patentia perfecte lanceolata apice denticulato cano igitur subpilifera acuta substricta canaliculata, nervo lato excurrente dorso *parce et breviter lamelloso*, cellulis alaribus maxime teneris fuscidulis vel hyalinis ventricosis, *inferne e cellulis minutis subquadratis, superne elongatis angustissimis vermiformi-flexuosis chlorophyllosis viridissimis* reticulata.

Campylop. atrovirens De Not. Syllab. Musc. p. 221. et Br. Eur. Fasc. 41; *Campylopus*; p. 5. t. 4. cum planta fertili *Brasiliensi*, quacum *Italiana* omnino convenire dicitur. Ratio nobis incerta atque dubia est, dum planta *Italiana* fertilis inventa erit. — Planta *Brasiliensis* in Br. Europ. descripta est verbis sequentibus: folia perichaetialia intima vaginantia in subulam tenuissimam producta, theca minuta ovata in pedunculo cygneo demissa, sicca erecta; calyptra ciliis brevissimis fimbriata; perist. dentes angusti ad medium fissi cruribus rugulosis.

Patria. Italia, ad rupes montium ad Verbanum: Cesati, De Notaris; ad Larium: Garovaglio.

D. chlorophylloso soli affine, notis parallelis facile discernibile.

Species non satis notae.

107. **D. cuspidatum** Hsch. (Fl. Bras. p. 13.); ascendens 2 — 3 unciale robustum fragile fastigiato-ramosum dense foliosum, ramis cuspidatis pungentibus; folia subsecunda dense imbricata, siccitate cauli appressa, rigida oblongo-lanceolata acuminata brevipilosa integerrima concava, apicem versus marginibus involutis, inferiora fusca, superiora straminea nitentia, nervo crasso e cellulis linearibus composito concolore excurrente, retis areolis parallelogrammis confertis. †.

Patria. Brasilia prope Sincora et ad Rio de Contas: Martius.

108. *D. penicillatum* Hsch. (Fl. Bras. p. 13.); robustum assurgens 2 — 3 unciale fastigiato-ramosum dense foliosum, ramis cuspidatis; folia longa falcata, siccitate torta, rigidiuscula lanceolato-subulata argutissime serrata canaliculata, suprema erecta duplo longiora vaginata convoluta teneriora quasi penicillum formantia, inferiora fuscescentia, superiora luteo-viridia, omnia nervo latissimo obscure colorato plus quam tertiam totius folii latitudinem occupante striato, retis areolis basi laxioribus subquadratis, in reliqua folii parte linearibus. †.

Patria. Brasilia, in prov. Minas Geraës et ad ripas fluvii Rio de Contas, prov. Bahiensis: Martius.

109. *D. subfalcatum* Hsch. (Fl. Bras. p. 13.); ascendens biunciale flexuosum fasciculato-ramosum dense foliosum; folia rigida secunda subfalcata lanceolata acuminata concava integerrima, inferiora fusca, superiora luteo-viridia, nervo lato striato concolore excurrente, retis areolis linearibus obscurioribus. †.

Patria. Brasilia in montibus sylvestribus prope Sin-cora prov. Bahiensis: Martius.

Trib. XVII. LEPTOTRICHACEAE.

Cespitosae plus minus elatae, saepius gregariae pusillae, acrocarpicae, innovando ramosae vel ramis fertilibus apice pluries divisae. Folia lanceolata vel subulata, saepe canaliculato-concava, nervo plerumque applanato vel tereti praedita. Retis cellulae *prosenchymaticae parenchymaticis saepe mixtae*, laxae, laxiusculae vel plus minus firmae inanes, apice haud raro incrassatae igitur quadratae. Theca ovalis vel cylindrica, nunc arcuata, nunc stricta, basi saepe strumulosa, operculo conico vel subulato. Archegonia, antheridia et paraphyses plerumque ut in *Dicranaceis*.

Dicranaceis ex habitu proximae et saepius simillimae, cellulis tamen alaribus deficientibus longe diversae.

Patria. Per orbem totum terrarum, regiones omnes atque loca diversissima, partim libenter argillosa et alia, partim rupes nudas habitantes. 2|.

Angströmiaceae Br. Europ. Fasc. 33 — 36.

Gen. I. **Brachyodus** Fürnrohr nom. emend.

in Br. Germ. II. 2. p. 5. — *Gymnostomum* al. — *Weisia* Hook. et Tayl. — *Anoectangium* al.

E vocibus *βραχύς* *brevis* et *ὄδος* *dens* nomen compositum.

Calyptra *mitraeformis*. Peristomium simplex: dentes 16 brevissimi lati obtusi irregulariter lacerati tenerrime membranacei pallidi fugacissimi, aequidistantes vel parum confluentes. Theca anulo magno peristomium subsuperante. Inflorescentia monoica.

Statura *Seligeriarum* pusillarum, e peristomio autem memorabili genus distinctum.

1. **Br. trichodes** Fürnr. (l. c.); gregarius nanus simplicissimus vel parce divisus; folia caulina flavescencia, e basi oblonga minute subtenero-areolatâ subulata obtusiuscula integerrima, ad subulam e cellulis minutissimis obscure viridibus reticulata, nervo tenui subulam totam fere occupante praedita, parum concava; perichaeitalia basi tenuius areolata; theca in pedunculo brevi stricto flavido ovalis minuta erecta, operculo longe subulato recto pallido, basi conica rubella praedito, sicca striata.

Br. Europ. Fasc. 33 — 36. *Campylosteliaceae*, c. ic. — *Brachyodon* et *Brachydontium* Fürnrohr in Regensb. bot. Zeit. 1827. 2. Beil. 1. p. 37. et 2. p. 112. — *Gymnostomum trichodes* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 85. — *G. Davallianum* Sm. in Schrad. Journ. I. p. 191. — *Anoectang. trichodes* Schw. Suppl. I. I. p. 33. t. 10.

Patria. In rupibus diversis humidis umbrosis regionis montanae totius Europae. — *Veris initio ad autumnum.*

Flos masculus in ramo brevi basilari. Caetera ut in *Campylostelio*.

Gen. II. *Campylostelium* Br. et Sch.

Br. Europ. Fasc. 29 — 30. *Dicranaceae* dein *Campylosteliaceae*. — *Campylopus* et *Weisia* Brid. Mant. — *Dryptodon* Brid. Br. univ. — *Grimmia* Schwägr. — *Dicranum* Web. et M.

Nomen e vocibus *καμπύλος* *curvus* et *στελεόν* *securis manubrium* q. e. *pedunculis*, ob pedunculum curvum *Campylopodi* affinem ductum.

Calyptra *mitraeformis*. Peristomium simplex: dentes 16 in membrana reticulata emersa aequidistantes lanceolati purpurei *dicranoideo-bifidi*. Inflorescentia monoica. Theca annulata.

Statura *Seligeriarum* pusillarum, pedunculus *Campylopodis* sectionis, peristomium *Dicrani*, calyptra *Brachyodontis*.

1. *C. saxicola* Br. et Sch. (l. c. p. 3. t. 1); gregarium nanum simplicissimum vel parce divisum; folia caulina viridissima e basi oblonga pellucide laxius et tenero-areolatâ lineari-subulata acuta integerrima, ad subulam e cellulis minutis quadratis viridibus laevibus reticulata, nervo angusto subexcurrente; perichaetialia basi latiora; theca cylindrica minuta olivacea, operculo longe subulato purpureo stricto thecam aequante; calyptra operculum tegens tenera basi pluries laciniata.

Grimmia geniculata Schwägr. Suppl. I. I. p. 82. tab. 22. et Brid. I. p. 189. — *Weisia geniculata* Brid. Mant. p. 38. — *Dicranum saxicola* W. et M. Bot. Taschb. p. 167. — *Campylopus saxicola* Brid. Mant. p. 72. — *Dryptodon saxicola* Brid. I. p. 770.

Patria. Ad lapides et saxa humidiuscula granitica et arenacea umbrosa per regionem montanam Germaniae, Angliae, Hiberniae et in fageto Bucze prope Nawsie Wielopolskie Haliciae: Łobarzewski. In Ducatu Brunsvicensi detexit Schrader. — *Primo vere.*

Folia perigonialia floris masculi in ramulo brevi basilari positi minuti convolutacea breviter acuminata obtusiuscula. Paraphyses et antheridia parva.

Gen. III. **Seligeria** Br. et Sch.

Br. Europ. Fasc. 33 — 36. *Seligeriaceae*. — *Anodus* eor. l. c. — *Weisia* al. — *Gymnostomum* al.

Nomen in memoriam pastoris ecclesiae *Seliger* Silesiaci, scrutatoris muscorum Silesiae olim acerrimi et indefessi impositum.

Calyptra dimidiata. Peristomium nullum vel simplex: dentes 16 aequidistantes lanceolati planissimi aurantiaci articulati laevissimi interdum pertusi et fissiles vel linea media exarati, medio igitur fissiles. Inflorescentia monoica vel dioica.

Euseligeriae habitu *Brachyodontis*; *Leptotrichellae* generi *Angströmiæ* sect. *Dicranellae* vel *Leptotrichis* nonnullis affines.

Sectio I. **Euseligeria**. Plantae exiguae humillimae paucifoliae, foliis parvis minute et dense areolatis; theca gymnostoma vel dentibus planissimis aurantiacis laevissimis integris raro pertusis vel fissis. — *Seligeriaceae* Br. Eur. Fasc. 33 — 36.

1. **S. pusilla** Br. et Sch. (l. c. p. 4. t. 1.); *monoica*; gregaria vel cespitulosa brevissima simplex vel dichotoma; folia caulina anguste lanceolata vel e basi latiore longe subulata acuta, nervo angusto subulam totam superam occupante, pellucide et minute areolata amoene tenera, superne leviter crenulata; perichaetialia latiora et longiora; theca in pedunculo brevi stricto flavido pyriformi-ovalis, minuta olivacea, evacuata turbinata fusca, operculo conico subulato obliquo tenero-membranaceo; perist. dentes madefacti inflexi, siccitate seniores reflexi, lanceolati planissimi amoene aurantiaci, margine irregulares, raro pertusi, remote articulati.

Weisia pusilla Hdw. Musc. Frond. II. p. 68. t. 29. — Brid. I. p. 349. — *W. paludosa* Brid. Musc. Rec. II. I. p. 74. — *Grimmia*

pusilla Schrad. Samml. fide Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 140. — *Swartzia pusilla* Ehrh. Hann. Mag. ex Brid. — *Afzelia pusilla* Ehrh. Pl. Crypt. Exs. No. 183. — *Mnium paludosum* L. jun. Meth. Musc. p. 365. — *Bryum paludosum* L. Sp. Pl. p. 1584. — *Bryum trichodes acaulon palustre minimum*, setis et capsulis brevissimis. Dill. Musc. p. 387. t. 49. f. 53. — *Weisia Seligeri* Nees et Hsch. Br. Germ. II. p. 105. t. 34. f. 26. — Brid. I. p. 350. — *Grimmia Seligeri* W. et M. Bot. Taschb. p. 140 et 459. — *Weisia calcarea* Sulliv. Musc. Allegh. Exs. No. 142.

Patria. Loca umbrosa humida ad rupes et saxa praeprimis calcarea per regionem montanam et subalpinam totius Europae. — *Aestate.*

Flos masc. in ramo ad basin perichaetii posito gemmaceus minutissimus, foliis perigonalibus minutis concavis ovatis brevissime acuminatis haud coloratis teneris, antheridiis pariter minutis et paraphysibus tenerrimis brevissimis mixta.

2. *S. calcarea* Br. et Sch. (l. c. p. 4. tab. 1.); *monoica*; habitus *S. pusillae*; folia caulina ovata vel ovato-lanceolata, superiora ex ovato anguste lanceolata, obtusiuscula, breviora sordide viridia, e cellulis basi teneris angustioribus superne incrassatis multo firmioribus areolata; theca praecedentis, sed major robustior, dentibus latioribus obtusioribus magis approximate articulatis.

Weisia calcarea Hdw. Sp. Musc. p. 66. tab. 11. — Brid. I. p. 351. — *Grimmia calcarea* Sm. Fl. Brit. III. p. 1187. — *Bryum calcareum* Dicks. Fasc. II. Pl. Crypt. p. 3. t. 4.

Patria. In rupibus cretaceis Britanniae et insulae Rügen Germaniae, ubi Hornschuch detexit. — *Vere.*

Folia perigonalia longiora, antheridia majora, paraphysibus saepe nullis. — A *S. pusilla* notis cursive impressis longe distat.

3. *S. recurvata* Br. et Sch. (l. c. p. 6. t. 3.); *monoica*; habitus *S. pusillae*; folia e basi oblonga lanceolato-subulata elongata flexuosa acuta, inferne e cellulis elongatis angustis teneris pellucidis ad subulam minutissimis obscuris incrassatis areolata, integerrima, nervo angusto subulam totam superam occupante; perichaetialia majora subvaginantia; theca in pedunculo elatiusculo apice

recurvato ovalis vel subpyriformi-ovalis, ore angustiore, operculo subulato subrecto; perist. dentes lanceolati vel obtusi, integri vel irregulariter bifidi, densiusculo-articulati.

Weisia recurvata Brid. l. p. 352. — *W. parasitica* Roehl. Deut. Fl. III. p. 51. — *Grimmia recurvata* Hdw. Musc. Fr. I. p. 102. t. 38. — *Gr. parasitica* Voit in Sturm Deut. Fl. Crypt. Fasc. II. — *Bryum recurvatum* Hoffm. Deut. Fl. II. p. 31.

Patria. In rupibus et saxis calcareis, arenaceis et graniticis per regionem montanam totius Europae et in America septentrionali. — *Vere.*

Inflorescentia *S. pusillae*.

4. **S. tristicha** Br. et Sch. (l. c. p. 5. t. 2.); *monoica*; habitus *S. pusillae*; folia *tristicha stricta lanceolato-subulata obtusiuscula, brevia*, e cellulis parvis infima basi pellucidis, superne sordide flavis firmis areolata, nervo angusto subulam integerrimam supremam totam occupante; theca *S. pusillae*.

Weisia tristicha Brid I. p. 355. — *Grimmia tristicha* Schwägr. Suppl. I. I. p. 84. tab. 26. — *Gr. trifaria* W. et M. Bot. Taschb. p. 141 et 460.

Patria. Ad rupes calcareas madidas per convallia alpina Helvetiae, Tirolis, Salisburgiae, et Lapponiae, nec non in montosis jurassicis Franconiae, Cebennarum atque Hercyniae. — *Majo, in alpibus Julio et Augusto.*

Inflorescentia *S. pusillae*.

5. **S. Doniana** C. Müll.; *monoica*; brevissima gregaria simplex; folia caulina lanceolato-subulata acutiuscula *crenulato-denticulata*, perichaetialia breviora obtusiuscula, omnia e cellulis basi tenerrimis pellucidis minutis subquadratis superne valde chlorophyllosis igitur obscure viridibus areolata, nervo angusto subulam supremam totam occupante; theca in pedunculo stricto flavido subpyriformi-ovalis *gymnostoma minutissima* olivacea, ore ampliori, operculo conico brevi subobliquo.

Anodus Donianus Br. Europ. Fasc. 33—36.; Seligeriaceae; cum ic. — *Gymnostomum Donianum* Engl. Bot. t. 1582. — Brid. I. p. 66.

Patria. Ad rupes arenaceas et calcareas occultas Britanniae montosae, ubi in spelunca Duppliniana (Pershire) detexit G. Don; Scotia: Greville. Germania ad rupes marmoreas Hercyniae prope Rübeland: Hampe; Bavaria superior in monte Peissenberg ad rup. arenac.: Sendtner.

Flos masc. in ramo proprio basilari terminalis; folia perigonialia externa oblongo-lanceolata subnervia, interna minora tenuiora enervia; antheridia pauca minuta eparaphysata. — A *S. pusilla* simillima theca constanter eperistomata specificè sed minime generice distat.

Sectio II. **Leptotrichella.** Plantae elatiores, foliis partibus omnibus majoribus, perist. dentibus linea media plerumque exaratis igitur saepe medio secedentibus. — An genus proprium?

6. **S. longirostris** C. Müll.; *dioica*; exigua erecta innovando subramosa; folia caulina *subsecunda* densa, *inferiora lanceolata*, superiora *lanceolato-linearia integerima*, *suprema s. perichaetialia rarius pilifera et ad basin pili interdum parce denticulata*, luteo-viridia, senio fusco-nigra, nervo crasso ad apicem fere extimum perdurante, *e cellulis linearibus seriatis subtilibus areolata*; theca in pedunculo recto siccitate parum tortili longiusculo erecta ovalis parva aequalis luteo-brunnea annulata, operculo longe et oblique subulato; perist. dentes lanceolato-subulati trabeculati, inter trabes singulas medias lacuna s. fissura angusta pertusi, apice integri, aetate saepe bifidi, cruribus inaequalibus, ferrugineo-rufi. †.

Trematodon longirostris Schwägr. Suppl. I. p. 343. — *Weisia longirostris* ej. Suppl. II. I. p. 54. t. 117. — *Coscinodon longirostris* Brid. I. p. 376. — *Leptotrichum longirostre* C. Müll. Bot. Zeit. 1847. p. 806.

Patria. In monte sulphurifero Guadelupae inter *Dicranum Richardi*: Richard.

7. **S. Kunzeana** C. Müll.; *dioica*; gregaria cespitosa *gracillima tenuis erecta* adscendens subhumilis, apice innovando ramosa, innovationibus filiformibus; folia caulina *e basi subraginante lanceolata*, *oblonga vel orata subu-*

lata, linearia, acuta angusta madefacta flexuosa, plicato-concava canaliculata, nervo crassiusculo subexcurrente, margine parum recurva; perichaetialia angustiora obtusiuscula evanidinervia; omnia undique e cellulis parvis pellucidis quadrato-rhomboideis subangustis reticulata; theca in pedunculo longiusculo tenuissimo erecto pallido erecta urceolato-ovalis annulata parva brunnescens, operculo longe et oblique subulato; perist. dentes breves lanceolato-lineares acuti tenuissime trabeculati rugulosi ferruginei interdum subpertusi.

Leptotrichum Kunzeanum C. Müll. Bot. Zeit. 1847. p. 806. — *Weisia tenuis* Kze. in Pöpp. Coll. Pl. Chil. IV. No. 230.

Patria. Chile et in Peru ad Cuchero: Pöppig.

Pl. mascula quam maxime tenuis pluries e perigoniis innovans igitur quasi prolifera, floribus 2—5, interdum ramis masculis divisa. Flos masc. pro plantulae exiguitate crasse gemmaceus; folia perigonialia e basi lato-ovata colorata tenuius areolata valde concavâ subito et breviter acuminata obtusa subintegerrima evanidinervia, intima brevissime acuminata convolutacea enervia; antheridia haud copiosa submagna, paraphysibus aequalibus hyalinis tenuibus mixta.

8. *S. pallidiseta* C. Müll.; *dioica*; erecta firma subhumilis simplex vel apice divisa; folia caulina superiora densiora *erecto-appressa, madefacta erecto-patentia, ovato-lanceolata, nervo crasso lutescente continuo, suprema longiora subulata basi vaginantia marginibus involuta, siccitate leniter incurva, e luteolo vel lutescente viridia; ramea brevia laxa appressa; omnia integerrima rigida e cellulis subquadratis areolata, theca in pedunculo brevi recto luteo vel luteo-ferrugineo erecta late annulata ovata laevis badia, operculo conico subulato obliquo rufo-badio; perist. dentes lineari-lanceolati transverse sulcati badii foraminibus quinis pertusi. †.*

Weisia pallidiseta Schwägr. Suppl. II. p. 54. t. 117. — *Coscinodon pallidisetus* Brid. I. p. 377.

Patria. Insula Madagascar: Aubert du Petit Thouars.

9. S. Miqueliana C. Müll.; *dioica*; *cespitose gregaria pusilla prostrata* innovando ramosa; folia caulina erecto-patentia *homomalla lanceolata latiuscula stricta breviter acuta carinata vel plicato-concava margine parum revoluta*, nervo flavo crassiusculo ante apicem denticulatum evanido, undique e cellulis elongatis ampliusculis pellucidis tenuibus areolata; perichaetialia *majora obtuso-acuta*; theca in pedunculo *elongato* purpureo rigido stricto erecta vel parum obliqua anguste cylindrica fusco-purpurea, operculo *longe et oblique subulato*; perist. dentes approximati latiusculi lineari-lanceolati obtusi basi crasse trabeculati erecto-conniventes.

Weisia Miqueliana Mont. in Lond. Journ. of bot. 1844. p. 633 et in Ann. d. sc. nat. 1845. 4. p. 118. — *W. macrorrhyncha* Mont. Ann. d. sc. nat. l. c. p. 117. e spec. auth. huc pertinet!

Patria. In terra nuda prov. Buitenzorg Javae insulae: Hb. Miquelian. Zollinger Coll. No. 1532.

Flos masc. in planta propria multo graciliore simplicissima terminalis, habitu Astomi. Folia perigonialia e basi lato-ovata valde concava tenuius areolata colorata breviter et brevissime acuminata. Antheridia haud numerosa submagna, paraphysibus tenuibus brevioribus hyalinis mixta.

10. S. pallens C. Müll.; *cespitosa subramosa 2—3 linearis*; folia suberecta *lineari-lanceolata*, siccitate vix tortilia, lanceolata *integerrima* evanidinervia, laxe reticulata; theca in pedunculo *humili* pallide rubello suberecta *pyriformis*, sicca subcylindrica, ore parum constricto, badia, operculo conico brevi oblique rostellato; perist. dentes pyramidati angusti rubri. †.

Weisia pallens Hook. et Wils. in Hook. Ic. Pl. Rar. t. 739 A.

Patria. Nova Hollandia ad flumen Swan River: James Drummond.

A *S. Miqueliana* ex ic. proxima notis cursive impressis distat.

Gen. IV. **Garckea** C. Müll.

Bot. Zeit. 1845. p. 865. — *Dicranum* Hook. — *Grimmia* Dz. et Molkb. — *Weisia* Hmp.

Nomen in honores amicissimi Garcke, florae Halensis praestantissimae nunc ad lucem pertractae auctoris spectatissimi conditum.

Calyptra campanulata. Peristomium fere *Trematodontis* simplex: dentes 16 lanceolati, basi tantum paucis trabeculis, medio perforati ita, ut membrana tenuissima hyalina reliqua sit. Inflorescentia dioica.

Habitus *Bruchiaceis* simillimus. Genus memorabile, hucusque Indicum, specie unica tantum gaudens.

1. **G. phascoides** C. Müll. (l. c.); gregaria, filiformis recta fragilis simplex, inferne foliis minoribus, apice majoribus comosa, floribus femineis masculisque 2—3 ramosa; folia caulina lanceolata subcava, excurrentinervia integra; perichaetia parce denticulata apice saepe obliqua crassinervia oblongo-lanceolata; theca immersa cylindraceo-oblonga parva, operculo conico recto basi tumido, annulo tenero duplici haud volubili; perist. dentes scaberrimi; calyptra operculum tegens valde papillosa basi non laciniata.

Dicranum phascoides Hook. Miscell. bot. 1830. I. p. 39. t. 21. — *Weisia phascoides* Hmp. in sched. — *Grimmia comosa* Dz. et Molkb. Ann. d. sc. nat. 1844. II. p. 304.

Patria. India orientalis prope Sylhet: Wallich. Java, ubi inter *Trematodontes* viget, in provincia Buitenzorg: Hb. Miquelianum; in locis aliis non designatis: Zollinger, No. 1579. Ex insula Sumatra acceperunt Dozy et Molkenboer.

Flos masculus gemmiformis in planta simplicissima terminalis perigonio longissimo inclusus. Folia perigonia e basi latissima valde convoluta superne sinuato-constricta et apice rotundata subito capillaria flexuosa, inferne laxae arcolata. Antheridia parva clavata vix sti-

pitata, paraphysibus tenerrimis cincta. — *Astomo subulato* ex habitu simillima tenella et *Angströmiæ filiformi* pariter affinis.

Gen. V. **Eccremidium** Hook. et Wils.

Lond. Journ. of bot. 1846. p. 450. — *Bryum* Tayl. — *Schistidium* Hook. et Wils. in Hook. Ic. Pl. Rar.

Nomen graecae originis, ab ἐκκρέμματα dependeo, ob thecam pendulam, ductum.

Calyptra minuta campanulata. Theca gymnostoma medio dehiscens cum operculo arcte con-nata.

Plantae e thecis, exiguitate et habitu *Bruchiae exiguae* similes, sed musci stegocarpici, quoad caules *Angströmiis julaceis* proximae, nobis tamen hucusque haud visae, ex iconibus et descriptionibus autem huc pertinentes, memorabiles.

1. **E. arcuatum** Hook. et Wils. (l. c.); fertile *simplex* pusillum lineare et ultra, sterile duplo longius; caulis fertilis basi erectus, apice arcuato-inflexus; folia caulina *trifariam imbricata* appressa *rhomboideo-orata obtusiuscula, margine minutissime crenulato-denticulata, carinato-concava*, nervo valido subcontinuo; perichae-tialia *lanceolato-acuminata subfalcata*; theca in pedunculo breviter exserto superne incrassato pendula, cum operculo *pyriformi-globosa obtusiuscula*, medio dehiscens, rufo-brunnea; calyptra conico-mitraeformis *membrana-cea luteola*.

Schistidium arcuatum cor. Hook. Ic. Pl. Rar. t. 738 A. — *Bryum tenuissimum* Tayl. Lond. Journ. of bot. 1846. p. 52.

Patria. Nova Hollandia ad flumen Swan River: James Drummond.

2. **E. pulchellum** Hook. et Wils. (l. c.); duplo longius gracilius nitidum lenissime curvatum, hic illic ramis erectis filiformibus; folia caulina arcte imbricata appressa *nec trifaria orata apiculato-acuminata integerrima*, nervo in foliis caulinis subcontinuo in ramulinis abbre-

viato; perichaetialia ovato-lanceolata *longe acuminata*; theca in pedunculo breviter exserto incurvo superne incrassato pendula, *pyriformis* rufo-brunnea, operculo conico-acuminato subcoriacea lutea.

Schistidium pulchellum Hook. et Wils. in Hook. Ic. Pl. Bar. t. 738 B.

Patria praecedentis.

Angströmia andicolae ex habitu caulium et structura foliorum simile.

Gen. VI. **Angströmia** Br. et Sch.

Bryol. Europ. Fasc. 33 — 36. — *Dicranum* al. — *Weisia* al.

Nomen in honores bryologi Suecici Ångström, de muscis Scandinaviae perscrutandis meriti, conditum.

Calyptra cucullata. Peristomium nullum vel simplex: dentes 16 aequidistantes basi plus minus dense approximati bifidi, dicranoidei inferne trabeculati, cruribus articulatis. Inflorescentia monoica vel dioica.

Habitus partim dicranoideus, partim proprius.

Sectio I. Euangströmia. Plantae julaceae, foliis densissime appressis amplexantibus, dioicae. — Plantae suo generi ut *Bryum julaceum* analogum *Bryo* generi et ab *Angströmiis* ceteris typice minime distantes.

1. **A. longipes** Br. et Sch. (l. c. p. 3. t. 1.); basi caespitulosa *humilis erecta ramulosa* viridis; folia caulina densissime erecto-appressa, inferiora minuta, superiora sensim majora, e basi lato-vaginante e cellulis ampliusculis pellucidis teneris superne minoribus magis incrassatis areolatâ *breviter acuminata, obtusa, nervo angusto flaviore tenuissimo evanido*, integerrima, convolutaceo-concava; perichaetialia majora latiora laxius reticulata magis acuminata subacuta; theca in pedunculo *elongato* purpureo *globoso-ovalis brevis* exannulata, operculo conico brevi recto; perist. dentes ad medium bifidi angusti, cruribus inaequalibus rectiusculis.

Dicr. julaceum Hook. et Wils. in Drumm. Musc. No. 100. — *Weisia longipes* Sommerf. Suppl. ad Wahlenb. Fl. Lapp. p. 54. t. 1.

Patria. In valle Saltdalen Nordlandiae Norvegiae, terram argillosam humidam ad rivulos montanos habitantem detexit Sommerfeldt, in loco vicino Sandhorn versus meridionalem locum Saltenfjord legit Lessing; in rupibus ad Portage River prope flumen Columbia Canadæ superioris legit Drummond.

Pl. mascula gracillima, flore capituliformi crassiusculo denso. Folia perigonialia perichaetialibus similia acutiuscula tenuinervia magis convolutacea colorata. Antheridia magna, paraphysibus longioribus breviter articulatis mixta.

2. A. vulcanica C. Müll.; *basi cespitoso - cohaerens elata erecta subflexuosa simplicissima filiformis*; folia caulina densissime appressa erecta, lanceolata et nervo in subulam canaliculatam longiusculam acutam producto flavo, integerrima, e cellulis angustissimis subflexuosis longiusculis incrassatis subconflatis firmis areolata, canaliculato-concava; perichaetialia majora in comam elongatam strictam congesta longissime et flexuose subulata, intima minora et laxius reticulata; theca in pedunculo immerso cylindrica parva erecta, operculo conico-rostrato brevi subrecto; perist. dentes breves transverse sulcati incurvi, apice tantum bifidi, luteo-rufi.

Dicr. vulcanicum Brid. l. p. 466. — *D. filiforme* Schwägr. Suppl. II. p. 72. t. 122. — *Weisia vulcanica* Brid. Sp. Musc. l. p. 124.

Patria. In crateribus incensis montium ignivomorum insulae Bourbonis, 1300 hexapodes supra mare: Bory St. Vincent.

Flos masculus in planta femineae simili terminalis, foliis perigonialibus perichaetialibus simillimis longissime cuspidatis, intimo rarius mutico. Antheridia elongata, paraphysibus paucis aequalibus tenuibus flavidis mixta. Schwägr. l. c.

3. A. Gayana C. Müll.; cespitulosae elongatae simplicissima flexuosa; folia caulina dense appressa apice pa-

rum patula, e basi amplexante oblonga e cellulis inferne pellucidis subteneris longiusculis superne incrassato-ellipticis firmis areolatâ breviter acuminata, nervo in subulam brevem carnosulam fuscam obtusam excurrente flavido crassiusculo, integerrima; perichaetialia latiora magis vaginantia basi tenuiora, intima longius acuminata, summo apice indistincte pluries emarginata; theca in pedunculo brevi purpureo stricto crasso erecta ovalis major fusca, operculo longe subulato obliquo; perist. dentes robusti carnosi subbreves intense purpurei profunde bifidi ad basin densissime approximati subconflati, apice incurvi, cruribus crassis teretibus scaberrimis.

Dicr. Gayanum Mont. Ann. des sc. nat. 1845. 4. p. 112. et in Gay Hist. de Chile Bot. Crypt. t. 2. f. 3.

Patria. Chile australis, ubi ad terram frequenter legit C. Gay.

Pl. mascula apice perigonio breviter comoso crasso et infra idem iterum innovatione mascula graciliore divisa. Folia perigonialia latissima convolutaceo-vaginantia colorata, inferne laxius areolata, ad subulam magis emarginata. Antheridia numerosissima maxime elongata robusta curvula, paraphysibus brevioribus flavidis mixta. — Planta speciosissima. Ab *A. vulcanica* proxima jam notis cursive impressis, primo adspectu autem pedunculo multo longius exserto facillime distinguitur.

4. **A. andicola** C. Müll.; (in bot. Zeit. 1847. p. 189.); basi cespitulosa humilis tenella tenuissime julacea, inferne simplex, superne ramis tenuissimis brevibus curvulis divisa, *flavescens nitida*; folia densissime appressa, inferiora minora, superiora majora amplexantia canaliculato-concava ovata acuta, margine tenuissimo crenulata, amoene aurea, nervo obscuriore crassiusculo ante apicem evanido, e cellulis minutis incrassatis in membranam firmam conflatis areolata; perichaetialia e basi convolutaceo-vaginate subito acuminata, excurrentinervia, longius reticulata; theca in pedunculo longiusculo tortuoso-stricto rigido purpureo elliptica erecta firma fusca, oper-

culo longe et oblique subulato et *annulo maximo revolvibili praedita, sed gymnostoma.*

Gymnostomum julaceum Hook. Musc. Exot. t. 42. et Schwägr. Suppl. III. I. 1. t. 206. — Brid. I. p. 92.

Patria. In crepidinibus montis ignivomi Rucu-Pichincha prope Tablahuma regni Quitensis, regione frigida super basaltum, altitudine 2340 hexapodum: Humboldt et Bonpland.

Pl. mascula ignota. Species memorabilis certe huc pertinens, notis illustratis e distinctissimis.

Sectio II. **Campylopodium.** Plantae *Campylopodibus* simillimae pedunculis cygneo-recurvis.

5. **A. euphoroclada** C. Müll.; humilis gracilis, inferne nuda, superne foliis capillaceis parce foliosa, simplicissima, apice ramis fertilibus pluribus sublongis teneris divisa, tenella flexuosa fuscescens; folia caulina homomalla subfalcata, e basi vaginante latiuscula superne sinuata planiuscula subito flexuoso-capillacea acuta, apice obsolete denticulata, e cellulis angustissimis elongatis parietibus flavidis instructis flexuosis inanibus flavescentibus vel pellucidis areolata, nervo basi tenui superne totum folium occupante; perichaetialia inferne laxius reticulata; theca annulata in pedunculo brevi valde cygneo semper descendente fusco ovalis parva basi apophysata subrugulosa aequalis fusca, operculo conico subulato recto; calyptra basi laciniato-fissa inflexa; perist. dentes profunde fissi, cruribus hyalinis rugulosis tenuissimis fissilibus.

Didymodon medius Duby in Moritzi: Syst. Verz. der Zolling. Pfl. p. 134? — *D. grimmii* Dub. l. c.?

Patria. Java: Hb. Gottscheanum. Zollinger Coll. No. 411. z. a. et b.

Campylopodibus ex habitu simillima, sed structura interna i. e. cellulis alaribus deficientibus folisque caulinis vaginantibus toto coelo distat.

Sectio III. **Dicranella.** Plantae simplices foliis plus minus patulis pedunculisque erectis.

a. *Folia homomalla.*

α. *Theca strumosa.*

6. A. cerviculata C. Müll.; *dioica*; *dense cespitosa vel compacta* humilis erecta parce ramosa subvelutine flavide virescens, inferne tenuis, superne crescens; folia caulina inferiora lanceolato-subulata, erecto-patentia appressa, superiora *e basi semivaginantia tenuissime membranacea pallescente elongate pellucide angustiuscule et laxae areolatâ* canaliculate flexuoso-setacea acuta secunda, apice obsolete denticulata, nervo lato valde applanato totam subulam occupante concolore; perichaetia latiora et longius vaginantia; theca in pedunculo longiusculo tenuissimum flavo flexuoso-erecto *globoso-ovalis basi depresso-strumosa minutissima* leviter striata olivacea dein aureo-nitens, cernua, annulo spurio, operculo conico longe et oblique subulato rubente; perist. dentes angusti breves luteo, ferruginei ad medium bifidi, cruribus tenuissimis asperulis ferrugineis.

Dicr. cerviculatum Hdw. Musc. Frond. III. p. 89. t. 37 B. — *Bryum cerviculatum* Dicks. Fasc. Crypt. III. p. 7. — *Oncophorus cerviculatus* Brid. I. p. 391. — *Dicranum flavidum* Schwägr. Suppl. I. I. p. 192. t. 45. — *Oncophorus flavidus* Brid. I. p. 392. — *Dicr. uncinatum* Sm. Fl. Brit. p. 1207. — *Oncoph. cerviculatus* β. *uncinatus* Brid. I. p. 392. — *Dicr. pusillum* Hdw. Musc. Frond. II. p. 80. t. 29. f. 13. — *Oncoph. pusillus* Brid. I. p. 390.; forma humilis simplex, foliis minoribus suberectis atque theca minore minus gibbosa.

Patria. In ericetis et turfosis per totam Europam, e planitie usque ad alpes ascendens et in America septentrionali. — *Junio usque ad Augustum.*

Pl. mascula minor; flos capituliformis; folia perigonialia ex ovata et valde concava basi lineari-subulata; paraphyses et antheridia parva sat copiosa. — Ab *A. heteromalla* proxima notis cursive impressis longe distat.

7. A. Sauteri C. Müll.; *monoica*; brevissima simplex cespites pusillos densos ditissime fructificantes effi-

ciens; folia parva erecta densa obscure fusca *lanceolata carinata obtusa*, nervo crasso *subexcurrente*, superiora rigidiuscula in acumen breve angustata fasciculata pallide viridia; perichaetialia *vaginantia orato-lanceolata*; theca in pedunculo solitario erecto flavido obovata cernua dorso gibboso-obliqua, ore angustata flavida, evacuata amplior, striata, basi strumulosa, operculo e basi convexa oblique et flavide rostrato; perist. dentes lanceolati rubri dense trabeculati inflexi dein reflexi, ad medium usque fere fissi. †.

Dicranum pumilum Saut. in Regensb. Flora 1839. I. p. 264.

Patria. Alpes Salisburgiae, in terra glimmeracea, altitudine 6000 ped. montis Heubachhorn dicti versus meridion. ditionis Zell am See: Sauter 1835. Sept. 23.

Ab *A. cerviculata*, ex obs. auctoris proxima, inflorescentia monoica et notis ceteris laudatis distat.

8. ***A. coarctata*** C. Müll.; *dioica*; habitus *A. heteromallae*; folia caulina inferiora lanceolato-subulata, media e basi *latiusculo-vaginate* flavida anguste dense longiuscule areolata *superne subsinuata margine crenulata* et minutius reticulata subito subulata falcata acuta, apice summo denticulata, nervo latiusculo flavo canaliculato subulam superam totam occupante; perichaetialia longius et angustius vaginantia, inferne laxius areolata; theca in pedunculo elongato *apice parum inclinata erecta ovalis ore coarctata basi strumosa annulo lato valde revolubili praedita* fuscescens, operculo longe et oblique subulato; perist. dentes dense approximati longi angusti inferne robuste trabeculati et intense purpurei, superne vix ad medium bifidi, cruribus strictis crassiusculis asperis flavescensibus dense cohaerentibus.

Patria. Java: Zollinger Coll. No. 411. z; specimina pauca *Leptotr. Boryano* intermixta invenimus.

Ab *A. heteromalla* notis cursive impressis distat.

9. ***A. aulacocarpa*** C. Müll.; *dioica*; cespitulosa humilis simplex amoene flavida, inferne foliis minoribus superne majoribus densius imbricatis, siccitate crispatis

subsecundis; caulina e basi elongate oblonga superne latiore sinuata e cellulis elongatis pellucidis ampliusculis teneris flexuosis superne minoribus subincrassatis areolatâ subito loriformi-subulata obtusiuscula integerrima, nervo angusto tenui subulam canaliculatam superam totam occupante; perichaetialia superne magis convolutacea; theca in pedunculo brevi stricto flavido erecta subgibboso-ovalis parva rubens striata annulata basi strumulosa, operculo longe et oblique subulato pallide rubro; perist. dentes ad medium bifidi angusti, cruribus apice pallidis tenuibus.

Dicranum aulacocarpum Mont. Ann. d. sc. nat. 1845. 4. p. 113.

Patria. Chile australis ad terram nudam: C. Gay.

Ab *A. heteromalla* proxima notis cursive impressis distat.

β. *Theca exstrumosa.*

10. **A. heteromalla** C. Müll.; *dioica*; simplex humilis vel elatiuscula ramosa; folia caulina perfecte homomalla, e basi angusta e cellulis angustissimis densis subparvis areolatâ lineari-setacea falcata minute denticulata, nervo angusto subulam superam totam occupante; perichaetialia basi latiore vaginante inferne laxius areolata; theca in pedunculo tenuissimo flavido elongato flexuoso-erecto subgibboso-ovalis subcernua subaequalis nitida striata rubens angustissime annulata, operculo longe et oblique subulato intense purpureo; perist. dentes 2—3-fidi valde purpurei plus minus robusti lati tenues, cruribus tenuibus ferrugineis rugulosis.

Dicranum heteromallum Hdw. Musc. Frond. I. p. 68. t. 26. — Bryol. Europ. Fasc. 37—40. p. 25. t. 15. — Brid. I. p. 423. — *Fuscina heteromalla* Schrank. Baiersche Fl. II. p. 454. — *Bryum heteromallum* Dill. Musc. p. 375. t. 47. f. 37.

β. *stricta*; foliis undique erecto-patentibus strictis, pedunculo elongato flexuoso. Br. Europ. I. c.

γ. *interrupta*; major, caule altiore ramosiore nunc interrupte folioso, foliis patentibus vel subsecundis. Br. Europ. I. c. — *Dicr. interruptum* Hdw. Sp. Musc. p. 129. t. 29. — *D. caducum* Brid. I. p. 425.

δ. orthocarpa; elongata ramosa, foliis secundis, theca cylindrico-ovalis erecta aequalis. *Dicr. orthocarpum* Hdw. Sp. Musc. p. 131. tab. 30. — *D. heteromallum* var. 2. Sulliv. Musc. Exs. Allegh. No. 166.

Patria. In terra denudata et rupibus praeprimis arenaceis et in turfosis planitierum et regionis montanae totius Europae atque Americae septentrionalis. — *Primo vere.*

Pl. mascula femineae aequalis vel minor. Folia perigonialia e basi ovata concavâ subito subulata tenuius nervosa; intimum latissimum brevissime subulatum tenerimum. Paraphyses et antheridia mediocriter numerosa.

11. A. subulata C. Müll.; *dioica*; interrupte cespitosa, erecta vel e basi decumbente ascendens, *amoene sericeo-viridis*, humilis gracilescens ramosa, apice innovans; folia caulina falcato-secunda, e basi oblonga e cellulis angustissimis *densis subteneris* areolatâ falcato-setacea, *integerrima*, nervo latiusculo *obscuriore* subulam canaliculatam angustam superam totam occupante; perichaetialia *convolutaceo-vaginantia ut caulina sed parum laxius reticulata*; theca in pedunculo purpureo *cernua gibboso-ovalis coriacea* obsolete striata annulata, operculo *recurvirostri longissimo* concolore; peristomium *A. curvatae*.

Dicranum subulatum Hdw. Sp. Musc. p. 128. t. 34. — Br. Europ. Fasc. 37 — 40. p. 23. t. 13. — Brid. I. p. 426. — *D. secundum* Sw. Act. Holm. 1795. p. 244. — *D. Sudeticum* Schwägr. Suppl. I. I. p. 175. tab. 45., forma elatior e spec. Ludwigianis.

Patria. In terra micacea et arenosa per regionem subalpinam et alpinam Germaniae, Helvetiae, totius Scandinaviae et in America septentrionali. — *Augusto.*

Pl. mascula gracilior subsimplex, sub flore innovans; flos capituliformis; folia perigonialia ex ovata valde concava colorata et tenero-areolata basi subulata; paraphyses et antheridia pauca tenera.

12. A. curvata C. Müll.; *dioica*; gregarie et laxe cespitosa pluries divisa subhumilis gracilis subremotifolia sordide lutescens; folia caulina falcato-secunda, e basi

oblonga angusta e cellulis elongatis angustissimis densissimis *in membranam veluti conflatis areolatâ falcato-setacea, apice obsolete denticulata*, nervo latiusculo *concolore* subulam canaliculatam angustissimam superam totam occupante; perichaetia *basi longiuscule vaginantia tenerrime et pellucide reticulata diaphana*; theca in pedunculo longiusculo substricto brunneo *erecta vel parum curvata ovato-oblonga aequalis* brunneo-fusca annulata striata, ore *subtruncato*, operculo conico-subulato obliquo; perist. dentes elongati angustissimi ad medium bifidi plus minus aurantiaci planissimi, cruribus tenuissimis laevibus.

Dicranum curvatum Hdw. Sp. Musc. p. 132. tab. 31. — Br. Europ. Fasc. 37 — 40. p. 24. tab. 14. — Brid. I. p. 425.

Patria. Ad rupes et terram denudatam arenaceo-argillosam per regionem montanam sylvaticam Germaniae, Galliae, Britanniae et Scandinaviae Lapponiae prope Kipinä ex Ångström. — *Sero auctumno et primo vere.*

Inflorescentia *A. subulatae*, quacum saepe commutata sed notis cursive impressis facile distinguitur.

13. A. Perrottetii C. Müll.; *dioica*; laxè cespitosa elatiuscula erecta gracilis, inferne gracilior superne densius foliosa; folia caulina erecto-patentia vel secunda, e basi ovata vel lanceolata *elongate anguste dense ampliuscule et valde flavido-areolatâ* inferiora sensim superiora fere subito subulata acutiuscula *integerrima* canaliculata, nervo lato deplanato subulam superam totam minute areolatam occupante *concolore*; perichaetia interiora e basi angustiore medio latiore supra attenuata *elongate ampliuscule et pellucide reticulata sensim et brevius subulata*; theca in pedunculo strictiusculo flavo *apice parum inclinato crassiuscule ovalis parva* coriacea annulata, operculo longe et oblique rostrato; perist. dentes vix ad medium bifidi, cruribus conniventibus tenuibus asperrimis ferrugineis.

Dicranum Perrottetii Mont. Ann. d. sc. nat. 1843. XIX. p. 241. — *D. sclerocarpum* Hook. et Wils. Lond. Journ. of bot. 1847. p. 291. t. 11. ex ic. huc pertinet.

Patria. Insula Martinique: Perrottet. Ex insula Guadeloupe a C. S. Parker lectam et e Nova Granada acceperunt Hooker et Wilson.

Pl. mascula cespitulos proprios efficiens gracillima flexuoso-erecta ad perigonium innovans. Folia perigonia caulinis superioribus e forma et areolatione similia sed convoluta colorata, interiora laxius et tenuius reticulata; antheridia majuscula, paraphysibus tenerrimis aequalibus mixta.

14. **A. brachyblepharis** C. Müll.; *dioica*; laxa cohaerens erecta tenuis simplicissima sordide viridis; folia caulina apice densiora subsecunda, e basi oblonga vel ovali sensim et latiusculo-subulata subfalcata acuta integerrima, e cellulis albido-pellucidis sed parietibus flavis praeditis ampliusculis inferne elongatis superne parallelis strictis composita; perichaetia basi longiore parum vaginante inferne angustiore; omnia nervo crassiusculo rufescente in subulam supremam evanescente; theca in pedunculo breviusculo stricto pallido erecta elliptica parva annulata aequalis sulcata rufescens, operculo longe et oblique subulato; perist. dentes brevissimi profunde et irregulariter bifidi purpurei, cruribus brevibus strictis subhyalinis.

Dicr. curvatum Hsch. in Musc. Depp. et Schied.

Patria. Mexico prope Xalapam: Deppe et Schiede.

Pl. mascula multo humilior saepe ramo masculo dichotoma, flore terminali; folia perig. e basi lato-ovalia valde concava sensim subulata obtusiuscula, interiora tenuius areolata et colorata. — Ab *A. aulacocarpa* proxima notis cursive impressis facile distinguitur.

15. **A. varia** C. Müll.; *dioica*; humilis erecta cespitulosa basi divisa; folia caulina densiuscula imbricata erecto-patentia vel secunda flavescentia, lanceolato-subulata acuta angusta, carinata integerrima vel parce denticulata, nervo in acumen breve excurrente flavo angusto, undique e cellulis angustis firmis densis longiusculis parietibus pallidis areolata, perichaetia subvaginantia;

theca in pedunculo mediocri purpureo ascendente *obovalis obliqua brevis subcernua* firma coriacea exannulata, operculo conico rostellato obliquo; perist. *A. rufescentis*.

Dicranum varium Hdw. Musc. Frond. II. p. 95. t. 34. — Br. Europ. Fasc. 37 — 40. p. 20. t. 10, 11. — Brid. I. p. 435. — *Dicr. varium a. viride* Hook. et Tayl. Musc. Brit. ed. II. p. 102. t. 17 ex parte. — *Dicr. laxifolium* Brid. I. p. 431., folis valde secundis e spec. auth. sterilibus huc forte pertinet. — *Dicr. rigidulum*, innovationibus pedunculo longioribus, foliis secundis. Sw. Musc. Suec., p. 89. t. 3! — *Dicr. callistomum* Brid. Sp. Musc. I. p. 187.; forma minor *A. rufescenti* similior. — *Bryum callistomum* Dicks. Fasc. III. Pl. Crypt. p. 5. t. 8. f. 10. — *Fuscina simplex* Schrank. Baiers. Fl. II. p. 453. — *Bryum simplex* L. Sp. Pl. p. 1587. — *Bryum trichodes* capsulis rubris cernuis. Dill. Musc. p. 390. t. 50. f. 59.

β. tenuifolia; foliis tenuioribus obsolete nervosis. Br. Europ. l. c. p. 21. — *Dicr. tenuifolium* Bruch in Fr. Mülleri Musc. Sard.

Patria. Ad terram denudatam argillaceo-arenosam humidam per Europam totam. Var. *β.* in Europa meridionali, Africa et America septentrionali. — *Auctumno et primo vere.*

Pl. mascula gracilior; flos tenuis; folia perigonialia externa ex ovata et concava basi anguste lanceolato-subulata, interna sensim brevius acuminata, dein late ovata breviter apiculata; antheridia parva et una cum paraphysibus tenuissimis brevibus haud copiosa.

16. *A. rufescens* C. Müll.; *dioica*; humilis oblique erecta gregaria vel gregarie cespitosa simplex vel parce ramosa; folia caulina secunda *remota rufescentia, lanceolato-subulata acuta angusta, nervo ferrugineo in acumen eranescente*, apicem versus denticulata, *undique e cellulis elongatis valde pellucidis angustis laxiusculis parietibus rufescentibus* areolata, perichaetialia longius subulata; theca exannulata in pedunculo brevi geniculato-ascendente purpureo flexuoso erecta ovalis aequalis parva ferruginea, operculo conico rostellato obliquo; perist. dentes breves inflexi angusti irregulariter ad medium usque 2—3-fidi, cruribus tenuissimis hyalinis asperulis.

Dicranum rufescens Turn. Musc. Hibern. p. 66. — Br. Europ. Fasc. 37 — 40. p. 22. t. 12. — Brid. I. p. 437. — *Dicr. varium β.*

rufescens Brid. Mant. Musc. p. 62. — *D. curvatum* Schultz. Suppl. Fl. Starg. p. 71. — *D. carneum* Blandow in Sturm Deutschl. Fl. II. Fasc. II. — *Bryum rufescens* Dicks. Fasc. III. Pl. Crypt. p. 6. t. 8. f. 1.

Patria. In terra argilloso-arenaria humida umbrosa Germaniae, Galliae atque Britanniae. — *Auctumno per hyemem usque ad ver primum thecis maturis.*

Ab *A. varia* proxima foliorum areolatione certe distat. Inflorescentia praecedentis.

b. *Folia heteromalla.*

α. *Squarroso-reflexa.*

† *Elatae.*

17. A. Reinwardti C. Müll.; *monoica*; *adscendens*, *ramis brevibus compluribus fertilibus divisa*, *valde robusta elata* aureo-nitentia; *folia caulina e basi lato-amplexante brevi convolutacea superne auriculato-flexuosa e cellulis elongatis angustis partim flavis partim aurantiaco-striatis areolatâ subito reflexa squarroso-tortilia in subulam latiusculam superne angustam acutam canaliculatam emarginate serrulatam e cellulis minoribus robustis valde incrassatis compositam producta*, *nervo angusto excurrente superne dorso scabro*; *perichactialia latiora pallidiora breviora sed longius vaginantia et laxius reticulata*; *theca anguste annulata in pedunculo substricto breviusculo rubente erecta ovalis crassa majuscula rubens*, *operculo oblique rostrato*; *perist. dentes robusti intense purpurei valde trabeculati profunde 2—3-fidi, madefacti reflexi.*

Dicr. Reinwardti Dz. et M. Ann. d. sc. nat. 1844. II. p. 303. — *D. tortifolium* A. Br. mst. ex Hampe.

Patria. Java. Borneo.

Flos masc. axillaris crassiuscule gemmaceus; *folia lato-convolutacea breviter acuminata et apice parum reflexa obsoletinervia vel enervia*, *obtusiuscula flave vel aurantiaco-tincto-areolata*; *antheridia elongata angusta purpurea*, *paraphysibus aureis longioribus breviter articulatis mixta.* — *Dicrano Drummondi* e foliis squarroso-tortilibus haud dissimilis.

18. **A. squarrosa** C. Müll.; *dioica; robusta elata erecta dichotome ramosa dense radiculosa squarroso-foliosa e viridi aurea; folia caulina lata e basi latissime vaginante superne sinuatâ reflexa brevia lato-canaliculata apice ligulato-obtusa integerrima vel emarginata, nervo flavo tenui evanido, basi e cellulis laxissimis elongatis amplis utriculo primordiali valde instructis superne minoribus apice subincrassatis areolata*, perichaetialia intima superne haud sinuata sed reflexa et sensim oblonga; theca exannulata in pedunculo breviusculo *carnosulo* crasso purpureo stricto oblonga cernua strumulosa firma coriacea, operculo conico brevirostrato obliquo purpureo; perist. dentes robusti lati longi 2 — 3-fidi amoene purpurei, cruribus irregularibus flexuosis apice pallidis.

Diobelon squarrosus Hmp. in litt. *Dicranum squarrosus* Starcke in litt. ad Schrader! ut ex ejus schedulis in Hb. Reg. Berol. elucet. Schrad. in Bot. Journ. V. p. 68. — Br. Europ. Fasc. 37 — 40. p. 17. t. 5. — *Oncophorus squarrosus* Brid. I. p. 404. — *Bryum palustre* Dicks. Fasc. IV. Pl. Crypt. p. 11. — *Br. pellucidum* β. L. Sp. Pl. p. 1583. — *Bryum erectis capitulis brevibus, foliis reflexis.* Dill. Musc. p. 365. t. 46. f. 24.

Patria. In locis aquosis praecipue montium altiorum, ubi ad fontes et rivulos frigidos caespitibus latis raro tamen fructifera viget per totam fere Europam et in America septentrionali. — *Aestate et sero auctumno.*

Pl. mascula femineae similis; flores capituliformes; folia externa e basi lata concavâ lanceolata patentia, interna breviora tenuiora. Antheridia maxima, paraphysibus teneris longioribus breviter articulatis.

†† *Humiles.*

19. **A. Schreberi** C. Müll.; *dioica; densissime gregaria humilis parce divisa viridis; folia caulina omnia e basi lato-vaginante anguste dense elongate et firme areolata difficile emolliente superne sinuato-flexuosâ sensim acuminato-subulata reflexa viridia acuta apice denticulata, nervo latiusculo tenui in subulam canaliculatam minutius reticulatam excurrente; perichaetialia majora; theca in pedunculo strictiusculo purpureo flexuoso oblonga*

cernua basi strumulosa exannulata firma coriacea, operculo conico longe subulato crasso obliquo purpureo; perist. dentes intense purpurei angusti longi conniventes, ad medium bifidi, cruribus tenuibus apice hyalinis trabeculatis subrugulosis.

Dicranum Schreberi Hdw. Sp. Musc. p. 144. t. 33. — Br. Europ. Fasc. 37 — 40. p. 18. t. 6. — Brid. I. p. 449. — *D. recognitum* Röhl. Moosg. Deut. p. 377. — *Barbula Schreberi* Brid. Musc. Rec. II. I. p. 207. — *B. mutabilis* Baumg. Fl. Lips. n. 1263. — *B. crispa* Hdw. Fund. Musc. II. p. 92. — *Bryum crispum* Schreb. Spic. Fl. Lips. p. 79.

Patria. In terra argillosa humida sylvarum praecipue umbrosarum regionis montanae et planitiei per totam Europam, sed rarior. — *Auctumno.*

Pl. mascula minor subsimplex, flore capituliformi.

20. A. Grevilleana C. Müll.; *monoica*; habitus *A. Schreberi*; folia caulina omnia e basi longiore *angustius et mollius areolata* superne valde sinuato-flexuosa *facile emolliente* sensim flexuoso-subulata reflexa, *integerrima*, nervo angusto tenuiore excurrente; theca exannulata, operculum et peristomium *A. Schreberi*.

Dicranum Grevillianum Br. Europ. Fasc. 37 — 40. p. 19. t. 7. — *D. Schreberi* β. *Grevillianum* Brid. I. p. 450 — *D. Schreberianum* Hook. et Tayl. Musc. Brit. ed. II. p. 95. t. Suppl. 3. — Grev. Scott. Crypt. Fasc. 24. tab. 116. — Drummond. Musc. Amer. No. 93.

Patria. In terra humida denudata per regionem alpinam Scotiae, Helvetiae, Italiae, Germaniae et Scandinaviae. In locis iisdem alpinis Americae septentrionalis haud raram legit Drummond.

Folia perigonialia floris masculi in ramulo brevi gracillimo terminalis basi convolutacco-vaginantia laxius tenerius et longius reticulata colorata superne sensim fere subulata.

21. A. crispa C. Müll.; *monoica*; laxe cespitosa simplex humilis flavescens tenuis; folia caulina inferiora et superiora e basi oblonga *omnino* e cellulis *angustioribus* pellucidis elongatis areolatâ reflexa et pluries flexuosa subulata *acuta*, apice denticulata, inferiora *basi longiore*

angusta haud plicata, superiora tantum sinuata; perichaetalia longius vaginantia, inferne multo laxius et tenuius reticulata; theca in pedunculo longiusculo purpureo stricto erecta ovalis truncata fuscescens laevis, sicca striata angustissime annulata, operculo conico subulato elongato obliquo purpureo; perist. dentes purpurei ad medium bifidi, cruribus ferrugineis teneris subrugulosis.

Dicranum crispum Hdw. Musc. Frond. II. p. 91. t. 33. — Br. Europ. Fasc. 37—40. p. 20. t. 8. — Brid. I. p. 451. — *Bryum marginale* Dicks. Fasc. III. Pl. Crypt. p. 8.

Patria. In arenosis humidis regionis montanae et subalpinae per totam fere Europam sed raro et in America septentrionali. — *Aestate.*

Flos masculus in ramulo brevi radicali gracillimo tenuiter gemmaceus, foliis convolutaceo-concavis, basi coloratis, e reliquis caulinis inferioribus similibus. Anthridia majuscula pauca, paraphysibus longioribus fuscis remote articulatis.

22. A. Guillemianiana C. Müll.; *dioica*; laxa cespitosa simplex humilis flavescens robusta; folia caulina inferiora minora, superiora majora, e basi lato-vaginate superne plicato-sinuata latiore flexuosa anguste elongate et pellucide superne minutissime incrassate et angustissime areolata sensim acuminato-subulata, sicca valde crispa, madefacta flexuosa, apice obtusiusculo obsolete denticulata, nervo angusto flavo in subulam canaliculatam excurrente; perichaetalia majora longius laxius et pellucidius reticulata; theca annulata in pedunculo longiusculo stricto flavido erecta elliptica plicata aequalis olivacea operculo longe et oblique subulato purpureo; perist. dentes angusti usque ad medium bifidi, cruribus inaequalibus hyalinis subrugulosis erectis conniventibus.

Dicranum Guillemianum Mont. Ann. d. sc. nat. 1841. XVI. p. 267. — *D. sulcatum* C. Müll. Bot. Zeit. 1844. p. 709 et 1845. p. 93.

Patria. Brasilia ubi ad terram micaceam prope Rio de Janeiro primus legit Riedel; in rupibus humidis prov. Corcovado; Gardner Coll. No. 26.

Ab *A. crisper* proxima statura multo robustiore, foliis latioribus, aliter areolatis et partim formatis praecipue thecae forma facile distinguitur.

23. *A. cylindrica* C. Müll.; *dioica*; gregaria vel cespitulosa humilis flavescens simplex vel parce divisa; folia caulina undique patentia, e basi vaginante *anguste elongate et firme areolatâ* reflexo-capillaria flexuosa siccitate crispa acuta, nervo latiusculo concolore subulam superam denticulatam totam occupante; perichaetia magis vaginantia subito subulata; theca in pedunculo elongato purpurascente tortuoso-stricto erecta *angustissime cylindrica curviuscula*, annulata, operculo conico *brevi recto*; perist. dentes regulariter *profunde bifidi* longi purpurei, cruribus remote articulatis.

Ceratodon cylindricus Br. et Sch. Br. Europ. Fasc. 29—30. p. 6. t. 3. — *Trichostomum cylindricum* Hdw. Sp. Musc. p. 107. t. 24. — *Tr. tenuifolium* Schrad. Bot. Journ. II. p. 58. — *Didymodon cylindricus* Wahlenb. Fl. Suec. p. 754. — *Dicranum cylindricum* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 202.

Patria. In terra arenosa denudata humida et subspongiosa per regionem infra alpinam et alpinam, rarissime in planitie; in Alsatia, Silesia, Rhaetia, Salisburgiae ditione et Scandinavia tota. E rarioribus. — *Vere, in alpibus aestate.*

Pl. mascula gracilior; folia perigonia caulinis similia sed convolutaceo-concava subulata; antheridia numerosa paraphysibus teneris parum longioribus. — Ab *A. crispa* simillima jam thecae forma primo adpectu differt.

β. *Crispato-flexuosa.*

24. *A. tenuirostris* C. Müll.; *dioica*; cespitulosa humillima gracilis ramis brevibus aequalibus compluribus *fastigiato-ramosa glauco-viridis*; folia caulina e basi oblongâ perfecte *lineari-subulata vel loriformia angusta flexuoso-crispata, apice valde obtusa denticulata*, nervo pro folio angusto latiusculo deplanato flavo *ante apicem evanido flexuoso*, inferne elongate anguste et laxè superne minutius sed laxè et pellucide areolata, canalicu-

lato-concava; perichaetialia *intima angustissima*; theca in pedunculo sublongo tenuissimo flavido erecta ovalis minuta aequalis, annulata, coriacea, laevis, operculo longissime tenuissime et oblique subulato thecam superante rubro; perist. dentes longi angustissimi profunde bifidi ferruginei, cruribus tenuissimis fuscidulis asperulis.

Dicranum tenuirostre Kze. in Pöpp. Pl. Chil. III. No. 232. et in Schwägr. Suppl. IV. tab. 308.

Patria. Chile australis: Pöppig 1829. E Cayenna accepisse Cl. Montagne indicavit.

Pl. mascula robustior densius foliosa, sed humillima, ramis 2—3 masculis; flos masculus oblongo-gemmaceus in foliis caulinis immersus; folia perigonialia interiora valde convolutacea breviuscule acuminata, intima integerrima acuta breviora, colorata tenerrime reticulata et membranacea; paraphyses et antheridia subparva pauca.

25. A. euchlora C. Müll.; *monoica*; pumila cespitosa innovando-ramosa; folia caulina *e basi oblongâ subulata canaliculata* patienti-inflexa siccitate flexuosa *marginē tenuissime denticulata*, nervo mediocri ad apicem continuo; perichaetialia conformia basi ampliore vaginantia; theca *nutans oblonga paucistriata obsolete strumulosa*, operculo conico oblique rostrato thecam dimidiam superante. †.

Dicranum euchlorum Mont. Ann. d. sc. nat. 1845. 4. p. 112.

Patria. Chile ad terram et in ramulis dejectis: C. Gay.

Ex animadvers. auctoris *A. tenuirostris* affinis.

26. A. hilariana C. Müll.; *dioica*; cespitulosa humillima subsimplex basi innovando divisa; folia caulina undique patentia, sicca et madefacta subcrispata, *oblongo-linguaeformia obtusa plicato-flexuosa*, apice suberosa, basi e cellulis laxis elongatis teneris flavide pellucidis superne minutis et minutissimis pellucidis areolata, nervo canaliculato angusto flavo flexuoso crassiusculo ante apicem evanido; perichaetialia *distincte obtusa*; theca in pedunculo brevi erecta ovalis brunnescens minuta aequalis,

sicca cylindrica, operculo longe et oblique subulato; perist. dentes inflexi rubri ad medium usque bifidi, cruribus tenuissimis hyalinis longis subrugulosis.

Dicranum Hilarianum Mont. Ann. des sc. nat. 1839. p. 52. t. 1. f. 2. — *D. Sellowii* Hsch. Fl. Bras. 1840. p. 14. e spec. auth.! — *D. innovans* C. Müll. Bot. Zeit. 1844. p. 709. — *D. parvulum* var. Hook. et Wils. Lond. Journ. of bot. 1844. p. 151.

Patria. Brasilia meridionalis ad terram: Hb. Montagneanum. In campis Mondevidensibus: Sellow, prope Sebastianopolin: Merkel, mense Julio et Augusto; Parahybuna: Gardner Coll. No. 19. C. mense Oct. 1840.

27. A. Tovariensis C. Müll.; *dioica*; laxa cespitosa elatiuscula erecta apice densius comosa, ad perichaetium innovatione elongata gracillima remotifolia, viridis; folia caulina undique patentia sicca crispula madefacta stricta, e basi vaginante dense longiuscule anguste incrassate firme difficile emolliente et viridi-areolatâ subito canaliculato-subulata acutiuscula integerrima, nervo latiusculo concolore subulam superam totam occupante; perichaetialia latius vaginantia basi laxius pellucidius et tenuius superne rhomboideo-, ad subulam inferam minutissime incrassate reticulata; theca in pedunculo longiusculo stricto purpureo erecta ovalis parva annulata coriacea, operculo longe et oblique subulato; perist. dentes angusti purpurei ad medium bifidi, cruribus conniventibus scaberrimis ferrugineis.

Dicranum Perrottetii C. Müll. in Linnaea XIX. p. 206.

Patria. Columbia, ubi in colonia Tovar Germanica altitud. 5000 ped. inter *Polytricha* viget: Moritz.

Pl. mascula femineae intermixta multo gracilior et ad perigonium innovatione gracillima; folia perigonialia e basi lato-convoluta superne valde sinuata elongate angustissime et tenero-areolata colorata subulata; antheridia numerosa majuscula, paraphysibus teneris brevioribus paucis mixta. — Ex habitu *A. Perrottetii* simillima, notis autem cursive impressis et planta mascula multo minore aliter formata longe distat.

γ. *Stricta.*

28. **A. exigua** C. Müll.; *dioica; nana, ramis brevissimis gemmaceo - minutis divisa, flavescens erecta; apice curvata, folia caulina erecta dense appressa lanceolata nervo crassissimo tereti in infimis evanido in supremis cuspidem longiusculam crassam acutam efficiente praedita, undique e cellulis minutis firmissculis subquadrato-rhomboideis areolata, carinato concava; perichaetia majora; theca in pedunculo brevi ochraceo erecta ovalis parva coriacea minute annulata, operculo subulato obliquo; perist. dentes quam maxime angusti tenelli profunde bifidi, cruribus brevibus dense articulatis ferrugineis.*

Dicranum parvulum Hsch. Fl. Bras. p. 14. — *D. debile* Hook. et Wils. in Drumm. Musc. Amer. No. 51. ex eorum ratione, in Lond. Journ. of bot. 1844. p. 151. data! — *Weisia exigua* Schwägr. Suppl. II. II. 2. t. 179.

Patria. Brasilia, in solo limoso in Serra d'Estrella, *Augusti* mense, in umbrosis montium prope Sebastiano-polin *Octobris* et *Februarii* mense: Beyrich; in Minis generalibus: Martius; in rupibus humidis m. Corcovado: Gardner Coll. No. 19.

Pl. mascula minutissima, ad perigonium crassiusculum ramo brevi multo graciliore divisa; folia perigonialia ex ovata valde concava colorata basi sensim subulata, nervo tenuiore cuspidata, laxius et tenerius areolata, intima convolutacea latiora sed brevissima acuminata enervia; antheridia pauca subparva, paraphysibus paucis aequalibus teneris mixta. — Ex habitu *Seligeriis* minoribus affinis sed distincta species.

29. **A. bicolor** C. Müll.; *dioica; densissime et late cespitosa sed laxè cohaerens, inferne lutescens superne amoene viridis, erecta humilis gracilis, apice elongato-attenuata, capillaris, basi divisa, ad perichaetium innovatione gracillima tenuissima, mollis; folia caulina erecta appressa, e basi ovata concava e cellulis subquadratis subparvis densiusculis flavidis ad subulam minoribus plus minus incrassatis reticulata, canaliculato-subulata acuta,*

nervo flavo crassiusculo subulam superam totam occupante, integerrima; perichaetialia *basi longiore subvaginate*; theca in pedunculo tenui longiusculo flexuoso-erecto brunnescente erecta *suburceolato-ovalis parum gibbosa* brunnea striata annulata, operculo conico-subulato obliquo cum calyptra deciduo; perist. dentes breves ad medium fissi pallide ferruginei, cruribus hyalinis laevibus.

Dicranum densum C. Müll. Linn. XIX. p. 206. — *D. densum* β. minus Hmp. Linn. XX. p. 73.

Patria. Columbia, ubi in colonia Germanica Tovar altitudine 5500 ped. legit Moritz, Coll. No. 21 b.

Ab *A. densa* proxima e spec. auth. nobis nunc emanata notis cursive impressis facile distinguitur. Pl. mascula ignota.

30. **A. densa** C. Müll.; *dioica*; dense cespitosa compacta humilis, basi *divisa* flavescens tenuis; folia caulina inferiora *lato-lanceolata subulata*, superiora sensim majora basi latiora, omnia acuta integerrima canaliculata, nervo latiusculo crasso flavo in subulam canaliculatam excurrente supremam totam occupante, basi *e cellulis elongatis ampliusculis pellucide viridibus parietibus crassiusculis flavis praeditis*, superne minoribus plus minus *quadratis* reticulata; perichaetialia caulinis superioribus simillima, sed majora et magis vaginantia; theca in pedunculo brevi rubente stricto *apice vix inclinato erecta urceolato-ovalis parva* firma coriacea lato-annulata, operculo longe et oblique rostellato concolore; perist. dentes breves angustissimi profunde bifidi, cruribus tenuibus aurantiacis nodosis asperulis subinflexis.

Dicranum densum Hook. Muse. Exot. tab. 140. — Brid. I. p. 464.

Patria. In crepidinibus montis Quindiu regni Mexicani, in regione temperata: Humboldt et Bonpland.

Pl. mascula femineae intermixta et similis; folia perigonialia lato-concava laxius reticulata colorata subito fere subulata tenuinervia, intima convolutacea; antheridia elongata, una cum paraphysibus haud numerosa.

Obscuriores.

Leucophanes? Leanum Sulliv. (Musc. Allegh. Exs. No. 172.); densissime cespitosum humile, inferne intertextum ochraceum, superne viride, sericeo-nitens, apice subcurvatum, fastigiato-ramosum; folia caulina lanceolato-subulata convolutaceo-concava tenuiter sublonge et sublaxe areolata, pellucida, vel albido-viridia, e compluribus stratis tubulosarum cellularum (nervi obsoleti dorso sublaevis, haud incrassatarum) conformata igitur carnosula.

Patria. America septentrionalis, ubi in sylvaticis depressis inter montes Alleghanies, ad arborum truncos putridos, nec non in Ohione haud infrequens, at semper sterile legit T. G. Lea.

Ad apicem caulis saepissime gemmulae, folia juniora carnosa linearia brevia stricta efficientes, ramis brevissimis similes, reperiuntur. Muscus dubius, dum fructus haud innotescit.

Gen. VII. **Leptótrichum** Hmp.

in Linnaea 1847. p. 74. et C. Müll. in Bot. Zeit. 1847. p. 806. — *Aschistodon* Mont. — *Didymodon* nonnull. — *Trichostomum* nonnull. — *Weisia* al.

Nomen graecae compositionis, a λεπτός *tenuis* et ῥοίξ *capillus*, ob dentes peristomii graciles ductum.

Calyptra *dimidiata* angusta torta. Peristomium simplex: dentes 16 *aequidistantes*, *subulati ciliiformes linea media exarati vel in cilia fissi igitur 32 per paria approximati*, basi in membranam plus minus elatam conflati rubescentes. Theca annulata. Inflorescentia monoica vel dioica.

Habitus partim dicranoideus, partim proprius.

a. *Folia crispata.*

1. **L. plicatum** C. Müll.; *monoicum*; flores masculi minuti oblongi plures infra perichaetium positi axillares;

laxe cespitosum *gracile flexuoso-erectum inferne nudum, superne crispato-comosum, amoene flavescens*; folia caulina laxè imbricata sicca et madefacta crispata, e basi anguste oblonga dense anguste et elongate areolata vaginante valde flexuoso-capillaria, marginibus ad subulam nervo pro latitudine folii lato omnino occupatam subinvolutis canaliculata, summo apice denticulata; perichaetia longe vaginantia subito subulata; theca in pedunculo longiusculo tenui flavido cylindrica erecta, operculo conico brevi recto.

Didymodon plicatus Mont. in litt. — *D. cirrhifolius* Mont. in Crypt. Neelgher Ann. d. sc. nat. 1842. No. 56.

Patria. In sylvis Neelgheriensibus humidis post Bangalo τοῦ Avalanchy: Perrottet.

Habitus caulis *Bryi pyriformis*; theca *Leptotrichi*. — Folia perigonia parva angusta parce denticulata breviora, interiora obtusiuscula.

b. *Folia stricta.*

2. **L. tenue** C. Müll.; *dioicum*; gregarie cespitosum humile simplex, vel ramo gracillimo basilari divisum; folia caulina *appressa erecta stricta*, e basi ovatâ *lanceolato-subulata obtusiusculo-acuta, subintegerrima*, nervo *teretiusculo crasso in subulam excurrente*, omnino e cellulis flavidis parvis superne minutissimis areolata; perichaetia longiora subvaginantia, inferne *elongate valde laxè et pellucide superne minutissime reticulata*; theca in pedunculo breviusculo rubente erecta *ovalis minuta pallida*, operculo conico subulato obliquo; perist. dentes breves maxime tenues rubri geminati in membrana brevi annulo magno obtecta positi.

Trichostomum tenue Hdw. Sp. Musc. p. 107. t. 24. — Brid. I. p. 491. — Br. Europ. Fasc. 18 — 20., p. 13. t. 2?

Patria. America septentrionalis ad fossarum margines. Specimina Br. Europ. ad Vicentiam Italiae lecta.

Planta mascula valde humilis simplicissima, inferne subnuda, apice densifolia; folia perigonia e basi ovata e cellulis tenerrimis inferne laxis pellucidis superne amoene

viridibus areolatâ subito fere breviter subulata obtusa, ad acumen minutissime reticulata, excurrentinervia, intima convolutacea. Antheridia magna curvula paraphysibus tenerrimis copiosis.

3. L. subulatum Hmp. (l. c.); *monoicum*; *antheridia ad basin perichaetii libera per paria approximata*, paraphysibus paucis teneris mixta; habitus *L. Capensis*; folia caulina lanceolato-subulata breviuscula stricta, superiora flexuosa, *omnino e cellulis firmis subquadratis parvis pellucidis areolata*, integerrima subcanaliculata, nervo latiusculo *pallido* subulam totam superam occupante; perichaetialia basi longiore vaginata longius areolata; theca in pedunculo stricto purpurascente erecta ovalis aurea, operculo conico brevi obliquo; perist. dentes in membrana breviter emersa tenuissimi capillares geminati inaequales haud nodosi subrugulosi.

Trichostomum subulatum Br. et Sch. Br. Europ. Fasc. 18 — 20. p. 17. t. 13. — *Didymodon subulatus* Bruch in De Notaris Syllab. Musc. p. 199. — *Did. aureus* De Not. l. c.

Patria. In pascuis Sardiniae centralis: Comba, Sicilia: Balsamo, Corsica: Lèveillé, in campis Tingitanis: Salzmänn.

4. L. Montagnei C. Müll.; *dioicum*; planta mascula ad perigonia terminalia pluries innovans igitur interrupte elongata; gregarie cespitosum, sterile humile simplicissimum gracillimum attenuatum flavidum, fertile elongatum ad perichaetia ramis pluribus saepe fertilibus divisum, obscure flavidum inferne nigrescens; folia caulina erecto-patentia firma substricta, e basi ovato-oblongâ lanceolato-subulata hyalino-acuta, ad subulam marginibus parum convolutis canaliculata, integerrima, omnino e cellulis minutissimis incrassatis flavidis basi ad marginem tenero-membranaceis areolata, nervo lato subulam superam totam occupante; perichaetialia longe convolutacea pauca, subito et breviter acuminata, intima inferne magis elongate areolata; theca in pedunculo stricto breviusculo purpurascente elliptica, operculo conico recto brevi;

perist. dentes in membrana brevissima longi filiformes rugulosi basi rubri superne pallescentes parce et remote nodosiusculi integri aequales.

Aschistodon conicus Mont. Ann. d. sc. nat. 1845. 4. p. 109.

Patria. Chile meridionalis: C. Gay.

Folia perigonialia lato-ovalia acuta, intima convoluta latiora tenuiora laxius areolata colorata breviter acuminata, omnia nervo excurrente angusto. Antheridia numerosa elongata curvata, paraphysibus aequalibus flavis.

c. *Folia secunda.*

α. *Elata.*

5. **L. flexicaule** Imp. (l. c.); *dioicum; dense cespi-
tosum tomentosum elatum dichotome ramosum flexicaule,
aureo-flavidum, inferne fuscum, ad perichaetium inno-
vationibus gracilibus apice longe comoso subfalcatis; folia
caulina secunda superne densiuscula longa lanceolato-
subulata acuta falcata, e basi marginibus conniventibus
canaliculata subtorta, nervo lato applanato concolore in
subulam excurrente, apice summo denticulata, inferne e
cellulis oblongis angustis firmis robustis incrassatis su-
perne minoribus areolata; perichaetialia vaginantia subito
flexuose longe loriformi-setacea, basi e cellulis ampliori-
bus elongatis ad nervum parietibus interruptis crassis fla-
vidis, ad marginem e cellulis minoribus tenuioribus ad
subulam minutis incrassatis ellipticis areolata, nervo su-
bulam totam superam occupante; theca firma in pedun-
culo elongato purpureo rigido torto stricto elliptica erecta
plus minus curva fuscescens, operculo arcte adhaerente
conico brevi recto rubro; perist. dentes in membrana bre-
viter emersa subliberi inaequales longi tenerrimi pallidi
rugulosi vix articulati fugacissimi.*

Trichost. flexicaule Br. Europ. Fasc. 18—20., p. 15. t. 11. —
Cynodontium flexicaule Schwägr. Suppl. I. p. 113. t. 29. — *Di-
dymodon flexicaulis* Brid. I. p. 506.

Patria. In apricis calcareis, praeprimis formationis jurassicae per edita alpina et subalpina totius fere Europae in America septentrionali. — *Majo et Junio.*

Pl. mascula gracilior, interdum cespites proprios efficiens, floribus terminalibus et innovando lateralibus crassiusculis gemmaceis. Folia perigonialia externa e basi ovatâ subulata, interna late ovata acuminata enervia minora. Paraphyses et antheridia parva.

6. **L. Hornschuchii** C. Müll.; *dioicum*; planta mascula gracillima, flore terminali unico ad perigonium gemmaceum semel innovans; laxe cespitosum elatum gracile flexuosum parce ramosum; folia caulina e basi *vaginata oblonga superne sinuato-rotundata subintegra subito canaliculate et flexuose subulata acuta integerrima, basi e cellulis elongatis densis firmis irregularibus plurimis prosenchymaticis* superne quadratis incrassatis areolata, nervo lato subulam superam totam occupante; perichaetialia latiora convolutacea longiora inferne laxius reticulata; theca in pedunculo crassiusculo *cygneo-flexuoso* ovalis pallida leviter plicata, operculo subulato recto; perist. dentes breves per paria approximati tenues apice pallidi.

Didymodon proscriptus Hsch. in Hor. Phys. Berol. p. 60. tab. 12. — Brid. I. p. 517.

Patria. Insula St. Helena: Hb. Willdenowii.

Folia perigonialia e basi maxime vaginante superne maxime sinuata flexuosa tenuiter sed minute areolatâ ut caulina sed tenuinervia, intima lageniformi - convoluta tenuius reticulata colorata capillaria vel brevi-acuminata, elongata. Antheridia paraphysibus tenerrimis brevioribus. — *L. flexicauli* ex habitu proximum.

7. **L. Hookeri** C. Müll.; *monoicum*; flos masculus in ramo infra perichaetium oriundo terminalis; dense cespitosum gracile erectum atrovirens subrigidum, apice subcuspidato virescente parum falcato subcompresso, breviter ramosum, flexuosum; folia caulina siccitate et madefacta erecto-patentia parum secunda rigida firma anguste lanceolata subulata falcata concava laevissima, summo apice parce denticulata, e cellulis superne minutissimis incrassatis ellipticis inferne longioribus tenuissimis areolata, angustinervia perichaetialia e basi vaginante

firma superne rotundata setacea, nervo subulam summo apice denticulatam totam occupante, inferne elongate et subaxe areolata pallide fuscescentia; theca in pedunculo elongato stricto purpurascente cylindrico-elliptica stricta, operculo brevi-conico; perist. dentes in membrana exserta subreticulata erecti ad basin usque fissiles nodosi rugulosi pallidi.

Didymodon longifolius Hook. et Wils. in schedulis.

Patria. Insula Eremitae ad Cap. Horn: J. Hooker.

Folia perigonialia e basi brevi lato-convoluta sensim subulata tenuiter et minute areolata colorata, nervo in subula evanescente vel excurrente, summo apice denticulata, intima breviora integerrima. Antheridia elongata paraphysibus flavis parum longioribus. — *L. flexicauli* ex habitu atque statura simile.

β. Pusilla.

8. *L. pallidum* Hmp. (l. c.); *monoicum*; flores masculi tenues ad perichaetii basin plures axillares gemmaeci; gregarie cespitosum humile simplex strictum flavesceus; folia caulina erecto-patentia vel parum falcato-secunda, e basi ovata *elongate laeve et tenuiter areolata lanceolato-subulata acuta canaliculata latiuscula*, superne denticulata, *ad subulam inferam angustissime elongate reticulata*, nervo *latissimo* totam subulam occupante; perichaetialia basi latiora *laxius* reticulata tenuiora; theca in pedunculo longissimo flavo *stricto torto* elliptica erecta, pallide nitens dein fusca, operculo conico brevi obliquo rubente; perist. dentes intense rubri longissimi capilliformes *geminati scaberrimi nodosiusculi* in membrana brevi positi.

Trichostom. pallidum Hdw. Stirp. Crypt. p. 71. t. 27. — Brid. l. p. 489. — Br. Europ. Fasc. 18 — 20. *Trichostomum*, p. 18. tab. 14. — *Trich. pallidum* β. *strictum* Schwägr. Suppl. II. l. p. 77. t. 123. — *Trich. strictum* Sw. Fl. Ind. Occ. III. p. 1781. — *Didymodon pallidum* W. et M. Bot. Taschb. p. 196. — *Didymodon pallidus* P. B. Prodr. p. 56. — *Bryum pallidum* Schreb. Spic. Fl. Lips. p. 80. — *Bryum acaulon heteromallum*, setis longis pallidis. Dill. Musc. p. 389. t. 49. f. 57.

Patria. In terra argillacea sylvarum totius Europae et Americae septentrionalis. — *Majo.*

Folia perigonialia ovato-lanceolata angustissime lanceolata tenuinervia, interna ovata acuminata enervia. Caetera congenerum.

9. **L. Boryanum** C. Müll.; *monoicum*; flores masculi tenues ad perichaetii basin plures axillares gemmacei; habitus perfecte *L. pallidi*; folia caulina subsecunda, e basi oblonga elongate angustissime firme et subincrassate areolatâ lanceolato-subulata obtusiuscula canaliculata angusta, summo apice denticulata, nervo latissimo totam subulam fere occupante; perichaetialia basi vaginante latiora tenuius membranacea pallidiora sed anguste elongate et incrassate reticulata, e reliquis caulinis simillima; theca in pedunculo longissimo flavo longe cylindrico-elliptica crassiuscula major erecta dein curvata fuscescens, operculo conico brevi obliquo obtuso; perist. dentes *L. pallidi*.

Trichostomum pallidum Brid. hb. — *Trich. difficile* Duby in Moritzi Verz. der Zollinger'sch. Pfl. p. 134.

Patria. Insula Bourbonis: Bory St. Vincent. Java: Zollinger Coll. No. 411. z.

Folia perigonialia pauca, externa lanceolata, interna e basi convolutacea colorata superne sinuata pro exiguitate folii latiusculo-subulata, nervo in subulam excurrente praedita, obtusa denticulata, tenuius rhomboideo-prosenchymatico-areolata. Antheridia pauca parva. — A *L. pallido* simillimo notis cursive impressis certe refugit. *L. affine* foliis crispatis jam distat.

10. **L. affine** C. Müll.; (Bot. Zeit. 1847. p. 825.); *monoicum*; flos masculus ad basin perichaetii gemmaceus; habitus *L. pallidi*; folia caulina sicca crispata e basi tenerrime membranacea convolutacea e cellulis parvis angustis confluentibus composita angustâ lineari-subulata obtusiuscula, apice denticulata, nervo latiusculo subulam totam superam occupante; perichaetialia basi vaginante latiore tenerrime membranacea inferne elongate angustissime superne incrassate et elliptico-reticulata; theca in

pedunculo elongato *flexuoso-stricto* pallido erecta cylindrica attenuata curviuscula, angusta dein fusca; perist. dentes in membrana breviter exserta ciliiformes rugulosi longi rubri *haud nodosi*.

Patria. Chile australis: Pöppig.

Folia perigonialia e basi latiuscula ventricoso-convoluta tenuius reticulata coloratâ breviter subulata obtusa integerrima. — A *L. pallido* simillimo notis cursive impressis certè distat.

11. *L. Capense* C. Müll.; *monoicum*; flos masculus infra perichactium axillaris; habitus *L. affinis*; folia caulina crispa lineari-subulata *acuta* apice obsolete denticulata, *madefacta valde flexuosa*, omnino minute et incrassate areolata, nervo subangusto concolore supremam subulam occupante; perichactialia latiora tenerrime membranacea vaginantia; elongate angustissime et tenerrime areolata; theca in pedunculo *brevi* stricto pallido erecta elliptica pallide nitida, dein fusco-nitens *cernua parva*, operculo conico brevi obliquo; perist. dentes *breves tenuissimi scaberrimi* haud nodosi in membrana brevi immersa inaequaliter geminati.

Didymodon longifolius et *Trichost. longifolium* herb. nonnull., non Brid.

Patria. Prom. b. spei, in locis humidis ad cataractam Montis Tabularis orientalis et in fissura loci „Van Kamps-Bay”: Ecklon; Port Natal: Guerinzius.

Folia perigonialia e basi convoluta tenera pellucida colorata brevia acuminata obsoletinervia flexuosa vel reflexa integra obtusiusculo-acuta. Antheridia pauca parva purpurea. — A *L. pallido* et *affini* notis cursive impressis longe refugit.

12. *L. homomallum* Imp. (l. c.); *dioicum*; *laxe cespitosum humile ramosum gracillimum viride*, apice *subfulcatum*; folia caulina *homomalla lanceolato-capillaria acuta integerrima angusta nitida*, nervo latiusculo concolore canaliculato excurrente, omnino *breviter angustissime et firme areolata*; perichactialia longe vaginantia

subito et falcato-capillaria longius sed firme reticulata; theca in pedunculo stricto longiusculo purpureo erecta elliptica pallida, dein brunnea, parva, operculo conico brevi obliquo; perist. dentes in membrana brevi immersa geminati saepe conglutinati dein irregulariter fissi vix articulati rugulosi tenuissimi breves ferruginei.

Trichost. homomallum Br. et Sch. Fasc. 18—20. p. 16. t. 12. — *Didymodon homomallus* Hdw. Sp. Musc. p. 105. t. 23. — Brid. I. p. 510. — *Grimmia homomalla* Sm. Fl. Brit III. p. 1194. — *Did. heteromallus* Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 68. t. 20. — *Weisia heteromalla* Hdw. Stirp. Crypt. I. p. 22. t. 8. — Brid. I. p. 361. — *Grimmia heteromalla* W. et M. Bot. Taschb. p. 137. — *Afzelia heteromalla* Ehrh. Pl. Crypt. Exs. n. 173.

Patria. In locis argilloso-arenariis, ad viarum latera, muros, in terra sylvatica etc. per totam Europam montanam. — *Auctumno et primo vere.*

Pl. mascula gracilior dichotome ramosa; flores innovationes terminantes; folia perigonialia lanceolato-capillaria tenuinervia.

13. L. tortile Hmp. (l. c.); *dioicum*; gregarie caespitosum humile gracillimum basi divisum, laete viride; folia caulina erecto-patentia subsecunda lanceolato-subulata apice obsolete denticulata, nervo teretiusculo crasso flavido excurrente subcanaliculato, omnino minute firme areolata, margine paullo reflexa; perichaetialia vaginantia inferne laxius et longius reticulata, superne subito fere subulata reflexiuscula; theca in pedunculo stricto mediocri purpurascente erecta cylindrica pallida, operculo conico breviusculo obliquo; perist. dentes subtorti elongati capillares aequales geminati vix nodosi rugulosi purpurei, in membrana emersa positi.

Trichost. tortile Schrad. Syst. Samml. Crypt. Gew. No. 49. — Br. Europ. Fasc. 18—20. p. 14. t. 10. — Brid. I. p. 488. — *Didymodon tortilis* W. Arn. Disp. meth. p. 37. — *Dicranum tortile* W. et M. Bot. Taschb. p. 198. t. 7. f. 12. 13.

β. pusillum; caule simplicissimo vel subramoso, foliis patentibus vel homomallis, brevioribus; theca oblongo-ovalis, dentes perist. breviores. Br. Europ. l. c. p. 14. — *Trichost. pusillum* Hdw. Musc. Frond. I. p. 78. t. 28. f. 2. 4. 9. 10. —

Trich. vaginans Sulliv. in Musc. Allegh. No. 176. — *Didymod. pusillus* Hdw. Sp. Musc. p. 104. — Brid. I. p. 509. — *Barbula curta* Hdw. Musc. Frond. III. p. 75. t. 31. — *Tortula curta* Sw. Musc. Suec. p. 41. — *Desmatodon curtus* Brid. I. p. 526.

Patria. In argillosis per Europam totam fere et Americam septentrionalem. Var. β . praeprimis in arenosis humidis. — Ab auctumno per hyemem thecas maturas ferens.

Pl. mascula tenuior; flores terminales, interdum 2—3 aggregati; folia perigonialia externa e basi lata anguste lanceolata, interna ovato-acuminata, nervosa. Antheridia parva pauca paraphysibus parce cincta. — A *L. homallo* notis cursive impressis distat.

Gen. VIII. **Lophiodon** Hook. et Wils.

Lond. Journ. of bot. 1844. p. 543.

Nomen a graeca voce *λοφίον* parva crista et *ὀδούς* dens, ob peristomium breve conditum.

Calyptra cucullata. Peristomium simplex: dentes 16 pyramidati, per paria approximati, conniventes siccitate erecti breves apice attenuati. Inflorescentia dioica.

Habitus *Blindiae*; retis cellulae *Angströmiarum*, firmae in membranam crassam firmam connatae, angustissimae subparvae.

1. *L. strictus* cor. (l. c.); compactus prostratus longiusculus gracilis valde ramosus nigrescens, apice lutescens; folia caulina erecto-patentia rigidissima subsecunda stricta, e basi lanceolata concava margine hyalinâ lineari-subulata, nervo lato continuo, apice denticulato obtuso paulo latiore; perichaetialia majora vaginantia intima convolutacea firma acuta integra; theca in pedunculo rigido breviusculo purpureo plus minus curvato erecta ovato-cylindracea parva basi rotundata badia laevis nitida, operculo conico-subulato recto paulo longiori; calyptra theca longior fusca.

Patria. Insulae Aucklandi et Campbelli: J. Hooker.

Pl. mascula longior cacterum femineae simillima, floribus pluribus terminalibus noduloso-gemmaceis. Folia perigonialia externa caulinis similia loriformi-subulata veluti truncato-obtusa denticulata, intima multo minora tenuiora convolutacea ovata integerrima obsoletinervia, e cellulis parvis ampliusculis tenuibus parum flexuosis areolata aurea. Antheridia elongata hyalina dein fusca clavata inferne angustata substipitata, paraphysibus numerosis tenuibus aureis saepe tortilibus mixta.

Gen. IX. **Tremátodon** Rich.

in Fl. Am. Bor. Mich. II. p. 289. — *Dicranum* Hdw. — *Cynodontium* P. B. — *Bryum* et *Mnium* nonnull.

Nomen a *τρῆμα* *foramen* et *ὀδοῦς* *dens*, ob dentes cruribus cohaerentibus parum secedentibus veluti perforatos ductum.

Calyptra cucullata. Peristomium nullum vel simplex: dentes 16 *basi connati* erecti lanceolati trabeculati *strigillosi* granulati purpurei *fissiles*, *cruribus plus minus secedentibus*, *igitur veluti perforati*. Inflorescentia monoica. Theca annulata, ad collum stomatiis praedita.

Habitus e theca collo elongato praedita speciosissimus et maxime naturalis. Plantae gregariae vel cespites parvos efficientes.

a. *Peristomium nullum.*

1. **Tr. paradoxus** Hsch. (Linn. XV. p. 122.); flos masculus in ramo basilari gracillimo inferne subnudo apice autem comoso capituliformi-gemmaceus; subhumilis ramis pluribus basilaribus; folia caulina sicca crispata, e basi oblonga laxissime et maxime pellucide areolatâ angustata apice ligulato-obtusa, integerrima, superne minutius sed laxissime reticulata, canaliculata, nervo tenui flavo evanido; perichaetialia basi latiora; theca in pedunculo subbrevis pallido erecta, e collo brevi ventricosa clavaeformis fuscescens, operculo oblique subulato.

Patria. Prom. bonae spei, ubi in fissuris humidis umbrosis Montis Tabularis legit Ecklon. — *Novbr.*

Folia perigonialia externa basi convolutacea e reliquis caulinis simillima, intima multo breviora, superne lanceolato-acuta. Paraphyses et antheridia pauca. — Nulla alia specie confundi potest. Folia funarioideo-areolata.

b. *Peristomium indivisum.*

2. Tr. brevicollis Hsch. (Regensb. bot. Zeit. 1819. p. 88.); flos masculus in ramo brevi terminalis; humillimus, fragilis, ramis basi subnudis; folia dense imbricata rigida stricta, caulina ovato-lanceolata, superiora majora, concava, nervo depresso angusto evanido, integerrima, subparva sed laxe areolata; perichactialia longiora magis amplexantia majora; theca in pedunculo brevi stricto flavo erecta, e collo brevi haud ventricosus sed aequali claviformis leniter incurva fuscescens, operculo longe et oblique subulato; perist. dentes breves pallide aurantiaci vel intense purpurei lanceolati integri sed fissura media plus minus distincta exarati.

Br. Europ. *Trematodon*. p. 5. t. 1. — Brid. I. p. 385. — *Tremat. ambiguus* β . *brevicollis* Schwägr. Suppl. II. p. 69.

Patria. In summis alpium cacuminibus: Tirolis in Tauschnitzer Alpe: Hornschuch; in alpibus Valesiacis: Schleicher; in summo Faulhorn altitud. 7800': Mühlenbeck, W. P. Schimper. — *Aug., Septbr.*

Folia perigonialia minuta, externa ovato-acuminata, interna convolutaceo-acuminata, omnia nervosa. Antheridia parva, paraphysibus tenerrimis mixta. — E rarissimis.

c. *Peristomium fissile.*

3. Tr. ambiguus Hsch. (Regensb. bot. Zeit. 1819. p. 88.); flos masculus in ramo basilari longiusculo terminalis, primum ad basin perichactii; elatiusculus ramosus; folia caulina erecto-patentia vel patula apice incurva vel flexuosa, e basi ovata laxe areolata subito fere setacea acutiuscula subintegerrima, margine haud reflexa,

parum canaliculata, nervo tenui partem subulae totam superam occupante; perichaetia multa majora, e basi lata plana tenerrima laxissime areolata sensim et breviter subulata stricta, nervo caulinorum; theca in pedunculo elongato substricto flavo erecta, e collo sublongo arcuato crassiusculo ventricoso oblonga crassa fusca, operculo oblique subulato; perist. dentes longi angusti irregulariter 2 — 3 fissi purpurei tenuiter trabeculati.

Br. Europ. *Trematodon*; p. 5. t. 2. — *Trem. vulgaris* Brid. I. p. 386. — *Dicranum ambiguum* Hdw. Musc. Frond. III. p. 87. tab. 36. — *Mnium setaceum* L. Sp. Pl. p. 1576?

Patria. In locis humidis vel uliginosis e planitie usque sed raro ad alpes totius Europae ascendens, passim. — *Junio*, in *alpibus Septembri*.

Folia perigonialia parva, intima convolutacea breviter acuminata subnervia.

4. **Tr. longicollis** Rich. (in Mich. Fl. Am. Bor. II. p. 289.); flos masculus *gemmaceus ad basin plantae femineae brevissimus*; simplex; folia caulina erecto-patula, sicca et madefacta flexuosa, e basi orali amplexante latiuscula laxae areolatae setacea canaliculata, apicem versus denticulata minute areolata, acutiuscula, nervo angusto subexcurrente; perichaetia basi tenuiora apice obtusiora; theca in pedunculo elongato erecto subtorto flavo erecta, e collo elongato basi ventricoso angustissimo arcuato oblongo-cylindrica fusca nitida, operculo oblique subulato; perist. dentes erecti conniventes intense purpurei longi usque ad apicem fissi, sed cruribus cohaerentibus nodoso-trabeculatis striatis inaequaliter latis.

Brid. I. p. 388. — *Dicranum longicollum* ej. Sp. Musc. I. p. 203. — *Cynontodium trematodum* P. B. Prodr. p. 52.

Patria. America septentrionalis, in arenosis humiculis Alabamae, Georgiae et Carolinarum.

Folia perigonialia valde convoluta colorata, e reliquis caulinis similia.

5. **Tr. acutus** C. Müll.; flos masculus in ramo basilari brevi; habitus *Tr. reflexi*; folia caulina crispatis-

sima, e basi oblongâ dense minute et quadrato-areolatâ linearî-setacea acutissima, margine parum reflexa, canaliculata, superne minutissime quadrato et incrassato-areolata, nervo latiusculo excurrente, subintegerrima; perichaetialia longiora, apice parum denticulata, basi longiore elongate anguste tenuiter pellucide et multo laxius areolata; theca in pedunculo elongato flavo tenuissimo flexuoso erecta, e collo tenuissimo elongato ventricosus arcuato cylindracea valde angusta pallide fusca, operculo oblique subulato; perist. dentes *Tr. longicollis*, sed angustissimi.

Tr. longicollis β . *crispatissimus* Hsch. Nov. Act. Leop. XIV. II. Suppl. p. 702?

Patria. Java: Hb. Miquelianum.

A *Tr. longicollis* proximo notis cursive impressis distat. — Folia perigonialia externa caulinis similia, intima convolutacea laxè areolata. Antheridia numerosa paraphysibus tenerrimis multo brevioribus mixta.

6. ***Tr. paucifolius*** C. Müll.; flos masculus in ramulo basilari brevi terminalis; simplex humillimus gregarius; folia caulina pauca sicca et madefacta substricta vel parum falcata breviter oblongo-acuminata obtusiuscula valde canaliculata ad apicem denticulata viridissima, nervo angusto excurrente, basi dense longiuscule minute quadrato superne minutissime non autem incrassate sed mollior areolata, margine non reflexa; perichaetialia stricta majora parum laxius areolata; theca in pedunculo longiusculo tenuissimo curvato ventricosus ovalis minuta pallide fusca, operculo oblique subulato; peristomium *Tr. acuti*.

Trematod. longicollis Dub. in Zollinger Coll. No. 1943.

Patria. Java: Zollinger.

Folia perigonialia externa caulinis similia, intima convoluta basi laxius areolata colorata, caetera ut in *Tr. acuto*. — *Tr. ambiguus* ex habitu proximum.

7. ***Tr. reflexus*** C. Müll.; flos masculus in ramulo basilari brevi terminalis; laxè cespitosus simplex raro basi

ramosus; folia caulina e basi *oblonga anguste elongate et dense areolatâ valde canaliculato-angustata* sicca et maderfacta valde crispata vel flexuosa, *marginè valde reflexa* latiora, *apice ligulato-obtuso denticulato*, nervo tenui evanido praedita, superne minutissime areolata; perichaetialia strictiora, e reliquis caulinis simillima; theca in pedunculo sublongo strictiusculo flavo erecta, e collo elongato basi ventricosso angustissimo arcuato *pyriformi-oralis* pallide fusca, operculo oblique subulato; perist. dentes *Tr. longicollis*, sed pallidiores, magis incurvi et saepe trifidi.

Tr. affinis Br. et Sch. in Bryol. Europ. Fasc. 29—39. *Trematodon* p. 4 memoratus? — *Tr. longicollis* hb. nonnull.

Patria. Brasilia: ab Hagendorf.

Folia perigonialia caulinis similia. Antheridia et paraphyses *Tr. longicollis*, a quo notis cursive impressis certe distat.

Species nomine tantum notae.

8. *Tr. divaricatus* Br. et Sch. (in Br. Europ. *Trematodon*; p. 4. memoratus.); *Tr. ambiguo* proximus, sed tenuius, foliis angustioribus et dentibus perfecte bifidis, remote articulatis differt.

Patria. Prom. b. spei: Krauss.

9. *Tr. brachypus* Mont. (l. c. memoratus).

Patria. Brasilia.

Gen. X. *Symblépharis* Mont.

Ann. d. sc. nat. 1837. VIII. p. 252.

E verbis graecis συν cum, geminatus et βλεφαρίς palpebrae, ob dentes geminatos nomen compositum.

Calyptra *dimidiata* angusta cylindrico-subulata basi angustissime lissa. Peristomium simplex: dentes 16 per paria approximati infra orificium oriundi ad basin infimam subconnexi lanceolati usque ad

basin trabeculatam bifidi, sed cruribus cohaerentibus rugulosis nodosis in conum conniventibus. Inflorescentia monoica.

Habitus *Angströmiis heteromallis* foliis squarroso-reflexis similis. Peristomium *Holomitrii*.

1. **S. helicophylla** Mont. (l. c.); laxe cespitosa parce et breviter ramosa flavescens; folia caulina e basi valde vaginante superne latiore sinuato-flexuosa e cellulis elongatis ampliusculis areolatâ reflexa valde crispato-involuta, in subulam incrassato-quadrata areolatam canaliculatam apice denticulatam producta, nervo angusto excurrente apice dorso scabro; perichaetia longius vaginantia; thecae innovando laterales in pedunculis saepe geminatis brevibus flavidis tenuissimis erectae angustissime cylindricae elongatae estriatae fuscescentes exannulatae.

Patria. Mexico in prov. Oaxaca: Andrieux; in cavernis aluminatis ad pedem montis Cerro de los Nebejos: C. Ehrenberg.

Flos masc. tenuis axillaris compressus, e foliis perigonalibus paucis lato-convolutaceis brevi-acuminatis integris haud coloratis tenuissime nervosis constructus; artheridia pauca elongata, paraphysibus subnullis.

Leptotrichaceae?

1. **Didymodon?** **Tortula** Harv. (Lond. Journ. of bot. 1840. II. p. 4; c. ic. in Hook. Ic. Pl. Rar. tab. 18.); erectus elatus dichotomus robustus; folia subsecunda ovato-lanceolata serrata, marginibus reflexis, siccitate crispatis contortis, theca oblonga erecta breviter pedunculata; perist. dentes basi subconnati longissimi filiformes subtorquati. †.

Patria. Nepal: Wallich.

Barbulae similis, foliatione autem habituque *Didymodonti* vel *Trichostomo* (quo sensu?) magis affinis: *Auctor.*

2. **Did. vaginatus** Hook. (l. c. p. 5. c. ic. l. c.); erectus elatus valde ramosus robustus; folia subulata falcato-secunda, siccitate crispata involuta vaginata, vagina latissima oblonga; theca breviter pedunculata erecta cylindracea, operculo rostrato obliquo; perist. dentes paria approximati elongati basi connati. †.

Patria. Nepal: Wallich.

Symblephari ex ic. similis.

3. **D. cirrhifolius** Harv. (l. c. c. ic. l. c.); erectus elatus ramosus robustus; folia longissima subulata flexuosa patentia, siccitate crispata, basi ovata vaginante; theca breviuscule pedunculata erecta oblonga, operculo conico-acuminato; perist. dentes tenuissimi tortiles. †.

Patria. Nepal: Wallich.

Didymod. capillaceo (sensu antiquorum!) proximus, sed differt foliis siccitate magis crispatis: *Auctor.*

4. **Did. calyptratus** Tayl. (Lond. Journ. of bot. 1848. p. 188.); uncialis, cespitosus erectus subsimplex, partibus junioribus glauco-viridibus; folia laxè imbricata erecto-patentia incurva linearia acuta, siccitate torta integerrima, basi margine inflexa; theca tenella ovato-cylindrica basi subplicata, siccitate rugosa, operculo longirostro; perist. dentes filiformes linea media opaca exarati angusti; calyptra linearis thecam duplo superans torta. †.

Patria. In Andium Quitensium monte alpino Pichincha: W. Jameson, Dec. 1846.

Ex habitu *Weisiae tenuirostri* Hook. et Tayl. *), quae *Didymodon* videtur, affinis, sed calyptra memorabiliter longa differt. — E descriptione *Leptotrichum* videtur.

5. **Did. polycephalus** Mont. (Ann. d. sc. nat. 1845. p. 108.); *dioicus*; cespitosus erectus filiformis innovando ramosus, folia undique imbricata, e basi ovatâ lanceolato-subulata stricta, nervo lato continuo, summo apice

*) Quo loco descriptae? nobis ignotae.

acuto canescentia integerrima, perichaetia acuminato-cuspidata convoluta; theca cylindracca tandem falciformi-attenuata. Caetera desiderantur.

Patria. Chile australis ad terram arenosam: C. Gay.

Pilopogo gracili simile, sed differt foliis brevissime piliferis et perichaetialibus duplo longioribus: *Auctor.* Species valde obscura.

6. *Did. tenellus* Hdw. Fil. (in hb. Candoll. et Brid. I. p. 821.); caule simplicissimo, foliis ovato-subulatis appressis inflexiusculis, theca urceolata brevi. †.

Patria ignota. Hb. Candoll.

Species suspectissima.

II. *Folia papillosa.*

Trib. XVIII. BARTRAMIOIDEAE.

Cespitosae plus minus elatae, pusillae et elatae, graciles v. robustae, polymorpha-ramosae, acrocarpicae. Folia lanceolata, ovata, subulata, carinata v. planiuscula, stricta v. reflexa, nervis teretibus percursa. Retis cellulae parenchymaticae, in pagina saepe utraque ad parietes transversales, nonnullis speciebus exclusis, papillis solitariis instructae, plerumque quadratae s. plus minus hexagonae, laxae, laxiusculae et densae raro chlorophyllosae vel utriculo primordiali instructae, raro incrassatae. Theca longicollis funarioidea pyriformis vel sphaerica regularis et asymmetrica, recta et polymorpha-inclinata, laevis et sulcata, operculo plerumque hemisphaerico seu conico, rarissime rostellato. Archegonia et antheridia normalia, paraphyses, ut in *Funarioideis*, clavato-articulatae vel acutae.

Funarioideis partim affines, partim habitum maxime proprium tenentes.

Patria. Per orbem totum terrarum, plerumque locorum uliginosorum amantes. 24.

Subtrib. I. M E E S E A C E A E.

Habitus funarioideus *Amblyodontis*. Arcolatio foliorum partim laxa laevis, utriculi primordialis saepe expers (*Meesea*), partim laxa et densa papillosa (*Paludella*). Theca erecta elongata collo plus minus elongato praedita, igitur plus minus pyriformis, laevis, collo stomatiis praedita. Antheridia tribus. Paraphyses clavatae. Inflorescentia gemmacea v. discoidea.

Patria. Paludum incolae, zonam borealem solam fere praeferentes. 24.

Meeseaceas cum *Bartramiaceis* conjungentes, rationem am. Hampe sequimur. Habitus quidem theca longicolla alienus fit, eandem formam tamen theca *B. longicollis* inclinata pariter offert. Arcolationem quoque laxam laevem *Meesearum* haec species Javanica memorabilis ostendit; *Paludella* denique, ut *Bartramia* peristomii *Bryi* expers et *Meeseacea* vera, rete folii *Bartramiarum* totum papillosum possidet, ut, tribum utramque conjungentes, ob causas hasce rationem nostram justificatam habeamus.

Gen. I. **Meesea** Hdw.

Fund. Musc. II. p. 97. t. 9. f. 56. 57. sub nomine *Meesiae*. — *Amblyodon* P. B. — *Diplocomium* Brid. — *Bryum* et *Mnium* Linn. et al.

In memoriam hortulani botanici *Meese* Batavi nomen conditum.

Calyptra dimidiata. Peristomium duplex. Externum: dentes 16 brevissimi lati obtusi linea media exarati vel fissiles. Internum: membrana brevis, in dentes 16 linea media exaratos vel fissos et pertusos cartilagineos producta; dentes ciliis plus

minus perfectis plerumque irregulariter cohaerentibus appendiculiformibus interpositis saepe cohaerentes. Inflorescentia hermaphrodita, monoica v. dioica. Arcolatio foliorum laxa monomorpha.

Habitus funarioideus et proprius, *Amblyodonti* similis, sed foliis ubique parenchymatico-areolatis distat.

1. **M. uliginosa** Hedw. (Musc. Frond. I. p. 1. t. 1. 2.); *floribus hermaphroditis et monoicis in eadem planta; humilis dense cespitosa innovans; folia caulina anguste ligulata obtusa integerrima, inferne e cellulis elongatis laxissimis angustis superne minutis quadratis areolata, nervo basi latissimo superne sensim angustato sub apice evanido, canaliculato - concava; perichactialia longiora, omnia margine subrevoluta; theca annulo simplici praedita longe pedunculata, e collo brevi recto recurvo-pyriformis, operculo conico obtusiusculo; perist. dentes M. hexagonae, sed ciliis internis minus perfectis.*

Br. Europ. Fasc. X. p. 5. t. 1. — Brid. II. p. 60. — *Amblyodon uliginosus* P. B. Prodr. p. 41. — *Webera trichodes* Hdw. Fund. Musc. II. p. 95. — *Mnium uliginosum* Gmel. Syst. Nat. p. 1329. — *Bryum trichodes aureum*, capsulis incurvis obtusis in setis longis. Dill. Musc. p. 389. t. 49. f. 58.

β . *alpina*; foliis strictis undique patentibus vel subhomomallis acutioribus, capsula brevior. Br. Europ. l. c. — *M. alpina* Fk. Bot. Zeit. 1825. p. 274. — *M. stricta* et *angustifolia* Brid. II. p. 61 et 62.

γ . *minor*; humilis, foliis erectis brevioribus muticis, capsula perbrevis crassiuscula in pedicello brevi. Br. Europ. l. c. — *M. minor* Brid. II. p. 62.

Patria. In uliginosis rupibusque irriguis, e planitiibus usque in alpina edita ascendens, per Europam totam et Americam septentrionalem atque arcticam. Var. β . et γ . in alpibus. — *Junio, in alpibus Julio et Augusto.*

Flos masc. gemmaceus, foliis perigonialibus ovato-lanceolatis obtusis; paraphyses et antheridia pauca.

2. **M. longiseta** Hdw. (Musc. Frond. I. p. 36. t. 21 et 22.); *hermaphrodita; late et laxe cespitosa, elongata*

gracilis tomentosa innovans; folia caulina erecto-patentia siccitate tortilia ovato-lanceolata acutiuscula carinato-concava, margine *integerrima* reflexiuscula, basi laxe superne incrassata et densius reticulata, nervo crasso sub apice evanido; perichaetia longius acuminata, intima minuta lanceolata dense areolata; theca longissime pedunculata e collo erecto arcuato-pyriformis fusca, *annulo simplici* et operculo conico brevi acuto; perist. *M. tristichae*.

Br. Europ. Fasc. X. p. 6. t. 2. — *Diplocomium longisetum* Moug. et Nestl. Stirp. Vogeso-Rhen. Crypt. Fasc. IV. No. 327. — Brid. II. p. 66. ex parte. — Synonyma caetera incerta, quum planta cum *M. tristicha* simili persaepe commutata sit.

Patria. Per Europam mediam et borealem e planitie usque in editiora ascendens, loca profunde turfosa habitans. — *Julio.*

Antheridia pauca longe clavata violacea.

3. *M. hexagona* Albertini (in Brid. II. p. 68.); *monoica*; habitus *M. longisetae*; sed folia caulina *magis lanceolata*, margine *valde* reflexa; theca *exannulata* brevior crassior; perist. dentes externi *brevissimi*, interni *breviores stricti remote articulati* in crura duo cohaerentia ad latera subglabera *haud rotundato-articulata* divisi rufi, ciliis duobus *fugacissimis fragilissimis pallide flavidis articulatis interpositis*.

Meesia Albertinii Br. Europ. Fasc. X. p. 7. t. 3. — *Diplocomium hexastichum* Fk. Moostaschb. p. 43. t. 27. — Brid. II. p. 68.

Patria. Germania, in turfosis prope Neodamum Neomarchiae Borussicae: Itzigsohn; Silesia: Albertini primus legit; Franconia prope Ratisbonam: Emmerich; prope Karlsruhe: A. Braun. E rarissimis! — *Julio.*

Flos masculus longe infra perichaetium in ramulo proprio subdiscoideus, antheridiis et paraphysibus numerosis. Folia perigonialia *M. tristichae*, sed *magis acuminata et haud incrassate sed pellucide areolata*.

4. *M. tristicha* Br. et Sch. (Br. Europ. Fasc. X. *Meesia*, p. 8. t. 4.); *dioica*; late et laxe cespitosa, clon-

gata innovans radiculosa; folia caulina *tristicha squarrosopatula*, e basi lata *luxissime areolata decurrente semiamplexicauli reflexa*, *plicato-carinato-concava lanceolata s. cuspidata*, flexuosa, margine plano *argute denticulata*, superne laxe sed minutius reticulata, nervo subexcurrente; perichaetia longiora angustiora, nervo lato cuspidem longam totam occupante; theca *exannulata* in pedunculo longissimo, e collo basi subventricosso erecto curvata, irregulariter pyriformis fusca, operculo conico acuto brevi; perist. dentes externi breves obtusi medio fissi *secedentes*, interni longissimi medio linea exarati pertusi, margine grosse crenati veluti articulati, appendicibus articulatis pallidis irregularibus praediti fusci cartilaginei.

Diplocomium tristichum Fk. Moostaschb. p. 43. t. 27. — *Dipl. longisetum* Brid. II. p. 66. ex parte. — *Mnium triquetrum* L. Sp. Pl. p. 1578. ex Ångström Summ. Veget. p. 89.

Patria. Per Germaniam, Helvetiam et Scandinaviam in turfosis profundis raro. — *Julio.*

Flos masc. discoideus terminalis. Folia perigonialia latissime ovata acuminata subexcurrentinervia, margine subcrenulata, superne dense areolata. Paraphyses et antheridia copiosissima.

5. *M. vagans* C. Müll.; caulis vage ramosus erectus elongatus; folia laxe imbricata, comalia subsecunda, patentia latiusculo-ovato-lanceolata, apiculata, nervo tenui ante apicem evanido praedita, flavescentia, e basi usque fere ad apicem e cellulis longissimis angustissimis marginata, remote denticulata, e cellulis elongatis superne paullo minoribus laxissimis pellucidis composita.

Bryum vagans Hook. et Wils. Lond. Journ. of bot. 1844. p. 546.

Patria. Insula Eremitae ad Cap. Horn: J. Hooker.

Ex areolatione foliorum *Meesea* vera, nunquam *Bryum* et species pulcherrima.

Gen. II. **Paludella** Ehrh.

Phytophylac. No. 96. — *Bryum* L. Hedw. — *Mnium* L. Wahlenb. — *Hypnum* Web. et M. — *Orthopyxis* P. B.

E voce *palus* nomen conditum, quum species unica hucusque detecta in paludibus profundis habitet.

Calyptra dimidiata. Peristomium duplex *Pohliae*. Inflorescentia dioica. Areolatio foliorum dimorpha, laxa et densa.

Genus maxime memorabile, *Meeseaceas* cum *Bartramiaceis* conjungens, quum areolatione et forma reflexa foliorum *Bartramiarum*, praesertim sectionis *Plicatellae*, thecam *Meesearum* teneat.

1. **P. squarrosa** Brid. (Mant. Musc. p. 115. t. 2. f. 13.); dioica; elongata subsimplex tomentosa profunde cespitosa; folia caulina laxè imbricata maxime squarrosa, e basi decurrente carinato-vaginata laxè areolata superne maxime dilatata subito maxime reflexa late carinato-lanceolata, margine recurvo eroso-denticulata, nervo crassiusculo carinato evanido dorsi apice scabro, e cellulis minutis pellucidis quadratis versus apicem sensim densioribus ad paginam folii superiorem minute et creberrime papillosis areolata; perichaetialia sensim magis comosa erecta longius acuminata apice recurva; theca annulata in pedunculo elongato recto tenui brevicolla ovali-oblonga parum inclinata laevis, basi stomatiis praedita, operculo conico-obtuso mammillari.

Brid. II. p. 1. — Br. Europ. Fasc. X. p. 3. t. 1. — *Bryum squarrosum* Linn. Sp. Pl. II. p. 1585. Hdw. Sp. Musc. p. 166. t. 44. f. 6 — 11. — *Mnium squarrosum* Linn. fil. Meth. Musc. p. 364. — *Orthopyxis squarrosa* P. B. Prodr. p. 79. — *Hypnum Paludella* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 274.

Patria. In paludibus profundis Germaniae septentrionalis, Saxoniae, Silesiae, Helvetiae, Rossiae, totius Scandinaviae et Labradoris. In promontorio bonae spei specimina legit Berg, quae cum Europaeis omnino conveniunt. — *Aestate.*

Pl. mascula femineae similis, paulum gracilior, flore discoideo. Folia perigonialia latissime obovato-lanceolata, laxius areolata, apice obsolete denticulata nervosa. Antheridia parva, paraphysibus clavatis numerosis mixta.

Subtrib. II. BARTRAMIACEAE.

Habitus proprius. Areolatio foliorum laxa laevis, laxa papillosa, densa laevis et densa papillosa. Theca erecta v. inclinata, horizontalis et pendula, regularis v. asymmetrica, laevis v. sulcata, *plus minus autem sphaerica, stomatiis carens.* Antheridia tribus. Paraphyses clavatae et acutae. Inflorescentia gemmacea v. discoidea.

Patria. Per totum orbem terrarum, regionum omnium, e planitiebus usque ad nives aeternas, incolae, locis omnibus, uliginosis v. apricis, contentae. 24.

Gen. III. **Cónostomum** Sw.

Schrad. Neu Bot. Journ. I. III. p. 14. — *Bartramia* Brid. et Br. Europ. — *Grimmia* Sm. — *Weisia* Hdw. — *Bryum* al.

Nomen graecae originis, a κώνος *conus* et στόμα, ob peristomii dentes constanter in conum conniventes ductum.

Calyptra dimidiata. Peristomium simplex: dentes 16 lanceolati sicci et madefacti erecti dense et nodoso-trabeculati, linea media exarati, apice per paria coaliti et in conum clausum obliquum connati, basi spatio aequali infra orificium oriundi. Habitus bartramioideus.

1. **C. boreale** Sw. (Schrad. Neu Bot. Journ. I. 3. p. 24. t. 5.); *dioicum*; compactum *gracile* erectum, ramis *filiformibus* attenuatis pentagonis subfasciculatis *glaucescentibus fragilibus*; folia dense conferta pentasticha, *lato-lanceolata mucronata brevia*, carinato-concava, *marginem serrulata*, *undique e cellulis minutis ampliusculis irregulariter hexagonis papillis subcarentibus pellucidis areolata*, nervo latiusculo obscuro *evanido v. excurrente*, *dorso scabriusculo*; perichaetia multa longiora, elongate laxae areolata tenuiora; theca in pedunculo elongato erecto apice subventricosso subito obovato-globosa gibbosa, dein sulcata, luteo-fusca, operculo conico rostrato obliquo.

Brid. I. p. 150. — *C. arcticum* Sw. in Brid. Sp. Musc. I. p. 127. — *Bartramia conostoma* Br. Europ. Fasc. XII. p. 16. t. 7. — *Grimmia conostoma* Sm. Fl. Brit. p. 1169. — *Bryum tetragonum* Dicks. Fasc. Crypt. II. p. 8. t. 4. f. 9.

Patria. In summis jugis alpium Helvetiae, Tirolis, Carinthiae raro, Scandinaviae, Lapponiae et Scotiae frequenter, in America et Asia septentrionalis v. arctica, loca uliginosa praeferebat. — *Aestate.*

Pl. mascula fertili similis, flore discoideo, foliis perigonalibus externis ovato-acuminatis imbricatis, internis e basi lato ovata concava erectis patentibus obsolete denticulatis tenuinervibus firmis laevibus. Antheridia magna clavata, paraphysibus longioribus, longe articulatis obtusis subclavatis pallide luteis.

2. C. australe Sw. (l. c. p. 134. t. 1. f. 3.); *dioicum*; compactum robustius erectum, ramis crassiusculis attenuatis subcuspidatis pentagonis subfasciculatis glaucescentibus dein luteis flaccidioribus; folia dense conferta pentasticha, majora, anguste lanceolata, nervo lato obscuro in cuspidem longam acutissimam saepe apice piliferam producta, stricta, ubique e cellulis elongatis angustis, basi tenerioribus laxioribus superne densis flexuosis areolata, superne margine erecto et dorso papillis creberrimis scaberrime serrulata, inferne laevia; perichaeitalia multo robustiora laxius reticulata denticulata laevia; theca in pedunculo elongato erecto subito subquadrate globosa ampla cernua brevis, sublucida, operculo longirostrato.

Brid. I. p. 152. — Schwägr. Suppl. II. 2. t. 130. — *Bartramia pentasticha* Brid. Musc. Rec. II. III. p. 134. t. 1. f. 8. — *Weisia pentasticha* Hdw. in Brid. I. p. 152. — *Bryum angulosum* Menz. ibidem.

Patria. In freto Magellanico primus legit Commerson; in Terra Statuum: Menzies; insula Aucklandi et Eremitae ad Cap. Horn: J. D. Hooker.

Pl. mascula fertili similis, flore gemmaceo. Folia perigonalia e basi lato-ovata complicato-concava laxe areolata colorata tenera lanceolata, nervo lato pungentia stricta

laevia. Antheridia et paraphyses ut in specie praecedente simili notis datis distinctissima.

Gen. IV. **Bartramia** Hdw.

Musc. Frond. II, p. 111, t. 10. — *Bartramidula* Br. Europ. — *Philonotula* Br. Europ. — *Glyphocarpa* R. Br. — *Philonotis* Brid. — *Bryum*, *Mnium*, *Hypnum* al. antiq.

Nomen in memoriam Bartrami coloni Pensylvanici, qui Dillenium muscis pluribus Americanis donavit, impositum.

Calyptra dimidiata. Peristomium *nullum, simplex vel duplex*. Externum: dentes 16 lanceolati *laeves trabeculati* linea media exarati v. interdum medio secedentes, *madefacti erecti, sicci incurvi*, rufi. Internum: *membrana sedecies plicata, in dentes 16 lanceolatos carinatos latos, dein in lacinias duas divergentes articulatas fissas, producta, ciliis 1—3 interjectis vel nullis*.

Habitus theca plerumque sphaerica asymmetrica ampla proprius. Peristomium duplex *Bryi-Acidodontii*.

Sectio I. **Philonotis**. Brid. II, p. 15. — Caulis apice ramis fastigiatis, foliis plus minus lanceolatis carinatis pellucide areolatis carnosulis erectis.

A. *Robustiores*.

Philonotis Br. Europ.

a. *Folia heteromalla*.

1. **B. rigida** Bals. et De Not. (Pugill. n. 1.); *monoica*; dense cespitosa humilis robusta erecta v. prostrata tomentosa; caulis fertilis *inferne ramis solitariis, apice fastigiatis permultis inaequalibus brevibus rigidis apicem versus crescentibus praeditus*; folia caulina erecto-appressa patentia stricta lanceolata, *nerro crasso dorso scabrido in cuspidem producta*, margine simpliciter dentata, dorso papillis obscuris brevissimis asperula, undique e cellulis angustis elongatis viridibus areolata; perichaetia-

lia latiora longius cuspidata; theca in pedunculo elongato crasso rigido subflexuoso subito globosa submicrostoma magna inclinata sulcata, operculo depresso conico; perist. duplex normale *B. Marchicae*.

Br. Europ. Fasc. XII. p. 20. t. 11. — De Notaris Syllab. p. 102. — *Philonotis rigida* Brid. II. p. 17. — *B. fontana* Schw. Sp. Musc. p. 92.

Patria. Calabria in sabulosis humidis: Requier detexit. Sicilia prope Messanam in humentibus collium: Balsamo. Torlano in Friaul: Sendtner. Madeira: Holl 1829.

Flos masc. gemmaceus juxta femineum positus, foliis perichaetialibus similibus robustis. Antheridia elongata, paraphysibus clavatis obtusis mixta. — Ramificatione et inflorescentia facile discernibilis, *B. Gardneri* et speciminibus *B. Marchicae* minoribus similis.

2. *B. Mühlenbergii* Schwägr. (Suppl. I. II. p. 58. t. 61.); *dioica*; dense cespitosa; caulis nudus humilis tomentosus erectus, apice ramis permultis subsimplicibus elongatis flexuosis gracilibus, fasciculatis; folia laxius imbricata erecta, lato-lanceolata subacuminata subdenticulata parum concava rigida amoene viridia, nervo crasso rufescente excurrente, e cellulis parallelogrammis minutis densis areolata; perichaetialia interna quadruplo minora lanceolata obtusa solidinervia tenera et albicantia; thecae solitariae v. plures in pedunculis erectis subflexuosis horizontales, e collo brevissimo globosae breves sulcatae, operculis e convexo acutissime et brevissime mucronatis; perist. duplex normale. †.

Philonotis Mühlenbergii Brid. II. p. 22.

Patria. Pensylvania: Mühlenberg.

B. Gardneri ex habitu similis et formis minoribus *B. fontanae* atque *Marchicae* haud dissimilis, sed notis cursive impressis facile distinguitur.

3. *B. Turneriana* Schw. (Suppl. III. I. 2. t. 238.); *dioica*; laxa cespitosa subhumilis laeve foliosa, erecta, caulis fertilis inferne simplex laxissime foliosus robustus ra-

diculosus, apice ramis paucis *compressis flaccidis incrassatis brevibus*, plantis sterilibus compressis apicem versus crescentibus apice attenuatis mixtus; folia caulina perfecte lanceolata longissime cuspidata, nervo excurrente tenui, margine erecto denticulata, angustissime elongate areolata, papillis remotis humilibus scabra; perichaetialia latiora *maxime setacea*; theca in pedunculo elongato subito globosa *maxima* et *orificio amplissimo* praedita subinclinata sulcata; perist. duplex normale robustum.

Patria. Nepal, in arenosis.

Pl. mascula femineae similis flaccida, apice ramis solitariis vel 2—3 brevibus oblique positis compressis. Flos discoideus latus. Folia perigonialia basi latissima multo laxius areolata, longissime cuspidata, caeterum perichaetialibus similia. Antheridia normalia, paraphysibus numerosis clavatis obtusis mixta. — Ab omnibus congeneribus ramis compressis flaccidis et notis caeteris illustratis facile distinguitur.

4. **B. erythrocaulis** C. Müll.; *dioica*; laxissime caespitosa inferne tomentosa; caulis sterilis et masculus erectus flaccidus longiusculus flexuosus, inferne inter folia radiculosus, rufus rigidus; folia *remote* disposita e basi ovata vel lato-lanceolata longe et acute cuspidata, carinate vel complicate concava, margine revoluta denticulata, undique e cellulis minutis rectangularibus pellucidis angustis areolata, papillis scaberrima.

B. affinis Hsch. in Musc. Mexic. a Deppe et Schiede lectis.

Patria. Mexico: Deppe et Schiede.

Flos masculus terminalis, inter ramos binos breves dein elongatos flaccidos apice comosos positus, crasse gemmaceus. Folia perigonialia basi latissime ovata concava laxius et amplius areolata, caeterum caulinis similia. Antheridia elongata, paraphysibus numerosis clavatis pallidis mixta. Formis flaccidioribus *B. fontanae* haud dissimilis, amoene viridis, gracilis, primo intuitu *Bryo erythrocauli* ex habitu affinis.

b. *Folia homomalla.*

α. *Thera sphaerica.*

5. **B. fontana** Schw. (Suppl. I. II. p. 61.); *dioica*; dense cespitosa elongata, inferne tomentosa, valde ramosa; caulis erectus, apice ramis fastigiatis *robustis* per multis erectis inaequalibus elongatis; folia caulina erecto-patentia heteromalla vel homomalla *biformia*, haec ovato-acuminata brevia cauli adpressa, illa lanceolata longiora, basi plicata et margine saepe deplanato revoluta minute denticulata, carinato-complicata, undique e cellulis parvis plus minus rectangularibus viridibus densiusculis basi laxioribus amplioribus papillis remotis scabridis instructis areolata; perichaetialia multo latiora in subulam latiusculam longius cuspidatam producte teneriora; perigonialia interna e basi lata concava *horizontalia obtusa enervia*, e cellulis valde angustis elongatis subflexuosis, basi tenerime membranaceis albidis areolata, apice eroso-denticulata; theca in pedunculo elongato crasso rigido erecto inclinata, subito globosa magna sulcata *pachyderma*, operculo breviter conico acuto; perist. duplex normale robustum magnum.

Br. Europ. Fasc. XII. p. 18. t. 9. — *Philonotis fontana* Brid. II. p. 18. — *Mnium fontanum* L. Sp. Pl. p. 1574. — *Bryum fontanum* Sw. Musc. Succ. p. 48. — *Bryum palustre scopis teretibus stellatis, vertice multifidis.* Dill. Musc. p. 240. t. 14. f. 2. — *Br. interruptum* Dicks. Brid. I. p. 685. Dicks. Fasc. IV. Pl. Crypt. p. 13. t. 11. f. 6? — *Br. lycopodiforme* Schleich. Brid. I. p. 856. ex obs. Schwägr. Sp. Musc. 1830. p. 92. — *Hypnum fontanum* Schrk. Baiers. Fl. II. p. 472.

β. *alpina*; humilis subuncialis robustior, ramis densissime foliosis, foliis ovato-lanceolatis mucronatis; pedunculis brevioribus. Br. Europ. l. c. *Philonotis fontana* γ. *alpina* Brid. II. p. 20.

γ. *falcata*; ramis apice aduncis, foliis omnibus falcato-secundis latescentibus, nervo crasso rufescente. Br. Europ. l. c. *B. falcata* Hook. Trans. of Linn. Soc. IX. p. 317. t. 27. f. 4. — *Ph. fontana* ζ. *falcata* Brid. II. p. 21.

Patria. In locis uliginosis planitiei usque ad alpes totius Europae et Americae septentrionalis. Var. β. in

alpibus summis Tirol. Hisp. et Nepal. Var. γ . ad scaturigines alpium. Ex India accepisse Br. et Sch. dicunt. Ad fretum Magellanicum legit Commerson.

Pl. mascula fertili similis, innovatione florifera stricta, sub flore ramulis subverticillatis brevibus ramisque innovationes sistentibus fasciculatae. Folia perigonialia inferiora imbricata, late ovata tenuissime acuminata nervosa, sequentia e basi lata vaginante patentia, intima majora ut supra descripta. Paraphyses et antheridia *B. Marchicae* simillima.

6. *B. calcarea* Br. et Sch. (Br. Europ. Fasc. XII. p. 19. t. 10.); *dioica*; habitus *B. fontanae*; folia *uniformia*, caulina secunda v. subsecunda conferta ovato-acuminata plicata *longiora crassinervia*, *multo laxius e cellulis hexagonis papillis fere carentibus teneris amplis reticulata*; perigonialia *omnia acute acuminata solidinervia*; perist. minus, dentibus remote articulatis.

Patria. In rivulis calcareis. Prope Bipontem et in Hassia superiore prope Biedenkopf: Bruch; pr. Fleurier Jurassi: Lesquereux; in Speluga Rhaetiae: Br. et Schimp.; pr. Brunnkopf circa Ammergau alpium Bavariae: Sendtner. — *Julio in extraalpinis, Augusto et Septembri in alpinis.*

A *B. fontana* simillima notis datis revera distincta videtur.

7. *B. Marchica* Schw. (Suppl. I. II. p. 59.); *dioica*; dense cespitosa plus minus elongata, inferne tomentosa, valde ramosa; caulis erectus, apice ramis fastigiatis *gracilibus* permultis erectis inaequalibus; folia caulina erecto-patentia heteromalla vel homomalla, *perfecte anguste lanceolata*, nervo crasso in cuspidem acutam producta, *nitida*, *marginem erecto* minute denticulata, carinato-concava, undique e cellulis parvis rectangularibus viridibus densiusculis papillis remotis scabridis instructis areolata; perichaetia multa latiora in subulam latiusculam longius cuspidatam producta teneriora; perigonialia interna *suberecta lanceolata acuta nervosa*; theca in pedunculo elon-

gato crasso rigido erecto inclinata, e collo brevissimo subito globosa magna sulcata *leptoderma*, operculo breviter conico acuto; perist. duplex normale robustum magnum.

Br. Europ. Fasc. XII. p. 17. t. 8. — Brid. Mant. Musc. p. 116. — *B. fontana* β . *Marchica* Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 87. — *Philonotis Marchica* Brid. II. p. 23 et 735. — *Mnium Marchicum* Hdw. Musc. Frond. II. p. 108. t. 39. — *Leskea Marchica* Willd. Prodr. Fl. Ber. No. 944. t. 6. f. 12. — *Bryum Marchicum* Roth. Fl. Germ. III. p. 236.

Patria. In pratis humidis et uliginosis, ad rivulorum margines, praecipue in solo luto-arenoso Europae occidentalis et borealis. Prope Spandau detexit Willdenow. Rarior. — *Aestate.*

Pl. mascula gracilior, sub flore ramulosa; folia perigonia externa ovato-acuminata, interiora e basi lata concava anguste lanceolata acuminata, nervo tenui subexcurrente. Antheridia numerosa, paraphysibus innumeris robustis breviter articulatis clavatis mixta. — Notis cursive impressis a *B. fontana* simillima differt.

8. ***B. uncinata*** Schwägr. (Suppl. I. II. p. 60. t. 57. sub nom. *B. scabridae*.); dioica; dense cespitosa *elongata* foliosa, inter folia ad apicem fertilem tomentosa, plantis sterilibus simplicibus elongatis mixta, apice 3—4 ramis *crassiusculis brevibus secundis saepe ramulosis luteis*; folia caulina dense conferta secunda, perfecte lanceolata stricta v. subfalcata, nervo crasso in cuspidem longiusculam acutam flavidam producto, carinato-concava, margine e basi usque ad apicem revoluta et serrulata, dorso papillis argutis scaberrima, undique e cellulis rectangularibus minutis densis areolata; perichaetialia multo latiora, acutissime et elongate subulata, angustissime longius et tenuiter reticulata, tenuiora laevissima vix denticulata plicata tenuinervia; theca in pedunculo elongato horizontalis globosa magna sulcata macrostoma *pachyderma*, operculo conico; perist. duplex normale, interni dentes lati valde striatuli.

Philonotis uncinata Brid. II. p. 22. — *Ph. fontana* β . *lanata* Brid. II. p. 21. caules steriles. — *Ph. fontana* γ . *dealbata* Brid. II. p. 21.

Patria. In monte sulphurifero Guadelupae: Richard.

Flos masculus in planta distincta minori terminalis gemmiformis ex obs. Schwägricheni l. c. Iconibus Schwägrichenianis male illustrata et colorata. — A *B. fontana* praesertim *Marchica* notis cursive impressis et flore masculo certe differt.

9. *B. Gardneri* C. Müll.; *dioica*; dense cespitosa *humilis* tomentosa, apice ramis c. 3 *inaequalibus tenerioribus viridibus*; folia caulina conferta secunda, perfecte lanceolata stricta v. subfalcata, *breviora*, nervo crasso *sub apice eranido*, carinato-concava, margine e basi usque ad apicem fere revoluta et serrulata, dorso papillis brevioribus scabra, undique e cellulis rectangularibus minutis densis areolata; perichaetialia multo latiora, acutissime et elongate subulata, angustissime longius et tenuiter reticulata, *intima* tenuiora laevissima vix denticulata, *exteriora caulinis similia*, sed *latiora et media longe subulata margine valde serrulata et dorso scaberrima*, nervo excurrente tenui; theca et caetera ut in *B. uncinata*.

B. uncinata C. Müll. et Wils. in Gardner: Coll. Muscor. Brasil. No. 44.

Patria. Brasilia monte Corcovado: Gardner.

A *B. uncinata* proxima notis cursive impressis certe distat.

10. *B. tenuis* Tayl. (Phytologist. 1844. p. 1095.); late cespitosa erecta subsimplex gracilis pallide luteo-viridis uncialis; folia laxa erecto-patentia, ex lata ovata basi lanceolato-subulata serrulata flexuosa subsecunda; theca rotundato-oblonga curvato-cernua striata, basi hinc gibba, e cellulis laxis rufo-brunneis reticulata, operculo convexo umbonato; perist. duplex normale. †.

Patria. Insula Norfolk: Allan Cunningham. Nova Seelandia: Rich. Cunningham 1826.

A formis tenuioribus *B. fontanae* ex animadv. auctoris foliis longioribus angustioribus minus denticulatis distare dicitur.

β. *Theca longicollis*.

11. B. longicollis Hmp. (in litt.); *dioica*; laxe cespitosa tomentosa; caulis fertilis erectus v. ascendens foliosus et inter folia tomentosus, apice ramis fastigiatis longiusculis flexuosis crinite foliosis; folia caulina laxe imbricata patentia secunda, lato-lanceolata cuspidata, *valde falcata*, nervo tenui excurrente, margine revoluta, denticulata, carinato-concava, *basi e cellulis hexagonis laevibus amplis laxissimis supra medium folii angustis densis minutis sublaevibus areolata*; perichaetalia externa latiora caeterum caulinis similia, basi multo laxius reticulata, interiora tenerrima plicata colorata laevissima; theca in pedunculo *longissimo* erecto flexuoso crasso *apice parum arcuato subinclinata*, e collo longiusculo subcylindrica, *orificio coarctata, rugulosa*; perist. duplex normale robustum magnum horizontale.

Patria. Java: Junghuhn. Hb. Gottscheanum.

Operculum et flos masculus desunt. — Species memorabilis, habitu meeseoideo.

B. *Graciliores*.*Philonotula* Br. Europ.α. *Theca gymnostoma*.

12. B. Roylii C. Müll.; *hermaphrodita*; pusilla; caulis brevissimus erectus radiculoso-tomentosus, ramulis 2—4 tenuibus erectis subsecundis *rigidis* breviusculis; folia caulina conferta brevia paulisper secunda lanceolata, nervo crasso in acumen serrulatum paullo falcatum producto, carinate-concava, ad marginem erectum superne denticulata, *undique e cellulis minutis subdensis basi magis quadratis areolata*; perichaetalia longius subulata majora latiora; theca in pedunculo elongato *stricto globosa ampla erecta* laevis fuscescens, operculo depresso mammillato.

Glyphocarpa Roylii Heck. fil. in Hook. Ic. Pl. Rar. II. t. 194 C. et in Lond. Journ. of bot. 1844. Vol. II. p. 8. — *Bartramidula Roylii* Br. Europ. Fasc. 29—33. Bartramidula, p. 2.

Patria. In Himalayae montibus legit Dr. Royle. In montibus Neelgheriensibus legit Perrottet. **Hb. Montagneanum.**

B. Wilsoni proxima, sed notis illustratis facile distinguitur.

13. B. Wilsoni C. Müll.; *hermaphrodita*; pusilla; caulis brevis *prostratus* radiculosus, ad apicem fertilem ramis plerumque 3 brevibus secundis; folia caulina imbricata brevia secunda lanceolata subfalcata, nervo crasso *subcontinuo* vel in aristam valde denticulatam producto, carinato-concava ad marginem erectum raro revolutum supra basin regulariter dentata, e cellulis magnis inferne amplioribus superne angustioribus rectangulari-hexagonis interdum chlorophyllosis areolata; perichaetialia longiora tenuius nervosa; thecae 1—5 *globosae brevicollae* in pedunculis longiusculis *cygneis horizontales tenuiter membranaceae laeves dein rugulosae, pallide rubiginosae* demum fusco-brunneae *nitidae*, exannulatae *microstomae* operculis *minutissimis* convexis. †.

Bartramidula Wilsonii Br. Europ. Fasc. 29—33. *Bartramidula*, c. ic. — *Glyphocarpa? cernua* Wils. in Lond. Journ. of bot. 1841. p. 8. memorata.

Patria. In montosis Britanniae et Hiberniae ad Can-nor Hill; prope Corn Bychon Valesiae; in alpibus Scoti-cis ad Glen-Dole in Clova mountains copiose. Wilson anno 1829. detexit.

Paraphyses fl. fertilis tenues acutae. — *B. cyneae* simillima, sed notis cursive impressis distinctissima.

14. B. cynea Mont. (*B. Philonotis*. Ann. d. sc. nat. 1845. 4. p. 102.; c. ic. in Hist. d. Chile. Bot. Cr. t. 2. f. 2.); *dioica*; pusilla; caulis brevissimus *erectus* radiculo-tomentosus, ramulis 2—4 tenuibus subsecundis verticillatis erectis breviusculis; folia caulina imbricata brevia secunda, lanceolata falcata, nervo crasso dorso superne serrulato *in acumen producto*, carinato-concava, ad marginem erectum tenuiter et argute dentata, *undique e cellulis rectangularibus minutiusculis viridibus arco-*

lata; perichaetialia longiora acutissime subulata; theca solitaria in pedunculo elongato cygneo-flexuoso sphaerica erecta vel nutans 8-striata, operculo convexo.

Patria. Chile, in locis fuliginosis: C. Gay.

Pl. mascula simplex, flore terminali gemmaceo fusco ob innovationem brevissimam laterali. Folia perigonialia e basi late convolutacea tenuiter reticulata colorata in subulam reflexiusculam denticulatam producta. Antheridia subparva curviuscula paraphysibus flavis obtusis mixta. — *B. Wilsoni* simillima, sed differt ramis longioribus, foliis excurrentinervibus, pedunculo longiore magis cygneo-curvato, theca striata et inflorescentia dioica.

15. **B. pusilla** C. Müll.; caulis subramosus pusillus; bilinearis; folia erecto-patentia ovata acuta reticulata (i. e. laxe reticulata?), margine plana, nervo subcontinuo; theca cernua globosa, operculo conico. †.

Glyphocarpa pusilla Hook. et Wils. Lond. Journ. of bot. 1844. p. 545.

Patria. Terra Van Diemen: D. Lyall.

Ex animadvers. auctorum *B. Wilsoni* similis.

b. *Theca peristomata.*

α. *Caulis filiformis teres.*

16. **B. laxissima** C. Müll.; dioica; late et laxe cespitosa, laxe cohaerens radiculosa glauco-viridis; caulis elatiusculus, apice ramis longis filiformibus flexuosis tenerrimis apice uncinatis; folia caulina laxe disposita erecto-appressa subsecunda, lato-lanceolata brevia parum falcata, e cellulis amplis laxis pellucidis hexagonis papillis obscuris et utriculo primordiali tenerrimo instructis areolata, margine e basi fere usque ad apicem duplicato-serrata, nervo crasso viridi ante apicem dissoluto; perichaetialia longe acuminata excurrentinervia denticulata; theca in pedunculo elongato flexuoso erecto globosa horizontalis brevis, operculo hemisphaerico mammillato; perist. duplex normale breve, internum rugulosum.

B. falcata Hb. Miquel. et Gottschean. — *Hypnum hastatum* Duby in Moritzi Verz. d. Zolling. Pfl. v. Java p. 132. No. 1813!!

Patria. Java.

Cespites lati parce fructiferi. — *B. filiformi* Hsch. proxima, sed partibus omnibus robustior et notis cursive impressis facile distinguitur.

17. **B. sphaericarpa** Schw. (Suppl. I. II. p. 59.); *dioica*; caules aggregati unciales erecti, tomento radicali vestiti, inferne simpliciusculi filiformes, ramis fasciculatis brevibus tenuissimis reflexis, caulibus sterilibus simplicibus mixti; folia *undique sparsa minuta approximata imbricata patentia, lanceolata acuminata cuspidata*, nervo continuo, quadrate laxius areolata, margine denticulata, dorso papillis hispidula; theca in pedunculo elongato horizontalis *subito globosa ampliuscula brevis*, operculo subplano brevissime acuminato; perist. duplex normale angustum. †.

Philonotis sphaericarpa Brid. II. p. 25. ex parte. — *Mnium sphaericarpum* Hdw. Musc. Fr. III. p. 93. t. 38. A. — *Bryum sphaericarpon* Sw. Fl. Ind. Occ. III. p. 1835.

Patria. In umbrosis muscosis montium summorum Jamaicae australis: Swartz.

Pl. mascula simplex, flore terminali vel innovando laterali minutissime gemmaceo. Folia perig. basi latiora concava teneriora. — A *B. tenella* foliis magis acuminatis et thecae forma distat.

18. **B. tenella** C. Müll.; *dioica*; pusilla dense cespitosa lutescens; caulis brevis radiculosus v. tomentosus, apice *ramis 5 — 10 inaequalibus secundo-recurvis subprostratis subteretibus tenuibus breviusculis*; folia caulina conferta subsecunda *lanceolata breviter obtuse acuta curvula carinato-concava*, margine obscure duplicato-serrulata dorso papillis remotis scabra, undique e cellulis laxis minutis areolata, nervo viridi subcontinuo; perichaetia latiora tenuiter cuspidata teneriora laevia; theca in pedunculo elongato crassiusculo *inclinata vel horizontalis minute globoso-oblonga, sicca cylindrico-cernua subgib-*

bosa leviter sulcata, operculo conico acuto, perist. duplex normale breve.

Philonotis Mühlenbergii β . *tenella* Brid. II. p. 23.

β . *humilis*; perpusilla, ramis erectioribus tenuioribus, foliis angustioribus pellucidius laxius areolatis, crassius nervosis, confertioribus et erectis haud secundis. *Philonotis humilis* Brid. II. p. 17. — *Anoetangium Portoricense* Spreng. in Brid. ibid. — *Bartr. radicalis* Hmp. in sched. — *Bartr. fontana* Schw. p. 92.

γ . *erecta*; rami erecti gracillimi apice uncinati. Planta mascula simplex apice flore praedita vel pluries furcata et inter ramos breves flore gemmaceo crassiusculo fusco instructa. *B. glaucescens* Hsch. Fl. Bras. p. 40?

δ . *gracillima*; inferne compacte tomentosa, ramis elongatis gracillimis tenuissimis flexuosis. Pl. mascula simplex tenuissima flore terminali vel innovatione laterali gemmaceo tenui. *B. filiformis* Hsch. Fl. Bras. p. 40?

Patria. Insula Trinitatis Antillarum: Crüger. Hispaniola: Bertero. Var. β . Hispaniola et Portorico ad saxa humida: Bertero; in montibus St. Jan: Breutel. Var. γ . Serra dos Orgãos: Riedel. Var. δ . Brasilia, solum humidum praeferens.

Pl. mascula perpusilla tenerrima, caulis elatus tenerimus curvus, apice ramis 2 brevissimis furcatus, inter eos flore masculo gemmaceo crassiusculo parvo; folia perigonialia e basi lato-ovata concava colorata subito fere in subulam latiusculam acutam subflexuosam producta, laxe areolata tenera, nervo tenui excurrente.

19. **B. rufiflora** Hsch. (Fl. Bras. p. 40.); *dioica*; dense cespitosa; caulis fertilis *clatiusculus filiformis*, inferne radiculoso-tomentosus, apice ramis fastigiatis pluribus brevibus subsecundis et interdum iterum fertilibus; folia caulina erecto-appressa subsecunda, madefacta paulisper patentia, *lato-lanceolata brevia*, nervo crasso subcontinuo acutiuscula, margine duplicato-serrulata, dorso papillis remotis obscuris sublaevia, carinato-concava vix curvula, *undique e cellulis ampliusculis laxis hexagono-*

quadratis pellucidis areolata; perichactialia e basi lato-ovata tenerrime reticulata plicata pellucida fusco-colorata in subulam longam subtortam sensim producta, intima laevia vix denticulata; theca in pedunculo elongato flexuoso rigido inclinata globosa brevis ampliuscula rugulosa, operculo hemisphaerico mammillato; perist. duplex normale majusculum.;

B. angulata Tayl. Lond. Journ. of bot. 1846. p. 55.; ex obs. Cl. Wilson l. c. p. 451. forma foliis quinquefariis *B. rufiflorae*.

Patria. Brasilia; Serra d'Estrella supra saxa rivo-
rum et in solo glareoso, Augusto: Beyrich. Serra dos
Orgaôs: Gardner No. 46. In Andibus Quitensibus: W.
Jameson. Hb. Taylor.

Pl. mascula gracilior, inferne foliosa, apice floribus solitariis vel binis et ternis plus minus conglomeratis crassis fuscis ternatus et ex iis ramis tenuissimis flexuosis brevibus innovans. Folia perigonialia e basi lato-ovata convolutacea fusco-colorata tenero-reticulata subito in subulam latiusculam, nervo excurrente percursam, denticulatam scaberulam producta. Antheridia majuscula, paraphysibus numerosis aureis obtusis cincta. — Foliis lato-lanceolatis, altitudine et planta mascula a speciebus humilioribus sectionis *Philonotis* praesertim a *B. tenella* facile distinguitur.

20. *B. elegantula* Tayl. (Lond. Journ. of bot. 1847. p. 335.); laxe cespitosa gracillima erecta triuncialis subfasciculatim ramosa; folia approximata erecta lanceolata subdenticulata, nervo sub summo apice evanescente; perigonia paucifolia arcte imbricata subrotunda; theca in pedunculo caulem superante flexuoso inclinata subglobosa subaequalis striatula, operculo convexo acuminulato; perist. duplex normale. †.

Patria. Monte Pichincha Andium Quitensium: W. Jameson. Nov. 1846.

B. filiformi Hsch. ex animadv. auctoris affinis, sed minus ramosior, basis folii angustior, apice magis acuminato, nervus evanescens, areolatio latior, pedunculus

crassior, theca amplior et folia perigonialia magis appressa.

21. B. minuta Tayl. (Lond. Journ. of bot. 1847. p. 335.); caules aggregati, dein innovando ramosi erecti trilineares, rami minuti stricti rigidi et foliorum apicibus acuminatis setacei; folia arcte imbricata stricta erecta anguste lanceolata acuminata subserrulata, margine basi reflexa; theca in pedunculo elongato apice incrassato subsphaerica erectiuscula subpellucida, operculo convexo-conico subpellucido; perist. duplex normale. $\frac{1}{4}$.

Patria. Prope Quito Andium: W. Jameson. Novemb. 1846.

A *B. Marchica* e sententia auctoris exiguitate, foliis dense confertis, theca pallida magis sphaerica estriata differt.

β . *Caulis plumosus.*

22. B. mollis Dz. et M. (Ann. d. sc. nat. 1844. II. p. 300.); *dioica*; late et laxe cespitosa prostrata, innovationibus elongatis sterilibus gracillimis mixta, caulis *elatusculus*, inferne foliosus tomentosus, apice ramis tenuibus brevibus 3—6 erectis, aureis vel flavido-viridibus; folia caulina erecto-patentia laxa, lanceolata, *nervo subtenui in cuspidem piliferam elongatam producta*, basi latiora, margine toto duplicato-serrulata, dorso breviter et remote papillosa, undique e cellulis elongatis angustis laxiusculis viridibus areolata; perichaetialia similia basilatiora; theca in pedunculo elongato globosa *oblique gibbosa*, orificio magno obliquo, sulcata, senectute *basi subquadrata*, operculo convexo; perist. duplex normale, *internum striatulo-asperum*.

B. sphaerocarpa Mont. in Hb. Miqueliano.

Patria. Java.

Pl. mascula multo gracilior prolifera parce ramosa; flore terminali gemmaceo colorato. Folia perigonialia basi convolutaceo-concava colorata fusca tenerrime areolata laevia sensim pilifera, superne margine et dorso nervi

denticulata. Antheridia subparva, paraphysibus aureis obtusis humilibus cincta. — *B. Berteroanae* proxima.

23. B. Berteroana C. Müll. (Linn. XVII. p. 590.); *dioica*; dense cespitosa humilis inferne tomentosa, ad apicem fertilem ramis 5 — 7 caule pusillo longioribus gracilibus curvulis ad basin tomentosis pallide viridibus, v. luteis; folia caulina *tenerrima in caulem rubentem laeve disposita, anguste lanceolata canaliculata curvula*, margine e basi usque ad apicem fere tenuiter revoluta duplicato-serrulata, dorso papillis — *pro cellulis laxis pellucidis rectangularibus teneris minutis* — crassis scabra, nervo subtenui subcontinuo; perichaetia similia, basi latiora longe acuminata, intima laeviora teneriora, omnia excurrentinervia; theca in pedunculo elongato *globosa macrostoma senectute truncata parva recta regularis* vix sulcata; perist. normale inflexum, internum striatulum.

β. flaccida; ramis longissimis gracillimis flexuosis luteis, foliis patentibus.

Patria. Insula Trinitatis Antillarum: Crüger. *Var. β.* in insula Guadeloupe: Bertero.

Pl. mascula elatior, apice 2 — 3 ramis recurvis tenerimis brevioribus, inter sese flore crassiuscule gemmaceo. Folia perigonialia e basi lato-ovata concava colorata tenera subito lanceolato-subulata subexcurrentinervia laevia parce denticulata. Antheridia numerosa, archegoniis majora, paraphysibus aequalibus breviter articulatis obtusis mixta.

24. B. radicalis P. B. (Prodr. p. 44.); *dioica*; *maxime humilis* erecta tomentosa, apice ramis tenellis circa 4 simplicibus; folia caulina *elongata patienti-conferta, angustissime lanceolata, nervo crasso luteo in cuspidem crassiusculam et acutissimam producta*, margine erecto simpliciter serrulato, dorso papillis crassiusculis remotis scabra, ubique e cellulis angustis elongatis laxis pellucidis areolata; perichaetia latiora et laeviora; theca in pedunculo *maxime elongato subradicali crasso rigido* ho-

rizontalis globosa magna, macrostoma; perist. duplex normale, internum subasperum.

Schwägr. Suppl. I. II. p. 56. t. 61. — *B. longiseta* Rich. Fl. Am. Bor. Mich. II. p. 301. — *Philonotis radicalis* Brid. II. p. 16.

Patria. Virginia: Boscq. Carolina meridionalis, in humidis: P. d. Beauv.

Species notis illustratis e spec. auth. distinctissima saepe commutata, e pedunculo longissimo, exiguitate caulibus foliisque longissimis cuspidatis angustis facillime discernibilis. Ex obs. Cl. Bridel et Schwägrichen in axillis foliorum occurrunt frequenter bulbi rufescentes decidui, foliis suboctonis, lanceolati obtusiusculi compacti, ut in *Bryo annotino* reperiuntur. In specimine unico Hb. Bridel. non vidimus.

25. B. Pabstiana C. Müll.; *dioica; laxe cespitosa inferne radiculosa humilis erecta gracilis; caulis fertilis brevissimus, ramis c. 10 gracilibus brevibus subuncinatis plumose foliosis fastigiatis; folia caulina laxe imbricata homomalla, anguste lanceolata sublonge acuminata, nervo crasso viridi excurrente, curvula carinato-concava, margine duplicato-serrulata, dorso papillis obscuris remotis sublaevia, undique e cellulis minutis subquadratis laxis pellucidis areolata; perichaetialia latiora tenuiora longe et flexuose cuspidata excurrentinervia, intima laevia denticulata; theca in pedunculo radicali elongato crasso rigido horizontalis subito subglobosa brevis ampla sulcato-rugulosa, operculo hemisphaerico mammillato; perist. duplex normale robustum.*

β. plumosa; amoene viridis, laxius subgregarie cespitosa elatior gracilescens valde plumoso-foliosa.

Patria. Insula St. Catharinae Brasiliae, societate *Physcomitrii* inter fruticeta coloniae Germanicae, ad flumen Itajahi conditae, thecis apertis, Aug. Sept. 1846 leg. Pabst, hortulanus Halensis. Var. *β.* Ibidem in viis cavis locorum umbrosorum montosorum prope Destero, thecis junioribus, Mart. 1847 leg. Pabst.

Pl. mascula subsimplex, parce ramosa flore terminali v. ob innovationem laterali gemmaceo tenui. Folia perig. e basi lato-ovata concava colorata tenero-areolata subito in subulam latiusculam acute acuminatam producta, nervo tenui excurrente praedita, denticulata. — *B. sphaerocarpha* e forma thecae affinis, sed imbricatione foliorum plumosa, ramis subuncinatis et foliis homomallis distat. A *B. tenella* foliis angustioribus longioribus acutioribus plumose dispositis et thecis collo carentibus subito globosis brevibus siccitate haud cernuis amplioribus certe differt. A *B. radicali* foliis brevioribus, non pungentibus, aliter areolatis et thecae forma distinguitur. Proxime autem ad *B. Berteroanam* quoad imbricationem foliorum accedit, sed foliis laxius et amplius areolatis et thecae forma facile cognoscitur.

Sectio II. **Plicatella.** Caulis vage – et apice fasciculato-ramosus, foliis e basi erecta reflexis, anguste elongate, basi utrinque ad marginem amplius areolatis, longitudinaliter plicatis plus minus fragilibus.

a. *Brevipedunculatae.*

26. **B. arcuata** Brid. (Spec. Musc. III. p. 79.); *dioica*; dense cespitosa elongata, inter folia tomentosa, aureo-viridis nitens, vage ramosa, ramis inaequalibus, robusta; folia caulina erecto-patentia conferta, e basi lata amplexicauli rectiuscula ovato-lanceolata et subreflexa, multoties plicata, margine subrevoluta superne denticulata, nervo tenui in cuspidem acutam excurrente, undique e cellulis angustissimis rectangularibus areolata, papillis tenuissimis scabrida; perichaetia ovato-lanceolata stricta laevia; theca in pedunculo breviusculo flexuoso-arcuato inter ramulos nonnullos inaequales posito crasso pendula subito sphaerica microstoma magna, sulcata ferruginea, operculo minuto conico-mammillato; perist. duplex normale *B. Hallerianae*.

Br. Europ. Fasc. XII. p. 15. t. 6. — Schw. Suppl. I. II. p. 61. t. 62. excl. Syn. Swartz. et Suppl. III. I. t. 240. — Brid. II. p. 35. *Mnium arcuatum* Dicks. Fasc. III. Pl. Crypt. p. 2. t. 7. f. 3. — *Mn. chrysocomum* Hdw. Sp. Musc. p. 74. — *Hypnum chrysocomum*

Dicks. Fasc. III. Pl. Cr. p. 12. — Hypnum palustre erectum, coma lutea, basi nigricante. Dill. Musc. p. 302. t. 39. f. 36.

Patria. In rupibus humidis irroratis Angliae, Scotiae et Hiberniae, ubi haud rara reperta est. In monte Rigi Helvetiae sterilem legit Hegetschweiler. — *Vere.*

Pl. mascula subsimplex, sub flore innovationem unicam, rarius plures, emittens, unde post generationes complures geniculata et multiflora apparet, ramulis singulis gracilibus. Flos terminalis discoideus polyphyllus; folia perigonialia exteriora e basi lata valde concava lanceolata, interiora e basi erecta recurva, caeterum caulinis similia; antheridia copiosa, brevistipitata; paraphyses numerosae subclavatae lutescentes. Br. Europ. l. c.

27. B. tomentosa Hook. (Musc. Exot. t. 19.); *dioica*; caules tomento ferrugineo densissime obsiti, digitales ad palmares, vage ramosi, ramis hic illic tomentosus, subpinnatim divisis saepe fasciculatis flexuosis *gracilibus* inaequalibus; folia dense imbricata horizontaliter patentia subrecurva nitida flavescentia, ovato-lanceolata longe acuminata, serrulata plicata, margine inferne revoluta, nervo tenui percursa, undique e cellulis rectangularibus angustis minute papillosis areolata; perichaetialia interna multo latiora, basi laxissime elongate areolata tenera; theca in pedunculo *brevis erecto horizontalis magna ovato-globosa* sulcata; perist. duplex normale.

? *Philonotis tomentosa* Brid. II. p. 26. — *Bartr. arcuata* Schw. Suppl. I. II. p. 62. — *Mnium tomentosum* Sw. Prodr. p. 139. — *Bryum tomentosum* Sw. Fl. Ind. Occ. III. p. 1837.

Patria. Ad latera sylvarum montium altissimorum Jamaicae: Swartz. Columbia, Silla de Caracas: Moritz.

Pl. mascula vage ramosa maxime tomentosa, flore terminali et ob innovationem novam masculam plus minus elongatam tomentosam laterali discoideo. Folia perigonialia omnia e basi recta reflexa, externa e basi latissima laxae areolata tenera lanceolato-acuminata plicata denticulata, interna e basi colorata laxissime reticulata subito reflexa obtuse acuminata subligulato-ovata crosso-denticu-

lata obsoletinervia. Antheridia elongata angusta, paraphysibus numerosis filiformibus et crasse clavato-articulatis mixta. *B. arcuatae* proxima.

28. *B. gnaphalea* C. Müll.; caulis erectus elongatus gracilior, inter folia tomentosus, ramis vagis *gracilibus subpinnate dispositis flaccidioribus, apice elongatis strictis robustioribus*; folia caulina imbricata *squarrosa*, e basi oblonga erecta plicata in subulam plus minus reflexam lanceolatom et nervo tenui excedente acutissime cuspidatam producta, margine denticulata et dorso ubique papillis teneris acutis remotis scabra, e cellulis angustissimis sublongis *pellucidis* areolata.

B. arcuata Brid. II. p. 35. — *B. tomentosa* Schw. Sp. Musc. 1830. p. 97. — *Hypnum? gnaphaleum* P. B. Prodr. p. 64.

Patria. Insula Bourbon, Plaine des Chicots: Bory St. Vincent altitud. 1000 hexapod. legit.

A *B. arcuata* et *tomentosa* proximis notis datis distat.

b. *Longipedunculatae.*

29. *B. gigantea* Schw. (Suppl. I. II. p. 63. t. 63.); *dioica*; procera elongata robusta rigida erecta v. geniculato-flexuosa; apice rami pauci robusti breves *summo apice foliis nonnullis convolutis cuspidati*; folia caulina *reflexa squarrosa rigida, e basi latissima colorata breviter erecta valde plicata*, utrinque ad marginem cellulis albidis laxis praedita, in subulam latissimam lanceolato-cuspidatam elongatam producta, subtorta, margine erecto denticulata, e basi ad apicem pluries plicata, nervo tenui excurrente, e cellulis angustissimis remote papillosis areolata; perichaetialia *angustiora erecto-appressa, maxima parte folii laevia laxissime elongate et tenerrime reticulata pulcherrime ferruginea, plicata, nervo in laminam superam dissoluto ferrugineo*; theca in pedunculo stricto inter ramos binos posito et innovando caulis laterali incurvo fragilissimo *horizontalis elongato-pyriformis* striata; perist. normale duplex, ciliis interpositis nullis.

Schw. Suppl. II. II. p. 30. t. 161. — Brid. II. p. 36. — *Dicranum giganteum* Brid. Sp. Musc. I. p. 97. — *Hypnum arundinifolium* Dub. in Moritzi Verz. d. Zollingerschen Pfl. v. Java p. 131!!

Patria. Insula Bourbon, planitie des Chicots c. 6000 ped. supra mare: Bory St. Vincent. Java, ad rupium parietes juxta flum. Tjapus circa 5000 ped.: Zollinger Coll. No. 1811.

Fructum non vidimus. Species maxime memorabilis, muscis pleurocarpicis valde similis et *Spiridentis* genus haud male referens, omnium congenerum gigantea hypnoidea.

30. **B. scoparia** Schw. (Suppl. III. I. 2. t. 241.); *dioica*; caules steriles in cespites latissimos congesti, longissimi parce tomentosi, ramis pinnate dispositis inaequalibus rectiusculis vel horizontalibus flaccidis, approximatis vel remotis; fertiles multo humiliores foliosi et inter folia valde tomentosi, apice ramis fasciculatis brevibus, erectis; folia caulina *sicca et madesacta* erecto-patentia laxiuscula, e basi lato-orata plicata, utrinque ad marginem inferum e cellulis nonnullis multo majoribus laxioribus fuscidulis areolata, in subulam lanceolatam longissime cuspidatam denticulatam plus minus plicatam producta, margine inferne revoluta, nervo tenui excurrente, e cellulis angustissimis subpellucidis reticulata; perichætalia caulinis similia; theca in pedunculo elongato erecto pyriformi-orata erecta regularis perfecte sulcata.

Patria. Insula Martinique: G. Sieber.

Operculum et peristomium desunt. Theca *B. Sieberi*, habitus *B. tomentosae*. — Flores masculi inter longissimos caules et inter breviores fertiles, disciformes utroque caule crassiores, foliis octonis v. duodenis patentibus, ex ovato longe acuminatis, nervo apice evanescente, basi erecta concava ferruginea, superiore parte patente flavo-viridi. Antheridia paraphysibus longioribus numerosis filiformibus limpidis cincta.

31. **B. integrifolia** Tayl. (Lond. Journ. of bot. 1846. p. 55.); *dioica*; caulis cespitosus elongatus erectus vage

ramosus, ramis subfasciculatis pallide luteo-viridibus; folia imbricata erecto-patentia ovato-lanceolata longius acuminata *integerrima*, margine reflexa, apice semel torta, inferne concava; theca *pyriformi-oblonga cernua* striata, operculo umbonato; perist. duplex normale. †.

Patria. In Audibus Quitensibus: W. Jameson 1845.

Ex auctore *B. tomentosae* affinis, sed humilior et foliis integris thecaque pyriformi-apophysata differre dicitur. Ex observationibus Cl. Wilson (l. c. p. 451.) a *B. pendula* vix differt, serraturis foliorum absentibus exceptis. Folia perigonialia ovata squarrosa.

32. *B. pendula* Hook. (Musc. Exot. t. 21.); *dioica*; dense cespitosa tomentosa subhumilis erecta sordide viridis; caulis fertilis inferne maxime tomentosus, apice ramis compluribus rectis, pro plantulae altitudine longiusculis, rigidis; folia caulina erecto-patentia laxè imbricata, sicca crispata, e basi amplexicauli rectiuscula in subulam lanceolatam reflexam acutissimam producta, nervo subterni excurrente, margine basi paulisper revoluta, apice denticulata, undique e cellulis angustissimis longiusculis minute et remote papillosis areolata; perichaetialia *externa multo latiora substricta, caeterum caulinis similia, versus vaginam sensim laxissime areolata*, intima squamiformia lato-orata acuminata pulchre fusca integra *energia tenerrima*; theca in pedunculo crasso longiusculo apice arcuato *pendula ovato-cylindrica* sulcata, operculo *planiusculo*; perist. duplex normale robustum.

Schwägr. Suppl. III. 1. 2. t. 239. — *Philonotis pendula* Brid. II. p. 27. — *Mnium pendulum* Sm. Trans. of Linn. Soc. VII. p. 262. — *Bryum pendulum* Brid. Mant. Musc. p. 120.

Patria. In sinu Dusky Bay Novae Seelandiae: Menzies 1794. Insula Eremitae pr. Cap. Horn: J. D. Hooker.

Areolatio *Philonotis* et forma folii *Plicatellae*, habitus *B. tomentosae*.

33. *B. Sieberi* Hsch. (in Sieb. Musc. Nov. Holl. No. 13.); *dioica*; dense cespitosa, inter folia tomentosa erecta sublonga robusta, aureo-viridis; caulis fertilis strictus

simplex vel longe infra florem ramis inaequalibus brevibus gracilioribus parce ramosus, *apice ramis compluribus brevissimis gemmiformibus discoideo-stellatus comosus*; folia erecto-patentia, *siccitate crispa*, caulina patentidivergentia, e basi lata complicato-concava erecta in subulam reflexam lanceolato-cuspidatam producta, margine ex maxima parte folii revoluta superne denticulato, nervo ferrugineo carinato-excurrente dorso scabro, undique e cellulis angustissimis minute et remote papillosis subflexuosis longiusculis aureis areolata; ramea basi magis ovato-dilatata vix reflexa; perichaetia his similia, sed multo angustiora longiora lanceolata longe cuspidata acutissima excurrentinervia, basi parce plicata; theca *in pedunculo elongato erecta ovato-globosa regularis perfecte sulcata*.

B. pendula Spreng. Syst. Veget. IV. II. p. 323. — *B. scoparia* Schw. Sp. Musc. p. 98.

Patria. Nova Hollandia; Sieber.

Operculum, peristomium et florem masculum non vidimus. Perist. forsan nullum? Fructum caeterum deciduum inter cespitem invenimus.

Obscuriores.

Hypnum consimile Hook. et Wils. (in sched. musc. antarctic.); simplex foliosum radiculosum, apice ramis 2 inaequalibus brevibus vel elongatis cauli communi similime foliosis, flaccidis; folia caulina laxa imbricata patentia, e basi lata subovata utrinque ad marginem planiusculum e cellulis laxioribus quadratis amplis pellucidis lato-lanceolata, nervo subtenui in cuspidem brevem excurrente, margine erecto serrulato-denticulata, e cellulis angustis minutis inferne laevibus longioribus superne quadratis papillosis areolata, plicata.

Patria. Insula Aucklandi: J. D. Hooker.

Sectio III. **Vaginella.** Caulis dichotome ramosus, foliis e basi vaginata laxa areolata erecta subito reflexis minute reticulatis.

a. *Longipedunculatae.*

34. B. ithyphylla Brid. (Sp. Musc III. p. 85.); *hermaphrodita*; subpulvinata subhumilis radiculosa ramosa, ramis brevibus strictis dichotomis, lacte viridis vel fuscescens; folia caulina *erecto-potentia conferta breviora*, e basi *breviore angustiore* tenera laxè anguste elongate et pellucide areolata superne dilatata et *minus rotundata* subito in subulam canaliculatam *lanceolatam brevior*em margine parce denticulatam et dorso papillis brevibus scaberulam minute areolatam producta, nervo lato viridi subulam superiorem totam fere occupante; perichaetialia sensim magis subulata; theca in pedunculo elongato *tenui* innovatione laterali globosa basi subquadrata *profunde sulcata*, e cellulis multo densioribus reticulata, obliqua, operculo convexo-conico; perist. normale.

Brid. II. p. 43. — Br. Europ. Fasc. XII. p. 11. t. 2. — *B. pomiformis* Wahlenb. Fl. Lapp. p. 362.

Patria. Ad terram et rupes in montanis et alpinis per totam Europam, Asiam et Americam borealem. — *Majo et Junio, Julio et Augusto in alpinis.*

B. patenti proxima et notis cursive impressis distincta.

35. B. subulata Br. Europ. (Fasc. 31. Suppl. c. tab.); *androgyna*; *parvula compacte cespitosa glauco-viridis*, inferne valde tomentosa, pluries dichotoma; folia caulina conferta stricta erecta, siccitate appressa, e basi lata vaginante laxè areolata hyalina subito in subulam lanceolatam reflexiusculam minute reticulatam chlorophyllosam margine apicis grosse serrulatam tuberculoso-exasperatam producta, nervo excurrente vel cum apice evanido; perichaetialia erecta ex oblongo-lanceolato subulata, basi pluries plicata laxius areolata tenuius nervosa; theca in pedunculo trilineari rigidulo tereti rubello *erecta globoso-orata paulisper striata microstoma*, operculo minuto convexo-conico; perist. *nullum*, sed membrana capsularis ad orificium e cellulis transverse elongatis hexagono-rotundatis conformibus teneris areolata. †.

Sub *Glyphocarpae* Sectione 1. c. — *Weis. viridissima* Brid. I. p. 364. e spec. auth. forsitan huc pertinet.

Patria. In summo cacumine montis Gaisstein Pinzgaviae alp. Salzburg, altitudine 8000', legit W. P. Schimper 1843. — *Augusto et Septembri.*

Flos masc. gemmaceus juxta femineum. — Habitus *B. ithyphyllae* formae alpinae, notis cursive impressis facile discernibilis.

36. *B. patens* Brid. (Sp. Musc. III. p. 82.); *hermaphrodita*; laxè cespitosa subhumilis radiculosa ramosa, ramis brevibus strictis dichotomis, fuscescens vel viridis; folia caulina *maxime patentia laxè disposita longa*, e basi *elongata* tenera laxè angustè elongate et pellucide areolata superne dilatata et *valde rotundata* subito in subulam canaliculatam *elongate setaceam* margine parce denticulatam et dorso papillis brevibus scaberulam minute areolatam producta, nervo lato viridi subulam superiorem totam fere occupante; perichaetia sensim magis subulata; theca in pedunculo elongato *rigido* innovatione brevi laterali globosa *magna tenuiter membranacea laevis vir sulcata*, e cellulis magnis laxis *pulchre reticulata* obliqua, operculo convexo-mammillato; perist. normale, internum externo valde adglutinatum.

Brid. II. p. 38. excl. Syn. Schwägr. et Turner. — *B. reticulata* P. B. Prodr. p. 44!

Patria. In freto Magellanico detexit Commerson. Ex insulis vicinis Falklandi et Eremitae ad Cap. Horn retulit J. D. Hooker.

Antheridia maxima clavata, archegonia elongata angusta, paraphysibus longis acutis flavis numerosis cincta. — *B. ithyphyllae* similis.

Non satis notae.

37. *B. Potosica* Mont. (Ann. d. sc. nat. 1838. IX. p. 56. et in d'Orbigny Voyage p. 95.); laxè cohaerens stolonibus tenuissimis humilibus mixta, *simplicissima*, *inferne tenuis parce foliosa*, *apicem versus valde crescens*, *apice truncato-comosa*; folia dense conferta erecto-ap-

pressa, sicca et madefacta stricta, e basi elongate vaginata tenerrima anguste elongate et pellucide areolata superne parum dilatata igitur *subquadrata* subito in subulam sublongam *lanceolatam acutam carnosam concavam, nervo lato quasi toto occupatam obscuram, dorso scaberrimam margine tenuissime serrulatam producta, fragilissima.*

Patria. In jugis Andium prov. Potosi, ad rupes prope glacies aeternas: d'Orbigny.

Species etsi sterilis, tamen memorabilis, ex habitu *B. strictae*, *B. ithyphyllae* autem quoad foliorum formam magis affinis, notis illustratis facillime discernibilis.

38. *B. robusta* Hook. et Wils. (in sched. muse. antarctic.); compacte cespitosa inferne tomentosa humilis, *ramis brevibus gracilibus fastigiatis densissime approximatis valde robusta fragilis*; folia caulina erecto-patentia *crispa, madefacta stricta fragilissima*, e basi lato-vaginata elongate laxiuscule tenuiter areolata superne dilatata sensim minutius reticulata in subulam lanceolatam *crasse cuspidatam, papillis dorsi minutis creberrimis obscure areolatam, quasi nervo excurrente toto occupatam, canaliculatam margine papillis denticulatam plus minus flexuosam producta.*

Patria. Insula Aucklandi: J. D. Hooker.

Foliorum areolatio *B. Potosicae*, habitus *B. ithyphyllae*.

b. *Brevipedunculatae.*

39. *B. Halleriana* Hdw. (Musc. Frond. II. p. 111. t. 40.); *monoica*; laxe cespitosa mollis inferne tomentosa erecta elongata glaucescens v. flavescenti-viridis, ramis fastigiatis v. inaequalibus; folia caulina patentia vel subsecunda flexuosa, e basi subreflexa lato-oblonga lanceolato-subulata, versus apicem margine reflexa et dorso serrulata, basi elongate anguste tenuiter superne minute reticulata, nervo crasso excurrente; perichaetia similia; thecae breviter pedunculatae subimmersae subglobosae

parvae pallidae striatae geminatae in ramis lateralibus brevibus terminales, pedunculis subarcuatis operculisque conicis; perist. duplex: dentes externi lanceolati subulati integri trabeculati rubri, interni bartramioidei normales.

Br. Europ. Fasc XII. p. 14. t. 5. — Brid. II. p. 33. — *Webera Halleriana* Hdw. Fund. Musc. II. p. 95. — *Web. clandestina* ibid. p. 104. t. 6. f. 39. — *Mnium laterale* Hoffm. Deut. Fl. II. p. 54. — *Bryum laterale* Ehrh. Crypt. Exs. n. 33. — *Br. Norvegicum* Oed. Fl. Dan. t. 538. f. 3. — *Br. pendulum* Fl. Dan. V. t. 835. f. 1. — *Br. recurvum* Wulf. in Jacq. Coll. II. p. 224.

Patria. In montosis praecipue subalpinis, fissuras rupium prime quarzosarum cespitibus insignibus habitans per Europam totam. — *Majo, Junio et Julio.*

Flos masculus in vicinia feminei vel infra, foliis tenuioribus laevioribus, antheridiis elongatis et paraphysibus flavis.

40. **B. viridissima** C. Müll. (Linn. XIX. p. 202.); *hermaphrodita*; laxissime cespitosa; caulis erectus longiusculus mollis basi tomentosus laxissime foliosus, simplex v. basi ramosiusculus fertilis apice ramis nonnullis comosus; folia caulina e basi oblonga brevi longissime subulata setacea, jam e basi ad apicem duplicato-dentata, dorso serratiformi-papillosa, apice supremo integra, amoene viridia, anguste et elongate reticulata, flexuosa erecto-patentia excurrentinervia; perichaetialia basi insigniter dilatata; theca *sessilis erecta terminalis elliptico-globosa magna laevis* pallida dein brunnea, operculo *planissimo membranaceo hemisphaerico*; perist. simplex: dentes lanceolati lacerati medio fissibiles brevi-articulati cartilaginei aurantiaci.

Cryptopodium Hookeri Hmp. Linn. XX. p. 75. — *Leucodon bartramioides* Hook. Ic. Pl. Rar. I. t. 71.

Patria. Columbia, Surrucucho prope Cuença: W. Jameson primus legit; prope coloniam Tovar Germanicam prov. Meridae, altitud. 5500 ped. legit Moritz 1845.

Antheridia maxima clavata; archegonia elongata, paraphysibus permultis cincta.

41. B. brachypus Br. et Sch. (in Musc. Abyss. No. 441.); *hermaphrodita*; dense cespitosa inferne tomentosa ramosa, ramis densis strictis brevibus; folia caulina *erecto-appressa, madefacta patentia, breviora, glauco-viridia*, e basi *longiore multo laxius* elongate areolata et superne dilatata subito canaliculato-subulata acuta, margine haud revoluta denticulata, dorso breviter papillosa, nervo *viridi* subulam minute reticulatam totam fere occupante; perichaetia interna magis sensim subulata; theca in pedunculo brevi substricto vix exserta globoso-obliqua stricta, stomate minuto; perist. dentes externi *parvi angusti lineari-lanceolati* trabeculati, interni normales, sed *perbreves*.

Patria. Abyssinia in monte alpestri Silke: W. Schimper, 16. Febr. 1840. Un. it. Abyss.

A *B. vulcanica* proxima notis illustratis certe distat.

42. B. vulcanica Brid. (II. p. 37.); *hermaphrodita*; ramosa, ramis densis strigosis, radiculoso-tomentosa subhumilis *superne lutescens inferne ferruginea*; folia conferta *stricta* patentia longa, e basi *oblonga superne latiora subventricosa inferne planiuscula subraginata elongate late areolata* subito subulata acutissima setacea, minute reticulata, nervo lato ferrugineo *subulam canaliculatam totam fere occupante* praedita, margine haud revoluta et dorso denticulata; perichaetia sensim subulata; theca in pedunculo brevi subarcuato paulisper exserta globosa pseudolateralis striata, operculo convexo mammillato.

B. gigantea Bory St. Vincent. Voy. en Afriq. III. p. 96. — *B. patens* Schw. Suppl. I. II. p. 55. t. 62. — *B. squarrosa* Turn. in König et Sims Ann. Bot. I. p. 329. t. 2. f. 2?

Patria. Insula Bourbonis, in crateribus montium ignivomorum, ex. gr. in Ramonde crat. ad 800 hexapodum et Piton des Neiges ad 1103 altitudinem cespitose vicens: Bory St. Vincent.

Species pulcherrima, ex habitu *B. Hallerianae* haud dissimilis, sed notis cursive impressis distinctissima.

Fructus imperfectus. Antheridia crassa elongata una cum archegoniis paraphysibus numerosis flavis cincta.

43. **B. longifolia** Hook. (Musc. Exot. t. 68.); cespitosa; caulis erectus elatus flexuosus saepe ramosus; folia sordide viridia arcte imbricata patentia, *longissime subulata setacea flexuosa, basi breviter vaginata*, nervo crasso subulam superam totam occupante obscuro, margine supra basin tenuissime serrulata; theca in pedunculo *brevi* ob innovationem saepe laterali inclinata, e collo brevissimo globosa magna sulcata microstoma, operculo conico obtuso. †.

Brid. II. p. 39.

Patria. In devexis udis frigidis montis Quindiu (Cordillera de los Andes de Cundinamarca), altitudine 1400 hexapodum, graniti habitans: Humboldt et Bonpland.

B. pomiformi haud dissimilis, sed foliis vaginatis longe distat. *B. patenti* proxima.

44. **B. Mülleri** Mont. (in litteris!); *dioica?* dense cespitosa; caulis elatus *teretiusculus recurvo-flexuosus, apice comoso incurvato*, inferne tomentosus, *albido-viridis*; folia caulina erecto-appressa *superne falcato-secunda*, e basi *elongato-vaginata albida* pellucida laxiuscule elongate anguste et tenuiter reticulata superne dilatata subito latiuscule canaliculate et elongate subulata acuta, margine haud revoluto *sensim argute serrata*, ad subulae minute reticulatae dorsum papillis densis brevibus scaberrima, nervo crasso excurrente viridi subulam totam fere occupante; perichaetialia *sensim* magis subulata; theca in pedunculo *brevi* pseudolaterali globosa crassa obliqua profunde sulcata, operculo hemisphaerico conico; perist. duplex normale magnum.

B. Potosica C. Müll. Linn. XIX. p. 204 et Hmp. Linn. XX. p. 76. — *B. patens* Hook. in Kunth Synops. Pl. Aeq. p. 55.

Patria. Columbia, Sierra Nevada prov. Meridae: Moritz No. 187. b. In sylvis Cinchonarum editioribus Americae meridionalis prope Loxam primus legit Humboldt.

Archegonia elongata, paraphysibus longissimis brev articulatis clavatis flavissimis numerosis mixta.

Sectio IV. **Eubartramia.** Caulis dichotome ramosus, foliis strictis erectis, nec vaginatis, nec plicatis, minute areolatis.

A. *Crispatae.*

a. *Longipedunculatae.*

45. B. pomiformis Hdw. (Sp. Musc. p. 164.); *androgyna*; late et pulvinato-cespitosa glauco-viridis vel lutescens inferne tomentosa longiscens dichotome ramosa, ramis fastigiatis substrictis; folia caulina erecto-patentia *crispata* conferta lanceolato-subulata, margine revoluta sensim argute serrata, canaliculata, dorso serrulato-scabra, nervo excurrente subtenui praedita, minute basi sublongius sed dense areolata; perichaetia angustiora; theca in pedunculo elongato pseudolaterali flexuoso globosa obliqua profunde sulcata, operculo conico; perist. normale.

Brid. II. p. 39. — Br. Europ. Fasc. XII. p. 13. t. 4. — *B. vulgaris* Dec. Fl. Franç. I. p. 509. — *Webera pomiformis* Hdw. Fund. Musc. II. p. 95. — *Bryum capillaceum*, capsulis sphaericis. Dill. Musc. p. 339. t. 44. f. 1.

β . *crispa*; major, foliis longioribus remotioribus, ramis thecas saepe superantibus gracilibus. Br. Europ. l. c. *B. crispa* Sw. Musc. Suec. p. 73. — Brid. II. p. 41. — *B. pomiformis v. major* Musc. Brit. p. 85. — *B. Hercynica* Flörke in Schrad. Bot. Journ. 1799. II. p. 71. — *B. incurva* Hoppe in Sturm Fl. Germ. Crypt. Fasc. 6.

γ . *heteromalla*; maxime *crispata* foliis subsecundis. *B. heteromalla* Brid. II. p. 42.

Patria. Ad terram et rupes per Europam totam vulgarissima, in Asia et America septentrionali. Var. β . in rupium fissuris humidis regionis subalpinae et alpinae; Var. γ . in America sept. — *Vere et aestate.*

Flores masculi et feminei plures terminales approximati. Folia perigonialia loriformi-angusta linearia pauca, superne serrata. Antheridia pauca paraphysibus nonnullis mixta.

b. *Brevipedunculatae*.

46. **B. Jamesoni** Tayl. (Lond. Journ. of bot. 1847. p. 334.); laxe cespitosa erecta dichotome ramosa biuncialis gramineo-viridis, caulibus *apice incrassatis*; folia arcte imbricata elongata, sicca tortilia, ex subulata amplexante basi linearia acuminata celluloso-subserulata, nervo in cuspidem distincte excurrente; theca *axillaris sessilis erecta rotundato-obovata laevis*; perist. *simplex internum*: dentes in membrana pallida crassa infra orificium enata lanceolati acuminati medio longitudinaliter linea exarati interdum perforati. †.

Patria. Monte Pichincha Andium Quitensium: W. Jameson. Nov. 1846.

B. Hallerianae affinis, sed brevior, ramis incrassatis, foliis longioribus, theca sessili et peristomio longe differre dicitur.

B. Rigidae.a. *Longipedunculatae*.

47. **B. stricta** Brid. (Mant. Musc. p. 116. et Bryol. Univ. II. p. 45.); *hermaphrodita*; compacte cespitosa humilis dichotome ramosa, ramis aequalibus strictis, glauco-viridis *inferne zonato-colorata* subferruginea vel lutea; folia caulina erecto-appressa, madefacta paulisper patentia, e basi lato-oblonga lanceolato-subulata acuta *strictissima*, margine e basi folii *revoluta* integra, superne ad subulae marginem et dorsum serrata, ubique minute areolata, dorso papillis brevissimis scaberula, nervo crasso viridi excurrente; perichaetia similia basi latiora, tenuius et longius areolata; theca in pedunculo *elongato terminali* vel innovando laterali subglobosa *striata*, basi *subquadrato-obtusa*, operculo convexo mammillato; perist. *simplex externum*: dentes lanceolati breves hinc inde *pertusi*.

Br. Europ. Fasc. XII. p. 10. t. 1. — Schwägr. Suppl. I. II. p. 58. t. 60. — *B. strictifolia* Tayl. Lond. Journ. of bot. 1846. p. 54; ex obs. Cl. Wilson l. c. p. 451 huc pertinet.

Patria. Ad terram et rupes prime viarum cavarum Italiae vulgatissima, Siciliae, Sardiniae, Hispaniae, ubi in Pyrenaeis et Monte Serrato 1803, serius in Apeninns, primus legit Bridel. Ex Africa septentrionali retulit Desfontaines. Ad fretum Magellanicum: Commerson in Hb. Brideliano. E Nova Hollandia ad Swan River a J. Drummond lect. accepit Taylor.

Antheridia maxime clavata, archegonia angusta, paraphyses numerosissimae.

48. **B. compacta** Hsch. (Hor. Phys. Berol. p. 63. t. 53.); *hermaphrodita; compacta humillima* ramosa, ramis brevibus strictis dichotomis, apice glauco-viridis inferne ferruginea; folia caulina sicca et madefacta erecto-appressa parva stricta, *lanceolato-subulata* basi plus minus ovata, ad marginem superiorem plerumque reflexum serrulata et dorso superiore scaberula, nervo crasso viridi excurrente, ubique minute subquadrata viride areolata; perichaetia similia; theca in pedunculo terminali vel innovando laterali *brevi subglobosa regularis minuta erecta glabra fuscescens gymnostoma*, operculo minute conico.

Brid. H. p. 44. — *B. Kraussii* Br. et Sch. Br. Europ. Fasc. XII. p. 10. t. 1. partibus omnibus cum specie Hornschuchiana convenit. — *B. stricta* Schw. Sp. Musc. p. 104.

Patria. Promont. bonae spei, in monte Leonis arborum cortices habitans: Bergius; ad terram humidam in umbrosis serius legit in promontorio Dr. Krauss 1838. Julio.

Paraphyses et antheridia pauca parva. *B. strictae* ex habitu aliquantulum affinis, sed notis illustratis species distinctissima et tenella.

49. **B. incana** Tayl. (Lond. Journ. of bot. 1848. p. 189.); *dioica?* uncialis cespitosa dichotome ramosa abbreviata erecta intense olivacea, junior viridis, ramis subdivaricatis; folia arcte imbricata erecta, tam madore quam siccitate stricta, triangulari-lanceolata acuminata subserrulata, *apice diaphano incano*; theca in pe-

dunculo axillari caulem superante *erecta oblongo-rotundata striata*; perist. duplex: dentes externi truncati. †.

Patria. Monte Pichincha Andium Quitensium: W. Jameson.

Ex animadv. auctoris *B. strictae* affinis, sed foliis incanis margine haud reflexis et theca majore erecta differre dicitur.

50. *B. ambigua* Mont. (Ann. d. sc. nat. 4. 1845. p. 103.); *dioica*; *laxe cespitosa* subhumilis erecta dichotome ramosa, ramis aequalibus strictis, sordide viridis; folia caulina conferta *erecto-appressa apicibus paulisper falcato-reflexa*, *madefacta patulo-recurva*, e basi *ampliata ovata oblongo-subulata* elongata, margine e basi ultra medium revoluta superne serrulato et apice serrato, dorso scaberrima, concava, nervo crasso viridi dorso serrato excurrente, ubique minute areolata; perichaetialia basi elongate anguste dense reticulata subplicata; theca in pedunculo elongato innovando laterali *erecta perfecte globosa regularis* profunde sulcata, operculo convexo hemisphaerico; perist. *simplex breve*: dentes externi *lineares angusti irregulares cartilaginei fusi*.

Patria. Chile, in terra nuda et ad rupes prope S. Jago et in Chile australiori: C. Gay et Pöppig.

Habitus *B. ithyphyllae* et *strictae*; ab illa jam differt ex foliorum forma, ab hac notis ceteris cursive impressis.

51. *B. sericea* Hsch. (Hor. Phys. Berol. p. 63. t. 13.); *hermaphrodita*; dense cespitosa humilis ramosa, ramis strictis dichotomis brevissimis, glauce vel luteo-viridis; folia caulina stricta erecto-appressa madefacta paulisper patentia, e basi *latiuscula lanceolata*, nervo crasso in *acumen breve crassum productum*, ad marginem *erectum* superne dentata, *dorso vix scabra*, undique e cellulis quadratis densis minutis areolata; perichaetialia similia; theca in pedunculo elongato substricto globosa erecta regularis basi subquadrata sulcata *gymnostoma macrostoma*, operculo minute conico.

Glyphocarpa Capensis R. Br. Trans. of Linn. Soc. XII. p. 575. — *Glyphocarpus Capensis* Brid. II. p. 91. — Schwägr. Suppl. II. p. 98. t. 128. — *Gymnostomum Capense* Hook. Musc. Exot. t. 165.

Patria. In prom. b. spei vulgatissima, terram et arborum corticem habitans: *Bergius* primus legit. — *Julio ad Novbr.*

Antheridia parva, paraphysibus acutis paucis flavidis mixta. — *B. strictae* similis, sed notis illustratis longe differt.

52. *B. quadrata* Hook. (Musc. Exot. t. 132.); *dioica*; laxe cespitosa erecta flexuosa elongata superne ramosa, inferne praecipue tomentosa; folia caulina *sparsa* erecta, *e lineari longe acuminata planiuscula* subtiliter serrata, basi subintegerrima, amoene viridia basi ferruginea, e cellulis subtilibus linearibus areolata, nervo valido ad apicem tenuiore pertingente ferrugineo; perichaetia interiora sensim minora basi badia; theca in pedunculo elongato erecta v. inclinata, *e conico globosa irregulariter angulata, interdum fere quadrangula, medio contracta, nuda, sicca valde sulcata, microstoma, operculo planiusculo mammillato, centro impresso.* †.

Glyphocarpus quadratus Brid. II. p. 92. — *Glyphocarpa quadrata* Schw. Suppl. II. I. p. 94. t. 128. — *Gymnostomum quadratum* Hook. Musc. Exot. t. 132.

Patria. In saxis humectatis umbrosis, ad scaturigines, in cacumine montis altissimi Postberg dicti, prope pagum Georgii in regione Anteniqualand prom. b. spei: *Burchell.*

Flos masc. terminalis capituliformis, foliis 4 — 6 ovato-acuminatis brevibus enervibus badiis. Antheridia ovato-oblonga, paraphysibus subclavatis mixta. — Species quoad thecae formam ab omnibus congeneribus primo ad spectu distinguitur.

b. *Brevipedunculatae.*

53. *B. intertexta* Schimp. (*B. [Glyphocarpa]* in Hb. Schlechtend.); *dioica*; latissime cespitosa subprostrata, tomento fusco inferne intertexta, *amoene lutescens*, ra-

mosa, ramis perbrevis teretibus curviusculis attenuatis; folia caulina erecto-appressa, madefacta erecto-potentia longa, lanceolato-subulata acutissima stricta, margine toto fere revoluta et minute serrulato, dorso valde serrulato-papillosa, e cellulis ubique aequaliter minutissimis, densis firmis rotundatis areolata, nervo crasso viridi in acumen serrulatum producto; perichaetialia teneriora longius setacea integra laevia; theca in pedunculo inter ramos duos posito perbrevis cygneo globoso-elliptica, sicca ore subcoarctata, magna laevissima purpurascens nitida gymnostoma, ore purpureo-annulato, tenuiter membranaea exserta, operculo hemisphaerico.

Gymnostomum setifolium Hook. Ic. Pl. Rar. II. t. 135.

Patria. Mexico: C. Ehrenberg. Peru pr. Huamantanga: Mathews.

Flores masculi in plantis propriis subsimplicibus intertextis cespites proprios efficientibus terminales gemmiformes crassiusculi ob innovationem perbrevem laterales fusci. Folia perigonialia e basi maxime concava lato-convolutacea margine paulisper denticulata tenuius areolata subito in subulam reflexam flexuosam subcanaliculatam parce denticulatam producta laevia. Antheridia maxima crassa superne attenuata curviuscula, paraphysibus tenuibus aureis acutis mixta. Vagina pedunculi lutei altitudinem aequans crassa fusca. — Species pulcherrima et nulla alia confundi potest. *B. Webbii* proxima est.

54. **B. Webbii** C. Müll.; dioica; procumbens subpulvinata sed laxè cohaerens radiculosa, pluries dichotome ramosa, ramis brevibus una cum caule teretibus attenuatis, lutea inferne ferruginea; folia caulina dense conferta erecto-appressa, e basi subovata lanceolato-subulata robusta, margine revoluta serrulata, dorso scaberrima, undique e cellulis minutissimis densis quadratis areolata, nervo crasso in acumen robustum excurrente; perichaetialia angustiora longiora laeviora longius reticulata teneriora; theca in pedunculo recto brevissimo inter ramos duos breves posito subexserta pachyderma globosa

tandem urceolata aequalis laevis *erecta*, gymnostoma, operculo, hemisphaerico depresso mammillato.

Glyphocarpa Webbii Mont. in Ann. des sc. nat. 1838. IX. p. 56. et in Hist. des Iles Canar. p. 28. t. 2. f. 2.

Patria. Insula Teneriffa, ad summam vallem Orotaviensem in fissuris rupium, quas incolae los Organos dicunt, nec alibi: **Webb.**

Calyptra ex auctore conica mitraeformis (?) subventricosa, margine repando v. integro, glabra. Flos masc. ignotus. — *B. intertextae* proxima, sed multo robustior longius radiculosa, haud tomentosa intertexta, theca pachyderma in pedunculo recto posita globosa.

55. B. Menziesii Turn. (in König et Sims Ann. Bot. I. p. 525. t. 11. f. 1.); *dioica; elongata erecta flexuosa flaccida mollis sericea parce et dichotome ramosa*, inferne tomento dense obsita; folia arcte imbricata erecta appressa stricta flavo-viridia, e basi lanceolata margine reflexa longe subulata, apicem versus denticulata, nervo crasso continuo, undique e cellulis subquadratis areolata; perichactialia interna longissime subulata; theca in pedunculo innovando laterali *brevis erecta globosa regularis laevis*, operculo convexo lato-mucronato; perist. nullum? †.

Hook. Musc. Exot. t. 67. — Brid. II. p. 48. — Schwägr. Suppl. III. 1. 2. t. 260.

Patria. In plaga occidentali Americae borealis: **Menzies 1792.**

Ex animadv. *Hookeri* *B. gracili* ex habitu similis, ex iconibus autem magis ad *B. intertextam* accedens.

56. B. affinis Hook. (Musc. Exot. t. 176.); *dioica; elongata erecta flexuosa dichotome ramosa*, inferne tomentosa, fusco-lutea; folia caulina undique imbricata erecto-patentia stricta, ovato-lanceolata, nervo crasso subferrugineo in cuspidem longam crassam producta, margine (tenuiter reflexa?) incrassata denticulata, e cellulis minute quadratis basi utrinque ad marginem amplioribus areolata; perichactialia intima minora et angustiora; theca

in pedunculo *brevi apice arcuato pendula sphaerica ampla brevis macrostoma sulcata*; perist. *duplex* (destructum). †.

Brid. II. p. 49. sub alio nomine *B. Brownei*, quum nomen, ex sententia *Bridelii* vera, vix satis idoneum sit. — Schwägr. Suppl. III. I. 2. t. 237.

Patria. Insula Van Diemen: R. Brown.

Ex animadv. Hookeri primo intuitu *B. Menziesii* similis, sed foliis brevioribus latioribus patentioribus et notis ceteris datis distat. Schwägrichen *B. fontanae* proximam habet. Planta mascula gracilior, flore terminali discoideo. Folia perigonialia late ovata acuta obsoletinervia, inferne gibbosa i. e. basi erecta inde patentia, aurantiaca. Antheridia longa, paraphysibus numerosis breviter articulatis obtusiusculis pallide flavescentibus.

57. *B. Abyssinica* C. Müll.; *dioica?* dense cespitosa humilis dichotoma, ramis aequalibus strictis, glauco-viridis; folia caulina erecto-appressa, madefacta erecto-patentia, e basi *ovata* concava lanceolato-subulata acuta stricta et *paulisper falcata*, margine *ad medium folii* paullo revoluta integra, superne ad subulae marginem et dorsum serrata, basi minutiuscule dense superne minute areolata, dorso papillis brevissimis scaberula, nervo crasso viridi excurrente; perichaetialia similia longius areolata; theca in pedunculo *brevi* stricto ob innovationem laterali exserta globosa, operculo parvo hemisphaerico aurantiaco et *stomate nudo*.

Glyphocarpa Abyssinica Hmp. hb.

Patria. Abyssinia, inter muscos alios Schimperianos collegit Hampe.

Florem masculum in ramis fertilibus frustra quaesivimus. Archegonia copiosa paraphysibus numerosis flavis mixta. *B. strictae* simillima, sed notis datis facile discernibilis.

58. *B. laevisphaera* C. Müll.; caulis *laev* cespitosus semiuncialis brunneo-olivaceus erectus subramosus; folia imbricata *valde rigida*, *maderfacta* *patenti-recurva*

secunda, lanceolato – subulata longe setacea serrulata, margine reflexa excurrentinervia; theca in pedunculo *perbrevis subexserta erecta sphaerica laevis*; peristomium: *membrana brevissima annularis*. †.

Glyphocarpa laevisphaera Taylor. Lond. Journ. of bot. 1846. p. 56.

Patria. In monte Pichincha Andium Quitensium: W. Jameson. Septbr. 23. 1826.

59. **B. subsessilis** Tayl. (Lond. Journ. of bot. 1847. p. 334.); subcespitosa erecta subsimplex, inferne brunnea superne amoene viridis; folia arcte imbricata subsecunda, *ex ovata basi subulato-setacea*, margine reflexa denticulata, siccitate stricta rectiuscula; theca in pedunculo *brevissimo subexserta erectiuscula sphaerica estriata*, operculo minuto; perist. nullum? †.

Patria. Monte Pichincha Andium Quitensium: W. Jameson. Novbr. 1846.

B. Hallerianae affinis, pedunculo brevior, foliis strictioribus angustioribus.

60. **B. Cryptopodium** C. Müll.; *divica*; caulis erectus elongatus, inferne denudatus, versus apicem *incrassatus, simplex* v. dichotomus robustissimus; folia caulina undique imbricata sparsa erecto – patentia, *linearisubulata* setacea parum falcata *longissima rigida carinata, fusco-viridia* v. *rufo-fusca*, margine erecto et ad nervi *ferruginei* crassi excurrentis dorsum serrata, e cellulis undique subrotundis minutis areolata; perichaetia paullo minora; theca in pedunculo *brevissimo parum curvo immersa late ovata erecta fusco-flavescens laevis terminalis*; perist. duplex praegrande: dentes externi lanceolato – acuminati rubri transversim striati intus denticulati, margine pellucidi flavescentes, interni *longe lanceolati albi*, laciniis connatis haud divergentibus, medio, pro more *Bryi, lacunosus*, ciliis elongatis 1 – 2 interpositis. †.

Cryptopodium bartramioides Brid. II. p. 31. — *Cryptop. Bartramia* Schwägr. Sp. Musc. 1830. p. 90. — *Bryum bartramioides* Hook. Musc. Exot. t. 18. — *Bryum Bartramia* Schw. Suppl. II. II. p. 25. t. 160.

Patria. In sinu Dusky Bay Novae Seelandiae: Menzies 1791. In insulis Sandwicensibus: Gaudichaud.

Pl. mascula dichotome ramosissima, floribus terminalibus creberrimis terminalibus crasso-gemmaceis. Folia perigonialia ovata acuta solidinervia. Antheridia numerosa, paraphysibus filiformibus tenuibus mixta. — Species memorabilis, habitu aliquantulo *B. viridissimae* theca terminali immersa et statura robusta similis, sed foliis evaginatis longe distat. *Cryptopodii* genus delemus; nam peristomium ab illo *Bartramiae* laciniis semper connatis haud divergentibus differt, utrumque autem est perist. *Bryi*; aliud (*Bartramiae*) sectionis *Acidodontii*, aliud (*Cryptopodium*) sectionis *Weberae*. Peristomia igitur typice non divergunt.

Sectio V. **Oreadella.** Caulis fastigiato-ramosus, foliis lanceolatis ut in *Weisiis* complicato-carinatis, nervis carinatis percursis, margine maxime revolutis, quadrate weisioides-areolatis, sublaevibus.

62. **B. gracilis** Flörke (in Schrad. bot. Journ. 1799. II. p. 171.); hermaphrodita; lata et laxe cespitosa elata gracilis inferne radiculosa viridissima v. sublutescens vage ramosa, ramis inaequalibus fastigiatis; folia caulina laxe disposita erecto-patentia falcato-recurva, lanceolata complicato-carinata, margine e maxima parte folii valde revoluta, apice et dorso nervi carinati excurrentis simpliciter serrata, laevia, e cellulis minutis quadratis densis, utriculo primordiali viridissimis, areolata; perichaetialia similia, sed basi e cellulis elongatis angustis plus minus laxis tenuioribus reticulata; theca in pedunculo substricto elongato globosa obliqua parva, sicca profunde sulcata, operculo conico acuto parvo; perist. *B. pomiformis*.

B. Oederiana Sw. Schrad. Journ. 1800. II. p. 181. — *B. Oederi* Schwägr. Suppl. I. II. p. 49. t. 59. — Brid. II. p. 46. — Br. Europ. Fasc. XII. p. 12. t. 3. — *Bryum Oederi* Gunn. Fl. Norv. n. 1005. — *Bartr. grandiflora* Schwägr. Suppl. I. II. p. 48. t. 58. — *B. pomiformis* Sulliv. Musc. Allegh. No. 121. — *B. longiseta* Brid. Mant. Musc. p. 116. — *B. subintegrifolia* P. B. Prodr. p. 44.

β. tomentosa; humilior compacte tomentosa gracilior.
B. Oederi *δ. fastigiata* Brid. Hb.

Patria. In rupibus humidis praesertim calcareis per subalpina et alpina totius Europae et Americae septentrionalis. Var. *β.* in alpidibus. — *Majo ad Augustum.*

Species distinctissima et foliorum forma habituque animum ad *Oreadem Martianam* referens, solitaria.

Gen. V. **Oréas** Brid.

Br. univ. I. p. 380. — *Catoscopium* Hüb. — *Weisia* Hsch.

Nomen ab auctore a graeca voce ὄρος (gen. ὄρεος) mons ductum est: melius autem ab *Oréas* (montis Nympha) derivatur. Nomen ante illud Chamissoanum synonymum prioratum tenet.

Calyptra cucullata. Peristomium simplex: dentes 16 lato-lanceolati, linea media carentes, intus lamellato-articulati, tenues laevissimi plani, interdum hic illic perforati, amoene aurantiaci, longitudinaliter striati, madefacti horizontales, sicci erecti. — Theca e collo globosa bartramioidea regularis sulcata exannulata. Habitus caulis weisioides, *B. gracilem* in memoriam redigens et *Catoscopio* similis.

1. **O. Martiana** Brid. (l. c. p. 383.); monoica; late et dense cespitosa, inferne tomentosa et arcte cohaerens, erecta elongata gracilis lutescens dichotome ramosa, innovationibus fastigiatis; folia octosticha sublaxe imbricata erecto-patentia parva, siccitate crispula, lanceolata stricta carinata, nervo excurrente, margine parum revoluta integerrima, ubique e cellulis quadratis leptodermis subpapillosis areolata; perichaetalia longius et acutius cuspidata, basi longius et tenuius reticulata; theca in pedunculo brevi cygneo-curvato nutans v. plus minus erecta parva sulcata nitido-rubra, operculo conico-rostellato obliquo.

Br. Europ. Fasc. XII. *Oreas*, p. 4. c. tab. — *Catoscopium Martianum* Hüb. Muscolog. Germ. p. 153. — *Weisia Martiana* Hsch. Flora 1819. II. p. 86.

Patria. In alpibus Tirolis, Salisburgiae et Carinthiae: Windisch - Mattreyer Tauern: Hornschuch detexit, Pasterze: Hornschuch, Funk, in schistosis apricis am Gaisstein im Pinzgau 6000': Sauter. E rarioribus. — *Aestate.*

Flos masc. terminalis, dein innovatione feminea lateralis minutus triphyllus. Folia perig. ovato - lanceolata obtusa. Antheridia pauca parva, paraphysibus paucis tenuissimis mixta.

Gen. VI. **Catoscopium** Brid.

Br. univ. I. p. 368. — *Weisia* Hdw. — *Grimmia* Sm. — *Bryum* Dicks. — *Melania* Brid. olim.

A *χάτω* deorsum et *οζονέω* speculor, ob thecae verticem deorsum spectantem.

Calyptra cuculliformis parvula. Peristomium simplex: dentes 16 brevissimi truncato-lanceolati diffformes inaequales transverse articulati, linea media exarati, albidi rugulosi rigidi suberecti. — Theca e collo inclinato globosa parva discelioidea nitida brunnea dein nigrescens pachyderma subcornea exannulata laevis. Habitus caulis in *Oreadem* inclinans.

1. **C. nigratum** Brid. (l. c.); *dioicum*; late et dense cespitosum, inferne tomentosum, sed laxius cohaerens, erectum elongatum gracile lutescens vage et dichotome ramosa; folia caulina octosticha laxe imbricata erecto-patentia parva, lanceolata stricta carinata, nervo excurrente, margine parum revoluta, integerrima, ubique e cellulis quadratis pachydermis laevibus areolata; perichaetia longius et acutius cuspidata, basi longius areolata; theca in pedunculo elongato erecto rigido dextrorsum torto purpureo apice in collum incrassato inclinata exannulata.

Br. Europ. Fasc. XII. *Oreadeae Catoscopium*, p. 4. c. tab. — *Weisia nigrata* Hdw. Musc. Frond. III. p. 97. t. 39. — *Grimmia nigrata* Sm. Fl. Brit. III. p. 1195. — *Bryum nigratum* Dicks. Fasc. III. Pl. Crypt. p. 9.

Patria. In rupibus irrigatis et pratis spongiosis ad alpium latera totius Europae, rarius in planitiei turfosis et in America septentrionali, ubi in Rocky Mountains turfosa loca copiose habitat: Drummond. Terra Nova insula: La Pylaie. — *Junio* et *Julio*.

Pl. mascula femineae similis, flore terminali gemmae-
ceo fusco. Folia perigonialia lanceolata stricta, basi ma-
gis concava tenuius reticulata. Antheridia pauca crassa,
paraphysibus paucis tenuibus pallidis obtusiusculis mixta.

Genus incertum.

Plagiopus Brid.

in Br. univ. I. p. 596. — *Bartramia* Seringe l. c.

Nomen a voce *πλάγιος obliquus* et *πούς pes*, ob pe-
dunculum thecae oblique insertum, ductum.

Calyptra dimidiata? Peristomium duplex. Exte-
rius: dentes 16 lanceolati acutiusculi aequidistantes.
Interius: *cilia totidem erecta, filiformia, cum*
dentibus alternantia, iisque subaequalia articulata
pallida.

Ex ic. *Bridelianis* *Bartramiae* fructum habet, sed
specimina ejus herbarii carent, quare de peristomii stru-
ctura referre non possumus. Ex habitu, forma et areo-
latione folii ad *B. gracilem* accedunt.

Pl. serratus Brid. (l. c.); *dioicus*; gracilis, erectus,
dichotome ramosus, inferne valde tomentosus; folia con-
ferta erecto-patentia, oblongo-lanceolata plus minus com-
plicato-concava, carinata, margine reflexa flexuosa, su-
perne denticulata et apice serrata, e cellulis quadratis
pachydermis sublaevibus areolata; perichaetia magis co-
mosa longiora; theca in pedunculo ob innovationem saepe
lateralis erecto stricto semunciali erecta, irregulariter e
ventricoso ovata, laevis, e lutescente fuscidula, operculo
brevis conoideo obtuso, thecae concolori.

Patria. In uliginosis alpium Helvetiae densissime
cespitosa habitat: Seringe 1822 ad Bridelium misit.

Optandum est, muscum hunc semel tantum lectum mox iterum reperiri.

Trib. XIX. POTTIOIDEAE.

Cespitosae raro gregariae, plus minus elatae saepe humillimae, graciles v. robustae, simplices v. ramosissimae, acrocarpicae v. ob innovationes pleurocarpicae. Folia lanceolata, ovata, rotundata, spatulata v. loriformia, carinata, complicata v. planiuscula, stricta v. reflexa, nervis teretibus instructa. Retis cellulae *parenchymaticae perfecte hexagonae v. quadrate hexagonae, basi semper laxiores saepe laxissimae, plus minus pellucidae saepe maxime hyalinae amplae fragiles rigidae foraminatae, superne papillis solitariis v. pluribus confluentibus, igitur saepe truncatis apice tuberculosi, in medio cellulae positae*, plerumque chlorophyllosae, raro utriculo primordiali praeditae, saepe minutissimae et incrassatae. Theca erecta rarissime inclinata, ovalis, elliptica v. pyriformi-oblonga, laevis v. striata, operculo plerumque conico v. rostrato. Archegonia et antheridia normalia, paraphyses plerumque filiformes.

Habitus distinctus nullus quidem, sed e foliorum areolatione inter sese intime cohaerentes plantae.

Patria. Regiones omnes orbis totius terrarum.

Subtrib. I. CALYMPERACEAE.

Cellulae folii basilares rigidae hyalinae saepe fragilissimae plus minus amplae inanes, distincte foraminatae.

Patria. Usque ad nives aeternas per orbem totum terrarum, sed *Encalyptae* hemisphaeram borealem prime amantes, *Calymperes* et *Syrrhopodontes* meridionalem solum praeferentes.

Plantae perfecte pottioideae, hic illic *Leucophanis* congeneres imitantes, subtribum maxime naturalem formantes, a *Pottiaceis* nec folii areolatione, nec ulla nota alia typice recedentes.

Gen. I. **Encalypta** Schreb.

Gen. Pl. n. 1643. — *Leersia* Hdw. — *Bryum*, *Mnium* antiq.

A graecis vocibus ἐν et καλύπτω velo obtegre, ob calyptrae totam thecam amicientis indolem.

Calyptra longe cylindrico - campanulata, superne operculi instar clavellate angustata, thecam superans firma, basi integra, lacerata v. ciliata. Perist. nullum, simplex v. duplex; externum: dentes 16 lanceolati v. longe subulati ciliiformes, plerumque linea longitudinali exarati rubentes rugulosi; internum: membrana tenera dentibus adglutinata in cilia dentibus opposita s. interposita producta.

Habitus calyptra excellentissime efformata proprius, e foliis involuto - tortuosis *Hypophilis* similis, cellulis autem basilaribus folii perfecte calymperoides ab iis distans. Folia basi e cellulis maxime pellucidis rectangulari - hexagonis plerumque rigidis fragilibus, parietibus teneris pallidis, dein rubentibus praeditis, superne grosse rotundatis maxime saepe truncato - papillosis areolata, opaca. Nervus basi purpureus superne flavus crassus.

Sectio I. **Psilotheca**. Theca glabra estriata.

a. *Peristomium nullum.*

1. **E. commutata** Nees et Hsch. (Br. Germ. II. p. 46. t. 15.); *monoica*; plerumque elongata valde dichotome ramosa ubique radiculosa; folia caulina erecto - patentia, patula v. squarrulosa, orato - lanceolata acuminata, nervo in cuspidem plus minus elongatam producta, concava subundulata, basi e cellulis multis laxis erythrodermibus reticulata margine cellulis multis angustioribus flavidis limbata, superne minutius areolata, maxime opaca, te-

nuius papillosa, haud revoluta; perichaetia similia; theca in ped. longiusculo purpureo erecta, subcylindrica, basi aequalis, laevis v. senectute striis rubentibus, haud sulcata, simpliciter annulata, operculo longe subulato recto; calyptra basi aequalis v. lacerata haud ciliata *superne glabra*.

Br. Europ. IV. p. 8. t. 1. — *E. affinis* Schw. Suppl. I. I. p. 68. t. 16. — Brid. I. p. 143. — *E. alpina* Wahlenb. in Fl. Lapp. p. 312.

Patria. In summis alpibus totius Europae, ubi ad nives aeternas usque rupium fissuras v. terram nudam habitat, et in America septentrionali. — *Julio, Augusto.*

Flos masc. lateralis, foliis perig. ovato-lanceolatis apiculatis, superne opacis, nervo evanido v. excurrente; antheridiis paucis, paraphysibus flavidis clavate articulatis mixtis. — Notis illustratis ab *E. vulgari* et omnibus congeneribus certe refugit.

2. *E. lacera* De Not. (Mant. n. 66. et Syllab. p. 268.); *monoica*; laxa cespitosa erecta innovando ramis tenuibus fastigiata ramosa; folia caulina erecto-patentia oblongo-subovata v. oblonga acuminata canaliculato-subundulata integra, nervo valido crasso sursum attenuato apicem subattingente, juniora cuspidulata cava demum acuta v. obtusiuscula, sicca complicate incurva, basi e cellulis permultis laxis erythrodermibus, margine elongatis angustatis limbum flavidum efficientibus, superne minutis valde opacis tenuissime papillosis areolata; perichaetia similia; theca in ped. mediocri rubente erecta cylindracea aequalis annulata laevis, operculo conico subulato breviori; calyptra basi *haud coarctata ciliis laciniformibus latis inflexis divisa, apice scaberula*.

Patria. In alpibus Penninis: Comba; in monte Cenisio: Bonnaz.

Ab *E. commutata* et *ciliata* calyptrae indole primo intuitu certe differt.

3. *E. microstoma* Bals. et De Not. (Pugill. n. 18. et Syllab. p. 269.); *monoica*; laxa cespitosa erecta sub-

elongata parce breviter ramosa inferne radiculosa; folia caulina *patenti-erecta haud reflexa, late ovata* obtusiuscula evanidinervia v. nervo excurrente mucronata, basi *brevi* e cellulis parvis erythrodermibus *paucis* margine limbum vix efficientibus superne robustis hexagonis viridissimis *tenuissime papillosis* areolata, *margine haud vel vix revoluta*; perichaetialia similia; theca in ped. brevi rubente erecta, *cylindracea oblonga utrinque sensim attenuata, ore angustissima*, operculo subaequante, calyptra basi minute et irregulariter fimbriata denticulata lacerave apice summo scaberula.

Enc. ciliata v. *gymnostoma* Hb. nonn.

Patria. In monte Adula (St. Gottardo) *Brambilla* detexit, in summo Faulhorn, in jugo Bormiensi pr. Trafoi: W. P. Sch., in m. Geistein Tirolis altit. 7000': Sauter.

Notis cursive impressis ab *E. ciliata* proxima distat.

4. ***E. cuspidata*** Br. et Sch. (in Musc. Abyss. Schimp. No. 492 b.); *monoica*; dense cespitosa erecta elongata robusta breviter ramosa, inferne sordida vel *purpurascens*, superne virescens; folia dense imbricata, late oblonga subcomplicata, nervo valido excedente crasse cuspidata robusta, basi brevi cellulis erythrodermibus multis limbum vix efficientibus superne viridissimis perfecte papillosis opacis areolata, margine revoluta; perichaetialia latiora; theca in ped. brevi rubente erecta cylindracea, operculo breviori; calyptra magna *basi coarctata*, laciniiis latis eleganter fimbriata, summo apice scaberula.

Patria. In monte Simensi Bachit Abyssiniae: W. Schimper.

Flos masc. axillaris, foliis perig. latissime ovatis cuspidatis laxè reticulatis rufis, superne subpapillosis subviridibus, antheridiis elongatis numerosis, paraphysibus crassis flaccidis aureo-flavis acutis mixtis. — Ab *E. ciliata* simillima theca *gymnostoma*, a ceteris congeneribus hujus divisionibus calyptra basi coarctata et foliis senectute purpurascentibus differt.

5. *Peristomium simplex*.

5. **E. vulgaris** Hdw. (Sp. Musc. p. 60.); *monoica*; humilis dense cespitosa parce dichotoma, radiculosa; folia caulina oblongo-lanceolata obtusa v. plus minus acutiuscula et nervo saepe excurrente apiculata v. pilifera, basi margine e cellularum angustarum seriebus compluribus limbata, obsolete denticulata, superne haud revoluta; perichaetialia similia; theca in ped. breviusculo purpureo plerumque erecta raro obliqua perfecte cylindrica rubens simpliciter annulata, operculo longe subulato recto; perist. nullum *vel fugacissimum, e dentibus lanceolatis s. truncatis obsolete articulatis albidis rugulosis compositum*; calyptra pallida *basi aequalis v. lacerata superne scabra*.

Brid. I. p. 139. — Br. Eur. IV. p. 9. t. 2. — *E. exstinctoria* Sw. Musc. Suec. p. 24. — *E. pilifera* Fk. in Brid. I. p. 141. — *E. obtusifolia* ej. et *laevigata* ej. in Brid. I. p. 766. — *E. leptodon* Bruch in schedulis, forma peristomata. — *E. Orsinii* De Not. Syllab. p. 267. — *Leersia vulgaris* Hdw. Musc. Fr. I. p. 46. tab. 18. — *Mnium exstinctorium* L. fil. Meth. Musc. p. 365. — *Bryum exstinctorium* L. Sp. Pl. p. 1531. — *Bryum*, calyptra exstinctorii forma, minus. Dill. Musc. p. 249. t. 45. f. 8.

Patria. Per totam Europam, muros, saxa, graminosa, terram nudam praecipue argillosam habitans, usque ad alpes ascendens. — *Vere.*

Flores masc. laterales angusti, foliis perig. convolutaceo-ovatis acuminatis obsolete nervibus eroso-denticulatis, ubique laevibus et pellucide reticulatis, antheridiis paucis, paraphysibus paucis filiformibus tenuissimis mixtis.

6. **E. Mexicana** C. Müll.; *monoica*; habitus *E. vulgaris*, sed robustior; folia caulina nervo excurrente apiculata; perichaetialia similia; theca in ped. longiore flavido dein rubente erecta cylindrica angusta simpliciter annulata, operculo longe subulato recto; perist. simplex, e dentibus lanceolatis brevibus rubentibus rugulosis superne albidis obsolete articulatis compositum; calyptra *basi perfecte et longe fimbriata superne glabra*.

E. leptodon Schimp. in Hb. Schlechtendalano.

Patria. Mexico: C. Ehrenberg.

Flores masculi laterales, *crassi*, foliis perig. *late ovatis acutis*, nervo evanido v. *excurrente*, apice denticulatis et *opace areolatis scaberrime papillosis*; antheridiis paucis, paraphysibus *numerosis clavato-articulatis* mixtis. — Ab *E. vulgari* notis cursive impressis certe distat.

7. **E. microphylla** Nees et Hsch. (Br. Germ. II. p. 44. t. 14.); *monoica*; dense cespitosa humilis inferne radiculosa pluries dichotoma *gracilis*, intense olivacea apice amoene virescens; folia caulina *parva subsquarrosa ovato-elliptica*, nervo crasso *excurrente*, apice *parum recurva*; perichaetialia majora oblonga undulata, *intima minuda lanceolata obsoletinervia* diaphana; *omnia longicuspidata*; theca in ped. brevi cylindrica erecta aequalis laevis; perist. simplex, e dentibus 15 simplicibus lanceolato-subulatis purpureis compositum; operculo dimidio breviori, calyptra basi integra pluries laciniata. $\frac{1}{4}$.

Patria. Tirolis, inter „dem Brenner und dem Vitschthal“, ubi legit Funk 1825. — *Julio.*

Flos masc. lateralis, foliis perig. ext. rotundato-obtusis evanidinerviis, internis caulinis similibus minoribus laxius reticulatis. Detectori ipsi ignota species, ut ex animadv. Br. Europ. elucet, caeterum gracilitudine et foliis squarrosis parvis ovato-ellipticis ab *E. vulgari* longe distare videtur.

8. **E. ciliata** Hdw. (Sp. Musc. p. 6.); *monoica*; laxe cespitosa breviter dichotome ramosa intense viridis; folia caulina e basi angusta erecta subito patula late ovata, spathulata, planiuscula, sicca paullo torta, *marginē medii revoluta*, nervo in acumen denticulatum producta, basi e cellulis maxime pellucidis plerumque erythrodermibus *marginē vix limbum efficientibus* superne grosse rotundatis et maxime papillosis areolata, perichaetialia similia; theca in ped. longiusculo flavido dein purpureo erecta, subcylindracea intense rubens, simpliciter annulata, operculo longe subulato recto; perist. simplex, e dentibus 16, divisione saepe multiplicatis, *longe infra orificium oriundis*, lanceolatis articulatis rugulosis rufis compositum; ca-

lyptra basi coarctata, fimbriis inflexis pulchre reticulatis eleganter ciliata, amoene flavida, summo apice scabra.

Br. Eur. IV. p. 10. t. 3. — *E. fimbriata* Brid. I. p. 145. — *E. clausa* Wallr. Fl. Germ. Crypt. — *Leersia fimbriata* Brid. Musc. Rec. II. I. p. 53. — *L. ciliata* Hdw. Musc. Fr. I. p. 49. t. 19. — *L. laciniata* Hdw. Fund. Musc. II. p. 103. — *Bryum extinctorium* formâ majus et ramosum. Dill. Musc. p. 350. t. 45. f. 9.

Patria. In montosis usque ad alpes totius Europae et in America septentrionali, rupes et terram nudam habitans. — *Vere.*

Flos masc. minutus lateralis, foliis perig. ovato-lanceolatis acuminatis evanidinervibus, externis apice subopacis, internis ubique pellucide reticulatis, antheridiis copiosis, paraphysibus clavato-articulatis flavidis mixtis.

9. ***E. apophysata*** Nees et Ilisch. (Br. Germ. II. p. 49. t. 15.); *monoica*; dense cespitosa tomentosa humilis parce ramosa; folia caulina late lanceolata, nervo excurrente mucronata carinate concava, basi brevi pellucida rubiginosa haud limbata, superne maxime opaca, saepe plicata undulata, valde papillosa, perichaetialia in pilum brevem denticulatum producta; theca in ped. breviusculo rubente erecta, *ex ovato cylindrica collo instructa, operculo longe subulato recto et annulo imperfecto persistente*; perist. simplex: dentes angusti longiusculi pallidi rugulosi articulati linea longitudinali exarati v. fissi; calyptra maxime scabra, *basi irregulariter laciniata.*

Br. Eur. IV. p. 11. t. 4. — *E. cylindrica* Nees et Hornsch. Br. Germ. p. 52.

Patria. In alpibus Helvetiae, Tirolis, Carinthiae, Sudetorum, Norvegiae. — *Aug., Sept.*

Flos masc. angustus lateralis, foliis perig. 3—4 latiuscule ovatis mucronato-acuminatis, nervo evanido, superne opacis angustis; antherid. paucis, paraphysibus longis flaccidis superne flavidis longe articulatis tenuibus mixtis. *E. rhabdocarpae* affinis, sed theca estriata longicolla jam primo adspectu differt.

10. ***E. longicolla*** Br. et Sch. (Br. Eur. IV. p. 12. t. 5.); *monoica*; dense cespitosa radiculosa, interdum so-

litaria v. aggregata, humilis parce breviter dichotoma; folia caulina e basi oblonga medio coarctata margine haud limbata late lanceolata acutiuscula v. apiculata, concava, nervo apice evanido, haud revoluta, maxime opaca; perichaetia ovato-lanceolata tenuissime apiculata s. pilifera; theca in ped. breviusculo rubente erecta *pyriformi-oblonga longicolla, deoperculata ore ampliata*, simpliciter annulata, operculo e basi *convexa clavellato dimidio breviori dicranioideo*; perist. simplex; dentes 16 lanceolati longi, *linea longitudinali relictis in cilia cohaerentia saepe ramuloso-dilacerata fissi, rarius subintegri, intense purpurei*; calyptra basi crenulato-laciniata apice scabra sordide flava.

Patria. In monte Schwarzenberg regionis Wochein alp. Carniol. legit primus Fr. Müller saxa habitantem 1826. Ad Chasseron mont. Jura legit W. P. Schimper 1846. In alpib. Bavaricis, Schattenberg 5 — 5600' alt. leg. Sendtner. E rarissimis! — *Aestate.*

Flos masc. lateralis angustus longus, foliis perig. anguste lanceolatis acutiusculis concavis apice opacis evanidinervibus, antheridiis paucis, paraphysibus longis rufescentibus tenuibus mixtis.

11. **E. brevicolla** Bruch (in schedulis); *monoica*; *E. longicollae* simillima, folia latiora, theca cylindrica, collo brevi angustiori; perist. dentes similes breviores albidii, sporae duplo minores. †.

E. longicolla β. *brevicolla* Br. Eur. IV. p. 12. t. 5. β.

Patria. Norvegia pr. Kongsvold detexit Kurr; praeterea ex Ångström in Suecia. Lapponia pr. Kandalax, et in Finlandia pr. Kuusamo.

Sectio II. **Rhabdotheca.** Theca sulcata

12. **E. spathulata** C. Müll.; *monoica*; *humillima gracillima, ramis duobus divisa, subaggregata cespitosa radiculosa*; folia caulina *madefacta et sicca maxime patula minus torta, e basi longa e cellulis elongatis angustis pellucidis flavidis raro inferne rufescentibus fragili-*

bus reticulata margine vix limbata *angustâ sensim ovata*, igitur *spathulata*, undulata planiuscula, apice *reflexa*, infima obtusa, superiora et perichaetialia in *pilum longum flexuosum obsolete denticulatum hyalinum producta*, superne maxime opaca et papillosa; theca in ped. longiusculo purpureo erecta, *subcylindracea*, ore *aequali subangusto*, *longicolla laeviter et erecte striata gymnostoma*, simpliciter annulata, operculo breviori conico-subulato recto; calyptra flavida, basi laciniata aequalis, summo apice minutissime scabra.

E. rhabdocarpa β . *pilifera* Schwagr. in Willkomm Musc. Hisp.

Patria. Hispania, in fissuris rupium calcar. montis Santa Maria dicti in Sierra de Chiva, 5500' altitud. 2. Juni 1844: Willkomm.

Flos masc. in ramulo proprio terminalis minutus, foliis perig. parvis externis late ovatis piliferis, superne opacis, internis angustis piliferis pellucide reticulatis excurrentinervibus; antheridiis magnis paucis, paraphysibus paucis *crassis clavato-articulatis cellulosus v. ramosis raro simplicibus rigidis* flavidis mixtis. — Notis cursive impressis ab *E. rhabdocarpa*, *commutata* et *apophysata* simillima distat.

13. *E. rhabdocarpa* Schw. (Suppl. I. I. p. 56. t. 17.); *monoica*; dense cespitosa radiculoso-tomentosa parce et breviter dichotoma; folia caulina late lanceolata v. oblonga acutiuscula v. pilifera acutiuscula, margine basis limbata subdenticulata, haud revoluta, nervo evanido v. excurrente; perichaetialia obtusiuscula; theca in ped. breviusculo purpureo erecta ovata dein subcylindracea, *striis 8—16 rufis erectis sulcata*, simpliciter annulata, operculo longe subulato recto; perist. *simplex*, e dentibus 16 late lanceolatis subtrigonis, *linea longitudinali carinata saepe obsoleta exaratis, articulatis plerumque integris rugulosis rufis vel plus minus albidis compositum*; calyptra basi sublacerata, superne scabra.

Brid. I. p. 142. — Br. Eur. IV. p. 13. t. 6. — *E. affinis* Hdw. Fil. in Web. et Mohr. Arch. syst. nat. Gesch. I. p. 121.

Patria. In subalpinis et alpinis totius Europae et Americae septentrionalis. — *Julio, Augusto.*

Flores masculi laterales, foliis perig. late ovatis breviter acuminatis, superne opacis, basi margine limbata, antheridiis paucis, paraphysibus numerosis saepe tortuosis aureo-viridibus longis crassis mixtis.

14. *E. streptocarpa* Hdw. (Sp. Musc. p. 62. t. 10.); *dioica*; dense cespitosa radiculoso-tomentosa elongata robusta parce dichotoma; folia caulina valde involuto-tortuosa, madefacta patula, e basi angustiore fragilissima ad marginem denticulatum cellulis angustioribus longioribus limbata late et obtuse lanceolata, parum concava, nervo crasso flavido dorso scabro evanido basi purpureo, grosse rotundato-areolata viridissima, in utraque pagina robuste papillosa igitur opaca; perichaetia e lanceolato subito acuminata; theca in ped. longo crasso purpureo stricto erecta, elongate cylindrica, basi ovata aequalis, *spiraliter profunde sulcata*, pallida, late annulata, operculo longe subulato recto aurantiaco; calyptra longe falcata cornea sordide flava basi lacerata, apice scaberrima; perist. duplicis dentes externi *longi stricti 16 subulato-filiformes nodosi rugulosi purpurei*; interni: *cilia tenuiora multo breviora articulata in membrana longe exserta posita rugulosa fuscidula.*

Brid. I. p. 111. — Br. Eur. IV. p. 15. t. 7. — *E. grandis* Sw. Schred. Bot. Journ. II. p. 112. — *Hypnum saxatile* erectum ramulis teretibus foliis subrotundis saturate viridibus. Bill. Musc. p. 385. t. 43. f. 71.

Patria. In rupium fissuris et muris prae calcareis per totam Europam, e planitie ad alpes ascendit, sed rarissime fertilis. — *Majo, Junio, in alpidibus Augusto.*

Pl. mascula paulo gracilior, femineae intermixta. Flos terminalis in ramulo proprio gemmiformis, foliis perig. internis late-ovatis subacuminatis; antheridiis numerosis, paraphysibus clavato-articulatis mixtis. — Ex axillis folior. super. radicle fasciculate ramosi egrediunt.

15. *E. procer* Br. et Sch. (Br. Eur. IV. p. 14. t. 6.); *monoica*; habitus *E. streptocarpae*; folia e basi margine

*vix vel haud limbata integerrima brevior latiore late et obtuse lanceolata subligulata, margine revoluta, papillis longis creberrimis ubique oblecta; superiora et perichae-
talia in pilum longum flexuosum denticulatum producta; theca multo laevius spiraliter sulcata; perist. duplicis den-
tes externi 16 inaequales lineari-subulati linea longitudi-
nali exarati transverse articulati rufi rugosi, interni: ci-
lia 16 dentibus similibus opposita lineari-lanceolata lu-
tescentia punctulata transverse articulata, e membrana
obscuriore in dentium interstitiis linea rufa ornata proce-
dentia, dentes externos aequantia, calyptra minus cornea
scaberrima flavide nitens.*

E. streptocarpa Hook. in Drumm. Musc. Amer. No. 48.

Patria. Norvegia, in alpibus Kongsvoldianis: Dr. Kurr 1827. — America septentrionalis ad saxa et ru-
pes in Rocky-Mountains: Drummond.

Flores masc. laterales plures, foliis perig. patulis e
basi angusta laxe reticulata late-ovata breviter acumi-
nata, superne margine papillis eroso-denticulata evani-
dinervia; antherid. magnis clavatis, paraphysibus nume-
rosis clavato-acutis flavis mixtis. Caetera: theca, oper-
culum, annulus praecedentis.

Incertae sedis.

E. Caucasica Ruprecht (Bull. de la soc. imp. des
nat. d. Mosc. 1846. p. 521.); caulis erectus s. adscendens,
dense foliosus, ramis inaequalibus; folia sparsa congesta
erecto-patula carinata, lanceolata longissime acuminato-
cuspidata, subinde apice diaphana, sicca contorta, tenuis-
sime areolata, nervo crasso excurrente; theca in ped. me-
diocri rubente oblongo-cylindracea laevis, basi et apice
colore croceo ornata, operculo longe acuminato recto, ca-
lyptra basi in lacinias inaequales obtusas fissa, laciniis
inaequaliter incisis. †.

Patria. In monte Kasbeck Caucasico, ex altitud.
1526', prope nives liquescentes, Aug.: Kolenati.

Proxime accedit ad *E. commutata* et *ciliata*; differt ab antecedente: calyptra basi laciniata, ab insequente foliis lanceolatis acuminato-cuspidatis, haud spathulatis, apiculatis. Perist. thecae imperfectae auctor non vidit.

Gen. II. *Calymperes* Sw.

Jahrbücher der Gewächskunde von Sprengel, Schrader und Link. 1818. p. 1. t. 1. — *Cryphium* P. d. B. mst.

A graeca voce *κάλυμμα* tegmen, et *πέλω* transadigo nomen compositum.

Calyptra totam thecam involvens latere fissa torta basi angustata persistens plicata. Peristomium nullum. Caetera *Syrrhopodontis*.

Calyptrae typus *Pyramidulae*, qua nota congeneres *Syrrhopodontes* certe refugiunt.

Sectio I. **Hyophilina.** Folia late convoluta, marginibus involutis, nervo crasso calli instar folium percurrente.

1. **C. Moluccense** Schw. (Suppl. II. 2. p. 99. t. 127.); *dioicum*; brevicaule robustum molle dense cespitosum brevissime ramosum; folia densa patentia lanceolato-linearia obtusa, margine undulata, hic illic inflexa, integerrima, sicca tortilia, basi pellucida, superius virore a margine versus nervum oblique ascendente, mollia, amoene viridia, nervo lato ad apicem saepe latiori concolori; perichaetia sextuplo minora; theca brevipedunculata cylindrica gymnostoma laevis badia, operculo triplo minori conico-subulato; calyptra profunde sulcata. $\frac{1}{4}$.

C. Afzelii β . *Moluccense* Brid. II. p. 87.

Patria. Insula Rauwack Archipelagi Moluccensis, lignis adnatum: Gaudichaud.

E patria et notis supra datis a *C. latifolio* certe distare videtur.

2. **C. Afzelii** Sw. (l. c. p. 3. t. 1. ex parte); *dioicum*; habitus *C. Richardi*; sed robustius magis ramosum mollius, folia multo angustiora, superne madefacta quoque

valde convolutacea angusta, nervo dorso scaberulo in cuspidem crassissimam terelem obtusatam utrinque serrulato-scaberrimam saepe anomalam producto, apice serrulata, supra basin anguste basi late limbata; theca brevipedunculata ovalis gymnostoma, operculo subulato recto brevi; calyptra plicata.

Brid. II. p. 86. — *C. Palisoti* Schw. Suppl. I. I. p. 334. ex parte. — *Dicranum ustulatum* Brid. I. p. 458!

Patria. Ad Sierram Leonam Africae, ubi ad arbor. legit *Afzelius*.

Notis cursive impressis a *C. Richardi* simillimo facile differt.

3. **C. Richardi** C. Müll.; *dioicum*; laxe cespitosum gracile subsimplex *rigidum* viridissimum; folia caulina rigida torta, madefacta patula, e basi erecta superne dilatata laxe arcolata longiuscula latiuscule flavide limbata crenulata subito reflexiuscula convolutaceo-oblonga undulata *obtusissima*, nervo ante apicem cranido apice saepe *incrassato dilatato* haud excedente filis articulatis oblecto, minute areolata opaca, tenuissime papillosa, *integerrima*, supra basin ultra medium angustissime fere obsolete flavide limbata; theca breviter pedunculata ovalis gymnostoma exannulata, operculo conico subulato recto brevi; calyptra flavida plicata, apice tenuissime scabra.

C. Palisoti Schw. Suppl. I. I. p. 334. ex parte et mult. al.

Patria. Per totam Guianam, Gallicam, Anglicam et Batavicam: Richard, Schomburgk, Kegel. Brasilia ad Pernambuco: Gardner Coll. No. 47.

A *C. Afzelii* notis illustratis certe distat.

4. **C. erosum** C. Müll. (Linn. XXI. 1818. p. 182); *dioicum*; breviusculum erectum, apice breviter et fastigiate ramosum igitur comosum, basi simplex tenue, molle, viridissimum, tenellum; folia caulina breviter crispata, madefacta patula, basi erecta vaginante brevi inferne angusta superne lata maxime pellucida laxa, *marginibus limbo incrassato tenerrime et angustissime membranaceo hyaline serrulato praedita*, supra basin constrictam parum

reflexa convolutaceo-oblonga obtuse acuminata, nervo crasso ante apicem evanido *dorso scabro*, minutissime areolata opaca, tenuissime papillosa, *toto ambitu undulata erosio-serrulata*; theca in ped. brevi rubente flexuoso erecta angusta ovalis, operculo subulato recto; calyptra longa torta angusta plicata, plicis serrulato-scabris.

Patria. Ad truncos arborum Surinami, inter *Cladonias* legit Kegel, inter *Hypna* misit Miquel.

Calymperi Richardi proximum, sed foliis illustratis facile discernibile.

5. **C. latifolium** Hmp. (Pl. Preiss. p. 116.); *C. Richardi* simillimum; folia rigida torta viridissima, *spathulato-oblonga* obtusa brevissime acuta, nervo crasso ante apicem evanido, *ubique integerrima*, basi cellulis laxis neque pellucidis fragilibus, sed mollibus flavidis, *marginibus haud limbata*, superne minutissime areolata opaca, tenuissime papillosa.

Patria. Nova Hollandia, inter *Fabroniam Hampeanum* prope oppid. Perth: Preiss 1840. No. 2473.

A *C. Richardi* notis datis facillime distinguitur. Folia anomala non vidimus.

6. **C. disciforme** C. Müll. (Linn. XXI. 1848. p. 183.); pulvinate cespitosum erectum rigidum crassum subsimplex sordide viride; folia caulina rigida, parum incurva, madefacta valde patula; inferiora majuscula curvata, convolutaceo-oblonga, nervo dorso apicis interdum scabro excurrente mucronata, integra, basi $\frac{1}{3}$ laxae areolata, cellulis amplis limpidis, margine flavide marginata, superne opace minute reticulata, tenuissime papillosa; *superiora caudis sterilis apice caudis discum formantia latissime ovata acuta planiuscula*, nervo latissimo continuo, medio *filis articulatis fasciculatis numerosis conglomeratis instructo*, basi haud marginata, minus laxae, superne majus areolata; theca brevipedunculata ovalis, operculo conico obliquo, calyptra plicata, ad plicas et summo apice scaberrima.

Patria. Surinam pr. Paramáribó in ramis tenuibus loc. valde humid. et occultorum: Kegel Aug. 1844. legit. Ex insula Trinitatis Antill. mis. Crüger. Rarissimum.

Caulis e disco saepe quasi polytrichoideo – prolifer, qua nota species e distinctissimis.

7. **C. repens** C. Müll.; late et dense cespitosus, *repens effusus, pusillus densifolius robustus*, fastigiatus brevissime ramosus, aureo-viridis, *rigidus*; folia *densissima* tortuosa, *madefacta subdivaricata*, e basi erecta brevi e cellulis pellucidis angustis reticulata late flavide limbatâ reflexa, *late lingulate oblonga*, nervo tenui flavido in mucronulum brevissimum excurrente, minutissime rotundate areolata vix opaca viridissima, tenuissime papillosa, margine *valde undulato* involutaceo limbo angusto flavido ante apicem evanido instructo, *toto ambitu crenulata*.

Syrrhopodon repens Harv. Lond. Journ. of bot. 1840. II. p. 7. Ic. in Hook. Ic. Pl. Rar. t. 22. f. 4; sed margine nimis serrulato declinato!

Patria. India orientalis, Penang ad cort. arborum.

E structura foliorum (normalium) ad *Calymperis* genus magis quam ad *Syrrhopodontes* pertinet.

Sectio II. **Eucalymperes.** Folia plus minus plana, nervo carinato.

a. *Folia loriformia.*

8. **C. lonchophyllum** Schw. (Suppl. I. II. p. 333. t. 98.); *dioicum*; late laxè cespitosum molle acaule cerino-viride, in ramos acaules permultos comose dispositos divisum; folia elongata maxime tortuosa, *madefacta stricta*, parum canaliculata, longe lanceolata, basi ovate dilatata: ad nervum crassum continuum e cellulis permultis amplis pellucidis areolata, utrinque limbo obscuro incrassato marginata, limbo iterum membrana tenerrima hyalina crenulata limitato, superne utrinque margine lamellata, lamellis obsolete et remote denticulatis, minute flavide areolata firma; theca in ped. mediocri exserto recto cylindraceo-ovalis gymnostoma exannulata fusca, oper-

culo in columella exserta longe persistente subulato recto; calyptra profunde plicata, apice plicis denticulato-scabris.

Brid. II. p. 88. excl. Syn. *C. Palisoti*.

Patria. In arboribus Guianae detexit Richard. Ex insula Trinitatis Antillarum misit Crüger, qui in monte Tamanaco pulcherrime fructiferum legit.

Archegonia permulta angusta, paraphysibus numerosis filiformibus elongatis maxime hyalinis breviter articulatis mixtis.

9. *C. serratum* A. Br. (in Nees Hb.); *dioicum*; habitus *C. lonchophylli*; sed folia breviora, basi e cellulis multo minoribus areolata vix limbata, lamellis folii superioris serratis, nervo in apicem crassum producto.

Patria. Java: Junghuhn.

b. *Folia lanceolata.*

10. *C. Crügeri* C. Müll.; *dioicum*; laxe cespitosum elatiusculum erectum robustum parce divisum sordide viride; folia caulina dense imbricata tortuosa squarrosa, basi erecta vaginante inferne angusta superne sensim late dilatata, cellulis amplis pellucidis, margine late flavide et incrassate limbata, subito reflexa anguste lanceolata, apice nervo crasso percursu rigido crasso obtuso subanomalo, margine incrassate limbata *integerrima*, canaliculata minutissime flavide areolata; perichaetia erecta latiora longe vaginantia, cellulis elongatis angustis teneris flexuosis reticulata; thecae saepe geminatae brevipedunculatae erectae ampliuscule ovaes laevissimae nitidae gymnostomae exannulatae, operculis conico-subulatis rectis; calyptra nitida laevis dein plicata apice scabra.

Patria. Insula Trinitatis Antillarum, monte Tocuche: Crüger, 4. Dec. 1847.

Archegonia pauca, paraphysibus longissimis numerosis tenuissimis acutis longe articulatis mixtis. — Species pulcherrima.

11. **C. Guildingii** Hook. et Grev. (in Brewster Edinb. Journ. of Sc. III. p. 223.); caulis elongatus; folia lineari-setacea subrigida, sicca subtorta, madefacta stricta, sensim acuminata, omnino integerrima; pedunculus vix exsertus; calyptra fusca. †.

Patria. In locis umbrosis, ad trunc. arborum montis St. Andreae insulae St. Vincentii: Rev. L. Guilding.

An a *C. Crügeri* distet, e diagnosi pauperrima haud elucet.

Species delenda.

C. Berterii Spreng. (in Neu. Entdeck. III. p. 1.), quod e spec. Ilb. Sprengel. compositum est e *Funaria hygrometrica* et *Bryo* quodam sterili.

Gen. III. Syrrhópodon Schw.

Suppl. II. 2. p. 110. — *Cleistostoma* Brid. — *Orthotheca* Brid. — *Dicranum* cj. — *Trachymitrium* cj. — *Calymperes* nonnull. — *Codonoblepharum* Dz. et. M. — *Weisia* al.

A graeca voce *σὺρρῆνω* connireo et *ὀδούς*, ob dentes peristomii conniventes fere horizontales, nomen ductum.

Calyptra *dimidiata cucullata*. Peristom. e dentibus 16 lanceolatis integris plerumque horizontalibus compositum, v. nullum. Thecae orificium interdum epiphragmate clausum.

Calyptra sola a *Calymperi* differt.

Sectio I. **Myophilidium**. Folia plus minus reflexa, e basi vaginata lanceolata, margine siccitate involuta, involute crispata, rigida, crassinervia.

1. **S. Hornschuchii** Mart. (Fl. Bras. p. 6.); erectus fasciculato-ramosus, inferne subnudus, ramis dense foliosis; folia rigidiuscula, tortilia, madefacta patentia, inferiora ovato-lanceolata denticulata margine involuta inde subulata, superiora longiora e basi membranacea vaginante excavata pallidiore linearia acutiuscula carinata marginata pellucide serrata margine inflexo, rufescentia, nervo

crasso ferrugineo plerumque ultra apicem excurrente; perich. latiora; thecae subinde geminatae in ped. erectis longiusculis apice incrassatis erectae oblongae laeves fuscae, operculis conico-subulatis obliquis duplo fere longioribus; calyptra subcampanulata longa glabra straminea, apice fusca, latere fissa. †.

Patria. Brasilia, prov. Minarum Generalium et in regionibus flum. Amazonum: Martius.

Calymp. *Afzelii* proximus dicitur. Perist. ignotum.

2. S. fasciculatus Hook. et Grev. (in Brewster Edinb. Journ. of Sc. III. p. 225.); *dioicus*; subrepens dense cespitosus clatus *crassus robustus rigidus* flavescens *densifolius* dichotomus, *ramis fastigiatis* flexuosis ascendentibus; folia caulina *densissima* erecta crispata *subappressa*, *madefacta maxime patula*, e basi *lata* erecta vaginante brevi e cellulis pellucide flavidis *ampliusculis laxis maxime conspicue foraminatis* reticulata late flavide limbata superne dilatata integrâ *subito lato-lanceolata* sensim reflexa, maxime undulata, e cellulis *valde incrassatis rotundatis angulatis* minutis flavidis *tenuissime papillosis* areolata, versus apicem descrescenti-limbata *valde ceroso-denticulata*, nervo crassiusculo concolore in mucronulum producto, dorso distincte *scabro*; perichaetia breviora convoluta ubique latissime limbata, interna basi longius pellucida *rhomboidaliter laxe* reticulata; theca in ped. sesquiunciali erecto vix tortili ferrugineo *oralis robusta* laevis badia, operculo rostrato breviori, calyptra longa.

Schw. Suppl. III. II. 2. t. 299. — *S. undulatus* A. Br. mst. in Bot. Zeit. 1847. p. 938. a recensente Hampe memoratus?

Patria. Insula Ternate: Dickson Hb. Sincapore. Java, ubi haud rarus videtur.

Calyptram, ab auctoribus consociatis Hooker et Greville calymperoideam basi thecam amplexentem et lateraliter fissam delineatam, etsi nobis haud visam, *Syrrhopodontis* dimidiatam habemus.

3. S. Codonoblepharum C. Müll.; *dioicus*; repens, *ramis erectis flexuosis flaccidis subsimplicibus v. parce*

dichotomis elatiusculis gracilibus remotis, flavescens; folia laxè imbricata falcato-erecta parum crispatula, madefacta erecto-patentia, teneriora, e basi erecta brevialatiuscula e cellulis angustis flavide pellucidis reticulata angustius flavide limbata superne paullo dilatata integrâ sensim lanceolato-acuminata et reflexa, undulata, e cellulis incrassate hexagonis minutissimis sublaevibus diaphanis areolata, toto ambitu angustissime limbata tenuissime eroso-denticulata, nervo crassiusculo continuo, dorso sublaevi; perich. breviora convolutacea, basi e cellulis angustis rectangularibus pellucidis superne minutissime rotundatis areolata; theca in ped. flexuoso mediocri erecta oblonga parva brevicolla, operc. longe oblique subulato; perist. duplex: ext. dentes breves lanceolati lutei firmi integri tenuiter articulati granulosi geminati in conum conniventes, interni e membranula carinato-plicata vix emersa lineares conniventes; calyptra apice scabra.

Codonoblepharum undulatum Dz. et Molkb. in Muse. Archip. Ind. p. 96. t. 32.

Patria. Ad arborum cortices insularum Java, Borneo juxta Martapoera et Sumatra juxta flumen Batang-Bessie: Korthals.

Notis cursive impressis a *S. fasciculato* affini facillime distinguitur.

4. **S. Dregei** Hsch. (Linn. XV. p. 116.); *dioicus*; dense cespitosus elatiusculus rigidus, viridis inferne nigrescens, inter folia tomentosus, dichotome divisus, ramis fastigiatis; folia caulina rigida valde involute crispa appressa, madefacta patula, e basi erecta e cellulis ampliusculis flavidis maxime distincte foraminatis reticulata subito late oblongo-lanceolata carnosula obtusa, evanidinervia, margine valde involuta, maxime opaca, papillis ubique praesertim apice longis densissime oblecta et igitur margine prominula, integerrima immarginata; perich. in cylindrum angustum valde exsertum apice patulum convoluta erecta, intima longe acuminata excurrentinervia basi tenerrima pellucida elongate laxè reticulata, pa-

rum superne papillosa; theca in ped. breviter exserto ovalis turgida magna sordide flava, ore constricta, epiphragmate carnosulo clausa, operculo oblique rostellato, dentibus late lanceolatis flavidis robuste trabeculatis, infra orificium oriundis involutis.

S. perichaetialis Bruch in Regensb. Bot. Zeit. 1846. p. 132.

Patria. Prom. b. spei, inter Schiloh et Zwart-Key, Windvoogelberg, in *Encephalarto* Frid. Guilielmi, altitud. 5000': Drège, 22. Novbr., in cacumine M. Tabularis ad saxa: Ecklon. Ad trunc. *Zamiae Caffrae* in summitate montium Winterhoek, Uitenhage, Aprili, alt. 3 — 4000': Krauss.

Notis illustratis species distinctissima, *S. clavato* et *pomiformi* proxima. — Flos masc. axillaris.

5. *S. pomiformis* Hmp. (Hb.); *dioicus*; habitus praecedentis, ferrugineo-aureus; folia caulina rigida; *densissime imbricata*, valde involute crispa appressa, madefacta erecto-patentia, e basi erecta e cellulis *angustis* laxis irregulariter hexagonis superne minoribus pellucidis reticulata oblonga concavâ parum reflexa, late *lanceolata acuta* canaliculata carnosula, superne e cellulis minutis rotundatis *subopacis* areolata, toto ambitu *albide marginata*, *marginine erecto*, dorso praecipue nervi crassi excurrentis longe papillosa, integerrima; perich. in cylindrum angustum valde exsertum apice patulum convoluta erecta, intima longe acuminata, basi longa pellucida elongate anguste reticulata, apice scabra; theca in ped. parum exserto *sphaerica* ore coarctata fuscidula, dentibus late lanceolatis involutis trabeculatis, operculo oblique rostellato.

Weisia pomiformis Hook. Musc. Ex. t. 131. — ? *Grimmia pomiformis* Brid. I. p. 187.

Patria. Prom. b. sp., in rupibus humidis soli et tempestati expositis, montium altissimorum ad locum Mountain Station dictum, rivulo Krombeks vicinum, et alibi in jurisdictione Zwellendam: Burchell. Zeyher No. 493. Ecklon. *Rarissime fructificans.*

A *S. Dregei* proximo notis cursive impressis facile discernibilis.

6. *S. clavatus* Schw. (Suppl. III. II. 2. t. 299.); *S. pomiformi* simillimus; folia densissima, e basi ovata *linear-lanceolata*, *lateribus involuta*, margine tenui albicante *eroso*, sicca contorta, luride viridia, nervo crasso tereti, *ex apice tantillum emergente* lutescente, basi e cellulis parallelogrammis pellucidis superne subrotundis opacis areolata. †.

Patria. Nova Hollandia: Guil. Sieber.

Notis designatis a praecedente sat distinctus.

Sectio II. **Orthophyllum.** Folia plus minus erecta stricta, haud reflexa, basi longissima pellucida, haud vaginata, superne e cellulis minutis paucis areolata, lanceolata.

7. *S. revolutus* Dz. et M. (Musc. Archip. Ind. p. 59. t. 22.); *monoicus*; late cespitosus dense congestus *glaucescens* humilis pusillus densifolius breviter fasciculate ramosus; folia caulina arcte appressa perfecte erecta stricta breviuscula anguste lanceolata, basi longa pellucida usque fere ad apicem producta et ibidem utrinque cellulis minutis rotundatis flavidis diaphanis asperulis apicis summi circumducta, *toto fere ambitu anguste diaphane limbata* integerrima, *margine apicis revoluta*, nervo tenui flavido *in mucronulum brevem excurrente*; perichaetia latiora amplius et magis irregulariter reticulata, theca in ped. mediocri rigido rubro erecta *ovalis brevicollis ore constricta* fusco-badia, operculo subulato recto tenuissimo, dentibus brevibus *aurantiacis* lanceolatis infra orificium oriundis dense articulatis *saepe fissis*, calyptra dimidio brevior decidua, conico-campanulata, dein ad medium usque fissa, *basi laciniata* pallida, apice rufescente scabra.

Patria. Java, in arborum cortice: Korthals. Borneo, prope pagum Enjarmassing: Korthals.

Flos masc. in ramulo proprio graciliori, foliis perig. ext. 3 paullo majoribus latioribus, int. 2 ovato-lanceolatis concavis margine versus apicem planiusculum revolu-

tis, intimo ecostato; antherid. stipitatis, paraphysibus nullis. — *S. involuto* et *rigescenti* proximus, sed ab hoc differt notis cursive impressis, ab illo simillimo foliis strictis firmioribus apice diaphane minute areolatis, integerimis, thecae figura et dentium longitudine.

8. *S. involutus* Schw. (Suppl. II. 2. p. 117. t. 132.); *dioicus?* dense cespitosus *teres* humilis pusillus glaucescens densifolius breviter fasciculate ramosus; folia sicca *apicis marginibus valde involutis tortilia, tenerrima* perfecte erecta stricta breviuscula angusta lanceolata, basi longa pellucida crassa cellulis apicis minutis viridibus *opacis crebrioribus* superne circumducta et terminata, margine parum involuta *serrulata*, luteo-viridia, nervo crasso *concolore* continuo, tenuissime papillosa; theca in ped. brevi erecta *subglobosa v. oralis* badia minuta, operculo subulato recto, dentibus infra orificium oriundis lanceolato-subulatis *longis* aurantiacis linea media minus perspicua exaratis interdum pertusis, calyptra parum brevior straminea apice fusca (scabra?). †.

Patria. Insula Rauwack Moluccensis: Gaudichaud.

Ic. auctoris folia basi limbata ostendit. A *S. revoluta* simillimo notis cursive impressis differt.

9. *S. rigescens* Schw. (Suppl. II. 2. p. 102. t. 181.); *dioicus?* late compacte cespitosus *sordide glaucus* uncialis *tenuis* fragilis, madore mollescens, parce brevissime ramosus; folia dense imbricata perfecte erecta stricta breviuscula anguste lanceolata, basi longa pellucida usque fere ad apicem producta et ibidem utrinque cellulis minutis subquadratis flavidis diaphanis apicis summi circumducta, *marginibus apicis involuta*, nervo tenui flavido continuo; theca in ped. mediocri fusco *minuta brevis subcylindrica*, orificio valde incrassato obscurius colorato, fusca, operculo subulato concolori thecae longitudine, dentibus brevibus lanceolatis *pallidis* infra orificium oriundis parce articulatis integris, calyptra thecam tegente subulato-campanulata (dein dimidiata?) pellucida (scabra?). †.

Patria. Insulae Malouinae: Gaudichaud.

A *S. revoluta* affini notis cursive impressis discrepat.

10. *S. rufescens* Hook. et Grev. (in Brewster Edinb. Journ. of Sc. III. p. 227.); laxe cespitosus *humilis gracilis tenellus* albidus, *radiculis rufis tenuibus rufescens*, parce ramosus, *fragilis, mollis*; folia caulina *dense imbricata, madefacta patula, parum subsecunda, erecta v. magis minusve falcata, anguste elongate lanceolata acuta, canaliculata*, basi longissima e cellularum amplarum hyalinarum seriebus paucis laxe reticulata, apice cellulis minutissimis cerino-flavidis rotundatis utraque pagina papillosis areolata, e basi usque fere ad apicem angustissime limbata, nervo tenuissimo continuo; perichaetia intima multo breviora erecta omnino laxa; *omnia integerrima*; pedunculus *tenuissimus rufescens fragilis longiusculus*.

Patria. India orientalis, Sincapore, Penang.

Paraphyses nullas invenimus, archegonium unicum.

11. *S. spiculosus* Hook. et Grev. (in Brewster Edinb. Journ. of Sc. p. 226.); folia anguste linearia, dorso marginibusque incrassata hyaline inaequaliter spiculoso-denticulata. †.

Patria. Sincapore: Wallich.

E foliis *S. rufescenti* test. auctorib. proximus.

Sectio III. **Orthotheca.** Brid. I. p. 778. Folia rigida, plerumque limbo lamellato v. incrassato, raro nullo praedita, e basi vaginante superne dilatata reflexa canaliculata, sordide viridia, difficile emollientia.

a. *Folia limbo lamellosa.*

12. *S. Hobsoni* Hook. et Grev. (in Brewster Edinb. Journ. of Sc. III. p. 224.); *dioicus*; dense cespitosus erectus curvatus crassiusculus parce breviter ramosus sordide viridis fuscidulus; folia caulina rigida *densa*, e basi angusta superne parum dilatata *longiuscule pellucida* persistente, inferne limbo *angusto diaphano* superne in cellulas *minutas ellipticas diaphanas* dissoluto circumducta supra *distincte crenulata* angustato-lanceolata obtusata acuta,

e cellulis minutissimis *hexagonis diaphanis* areolata, ad margines lamina horizontali utrumque serrata ante summum apicem dentatum evanida; nervo crasso ante apicem abrupto, apice dorsi scabro; theca in ped. brevi elliptica, erecta, fusca, orificio angusto coarctato incrassato brunneo, dentibus *brevibus lanceolatis*, calyptra glabra.

S. incompletus Schw. Suppl. II. 2. (1824.) p. 119. sub nom. *S. semicompleti* Suppl. II. II. 2. p. 97. — *Cleistostoma incompletum* Brid. I. p. 158. — *Calymperes Hobsoni* Grev. in Ann. of the Lyc. of Nat. Hist. of New-York. V. 1824. p. 271. c. ic.

Patria. Guiana: Hobson, Cuba: Pöppig et in insulis vicinis haud rarus, ad trunc. arborum.

Notis cursive impressis a *S. rigido* facillime distinguitur.

13. *S. Miquelianus* C. Müll.; *dioicus*; *S. rigido* similimus; folia breviora *ligulato-lanceolata obtuso-acuta multo latiora*, basi inferne angusta supra versus dilatata concava margine denticulata, ad partem inferiorem brevissime pellucida, cellulis flavidis parum angustioribus laxis *veluti* marginata, ad superiorem cellulis *parvis* flavidis firmis rectangularibus apicem versus sensim minoribus *hexagonis v. quadratis* incrassatis, supra basin parum *falcato-reflexa ultra medium usque complicatione constricta*, apice *planiuscule lingulata*, supra basin margine lamina horizontali utrinque serrata ante summum apicem evanida, nervo crasso ante apicem abrupto; theca in ped. *brevi apice incrassato inclinate ovalis*, raro erecta; operculo longe subulato recto; calyptra glabra.

Patria. Surinam: Hb. Miquel.

Flores masc. axillares minuti fusci, foliis perig. 6. late ovatis breviter acuminatis evanidinervibus concavis crenulatis, antheridiis turgidis paucis, paraph. flaccidis mixtis. — A *S. rigido* notis cursive impressis distinctissimus. Perist. nullum?

14. *S. longisetaceus* C. Müll.; *dioicus*; laxe latissime cespitosus intertextus elatus fusco-viridis, ascendens, veluti simplex, sed ramis brevibus appressis divi-

sus superne crescens, tomentosus, laxifolius; folia longa flexuosa obscure viridia patula, e basi brevi erecta e cellulis ampliusculis flavidis inferne hyalinis reticulata, limbo lato breviter rectangulari-reticulato, ad partem superiorem dilatatam in cellulas permultas minutas rotundatas incrassatas papillosas folii superioris dissoluto, circumducta maxime eroso-denticulatâ parum reflexa, *longe anguste lanceolata acuminata acuta*, omnino complicate carinata, margine limbo lamellato utrinque remote dentato, tenuiter tuberculose papillosa; theca in ped. *longissimo* rigido purpureo *magna erecta elliptica*, basi et orificio angusto attenuata, *fusco-nitida pachydermis*, operculo subulato recto concolori, *loco peristomii membrana brevissima al-bida tenerrima*, calyptra glabra.

Calymperes androgynum Mont. Ann. d. sc. nat. III. p. 195. — *C. rigidum* Mont. nunc in sched. non *Syrrhop. rigidus* H. et Gr.

Patria. Guiana Gallica: Leprieur, Insula Trinitatis Antillarum, monte Tocuche: Crüger, 20. Jan. 1817, pulcherrime fructificans.

Sp. *Montagneana* folia apice anomalo habet. E pedunculo longissimo, theca nitida magna elliptica et foliis longis primo adpectu a sequentibus differt. — Flos masc. axillaris minutus fuscus, foliis perig. paucis oblongo-ovatis acuminatis serrulatis haud limbatis, antherid. purpureis longiusculis, paraphysibus flavidis aequalibus mixtis.

15. S. rigidus Hook. et Grev. (in Brewster Edinb. Journ. of Sc. III. p. 226.); dense cespitosus elatiusculus, ramis *elongatis dichotomis fastigiatis robustis crassis densifoliis* curvatis *sordidissime viridibus* inferne pallide ferrugineis divisus, caulis inferne *foliis obesis teres*, tomentosus; folia flexuosa, madefacta stricta patentia breviuscula, *robusta*, e basi late concava superne maxime dilatata longe pellucida laxa, limbo e cellulis angustioribus rectangularibus areolato superne in cellulas quadratas soluto circumducta integerrima, superne crenulata immarginatâ parum reflexa, *late lanceolata*, *apice veluti prae-morsa*, *canaliculata*, minutissime quadrate areolata, nervo

latissimo ante apicem serratum abrupto *apice dorsi grosse serrato*, margine lamina *canaliculata* utrinque serrata ante summum apicem evanida.

Patria. Insula Trinitatis Antillarum, Moruja: Crüger, 20. Oct. 1847. Ad arbor. trunc. m. divi Andreæ ins. St. Vincentii, 1012' alt.: Hb. Hook.

Notis cursive impressis ab affinibus *S. Hobsoni* et *Berteroano* facillime distat. Folia apice filis brevibus saepe obtecta. Haec species e speciminib. authent. Hb. Schwägricheniani vera est auctorum Hook. et Gr.

16. *S. sordidus* C. Müll. (Bot. Zeit. 1848. p. 766.); *prostratus*, cespites latissimos *humiles* efficiens, parce ramosus *gracilior* sordide viridis fuscidulus curvatus; folia caulina rigida crispata, *laxa*, madefacta difficile emollientia, marginibus flexuosis, e basi oblonga *brevisissime pellucida fugacissima* e cellulis parvis laxis albidis reticulata latiuscule *aureo-limbata integerrima superne vix v. parum dilatata* angustato-lanceolata *acuta*, canaliculato-concava, nervo tereti crassiusculo dorsi apice parce dentato excurrente, e cellulis quadratis firmis apicem versus sensim minoribus areolata, ad margines lamina horizontali utrumque serrata *longe* infra apicem dentatum folii evanida.

Orthotheca circinnata Brid. I. p. 779. — *Dicranum circinnatum* Brid. I. p. 446.

Patria. Guadeloupe, ad trunc. arbor. arcte cohaerens: Hb. Bridel. Columbia, prov. Carabobo, pr. Cumbré de Valencia, altitud. 5000'. Funck et Schlim in Lindén Coll. No. 617. *Majo*.

Fructum non vidimus, *Bridelius* autem descripsit thecam erectam fuscam ovatam subinaequalem arcu altero valentiore orificioque tantillum obliquo in ped. erecto subflexuoso foliis perich. multo longiore apice leviter incrassato fusco. Peristomii destructi vestigia vix ulla. In ejus Hb. tamen deest. — A *S. Hobsoni* simili notis cursive impressis distat.

17. **S. Gardneri** Schw. (Suppl. II. 2. p. 110. t. 131.); *dioicus*; laxe cespitosus humilis flexuosus, interrupte foliosus, *ferrugineus apice flavide virescens*, tortuosus, fragilis, *rigescens*, parce breviter ramosus; folia e basi erecta inferne angusta superne parum dilatata pellucida laxe reticulata utrinque latiuscule flavide marginata *et valde crosso-denticulata* vix vel paullo reflexa, lingulato-lanceolata, minutissime quadrate rotundato-areolata opaca viridia, convolutaceo-canaliculata, margine limbo lamellato, lamellis utrinque remote serrulatis, nervo continuo carinato flavido dorso scabro; theca in ped. perbrevis erecta ovalis ore contracta laevissima fusco-badia, operculo subulato recto; dentibus *brevibus lanceolatis rubris* infra orificium oriundis; calyptra *dimidia theca longiore*.

Cleistostoma Gardneri Brid. l. p. 155. — *Calymperes Gardneri* Hook. Musc. Exot. t. 146.

Patria. Nepal.

Folia apice saepe fila articulata efformantia.

b. *Folia limbo incrassato, haud lamelloso.*

18. **S. lycopodioides** C. Müll.; *dioicus*; laxe cespitosus *longissimus* maxime breviter et elongate remote ramosus subcompressus, *inferne nigrescens, superne viridis v. plerumque cerino-flavescens*, fragilissimus; folia elongata loriformia flexuosa laxe imbricata patula, e basi brevi erecta e cellulis ampliusculis hyalinis reticulata, *limbo lato elongate anguste reticulato, ad partem superiorem dilatatam in cellulas permultas magnas rhomboideo-rotundatas utriculo primordiali instructas papillis tuberculosas dissoluto, circumducta* integerrimâ subito reflexa, anguste lanceolata planiuscula, limbo angusto *crasso argute et robuste serrato marginata*, e cellulis parvis depresso-hexagonis tenuiter papillosis subopacis areolata, nervo crasso in acumen breve excurrente; theca in ped. breviter exserto erecta *obovalis magna fusco-nitida* orificio angustiori incrassato brunneo, operculo subulato recto, dentibus brevibus, calyptra turgida apice scabra.

Orthotheca lycopodioides Brid. I. p. 778. — *Dicranum?* *lycop.* Sw. Fl. Ind. Occ. III. p. 1066. — Schw. Suppl. I. I. p. 185. t. 40. — *Bryum lycop.* Sw. Prodr. Fl. Ind. Occ. p. 139.

Patria. In montibus umbrosis muscosis silvestribus, altissimis insulae Jamaicae: Swartz, Porto-Rico, Guadeloupe: Bertero, Trinitatis Antillarum, monte Tocuche: Crüger et in montibus altissimis prov. Meridae Columbiae: Moritz.

19. S. Berteroanus C. Müll.; *dioicus*; *S. Hobsoni* simillimus, sed folia e basi longius pellucida laxiore convoluto-latissima superne valde sinuato-dilatata vix crenulata longius lanceolata, margine limbiformi-incrassato haud lamellato remote denticulato, theca cylindrico-oblonga brevissime peristomata.

Orthotheca Berteriana Brid. I. p. 778. ex parte. — *Dicranum Berterianum* Brid. I. p. 445.

Patria. Portorico, ad trunc. arbor. montium: Bertero, 1819. Apr. Insula Trinitatis Antillarum, Caura, 18. Jul. 1847.: Crüger.

Flores masc. in planta femineae simili axillares minute gemmiformes, foliis perig. externis e basi late convolutacea pellucida late marginata subito acuminatis, internis latioribus tenerioribus brevius acuminatis, omnibus margine haud incrassatis obsolete dentatis, antheridiis elongatis, paraphysibus longis filiformibus flavidulis.

20. S. Malouinensis C. Müll.; *S. Urvilleano* similis; sed folia e basi late convoluta longe pellucida laxissima persistente, inferne late flavide marginata angusta, superne valde dilatata rotundate minute areolata valde denticulata sinuatâ subito canaliculate anguste lanceolata longiuscula, margine incrassato haud lamellato grosse serrata, nervo crasso ante apicem obtusiusculum dentatum abrupto.

Orthotheca Berteriana Brid. I. p. 778. ex parte.

Patria. Insulae Malouinae: Dumont d'Urville.

c. *Folia limbo nullo.*

21. S. Urvilleanus C. Müll.; *dioicus*; *S. Berteroano* simillimus; folia caulina e basi longa convolutacea *superne maxime sinuato-dilatata, inferne brevissime pellucida fugacissima, superne e cellulis elongatis angustis flavidis incrassatis interrupte articulatis* reticulata haud marginata integra plicata subito sensim *longe acuminata, haud limbata, sed grosse et inaequaliter serrata* minute areolata opaca, sordide viridia, evanidinervia; perich. *in cylindrum longe ersertum angustissimum congesta longe convolutacea longissime acuminata, basi elongate anguste flavide areolata*; theca in ped. breviusculo erecta *oralis majuscula, longiuscule peristomata*.

Orthotheca Berteriana Brid. I. p. 778. ex parte.

Patria. Insula St. Catharina Brasiliae: Dumont d'Urville.

Sectio IV. **Eusyrrhopodon.** Folia mollia, limbo plerumque angustissimo diaphano, e basi vaginante superne plus minus dilatata reflexa canaliculata, albida, viridia v. flavescentia, facile emollientia.

a. *Albide virides.*

22. S. tristichus Nees (in Schw. Suppl. IV. t. 311.); *dioicus*; laxe cespitosus *elatus* parce ramosus *gracilis fragilissimus* albidus; folia *elongata squarroso-patentia fragilia*, e basi longa vaginante laxa et pellucide reticulata reflexa, e cellulis minutissimis cerino-flavidis tenuissime papillosis areolata, e basi usque ad apicem anguste limbata, *apice tenuiter dentata*, nervo albido continuo tenui; theca in ped. *brevis* erecta cylindracco-ovalis, fusco-brunnea, dentibus normalibus 16 articulatis, operculo oblique subulato.

Patria. Java, ubi haud rarus videtur. Sumatra: Korthals.

Flos masc. terminalis gemmaceus, foliis perig. externis caulinis similibus, internis brevioribus convolutaceis, haud limbatis vix laxa areolatis denticulatis, nervo tenui evanido. Antheridia pauca, paraphysibus nullis. — Species excellentissima.

23. S. Leprieurii Mont. (Ann. d. sc. nat. III. p. 197. t. 3.); *dioicus*; laxe cespitosus mollis tortuosus albido-viridis humilis gracilis parce ramosus; folia e basi erecta late vaginante maxime pellucida laxissima anguste diaphana marginata *longe ciliata* reflexiuscula brevia, anguste et convolutaceo-oblonga mucronata, angustissime diaphane limbata, flexuosa, minutissime rotundate areolata opaca viridissima, *papillis creberrimis ciliiformibus uncinatis apice majoribus hyalinis dorso scaberrima*, nervo tenui continuo; theca in ped. mediocri torto rubro *obliqua ovalis minuta fusca*, dentibus *longis dense trabeculatis fuscidulis conniventibus*.

Patria. Guiana: Leprieur.

Pulcherrima species, foliis basi ut in *S. ciliato* margine ciliatis facile discernibilis.

24. S. albovaginatus Schw. (Suppl. II. 2. p. 112. t. 131.); *dioicus*; dense cespitosus humilis parce ramosus *albide viridis* ascendens, *mollis*; folia laxa secunda parum involuta, e basi vaginante maxime pellucida *submarginata integerrima magis reflexa* lingulato-lanceolata, minutissime areolata viridia, margine lamellis *argute serratis*, nervo continuo carinato flavido, utraque pagina papillosa; theca in ped. breviusculo erecta minute ovalis laevissima fusco-badia, operculo subulato recto, dentibus infra orificium oriundis, *longis, per paria, trigas v. quadrigas approximatis, luteo-albidis articulatis*, calyptra *theca brevior*. †.

Cleistostoma alboraginatum Brid. l. p. 156. — *Calymperes albovaginatum* W. Arn. Disp. p. 14.

Patria. Ad ligna putrida insulae Radack Archipelagi Moluccensis: Gaudichaud.

Folia apice saepe anomala. — Notis cursive impressis a *S. Gardneri* refugit.

b. *Sordide flavescentes.*

25. S. flavesens C. Müll.; *dioicus*; habitus *S. papilloso*; folia caulina longissima *sordide flavescentia*, e

basi *multo latiori et breviori* subito longiuscule linearia, apice *acuto* ciliato-dentatu, toto ambitu anguste limbata, e cellulis minutis *arcte aggregatis opacis subinanibus* rotundatis dorso papillosis areolata, nervo continuo tenui diaphano, canaliculata; perichaetialia multo breviora; theca in ped. mediocri stricto rubro fragili anguste ovalis fusca, operculo longe oblique subulato; calyptra dimidiata angusta apice scaberula; dentibus brevibus anguste lanceolatis longe infra orificium coarctatum oriundis.

Patria. Insula Trinitatis Antillarum, monte Tocuche, ubi mensibus Decembr. et Maji fertilem legit Crüger.

c. *Glauco-virides v. virescentes.*

26. S. prolifer Schw. (Suppl. II. II. 2. p. 99. t. 180.); *dioicus*; laxe cespitosus humilis, parce breviter fastigiato ramosus, mollis crassiusculus albido-viridis; folia caulina *longiuscula* tortuosa madefacta erecta flexuosa, maxime patula mollia, e basi longa angusta superne sensim dilatata vaginata e cellulis amplis laxis pellucidis reticulatâ subito anguste flexuose longiuscule lanceolata minutissime areolata viridia opaca, toto ambitu anguste limbata, apice inaequaliter et remote dentata, nervo tenui subcontinuo dorsi apice plus minus scabro, canaliculata laevia; theca brevipedunculata erecta ovalis fusco-brunnea, operculo conico subulato recto, dentibus 16 brevibus lanceolatis.

β. acanthoneurus; folia breviora, perfecte acuta, molliora, basi longius laxa, margine et nervi dorso supra medium folii valde dentata. *S. acanthoneuros* C. Müll. Bot. Zeit. 1845. p. 106.

Patria. Brasilia, Serra dos Orgaos: Beyrich. Columbia: Moritz Coll. I. No. 57. Var. *β.* Serra de Natividade: Gardner No. 50. Decbr. 1839.

Folia interdum apice prolifera i. e. plantas juniores efficientia. Archegonia pauca, paraphysibus tenuissimis paucissimis.

27. S. Gaudichaudi Mont. (Ann. d. sc. nat. II. p. 376. t. 16.); *dioicus*; laxe cespitosus mollis subulatus parce

ramosus albide viridis *tortuosus densifolius*; folia *brevia undulata*, e basi longa inferne angusta superne parum dilatata latiuscula vaginante maxime pellucida anguste diaphane limbata oblongo-lanceolata acutiuscula, canaliculata, minutissime areolata opaca viridia, *subcarnosa*, angustissime diaphane limbata, *apice summo crosso-denticulata*, dorso nervi continui apice acute scabro; theca brevipedunculata erecta ovalis, fusco-badia, operculo subulato recto, dentibus brevibus articulatis carnosulis fuscis longe infra orificium ampliusculum oriundis.

S. undulatus C. Müll. Bot. Zeit. 1844. p. 727.

Patria. Insula St. Catharina Brasiliac: Gaudi-chaud. Serra dos Orgãos, trunc. putrid. habitans: Gardner No. 45. Aprili 1837.

A *S. prolifero* notis cursive impressis refugit.

28. *S. obliquirostris* C. Müll.; *dioicus*; *S. Gaudi-chaudi* simillimus, sed humilior, folia basi plerumque obsolete denticulata, theca minor angustior, operculo tenuissime maxime obliquo stricto.

Patria. Prom. b. spei, Groodvaterbosch: Ecklon. Hb. Kunz.

Species haecce, e patria jam distincta, *S. Gaudi-chaudi* licet sit maxime similis, operculum tamen maxime curvirostre proprium apparet adeo, ut plantam utramque operculatam primo adspectu distingui possit. Theca omnino matura nobis non est, dentes igitur diversi quoque forsan reperiantur.

29. *S. papillosus* C. Müll. (Bot. Zeit. 1848. p. 766.); *dioicus*; *acaulis*, ramis brevissimis in comam longissimam congestis; folia caulina longissima mollia fragilissima, laxissime imbricata, flexuosa haud tortilia, *glauca*, e basi longissima angustissima laxe pellucide reticulata longe linearia, apice saepe incrassato *obtusato* subanomalio dense ciliato-denticulata, toto ambitu anguste limbata, e cellulis minutis chlorophyllosis *solitariis* rotundatis dorso papillosis areolata, nervo continuo tenui diaphano.

Patria. Columbia, prov. de Caracas, pr. Galipan 5000' altitud. in arboribus: Funck et Schlim in Lind. Coll. No. 358.

A *S. prolifero* foliis longissimis et caule brevissimo subnullo primo adpectu differt.

30. *S. parvulus* Schimp. (in litt.); *dioicus*; gregarius v. cespitosus humilis, parce ramosus dense foliosus pallide glauco-viridis, folia patentia, sicca flexuosa, linearia concava, margine albida, summo apice serrulata et hic illic filamentorum brevium fasciculo instructa, nervo excurrente pallido, basi e cellulis magnis rectangularibus hyalinis superne punctiformibus chlorophyllosis prominulis areolata; theca in ped. lineari v. bilineari erecta, parvula oblongo-cylindrica, castanea vernicosa, calyptra albida ad thecae basin producta, operculo rostellato brevior, dentibus sub orificio oriundis brevibus lineari-lanceolatis stramineis. †.

Patria. *Hypnis* intermixtus prope Mirador Mexicanorum.

E minoribus gentis, *S. prolifero* similis, sed minor, foliis atque pedunculo brevioribus primo intuitu distinguendus.

31. *S. ciliatus* Schw. (Suppl. II. 2. p. 114. t. 130.); *dioicus*; dense cespitosus humilis subsimplex v. parce breviter ramosus mollis dense foliosus, viridescens inferne ferrugineus, fragilis; folia laxa patula tortilia, *subspathulato-lingulata acuta* basi laxissima pellucida, angulo acuto in laminam folii superiorem viridissimam minutissime areolatam opacam producta, *toto ambitu et dorso nervi excurrentis longissime uncinata hyaline ciliata*; theca in ped. perbrevis erecta ovalis parva laevis badia, operculo conico-rostrato obliquo, dentibus longis dense trabeculatis fasciculis conniventibus; calyptra theca longiore ubique scabra, dein dimidiata. †.

Trachymitrium ciliatum Brid. I. p. 159. -- *Weisia ciliata* Hook. Musc. Exot. t. 171.

Patria. Insula Ternate Oceani Indici ad ligna putrida, unde Dickson jam habuit. Borneo, in cortice *Metroxyl*: Korthals.

A *S. Leprieurii* affini notis cursive impressis longe distat.

32. S. Jamesoni Tayl. (Lond. Journ. of bot. 1847. p. 331.); uncialis cespitosus erectus subsimplex viridissimus; folia sicca crispa, *laxa*, ex exsucca amplexante longa erecta basi patienti-recurva, dentata, nervo subpellucido; theca in ped. tenui ovata *inaequalis inclinata*, dentibus *elongatis subbifidis v. trifidis angustissimis opacis brunneis, siccitate involutis v. tortis.* †.

Patria. M. Pichincha Andium Quitensium: W. Jameson, Nov. 1846.

E ratione auctoris species haecce notis cursive impressis ab omnibus congeneribus ceteris differre dicitur.

Syrrhopodontes incerti.

1. S. ? elatus Mont. (Ann. d. sc. nat. III. p. 198.); erectus simplex v. parce ramosus; folia undique imbricata erecto-patientia lineari-lanceolata plana, basi oblonga amplexicaulia solidinervia margine incrassato denticulato. †.

Patria. Guiana Gallica: Leprieur.

2. S. Taylori Schw. (Suppl. II. 2. p. 115. t. 132.); *monoicus*; subsimplex humilis erectus v. curvatus parce divisus ferrugineus basi fuscus; folia terminalia erecta, lateralibus falcata v. secunda sparsa, e basi amplexante cellulis lutescenti-badiis majoribus nonnullis praedita subito canaliculate subulata brevia, margine involuta, v. plana, sicca valde contorta, integerrima viridia, papillis tenuibus scabra, nervo crasso concolori v. pellucido ante apicem evanido; theca in ped. erecto badio erecta cylindrica laevis badia, operculo concolori subulato recto, dentibus horizontalibus ad marginem adnatis breviusculis lutescentibus dense trabeculatis, calyptra longiore albida dimidiata. †.

Cleistostoma Taylori Brid. I. p. 156.

Patria. Nepal, in cortice arborum putrido.

Flos masc. axillaris gemmiformis, foliis subbinis ovato-acuminatis, nervo minus perspicuo; autheridiis longiusculis curvulis, paraphysibus longis filiformibus mixtis. — Ex auctoris descriptione et iconibus *Blindia* videtur!

3. *S. recurvifolius* Hsch. (Linn. XV. p. 118.); late et laxe cespitosus, caulis primarius repens v. prostratus fasciculato-ramosus radiculosus, ramis erectis, plerumque dichotome ramulosis, foliosis, inferne interdum subnudis; folia conferta recurva sicca parum crispabilia rufescentia v. luteo-viridia, e basi latiore oblonga subvaginata integerrima subpellucida e cellulis linearibus laxis reticulatâ lanceolata canaliculata, irregulariter grosse et argute serrata, nervo crasso concolore infra apicem evanido, superne minutissime rotundate areolata. †.

Patria. Prom. b. spei: Ecklon.

Ex animadv. auctoris habitu *Macromitrii* v. *Orthotrichi*, nobis igitur dubius.

Subtrib. II. POTTIACEAE.

Cellulae folii basilares molles pellucidae longiores, plerumque inanes, raro utriculo primordiali instructae.

Patria. Per zonas omnes totius orbis terrarum.

Gen. IV. *Pottia* Ehrh.

Beiträge II. p. 175. — *Anacalypta* Röhl. et al. — *Gymnostomum* Hdw. et al. — *Dermatodon* Hüb.

In memoriam Profess. Botanices Brunsvicensis Joh. Fr. Pott, auctoris Florae Brunsvic., nomen conditum.

Calyptra dimidiata. Peristomium simplex, e dentibus lanceolatis articulatis simplicibus s. linea longitudinali exaratis rugulosis carnosulis compositum v. nullum.

Sectio I **Anacalypta** Röhl. Moosg. Deutschl. I. p. 108. — Theca distincte peristomata. Folia latiuscula planiuscula v. concava, plus minus spathulata.

a. *Caulis tenellus patentifolius.*

1. **P. Starckeana** C. Müll.; *monoica; annua pusilla gregarie cespitulosa simplex*; folia pauca patentia conferta, oblongo-ovali-lanceolata, nervo crasso ferrugineo excedente breviter mucronata, valde subplicate concava margine e basi usque fere ad apicem revoluta, integerrima, basi e cellulis amplis hexagonis pellucidis laevibus, superne multo minoribus opacis tenuissime papillosis areolata; perichaetialia intima perfecte oblonga angustiora; theca in ped. brevi stricto minute ovalis, erecta fusca, annulo angustissimo et operculo *hemisphaerico-conico obtuso*; perist. dentes mutabiles breves erecti truncati articulati pallidi rugulosi simplices saepe lacunosi.

Anacalypta Starckeana Br. Germ. II. p. 138. t. 36. f. 2. — Br. Europ. Fasc. 18—20. p. 2. t. 1. — *Dermatodon Starkii* Hüb. Musc. Germ. p. 109. — *Weisia Starckeana* Hdw. Musc. Fr. III. p. 83. t. 34. — Brid. I. p. 353. — *Grimmia Starckeana* W. et M. Bot. Tasschb. p. 137. — *Bryum Starckeanum* Hoffm. Deut. Fl. II. p. 32. — *Br. minutum* Dicks. Fasc. IV. Pl. Cr. p. 7. t. 10. f. 17 fide Smith.

β. *brachyodus*; perist. dentibus brevissimis praemorsis. Br. Eur. l. c. — *Dermatodon affinis* Hüb. l. c. p. 110. — *Weisia affinis* Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 44. t. 14. — Brid. I. p. 354.

Patria. In terra argilloso-calcareo agrorum et camporum sterilium per Europam mediam et calidiorem. Var. β. passim cum forma normali pr. Bipontem, prime in Gallia meridionali, in Sardiniae insulis et in Britannia haud infrequens. — *Primo vere.*

Anthridia ad pedem floris feminei plerumque nuda eparaphysata minuta 2—3. — Ex habitu *P. minutulae* simillima.

2. **P. cespitosa** C. Müll.; *monoica; annosior pusilla gregarie cespitulosa elatior gracilior ramosa*; folia patentia, ovato-et oblongo-lanceolata *angustiora*, nervo tenui ferrugineo excurrente brevissime mucronata, cym-

biformi - *concava margine haud revoluta*, integerrima e cellulis minutis basi rectangularibus pellucidis, superne opacis tenuissime papillosis areolata; perichaetialia longiora, *vaginantia*; theca in ped. brevi ovata erecta, anguste annulata, fusca nitida, operculo conico longe subulato obliquo; perist. dentes plus minus perfecti erecti breves pallidi linea media longitudinaliter plus minus divisi vel lacunosi obtusati angusti.

Anacalypta cespitosa Bruch in Br. Germ. II. 2. p. 146. t. 37. — Br. Europ. Fasc. 18—20. p. 3. t. 2. — *Weisia cespitosa* Bruch in Brid. I. p. 808. — *W. tenella* Brid. I. p. 809? in Hb. Brideliano nobis haud visa. — *Gymnostom. carbunculoides* De Not. in schedulis! — *Dermatodon cespitosus* Hüb. Musc. Germ. p. 111.

Patria. In collinis calcareis pr. Bipontem: Bruch; pr. Falaise Normandiae: De Brébisson; in pascuis pr. Cagliari Sardiniae: De Notaris. — *Vere.*

Flos masc. ad pedem fl. feminei minute gemmaceus angustus, in innovationibus primariis terminalis, dein pseudolateralis, foliis ovato-acuminatis, nervo excurrente vel evanido, antheridiis minutis paraphysatis. — A *P. Starkkeana* notis cursive impressis primo adspectu distat.

3. **P. flaccida** C. Müll.; cespitosa pusilla innovando ramosa intense viridis flaccida; folia patentia *valde flaccida ovata obtusa*, *nervo excurrente*, pellucide reticulata tenera; theca in ped. perbrevis erecta ovata parva. $\frac{1}{4}$.

Weisia flaccida Harv. Ic. in Hook. Ic. Pl. Rar. t. 18. f. 3. et Lond. Journ. of bot. 1840. II. p. 6. cum diagnosi.

Patria. Nepal: Wallich.

Operculum ac peristomium perfectum deerant, in 1—2 thecis aliquot dentes breves inventi sunt, generi *Weisiae* similes. *Auctor.*

b. *Caulis robustus patentifolius.*

4. **P. lanceolata** C. Müll.; *monoica*; biennis laxa et plus minus extense cespitosa mollis, simplex humilis v. magis minusve ramosa elata intense viridis; folia caulina patentia laxa disposita, sicca parum torta, ovali-oblongo-lanceolata, nervo crasso in aristam flexuosam producta,

margine usque fere ad apicem obsolete crenulatum revoluta, subcomplicato-carinata, ubique e cellulis firmis sublaevibus parce chlorophyllosis hexagonis basi majoribus areolata; perichaetialia angustiora; theca in ped. breviusculo erecta, ovalis brevicolla brunnescens, annulo simplici et operculo conico plus minus subulato obliquo aurantiaco; perist. dentes in membrana exserta pallida rugulosa erecti longiusculi inaequaliter articulato-subulati obtusati latiusculi pallidi rugulosi medio longitudinaliter fissiles v. lacunosi.

Anacalypta lanceolata Röhl. Moosgesch. Deut. I. p. 108. — Br. Germ. I. p. 141. t. 36. f. 3. — Br. Europ. Fasc. 18—20. p. 4. t. 3. — *Dermatodon lanceolatus* Hüb. Musc. Germ. p. 112. — *Weisia lanceolata* Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 44. t. 14. — *Coscinodon lanceolatus* Brid. I. p. 372. — *Encalypta lanceolata* Hdw. Sp. Musc. p. 63. — *Leersia lanceolata* Hdw. Musc. Fr. III. p. 66. t. 23. — *L. cuspidata* Schrk. Baiers. Fl. II. p. 442. — *Grimmia lanceolata* W. et M. Bot. Taschb. p. 136. — *Bryum lanceolatum* Dicks. Fasc. III. Pl. Cr. p. 4. — *Br. cuspidatum* Gmel. Syst. Nat. II. p. 1332. — — *Coscinodon aciphyllus* Brid. I. p. 373. — *Weisia aciphylla* Wahlenb. in Nov. Act. Holm. 1806. p. 133. t. 4. f. 1. — *Grimmia aciphylla* W. et M. l. c. p. 139. et 457. — — *Coscinodon connatus* Brid. I. p. 374. — *Grimmia connata* Kaulf.

β. angustata; theca gracilior; peristomii dentes in membrana exserta obsoleti. Br. Europ. l. c. *Entosthymenium mucronifolium* Bruch in Fr. Müller Musc. Sard. et Regensb. Flora 1829. p. 387. — *Pottia brevicaulis* De Not.

Patria. Ad terram nudam ubique per totam Europam temperatam et meridionalem vulgatissima. Var. *β.* pr. Smyrnam: Fleischer, pr. Genuam in collibus ad margines agrorum: De Notaris. — *Primo vere.*

Flos masc. minute gemmaceus, foliis minutis late ovatis acuminatis, cum vel absque nervo.

c. Caulis robustus julaceus.

5. **P. latifolia** C. Müll.; monoica; gregaria vel dense cespitosa humilis robusta gemmaceo-julaceo-foliosa, simplex v. innovando ramosa, argenteo-viridis; folia caulina arcte imbricata, cochleariformi-concava latissime obovata rotundata, obtusa vel apiculata, nervo tenui ferrugineo

v. viridi ante apicem evanido, nitidula, margine haud revoluta, e cellulis basi amplis hexagonis laxis pellucidis laevissimis superne minoribus, sed pellucidis plus minus scariosis echlorophyllosis reticulata, integerrima laevia; perichaetialia basi longa laxe reticulata valde angustata; theca in ped. longiusculo stricto aurantiaco erecta, ovali-oblonga, anguste annulata, fusca, operculo brevirostro obliquo; perist. dentes latiuscule lanceolati integri vel ad medium bifidi, linea longitudinali destituti, in membrana perangusta positi, pallidi laeves vel rubelli et subrugulosi.

Anacalypta latifolia Br. Germ. II. p. 135. t. 36. — Br. Eur. Fasc. 18 20. p. 5. t. 4. — *Dermatodon latifolius* Hüb. Musc. Germ. p. 115. — *Didymodon bulbosus et bullatus* Hartm. fide Ångström. — *Weisia latifolia* Schw. Suppl. I. I. p. 64. t. 18. — *Grimmia latifolia* W. et M. Bot. Taschb. p. 147.

β. *pilifera*; foliis in pilum longam flexuosam acuminatis. Br. Europ. l. c. Br. Germ. l. c. p. 237. sub nom. *Anacal. latifoliae* β. *piliferae*. — *Coscinodon pilifer* Brid. l. p. 810. — *Weisia pilifera* Fk. mst. — *Dermatodon Funkii* Hüb. Musc. Germ. p. 115.

Patria. Ad terram in summis alpihus Europae et in America septentrionali. Var. β. in locis siccioribus. — *Aestate.*

Flos masc. terminalis, dein ad pedem innovationis femineae gemmiformis, foliis 3 ovalibus obsolete nervosis, antheridiis elongatis, paraphysibus robustis clavatis mixtis.

Sectio II. **Eupottia.** Theca gymnostoma vel loco peristomii membrana basilaris laciniata. Folia lata planiuscula v. concava, plus minus spathulata.

A. *Folia lamellosa.*

6. **P. cavifolia** Ehrh. (Beitr. II. p. 187.); *monoica*; annua vel biennis, gregaria vel cespitulosa pusilla subsimplex viridis; folia caulina arcte imbricata, e basi oblonga sensim rotundato-ovata cochleariformi-concava, nervo viridi in pilum plus minus elongatum flexuosum producto, lamellis latis undulatis pluribus superne praedito, integerrima, margine haud revoluta, inferne e cel-

lulis elongate hexagonis pellucidis superne minoribus irregulariter subrhomboideo-hexagonis laevibus parce chlorophyllosis diaphanis areolata; theca in ped. brevi purpureo rectiusculo ovalis turgescens brunnea erecta exannulata, operculo e convexa basi oblique rostellato.

Br. Europ. 18—20. p. 7. t. 2. — *Gymnost. ovatum* Hdw. Musc. Fr. I. p. 16. t. 6. — *G. pusillum* Hdw. Fund. Musc. II. p. 32 et 87. — *Bryum ovatum* Dicks. Fasc. II. Pl. Cr. p. 4.

Patria. In cultis murisque totius Europae vulgarissima et in America septentrionali, usque ad alpina edita ascendens. — *Vere.*

Flos masc. primo terminalis, dein ad pedem rami fertilis subgemmaceus, foliis 2—3 late ovatis apiculatis subseminervibus; antheridiis majoribus, paraphysibus subclavatis mixtis.

B. *Folia elamellosa.*

a. *Folia dentata v. serrata.*

7. P. Heimii Fürnr., *monoica rarius hermaphrodita*; pulvinato-cespitosa viridis inferne fuscescens biennis v. triennis ramosa flaccida, folia laxè imbricata erecto-patula, sicca subtortilia, late longa ovato-oblonga acuminata, basi e cellulis elongatis pellucidis teneris laxis laevibus superne multo minoribus perfecte aequaliter hexagonis creberrime punctulato-papillosis igitur subopacis areolata, margine cellulis plerumque epapillosis laevibus usque fere ad apicem visis quasi marginata, apice inaequaliter serrata, nervo in mucronem brevem producto v. ante apicem evanido fuscescente; perichaetia longius acuminata majora; omnia plus minus aequaliter concava saepe complicata flexuosa haud revoluta tenera; theca in ped. purpurascens erecto longiusculo erecta, ovata truncata fusca, operculo oblique rostrato columella exserta elevato longe persistente.

Br. Europ. 18—20. p. 12. t. 7. — *Gymnost. Systilium* Fk. — *G. obtusum* Turn. Musc. Hib. p. 9. t. 1. — *G. affine* Bryol. Germ. I. p. 138 et 140. t. 9.

β. intermedia; folia superne e cellulis diaphanis vix papillosis firmioribus echlorophyllosis areolata. — Forma, quae typum cum sequente varietate, per se quasi propria specie, conjungit.

γ. chlorophyllosa; folia superne e cellulis valde chlorophyllosis laxis vix papillosis v. laevibus areolata. *Gymnost. Heimii* Hdw. Musc. Fr. I. p. 84. t. 30. e spec. *Hedwigianis*!

Patria. In locis praecipue salsosis per Europae partem magnam passim et in America septentrionali: Drummond; pr. Cap. Horn in insula Eremitae: J. D. Hooker. Prope Spandau Berolini vicinam urbem detexit Cl. Heim, medicus ille scientiae nostrae intimus, ingenio excelso. — *Majo*, in *alpibus aestate*.

Flos masc. in ramo brevi terminalis, foliis 2 — 3 caulinis similibus, antheridiis robustioribus, paraphysibus multis robustis acutis v. plus minus clavatis brevibus mixtis.

8. **P. flavipes** Mont. (Ann. d. sc. nat. 1845. 4. p. 122.); *monoica*; cespitosa, radiculis permultis intertexta, subsimplex, innovando ramosa; folia laxe imbricata erecto-patentia, late oblongo-lanceolata *elongata longe acuminata*, *nerco tenui flexuoso ferrugineo eranido*, *apice parcissime dentata*, margine haud revoluta, basi e cellulis laxissimis elongate hexagonis tenerrimis pellucidis superne minoribus rotundato-hexagonis pellucidis laevibus reticulata; theca in ped. *elongato flavido* superne purpurascente recto *minute obconica*, *deoperculata turbinata truncata macrostoma*, operculo convexo-conico oblique rostrato, columellae tandem liberae exsertae adhaerente.

C. Gay. Hist. de Chile. Bot. Cr. t. 3. f. 2.

Patria. Chile, ad terram: C. Gay.

Flos masc. in ramo brevi infra florem fem. posito terminalis; foliis perig. caulinis similibus, antheridiis elongatis robustis paraphysibus crasse clavatis mixtis. — A *P. Heimii* proxima notis illustratis facile distinguitur.

9. **P. longirostris** Hmp.; *monoica*; laxe cespitosa humilis *robusta* simplex; folia laxe imbricata erecta patentia *elongata pauca*, *apice parum falcata*, *late ovato-*

lanceolata concava, nervo crasso ferruginea *rubiginoso-mucronata*, margine medio parum revoluta, *apicem versus sensim inaequaliter grosse serrata*, *marginata*, basi e cellulis laxis amplis hexagonis pellucidis laevibus, *superne minutis opacis tenuissime papillosis areolata*; perichaetia majora; theca in ped. elongato flexuoso erecto purpureo cylindrico-oblonga robusta erecta fusca, operculo conico longirostrato obliquo.

Gymnostomum longirostre Br. et Sch. in Musc. Abyss. Schimp. II. No. 475.

Patria. Abyssinia, in alpe Deggen altitud. 12000', 3. Mart. 1840.: W. Schimper.

Antheridia in axilla folii late cordato-acuminati brevis multa robusta, paraphysibus multis longe stipitatis et acute clavatis robustis fuscis breviter articulatis mixta. — Habitu *Barbulae subulatae*, *P. Heimii* proxima et pulcherrima species.

b. *Folia integra.*

α. *Folia acuminata.*

10. **P. eustoma** Ehrh. (Beitr. II. p. 187.); *monoica*; laxe cespitosa v. gregaria, simplex v. dichotome ramosa, humilis v. elata; folia patentia et patula, e basi oblonga angusta elongate hexagone pellucide parce chlorophyllose reticulata tenera laevi sensim rotundato-ovata *acuminata*, nervo crasso viridi in mucronem plus minus elongatum strictum productum, margine integerrimo v. apice obsolete crenulato plus minus revoluta, superne e cellulis *minoribus amoene chlorophyllosis diaphanis veluti laevissimis* areolata, plus minus complicate concava; perich. majora; theca in ped. brevi purpureo *truncato-obovata macrostoma*, operculo e basi convexa oblique rostrato; calyptra glabra.

P. truncata Br. Europ. 18 — 20. p. 9. t. 4 et 5. — *P. eustoma* β. *minor* Ehrh. l. c. 188. — *Gymnost. truncatum* Hdw. Musc. Fr. I. p. 13. t. 5. — *G. truncatulum* Hdw. Fund. Musc. II. p. 87. — Brid. I. p. 67. — *G. cuspidatum* Roehl. Ann. Wett. Gesells. II. p. 130. e Bryol. Germ. huc pertineat. Auctor ad Schkubrium mississe dicitur; in ejus herbario autem frustra quaesivimus. — *Bryum trun-*

catulum L. Sp. Pl. p. 1584. — Br. exiguum, creberrimis capsulis rubris. Dill. Musc. p. 34. t. 45. f. 7. F — K.

β . *major*; robustior, theca ovali-oblonga truncata. Br. Eur. l. c. t. 5. — *P. eustoma* β . *major* Ehrh. l. c. 188. — *Gymn. intermedium* Schw. Suppl. I. l. p. 19. t. 7. — Brid. I. p. 69.

γ . *subcylindrica*; foliis ex ovali late lanceolatis longius mucronatis, theca subcylindrica. Br. Eur. l. c.

Patria. In agris, graminosis, pratis humidis, ad fossarum margines, in muris rupibus et arborum truncis terra obtectis per totam Europam, in Africa et America sept. Var. β . ubique vulgatissima; var. γ . in agris Sardiniae.

Flos masc. *P. minutulae*. Specimina prope Halam in truncis populorum antiq. excavat. terra obtectis legimus, quorum thecae loco peristomii membranam basilarem valde exsertam laciniatam ostendunt.

11. **P. Wilsoni** Br. et Sch. (Br. Europ. 18 — 20. p. 14. t. 6.); *monoica*; habitus *P. eustomae*; folia laxè imbricata patula, e basi angusta oblonga elongate hexagone pellucide reticulata tenerrima laevi sensim rotundato-ovata *obtusà*, nervo crasso viridi in aristam plus minus flexuosam producto, margine integerrimo superne parum revoluta, superne e cellulis minoribus *opacis tenuissime papillosis* areolata, subcomplicate concava; perichaetialia majora; theca in ped. brevi flavido oblongo-elliptica, *ore paulisper contracta*, exannulata fusca, operculo oblique rostrato, calyptra superne *scabra*.

Gymnostomum Wilsoni Hook. Bot. Miscell. I. 1830. p. 143. t. 41. — *G. solivagum* Green in Brid. I. p. 69?

Patria. In Anglia ad terram pr. Over in comitatu Cheshire: Wilson detexit; in arvis pr. Torfar Scotiae: Drummond.

Antheridia in axillis folior. super. solitaria v. binata libera, longiuscule stipitata, paraphysibus teneris filiformibus mixta. Spec. tenella!

12. **P. Mexicana** Hmp. (Hb.); *monoica*; habitus *P. eustomae* β . *majoris*; folia caulina subspathulata, e basi

oblonga laxe reticulata sensim ovata dilatata, nervo crasso in cuspidem producta, e cellulis amplis teneris chlorophyllosis mollibus hexagonis areolata, integerrima, margine parum revoluta, concava, paullo flexuosa, laevia; theca in ped. *brevi* rubro erecta *brevi maxime truncata turbinata ampla physcomitrioidea*.

Patria. Mexico.

A *P. cystoma* β . *majori* simillima thecae forma primo adspectu differt, a *P. flavipede* simili pedunculis brevioribus, foliis integerrimis firmioribus et theca ampliore distat.

13. *P. minutula* Hmp.; *monoica*; *annua subsimplex pusilla gregaria*; folia pauca erecto-patentia ovato-et oblongo-lanceolata, nervo crasso ferrugineo pungentia, margine integerrimo ubique fere revoluta, subcarinate concava, basi e cellulis laxis pellucidis amplis brevibus paucis superne minoribus parce chlorophyllosis diaphanis parce et tenuissime papillosis firmis areolata; perich. lanceolata; theca in ped. brevi flavido minute ovato-truncata macrostoma fusca exannulata, operculo late obtuso-conico.

Br. Europ. 18 - 20. p. 8. t. 3. — *Gymnost. minutulum* Schw. Suppl. I. I. p. 25. t. 9. — Brid. I. p. 61.

β . *rufescens*; foliis angustioribus rufescentibus. Br. Eur. I. c. — *Gymm. rufescens* Schultz. Fl. Starg. p. 278. — Ic. in Br. Germ. I. p. 121. t. 9. — Brid. I. p. 62.

γ . *conica*; foliis ovato-lanceolatis brevius mucronatis, theca ore angustata. Br. Eur. I. c. — *Gymnost. conicum* Schw. Suppl. I. I. p. 26. t. 9. — Brid. I. p. 63. — *G. reflexum* Brid. I. p. 63!

$\gamma\gamma$. *oblonga*; theca oblonga subcylindrica. Br. Eur. I. c.

Patria. In locis natalibus *P. cystomae* regionum prime montosarum Europae mediae et occidentalis. Var. $\gamma\gamma$. e Sardinia retulit Fr. Müller. — *Auctumno et primo vere*.

Flos masc. in axillis folior. super. sessilis gemmiformis minutus, foliis 2—3 ovato-acuminatis concavis en-

vibus fugacissimis, igitur antheridiis plerumque nudis 2—3 minutis stipitatis, paraphysibus tenerrimis v. nullis mixtis.

14. P. brevicaulis C. Müll.; subcespitosa brevis simplex; folia late ovata, nervo excurrente apiculata, margine recurva integerrima; theca *cylindracea* exannulata subaequalis, operculo *conico apiculato*. †.

Gymnost. brevicaule Tayl. Lond. Journ. of bot. 1846. p. 42.

Patria. Nova Hollandia ad flumen Swan River: J. Drummond.

Ex obs. Cl. Wilson (l. c. p. 447.) a *P. minutula* γ. *obtusa* vix diversa videtur; sed foliis magis ellipticis, nervo vix excurrente et operculo apiculato distat.

15. P. macrocarpa Schimp. (Ann. d. sc. nat. Ser. II. T. VI. p. 145. t. 8.); *monoica*; caulis brevis subramosus; folia ovato-lanceolata, terminalia majora, concava integerrima, *margine haud revoluta*, nervo sub apice evanido, erecto-patentia, sicca incurva, *laxe hexagono-areolata*; theca *exserta magna subsphaerica brevicolla*, operculo *plane convexo umbonato*. †.

Patria. In terra lutoso-arenaria pr. Valparaiso Chile: Bertero.

β. *Folia obtusata.*

16. P. obtusifolia C. Müll.; *monoica?* brevicaulis pusilla annua subsimplex erecta; folia erecta, *arcte imbricata*, inferiora e cordato ovata, superiora oblonga, suprema fere spathulata, *apice rotundata*, integerrima, pallide e viridi badia, nervo crasso *ante apicem evanido* lurido, e cellulis subquadratis hexagonis pellucidis, inferioribus dimidio longioribus quam latioribus, areolata; theca in ped. erecto breviusculo ovata truncata laevis badia, operculo e convexo *brevirostri obtuso columellae exsertae adhaerente*. †.

Gymnost. obtusifolium R. Br. Suppl. Append. II. Parryan. p. 299. — Schwägr. Suppl. II. II. 2. p. 83. t. 176.

Patria. Insula Melville: Sabine, navarchus.

A *P. cystoma* fide Schwägricheni simillima notis cursive impressis diversa.

17. *P. amblyophylla* C. Müll.; cespitosa brevis erecta innovando ramosa pallide viridis; folia patentia v. erecto-patentia *ovata obtusissima, basi dilatata, margine recurva*, integerrima concava *minute reticulata*, nervo *valido subcontinuo*, ramulina magis exacte ovata, margine minus recurva; theca in ped. longiusculo semunciali gracili flavo-rubicundo terminali *ovato-oblonga, supra medium leniter contracta*, rufo-fusca, operculo conico acuminato thecam subaequante recto. $\frac{1}{4}$.

Gymnost. amblyophyllum Hook. Bot. Miscell. I. 1830. p. 352. tab. 75.

Patria. America meridionalis, ad ripas circa Menozam: Gillies.

18. *P. vernicosa* Hmp. (Hb.); dioica; gregarie cespitulosa maxime explanata, intense viridis pusilla subramosa; folia caulina ovato-oblonga *obtusissima integerrima seminervia*, ramulina *subrotundata, laeve pellucide areolata*; thecae creberrimae in ped. perbrevibus ovatae erectae *brunneae nitidissimae*, operculis *longe rostratis*.

Gymnost. vernicosum Hook. in Wall. Cat. n. 7549. — Ic. Pl. Bar. tab. 17. f. 4. c. ic. — Lond. Journ. of bot. 1840. II. p. 2. c. diagnosi.

Patria. India orientalis, Prome: Wallich. Java, in muris pr. Diocja societate *Bryi exilis*: Junghuhn, Aprili.

Spec. Javanica ramulos tenuissimos erectos remotifolios viridissimos, capitulis patulis instructos, effundunt. Species pulcherrima tenella.

Species non satis notae.

***Gymnostomum Japonicum* Hdw. (Sp. Musc. p. 34. t. 1.)**; pusilla erecta tenera simplex; folia remota pauca oblongo-lanceolata integerrima tenera subexcurrentinervia; theca in ped. purpurascens longiusculo ovata brevis macrostoma fuscilla, operculo conico-hemisphaerico mammillato.

Brid. I. p. 67.

Patria. Japonia: Thunberg.

Ad *Pottiaceas* magis, quam ad *Funarioideas* pertinere videtur. Habitus inter *Pottiam cystomam* et *minutulam*.

Sectio III. **Hyophila** Brid. I. p. 760. — Theca gymnostoma, rarissime peristomata. Folia plus minus lata marginibus involutis, basi pellucide superne minute opace areolata, plerumque facile emollientia. Inflorescentia dioica. Calyptra plerumque angusta subtorta. — A *Pottia* nunquam discerni potest, nam areolatio folii omnino *Eupottiae* est, ut in *Hyophila blanda* videmus.

A. Acaules.

19. P. Barbula C. Müll.; acaulis gregarie cespitosa paucifolia simplicissima; folia conferta vix tortilia, oblongo-lanceolata inferiora acuminata, superiora obtusiuscula, parum involuta, basi parallelogramme superne grosse rotundata, margine igitur subcrenulata, nervo subcontinuo; theca in ped. breviusculo purpurascente erecta cylindrica vix curvula angusta brunnea annulata, operculo conico subulato rectiusculo.

Hyophila Barbula Hmp. Bot. Zeit. 1846. p. 267. — *Gymnost. Barbula* Schwägr. Suppl. II. II. 1. p. 77. t. 175.

Patria. Insula Cuba, ad rupes calcareas: Pöppig.

Pl. mascula robustior, flore terminali minuto tetraphyllo, foliis minutis ovatis acutiusculis enervibus. Antheridia parva turgida, paraphysibus tenuissimis mixta.

20. P. blanda C. Müll.; acaulis, gregarie cespitosa paucifolia simplicissima; folia conferta parum tortilia, e basi breviter oblonga laxiuscule molliter pellucide reticulata late ligulato-spathulata, sicca valde convoluta, obtusata, nervo crasso ante apicem evanido, integerrima; theca in ped. brevi flavido erecta cylindrico-elliptica brevicolle fusca minuta, annulo lato columellae arcte appresso, ore angusto, operculo oblique subulato.

Hyophila Gardneri Hmp. Bot. Zeit. 1846. p. 267. — *Hymenostom. obtusifolium* C. Müll. Bot. Zeit. 1845. p. 91. — *Gymnostom. blandum* Hook. et Wils. Lond. Journ. of bot. 1844. p. 151.

Patria. Brasilia, in rupibus arenaceis pr. urbem Oeiras, Majo 1839.: Gardner Coll. No. 6.

Structura foliorum maxime ad *Eupottiam* accedens.

21. P. obtusifolia C. Müll.; acaulis cespitosa paucifolia simplicissima; folia conferta valde tortilia, e basi longe oblonga pellucide minutius reticulata longiora superne ligulata vix spathulata, apice obtusata plerumque emarginata, nervo continuo, e cellulis multo minoribus et magis opacis areolata, tenuissime papillosa, integerrima; theca in ped. brevi flavido erecta cylindrica angustissima (annulata?), operculo longe et oblique subulato tenuissimo.

Hyophila Wilsoni Hmp. Bot. Zeit. 1846. p. 267. — *Weisia obtusifolia* C. Müll. l. c. 1845. p. 91. — *Gymnostom. Barbula* Hook. et Wils. Lond. Journ. of bot. 1844. p. 151.

Patria. Brasilia, Serra di Araripe pr. Brejo Grande in prov. Ceará. Febr. 1839.: Gardner Coll. No. 3 et 4.

A *P. blanda* notis cursive impressis facile distinguitur.

22. P. spathulata C. Müll.; acaulis gregarie cespitosa paucifolia; folia conferta, e basi brevissime oblonga subito late spathulata, obtusiuscula valde convoluta, integerrima, nervo continuo; theca in ped. brevi erecta, cylindracea, operculo subulato. †.

Gymnest. spathulatum Harv. in Hook. Ic. Pl. Rar. t. 17. et diagnosi in Lond. Journ. of bot. 1840. II. p. 2.

Patria. Nepal: Wallich.

B. Caulescentes.

a. Folia integerrima.

23. P. Tortula C. Müll.; dense cespitosa pusilla erecta parce ramosa; folia breviter densa oblonga planiuscula, basi paulum angustata obtusiuscule acuta, integerrima, parum involuta amoene viridia, nervo crasso fuscescente continuo, basi laxiuscule superne minute areolata; theca in ped. breviusculo purpurascens erecta

cylindrica angusta vix curvula brunnea, operculo conico oblique subulato.

Hyophila Tortula Hmp. Bot. Zeit. 1846. p. 267. — *Gymnost. Tortula* Schw. Suppl. II. II. 1. p. 78. t. 175.

Patria. Insula Cuba: Pöppig. Brasilia pr. Rio Janeiro: Beske.

A *P. Barbula* proxima notis cursive impressis certe distat.

24. *P. involuta* C. Müll.; cespitosa humilis simplex; folia laxè imbricata tortilia, e basi brevissima angusta late ovato-oblonga sublonga *breviter acuminata, sicca et madefacta valde involuta, nervo subcontinuo* ferrugineo, basi e cellulis parvis firmis quadrate hexagonis pellucidis superne minutissimis opacis areolata; perichaetialia intima breviora; theca in ped. elongato flavido inferne purpurascens erecto tenui erecta, *aequalis*, cylindrica parum curvula angusta longiuscula fusca annulata, operculo subulato obliquo breviusculo.

Hyophila Hookeri Hmp. Bot. Zeit. 1846. p. 267. — *Gymnost. involutum* Hook. Musc. Ex. t. 154. — Brid. I. p. 75. — Schw. Suppl. II. 2. p. 81. t. 176.

Patria. Nepal: Gardner.

25. *P. involutifolia* C. Müll.; habitus *P. involutae*; folia breviora, *maderfacta concava quidem, sed haud involuta* obtusiuscula, vel nervo crasso ferrugineo *distincte in apiculum* producto; perichaetialia *intima magis acuminata*; theca minus cylindrica, *sed brevior cylindrico-elliptica haud curvula*.

Hyophila Caripensis Hmp. Linn. XX. p. 68. — *Hymenostom. involutifolium* C. Müll. Linn. XIX. p. 198.

Patria. Columbia, pr. Caripe: Moritz Coll. No. 127.

26. *P. Javanica* C. Müll.; dense cespitosa pusilla simplex basi innovans; folia inferiora appressa suberecta oblongo-lanceolata ferruginea, suprema patentia ovata saturate nitideque viridia; omnia obtusa, *nervo valido fusco mucronulata*, superne dense, infima basi pellucide areolata; perichaetialia paullo breviora ovata acutiuscula evanidinervia; theca in ped. interdum gemino tenui fla-

vido inferne purpurascente erecta, cylindrica paullo curvula *brevicolla* fusca, ore contracta, annulata, operculo subulato obliquo breviori.

Hyophila Javanica Brid. I. p. 761. — *Rottleria Javanica* Brid. I. p. 106. — *Gymnost. Javanicum* Nees ab Es. in Nov. Act. Phys. Med. Ac. Caes. XI. I. p. 129. t. 14. f. 2. — Brid. I. p. 757.

Patria. Java: Blume.

A *P. involuta* simillima notis laudatis differt.

27. P. Zeyheri Hmp. (in litt.); dense cespitosa humilis parce dichotoma rigidissima; folia parum tortilia, latiuscule *lanceolata sensim perfecte acuminata*, nervo *crasso in mucronem elongatum crassiusculum strictum producta*, parum convoluta, perichaetialia longius cuspidata; omnia basi laxe hexagone reticulata pellucida; thecae in ped. brevibus flavidis erectae ovaes breves fusciculæ sæpe binatae brevicollae, exannulatae, operculis longe subulatis obliquis.

Weisia Capensis Spreng. in schedulis. — *Gymnost. euchlorum* Zeyher. Pl. Cap. No. 480.

Patria. Prom. b. spei: Zeyher.

28. P. rufescens C. Müll.; pusilla laxe cespitosa erecta innovando ramosa *rufescens*; folia remotiuscula erecta, rigida non torta, *rufescentia*, superne *lato-lanceolata*, margine arcte involuta integerrima, nervo continuo crasso *saturate ferrugineo*, basi e cellulis ampliusculis pellucidis superne minutissimis opacis tenuissime papillosis areolata; theca in ped. breviusculo ferrugineo erecta tereti-oblonga aequalis fusco-badia maxime late annulata, operculo longe subulato obliquo. †.

Gymnost. rufescens Hook. in Schw. Suppl. III. II. 1. t. 206. et Harvey in Hook. Ic. Pl. Rar. t. 17.

Patria. Nepal: Wallich.

29. P. Hollii C. Müll.; dioica; humilis parce divisa rigida sordide viridis; folia caulina contorta, late oblongo-lanceolata, basi dilatata, *nervo crasso in cuspidem brevem excurrente*, basi e cellulis longioribus laxioribus flavide diaphanis superne minutissimis opacis areolata; pe-

perichaetia subconvolutacea; theca in ped. stricto medio rubente erecta ovalis, *peristomata*; peristomii dentes infra orificium oriundi membranacei articulati latiusculi; operculum conico-subulatum subrectum.

Hymenostomum contortum Kze. in Regensb. Flora 1830. II p. 373.

Patria. Insula Madera, in Pico branco ad lapides: H. o. 11 1828. Decbr.

Dentes imperfectos, tenuissime membranaceos, hyalinos, breves vidimus et hac nota species memorabilis, habitu et structura omnino *Hypophila*. Perist. ut in *Anacalypta*?

b. *Folia dentata.*

30. P. cylindrica C. Müll.; habitus *P. involutae*; folia multo latiora, madefacta minus involuta, apice distincte serrata, nervo crassissimo subferrugineo ante apicem evanido; perichaetia intima duo obtusissima apice crenulata, nervo tenui longe infra apicem evanido.

Hypophila Harreyana Hmp. Bot. Zeit. 1846. p. 267. — *Gymnost. cylindricum* Hook. Ic. Pl. Rar. t. 17. et diagnosi in Lond. Journ. of bot. 1840. II. p. 2. — Schw. Suppl. IV. t. 305.

Patria. Nepal, Prome: Wallich.

31. P. Pöppigiana C. Müll.; habitus *P. cylindricae*, sed multo robustior, dense cespitosa; folia arcte imbricata tortilia, e basi breviter pellucida late ovato-oblonga breviora, madefacta magis involuta, apice dentata, undulata, nervo minus crasso in apiculum distincte producto; perichaetia exteriora distincte acuminata excurrentinervia, intimum unicum obtusissimum apice crenulatum; theca *P. cylindricae*.

Patria. Chile australis: Pöppig.

Sectio IV. **Hymenostylium** Brid. II. p. 81. — Folia angusta, marginibus erectis v. revolutis, carinata lanceolata.

32. P. longirostris C. Müll.; dioica; sequenti similis, sed gracilior et superne glauco-viridis; folia caulina crispula minus homomalla, madefacta valde patula,

longiuscula *angustissime lineari-lanceolata acuta*, integerrima, basi infima e cellulis pellucidis teneris *parvis irregulariter rectangulari-hexagonis superne minutis subquadratis sordide viridibus*, haud chlorophyllosis mollibus, firmis, tenuissime papillosis areolata, parum flexuosa, nervo ante apicem evanido; perichaetialia e basi *multo laxius reticulata longe pellucida tenera lato-ovata subraginante sensim longe lineari-acuminata*; theca in ped. breviusculo fusco erecta obovata, fusca, dein ovalis brunnea exannulata parva, operculo longe et oblique subulato.

Gymnostomum longirostre Kze. in Pöppig Coll. Pl. Chil. III. No. 230.

Patria. Chile australis in Andibus: Pöppig.

A *P. xanthocarpa* simillima notis cursive impressis certe distat.

33. *P. xanthocarpa* C. Müll.; *dioica*; dense cespitosa elatiuscula erecta, brevissime et parce ramosa, inferne pallide ferruginea *superne intense sordide viridis*, inter folia tomentosa; folia caulina crispula rigida, ad unum latus spectantia, madefacta valde patula, longiuscule *lato-lanceolata*, integerrima, basi infima e cellulis pellucidis laxis *majusculis hexagonis superne depresse quadratae hexagonis chlorophyllosis dein diaphanis* tenuissime papillosis areolata, parum flexuosa, nervo subexcurrente; perichaetialia similia, basi laxa pellucida longiore; theca in ped. breviusculo fusco erecta obovalis exannulata parva fusca, operculo longe et oblique subulato concolori.

Hymenostylium xanthocarpum Brid. II. p. 82. — *Gymnostom. xanthocarpum* Hook. Musc. Exot. II. t. 153.

Patria. Nepal: Gardner.

34. *P. bicolor* C. Müll.; *dioica*; dense cespitosa humilis parce ramosa, intense viridis inferne ferruginea radiculosa, gracilis; folia caulina conferta, e basi erecta ovata v. oblonga plus minus recurva lanceolata carinata acuta evanidinervia, margine interdum revoluta integer-

rima, inferne e cellulis plus minus elongatis *subrhomboido-hexagonis angustis ferrugineo-coloratis firmis* superne sensim minutissime quadrate hexagonis tenuissime papillosis opacis areolata, scabriuscula; perichaetia externa *basi latiora breviter vaginantia*, intima *longe vaginantia breviter acuminata* ubique e cellulis rhomboideo-elongatis reticulata; theca in ped. breviusculo rigido purpureo erecta, elliptico-oblonga brevicolla purpurea, *late annulata, gymnostoma*, operculo conico obliquo brevi et orificio angusto.

Gymnostomum (Gymnoweisia) bicolor Br. Eur. 33—36. p. 4. tab. 1.

Patria. In terra calcarea montis Radstadter Tauern alp. Salisburgiae: Funk et in alpidibus Julicis: Sendtner. In alpib. Bavaricis, Hochvogel 6200' alt. leg. Sendtner. Rarissima. — *Aestate.*

Pl. mascula gracilior, floribus hexaphyllis. Folia perig. ovato-lanceolata nervosa.

35. **P. ceratodonte** C. Müll.; *dioica*; late laxa cespitosa radiculosa simplex, *apice innovando semel divisa*, luteo-viridis crispula; folia caulina laxa imbricata erecto-patula, oblongo-lanceolata, complicato-carinata parum undulata, margine inferne valde revoluta, integerima, superne e cellulis minutis rotundatis diaphane opacis basi parum majoribus quadrate hexagonis firmis areolata, sublaevia, nervo crasso evanido flavido; perichaetia robustiora; theca in ped. longiusculo purpureo flexuoso erecta, elliptica ochracea exannulata, operculo oblique subulato, ad columellam longe adnato.

Patria. Prom. b. spei, Philippstown ad flumen Kat-Rivier, Junio: Ecklon.

Habitus *Ceratodonti* purpureo primo adspectu similis, sed planta pottioidea.

Pottiae obscurae.

1. **Gymnostomum simplicissimum** Brid. (I. p. 67.); bipollicare simplicissimum erectum pallidum; folia capillaria tenuissima imbricata; theca rotunda nuda. †.

Sphagnum simplicissimum Loureiro Fl. Cochinch. II. p. 839.

Patria. Cochinchina, in muris et truncis arborum, tempore pluvio.

2. Gymnost. Niloticum Delile (Fl. Aegpt. p. 45. Illustr. 31.); pusillum simplicissimum; folia 6—8 amplexicaulia acute lanceolata subcarinata lineam longa, suprema perichaetialia grandiora rosacea fructum obvelantia, theca in ped. recto, thecam aequante, intra folia subimmersa subsphaerica depressa margine crassiuscula laevissima nuda, operculo depresso-convexo acuto brevissime rostellato; calyptra parva pyramidalis, a basi ad medium fissae. †.

Brid. I. p. 756.

Patria. In fossis prope hydraulicas rotas in Cahiro, Gizeh etc. ad canales, et in Aegypto inferiore cespitosum: Delile.

3. G. foliosum Roehl. (Ann. Wett. Ges. II. p. 129.); caulis 3—4 linearis longior erectus ramosiusculus. Folia densissime conferta, caulem prorsus obvelantia, directione varia, angusta, oblongo-subulata, obtusa carinata integerrima, nervo crasso exarata, suprema viridia, caetera squalide brunnea; ped. terminalis erectus, vix foliorum apicem superans tortilis dilute brunneus; theca parvula ovata, orificio mediocri, concolor. †.

Brid. I. p. 95.

Patria. In Suecia pr. Amboga cespitibus dense implexis vivit.

Species delenda.

Gymnost. flaccidum Brid. I. p. 96. Specimina sterilia Hb. auctoris ad *Bryum* quoddam, forsitan *erythrocarpum* pertinent.

Gen. V. *Schistidium* Brid.

Mant. Musc. p. 21. — Br. univ. I. p. 113. — *Fiedleria* Rabenh. in Regensb. bot. Zeit. 1848. et Deut. Crypt. — *Pottia* Br. et Sch. — *Gymnostomum* al. — *Anaectangium* Röhl.

Nomen a graeco *σχίζω* *findo*, ob calyptrae fissuras basilares.

Calyptra *mitraeformis basi laciniata*. Peristomium nullum. Caetera *Pottiae*.

Habitus *Phasci cuspidati* et genus ob calyptram distinctissimum.

a. *Folia lamellosa.*

1. **Sch. subsessile** Brid. (l. c.); monoicum; gregarium v. late cespitosum humillimum annuum v. biennium ramosum, foliis piliferis canescens, intense viride; folia dense imbricata erecto-patentia, e basi angustiore sub-laxe pellucide reticulata brevi sensim latiora ovata, nervo crasso viridi in pilum longum denticulatum producto superne lamellis undulatis lobatis pluribus praedito, margine integerrima subinvoluta, superne e cellulis minoribus amoene chlorophyllosis hexagonis diaphanis papillosis areolata, plus minus valde concava; theca immersa breviter pedunculata subglobosa brunnea, aperta cupuliformis ampliata macrostoma, operculo magno rostellato recto; calyptra glabra tenera profunde laciniata flavida.

Fiedleria subsessilis Rabenh. Deut. Crypt. II. p. 98. — *Pottia subsessilis* Br. Eur. 18—20. p. 6. t. 1. — *Gymnost. subsessile* Schw. Suppl. 1. I. p. 27. — *G. acaule* W. et M. Bot. Taschb. p. 79. t. 6. f. 4—8. — *Anoetangium acaule* Röhl. Ann. Wett. Ges. II. p. 200.

Patria. In terra argillosa, prime muros amans, per totam Germaniam passim et in America septentrionali: Drummond. Prope Jenam detexit Flörke. — *Vere.*

Flos masc. femineo approximatus sessilis, foliis 1—3, ovato-acuminatis concavis laxè reticulatis enervibus fugacibus, antheridiis parvis et paraphysibus clavatis.

b. *Folia elamellosa.*

2. **Sch. marginatum** Hook. et Wils. (Lond. Journ. of bot. 1844. p. 539.); monoicum? dense cespitosum humile ramosum ferrugineum; folia dense imbricata erecto-patentia, e basi angustiore elongate sub-laxe pellucide reticulata brevi sensim latiora ovato-lanceolata, nervo crasso

ferrugineo in acumen breve producto, margine e cellulis densissimis incrassatis e basi usque ad apicem late et ferrugineo-limbata, apice denticulata, superne e cellulis minutis opacis tenuissime papillosis areolata; theca immersa breviter pedunculata subrotunda brunnea, operculo rostrato erecto, calyptra magna firma fusca e cellulis incrassatis reticulata, basi laciniis multis irregularibus praedita, apice scabra.

Patria. Insula Kerguelen maris antarctici: J. D. Hooker.

A *Sch. subsessili* simillimo longe recedit, pulcherrima species!

Gen. VI. **Trichóstomum** Hdw. em.

Musc. Fr. I. t. 27. — *Leptodontium* Hmp. — *Desmatodon* Brid. — *Didymodon* mult. auct. — *Dicranum* Web. et Mohr. — *Barbula*, *Grimmia*, *Weisia*, *Cynodon* nonnull. ex parte. — *Plautelia* Brid. — *Swartzia* Hdw. — *Bryum* et *Mnium* antiq.

Nomen a vocibus graecis *τρίξ* capillus et *στόμα* os, ob dentes perist. capilliformes, ductum.

Calyptra dimidiata. Peristomium simplex: dentes sedecim ad basin in cilia duo, interdum irregularia igitur plura, fissi, erecti stricti haud tortuosi.

Barbulae generi proximum.

Sectio I. **Pycnophyllum.** Folia plus minus angusta stricta vel crispula carinato-concava, ubique e cellulis minutis plus minus monomorphis et chlorophyllosis saepe quadratis areolata erecta. — Inflorescentia dioica rarissime monoica.

A. *Tenella.*

1. **Tr. brevicaule** Hmp. (Hb.); *brevissimum paucifolium subsimplicissimum*; folia lingulato-oblonga apiculata subconvolutacea, integerrima, madefacta patentia, sicca incurva contorta, nervo apice evanido, basi e cellulis pellucidis amplis hexagonis superne grosse rotundatis haud opacis firmis chlorophyllosis areolata; theca in ped. erecto stricto tenui rubente oblique cylindrica erecta

angusta annulata, operculo conico subulato dimidio breviori, dentibus gracilibus aequalibus rugulosis usque infra medium partitis rubris.

Patria. Java, ad parietes calce callitos balnearii ad Djocjo, Aprili: Junghuhn, societate Pott. *Javanicae* legit.

Pottiae Barbulae ex habitu simile.

2. Tr. Orientale Willd. (Hb.); late cespitosum; caulis *pusillus tenellus gracillimus fragilis*, apice in ramos brevissimos duos divisus et *reclinatum* vel flexuose ascendens; folia *minuta* erecto-appressa stricta, sicca tortilia, *carinato-oblonga, obtusiuscula, angustiora*, nervo flavido in cuspidem brevissimam plus minus reflexam producto, *dorso scaberrimo, margine parum undulata* integra paullo revoluta, e cellulis basi minutis quadrate hexagonis pellucidis teneris, superne minutissimis obscuris tenuissime papillois areolata; perichaetia angustiora longiora basi amplexantia teneriora; theca in pedunculo brevi rectiusculo *saepe geniculate descendente* ochraceo crecta ovalis minuta *plus minus tuberculosa* ochracea, operculo conico obtuso obliquo; perist. dentes tenues, basi membranacci fusciduli haud trabeculati *subremoti*, ciliis binis *obscuris rugulosis*.

Trich. Indicum Schw. Suppl. I. I. p. 142. t. 36, non Willdenow! — *Barbula Indica* Brid. I. p. 544. — *Tortula Indica* Hook. Musc. Exot. t. 135. excl. Syn. Willd., quocum tam Schwägrichen, quam Hooker et Bridel commutavere.

Patria. India orientalis, ubi cum plantis multis aliis apostolus ecclesiae Klein in parietibus domorum mensibus Dec. et Jan. primus legit et ad Willdenow misit. Ad terram et in muris Horti Botanici Calcuttae leg. Rottler et Wallich.

3. Tr. Berteroanum C. Müll.; cespitosum, *tenellum gracillimum flexuose erectum tenerrime foliosum* viridissimum, inferne ferrugineum subsimplex; folia *minuta* erecto-patentia sicca tortilia, *lineari-oblonga obtusiuscula*, nervo flavido crassiusculo in cuspidem brevissimam pro-

ducto, margine integra revoluta s. plus minus involuta, basi minute quadrate superne *quam maxime minute* hexagono-areolata, tenuissime papillosa; perichaetialia *basi e cellulis amplis parvis pellucidis hexagonis* reticulata, apice parum crenulata; theca in pedunculo *brevis tenuissimo flavido* erecta, cylindrico-elliptica ore paullo coarctata *angustissima minuta* brunnescens, parum incurva, annulata, operculo conico-rostrato obliquo breviusculo; perist. dentes *breves fusci rugulosi, inaequaliter binati et irregulares, in membrana valde exserta fusca positi.*

Plaubelia tortuosa Brid. I. p. 522. e spec. Hb. Brideliani! — *Barbula Sprengelii* Schwägr. Suppl. II. p. 64. t. 119. — Brid. I. p. 532. — *Weisia Berteroana* Spr. Syst. Veget. IV. p. 156.

Patria. Hispaniola: Bertero.

Species omnium tenerrima, speciminibus *Tr. mutabilis vel crispuli* minoribus vel *Tr. Indico* affinis.

B. Elata.

a. Inflorescentia monoica.

4. *Tr. glaucescens* Sw. (in Hdw. Musc. Fr. III. p. 91. t. 37. B.); *monoicum*; dense cespitosum erectum elatiusculum valde fastigiate ramosum, e viridi lutescens, inferne ferrugineum saepe tomentosum *superne productione leprosa farinosa glaucescens*, gracillimum; folia caulina inferne minuta remota, apice comosa subtortilia, e basi lanceolata lineari-subulata acuta carinata, margine erecto, apice dentata, nervo evanido, laevia, ubique e cellulis quadratis rectangularibus firmis chlorophyllosis areolata; perichaetialia basi laxiora pellucidiora longius reticulata; theca in ped. breviusculo purpurascente elliptica olivacea dein fusca leptodermis, annulata, operculo anguste conico subobliquo; perist. dentes valde variabiles longi erecti intense purpurei subrugulosi cruribus binatis v. subsolitarii v. partim obsoletis articulatis.

Bryol. Europ. 18—20. p. 18. t. 15. — *Didymod. glaucescens* W. et M. B. T. p. 158. — Brid. I. p. 513. — *Leptotrichum glaucescens* Hmp. Linn. XX. p. 74. — *Bryum glaucescens* Dicks. Fasc. IV. Pl. Cr. p. 10. — *Br. caesium* Vill. Pl. Dauph. III. p. 879.

β. brevipedunculatus; theca in ped. paullo exserto.
Did. aeruginosus Hook. in Brid. I. p. 516.

Patria. In rupium fissuris et praeprimis pascuis subalpinis et alpinis totius Europae et in America septentrionali. Var. *β.* in iisdem locis rarius occurrit. — *Per totum aestatem thecis reperitur.*

Flos masc. in ramo proprio plus minus elato ad pedem feminei posito, gemmaceus tenuis, foliis perig. e basi late ovata concava colorata tenuiore subito patulis subulatis, antheridiis angustis longiusculis eparaphysatis.

b. *Infloresc. dioica.*

α. *Folia tortilia.*

5. **Tr. rigidulum** Sm. (Fl. Brit. III. p. 1238.); laxecespitosum vel subpulvinatum, e viridi ferrugineum, parce dichotome ramosum, subgracile plus minus humile; folia caulina erecto-appressa subtortilia, anguste oblongo-lanceolata, carinato-concava, nervo crasso ferrugineo continuo, obtusiuscule acutata, parum recurva, rigida, margine integerrimo revoluta, e cellulis ubique parvis, basi quadrata hexagonis pellucidis, superne incrassate rotundatis areolata, sublaevia; perichaetia basi amplexicauli longius amplius pellucidius et tenerius reticulata, longiora; theca in pedunculo breviusculo purpurascens rigido substricto erecta, elliptico-cylindrica subangusta, annulata, coriacea dein fusca, operculo conico-subulato obliquo, thecae arte adhaerente; perist. dentes in membrana brevi fuscidula erecti stricti regulariter binati, e basi articulata fuscidula tenues nodosi fusci.

Br. Europ. Fasc. 18 — 20. *Trichostomum*, p. 10. t. 7. — *Didymodon rigidulus* Hdw. Musc. Frond. III. p. 8. t. 4. — *Bryum rigidulum* Dicks. Fasc. IV. Pl. Cr. p. 12. — *Br. didymodon* Gmel. Syst. Nat. II. p. 1333. — *Desmatodon rupestris* Fk. in Brid. I. p. 822. ex parte.

Patria. In muris rupibusque humidis vel siccis per totam fere Europam rarius, et in America septentrionali. — *Auctumno et hyeme, in alpibus aestate.*

Pl. mascula femineae similis, flore gemmaceo. Folia perig. externa caulinis inferioribus similia, sed paullo latiora, interna breviora e basi lata concava longe acuminata nervosa. A *Tr. conico* notis cursive impressis distat.

6. *Tr. mutabile* Bruch (Br. Europ. Fasc. 18 — 20. Trichost., p. 8. t. 5.); dense cespitosum humile rigidum, infra comam fertilem innovans, *sordide viride*; folia erecto-patentia laxa, sicca tortilia firma, latiusculo-lanceolata, nervo crasso depressiusculo flavido in cuspidem *rectam planam crassiuscule acutam* producto, margine parum undulata, integerrima, basi e cellulis tenuioribus plus minus flavidis et firmis, superne minutissime hexagonis et papillosis areolata; perichactalia angustiora et longius acuminata, linearia; theca in pedunculo longiusculo purpurascente erecta, plus minus *ovata breviuscula subampla sordide brunnea*, exannulata, operculo conico longirostrato obliquo; perist. dentes *valde mutabiles inaequales brevissimi*, per paria cohaerentes in membrana brevi positi, obsolete articulati sublaeves pallide lutei vel rufescentes rugulosi.

Tr. brachydontium Bruch et Müll. in Regensb. bot. Zeit. 1829. p. 393. t. 3. — *Didymod. brachydontius* Wils. in Engl. Flora V. p. 30. — *D. crispulus* Wils. et *D. Benthami* Arn. — *Plaubelia tortuosa* Bruch in Müll. Musc. Sardois.

Patria. Sardinia, in fruticetis prope Cagliari et in aggere limoso pr. Golfo di Spezzia: Fr. Müller 1827 detexit. Dalmatia in insula Passmann ad Porto St. Antonio et insula Lussin in Guarnero: Sendtner. Gallia sept. pr. Falaise: de Brébisson; in Pyrenaeis: W. P. Sch. Algeria: W. Schimper. Anglesca, in rupibus calcareis maritimis pr. Carneg Onnen et Tros-y-Marian: Wilson. — *Martio, Aprili, in reg. sept. Junio.*

Flos masc. *Tr. crispuli* simillimi.

7. *Tr. crispulum* Bruch (Müll. in Regensb. bot. Zeit. 1829. p. 395. t. 4.); habitus *Tr. mutabilis*; folia caulina lanceolata et lineari-lanceolata, *margine incurvo obsolete undulata*; perichactalia basi ad medium vagi-

nante elongate anguste flexuose firme areolata praedita; omnia, infimis exceptis, apice subincurva et fere cucullata, nervo excedente mucronata; theca praecedentis; perist. dentibus gemellis inaequalibus vel in unum coalitis tenerrimis pallide flavicantibus vel rubellis fugacissimis.

Br. Europ. Fasc. 18 — 20. *Trichostomum*, p. 7. t. 4.

β. brevifolium; dense cespitosum gracilius, foliis brevioribus lanceolato-acuminatis mucronulatis, theca minori. Br. Europ. l. c.

γ. angustifolium; dense cespitosum, humilius densius foliosum; foliis anguste lineari-lanceolatis acuminato-mucronatis; perist. dentibus perfectioribus, cruribus subaequalibus. Br. Europ. l. c. *Trichost. viridulum* Bruch. Müll. in Regensb. bot. Zeit. 1829. p. 301. t. 5.

Patria. In collibus dumetosis et rupibus prope Cagliari Sardiniae: Fr. Müller; Italia orientalis, in muris pr. Taranto: Rabenhorst; Algeria: W. Schimper; Dalmatia, Torrette prope Spalato et in Littorale, Cersotsha pr. Flitsch: Sendtner. Var. *β.* formae typicae intermixta. Var. *β.* in arenosis humidis insulae Rhennae Argentinensis: Kneiff; in Helvetia am obern Grindelwald-Gletscher: W. P. Schimper.

Planta masc. nunc fertili similis, nunc gracilior et subsimplex. Folia perig. ovato-acuminata, tria interna externis minora obsolete nervosa. A *Tr. mutabili* notis cursive impressis distat.

8. **Tr. brevifolium** Sendtner (in litt.); dense cespitosum pulvinatum *gracillimum* erectum elatiusculum, apice solo viridissimum, inferne ferrugineum; folia caulina erecto-patentia, sicca tortilia, lineari-lanceolata obtusiuscula, nervo in cuspidem brevissimam subrectam producto, apice margine incurvo, integerrimo, basi e cellulis minutis flavide pellucidis quadratis firmis superne minoribus opacis hexagonis areolata; perichaetialia sensim longe vaginantia et longe acuminata, intima nervo excedente longe cuspidata, teneriora pellucidiora laevia anguste elongate superne minute pellucide reticulata; theca in pedunculo

elongato tenui stramineo dein purpurascente tortili erecta, *minute elliptica* fusca, exannulata, operculo longirostrato tenuissimo obliquo thecam superante purpureo; perist. dentes erecti *longiusculi* tenuissimi *geminati aequales rugulosi nodosiusculi* fusci, in membrana brevi positi.

Patria. Bosnia, Sutynska: Sendtner 1847. *Junio.*

A *Tr. crispulo* simillimo foliis caulinis apice haud cucullatis, perichaetialibus longe acuminatis et cuspidatis atque theca minute elliptica, a *Tr. mutabili* foliis perichaetialibus, theca et peristomio regulari distinguitur.

9. *Tr. tophaceum* Brid. (Mant. Musc. p. 84.); late dense cespitosum erectum plus minus elatum gracile fasciculato-ramosum, e viridi ferrugineum; folia erecto-patentia, sicca subtortilia, inferiora remota, superiora sensim confertiora majora, *ovato-lanceolata obtusata*, nervo viridi *ante apicem evanido dorso scabro*, margine integerima et e basi usque fere ad apicem valde revoluta, carinato-concava, *undique e cellulis firmis subrotundatis subincrassatis* parvis sordide viridibus areolata; perichaetialia longius laxius pellucide et perfecte hexagono-reticulata; theca in ped. longiusculo rigido purpureo erecto elliptica fusca *exannulata*; operculo longiuscule conico oblique rostellato; perist. dentes variabiles, e membrana angusta aequales, v. cruribus solitariis obsoletis, v. saepe integri per totam longitudinem perforato-cribroso, rubri.

Brid. I. p. 495. — Br. Europ. Fasc. 18—20. p. 9. tab. 6. — *Anacalypta tophacea* Bruch in Br. Germ. II. p. 148. t. 37. — *Trichost. lineare* Sm. Fl. Brit. III. p. 1247?

Patria. Ad rupes tophaceas perpetuo irriguas muscus crescens, cujus surculi innovati aquam terra calcarea impraegnata filtrando singulis annis in tophum abeunt, hic illic per Germaniam; pr. Comburg Suevorum detexit Februario 1808 Fröhlich. In Gothia et Norvegia australi ex Ångström. In Gallia sept. in abruptis maritimis calcareis et in maritimis Algeriae: W. Schimper. — *Aestate.*

Pl. masc. gracilior, valde ramosa, floribus terminalibus gemmiformibus, foliis perig. externis e basi concava lineari - lanceolatis obtusis, internis ovato - acuminatis, nervosis, paraphysibus et antheridiis numerosis. — *Weisia verticillatae* persimile, et foliis interdum e cellulis longioribus quadratis areolatis praeditum.

10. Tr. laetum Kze. (in Pöpp. Coll. Pl. Chil.); gregarie cespitosum simplex, basi innovatione feminea longiore flexuosa gracillima subremotifolia divisum, subhumile laete viride; folia omnia parva erecta, sicca tortilia, e basi amplexante concava ovata breviter acuminata, inferiora obtusiora, superiora magis acuta, ubique quadrate, sed inferne magis rectangulari - areolata, leptoderma, nervo subtenui ante apicem concavum subreflexum evanido flavido, dorso sublaevia; perichaetia longiora; omnia margine flexuosa subinvoluta; theca in pedunculo elongato gracillimo flexuoso purpureo erecta cylindrica subaequalis angusta exannulata fusca, operculo conico longirostrato obliquo; perist. dentes in conum congesti breviusculi tenerrime subulati angusti intense purpurei, rugulosi, basi in membrana breviter exserta positi, in crura duo laxius cohaerentia fissi.

Patria. Chile austr. in terra limosa: Pöppig.

β. Folia stricta.

11. Tr. trifarium Sm. (Fl. Brit. III. p. 1235.); subpulvinatum sed laxe cohaerens teres rigidum erectum humile parce et breviter dichotomum, fuscescens; folia caulina erecto - appressa stricta rigida, madefacta patentia, ovato - lanceolata obtusiuscula, carinata, nervo crasso continuo, margine integerrimo basi recurvo, undique e cellulis rotundatis incrassatis areolata, sublaevia; perichaetia multa latiora obtusa, e ceteris caulinis simillima; theca in pedunculo breviusculo rigido tortili purpureo erecta, oblongo - cylindrica, brunnescens, annulo simplici et operculo conico obtuso obliquo praedita; perist. dentes, pro more imperfecti, breves irregulares, usque ad basin

bifidi, vel hic illic conglutinati pallide flavidi remote et obsolete articulati laeves.

Trich. linoides Engl. Bot. t. 2295 non Dicks. ex Hooker, *Didymodon luridus* Hornsch. in Spr. Syst. Veget. IV. p. 173. — Br. Europ. Fasc. 29 — 30. *Didymodon*, p. 4. t. 2. — *Cynodon luridus* Brid. I. p. 118. — *Did. trifarius* Sw. Musc. Succ. p. 28. — Brid. I. p. 508. — *Swartzia trifaria* Hdw. Musc. Fr. II. p. 76. t. 28. forma gracilior, foliis longius acuminatis videtur! — *Barbula deusta* Brid. I. p. 553!

Patria. In terra humida vel in saxis arenosis semidecompositis hic illic per Scandinaviam, Germaniam, Galliam, Britanniam et in America sept. ad catarractam Niagara: Drummond Musc. No. 120. — Martio, Aprili.

Pl. mascula gracilior, foliis minus confertis, flore terminali, foliis perig. externis erecto-patentibus ovato-lanceolatis, internis in gemmam clausam conjunctis, brevioribus evanidinerviis.

12. Tr. conicum Hmp. (in litt.); laxe cespitosum, e viridissimo ferrugineum, parce dichotome ramosum, subgracile, humile; folia caulina erecto-appressa parva, apice in comam parvam clausam congesta, sicca et madefacta stricta, latiuscule ovato-lanceolata, nervo crasso viridi dein ferrugineo in cuspidem acutam producta, viridissima, margine integerrimo revoluta, undique e cellulis parvis quadrate hexagonis firmis viridibus dein pellucidis haud incrassatis areolata, laevia; perichaetia intima convolutaceo-vaginantia obtusata, excurrentinervia, multo laxius amplius et pellucidius reticulata; theca in pedunculo longiusculo purpureo tortili, erecta parva, elliptica ampliuscula, fusca annulata, operculo conico obtuso recto brevi facillime deciduo; perist. dentes in membrana brevi pallescente erecti stricti regulariter binati, e basi trabeculata purpurea sensim tenuissimi nodosi purpurei.

Patria. Germania septentrionalis, Flegesen circa Hameln prope Hohnsen in muris: Schlottheuber. — Majo.

A *Tr. rigidulo* proximo theca ampliuscule elliptica breviter conico-operculata primo intuitu jam distat, foliis

autem pungentibus laevibus ab omnibus affinibus congeneribus differt.

13. Tr. strictum Bruch (in De Not. Syllab. Musc. p. 190.); late et laxe cespitosum, laxissime cohaerens, sordide viride, caulis erectus, ad florem femineum ramis plerumque binis divisus, sterilis simplex, substrictus *dense foliosus subteres* parce radiculosus; folia caulina erecto-patentia *stricta*, e basi lato-ovata amplexante, e cellulis subquadratis subfirmis pellucide flavidis amplioribus reticulata, subito in subulam lanceolatam firme minute quadrate areolatam opacam concavam crassam rigidam integerrimam nervo lato deplanato *in cuspidem longam acutam* producta, *dorso papillosa*; perichaetalia *longe involute vaginantia*, e basi elongate anguste irregulariter hexagono-reticulata, superne interdum sinuatâ subito subulata; theca in pedunculo *strictissimo* purpurascente v. stramineo longiusculo erecta elliptico-oblonga subincurva, *anulo robusto duplici praedita, nitide purpurea dein atro-brunnea*, operculo conico brevirostrato recto; perist. dentes tenuissimi longissimi in conum congesti, dense approximati, *fusci, subrugulosi*, basi in membranam brevissimam conflati.

Ceratodon chloropus Brid. l. p. 486. e spec. Hb. Brideliani! forma tenuior basi compacte cespitosa subtomentosa. — *Dicr. chloropus* Brid. Mant. Musc. p. 70. — *Didymodon ictericus* De Not. Spicil. p. 13.

Patria. Circa Romam in herbidis humentibus primus legit Bridel. 1818. Aprili. Sardinia, in pascuis siccis: Fr. Müller 1828. Italia orientalis, Caserano in terra di Otranto; Rabenhorst 1847.

Pl. mascula gracilior, flore terminali, foliis e basi lata concava subito acuminatis evanidinervibus. *Ceratodonti purpureo* haud dissimile.

14. Tr. Chilense Mont. (in Ann. d. sc. nat. 1845. 4. p. 109.); simplex, basi innovatione feminea divisum, humile erectum, sordide viride; folia *inferiora minuta, apicem versus sensim majora, erecto-patula subsecunda*, e basi amplexante oblonga erecta, e cellulis rectangula-

ribus flavidis firmis laevibus areolata subito in subulam *flexuosam* minutissime quadrate areolatam opacam *conca-*
vam, *dorso scaberrimam*, *crassiusculam lanceolatam*,
nervo lato excurrente percursam, *producta*; *perichaetia*
longius et tenuius amplexantia longiora; *theca* in pedun-
culo longo erecto purpureo erecta cylindrica subaequalis
exannulata brunnea, *operculo conico-subulato longo ere-*
cto; *perist. dentes longissimi angusti in conum congesti*,
dense approximati, *e basi brevi rubra trabeculata* in crura
duo aequalia arcte cohaerentia pallida rugulosa et valde
appendiculiformi-nodosa fissi.

Patria. In terra arenosa Chiles australioris: C. Gay.

Leptotricho tortili haud dissimile, sed foliis papillo-
 sis jam distat. E forma folii *Tr. stricto* proximum.

Sectio II. **Leptodontium** Hmp. Linn. XX. p. 70. — *Folia*
squarroso-reflexa complicato-concava flexuosa, *basi e cellulis*
inanibus longioribus superne subchlorophyllosis areolata. — *Theca*
omnium cellulis orificii terminalibus annulo similibus veluti annulata.
Inflorescentia dioica.

A. *Pusilla*.

15. **Tr. flexifolium** Sm. (Fl. Brit. III. p. 1246.); *gre-*
garie cespitosum pusillum subsimplex fragile lutescens;
folia caulina erecto-tortilia, madefacta reflexa, parva,
oblongo-ligulata breviter acuminata, parum complicata,
reflexa, *e basi usque ad medium et ultra margine revo-*
luta, *apicem versus inaequaliter serrata*, *basi e cellulis*
quadrate hexagonis parvis ampliusculis pellucidis laevibus
paucis, *superne minutis hexagonis tenuissime papillosis*
areolata; *perichaetia e basi longe convolutaceo-vagi-*
nante e cellulis inferne pellucide laxae elongate hexagonis
laevibus superne angustioribus punctulatis reticulata erecta;
omnia subexcurrentinervia; *theca in pedunculo lon-*
giusculo flavido strictiusculo v. tortili tenui erecta, an-
guste cylindrica parva pallida dein fusca, *operculo coni-*
co-obtuso brevi; *perist. dentes breves pallidi*, *plus minus*
regulares, plerumque dense cohaerentes binati laeves.

Brid. I. p. 499. — *Didymodon flexifolius* Hook. et Tayl. Musc. Brit. ed. II. p. 45. t. 20. — Br. Eur. Fasc. 29—30. p. 6. t. 4. — *Leptodontium flexifolium* Hmp. Linn. XX. p. 70. — *Desmatodon flexifolius* Hmp. Veget. Cellul. Coll. No. 112. — *Bryum flexifolium* Dicks. Fasc. III. Pl. Cr. p. 5. t. 7. f. 9

Patria. In locis sterilibus petrosis prope Croydon: Dickson et in multis locis aliis Britanniae; in iisdem locis Germaniae prope Blankenburg Hercyniae: Hampe; Oberstein Borussiae Rhenanae et Ludwigshütte Hassiae superioris: Bruch, sed hic sterile. E Lusitania a Schrader acceptum in Hb. Bridelii vidimus. — *Vere.*

Pl. mascula gracilior, flore terminali minuto, foliis perig. externis ovato-lanceolatis, e basi concava erecta patentibus, internis duplo fere minoribus, ovato-acuminatis integris. — Omnium congenerum *Leptodontii* sectionis humillima species.

B. *Elata.*

16. **Tr. squarrosus** Schwägr. (Suppl. II. I. p. 78. t. 123.); elongatum flexuosum, ramis elongatis flexuosis parce dichotome ramosum, subrobustum, e luteo viride inferne nigrescens; folia erecto-patentia tortilia, madefacta valde squarrosa, late complicato-lanceolata, undulato-flexuosa, apicem versus subaequaliter serrata, margine supra basin elongate subanguste pellucide laxè areolatam laevem superne solo punctulatam ultra medium revoluta, superne minute rotundata tenuissime papillosa; perichaetialia e basi longe vaginante laxissime elongate anguste reticulata laevi convolutaceo-erecta; omnia subexcurrentinervia; theca in pedunculo brevi erecto rigido flavido erecta ampliuscule cylindrico-oblonga robusta fuscescens, operculo longirostrato obliquo; dentes perist. breviusculi ciliis binatis plus minus coalitis plerumque arcte cohaerentibus laevibus fuscidulis.

Brid. I. p. 498. ex parte. — *Didymodon squarrosus* Hook. Musc. Exot. t. 150.

Patria. Nepal Indiae: Gardner.

17. **Tr. ulocalyx** C. Müll.; *tomentosum*; habitus *Tr. squarrosi*; folia caulina longiora angustiora, basi e cellu-

lis angustis firmis rectangularibus inferne laevibus superne punctulatis, supra basin angulato-rotundatis minutissime papillosis areolata, supra basin brevissimam margine ultra medium revoluta, apicem versus inaequaliter serrata, excurrentinervia; perichaetialia e basi longe vaginante, *cujus cellulae angustae elongatae ubique parietibus interruptis instructae firmae haud laxae tenerae, longe anguste acuminata valde undulata*; theca in pedunculo brevi tortili rigido erecta cylindrico-oblonga; perist. dentes (thecae deoperculatae supramaturae) rudimentarii brevissimi.

Trichost. squarrosus Hsch. in Musc. Mexic. Depp. et Schied. — *Didymodon luteus* Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1846. p. 48. operculo breviter rostrato?

Patria. Mexico: Depp. et Schiede. Monte Pichincha Andium Quitensium: W. Jameson.

A *Tr. squarroso* simillimo notis cursive impressis distat.

18. *Tr. epunctatum* C. Müll.; habitus *Tr. squarrosi*, sed gracilius flavius humilior; folia caulina *anguste lanceolata* tortilia, madefacta flexuosa, valde falcata, apicem versus inaequaliter serrata, margine parum revoluta, basi e cellulis *minute hexagonis teneris pellucidis laevibus haud punctulatis brevissima* praedita, supra basin minutissime incrassate rotundato-areolata, minutissime papillosa, nervo subexcurrente; perichaetialia convolutaceo-vaginantia, longiora, basi longa elongate anguste flavide areolata laevia; theca in pedunculo brevi erecta cylindrica.

Trich. squarrosus Brid. I. p. 498. excl. Syn. Hook. — *Neckera viticulosoides* P. B. Prodr. p. 78. e spec. auth. — *Encalypta squarrosa* Brid. Sp. Musc. I. p. 93.

Patria. Insula Bourbonis, ubi in planitie des Chicots latissime cespitosum legit Bory St. Vincent.

19. *Tr. stellatum* C. Müll.; caulis erectus elongatus valde squarrosus robustus dichotome ramosus, apice stellate comosus, ramis elongatis; folia *late complicato-*

lanceolata, valde reflexa, apicem versus grosse inaequaliter serrata, margine e basi usque fere ad apicem maxime revoluta, basi e cellulis minutis angustis rectangularibus firmis haud pellucidis valde punctulatis, superne minute rotundatis areolata, papillis creberrimis ad marginem revolutum valde conspicuis praedita, nervo subexcurrente.

Dicranum stellatum Brid. I. p. 443.

Patria. Insula Bourbonis, in humidis: Bory St. Vincent.

A *Tr. epunctato* notis cursive impressis facile distinguitur, a *Tr. aggregato* maxime simili, sed graciliori papillis foliorum valde robustis distat.

20. *Tr. aggregatum* C. Müll.; late et laxe cespitosum elongatum gracile flexuosum, innovationibus infra apicem brevioribus caulibus elongatis flexuosis gracilibus parce dichotome ramosum, luteum inferne brunneum v. nigrescens; folia erecto-patentia tortilia, madefacta valde squarrosa, late complicato-lanceolata, nervo subexcurrente, undulato-flexuosa, apicem versus valde grosse inaequaliter serrata, margine e basi usque fere ad apicem valde revoluta, valde reflexa, basi e cellulis minutis angustis rectangularibus punctulatis firmis flavidis haud pellucidis, superne minutissime rotundatis areolata, minutissime papillosa; perichaetia e basi elongate anguste flavide vel fusce reticulata subvaginantia reflexa haud convolutacea; thecae plerumque plures 1—4, in pedunculis brevibus flavis tenuissimis arcuatis angustissime cylindricae erectiusculae arcuatae, collo subventricoso brunnescente praeditae, pallide ochraceae pachydermes, operculis longirostratis tenuissimis concoloribus; perist. dentes longissimi erecti stricti laeves rubelli, regulariter binati v. plus minus coaliti.

Leptodontium aggregatum C. Müll. bot. Zeit. 1847. p. 829.

Patria. Java: Zollinger Coll. No. 2130.

Pulcherrima species, *Tr. stellato* proxima. Calyptra glabra nitida.

Incerta.

1. **Didymodon? Pichinchensis** Tayl. (Lond. Journ. of bot. 1848. p. 280.); caulis laxe cespitosus erectus, apice prolifero, simplex apice incrassatus, inferne ferrugineus superne pallide viridis; folia arcte imbricata squarroso-recurva, ovata acuta flexuosa, margine tumentirecurva, nervo pellucido excurrente, serrulata immarginata; perichaetialia minora; theca erecta inaequalis operculo tenuiter longirostro. †.

Patria. Monte Pichincha Andium Quitensium: W. Jameson, 5. Jul. 1847.

Habitus *Tr. squarrosi*.

2. **Barbula Jamesoni** Tayl. (Lond. Journ. of bot. 1846. p. 48.); caulis laxe cespitosus erectus subramosus, 2—3 uncialis, flexuosus, pallide olivaceus, ramis elongatis paucis; folia laxa patenti-recurva, sicca torta atque incurva, ex lata amplexante basi lineari-lanceolata obtusiuscula, margine infero reflexa, supero serrulata, nervo valido percurrente, dense et minute areolata; theca in ped. unciali terminali cylindracea erecta parum curvula, perist. brevi pallido. †.

Patria. Pichincha Andium Quitensium: W. Jameson. Oct. 1827.

Ex animadv. auctoris *Barb. cylindricae* Hiberniae (*Zygotrichiae* Fl. Hib.) *) proxima. Ex obs. Wilsoni (l. c. p. 449.) *Trich. luteo* affinis et peristomio *Trichostomi* instructa, *Barbulis* valde dissimilis.

Sectio III. **Eutrichostomum.** Folia carinato-concava erecta inflexo-tortilia, basi pellucide laxe calymperoideo-reticulata, superne papillis maxime opaca, longa angusta.

A. Infloresc. hermaphrodita.

21. **Tr. rubellum** Rabenh. (Deutschl. Crypt. Bd. II. p. 115.); laxe cespitosum, innovationibus saepe valde ra-

*) Ineditae? *Trich. flexifolio*?

mosum, intense viride dein maxime rubellum; folia caulina patenti-recurva, sicca tortilia parum inflexa, e basi erecta laxe pellucide sublonge hexagone et tenerrime reticulata oblongâ recurva carinato-linearî-acuminata, nervo excurrente acuta, margine reflexa, superne e cellulis parvis tenuissime papillosis chlorophyllosis dein rubellis areolata, integra, inferiora intense igneo-rubella; perichaetialia basi latiore laxius areolata; theca in pedunculo stricto purpureo tortili longo erecta cylindrica, raro elliptica, annulata, pallida dein rubella, operculo conico-subulato obliquo; perist. dentes cruribus arcte cohaerentibus rarius solitariis appendiculariter nodosis subrugulosis, igitur veluti sedecim lineari-subulati, fusci subrugulosi.

Didymodon rubellus Br. Europ. Fasc. 29 — 30. p. 3. tab. 1. — *Weisia recurvirostra* Brid. l. p. 347. — *W. recurvirostris* Hdw. Musc. Fr. I. p. 19. tab. 7. — *W. revoluta* Schl. fide Bridel. — *Grimmia recurvirostris* Sm. Fl. Brit. III. p. 190. — *Gr. curvirostra* Web. et M. Bot. Taschb. p. 135. — *Gr. rubella* Roth. Tent. Fl. Germ. III. I. p. 147. — *Anacalypta recurvirostris* Br. Germ. II. 2. p. 151. t. 37. — *Anacal. rubella* Hüb. Musc. Germ. p. 119. — *Tortula lacustris* P. B. Prodr. p. 92. fide Bridel; itidem *Bryum palustre* Brid. Musc. Rec. II. III. p. 35, *B. setaceum* β. Huds. Fl. Angl. p. 482. et *Bryum stellare*, lacustre, foliis rubris capillaceis. Dill. Musc. p. 382. t. 48. f. 45. — *Br. recurvirostrum* Dicks. Fasc. II. Pl. Cr. p. 7. — *Br. rubellum* Hoffm. Deut. Fl. II. p. 33. — *Barbula Turneri* Brid. Mant. Musc. p. 93. — *Barb. fallax* δ. *Turneri* ej. I. p. 559.

Patria. In rupibus et muris umbrosis, rarius ad terram per totam Europam et Americam septentrionalem. Ex Abyssinia misit W. Schimper. E planitie usque ad alpes summas ascendit. — *Auctumno.*

B. Infloresc. monoica.

22. Tr. distans Hmp. (in litt.); cespitosum humillimum, ramis aequalibus brevissimis fastigiatis in comam congestis igitur quasi simplex, amoene virescens; folia laxè imbricata, erecto-patula, lineari-lanceolata angusta elongata parum flexuosa, sicca involute tortilia, apice acutissime cuspidato vix reflexo, integerrima, nervo

crassiusculo excurrente flavido praedita, basi tenerrime pellucide elongate superne minute quadrate hexagono-areolata, sublaevia; perichaetialia longiora basi tenuiora; theca in pedunculo erecto longiusculo flavido erecta *oralis* pallida exannulata leptodermis, operculo longirostrato obliquo; perist. dentes *brevissimi oblique erecti rubri cartilaginei laeves parum nodosiuscule articulati lineares, infra orificium oriundi, cruribus haud juxta sed pone positis igitur primo intuitu veluti simplices weisioides*.

Didymodon leptocarpus Br. et Sch. in Coll. Schimp. Abyss. II. No. 462.

Patria. Abyssinia, ad ripas rivulorum, in paludibus uliginosis montis Silke prope Cosso Berri 11000 pedes supra mare, d. 25. Febr. 1840 leg. W. Schimper.

Antheridia in axillis foliorum rami fertilis superiorum ad pedem floris feminei nuda.

23. Tr. Barbula Schwägr. (Suppl. I. I. p. 144. t. 36.); laxe cespitosum humile, innovationibus ad comam fertilem oriundis dichotomum, amoene virens *rigidum*; folia laxe imbricata erecto-patentia tortilia, madefacta stricta, comalia e basi *tenuiter pellucide areolata brevi lato-lanceolata parum concava, nervo latissimo depresso ante apicem exanido obscuro laevi, margine parum undulata apice plerumque dentata*, e cellulis minutis hexagonis tenuissime papillosis obscure areolata; theca in pedunculo elongato purpurascente crasso erecta *oblongo-cylindrica longa robuste flavida dein coriacea pachydermis parum curvata, exannulata, operculo conico rostrato rectiusculo crasso*; perist. dentes *longiores robustiores nodosi purpurei*.

Br. Europ. Fasc. 18—20. *Trichostomum*; p. 5. t. 1. — *Tr. barbuloides* Brid. I. p. 493. — *Tortula Lusitanica* Brid. Sp. Musc. I. p. 249.

Patria. Terrae maris mediterranei.

A *Tr. flavo-virente* proximo notis cursive impressis facillime distinguitur. — Antheridia in axillis foliorum ad pedem floris feminei nuda.

C. *Infloresc. dioica.*a. *Robusta.*

24. *Tr. corniculatum* Schwägr. (Suppl. II. p. 75. t. 118.); habitus *Tr. Barbulae*; folia jam supra medium dentata; theca annulata; perist. dentes laeves pallide fusci nodosiusculi.

Brid. I. p. 494. — *Encalypta corniculata* Wahlenb. in. Berl. Mag. V. p. 295. t. 7. f. 2.

Patria. Kamtschatka in humo arenosa cum *Ceratod. purpureo*: Tillesius.

E spec. authenticis species notis illustratis a *Tr. Barbula* simillimo distinctissima.

25. *Tr. flexipes* Br. et Sch. (in Br. Europ. Fasc. 18—20. *Trichostomum*, p. 6. t. 2.); habitus *Tr. Barbulae*, sed humilius et infra comam innovans: folia caulina in comam patulam congesta erecto-patula, sicca tortilia, linearilanceolata, basi tenuiter pellucide elongate hexagono-areolata brevi praedita, superne minute hexagone areolata minutissime papillosa, apice dentata, latinervia; theca in pedunculo siccitate cygneo-arcuato breviusculo erecta elliptico-cylindrica brevior annulata coriacea pachydermis, operculo conico rectiusculo crassiusculo; perist. dentes elongati stricti rugulosi haud nodosi fusci.

Patria. Sardinia prope Iglesias rivulo exsiccato: Fr. Müller. — Vere.

Pl. mascula gracilior, ex apice innovans, foliis externis ovato-lanceolatis, internis ovato-acuminatis nervosis. Species distinctissima.

26. *Tr. cirrhatum* Hmp. (Ic. Musc. tab. 24.); laxe cespitosum humile, innovationibus infra comam fertilem oriundis, flavo-virens rigidum; folia laxe imbricata erecto-patentia tortilia, madefacta stricta, illa comae fertilis linearilanceolata elongate cuspidata, basi e cellulis elongate hexagonis pellucidis superne minutis tenuiter papillosis subobscurae areolata, integra, nervo flavido excurrente; perichaetia longiora; illa comae sterilis multo

robustiora et maxime obscure areolata, basi breviuscula elongate pellucide reticulata, supra basin ad marginem cellulis basilaribus submarginata, nervo crasso carinato in cuspidem brevem acutam producto, margine subundulato et involuto; theca in pedunculo elongato purpureo erecta ovato-cylindrica pallide fusca longiuscula exannulata, operculo conico rostrato obliquo; perist. dentes stricti *longissimi amoene fusci laevissimi, sed creberrime minute nodosi.*

Patria. Nova Hollandia ad flumen Swan River dictum, *Barbulae calycinae* intermixtum: Preiss No. 2458.

A *Tr. flavo-virente* proximo notis cursive impressis, prime foliis comae fertilis longicuspидatis primo intuitu distinguitur.

27. *Tr. flavo-virens* Bruch (Fr. Müller in Regensb. bot. Zeit. 1829. p. 304. t. 7.); laxe cespitosum humile, innovationibus ad comam fertilem oriundis dichotomum, flavo-virens *molle*; folia laxe imbricata erecto-patentia tortilia, madefacta stricta, comalia e basi oblonga *tenerime elongate* et pellucide reticulata *longâ lineari-lanceolata*, margine *valde* undulata, nervo dorso laevi crasso flavido ad apicem planiusculum erectum *in cuspidem brevem acutam producto*, supra basin e cellulis minutis hexagonis tenuissime papillosis obscure areolata et ad marginem supra basin cellulis basilaribus *tenerrimis pellucide marginata*, superne immarginata *integra*; theca in pedunculo longo purpureo erecta ovato-cylindrica pallida, dein fusca, *leptodermis* exannulata, operculo conico rostrato obliquo; perist. dentes stricti intense purpurei rugulosi, cruribus regularibus binis.

Br. Europ. Fasc. 18—20. *Trichostomeae*; p. 6. t. 3.

Patria. In fruticetis maritimis Sardiniae detexit Fr. Müller; Otranto, in terra di Otranto: Rabenhorst; in pinetis sabulosis pr. Massiliam: Jordan; ad mare Algeriae: W. Schimper; in ericetis Tingitanis: Salzmann; pr. Pola Istriae et in insula Pasman Dalmatiae: Sendtner. — *Martio.*

Pl. mascula gracilior subsimplex, foliis late ovato-lanceolatis, internis brevioribus obsoletinerviis. — *Tr. Barbulae* proximum.

28. *Tr. fragile* C. Müll.; *dense cespitosum erectum strictum, aequaliter e basi usque ad apicem foliosum, tomentosum fragile; folia caulina erecto-appressa, flexuosa rigida fragilia, madefacta erecto-patentia, lineari-lanceolata acuminata erecta, nervo carinato laevi subcontinuo tenui flavido, integerrima, basi longa elongate pellucide areolata et margine subundulata, supra basin cellulis basilaribus pellucidis marginata, minutissime hexagono-areolata et papillosa; perichaetia basi longissima tenerime elongate reticulata; theca in pedunculo elongato rigido fragili purpureo erecta cylindrica robusta, columella filiformi exserta.*

Didymodon fragilis Hook. in Drumm. Musc. Americ. No. 127.

Patria. America septentrionalis ad margin. lacuum alpin. legit Drummond, sed rarissime, fertile. Terre Neuve: La Pylaie primus legit, sed sterile.

Species primo intuitu distinctissima et notis cursive impressis, prime fragilitate maxima, facile distinguitur.

29. *Tr. cylindricum* C. Müll.; *late et laxe cespitosum amoene luteo-viride valde crispulum parum inflexum, plus minus humile, depressum fastigiate ramosum, molle; folia caulina erecto-patentia subflexuoso-recurva, anguste lineari-acuminata, nervo excurrente acutiuscula, margine papillis subcrenulata flexuosa haud revoluta, e cellulis basi laxis pellucidis elongatis superne minutis tenuissime papillosis opacis areolata, carinata; perichaetia basi magis vaginante longius pellucida praedita, valde acuminata; theca in pedunculo longiusculo flavido substricto erecta anguste cylindrica longiuscula, pallida dein fuscescens, annulata, operculo conico-subulato obliquo; perist. dentes *Tr. rubelli*, seu saepius *bifidi* v. *cribrosi*.*

Didymodon cylindricus Br. Europ. Fasc. 29 — 30. p. 5. t. 3. — *D. tenuirostris* Wils. in Lond. Journ. of bot. 1841. p. 376. — *Weisia cylindrica* Bruch in Br. Germ. II. 2. p. 58. t. 29. — Brid. 1.

p. 806. — *W. tenuirostris* *) Hook. et Tayl. Musc. Brit. ed. II. p. 83. Suppl. 3.

Patria. In rupibus arenaceis umbrosis per Vogesum, ubi pr. Bipontum detexit Bruch, Sylvam Nigram, Thuringiam, Bavariam superiorem pr. Rothenbach (Sendtner) et in Britannia atque Hibernia. In India orientali Br. Europ. pariter indicavit. — *Sero auctumno.*

Pl. mascula gracilior, sed magis ramosa, floribus terminalibus. Folia perig. e basi ovata concava anguste lineari-lanceolata. — Speciminibus *Barbulae tortuosae* minoribus haud dissimile, et peristomio, a *Trichostomis* typice minime refugiente, a ceteris congeneribus hujus sectionis, *Tr. rubello* excepto, facile distinguitur.

b. *Pusilla.*

30. *Tr. inflexum* Bruch (Fr. Müller in Regensb. bot. Zeit. 1829. p. 402. t. 6.); *pusillum tenellum simplex cespitosum* virens; folia *pauca* erecto-patentia, sicca tortilia, *angustissime* lineari-lanceolata, apice breviter acuto *semper plus minus arcuato-inflexa*, basi tenera pellucide areolata et nervo tenui excurrente praedita, integerrima, superne minutissime hexagono-reticulata et papillosa; theca in pedunculo erecto stricto *flavido tenui* erecta elliptica *angusta parva amoene fusca*, exannulata, operculo conico-rostrato recto purpureo; perist. dentes erecti *tenuissimi fusci sublaeves*.

Br. Europ. Fasc. 18—20. *Trichostomum*, p. 12. t. 9.

Patria. Sardinia prope Laconi in rupibus: Fr. Müller; Istria prope Rovigno: Sendtner; Otranto, in terra di Otranto Italiae: Rabenhorst.

Pl. mascula gracilior, foliis ovato-lanceolatis, externis apice inflexis, internis tenuioribus evanidinervibus.

31. *Tr. calcicola* Hmp. (Ic. Musc. t. 29.); *cespitosum pusillum subsimplex* e virente flavescens rigidum erectum; folia in comam patulam congesta, erecto-paten-

*) Adnotat. in pag. 462 deleatur.

tia tortilia, madefacta stricta, *lanceolata obtusato-acuta*, nervo crasso flavido ante apicem evanido, margine integerrimo erecto, basi quadrate hexagone pellucide reticulata brevi, superne e cellulis *submagnis rotundato-hexagonis incrassatis opacis* areolata, subcanaliculata; theca in pedunculo erecto tortili longiusculo purpureo erecta, ovato-cylindrica subaequalis, brunnea pachydermis, exannulata, operculo conico subulato obtuso rectiusculo; perist. dentes *longissimi albidii laeves haud nodosi*.

Patria. Nova Hollandia, in rupibus calcareis prope Freemantle: Preiss, 14. Aug. 1839.

Sectio IV. **Desmatodon** Brid. Mant. Musc. p. 86. et Br. univ. I. p. 523. — *Dermatodon* Hüb. — *Trichostomum* al. — Folia lata plus minus plana et ovata, ubique e cellulis hexagonis ampliusculis chlorophyllosis basi plus minus pellucidis areolata, cymbiformi-concava v. plus minus carinata.

A. *Theca erecta.*

a. *Inflorescentia monoica.*

32. Tr. latifolium Schwägr. (Suppl. I. I. p. 145.); *monoicum*; laxe cespitosum humile parce ramosum; folia laxe imbricata patentia, sicca fere in spiram contorta, late oblongo-lanceolata, nervo crasso in *aristam plus minus longam flexuosam* acutam producta, margine inferne parum revoluta, *distincte papillosa*, apice subcrenulata, basi longa e cellulis elongatis laxissimis pellucidis laevibus reticulata praedita, superne e cellulis *multo minoribus opacis* viridibus areolata; theca in pedunculo elongato *flexuoso haud tortili lutescenti-purpureo erecta, oblongo-cylindrica*, pallide lutea leptodermis nitida, dein fusca, annulo simplici et operculo *oblique et obtuse rostellato* basi amoene aurantiaco; perist. dentes purpurei, in membrana brevi positi, e basi latiuscula subregulariter bifidi articulati rugulosi, *siccitate incurvi*.

Desmatodon latifolius Brid. I. p. 524. — Br. Europ. p. 5. tab. 1. — *D. brevicaulis* Brid. I. p. 525. — *D. Systylius* Blytt in litt., in insula Tromsøe Norvegiae lectus. — *D. Güntheri* Sendtn. in Schedulis. — *Trichostomum piliferum* Sm. Fl. Brit. III. p. 1245. — *Di-*

cranium latifolium Hdw. Musc. Fr. I. p. 89. t. 33. — *Swartzia pilifera* Brid. in Schrad. Journ. 1800. p. 289. — *Mnium latifolium* Gmel. Syst. Nat. II. p. 1328. — *Bryum piliferum* Dicks. Fasc. IV. Pl. Cr. t. 11. f. 1.

β. muticum; altius valde ramosum, foliis evanidincr-
vibus. Br. Europ. I. c. *Desmatodon latifolius β. muticus* Brid. I.
p. 525. — *D. glacialis* Fk. in Brid. I. p. 822. — *D. spathulatus*
Hartm. fide Ångström in Fries Summ. Veget. p. 94. — *Dicran.*
latifolium Hook. in Drumm. Musc. Amer. No. 109. — *Trichost. Hop-*
peanum Schultz in Syllog. Ratisb. 1828. p. 140?

Patria. Ad terram in subalpinis et alpinis per to-
tam Europam, in alpibus vulgatissimum. Var. *β.* in sum-
mis alpibus et in Rocky Mountains Americae septentrio-
nalis. — *Aestate.*

Flos masc. in axillis comae foliorum superiorum sub-
terminalis sessilis 1—2 phyllus, foliis perig. ovato-acu-
minatis solidinervibus. Antheridia brevissime stipitata,
paraphysibus clavatis flavidis mixta.

33. Tr. Systylium C. Müll.; *monoicum*; cespitosum
humile parce ramosum; folia densissime imbricata paten-
tia, sicca tortilia, inferiora oblongo-lanceolata, superiora
latissime oblonga et spathulato-obovata, margine plana,
apice crenulata, *vix papillosa*, nervo tenui flexuoso in
aristam longam valde flexuosam acutam piliferam pro-
ducto, *superne e cellulis majoribus diaphanis subrhom-*
boideo-hexagonis tenuioribus parce chlorophyllosis vel
perfecte pellucidis reticulata; theca in pedunculo lon-
giusculo recto cylindrica erecta fusca pachydermis, an-
nulo simplici et operculo columella exserta elevato plus
minus persistente; perist. dentes abbreviati pallide fer-
ruginei inaequaliter 2—3-fidi vel lacunosi, basi integri,
in membrana sat exserta concolore conjuncti, siccitate
incurvi.

Desmatodon Systylius Br. Europ. Fasc. 31. Suppl. c. tab.

Patria. Norvegia, in alpe Dovrefjeld et in valle Gul-
brandsdalen ad latera viae cavae prope Ringbøe: W. P.
Sch. detexit 1844. Fillefjeld et Gustafjeld: Blytt. In

alpibus Bavaricis pr. Linkerskopf, in locis imperviis, altitud. 6856' legit Sendtner.

Flos masc. *D. glacialis*, a quo notis cursive impressis facile differt.

34. Tr. Guepini C. Müll.; *monoicum*; cespitosum subramosum; folia patentia, inferiora ovato-lanceolata, superiora ovali-oblonga, nervo excedente subaristata, margine revoluta; theca in pedunculo breviusculo erecta oblonga subcylindracea badia, annulo simplici et operculo majusculis conico oblique apiculato concolori; perist. dentes subaequales longiusculi perfecte regulariter ad basin fissi et per paria approximati, humiditate et in theca recenter deoperculata in conum obliquum conniventes, sicci strictiusculi rubello-rufescentes valde granulati. †.

Desmatodon Guepini Br. Europ. Fasc. 18—20. p. 8. t. 4.

Patria. In terra argillosa prope Angers Galliae occidentalis: Guépin.

Flores masc. axillares gemmiformes 2—3-phylli apice patuli; folia perig. ovata acuminata, obsolete et nullo modo nervosa; antheridia 2—3; paraphyses nullae. — Ab *Anacalypta lanceolata* simillima notis cursive impressis distat.

35. Tr. convolutum Brid. (l. p. 492.); *monoicum*; humile subpulvinato-cespitosum dichotome ramosum; folia dense imbricata, sicca in spiram convoluta, madefacta erecta stricta, ovali-oblonga, nervo crasso flavido in mucronem brevem acutum producta, margine integerrimo revoluta et parum flexuosa, basi e cellulis pellucidis tenerimis parvis laevibus superne minutis opacis tenuissime papillosis areolata, carnosula; perichaetiale intimum brevius, margine haud revolutum; theca in pedunculo breviusculo purpurascens erecta ovalis, plerumque exannulata, pallide lutea dein fuscescens, operculo conico breviter oblique rostellato; perist. dentes longiusculi valde inaequales, in membrana altiuscula pallida positi, fusciduli rugulosi.

Trich. nerrosus Bruch in Musc. Müller. Sard. et Hüb. Musc. Germ. p. 295. — *Desmatodon nerrosus* Br. Eur. Fasc. 18—20. p. 6.

t. 3. — *Didymodon nervosus* Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 66. tab. 20. — Brid. I. p. 516. — *Did. Capensis* Spr. Syst. Veget. IV. II. p. 323. — *Grimmia atrovirens* Sm. Engl. Bot. t. 2015. fide Hooker. — *Weisia nerrosa* Hook. in Brid. I. p. 808. e spec. imperfectis paucis authent. huc pertinere videtur. — *Barbula circinalis* C. Müll. Linn. XVII. p. 703, sed annulo simplici. — *Tortula parrula* Hook. Brid. I. p. 825.

β. edentulum; operculo conico breviusculo, peristomio solam membranam basilarem sistente. Br. Europ. l. c.

Patria. In muris argillaceis et rupibus semidecompositis hic illic in valle Rhenana pr. Gebweiler Alsatie, pr. Bonam et Kreuznach, in Gallia occidentali pr. Angers, in Italia, Britannia, Sardinia, Tirol pr. Botzen et in prom. b. spei vulgare. — *Vere, in Africa Junio ad Sept.*

Flos masc. ad pedem feminei minute gemmaceus, foliis perig. externis ovato-lanceolatis solidinervibus, internis minoribus tenuioribus tenuinervibus. Antheridia paraphysibus tenuibus subclavatis mixta.

36. Tr. flavicans C. Müll.; *monoicum*; humile cepitosum parce dichotome ramosum; folia conferta parvula, sicca incurvo-subtortilia, late oblonga obtusa vel breviter acuminata, margine parum revoluta integerrima, basi e cellulis pellucidis tenerrimis parvis laevibus superne minutis valde opacis tenuissime papillosis areolata, carnosula, *nerve crasso evanido*; perichaetia basi longius pellucida; theca in pedunculo breviusculo stramineo dein purpurascente erecta ovali-oblonga, late annulata lutea dein fuscescens, operculo conico breviter oblique rostrato; perist. dentes longiusculi subaequales fusciduli sublaeves.

Desmatodon flavicans Br. Europ. Fasc. 18 — 20. p. 7. t. 4. — *Didymodon flavicans* Fk. in schedulis. — *Did. oblongifolius* Hook. in Drumm. Musc. Amer. No. 114. — *Tortula humilis* Hook. ibidem No. 137. non Hdw. — *Barbula obtusifolia* Schwägr. Suppl. I. I. p. 129. t. 31! — Brid. I. p. 552. excl. syn. Schultz.

Patria. Ad rupes umbrosas pr. Heiligenblut Carinthiae, pr. Waldstein Montis piniferi: Funk; Faulhorn loco Bachalpe: W. P. Sch., ad Sentis Helvetiae: Mühlenbeck, Valesia: Schleicher. America sept. in ru-

pib. calcareis ad lacum Winnipeg et in Rocky Mountains: Drummond. — *Aestate.*

Flos masc. *Tr. convoluti* proximi, a quo notis cursive impressis facile distinguitur.

b. *Infloresc. dioica.*

37. *Tr. amblyophyllum* C. Müll.; *dioicum*; cespitosum brevicaule, innovando ramosum; folia laxe imbricata, e basi *plerumque subinvoluta* cellulis elongatis laxis pellucidis laevibus areolata *longâ elongate oblonga obtusiuscula, inferiora apice emarginata*, nervo autem in aristam brevem acutissimam flavidam producta, margine plus minus revoluta *et valde flexuosa*, integerrima, papillis tenuissimis aspera, supra basin *minutissime opace* areolata; perichaetialia intima e basi angustissima longe subspathulata breviter mucronata, omnia basi laxissima tenerrima; theca in pedunculo longo purpureo recto *cylindracea* erecta, fusca annulata, operculo *subulato* obliquo; perist. dentes in membrana brevi positi, breves sinistrorsum subtorti, *rugulosi* intense purpurei, binati *tenues*.

Desmatodon amblyophyllus Mont. in Ann. d. sc. nat. 1845. 4. p. 108.

Patria. Chile, ad terram prope Valparaiso et S. Jago: C. Gay. — *Aprili* 1830.

Tr. obliquo simile, notis autem sat distinctum. — Pl. mascula multo ramosior, innovationibus masculis pluribus brevibus dense comosis. Folia perigonialia externa e basi late ovata concava tenera brevi lanceolata concava obtuse acuta evanidinervia, pellucidius, sed minute areolata, margine vix revoluta; interna late cordato-acuminata undique tenerrime reticulata colorata, nervo tenui evanido. Antheridia magna, paraphysibus flavidis subacutis cincta.

38. *Tr. Schimperii* Mont. (in Ann. d. sc. nat. 1845. 4. p. 103.); *dioicum*; cespitosum *brevissimum* subsimplex; folia erecto-patula in comam crassiusculam congesta, *lato-oblonga carinato-ligulata obtusissima*, nervo

tenui ante apicem evanido, margine integerrimo parum flexuosa, e cellulis basi *ampliuscule hexagonis* subfirmis pellucidis laevibus superne minoribus minutissime papillo-sis areolata; theca in pedunculo breviusculo purpureo erecto *oralis parva* brunnea, operculo conico recto obtuso thecam superante; perist. dentes in membrana brevi pal-lide fusci geminati subrugulosi.

Mont. in Gay, Hist. de Chile. Bot. Crypt. t. 2. f. 1.

Patria. Chile, in terra nuda pr. loc. Racangua: Bertero.

B. *Theca obliqua vel nutans.*

39. Tr. inclinatum C. Müll.; *monoicum*; humile gregarium vel cespitosum parce dichotome ramosum; folia caulina laxè imbricata, late oblongo-lanceolata, nervo crasso in cuspidem brevem acutam producta, margine inferne revoluta, *tenuissime subobsolete papillosa*, apice subcrenulata, basi longa e cellulis elongatis laxissimis pellucidis laevibus reticulata praedita, superne e cellulis *submajusculis valde et amoene chlorophyllosis* areolata, *superiora submarginata*; theca in pedunculo elongato purpureo *sinistrorsum tortili* erecto *minute globoso-oralis*, collo angusto *inclinato obliqua*, pallide lutea leptodermis nitida dein fusca et nigrescens, annulo simplici et operculo conico *recto breviter acuto* aurantiaco; perist. dentes amoene aurantiaci, in membrana brevi positi, e basi latiuscula irregulariter bifidi articulati rugulosi, *siccitate recti*.

Desmatodon inclinatus Sendtn. in Regensb. Denckschrift. 1841. p. 144. — *Anacalypta inclinata* Nees Mst. — *Desmatodon cernuus* Br. Europ. Fasc. 18—20. p. 8. t. 5. 1843. — *Didymodon latifolius* Wahlenb. Fl. Lapp. p. 313. t. 20. — Hook. in Drumm. Musc. Amer. No. 115. et al. auct. — *Cynodontium latifolium* Schw. Suppl. I. I. p. 110. t. 28. — *Cynodon latifolius* Brid. l. p. 502. — *Desmatodon cernuus* Hüb. M. Germ. p. 117. 1833.

Patria. Norvegia, Lapponia, Suecia, Tirolis, Carinthia, Helvetia, Salisburgia, in Sudetis Bohemiae et in Rocky Mountains Americae septentrionalis, muros calcareos praeferens, passim. — *Versus aestatis finem.*

Flos masc. ad pedem feminei, antheridiis, foliis duobus brevioribus tectis, longiuscule stipitatis, paraphysibus valde clavatis mixtis. — Partibus multis cum *Discelio nudo* convenit et nulla alia specie confundi potest.

40. Tr. obliquum C. Müll.; *androgynum*; cespitosum brevicaule subramosum; folia dense imbricata *late orato-lanceolata*, basi e cellulis laxis amplis hexagonis longis *brevibus* e medio usque ad apicem *multo minoribus opacis* areolata, *nerve constanter in aristam flexuosam producta*, margine, apice crenulato excepto, ubique revoluta, tenuissime papillosa; theca in pedunculo longiusculo *erecto* purpureo *parum inclinata cylindraceo-cernua* fuscescens annulata, operculo conico acuto; perist. praecedentis.

Desmatodon obliquus Br. Europ. Fasc. 18 — 20. p. 10. t. 7. — *Desmatodon Tortula* Bruch in schedulis. — *Tortula suberecta* Hook. in Drumm. Musc. Amer. No. 145.

Patria. In rupestribus alpis Pasterze pr. Heiligenblut Carinthiae et in alpe Radstadter-Tauern dicta: Funk. In alpib. Bavaricis, Linkerskopf, 6856' altitud. leg. S e n d t n e r. In locis umbrosis alpinis ad marginem rivuli in Rocky Mountains Americae septentrionalis: D r u m m o n d. — *Aestate.*

Caetera ut in praecedente specie, quacum notis illustratis nunquam confundi potest.

41. Tr. Laureri Schultz (in Regensb. bot. Zeit. 1827. p. 163.); *androgynum*; dense cespitosum humile parce dichotomum; folia dense imbricata, *e basi oblonga* e cellulis magnis hexagonis amoene pellucidis *superne valde punctulatis reticulata late orata obtusiuscula apiculata*, *nerve evanido vel in cuspidem producto*, margine, apice denticulato excepto, ubique revoluta, *superne* e cellulis valde chlorophyllosis *majusculis* tenuissime papillosis areolata, carinata; perichaetialia longiora magis acuminata; theca in pedunculo breviusculo *apice arcuato nutans*, *oralis parvula* fuscescens annulata, operculo minute rostrato obliquo parvulo; perist. dentes sinistrorsum semel torti, e membrana brevissima longiusculi ad basin bifidi, cruribus

obtuse tetragonis subaequalibus nodosiusculis amoene aurantiacis.

Desmatodon Laureri Br. Europ. Fasc. 18—20. p. 9. t. 6. — *D. Blyttii* Hartm. ex Ångström Summ. Veget. auct. E. Fries. p. 94. — *Tortula bryoides* Hook. in Drumm. Musc. Amer. No. 135!

Patria. Locis rupestribus in der Leiter prope Heiligenblut Carinthiae: Laurer detexit. Norvegia pr. Kongsvold: Kurr. Helvetia in summo Faulhorn prope casam: Mühlenbeck et W. P. Sch. — In alpib. Bavaricis, Linkerskopf, 6856' altitudine: Sendtner. Manhard inter Carinthiam et Littorale: Sendtner. America sept. in terra mont. Rocky Mountains: Drummond. — *Augusto.*

Antheridia ad basin floris feminei in axillis foliorum comalium subnuda. Paraphyses subclavatae breviter articulatae. — A *Tr. obliquo* notis cursive impressis jam facillime distinguitur.

Gen. VII. **Barbula** Hdw.

Fund. Musc. II. p. 92. — *Tortula* ej. ibid. — *Zygotrichia* Brid. — *Mollia* Schrank. — *Streblotrichum* P. B. — *Syntrichia* W. et M. — *Mnium* Linn. Jun. — *Bryum* Dill. Linn. et al. — *Hypnum* Hall. — *Luida* Adans.

Nomen ob cilia instar barbae os thecae cingentia conditum.

Calyptra dimidiato - cucullata. Perist. *simplex ciliiforme*; cilia 32 solitaria v. per paria approximata, in membrana basilari plus minus exserta, in ciliola duo postica fissae, longissima, articulata rugulosa, in spiram unicam v. complures sinistrorsum rarissime dextrorsum contorta, hygroskopica. Cellulae operculi et calyptrae itidem contortae.

Nomen „*Tortula*” prioratum tenet quidem, sed ob synonymum genus phanerogamicum (malum nunc obsoletum) prius deletum, bryologos, qui nomine „*Barbula*” dein usi sunt, alienavit, quare hoc nomen posterius anteponimus, dum alii *Tortulam* rectius praeferunt. Prioratus ergo auctori illi erit, qui speciem primus novam descripsit, etiamsi *Tortulam* nominaverit; nam nomen pro nomine immutare facile et igitur ridiculosum est, prioratum simul mutare.

Sectio I. **Aloina.** Foliorum nervus laxus latus deplanatus superne fila articulata efficiens; folia e basi tenera vaginatâ reflexa, carnosula, margine involuto, involute tortilia, viridissima, integerrima. Perist. sinistrorsum contortum.

1. **B. rigida** Schultz (Rec. Barb. t. 32.); *dioica*; brevissima, simplex v. semel basi innovans; folia oblonga obtusa, brevissime mucronata v. superiora pilifera concava, margine membranacea; theca *elliptico-oblonga* recta, annulo *revolubili*, operculo oblique et longe rostrato *basi crenulato*, calyptra thecam *dimidiam* obtegente, perist. longiusculo, spiras *complures* efficiente.

Br. Europ. 13 — 15. p. 13. t. 1. — Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 212. ex parte. — *Tortula enervis* Hook. et Tayl. Musc. Brit. ed. II. p. 52. t. Sppl. 2. — *Tortula bifrons* De Not. Spec. de Tort. Ital. No. 17. forma pilifera.

Patria. In muris, rupibus schistosis, calcareis atque siliceis et ad terram argillosam per totam Europam temperatam et calidiorem, forma pilifera in Italia et prom. b. spei, ubi legit Drège. — *Auctumno et hyeme.*

Pl. mascula fem. intermixta minutissima triphylla, flore gemmif., foliis perig. late ovatis concavis tenuibus obsolete nervosis nudis, antherid. oblongis, paraphys. subclavatis.

2. **B. ambigua** Br. et Sch. (Br. l. c. p. 14. t. 2.); *dioica*; habitus praecedentis, brevicaulis; folia patula ligulato-lanceolata obtusa, *apice subincurva*; theca *cylindrica* erecta, annulo *subpersistente*, operculo *breviori* elongato-conico margine *integro*, calyptra *brevi* operculum *solum* obtegente, perist. *brevi* semel contorto.

B. rigida Hdw. Musc. Fr. I. p. 65. t. 25. f. 3 et 5. Ejusd. Sp. Musc. p. 116. — Brid. I. p. 528 et p. 824.

Patria. In locis iisdem praecedentis prime argillosis forsân per totam Europam temperatam et calidiorem. — *Auctumno, hyeme et primo vere* thecis maturis atque juvenilibus.

Ex obs. auctorum species praecedenti intime proxima notis illis leviter distinguuntibus constantibus inveniri fertur.

3. **B. aloides** Br. et Sch. (Br. Europ. 13 — 15. p. 15. t. 2.); *dioica*; humilis cespitosa simplex; folia patula lan-

ceolata obtusiuscule acuta, supra basin longiusculam reflexa, superiora erecta, nervo mediocriter lato; theca in ped. longiusculo flavo-rubente flexuoso *inclinata*, *gibbo-so-cylindrica*, flavida dein fusca nitida, operculo longo *tenuirostri* obliquo, annulo lato longe persistente, dentibus humidis in spiram *unicam* contortis, longis, *per paria approximatis*, *siccis divaricatis*.

Tortula rigida Hook. et Tayl. Musc. Brit. ed. 2. p. 53. t. 12.—
Trichostomum aloides Koch in Brid. I. p. 816.

Patria. In rupibus arenariis, muris calcareis et locis argillosis per Europam mediam sparsim, et in Terra Nova, ubi legit La Pylaie. In Germania prope Bipontum: Bruch, pr. Esslingam: Hochstetter, pr. Detmold: C. Müller; pr. Naumburg: Beneken. In Anglia pr. Yarmouth et Henfield. In Gallia australi: Decandolle. —
Hyeme.

4. **B. brevirostris** Hook. et Tayl. (*Tortula* in Musc. Brit. ed. 2. p. 53. Suppl. t. 2.); *hermaphrodita*; cespitulosissima *humillima simplicissima*; folia *ovato-rotundata* late oblonga, valde concava, in *gemma clausam paucifoliam* congesta, *vix vel paullo reflexa*, latissime nervosa, margine hyalino toto ambitu inflexa, ad folii partem superiorem filis oblecta; theca oblonga erecta, operculo triplo brevior, annulo latiusculo revolubili; perist. dentes in spiras complures contorti.

Br. Europ. 13 — 15. p. 16. t. 2 bis. — *B. rigida* nonnull.

Patria. In argilloso-arenaceis Scotiae, ubi detexit Stewart, Sueciae pr. Upsaliam: Wahlenberg et al. America sept., Rocky Mountains et ad York factory: Drummond No. 136.

Ex inflorescentia hermaphrodita facile cognoscitur.

Sectio II. **Argyrobarbula.** Foliorum nervus teres, superne massa filamentosa quasi byssoidea oblectus; folia erecta lato-ovata, basi haud vaginata, superne chlorophyllo destituta, margine erecto v. revoluta, pilis latis maxime canescentia. Perist. sinistrorsum contortum.

5. **B. membranifolia** Hook. (*Tortula* in Musc. Exot. t. 26.); *monoica*; innovando ramosa pulvinato-cespitosa;

folia erecto-patentia late ovata et late elliptica, *apice membranacea hyalina*, nervo tereti in pilum longum *denticulatum* producto; theca erecta elliptico-oblonga, *latuscule annulata*, operculo brevirostri; perist. membrana basilaris annulo triplo longior; calyptra in dimidium fere thecam descendente.

Br. Europ. 13—15. p. 17. t. 3. — *Barbula chloronotos* Brid. l. p. 539. ex parte.

Patria. In muris, rupibus et collibus lapidosis apicis Italiae, Sardiniae, Galliae meridionalis, Algeriae, Tirolis, Duc. Badensis super. et Hassiae superioris. Ex insula Teneriffa primus retulit Schmidt. — *Ineunte aestate.*

Flos masc. ad basin feminei vel innovationis fertilis sessilis gemmiformis diphyllus; folia perig. caulinis breviora, nervo obsoleto v. nullo; antherid. pauca, paraphysibus subclavatis.

6. **B. chloronotos** Brid. (Mant. Musc. p. 90.); *dioica*; praecedenti simillima, folia imbricata late ovata concava *omnino viridia*, dein chlorophyllosa, *integerrima*, *superne magis rotundata*, nervo in pilum sublaevem excurrente; theca elliptico-oblonga annulata parvula.

Brid. l. p. 539. excl. syn. Hook. — Br. Europ. l. c. p. 18. t. 4. — *Tortula crassinervia* De Not. Spec. de Tort. Ital. No. 15.

Patria. In Pyrenaeis ad terram ochraceam: Bridel detexit; in lapidosis calcareis et ad moenia Monspessulani: Salzmann, W. P. Sch.; pr. Cagliari Sardiniae: Fr. Müller. — *Vere.*

Flos masc. in pl. graciliore terminalis polyphyllus; fol. perig. ext. nervo in pilum exeunte, interiora obsolete nervosa submutica, intima omnino enervia, antheridia sat copiosa, paraphysib. apicem versus sensim incrassatis mixtis.

7. **B. papillosa** Wils. (Tortula in Lond. Journ. of bot. 1845. p. 192.); cespitulosa brevis basi ramosa; folia patentia, haud recurva, valde concava obovata, nervo in mucronem v. pilum producto, superne filis brevibus articulatis oblecto, *magis hyalina fragilia luxius areolata*

dorso distincte papillosa, sicca marginibus involutis et apicibus conniventibus. †.

Patria. Ad truncos vetust. ulmorum Angliae, pr. Huntington pr. York, Majo 1843; Castle-Howard park; pr. Llansaintffraid (N. Wales) Jun. 1844: Wilson.

Ex habitu et caractere essentiali *B. laevipilae* formis minoribus similis, cacterum *B. membranifoliae* proxima dicitur.

Sectio III. **Tortella.** Folia cirrhata rigida opace et minute areolata, basi vaginante plus minus albida tenera, margine erecto v. plus minus involuto, rarissime revoluto, carinata. Perist. sinistrorsum in una specie dextrorsum contortum.

Generi *Barbulae*, quod sectio *Eutrichostomi* affinis generi *Trichostomo*.

a. *Perichaetio exserto cylindraceo.*

8. **B. calycina** Schw. (Suppl. II. I. p. 63. t. 119.); *dioica*; laxè cespitosa innovando dichotoma rigida lutescens cirrhato-tortilis; folia caulina madefacta patentia, e basi breviter vaginante laxè et elongate reticulata *utrinque pellucida ad nervum flavidâ* subito lanceolata reflexa, nervo crasso flavo canaliculato-concavo in mucronem brevissimum producto, minute areolata opaca viridissima, tenuissime papillosa, margine parum involuta; perichaetialia *in cylindrum longe exsertum convoluta erecta*, elongate laxè reticulata subtorta; theca in ped. *elongato rigido erecta cylindraceo-oblonga* parum arcuata fusco-badia, operculo longe subulato recto; perist. elongatum pluries contortum.

Brid. I. p. 541.

Patria. Nova Hollandia: La Billardiere primus legit. Ad fl. Swan River legit Preiss.

A *B. inclinata* et affinibus ceteris notis illustratis facillime differt.

9. **B. lamprocalyx** C. Müll.; *dioica*; dense cespitosa subdeclinata fastigiata breviter ramosa, densifolia crassiuscula viridis, teretiuscula; folia caulina appressa subtorta, madefacta erecto-patentia, dense conferta, e basi

rectiusculâ oblonga, obtusa v. plus minus acuminata, nervo viridi in aristam brevem viridem laevem producto, integerrima, margine ubique revoluta, inferne e cellulis ubique laxis hexagonis teneris flavidulo-pellucidis longiusculis, superne sensim minutissimis maxime opacis viridissimis tenuissime papillosis areolata; perich. in cylindrum exsertum flavidum nitidum subclausum congesta, erecta, latiora, elongate acuminata et aristata, basi longiore pellucida, medio plicato-concava; theca in ped. longiusculo flexuoso tenui rubro erecta anguste cylindrica curvula leptodermis fusca, operc. longe conico, annulo nullo, perist. elongato laxo contorto, in membrana brevi posito.

Patria. Chile: Pöppig. Hb. Kunz.

B. Northianae affinis, sed inter *Tortellas* fere solitaria.

b. *Perichaetio immerso patulo.*

10. **B. inclinata** Schwägr. (Suppl. I. I. p. 131. t. 33.); dioica; late et laxo cespitosa breviter dichotoma erecta, plus minus elata plerumque humilis flavide rarius lacte viridis, fragilis densissime imbricata; folia caulina cirrhato-tortilia, madefacta erecto-patentia, e basi breviter vaginante pellucida laxo et elongate reticulata partem superiorem minute areolatam opacam tenuissime papillosam margine igitur subcrenulatam inferne pellucide cingente erectâ parum reflexa, perfecte lanceolata, nervo in mucronem brevem producto carinato, margine erecto v. parum incurvo vix undulato, latiora breviora, integerrima; perichaetia longiora erecta longius cuspidata longe vaginantia et laxo reticulata; theca in ped. mediocri orato-oblonga subgibbosa curvula obliqua, dentibus laxo contortis apice divergentibus tubum vix basi efficientibus.

Brid. I. p. 575. — Br. Eur. 13—15. p. 25. t. 12. — *B. nervosa* Brid. Mant. Musc. p. 95. — *Tortula curvata* Schleich. in sched.! — *Barb. angustifolia* Brid. I. p. 568.

Patria. In glareosis secus fluviorum ripas, in colibus calcareis et in alpinis totius Europae. — *Primovere, in alpidibus aestate.*

Pl. masc. fertili nunc similis, nunc gracilior et ramosior; flores terminales gemmiformes; fol. perig. externa et media ovato-lanceolata, interna ovato-acuminata, omnia nervosa. — A *B. tortuosa* affini notis cursive impressis facile distinguitur.

11. *B. tortuosa* Web. et Mohr (Bot. Taschb. p. 205.); *dioica*; late et *pulvinata* cespitosa elata dichotome ramosa dense imbricata viridis v. lutescens; folia erecto-tortilia, *madefacta erecto-patula* flaccida flexuosa, e basi longe vaginante pellucida *lare et elongate hexagono-reticulata*, partem superiorem minutissime areolatam viridem opacam margine parum cingente anguste lanceolata acuta elongata flexuosa, margine undulata, *integerrima*, *papillis tenuissimis margine subcrenulata*, perichaetalia *longiora longe* vaginantia, laxius articulata, caeteris caulinis similia, *omnia nerro in cuspidem acutam parce denticulatam producta*; theca in ped. elongato stricto suberecta, plus minus arcuata cylindrica, operculo subulato longo aurantiaco; perist. e membrana brevissima compluries contortum.

Brid. I. p. 574. — Br. Eur. 13—15. p. 26. t. 13. ex parte. — *Mollia tortuosa* Schrk. Prodr. Fl. Salisb. n. 833. — *Mnium tortuosum* L. jun. Meth. Musc. p. 364. — *Bryum tortuosum* L. Sp. Pl. p. 1583. — *Br. cirrhatum* setis et capsulis longioribus. Dill. Musc. p. 377. t. 48. f. 40. — *Hypnum tortuosum* Web. Spic. Fl. Goett. p. 90. — ? *Syrrhopodon dubius* Sendtn. in sched.

Patria. Ad rupes, humo obtectas, praesertim calcareas per totam Europam in subalpinis et alpinis et in America sept. — *Vere, in alpibus versus aestatis finem.*

Pl. mascula similis, floribus terminalibus solitariis v. aggregatis gemmiformibus. Folia perig. interna caulinis latiora breviora longius acuminata.

12. *B. squarrosa* Brid. (I. p. 833!); *dioica*; late et *lare* cespitosa elata dichotoma dense imbricata lutescens; folia erecto-tortilia, *madefacta reflexo-squarrosa* flaccida subflexuosa *breviora*, e basi breviter vaginante minute *rectangulari-areolata flavida*, margine solo e cellulis pellucidis parvis *laxioribus cincta distincte reflexa*, flexuosa, lanceolata *evanidinervia*, margine distincte denticulata,

et tenuissime papillosa; perichaetialia *breviora*, *breviter vaginantia valde reflexa*, inferne laxius reticulata; theca erecta elongate cylindrica subarcuata, operculo conico-subulato, annulo simplici, perist. dentibus teneris valde papillosis.

Br. Eur. 31. Suppl. t. 1. — *Tortula?* *squarrosa* De Not. Spec. de Tort. Ital. n. 29. — *Barbula tortuosa* Br. Eur. 13 — 15. p. 26. ex parte.

Patria. Ad terram in pascuis aridis, humilioribus totius fere Italiae c. Sicilia et Sardinia: De Notaris, Fr. Müller. Gallia, pr. Monspeulanum in collibus calcareis apricis: W. P. Sch. Anglia, ad littora prope Hastings et in Beeding Chalkpit (Sussex): Spruce. In insulis quoque Canariensibus vigere dicitur.

A *B. tortuosa* habitu simillima areolatione folii jam toto coelo et notis ceteris cursive impressis differt.

13. B. Northiana Grev. (*Tortula* in Trans. of the Linn. Soc. XV. II. p. 342. t. 3. f. 4.); *monoica*; innovando parce dichotoma subsimplex cespitulosa, *amoene viridis nitida inferne albida*, humilis; folia caulina cirrhato-tortilia, madefacta erecto-patentia, e basi breviter vaginante pellucida laxa et elongate reticulata partem superiorem minutissime areolatam viridissimam opacam tenuissime papillosam margine parum cingente paullo reflexa, lanceolata mucronata excurrentinervia; integerrima parum undulata, margine erecto; perichaetialia basi laxiore longiore patula; theca in ped. longiusculo flavo-rubente flexuoso *erecta cylindraceo-oblonga* plus minus arcuata, operculo subulato recto; perist. pluries contortum *tubulosum*.

B. cirrhata Br. et Sch. Br. Eur. 13 — 15. p. 24. t. 11. — *Tortula cirrhata* W. Arn. Bruch. — *T. intermedia* De Not. Syllab. p. 181. — *Barb. cespitosa* Schw. Suppl. I. I. p. 120. t. 31. — *B. cespitosa* Sulliv. Musc. Allegh. No. 150. — Brid. I. p. 535. — *B. humilis* Hdw. Sp. Musc. p. 116. t. 25 et Brid. I. p. 537. c spec. Hb. Bridel. huc pertinet.

Patria. Italia tota et ager Mediterraneus, Africa septentrionalis atque meridionalis et utraque America,

arborum truncos emortuos vel humum mollem libenter habitans. — *Aestate*.

Flores masc. plures axillares breviter stipitati in caule femineo positi tenuiter gemmiformes paucifolii; fol. perig. late ovata acuminata apice recurva laevia tenera pellucida enervia; antheridia pauca, paraphysibus filif. paucis mixtis. — A *B. inclinata* haud dissimili notis laudatis longe distat, *Eutrichostomis* e. gr. *Tr. Barbulae* similima et e distributione geographica lata polymorpha.

14. **B. anomala** Br. et Sch. (Br. Europ. 13—15. p. 45. t. 29.); *monoica*; laxe cespitosa erecta elatiuscula comose foliosa inferne nudiuscula, innovando pluries divisa; folia longiuscula tortilia, madefacta erecto-patentia laxe imbricata, viridissima nitida, inferiora minora, ligulate lanceolata, margine subinvolutaceo plus minus flexuoso, supra basin elongate anguste pellucide et laxe reticulatam *usque ad apicem dentato*, dense minute areolata, sed laevia haud opaca mollia, nervo crassiusculo subexcurrente; theca in ped. longo flexuoso rubro tenui erecta longiuscule cylindrica subobliqua fuscescens nitida, operc. conico recto breviusculo, annulo duplici revolubili, perist. *dextrorsum contorto* longo valde scabro ad basin usque fere fisso, ciliis binatis.

Patria. In olivetis pr. Varennam ad lac. Comensem et in ipsius lacus ripis fruticibus umbratis, praecipue versus Bellano: W. P. Schimper et Mühlenbeck, ineunte Julio 1840.

Flores masc. in ramulis propriis terminales solitarii v. aggregati gemmacei; fol. perig. ovato-acuminata nervosa parva diaphana; antheridia pauca minuta, paraphysibus filiformibus paucis mixta. — *Trichostomo Barbulae* maxime similis, sed peristomio barbuloideo dextrorsum contorto ab eodem ceterisque congeneribus longe distincta.

15. **B. angustifolia** Hook. et Grev. (Brewster Edinb. Journ. I. p. 299. t. 12.); elongata subramosa; folia linearia carinata acuta subapiculata rigidiuscula, siccitate tortilia; theca cylindracea, operculo longirostrato. †.

B. tenuirostris Brid. I. p. 826.

Patria. Nepal: Wallich.

B. linearis affinissima, distincta tantum caule elongato et foliis carinatis vix mucronulatis. *B. tortuosam* etiam referre dicitur, sed longe brevior et foliis nullatenus undulatis.

Sectio IV. **Myophiladelphus.** Plantae graciles, foliis involutis plus minus spathulatis, basi e cellulis majoribus limpidis superne minutis plus minus opacis minus papillosis areolata. Perist. sinistr. c.

16. **B. agraria** Sw. (*Tortula* in Fl. Ind. Occ. III. p. 1763.); *monoica*; *flos masculus in ramo proprio basilaris brevi* minutus paucifolius, foliis perig. convolutaceis acuminatis erectis, nervo ante apicem evanido flavido; caulis pusillus simplex dense cespitosus paucifolius; folia caulina erecto-conferta apice parum curvata, marginibus involutis, madefacta laxe conferta, *spathulato-lanceolata*, nervo valido flavido excurrente, integerrima, basi e cellulis majusculis utriculo primordiali tenuissimo instructis superne minoribus densioribus hexagonis *haud opacis* areolata, paullo concava; perichaetia *intima duo convolutacea breviora luxius reticulata*, apice obtusiuscule rotundata, nervo evanido in intimo obsoleto; theca in ped. longiusculo cylindracea subcurvula annulata, operculo conico obliquiusculo; perist. pluries contortum, e membrana brevissime exserta ortum.

Brid. I. p. 532. — Hdw. Musc. Fr. III. p. 17. t. 6. — *B. stellata* Brid. Mant. Musc. p. 88. — *B. conica* Brid. Musc. Rec. II. I. p. 193. — *Bryum agrarium* Sw. Prodr. p. 139. — *Barbula acuminata* Brid. Musc. Rec. II. I. p. 208. — *Tortula decipiens* Brid. Sp. Musc. I. p. 247. — *Bryum acuminatum* Sw. Prodr. p. 139. e spec. auth.! — *Barb. domestica* Brid. Mant. Musc. p. 89. Br. univ. I. p. 536! — *Barb. latifolia* Brid. I. p. 536! — *B. pallens* Brid. I. p. 531!

Patria. In Antillis insulis omnibus et terra continente vicina, in muris, agris saccharinis rupibusque.

17. **B. spathulata** Dz. et Molkb. (Musc. Archip Ind. p. 49. t. 19.); *dioica?* praecedenti simillima; folia inferiora magis dissita, superiora in comam congesta recurvo-pa-

tentia, e basi caulem amplexente *spathulata*, *versus apicem denticulata*, margine undulata, nervo crasso una cum apice desinente, late obovata obtusata saepe apice emarginata, basi e cellulis subquadratis majusculis elongatis limpidis superne minimis rotundato-hexagonis chlorophyllosis areolata; perich. minora ped. mediocrem amplexentia oblonga evanidinervia; theca erecta cylindrica *parva*, annulo simplici revolubili, operculo conico-acuminato curvulo.

Patria. Java, in horto Bogoriensi: Korthals. Amboina, in solo calcareo: Zippelius.

A *B. Javanica* laeviter differt.

18. **B. Javanica** Dz. et Molkb. (Musc. Archip. Ind. p. 47. t. 18.); *dioica*; laxè cespitosa erecta humilis, innovationibus teneris divisa, basi foliis remotis apicem versus densioribus incrassata, gracilis; folia caulina sicca inflexo-tortilia, e basi caulem amplexente lata laxè et pellucide reticulata involutaceo-oblonga obtusa, nervo crasso ante apicem evanido v. excurrente, integerrima, minutissime areolata viridia haud opaca; perichaetia oblongiora vaginantia convoluta; theca in ped. longiusculo flexuoso rubente recta anguste cylindracea, operculo conico rectiusculo, annulo angusto, perist. parce contorto in membrana brevissima posito.

B. calymperifolia C. Müll. Linn. XVIII. p. 703.

Patria. In terra nuda summi montis Gédé: Zippelius. E prov. Buitenzorg inter *Bryum pachypoma* Mont. misit Miquel.

Pl. masc. similis, flore terminali gemmaceo; fol. perig. latissime ovatis acuminatis obtusiusculis, intimo enervi subrotundato; antherid. numerosis, paraph. filiformibus mixtis.

19. **B. inflexa** Dub. (Tortula in Moritzi Verz. d. Zoll. Pfl. p. 133.); *dioica*; ex habitu *B. Javanicae* simillima, folia caulina convolutaceo-concava oblongo-lanceolata abrupte acuta integerrima, nervo excurrente v. ante apicem summum evanido crassiusculo, basi e cellulis hexagonis

longiusculis firmiusculis superne minute hexagonis haud opacis sublaevibus areolata; perich. longiora; omnia sordide viridia, sicca inflexo-tortilia; theca in ped. mediocri rubro erecta cylindracco - oblonga, operc. *oblique longe rostrato*; perist. dense contortum in membrana perangusta positum.

Patria. Java, ad terram humidam rivulorum Pantar Petè: Zollinger No. 1603.

A *B. Javanica* proxima notis cursive impressis certe distat.

Sectio V. **Senophyllum.** Plantae graciles. Folia plus minus torta, angusta, plerumque lanceolata, carinata superne minute et rotundate areolata saepe opaca, margine plus minus revoluta s. erecto. Perist. sinistr. cont.

A. Folia margine erecto.

a. Nervus excurrentes vel evanidus.

20. B. erythrodonta Tayl. (Lond. Journ. of bot. 1846. p. 50.); laxe cespitosa erecta subuncialis pallide lutescenti-olivacea, ramis crebrioribus fertilibus erectis fastigiatis; folia imbricata erecto-patentia subrecurva subfasciculata, *elongate lanceolato-acuminata carinata longe setacco-apiculata, margine infero recurva, haud revoluta, supero serrulata, marginata, nervo percurrente*; perich. *conformia*; theca in ped. *perbrevis* stramineo torto erecta oblongo-cylindracea ampla aequalis, operc. *obtusè conico brevi*, perist. *intense purpureo brevi dense contorto anguste tubuloso*. †.

Icon *Wilsoni* l. c. p. 450. t. XV. F.

Patria. Monte Pichincha pr. Quito: W. Jameson.

Ex animadv. *Wilsoni* stirps memorabilis, habitu *Leptothecae speciosae* Hook. et Wils.

21. B. Pöppigiana C. Müll. (Linn. XVII. p. 585.); *dioica*; dense cespitosa pusilla, sordide viridis, innovationibus *aequilongis stellatim superne dispositis nonnullis quasi truncata v. siccitate deusta*, inferne paucifolia, superne comosa; folia caulina sicca subspiraliter torta, madefacta recurvo-patentia, parva, e basi *brevi tenerrime*

hexagone reticulata *maxime pellucida* recurvo-lanceolata, e cellulis minutis opacis hexagonis *saepe diaphanis* areolata, margine integerrimo erecto; perich. erecta basi latiora et *multo teneriora* laxius reticulata amplexicaulia; omnia *vix viridia, sed grisea*, nervo excurrente rufescente; theca in ped. mediocri erecta elliptica, badia, simpliciter annulata, operculo conico obliquo brevi, perist. in membrana brevisissima parum contorto sublaevi fuscidulo.

Patria. Chile australis: Pöppig Coll. Pl. Chil. No. 4.

E ramificatione et foliorum structura singularis species.

22. B. paludosa Schw. (Suppl. I. I. p. 124. t. 30.); *dioica*; late et dense cespitosa elata erecta, fastigiata ramosa, amoene virescens inferne fuscescens; folia caulina parum tortilia, madefacta erecto-patentia, lanceolata, canaliculato-concava, basi erecta *anguste elongate firme* reticulata, subpellucide flavida, superne plus minus reflexa e cellulis minutis quadratis firmis incrassatis tenuissime papillosis opacis areolata, margine erecto *apice plus minus remote denticulato*, superiora et perichaetialia basi laxius reticulata, haec subvaginantia longius acuminata; omnia nervo excurrente; theca in ped. mediocri parvula elliptica *plerumque irregularis curvula, igitur subgibbosa*, badia, *exannulata*, operc. subulato recto, perist. pluries contorto, in membrana basilari angustissima.

Br. Eur. 13 — 15. p. 21. t. 7. — Brid. I. p. 562. — *B. crocea* Brid. Mant. Musc. p. 90.

β. Funkiana; humilior tenerior, foliis angustioribus, theca minori. Br. Europ. l. c. — *B. Funkiana* Schultz. Rec. Barb. t. 32. — Brid. I. p. 542.

Patria. In udis et irrigatis alpinis et subalpinis Germaniae, Helvetiae, Sabaudiae, Rhactiae, Salisburgiae, ditionis Mediolanensis ad lac. Comensem et majorem, et in Bavaria. — *Aestate.*

Flos masc. in pl. propria terminalis gemmiformis, foliis perig. ext. ovato-lanceolatis, intimis minoribus, nervo brevi tenui. — In axillis foliorum super. auct. Br. Eur. corpuscula cellulosa invenerunt. — E distinctissimis.

23. B. lurida Hsch. (Fl. Bras. p. 18.); erecta uncialis simplex, inferne radiculosa, superne foliosa, gracilis; folia *erecto-patentia, sicca torquescentia, lanceolata obtusa planiuscula, integerrima*, lurido-viridia, nervo crasso carinato rufescente infra apicem evanido, retis areolis subquadratis minutis; perich. ext. erecta basi vaginata, interiora minuta lanceolato-acuminata; theca in ped. terminali v. innovationibus brevibus laterali purpureo flexuoso erecta, cylindrico-oblonga parum curvata, laevis brunnea, operc. conico brevissimo concolori. $\frac{1}{4}$.

Patria. Brasilia in Minis Generalibus: Martius.

Cui affinis?

b. *Nerrus excedens*.

24. B. Hornschuchiana Schultz. (Nov. Act. 1823. XI. I. p. 217.); dioica; laxa et late cespitosa flavescens fragilis gracillima erecta parce breviter dichotoma; folia caulina *sicca incumbantia*, madefacta patentia, *perfecte late lanceolata acutissima*, nervo crasso excurrente v. in superioribus excedente, integerrima, inferiora minute sed dense areolata *sublaevia* margine minus revoluta, superiora v. perichaetialia *parum majus areolata, margine erecto*; theca oblongo-cylindrica, badia parva subcurvula, anguste annulata, operculo oblique subulato; perist. praecedentis.

Br. Europ. 13 — 15. p. 28. t. 10. — *B. revoluta* β . *Hornschuchiana* Brid. I. p. 572. — *B. revoluta* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 210.

Patria. In apricis per totam Europam temperatam et calidiorem. In Africa septentrionali a W. Schimper lectam Br. Eur. indicat. — *Vere*.

Fl. masculus *B. revolutae* simillimae, a qua notis cur-sive impressis certe refugit.

25. B. linearis Sw. (Tortula in Fl. Ind. Occ. III. p. 1765.); dioica? humillima simplex; folia *elongate lineari-lanceolata*, patula, sicca incurva, *basi brevissima laxa* reticulata, superne e cellulis minutissime rotundatis opacis tenuissime papillosa areolata, planiuscula, margine

erecto, nervo crasso flavido excurrente mucronata; theca in ped. mediocri rubente cylindracea parva, operculo oblique subulato, annulo duplici revolubili, perist. pluries contorto, in membrana basilari vix exserta.

Brid. I. p. 533. — Schwägr. Suppl. I. I. p. 119. t. 30.

Patria. In siccis calcareis Hispaniolae: Swartz.

A. B. agraria longe distat.

26. B. flexuosa Hook. (Musc. Exot. t. 125.); vix uncialis erecta crassiuscula apicem versus praecipue ramosa, fusco-viridis; folia caulina arcte imbricata erecto-patentia rigidiuscula lanceolata subcurvula carinata, margine erecto subundulata integerrima, nervo valido intense fusco, paulo ultra apicem excurrente; perich. elongata, pedunculi *elongati flexuosi* flavo-rubentis basin *insigniter vaginantia atque circumvoluta flavo-fusca longe acuminata obsoletinervia*; theca cylindracea badia, operc. elongate rostrato acutissimo rectiusculo, perist. longo flavo-rufescente compluries contorto ad basin usque fisso. †.

Brid. I. p. 573.

Patria. Ad prom. b. spei: Menzies 1791.

B. Folia margine revoluta.

a. Folia stricta.

α. Perichaetium patulum.

† Nervus excurrents.

27. B. gracilis Schwägr. (Suppl. I. I. p. 125. t. 34.); dioica; laxe cespitosa parum cohaerens, fuscescens, rarius viridis, humilis, simplex v. innovationibus fastigiatis; folia caulina *madefacta et sicca erecto-patentia stricta densiuscule imbricata e basi late ovata concava marginibus convexo-recurvis instructâ lanceolato-acuminata*, nervo rufescente excurrente, integerrima, haud plicata, ubique e cellulis firmis parvis infima basi pellucidis quadratis paucis superne plus minus rotundatis incrassatis robustis vix papillosis areolata; perich. *longe et flexuose acuminata*, intima basi amplexante laxius et pellucidius reticulata; theca in ped. mediocri rigidulo erecta, ovalis

v. oblonga regularis v. curvula, *exannulata*, operc. subulato obliquiusculo, perist. *vix* contorto, in membrana latiuscula.

Br. Eur. 13 — 15. p. 22. t. 8. — Brid. I. p. 536. — *B. acuta* Brid. I. p. 554! — *B. rectifolia* Tayl. Lond. Journ. of bot. 1846. p. 49. ex animadv. *Wilsoni* (l. c. p. 450.) huc var. seta longiori pertinet.

β. viridis; elatior; folia angustiora elongato-lanceolata laete viridia, sicca laxè imbricata et subtortilia. Br. Eur. l. c. — *Tortula fallax stricta* De Not. Spec. de Tort. Ital. No. 26.

Patria. In glareosis calcareis v. arenaceo-argillosis per totam Europam et in Andibus, m. Pichincha 12,000' alt. Var. *β.* in umbrosis Sardiniae, ubi legit Fr. Müller. — *Vere.*

Pl. masc. similis, flore gemmiformi; fol. perig. ext. caulinis paulo latiora, interna e late ovato acuminata, nervo ante apicem evanido.

28. *B. fusca* C. Müll.; *dioica*; *B. gracili* simillima, sed folia *perichaetialia caulinis simillima*, intima basi laxius areolata, omnia e cellulis *multo densioribus firmioribus* inanibus diaphanis areolata, latiora *annulo simplici* praedita, caetera praecedentis.

Patria. Chile, ad Talcahuano: Pöppig.

29. *B. comosa* Dz. et Molkb. (Musc. Archip. Ind. p. 46. t. 17.); *dioica*; ascendens simplex v. apice innovationibus binis brevibus ramulosa luteo-viridis subgregaria pusilla; folia caulina sicca adpressa subtortilia, madefacta erecto-patentia, inferiora minuta remota subtriangularia, superiora sensim majora et conferta, *anguste lanceolata* subacuta, *summo apice obsolete denticulata*, *marginè angustissime longe ultra medium folii reflexa*, ubique e cellulis *submollibus parvis subhexagonis diaphanis* areolata, nervo tenui excurrente carinato; perich. longiora basi amplexicaulia; theca in ped. longiusculo rubente erecta *cylindrica minuta*, operculo conico-subulato subaequilongo recto, perist. in membrana *annulum* haud superante *compluries contorto*.

Patria. Amboina, in solo calcareo: Zippelius.

A *B. gracili* proxima notis cursive impressis facile distinguitur.

30. *B. graminicolor* C. Müll.; *dioica*; laxe cespitosa erecta subhumilis gracilis, e perichaetio saepe semel vel bis prolifera, e ceteris simplex, *amoene viridis*; folia erecto-tortilia, madefacta *erecto-potentia stricta*, inferiora minora remota, superiora confertiora subcomantia, e basi erecta *tenerrime reticulata pellucidâ recurva*, *anguste lanceolata acuta*, margine integerrima supra basin parum revoluta, minute areolata opaca, tenuiter papillosa, nervo tenui excurrente *viridi*, perich. *basi teneriora laxiora*; theca in ped. longo rubro stricto tenui erecta *oblongo-cylindrica subcurvula*, pallida, dein fuscescens, operc. *conico-subulato obliquo*, annulo simplici angustissimo persistente, perist. longo pluries contorto *ad basin usque fisso* pallide fusco laeviusculo.

B. Atlantica Schimp. in schedulis.

Patria Chile, ad terram loc. umbr. pr. Racangua: Bertero legit 1828. Junio.

Pl. masc. gracilior, flore terminali, innovando dein laterali gemmacco; fol. perig. ext. basi late ovata, interna multo breviora ovato-acuminata acuta fusca diaphana, omnia nervo evanido rufescente; antheridia pauca turgida, paraph. paucis filif. mixta. — A *B. elata* Mont. affini notis cursive impressis facile distinguitur.

31. *B. torquata* Tayl. (Lond. Journ. of bot. 1846. p. 50.); cespitosa brevis erecta subramosa, superne flavescenti-viridis inferne brunneo-flavescens; folia sicca spiraliter atque arcte convoluta, conferta erecto-potentia lanceolata acuminata integerrima margine reflexa, nervo percurrente; perich. conformia; theca in ped. subflexuoso pallide rubro tenui erecta subaequalis oblongo-ovata, operc. elongate conico, perist. pluries contorto *ad basin usque fisso*. †.

Patria. Nova Hollandia ad flumen Swan River: J. Drummond.

Ex auctore siccitate foliorum torsione habitum *Rhacopilii tomentosi* referens, ex animadv. *Wilsoni* (l. c. p. 450.) *B. unguiculatae* affinis, sed foliis acutioribus distare dicitur et siccitate *B. replicatae* simulans.

†† *Nervus excedens.*

32. *B. unguiculata* Hdw. (Musc. Fr. I. p. 59. t. 23.); *dioica*; laxa et late cespitosa, plus minus elata, et dichotome ramosa, sordide viridis inferne fuscescens parce radiculosa; folia *erecto-patentia* v. *patentia* siccitate sub-torta adpressa, ovate et lineari-lanceolata plus minus obtusiuscula, nervo crasso carinato *flavido excedente mucronata*, margine integerrima v. papillis tenuissimis asperula, inferne revoluta, basi e cellulis parvis *rectangulalibus pellucidis* superne *quadratis* multo minoribus *opacis* areolata; perich. *patula* longiora basi longiore laxius reticulata; theca in ped. mediocri purpureo substricto erecta oblongo-cylindrica saepe curvula fusca leptodermis subnitida, operc. longe subulato rectiusculo, annulo nullo, perist. in membrana angustissima pluries contorto intense purpureo papillosa.

Br. Europ. 13—15. p. 19. t. 5 et 6. — Brid. I. p. 563. — *Mollia unguiculata* Schrank. Baiers. Fl. II. p. 457. — *Dicranum laxum* Brid. Musc. Rec. II. I. p. 175. excl. Synon. — *Bryum unguiculatum* et *barbatum* surculis in summitate crassioribus. Dill. Musc. p. 383. t. 48. f. 47.

Barb. amoena Schumacher. Fl. Saelandiae II. p. 48. et Brid. I. p. 538, testib. Weber et Mohr huc revocanda.

Barbula aristata Brid. Mant. Musc. p. 92. — *Tortula aristata* Sm. Fl. Brit. III. p. 1261. — *Orthopyxis aristata* P. B. Prodr. p. 79. — *Bryum aristatum* Dicks. Fasc. IV. Pl. Cr. p. 12. t. 11. f. 7.

Barbula dubia Brid. Mant. Musc. p. 93. — *Tortula dubia* P. B. Prod. p. 92. — *Tort. barbata* Sm. Fl. Brit. III. p. 1260. — *Bryum barbatum* Curt. Fl. Lond. Fasc. IV. t. 65. — *Bryum unguiculatum* et *barbatum*, tenuius et stellatum. Dill. Musc. p. 384. t. 48. f. 48.

Tortula mucronulata Sm. Fl. Brit. III. p. 1250. — *Bryum mucronulatum* Dicks. Fasc. III. Pl. Cr. p. 3.

Barb. apiculata Hdw. Sp. Musc. p. 117. t. 26. — Brid. I. p. 560 et 831. — *Trichostomum Pensylvanicum* Spr. Syst. Veget. IV. I. p. 170, non Hmp. Linn. XIII. p. 41.

Barb. microcarpa Schultz. Rec. Barb. t. 33. — Brid. I. p. 561.

Barb. lanceolata Hdw. Sp. Musc. p. 119. t. 26! — Brid. I. p. 568. — *Barb. obtusifolia* Schultz Rec. Barb. t. 32. — Brid. I. p. 552. excl. Syn. Schwägr.

Barb. stricta Hdw. l. c. t. 26! — Brid. I. p. 540.

Barb. fastigiata Schultz. Rec. Barb. t. 33. — Brid. I. p. 554.

β. cuspidata; humilior, foliis angustioribus longius et sensim mucronatis, perichaetialibus nervo longius excedente fere cuspidatis. Br. Europ. l. c. — Brid. I. p. 565. —

Barb. cuspidata Schultz. Rec. Barb. t. 32. — *Tortula mucronulata* Sw. Musc. Suec. p. 40.

γ. Patagonica; fastigiato-ramosa, foliis plerumque obtuse rotundatis, nervo excedente mucronatis. C. Müll. Linn. 1843. p. 583. — *Syntrichia ericetorum* Brid. I. p. 588. — *Tortula ericetorum* Sm. Fl. Brit. III. p. 1258? — *Bryum ericetorum* Dicks. Fasc. II. Pl. Cr. p. 5? — *Bryum ruralis* facie, foliis minoribus et non pilosis Dill. Musc. p. 354. t. 45. f. 13. e spec. Hb. Dillen.!

δ. brachypus; humilis simplex subgregaria, folia robusta torta, pedunculus perichaetium parum superans, theca parva ovalis. *B. brachypus* Brid. I. p. 551. — *Tortula acuminata* cj. Sp. Musc. I. p. 252. Varietas memorabilis, a Bridelio in Monte Serrato Cataloniae et circa Gotham Thuringiae lecta, typice autem a *B. unguiculata* non recedens.

Patria. Per orbem Europam totam et Americam septentrionalem, terram nudam habitans, vulgatissima polymorpha. — *Auctumno.*

Pl. mascula femineae similis v. gracilior, flore terminali gemmaceo; fol. perig. ext. ovato-lanceolata, media similia et breviora, intima e basi lata acuminata breviora; anth. crassiuscula, paraphysibus filiformibus cincta.

33. B. flavescens Hook. et Grev. (Brewster Edinb. Journ. I. p. 297. t. 12.); flavescens elongata ramosa; folia erecta, sicca tortilia, e basi ovata apice acuminata obtusiuscula e nervo subexcedente apiculata, inferne margine recurvo; theca cylindracea, operculo longe rostrato thecam aequante. †.

Brid. I. p. 831. — *B. fuscescens* Wallich. Catal. No. 7567.

Patria. Nepal, in solo argilloso: Wallich.

Habitus et caulis *B. fallacis*, sed folia longius acuminata, humida erecta, sicca tortilia. A *B. unguiculata* simili operculo multo longiore differt.

34. *B. icmadophila* Schimp. (Br. Europ. Suppl. ined.); *dioica*; dense cespitosa, sed laxè cohacrens, *procera gracillima flexuosa*, innovationibus brevibus subcuspidatis parce divisa, *subjulacea rigida*, sordide viridis v. fuscescens; folia caulina *erecto-conferta*, *madefacta parum patentia strictissima*, *perfecte ovato-lanceolata*, superiora *nervo excedente in subulam angustam longam substrictam producto* crasso fuscescente, margine vix revolutò v. convexo integerrimo, laevia, ubique e cellulis minutis firmis quadratis diaphanis areolata; perich. longius subulata, basi tenuiore, magis amplexante latiore; theca in ped. breviusculo rubro torto erecta oblonga *minuta ore angustata*, operculo *oblique rostrato acuto* rubro, annulo simplici, perist. longiusculo pluries contorto ad basin usque fisso.

Patria. Ad catarractam „Krimmlfall” Pinzgoviae societate *Bryi julacei*, ubi legit W. P. Schimper.

Notis editis ab affinibus *B. vineali* et *gracili* longe refugit et species distinctissima. Parce fructificat.

35. *B. teretiuscula* Schimp. (in litt.); *dioica*; dichotome ramosa, ramis siccitate teretibus; folia conferta erecta, sicca imbricata, ovato-lanceolata, nervo excurrente mucronata, margine basin versus reflexa; perich. late lanceolata subvaginantia, nervo apice evanido; theca ovali-oblonga erecta, annulo simplici angusto, operc. rostrato theca breviori, perist. semel torto. †.

Patria. Mexico, ad montem Orizaba: Liebmann.

A *B. gracili* proxima tam magnitudine quam habitu et colore, thecae forma et peristomii torsione, foliis tamen brevius acuminatis, nec in subulam abeuntibus, siccitate arcte imbricatis, annulo latiore constanter distincta.

β. Perichaetium convolutum.

36. *B. convoluta* Hdw. (Musc. Fr. I. p. 86. t. 32); *dioica*; dense cespitosa *pulvinata*, erecta *gracillima* par-

vula dichotome ramosa lacte v. flavo-viridis, inferne radiculosa v. tomentosa; folia caulina *erecto-patentia parva* carinato-lanceolata, *ubique* e cellulis minutis superne subopacis viridibus *quadrate hexagonis* basi rectangularibus pellucidis arcolata, integerrima, *inferne margine paullo reflexa*; perich. nonnulla exserta convolutacea *ubique elongate et distincte laxe reticulata* flavide pellucida, acuminata *intima obtusa obsoletinervia*; theca in ped. elongato flavido stricto tenui inter ramos 2 posito erecta v. subobliqua anguste oblonga, badia, operculo oblique longirostrato, perist. compluries contorto in membrana basilaris annulum revolubilem duplicem superante.

Br. Eur. 13—15. p. 29. t. 16. — Brid. I. p. 569. — *B. setacea* Hdw. Fund. Musc. II. p. 92. — *B. purpurea* Agardh ex' animadv. Hornschuchii in Brid. I. c. — *Streblotrichum convolutum* P. B. Prodr. p. 89. — *Mnium setaceum* Ehrh. Hann. Mag. 1780. p. 235. — *Bryum setaceum* Vill. Pl. Dauph. III. p. 880. — *Br. convolutum* Dicks. Fasc. II. Pl. Cr. p. 6. — *Bryum stellare*, nitidum, pallidum, capsulis tenuissimis Dill. Musc. p. 381. t. 48. f. 44. — *Hypnum setaceum* Weis. Crypt. Goett. p. 206.

β. Sardoia; foliis magis opacis, perich. internis acuminatis. Br. Eur. I. c.

Patria. In apricis per totam Europam et Americam septentrionalem. Var. *β.* in Sardinia: Fr. Müller. — *Aestate ineunte.*

Pl. masc. gracilior ramosior, flore gemmiformi, fol. perig. ext. caulinis brevioribus, mediis ovato-lanceolatis, intimis ovato-acuminatis tenuinervibus.

37. B. leucocalyx Mont. (Ann. d. sc. nat. IX. 1838. p. 53.); *dioica*; erecta, innovationibus iteratis *apice stellate foliosis brevibus veluti prolifera*, *inferne subnuda*; folia caulina *ima squamiformia appressa minuta*, suprema rosaceo-congesta late ovato-lanceolata, *apice incurvo obtusiusculo*, margine revoluta, canaliculata, integra v. papillis distinctis densissimis crenulata, e cellulis hexagonis basi infima laxis parvulis flavidis superne minutis apice opacis arcolata, nervo crasso excurrente, perich. in *cylindrum exsertum convoluta*, *squamiformi-ligulata*,

interiora maxime obtusata, basi laxissime superne minutius sed pellucide reticulata *obsoletinervia*, *albida*; theca in ped. ob innovat. laterali mediocri stricto rubro cylindracea subincurva, operc. subulato.

Patria. Chile, ad terram: **Bertero**.

Planta memorabilis singularis.

38. B. inaequalifolia Tayl. (Lond. Journ. of bot. 1846. p. 49.); *brevis gracilis simplex*; folia *erecto-patentia subimbricata*, *inferiora minora ovata*, *superiora lanceolata*, *omnia obtuse acuta*, *marginem integerrima revoluta*, nervo valido *percurrente*, perich. *majora erecta elongata*, basin pedunculi mediocris *vaginantia*, *cylindrum fere efficientia*, theca erecta cylindracea leviter curvula, *pro gracilitudine caulis lata*, operc. conico brevi, perist. bis contorto pallide rubente ad basin usque fisso. †.

Ic. *Wilsoni* l. c. p. 450. t. XV. D.

Patria. Mons Pichincha Andium Quitensium: **W. Jameson**.

Notis datis a *B. revoluta* et affinibus distare videtur.

b. *Folia recurva.*

α. Nervus excurrents.

† *Perichaetium patulum.*

39. B. fallax Hdw. (Musc. Fr. I. p. 62. t. 24.); *dioica*; longe laxe lateque cespitosa plerumque rufescens erecta plus minus elata subsimplex v. pluries dichotoma; folia caulina *madefacta celeriter squarroso-reflexa*, sicca erecto-patentia subtortilia, inferiora minuta, superiora majora subcomantia, e basi lata subito angustato-lanceolata acuminata, *reflexa*, nervo *excurrente rufescente*, inferne valde revoluta, integerrima, e cellulis basi parvis *firmis quadratis*, superne minoribus *angulato-rotundatis incrassatis igitur obscuris non papillis opacis*, in utraque ala *plica longitudinali praedita*; perich. longiora, e basi tenera pellucida vaginante erecta *curvula*; theca in ped. mediocri atro-rubente tenuiore erecta, plus minus cylindracea angusta, exannulata badia nitida leptodermis, operculo rostrato rectiusculo thecam aequante, perist. *fuga-*

cissimo tenuissime ciliato laxo et pluries contorto, in membrana brevissima posito.

Br. Eur. 13 — 15. p. 23. t. 9. — Brid. I. p. 556. — *Tortula imberbis* Sm. Fl. Brit. III. p. 1261. — *Mollia fallax* Schrank. Baiers. Fl. II. p. 458. — *Bryum fallax* Dicks. Fasc. III. Pl. Cr. p. 5. — *Br. imberbe* Linn. Mant. Pl. II. p. 309. — *Br. tenue, imberbe et pallidum*, foliis crebrioribus. Dill. Musc. p. 382. t. 48. f. 46.

B. flarescens Brid. Mant. Musc. p. 92. — *B. fallax* β . Br. univ. I. p. 558.

B. reflexa Brid. Mant. Musc. p. 93. — *B. fallax* γ . Br. univ. I. p. 558.

β . *brevicaulis*; caulis brevis subsimplex; folia conferta patentia margine subundulata, operculo brevirostro. Br. Eur. I. c. — *B. brevipaulis* Schw. Suppl. I. I. p. 126. t. 32. — Brid. I. p. 551.

γ . *brevifolia*; dense cespitosa gracilescens fastigiata ramosa; folia ovato-lanceolata breviora, perichaetio breviori. Br. Eur. I. c. — *B. (Tortula) brevifolia* Sm. Fl. Brit. III. p. 1259. — Brid. I. p. 555.

Patria. In collibus lapidosis calcareis et argilloso-siliceis, ad aggeres, muros vetustos, rupes tam siccas quam humidas, per totam Europam vulgatissima. — *Sero auctumno et hyeme.*

Pl. masc. ramosior, floribus terminalibus, fol. perig. ext. caulinis similibus, mediis brevioribus, intimis e basi lata concava anguste lanceolatis, nervo tenuissimo v. nullo, omnibus basi buplicatis. — Notis cursive impressis a *B. unguiculata* saepe commutata facile distinguitur.

40. ***B. vinealis*** Brid. (I. p. 830.); *dioica*; *B. fallaci* simillima, folia caulina recurvo-patentia, e basi late ovata sensim angustate lanceolata acuminata parum curvata, nervo subexcurrente rufescente, inferne revoluta, integerrima, e cellulis ubique firmis parvis basi infima quadratis pellucidis superne minutissimis incrassato-rotundatis ob papillas tenuissimas punctulato-opacis areolata; perich. longiora, e basi tenera pellucida v. flavida vaginante erecta curvula; theca in ped. mediocri rubente erecta, ovato-oblonga v. oblongo-cylindracea annulata brevirostris, perist. in membrana latiore semel contorto.

Br. Europ. f3 — 15. p. 24. t. 10. — *Tortula fallax vinealis* De Not. Spec. de Tort. No. 27. — *Tort. insulana* De Not. l. c. No. 28. — *Weisia monoclados* Brid. l. p. 360.

Patria. In vinearum muris soloque calcarco circa Durlach Duc. Badensis: A. Braun detexit, praeterea hic illic in rupib. arenaceis, rarius fertilis. — *Majo, Junio.*

Infloresc. *B. fallacis* simillimae, a qua notis cursive impressis certe refugit.

41. B. Crügeri Sonder (in litt. ad Crüger); *dioica*; late et laxissime cespitulosa subaggregata, erecta gracilis simplex, apice semel innovans, sordide v. lutescenti-viridis; folia caulina in caule rubro *remota* subtorta, madefacta valde patula parum recurva, *apice incurva, oblongo-lanceolata obtusa, acumine quam maxime brevi acutata*, margine inferne revoluta, integerrima, nervo crasso subexcurrente viridi, e cellulis basi minute quadratis viridibus firmis superne *minutissimis maxime opacis* papillois areolata, carinata; perich. majora, basi latiora laxius reticulata; theca in ped. mediocri rubro erecta, anguste cylindrica pallida, operc. oblique rostrato acuto rubro, anulo nullo, perist. ad basin usque fisso longo tenuissime ciliato longo.

Patria. Insula Trinitatis Antillarum: Crüger legit in terra argillosa ad La Ventille, die Aug. 2. 1846, fructibus supramaturis in muris et rupibus calcareis formam confertiore Nov. 28.

Pl. mascula cespites propr. efficit, gracilior, floribus in eodem cauli pluribus remotis lateralibus gemmaceis sessilibus; fol. perig. interiora e basi lato-ovata valde concava laxe reticulata fuscescente breviter et profunde canaliculate lanceolata brevissime acutata, nervo tenuiore; antherid. majuscula multa, paraphys. longioribus subclavatis flavidis mixta. — A *B. unguiculata* proxima notis laudatis facile distinguitur.

42. B. Australasiae Hook. et Grev. (Brewster Edinb. Journ. l. p. 301. t. 12.); breviuscula semuncialis rutilans, vix ramosa; folia inferiora dissita, superiora densiora,

lineari-lanceolata carinata acutissima patentia, margine reflexa integerrima, sicca tortilia, pallide olivacea; theca ovato-cylindracea erecta, operculo brevirostrato; peristomii cilia basi membrana angustissima unita; parum torta. †.

Brid. l. p. 828. — *B. rufiseta* Tayl. Lond. Journ. of bot. 1846. p. 51. teste Wilson l. c. p. 450.

Patria. In Novae Hollandiae King Georg's Sound habitat: Menzies 1791.

Habitus fere *Ceratodontis purpurei* habere fertur. Ex animadv. Wilsoni ad *B. vinealem* forsan pertineat, sed peristomio praedita, cujus cilia binata *Trichostomis* affinia dicuntur.

43. *B. campylocarpa* Tayl. (Lond. Journ. of bot. 1848. p. 187.); *dioica*; laxa cespitosa subramosa breviuscula, inferne brunnea, apice flavide viridis; folia laxa imbricata patenti-recurva, ex lata ovata basi lineari-subulata, integerrima, margine recurva, summa siccitate convoluta; perich. majora erecta dense appressa; theca in ped. rubro-brunneo elongato-cylindrica, hinc curvato-inclinata, operc. longirostro. †.

Patria. Monte Pichincha Andium Quitensium: W. Jameson. Febr. 1847.

A *B. fallaci* theca curvata, foliis magis subulatis, a *B. vineali* perichaetio majori et foliis basi latioribus refugere legitur.

44. *B. xanthocarpa* C. Müll. (Linn. XVII. p. 581.); *dioica*; dense cespitosa, sed laxa cohaerens, *rigidissima* longiuscula flexuosa gracilis, apicem versus crassior lutescens, inferne sordide fusca, *innovatione brevi solitaria terminali dein caule iterate longiscente laterali* parce ramosa; folia caulina inferiora minuta remota, apice comantia, recurvo-patula flexuosa, *sicca subincumbentia*, robusta rigida, e basi oblonga lanceolata, obtuse acuta, margine integerrimo valde revoluta, nervo crassissimo rufescente excurrente, profunde canaliculata, basi e cellulis angustis longiusculis rectangularibus flavidis superne

maxime minutis incrassato-rotundatis obscuris haud opacis areolata; perich. interiora vaginantia breviora, apice rotundata breviter acuminata obsoletinervia, ubique tenerrime pellucide reticulata; theca in ped. mediocri rubente flexuoso erecta elliptico-cylindracea lutescens, breviter annulata, operc. conico-acuminato recto, perist. pluries contorto in membr. brevi posito.

Patria. Prom. b. spei, inter fruticeta camporum juxta flum. Zwartkoppsrivier dictum: Ecklon. Ad montem Leonis.

A *B. vineali* affini et omnibus congeneribus caeteris notis laudatis distinctissima.

45. **B. elata** Durieu et Mont. (Fl. Alger. mox ed.); *dioica*; elatiuscula gracilis flexuosa superne innovationibus c. 3 longiusculis divisa, *remotifolia*, sordide viridis; folia sicca erecta vix torta laxè imbricata remota, madefacta valde recurvo-patula, caulina e basi decurrente oblonga margine revoluta sensim et valde recurvo-lanceolata, integerrima, nervo rufescente excurrente, ubique e cellulis parvis parum pachydermibus mollibus inferne subpellucidis superne opacis minoribus areolata, perich. longiora basi latiora tenerius et pellucidius reticulata; theca in ped. longiusculo stricto rubro erecta majusculè oblonga, leptodermis, operc. conico recto acutiusculo, *anulo arcte adhaerente simplici*, perist. in membrana latiuscula compluries contorto lutescente.

Patria. Algeria: Durieu.

A *B. fallaci* jam theca annulata, a *B. vineali* notis caeteris cursive impressis differt.

46. **B. geniculata** Mont. (Ann. d. sc. nat. 1845. p. 107.); *dioica*; humilis pallide ferruginea, ramis brevibus paucis *dichotome divisa*, apice densius foliosa; folia caulina sicca et madefacta stricta, haud tortilia; breviter late lanceolata vix recurva, obtusiusculè acuta, e cellulis basi laxis teneris pellucidis medio folii minoribus depresso-hexagonis diaphanis apice magis incrassatis rotundatis fuscidulis areolata, integerrima, margine erecto v. parum

reflexo, nervo excurrente rufescente, canaliculata; perich. *similia* intima basi teneriora; theca in ped. mediocri rubro erecta ovata *minuta* simpliciter annulata badia, operc. conico duplo breviori, perist. in membr. brevi parce contorto ruguloso.

Patria. Chile pr. Valparaiso: C. Gay.

A *B. Pöppigiana* proxima notis cursive impressis refugit. Nomen triviale vix idoneum.

†† *Perichaetium convolutum.*

47. **B. flavipes** Br. et Sch. (Br. Eur. 13 — 15. p. 30. t. 15.); *dioica*; late cespitosa, *sed laxè cohaerens*, humilis, basi innovando parce divisa, *tenella*; folia caulina *squarroso-patula*, *elongate lanceolata* carinata, margine revoluta flexuosa, dense rotundate arcolata opaca tenuissime papillosa, basi pellucidiora magis rectangulari-arcolata; perich. nonnulla longe convoluta, externa apice subito lanceolata, excurrentinervia, interna breviter acuminata evanidinervia, omnia basi pellucidiora laxius, *sed anguste reticulata*; theca in ped. elongato stricto flavido subobliqua *oblongo-cylindracea* fuscescens, operc. oblique rostrato rubro, annulo duplici, perist. compluries contorto in membrana breviter exserta posito.

B. lutescens Laurer in schedulis longe ante auctores supradictos.

Patria. In alpinis Salisburgiae, Bavariae alpestris et pr. Monachum (Bayerbrunn: Sendtner), Carinthiae pr. Heiligenblut, Austriae sup. pr. Steyr et ditionis Mediolanae, pineta alpina calcarea et loca denudata habitans. — *Junio ad Augustum.*

Pl. mascula gracilior longior, fol. brevioribus angustioribus; flore terminali gemmiformi; fol. perig. ext. ovato-lanceolatis, mediis ovato-acuminatis, internis ovatis tenuissime nervosis. A *B. convoluta* notis laudatis certe distat.

48. **B. revoluta** Schw. (Suppl. I. I. p. 127. t. 32.); *dioica*; compacta et subpulvinata humilis erecta gracillima pluries dichotoma, lacte viridis, inferne fuscescens; folia

caulina *spiraliter ad sinistram contorta*, madefacta erecto-patentia, e medio parum recurva, *oblongo-lanceolata tenuissime mucronata*, margine *maxime* revoluta igitur *angusta*, superne opaca minutissime rotundato areolata tenuissime papillosa, inferne laeviora parum majus et quadrata areolata; perich. longiora acuminata *basi laxè areolata vaginante tenera superne tantum revoluta* laevi; omnia excurrentinervia carinata; theca in ped. longo stricto rubente erecta elliptica, ore angustato, badia, simpliciter annulata, operculo subulato recto; perist. compluries contortum, in membrana sat exserta positum.

Br. Eur. 13 — 15. p. 27. t. 14. — Brid. I. p. 571. — *Tortula revoluta* Hook. et Tayl. Musc. Brit. ed. 2. p. 54. t. 12.

Patria. Ad muros et saxa Germaniae, Galliae, Britanniae, Italiae, Sardiniae et Africae septentrionalis rarior. — *Vere.*

Pl. masc. gracilior magis ramosa. Flores gemmiformes terminales, foliis perig. ext. ovato-lanceolatis, mediis latioribus, brevioribus, intimis ovato-acuminatis teneris, margine erectis obsoletinervibus. Antherid. parva, paraphys. filiformibus mixta. — A *B. Hornschuchiana* haud dissimili notis cursive impressis longe differt. A *B. convoluta*, e cespitibus affini, perichaetio magis patulo jam distat.

β. Nervus excedens.

49. *B. spiralis* Schimp. (in litt.); *dioica*; dense foliosa fastigiatim ramosa; folia patentia et recurva, sicca spiraliter incumbentia, lanceolata obtusa canaliculata, marginibus valde revolutis, nervo valido in mucronem exeunte; perich. late lanceolata, haud vaginantia, nervo solido; theca elliptica annulata, operc. conico brevirostro. †.

Patria. Mexico, Yarrea (?) pr. Mirador: Liebmann.

A *B. revoluta* simillima, cujus folia, peristomium, annulum et sporas habet, statura majore et fortiore, foliorum imbricatione spirali et perichaetialibus haud vaginantibus differre dicitur.

50. **B. replicata** Tayl. (Lond. Journ. of bot. 1846. p. 49.); *simplex* pusilla erecta subcespitosa *pallide viridis*; folia contorta, madefacta laxè imbricata erecto-patentia *subrecurva subovate lanceolata* obtusa, nervo crasso excedente apiculata, *marginè toto revoluta*, integerrima; theca in ped. mediocri erecta longiuscule ovata, operculo subulato rectiusculo. †.

Ic. *Wilsoni* l. c. p. 450. t. XV. C.

Patria. Ad muros prope Quito: W. Jameson.

B. unguiculatae ex ic. subaffinis videtur, sed statura et notis cursive impressis distincta.

Sectio VI. **Eubarbula.** Plantae humiles minus ramosae, *Eupottiis* magis similes, foliis plus minus spathulatis oblongis, margine erecto v. revolutò, tenuiter papillosa v. laeviora, basi e cellulis magis flaccidis mollibus reticulata. Perist. sinistrors. cont.

A. *Marginè revolutò.*

a. *Peristom. tubulosum.*

51. **B. subulata** Hdw. (Fund. Musc. II. p. 92.); *monoica*; late cespitosa humilis crassa robusta latifolia breviter ramosa, viridissima, rosacco-foliosa; folia conferta plus minus spathulato-oblonga, nervo crasso excedente mucronata, margine integerrimo v. subserrulato erecto vel parum revolutò paulisper flexuoso, basi e cellulis laxis elongatis pellucidis superne multo minoribus valde chlorophyllosis tenuiter papillosis opacis arcolata, *limbo plus minus conspicuo circumducta*; theca in ped. crasso rubente longiusculo erecta *longissime cylindrica* curvulabada, operc. conico brevi, annulo duplici, perist. membrana basilari in tubum pallidum *longum quadratim et oblique tessellatum* producta, dentibus rubellis.

Br. Eur. 13 — 15. p. 36. t. 21. excl. *B. inermi.* — *Syntrichia subulata* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 214. — *S. alpina* Brid. Mant. Musc. p. 97. — *Tortula Hercynica* Schrad. Spic. Fl. Germ. p. 65. — *Mollia subulata* Schrk. Prim. Fl. Salisb. No. 830. — *Mnium subulatum* Linn. Jun. Meth. Musc. p. 365. — *Bryum subulatum* L. Spec. Pl. p. 1581. — *Bryum* capsulis longis subulatis. Dill. Musc. p. 350. t. 45. f. 10. — *Syntrichia subulata* δ . *macrocarpa* Brid. l. p. 582. seu

Barbula macrocarpa ej. Sp. Musc. I. p. 267. secundum specimen unicum Hb. Bridel. ex Hispaniola relatum species diversa videtur, foliis longioribus angustioribus complicate concavis, vix limbatis, margine revolutis, e cellulis magis diaphanis minus vel vix opacis sublaevibus areolatis, mucronatis.

Patria. Ad aggeres, arborum radices, muros terra obtectos totius Europae. — *Aestate.*

Flos masc. axillaris gemmiformis, subsessilis v. in ramulo brevi; fol. perig. parvula ovato-lanceolata evanidinervia; paraphyses filiformes et subclavatae.

52. B. inermis Mont. (Archiv de Bot. I. p. 136. t. 4.); *monoica*; *B. subulatae* simillima, sed folia densa perfecte oblonga obtusa et mutica, margine integerrimo e basi usque ad apicem valde revoluta haud limbata, ubique minutius reticulata magis carnosula opaciora firmiora; theca brevior.

B. subulata γ . *inermis* Br. Eur. 13 — 15. p. 37. t. 22. — *Syntrichia subulata* γ . *inermis* Brid. I. p. 581.

Patria. In fissuris rupium pr. De Senna Pyrenaeorum: Montagne; in Galliae australioris provincia de la Lozere, in montanis et circa Avenionem, ubi Requier primus legit; pr. Rüdesheim ad Rhenum: Bruch.

E notis cursive impressis constantibus speciem distinctam putamus.

53. B. mucronifolia Schwägr. (Suppl. I. I. p. 136. t. 34.); *monoica*; *B. subulatae* simillima, sed folia oblongo-acuminata mucronata margine integerrimo vix vel parum revoluta e cellulis teneris mollibus ubique laevissimis diaphanis reticulata; theca brevior, peristomii tubulo breviori laxius tessellato, interdum cribroso-perforato.

Br. Eur. 13 — 15. p. 38. t. 23. — *Syntrichia mucronifolia* Brid. Mant. Musc. p. 97. et Br. univ. I. p. 582. — *Tortula subulata* β . *mucronifolia* Röhl. Deut. Fl. III. p. 78. — *T. subulata* Drumm. Musc. Am. No. 144.

Patria. Ad rupes terra obtectas et ad viarum latera alpium Germaniae, Helvetiae, Norvegiae, Pyrenaeorum et Americae sept. — Julio.

Fol. perig. laevissima, caetera *B. subulatae* distinctae.

54. B. canescens Bruch (in Br. Eur. 13—15. p. 34. t. 19.); *monoica*; gregarie cespitosa humilis subsimplex, *B. murali* simillima, sed folia *marginē vix vel parum revoluta*, longe pilifera, theca erecta minor, operculo conico obliquo, peristomii membrana basilaris *in tubum oblique tessellatum longiusculum* exserta.

Patria. In pascuis, ad rivulorum margines, ad rupes et arborum truncos totius Sardiniae vulgaris: Fr. Müller detexit; in Gallia occidentali, septentrionali et meridionali pr. Collioure. — *Vere.*

Infloresc. *Barb. muralis* distinctae.

b. *Peristom. profunde fissum.*

55. B. muralis Hdw. (Sp. Musc. p. 123.); *monoica*; plus minus compacte et late cespitosa humilis parce ramosa, viridis subtorta firma; folia plus minus spathulato-oblonga obtusa, nervo in pilum *hyalinum* producto, *marginē supra basin usque ad apicem aequaliter et valde revoluta*, e cellulis minutis valde chlorophyllosis opacis tenuiter papillosis basi laxioribus longioribus pellucidis arco-lata; theca in ped. longo flavo vel rubro erecta oblongo-cylindrica leniter curvula, operculo oblique conico-rostellato, annulo angustissimo *simplici subpersistente*, perist. in membrana basilari *angustissima* longo compluries et arcte contorto.

Br. Europ. 13—15. p. 35. t. 20. — Brid. I. p. 546. — *Mollia muralis* Schrank. Prim. Fl. Salisb. n. 832. — *Mnium murale* Linn. Jun. Meth. Musc. p. 364. — *Bryum murale* L. Sp. Pl. p. 1581. — *Bryum tegulare*, humile pilosum et incanum. Dill. Musc. p. 365. t. 45. f. 15.

Tortula Goettingensis Brid. Musc. Rec. II. I. p. 185. — *T. pilosa* Schrad. Spic. Fl. Germ. p. 66. — *T. ambigua* Röhl. Moosg. Deut. p. 389. — *Barbula Itzigsohni* Hmp. Linn. XVII. p. 673.

β. incana; brevicaulis microcarpa, foliis ovali-lanceolatis brevioribus longipilis. Br. Europ. l. c. — *Grimmia crassa* Spr. Syst. Veg. IV. II. p. 321.

γ. aestiva; longe lateque cespitosa gracilescens, foliis longioribus angustioribus lineari-lanceolatis, nervo in mucronem v. pilum brevem producto. Br. Eur. l. c. — *B.*

aestiva Schultz. Nov. Act. Leop. XI. I. p. 223. t. 34. — Brid. I. p. 548. — *B. cuneifolia* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 207. — *Mollia tegularis* Schrk. Baiers. Fl. II. p. 457.

Patria. In muris, parietibus, saxis etc. per totum fere orbem terrarum vulgatissima. Var. β . in muris calcareis gypsaceis siccis et in Monte Leonis prom. b. spei; var. γ . in rupibus praeprimis arenaceis humidiusculis s. umbrosis, inque murorum fissuris. — *Aprili, in editioribus Majo et Junio.*

Flos masc. in ramulo gracili terminalis gemmiformis, fol. perig. ovato-oblongis et ovatis obtusis breviter pilosis, antherid. majusculis, paraph. filif. et subclavatis.

56. B. emarginata Dz. et Molkb. (Musc. Archip. Ind. p. 50. t. 20.); *monoica*; *B. murali* simillima, sed folia angustiora longe lineari-oblonga valde obtusa et *profunde emarginata*, margine supra basin longam pellucidam ad apicem usque revoluta, longe pilifera; perigonialia *similia breviter longe pilifera*; theca *anguste cylindrica*, opere. conico obliquo *obtusos*; perist. dentes membrana basilari angusta vix annulum superante.

Patria. Japonia: a Siebold.

A *B. murali* parum sed distincte recedit.

57. B. Vahlia Schultz. (Nov. Act. Leop. XI. I. p. 222. t. 34.); *monoica*; gregaria v. cespitulosa, brevis viridis, *B. murali* similis; folia oblongo-cuneata, nervo in aristam viridem acutam producta, *margine vix vel supra basin tantum parum revoluta, ubique laxius reticulata diaphana vix vel parum opaca* et integerrima; theca elongate oblonga cylindrica saepe leniter curvula, opere. brevi subobliquo, perist. *membrana basilaris annulo latiusculo quadruplo longiore laxa tessellata.*

Br. Eur. 13—15. p. 33. t. 18. — Brid. I. p. 545. — *B. extenuata* De Not. Spec. de Tort. It. No. 12. forma minor.

Patria. In terra argillosa humidiuscula ad viarum et fossarum margines Sardiniae, pr. Cagliari: Fr. Müller, De Notaris.

Flos masc. in ramulis gracilioribus microphyllis terminalis gemmiformis; fol. perig. ext. ovali-oblonga, interna paullo breviora et latiora, nervo in mucronem v. aristam brevem excedente; paraphyses subclavatae, antheridiis majusculis longiores. — A *B. murali* notis laudatis certe differt.

58. **B. recurvata** Hook. (Musc. Exot. t. 130.); *monoica*; humilis breviter et parce ramosa crassa; folia rigida, madefacta erecta stricta, *lato-lanceolata acuminata* concava, marginibus *recurvatis haud perfecte revolutis* integerrimis, nervo *crasso excurrente obtuse acutata*, e cellulis basi *parvis quadratis* subpellucidis superne minoribus firmioribus carnosulis chlorophyllosis magis rotundatis vel pachydermibus areolata; theca in ped. mediocri oblonga erecta brunnescens, annulo simplici, operc. conico obliquo obtusiusculo pallidiori; peristomium in membrana latiuscula breve.

B. parrula Hook. Spreng. Syst. Veg. IV. I. p. 179. — *Entosthymenium apiculatum et rubellum* Hsch. in Hb. Kunzeano.

Patria. Prom. b. spei, terram habitans, haud rara.

Flos masc. gemmaceus, in ramo proprio radicali; antheridia pauca magna, paraphys. filiformibus longiusculis cincta; fol. perig. basi laxiuscule apicem versus densiuscule hexagono-areolata. — *Trichost. nervoso* simillima, sed peristomii ciliis in duo ciliola postica fissis barbuloideis e genere differt.

59. **B. Quitoensis** Tayl. (Lond. Journ. of bot. 1847. p. 332.); caulibus brevibus aggregatis, innovando ramosis; folia erecto-patentia, ex angusta amplexante basi elongate obovata apiculata, integerrima, madefacta fragilissima, grosse cellulosa, tenella, brunnea; theca erecta cylindrica subcurvula, operculo conico-rostrato, annulo persistente, perist. ad basin usque fisso. $\frac{1}{4}$.

Patria. Prope Quito Andium: W. Jameson. Nov. 1846.

A *B. subulata* peristomio, operculo theca breviori, foliis superne latioribus et aliter reticulatis ex animadv. auct. differt.

60. **B. Pichinchensis** Tayl. (Lond. Journ. of bot. 1847. p. 333.); laxe cespitosa erecta breviuscula subsimplex, inferne ferruginea, superne pallide viridis; folia imbricata patenti-recurva lingulata obtusissima subrepando-denticulata, nervo excurrente, dorso subdenticulato, flexuosa, margine reflexa; theca ovato-cylindrica inaequalis subcurvata, operculo rostrato inclinato, perist. brevi ad basin usque fisso. †.

Patria. Monte Pichincha Andium Quitensium: W. Jameson. Nov. 1846.

B. Quitoensi e foliis lingulatis et thecae forma affinis, sed foliis siccis subquarrosis dense et apice magis rotundate arcolatis et pedunculis brevioribus differre fertur.

B. Margine erecto.

a. Folia immarginata.

61. **B. cuneifolia** Hook. et Tayl. (Musc. Brit. p. 31. t. 12.); *monoica*; laxe cespitosa saepe gregaria humilis subsimplex amoene viridis; folia inferiora remota late ovata acuminata, *putredine saepe echlorophyllosa albida, superiora in rosulam patulam congesta* plus minus elongate spathulata acuminulata, laevissima, nervo flaccido tenui *ante apicem evanido* v. in mucronem rarius in pilum laevem producto, integerrima, margine erecto plus minus flexuoso, *tenera, mollia*, saepe complicate concava, basi e cellulis *elongatis laxissimis maxime pellucidis* superne minoribus *mollibus granulose chlorophyllosis amoene diaphanis* reticulata; theca in ped. longo purpureo stricto erecta oblonga atro-fusca, operc. oblique conico brevi, annulo simplici persistente; perist. in membr. latiuscula breve dense contortum rubellum.

Br. Eur. 13—15. p. 31. t. 17. — Brid. I. p. 549 et 829. excl. syn. Web. et Mohr., Schrk. et Funk. — *B. Dicksoniana* Schultz. Nov. Act. XI. I. p. 224. t. 34. — *Tortula spathulaefolia* De Not. Spec. de Tort. Ital. No. 10. — *T. acuminata* Brid. Musc. Rec. II. I. p. 188. — *T. mutica* ej. Sp. Musc. I. p. 251. — *Bryum cuneifolium* Dicks. Fasc. III. Pl. Cr. p. 7. — *Bryum humile*, pilis carens, viride et pellucidum. Dill. Musc. p. 356. t. 45. f. 15.

Patria. In terra argillosa ad fossarum margines et in limosis humidiusculis per totam Galliam occid. et merid., per Britanniam, ubi *Dillenius* detexit, per Italiam et insulas mediterraneas haud rara. — Majo.

Flos masc. primum terminalis, innovatione fertili lateralis 1—3 phyllus, fol. perig. tenerrimis parvulis late ovatis obtusis v. acuminulatis, nervo tenui v. obsoletissimo, antherid. parvulis, paraphysibus filif. paucis. — A *B. murali* toto coelo distat.

62. B. contorta Hmp. (Hb.); gregaria erecta simplex subgracilis; folia *sicca et madefacta laxè imbricata solitaria spiraliter incumbentia, maxime complicata, plicata, e basi lata acuminata*, ubique e cellulis diaphanis laxis majusculis, sed inferne majoribus perfecte pellucidis laevibus, superne papillis tenuissimis punctulatis reticulata; theca in ped. longo stramineo-rubente erecta oblongo-cylindracea subcurvula, operc. acuto subulato, annulo composito adhaerente, perist. breviter tubuloso compluries contorto longo albido.

Patria. Chile: Bertero.

Notis cursive impressis constantibus stirps distinctissima, *B. Kunzeanae* haud dissimilis.

b. *Folia marginata.*

63. B. marginata Br. et Sch. (Br. Eur. 13—15. p. 33. t. 19.); *dioica*; humilis simplex gregaria v. cespitosa; folia spathulate et obtuse lanceolata longiuscula superne latiora, nervo in mucronem v. aristam excedente, ad basin subventricose concavam laxè et late reticulata pellucida, versus apicem sensim minutius arcolata carnosula, papillis tenuissimis maxime punctulato-opaca viridissima, concava, *marginè limbato erecto, superne e cellulis densis incrassatis basi angustis elongatis reticulato*; theca in ped. longiusculo erecta cylindraceo-elliptica sordide badia, operculo brevi obliquo, annulo duplici, perist. pluries contorto in membrana annulum superante.

Barb. cespitosa Bruch. in sched. Musc. Müll. Sardiniae. — *B. subpilosa* Brid. I. p. 534. e spec. unico Hb. Brideliani forma foliis margine plerumque revolutis.

Patria. In terra argillosa et ad saxa humo oblecta: in Gallia merid. pr. Corbières, loco „Hermitage de St. Antoine de Galamus”: Montagne, in Sardinia pr. Iglesias serius legit Fr. Müller, in Italia merid., in „terra di Otranto” ad muros legit Rabenhorst, pr. Steyr et Salisburgum in muris Sauter legisse dicitur, in Lusitania Holl, ex Algeria misit W. Schimper. — *Vere.*

Fl. masc. in pl. simili terminalis gemmaceus; fol. perig. caulinis minora.

64. **B. Kunzeana** C. Müll. (Linn. XVII. p. 586.); dioica; humilis simplex aggregata; folia *B. marginatae*, sed laxissime imbricata valde patula et apice serrata, nervo excurrente; theca in ped. elongato erecta elongate cylindrica pallide fusca, operculo longe conico-subulato subobliquo, annulo longe persistente, perist. in membrana longissime tubulosa grosse areolata pluries contorto primum albido dein purpureo.

Tortula marginata Kze. in Pl. Chil. Pöppig. No. 19; sed diagnosi carens, qua de causa nomen illi speciei praecedentis postponendum erat.

Patria. Chile australis, Antuco in argillosis: Pöppig 1828.

Pulcherrima species, a *B. marginata* proxima toto coelo distincta.

65. **B. longipedunculata** C. Müll.; dioica; simplex cespitulosa humilis, rigida; folia sicca tortilia, madefacta erecto-subappressa, e basi oblonga laxa et flavide reticulata concava haud ventricosa breviter et obtuse lanceolata, marginibus flexuosis plus minus involutaceis, e cellulis fuscis diaphanis pachydermibus minutis limbatis, minute opace hexagone areolata viridia, integerrima, nervo crasso rubente in mucronulum plerumque excurrente, tenuiter papillosa; perich. latiora; theca in ped. longissimo flexuoso rubente erecta elongate cylindracea cum operculo

conico acuto arcuata, annulo simplici, perist. in membr. brevi compluries contorto.

Patria. Prom. b. spei, prope Zwellendam: P a p p e 1838.

A *B. marginata* subaffini notis datis toto coelo differt.

66. B. densifolia Hook. et Wils. (Lond. Journ. of bot. 1844. p. 543.); *dioica*; cespitulosa humilis, breviter ramosa, densifolia; folia *sicca et madefacta erecta haud appressa*, e basi erecta laxe elongate ampliuscule plerumque flavide reticulata vix vel parum reflexa *longe angustiuscule lanceolato-acuminata acuta* canaliculata, superne minute areolata opaca viridia maxime tenuiter papillosa, *marginē erecto ubique cellulis, praesertim apice folii serrulato, incrassatis elongatis angustis flavidis limbata*, nervo crassiusculo rubente excurrente; perich. conformia; theca in ped. stricto stramineo longiusculo oblonga, operc. subulato, perist. in membrana breviuscula compluries contorto.

Patria. Insulae Falklandi: J. D. Hooker.

A *B. longipedunculata* affini notis laudatis, margine limbato excepto, longe recedit.

Obscurae.

B. leucostoma R. Br. (Suppl. Append. ad iter Par-
rayan. p. 298.); erecta brevis semiuncialis subsimplex; folia dense conferta ovato-lanceolata, nervo valido in mucronulum excurrente, margine integerrimo anguste revoluta, sicca appressa parum torta; theca in ped. terminali erecto solitario laevi fusco oblonga aequalis laevis, operculo conico acuto subobliquo breviori, perist. albo tubuloso. †.

Tortula leucostoma Hook. et Gr. Brewst. Edinb. Journ. I. p. 294, quo loco auctores perist. tubulosum indicant, quod *Brownius* e dentibus 32 filif. per paria approximatis dimidioque inferiore trabeculis connexis supra distinctis apicibus parum tortis compositum descripsit. — *Zygotrichia leucostoma* Brid. I. p. 521 et 821.

Patria. Insula Melville: Sabine.

Sectio VII. **Syntrichia.** Plantae elatiores saepe procerae et valde ramosae, *Encalyptis* magis similes, foliis plus minus spatulatis oblongis, margine erecto v. revoluta, plerumque grosse papillosa, basi e cellulis magis hyalinis dein saepe fragilibus calymperoideis reticulata. Perist. sinistrors. cont.

A. *Nervus in apiculum productus v. excurrents.*

α. *Folia marginata.*

67. **B. mnioides** Schw. (Suppl. IV. t. 310.); *dioica*; dense cespitosa humilis parce dichotoma erecta fusco-viridis radiculosa; folia caulina dense conferta recurvo-patula, lanceolato-cuspidata, interdum apice obtusiuscula, margine revoluta, apice juniorum plus minus argute hyaline et tenuiter dentata, dentibus senectute fugacibus, nervo in cuspidem excedente dentato, cellulae basis inferioris laxae amplae hexagonae fragiles calymperoideae, superioris parietibus crassis fasciculis plus minus interruptis instructae, superne sensim maxime incrassatae vix diaphanae fuscae, apice subvirides minutae opacae, marginis multo densiores intensius fuscae igitur limbum toto ambitu efficientes; perich. basi vaginante longius laxiore, longiora erecta; theca in ped. breviter exserto cylindrico-elliptica curvula pachydermis badia, operc. conico acuto crasso recto, annulo arcte adhaerente latiusculo, perist. in membr. tubiformi magna.

β. *prostrata*; radicans prostrata robustior; cellulae foliorum supra basin laxam parietibus interruptis praeditae, superne vix opacae, sed maxime incrassatae subdiaphanae fuscae. *Barb. prostrata* Mont. in Ann. des sc. nat. 1845. p. 107.

Patria. Chile, ad trunc. arborum: Pöppig, C. Gay.

β. *Folia immarginata.*

† *Integra.*

68. **B. latifolia** Br. et Sch. (Br. Eur. 13—15. p. 41. t. 25.); *dioica*; late et laxe cespitosa viridissima humilis gracilis parce et breviter ramosa, laxe foliosa; folia caulina e spatulato ovata obtusata, medio apicis plerumque emarginata, margine vix vel parum revoluta, concava,

flexuosa, sicca subtorta, basi longiuscula pellucida laxissime hexagone reticulata tenera molli, superne minute areolata, papillis tenuissimis opaca, nervo crasso cum apice abrupto dorso apicis scabro; perich. interna magis *complicata et oblonga*; theca in ped. mediocri rubro erecta, cylindracco-oblonga curvula, pallide badia, annulo *simplici*, operculo suboblique subulato, perist. longiuscule tubuloso, pluries contorto.

Santrichia latifolia Bruch in Brid. I. p. 836. — *S. laeripila* β . *mutica* Schultz. Rec. Barb. in Nov. Act. Leop. XI. I. 1823. p. 230. t. 34. f. 4. B.

Patria. Ad arbores campestres, praesertim populos, c. *B. laeripila* saepe consociata per Europam passim, sed rarissime fructificans et facile aboriens. — *Vere.*

Pl. masc. ignota. — Species, ex infloresc. jam diversa, saepe falso credita, scrutatori naturae vivae primo intuitu a *B. laeripila* distinctissima.

69. *B. subspathulata* C. Müll.; *dioica*; dense cespitosa subuncialis breviter dichotome ramosa radiculosa, sordide viridis parum rufescens; folia erecto-appressa *vix torta*; madefacta erecto-patula, haud recurva, e basi *angusta breviuscula* e cellulis *parvulis* hexagonis teneris pellucidis mollibus reticulatâ *late subspathulato-oblongo-orata*, *planiuscula*, *erecta*, nervo viridi in mucronulum excurrente, minute areolata, opaca, carnosula, tenuiter papillosa, margine integerrimo plus minus flexuoso *haud revoluta*; perich. *conformia*; theca in ped. brevi rubente cylindracco-oblonga *vix curvula*, operc. *acute subulato obliquiusculo*, annulo *simplici*, perist. longo semel contorto in membrana breviter exserta posito.

B. glacialis Br. et Sch. in Musc. Abyss. Schimp. No. 491. haud Kze.

Patria. Abyssinia, ad rupes madidas montis Bachit, societate *B. mollis*, 19. Aug. 1838: W. Schimper.

Magis ad *B. subulatam* versus quam *glaciale* vertit; a prima peristomio haud tubuloso, magnitudiae, foliorum textura et aliis notis jam longe differt, a secunda habitu et notis laudatis toto coelo refugit.

70. B. fragilis Tayl. (Lond. Journ. of bot. 1847. p. 333.); laxe cespitosa erecta subdichotoma breviuscula ferruginea superne olivacea; folia imbricata erecta, suprema patentia, *sicca appressa* torta, lata, lineari-lanceolata obtusa, nervo excurrente *apiculata*, integerrima, margine flexuosa, fragilissima, inferne laxe reticulata hyalina, superne dense areolata; theca in ped. demum axillari subflexuoso tenui innovationes superante, ex ovata basi cylindrica hinc incurva, operc. longirostro obliquo, perist. brevi pallide rubro *ad basin usque fisso*. †.

Patria. Mons Pichincha Andium Quitensium: W. Jameson. Nov. 1846.

A *B. rurali* notis cursive impressis ex auctore recedere dicitur.

71. B. glacialis Kze. (in Pöppig Coll. Pl. Chil. III. No. 272. [54.]); *dioica*; dense cespitosa elata robusta innovando *breviter* fastigiata ramosa, rubiginoso-viridis *radiculosa*; folia inferiora appressa latiora ferruginea, planiuscula, superiora flexuose subtorta viridia firma, late oblonga lanceolata, nervo crasso rubente excedente *rufo-mucronata*, inferne margine revoluta, integerrima, e basi e cellulis elongatis laxis pellucidis mollibus reticulata longiusculâ parum recurva, superne *minutissime* areolata opaca *tenuissime* papillosa; perich. interna angustiora; theca in ped. *perbrevis* rubro crasso flexuoso erecta *majusculè oblonga* rubens, operc. *obtusè conico brevi* recto, annulo latiusculo *composito*, perist. *brevi tubuloso parum contorto*; calyptra robusta nitida sordida laevis.

Patria. Chile australis, in summis rupibus inter glacies perpetuas montis igniv. Antuco, 11,300'. Februar. Pöppig.

Ex habitu *B. andicolae* similis, sed notis laudatis longe differt.

72. B. scabrinervis C. Müll.; *dioica*; humilis parce ramosa v. simplex densifolia viridis v. rufescens; folia dense conferta et appressa, vix tortilia, *brevia* erecto-patentia, *late oblongo-lanceolata*, basi brevi ubique laxè

pellucide et tenuiter reticulata, superne minute areolata opaca, integerrima, margine medio folii reflexa, nervo crasso purpureo excedente dorso papillis hyalinis plerumque ciliiformibus interdum obsoletis scabro breviter apiculata; theca in ped. breviusculo rubro flexuoso erecta angustius cylindraceo-oblonga, operc. conico recto acuto, annulo simplici lato; peristomii rugulosi membrana basilaris longiuscule tubulosa tessellata.

Patria. Chile australis, in truncis arborum prov. Quillotae, in convall. „los Chorillos” dicto, ubi legit soc. *Leskeae seminervis* Kze. Pöppig, Septbr. 1827.

B. laevipilae affinis, sed notis illustratis facile discernibilis.

†† *Folia dentata v. serrata.*

73. B. robusta Hook. et Gr. (Brewster Edinb. Journ. I. p. 209. t. 12.); *dioica*; elongata parce dichotome ramosa laxe cespitosa pallide viridis dein rufescens; folia caulina parum torta, madefacta recurvo-patula, e basi erecta ubique elongate laxe pellucide reticulata reflexa lanceolata acuminata, nervo excurrente, margine erecto apicem versus inaequaliter serrata, e cellulis majusculis hexagonis chlorophyllosis subpellucidis tenuissime papillosis areolata, opaca; perich. erecta latiora longiora diaphana sublaevia flavida, longitudinaliter plicata planiuscula, nervo rubro in acumen breve hyalinum producto, superne dentibus hyalinis argutis teneris fugacissimis serrata; theca in ped. mediocri cylindrica curvula, operculo subulato, perist. longe tubuloso.

Mnium punctulatum Brid. II. p. 734. — *Barbula speciosa* Hook. et Wils. Lond. Journ. of bot. 1844. p. 543.

Patria. Insula Eremitae ad Cap. Horn: J. D. Hooker. In insulis Falklandi primus legit Dumont d'Urville.

Pl. masc. ramis binis; flos in ramo terminali brevi inter illos ramos posito crasse gemmaceus subdiscoideus; folia perig. ext. reflexa, interiora sensim breviora latiora, late ovata acuminata subintegra, nervo tenui excurrente, e cellulis laxis flavide pellucidis laevibus amplis parieti-

bus plus minus interruptis praeditis reticulata; antherid. longa clavata numerosa, paraphysib. creberrimis robustis clavatis mixtis. — Notis cursive impressis ab omnibus *Syntrichiis* facile distinguitur.

74. B. Ehrenbergiana C. Müll.; *dioica*; laxa cespitosa saepe recurva gracilior elatiuscula parce ramosa sordide viridis v. rufescens; folia caulina dense conferta subtorta, appressa, madefacta patula vix reflexa, e basi erecta longiuscula laxa elongate anguste flavide reticulata sensim recurva anguste canaliculate lanceolata acuminata, nervo rubro in mucronem producta, margine infero anguste revoluta, supero remote et obscure denticulata, minutissime areolata, opaca tenuissime papillosa; perich. basi latiore longius pellucida laxiore amplexante, intima brevissima laxissima hyalina obtusiuscula, theca in ped. breviusculo rubro angustiuscule cylindrica curvula longiuscula.

Patria. Mexico: C. Ehrenberg.

Formis minoribus *B. ruralis* subaffinis.

75. B. serrulata Hook. et Grev. (Brewster Edinb. Journ. I. p. 298. t. 12.); aurantiaco-brunnea, elongata subramosa; folia erecto-patentia ovato-lanceolata carinata, margine erecto superne serrulata, nervo valido; theca cylindrica inclinata; perist. valde contorti membrana basilaris latiuscula. †.

Brid. I. p. 833.

Patria. Terre de Feu, unde primus habuit Dickson.

B. antarcticae proxima videtur.

B. Nervus in aristam productus.

a. *Infloresc. hermaphrodita.*

76. B. princeps De Not. (Spec. de Tort. Ital. No. 1.); *hermaphrodita*; compacte cespitosa elongata crassa erecta, sub apice innovationibus brevibus crassis repetitis divisa, in axillis foliorum tomentoso-radiculosa, dense foliosa, pulchre ferruginea; folia sicca arcte appressa, summa subtorta viridia, madefacta imbricato-patentia, late ob-

longo - ovata rotundata, nervo crasso rubro in aristam longiusculam *crassam* hyalinam denticulatam producto, margine revoluta basi e cellulis *amplis* laxis pellucidis inanibus *dein fragilibus utrinque marginis plus minus massa grisea repletis dein firmioribus inanibus veluti limbata*, superne grossiuscule areolata haud opaca mollia grosse papillosa; theca in ped. longo crasso rubro flexuoso erecta cylindrica curvula elongata, operculo conico - subulato acuto, annulo duplici, perist. longe tubuloso pluries contorto *dein dissoluto*.

*Barbula Müller*i Br. et Sch. Br. Eur. 13 — 16. p. 44. t. 28. — *Syntrichia Müller*i Bruch in Musc. Müller. Sardois.

Patria. Ad truncos arborum et ad rupes Sardiniae, Siciliae, Italiae merid. ad Promontorio del Gargano, ubi 1847 legit Rabenhorst et Hispaniae, ubi in Sierra Nevada Pyrenaeorum ad Guéjar de la Sierra legit W. P. Sch. 5. Jul. 1847.

Paraphyses longae clavatae. — A *B. rurali* subaffini notis cursive impressis facile discernibilis.

77. *B. mollis* Br. et Sch. (in Musc. Abys. Schimp. No. 467.); *hermaphrodita*; dense cespitosa breviuscula subuncialis subgracilis fuscescens, ramis brevibus appressis dichotoma; folia caulina erecto - appressa vix torta, madefacta erecto - patentia arcte imbricata, *oblongo - ovata obtusiuscula v. oblongo - acuminata*, nervo crasso rubro in pilum hyalinum longum sublaevem producto, margine *distincte revoluta* integerrimo, basi e cellulis laxis longiuscule hexagonis fere erythrodermibus pellucidis teneris superne parvulis opacis tenuissime papillosis areolata, perich. *externa basi latissima luxissime reticulata longe acuminata pilifera, intimum multo brevius ubique tenerrimum pellucidum*; theca in ped. longo stramineo erecta, cylindraceo - oblonga curvula fuscidula, operc. conico - subulato subobliquo, annulo composito, perist. longo in membr. longe tubulosa parum contorto.

Patria. Abyssinia, ad rupes madidas montis Bachit: W. Schimper, 14. Aug. 1838.

Anthheridia numerosa magna, paraphysibus creberrimis clavatis flavidis cincta, archegonia multo pauciora. — A *B. laevipila* proxima notis cursive impr. longe distat.

78. *B. antarctica* Imp. (in litt.); *hermaphrodita*; cespitosa, sed laxissime cohaerens radiculosa, rigida, sed facile emolliens, semiuncialis, pulchre rufescenti-flavida, parce dichotome ramosa, teretiuscula, haud compressa, gracilior; folia caulina erecta appressa ubique sub torta, madefacta erecto-patula parum vel vix recurva, late oblonga obtuse acuminata, superne diverse complicata, nervo crasso rubente in aristam hyalinam longam serratam producto, margine valde revoluta, integerrima, basi e cellulis laxis amplis mollibus ubique valde pellucidis, utrinque marginis interdum flavidis, inanibus, superne minoribus compresse hexagonis firmis chlorophyllosis dein inanibus diaphanis haud opacis, tenuissime papillosis arcolata; perich. teneriora planiuscula; theca in ped. stricto rubentistramineo erecta, operc. conico subulato recto.

Tortula Mülleri Hook. et Wils. in sched. Musc. Antarct.

Patria. Insulae Falklandi: J. D. Hooker.

Anthheridia majuscula numerosa, interdum pauca, paraphysib. robustis clavatis flavidis cincta. — A *B. Mülleri* longe differt et magis *B. laevipilae* affinis. Fructum immatur. tantum vidimus.

b. *Infloresc. monoica.*

79. *B. laevipila* Schw. (Suppl. II. I. p. 66. t. 120.); *monoica*; late et laxe cespitosa robustior elatior, breviter dichotome ramosa confertius foliosa; folia caulina appressa parum torta, madefacta patula, oblonga v. plus minus spathulato-oblonga, apice obtuso, nervo rubro in aristam longam hyalinam reflexam parce denticulatam v. laevem producto crasso, margine vix vel parum revoluta, basi laxe hexagone tenuiter utrinque minutius reticulata sublonga pellucida, superne multo minutius arcolata, papillis plus minus tenuibus dorso plerumque obsoletis opaca; perich. magis acuminata; theca in ped. mediocri rubro erecta cylindracea curvula badia, operculo suboblique

subulato, annulo *duplici*, perist. longe tubuloso pluries contorto.

Br. Europ. 13 — 15. p. 40. t. 25. — *Syntrichia laevipila* Brid. l. p. 586. — *S. montana* Nees in Regensb. Bot. Zeit. 1819. 2. p. 301. — *Tortula ruralis* β . *laevipila* Hook. et Tayl. Musc. Brit. ed. 2. p. 56.

Patria. Per totam fere Europam temperatam et calidiorem, nec non in Africa septentrionali, ad arbores campestres. — Junio.

Flores masc. in axillis foliorum nunc sessiles, nunc ramulis brevibus gracilibusque insidentes parvuli gemmiformes 3 — 6 phylli; folia perig. ext. ovato-acuminata brevipila, apice recurva, interna longiora, acuminata fusca sublaevia tenerius areolata; antheridia majuscula pauca, paraphys. clavatis mixtis. — A *B. latifolia* notis cursive impressis distat, a *B. rurali* inflorescentia, pilo breviori minus dentato, perist. breviori et cespitibus densioribus distinguitur.

80. *B. alpina* Br. et Sch. (Br. Eur. 13 — 15. p. 39. t. 24.); *monoica*; *B. laevipilae* simillima, sed folia *molliora tenuiora magis diaphana*, arista *breviore semper rubra*, v. mutica, plerumque pallide rarius purpureo-fusca; theca in ped. *longiore* rubente *tenuiore* cylindrica curvula badia *leptodermis*, operculo oblique rostrato, annulo *duplici*, perist. *breviter tubuloso semel laxo contorto*.

Patria. In alpibus Tirolis: Funk, Gastoniae Salisburgensis ad muros: A. Braun, Pinzgoviae prope Mittersill, ubi in umbrosis arcis antiquae ad rupes calcareas detexit Sauter. — Aug., Septbr.

Infloresc. *B. laevipilae*.

c. *Infloresc. dioica.*

α . *Folia obtusa.*

81. *B. ruralis* Hdw. (Sp. Musc. p. 121.); *dioica*; laxo late cespitosa elata dichotome ramosa rufescenti-viridis; folia caulina subcontorta, madefacta squarroso-recurva, laxo imbricata, e basi *longe erecta* amplexante longa pellucida tenera hexagone laxo elongate angustius-

cule reticulata dein fragili, margine utrinque cellulis intense flavioribus veluti limbatâ reflexa, plus minus complicate oblonga obtusa, nervo in aristam elongatam valde dentatam hyalinam producto dorso scaberrimo, margine ubique revoluta, superne e cellulis mollibus parvulis hexagonis valde chlorophyllosis areolata, grosse papillosa; perich. longiora erectiora; theca in ped. plus minus longo crasso basi vix tortili purpureo erecta, oblongo-cylindrica curvula, pachydermis badia, annulo duplici, opere. subulato rubro subobliquo, perist. longe tubuloso longe ciliato.

Br. Eur. 13 — 15. p. 42. t. 27. — *Syntrichia ruralis* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 215. — Brid. I. p. 584. — *Mollia ruralis* Schrank. Prim. Fl. Salisb. No. 831. — *Mnium rurale* Linn. Jun. Meth. Musc. p. 364. — *Bryum rurale* L. Sp. Pl. p. 1581. — *Bryum rurale unguiculatum*, hirsutum elatius et ramosius. Dill. Musc. p. 352. t. 45. f. 12. — *Hypnum rurale* Weis. Crypt. Gött. p. 210.

β. rupestris; humilior densius cespitosa, foliis magis erectis, ovalibus obtusissimis, pilo magis erecto, theca brevior. *Syntrichia intermedia* Brid. I. p. 586. — *Tortula ruralis crinita* De Not. Spec. de Tort. Ital. No. 5.

Patria. Per totam Europam et Americam septentrionalem vulgatissima in rupibus, tectis, arboribus et terra. Var. *β.* in Duc. Badensi pr. Durlach, in Alsatia, Gallia merid. et sept., pr. Fiume, in Sardinia, rupes, praesertim calcareas, et muros in ditione Smyrnensi et prom. b. spei, habitans. — *Vere et ineunte aestate.*

Flos masc. in planta terminalis crasse gemmaceus, foliis perig. ext. rameis similibus, sed minoribus, e medio patulis, secundis brevioribus, omnino erectis et pilo brevior. instructis, intimis ovato-oblongis submuticis; antherid. et paraph. subclavatis numerosis.

82. B. obtusissima C. Müll.; dioica; *B. rurali* similissima, sed folia squarroso-patula, latissime complicate ovata obtusissima emarginata, robustiora, basi vix erecta, vix v. parum pallide limbata e cellulis laxissimis amplissimis pellucidis maxime foraminatis ubique conformibus reticulata, superne majus areolata, papillis grossis majore-

ribus verrucosa, nervo in aristam *maxime elongatam* flavide hyalinam serratam producto; theca in ped. longiusculo erecta cylindrica curvula, perist. longe tubuloso, annulo duplici.

B. ruralis Schimp. in Hb. Schlechtendal.

Patria. Mexico: C. Ehrenberg.

Notis cursive impressis sp. distinctissima.

83. *B. leucostega* C. Müll.; *dioica*; *B. rurali* similima, sed folia *erecto-patentia*, e basi cellulis *ubique mollibus laxis pellucidis reticulatâ haud limbatâ breviter oblonga parum curvata*, apice *obtusissimo plerumque inaequaliter emarginato*, toto ambitu margine revoluta, grossius papillosa, longius pilifera; theca angustius cylindrica fusca, operc. conico-subulato pallide rubente; perist. albido; caetera *B. ruralis*.

Patria. Prom. b. spei, pr. Swellendam in tectis: Ecklon, 1828. Octobr.

84. *B. pilifera* Hook. (Musc. Exot. t. 12.); *dioica*; densiuscule cespitosa erecta subuncialis, robusta flexuosa, multoties dichotoma, lutescenti-viridis, firma; folia caulina appressa, parum apice autem spiraliter torta, madefacta erecto-patula paullo recurva, e basi latiuscule amplexante e cellulis *ubique parvulis flavidis subrectangulari-hexagonis laxis reticulata erectâ recurvo-oblonga obtusa*, nervo viridi crassiusculo in aristam apice hyalinam *sublaevem longam* obliquam producto, margine revoluta, *quadrate firme areolata*, papillis tenuissimis opaca; perich. in cylindrum *parum exsertum congesta, longe acuminata pilifera*, ubique fere tenuiter et laxè reticulata; omnia integerrima; theca in ped. longiusculo rubente substricto robusta erecta cylindraceo-oblonga, curvata coriaceo-brunnea, operc. oblique conico-subulato, annulo persistente duplici, perist. *ad basin diviso* pluries dense contorto rubente.

Brid. l. p. 572. — *B. crinita* Schultz. Nov. Act. Leop. XII. I. p. 226. t. 34.

C. Müller: Synops. musc. frond.

β. gracilis; gracilior humilior, foliis siccitate appressis, caulem igitur teretiusculum efficientibus, angustioribus tenuinervibus, perichactio vix exserto et theca anguste cylindraceo-oblonga minore.

Patria. Java, unde Dickson primus habuit. Prom. bonae spei, ubi vulgatissima videtur. Chile: Pöppig et al. Var. *β.* in prom. b. spei et in Manila, ubi Meyen legit.

A *B. laevipila* subaffini notis illustratis longe distat.

85. **B. flagellaris** Schimp. (Ann. des sc. nat. II. Ser. Tom. VI. p. 146. t. 10.); *dioica*; elata ramosa, ramis brevioribus rectis v. elongatis flagelliformibus basi declinatis radicanibus, foliis denudatis, apice erectis foliosis; folia patentia tortilia siccitate incurva, oblongo-carinata, obtusa, margine reflexa, nervo in aristam producto v. sub apice evanido; perich. caulinis similia erecta; theca elongata subcylindrica longius suboblique rostellata, perist. tubuloso-barbato. †.

Patria. Chile, ad arbor. truncos: Bertero.

Magnitudine et habitu *B. rurali* haud dissimilis, foliorum arista brevior laevique cum *B. laevipila* congruit; ab utrisque autem ramificatione propria discrepat. A prima foliis angustioribus haud reflexis acuminatioribus, theca diversa atque irregulari pedunculoque inferne dextrorsum superne sinistrorsum contorto, ab altera infloresc. dioica differt.

86. **B. Preissiana** C. Müll.; *dioica*; laxa cespitosa humilis, innovationibus brevibus apice crassioribus parce dichotoma; folia caulina erecto-subtortilia, madefacta e basi longa erecta subito recurva, complicate oblonga obtusiuscula, nervo rubente in aristam denticulatam reflexiusculam hyalinam producto; perich. conformia; theca in ped. breviusculo erecta anguste cylindrica curvula, annulo composito revolubili, perist. in membr. longe tubulosa parum contorta albido.

B. laevipila Hmp. in Pl. Preis. II. p. 114. Coll. No. 2467.

Patria. Nova Hollandia, in ramis putrescentibus insulae Roseness: L. Preiss. Aug. 19. 1839. Ab originibus „Worup” dicta.

A *B. laevipila* simillima notis cursive impressis certe distat.

β. Folia lanceolato-acuminata.

87. *B. aciphylla* Br. et Sch. (Br. Eur. 13 — 15. p. 42. t. 26.); *dioica*; *B. rurali* simillima, sed folia *squarrosopatula*, basi *minus erecta* utrinque margine haud flavide limbata sed conformia v. chlorophyllosa, *ovato-lanceolata acuminata*, nervo viridi in aristam *rubellam* subspinulosam producto, tenuius papillosa; theca *ovata* vel ovato-oblonga, in ped. a basi ad medium dextrorsum tortili.

Tortula ruralis alpina De Not. Spec. de Tort. Ital. No. 4. — *Syntrichia Norregica* Brid. l. p. 588; an et *Wahlenbergii*? — *B. Enderesii* Garov. in Bryol. Austr. p. 37?

Patria. In alpibus Germanicis, Helveticis et Pyrenaicis, ubi in casarum vicinitate ad muros et saxa umbrosa cespitose habitat. — *Julio et Augusto.*

88. *B. andicola* Mont. (Ann. d. sc. nat. IX. 1838. p. 53.); *dioica*; dense cespitosa *compacta tomentosa elongata*, innovationibus terminalibus *elongatis* binis divisa, inferne maxime ferruginea, *apice pallide virescens*; folia caulina inferiora sicca laxè appressa, superiora flexuoso-subtorta, e basi laxè hexagone maxime pellucida encalyptacea amplexicauli late oblongo-lanceolata obtusiuscula v. acuminata concava, nervo crasso *intense purpureo* in pilum hyalinum rufescentem dentatum producto, margine ubique revolutò apice dentato, grosse hexagone arcolata, papillis grossis in utraque pagina creberrimis opaca scaberrima; perich. minora longe pilifera; theca in ped. brevi inter innovationes posito atro-rubente subarcuato erecta *elongate cylindrica angusta falcato-arcuata brevicolla* pallida, dein fuscescens, operculo *longe subulato recto*, annulo simplici persistente; perist. dentes *basi liberi albid*i, *dein vix rufescentes, semel torti rugulosi*; columella longe exserta; calyptra longissima purpurea.

Patria. Ad terram inter rupes in declivibus orientilibus Andium de la Paz prope nives aeternas, longe supra oppidum Tajesi: D'Orbigny. Columbia, Sierra nevada de Merida: Moritz No. 187. a.

Notis cursive impressis ab omnibus congeneribus jam facile distinguenda pulcherrima solitaria species, foliis perfecte encalyptoideis.

89. **B. subaristata** Br. et Sch. (Musc. Abyss. No. 448.); *dioica*; dense cespitosa, sed laxè cohaerens, subhumilis *rufescens*, innovando parce ramosa; folia caulina erecto-subappressa, madefacta erecto-patula parum recurva, late *oblongo-lanceolata*, concava, nervo crasso rubente *in aristam brevem recurvam superne hyalinam dentatam producta*, margine revoluta, basi laxè pellucide hexagone reticulata molli, superne multo minutius areolata subopaca, integerrima, *tenuiter papillosa*; perich. similia; theca in ped. *brevi innovationem brevem haud superante* rubro elliptica, vix curvula, badia, operc. conico rectiusculo rubro, annulo simplici persistente, peristomio longe tubuloso albido.

Patria. Abyssinia, in jugis ad arbores 12000': W. Schimper, 1840. 18. Febr.

Pl. masc. parum gracilior, florib. terminalibus ob innovat. lateralibus crasse gemmaceis; folia perig. late ovata breviter acuta excurrentinervia, interna obtusata evanidinervia, omnia tenuiter et pellucide flavide reticulata maxime concava; antherid. magna clavata, paraphys. numerosis flaccidis longis clavatis mixtis. — A *B. latifolia* habitu affini notis cursive impressis, et foliis perigonalibus longe differt.

Incertae sedis.

90. **B. breviseta** Mont. (Ann. d. sc. nat. 1845. p. 107.); *dioica*; humilis subramosa; folia sicca haud tortilia, oblonga obtusa non acuminata canaliculata, margine incurvo recurvove, basi pellucida parallelogramme reticulata, a medio ad apicem patenti-recurva, obscure punctiformi-areolata, nervo crasso in pilum apice canum abeunte per-

cursa; theca lineari-cylindrica longiuscula c. operculo conico brevi pedunculum aequante; perist. sat longioris et torti membrana basilaris angustissima, annulo nullo. †.

Patria. Chile, in terra circa S. Jago: C. Gay, 1829. April.

Syntrichia forsan erit.

Barbulae obscuriores v. delendae.

1. ? **Dicranum stygium** Brid. (I. p. 444.); caulis elongatus divisus, ramulis subnullis, basi radiculoso-tomentosus; folia trifariam cauli arcte circumposita, e basi amplexicauli lanceolato-acuminata, undulato-flexuosa, reflexa, integerrima, supra basin subplicatam margine planiusculo reflexo praeditam complicate concava, nervo crasso continuo ferrugineo dorso scabro, e cellulis parvis basi quadratis superne incrassatis angulato-rotundatis inanibus tenuissime papillosis areolata, sicca apicibus valde contorta et crispata, fuscescentia.

Patria. In Delphinatu prope Magnam Carthusiam in uliginosis: Dejean.

An *Barbula*?

2. **Barbula linoides** Brid. I. p. 543 e spec. a Cl. Green Bridelio missis *Pottiacea* quidem, sed ob perist. carens incertae sedis, suspectissima igitur e genere ejicienda.

3. **Barb. diaphana** Brid. (I. p. 577.) e spec. Hb. auctoris *Grimmia* videtur.

4. **Barb. flexifolia** Brid. (I. p. 560.) ex Hb. auctoris *Macromitrium* quoddam sterile.

5. **Barb. tenera** Brid. (I. p. 577 et 835.) e verbis auct. ipsis delenda.

Gen. VIII. **Ceratodon** Brid.

I. p. 480. — *Aegiceras* Green in Brid. Mant. Musc. p. 69. sed nomen jamdiu generi phanerogamico impositum. — *Dicranum* Hdw. et al. — *Didymodon* Hook. et Tayl. — *Fuscina* Schrank. — *Mnium* Linn. — *Bryum* Dill. et al. — *Luida* Adans.

A κέρας cornu et ὀδοὺς dens, inde quod peristomii dentes inflexione sua et trabeculis nodulosis caprae cornua referunt.

Calyptra dimidiata. Peristomium simplex: dentes 16 basi membrana cellulosa connati, in crura duo longa nodoso-articulata fusca utrinque pallidiora fissi, parte inferiore dense trabeculati. Habitus theca pachyderma nitida cernua, collo subnodoso instructa, (annulata) proprius.

1. **C. purpureus** Brid. (I. p. 480.); *dioicus*; dense cespitosus, sed laxe cohaerens, inferne radiculosus, dichotome ramosus, sordide viridis, erectus plus minus elatus; folia caulina erecto-patentia laxius imbricata sicca subtortilia, oblongo-lanceolata, subcomplicate concava, toto margine revoluta integerrima v. apice parce denticulata, excurrentinervia, undique e cellulis rotundato-quadratis sublaevibus chlorophyllosis areolata; perichactialia longiora, intima longe vaginantia superne sinuata et subito saepe plus minus acuminata et apice crenulato-denticulata, tenerrime longius reticulata, tenuinervia; theca in pedunculo longo *purpureo* magis minusve inclinata *oblonga turgescens* cernua purpurea, collo brevissimo et operculo conico nitido; perist. dentes longissimis cruribus latis valde bicoloribus purpureis.

Br. Europ. Fasc. 29 — 30. *Ceratodon*, p. 5. t. 1 et 2. — *Dicranum purpureum* Hdw. Sp. Musc. p. 136. t. 36. — *Didymodon purpureus* Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 65. t. 20. — *Fuscina purpurea* Schrank. Baiers. Fl. II. p. 453. — *Mnium purpureum* L. Sp. Pl. p. 1575. — *Bryum purpureum* Neck. Meth. Musc. p. 211. — *Br. tenue* Dicks. Fasc. III. Pl. Crypt. p. 8. — *Br. tenue*, stellatum, setis purpureis. Dill. Musc. p. 386. t. 49. f. 51. — — *Dicranum Celsii* Hdw. Sp. Musc. p. 149. t. 33. f. 1—4. *Bryum Celsii* L. Sp. Pl. p. 1585. *Br. trichodes* acaulon minimum setis et capsulis oblongis. Dill. Musc. p. 388. t. 49. f. 54. — — *Dicranum purpurascens* Hdw. Musc. p. 137. t. 35. f. 1—7. — — *Dicr. intermedium* Hdw. Sp. Musc. p. 138. t. 31. f. 1—6. — — *Dicr. bipartitum* Sm. Fl. Brit. III. p. 1218. *Bryum bipartitum* Dicks. Fasc. II. Pl. Crypt. p. 7. *Bryum parvum* surculis et setis geminatis. Dill. Musc. p. 385. t. 49. f. 50. *Trichostomum tortum* Schrank. Baiers.

Fl. II. p. 449. — — *Dicr. palustre* Brid. Musc. Rec. II. I. p. 174. *Dicr. longisetum* Brid. Mant. Musc. p. 66. *Dicr. strictum* Sm. Fl. Brit. III. p. 1218. *Trichostomum basiflorum* Schrk. Baiers. Fl. II. p. 449. *Bryum basiflorum* Gmel. Syst. Nat. II. p. 1332. *Bryum strictum* Dicks. Fasc. IV. Pl. Cr. p. 13. *Bryum polytrichoides palustre*, setis longioribus rubris sericeis. Dill. Musc. p. 387. t. 49. f. 52. — — *Trichostomum papillosum* Sm. Fl. Brit. III. p. 1238. — *Bryum papillosum* Dicks. Fasc. IV. Pl. Cr. p. 12. t. 11. f. 5. — — *Barbula Saussuriana* Brid. Mant. Musc. p. 94. *Tortula Saussuriana* Brid. Musc. Rec. II. I. p. 203.

Patria. Cosmopolites omnium muscorum maximus, orbis totius terrarum inhabitans, bryologis tanquam tedium creatus. — *Vere.*

Pl. mascula gracilior, flore terminali gemmaceo. Folia perigonialia externa e basi lato-ovata acuminata margine valde reflexa crassinervia, e cellulis quadratis pachydermis areolata, interna lato-convolutacea obtusa vel acuminata tenerrime et rhomboideo-reticulata fusca integerrima obsoletinervia. Antheridia brevistipitata magna crassa, paraphysibus flavidis obtusis filiformibus mixta. — Valde polymorpha species, quoad thecas purpureas sulcatas pachydermas nitidas inter formas diversissimas facile discernibilis, discipulo autem terribilis.

2. C. stenocarpus Br. et Sch. (in Monogr. Ceratod. p. 4. memoratus.); dioicus; habitus *C. purpurei*; theca in pedunculo flavido plus minus cylindrica, cernua; perist. dentibus brevioribus angustioribus fuscis subunicoloribus rugulosis, ad basin usque fere fissis.

C. purpureus var. *palustris* Mont. in Musc. Neelgheriensib. no. 57. — *Barbula conica* Spr. Syst. Veget. IV. II. p. 323.

Patria. Zonam calidam solam habitans: in promont. b. spei sat copiose legit Ecklon, e. gr. in locis humidis rupestribus cacuminis montis Tabularis. In montibus Neelgheriensibus prope Neddoubetta: Perrottet. Mexico: Liebmann. Columbia, prov. Caracas, prope coloniam Germanicam Tovar in apricis altitud. 5600 ped. 1845. Jan. Funck et Schlim in Coll. Lind. No. 473.

Specimina multa habemus et thecam valde polymorpham, nunc elongatam, nunc brevem et plus minus cy-

lindricam videmus. Pedunculo flavido primo adpectu distinguitur.

Gen. IX. **Tridontium** Hook. fil.

Hook. Ic. Pl. Rar. III. t. 148.

Nomen ob dentes trifidos ab auctore huic generi impositum.

Calyptra conica latere fissa. Peristomium simplex: dentes 16 *elongati, siccitate reflexi, e ciliis tribus articulatis magis minusve connexis* formati.

Habitu *Angströmiæ pellucidæ* haud dissimile. Auctor *Scouleriæ* et *Wardiae* comparavit.

1. **Tr. Tasmannicum** Hook. fil.; dioicum? elongatum innovando ramosum rigidum flexuosum fuscum laxè cespitosum; folia laxè undique disposita patentia, oblongo-lanceolata obtusa, nervo valido fusco subcontinuo, supra canaliculata, integerrima, e cellulis basi angustis subrhomboideis superne minutis rotundatis incrassatis laeviusculis areolata, ad marginem interdum cellulis magis incrassatis quasi limbata; perichaetialia angustiora subacuminata; theca in pedunculo breviusculo rigido fusco turbinata brevis ampla macrostoma, operculo conico longe rostrato, calyptra fusca.

Patria. In locis aquosis irroratis m. Ben Nevis Terræ Diemenii: Ronald Gunn.

Gen. X. **Weisia** Hdw.

Fund. Musc. II. p. 90. — *Rhabdoweisia* Br. Eur. — *Eucladium* Br. Eur. — *Grimmia* nom. — *Gymnostomum* mult. — *Dicranum* Brid. partim et Hdw. — *Hymenostomum* R. Br. et al. — *Afzelia* Ehrh. — *Coscinodon* Brid. — *Trimatium* Fröhl. — *Bryum* antiq.

Nomen Hedwigianum, memoriam *Weisii*, stirpium cryptogamicarum Goettingensium sagacis ac modesti indagatoris, professoris botanices, illustrans.

Calyptra *dimidiata*. Peristomium simplex, e dentibus 16 lanceolatis v. subulatis integris v. cribrosis aequidistantibus compositum, saepe nullum.

Sectio I. **Rhabdoweisia** Br. Europ. Fasc. 30–36. — Theca sulcato-striata; perist. dentes subulati; folia crispata.

1. **W. fugax** Hdw. (Sp. Musc. p. 64. t. 13. f. 5—10.); *monoica*; *dense cespitosa pulvinata* valde crispula amoene viridis erecta gracillima tenella fastigiata ramosa; folia caulina *conferta*, madefacta reflexo-patula, e basi *recta perfecte rectangulari-quadrata pellucide firme* leviter reticulata angusta brevi reflexiuscula flexuosa lineari-lanceolata *acuta*, evanidinervia, apice *subintegra v. denticulata*, margine vix revoluta, *superne e cellulis depresso-quadratis plus minus incrassatis papilla unica vesiculiformi praeditis areolata*, carinata; theca in ped. tortili brevi tenuissimo flavido erecto globoso-ovalis minuta aurentiaca, dein fusca, exannulata perfecte sulcata, operculo longirostri obliquo; perist. dentes longi tenuissime subulati fugaces articulati plus minus regulares.

Brid. I. p. 340. — *Rhabdoweisia fugax* Br. Eur. 33—36. p. 4. t. 1. — *W. striata* Kaulf in Sturm. Fl. Germ. II. Fasc. 16. t. 24. — *W. pumila* Brid. I. p. 338. — *W. leptodon* Plaub. in Brid. I. p. 341. — *Grimmia striata* W. et M. Bot. Taschb. p. 325.

Patria. Ad rupes praecipue arenaceas et graniticas, nec non ad terram praeruptam graminosam per regionem subalpinam et alpinam totius Europae. — *Junio, in alpinis Julio et Augusto.*

Flores masculi gemmacei minuti in vicinia feminei, foliis perig. caulinis similibus, internis minoribus, antheridiis 3 eparaphysatis.

2. **W. vulcanica** C. Müll.; *monoica*; habitus *W. fugacis*, sed laxe cespitosa humilior tenella, amoene viridis inferne radiculosa haud tomentosa, parce fastigiata ramosa; folia caulina *ubique laxe imbricata* crispula, madefacta flexuose patentia, e basi *minute firme haud pellucide* areolata vix erecta reflexiuscula, lineari-lanceolata acutissima subintegerrima, *ubique e cellulis minutissimis*, papillis tenuissimis praeditis, opacis areolata scaberrima, nervo evanido dorso minutissime scabro, carinata; theca et perist. *regulare* ut in praecedente.

Patria. Mexico, in cavernis trachytaceis crateris m. Cerro de los Nebejos, Mart. 1839: C. Ehrenberg legit societate *Bartr. intertextae*.

W. fugaci simillima, sed notis illustratis distinctissima, pulchella species.

3. *W. denticulata* Brid. (Mant. Musc. p. 40.); *monoica*; habitus *W. fugacis*, sed folia basi e cellulis multis amplis laxis pellucidis elongate quadratis laevibus reticulata, superne remote et grosse dentata nitida latiora, minus crispata, theca collo distinctiore, sicca turbinata minuta et perist. dentibus majoribus, e basi latiore subito longe subulatis robustioribus.

Brid. I. p. 342. — *W. striata* β . *major* Hook. et Tayl. Musc. Brit. ed. II. p. 81. t. 15. — *W. crispata* Brid. olim Musc. Rec. II. I. p. 73. — *Bryum crispatum* Dicks. Fasc. III. Pl. Cr. p. 3. t. 7. f. 4. fide Bridel. — *Rhabdoweisia denticulata* Br. Eur. Fasc. 33—36. p. 5. t. 2.

Patria. In subalpinis et alpinis locis praeruptis ad moles graminosas, rarius in rupium fissuris per totam fere Europam temperatiorem. — *Aestate*.

4. *W. Schisti* Brid. (Mant. Musc. p. 39.); *monoica*; habitus *W. fugacis*; folia caulina lineari-lanceolata, e basi erecta subito valde reflexa, margine revoluta, ubique e cellulis minutis flavidis quadratis inferne magis rectangularibus superne pagina superiore valde papillosis arcolata, igitur margine valde crenulata; perichaetia basi multo tenerius reticulata longe vaginantia, omnia nervo dorso apicis scabra; theca ovalis, collo conspicuo, operculo brevirostro crassiusculo obliquo; perist. dentes longissimi subulati trabeculato-articulati fusciduli paullisper latiores.

Brid. I. p. 339. — *Rhabdoweisia Schisti* Br. Eur. I. c. p. 5. t. 3. — *Weisia striata* β . *minor* Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 45. t. 15. ex parte. — *Grimmia Schisti* Sm. Fl. Brit. III. p. 1185. — *Dicranum splachnoides* Brid. olim Musc. Rec. II. I. p. 81. — *Bryum Schisti* Oeder Fl. Dan. t. 538.

Patria. In rupium fissuris humidis et ad terram humosam per Lapponiam (sec. Hb. Bridel.), Gothiam et Norvegiam Scandinaviae, ubi pr. Christianiam primus legit

Oeder, et in alpibus Germaniae et Angliae. Raro. —
Julio, Aug.

Dentes perist. in speciminibus nec Bridelianis, nec Swartzianis tam latos et robustos invenimus, ut Br. Europ. delineatos indicat. E structura folii *W. serrulatae* haud dissimilis.

Sectio II. **Euweisia.** Theca laevis peristomata v. nuda: dentes lanceolati, saepe pertusi. Folia crispula, interdum rigida.

A. *Peristomatae.*

a. *Folia crispula.*

5. ***W. viridula*** Brid. (l. p. 334.); *monoica*; laxe plus minus late saepe subpulvinata cespitosa, lacte viridis, ramosa, plus minus humilis; folia caulina involute crispata, madefacta erecto-patentia, inferiora minuta lanceolata, superiora in comam patulam congesta longiora, e basi rectiuscula lineari-lanceolata subreflexa, integerrima, *marginē superne involuto*, nervo crasso flavido in mucronem acutum brevem producto, basi e cellulis parvis rectangularibus pellucidis teneris superne *minutissime quadratis et papillis tenuissimis opacis intense viridibus*; perichaetialia comalibus similia; theca in ped. breviusculo pallido erecta raro subobliqua, plus minus ovalis, orificio et *annulo angusto praedita*, sordide fusca, operculo longe subulato obliquo; perist. dentes variabiles breves, lineari-lanceolati obtusi, integri v. apice fissi v. pertusi ferruginei subrugulosi.

Br. Europ. 33—36. p. 5. t. 2 et 3. — *W. controversa* Hdw. Musc. Fr. III. p. 12. t. 5. — *W. mutabilis* Brid. Sp. Musc. I. p. 103. — *W. virens* ej. Musc. Rec. II. I. p. 69. — *W. crispa* Timm. Prodr. Fl. Megap. n. 736. — *W. Dicksoni* Gmel. Syst. Nat. II. p. 1334. — *W. microdonta* Hdw. Sp. Musc. p. 67. t. 11. f. 7—12. — *W. humilis*, *fallax* Schl. et *Bruchiana* Br. Germ. II. 2. p. 36 et 38. tab. 26 et 28. — *W. Cyrnaea* Brid. l. p. 803. — *W. tortilis* Spr. Syst. Veget. IV. 2. p. 321. — *W. curricula* Brid. l. p. 336. — *W. obscura* Röhl. Ann. Wett. Ges. III. p. 99. et Brid. l. p. 337? — *Dicranum xanthodon* Hdw. Sp. M. p. 145. t. 30. — *D. flexifolium* Hook. Musc. Exot. t. 144? — *Hymenostom. subglobosum* Br. Germ. I. p. 103. t. 12. et Brid. II. p. 79. — *Grimmia controversa* W. et M. Bot. Taschb. p. 133. — *Afzelia crispa* Ehrh. Cr. Exs. n. 222. —

Bryum viridulum L. Sp. Pl. p. 1584. — *Br. virens* Dicks. Fasc. II. Cr. p. 4. — *Br. paludosum* β . *viridulum* Web. Sp. Fl. Goett. p. 11. — *Br. controversum* Hoffm. Deut. Fl. II. p. 34. — *Bryum capillaceum* breve pallide et laete virens, capsulis ovatis. Dill. Musc. p. 380. t. 48. f. 43.

β . *stenocarpa*; pusilla, theca attenuata subcylindrica. *W. controversa* β . *stenocarpa* Br. Germ. p. 45. t. 17.

γ . *densifolia*; elatior compacte cespitosa ramosissima, dense et fasciculate foliosa, foliis angustioribus, perist. dentibus minus perfectis. Br. Eur. l. c. — *W. densifolia* Wils. Ms.

δ . *amblyodon*; foliis nunc lineari-lanceolatis, nunc oblongo-lanceolatis, perist. dentibus maxime polymorphis brevissimis, truncatis, acutis v. apice fissis, pallidis v. lutescentibus. Br. Eur. l. c. — *W. amblyodon* Brid. I. p. 805. — *W. gymnostomoides* et *microstoma* Br. Germ. II. 2. p. 34 et 52. t. 25 et 37.

ϵ . *gymnostomoides*; perist. dentibus valde imperfectis pallidis. Br. Eur. l. c. — *W. gymnostomoides* Brid. I. p. 342. — *W. Rudolphiana* Br. Germ. II. p. 33. t. 25.

ζ . *mucronata*; folia margine plerumque erecto rarius involuto, distinctius mucronata, peristomium fugacissimum. *W. mucronata* Bruch in Br. Europ. 33 — 36. p. 7. t. 4. sub nom. *W. mucronulatae*. — *Hymenostomum rutilans* Br. Germ. I. p. 201. t. 12.

Patria. In terra nuda humosa rupium, murorum, sylvarum, pratorum etc. per totam Europam vulgatissima una cum variet. illustratis et in Americae septentrionalis, Africae et Asiae regionibus temperatis. — *Vere, in Africa merid. Septembri.*

Flores masculi in innovationibus terminales saepe plures aggregati, minute gemmacei, colorati; foliis perig. parvis e basi late ovata concava tenerrime et pellucide areolata acuminata subconvolutacea evanidinervia; antheridiis crassiusculis, paraphysibus paucis mixtis. — Species foliis superne valde involutis facile discernibilis.

6. *W. cryptodon* Mont. (Ann. d. sc. nat. 1845. 4. p. 120.); *monoica*; cespitosa, procumbenti-erecta basi et apice innovando divisa humilis; folia crispata, madefacta

erecto-patentia conferta, inferiora minora angustiora lanceolato-acuminata, carinata, apice vix inflexa, superiora sensim latiora, *apice inflexa, plicate concava, margine valde revoluta* integerrima, fusco-viridia, e cellulis basi rectangularibus superne multo minoribus perfecte quadratis *echlorophyllosis pellucidis flavide pachydermis* areolatis, nervo *subevanido*; perich. intimum obtusiusculum breve; theca propter pedunculum *arcuatum* breve flavidum quasi horizontalis, erecta oblongo-cylindrica turgida sordide fusca, operculo conico rostrato *recto dimidio breviori*; perist. dentes breves lanceolati obtusi integri laeves amoene purpurei trabeculati.

Patria. Chile australis: C. Gay.

Flos masc. in axilla folii inferioris crassiuscule gemmaceus sessilis, foliis perig. paucis lato-ovatis acuminulatis convolutaceis laxiuscule reticulatis. — A *W. viridula* proxima notis cursive impressis facile distinguitur.

7. W. Wimmeriana Br. et Sch. (Br. Eur. 33—36. p. 4. t. 1.); *androgyna*; pusilla dense cespitosa innovando ramosa; folia caulina stricte patula, siccitate crispata, e luteo viridia dein rufescentia, inferiora breviora lanceolata, superiora anguste lanceolata acutissima, apice subcucullata, supra basin involutacea, integerrima, evanidinervia carinata, e cellulis basi rectangularibus pellucidis tenerrimis minutis versus apicem sensim minutissimis opacis maxime tenuiter papillosis areolata; perichaetialia basi longe vaginante tenera, omnia plus minus flexuosa; theca in ped. longiusculo flavido stricto erecta interdum obliqua, ovali-cylindrica v. ovalis minuta, annulata fuscescens, operculo oblique subulato; perist. dentes *brevisissime rudimentarii truncati pallidi*.

Gymnost. Wimmerianum Sendtner in Regensb. Bot. Zeit. 1840. I. p. 50. et in Regensb. Denckschriften 1841. p. 141. — *Gymn. Trafoiense* Schimp. in sched.

Patria. In rupium fissuris humo repletis in montibus depressis Sudetorum prope fontes Morae, in sic dicto Kessel auf der Janowitzer Haide detexit Sendtner;

praeterea in jugo Bormiensi pr. Trafoi, in summa Albula Rhaetiae retro Weissenstein aliisque locis Helvetiae et Tirolis: W. P. Sch.; in monte Chasseron Jurassi: Lesquereux; in Norvegiae alpibus: Ångström. — *Julio*.

8. **W. reflexa** Brid. (I. p. 355.); *dioica*; pusilla cespitosa, innovando ramulosa; folia *pauca reflexa, anguste lanceolata ligulato-obtusa*, margine erecto integra flexuosa parum carinata magis plana, basi e cellulis *rectangularibus laxis parvis pellucidis* superne minutis echlorophyllosis granuloso-papillosis pallide viridibus areolata, nervo evanido flavido; theca in ped. erecto longiusculo tenui flavido oblongo-elliptica, late annulata fuscescens parva, operculo *conico obliquo obtuso*; perist. dentes *breves lineares obtusiusculi articulati ferruginei subgranulosi*.

Br. Europ. Fasc. 33 — 36. p. 7. t. 4. — *Gymnost. irretitum* Brid. I. p. 758!

Patria. In terra calcarea prope Avenionem Galliae australis: Requier detexit; pr. Pessulanum (Montpellier): Salzmann et pr. Mende: Prost.

Pl. mascula minor, parce ramosa, flore terminali minuta gemmaceo, foliis perig. externis ex ovato lanceolatis medio recurvis, internis ovatis, antheridiis et paraphysibus paucis parvis. — *W. tenui* simillima.

9. **W. compacta** Brid. (Mant. Musc. p. 42.); *monoica*; *compacte cespitosa plus minus pulvinata, atro-viridis*, fastigiata ramosa, dense foliosa humilis *tenella, crispula*; folia caulina plus minus patentia, *e basi latiore oblonga sensim lanceolato-subulata obtusiuscula, valde concava subinvolutacea*, margine integerrimo, nervo tenui sub apice evanido ferrugineo, basi infima e cellulis *rectangularibus tenuioribus pellucidis*, superne perfecte quadratis parvis pachydermis obscure coloratis haud opacis tenuissime papillosis areolata; perichaetia *longe vaginantia, breviter acuminata, intimum ligulato-obtusum tenerum pellucidum*; theca in ped. *brevis flexuoso purpurascens ovalis subrecta, sordide brunnea, exannulata, pachyderma, sicca rugosa*, operculo oblique rostrato ob-

tusiusculo; perist. dentes lineari-lanceolati apice subbifidi dense trabeculati rufo-purpurei, siccitate reflexi.

Brid. I. p. 345. — Br. Europ. 33—36. p. 8. t. 5. — *W. atrovirens* Br. Germ. II. 2. p. 56. t. 29. — *W. condensata* Brid. Mant. Musc. p. 41. — *Grimmia compacta* Schleich. Pl. Helv. Exs.

Patria. In summis alpibus Helvetiae, ubi in glareosis alp. Sanensium 1801 legit Bridel, Tirolis, altitud. 8—9000' ad rupes humidiusculas semidecompositas et Salisburgiae. — *Aestate.*

Flos masc. minutus, foliis internis latiuscule ovatis acuminulatis obtusis. — Primo intuitu *Grimmiae confertae* cespitibus gracillimis compactis haud dissimilis.

10. ***W. serrulata*** Funk (in Brid. I. p. 804.); *monoica*; dense cespitosa ubique in axillis foliorum radiculosa, interrupte ramosa, ramulis saepe brevissimis, fragilis; folia dense conferta erecto-patentia torquescentia, late lanceolata et lineari-lanceolata *obtusa* vel acuminulata, plus minus complicate concava evanidinervia, basi e cellulis tenerioribus pellucidis rectangularibus laxiusculis superne minutis opacis areolata, *dorso papillis tuberculosus magnis creberrimis valde serrulato-papillosa*; perichactialia longiora et basi longiore pellucida laxa; theca in ped. breviusculo flavido stricto erecta, ovali-oblonga aequalis v. plus minus incurva, exannulata, collo brevissimo praedita, parva sordide fuscescens, operculo oblique et breviter rostrato obtusiusculo; perist. dentes lanceolato-subulati integri minus fissi, dense trabeculati, rufo-purpurei apice pallidi.

Br. Europ. 33—36. p. 11. t. 8. — Br. Germ. II. 2. p. 90. t. 33. — *W. torquescens* Brid. I. p. 349. et Br. Germ. I. c. p. 86. t. 32. — *W. procera* Laurer in Br. Germ. I. c. p. 82. t. 32. — *Trichostom. paradoxum* Brid. I. p. 817.

Patria. In summis alpibus Carinthiae, Tirolis, ubi in Mattreyer-Tauern ad rupes detexit Funk, et Salisburgiae. Rarior! — *Augusto.*

Flos masc. gemmiformis terminalis. — Species foliis verrucoso-papillosis primo adpectu distinctissima.

Folia stricta.

11. W. verticillata Brid. (Sp. Musc. I. p. 121.); *dioica*; laxa et late cespitosa plus minus elata, valde dichotome ramosa, glaucescens topho oblecta; folia caulina erecto-patentia laxa disposita, siccitate rigida, juniora paulisper curvata, *lanceolata subsubulata angusta, basiliore longe pellucida margine dentata elongate laxe reticulata*, superne rotundato-quadrata areolata viridia, nervo crasso in acumen crassum exeunte; perichaetia basi laxius reticulata amplexicaulia; theca in ped. breviusculo purpureo erecta v. subobliqua, ovalis, *angustissime annulata*, evacuata truncata, fusca pachydermis, operculo oblique subulato; perist. dentes 16 simplices integri vel apice subbifidi, linea divisurali longitudinali carentes, pallide aurantiaci sublaeves.

W. gypsacea Schleich. Cat. Pl. Helv. 1807. p. 31. — *Eucladium verticillatum* Br. Eur. 33—36. p. 3. t. 1. — *Coscinodon verticillatus* Brid. I. p. 374. — *C. elongatus* ej. l. c. p. 376. — *Barbula Atlantica* Brid. I. p. 559. — *Grimmia verticillata* W. et M. B. T. p. 129. — *Trimatium tophaceum* Fröhl. in Brid. Hb. — *Bryum verticillatum* Dicks. Pl. Cr. Exs. No. 19.

Patria. In rupibus praesertim calcareis humidis praesertim tophum efficientibus, ut *Trich. tophaceum* tophum pariter formans, per regionem montanam et subalpinam totius Europae. — *Junio et Julio.*

Pl. mascula gracilior, floribus terminalibus saepe aggregatis, foliis perig. externis e basi ovali concava lanceolatis, internis acuminatis evanidinervibus; antheridiis oblongis, paraph. longioribus filiformibus. — Ex habitu *Trich. tophaceo* similis, sed structura foliorum longe distans.

B. Gymnostomae.

a. Robustiores.

12. W. Kunzeana C. Müll.; *dioica*; pusilla cespitosa rigida sordide viridis parce fasciculato-ramosa; folia caulina sicca valde crispata rigida, madefacta stricta, e basiliore oblonga e cellulis rectangularibus pellucidis teneris multis reticulata concava saepe subito fere lanceolata in-

terdum reflexiuscula, minutissime quadrato-areolata, tenuissime papillosa opaca, margine involuta; perichaetialia basi laxiora; omnia nervo crasso flavido carinato in mucronem breviter excurrente; theca in ped. medio rubente erecta ovalis parva sordide fusca, operculo subulato obliquo tenuissimo.

Gymnost. marginatum Kze. mst. in Pöpp. Pl. Chil.

Patria. Chile: Pöppig.

A *W. viridula* simillima theca gymnostoma differt.

13. *W. rupestris* C. Müll.; *dioica*; dense cespitosa, plus minus elata gracilis, dichotome ramosa, interrupte foliosa, laete viridis, inferne fuscescens, et tomentoso-radiculosa; folia caulina erecto-patentia rigidiuscula, *sicca crispula, lanceolato-linearia, obtusiuscula, basi papillis crenulata*, evanidinervia, e cellulis basi rectangularibus superne magis quadratis *tenuissime papillosis igitur opacis minutis* areolata; perichaetialia basi laxius pellucidius et magis hexagone reticulata, plus minus vaginantia; theca in ped. breviusculo tenuissimo ovalis brevicolla, subnitida brunnea, vix annulata, evacuata macrostoma, operculo oblique et longe rostrato.

Gymnost. rupestre Schw. Suppl. I. I. p. 31. t. 11. — Br. Eur. 33 — 36. p. 7. t. 5 et 6. — Brid. I. p. 77. — *G. articulatum* Schkuhr Deut. Moos. p. 29. t. 11. c. et Br. Germ. I. p. 156. t. 10. — *G. erythrostromum* Brid. I. p. 85.

β. ramosissima; dense compacta, folia breviora obtusiuscula, theca minor in ped. breviora. Br. Europ. I. c.

γ. stelligera; laxe cespitosa, folia in innovationis apice valde comantia, stellate patentia subrecurva, lineari-lanceolata acutiuscula. Br. Eur. I. c. — *Gymnost. stelligerum* Sm. Fl. Brit. III. p. 1164. — Brid. I. p. 89. — Br. Germ. I. p. 168. t. 11.

δ. compacta; fasciculate foliosa, folia paulo latiora obtusiuscula. Br. Eur. I. c.

Patria. In rupium fissuris humidis, e subalpinis ad alpes ascendens per totam Europam et in America septentrionali. — *Vere et aestate.*

Pl. mascula tenerior, foliis perig. internis ovatis tenerioribus fuscis.

14. **W. curvirostris** C. Müll.; *dioica*; dense cespitosa elata fastigiata ramosa tomentoso-radiculosa, superne sordide viridis inferne ferruginea; folia caulina *sicca et madefacta erecto-patentia vix crispula, lanceolata, acuta, rigidiuscula, ubique e cellulis diaphanis haud opacis quadratis basi rectangularibus laevioribus areolata, inferne margine parum revoluta*, basi late concava superne carinata; perichaetia basi vaginante laxius et pellucidius reticulata; theca in ped. breviusculo erecta, ex ovato globosa brevicolla, subnitida brunnea vix annulata, evacuata macrostoma, operculo longirostrato obliquo, *in columella persistente*.

Gymnost. curvirostrum Hdw. Musc. Fr. II. p. 88. t. 34. — Br. Eur. 33 — 36. p. 8. t. 7 et 8. — Brid. I. p. 84. — *G. aeruginosum* Sm. Fl. Brit. p. 1163.

β. pomiformis; foliis tenuioribus angustioribus, theca obovato-subglobosa. Br. Eur. I. c. — *Gymnost. pomiforme* Nees et Hsch. Br. Germ. I. p. 158. t. 10. — Brid. I. p. 79.

γ. microcarpa; densius cespitosa, foliis paullo latioribus erecto-patentibus; theca obovato-globosa minor. Br. Eur. I. c. — *Gymnost. microcarpum* Br. Germ. I. p. 161. t. 10. — Brid. I. p. 81.

δ. pallidiseta; elongata gracillima valde ramosa fasciculato-foliosa; foliis patentibus tenerrimis; theca in ped. abbreviato minuta obovata v. obconico-ovata, operculo brevius rostrato. Br. Eur. I. c. p. 9. — *Gymnost. pallidisetum* Br. Germ. I. p. 166. t. 11. — Brid. I. p. 83. — *Gymn. brevisetum* Br. Germ. I. p. 164. t. 10. — Brid. I. p. 82.

Patria. In rupibus irroratis praeprimis calcarcis per regionem subalpinam et alpinam, rarius montanam vel in planitie per totam Europam et in America septentrionali. Varietates in alpibus. — *Julio, Augusto.*

Pl. mascula gracilior, innovationibus brevioribus, floribus *W. rupestris*, a qua notis cursive impressis facile distinguitur. Species polymorpha.

15. W. rigescens C. Müll.; *dioica*; laxe cespitosa elata, ramis dichotomis saepe brevissimis valde divisa, gracilis flexuosa, sordide viridis, *fragilis*; folia caulina erecto-patentia parva, *ex ovato subulata parum falcata integerrima*, concava, margine saepe revoluta, nervo subcontinuo ferrugineo, ubique e cellulis firmis quadratis parvis superne chlorophyllosis areolata, sublaevia; perichaetia intima e basi latiore amplexante majus reticulata subito subulata; theca in ped. brevi flexuoso purpureo globoso-ovalis macrostoma.

Gymnostom. rigescens Br. et Sch. in Musc. Abyssin. Schimp. No. 447.

Patria. Abyssinia, ad rupes alpis Silke, 12. Febr. 1840: W. Schimper.

b. *Tenellae.*

16. W. calcarea C. Müll.; *dioica*; *compacte cespitosa gracillima tenerrima humilis, innovando ramosa viridissima*, inferne ferruginea; folia caulina erecta crispula, madefacta patula, *lineari-lanceolata, tenera* integerrima evanidinervia carinata, ubique e cellulis minutis quadratis viridibus superne opacis tenuissime papillosis areolata; perichaetia e basi latiore amplexante subhexagone *pelucidius laxius reticulata subito subulata*; theca in ped. medio flavido erecta ovalis brevicolla vix annulata *parva*, operculo oblique subulato.

Gymnost. calcareum Nees et Hsch. Br. Germ. I. p. 153. t. 10. — Br. Europ. 33—36. p. 6. t. 4. — Brid. I. p. 65.

β. tenella; brevissima 1—2 linearis parce ramosa, theca ex ovali elliptico-oblonga. Br. Eur. I. c.

γ. viridula; caulis 2—3 linearis, ramis gracilescen-
tibus, foliis patenti-recurvis ovato-lanceolatis, theca ovalis. Br. Eur. I. c. t. 3. — *Gymnost. viridulum* Brid. I. p. 66.

δ. gracillima; ramis sterilibus fertilibus longioribus, theca oblonga. Br. Eur. I. c. — *Gymnost. gracillimum* Br. Germ. I. p. 149. t. 10.

Patria. In conglomerato calcareo pr. Monachium et Salisburgiam, praeterea in Littorale et Bosnia. Var. *β.*

et γ . in muris calcareis pr. Monspelum et in rupibus tophaceis Sardiniae. Var. δ . in schisto micaceo alpium Salisburgensium et Pyrenaeorum. — *Junio, Julio*.

Pl. mascula gracilior, flore minutissimo innovando laterali, foliis perig. internis ovato-acuminatis latiusculis parvis, antheridiis breviter stipitatis, paraphysibus tenerimis paucis mixtis. — A *W. tenui* simili notis laudatis facile distinguitur.

17. *W. tenuis* C. Müll.; *dioica*; longe lateque cespitosa brevissima, e basi pluries divisa lutescens; folia inferiora minima linguaeformia, superiora lineari-lanceolata obtusa, margine parum crenulata; perichactialia ultra medium vaginantia, omnia minutissime areolata et papillosa, inferne laevia et pellucidius majus reticulata; theca in ped. stricto longiusculo flavido erecta oblonga, collo parvo praedita, pallide ferruginea, late annulata, operculo conico brevi subobliquo.

Gymnost. tenue Schrad. Coll. Pl. Cr. No. 31. — Brid. I. p. 64. — Br. Europ. 33 — 36. p. 5. t. 2. — *G. paucifolium* Engl. Bot. t. 2806. — *Bryum paucifolium* Dicks. Fasc. IV. Pl. Cr. p. 7. t. 11. f. 3.

Patria. Ad rupium arenacearum parietes et ad muros per mediam Europam. — *Julio, Augusto*.

Pl. mascula femineae similis, fol. perig. externis ovato-lanceolatis obtusis, internis ovatis enervibus mollibus; antheridiis minutis, paraph. mixtis vel nullis.

Sectio III. **Hymenostomum** R. Br. Trans. of the Linn. Soc. XII. II. p. 573. — Habitus omnino *W. viridulae*, sed thecae orificio columella apice dilatata clauso.

Columellam notam genericam non habemus, nam in generibus variis diversissima, mox immersa mox exserta (e. gr. *Pottia* c. *Desmatodonte*), nunc cylindrica, nunc globosa (e. gr. *Splachnaceae*) reperitur. Caeterum in *Pottia* (*Hypophila*) *involutifolia* columella pariter apice dilatata observatur, dum in congeneribus aliis normalis invenitur.

a. *Folia patula.*

18. *W. microstoma* C. Müll.; *monoica*; late et plus minus dense cespitosa humillima tenella gracillima parce

ramosa ditissime fructifera; folia sicca crispula, late lanceolata, nervo excurrente mucronata, *marginē involuta*, basi e cellulis parvis pellucidis teneris rectangularibus superne minute quadratis tenuissime papillosis igitur opacis viridibus arcolata; perichaetialia basi tenuiora; theca in ped. brevi tenuissimo flavido *minuta*, *nunc erecta aequaliter ovata et elliptico-ovalis*, *nunc obliqua et gibba*, *sordide olivacea*, *microstoma*, *annulata*, operculo nunc anguste conico, nunc subulato.

Hymenost. microstomum R. Br. l. c. — Br. Eur. 33—36. p. 4. t. 1. — Brid. II. p. 77. — *Gymnost. microstomum* Hdw. Musc. Fr. III. p. 71. t. 30. — *G. phascoides* Drumm. Musc. Amer. No. 12 forsan huc pertinet. Ic. in Schw. Suppl. IV. t. 304. — *Bryum microstomum* Dicks. Fasc. IV. Pl. Cr. p. 9.

β. obliqua; theca oblongo-cylindrica incurva, operculo anguste conico. Br. Eur. l. c. — *Hym. obliquum* Br. Germ. I. p. 194. tab. 12. — Brid. II. p. 75.

γ. brevirostris; theca oblongo-cylindrica, regularis, operculo breviter conico. Br. Eur. l. c. — *Gymnost. sepincola* Fk. in Brid. I. p. 74.

δ. brachycarpa; theca brevius pedunculata abbreviate ovata et globosa, gibbosa. Br. Eur. l. c. — *Hymenost. brachycarpum* Br. Germ. I. p. 196. tab. 12. — Brid. II. p. 76.

ε. elata; innovationibus elongatis, thecas superantibus, theca minore, subglobosa, operculo anguste conico. Br. Eur. l. c.

Patria. In terra nuda umbrosa argillacea sylvarum et cultorum locorum per totam Europam vulgaris. — *Vere.*

Flos masc. in vicinia feminei, in ramulo brevissimo minutus, foliis perig. patulis, caulinis similibus, basi concavis margine haud vel vix involutis, vix opacis.

19. W. tortilis C. Müll.; *monoica*; pulvinate cespitulosae dichotomae et fastigiate ramosae fasciculate foliosae, viridissima inferne ferruginea parce radiculosa, *robusta*; folia caulina conferta, *sicca valde incumbenti-tortilia*, madefacta erecto-patula, inferiora minuta ovata, superiora late oblongo-lanceolata, nervo excurrente breviter mucronata, margine integerrimo incurva, carinata, subun-

dulata, ubique e cellulis quadratis minutis firmis diaphanis apice folii opacis tenuissime papillosis areolata; perichaetialia longiora, basi tenerius longius angustius pellucidius areolata; theca in ped. medio flavido *turgide ovalis* raro cylindracea aequalis v. gibba *firma*, *orificio majori rubro post operculi lapsum medio apertum*, fuscescens, simpliciter annulata, operculo longirostrato obliquo.

Hymenostomum tortile Br. Eur. 33—36. p. 6. tab. 3 et 4. — *Gymnost. tortile* Schw. Suppl. I. I. p. 29. t. 10. — *G. condensatum* Voit. Musc. Herbip. p. 14. — *G. hymenostomoides* Pöck in Musc. Bohemicis. — *Weisia involuta* Brid. p. 336. e spec. auth. unico pessimo Hb. Brideliani huc pertinere videtur.

Patria. In rupium et murorum fissuris, terra calcarea impletis vel in terra calcareo-argillosa per regionem montanam usque ad alpinam totius fere prime meridionalis Europae, sed nusquam vulgare. — *Vere.*

Flos masc. *W. microstomae* similis, a qua notis curvis impressis distat.

20. *W. crispata* C. Müll.; *monoica*; habitus praecedentis sed multo gracilior; folia longiora lineari-lanceolata *spiraliter torta* angustiora, nervo in mucronem producta, theca ovato-oblonga saepe incurva, *ore angusto*.

Hymenostom. crispatum Br. Germ. I. p. 205. t. 12. — Br. Eur. 33—36. p. 6. t. 4. — *H. Mülleri* Bruch in Regensb. Flora 1829. p. 387.

Patria. In hortis prope Tergestum: Hornschuch, in murorum fissuris terra impletis prope Cagliari Sardiniae: Fr. Müller. Italia, Monte bello: Rabenhorst; Dalmatia pr. Spalato: Sendtner.

A *W. tortili* simillima notis illustratis parum recedit.

21. *W. micacea* C. Müll.; *dioica*; dense et late caespitosa brevicaulis *simplicissima* v. *ex apice innervatione tenui*, sordide viridis, rigida; folia caulina cirrhate incumbencia, madefacta stricta, dense conferta, e basi *amplexante angusta oblonga* tenuiter pellucide et rectangulari-areolata sensim *subulato-lanceolata*, margine involuta, apice parum incurva, superne minute quadrate areo-

lata, superiora et perichaetialia e basi latiore tenuiore laxiore superne subcoarctata subito subulato-lanceolata; nervus excurrent; theca in ped. elongato stricto flavido-rubente tenui erecta parva ovalis, orificio angusto, pachydermis, fusca, orificio atro, maxime nitida, turgida, latiuscule sed simpliciter annulata, evacuata aperta, operculo subulato valde obliquo.

Hymenost. nitidulum in Br. Europ. 33 — 36. p. 3. memoratum? — *Hym. subglobosum* Hsch. Fl. Bras. I. p. 6. — *Gymnost. micaceum* Schlechtd. Linnaea. X. 1835. p. 443.

Patria. Brasilia, terram arenosam micaceam habitans, in locis compluribus, ad Rio Janeiro a Beske et ad Rio Comprido (Gardner Coll. No. 9.) lectam vidimus. — *Julio.*

Pl. mascula apice crassior, minor; flore crassiusculo terminali; foliis perig. externis e basi erecta patulis, internis e basi latiuscule ovata acuminata minora, nervo tenui excurrente v. in intimis ante apicem evanido; antheridiis multis gracilibus curvatis, paraphysibus filiformibus flexuosis pachydermibus flavidis acutis multis mixtis. — Species theca vernicose splendente pachydermi primo adpectu discernibilis.

b. *Folia squarroso-reflexa.*

22. W. squarrosa C. Müll.; *monoica*; laxe cespitulosam, caule annosiore decumbente irregulariter ramosam; folia squarrosa latiora, margine erecto, haud involuto; theca erecta ovata et elliptica aequalis, operculo anguste conico rostellato.

Hymenost. squarrosam Br. Germ. I. p. 193. t. 12. — Br. Eur. 33 — 36. p. 5. t. 2. — Brid. II. p. 74.

Patria. In agris et pratis argillosis prope Bipontem detexit Bruch; in pratis urbis Francofurti ad Oderam siti: Itzigsohn; pr. Angers Galliae occidentalis: Guépin. E rarioribus, sed forsitan praetervisa. — *Sero autumno et hyeme.*

Caetera ut in *W. microstoma* simillima; notis cursive impressis facile discernibilis.

23. W. Breutelii C. Müll.; *dioica*; laxe cespitosa humilis *subsimplex*, basi interdum breviter ramosa, luteo-virens; folia caulina sicca tortilia, lineari-lanceolata *acuta* longiuscula, *reflexo-patula*, *basi plus minus longa erecta*, ibidem e cellulis angustis rectangularibus pellucidis, superne minutissime quadratis viridibus tenuissime papillosis parum opacis areolata, margine involuto, excurrentinervia; perichaetia intima erecta haud reflexa, basi tenuiora pellucidiora parum convolutacea; theca in ped. longiusculo flavido tenui erecta, *cylindrico-oblonga* fuscidula, exannulata, operculo conico-subulato parum obliquo.

Hymenostomum cylindricum Br. et Sch. Br. Eur. 33—36. p. 3 nomine memoratum? — *Gymnost. Breutelii* eor. in schedulis.

Patria. Ex insula Antillarum St. Thomas dicta retulit Breutel.

Weisiae non satis notae v. suspectae.

1. W. simplex Brid. (I. p. 803.); subacaulis cespitosa luteo-virens; folia oblongo-ovata obtusa concava evanidinervia, siccitate conniventia subcrispula; theca oblonga, operculo conico-subulato. †.

Patria ignota. Hb. Candoll.

2. W. occulta Wallr. (Linnaea XIV. p. 682.); caulis brevissimus fere subnullus simplicissimus oligophyllus; folia subulato-setacea enervia stricta, theca in ped. erecto ovata laevis, operculo tenui thecae diametrum aequante recto. †.

Patria. In lapid. arenac. decompositis Hercyniae merid., societate *Collemat. nigri*, passim.

Habitu *Brachyod. trichodis* v. *Campylostel. saxicolae*, sed ex animadv. auctoris ab ambabus speciebus textura foliorum differre dicitur.

3. W. erythrogona Brid. (I. p. 337.); *dioica*; laxe cespitosa pusilla simplex tenera, luteo-virens; folia laxe imbricata lineari-lanceolata carinata margine parum revoluta pallide viridia *acuta* excurrentinervia, ubique e cel-

lulis quadratis parvis sublaevibus basi sola laxioribus areolata, apice dentata, perichaetialia longiora.

Patria. America septentrionalis.

Pl. mascula robustior ramosa; rami floribus crassiuscule gemmaceis coloratis terminati; folia perig. externa caulinis similia, basi latiora ovata, interiora late convolutacea breviter acuminata tenerius reticulata colorata, evanidinervia obtusiuscula integra, margine parum revoluta. — Ad *Weisiae* genus si pertinet, species bene distincta erit.

4. ***Weisia zonata*** Brid. (I. p. 364.); *compacte cespitosa; caulis gracillimus fragilissimus erectus elatiusculus, ramis paucis erectis cauli subappressis divisus, nitidus intense viridis inferne plus minus zonate ferrugineus, folia appressa, madefacta et sicca paullo patentia, parva, lanceolato-acuminata firma amplexicaulia carinata, ubique minute quadrate flavide areolata, integerrima, nervo tenui subcontinuo.*

Br. Germ. II. 2. p. 123. t. 35. — *Dicranum sericeum* Hsch. in schedulis. — *Conostomum variegatum* Brid. olim mst. — *Conostomum boreale* Hmp. in litt.

Patria. In Pyrenaeis orientalibus 1803 aestate primus legit Bridel; dein ad rupes madidas montis Grossarl legit Hornschuch; e monte Bructero misit Hampe.

Muscus memorabilis, habitu *Angströmiis* julaceis prime autem *Conostomo boreali* primo intuitu haud dissimilis, hucusque sterilis tantum repertus, observationibus bryologorum dignissimus.

Subtrib. III. ORTHOTRICHACEAE.

Cellulae folii basilares infimae solae molles, superiores plerumque incrassatae, rarius pellucidae normales.

Patria. Per omnes zonas totius orbis terrarum. 24.

Quoad reticulationem foliorum hujusce tribus plantas a *Pottioideis* praecedentibus separare nequivimus; nam pro omnibus congeneribus parenchymatica, maxime autem polymorpha plerumque incrassata reperitur. Habitum sci-

licet proprium esse; notae tamen pottioideae multae *Orthotrichacearum* sunt. Inter multas alias species affines *Zygodon conoideus*, *Orthotrichum Sprucei*, *pumilum*, *rivulare*, *diaphanum*, *Grimmia pulvinata* et *Gümbelia laxa* folia perfecta *Eupottiarum* conservant; *Ulozygodontes* etsi robustiores *Rhabdoweisiis*, *Anoectangia Euweisiis* maxime similes sunt; *Orthotricha* congeneres *Calymperis*, *Brachystelea* et *Racomitria* illos *Leptodontii*, *Schlotheimiae* surculis torquatis et calyptris campanulatis species *Encalyptarum* in memoriam referunt. Affinitates adhuc multas illustrare possimus, sed his contenti sint bryologi et credant, auctorem haud leviter egisse. Ex omnibus autem his factis lex illa systematica profunde agens elucet: *tribui omni esse reticulationis foliorum typum, hic perfectum, illic mutatum, formam folii et habitum maxime variam efficientem.*

Hemicyclus I. ORTHOTRICHEAE.

Folia distincte papillosa, papillis plerumque tuberculatis, saepe minutissimis, rarius obsoletis. Peristomia plerumque carnosula et pallida, rarissime aurantiaco-colorata.

Patria. *Orthotricha* praesertim in terris hemisphaerae borealis, *Zygodontes*, *Macromitria* et *Schlotheimiae* illas hemisphaerae meridionalis praeferentes.

Gen. XI. *Zygodon* Hook. et Tayl.

Musc. Brit. p. 70. — *Anoectangium* al. — *Amphidium* Nees ab Es. — *Hedwigia* Hook. — *Codonoblepharon* Schw. — *Gymnostomum* al. — *Gagea* Raddi. — *Syrrhopodon* al. — *Aulaconnion* nonn. — *Gymnocephalus* Schw. partim. — *Weisia* al. — *Grimmia* al. — *Bryum* et *Mnium* antiq.

A verbis graecis ζυγός jugum et ὀδοίς dens, ob dentes conjugatos nomen ductum.

Calyptra dimidiata. Peristomium nullum, simplex externum vel internum, s. duplex; *externum e dentibus orthotrichoideis 32 simplicibus geminatis*

v. bigeminalis *conglutinatis planis pallidis rugulosis carnosulis, e cellularum serie unica formatis, siccitate patulis v. reflexis et thecae modo Orthotrichorum appressis compositum; internum: cilia 8—16 linearia hyalina plus minus conniventia horizontalia v. dentibus externis similia. Theca pyriformis sulcata rarius glabra, exannulata.*

Zygodonteae Br. Europ.:

Sectio I. **Amphidium** Nees in Sturm Fl. Germ. II. 17. — Folia lata subspathulata e cellulis pottioideo-hexagonis areolata, planiuscula v. carinata laevia, erecta. Theca sulcata.

1. **Z. conoideus** Hook. et Tayl. (Musc. Brit. p. 71. t. 21!); *monoicus*; pulvinatus humilis breviter ramosus, inferne tomentosus viridissimus; folia caulina dense conferta, madefacta patula, e basi angustiore ampliuscule hexagone reticulata sensim late ovato-lanceolata s. subspathulato-acuminata, *planiuscula* nervo ante apicem evanido crassiusculo, integerrima, e cellulis ubique magnis perfecte hexagonis chlorophyllosis firmis areolata; perichaetialia basi multo laxius reticulata; theca in ped. brevi flavido crassiusculo erecta, pyriformi-ovalis, fuscescens 8-striata, ore coarctata, operculo conico subulato obliquo; perist. dentes externi 8 bigeminati latiusculi subrugulosi pallide lutescentes sicci reflexi apice liberi, interni: cilia 8 cum dent. alternantia breviora anguste subulata hyalina subrecta.

Bryol. Eur. Fasc. IV. p. 8. t. 2. — Brid. I. p. 590. — *Z. conoideus* β . *succulentus* Hook. et Grev. in Edinb. Journ. of sc. 1824. — *Amphidium pulvinatum* Nees in Sturm Fl. Germ. II. Fasc. 17. — *Gagea compacta* Raddi. Nuova Raccolt. Dec. II. — *Gymnocephalus conoideus* Schw. Suppl. I. II. p. 87. — *Weisia Forsteri* Brid. I. p. 357. e spec. auth. Hb. Bridel.! — *Grimmia Forsteri* Sm. Fl. Brit. III. p. 1196. — *Bryum Forsteri* Dicks. Fasc. III. Pl. Cr. p. 4. t. 7. f. 8.

Patria. Ad arborum truncos Germaniae, Galliae merid. et Pyrenaeorum, Britanniae, Italiae et Sardiniae. In Norvegia indicat Ångström; e Brasilia lectum accepisse Br. et Sch. dicunt. *Revera?* — *Vere.*

Flos masc. in ramulo tenero terminali gemmaceus, foliis perig. ovato-lanceolatis nervosis, antheridiis breviter stipitatis, paraphysibus filiformibus mixtis.

2. Z. Drummondii Tayl. (Lond. Journ. of bot. 1846. p. 46.); *dioicus*; habitus praecedentis; folia spathulata acuminata *canaliculata*, nervo subcontinuo, *marginē revoluta*, basi e cellulis hexagonis mollibus ampliusculis *pellucidis*, *superne valde incrassatis saepe rotundatis vix chlorophyllosis* areolata; theca in ped. brevi rubente tenui erecta, pyriformi-ovalis, pallida dein fuscescens, 8-sulcata, ore coarctata, operculo conico subulato obliquo basi aurantiaco superne flavido; perist. praecedentis.

Patria. Nova Hollandia, ad arbores reg. flum. Swan River legit J. Drummond, in regione Port Adelaide ad Kowimanila leg. Behr.

Species tenella, distincta, caulibus filis articulatis (Conferva Orthotrichi sic dictis) saepe terminatis.

Sectio II. **Codonoblepharon** Schw. Suppl. II. p. 142. — Folia parva angusta, e cellulis rotundatis superne areolata, papillosa complicata v. carinata appresso-erecta. Theca sulcata.

3. Z. Menziesii W. Arn. (Disp. d. M. p. 15.); *dioicus*; dense cespitosus tomentosus humilis subrobustus crassiusculus angulate teres undique fuscescens, ramulis fastigiatis brevibus; folia caulina erecto-appressa, madefacta parum patentia brevia, *basi subdecurrente angustiora sensim dilatata, medio latissima gibboso-convera, inde late lanceolata obtusiuscula v. subacuminata*, integerrima, *basi e cellulis elongatis laxiusculis plus minus hexagonis pellucidis v. fusco-striatis saepe interruptis laevibus superne rotundatis incrassatis tenuissime papillatis areolata*; perichaetia perfecte erecta appressa oblongo-lanceolata obtusiuscula vel intima breviter acutata, basi multo longiore tenuiter elongate anguste et pellucide reticulata; omnia nervo sub apice evanido tenui fuscescente, inferne latius superne anguste et profunde carinata; theca in ped. brevi rubente flexuoso erecta, *pyriformi-ovalis turgida, sordide fusca, profunde sulcata, ore coarctata, operculo*

conico breviter obliquo; perist. duplex, dentes externi 8 bigeminati lato-lanceolati divisi longiusculi obscure articulati et ruguloso-pallidi, sicci reflexi et thecae adpressi; interni: cilia 8 filiformia articulata conniventia albida.

Codonoblepharon Menziesii Schw. Suppl. II. p. 142. t. 137. — Brid. I. p. 594.

Patria. Nova Seelandia: Archibald Menzies. Inter *Leucod. hexastichum* a Cl. Pöppig in Chile lectum reperimus. Ibidem: Philippi.

Flos masc. in pl. propria graciliore terminalis crassiuscule gemmaceus, foliis perig. lato-ovatis acuminatis concavis, internis omnino fere tenuiter et pellucide reticulatis fuscis obsoletinervibus; antherid. longis crassis, paraphysibus longioribus acutis flavidis. — Areolatio folii *Z. pentastichi*, forma thecae *Z. conoidei*, species pulcherrima. Cilia perist. interni Schwägrichen 16 indicat, ipsi 8 tantum invenimus.

4. *Z. Schwägricheni* C. Müll. (Linn. XVIII. p. 669.); *dioicus*; late et dense cespitosus erectus subgracilis mediocris fastigiata ramosus, brunnescens; folia caulina laxa cespitosa erecto-patentia crispula, madefacta strictiora, flexuosa, e basi amplexicauli e cellulis hexagonis pellucidis teneris reticulata longe pellucida oblongo-lanceolata angustata longiuscula, superne e cellulis quadrate hexagonis pachydermibus firmis brunneis subopacis tenuissime papillosis areolata, apice obsolete denticulata v. integra, nervo crasso ferrugineo continuo; perichaetialia basi magis vaginantia pellucidiora.

Syrrhopodon dubius Schw. Suppl. IV. t. 312.

Patria. Nova Hollandia: G. Sieber.

5. *Z. papillatus* Mont. (Ann. d. sc. nat. 1845. p. 106.); *dioicus*; laxa cespitosus, inferne tomentoso-radiculosus, humilis tenuissimus filiformis erectus, siccitate apice incurvus, innovando ramulosus, flexuosus fragilis sordide viridis; folia caulina erecto-appressa crispula, madefacta erecto-patentia, parva, lanceolata mucronata, nervo longe

infra apicem evanido fusco subtenui, carinata, margine parum convexa, integerrima, papillis ubique sparsis tenuissimis scaberrima, e cellulis basi paucis laxis pellucidis superne rotundato-angulatis maxime incrassatis areolata, plus minus fuscescentia; perichaetialia similia basi cellulis laxis crebrioribus; theca in ped. brevi *tenuissimo* erecta *minuta* obovalis 8-striata *haploperistomata*, ciliis *internis octonis*, operculo oblique rostellato.

Patria. Chile australior, ad cort. arborum: C. Gay.

Z. obtusifolio maxime similis, sed notis cursive impressis species propria, pulcherrima. Perist. non vidimus et florem masculum nec in caule femineo nec alio invenimus.

6. *Z. obtusifolius* Hook. (Musc. Ex. t. 159.); *monoicus*; laxe cespitosus humilis tenuissimus filiformis erectus, siccitate apice incurvus, innovando ramulosus, flexuosus fragilis *aureus*; folia caulina erecto-appressa crispula, madefacta erecto-patentia, parva, *oblongo-ligulata obtusata*, papillis margine convexiusculo et ubique scaberrima, fusca, nervo *aureo crasso* longe infra apicem evanido, basi infima e cellulis rectangularibus paucis firmis superne maxime incrassatis minutis rotundate angulatis areolata; perichaetialia simillima intima breviora; theca in ped. brevi tenui erecta minuta perfecte pyriformis longicolla fusca, octies sulcata, operculo conico oblique et breviter rostellato; perist. *duplex: dentes externi 8 bigeminati breves lato-lanceolati dense articulati pallide lutei siccitate reflexi et thecae adpressi, interni: cilia octo cum dentibus alternantia filiformia subconniventia.*

Brid. I. p. 594. — Schwägr. Suppl. II. p. 140. t. 136.

Patria. Nepal: Gardner.

Flos masc. in ramo proprio longiusculo terminalis minutissime gemmaceus, foliis perig. lato-ovatis concavis breviter acuminatis, basi laxe et in seriebus obliquis superne rotundato-reticulatis, antherid. paucis parvis, paraphys. paucis brevibus teneris mixtis.

Sectio III. **Euzygodon.** Folia angusta, margine plus minus convexa, e cellulis rotundatis superne areolata papillosa complicata v. carinata, e basi erectâ reflexa v. squarrosa. Theca sulcata.

A. Folia integrâ.

a. Perist. nullum.

7. Z. viridissimus Brid. (I. 592. excl. Syn. Grimm. *Forsteri.*); dioicus; pulvinatus fastigiato ramosus dense foliosus intense viridis; folia caulina erecto-appressa subtorta, madefacta parum recurva perfecte lanceolata integerrima, nervo exanido, carinato-concava, marginibus convexiusculis, basi e cellulis tenerrimis pellucidis quadrate hexagonis superne rotundatis sublaevibus amoene viridibus areolata; perichaetialia similia; theca in ped. breviusculo flavido erecta, obovata brevicolla olivacea dein fuscescens obscure 8-striata, operculo conico oblique rostrato aurantiaco; perist. nullum.

Br. Eur. IV. p. 7. t. 1. excl. Syn. Weis. *Forsteri.* — *Gymnost. viridissimum* Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 10. tab. 6. excl. Syn. *Grimmia Forsteri.* — *Dicran. viridissimum* Sm. Musc. Brit. III. p. 1224. — *Bryum viridissimum* Dicks. Fasc. IV. Pl. Cr. p. 9. t. 10. f. 18.

Patria. In truncis arbor. sylvat., praeprimis quercuum et castanearum, per totam fere Europam mitiorem et calidiorem passim, rarius in muris et saxis. — **Vere.**

Flos masc. in pl. graciliore terminalis gemmiformis, foliis perig. externis ovato-lanceolatis, intimis ovato-acuminatis nervosis v. enervibus, antheridiis et paraphys. filiformib. copiosis. — Folia maxime ad illa *Eupottiarum* accedunt.

b. Perist. simplex.

8. Z. intermedius Br. et Sch. (Br. Eur. IV. p. 9.); sedem tenet inter *Z. viridissimum* et *Brebissoni*, peristomio simplici interno 8-ciliato. †.

In coll. Schimp. Abyss. species sub nom. eodem a Br. et Sch. edita est, cujus diagnosin huc damus: dioicus; dense cespitosus intertextus dichotome ramosus gracilis luteo-viridis; folia caulina madefacta recurva, lanceolata complicata, margine plicate convexa, integerrima subundulata, ubique e cellulis firmis pachydermibus basi

parum majoribus quadratis superne minutis subopacis rotundis tenuissime papillois areolata, evanidinervia; perichaetialia longiora angustiora apice falcata, basi laxius pellucidius reticulata; theca in ped. longiusculo erecta cylindraceo-pyriformis 8-sulcata longicolla, operculo e conico oblique subulato. — Pl. mascula vix gracilior, foliis perig. e basi late ovata concava colorata tenuiter reticulata breviter acuminatis obsoletinervibus; antheridiis longis stipitatis, paraphysibus tenuibus filiformibus mixtis. — An haecce species cum praecedente Novae Seelandiae conveniat, dubii sumus; quoad patriam vix credimus.

Patria. Nova Seelandia: Hb. Hooker.

9. **Z. anomalus** Dz. et Molkb. (Ann. d. sc. nat. 1844. p. 316.); *hermaphroditus*; humilis pulvinato-cespitosus erectus, innovando parce et fastigiato ramulosus, flavide viridis; folia recurvo-patentia inferiora erecto-patentia, sicca contorta, oblongo-lanceolata complicate carinata undulata *integerrima*, margine convexiuscula haud revoluta, ubique e cellulis firmis minutis subrotundatis flavidis infima basi quadratis areolata, nervo in apiculum breve excurrente; perichaetialia exteriora lanceolata recurvo-acuminata erecta, interiora breviora stricta ovato-lanceolata evanidinervia tenuius laxius pellucidius superne rotundate areolata; theca in ped. breviusculo luteo-rubro flexuoso erecta, *subpyriformi-ovalis basi plicata, exsiccata ore contracta et octies plicata* fusca, operculo conico-rostrato incurvo breviori; perist. *simplex: dentes 16 brevissimi basi membrana interiore thecae conjuncti, lineari-lanceolati horizontales, sicci erecti vix emersi teneri hyalini.*

Dozy et Molkb. Musc. Archip. Ind. IV. p. 92. t. 31.

Patria. Java: Korthals.

In foliis fila confervoidea repentina reperiuntur, unde nomen triviale ineptum. A *Z. tetragonostomo* notis laudatis differt.

10. **Z. cylindricus** Schimp. (in litt.); *dioicus*; laxo cespitosus conspicuus divisus, ad apicem usque tomento rufo obtectus; folia inferiora erecta, superiora e basi erecta patula et recurva, illa oblongo-lanceolata, haec lineari-lanceolata acuminata; perichaetialia erecta lineari-lan-

ceolata, haud vaginantia; omnia carinata; theca in ped. elongato erecta, elongato-cylindrica, longicolla, calyptra ad mediam thecam fere producta, operculo e basi conica subulato; perist. simplex internum, ciliis brevibus pallidis. †.

Patria. Mexico, Pico de Orizaba: Liebmann.

E generis majoribus et habitu ad *Z. tetragonostomum* et *Reinwardti* accedens; peristomio et thecae membrana huicce proximus.

11. *Z. Liebmanni* Schimp. (in litteris.); *dioicus*; folia erecto-patentia oblongo- et lineari-lanceolata, comalia e medio patula, margine integra, perichaetia erecta, haud vaginantia, ab externo ad internum sensim minora; theca in ped. mediocri erecta, obovato-oblonga brevicollis, operculo mediocriter rostellato; perist. simplicis externi dentes bigeminati breves obtusi fugacissimi. †.

Patria. Mexico, Pico de Orizaba ad arbor. truncos: Liebmann.

A *Z. Brebissoni* proximo differt: foliis densioribus minus patentibus, pedunculo brevior et crassior, theca solidior et peristomio simplici brevior.

12. *Z. stenocarpus* Tayl. (Lond. Journ. of bot. 1847. p. 330.); laxe cespitosus erectus uncialis subdichotomus; folia caulina imbricata patienti-recurva, sicca subappressa, lineari-lanceolata acuta, canaliculata integerrima, margine subundulata, evanidinervia, dense et maculate areolata; theca in ped. tenui stramineo erecta *cylindrica* striata obconice apophysata, operculo longirostro declinato; perist. *simplex internum* 16-ciliatum, membrana annulari cinctum. †.

Patria. Andes Quitenses, monte Pichincha: W. Jameson, Nov. 1846.

A *Z. viridissimo* statura altiore, theca cylindrica et peristomio differt.

c. *Perist. duplex.*

a. *Humiles.*

13. *Z. Brebissoni* Br. et Sch. (Br. Eur. IV. p. 8. t. 2.); *dioicus*; *Z. viridissimo* simillimus, sed folia magis

acutato - acuminata, nervo et pagina magis papillosa, theca pyriformi - oblonga longicolla, *praeprimis autem peristomio duplici*; externum e dentibus octo bigeminatis late planis pallide luteis subrugulosis fugacissimis, siccitate erectis densius articulatis compositum; internum ciliis brevibus fugacissimis albidis.

Z. conoideus Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 71. t. 21. excl. Syn. ! — *Bryum conoideum* Dicks. IV. Pl. Cr. p. 9. t. 11. f. 2. — *Mnium conoideum* Sm. Fl. Brit. III. p. 1345.

Patria. In arboribus pr. Inverary Scotiae: Dickson, pr. Manchester: Hobson; in Normandia c. *Z. viridissimo* commixtum legit De Brébisson.

14. **Z. Brownii** Schw. (Suppl. IV. t. 317.); *monoi-cus*; dense cespitosus humilis gracillimus radiculosus erectus fastigiato ramosus *luteo-viridis*; folia caulina parva *erecto-recurva oblonga v. spathulato-oblonga* acuta integerrima pellucida, nervo crasso ad ultimum apicem subevanescente lutescente, integerrima carinata, e cellulis *ubique subrotundis* areolata; perichaetialia similia erecta; theca in ped. breviusculo tenuissimo flavido erecta, *ovata, basi sensim attenuata*, sicca costata, badia; perist. *duplex*, externum dentibus 8 bigeminatis, internum ciliis 8 lanceolato-linearibus, e tribus cellulis compositis albidis. †.

Patria. Terra van Diemen: R. Brown.

Z. papillato ex ic. simillimus, sed notis cursive impressis longe distare videtur. Perist. externum imperfectum auctor vidit. Flores masc. terminales, post innovatum caulem laterales sessiles, foliis perig. duplo minoribus late ovatis concavis tenuiter reticulatis breviter acuminatis fuscis, antheridiis ovatis turgidis, paraphysibus aequalibus filiformibus acutis limpidis.

15. **Z. ventricosus** C. Müll. (Linn. XVIII. p. 668.); laxo cespitosus humilis laxo foliosus parce ramosus; folia *erecto-patentia lanceolata curviuscula, basi ventricos-concava*, integra s. cellulis margine prominulis, nervo excurrente; perichaetialia nervo evanido; theca e collo brevi

oblongo - elliptica, deoperculata ore plicato, 6-striata, breviter pedunculata, operculo conico brevi recto; perist. duplex: dentes externi lanceolati breviusculi latiusculi rugulosi, interni ejusdem formae illos aequantes, linea longitudinali instructi, pallidi.

Patria. Chile in ramis arborum: Philippi. Hb. Reg. Berolin.

β. *Elati.*

16. **Z. pentastichus** C. Müll.; *dioicus*; robustus elatus, caule repente valde tomentoso, ramis remotis ascendentibus saepe elongatis flexuosis simplicibus, innovationibus ramulosis; folia caulina sicca dense appressa pentasticha, madefacta squarroso - recurva, e basi erecta lata oblonga e cellulis elongatis pachydermibus pellucidis flavidis v. fuscis igitur fusce striatis flexuosis reticulatâ recurva, ovato - acuminata complicata plicata semel torta, minute areolata, utraque pagina tenuiter papillosa, integerrima; perichaetialia erecta lato - acuminata, intima e cellulis ubique elongatis laxiusculis diaphanis basi plus minus fusce striatis reticulata; omnia evanidinervia; theca in ped. breviusculo purpureo tortili crasso elongate cylindrica erecta brevicolla 8-sulcata fuscescens, operculo e conico subito subulato recto; perist. duplicis dentes ext. 16 lati carnosuli opaci rugulosi dense approximati robusti obtusiusculi linea longitudinali pallida divisi tessellati, interni: membrana ad basin externorum enata cellulosa, processibus irregularibus rugulosis, illis dense adglutinata; calyptra magna laevis straminea nitens.

Aulacomnion pentastichum Mont. Ann. d. sc. nat. 1845. p. 103. et in Gay Hist. de Chile Bot. Crypt. t. 5. f. 1.

Patria. Chile australis, ubi primus legit Pöppig, dein C. Gay.

Archegonia pauca, paraphysibus numerosis strictissimis intermixtis. — *Zygodon pulcherrimus*, e robustissimis, *Z. squarroso* soli proximus.

17. **Z. squarrosus** C. Müll.; laxe cespitosus subramosus, ramis erectis; folia caulina pentasticha laxa pa-

tenti-recurva latiuscule ovata integerrima acuta margine flexuosa; perichaetialia latiora erecta; theca in ped. longiusculo obovata subaequalis striata, operculo tenuiter longirostro; perist. duplex. †.

Aulacomnion flexifolium H. et W. Lond. Journ. of bot. 1846. p. 448. t. 15. — *Leptostomum squarrosum* Tayl. l. c. p. 43.

Patria. In Andibus Quitensibus, loca uliginosa habitans: W. Jameson legit altitud. 14000' ad Cayambe.

Ex animadv. Wilsoni habitu *Paludellae*, et *Aulacomn. pentasticho* Mont. proximus dicitur. Spec. Montagn. *Zygodon* verus est; speciem *Taylorianam* igitur ex analogia et icone huc retulimus. A prima foliis flexuosis angustioribus fide Wilson differt.

Non satis noti.

18. Z. angustatus Schimp. (in litt.); *polygamus*; dense cespitosus, tomento rufo ad apicem usque obductus; folia conferta, patentia lineari-acuminata, carinata, margine plana vel hic illic reflexa; theca in ped. breviora pallido suberecto elongato longicolla, operculo longe rostellato; perist. imperfectum. †.

Patria. Mexico, ad montem Orizaba: Liebmann.

Z. viridissimo proximus, primo intuitu theca elongata distinctus. — Flores masc. secus hermaphroditos et his similes, antheridiis et paraphysibus copiosis.

19. Z. Ehrenbergii C. Müll. (Linn. XVIII. p. 672.); *dioicus*; late et laxo pulvinatus subrobustus elatiusculus erectus, apice incurvo, valde fastigiatis ramulosus, luteo-viridis inferne ferrugineus, inter folia usque ad apicem radiculosus; folia dense conferta erecta parum torta, madefacta superne subrecurvo-patula, e basi subdecurrente angusta minute quadrate et pellucide reticulata brevi ovato-lanceolata complicate concava undulata, apice torsione unica obliqua, integerrima, margine convexiuscula, e cellulis minutissimis rotundatis viridissimis subopacis tenuissime papillosis areolata; perichaetialia similia; theca in ped. perbrevis octies sulcata.

Patria. Mexico: C. Ehrenberg.

Caetera desunt. Archegonia numerosa, paraphysibus brevioribus paucis filiformibus acutis pellucidis mixta.

20. Z. Schimperi Hmp. (C. Müll. in Linn. XVIII. p. 671.); *dioicus*; laxe cespitosus erectus elatus fastigiato-ramosus; folia caulina erecto-recurva, madefacta squaroso-reflexa, e basi late oblonga inferne longius laxius reticulata sensim lanceolato-acuminata subcuspidata, margine plerumque valde revoluta integerrima, nervo excurrente ferrugineo, e cellulis amoene flavidis maxime incrassatis minutis inaequaliter angulatis tenuissime subobsolete papilloso areolata; perichaetialia longe exserta, basi late amplexicauli multo tenuiora laxius longius tenerius et laeve reticulata apice reflexa; theca in ped. medio purpurascens pyriformi-ovalis.

Patria. Abyssinia: W. Schimper Coll. No. 428.

Archegonia pauca, paraphysibus numerosis strictis acutis flavidis mixta. Fructus imperfectus fuit.

B. *Folia dentata.*

a. *Perist. nullum.*

21. Z. tetragonostomus A. Br. (Br. Eur. IV. p. 9.); *hermaphroditus*; folia serrulata; theca quater striata, sicca evacuata tetragona, gymnostoma. †.

Patria. Java: Blume.

22. Z. trichomitrius Hook. et Wils. (Lond. Journ. of bot. 1846. p. 143. t. 4. B.); laxe cespitosus ultrauncialis parce dichotome ramosus, inferne radiculis purpureis tomentosus, ramis erectis; folia caulina laxiuscula, sicca subcrispata, patula subrecurva flexuosa linearia apiculata carinata, margine subrecurva, apice minute denticulata luteo-viridia, inferiora fusca, punctiformi-areolata; perichaetialia erecta latiora; vaginula pilosa, theca in ped. brevi erecta, elliptico-oblonga gymnostoma, ore angustata, sicca plicata, fusco-badia, operculo e conico subulato subobliquo thecam dimidiam aequante; *calyptra pilis lutescentibus hirta*. †.

Patria. Prom. b. spei, ad trunc. arbor. sylvar. Grootvaterbosch dictarum, in districtu Zwellendam: Zeyher.

Ex animadv. auct. *Z. viridissimo* proximus dicitur.

b. *Perist. simplex.*

23. Z. Reinwardti A. Br. (Br. Europ. IV. p. 9.); *hermaphroditus v. polygamus*; laxe cespitosus inferne tomentosus elatiusculus parce ramosus ascendens; folia longe decurrentia, laxe imbricata erecto-patentia, *madefacta magis patula erecta*, lanceolata flexuoso-undulata, apice parce et remote dentata, convexiuscula complicato-carinata, rarius torta, margine haud revoluta, ubique e cellulis rotundatis firmis tenuissime papillosis haud opacis areolata, nervo excurrente mucronulata; perichaetialia interiora parum latiora erecta lanceolato-acuminata evanidinervia multo tenuiora, basi rotundata multo laxius tenerius pellucidius et colorate reticulata integra; theca in ped. elongato flavido tenuissimo erecta *subcylindraceo-elliptica microstoma* 8-sulcata fuscescens, operculo conico subulato obliquo; perist. simplex internum, e ciliis *sedecim* formatum.

Syrrhopodon Reinwardti Hsch. Nov. Act. Phys. Med. Acad. Leop. XIV. II. p. 700. t. 39. — Schwägr. Suppl. IV. t. 312.

Patria. Java: Reinwardt.

A sequente notis cursive impressis refugit. Flos paraphysibus numerosis acutis praeditus.

24. Z. Moritzianus C. Müll. (Linn. XIX. p. 199.); *dioicus*; laxe cespitosus inferne tomentosus elatiusculus parce ramosus erectiusculus; folia laxe imbricata erecto-patentia, madefacta *plus minus recurva*, lanceolata flexuoso-undulata, apice parce et remote dentata, convexiuscule complicato-carinata, semel torta, margine haud revoluta, ubique, cellulis basis infimae laxioribus pellucidioribus exceptis, minute rotundate subopace areolata, minutissime papillosa, nervo in mucronulum brevissimum acutum producto flavido; perichaetialia erecta lanceolato-acuminata breviora tenuiora inferne pellucidius longius laxius reticulata, superne integra; theca in ped. elongato

flavido tenuissimo erecta, *cylindrica longiuscula subcurva* 8-sulcata olivacea, dein fusca, operculo conico longe subulato incurvo; perist. simplex internum, e ciliis octo tenerrimis filiformibus fugacissimis formatum.

Patria. Columbia, prov. Merida, in montibus nivosis: Moritz.

Archegonia c. 10, paraphysibus numerosis filiformibus acutis flavidis mixta. Calyptra glabra. — Habitus *Z. Reinwardti*, a quo foliis semper reflexis, inflorescentia dioica et perist. 8 — ciliato facile distinguitur.

25. *Z. denticulatus* Tayl. (Lond. Journ. of bot. 1847. p. 329.); laxe cespitosus erectus dichotomus 1 — 2-uncialis viridis; folia caulina imbricata subquarroso-patentia oblongo-ovata, apice denticulata, dense areolata, margine flexuosa, nervo apiculata; theca erecta ovata basi obconice strumosa (i. e. collo praedita?), sicca striato-costata, operculo subulato; perist. simplex *brevissimum*: dentes 16 *valde irregulares subtriangulati acuminulati* pallidi. †.

Patria. Andes Quitenses; monte Pichincha: Will. Jameson, Nov. 1846.

Ex animadv. auctoris habitu *Z. viridissimi*.

Non satis noti.

26. *Z. Sullivanti* C. Müll.; laxe cespitosus erectus elatus ascendens flexuosus *gracillimus*, ramis *inaequalibus remotis tenuissimis* divisus; folia laxe imbricata erecto-patentia, flavida, e basi lata ovato-acuminata, complicate concava, parum reflexa, margine *inferne valde revoluta*, *superne inaequaliter serrata*, nervo excurrente mucronulata, basi infima e cellulis anguste rectangularibus paucis fuscis laxioribus superne rotundatis valde incrassatis tenuissime papillosis areolata.

Syrrhopodon? excelsus Sulliv. in Musc. Allegh. Exs. No. 170. sterilis.

Patria. In summo cacumine montis Grandfather Carolinae septentrionalis, arboreus: Sullivan.

27. Z. campylophyllus C. Müll.; *dioicus*; laxe cespitosus elongatus gracilis flexuosus, ramis dichotomis longis pluries divisus, intense viridis inferne tomento radiculoso ferrugineus; folia erecto-patentia crispula, madefacta valde arcuato-reflexa, saepe circulum fere delineantia, longiuscula, e basi decurrente lanceolata, nervo excurrente mucronulata, apice grosse et irregulariter serrata, carinata, marginibus perfecte convexis igitur veluti revolutis, ubique e cellulis minutis rotundatis tenuissime papilloso haud opacis areolata, flavida; perichaetia similia; theca in ped. breviusculo erecta, anguste longe pyriformi-oblonga 8-sulcata.

Bartramia brachypus Schimp. in Hb. Schlechtend.

Patria. Mexico: C. Ehrenberg.

Sectio IV. **Ulozygodon.** Folia angusta flexuosa patula, parum reflexa, superne rotundate areolata, crispula v. spiraliter torta, carinata. Theca sulcata.

28. Z. Lapponicus Br. et Sch. (Br. Eur. IV. p. 6.); *monoicus*; late et laxe cespitosus gracilis plus minus elatus, ramis dichotomis paucis erectis gracilibus; folia crispata, madefacta patula, oblongo-lanceolata angusta curvata, acutata, evanidinervia integerrima, margine non revoluta, basi e cellulis parvis subquadratis pellucidis teneris superne minutissimis valde chlorophyllosis viridissimis maxime opacis areolata, tenuissime papillata; perichaetia e basi angustata superne latiore elongate vaginante tenuiter plus minus pellucide reticulata breviter acuminata laevissima, nervo longe infra apicem evanido; theca in ped. breviter exserto stricto pyriformi-ovalis 8-sulcata, siccitate urceolata, operculo e conico subito oblique breviter subulato.

Anoetang. Lapponicum Hdw. Sp. Musc. p. 40. — *Gymnostom. Lapponicum* Hdw. Musc. Fr. III. p. 12. t. 5. — *Hedwigia Lapponica* Brid. Musc. Rec. II. p. 33. — *Gymnost. striatum* Brid. I. p. 90. — *Schistidium striatum* ej. Mant. Musc. p. 22. — *Bryum Lapponicum* Dicks. IV. Pl. Cr. p. 10.

Patria. In rupium fissuris per alpinas regiones totius Europae non raro, in America septentrionali: Drummond. — Aug., Septbr.

Flos masc. parvus, foliis patulis lato-ovatis breviter acuminatis convolutis tenero-reticulatis intimis enervibus, antheridiis cum vel sine paraphysibus.

29. Z. Mougeotii Br. et Sch. (Br. Eur. IV. p. 7.); dioicus; habitus praecedentis; folia lanceolata acute acuminata angustiora longiora, crassius nervosa, ubique e cellulis incrassatis vix vel nunquam opacis plus minus flavidis et quadratis sublaevibus areolata, margine revoluta; perichaetialia longe et sensim acuminata amplexicaulia non convolute vaginantia ut caulinia areolata, intima margine non revoluta, subexcurrentinervia; theca in ped. longius exserto, operculo longius rostrato.

Patria. Ad rupes catarractae „Cascade du Mont Dore” Averniae, pulcherrime fructificans, dein lectus pr. Zell am See Pinzgoviae alp. Salisb., in Tirol, Vogeso et Norvegia, unde nobiscum communicavit Hübener. — *Aestate.*

Flos masc. in pl. propria terminalis gemmiformis, fol. perig. externis ovato-lanceolatis non recurvis, antheridiis paucis, paraphysibus nullis.

30. Z. curvipes C. Müll.; dioicus; humilis, ramis fastigiatis brevibus dense approximatis; igitur caule crasso; folia caulina involuto-torta, e basi oblonga cellulis parvis pellucidis teneris quadratis reticulata angustissime linearia acuminata flexuosa, nervo crasso fusco excurrente acutata, apice obsolete denticulata, medio margine parum revoluta, superne e cellulis minutis incrassate quadratis sublaevibus non opacis areolata; perichaetialia interiora subvaginantia, basi longa laxa pellucide et tenuiter reticulata longe acuminata; theca in pedunculo vix exserto versus apicem sensim crassiore arcuato globosa 8-sulcata.

Anoetang. Lapponicum Kze. in Holl. Coll. Pl. ins. Madeirae.

Patria. Insula Madeira: Holl.

A *Z. Mougeotii*, cui structura folii proxima, notis cursive impressis certe distat, a *Z. Lapponico* foliis caulinis multo angustioribus longe acuminatis excurrentinervibus non opacis obsolete denticulatis, perichaetialibus

longissime acuminatis, pedunculo thecae forma et inflorescentia longe refugit.

31. Z. cyathicarpus Mont. (Ann. d. sc. nat. 1845. p. 106.); *monoicus*; humilis ramis fastigiatis gracilioribus laxè dispositis; folia caulina involuto-torta, e basi oblonga angustissime linearia, *ubique distincte sed remote dentata, evanidinervia*, basi e cellulis pellucidis parvis quadratis teneris paucis subito minoribus viridibus subopacis tenuissime papillois areolata, margine inferne parum revoluta; perichaetialia e basi late ovato-oblonga inferne elongate laxè pellucide tenerrime superne firmiter reticulata *margine denticulata* subvaginantia, caeterum superne caulinis simillima; theca in ped. breviter exserto *stricto* breviter pyriformis 16-striata, *sicca evacuata cyathiformis*, operculo plano-convexo oblique et obtuse apiculato.

Mont. in Gay. Hist. de Chile Bot. Crypt. t. 3. f. 1. — *Gymnost. linearifolium* Tayl. Lond. Journ. of bot. 1846. p. 42. ex obs. Wilsoni l. c. p. 447. huc pertinet. — *Syrrhopodon tortuosus* Hsch. in Musc. Capens. Linn. XV. p. 117.

Patria. Chile, ad S. Antonio in terra nuda: C. Gay. Augusto. Ex Andibus, monte Pichincha habuit Taylor. Prom. b. sp., monte Diaboli: Ecklon.

Flos masc. ad pedem feminei crassiuscule gemmaceus, foliis e basi late ovata concava tenerrime et pellucide reticulata margine denticulata subito anguste subulata integra, antheridiis majusculis. — *Z. Lapponico* valde similis, magis autem e structura folii *Z. Mougeotii* v. *curripedi*, a quibus notis cursive impressis facile distinguitur.

32. Z. torquatus Liebm. (in Wickström Jahresber. Deutsch v. Beilschm., für 1839 — 42. p. 430.); *dioicus*; dense cespitosus, sed laxè cohaerens erectus elatus gracilis fasciculato-ramosus, amoene viridis inferne fuscescens s. brunnescens; folia caulina *in spiram contorta erecta subappressa*, madefacta subpatentia, lanceolato-acuminata complicate carinata, ubique e cellulis minutis rotundatis incrassatis firmis subopacis tenuissime papillois areolata, integerrima *nerve in superioribus in pilum*

breve saepe producto; theca Z. Lapponici, sed obsolete striata, operculo breviori erectiori.

Dryptodon torquatus Brid. I. p. 772. — *Grimmia torquata* Hsch. Grev. Scot. Crypt. Fl. n. 40. t. 199. — *Gr. torta* Br. Germ. II. I. p. 179. t. 24.

Patria. In alpibus summis Carinthiae, ubi ad rupes praeruptas detexit Hornschuch, Tirolis et Helvetiae, in Scotia, Norvegia, in Rocky Mountains Americae septentrionalis et Islandia, ubi ad fontes vulcanicos calidos fertilem legit *Steenstrup*.

Fructum non vidimus. *Grimmiae spirali* habitu similis.

Sectio V. **Anoectangium** Hdw. Sp. Musc. I. p. 40. — Br. Europ. Fasc. 29 — 30. *Anoectangiaceae*. — Folia angusta plus minus lanceolata superne dense areolata. Theca laevis. Infloresc. dioica. — E structura folii quam fructus situ laterali ad *Zygodontes* certe pertinens.

A. *Folia brevia tenella.*

33. Z. compactus C. Müll.; *compacte cespitosus elatus* gracilis *fragilis* dichotome ramosus, amoene viridis inferne ferrugineus et radiculosus; folia remota superne confertiora spiraliter tortilia, madefacta patentia, lanceolata, nervo excedente mucronulata, carinata, ubique e cellulis quadratis firmis superne minutissimis subopacis areolata, tenuissime papillosa, margine igitur plus minus eroso-denticulata; perichaetialia e basi late vaginante acuminata evanidinervia longius tenerius laxius laeve reticulata, externa brevia lato-lanceolata acuminata; theca in ped. breviusculo supra cespitem exserto flavido tenui erecta minuta ovali-oblonga, operculata subpyriformis collo distincto, operculo longe subulato valde obliquo tenuissimo.

Anoectangium compactum Schw. Suppl. I. I. p. 36. t. 11. — Br. Europ. 29 — 30. p. 5. t. 1. sub nom. *An. aestiri*. — *Gymnost. compactum* Schleich. Cr. Helv. Cent. II. n. 7. — Brid. I. p. 86. — *G. aestirum* Hdw. Sp. Musc. p. 32. t. 11? — *G. tristichon* Wahlenb. Fl. Lapp. p. 303. — *G. luteolum* Engl. Bot. t. 2201. fide Hooker.

Patria. In rupibus humidis umbrosis, praeprimis micaceo-schistosis per totius Europae regionem alpinam. — *Auctumno.*

Pl. mascula femineae similis, floribus axillaribus numerosis solitariis v. aggregatis. Folia perig. cum v. sine nervo, caulinis tenuiora, e basi ovata concava acuminata; antheridia eparaphysata.

34. Z. pusillus C. Müll. (Linn. XIX. p. 200.); cespites *pusilli* basi compacti ramis ascendentibus brevibus laxissimi; caulis ex apice innovans ramosiusculus gracillimus; rami *apice incurriusculi*; folia sicca spiraliter torta, *oblongo-lanceolata apicem versus parum dilatata* mucronata excurrentinervia, superne e cellulis minutissimis *maxime opacis* basi pallidioribus majus rotundatis areolata, *utraq. pagina et nervo valde conspicuo-papillata*, margine igitur perfecte crenulata; perichaetialia externa late lanceolata acuminata, interiora convolutacea acuminata, tenerius laxius pellucide laeve areolata, evanidinervia; theca in ped. longiusculo tenui flavido erecta ovalis *minor* brevicolla fusca, operculo longe subulato obliquo.

Anoetang. Breutelianum Br. et Sch. Fasc. 29—30. p. 6. memoratum? — *Gymnostom. Guadeloupense* Spr. Syst. Veget. IV. I. p. 145. — *G. euchlorum* Schw. II. 2. p. 83. t. 176. — *G. Mascholocarpus* Mont. in sched. ad De Notaris. — *G. lamprocarpum* Mont. Ann. d. sc. nat. IX. 1838. p. 49.

Patria. Insulae Antillarum, ubi in Guadeloupe primus legit Bertero, et in Mexico: Deppe et Schiede.

Planta tenella ramis apice curvatis gracillimis haud fragilibus amoene luteo-viridibus primo momento a *Z. compacto* distat.

35. Z. tenerrimus C. Müll.; *densissime compactus* humilis lutescenti-viridis, inferne sensim ferrugineus zonatus, caulis *tenerrime filiformis*, innovando ramosus; folia caulina *minutissima parum torta*, inferiora oblonga *obtusa brevia minus opaca*, nervo carinato ante apicem evanido, superiora et perichaetialia longiora acuta, nervo subexcurrente, illa modo caulinorum integerrima, haec basi latiora *haud convolutacea, sed amplexicaulia laxius*

areolata ad medium tenuissime crenulata; theca in ped. supra cespitem longiuscule exserto tenuissimo flavido subinclinata v. recta minutissima ovalis brevicolla fuscescens, operculo conico subulato obliquo, calyptra minuta tenera.

Anoectang. tenerrimum C. Müll. Bot. Zeit. 1847. p. 801. — *Gymnost. laxifolium* Kze. in Pöpp. Pl. Chil. Coll. III. 268(53).

Patria. Chile australis, in truncis arborum et rupibus ad Antuco: Pöppig.

A *Z. pusillo* affini caule filiformi tenuissimo jam primo intuitu differt.

B. *Folia longa robusta.*

36. Z. Hornschuchianus C. Müll.; late et plus minus dense cespitosus elatus robustus pluries dichotome ramosus luteo-viridis, mollis, inferne pallide ferrugineus, radiculosus; folia caulina laxe conferta subcrispula erecta, madefacta subpatula longa, e basi longiuscula erecta lato-ovata anguste pellucide subelongate hexagono-reticulata margine denticulatâ parum reflexa lanceolata acutiuscula subsubulata canaliculata, e cellulis minutis rotundato-quadratis subopacis sublaevibus areolata, integerrima, excurrentinervia; perichaetialia e basi multo latiore subvaginate laxius reticulata margine distinctius eroso-denticulata subito longe subulata; theca in ped. brevi flavido inferne purpurascente erecta, globoso-pyriformis pallide olivacea, operculo longe subulato obliquo basi aurantiaco, evacuata fusca.

Anoectangium Hornschuchianum Hoppe in Regensb. bot. Zeit. 1819. I. p. 83. et 1820. I. p. 182. — Br. Europ. 29—30. p. 6. t. 2. — *Gymnost. Hornsch.* Fk. in Br. Germ. I. p. 176. t. 11. — Brid. I. p. 88. — *Hedwigia Hornsch.* Hook. Musc. Ex. t. 103.

Patria. In alpibus Carinthiae pr. Heiligenblut, ad cataractas Gössnitzfall et Leiterbachfall, ubi in locis perpetuo irroratis imperviis primus legit Hornschuch, anno 1816. E rarissimis! — *Augusto, Septembri.*

Flores masculi numerosi aggregati, raro solitarii. Caetera sectionis. — Pl. pulcherrima, cum alia specie nunquam confundenda.

37. Z. Sendtnerianus C. Müll.; habitus praecedentis, sed caule fragili *humiliore* minus radiculoso, folia ejusdem innovationis sensim majora *lineari-lanceolata robustiora et robustius basi magis quadrate et firme areolata, ubique integerrima, dense conferta subfasciculata magis glaucescentia*; perichaetia angustiora; theca in ped. longiore supra cespitem exserto *parva oralis brevicola*.

Anoetang. Sendtnerianum Br. et Sch. Br. Eur. 29 — 30. p. 7. t. 3. — *Gymnost. Hornschuchianum* Br. Germ. I. p. 178, loco Rauris indicatum.

Patria. In alpibus Salisburgiae „in der Rauris prope dem Tauernhaus“, ubi leg. Funk et Laurer; in alpibus Julicis, loco Pad Mangerskaskala, altitud. 6000': Sendtner legit 14. Junio 1843.

A praecedente certe distat.

Zygodontes?

Didymodon? papillatus Hook. et Wils. (Lond. Journ. 1844. p. 544.); elongatus ramosus; folia patentirecurva solidinervia papillosa, sicca erecta subincurva. †.

Leskea rubricaulis Tayl. mst.

Patria. Terra Van Diemen.

Musculus ex animadv. auct. excellens, habitu *Leskeae* perichaetiis autem terminalibus, innovationibus attamen lateralibus.

Gen. XII. **Drummondia** Hook.

Drumm. Musc. Americ. No. 62. — *Macromitrium* Schwägr. et C. Müll. — *Leiotheca* Brid. — *Orthotrichum* Hook. — *Gymnostomum* Hdw. — *Hypnum* Dill.

In memoriam perpetuam *Drummondi*, bryologi indefessi et peregrinatoris Americae septentrionalis scrutantis genus conditum, egregium, prius a nobis errantibus deletum.

Calyptra *dimidiata magna, thecam juvenilem superans, late concava, amoene straminea laevissima nitida*, primum ut in *Schlotheimiis* conica. Pe-

ristomium simplex, dentibus sedecim brevissimis, veluti imperfectis truncatis, integris, linea longitudinali tenuissima notatis, dense trabeculatis rufis leptodermibus laevibus.

Habitus *Amphidii* generis *Zygodontis*, pedunculo autem certe terminali et theca laevi.

a. *Folia perichaet. caulinis similia.*

1. **Dr. clavellata** Hook. (l. c.); dioica; pulvinuli pusilli densi longe et late extensi depressi, amoene virides, dein sordidi vel inferne nigricantes, surculis longe repentibus brevissime ramosis; folia caulina dense imbricata appressa, madore erecto-patentia, late ovato-lanceolata, brevia, obtuse acuta, margine erecto v. parum involuta-ceo, cellulis ubique rotundis firmis viridibus, concava, nervo carinato evanido; perich. conformia, basi cellulis magis quadratis; theca in ped. brevi recto subgloboso-ovata laevissima turgida leptodermis fusca, operculo oblique rostrato, annulo nullo.

Macromitr. (Chaenomitrium) clavellatum C. Müll. Bot. Zeit. 1845. p. 523. — *Macromitr. clavellatum* Schw. Suppl. II. 2. p. 130. — *Leiotheca clarellata* Brid. I. p. 728. — *Orthotrichum clavellatum* Hook. et Grev. Brewst. Edinb. Journ. I. p. 114. t. 4. — *Gymnost. prorepens* Hdw. Sp. Musc. p. 35. t. 3. f. 1—4. — *Anodontium prorepens* Brid. Sp. Musc. I. p. 41. — *Hypnum clavellatum parvum*, repens. setis brevibus. Dill. Musc. p. 551. t. 85. f. 17!

Patria. America septentrionalis, ad corticem arborum in Marylandia, Virginia et Carolinis.

b. *Folia perichaet. caulinis dissimilia.*

2. **Dr. obtusifolia** C. Müll.; monoica; longe repens, ramis densius approximatis brevibus viridissimis, inferne sordidis, brevissime fastigiatim ramulosis, apice curviusculis, tenuibus; folia subrecta, madore erecto-patentia, e basi latiuscule ovata ad insertionem laxiuscule reticulata biplicatâ angustate lanceolata acuta, strictiuscula, nervo canaliculato-carinato, ante apicem evanido, margine basi distincte involuto apice erecto, rotundate areolata viridissima; perich. latissime ovato-ligulata obtusa, intima

basi laxissime reticulata; theca in ped. brevi ovata magna laevis leptodermis sordide fusca, calyptra glabra.

Macromitr. clavellatum Kze. in Pöpp. Pl. Chil. No. 16.

Patria. Andes Chilenses: Pöppig 1826.

Flos masc. ad basin feminei crassus, fol. perig. latissime ovatis obtusis v. breviter ligulatis obtusatis, inferne laxe reticulatis subseminervibus, antherid. magnis, paraphys. copiosissimis superne brevissime articulatis elongatis flexuosis. Operculum, calyptra matura et theca perfecta desunt. — Species praecedenti maxime similis. Calyptram quidem maturam nondum vidimus, species tamen procul dubio huc certe pertinet. Dentes praecedentis.

Gen. XIII. **Orthotrichum** Hdw.

Musc. Frond. II. p. 96. — *Brachytrichum* et *Orthotrichum* Röhl. — *Grimmia* et *Weisia* al. — *Polytrichum* Dill. — *Hypnum* antiq.

Ab ὀρθός rectus et θρίξ capillus, propter pilos calyptrae saepius hirtae rectos nomen conditum.

Calyptra *companulata plicata*. Peristomium nullum, simplex v. duplex; externum e dentibus **32 geminatis (16) vel bigeminatis (8)**, rarius sedecim integris haud fissis, granulosus carnosulis s. fragilibus, plerumque pallidis, rarius aurantiacis, erectis, dein reflexis, sub ore thecae oriundis compositum. Internum: *cilia 8 vel 16*, simplicia hyalina v. dentibus (rarius tamen) similia. Vaginula ochracea. Infloresc. monoica v. dioica. Theca exannulata, plus minus pyriformis sulcata rarius glabra, operculo cupulato-conico.

Sectio I. **Orthophyllaria.** Folia erecto-appressa, sicca atque madefacta erecta stricta.

A. *Folia margine plus minus involuto.*

1. **O. obtusifolium** Schrad. (Crypt. Gew. p. 14.); *dioicum*; dense pulvinatum *humile turgescens compactum lu-*

tescenti-viride breviter et parce dichotomum; folia caulina *arcte appressa*, madefacta erecto-patentia brevia, e basi breviter erecta ubique regulariter parenchymatice reticulatâ parum recurva, *oblongo-ligulata obtusata* evanidinervia, margine erecto subinvolutaceo, apice dein canescentia, superne grosse elliptico-areolata diaphana grosse papillosa; perich. majora latiora plicata; theca terminalis brevipedunculata immersa, e collo longo ovalis late 8-striata, operculo acute cupulato; perist. ext. dentes lanceolati 8 bigeminati rubelli apice saepe pertusi, int. cilia 8 breviora e cellul. serieb. 2 composita carinata rufescentia; calyptra ampla straminea, apice badia, plicata, basi sublacerata, ubique scabra.

Br. Eur. 2—3. p. 13. t. 1. — Brid. I. p. 287. — *Weisia obtusifolia* Roth. Tent. Fl. Germ. III. I. p. 218. — *Orth. gymnostomum* Blytt in sched. pr. Christianiam lectum.

Patria. Ad trunc. arborum campestrium per magnam partem Europae, sed raro fertile. — *Aprili—Junium.*

Pl. masc. multo gracilior, floribus terminalibus, innovando lateralibus sessilibus gemmaceis; fol. perigon. caulinis similia minora convolutacea, intima multo tene-rius reticulata fusca obsoletinervia; anth. longe stipitata majuscula, paraphys. filiformibus flavidis. Folia fila breviter articulata saepe efficientia.

2. *O. gymnostomum* Bruch (Brid. I. p. 782.); *dioicum*; praecedenti simillimum, sed laxius pulvinatum, robustius, folia caulina *margine toto ambitu valde involuto, apice igitur cochleariformi-concava, ubique fere e cellulis rhomboidaliter angulatis tenuissime papillosis obscuris* areolata, majora, *latius ligulata*; perich. acutiora; theca immersa *oblonga gymnostoma* substriata; calyptra nuda v. parce pilosa ubique scabriuscula basi sublacera.

Br. Europ. 2—3. p. 8. t. 1.

Patria. Ad *Populum tremulam* sylvae unicae pr. Bipontum: Bruch. — *Martio et initio Aprilis.*

Infloresc. praecedentis, quocum notis illustratis nunquam confundi potest, pulcherrima species, alibi forsitan praetervisa.

3. **O. inflexum** C. Müll.; dioicum; *O. obtusifolio* simillimum; folia caulina oblongo-lanceolata *angustate ligulata acutiuscula, apice plus minus inflexo*, margine erecto v. parum involuto, e cellulis *grossissimis angulatis tenuiter papillosis ubique areolata*; perich. caulinis majora latiora *basi firma*; theca vix emersa cylindrico-oblonga striata, operc. acute cupulato, perist. et calyptra *O. obtusifolii*.

O. Rogeri Br. et Sch. in correct. Musc. Drumm. Lond. Journ. of bot. 1843. p. 667. — *O. obtusifolium* Hook. Drumm. Musc. Amer. No. 157.

Patria. E Canada usque ad Rocky-Mountains transiens: Drummond.

4. **O. plicatum** P. B. (Prodr. p. 81.); monoicum; tenellum repens, ramis erectis, sterilibus simplicibus, fertilibus parce et breviter dichotomis, *teretibus gracilibus tenuibus acuminatis densifoliis*; folia caulina laxius imbricata *oblonga obtusa, juniora submucronata*, sicca complicata paulum tortilia mollia et obesa, superne e luteo viridia, inferne e viridi fuscescentia, nervo crasso ad apicem vix perdurante ferrugineo, minute rotundate areolata; perich. ovato-lanceolata, interna minora teneriora; theca in pedunculo *vaginula longa exserta* cincto exserto brevi tenuissimo minuta *subgloboso-pyriformis brevicolla*, sulcis subsenis exarata, brunnea, ore rufescens, operc. breviter apiculato, calyptra conico-campanulata integra non plicata sursum pilosa thecam omnino obtegente; perist. dentes 8 bigeminati breves lati, sicci reflexi, pallidi, cilia 8 linearia albida simplicia articulata. $\frac{1}{4}$.

Schwägr. Suppl. III. II. p. 18. t. 52. — *Ulota plicata* Brid. I. p. 303.

Patria. Insula Franciae, ad arbores: *Aub. du Petit-Thouars*.

Ex animadv. Schwägricheni flores masculi rari ad apices ramulorum, fol. ex ovato brevius acuminatis v. ovato-lanceolatis, quandoque denticulatis, paraph. paucis ter articulatis. — Ex habitu *Z. obtusifolio* simile esse videtur.

Species obscurae.

? **Orth. submarginatum** Brid. (I. p. 792.); elongatum fastigiate ramosum; folia oblonga obtusa, apice subundulata, insuper margine tenui ex unica cellularum serie composito, nervo continuo. †.

Patria. Insula Terre Neuve: La Pylaie.

In Hb. Brideliano non vidimus.

B. *Folia margine erecto.*

5. **O. crassifolium** Hook. et Wils. (Lond. Journ. 1844. p. 546.); *monoicum*; laxè pulvinatum humile parce et breviter ramosum sordide viride v. fuscescens; folia caulina erecto-appressa, madefacta erecto-patentia *ovato-lanceolata obtusiuscula, carnosà*, margine erecto, ubique e cellulis subparenchymaticis, *superne minutis obscuris inferne majoribus magis rectangularibus crassis areolata, laevia*, nervo crasso fuscescente evanido; perich. majora; theca breviter exserta *subgloboso-pyriformis brevicolle*, orificio dilatato, obsolete striata, operculo breviter apiculato, perist. simplici: dentes 16 geminati longiuscule lanceolati *carnosi flaviduli*, praesertim *margine eroso-rugulosi*, calyptra parva conico-campanulata *nuda fusca basi subintegra sulcato-plicata*.

β. acutum; foliis acutioribus, theca subimmersa.

Patria. Insulae Eremitae, Aucklandi et Falklandi.
Var. *β.* in Terra Kerguelen: J. D. Hooker.

Species solitaria, ex habitu *O. psychrophilo* Mont. haud dissimilis, flore masc. axillari, fol. perig. late ovatis breviter acuminatis, inferne teneris coloratis, superne carnosulis, anth. longis angustis, paraph. longis filif. mixtis.

6. **O. angustifolium** Hook. et Wils. (Lond. Journ. 1844. p. 547.); *O. crassifolio* simile, nigricans, folia *anguste lanceolata evanidinervia, vel subulata, nervo in subulam carnosulam obscuram acutiusculam subcontinuo, e cellulis ubique mollioribus haud incrassatis areolata*; theca immersa *subsessilis elliptica*, operc. rostellato, perist. simplici: dentes sedecim.

Patria. Insula Campbelli antarctica: J. D. Hooker.
Fructum non vidimus.

C. *Folia margine revoluta.*

7. **O. Hutchinsiae** Hook. et Tayl. (Musc. Brit. p. 73. t. 21.); *monoicum*; dense pulvinatum sed laxè cohaerens teretiusculum densifolium breviter et parce ramosum sordide viride inferne fuscescens rigidum; folia caulina erecto-appressa, madefacta erecto-patentia stricta oblongo-lanceolata saepe plus minus incurva, subcomplicate carinata, margine convexa vel parum revoluta, ubique incrassate areolata, perich. conformia; theca longe exserta ovali-oblonga 8 striata fuscidula, operculo acute conico, calyptra conico-campanulata pallide pilosa; perist. dentes 8 bigeminati, pallidi rugulosi, sicci reflexi, cilia 8 subduplicia hyalina subaequantia.

Br. Eur. 2—3. p. 20. t. 10. — Brid. I. p. 277 et 720. — *O. Americanum* P. B. Prodr. p. 80 et Schwägr. Suppl. II. p. 144. tab. 138. — *O. strictum* Brid. I. p. 289. — *Ulota nigricans* Brid. I. p. 792, colore nigricante fusco-luteo.

Patria. Ad rupes, rarius ad radices arborum, in montosis per totam fere Europam et Americam borealem. In comitatu Wicklow Hiberniae prima legit Miss Hutchins. — *Julio.*

Flores masc. axillares sub femineum positi crasse gemmacei, fol. perig. late ovato-acuminatis seminervibus ubique fere incrassate areolatis, anth. longis angustis, paraph. longis aureis tenuibus.

8. **O. nigrum** Br. et Sch. (Br. Eur. 2—3. p. 11. t. 4.); *monoicum*; *O. Hutchinsiae* simile, sed gracilescens, inferne nigricans superne laete viride, folia margine revoluta, nervo ad apicem usque producto, punctulate areolata, vaginula pilosa, theca longe exserta *parva subpyriformis brevicolla*, pallide fusca, 8 striata, sicca ore constricta, operc. conico pallido, calyptra campanulata straminea pilosissima fusca $\frac{2}{3}$ obtegente; perist. dentes 16 geminati per paria approximati serius partim divisi punctulato-lutei, sicci patuli, cilia *nulla*. †.

Patria. Ad rupes in loco „Rofflen” dicto pr. Andeer m. Splügen Rhaetiae: A. Braun 1825; rarissimum. — *Aestate.*

9. *O. Pylaisaei* Brid. (l. 722 et 790.); *monoicum*; dense pulvinatum compactum erectum elatiusculum parce dichotomum rigidum densifolium sordide viride inferne ferrugineum; folia caulina late ovato-lanceolata obtusiuscule acutata canaliculata, margine ubique fere revoluta, e cellulis superne incrassate rotundatis majusculis firmis obscuris tenuissime papillois basi magis quadratis diaphanis, parietibus plus minus interruptis, areolata; perich. basi teneriora; theca breviter exserta, subpyriformis parvula, evacuata e collo breviusculo angusto urnigera, orificio amplo haud constricto praedita, ochracea, anguste et obsolete 8 striata, operculo cupulato longiuscule apiculato; perist. dentes 8 bigeminati, dein secedentes, late lanceolati rubiginosi robusti, rugulosi, obscuri, cilia 8 fragilissima simplicia dentibus adglutinata lutea; calyptra acute conico-campanulata brunneo-fusca subpilosa.

O. Breutelii Hmp. in litt. et Sendtner in Regensb. Bot. Zeit. 1849. p. 273.

Patria. Grönlandia, unde primus habuit Breutel, dein Sendtner, cujus specimina a D. Barth collecta. In insula Terre Neuve primus omnium legit La Pylaie.

Flores masc. axillares plures crassi, fol. perig. late ovato-acuminatis, internis obsoletinervibus tenuiter reticulatis. — *O. anomalo* habitu simillimum, sed foliis nunquam recurvis primo momento discernibile; notis cursive impressis a praecedentibus primo intuitu distinguitur.

10. *O. Barthii* Sendtner (in Regensb. Bot. Zeit. 1849. p. 274.); *O. Pylaisaei* simillimum, sed folia magis acuminata, densius et angulate hexagono-areolata, magis chlorophyllosa, distinctius papillosa; theca multo robustior major, perist. dentibus sedecim discretis basi dense approximatis fragilissimis tenuissime membranaceis laevissimis hyalinis irregulariter lanceolatis, ciliis 8 lineari-lanceolatis, dentibus brevioribus, e duplici cellularum serie compositis.

Patria. Grönlandia, in saxis quarzosis v. graniticis, unde misit D. Barth.

Sectio II. **Euorthotrichum.** Folia sicca imbricata, madefacta subito reflexo-squarrosa, dein erecto-patula, recurva.

A. Folia chlorophyllosa.

a. Theca exserta.

11. O. anomalum Hdw. (Sp. Musc. p. 162.); monoicum; orbiculariter pulvinatum parce dichotomum humile crassiusculum sordide viride vel lutescens; folia caulina erecto-appressa, perfecte lanceolata, margine e basi usque ad apicem valde revoluta, obtusiuscula, evanidinervia, profunde carinata, e cellulis minutis rotundatis chlorophyllosis basi rectangularibus densis diaphanis areolata; perich. acutiora longiora, basi tenerrima; theca in ped. breviter exserto oblonga, sedecies striata aureo-fusca, operc. breviter apiculato, calyptra aurea parce pilosa omnino oblecta, peristomio simplici, dentibus 8 bigeminatis pallidis sublaevibus late lanceolatis breviusculis erectis.

Br. Eur. 2 — 3. p. 10. t. 3. — *O. saxatile* Brid. l. p. 275. — *Brachytrichum saxatile* Röhl. Ann. d. Wetter. Ges. III. p. 194. — *Weisia anomala* Roth. Fl. Germ. III. l. p. 215. — *W. ithyphylla* β. minor Ehrh. Beitr. l. p. 191. — *Grimmia orata* Schrank. Baierische Fl. II. p. 443. — *Orthotr. aureum* Mart. Fl. Erlang. Crypt. p. 11. t. 11. — *O. humile* Schleich. Cent. IV. n. 15.

Patria. In tectis, muris et rupibus, rarius ad arbores per totam Europam vulgare et ditissime fructificans.

Flos masc. axillaris ad basin feminei; fol. perig. ovata breviter acuminata, ext. nervosa, interna obsoletinervia tenera colorata.

b. Theca immersa v. emergente.

α. Pilifera.

12. O. diaphanum Schrad. (Spic. Fl. Germ. p. 69.); monoicum; laxe et irregulariter pulvinatum humile parce dichotomum viridissimum incanum; folia caulina erecto-conferta, oblongo-lanceolata longe acuminata apice subdenticulata semper fere canescentia igitur veluti pilifera,

ubique e cellulis mollibus ampliusculis basi rectangularibus superne subrotundate hexagonis sublaevibus amoene chlorophyllosis areolata, margine ultra medium revoluta, plus minus complicate concava; perich. basi teneriora; theca immersa cylindrico - oblonga 8 plicata pallescens, operc. breviter conico; perist. dentes ext. 16 geminati robusti pallidi rugulosi, int. cilia 16 hyalina simplicia; calyptra $\frac{1}{3}$ brevior straminea apice scabra parce pilosa v. nuda.

Br. Eur. 2—3. p. 26. t. 14. — Brid. I. p. 293. — *O. heterophyllum* P. B. Prodr. p. 80. — *O. pilosum* ej. p. 81. — *O. ulmicola* Lagasca, Ann. d. Ciens. Nat. n. 14. p. 186. — *O. aristatum* Turn. Musc. Hib. p. 100. t. 9. f. 2. — *Weisia diaphana* Roth. Fl. Germ. III. I. p. 223.

Patria. Ad arbores campestres, rarius ad saxa, per totam Europam. — *Martio, Aprili.*

Flos masc. in ramulo proprio subbasilari terminalis; folia perig. ext. ovato-acuminata breviter pilifera evanidinervia, int. late ovata convolutacea colorata obsoletinervia tenerrima; anth. turgida parvula, paraph. brevibus filiformibus.

13. *O. glaucum* Spreng. (Syst. Veget. IV. II. p. 323.); *monoicum*; *O. diaphano* simillimum; sed folia caulina densius areolata haud granuloso-chlorophyllosa sed utriculo primordiali instructa, juniora haud diaphana, sed flavide pilifera, angustiora, distinctius tenuiter papillosa; theca subemersa, calyptra straminea pilosa omnino obtecta, perist. ext. dentes 16 lanceolati linea longitudinali obsoleta exarati breves pallidi rugulosi, ciliis 16 simplicibus alternantes.

Patria. Prom. b. spei, ubi ad montem tabularem legit Ecklon; ad trunc. *Mimosarum* pr. Fort Beaufort ad flum. Katrivier terrae Caffrorum Julio 1829. Mundt.

Infloresc. *O. diaphani*, fol. perig. ext. flavide piliferis.

β. Epilifera.

† *Anguste lanceolata.*

14. *O. leucomitrium* Bruch (Br. Eur. 2—3. p. 26. t. 15.); *monoicum*; subpulvinatum humile parce ramosum;

folia patula, siccitate laxe imbricata leviter contorta, *lanceolata acutiuscula* carinata, margine revoluta; *areolatione O. diaphani*; perich. magis erecta basi plicata; theca emergens *ovato - elliptica s. elongato - pyriformis, longicolla*, pallide fuscescens luteola, striis 8 angustis subconcoloribus, sicca sub orificio vix angustata, operculo altius convexo, calyptra $\frac{2}{3}$ obtegente campanulata albide luteola apicem versus breviter pilosa leviter plicata; perist. dentes sedecim geminati per paria approximati sicci reflexi lineari-lanceolati ferruginei, cilia totidem filiformia hyalina longa conniventia. †.

Patria. Ad arbores campestres, praesertim populos, pr. Carlsruhe, Baden, Dahn in Vogeso, Argentoratum, Bipontum ubi Bruch detexit, Münster Alsatie, Monachium, Salisburgum et in Bosnia. — *Majo, Junio.*

Flores masc. in ramulis brevibus terminales, interdum ad basin feminei laterales, fol. perig. ovato-acuminatis, interioribus enervibus. — Habitus *O. tenello* et areolatio folii *O. diaphano* similes dicuntur. Ab ulteriori, cujus folia saepe apice hyalino echlorophylloso carent, haud recedere videtur.

15. *O. pumilum* Sw. (Musc. Suec. p. 42 et 92. t. 4.); *monoicum*; pulvini parvuli tenelli densi virides; caulis tenellus parce breviter dichotomus; folia caulina erecta, madefacta recurvo - patula, lanceolata obtusiuscula vel breviter acutata, margine e basi usque fere ad apicem revoluta, carinate concava, mollia, ubique e cellulis hexagonis valde chlorophyllosis sublaevibus basi longioribus et subquadratis areolata; perich. majora; theca *immersa turgide ovalis brevicolla igitur subglobosa*, ore constricta, perfecte late et fusce 8 sulcata, calyptra late campanulata $\frac{2}{3}$ obtegente fusce striata nuda lutea, operculo brevi, perist. dentibus 8 bigeminatis late lanceolatis *pallide aurantiacis* rugulosis, ciliis 8 hyalinis brevioribus subsimplicibus.

Br. Europ. 2 — 3. p. 14. t. 5. — Brid. I. p. 285. — Schwägr. Suppl. I. p. 22. t. 50. — *O. affine* β. *pumilum* H. et T. Musc. Brit. p. 74.

Patria. Ad truncos arborum campestrium per totam fere Europam passim. — *Martio, Aprili, Majo.*

Flores masc. axillares v. in ramulis terminales minuti, fol. perig. ovatis tenerrimis evanidinervibus, anth. et paraph. paucis. — *O. diaphano* saepe associato haud dissimile, sed foliis haud piliferis et peristomio primo momento discernibile, ab *O. fallaci* notis cursive impressis distat.

16. *O. fallax* Bruch. (in Brid. I. p. 787.); *monoicum*; *O. pumilo* simillimum, sed folia acutiora, magis erecta, theca *longicolla cylindraceo-oblonga, siccitate emersa, anguste 8 striata*, pallida dein fuscescens, *ubique concolor*, perist. dentibus *pallidis subrugulosis 8 bigeminatis*, ciliis hyalinis brevioribus subsimplicibus, calyptra *conico-campanulata pallidior, ubique concolor.*

Br. Europ. 2 - 3. p. 15. t. 5.

Patria. Ad trunc. arbor. campestrium per totam fere Europam, hic illic vulgatissimum, verosimiliter saepe praetervisum. — *Aprili, Majo.*

17. *O. stramineum* Hsch. (in Brid. I. p. 789.); *monoicum*; pulvinuli *planiusculi laxi*; caulis subhumilis *gracilis flavide viridis fastigiata* breviter ramosus; folia caulina *laxe conferta*, madefacta erecto-patula recurva, e basi erecta decurrente longiusculà anguste lanceolato-acuminata, margine usque fere ad apicem valde revoluta, carinata, cellulae basilares angustae rectangulares longiusculae teneriores laeves, superiores minute rotundatae sublaeves; perich. basi teneriora; theca *emersa longicolla pyriformis tenella parvula e lutescente fusca* profunde 8 sulcata, *sporangio et collo subinflatiss*, evacuata longe cylindrico-ampullacea, operc. breviter apiculato, calyptra $\frac{2}{3}$ obtegente amoene plicata basi breviter laciniata straminea apice fusca, perist. dentibus 8 bigeminatis late lanceolatis luteolis subrugulosis, *ciliis 8 aequalibus v. 8 longis et 8 brevibus tenuibus hyalinis.*

Br. Eur. 2 — 3. p. 24. t. 13. — *O. umbonatum* Brid. I. p. 787.

Patria. Ad truncos arborum, per magnam partem Germaniae, Helvetiae, Vogesi, Sueciae (Gothiae) et Norvegiae. — *Junio, Julio.*

Pulchella et distinctissima species, thecae forma, cespitibus laxis planis et foliis laxè imbricatis primo adpectu discernibilis.

18. **O. alpestre** Hsch. (in schedulis); *monoicum*; *O. stramineo* simillimum, sed robustius, densius pulvinatum, folia breviora, basi haud decurrente latiore, minus recurva, amplius et tenerius areolata, distinctius papillosa, minus chlorophyllosa, theca *vix emersa ovalis brevicolla sordide olivacea*, calyptra *omnino obtegente parce pilosa*, perist. dentibus similibus, apice magis divisis pallidioribus striatulis, *ciliis 8 aequalibus constantibus simplicibus subulatis hyalinis.*

O. stramineum Br. Europ. 2—3. p. 24.

Patria. Ad truncos arborum alpium Helvetiae, ubi Hornschuch detexit. Albula Rhactiae: W. P. Sch. — *Julio, Augusto.*

19. **O. fastigiatum** Bruch (in Brid. I. p. 785.); *monoicum*; *O. affini* habitu simillimum, sed foliorum cellulae superiores valde chlorophyllosae laeviores majores et magis rotundate hexagonae, basilares angustae elongatae hexagonae tenerrimae pellucidae, mediae rectangulares subdiaphanae, omnes molles; perist. dentes 8 bigeminati pallidi rugulosi, cilia 8 filiformia hyalina breviora simplicia.

Br. Europ. 2—3. p. 18. t. 8. — *O. affine* Schw. Suppl. I. II. p. 19. t. 49.

Patria. Ad arbores campestres, praecipue populos, rarius ad saxa, nunquam in sylvaticis, per Europam forsitan totam, *O. affini* saepe associatum. — *Aprili et initio Maji.*

Br. Europ. speciem ab *O. affini* distinguit notis sequentibus partim valde relativis: pulvinulis densioribus, foliis brevioribus latioribus sensim acuminatis, areolatione laxiore, theca crassiore ovato-pyriformi late striata lon-

gicolla, calyptra pallida v. straminea apice fuscidula, operculo majori, ciliis perist. interni brevioribus atque latioribus, tempore denique fructus maturitatis. Flores masc. *O. affinis*.

†† *Late lanceolata*.

20. *O. rivulare* Turn. (Musc. Hib. p. 96. t. 8.); *monoicum*; laxè pulvinatum flaccidum prostratum pluries dichotomum intense viride; folia caulina laxè conferta, madefacta erecto-patentia vix recurva, latissime *ovato-lanceolata obtusa*, apice interdum dentata, margine e basi usque ad apicem fere revoluta, *ubique e cellulis minute hexagonis valde chlorophyllosis firmis* areolata, evanidinervia, basi biplicata valde concava superne profunde canaliculata, sublaevia; perich. majora; theca subemersa majusculè pyriformis fusca 8 plicata, operc. convexo apiculato; calyptra nuda sordida ampla brevis, basi late laciniata, plicis apice flexuose serratis; perist. ext. d. late lanceolati 8 big. pallidi, cilia 16 rarius 8 hyalina.

Br. Europ. 2—3. p. 25. t. 14. — Brid. I. p. 292.

Patria. In locis montosis aquosis, saxa rivulorum amans, hic illic per Germaniam, Galliam occidentalem, Pyrenaeos, Angliam et Hiberniam, rarius ad trunc. arborum humidos. — *Majo ad Julium*.

Flos masc. crassiusculus, fol. perig. latissime ovatis acutis concavis molliter areolatis.

21. *O. Sprucei* Mont. (Lond. Journ. of bot. 1845. p. 186.); *O. rivulari* simillimum, sed humilius parce ramosum; folia late ligulate lanceolata rotundata *breviter apiculata*, *ubique e cellulis amplis hexagonis mollibus*, *basis laxioribus majoribus*, *omnibus utriculo primordiali valde instructis* areolata, sublaevia; theca immersa subgloboso-pyriformis crassa anguste 8 striata; perist. cilia 8 hyalina.

Patria. Anglia ad loca plura, truncos arborum humidos in societate *Barb. latifoliae* et loca littorea habitans. W. Arnott 1824. pr. Glasgow detexit. — *Januario*.

Flos masc. *O. rivularis*. Arcolatio *Zygodontis conoidei*.

22. *O. cupulatum* Hoffm. (Deutschl. Fl. II. p. 26.); monoicum; laxissime pulvinatum pluries dichotomum erectum intense viride; folia caulina erecto-appressa, maderfacta erecto-patentia, *perfecte late lanceolata*, apice obtusiusculo v. acutiusculo saepe canescenti echlorophylloso, margine usque fere ad apicem revoluta, sublaevia, nervo crasso evanido, aequaliter concava, basi e cellulis *rhomboideo-rectangularibus angustis, apicem versus sensim minutis subrotundate hexagonis, omnibus densis* sed mollibus et chlorophyllosis areolata; perich. majora, basi teneriora; theca subimmersa subgloboso-oblonga, sedecies striata evacuata urceolata macrostoma rufo-badia, operc. minuto apiculato; perist. *simplicis* dentes 16 *geminati late lanceolati corneo-lutescentes, dein rufi laevissimi* inanes; calyptra ampla brevis late laciniata, nuda v. pilis nodoso-scabris parce oblecta tenera pallida.

Br. Eur. 2 — 3. p. 8. t. 2. — Brid. I. p. 272. — *O. urceolatum* Schleich. Cat. Pl. Helv. p. 42. — *O. confertum* Bruch in Brid. I. p. 783. — *Brachytrichum cupulatum* Röhl. Ann. d. Wett. Ges. III. p. 195. — *Weisia cupulata* Roth. Fl. Germ. III. I. p. 217. — — *O. Rudolphianum* Lehm. in Regensb. bot. Zeit. 1827. p. 656.; forma calyptra pilosa. — *O. Flörkei* et *reflexum* Hsch. — *O. commutatum* Bruch in Brid. I. p. 784. — — *O. nudum* Sm. Fl. Brit. III. p. 1268, theca exserta, calyptra nuda. — *O. cupulatum* γ . *riparium* Hüb. Musc. Germ. p. 381.

Patria. Ad rupes et muros humidos per Europam totam montanam et Americam septentrionalem. — *Majo, Junio, in alpibus Julio et Augusto.*

Flores masc. laterales, in ramulis brevissimis crassiusculi, fol. perig. late ovatis ligulate obtusis brevibus tenuiter reticulatis coloratis, nervo evanido v. obsoleto; anth. longa late et longiuscule stipitata, paraph. aureis filiformibus.

B. *Folia echlorophyllosa.*

1. *Tenella humilia dense putrinata.*

a. *Calyptra glabra.*

23. *O. Rogeri* Brid. (Mant. Musc. p. 110.); *monoicum*; dense pulvinatum humile parce dichotomum viri-

descens; folia caulina dense conferta appressa, e basi *maxime ventricoso-concava tenuiter reticulatâ angustate ligulata acutiuscula* profunde canaliculata, margine inferne convexe revoluta, superne plana e cellulis *amplis pottioideis* rotundatis diaphanis pachydermibus sed *mollibus* areolata, laevia, apice parum inflexa; perich. longiora magis lanceolata, basi teneriora haud ventricosa; omnia nervo ante apicem evanido; theca immersa pyriformi-oblonga late 8-striata, operc. convexiusculo breviter acuminato; perist. ext. dentes 8 bigeminati pallidi, siccitate reflexi, int. cilia 8 filiformia luteola simplicia dentibus breviora; calyptra glabra.

Brid. I. p. 286. — Br. Eur. 2—3. p. 16. t. 6.

Patria. In monte Jura Helvetiae in fagorum cortice:
R o g e r.

Flores masc. in ramo proprio saepe elongato terminales 2—3 aggregati; folia perig. late ovata concava involutacea breviter acuminata, basi fusca tenerrime reticulata, intima obsoletinervia. — *O. pallenti* proximum, sed foliis basi ventricosis laxius areolatis longe distat.

24. *O. pallens* Bruch (in Brid. I. p. 788.); *monoicum*; dense pulvinatum humile parce dichotomum viridescens; folia caulina dense conferta appressa, tenera, e basi *aequaliter concava e cellulis rectangularibus flavidis firmis reticulatâ* recurvo-patula lanceolata obtusiuscula, *margine ultra medium usque valde revoluta*, profunde carinata, *firme angulate rotundato-areolata* tenuissime papillosa; perich. longiora basi laxius tenerius reticulata; theca immersa elliptice oblonga, *evacuata sicca ampullaceo-coarctata interdum infundibuliformi-urceolata*, 8 plicata pallide olivacea, operc. breviter acuminato; perist. ext. d. 8 bigeminati pallidi, cilia 8 vel 16 simplicia hyalina; calyptra nuda *parum scabriuscula*.

Br. Eur. 2—3. p. 24. t. 13.

β. immersum; calyptra subpilosa. *O. immersum* Brid. I. p. 786. e spec. auth., a La Pylaie in insula Terre Neuve lectis, haud recedere videtur.

Patria. Ad truncos et ramulos fruticum, praesertim *Crataegi oxyacanthae*, *Pruni spinosae*, *Rhamni catharticae* et *Ribis Grossulariae* hic illic per Germaniam. Bruch detexit. In Halicia, truncos Acerum habitans pr. pagum Zelazna Woda circa Leopolin legit Ł o b a r z e w s k i 1841.

Flos masc. in ramulo brevi terminalis minutus, fol. perig. late ovatis convolutis breviter acuminatis basi fuscis teneris. — Notis illustratis ab *O. Rogeri* diversum.

25. *O. Braunii* Br. et Sch. (Br. Europ. 2—3. p. 16. t. 7.); *monoicum*; *O. patenti* simile, sed humiliter confertius pulvinatum, theca pyriformis immersa, *pachyderma luteo-fusca*, *sicca et evacuata urceolata*, *inferne ventricosa striis 8 latis luteis inferne obsoletis*, calyptra $\frac{1}{2}$ obtegente *nuda laevius plicata*, peristomii cilia breviora obscuriora inferne duplicia.

Patria. Ad arbores, praesertim juniores, frutices (ad Fagos jun. et Crataegum oxyac.) et saxa pr. Carlsruhe et Baden, ubi A. Braun detexit; in ditione Salisburgensi, pr. Aschaffenburg et Bipontum. — *Majo*.

Folia perig. late ovato-acuminata, apice obtusiuscula obsoletinervia, superne rotundate areolata.

b. *Calyptra pilosa.*

26. *O. strangulatum* P. B. (Prodr. p. 81.); *monoicum*; *dense pulvinatum tenellum pusillum pulchellum* parce dichotomum sordide viride; folia caulina erecto-appressa, madefacta recurvo-patula, late ovato-lanceolata breviuscula rigidiuscula, complicate carinata, margine usque fere ad apicem revoluta, e cellulis rotundatis firmis tenuissime papillois subobscuris basi infima rectangularibus areolata, evanidinervia, acutiuscula; perich. conformia; theca immersa *hemisphaerica ampla tenella minuta una cum calyptra late campanulata parce pilosa tenera* $\frac{2}{3}$ obtegente *amoene straminea angustissime octies sulcata*, operc. breviter apiculato; perist. simplicis dentes *brevissimi irregulariter lanceolati obsolete divisi igitur sedecim subintegri pallidi rugulosi*.

Schw. Suppl. I. II. p. 33. t. 54. — Brid. I. p. 273. — *O. affine* v. *pumilum* Hook. in Drumm. Musc. Amer. No. 150. — *O. stellatum* Brid. I. p. 274.

Patria. America sept., in arboribus. Mühlenberg primus legit.

Flos masc. *O. striati*. Species pulcherrima!

27. *O. patens* Bruch (in Brid. I. p. 787.); *monoicum*; *O. strangulato* affine, foliis similibus, sed robustius altius magis fasciculate ramosum lutescens; theca *subpyriformis subemersa*, e collo *angustissimo breviusculo ovalis*, *evacuata ampla suburnigera tenella leptodermis amoene straminea anguste octies sulcata*, operculo brevi, calyptra late campanulata $\frac{2}{3}$ fere obtegente parce pilosa superne brunescens tenella, perist. dentes 8 bigeminati pallide luteoli rugulosi angustiusculi, cilia 8 hyalina breviora.

Br. Eur. 2—3. p. 17. t. 7.

Patria. Ad frutices, arbores campestres et sylvestres, rarius ad saxa per totam fere Europam; ad fagos juniores pr. Bipontum detexit Bruch.

Flores masc. pseudolaterales, fol. teneris coloratis laxè reticulatis obsoletinerviis ovato-acuminatis, antherid. longiusculis, paraph. filiformibus. — Species pulcherrima.

28. *O. Canadense* Br. et Sch. (Lond. Journ. of bot. 1843. p. 667.); *monoicum*; *O. patenti* simillimum; sed folia molliora, theca longius emersa, *dentibus sedecim integris linea longitudinali obsoleta vix exaratis brevibus obtusis albidis striatulis dein luteolis*, ciliis totidem brevissimis praedita, calyptra straminea parce pilosa omnino fere obtecta.

O. affine Hook. in Drumm. Musc. Amer. No. 151.; forma major theca minus emersa sub No. 149.

Patria. Canada superior, ad Rocky Mountains et ad lacum superiorem, truncos arborum habitans: Drummond.

Theca *O. patensis*, peristomium externum *O. strangulato* affine, sed interno 16-ciliato certe distincta species.

29. *O. assimile* C. Müll.; *monoicum*; habitus inter *O. stramineum* et *alpestre*; pusillum parce dichotomum, folia *O. alpestris*, sed echlorophyllosa, theca ejusdem, ovalis brevicolla, sed minuta, breviter sed longius quam in *O. stramineo* exserta, calyptra pilosa et peristomium *O. alpestris*, sed dentes ubique rugulosi luteoli.

Patria. Chile: Pöppig.

Flos masc. *O. straminei*.

30. *O. tenellum* Bruch (in Brid. I. p. 786.); *monoicum*; humile; folia acuta firme areolata *O. affini* similia, theca subemersa longe cylindracea angusta, octies late striata, evacuata superne aequalis, calyptra longe cylindracco - campanulata $\frac{3}{4}$ obtegente stramineo - fuscidula, acuta, subpilosa.

Br. Europ. 2 — 3. p. 15. t. 6.

Patria. Ad arbores campestres, praeprimis populos, hic illic per Germaniam, ubi pr. Bipontum detexit Bruch, Galliam, Italiam superiorem et Sardiniam, ubi ad Cactum Opuntiam legit Fr. Müller.

Flos masc. *O. affinis*.

31. *O. psychrophilum* Mont. (in D'Orbigny Voy. dans l'Am. mer. VII. Crypt. p. 89.); *monoicum*; caulis erectus densifolius pusillus innovationibus iteratis fertilibus brevissimis densifoliis parce ramosus, lutescenti-fuscescens, rigidus; folia caulina erecta, madefacta distantia, recurviuscula, robusta, longiuscula, e basi ovato-oblonga lanceolata acuminata, margine ultra medium usque revoluta, evanidinervia, complicate carinata subtor-tuoso - flexuosa, grosse angulate rotundate basi ubique incrassate rectangulari - areolata, grosse papillosa; perich. majora basi tenerius reticulata; theca immersa oblonga longicollis, obscure sulcata, operculo convexo mucronato, perist. duplici: dentes 8 bigeminati pallidi rugulosi, cilia 8 nodosa, calyptra conica fusca rigida pilosiuscula.

Patria. In jugis Andium prov. Potosi, ad rupes pr. glacies aeternas, 2500 hexap. alt., ubi legit D'Orbigny.

Flores masc. axillares anguste et longiuscule gemma-
rei; fol. perig. oblongo-lanceolata acuta, basi breviora te-
nera, enervia; anth. parvula. — Ab *O. affini* haud dis-
simili notis superioribus facile distinguitur. Statura *Grim-*
miae maritimae formas minores haud male refert.

2. *Robusta elata laxè pulvinata.*

a. *Perist. intern. 8-ciliatum.*

32. ***O. affine*** Schrad. (Spic. Fl. Germ. p. 67.); *mo-*
noicum; pulvinatum plus minus elatum erectum v. decum-
bens fastigiata ramosum viride; folia plus minus conferta,
madefacta recurvo-patula, oblongo-lanceolata, superiora
apicem versus obtusiuscule acutata, profunde carinata
subcomplicata, basi planiuscule concava, margine ubique
valde revoluta, *cellulae angulate rotundatae incrassatae*
firmae papillis scabrae obscurae, basilares teneriores an-
gustae longiusculae laeviores, parietibus subinterruptis in-
structae; theca matura subimmersa, e collo brevi oblon-
go-elliptica olivacea, evacuata subpyriformis, plicis 8 lu-
teis, operculo breviter apiculato, calyptra ochracea sub-
pilosa, perist. dentes 8 bigeminati, sed paulisper separati,
pallidi rugulosi, sicci reflexi, cilia 8 hyalina simplicia ae-
qualia.

Br. Europ. 2—3. p. 17. t. 7. — Brid. I. p. 281 et 785. — *O.*
octoblepharis Brid. Musc. Rec. II. II. p. 24. — *O. umbonatum* Brid.
I. p. 787! — *Weisia affinis* et *octoblepharis* Roth. Fl. Germ. III. I.
p. 217 et 218. — *Bryum affine* Gmel. Syst. Nat. II. p. 1335? —
Br. semiracuum Vill. Pl. Dauph. III. p. 868? — *Splachnum semi-*
racuum P. B. Prodr. p. 89. — *Polytrichum* capsulis sessilibus, fo-
liis brevibus rectis carinatis. Dill. Musc. p. 432. t. 55. f. 10?

Patria. Per totam Europam vulgatissimum, in Ame-
rica boreali et Africa septentrionali (Br. Europ.), arbores
campestres et sylvestres, rarius saxa habitans. — *Junio,*
Julio.

Flores masc. numerosi axillares, fol. perig. ovatis acu-
minatis obtusiusculis. — Ab *O. fastigiato*, habitu simil-
limo, notis cursive impressis certe differt.

33. ***O. speciosum*** Nees ab Es. (in Sturm Deutschl.
Fl. Cr. Fasc. 16.); *monoicum*; laxè pulvinatum elatum

fastigiate ramosum subdecumbens intense viride; folia caulina longiuscula erecto-appressa, madefacta subrecurvopatula, late ovato-lanceolata acuminata, pluries plicata, complicate carinata, usque fere ad apicem margine revoluta, evanidinervia, e cellulis grosse rotundatis obscuris tenuiter papillois basi teneris angustis longiusculis, parietibus parum interruptis praeditis, diaphanis areolata; perich. majora basi teneriora; theca *distincte emersa subcylindrico-oblonga obsolete striata* pallescens, operc. breviter apiculato, calyptra *anguste campanulata pilosissima*; perist. ext. d. 8 bigeminati late lanceolati ubique rugulosi pallidi, cilia 8 aequantia e cellularum pellucidarum series duabus composita flaccida.

Br. Europ. 2 — 3. p. 19. t. 9. — Brid. I. p. 280. — *O. elegans* Schw. Richards. in Franklin's Append. p. 756. et Hook. in Drumm. Musc. Am. No. 155. — *O. Bruchii* Hüb. pedunculo subcurvato.

Patria. Ad trunc. campestres atque sylvaticos, rarius ad saxa totius fere Europae et Americae septentrionalis. — *Junio, Julio.*

Flores masc. sub femineum complures axillares; caetera *O. striati*.

34. *O. leptocarpon* Br. et Sch. (Musc. Abyss. No. 429. b.); *dense pulvinatum erectum parce dichotomum lutescens*; folia *O. speciosi*, sed minute rotundate areolata; theca *immersa oblongo-ovalis angusta distincte octies anguste striata* pallescens, calyptra minus pilosa; perist. dentes *inferne rugulosi, superne laeviores magis diaphani*, cilia *subsimplicia hyalina flexuosa fragilia*.

Patria. Abyssinia: W. Schimper legit in monte Silke, ad truncos *Ericae acrophyae* Fres., in reg. sup. ericarum, 16. Febr. 1840.

Flores masc. *O. speciosi*, a quo notis laudatis facile distinguitur.

35. *O. elongatum* Tayl. (Lond. Journ. of bot. 1846. p. 45.); *monoicum*; late pulvinatum biunciale elongatum adscendens, apice caulis proliferum, apice incrassato; folia imbricata recurvato-patentia lanceolata acuminata,

margine reflexa, substriata, theca breviter pedunculata elongate ovalis laevis, calyptra pilosa; perist. ext. d. 8 bigeminati siccitate reflexi, int. cilia octo duplicia, per paria dentibus geminatis opposita. †.

Patria. Ad truncos arborum prope Quito: Prof. W. Jameson 1845.

Ab *O. striato* affini habitu robustiore, calyptra magis pilosa, pedunculis longioribus et ciliis haud fimbriato-erosis differre legitur.

36. *O. Tasmanicum* Hook. et Wils. (Lond. Journ. of bot. 1848. p. 27.); *monoicum*; laxè pulvinatum fusco-brunneum elatiusculum; folia caulina suberecta, madefacta patula subrecurva lanceolato-subulata, margine reflexa, flavide viridia; pedunculus thecam superans longiusculus; theca elliptico-oblonga, sicca striata cylindrica, operculo conico apiculato rubente dimidio breviori, calyptra pilosiuscula pallida nitida, vaginula pilosa, ciliis 8 *latissimis carinatis* integris conniventibus. †.

Patria. Ad ramos juniores *Hymenantherae angustifoliae* Tasmaniae, ad N. Esk, Launceston: R. Gunn, Sept. 1841.

E ciliis latis *O. elongato* Tayl. affine, sed foliis et calyptra distans dicitur.

37. *O. rupestre* Schleich. (Crypt. Helv. Exs. Cent. III. n. 24.); *monoicum*; laxè et late pulvinatum elongatum pluries dichotomum subdecumbens viridescens; folia caulina erecto-appressa, madefacta recurvo-patula, late lanceolata, robusta, profunde complicate carinata, margine usque fere ad apicem revoluta, evanidinervia, e cellulis minute rotundatis tenuissime papillosis obscuris, inferne magis rectangularibus, densis, infima basi fuscis areolata; perich. latiora conformia; theca *immersa* crassiuscule pyriformis 8 striata, operc. brevi apiculato; calyptra omnino fere obtegente pilosa fusca; perist. dentes 8 *bigeminati pallidi rugulosi* late lanceolati patentes, cilia octo diaphana duplicia.

Brid. I. p. 279. — Br. Europ. 2 — 3. p. 19. t. 9. — *O. rupicola* Fk. in Brid. I. p. 284., forma humilior. — *O. Sehmeyeri* Hsch. in Brid. I. p. 784., forma elongata.

Patria. In rupibus regionum montanarum et alpestrium per totam fere Europam. — *Majo, Junio, in alpibus Julio et Augusto.*

Flores masc. illis *O. urnigeri* similes, a quo notis cur-sive impressis facile differt.

38. *O. Sturmii* Hsch. et Hpp. (Regensb. Bot. Zeit. 1819. p. 89.); *monoicum*; *O. rupestri* simillimum, sed theca immersa obovata brevior *obsolete striata*, calyptra pilosa brevior, peristomio *simplici*, *dentibus sedecim geminatis angustis divisis plus minus seccidentibus luteolis superne obsolete trabeculatis.*

Br. Europ. 2 — 3. p. 9. t. 2. — Brid. I. p. 277.

Patria. In rupibus reg. montosarum et alpestrium totius fere Europae.

b. *Perist. intern. 16 - ciliatum.*

39. *O. striatum* Hdw. (Musc. Fr. II. p. 99. t. 36.); *monoicum*; laxè lateque pulvinatum elatum valde ramosum viridescens; folia caulina falcato-patula, sicca erecto-appressa, lanceolato-acuminata, carinata, margine usque fere ad apicem valde revoluta, recurva, basi anguste longiuscule dense reticulata brevi, superne e cellulis irregulariter rotundatis obscuris tenuiter papillosis firmis areolata, evanidinervia; perich. conformia submajora; theca immersa ovalis ampla *estriata laevissima* pallide fusca, operc. longiuscule rostellato; calyptra thecam $\frac{1}{2}$ obtegens straminea nudiuscula v. parce pilosa; perist. ext. d. 16 geminati longe lanceolati arcte approximati carnosuli rugulosi pallidi sicci reflexi, cilia *totidem breviora maxime irregulariter eroso-articulata rugulosa.*

Brid. I. p. 290. — *O. leiocarpum* Br. Eur. 2 — 3. p. 28. t. 15. — *Grimmia striata* Hdw. Fund. Musc. II. p. 89. — *Gr. oblonga* Schrank. Baiersche Fl. II. p. 443. — *Weisia striata* Roth. Fl. Germ. III. I. p. 120. — *W. polytrichoides* Wigg. Prim. Fl. Hols. n. 821. — *W. ithyphylla major* Ehrh. Beitr. I. p. 191. — *Bryum*

striatum L. Sp. Pl. p. 1579. — *Polytrichum*, Bryi ruralis facie, capsulis sessilibus majus. Dill. Musc. p. 430. t. 55. f. 8.

Patria. Ad arbores sylvaticas et campestres, rarius ad rupes per totam Europam et Americam septentrionalem. In prom. b. sp. quoque indicatur. — *Aprili, Majo.*

Flos masc. in vicinia feminei gemmiformis, fol. periglate ovatis breviter acuminatis teneris coloratis enerviis, antherid. et paraph. majusculis.

40. **O. pycnophyllum** Schimp. (in litt.); habitus, inflorescentia et theca *O. speciosi*; folia patula, sicca incumbencia lanceolata anguste acuminata canaliculata, margine reflexa apice subtorta, nervo subexcurrente, theca emersa oblonga leptodermis obsolete striata, calyptra parce pilosa, perist. interno 16 ciliato. †.

Patria. Mexico, ad Chinantla et Pico de Orizaba: Liebmann.

Inter *O. speciosum* et *Lyellii* ambiguum, primo habitu et theca, secundo foliis margine crenulatis et dorso papillois, calyptra parce pilosa et perist. interni ciliis solidis margine erosis affine.

41. **O. recurvans** Schimp. (in litt.); praecedenti simillimum, sed differt: foliis mollioribus flexuoso-recurvis, peristomii interni ciliis pallidis et solo uno latere erosis, altero integris. †.

Patria. Mexico, ad m. Orizaba alt. 8 — 10000 ped., una cum praecedente: Liebmann.

42. **O. Lyellii** Hook. et Tayl. (Musc. Brit. p. 76. t. 22.); *dioicum*; laxè et late pulvinatum flexuoso-ascendens elatum fastigiate ramosum lutescens flaccidum; folia caulina longa, erecta, inferne appressa, superne apicibus flexuoso-patulis, madefacta valde recurva, e basi erecta subcomplicate oblonga inferne elongate anguste fusco ubique incrassate reticulata margine revoluta et papillis geminatis divergentibus veluti ciliatà recurve lanceolato-acuminata profunde canaliculata minute rotundate et incrassate areolata acuta apice suberoso-crenulata, margine erecto, ciliato-papillosa; perich. majora basi tene-

rora laevia; theca brevipedunculata immersa subpyriformis laeviter 8 striata, pallida, calyptra acuminato-campanulata pilosa, perist. dentes 16 *geminati angusti longi valde rugulosi* pallidi, cilia *sedecim aequalia carnosae fuscescentia linearilanceolata trabeculata ad marginem albidè limbata*.

Patria. Ad truncos arborum praesertim sylvestrium humidarum, rarius ad saxa, sed raro fertile, per totam fere Europam, hic illic vulgare. — *Julio, Augusto.*

Pl. mascula gracilior, floribus in ramulis propriis terminalibus, fol. perig. ext. ovato-lanceolatis, int. acuminatis, enervibus; anth. et paraph. copiosis. — Ab omnibus congeneribus planta fertilis peristomii fabrica, pl. sterilis *O. specioso* et *striato* similis foliis, cellulis anomalis tubulosis plus minus ramulosis luxuriantibus fuscis articulatis, fila confervoidea (*Confervam Orthotrichi* Hook. et Tayl. vulgo dictam) sistentibus, obtectis primo intuitu distinguitur.

43. *O. urnigerum* Myrin (in Corallar. Fl. Ups. p. 71.); *monoicum*; laxè pulvinatum elatum pluries dichotomum intense viride; folia caulina erecto-appressa, madefacta recurvo-patula, late ovato-lanceolata acuta robusta majuscula complicate profunde carinata, margine usque fere ad apicem valde revoluta, evanidinervia, e cellulis minute rotundatis tenuissime papillosis obscuris supra basin infimam longe decurrentem laxius reticulatam fuscam magis rectangularibus densis, firmis areolata; perich. majora; theca subemersa magna subgloboso-obovata 8 striata ampla, operc. brevi apiculato; calyptra obtuse campanulata $\frac{2}{3}$ obtegente pilosa; perist. dentes late lanceolati 16 longi geminati lutescentes laeves patentes, cilia *sedecim filiformia subsimplicia*.

Br. Europ. 2—3. p. 29. t. 17.

Patria. In rupibus subhumidis Sueciae pr. Gottsunda: Myrin, pr. Holmiam et Upsaliam: Lindgren; in valle fluminis Bode Hercyniae: Hampe; in saxis vallis Ferrara dictae pr. Andeer: W. P. Sch.; in Pyrenacis: Spruce. — *Junio.*

Flores masc. sub femineum plures axillares crassi gemmacci fusci; fol. perig. latissime ovata breviter acuminata, interna enervia, tenera, colorata, antherid. clavatis majusculis, paraph. filif. aequalibus flavidis. — *O. cupulato* haud dissimile, sed e foliorum areolatione primo adspectu sub microscopio distinguitur.

Sectio III. **Ulota** Brid. I. p. 298. — Folia sicca crispata, madefacta primum subito reflexo-squarrosa, dein erecto-patula, recurva.

a. *Calyptra nuda.*

44. ***O. pulchellum*** Hook. et Tayl. (Musc. Brit. p. 75. t. 21.); *monoicum*; pulvinos tenellos humiles parvulos sistens, lutescens fastigiata ramosum; folia caulina parum crispula, madefacta recurvo-patula, anguste lanceolato-acuminata acuta falcata, complicate carinata, margine usque fere ad apicem anguste revoluta, e cellulis rotundis parum obscuris distincte papillosis inferne rectangularibus infima basi subdecurrente ubique laxioribus fuscis areolata, tenera, evanidinervia; perich. conformia basi teneriora; theca exserta brevipedunculata pyriformis 8 striata pallescens *minuta pulchella*, operculo breviter apiculato basi aurantiaco, calyptra $\frac{2}{3}$ obtegente *pulchre regulariter plicata nuda*; perist. dentes 16 geminati anguste lanceolati remote articulati rugulosi aurantiaci, cilia sedecim tenuissime filiformia fusca aequantia.

Brid. I. p. 294 et 724. — Br. Europ. 2 — 3. p. 29. t. 18. — *O. stenocarpon* Brid. I. p. 271. e spec. revera huc pertinet.

Patria. Ad pinos et fagos Angliae, Hiberniae et Normandiae, ad arbores et frutices campestres atque hortenses Germaniae septentrionalis, ubi 1840 prope Jever et Wittmund legimus, in iisdem locis Belgii septentrionalis et Gothiae Succicae. — *Martio usque ad Junium.*

Flores masc. axillares plures minuti fusci, fol. perig. late ovatis acuminatis coloratis tenerrime reticulatis. — Species pulcherrima, ab *O. crispulo* haud dissimili notis illustratis facillime discernibilis.

b. *Calyptra pilosa.*

α. Peristom. simplex.

45. O. Drummendi Hook. et Grev. (in Grev. Scott. Crypt. Fl. t. 115.); monoicum; extense prostrato-pulvinatum repens fastigiata ramosum subhumile, tomentosum, viride v. lutescens, ramis crassis densifoliis brevibus; folia caulina erecto-appressa subcrispula brevia, madefacta patentia arcte imbricata, e basi ovata subventricoso-concava ad nervum utrinque e cellulis ellipticis angustis incrassatis, ad alam utramque parum parenchymaticis diaphanis areolatâ lanceolata, profunde canaliculate concava, rotundate incrassate areolata sublaevia, margine inferne parum revoluta; perich. basi haud ventricosa, majora; theca brevipedunculata pyriformis 8 sulcata pallida, ore coarctata, operculo oblique rostrato stramineo; calyptra $\frac{1}{2}$ obtegente conico-campanulata pilosa fusca, perist. dentibus elongate lanceolatis 16 geminatis pallidis rugulosis.

Br. Eur. 2 — 3. p. 12. t. 3. — *O. subrepens* Sommerf. Fl. Lapp. p. 191. t. 1. f. 2. — *Ulota Drummondii* Brid. I. p. 299. — *U. bicolor* Brid. I. p. 792. — *Macromitrium Drummondii* Hmp. Regensb. bot. Zeit. 1837. p. 280.

Patria. Ad betulas vetustas Scotiae, ubi Drummond primus legit, et Norvegiae, ad Sorbum aucupariam Hercyniae super. ad rupes „Hohneklippen” dictas: **Hampe.** — *Septbr.*

Flos masc. minute gemmaceus terminalis, dein innovando lateralis, fol. perig. late ovatis breviter acuminatis inferne tenerioribus nervosis.

β. Peristom. duplex.

†. *Internum 8-ciliatum.*

46. O. crispum Hdw. (Sp. Musc. p. 162.); monoicum; late et laxiuscule pulvinatum valde crispum lutescens humile breviter dichotome et fastigiata ramosum dense foliosum; folia caulina madefacta subrecurvo-patula, e basi ovata concava ad nervum utrinque e cellulis maxime incrassatis angustis oblique seriatis inferne fuscis superne

lutescentibus, ad utramque alam parenchymaticis diaphanis late circumductâ lanceolata complicate carinata flexuosa, margine parum reflexa, distincte papillosa; perich. majora; theca in ped. flexuoso exserto *pyriformis longicolla*, *evacuata ore ampliata*, pallescenti-straminea, 8 plicata, operc. longiuscule apiculato stramineo, perist. duplici; dentes sicci reflexi, pallidi 8 bigeminati anguste lanceolati rugulosi, cilia 8, rarius 16, inferne duplicia hyalina; calyptra pilosa.

Br. Eur. 2—3. p. 23. t. 12. — *Ulota crispa* Brid. I. p. 299. — *Neckera ulophylla* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 236. — *Weisia crispa* Roth. Fl. Germ. III. I. p. 222. — *Grimmia capillata* Moench. Fl. Marp. p. 731. — *Gr. sylvatica* Willd. Prodr. Fl. Ber. n. 906. — *Bryum sylvaticum* Gmel. Syst. Nat. II. p. 1331. — *Br. crispum* Hoffm. Deut. Fl. II. p. 25. — *Br. striatum* ♂, Linn. Sp. Pl. p. 1580. — *Br. capillaceum* Hull. Brit. Fl. p. 249. — *Polytrichum striatum* Neck. Meth. Musc. p. 121. var. γ . — *P. bryoides* v. *capillaceum* Weis. Crypt. Gött. p. 177. — *P. arboreum* Oed. Fl. Dan. t. 648. — *P. capillaceum*, *crispum*, calyptris acutis pilosissimis. Dill. Musc. p. 433. t. 55. f. 11. — Inter Synonyma haece antiquorum *O. coarctatum* et *crispulum* forsân inveniantur.

Patria. Ad arbores sylvestres praesertim umbrosas humidâs per totam fere Europam. — *Aug.*, *Septbr.*

Flores masc. ad basin feminei minuti, fol. perig. anguste lanceolatis acutis, superne incrassate, inferne laxè rhomboideo-areolatis, anth. et paraph. paucis.

47. *O. coarctatum* P. B. (Prodr. p. 80.); *monoicum*; *O. crispo* simillimum, sed minus crispulum, folia laeviora, cellulis basilaribus ad nervum positis longioribus laxioribus, theca altius exserta *ovalis*, *evacuata elongata angusta attenuata ore coarctata*, operculo longiori; perist. cilia simpliciora.

Br. Eur. 2—3. p. 21. t. 11. — Brid. I. p. 288. — *Ulota Bruchii* Hsch. Brid. I. p. 794. — *O. dilatatum* Br. et Sch. I. c. p. 22. t. 11., thecae orificio valde dilatato.

Patria. In iisdem locis cum *O. crispulo* per totam fere Europam et in America boreali. — *Julio ad Septbr.*

48. *O. crispulum* Hsch. (in Br. Eur. 2—3. p. 23. t. 12.); *monoicum*; *O. crispo* simillimum, sed gracilius

tenuius, thecae longicollae pyriformis *minutae tenellae brevius pedunculatae orificio magis dilatato, collo subito et maxime coarctato*, perist. dentibus apice pertusis.

O. crispum β . *minus* Schw. Suppl. I. II. p. 25. — *O. cirrhatum* Bernhardi in Brid. I. p. 301. sub *O. crispo*. — *Ulota crispula* Brid. I. p. 793.

Patria. In iisdem locis *O. crispi*, rarius ad saxa. — *Majo, Junio.*

Ab *O. crispo* notis cursive impressis, maturitatis tempore et foliis basi e cellulis minus incrassatis arcolatis, alis minus parenchymatice limbatis, primo adspectu partibus omnibus minoribus et theca evacuata, superne minute urnigera, inferne subito valde coarctata certe distat.

49. *O. Ludwigii* Schw. (Suppl. I. II. p. 24. t. 51.); *monoicum*; prostrato-repens fasciculate ramosum, ramis brevibus curvatis subsciuroideis intense v. sericeo-viridibus; folia *parum tortilia*, madefacta patula, e basi *plus minus ventricosa*, alis *parum parenchymatice circumductis instructâ* breviter lanceolata complicate carinata, margine parum vel vix revoluta, sublaevia; perich. majora, basi cellulis longioribus; theca longiuscule pedunculata *obovato-pyriformis*, *superne subglobosa, orificio maxime coarctato et octies plicato, inferne laevis pallescens nitidiuscula leptodermis, evacuata longicolli-pyriformis fusca*, operculo longe apiculato recto, perist. dentes 8 bigeminati late lanceolati apice *plus minus pertusi rugulosi pallidi obscuri*, cilia 8 *fugacissima tenuissima*, calyptra pilosissima fuscescens fugax.

Br. Europ. 2 — 3. p. 12. t. 4. — *O. clausum* Hsch. in sched. — *Ulota Ludwigii* Brid. I. p. 302 et 794. — *O. plicatum* Ludw. in sched., *O. striatum* olim in Cent. Pl. Crypt.

Patria. Ad arbores praesertim sylvestres montanas et prime fagos hic illic per totam fere Europam. — *Augusto, Septbr.*

Flos masc. *O. Drummondii*. Notis illustratis cum alia specie nunquam confundendum. Habitus pulvinorum *O. Drummondii*. Cilia perist. int. ab aliis auctoribus negantur.

50. **O. curvifolium** Wahlenb. (Fl. Lapp. p. 365.); *dioicum*; laxè pulvinatum, dichotome fastigiate ramosum, *inferne nigricans superne glaucum v. amoene lutescens v. fuscescens*; folia caulina *appressa tortilia*, madefacta erecto-patentia dense imbricata, e basi oblongo-ovata *ubique fere incrassate* areolata ad marginem *parum* parenchymatice limitata concavà lanceolata brevia, carinata, margine vix vel parum revoluta, *maxime incrassate angulato-areolata*, *papillis remotiusculis distinctis scaberrima*; perich. conformia majora; theca brevipedunculata e collo longo obovata, orificio dilatato, 8 plicata, brunescens, operculo longiuscule apiculato, perist. duplici; dentes 8 bigeminati apice fissibiles pallidi rugulosi, cilia 8 filiformia duplicia hyalina; calyptra $\frac{2}{3}$ obtegente pilosa.

Br. Europ. 2—3. p. 21. t. 10. — *O. Laureri* Hsch. Regensb. Bot. Zeit. 1827. p. 656. — *Ulota curvifolia* Brid. l. p. 302.

Patria. In saxorum lateribus umbrosis Norvegiae borealis et Lapponiae australis, ubi Wahlenberg detexit, in alpibus Carinthiae, in alpe Zirknitz dicta: Laurer et in alp. Salisburgiae: Bruch Hb. Prope Mittersill Pinzgoviae alt. 4500' Sauter legisse dicitur. *Rarissima species.* — *Aestate.*

Pl. masc. gracilescens, flore terminali.

51. **O. germanum** Mont. (Ann. d. sc. nat. 1845. p. 121.); *monoicum*; *O. coarctato* simile, sed humilius, minus tortile, folia caulina e basi *ovata lanceolata longe et angustissime acuminata acuta*, rubentinervia, tenera, lutescentia, distincte papillosa; theca ovalis *brevicolla aurantiaca*, *evacuata subcylindracea*, *leviter 8 striata*, perist. dentes 8 bigeminati, cilia 8 duplicia lutescentia; calyptra pilosa conica straminea.

O. luteolum Hook. et Wils. in sched. musc. antarctic, quo ad diagnosin usi sumus.

Patria. Chile, ad cort. arborum: C. Gay. Insula Eremitae ad Cap. Horn: J. D. Hooker.

52. **O. Eckloni** Hsch. (Linn. XV. p. 129.); pusillo-pulvinatum erectum semiunciale breviter fastigiate ramo-

sum dense foliosum; folia caulina crispata, madefacta erecto - patentia subflexuosa, e basi *ventricosa* linearilanceolata canaliculata, margine plano, inferne rufescentia, superne viridi-lutea, cellulis ad marginem basis folii quadratis laxis hyalinis, ad nervum linearibus angustis densis, superne minute rotundis; perich. *longissima thecam superantia* lanceolato-lineararia, basi ad medium vaginata; theca *parva vix emersa* ovata longicolla s. clavata 8 striata, sicca infra os parum coarctata, viridibrunnea, evacuata cylindrica angustissima torta lutescens, opere. brevissime apiculato, calyptra acuminate campanulata laciniata pilosissima *pallida*, perist. dentes 8 bigeminati latissimi albidii, cilia 8 breviora filiformia basi duplicia hyalina. †.

Patria. Prom. b. spei, in rupis fissura ad cacumen m. tabularis editi quarti: Ecklon.

Ab *O. crispo* notis cursive impressis facillime distinguitur.

††. *Internum 16 - ciliatum.*

53. *O. Magellanicum* Mont. (Voy. au pôle Sud, Crypt. t. 20. f. 2.); *monoicum; repens tenellum gracillimum pusillum, ramis brevibus erectis ad apicem incrassatis, pallide viride; folia caulina subtortilia, madefacta recurvopatula, e basi ovata ventricoso-concarâ angustissime lanceolato-acuminata, secunda, valde falcata, nervo longe infra apicem evanido viridi, parum complicate carinata, margine erecto, rarissime supra basin parum revoluta, sublaevia, flexuose subulata, grossiuscule rotundate, supra basin infimam fuscam parum laxiusculam elliptico-areolata, ad alas basilares paulisper parenchymatice limitata; theca longe exserta anguste clavata minuta longicolla, obsolete 8 striata, fuscidula, operculo amplo convexo apiculato, perist. duplici: dentes sicci reflexi, 16 paria approximati, cilia 16 plana irregularia, calyptra parce pilosa.*

Patria. Ad cortic. arbor. et fruticum Freti Magellanici, loci Port-Fomine: Jacquinet.

Notis cursive impressis jam primo adspectu ab omnibus congeneribus differt. Flores masc. plures sub femineum in ramis propriis brevibus positi, fol. perig. angustis, internis e basi longe oblonga concava tenerrima colorata nervosa breviter acuminatis rotundate areolatis viridibus.

Species non satis notae.

54. O. Jutlandicum Brid. (l. p. 296.); laxe et *latissime pulvinatum prostratum* repens, ramis *erectis flaccidis longiusculis parce dichotomis*, amoene viridis, lutescens v. fuscescens; folia caulina laxe conferta valde *tortilia*, madefacta erecto-patentia, *flaccida, longa, e basi longe oblonga concava lanceolata longe acuminata flexuosa*, margine inferne magis superne angustissime vel haud revoluta, basi *elongate anguste* incrassate fuscate *subserpentine* areolata, ad alas *valde plicatas serie cellularum parenchymaticarum unica saepe obsoleta limitata*, papillis remotis inferne tuberculosa superne sensim minute et valde incrassate rotundate areolata, tenera, lutescentia, nervo crasso parum carinato fuscescente evanido v. *excurrente et in cellulas tubulosas anomalas apice caulis stellatim dispositas dissoluto*.

O. phyllanthum Steud. Nomencl. Ed. l. — Br. Europ. 2 — 3. p. 30. t. 18. — *Ulota phyllantha* Brid. Mant. Musc. p. 113. — *O. crispum* Hook. et Wils. in sched. musc. antarct. — *O. fasciculare* Brid. l. p. 790.!

Patria. Ad arbores campestres rarius, ad sylvestres, praesertim fagos, sylvarum humidarum Germaniae sept. maritimae pr. Jever Duc. Oldenburgensis 1840 copiosissime legimus; in iisdem locis Belgii septentr., Jutlandiae Danicae, Gothiae (Scaniae) Suecicae et Norvegiae occidentalis ut in Gallia septentr. rupes maritimas habitans. Insula Eremitae ad Cap. Horn, unde J. D. Hooker specimina, cum Europaeis omnino congruentia, retulit. In insula Terre Neuve arctica legit La Pylaie!

Species distinctissima et pulcherrima, *O. crispulo* similis, spretis examinibus acuratissimis a nobis semper sterilis reperta.

55. *Ulotia fulva* Brid. (I. p. 301.); *Orthotricho crispo* simillima, sed saturate aureo-fulva, non flavescens; folia madore incurva nec erecta subreflexa, lineari-lanceolata incurva; theca in ped. duplo fere longiore non tam evidenter e basi sensim in thecam dilatato, sed fere lineari tortili ovata, evacuata inaequalis subcernua, operculo convexo-conico. †.

Orth. crispum var. Brid. Sp. Musc. II. p. 5.

Patria. Insula Bourbonis: Bory St. Vincent.

Calyptra et peristomium desunt. In Hb. Brideliano non vidimus, species autem bona videtur.

Orthotricha delenda.

1. *Orth. heteromallum* Schw. Brid. I. p. 297. nomine solo notum.

2. *Orth. fasciculatum* Brid. I. p. 297. — *Grimmia fasciculata* ej. Mant. Musc. p. 37. — In Hb. Brideliano non vidimus; forsan *Grimmia*.

3. *Orth. radiculosum* Brid. I. p. 791. E spec. Hb. Brideliani Barbula quaedam sterilis ad sectionem *Senophyllum* revocanda videtur.

Gen. XIV. *Cryptocarpus* Dz. et M.

Musc. Archip. Ind. p. 37. t. 15. — *Macromitrium* Hook. et Wils. C. Müll. olim.

Nomen ob thecam immersam conditum.

Calyptra mitraeformis brevissima operculum solum obtegens, haud plicata, pilosa. Peristomium nullum.

Plantae habitu *Macromitriorum*, calyptra glabra *Schlotheimiarum*, sed brevi *Grimmiarum*, a gregibus ambabus prioribus, ut *Grimmiae* a *Brachysteliis*, distinguuntur et genus egregie conditum sistunt. Inter omnes *Orthotrichaceas* caulibus heteromorphis facillime cognoscuntur. Ob thecae et calyptrae formam *Cryphaeis* haud male aemulantur.

1. *Cr. apiculatus* Dz. et M. (l. c.); hermaphroditus; caulis repens, ramis sterilibus brevibus gemmaeformibus

densifoliis crassis, fertilibus elongatis gracilibus, ob folia in series nonnullas distincte erectas cauli subtorto parum spirales disposita polystiche angulatis, summo apice breviter brachiate fasciculatim divisis, fusco-luteis; folia ram. steril. late oblongo-ligulata obtusa mucronata, alis convexiusculis grosse incrassate rotundate areolatis inferne mammillate papillosis; fol. ram. fertil. multo breviora late ovata, apice parum retuso acuminato; perich. latissime ovata, apice emarginata valde eroso-crenulata, medio apicis brevissime mucronata, multo pallidiora tenuiora, cellulis maxime incrassatis in membranam veluti conflatis linearibus; theca immersa minutissime ovato-oblonga microstoma laevissima pallide olivacea, operc. brevi conico, calyptra pilis longis erectis angulate flexuosis incrassatis multis pilosissima, basi incisula.

Macromitr. brachiatum Hook. et Wils. Ic. Pl. Rar. Hooker. 1845. t. 746. B.

Patria. Insulae Philippinae: Cuming. Borneo, juxta Martapoeram una cum *Macromitriis* arborum habitans: Korthals.

Gen. XV. **Macromitrium** Brid.

Mant. Musc. p. 132 et Br. univ. I. p. 306. — *Orthotrichum* Hook. et Grev. — *Leiotheca* Brid. — *Hypnum* antiq.

A μακρός longus et μίτριον, ob calyptrae insignem longitudinem nomen compositum.

Calyptra campanulata plicata, basi plus minus *profunde laciniata*. Perist. nullum, simplex vel duplex; externum: dentes 16 lanceolati discreti v. geminati, granuloso-albidi v. rufescentes; internum: *membrana plus minus elata truncata vel in dentes externis similes fissa*. Theca exannulata vel rarius simpliciter annulata.

Plantae magis hypnoideo-repentes, qua nota ab *Orthotrichis* proximis primo adspectu distinguuntur.

Sectio I. **Macrocoma** Hsch. in Hb. Kunzeano. — Caulis rigidus longe repens, ramis siccitate filiformibus teretibus dense foliosis remotis plus minus pinnatis. Folia stricta, basi acetabuliformi-concava s. ventricosa, parva, dense appressa, evanidinervia, madore patentia, stricta, superne canaliculata, hexagone-rotundato-areolata. Theca microstoma.

1. **M. filiforme** Schw. (Suppl. II. II. 1. p. 64. t. 171.); *monoicum*; valde decumbens gracillimum, ramis *teretibus filiformibus* breviter ramulosis viridulis *ditissime fructiferis*; folia latiuscule lanceolata plus minus acuta, parum papillosa; perich. acutiora; theca in ped. longiusculo cylindraceo-ovalis cinnamomea *sublaevis*, parvula, operc. conico acuto brevi, dentibus (*externis*) brevibus sedecim linea media exaratis geminatis rugulosis, calyptra *thecam aequante*, filis longis incrassatis nodosis hirta, *perfecte campanulata*.

Leiotheca filiformis Brid. I. p. 727 et 795. — *Orthotrich. filiforme* Hook. et Grev. in Brewst. Edinb. Journ. I. p. 116. t. 4. — *Lasia orthotrichoides* Raddi in schedulis.

Patria. In Brasilia, ubi haud rara videtur, Sellow primus legit; e Chile retulit Pöppig.

Flores masc. axillares plures minutissimi, fol. perig. paucis minutis ovato-acuminatis subintegris basi teneris fuscis.

2. **M. tenue** Brid. (I. p. 740.); *monoicum*; late pulvinatum, repens, ramis brevibus tenuibus fusco-viridibus, ditissime fructiferis; folia caulina *M. pulchelli*; perich. majora; theca in ped. *elongato perfecte cylindracea recta, longe madefacta gibboso-ovalis subobliqua*, leviter, sed distincte sulcata, pallide fusca, dein cinnamomea, orificio angustissimo, operc. e basi *minute conica longiuscule acutissime subulato stricto*, madore conico acuto, flavo, calyptra thecam superante, peristomio simplici interno, e membrana brevissima truncata rugulosa composito.

Schwägr. Suppl. II. II. 2. p. 142. t. 191? — *Orthotr. tenue* Hook. et Grev. in Brewst. Edinb. Journ. I. p. 120. t. 5. — *Maschalocarpus declinatus* Spr. Syst. Veget. IV. I. p. 158.

Patria. Prom. b. spei, ubi primi legerunt Menzies et Burchell.

Flos masc. minute gemmaceus infra femineum positus, fol. perig. paucis, e basi late ovata tenero-reticulata fusca margine distincte crenulata, breviter acuminata.

3. M. Perrottetii C. Müll.; *monoicum*; *M. tenui* simillimum, sed folia *longiora acutiora*, perich. caulinis multo majora, intima basi tenerius laxius et longius reticulata; theca in ped. elongato, *sicca et madefacta minute et anguste elliptica cylindracea*, leviter striata, perist. simplici interno: membrana vix exserta truncata, calyptra pilosissima.

M. tenue Mont. in Musc. Neelgheriens.

Patria. Montes Neelgherienses: Perrottet.

Flos masc. in ramulo ad basin feminei floris posito, terminalis gemmaceus, foliis *M. tenuis*. Operculum et calyptra matura desunt. Theca illi *M. filiformis* proxima.

4. M. microphyllum Brid. (l. p. 737.); *M. tenui* simillimum, sed *statura valde pusilla*, folia *sublaevia*, teneriora, theca *longicolla pyriformis angusta*, distincte sulcata.

Orthotrich. microphyllum Hook. et Grev. in Brewst. Edinb. Journ. I. p. 121. t. 6.

Patria. Prom. b. spei, ubi primus legit Burchell, rarius.

5. M. Dregei Hsch. (Linn. XV. p. 131.); *monoicum*; *M. tenui* maxime simile, sed folia minora, pellucidiora, theca *angustior minor sublaevissima vel evacuata ore et basi parum plicata*, operculo acute subulato, calyptra ut in *M. pulchello thecam* $\frac{2}{3}$ obtegente, pilis longis geniculatis hirta.

Patria. Prom. b. spei: Albany 1. Decbr. 1831, Paarlberg 1500' soc. *Barb. piliferae* 30. Mart. 1828, Enon in sylva 500' 18. Mart. 1833: Drège.

Flos masc. *M. tenuis*.

6. M. lycopodioides Schw. (Suppl. II. II. 2. p. 141. t. 193.); *dioicum*; *M. tenui* simillimum, sed ramis crassioribus, folia magis curvata, perichaetialia magis acuminata longiora, pedunculus *brevis*, *maxima parte vaginula*

longe exserta vaginatus et paraphysibus longe exsertis simulac cinctus, theca anguste elliptica brevior minus distincte striata cinnamomea, operculo conico obliquo, calyptra thecam superante et clavaeformi-cingente pilosissima, peristomio nullo.

Maschalocarpus Eckloni Spr. Syst. Veget. IV. II. p. 321. — *Orthotrichum lycopodioides* Burch. Cat. geogr. Pl. Africae australis extratropicae No. 5144 — 47. — *Macrocoma elegans* Hsch in sched.

Patria. Prom. b. spei, ubi Burchell primus legit, affinium congenerum vulgatissimus.

Infloresc. Schwägrichen monoicam et dioicam dixit, nos ipsi dioicam semper observavimus.

7. M. Abyssinicum C. Müll.; *dioicum?* *M. lycopodioidi* simillimum, sed rami longiores et fertiles fastigiate ramosi; folia caulina majora longiora acutiora, *marginē basis papillis distinctis acutis scaberrima et denticulata, perich. ruguloso-plicata marginē inferne distincte denticulata; theca in ped. elongato longicolla clavaeformis obliqua submacrostoma.*

M. lycopodioides Br. et Sch. in W. Schimp. Musc. Abyss.

Patria. Abyssinia: W. Schimper.

8. M. pulchellum Brid. (l. p. 313 et 737.); *dioicum?* repens pluries divisum, ramulis brevissimis subrosulatis approximatis, tenellum, pallide viride; folia angustiuscule lanceolata, obtusiuscule acutata, parum papillosa, alis convexis, cellulis minutis subrotundis, basi tenerioribus plus minus pellucidis hexagonis; perich. latiora; theca in ped. longiusculo substricto angustissime oblonga minutata, sulcata, operc. conico acuto, calyptra thecam dimidiam obtegente minuta, pilis squamaeformibus brevibus latis erectis obtecta, basi pluries profunde laciniata, luteo-fusca, dentib. ext. 16 brevibus obtusis, perist. int. e membrana brevi truncata composito.

Schlotheimia pulchella Hsch. in Hor. Phys. Berol. p. 61. t. 12. — Schw. Suppl. III. I. 2. t. 249. — *Orthotr. Hornschuchii* Hook. et Gr. Brewster Edinb. Journ. I. p. 129. t. 6.

Patria. Prom. b. spei, ubi in cortice *Proteae conocarpace* ad M. Tabularem m. Octobr. leg. Bergius.

A *M. tenui* et affinibus jam calyptra distat.

Sectio II. **Orthophyllina.** Plantae densius pulvinatae, caulis teres, foliis appressis strictis, circulariter areolatis ubique canaliculatis.

9. *M. hymenostomum* Mont. (Ann. d. sc. nat. 1845. 4. p. 120.); dioicum; repens, sed dense pulvinatum, ramis erectis teretiusculis subrobustis breviter ramulosis sordide viridibus, dein fuscis, fragilibus; folia dense appressa, madore parum patentia oblongo-lanceolata subacuminata acutiuscula, margine inferne anguste revoluta, profunde canaliculata, evanidinervia, incrassate angulate rotundate areolata, firma; perich. latiora obtusiora, acumine acuto; theca in ped. breviter exserto minute ovata 8-striata, operculo conico-acuminato dimidio breviori, perist. simplici interno, e membrana altiuscula integra truncata composito, calyptra glabra fuscata parva obsolete plicata.

Patria. Chile australis: C. Gay.

Calyptram juniorem solam vidimus. Species *Drummondiae* haud dissimilis. An *Macromitrium*?

Sectio III. **Eumacromitrium.** Caulis plus minus incrassatus, rigidus v. flaccidus, foliis siccitate flexuosis v. crispatis v. spiraliter contortis, canaliculatis.

A. *Folia strictiuscula parum flexuosa.*

α. *Folia madore erecta.*

10. *M. dubium* Schimp. (in Hb. Hampeano!); longissime repens, ramis remotis robustissimis densifoliis fastigiatim ramulosis fuscescentibus; folia caulina longissima flexuoso-erecta, madore caulem scopaeformem v. comosum laxè imbricatum efficientia laxè patentia, late lanceolata longissime et tenuissime acuminata, veluti aristata, excurrentinervia, canaliculata, alis planiusculis, ad marginem erectum remote et obsolete denticulatis, cellulis ubique elongatis rectangularibus angustis, parietibus sub-

interruptis praeditis pallide rufis; perich. breviora; theca in ped. elongato intense purpureo majusculè ovalis nitide fusca laevis, gymnostoma (?), operculo longe subulato recto, calyptra glabra longa angusta fusca parum angulata.

Patria. In truncis arborum montium insulae St. Kitts: Hb. Schimper.

Syrrhopod. longisetaceo habitu valde simile, sed, calyptra matura licet nondum visa, ad genus hocce pertinere videtur. A M. Leprieurii, specie affini unica, notis cur-sive impressis longe differt.

11. **M. Leprieurii** Mont. (Ann. d. sc. nat. Ser. I. XIV. p. 347. t. 20.); caulis repens, ramis magis approximatis *rigidis*; folia *dense imbricata appressa, minus flexuosa, multo breviora, haud longe cuspidata, sed anguste lanceolata acuta, superne longiuscule ellipticè areolata, theca operculo cupulato-conico brevissimo tecta gymnostoma, calyptra breviorè.*

Patria. Guiana Gallica, ad truncos arborum circa Cayennam: Leprieur.

M. dubio maxime affine et, operculum si longe subulatum esset, varietatem putaremus.

β. Folia madore reflexa.

12. **M. truncatum** C. Müll. (Linn. XVII. p. 383.); dioicum? longe repens, ramis remotiusculis simplicibus fuscis robustiusculis densifoliis; folia erecto - appressa, multifaria, madore divergenti-divaricata, longiuscule angustata, ultra medium plicata, semitorta, plus minus regulariter truncata, nervo excedente breviter apiculata, canaliculata, margine convexo, cellulis basis longae elongatis incrassatis angustis, superne longiuscule quadratis dein elliptico - incrassatis; perich. longissime acuminata, lamina inaequali attenuata, nervo longe excedente flexuoso, ubique elongate reticulata; theca in ped. elongato flexuoso cylindraco - oblonga sulcata, ore coarctata, operculo aciculari recto, perist. simplici, dentibus geminatis carnosulis obtusatis pallidis rugulosis.

Patria. Insula St. Vincent: Hb. Kunzean.

Notis illustratis species ab omnibus congeneribus distinctissima. Calyptra ignota.

B. Folia in spiram contorta.

a. Calyptra pilosa.

13. M. prorepens Schw. (Suppl. II. II. 1. p. 62. t. 171.); *dioicum?* longe repens, sed ramis brevibus erectis subsimplicibus *rigidis crassis sordide fuscis dense approximatis subcompactum*; folia *leviter in spiram contorta*, madore dense erecto-conferta, oblongo-lanceolata, dilatate valde canaliculata, obtusiuscula, nervo valido in cuspidem brevissimam exeunte, inferne lutea teneriora, superne sordide viridia firma, cellulis minutissime rotundatis opacis, basi minute quadratis pallidioribus; perich. latiora; theca in ped. brevi ovalis parvula laevis badia, apice fusca, operc. rostrato recto (?), calyptra anguste conica *pilosa badia, apice fusca*, perist. dentibus externis brevibus pallidis geminatis. †.

Leiotheca prorepens Brid. l. p. 305, 727, 795. — *Orthotrich. prorepens* Hook. Musc. Exot. t. 120.

Patria. In sinu Dusky-Bay Novae Seelandiae: Menzies 1791.

Notis cursive impressis primo adpectu cognoscitur.

14. M. Nepalense Schw. (Suppl. II. II. 2. p. 134. t. 192.); *dioicum*; repens, ramis brevissimis dense approximatis densifoliis luteo-fuscis subsimplicibus; folia caulina spiraliter imbricata, madore erecto-patentia, *apicibus erecto-curvatis, breviter lanceolatis*, alis convexis, basi firmis minute quadrate areolatis luteis, superne opacis carnosulis breviter sed densissime papillosis viridissimis, nervo subexcurrente, canaliculata, perich. *majora exserta late lanceolata longè recte cuspidata pluries plicata* incrassate irregulariter anguste quadrate areolata lutea; theca in ped. breviter exserto *cylindraceo-oblonga laevis*, orificio aurantiaco, operc. recte conico subulato, perist. *simplici*, dentibus geminatis breviusculis albidis, calyptra longe anguste conica *pilosissima thecam superante*.

Brid. I. p. 732. — *Orthotr. Nepalense* Hook. et Grev. Brewst. Edinb. Journ. I. p. 117. t. 4.

Patria. Nepal, Dhoopabasah et Beahico: Wallich.

b. *Calyptra nuda.*

α. *Pedunculus brevis.*

15. M. urceolatum Schw. (Suppl. II. II. 2. p. 128. t. 189.); dioicum? longe repens, ramis dense approximatis erectis brevissime ramulosis crassis sordide viridibus pollicaribus strictis rigidis dense pulvinatum; folia arcte denseque imbricata subspiraliter contorta, madore *erectiuscula*, *terminalia paullum patentia*, rigida, e viridi flavescentia, aetate fere aurea, inferiora badia, *fragilia*, *anguste lanceolato-attenuata obtusiuscula*, *acumine brevissimo acuto terminata*, nervo ante apicem abrupto viridi, dein ferrugineo, cellulis basilaribus rectangularibus, superioribus minute subquadratis opacis granulosi viridibus, margine saepe involuto praedita; perich. breviora; theca brevipedunculata *breviter urceolata majuscula* laevis badia, operc. recte aciculari, calyptra profunde lacinata *glabra*, perist. simplici, dentibus pallidis crassis solidariis brevibus. †.

Brid. I. p. 312, 730. — *Orthotr. urceolatum* Hook Musc. Exot. t. 124.

Patria. Insula St. Helena: Menzies.

16. M. Mauritianum Schw. (Suppl. II. II. 2. p. 127. t. 189.); *dioicum?* longe repens, ramis approximatis brevibus v. longioribus, dense foliosis subsimplicibus luteo-viridibus inferne fuscescentibus clavato-incrassatis rigidis; folia *in spiram densam* sinistrorsum ductam disposita, madore *erecto-patentia* stricta rigida, *lanceolata*, *nervo crasso in cuspidem brevem producto*, cellulis subrotundis minutis obscurioribus, basi subquadratis lunatis; perich. caulinis similia, neque longiora; theca in ped. *perbrevis urceolata ore contracta*, *laevis*, fusco-badia, operc. thecam aequante aciculari recto, calyptra theca paulisper brevior *glabra* *sulcata* luteo-badia, perist. *simplicis* dentes externi breves lanceolati albidii. †.

Patria. Insula Mauriti: Sieber.

A *M. urceolato* ramis gracilioribus et notis caeteris descriptis facile discernibile.

17. *M. microcarpum* C. Müll.; *dioicum*; humile tenellum, longe repens, sed ramis erectis gracilibus brevibus simplicibus v. *brevissime ramulosis* sordide viridibus dense approximatis dense pulvinatum, rigidiusculum; folia apice praesertim in spiram dense contortam congesta, madore erecto-patentia subappressa densissime imbricata *brevia, lanceolata acuta substricta*, profunde basi latiuscule canaliculata, margine integro convexo, nervo subevanido, cellulis ubique incrassatis, minute rotundatis, subopacis, basi quadratis pallidioribus laevibus; perich. conformia, theca *breviter pedunculata minute oralis laevis, ore valde plicata contracta, brunnea nitida*, operc. *oblique aciculari*, perist. *simplici interno*, e membrana truncata brevi composito, calyptra *glabra*.

M. microstomum Schw. in Hb. Kunzeano.

Patria. Chile: Pöppig.

M. microstomo proximum videtur.

18. *M. microstomum* Schw. (Suppl. II. II. 2. p. 130.); repens, ramis *longis* strictis apice ramosus, ramulis fastigiatis brevissimis; folia spiraliter contorta, lanceolata apiculata pallide e brunneo viridia, theca ovata laevis, ore contracto plicata, profunde brunnea, perist. simplicis *externi dentes angusti erectiusculi geminati trabeculati albi*, calyptra elongato-cylindracea angusta glabra laevis basi pluries laciniato-fissa. †.

Leiotheca microstoma Brid. I. p. 729. — *Orthotr. microstomum* Hook. et Gr. in Brewst. Edinb. Journ. I. p. 114. t. 4.

Patria. Terra Van Diemen: Dr. Spence.

A *M. microcarpo*, cui ex icone et diagnosi auctoris pauperrimis simillimum videtur, peristomii fabrica longe refugit.

19. *M. apiculatum* Brid. (I. p. 311.); *dioicum*; dense pulvinatum intertextum inferne radiculosum, ramis *longiusculis valde fastigiatis divis*is robustiusculis viridibus;

folia *maxime inordinate* horride spiraliter *crispula*, madore erecto-patentia, *longiuscule lanceolato-acuminata*, nervo *stricte excedente breviter cuspidata*, canaliculata, alis valde convexis minute rotundate basi infima ad nervum cellulis nonnullis laxis fuscis areolatis, *e basi ultra medium folii limbo angusto pellucido praeditis*; perich. conformia multo latiora; theca in ped. *breviusculo majuscule urceolato-ovalis macrostoma*, sub ore coarctata, laevis, sicca evacuata basi plicata, brevicolla firma, operculo conico aciculari recto, calyptra thecam subaequante glabra sordide lutea, apice fusca, multifida, perist. simplici, e membrana truncata firma composito.

Schw. Suppl. II. II. 1. p. 58. t. 170. — *Leiotheca apiculata* Brid. I. p. 734, 796. — *Orthotrich. apiculatum* Hook. Musc. Exot. t. 45. — *Macromitr. macrostomum* Schw. Suppl. II. II. 2. t. 190! — *M. longirostre* Hsch. in Musc. Mexic. a Deppe et Schiede lectis!

Patria. Mexico, Xalapa, regione temperata: Humboldt et Bonpland. Brasilia, Serra dos Orgãos: Beyrich, Gardner No. 58. Guatemala: Friedrichsthal No. 85.

Notis illustratis facile distinguendum. Inflorescentiam Schwägrichen in speciminibus Mexicanis monoi-cam, in ramulis propriis gracillimis terminalem, fol. perig. parvis ovatis acutis, observare dicit. In spec. nec Brasiliensibus nostris, a quibus diagnosin duximus, nec Mexicanis a Deppe et Schiede lectis, non vidimus.

20. *M. brevipes* C. Müll.; *dioicum*; dense pulvinatum tenellum humile *rigidissimum luteo-fuscum* longe repens, ramis brevibus simplicibus v. fastigiatis ramulosis, folia *inordinate horride spiraliter contorta*, madore erecto-patentia, oblongo-ligulata obtusiuscula, nervo excurrente breviter mucronata, cellulis hexagone-rotundatis ob papillas granulosas opacis, basi magis incrassatis, alis convexis hic illic plicatis, basis margine in limbum angustum incrassatis, viridibus; perich. conformia; theca in ped. *perbrevis* curvulo, madore recto rigido flavido purpurascens *minute elliptica microstoma* laevis pallide fusca *gymnostoma*, operc. breviter aciculari recto, calyptra nuda.

M. apiculatum C. Müll. Bot. Zeit. 1845. p. 525. — *Orthotr. elegans* Hsch. (non Schw.) in Musc. Sieb. No. 21.

Patria. Insulae Martinique: Hb. Fée, Guadeloupe: Bertero, Trinidad: Sieber.

A *M. Swainsoni* notis cursive impressis facile distinguitur. A *M. apiculato*, ejus forma tanquam humilis putari potest, statura humili, foliis magis ligulatis et thecae gymnostomae forma jam satis differt.

21. *M. longirostre* Schw. (Suppl. II. I. p. 38. t. 112.); *dioicum?* caulis longe repens *densifolius crasse filiformis*, ramis pinnatis fastigiatae divisis et iterum ramulosis longiusculis multis erectis *aureis incrassatis, sed apice acutis*, rigidis *fragilibus*; folia in spiram *laxam inordinatam horridam* contorta, madore erecto-conferta arcte imbricata, *late lanceolata cuspidata stricta rigidissima* excurrentinervia, basi dilatate canaliculata, alis convexiusculis, cellulis *minutis punctiformi-quadratis sublaevibus, diaphanis pellucide flavidis*; perich. conformia; theca in pedunculo brevi crasso flavido dein purpureo oblonga leviter 8 plicata subaurea dein brunnea, operculo aciculari recto, perist. simplici, dentibus erectis longiusculis calyptra glabra aurea multifida.

Brid. I. p. 310. — *Orthotrich. longirostre* Hook. Musc. Exot. t. 25. — *Macromitr. acutifolium* Brid. I. p. 735 seu *Orthotr. acutifolium* Hook. et Grev. in Brewst. Edinb. Journ. I. p. 118. t. 5. in Terra van Diemen lectum e specim. antarcticis Hookerianis forma thecae magis ovali praedita huc revocandum est.

Patria. Dusky-Bay Novae Seelandiae: Menzies. Terra Van Diemen: Dr. Spence et Neill. Insulae Aucklandi et Campbelli: J. D. Hooker.

Species pulcherrima, ramis aureis saepe nitidis incrassatis inordinate spiraliter foliosis primo intuitu distinguenda.

β. *Pedunculus longissimus.*

22. *M. longipes* Schw. (Suppl. II. 2. p. 147. t. 139.); *dioicum?* *M. longirostri* simillimum, sed differt foliis *lanceolatis obtusiusculis brevioribus*, pedunculis *longissimis*

thecisque oblongo - ellipticis sordide fuscis *sublaevibus ore plicatis*. †.

Brid. I. p. 317, 737. — *Orthotrich. longipes* Hook. Musc. Exot. t. 24.

Patria. Dusky-Bay Novae Seelandiae: Menzies 1791.

23. M. Blumei Nees (in Schw. Suppl. IV. t. 316.); *dioicum*; laxissime pulvinatum intertextum longe repens, ramis erectis longiusculis gracilibus teretibus subrigidis fastigiatim ramulosis fusco - luteis, inferne ferrugineis, siccis *apice acutis*; folia spiraliter contorta, madore erecto - patentia, latiuscule lanceolata, nervo excedente acute mucronata, profunde canaliculata, medio utrinque subgibbosa, alis convexiusculis, cellulis *grosse rotundatis incrassatis* subviridibus inferne magis rectangularibus luteis tuberculose papillois; perich. perichaetium subtrigonum efficientia breviora *latissime ovata obtusa crenulata*, mucronata; theca in ped. *longissimo rigido subpyriformi-urceolata brevicolla nitidissima laevissima, ore coarctata, aurantiaca dein brunnea*, sicca basi plicata, operc. longe aciculari recto, calyptra *nitidissima* latiuscule campanulata *apice scabra ubique valde plicata*, perist. simplici externo imperfecto, dentibus brevissimis truncatis pallidis basi connatis.

M. Miquelianum Mont. in litt. — *Schloth. teres* Dz. et M. Ann. des sc. nat. 1844. 2. p. 314.

Patria. Java: Blume primus legit. E provincia Buitenzorg lectum Hb. Miquel. copiosissime accepit.

Notis illustratis species pulcherrima.

C. *Folia incumbenti-contorta.*

1. *Folia elongate acuminata aristata.*

24. M. piliferum Schw. (Suppl. II. II. 1. p. 66. t. 172.); *dioicum*; longe repens, ramis remotis incrassatis subclavatis rectis luteo - viridibus, dein fuscis subsimpli-
cibus; folia caulina dense imbricata crispula, madore erecto - patentia, *lanceolata et in aristam flexuosam tenuissimam acicularem producta, fragilia, complicata, subqua-*

drate minute areolata, summa et perich. longiora; theca in ped. breviuscule exserta *oblongo-ovata*, *utrinque contracta*, *costis elevatis subsenlis*, badio-fusca, operc. rostrato recto, peristomio *nullo*, calyptra magna thecam aequante pilosissima. †.

Brid. I. p. 797. — *Orthotrich. lanceolatum* W. Arn. Disp. d. M. 1825. p. 16; sub pag. 17 auctor eandem speciem nomine *M. piliferi* iterum enumeravit! — *Ulota pilifera* Nees in Nov. Act. Acad. Caes. Leop. XVI. Suppl. II. 1843. p. 477.

Patria. In insulis Sandwicensibus leg. Gaudichaud et Menzies. Oahu: Meyen.

A *M. cuspidato* notis illustratis longe recedit.

25. *M. cuspidatum* Himp. (Ic. Musc. t. 20.); *dioicum*; caulis longissime repens, ramis erectis remotis incrassatis dense foliosis sordide viridibus subsimplicibus; folia caulina late lanceolata, *lamina apice acuminata v. inaequaliter obtusiuscula emarginata angusta*, *nervo excedente longe flexuose aristata*, margine basi parum revoluta, longitudinaliter plus minus plicata, profunde canaliculata, integra, cellulis longiusculis angustis *pellucidis lunatis* apice quadratis minoribus; perich. longius aristata; theca in ped. *breviter exserto ovalis laevis*, operc. conico longe aciculari recto, calyptra amoene plicata parum hirta, perist. *simplici* e dentibus brevibus involutis teneris sedecim solitariis composito.

M. elongatum Dz. et M. Ann. des sc. nat. 1844. II. p. 311.

Patria. Java: Blume, Junghuhn; Borneo et Sumatra: Korthals.

Notis datis a *M. pilifero* affini facile refugit.

26. *M. pentastichum* C. Müll. (Linn. XXI. p. 186.); *dioicum*; longissime repens, ramis remotiusculis elongatis *flaccidis* subsimplicibus viridibus *eximie pentastiche foliosis gracilibus*; folia caulina parum crispula, madore valde patula patienti-divergentia laxa imbricata, *anguste lanceolata acuminata longiuscula*, margine *undulato-flexuoso* erecto v. convexiusculo, ubique fere tenuitèr crenulato, grosse papillosa, profunde canaliculata, viridia rufinervia,

cellulis hexagono-rotundatis striatis; perich. *longissime loriformia*; omnia excurrentinervia; theca in ped. *breviter exserto ovalis leptodermis laevis*, calyptra maxime profunde laciniata angusta, *pilis latis incrassatis flexuosis valde hirta*.

Patria. Surinam, in sylvis valde humidis opacis pr. Mariepaston ad flum. Saramacca dictum, ramos arborum tenues habitans, sed rarius: Kegel 1846. *Majo*.

Operculum et peristomium desunt. Notis illustratis jam facillime cognoscendum. Theca annulata videtur.

27. M. cirrhosum Brid. (l. p. 316, 738, 798.); *dioicum*; longe repens, ramis elongatis simplicibus v. dichotomis, madore flaccide foliosis, pallide luteis; folia caulina valde crispula, elongata, *e basi latiore lanceolata et in acumen angustum longum acutum argute et tenuiter serrulatum producta*, canaliculata, *minus reflexa*, ala unica basilari depressa, superne vix rugulosa, cellulis basilari-bus rectangularibus flexuosis incrassatis tuberculoso-papillosis, superioribus sensim minoribus quadratis; theca in ped. *breviusculo globoso-ovalis laevis* brunnescens, opere. e basi conica recte subulato, perist. duplici: dentes ext. 16 geminati *breviusculi* rufescentes, interni *membrana erecta irregulariter in dentes 16 breviores fissa* lutea, calyptra laevis.

Schlotheimia cirrhosa Schw. Suppl. III. 1. 1. t. 201. — *Orthotrich. cirrhosum* Hook. et Grev. Brewst. Edinb. Journ. 1. p. 130. t. 6. — *Neckera cirrhosa* Sw. Fl. Ind. Occ. III. p. 1802. — *Anoetangium cirrhosum* Hdw. Sp. Musc. p. 42. t. 5. — *Hypnum cirrhosum* Sw. Prodr. Fl. Ind. p. 142.

Patria. Jamaica temperata, supra truncos arborum: Swartz; insula St. Vincent: Menzies et al.; Brasilia: Beyrich, Gardner No. 70.

A *M. longifolio* proximo notis cursive impressis facile distinguitur. Peristomium imperfectum tantum vidimus.

28. M. ochraceum C. Müll. (Bot. Zeit. 1845. p. 544.); *dioicum?* longe prorepens vage ramosum, ramis distanti-

bus elongatis adscendentibus simplicibus v. fastigiatis divisis ochraceo-lutescentibus; folia caulina tortilia, madore recurvo-patentia, elongata, e basi late oblonga recurva lanceolata longe acuminata, flexuosa, margine medio folii parum convexo, apice crenulate denticulato, nervo rufo excurrente, cellulis basi dense angustis longiusculis *acute elevate papillosis scaberrimis* superne incrassate rotundatis *veluti mammillari-punctatis*, profunde canaliculata; perich. longissime acuminata, nervo excurrente quasi cuspidata; theca in ped. *elongato scaberrimo* erecta *ovalis, sicca costato-plicata*, operc. convexo subulato, calyptra basi laciniata *dense pilosa*.

Schlotheimia ochracea Dz. et M. Ann. d. sc. nat. 1844. 2. p. 314. — *Macromitr. cirrhosum* Dz. et Molke. et A. Braun Mst.

Patria. Java: Zippelius.

Notis cursive impressis a *M. cirrhoso* affini primo momento distinguitur. Peristomium et calyptram non vidimus.

29. *M. perichaetiale* C. Müll. (Bot. Zeit. 1845. p. 544.); repens, ramis longiusculis parce divisis fusciscentibus robustis densifoliis; folia crispatula, madore patentia, dense imbricata, *lanceolata acuta* carinata, luteo-fuscescentia, nervo ferrugineo *in cuspidem brevem in perichaetialibus longissimam setaceam exeunte*, cellulis elongatis angustis densis, apice incrassate anguste ellipticis; theca in ped. longo ovalis laevis fusco-badia, perist. *duplici fragilissimo*; dentes externi lineari-lanceolati obtusi linea longitudinali valde exarati, interni sedecim ima basi connati latiusculi lutescentes, calyptra *pilosa* 4—5 fida. †.

Schlotheimia perichaetialis Schw. Suppl. II. II. 1. p. 56. t. 169. — *Leiotheca perichaetialis* Brid. l. p. 731. — *Orthotrich. perichaetiale* Hook. et Grev. in Brewst. Edinb. Journ. l. p. 127. t. 6.

Patria. Insula St. Vincent: Menzies et Guilding.

M. truncato habitu ex icone simile videtur, sed obscurius.

30. *M. gracile* Schw. (Suppl. II. 2. p. 39. t. 112.); *dioicum?* ramis gracilibus elongatis flexuosis remotis sub-

simplicibus inaequalibus luteo-fuscis; folia crispata, madore laxe patentia erecta, *lanceolato-acuminata*, *angusta*, *nervo in subulam elongatam flexuosam madore quoque semel tortam excurrente*, canaliculata, cellulis minute quadratis punctatis, basi elongatis, parietibus transversalibus obsoletis; perich. *duplo fere longiora*; theca in ped. *breviter exserto oblonga laevis*, basi subplicata, fusca, operculo *thecam aequante v. superante tenuissime aciculari*, calyptra profunde multifida glabra fusca angusta; perist. simplicis ext. dentes breves obtusi pallidi. †.

Brid. I. p. 315. — *Leiotheca gracilis* Brid. I. p. 730. — *Orthotrich. gracile* Hook. Musc. Exot. t. 27.

Patria. Dusky-Bay Novae Seelandiae: Menzies 1791.

2. *Folia lanceolata plus minus acuminata.*

a. *Robusta.*

α. *Folia erecto-patentia.*

31. *M. tomentosum* Hsch. (fl. Bras. I. p. 21.); *dioicum*; repens, dense pulvinatum tomentosum, ramis erectis subsimplicibus, inferne radiculoso-tomentosis, superne foliosis; folia densa erecta, apice paullo incurva, sicca *tortilia, linearia mucronulata carinata basi ad medium (papillis?) denticulata*, apicem versus integerrima, inferiora fusca, suprema luteo-viridia, nervo subevanido, cellulis circularibus minutis seriatis; theca in ped. vix semiunciali purpurascente erecta oblongo-cylindrica angusta, 4 *sulcata, sicca tortilis, purpurascens*, operc. subulato recto duplo breviori luteo-albo, calyptra theca dimidia fere brevior glabra sulcata, lobis 8 ovatis brevibus, inferne ferruginea superne fusca; perist. simplicis membrana tenera integra reticulata albida subhyalina apice fatiscens. †.

Patria. Brasilia, in campis Montevideosibus: Sellow.

Auctor *M. longirostri* Schw. comparavit, sed mirum sane! speciem hancce Novae Hollandiae (Seelandiae!) indigenam ab eo (p. 21.) rectius denotatam in pag. 23. Brasiliae habitantem enumeravit!

32. M. nitidum Hook. et Wils. (Lond. Journ. of bot. 1844. fasc. Mart.); *dioicum*; repens, ramis *erectis fastigiatim ramulosis dense approximatis* luteo-viridibus densifoliis *conferte pulvinatum*; folia crispula, madore erecto-patentia, oblongo-acuminata acuta, *apice parum curvata*, canaliculata, alis parum convexis, cellulis basi sublunatis, superne minute rotundatis, luteis; perich. late lanceolata *cuspidata* tenuiora; theca in ped. longiusculo flexuoso flavido purpurascente ovalis, ore angusto, laevis fuscidula, sicca plicata, operc. conico aciculari recto, aurantiaco, calyptra longe conica glabra, dentibus externis longe infra orificium oriundis granulosis albidis longiusculis obtusis subintegris discretis.

M. microstomum Hsch. (nec Hooker!) Fl. Bras. I. p. 21?

Patria. Brasilia: Gardner No. 52.

M. Reinwardti haud dissimile, sed ramis multo gracilioribus, nec incrassatis turgidis, nec simplicibus jam primo adspectu distinguendum.

33. M. Reinwardti Schw. (Suppl. II. II. 1. p. 69. t. 173.); *monoicum*; longe repens prostratum pinnate ramosum, ramis depressis brevibus incrassatis densifoliis *apice attenuatis luteo-viridibus subsimplicibus*; folia crispula, madore parum patentia erecto-curvata, e basi lanceolata anguste acuminata acuta erecto-uncinata, profunde canaliculata, margine integerrimo erecto v. vix convexo, cellulis basi sublunate elongatis angustis luteis, superne quadratis multo minoribus incrassatis; perich. late lanceolata acuminata, intima nervo excedente recte et tenuiter cuspidata; theca in ped. *elongato* flexuoso *majusculè ovata brevicolla laevis fusca*, ore plicata, operc. longe et recte subulato tenui, perist. *simplici*, e dentibus lanceolatis albidis rugulosis discretis linea longitudinali exaratis composito, calyptra glabra.

Leiotheca Reinwardti Brid. I. p. 796.

Patria. Java: Reinwardt primus legit.

Flos masc. in vicinia feminei turgide gemmaceus, fol. perig. late ovatis obtusis crenulatis, acumine brevi acuto terminatis, antherid. majusculis, paraphys. flavidis cinctis.

34. M. hemitrichodes Schw. (Suppl. II. II. 2. p. 136. t. 193.); *dioicum*; longe repens, sed dense pulvinatum, ramis brevibus densissime approximatis robustis densissime foliosis luteo-fuscis subsimplicibus rigidissimis fragilibus subclavatis; folia caulina parum crispula, madore erecto-patentia densissime conferta apice substellatim disposita, oblongo-lanceolata substricta rigida, canaliculata, alis margine reflexo-convexis, basi papillis elevatis remotis scabris et cellulis flavidis anguste rectangularibus incrassatis, superne rotundate areolata viridia opaca densissime breviter papillosa; perich. lanceolata, intima apice haud opaca; theca in ped. rigido longiusculo purpureo apice flavido elliptica, ore angustata, laevis, sicca ruguloso-plicata, operc. aciculari recto, perist. simplici, dentibus brevibus latiusculis obtusis inflexiusculis ruguloso-albidis, calyptra angusta angulate plicata, pilis simplicibus fugacissimis paucissimis oblecta, plerumque glabra.

Patria. Nova Hollandia: G. Sieber.

Notis cursive impressis facile cognoscitur.

35. M. Moorcroftii Schw. (Suppl. II. II. 1. p. 67. t. 172.); *dioicum*; longe repens, ramis approximatis longiusculis parce breviter divisis luteo-viridibus; folia caulina crispula, madore flexuoso-patula, laxius imbricata, apicibus erecto-curvatis, anguste lanceolata acuta acuminata, apice falcato acuto, nervo excurrente, profunde canaliculata, cellulis viridissimis, basi rectangularibus rectis incrassatis, ad nervum infimum laxis, superne minutissime rotundatis granuloso-opacis, ad marginem erectum tenuiter crenulatis; perich. conformia; theca in ped. purpureo longiusculo oblongo-cylindracea purpureo-aurantiaca, basi aurea, sulcata, operculo recte rostrato, calyptra latiuscule campanulata pilosa, perist. simplici externo, dentibus brevibus albido-rugulosis.

Brid. I. p. 305, 727, 795. — *Orthotrich. Moorcroftii* Hook. et Grev. in Brewst. Edinb. Journ. I. p. 116. t. 4.

Patria. Nepal, Simirague: Dr. Moorcroft.

Notis illustratis, praesertim thecae angulatae colore primo adpectu distinctissima species.

36. M. Neelgheriense C. Müll.; *dioicum*; laxè pulvinatum *longicaule subgracile* valde et elongate fastigiata divisum luteo-fuscescens; folia caulina crispula, madore erecto-patentia, e basi latiuscule oblongà anguste lanceolata *longius* acutissima curvata *haud undulata*, cellulis basi angustis longiusculis parum tuberculoso-papillosis, superne multo minoribus subrotundatis *obscuris* epapillosis; perich. *longius et angustius acuminata*, superne valde *uncinata*; theca in ped. longiusculo *cylindraceo-oralis* profunde sulcata, brevicolla, recte rostellata, calyptra glabra straminea, perist. duplici.

M. serpens Mont. in Musc. Neelgheriensib.

Patria. Montes Neelgherienses: Perrottet.

Perist. illud. *M. sulcati*, e foliis simillimi, sed notis cursive impressis certe distincti, videtur.

β. Folia reflexa.

37. M. longifolium Brid. (l. p. 309 et 738.); *dioicum*; amoene aureum, inferne tomentosum, ramis longiusculis subsimplicibus; folia caulina valde crispata, madore maxime patula flaccida, elongata *ubique angustato-lanceolata acuminata acutiuscula*, apice minute denticulata, basi longa erecta, superne *distincte reflexa* flexuosa, margine convexa, apicem versus *plus minus rugulosa*, cellulae basilares rectangulares incrassatae tuberculoso-papillosae, superiores sensim rotundatae, papilla unica notatae igitur unipunctatae, perich. longius acuminata; omnia *apice crenulato-denticulata* subexcurrentinervia; theca in ped. longiusculo flexuoso *urnigero-oralis brevis*, *sub ore courctata*, *profunde sulcata*, cinnamomea, annulata, operculo e basi conica subito aciculari concolori, perist. duplici: dentes ext. bigeminati late lanceolati dense articulati *longiusculi*, articulis *margine rotundatis*, *interni*: membrana alta in dentes *multo teneriores breviores*, *subregulares runcinatos fissa*, calyptra glabra.

Schlotheimia longifolia Schw. Suppl. III. l. 1. t. 201. — *Schl. oblonga* Tayl. Lond. Journ. of bot. 1846. p. 46. ex animadv. Wilsoni l. c. p. 449. huc pertinet. — *Orthotrich. longifolium* Hook. Musc. Ex. t. 44.

Patria. Ad radices *Befariae glaucae* alt. 950 hexapod., reg. temperata, in devexis montis Avilae pr. Caracas Columbiae: Humboldt et Bonpland. Silla de Caracas: Moritz. In Andibus prope Quito legit W. Jameson.

A *M. cirrhoso* proximo notis illustratis longe distat.

38. *M. sulcatum* Brid. (l. p. 319, 738.); *dioicum*; *M. longifolio* simillimum, sed flavo-virens, folia breviora, lanceolata longiuscule acutissima, basi papillis tuberculosa, superne minutissime rotundate arcolata viridia epapillosa, valde undulata, integra vel obsolete crenulata, basi cellulis nonnullis laxioribus teneris fuscis; theca annulata; peristomium duplex, internum: membrana alta in lacinias irregulares hic illic fissa, calyptra glabra.

Schlotheimia sulcata Hook. Musc. Exot. t. 156. — *Orthotrich. sulcatum* Hook. et Grev. Brewst. Edinb. Journ. l. p. 129.

Patria. Nepal: Gardner.

39. *M. Regnellii* Hmp. (in litteris!); *dioicum*; laxe intertextum, ramis elongatis inaequaliter fastigiatim ramulosis gracilioribus magis teretibus flexuosis luteo-viridibus inferne fuscescentibus; folia crispula, madore reflexa flexuosa, longiuscule angustate oblongo-lanceolata, haud longe acuminata subulata, apice tenuiter et argute serrata, alis convexis undulatis, canaliculata, cellulis basi rectangularibus brevibus, papillis tuberculosus scabris, superne minutissimis punctiformibus, nervo excurrente; perich. erecta late lanceolata acuminata plicata pellucidiora lutescentia subintegra; theca in ped. elongato flexuoso purpureo urceolato-oblonga brevicolla, ore angusto, intense fusca nitida, laevissime plicata, operc. conico aciculari recto, calyptra laevi straminea; perist. duplex: externum e dentibus brevissimis veluti truncatis obtusatis valde trabeculatis latis pallidis in membranam veluti connatis, internum e membrana tenui truncata formata.

Patria. Brasilia, Minas Geraës, ad Caldas: Dr. Regnell.

Notis cursive impressis a *M. cirrhoso* proximo longe distat.

b. *Graciliora.*α. *Folia erecto-patentia.*†. *Theca laevis.*

40. *M. fimbriatum* Schw. (II. I. p. 37. t. 111.); *repens ramosior, rami crassiores densius foliosi; folia madore erecto-patentia, duplo minora oblonga, mucronata, apice erecto-curvata; perich. oblongo-lanceolata; theca in ped. magis terminali magis elongata oblonga v. cylindrica laevis, operculo brevius aciculari, calyptra thecam aequante basi crenato-laciniata, peristomio nullo? †.*

Orthotrich. fimbriatum P. B. Prodr. p. 80. — *Macromitr. uncinatum* Brid. I. p. 308, 735, 797. — *Weisia uncinata* ej. Mant. Musc. p. 42.

Patria. Insula Tristan d'Acunha et Franciae: Aub. du Petit-Thouars. An patria duplex recta?

Notis cursive impressis a *M. aciculari* differt.

41. *M. serpens* Brid. (I. p. 736.); *dioicum; longe repens prostratum, ramis tenellis erectis breviusculis gracilibus amoene pallide viridibus inferne ferrugineis subsimplicibus; folia crispula, madore erecto-patentia, apicibus parum erecto-curvatis, dense conferta, oblongo-attenuata obtusiuscula v. acutiuscula, alis basi convexo-plicatis pellucidis breviter lunate areolatis, remote tenuissime papillois, superne minutissime areolatis granulose opacis pallidis convexiusculis, profunde canaliculata; perich. intima magis lanceolata ubique pellucida; theca in ped. breviusculo aurantiaco minute elliptica laevis, sicca evacuata leviter plicata, pallide aurantiaca dein fusca nitens, operc. conico tenuissime subulato recto, calyptra thecam aequante amoene maxime multifida pallide straminea, filis maxime singulis simplicibus hic illic tecta; perist. simplicis ext. dentes anguste lanceolati valde rugulosi albid.*

Orthotrich. serpens Hook. et Grev. in Brewst. Edinb. Journ. I. p. 119. t. 5.

Patria. Prom. bonae spei, ubi in truncis ramisque arborum sylvaticarum pr. George's Plain regionis Anteni-

qua - Land primus leg. Burchell; Olifantshoek distr. Uitenhagen: Ecklon.

Notis cursive impressis a *M. subtili* affini facillime distinguendum.

42. *M. amoenum* Hsch. (in Musc. Sieber. Nov. Holl.); *dioicum*; *M. serpenti* simillimum, sed foliorum cellulae basilares *rectangulares v. rotundate quadratae flavidae multo robustiores distinctius papillosae*, superiores viridissimae; perich. late lanceolata plicata, omnia supra basin granulose reticulata.

Patria. Nova Hollandia: Sieber.

Operculum et calyptram non vidimus.

43. *M. Japonicum* Dz. et M. (Ann. d. sc. nat. 1844. 2. p. 311.); repens, ramis brevissimis erectis simplicibus; folia contorta, madore dense imbricata patula apice erecto-curvata oblongo-lanceolata acuminata acuta, canaliculata, evanidinervia, alis convexis, e cellulis *ubique minutissime quadratis laevibus basi hic illic laxioribus pellucidis arco-lata*; theca erecta ovato-oblonga, operculo convexo-conico subulato-rostrato, calyptra profunde incisa pilosa, perist. simplici, dentibus brevibus.

Patria. Japonia: a Siebold.

A *M. subtili* et *angustifolio* notis cursive impressis primo momento differt.

++. *Theca sulcata.*

44. *M. Richardi* Schw. (Suppl. II. II. 1. p. 70. tab. 173.); *dioicum*; longe repens tenellum, ramis brevissimis simplicibus v. longioribus breviter et fastigiatim ramulosis viridibus; folia crispa, madore *erecto-patentia, breviter lanceolata rectiuscula* canaliculata, nervo in acumen brevissimum exeunte, superne minute rotundate areolata; perich. *conformia*; theca in ped. longiusculo minute ovata, ore angusto, plicis octo ad orificium profundioribus, *in thecae madidae ventre oblitteratis, sicca angustior et profunde plicata, badia, dentibus externis brevibus obtusis pallidis.* †.

Brid. I. p. 798.

Patria. Guiana: Richard.

M. filicauli proximum, sed quoad sectionem jam distinctum.

45. **M. brachyrrhynchum** Schimp. (mst.); *dioicum*; repens intertextum, ramis *gracilibus tenuibus elongatis* parce divisis *luteo-ferrugineis*, *summis apicibus viridibus*; folia *crispula*, *madore laxa imbricata erecto-patentia*, *oblongo-lanceolata acuta*, *parum curvata*, margine *convexiuscule flexuoso v. undulato subcrenulato*, *canaliculata*, *excurrentinervia*, *cellulis basi quadratis minutis subpellucidis*, *superne grossius rotundate hexagonis tenuissime papillosis*; perich. *magis acuminata*, *cellulis superne magis ellipticis*; theca in ped. *brevi suburceolato-oblonga brevicolla*, *sulcata fusca*, dein *brunnea*, *annulata*, operculo *conico recte aciculari breviusculo*, calyptra thecam *subaequante angusta laevi*; perist. *externi dentes in membranam carnosulam apice crenato-rotundatam truncatam veluti connati*, *interni membrana vix conspicua tenuissime membranacea truncata*.

Schlotheimia brachyrrhyncha Schw. Suppl. II. II. 1. p. 53. tab. 168. — Brid. I. p. 800. — *Schloth. viticulosa* Radd. Critt. Bras. p. 28? seu *Macromitr. viticulosum* Brid. I. p. 738.

Patria. Brasilia, ad saxa pr. Rio Janeiro: Beyrich.

Notis cursive impressis ab affinibus facile distinguitur. Calyptram nobis saepius visam, a Schwägrichen subpilosam dictam, glabram semper invenimus.

46. **M. Didymodon** Schw. (Suppl. II. II. 2. p. 138. t. 190.); *monoicum*; prostratum, ramis *ascendentibus gracilibus teneris luteo-viridibus breviter ramulosis*; folia *crispata*, *madore erecto-patentia*, *apicibus erecto-curvatis*, *oblongo-attenuata*, *apice parum incurvata*, *profunde canaliculata*, *ala una maxime convexo-reflexa*, *altera planiuscula*, *cellulis grosse rotundis et turgide papillosis diaphanis subopacis*, *nervo evanido*; perich. *erecta late lanceolata cuspidata*; theca in ped. *longiusculo purpureo crasso flexuoso minute cylindraceo-ovalis microstoma*,

8 *plicata* pallide fusca leptodermis, calyptra anguste conica sordide straminea, *basi parum laciniata truncata theca brevior appresso-pilosa*, operc. recte aciculari; perist. simplicis dentes solitarii latiuscule lanceolati obtusi ruguloso-albidi.

Patria. Brasilia, ubi ad vicum Novo-Friburgum primus legit Beyrich mens. Decbr. Serra dos Orgãos: Gardner No. 54. Insula St. Catharina: Pabst, Jun. et Julio 1847.

Flos masc. ad basin rami fertilis minutus, fol. perig. parvis late ovatis subligulatis.

47. **M. macrothele** C. Müll. (Bot. Zeit. 1848. p. 766.); *dioicum*; late dense pulvinatum tenellum densifolium rubiginosum, apice solo luteo-viride, repens, ramis humilibus subsimplicibus; folia dense crispula, madore erecto-patentia, *angustissime lanceolato-acuminata*, nervo *excedente longiuscule mucronata* apice erecto-curvata, canaliculata, alis planiusculis, cellulis grossiuscule hexagone rotundatis, ob papillas granulosas opacis, basi majoribus rectangularibus angustis incrassatis ob papillas solitarias verruciformes mammillate tuberculosi; perich. brevia, late lanceolata acuminata, cellulis grossiuscule ellipticis; theca in ped. brevi *minute pyriformi-oblonga sublongicolla profunde sulcata* brunnescens, operc. recte subulato, calyptra nuda; perist. *duplex*, externum: dentes arctissime approximati, in membranam veluti conflati aurantiaci, internum: membrana rugulosa albida altiuscula, in dentes irregulares fugacissimos fissa.

Patria. Columbia, Galipan prov. Caracas, alt. 5000': Funck et Schlim in Coll. Linden. No. 364, in lapidibus humidis. Varietatem fol. magis flexuosis ad trunc. arbor. prope Lagunita prov. Meridae alt. 6000', Septbr. lect. sub No. 993 accepimus.

Notis cursive impressis species tenella facile cognoscenda.

β. *Folia reflexa.*

48. **M. longicaule** C. Müll.; *dioicum*; *longicaule* parce divisum luteo-virens, *aequaliter gracile*; folia cau-

lina crispula, madore reflexa, e basi erecta oblongà *valde reflexa anguste lanceolata acuminata, apice remote et obsolete denticulata*, haud rugulosa, cellulis basilaribus lunatis pellucidis elevato-papillosis, caeteris supra basin brevem positis quadratis *obscuris veluti granulosis diaphanis*, nervo evanido; perich. conformia; theca in ped. *brevissime exserto globosa laevis badia*, operculo recte rostrato, peristomio *simplici*: dentibus sedecim discretis late lanceolatis granuloso-albidis, calyptra late campanulata *apice parum hirta*, pulchre plicata et laciniata.

M. cirrhosum Mont. in Hb. Miquel.

Patria. Java: Miquel Hb.

A *M. cirrhoso* parum simili notis cursive impressis longe distat.

49. *M. angustifolium* Dz. et M. (Ann. d. sc. nat. 1844. 2. p. 311.); *dioicum*; repens, ramis ascendentibus approximatis longiusculis gracilibus densifoliis simplicibus v. *fastigiatis divisis*, ramis brevioribus intermixtis, sordide flavidis; folia valde crispula, *madore horizontalia, apicibus erecto-curratis*, lineari-lanceolata, basi erecta, medio reflexa, apice curvata, acuta, margine *integro erecto* v. parum convexo, profunde canaliculata excurrenti-nervia, cellulis pallidis, basi breviter lunatis pellucidis, superne minute quadratis opacis *sublaevibus*; perich. conformia; theca in ped. breviusculo *subgloboso-ovalis*, *evacuata urceolata, obsolete plicata*, fusca, operc. conico recte aciculari, calyptra angusta pilosa, perist. simplici, *dentibus brevibus irregulariter lanceolatis tenuiter membranaceis laevibus veluti obsoletis*.

Patria. Amboina, unde habemus, Sumatra, Borneo, Java.

Ex habitu *M. longicauli* affine et notis illustratis facile discernibile.

50. *M. semipellucidum* Dz. et M. (Ann. d. sc. nat. 1844. 2. p. 311.); *dioicum*; longe prorepens flexuosum vage ramosum, ramis rectis brevibus tenellis densifoliis luteis simplicibus; folia caulina crispula, madore subhori-

zontalia apicibus patentibus, haud erecto-curratis, anguste lanceolata obtusiuscula, nervo excedente breviter mucronata, substricta, margine integerrimo saepe undulato erecto vix convexo, profunde canaliculata, basi longa pellucida e cellulis breviter lunatis reticulata, superne cellulis minutissimis rotundatis maxime opacis tenuissime granulosus; perich. conformia; theca in ped. breviusculo ovato-oblonga basi plicata, operculo convexo subulato, calyptra pilis appressis parum hirta angusta.

Patria. Borneo: Korthals.

A *M. angustifolio* notis cursive impressis facile distinguitur. Thecam et peristomium (nullum?) non vidimus.

51. *M. subtile* Schw. (Suppl. II. II. 2. p. 140. t. 192.); dioicum; longe repens tenellum, ramis vagis breviusculis gracilibus subsimplicibus luteo-viridibus; folia caulina crispula, madore laxissime conferta tenera subhorizontalia, erecto-flexuosa, anguste lanceolata acuminata acuta mucronata, basi erecta brevi pellucida lunato-arcolata, medio reflexa, apice erecto-curvata, superne valde opaca granulosa viridia, margine plerumque convexo; theca in ped. breviusculo minute ovalis sublaevis, operculo conico acuto recto, perist. nullo, calyptra anguste conica pilosiuscula.

M. incurvifolium Mont. Voy. au Pôle Sud.

Patria. Otaheite: Menzies primus legit.

A *M. semipellucido* notis cursive impressis distat, a *M. angustifolio* statura multo teneriore humiliore, thecae forma, peristomio carente et foliis superne multo obscurioribus laxissime imbricatis distinguitur.

52. *M. aciculare* Brid. (Mant. Musc. p. 132.); dioicum; longe repens, ramis erectis subsimplicibus longiusculis v. brevibus pallide viridibus tenellis gracilibus subteretibus; folia in series obliquas contorta crispula, madore reflexa, anguste lanceolata acuminata acuta, basi erecta, superne reflexo-currata, carinata, alis convexis, cellulis basilaribus pellucidis breviter lunatis, superioribus minu-

tis punctiformibus opacis granulosis; perich. *perfectius lanceolata erecta*; theca in ped. longiusculo *subglobosa parva laevis*, operculo subulato recto, calyptra maxime et profunde lacinata *glabra*, dentibus externis brevibus geminatis lanceolatis albidis.

Schw. Suppl. II. I. p. 35. t. 111. — Brid. I. p. 307, 730. — *Orthotrich. aciculare* Hook. et Grev. in Brewst. Edinb. Journ. I. p. 114. — *O. pallidum* P. B. Prodr. p. 81. — *O. breve* ej. l. c. p. 80, quod Bridel sub nomine „*O. laeve*” P. B. false escripto ad *Schlotheim. torquatam* retulit. — *Schloth. acicularis* Brid. Sp. Musc. II. p. 21. — *Trichostom. arbustorum* ej. l. c. I. p. 241. — *Lasia acicularis* Spreng. in Steud. Nom. Crypt. p. 231.

Patria. Insulae Bourbonis et Franciae: Aubert du Petit Thouars.

53. *M. filicaule* C. Müll.; *dioicum*; longe et flexuose repens, ramis rectis curvatis gracilibus tenellis breviusculis luteo-viridibus subsimplicibus; folia in series obliquas contorta crispula, madore reflexa, brevia, lanceolato-acuminata, apicibus saepe attenuatis curvatis, angusta, canaliculata, alis vix convexis, cellulis *luteis*, *basi angustis elongatis densis*, *superne minute quadratis*; perich. *late lanceolata* nervo excedente *longiuscule mucronata*; theca in ped. *elongato flexuoso tenui purpurascente flavido perfecte ovalis parvula brunnescens nitida laevis*, ore *plicata*, opere. *longe subulato obliquo*, dentibus *externis* brevibus obtusis carnosulis ruguloso-albidis.

M. aciculare C. Müll. in Gardneri Muscis Bras. No. 53. B. — *M. microstomum* Hsch. Fl. Bras. I. p. 21?

Patria. Brasilia: Gardner.

A *M. aciculari*, habitu affini, notis cursive impressis longe refugit; a *M. Richardi* foliis perfecte reflexis jam distat.

54. *M. orthostichum* Nees (in Schw. Suppl. IV. t. 316.); *dioicum*; repens, sed inferne intertextum radiculosum, ramis erectis pluries breviter ramulosis luteo-viridibus gracilibus rigidiusculis; folia erecto-imbricata crispula, *madore valde squarrosa*, *breviter lanceolata reflexa*, nervo excedente mucronata carinata, alis hic illic

convexis, cellulis ubique hexagonis ampliusculis pellucidis mollibus pottioideis, integra; perich. maxime reflexa; theca in ped. brevi ubique scaberrimo crasso rubro subgloboso-ovalis magna laevis badia, operc. conico-aciculari brevi, perist. simplici interno, e membrana truncata brevi composito, calyptra thecam totam obtegente, pilis patentissimis fuscis valde hirta.

Patria. Java: Junghuhn.

Areolatio perfecte pottioidea et species excellentissima. — Pl. mascula gracilior, floribus pluribus terminalibus minutiuscule gemmaceis, fol. perig. parvis late ovatis acuminatis, basi tenuiter laxe reticulatis.

3. *Folia oblongo-ligulata mucronata.*

55. **M. mucronifolium** Schw. (Suppl. II. II. 1. p. 61. t. 170.); *monoicum*; longe repens tenellum, ramis brevibus gracilibus subsimplicibus plus minus approximatis, quare plus minus dense pulvinatum, viride, inferne ferrugineum; folia crispula, madore subreflexo-patentia, arcte imbricata, oblongo-ligulata obtusa, mucrone brevi reflexiusculo terminata, ruguloso-plicata, tenera, canaliculata, excurrentinervia, alis convexis integris pallide viridibus ubique minute rotundate areolatis, basis margine limbo angustissimo incrassato praeditis; perich. conformia; theca breviter pedunculata urceolato-ovalis brevicolla laevis leptodermis sordide fusca, sicca evacuata basi plicata, *gymnostoma*, angustissime annulata, operculo conico subulato recto, calyptra thecam dimidiam obtegente glabra, profunde laciniata, laciniis distantibus.

Leiotheca mucronifolia Brid. I. p. 729 et 795. — *Orthotr. mucronifolium* Hook. et Grev. in Brewst. Edinb. Journ. I. p. 116. t. 4.

Patria. Insulae Antillarum Trinidad, St. Vincent, Guiana Batavorum, Brasilia plana, vulgare: Sieber et Crüger, Menzies, Weigelt et Kegel, Beske.

Flos masc. in ramo proprio caulis fertilis repentis minutissime gemmaceus, foliis perig. ovato-acuminatis, antheridiis et paraphys. paucis. — Species foliis ligulatis ad *Schlotheimias* sect. *Ligulariae* accedens, distinctissima.

56. *M. Swainsoni* Brid. (I. p. 318.); *dioicum*; late dense pulvinatum subcompactum humile densissime foliosum repens, ramis brevibus brevissime ramulosis luteo-viridibus inferne ferrugineis; folia crispula, madore patentia arcte imbricata, late oblongo-ligulata obtusissima, mucrone recto brevissimo terminata, hic illic plicata nec rugulosa, dilatate canaliculata, alis convexis integris obscure viridibus, robustius rotundate areolatis, basi vix conspicue papillata margine limbo angustissimo pallido praeditis; perich. magis acuminata; theca *M. mucronifolii*, sed minor, calyptra longe multifida, laciniis densius approximatis; perist. simplicis dentes externi longiusculi albidī subintegri.

Leiotheca Swainsoni Brid. I. p. 730. — *Orthotrich. Swainsoni* Hook. Musc. Exot. t. 127.

Patria. Brasilia, pr. Rio Janeiro: Swainson. Cuba: Döring, cujus specimina descripsimus.

Peristomium thecarum vetustarum spec. nostrorum non vidimus. — A. *M. mucronifolio* proximo notis illustratis facillime distinguitur.

57. *M. stellulatum* Brid. (I. p. 314, 741.); *dioicum*; *M. Swainsoni* simile, sed rami foliis subhorizontalibus apice stellatim foliosis; folia densissime imbricata, late oblongo-ligulata breviter acuminato-mucronata, superne minutissime rotundate, basi minute quadrate areolata distincte tuberculose papillata, limbo marginis carentia, alis valde convexis plicate gibbosis; perich. late lanceolata acuminata plicata pallidiora magis elliptice areolata subcrenulata; theca in ped. longiusculo oblongo-orata sulcata pallide fusca, operculo conico acuto breviusculo, calyptra thecam $\frac{2}{3}$ obtegente laevi profunde multifida, laciniis distantibus; peristomium duplex, externum: dentes longiusculi late lanceolati dense trabeculati densissime approximati in membranam veluti connati, ruguloso-albidi, latere crenati, internum: dentes totidem, externos aequantes, tenues lanceolato-subulati albidī in membrana brevissima positi.

Schlotheimia stellulata Hsch. in Hor. Phys. Berol. p. 61. t. 12. — Schwägr. Suppl. III. 1. 2. t. 249. — *Orthotrich. stellulatum* Hook. et Grev. in Brewst. Edinb. Journ. I. p. 119. — *Macromitr. Swainsoni* Hook. et Wils. in Gardner. Musc. Bras. No. 60! — *M. xanthocarpum* Hsch. Fl. Bras. I. p. 26. e spec. Hb. Acad. Monacens. forma foliis minus horizontalibus.

Patria. Brasilia, ad flum. Orinoco: Hb. Willdenow; dein leg. Pohl., in prov. Goyaz pr. Arrayas leg. Gardner mens. Martii. Coll. No. 60.

58. *M. fuscescens* Schw. (Suppl. II. II. 2. p. 129. t. 191.); late laxius pulvinatum breviusculum longe repens, ramis brevibus saepe iterum repentibus simplicibus v. fastigiatis divisis remotiusculis laxiuscule foliosis fusciscentibus; folia tortilia, madore patula erecta, luteo-fusca, lanceolato-obtusa, nervo crasso in cuspidem longiusculam producto, ferrugineo, cellulis subrotundis, basi elongato-quadratis; perich. conformia; theca in ped. brevi rufo ovato-oblonga laevis, apice et basi plicata, badia, operc. conico acuto recto, brevi, concolori, calyptra anguste conica nuda multifida nitens, flavo-badia; perist. dentes breves albid. †.

Patria. Insulae Marianae: Gaudichaud.

Macromitria non satis nota.

59. *M. punctatum* Brid. (I. p. 739.); caulis decumbens? folia laxa lineari-oblonga acuta punctata pellucida plana patula, nervo evanido, sicca insigniter involuta; theca oblongo-pyriformis sulcata, calyptra junior apice subpilosa, inferne sulcata basi fimbriata, operculo conico brevi aciculari. †.

Orthotrich. punctatum Hook. et Grev. in Brewst. Edinb. Journ. I. p. 119. t. 5. c. ic. pauperrimis.

Patria. Brasilia inter *M. filiforme*: Raddi.

Ex animadv. auctorum prim. species solitaria, cujus folia illis *Catharineae undulatae* similia dicuntur. An *M. Didymodon*?

60. *M. quinquefarium* Hsch. (Fl. Bras. I. p. 26.); caulis declinatus ramosus apice stoloniformis, ramis secundis erectis subsimplicibus dense foliosis rufis; folia

quinquefaria patentia, sicca appressa crispula, cordato-ovata obtusiuscula concava, margine parum revoluta, viridi-ferruginea, nervo crasso solido ferrugineo evanido, cellulis rotundis seriatis pusillis; perich. interiora basi submembranacea, oblongo-lanceolata longe acuminata, nervo angustiore concolore supra medium evanescente, cellulis laxis, basi subquadratis, intima lanceolata mucronata; theca in ped. semiunciali apice in sporangium transiente erecta clavata 8 sulcata, amoene badia, ore angustata; perist. dentes ext. lanceolati bigeminati, igitur octo lato-lanceolati ferruginei, interni octo filiformes articulati lutescentes, ex unica serie cellularum formati. †.

Patria. Brasilia, in montibus ad Lages, Sincora et ad Rio de Contas, in mediterraneis prov. Bahiensis: Martius.

61. *M. undulatum* Schw. (Suppl. II. II. 2. p. 137.); laxe pulvinatum biunciale repens, ramis erectis aliquoties divisis, numerosis tumidis pallide luteis, ramulis fastigiatis; folia longiuscule oblongo-ligulata obtusa mucronulata, margine insigniter undulata, sicca tortilia, cellulis subrotundis, basilaribus subquadratis triplo majoribus, pro more *Syrrhopodontium pellucidis laxis*, theca oblongo-cylindracea laevis, operculo aciculari longo recto, calyptra thecam superante multifida pilosa. †.

Leiotheca undulata Brid. I. p. 733. — *Orthotrich. undulatum* Hook. et Grev. Brewst. Edinb. Journ. of bot. p. 117. t. 4. c. ic. pauperrimis.

Patria. Insula Ternate: Hb. Dickson.

62. *M. involutifolium* Schw. (Suppl. II. II. 2. p. 144.); repens, ramulis brevibus intumescens, folia oblongo-lanceolata obtusiuscula apice insigniter involuta, substriato-carinata, theca oblongo-ovata laevis, calyptra inferne laciniata. †.

Leiotheca involutifolia Brid. I. p. 733. — *Orthotrich. involutifolium* Hook. et Grev. Brewst. Edinb. Journ. I. p. 117. t. 5. c. ic. pauperrimis.

Patria. In freto King George's Sound: Hb. Dickson. Nova Seelandia et Paramatta Novae Walesiae australis: Hb. Hobson.

63. **M. incurvifolium** Schw. (Suppl. II. II. 2. p. 144.); repens, folia lanceolato-acuminata, carinata, apice incurva, sicca crispata, theca ovata laevis, calyptra longe laciniata pilosa, operc. aciculari recto. †.

Leiotheca incurvifolia Brid. I. p. 732. — *Orthotrich. incurvifolium* Hook. et Grev. Brewst. Edinb. Journ. I. p. 117. t. 4. c. ic. pauperrimis.

Patria. Insula Ternate Archip. Indici, et in freto King George's Sound dicto: Dickson Hb.

64. **M. subtortum** Schw. (Suppl. II. II. 2. p. 145.); caulis repens, ramis erectis, fusco-brunneis biuncialibus, folia lanceolato-acuminata carinata oblique recurva, sicca subspiraliter torta, theca ovato-oblonga, ore sulcato. †.

Leiotheca subtorta Brid. I. p. 734. — *Orthotrich. subtortum* Hook. et Grev. Brewst. Edinb. Journ. I. p. 117. t. 5. c. ic. pauperrimis.

Patria. India orientalis.

Plantae speciosae, ex animadv. auctorum habitu *M. longifolii*, sed incomplete notum.

65. **M. recurvifolium** Brid. (I. p. 740.); caulis repens, folia ovata longe acuminata carinata, recurvata, sicca spiraliter torta, perich. majora convoluta, theca ovato-oblonga laeviter sulcata. †.

Orthotrich. recurvifolium Hook. et Grev. Brewst. Edinb. Journ. I. p. 120. t. 5. c. iconibus pauperrimis haud explicabilibus!

Patria. Java, unde Dickson jam habuit.

Species delenda.

Brachypodium parasiticum Brid. (I. p. 149.); caulis erectus subsimplex, sterilis brevissimus, fertilis longior, folia dense conferta patula subreflexa, lanceolato-lineararia carinata, sicca margine undulata, nervo crasso ferrugineo continuo; perich. conformia erecto-conniventia; theca in ped. perbrevis saepius gemello apice incrassato vix tortili brunneo erecta cylindrica laevis, operc. e con-

vexiusculo subulato thecam aequante, dentibus sedecim parvis erectiusculis trabeculatis albis, calyptra junior longe subulata pallida ore aequali, latere demum fissa. †.

Encalypta parasitica Sw. Fl. Ind. Occ. III. p. 1739. — Schw. Suppl. I. I. p. 60. t. 17. — *Anictangium parasiticum* Brid. Sp. Musc. I. p. 270. — *Bryum parasiticum* Sw. Prodr. Fl. Ind. Occ. p. 139.

Patria. Hispaniola, in ramis *Haematoxyli* et *Mimosae Unguis cati*: Swartz.

Habitus *Macromitrii* refert quidem, sed rectius sentiente Hookero *Calymperes* videtur.

Gen. XVI. **Schlotheimia** Brid.

Mant. Musc. p. 114. t. II. f. 10. et Br. univ. I. p. 320. — *Orthotrichum* et *Macromitrium* C. Müll. errans.

In honorem investigatoris palaeontologici celeberrimi Gothani a Schlotheim ab auctore amico genus egregium conditum.

Calyptra campanulata *glabra*, i. e. *haud plicata*, basi laciniis involutis constricta. Perist. dentes *externi in spiram revoluti*, sedecim, linea longitudinali exarati, plerumque valde rugulosi carnosique; interni totidem plus minus perfecti, saepe rudimentarii, e membrana pallida oriundi. Theca exannulata. Operculum omnium cupulatum recte subulatum leptoderme tenero-reticulatum. Caetera *Macromitrii*.

Habitu, praesertim calyptra, *Encalyptas* in memoriam valde revocantes, e reliquis *Macromitriis* proximae species.

Sectio I. **Gracilaria.** Caulis filiformis subteres, foliis appressis, in spiram contortis oblongis, laevibus, nec plicatis, nec corrugatis.

S. squarrosa Brid. (I. p. 324.); *dioica*; laxè pulvinata elata flexuosa, innovationibus brevibus valde divisa, rigida, intense fusca; folia caulina dense appressa, subspiraliter conferta, madore in orthostichas obliquas plures distinctas disposita, squarrosa, breviter reflexiuscule et anguste oblonga, nervo excedente acute apicu-

lata, profunde canaliculata, margine hic illic vix revoluta, cellulis amoene fuscis, ubique conflato-incrassatis rhomboidaliter quadratis minutis; perich. latiora magis concava; theca in ped. tenuissimo longo, innovationes superante v. occulto, inter furcam innovationum posito minute obovata fusca, sicca plicata, brachydonta, calyptra parva, basi tumida, appendicibus 4 brevibus latis, intense fusca, nitida, laevissima.

Schloth. squarrosa Schw. Suppl. I. II. p. 39. t. 56? — *Orthotrich. squarrosus* Hook. et Grev. Brewster Edinb. Journ. I. p. 128.

Patria. Insula Bourbonis: Hb. Montagn.

Ab omnibus congeneribus teneritate partium omnium primo adpectu differt et *Macromitr. filiformi* haud dissimilis.

Sectio II. **Acuminella.** Caulis robustus densifolius, foliis appressis in spiram contortis lanceolato-acuminatis, v. cuspidatis laevibus vel corrugatis.

a. *Theca immersa.*

2. **S. tecta** Hook. et Wills. (Lond. Journ. of bot. 1844. p. 157.); dioica; clatiuscula subrobusta, ramis brevibus dichotomis strictis, ubique ferruginea, inferne nuda; folia caulina dense imbricata leviter spiraliter torta, majore patentia, lanceolato-acuminata, latiuscula, complicate concava, margine hic illic parum revoluta, apice breviter dentato, cellulis basi angustis longis rectangularibus, superne sensim rotundatis, ubique incrassatis, excurrentinervia; perich. in cuspidem elongatam crassam flexuosam producta; theca immersa majusculis ovalis laevis, dentibus ext. et int. longiusculis, his angustis pallidis rugulosis subbifidis, calyptra magna firma intense fusca, apice scaberrima.

Schloth. immersa C. Müll. Bot. Zeit. 1844. p. 740. — *Macromitr. immersum* C. Müll. Bot. Zeit. 1845. p. 542.

Patria. Brasilia, Serra dos Orgãos: Gardner No. 71.

E pulcherrimis et distinctissimis.

b. *Theca exserta.*

3. S. quadrifida Brid. (Mant. Musc. p. 114.); humilis erecta parce dichotome robusta densifolia basi tomentosa, apice incrassata, viridis, inferne ferruginea; folia densissime conferta parum tortilia, madore erecto-patentia, *oblongo-acuminata, nervo in cuspidem plus minus reflexam* longiusculam producta, margine convexo, cellulis minute circularibus basi parallelogrammis; perich. conformia immersa; theca in ped. pseudolaterali elongato flexuoso oblongo-cylindracea, laevis brunnea, operc. recte longe subulato, calyptra laevi brunneo-fusca, basi appendicibus 4 latis, dentibus ext. longis angustis, int. irregularibus in membrana breviuscula positis. $\frac{1}{4}$.

Brid. I. p. 321. — Schw. Suppl. I. II. p. 41. t. 57. — *Orthotr. quadrifidum* Hook. et Grev. in Brewst. Edinb. Journ. I. p. 128. — *O. angulosum* P. B. Prodr. p. 90. fide Schwägrichen.

Patria. Insulae Bourbonis et Franciae: Aubert du Petit-Thouars.

Notis illustratis a sequente longe differt. — In insula Tristan d'Acunha Africae occidentali-meridionalis, verosimiliter attamen false, enumeratur.

4. S. Campbelliana C. Müll.; dense pulvinata, inferne radiculosa, robusta densifolia, nitide ferruginea, subhumilis, ramis erectis parce et breviter dichotomis; folia caulina subspiraliter torta, madore erecto-patentia, *basi ovata, medio angustiora, superne latiora, apice laminae inaequali rotundata emarginata praedita*, rarius acuminata, nervo profunde canaliculato intense fusco *in aristam crassam longam laevem* producta, cellulis grossis rhomboidaliter quadrate incrassatis conflatis aureis, basi rectangularibus pellucidioribus, basi subcomplicate concaeva, interdum parum rugulosa; perich. breviora magis oblonga teneriora; theca in ped. longiusculo flexo cylindrica, sicca plicata.

S. quadrifida Hook. et Wils. in sched.

Patria. Insula Campbelli: J. D. Hooker.

E distinctissimis et pulcherrimis! cujus foliorum forma *Syntrichias* refert.

Sectio III. **Ligularia.** Caulis robustus densifolius, foliis appressis in spiram contortis, oblongo-ligulatis, corrugatis v. laevibus.

a. *Calyptra glabra, plus minus scabra.*

α. Folia distincte torquata.

†. *Humiles.*

5. **S. nitida** Schw. (Suppl. II. II. 1. p. 51. t. 167.); *dioica*; dense pulvinata inferne tomentosa, humilis, ramis erectis dichotomis *viridibus*, inferne fuscis, robustiusculis; folia caulina *distincte spiraliter torta*, oblonga, obtusiuscula, nervo rufo excedente reflexiuscule apiculata, *perfecte incrassate rotundate, basi elliptice, haud rhomboidaliter areolata*, superne valde rugulosa, magis carinate basi *subventricose* concava, perich. *conformia*, majora pauca, latiora, magis acuminata recte apiculata, plicata, theca in ped. brevi *parvula cylindrica angusta*, evacuata plicata, dentibus ext. et int. breviusculis, calyptra *amoene aureo-lutea valde nitida, apice vix scabra.*

Brid. I. p. 798.

Patria. Brasilia, in Serra dos Orgaos pr. Rio Janeiro primus leg. Beyrich. Insula Stae. Catharinae vicina: **P a b s t.**

A *S. rugifolia* notis cursive impressis differt.

6. **S. fusco-viridis** Hsch. (Fl. Bras. I. p. 32.); *dioica*; *S. nitidae* simillima, sed minus torquata et magis fusca; folia caulina breviter oblongo-ligulata, breviter et reflexiuscule apiculata, basi subventricose concava, *superne haud vel vix plicata*, alis convexis, cellulis rotundis minutis, dein pachydermibus diaphanis, basi tenerioribus subrectangularibus; perich. *conformia*, intima acuminata minora angustiora *haud plicata*; theca in ped. brevi erecta, juvenilis cylindrica, calyptra nitida fusco-lutea, superne vix scabra.

Patria. Brasilia, Villa Rica in cort. arborum: **M a r t i u s.**

7. **S. Kegeliana** C. Müll.; *dioica*; *S. fusco-viridi* simillima, innovationibus repentibus gracillimis, obscure

viridis; folia caulina *basi uno latere, rarius quoque altero, ventricoso-concava*, cellulis amoene fuscis et diaphanis pachydermibus, folia innovationum repentium angustissime oblonga viridissima, cellulis minute rotundis obscuris; perich. *latiora carinato-concava* laevia vix undulata; theca in ped. brevi minuta cylindrico-oblonga, sicca subrugulosa, operc. cupulato brevi, dentibus ext. et int. aequaliter longis, breviusculis, calyptra intense fusca, superne *scaberrima*.

Macromitr. Kegelianum C. Müll. Linn. XXI. p. 187.

Patria. Surinam, pr. Paramáribó, locis magis apricis, ad trunc. arborum, ubi in scissuris bene viget: Kegel, Julio 1844. Rara.

Notis cursive impressis a *S. fusco-viridi* refugit.

8. **S. Brownei** Schw. (Suppl. II. II. 1. p. 52. t. 167.); *dioica*; repens, ramis fastigiatis brevibus dichotomis, fusco-viridibus robustiusculis; vix tomentosa; folia caulina parum spiraliter torta, oblonga obtusiuscula, acute et *recte* apiculata, nervo evanido, superne profunde canaliculato, alis convexis *parum* rugulosis, *basi concava, haud ventricosa*, cellulis *S. nitidae*, sed minoribus, perich. conformia haud rugulosa, parum latiora; theca in ped. *longo* cylindraceo-oblonga, sicca plicata, operc. conico recte subulato, calyptra *intense fusca*, apice vix scabra, dentibus ext. *longis* angustis, int. *aequalibus* e membrana longa pallida oriundis.

Brid. I. p. 799. — *Macromitr. Brownei* C. Müll. Bot. Zeit. 1845. p. 544.

Patria. Nova Hollandia, ubi ad Port Jackson legit R. Brown.

Notis cursive impressis a *S. nitida* affini differt.

9. **S. ferruginea** Brid. (I. p. 743.); *dioica*; late depresse et densiuscule pulvinata, repens, ramis brevibus *turgidis robustis* vix ramulosis, *foliis in spiram contortis apice acutis*, luteo-fusca *nitida mollis*; folia caulina *madore erecto-conferta*, *longiuscule anguste oblongo-ligulata*, recte apiculata, *superiora sensim magis acuminata*,

ubique profunde canaliculata v. basi plus minus ventricosa, superne rugulosa, juniora laeviora, cellulis minute rotundatis, basin praesertim ad nervum versus sensim rhomboidalibus, infima basi magis rectangularibus teneris, alis saepe valde convexis; perich. basi latiora multo teneriora pallidiora, interiora longiuscule acuminata, haud rugulosa; theca in ped. longiusculo anguste cylindrica, sicca sulcata, operc. longe subulato, dentibus ext. breviusculis, int. in membrana brevissima duplo brevioribus fugacibus, calyptra acutissima, pulchre straminea nitida laevissima, appendicibus longis teneris subsenis.

Macromitr. ferrugineum C. Müll. Bot. Zeit. 1845. p. 544. — *Orthotrich. ferrugineum* Hook. et Grev. in Brewster Edinb. Journ. 1. p. 118. t. 5.

Patria. Prom. b. spei, ubi haud rara truncos arborum in montibus sylvestribus habitat: Burchell, Ecklon, Drège.

A *S. Brownei* haud dissimili notis cursive impressis longe recedit.

10. *S. ventrosa* C. Müll.; *dioica*; *S. rugifoliae* simillima, sed folia caulina *distinctius etsi parum torquata, basi uno vel altero quoque latere ventroso-concava, e cellulis minute rotundatis pallide viridibus basi ellipticis v. rectangularibus areolata, valde rugulosa, perich. immersa late lanceolato-acuminata, parum majora, nec rugulosa nec plicata; theca angustius cylindrica brevicolla laevissima v. obsolete striata cinnamomea, dentibus brevioribus tenuioribus, calyptra apice scaberrima appendicibus 4 latis intense fusca.*

Patria. Prom. b. spei, Olifantshoek in Districtu Uitenhagen: Ecklon. Hb. Kunz.

11. *S. Sullivantii* C. Müll.; *dioica*; *humillima depressa* late pulvinata prostrato-repens fusco-viridis, innovationibus breviter pinnatis, densifolia, folia caulina dense imbricata *torquata*, madore erecto-conferta breviter oblongo-ligulata obtusa, breviter apiculata, valde corrugata, *basi uno latere vel altero quoque latere ventricose*

concava, alis convexis, cellulis *minute rotundatis*, ad basin *teneriorem rhomboidalibus*; perich. *immersa*, interna *pauca late lanceolata nec majora nec rugulosa*; theca in ped. *perbrevis minute oralis laevissima*, evacuata *plicata*, dentibus *ext. brevibus, int. brevioribus*, calyptra *intense fusca*, apice *minus scabra*.

Sch. rugifolia Sulliv. Musc. Allegh. II. No. 146.

Patria. America sept. Un., ubi in Ludovicia arborum corticem habitat.

A *S. rugifolia* notis cursive impressis longe refugit, a ceteris congeneribus jam exiguitate differt.

12. S. Chamissonis Ilsh. (Fl. Bras. I. p. 31.); dense pulvinata robusta densifolia, dense ramosa atro-fusca, ramis brevibus simplicibus; folia caulina appressa torquata, madore erecto-imbricata, *lineari-lanceolata* obtusa canaliculata, nervo crasso ferrugineo brevissime mucronata, *marginē parum involuta*, subinde longitudinaliter plicata cellulis basi linearibus, superne rotundis obscuris; perich. interiora oblongo-lanceolata, intima *minuta orato-acuminata tenuissima vaginata*, basi *hyalina*, apicem versus *pellucida*, nervo crasso viridi cranido, theca in ped. *bilineariter erecta cylindrica angusta laevis*, ore purpureo, calyptra *fuscescente laevi* (?). †.

Macromitr. Chamissonis C. Müll. Bot. Zeit. 1845. p. 513.

Patria. Insula Sta. Catharina Brasiliae: Chamisso.

A *S. rugifolia* notis illustratis certe distare videtur.

††. *Elatiores.*

13. S. Jamesoni Brid. (I. p. 742.); *dioica*; laxē prostrato-pulvinata, ramis ascendentibus longiusculis breviter dichotomis luteo-ferrugineis subgracilibus, folia pulchre torquata, madore erecto-patentia *late lanceolato-ligulata v. acuminata*, complicate canaliculata, apice reflexiuscule apiculato, *alis flexuosis, haud rugulosis*, convexiusculis, cellulis minute rotundatis, basi ellipticis; perich. longe acuminata exserta, laevia complicata et plicata; theca in ped. *elongato* majusculē cylindraco-oblonga bre-

vicolla laevis, evacuata subplicata cinnamomea, operc. majusculè cupulato acute subulato, dentibus ext. longis, valde rugulosis, int. in membrana longa pallidioribus rugulosis brevioribus, calyptra apice scabriuscula intense fusca.

Schw. Suppl. III. I. 1. t. 202. — *Macromitr. Jamesoni* C. Müll. Bot. Zeit. 1845. p. 543. — *Orthotr. Jamesoni* Arnott in Trans. of the Werner. Soc. V. p. 201. et Hook. et Grev. in Brewst. Edinb. Journ. I. p. 129. t. 6.

Patria. Brasilia, unde pr. Rio Janeiro lectam primus habuit Jameson.

Notis designatis a *S. Sprengelii* simillima differt.

14. *S. Sprengelii* Hsch. (Fl. Bras. I. p. 34.); *dioica*; *S. Jamesoni* simillima, sed folia *breviter oblongo-ligulata*, apice breviter acuminato apiculato recto, superne valde rugulosa; perich. longe exserta, longissime saepe loriformi-acuminata plicata, haud rugulosa, cellulis magis lineari-ellipticis; theca in ped. brevi anguste cylindrica brevior.

Schl. torquata Spr. Hb. — *Macromitr. Sprengelii* C. Müll. Bot. Zeit. 1845. p. 543. — *Schl. nitida* Wils. et C. Müll. in Gardner. Musc. Bras. No. 65.

Patria. Brasilia: Hb. *Sprengelii*, Blanchet No. 3799, Gardner.

15. *S. torquata* Brid. (I. p. 323. excl. Syn. P. B.); longe repens crassiuscula conferta, ramis vix pollicaribus, versus apices decrescentibus minoribus confertis erectis simpliciusculis subinde divisis teretibus subacutis strictis; folia undique conferta, oblonga acuta carinata, madore patentia, sicca spiraliter per totos ramos disposita adpressa, flavo-viridia, vetustiora fusco-ferruginea; perich. ramos terminantia plura, rameis duplo longiora attenuata erecta, conniventia carinata longitudinaliter striata pallidiora rigida; theca in ped. semipollicari erecto oblongo-cylindracea recta, laevis, operc. acuminato recto, calyptra straminea, apice fusca nitida glaberrima (?), appendicibus 5—7 aequalibus, dentibus ext. et int. *S. rugifoliae*. †

Schl. torta Schw. Suppl. I. II. p. 243. — *Orthotr. tortum* Hook. et Grev. Brewster Edinb. Journ. I. p. 127. — *Neckera torta* Sw. Fl. Ind. Occ. III. p. 1800. — *Hypnum torquatum* Hdw. Sp. Musc. p. 246. t. 63.

Patria. In truncis vetustis muscosis montium sylvestr. Jamaicae: Swartz.

A *S. Jamesoni* fol. perich. exsertis longioribus, a *S. Sprengelii* fol. caulinis haud (vel vix?) rugulosis longe distare videtur.

16. **S. Ottonis** Schw. (Suppl. II. II. 1. p. 54. t. 168.); dioica; longe repens, ramis elongatis flexis parum divisis, senioribus subpinnatis, *teretibus* subgracilibus, fusca; folia caulina appressa, vix spiraliter torta, madore *patenti-recurva*, *ex ovata basi paullo angustiora*, deinde in apicem subrotundum terminata, nervo exeunte rufo apiculata, concava, margine parum involuto, cellulis luteis quadratis, basi paullo longioribus, incrassatis praedita, *haud rugulosa*; perich. exserta duplo longiora, e lanceolato-cuspidata, plica una alterave distincta, intima longissima; theca in ped. *brevi* cylindracea, basi siccitate plicata, operc. recte subulato, dentibus ext. longis, int. lanceolatis hiantibus rigidis inaequalibus. $\frac{1}{4}$.

Brid. I. p. 801. — *Macromitr. Ottonis* C. Müll. Bot. Zeit. 1845. p. 544.

Patria. Brasilia, Monte Video, unde habuit Otto, Hort. Berol. olim inspector.

Notis cursive impressis a *S. Sprengelii* refugit.

17. **S. longifolia** Hsch. (Fl. Bras. I. p. 34.); dioica; laxè pulvinata mollis subflaccida gracilis pallide viridis inferne fuscescens, valde dichotoma, *fastigiata* ramosa; folia laxè imbricata torquata, madore reflexa, *anguste longiuscule oblonga ligulata reflexe apiculata v. acuminata acuta, curvata*, alis parum undulatis reflexo-converis, cellulis minute rotundatis pallide viridibus obscuris, basi subhyalinis irregulariter rectangularibus, nervo pallide rufo profunde canaliculato excurrente; perich. magis acuminata, basi latiora, majora, magis elliptice areolata; theca in ped. tenui longiusculo angustissime cylindrica laevis-

sima, evacuata interdum ovata, operc. cupulato breviter acuminato, calyptra angusta amoene aurea nitida superne vix scabra, dentibus ext. et int. longiusculis aequalibus.

Macromitr. linearifolium C. Müll. Bot. Zeit. 1845. p. 543.

Patria. Brasilia, Monte Video: Sellow.

Notis cursive impressis a *S. Ottonis* simillima refugit.

18. *S. Martiana* Hsch. (Fl. Bras. I. p. 32.); repens 1—2 uncialis subnuda ramosissima fusca torquatifolia, ramis erectis v. assurgentibus superne fastigiatim divisis dense foliosis; folia caulina madore erecto-patentia, oblongo-ovata, basi concava, fusco-brunnea, nervo crasso ferrugineo mucronulata, cellulis basi laxioribus subquadratis, superne subrotundis seriatis minutissimis; perich. majora, ext. oblongo-lanceolata acuta, intima longiora lanceolato-acuminata, vaginata longitudinaliter plicata; theca in ped. pseudolaterali brevi erecta cylindrica laevis brunnea, dentibus ext. lanceolatis, int. in membrana, illis dimidio brevioribus, linearibus v. lanceolatis, calyptra straminea nitida superne pallide ferruginea 4 appendiculata laevi (?). †.

Macromitr. Martianum C. Müll. Bot. Zeit. 1845. p. 543.

Patria. Brasilia, pr. Rio de Janeiro, Mandioca, in Serra dos Orgãos, Villa Rica, ad trunc. arbor. demortuos sylvarum: Martius, in Serra d'Estrella pr. Corrego secco, Februario: Beyrich.

Cui affinis?

β. Folia magis erecto-appressa.

19. *S. rugifolia* Brid. (l. p. 322. excl. Syn. Schwägr. !); dioica; prostrato-repens dense pulvinata elatiuscula robusta breviter ramulosa densifolia ferruginea; folia caulina dense appressa, vix spiraliter torta, madore erecto-patentia, oblongo-ligulata, nervo profunde canaliculato in mucronulum reflexiusculum exeunte, alis planiusculis convexis, superne ruguloso-undulatis, cellulae rhomboidaliter incrassate quadratae, basi rectangulares, parietibus transversalibus flexuosis; perich. multo majora ex-

serta longius apiculata irregulariter complicata apice valde rugulosa; theca brevipedunculata cylindraceo-oblonga laevis, sicca evacuata plicata cinnamomea, operc. cupulato recte subulato, dentibus ext. longis obscuris, int. in membrana brevi angustissimis aequaliter longis, calyptra intense fusca, superne subspinoso-scaberrima.

Brid. I. p. 322. — *Macromitr. rugifolium* C. Müll. Bot. Zeit. 1845. p. 543. — *Orthotrich. rugifolium* Hook. Musc. Ex. t. 128. — *S. Merkelii* Hsch. Fl. Bras. I. p. 29. t. 1.

Patria. Brasilia, ubi pr. Rio Janeiro primus legit Swainson.

20. *S. julacea* Hsch. (Fl. Bras. I. p. 30.); *S. rugifoliae* simillima, sed differt foliis brevioribus latissime ovato-oblongis, superne angustioribus, perich. perfecte acuminatis, haud ligulatis, haud rugulosis, theca evacuata brevior ovali nitida ruguloso-plicata, calyptra minus scabra.

Macromitr. julaceum C. Müll. Bot. Zeit. 1845. p. 543.

Patria. Brasilia, Serra d'Estrella: Martius.

E spec. auth. Hb. Reg. Monacensis distinctissima.

21. *S. sinuata* Hsch. (Fl. Bras. I. p. 31.); *S. rugifoliae* simillima, sed folia caulina superiora oblongo-lanceolata apiculata, inferiora pariter ligulata, basi dilatate ventricose concava et inde utrinque plicatione unica longitudinali undulata et medio constricta, cellulis rotundatis, basi ellipticis; perich. caulinis superioribus similia, haud majora immersa, acuminata, haud rugulosa, intima minuta linear-acuminata; theca brevissime pedunculata parvula cylindracea, calyptra ubique scaberrima, in appendicibus fimbriato-papillosa.

S. rugifolia Schw. Suppl. II. 2. t. 139! — *S. rugifolia* Wils. et C. Müll. in Musc. Bras. Gardner. No. 68. — *Macromitr. sinuatum* C. Müll. Bot. Zeit. 1845. p. 543.

Patria. Brasilia, insula Sa. Catharina: Chamisso, Praia Vermelha: Gardner.

22. *S. affinis* C. Müll.; dioica; *S. rugifoliae* simillima, sed haud tomentosa, laxissime pulvinata, folia cau-

lina oblongo-ligulata, nervo reflexe apiculata, valde rugulosa, basi ventricose concava, igitur medio saepe contracta v. sinuata, superne rotundate haud rhomboidaliter et basi anguste elliptice areolata; perich. conformia rugulosa majora plicata, theca anguste cylindrica brevicolla laevis v. obsolete striata cinnamomea, calyptra apice scabriuscula.

S. torquata C. Müll. in Musc. Bras. Gardner. No. 66. — *S. squarrosa*? Hook. et Wils. ibidem.

Patria. Brasilia, Morro Velho: Gardner.

23. *S. recurvifolia* Hsch. (Fl. Bras. I. p. 35.); *dioica*; longe repens, ramis erectis ascendentibus longiusculis subsimplicibus, haud compacta, ferruginea, subgracilis, folia caulina erecto-appressa, madore patentia, longiuscule oblonga, longiuscule acuminato-apiculata, valde rugulosa, margine inferne angustissime revoluta, cellulis rotundis minutis, basi irregulariter rectangularibus, perich. majora latiora apice rugulosa, inferne plicata, theca in ped. brevi cylindrica laevis, dentibus longiusculis.

Patria. Brasilia, montibus Araracoara (unde lectam vidimus) et Cupati, prov. Rio Negro, pr. urbem Villa Rica dictam, nec non pr. Lages et Sincora et Rio de Contas prov. Bahiensis: Martius.

A *S. rugifolia* notis illustratis differt.

24. *S. laxa* Hsch. (Fl. Bras. I. p. 33.); *dioica*; prostrata repens, ramis elatiusculis ascendentibus dichotomis, ubique ferruginea; folia caulina sublaxe conferta crispula, vix spiraliter torta, madore patentia, reflexiuscula, oblongo-lanceolata, latiuscule acutata, vix corrugata v. laevia, nervo profunde canaliculato in apiculum producta, margine hic illic convexo, cellulis ubique valde incrassatis, minutissime rotundatis, basi rhomboideis; perich. latiora nec exserta, nec rugulosa; theca in ped. breviusculo erecta cylindracco-oblonga laevis, operc. conico acuminato brevi, calyptra glabra, vix scabra, ferruginea angusta, laciniis inflexis, dentibus ext. angustis longis crassis obtusis, linea longitudinali exaratis, int. in membranam co-

nicam lutescentem superne in lacinias irregulares fissam, basi integram conflatis.

Macromitr. laxum C. Müll. Bot. Zeit. 1845. p. 543.

Patria. Brasilia, Villa Rica in Minis generalibus: Martius, Aprili.

A *S. rugifolia* foliis vix corrugatis v. laevibus et notis caeteris primo momento differt.

b. *Calyptra pilosa.*

25. *S. trichomitria* Schw. (Suppl. II. II. 1. p. 55. t. 169.); *dioica*; prostrata tomentosa, ramis erectis dichotomis densifoliis mollibus ferrugineis, folia caulina *subspiraliter crispa laxius conferta*, madore erecto-patentia, breviter oblonga obtusiuscula, nervo in apiculum reflexiusculum exeunte, profunde canaliculato, basi subventroso-concava, alis margine convexis, superne maxime rugulosis, ubique rhomboidaliter incrassate quadrate-areolata; perich. conformia, intima longius apiculata; theca in ped. *brevissimo cylindrica*, laevis, operc. recte subulato, calyptra *amoene aurea pilosissima mollis*.

Brid. I. p. 801. — *Macromitr. trichomitrium* C. Müll. Bot. Zeit. 1845. p. 543.

Patria. Brasilia, Monte Video: Sellow.

A *S. rugifolia* notis cursive impressis facile distinguitur.

26. *S. compacta* C. Müll.; *dioica*; a *S. rugifolia* simillima differt: calyptra ad lacinias pilis crispis flexuosis longis, apice brevibus appressis strictis, paucis instructa.

Schloth. trichomitria C. Müll. Bot. Zeit. 1845. p. 107. — *Schl. squarrosa?* Hook. et Wils. Lond. Journ. of bot. 1844. fasc. Martii.

Patria. Brasilia, Pajol: Gardner No. 67.

Schlotheimiae obscurae.

1. *S. gracilis* Hsch. (Fl. Bras. I. p. 35); repens gracilis nuda ramosa, ramis ascendentibus gracilibus sparse ramulosis foliosis; folia remota patenti-recurva, sicca torta, oblonga acuta, canaliculata integerrima fuscescen-

tia, nervo valido ferrugineo excurrente, cellulis subquadratis minutis obscuris. †.

Macromitr. gracile C. Müll. Bot. Zeit. 1845. p. 544.

Patria. Brasilia: Martius.

2. S. acuminata Reinw. et Hsch. (Nov. Act. Leop. XIV. II. Suppl. 1829. p. 711.); repens ramosa, ramis secundis erectis uncialibus fasciculato-ramulosis, densissime foliosis, inferne fuscis, apice purpurascens; folia flexuosa lanceolata acuminata integerrima canaliculata, inferiora fusca, superiora flava vel pallide rufescentia, nervo ferrugineo excurrente, cellulis basi linearibus undulatis, superne rotundatis seriatis minutis. †.

Macromitr. acuminatum C. Müll. Bot. Zeit. 1845. p. 544.

Patria. Java: Reinwardt.

3. Ulota plicata Brid. (l. p. 726 excl. Syn. Hooker.); longe repens, ramis brevibus crassiusculis densifoliis fuscatis, parum spiraliter foliosis, subsimplicibus; folia late oblongo-ligulata, apice mucronato reflexiusculo brevi, basi valde concava, superne canaliculata, cellulis basilaribus oblique ellipticis maxime incrassatis luteo-fuscis, superioribus incrassate rotundatis intense fuscis, laevibus; perich. magis exserta stricta late lanceolata subcuspidata, ubique elliptice areolata pallidiora.

Patria. Insula Terre Neuve Americae septentrionalis: La Pylaie.

Species ob patriam borealem memorabilis, nunquam cum *Ulota plicata* insularum Mascarenium conjungenda, habitu *Schlotheimiae nitidae*.

Hemicyclus II. GRIMMIEAE.

Folia multo laeviora, papillis plerumque obsoletis, rarius distinctis. Peristomia constanter colorata, purpurea, rufa v. aurantiaca.

Patria. Per totum orbem terrarum.

Gen. XVII. **Coscinodon** Spreng.

Einleit. in das Stud. der Kryptog. Gew. 1804. p. 281. — *Grimmia* Hdw.

Nomen a graecis vocibus *χόσζινον* *cribrum* et *ὀδοός* *dens* ob dentes cribrosos ductum.

Calyptra *orthotrichoideo-campanulata* $\frac{3}{4}$ *thecae obtegente magna*, laevis haud plicata, basi pluries fissa. Perist. *Grimmiae*, sed dentibus in cilia multa plus minus cohaerentia fissis, igitur valde cribrosis. Caetera *Grimmiae* generis.

1. **C. cribrosus** Spruce. (Ann. and. mag. of. nat. hist. 1849. p. 188.); *dioicus*; dense pulvinatus, sed laxissime cohaerens parce dichotomus humilis obscure viridis canescens; folia caulina appressa, madefacta erecto-subpatentia, lanceolata, apice obtusiusculo pilo elongato sublaevi terminato, margine erecto, concava, ad apicem angustatum pluries et ad basin bi-plicata, cellulis superne rotundate incrassatis minutis opacis, basi quadratis diaphanis majoribus; perich. intima basi tenerrima apicem versus tantum plicata; theca subemersa ovalis macrostoma laevis leptodermis pallida, operc. cupulato-conico acuto purpureo, annulo simplici, calyptra ochracea leptodermi.

C. pulvinatus Spr. l. c. p. 372. t. 8. f. 75. — Br. Europ. 2—3. *Coscinodon*; p. 3. t. 1. — *Grimmia cribrosa* Hdw. Musc. Frond. III. p. 73. t. 31. — Brid. I. p. 174. — *Bryum cribrosum* Hoffm. Deut. Fl. II. p. 31.

Patria. Ad muros et rupes montium editiorum hic illic Germaniae, ubi pr. Gosslar primus legit Persoon; per totam Europam caeteram passim.

Pl. masc. gracilior ramosior, floribus in axillis furcarum ramorum positis, fol. perig. late ovatis breviter acuminatis, antherid. parvulis eparaphysatis. — *Grimmiae apocarpae* primo adspectu habitu affinis.

Gen. XVIII. **Glyphomitrium** Brid.

Method. Musc. 1822. p. 30. — *Grimmia* Hook. et Tayl. — *Encalypta* Sm. — *Griffithia* R. Br. — *Bryum* Dicks.

A *γλύψω* *insculpo* et *μίτριον*, ob calyptram sulcatam.

Calyptra *campanulata magna thecam totam includens, profunde laciniata plicata*. Peristomium

e dentibus *sedecim brevibus lanceolatis* dense trabeculatis *integris linea media exaratis per paria approximatis* incurvis infra orificium oriundis aurantiacis laevibus compositum. — Infloresc. monoica.

Orthotrichi sectioni *Ulotae* ex habitu affine.

1. **G. Daviesii** Brid. (l. c. p. 31.); dense pulvinatum humile crispulum parce dichotomum, intense viride, inferne ferrugineum; folia madore erecto-patentia, lineari-lanceolata curvata, profunde carinata, margine erecto v. vix revoluta, cellulis maxime incrassate quadratis, basilarioribus; theca in ped. breviusculo stricto minuta subglobosa laevis, operc. conico acuto recto, annulo nullo, calyptra laevi pallida.

Br. Europ. 2—3. p. 3. t. 1. — *Encalypta Daviesii* Sm. Fl. Brit. III. p. 1188. — *Grimmia Daviesii* Turn. Musc. Hib. p. 24. — *Griffithia Daviesii* R. Br. Transact. of the Linn. Soc. XII. II. p. 375. — *Bryum Daviesii* Dicks. II. Pl. Crypt. p. 3. t. 7. f. 6.

Patria. In alpibus Cambro-Britannicis *Davies* detexit; in rupibus marinis in Anglesea, et in Hibernia ad basaltum pr. locum „Giant's Causeway” promontorii Fairhead, societate *Grimmiae maritimae*. — *Aestate*.

Flores masculi axillares minuti compressiusculi, fol. perig. intimis latiuscule convolutaceo-ovatis reflexo acuminatis, antherid. et paraph. paucis.

Gen. XIX. **Brachysteleum** Rchb.

Endl. Gen. 49. n. 507; et Hsch. Fl. Bras. Fasc. I. p. 19; et Linn. XV. p. 126—9. — *Ptychomitrium* Br. et Sch. — *Notarisia* Hmp. — *Macromitrium* Kze. — *Brachypodium* Brid. haud P. B. — *Glyphomitrium* Brid. — *Racomitrium* Brid. — *Trichostomum* Schw. — *Cecalyphum* P. B. — *Dicranum* Sm. — *Orthotrichum* Hook. et Grev. — *Grimmia* al. — *Encalypta* Schw. — *Bryum* antiq.

Nomen e graecis verbis *βραχύς brevis* et *στηλὶς columella*, ob pedunculum brevem *Br. crispata*, pro cacteris congeneribus vage conditum.

Calyptra *Glyphomitrii*, thecam omnino vel partem maximam obtegens mitraciformis longe et pluries

laciniata leviter plicata. Perist. *Trichostomi*, *cujus dentes plus minus ad basin usque in crura duo fissi.* — Infloresc. monoica.

a. *Folia dentata.*

1. **B. polyphyllum** Hsch. (Linn. XV. p. 127.); planta in pulvinos densiusculos hemisphaericos subdepressos congesta, ascendens elatiuscula subrobusta viridissima, inferne nigricans, crispata, densifolia, ditissime fructificans; folia madore valde patula, *elongata, late lanceolato-acuminata, apice remote grosse dentata*, margine medio folii revoluta, cellulis basi angustissimis elongatis, ad alas infimas laxis amplis dein fuscescentibus, superne minutiuscule quadratis, nervo valde canaliculato, *plicata*; theca in ped. *elongato rubro stricto cylindrico-elliptica pallida leptodermis erecta, operc. longe subulato recto rubro, anulo latissimo; dentes longissimi purpurei, cruribus tenuissimis rugulosis, calyptra apice scabriuscula.*

Ptychomitrium polyphyllum Br. Europ. 2—3. p. 4. t. 1. — *Racomitr. polyphyllum* Brid. I. p. 225. — *R. lingulatum* Brid. I. p. 777. — *R. falcifolium* ej. Mant. Musc. p. 82. — *Trichost. polyphyllum* Schw. Suppl. I. I. p. 153. t. 39. — *Tr. serratum* Schleich. Pl. Helv. Cent. II. No. 19. — *Tr. cirrhatum* Sm. Fl. Brit. III. p. 1239. — *Cecalyphum tortile* P. B. Prodr. p. 52. — *Dicran. polyphyllum* Sm. Fl. Brit. III. p. 1225. — *D. aggregatum* Brid. olim Sp. Musc. I. p. 203. — *Bryum polyph.* Dicks. III. Crypt. p. 7. — Br. cirratum setis et capsulis brevioribus et pluribus. Dill. Musc. p. 378. t. 48. f. 41. — *Mnium tortile* Brid. olim Sp. Musc. III. p. 64.

Patria. Ad rupes et muros reg. montanae per totam Europam passim, in insula Madera, ubi in Pico Ruivo ad saxa legit Holl, et in America sept. — *Vere et aestate.*

Flores masculi in vicinia feminei plures compressi minuti, fol. perig. late ovatis acuminatis valde concavis integerrimis, anth. et paraph. parvulis paucis.

2. **B. lepidomitrium** C. Müll.; habitus, foliorum forma et flores *B. polyphylli*; diversum foliis e medio ad apicem densius et argutius dentatis, thecis in ped. brevioribus anguste cylindraceis, saepe 2—6 aggregatais, ca-

lyptra longiore, apice spinosa, inferne pilis brevibus et squamulosis instructa, dentibus paulo brevioribus.

Ptychomit. lepid. Schimp. in litt.

Patria. Mexico, M. Orizaba: Liebmann.

3. **B. serratum** C. Müll.; *B. polyphylo* simillimum, sed differt foliis latioribus obtusiusculis, apice argute serratis, haud plicatis, thecae pedunculo brevior et dentibus minoribus. †.

Ptychomitrium serratum Schimp. in litt. et Br. Europ. 2—3. p. 4.

Patria. Mexico, Pico de Orizaba cum *B. lepidomitrio*: Liebmann.

b. *Folia integra.*

α. *Elatiora.*

4. **B. crispatum** Hsch. (Linn. XV. p. 126.); habitus, foliorum forma et flores *B. polyphylli*, sed folia haud plicata integerrima, cellulis infima basi ubique laxè pellucidis, superne multo minoribus opacis, margine hic illic parum revolutò, theca brevius pedunculata, cylindraco-obovata, dentibus brevibus angustioribus, cruribus cohaerentibus, calyptra laevi.

Ptychomit. nigricans Br. Europ. 2—3. p. 5. — *Notarisia Capensis* Hmp. Linn. XI. p. 379. — *Macromitrium nigrescens* Kze. Regensb. Bot. Zeit. 1830. p. 373. — *M. tenerum* Kze. l. c. — *Ptychomit. nigricans* Br. Eur. 2—3. p. 5. — *Brachypodium crispatum* Brid. l. p. 147 et 717. — *Orthotrich. crispatum* Hook. et Grev. in Brewster Edinb. Journ. of Sc. l. 1824. p. 115. — *Glyphomit. crispatum* Brid. Mant. Musc. p. 30. — *Eucalypta crispata* Schw. Suppl. l. l. p. 60. t. 17. — *Grimmia crispata* Hook. Bot. Misc. 1830. p. 133. t. 36.

Patria. In prom. b. spei, ubi primus lg. Thunberg, vulgatissimum in arboribus et saxosis, usque ad altitud. c. 6000' ascendens, insula Madera lg. Holl. — *Junio ad Augustum.*

5. **B. indicum** C. Müll.; *B. polyphylo* simillimum, folia autem *e basi late vaginante convolutaceâ* lanceolato-acuminata, integerrima; theca elliptico-cylindracea longipedunculata, oper. longe subulato recto, dentibus longissimis.

Trichost. Indicum Willd. in Römer und Usteri Magaz. für die Botanik. 1787. IV. p. 7. t. 1!

Patria. India orientalis, unde inter alias plantas accepit Willdenow.

Habitus et thecae forma *Br. polyphylli*, folia *B. crispata*, sed basi late convolutacea.

6. **B. Sellowianum** C. Müll.; *B. crispato* simillimum, sed theca lateraliter emergente brevissime pedunculata ovalis parvula, collo brevi angulate plicato instructa, dentibus brevibus vix ad basin fissis.

B. crispatum Hsch. in Fl. Bras. Fasc. I. p. 20. verosimiliter huc pertinet.

Patria. Brasilia, in campis Montevideosibus: Sellow.

7. **B. cucullatifolium** C. Müll.; humile parce ramosum dense pulvinatum, gracilius; folia caulina madore densissime conferta patentia rigida haud flaccida, breviora, obtusiuscule acutata, apice plerumque incurvo cucullato-concava, basi longius tenera, margine hic illic parum revoluta, theca brevissime pedunculata, breviter ovalis, operc. breviori; calyptra laevis thecam superans; dentes multo breviores, in crura duo, haud stricta valde conniventia aequalia prismatica cohaerentia angusta, sed inaequaliter latiuscula secedentia planiuscula fissi.

B. crispatum β . *brachycarpum* Hsch. Linn. XV. p. 126.

Patria. Prom. b. spei, Witbergen in rupibus, altit. 7500', Januario 1833: Drège.

A *B. crispato* affnissimo notis cursive impressis certe distat.

β . Pusilla.

8. **B. glyphomitrioides** C. Müll.; *pusillum* subramosum dense foliosum intense viride; folia *B. cucullatifolii*, sed margine ubique erecta, breviora; theca in ped. parum longiore ovalis minuta, operc. longe subulato recto, dentibus pallide purpurascens, rugulosis, in crura duo tenuissime filiformia elongata inaequalia disjuncta v. cohaerentia, vix ad basin usque fissis; calyptra laevis theca $\frac{2}{3}$ brevior.

Ptychomit. pusillum Br. Europ. 2—3. p. 5. t. 1. — *Notarisia Italica* Hmp. Linn. 1837. — *Grimmia glyphomitrioides* Bals. et De Not. Prodr. Bryol. Mediol. p. 153.

Patria. Ad saxa calcarea in collibus pr. Corgeno in agro Mediolanensi: Balsamo; pr. pagum Camnago pr. Como: Cesati; in Pyrenaeis: Spruce.

A *B. cucullatifolio* notis cursive impressis facile distinguitur.

9. **B. incurvum** C. Müll.; *B. glyphomitrioidi* simillimum, sed dentes multo angustiores, cruribus valde inaequalibus, altero brevissimo tenuissimo saepe fugaci vel obsoleto, altero latiusculo subulato.

Ptychomit. pusillum Sulliv. Musc. Allegh. No. 135. — *Brachystel. Hampeanum* C. Müll. Linn. XVII. p. 597. — *Notarisia Virginica* Hmp. XI. p. 379. — *Grimmia Hookeri* Drumm. Musc. Amer. No. 61! — *Gr. Mühlenbergii* Brid. I. p. 181. — *Gr. incurva* Mühlenb. Cat. Pl. Amer. Sept. p. 78. — *Weisia incurva* Schw. Suppl. II. I. p. 51. t. 116.

Patria. America septentrionalis, passim: Mühlenberg detexit.

10. **B. Drummondii** C. Müll.; *B. incurvo* simillimum, sed differt foliis lineari-lanceolatis acutis, haud apice incurvis, siccitate valde crispatis, crassiusculis haud nitentibus, theca magis elliptica minuta exannulata, ore rubra, dentibus longe infra orificium oriundis subimmersis conniventibus late subulatis, subinde perforatis, apice vix fissis, leniter trabeculatis, saturate fulvis, basin versus rubris, calyptra thecam $\frac{2}{3}$ obtegente. $\frac{1}{4}$.

Grimmia Drummondii Hook. et Wils. in Lond. Journ. of bot. IV. 1842. p. 422. t. 25. B. et III. p. 90. t. 3.

Patria. Louisiana, in arborum truncis: Drummond.

Gen. XX. **Gümbelia** Hmp.

Bot. Zeit. 1846. p. 124. — *Grimmia* al.

In honores domini Gümbel, Bryologiae Europaeae socii, nomen conditum.

Calyptra dimidiata. Caetera *Grimmiae*.

a. *Pedunculus immersus*.

1. **G. laxa** C. Müll.; dioica; laxe pulvinata humilis, basi cohaerens, flaccida mollis, *viridis*, dein ferruginea et subtomentosa, folia caulina laxe conferta erecto-patentia, e basi erecta longiuscula late oblongo-dilatata laxiuscule hexagone tenuiter pellucide reticulatâ oblique lanceolata, pilo longo denticulato terminata, superne molliter et multo minutius areolata opace viridia, margine erecto; perich. basi multo laxius et longius reticulata; theca vix emersa erecta longiuscule ovalis macrostoma brunnea, obsolete striata, dentibus late lanceolatis, calyptra parvula basi in lacinias inflexas fissa.

Grimmia laxa C. Müll. Bot. Zeit. 1847. p. 801.

Patria. Mexico, in monte Orizaba: Deppe et Schiede. No. 1070. a.

Folia innovationum imberbia s. mucronata, apice incurva; caulina speciminum viridissimorum ad alas striis nonnullis, e seriebus simplicibus pluribus cellularum incrassatarum compositis, ornata. Operc. et caetera desunt. — *Grimmia pulvinatae* haud dissimilis, magis tamen ad *Gr. Hoffmanni* spectans.

b. *Pedunculus emergens curvulus*.

2. **G. crinita** Hmp. (l. c.); monoica; plus minus pulvinata canescens tenella; folia caulina laxe imbricata erecto-appressa, oblongo-ovata, inferiora *obtusa v. mutica*, superiora *pilifera*, concava, *margine erecta*, basi tenuiter longiuscule diaphane superne magis incrassate areolata; theca in ped. *brevi curvulo subemersa* subventricoso-ovata pachyderma obsolete striata, operculo breviter conico obtusiusculo; perist. dentes ob annulum latissimum longe persistentem erecti intense aurantiaci, superne plerumque pluries fissi granulosi, calyptra lata.

Grimmia crinita Brid. Mant. Musc. p. 32. Br. univ. I. p. 163. — Br. Europ. 25—28, p. 10. t. 2. — *Gr. capillata* De Not. Mant. Musc. ad Fl. Pedem. p. 40. — *Gymnost. decipiens* Web. et Mohr. Bot. Tashb. p. 79.

Patria. In muris calce lutatis hic inde per totam Europam temperatam et calidiorē, ex Ångström et in Norvegia et Lapponia. — *Vere.*

Flores masc. plures emersi crassiusculi, foliis perig. interioribus obtusis; antheridiis eparaphysatis. — *Gr. plagiopodiae* habitu haud dissimilis.

3. *G. Sinaica* Hmp. (l. c.); *G. crinitae* simillima, sed differt theca minus ventricosa, in pedunculo longiore constanter lateraliter emergente et dentibus duplo latioribus superne 3—4 fidis, sed cohaerentibus. $\frac{1}{4}$.

Grimmia Sinaica Br. Eur. 25—28. p. 11.

Patria. Monte Sinai: W. Schimper.

c. *Pedunculus exsertus.*

α. *Folia crispula.*

4. *G. Abyssinica* Hmp. (l. c.); dioica; dense pulvinata, sed laxē cohaerens, elatiuscula, fastigiata ramosa, subdecumbens fusco-lutea crispula, folia caulina erecto-patentia, sicca crispula, lanceolata, longe subulata, haud pilifera, concava, margine inferne convexo-reflexo, foliorum cellulae basi angustae elongatae densae, superne minutae quadratae incrassatae, parietibus interruptis v. crenulatis; perich. longiora, basi laxius longius reticulatae cellulis haud interruptis; theca in ped. valde decurvato minute ovalis laevis pallescens, operc. oblique conico obtuso, annulo lato duplici, dentibus angustis integris vel apice parum fissilibus asperis remote articulatis purpureis.

Grimmia Abyssinica Br. et Sch. in Musc. Abyss. Schimp. No. 435.

Patria. Abyssinia, monte alpestri Silke, 18. Febr. 1840: W. Schimper.

Grimmiae apiculatae haud dissimilis. Calyptram non vidimus.

β. *Folia conferta.*

5. *G. alpestris* Hmp. (l. c.); dioica; depresso-pulvinata compacta, virescens v. nigricans, canescens, humilis; folia caulina erecto-patentia, e basi oblongo-ovatà lanceolato-acuminata pilifera, valde concava, obsolete

plicata, margine erecto, cellulis diaphanis basi quadrate hexagonis superne depressis pachydermibus minoribus sublaevissimis; perich. majora latiora molliora tenuius reticulata magis chlorophyllosa; theca in ped. breviter exserto erecta, plus minus elliptica brunnescens laevissima, operc. obtuse conico, annulo angusto triplici; perist. dentes angusti aurantiaci irregulariter bifidi, calyptra angusta.

Grimmia alpestris Schleich. Pl. Helv. exs. — Br. Germ. II. I. p. 139. t. 21. — Br. Europ. 25 — 28. p. 27. t. 15.

Patria. Ad rupes siccas alpium editiorum totius fere Europae. — *Aestate.*

Pl. mascula ramosior, fol. perig. int. muticis, antherid. eparaphysatis. — A *G. orbiculari* aliquantulum simili, inflorescentia et notis illustratis longe distat; ab aliis cum *Grimmia obtusa* habitu affini commutata est.

6. *G. caespiticia* C. Müll.; dioica; *G. alpestri* simillima, sed folia plicis basi duabus flavis interdum obsoletis, superne pluribus, utrinque juxta nervum crassum profunde canaliculatum viridem igitur sulcata, basi cellulis quadratis hexagonis pellucidis, superne opacis minutis tenuissime papillosis, mutica, superiora brevissime pilifera; theca longe exserta oblonga cylindracea, operculo acutato, annulo angusto, perist. dentibus lanceolatis integris rugulosis, calyptra minuta.

G. sulcata Hmp. l. c. — *Grimmia Jacquini* Garov. Bryol. Austr. exc. 1840. p. 25. et Catalogo di alcune crittogame 1837. p. 7 et 25. teste Sauter. — *Gr. sulcata* Saut. Regensb. bot. Zeit. 1841. I. p. 39. — Br. Europ. 25 — 28. p. 27. t. 16. — *Dryptodon caespiticius* Brid. I. p. 200!

Patria. In rupibus praeprimis schistosis subhumidis summarum alpium Salisburgiae: Sauter, Tirolis: W. P. Sch., Pyrenaeorum: Endress, Spruce. In monte sancti Bernhardi Helvetiae caespitibus irregularibus incanis ad rupes habitantem primus legit ante multos annos Schleicher.

Plicae foliorum illis fol. *Coscinodontis* simillimae reperiuntur.

7. *G. montana* Hmp. (l. c.); *dioica*; dense pulvinata, depressa, canescens gracilis humilis; folia caulina erecto-patentia, oblongo-lanceolata longe sublaevipila curvata, valde concava, margine erecto, s. subincurvo, cellulis *basi diaphanis* quadrate hexagonis superne minutis *rotundate incrassatis opacis* sublaevibus; perich. longiora, basi angustius longius et tenuius reticulata; theca in ped. breviter exserto erecta, *ovata parva lutescens, dein fusca*, laevissima, operc. *oblique rostrato*, annulo *simplici*; perist. dentes superne irregulariter lacerati; calyptra *major*.

Grimmia montana Br. Europ. 25—28. p. 26. t. 14.

Patria. In rupibus schistosis, basalticis et porphyraeis Galliae occidentalis, vallis Badensis Murgthal: A. Braun, Hassiae superioris, pr. Biedenkopf: Bruch, m. Donnersberg Vogesi: Gumbel, Norvegiae pr. Christianiam: Blytt, et in alpe Dovrefjeld: W. P. Sch.

Pl. masc. minor, floribus pluribus, foliis perig. internis late ovatis breviter acuminatis s. brevipilis, anth. epaphysatis. — A *G. alpestri* simili notis cursive impressis distinguitur.

8. *G. ovalis* C. Müll.; *dioica*; *latissime laxè pulvinata, elatiuscula robusta* substricta, viridissima, pilis grisea; folia caulina laxè praesertim inferiora *subsquarrosconferta, madefacta prime reflexa, dein curvato-erecta patula*, e basi ovatâ reflexo-lanceolata longe sublaevipila, margine erecto, cellulis infimae basis angustis densis flavidis utrinque et supra magis quadratis diaphanis, superne minutis rotundate incrassatis opacis; perich. longiora basi longius laxius pellucidius reticulata; theca in ped. breviter exserto stricto erecta *turgide ovalis v. elliptica magna* fuscescens, operc. oblique rostrato, annulo latissimo, calyptra lata thecam dimidiam obtegente; perist. dentes longi lati densissime trabeculati, inferne purpurei, superne pluries ciliati asperuli pallidi.

G. elliptica Hmp. l. c. — *Grimmia commutata* Hüb. Musc. Germ. p. 185. — Br. Europ. 25—28. p. 25. t. 19. — *Gr. elliptica* Fk. Moostaschb. p. 16. t. 11. — *Dryptodon oratus* Brid. l. p. 202. — *Campylopus oratus* ej. Mant. p. 76. — *Dicranum ovale* Hdw. Musc.

Fr. III. p. 81. t. 34. — *D. durum* Lagasc. Ann. de Cienc. Nat. IV. p. 177. — *Trichost. ovatum* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 110. — *Bryum orale* Hoffm. D. Fl. II. p. 35. — *Br. brevicaule* Vill. Pl. Dauph. III. p. 871.

Patria. Per reg. montanam totius Europae, rupes habitans, vulgatissima. — *Vere*, in Scandinavia autumno.

Pl. mascula similis subfasciculata, fol. perig. int. late ovatis breviter acuminatis. Species notis datis ab omnibus congeneribus primo intuitu distinguenda.

9. *G. orbicularis* Himp. (l. c.); *monoica*; dense hemisphaerico-pulvinata humilis grisea s. canescens virescens gracilis; folia caulina erecto-patentia, profunde carinato-lanceolata, pilo longo sublaevi, apice curvula, cellulis ubique minute quadratis, basi diaphanis, superne chlorophyllosis, margine erecto; perich. angustiora longiora, basi elongate anguste laxe reticulata; theca in ped. apice arcuato flavido inclinata v. nutans orbicularis, aurantiaca dein brunnescens, *laeviter striatula*, operculo *mammillato purpureo*, annulo simplici, calyptra parva, perist. dentibus basi latis trabeculatis superne pluries ciliato-fissis aurantiacis asperulis, calyptra parvula.

Grimmia orbicularis Br. Europ. 25 — 28. p. 13. t. 5. — *Gr. mammillaris* Pösch in Musc. Bohemicis. — *Dryptodon obtusus* Brid. I. p. 198. partim.

Patria. In muris et rupibus calcareis hinc inde per totam Europam temperatam et meridionalem. — *Vere*.

Grimmiae pulvinatae, cujus infloresc. habet et quacum persaepe commixtam legimus, simillima, sed theca minor in iisdem locis prius matura, notis cursive impressis praesertim calyptra primo adspectu discernibilis.

10. *G. calyptrata* C. Müll.; *dioica*; dense pulvinata canescens *breviter ramosa* erecta, foliis superioribus erectis substricta, folia caulina laxa conferta erecta subappressa, oblongo-lanceolata, inferiora pilo carentia, superiora longe et subleviter pilifera, subcomplicate carinata, cellulis basi diaphanis longiusculis angustis ad marginem majoribus magis quadrate hexagonis, superne minutis in-

crassatis subrotundatis, margine erecto vix convexo; perich. longiora latiora basi laxius tenerius pellucidius reticulata; theca in ped. parum exserto erecta, cylindraceo-oblonga, laevis fusca, calyptra *majuscula thecam totam maturam obtegente*, operculo conico rostrato; perist. dentes subintegri purpurei, annulo angusto.

Grimmia calyptrata Hook. in Drumm. Musc. Amer. No. 60.

Patria. Ad rupes in Rocky - Mountains: Drummond.

A *Grimmia leucophaea* simillima notis cursive impressis primo adspectu differt.

Gen. XXI. **Grimmia** Ehrh.

Beiträge I. p. 176. — *Schistidium* Br. et Sch. — *Dryptodon* Brid. — *Rhacomitrium* Brid. — *Trichostomum* al. — *Dicranum* al. — *Bryum*, *Fontinalis* et *Hypnum* antiq.

In memoriam Joh. Fr. Car. Grimm, Archiatri Gothani, Botanici peritissimi et auctoris Florae Isenacensis ab *Ehrharto* impositum, a posterioribus *Hedwigio* praesertim nomen emendatum.

Calyptra *mitraeformis laciniata*, operculum *vix superans laevis*, v. *brevior*. Perist. simplex: dentes 16 lanceolati linea media exarati trabeculati, saepe vero fissiles, quare valde polymorphi, plus minus ad medium usque 2—4 fidi vel in crura duo ad basin usque fissi.

Sectio I. **Platystoma**. Plantae plus minus orbiculariter pulvinatae, saepe gracilescentes, dichotomae; foliorum cellulae plerumque incrassatae rotundatae v. quadratae, parietibus laevibus, rarius crenulatis. Theca immersa, rarissime exserta, laevis, aperta *macrostoma urniformis* v. *cyathiformis*. Perist. dentes pluries fissi, sed cruribus hic illic cohaerentibus, igitur cribrosi, vel apice solo fissi, rarius integri, vel nulli.

A. *Theca immersa*.

a. *Folia imbricata*.

α. *Laxe pulvinatae*.

1. **Gr. apocarpa** Hdw. (Musc. Fr. I. p. 104. t. 39.); *monoica*; laxae pulvinata, fusco-lutca, rigida, plus minus

elata et dichotome ramosa, ramis theca terminali apice incrassatis; folia caulina *madefacta prime reflexa, dein erecto-patentia, sicca appressa, e basi ovata rectiuscula recurvato-lanceolata, superiora apiculo hyalino terminata, margine basi revoluta ubique minute rotundate v. plus minus quadrata areolata*, superne opaca, firma sordida; perich. emersa multo latiora, longiora stricta, vaginantia, *longe acuminata brevipila*, apice denticulata, basi anguste tenerrime pellucide laxe superne minute reticulata; theca immersa urniformi-ovalis, exannulata, macrostoma, glabra coriacea pachydermis, operc. cupulato oblique rostellato, dentibus longe lanceolatis intense purpureis parce cribrosis v. integris *carnosulis*.

Brid. I. p. 169. — *Gr. polyodon* Ehrh. Beitr. p. 169. — *Gr. fusca* Br. Germ. II. I. p. 120. t. 19. — *Gr. robusta* ibid. 123. tab. 20. — *Gr. apocaulos* Dec. Fl. Franç. I. p. 458. — *Gr. strigosa* Brid. I. p. 171. — *Gr. fasciculata* Brid. Mant. p. 33. — *Gr. Torreyana* ej. I. p. 172? quod in Hb. auctoris non invenimus. — *Dicranum? phascoideum* P. B. Prodr. p. 54. et Brid. I. p. 467? — *Bryum apocarpum* L. Sp. Pl. p. 1579. — *Fontinalis apocarpa* Linn. Jun. Meth. Musc. p. 366. — *Sphagnum subhirsutum* obscure virens, capsulis rubellis. Dill. Musc. p. 243. t. 32. f. 4.

β. rivularis; elongata valde dichotome ramosa gracilis magis flaccida intense viridis, foliis ovato-lanceolatis obtusiusculis. *Gr. rivularis* Brid. I. p. 166. — *Gr. alpicola* Sw. Musc. Suec. p. 27 et 81. t. 1. f. 1. — *Gr. Helvetica* Schk. Deut. Moos. p. 48. t. 21.

γ. gracilis; longior gracilescens decumbens, foliis undique patentibus v. homomallis, perichaetiis secundis. *Gr. gracilis* Schl. in Schw. Suppl. I. I. p. 98. t. 23. — *Gr. Schleicheri* Spreng. Einleit. in d. Stud. d. Krypt. Gew. p. 277. t. 7. f. 59. — *Gr. trichodon* Brid. I. p. 171. — *Gr. stricta* Turn. Musc. Hib. p. 20. t. 2. f. 1.

δ. conferta; dense pulvinata, saturate viridis, folia breviora obtusiora, perich. minus vaginantia brevius pilifera, theca brevior, dentibus aurantiacis. *Gr. conferta* Fk. Moostaschb. p. 18. t. 12. — *Gr. glacialis* Br. Germ. II. I. p. 118. t. 19. — *Gr. urceolaris* ibid. p. 121. — *Gr. latifolia* Brid. I. p. 162. — *Schistidium confertum* Br. Europ. 25—28. p. 7. t. 1.

Patria. Per totam partem Europae, Asiae et Americae septentrionalis, vulgatissima, rupes, muros, tecta, rarius arborum truncos habitans, et in alpes ascendens. In montib. Chilensibus leg. Pöppig, ad Cap. Horn: J. D. Hooker. Var. β . ad rivulorum ripas; γ . in locis apricis; δ . in montosis et alpestribus Europae et Abyssiniae.

Flos masc. terminalis v. pseudo-lateralis.

2. **Gr. depilis** C. Müll.; *monoica*; laxe pulvinata *elatiuscula* gracilis, *inferne nuda*, superne foliosa, *fastigiata ramosa*, luteo-fusca, rigida, ramis apice theca vix incrassatis; folia caulina arcte appressa, madefacta reflexa, dein patentia, parva, *lanceolata depilia obtusiuscula*, basi *ad latus sinistrum solum margine revoluta*, ubique minute incrassate rotundate areolata, firma; perich. caulinis longiora latiora emersa stricta vaginantia *oblongo-lanceolata*, *acumine brevissimo hyalino denticulato tenuissimo fugaci terminata*, inferne tenerius laxius pellucidius reticulata; theca *omnino clausa* subsessilis ovalis macrostoma, glabra coriacea, operculo conico obtuso recto calyptra tenera angusto tecto, annulo *simplici* imperfecto, dentibus teneris aurantiacis.

Grimmia maritima v. *australis* Hmp. in Hb. Kunzean.

Patria. Prom. b. spei, Philippstown ad Kat-Rivier: Papp.

Flos masc. minutus, fol. perig. teneris late ovatis inferne tenuius laxius apice minutius firmitus areolatis, antherid. longis curvatis eparaphysatis. — A *Gr. apocarpa* δ . *conferta* notis cursive impressis facile distinguitur.

3. **Gr. fuliginosa** Schimp. (in litt.); *dioica*; pulvinata, semiuncialis, dichotome ramosa; folia inferne parvula appressa acuminato-ovata, media et superiora *conferta patula*, apice incurva, sicca flexuosa, lineali-lanceolata pilifera; perich. vaginantia; theca immersa minuta ovalis, pedunculo paullo longiore, recto v. curvulo, operc. conico acuto, calyptra conica basi lacera; perist. *Gr. obtusae*. †.

Patria. Mexico, in summo Pico de Orizaba, alt. 14000': Liebm ann.

Habitus *Gr. apocarpae* var. *confertae*; theca minor quam in congeneribus affinibus.

4. *Gr. amblyophylla* C. Müll.; *monoica*; *pusilla* parce et breviter ramosa, inferne tomentosa, ramis inferne nudis, apice dense foliosis, fusco-viridis, compacte pulvinata; folia caulina conferta, *maefacta primum haud reflexa, sed erecto-patentia, anguste lanceolata subacuminata*, curviuscula, carinata, *superiora latiora magis acuminata*, brevissime hyaline apiculata, margine hic illic convexiusculo, cellulis rectangularibus superne quadratis latere crenulatis incrassatis firmis luteis; perich. e basi oblonga sensim dilatata ligulato-obtusata, margine erecto, cymbiformi-carinata, caulinis multo latiora, robustius areolata; theca subsessilis immersa urceolata brevis exannulata, operc. cupulato recte rostellato, dentibus subintegerrimis aurantiacis linea media exaratis punctulatis latis.

Gr. apocarpa var. Hook. et Wils. in sched. musc. antarct. partim.

Patria. Insula Eremitae et Kerguelen ad Cap. Horn: J. D. Hooker.

Flos masc. minutus angustus, fol. perig. oblongis obtusiusculis. — A *Gr. apocarpa* reticulatione crenulata, haud leviter quadrata sub microscopio primo momento distinguitur.

β. Compacte pulvinatae.

5. *Gr. plagiopodia* Hdw. (Sp. Musc. p. 78. t. 15.); *monoica*; *latissime compacte pulvinata, sed laxe cohaerens, griseo-viridis humilis*; folia caulina *arcte imbricata, inferiora ovata obtusa, superiora ovato-acuminata breviter laevipila, cochleariformi-concava*, margine erecto, *teniter membranacea*, cellulis basi pellucidis hexagonis, superne rotundatis magis chlorophyllosis, dein inanibus; perich. majora, basi longius et laxius reticulata; theca in ped. curvulo brevissimo immersa, operculo cupulato mam-

millato ovalis, macrostoma, lutea, dentibus pulchre aurantiacis, dense trabeculatis, superne valde ciliato-fissis *glabris*, annulo duplici.

Br. Europ. 25 — 28. p. 9. t. 1. — Brid. I. p. 162. — *Gr. obtusa* Brid. Schrad. Bot. Journ. IV. p. 276. — *Gr. plagiopus* Schw. Suppl. I. I. p. 95. — *Coscinodon plagiopus* Spreng.

Patria. In arena variegata pr. Jenam: Flörke 1798, pr. Naumburgum ad Salam sit. ad ruinas arcis Schönburg: Beneken 1846, ad Steinholz pr. Quedlinburg: Hampe, in Pyrenaeis: Spruce. — *Vere.*

Flos masc. terminalis infra femineum, fol. perig. ligulato-ovalibus cochleariformi-concavis evanidinervibus diaphanis, anth. eparaphysatis. — *Coscinodonti cribroso* simillima.

6. *Gr. anodon* Br. et Sch. (Br. Europ. 25 — 28. p. 8. t. 1.); *monoica*; *Gr. plagiopodiae* simillima, sed thecae basi valde ventricosa subglobosa minor, peristomio nullo, annulo simplici.

Patria. In muris et rupibus calcareis, pr. Heidelberg ad arcem: A. Braun, pr. Gefrees m. piniferi: Funk, loco Brühl pr. Vindobonam ad latera viae cavac: Putterlick, Pad Mangerskaskala alp. Julic.: Sendtner, pr. Mende Galliae merid.: Prost, in alpib. Tirolis et Styriae: W. P. Sch., Carinthiae pr. Heiligenblut: Funk, in Pyrenaeis: Spruce.

7. *Gr. Hoffmanni* C. Müll.; *monoica*; *minute dense pulvinata rigida*, inferne fusco-nigricans, apicibus luteo-viridibus griseis; folia caulina *anguste lanceolata curcula*, *ubique minute incrassate elliptico-areolata firma*, *flavida*, superiora et perichaetialia majora latiora *longius pilifera*, basi pellucidius laxius tenerius superne *minute subquadrate areolata*, *firma*, *haud chlorophyllosa*, *omnia margine distincte revoluta*; theca *subsessilis erecta subglobosa symmetrica*, operculo cupulato mammillato, dentibus *rudimentariis*, annulo angusto duplici.

Schistidium pulvinatum Brid. I. p. 114. — Br. Europ. 25 — 28. p. 6. t. 1. — *Gymnost. pulvinatum* Hoffm. Deut. Fl. 1798. in Add. — *Anoetangium pulvinatum* Röhl. Ann. Wett. Ges. II. p. 207.

Patria. In rupibus reg. montanae, ubi pr. Reinhausen circa Göttingam detexit Hoffmann, usque in nivalem hinc inde per totam Europam, in Canada superiore et in rupibus montium Simensium (Abyssiniae) inde a 9000 ped. supra mare usque ad 13000 pedes: W. Schimper, 6. Jun. 1838. — *Vere, in alpihus aestate.*

Flos masc. sub femineo pseudolateralis, fol. perig. int. ovalibus concavis; anth. paucis, paraphysibus brevibus v. nullis. — Notis cursive impressis a *Gr. plagiopodia* et *anodonte* facile distinguitur.

b. *Folia tortuosa.*

8. *Gr. maritima* Turn. (Musc. Hib. p. 23. t. 3.); *monoica*; dense pulvinata fusco-lutea humilis; folia caulina erecto-patentia stricta, *sicca praesertim superiora falcato-currata*, rigida, caetera subtortuosa ovato-lanceolata, in acumen brevissimum hyalinum denticulatum saepe producta, canaliculato-concava, margine convexo, cellulis plus minus dolioliformibus superne minoribus firmis incrassatis inanibus; perich. *multo longiora et latiora, emersa, sicca distincte falcata, basi oblonga laxa pellucide elongate reticulata, medio latiora, superne subpili-fero-acuminata*, margine erecto vix involuto; theca exannulata obovata urniformis truncata laevis, operculo cupulato oblique rostellato calyptra vix tecto, dentibus magnis lato-lanceolatis purpureis remote articulatis plus minus cribrosis.

Brid. I. p. 164. — *Schistidium maritimum* Br. Europ. 25 — 28. p. 10. t. 5. — *Grimmia rigida* Brid. I. p. 768.

Patria. In scopulis maritimis Gothiae, Norvegiae, Lapponiae australis, Scotiae, Angliae, Hiberniae, Galliae occidentalis et teste Hübener orae Slesovico-Holsaticae. In insula Terre Neuve Americae sept. legit La Py-lae. — *Initio aestatis.*

Flos masc. ad pedem feminei crassiusculus terminalis, foliis perig. late ovatis breviter acuminatis, anth. epa-raphysatis. — A *Gr. apocarpa* habitu simillima notis illustratis facile distinguitur.

9. *Gr. tortuosa* Hook. et Wils. (Lond. Journ. of bot. 1844. p. 540.); *dioica*; *laxe pulvinata*, *sed inferne maxime cohaerens tomentosa*, *valde fastigiata ramosa*, *humilis mollis flaccida robusta obscure viridis*, *ramis multis brevibus gracilibus dense approximatis*; *folia caulina subtortuosa*, *madefacta flaccide patula longiuscula*, *anguste lanceolato-acuminata*, *pilo breviusculo sublaevi acuto terminata*, *carinata e cellulis minutissimis rotundatis opacis viridibus basi angustis elongatis pellucidis areolata*, *marginē erecto*; *perich. conformia* *basi laxiore magis concava*; *theca breviter urceolata laevis perfecte immersa*, *subsessilis*, *operc. convexo umbonato*, *calyptra parva basi multoties laciniata*, *dentibus carnosus purpureis opacis*.

Patria. Insulae Falklandi: J. D. Hooker.

Notis designatis species maxime propria, *Gr. maritimae* similis. Theca exannulata videtur.

c. *Folia falcato-secunda.*

10. *Gr. falcata* Hook. et Wils. (Lond. Journ. of bot. 1844. p. 540.); *dioica*; *laxissime intertexta*, *procera gracillima flexuosa*, *valde ramosa*, *ramis elongatis apice falcatis pendula sordide viridis*; *folia falcato-secunda laxissime imbricata*, *late lanceolata breviter subulata obtusiuscula*, *carnosula crassinervia*, *ubique minute quadrate incrassate et densissime areolata subopaca*, *marginē erecto vel parum involutaceo*; *theca urceolata magna brevis fusca exannulata macrostoma immersa subsessilis laevis majusculè reticulata*, *operc. rostellato obliquo*, *calyptra parva latere fissa cucullato-mitraeformi tecto*, *columella persistente emergente elevato*, *dentibus latissime lanceolatis late et ditissime trabeculatis purpureis laevissimis linea longitudinali laevi exaratis integerrimis*.

Patria. Insula Kerguelen: J. D. Hooker.

Pl. mascula floribus terminalibus crassiusculis, fol. perig. latissime ovatis breviter acuminatis, basi tenerius et pellucidius areolatis; antherid. elongatis curvulis com-

pacte approximatis eparaphysatis numerosis. — Ab omnibus congeneribus notis illustratis distans.

B. *Theca exserta.*

11. *Gr. laxifolia* Hook. fil. (Lond. Journ. of bot. 1840. p. 5; tabula in Hook. Ic. Pl. Rar. 194. B.); elongata cespitosa flaccida, subramosa; folia erecto-patula laxe imbricata, oblongo-lanceolata acuta, carinata, mollia lurido-virescentia flaccida, sicca crispa; theca in ped. recto pseudolaterali longe exserto elliptica oblonga brevis macrostoma, late angulari-reticulata, rufo-brunnea dentibus brevibus rufis, superne flavis. $\frac{1}{4}$.

Patria. Himalayae montes: Royle.

Ex animadv. auctoris nulli speciei cognitae similis. *Gr. apocarpae* var. *rivulari* ex icone habitus affinis videtur.

Sectio II. **Eugrimmia.** Plantae plus minus orbiculariter pulvinatae, humiles, dichotomae; foliorum cellulae ubique quadratae, basi plerumque quadrate hexagonae, parietibus laevibus, incrassatae v. molles. Theca *microstoma*, pedunculo exserto recto v. cygneo. Perist. dentes regulariter 2—3 fidi, rarius integri.

A. *Pedunculus cygneus.*

a. *Areolatio mollis chlorophyllosa.*

12. *Gr. pulvinata* Hook. et Tayl. (Musc. Brit. p. 38. t. 13.); *monoica*; dense haemisphaerico-pulvinata canescens virescens humilis; folia caulina erecto-patentia, late lanceolata, carinata, pilo longo sublaevi, margine erecto v. parum revoluta veluti tumidiusculo, cellulis ubique quadratis, basi majoribus diaphanis, superne opacis chlorophyllosis mollibus; perich. magis cymbiformia basi laxius reticulata; theca in ped. arcuato flavido declinata ovalis lutea dein fuscescens octies plicata, operc. rostrato recto, purpureo, annulo lato, dentibus intense purpureis late lanceolatis plerumque trifissilibus integris parum pertusis subrugulosis.

Br. Europ. 25—28. p. 12. t. 4. — *Dryptodon pulvinatus* Brid. I. p. 196. — *Campylopus pulvin.* ej. Mant. Musc. p. 75. — *Dicran. pulvinatum* Schw. Suppl. I. I. t. 189. — *Trichost. pulvinatum* Web. et Mohr. Bot. Taschb. p. 109. — *Fissidens pulvin.* Hdw. Sp. Musc.

p. 158. t. 40. — *Leersia pulvinata* ej. Fund. Musc. I. t. 10. f. 65. — *Afzelia pulvinata* Ehrh. Crypt. 163. — *Bryum pulvinatum* Linn. Sp. Pl. p. 1586. — *Bryum orbiculare*, *pulvinatum*, *hirsutie canescens*, *capsulis immersis*. Dill. Musc. p. 395. t. 50. f. 65.

β. obtusa; humilior, theca in ped. brevior brevis-ovalis, operc. conico obtuso v. papillato, dentibus brevioribus. Br. Eur. l. c. — *Fissidens pulvinatus β. Africanus* Hdw. Sp. Musc. p. 159. t. 40. — *Dryptodon obtusus* Brid. I. p. 198 ex parte. — *Gr. cygnicolla* Tayl. Lond. Journ. of bot. 1846. p. 449 fide Wilson huc pertinet.

Patria. In substratis maxime variis, rarius arboribus, per totum fere orbem terrarum sed haud arcticum, vulgatissima. Var. *β.* in locis apricis regionum praesertim meridionalium. — *Martio et Aprili.*

13. Gr. arenaria Hmp. (Linn. X. p. 404.); *monoica*; pulvinuli tenelli depressi humiles canescentes; caulis pusillus parce dichotomus gracilis; folia caulina erecto-patentia, *longiuscule et anguste lanceolata*, *longissime sublaevipila*, plus minus flexuosa, *molli*a, margine erecto, cellulis basi angustis elongatis pellucidis, superne sensim minutis quadratis amoene chlorophyllosis opacis; perich. intima breviora basi laxius reticulata; theca in ped. *brevicurvulo lateraliter emergente minute ovalis* leptodermis amoene pallide lutea glabra, operc. conico brevi obtusiusculo aurantiaco, *annulo simplici angustissimo*, dentibus angustis teneris dense articulatis superne cribrosis aurantiacis glabris, siccitate recurvis.

Gr. curvula Br. Europ. 25—28. p. 11. t. 3. 1845. — *Gr. incurva* Schleich. in litt. — *Gr. Zahlbruckneri* Garov. Bryol. Austr. p. 26 ex Sauter.

Patria. In rupibus schistosis Helvetiae: Schleicher primus legit, in schisto transitionis Galliae occidentalis pr. Angers: Guépin, Pyrenaeorum: Spruce, in rupibus arenaceis loci Regenstein pr. Blankenburg Hercyniae: Hampe. — *Martio.*

Flos masc. lateralis minutus, fol. perig. minute ovatis, anth. eparaphysatis. — A *Gr. obtusa* simillima notis cursive impressis primo adspectu distat.

b. *Areolatio firma.*α. *Infloresc. dioica.*

14. **Gr. trichophylla** Grev. (Scot. Crypt. Fl. t. 100.); late et laxe pulvinata humilis *luteo-viridis* parce dichotoma ascendens gracilis rigidiuscula; folia caulina erecto-conferta, madefacta subito erecto-patentia, *anguste curvato-lanceolata*, pilo acuto sublaevi terminata, profunde carinata, margine medio folii parum revoluta, cellulis ubique firmis quadrate rotundatis incrassatis, luteis, basi rectangularibus, superne minutis; perich. latiora vaginantia, inferne tenuiter et laxe pellucide reticulata; theca in ped. *pluries decurvato longe exserto flavido reclinata*, ovalis, flavida, dein fuscescens, *sicca valde angulate plicata*, operc. *rostrato subulato, purpureo, rectiusculo*, annulo lato triplici, dentibus purpureis angustis apice 2—3 fidis laevibus dense trabeculatis.

Br. Europ. 25—28. p. 16. t. 9. — *Gr. Schultzii* Hüb. Musc. Germ. p. 196. — *Dryptodon Schultzii* Brid. I. p. 199. — *Dr. trichophyllus* ej. l. c. p. 771.

β. *meridionalis*; elatior gracilior, foliis minutius et inferne magis incrassate areolatis, theca minutula subgloboso-ovalis, dentibus brevioribus.

Patria. In saxis regionis montanae et subalpinæ totius Europæ et in Asia minore. Var. β. Hispania, in collibus apricis pr. Granada et Escorial in Sierra de Guadarrama: W. P. Sch. — *Aprili, Majo.*

Pl. masc. gracilior subsimplex, flore terminali, fol. perig. late ovatis brevi-acuminatis obtusiusculis, ubique fere laxe et tenuiter reticulatis, anth. eparaphysatis breviusculis. — *Gr. pulvinatae* parum affinis et pulvinis luteo-viridibus parum canescentibus et theca in pedunculo supra perichaetium exserto atque cygneo reclinata angulate costata parva facile cognoscitur.

15. **Gr. consobrina** Kze. (in Pöpp. Pl. Chil.); *Gr. trichophyllae* simillima, sed folia superiora atque perich. basi multo tenuius longius et pellucidius reticulata, omnia

longiora, molliora sub microscopio amoene luteo-viridia, perich. intima angustissima tenerrima, annulo angusto, dentibus angustissimis aurantiacis remote articulatis, usque ad basin in crura inaequalia apice tenuissima fissis.

Patria. Chile australis: Pöppig.

16. Gr. Lisae De Not. (Spicil. p. 15 et Syllab. p. 251.); *Gr. trichophyllae* simillima, sed differt foliis late lanceolatis, magis recurvis, margine e basi usque ad medium convexo-revolutis, theca subglobose pomiformi, basi impressa, orificio coarctato - angustato, laevi, operculo constanter oblique subulato.

Patria. In collibus pr. Taurinum ad rupes: Lisa, in insula Caprariae: De Notaris, Lisa.

Species, notis constantibus repertis, distinctissima.

17. Gr. Sardon De Not.; *Gr. trichophyllae* var. *meridionali* simillima pusilla, sed folia magis reflexa, e basi valde dilatata lanceolata, apice falcato-curvata, margine longe ultra medium folii valde revoluta, cellulis minutissimis, apice veluti punctiformibus, inferne minute quadratis, infima basi utrinque margine nonnullis pellucidis majus quadratis, caeteris plus minus chlorophyllosis; perich. basi amplexante, haud vaginante, brevi minus laxae areolata; theca in ped. maxime ad basin plantae spectante reclinato turgide globosa, laevissime octies plicata, nitida leptodermis flavido-aurantiaca, dentibus subintegris, basi late densissime approximatis.

Patria. Sardinia, ad rupes montium: De Notaris Martio 1835 legit.

18. Gr. ancistrodes Dur. et Mont. (in Fl. Alger. mox ed.); laxae pulvinata erecta altiuscula gracilis griseo-viridis dichotome divisa; folia erecto-conferta, madore subito maxime falcato-reflexa, anguste lanceolato-acuminata, pilo denticulato plus minus longo terminata, alis parum revolutis, cellulis minutissimis rotundis viridibus, basi quadratis pellucidis; perich. latiora, basi longiuscula laxae reticulata, cellulis superne magis quadratis; theca

in ped. brevi maxime decurvato *minute ovalis sublaevis*, annulo latiusculo, dentibus ad medium bifidis latiusculis.

Patria. Algeria: Durieu.

Foliis subito maxime et constanter recurvis ab affinis praecedentibus primo adspectu distinguenda.

β. *Infloresc. monoica.*

19. Gr. Eckloni Spreng. (Syst. Veget. IV. II. p. 321.); habitus *Gr. trichophyllae*; folia caulina densissima, *perfecte anguste lanceolata longiuscula strictiuscula, margine alis sensim convexis* haud revolutis, longe sublaevipila, cellulis minutiuscule punctiformibus rotundatis basi quadratis diaphanis plus minus laxis, superiora latiora magis curvata; perich. intima subvaginantia, basi tenuius areolata; theca in ped. pluries curvato flavido ovalis maxime costato-plicata lutea, operc. conico brevi obtuso purpureo, annulo lato triplici, dentibus late lanceolatis carnosulis purpureis, dense leviter articulatis, rugulosis, apice irregulariter bifidis v. integris subcribrosis.

Patria. Prom. b. spei, ad saxa montis leonis: Ecklon et pr. Zwellendam.

Fol. perig. generis longius acuminata basi laxe reticulata, externa basi ventricoso-concava. — A *Gr. trichophylla* notis cursive impressis facile distinguitur. *Gr. pygmaeae* foliis subaffinis.

20. Gr. pygmaea C. Müll.; laxiuscule pulvinata *humillima subsimplex v. semel dichotoma* luteo-viridis paulisper canescens, *basi nuda*, apice foliis densissimis *incrassata*; folia caulina erecta paullo patentia, *brevia, stricta, latiuscule elliptica*, in pilum longum sublaevem latiusculum producta, parum carinata, marginibus haud revolutis, *sed alis sensim convexis*, cellulis incrassate quadratis, *basi multo laxioribus pellucidis hexagonis*; perich. intima apice magis acuminata; theca in ped. *brevissimo semel decurvato ovalis, laeviter plicata*, pallide fusca, operc. conico acuto brevi purpureo, annulo lato, dentibus *brevibus late lanceolatis*, inferne purpureis dense articu-

latis, superne in cilia 2—3 pallida rugulosa apice cohaerentia v. secedentia fissis.

Gr. trichophylla var. *australis* Hmp. in Plant. Preiss. exsicc. — *Gr. Africana* ej. in Pl. Preiss. ed. Lehmann. II. p. 116.

Patria. Nova Hollandia, ad rupes graniticas: Preiss.

Flos masc. in ramo brevi terminalis crassus, fol. perig. late ovatis breviter acuminatis, ubique fere laxe reticulatis. — A *Gr. trichophylla* atque *pulvinata* β . *obtusa* (*Gr. Africana*) toto coelo notis cursive impressis distans et pulcherrima species, cui habitus *Gr. trichophyllae* et folia similia *Gr. leucophaeae*.

21. *Gr. imberbis* Kze. (Hb.); dense pulvinata *pusilla* subfastigiata ramosa fusco-viridis *gracilis*; folia caulina madefacta erecto-patentia, *brevia*, curvula, e basi *anguste lanceolata carinatâ canaliculate acuminata*, margine medio folii revoluta, e cellulis basi rectangulari-hexagonis flavidis margine utrinque hyalinis, apicem versus sensim depresso-quadratis subopacis incrassatis firmis areolata, superiora apice plerumque curvato, *acumine hyalino brevissimo acuto* terminata; perich. basi latiora et tenuius reticulata; theca in ped. parum arcuato minute ovalis distincte et angustissime plicata, latiuscule annulata, operc. conico recto obtusiusculo, dentibus *angustissime et breviter lanceolatis* dense articulatis apice solo parum bifidis rufis glabris.

Patria. Chile australis, ad rupes: Pöppig.

Fol. perig. late ovata apice breviter coarctato-acuminata, intima obtusiuscula, basi laxius reticulata, anth. turgide ellipticis breviusculis. — Statura humili et fol. depilibus brevibus facile cognoscitur. *Gr. trichophyllae* et affnibus similis.

c. *Areolatio conflato-incrassata.*

α . *Folia crispato-tortuosa.*

22. *Gr. incurva* Schwägr. (Suppl. I. I. p. 90. t. 97.); *dioica*; irregulariter laxe et depresso-pulvinata, dichotome ramosa, humilis, subfasciculatim foliosa, mollis, obscure viridis, dein nigricans, sicca subcrispata; folia la-

xissime inaequaliter imbricata tortuoso-curvata, madore patentia, angustissime lanceolato-acuminata longiuscule subulata, apice diaphana, basi erecta, superne curvata, margine haud vel vix revoluta; perich. basi longa vaginante tenera; theca in ped. lateraliter vix emergente madore curvulo minute ovalis leptodermis pallide fusca laevis, operc. conico obtusiusculo vel acutato, annulo triplici, dentibus plus minus longis irregulariter apice bifidis rufis subrugulosis.

Brid. I. p. 185. — Br. Germ. II. I. p. 168. t. 23. — *Gr. uncinata* Kaulf. in Sturm. Deut. Fl. Crypt. Fasc. 15. — Br. Europ. 25—28. p. 19. t. 12. — *Dryptodon contortus* Brid. I. p. 199. — *Campylop. contortus* ej. Mant. p. 74. — *Dicran. contortum* Wahlenb. Fl. Carpath. p. 346. t. 4?

Patria. Ad saxa quarzosa, praeprimis ad eorum latera oblecta, nec non in cryptis petrosis soli imperviis, per regionem subalpinam Sudetorum, m. Piniferi, ubi in m. Schneeberg sterilem legit Funk, Styriae, in „See-thaler-Alp”: Kaulfuss, m. Splügen et Vogesi: W. P. Sch. Rara et rarissime fertilis! — *Vere.*

Pl. masc. ramosior, floribus terminalib., fol. perig. int. convolutaccis breviter acuminatis. — Ex habitu *Blindiae cirrhatae* et notis supra descriptis e distinctissimis atque pulcherrimis.

β. Folia spiraliter torta.

23. *Gr. spiralis* Hook. et Tayl. (in Drumm. Musc. Scot. V. 2. No. 29.); *dioica*; dense pulvinata, sed laxissime cohaerens, gracilis elatiuscula dichotome ramosa v. fastigiata, ramis funiformi-tortis, junioribus interdum acutate triquetris, coerulescenti-viridis canescens, inferne ferruginea; fol. caulina dense subspiraliter conferta, madefacta erecto-patentia, oblongo-lanceolata, infima depilia, superiora pilo inaequaliter longo acuto sublaevi terminata, margine medio folii parum revoluta, cellulis ubique conflato-incrassatis, basi longiuscule ellipticis, margine utrinque vix ullis pellucidis quadratis, superne rotundatis minutis; perich. longiora latiora longe pilifera, intima basi laxius et tenerius reticulata, magis amplexan-

tia; theca in ped. brevi arcuato minute ovalis, flavida, dein fuscescens, obsolete striata, operc. obtuse rostellato aurantiaco, annulo triplici, dentibus angustis rufo-purpureis apice bifidis integriusculis rugulosis.

Bryol. Europ. 25—28. p. 14. t. 7. — Hook. et Tayl. Musc. Brit. ed. II. p. 69. t. Suppl. 2. — *Dryptodon spiralis* Brid. I. p. 771. — *Grimmia cernua* Br. Germ. II. I. p. 174. t. 24. — *Gr. incurva* Br. Europ. I. c. p. 15. t. 8. nobis haud visa forma theca rostrate operculata, dentibus subintegris et foliis vix spiraliter tortis huc pertinere videtur.

Patria. In rupibus siccissimis, praeprimis micaceis summarum alpium totius Europae, sed parce fructificans. — *Aestate.*

Pl. masc. humilior, floribus terminalibus, fol. perig. int. late ovatis obtusiuscule acutis inferne laxe reticulatis, anth. parvulis eparaphysatis. — Folia spiraliter conferta *Macromitria* in memoriam referunt.

γ. Folia stricta.

24. *Gr. fusco-lutea* Hook. (Musc. Exot. t. 63.); *monoica*; compacte et tenelle pulvinata subhumilis fusco-lutea *rigida* erecta fastigiata ramosa; folia caulina *maderfacta et sicca stricta*, erecto-patentia, curvata *anguste lanceolato-acuminata*, pilo longo *sublaevi terminata*, infima depilia *rigida*, lutea, margine inferne revoluta interdum erecto; cellulae *valde incrassatae subconflatae angustae longiuscule quadratae margine valde crenulatae*, basi longiores et utrinque margine nonnullae tenerae hyalinae; perich. basi laxius et longius reticulata; theca in ped. decurvato brevi ovalis parvula laevis, pallide lutea, leptodermis, operc. conico obtusiusculo recto, annulo lato composito, dentibus anguste subulatis remote articulatis rugulosis rufo-fuscis, vix pertusis.

Brid. I. p. 188.

Patria. In frigidis Toluccae et Islahuacae regni Mexicani, alt. 1300 hexap.: Humboldt et Bonpland; in monte Orizaba: Deppe et Schiede No. 1070. b; forma minor.

Flos masc. lateralis, fol. perig. late ovatis acuminatis, int. ubique fere laxe et tenuiter reticulatis, anth. eparaph. longis curvulis. — *Gr. apiculatae* simillima.

25. *Gr. apiculata* Hsch. (Br. Germ. II. I. p. 171. t. 24.); *monoica*; *Gr. luteo-fuscae* simillima et affluissima, folia brevius et laevius pilosa; perich. *vaginantia tenuiora, cellulis basi amplioribus laxioribus et usque medium folii elliptico-incrassatis; theca magis globoso-oralis, magis exserta, dentibus bifide fissis maxime rugulosis carnosulis.*

Br. Europ. 25 — 28. p. 13. t. 6. — Brid. I. p. 186.

Patria. In rupibus micaceis humidis alpium summorum: Messerlingwand alpium Windisch — Mattreyer — Tauern et Leiter pr. Heiligenblut Carinthiae: Hornschuch 1816, in Zirknitz-Alpe pr. Döllach: Laurer, in Nassfelder — Tauern pr. Gastein: Funk, in summo Dovrefjeld Norvegiae loco deserto Nystüchöe: Blytt. *Rarius occurrit! — Aestate.*

Specimina a Cl. Blytt missa vetustiora imperfecta statura graciliore elatiore, foliis madefactis magis reflexis minus rigidis brevissime vel haud pilosis, brevioribus recedunt. An propria species?

B. *Pedunculus rectus.*

a. *Theca immersa.*

26. *Gr. pilifera* P. B. (Prodr. p. 58. 1805.); *dioica*; densius pulvinata, pallide viridis, inferne nigrescens, rigida, *stricta*, humilis, parce dichotoma, ramis *apice attenuatis*; folia caulina madefacta pro primo momento reflexa, subito erecto-patentia, e basi late ovata, margine utrinque valde reflexo instructa subito lanceolata et *pilolongo* denticulato terminata, ubique robustius areolata; perich. multo longiora latiora *longius pilifera* vaginantia pallida, e cellulis basi laxioribus tenuioribus, a medio *re-luti confluentibus incrassatis, parietibus plus minus interruptis, superne ellipticis areolata; theca immersa cylindrico-ovalis, orificio angustiori, glabra pallida, opere.*

cupulato recte rostellato, dentibus superne *ciliato-fissis angustioribus aurantiacis tenuius membranaceis* dense articulatis.

Brid. I. p. 173. — *Gr. Pensylvanica* Schw. Suppl. I. I. p. 91. t. 25. (1811.) — *Weisia pilifera* Röhl. Ann. Wett. Ges. III. p. 113.

Patria. America septentrionalis: P. B. detexit.

Cum *Gr. apocarpa* nunquam confundi potest.

27. *Gr. Schimperii* Br. et Sch. (in Musc. Abyss. No. 584.); *dioica*; *Gr. piliferae* simillima, sed fastigiata valde ramosa, folia caulina *inferiora imberbia*, superiora *brevius pilifera*, omnia *basi oblonga*, *supra basin margine paulisper revoluta*, *angustiora*, angulate incrassate oblongo-areolata, superne opaca; perich. *superne opaca*; theca breviter pedunculata immersa compresse *ovalis parvula basi umbilicate impressa*, orificio *angustissimo coarctato*, operculo longe rostellato calyptra basi 5 lobata omnino tecto.

Patria. Abyssinia: W. Schimper.

Fructum immatur. tantum vidimus, annulus autem et peristomium angustissimum adesse videntur.

b. *Theca exserta.*

α. *Atratae.*

28. *Gr. elongata* Kaulf. (in Sturm Deutschl. Fl. Crypt. Heft 5.); *dioica*; dense pulvinata *protrato-depressa*, *elongata gracilis*, *inferne nuda*, *atrato-viridis*, *rigida*; folia caulina patentia, *e basi anguste oblongâ curvate lanceolata obtusa*, *summa et perich. apice plerumque diaphana*, *margine erecto*, cellulis basi rectangularibus, superne sensim minutis depresso-quadratis firmis, luteis, ad basin utrinque margine hyalinis; perich. basi magis vaginantia laxius reticulata; omnia distincte tenuissime papillosa; theca in ped. brevi recto *minute ovalis glabra fuscescens*, operc. *breviter et obtuse conico*, annulo triplici, dentibus lanceolatis remote articulatis integerrimis v. hic illic pertusis, rufo-fuscis, siccis reflexis; calyptra cucullato-mitraeformis.

Br. Europ. 25-28. p. 28. t. 22. — Brid. I. p. 179.

β. patula; fol. longioribus, squarroso-patulis, summis subpiliferis, theca obliqua. Br. Eur. l. c.

Patria. In rupium fissuris humidis „auf der Seethaler-Alp” Styriae: Kaulfuss 1812; Velber-Tauern alt. 6500': Sauter; ad pedem „des untern Aargletscher”: W. P. Sch.; in monte Splügen Rhaetiae Garovaglio legisse dicitur; Dovrefjeld Norvegiae in rupibus cataractae Sprönbähker: Blytt. Var. *β.* locis siccis Messerlingwand Tirolis: Hornschuch. E rarissimis! — *Augusto.*

Pl. masc. ramosior, florib. termin. minutis, fol. perig. muticis, anth. brevibus eparaphysatis.

29. Gr. unicolor Grev. (Scot. Crypt. Fl. t. 123.); *dioica*; late pulvinata, prostrata, *laxe cohaerens*, atroviridis subpurpurascens, elata fastigiata ramosa rigida, *ramis filiformibus microphyllis*; folia caulina erecto-patentia, sicca dense conferta, e basi oblonga curvate lanceolata obtusa, *nunquam apice diaphana*, margine erecto, e cellulis basi rectangularibus, superne sensim minutis depresso-quadratis firmis incrassatis areolata, apice opaca *carnosula, laeviora*; *ramulina late obovata breviter et obtuse acuminata*; perich. latiora magis vaginantia, basi laxius reticulata; theca in ped. exserto erecta v. subobliqua, *turgide ovalis, leptodermis stramineo-lutea laevis*, operc. *rostrato obliquo v. subrecto aurantiaco*, annulo lato triplici, dentibus purpureis apice bifidis dense trabeculatis glabris; calyptra cucullato-mitraeformis.

Br. Europ. 25—28. p. 29. t. 23. — Brid. l. p. 182.

Patria. In rupibus humidis v. saepius irrigatis alpinum Scotiae: Ogelvies primus legit; in Norvegiae subalpinis: Blytt; in Rhaetia inter Andeer et Splügen loco Roffla: W. P. Sch. — *Aestate.*

Pl. masc. gracilior, floribus terminal., fol. perig. ovatis, anth. majusculis eparaphysatis. — A *Gr. elongata* et *atrata* proximis notis cursive impressis facile distinguitur.

β. Viridi - canescentes.

†. Infloresc. dioica.

30. Gr. leucophaea Grev. (Transact. of the Werner. Soc. IV. t. 6.); dense pulvinata, *sed laxissime cohaerens, canescens*, sordide viridis, subsimplex, parce et breviter dichotoma, *ramis apice subclavatis* erecta subhumilis, *dense foliosa*; folia caulina madefacta erecto-patentia, sicca appressa, *ovato-oblonga*, pilo elongato margine et dorso denticulato terminata, *cymbiformi-concava*, margine erecto, cellulis mollibus viridibus, ubique quadrate rotundatis, apice opacis minutis; perich. majora, basi tenuius et laxius areolata; omnia *tenuinervia*; theca in ped. *breviter exserto erecta* plus minus ovalis, rufo-fusca, glabra, operc. rostrato recto, annulo duplici revolubili, latiusculo, dentibus dense articulatis 2—3 fido-cribrosis rugulosis rufo-purpureis, calyptra operculo longiore.

Br. Europ. 25—28. p. 23. t. 20. — *Dryptodon leucophaeus* Brid. I. p. 773. — *Grimmia campestris* Burchell in Hook. Musc. Exot. t. 129. — *Gr. laevigata* Brid. I. p. 184! — *Gr. Oertzeniana* Schultz in Syllog. Ratisbon. 1828. p. 134. teste Schwägrichen.

β. *subrotunda*; theca rotundato-ovata. Wilson in Lond. Journ. of bot. 1846. p. 449. — *Gr. leiocarpa* Tayl. l. c. p. 44 ex animadv. Wilsoni.

Patria. Per Europam totam, Americam septentrionalem, terras mediterraneas usque ad Africam meridionalem et in Abyssinia, in montosis, rupes habitans. Var. β. ad Swan River Novae Hollandiae: J. Drummond. — Vere.

Pl. mascula femineae similis et cum ea commixta, fol. perig. int. late ovatis brevipilibus, anth. curvulis, paraphysibus brevibus mixtis.

31. Gr. Tergestina Tommas. (Br. Europ. 25—28. p. 24. t. 21.); *Gr. leucophaeae* simillima, pulchre argenteo-canescens; folia caulina infima obtusa v. mutica, e cellulis viridissimis basi angustis longiusculis areolata; perich. multo latiora et longiora, e basi late vaginante *angusta elongate et chlorophyllose* reticulata, *margine utrinque plus minus late tenerrime membranaceo pellu-*

cido praedita, longiusculâ subito plus minus coarctato-acuminata, apice opace areolata; theca immersa majusculæ elliptico-conica pallida, annulo latissimo composito, dentibus anguste lanceolatis carnosulis intense purpureis, medio plus minus pertusis, remote articulatis, calyptra stricta.

Gr. crinita var. Garovagl. Musche Comasche. Dec. 7.

Patria. Prope Tergestum, in muro sylvam quercuum loci Melara cingente, ad limitem aquaticum inter Longera et Rozzol: Tommasini, in sylva querc. sub locum Melara in rupibus arenaceis: ab Heufler.

Pl. mascula femineae similis. — A *Gr. leucophaea* notis illustratis species distinctissima et pulcherrima.

32. *Gr. reflexidens* C. Müll.; *Gr. leucophaeae* similima, sed pusilla, ramis apice longe crinitis attenuatis; folia caulina arcte appressa, madefacta minus patentia, e basi ovata subito angustato-lanceolata, inferiora curcula brevipilia, superiora superne margine plicata, igitur veluti revoluta, longe sublaevipilia, cellulis basi quadratis diaphanis, superne sensim rotundatis opacis; perich. longiora latiora, basi laxissime quadrate hexagone reticulata, omnia crassinervia et margine erecto, carinato-concava; theca vix emersa minute ovalis macrostoma, glabra rufo-fusca, operc. conico obliquo brevi, dentibus lanceolatis subintegris v. apice parum bifidis, dense articulatis, rugulosis rufis, angustis, siccitate usque ad thecae parietem reflexis.

Patria. Chile australis inter *Gr. consobrinam*: Pöppig. Hb. Kunzean.

††. *Infloresc. monoica.*

33. *Gr. longirostris* Hook. (Musc. Exot. t. 62.); dense pulvinata, sed laxè cohaerens, fastigiata et breviter ramosa, densifolia, subhumilis, inferne ferruginea, superne luteo-viridis; folia caulina appressa, madefacta patentia, e basi obovata v. oblonga lanceolata, pilo longiusculo denticulato terminata, profunde carinata, margine medio saepe convexiusculo, caeterum erecto, cellu-

lis basi incrassate ellipticis, utrinque margine nonnullis pellucidis quadratis, superne sensim incrassate quadratis minutis, parum opacis; perich. *conformia*, exserta; theca in ped. breviter exserto erecta *cylindraceo-ovalis* glabra coriacea, operc. rostrato recto mediocri, annulo angusto, dentibus anguste subulatis subintegris, calyptra interdum latere fissa.

Brid. I. p. 182.

Patria. In locis scopulosis apricis, in declivitate montis Chimborazo, altitud. 14,280' super porphyrite: Humboldt et Bonpland.

Flos masc. lateralis minutus, fol. perig. oblongis v. ovatis evanidinervibus, anth. parvulis eparaphysatis. — *Gr. leucophaeae* haud dissimilis, sed notis cursive impressis jam facile differt.

34. *Gr. obtusa* Schwägr. (Suppl. I. I. p. 88. t. 25.); *Gr. arenariae* simillima, sed folia breviora latiora, cellulae superne minus chlorophyllosae magis angulatae firmiores, perichaetialium basi breviores minus laxae; theca in ped. *breviter exserto recto erecta*, annulo *triplici lato*.

Br. Europ. 25—28. p. 20. t. 13. — Brid. I. p. 174. — *Gr. Suedica* Schwägr. Suppl. I. I. p. 87. — *Gr. Donniana* Sm. Fl. Brit. III. p. 1198, theca magis immersa.

Patria. In rupibus arenaceis et graniticis montium editiorum usque ad alpes ascendens per totam Europam. — *Martio usque ad Junium*.

35. *Gr. ovata* Web. et Mohr (in It. Succ. p. 132. t. 2. f. 4.); laxa pulvinata canescens viridis v. nigricans *elatuscula* pluries dichotoma, *robusta*; folia caulina erecto-patentia, e basi oblongo-ovata anguste lanceolata, pilo brevi parum denticulato terminata, margine erecto v. supra basin parum revoluta, cellulis basi densis angustis longiusculis utrinque margine solo pellucidis, sensim ellipticis, apice minute rotundatis opacis; perich. subvaginantia longiora latiora, sed angusta, basi teneriora; *omnia firma*; theca in ped. breviter exserto v. emerso stricto erecta ovata v. elliptica laevis *fusco-brunnea*, operc. bre-

viusculo *oblique rostellato*, annulo duplici, dentibus plerumque bifido-cribrosis rufo-purpureis, dein recurvis.

Br. Europ. 25 — 28. p. 21. t. 17 et 18. — Brid. I. p. 176. — *Dicran. oratum* Fk. Fasc. Crypt. IV. n. 86. — *Grimmia sciuroides* Br. Germ. II. I. p. 155. t. 22. — *Gr. patens* ibid. p. 148. t. 21. — Brid. I. p. 179. — *Gr. nigricans* Lam. et Dec. Syn. Fl. Gall. No. 1215? Brid. I. p. 178.

β. affinis; robustior, theca in ped. brevior plerumque haud exserto. *Gr. affinis* Br. Germ. II. I. p. 142. t. 21. — Brid. I. p. 178. — *Gr. canescens* Schleich. Cat. Pl. Helv. 1807. n. 29.

γ. obliqua; theca subobliqua. *Gr. obliqua* Br. Germ. I. c. p. 153. t. 22. — Brid. I. p. 180.

δ. cylindrica; theca longior oblongo-cylindrica. *Gr. cylindrica* Br. Germ. I. c. p. 161. t. 23.

Patria. E montosis usque ad alpes summas per totam Europam. Var. *β.* loca saepius irrigata, *γ.* siccissima ventosa, *δ.* umbrosa praeprimis convallium alpestrium praeferentes. — *Aestate.*

A *Gr. obtusa* primo adspectu habitu robustiore, theca brunnescente oblique rostellata et notis ceteris illustratis distinguitur.

Sectio III. **Dryptodon** Brid. Mant. Musc. p. 71 et Br. univ. I. p. 191. — Plantae procerae late irregulariter, haud orbiculariter, laxissime pulvinatae, regulariter dichotome ramosae, ramis fastigiatis. Foliorum cellulae incrassatae, parietibus plus minus crenulatis v. sinuatis. Perist. dentes *Eugrimmiae*, vel ad basin usque in crura duo filiformia fissi. Caetera *Eugrimmiae*.

a. *Pedunculus arcuatus.*

36. *Gr. patens* Br. Europ. (25 — 28. p. 18. t. X bis); *dioica*; laxa et late pulvinata decumbens longiscens, ramis curvatis pluries dichotoma, inferne nudiuscula nigrescens v. luteo-fusca, superne foliis densis siccitate appressis teretiuscula gracilis, luteo-viridis v. fuscescens; folia caulina madore subito reflexa, dein patentia, *curvate lanceolato-acuminata obtusiuscula*, angusta *elongata*, *marginē e basi ultra medium revoluta*, *profunde canaliculata*, cellulis minutissime *subrotundatis*, basi paullo majoribus, angulatis, dein maxime incrassatis, *nervo dorso*

pluries lamelloso; perich. breviora; theca in ped. *decurvato* breviusculo flavido demissa majusculè *ovalis*, laevis flavida, dein fuscescens, operc. conico subulato recto rubro, annulo latissimo, dentibus longiusculis purpureis dense trabeculatis, in crura duo inaequalia interdum cribrosa fissis, *subrugulosis*, calyptra laevi.

Gr. arcuata De Not. Mant. No. 77. et Syllab. p. 252. — *Racomitr. patens* Hüb. Musc. Germ. p. 198. — *Dryptodon patens* Brid. I. p. 192. — *Trichost. patens* Schw. Suppl. I. I. p. 151. t. 37. — *Dicran. patens* Sm. Fl. Brit. III. p. 1213. — *D. arcuatum* Schleich. — *Fissidens patens* Wahlenb. Fl. Lapp. p. 334. — *Bryum patens* Dicks. Fasc. II. Pl. Crypt. p. 6. t. 4. f. 8. — *Orthotrichum curvatum* Brid. I. p. 791!!

Patria. Ad rupes humidas regionis subalpinae per totam Europam et in America sept. — *Primo vere.*

Pl. masc. gracilior simplicior, floribus terminalibus, fol. perig. convolutaceo-ovatis breviter acuminatis teneris. — *Gr. ellipticae* et affinissimis ex habitu similis, sed primo momento notis cursive impressis discernibilis.

37. *Gr. elatior* Br. Europ. (25 — 28. p. 17. t. 10.); *dioica*; *late pulvinata* elata *laxe cohaerens* canescens, inferne nigricans, superne intense viridis, ramis dichotomis longis et brevibus, basi nuda, superne densifolia, *robusta*; folia caulina erecto-appressa, madefacta prime valde reflexa, dein erecto-patentia, *lato-lanceolata elongata*, parum recurva, pilo longiusculo sublaevi terminata, *profunde canaliculato-concava*, margine inferne revoluta, cellulis basi longiuscule ellipticis sinuatis, apicem versus sensim minutis perfecte rotundatis, apice opacis, incrassatis; perich. erecta basi teneriora, laxius hexagone reticulata, majora; theca in ped. arcuato *majusculè ovalis decies plicata* pallide fusca, operc. longe rostellato recto, annulo triplici, dentibus late subulatis, dense et robuste articulatis, aurantiacis, apice bifidis et perforatis.

Racomitr. incurvum Hüb. Musc. Germ. p. 201. — *Trichostom. incurvum* Hsch. in Regensb. Bot. Zeit. 1819. p. 89. — *Dryptodon incurvus* Brid. I. p. 194.

Patria. Ad rupes graniticas et schistosas per regionem subalpinam et alpinam alpium Germaniae, Helvetiae, Pyrenaeorum et Scandinaviae. — *Vere.*

Pl. mascula ramosior, floribus terminalibus, fol. periglate ovatis breviter acuminatis, anth. elongatis curvulis, paraph. brevissimis paucis mixtis. — A *Gr. funali* simillima notis cursive impressis differt.

38. *Gr. funalis* Br. Europ. (25—28. p. 17. t. 11.); *monoica*; *Gr. elatiori* simillima, sed statura humilior, folia breviora pilo valde denticulato terminata, cellulae incrassato-quadratae, parietibus crenulatis instructae, minutae, basi longiores et utrinque margine nonnullae quadratae magis pellucidae tenerae, perichaetialium basi laxius quadratae pellucidae, medio ellipticae; theca obovata v. elliptica octoties plicata, dentibus profunde irregulariter bifidis.

Racomitr. funale Hüb. Musc. Germ. p. 200. — *Dryptodon funalis* Brid. I. p. 193 et 771. — *Campylopus funalis* ej. Mant. Musc. p. 75. — *Trichost. funale* Schw. Suppl. I. I. p. 150. t. 37.

Patria. In rupibus et saxis regionis montanae, rarius subalpinae totius Europae. — *Primo vere.*

Flos masc. terminalis ad pedem feminei, fol. periglate ovatis breviter acuminatis depilibus basi laxè irregulariter hexagone reticulatis; anth. elongatis curvatis breviter stipitatis.

b. *Pedunculus rectus.*

α. *Folia obtusa.*

39. *Gr. elliptica* C. Müll.; *dioica*; depresso-pulvinata luteo-fusca, dein nigricans, rigida dichotome ramosa, elatiuscula erecta fragilis, inferne denudata; folia appressa, madefacta paulisper erecto-patentia, substricta, breviter oblongo-lanceolata obtusa, carinato-concava, margine erecto v. parum convexiusculo, e cellulis ubique incrassatis valde conflatis pachydermibus luteis margine valde punctulato-crenulatis, basi angustissimis, longis, superne minutis areolata; perich. conformia; theca in ped. exserto subglobosa parvula pachydermis, lacvis pallide

fuscescens, operc. subulato recto calyptra apice scabra omnino et ultra tecto, annulo lato duplici, dentibus anguste lanceolatis dense trabeculatis rufo-purpureis laevibus apice bifidis.

Racomitrium ellipticum Br. Europ. 25—28. p. 5. t. 24; in tabula *Dryptodon*. — *Dryptodon ellipticus* Brid. I. p. 204. — *Campylopus ellipt.* ej. Mant. Musc. p. 76. — *Dicran. ellipticum* Schw. Suppl. I. I. p. 184. t. 47. — *Trichostom. ellipticum* Hook. et Tayl. Musc. Brit. p. 62. t. 19.

Patria. Ad rupes irrigatas v. humidas Hiberniae: Brown detexit, alpium Scotiae et litoris Norvegiae occidentalis pr. Bergen: Blytt. — *Aestate.*

Gr. aciculari et *Gr. protensae* haud dissimilis.

40. **Gr. aquatica** C. Müll.; *dioica*; laxè pulvinata elongata rigida, ramis teretiusculis, sordide viridis, ascendens, folia caulina dense imbricata, madefacta erecto-patentia, interdum paulisper secunda, late ovato-lanceolata, obtusiuscula, canaliculata, margine convexo revoluta, igitur biplicata, reticulatione *Gr. ellipticae*; perich. inferne laxius et tenuius reticulata; theca in ped. longe exserto tortili pseudolaterali erecta, elliptico-cylindracea, laevis pallida, operc. subulato recto rubro, annulo lato, dentibus ad basin usque fissis ciliiformibus subulatis laevibus rufis.

Racomitrium protensum A. Braun in Br. Europ. 25—28. p. 6. t. 2. — *R. aquaticum* Brid. I. p. 222. — *R. cataractarum* A. Br. in Brid. I. p. 776. — *Trichost. aquaticum* Brid. Musc. Rec. II. I. p. 102. — *Tr. aciculare* β . *aquaticum* Web. et M. Bot. Taschb. p. 192. — *Dicran. aquaticum* Brid. Sp. Musc. I. p. 190. — *D. aciculare* β *fluitans* Turn. Musc. Hib. p. 67. — *D. subulatum* Röhl. Moosg. Deut. p. 347. — *Bryum rivulare* Hoffm. Deut. Fl. II. p. 37. — *Br. nigrescens* Vill. Fl. Damph. III. p. 889. — *Bryum hypnoides aquaticum*, calyptris nigris acutis. Dill. Musc. p. 367. t. 46. f. 26. — *Hypnum aciculare* β . *aquaticum* Web. Spic. Fl. Gött. p. 84.

Patria. Ad rupes irriguas totius Europae in regione montana et subalpina. — *Majo et Junio.*

Pl. mascula femineae similis, floribus terminalibus, fol. perig. ovatis breviter acuminatis, anth. curvulis turgidis, paraphysibus paucis tenuissimis.

41. Gr. acicularis C. Müll.; *dioica*; *Gr. aquaticae* similis, sed laxius cohaerens et multo robustior, densissime foliosa; folia caulina appressa, madefacta erecto-patentia subsecunda, *late ovato-oblonga ligulato-obtusae hic illic undulato-plicata, canaliculato-complicata, apice parce et obsolete dentata*, margine ubique fere valde revoluta, cellulis utrinque ad alas infimas nonnullis laxioribus fuscidulis, basi caetera angustissimis crenulatis, apicem versus sensim grossiuscule rotundatis; perich. intima inferne tenuiora laxius reticulata; theca breviter pedunculata, majuscula ovali-elliptica microstoma, late annulata, operc. subulato recto, dentibus *Gr. lamprocarpae*, sed basi dense articulatis.

Racomitrium aciculare Brid. l. p. 219. — Br. Europ. 25 — 28. p. 5. t. 1. — *Trichostom. aciculare* Schw. Suppl. l. l. p. 157. — *Dicran. aciculare* Hdw. Musc. Fr. III. p. 79. t. 33. — *Mnium aciculare* Timel. Syst. Nat. II. p. 1328. — *Bryum aciculare* L. Sp. Pl. p. 1583. — *Bryum montanum*, hemiheterophyllum, operculis acutis, Dill. Musc. p. 366. t. 46 f. 25. — *Hypnum aciculare* Scop. Fl. Carn. ed. II. No. 1225.

Patria. In locis humidis, praesertim saxis rivulorum per regionem montanam et subalpinam totius Europae et Americae septentrionalis. — *Vere.*

Pl. mascula *Gr. aquaticae*.

β. *Folia acuta.*

42. Gr. nigrita C. Müll.; *dioica*; *Gr. aquaticae* similis, sed gracilior; folia madore valde patentia, late lanceolata *acuminata acuta*, cellulis *maxime incrassatis conflatis* valde crenulatis fuscis; theca in ped. breviusculo flavo tenui terminali v. pseudolaterali elliptico-cylindracea *minuta angustissima* pallida, operc. subulato recto, annulo angusto, dentibus anguste subulatis, *ad basin usque in crura subaequalia, basi cohaerentia et articulata, tenuia maxime rugulosa fissis rufis*; calyptra *apice scabra*.

Racomitrium protensum var. Hook. et Wils. in sched.

Patria. Insula Eremitae ad Cap. Horn: J. D. Hooker.

43. Gr. lamprocarpa C. Müll.; *dioica*; *Gr. aquaticae* simillima, sed robustior; folia caulina *latissime lanceolata acuta*, concava, nervo canaliculato, margine e basi ultra medium valde revoluta, cellulis *infima basi utrinque ad alas laxissimis fuscis*; perich. *intima latere alarum laxissime reticulata*; thecae saepe geminatae *brevipedunculatae majusculae ellipticae turgidae*, siccata angulata leptodermis nitida microstoma, operc. subulato recto, anulo latissimo, dentibus *in crura duo robusta aequalia rugulosa profunde, haud usque ad basin, fissis, densissime approximatis*, basi obscure articulatis, carnosius aurantiacis.

Racomitrium catarractarum var. 3. Hook. et Wils. in sched.

Patria. Insulae Falklandi: J. D. Hooker.

Inter *Gr. aquaticam* et *acicularem* medium tenens.

44. Gr. didyma Mont. (Ann. des sc. nat. IV. 1845. p. 122.); *Gr. aquaticae* similis, folia undique patentia vix subsecunda, ovato-lanceolata *acutata v. acumine hyalino brevissimo mucronata*; theca cylindracea *anguste annulata*, operc. recte rostrato theca dimidia breviori, dentibus *latiuscule lanceolatis lacunosus* quartam diametri thecae partem aequantibus, madore inflexo-conniventibus.

Patria. Chile australior: C. Gay.

Pedunculi interdum geminati, unde nomen triviale.

45. Gr. convoluta C. Müll.; procumbens dichotome ramosa, ramis fastigiatis, siccitate incurvatis brevissime ramulosis, sordide viridibus; folia ovato-lanceolata *acutiuscula*, margine reflexa, integerrima evanidinervia, madore subrecurva, sicca imbricata, firma; minute dense areolata; perich. *convoluta rotundato-obtusissima*; theca in ped. pseudolaterali erecto posita, calyptra striata glabra basi laciniata.

Racomitr. convolutum Mont. in Ann. d. sc. nat. 1845. p. 122.

Patria. In truncis arborum reipublicae Chilensis: C. Gay.

Ex habitu *Gr. patenti* v. *didymae* proxima, ab ulteriore notis cursive impressis facile distinguitur.

46. *Gr. rupestris* C. Müll.; *dioica*; laxè cohaerens *procera* parce dichotoma *squarrosula sordida nigricanti-viridis*, inferne nuda, apice robusta; folia *sicca et madefacta squarrosulo-potentia* substricta, breviter oblongo-lanceolata *acuta*, latiora, margine, concavitate et reticulatione *Gr. ellipticae*; perich. intima magis vaginantia, basi margine utrinque tenuius laxius et laevius reticulata obtusiuscula; theca in ped. brevi pseudolaterali erecta *cylindraceo-oblonga*, fusca laevis nitida pachydermis, operc. conico-aciculari.

Dryptodon rupestris Hook. et Wils. Lond. Journ. of bot. 1844. p. 544.

Patria. Insula Eremitae ad Cap. Horn: J. D. Hooker.

Dentes, calyptram, operculum et pl. masculam non vidimus. — Notis cursive impressis a *Gr. elliptica* facillime differt.

47. *Gr. atrata* Mieliçhh. (in Regensb. Bot. Zeit. 1819. p. 85.); *dioica*; late dense pulvinata, inferne subtomentosa, *procera*, ubique dense foliosa, ramis elongatis, inferne nigricans, superne obscure viridis v. lutea, rigida; folia caulina appressa, madefacta erecto-potentia, breviter lanceolata, robusta, latiuscule acuta substricta, margine convexiusculo, profunde canaliculata, cellulis pachydermibus quadratis, minutis, parietibus punctulato-crenulatis praeditis, basi paulisper rectangularibus, utrinque margine nonnullis pellucidis laevibus; perich. intima cymbiformi-concava, semiamplexicaulia, basi leviter laxius et pellucidius reticulata; theca in ped. brevi crasso erecta v. subobliqua, *oblongo-orata*, collo brevissimo, luteo-fusca laevis, operc. obtuse et breviter rostellato aurantiaco, annulo lato e cellularum seriebus pluribus 3—4 composito, dentibus dense trabeculatis glabris ferrugineis, apice pertusis v. bifidis, siccis reflexis; calyptra cuculato-mitraeformis.

Br. Europ. 25—28. p. 30. t. 23. — Brid. I. p. 184.

Patria. Ad rupes humidās v. irroratas summorum alpium, a sylvarum reg. supremā ad nives aeternas, circa fodinas Schwarzwand dictas vallis Salisburgensis Gross-

arl, ubi Mieliichhofer 1815 detexit; ad latus septentrionale jugi Malnitzer-Tauern Gastuniae: Funk; Dovre Norvegiae et Salten Lapponiae ex Ångström; in summis Pyrenaeis leg. Spruce et W. P. Sch. — *Auctumno*.

Pl. masc. similis, floribus *Gr. unicoloris*, a qua et *Gr. elongata* notis dictis species pulcherrima facillime distinguitur.

48. **Gr. crispula** C. Müll.; habitus *Gr. ellipticae*; folia sicca appressa, parum crispula, rigida, madefacta erecto-patentia, *ex ovato lanceolata, in acumen longum apice hyalinum producta*, parum carinata, *plicata, margine distincte revoluta*, reticulatione *Gr. ellipticae*, sed magis incrassata robustiore; theca in ped. *perbrevis elliptica, operculo rostrato*.

Dryptodon crispulus Hook. et Wils. Lond. Journ. of bot. 1844. p. 544.

Patria. Insula Campbelli antarctica: J. D. Hooker. Pl. sterilem solam vidimus.

γ. **Folia pilifera.**

49. **Gr. microcarpa** C. Müll.; *dioica*; late pulvinata intertexta decumbens, gracilis dichotome microphylla, ramis regularibus, luteo-viridibus, inferne nigricans; folia caulina erecto-conferta, madore reflexa, dein erecto-patentia, *lanceolato-acuminata, pilo brevi rigido dentato terminata*, margine ultra medium revoluta, carinata, firmiuscula, reticulatione crenulata; theca in ped. *abbreviato parum curvato minute oralis* laevis flavida, orificio minuto, operc. breviori rubro, annulo latiusculo, dentibus brevibus plerumque *inaequaliter tripartitis*, cruribus plus minus cohaerentibus subrugulosis, inferne nodosiusculis, calyptra laevi.

Racomitr. microcarpum Brid. I. p. 211. — Br. Europ. 25—28. p. 10. t. 5. — *Trichost. microcarpum* Hdw. Sp. Musc. p. 112. tab. 23. — *Grimmia ericoides* Brid. I. p. 768 ex insula Terre Neuve a La Pylae relata e spec. auth. huc pertinet. — *Bryum microcarpon* Gmel. Syst. Nat. p. 1332. — *Bryum hypnoides*, alpinum, setis et capsulis exiguis. Dill. Musc. p. 370. t. 47. f. 29.

Racomitr. Sudeticum Bryol. Europ. 25 — 28. p. 7. t. 1. — *R. obtusum* Brid. I. p. 213. — *Grimmia procera* Bals. et De Not. Puggill. Muse. No. 17. et Syllab. Muse. p. 252. — *Dryptodon Sudeticus* Brid. I. p. 195. — *Trichost. Sudeticum* Fk. Crypt. Fasc. 27. No. 670. — *Tr. patens* var. β . Schwägr. Suppl. I. I. p. 152? — *Tr. nudum* Schl. Crypt. Helv. Exs. Cent. III. No. 19? — Forma procera, minus ramosa, strictior, ex omnibus partibus autem essentialibus huc certe pertinens.

Patria. Per totam Europam, in subalpinis et alpinis et in America septentrionali. — *Ex auctumno in ver primum vigens.*

Flores masculi congenerum.

50. *Gr. cylindrica* C. Müll.; *Gr. microcarpae* similima, sed differt statura majore robustiore, theca longiore anguste cylindrica. †.

Racomitr. cylindricum Schimp. in litt.

Patria. Mexico, Pico de Orizaba: Liebmann.

51. *Gr. sulcipila* C. Müll.; *dioica*; laxissime cohaerens *subhumilis* *parcissime breviter dichotoma gracilis rigida fusco-lutea*, ascendens; folia caulina dense imbricata subsecunda brevia, madore subito reflexa, dein erecto-patentia, *late lanceolata*, breviter, tenuiter denticulate pilifera, alis planiusculis, margine hic illic parum revolutis, nervo profunde canaliculato, cellulis ubique incrassatis valde crenulatis quadratis, superne minutis, luteo-dianis; superiora et perich. *pilo longo cellulis angustis elongatis distincte visibilibus veluti striato, terminata*, haec basi laxius reticulata magis plicata; theca in ped. brevi ovalis recta laevis, annulo latiusculo, dentibus angustis brevibus *dense trabeculatis ultra medium inaequaliter bifidis*, rufis subrugulosis.

Patria. India orientalis, litus Coromandel: ex Hb. Tilesii habuit Kunze.

Pl. masc. simplicissima, flore terminali ob caulem apice innovantem laterali, fol. perig. interioribus late ovatis convolutis teneris coloratis, anth. magnis, paraph. brevissimis tenuissimis. — Formis pygmaeis gracillimis *Gr. protensae* similis.

Sectio IV. **Racomitrium** Brid. Mant. Musc. p. 78 et Br. univ. I. p. 207 sub nomine corrigendo *Racomitrii*. — Plantae irregulariter ramosae, ramulis lateralibus pluries divisae, innovationibus haud fastigiatis. Pedunculus rectus. Caetera *Dryptodontis*.

a. *Folia pilifera*.

51. Gr. lanuginosa C. Müll.; *dioica*; laxissime pulvinata procera, ramis alternis sterilibus vel fertilibus brevibus maxime ramosa lanoso - canescens; folia caulina conferta, madore subito reflexa et subito laxo erecto - patentia, elongata, late lanceolato - acuminata, cum nervo canaliculato in aristam elongatam *flaccidam* hyalinam producta, margine basi revoluta, *apice valde sinuate eroso canescente*, concava; ubique valde granulate crenulato - areolata; perich. intima vaginantia, superne subito acuminato - pilifera, margine ubique integro; thecae creberrimae in pedunculis *brevibus scabris* saepe geminatis erectae ovaes parvulae flavide fusciscentes, late annulatae, operculis recte subulatis, dentibus ciliaeformibus ad basin usque fissis tenuissimis rugulosis rufis, calyptra apice scabra.

Racomitrium lanuginosum Brid. I. p. 215. — *R. Canadense* Brid. I. p. 217? quod in Hb. Brideliano non invenimus et in Rich. Fl. Amer. Bor. II. p. 296 nomine *Trichost. Canadense* descriptum est. — *R. Borbonicum* Brid. I. p. 218 et *R. lanuginosum* β . *squalidum* p. 217 e spec. sterilibus huc pertinere videntur. — Br. Europ. 25 — 28. p. 11. t. 6. — *Trichost. lanuginosum* Hdw. Musc. Fr. III. p. 3. t. 2. — *Tr. hypnoides* Willd. Prodr. Fl. Berol. No. 916. — *Tr. ramigerum* Timm. Prodr. Fl. Megap. No. 774. — *Tr. serratum* Ehrh. Crypt. Exs. No. 94. — *Bryum lanuginosum* Hoffm. Deut. Fl. II. p. 42. — *Br. hypnoides* L. Sp. Pl. p. 1584. — *Bryum hypnoides*, polycephalum, lanuginosum, montanum. Dill. Musc. p. 372. t. 47. f. 32. — *Hypnum canescens* Web. Sp. Fl. Gött. p. 81.

Patria. In montanis, lapidosis sylvisque praesertim arenosis per orbem totum fere terrarum usque in floram arcticam et antarcticam, regionem frigidam sylvaticam praeferens, ubi ditissime fructificat. — *Aestate*.

Pl. masc. similis, floribus multis in ramis brevibus lateralibus, saepe aggregatis; fol. perig. concoloribus ovatis acutis, anth. turgidis, paraph. brevibus paucis.

53. Gr. canescens C. Müll.; *dioica*; latissime et laxissime pulvinata canescens, luteo-viridis, inferne sordida, humilior et minus ramosa; folia caulina *breviora squarroso-reflexa*, sicca subappressa, late ovate v. lanceolate acuminata, *curvata irregulariter plicata*, in acumen flaccidum hyalinum minute erosum breviusculum producta, reticulatione multo densiore minore infima basi utrinque ad alas decurrentes laxa, *ubique papillis scaberrima*; perich. intima subvaginantia basi laxe reticulata; theca in ped. *elongato laevi* erecta, elliptico-cylindracea angustior, *substriata, sicca angulosa*, operculo *thecam subsuperante* aciculari, annulo latiusculo, dentibus similibus, sed *longissimis*.

Racomitrium canescens Brid. I. p. 208. — Br. Europ. 25—28. p. 12. t. 7 et 8. — *R. Canadense* Brid. I. p. 217? — *Trichost. canescens* Hdw. Musc. Fr. III. p. 5. t. 3. — *Bryum canescens* Hoffm. Deut. Fl. II. p. 41. — *Br. hypnoides* Schreb. Spic. Fl. Lips. p. 77. — *Bryum hypnoides*, hirsutie canescens, vulgare Dill. Musc. p. 368. t. 47. f. 27. — *Hypnum canescens, pilosum* Weis. Cr. Gött. p. 213.

β. ericoides; caulis ramulis creberrimis brevibus obtusis alternis divisus. *Racomitr. ericoides* Brid. I. p. 210. — *Trichost. ericoides* Schw. Suppl. I. I. p. 147. t. 38. — *Tr. elongatum* Ehrh. Crypt. Exs. No. 233. — *Bryum ericoides* Dicks. IV. Crypt. p. 14. — *Br. elongatum* Hoffm. Deut. Fl. II. p. 41. — *Br. hypnoides, ericae facie, capsulis barbatis, alpinum*. Dill. Musc. p. 371. t. 47. f. 31.

Patria. In ericetis planitiei quam montium, terram atque rupes habitans, per totam Europam et Americam septentrionalem vulgatissima. — *Auctumno et vere.*

Pl. masc. *Gr. lanuginosae*, a qua notis cursive impressis facile distinguitur.

54. Gr. heterosticha C. Müll.; *dioica*; laxè pulvinata subprostrata, luteo-viridis canescens, gracilis inaequaliter ramosa; folia caulina conferta, madore subito reflexa, dein erecto-patentia v. *subsecunda*, e basi late ovata lanceolato-acuminata in pilum elongatum hyalinum denticulatum flaccidum producta, valde curvata, plicata, profunde canaliculata et complicata, margine e basi ad

apicem usque revoluta, reticulatione tenera basi angusta elongata superne subrotundata crenulata; perich. intima convolutaceo-vaginantia inferne multo tenerius laxius et longius reticulata; theca in ped. longiusculo *oblongo-cylindrica*, leptodermis laevis fuscescens, opere. breviter subulato subobliquo, annulo latiusculo, dentibus breviusculis, cruribus tenuissimis laevibus inaequalibus plerumque perfecte ad basin usque fissis solitariis, calyptra *apice scabra*.

Racomitr. heterostichum Brid. I. p. 214. — Br. Europ. 25—28. p. 9. t. 2 et 3. — *Dryptodon carnosus* Brid. I. p. 206! — *Trichost. heterostichum* Hdw. Musc. Fr. II. p. 70. t. 25. — *Bryum heterostichum* Hoffm. Deut. Fl. II. p. 40. — *Br. secundum* Gmel. Syst. Nat. II. p. 1333. — *Bryum hypnoides*, hirsutie canescens vulgare. Dill. Musc. p. 368. t. 47. f. 27. A. F. G.

β. alopecura; elongata fasciculato-ramosa, foliis brevipediculis, thecis minoribus. Br. Europ. I. c. — *Racomitr. Alopecurum* Brid. I. p. 215. — *Trichost. Alopecurum* Schk. Deut. Moos. p. 77. t. 35. — *Tr. affine* Schl. Cat. Pl. Helv. 1807. p. 31. Cent. IV. No. 18.

γ. gracilescens; subramulosum, foliis obtusis v. apiculo diaphano brevissimo instructis, thecis minutis brevius pedunculatis. Bryol. Europ. I. c.

Patria. Per totam Europam, in montanis et subalpinis praesertim lapidosis saxosis. Var. *β.* in locis humidis montium editiorum una cum var. *γ.* — *Vere.*

55. Gr. crispipila C. Müll.; erecta fasciculatim ramosa, ramis brevibus, erectis, pallide olivacea; folia imbricata erectiuscula, ovato-lanceolata, margine reflexa, *in acumen subserrulatum piliforme crispum producta*; perich. convoluta stricta obtusa apiculata; theca in ped. laterali innovationibus vix longiore lineari-cylindrica erecta subaequalis, dentibus filiformibus angustis ad basin usque fissis. †.

Trichostom. crispipilum Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1846 p. 47.

Patria. In summis Andibus Quitensibus: W. Jameson 1845.

Gr. fasciculari ex animadv. auctoris proxima.

b. *Folia depilia.*

56. Gr. fascicularis C. Müll.; *dioica; subprostrata luteo-viridis, inferne ferruginea, ramis brevibus subfasciculata; folia caulina sicca subappressa, madefacta subito reflexa, dein erecto-patentia, parum curvula, late lanceolato-acuminata obtusiuscula, tenero-membranacea, plicata, margine revoluta, irregulariter canaliculata, reticulatione firme elongata angusta conflata crenulata ad basin infimam decurrentem laxiuscula; perich. intima plicato-vaginantia, inferne tenerius areolata; theca in ped. breviusculo oblongo-ovalis, laevis flavida, operculo recte rostrato aurantiaco, annulo lato, dentibus longis ciliaeformibus ad basin usque fissis subrugulosis, calyptra ubique fere scaberrima.*

Racomitr. fasciculare Brid. I. p. 218. — Br. Europ. 25 — 28. p. 8. t. 4. — *Trichost. fasciculare* Hdw. Sp. Musc. p. 110. — Schw. Suppl. I. I. p. 155. t. 38. — *Tr. saxatile* Tayl. Trans. of the Edinb. Bot. Soc. II. I. 1845. p. 1; forma dentibus brevioribus. — *Bryum fasciculare* Hoffm. Deut. Fl. II. p. 41. — *Br. lutescens* Dicks. IV. Crypt. p. 14. — *Br. hypnoides et hirsutie virescens, fasciculare, alpinum.* Dill. Musc. p. 370. t. 47. f. 28.

Patria. In subalpinis et alpinis totius Europae et Americae septentrionalis, rupes humidus habitans. — *Vere.*

Pl. mascula congenerum, a quibus notis supra cursive impressis facile distinguitur.

57. Gr. symphyodonta C. Müll.; *Gr. fasciculari similis, sed erecta elongata, ramis dichotomis longis, ramulis brevibus subfasciculata gracilis; folia caulina hyaline apiculata; perich. acutiuscula; theca in pedunculo flavido tenuissimo cylindrica microstoma, dentibus brevibus, usque ad basin fere fissis, sed cruribus valde rugulosis robustioribus arctissime cohaerentibus.*

Racomitr. fasciculare var. 2 et 3. Hook. et Wils. in schedulis.

Patria. Insula Eremitae ad Cap. Horn: J. D. Hooker.

Grimmiae obscurae.

1. ? Gr. conferruminata Wallr. (Linnaea 1840. p. 683.); caulibus erectis simplicibus polyphyllis densissime

congestis veluti in massam conformem conferruminatis, foliis e basi vaginante linearibus carinato-costatis acutiusculis integerrimis siccando adpresso-patulis. $\frac{1}{4}$.

Patria. Hercynia australis in fissuris rupium calcarearum apricarum, ubi densissime habitat: Wallroth.

Species delendae.

1. **Gr. Gebhardi** Spreng. in Steud. Nom. Crypt. p. 189. olim, in Syst. Veget. omissa in ejus herbario quoque deest.

2. **Gr. nutans** Bruch. in Regensb. Bot. Zeit. 1829. p. 391, pr. Smyrna a Fr. Müller lecta, in Bryol. Europ. ipsa silentio deletur.

3. **Gr. albida** Spreng. Syst. Veget. IV. II. p. 321. e *Bryo argenteo* et *Trichostomo convoluto* composita est.

4. **Gr. nana** Schleich. in Steud. Nomencl. Crypt. p. 189.

5. **Gr. ramosa** Schleich. l. c.

6. **Gr. ventricosa** ej. l. c. Omnes hae species tres nobis nunquam visae, ab omnibus recentioribus auctoribus ignoratae.

7. **Dryptodon brevifolius** Brid. I. p. 775, s. *Dicran. brevifolium* Schl., forsan ad *Gr. pulvinatam* pertineat.

8. **Dr. crispus** Brid. I. p. 206, s. *Dicran. crispum* Thunb. ad *Leptotrichum Capense* revocandum sit.

9. **Dr. curvifolius** Brid. I. p. 201, s. *Campylopus curvifolius* ej. Mant. Musc. p. 78, a Seligero in comitatu Glatziensi lectus, sentiente Bridelio ad *Gümbeliam ovalem* adscribendus sit.

10. **Dr. dichotomus** Brid. I. p. 201, s. *Campylop. dichotomus* ej. Mant. Musc. p. 77, s. *Dicran. dichotomum* P. B. Prodr. p. 53.

11. **Dr. cribrosus** Brid. Br. univ. I. p. 198, s. *Campylopus cribrosus* ej. Mant. p. 76; e *Grimmia trichophylla* et *leucophaea* compositus est!

Trib. XX. DIPHYSCIACEAE.

Gregarie cespitosae humiles. Folia dimorpha: caulina linguaeformia, e cellulis *perfecte pottioideis dense hexagonis parenchymaticis chlorophyllosis* areolata; perichaetialia maxime emersa, caulina superantia, e cellulis *chlorophyllo dein destitutis igitur laxioribus* reticulata. Theca maxima obliqua gibbosa buxbaumioidea. Infloresc. monoica. Arche-gonia et antheridia normalia, paraphysibus filiformibus.

Habitus perfecte buxbaumioideus, sed e foliorum structura dimorpha a *Buxbaumiaceis* distinctus. Quod ad affinitatem hancce magnam generum *Diphyscii* et *Buxbaumiae* pertinet, ex observationibus recentioribus persuasum habemus: *Buxbaumiiis* quoque folia caulina diphysciacea, sed ad huc nec observata nec conjectata adscribenda, ambo genera igitur tribum unicum formatura, sed quoad methodum nostram separanda esse usque adeo donec folia caulina *Buxbaumiaram* observata sint.

Patria. Plantae per Europam totam Americam septentrionalem et Asiam passim.

Gen. I. **Diphyscium** Mohr.

Obs. Bot. p. 34. Web. et Mohr. Bot. Taschb. 1807. p. 377. t. 11. f. 1. — *Buxbaumia* al. — *Hymenopogon* P. B. — *Webera* Ehrh. — *Bryum* al. — *Phascum* al.

E verbis graecis *δίς bis* et *φύσκη vesica*, ob membranam duplicem thecae, epidermidem inflatam et sporangidium, nomen ductum.

Calyptra operculum obtegens conica. Peristomium simplex internum *Buxbaumiae*, basi annulo multiplici solubili magno cinctum.

Si genera *Diphyscii* et *Buxbaumiae* tribum naturalem unicum efforment, *Diphyscii* species ad *Buxbaumias*, sectionem naturalem caule abbreviato et foliis perichae-

tialibus maximis illustratam efformantes, revocandae sunt. Peristomium externum non reperimus.

1. D. foliosum Mohr. (l. c.); abbreviatum, folia caulina linguaeformia, plus minus concava, obtusa v. acuminata, apice saepe cucullato-concava, e stratis cellularum compluribus composita, evanidinervia, dense areolata; perich. maxima late lanceolata, nervo longe excedente crasso pilifera, apice laciniato-ciliata, calyptra glabra.

Br. Europ. I. Buxbaumiaceae, c. tab. — Brid. I. p. 326. — *Buxbaumia foliosa* Linn. Syst. Veg. ed. XIV. p. 925. — *B. sessilis* Schmidel Diss. de Buxbaumia p. 26. c. ic. — *Webera Diphyscium* Ehrh. Hann. Mag. 1779. p. 257. Ejusd. Beitr. I. p. 177. — *Hymenopogum heterophyllum* P. B. Prodr. p. 60. — *Bryum Hallerianum* Neck. Meth. Musc. p. 233. — *Br. phascoides* Jacq. Collect. II. p. 220. — *Phascum Hallerianum* Poll. Pl. Pal. III. n. 974. — *Ph. Halleri* O. F. Müll. Act. Holm. 1764. p. 29. c. ic. — *Ph. maximum* Lightf. Fl. Scot. II. p. 693. — *Ph. montanum* Huds. Fl. Angl. II. p. 466. — *Sphagnum acaulon*, maximum, foliis in centro ciliaribus. Haller in Dill. Musc. p. 253. t. 32. f. 13. et in Itin. Alp. 1739. p. 83. c. ic.

D. foliosum β . *Dominghense* Brid. II. p. 740. nullo modo a specie Europaea recedit et patria Hispaniola forte falsa indicata est.

Patria. In locis umbrosis sylvarum praeprimis montosarum totius Europae et Americae septentrionalis.

2. D. longifolium Griff. (in Schwägr. Suppl. IV. t. 325.); a praecedente foliis caulinis excurrentinervibus, perichaetialibus nunquam ciliatis sed integerrimis differt.

Patria. In Assam superiore Indiae orientalis detexit W. Griffith.