24A

Annexe: 6E

JOHN BRIQUET

BIBLIOTHECA BOTANICA

N^o _____

1910.

CONSERVATOIRE
BOTANIQUE

VILLE DE GENÈVE

DUPLICATA DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GENEVE
VENDU EN 1922

homage to
O. MATTIROLO

ILLUSTRAZIONE DEL PRIMO VOLUME
DELL'ERBARIO

DI

ULISSE ALDROVANDI

CONSERVATOIRE
BOTANIQUE
←→
VILLE de GENÈVE

GENOVA

TIPOGRAFIA DI ANGELO CIMINAGO

Vico Mele, 7, int. 5-6

1899.

O. MATTIROLO

ILLUSTRAZIONE DEL PRIMO VOLUME
DELL'ERBARIO

DI

ULISSE ALDROVANDI

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

CONSERVATOIRE
BOTANIQUE
←→
VILLE de GENÈVE

GENOVA

TIPOGRAFIA DI ANGELO CIMINAGO

Vico Mele, 7, int. 5-6

1899.

AK 77
A6
M37
1899

L' Erbario di ULISSE ALDROVANDI rappresenta nella Storia della Botanica il più antico e il più importante documento di questo genere; poichè non si ha più nessuna notizia circa l'Erbario dell'inglese GIOVANNI FALCONER, che prima di ALDROVANDI avrebbe, secondo le più recenti indagini, composto una raccolta di essiccate (1).

Le ricerche di J. CAMUS farebbero ritenere il 1551 come l'anno, in cui l'ALDROVANDI diede principio alla sua collezione; mentre SAINT LAGER riporterebbe all'anno 1553 l'inizio di questa raccolta che egli dichiara *d'une valeur historique inestimable..... un des monuments plus importants de la Botanique..... le prototype de l'art* (2).

SAINT LAGER ritiene che il 1553 « *fixe d'une manière définitive la date des premières récoltes d'Aldrovandi* » fondandosi sopra una lettera di P. A. MATTHIOLI (3) in cui si parla di un catalogo di semplici raccolti da ALDROVANDI.

(1) Vedasi ampiamente trattata la questione nelle opere di: J. CAMUS — St. LAGER — MEYER — SACCARDO — CALVI — TARGIONI-TOZZETTI — CAMUS e PENZIG, ricordati nel mio recente lavoro: *L'opera botanica di Ulisse Aldrovandi* (1549-1605). Bologna, Tip. Regia 1897.

(2) V. St. LAGER, *Histoire des Herbiers*. Paris 1885.

(3) Questa lettera 12 Luglio 1553 è riferita dal Fantuzzi nelle sue *Memorie della vita di Ulisse Aldrovandi*. Bologna 1774. *Lelio della Volpe* pag. 154.

(4) J. CAMUS, *Historique des Premiers Herbiers* pag. 18 Malpighia. Genova 1895.

CAMUS ⁽¹⁾, osserva invece che ALDROVANDI « *avait du en rapporter (dei semplici) déjà de l'excursion qu'il avait fait, selon Fantuzzi, en 1551 au Monte Baldo avec ANGUILLARA, ALPAGO e CALZOLARI* ⁽¹⁾. Che il CAMUS si apponga al vero, e che l'anno 1551 debba realmente essere ritenuto, come anno di fondazione, direi, dell'Erbario, risulta dalle ricerche da me fatte appositamente in esso, avendovi trovate delle piante raccolte dall'ALDROVANDI sul Monte Baldo.

ALDROVANDI incominciò gli studi sotto la guida di LUCA GHINI nell'anno 1549 ⁽²⁾. Nell'anno 1570, come si rileva da una lettera di BARTOLOMEO MARANTA ⁽³⁾ (9 Aprile) all'ALDROVANDI, l'Erbario comprendeva già quattordici volumi.

La collezione ALDROVANDI si può considerare, in massima parte, come un Erbario regionale, poichè le piante che vi si contengono furono in gran parte raccolte nei dintorni di Bologna; poche infatti sono le piante coltivate, e in quantità limitata le specie provenienti da esotici paesi; nè mancano le piante alpine, tra cui alcune del Monte Cenisio, del Monte Baldo e dei Monti di Creta.

L'Erbario ALDROVANDI, a differenza di quello di A. GESALPINO ⁽⁴⁾, diligentemente illustrato dal Prof. TEODORO CARUEL, non presenta ordine alcuno nella distribuzione e nella seriazione delle piante.

Il numero delle specie ascendeva in origine al numero complessivo, nei sedici volumi di 4117; e per rapporto quindi al numero delle specie supera questa collezione (in cui pure certi tipi sono ripetuti) e quanto di tali collezioni compilate nel XVI secolo è ancora rimasto ⁽⁵⁾.

Questo Erbario, che il CAMUS qualifica come « *le plus ancien et le plus important de tous* » subì curiose vicende.

⁽¹⁾ FRANC. CALZOLARI, *Il viaggio del Monte Baldo*. Venetia 1566, pag. 15.

⁽²⁾ V. MATTIROLO, loc. cit.

⁽³⁾ MARANTA scrive (V. FANTUZZI loc. cit., p. 193): *Mi avete fatto stupire di tanta collezione di semplici, che mi dice avete agglutinati in 14 volumi..... al numero di quattromila e cinquecento.....*

⁽⁴⁾ Vedi a questo riguardo, MATTIROLO loc. cit.

⁽⁵⁾ V. MATTIROLO loc. cit. i confronti cogli Erbari italiani ed esteri del Secolo XVI.

Dall'anno 1605 (4 Maggio), epoca della morte del suo Autore, rimase sino al 1742-43, secondo il MAZZETTI ⁽¹⁾, nel Palazzo del Comune; dal 1743 al 1796 nei locali dell'Istituto della Università di Bologna. Nell'anno 1796 fu portato a Parigi per ordine dei commissarii della Repubblica Francese e depositato presso il Museo di Storia Naturale ⁽²⁾. L'Erbario fece poi ritorno a Bologna, dopo il trattato di Vienna e nuovamente fu depositato nei locali della Biblioteca universitaria, donde nel mese di Maggio del 1874, essendo Rettore il Prof. CAPELLINI e Bibliotecario il CARONTI, fu trasportato nei locali del R. Orto botanico.

Nel corso di tutte queste peripezie l'Erbario ebbe a subire considerevoli danni, oltre a quelli portati dal tempo e dagli insetti.

Ma più che dal tempo e dagli insetti questa preziosissima collezione ebbe a subire rapine e deterioramento per opera dei botanici che lo esaminarono. Nè per quanto io abbia cercato, mi fu concesso di determinare l'epoca in cui si svolsero, a danno di questo glorioso monumento, gli atti vandalici, che lamento.

Molte delle piante classiche scomparvero! intiere carte furono esportate, altre brutalmente rubate con lacerazione del foglio, su cui gli esemplari erano agglutinati; e in alcune carte osserviamo talora esportazioni parziali di specie o di esemplari, i nomi dei quali possiamo però ancora riconoscere, ricorrendo ai cataloghi manoscritti che dell'Erbario ci lasciò ALDROVANDI ⁽³⁾.

Malgrado però le lamentate rapine (che oggi saranno rese difficili, dall'esatto catalogo che dei XVI volumi ho creduto mio dovere di ren-

⁽¹⁾ V. MATTIROLO loc. cit. ampiamente trattata questa questione di date a proposito dei cimelii lasciati da U. Aldrovandi, oggi conservati nella Sala a lui dedicata nei locali del R. Orto botanico di Bologna. V. anche Malpighia 1898, p. 144.

⁽²⁾ V. id.

⁽³⁾ V. MATTIROLO loc. cit. il numero di Biblioteca di tali cataloghi presso la Biblioteca Universitaria di Bologna e quanto può interessare per riguardo loro il botanico. Il N. 89 dei *Manoscritti Aldrovandiani* contiene in due volumi il catalogo più completo. Il 1.^o volume porta il nome delle piante secondo l'ordine con cui esse furono agglutinate, mentre il secondo le ha distribuite per ordine alfabetico. *Ulyssis Aldrovandi Phil. ac Medici. Elenchus Plantarum agglutinarum seu ordinem chartarum ad comodiorem posteriores instructionem.*

dere di pubblica ragione) ⁽¹⁾; malgrado i guasti operati anche in parte dal processo di avvelenamento degli esemplari dei due primi volumi, l'Erbario contiene ancora molte piante in buono stato.

Ogni pianta essiccata fu *agglutinata*, o incollata sopra il foglio. Ogni foglio fu numerato, e ogni esemplare trovasi indicato col nome latino adottato dall'ALDROVANDI, corrispondente a quelli adoperati dagli Autori più in voga a quei tempi e più particolarmente a quelli usati da LOBELIUS, CLUSIUS, DODONAEUS, FUCHSIUS, coi quali ALDROVANDI era in diretta relazione e in corrispondenza di scambio. Pochi sono i nomi volgari.

In generale sopra ogni foglio è agglutinata una pianta sola, ma non raramente anche due o tre specie o frustuli di specie vi si trovano; e allora ciascuna è indicata coi nomi e numeri corrispondenti. Strani conubii di parti di piante differenti, insieme agglutinate e ravvicinate in modo da parere una sola pianta, vi si osservano talora; nè per quanto io abbia studiato, mi fu dato conoscere la ragione di questo modo curioso di procedere dell'ALDROVANDI ⁽²⁾.

L'Erbario è composto di *sedici volumi*, di cui quindici corrispondono a quelli elencati dall'ALDROVANDI, mentre del XVI non troviamo elenco alcuno.

Prima delle ricerche da me fatte, si riteneva che l'Orto botanico di Bologna possedesse N. 17 volumi dell'Erbario Aldrovandiano — mentre poi si riconobbe che il volume ritenuto il XVI della serie dell'Erbario Aldrovandiano, e che come tale fu ricordato dal St. LAGER ⁽³⁾, è invece opera posteriore di OVIDIO MONTALBANO.

I fogli sono in numero differente per ciascun volume. Ogni volume è chiuso da una teca libera in cartone, provvista di nastri, ricoperta al dorso da carta pecora — sulla quale sta inciso in oro il numero del Tomo.

⁽¹⁾ V. MATTIROLO loc. cit. Appendice III e Capitolo V.

⁽²⁾ Sono indicati nel testo i singoli casi in cui tale curioso ravvicinamento si ebbe a constatare.

⁽³⁾ St. LAGER, *Histoire des Herbiers* 1885. Paris pag. 44. Intorno a questa questione V. MATTIROLO loc. cit. dove si trovano gli esatti ragguagli sulle dimensioni e sullo stato presente di ogni singolo volume.

Interessanti sono i cartoni che direttamente si attaccano ai fogli coi quali sono legati, che formano l'antica copertura dell' Erbario stesso, prima che fossero fatte nel XVIII secolo le teche presenti.

Alcuni di questi cartoni ricoperti di antiche carte pecore presentano ancora delle miniature o delle iniziali miniate; mentre gli altri lasciano ancora scorgere antiche scritture sulla pergamena, raschiate in gran parte.

Il cartone del Tomo VIII (1) (VI secondo St. LAGER) è fra tutti il più interessante per la miniatura che lo adorna, la quale rappresenta un docente circondato dai suoi scolari. Il numero del tomo è sopra questi cartoni scritto trasversalmente.

A pag. 37 dell'*Histoire des Herbiers* il S.^t LAGER scrive:

Nous attendons avec impatience le volume des Mémoires de l'Académie des sciences de Bologne qui contiendra l' « ILLUSTRAZIONE DELL' ERBARIO DI ULISSE ALDROVANDI ». Le botaniste italien qui se dévouera à cette tâche patriotique n'aura pas seulement produit une oeuvre utile à la connaissance de l'Histoire de notre science, il aura encore fait une belle et bonne action » e altrove a pag. 36:

A tous les points de vue un tel travail fera honneur à celui qui l'accomplira et sera en outre un juste et tardif hommage rendu au collectionneur infatigable qui, par son zèle désintéressé pour la science a obtenu à bon droit l'admiration de ses contemporains et mérite d'occuper une place éminente dans le catalogue des naturalistes dignes de mémoire.

Senza nessunissima pretesa di giungere a raccogliere il premio preconizzato dal S.^t LAGER, ho compiuto (2) e presento oggi al pubblico bo-

(1) L'elenco di seriazione da me fatto corrisponde a quello dei Cataloghi Aldrovandiani.

(2) In questa occasione mi è grato ricordare l'opera diligente prestatami dal Sig. GIOVANNI ETTORE MATTEI (1.^o Assistente al R. Orto botanico di Bologna) nell'anno scolastico 1894-95 e nel 1.^o semestre del 1896. Da lui ebbi efficace aiuto allora in questo lungo e faticoso lavoro.

tanico l' *Illustrazione del 1.^o volume dell'Erbario di Ulisse Aldrovandi*, che ricorda 557 piante contenute in N. 396 carte.

Possa questa sedicesima parte ⁽¹⁾ del colossale lavoro ⁽²⁾, invogliare altri a continuare l'opera da me intrapresa, diretta ad illustrare uno dei monumenti più importanti per la Storia della botanica, che ricorda la gloria del passato scientifico della nostra Italia nel XVI Secolo.

ELENCO CRONOLOGICO

delle opere principali che servirono alla compilazione del presente lavoro.

RUELLIUS J. *De natura stirpium*. Basileae. Froben, 1537.

FUCHSIUS L. *De historia stirpium*, ecc. Basileae, 1542.

TRAGUS H. *De stirpium*, etc. *Comment. libri tres*. Argentinae, 1552.

CORDUS V. *Opera*, 1561.

ANGUILLARA L. *Semplici*. Vinegia. V. Valgrisi, 1561.

LOBELIUS (De l' Obel) M. *Nova stirpium adversaria*. Antwerpiae. Plantinus, 1576.

LOBELIUS (De l' Obel) M. *Plantarum seu stirpium historia*. Antwerpiae. Plantinus, 1576.

CAESALPINUS A. *De plantis*. Florentiae. G. Marescotti, 1583.

DALECHAMPS J. *Historia plantarum*. Lugduni. G. Rovillius, 1587.

⁽¹⁾ In questo volume si contengono 546 specie di piante — di esse 532 sono italiane — fra le quali 317 del Bolognese, 11 piante estere coltivate e 3 estere non coltivate.

⁽²⁾ Il S.^t LAGER, conoscendo quale sia la mole del lavoro da farsi per riuscire alla completa illustrazione di tutto l'Erbario così si esprime: *Nous espérons que plusieurs naturalistes italiens s'associeront pour décrire la Collection Aldrovandienne et surtout l'Herbier qui intéresse l'Histoire de la Botanique, d'abord parce qu'il est le plus ancien monument de l'art de conserver les plantes sèches, et ensuite parce qu'il offrira le tableau presque complet des espèces végétales connues au XVI Siècle et des dénominations qui leur étaient données.*

CLUSIUS (De l'Ecluse) C. *Rariorum plantarum historia*. Antwerpiae. Plantinus, 1601.

DODONAEUS R. *Pemptades*. Antwerpiae. Plantinus, 1616.

BAUHINUS J. *Historia Plantarum*. Tomi I, II, III. Ebroduni, 1651.

BAUHINUS G. *Pinax Theatri Botanici*. Basileae. J. Regis, 1671.

MATTHIOLI P. A. *Opera omnia*. Basileae. Koenig J. 1674.

RIVINUS A. Q. *Res Herbaria*. Lipsiae. C. Günther, 1690.

LINNAEUS C. *Species plantarum*. I. ed. Holmiae. L. Salvii. 1753, et II. ed. 1762-3.

DE CANDOLLE A. P. *Prodromus Regni vegetabilis*. Parisiis. Fortin Masson, 1824, 1873.

BERTOLONI A. *Flora italica*. Bologna. R. Masi, 1833-54.

RICHTER H. E. *Codex botanicus Linnaeanus*. Lipsiae. O. Wigand, 1835.

KOCH D. G. D. J. *Synopsis Florae germanicae*. Francofurti ad M. Wilman, 1837.

PARLATORE F. *Flora italiana*, Firenze. Le Monnier, 1848-1894.

CESATI V., PASSERINI G., GIBELLI G. *Compendio della Flora italiana*. Milano. Vallardi, 1867.....

COCCONI G. *Flora Bolognese*. Bologna. N. Zanichelli, 1883.

G. E. MATTEI. *Aggiunte alla Flora bolognese*. Bologna. Tip. Azzoguidi, 1886.

FRATELLI ADRIANO e ANDREA FIORI. *Alcuni appunti da servire come contributo alla Flora del Bolognese*. Società dei Naturalisti di Modena Serie III, vol. III. Modena, 1887.

ANDREA FIORI. *Piante rare o nuove per il Bolognese*. N. 12 giornale *La Rondine* Bologna.

ARCANGELI G. *Flora italiana*, 2.^a ediz. Torino. Loescher, 1894.

VOLUME PRIMO ⁽¹⁾

1. [1]. **Artemisia pontica** L. Sp. plant. 1, p. 847; Richter Cod. p. 807; Arc. Fl. it. 687.

« *Absinthium Ponticum Matthioli. Abs. Galatium Sardonium Lob. Abs. ponticum Galeni. Santonicum Ruellii. Abrotanum foem. Fuchsii.* »

— *Absinthium ponticum*, Matth. Op. p. 509. *Galatium Sardonium Absinthium* Lob. Stirp. obs. p. 436. *Absinthium Santonicum*, Ruell. Nat. Stirp. p. 493. *Abrotanum foemina*, Fuchs. Hist. Stirp. p. 7. 8. *Absinthium ponticum tenuifolium incanum*, Bauh. Pin. p. 138.

— Esemplare non fiorito, in discreto stato di conservazione, ma tarlato nella parte superiore.

— Specie originaria d'Oriente. Coltivasi negli orti e nei giardini. Nome Bolognese: *Inzeins Pondghein* — Assenzio di Ponto — Erba Pontica.

(¹) A scanso di erronee interpretazioni, è bene avvertire che:

- 1) La prima cifra segna il numero progressivo delle piante conservate nel volume 1.° dell' Erbario Aldrovandi;
- 2) La cifra fra le parentesi indica il numero corrispondente ai fogli del volume 1.° col numero delle specie contenute in ciascun foglio;
- 3) La prima frase indica il nome moderno di ciascuna specie, accompagnato dai sinonimi e dalle più importanti indicazioni sistematiche;
- 4) La seconda frase segna, fra virgolati «—» i nomi usati e scritti di pugno di Aldrovandi sopra ciascun foglio, accanto a ciascuna specie;
- 5) La terza frase indica i sinonimi precisi desunti dai codici dei vecchi autori contemporanei all'Aldrovandi.

Le frasi susseguenti hanno riguardo:

Allo stato di conservazione dei singoli esemplari — Alle osservazioni diverse — Alla esistenza della specie nella Flora italiana e più particolarmente in quella bolognese — Alla esistenza della relativa tavoletta silografica fatta eseguire dall'Aldrovandi e conservata oggi nel Museo Aldrovandiano del R. Istituto botanico di Bologna, e finalmente ai corrispondenti e alle località citate dall'Aldrovandi stesso nel suo Erbario.

2. [1 bis]. **Santolina Chamaecyparissus** L. Sp. plant. I, p. 842; Richter Cod. p. 802; Bert. Fl. it. IX, p. 92; Arc. Fl. it. p. 685.

« *Chamaecyparissus. Abrotanum foemina. Santolina. Santonicum minus Diosc. Tragi.* »

— *Chamaecyparissus*, Fuchs. Hist. Stirp. p. 874. *Abrotanum foemina*, Lob. Stirp. hist. p. 443. Matth. Op. p. 513. *Santolina vulg.*, Caesalp. De Pl. p. 478. *Abrotanum foemina vulgare*, Clus. Pl. hist. p. 341.

— Esiste questa specie in una tavoletta già incisa, col nome di « *Abrotanum foemina flore pallido* ».

— Esemplare con foglie alquanto danneggiate e con capolini quasi del tutto distrutti.

— Pagina duplicata. Porta il n. 1 bis.

— Trovasi spontanea qua e là nell'Italia centrale e meridionale: nel Bolognese manca. Coltivasi sovente nei giardini.

3. [2]. **Artemisia camphorata** Vill.: Bert. Fl. it. IX, p. 115; Arc. Fl. it. p. 686.

« *Abrotanum mas.* »

— *Abrotano maschio*, Matth. Op. p. 512. *Abrotonum*, Caes. De Pl. p. 478.

— Esemplare con foglie e fiori, ben conservato.

— Specie confusa dagli antichi con l'*Artemisia Abrotanum* L. come rileva Bertoloni l. c. p. 118, ove dice: « *Haec species a botanicis nostris olim habebatur pro Artemisia Abrotano L. et forte ipse Linnaeus utramque conjunxit, etc.* ».

In Italia: anche nel Bolognese piuttosto frequente. Cocc. flor. bol. p. 295.

4. [3]. **Galium aristatum** L. Sp. pl. II. p. 152; Richter Cod. p. 119; Bert. Fl. it. II, p. 112 sub *Galio sylvatico* L.; Arc. Fl. it. p. 626 pro varietate *Galii sylvatici* L.

« *Alysson Plinii. Asperula vel asperula odora Lob. Matrisylæa Tragi. Est tamen earum major paulo et pinguior, minusque odorata quam Belgarum, teste Cordo.* »

— Esemplare assai bene conservato.

— In Italia. Nel Bolognese non ancora riscontrata.

5. [4 n. 1]. **Xiphion foetidissimum** Parl. *Iris foetidissima* L. Sp. pl. I, p. 39; Richter Cod. p. 55; Bert. Fl. it. I, p. 238; Arc. Fl. it. p. 156.

« *Xyris seu Spatula foetida.* »

— *Xyris* Cord. Op. p. 63. *Xyris*, *Spatula foetida vulgo* Lob. Stirp. adv. p. 32 et Lob. Stirp. obs. p. 36. *Spatula foetida. plerisque Xyris* Bauh. Hist. pl. p. 731. *Spatula foetida* Caes. Pl. p. 422.

— Esemplare con foglie e fiori, molto rovinato.

— Assai rara nel Bolognese; qualche volta coltivasi. Frequente nell'Italia centrale e meridionale. Cocc. Flor. bol. p. 469.

6. [4 n. 2]. **Ilex Aquifolium** L. Sp. pl. I, p. 125; Richter Cod. p. 140; Bert. Fl. it. II, p. 221; Arc. Fl. it. p. 467.

« *Ilex aquifolia. Acrifolium.* »

— *Aquifolium* Caes. Pl. p. 94. *Aquifoglio* Matth. Op. p. 147. *Aquifolium sive Aquifolium* Lob. Stirp. obs. p. 582. *Ilex aculeata baccifera* Bauh. Pin. p. 425. *Ilex aquifolia* Lonic. ex Bauh. l. c.

— Esiste la sola impronta di due foglie, dalla quale però si può riconoscere trattarsi di questa specie.

— Piuttosto scarso nell'Appennino Bolognese; coltivasi nei giardini. Cocc. Flor. bol. p. 145.

7. [5 n. 1]. **Phillyrea stricta** Bert. *Phillyrea variabilis* Timb. Bull. Soc. bot. Franc. VII, p. 18. var. *stricta* Auct.; *Phillyreae latifoliae* L. Sp. pl. I, p. 8. var. *stricta* DC. Prodr. v. 8, p. 292; Arc. Fl. it. p. 361.

« *Alaternus Pl. Phillyrea quibusd.* »

— Esistono due esemplari, alquanto dissimili, con sole foglie. Il primo appartenente alla *Phillyrea stricta* Bert., è in discreto stato di conservazione, quantunque mancante di parecchie foglie; del secondo, che rammenta alquanto la *Phillyrea media* L., non restano che tre soli frammenti di foglie.

— Col nome di *Alaternus Plinii*, Lobelio (Stirp. obs. p. 566) descrive realmente il *Rhamnus Alaternus* L. e non questa specie. — De Candolle nel *Prodromus* l. c., riportando dubitativamente questa pianta

quale varietà della *Phillyrea latifolia* L. aggiunge: « *An species propria?* »

— Piuttosto rara nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 334.

8. [5 n. 2]. **Obione portulacoides** Moq. — *Halimus portulacoides* Wallr. — *Atriplex portulacoides* L. Sp. pl. I, p. 1053; Richter Cod. p. 1001; Bert. Fl. it. X, p. 410; Arc. Fl. it. p. 209.

« *Halimus Diosc. Portulaca marina.* »

— *Halimus* Caes. Pl. p. 160. Clus. Pl. hist. p. 54. *Portulaca marina* Lob. Stirp. obs. p. 213. Dod. Pempt. p. 771. *Halimus s. Portulaca marina* Bauh. Pin. p. 120.

— Tre rami avvicinati con foglie e fiori, due ben conservati, il terzo quasi ridotto alla sola impronta.

— In Italia, frequente lungo il litorale; nel Bolognese manca.

9. [6]. **Anagyris foetida** L. Sp. pl. I, p. 374; Richter Cod. p. 390; Bert. Fl. it. IV, p. 404; Arc. Fl. it. p. 473.

« *Anagyris vera Diosc. Nantea Pl.* »

— *Anagyris* Caes. Pl. p. 112. Lob. Stirp. obs. p. 505. *Anagyris vera* Clus. Hist. pl. p. 93. *Anagyris foetida* Bauh. Pin. p. 391.

— Ramo con sole foglie, assai rovinato.

— In Italia; nel Bolognese manca.

10. [7 n. 1]. **Arbutus Unedo** L. Sp. pl. I, p. 395; Richter Cod. p. 412; Bert. Fl. it. IV, p. 432; Arc. Fl. it. p. 357.

« *Arbutum. Unedo. Memecylon Diosc.* »

— *Arbutus* Clus. Pl. p. 47. Lob. Stirp. hist. p. 571. Dalech. Hist. pl. p. 195. Caes. Plant. p. 103, ecc. *Arbutus folio serrato* Bauh. Pin. p. 460.

— Tre esemplari assai ben conservati, alquanto dissimili fra loro per la forma delle foglie: uno porta una giovane infiorescenza, un secondo porta un frutto; il terzo consta di sole foglie. Mancano due foglie, delle quali resta l'impronta.

— Nell'Italia media e meridionale; nel Bolognese manca.

11. [7 n. 2]. **Alchemilla vulgaris** L. Sp. pl. I, 123; Richter Cod. 137; Bert. Fl. it. II, p. 204; Arc. Fl. it. p. 543.

« *Alchymilla. Pes Leonis. Drosion a rore q. madet. Stellaria. Sanicula major quocundam.* »

— *Alchimilla*, Lob. Stirp. obs. p. 378. *Alchimilla vulgaris*. Clus. Plant. hist. p. CVIII. Bauh. Pin. p. 319. *Alchimilla vulgo et Pes Leonis*, Caes. Plant. p. 557. *Pes Leonis sive Alchimilla*. Bauh. Hist. pl. v. II, p. 398. *Stellaria*, Matth. Op. p. 819. *Drosium*, Cordo Hist. pl. p. 147, 148.

— Esemplare con foglie e fiori, alquanto danneggiato.

— Intorno al nome *Drosium*, dato a questa pianta, Cordo, l. c., così si esprime: « *ipsis foliis ros in guttas coactus continetur, nonnunquam etiam singulis incisuris ros margaritarum modo insidet, unde etiam Graecum et Germanicum nomen accepit* ».

— Non rara nell'Appennino Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 201.

12. [8]. **Corylus Avellana** L. Sp. pl. I, p. 998; Richter Cod. p. 945; Bert. Fl. it. X, p. 237; Arc. Fl. it. p. 181.

« *Avellana sativa.* »

— *Corylus Sativa*, Bauh. Pin. p. 417.

— Due esemplari: uno con sole foglie abbastanza ben conservato, e l'altro con fiori, ridotto a pochi frustoli di amenti.

— Specie comunissima nelle boscaglie del Bolognese; coltivasi ancora in più varietà. Cocc. Fl. bol. p. 440.

13. [9 n. 1]. **Arenaria serpyllifolia** L. Sp. pl. I, p. 423; Richter Cod. p. 437; Bert. Fl. it. IV, p. 659; Arc. Fl. it. p. 321.

« *Alsine species 3.^a Fuchsii.* »

— *Alsine minor* Fuchs. Hist. pl. p. 23. *Alsine minor multicaulis* Bauh. Pin. p. 250. *Alsine minima* Dod. Pempt. p. 30, Dalech. Hist. pl. p. 1233, Lob. Stirp. obs. p. 246. *Centunculi varietas*, etc. Caes. Pl. p. 259 e 260.

— Esemplari ben conservati.

— Specie vulgarissima nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 116.

14. [9 n. 2]. **Moehringia trinervia** Clairv. — *Arenaria trinervia* L. Sp. pl. I, p. 423; Richter Cod. p. 436; Bert. Fl. it. IV, p. 658; Ces. Pass. Gib. Fl. it. p. 779; Parl. Fl. it. IX p. 553; Arc. Fl. it. p. 322.

« *Alsine* 1.^a *Fuchsii*. *Hippia minor* Cordi. »

— Esemplare bene conservato.

— Pare che Aldrovandi abbia confuso questa specie colla *Stellaria media* Vill. forse a cagione dell' identico portamento di entrambe. Infatti i nomi citati nell' erbario, cioè *Alsine prima* (uguale ad *Alsine major*) *Fuchsii* ed *Hippia minor* Cordi corrispondono realmente alla *Stellaria media* come rilevasi dalle figure e dalle descrizioni date dai suddetti autori. Vedasi inoltre a proposito di questa sinonimia Bauhinio Pinax p. 250.

— Piuttosto rara nell' alto Appennino Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 116.

15. [10 n. 1]. **Stellaria media** Vill. var. **brachypetala** Bor. — *Alsine media* L. Sp. pl. I, p. 272; Richter Cod. p. 288; Bert. Fl. it. IV, p. 645; Parl. Fl. it. IX, p. 524; Arc. Fl. it. p. 319.

« *Alsine*. »

— *Alsine major*, Fuchs. Hist. pl. p. 21. *Alsine media*, Bauh. Pin. p. 250. *Alsine minor*, Dod. Pempt. p. 29. *Hippia minor*, Cord. Plant. p. 159. *Centunculus*, Caes. Plant. p. 259.

— Esemplari bene conservati.

— Forma assai atipica, ascrivibile alla var. *brachypetala* Bor. stante l' esistenza di petali piccolissimi. Rammenta la var. *Boreana* Freyn. ma non è riunibile ad essa, essendo quest' ultima una forma apetala.

— Comunissima nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 117.

16. [10 n. 2]. **Anagallis arvensis** L. Sp. pl. I, p. 148. var. **phoenicea** Lamk.; Richter Cod. p. 164; Bert. Fl. it. II, p. 422; Arc. Fl. it. p. 456.

« *Anagallis mas*. »

— *Anagallis mas*, Cam. in Richter l. c. *Anagallis phoenicea mas*, Lob. St. obs. p. 247. *Anagallis phoenicea flore*, Bauh. Pin. p. 252.

— Esemplari con fiori e frutti, assai bene conservati.

— Comunissima nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 392.

17. [11]. **Petasites niveus** Baumg. — *Tussilago nivea* Villars. — Bert. Fl. it. IX, p. 208; Arc. Fl. it. p. 662.

« *Arction. Cacalia quibusdam.* »

— Esiste tavoletta già incisa rappresentante questa specie e portante il nome: *Arction montanum foliis farfarae*. *T. Aggl. pr. 11.*

— Due sole foglie bene conservate.

— I nomi *Arction* od *Arctium* vengono dati dagli autori alle specie del genere *Lappa*, ed il nome *Cacalia* a quelle del genere *Adenoxyles*. Vedasi Bauh. Pinax p. 198.

— In Italia trovasi solo sulle Alpi.

18. [12 n. 1]. **Allium ursinum** L. Sp. pl. I, p. 300; Richter Cod. p. 315; Bert. Fl. it. IV, p. 65; Parl. Fl. it. III, p. 516; Ces. Pass. Gib. Fl. it. p. 139; Arc. Fl. it. p. 133.

« *Allium Ursinum.* »

— *Allium ursinum*, Caes. Plant. p. 409. Fuchs. Hist. pl. p. 683. Lob. Stirp. obs. p. 80. *Allium sylvestre latifolium*, Bauh. Pin. p. 74.

— Una foglia ed una ombrelletta fruttifera in discreto stato di conservazione.

— Recentemente rinvenuto anche nel Bolognese. Vedasi Fratelli Fiori. Alcuni appunti da servire come contributo alla Flora del Bolognese. Atti della Società dei Naturalisti di Modena, 1887, p. 5.

19. [12 n. 2]. **Kentrophyllum lanatum** DC. Prodr. VI, p. 610. — *Carthamus lanatus* L. Sp. pl. I, p. 830. — *Atractylis lanata* Scop. Richter Cod. p. 792; Bert. Fl. it. IX, p. 66; Arc. Fl. it. 717.

« *Atractylis vulgaris. Fusus agrestis.* »

— *Atractylis vulgaris*, Ang. Sempl. p. 147. *Atractylis lutea*, Bauh. Pin. p. 379. *Atractylis*, Dod. Pempt. p. 736.

— Esempio completo in buono stato.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. it. p. 280.

20. [13 n. 1]. **Stachys sylvatica** L. Sp. pl. I, p. 580; Richter Cod. p. 568; Bert. Fl. it. VI, p. 142; Arc. Fl. it. p. 436.

« *Hormini species. Heraclea Tragi. Lamii species. Anguillariae lamium. Galeopsis. Urtica non mordax. Alysson Gal. quibusdam. Baccharis lacuna videtur.* »

— *Lamium maximum sylvaticum foetidum*, Bauh. Pin. p. 231. *Galeopsis legitima*, Clus. Hist. pl. XXXVI. *Urtica Heraclea*, Dalech. Hist. pl. p. 1244. *Stachys sylvatica*, Riv. Res. herb. tav. 26.

— Esemplare fiorito bene conservato.

— Frequente nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 385.

21. [13 n. 2]. ***Campanula latifolia*** L. Sp. pl. I, p. 165; Richter Cod. p. 178; Bert. Fl. it. II, p. 480; Parl. Fl. it. VIII, p. 86; Arc. Fl. it. p. 638.

« *Angelicae species. Cervicaria.* »

— *Campanula maxima foliis latissimis*, Bauh. Pinax p. 94. *Trachelium majus*, Clus. Hist. pl. p. CLXXII.

— Esemplare piuttosto danneggiato.

— I nomi di *Archangelica*, Caes. Plant. p. 386. e di *Cervicaria*, Lob. St. obs. p. 176 sono piuttosto riferibili alla *Campanula Trachelium* L. colla quale forse Aldrovandi ha confuso questa specie. Vedasi Bauhinio Pinax, p. 94.

— Non ancora riscontrata nel Bolognese.

22 [14]. ***Angelica silvestris*** L. Sp. pl. I. p. 250; Richter Cod. p. 268; Bert. Fl. it. III, p. 412; Arc. Fl. it. p. 608.

« *Angelica sylvestris. Phellandrium Pl. Guilandini.* »

— *Angelica sylvestris*, Dod. Pempt. p. 318. Lob. St. obs. p. 399. *Angelica palustris*, Riv. Op. Tab. 17. *Phellandrium Plinii Guilandino*, ex Lob. l. c.

— Trovasi tavoletta già incisa col nome: *Angelica sylvestris, alia flore albo, alia rubro. T. 4. c. 284.*

— Foglia assai rovinata. Vi si trova unita una ombrella, pure molto danneggiata, non appartenente a questa specie, perchè munita di foglie involucranti: forse è di *Daucus*.

— Piuttosto rara nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 234.

23. [15 n. 1]. **Campanula Trachelium** Sp. pl. I, p. 166 var. **dasycarpa** DC. — *Campanula urticifolia* Schmidt.; Richter Cod. p. 178; Bert. Fl. it. II, p. 485; Parl. Fl. it. VIII, p. 83; Arc. Fl. it. p. 638.

« *Archangelica. Campanula major Fuchsii.* »

— *Archangelica*, Caes. Plant. p. 386. *Trachelium sive Cervicaria*, Lob. St. hist. p. 176. *Cervicaria major*, Dod. Pempt. p. 164.

— Esemplare con foglie e fiori, moltissimo danneggiato.

— La figura di Fuchsio, Hist. Stirp. p. 432 citata dagli autori per questa specie, rappresenta probabilmente la *Campanula rapunculoides* L.

— Frequente nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 326.

24. [15 n. 2]. **Salvia Aethiopis** L. Sp. pl. I, p. 27; Richter Cod. p. 41; Bert. Fl. it. I, p. 159; Arc. Fl. it. p. 429.

« *Aethiopis.* »

— *Aethiopis*, Caes. Plant. p. 443. Lob. St. obs. p. 304. *Aethiopis foliis sinuosis*, Bauh. Pin. p. 241.

— È stata tagliata ed asportata la parte di pagina contenente questa pianta. Ne rimane però una foglia, discretamente conservata, che permette di identificare con certezza la specie.

— Specie originaria d'Oriente, sovente coltivata nei giardini e qualche volta inselvatichita. Indicata dubitativamente per alcune località d'Italia; nel Bolognese manca.

25. [16 n. 1]. **Echium vulgare** L. Sp. pl. I, p. 139; Richter Cod. p. 156; Bert. Fl. it. II, p. 347; Parl. Fl. it. VI, p. 926; Arc. Fl. it. p. 378.

« *Anchusa coerulea seu Alcibiaca. Echion aliis. Alcanna aliis.* »

— *Anchusa major*, Caes. Plant. p. 435. *Echium sive Alcibiacum*, Dod. Pempt. p. 631, *Echium*, Riv. Op. p. 7. Lob. St. obs. p. 312. *Echium vulgare*, Bauh. Pin. p. 254. Clus. Hist. pl. V, p. 143.

— Esemplare bene conservato.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 346.

26. [16 n. 2]. **Echium italicum** L. Sp. pl. I, p. 139; Richter Cod. p.

156; Bert. Fl. it. II, p. 342; Parl. Fl. it. VI, p. 925; Arc. Fl. it. p. 378.

« *Anchusa alia prima.* »

— *Echion*, Caes. Pl. p. 436. *Lycopsis*, Bauh. Pin. p. 255. Lob. Stirp. obs. p. 312. *Echii altera species*, Dod. Pempt. p. 631.

— Esemplare alquanto danneggiato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 346.

27. [17]. ***Hypericum tetrapterum*** Bert. Fl. it. VIII, p. 313 *cum* *Hyperico quadrangulo* L.; Arc. Fl. it. p. 334.

« *Ascyron.* »

— *Ascyron*, Dod. Pempt. p. 78. Caes. Plant. p. 395. Lob. St. obs. p. 216. *Hypericum Ascyron dictum*, etc., Bauh. Hist. pl. III, p. 382.

— Esemplare con frutti, discretamente conservato.

— È incerto se le figure citate da Bauhinio, Lobelio, ecc. rappresentino questa specie oppure l'*Hypericum quadrangulum* L. essendo molto imperfette e deficienti, e differendo queste due specie per caratteri di lieve momento. La figura di Fuchsio (Plant. hist. p. 74) pure col nome di *Ascyrum* pare rappresenti l'*Hypericum Richeri* Vill.

— Piuttosto raro nell'Appennino Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 133.

28. [18]. ***Ambrosia maritima*** L. Sp. pl. I, p. 988; Richter Cod. p. 935; Bert. Fl. it. X, p. 185; Arc. Fl. it. p. 690.

« *Ambrosia V.^o Conyza Hip.^{itis} de morbis mul. Cotula Scit Hip.^{itis} Senecioni congener. Artemisiae species quib.* »

— *Ambrosia*, Caes. Plant. p. 158. Dod. Pempt. p. 35. *Ambrosta quibusdam*, Bauh. Hist. pl. III, p. 190 p. p. *Ambrosia sativa hortensis*, Lob. St. obs. p. 442. *Ambrosia maritima*, Bauh. Pin. p. 138.

— Due esemplari: il primo grande con foglie e fiori, l'altro piccolo con frutti: entrambi alquanto danneggiati.

— In Italia frequente presso al mare: nel Bolognese manca.

[19].

— Non esiste alcuna pagina corrispondente a questo numero, ma pare che ciò dipenda unicamente da errore di numerazione, non risul-

tando che sia stata asportata. Anche nell'indice dell'Erbario Aldrovandi viene ommesso questo numero.

29. [20]. **Asparagus officinalis** L. Sp. pl. I, p. 313; Richter Cod. p. 326; Bert. Fl. it. IV, p. 148; Parl. Fl. it. III, p. 16.

« *Asparagus sativa cum baccis.* »

— *Asparagus sativa*, Bauh. Pin. p. 489. Dalech. Hist. p. 610. *Asparagus hortensis*, Dod. Pempt. p. 703. *Asparagus domesticus vulgaris*, Lob. Stirp. obs. p. 458.

— Esemplare con frutti, alquanto rovinato.

— Coltivasi negli orti: qualche volta inselvaticisce. Cocc. Fl. bol. p. 464.

30. [21]. **Asparagus officinalis** L. Vedasi numero precedente.

« *Asparagus sine baccis.* »

— Vedasi numero precedente.

— Esemplare senza frutti, alquanto rovinato.

31. [22]. **Galium Mollugo** L. Sp. pl. I, p. 107; Richter Cod. p. 118; Bert. Fl. it. II, p. 114; Arc. Fl. it. p. 626.

« *Aparine levis. Mollugo Lob.* »

— *Mollugo*, Clus. Hist. pl. p. CLXXVI. Dod. Pempt. p. 354. Lob. Stirp. obs. p. 466. *Lappago quidam Aparinem laevem vocant*, Caesalp. Pl. p. 325.

— Abbastanza bene conservato.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 255.

32. [23]. **Apium graveolens** Sp. pl. I, p. 264; Richter Cod. p. 280; Bert. Fl. it. III, p. 258; Parl. Fl. it. VIII, p. 443; Arc. Fl. it. p. 591.

« *Apium palustre. Paludapium. Elioselinum.* »

— *Apium palustre*, Riv. Op. tab. 87. Bauh. Pin. p. 154. *Paludapium sive Eleoselinum*, Lob. Stirp. obs. p. 405. Adv. 315.

— Esemplare fiorifero in discreto stato di conservazione.

— Coltivasi negli orti e qualche volta inselvaticisce. Cocc. Fl. bol. p. 244.

33. [24]. **Smyrniium Olusatrum** L. Sp. pl. I, p. 262; Richter Cod. p. 278; Bert. Fl. it. III, p. 289; Parl. Fl. it. VIII, p. 479; Arc. Fl. it. p. 588.

« *Apium Alexandrinum* Cordo. *Hipposelinum*. *Cynapium*. *Olusatrum*. *Macerone dictum forte quasi Macedone*. *Petroselinum Alexandrinum* Tragi. »

— *Hipposelinum*, Dod. Pempt. p. 698. Bauh. Pin. p. 154. *Olusatrum* vulgo *Macerone*, Caes. Plant. p. 303. *Petroselinum Alexandrinum*, Trag. Stirp. p. 436.

— Due esemplari, uno con fiori, l'altro con frutti, moltissimo rovinati.

— In Italia. Nella Provincia di Bologna manca.

34. [25]. **Avena sterilis** L. Sp. pl. II, p. 118; Richter Cod. p. 92; Bent. Fl. it. I, p. 692; Parl. Fl. it. I, p. 289; Ces. Pass. Gib. Fl. it. p. 62; Arc. Fl. it. p. 46.

« *Avena sativa*. *Avena vesca*. *Bromos*. »

— Foglia ed infiorescenza fruttifera, poco danneggiate.

— I nomi citati dall'Adrovandi si riferiscono all'*Avena sativa* L. e non a questa specie. Vedasi a tale proposito Bauhinii, *Pinax* p. 23 e Linneo l. c.

— Piuttosto frequente nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 533.

35. [26]. **Aconitum Lycoctonum** L. Sp. pl. I, p. 532; Richter Cod. p. 529; Bert. Fl. it. V, p. 417; Arc. Fl. it. p. 244.

« *Aconitum Ponticum*. *Lycoctonum album*. »

— *Aconitum luteum ponticum*, Lob. Stirp. obs. p. 385. *Aconitum lycoctonum luteum*, Bauh. Pin. p. 183. *Aconitum lycoctonum vulgatius*, Clus. Hist. pl. p. XVIII.

— Due foglie alquanto dissimili, bene conservate, ed una infiorescenza con giovani fiori, assai rovinata.

— Luoghi elevati delle Alpi e dell'Appennino: assai raro nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 72.

36. [27]. **Aconitum variegatum** L. Sp. pl. I, p. 532; Richter Cod. p. 530; Bert. Fl. it. V, p. 423; Arc. Fl. it. p. 244.

« *Aconitum ponticum aliud.* »

— *Aconitum coeruleum minus*, Bauh. Pin. p. 183.

— Due esemplari dissimili: l'uno con sole foglie appartenente certamente a questa specie, l'altro fiorifero forse spettante ad altra specie. Il primo ben conservato, l'altro danneggiato.

— Nelle Alpi orientali.

37. [28 n. 1]. **Ononis spinosa** L. Sp. pl. I, p. 716; Richter Cod. p. 698; Bert. Fl. it. VII, p. 369; Arc. Fl. it. p. 482.

« *Anonis flore coeruleo. Arresta bovis. Remora aratri. Aegypyros Crateve.* »

— *Oononis*, Caes. Plant. p. 243. Lob. Stirp. obs. p. 492. *Anonis*, Fuchs. Hist. pl. p. 60. Dod. Pempt. p. 743. *Anonis spinosa flore purpureo*, Bauh. Pin. p. 389.

— Esemplare molto danneggiato.

— Forse riferibile alla var. *antiquorum* (L.), ma non è possibile accertarsene stante il cattivo stato di conservazione dell'esemplare.

— Comunissima nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 156.

38. [28 n. 2]. **Ononis Natrix** L. Sp. pl. I, p. 717; Richter Cod. p. 701; Bert. Fl. it. VII, p. 393; Arc. Fl. it. p. 480.

« *Anonis lutea sine spinis Lob. aut similis. Natrix Pl. Herbar. Melilotos sylv. pinguis. Anonis mitior Clus. Ciceris genus Hyp.* »

— *Natrix Plinii herbariorum*, Lob. Stirp. obs. p. 493.

— Tre esemplari: uno di sole foglie, uno con fiori ed uno con frutti; questi due ultimi (assai) rovinati.

— Frequente nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 157.

39. [28 n. 3]. **Ononis spinosa** L. Vedasi n. 28.

« *Anonis flore rubro.* »

— Vedasi n. 28 n. 1.

— Esemplare fiorifero discretamente conservato.

40. [29]. **Abutilon Avicennae** Gaertn. — *Sida Abutilon*, L. Sp. pl. I, p. 685; Richter Cod. p. 668; Bert. Fl. it. VII, p. 244; Arc. Fl. it. p. 341.

« *Althaea Theophrasti. Abytylon Avicennae Anguill.*

— *Althaea Theophrasti*, Caes. Plant. p. 576. *Althaea Theophrasti flore luteo*, Bauh. Pin. p. 316. *Althaea luteis floribus*, Lob. Stirps. obs. p. 374. *Althaea altera sive Abutilon Avicennae*, Matth. Op. p. 662.

— Due foglie; rametto con giovani fiori e frutti, discretamente conservati.

— In Italia, spontanea e qualche volta coltivata nei giardini: nel Bolognese manca.

41. [30 n. 1]. **Pallenis spinosa** Cass. — *Asteriscus spinosus*, Gren. Godr. — *Buphtalmum spinosum*, L. Sp. pl. I, p. 903; Richter Cod. p. 851; Bert. Fl. it. IX, p. 417; Arc. Fl. it. p. 695.

« *Aster atticus. Bubonium inguinalis.* »

— *Aster acticus*, Caes. Plant. p. 495. *Aster atticus*, Lob. Stirp. obs. p. 188. *Aster atticus luteus foliolis ad florem rigidis*, Bauh. Pin. p. 266.

— Assai bene conservato.

— Circa il nome di *Bubonium inguinalis* dato a questa specie, Bauhinio (l. c.) così si esprime: *Aster, ab aliquibus Bubonium appellatur, quoniam Inquinum (Sc. inflammationi) praesentaneum remedium est.*

— Frequente nel Bolognese. Bocc. Fl. bol. p. 288.

42. [30 n. 2]. **Foeniculum capillaceum** Gilib. — *Foeniculum officinale*, All. — *Foeniculum vulgare*, Gaertn. — *Meum Foeniculum*, Smith. — *Anethum Foeniculum*, L. Sp. pl. I, p. 263; Richter Cod. p. 279; Bert. Fl. it. III, p. 339; Parl. Fl. it. VIII, p. 308; Arc. Fl. it. p. 602.

« *Anethum.* »

— *Foeniculum*, Caes. Plant. p. 282. Dod. Pempt. p. 297. *Foeniculum vulgare, etc.*, Bauh. Pin. p. 147.

— Ombrella florifera e piccole foglie, alquanto danneggiate.

— Coltivasi negli orti in parecchie varietà; di rado spontaneo od inselvatichito. Cocc. Fl. bol. p. 239.

43. [31]. **Chenopodium murale** L. Sp. pl. I. p. 319; Richter Cod. p. 239; Bert. Fl. it. III, p. 29; Arc. Fl. it. p. 212.

« *Atriplex sylvestris*. *Pes anserinus* Fuchs. *Chenopos sive Pes anserinus primus* Tabernamontano. »

— *Pes anserinus*, Fuchs, Hist. 652. *Atriplex sylvestris latifolia acutiore folio*, Bauh. Pin. p. 119.

— Esemplare alquanto rovinato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 409.

44. [32 n. 1]. **Chenopodium album** L. Sp. pl. I, p. 219; Richter Cod. p. 240; Bert. Fl. it. III, p. 30; Arc. Fl. it. p. 213.

« (*Atriplex alia*). »

Nome citato per questo numero nell'indice dell'Erbario Aldrovandi, ma non nell'erbario stesso.

— *Atriplex sylvestris*, Fuchs, Hist. Pl. p. 119. *Atriplex sylvestris folio sinuato candicante*, Bauh. Pin. p. 119.

— Assai danneggiato.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 409.

45. [32 n. 2]. **Chenopodium polyspermum** L. Sp. pl. I, p. 220; Richter Cod. p. 241; Bert. Fl. it. III, p. 40; Arc. Fl. it. p. 212.

« *Atriplex alia sylvestris*. *Polyspermon* Cassani, Bassii, *Anguillarae*. »

— *Polyspermon* Cassani, Bassi, *Anguillarae*, Lob. St. obs. p. 129. *Blitum polyspermon*, Bauh. Pin. p. 118.

— Esemplare assai ben conservato.

— Frequente nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 409.

46. [33 n. 1]. **Chenopodium opulifolium** Schrad. Bent. Fl. it. III, p. 32; Arc. Fl. it. p. 213.

« *Atriplex sylvestris*. »

— Due esemplari alquanto danneggiati.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 409.

47. [33 n. 2]. **Atriplex hortensis** L. Sp. pl. I, p. 1053; Richter Cod. p. 1001; Bert. Fl. it. X, p. 417; Arc. Fl. it. p. 210.

« *Atriplex sativa*. »

— *Atriplex*, Caes. Plant. p. 160. *Atriplex sativa*, Lob. St. obs. p. 127.

Atriplex hortensis, Fuchs. Hist. Pl. p. 118; Bauh. Pin. p. 119.

— Esemplare danneggiato.

— Coltivata e qualche volta inselvatichita. Cocc. Fl. bol. p. 407.

48. [34 n. 1]. **Asarum europaeum** L. Sp. pl. I, p. 442; Richter Cod. p. 454; Bert. Fl. it. V, p. 3; Arc. Fl. it. p. 223.

« *Asarum*. »

— *Asarum*, Caes. Plant. p. 389. Bauh. Pin. p. 197. Lob. St. obs. p. 328.

— Tre foglie ben conservate.

— Nell'alto Appennino Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 419.

49. [34 n. 2]. **Rhinanthus minor** Ehrh. — *Alectorolophus minor*, Rehb., Arc. Fl. it. p. 407.

« *Alysson quibusdam. Cavagnola dicta a figura canistri in flore*. »

— *Crista galli herbariorum*, Lob. St. obs. p. 285. ? *Crista galli angustifolia*, Bauh. Pin. p. 163.

— Esemplare fruttificato, alquanto rovinato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 366.

50. [34 n. 3]. **Aloe vulgaris** Lamk. — *Aloe perfoliata vera*, L. Sp. pl. I, p. 320; Richter Cod. p. 332; Arc. Fl. it. p. 161.

« *Aloë*. »

— *Aloe*, Lob. St. obs. p. 202. *Aloë vulgaris*, Bauh. Pin. p. 286.

— Piccolo frammento di foglia, male conservato, appena identificabile per la forma e la reciproca distanza dei denti marginali.

— È stata tagliata parte della pagina corrispondente a questo ed asportata assieme agli esemplari che conteneva. Nell'indice dell'Erbario è pure indicato collo stesso nome di *Aloë* il Tom. 3, cart. 21, ma anche tale pagina fu completamente asportata!

— Nelle regioni più calde d'Italia. Coltivasi sovente.

51. [35]. **Vincetoxicum officinale** Moench. — *Cynanchum Vincetoxicum* Br. — *Asclepias Vincetoxicum* L. Sp. pl. I, p. 216; Richter Cod. p. 237; Bert. Fl. it. III, p. 11; Arc. Fl. it. p. 365.

« *Asclepias. Vincetoxicum s. ipsius. Apocini. Hyrundinaria.* »

— *Asclepias*, Caesalp. Plant. p. 269. *Asclepias*, Lob. Stirp. obs. p. 356. *Vincetoxicum*, Dod. Pempt. p. 407. *Hirundinaria*, Trag. Hist. p. 180. *Asclepias albo flore*, Bauh. Pin. p. 303.

— Due esemplari, uno con frutti ed uno con fiori; il primo ben conservato, il secondo alquanto danneggiato.

— Frequente nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 332.

52. [36 n. 1]. **Majorana hortensis** Moench. — *Origanum Majorana*, L. Sp. pl. I, p. 590; Richter Cod. p. 575; Arc. Fl. it. p. 422.

« *Amaracus.* »

— *Amaracus*, Fuchs. Hist. at. p. 666. *Majorana vulgaris*, Bauh. Pin. p. 224.

— Esemplare alquanto danneggiato.

— Originaria d'Oriente, coltivasi nei giardini.

53. [36 n. 2]. **Aegilops triaristata** Wild. — *Triticum triaristatum*, Gr. Godr.; Bert. Fl. it. I, p. 788 *sub Aeg. neglecta*, Reg.; Parl. Fl. it. I, p. 511; Arc. Fl. it. p. 71.

« *Aegylops.* »

— Tre esemplari appartenenti a questa specie, ed un esemplare appartenente all'*Aeg. ovata* L. Quest' ultimo ridotto alla sola spighetta.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 551.

54. [37]. **Pallavicinia Alliaria** Cocc. — *Alliaria officinalis*, Andrz. *Hesperis Alliaria*, Lmk. — *Sisymbrium Alliaria*, Scop. — *Erysimum Alliaria*, L. Sp. pl. I, p. 660; Richter Cod. p. 641; Bert. Fl. it. VII, p. 90; Arc. Fl. it. p. 264.

« *Alliaria. Rima Maria. Anguill. Pes asini Pandectarii. An alectorolophos Pl. ? Lob. Belgis Allium nd. bulbosum. Looch, Sonder Looch. Germ. Herba Salis, Salzkraut.* »

— *Alliaria*, Caes. Plant. p. 370. Fuchs. Hist. plant. p. 104. Bauh. Pin. p. 110. Lob. St. obs. p. 285 et St. adv. p. 228. *Rima Maria*, Anguill. Sempl. p. 240.

— Esemplare con frutti, ben conservato.

— Comunissima nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 90.

55. [38 n. 1]. **Antirrhinum majus** L. Sp. pl. I, p. 617. var. *angustifolium*, Willk. (*flore albo*); Richter Cod. p. 596; Bert. Fl. it. VI, p. 371; Arc. Fl. it. p. 396.

« *Antirrhinum V. Caput canis. Caput vituli. Apuleyi Cynocephalis, flore albo angustifolium.* »

— *Os Leonis*, Caes. Pl. p. 350. *Antirrhinum*, Dod. Pemp. p. 182. Lob. St. obs. p. 221. St. adv. p. 175. *Antirrhinum majus alterum folio longiore*, Bauh. Pinax p. 211.

— Esemplari in fiore, assai danneggiati.

— Anche sulle mura di Bologna. Sovente coltivasi nei giardini. Cocc. Fl. bol. p. 361.

56. [38 n. 2]. **Antirrhinum majus** L. var. *angustifolium* Willk. (*flore rubro*). Vedasi numero precedente.

« . . . *flore rubro.* »

— Vedasi numero precedente.

— Esemplari in fiore ed in frutto, assai danneggiati.

57. [39 n. 1] **Asplenium Ruta-Muraria** L. Sp. pl. I, p. 1081; Richter Cod. p. 1030; Bert. Fl. it. I, p. 71; Arc. Fl. it. p. 6.

« *Adiantum album. Salvia vitae. Ruta muraria.* »

— *Ruta muraria*, Bauh. Pin. p. 356. *Salvia vita*, Lob. obs. p. 472.

— Frondi abbastanza ben conservate.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 560.

58. [39 n. 2]. **Adiantum Capillus-Veneris** L. Sp. pl. I, p. 1096; Richter Cod. p. 1036; Bert. Fl. it. Crypt. I, p. 98; Arc. Fl. it. p. 8.

« *Adiantum nigrum. Apuleij. Ebenotrichon a capillaceo cauliculo atro.* »

— *Capillus Veneris*, Caes. Pl. p. 596. *Adiantum sive Capillus Veneris venus*, Lob. St. adv. p. 361. *Adiantum foliis coriandri*, Bauh. Pin. p. 355.

— Fronda assai bene conservata.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 562.

59. [39 n. 3]. **Acer platanoides** L. Sp. pl. I, p. 1055; Richter Cod. p. 1004; Bert. Fl. it. IV, p. 358; Arc. Fl. it. p. 470.

« *Acer campestre*. *Sphendamnus Theophr.* *Acer candidum*. *Glimon gb.* *Theoph.* *Gallica Gal.* »

— *Acer montanum tenuissimis et acutis foliis*, Bauh. Pin. p. 431.

— Una sola foglia ben conservata.

— I nomi citati da Aldrovandi sono riferibili all'*Acer campestre* L. e non a questa specie. Vedasi Bauh. l. c.

— Coltivato e raramente spontaneo. Cocc. Fl. bol. p. 134.

60. [39 n. 4]. **Ceterach officinarum** Willd. — *Gymnogramme Ceterach*, Spl. *Grammitis Ceterach*, Pass. — *Scolopendrium Ceterach*, Smith. — *Asplenium Ceterach*, L. Sp. pl. I, 1080; Richter Cod. p. 1029; Bert. Fl. it. Cript. I, p. 37; Arc. Fl. it. p. 2.

« *Asplenium*. *Scolopendria*. *Ceterach Arab.* »

— *Asplenium*, Lob. St. obs. p. 470. *Cetrach* Caes. Plant. p. 535. *Ceterach officinarum*, Bauh. Pin. p. 354.

— Parecchie frondi ben conservate.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 557.

61. [40 n. 1]. **Aquilegia vulgaris** L. Sp. pl. I, p. 533 (*flore albo*); Richter Cod. p. 531; Bert. Fl. it. V, p. 428; Arc. Fl. it. p. 241.

« *Aquileja flore albo*. *Isopyron Columbo falso*. *Columbina*. *Leontostomi, sive Leo herba* Dod. »

— *Aquilegia*, Caes. Plant. p. 589. *Aquilina*, Lob. St. obs. p. 440. *Aquilegia sylvestris et hortensis*, Bauh. Prin. p. 144.

— Due foglie alquanto rovinate: infiorescenza affatto distrutta.

— Appennino Bolognese. Coltivasi nei giardini in molte varietà. Cocc. Fl. bol. p. 71.

62. [40 n. 2]. **Aquilegia vulgaris** L. (*flore coeruleo*). Vedasi numero precedente.

« *Aquileja flore coeruleo*. »

— Foglie discretamente conservate; fiori quasi distrutti.

63. [41 n. 1]. **Gratiola officinalis** L. Sp. pl. I, p. 17; Richter Cod. p. 32; Bert. Fl. it. I, p. 112; Parl. Fl. it. VI, p. 549; Arc. Fl. it. p. 399.

« *Gratia Dei Matthioli. Anagallis aquatica. Hyssopum montanum. Stanca cavallo. Gratiola V.* »

— *Gratiola*, Lob. St. obs. p. 238. Dod. Pempt. p. 362. *Gratia Dei*, Caes. Plant. p. 265. *Gratiola Centauroides*, Bauh. Pin. p. 279.

— Due esemplari con fiori e frutti, abbastanza ben conservati.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 364.

64. [41 n. 2]. **Veronica Anagallis** L. Sp. pl. I, p. 12; Richter Cod. p. 27; Bert. Fl. it. I, p. 70; Parl. Fl. it. VI, p. 501; Arc. Fl. it. p. 401.

« *Anagallis aquatica. Sion Cratervae*. »

— *Anagallis aquatica*, Lob. St. obs. p. 248. *Anagallis aquatica major*, Bauh. Pin. p. 252.

— Esemplare alquanto danneggiato.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 359.

65. [41 n. 3]. **Aconitum Napellus** L. Sp. pl. I, p. 532; Richter Cod. p. 529; Bert. Fl. it. V, p. 420; Arc. Fl. it. p. 244.

« *Aconitum cynoctocon. Cynoctonon*. »

— *Napellus*, Dod. Pempt. p. 442. *Napellus verus*, Lob. St. obs. p. 387. *Aconitum coeruleum, etc.*, Bauh. Pin. 183.

— Una sola foglia discretamente conservata.

— In Italia; nel Bolognese manca.

66. [42 n. 1]. **Salsola Soda** L. Sp. pl. I, p. 223; Richter Cod. p. 242; Bert. Fl. it. III, p. 54; Arc. Fl. it. p. 216.

« *Alkali*. »

— *Kali majus cochleato semine*, Bauh. Pin. p. 289. *Kali magnum*, Lob. St. obs. p. 214. Ado. p. 169.

— Due esemplari non fioriti alquanto dissimili; uno assai danneggiato.

— In Italia; nel Bolognese manca.

67. [42 n. 2]. **Carex pendula** Huds. — *Carex maxima*, Scop. — Bert. Fl. it. v. V, p. 145; Arc. Fl. it. p. 92.

« *Ampelodesmos. Stelephuros.* »

— Esemplare alquanto danneggiato.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 508.

68. [42 n. 3]. **Achillea Ageratum** L. Sp. pl. I, p. 897; Richter Cod. p. 846; Bert. Fl. it. IX, p. 388; Arc. Fl. it. p. 684.

« *Ageratom. Eupatorium. Mesues. Mentha corimbifera Cordi, Gesnero, Dod. Costus hortensis minor aliorum.* »

— *Agerathum*, Bob. p. 259. *Eupatorium Mesuae*, Trag. St. hist. p. 515. *Ageratum foliis serratis*, Bauh. Pin. p. 221. *Menta Corymbifera minor*, Cord. Hist. pl. p. 143.

— Esemplare ben conservato.

— Frequente nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 291.

69. [43]. **Sisymbrium Sophia** L. sp. pl. I, p. 659; Richter Cod. p. 639; Bert. Fl. it. VII, p. 65; Arc. Fl. it. p. 264.

« *Nasturtium Fuchsii. Absinthium Seriphium. Cordi Fuchsii. Sophia Chyrurgorum Pl. Thalictrum Dod. Accipitrina Gualteri.*

— *Accipitrina*, Caes. Plant. p. 361. *Seriphium absinthium*, Fuchs. Hist. st. p. 2. *Nasturtium sylvestre, etc.*, Bauh. Pin. p. 105. *Sophia chirurgorum*, Lob. Stirp. obs. p. 426. *Thalictrum*, Dalech. Hist. pl. p. 1146.

— Esemplare in frutto, abbastanza ben conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 89.

70. [44 n. 1]. **Artemisia Santonicum** L. ?

« *Absinthium Santonicum.* »

(Dall' indice).

— L'intera pagina è stata asportata, quindi non si può verificare la specie. Il nome *Absinthium Santonicum*, esistente nell'indice, corrisponderebbe, secondo Bauhinio e Linneo, a questa specie.

71. [44 n. 2]. **Artemisia Absinthium** L.?

« *Absinthium romanum vulgare.* »

(Dall' indice).

— Vedasi numero precedente.

72. [44 n. 3]. **Artemisia maritima** L.?

« *Absinthium marinum sive Seriphium.* »

(Dall' indice).

— Vedasi numero precedente.

L'indice nota pure col medesimo nome il Tom. 2, p. 247, ed il Tom. 5, p. 33. Ora quest'ultimo contiene realmente un esemplare di *Artemisia maritima*, ma il primo contiene un esemplare di *Artemisia coerulescens*, specie del resto assai affini fra loro.

73. [45 n. 1]. **Althaea cannabina** L. Sp. pl. I, p. 686; Richter Cod. p. 669; Bert. Fl. it. VII, p. 249; Arc. Fl. it. p. 340.

« *Alcea.* »

— *Alcea altera*, Caes. Plant. p. 562. *Alcea cannabina*, Bauh. Pin. p. 316.

— Esemplare discretamente conservato.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 127.

74. [45 n. 2]. **Malva moschata** L. Sp. pl. I, p. 690; Richter Cod. p. 672; Bert. Fl. it. VII, p. 265; Arc. Fl. it. p. 337.

« *Malva crispa.* »

— *Alcea folio rotundo laciniato*, Bauh. Pin. p. 316.

— Esemplare con fiori, moltissimo danneggiato.

— Il nome *Malva crispa* corrisponde, secondo Richter e Bauhinio, (ll. cc.), alla *Malva crispa* L. e non a questa specie.

— Appennino Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 124.

75. [46]. **Althaea officinalis** L. Sp. pl. I, p. 686; Richter Cod. p. 669; Bert. Fl. it. VII, p. 246; Arc. Fl. it. p. 339.

« *Althea. Ibiscus.* »

— *Althaea*, Fuchs. Hist. Pl. p. 15. *Althaea ibiscus*, Dod. Pempt. p. 655. *Vismalva*, Caes. Pl. p. 561.

— Due esemplari con frutti, alquanto danneggiati.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 126.

76. [47]. **Aristolochia Clematitis** L. Sp. pl. I, p. 962; Richter Cod. p. 907; Bert. Fl. it. IX, p. 647; Arc. Fl. it. p. 224.

« *Aristolochia Clematis.* »

— *Aristolochia Clematitis*, Clus. Hist. St. p. LXXI. Lob. St. obs. p. 332. Bauh. Pin. p. 307.

— Esemplare senza fiori, ben conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 420.

77. [48 n. 1]. **Androsaemum officinale** All. — *Hypericum Androsaemum*, L. Sp. pl. I, p. 784; Richter Cod. p. 757; Bert. Fl. it. VIII, p. 308; Arc. Fl. it. p. 333.

« *Siciliana. Periclymenum. Androsamon quib.* »

— *Androsaemum*, Caes. Pl. p. 395. Dod. Pempt. p. 78. *Androsaemum maximum*, etc., Bauh. Pin. p. 280. *Clymenon italarum*, etc., Lob. st. obs. p. 357. *Siciliana*, etc., Bauh. Hist. pl. III, p. 383.

— Esemplare non fiorito, poco danneggiato.

— Nell'Appennino Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 131.

78. [48 n. 2]. **Lathyrus annuus** L. Sp. pl. II, p. 1032; Richter Cod. p. 713; Bert. Fl. it. v. VII, p. 456; Arc. Fl. it. p. 520.

« *Arachus.* »

— *Lathyri species lutea*, Bauh. Hist. II, p. 304.

— Piccolo esemplare con frutti, discretamente conservato.

— Il nome *Aracus* spetta, piuttosto che a questa specie, ai *Lathyrus sativus* L. e *Cicera* L. Vedasi Richter l. c.

— Frequente nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 175.

79. [49]. **Acanthus mollis** L. Sp. pl. I, p. 639; Richter Cod. p. 620; Bert. Fl. it. VI, p. 458; Arc. Fl. it. p. 445.

« *Acanthus mollis*, Verg. *Marmoraria*, *Vitruvi*, *Pederota*. *Diosc.* »

— *Acanthus sativus vel mollis Vergilii*, Bauh. Pin. p. 383. *Acanthus vulgo Brancaursina*, Caes. Plant. p. 333.

— Due foglie abbastanza ben conservate, ed una parte di infiorescenza con fiori assai danneggiati.

— In Italia; nel Bolognese manca; qualche volta coltivasi nei giardini.

80. [50]. **Cirsium Erisithales** Scop. — *Cnicus Erisithales*, L. Sp. pl. II, p. 1157. — *Carduus Erisithales*, Jacq.; Richter Cod. p. 789; Bert. Fl. it. IX, p. 19; Arc. Fl. it. p. 727.

« *Acanthus montana seu Branca Ursina sylvestris*. *Spina incognita*, *Fuchsii*. *Spina peregrina*, *Dodonaei*. *Tetralix spinosa*, Pl. *Chamaeleon niger*, Tragi. *Carduus pratensis*, Tragi. *Aeritalis*, Pl. *Brassica pratensis*, German. »

— *Carduus pratensis foliis tenuibus laciniatis*, Bauh. Pin. p. 376. *Erisithales*, Dalech. Hist. pl. p. 1094.

— Una foglia ed un ramo con fiori, alquanto danneggiati.

— Nell'elevato Appennino Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 277.

81. [51 n. 1]. **Centaurea solstitialis** L. Sp. pl. I, p. 917; Richter Cod. p. 862; Bert. Fl. it. IX, p. 475; Arc. Fl. it. p. 714.

« *Aconum alind*. *Spina solstitialis*. »

— *Spina solstitialis*, Dod. Pempt. p. 734. Lob. St. adv. p. 372. *Cacatreppola altera*, Caes. Plant. p. 536.

— Esiste una tavoletta, solo disegnata, rappresentante questa specie, col nome *Solstitialis simillima*.

— Esemplare ben conservato.

— Frequente nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 278.

82. [51 n. 2]. **Centaurea Calcitrapa** L. Sp. pl. I, p. 917; Richter Cod. p. 862; Bert. Fl. it. IX, p. 483; Arc. Fl. it. p. 716.

« *Carduus stellatus* Dod. *Aconum* Pl. *Polyacantha Cordi Ruellii*. *Tribulus terrestris* Theoph. *Spina alba vera Rondeletii*. *Calcitrapa*. An *Myacanthos* Theoph.? Lob. *Hippophaes*. *Columbo ineptissime*. »

— *Cacatreppola*, Caes. Plant. p. 535. *Carduus stellatus*, Dod. Pempt. p. 733. Lob. St. obs. p. 482. *Carduus muricatus*, Clus. St. hist. p. 7. *Polyacantha*, Cord. hist. p. 21.

— Due piccoli esemplari, alquanto dissimili, avvicinati; uno di essi assai danneggiato.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 278.

83. [52 n. 1]. **Orobis varius** Willd. — *Orobis versicolor*, Gm. — *Orobis albus*, L. fil. var. — *Orobis pannonicus*, Jac. var. — *Lathyrus asphodeloides*, Gr. var.; Bert. Fl. it. VII, p. 431; Arc. Fl. it. p. 522.

« *Apio Fuchsii congener*. »

— Esemplare in frutto assai ben conservato.

— Non raro nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 178.

84. [52 n. 2]. **Asphodelus albus** Willd.; Bert. Fl. it. IV, p. 122; Arc. Fl. it. p. 140.

« *Asphodelus fl. albo*. »

— *Asphodelus albus non ramosus*, Bauh. Pin. p. 28. *Asphodelus major albus*, Lob. St. obs. p. 16. *Asphodelos alter*, Clus. Hist. p. 197. *Asphodelus caule simplici*, Caes. Plant. p. 415.

— Foglie ed infiorescenza con fiori moltissimo danneggiati.

— Alto Appennino Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 463.

85. [53 n. 1]. **Alnus glutinosa** Gaert. *Betula Alnus* var. *glutinosa*, L. Sp. pl. I, p. 983; Richter Cod. p. 931; Bert. Fl. it. X, p. 163; Arc. Fl. it. p. 179.

« *Alnus*. »

— *Alnus*, Caes. Plant. p. 39. Dod. Pempt. p. 839. *Alnus vulgaris*

Bauh. Hist. pl. v. 1, p. 151. Clus. Hist. st. p. 12. — *Alnus rotundifolia glutinosa viridis*, Bauh. Pin. p. 428. — *Amedanus*, Cresc. in Bauh. l. c.

— Esempiare ben conservato con foglie e frutti; piccolo rametto con amenti, alquanto danneggiati.

— Frequente anche nel Bolognese. Coltivasi sovente. Cocc. Fl. bol. p. 442.

86. [53 n. 2]. **Hypericum tetrapterum** Fr. Vedi n. 17.

« *Aphaca sylvestris*. »

— Vedasi n. 17.

— Vedasi n. 17.

— Il nome *Aphaca sylvestris* è riferibile al *Lathyrus Aphaca* L. e non a questa specie.

— Piccolo ramo con sole foglie, in buon stato.

87. [53 n. 3]. **Abies pectinata** DC. — *Pinus picea*, L. Sp. pl. I, p. 1001; Richter Cod. p. 947; Bert. Fl. it. X, p. 270; Arc. Fl. it. p. 16.

« *Abies foemina*. »

— *Abies foemina*, Bauh. Hist. pl. v. 1, p. 231. — *Abies conis sursum spectantibus sive mas*, Bauh. Pin. p. 505.

— Piccolissimo frustolo, con sole foglie, assai danneggiato.

— Anche nell'elevato Appennino Bolognese; sovente coltivasi nei giardini. Cocc. Fl. bol. p. 447.

88. [54 n. 1]. **Mentha piperita** L. Sp. pl. p. 576. var. Richter Cod. p. 564. Arc. Fl. it. p. 421.

— Quattro esemplari, discretamente conservati.

— Specie ritenuta dai moderni autori quale ibrido fra la *Mentha viridis*, L. e la *Mentha aquatica*, L.

— Coltivasi spesso nei giardini e sovente inselvaticita. Cocc. Fl. bol. p. 376.

89. [54 n. 2]. **Cirsium Lobelii** Ten. Fl. Neap. IV, p. 118. — *Cnicus*

18. *Malpighia*, anno XII, vol. XII.

eriphorus Sp. pl. I, p. 823 sub *Carduo* var. Bert. Bert. Fl. it. v. IX, p. 26. Arc. Fl. it. p. 723.

« *Acanthus sylvestris*. »

— *Phoenix Leo sive Cardus ferox*, Lob. obs. st. p. 485. — *Leo vel Carduus ferox*, Dod. Pempt. p. 738. — *Carduus ferox*, Dalech. Hist. pl. p. 1489. — *Acarnae affinis, Leo ferox flore pallido*, Bauh. Pl. hist. v. 3, p. 92. — *Acarna minor caule non folioso*, Bauh. Pin. p. 379.

— Una sola foglia discretamente conservata.

— Linneo non fa menomamente menzione di questa specie, nè dei diversi sinonimi degli antichi autori. Oltre alla figura ed alle descrizioni di Lobelio e degli autori ad esso posteriori, la località stessa citata da Lobelio, cioè nei colli ai piedi degli Appennini, ci persuade trattarsi realmente di questa specie e non del *Cirsium ferox* DC. il quale è esclusivo dei luoghi alpini.

— In Italia; nel Bolognese non ancora rinvenuto.

90. [55]. **Ammi majus** L. Sp. pl. I, p. 243. — *Apium Ammi-majus*, Crantz. Richter Cod. p. 259; Bert. Fl. it. III, p. 252; Parl. Fl. it. VIII, p. 439; Arc. Fl. it. p. 592.

« *Ammi vulgare Fuchsii*. »

— *Ammi*, Fuchs. Hist. st. p. 66. — *Ammi vulgare*, Dod. Pempt. p. 301. — *Ammi vulgatus*, Lob. St. obs. p. 415. — *Ammi majus*, Bauh. Pin. p. 159.

— Esemplare alquanto danneggiato.

— Raro nel Bolognese. Cocc. Fl. p. 243.

91. [56 n. 1]. **Stratiotes aloides** L. Sp. pl. I, p. 535; Richter Cod. p. 532; Bert. Fl. it. V, p. 441; Parl. Fl. it. III, pag. 580; Arc. Fl. it. p. 109.

« *Aloe palustris. Stratiotes aquatica*. »

— *Aloe palustris*, Bauh. Pin. p. 286. — *Stratiotes aquaticus*, Dalech. Hist. pl. p. 1061; Lob. St. obs. p. 204.

— Quattro foglie; due ben conservate, la terza alquanto danneggiata, una infine ridotta alla sola impronta.

— A Mantova e Ferrara: nel Bolognese manca.

92. [56 n. 2]. **Artemisia vulgaris** L. Sp. pl. I, p. 848; Richter Cod. p. 807; Bert. Fl. it. IX, p. 126; Arc. Fl. it. p. 688.

« *Arthemisia latifolia Fuchsii.* »

— *Artemisia latifolia*, Fuchs. Hist. st. p. 44. — *Artemisia vulgaris*, Caes. Plant. p. 478. Bauh. Pin. p. 137.

— Esemplare discretamente conservato.

— Frequente nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 295.

93. [57 n. 1]. **Celosia cristata** L. Sp. pl. I, p. 205; Richter Cod. p. 224; DC. Prodr. XIII, 2, p. 242. (var. *spicis haud dilatatis*).

« *Amaranthus purpureus.* »

— *Amaranthus purpureus saturo coccineus*, Lob. St. adv. p. 95.

— *Amaranthus panicula conglomerata*, Bauh. Pin. p. 121.

— Esemplare ben conservato.

— Coltivasi nei giardini, specialmente in varietà ad infiorescenza, assai dilatato - compressa.

94. [57 n. 2]. **Aster Amellus** L. Sp. pl. I, p. 873; Richter Cod. p. 826; Bert. Fl. it. IX, p. 255; Arc. Fl. it. p. 665.

« *Aster atticus verus. Amellus Verg. Conyzoides coerulea seu Dentelaria. Tinctorius flos Tragi. Tereigeron dici potest.* »

— *Aster atticus*, Fuchs. Hist. st. p. 134. Dod. Pempt. p. 266. Bauh. Pin. p. 267. — *Aster italorum*, Lob. St. obs. p. 188.

— Esemplare multifloro assai ben conservato.

— Recentemente rinvenuto anche nel Bolognese. Vedasi Mattei: *Aggiunte alla Flora bolognese*, p. 17 e 18.

95. [58]. **Celosia cristata** (var. *spicis haud dilatatis*). Vedasi n. 57 1.º.

« *Amaranthus purpureus alter.* »

— Vedasi n. 57 1.º

— Esemplare assai ben conservato.

96. [59]. **Cinara horrida** Ait. *Cynara spinosissima*, Presl.; Bert. Fl. it. IX, p. 46.

« *Acanthus montana*. »

— Sola foglia, ben conservata. Confrontata per la determinazione con esemplari dell'Erbario del R. Istituto Botanico di Torino.

— Ritenuta da alcuni per la forma spontanea dalla quale sarebbero derivate la *Gynara Cardunculus*, L. (volg. *Cardo*) e la *Gynara Scolymus*, L. (volg. *Carciofo*); però bene distinta da entrambe.

— In Italia; nel Bolognese manca.

97. [60]. **Phragmites communis** — Trin. *Arundo Phragmites*, L. Sp. pl. I, p. 81; Richter Cod. p. 93; Bert. Fl. it. I, p. 741; Parl. Fl. it. I, p. 220; Arc. Fl. it. p. 36.

« *Arundinis species. Characias seu vallis vel Phragmites*. »

— *Arundo vulgaris sive Phragmites*, Bauh. Pin. p. 17. — *Arundo vallis*, Lob. St. oas. p. 28. — *Arundo Phragmites*, Dod. Pempt. p. 602.

— Esemplare con infiorescenza e foglie, ben conservato.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 528.

98. [61 n. 1]. **Statice Limonium** L. Sp. pl. I, p. 274; Richter Cod. p. 292; Bert. Fl. it. III, p. 514; Arc. Fl. it. p. 458.

« *Ben rubrum Cordi. Marus officin. Tripolium quibusd. perperam. Limonium Matthioli*. »

— *Ben rubrum*, Cord. Op. p. 250. — *Limonium*, Matth. Op. p. 695. Caes. Plant. p. 166; Lob. St. obs. p. 157. — *Limonium maritimum majus*, Bauh. Pin. p. 192.

— Esemplare in fiore assai bene conservato. Vi si trova unita una foglia non appartenente a questa specie, forse riferibile ad un *Verbascum*.

— Frequente in Italia: nel Bolognese non riscontrato, benchè copioso nelle provincie finitime.

99. [61 n. 2]. **Calystegia Soldanella** Roëm et Schult. — *Convolvulus Soldanella*, L. Sp. pl. I, p. 149; Richter Cod. p. 174; Bert. Fl. it. II, p. 451; Parl. Fl. it. VI, p. 797; Arc. Fl. it. p. 373.

« *Brassica marina. Soldanella*. »

— *Brassica marina*, Cord. Hist. pl. p. 205. Ang. Simpl. p. 113. Matth.

Op. p. 368. — *Soldanella*, Caes. Plant. p. 384. Dod. Pempt. p. 395. Bauh. Hist. pl. 2, p. 116. — *Soldanella maritima minor*, Bauh. Pin. p. 295.
 — Due foglie: una ben conservata, l'altra ridotta alla sola impronta.
 — In Italia, nelle arene marittime; nel Bolognese manca.

100. [62 n. 1]. **Leucanthemum vulgare** DC. — *Chrysanthemum Leucanthemum*, L. Sp. pl. I, p. 888. — *Matricaria Leucanthemum*, Scop. Richter Cod. p. 839; Bert. Fl. it. IX, p. 326; Arc. Fl. it. p. 675.

« *Bellis major Plinii*. »

— *Bellis major*, Caes. Plant. p. 494. Fuchs. Hist. st. p. 148. Bauh. Hist. pl. v. 3, p. 114; Lob. St. obs. p. 253; Dod. Pempt. p. 265. — *Bellis sylvestris major*, Bauh. Pin. p. 261.

— Esemplare assai rovinato.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 293.

101. [62 n. 2] **Ajuga reptans** L. Sp. pl. I, p. 561. — *Bugula reptans*, All. Richter Cod. p. 554; Bert. Fl. it. VI, p. 9; Parl. Fl. it. VI, p. 309; Arc. Fl. it. p. 443.

« *Butannica alia. Herba S. Laurentii. Amethystos Plinii. Consolida media Matth. Solidago media.* »

— *Consolida media*, Fuchs. Hist. st. p. 391. — *Consolida media pratensis coerulea*, Bauh. Pin. p. 260. — *Bugula*, Dod. Pempt. p. 135.

— Due esemplari: uno florifero assai danneggiato, l'altro composto di sole quattro foglie, pure rovinate.

— Comune nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 390.

102. [63 n. 1]. **Verbascum Blattaria** L. Sp. pl. I, p. 178; Richter Cod. p. 192; Bert. Fl. it. II, p. 586; Parl. Fl. it. VI, p. 579; Arc. Fl. it. p. 392.

« *Blattaria flore luteo.* »

— *Blattaria*, Dod. Pempt. p. 145. Fuchs. Hist. st. p. 183. Lob. St. obs. p. 304. — *Blattaria lutea, etc.*, Bauh. Pin. p. 240. — *Verbascum nolum*, Caes. Plant. p. 347.

— Esemplare moltissimo rovinato.

— Comunissimo nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 356.

103. [63 n. 2]. **Anchusa italica** Retz.; Richter Cod. p. 150. Bert. Fl. it. II, p. 289; Parl. Fl. it. VI, p. 891; Arc. Fl. it. p. 382.

« *Buglossum. Anchusa. Lycopsis.* »

— *Buglossa, quasi lingua bovina*, Caes. Plant. p. 432. — *Alchusa Alcibiadion*, Dod. Pempt. p. 629.

— Esemplare danneggiato.

— Comune nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 344.

104. [63 n. 3]. **Borrago officinalis** L. Sp. pl. I, p. 137; Richter Cod. p. 154; Bert. Fl. it. II, p. 330; Parl. Fl. it. VI, p. 883; Arc. Fl. it. p. 382.

« *Borago.* »

— *Borrago*, Caes. Plant. p. 433. — *Buglossum latifolium sive Borrago*, Bauh. Pin. p. 256.

— Esemplare discretamente conservato.

— Comunissima nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 344.

[64]. Come per la p. n. 19, anche per questo numero non esiste alcun foglio corrispondente, forse per errore di numerazione, non trovandosi neppure nell' indice dell' Erbario indicato questo numero.

105. [65. n. 1]. **Amaranthus Blitum** L. Sp. pl. I, p. 990; Richter Cod. p. 937; Bert. Fl. it. X, p. 187; Arc. Fl. it. p. 207.

« *Blitum nigrum.* »

— *Blitum album minus*, Bauh. Pin. p. 118.

— Ben conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 404.

106. [65 n. 2]. **Balsamina hortensis** DC. — *Impatiens Balsamina*, L. Sp. pl. I, p. 938; Richter Cod. p. 883.

« *Balsamina foemina.* »

— *Balsamina foemina*, Bauh. Pin. p. 306; Lob. St. obs. p. 172.

— Pianta con fiori alquanto danneggiata.

— Forma a foglie alquanto più strette ed a fiori più piccoli (con sperone assai allungato) che nelle varietà ortensi ora coltivate.

— Coltivasi nei giardini. Originario delle Indie.

107. [65 n. 3]. **Momordica Balsamina** L. Sp. pl. I, p. 1009; Richter Cod. p. 956.

« *Balsamina mas cucumerina. Charanza Ital.* »

— *Balsamina rotundifolia repens sive mas*, Bauh. Pin. p. 306. — *Balsamina cucumerina*, Bauh. Hist. pl. 2, p. 251. — *Balsamina aliis Caranza*, Caes. Plant. p. 199. — *Charantia*, Dod. Pemp. p. 670.

— Due sole foglie assai rovinate.

— Col nome di *Caranza* o *Caranzia* gli orticoltori italiani indicano la *Momordica Charantia*, L. e non questa specie, la quale, del resto, è assai raramente coltivata da noi.

— Originaria delle Indie; coltivasi nei giardini.

108. [66 n. 1]. **Berberis vulgaris** L. Sp. pl. I, p. 330; Richter Cod. p. 341; Bert. Fl. it. IV, p. 222; Arc. Fl. it. p. 245.

« *Uva ursi Gal. Berberis.* »

— *Crespinus sive Berberis*, Caes. Pl. p. 99. — *Berberis dumetorum*, Bauh. Pin. 454. — *Berberis vulgaris*, Clus. Hist. st. p. 120.

— Esemplare non fiorito ben conservato;

— Indicato anche pel Bolognese; coltivasi sovente nei giardini. Cocc. Fl. bol. p. 73.

109. [66 n. 2]. **Buxus sempervirens** L. Sp. pl. I, p. 983; Richter Cod. p. 931; Bert. Fl. it. X, p. 166; Arc. Fl. it. p. 197.

« *Buxus.* »

— *Buxus*, Caes. Plant. p. 126. Dod. Pempt. p. 782. Bauh. Pin. p. 471.

— Esemplare non fiorito, assai bene conservato.

— Raro nell'elevato Appennino Bolognese; coltivasi spesso nei giardini. Cocc. Fl. bol. p. 420.

110. [66 n. 3]. **Amaranthus** (?).

« *Blitum rubrum* »

— Una sola foglia ben conservata.

111. [67]. **Scutellaria Columnae** All.; Bert. Fl. it. VI, p. 246; Parl. Fl. it. VI, p. 320; Arc. Fl. it. p. 432.

« *Betonica*. »

— *Lamium peregrinum* dice *Scutellaria*, Bauh. Pin. p. 231.

— Esisto una tavoletta solo disegnata, rappresentante questa specie col nome *Scutellaria major*.

— Un esemplare alquanto danneggiato. È stata tagliata metà della pagina ed esportato l'esemplare che conteneva, certamente della stessa specie, come si può ancora rilevare dall'indice, il quale a questo numero non assegna alcuna altra specie.

— Pare che Linneo (Sp. pl. II, p. 836) col nome di *Scutellaria peregrina* L., abbia voluto indicare realmente questa specie, come risulta ancora dalla località che adduce e dai sinonimi di *Columna*, ecc. Vedasi Caruel in Parl. l. c., il quale per la *Scutellaria peregrina*, degli autori moderni propone il nome di *Scut. Linneana*.

— Piuttosto frequente nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 383.

112. [68]. **Cota tinctoria** Gay. — *Anthemis tinctoria*, Sp. pl. I, p. 896; Richter Cod. p. 846; Bert. Fl. it. IV, p. 385; Arc. Fl. it. p. 680.

« *Buphtalmus*. »

— *Buphtalmum*, Trag. St. hist. p. 152. *Buphtalmum vulgare*, Clus. Hist. st. p. 332. — *Buphtalmum tanacetifolius*, Bauh. Pin. p. 134. — *Chamaemelum chrysanthemon*, Fuchs. Hist. p. 26.

— Tre esemplari avvicinati bene conservati.

— Comune nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 290.

113. [69]. **Spiraea Aruncus** L. Sp. pl. I, p. 490; Richter Cod. p. 495; Bert. Fl. it. v. V, p. 180; Arc. Fl. it. p. 534.

« *Barba caprae*. *Ulmaria*. *Regina prati*. »

— *Barba caprae*, Fuchs. Hist. pl. p. 181. Bauh. Pin. p. 163. Dalech. Hist. st. p. 180.

— Esemplare con foglie e fiori, moltissimo rovinato.

— I nomi *Regina prati*, Dod. ed *Ulmaria*, Clus., Bauh., sono riferiti alla *Spiraea Ulmura* L. Vedasi Bauh. Pin. l. c.

— Nell'alto Appennino Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 190.

114. [70]. **Capsella Bursapastoris** Moench. var. *rubella*, Reut. — *Thlaspi Bursa-pastoris*, L. Sp. pl. I, p. 647; Richter Cod. p. 628; Bert. Fl. it. VI, p. 533; Arc. Fl. it. p. 279.

« *Bursa pastoris*. »

— *Bursa pastoris*, Caes. Plant. p. 365. Fuchs, Hist. st. p. 611. Bauh. Pin. p. 108. Lob. St. obs. p. 110. Dod. Pempt. p. 103.

— Esemplare poco danneggiato.

— Volgarissima nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 92.

115. [71]. **Chenopodium Botris** L. Sp. pl. I, p. 219; Richter Cod. p. 240; Bert. Fl. it. III, p. 35; Arc. Fl. it. p. 213.

« *Botris*. »

— *Botrys*, Caes. Plant. p. 158. Dod. Pempt. p. 34. Dalech. Hist. st. p. 952. — *Botrys Ambrosioides vulgaris*, Bauh. Pin. p. 138.

— Bene conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 409.

116. [72 n. 1]. **Clinopodium vulgare** L. Sp. pl. I, p. 590. — *Calamintha Clinopodium*, Bent. — *Melissa Clinopodium*, D. Not. — *Satureia Clinopodium*, Caruel.; Richter Cod. p. 574; Bert. Fl. it. VI, p. 192. Parl. Fl. it. VI, p. 135; Arc. Fl. it. p. 426.

« *Betonica Pauli* Aeg. *Clinopodium* Matth. *Origanum foemina Leoniceri*. »

— *Clinopodium Matthioli*, Clus. Hist. st. p. 334. — *Clinopodium origano simile*, Bauh. p. 224. — *Acinos*, Lob. St. obs. p. 269.

— Ben conservato.

— Comune nel Bolognese. Cocc. Fl. Bol. p. 378.

117. [72 n. 2]. **Melissa altissima** Sibth. Smith. — *Melissa cordifolia*, Pers. *Melissa graveolens*, Host. — *Melissa officinalis*, L. Sp. pl. I, p. 592. var.; Richter Cod. p. 577; Bert. Fl. it. VI, p. 229; Parl. Fl. it. VI, p. 147; Arc. Fl. it. p. 427.

« *Ballote. Marrubium nigrum*. »

— *Melissa*, Caes. Plaut. p. 446. *Melissa hortensis*, Bauh. Pin p. 229. *Apiastrum sive Melissa ophyllum*, Lob. St. obs. p. 277.

— Ben conservato.

— I nomi citati dall'Adrovandi spettano alla *Ballota nigra*, L. e non a questa specie. Vedasi Richter Cod. p. 570.

— Frequente nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 380.

118. [72 n. 3]. **Tragopogon pratense** L. Sp. pl. I, p. 789; Richter Cod. p. 763; Bert. Fl. it. VIII, p. 344; Arc. Fl. it. p. 741.

— *Tragopogon*, Caes. Plant. p. 517. Fuchs. Hist. pl. p. 821. — *Tragopogon pratense luteum majus*, Bauh. Pin. p. 274.

— Esemplare discretamente conservato.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 309.

119. [72 n. 4]. **Podospermum Jacquinianum** Koch. Flor. germ. p. 425. — *Scorzonera laciniata*, Jacq. non L.; Bert. Fl. it. VIII, p. 369; Arc. Fl. it. p. 741.

« *Tragopogon*. »

— *Tragopogon laciniatum luteum*, Bauh. Pin. p. 274.

— Due esemplari completamente rovinati, quasi ridotti alla sola impronta.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 308.

120. [73]. **Myagrum perfoliatum** L. Sp. pl. I, p. 640; Richter Cod. p. 622; Bert. Fl. it. VI, p. 609; Arc. Fl. it. p. 285.

« *Brassica sylvestris*. *Brassica canis*. *Isatis sylvestris quib.* »

— *Myagrum monospermum latifolium*, Bauh. Pin. p. 109.

— Discretamente conservato.

— Col nome di *Brassica sylvestris*, sono indicato alcune specie di *Brassica* o di *Arabis*. Vedansi Richter et Bauh. ll. cc.

— Frequente nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 93.

121. [74]. **Betula alba** L. Sp. pl. I, p. 982; Richter Cod. p. 930; Bert. Fl. it. X, p. 228; Arc. Fl. it. p. 180.

« *Betula Plinii*. »

— *Betulla Plinii*, Caes. Plant. p. 121. — *Betula*, Bauh. Pin. p. 427. Dod. Pempt. p. 839. Lob. St. obs. p. 607. Dalech. Hist. pl. p. 92.

— Due esemplari con sole foglie, assai ben conservati.

— Indicata anche per il Bolognese. Coltivasi nei giardini. Cocc. Fl. bol. p. 443.

122. [75]. **Betonica officinalis** L. Sp. pl. I, p. 573. — *Stachys Betonica* Benth.; Richter Cod. p. 567; Bert. Fl. it. VI, p. 135; Parl. Fl. it. VI, p. 165; Arc. Fl. it. p. 435.

« *Betonica rubra*. »

— *Betonica* Caes. Plant. p. 444. Fuchs. Hist. pl. p. 350. Lob. St. obs. p. 286. — *Betonica purpurea* Bauh. Pin. p. 235.

— Un esemplare in fiore, uno in frutto ed una foglia, abbastanza ben conservati.

— Comune nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 384.

123. [76]. **Butomus umbellatus** L. Sp. pl. I, p. 372; Richter Cod. p. 387; Bert. Fl. it. IV, p. 402; Parl. Fl. it. III, p. 589; Arc. Fl. it. p. 108; Ces. Pass. Gib. Fl. it. p. 197.

« *Butomos Theophr.* *Juncus aquaticus*. *Holoschaenos Guilandini*. *Juncus floridus*. »

— *Butomus Theophrasti*, Caes. Plant. p. 553. — *Juncus floridus major*, Bauh. Pin. p. 12. — *Juncus cyperoides floridus paludosus*, Lob. St. obs. p. 44.

— Infiorescenza alquanto danneggiata.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 450.

124. [77 n. 1]. **Leucanthemum vulgare** DC. Vedasi N. 62 n. 1.

« *Bellis minor*. »

— Vedasi n. 62 n. 1.

— Forma atipica, minore in ogni sua parte, quale si rinviene in esemplari stati tagliati.

— Piccolo esemplare moltissimo danneggiato.

125. [77 n. 2]. **Bellis sylvestris** Cyrill.; Bert. Fl. it. IX, pag. 317; Arc. Fl. it. p. 666.

« *Bellion.* »

— *Bellis media*, Matth. Op. p. 653. — *Bellis sylvestris*, Dod. Pempt. p. 265.

— Trovasi tavoletta disegnata che pare rappresenti questa specie, col nome: *Bellidis majori congener*. T. 5. c. 291.

— Pare che Linneo abbia confuso questa specie col *Bellidiastrum Micheli*. Cass. Vedasi Richter l. c.

— Due esemplari alquanto dissimili: uno ben conservato.

— Recentemente rinvenuto anche nel Bolognese. V. Mattei Aggiunte Fl. Bol. p. 18.

126. [78]. *Cichorium Intybus* L. Sp. pl. I, p. 813 var. **sativum**; Richter Cod. p. 782; Bert. Fl. it. VIII, p. 588; Arc. Fl. it. p. 732.

« *Blattariae* » sp.

— *Cichorium*, Caes. Plant. p. 506. — *Cichorium sativum*, Bauh. Pin. p. 125. — *Cichorium domesticum*, Matth. Op. p. 387. — *Seris sativa*, Lob. St. obs. p. 114.

— Due sole foglie, bene conservate.

— Col nome di *Blattaria* gli antichi autori indicavano le specie del genere *Verbascum*. Vedasi *Bauhinio* Pinax p. 240.

— Volgarissimo nel Bolognese, coltivasi negli orti. Cocc. Flor. bol. p. 304.

127. [79 n. 1]. *Capparis rupestris* Sibth. Sm.; Bert. Fl. it. V, p. 302; Arc. Fl. it. p. 286.

« *Capparis sine spinis.* »

— *Capparis italica*, Caes. Plant. p. 568.

— Esemplare alquanto danneggiato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. pag. 98.

128. [79 n. 2]. *Cyclamen neapolitanum* Ten. — *Cyclamen hederifolium*, Bert.; Richter Cod. p. 161. cum *C. europaeo* L.; Bert. Fl. it. II, p. 403; Arc. Fl. it. p. 455.

« *Cyclaminus.* »

— *Cyclaminus vulgo Panporcinus*, Caes. Plant. p. 392. — *Cyclamen hederæ folio*, Bauh. Pin. p. 308.

— Due fiori e due foglie, bene conservati.

— Forma a foglie non angolose, quale pure si rinviene sovente anche nel Bolognese.

— Frequente nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. pag. 393.

129. [79 n. 3]. **Cardamine asarifolia** L. Sp. pl. I, p. 654; Richter Cod. p. 635; Bert. Fl. it. VII, p. 11; Arc. Fl. it. p. 259.

« *Crescion majus. Sisymbrium aliud.* »

— Due sole foglie, alquanto danneggiate.

— Nell'alto Appennino Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 83.

130. [79 n. 4]. **Teucrium Botrys** L. Sp. pl. I, p. 562; Richter Cod. p. 554; Bert. Fl. it. VI, p. 17; Parl. Fl. it. VI, p. 297; Arc. Fl. it. p. 443.

« *Chamaedrys prima Fuchsii.* »

— *Chamaedrys vera foemina*, Fuchs. Plant. hist. p. 870. — *Botrys chamaedryoides*, Bauh. Pin. p. 138

— Piccolo esemplare discretamente conservato.

— Delle tre specie di *Chamaedrys* che descrive Fuchsio, l. c. la prima è il *Teucrium Chamaedrys* L., la seconda è questa specie; la terza è una *Veronica*.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 389.

131. [80 n. 1]. **Rhus Cotinus** L. Sp. pl. I, p. 267. — *Cotinus Coggyria*, Scop.; Richter Cod. p. 283; Bert. Fl. it. III, p. 479; Arc. Fl. it. p. 466.

« *Cotinos Pl. Chrysoxylon. Thapsos in com. Theocr.* »

— *Scotanum*, Caes. Plant. p. 75. — *Cocconilea seu Coccygria*, Bauh. Pin. p. 415.

— Esemplare discretamente conservato.

— Comune nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 147.

132. [80 n. 2]. **Juniperus Sabina** L. Sp. pl. I, p. 1039; Richter Cod.

p. 985; Bert. Fl. it. X, p. 387; Arc. Fl. it. p. 17.

« *Cupressus foemina*. »

— *Sabina*, Dod. Pempt. p. 854. Lob. St. obs. p. 625. — *Sabina folio cupressi*, Bauh. Pin. p. 487.

— Esemplare con sole foglie, ben conservate.

— Cæsalpino De Plantis. Lib. III, 134 e 135 parla di un *Cupressus foemina* che, secondo l'indicazione di Richter Cod. p. 948, dovrebbe essere il *Cupressus sempervirens* Lin.

— Luoghi alpestri d'Italia: nel Bolognese manca: qualche volta coltivasi.

133. [81 n. 1]. ***Vicia bythinica*** L. Sp. pl. II, p. 1038. — *Lathyrus bithynicus* Lmk.; Richter Cod. p. 716; Bert. Fl. it. VII, p. 459; Arc. Fl. it. p. 528.

« *Cicercula sylv^{is}*. »

— Esemplare in frutto, ben conservato.

— Anche nel Bolognese, Cocc. Flor. bol. p. 181.

134. [81 n. 2]. ***Lathyrus Ochrus*** DC. — *Pisum Ochrus* L. Sp. pl. I, p. 727; Richter Cod. p. 711; Bert. Fl. it. VII, p. 442; Arc. Fl. it. p. 518.

« *Cicercula sylv. alia*, *Ochrus sive Ervilia*, Lob. *Aracus niger*. *Ervilia sylv^{is}* Dod. »

— *Ochrus sylvestris sive Ervilia*, Lob. St. obs. p. 516. *Aracus niger*, Matth. Op. p. 338. *Ervilia sylvestris*, Dod. Pempt. p. 522. *Ochrus folio integro capreolos emittente*, Bauh. Pin. p. 343.

— Esiste una tavoletta incisa rappresentante questa specie col nome: *Ervilia species* T. obs. 267.

— Esemplare assai bene conservato.

— In Italia, nel Bolognese manca.

135. [82 n. 1]. ***Lathyrus Aphaca*** L. Sp. pl. I, p. 729; Richter Cod. p. 712; Bert. Fl. it. VII, p. 439; Arc. Fl. it. p. 518.

« *Cicercula sylv^{is} alia*. *Perfoliatum aliquibus*. *Pityne Theoph. Anguillarae*. *Aphaca* Lob. et Dodon. *Orobanche legumen*. »

— *Aphaca*, Caes. Plant. p. 236. Lob. St. obs. p. 518, *Pitine di Theofrasto*, Anguill. Sempl. p. 183.

— Esemplare ben conservato.

— Comunissimo nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 174.

136. [82 n. 2]. **Rosa sp.** con galla (Bedeguar) prodotta dal *Rhodites Rosae*.

« *Cynorhodos*. »

— Piccolo esemplare alquanto danneggiato.

— Questo tipo di galla è anche nel Bolognese assai comune.

137. [83 n. 1]. **Senecio crucifolius** L. Sp. pl. I, p. 869, teste Richter. — *Senecio tenuifolius*, Bert.; Richter Cod. p. 823; Bert. Fl. it. IX, p. 233; Arc. Fl. it. p. 669.

« *Cineraria falsa Verbenaca recta aliis*. »

— *Jacobaea incana altera*, Bauh. Pin. p. 131.

— Esemplare non fiorito assai ben conservato.

— Frequente nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 298.

138. [83 n. 2]. **Cineraria maritima** L. Sp. pl. II, p. 1244. — *Senecio Cineraria*, DC.; Richter Cod. p. 831; Bert. Fl. it. IX, p. 294; Arc. Fl. it. p. 672.

« *Cineraria vera. Chrysocome quibusd.* »

— *Cineraria*, Dod. Pempt. p. 642. *Jacobaea maritima*, Bauh. Pin. p. 131.

— Esemplare fiorito assai ben conservato.

— In Italia, lungo il litorale. Nel Bolognese manca. Coltivasi sovente nei giardini.

139. [84 n. 1]. **Cucurbita Pepo** Ser. (L. sp. pl. I, p. 1010); Richter Cod. p. 957.

« *Cucurbita. Cucumer turcicus*. »

— *Cucurbita major rotunda flore luteo, folio aspero*, Bauh. Pin. p. 312.

- Una sola foglia discretamente conservata.
- Coltivasi. Cocc. Flor. bol. p. 210.

140. [84 n. 2]. **Cucurbita maxima** Duch.

« *Cucurbita alia.* »

- Una sola foglia bene conservata.
- Coltivasi. Cocc. Flor. bol. p. 209.

141. [85]. **Chelidonium majus** Lin. Sp. pl. I. p. 505; Richter Cod. p. 511; Arc. Flor. it. p. 249.

« *Chelidonium majus.* »

- *Chelidonium*, Lob. Adv. 439. — *Chelidonium*, Clus. loc. cit. p. 203.
- Due esemplari ben conservati.
- Volgare nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 74.

142. [86]. **Actaea spicata** Lin. Spec. I. p. 504; Richter Cod. p. 510; Arc. Fl. it. 244.

« *Actea Plinii. Christophoriana. Aconitum racemosum.* »

- *Christophoriana*, Clus. p. 86.
- Foglie, frutti e radice in buono stato di conservazione.
- Anche nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 73.

143. [87 n. 1]. **Valeriana officinalis** Lin. Sp. I. p. 31; Richter Cod. p. 46; Arc. Fl. it. 648.

« *Cardiaca.* »

- Una sola foglia abbastanza ben conservata.
- Nel tomo III a pag. 114 dell' Erbario Aldrovandiano col nome di *Cardiaca herbariorum* ecc. trovasi un esemplare di *Leonurus cardiaca* Lin. specie affatto diversa da quella rappresentata da questa foglia la quale ci fu determinata dal prof. Ascherson di Berlino. La foglia dell' Erbario Aldrovandi è una foglia basilare radicale di *Valeriana officinalis* Lin.

- Comune nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 259.

144. [87 n. 2]. **Leonurus cardiaca** Lin. Sp. Pl. I, p. 584; Richter Cod. p. 571; Arc. Fl. it. p. 438.

« *Cardiaca alia Lycopsis.* »

— *Cardiaca*, Lob. Adv. p. 278.

— Esemplare in fiore bene conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 387.

145. [88]. **Centaurea Centaurium** (?) Lin. Sp. II, p. 910; Richter Cod. p. 858.

« *Centaurium majus. Rhaponticum V.* »

— Capolini e foglie in cattivo stato di conservazione.

— Manca nel Bolognese.

146. [89 n. 1]. **Erythraea Centaurium** Pers. Syn. Plant. I, p. 283; Richter Cod. p. 249. Arc. Flor. it. p. 370.

« *Centaurium minus fl. rubro fol. ten. febrifuga.* »

— *Centaurium minus*, Bauh. Pin. 278.

— Esemplare alquanto danneggiato.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 339.

147. [89 n. 2]. **Chlora perfoliata** Lin. Sp. pl. I, p. 232; Richter Cod. p. 362; Arc. Fl. it. p. 369.

« *Centaurio minori congener flore luteo. Sideritis 3.^a Plinii al. Perfoliatum al.* »

— *Centaurium luteum perfoliatum*, Bauh. Pin. 278. *Centaurium parvum flore luteo*, Clus. Hist. pag. 180.

— Esemplare alquanto danneggiato.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 338.

148. [90]. **Anthemis Cota** Lin. Sp. pl. I, p. 893; Richter Cod. p. 844; Arc. Fl. it. p. 680.

« *Cotula foetida.* »

— Esiste una tavoletta incisa col nome di *Chamaemelon sylvestre album latifolium flore maximo*, Tom. 3 mag.

— Esemplari bene conservati.

— Il nome di *Cotula foetida* di Bauhin spetterebbe alla *Anthemis cotula* Lin. e non a questa specie. Vedi Richter loc. cit. pag. 845.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. pag. 290.

149. [91 n. 1]. **Vicia cassubica** Lin. Sp. pl. I, p. 735; Richter Cod. 715; Arc. Fl. it. p. 525.

« *Cicer sylvestre*. »

— Esemplare non fiorito discretamente conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 181.

150. [91 n. 2]. **Glechoma hederacea** Lin. Sp. pl. I, p. 578; Richter Cod. 565; Arc. Fl. it. p. 431.

« *Chamaecissus. Hedera terrestr.* »

— *Chamaecissus*, Fuchs. Hist. 876. — *Hedera terrestris vulgaris*, Bauh. Pin. 306.

— Esemplare in buono stato di conservazione.

— Per errore vi è unito anche una foglia di Viola.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 382.

151. [92]. **Conium maculatum** Lin. Spec. pl. p. 243; Richter Cod. p. 260; Arc. Fl. it. p. 588.

— *Cicuta major*, Bauh. Pin. 160. — *Cicutaria major vulgaris*, Clus. Hist. p. 200 e 201.

— Esemplare alquanto danneggiato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. 246.

152. [93]. **Silene Otites** Smith. — *Cucubalus Otites* Lin. Sp. Pl. I, p. 415; Richter Cod. p. 430; Arc. Fl. it. 312.

« *Cher seu Cherzella. Muscicapa. Leucoion sylvestre. Caprinella Monachorum. Sesamoides parva quibusdam putata. Largatella Tridentinis qui ea utuntur ad capiendas muscas ob viscum. Ex J. Zuingerio (Trento)* »

— *Lychnis viscosa flore muscoso*, Bauh. Pin. p. 206. — *Sesamoides magnum salmanticum*, Clus. Hist. p. 295.

- Esemplare abbastanza bene conservato.
- Nell'Indice, Aldrovandi parla estesamente della proprietà di questa cosiddetta *Muscicapa* degli antichi autori.
- Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 112.

153. [94]. **Erysimum Cheiranthus** Pers. Arc. Fl. it. p. 265. — *Erysimum lanceolatum* R. Brow.

« *Cheirella Leucojon sylvestre.* »

— Esiste una tavoletta solamente disegnata col nome di *Leucojon peregrinum luteum* T. 2, obs. C. 129.

— Alquanto danneggiato l'esemplare non completamente fruttificato contenuto nel foglio 94.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 90.

154. [95]. **Cornus mas** Lin. Sp. pl. p. 117. Richter Cod. p. 129.

« *Cornus foemina.* »

— *Cornus sylvestris mas*, Bauh. Pin. 447. — *Cornus mas pumilio*, Clus. Hist. I, p. 13.

— Esemplare bene conservato con frutti.

— Il nome di *Cornus foemina* corrisponde veramente al *Cornus sanguinea* L. V. Richter pag. 129. Bauh. Pin. 447. Va notato però che sulla parola *foemina* esiste un tratto che si può valutare come una cancellatura.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 248.

155. [96]. **Cercis Siliquastrum** Lin. Sp. pl. I, p. 374; Richter Cod. p. 391; Arc. Fl. it. p. 530.

« *Cercis Theophr. Carobaria siliqua sylvestris. Arbor famfaluga. Arbor judae.* »

— *Syliqua sylvestris*, Clus. Hist. I pag. 13. — *Syliqua sylvestris rotundifolia*, Bauh. Pin. p. 402. — *Arbor judae* Aut.

— Foglie e fiori e frutti, ma alquanto danneggiati.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 185.

156. [97]. **Lathyrus sylvestris** Lin. Sp. pl. I, p. 733; Richter Cod. p. 714; Arc. Fl. it. p. 520.

« *Clymenos Ruellii*. *Ervum sylvestre*. *Lathyrus potius seu Cicera Lobelii vel Aracus*. »

— *Lathyrus sylvestris*, Clus. Hist. plant. II, p. 129. — *Lathyrus sylvestris major*, Bauh. Pin. 433.

— Foglie e fiori alquanto danneggiati.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 177.

157. [98]. **Cistus salvifolius** Lin. Sp. pl. I, p. 524; Richter Cod. 521; Arc. Fl. it. p. 291.

« *Cystus foemina*. »

— *Cistus foemina*, Lob. obs. p. 549. Clus. Hist. pl. p. 70.

— Esempio ben conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. pag. 99.

158. [99]. **Bonjeania hirsuta** Rehb. — *Lotus hirsutus*, Lin. Sp. pl. II, p. 775; Richter Cod. p. 748; Arc. Fl. it. p. 503.

« *Cytisus falsus*. *Rubiae species*. *Glauca aliis*. *Melilotus fruticans quibusdam Dorycnio congener Planta Clusio*. »

— *Dorycnio congener planta*, Clus. Hist. I, pag. 100.

— Esempio assai guasto.

— Anche nel Bolognese comune. Cocc. Flor. bol. p. 159.

159. [100]. **Cytisus nigricans** Lin. Sp. pl. II, p. 739; Richter Cod. p. 719; Arc. Fl. it. p. 477.

« *Cytisus alter sylvestris*. *Cordi*. »

— *Cytisus IIII*, Clus. Hist. I, p. 95.

— Esiste una tavoletta già incisa col nome di *Cithisi species oxithriphilla* T. 4, mag. C. 108.

— Esempio in cattivo stato di conservazione.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 155.

160. [101]. **Cytisus hirsutus** Lin. var. **ciliatus** Koch Syn. Ed. III, p. 134; Lin. Sp. pl. II, 739; Richter Cod. 719; Arc. Fl. it. 478.

« *Cytisus alius.* »

— *Cytisus tertius*, Clus. Hist. I, p. 94.

— Esemplare in frutto bene conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. pag. 155.

161. [102]. **Carthamus tinctorius** Lin. Sp. pl. II, p. 830; Richter Cod. p. 792.

« *Cnicum Carthamum. Acanthus croceus.* »

— *Cnicus vulgaris*, Clus. Hist. II, pag. 152.

— Esemplare bene conservato dal quale però è stato esportato un fiore e il pezzo di carta che lo portava.

— Coltivato.

162. [103]. **Bifora testiculata** Rehb. — *Coriandrum testiculatum*, Lin. Sp. pl. I, p. 256; Richter Cod. p. 273; Arc. Fl. it. p. 614.

« *Coriandrum sylvestre.* »

— *Coriandrum alterum minus odorum*, Lob. obs. p. 404.

— Esemplare passabilmente conservato.

— Anche nel Bolognese dove è stato confuso colla *Bifora radians* M. B. Non citato da Cocconi (G. E. Mattei).

163. [104]. **Ammi majus** Lin. Sp. pl. I, p. 243; Richter Cod. p. 259; Arc. Fl. it. p. 592.

« *Carum vulgare aliquibus. Ammi Fuchsii.* »

— *Ammi majus*, Bauh. Pin. p. 159.

— Esemplare ben conservato accompagnato da due pezzi di foglie diverse, forse di *Aegopodium Podagraria* Lin.

— Vedasi identica pianta al foglio N. 55.

— Raro nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 243.

164. [105 n. 1]. **Quercus Cerris** Lin. Sp. pl. II, p. 997; Richter Cod. p. 943; Arc. Fl. it. p. 182.

« *Cerrus.* »

— Una foglia assai bene conservata.

— Qui Aldrovandi pare abbia confuso due specie, aggiungendo ad una vera foglia di *Cerro* un rametto con foglie di *Quereus sessiliflora* Smith.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 441.

165. [105 n. 2]. **Muscari comosum** Mill. — *Hyacinthus comosus*, Lin. Sp. pl. I, p. 318; Richter Cod. p. 330; Arc. Fl. it. p. 132.

« *Hyacinthi species. Coepa bovis. Hyacinthus, Dioscoridis comosus major. Diosc. Lobelii.* »

— *Hyacinthus comosus major purpureus*, Bauh. Pin. p. 42.

— Frutti in discreto stato di conservazione.

— Comune nel Bolognese, Cocc. Flor. bol. p. 458.

166. [106]. **Ostrya carpinifolia** Scop. — *Carpinus Ostrya* Lin. Sp. pl. II, p. 998; Richter Cod. p. 944; Arc. Fl. it. p. 181.

« *Oriptelea Plinii. Montiulmus. Carpinus male Betulus Lobelii. Atimia Plinii quibus. Tilia mas Matthioli.* »

— *Ostrya ulmo similis, fructu racemoso lupulo simili*, Bauh. Pin. pag. 427.

— Esiste una tavoletta incisa col nome *Oriptelea* Theophr. *Ulmus montanus* Plinii.

— Esemplare bene conservato.

— Frequente nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 439 e 440.

167. [107]. **Castanea vesca** Willd. — *Fagus castanea* Lin. Sp. pl. II, p. 997; Richter Cod. p. 944; Arc. Fl. it. p. 182.

« *Castanea.* »

— Esemplare bene conservato.

— Comune nel bolognese. Cocc. Fior. bol. p. 441.

168. [108]. **Carlina acaulis** Lin. var. *caulescens* Lam.; Lin. Spec. II, p. 828; Richter Cod. p. 790; Arc. Fl. it. p. 704.

« *Chameleon niger.* »

— *Chameleon albus Dioscoridis*, Clus. Hist. II, p. 155. *Carlina herbariorum*, Lob. obs. p. 479.

- Due tavolette disegnate col nome di *Chameleon acanlis* ecc.
- Il fiore è stato esportato.
- Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 282.

169. [109]. **Carlina acanthifolia** All.; Arc. Fl. it. p. 704.

« *Chamaleon albus*. »

- *Chamaleon albus*, Diosc. Lobel. obs. p. 479.
- Esemplare non fiorito. Manca una foglia di cui non rimane altro che una impronta.
- Manca nel Bolognese.

170. [110]. **Ecballium Elaterium** Rich. — *Momordica Elaterium* Lin. Sp. pl. II, p. 1010; Richter Cod. p. 956; Arc. Fl. it. p. 641.

« *Cucumis asininus ex quo Elaterium Cuc. sylv^{is} Fuchsji*. »

- *Cucumis sylvestris asininus dictus*. Bauh. Pin. p. 314. — *Cucumis asininus officinarum*, Lob. obs. p. 868.
- Esemplare alquanto danneggiato.
- Trovasi unito altro esemplare con foglie appartenente ad altra specie di pianta. (Abutilon?).
- Anche nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 209.

171. [111]. **Carbenia benedicta** B. H. — *Cnicus benedictus*, Lin. Sp. pl. II, p. 826; Richter Cod. p. 861; Arc. Fl. it. p. 717.

« *Carduus benedictus*. »

- *Carduus benedictus*, Bauh. Pin. p. 378. — *Carduus benedictus*, Lob. obs. p. 484.
- Esemplare mediocrementemente conservato.
- Coltivasi.

172. [112]. **Daucus Carota** Lin. Sp. pl. I, p. 242; Richter Cod. p. 258; Arc. Fl. it. p. 616.

« *Carota Pastinaca sativa quibus*. »

- *Pastinaca sylv^{is} Dioscoridis*, Bauh. Pin. p. 151. — *Daucus vulgaris*, Clus. Hist. II, p. 198.

- Esemplare passabilmente conservato.
- Coltivata e spontanea. Cocc. Flor. bol. p. 231.

173. [113]. **Cynoglossum pictum** Ait.; Arc. Fl. it. p. 384.

« *Cynoglossum secundum Plinii.* »

- Esemplare ottimamente conservato.
- Anche nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 349.

174. [114]. **Echinophora spinosa** Lin. Sp. pl. I, p. 239; Richter Cod. p. 255; Arc. Fl. it. p. 587.

« *Crithmum spinosum. Pastinaca spinosa.* »

- *Crithmum maritimum spinosum*, Bauh. Pin. p. 288.
- Esemplare (alquanto atipico) discretamente conservato.
- Manca nel Bolognese.

175. [115]. **Crithmum maritimum** Lin. Sp. pl. I, p. 246; Richter Cod. p. 264; Arc. Fl. it. p. 603.

« *Crithmum sine spinis.* »

- *Crithmum s. Foeniculum maritimum minus*, Bauh. Pin. p. 288.
- Esemplare guasto e in parte perdutosi, rimanendovi le impronte sole.
- In Italia: manca nel Bolognese.

176. [116 n. 1]. **Plantago Coronopus** Lin. Sp. pl. I, p. 115; Richter Cod. p. 126; Arc. Fl. it. p. 464.

« *Coronopus.* »

- *Coronopus sylv^{is} hirsutior*, Bauh. Pin. p. 190. *Coronopus*, Lob. obs. p. 239.

-- Tavoletta incisa col nome di *Coronopus sylvestris*.

- Due esemplari bene conservati.
- Coltivasi e trovati qualche volta inselvatichita nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. 395.

177. [116 n. 2]. **Allium Cēpa** Lin. Sp. pl. I, p. 300; Richter Cod. p. 315; Arc. Fl. it. p. 137.

« *Caepe.* »

— *Cepa vulgaris*, Bauh. Pin. p. 71. *Cepa*, Lob. obs. p. 73.

— Esemplare in fiore bene conservato.

— Coltivasi. Cocc. Flor. bol. p. 461.

178. [117 n. 1]. **Genista tinctoria** Lin. Sp. pl. II, p. 710; Richter p. 693; Arc. Fl. it. p. 476.

« *Corneola lutea*, *Flos tinctorum*, *Lutea Plinii*, *Lutum Vitruvii*, *Lysimachia Ruellii*.

— *Genista tinctoria germanica*, Bauh. Pin. p. 395. — *Genista tinctoria vulgaris*, Clus. Hist. p. 101. Lob. obs. p. 531.

— Esemplare bene conservato.

— Frequente nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 154.

179. [117 n. 2]. **Linum viscosum** Lin. Sp. pl. ed. 2.^a, p. 398; Richter Cod. 294; Arc. Fl. it. p. 349.

« *Corneola coerulea.* »

— *Linum sylv. latif. caule viscoso, flore rubro*, Bauh. Pin. p. 214.

— Esemplare discretamente conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 122.

180. [117 n. 3]. **Anacamptis pyramidalis** Rich. Arc. Fl. it. p. 166.
— *Orchis pyramidalis*, Lin. Sp. II, p. 940; Richter Codex. p. 386.

« *Cynosorchis.* »

— Tavoletta disegnata colla dizione *Testiculus flore purpureo pyramidalis* T. 4. c. 277.

— Due esemplari abbastanza bene conservati.

— Anche nel Bolognese volgare. Cocc. Flor. bol. p. 481.

181. [118 n. 1]. **Colchicum autumnale** Lin. Sp. pl. I, p. 341; Richter Cod. p. 350; Arc. Fl. it. p. 142.

« *Colchicum Hermodactylus officinarum falso.* »

— *Colchicum commune*, Bauh. Pin. p. 67. Lob. obs. p. 69.

— Fiore e foglie con frutto bene conservati.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 451.

182. [118 n. 2]. *Oenanthe* (?) *pimpinelloides* Lin. Sp. pl. p. 255.

« *Caucalis Anguillare*. »

— Due esemplari così danneggiati che quasi non ne rimangono che le impronte. La determinazione è quindi dubbia.

183. [119 n. 1]. *Cuscuta Epithymum* Murr. Syst. ed. 13.^a, p. 140.

« *Cuscuta gronco*. »

— Esemplari passabilmente conservati.

— Vedi anche i fogli N. 173 e N. 208.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 342.

184. [119 n. 2]. *Ranunculus tricophyllus* Chaix.; Richter Cod. p. 548; Arc. Fl. it. p. 233.

« *Conferva Plinii. Ranunculi aquatici species*. »

— Esemplare bene conservato.

— Col nome di *Conferva Plinii*, invece il Lobel rappresenta una vera alga di acqua dolce. V. Lobel obs. p. 654.

— Comunissimo nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 66.

185. [120 n. 1]. *Crocus sativus* Lin. Sp. pl. I, p. 36; Richter Cod. p. 51; Arc. Fl. p. 152.

« *Crocus*. »

— Esemplare assai danneggiato.

— Manca nel Bolognese.

186. [120 n. 2]. *Cirsium arvense* Scop. — *Serratula arvense*, Lin. Sp. pl. II, p. 820; Richter Cod. p. 784; Arc. Fl. p. 726.

« *Cirsium vulgare. Ceanothos Spina. Theophr. Anguillaræ Astone Patavinis vulgo*. »

— Esiste tavoletta solamente disegnata col nome di *Cirsium vulgare, Ceanothos Plinii et Theophr.* T. 5, 2 c. 301.

— Discretamente conservato, presenta però i capolini rovinati.

— Volgarissimo nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 275.

187. [121 n. 1]. **Citrus medica** (var.) Lin. Sp. pl. II, p. 782.

« *Citrigo seu Citrangulum.* »

— Sole foglie conservate.

— Queste foglie presentano i pezioli lievemente alati.

— Coltivasi.

188. [121 n. 2]. **Citrus medica** (var.) Lin. Sp. pl. II, p. 782.

« *Citrum.* »

— Solo foglie conservate.

— Queste invece hanno pezioli non alati.

— Coltivasi.

189. [122 n. 1]. **Hypochaeris radicata** Lin. Sp. pl. II, p. 811; Richter Cod. p. 780; Arc. Fl. it. p. 733.

« *Cichorium Fuchsii.* »

— *Hieracium longius radiculatum*, Lobel. obs. p. 120.

— Tre foglie alquanto dissimili fra loro.

— Frequente nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 305.

190. [122 n. 2]. **Pieris hieracioides** Lin. Sp. pl. II, p. 792; Richter Cod. p. 766; Arc. Fl. it. p. 737.

» *Cichorii alia species.* »

— Quattro sole foglie.

— Vedasi anche il foglio N. 157.

— Volgarissimo nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 307.

191. [123 n. 1]. **Chrysanthemum coronarium** Lin. Sp. pl. II, p. 890; Richter Cod. p. 841; Arc. Fl. it. p. 674.

« *Chamemelum chrysanthemon.* »

— *Chrysanthemum creticum*, Clus. Hist. I, p. 334.

— Esemplare assai danneggiato.

— Manca nel Bolognese dove però coltivasi qualche volta.

192. [123 n. 2]. **Adonis autumnalis** Lin. Sp. pl. ed. 2.^a, p. 771; Richter Cod. p. 543. Arc. Fl. it. p. 231.

« *Chamamelum eranthemon. Adonium quib. Anemone tenuifolium Cordi.* »

— Piccolo esemplare ben conservato.

— Frequente nel Bolognese. Confuso coll' *Adonis Aestivalis* in Cocc. pag. 65. V. Fiori. Aggiunta loc. cit.

193. [124]. **Matricaria Chamomilla** Lin. Sp. pl. II, p. 891; Richter Cod. p. 842; Arc. Fl. it. p. 677.

« *Chamamelum leucanthemon.* »

— *Chamamelum vulgare s. Leucanth. Dioscoridis*, Bauh. Pin. p. 135.

— Esemplare bene conservato.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 294.

194. [125]. **Calendula officinalis** Lin. Sp. pl. II, p. 921; Richter Cod. p. 866; Arc. Fl. it. p. 695.

« *Caltha Virgilii. Chrysanthemon Dioscoridis quib. Climenos. Theoph. Perichlymenos Dioscoridis. Columme si Dys. placet.* »

— *Caltha prolifera, majoribus s. minoribus floribus*, Bauh. Pin. p. 275.

— Esemplare passabilmente bene conservato.

— Coltivasi nel Bolognese.

195. [126 n. 1]. **Calendula arvensis** Lin. Sp. pl. II, p. 921; Richter Cod. p. 866; Arc. Fl. p. 695.

« *Caltha verg. alia, Calendula.* »

— Esiste una tavoletta non incisa col nome di *Caltha minor*.

— Esemplare bene conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 283.

196. [126 n. 2, 3, 4]. **Teucrium Chamaedrys** Lin. Sp. pl. II, p. 565; Richter Cod. p. 556; Arc. Fl. it. p. 442.

« *Chamedryos tres penes colorem diferentes.* »

— Esempolari bene conservati.

— Tre esemplari di cui due appartenenti in modo certo alla specie, mentre l'altro spetta ad una *Specularia*.

— Volgarissimo nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 389.

197. [127 n. 1]. **Chrysanthemum segetum** Lin. Sp. pl. II, p. 889; Richter Cod. p. 840; Arc. Fl. it. p. 674.

« *Chrysanthemum segetum* Lobel.

— *Chrysanthemum segetum*, Clus. Hist. p. 334.

— Esiste una tavoletta disegnata colla indicazione *Chrysanthemum Dioscoridis* T. 5. c. 144.

— Esemplare alquanto danneggiato.

— Due capolini e relative foglie molto danneggiati diversificano dagli altri.

— Indicato come trovato una volta nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. pag. 292.

198. [127 n. 2]. **Salicornia herbacea** (?) Lin. Sp. pl. I, p. 3; Richter Cod. p. 18; Arc. Flor. it. p. 215.

« *Cassia alba Alkali quibusdam.* »

— Due piccoli esemplari.

— Lo stato degli esemplari non permise una determinazione certa.

— Manca nel Bolognese.

199. [128]. **Cynara Scolymus** Lin. Sp. pl. II, p. 827; Richter Cod. p. 790; Arc. Fl. it. p. 728.

« *Cynara Gal. Carduus altilis. Carduus pinea Archilochum. Cactus Theoph. Scolymos. Scalias Theoph. fructus Cacti.* »

— *Scolymus Dioscoridis. Cactus Theophrasti*, Clus. Hist. II, p. 153.

— Una sola foglia bene conservata.

— Coltivasi nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 278.

200. [129]. **Cynara Scolymus** Lin. Vedi numero prec.

« *Cynara alia Archilochum sylv.* »

- Vedi s.
- Una sola foglia. C. s.
- Vedi s.

201. [130 n. 1]. **Cirsium lanceolatum** Scop. — *Carduus lanceolatus*, Lin. Sp. pl. II, p. 821; Richter Cod. p. 785; Arc. Fl. it. p. 723.

« *Cynara alia sylvestris*. »

- Una sola foglia c. s.
- Volgare nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 275.

202. [130 n. 2]. **Asparagus acutifolius** Lin. Sp. pl. I, p. 314; Richter Cod. p. 326; Arc. Fl. it. p. 119.

« *Corruda Asparagus sylvestris. Myacantha*. »

- *Corruda prior.*, Clus. Hist. I, p. 177.
- Discretamente conservato.
- Volgare nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 464.

203. [131 n. 1]. **Colutea arborescens** Lin. Sp. pl. II, p. 723; Richter Cod. p. 721. Arc. Fl. it. p. 507.

« *Colutea Theophr.*. »

- *Colutea vesicaria*, Bauh. Pin. p. 396.
- Esemplare in ottimo stato di conservazione.
- Volgare nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 171.

204. [131 n. 2]. **Vinca minor** Lin. Sp. pl. I, p. 209; Richter Cod. p. 230; Arc. Fl. it. p. 363.

« *Clematis Daphnoides. Dioscor. Vinca pervinca Plinii*. »

- Esemplare senza fiori bene conservato.
- Anche nel Bolognese. Cocc. Fior. bol. p. 333.

205. [132]. **Salvia glutinosa** Lin. Sp. pl. I, p. 26; Richter Cod. p. 40; Arc. Fl. it. p. 429.

« *Cerinth Plinii. Hormino congener Meleagro vulgo Colus Jovis Lob. Horminium luteum seu Tridentinum Dodon.* »

— *Horminum luteum glutinosum*, Bauh. Pin. p. 238. Lob. obs. 301. Clus. Hist. 1, 29.

— Esemplare assai danneggiato nella infiorescenza.

— Per errore in questo foglio, trovasi aggiunto un rametto portante sole foglie, che appartiene ad una *Scutellaria* e più precisamente alla *Scutellaria Columnae* All.

— Frequente nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 381.

206. [133 n. 1]. ***Mentha arvensis*** Lin. (var. ***gentilis*** Sm.). Lin. Sp. pl. II, p. 577; Richter Cod. p. 564; Arc. Fl. it. p. 421.

« *Melissa Fuchsii. Calamenthi species. Calamintha proestantior* Lobel.

— *Calaminta montana proestantior*, Lobel. obs. p. 274. Lobel. Adr. p. 219.

— Esemplare senza fiori.

— La *Melissa Fuchsii* corrisponde alla *Melittis melissophyllum* V. Richter p. 580.

— Coltivasi.

207. [133 n. 2]. ***Calamintha grandiflora*** Moench. — *Melissa grandiflora*, Lin. Sp. pl. II, p. 592; Richter Cod. p. 577; Arc. Fl. it. p. 426.

« *Chalamenthum aquaticum.* »

— Due piccoli esemplarini di cui uno solo ben conservato, l'altro ridotto alla sola impronta. (Esemplare atipico microfillo).

— Anche nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 379.

208. [134 n. 1]. ***Calamintha officinalis*** Lin. — *Melissa calamintha*, Lin. Sp. pl. II, p. 593; Richter Cod. p. 577; Arc. Fl. it. p. 426.

« *Calamenthum montanum.* »

— Esemplare discretamente conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Flor. bol. p. 379.

209. [134 n. 2]. ***Teucrium scorodonia*** Lin. Sp. pl. II, p. 564; Richter Cod. p. 556; Arc. Fl. it. p. 441.

« *Scordion Plinii quibus. Calamenthum.* »

— Bene conservato l'esemplare.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 389.

210. [135]. **Nepeta Cataria** Lin. Sp. pl. II, p. 570; Richter Cod. p. 559; Arc. Fl. it. p. 431.

« *Calamenthum tertium Monachorum. Mentha cataria volg. Herba gattara.* »

— Due esemplari ben conservati.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 382.

211. [136]. **Carduus nutans** Lin. Sp. pl. II, 821; Richter Cod. p. 875; Arc. Fl. it. p. 718.

« *Crocodylion verum quibusdam. Cardus.* »

— Foglie e capolino passabilmente conservati.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 274.

212. [137 n. 1]. **Mentha aquatica** Lin. Sp. pl. II, p. 576; Richter Cod. p. 564; Arc. Fl. it. p. 421.

« *Calamenthum montanum.* »

— Esemplare non fiorito ma in buon stato di conservazione.

— Frequente nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 376.

213. [137 n. 2]. **Melampyrum cristatum** Lin. Sp. pl. II, p. 605; Richter Cod. p. 587; Arc. Fl. it. p. 409.

« *Triticum vaccinum. Melampyron. Alopecuros Plinii.* »

— *Melampyrum an Alopecuros Plin.* Lobel. Adv. p. 11.

— Esiste una tavoletta disegnata, ma con dicitura non leggibile.

— Esemplare molto guasto.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 365.

214. [137 n. 3]. **Veronica officinalis** Lin. Sp. pl. I, p. 11; Richter Cod. p. 26; Arc. Fl. it. p. 402.

« *Veronica mas. Veronica Tabernamont.* »

— Esemplare discreto.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 357.

215. [138 n. 1]. **Trifolium angustifolium** Lin. Sp. pl. II, p. 769 :
Richter Cod. p. 744; Arc. Fl. it. p. 495.

« *Cauda vulpis. Alopecuros. Lagopus.* »

— Esemplare bene conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 167.

216. [138 n. 2]. **Muscari racemosum** Mill. — *Hyacinthus racemo-*
sus Lin. Sp. pl. I, p. 318; Richter Cod. p. 330; Arc. Fl. it. p. 132.

« *Caepe caninum. Hyacinthi species.* »

— Alcuni frutti.

— Comunissimo nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 459.

217. [138 n. 3]. **Ajuga Chamaepitys** Schr. — *Teucrium Chamae-*
pitys Lin. Sp. pl. II, p. 562; Richter Cod. p. 554; Arc. Fl. it. p. 444.

« *Chamaepitis foemina.* »

— Esiste la tavoletta disegnata colla dicitura: *Chamaepitys latifolia*.

Tom. 5. c. 110.

— Due esemplari ben conservati.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 390.

218. [139 n. 1]. **Centaurea nigrescens** Willd.

« *Cyanus flos. jacea nigra quibus.* »

— Esemplare in buono stato di conservazione.

— Anche nel Bolognese volgare. Cocc. Fl. bol. p. 279.

219. [139 n. 2]. **Centaurea Cyanus** Lin. Sp. pl. II, p. 911; Richter
Cod. p. 859; Arc. Fl. it. p. 710.

« *Cyanus alter. Gregola vulgi.* »

— Esemplare rovinato nei capolini.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 280.

220. [140]. **Rhagadiolus stellatus** Willd. — *Lapsana stellata* Lin. Sp. pl. II, p. 811; Richter Cod. p. 781; Arc. Fl. it. p. 731.

« *Catanance vulgo. Intybi species. Hieracium falcatum.* »

— Discretamente conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 305.

221. [141]. **Calamintha patavina** Host: Arc. Fl. it. p. 427.

« *Clinopodium minus. Serpyllum sylvestre.* »

— Tavoletta disegnata col nome di *Clinopodium alpestre serpillifolium*. T. J. n. 302.

— Esemplari ben conservati.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 379.

222. [142 n. 1]. **Galium purpureum** Lin. Sp. pl. I, pag. 107; Richter Cod. p. 119; Arc. Fl. it. p. 628.

« *Coris.* »

— Esiste una tavoletta colia dicitura *Coris flore purpureo*. Tom. 4. M. C. 53.

— Esemplare senza fiori.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 256.

223. [142 n. 2]. **Pulicaria vulgaris** Gaertn.; Lin. Sp. pl. II, p. 882; Richter Cod. p. 833; Arc. Fl. it. p. 693.

« *Conyza parva.* »

— Esemplare discretamente conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 285.

224. [143 n. 1]. **Senecio nemorensis** Lin. Sp. pl. II, p. 870; Richter Cod. p. 824; Arc. Fl. it. p. 671.

« *Conyza vera. Virga aurea alys.* »

— Bene conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 296.

225. [143 n. 2]. **Inula Conyza** DC. — *Conyza squarrosa* Lin. Sp. pl. II, p. 861; Richter Cod. p. 816; Arc. Fl. it. p. 692.

« *Conyza alia.* »

— Esemplare senza fiori.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 284.

226. [144]. **Sorbus torminalis** Grantz. — *Crataegus torminalis* Lin. Sp. pl. I, p. 476; Richter Cod. p. 485; Arc. Fl. it. p. 554.

« *Crategon seu Crateogonon Theoph. Anguillarae. Mespilus sylvestris. Aquifolium Theoph. aliquib. Sorbus. Torminalis alys. Lobelio, etc.* »

— *Mespilus Api folio sylvestris non spinosa*, Bauh. Pin. p. 454. Clus. Hist. p. 10. Lob. p. 614.

— Un rametto con sole foglie, in buono stato di conservazione.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 205.

227. [145]. **Cyperus longus** Lin. Sp. pl. I, p. 45; Richter Cod. p. 61; Arc. Fl. it. p. 76.

« *Cyperus.* »

— Esemplare ben conservato.

— Frequente nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 501.

— [146]. Il foglio fu esportato.

« *Cyanus maximus. Rhaponticus Monti Baldi. Cynoglossa ex Apulia.* »

— Questo foglio fu tagliato ed esportato; però nel retro del foglio precedente, trovasi notata la dicitura che abbiamo riportata, la quale corrisponde esattamente al nome scritto nell'Indice dell'Erbario, quale si conserva nella Biblioteca universitaria di Bologna.

228. [147 n. 1]. **Lathyrus pratensis** Lin. Sp. pl. II, p. 733; Richter Cod. p. 514; Arc. Fl. it. p. 521.

« *Cicercula sylvestris.* »

— Esemplare danneggiato nella infiorescenza.

— Anche nel Bolognese comune. Cocc. Fl. bol. p. 175.

229. [147 n. 2]. **Genista tinctoria** Lin. Sp. pl. II, p. 710; Richter Cod. p. 693; Arc. Fl. it. p. 476.

« *Cicerbita sylvest. alia.* »

— Esemplare non ancora fiorito.

— Anche nel Bolognese comune. Cocc. Fl. bol. p. 154.

230. [147 n. 3]. **Craeca varia** Gren. Godr.

« *Cicercula sylvestris.* »

— Esemplare male conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 182.

231. [148]. **Calamintha parviflora** Lam. — *Melissa Nepeta* Lin. Sp. pl. II, p. 593; Richter Cod. p. 577; Arc. Fl. it. p. 426.

« *Calamentum 2^{um}. Pulegium usuale sylvestre. Nepeta.* »

— Esemplari bene conservati.

— Frequentissima nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 379.

232. [149]. **Cerasus avium** Lois. — *Prunus cerasus* var. *avium*, Lin. Sp. pl. I, p. 474; Richter Cod. p. 483; Arc. Fl. it. p. 533.

« *Cerasus.* »

— Ramo con sole foglie, ben conservato.

— Coltivasi nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 189.

233. [150]. **Cerasus avium** Lois. id. c. s.

« *Cerasus amarina.* »

— Id. c. s.

— Id. c. s.

234. [151]. **Cicer arietinum** Lin. (v. *album* DC). Lin. Sp. pl. II, p. 738; Richter Cod. p. 718; Arc. Fl. it. p. 517.

« *Cicer arietinum* Lob. *Cicer sativum album.* »

— *Cicer sativum arietinum*, Lob. obs. p. 519.

— Esemplare ben conservato.

— Coltivasi nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 184.

235. [152]. **Cannabis sativa** Lin. Sp. pl. II, p. 1027; Richter Cod. p. 975; Arc. Fl. it. p. 186.

« *Cannabis sativa.* »

— *Cannabis*, Lob. obs. p. 284.

— Esemplare femminile passabilmente conservato.

— Coltivasi largamente nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 432.

236. [153]. **Bidens tripartita** Lin. Sp. pl. II, 831; Richter Cod. p. 794; Arc. Fl. it. p. 689.

« *Cannabis sylvestris.* »

— Esiste una tavoletta solo disegnata col nome: *Cannabis sylvestris*.

T. p. Agg. 153.

— Esemplare alquanto danneggiato.

— Comune nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 289.

237. [154 n. 1]. **Calamintha parviflora** Lam. V. foglio n. 148.

« *Calamenthum usuale.* »

— Esemplari in fiore ben conservati.

— V. n. 148.

238. [154 n. 2]. **Senecio crucifolius** Lin. Vedi foglio n. 83.

« *Conyza species.* »

— Esemplari coi capolini quasi intieramente perduti.

— Frequente nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 298.

239. [155]. **Calystegia sepium** R. Br. — *Convolvulus sepium* Lin. Sp. pl. I, p. 153; Richter Cod. p. 169; Arc. Fl. it. p. 373.

« *Campanula major. Smilax laevis Fuchsii.* »

— *Smilax laevis major*, Lob. obs. p. 340.

— Esemplare bene conservato.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 341.

240. [156]. **Tanacetum Balsamita** Lin. Sp. pl. II, p. 845; Richter Cod. p. 805; Arc. Fl. it. p. 684.

« *Costus hortensis* Ruellii. *Agerato majori* congener. *Herba S. Maria V. Eupatorio majori* congener. *Balsamita belgar.* »

— *Hortorum Costus* — *Balsamita major*, Lob. obs. p. 174.

— Esemplare bene conservato.

— Coltivasi.

241. [157]. **Pieris hieracioides** Lin. — V. foglio n. 122.

« *Cichorii species. Amarago* Theophr. »

— Esemplare in cattivissima condizione.

— V. foglio n. 122.

242. [158 n. 1]. **Ballota pseudodictamnus** Benth. — *Marrubium pseudodictamnus* Lin. Sp. pl. II, p. 583; Richter Cod. p. 571; Arc. Fl. it. p. 440.

« *Pseudodictamnum* Matth. »

— *Pseudodictamnum floribus verticillatis*, Lob. obs. p. 267.

— Esemplare ben conservato.

— Confrontato con esemplari raccolti a *Creta* dal dott. *A. Baldacci*.

— Indicata anche per il Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 388.

243. [158 n. 2]. **Dictamnus albus** Lin. Sp. pl. I, p. 383; Richter Cod. p. 399; Arc. Fl. it. p. 353.

« *Dictamnum radicis alb. Fraxinellus* Matth. *Tragium creticum* Guiland. »

— *Fraxinella Cordii et officinarum*, Lob. obs. p. 537; Clus. I, p. 99.

— Esemplare ben conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 138.

244. [159]. **Asplenium Adiantum nigrum** Lin. Sp. pl. II, p. 1081; Richter Cod. p. 1030; Arc. Fl. it. p. 7.

« *Dryopteris.* »

— Cinque frondi ben conservate.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 561.

245. [160 n. 1]. **Digitalis lutea** Lin. Sp. pl. II, p. 622; Richter Cod. p. 601; Arc. Fl. it. p. 400.

« *Digitalis alba*. »

— Esemplare ben conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 364.

246. [160 n. 2]. **Viola tricolor** var. **arvensis** DC.; Lin. Sp. pl. II, p. 936; Richter Cod. p. 881; Arc. Fl. it. p. 298.

« *Diosanthos. Herba Trinitas Fuchsii. Jacea Matthioli. Viola flammea Lobel. Flos Jovis*. »

— *Viola bicolor arvensis*, Bauh. Pin. p. 200.

— Esemplare ben conservato.

— Nel Bolognese volgare. Cocc. Fl. bol. p. 102.

247. [161]. **Daphne Laureola** Lin. Sp. pl. I, p. 357; Richter Cod. p. 372, Arc. Fl. it. p. 218.

« *Daphnoides laureola. Laureago. Chamedaphne Matth. falso. Thymelea Tragi perperam*. »

— *Laureola*, Lob. obs. p. 200.

— Esemplari con sole foglie in discreto stato di conservazione.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 417.

248. [162]. **Pimpinella peregrina** Lin. Sp. pl. I, p. 264; Richter Cod. p. 280; Arc. Fl. it. p. 596.

« *Daucus quibusdam*. »

— *Apium peregrinum fol. subrotundis*, Bauh. Pin. p. 153.

— Esemplare alquanto danneggiato in fiore.

— Manca nel Bolognese.

249. [163]. **Senecio Doria** Lin. Sp. pl. ed. II, p. 1221; Richter Cod. p. 824; Arc. Fl. it. p. 671.

« *Doria. Panax pharnaceum Plin*. »

— *Virga aurea major s. Doria*, Bauh. Pin. p. 268.

— Foglia ed infiorescenza molto danneggiata.

— In Italia e nel Bolognese mancante.

250. [164]. **Doronicum austriacum** Jacq.; Richter Cod. p. 835; Arc. Fl. it. p. 673.

« *Doronicum.* »

— Esemplare alquanto danneggiato.

— V. *Clus. Hist.* p. 19 e *Koch Fl. germ.* p. 381. Questa specie è abbastanza distinta dal *D. Pardalianches* e *Clusio* le ha nettamente separate, mentre *Linneo* le ha unite. V. Richter Cod. p. 835.

— Anche nel bolognese. *Cocc. Fl. bol.* p. 298.

251. [165]. **Delphinium Ajacis** Lin. Sp. pl. I, p. 531; Richter Cod. p. 528; Arc. Fl. it. p. 243.

« *Delphinium. Cuminum sylvestre Matth.* »

— *Consolida regalis hortensis flore majore et simplici*, Bauh. Pin p. 142; *Clus. Hist.* p. 206; *Lob. obs.* p. 426.

— Due esemplari ben conservati.

— Trovasi unito per errore un esemplare di *Delphinium velutinum* Bert. specie esistente spontanea nel Bolognese. V. *Cocc. loc. cit.* p. 71.

— Coltivasi, *Cocc. Fl. bol.* p. 72.

252. [166]. **Delphinium Consolida** Lin. Sp. pl. I, p. 530; Richter Cod. p. 528; Arc. Fl. it. p. 243.

« *Delphinium aliud. Consolida regalis. Dryophonon Plinii.* »

— *Consolida regalis arvensis*, Bauh. Pin. p. 142; *Clus. Hist.* p. 207.

— Esemplare intatto.

— Comune anche nel Bolognese. *Cocc. Fl. bol.* p. 72.

253. [167 u. 1]. **Arabis Turrata** Lin. Sp. pl. II, p. 665; Richter Cod. p. 645; Arc. Fl. it. p. 257.

« *Delphinia. Nasturtii species. Hesperis. Turritis major.* »

— *Turrata major*, *Clus. Hist.* II, p. 126.

— Esemplare fruttifero ben conservato.

— Anche nel Bolognese. *Cocc. Fl. bol.* p. 82.

254. [167 n. 2] **Dipsacus silvestris** Mill.; Richter Cod. p. 109; Arc. Fl. it. p. 650.

« *Dipsacus sylvestris. Virga pastoris.* »

— Esemplare bene conservato.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 263.

255. [168]. *Artemisia Dracunculus* Lin. Sp. pl. II, p. 849; Richter Cod. p. 808; Arc. Fl. it. p. 688.

« *Dracuncellus. Pyretro congener. Tarchon Sethi.* »

— *Draco aut potius Tarchon Simeonis Sethi*, Lob. obs. p. 245.

— Rami con sole foglie.

— Coltivasi nel Bolognese.

256. [169]. *Amaracus Dictamnus* Benth. — *Origanum Dictamnus* Lin. Sp. pl. II, p. 589; Richter Cod. p. 575.

« *Dictamnium creticum.* »

— *Dictamnium creticum*, Bauh. Pin. p. 222; Lob. obs. p. 267.

— Due esemplari ben conservati.

— Coltivasi.

257. [170]. *Dentaria pinnata* Lam.; Arc. Fl. it. p. 261.

« *Dentaria flor. albo.* »

— Esemplare ben conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 84.

258. [171]. *Daucus gummifer* Lam. Dict. I, p. 634; Arc. Fl. it. p. 616.

« *Daucus marinus.* »

— Tavoletta disegnata col Nome di *Daucus marinus Tyburtino similis*. T. P. Agg. 171.

— Due sole foglie e ancora in imperfetto stato di conservazione.

— In Italia, manca nel Bolognese.

259. [172]. *Daucus maximus* Desf.; Arc. Fl. it. p. 616.

« *Daucus creticus aliquibus.* »

— Tavoletta disegnata col nome: *Daucus creticus quibusd.* T. I, Agg. 172.

— Due foglie quasi ridotte alla pura impronta. Impronta di una piccola infiorescenza.

— Il nome di *Daucus creticus* corrisponderebbe all'*Athamantha cretensis* Lin. V. Richter p. 262.

— Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 231.

260. [173 n. 1]. **Inula crithmoides** Lin. Sp. pl. II, p. 833; Richter Cod. p. 834; Arc. Fl. it. p. 693.

« *Empetron. Calcifraga.* »

— Esemplare senza fiori passabilmente conservato.

— Tanto il nome di *Empetron* Lob. quanto quello di *Calcifraga* corrisponderebbero a quello di *Crithmum maritimum* L. sec. Richter Cod. p. 264.

— In Italia, manca nel Bolognese.

261. [173 n. 2]. **Cuscuta Epithymum** Lin. Vedansi i fogli n. 119 e 208.

« *Cuscuta.* »

— Esemplare in fiore ben conservato.

— V. fogli citati. Cocc. Fl. bol. p. 342.

262. [174. n. 1]. **Eruca sativa** Lamk. — *Brassica Eruca* L. Sp. pl. II, p. 667; Richter. Cod. p. 647; Arc. Fl. it. p. 270.

« *Eruca alba.* »

— Esemplare in fiori e frutti bene conservati.

— Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 96.

263. [174 n. 2]. **Diploaxis tenuifolia** DC.; Lin. Sp. pl., ed. 2.^a, p. 917; Richter Cod. p. 638; Arc. Fl. it. p. 269.

« *Eruca lutea.* »

— Esemplari c. s.

— Comune nel Bolognese. Cocc. Fl. it. p. 96.

264. [175]. **Barbarea vulgaris** R. Br. — *Erysimum Barbarea* L. Sp. pl. II, p. 660; Richter Cod. p. 640; Arc. Fl. it. p. 256.

« *Erysini species. Herba Sancti Alberti Bonon. Barbarea Lob. Eruca palustris Dalech.* »

— Esemplare bene conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. it. p. 81.

265. [176]. **Sisymbrium officinale** Scop. — *Erysimum officinale* L. Sp. pl. II, p. 660; Richter Cod. p. 640; Arc. Fl. it. p. 263.

« *Erysimum Matth. Erysimum 2.^{um}. Tabernamont.* »

— Due esemplari bene conservati.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 89.

266. [177 n. 1]. **Equisetum arvense** Lin. Sp. pl. II, p. 1061; Richter Cod. p. 1020; Arc. Fl. it. p. 9.

« *Equisetum. Hippuris. Polygonum foemina Diosc. seu Sanguinaria foemina. Equisetum alterum Matth.* »

— Esemplare sterile.

— Comune nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 563.

267. [177 n. 2]. **Equisetum limosum** Lin. Sp. pl. II, p. 1062; Richter Cod. p. 1020; Arc. Fl. it. p. 10.

« *Equisetum sine foliis. Equisetum nudum Tabernam. Equisetum junceum Tragi.* »

— Esemplare guasto.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 563.

268. [178]. **Peucedanum Cervaria** Lap. — *Athamanta Cervaria* Lin. Sp. pl., ed. 2.^a, I. p. 352; Richter Cod. p. 262.

« *Elaphoboscum.* »

— *Seseli 2.^{um} montanum pannonicum* Clus. Hist. II, p. 193.

— Una sola foglia ben conservata.

— Per errore si è aggiunta una foglia di *Pimpinella* spec. Il nome di *Elaphoboscum* Bauh. Hist. 3. p. 149, corrisponderebbe alla *Pastinaca sativa* Lin. Sec. Richter. l. c. p. 278.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 235.

269. [179 n. 1]. **Erica arborea** Lin. Sp. pl. I, p. 353; Richter Cod. p. 369; Arc. Fl. it. p. 358.

« *Erica. Selago quibusdam.* »

— Sommità fiorita in buono stato di conservazione.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 328.

270. [179 n. 2]. **Galium silvaticum** Lin. Sp. pl. ed. 2.^a, p. 155; Richter Cod. p. 119; Arc. Fl. it. p. 626.

« *Erytrodanum minus. Aparine quibusd.* »

— Esempio composto di sole foglie.

— Per errore vi si trova unito un secondo esemplare appartenente ad un *Galium* affatto diverso.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 257.

271. [180 n. 1]. **Agrimonia Eupatoria** Lin. Sp. pl. I, p. 448; Richter Cod. p. 462; Arc. Fl. it. p. 543.

« *Eupatorium Dioscoridis.* »

— Due buoni esemplari.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 201.

272. [180 n. 2]. **Euphrasia officinalis** Lin. Sp. pl. II, p. 604; Richter Cod. p. 586; Arc. Fl. it. p. 406.

« *Euphrasia ocularis.* »

— *Euphrasia* Lob. obs. p. 261.

— Due piccoli esemplari buoni.

— Per errore trovasi unita una pianticella di *Rhinanthus*.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 368.

273. [181]. **Eupatorium cannabinum** Lin. Sp. pl. II, p. 838; Richter Cod. p. 798; Arc. Fl. it. p. 661.

« *Eupatorium Avicennae, Matth. falso. Cannabina vulgo. Heupatorium aquaticum.* »

— Assai bene conservato.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 303.

274. [182]. **Eryngium campestre** Lin. Sp. pl. I, p. 233; Richter Cod. p. 252; Arc. Fl. it. p. 584.

« *Eryngium Diosc.* »

— *Eryngium campestre vulgare* Clus. Hist. 2, p. 157. Lob. obs. p. 490.

— Esiste una tavoletta solo disegnata col nome di *Eryngium Genuense*, *Argentinum fructu Dipsaci* T. y. 4, p. 242.

— Buon esemplare.

— Raro nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 247.

275. [183 n. 1]. **Scolymus hispanicus** Lin. Sp. pl. II, p. 813; Richter Cod. p. 782; Arc. Fl. it. p. 730.

» *Eryngium officin.* »

— Discreto esemplare.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 304.

276. [183 n. 2]. **Eryngium maritimum** Lin. Sp. pl. I, p. 233; Richter Cod. p. 251; Arc. Fl. it. p. 584.

« *Eryngium marinum. Crocodilon quibusd.* »

— Esemplare buono.

— In Italia, manca nel Bolognese.

277. [184 n. 1]. **Linaria Elatine** Mill. — *Antirrhinum Elatine* L. Sp. pl. II, p. 612; Richter Cod. p. 592; Arc. Fl. it. p. 397.

« *Elatine. Veronica foemina Fuchsiy.* »

— *Veronica foemina* Fuchs. Hist. p. 168.

— Esemplare ben conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 362.

278. [184 n. 2]. **Specularia Speculum** DC. — *Campanula Speculum* Lin. Sp. pl. I, p. 168; Richter Cod. p. 180; Arc. Fl. it. p. 634.

« *Elatine quib. Mazza ferrata. Onobrychis Dodon.* »

— Buon esemplare.

— Comunissimo nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 324.

279. [185 n. 1]. **Rubia tinctorum** Lin. Sp. pl. I, p. 109; Richter Cod. p. 121; Arc. Fl. it. p. 625.

« *Erythrodanum Dioscoridis majus. Rubia tinctorum.* »

— Sole foglie.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 253.

280. [185 n. 2]. **Senecio vulgaris** Lin. Sp. pl. II, p. 867; Richter Cod. p. 822; Arc. Fl. it. p. 667.

« *Erigeron.* »

— Esemplare buono.

— Comunissimo nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 296.

281. [186]. **Calluna vulgaris** Sal.; Lin. Sp. pl. I, p. 352; Richter Cod. p. 368; Arc. Fl. it. p. 358.

« *Erica marina purpurea.* »

— Due buoni esemplari.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 328.

282. [187]. **Viburnum Lantana** Lin. Sp. pl. I, p. 268; Richter Cod. p. 283; Arc. Fl. it. p. 643.

« *Fluida. Rhè foemina. Viburnum Matth. Lantana.* »

— Esemplare fruttificato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 250.

283. [188]. **Fumaria officinalis** Lin. Sp. pl. III, p. 700; Richter Cod. p. 684; Arc. Fl. it. p. 250.

« *Fumus terrae.* »

— Buon esemplare.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 75.

284. [189]. **Foeniculum capillaceum** Gilib.; Arc. Fl. it. p. 602.

« *Foeniculum sativum. Marathrum.* »

— Foglie e fiori alquanto danneggiati.

— Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 239.

285. [190]. **Clematis Flammula** Lin. Sp. pl. I, p. 544; Richter Cod. p. 540; Arc. Fl. it. p. 226.

« *Flammula Jovis. Clematis 2.^a.* »

— Alquanto danneggiata.

— In Italia, manca nel Bolognese.

286. [191 n. 1]. **Briza maxima** Lin. Sp. pl. I, p. 70; Richter Cod. p. 83; Arc. Fl. it. p. 56.

« *Foenum.* »

— In cattivo stato di conservazione.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 540.

287. [191 n. 2]. **Serrafalcus mollis** Parl. — *Bromus mollis* Lin. Sp. pl., ed. II, p. 112; Richter Cod. p. 88.

« *Foenum aliud. Festuca altera Dod.* »

— In buono stato di conservazione.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 546.

288. [191 n. 3]. **Triticum vulgare** (var.) Will.; Arc. Fl. it. p. 70.

« *Frumentum.* »

— Una sola spiga in mediocre stato di conservazione.

— Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 550.

289. [191 n. 4]. **Hordeum disticum** Lin. Sp. pl. I, p. 85; Richter Cod. p. 96; Arc. Fl. it. p. 72.

« *Far - Farnum forte Hordeon distichon Lobelij seu minus.* »

— Due spighe c. s.

— Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 552.

290. [192]. **Zea Mays** Lin. Sp. pl. I, p. 971; Richter Cod. p. 921; Arc. Fl. it. p. 28.

« *Frumentum turcicum luteum.* »

— *Frumentum indicum Mayz dictum*, Bauh. Pin. p. 25; Theat. p. 490; Lob. obs. p. 24.

- Esemplare ben conservato.
- Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 553.

291. [193]. **Polygonum Fagopyrum** Lin. Sp. pl. I, p. 364; Richter Cod. p. 379; Arc. Fl. p. 200.

« *Frumentum indicum. Fagotriticum Belg. Erysimum cereale Ruellii. Ocymum veterum Tragi. Fegopyron. Ocymon cereale seu Tragopyron Tabernamontani.* »

- *Erysimum cereale folio hederaceo*, Bauh. Pin. p. 27; Lob. obs. p. 513.
- *Ocymum cereale*, Tabern. Hist. p. 276.
- Due esemplari, di uno però non rimane che l'impronta.
- Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 411.

292. [194 n. 1]. **Vicia Faba** Lin. Sp. pl. II, p. 737; Richter Cod. p. 717; Arc. Fl. it. p. 522.

« *Faseulus minor Dodon. Faba sativa.* »

- *Faba minor s. equina*, Bauh. Pin. p. 338.
- Esemplare in buono stato di conservazione.
- Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 180.

293. [194 n. 2]. **Fragaria vesca** Lin. Sp. pl. I, p. 495; Richter Cod. p. 500; Arc. Fl. it. p. 541.

« *Fragaria.* »

- Alcuni piccoli esemplari — uno dei quali pare appartenga piuttosto alla *Fragaria collina* Ehrh.
- Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 134.

294. [195]. **Aspidium aculeatum** Sw. — *Polypodium aculeatum* Lin. Sp. pl. II, p. 1090; Richter Cod. p. 1034.

« *Filix mas.* »

- *Filix aculeata major*, Bauh. Pin. p. 358.
- Una sola foglia.
- Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 558.

295. [196]. **Pteris aquilina** Lin. Sp. pl. II, p. 1075; Richter Cod. p. 1027; Arc. Fl. it. p. 8.

« *Filix foemina.* »

— *Filix foemina*, Fuchs. Hist. p. 506.

— Esemplare ben conservato, ridotto ad impronta; una foglia ancora in prefogliazione.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 561.

296. [197]. **Cystopteris fragilis** Bernh. — *Polypodium fragile*, Lin. Sp. pl. II, p. 1091; Richter Cod. p. 1034; Arc. Fl. it. p. 5.

« *Hydropteris. Filix aquatica. Adiantum nigrum* Plin. Lob.»

— Cinque foglie in buono stato di conservazione.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 559.

297. [198]. **Ferula galbanifera** Koch — *Ferula Ferulago*, Lin. Sp. pl. I, p. 247; Richter Cod. p. 265; Arc. Fl. it. p. 609.

« *Ferula.* »

— *Galbanifera ferula*, Lob. obs. p. 451.

— Una foglia sola.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 236.

298. [199]. **Fraxinus Ornus** Lin. Sp. pl. II, p. 1057; Richter Cod. p. 1012; Arc. Fl. it. p. 362.

« *Fraxinus. Orno vulgi. Bumelia seu Bubula. Fraxinus Gazae.* »

— Rametto con sole foglie conservate, il resto ridotto alla sola impronta.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 335.

299. [200]. **Fagus silvatica** Lin. Sp. pl. II, p. 998; Richter Cod. p. 944; Arc. Fl. it. p. 182.

« *Fagus.* »

— Esemplare ben conservato con foglie e frutto

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 440.

300. [201]. **Ficus Carica** Lin. Sp. pl. II, p. 1059; Richter Cod. p. 1016; Arc. Fl. it. p. 187.

« *Ficus sativa.* »

— Due sole foglie.

— Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 428.

301. [202 n. 1]. **Fraxinus Ornus** Lin. V. foglio n. 199.

« *Fraxinus a fragrore.* »

— V. foglio 199.

— Idem.

302. [202 n. 2]. **Pharbitis Nil** Chois. — *Convolvulus Nil* Lin. Sp. Pl. ed. II, p. 219; Richter Cod. p. 170.

« *Nil Avicennae seu Nil semen. Volubilis spec. Scamonia aliquib. Vitis sylv. alys.* »

— Foglie, fiori e frutti.

— Coltivasi nel Bolognese.

303. [203]. **Gentiana Asclepiadea** Lin. Sp. pl. I, p. 227; Richter Cod. p. 247; Arc. Fl. it. p. 367.

« *Gentianella flor. caeruleo.* »

— *Gentiana asclepiadis folio*, Bauh. Pin. p. 187.

— Esempio fiorito alquanto danneggiato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 337.

304. [204]. **Galium verum** Lin. Sp. pl. I, p. 107; Richter Cod. p. 118; Arc. Fl. it. p. 629.

« *Galium luteum.* »

— Quattro esemplari discretamente conservati.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 255.

305. [205]. **Gladiolus segetum** Gawl.; Arc. Fl. it. p. 154.

« *Gladiolus.* »

— Foglie e frutti.

— Comune nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 468.

306. [206 n. 1]. **Filago germanica** Lin. Sp. pl. ed. II. p. 1311; Richter Cod. p. 871; Arc. Fl. it. p. 699.

« *Gnaphalium. Impia quibusd.* »

— *Gnaphalium vulgare Centunculus*, Lob. obs. p. 255.

— Esemplare ben conservato.

— Vedi foglio n. 253.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 287.

307. [206 n. 2]. **Stellaria Holostea** Lin. Sp. pl. I, p. 422; Richter Cod. p. 435; Arc. Fl. it. p. 320.

« *Chamaecissus Oribasii. Gramen leucanthemon Dodon. Holostium Ruellii.* »

— *Holostium Ruellii, Herbarium, etc.* — *Chamaecissus Oribasii ital. etc.* Lob. obs. p. 26.

— Esiste una tavoletta disegnata, ma portante una dicitura illeggibile.

— Esemplare ben conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 117.

308. [206 n. 3]. **Cynodon Dactylon** Pers. — *Panicum Dactylon* Lin. Sp. pl. I, p. 58; Richter Cod. p. 72; Arc. Fl. it. p. 32.

« *Gramen 1.^{us} Dioscorid. Dactyl. 1.^{us} aculeat Plinii. Gramen aculeatum. Gramen canarium alterum Lob. Pentadactylon.* »

— *Gramen legitimum*, Clus. Hist. p. 217.

— Esemplare non fiorito, ben conservato.

— Comune nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 526.

309. [207]. **Lychnis Flos-Cuculi** Lin. Sp. pl. I, p. 436; Richter Cod. p. 449; Arc. Fl. it. p. 315.

« *Odontides. Garofanetti vulgo.* »

— Esemplare ben conservato.

— Comune nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 113.

310. [208 n. 1]. **Trifolium rubens** Lin. Sp. pl. I, p. 768; Richter Cod. p. 743; Arc. Fl. it. p. 496.

« *Trifolium Cauda vulpis.* »

— *Folio pinnato, Lagopus altera*, Lob. obs. p. 499; Clus Hist. p. 246.

— Esemplare buono.

— Il nome *Cauda vulpis* Lob. viene ascritto ad un *Alopeceurus* da Richter Cod. p. 75.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 166.

311. [208 n. 2]. **Trifolium flexuosum** Jacq. — (*Trifolium medium*, Hut.); Richter Cod. p. 744; Arc. Fl. it. p. 496.

(Il nome è lo stesso del *Trifolium rubens* Lin. Sullo stesso foglio furono queste due specie avvicinate dall'Aldrovandi, che però le distinse con due numeri).

— Esiste una tavoletta disegnata col nome di *Trifolium vulpinum*.

— Esemplare ben conservato.

— Anche nei Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 166.

312. [208 n. 3]. **Cuscuta Epithymum** Engl. V. Fogli 119 e 173.

« *Cuscuta.* »

— Vadi fogli 119 e 173.

313. [209]. **Anthyllis Vulneraria** Lin. Sp. pl. II, p. 719; Richter Cod. p. 702; Arc. Fl. it. p. 502.

« *Glaur. Astragalus alys. Anthyllis leguminosa Belgar. Melilotus latifolia Dalech. Anthyllis prior Dod.* »

— *Anthyllis leguminosa Belgarum*, Lob. obs. p. 530.

— Esemplare in ottimo stato di conservazione.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 157.

314. [210 n. 1]. **Agrostemma Githago** Lin. Sp. pl. I, p. 435; Richter Cod. p. 448; Arc. Fl. it. p. 315.

« *Githago. Lolium Fuchsiy. Lychnis segetum.* »

— *Pseudomelanthium, Nigellastrum Dod. Githago Tragi*, Lob. obs. p. 23.

— Fiore e frutto.

— Frequente assai nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 113.

315. [210 n. 2]. **Spartium juncum** Lin. Sp. pl. II, p. 708; Richter Cod. p. 691. Arc. Fl. it. p. 474.

« *Genista*. »

— Esemplari con fiori e frutti alquanto danneggiati.

— Anche nel Bolognese comune. Cocc. Fl. bol. p. 153.

316. [211]. **Glycyrrhiza glabra** Lin. Sp. pl. II, p. 742; Richter Cod. p. 721; Arc. Fl. it. p. 506.

« *Glycyrrhiza Dioscor.* »

— Sole foglie ben conservate.

— Per errore vi si trova unita una foglia di altra specie, forse di *Dictamnus*.

— Rara nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 170.

317. [212]. **Geranium silvaticum** Lin. Sp. pl. II, p. 681; Richter Cod. p. 662; Arc. Fl. it. p. 342.

« *Geranium majus*. »

— Esemplare con fiori e frutti, assai bene conservati.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 128.

318. [213 n. 1]. **Genista germanica** Lin. Sp. pl. II, p. 710; Richter Cod. p. 693; Arc. Fl. it. p. 476.

« *Genistella. Rosmarinum aculeatum Gallor. Tetralix Pl. quibus*. »

— Esemplare con fiori e frutti.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 154.

319. [213 n. 2]. **Geranium Robertianum** Lin. Sp. pl. II, p. 681; Richter Cod. p. 663; Arc. Fl. it. p. 345.

« *Geranii species. Sideritis. Achillea*. »

— *Geranium Robertianum*, Lob. obs. p. 375.

— Esemplare in gran parte rovinato.

— Nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 130.

320. [214] **Geum urbanum** Lin. Sp. pl. I, p. 501; Richter Cod. p. 505; Arc. Fl. it. p. 515.

« *Caryophyllata sylvest. Geum Pl. quibusd.* »

— *Vulgaris Caryophyllata*, Lob. obs. p. 396.

— Due esemplari; uno in fiore, l'altro in frutto, ben conservati.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 191.

321. [215]. **Orlaya grandiflora** Hoffm. — *Caucalis grandiflora* Lin. Sp. pl. I, p. 240; Richter Cod. p. 257; Arc. Fl. it. p. 615.

« *Caucalis quibusd. Daucoides. Lappula.* »

— Esemplare discreto.

— Anche nel Bolognese. Cucc. Fl. bol. p. 231.

322. [216]. **Torilis Anthriscus** Gm. — *Tordylium Anthriscus* Lin. Sp. pl. I, p. 240; Richter Cod. p. 256; Arc. Fl. it. p. 617.

« *Gingidii sp. Lappula canariae sp.* »

— Esemplare bene conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 233.

323. [217]. **Daucus Michellii** Car.; Caruel Prodr. p. 292.

« *Lappula canaria alia. Gingydium aliis.* »

— Esemplare in cattivo stato.

— Recentemente trovata dal sig. G. E. Mattei nel Bolognese.

324. [218 n. 1]. **Daucus Gingidium** Lin. Sp. pl. I, p. 242; Richter Cod. p. 259; Arc. Fl. it. p. 616.

« *Gingydii species alia.* »

— Esemplare insufficiente e discretamente conservato.

— Finora non trovato nel Bolognese.

325. [218 n. 2]. **Jasminum officinale** Lin. Sp. pl. I, p. 7; Richter Cod. p. 22; Arc. Fl. it. p. 361.

« *Gelseminum flore albo.* »

— Discretamente conservato.

— Coltivasi.

326. [219 n. 1]. **Jasminum humile** Lin. Sp. pl. I, p. 7; Richter Cod. p. 22; Arc. Fl. it. p. 361.

« *Gelseminum flor. luteo.* »

— *Gelseminum humile luteum* Bauh. Hist. 2, p. 102.

— In discreto stato.

— Coltivasi.

327. [219 n. 2]. **Scrophularia aquatica** Lin. Sp. pl. II, p. 620; Richter Cod. p. 599; Arc. Fl. it. p. 394.

« *Galeopsis Scrophularia.* »

— Esemplare in frutto.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 363.

328. [220]. **Gentiana Asclepiadea** Lin. (Flore albo). V. foglio N. 203.

« *Gentiana fl. albo seu Gentianella.* »

— Due esemplari discretamente conservati.

— Vedasi foglio N. 203.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 337.

329. [221]. **Sarothamnus vulgaris** Vimm. — *Spartium scoparium*, Lin. Sp. pl. II, p. 709; Richter Cod. 692; Arc. Fl. it. p. 478.

« *Genista species.* »

— Esemplari senza fiori nè frutti.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 153.

330. [222]. **Astragalus Glycyphyllos** Lin. Spl. p. II, p. 758; Richter Cod. p. 735; Arc. Fl. it. p. 511.

« *Hedysari species. Foeniculum graecum sylvestre* Tragi. *Glycyrrhiza sylvestris* Germ. *Glaux quibus. Lob.!* *Polygala Cordii* ».

— Esemplare discretamente conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 171.

331. [223 n. 1]. **Coronilla Emerus** Lin. Sp. pl. II, p. 742; Richter Cod. p. 722; Arc. Fl. it. p. 513.

« *Hedysari species. Foenum graecum. Senna Aloysio. Securidaea minor. Astragalus monspelliens.* »

— La pianta da noi indicata è segnata nel foglio N. 223 col num. 1. È stato asportato un pezzo del foglio sul quale doveva necessariamente essere agglutinato il N. 2 mancante, il quale secondo l'*Indice* portava il nome di *Hypocistis*, che doveva essere il *Cytinus Hypocistis* Lin. (Richter p. 908).

— Esemplare in frutto.

— Comune nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 173.

332. [224 n. 1]. **Astragalus monspessulanus** Lin. Sp. pl. II, p. 761; Richter Cod. p. 738; Arc. Fl. it. p. 512.

« *Hedysari species. Forte caput Gallinaceum Herbar.* »

— Esiste tavoletta solo disegnata col nome di *Hedysarum* spec. T. 5, p. 71.

— Due esemplari bene conservati.

— Comune nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 171.

333. [224 n. 2]. **Coronilla minima** Lin. Sp. pl. edit. II, II, p. 1048; Richter Cod. p. 722; Arc. Fl. it. p. 513.

« *Polygala.* »

— Esemplare unico in buono stato.

— Anche nel Bolognese.

334. [225 n. 1]. **Potentilla hirta** Lin. Sp. pl. I, p. 497; Richter Cod. p. 502; Arc. Fl. it. p. 540.

« *Heptaphyllum lanuginosum.* »

— Esemplare buono.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 193.

335. [225 n. 2]. **Hordeum murinum** Lin. Sp. pl. I, p. 85; Richter Cod. p. 96; Arc. Fl. it. p. 72.

« *Holcus Plin. Hordeum murinum Lobeliy.* »

— *Hordeum spontaneum spurium* Lob. obs. p. 18.

— Tavoletta disegnata col nome di *Holcus Plinii* — *Hordeum spontaneum spurii* Lob.

— Due buoni esemplari.

— Volgarissimo nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 552.

336. [225 n. 3]. **Hordeum vulgare** Lin. Sp. pl. I, p. 84; Richter Cod. p. 96; Arc. Fl. it. p. 72.

« *Hordeum*. »

— Un esemplare solo.

— Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 551.

337. [226]. **Inula Helenium** Lin. Sp. pl. II, p. 881; Richter Cod. p. 832; Arc. Fl. it. p. 690.

« *Helenium* *I.^{mun.}*. »

— *Helenium*, Lob. obs. p. 309.

— Due foglie ed un capolino ben conservati.

— In Italia, manca nel Bolognese.

338. [227]. **Hypericum perforatum** Lin. Sp. pl. II, p. 785; Richter Cod. p. 758; Arc. Fl. it. p. 333.

« *Hypericon*. »

— *Hypericum*, Lob. obs. p. 216.

— Esiste tavoletta disegnata col nome di *Hypericon* fol. angustis.

— Due buoni esemplari.

— Frequente nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 133.

339. [228]. **Ruscus Hypoglossum** Lin. Sp. pl. II, p. 1041; Richter Cod. p. 989; Arc. Fl. it. p. 118.

« *Hypoglosson* *fato. Laurus taxa*. »

— *Hypoglosson Bonifacia*, Lob. obs. p. 362. Clus. Hist. I, p. 278.

— Esemplare buono.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 465.

340. [229]. **Crepis setosa** Hall.; Arc. Fl. it. p. 751.

« *Hyeracium minus*. »

— Esemplare in buono stato di conservazione.

— Comune nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 314.

341. [230]. **Chondrilla juncea** Lin. Sp. pl. II, p. 796; Richter Cod. p. 769; Arc. Fl. it. p. 742.

« *Hyeracium maius. Chondrillae forte species*. »

— Esemplare in cattivo stato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 309.

342. [231]. **Hyssopus officinalis** Lin. Sp. pl. II, p. 569; Richter Cod. p. 559; Arc. Fl. it. p. 425.

« *Hyssopus Matthioli*. »

— *Hyssopus arabum*, Lob. obs. p. 237.

— Quattro esemplari discretamente conservati.

— Coltivasi.

343. [232]. **Salvia Sclarea** Lin. Sp. pl. I, p. 27; Richter Cod. p. 41; Arc. Fl. it. p. 429.

« *Horminum. Sclarea vulgo*. »

— *Sclarea*, Lob. obs. p. 300.

— Esemplare discretamente conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 381.

344. [233]. **Veratrum nigrum** Lin. Sp. pl. II, p. 1044; Richter Cod. p. 993; Arc. Fl. it. p. 144.

« *Helleborus albus*. »

— *Helleborum album*, Lob. obs. p. 167.

— Foglie ed infiorescenza bene conservata.

— In Italia, manca nel Bolognese.

345. [234]. **Helleborus niger** Lin. Sp. pl. I, p. 558; Richter Cod. p. 550; Arc. Fl. it. p. 240.

« *Helleborus niger verus.* »

— *Helleborus niger*, Lob. obs. p. 388.

— Due sole foglie.

— In Italia, manca nel Bolognese.

346. [235]. *Helleborus viridis* Lin. (V. Bocconii Ten.) Sp. pl. I, p. 558; Richter Cod. p. 550; Arc. Fl. it. p. 240.

« *Helleborus adulterinus herbaceus.* »

— Foglie fiori e frutti ben conservati.

— In Italia, manca nel Bolognese.

347. [236]. *Helleborus odorus* W. K.; Arc. Fl. it. p. 240.

« *Helleborus niger alter.* »

— Foglie e fiori bene conservati.

— Comunissimo nel Bolognese. (G. E. Mattei).

348. [237]. *Helleborus foetidus* Lin. Sp. pl. I, p. 558; Richter Cod. p. 550; Arc. Fl. it. p. 241.

« *Helleborastrum Lobel. Helleborina.* »

— Foglie e fiori bene conservati.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 70.

349. [238]. *Lilium croceum* Chaix.; L. Sp. pl. I, p. 302; Richter Cod. p. 316; Arc. Fl. it. p. 124.

« *Heimerocallis* L. Matthioli. *Lilium rubens* Plin. *alterus. Hyacinthus Ovidii.* »

— *Lilium cruentum* IV. *secundum caulem bulbulis donatum*, Lob. obs. p. 84.

— Tavoletta solo disegnata col nome di *Heimerocallidis species* T. 4, Mag. c. 36.

— Esemplare unifloro danneggiato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 456.

350. [239]. **Helichrysum Stoechas** Gaert. — *Gnaphalium Stoechas*, Lin. Sp. pl. II, p. 853; Richter Cod. p. 809; Arc. Fl. it. p. 697.

« *Chrysocome. Heliochrysos. Stoechas citrina quibus. Amaranthus lutea alijs.* »

— *Chrysocome*, Lob. obs. p. 256.

— Tavoletta incisa col nome: *Chrysocome ex Hispania*.

— Sei esemplari discretamente conservati.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 288.

351. [240]. **Gnaphalium luteo-album** Lin. Sp. pl. II, p. 851; Richter Cod. p. 811; Arc. Fl. it. p. 698.

« *Heliochrysos alius. Gnaphalii species.* »

— Cinque esemplari discretamente conservati.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 286.

352. [241]. **Salvia Verbenaca** Lin. Sp. pl. I, p. 25; Richter Cod. p. 39; Arc. Fl. it. p. 430.

« *Hormini species. Centrum galli.* »

— Due esemplari discretamente conservati.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 381.

353. [242]. **Heliotropium europaeum** Lin. Sp. pl. I, p. 130; Richter Cod. p. 148; Arc. Fl. it. p. 386.

« *Heliotropion maius.* »

— *Heliotropium majus*, Lob. obs. p. 132.

— Due buoni esemplari.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 349.

354. [243 n. 1]. **Convolvulus arvensis** Lin. Sp. pl. I, p. 153; Richter Cod. p. 169; Arc. Fl. it. p. 373.

« *Helxine cyssampelos Dod. Convolvulus niger Lob.* »

— Esemplare ben conservato.

— Il nome di *Convolvulus niger* Auct. corrisponderebbe secondo Richter p. 379 al *Polygonum Convolvulus* Lin. Anche il nome di *Helxine*

cyssampelos Dal. apparterrebbe alla medesima specie. Ved. loc. cit. Anche la fig. di *Lobelio* obs. p. 343 corrisponde al *Polygonum Convolvulus*. Il *Convolvulus arvensis* Lin. è figurato dal Lobel a pag. 340.

— Volgarissimo nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 342.

355. [243 n. 2]. **Erythronium Dens-Canis** Lin. Sp. pl. I, p. 305; Richter Cod. p. 319; Arc. Fl. it. p. 122.

— Senza nome.

— Esemplare piccolo bene conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 454.

356. [244]. **Polygonum Persicaria** Lin. Sp. pl. I, p. 361; Richter Cod. p. 377; Arc. Fl. it. p. 201.

« *Hydropiper.* »

— Due esemplari discretamente conservati.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 412.

357. [245]. **Senebiera Coronopus** Poir. — *Cochlearia Coronopus*, Lin. Sp. pl. II, p. 648; Richter Cod. p. 629; Arc. Fl. it. p. 284.

« *Holostium. Herba carrara. Herba stella Bonon. Ruta capraria aliys.* »

— Due esemplari bene conservati ed uno distrutto completamente.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 92.

358. [246]. **Hedera Helix** Lin. Sp. pl. I, p. 202; Richter Cod. 220; Arc. Fl. it. p. 620.

« *Hedera nigra.* »

— Esemplare in fiore bene conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 247.

359. [247]. **Hyoscyamus albus** Liu. Sp. pl. I, p. 180; Richter Cod. p. 193; Arc. Fl. it. p. 388.

« *Hyoscyamus flor. luteo.* »

— Il *Hyoscyamus flore luteo* Riv. è il *H. aureus* Lin. V. Richter, loc. cit. p. 194.

— Esemplare bene conservato.

— Dubbiamente citato per Bologna (Mattei). Cocc. Fl. bol. p. 351.

360. [248]. **Paris quadrifolia** Lin. Sp. pl. I, p. 367; Richter Cod. p. 382; Arc. Fl. it. p. 120.

« *Solcnum tetraphyllo*. *Sol. monococcum* Gesn. *Aconitum monococcum* Cordi. *Herba Paris*. *Aconitum Pardalianches* Fuchsiy. *Aster non Atticus* Cordi. »

— Due esemplari di cui uno con fiore ben conservato.

— *Solanum tetraphyllum* etc. Lob. obs. p. 137. — *Herba Paris* Caes. Tutti i nomi indicati per questa specie dall' Aldrovandi trovansi in *Lobelio* loc. cit.

— Nell' alto Apennino Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 465.

361. [249]. **Lepidium graminifolium** Lin. Sp. pl. II, e lit. 2.^a p. 900; Richter Cod. p. 627; Arc. Fl. it. p. 281.

« *Iberis cardamantica*. *Vincitoxicum*. *Thlaspi angustifolium* Fuchsiy. *Thl. minus*. Dod. *Cardamine* 2.^a Lobel. »

— Esemplare bene conservato.

— Anche nel Bolognese comunissimo. Cocc. Fl. bol. p. 91.

362. [250 n. 1]. **Chamaepeuce gnaphalodes** DC.

« *Jacea moschata* forte *Chamaepitis* 3.^a *Dioscoridis* *congener*. »

N. B. L'indice porta il nome di *Iva moschata*. L'*Iva moschata* secondo Lobel obs. p. 208 è certamente una *Ajuga*.

— Esiste una tavoletta solamente disegnata col nome *Jacea moschata folio Rhamni secundi*, *Artemisiae marinae* Lobeliy similis. T. P. Agg. 250, N. 1 che corrisponde alla specie di cui i residui si contengono in questo foglio.

— L'esemplare è per metà asportato, restano solo le foglie inferiori. Dal disegno della Tavoletta corrispondente si deduce che l'intero esemplare non era fiorifero, ma aveva le foglie conformi a quelle che ancora rimangono.

— L' *Artemisia marina* di Lobel (obs. p. 441) sarebbe secondo Linneo l' *Artemisia coerulescens* L. V. Richter Cod. p. 808. Non si rinviene negli autori il nome di *Jacea moschata*; esiste bensì *Centaurea moschata* Lin. specie affatto diversa, che corrisponde alla *Amberboa moschata* Less. Il nome di *Chamaepitis* corrisponde ad una *Ajuga* V. Cord. p. 61.

— Specie assai rara nota di una sola località della Calabria.

363. [250 n. 2]. **Scirpus Holoschaenus** Lin. Sp. pl. I, p. 49; Richter Cod. p. 64; Arc. Fl. it. p. 81.

« *Juncus rotundus. Holoschaenus Dalech.* »

— Due esemplari discreti.

— Per errore vi si trova un esemplare aggiunto di un *Carex*, forse della *Carex divulsa* Good.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 502.

364. [251 n. 1]. **Epilobium parviflorum** Schreb.; Arc. Fl. it. p. 559.

« *Onagra minima seu Impia. Chamenerii species Gesnero. Delphinium buccinum Dioscorid.* »

— Esemplare in frutto ben conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 212.

365. [251 n. 2]. **Epilobium montanum** Lin. Sp. pl. I, p. 348; Richter Cod. p. 358; Arc. Fl. it. p. 559.

« *Onagra alia Chamen. species. Terzola Pandect. Lysimachia siliquosa. Filius antem patrem. Epilobion.* »

— *Lysimachia siliquosa*, Lob. obs. p. 185.

— Tavoletta incisa colla dicitura *Cham. T. P. Aggl. 251, 1.º*.

— Esemplare in buono stato di conservazione.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 212,

366. [252]. **Epilobium hirsutum** L. Sp. pl. I, p. 347; Richter Cod. p. 359; Arc. Fl. it. p. 559.

« *Lysimachia 1.ª Fuchsiy. Epilobion hirsutum.* »

- Due buoni esemplari.
- Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 211.

367. [253 n. 1]. **Filago germanica** Lin. Vedi foglio N. 206.

« *Gnaphalium Impia.* »

- Esemplari ben conservati.
- V. loc. cit,

368. [253 n. 2]. **Juniperus communis** Lin. Sp. pl. I, p. 1039; Richter Cod. p. 986; Arc. Fl. it. p. 17.

« *Juniperus tertia Dioscorid.* »

- Discreto esemplare in frutto.
- Comune nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 444.

369. [254 n. 1]. **Zizyphus vulgaris** Lam — *Rhamnus Zizyphus*, Lin. Sp. pl. I, p. 194; Richter Cod. p. 211; Arc. Fl. it. p. 469.

« *Jujube domestica. Serica Galen. Zyzzypha Plin. Paliurus Agatoclis.* »

- *Jujuba sylvestris*, Bauh. Pin. p. 446. — *Jujube Arabum* etc. Lob. obs. p. 597.
- Esemplare in frutto danneggiato.
- Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 147.

370. [254 n. 2]. **Xiphion gramineum** Parl. — *Iris graminea*, Lin. Sp. pl. I, p. 69; Richter Cod. p. 56; Arc. Fl. it. p. 157.

« *Iris Illyrica. Gladioli species.* »

- *Iris angustif.*, 3.^a Clus. Hist. I, p. 230. Lob. obs. p. 34.
- Foglie e fiori alquanto danneggiati.
- Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 469.

371. [255]. **Reseda luteola** L. Sp. pl. I; p. 448; Richter Cod. p. 462; Arc. Fl. it. p. 288.

« *Isatis sativa. Guadarella.* »

- *Luteola herba salicis folio*, Bauh. Pin. p. 100. — *Luteola belg.* Lob. obs. p. 190.

— Tre esemplari in discreto stato di conservazione.

— Per errore vi è unita una foglia ridotta a metà, affatto diversa, forse di un *Cychorium*. Il nome di *Isatis sativa* secondo Richter p. 650 corrisponderebbe ad *Isatis tinctoria* Lin.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 103.

372. [256]. **Inula salicina** Lin. Sp. pl. II, p. 882; Richter Cod. p. 833; Arc. Fl. it. p. 691.

« *Asteris Attici species. Incensaria.* »

— Tavoletta incisa col nome di *Aster atticus fl. Helenii luteo* 23 obs. p. 137.

— Due esemplari ben conservati.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 285.

373. [257]. **Inula britannica** Lin. Sp. pl. I, p. 882; Richter Cod. p. 832; Arc. Fl. it. p. 691.

« *Impia alia. Onagrae spec.* »

— Esemplare non fiorito.

— Anche nel Bolognese volgare. Cocc. Fl. bol. p. 284.

374. [258]. **Imperatoria Ostruthium** Lin. Sp. pl. I, p. 259; Richter Cod. p. 275; Arc. Fl. it. p. 611.

« *Herba Rhema. Smyrnum aliq. Laserpitium germanicum. Astantia. Imperatoria 2.^a.* »

— *Astrantia*, Clus. Hist. p. 194. — *Imperatoria, Ostrutium, Smyrnum Tragi, Laserpitium Fuchsiy*, Lob. obs. p. 398.

— Esemplare in fiore e foglie alquanto danneggiato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 234.

375. [259]. **Quercus Ilex** Lin. Sp. pl. II, p. 995; Richter Cod. p. 942; Arc. Fl. it. p. 183.

« *Ilex.* »

— Esemplare ben conservato.

— La pagina è tagliata per metà, quindi è evidente che altri esem-

plari furono asportati. L'indice segna però questa sola specie alla quale necessariamente dovevano appartenere quegli esemplari che ora mancano.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 441.

376. [260]. **Quercus Ilex** Lin. c. s.

« *Ilex alia*. »

— La pagina quivi pure è stata tagliata e gli esemplari, tranne uno, asportati. Questi esemplari probabilmente appartenevano ad altra specie, poichè l' *Indice* li distingue con altro nome cioè con quello di *Ilicis species*.

— Un solo esemplare. Nessuna differenza tra questo e il precedente che giustifichi il nome di « *Ilex alia* » dato dall' Aldrovandi.

— Id.

377. [261]. **Sison Amomum** Lin. Sp. pl. I, p. 252; Richter Cod. p. 269; Arc. Fl. it. p. 594.

« *Ligusticum Dioscoridis*. »

— Foglie e parte di infiorescenza alquanto danneggiata.

— Lobelia obs. p. 425 e 26 col nome di *Ligusticum Dioscoridis* etc. indica una specie affatto diversa forse il *Laserpitium Siler* Lin.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 243.

378. [262]. **Seseli Bocconi** Guss.; Arc. Fl. it. p. 601.

« *Libanotis 1.^a*. »

— Foglie difformi (*Peucedanum* spec.) e fiori alquanto danneggiati.

— Si osservarono altri esemplari di questa specie provenienti da raccolte Aldrovandi nell'Erbario di Monti, che si conserva nel R. Orto botanico di Bologna.

— Manca nel Bolognese.

379. [263]. **Ferula galbanifera** Koch. — *Ferula Ferulago*. Lin. Sp. pl. I, p. 247; Richter Cod. p. 265; Arc. Fl. it. p. 609.

« *Libanotis alia Galenii*. »

- *Galbanifera ferula*, Lob. obs. p. 451.
- Foglie e fiori giovani molto danneggiati.
- Vedi foglio N. 198.
- Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 236.

380. [264]. **Lysimachia vulgaris** Lin. Sp. pl. I, p. 146; Richter Cod. p. 163; Arc. Fl. it. p. 455.

« *Lysimachia lutea. Salicaria.* »

- *Lysimachia lutea*. Lob. obs. p. 185.
- Esemplare discreto.
- Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 391.

381. [265 n. 1]. **Stachys palustris** Lin. Sp. pl. II, p. 580; Richter Cod. p. 569; Arc. Fl. it. p. 436.

« *Lysimachia coerulea bifolia.* »

- Esemplare buono.
- Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 385.

382. [265 n. 2]. **Lythrum Salicaria** Lin. Sp. pl. I, p. 446; Richter Cod. p. 460; Arc. Fl. it. p. 556.

- Indicato collo stesso nome e segnato dal N. 2.
- *Lysimachia purpurea*, Lob. obs. p. 185.
- Esemplare alquanto danneggiato.
- Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 215.

383. [266]. **Lupinus albus** Lin. Sp. pl. II, p. 721; Richter Cod. p. 704; Arc. Fl. it. p. 479.

« *Lupinus sativus.* »

- *Sativus Lupinus*, Lob. obs. p. 514.
- Ottimo esemplare con fiori.
- Coltivasi e in qualche luogo è subspontaneo. Cocc. Fl. bol. p. 156.

384. [267 n. 1]. **Marchantia polymorpha** Lin. Sp. pl. I, p. 1137; Richter Cod. p. 1055.

« *Lichen. Hepatica.* »

— Esemplare ben conservato.

— Comune nel Bolognese.

385. [267 n. 2]. **Primula acaulis** Jacq. Lin. Sp. pl. I, p. 142; Richter Cod. p. 159; Arc. Fl. it. p. 450.

« *Primula veris. Lactuca sylv.* »

— Esemplare ben conservato.

— Vi si trova unito anche un esemplare di *Primula officinalis* Jacq.

— Comunissima. Cocc. Fl. bol. p. 392.

386. [268]. **Solidago Virga aurea** Lin. Sp. pl. II, p. 880; Richter Cod. p. 830; Arc. Fl. it. p. 663.

« *Succisa. Lambruna vulgo. Virga aurea consimilis.* »

— È dubbio se le due foglie unitevi appartengano alla medesima specie.

— Esemplare non ancora fiorito.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 299.

387. [269]. **Ligustrum vulgare** Lin. Sp. pl. I, p. 7; Richter Cod. p. 23; Arc. Fl. it. p. 362.

« *Ligustrum. Alcana.* »

— Due esemplari colle infiorescenze rovinata ed uno in frutto.

— Comune pure nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 334.

388. [270 n. 1]. **Lolium temulentum** Lin. (var. **macrochaeton**) Sp. pl. I, p. 83; Richter Cod. p. 94; Arc. Fl. it. p. 67.

« *Lolium.* »

— Due esemplari assai bene conservati. Vi si trova unito un esemplare atipico, forse appartenente ad altra specie.

— Anche nel Bolognese ove è assai più frequente la forma mutica. Cocc. Fl. bol. p. 548.

389. [270 n. 2]. **Lemna minor** Lin. Sp. pl. II, p. 970; Richter Cod. p. 919; Arc. Fl. it. p. 103.

« *Lenticula palustris*. »

— *Lenticula palustris*, Bauh. Pin. p. 362. Lob. obs. p. 648.

— Esemplare in buono stato.

— Volgare nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 492.

390. [271 n. 1]. **Pistacia Lentiscus** Lin. Sp. pl. II, p. 1026; Richter Cod. p. 973; Arc. Fl. it. p. 465.

« *Lentiscus*. »

— Esemplari con frutti bene conservati.

— Vedasi foglio N. 293.

— Manca nel Bolognese.

391. [271 n. 2]. **Statice Limonium** Lin. Sp. pl. I, p. 274; Richter Cod. p. 292; Arc. Fl. it. p. 458.

« *Limonium Arabum*. »

— Rimane unicamente la impronta di questa specie, la quale nell'Erbario Aldrovandiano era rappresentata da una sola foglia.

— Manca nel Bolognese.

392. [272]. **Trifolium arvense** Lin. Sp. pl. II, p. 769; Richter Cod. p. 744; Arc. Fl. it. p. 494.

« *Lagopus*. »

— *Lagopus*, Fuchs. Hist. p. 494. Lob. obs. p. 498.

— Esemplare ben conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 167.

393. [273 n. 1]. **Linum usitatissimum** Lin. Sp. pl. I, p. 277; Richter Cod. p. 293; Arc. Fl. it. p. 349.

» *Linum sativum*. «

— Esemplare in frutto e fiori.

— Coltivasi e trovasi anche subspontaneo. Cocc. Fl. bol. p. 122.

394. [273 n. 2]. **Lilium candidum** Lin. Sp. pl. I, p. 302; Richter Cod. p. 316; Arc. Fl. it. p. 124.

« *Lilium album.* »

— Solo caule senza fiori e in cattivo stato di conservazione.

— Coltivasi.

395. [274 n. 1]. **Linosyris vulgaris** DC. — *Chrysocoma Linosyris*. Lin. Sp. pl. II, p. 841; Richter Cod. p. 801. — *Aster Linosyris*. Bernh.; Arc. Fl. it. p. 666.

« *Linaria aurea. Linariae 3.^{um} genus Tragi. Amaranthus major. Chrysocome Aloysii Anguillarae. Aster atticus flore luteo. Heliochrysos.* »

— *Linosyris*, Lob. obs. p. 223. Clus. Hist. p. 325.

— Esemplari bene conservati.

— Per errore si trova unita a questa specie un esemplare di *Linum viscosum*.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 299.

396. [274 n. 2]. **Linum angustifolium** Huds.; Richter Cod. p. 294; Arc. Fl. it. p. 349.

« *Linum.* »

— Esemplare in frutto assai guasto.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 122.

397. [275]. **Diospyros Lotus** Lin. Sp. pl. I, p. 1057; Richter Cod. p. 1013; Arc. Fl. it. p. 359.

« *Lotus vera. Laurus regia Plin. Lignum sanctum Patavii.* »

— *Lotus arbor*, ecc., Lob. obs. p. 605; id. Adv. p. 439.

— Esemplare con frammento di frutto e foglie, alquanto danneggiato.

— Manca nel Bolognese.

398. [276]. **Celtis australis** Lin. Sp. pl. I, p. 1043; Richter Cod. p. 1005; Arc. Fl. it. p. 186.

« *Lotus Matth. Frascenago. Perbaro V.* »

— Due buoni esemplari di cui uno con frutti.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 430.

399. [277]. **Melia Azedarach** Lin. Sp. pl. I, p. 384; Richter Cod. p. 402.

« *Lotus V.^{us} Sycomorus vulgaris. Azederach Avicennae.* »

— *Zizipha ecc. Azedarach Avicennae*, Lob. obs. p. 546; Clus. Hist. p. 30.

— Esempiare con fiori in mediocre stato di conservazione.

— Coltivasi.

400. [278 n. 1]. **Melilotus officinalis** Desr. — *Trifolium M. officinale* Lin. Sp. pl. II, p. 765; Richter Cod. p. 741; Arc. Fl. it. p. 491.

« *Lotus pratensis lutea mon. Melilotus germanica Lob. Sol-fanella Bon. Melilotus lutea et alba Avicennae Lobel. Trifolium odoratum Dodon.* »

— Esempiare bene conservato,

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 169.

401. [278 n. 2]. **Melilotus alba** Desr. — *Trifolium M. officinalis* var. γ . Lin. Sp. pl. II, p. 765; Richter Cod. p. 741; Arc. Fl. it. p. 491.

« *Lotus pratensis alba.* »

— Esempiare bene conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 169.

402. [279]. **Melilotus alba** Desr. v. c. s.

« *Lotus urbana Matthioli.* »

— Id. c. s.

— Id. c. s.

403. [280]. **Lunaria rediviva** Lin. Sp. pl. II, p. 653; Richter Cod. p. 634; Arc. Fl. it. p. 272.

« *Viola lunaris 1.^a Tabernamont. Lunaria odorata. Viola latifolia Dod. Nyctigreton forte Plinii.* »

— *Lunaria graeca, bolbanac belg.*, Lob. obs. p. 174.

— Esempolari con fiori e frutti assai bene conservati.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 85.

404. [281]. **Adenostyles alpina** B. et F. — *Cacalia alpina*, Lin. Sp. pl. II, p. 836; Richter Cod. p. 797; Arc. Fl. it. p. 661.

« *Tussilago alpina*. *Lunaria rotunda*. *Petasites quibus*. *Cacalia*. »

— Due esemplari assai ben conservati.

— Il nome di *Tussilago alpina* è piuttosto riferibile all' *Homogyne alpina* Cass.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 303.

405. [282]. **Cytisus Laburnum** Lin. Sp. pl. II, p. 739; Richter Cod. p. 718; Arc. Fl. it. p. 477.

« *Laburnum Plin*. *Anagyris Matth*. »

— Esemplare alquanto danneggiato, con fiori e frutti.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 155.

406. [283 n. 1]. **Agrostemma coronaria** Lin. Sp. pl. I, p. 436; Richter Cod. p. 448; Arc. Fl. it. p. 315.

« *Lychnis coronaria*. »

— *Lychnis coronaria*, Lobel. obs. p. 181.

— Abbastanza conservato.

— Recentemente indicato anche per il Bolognese (Mattei).

407. [283 n. 2]. **Dianthus Liburnicus** Bart.; Arc. Fl. it. p. 305.

« *Lychnis agria*. »

— Tavoletta disegnata col nome di *Lychnis agria Polyanthus* T. y. 4. 36.

— Bene conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 108.

408. [283 n. 3]. **Dianthus Caryophyllus** Lin. Sp. pl. I, p. 410; Richter Cod. p. 426; Arc. Fl. it. p. 306.

« *Lychnis agria alba*. »

— *Caryophyllus*, Lob. obs. p. 241.

— Esemplaretti in cattivo stato.

— Cocc. u. s. Fl. bol. p. 109.

409. [284 n. 1]. **Lithospermum officinale** Lin. Sp. pl. I, p. 132; Richter Cod. p. 149; Arc. Fl. it. p. 380.

« *Lithospermon rectum.* »

— Esemplare in frutto in buono stato.

— Cocc. Fl. bol. p. 346.

410. [284 n. 2]. **Lithospermum purpureo-coeruleum** Lin. Sp. pl. I, p. 132; Richter Cod. p. 150; Arc. Fl. it. p. 380.

« *Lithospermum repens.* »

— *Lithospermum repens majus*, Clus. Hist. p. 168. Lob. obs. p. 245.

— Esemplare non fiorifero.

— Cocc. Fl. bol. p. 346.

411. [285]. **Melittis Melissophyllum** Lin. Sp. pl. II, p. 597; Richter Cod. p. 580; Arc. Fl. it. p. 433.

« *Lamium Plinii.* »

— Due esemplari in fiore e frutti ben conservati.

— Anche nel Bolognese comune. Cocc. Fl. bol. p. 383.

412. [286]. **Levisticum officinale** Koch. — *Ligusticum Levisticum*, Lin. Sp. pl. I, p. 250; Richter Cod. p. 267; Arc. Fl. it. p. 608.

« *Levisticum vulgare Fuchsii. Smyrnum Ruellii. Hippo-selinum.* »

— *Levisticum*, Lob. obs. p. 401.

— Foglie e fiori quasi rovinati.

— Manca nel Bolognese.

413. [287]. **Lappa major** Gaertn. — *Aretium Lappa*, v. β; Lin. Sp. pl. II, p. 816; Richter Cod. p. 782; Arc. Fl. it. p. 703.

« *Lappa major.* »

— Esemplare in buono stato.

— Anche nel Bolognese volgare. Cocc. Fl. bol. p. 281.

414. [288]. **Humulus Lupulus** Lin. Sp. pl. II, p. 1028; Richter Cod. p. 976; Arc. Fl. it. p. 186.

« *Lupulus*. »

— *Lupus salictarius sive Lupulus*, Lob. obs. p. 347.

— Esempolari con frutti giovani e maturi — in discreto stato di conservazione.

— Coltivasi e subsontaneo nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 432.

415. [289]. **Convallaria majalis** Lin. Sp. pl. I, p. 314; Richter Cod. p. 328; Arc. Fl. it. p. 120.

« *Lilium convallium*. »

— Sole foglie e ben conservate.

— Coltivasi ed è anche indicata per spontanea nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 465.

416. [290]. **Cistus monspeliensis** Lin. Sp. pl. I, p. 524; Richter Cod. p. 521; Arc. Fl. it. p. 291.

« *Ledon. Cistus Ladanifera*. »

— Esempolare in parte asportato. L'indice però non porta altra indicazione che il nome di *Ladanum*.

— L'esemplare è molto atipico e forse rappresenta il *Cistus florentinus* Lamk. corrispondente al *Cist. monspeliensis* × *salviaefolius*.

— Manca nel Bolognese.

417. [291 n. 1]. **Blechnum Spicant** Roth. — *Osmunda Spicant*, Lin. Sp. pl. II, p. 1066; Richter Cod. p. 1023; Arc. Fl. it. p. 7.

« *Lonchitis altera vel aspera*. »

— *Lonchitis altera*, Lob. obs. p. 475.

— Foglie bene conservate.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 561.

418. [291 n. 2]. **Luzula multiflora** Lej.; Arc. Fl. it. p. 111.

» *Luciola herba vulg. Ischaemon*. »

— Pianta non florifera.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 497.

419. [291 n. 3]. **Usnea barbata** Lin. — *Lichen barbatus*, Lin. Sp. pl. II, p. 1155; Richter Cod. p. 1064.

« *Abies foemina candida*. »

— Esemplare in parte mancante.

— Non è conservato altro che alcuni pezzi del tallo dell' *Usnea* e alcune foglie di un *Abies*.

Anche nel Bolognese.

420. [292 n. 1]. **Xanthium Strumarium** Lin. Sp. pl. II, p. 987; Richter Cod. p. 934; Arc. Fl. it. p. 690.

« *Xanthium. Lappula minor*. »

— *Xanthium*, Lobel. obs. p. 319. Adv. p. 254.

— Esemplare in frutto.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 321.

421. [292 n. 2]. **Phyllirea media** Lin.: Richter Cod. p. 23; Arc. Fl. it. p. 361.

« *Ligustrum marinum. Halymus quib*. »

— Ramo non fiorito e mancante di alcune foglie.

— Vedi foglio N. 5.

— Anche nel Bolognese. Vedi Mattei, Aggiunte, ecc.

422. [293]. **Pistacia Lentiscus** Lin. Sp. pl. II, p. 1026; Richter Cod. p. 973; Arc. Fl. it. p. 465.

« *Lentiscus*. »

— Tav. incisa col nome di *Pistachium fructu racemosum rotundo* T. 4. M. c. 9.

— Esemplare ben conservato.

— Manca nel Bolognese.

423. [294]. **Viburnum Tinus** Lin. Sp. pl. I. p. 267; Richter Cod. p. 283; Arc. Fl. it. p. 643.

« *Laurus sylvestris. Tynnus Theoph*. »

— *Tinus lusitanica Clusii*, Lob. obs. p. 572. Clus. Hist. p. 49.

- Esemplare non fiorito.
- Vedi pure il foglio seguente al N. 2.
- Manca nel Bolognese dove si coltiva.

424. [295 n. 1]. **Laurus nobilis** Lin. Sp. pl. I, p. 389; Richter Cod. p. 384; Arc. Fl. it. p. 219.

« *Laurus baccifera.* »

- Esemplare con frutti.
- Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 417.

425. [295 n. 2]. **Viburnum Tinus** Lin. Vedasi foglio N. 294.

» *Laurus Delphica Plin. Trigos Lactanty Gramatici.* »

- Esemplare non fiorito a cui rimangono solo alcune foglie.
- Come al foglio 294.

426. [296]. **Medicago sativa** L. Sp. pl. II, p. 778; Richter Cod. p. 751.

« *Medica.* »

- Esemplare con fiori e frutti bene conservati.
- Vedi pure foglio N. 320.
- Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 161.

427. [297]. **Medicago sativa** Lin. V. c. s.

« *Medica alia.* »

- Id. meno conservato.
- Id.
- V. id.

428. [298 n. 1]. **Lapsana communis** Lin. Sp. pl. II, p. 811; Richter Cod. p. 780; Arc. Fl. it. p. 730.

« *Morsus Diaboli. Lampsana Lob.* »

- *Lampsana*, Lob. obs. p. 104. Adv. p. 70.
- Esemplare con fiori e frutti in buono stato.

— Il nome di *Morsus Diaboli* Cam. Epit. 397 corrisponde, secondo Linneo, alla *Scabiosa succisa*: V. Richter p. 110.

— Anche nel Bolognese volgare. Cocc. Fl. bol. p. 305.

429. [298 n. 2]. **Brachythecium salebrosum** Hoffm.; Schimp. Syn. p. 532; Rabenh. Exicc. p. 772.

« *Muscus. Bryon.* »

— Piccolo esemplare non fruttificato.

— La determinazione di questo esemplare e del seguente venne fatta dal D. A. Fiori.

430. [298 n. 3]. **Eurhynchium praelongum** Lin. Schimp. Syn. p. 673. Nessuna indicazione. Tanto questo come il precedente portano segnato uguale N. 2.

— Frustulo di esemplare non fruttificato.

431. [298 n. 4]. **Evernia Prunastri** Lin.

« *Muscus alter.* »

— Esemplare ridotto a pochi frammenti di Tallo.

432. [299 n. 1]. **Citrus decumana** Lin.

« *Malus Assyria.* »

— Ramo non fiorito.

— Vedasi N. 121. Confrontisi anche con l'esemplare contenuto nel Tom. VI, p. 387 dell'Erbario Aldrovandi.

— Coltivasi.

432 bis. [299 n. 2].

« *Cistus Ledon* (an *Leo?*), *Seseli massilense aliys Creticus.* »

— Tavoletta che rappresenta una Ombrellifera col nome di *Seseli Massilense* etc.

— NB. È stata esportata la parte di pagina che corrisponde a questo numero — forse questo foglio poteva contenere un *Cistus* ma è più probabile contenesse invece una *Ombrellifera*, poichè nell'Indice al numero

corrispondente trovasi scritto *Seseli massilense alijs creticus*. Ricordo però che il *Seseli massilense* di Bauhin corrisponderebbe al *Seseli tortuosum* Lin. Vedi Richter p. 276.

433. [300 n. 1]. **Mespilus germanica** Lin. Sp. pl. I, p. 478; Richter Cod. p. 486; Arc. Fl. it. p. 553.

« *Mespilus setania*. »

— *Mespilus setania*, Dalech. Hist. p. 334. Bauh. Pin. p. 453. Lob. obs. p. 591.

— Esemplaretto con porzione di frutto.

— Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 203.

434. [300 n. 2]. **Crataegus Azarolus** Lin. Sp. pl. I, p. 477; Richter Cod. p. 485; Arc. Fl. it. p. 553.

« *Mespilus Aronia*. »

— *Mespilus aronia*, Lob. obs. p. 615.

— Due esemplari ben conservati portanti frutti.

— Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 203.

435. [301]. **Mercurialis annua** Lin. (*Planta foeminea*). Lin. Sp. pl. II, p. 1035; Richter Cod. p. 981; Arc. Fl. it. p. 196.

« *Mercurialis mas*. »

— *Mercurialis* Lob. obs. p. 131.

— Due buoni esemplari.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 124.

436. [302]. **Mercurialis annua** (*Planta mas*) Lin. c. s.

« *Mercurialis foemina*. »

— Esemplare assai bene conservato.

— Loco cit.

437. [303]. **Morus alba** Lin. Sp. pl. II, p. 986; Richter Cod. p. 933; Arc. Fl. it. p. 187.

« *Morus alba*. »

- *Morus candida* Lob. obs. p. 610; Adv. p. 441.
- Esemplari con frutti.
- Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 428.

438. [304]. **Morus nigra** Lin. Sp. pl. II, p. 986; Richter Cod. p. 933; Arc. Fl. it. p. 187.

« *Morus nigra.* »

- Esemplare con sole foglie.
- Idem.

439. [305]. **Allium nigrum** Lin., ed. II, I, p. 430; Richter Cod. p. 314; Arc. Fl. it. p. 133.

« *Moly Theophrast.* »

- Infiorescenza e foglie discretamente conservate.
- Raro nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 459 indica la sola varietà *magicum*. Trovata nel Bolognese dal prof. *Sacenti* anche la specie indicata dall'*Aldrovandi* (G. E. Mattei).

440. [306]. **Campanula medium** Lin. Sp. pl. I, p. 167; Richter Cod. p. 179; Arc. Fl. it. p. 640.

« *Medion.* »

(Questa parola è seguita da queste due altre *semper virens* sulle quali è tirata una linea).

- *Viola mariana*. Lob. obs. p. 175; Adv. p. 137.
- Due esemplari alquanto rovinati.
- Rara nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 327.

441. [307 n. 1]. **Campanula medium** Lin. c. s.

« *Medion moriens.* »

- Esemplare in cattivo stato di conservazione.
- Rara nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 327.

442. [307 n. 2]. **Mentha arvensis** Lin. Sp. pl. II, p. 577; Richter Cod. p. 564; Arc. Fl. it. p. 421.

« *Mentha.* »

— Esempolari senza fiori.

— Rara nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 375. *Mentha arvensis* Lin.
β gentilis Solo.

443. [308]. **Stachys palustris** Lin. Vedi foglio 265.

« *Mentha romana.* »

— Esemplare buono.

— Col nome di *Mentha romana* gli Autori indicavano la *Mentha viridis* Lin. e non questa specie. V. Richter Cod. p. 563 e Lob. obs. p. 271. Però la figura di *Lobel* loc. cit. rammenta questa specie.

— V. Foglio 265.

444. [309 n. 1]. **Punica Granatum** Lin. Sp. pl. I, p. 472; Richter Cod. p. 480; Arc. Fl. it. p. 563.

« *Malum punicum.* »

— *Malum punicum* Lob. obs. p. 564.

— Due esemplari in cattivo stato.

— Coltivasi e subspontaneo. Cocc. Fl. bol. p. 207.

445. [309 n. 2]. **Tenuacrium Marum** Lin. Sp. pl. II, p. 564; Richter Cod. p. 555; Arc. Fl. it. p. 442.

« *Marum.* »

— Un piccolo esemplare.

— Parte di questo foglio è stato asportato con un altro esemplare di questa stessa specie.

— Coltivasi.

446. [310] **Meum athamanticum** Jacq. — *Athamantha Meum* Lin. Sp. pl. I, p. 244; Richter Cod. p. 263; Arc. Fl. it. p. 606.

« *Meum verum.* »

— *Meum* Lob. obs. p. 449.

— Due esemplari in cattivissimo stato.

— Manca nel Bolognese, frequente nell'Apennino Modenese e Toscano.

447. [311 n. 1]. **Althaea rosea** Cav. (var. **alba**) — *Alcea rosea* Lin. Sp. pl. II, p. 687; Richter Cod. p. 670; Arc. Fl. it. p. 340.

« *Malva hortensis alba*. »

— Foglie e fiori assai danneggiati.

-- Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 126.

448. [311 n. 2]. **Althaea rosea** (var. **coerulea**) Cav. — Id. ut s.

« *Malva hortensis coerulea*. »

— Idem.

— Idem.

449. [312]. **Myrrhis odorata** Jacq. — *Scandix odorata* Lin. Sp. pl. I, p. 256; Richter Cod. p. 273; Arc. Fl. it. p. 600.

« *Myrrhis*. »

— *Myrrhis* Lob. Obs. p. 423. — *Cicutaria odorata* Bauh. Pin. p. 160.

— Foglie discretamente conservate. Impronta dei frutti, dei quali uno solo ne rimane.

— Manca nel Bolognese, ma è frequente nell'Apennino di Modena e di Toscana.

450. [313]. **Melissa officinalis** Lin. Sp. pl. II, p. 592; Richter Cod. p. 577; Arc. Fl. it. p. 427.

« *Melissophyllum*. »

— *Apiastrum sive Melissophyllum* Lob. Obs. p. 277.

— Esemplare bene conservato.

— Il nome di *Melissophyllum* Riv. Fuchs. Corda Trag. ecc., corrisponderebbe alla *Melittis melissophyllum* Lin. e non a questa specie.

— Frequente nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 380.

451. [314]. **Marrubium vulgare** (var. **Apulum** Ten.) Lin. Sp. pl. II, p. 583; Richter Cod. p. 571; Arc. Fl. it. p. 434.

« *Marrubium verum*. »

— Due esemplari, di cui uno danneggiato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 384.

452. [315]. **Panicum miliaceum** Lin. Sp. pl. I, p. 58; Richter Cod. p. 72; Arc. Fl. it. p. 31.

« *Milium*. »

— *Milium* Lob. Obs. p. 24.

— Esemplare in buono stato.

— Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 525.

453. [316]. **Persica vulgaris** Mill. — *Amygdalus Persica* Lin. Sp. pl. I, p. 472; Richter Cod. p. 481; Arc. Fl. it. p. 532.

« *Malum persicum*. »

— *Persica malus* Lob. Obs. p. 568.

— Esemplare con sole foglie.

— Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 186.

454. [317]. **Cydonia vulgaris** Pers. — *Pyrus Cydonia* Lin. Sp. pl. I, p. 480; Richter Cod. p. 488; Arc. Fl. it. p. 553.

« *Malum cydonium*. »

— *Cotonea seu Cydonia mala* Lob. Obs. p. 580.

— Abbastanza ben conservato.

— Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 204.

455. [318 n. 1]. **Mentha rotundifolia** (var.). Lin. Sp. pl., edit. II, p. 805; Richter Cod. p. 563; Arc. Fl. it. p. 420.

« *Mentastrum*. »

— Buon esemplare.

— Nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 375.

456. [318 n. 2]. **Mentha rotundifolia** Lin. (var.) ut s.

« *Mentastrum aliud*. »

— Idem.

— Idem c. s.

457. [319 n. 1]. **Doryenium suffruticosum** Vill. — *Lotus Dorycnium* Lin. Sp. pl. II, p. 776; Richter Cod. p. 749; Arc. Fl. it. p. 503.

« *Dorycnium Hispanicum Clusii.* »

— Esemplare ben conservato.

— Linneo (v. Richter p. 749) col nome di *Lotus Dorycnium* confonde assieme queste due specie. - Il *Dorycnium Hispanicum* di Clusio Rar. plant. hist. p. 101 è realmente il *Dorycnium suffruticosum* di Vill. - Anzi, a proposito di questa specie Clusio loc. cit. così si esprime: *Ejus semen a C. V. Ulisse Aldrovando aliquando missum fuit Trifolii albi appellatione, et ex illo plantae natae.*

— Manca nel Bolognese.

458. [319 n. 2]. ***Dorycnium herbaceum*** Vill. V. s.

« *Melilotum aliud.* »

— Due esemplari danneggiati.

L'Indice porta per il foglio n. 319, il nome complessivo di *Melilotum album*, non facendo alcuna differenza fra le due specie che realmente esistono in Erbario.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 162.

459. [320 n. 1]. ***Medicago sativa*** Lin. Vedi fogli 296 e 297.

« *Melilotum alterum.* »

— Vedi fogli 296 e 297.

460. [320 n. 2]. ***Medicago falcata*** Lin. Sp. pl. II, p. 779; Richter Cod. p. 751; Arc. Fl. it. p. 486.

« Non porta alcuna indicazione tranne il numero 2. »

— Tavoletta disegnata col nome di *Trifolium falcatum* etc.

— Esemplarino ben conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 161.

461. [321]. ***Lotus corniculatus*** (f. *latifolia*) Lin. Sp. pl. II, p. 775; Richter Cod. p. 749; Arc. Fl. it. p. 504.

« *Melilotum aliud vulgare.* »

— *Melilotus coronata* Lob. Obs. p. 501.

— Tavoletta disegnata, ma senza nome.

- Esempolari alquanto danneggiati.
- Volgarissimo. Cocc. Fl. bol. p. 158.

462. [322] **Hippocrepis comosa** Lin. Sp. pl. II, p. 744; Richter Cod. p. 724; Arc. Fl. it. p. 515.

« *Melilotum aliud.* »

- Tavoletta disegnata senza indicazioni.
- Esempolari in cattivissimo stato di conservazione.
- Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 173.

463. [323]. **Solanum esculentum** Dun. (*S. melongena* Lin.) var. **fructu albo** Lin. Sp. pl. I, p. 186; Richter Cod. p. 199; Arc. Fl. it. p. 389.

« *Mala insana alba.* »

- *Melangena vel Mala insana* Lob. Obs. p. 138.
- Due foglie.
- Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 352.

464. [324]. **Solanum esculentum** Dun. (*S. melongena* Lin. var. **fructu purpureo**). Come s.

« *Mala insana purpurea.* »

- Due foglie e due fiori.
- Idem.

465. [325 n. 1]. **Teucrium Scorodonia** Lin. Vedi n. 134.

« *Menthastrum.* »

- Esempolare ben conservato.
- Vedi foglio n. 134.

466. [325 n. 2]. **Viola odorata** Lin. Sp. pl. II, p. 934; Richter Cod. p. 880; Arc. Fl. it. p. 296.

« *Viola matronalis. Mater violarum.* »

- Tre foglie disposte l'una sopra l'altra.

— La *Viola matronalis* Dod., p. 161, corrisponde, secondo Linneo all'*Hesperis matronalis*. V. Richter Cod. p. 644.

— Volgarissimo nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 100.

467. [326]. **Sorbus Aria** Crtz. — *Crataegus Aria* Lin. Sp. pl. I, p. 475; Richter Cod. p. 484; Arc. Fl. it. p. 554.

« *Aria Theoph. Matalum agnum. Lotus sylv.^{is} aliys.* »

— *Aria* Dalechamp. Hist. 202; Lob. Adv. 435.

— Esemplare ben conservato con sole foglie.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 206.

468. [327 n. 1]. **Rhamnus Frangula** Lin. Sp. pl. I. p. 193; Richter Cod. p. 210; Arc. Fl. it. p. 468.

» *Matalum aliud.* «

— Esemplare di sole foglie in cattivo stato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 147.

469. [327 n. 2]. **Mentha rotundifolia** Lin. (var.). Vedi n. 318.

« *Menta.* »

— Esemplare passabilmente ben conservato.

— Nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 375.

470. [328 n. 1]. **Mentha viridis** Lin. Sp. pl. II, ed. II, p. 804; Richter Cod. p. 563; Arc. Fl. it. p. 421.

« *Menthastrum.* »

— Esemplare ben conservato.

— Coltivata e subspontanea. Cocc. Fl. bol. p. 376.

471. [328 n. 2]. **Mentha rotundifolia** Lin. (var.). Vedi n. 318 e 327.

« *Menta alia.* »

— Buon esemplare.

— Vedi fogli n. 318 e 327.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 375.

472. [329]. **Mentha rotundifolia** Lin. (var.) Vedi c. s.

« *Menthastrum*. »

— Due esemplari alquanto dissimili, ben conservati.

— Come sopra.

— c. s.

473. [330]. **Myrtus communis** Lin. (var. **latifolia** Willk. Lange.); Lin. Sp. pl. I, p. 471; Richter Cod. p. 479; Arc. Fl. it. p. 562. (Linneo indica sette varietà di questa specie, ma poco caratterizzate).

« *Myrtus latifolia sylvestris*. »

— Clusius - *Rar. Pl. Hist.* p. 65 e 66 - ha una varietà di *Myrtus* che chiama « *Baetica latifolia sylvestris* » corrispondente appunto a questa forma. Vedasi anche Willkomm et Lange Fl. hisp. 3, p. 191.

— Esemplaretti n. 2 ben conservati.

— Secondo l'Indice la parte di foglio asportata conteneva i n. 1 e 2, i quali erano così caratterizzati:

N. 1. *Myrtus platiphyllus alter vulgo* - *Rhu Plinii congener*.

N. 2. *Myrtus Tarantina Plinii sive Myrtillus, Mortilla vulgo*.

Probabilmente dovevano essere specie del gen. *Vaccinium* Lin.

— Manca nel Bolognese.

474. [331]. **Myrtus communis** Lin var. **microphylla** Willk. Lange. Come s.

« *Myrtus altera*. »

— Un esemplare ben conservato; l'altro ridotto alla impronta sola.

— Manca nel Bolognese.

475. [332]. **Lepidium sativum** Lin. Sp. pl. II, p. 644; Richter Cod. p. 627; Arc. Fl. it. p. 280.

« *Nasturtium agreste*. »

— Esemplare in frutto ben conservato.

— Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 91.

476. [333 n. 1]. **Iberis umbellata** Lin. Sp. pl. II, p. 649; Richter Cod. p. 630; Arc. Fl. it. p. 283.

« *Thlaspi Cappadocicum. Iberis Dod.* »

— *Thlaspi Candiae Umbellati. Iberidis folio* Lob. Obs. p. 108.

— Esemplaretto discreto.

— Parte della pagina è asportata — manca un esemplare appartenente forse a questa specie. L'indice porta i due nomi soli che rimangono a caratterizzare le due specie contenute nel foglio 333.

— Coltivasi — indicata anche come spontanea in Italia. Manca nel Bolognese.

477. [333 n. 2]. **Lysimachia Nummularia** Lin. Sp. pl. II, p. 148; Richter Cod. p. 164; Arc. Fl. it. p. 455.

« *Nummularia. Denariola.* »

— Esemplari bene conservati.

— Frequente nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 392.

478. [334]. **Juglans regia** Lin. Sp. pl. II, p. 997; Richter Cod. p. 943; Arc. Fl. it. p. 174.

« *Nux.* »

— *Nux - Juglans* Lob. Obs. p. 545.

— Una sola foglia.

— Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 438.

479. [335]. **Nymphaea alba** Lin. Sp. pl. I, p. 510; Richter Cod. p. 515; Arc. Fl. it. p. 246.

« *Nymphaea alba.* »

— *Nymphaea alba* Lob. Obs. p. 324.

— Una foglia e due fiori assai danneggiati.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 73.

480. [336]. **Nuphar luteum** Sm. — *Nymphaea lutea* Lin. Sp. pl. I, p. 510; Richter Cod. p. 515; Arc. Fl. it. p. 246.

« *Nymphaea lutea.* »

— *Nymphaea lutea* Lob. Obs. p. 324.

— Due foglie e due fiori in cattivo stato di conservazione.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 73.

481. [337 u. 1]. **Caltha palustris** Lin. Sp. pl. I, p. 558; Richter Cod. p. 550; Arc. Fl. it. p. 240.

« *Nymphaea alia quib. Farfugium Plin. Caltha palustris Lobel.* »

— *Caltha palustris Gesneri et recent.* Lob. Obs. p. 323; Adv. p. 256.

— Due foglie e rametto fiorifero assai danneggiato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 70.

482. [337 n. 2]. **Hydrocharis Morsus-ranae** Lin. Sp. pl. II, p. 1036; Richter Cod. p. 981; Arc. Fl. it. p. 109.

« *Nuphar parva. Farum Ausc. (?)*. »

— *Ranae morsus* Lob. Obs. p. 324; Adv. p. 258.

— Quattro foglie discretamente conservate.

— Il nome di *Farus* viene da Lobelio riferito all' *Arum maculatum* Lin. V. Lobel. Obs. p. 325.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 489.

483. [338]. **Nigella damascena** Lin. Sp. pl. I, p. 534; Richter Cod. p. 531; Arc. Fl. it. p. 241.

« *Nigella citrina. Damasonium Plinii. Isopyrion quib.* »

— *Melanthium sylvestre* Lob. Obs. p. 428. (la *Nigella citrina* di Lob. è la *Nigella sativa*).

— Due esemplari alquanto danneggiati.

— Per errore vi si trova aggiunta una foglia di Ombrellifera.

— Comunissima nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 71.

484. [339]. **Raphanus sativus** Lin. Sp. pl. II, p. 669; Richter Cod. p. 649; Arc. Fl. it. p. 270.

« *Napus. Navone Bonon.* »

— Due esemplari fioriferi ed uno con frutti, forse appartenenti a specie differenti: discretamente conservati.

— Il *Navone* dei bolognesi è la *Brassica campestris* var. *esculenta*, cui forse appartengono le silique contenute in questo foglio.

— Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 95 e 97.

485. [340]. **Rapistrum rugosum** All.: Lin. Sp. pl. II, p. 640; Richter Cod. p. 622; Arc. Fl. it. p. 271.

« *Napus alter.* »

— Esemplare in buono stato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 93.

486. [341]. **Nigella damascena** Lin. Vedi foglio N. 338.

« *Nigella citrina.* »

— Due esemplari di cui uno in fiore ed uno in frutto alquanto danneggiati.

— V. foglio N. 338.

487. [342 n. 1]. **Listera ovata** R. Brow. — *Ophrys ovata* Lin. Sp. pl. II, p. 946; Richter Cod. p. 892; Arc. Fl. it. p. 161.

« *Ophris.* »

— Nel Tom. 4 foglio N. 386 dell'Erbario, col nome di *Ophrys Plinii* etc. tre esemplari in fiore di *Listera ovata* R. Brow.

— *Ophris* Fuchs. Hist. p. 565.

— Esemplare non fiorito con sole due foglie.

— Il nome *Ophrys* viene dato, secondo Linneo, alla *Listera ovata* ed al *Majanthemum bifolium*. V. Richter Cod. p. 892 e p. 328 e 329.

— Nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 477.

488. [342 n. 2]. **Orobanche cruenta** Bert. Fl. it. VI, p. 430; Arc. Fl. it. p. 411.

« *Herba tora. Rhodora Plinii. Orobanche. Ernangna (?)*. »

— Due esemplari piuttosto danneggiati.

— Nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 370.

489. [343]. **Crataegus Oxyacantha** Lin. Sp. pl. I, p. 477; Richter Cod. p. 485; Arc. Fl. it. p. 552.

« *Oxyacantha.* »

— *Oxyacantha* Lob. Obs. p. 614.

— Due esemplari con frutti ben conservati.

— Comunissima anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 203.

490. [344]. **Ornithogalum narbonense** Lin. ed. II, Sp. pl. II, p. 439; Richter Cod. p. 320; Arc. Fl. it. p. 128.

« *Ornithogalum.* »

— *Ornithogalum spicatum MonsPELLIENSIS* flore lacteo Lob. Obs. p. 47.

— Due esemplari con fiori e frutti ben conservati.

— Il nome di *Ornithogalum* Caes. Syst. 405, corrisponde all'*Ornithogalum umbellatum* Lin. V. Richter Cod. p. 321.

— Anche nel Bolognese comune. Cocc. Fl. bol. p. 203.

491. [345 n. 1]. **Coronilla varia** Lin. Sp. pl. II, p. 743; Richter Cod. p. 722; Arc. Fl. it. p. 514.

« *Hedysarum. Onobrychis quibusd.* »

— Tav. disegnata col nome *Onobrychis altera species*.

— Alquanto danneggiato.

— Anche nel Bolognese comune. Cocc. Fl. bol. p. 173.

492. [345 n. 2]. **Galega officinalis** Lin. Sp. pl. II, p. 714; Richter Cod. p. 732; Arc. Fl. it. p. 506.

« *Onobrychis. Regalega Vulg. flore albo.* »

— *Galega* Lob. Obs. p. 509; Adv. p. 392.

— Alquanto danneggiato.

— Anche nel Bolognese comune. Cocc. Fl. bol. p. 170.

493. [346]. **Onobrychis sativa** Lam. — *Hedysarum Onobrychis* Lin. Sp. pl. II, p. 751; Richter Cod. p. 729; Arc. Fl. it. p. 517.

« *Astragalus quibusd. Onobrychis vera Dioscorid. mea sententia. Caput gallinaceum Belg.* »

— *Caput gallinaceum belgarum* Lob. Obs. p. 527. Lob. Ic. 2 p. 81. Vedi anche Lin. Sp. pl. II, p. 751.

— Due esemplari discretamente conservati.

— Anche nel Bolognese coltivata e subspontanea. Cocc. Fl. bol. p. 172.

494. [347]. **Orobis vernus** Lin. Sp. pl. II, p. 728; Richter Cod. p. 711; Arc. Fl. it. p. 522.

« *Erebinthos ζυζα* (?). *Cicercula* Plin. *Orobis sylv.*¹⁶ *Ervum sylv.*¹⁶ *Fuchsiy. Cicer sylvestris* Dod. *flore luteo.* »

— Discretamente conservato.

— I nomi citati da Aldrovandi sono piuttosto riferibili al *Lathyrus Cicera* Lin. ed al *L. sativus* Lin. V. Richter Cod. p. 712 e 713. *Erebinthus* Mitch. gen. 210, secondo Linneo corrisponderebbe a *Galega virginiana* L. V. Richter Cod. p. 732.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 179.

495. [348]. *Lathyrus pratensis* Lin. Sp. pl. II, p. 733; Richter Cod. p. 714; Arc. Fl. it. p. 521.

« *Orobis sive Ervum.* »

— Due esemplari alquanto danneggiati.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 175.

496. [349]. *Oryza sativa* Lin. Sp. pl. I, p. 333; Richter Cod. p. 343; Arc. Fl. it. p. 23.

« *Oryza.* »

— *Oryza* Bauh. Pin. p. 24; Th. 479; Cam. Dod. etc Lob. Obs. p. 23.

— Tre esemplari assai bene conservati.

— Coltivasi nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 520.

497. [350 n. 1]. *Tagetes erecta* Lin. Sp. pl. II, p. 887; Richter Cod. p. 838.

« *Othonna. Tagetes Indica* Plin. »

— L'indice divide queste specie N. 1 e N. 2 in 1.° *Othona sive Tagetes indica* Plinii. 2.° *Othona major. Othonna italorum.*

— Tavoletta disegnata col nome di *Tagetes indica* etc.

— Due esemplari assai danneggiati.

— Per errore di numerazione il N. 350 trovasi duplicato.

— Coltivasi.

498. [350 n. 2]. *Tagetes erecta* Lin. var. *flore majore* v. s.

— *Othonna major Polyanthos* Lob. Obs. p. 410.

— Fiore quasi rovinato.

— Id. c. s.

499. [350 bis]. **Rumex Acetosa** Lin. Sp. pl. I, p. 337; Richter Cod. p. 347; Arc. Fl. it. p. 205.

« *Oxalis*. »

— *Oxalis* Cesalp. Syst. p. 165 — *Oxalis* Lob. Obs. p. 155 e Adv. p. 119.

— Due esemplari male conservati.

— Coltivasi è qua e là spontaneo. Cocc. Fl. bol. p. 416.

500. [351 n. 1]. **Oxalis stricta** Lin. Sp. pl. I, p. 435; Richter Cod. p. 447; Arc. Fl. it. p. 347.

« *Oxys Panis Cuculi*. »

— *Oxys* Cesalp. Syst. p. 564 viene riferito all'*Oxalis corniculata* Lin. V. Richter Cod. p. 447. Il nome poi di *Panis Cuculi* viene riferito all'*Oxalis acetosella* L. V. Lob. Obs. p. 495 e Adv. p. 381.

— Esemplari bene conservati.

— Questa specie, ora comunissima da noi, viene indicata da Linneo, V. loc. cit., solo per l'America settentrionale.

— Comune anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 137.

501. [351 n. 2]. **Majorana Onites** Benth. — *Origanum Onites* Lin. Sp. pl. II, p. 590; Richter Cod. p. 575; Arc. Fl. it. p. 422.

« *Origanum cretense*. *Onitis seu Hyssopus verus*. *Origanum album Anguillarae*. »

— L'*Origanum creticum* di Bauh. viene da Linneo chiamato *Oryganum creticum*, mentre *Onites* di Bauh. viene riferito all'*Oryg. Onites* Lin. V. Lob. Obs. p. 265 e Ved. Richter loc. cit.

— Esemplare discretamente conservato.

È stata tagliata parte della pagina, con asportazione di un esemplare di queste varie specie, come si può arguire dal fatto che l'*Indice* non ha altra indicazione di piante, oltre alle due citate.

Nei Tomi 4 e 6 dall'Erbario rispettivamente ai fogli N. 374 e 418 esistono esemplari di questa specie, indicati coi medesimi nomi.

— Manca nel Bolognese.

502. [352]. **Origanum vulgare** Lin. Sp. pl. II, p. 590; Richter Cod. p. 575; Arc. Fl. it. p. 422.

« *Oryganum sylvestre*. »

— *Oryganum sylvestre* Bauh. Pin. p. 223.

— Tre esemplari.

— Comune anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 377.

503. [353 n. 1]. **Melandrium dioicum** Coss. Germ. — *Lychnis dioica* β Lin. Sp. pl. I, p. 437; Richter Cod. p. 449; Arc. Fl. it. p. 314.

« *Lychnis sylvestris flore rubello* Lob. vide Tom. 6. 421 $\times$. *Ocymoides flor. albo*. *Radicula lanaria*. *Struthium aliys*. »

— *Ocymoides album* Bauh. Hist. 3, p. 432. — *Melandrium Plinii genuinum* Clus. Hist. 1, p. 294.

— Due buoni esemplari.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 112.

504. [353 n. 2]. **Melandrium sylvestre** Röhl. Richter Cod. v. s. — *Lychnis diurna* Sibth.; Arc. Fl. it. p. 314.

« *Ocymoides flore rubro*. »

— *Ocymoides flore rubro* Cam. Ep. 740 f. 1.

— Un esemplare bene conservato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 113.

505. [354]. **Ocimum Basilicum** Lin. Sp. pl. II, p. 597; Richter Cod. p. 581; Arc. Fl. it. p. 419.

« *Ocimum citratum*. »

— *Ocimum maximum Caryophyllatum ac citreatum* Lob. Obs. p. 268. Adv. p. 215.

— Alquanto danneggiato.

— Coltivasi.

506. [355]. **Linaria vulgaris** Mill. — *Antirrhinum Linaria* Lin. Sp. pl. II, p. 616; Richter Cod. p. 595; Arc. Fl. it. p. 397.

« *Osyris*. »

— *Osyris* Fuchs. Hist. p. 543 non Dodon. Lob. Obs. p. 222.

— Tre esemplari danneggiati.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 362.

507. [356]. **Epilobium spicatum** Lam. — *Epilobium angustifolium* Lin. Sp. pl. I, p. 317; Richter Cod. p. 357; Arc. Fl. it. p. 559.

« *Onagra*. »

— Tavoletta disegnata col nome di *Onagra Dioscoridis* T. y. 2. c. 204.

— Tre esemplari danneggiati.

— Il nome di *Onagra* Cesalp. Syst. 268 corrisponde all' *Epilobium angustifolium* Lin. od *Epilobium spicatum* Lamk. v. Richter Cod. p. 357.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 213.

508. [357 n. 1]. **Allium roseum** Lin. Sp. pl. I, p. 296; Richter Cod. p. 312; Arc. Fl. it. p. 134.

« *Opioscorodon*. »

— Due esemplari in cattivo stato di conservazione.

— Bauhino scrive *Ophioscorodon* come pure Lobel e non *Opioscorodon*. Tale nome però viene da Linneo riferito all' *Allium scorodoprasum*, specie distinta.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 460.

509. [357 n. 2]. **Allium ochroleucum** (?) W. K.; Arc. Fl. it. p. 135.

« *Opioscorodon aliud*. »

— Due esemplari, uno con bulbo assai danneggiato.

— Manca nel Bolognese.

510. [358]. **Acer campestre** Lin. Sp. pl. II, p. 1055; Richter Cod. p. 1005; Arc. Fl. it. p. 470.

« *Ornus quib. Aceris species. Opio q. opulus. Tostone vulgo.* »

— *Acer* Lob. Adv. p. 443.

— Esemplare con due frutti in buono stato.

— Il nome di *Ornus* Dalech. corrisponderebbe al *Fraxinus Ornus* Lin. V. Richter p. 1012. Il nome di *Opulus* degli antichi viene riferito

al *Viburnum Opulus* Lin. Però il nome di *Opulus* Cesalp. Syst. 42 è da Linneo riferito a questa specie. V. Richter p. 1005. Questa pianta in varii dialetti italiani viene tuttora chiamata *Opio* od *Oppio*.

— Comune nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 135.

511. [359]. **Olea europaea** var. **sativa** Hoff.; Lin. Sp. pl. I, p. 8; Richter Cod. p. 23; Arc. Fl. it. p. 361.

« *Oliva sativa*. »

— *Olea sativa* Bauh. Pin. p. 472; *Olea* Lob. Obs. p. 556.

— Tavola incisa col nome di *Oliva*.

— Ben conservato. Persiste l'impronta di un frutto.

— Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 334.

512. [360]. **Olea europaea** Lin. var. **Oleaster** Hoff.; Lin. Sp. pl. I, p. 8; Richter Cod. p. 23; Arc. Fl. it. p. 361.

« *Olivastrum*. »

— *Oleaster seu Olea sylvestris* Bauh. Pin. p. 472.

— *Ex agro Pistoriensi*.

— Tav. incisa col nome di *Olea sylvestris seu Olivastrum ex Agro Pistoriensi* Tom. I Aggl. foglio 360.

— Impronta di rami; rimangono solo 7 foglioline.

— La pagina è stata in gran parte tagliata ed asportata. L'indice indica però solo questo nome e quindi a questa specie necessariamente apparteneva l'esemplare asportato.

— Trovata recentemente nel Bolognese. V. Mattei. Aggiunte alla Flor. bologn.

513. [361]. **Salix nigricans** Sm.; Arc. Fl. it. p. 176.

« *Eleagnus. Salicis species. Ovedro Vulgo*. »

— Esemplare in discreto stato.

— Il nome di *Eleagnus* Cam. Ep. 106 apparterebbe all'*Eleagnus angustifolia* L. e non ad un *Salice*. V. Richter Cod. p. 134.

— Nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 434.

514. [362 n. 1]. **Epilobium rosmarinifolium** Haenke — *Epilobium angustifolium* v. α . Lin. Sp. pl. I, p. 347; Richter Cod. p. 357; Arc. Fl. it. p. 559.

« *Onagrae spec. Impia aliys. Linagra Vulg.* »

— Frustulo malissimo conservato, quasi indeterminabile.

— Nel Tom. IV dell'Erbario fogli N. 399 e 610 esistono esemplari perfetti di questa specie portanti i medesimi nomi aldrovandiani.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 213.

515. [362 n. 2]. **Lychuis Flos Cuculi** L. (*flore pleno*). V. N. 207.

« *Odontites.* »

— *Odontites Plinii pleno flore* Clus. Hist. 3 p. 293.

— Esemplarino molto danneggiato.

— Vedi foglio N. 207.

— Cocc. Fl. bol. p. 113.

516. [362 n. 3]. **Oenanthe pimpinelloides** (?) Lin. Sp. pl. I, p. 255; Richter Cod. p. 271; Arc. Fl. it. p. 604.

« *Oenanthe* »

— Una sola ombrella florifera quasi indeterminabile.

— Comune attorno Bologna. Cocc. Fl. bol. p. 240.

517. [363 n. 1]. **Evonymus europaeus** Lin. Sp. pl. I, p. 197; Richter Cod. p. 214; Arc. Fl. it. p. 467.

« *Tetragonia Theoph. secundum Dalechamp.* »

— Esemplare con frutti alquanto danneggiati.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 145.

518. [363 n. 2]. **Evonymus europaeus** Lin.

« *Evonymos Anonymos. Fusano vulg.* »

— *Tetragonia Dalech.* Hist. 1, p. 57. — *Evonymos Theoph.* Lob. Obs. p. 591.

— Ramo con sole foglie quasi ridotto alla impronta.

— c. s.

519. [364]. **Unidium apioides** Spr. — *Selinum Apioides* B. H.; Arc. Fl. it. p. 608.

« *Pastinaca sylvestris*. »

— Esemplare in cattivo stato di conservazione.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 246,

520. [365]. **Daucus Carota** Lin. Vedi foglio 112.

« *Pastinaca sylvestris alia*. »

— Esemplare molto guasto.

— Vedi foglio 112.

— Vedi fogl. cit.

521. [366]. **Amni majus** Lin. form. **angustifolium** Lin. Sp. pl. I. p. 243; Richter Cod. p. 259; Arc. Fl. it. p. 592.

« *Pastinaca sativa*. »

— Esemplare alquanto danneggiato.

— La *Pastinaca sativa* degli antichi corrisponde realmente alla *Pastinaca sativa* Lin. specie diversa da questa. V. Richter Cod. p. 278.

— Raro nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 243.

522. [367]. **Daucus Michellii** Car. Vedi foglio n. 217.

— Tre esemplari assai guasti.

— Vedi foglio N. 217.

523. [368]. **Solanum Lycopersicum** Lin. Sp. pl. I. p. 185; Richter Cod. p. 199; Arc. Fl. it. p. 615.

« *Pomum amoris. Mali insani species. Tembul quibusd.* »

— *Pomum amoris* Cam. Ep. 821; *Poma amoris* Lob. Adv. p. 108.

— Esemplare ben conservato. Una foglia ed una piccola infiorescenza.

— Per errore si trovano nello stesso foglio due foglie di *Cucumis Citrullus*. Lob. Obs. p. 165 ricorda un frutto denominato *Tembul* il quale nulla ha da vedere col *Sol. Lycopersicum*.

524. [369]. **Pyrethrum Parthenium** Willd. — *Matricaria Parthenium* Lin. Sp. pl. II, p. 890; Richter Cod. p. 841; Arc. Fl. it. p. 676.

« *Parthenium quibusd. Matricaria. Amaracus. Aegineta.* »

— Due buoni esemplari.

— Il nome di *Amaracus* apparterebbe all'*Oryganum Majorana* (V. Richter Cod. p. 575). Il nome di *Aegineta* non fu trovato negli Autori che abbiamo consultato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 294.

525. [370]. **Polygonatum multiflorum** All. — *Convallaria multiflora* Lin. Sp. pl. I, p. 315; Richter Cod. p. 328; Arc. Fl. it. p. 120.

« *Polygonum angustifolium.* »

— Esemplare con giovani frutti, alquanto danneggiati,

— I nomi di *Polygonum angustifolium* Bauh. Pin. 376 e *P. latifolium* Bauh. Pin. 281, sono da Linneo riferiti a due forme di *Polygonum aviculare*. Vedi Richter Cod. p. 378.

Il nome di *Polygonatum angustifolium* Bauh. 3, p. 531, viene poi riferito al *Polygonatum verticillatum* e non al *multiflorum*. Vedi Richter Cod. p. 328.

Il nome di *Polygonatum latifolium* appartiene realmente al *Polygonatum officinale*.

Questo errore di dicitura (*Polygonum* per *Polygonatum*) trovasi anche nelle *Styrpium Advers.* di Lobel p. 283, mentre invece trovasi scritto e figurato il *Polygonatum multiflorum* così indicato nelle *Observationes* pag. 361, dove è detto — *Lege Polygonatum*.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. Bol. 466.

526. [371]. **Polygonatum officinale** All. — *Convallaria Polygonatum* Lin. Sp. pl. II, p. 315; Richter Cod. p. 328; Arc. Fl. it. p. 119.

« *Polygonum latifolium.* »

— Esemplare con frutto alquanto danneggiato.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 466.

527. [372]. **Pisum sativum** Lin. Sp. pl. II, p. 727; Richter Cod. p. 710; Arc. Fl. it. p. 518.

« *Pisum romanum. Eroviglia Vulg.* »

- Esemplare danneggiato.
- Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 174.

528. [373]. **Cnidium Apioides** Spr. Vedi foglio N. 364.

« *Pyrethrum salivare* ».

- *Pyrethrum alterum* Lob. Obs. p. 447. Adv. p. 347.
- Esemplare alquanto danneggiato.
- Gli autori antichi in generale col nome di *Pyrethrum salivare* indicavano una *Anthemis* e non una *Ombrellifera* V. Fuchs. Hist. p. 640 e figura.
- V. c. s.

529. [374]. **Lepidium latifolium** Lin. Sp. pl. II, p. 644; Richter Cod. p. 627; Arc. Fl. it. p. 281.

« *Pipiritis. Lepidium Pauli.* »

- *Lepidium Pauli* Baub. Hist. 2 p. 940. *Lepidium vulgo Herba Piperitis* Caesalp. Syst. p. 364.
- Esemplare fiorifero con una foglia staccata.
- Nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 92.

530. [375]. **Heracleum Spondylium** Lin. Sp. pl. I, p. 249; Richter Cod. p. 266; Arc. Fl. it. p. 612.

« *Panax Heracleum.* »

- *Panax heracleum* Lob. Obs. p. 299. Adv. p. 312.
- Due foglie solo ben conservate.
- Due tavolette soltanto disegnate col nome: *Panax Heracleum* etc. La loro identificazione è però dubbiosa.
- Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 237.

531. [376]. **Paeonia peregrina** Mill. — *Paeonia officinalis* var. α . **foeminea** Lin. Sp. pl. I, p. 530; Richter Cod. p. 526; Arc. Fl. it. p. 245.

« *Paeonia foemina.* »

- Foglia e frutto ben conservati.
- *Paeonia foemina* Fuchs. Hist. p. 202 e Lob. Ic. p. 602. Corrispon-

derebbe alla *P. officinalis* Lin. var. **foeminea**, cioè alla *Paeonia officinalis* Retz. Lob. Obs. p. 390.

532. [377]. **Paeonia corallina** Retz. (?) — *Paeonia officinalis* var. **mascula** Lin. Sp. pl. I, p. 530; Richter Cod. p. 526; Arc. Fl. it. p. 245.

« *Paeonia mas.* »

— *Paeonia mas* Lob. Obs. p. 390. Adv. p. 305.

— Sola foglia e ancora non determinabile con esattezza.

— *Paeonia mas* Lob. Ic. p. 684, corrisponderebbe alla *Paeonia officinalis* var. **mascula** di Lin. cioè alla *P. corallina* di Retz. V. Koch. *Flora germanica* p. 26. Lob. Obs. p. 390.

— Manca nel Bolognese.

533. [378 n. 1]. **Petasites officinalis** Möench — *Tussilago Petasites* Lin. Sp. pl. II, p. 866; Richter Cod. p. 821; Arc. Fl. it. p. 662.

« *Petasites.* »

— Una sola foglia ben conservata.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 302.

534. [378 n. 2]. **Bupleurum protractum** Link et Hoffm. Arc. Fl. it. p. 589.

« *Perfoliatum. Centaurium majus alijs.* »

— *Perfoliatum vulgatus flore luteo, folio umbilicato* Lob. Obs. p. 215; Adv. p. 171 e fig.

— Tavoletta disegnata col nome di *Perfoliata minima*.

— Esemplare ben conservato.

— Per errore vi si trovano uniti due esemplaretti di una *Euphorbia*. Il nome *Perfoliatum* Lob. viene dal Linneo ascritto al *Bupleurum rotundifolium* col quale probabilmente fu confuso il *B. protractum*, V. Richter Cod. p. 253. Il nome di *Centaurium majus* viene da Linneo e dagli altri autori sempre ascritto a varie specie di *Centaurea*.

— Anche nel Bolognese comune. Cocc. Fl. bol. p. 240.

535. [379] **Scolopendrium vulgare** Sym. Arc. Fl. it. p. 7.

« *Phyllitis. Lingua cervina.* »

— *Phyllitis, Lingua cervina officinarum* Lob. Obs. p. 469.

— Una sola foglia.

— Quasi tutti gli Autori antichi concordano nell'indicare questa specie col nome di *Lingua cervina*.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 561.

536. [380]. ***Osmunda regalis*** Lin. Sp. pl. II. p. 1065; Richter Cod. p. 1022; Arc. Fl. it. p. 2.

« *Phyllitis ramosa. Filix florida* Lobel. *Osmunda. Filix latifolia.* »

— *Osmunda, Filix latifolia* Cordi Lob. Obs. p. 474. Adv. p. 363.

— Tre foglie ben conservate.

— Manca nel Bolognese.

537. [381]. ***Polypodium vulgare*** Lin. Sp. pl. II, p. 1085; Richter Cod. p. 1031; Arc. Fl. it. p. 3.

« *Polypodium.* »

— *Polypodium* Lob. Obs. p. 475. Adv. p. 363.

— Tre foglie ben conservate.

— Anche nel Bolognese comune.

538. [382 n. 1]. ***Platanus occidentalis*** Lin. Sp. pl. II, p. 999; Richter Cod. p. 945; Arc. Fl. it. p. 187.

« *Platanus.* »

— Foglia e frutto.

— Le due specie contenute nello stesso foglio non sono contrassegnate da alcun numero distintivo.

— Coltivasi. Cocc. Fl. bol. p. 427.

539. [382 n. 2]. ***Platanus orientalis*** Lin. Sp. pl. II, p. 999; Richter Cod. p. 945; Arc. Fl. it. p. 187.

— Foglia e frutto.

— Id. c. s.

540. [383]. **Asparagus tenuifolius** Lmk. — *Asparagus officinalis* L.
Lin. Sp. pl. I. p. 313; Richter Cod. p. 326; Arc. Fl. it. p. 118.

« *Palatium leporis. Asparagus.* »

— Esemplare con frutti.

— *Palatium leporis* Caesalp. Syst. p. 217 corrisponderebbe a questa specie, V. Richter p. 326. Il nome di *Asparagus* Cam. Ep. 259, corrisponderebbe all' *Asparagus officinalis* Lin.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 464.

541. [384]. **Silene Cucubalus** Wib. — *Silene inflata* Sm. — *Cucubalus Behen* Lin. Sp. pl. I, p. 414; Richter Cod. p. 429; Arc. Fl. it. p. 314.

« *Polemonia. Ben Album.* »

— *Been album* Bauh. Hist. 2 p. 356. *Polemonia* Caes. Syst. p. 258.
Been album Monsp. *Polemonium* Dod. Lob. Obs. p. 184.

— Tre esemplari in mediocre stato di conservazione.

— Comunissima nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 110.

N. 385 — *Pistachium verum, Terebintus indica fistici Arabibus* N. 1.
— *Pistachium aliud* N. 2.

N. 386 — *Pistachium sylvestre* — *Staphillodendros Plinii*.

N. 387 — *Pecten Veneris* N. 1. — *Prunus sylvestris* N. 2.

N. 388 — *Polygonum mas* — *Prosirpinaca Apuleij* — *Corrigiolanulgo*.

N. 389 — *Polygonum foemina* N. 1. — *Melilotus sylvestris* N. 2.

385. 386. 387. 388. 389. Questi cinque fogli mancano nell'Erbario di Aldrovandi Tom. 1. La mancanza parrebbe doversi ascrivere ad errore di numerazione non risultando che queste pagine siano state asportate. Però esse dovevano esistere in origine, perocchè il Catalogo (N. 89 dei Manoscritti Aldrovandiani vol. I, II e quello del N. 125) segnano a questi numeri i nomi sopra indicati.

542. [390 n. 1]. **Equisetum Telmateja** Ehrh. — *Equisetum fluviatile* Lin. Sp. pl. II, p. 1062; Richter Cod. p. 1020; Arc. Fl. it. p. 9.

« *Polygonum foemina.* »

— Esemplare sterile ben conservato.

— Il nome di *Polygonum foemina* Cam. Epist. p. 689, corrisponderebbe all' *Hippuris vulgaris* Lin. V. Richter p. 19. Però l' *Hippuris* di Lobelio Adv. p. 355 è certamente un *Equisetum*, come risulta oltrechè dai caratteri; anche dal nome italiano citato (*Asperella*), dall'uso che se ne indica (*detergendae omnigenae supellectili a mulierculis expeditos etc.*) Però il *Polygonum foemina semine ridua* di Lob. Adv. p. 154 potrebbe essere un *Equisetum*, ma non questa specie.

— Comune nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 563.

543. [390 n. 2]. **Lotus corniculatus** Lin. Vedi foglio N. 321. -

« *Melilotus sylvestris*. »

— Esemplare quasi rovinato.

— V. foglio N. 321.

544. [390 n. 3]. **Helianthemum vulgare** Gaert. — *Cistus Helianthemum* Lin. Sp. pl. I, p. 528; Richter Cod. p. 524; Arc. Fl. it. p. 293.

« *Panax Chironion*. *Helion Cordi*. *Helianthemum*. »

— Esemplare quasi del tutto rovinato.

— Il nome di *Panax Chironium* Cam. Ep. p. 501 ed *Helianthemum* Lob. Hist. p. 238, sono da Linneo ritenuti sinonimi del *Cistus Helianthemum* Lin. od *Helianthemum vulgare* Gaertn. V. Richter p. 524. Cordo, Hist. plant. 89 ha il nome di *Helianthemum*. Il nome di *Helion* citato da Aldrovandi non ci avvenne di trovarlo negli Autori.

— Comunissimo nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 99.

545. [391 n. 1]. **Potentilla hirta** Lin. Sp. pl. I. p. 497; Richter Cod. p. 502; Arc. Fl. it. p. 540.

« *Pentaphyllum*. »

— Esemplare ben conservato.

— Il nome di *Pentaphyllum* Lob. Baulh. è sinonimo del nome generico di *Potentilla*.

— Anche nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 193.

546. [391 n. 2]. **Silene italica** Pers. Arc. Fl. it. p. 313.

« *Papaver spumeum. Viscago.* »

— Esemplare ridotto in cattivo stato.

— Il nome di *Papaver spumeum* Lob. Ic. p. 340 viene riferito da Linneo al *Cucubalus Behen* Lin. il quale corrisponde alla *Silene inflata* Smith. V. Richter Cod. p. 429. Il nome *Viscago* Dill. viene da Linneo riportato come sinonimo del nome generico *Silene*. Quindi se il nome *Viscago* è realmente applicabile a questa specie (ed alle affini congeneri) il primo è stato erroneamente applicato dall'Aldrovandi. Conf. Foglio N. 384. Il *Papaver spumeum* Lob. Obs. p. 184 (con figura) corrisponde alla *Silene inflata* Sm. Il nome *Viscaria* usato da Lob. Obs. p. 242 corrisponde ad una *Silene*, ma non a questa specie.

— Comune nel Bolognese. Cocc. Fl. bol. p. 111.

Colla carta N. 391 e colla specie N. 546 si chiude oggi (anno 1898) il 1.º Volume dell'Erbario di ULISSE ALDROVANDI, che originariamente conteneva carte N. 396 e specie N. 557.

Il nome Aldrovandiano delle specie contenute nelle sei carte oggi mancanti ci fu concesso di poter conoscere ancora consultando i N. 125 e 89 dai manoscritti Aldrovandiani conservati nella Biblioteca Universitaria di Bologna. I due volumi compresi sotto il N. 89 rappresentano la copia distinta dello stesso catalogo malamente riprodotto con pessima calligrafia nel manoscritto al N. 125, il 1.º volume del N. 89 è l'« *Elenchus Plantarum agglutinatorum Ulyxis Aldrovandi sec. ordinem chartarum ad commodiorem posterior. instructionem* » mentre il Vol. II rappresenta lo stesso catalogo ordinato alfabeticamente. Questi cataloghi non hanno riguardo che ai quindici volumi di piante agglutinate menzionate dall'Aldrovandi nel suo testamento, possedute oggi dal R. Orto botanico di Bologna; le piante contenute nel XVI volume, pure oggi ivi conservate, non furono catalogate nei manoscritti Aldrovandiani.

Riferendosi dunque ai citati cataloghi le carte mancanti avrebbero dovuto contenere:

547. [392 n. 1]. *Pilosella major* Fuchsii.

548. [392 n. 2]. *Pilosella minor*.

549. [393 n. 1] *Psyllium*
550. [393 n. 2]. *Psyllium aliud.*
551. [394 n. 1]. *Periclimines.*
552. [394 n. 2]. *Periclim. repens.*
553. [395 n. 1]. *Periploca.*
554. [395 n. 2]. *Phalaris.*
555. [396 n. 1] { *Panicum sylvestre.*
 Panicastrillum.
556. [396 n. 2]. *Pseudonardus foemina*
557. [397]. *Pulegium foemina seu Puligiolo vulgo.*
-

INDICE DELLE SPECIE CONTENUTE NEL 1.^o VOLUME

DELL' ERBARIO DI ULISSE ALDROVANDI

-
53 ³ . <i>Abies pectinata</i> D.C.	169. <i>Amaracus Dictamnus</i> Benth.
29. <i>Abutilon Avicennae</i> Gaertn.	55, 104, 366. <i>Ammi majus</i> L.
49. <i>Acanthus mollis</i> L.	117 ³ . <i>Anacamptis pyramidalis</i> Rich.
358. <i>Acer campestre</i> L.	10 ² . <i>Anagallis arvensis</i> L.
39 ³ . <i>Acer platanoides</i> L.	6. <i>Anagyris foetida</i> L.
42 ³ . <i>Achillea Ageratum</i> L.	63 ² . <i>Anchusa italica</i> Retz.
26. <i>Aconitum Lycoctonum</i> L.	48 ¹ . <i>Androsaemum officinale</i> All.
41 ³ . <i>Aconitum Napellus</i> L.	14. <i>Angelica silvestris</i> L.
27. <i>Aconitum variegatum</i> L.	90. <i>Anthemis Cota</i> L.
86. <i>Actaea spicata</i> L.	209. <i>Anthyllis Vulneraria</i> L.
281. <i>Adenostyles alpina</i> Bluff.	38 ¹ . <i>Antirrhinum majus</i> L.
39 ² . <i>Adiantum Capillus-Veneris</i> L.	38 ² . <i>Antirrhinum majus</i> L. v. <i>angustifolium</i> Willk.
123 ² . <i>Adonis autumnalis</i> L.	23. <i>Apium graveolens</i> L.
36 ² . <i>Aegilops triaristata</i> L.	40 ¹ , 40 ² . <i>Aquilegia vulgaris</i> L.
180 ¹ . <i>Agrimonia Eupatoria</i> L.	167 ¹ . <i>Arabis Turrita</i> L.
283 ¹ . <i>Agrostemma coronaria</i> L.	7 ¹ . <i>Arbutus Unedo</i> L.
210 ¹ . <i>Agrostemma Githago</i> L.	9 ¹ . <i>Arenaria serpyllifolia</i> L.
138 ³ . <i>Ajuga Chamaepytis</i> Schr.	47. <i>Aristolochia Clematidis</i> L.
62 ² . <i>Ajuga reptans</i> L.	44 ² . <i>Artemisia Absinthium</i> L.
7 ² . <i>Alchemilla vulgaris</i> L.	2. <i>Artemisia camphorata</i> Vill.
116 ² . <i>Allium Coepa</i> L.	163 ² . <i>Artemisia Dracunculus</i> L.
305. <i>Allium nigrum</i> L.	44 ³ . <i>Artemisia maritima</i> L.
357 ² . <i>Allium ochroleucum</i> W. K.	1. <i>Artemisia pontica</i> L.
357 ¹ . <i>Allium roseum</i> L.	44 ¹ . <i>Artemisia Santonicum</i> L.
12 ¹ . <i>Allium ursinum</i> L.	56 ² . <i>Artemisia vulgaris</i> L.
53 ¹ . <i>Alnus glutinosa</i> Gaertn.	34 ¹ . <i>Asarum europaeum</i> L.
34 ³ . <i>Aloe vulgaris</i> L.	130 ² . <i>Asparagus acutifolius</i> L.
45 ¹ . <i>Althaea cannabina</i> L.	20, 21. <i>Asparagus officinalis</i> L.
46. <i>Althaea officinalis</i> L.	383. <i>Asparagus tenuifolius</i> Lmk.
311 ² . <i>Althaea rosea</i> Cav.	52 ² . <i>Asphodelus albus</i> Willd.
65 ¹ , 66 ³ . <i>Amaranthus Blitum</i> L.	195. <i>Aspidium aculeatum</i> Sw.
18. <i>Ambrosia maritima</i> L.	

159. *Asplenium Adiantum-nigrum* L.
 39¹. *Asplenium Ruta-muraria* L.
 57². *Aster Amellus* L.
 222. *Astragalus glycyphyllos* L.
 224¹. *Astragalus monspessulanus* L.
 33². *Atriplex hortensis* L.
 25. *Avena sterilis* L.
 394². *Baldigera arundinacea* Dum.
 158¹. *Ballota pseudodictamnus* Benth.
 65¹. *Balsamina hortensis* D.C.
 175. *Barbarea vulgaris* R. Br.
 77¹. *Bellis silvestris* Cyr.
 66¹. *Berberis vulgaris* L.
 75. *Betonica officinalis* L.
 74. *Betula alba* L.
 153. *Bidens bipartita* L.
 103. *Bifora testiculata* Rehb.
 291¹. *Blechnum Spicant* Roth.
 99. *Bonjeanea hirsuta* Rehb.
 63¹. *Borago officinalis* L.
 298². *Brachythecium salebrosum* Hoffm.
 191¹. *Briza maxima* L.
 378². *Bupleurum protractum* Link. Hoff.
 76. *Butomus umbellatus* L.
 66². *Buxus sempervirens* L.
 72. *Calamintha Clinopodium* Br.
 133². *Calamintha grandiflora* Moench.
 134¹. *Calamintha officinalis* Moench.
 148, 154¹. *Calamintha parviflora* Lam.
 141. *Calamintha patavina* Host.
 126¹. *Calendula arvensis* L.
 125. *Calendula officinalis* L.
 186. *Calluna vulgaris* Sal.
 337¹. *Caltha palustris* L.
 155. *Calystegia sepium* R. Br.
 61¹. *Calystegia Soldanella* R. S.
 13². *Campanula latifolia* L.
 306, 307¹. *Campanula Medium* L.
 15¹. *Campanula Trachelium* L.
 152. *Cannabis sativa* L.
 79¹. *Capparis rupestris* Sib. Sm.
 70. *Capsella Bursa pastoris* Moench.
 111. *Carbenia benedicta* B. H.
 79². *Cardamine asarifolia* L.
 136. *Carduus nutans* L.
 42². *Carex pendula* Huds.
 109. *Carlina acanthifolia* All.
 108. *Carlina acaulis* L.
 102. *Carthamus tinctorius* L.
 107. *Castanea vesca* Willd.
 57¹, 58. *Celosia cristata* L.
 276. *Celtis australis* L.
 51². *Centaurea Calcitrapa* L.
 88. *Centaurea Centaureum* L.
 139². *Centaurea Cyanus* L.
 139¹. *Centaurea nigrescens* Willd.
 51¹. *Centaurea solstitialis* L.
 149, 150. *Cerasus avium* Loisl.
 96. *Cercis Siliquastrum* L.
 39². *Ceterach officinarum* W.
 250¹. *Chamaepeuce gnaphaloides* D. C.
 85. *Chelidonium majus* L.
 32¹. *Chenopodium album* L.
 71. *Chenopodium Botrys* L.
 31. *Chenopodium murale* L.
 33¹. *Chenopodium opulifolium* Schr.
 32². *Chenopodium polyspermum* L.
 89². *Chlora perfoliata* L.
 230. *Chondrilla juncea* L.
 123¹. *Chrysanthemum coronarium* L.
 127¹. *Chrysanthemum segetum* L.
 151. *Cicer arietinum* L.
 78. *Cichorium Intybus* L.
 83². *Cineraria maritima* L.
 120². *Cirsium arvense* Scop.
 50. *Cirsium Erisithales* Scop.
 130¹. *Cirsium lanceolatum* Scop.
 54². *Cirsium Lobelii* Ten.
 290. *Cistus monspeliensis* L.
 98. *Cistus salviaefolius* L.
 299¹. *Citrus decumana* L.
 121¹, 121². *Citrus Medica* L.
 190. *Clematis flammula* L.
 72¹. *Clinopodium vulgare* L.

- 364, 373. *Cnidium apioides* Spr.
 118¹. *Colchicum autumnale* L.
 131¹. *Colutea arborescens* L.
 92. *Conium maculatum* L.
 289. *Convallaria majalis* L.
 243¹. *Convolvulus arvensis* L.
 95. *Cornus mas* L.
 223¹. *Coronilla Emerus* L.
 224². *Coronilla minima* L.
 345¹. *Coronilla varia* L.
 8. *Corylus Avellana* L.
 68. *Cota tinctoria* Gay.
 147³. *Cracca varia* G. G.
 300². *Crataegus Azarolus* L.
 343. *Crataegus Oxyacantha* L.
 229. *Crepis setosa* Hall.
 115. *Crithmum maritimum* L.
 120¹. *Crocus sativus* L.
 84¹. *Cucurbita maxima* Duch.
 84². *Cucurbita Pepo* Ser.
 119¹, 173², 208³. *Cuscuta Epithymum* Engl.
 79². *Cyclamen hederaefolium* Bert.
 317. *Cydonia vulgaris* Pers.
 59. *Cynara horrida* Ait.
 128, 129. *Cynara Scolymus* L.
 206³. *Cynodon. Dactylon* Pers.
 113. *Cynoglossum pictum* Ait.
 145. *Cyperus longus* L.
 197. *Cystopteris fragilis* Bernh.
 223². *Cytinus Hypocistis* L.
 101. *Cytisus hirsutus* L.
 282. *Cytisus Laburnum* L.
 100. *Cytisus nigricans* L.
 161. *Daphne Laureola* L.
 112, 365. *Daucus Carota* L.
 218¹. *Daucus Gingidium* L.
 171. *Daucus gummifer* Lmk.
 172. *Daucus maximus* Desf.
 217, 367. *Daucus Michellii* Car.
 165. *Delphinium Ajacis* L.
 166. *Delphinium Consolida* L.
 170. *Dentaria pinnata* Lk.
 283³. *Dianthus Caryophyllus* L.
 283². *Dianthus liburnicus* Bartl.
 158². *Dictamnus albus* L.
 160¹. *Digitalis lutea* L.
 275. *Diospyros Lotus* L.
 174². *Diplotaxis tenuifolia* D. C.
 167². *Dipsacus silvestris* Mill.
 164. *Doronicum austriacum* Jacq.
 319². *Doryenium herbaceum* Vill.
 319¹. *Doryenium suffruticosum* Vill.
 110. *Ecballion Elaterium* Rich.
 114. *Echinophora spinosa* L.
 16². *Echium italicum* L.
 16¹. *Echium vulgare* L.
 252. *Epilobium hirsutum* L.
 251². *Epilobium montanum* L.
 251¹. *Epilobium parviflorum* Schr.
 362¹. *Epilobium rosmarinifolium* Haenk.
 256. *Epilobium spicatum* Lmk.
 177¹. *Equisetum arvense* L.
 389¹. *Equisetum Telmateja* Ehrh.
 177². *Equisetum limosum* L.
 179¹. *Erica arborea* L.
 174¹. *Eruca sativa* Lmk.
 182. *Eryngium campestre* L.
 183². *Eryngium maritimum* L.
 94. *Erysimum Cheiranthus* Pers.
 89¹. *Erythraea Centaurium* Pers.
 243². *Erythronium Dens-Canis* L.
 181. *Eupatorium cannabinum* L.
 180². *Euphrasia officinalis* L.
 298³. *Eurhynchium praelongum* L.
 298¹. *Evernia Prunastri* L.
 363^{1,2}. *Evonymus europaeus* L.
 200. *Fagus silvatica* L.
 198, 263. *Ferula galbanifera* Koch.
 201. *Ficus Carica* L.
 206¹, 253. *Filago germanica* L.
 30², 189. *Foeniculum capillaceum* Gil.
 194². *Fragaria vesca* L.

- 199, 202¹. *Fraxinus Ornus* L.
 188. *Fumaria officinalis* L.
 345². *Galega officinalis* L.
 3. *Galium aristatum* L.
 22. *Galium Mollugo* L.
 142¹. *Galium purpureum* L.
 179². *Galium silvaticum* L.
 204. *Galium verum* L.
 213¹. *Genista germanica* L.
 147². *Genista tinctoria* L.
 203, 220. *Gentiana asclepiadea* L.
 213². *Geranium Robertianum* L.
 212. *Geranium silvaticum* L.
 214. *Geum urbanum* L.
 210. *Githago segetum* Desf.
 205. *Gladiolus segetum* Gml.
 91². *Glechoma hederacea* L.
 211. *Glycyrrhiza glabra* L.
 240. *Gnaphalium luteo-album* L.
 41¹. *Gratiola officinalis* L.
 246. *Hedera Helix* L.
 389². *Helianthemum vulgare* Gaertn.
 239. *Helichrysum Stoechas* Gaertn.
 242. *Heliotropium europaeum* L.
 237. *Helleborus foetidus* L.
 234. *Helleborus niger* L.
 236. *Helleborus odoratus* W. K.
 235. *Helleborus viridis* L.
 375. *Heracleum Sphondylium* L.
 391². *Hieracium Pilosella* L.
 391¹. *Hieracium praealtum* Vill.
 322. *Hippocrepis comosa* L.
 191¹. *Hordeum distichum* L.
 225². *Hordeum murinum* L.
 225¹. *Hordeum vulgare* L.
 288. *Humulus Lupulus* L.
 337². *Hydrocharis Morsus-ranae* L.
 247. *Hyosciamus albus* L.
 227. *Hypericum perforatum* L.
 17, 53². *Hypericum tetrapterum* Fr.
 122¹. *Hypochaeris radicata* L.
 231. *Hyssopus officinalis* L.
 333¹. *Iberis umbellata* L.
 4². *Ilex Aquifolium* L.
 258. *Imperatoria Ostruthium* L.
 257. *Inula britannica* L.
 143². *Inula Conyza* D. C.
 173¹. *Inula crithmoides* L.
 226. *Inula Helenium* L.
 256. *Inula salicina* L.
 219¹. *Jasminum humile* L.
 218². *Jasminum officinale* L.
 334. *Juglans regia* L.
 253². *Juniperus communis* L.
 80². *Juniperus Sabina* L.
 12². *Kentrophyllum lanatum* D. C.
 298¹. *Lapsana communis* L.
 287. *Lappa major* Gaertn.
 48². *Lathyrus annuus* L.
 82¹. *Lathyrus Aphaca* L.
 81². *Lathyrus Ochrus* D.C.
 147¹, 348. *Lathyrus pratensis* L.
 97. *Lathyrus silvestris* L.
 295¹. *Laurus nobilis* L.
 395². *Lavandula officinalis* Chois.
 270². *Lemna minor* L.
 87². *Leonurus Cardiaca* L.
 249. *Lepidium graminifolium* L.
 374. *Lepidium latifolium* L.
 332. *Lepidium sativum* L.
 62¹, 77¹. *Leucanthemum vulgare* D. C.
 286. *Levisticum officinale* Koch.
 369. *Ligusticum vulgare* L.
 273³. *Lilium candidum* L.
 238. *Lilium croceum* Ch.
 184¹. *Linaria Elatine* Mill.
 355. *Linaria vulgaris* Mill.
 274¹. *Linosyris vulgaris* D.C.
 274². *Linum angustifolium* Huds.
 273¹. *Linum usitatissimum* L.
 117². *Linum viscosum* L.
 342¹. *Listera ovata* R. Br.
 284¹. *Lithospermum officinale* L.

- 284². *Lithospermum purpureo-coeruleum* L.
 270¹. *Lolium temulentum* L.
 393. *Lonicera Caprifolium* L.
 321, 339². *Lotus corniculatus* L.
 280. *Lunaria rediviva* L.
 266. *Lupinus albus* L.
 291². *Luzula multiflora* Lej.
 207, 362². *Lychnis Flos-cuculi* L.
 333². *Lysimachia Nummularia* L.
 264. *Lysimachia vulgaris* L.
 265. *Lythrum Salicaria* L.

 361. *Majorana hortensis* Moench.
 351². *Majorana Onites* Benth.
 45². *Malva moschata* L.
 267¹. *Marchantia polymorpha* L.
 314. *Marrubium vulgare* L.
 124. *Matricaria Chamomilla* L.
 320². *Medicago falcata* L.
 296, 297, 320¹. *Medicago sativa* L.
 137². *Melampyrum cristatum* L.
 353¹. *Melandrium dioicum* Gr. Godr.
 353². *Melandrium silvestre* Roel.
 277. *Melia Azedarach* L.
 72². *Melissa altissima* S. S.
 313. *Melissa officinalis* L.
 278², 279. *Melilotus alba* Desr.
 279. *Melilotus macrorrhiza* Pers.
 278¹. *Melilotus officinalis* Desr.
 285. *Melittis Melissophyllum* L.
 137¹. *Mentha aquatica* L.
 133¹, 307². *Mentha arvensis* L.
 133¹. *Mentha gentilis* Sm.
 54¹. *Mentha piperita* L.
 396. *Mentha Pulegium* L.
 318¹, 318², 327², 328², 329. *Mentha rotundifolia* L.
 328¹. *Mentha viridis* L.
 301, 302. *Mercurialis annua* L.
 300¹. *Mespilus germanica* L.
 310. *Meum athamanticum* Jacq.
 9². *Moehringia trinervia* Clair.
 65². *Momordica Balsamina* L.
 303. *Morus alba* L.
 304. *Morus nigra* L.
 105². *Muscari comosum* Mill.
 133². *Muscari racemosum* Mill.
 73. *Myagrum perfoliatum* L.
 312. *Myrrhis odorata* Scop.
 330, 331. *Myrtus communis* L.

 135. *Nepeta Cataria* L.
 338, 341. *Nigella damascena* L.
 336. *Nuphar luteum* Sm.
 335. *Nymphaea alba* L.

 5². *Obione portulacoides* Moq.
 354. *Ocimum Basilicum* L.
 118², 362². *Oenanthe pimpinelloides* Desf.
 359, 361. *Olea europaea* L.
 346. *Onobrychis sativa* Lmk.
 28². *Ononis Natrrix* L.
 28¹, 28². *Ononis spinosa* L.
 352. *Origanum vulgare* L.
 215. *Orlaya grandiflora* Hoffm.
 344. *Ornithogalum narbonense* L.
 342². *Orobancha cruenta* Bert.
 52¹. *Orobus varius* Willd.
 347. *Orobus varius* L.
 349. *Oryza sativa* L.
 380. *Osmunda regalis* L.
 106. *Ostrya carpinifolia* Scop.
 351¹. *Oxalis stricta* L.

 277. *Paeonia corallina* Retz.
 376. *Paeonia peregrina* Mill.
 37. *Pallavicinia Alliaria* Cocc.
 391. *Pallenis spinosa* Coss.
 395¹. *Panicum Crus-galli* L.
 315. *Panicum miliaceum* L.
 243. *Paris quadrifolia* L.
 316. *Persica vulgaris* Mill.
 11. *Petasites niveus* Baumg.
 378¹. *Petasites officinalis* Moench.
 178. *Peucedanum Cervaria* Lap.

- 202². *Pharbitis Nil Chois.*
 60. *Phragmites communis* Trin.
 292². *Phyllirea media* L.
 5¹. *Phyllirea stricta* Bert.
 122², 157. *Picris hieracioides* L.
 162. *Pimpinella peregrina* L.
 271, 293. *Pistacia Lentiscus* L.
 385¹. *Pistacia vera* L.
 372. *Pisum sativum* L.
 392¹. *Plantago arenaria* W. K.
 116¹. *Plantago Coronopus* L.
 392². *Plantago Cynops* L.
 382¹. *Platanus occidentalis* L.
 282². *Platanus orientalis* L.
 72². *Podospermum Jacquinianum* Koch.
 370. *Polygonatum multiflorum* All.
 371. *Polygonatum officinale* All.
 388. *Polygonum aviculare* L.
 193. *Polygonum Fagopyrum* L.
 244. *Polygonum Persicaria* L.
 381. *Polypodium vulgare* L.
 225¹, 390¹. *Potentilla hirta* L.
 267². *Primula acaulis* Jacq.
 387². *Prunus spinosa* L.
 196. *Pteris aquilina* L.
 142². *Pulicaria vulgaris* Gaertn.
 309¹. *Punica Granatum* L.
 369. *Pyrethrum Parthenium* Willd.

 105¹. *Quercus Cerris* L.
 259, 260. *Quercus Ilex* L.

 119¹. *Ranunculus trichophyllus* Chaix.
 339. *Raphanus sativus* L.
 340. *Rapistrum rugosum* All.
 255. *Reseda Luteola* L.
 140. *Rhagadiolus stellatus* Willd.
 327¹. *Rhamnus Frangula* L.
 34². *Rhinanthus minor* Ehrh.
 80¹. *Rhus Cotinus* L.
 82². *Rosa* sp.
 185¹. *Rubia tinctorum* L.
 250^{bis}. *Rumex Acetosa* L.
 228. *Ruscus Hypoglossum* L.

 127². *Salicornia herbacea* L.
 361. *Salix nigricans* L.
 421. *Salsola Soda* L.
 15². *Salvia Aethiopis* L.
 132. *Salvia glutinosa* L.
 232. *Salvia Sclarea* L.
 241. *Salvia verbenaca* L.
 1^{bis}. *Santolina Chamaecyparissus* L.
 221. *Sarothamnus vulgaris* Wimm.
 387¹. *Scandix Pecten-Veneris* L.
 250². *Scirpus Holoschoenus* L.
 379. *Scolopendrium vulgare* Sim.
 183¹. *Scolymus hispanicus* L.
 219². *Scrophularia aquatica* L.
 67. *Scutellaria Columnae* All.
 245. *Senebiera Coronopus* Poir.
 163. *Senecio Doria* L.
 83¹, 154². *Senecio erucifolius* L.
 143¹. *Senecio nemorensis* L.
 185². *Senecio vulgaris* L.
 191². *Serrafalcus mollis* Parl.
 262. *Seseli Bocconii* Guss.
 384. *Silene Cucubalus* Wib.
 390². *Silene italica* Pers.
 93. *Silene Otites* Sm.
 261. *Sison Amomum* L.
 176. *Sisymbrium officinale* Scop.
 43. *Sisymbrium Sophia* L.
 24. *Smyrnum Olusatrum* L.
 323, 324. *Solanum esculentum* Dun.
 368. *Solanum Lycopersicum* L.
 268. *Solidago Virgaurea* L.
 326. *Sorbus Aria* Crantz.
 144. *Sorbus torminalis* Crantz.
 210². *Spartium junceum* L.
 184². *Specularia Speculum* D. C.
 69. *Spiraea Aruncus* L.
 265¹, 308. *Stachys palustris* L.
 13¹. *Stachys silvatica* L.
 386. *Staphylea pinnata* L.
 61¹, 271². *Statice Limonium* L.
 206². *Stellaria Holostea* L.
 10¹. *Stellaria media* Vill.
 56¹. *Stratiotes aloides* L.

- 350^{1,2}. *Tagetes erecta* L.
156. *Tanacetum Balsamita* L.
79¹. *Teucrium Botrys* L.
126^{2,3,4}. *Teucrium Chamaedrys* L.
309². *Teucrium Marum* L.
134², 325¹. *Teucrium Scorodonia* L.
216. *Torilis Anthriscus* Gm.
72³. *Tragopogon pratense* L.
138¹. *Trifolium angustifolium* L.
272. *Trifolium arvense* L.
208². *Trifolium flexuosum* Jacq.
208¹. *Trifolium rubens* L.
191³. *Triticum vulgare* Vill.

291⁵. *Usnea barbata* L.

87¹. *Valeriana officinalis* L.
233. *Veratrum nigrum* L.
63¹. *Verbascum Blattaria* L.

41². *Veronica Anagallis* L.
137⁵. *Veronica officinalis* L.
187. *Viburnum Lantana* L.
294, 295². *Viburnum Tinus* L.
81¹. *Vicia bythinica* L.
91¹. *Vicia cassubica* L.
194¹. *Vicia Faba* L.
131². *Vinca minor* L.
35. *Vincetoxicum officinale* Moench.
325². *Viola odorata* L.
160². *Viola tricolor* L.

292¹. *Xanthium Strumarium* L.
4¹. *Xiphion foetidissimum* Parl.
254². *Xiphion gramineum* Parl.

192. *Zea Mais* L.
254¹. *Zizyphus vulgaris* Lmk.
-

New York Botanical Garden Library

3 5185 00247 2510