COLUMBIA LIBRARIES OFFSITE

HEALTH SCIENCES STANDARD

HX64083241

M551 .St6 1892 Lehrbuch der Histolo

RECAP

STÖHR
LEHRBUCH
DER
HISTOLOGIE
UND DER
MIKROSKOPISCHEN ANATOMIE
DES MENSCHEN

FROM THE LIBRARY OF

WILLIAM DUNCAN MCKIM

GRADUATE OF

COLUMBIA UNIVERSITY

A. B., 1875; A. M., 1878; M. D., 1878

QM551

St 6

1892

Columbia University
in the City of New York

College of Physicians and Surgeons

Library

FROM THE LIBRARY OF

WILLIAM DUNCAN

GRADUATE OF

COLUMBIA UNIVERSITY

B., 1875; A. M., 1878;

LEHRBUCH
DER
HISTOLOGIE
UND DER
MIKROSKOPISCHEN ANATOMIE DES MENSCHEN
MIT
EINSCHLUSS DER MIKROSKOPISCHEN TECHNIK.

Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
Open Knowledge Commons (for the Medical Heritage Library project)

W. Duncan McKim

LEHRBUCH
DER
HISTOLOGIE
UND DER
MIKROSKOPISCHEN ANATOMIE DES MENSCHEN

MIT
EINSCHLUSS DER MIKROSKOPISCHEN TECHNIK
VON

DR. PHILIPP STÖHR,
O. Ö. PROFESSOR DER ANATOMIE UND DIREKTOR DER ANATOM. ANSTALT IN ZÜRICH.

FÜNFTE, VERBESSERTE AUFLAGE.

MIT 216 HOLZSCHNITTEN.

J E N A
VERLAG VON GUSTAV FISCHER
1892.

QM 551

Stb

1892

Vorwort zur fünften Auflage.

Unsere Kenntnisse über den feineren Bau des Körpers haben in den letzten Jahren wieder eine so vielfache Bereicherung erfahren, dass eine erneute Bearbeitung mehrerer Kapitel erfolgen musste. Es betrifft dieselbe vorzugsweise die Kapitel über allgemeine Zellenlehre, über das Skeletsystem, über Muskeln, über das Centralnervensystem und die Nervenendapparate. Wenn dabei der Text nicht wesentlich vermehrt wurde, so ist das dem Umstand zu verdanken, dass die neuen Thatsachen zum Theil eine Vereinfachung der Darstellung ermöglichten. Mein Vorhaben, die kleinen Abbildungen durch grössere, übersichtlichere zu ersetzen, konnte aus Mangel an Zeit nur zum kleinsten Theil ausgeführt werden, da ich mich nicht entschliessen konnte, nicht fachmännischen, wenn auch kunstgeübten Händen die Anfertigung zu übertragen. Alle neuen Figuren sind von mir selbst gezeichnet worden.

Von neuen Methoden ist die Ehrlich'sche vitale Methylenblaufärbung nach Dogiel's Modifikation, ferner die Darstellung der Gallenkapillaren nach Böhm-Oppel aufgenommen worden. Allen, die sich in mikroskopisch-technischer Beziehung weiter ausbilden wollen, sei das kleine Buch¹⁾ dieser Autoren auf das Beste empfohlen. Es sollte in keinem mikroskopischen Laboratorium fehlen.

Die Methode über Härtung des Celloidins und Aufhellung der Celloidinschnitte hat mir Herr Dr. Overton, Privatdocent der Botanik an unserer Hochschule, dessen Umgang mir in so vieler Beziehung werthvoll ist, mitgetheilt.

Zürich, im März 1892.

Philipp Stöhr.

¹⁾ Böhm-Oppel, Taschenbuch der mikroskopischen Technik. München 1890.

Vorwort zur vierten Auflage.

Die vierte Auflage unterscheidet sich von ihren Vorgängerinnen hauptsächlich dadurch, dass ich eine andere Eintheilung und zwar die nach den Geweben getroffen habe. Diese Neuerung hatte natürlich eine ganze Reihe von Umordnungen im Gefolge, so dass der erste Theil des Buches in wesentlich anderer Fassung erscheint.

Aber auch in der Reihenfolge der Organe glaubte ich einige Aenderungen eintreten lassen zu müssen: Die weite Verbreitung der Gefässe schien mir deren Voranstellung zu rechtfertigen. Entwicklungsgeschichtlichen Forderungen Rechnung tragend, habe ich die Thymus in das Anhangs-Kapitel zu den Athmungsorganen gestellt; auch die Nebenniere hat einen anderen Platz — beim Nervensystem — erhalten.

Nach Massgabe neuer Forschungen hat auch der Text an vielen Stellen Verbesserungen erfahren; die wesentlichsten betreffen das Nervensystem, woselbst [den wichtigen Resultaten Golgi's die gebührende Würdigung zu Theil wurde.

In den technischen Abschnitt habe ich neu aufgenommen: die Chrom-Essigsäure als theilweisen Ersatz für die kostspielige Chromosmium-Essigsäure, eine neue, kürzere Methode Golgi's, ferner eine Methode zur Färbung der Zellen des Centralnervensystems, die ich von meinem Kollegen Oscar Schultze gelernt habe, dann Hermann's Platinchloridmischung, endlich die Verwendung der Salpetersäure als Fixirungsmittel.

Den neuen Figuren liegen z. Th. Präparate, die nach den oben genannten Methoden hergestellt wurden, zu Grunde. Die Zeichnungen habe ich mit Ausnahme der Figuren 63 und 115, welche ich Herrn Schröter in Hottingen verdanke, selbst angefertigt.

Zürich, am 15. August 1890.

Philipp Stöhr.

Vorwort zur dritten Auflage.

Obwohl seit dem Erscheinen der letzten Auflage erst 8 Monate verstrichen sind, hat sich doch abermals die Nothwendigkeit zu eingreifenden Aenderungen geltend gemacht.

Dieselben betreffen den feineren Bau der quergestreiften Muskelfasern, eine neue Eintheilung der Drüsen nach den Vorschlägen Flemming's, sowie eine neue Darstellung des Zusammenhanges der Netzhautelemente auf Grund der Untersuchungen Dogiel's, dessen Präparate mir vorgelegen haben. Letzteren Schilderungen sind neue schematische Zeichnungen beigegeben worden. Kleinere Zusätze haben die Kapitel „Geschlechtsorgane“ und „Haut“ erfahren.

Im technischen Abschnitte ist statt der Weigert'schen Färbung die Methode Pal's gesetzt worden, welche die Vorzüge rascherer Ausführbarkeit und minderer Säureempfindlichkeit der Präparate besitzt. Für Vergoldung habe ich (pag. 263) die von Drasch empfohlene Methode eingefügt, der ich treffliche Resultate verdanke. Die eine der neuen Hornhautfiguren (Fig. 182) ist die getreue Abbildung eines nach dieser Methode hergestellten Präparates.

Im Uebrigen ist, von kleineren Ausbesserungen abgesehen, Alles beim Alten geblieben.

Würzburg, im Dezember 1888.

Der Verfasser.

Vorwort zur zweiten Auflage.

Die zweite Auflage, welche ich hiermit der Oeffentlichkeit übergebe, hat nach verschiedenen Richtungen hin Verbesserungen und Erweiterungen erfahren.

Vorzugsweise betrifft dies den deskriptiven Theil des Lehrbuches; das Kapitel über Zellstruktur und Zelltheilung, über Knochen, über Entwicklung der Samenfäden, über Haarwechsel und über die Gefäße des Labyrinthes sind auf Grundlage im vergangenen Jahre erschienener Publikationen neu bearbeitet, zum Theil mit neuen Abbildungen versehen worden. Auch in anderen Kapiteln wird der aufmerksame Leser die bessernde Hand nicht vermissen.

Im technischen Abschnitte sind dagegen — abgesehen von einer kurzen Anleitung zum Messen und von der Angabe der Golgi'schen Methode — keine wesentlichen Vermehrungen eingetreten. Ich bin in dieser Hinsicht dem im Vorworte zur ersten Auflage entwickelten Programme treu geblieben. In anderer Beziehung jedoch habe ich eine Aenderung eintreten lassen. Von verschiedenen Seiten gestellten Anforderungen folgend, habe ich eine kurze Vorschrift zur Handhabung des Mikrotoms und der wichtigsten, dazu gehörigen Einbettungsmethoden in einem Anhange beigefügt, Doch möchte ich hier noch einmal betonen, dass ich zur Herstellung der in diesem Buche abgebildeten Präparate ein Mikrotom für durchaus überflüssig erachte. Eine nur einigermaßen geübte Hand wird mit einem einfachen Rasirmesser vollkommen Genügendes erzielen. Zum Zwecke eingehender Studien, zur Anfertigung von sehr feinen Schnitten, lückenlosen Serien und Demonstrationspräparaten mag dagegen das Mikrotom gebraucht werden. Neu ist endlich die am Schlusse der technischen Vorschriften angefügte Tabelle, welche die Vorschriften

nach der Schwierigkeit der Ausführung sowie der Beobachtung ordnet und den Anfänger vor misslungenen Versüchen, die ihn abschrecken könnten, möglichst bewahren soll. Derjenige, der sich durch die trotz aller Einschränkung immer noch ansehnliche Menge mikroskopischer Hilfsmittel zurückschrecken liesse, zu Hause sich ein kleines Laboratorium einzurichten, möge aus dieser Tabelle erschen, dass es keineswegs, um anzufangen, gleich des ganzen Apparates bedarf. Schon mit Alkohol, mit Müller'scher Flüssigkeit, mit destillirtem Wasser und einem Fläschchen Böhmer'schen Haematoxylin lässt sich eine stattliche Reihe von Präparaten herstellen.

Zum Schlusse sei allen Herren Kollegen, welche mir für die Bearbeitung dieser Auflage werthvolle Rathschläge zu Theil werden liessen, mein bester Dank ausgesprochen.

Würzburg, im März 1888.

Der Verfasser.

Vorwort zur ersten Auflage.

Vorliegendes Buch ist bestimmt, durch Anleitung zu mikroskopischen Präparirübungen den Studirenden in Stand zu setzen, auch hier von dem wichtigsten Lernmittel der Anatomie, dem Präpariren und dem Studium des Präparates, erfolgreichen Gebrauch zu machen.

Bei der Abfassung der technischen Vorschriften bin ich von der Voraussetzung ausgegangen, dass der Studirende durch den Besuch eines mikroskopischen Kursus mit den einzelnen Bestandtheilen des Mikroskopes und den einfachen Handhabungen derselben bekannt ist. Derartige Kenntnisse lassen sich mühelos durch direkte Unterweisung, schwer aber und nur auf weiten Umwegen durch schriftliche Anleitung aneignen.

Bei der Auswahl aus dem reichen Schatze der mikroskopischen Methoden habe ich mich nur auf die Angabe einer möglichst kurzen Reihe möglichst einfacher Hilfsmittel beschränkt. Der Studirende wird durch die stets wiederholte Anwendung immer derselben, genau vorgeschriebenen Methoden nicht nur rasch lernen, diese vollkommen zu beherrschen, sondern auch bald im Stande sein, nach anderen, in diesem Buche nicht angegebenen, nicht so genauen Vorschriften zu arbeiten. Aus diesem Grunde habe ich auf die Empfehlung vieler, selbst trefflicher Methoden verzichtet.

Die Handhabung des Mikrotoms glaubte ich vollkommen aus einer Technik für Studirende verbannen zu müssen. So unschätzbar dieses Instrument in mikroskopischen Laboratorien ist, für unsere Zwecke hier ist ein Mikrotom ganz entbehrlich; ein scharfes Rasirmesser leistet dieselben, ja noch bessere Dienste, da es nicht die zeitraubenden Vorbereitungen erfordert, wie das Mikrotom. Wer aber gelernt hat, mit einem Rasirmesser gute Schnitte zu machen, der wird auch dann, wenn ihm ein Mikrotom zur Verfügung steht, sich desselben nur im Nothfalle bedienen.

Wer gute Präparate anfertigen will, muss schon vorher Kenntniss der anatomischen Thatsachen besitzen. Ich habe deswegen einen kurzen Abriss der gesammten mikroskopischen Anatomie des Menschen beigelegt und denselben mit zahlreichen Abbildungen versehen. Auf die Anfertigung der Abbildungen habe ich eine ganz besondere Sorgfalt verwendet; sind sie ja doch nicht nur zur Erläuterung des Textes, sondern auch als Wegweiser beim Mikroskopiren die werthvollsten Hilfsmittel. Sämmtliche Figuren sind nach Präparaten¹⁾ gezeichnet, welche nach den hier angegebenen Methoden von mir angefertigt worden sind. Alle Zeichnungen sind mit Hilfe von Zeichenapparaten bei stets gleicher Höhe des Zeichentisches aufgenommen worden, können also bei Messungen mit einander verglichen werden²⁾. Ich habe mich dabei bestrebt, die Objekte in möglichster Treue wiederzugeben. Die beliebte Methode, Objekte bei schwachen Vergrößerungen zu zeichnen und die Details mit Hilfe starker Vergrößerungen nachzutragen, sowie das „Halbschematisiren“ habe ich vermieden. Solche Abbildungen mögen in anderen Lehrbüchern Platz finden; hier, wo es sich darum handelt, dem Mikroskopirenden zu zeigen, wie ein Objekt bei einer bestimmten Vergrößerung wirklich aussieht, würde die Anwendung derartiger Figuren zu Irrungen führen. Der Anfänger neigt ohnehin zu der unmöglichen Anforderung, dass ein Präparat Alles zeigen soll. Viele Figuren würden schöner sein, wenn ich sie in grösseren Dimensionen ausgeführt hätte; allein ich habe das absichtlich unterlassen; einmal, weil ich dem von Anfängern so beliebten vorwiegenden Gebrauch der stärkeren Vergrößerungen nicht Vorschub leisten wollte, und zweitens, weil ich dem Mikroskopirenden zeigen möchte, dass oft kleine Bezirke eines Präparates hinreichen, um sich über den Bau eines Organes zu unterrichten,

In Rücksicht darauf, dass dem Studirenden nur selten Mikroskope zu Gebote stehen, welche eine stärkere als 600fache Vergrößerung liefern, habe ich unterlassen, mit sehr starken Objektiven untersuchte Präparate zu zeichnen. Die Vergrößerungen 50—100 entsprechen den gewöhnlichen Mikroskopen beigegebenen schwächeren Objektiven, die Vergrößerungen 240—560 den stärkeren Objektiven mit

1) Ich habe, wo immer nur möglich, zu den Organpräparaten Theile des menschlichen Körpers benützt; aus diesem Grunde habe ich auch ein von Hans Virchow hergestelltes Retinapräparat (Fig. 187) und ein Nebennierenpräparat Gottschau's (Fig. 93, B) abgebildet. Sämmtliche Maassangaben betreffen Theile des Menschen.

2) Die Präparate sind nicht nur z. B. bei 50- etc. facher Vergrößerung gezeichnet, sondern auch in der That 50 fach vergrössert.

eingeschobenem oder mehr oder weniger ausgezogenem Tubus und schwachem oder mit mittlerem Okulare¹⁾. Für Vergrößerungen unter 50 nehme man theils Lupen²⁾, theils schwache Objektive, die man auch durch Auseinanderschrauben des schwächeren Objectives (3 bei Leitz, 4 bei Hartnack) herstellen kann³⁾.

Litteraturnachweise habe ich dem Texte nicht beigefügt; sie würden, wenn sie in brauchbarer Form gegeben worden wären, den Umfang des Buches über Gebühr ausgedehnt haben. Wer sich in dieser Hinsicht weiter unterrichten will, der möge ausser den Hofmann-Schwalbe'schen (früher Henle-Meissner'schen) Jahresberichten die Lehrbücher von Kölliker⁴⁾, Schwalbe⁵⁾ und Stricker⁶⁾ zu Rathe ziehen. Für technische Angaben sei ganz besonders Ranvier's treffliches technisches Lehrbuch der Histologie⁷⁾ empfohlen. Werthvolles findet sich endlich in der Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und für mikroskopische Technik.

Meinem Verleger, Herrn Gustav Fischer, sei hier mein ganz besonderer Dank ausgesprochen für die der Ausstattung des Buches zugewendete Sorgfalt, sowie für die Liberalität, welche mir die Beifügung so zahlreicher, aus der bekannten Anstalt von Tegetmeyer hervorgegangener Holzschnitte ermöglichte.

Würzburg, im September 1886.

Philipp Stöhr.

1) In den neuen Mikroskopen von Leitz beigegebenen Tabellen sind sämtliche Zahlen etwas höher, als die meinen Zeichnungen beigegebenen Werthe. Der Grund liegt darin, dass ich bei der Anwendung der Zeichenapparate ein Okular benützt habe, das schwächer ist, als Okular 1 Leitz.

2) Statt der Lupe kann man sich bei fertigen Präparaten auch eines der Okulare bedienen. Man setzt das Okular mit der oberen (sog. Okular-Linse) auf die Rückseite des gegen das Licht gehaltenen Objektträgers und betrachtet von der unteren (sog. Kollektiv-) Linse des Okulares aus.

3) Dadurch wird eine ca. 20—40 fache Vergrößerung erzielt. Man vergesse nicht, bei solchen Vergrößerungen den Planspiegel anzuwenden.

4) Mikroskopische Anatomie. Zweiter Band 1850—52 und Handbuch der Gewebelehre des Menschen. Leipzig 1867.

5) Lehrbuch der Anatomie von Hofmann-Schwalbe. 2. Band, zweite und dritte Abtheilung.

6) Handbuch der Lehre von den Geweben. 1872.

7) Uebersetzt von Nicati und v. Wyss. Leipzig 1877.

Inhalts-Verzeichniss.

I. Abschnitt.

Allgemeine Technik.

	Seite		Seite
I. Die Einrichtung des Laboratorium (pag. 1—8).		7. Schneiden	10
1. Instrumente	1	8. Färben	17
2. Reagentien	3	9. Injiziren	21
II. Das Herstellen der Präparate (pag. 8—27).		10. Einschliessen und Konserviren der Präparate . .	21
1. Beschaffen des Materiales	9	11. Untersuchung frischer Objekte	25
2. Tödtten und Seciren der Thiere	9	12. Aufbewahren der Dauerpräparate	27
3. Isoliren	10	III. Handhabung des Mikroskops (pag. 27—31).	
4. Fixiren	12	Zeichnen	29
5. Härten	14	Messen	29
6. Entkalken	15		

II. Abschnitt.

Mikroskopische Anatomie und spezielle Technik.

I. Histologie.

(Mikroskopische Anatomie der Zellen und der Gewebe.)

A. Die Zellen (pag. 33—39).		II. Stützgewebe (pag. 48—56).	
Bestandtheile der Zelle . .	33	1. Das Bindegewebe . . .	48
Form der Zellen	35	2. Das Knorpelgewebe . .	53
Grösse der Zellen	35	3. Das Knochengewebe . .	55
Bewegungserscheinungen der Zellen	35	Technik Nr. 3—16. (pag. 57—60).	
Bildung und Fortpflanzung der Zellen	36	III. Muskelgewebe (pag. 60—64).	
Lebensdauer der Zellen . .	39	1. Gewebe der glatten Muskeln	60
Wachsthum der Zellen . .	39	2. Gewebe der quergestreiften Muskeln	62
Ausscheidungen der Zellen .	39	Technik Nr. 17—23 (pag. 64—66).	
Technik Nr. 1	39	IV. Nervengewebe (pag. 66—70).	
B. Die Gewebe (pag. 40—43).		a) Nervenzellen	66
I. Epithelgewebe	40	b) Nervenfasern	68
Sekretorische Thätigkeit des Epithelgewebes . .	43	Technik Nr. 24—31 (pag. 70—72).	
Anhang. Die Drüsen . .	44		
Technik Nr. 2	48		

II. Mikroskopische Anatomie der Organe.

	Seite		Seite
I. Cirkulationsorgane (pag. 73—89).		IV. Organe des Nervensystems (pag. 116—137).	
1. Blutgefässsystem . . .	73	1. Centrales Nervensystem .	116
Herz	73	Rückenmark	116
Arterien	74	Gehirn	119
Venen	77	Grosshirnrinde	121
Kapillaren	78	Grosshirnganglien	122
Neubildung von Kapillaren	79	Grau der centralen Höhlen	122
Steissdrüse und Karotisdrüse	79	Kleinhirnrinde	122
Das Blut	80	Weisse Substanz	124
Entwicklung der farbigen Blutkörperchen .	82	Hypophysis cerebri	124
2. Lymphgefässsystem . .	82	Zirbel	125
Lymphgefässe	82	Hüllen des Centralnervensystems	125
Lymphknoten	83	Blutgefässe und Lymphbahnen des Centralnervensystems	126
Peripherische Lymphknoten	85	2. Peripherisches Nervensystem	127
Lymphhe	86	Nerven	127
Milz	86	Ganglien	129
Technik Nr. 32—50 (pag. 89—94).		Peripherische Nervenendigungen	130
II. Organe des Skeletsystems (pag. 94—107).		Endigungen der sensitiven Nerven	130
Die Knochen	95	Endigungen der motorischen Nerven	134
Verbindungen der Knochen .	99	Anhang. Die Nebennieren	135
Die Knorpel	101	Technik Nr. 63—84 (pag. 137—144).	
Entwicklung der Knochen	102	V. Verdauungsorgane (pag. 144—175).	
Erste Entwicklung der Knochen	102	Schleimhaut	144
a) Entwicklung der knorpelig vorgebildeten Knochen	102	Die Schleimhaut der Mundhöhle	145
b) Entwicklung der Bindegewebsknochen	106	Die Zähne	146
Weiteres Wachstum der Knochen	106	Entwicklung der Zähne	148
Resorption der Knochen .	107	Die Zunge	151
Technik Nr. 51—57 (pag. 107—111).		Der Pharynx	155
III. Organe des Muskelsystems (pag. 111—114).		Die Speiseröhre	156
Muskeln	111	Der Magen	157
Sehnen	112	Der Darm	160
Fascien	113	Die Blutgefässe des Magens und des Darmes	163
Sehnenscheiden und Schleimbeutel	113	Die Lymphgefässe des Magens und des Darmes	165
Technik Nr. 58—62 (pag. 114—116).		Die Nerven des Magens und des Darmes	166

	Seite
Die Speicheldrüsen	166
Die Leber	169
Das Bauchfell	175
Technik Nr. 85—116 (pag. 175—186).	
VI. Athmungsorgane (pag. 186—192).	
Der Kehlkopf	186
Die Luftröhre	187
Die Bronchen und die Lungen	187
Anhang: Die Schilddrüse . .	191
Die Thymus	192
Technik Nr. 117—123 (pag. 193—194).	
VII. Harnorgane (pag. 194—201).	
Die Nieren	194
Die ableitenden Harnwege .	199
Nierenkelche, Nierenbecken und Ureter	199
Die Harnblase	200
Die Harnröhre	201
Technik Nr. 124—133 (pag. 201—203).	
VIII. Geschlechtsorgane (pag. 203 —218).	
A. Die männlichen Geschlechts- organe (pag. 203—211).	
Die Hoden	203
Der Samen	207
Die ableitenden Samenwege	208
Anhangsdrüsen der männ- lichen Geschlechtsorgane .	209
Der Penis	210
B. Die weiblichen Geschlechts- organe (pag. 211—218).	
Die Eierstöcke	211
Epoophoron und Paroopho- ron	215
Eileiter und Uterus	215
Scheide und äussere weibliche Genitalien	217
Technik Nr. 134—147 (pag. 218—220).	
IX. Die Haut (pag. 220—233).	
Die äussere Haut	221
Die Nägel	223
Haare und Haarbälge	224
Entwicklung der Haare . . .	227
Haarwechsel	228
Drüsen der Haut	228

	Seite
Die Blutgefässe, Lymphge- fässe, und Nerven der Haut	230
Anhang: Die Milchdrüse . .	231
Technik Nr. 148—162 (233—236).	
X. Sehorgan (pag. 236—259).	
Der Augapfel	236
Tunica externa	237
Cornea	237
Sklera	239
Tunica media	239
Chorioidea	239
Corpus ciliare	240
Iris	241
Der Cornealfalz	242
Tunica interna	243
1. Pars optica retinae . . .	243
Gehirnschicht	244
Neuroepithelschicht . . .	246
Pigmentepithel	247
Macula lutea und Fovea centralis	247
Ora serrata	248
2. Pars ciliaris retinae . .	249
3. Pars iridica retinae . .	249
Der Sehnerv	249
Die Linse	250
Der Glaskörper	251
Die Zonula ciliaris	252
Die Blutgefässe des Augapfels	252
Die Lymphbahnen des Aug- apfels	255
Die Nerven des Augapfels .	255
Die Augenlider	256
Das Thränenorgan	259
Technik Nr. 163—177 (pag. 260—266).	
XI. Das Gehörorgan (266—276).	
Inneres Ohr	266
Sacculus, Utriculus und Bogengänge	267
Schnecke	268
Mittelohr	274
Paukenhöhle	274
Ohrtrompete	274
Aeusseres Ohr	275
Trommelfell	275
Aeusserer Gehörgang . . .	275
Technik Nr. 178—182 (pag. 276—278).	

	Seite		Seite
XII. Geruchsorgan (pag. 278—281).		II. Einbetten	292
1. Regio vestibularis	279	A. In Paraffin	292
2. Regio respiratoria	279	B. In Celloidin	294
3. Regio olfactoria	279	III. Schneiden	295
Technik Nr. 183—185		A. Paraffinobjekte	295
(pag. 282).		Schneiden beischräger Messer-	
XIII. Geschmacksorgan (pag. 282		stellung	295
—284).		Schneiden bei querer Messer-	
Technik Nr. 186—188		stellung	296
(pag. 284).		Misstände beim Schneiden .	296
Tabelle technischer Vorschrif-		B. Celloidinobjekte	297
ten	285	IV. Einlegen der Schnitte	297
Anhang. Die Mikrotomtech-		A. Paraffinobjekte	297
nik (pag. 292—298).		B. Celloidinobjekte	298
I. Mikrotome	292	Namens- und Sachregister .	299

I. Abschnitt.

Allgemeine Technik.

I. Die Einrichtung des Laboratorium.

1. Instrumente.

Das Mikroskop. Aus eigener Erfahrung kenne ich die aus den optischen Werkstätten von Hartnack in Potsdam, Leitz in Wetzlar, Seibert in Wetzlar und Zeiss in Jena hervorgegangenen Mikroskope, deren treffliche Leistungen ich schon vielfach erprobt habe¹⁾. Es ist nicht rathsam, dass der Anfänger sich ein Mikroskop kaufe, ohne zuvor dasselbe einem Fachmanne zur Prüfung unterstellt zu haben. Zur guten Instandhaltung des Mikroskops ist es nöthig, dasselbe vor Staub zu schützen; bei häufigem Gebrauche ist es am besten, das Mikroskop unter einer Glasglocke an einer dem Sonnenlichte nicht ausgesetzten Stelle aufzuheben. Der am Tubus sich bildende Schmutz wird mit einem trockenen Stückchen weichen Filtrirpapiers abgerieben; Verunreinigungen der Linsen²⁾ und des Spiegels sind mit weichem

¹⁾ Studirenden der ersten Semester rathe ich, von Ankauf starker Okulare und Immersionsysteme zunächst Abstand zu nehmen. Man kaufe solche erst kurz vor Beginn bakteriologischer Untersuchungen.

Folgende Zusammenstellungen sind zu empfehlen:

Hartnack. Preisverzeichn. 1891. Mikroskop Nr. V. Preis 458 <i>Mk</i> (ohne homog. Immers. 308 <i>Mk</i>)		oder	„	Nr. VI. „	422 <i>Mk</i> („ „ „ 272 <i>Mk</i>)
Leitz.	„	„	Nr. 34. 1891. Mikroskop Nr. 5. Preis 355 <i>Mk</i>		
			(ohne homog. Immers. und ohne Okul. IV 250 <i>Mk</i>)		
Seibert.	„	„	Nr. 22. 1891. Mikroskop 4a. Preis 498 <i>Mk</i>		
			(ohne homog. Immers., Objektiv 3, u. Okul. 0. 272,50 <i>Mk</i>)		
Zeiss.	„	„	Nr. 29. 1891. Zusammenstellung (pag. 110). 9) c. Preis 502 <i>Mk</i>		
			(ohne homogene Immers. 342 <i>Mk</i>)		
			oder 10) c. Preis 484 <i>Mk</i> (ohne homogene Immers. 324 <i>Mk</i>)		

Die meisten der für dieses Buch angestellten Untersuchungen habe ich mit einem Mikroskop von Leitz vorgenommen.

²⁾ Die Objektivlinsen dürfen nicht auseinander geschraubt werden.

Leder und wenn das nicht zum Ziele führt (z. B. bei Beschmutzung mit Damarfirniss) mit einem weichen Leinwandläppchen zu entfernen, welches mit einem Tropfen reinem Spiritus befeuchtet ist. Bei letzterer Procedur sei man sehr vorsichtig, damit nicht etwa der Weingeist in die Fassung der Linsen eindringe und den Kanadabalsam auflöse, mit welchem die Linsen verkittet sind. Man wische deshalb schnell mit der befeuchteten Stelle des Läppchens den Schmutzfleck weg und trockne die Linse sorgfältig ab. Die Schrauben des Mikroskops sind mit Petroleum zu putzen.

Ein gutes Rasirmesser, dessen Klinge auf der einen Seite flach geschliffen ist. Das Messer ist immer scharf schneidend zu erhalten und muss vor jedesmaligem Gebrauche auf dem Streichriemen ohne Druck auszuüben abgezogen werden. Das Schleifen des Messers auf dem Steine ist dem Instrumentenmacher zu überlassen. Man benütze das Rasirmesser nur zum Anfertigen der feinen Schnitte.

Ein feiner Schleifstein.

Eine feine gerade Scheere.

Eine feine, leicht schliessende Pincette mit glatten oder nur wenig gekerbten Spitzen.

Vier Nadeln mit Holzgriffen; zwei davon erhitze man, krümme sie dann leicht, erhitze sie abermals und steche sie in festes Paraffin, wodurch sie wieder gehärtet werden. Die beiden anderen müssen stets sauber und fein zugespitzt erhalten werden; bei feinen Isolirarbeiten spitze und polire man die Nadeln erst auf dem Schleifsteine und dann auf dem Streichriemen. Sehr brauchbar sind die sogenannten Staarnadeln der Augenärzte.

Nicht absolut nothwendig aber sehr brauchbar ist ein federnder Spatel aus Neusilber zum Uebertragen der Schnitte aus Flüssigkeiten auf den Objektträger. Man kann statt dessen auch ein mit breiter Klinge versehenes Messer aus dem anatomischen Präparirbestecke benützen.

Stecknadeln, Igelstacheln, Korkplatten, ein feiner Malerpinsel.

Ein gelber Kreidestift zum Schreiben auf Glas¹⁾.

Objektträger (eines der gebräuchlichen Formate) sollen von reinem Glase und nicht zu dick (1—1,5 mm) sein; Deckgläschen von ca. 15 mm Seite sind für die meisten Fälle gross genug; ihre Dicke darf zwischen 0,1 bis 0,2 mm schwanken.

Glasfläschchen (sogen. Pulverflaschen), ein Dutzend, mit weitem Halse von 30 und mehr cem Inhalt. Fläschchen mit Glasstöpsel sind zu theuer und nicht zu empfehlen, da die Stöpsel meist schlecht eingerieben sind.

Einige grössere Präparatengläser mit eingeschliffenem Glasdeckel, Höhe 8—10 cm, Durchmesser 6—10 cm; irdene Töpfe.

¹⁾ Das sind besondere von A. W. Faber in Nürnberg hergestellte Stifte, mit denen man auf Glas leicht schreiben kann. Ist das Glas fett, so muss es zuvor mit etwas Weingeist gereinigt werden.

Ein graduirtes Cylinderglas 100—150 ccm enthaltend. Ein Glastrichter von ca. 8—10 cm oberem Durchmesser.

Eine Pipette; man kann sich kleine Pipetten selbst verfertigen, indem man sich ein ca. 1 cm dickes, ca. 10 cm langes Glasröhrchen an einem Ende spitz auszieht und am anderen Ende ein ca. 6 cm langes Stückchen Gummirohr aufsetzt, das am oberen Ende mit einem starken Bindfaden fest zugebunden wird.

Ein Dutzend Uhrgläser von ca. 5 cm Durchmesser.

Ein Dutzend Reagirgläschen von ca. 10 cm Länge und ca. 12 mm Weite.

Glasstäbe von ca. 3 mm Dicke, 15 cm Länge, z. Th. an einem Ende spitz ausgezogen.

Für Reagentien dienen alte Medizingläser, Weinflaschen etc., die man vorher gut gereinigt hat¹⁾.

Nicht absolut nöthig, aber sehr brauchbar sind Präparatenschalen mit Glasdeckel²⁾ von 10—12 cm Durchmesser. Statt derselben lassen sich für viele Fälle Untertassen, Futternäpfchen für Vögel etc. verwenden.

Ein paar Bogen Filtrirpapier³⁾, grosse und kleine gummirte Etiketten, weiche Leinwandlappen (alte Taschentücher), ein Handtuch, eine grössere und eine kleinere Flaschenbürste.

Ein grosser Steinguttopf für die Abfälle.

2. Reagentien⁴⁾.

Allgemeine Regeln. Man halte sich nicht zu grosse Quantitäten vorrätzig, da viele Reagentien in verhältnissmässig kurzer Zeit verderben einzelne Reagentien (s. unten) sind erst kurz vor dem Gebrauche zu beziehen resp. zuzubereiten. Jede Flasche muss mit einer grossen, ihren Inhalt anzeigenden Etikette versehen sein; es empfiehlt sich, nicht nur das Rezept der betreffenden Flüssigkeit, sondern auch die Art der Anwendung derselben auf

1) Zum Reinigen genügt für die meisten Fälle das Ausbürsten der Flaschen mit Wasser, in anderen Fällen spüle man die Flaschen mit roher Salzsäure resp. mit Kalilauge aus, dann mit gewöhnlichem Wasser, dann mit destillirtem Wasser und zum Schluss mit etwas Alkohol.

2) Die meisten hier aufgezählten Glasgegenstände (auch Objektträger) sind billig bei W. P. Stender, Leipzig, Dampfgeschleiferei zu beziehen. Für grössere Präparatengläser empfehle ich H. Syré in Schleusingen, Thüringen.

3) Das sog. schwedische Filtrirpapier ist zu dick; das für unsere Zwecke passende Filtrirpapier kostet in besseren Papierhandlungen 70 Pfennige per Buch.

4) Die Reagentien müssen aus guten Apotheken oder besonders empfohlenen Drogenhandlungen bezogen werden. In ersteren sind auch die meisten Farbstoffe zu haben. Vorzügliche Farbstoffe und Reagentien sind zu haben bei Dr. Grübler, physiol. chem. Laboratorium, Leipzig, Bayersche Strasse 12.

Anfänger wenden sich betreffs der verschiedenen Bezugsquellen immer am besten an die Dozenten der anatomischen Institute.

der Etikette anzugeben. Sämmtliche Flaschen müssen fest mit Kork oder mit guten Glasstöpseln verschlossen sein. Die Flüssigkeit soll nicht bis zur Unterfläche des Korkes reichen.

1. Destillirtes Wasser 3—6 Liter.

2. Kochsalzlösung 0,75⁰/o. Aq. destill. 200 ccm.

Kochsalz 1,5 gr.

Der Kork der Flasche muss mit einem bis zum Flaschenboden reichen- den Glasstab versehen sein. Die Flüssigkeit verdirbt leicht, muss öfters neu bereitet werden.

3. Alkohol. a) Alkohol absolutus. 200 ccm vorrätig zu halten. Der käufliche absolute Alkohol ist ca. 96⁰/oig und ist in den aller- meisten Fällen für mikroskopische Zwecke vollkommen genügend. Will man vollständig wasserfreien Alkohol erhalten, so werfe man in die Flasche einige Stückchen (auf 100 ccm Alkohol je 15 gr) weissgeglühten Kupfervitriols; ist derselbe blau geworden, so muss er durch neuen ersetzt oder von neuem gebrannt werden. Auch frisch gebrannter Kalk dient zu gleichem Zwecke, nur wirkt dieser langsamer.

b) Reiner Spiritus, ca 90⁰/o Alkohol enthaltend, 3 bis 5 Liter (»90⁰/oiger Alkohol«¹⁾).

c) 70⁰/oiger Alkohol. 500 ccm sind herzustellen durch Vermischen von 365 ccm 96⁰/oigem Alkohol mit 135 ccm destillirtem Wasser.

d) Ranvier's Drittelalkohol. 35 ccm 96⁰/oiger Alkohol + 65 ccm destillirtes Wasser.

4. Essigsäure ca. 50 ccm. Die offizinelle Essigsäure ist 30⁰/oig.

5. Eisessig (der in den Apotheken käufliche ist 96⁰/oig) ist kurz vor dem Gebrauche zu beziehen (ca. 10 ccm).

6. Salpetersäure. Man halte sich eine Flasche mit 100 ccm kon- zentrirter Salpetersäure von 1,18 spec. Gewicht (enthält 32⁰/o Säurehydrat).

7. Reine Salzsäure 50 ccm.

8. Chromsäure. Man bereite sich eine 10⁰/oige Stammlösung (10 gr der frisch bezogenen krystallisirten Chromsäure in 90 ccm destillirtem Wasser

1) Aus Apotheken zu erhalten. Der für die anatomischen Institute bezogene Alkohol ist gewöhnlich 96⁰/oig. Zur Herstellung von Alkoholmischungen geringeren Procentgehaltes diene die Gleichung: $100 : 96 = x : p$. p = dem gewünschten Procent- gehalte. Soll z. B. 90⁰/oiger Alkohol hergestellt werden, so lautet die Gleichung:

$$100 : 96 = x : 90.$$

$$96x = 90 \cdot 100$$

$$x = \frac{9000}{96} = 93,7 \text{ abgerundet } 94.$$

Also: um 100 ccm 90⁰/oigen Alkohol zu erhalten, muss man 94 ccm 96⁰/oigen Alkohol mit 6 ccm destillirtem Wasser vermischen.

Die der Berechnung anhaftenden Fehler sind zu unbedeutend, als dass sie für unsere Zwecke in Betracht gezogen werden müssten.

zu lösen). Davon bereite man sich a) 0,1^o/oige Chromsäurelösung (10 ccm der Stammlösung zu 990 ccm destillirtem Wasser) und

b) 0,5^o/oige Chromsäurelösung (50 ccm der Stammlösung zu 950 ccm destillirtem Wasser).

9. Doppelt chromsaures Kali. Man halte vorrätbig: 25 gr in 1000 ccm destillirtem Wasser gelöst. Löst sich langsam (nach ca. 3 bis 6 Tagen).

10. Müller'sche Flüssigkeit. 30 gr schwefelsaures Natron und 60 gr pulverisirtes doppeltchromsaures Kali werden in 3000 ccm destillirtem Wasser gelöst. Die Lösung erfolgt bei Zimmertemperatur langsam (in 3 bis 6 Tagen). Man bereite deshalb die Lösung mit erwärmtem Wasser oder stelle die Flasche in die Nähe des Ofens.

11. Pikrinsäure. Man halte vorrätbig 50 gr der Krystalle und ca. 500 ccm einer gesättigten wässerigen Lösung, in welcher die Krystalle immer in 2 bis 3 mm hoher Schicht am Boden der Flasche liegen müssen. Löst sich leicht.

12. Pikrinschwefelsäure nach Kleinenberg. Zu 200 ccm gesättigter wässriger Pikrinsäurelösung giesse man 4 ccm reine Schwefelsäure; daraufhin erfolgt ein starker Niederschlag. Nach ca. 1 Stunde filtrire man diese Mischung und verdünne das Filtrat mit 600 ccm destillirtem Wasser. Der auf dem Filter zurückgebliebene Rückstand ist in den Abfalltopf zu werfen.

13. Chrom-Essigsäure. Zu 50 ccm 0,5^o/oige Chromsäurelösung (8 b.) werden 50 ccm destillirtes Wasser und 3—5 Tropfen Eisessig gesetzt.

14. Osmiumsäure. 50 ccm der 2^o/oigen wässerigen Lösung vor dem Gebrauche aus der Apotheke zu beziehen. (Sehr theuer, die genannte Lösung kostet 5 Mark.) Ist im Dunkeln oder im dunkeln Glase aufzubewahren und, wenn gut verschlossen, viele Monate haltbar.

15. Chromosmium-Essigsäure. Man bereite sich eine 1^o/oige Chromsäurelösung (5 ccm der 10^o/oigen Lösung [pag. 4] zu 45 ccm destillirtem Wasser), giesse dazu 12 ccm der 2^o/oigen Osmiumsäure, und füge noch 3 ccm Eisessig hinzu. Diese Mischung muss nicht im Dunkeln aufbewahrt und kann lange vorrätbig gehalten werden¹⁾.

16. Platinchlorid (theuer!). Man halte sich eine 10^o/oige Stammlösung, 2 gr in 20 ccm destillirtem Wasser gelöst.

17. Platinchlorid-Osmium-Essigsäure. Man giesse zu 60 ccm 1^o/oiger Platinchloridlösung (6 ccm der Stammlösung und 54 ccm destillirtes Wasser) 8 ccm 2^o/oige Osmiumlösung und 4 ccm Eisessig.

1) Mit alten Chromosmiumessigsäurelösungen fixirte Gewebe färben sich oft schlecht, weil die Essigsäure verdunstet ist; 5—20 Tropfen Eisessig der Lösung von Neuem zugesetzt, beseitigen diesen Uebelstand.

18. Salpetersaures Silberoxyd. Man beziehe kurz vor dem Gebrauche aus der Apotheke eine Lösung von 1 gr Argent. nitric. in 100 ccm destillirtem Wasser. Die Flüssigkeit muss im Dunkeln oder in schwarzer Flasche aufbewahrt werden und ist lange haltbar.

19. Goldchlorid. Man beziehe kurz vor dem Gebrauche aus der Apotheke eine Lösung von 1 gr Aur. chlorat. in 100 ccm destillirtem Wasser. In Dunkeln oder in schwarzer (brauner) Flasche zu halten.

Zur Goldchloridfärbung bedarf man

20. Ameisensäure. 50 ccm.

21. Konzentrirte (35%ige) Kalilauge 30 ccm. Das Fläschchen muss mit einem nichtvulkanisirten Kautschukpfropfen, der von einem Glasstabe durchbohrt ist, verschlossen sein. Aus der Apotheke zu beziehen.

22. Glycerin. 100 ccm reines Glycerin vorrätig zu halten, sowie eine Lösung von 5 ccm reinem Glycerin in 25 ccm destillirtem Wasser. Zur Verhütung der rasch in diesem Gemisch auftretenden Pilze kann man 5—10 Tropfen reine 1%ige Karbolsäurelösung oder einen Chloralhydrat-Krystall zusetzen. Der Kork des Fläschchens muss mit einem Glasstabe versehen sein, ebenso wie bei

23. Bergamottöl (grünes) 20 ccm. Das vielfach verwendete (billigere) Nelkenöl verpestet das ganze Laboratorium und dessen Insassen.

24. Damarfirniss, von Dr. Fr. Schoenfeld & Co. in Düsseldorf, ist in Fläschchen von ca. 50 ccm in Handlungen von Malerutensilien käuflich und kann, wenn er zu dickflüssig ist, mit reinem Terpentinöle verdünnt werden. Er hat die richtige Konsistenz, wenn von einem eingetauchten Glasstabe die Tropfen, ohne lange Fäden zu ziehen, abfallen. Damarfirniss ist dem zu stark aufhellenden (mit Chloroform verdünntem) Kanadabalsam vorzuziehen, hat aber den Nachtheil des sehr langsamen Trocknens, während Kanadabalsam rasch trocknet. Der Kork der Flasche muss mit einem Glasstabe versehen sein.

25. Deckglaskitt. Venetianisches Terpentin wird mit so viel Schwefeläther verdünnt, bis das Ganze eine leicht tropfbare Flüssigkeit bildet; dann wird warm filtrirt (im heizbaren Trichter) und das Filtrat auf dem Sandbade eingedickt. Die richtige Konsistenz ist erreicht, wenn ein mit einem Glasstabe auf den Objektträger übertragener Tropfen sofort soweit erstarrt, dass er ganz hart wird und sich mit dem Fingernagel nicht mehr eindrücken lässt. Man lasse wegen Feuersgefahr den Kitt in der Apotheke anfertigen.

26. Haematoxylin nach Böhrer. a) 1 gr krystallisirtes Haematoxylin (50 Pfg.) wird in 10 ccm absolutem Alkohol gelöst. b) 20 gr Alaun werden in 200 ccm destillirtem Wasser warm gelöst und nach dem Erkalten filtrirt. Am nächsten Tage werden beide Lösungen zusammengegossen und bleiben acht Tage in einem weitoffenen Gefässe stehen. Dann wird die

Mischung filtrirt¹⁾ und ist von da ab verwendbar. Trübungen, Pilzentwicklung in der Flüssigkeit beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit derselben nicht im Mindesten. Vorräthig zu halten.

27. Haematoxylin nach Weigert zur Darstellung der markhaltigen Nervenfasern des Gehirnes und Rückenmarkes. 1 gr krystallisirtes Haematoxylin wird in 10 ccm Alkohol abs. + 90 ccm destillirtes Wasser gebracht, gekocht und nach dem Erkalten filtrirt. Kurz vor dem Gebrauche anzufertigen.

Die Anwendung dieser Farbe beansprucht eine Zuhilfenahme von einer

27 a. Gesättigten Lösung von Lithion carbonicum; 3—4 gr Lith. carb. in 100 ccm destillirtem Wasser gelöst. Einen Tag vor dem Gebrauche anzufertigen. Ferner einer

27 b. 0,25%igen Lösung von übermangansauerm Kali; 0,5 gr Kali hypermangan. zu 200 ccm destillirtem Wasser. Vorräthig zu halten. Ferner einer

27 c. Säuremischung. 1 gr Acid. oxal. pur. und 1 gr Kalium sulfurosum (SO_3K_2) werden in 200 ccm destillirtem Wasser gelöst. Diese Mischung ist einen Tag vor dem Gebrauche zu bereiten und in gut verschlossener Flasche zu halten.

28. Neutrale Karminlösung. Ein Gramm bester Karmin wird kalt gelöst in 50 ccm destillirtem Wasser + 5 ccm Liq. ammon. caust. Die tiefkirschrothe Flüssigkeit bleibt so lange offen stehen, bis sie nicht mehr ammoniakalisch riecht (ca. 3 Tage) und wird dann filtrirt. Vorräthig zu halten. Der Geruch dieser Lösung wird alsbald ein sehr übler; die Färbekraft wird dadurch nicht beeinträchtigt.

29. Pikrokarmin. Man giesse zu 50 ccm destillirtem Wasser 5 ccm Liq. Ammon. caustic., schütte in diese Mischung 1 gr besten Karmin. Umrühren mit dem Glasstabe. Nach vollendeter Lösung des Karmins (ca. 5 Minuten) giesse man 50 ccm gesättigte Pikrinsäurelösung zu und lasse das Ganze zwei Tage in weit offenem Gefässe stehen. Dann filtrire man. Selbst reichliche Pilzentwicklung beeinträchtigt nicht die Färbekraft dieses vorzüglichen Mittels.

30. Alaunkarmin. 5 gr Alaun werden in 100 ccm warmem, destillirtem Wasser aufgelöst und dann 2 gr Karmin zugefügt. Diese Mischung wird 10—20 Minuten gekocht und nach dem Erkalten filtrirt; zuletzt werden der klaren, schön rubinrothen Flüssigkeit 2—3 Tropfen Acid. carbol. liquefact.²⁾ zugesetzt.

31. Boraxkarmin. 4 gr Borax werden in 100 ccm warmem destillirtem Wasser aufgelöst, nach dem Erkalten der Lösung werden 3 gr guter

1) Nach dem Erkalten des Alauns, sowie nachdem die Haematoxylin-Alaunmischung 8 Tage offen gestanden hat, finden sich am Boden des Gefässes (besonders bei niedriger Temperatur) Alaunkrystalle, die nicht weiter verwendet werden.

2) Vorsicht! diese Karbolsäure ätzt sehr stark.

Karmin unter Umrühren zugefügt und dann 100 ccm 70^o/oiger Alkohol (siehe pag. 4) zugegossen. Nach 24 Stunden filtrire man die Flüssigkeit, die sehr langsam (24 Stunden und noch länger) durch das Filter tropft.

Die Boraxkarminfärbung beansprucht die Nachbehandlung mit 70^o/oigem salzsaurem Alkohol, welcher bereitet wird durch Zufügen von 4—6 Tropfen reiner Salzsäure zu 100 ccm 70^o/oigem (pag. 4) Alkohol.

Beides vorrätbig zu halten.

32. Karminsaures Natron. 2 gr des Farbstoffes in 200 ccm destillirtem Wasser zu lösen.

33. Saffranin. 2 gr des Farbstoffes in 60 ccm 50^o/oigem Alkohol (31 ccm 96^o/oiger Alkohol + 29 ccm destillirtes Wasser) zu lösen.

Die Saffraninfärbung erfordert die Nachbehandlung mit absolutem salzsaurem Alkohol (8—10 Tropfen reine Salzsäure zu 100 ccm Alkoh. abs.).

Beides kann vorrätbig gehalten werden.

34. Eosin. 1 gr des Farbstoffes in 60 ccm 50^o/oigem Alkohol (31 ccm 96^o/oiger Alkohol + 29 ccm destillirtes Wasser) zu lösen.

Vorrätbig zu halten.

35. Kongoroth. 1 gr des Farbstoffes wird in 100 ccm destillirtem Wasser gelöst. Von dieser Stammlösung stelle man sich her

a) eine $\frac{1}{30}$ procentige Lösung: 3 ccm Stammlösung zu 100 ccm Ap. destill.

36. Vesuvio oder

37. Methylviolet B. etc. können in gesättigten wässerigen Lösungen (1 gr zu 50 ccm destillirtem Wasser) vorrätbig gehalten werden.

II. Das Herstellen der Präparate.

Einleitung.

Die wenigsten Organe des thierischen Körpers sind so beschaffen, dass sie ohne Weiteres der mikroskopischen Untersuchung zugänglich sind. Sie müssen einen gewissen Grad von Durchsichtigkeit besitzen, den wir dadurch erreichen, dass wir die Organe entweder in ihre Elemente zertheilen, die Elemente isoliren, oder in dünne Schnitte zerlegen, schneiden. Nun haben aber wiederum die wenigsten Organe eine Konsistenz, welche sofortiges Anfertigen genügend feiner Schnitte gestattet; sie sind entweder zu weich, dann muss man sie härten, oder zu hart (verkalkt), dann muss man sie entkalken. Härten und Entkalken kann jedoch nicht an frischen Objekten vorgenommen werden, ohne deren Struktur zu schädigen; es muss demnach beiden Prozeduren ein Verfahren vorausgehen, welches eine rasche

Erstarrung und damit eine Festigkeit der kleinsten Theilchen ermöglicht, dieses Verfahren nennt man *fixiren*. Das Anfertigen feiner Schnitte ist demnach meist nur nach vorausgegangener Fixirung und Härtung (eventuell nachfolgender Erkalkung) des betreffenden Objektes möglich. Aber auch die Schnitte beanspruchen noch weitere Behandlung; sie können entweder sofort durchsichtig gemacht werden, durch Aufhellungsmittel, welche auch mit Erfolg bei frisch untersuchten Objekten angewendet werden oder sie können vor der Aufhellung gefärbt werden. Die Farbstoffe sind für die mikroskopische Untersuchung unschätzbare Hilfsmittel, sie lassen sich auch auf frische, ja selbst auf lebende Organe applizieren; eine grosse Zahl der wichtigsten Thatsachen ist nur mit Hilfe der Farbstoffe aufgedeckt worden. In die Gefässe eingespritzt, injiziert, lehren sie uns die Vertheilung und den Verlauf der feinsten Verzweigungen derselben kennen.

1. Beschaffen des Materiales.

Für Studien über die Formelemente und die einfachsten Gewebe sind Amphibien: Frösche, Molche (am besten der gefleckte Salamander, dessen Elemente sehr gross sind) zu empfehlen, für Studien der Organe dagegen nehme man Säugethiere. Für viele Fälle genügen hier unsere Nagethiere (Kaninchen, Meerschweinchen, Ratte, Maus), ferner junge Hunde, Katzen etc. Doch versäume man keine Gelegenheit, die Organe des Menschen sich zu verschaffen. Vollständig frisches Material ist in chirurgischen Kliniken zu haben; im Winter sind viele Theile selbst vor 2—3 Tagen Verstorbener noch vollkommen brauchbar.

Im Allgemeinen empfiehlt es sich, die Organe lebenswarm einzulegen. Um möglichst rasch dieser Aufgabe sich zu entledigen, ist es geboten, zuerst die zur Aufnahme der Objekte bestimmten Gläser mit der betreffenden Flüssigkeit zu füllen und mit einer Objekt, Flüssigkeit und Datum (ev. Stunde) anzeigenden Etikette zu versehen; danach lege man die zur Sektion nöthigen Instrumente (das anatomische Präparirbesteck) zurecht und dann erst tödte man das Thier¹⁾.

2. Tödteten und Seziren der Thiere.

Amphibien durchschneide man mit einer starken Scheere die Halswirbelsäule²⁾ und zerstöre Hirn und Rückenmark vermittelst einer von der Wunde aus in die Schädelhöhle resp. in den Wirbelkanal eingestossenen Nadel. Säugethiere durchschneide man den Hals mit einem kräftigen bis

1) Dem lebenden Thiere Theile zu entnehmen, ist eine ganz nutzlose Grausamkeit.

2) Frösche fasse man dabei mit der linken Hand mit einem Tuche an den Hinter-schenkeln.

zur Halswirbelsäule reichenden Schnitt oder man tödte sie mit Chloroform, das man auf ein Tuch giesst und so den Thieren vor die Nase drückt. Kleine, bis 4 cm grosse Thiere, Embryonen, können im Ganzen in die Fixirungsflüssigkeit geworfen werden. Nach ca. 6 Stunden öffne man diesen die Bauch- und Brusthöhle durch Einschnitte. Bei der Sektion halte wemöglich ein Gehilfe die Extremitäten; kleine Thiere kann man mit starken Stecknadeln an den Fussflächen auf Kork- oder Wachsplatten spannen. Die Organe müssen sauber herauspräparirt werden (am besten mit Pincette und Scheere), Quetschen und Drücken der Theile, Anfassen mit den Fingern ist vollkommen zu vermeiden. Die Pincette darf nur am Rande der Objekte eingreifen; anhängende Verunreinigungen, Schleim, Blut, Darminhalt dürfen nicht mit dem Skalpell abgekratzt werden, sondern sind durch lang-sames Schwenken in der betreffenden Fixationsflüssigkeit zu entfernen.

Bei den im Folgenden angegebenen Methoden ist es nicht zu vermeiden, dass Scheeren, Pincetten, Nadeln, Glasstäbe etc. mit den verschiedensten Flüssigkeiten, z. B. Säuren benetzt werden. Man reinige die Instrumente sofort nach dem Gebrauche durch Abspülen in Wasser und Abtrocknen. Vor allem vermeide man, einen z. B. mit einer Säure oder mit einem Farbstoff beschmutzten Glasstab in eine andere Flüssigkeit zu tauchen. Abgesehen davon, dass die Reagentien dadurch verdorben werden, wird oft das Gelingen der Präparate in Folge dessen gänzlich vereitelt. Gläser, Uhrschalen etc. sind leicht zu reinigen, wenn dies sofort nach der Benützung geschieht; lässt man dagegen z. B. einen Farbstoffrest in einem Glase antrocknen, so ist das Reinigen immer sehr zeitraubend. Man versäume also nie, auch die Gläser sofort nach dem Gebrauche zu reinigen; Uhrschalen werfe man wenigstens in eine Schüssel mit Wasser.

Alle Gefässe, in denen man isolirt, fixirt, härtet, färbt etc., müssen geschlossen gehalten (Uhrschalen decke man mit einer zweiten Uhrschale zu, wenn die Manipulationsdauer 10 Minuten übersteigt), und dürfen nicht in die Sonne gestellt werden.

3. Isoliren.

Man isolirt entweder durch Zerzupfen der frischen Objekte oder nach vorhergehender Behandlung der Objekte mit lösenden Flüssigkeiten, welche ein Zerzupfen ganz oder theilweise unnöthig machen. Es gehört zu den schwierigen Aufgaben, ein gutes Zupfpräparat anzufertigen. Viel Geduld und genaue Erfüllung nachstehender Vorschriften sind unerlässlich. Die Nadeln müssen spitz und ganz rein sein; man spitze und polire sie zuvor auf dem angefeuchteten Schleifsteine. Das kleine Objekt, von höchstens 5 mm Seite, wird nun in einen kleinen Tropfen auf den Objektträger gelegt, und wird, wenn es farblos ist, auf schwarzer, wenn es dunkel (etwa gefärbt) ist, auf weisser Unterlage zerzupft. Ist das Objekt faserig (z. B. ein Muskelfaserbündel), so setze man beide Nadeln an dem einen Ende des

Bündels an und zerreisse dasselbe der Länge nach in zwei Bündel¹⁾; das eine dieser Bündel wird auf dieselbe Weise, immer durch Ansetzen der Nadeln an das Ende wieder in zwei Bündel getrennt und so fort, bis ganz feine einzelne Fasern erzielt sind. Durch Betrachtung des (unbedeckten) Präparates mit schwacher Vergrößerung kann man kontrolliren, ob der nöthige Grad von Feinheit erreicht ist²⁾.

Als isolirende Flüssigkeiten sind zu empfehlen:

a) Für Epithelien

ist Ranvier's Drittelalkohol (s. pag. 4) ein ausgezeichnetes Isolationsmittel. Man lege Stückchen von 5—10 mm Seite (z. B. der Darmschleimhaut) in ca. 10 ccm dieser Flüssigkeit ein. Nach 5 Stunden (bei geschichtetem Pflasterepithel nach 10—24 Stunden und später) werden die Stückchen mit einer Pincette vorsichtig, langsam herausgehoben und ein paar Mal leicht auf einen Objektträger aufgestossen, der mit einem Tropfen der gleichen Flüssigkeit bedeckt ist. Durch das Aufstossen fallen viele Epithelzellen isolirt ab, manchmal ganze Fetzen, die man nur mit der Nadel leicht umzurühren braucht, um eine vollkommene Isolation zu erzielen. Nun lege man ein Deckglas auf (pag. 22) und untersuche. Will man das Objekt färben, so bringe man die ganzen Stückchen vorsichtig aus dem Alkohol in ca. 6 ccm Pikrokarmín (s. pag. 7). Nach 2—4 Stunden wird das Stückchen sehr vorsichtig in ca. 5 ccm destillirtes Wasser gelegt und nach fünf Minuten auf den Objektträger aufgestossen, der diesmal mit einem Tropfen verdünntem Glycerin (s. pag. 6) bedeckt ist. Deckglas. Das Präparat kann konservirt werden.

b) Für Muskelfasern, Drüsen

eignet sich 35%ige Kalilauge (s. pag. 6). Stückchen von 10—20 mm Seite werden in 10—20 ccm dieser Flüssigkeit eingelegt; nach etwa einer Stunde sind die Stückchen in ihre Elemente zerfallen, die mit Nadeln oder einer Pipette herausgefischt und in einem Tropfen der gleichen Kalilauge unter Deckglas betrachtet werden. Verdünnte Kalilauge wirkt ganz anders; würde man die Elemente in einem Tropfen Wasser betrachten wollen, so würden dieselben durch die nunmehr verdünnte Lauge in kürzester Zeit zerstört werden. Gelingt die Isolation nicht (statt dessen tritt zuweilen eine breiige Erweichung der Stückchen ein), so ist die Kalilauge zu alt gewesen. Man wende deshalb

1) Zuweilen ist es schwierig, das Bündel in zwei der ganzen Länge nach getrennte Hälften zu theilen; es genügt dann oft, nur $\frac{3}{4}$ der Gesamtlänge auseinandergezogen zu haben, so dass dann die isolirten Fasern am anderen Ende noch alle zusammenhängen.

2) In wenig Flüssigkeit liegende, nicht mit einem Deckglase bedeckte Präparate sehen oft unklar aus, zeigen schwarze Ränder etc., Fehler, die durch Zusatz eines hinreichend grossen Tropfens und durch ein Deckglas wieder ausgeglichen werden.

stets frisch bezogene Lösungen an. Auch die gelungenen Präparate lassen sich nicht konserviren.

Ferner ist geeignet eine Mischung von chlorsaurem Kali und Salpetersäure. Man bereitet sich dieselbe, indem man in 20 ccm reiner Salpetersäure (s. pag. 4) so viel chlorsaures Kali (ca. 5 gr) wirft, dass ein ungelöster Satz am Boden bleibt. Nach 1—6 Stunden (manchmal später) ist das Objekt genügend gelockert und wird nun in 20 ccm destillirtes Wasser übertragen, in dem es eine Stunde bleibt, aber ohne Schaden auch 8 Tage verweilen kann. Dann wird es auf den Objektträger übertragen, wo es in einem Tropfen dünnem Glycerin (s. pag. 6) mit Leichtigkeit zerzupft werden kann. Wenn die Salpetersäure gut ausgewaschen ist, lassen sich die Präparate konserviren und auch unter dem Deckglase färben (s. pag. 26). Einlegen der noch nicht zerzupften Stückchen in Pikrokarmine (s. die Isolation von Epithelien) gelingt nicht, da diese Farbflüssigkeit die Objekte brüchig macht.

c) Für Drüsenkanälchen

ist vorzüglich das Einlegen kleiner Stücke (von ca. 1 cm Seite) in 10 ccm reine Salzsäure. Nach 10—20 Stunden werden die Stückchen in ca. 30 ccm destillirtem Wasser gebracht, das innerhalb 24 Stunden mehrmals gewechselt werden muss. Die Isolation gelingt dann leicht durch vorsichtiges Ausbreiten des Stückchens mit Nadeln in einem Tropfen verdünntem Glycerin. Die so hergestellten Präparate können konservirt werden.

4. Fixiren.

Allgemeine Regeln. 1. Zum Fixiren muss stets reichliche, das Volum des zu fixirenden Objektes 50—100 mal übertreffende Flüssigkeit verwendet werden. 2. Die Flüssigkeit muss stets klar sein, sie muss, sobald sie trübe geworden ist, gewechselt, d. h. durch frische Flüssigkeit ersetzt werden. Die Trübung tritt oft schon eine Stunde (oder früher) nach dem Einlegen ein. 3. Die zu fixirenden Objekte sollen möglichst klein sein, im Allgemeinen 1—2 ccm nicht überschreiten. Sollte die Erhaltung des ganzen Objektes nöthig sein (z. B. zur nachherigen Orientirung), so mache man wenigstens viele tiefe Einschnitte (5—10 Stunden nach dem ersten Einlegen) in dasselbe. Die Objekte sollen nicht am Boden liegen; man hänge sie entweder im Glase auf oder man bringe auf den Boden des Gefässes eine dünne (ca. 1 cm hohe) Lage Watte oder Glaswolle.

1. Alkohol absolutus ist für Drüsen, Haut, Blutgefässe etc. sehr geeignet. Er wirkt zugleich als Härtungsmittel. In absolutem Alkohol eingelegte Objekte können schon nach 24 Stunden geschnitten werden¹⁾. Er

¹⁾ Man verschiebe die Verarbeitung der in absolutem Alkohol fixirten Objekte auf nicht zu lange Zeit, da die Elemente doch allmählich leiden; man schneide nach 3 bis 8 Tagen. Schnitte von Objekten, die nur 24 Stunden in absolutem Alkohol gelegen hatten, färben sich zuweilen schlecht.

eignet sich deshalb vorzugsweise zur raschen Herstellung von Präparaten. Besonders zu beachten ist Folgendes: 1. Der absolute Alkohol muss, auch wenn er nicht getrübt ist, nach 3—4 Stunden gewechselt werden. 2. Man vermeide, dass die eingelegten Objekte auf dem Boden des Glases fest aufliegen oder gar festkleben¹⁾; man hänge deshalb die Objekte entweder an einem Faden im Alkohol auf, oder lege auf den Boden des Glases ein Bäuschchen Watte.

Nicht absoluter (z. B. 90⁰/oiger) Alkohol wirkt ganz anders, schrumpfend und kann deshalb nicht statt des absoluten Alkohols verwendet werden.

2. Chromsäure kommt hauptsächlich in zwei wässerigen Lösungen zur Verwendung:

a) als 0,1—0,5⁰/oige Lösung (s. pag. 5) ist sie besonders geeignet für Organe, die viel lockeres Bindegewebe enthalten. Diese starke Lösung verleiht dem Bindegewebe eine vorzügliche Konsistenz, hat aber den Nachtheil, dass Färbungen erschwert werden; sie ist ferner geeignet zur Fixirung von Kerntheilungen. Die Objekte verweilen hier 1—8 Tage, werden dann 3—4 Stunden in fließendes Brunnenwasser gebracht, oder wenn das nicht möglich ist, ebensolange in 3—4mal zu wechselndes Wasser, dann in destillirtes Wasser auf einige Minuten übertragen und endlich in allmählich verstärktem Alkohol (s. pag. 14) unter Ausschluss des Tageslichtes (pag. 15, Anmerk. 1) gehärtet.

b) als 0,05⁰/oige Lösung, die man sich bereitet, indem man die 0,1⁰/oige Lösung mit der gleichen Menge destillirten Wassers verdünnt. Behandlung wie Lösung a), doch verweilen die Objekte nur ca. 24 Stunden in Lösung b).

Chromsäurelösungen dringen langsam ein; es dürfen demnach bei 24stündiger Einwirkung nur kleine Stücke (von 5—10 mm Seite) eingelegt werden.

3. Salpetersäure ist als 3⁰/oige Lösung (3 cem konzentrirte Salpetersäure [pag. 4] zu 97 cem destillirtem Wasser) wie die starke Chromsäurelösung ein treffliches Mittel für bindegewebsreiche Organe. Die Objekte verweilen 5—8 Stunden in dieser Lösung und werden dann nicht in Wasser, sondern direkt in allmählich verstärkten Alkohol (pag. 14) zum Härten übertragen.

4. Kleinenberg's Pikrinschwefelsäure (pag. 5). Zarte Objekte (Embryonen) werden 5 Stunden, festere Theile 12—20 Stunden in diese Flüssigkeit eingelegt; dann zum Härten, ohne vorhergegangenes Auswaschen mit Wasser, in allmählich verstärkten Alkohol übertragen (s. pag. 14).

5. Müller'sche Flüssigkeit (s. pag. 5). Die Objekte werden 1—6 Wochen²⁾ in grosse Quanten (—400 cem) dieser Lösung eingelegt;

1) Die betreffenden Stellen erscheinen auf dem Schnitte stark komprimirt.

2) Man kann die Stücke noch länger, bis zu 6 Monaten, in Müller'scher Flüssigkeit halten; sie lassen sich alsdann oft ohne Alkoholhärtung schneiden und färben.

dann 4—8 Stunden in (womöglich fliessendem) Wasser ausgewaschen, in destillirtem Wasser kurz abgespült und endlich unter Ausschluss des Tageslichtes in allmählich verstärkten Alkohol verbracht (s. pag. 15, Anmerk. 1). Wer nicht mit peinlicher Gewissenhaftigkeit die oben (pag. 12) angegebenen allgemeinen Regeln für das Fixiren befolgt, erzielt hier Misserfolge, für welche dann selbst von sonst erfahrenen Mikroskopikern die schuldlose Müller'sche Lösung verantwortlich gemacht wird.

6. Osmiumsäurelösung (s. pag. 5). Beim Gebrauche derselben nehme man sich vor dem Einathmen der die Schleimhäute sehr reizenden Dämpfe in Acht. Man fixirt entweder durch Einlegen sehr kleiner (bis 5 mm Seite) Stückchen in die (meist in 1%iger Lösung angewendete, also zur Hälfte mit destillirtem Wasser zu verdünnende) Säure, die nur in kleinen Quanten (1—6 ccm) angewendet zu werden braucht, oder dadurch, dass man das feuchte Objekt den Dämpfen der Osmiumsäure aussetzt. Zu letzterem Zwecke giesse man in ein ca. 5 cm hohes Reagenzgläschen ca. 1 ccm der 2%igen Lösung, füge ebensoviel destillirtes Wasser hinzu und stecke das Objekt mit Igelstacheln an die Unterseite des Korkstöpsels, mit welchem man das Reagenzgläschen fest verschliesst. Nach 10—60 Minuten (je nach der Grösse des Objectes) wird das Stückchen abgenommen und direkt in die in dem Gläschen enthaltene Flüssigkeit geworfen. In beiden Fällen verweilen die Objekte 24 Stunden in der Säure; dabei müssen die Gläser gut verschlossen und im Dunkeln gehalten werden. Dann werden die Objekte herausgenommen, in (womöglich fliessendem) Wasser $\frac{1}{2}$ —2 Stunden ausgewaschen, in destillirtem Wasser kurz abgespült und in allmählich verstärktem Alkohol gehärtet (s. pag. 14).

7. Chromosmium-Essigsäure (s. pag. 5), vorzügliches Mittel zur Fixirung der Kerntheilungen. Man lege ganz frische, noch lebenswarmer Stückchen von 2—5 mm Seite in 4 ccm dieser Flüssigkeit, woselbst sie 1—2 Tage verweilen, aber auch noch länger liegen bleiben können. Dann werden die Stückchen 1 Stunde lang (besser länger) in (womöglich fliessendem) Wasser ausgewaschen, in destillirtem Wasser abgespült und in allmählich verstärktem Alkohol gehärtet (s. pag. 14).

8. Platinchlorid-Osmium-Essigsäure (s. pag. 5) zur Darstellung scharfer Zellgrenzen sehr geeignet. Sie wird angewendet wie die Chromosmium-Essigsäure.

Die zum Fixiren verwendeten Flüssigkeiten können nicht mehr weiter gebraucht werden; man giesse sie weg.

5. Härten.

Mit Ausnahme des absoluten Alkohols erfordern sämtliche Fixirungsmittel eine nachfolgende Härtung. Das beste Härtungsmittel ist der Alkohol in steigender Verstärkung. Auch hier gilt die Regel, reichlich Flüssig-

keit zu verwenden, sowie trüb oder farbig gewordenen Alkohol zu wechseln¹⁾. Die genauere Handhabung ist folgende: Nachdem die Objekte (in einer der oben aufgezählten Flüssigkeiten) fixirt und in Wasser ausgewaschen sind²⁾, werden sie auf 12—20 Stunden in 70%igen Alkohol übertragen und nach Ablauf dieser Zeit in 90%igen Alkohol gebracht, wo sich die Härtung nach weiteren 24—48 Stunden vollendet. In diesem Alkohol können die Objekte bis zur definitiven Fertigstellung Monate lang verweilen. Der zum Härten benutzte 90%ige Alkohol wird in einer eigenen Flasche gesammelt und zum Härten von Klemmleber oder zum Brennen verwendet.

6. Entkalken.

Die zu entkalkenden Objekte können nicht frisch in die Entkalkungsflüssigkeit eingelegt werden, sie müssen vielmehr vorher fixirt und gehärtet werden. Zu diesem Zwecke lege man kleine Knochen (bis zur Grösse von Metakarpen) und Zähne ganz, von grösseren Knochen ausgesägte Stücke (von 3—6 cm Länge) in ca. 300 ccm Müller'sche Flüssigkeit und nach 2—4 Wochen (nach vorhergegangenen Auswaschen) in ca. 150 ccm allmählich verstärktem Alkohol (s. pag. 14). Nachdem der Knochen 3 Tage (oder beliebig länger) in 90%igem Alkohol verweilt hat, wird er in die Entkalkungsflüssigkeit: verdünnte Salpetersäure (reine Salpetersäure 9—27 ccm zu 300 ccm Aq. destill.) übertragen. Auch hier müssen grosse Quanten (mindestens 300 ccm) verwendet werden, die anfangs täglich, später alle 4 Tage zu wechseln sind, bis die Entkalkung vollendet ist. Man kontrollirt den Prozess durch Einstechen mit einer alten Nadel und Einscheiden mit einem Skalpell³⁾. Entkalkter Knochen ist biegsam, weich und lässt sich leicht schneiden. Foetale Knochen, Köpfe von Embryonen etc. werden in schwächerer Salpetersäure (1 ccm der reinen Säure [s. pag. 4] zu 99 ccm destillirtem Wasser) oder in 500 ccm gesättigter wässriger Pikrinsäurelösung (pag. 5) entkalkt. Der Entkalkungsprozess nimmt bei dicken Knochen mehrere Wochen in Anspruch, bei foetalen und kleinen Knochen 3—12 Tage.

1) Die in Chromsäure und Müller'scher Flüssigkeit fixirten Stücke geben, wenn nicht lange ausgewaschen wurde — und das muss man wegen eintretender Schädigung vermeiden — noch im Alkohol Stoffe ab, die bei gleichzeitiger Einwirkung des Tageslichtes in Form von Niederschlägen auftreten; hält man dagegen den Alkohol im Dunkeln, so entstehen keine Niederschläge, sondern der Alkohol färbt sich nur gelb, bleibt aber klar. Aus diesem Grunde ist oben der Ausschluss des Tageslichtes empfohlen worden; es genügt, die betreffenden Gläser in einer dunkeln Stelle des Zimmers aufzustellen. Auch der 90%ige Alkohol muss, so lange er noch intensiv gelb wird, täglich einmal gewechselt werden.

2) Ausgenommen sind die in 3%iger Salpetersäure und die in Pikrinschwefelsäure fixirten Objekte, die direkt aus dieser Flüssigkeit in den 70%igen Alkohol übertragen werden. Hier muss schon der 70%ige Alkohol während des ersten Tages mehrmals gewechselt werden.

3) Nadel und Skalpell sind sofort nach dem Gebrauche sorgfältig zu reinigen.

Sobald die Entkalkung vollendet ist, werden die Knochen 6—11 Stunden in (womöglich fliessendem) Wasser ausgewaschen und abermals in allmählich verstärktem Alkohol gehärtet (s. pag. 14).

Anfängern begegnet es nicht selten, dass der Knochen noch vor vollständiger Entkalkung in Alkohol gebracht wird und dann bei Schneideversuchen sich noch unbrauchbar erweist. In solchen Fällen muss dann die ganze Entkalkungsprocedur wiederholt werden. Allzulanges Liegen der Objekte in der Entkalkungsflüssigkeit führt schliesslich zu gänzlichem Verderben.

7. Schneiden.

Das Rasirmesser (s. pag. 2) muss scharf sein: das Gelingen guter Schnittpräparate hängt von der Schärfe des Messers ab. Beim Schneiden muss die Klinge mit Alkohol befeuchtet werden (nicht mit Wasser, welches die Klinge nur unvollkommen benetzt). Zu dem Zwecke tauche man das Messer vor jedem dritten oder vierten Schnitte in eine mit ca. 30 ccm 90%igem Alkohol gefüllte flache Glasschale, die zugleich zur Aufnahme der angefertigten Schnitte dient. Das Messer ist horizontal zu halten, leicht zu fassen, der Daumen gegen die Seite der Messerschneide, die übrigen Finger gegen die Messerrückenseite, die Handrückenfläche nach oben gerichtet. Zuerst stelle man an dem zu schneidenden Objekte eine glatte Fläche her, indem man ein Stück von beliebiger Dicke mit einem Zuge vom Objekte trennt. Dann beginnt das Herstellen der Schnitte, die immer mit einem leichten, nicht zu raschen Zuge¹⁾ möglichst glatt und gleichmässig dünn ausgeführt werden sollen. Es ist geboten, stets eine grössere Anzahl (10—20) von Schnitten anzufertigen, die mit der Nadel oder durch Eintauchen des Messers in die Glasschale übertragen werden²⁾. Dann stelle man die Schale auf eine schwarze Unterlage und suche die besten Schnitte aus. Die dünnsten Schnitte sind nicht immer die brauchbarsten; für viele Präparate, z. B. für einen Durchschnitt durch sämtliche Magenhäute, sind dickere Schnitte mehr zu empfehlen. Für Uebersichtsbilder fertige man grosse, dicke, für feinere Strukturen kleine dünne Schnitte an; für letztere genügen oft aller kleinste, durch zu oberflächliche Messerführung erzielte Bruchstücke von 1—2 mm Seite oder Randpartien etwas dickerer Schnitte.

Ist das zu schneidende Objekt zu klein, um nur mit den Fingern gehalten zu werden, so bettet man dasselbe ein. Die einfachste Methode ist das Einbetten resp. Einklemmen in Leber.

¹⁾ Man darf das Messer nicht durch das Objekt drücken, man muss ziehen; zu dem Zwecke muss immer der dem Messergriff zunächst liegende Theil der Messerschneide an das Objekt angesetzt werden.

²⁾ Sehr feine Schnitte kann man (wenn sie nicht gefärbt werden sollen oder wenn sie schon durchgefärbt sind) am Besten von der geeigneten Klinge direkt auf den Objektträger hinüberziehen oder spülen.

Man nehme entweder Rindsleber oder besser menschliche Fett- oder Amyloidleber (aus patholog.-anatomischen Instituten zu erhalten)¹⁾, schneide sie in ca. 3 cm hohe, 2 cm breite und 2 cm dicke Stücke, die man sofort in 90%igen Alkohol wirft, der am nächsten Tage gewechselt werden muss; nach weiteren 3—5 Tagen hat die Leber die erforderliche Härte. Nun schneide man eines dieser Stücke von oben her zur Hälfte der Höhe ein, und klemme das zu schneidende Objekt in die so entstandene Spalte. Ist das Objekt zu dick, so kann man mit einem schmalen Skalpell Rinnen in die Leber schneiden, in welche das Objekt eingepasst wird. Das Objekt bedarf keiner weiteren Fixirung (etwa durch Zubinden mit einem Seidenfaden oder dergl.).

Ich klemme die meisten Schnittobjekte in Leber; man kann so sehr feine Schnitte erzielen, sofern man nur einigermaßen Uebung hat und die kann man sich in wenigen Wochen leicht aneignen.

8. Färben.

Vor dem Gebrauche ist die betreffende Farbstofflösung stets zu filtriren. Die aus einem Stückchen Filtrirpapier von 5 cm Seite bestehenden kleinen Trichter werden einfach durch zweimaliges Zusammenlegen hergestellt und in einen Korkrahmen gesteckt, den man sich durch Ausschneiden eines Stückes von ca. 2 cm Seite aus einer Korkplatte von ca. 5 cm Seite verfertigt hat. Der Korkrahmen wird auf 4 lange Stecknadeln gestellt. Solche Trichter können viele Male benutzt werden; Trichter und Rahmen sollen nur für ein und dieselbe Flüssigkeit in Anwendung kommen. Die in die Farbflüssigkeiten gebrachten Schnitte sollen nicht an der Oberfläche schwimmen; sie sind mit Nadeln in die Farbe unterzutauchen.

1. Kernfärbung mit Böhmer'schem Haematoxylin (s. pag. 6). Man filtrire 3—4 ccm der Farblösung in ein Uhrsälchen und bringe in dasselbe die Schnitte. Die Zeit, in welcher die Schnitte sich färben, ist eine sehr verschiedene. Schnitte in Alkohol fixirter und gehärteter Objekte färben sich in 1 bis 3 Minuten. War die Fixirung mit Müller'scher Flüssigkeit erfolgt, so müssen die Schnitte etwas länger (bis 5 Minuten) liegen²⁾. Aus der Farbe werden die Schnitte zunächst in ein Uhrsälchen mit destillirtem Wasser

1) Auch Hundeleber (von physiologischen Instituten zu erhalten) ist zu empfehlen.

2) Schnitte in starker Chromsäure fixirter oder sonst nicht ganz säurefreier Objekte färben sich oft sehr langsam, zuweilen gar nicht. Man kann diesem Uebelstande abhelfen entweder durch 2—3 Monate langes Aufbewahren in 2—3 mal zu wechselndem 90%igem Alkohol, oder dadurch, dass man solche Schnitte, bevor man sie in das Haematoxylin bringt, auf 5—10 Minuten einlegt in ein Uhrsälchen mit ca. 5 ccm destillirtem Wasser, dem 3—7 Tropfen 35%ige Kalilauge zugesetzt sind. Dann übertrage man die Schnitte auf 1—2 Minuten in ein Uhrsälchen mit reinem destillirtem Wasser und von da in das Haematoxylin. Nach 5—10 Minuten färben sich auch solche Schnitte.

gebracht, abgespült, d. h. mit der Nadel etwas bewegt, um sie von dem überschüssigen Farbstoffe zu befreien, und nach 1—2 Minuten in eine grosse mit ca. 30 ccm destillirtem Wasser gefüllte Schale übertragen. Hier müssen die Schnitte mindestens 5 Minuten lang verweilen, dabei geht ihre blau-rote Farbe allmählich in ein schönes Dunkelblau über, das um so reiner wird, je länger (bis 24 Stunden) man die Schnitte im Wasser liegen lässt¹⁾.

Anfängern ist zu empfehlen, die Schnitte verschieden lange Zeit 1, 3, 5 Minuten in der Farbe zu belassen und dann zu kontrolliren, welche Zeitdauer zu einer gelungenen Färbung die passende ist. Die Hauptsache bei der Haematoxylinfärbung ist das ordentliche Auswaschen; ist das Wasser blau geworden, so muss es durch neues ersetzt werden. Der benützte Farbstoff wird durch das Filter wieder in die Haematoxylinflasche zurückgegossen. Das Uhrsälchen ist sofort zu reinigen.

2. Kernfärbung mit Alaunkarmin (s. pag. 7). Man filtrire 3 bis 4 ccm der Farblösung in ein Uhrsälchen und bringe in dasselbe die Schnitte, welche hier mindestens 5 Minuten verweilen müssen. Der Vortheil dieser Färbung besteht darin, dass die Schnitte beliebig länger in der Lösung verweilen können, ohne überfärbt zu werden, was bei Haematoxylin leichter eintritt; ein Nachtheil ist, dass die Alaunkarminfärbung eine reine Kernfärbung ist, während bei Haematoxylinfärbung auch das Protoplasma einen grauen oder grau violetten Ton erhält und damit leichter kenntlich ist.

3. Diffuse Färbung. Zum Färben des Protoplasma und der Intercellularsubstanzen.

a) Langsame Färbung. Ein kleiner Tropfen der neutralen Karminlösung (pag. 7) wird mit dem Glasstabe in eine mit 20 ccm destillirtem Wasser gefüllte Schale gebracht, auf deren Grund ein Stückchen Filtrirpapier liegt²⁾. Die Schnitte kommen über Nacht in die Flüssigkeit. Je heller rosa die Flüssigkeit ist, desto länger braucht die Färbung, desto schöner wird sie auch. Der Anfänger ist stets geneigt, die blassrosa Flüssigkeit für zu dünn zu halten, als dass sie eine gute Färbung erzielen könnte, bis am anderen Tage die dunkelrosa bis rothen Schnitte ihn eines besseren belehren.

Diese Färbung ist allein für sich nur in seltenen Fällen verwendbar, dagegen für Doppelfärbungen sehr zu empfehlen. Man färbe zuerst mit der Karminlösung, dann mit Haematoxylin.

b) Schnelle Färbung. Man giesse ca. 10 Tropfen der Eosinlösung (pag. 8) zu 3—4 ccm destillirtem Wasser. Die Schnitte bleiben darin 1 bis 5 Minuten, werden dann in einem Uhrsälchen mit destillirtem Wasser kurz „abgespült“ (s. bei Haematoxylinfärbung) und auf ca. 10 Minuten in ca.

1) Anfangs sehen die Schnitte ganz verwaschen blau aus; meist nach 5 Minuten, manchmal erst nach Stunden erfolgt die Differenzirung, die schon manche Details mit unbewaffnetem Auge erkennen lässt.

2) Wird das versäumt, so färben sich die Schnitte nur auf der einen Seite.

30 ccm destillirtes Wasser gebracht. Die Färbung ist allein und kombinirt mit Haematoxylin anzuwenden; zuerst ist die ganze Procedur der Haematoxylinfärbung und dann die Eosinfärbung zu vollziehen.

4. Färbung der chromatischen Substanz (für Kerntheilungen). Die Objekte werden auf 16—48 Stunden (je länger, je besser) in nur 3 ccm der Saffraninlösung (s. pag. 8) eingelegt. Dann wird die Lösung sammt den Schnitten in eine Schale mit destillirtem Wasser gegossen, die ganz undurchsichtigen Schnitte (oder Häute) mit der Nadel herausgefangen und in ca. 5 ccm salzsauren Alkohol (s. bei Saffranin pag. 8) zum Entfärben eingelegt. Giebt der Schnitt nicht mehr viel Farbe ab (meist nach $\frac{1}{2}$ —2 Minuten), so wird er in 5 ccm reinen absoluten Alkohol übertragen und nach einer weiteren Minute aufgehellt und eingelegt (s. pag. 22). Zu langes Verweilen sowohl in dem salzsauren, als in dem absoluten Alkohol kann bis zu völliger Entfärbung des Präparates führen. Misslingen der Färbung beruht meist auf zu geringem Essigsäuregehalt der Chromosmium-Essigsäure (pag. 5 Anmerk.).

5. Durchfärben. (Kernfärbung ganzer Organstücke vor Zerlegung derselben in Schnitte.)

Die fixirten und gehärteten Objekte werden, wenn sie klein (ca. 5 mm Seite) sind, auf 24 Stunden, wenn sie grösser sind, auf 2—3 Tage in ca. 30 ccm Boraxkarmin gebracht; daraus werden sie direkt in ca. 25 ccm salzsauren 70⁰/oigen Alkohol (pag. 8) übertragen; (das gebrauchte Boraxkarmin wird in die Flasche zurückgegossen). Nach wenigen Minuten ist der Alkohol roth und muss nun durch neuen salzsauren Alkohol ersetzt werden, nach etwa $\frac{1}{4}$ Stunde wird der Alkohol abermals gewechselt; dieser Wechsel wird so oft wiederholt, bis der Alkohol nicht mehr gefärbt ist¹⁾.

Dann wird das Stück in 90⁰/oigen Alkohol und, wenn es hier nach 24 Stunden nicht hart genug zum Schneiden geworden ist, auf 24 und mehr Stunden in absoluten Alkohol übertragen.

6. Pikrokarmin. Doppelfärbung: Kerne und Bindegewebe roth, Protoplasma gelb.

Ca. 5 ccm der Flüssigkeit werden in ein Uhrsälchen filtrirt. Die Zeitdauer, in welcher Pikrokarmin wirkt, ist für die einzelnen Objekte eine sehr verschiedene und kann nur bei den speziellen Anweisungen annähernd angegeben werden. Nach vollendeter Färbung wird die Farbe in die Flasche zurückfiltrirt und das Objekt auf 10—30 Minuten in ca. 10 ccm destillirtes Wasser übertragen. (Fällt beim Färben unter dem Deckglase pag. 26 natürlich weg.) Soll das Objekt, z. B. ein Schnitt, in Alkohol absol. wasserfrei

1) Das kann 1—3 Tage in Anspruch nehmen; während des ersten Tages wechselt man alle 2, während der folgenden Zeit alle 4 Stunden. Wenn man sparsam sein will, kann man mit einer Nadel das Objekt aus dem rothen Flüssigkeitshof, in dem es liegt, langsam hinausschieben und an eine andere ungefärbte Stelle der Flüssigkeit bringen.

gemacht werden (s. pag. 23), so darf derselbe nicht lange (1—2 Minuten) daselbst verweilen, da der Alkohol die gelbe Farbe auszieht¹⁾.

Vorzugsweise wird Pikrokarmine bei Untersuchungen frischer Objekte verwendet. Ist die Lösung gut, so erzielt man sehr hübsche Färbung, die besonders bei nachheriger Anwendung des angesäuerten Glycerins (s. pag. 26) scharf hervortritt.

7. Kernfärbung mit Anilinfarben.

Die besten Anilinfarben sind hierfür Vesuvine und Methylviolet B (s. pag. 8). Man filtrire ca. 4 ccm der Flüssigkeit in eine Uhrschale; die hier eingelegten Schnitte färben sich nach 2—5 Minuten ganz dunkel, werden dann in 5 ccm destillirtem Wasser kurz abgewaschen und in ein Uhrschälchen mit absol. Alkohol gebracht, wo sie abermals viel Farbe abgeben; nach wenigen (3—5) Minuten sind die Schnitte heller geworden, man kann einzelne Theile (z. B. bei Haut die Drüsen) schon mit unbewaffnetem Auge erkennen; nun werden die Schnitte in eine zweite Uhrschale mit (5 ccm) absol. Alkohol gebracht und nach ca. 2 Minuten aufgehellt und in Damarfirnis eingeschlossen (pag. 23). Der Effekt ist eine sehr schöne dauerhafte Kernfärbung. Ein Nachtheil liegt in dem starken Verbräuche von absolutem Alkohol.

8. Versilbern. Zur Darstellung von Zellengrenzen, Färbung der Kittsubstanzen.

Der Gebrauch von Metallinstrumenten ist zu vermeiden, man bediene sich der Glasstäbe; statt Stecknadeln nehme man Igelstacheln.

Das Objekt wird in 10—20 ccm der 1%igen oder schwächeren (s. die speziellen Angaben) Lösung von Argent. nitric. (s. pag. 6, 18.) getaucht, nach $\frac{1}{2}$ —10 Minuten (je nach der Dicke des Objektes) aus der Flüssigkeit, die sich unterdessen meist milchig getrübt hat, mit Glasstäben (nicht mit Stahlinstrumenten) wieder herausgenommen, abgespült und in einer grossen weissen Schale (einem Porzellanteller) mit ca. 100 ccm destillirtem Wasser dem direkten Sonnenlichte ausgesetzt; nach wenigen Minuten wird eine leichte Bräunung eintreten, das Zeichen der gelungenen Reduktion. Sobald das Objekt dunkelrothbraun geworden ist (gewöhnlich nach 5—10 Minuten), wird es herausgenommen, in ein Uhrschälchen mit destillirtem Wasser, dem ein paar Körner Kochsalz beigelegt sind, gebracht und nach 5—10 Minuten in ca. 30 ccm 70%igen Alkohol im Dunkeln aufbewahrt; nach 3—10 Stunden ersetzt man den 70%igen durch 90%igen Alkohol. Das Einlegen in die Silberlösung muss unter Ausschluss des Sonnenlichtes geschehen, die Reduktion dagegen soll nur bei Sonnenlicht vorgenommen werden²⁾. Scheint keine Sonne, so hebt man das aus der Silberlösung genommene und in destil-

¹⁾ Man kann dieser Entfärbung vorbeugen, indem man in die Uhrschale mit absolutem Alkohol einen kleinen Pikrinsäurekrystall wirft.

²⁾ Die Reduktion erfolgt zwar auch bei gewöhnlichem Tageslichte, aber nur langsam und liefert dann weniger scharfe Bilder.

lirtem Wasser kurz abgewaschene Objekt im Dunkeln in ca. 30 ccm 70%oigem (später 90%oigem) Alkohol auf, um es in diesem beim ersten Sonnenblicke dem Lichte auszusetzen.

9. Vergolden. Zur Darstellung von Nervenendigungen.

Stablinstrumente dürfen nicht in die Goldlösung getaucht werden; alle Manipulationen in der Goldlösung sind mit Glasnadeln oder Holzstäbchen vorzunehmen.

Man erhitze in einem Reagenzgläschen 8 ccm der 1%oigen Goldchloridlösung + 2 ccm Ameisensäure (pag. 6) bis zum Sieden. Die Mischung muss dreimal aufwallen. In die erkaltete Mischung werden sehr kleine Stückchen (von höchstens 5 mm Seite) eine Stunde lang eingelegt (im Dunkeln zu halten), dann in einem Uherschälchen mit destillirtem Wasser kurz abgewaschen und in einer Mischung von 10 ccm Ameisensäure mit 40 ccm destillirtem Wasser dem Lichte (es bedarf nicht des Sonnenlichtes) ausgesetzt. Die Reduktion (die Stückchen werden dabei aussen dunkelviolett) erfolgt sehr langsam (oft erst nach 24—48 Stunden), dann werden die Stücke in ca. 30 ccm 70%oigen Alkohol und am anderen Tage in ebensoviel 90%oigen Alkohol übertragen, woselbst sie zur Verhinderung weiterer Reduktion im Dunkeln mindestens 8 Tage bis zur definitiven Verarbeitung verbleiben müssen.

9. Injizieren.

Das Füllen der Blut- und Lymphgefässe mit farbigen Massen ist eine besondere Kunst, die nur durch sehr viel Uebung erworben werden kann. Die Kenntniss der vielen, kleinen, hier zur Anwendung gelangenden Kunstgriffe lässt sich kaum durch die Lektüre selbst in aller Breite gegebener Anweisungen aneignen. Hier ist der praktische Unterricht unerlässlich. Dem entsprechend glaube ich in dem für Anfänger bestimmten Buche auf die Angabe einer ausführlichen Injektionstechnik verzichten zu müssen.

Wer sich im Injizieren versuchen will, muss eine gut schliessende, mit leicht beweglichem Stempel versehene Spritze und Kanülen von verschiedener Dicke haben. Als Injektionsmasse empfehle ich: Berlinerblau von Grübler (Adr. pag. 3) 3 gr in 600 ccm destill. Wasser gelöst. Man beginne mit der Injektion einzelner Organe, z. B. der Leber, welche den Vorzug hat, dass selbst eine unvollkommene Füllung ihrer Gefässe noch brauchbare Resultate ergiebt. Das injizirte Objekt fixire man 2—4 Wochen in Müller'scher Flüssigkeit (pag. 13) und härte es in allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14). Die Schnitte dürfen nicht zu dünn sein.

10. Einschliessen und Konserviren der Präparate.

Die fertigen Schnitte etc. werden nun zur mikroskopischen Untersuchung auf einen Objektträger übertragen und mit einem Deckglase bedeckt. Die Medien, in welchen sich die Schnitte befinden, sind entweder 1. Wasser,

oder wenn man die Schnitte aufhellen und konserviren will: 2. Glycerin oder 3. Damarfirniss.

Das Uebertragen auf den Objektträger geschieht so, dass man in der Regel zuerst einen kleinen Tropfen der betreffenden Flüssigkeit auf die Mitte des Objektträgers bringt; dann fängt man mit dem Spatel den Schnitt auf und zieht ihn von da mit der Nadel auf den Objektträger. Sehr feine Schnitte werden besser mit der Spitze eines Glasstabes aufgefangen und durch Rollen desselben auf den Objektträger gebracht. Liegt der Schnitt glatt auf, so bedeckt man ihn mit einem Deckglase¹⁾. Dieses muss an den Kanten, nicht an den Flächen angefasst werden; beim Bedecken wird das Deckglas mit der linken Kante auf den Objektträger aufgesetzt und nun langsam auf das Präparat gesenkt, indem man die Deckglasunterfläche mit einer in der rechten Hand gehaltenen Nadel stützt. Einfacher ist es noch, an die Unterfläche des Deckglases einen Tropfen der betreffenden Flüssigkeit anzuhängen und dann das Deckglas sanft auf das Präparat fallen zu lassen. Die Flüssigkeit, in welcher sich der Schnitt etc. befindet, muss genau den ganzen Raum zwischen Deckglas und Objektträger ausfüllen. Ist nicht genug Flüssigkeit da (das ist an grossen unter dem Deckglase befindlichen Luftblasen kenntlich), so setze man mit der Spitze eines Glasstabes noch einen Tropfen der Flüssigkeit an den Rand des Deckglases. Ist zuviel Flüssigkeit da — und darin pflegt der Anfänger ganz Besonderes zu leisten —, so muss die über den Rand des Deckglases hinausgetretene Flüssigkeit mit Filtrirpapier aufgesogen werden. Die Oberfläche des Deckglases muss stets trocken sein. Kleine Luftblasen unter dem Deckglase entferne man durch öfteres vorsichtiges Heben und Senken desselben mit der Nadel (s. ferner pag. 24).

ad 1. Man versäume nie, ungefärbte wie gefärbte Schnitte in Wasser oder Kochsalzlösung (pag. 4) zu betrachten, da hier viele Struktureigenthümlichkeiten, z. B. Bindegewebsformationen scharf hervortreten, während dieselben unter dem aufhellenden Einflusse des Glycerins oder des Damarfirniss sich der Beobachtung fast gänzlich entziehen. In Wasser (oder auch in Kochsalzlösung) eingelegte Objekte lassen sich nicht aufheben.

ad 2. Die in Glycerin eingelegten Präparate lassen sich konserviren; um die leichte Verschiebung des Deckglases zu verhindern, fixire man dasselbe mit Deckglaskitt (s. pag. 6). Vorbedingung: Der Rand des Deckglases muss vollkommen trocken sein; denn nur an trockener Glasfläche haftet

¹⁾ Untersuchungen mit schwachen Vergrösserungen ohne Deckglas sind nur zu alleroberflächlichster Orientirung, ob z. B. ein Objekt hinreichend zerzupft ist, zulässig. In allen anderen Fällen ist das Deckglas unentbehrlich. Um sich davon zu überzeugen, betrachte man einen unbedeckten Schnitt, decke ihn dann mit dem Deckglase zu und betrachte wieder. Manches gute Präparat, das man zu bedecken versäumt hat, erscheint unbrauchbar. Untersuchungen mit starken Objektiven (Nr. 7) ohne Deckglas sind überhaupt unzulässig.

der Kitt. Das Trocknen geschieht in der Weise, dass man zuerst mit Filtrirpapier das über den Deckglasrand heraustretende Glycerin absaugt und dann mit einem mit 90%igem Alkohol befeuchteten Tuche, das man sich über die Fingerspitze stülpt, sorgfältig den Objektträger rings um das Deckglas abwischt, ohne letzteres zu berühren. Nun erhitze man einen Glasstab und tauche ihn in den harten Kitt¹⁾, bringe zunächst vier Tropfen an die Ecken des Deckglases und ziehe dann einen vollständigen Rahmen, der so beschaffen sein muss, dass er einerseits das Deckglas, andererseits den Objektträger in einer Breite von 1—3 mm deckt. Schliesslich glätte man mit dem nochmals erhitzten Stabe die Oberfläche des Rahmens.

In Glycerin konservirte Präparate werden oft erst am zweiten oder dritten Tage schön durchsichtig. Haematoxylin und andere Farbstoffe verblassen darin nach kurzer Zeit; Pikrokarmine und Karmin sind dagegen haltbar.

ad 3. Das Einlegen der Objekte in Damarfirniss ist die beliebteste Konservierungsmethode. Damarfirniss hat dem Glycerin gegenüber den Vortheil, dass er die Farben erhält, ein Nachtheil besteht aber darin, dass er viel stärker aufhellt, als das verdünnte Glycerin und mancherlei feine Strukturen dadurch vollkommen verschwinden macht.

Die in Wasser oder Alkohol befindlichen Schnitte können nicht ohne Weiteres in Damarfirniss eingelegt werden, sie müssen vorher wasserfrei gemacht werden. Zu dem Zwecke werden die Schnitte mit der Nadel (sehr feine Schnitte mit Spatel und Nadel) in ein bedecktes Uhrschildchen mit 5 cem absolutem Alkohol gebracht. Dabei soll den Schnitten möglichst wenig Wasser anhaften; benützt man einen Spatel, so sauge man von diesem das Wasser mit Filtrirpapier ab; überträgt man den Schnitt mit einer Nadel, so kann man gleichfalls durch leichtes Berühren des Schnittes mit Filtrirpapier das Wasser entfernen. Im absoluten Alkohol verweilen sie 2 Minuten (dünne Schnitte) — 10 Minuten (dickere Schnitte) oder beliebig länger²⁾. Dann übertrage man die von Alkohol gleichfalls möglichst befreiten Schnitte zum Aufhellen in ein Uhrschildchen mit ca. 3 cem Bergamottöl³⁾. Stellt man das Schildchen auf

1) Die Glasstäbe springen dabei sehr leicht, doch sind sie Metallstäben vorzuziehen, da letztere sich zu rasch abkühlen. Man kann dem Springen etwas vorbeugen, indem man die Glasstäbe unter fortwährendem Drehen lang, bis zum Rothglühen erhitzt; nur kurz erhitze Glasstäbe springen sofort bei dem Eintauchen in den Kitt.

2) Anfängern ist zu empfehlen, die aus Wasser kommenden Schnitte zuerst in 5 cem 90%igen und dann erst in ebensoviel absoluten Alkohol zu bringen.

3) Man kann feine Schnitte auch aus dem absoluten Alkohol direkt auf den Objektträger bringen, den überflüssigen Alkohol abwischen und einen Tropfen Bergamottöl daraufsetzen; anfangs wird das Oel immer vom Schnitte ablaufen und muss wiederholt mit einer Nadel zum Schnitt geleitet werden; nach vollendeter Aufhellung, die man unter dem Mikroskop bei schwacher Vergrösserung konstatiren kann, wird das Oel möglichst abgewischt und ein Deckglas mit Damarfirniss aufgelegt. Beim Betrachten des unbedeckten, in Oel liegenden Schnittes trüben sich oft durch Anhauchen Schnitt und Oel; in solchen Fällen lasse man das trübe Oel ablaufen und setze einen Tropfen neues Oel auf.

schwarzes Papier, so kann man das allmähliche Transparentwerden der Schnitte beobachten. Man vermeide in das Uhrschildchen zu hauchen, eine sofortige Trübung des Bergamottöles ist die Folge. Werden einzelne Stellen der Schnitte nach 2—3 Minuten nicht durchsichtig (solche Stellen erscheinen alsdann bei auffallendem Lichte trübweiss, bei durchfallendem Lichte schwarzbraun), so ist der Schnitt nicht wasserfrei gewesen und muss noch einmal in den absoluten Alkohol zurückgebracht werden. Nach vollzogener Aufhellung wird der Schnitt auf den trockenen Objektträger übertragen, das überflüssige Oel¹⁾ mit Filtrirpapier oder mit einem über den Zeigefinger gestülpten Leinwandlappen sorgfältig abgewischt²⁾ und ein Deckglas aufgelegt, an dessen Unterflache ein Tropfen Damarfirniss angehängt worden ist. Sollen mehrere Schnitte unter ein Deckglas gebracht werden, so ordne man zuerst die Schnitte mit der Nadel nahe zusammen, breite dann den Damarfirniss auf der Deckglasunterfläche mit einem Glasstabe in gleichmässig dünner Schicht aus und setze dann das Deckglas auf. Grosse Luftblasen werden durch Anfügen eines kleinen Tropfens Damarfirniss an den Deckglasrand vertrieben; am nächsten Tage sieht man, dass die Luftblase unter dem Deckglase hervorgetreten ist. Kleine Luftblasen verschwinden von selbst, können sich also überlassen werden.

Anfängern begegnet es nicht selten, dass der Firniss sich trübt und schliesslich das ganze Präparat oder Theile desselben undurchsichtig macht. Der Grund liegt darin, dass der Schnitt nicht vollkommen wasserfrei war. Bei geringer Trübung, die unter dem Mikroskop als aus kleinsten Wassertropfchen bestehend sich erweist, genügt oft ein leichtes Erwärmen des Objektträgers, bei stärkeren Trübungen lege man den ganzen Objektträger in Terpentinöl, hebe das Deckglas nach einer halben Stunde vorsichtig ab, lege den Schnitt zwei Minuten in Terpentinöl, um den anhaftenden Firniss zu lösen und dann zur vollkommenen Wasserentziehung in 4 ccm absoluten Alkohol, der nach 5 Minuten zu wechseln ist. Dann Bergamottöl und Damarfirniss.

Der Damarfirniss trocknet sehr langsam, die Objektträger dürfen deshalb nicht auf die Kante gestellt werden.

Die Reihe, welche somit ein frisches Objekt zu durchlaufen hat, bis es als fertig gefärbter Schnitt konservirt ist, ist sohin eine sehr lange. Wenn z. B. in der speziellen Technik angegehen wird: „Fixiren in Müller'scher Flüssigkeit 14 Tage, härten in allmählich verstärktem Alkohol, Schnitte färben in Karmin und Haematoxylin, Einschluss in Damarfirniss“, so ist die Procedur folgende:

1) Das zum Aufhellen benützte Oel in der Uhrschildchen kann wieder in die Flasche zurückgegossen werden.

2) Die Entfernung auch des Oeles gelingt immer am leichtesten durch Neigen und nachheriges Abwischen des Objektträgers.

Das frische ca. 1 cem grosse Objekt wird eingelegt in 100 cem¹⁾ Müller'sche Flüssigkeit, welche, sobald Trübung eingetreten ist (gewöhnlich schon nach einer Stunde) gewechselt wird. Nach 24 Stunden abermaliges Wechseln der Flüssigkeit, in welcher nun das Objekt 14 Tage lang verbleibt.

Nach Ablauf derselben

Auswaschen in (womöglich fliessendem) Wasser — 1—4 Stunden lang,
dann Einlegen in 20 cem destillirtes Wasser — ca. 15 Minuten lang,
dann Einlegen in 50 cem 70⁰/oigen Alkohol und

Dunkelstellen (s. pag. 15 Anmerk. 1) — ca. 24 Stunden lang,
dann Einlegen in 50 cem 90⁰/oigen Alkohol — ca. 24 Stunden lang,
dann Wechseln des 90⁰/oigen Alkohols.

Das nun fixirte und gehärtete Objekt kann nach beliebig langer Zeit, während welcher der 90⁰/oige Alkohol vielleicht noch einmal gewechselt wird, geschnitten werden. Die Schnitte²⁾ kommen aus der Alkoholschale (pag. 16) in

20 cem dünne Karminlösung	—	ca. 24 Stunden lang,
dann in 5 cem destillirtes Wasser	—	ca. 10 Minuten lang,
dann in 5 cem Haematoxylin	—	ca. 5 Minuten lang,
dann in 30 cem destillirtes Wasser	—	10—120 Minuten lang,
dann in 5 cem Alkohol absolut.	—	10 Minuten lang,
dann in 3 cem Bergamottöl	---	2 Minuten lang,
endlich Einschluss in Damarfirniss.		

11. Untersuchung frischer Objekte.

Ich habe dieselbe an das Ende sämtlicher Methoden gestellt, weil sie das Schwerste von Allem ist und ein schon etwas geübtes Auge voraussetzt. Diese Uebung lässt sich am leichtesten durch vorhergehende Untersuchung schon präparirter (gehärteter und gefärbter etc.) Objekte aneignen; hat man einmal Struktureigenthümlichkeiten deutlich gesehen und studirt, so ist es nicht so schwer, dieselben auch an frischen Objekten wieder aufzufinden, obwohl die meisten Einzelheiten an Deutlichkeit manches zu wünschen übrig lassen. Zu beachten ist hier folgendes:

Objektträger und Deckglas dürfen nicht fett sein. Man reinige sie mit Alkohol und trockne sie mit einem ganz reinen Tuche. Dann bringe man einen Tropfen 0,75⁰/oiger Kochsalzlösung (pag. 4) auf den Objektträger, lege dann ein kleines Stück des zu untersuchenden Gegenstandes ein und bedecke

1) Die Maassangaben sind nur für das eine 1 cem grosse Stück berechnet, bei mehr oder bei grösseren Stücken muss natürlich mehr Fixirungs- und Härtungsflüssigkeit verwendet werden.

2) Nachstehende Quantitäten sind für 3—6 Schnitte berechnet; bei mehr Schnitten ist besonders die Menge des absoluten Alkohols zu vergrössern.

dasselbe mit dem Deckglase. Dabei muss jeder Druck sorgfältig vermieden werden; bei sehr zarten Objekten (s. spezielle Technik) bringe man zwei feine Papierstreifen an die Seiten derselben, auf denen dann das Deckglas ruht, ohne das Objekt selbst zu drücken. Bedarf das Objekt keiner weiteren Behandlung, so umrahme man, um Verdunstung zu verhindern, das Deckglas mit Paraffin. Man schmelze auf einem alten Skalpell oder dergl. ein etwa linsengrosses Stückchen Paraffin und lasse es nicht von der Spitze, sondern von der Scheide des Skalpells an den Deckglasrand fliessen, etwaige Lücken kann man mit nochmals erhitztem Skalpell verstreichen. In den meisten Fällen prüft man aber bei frischen Objekten die Einwirkung gewisser Reagentien (Essigsäure, Kalilauge, Farbstoffe) direkt unter dem Mikroskop. Es handelt sich also darum, einen Theil des Medium, in dem das Objekt sich augenblicklich befindet (also in unserem Falle die Kochsalzlösung) zu entfernen und durch eine andere Flüssigkeit zu ersetzen. Zu diesem Zwecke bringe man zuerst an den rechten Deckglasrand mit einem Glasstabe einen Tropfen z. B. Pikrokarmine. Reicht der Tropfen nicht ganz bis an den Deckglasrand, so neige man nicht etwa den Objektträger, sondern man führe mit einer Nadel den Tropfen bis zum Rande des Deckglases. Man sieht nun, dass ein wenig des Farbstoffes sich mit der Kochsalzlösung mischt, aber ein ordentliches Fliessen der Farbflüssigkeit unter das Deckglas findet nicht statt. Um das zu ermöglichen, setze man an den linken Rand des Deckglases etwas Filtrirpapier¹⁾ und alsbald sieht man das Pikrokarmine die ganze Unterfläche des Deckglases einnehmen²⁾. Nun schiebe man das Filtrirpapier zur Seite und lasse die Farbe wirken; ist die Färbung vollendet — das lässt sich ja stets unter dem Mikroskop kontrolliren —, so bringe man jetzt an den rechten Deckglasrand einen Tropfen z. B. verdünntes Glycerin, dem man bei Pikrokarminfärbungen soviel Essigsäure zusetzt, als von einer einmal eingetauchten Stahlnadel abtropft (also einen ganz kleinen Tropfen), während links wieder das Filtrirpapier angesetzt wird. Auf diese Weise kann man eine ganze Reihe von Flüssigkeiten unter dem Deckglase durchleiten und so ihre Wirkungen auf die Gewebe erproben. Einzelne der Flüssigkeiten, z. B. Pikrokarmine nach vorhergegangener Osmiumfixirung, müssen sehr lange mit den Objekten in Berührung bleiben. Man verhindert alsdann die Verdunstung, indem man das Präparat in die feuchte Kammer verbringt. Zur Herstellung der feuchten Kammer braucht man einen Porzellanteller und einen kleinen Glassturz von mindestens 9 cm Durchmesser³⁾. In

1) Ich schneide ein ca. 4 cm langes, 2 cm breites Stückchen aus, falte es der Quere nach und stelle das so geformte Papierdach so auf den Objektträger, dass es mit dem einen 2 cm breiten, ganz gerade geschnittenen Rande den linken Rand des Deckglases berührt.

2) Wenn der erste Tropfen eingedrungen ist, setze man je nach Bedürfniss 2—3 weitere Tropfen an den rechten Deckglasrand.

3) Ein Topf, ein grösseres Präparatenglas etc. thut dieselben Dienste.

den Teller giesse man Wasser ca. 2 cm hoch, dann stelle man in die Mitte ein Glasnäpfchen oder eine auf vier Holzfüssen stehende Korkplatte; auf diese wird der Objektträger mit dem Präparat gelegt und das Ganze mit dem Glassturze bedeckt, dessen freier Rand überall in das Wasser taucht.

12. Aufbewahren der Dauerpräparate.

Die fertigen Präparate müssen sofort etikettirt werden. Man nehme keine gummirten Papieretiketten, sondern solche aus ca. 1,2 mm dicker Pappe, welche man mit Fischleim („Syndetikon“) aufklebt. Dadurch werden besondere Schutzleisten überflüssig; die Objektträger können aufeinander gelegt werden, ohne dass die Präparate gedrückt werden. Die Etiketten sollen möglichst gross (von ca. 2 cm Seite bei Objektträgern englischen Formates) und mit dem Namen des Thieres, des Organs und womöglich mit kurzer Andeutung der Methode versehen sein. Zum Aufbewahren wähle man nur solche Kästen, in denen die Objektträger liegen, nicht solche, in denen sie auf der Kante stehen¹⁾.

III. Handhabung des Mikroskops.

Gemäss der in der Einleitung erwähnten Voraussetzung kann hier auf eine eingehende Beschreibung der optischen und mechanischen Theile des Mikroskops nicht eingegangen werden. Figur 1 möge noch einmal die für die einzelnen Theile des Mikroskops üblichen Benennungen dem Leser in das Gedächtniss zurückrufen.

Die erste Bedingung ist vollkommene Reinheit sämtlicher Bestandtheile des Mikroskops (s. auch pag. 1). Spiegel, Objektive und Okulare dürfen an den Oberflächen nicht mit den Fingern berührt werden. Die Objektive halte man mit dem unteren Ende gegen das Fenster und prüfe so die Klarheit des reflektirten Bildes. Das Anschrauben an den Tubus geschieht so, dass man das Objektiv festhält und den Tubus dreht (nicht umgekehrt). Dann wird das Okular eingesetzt; Verunreinigungen desselben erkennt man durch Drehen des Okulars im Tubus; klebt die Verunreinigung am Okular, so dreht sie sich mit.

¹⁾ Die besten und billigsten Kästen erhält man bei Th. Schroeter, Leipzig, Windmühlenstrasse Nr. 46. Ich empfehle für Etuisform Sorte O (für ca. 300 Objektträger) zu 2 Mark; für Tafelform Sorte P mit flachgewölbten Klappdeckeln (für 10—20 Objektträger je nach der Grösse) zu 45 Pf.; die Tafelform hat den grossen Vorzug der Uebersichtlichkeit der Präparate.

Nun suche man sich das Licht. Zu dem Zwecke ziehe man den Tubus aus der Hülse und sehe durch die leere Hülse und das Loch im Diaphragma in den Spiegel, den man so lange dreht, bis man die gewünschte

Fig. 1.

Mikroskop von Leitz. $\frac{1}{2}$ natürl. Grösse.

Lichtquelle erblickt¹⁾. Als Lichtquellen sind zu empfehlen eine weisse von der Sonne beleuchtete Wolke, oder weisse von der Sonne beschienene Vorhänge; weniger gut, aber noch brauchbar, ist der blaue Himmel; direktes Sonnenlicht ist zu vermeiden. Arbeitet man Abends bei künstlicher Beleuchtung, so nehme man das Licht von der Innenfläche des weissen Lampenschirmes, nicht direkt von der Flamme. Eine grüne Glasplatte vor den Spiegel gestellt, dämpft das künstliche Licht in wohlthuender Weise, ohne die Schärfe der Bilder wesentlich zu beeinträchtigen. Es ist selbstverständlich, dass auch der Mikroskopirende nicht im Sonnenschein sitzt; man stelle das Mikroskop etwa 2 Meter vom Fenster entfernt auf.

Nun kann die Untersuchung beginnen. Stets untersuche man zuerst mit schwachen, dann mit starken Vergrösserungen, ganz besonders sei gewarnt vor dem Gebrauche starker Okulare. Das den gewöhnlichen Mikroskopen beigegebene schwächste, eventuell das mittlere Okular (bei Leitz Ok. I.)

1) Die von dem so gestellten Spiegel reflektirten Lichtstrahlen treffen das Objekt senkrecht, man nennt diese Beleuchtungsart die centrale Beleuchtung. Zur Erkennung feiner Niveaudifferenzen wendet man mit Vortheil die schiefe oder seitliche Beleuchtung an, bei welcher der Spiegel so nach der Seite verschoben wird, dass die von ihm reflektirten Strahlen schräg auf das Objekt treffen. Bei dieser Beleuchtung müssen Diaphragma und Diaphragmenträger, sowie der meist verschiebbliche Schlitten, in welchem letzterer steckt, weggenommen werden, so dass die Oeffnung im Objekttisch möglichst gross ist.

ist für die allermeisten Fälle ausreichend, zu starke Okulare verkleinern und verdunkeln das Gesichtsfeld und erschweren die Untersuchung in hohem Grade¹⁾. Auch das Ausziehen des Tubus ist für viele Fälle entbehrlich. Bei schwachen Vergrößerungen nehme man das Diaphragma mit grösster, bei starken Vergrößerungen das Diaphragma mit kleinster Oeffnung. Für die gewöhnlichen Objektive Nr. 3 und Nr. 7 ist nur der Konkavspiegel zu benutzen. Beim groben Einstellen, d. h. beim Senken des Tubus bis die undeutlichen Konturen des Präparates erscheinen, stosse man den Tubus nicht gerade herab, sondern senke ihn unter spiraliger Drehung. Dann folgt die feine Einstellung bis zur vollkommensten Schärfe des Bildes. Dabei halte die linke Hand den Objektträger, die rechte ruhe auf der Mikrometerschraube. Da wir nur die in einer Ebene liegenden Punkte des Präparates deutlich sehen, durchmustere man das Präparat unter feinem Heben und Senken des Tubus, d. h. unter leisem Drehen der Mikrometerschraube. Man gewöhne sich daran, beide Augen beim Mikroskopiren offen zu halten.

Man versäume nie, die Präparate mit der Lupe zu betrachten; als solche sind die Okulare (z. B. Leitz Okular III.) zu verwenden. Man halte das eingeschlossene Präparat gegen das Licht, die vom Deckglas bedeckte Seite gegen das Fenster gerichtet, setze die obere Linse des Okulares direkt auf die Rückfläche des Präparates und betrachte von der unteren Okularlinse aus.

Zeichnen.

Ein unschätzbares Hilfsmittel ist das Zeichnen der mikroskopischen Objekte. Die Beobachtung wird dadurch ganz bedeutend verschärft, manche Details, die bis dahin vollkommen übersehen worden waren, werden beim Zeichnen entdeckt; selbst die aufmerksamste Betrachtung vermag die Vortheile, welche das Zeichnen bietet, nicht zu ersetzen. Auch der im Zeichnen wenig Geübte versuche die Objekte bei schwachen und starken Vergrößerungen zu skizziren. Man lege zu dem Zwecke das Zeichenpapier in die Höhe des Objektisches²⁾, sehe mit dem linken Auge ins Mikroskop, mit dem rechten auf Papier und Bleistiftspitze. Anfangs fällt das etwas schwer, bei einiger Uebung eignet man sich jedoch rasch die nöthige Fertigkeit an.

Messen.

Zu diesem Zwecke benütze man ein Okularglasmikrometer und ein Objektivmikrometer³⁾. Man lege letzteres auf den Objektisch und zähle,

1) Sämmtliche den Abbildungen dieses Buches zu Grunde liegenden Präparate sind mit schwachen Okularen untersucht und gezeichnet.

2) Gewöhnlich sind die Mikroskopkästen von annähernd gleicher Höhe wie der Objektisch.

3) Die Okularmikrometer sind theils zum Einlegen (bei Leitz) oder zum Einschieben (bei Seibert) in die Okulare eingerichtet, theils sind besondere Messokulare

durch das mit dem Okularmikrometer versehene Mikroskop blickend, wie viel Theile des Okularmikrometers auf einen Theil des Objektmikrometers treffen¹⁾. Indem der Werth der Theile des Objektmikrometers bekannt ist, berechnet sich leicht, wie gross das Objekt ist, welches bei bestimmten Vergrösserungen einen, resp. mehrere Theile des Okularmikrometers deckt. Folgende Beispiele mögen die Manipulationen verständlich machen. Bei Leitz Objektiv 3, Okular I und eingeschobenem Tubus decken 5 Theile des Okularmikrometers einen Theil des Objektmikrometers; jeder Theil des von uns verwendeten Objektmikrometers = $\frac{1}{20}$ mm. Also sind 5 Theile des Okularmikrometers $\frac{1}{20}$ (0,05 mm) und ein Theil des Okularmikrometers 0,01 mm gross. Deckt demnach ein Objekt, z. B. eine quergestreifte Muskelfaser, deren Breite gemessen werden soll, bei dieser Vergrösserung 4 Theile des Okularmikrometers, so ist die Faser 0,04 mm breit.

Es ist oft, besonders bei schwachen Vergrösserungen, schwierig, die feinen Theilstriche des Okularmikrometers zu zählen. Man kann sich die Sache erleichtern, wenn man die je 5 und 10 Theile abgrenzenden grossen Theilstriche des Okularmikrometers zu Hilfe nimmt. Z. B. bei Leitz Objektiv 3 Okular I und ausgezogenem Tubus decken 40 Theile des Okularmikrometers 5 Theile des Objektmikrometers. Also sind 40 Theile $\frac{5}{20}$ mm = 0,25 mm gross, und 1 Theil des Okularmikrometers bei dieser Vergrösserung = 0,0062 mm. 2 Theile = 0,0124 mm u. s. w.

Bei Leitz Obj. 7 Okul. I und eingeschobenem Tubus gehen 30 Theile des Okularmikrometers auf einen Theil des Objektmikrometers. Also sind 30 Theile 0,05 mm, 1 Theil 0,0017 mm = 17 μ gross. Endlich gehen bei Leitz Obj. 7 Ok. I, und ausgezogenem Tubus 40 Theile des Okularmikrometers auf einen Theil des Objektmikrometers. Demnach 40 Theile = 0,05 mm; 1 Theil = 0,0012 mm oder 12 μ .

Derjenige, welcher viele Messungen vorzunehmen hat, wird gut thun, sich eine Tabelle von 1 bis zu 20 und von da in Zehnern bis zu 100 anzulegen. Es muss hervorgehoben werden, dass obige Berechnungen keineswegs für alle aus der Leitz'schen Werkstätte hervorgegangenen Mikroskope Geltung haben. Für jedes Instrument müssen nach der oben angegebenen Methode die Maasse besonders ermittelt werden.

(z. B. bei Zeiss) den Mikroskopen beigegeben. Die Grösse der Theile der Okularmikrometer braucht natürlich nicht bekannt zu sein. Das Objektmikrometer ist ein Objektträger, auf welchem ein Millimeter in 100 Theile getheilt eingeritzt ist. Man kann statt dessen auch ein zweites Okularmikrometer, welches gewöhnlich die Eintheilung eines Millimeters in nur 20 Theile enthält, benützen. Die damit erzielte Berechnung ist freilich nicht so genau, doch sind die Fehler so unbedeutend, dass sie kaum eine Berücksichtigung verdienen.

¹⁾ Anfänger haben oft Mühe, die Striche des Objektmikrometers einzustellen; schwache oder schräge Beleuchtung des Objektes erleichtert das Aufsuchen der Striche.

Zum Schlusse sei dem Mikroskopiker Geduld, viel Geduld empfohlen; misslingen Präparate, so suche er die Schuld nicht in der Mangelhaftigkeit der angegebenen Methoden — ich habe sie oft erprobt — sondern in sich selbst; wer sich nicht daran gewöhnen kann, die angegebenen Vorschriften gewissenhaft¹⁾ auszuführen, wer die zarten Objekte mit allen fünf Fingern anfasst, wer die Reagentien ineinander giesst, die in den Flüssigkeiten zu fixirenden Stücke der Sonne aussetzt oder eintrocknen lässt, hat nicht das Recht, gute Resultate seiner unsauberen Arbeit zu beanspruchen.

¹⁾ Die für Färben, Entwässern etc. im Einzelnen angegebene Zeitdauer kann nur annähernde Geltung beanspruchen. Sie wechselt in nicht unerheblichen Grenzen je nach der Dicke des Schnittes, der Konzentration der Lösung etc. Uebung wird den Mikroskopirenden bald lehren, den richtigen Zeitpunkt herauszufinden.

II. Abschnitt.

Mikroskopische Anatomie und spezielle Technik.

Der thierische Körper besteht aus Zellen, welche durch wiederholte Theilung aus einer einzigen Zelle hervorgegangen sind. Zu Beginn der Entwicklung sind die Zellen noch von gleicher Gestalt, alle sind sie rundliche Gebilde, keines mit besonderen Merkmalen ausgerüstet, welche es von seinen Genossen unterscheiden: die Zellen sind noch indifferent. Im Verlaufe der Entwicklung ordnen sich die Zellen in platte über einander liegende Schichten, in die Keimblätter. Mit der Sonderung in Keimblätter und der aus diesen entstehenden Organe werden aber auch die Zellen von einander verschieden, sie differenziren sich. In der Regel sind die nach einer Richtung hin ausgebildeten Zellen zu Komplexen vereint und bilden so ein Gewebe. Ein Gewebe ist somit ein Komplex gleichartig differenzirter Zellen. Wir unterscheiden vier Hauptgewebe. 1. Das Epithelgewebe, 2. das Gewebe der Stützsubstanz, 3. das Muskelgewebe, 4. das Nervengewebe. So lange diese Gewebe noch jung sind, bestehen sie nur aus gleichartigen Elementen, nur aus Zellen; im Verlauf der Entwicklung aber wird dieses Verhältniss in zweifacher Weise abgeändert. Erstens produziren die Zellen besondere Substanzen, welche, zwischen den Zellen gelagert, Intercellularsubstanzen genannt werden. Dadurch wird indessen der Charakter der Gewebe nicht wesentlich alterirt, die oben gegebene Definition von „Gewebe“ muss nur dahin erweitert werden, dass wir ein Gewebe einen Komplex gleichartig differenzirter Zellen und ihrer Abkömmlinge nennen. Eingreifender ist die zweite Abänderung, die darin besteht, dass die Gewebe der einen Art in andere Gewebe eindringen; dies ist nun in sehr verschiedenem Grade der Fall, am reinsten hat sich noch das Epithelgewebe erhalten, ihm folgt das Stützgewebe. Muskelgewebe aber und Nervengewebe sind im ausgebildeten Zustande von anderen Geweben der Art durchmischt, dass, wenn auch in ihnen die zu Muskeln resp. zu Nerven differenzirten Elemente vorherrschen, von einem Gewebe im Sinne der

gegebenen Definition doch kaum mehr die Rede sein kann¹⁾. Die Gewebe sind also unter sich nicht gleichwerthig; am Niedersten stehen das Epithelgewebe und das Stützgewebe; beide, sowohl hinsichtlich ihrer Gestalt, als auch ihrer Leistung von einander verschieden, kommen auch im Pflanzenreiche vor; wir können sie deshalb als vegetative Gewebe zusammenfassen. Höher, sowohl in morphologischer, wie in physiologischer Hinsicht, stehen das Muskel- und das Nervengewebe, die, nur dem thierischen Körper zu eigen, animale Gewebe genannt werden.

Indem verschiedene Gewebe zum Aufbau eines Körpers von bestimmter Form und bestimmter Funktion zusammentreten, bilden sie ein Organ.

Unsere Aufgabe theilt sich somit 1. in die Lehre von den Zellen und von den Geweben und 2. in die Lehre von den Organen. Die Erforschung der Zellen und der Gewebe fällt der Gewebelehre, der Histologie, anheim. Die Gewebelehre ist ein Theil der feineren Anatomie, die nach dem Hilfsmittel, dessen sie sich zumeist bedient, mikroskopische Anatomie benannt wird; auch die Erforschung der Organe, soweit dieselbe durch das Mikroskop vermittelt werden kann, ist Aufgabe der mikroskopischen Anatomie.

I. Histologie.

(Mikroskopische Anatomie der Zellen und der Gewebe.)

A. Die Zellen.

Unter Zelle, *Cellula*, versteht man ein räumlich begrenztes Formelement, welches unter gewissen Bedingungen im Stande ist, sich zu ernähren, zu wachsen und sich fortzupflanzen. Wegen dieses Vermögens führt die Zelle den Namen „Elementarorganismus“.

Die wesentlichen Bestandtheile einer Zelle sind 1. das Protoplasma („Zellsubstanz“), eine feinkörnige, weiche, zähflüssige Substanz, die, in Wasser unlöslich, leicht quellungsfähig ist, hauptsächlich aus Eiweisskörpern, Wasser und Salzen besteht und einen besonderen N-haltigen Proteinkörper, das Plastin, enthält. Mit Hilfe sehr starker Vergrößerungen erkennt man im Protoplasma statt der Körnchen ein Fadenwerk („Filarmasse“), welches in eine formlose Grundsubstanz („Interfilarmasse“²⁾ eingebettet ist³⁾. 2. Der

¹⁾ Aus diesem Grunde ist auch der Vorschlag gemacht worden, von einer Eintheilung in Gewebe Abstand zu nehmen und nur Elemente und Organe zu unterscheiden.

²⁾ Filarmasse = Spongioplasma = Protoplasma
Interfilarmasse = Hyaloplasma = Paraplasma } anderer Autoren.

Die Anwendung letzterer Benennungen dürfte wegen möglicher Verwechslung mit Protoplasma (= Zellsubstanz) nicht zu empfehlen sein.

³⁾ Nach den Untersuchungen Bütschli's ist diese fibrilläre Beschaffenheit des Protoplasma nur eine scheinbare, die Struktur des Protoplasma ist vielmehr eine schaumige, d. h. sie enthält kleine Räume, Waben, die nicht mit einander in Verbindung stehen.

Kern (Nucleus), ein meist helles, scharf begrenztes Bläschen, das von einem Häutchen, der Kernmembran begrenzt wird und ein Netzwerk verschieden feiner Fäden, das Kerngerüst, enthält. In den Maschen dieses Netzwerkes befindet sich die weiche Kerngrundsubstanz („Kernsaft“), sowie ein oder mehrere Kernkörperchen (Nucleoli). Viele Farbstoffe färben nur den grössten Theil des Kerngerüsts und das Kernkörperchen, deren Substanz deswegen chromatische Substanz (Chromatin) genannt wird; ein Theil des Kerngerüsts (das „Linin“), ferner die Kernmembran sowie die Kerngrundsubstanz bleiben dagegen ungefärbt, sie heissen achromatische Substanzen (Achromatin)¹⁾. Auch die Kerne bestehen aus Eiweisskörpern aus Wasser und Salzen; dazu kommt noch ein dem Kerngerüste eigenthümlicher Stoff, das Nuclëin. 3. Das Centrosoma, ein minimales, im Protoplasma gelegenes Körperchen²⁾, von welchem feine Fäden gegen die Peripherie der Zelle ausstrahlen; die Summe dieser Fäden heisst Attraktionssphäre. Höchst wahrscheinlich bestehen auch noch Fäden, welche, vom Centrosoma ausgehend, durch eine Lücke der Kernmembran tretend sich mit den Linin-

Fig. 2.

Schema einer Zelle. Die Filarmasse ist nur zur Hälfte eingezeichnet. Centrosoma und Attractionssphäre liegen an der Polseite (pag. 37.)

fäden und den färbbaren Theilen des Kerngerüsts verbinden.

Die meisten Zellen enthalten einen Kern, nur einzelne Zellen besitzen mehrere Kerne (manche Wanderzellen, Riesenzellen u. a.). Die kernlosen Zellen (verhornte Zellen

der Epidermis, farbige Blutzellen der Säugethiere) besitzen ursprünglich einen Kern, verlieren jedoch denselben im Verlaufe der Entwicklung.

Als unwesentliche Bestandtheile der Zellen gelten: die Zellmembran, welche vielen Zellen fehlt und da, wo sie vorhanden ist, meist eine Umbildung der peripherischen Protoplasmaschicht ist und als ein dünnes, meist strukturloses Häutchen erscheint; ferner die im Protoplasma einzelner Zellen befindlichen Körner („Mikrosomen“) von Pigment, Glykogen etc. und die Tropfen von Fett, von wässriger und schleimiger Flüssigkeit. Mit dem Namen

1) Gewisse Fixierungsmittel, z. B. die Müller'sche Flüssigkeit, sowie manche Farbstoffe, z. B. Haematoxylin, ermöglichen auch die achromatische Substanz zu färben.

2) In vielen Zellen ist ein doppeltes Centrosoma beobachtet worden.

„Nebenkern“, sind sehr verschiedenartige Bildungen bezeichnet worden, deren Bedeutung im Einzelnen noch nicht überall festgestellt ist.

Die Form der Zellen ist eine sehr mannigfaltige. Die Zellen können sein: kugelig, das ist die Grundform aller Zellen in embryonaler Zeit, beim Erwachsenen sind z. B. die Leukocyten kugelig; scheibenförmig z. B. die farbigen Blutkörperchen; polyedrisch z. B. die Leberzellen; cylindrisch z. B. die Epithelzellen des Dünndarmes; kubisch (sogen. Pflasterzellen) z. B. die Epithelzellen der Linsenkapsel; abgeplattet (sogen. Plattenzellen) z. B. die Epithelzellen der Blutgefässe; spindelförmig z. B. viele Binde-substanzzellen; zu langen Fasern ausgezogen z. B. glatte Muskelfasern und sternförmig z. B. viele Ganglienzellen. Die Form der Kerne passt sich meistens der Form der Zellen an; sie ist abgerundet länglich bei cylindrischen, spindelförmigen und sternförmigen Zellen, rundlich bei runden und kubischen Zellen. Gelappte, sogen. polymorphe Kerne finden sich bei Leukocyten und bei Riesenzellen; sie sind der Ausdruck einer Aktivität der Zelle, die auf Form- oder Ortsveränderung, oder auf vermehrte Stoffwechselenergie hinzielt.

Die Grösse der Zellen schwankt von mikroskopisch kleinen, $4 \mu^1$) grossen Gebilden (farbige Blutzellen) bis zu makroskopischen Körpern (Eier von Vögeln, Amphibien).

Die vitalen Eigenschaften der Zellen können hier nur insoweit erörtert werden, als sie direkt mikroskopischer Beobachtung zugänglich sind; im Uebrigen muss auf die Lehrbücher der Physiologie verwiesen werden. Es kommen demnach hier in Betracht: die Bewegungserscheinungen, die Fortpflanzung der Zelle, sowie die an die Sekretbildung geknüpften mikroskopischen Vorgänge.

Die Bewegungserscheinungen treten zu Tage in Form der amoeboiden²⁾ Bewegung, der Flimmerbewegung und der Kontraktionen ge-

Fig. 3.

Leukocyt eines Frosches, 560mal vergrössert. Gestaltwechsel 10 Minuten lang beobachtet. 0, zu Beginn der Beobachtung, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ Minute später, etc. gezeichnet. Technik Nr. 41.

die mannigfaltigsten Gestalten erzeugen. Die Fortsätze können wieder zurückgezogen werden oder sie heften sich irgendwo an und ziehen ge-

wisser Fasern (Muskelfasern). Die amoeboide Bewegung ist die wichtigste; weit verbreitet, ist sie bei fast allen Zellenarten des thierischen Körpers beobachtet worden. In ausgesprochenen Fällen, z. B. bei Leukocyten äussert sie sich dadurch, dass das Protoplasma der Zelle feinere oder gröbere Fortsätze ausstreckt, die sich theilen, wieder zusammenfliessen und auf diese Weise

¹⁾ Ein Mikron = μ = 0,001 mm.

²⁾ Die Amöben sind einzellige Organismen, welche die oben beschriebenen Bewegungen in ausgezeichneter Weise erkennen lassen, daher der Name „amoeboide Bewegung“.

wissermassen den übrigen Zellenleib nach sich, die Folge davon sind Ortsveränderungen, die man „Wandern“ der Zellen nennt; solche Wanderzellen spielen im Haushalte des thierischen Körpers eine grosse Rolle. Die Fortsätze können Körnchen oder kleine Zellen umfliessen und so in den Zellenleib einschliessen, ein Vorgang, der „Fütterung“ der Zelle genannt worden ist¹⁾. Die amoeboiden Bewegungen erfolgen sehr langsam, bei Warmblütern nur bei künstlicher Erwärmung des Objektes. Flimmerbewegung und Kontraktionserscheinungen s. pag. 41 und bei „Muskelgewebe“.

Es giebt noch eine andere Bewegungserscheinung, die nicht nur an der lebenden Zelle, sondern auch an der abgestorbenen beobachtet wird. Es ist dies die sog. Molekularbewegung, ein Oscilliren kleinster Körnchen in der Zelle, die Folge molekularer Flüssigkeitsströmungen. Man kann sie oft bei Speicheldrüsen (siehe Zungenbälge) beobachten.

Bildung und Fortpflanzung der Zellen. Früher unterschied man zwei Arten von Zellenbildung: die freie Entstehung der Zellen (Urzeugung, *Generatio aequivoca*), und die Entstehung der Zellen durch Theilung. Nach der Lehre von der Urzeugung sollten sich Zellen in einer geeigneten Flüssigkeit, dem Cytoblastema, bilden. Diese Lehre ist aber nun völlig verlassen; wir kennen jetzt nur mehr eine Art der Zellenentstehung, das ist die Bildung der Zellen durch Theilung schon vorhandener Zellen. „*Omnis cellulae cellula*“²⁾. Bei der Theilung einer Zelle trennt sich zuerst der Kern und dann das Protoplasma in zwei meist gleiche Theile. Bei diesem Vorgange erfolgt eine besondere Gruppierung und Umordnung des Kerngerüsts (pag. 34) nach bestimmten Gesetzen. Diese Theilungsart heisst „indirekte Theilung“, „Theilung durch Mitose“³⁾. Ihr Verlauf, den man gewöhnlich in drei Phasen theilt, ist folgender:

1) Nicht zu verwechseln mit Ernährung der Zelle, welche durch eine ganze Reihe komplizirter Vorgänge, chemische Prozesse im Innern der Zelle, diosmotische Strömungen, Imbibition, Druckwirkung etc. vermittelt wird.

2) Ebenso kann ein neuer Kern nur durch Theilung eines schon vorhandenen Kernes entstehen. Die Lehre von der „freien Kernbildung“, nach welcher Kerne direkt aus dem Protoplasma, also unabhängig von bestehenden Kernen der Zellen sich bilden sollen, entbehrt eines unzweideutigen Beweises.

3) *μῆκος* der Faden, weil bei diesem Vorgange im Kerne Fäden sichtbar sind. Ausserdem giebt es noch eine zweite Theilungsart, bei welcher die Kerne einfach zerschnürt werden, ohne dass eine regelmässige Gruppierung des Kerngerüsts erfolgt; man nennt diese Art „direkte oder amitotische“ Theilung. Es ist indessen sehr wahrscheinlich, dass diese Theilungsart bei den Wirbelthieren nicht eine physiologische Vermehrung und Neulieferung von Zellen bedeutet, — sehr oft unterbleibt die darauffolgende Protoplasma-theilung, so dass nur eine Kernvermehrung vorliegt — sondern vielmehr nur bei Zellen vorkommt, die zu Grunde gehen. Sie ist häufig bei Leukocyten, findet sich aber auch bei Epithelzellen z. B. an den oberflächlichen Epithelzellen der Harnblase junger Thiere. Erfolgt die Theilung des Kernes in ebenen Trennungsflächen, so wird sie auch „Segmentirung“ genannt, erfolgt sie in unregelmässigen Trennungskonturen, so spricht man von „Fragmentirung“.

1. Stadium, Prophase.

Centrosoma und Attraktionssphäre theilen sich, die Theilstücke beginnen an einander entgegengesetzte Punkte der Kernoberfläche zu rücken; zwischen den auseinanderrückenden Centrosomen spannen sich zarte Fäden, welche die erste Anlage der Spindel (s. unten) bilden. Während dessen hat sich der Kern vergrößert, das Kerngerüst ist chromatinreicher geworden und erscheint nunmehr in Form einer Anzahl von geschlängelten Theilstücken¹⁾ (Segmenten, Chromosomen), die quer zur Längsachse des Kernes gestellt sind. Die Gestalt der Theilstücke ist die von Schleifen, deren Umbiegungsstellen („Scheitel“) nach der einen Seite („Polseite“, „Polfeld“), deren freie Enden nach der anderen Seite („Gegenpolseite“) gerichtet sind. Die Theilstücke bilden in diesem Stadium einen „dichten Knäuel“ (Fig. 4), werden aber

Fig. 4.

Kerntheilungsbilder aus Flächenpräparaten des Mundhöhlenepithels von *Triton alpestris*. Das Bild mit sichtbarer Kernspindel stammt von einem Schnitt durch ein in Furchung begriffenes Ei von *Siredon pisciformis*. Die Centrosomen sowie die ersten Stadien der Spindelbildung sind bei dieser Vergrößerung nicht zu sehen. 560 mal vergrößert. Technik Nr. 1 b, pag. 40.

bald immer dicker und verlaufen mehr gestreckt; dadurch wird aus dem dichten Knäuel ein „lockerer Knäuel“. In diesem sind Schleifenscheitel auch an der Gegenpolseite wahrzunehmen. Um diese Zeit wird die Kernmembran unsichtbar, die Kernkörperchen sind schon früher verschwunden.

2. Stadium, Metaphase.

Die Schleifen rücken in die künftige Theilungsebene des Kernes und stehen bald so, dass ihre Scheitel gegen das Centrum, ihre freien Enden

¹⁾ Diese Theilstücke sind auch an vielen ruhenden Kernen vorhanden, sie sind aber wegen der vielen Seitenäste, durch welche sie sich mit ihren Nachbarn zu einem Netzwerk verbinden, nicht leicht zu unterscheiden. Mit Beginn der Theilung werden die Seitenäste eingezogen, dadurch werden die Theilstücke dicker und erscheinen deutlicher.

gegen den Aequator des Kerns gerichtet sind. Von der Pol- (oder Gegenpol-)seite aus gesehen, erscheint diese Gruppierung unter dem Bilde eines Sternes, des Muttersternes (Monaster). Unterdessen haben die Centrosomen einander entgegengesetzte Punkte erreicht, die zwischen ihnen ausgespannten zarten Fasern sind länger geworden und haben dadurch Zuwachs erhalten, dass die zwischen Centrosoma und Lininfasern bestehenden Verbindungsfäden (s. pag. 34) sich ihnen seitlich anschliessen. Diese Fäden erscheinen in ihrer Gesamtheit unter dem Bilde einer Spindel, an deren Spitze je ein Centrosoma gelegen ist. Die von den Centrosomen gegen die Peripherie der Zelle ausstrahlenden Fäden der Attraktionssphäre hat man hier „Polstrahlung“ genannt. Schon während der Bildung des Muttersternes spalten sich die Segmente der Länge nach, so dass aus je einer Schleife zwei „Schwesterschleifen“ werden. Jetzt erfolgt eine Theilung des Kernes genau in zwei Hälften, indem durch die Kontraktion der Spindelfäden die eine Schwesterschleife zum einen Pol, die andere Schwesterschleife zum andern Pol der Kernspindel gezogen wird. Man nennt diesen Vorgang Metakinesis. In diesem Stadium erscheinen die Segmente in Form zweier „Tochtersterne“, sie bilden den „Dyaster“. Jeder Tochterstern zeigt Pol- und Gegenpolseite.

3. Stadium, Anaphase.

Bald verwischen sich diese Verhältnisse, indem die Segmente Seitenzweige zur Verbindung mit Nachbarsegmenten ausschieken und so das Kerngerüst des ruhenden Kernes erzeugen. Unterdessen ist die Spindel und der grösste Theil der Polstrahlung unsichtbar geworden und eine neue Kernmembran (von der Gegenpolseite anfangend) ist erschienen; zugleich beginnt am Aequator der Zelle eine Theilung des bis dahin einfachen Protoplasma, welche bis zur vollkommenen Trennung in zwei Hälften führt.

In seltenen, vorzugsweise in pathologischen Fällen erfolgt auch eine gleichzeitige Theilung in mehr als zwei Kerne nach dem Typus der Mitose.

Die Dauer einer Zellentheilung schwankt von $\frac{1}{2}$ Stunde (beim Menschen) bis 5 Stunden (bei Amphibien). Als besondere Modifikationen der Zellentheilung gelten die sog. endogene Zellenbildung und die Knospung. Die endogene Zellenbildung kommt bei Zellen vor, die eine feste Hülle besitzen (Ei, Knorpelzellen). Der Theilungsvorgang ist ganz derselbe wie oben beschrieben, nur bleiben die aus einer Zelle (Mutterzelle) durch wiederholte Theilung entstandenen (Tochter- resp. Enkel-) Zellen von einer gemeinsamen Hülle umgeben. Fig. 23 B. Von Knospung spricht man dann, wenn die Theilprodukte von ungleicher Grösse sind, wenn eine Zelle Sprossen treibt, die, sich abschnürend, zu selbständigen Zellen werden (s. bei „Knochenmark“).

Die jungen Zellen tragen stets den Charakter der Mutterzelle; Fälle der Art, dass z. B. aus einer Epithelzelle durch Theilung Bindegewebszellen entstünden, kommen nie vor.

Sekretionserscheinungen s. Sekretorische Thätigkeit des Epithelgewebes.

Die Lebensdauer aller Zellen ist eine beschränkte; die alten Elemente gehen zu Grunde, neue treten an deren Stelle. Indem man diesen Vorgang vom Sekretionsprozesse nicht zu unterscheiden wusste, gelangte man zu der irrthümlichen Auffassung, dass der Sekretionsakt stets mit dem Untergange der secernirenden Zelle endige. Absterbende Zellen sind charakterisirt durch Volumabnahme von Kern und Protoplasma, welch letzteres oft am Rande angenagt erscheint, während im Kerne die chromatische Substanz entweder abnimmt oder in Form unregelmässiger, homogen sich färbender Brocken erscheint. Auch Vakuolen im Protoplasma oder im Kerne sind Zeichen absterbender Zellen.

Das Wachsthum der Zellen betrifft vorzugsweise das Protoplasma und erfolgt nur selten nach allen Richtungen gleichmässig, wobei die ursprüngliche Form der Zelle erhalten bleibt (z. B. Eizelle); in der Regel findet ein ungleichmässiges Wachsthum statt. Dabei wird natürlich die ursprüngliche Form der Zelle verändert, die Zelle wird gestreckt oder abgeplattet oder verästelt etc. Die meisten Zellen sind weich und im Stande, unter mechanischen Einflüssen ihre Form zu verändern; so werden z. B. die in der leeren Harnblase cylindrischen Epithelzellen in der gefüllten Blase zu niedrig abgeplatteten Gebilden.

Ausscheidungen der Zellen. Die ausgeschiedenen Stoffe werden entweder gänzlich entfernt (wie die meisten Drüsensekrete) oder sie bleiben erstarrend an den Zellen liegen. Hierher gehören gewisse Intercellularsubstanzen; viele derselben sind eine Ausscheidung von Zellen, andere sind durch eine Umwandlung der peripherischen Schichten des Zellenprotoplasma, noch andere durch totale Umgestaltung der Zellen selbst entstanden. Es ist sehr schwierig, zu entscheiden, ob die einzelnen Intercellularsubstanzen auf diese oder jene Weise gebildet worden sind; viele Punkte sind in dieser Hinsicht noch Gegenstand lebhafter Kontroverse.

Die Intercellularsubstanzen treten entweder in geringer Menge auf, dann spricht man von „Kittsubstanz“; diese ist ungeformt und findet sich zwischen Epithel-, Bindegewebszellen, glatten Muskelfasern etc. Oder die Intercellularsubstanzen kommen in grösseren, die Masse der Zellen übertreffenden Mengen vor, dann heissen sie Grundsubstanzen. Die Grundsubstanzen sind entweder ungeformt (gleichartig) oder geformt; in letzterem Falle sind sie zum grössten Theile in Fasern oder Körnchen verschiedener Natur umgewandelt; die dazwischen gelegenen geringen Reste ungeformter Grundsubstanz werden auch „Kittsubstanz“ genannt.

TECHNIK.

Nr. 1. Zu Studien über Kernstrukturen und -theilungen eignen sich am besten Amphibienlarven. Am leichtesten kann man sich die Larven

unserer Molche (der sog. Wassersalamander) verschaffen, die in den Monaten Juni und Juli in Massen jeden kleinen Tümpel bevölkern. Man werfe die frischgefangenen 3—4 cm langen Exemplare in ca. 100 ccm Chrom-Essigsäure (pag. 5), in der sie rasch sterben. Nach 3 Stunden bringt man die Thiere in womöglich fließendes Wasser auf 8 Stunden und dann in Alkohol 70%. Nach 4 Stunden oder beliebig später kann man die Objekte weiter verarbeiten.

a) für Kernstrukturen kratze man vorsichtig mit einem Skalpell das Epithel der Bauchhaut ab, ziehe dann den Rest, das dünne Corium, mit 2 spitzen Pincetten vom Bauche, färbe das Abgezogene 1—3 Min. in 5 ccm Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17) und konservire es in Damarfirniss (pag. 23). Man sieht theilweise noch die runden Drüsen, zwischen diesen aber schöne Bindegewebszellen mit grossen Kernen. Der fädige Bau des Protoplasma, Centrosoma und Attraktionsphäre sind ebenso wie die feinen Kernstrukturen nur bei Anwendung stärkster Vergrösserung und komplizirter Methoden zu erkennen. Die dem Studirenden zur Verfügung stehenden Mittel liefern Bilder wie Fig. 5.

Fig. 5.

Bindegewebszelle aus der Cutis von Triton taeniatus. Flächenbild 560 mal vergrössert. Nur die größeren Fädchen des Kerngerüsts sind deutlich zu sehen; bei dieser Vergrösserung erscheinen die feineren Fädchen als Punkte, die Kernkörperchen als Theile des Kerngerüsts.

Auch quergestreifte Muskeln des Schwanzes und glatte Muskelfaserhäute, welch' letztere man sich leicht durch Abziehen der Darmmuskularis verschaffen kann, liefern schöne Bilder.

b) für Kerntheilungen, die schon bei der vorerwähnten Behandlung vereinzelt zur Beobachtung gelangen, umschneide man mit einer feinen Scheere den Hornhautrand und ziehe mit einer feinen Pincette die Hornhaut, eine dünne Scheibe, ab, was ganz leicht gelingt; färbe und konservire wie a). Das Präparat muss so liegen, dass die konvexe Hornhautseite nach oben gekehrt ist; im Epithel sieht man schon bei schwacher Vergrösserung viele Kerntheilungs-

bilder, welche sich durch ihre intensive Farbe verrathen; bei starker Vergrösserung Bilder wie in Fig. 4. Kernspindel und Polstrahlungen sind bei dieser Methode nur an besonders günstigen Präparaten, z. B. an Eiern von Siredon, wahrzunehmen.

Auch die an der konvexen Seite der knorpeligen Kiemenbogen herabhängenden zarten Lamellen, sowie das Epithel des Mundhöhlenbodens sind sehr geeignet. Zuweilen findet man bei einem Thiere keine einzige Kerntheilung.

B. Gewebe.

I. Epithelgewebe.

Die Elemente des Epithelgewebes, die Epithelzellen, sind scharf begrenzte aus Protoplasma und Kern bestehende Zellen; eine Membran fehlt häufig, oft wird sie nur durch eine festere Beschaffenheit der peripherischen Protoplasmaschicht hergestellt. Die meisten Epithelzellen sind weich und leicht im Stande, sich umgebenden Druckverhältnissen anzupassen, daraus resultirt der Formenreichtum der Epithelzellen. Im Allgemeinen können

wir zwei Hauptformen unterscheiden: die platte und die cylindrische (besser prismatische) Form. Zahlreiche Uebergänge verbinden diese beiden Extreme.

Die platten Epithelzellen, Plattenzellen, Pflasterzellen, sind nur selten regelmässig gestaltet, nur das Pigmentepithel (s. Retina) besteht aus ziemlich regulären, sechsseitigen Zellen; meistens ist der Kontur sehr unregelmässig.

Die cylindrischen Epithelzellen, Cylinderzellen, sind von der Seite betrachtet, gestreckte Elemente, deren Höhe die Breite bedeutend überwiegt, von oben her gesehen erscheinen sie sechsseitig, sie sind also in Wirklichkeit

Fig. 6.

Epithelzellen des Kaninchens isolirt. 560mal vergr. 1. Pflasterzellen (Mundschleimhautepithel), Technik Nr. 85. 2. Cylinderzellen (Cornealepithel). 3. Cylinderzellen mit Kutikularsaum *s* (Darmepithel). 4. Flimmerzellen, *h* Wimpern (Bronchusepithel). Technik nach pag. 11a.

prismatisch. Zellen, die so hoch wie breit sind, heissen kubische Epithelzellen¹⁾. Viele Cylinderzellen tragen an ihrer freien Oberfläche einen oft von Streifen²⁾ durchsetzten Saum (Fig. 6, 3 *s*), der ein Produkt der Zelle, eine „Kutikular-

bildung ist. Andere Cylinderzellen sind an ihrer freien Oberfläche mit feinen Härchen (Wimpern, Flimmern) besetzt, die während des Lebens in lebhafter, nach einer bestimmten Richtung hinschwingender Bewegung begriffen sind. Man nennt diese Zellen Flimmer- oder Wimperzellen.

Die besonders differenzirten Sinnesepithelzellen werden bei den Sinnesorganen genauer beschrieben werden.

Die Epithelzellen sind derart mit einander verbunden, dass sie entweder sich mit glatten Flächen berühren (d. h. durch Vermittlung der in sehr geringer Menge vorhandenen Zwischen- oder Kittsubstanz), oder mit verschieden gestalteten Fortsätzen (Druckeffekte) in einander eingreifen. Als solche Fortsätze wurden auch feine Stacheln und Leisten aufgefasst, welche an der Oberfläche gewisser Epithelzellen (s. unten) sichtbar sind. Dieselben sind jedoch Verbindungsfäden, welche die zwischen zwei Epithelzellen gelegene Kittsubstanz durchsetzen und einen innigen Zusammenhang mit Nachbar-epithelzellen vermitteln. Mit solchen Stacheln und Leisten versehene Zellen werden Stachel- oder Riffzellen genannt; die Stacheln selbst bezeichnet man neuerdings mit dem geeigneten Namen „Intercellularbrücken“ (Fig. 7).

Zusammenhängende Lagen von Epithelzellen, welche äussere und innere Flächen des Körpers bedecken, nennt man „Epithel“. Die Lagen sind bald

1) Solche Zellen werden häufig auch Pflasterzellen genannt.

2) Die Streifen sind der Ausdruck feiner Stäbchen, die zuweilen schon mit mittelstarken Vergrösserungen deutlich gesehen werden können (Fig. 9e.).

in einfacher, bald in mehrfacher Schicht angeordnet. Wir unterscheiden demnach

1. einfaches Pflasterepithel, Fig. 8 (Pigmentepithel der Retina, Epithel der Lungenalveolen, des Bauchfelles, des Rete vasculosum Halleri, des häutigen Labyrinthes, ferner das Epithel der Gelenkhöhlen, der Sehnen-

Fig. 7.

Aus einem senkrechten Schnitte durch das geschichtete Pflasterepithel des Stratum mucosum der Epidermis. 560 mal vergr. Sieben Pflasterepithelzellen durch Interzellularbrücken miteinander verbunden. Technik wie Nr. 78.

Fig. 8.

Einfaches Pflasterepithel (Pigmentepithel der Retina) des Menschen. Von der Fläche gesehen. 560 mal vergrößert. Technik Nr. 164 b.

Fig. 9.

Einfaches Cylinderepithel (Darmepithel) des Menschen. 560 mal vergr. *c* Streifiger Kutikularsaum, *z* Cylinderzelle, *tp* Tunica propria. Dünndarmstückchen behandelt nach Technik Nr. 97.

scheiden, der Schleimbeutel, der Blut- und Lymphbahnen)¹⁾. Hierher wird auch das aus einer Lage kubischer Zellen gebildete Epithel gezählt, wie es als Bekleidung der Plexus chorioidei, ferner an der Innenfläche der Linsenkapsel, in der Schilddrüse und in den meisten anderen Drüsen gefunden wird;

2. einfaches Cylinderepithel, Fig. 9 (Epithel des Darmkanales und vieler Drüsenausführungsgänge);

3. einfaches Flimmerepithel, (in den feinsten Bronchen, im Uterus, in den Tuben, den Nebenhöhlen der Nase, im Centralkanale des Rückenmarkes);

4. geschichtetes Pflasterepithel; nicht alle Elemente desselben sind Pflasterzellen, die unterste Schicht besteht aus cylindrischen Zellen; darauf folgen mehrere Lagen sehr verschieden gestalteter, meist unregelmässig polygonaler Stachelzellen (s. oben), denen sich nach oben immer stärker abgeplattete Zellen anreihen (Fig. 10). Das geschichtete Pflasterepithel findet sich im Munde und in der Schlundhöhle, in der Speiseröhre, auf den Stimmbändern, auf der Conjunctiva bulbi, in der Scheide und in der weiblichen Urethra. Auch die äussere Haut ist mit geschichtetem Pflasterepithel überzogen; dasselbe ist aber dadurch charakterisirt, dass die Zellen der oberflächlichsten Schichten zu verhornten Schüppchen umgestaltet sind und ihren Kern verloren haben. Auch an Nägeln und Haaren finden wir verhornte, hier aber kernhaltige Schüppchen;

Fig. 10.

Geschichtetes Pflasterepithel (Kehlkopf des Menschen). 240mal vergr. 1. Cylindrische, 2. Stachel, 3. platte Zellen. Technik Nr. 117.

Auch an Nägeln und Haaren finden wir verhornte, hier aber kernhaltige Schüppchen;

¹⁾ Letztgenannte fünf Epithelien werden auch „Endothelien“, ihre Elemente „Endothelzellen“ genannt.

5. geschichtetes Cylinderepithel, beim Menschen nur auf der Conjunctiva palpebrarum und in einem Abschnitt der männlichen Harnröhre zu finden. Die Anordnung der Schichten ist die gleiche wie bei

6. geschichtetem Flimmerepithel, nur die oberflächlichsten Zellen sind cylindrisch und tragen Wimperhaare, in den tiefsten Schichten sind vorzugsweise rundliche, in den mittleren Schichten spindelförmige Elemente zu treffen (Fig. 11). Geschichtetes Flimmerepithel findet sich im Kehlkopfe, in der Trachea und in den grossen Bronchen, in der Nasenhöhle und im oberen Theile des Schlundkopfes, in der Tuba Eustachii und im Nebenhoden.

Das Epithel besitzt keine Blut- und Lymphgefässe, dagegen sind an verschiedenen Stellen Nerven gefunden worden, so im Epithel der äusseren Haut und vieler Schleimhäute.

Fig. 11.

Geschichtetes Flimmerepithel, 560 mal vergr. Ans der Nasenschleimhaut (Regio respirat.) des Menschen. Technik Nr. 185.

Sekretorische Thätigkeit des Epithelgewebes.

Viele Epithelzellen besitzen die Fähigkeit, Stoffe zu bilden und auszuscheiden, welche nicht für den Aufbau der Gewebe verwendet werden. Solche Zellen heissen Drüsenzellen, die von ihnen ausgeschiedenen Stoffe werden entweder noch im Körper verwerthet (Sekrete) oder als unbrauchbar, ohne weitere Benutzung, aus dem Körper entfernt (Exkrete). Die bei Bildung und Ausscheidung des Sekretes (resp. Exkretes) sich abspielenden Vorgänge äussern sich durch gewisse Verschiedenheit in Form und Inhalt der Drüsenzelle, welche den sekretleeren und sekretgefüllten Zustand der Zelle anzeigen. Bei vielen, z. B. den serösen Drüsenzellen beschränken sich diese Verschiedenheiten auf ein geringes Volum und ein dunkles Aussehen im sekretleeren, auf ein vermehrtes Volum und ein helleres Aussehen im sekret-

gefüllten Zustande. Bei anderen Drüsenzellen, z. B. bei vielen Schleimdrüsenzellen, lässt sich dagegen die Bildung des Sekretes genauer verfolgen. Beginnen wir mit dem sekretleeren Zustande, in welchem die cylindrische Zelle durch ein körniges Protoplasma

Fig. 12.

Secernirende Epithelzellen. Aus einem feinen Schnitte durch die Magenschleimhaut des Menschen. 560mal vergrössert. *p* Protoplasma, *s* Sekret. *a* Zwei sekretleere Zellen; die zwischen diesen gelegene Zelle zeigt den Beginn der schleimigen Metamorphose. *c* Die obere Wand der rechten Zelle ist geplatzt, der Inhalt tritt aus, das körnige Protoplasma hat sich wieder vermehrt, der Kern ist wieder rund geworden.

Technik Nr. 96.

und einen etwa in der Mitte gelegenen, meist länglichrunden Kern gekennzeichnet ist (Fig. 12 a). Die Sekretbildung hebt nun an der dem Drüsen-

lumen resp. der freien Oberfläche zugekehrten Seite der Zelle an und äussert sich durch Umwandlung des körnigen Protoplasma in eine helle Masse (b s), die sich mehr oder weniger scharf gegen das noch nicht umgewandelte Protoplasma (b p) abgrenzt. Mit fortschreitender Sekretbildung (c) werden immer grössere Mengen Protoplasma zu Sekret umgewandelt, Kern und Rest des nicht umgewandelten Protoplasma werden gegen die Basis der Zelle gedrückt, dabei wird der Kern allmählich rund oder selbst abgeplattet (d). Die ganze sekretgefüllte Zelle ist bedeutend grösser geworden. Endlich platzt die Zellenwand an der freien Oberfläche. Das Sekret tritt allmählich aus, während gleichzeitig das sich regenerirende Protoplasma, sowie der emporrückende Kern der nunmehr wieder verkleinerten Zelle das Aussehen des sekretleeren Zustandes verleihen. Die meisten Drüsenzellen gehen beim Sekretionsakte nicht zu Grunde, sondern sind im Stande, denselben Prozess mehrfach zu wiederholen; ausgenommen davon sind die Talgdrüsen und die Milchdrüsen (?), deren Sekret durch zerfallende Zellen gebildet wird¹⁾.

Die Drüsenzellen liegen entweder isolirt zwischen anderen Epithelzellen²⁾ oder sie sind zu Gruppen vereint und bilden so das Drüsengewebe.

Anhang. Die Drüsen³⁾.

Die Drüsen, Glandulae, sind unter die Körperoberfläche versenktes Drüsengewebe, welches entweder die Form von cylindrischen Röhren, Tubuli, oder bauchigen Säckchen, Alveoli hat. Wir unterscheiden demgemäss zwei Hauptformen von Drüsen: tubulöse und alveoläre Drüsen.

Die tubulösen Drüsen treten entweder einzeln, selbständig oder zu Gruppen vereint auf; deshalb theilt man sie ein in

1. tubulöse Einzeldrüsen, welche entweder die Gestalt einfacher oder verästelter Röhren haben (Fig. 13); letztere Form können wir ein Gangsystem⁴⁾ nennen;

2. tubulöse zusammengesetzte Drüsen, sie bestehen aus einer verschieden grossen Anzahl von Gangsystemen (Fig. 13).

1) Eine Sonderstellung nehmen Hoden und Eierstock ein, deren Drüsenzellen nach der Ausscheidung weitere Ausbildung erfahren.

2) Man nennt sie dann „einzellige Drüsen“; sie sind bei wirbellosen Thieren weit verbreitet, kommen aber auch beim Menschen als „Becherzellen“ (siehe Verdauungsorgane) vor.

3) Die Drüsen bestehen fast ausschliesslich aus Epithel; Stützgewebe und Blutgefässe treten, so wichtig letztere auch in physiologischer Hinsicht sind, in morphologischer Beziehung mehr in den Hintergrund. Daraus ergiebt sich die Berechtigung, die Drüsen, die doch Organe sind, im Anschluss an das Epithelgewebe zu beschreiben.

4) Die wahre Gestalt solcher Drüsen ist nicht ohne genaueste Untersuchung zu erkennen, weil die verästelten Röhren vielfach um einander gewunden und zu einem dichten Ballen gehäuft sind. Man nannte sie früher „traubige Drüsen“.

Die gleiche Eintheilung kann bei den alveolären Drüsen getroffen werden: auch hier unterscheiden wir

1. alveoläre Einzeldrüsen, die gleichfalls einfache oder verästelte, einen Ausführungsgang besitzende bauchige Säcke sind; letztere Form heisst Alveolensystem, und

Fig. 13.

Schema der verschiedenen Drüsenformen. a Ausführungsgang (s. pag. 46).

2. alveoläre zusammengesetzte Drüsen, welche aus mehreren Alveolensystemen bestehen (Fig. 13).

Unverästelte tubulöse Einzeldrüsen sind: die Lieberkühn'schen Drüsen, die Knäueldrüsen und die Fundusdrüsen.

Verästelte tubulöse Einzeldrüsen sind: die Pylorusdrüsen, die Brunner'schen Drüsen, die kleinsten Mundhöhlendrüsen und Drüsen der Zunge, sowie die Uterindrüsen.

Tubulöse zusammengesetzte Drüsen sind die grösseren Schleimdrüsen, die Speicheldrüsen und die Thränendrüsen¹⁾. Ferner die Nieren, die Cowper'schen Drüsen,

1) Die Querschnitte der vielfach gewundenen und eng zusammengedrängten verästelten Tubuli dieser drei Drüsen wurden lange Zeit für bläschenförmige Ausbuchtungen der Endstücke (pag. 47) gehalten und Endbläschen, Beeren (Acini) genannt. Derartige Ausbuchtungen kommen nun in der That (ausgenommen an einzelnen Stellen der Gl. sublingualis) hier nicht vor, der Durchmesser des Lumens ist hier nicht grösser, als an anderen Stellen der Tubuli. Dagegen ist die Verdickung der Wandung des Endstückes (durch höhere Drüsenzellen) bei manchen tubulösen Drüsen nicht selten, z. B. bei der Parotis (Fig. 124) und bei der Bauchspeicheldrüse (Fig. 126). Solche Verdickungen dürfen aber nicht Acini genannt werden, da wir mit dem Begriffe Acinus eine Ausbuchtung = Erweiterung des Lumens verbinden. Zur Vermeidung von Missverständnissen ist das Wort

Prostatastrüsen und die Schilddrüse, sowie Hoden und Leber. Die Verästelungen der beiden letzteren Drüsen anastomosiren und bilden Netze; man nennt deshalb Hoden und Leber auch „retikuläre Drüsen“.

Unverästelte alveoläre Einzeldrüsen sind die kleinsten Talgdrüsen und die Ovarialfollikel.

Verästelte alveoläre Einzeldrüsen sind die grösseren Talgdrüsen und die Meibom'schen Drüsen.

Alveoläre zusammengesetzte Drüsen sind die Milchdrüsen und die Lungen.

Bei den meisten, vorzugsweise bei den mit unbewaffnetem Auge sichtbaren Drüsen wird von Seiten des umgehenden Bindegewebes eine Hülle gebildet, welche Scheidewände, Septa, in die Drüse sendet und so dieselbe in verschieden grosse Komplexe, Drüsenläppchen, theilt. Die Septa sind die Träger der grösseren Blutgefässe und Nerven. Die Drüsen können in ihrer ganzen Ausdehnung secerniren, meist aber besorgt nur der dem blinden Ende näher gelegene Theil, der Drüsenkörper, die Sekretion, während der die Verbindung mit der Oberfläche vermittelnde Theil zur Ausführung des gebildeten Sekretes dient und Ausführungsgang heisst.

Drüsen ohne Ausführungsgang sind die Schilddrüse und das Ovarium. Erstere ist in embryonaler Zeit mit einem Ausführungsgange versehen, der jedoch im Laufe der Entwicklung verschwindet. Die Drüsenbläschen („Follikel“) des Eierstockes standen ebenfalls in einer embryonalen Zeit mit dem Oberflächenepithel in Verbindung. Die Verbindungen, die wir gleichfalls Ausführungsgänge nennen könnten, verschwinden, die Entleerung der im Ovarium gebildeten Produkte (d. s. die Eier) geschieht dann durch Bersten der Bläschen, der Eierstock ist eine dehiscierende Drüse.

Fig. 14.

Lieberkühn'sche Drüsen des Dickdarmes des Kaninchens im optischen Querschnitte (von oben gesehen), 240 mal vergrössert. Technik Nr. 104.

Sämmtliche Drüsenkörper bestehen aus einer (meist einfachen) Lage von Drüsenzellen, welche rings das Lumen der Drüse begrenzen und ihrerseits von einer besonderen Modifikation des Bindegewebes, einer Membrana propria (s. pag. 52) umgeben¹⁾ werden. Jenseits dieser liegen die Blutgefässe (Fig. 14). Zwischen Drüsenlumen und Blutgefässen sind somit die Drüsenzellen eingeschaltet, welche auf der einen (peripherischen) Seite die zur Bildung des Sekretes nöthigen Stoffe von den Blutgefässen (resp. aus den diese umgeben-

den) aufnehmen und auf der andern (centralen) Seite das Sekret abgeben.

„Acinus“ gestrichen und für Drüsen von der Form ausgebuchter Säckchen das Wort „Alveolus“ (Alveus, bauchiger Schlauch) gewählt worden. Auch die vielfach übliche Benennung „acinöse“ oder „traubige“ Drüse (= alveoläre Drüse) ist nicht mehr benutzt worden, weil auch Durchschnittsbilder tubulöser Drüsen ein traubiges Aussehen zeigen (vergl. Fig. 96).

¹⁾ Zuweilen finden sich statt derselben sternförmige, kernhaltige Zellen („Korbzellen“), welche die Drüsenröhrchen umgreifen.

den Lymphgefässen) beziehen, und nach der anderen (centralen, Lumen-) Seite die zu Sekret verarbeiteten Stoffe abgeben.

Das mikroskopische Aussehen der Drüsenzellen wechselt bekanntlich mit dem jeweiligen Funktionszustande derselben (s. pag. 43). Bei manchen Drüsen zeigen alle Drüsenzellen zu derselben Zeit dieselben, gleichen Funktionsbilder; bei anderen Drüsen dagegen gelangen selbst innerhalb eines Tubulus oder Alveolus verschiedene Funktionszustände gleichzeitig zur Beobachtung. Letzteres ist der Fall bei vielen Schleimdrüsen, deren Zellen zarte Wandungen haben. Man findet da Tubuli, welche sekretleere und sekretgefüllte Drüsenzellen ent-

Fig. 15.

Schema der Entstehung der Halbmonde.

I. Ein Querschnitt eines Schleimdrüsentubulus mit 6 Drüsenzellen. Drei davon sind sekretgefüllt *a, a, a* und haben die sekretleeren Drüsenzellen *b, b, b*, vom Drüsenlumen ab an die Wand gedrängt (vergl. Fig. 123, 1).

II. Derselbe Querschnitt etwas später: die Zellen *a, a, a* haben ihr Sekret zum Theil entleert und sind kleiner geworden. Die Zellen *b, b, b* beginnen wieder Sekret zu bilden, sind grösser geworden und reichen wieder bis zum Lumen.

III. Derselbe Querschnitt noch später: die Zellen *a, a, a* sind jetzt vollkommen sekretleer und von den jetzt ganz sekretgefüllten Zellen *b, b, b* vom Drüsenlumen ab an die Wand gedrängt.

In I sind die Zellen *b*, in III die Zellen *a* die Halbmonde.

halten. Die ganz sekretgefüllten Zellen drängen die ganz sekretleeren Zellen vom Drüsenlumen ab, letztere liegen dann an der Peripherie des Tubulus und stellen in dieser Form die sogen.

Giannuzzi'schen Halbmonde od. Randzellenkomplexe vor (Fig. 15). Es muss hier bemerkt werden, dass von anderen Autoren die Randzellenkomplexe als

junge, zum Ersatze für die bei der Sekretion zu Grunde gehenden Drüsenzellen angesehen werden. Gegen diese Deutung spricht das Fehlen von Resten zu Grunde gegangener Zellen, sowie die Unmöglichkeit, die an die Neubildung von Zellen stets geknüpften Kerntheilungsbilder nachzuweisen.

Den Drüsenkörpern müssen zugezählt werden die feinen Verästelungen der Ausführungsgänge mancher tubulöser Drüsen, welche durch Form und Struktur ihrer Epithelzellen besonders ausgezeichnet sind. Diese Verästelungen sind nämlich nicht nur ausführende Röhren, sondern es fällt ihnen auch die Rolle der Ausscheidung gewisser Stoffe (Salze) zu; sie gehören demnach zu den secernirenden Theilen der Drüsen. Der Bau derselben gebietet eine Einteilung in zwei Abschnitte: Der erste, an die Endstücke¹⁾ anschliessende Abschnitt ist schmal, mit bald platten, bald kubischen Zellen ausgekleidet, wir nennen ihn Schaltstück (Fig. 124); der darauffolgende Abschnitt ist breiter, mit hohen cylindrischen Zellen ausgekleidet, deren Basen deutlich längs gestreift sind (Fig. 125, A), wir nennen ihn Sekret- (Speichel-Schleim-) röhre; die Längenverhältnisse zwischen Schaltstücken und Sekret-röhren zeigen bei den einzelnen Drüsen grosse Unterschiede.

1) So nennen wir die blinden Enden der Tubuli.

Die Ausführungsgänge bestehen aus einem einfachen oder geschichteten Cylinderepithel und aus einer mit elastischen Fasern vermengten bindegewebigen Hülle.

Im komplizirtesten Falle bestehen somit die Drüsen aus folgenden Abschnitten: 1. aus dem Ausführungsgange, der sich theilend 2. in die Sekret-röhren übergeht, welche sich 3. in die Schaltstücke fortsetzen, die endlich 4. zu den Endstücken führen.

TECHNIK.

Nr. 2. Lebende Flimmerzellen erhält man, wenn man einen Frosch tödtet (pag. 9), ihn auf den Rücken legt und mit einer Scheere den Unterkiefer abschneidet, so dass das Dach der Mundhöhle frei vorliegt. Von der Schleimhaut dieses Daches schneide man mit einer feinen Scheere einen schmalen ca. 5 mm langen Streifen ab, bringe ihn in einigen Tropfen Kochsalzlösung auf den Objektträger und bedecke ihn mit einem Deckglase. Bei schwacher Vergrößerung wird nun der Neuling kaum etwas wahrnehmen, wenn nicht Strömungen, in denen die grossen Blutkörperchen schwimmen (Fig. 46 B), ihn auf die richtige Stelle leiten; man nehme deshalb starke Vergrößerung und suche die Ränder des Präparates ab. Im Anfange ist die Bewegung der Flimmerhaare noch so lebhaft, dass der Beobachter die einzelnen Haare nicht sieht, der ganze Haarsaum wogt; man hat das Bild passend mit einem vom Winde bewegten Kornfelde verglichen; nach wenigen Minuten schon nimmt die Schnelligkeit ab, die Härchen werden deutlich. Ist die Bewegung erloschen, so kann man sie vermittelst Durchleiten (pag. 26) eines Tropfens konzentrirter Kalilauge von Neuem anfachen; der Effekt ist jedoch ein kurz vorübergehender, so dass das Auge des Beobachters während des Durchlebens das Okular nicht verlassen darf. Wasserzusatz hebt die Flimmerbewegung auf.

II. Stützgewebe.

Während beim Epithelgewebe die Zellen die Hauptmasse ausmachen, treten sie beim Stützgewebe mehr in den Hintergrund, dafür ist die Inter-cellularsubstanz (Grundsubstanz) ansehnlich entwickelt und nach verschiedener Richtung hin weiter ausgebildet. Das Ueberwiegen der Inter-cellularsubstanz, welche auch funktionell die wichtigere Rolle spielt, ist für das Stützgewebe charakteristisch. Nach der Beschaffenheit derselben theilt man das Stützgewebe ein in 1. Bindegewebe, 2. Knorpelgewebe, 3. Knochengewebe.

1. Das Bindegewebe.

Die Grundsubstanz des Bindegewebes ist mehr oder weniger weich, die Zellen sind spärlich. Man unterscheidet mehrere Arten: a) Das gallertartige Bindegewebe, b) das fibrilläre und c) das retikuläre Bindegewebe.

a) Das gallertartige Bindegewebe besteht aus einer grossen Menge ungeformter, „schleimhaltiger“, feine Bindegewebsbündel (s. unten) einschliessender Zwischensubstanz und aus runden oder sternförmig verästelten

Zellen. Es findet sich bei höheren Thieren nur im Nabelstrange sehr junger Embryonen, ist dagegen bei vielen niederen Thieren sehr verbreitet¹⁾.

Fig. 16.

Aus einem Querschnitte des Nabelstranges eines ca. 4 Monate alten menschl. Embryo. 240 mal vergrößert. 1. Zellen. 2. Zwischen-substanz. 3. Bindegewebsbündel meist schräg getroffen, bei 4. rein quer durchschnitten. Technik Nr. 3, pag. 57.

b) Das fibrilläre Bindegewebe besteht aus reichlicher Grundsubstanz und aus Zellen.

Die Grundsubstanz ist differenziert zu Bindegewebsfibrillen (Bindegewebsfasern)²⁾, äusserst feinen ($0,6 \mu$) Fäden, welche durch eine geringe Menge ungeformter Kittsubstanz zu verschiedenen dicken Bündeln, den Bindegewebsbündeln, verbunden werden. Diese Bündel sind weich, biegsam, wenig dehnbar und charakterisirt durch ihre blassen Konturen, ihre Längsstreifung, ihren welligen Verlauf³⁾, sowie durch ihr chemisches Ver-

halten: sie zerfallen durch Behandlung mit Pikrinsäure in ihre Fibrillen, quellen auf Zusatz verdünnter Säuren, z. B. von Essigsäure, bis zu vollkommener Durchsichtigkeit auf, werden durch alkalische Flüssigkeiten zerstört und geben beim Kochen Leim (Glutin).

Fig. 17.

Verschieden dicke Bindegewebtsbündel des intermuskulären Bindegewebes des Menschen. 240mal vergrößert. Technik Nr. 4, pag. 58.

Die Grundsubstanz des fibrillären Bindegewebes enthält konstant, aber in wechselnder Menge, elastische Fasern (Fig. 18), welche durch ihre scharfen, dunklen Umrisse, durch ihr starkes Lichtbrechungsvermögen, sowie — im Gegensatze zu den Bindegewebsbündeln — durch ihre bedeutende Widerstandsfähigkeit gegen Säuren und Alkalien charakterisirt sind. Die elastischen Fasern sind von sehr verschiedener Dicke (vom unmessbar Feinen bis zu 11μ) und kommen meist in Form feinerer oder gröberer Netze vor, die wieder bald eng-

maschig, bald weitmaschig sind. Aus dickeren, elastischen Fasern gewebte, engmaschige Netze bilden den Uebergang zu elastischen Häuten (Fig. 19), welche entweder homogen oder feinstreifig, von verschiedenen grossen Löchern durchbrochen sind (daher der Name „gefensterte Membranen“) und wohl aus der Verschmelzung breiter elastischer Fasern hervorgehen.

1) Ueber den von manchen Autoren hierher gerechneten Glaskörper s. bei Glaskörper.

2) Hier sind Fibrillen und Fasern gleichbedeutend, während bei den quergestreiften Muskelelementen erst eine Summe von Fibrillen eine Faser bilden.

3) Daher der Name „welliges oder lockiges Bindegewebe“.

Ueberwiegt die Menge der elastischen Fasern die Zahl der Bindegewebsbündel, so spricht man von „elastischem Gewebe“. Die elastischen

Fig. 18.

Elastische Fasern 560mal vergrößert. *A* feine elast. Fasern (*f*) aus intermuskul. Bindegewebe des Menschen. *b* durch Essigsäure gequollene Bindegewebsbündel. Technik Nr. 9 pag. 59. — *B* sehr dicke elast. Fasern (*f*) aus dem Nackenbände des Rindes. *b* Bindegewebsbündel. Technik Nr. 10, pag. 59. — *C* aus einem Querschnitt des Nackenbandes des Rindes. *f* elastische Fasern. *b* Bindegewebsbündel. Technik Nr. 11 pag. 59.

Fasern sind weder aus Zellen, noch aus Kernen hervorgegangen, sondern sind Umbildungen der Grundsubstanz.

Fig. 19.

Netzwerk (*n*) dickerer elastischer Fasern, nach links in eine gefensterter Membran (*m*) übergehend. Aus dem Endokard des Menschen. 560mal vergr. Technik Nr. 12, pag. 59.

Fig. 20.

A Bindegewebszellen aus intermuskulärem Bindegewebe. 560mal vergrößert. 1. Platte Zelle, zum Theile einem Bindegewebsbündel anliegend. 2. geknickte Zelle. 3. Zelle, deren Protoplasma nicht sichtbar ist. *b* Bindegewebsbündel. Technik Nr. 5, pag. 58. — *B* Bindegewebsbündel mit umspinnenden Fasern. *k* Kern. Technik Nr. 7, pag. 53. — *C* Plasmazellen aus dem Augenhinde eines Kindes, Technik Nr. 176.

Die Zellen (Fig. 20 *A*) sind unregelmässig polygonal oder sternförmig, stark abgeplattet, verschiedenartig gebogen oder geknickt. Die Ab-

plattung und Knickung erklärt sich aus der Anpassung der Bindegewebszellen an die zwischen den Bindegewebsbündeln befindlichen engen Räume. Nicht selten bilden platte Bindegewebszellen vollkommene Scheiden um Bindegewebsbündel. Behandelt man ein solches Bündel mit Essigsäure, so quillt es auf, sprengt die umhüllenden Zellen, von denen ringförmige oder anders gestaltete Reste zurückbleiben und das aufgequollene Bündel einschnüren; man hielt diese Reste früher für Fasern, und nannte sie „umspinnende Fasern“ (Fig. 20 B). Andere Bindegewebszellen sind rundlich, protoplasmareich,

Fig. 21.

Fettzellen aus der Achselhöhle. 240mal vergr. A eines nur wenig abgemagerten Individuum. 1. Bei Einstellung des Objekts auf den Äquator der Zelle. 2. Objektiv etwas gehoben. 3. 4. Zellen durch Druck verunstaltet. p Spuren von Protoplasma in der Umgebung des platten Kernes k gelegen. B eines hochgradig abgemagerten Individuums. k Kern. f Fetttropfchen. c Blutkapillaren. b Bindegewebsbündel. Technik Nr. 9, pag. 59.

grobkörnig und von verhältnissmässiger Grösse; sie werden Plasmazellen genannt und finden sich vorzugsweise in der Nähe kleiner Blutgefässe (Fig. 20 C). Wieder andere, die „Mastzellen“, sind durch ihre leichte Färbbarkeit mit gewissen Anilinfarbstoffen (Eosin, Dahlia) ausgezeichnet, stehen jedoch nicht, wie ihr Name vermuthen liesse, in nachweisbaren Beziehungen zur Ernährung. Der einen Kern einschliessende Protoplasmaleib der Bindegewebszellen kann Farbstoffkörnchen enthalten, die Zellen werden dadurch zu Pigmentzellen, die beim Menschen nur an einzelnen Stellen der Haut und im Auge, bei niederen Thieren dagegen sehr verbreitet vorkommen; andere Bindegewebszellen können Fetttropfchen enthalten, die, wenn sie sehr gross sind, konfluieren und dann der Zelle eine Kugelgestalt und den Namen Fettzelle (Fig. 21 A) verleihen. An solchen Fettzellen bildet das Protoplasma nur einen schmalen, an der Peripherie gelegenen Saum; ebendasselbst befindet sich der stark abgeplattete Kern. Häufig ist der Saum so dünn, dass er nicht mehr zu sehen ist. Anhäufungen von Fettzellen geben Veranlassung zur Bildung einer von zahlreichen Blutgefässen, Lymphgefässen und Nerven durchzogenen Formation, des Fettgewebes, das in physiologischer Beziehung (Stoffwechsel) eine sehr wichtige Rolle spielt. Bei hohen Graden der Abmagerung findet man in einzelnen Fettzellen das Fett bis auf kleine Tröpfchen verschwunden; ein blasses, mit schleimiger Flüssigkeit vermengtes Protoplasma ist an dessen Stelle getreten, die Zelle ist nicht mehr kugelförmig, sondern platt geworden. Man nennt solche Zellen seröse Fettzellen (Fig. 21 B).

Endlich finden sich im Bindegewebe Leukocyten (pag. 80), die keine Bindegewebszellen sind, sondern aus den Blutgefässen stammen. Sie werden als Wanderzellen den Bindegewebszellen, die man als fixe bezeichnet

gegenübergestellt, eine Eintheilung die insofern nicht streng durchführbar ist, als unter (meist pathologischen) Umständen auch die fixen Bindegewebszellen wandern können¹⁾.

Menge und Vertheilung der verschiedenen Zellenarten unterliegen bedeutenden Schwankungen.

Die verschiedenen Elemente des fibrillären Bindegewebes vereinen sich entweder ohne eine bestimmte Gestaltung zu erfahren: „formloses Bindegewebe“, oder indem sie in bestimmte Formen geprägt werden: „geformtes Bindegewebe“. Das formlose Bindegewebe ist durch lockere Fügung und mannigfaltigste Richtung seiner Bindegewebsbündel ausgezeichnet; es befindet sich als Verbindungs- und Ausfüllungsmasse zwischen benachbarten Organen. Deswegen heisst es auch: „Interstitialgewebe“. Die Zellen des formlosen Bindegewebes enthalten nicht selten Fett. Das geformte Bindegewebe ist durch innigere Verbindung und gesetzmässigeren Verlauf seiner Bündel charakterisirt. Zum geformten Bindegewebe gehören: Die Lederhaut, die Schleimhäute, serösen Häute, die derben Hüllen des Nervensystems, der Blutgefässe, des Auges, vieler Drüsen, das Periost, das Perichondrium, die Sehnen, Fascien und Bänder.

Da, wo fibrilläres Bindegewebe an Epithel stösst, kommt es nicht selten zur Bildung strukturloser Häute, die als Grundmembranen (Basement membrane), als *Membranae propriae* und als *Glashäute* beschrieben werden²⁾. Sie sind Modifikationen des Bindegewebes.

Fig. 22.

Retikuläres Bindegewebe. Aus einem geschüttelten Schnitt einer menschlichen Lymphdrüse. 560 mal vergr. Technik Nr. 46, pag. 93.

c) Das retikuläre Bindegewebe. Die Ansichten über den Bau des retikulären Bindegewebes sind getheilte: Nach einer früher weitverbreiteten Meinung besteht dasselbe aus sternförmigen Zellen, die mit einander anastomosirend ein feines Netzwerk bilden. Dieser Auffassung entspricht der Name „cytogenes“, das ist aus Zellen gebildetes Gewebe³⁾. Es ist kein Zweifel, dass bei niederen Thieren und in embryonalen Stadien höherer Thiere solche Zellennetze bestehen. Bei den höheren Wirbelthieren

liegen jedoch die Verhältnisse anders; hier wird das Netzwerk (Fig. 22) nur von

1) Unter gleichen Umständen können auch Epithel- und Drüsenzellen wandern; es ist selbstverständlich, dass solche Wanderzellen nicht mit den Leukocyten in eine Kategorie gestellt werden dürfen.

2) Die *Membranae propriae* vieler Drüsen, z. B. der Speicheldrüsen, bestehen dagegen aus abgeplatteten, kernhaltigen Zellen, welche die Drüsenröhrchen korbartig umfassen.

3) Als cytogenes Gewebe könnte demnach auch das gallertartige Bindegewebe angesprochen werden.

feinen Bindegewebsbündeln gebildet, denen platte kernhaltige Zellen anliegen. Man kann mittelst komplizierter Methoden die Umrisse der platten Zellen auf den Fasern nachweisen, ein Verhalten, das schon beim fibrillären Bindegewebe als fast ausnahmslose Regel erkannt worden ist. Endlich lässt sich die Thatsache, dass fibrilläres Bindegewebe selbst noch beim Erwachsenen sich in retikuläres Gewebe umzuwandeln vermag, nur verstehen, wenn wir letzteres als ein Netzwerk feiner Bindegewebsbündel auffassen. Das retikuläre Bindegewebe ist also eigentlich nur eine Abart des fibrillären Bindegewebes. Die Maschen des retikulären Bindegewebes sind mit dicht gedrängten Leukocyten gefüllt.

Das retikuläre, mit Leukocyten gefüllte Bindegewebe kommt hauptsächlich in Lymphdrüsen (besser Lymphknoten) vor; deswegen wird es auch adenoides, d. i. drüsenähnliches Gewebe genannt.

2. Das Knorpelgewebe.

Die Grundsubstanz des Knorpelgewebes ist fest, elastisch, leicht schneidbar, von milchweisser oder gelblicher Farbe. Die Zellen zeigen wenig charakteristische Gestaltung, rundliche oder einseitig abgeplattete Formen sind die häufigsten. Sie liegen in den Höhlen der Grundsubstanz¹⁾, welche sie vollkommen ausfüllen. Nicht selten bildet die den Höhlen zunächst gelegene Grundsubstanz stark lichtbrechende, zuweilen konzentrisch gestreifte Schalen, die sog. Knorpelkapseln. Die sonst gleichartige Grundsubstanz ist entweder frei von faserigen Beimischungen oder sie wird von elastischen Fasern oder von fibrillärem Bindegewebe durchzogen. Danach unterscheiden wir a) hyalinen Knorpel, b) elastischen Knorpel, c) Bindegewebsknorpel (Faserknorpel).

ad a) Der hyaline Knorpel ist von leicht bläulicher, milchglasartiger Farbe. Er findet sich in den Knorpeln des Respirationsapparates, der Nase, der Rippen, der Gelenke, ferner in den Synchronrosen und beim Embryo an vielen Stellen, die späterhin durch Knochen ersetzt werden. Er ist charakterisirt durch seine gleichartige Grundsubstanz, welche bei den gewöhnlichen Untersuchungsmethoden ungeformt, durchaus homogen erscheint, aber bei gewissen Manipulationen (z. B. bei künstlicher Verdauung) in Faserbündel zerfällt. Auch das Verhalten bei polarisirtem Lichte spricht für eine fibrilläre Struktur der Grundsubstanz des hyalinen Knorpels. Sie ist sehr fest, sehr elastisch und giebt beim Kochen Knorpelleim (Chondrin).

1) Ob die Höhlen, wie beim Knochengewebe, durch ein feines in die Grundsubstanz eingegrabenes Kanalsystem mit einander verbunden sind, ist noch sehr zweifelhaft; viele diesbezügliche Beobachtungen sind als Irrthümer anerkannt worden. Die vermeintlichen Kanälehen sind Schrumpfungsbilder, welche durch Behandlung des Knorpels mit absolutem Alkohol oder mit Aether hervorgerufen werden können.

Die Grundsubstanz kann in besonderen Fällen eigenthümliche Modifikationen erfahren. So wird sie an Rippen- und Kehlkopfknorpeln stellenweise in starre Fasern umgewandelt, die dem Knorpel einen schon makroskopisch sichtbaren, asbestähnlichen Glanz verleihen. Ferner finden sich im höheren Alter in der hyalinen Grundsubstanz Einlagerungen von Kalksalzen, die anfangs in Form kleiner Körnchen, dann als vollständige, um die Knorpelzellen gelegene Schalen auftreten. Die Zellen des hyalinen Knorpels zeigen sehr häufig Formen, welche ihre Ursache in Wachstumsvorgängen haben. So sieht man zwei Zellen in einer Knorpelkapsel (Fig. 23, B 1), sie sind durch

Fig. 23.

Hyaliner Knorpel, 240mal vergrößert.

A Flächenbild des Proc. ensiform. des Frosches, frisch. *h* Kern. *p* Protoplasma der Knorpelzelle, welche die Knorpelhöhle vollkommen ausfüllt. *g* hyaline Grundsubstanz. Technik Nr. 13, pag. 59.
 B Aus einem Querschnitte eines menschlichen Rippenknorpels mehrere Tage nach dem Tode in Wasser untersucht. Das Protoplasma der Knorpelzellen *z* hat sich von der Wand der Knorpelhöhle *h* zurückgezogen, der Kern der Knorpelzelle ist nicht zu sehen. 1. Zwei Zellen in einer Knorpelkapsel *k*, bei *x* beginnt die Entwicklung einer Scheidewand. 2. Fünf Knorpelzellen von einer Kapsel umfasst, die unterste Zelle ist herausgefallen, so dass man die leere Knorpelhöhle sieht. 3. Knorpelkapsel schräg angeschnitten, dieselbe erscheint deshalb auf der einen Seite dicker. 4. Knorpelkapsel gar nicht angeschnitten, die Knorpelzelle schimmert durch. *g* Hyaline Grundsubstanz bei *f* zu starren Fasern umgewandelt. Technik Nr. 14, pag. 59.

(indirekte) Theilung einer Knorpelzelle entstanden; in anderen Fällen sieht man zwischen zwei solchen Zellen schon eine dünne Scheidewand hyaliner Substanz entwickelt. In wieder anderen Fällen kommt es nicht alsbald zur Bildung einer Scheidewand; die zwei Zellen können sich wiederholt theilen, dann sieht man Gruppen von 4, 8 und noch mehr Knorpelzellen von einer einzigen Kapsel umgeben (Fig. 23, B 2). Solche Erscheinungen wurden zur Aufstellung eines besonderen Zellentheilungsmodus, der sog. „endogenen Zellenbildung“ verworthen (s. pag. 38). Knorpelzellen erwachsener Personen enthalten nicht selten Fetttropfen.

ad b) Der elastische Knorpel ist von leicht gelblicher Farbe. Er kommt nur am Ohre, am Kehledeckel, an den Wrisberg'schen und Santorini'schen Knorpeln und am Proc. vocal. der Giessbeckenknorpel vor. Er zeigt

dasselbe Gefüge wie der hyaline Knorpel, nur ist seine Grundsubstanz von verschiedenen dichten Netzen bald feinerer, bald gröberer elastischer Fasern

Fig. 24.

Elastischer Knorpel. 240mal vergr. z Knorpelzelle (Kern nicht sichtbar), k Knorpelkapsel. 1. Aus einem Schnitte durch den Proc. vocal. des Giessbeckenknorpels einer 30 jährigen Frau. Elastische Substanz in Form von Körnchen. 2. und 3. Aus einem Schnitte durch die Epiglottis einer 60jährigen Frau. 2. Feineres Netz. 3. Dichteres Netz. Technik Nr. 15, pag. 60.

durchsetzt. Die elastischen Fasern entstehen nicht direkt aus den Zellen, sondern durch Umwandlung der Grundsubstanz und treten in der Umgebung der Knorpelzellen als Körnchen auf (Fig. 24, 1), die späterhin in Längsreihen verschmelzend zu Fasern werden.

Fig. 25.

Aus einem Horizontalschnitte des Lig. intervertebr. des Menschen. 240mal vergrößert. g Fibrilläres Bindegewebe, z Knorpelzelle (der Kern ist nicht zu unterscheiden), k Knorpelkapsel umgeben von Kalkkörnern. Technik Nr. 16, pag. 60.

ad c) Der Bindegewebsknorpel kommt in den Lig. intervertebralia, in der Symphysis oss. pub. und an den Gelenkenden des Kiefer- und des Sternoklavikulargelenkes vor. Die Grundsubstanz des Bindegewebsknorpels enthält reichlich fibrilläres Bindegewebe (Fig. 25 g), dessen lockere Bündel nach den verschiedensten Richtungen verlaufen. Die nur spärlichen, mit dicken Kapseln (pag. 53) versehenen Knorpelzellen (z) liegen zu kleinen Gruppen oder Zügen vereint in grossen Abständen.

3. Das Knochengewebe.

Die Grundsubstanz des Knochengewebes ist durch ihre Härte, Festigkeit und Elasticität ausgezeichnet, Eigenschaften, welche sie einer innigen Vermengung organischer und anorganischer Theile verdankt¹⁾. Sie besteht

1) Die Vermengung beider Theile ist derart, dass man jeden derselben entfernen kann, ohne die Struktur des Gewebes zu zerstören. Durch Behandlung mit Säuren (siehe „Entkalken“ pag. 15) werden die Kalksalze ausgezogen, das Gewebe wird dadurch biegsam, schneidbar wie Knorpel; man nennt deshalb entkalkten Knochen „Knochenknorpel“. Umgekehrt lassen sich durch vorsichtiges Glühen die organischen Theile entfernen; so behandelter Knochen heisst „ealeinirter Knochen“. Die fossilen Knochen sind (durch die lange Einwirkung von Feuchtigkeit) gleichfalls der organischen Theile beraubt.

aus Kalksalzen (vorzugsweise basisch-phosphorsaurem Kalk) und aus leimgebenden Fibrillen, die entweder zu feinen oder zu groben Faserbündeln vereint sind; man unterscheidet demnach *feinfaserige* (lamellöse) und *grob-faserige* (geflechtartige) Knochengrundsubstanz ¹⁾. Dieselbe erscheint homogen oder leicht streifig und enthält zahlreiche, kürbiskernähnliche, 15—27 μ lange Hohlräume, die *Knochenhöhlen* (früher „*Knochenkörperchen*“), Fig. 26 *h*, welche durch zahlreiche verästelte, feine Ausläufer, die *Knochenkanälchen* (*k*) unter einander kommunizieren. Auf diese Weise wird ein, die ganze Grund-

Fig. 26.

Aus einem trockenen Knochenschliffe des erwachsenen Menschen, 560mal vergrößert. *h* Knochenhöhlen. *A* von der Fläche, *B* von der Seite gesehen. *k* Knochenkanälchen. *g* Knochengrundsubstanz. Technik Nr. 51, pag. 108.

Fig. 27.

Aus Schnitten *a* des Humerus eines 4monatlichen menschlichen Embryo, *b* der mittleren Muschel eines erwachsenen Menschen, 560mal vergrößert. Knochenzellen *z* in den Knochenhöhlen *h* liegend, die Knochenkanälchen sind nur zum geringsten Theile zu sehen. *g* Grundsubstanz. Technik Nr. 57, pag. 110.

substanz durchziehendes, feines Kanalsystem hergestellt. In den Knochenhöhlen liegen die kernhaltigen *Knochenzellen* (Fig. 27 *z*), welche eine plattovale Gestalt haben. Ob diese Zellen Fortsätze in die Knochenkanälchen sendend mit einander zusammenhängen, ist sehr zweifelhaft.

Fibrilläres Bindegewebe und Knorpelgewebe können sich direkt in Knochen umwandeln, indem ihre Grundsubstanz verkalkt und die Bindegewebs- resp. Knorpelzellen zu Knochenzellen werden. Indessen sind diese Vorgänge verhältnismässig selten, gewöhnlich erfolgt die Bildung des Knochengewebes in der Weise, dass in embryonaler Zeit die Grundsubstanz des Bindegewebes resp. des Knorpels verkalkt. Um die Stränge der verkalkten Grundsubstanz lagern sich zahlreiche, junge, noch indifferente Bindegewebs-

¹⁾ Die feinfaserige Knochengrundsubstanz bildet fast das ganze Skelett des Erwachsenen und ist durch deutliche Lamellen (siehe Kap. Skelettsystem) charakterisirt; sie enthält elastische Fasern. Die grobfaserige Knochengrundsubstanz ist in der Foetalzeit in den perichondralen und sekundären Knochen (siehe Kap. Knochenentwicklung) vorhanden und findet sich beim Erwachsenen nur an den Nähten und an den Ansatzstellen der Sehnen; in ihr kommen daneben stets unverkalkte Bindegewebsbündel, die sogen. Sharpey'schen Fasern vor, welche indessen auch in der feinfaserigen Knochengrundsubstanz und zwar in den äusseren Grund- und in den anstossenden Schaltlamellen (siehe Kap. Skelettsystem) gefunden werden.

zellen, welche Knochensubstanz erzeugen. Anfangs liegen diese Zellen, wir nennen sie Osteoblasten, noch auf der von ihnen gebildeten Knochen-

Fig. 28.

Stückchen eines Querschnittes der Humerusdiaphyse eines 4monatlichen menschlichen Embryo. 560mal vergrößert.
Technik Nr. 57, pag. 110.

grunds substanz auf, später kommen sie in diese selbst zu liegen, werden sternförmig und gestalten sich damit zu Knochenzellen.

Eine Modifikation des Knochengewebes ist das Zahnbein gewebe; dasselbe unterscheidet sich in entwicklungsgeschichtlicher Beziehung dadurch vom Knochengewebe, dass die Bildungszellen desselben die Odontoblasten, nicht von der Grundsubstanz umschlossen werden, sondern nur Fortsätze in diese senden (siehe weiter „Zähne“).

Blut-, Lymphgefäße und Nerven des Stützgewebes.

Die aus Stützgewebe gebildeten Organe sind im Allgemeinen arm an Blutgefäßen¹⁾, Lymphgefäßen und Nerven. Eine wichtige Rolle aber spielt das Stützgewebe als Leitapparat für die aus den Blutgefäßen in die Gewebe übertretende Ernährungsflüssigkeit, den Gewebssaft. Derselbe bewegt sich in der Grundsubstanz und zwar, wenn diese weich ist, (wie beim gallertigen und lockeren Bindegewebe) durch die ganze Masse derselben; ist die Grundsubstanz dagegen fester, so cirkuliert der Gewebssaft in bestimmten Bahnen, im „Saftkanalsystem“, welches aus grösseren die Zellen enthaltenden Lücken, „Saftlücken“ und feinen, diese verbindenden Kanälchen, „Saftkanälchen“ besteht. So ist es bei dem festeren geformten Bindegewebe²⁾ und beim Knochengewebe. Ob der Gewebssaft in der Grundsubstanz des hyalinen Knorpels in diffusen oder in bestimmten Bahnen strömt, ist noch nicht sichergestellt.

TECHNIK.

Nr. 3. Gallertartiges Bindegewebe. Man fixire den Nabelstrang 3 bis 4monatlicher menschlicher Embryonen (oder 3—6 cm langer

¹⁾ Ausgenommen ist das Fettgewebe.

²⁾ Die hier befindlichen Saftkanälchen stehen in direkter Verbindung mit der Interzellular-(Kitt-)Substanz des Epithelgewebes, welche wir uns gleichfalls vom Gewebssaft durchzogen vorstellen müssen.

Schweinsembryonen) in 100 ccm Müller'scher Flüssigkeit (pag. 13) 3—4 Wochen und härte in ca. 30 ccm allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14). Der Strang wird noch immer sehr weich sein; um brauchbare Querschnitte von ihm zu erhalten, muss er in Leber geklemmt und beim Schneiden mit den Fingern etwas zusammengepresst werden; die Schnitte färbe man in Pikrokarmín (12 Stunden) oder mit Haematoxylin (5 Minuten) pag. 17. Man betrachte das Objekt in einem Tropfen destillirtem Wasser (Fig. 16); in Glycerin oder in Damarfirniss sind die feinen Zellausläufer und die Bindegewebsbündel unsichtbar. In der Nähe der Gefässdurchschnitte sind die Zellenetze weniger schön. Man wähle deshalb von den Gefässen entfernte Stellen. Je älter der Embryo war, um so grösser ist die Zahl der Bindegewebsbündel. Zum Konserviren nehme man dünnes Glycerin (pag. 6).

Nr. 4. Fibrilläres Bindegewebe, Bindegewebsbündel. Internuskuläres Bindegewebe, z. B. das dünne zwischen *M. serratus* und den *Mm. intercost.* liegende Blatt wird in kleinen, 1—2 cm langen Streifen abpräparirt, ein kleines Stückchen davon auf dem trockenen Objektträger mit Nadeln rasch ausgebreitet (s. „halbe Eintrocknung“ Nr. 26 a pag. 71) und mit einem Tropfen Kochsalzlösung und einem Deckglase bedeckt. Man sieht die wellig verlaufenden, blassen Bindegewebsbündel (Fig. 17), bei einiger Uebung kann man auch die schärfer konturirten, glänzenden elastischen Fasern schon jetzt unterscheiden, an günstigen Stellen auch die Kerne der Bindegewebszellen.

Nr. 5. Zellen des fibrillären Bindegewebes macht man sichtbar durch Zusatz eines Tropfens Pikrokarmín zu Präp. Nr. 4 unter dem Deckglase (pag. 26). In den meisten Fällen wird man nur den rothen Kern der Zelle wahrnehmen, besonders dann, wenn die Zelle ganz auf dem Bindegewebsbündel aufliegt (Fig. 20, A 3). In selteneren Fällen sieht man auch den blassgelben, verschieden gestalteten Leib der Zelle (Fig. 20 A 1 und 2).

Nr. 6. Fibrillen. Man lege ein ca. 2 cm langes Stück einer Sehne in 100 ccm gesättigte wässrige Pikrinsäurelösung. Am anderen Tage reisse man mit zwei Pincetten die Sehne der Länge nach etwas auf, entnehme dem Innern der Sehne ein ca. 5 mm langes Bündel und ziehe dasselbe auf trockenem Objektträger (vergl. Nr. 26 a pag. 71) auseinander, bedecke alsdann mit einem Tropfen destillirtem Wasser und einem Deckglase und untersuche mit starker Vergrösserung; die Fibrillen erscheinen als feinste, blasse Fäserchen.

Nr. 7. „Umspinnende Fasern“. Man schneide von dem in dem *Circul. art. Willisii* ausgespannten Bindegewebe ein ca. 1 qcm grosses Stückchen mit der Scheere aus, wasche es in einem Uhrschildchen mit Kochsalzlösung kurz ab und breite es in einem Tropfen dieser Lösung mit Nadeln aus. Deckglas! Schon bei schwacher Vergrösserung wird man ausser zahlreichen feinen Blutgefässen und gewöhnlichen Bindegewebsbündeln schärfer konturirte, glänzende Bündel finden, welche sich deutlich von dem übrigen Bindegewebe abheben und bei Anwendung stärkerer Vergrösserung und enger Blende sich ebenfalls aus fibrillärem Bindegewebe bestehend erweisen. Ein solches Bündel stelle man ins Gesichtsfeld und leite dann einige Tropfen Essigsäure unter das Deckglas (pag. 26). Sobald die Säure das Bündel erreicht, quillt es auf, die fibrilläre Zeichnung verschwindet, statt dessen erscheinen langgestreckte Kerne. Die Aufquellung ist keine regelmässige; das Bündel ist vielmehr durch Einschnürungen in verschieden grosse Abschnitte getheilt. Bei schwacher Beleuchtung sieht man die die Einschnürung bedingenden „Fasern“ (Zellenreste) (Fig. 20 B).

Nr. 8. Fettzellen. Man nehme aus der Achselhöhle eines recht abgemagerten Individuum ein kleines Stückchen des rötlich-gelben gelatinösen Fettes, breite davon ein linsengrosses Stückchen in möglichst dünner Schicht mit Nadeln schnell auf einem trockenen Objektträger aus und setze dann rasch einen Tropfen Kochsalzlösung zu und bedecke mit dem Deckglase. Dünne Stellen zeigen Fettzellen, wie in Fig. 21, *B*; man kann unter dem Deckglase mit Pikrokarmine (pag. 26) färben und in verdünntem Glycerin konservieren. Gewöhnliche Fettzellen, von beliebigen Stellen des Körpers genommen, untersuche man gleichfalls in Kochsalzlösung. Man betrachte die kugeligen Zellen bei wechselnder Einstellung (vergl. Fig. 21, *A*).

Nr. 9. Feine elastische Fasern sind leicht zu erhalten, wenn man Präp. Nr. 4 anfertigt und einige Tropfen Essigsäure unter das Deckglas zufügt (pag. 26). Die Bindegewebsbündel quellen bis zu vollkommener Durchsichtigkeit auf, die elastischen Fasern bleiben dagegen unverändert und treten scharf konturirt hervor (Fig. 18, *A*).

Nr. 10. Stärkere elastische Fasern erhält man durch Zerfasern eines ca. 5 mm langen, stecknaddeldicken Stückchens¹⁾ des frischen Nackenbandes eines Rindes in einem Tropfen Kochsalzlösung (Fig. 18, *B*). Man kann das Präparat mit Pikrokarmine färben (pag. 26) und in verdünntem Glycerin konservieren.

Nr. 11. Querschnitte starker elastischer Fasern erhält man, indem man ein ca. 10 cm langes, 1–2 cm dickes Stück des Nackenbandes trocknet (nach 4–6 Tagen schon brauchbar) und behandelt wie Nr. 59.

Nr. 12. Gefensterte Membranen erhält man, indem man Stückchen (von ca. 5 mm Seite) des Endokards abpräparirt, in einem Tropfen Wasser auf den Objektträger bringt und 1–2 Tropfen Kalilauge unter das Deckglas fliessen lässt (pag. 26). Man betrachte die Ränder des Präparates (Fig. 19).

Auch die Art. basilaris giebt gute gefensterte Membranen; man schneide ein Stück der Arterie der Länge nach mit der Scheere auf und lege es in 10 cem reiner Kalilauge. Nach 6 Stunden bringe man ein ca. 1 cm langes Stück in einigen Tropfen Wasser auf den Objektträger und suche es durch Schaben mit einem Skalpell in Lamellen zu zerlegen, was leicht gelingt. Deckglas, starke Vergrösserung. Die kleinen Löcher der Membran sehen wie glänzende Kerne aus.

Bei schwachen Vergrösserungen erkennt man die Membran an ihrer dunklen Konturirung. In 10 cem Wasser gut ausgewaschene (5 Minuten), in 3 cem Kongoroth (pag. 8) 12–20 Stunden gefärbte Membranen lassen sich in Damarfirmiss konservieren (pag. 23).

Nr. 13. Hyaliner Knorpel. Man schneide den sehr dünnen Schwertfortsatz des Frosches mit einer Scheere aus, bringe ihn auf einen trockenen Objektträger, bedecke ihn mit einem Deckglase und untersuche rasch mit starker Vergrösserung. Die Knorpelzelle füllt die Knorpelhöhle vollkommen aus. (Fig. 23, *A*). Bei längerer Beobachtung lasse man einen Tropfen Kochsalzlösung zufließen.

Nr. 14. Hyaliner Rippenknorpel. Ohne weitere Vorbereitung lassen sich mit trockenem Rasirmesser feine Schnitte anfertigen, die man in

¹⁾ Man nehme nicht von dem lockeren, das Band umgebenden Gewebe, sondern von den zähen gelbweissen Fasern.

einigen Tropfen Wasser unter Deckglas bringt. Man suche sich die im Durchschnitte des Rippenknorpels glänzenden Stellen aus, welche die starren Fasern enthalten. (Fig. 23, B.) Will man konserviren, so lasse man einige Tropfen verdünntes Glycerin zufließen.

Zu Färbungen sind frische Knorpel wenig geeignet, man lege sie zuvor in Kleinenberg's Pikrinschwefelsäure oder in Müller'sche Flüssigkeit und dann in Alkohol (pag. 14) und färbe endlich mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17). Einschluss in Damarfirniss hellt stark auf und lässt die feineren Details verschwinden.

Nr. 15. Elastischer Knorpel. Man nehme einen Giessbeckenknorpel des Menschen (besser noch des Rindes); die gelbliche Farbe des Proc. vocal. verräth den elastischen Knorpel. Man schneide so, dass die Grenze zwischen elastischem und hyalinen Knorpel in den Schnitt fällt und betrachte die Schnitte in Wasser. Konservirung wie Nr. 14. Die Entwicklung der elastischen Fasern lässt sich oft auch noch an Knorpeln erwachsener Personen besonders an Epiglottis und am Proc. vocal. cart. aryän. studiren. (s. Fig. 24, 1.)

Nr. 16. Bindegewebsknorpel. Ligam. intervertebr. des erwachsenen Menschen wird in Stücke von 1—2 cm Seite zerschnitten, in 100 ccm Kleinenberg'scher Pikrinschwefelsäure (pag. 13) 24 Stunden lang fixirt und in 50 ccm allmählich verstärktem Alkohol gehärtet (pag. 14). Die mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17) gefärbten Schnitte konservire man in Damarfirniss (Fig. 25). Schnitte durch Randpartien ergeben auch hyalinen Knorpel; Schnitte durch centrale Theile der Bandscheibe zeigen grosse Gruppen von Knorpelzellen.

III. Muskelgewebe.

Die charakteristischen Elemente des Muskelgewebes, die Muskelfasern, treten in zwei Formen auf, die wir glatte und quergestreifte nennen. Beide sind Zellen, deren Leib ausserordentlich in die Länge gestreckt ist.

1. Das Gewebe der glatten Muskeln. Die glatten Muskeln (kontraktile Faserzellen) (Fig. 29) sind spindelförmige, cylindrische oder leicht

Fig. 29.

Zwei glatte Muskelfasern aus dem Dünndarm eines Frosches. 240mal vergr. Durch 35%ige Kalilauge isolirt. Die Kerne haben durch die Kalilauge ihre charakteristische Form eingebüsst. Technik Nr. 23, pag. 66.

abgeplattete Zellen, deren Enden zugespitzt sind. Ihre Länge schwankt zwischen 45 und 225 μ , ihre Breite zwischen 4 und 7 μ ; im schwangeren Uterus

hat man noch längere, bis $\frac{1}{2}$ mm messende glatte Muskelfasern gefunden. Sie bestehen aus einem homogenen Protoplasma¹⁾ und einem gestreckten, stäbchenförmigen Kerne, der für glatte Muskelfasern charakteristisch

1) An einzelnen glatten Muskelfasern z. B. des Vas deferens ist ein längsstreifiger Bau des Protoplasmas nachgewiesen worden, welcher zur Annahme eines Aufbaues der Muskelfaser aus Fibrillen geführt hat; bei Fischen und Amphibien sind in der Iris pigmentirte Muskelfasern gefunden worden.

ist. Die glatten Muskelfasern sind durch eine strukturlose Kittmasse sehr fest mit einander verbunden¹⁾. Bindegewebige Scheidewände finden sich nur in grösseren Abständen (Fig. 30).

Die Vereinigung erfolgt entweder zu parallelfaserigen Häuten (Darmmuskeln) oder zu komplizierten Flechtwerken (Harnblase, Uterus). Die grösseren Blutgefässe verlaufen in den bindegewebigen Scheidewänden; die Kapillaren dagegen dringen zwischen die Fasern selbst ein und bilden dort langgestreckte Netze. Die ähnlich verlaufenden Lymphgefässe sind in ansehnlicher Menge vorhanden.

Fig. 30.

Stück eines Querschnittes der Ringmuskelschicht des menschlichen Darmes. 560 mal vergrössert. Technik Nr. 18.

Nerven s. bei Nervenendigungen.

Das Gewebe der glatten Muskeln findet sich im Darmkanale, in den zuführenden Luftwegen, in der Gallenblase,

im Nierenbecken, in den Ureteren, in der Harnblase, in den Geschlechtsorganen, in Blut- und Lymphgefässen, im Auge und in der äusseren Haut. Die Kontraktion der glatten Muskelfasern ist eine langsame und nicht dem Willen unterworfen.

Fig. 31.

A und B Herzmuskelfasern in Kali isoliert, A vom Frosche, B vom Kaninchen, X schiefe Abzweigungen. 240 mal vorgr. Technik wie Nr. 21, p. 65. C aus einem Längsschnitte, D aus einem Querschnitte durch einen Papillarmuskel des Menschen, C 240 mal, D 560 mal vorgr. Technik Nr. 32, pag. 89.

Eine besondere Stellung nehmen die Muskelfasern des Herzens ein. Sie sind zwar quergestreift, allein die Entwicklungsgeschichte sowohl wie ihr mikroskopisches Verhalten ergibt, dass die Herzmuskelfasern als eine Modifikation der kontraktile Faserzellen (pag. 60) aufzufassen sind.

¹⁾ In der aus glatten Muskelfasern bestehenden Darmmuskelschicht des Hundes, der Katze und auch des Menschen sind den Intercellularbrücken (pag. 41) ähnliche Verbindungen der glatten Muskelfasern gefunden worden.

Sie sind bei niederen Wirbelthieren (z. B. beim Frosche) spindelförmige, mit gestrecktem Kerne versehene Fasern, die oft deutlicher der Quere als der Länge nach gestreift sind (Fig. 31 A). Die Herzmuskelfasern der Säugethiere sind kurze Cylinder, deren Enden oft treppenförmig abgestuft sind (Fig. 31 B). Ihr Protoplasma ist zum Theil zu quergestreiften Fäserchen, „Fibrillen“ differenzirt, welche nicht selten in radiär zur Faserachse gestellte Blätter angeordnet sind (Fig. 31 D). Der (im Verhältniss zu den quergestreiften Muskeln) ansehnliche Rest nicht differenzirten Protoplasmas, das „Sarkoplasma“, ist vorzugsweise in der Faserachse gelegen, von welcher Fortsetzungen zwischen die Fibrillenblätter oder -Bündel ausstrahlen. Dadurch wird auch eine, oft sehr deutliche, Längsstreifung bedingt. Der ovale Kern liegt in dem axialen Theil des Sarkoplasma, welches sehr häufig Körnchen (meist fettiger Natur) einschliesst. Eine Zellmembran „Sarkolemm“ fehlt. Charakteristisch für die Herzmuskelfasern höherer Thiere ist die Verbindung durch kurze, schiefe oder quere Abzweigungen der Muskelfasern (Fig. 31 B X).

2. Das Gewebe der quergestreiften Muskeln. Die quergestreiften Muskelfasern sind nur mit Hilfe der Entwicklungsgeschichte als Zellen zu erkennen. Durch ein kolossales Wachsthum in die Länge, durch wiederholte Theilung ihres Kernes, sowie durch eigenthümliche Differenzirung ihres Protoplasma sind sie zu höchst komplizirten Gebilden geworden. Sie haben die Form langer, cylindrischer Fäden, die an den Enden gewöhnlich abgerundet oder stumpf zugespitzt, in einzelnen Fällen (Augenmuskeln, Muskeln der Zunge, der äusseren Haut) aber verästelt sind (Fig. 33, 4); ihre Länge schwankt zwischen 5,3 und 12,3 cm¹⁾, ihre Dicke zwischen 15 und 80 μ ; die Muskeln des Gesichtes haben feinere Fasern als die Rumpfmuskeln. Unter dem Mikroskope zeigt jede quergestreifte Muskelfaser abwechselnd dunkle breitere und helle schmalere Querbänder. Die Substanz der dunkeln Querbänder ist doppeltbrechend (anisotrope Substanz), diejenige der hellen Querbänder ist einfachbrechend (isotrope S.)²⁾. Ausser der Querstreifung ist eine mehr oder minder ausgesprochene Längsstreifung der Muskelfasern zu beobachten. Gewisse Reagentien (z. B. Chromsäurelösungen) lassen diese Längsstreifung noch deutlicher hervortreten und bewirken selbst einen Zerfall der Muskelfaser der Länge nach in feine ebenfalls quergestreifte Fäden, welche „Fibrillen“ heissen. Diese Fibrillen

1) Es ist wahrscheinlich, dass es noch längere Fasern giebt, doch ist deren vollkommene Isolirung mit grossen Schwierigkeiten verknüpft.

2) Stärkere Vergrösserungen zeigen, dass jedes Querband selbst quergegliedert ist; so findet sich regelmässig im isotropen (hellen) Querband ein dunkler Streifen, die Zwischenscheibe (Fig. 32 g), sowie über und unter dieser eine dunkle Scheibe, die Nebenscheibe, auch im anisotropen (dunklen) Querband ist ein heller Streifen, die Mittelscheibe, beobachtet worden. Diese Scheiben sind wegen ihres grossen Wechsels und ihrer Unbeständigkeit nur von untergeordneter Bedeutung.

sind die kontraktile Formelemente der Muskelfaser¹⁾, ihre Vereinigung vollzieht sich in der Weise, dass eine Anzahl Fibrillen, parallel zu einander gelagert, Längsbündel („Muskelsäulchen“) bilden, welche durch das

Fig. 32.

1. Muskelfaserstück des Menschen, 560mal vergr. *a* anisotrope, *i* isotrope Querbänder, *q* Zwischenscheibe, *k* Kerne. Technik Nr. 17 b, pag. 65. 2. Ein Muskelfaserende des Frosches 240 mal vergr. Zerfall in Fibrillen *f*. *k* Kern. Technik Nr. 20, pag. 65.

Sarkoplasma zusammengehalten und mit benachbarten Bündeln vereinigt werden. Die Anordnung des Sarkoplasma ist am Besten (bei starken Vergrößerungen) an Querschnitten zu sehen. Hier erscheint es in Form eines hellen Netzes, in dessen Maschen die Querschnitte der Fibrillenbündel (sie sind unter dem Namen „Cohnheim'sche Felder“ bekannt) gelegen sind. Das Sarkoplasma enthält die theils aus Fett, vielleicht auch aus Lecithin bestehenden „interstitiellen Körnchen“ und Kerne. Letztere sind ovale, parallel der Längsachse der Muskelfaser gestellte Gebilde, welche bei den Säugethieren, den Knochenfischen und einigen Vögeln vorzugsweise an der

Fig. 33.

Stücke isolirter quergestreifter Muskelfasern des Frosches, 50mal vergrößert. 1. Wasserwirkung ^s Sarkolemm. Bei *x* ist die Muskelsubstanz zerrissen, ihre Querstreifung ist nicht, die Längsstriefung dagegen deutlich zu sehen. Technik Nr. 18. 2. Essigsäurewirkung. *k* Kerne. Die feine Punktirung entspricht interstitiellen Körnchen. Technik Nr. 19. 3. Wirkung einer konzentrirten Kalilösung, *e* abgerundete Enden, die zahlreichen Kerne erscheinen bläschenförmig gequollen, die Querstreifung der Muskelsubstanz ist in 2 und 3 bei dieser Vergrößerung nicht sichtbar. Technik Nr. 21. 4. Verästelte Muskelfasern aus der Froschzunge. Technik Nr. 22, pag. 65.

¹⁾ Bei manchen Thieren zerfällt nach Einwirkung gewisser Reagentien die Muskelfaser statt in Fibrillen in Querscheiben (Discs). Fibrillen und Discs können in noch kleinere rundlicheckige, anisotrope Stücke zerfallen, welche „primitive Fleischtheilchen“ (Sarcous elements) genannt wurden. Einzelne Autoren haben deswegen die Discs, andere die primitiven Fleischtheilchen als die eigentlichen Formelemente erklärt.

Oberfläche der Muskelfaser unter dem Sarkolemm, bei den übrigen Wirbeltieren auch im Innern der Muskelfaser liegen.

Jede Muskelfaser wird von einer strukturlosen Hülle, dem Sarkolemm, welches die Bedeutung einer Zellmembran hat, eng umschlossen. Somit besteht die quergestreifte Muskelfaser aus Fibrillen, Sarkoplasma und Sarkolemm.

Die quergestreiften Muskelfasern finden sich in den Muskeln des Stammes, der Extremitäten, des Auges, des Ohres, ferner in der Zunge, im Schlunde, in der oberen Speiseröhrenhälfte, im Kehlkopf, in den Muskeln der Genitalien und des Mastdarmes. Bei manchen Thieren, z. B. beim Kaninchen, lassen sich zweierlei Arten von quergestreiften Muskeln nachweisen: rothe (z. B. der Semitendinosus, der Soleus) und helle oder weisse (z. B. der Adductor magnus).

Dem entsprechen zwei Arten von Muskelfasern. Es giebt 1. protoplasma- (resp. sarkoplasma-) reiche, trübe Fasern; sie zeigen eine weniger regelmässige Querstreifung, eine deutlichere Längstreifung und haben im Allgemeinen einen geringeren Durchmesser; sie sind es z. B., die den Soleus des Kaninchens bilden; 2. protoplasmaarme, helle Fasern, welche eine deutlichere Querstreifung und einen im Allgemeinen grösseren Durchmesser besitzen. Sie stellen die höher differenzirten Fasern dar. Während bei den einen Thieren die zwei Muskelfaserarten von einander geschieden in besonderen Muskeln auftreten, finden sie sich bei den anderen (auch beim Menschen) gemischt in denselben Muskeln. Im Allgemeinen gilt die Regel, dass die thätigsten Muskeln (Herz-, Augen-, Kau- und Athmungsmuskeln) die meisten protoplasmareichen Fasern enthalten.

Die Kontraktion der quergestreiften Muskeln ist (den glatten Muskelfasern gegenüber) eine schnelle und ist dem Willen unterworfen. Die Vereinigung der quergestreiften Muskelfasern zu Muskelgewebe findet durch fibrilläres Bindegewebe statt, welches der Träger der zahlreichen Blutgefäss- und Nervenverästelungen ist. Lymphgefässe finden sich nur spärlich im quergestreiften Muskelgewebe.

TECHNIK.

Nr. 17. Quergestreifte Muskelfasern a) des Frosches. Man schneide mit flach aufgesetzter Scheere in der Richtung des Faserverlaufes aus den Adduktoren eines soeben getödteten Frosches ein ca. 1 cm langes Muskelstückchen, zerpupfe („Isoliren“ pag. 10) einen kleinen, von der Innenfläche des Stückchens entnommenen Theil in einem kleinen Tropfen Kochsalzlösung, setze alsdann einen zweiten grösseren Tropfen derselben Flüssigkeit zu und bedecke, ohne zu drücken, das Präparat mit einem Deckgläschen. Bei schwacher Vergrösserung (50 mal) sieht man die cylindrische Gestalt (Fig. 33), die verschiedene Dicke, zuweilen auch schon die Querstreifung der isolirten Muskelfasern. Bei starker Vergrösserung (240 mal) sieht man deutliche Querstreifung, zuweilen blasse Kerne und glänzende Körnchen. Sehr zahlreiche Körnchen enthaltende Muskelfasern sind wahrscheinlich Zeichen reger

Stoffwechselvorgänge. Da, wo die Muskelfasern quer durchschnitten sind, sieht man nicht selten die Muskelsubstanz pilzförmig aus dem Sarkolemm-schlauche hervorquellen.

b) des Menschen. Sehr schöne Querstreifung habe ich an menschlichen, dem Präparirsaale entnommenen Muskeln gefunden (Fig. 32 1). Die Leichen waren mit Karbolsäure injicirt worden.

Will man konserviren, so färbe man unter dem Deckglase (pag. 26) mit Pikrokarmmin und verdränge nach vollendeter Färbung (ca. 5 Min.) dasselbe durch verdünntes Glycerin.

Nr. 18. Sarkolemm. Man lasse zu Präparat 17 a ein paar Tropfen Brunnenwasser zufließen (pag. 26). Nach 2—5 Minuten sieht man bei schwacher Vergrößerung (50mal), wie sich das Sarkolemm in Form durchsichtiger Blasen (Fig. 33, s) abgehoben hat; an anderen Stellen, wo sich die zerrissene Muskelsubstanz retrahirt hat, erscheint das Sarkolemm als feiner Streifen (Fig. 33, s').

Nr. 19. Kerne. Präparat 17 a anfertigen. Dann lasse man einen Tropfen Essigsäure zufließen (pag. 26). Schon bei schwacher Vergrößerung erscheinen die geschrumpften, aber scharf konturirten Kerne als dunkle, spindelförmige Striche (Fig. 33, 2).

Nr. 20. Fibrillen. Man lege einen frischen Froschmuskel in 20 ccm 0,1%ige Chromsäure (pag. 5). Nach ca. 24 Stunden erhält man beim Zerzupfen in einem Tropfen Wasser Fasern, deren Enden in Fibrillen aufgefasert sind (Fig. 32, 2). Will man ein Dauerpräparat herstellen, so lege man den Muskel in Wasser (1 Stunde lang), dann in 20 ccm 33%igen Alkohol 10—20 St., zerzupfe sofort oder bewahre ihn dann in 70%igem Alkohol beliebig lange auf bis zum Verarbeiten. Zerzupfen („Isoliren“ s. pag. 10). Wenn die Chromsäure durch längeres, mehrwöchentliches Liegen in öfters gewechseltem Alkohol ausgezogen ist, kann man dem Zupfpräparat Pikrokarmmin zufließen lassen (pag. 26) und nach vollendeter Färbung (in feuchter Kammer pag. 26) dieses durch verdünntes Glycerin ersetzen.

Nr. 21. Enden der Muskelfasern. Man lege einen frischen Froschgastrocnemius in 20 ccm konzentrirte Kalilauge (Gläschen zudecken). Nach ca. 30—60 Minuten (in kaltem Zimmer etwas später) zerrällt der Muskel bei leichter Berührung mit einem Glasstabe in seine Fasern. Tritt diese Wirkung nicht ein, so ist die Lauge zu geringprozentig gewesen (s. pag. 11). Man übertrage nun eine Anzahl Fasern in einem Tropfen derselben Lauge auf den Objektträger (die Fasern können nicht in Wasser oder Glycerin untersucht werden, da die hierdurch verdünnte Kalilauge alsbald die Fasern zerstört) und bedecke vorsichtig mit einem Deckglase. Man sieht bei schwacher Vergrößerung die Enden der Muskelfasern und zahlreiche, bläschenförmig gewordene, glänzende Kerne (Fig. 33, 3).

Nr. 22. Verästelte Muskelfasern. Man schneide einem soeben getödteten Frosche die (vorn am Unterkiefer angewachsene, nach hinten freie) Zunge aus und bringe sie in 20 ccm reine Salpetersäure, welcher ca. 5 gr chloresäures Kali (es muss noch ungelöstes Kali am Boden des Gefäßes liegen bleiben) zugesetzt sind. Nach etwa einer Stunde hebe man die Zunge mit Glasstäben vorsichtig heraus und lege sie in ca. 30 ccm dest. Wasser, das man öfter wechselt. Hier kann die Zunge bis zu 8 Tagen liegen bleiben, aber auch schon nach 24 St. verarbeitet werden. Zu dem Zwecke bringe man dieselbe in ein zur Hälfte mit Wasser gefülltes Reagenzgläschen und

schüttle einige Minuten; die Zunge zerfällt dabei. Nun giesse man das Ganze in ein Schälchen und bringe nach ca. 1 Stunde oder später etwas von dem unterdessen gebildeten Bodensatz in einem Tropfen Wasser auf den Objektträger. Hier kann man mit Nadeln noch etwas isoliren, was jedoch in den meisten Fällen überflüssig ist. Schwache Vergrösserung. Pikrokarminfärbung unter dem Deckglase (pag. 26). Konserviren in verdünntem Glycerin (pag. 6). Fig. 33, 4.

Nr. 23. Glatte Muskelfasern isolirt man am besten, wenn man ein Stückchen Magen oder Darm eines soeben getödteten Frosches in 20 cem Kalilauge bringt und weiter behandelt wie Nr. 21 (Fig. 29).

IV. Nervengewebe.

Das Nervengewebe ist durch zwei Formelemente charakterisirt, durch Nervenzellen und Nervenfasern, welche, obgleich von einander sehr verschieden, doch in engstem Zusammenhang mit einander stehen, denn jede Nervenfasern, d. h. deren Achsencylinder (pag. 68), ist nichts anderes als ein langer Fortsatz einer Nervenzelle.

a) Die Nervenzellen (Ganglienzellen) sind sehr verschieden geformte Zellen von sehr wechselnder Grösse (10 bis 100 μ und darüber). Es giebt kugelige und spindelförmige Ganglienzellen; sehr häufig ist die unregelmässige Sternform, d. h. das Protoplasma sendet mehrere Fortsätze aus. Ganglienzellen mit zwei Fortsätzen heissen bipolare, Ganglienzellen mit mehreren Fortsätzen multipolare Ganglienzellen; man spricht auch

Fig. 34.

Verschiedene Formen von Ganglienzellen. *aA* kugelige, unipolare Ganglienzellen aus dem Ganglion Gasserii des Menschen. *a* 80mal, *A* 240mal vergrössert. Nur zwei Zellen zeigen den Fortsatz, *f*, zwei andere Zellen sind von einer kernhaltigen Hülle *h* umgeben. Technik Nr. 24, pag. 70.

b spindelförmige, *c* multipolare Ganglienzelle aus dem Rückenmark des Rindes. 80mal vergrössert. Technik Nr. 25, pag. 70. *d* multipolare (Purkinje'sche) Ganglienzellen aus der menschlichen Kleinhirnrinde. *d* 80mal, *D* 240mal vergrössert. *p* Protoplasmafortsätze, *ax* Achsencylinderfortsatz. Technik Nr. 25, pag. 70. Die Kerne von *b*, *c* und *d* haben durch die Methode ihre charakteristische Form eingebüsst.

von unipolaren und apolaren Ganglienzellen. Es lässt sich jedoch, z. B. in Spinalganglien, nachweisen, dass der einzige Fortsatz vieler unipolaren Ganglienzellen¹⁾ in Wirklichkeit aus zwei Fortsätzen besteht, die eine Strecke weit in gleicher Richtung verlaufen, dann aber meist unter spitzem oder

¹⁾ Manche dieser Zellen werden zuerst als bipolare Zellen angelegt und nehmen erst später den unipolaren Typus an.

rechtem Winkel von einander abbiegen. Sie werden Zellen mit **T**-förmigen (oder mit **Y**-förmigen) Fasern genannt. Apolare, also fortsatzlose Ganglienzellen sind entweder Jugendformen oder durch Abreissen der Fortsätze beim Isoliren entstandene Kunstprodukte. Jede Ganglienzelle besteht aus einem körnigen oder feinstreifigen Protoplasma, das nicht selten gelbbraune Pigmentkörnchen enthält (Fig. 34 c und Fig. 84) und aus einem bläschenförmigen Kern, der ein ansehnliches Kernkörperchen einschliesst. Dieser

Kern ist charakteristisch für Ganglienzellen. Eine Zellenmembran fehlt. Die Ganglienzellen finden sich in den Ganglien, in Sinnesorganen, im Verlaufe sowohl cerebrospinaler, als sympathischer Nervenfasern, hauptsächlich aber im Centralnervensystem.

Hier unterscheidet man an den meisten multipolaren Ganglienzellen zweierlei Fortsätze. Die einen sind, wie das Protoplasma der Ganglienzelle selbst, körnig oder feinstreifig, von unregelmässiger Dicke; sie theilen sich bald wiederholt und gehen schliesslich in ein Gewirr feinsten Fäserchen über; solche Fortsätze heissen **Protoplasmafortsätze** (Fig. 34 p, Fig. 35), „Dendriten“, sie werden von den Einen nur als Leiter der ernährenden Flüssigkeiten

Fig. 35.

Ganglienzellen aus einem Schnitt der Grosshirnrinde des Menschen. 220mal vergrössert.
Technik Nr. 69.

zu den Ganglienzellen, von den Andern aber auch als Vermittler nervöser Erregung angesehen. Der andere Fortsatz, der einzige seiner Art¹⁾, ist nervöser Natur, Nervenfortsatz (Acheneylinderfortsatz); er ist hyalin, glattrandig, von gleichmässigem Kaliber. Nach seinem Verhalten kann man zwei Arten von Ganglienzellen unterscheiden. Entweder wird der Nervenfortsatz, nachdem er eine Anzahl feiner, sich weiter verzweigender Seitenästchen abgegeben hat, zum Achseneylinder einer markhaltigen Nervenfaser: Zellen mit langem Nervenfortsatz. Oder der Nervenfortsatz löst sich schon in der Nähe der Zelle unter fortwährender Theilung in ein dichtes nervöses Astwerk auf: Zellen mit kurzem Nervenfortsatz. Alle Fortsätze enden frei ohne Anastomosen zu bilden, eine Verbindung findet nur durch Kontakt statt. Es giebt

1) In den Spinalganglien von Fischen, in der Hirnrinde des Kaninehens sind Ganglienzellen mit zwei Nervenfortsätzen, in sympathischen Ganglienzellen sogar Zellen mit vielen Nervenfortsätzen beschrieben worden.

somit kein nervöses Netz sondern nur ein dichtes aus den ineinandergreifenden Verästelungen bestehendes Filzwerk.

b) Die Nervenfasern treten in zweierlei Formen auf, die wir als markhaltige und marklose Nervenfasern bezeichnen. Beide Formen sind jedoch keineswegs als örtlich und genetisch scharf getrennte Arten zu betrachten, es ist vielmehr eine ganz gewöhnliche Erscheinung, dass ein und dieselbe Nervenfaser in ihrem Verlaufe proximal markhaltig und distal marklos ist. Indessen befürworten praktische Erwägungen die oben getroffene Eintheilung.

Fig. 36.

A Markhaltige Nervenfasern aus dem N. ischiadicus des Frosches. 240mal vergr. 1, 2, 3 Frisch mit Kochsalzlösung. Technik Nr. 26a. 3. Faser mit Schnürring *r*. 4. Nervenfasern unter Einwirkung von Wasser. Technik Nr. 27. 5. Nervenfaser mit absolutem Alkohol behandelt. Technik Nr. 28. *m* geronnenes Mark, *a* Achsencylinder. — B und C Markhaltige Nervenfasern des Kaninchens. 560mal vergr. 6 Frisch, *c* cylindronische Segmente. Technik Nr. 26a. 7, 8 gehärtet. *a* Achsencylinder. *b* bikonische Anschwellung. *r* Schnürring. *m* Mark¹⁾ geronnen und abgehoben von *s* der Schwann'schen Scheide. *k* Kern der Schwann'schen Scheide. *k'* Kern des Endoneurium. Technik Nr. 29, pag. 71.

a) Die markhaltigen Nervenfasern sind in frischem Zustande vollkommen gleichartige, matt glänzende Fasern, von 1—20 μ Dicke, deren Zusammensetzung erst mit Zuhilfenahme von Reagentien erkannt werden kann. Der wichtigste Theil ist ein in der Achse der Faser verlaufender, elastischer, cylindrischer Faden, der Achsencylinder (Fig. 36 a). Feine Längsstreifen, die zuweilen an ihm beobachtet werden, sind der Ausdruck einer Zusammensetzung aus Fibrillen; eine sehr deutliche Querstreifung (Fig. 37), die nach Behandlung mit Höllesteinlösung sichtbar wird, ist in ihrer Bedeutung noch nicht aufgeklärt. Der Achsencylinder ist rings umgeben von der Markscheide, die aus einer zäh flüssigen, stark lichtbrechenden, fettartigen Substanz, dem Myelin, besteht. Unter günstigen Umständen sieht man, dass die Markscheide nicht kontinuierlich ist, sondern in etwas unregelmässigen

1) Der von *m* rechts abgehende Strich ist ein wenig zu kurz gerathen.

Abständen durch schräge Einschnitte (Lantermann'sche Einkerbungen) in die („cylindrokonischen“) Segmente getheilt wird (Fig. 36 B), welche durch Kittsubstanz mit einander verbunden sind. Das im Leben ganz homogene Mark erfährt im Absterben auf Zusatz verschiedener Reagentien eine theilweise Umwandlung, anfangs wird die Nervenfaser doppelt konturirt¹⁾, später gestaltet sich das Mark zu eigenthümlich kugelig zusammengeballten Massen (3, 4). Der Markscheide liegt auf: die Schwann'sche Scheide (Neurilemma), ein feines strukturloses Häutchen, dessen Innenfläche längsovale von einer geringen Menge Protoplasmas umgebene Kerne anliegen. An bestimmten

Fig. 37.

Markhaltige Nervenfasern des Frosches mit Höllesteinlösung behandelt, 560 mal vergrößert. 1. *r* Schnürring, *a* Achsencylinder nur eine kleine Strecke geschwärzt. *b* bikonische Anschwellung; beim Isoliren hat sich der Achsencylinder nach unten verschoben. 2. *a* Achsencylinder in situ nur eine kurze Strecke geschwärzt. 3. Achsencylinder mit Querstreifung. Das Mark ist bei dieser Methode nicht zu sehen, bei 3 war auch die dazu gehörige Faser nicht zu unterscheiden. Technik Nr. 30, pag. 71.

ringförmig eingeschnürten Stellen fehlt die Markscheide, so dass Achsencylinder und Schwann'sche Scheide sich berühren. Man nennt diese Stellen Schnürringe (Fig. 36, 3). Der Achsencylinder ist in der Nähe der Schnürringe mit einer bikonischen Anschwellung (Fig. 36 C b) versehen. Behandlung mit Höllesteinlösungen ergibt ferner die Ansammlung von Kittsubstanz an den Schnürringen (Fig. 37, *r*). Jede periphere markhaltige Nervenfaser ist mit Schnürringen versehen, die in Abständen von 0,08 (bei dünneren) bis 1 mm (bei dickeren Fasern) angeordnet, die Nervenfasern in („interannuläre“) Segmente theilen.

Die markhaltigen Nervenfasern finden sich in Stämmen und Aesten der cerebrospinalen Nerven, sind aber auch in sympathischen Nerven vorhanden. Weiterhin kommen sie vor im Hirn und Rückenmark, woselbst sie der Schwann'schen Scheide entbehren. Die Dicke einer Nervenfaser gestattet keinen Schluss auf die motorische oder

sensitive Beschaffenheit derselben, dagegen ist konstatirt, dass die Fasern um so dicker sind, einen je längeren Verlauf sie haben. Theilung markhaltiger Nerven findet erst am peripherischen Ende derselben statt. Auch die markhaltigen Nervenfasern haben eine beschränkte Lebensdauer. Sie degeneriren, indem Mark- und Achsencylinder allmählich in eine körnige Masse, die reich an Kernen ist, zerfallen; aus dieser Masse entstehen von Neuem Markscheide und Achsencylinder.

b) Die marklosen (blassen) Nervenfasern (Remak'schen Fasern) sind durchscheinende, fein längsgestreifte Fäden von wechselnder Dicke (Fig. 38). Sie bestehen aus einem Achsencylinder (einem Bündel feiner Fibrillen) und aus einer Schwann'schen Scheide mit Kernen. Die marklosen Fasern finden

¹⁾ Daher der alte Name: „doppelt konturirte oder dunkelrandige Nervenfaser“.

sich im Gehirn und Rückenmark, sowie (vorzugsweise) im sympathischen Nervensystem, woselbst sie nicht einfach neben einander verlaufen wie die markhaltigen Nervenfasern, sondern, indem sie sich theilen und wieder vereinen, langmaschige Geflechte bilden.

Fig. 38.

Zupfpräparat des N. sympath. vom Kaninchen, 240 mal vergr. 1. marklose, 2. dünne markhaltige Nervenfasern. 3. Ganglienzellen; das charakteristische Aussehen der grossen Kerne ist durch die Osmiumsäure verloren gegangen. 4. Kerne bindegewebiger Hüllen. 5. Feine Bindegewebsfasern. Das die Kerne der blossen Nervenfasern umgebende Protoplasma ist bei dieser Vergrösserung nicht zu sehen. Technik Nr. 31, pag. 72.

In den Endausbreitungen der cerebrospinalen Nerven giebt es marklose Nervenfasern ohne Schwann'sche Scheide, sog. nackte Achsencylinder.

Die Vereinigung der beiden Elemente zum Neryengewebe findet im Bereich des peripherischen Nervensystems durch Bindegewebe statt, welches die Verästlungen der Blutgefässe enthält; im Centralnervensystem wird die Vereinigung ausser durch Bindegewebe noch durch Nerven kitt (Neuroglia) vermittelt.

TECHNIK.

Nr. 24. Ganglienzellen, frisch. Man zerpufe ein Stückchen des Ganglion Gasseri in einem Tropfen Kochsalzlösung

und färbe unter dem Deckglase (pag. 26) 2 Minuten mit Pikrokarmin. Die Fortsätze der Zellen reissen meist ab.

Ebenso kann man Ganglienzellen der Gross- und Kleinhirnrinde erhalten, nur gehen ebenfalls die Fortsätze leicht verloren. Fig. 34, D.

Für Ganglienzellen der Klein- und Grosshirnrinde empfiehlt sich auch das Verfahren Nr. 25; für Ganglienzellen des Sympathicus siehe auch Nr. 31 und Fig. 38.

Nr. 25. Multipolare Ganglienzellen des Rückenmarkes. Man befreie frisches Rückenmark (des Rindes) mit der Scheere so gut als möglich von der weissen Substanz und lege den grauen Rest in 1—2 cm langen Stücken in 50 cem einer sehr verdünnten Chromsäurelösung (5 cem der 0,05⁰/oigen Lösung (pag. 13) zu 45 cem destillirtes Wasser). Nach ca. 1½—8 Tagen (die Zeit wechselt sehr, je nach der äusseren Temperatur) ist das Rückenmark zu einer weichen Masse macerirt, die mit einem Spatel vorsichtig auf 10—20 Stunden in die unverdünnte neutrale Karminlösung (pag. 7) gebracht wird. Dann wird dieselbe in ca. 50 cem destill. Wasser übertragen, um einen Theil der Farbe auszuwaschen und nach ca. 5 Minuten in dünner Schicht auf einem trockenen Objektträger mit Nadeln ausgebreitet. Man kann jetzt schon bei einiger Uebung die Ganglienzellen an ihren lebhaft roth gefärbten Kernen unterscheiden, vom Zellenkörper und den Fortsätzen ist noch nichts zu sehen. Nun lasse man die Schicht vollständig trocknen und bedecke sie dann direkt mit einem Deckglase, an dessen Unterseite ein Tropfen Damarfirniss aufgehängt ist. Fig. 34, c, d.

Nr. 26. Frische markhaltige Nervenfasern. Man lege den N. ischiadicus eines eben getödteten Frosches bloss und schneide denselben

unten in der Kniekehle und ca. 1 cm höher oben mit einer feinen Scheere durch und isolire (pag. 10) in einem Tropfen Kochsalzlösung.

Nr. 26a. Besser ist es, das Zerzupfen auf dem trockenen Objektträger ohne Zusatz, bei „halber Eintrocknung“ vorzunehmen. Indem man am unteren Ende des Nerven die Nadel aussetzt, spannt sich beim Auseinanderziehen ein glänzendes Häutchen zwischen den etwa zur Hälfte der Länge auseinandergezogenen Nervenbündeln, das nun mit einem Tropfen Kochsalzlösung und einem Deckglase bedeckt wird. Das Häutchen enthält zahlreiche, hinreichend isolirte Nervenfasern. Die Manipulation muss sehr schnell (in ca. 15 Sekunden) vorgenommen werden, damit die Nervenfasern nicht eintrocknen. Man halte sich nicht mit dem Isoliren in einzelne Bündel auf. Resultat Fig. 36, 1, 2.

Nr. 27. Veränderungen der Markscheide. Man lasse zu Präparat Nr. 26a einen Tropfen Wasser vom Rande des Deckglases zufließen. Schon nach einer Minute tritt die Bildung der Marktropfen ein. (Fig. 36, 3, 4.)

Nr. 28. Achsencylinder. Trocken zerzupfen (wie Nr. 26a) und statt Kochsalzlösung einen Tropfen Alkohol absol. zusetzen; das Auffinden der Achsencylinder erfordert Uebung im Sehen; leichter gelingt die

Nr. 29. Darstellung der Achsencylinder mit Chromsäure. Man lege den Nerv. ischiadicus eines frisch getödteten Kaninchens, ohne ihn zu berühren, bloss; dann wird ein Streichhölzchen parallel der Längsachse unter den Nerven geschoben, der Nerv vermittelt Ligaturen an das obere und untere Ende des Stäbchens befestigt, dann erst der Nerv jenseits der Ligaturen durchschnitten und endlich mit dem Hölzchen in 100 cem einer 0,1%igen Chromsäurelösung (s. pag. 5) eingelegt.

Nach ca. 24 Stunden werden die Ligaturen durchschnitten, ein 0,5 bis 1 cm langes Stückchen abgeschnitten und in feine Bündel (nicht in Fasern) zerzupft. Die Bündel kommen wieder in die Chromsäurelösung zurück und werden nach weiteren 24 Stunden in 50 cem destill. Wasser übertragen und nach 2—3 Stunden in ca. 30 cem allmählich verstärktem Alkohol gehärtet (pag. 14). Es ist gut, wenn die Bündel längere Zeit, 1—8 Wochen, in 90%igem Alkohol verweilen, weil sie sich dann leichter färben. Nach vollendeter Härtung werden die Bündel in einem Tropfen Pikrokarmine fein zerzupft und nach vollendeter Färbung, welche je nach der Zeitdauer der vorhergegangenen Alkoholhärtung $\frac{1}{2}$ —3 Tage (feuchte Kammer! pag. 26) in Anspruch nehmen kann, durch Zusetzen angesäuerten Glycerins (pag. 26) konservirt. Die Schnürringe sind nicht so deutlich wie am frischen und am Osmiumpräparat, sondern nur als feine Querlinien zu erkennen. (Fig. 36, 7.) Die etwas geschrumpften Achsencylinder und die Kerne sind schön roth gefärbt. Nicht selten verschiebt sich der Achsencylinder, so dass die bikonische Anschwellung nicht mehr am Schnürring, sondern darüber oder darunter liegt.

Nr. 30. Schnürring, Achsencylinder. Vorbereitung: 10 cem der 1%igen Lösung von Argent. nitr. sind zu 20 cem destill. Wasser zu gießen. Nun tödtet man einen Frosch, eröffnet durch einen Kreuzschnitt die Bauchhöhle, präparirt sämtliche Eingeweide heraus, so dass die an der Seite der Wirbelsäule herabsteigenden Nerven sichtbar werden. Jetzt spüle man durch Aufgießen destill. Wassers die Bauchhöhle aus und giesse, nachdem

das Wasser abgelaufen ist, etwa $\frac{1}{3}$ der Höllesteinlösung auf die Nerven. Nach zwei Minuten schneide man die feinen Nerven vorsichtig heraus und lege sie auf ca. $\frac{1}{2}$ Stunde in den Rest der Höllesteinlösung. In's Dunkle stellen! Dann übertrage man sie in ca. 10 ccm destill. Wasser, wo sie 1—24 Stunden verweilen können. Betrachtet man alsdann den Nerven in einem Tropfen Wasser, so erkennt man bei schwacher Vergrößerung die aus platten Zellen bestehenden Häutchen (s. „cerebrospinale Nerven“) und zahlreiche Pigmentzellen; oft liegt noch ein Blutgefäss dem Nerven an. Nun zerzupfe man den Nerven, bedecke ihn dann mit einem Deckglase und setze an den Rand desselben einen kleinen Tropfen dünnen Glycerins. Untersucht man nun bei starker Vergrößerung, so wird man im Anfang wenig von gefärbten Schnürringen und Achsencylindern sehen, lässt man aber das Präparat einige Stunden im Tageslichte liegen (im Sonnenlichte nur wenige Minuten), so tritt die Schwärzung der genannten Theile ein. Dem Ungeübten wird es im Anfang schwer fallen, die bikonischen Anschwellungen, die durch das Zerzupfen oft weit vom Schnürring verschoben worden sind, zu erkennen, bei einiger Uebung sieht man leicht Bilder, wie sie Fig. 37 zeigt.

Nr. 31. Marklose Nervenfasern. N. vagus eines Kaninchens wird trocken (Nr. 26a) zerzupft, dann mit einigen Tropfen einer 1%igen Osmiumlösung bedeckt; nach 5—10 Minuten sind die markhaltigen Nerven geschwärzt; (man überzeuge sich davon bei schwacher Vergrößerung). Nun lasse man die Osmiumlösung ablaufen und bringe statt deren einige Tropfen destill. Wasser darauf, das nach 5 Minuten durch neues Wasser ersetzt wird. Nach abermals 5 Minuten giesse man das Wasser ab, setze einige Tropfen Pikrokarmín auf das Präparat, bedecke es mit einem Deckglase und bringe es auf 24—48 Stunden in die feuchte Kammer; dann verdränge man das Pikrokarmín durch angesäuertes Glycerin¹⁾ (pag. 26). Bei starker Vergrößerung sieht man die markhaltigen Nerven blauschwarz, die marklosen sind blassgrau fein längsgestreift, die Maschen sind oft schwer zu sehen, nicht selten scheinen die blassen Nervenfasern grosse Strecken parallel zu laufen. Noch zahlreichere marklose Nervenfasern liefert die gleiche Behandlung des Sympathicus. Nur ist dieser Nerv etwas schwerer aufzufinden. Es empfiehlt sich, das grosse Zungenbeinhorn, sowie den Nerv. hypoglossus zu durchschneiden und auf die Seite zu drängen; hinter dem N. vagus findet man den Sympathicus, der an seinem 3—4 mm grossen, länglichovalen, gelblich durchscheinenden Ganglion cervicale supremum erkennbar ist. Zerzupft man das dicht unter dem Ganglion befindliche Stück, so erhält man auch die meist zweikernigen²⁾ Ganglienzellen; es ist sehr schwer, letztere so zu isoliren, dass die von ihnen ausgehenden Fortsätze deutlich sichtbar werden (Fig. 38).

1) Man kann auch nach vollendeter Färbung nochmals zerzupfen, was wegen der deutlicheren Sichtbarkeit der Elemente jetzt leichter ist.

2) In Fig. 38 ist zufällig nur die seltenere Form der einkernigen Ganglienzellen zu sehen.

II. Mikroskopische Anatomie der Organe.

I. Cirkulationsorgane.

1. Blutgefässsystem.

Die Blutgefässe bestehen aus Bindegewebe, elastischen Fasern und glatten Muskelfasern, welche Theile, in sehr verschiedenen Verhältnissen gemengt, in Schichten angeordnet sind. Im Allgemeinen herrscht in den Schichten eine gewisse Richtung vor; so die longitudinale Richtung in der innersten und äussersten, die cirkuläre in der mittleren Schicht. Eine Ausnahme hiervon machen durch seinen komplizirten Bau das Herz, durch ihren einfachen Bau die Kapillaren.

Herz.

Die Herz wand besteht aus drei Häuten: 1. dem Endocardium, 2. der gewaltig entwickelten Muskelhaut und 3. dem Pericardium.

ad 1. Das Endocardium ist eine bindegewebige Haut, welche glatte Muskelfasern und zahlreiche elastische Fasern enthält; letztere sind besonders in den Vorhöfen stark entwickelt und bilden daselbst entweder dichte Fasernetze oder sind selbst zu gefensterten Häuten verschmolzen (Fig. 19). Die der Herzhöhle zugewendete freie Oberfläche ist mit einer einfachen Lage unregelmässiger polygonaler Epithelzellen überzogen.

Fig. 39.

Stück eines Querschnittes eines Papillarmuskels des menschlichen Herzens. 240mal vergr.
m Querschnitte der Muskelfasern. *p* Perimysium mit kleinen (dunkelgefärbten) Kernen.
v Blutgefäss.

Technik Nr. 32, pag. 89.

ad 2. Die nackten Muskelfasern, deren Bau oben beschrieben worden ist (s. pag. 61), sind von einem feinen Perimysium umgeben. Ihre Vereinigung erfolgt durch zahlreiche quere oder schräge Abzweigungen (siehe Fig. 31). Der Verlauf der Muskelfasern ist ein sehr komplizirter. Die Muskulatur der Vorkammern ist von jener der Kammern vollkommen getrennt. An den Vorkammern kann man eine beiden Vorkammern gemeinschaftliche äussere, quere und eine jeder Vorkammer eigenthümliche, innere longitudinale (besonders im rechten Vorhofe, *Mm. pectinati*) Lage unterscheiden. Ausserdem finden sich viele kleine, in anderen Richtungen verlaufende Muskelbündel. Viel unregelmässiger ist die Muskulatur der Kammern, deren Bündel in den verschiedensten Richtungen, oft in Form von Achterzügen, verlaufen. Zwischen Vorkammern und Kammern liegen derbe Sehnenstreifen, die *Annuli fibrosi*, von denen der rechte stärker ist als der linke. Ebensolche, jedoch schwächer entwickelte Streifen liegen an den *Ostia arteriosa* der Kammern; zahlreiche Muskelfasern entspringen von sämtlichen Streifen.

ad 3. Das Pericardium ist eine bindegewebige, mit elastischen Fasern durchsetzte Haut, welche an der Aussenfläche (des visceralen Blattes) resp.

an der Innenfläche (des parietalen Blattes) von einem einschichtigen Epithel überzogen ist. Im visceralen Blatte sind Fettzellen gelegen, das parietale Blatt ist bedeutend dicker.

Die Herzklappen bestehen aus faserigem Bindegewebe, welches mit dem der Annuli fibrosi zusammenhängt, und sind an ihren Flächen vom Endokard überzogen. Muskelfasern sind nur in den Ursprungsrandern der Klappen enthalten.

Die zahlreichen Blutgefässe des Herzens verlaufen in der Muskulatur nach der für Muskeln typischen Anordnung (siehe „Organe des Muskelsystems“). Auch Perikard und Endokard (letzteres nur in seinen tieferen Schichten) besitzen Blutgefässe.

Lymphgefässe finden sich in kolossaler Menge im Herzen; sie stellen ein alle freie Räume zwischen Muskelbündeln und Blutgefässen einnehmendes System dar.

Die dem Vagus und Sympathicus entstammenden, theils marklosen, theils markhaltigen Nerven enthalten in ihrem Verlaufe zahlreiche Ganglienzellen.

Arterien.

Die Wandung der Arterien besteht aus drei Häuten: 1. der Tunica intima, 2. der T. media, 3. der T. adventitia. Die Tunica media zeigt

Querrichtung, die beiden anderen vorwiegend Längsrichtung ihrer Elemente. Bau und Dicke dieser Häute wechseln nach der Grösse der Arterien. Aus diesem Grunde empfiehlt sich eine Einteilung in kleine, mitteldicke und grosse Arterien.

Fig. 40.

Stücke kleiner Arterien des Menschen, 240mal vergrössert. *i* Kerne der T. intima, die Konturen der Zellen selbst sind nicht zu sehen. *m* T. media, an den quergestellten Kernen der glatten Muskelfasern kenntlich; *a* Kerne der T. adventitia. *A* Arterie, Einstellung auf die Oberfläche. *B* Arterie, Einstellung auf das Lumen. Man sieht bei *m'* die Muskulariskerne von dem einen Pole her, im optischen Querschnitte. *C* Kleine Arterie kurz vor dem Uebergange in Kapillaren; die T. media besteht hier nur aus vereinzelt Muskelnzellen.

Technik Nr. 33a, pag. 89.

Unter kleinen Arterien verstehen wir die Arterien kurz vor ihrem Uebergang in die Kapillaren. Ihre Intima besteht aus langgestreckten, spindelförmigen Epithel-

zellen und einer strukturlosen elastischen Haut, der sog. elastischen Innenhaut, die bei etwas grösseren Arterien den Charakter einer gefensterten Membran annimmt. Die Media wird durch eine einfache, bei etwas grösseren Arterien mehrfache Lage glatter Ringmuskelfasern hergestellt. Die Adventitia

besteht aus feinfaserigem, längsverlaufendem Bindegewebe und feinen elastischen Fasern. Sie geht ohne scharfe Grenze in das die Arterien tragende Bindegewebe über.

Zu den mitteldicken Arterien zählen wir sämtliche Arterien des Körpers, mit Ausnahme der Aorta und der A. pulmonalis.

Die Intima hat hier eine Verdickung erfahren, indem zwischen den Epithelzellen und der elastischen Innenhaut noch Netze feiner elastischer Fasern, sowie eine, abgeplattete Zellen einschliessende, streifige Binde substanz ¹⁾

Fig. 41.

Stück eines Querschnittes der Arteria brachialis des Menschen 100 mal vergr. Technik Nr. 32, pag. 89.

aufgetreten sind, welche beide der Länge nach verlaufen. Die Media besteht nicht mehr allein aus glatten Ringmuskelfasern ²⁾, die hier in mehreren Schichten übereinanderliegen, sie enthält auch noch weitmaschige Netze feiner elastischer Fasern. Der Anteil beider Gewebe ist in den einzelnen Arterien ein sehr verschiedener, so überwiegt in der Arteria coeliaca, femoralis und radialis das Muskelgewebe, in der Carotis, Axillaris und Iliaca communis

1) Sie fehlt der Iliaca ext., Renalis, den Mesentericae und der Coeliaca, sowie der Uterina jugendlicher Individuen.

2) An der inneren Grenze der Media kommen auch längs verlaufende Muskelfasern vor; sie sind besonders entwickelt in der A. subclavia.

dagegen das elastische Gewebe. Die Adventitia ist ebenfalls dicker geworden. Stärkere elastische Fasern finden sich in besonders reichlicher Menge an der Grenze der T. media und bilden daselbst bei vielen Arterien eine eigene Lage, die als elastische Haut der Adventitia (Fig. 41) bezeichnet worden ist. Als neue Elemente treten in der Adventitia mitteldicker Arterien glatte Muskelfasern auf, die zu längs verlaufenden einzelnen Bündeln, niemals zu einer geschlossenen Schicht geordnet sind.

Fig. 42.

Gefäßepithel einer Mesenterialarterie eines Kaninchens. Flächenbild. 260mal vergr. Technik Nr. 34, pag. 89.

Fig. 43.

Stück eines Querschnittes der Brustorta des Menschen. 100 mal vergrößert. Technik Nr. 32, pag. 89.

Bei den grossen Arterien (Aorta, Pulmonalis) zeigt die Intima kürzere, mehr der polygonalen Form sich nähernde Epithelzellen; dicht darunter liegen die schon bei den mittelstarken Arterien vorkommenden streifigen Binde-substanzlagen, die auch hier abgeplattete sternförmige oder rundliche Zellen, sowie elastische Fasernetze einschliessen. Diese Fasernetze sind um so dichter, je näher sie der T. media liegen und gehen endlich in eine gefensterte Membran über, welche der elastischen Innenhaut kleinerer und mitteldicker

Arterien entspricht. Die T. media der grossen Arterien ist durch reich entwickelte, die muskulösen Elemente an Menge übertreffende, elastische Elemente charakterisirt. An Stelle dünner Fasernetze finden sich hier entweder dichte Netze starker elastischer Fasern oder gefensterter Häute¹⁾, welche regelmässig mit Schichten glatter Muskelfasern abwechseln. Die elastischen Elemente haben wie die Muskelfasern einen cirkulären Verlauf; schräg die Muskelschichten durchsetzende Fasern und Häute stellen eine Verbindung aller elastischen Elemente der T. media her. Die Adventitia grosser Arterien zeigt keine wesentlichen Eigenthümlichkeiten, sie unterscheidet sich nur wenig von derjenigen mittelstarker Arterien. Eine elastische Haut der Adventitia fehlt. Glatte Muskelfasern kommen daselbst nur bei Thieren vor.

Venen.

Die Wandung der Venen steht hinsichtlich ihrer Dicke nicht in bestimmtem Verhältnisse zur Grösse der Venen, so dass eine Eintheilung nach der Grösse, wie bei den Arterien, zwecklos ist. Das Charakteristikum der Venen liegt in dem Vorwiegen der bindegewebigen Hüllen und in der geringen Ausbildung der muskulösen und elastischen Elemente. Auch an den Venen können wir drei Hüllen unterscheiden²⁾.

Die Intima besteht aus einer einfachen Lage platter Epithelzellen, die nur bei den kleinsten Venen von gestreckter, sonst von polygonaler Gestalt sind. Bei mittleren 2—9 mm im Durchmesser zeigenden Venen folgen darauf kernhaltige Bindesubstanzlagen, die sich bei ganz grossen Venen (V. cava sup., V. femor., V. poplit.) zu deutlich streifigen Lagen entwickeln. Daran schliesst sich eine elastische Innenhaut, die bei kleinen Venen strukturlos ist, bei mittleren und grossen Venen durch elastische Netze dargestellt wird. In der Intima der

Fig. 44.

Querschnitt der Wand der V. renalis
des Menschen. 50mal vergrössert.
Technik Nr. 32, pag. 89.

der V. iliaca, femoralis, saphena und der Darmvenen finden sich auch einzelne schräg oder längs verlaufende glatte Muskelfasern.

Die T. media zeigt grosse Schwankungen. Sie besteht aus cirkulären Muskelfasern, elastischen Netzen und fibrillärem Bindegewebe und ist am Besten entwickelt in den Venen der unteren Extremität (bes. in der Vena

¹⁾ Die elastischen Häute finden sich schon bei den grösseren mitteldicken Arterien; besonders gut sind sie bei den Karotiden ausgeprägt, die bezüglich ihres Baues den grossen Arterien am nächsten stehen.

²⁾ Die geringe Entwicklung der Tunica media hat sogar einzelne Histologen veranlasst, nur zwei Hüllen, T. intima und adventitia zu unterscheiden und die Schichten, die gewöhnlich als T. media aufgefasst werden, der T. adventitia zuzurechnen.

poplitea), weniger in den Venen der oberen Extremität, noch geringer in den grossen Venen der Bauchhöhle; sie fehlt endlich bei einer grossen Anzahl von Venen (den Venen der Pia und Dura mater, den Knochenvenen, Retinavenen, der V. cava superior, sowie den aus den Kapillaren hervorgehenden Venen). Hier finden sich nurmehr schräg und quer gestellte Bindegewebsbündel.

Die meist gut entwickelte Adventitia besteht aus gekreuzten Bindegewebsbündeln, elastischen Fasern und längs verlaufenden glatten Muskelfasern, die bei den Venen viel reicher entwickelt sind, als bei den Arterien. Einzelne Venen (Stamm der V. portar. und die V. renal.) besitzen eine fast vollkommene, ansehnliche Längsmuskelhaut. (Fig. 44.)

Die Venenklappen sind Bildungen der Intima, die an beiden Seiten von (an der dem Blutstrome zugekehrten Seite längsgestellten, an der der Venenwand zugekehrten Seite quergestellten) Epithelzellen überzogen werden. Unter den längsgestellten Zellen liegt ein dichtes elastisches Netzwerk, unter den quergestellten Zellen ein feinfaseriges Bindegewebe.

Kapillaren.

Die Kapillaren stellen — wenige Fälle, z. B. die Corpora cavernosa der Geschlechtsorgane, ausgenommen — die Verbindung zwischen Arterien und Venen her. Bei dem Uebergange der ersteren in die Kapillaren erfolgt eine allmähliche Vereinfachung der Gefässwand (Fig. 40 C) und zwar in der Weise, dass die Tunica media immer dünner und von weit auseinander stehenden Ringmuskelfasern gebildet wird, die schliesslich vollkommen verschwinden; auch die Tunica adventitia wird feiner; sie besteht aus einer dünnen Lage zellenhaltigen Bindegewebes, das schliesslich ebenfalls verschwindet, so dass zuletzt von der Gefässwand nichts mehr übrig bleibt, als die Intima, die, in ihren Schichten ebenfalls reduziert, einzig und allein von den platten, kernhaltigen Epithelzellen aufgebaut wird. Die Wandung der Kapillaren besteht somit nur aus einer einfachen Lage von Epithelzellen, deren Gestalt sich am Besten mit einer an jedem Ende zugespitzten Stahlfeder vergleichen lässt. Diese Zellen werden durch eine geringe Menge von Kittsubstanz an den Rändern mit einander verbunden.

Die Kapillaren theilen sich ohne Kaliberverminderung und bilden durch Anastomosen mit Nachbarkapillaren Netze, deren Maschenweite sehr wechselnd ist. Die engmaschigsten Netze finden sich in absondernden Organen, z. B. in Lunge und Leber; weitmaschige Netze kommen vor z. B. in Muskeln, serösen Häuten, in den Sinnesorganen. Umgekehrt verhält sich das Kaliber der Kapillaren; die weitesten Kapillaren finden sich in der Leber, die engsten Kapillaren in der Retina und in den Muskeln.

Neubildung von Kapillaren. Hier sollen nur die postembryonalen Entwicklungsvorgänge besprochen werden. Von der Wand einer schon fertigen Kapillare erhebt sich eine konische Protoplasmamasse, die mit breiter Basis der Kapillare aufsitzt und mit fein zulaufender Spitze frei endigt. Im weiteren Verlaufe der Entwicklung vereinigt sich diese Spitze mit einem anderen ihr entgegenkommenden Ausläufer, der auf gleiche Weise an einer

anderen Stelle der Kapillarwand entstanden ist. Diese anfangs solide Bildung wird von der Kapillarwand aus hohl und die Wände des so entstandenen Rohres differenzieren sich zu Epithelzellen. Die Entwicklung neuer Kapillaren vollzieht sich nach dieser Darstellung immer im Zusammenhange mit schon vorhandenen Kapillaren. In neuerer Zeit ist ein zweiter Bildungsmodus behauptet worden, demzufolge gänzlich isolirte Zellen (sog. „vasoformative“ Zellen)

Fig. 45.

Flächenbild eines Stückchens des Omentum majus eines 7 Tage alten Kaninchens, 210mal vergrößert. c Blutkapillaren, theilweise noch Blutkörperchen enthaltend. s Sprosse einer Kapillare in eine freie, solide Spitze auslaufend. i junge Kapillare, schon grösstentheils hohl, bei s' noch solid. k junge Kapillare des Bauchfell epithels. Technik Nr. 36, pag. 90.

zu einem Netzwerke zusammentreten, in ihrem Innern farbige, kernlose Blutkörperchen bilden und dann erst mit dem Blutgefässnetze sich verbinden. Es ist indessen die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass die vasoformativen Zellennetze sich rückbildende Blutgefässbezirke sind.

Alle mittleren und grossen Blutgefässe besitzen zur Ernährung ihrer Wand bestimmte kleine Blutgefässe, die *Vasa vasorum*, die fast ausschliesslich in der Adventitia verlaufen. (Fig. 41.) Die Intima ist stets gefässlos.

Alle Blutgefässe sind mit Nerven versehen, welche in der Tunica media der Arterien und Venen ein Geflecht markhaltiger Nervenfasern bilden. Hiervon entspringen marklose Fasern, welche die Gefässmuskeln versorgen. Die Kapillaren sind von marklosen Nervenfasern umspunnen.

Viele Blutgefässe sind von Lymphgefässen umspunnen, welche zuweilen so weit sind, dass sie vollkommen die Blutgefässe einschliessende Räume („adventitielle Lymphräume“) darstellen.

Die Steissdrüse, *Gland. coccygea*, ist eigentlich keine Drüse, sondern besteht aus Blutgefässen, deren Aeste durch halbkugelförmige Aussackungen charakterisirt sind, und aus Bindegewebe, das feine Bündel markhaltiger Nerven einschliesst. Einen ähnlichen Bau zeigt die Karotisdrüse („*Ganglion intercaroticum*“), die ausserdem anscheinliche Mengen von Nervenfasern und Ganglienzellen enthält.

Das Blut.

Das Blut ist ein leicht klebriger, roth gefärbter Saft, welcher aus einer Flüssigkeit, dem Blutplasma, und aus geformten Elementen: Blutzellen, Blutplättchen und Elementarkörnchen besteht. Es giebt zwei Arten von Blutzellen:

1. Die farbigen Blutzellen (farbige Blutkörperchen, Fig. 46) sind weiche, dehnbare, sehr elastische Gebilde und besitzen eine glatte, schlüpfrige Oberfläche. Sie haben beim Menschen und bei den Säugethieren die Gestalt meist platter kreisrunder Scheiben¹⁾, die auf jeder Fläche leicht ausgehöhlt sind und deshalb bikonkaven Linsen gleichen. Ausgenommen hiervon sind

Fig. 46.

Blutkörperchen 560mal vergrössert. A des Menschen. B des Frosches. 1–6. Scheibenförmige, farbige Blutkörperchen. 1. tiefe Einstellung. 2. Hohe Einstellung des Objektivs, 3. u. 4. von der Seite, 5. durch Verdunstung stechapfelförmig geworden, 6. nach Wasserzusatz, 7. kugeliges, farbiges Blutkörperchen, 8. farblose Blutkörperchen. 9. Blutplättchen. 10–13. Farbige Blutkörperchen des Frosches. 10. Ganz frisch, Kern wenig deutlich. 11. Einige Minuten später, Kern deutlich sichtbar, 12. von der Seite gesehen, 13. nach Wasserzusatz. 14. Lebendes, 15. todttes, farbloses Blutkörperchen. Technik Nr. 37–39, pag. 91.

Lama und Kameel, deren Blutkörperchen oval sind. Ihr Flächendurchmesser beträgt beim Menschen durchschnittlich $7,5 \mu$, ihr Dickendurchmesser $1,6 \mu$. Die farbigen Blutkörperchen unserer einheimischen Säugethiere sind alle kleiner; die grössten sind diejenigen des Hundes ($7,3 \mu$).

Die farbigen Blutkörperchen bestehen aus einem Stroma (Protoplasma), welches mit Blutfarbstoff, dem Haemoglobin, gefüllte Lücken enthält. Das Haemoglobin ver-

leiht den Blutkörperchen die gelbe oder gelblich grüne Farbe. Ein Kern, sowie eine eigentliche Zellenmembran fehlen. Die farbigen Blutkörperchen der Fische, Amphibien, Reptilien und Vögel unterscheiden sich von denen der Säugethiere durch ihre Gestalt, sie sind oval und bikonvex, durch ihre meist bedeutende Grösse (beim Frosch 22μ lang, 15μ breit), sowie durch das Vorhandensein eines runden oder ovalen Kernes; im Uebrigen zeigen sie die gleichen Eigenschaften wie diejenigen der Säugethiere.

2. Die weissen (farblosen) Blutzellen (Leukocyten) sind membranlose Zellen, welche aus einem körnigen, klebrigen Protoplasma und einem oder mehreren Kernen bestehen. Eine bestimmte Gestalt kann ihnen deshalb nicht zugeschrieben werden, weil sie während des Lebens in amoeboider Bewegung begriffen sind (s. pag. 35); im Zustande der Ruhe sind sie kugelig (Fig. 46), ihre Grösse schwankt zwischen 4 und 14μ . Die farblosen Blutkörperchen kommen auch im Lymphgefässsystem vor, woselbst sie „Lymph-

¹⁾ Ausserdem finden sich im menschlichen Blute noch kugelige, farbige Blutkörperchen, Fig. 46, A, 7.; sie sind kleiner (5μ) und nur in geringer Anzahl vorhanden.

und Chyluskörperchen“ genannt werden; auch ausserhalb des Gefässsystems werden sie gefunden, so im Knochenmark als „Markzellen“, ferner massenhaft im adenoiden Gewebe (s. pag. 53), zerstreut im fibrillären Bindegewebe, endlich zwischen Epithel- und Drüsenzellen, wohin sie vermöge ihrer amoeboiden Bewegungen gewandert sind; deshalb führen die Leukocyten auch den Namen „Wanderzellen“ (s. pag. 35 und pag. 51).

Was die Mengenverhältnisse sowie das Zahlenverhältniss zwischen farblosen und farbigen Blutkörperchen betrifft, so unterliegt die Bestimmung beider bedeutenden Schwierigkeiten, die Angaben können deshalb keine grossen Ansprüche auf Sicherheit erheben. Beim Menschen sind in einem Kubikmillimeter Blut etwa 5 Millionen farbiger Blutkörperchen enthalten. Die farblosen Blutkörperchen sind in viel geringerer Menge im Blute vorhanden; man rechnet ein farbloses Blutkörperchen auf 300—500 farbige.

Die Blutplättchen sind sehr vergängliche, farblose, runde oder ovale Scheiben von drei- bis viermal geringerem Durchmesser als die farbigen Blutzellen (Fig. 46, 9) und sind zuweilen in grosser Anzahl im Blute vorhanden. Es wird ihnen eine Hauptrolle bei der Gerinnung des Blutes zugeschrieben.

Die Elementarkörnchen sind grösstentheils Fettpartikelehen, welche durch den Chylus ins Blut übergeführt wurden. Sie lassen sich bei saugenden Thieren und bei Pflanzenfressern leicht nachweisen; dem vom gesunden Menschen entnommenen Blute fehlen sie.

Nach dem Tode (oder in veränderter Gefässwand) gerinnt das Blut durch Verbindung zweier im Plasma gelöst vorkommenden Substanzen, der fibrinoplastischen und der fibrinogenen Substanz. Das Produkt dieser Verbindung ist der Faserstoff (Fibrin). Das geronnene Blut sondert sich in zwei Theile, in den Blutkuchen (Placenta s. Cruor sanguinis) und in das Blutwasser (Serum.) Der Blutkuchen ist roth und besteht aus allen farbigen, den meisten farblosen Blutkörperchen und dem Faserstoffe, der sich mikroskopisch als ein Filz feiner Fasern erweist; die Fasern verhalten sich chemisch ähnlich den Fasern des leimgebenden Bindegewebes. Das über dem Blutkuchen sich sammelnde Blutwasser ist farblos und enthält einige farblose Blutkörperchen.

Der in den farbigen Blutkörperchen enthaltene Farbstoff, das Haemoglobin, besitzt die Eigenschaft, unter bestimmten Verhältnissen zu krystallisiren und zwar bei fast allen Wirbelthieren im rhombischen Systeme; die Gestalt der Krystalle ist bei den verschiedenen Thieren eine sehr verschiedene, beim Menschen eine hauptsächlich prismatische. Das Haemoglobin geht leicht in Zersetzung über. Eines dieser Zersetzungsprodukte ist das Haematin, welches weitere Umwandlungen zu Haematoidin und Haemin erfahren kann. Die Krystalle des Haematoidin, welche sich innerhalb des Körpers in alten Blutextravasaten, z. B. im Corpus luteum finden, sind rhombische Prismen von orangerother Farbe. Die Krystalle des Haemin sind, wenn gut

entwickelt, rhombische Täfelchen oder Bälkchen von mahagonibrauner Farbe; oft sind sie sehr unregelmässig gestaltet (Fig. 47, 1); sie sind in forensischer Beziehung von grosser Wichtigkeit (s. Technik Nr. 42).

Entwicklung der farbigen Blutkörperchen. Von der frühesten Zeit der embryonalen Entwicklung an durch das ganze Leben finden sich an

Fig. 47.

1. Haeminkristalle des Menschen, rechts Wetzsteinformen derselben. 2. Kochsalzkristalle. 3. Haematoidinkristalle des Menschen. 560mal vergr. Technik Nr. 42, pag. 92.

bestimmten Orten kernhaltige gefärbte Blutzellen, Haematoblasten (siehe „Knochenmark“). Ihre Menge schwankt und geht parallel mit der Energie des Blutbildungsprozesses. Aus ihnen gehen durch indirekte Theilung die farbigen Blutkörperchen hervor, die anfangs noch kernhaltig sind,

später aber ihren Kern verlieren. Als Ort der Blutbildung muss in embryonalen Perioden die Leber, später die Milz, beim Erwachsenen aber ausschliesslich das Knochenmark bezeichnet werden.

2. Lymphgefässsystem.

Lymphgefässe.

Die Wandung der stärkeren Lymphgefässe (von 0,2—0,8 mm an) setzt sich, wie die der Blutgefässe, aus drei Schichten zusammen. Die Intima besteht aus Epithelzellen und feinen elastischen Längsfasernetzen. Die Media wird durch quer verlaufende glatte Muskelfasern und wenige elastische Fasern gebildet. Die Adventitia besteht aus längs verlaufenden Bindegewebsbündeln, elastischen Fasern und gleichfalls längsgerichteten Bündeln glatter Muskelfasern. Die Wand der feineren Lymphgefässe und der Lymphkapillaren wird nur durch sehr zarte, geschlängelt konturirte Epithelzellen hergestellt. Die Lymphkapillaren sind weiter als die Blutkapillaren, häufig mit Einschnürungen und Ausbuchtungen besetzt und an den Theilungsstellen oft bedeutend verbreitert; das von ihnen gebildete Netzwerk ist unregelmässiger. Die Frage nach dem Ursprunge der Lymphgefässe ist noch nicht endgültig entschieden; während manche Autoren die Lymphkapillaren für allseitig geschlossen halten, sind nach der zweiten, weit verbreiteten Ansicht die Lymphgefässe peripheriwärts offen, indem sie mit dem im Stützgewebe befindlichen Saftkanalsystem¹⁾ (pag. 57) in direkter Verbindung stehen.

¹⁾ Die Saftkanälchen werden als „Lymphbahnen“ den mit zelligen Wandungen versehenen Lymphgefässen gegenübergestellt; andere Autoren setzen Lymphbahnen = Lymphgefässen + Saftkanalsystem.

Nach der ersten Meinung würde der durch die Blutkapillarenwand in die Gewebe übergetretene Gewebssaft (Parenchymsaft), soweit er nicht zur Ernährung der Gewebe verbraucht wird, durch Endosmose in die geschlossenen Lymphkapillaren eindringen, nach der zweiten Ansicht dagegen direkt von den Geweben aus durch die offenen Lymphgefässanfänge seinen Abfluss finden.

Von Wichtigkeit ist, dass die Lymphgefäße mit der Pleura- und Peritonealhöhle in offener Verbindung stehen und zwar durch zwischen den Epithelzellen der Pleura resp. des Peritoneum befindliche Oeffnungen, die Stomata, welche in der Pleurahöhle an den Interkostalräumen, in der Peritonealhöhle am Centrum tendineum des Zwerchfelles sich finden.

Die Lymphknoten.

Die Lymphknoten (schlechter „Lymphdrüsen“) sind makroskopische, in die Bahn der Lymphgefäße eingeschaltete Körper von meist rundlich-ovaler oder platter, bohnenförmiger Gestalt und sehr wechselnder Grösse. An der einen Seite haben sie meist eine narbige Einziehung, den Hilus, an welchem die abführenden Lymphgefäße austreten¹⁾. Ihr Bau wird verständlich, wenn wir von folgender Vorstellung ausgehen: An bestimmten Stellen theilen sich (3—6) Lymphgefäße mehrfach in mit einander anastomosirende Aeste, welche indessen sich bald wieder vereinen und zu ebenso viel oder weniger, meist engeren Lymphgefässen zusammenfliessen. So wird eine Art von Wundernetz²⁾ gebildet. Die sich theilenden Lymphgefäße heissen Vasa afferentia, die zusammenfliessenden Vasa efferentia. Zwischen den Maschen dieses Netzes liegen theils kugelige, theils langgestreckte Körper, die aus adenoidem Gewebe bestehen. Die kugeligen Körper, die Sekundärknötchen („Follikel“, „Ampullen“) nehmen die Peripherie, die gestreckten Körper, die Markstränge, das Centrum des Lymphknotens ein. Faseriges Bindegewebe, die Kapsel, umhüllt den Lymphknoten und schickt Ausläufer, Trabekel, ins Innere des Knotens (Fig. 48). Von den Trabekeln gehen feine Fortsetzungen in Form retikulären Bindegewebes aus, welche die Wandung der Lymphgefäße durchsetzend bis in die Sekundärknötchen und Markstränge eindringen und eine Stütze für die daselbst befindlichen zahlreichen Leukocyten bilden.

1) Die zuführenden Lymphgefäße dringen an verschiedenen Stellen in den Knoten ein.

2) Wundernetze sind zuerst bei Blutgefässen beschrieben worden. Man versteht darunter ein Gefässnetzwerk, welches den Verlauf eines Gefässstammes plötzlich unterbricht. Man findet sie sowohl an Arterien als auch an Venen: arterielle — venöse Wundernetze. Exquisite Beispiele von (arteriellen) Wundernetzen sind die Glomeruli der Niere (vergl. Fig. 146): ein Arterienstämmchen theilt sich in Zweige, die wiederum zu einem Stämmchen sich vereinen, welches dann in gewöhnlicher Weise sich weiter verästelt.

Der Lymphknoten besteht somit aus Rinden- (Kortikal-) substanz und Mark- (Medullar-) substanz, deren gegenseitige Mengenverhältnisse sehr wechseln. Die Rindensubstanz enthält die Sekundärknötchen, welche centralwärts direkt in die Markstränge übergehen (Fig. 48). Sekundärknötchen und Markstränge werden von den Fortsetzungen der eintretenden Lymphgefäße umgeben¹⁾. Diese hier sehr erweiterten Lymphgefäße heissen Lymphsinus; sie werden von retikulärem Bindegewebe durchzogen. Sekundärknötchen und Markstränge bestehen aus adenoidem Gewebe, d. i. aus retikulärem Bindegewebe, in dessen Maschen zahlreiche Leukocyten liegen,

Fig. 48.

Senkrechter Durchschnitt eines Lymphknotens einer 9 Tage alten Katze, 30mal vergrößert.; Technik Nr. 45, pag. 93.

In vielen Sekundärknötchen befindet sich ein heller, rundlicher Fleck, das Keimcentrum, dort findet man stets indirekte Kerntheilungsfiguren²⁾. Die Sekundärknötchen sind somit Bildungsstätten von Leukocyten, welche in die Lymphsinus und von da in die Vasa efferentia gelangen. Die Kapsel besteht aus faserigem Bindegewebe und glatten Muskelfasern, welche in den grossen Lymphknoten des Rindes zu grossen Zügen vereint sind. Die ebenso gebauten Trabekel schieben sich zwischen Sekundärknötchen und Markstränge, berühren dieselben aber nicht, sondern sind von ihnen durch die Lymphsinus getrennt. Die Wandung der Lymphsinus wird nur von einer einfachen Lage platter Zellen gebildet, welche sowohl der Oberfläche der Sekundärknötchen und Markstränge, wie auch der Oberfläche der Trabekel anliegen; auch das mit den Trabekeln zusammenhängende retikuläre Bindegewebe ist mit platten Zellen überzogen (vergl. pag. 53).

Der hier geschilderte Bau der Lymphknoten ist aber insofern schwierig zu erkennen, als mancherlei Komplikationen sich vorfinden. Diese Komplikationen bestehen darin, 1. dass benachbarte Sekundärknötchen oft miteinander verschmelzen, 2. dass die Markstränge miteinander zu einem groben

1) In das Innere der Sekundärknötchen dringen niemals Lymphgefäße.

2) Auch in den Marksträngen erfolgt eine Vermehrung der Zellen, jedoch in viel geringerem Grade als in dem Keimcentrum der Sekundärknötchen.

Netzwerke sich verbinden, 3. dass ebenso die Trabekel ein zusammenhängendes Netzwerk bilden, 4. dass das Netz der Markstränge und das der Trabekel ineinander greifen (Fig. 49), 5. dass die Lymphsinus mit Leukocyten gefüllt sind, welche erst durch besondere Methoden entfernt werden müssen. Auf diese Weise bilden Sekundärknötchen, Markstränge und die Leukocyten der

Fig. 49.

Aus einem senkrechten Schnitte eines Lymphknotens eines Rindes, 50mal vergr. Marksubstanz. In der oberen Hälfte sind die Trabekel und Markstränge der Länge, in der unteren Hälfte der Quere nach durchschnitten. Beide bilden ein zusammenhängendes Netzwerk. In den Lymphsinus sieht man die feinen Fasern des retikulären Bindegewebes, welches zum Theil noch Leukocyten enthält. Zeichnung bei abwechselnder Tubuseinstellung. Technik Nr. 46, pag. 93.

Lymphsinus eine weiche Substanz, die „Pulpa“ (Parenchym der Lymphknoten) genannt worden ist.

Die Blutgefässe der Lymphknoten treten theils an verschiedenen Stellen der Oberfläche, grösstentheils aber am Hilus ein. Die von der Knotenoberfläche eintretenden feinen Blutgefässe vertheilen sich in der Kapsel und in den grösseren Trabekeln, in deren Achse sie verlaufen. Die am Hilus eintretende grössere Arterie theilt sich in mehrere Aeste, die daselbst von reichlicher entwickeltem Bindegewebe umgeben sind. Die Aeste treten zum geringeren Theile in die Trabekel, zum grösseren Theile gelangen sie, die Lymphsinus durch-

setzend, in die Markstränge und von da in die Sekundärknötchen; an beiden Stellen lösen sich die Blutgefässe in ein wohlentwickeltes Kapillarnetz auf, welches die zur Bildung der Leukocyten nöthige Sauerstoffmenge liefert. Die Venen treten am Hilus aus.

Die Nerven der Lymphknoten sind spärliche, theils markhaltige, theils marklose Faserbündel, über deren Endigung nichts Näheres bekannt ist.

Die peripherischen Lymphknoten.

Das Leukocyten einschliessende retikuläre Bindegewebe ist nicht nur auf die Lymphknoten beschränkt; es findet sich auch in grosser Ausdehnung in vielen Schleimhäuten, und zwar in verschiedenen Entwicklungsgraden, bald als diffuse, bald als schärfer begrenzte Infiltration von Leukocyten. Diese Formationen werden nicht zum Lymphsystem gerechnet. Es giebt aber noch einen höheren Grad der Ausbildung, in welchem den Sekundärknötchen der Lymphknoten ganz ähnliche Knötchen („Follikel“) der Schleimhaut mit Keimcentrum bestehen. Diese hat man zum Lymphsystem gerechnet und peripherische Lymphknoten genannt. Sie sind in vielen Schleimhäuten entweder vereinzelt: Solitärknötchen („solitäre

Follikel¹⁾), oder in Gruppen: „Peyer'sche Haufen“, zu finden und liegen in stets einfacher Schicht in der Tunica propria (s. Verdauungsorgane) dicht unter dem Epithel. Verbreitung und Zahl der peripherischen Lymphknoten ist nicht nur bei den einzelnen Thierarten, sondern selbst bei einzelnen Individuen erheblichen Schwankungen unterworfen; da auch ihre Grösse bedeutend differirt und vielfache Uebergänge zu cirkumskripten und diffusen Infiltrationen bestehen, so ist es sehr wahrscheinlich, dass sie während des Lebens werden und vergehen, also nur temporär auftreten. Sie unterscheiden sich von den eigentlichen Lymphknoten vor Allem durch ihre minder innigen Beziehungen zu den Lymphgefässen, welche hier keine die Knötchen (Follikel) umgreifende Sinus bilden¹⁾). Ihre Beizählung zum Lymphgefässsystem scheint insofern eine berechnigte, als auch sie (in dem Keimcentrum) Brutstätten junger Leukocyten sind. Dieselben gelangen jedoch nur zum Theil in die Lymphgefässe; viele wandern vielmehr durch das Epithel auf die Schleimhautoberfläche.

Die Lymph.

Die Lymph ist eine farblose Flüssigkeit, in welcher die Leukocyten (s. „weisse Blutzellen“ pag. 80) und ausserdem noch Körnchen suspendirt sind. Die letzteren sind unmessbar klein, bestehen aus Fett und finden sich vorzugsweise in den Lymph (Chylus-)gefässen des Darmes; oft sind sie in kolossaler Menge vorhanden und sind dann die Ursache der weissen Farbe des Chylus. In anderen Lymphgefässen sind die Körnchen nur spärlich vorhanden. In den Lymphknoten findet man viele Leukocyten, deren Kern von so wenig Protoplasma umgeben ist, dass dessen Nachweis nur schwer zu liefern ist.

Milz.

Die Milz ist eine Blutgefässdrüse und besteht aus einer bindegewebigen Hülle, der Kapsel, und einer rothen, weichen, aus adenoidem Gewebe und Blutgefässen zusammengesetzten Masse, der Milzpulpa.

Die Kapsel ist fest mit dem sie überziehenden Bauchfelle verwachsen und besteht vorzugsweise aus derbfaserigem Bindegewebe und Netzen elastischer Fasern. Bei einigen Thieren (Hund, Katze, Schwein u. a.), nicht aber beim Menschen, finden sich daselbst auch glatte Muskelfasern. Von der Kapsel ziehen zahlreiche blatt- oder strangförmige Fortsetzungen, die Milzbalken, in das Innere der Milz und bilden dort ein zusammenhängendes Netzwerk, in dessen Maschen die Milzpulpa gelegen ist. Auch die Balken enthalten bei Thieren ausser Bindegewebe glatte Muskelfasern. Am Hilus der Milz giebt die Kapsel an die Blutgefässe besondere Hüllen („adventitielle

¹⁾ Ausgenommen ist nur das Kaninchen, in dessen Peyerschen Haufen Sinus vorkommen; die Solitärknötchen dieses Thieres entbehren dagegen ebenfalls der Sinus.

Scheiden“) ab, welche mit der Adventitia verschmelzen und jene auf weite Strecken begleiten. Diese Hüllen sind an den Arterien der Sitz zahlreicher

Fig. 50.

Aus einem Querschnitte der menschlichen Milz, 10mal vergrössert. Malpighi'sche Körperchen gut entwickelt, alle seitlich von Arterien durchbohrt; an dem rechten Aste der Arterie ist der Beleg der Leukocyten ein kontinuierlicher. Technik Nr. 48, pag. 94.

Leukocyten, die entweder als kontinuierlicher Beleg den ganzen Verlauf der Arterien begleiten (z. B. beim Meerschweinchen) oder nur auf einzelne Stellen beschränkt sind. In letzterem Falle bilden die Leukocyten kugelige Ballen von 0,2—0,7 mm Grösse, die sogenannten Malpighi'schen Körperchen (Mensch, Katze etc.) Zwischen beiden Formen giebt es viele Uebergänge.

Die Malpighi'schen Körperchen sitzen mit Vorliebe in den Astwinkeln der kleinen Arterien und zwar so, dass die Arterie entweder die Mitte oder den Rand des Körperchens durchbohrt. Hinsichtlich ihres feineren Baues stimmen die Körperchen vollkommen mit den Sekundärknötchen der Lymphknoten überein; sie enthalten zuweilen sogar Keimcentren. Auch die Malpighi'schen Körperchen gehören zu den temporären Gebilden;

fortwährend bilden sich solche zurück und entwickeln sich neue.

Die Milzpulpa bildet ein Netzwerk von Strängen, welche, ähnlich

Fig. 51.

Elemente der menschlichen Milz, 50mal vergr. 1. Farblose Zellen. 2. Epithelzellen. 3. Farbige Blutkörperchen 4. Körnchenhaltige Zellen; die obere schliesst auch ein farbiges Blutkörperchen b in sich. Technik Nr. 47, pag. 93.

Fig. 52.

Retikuläres Bindegewebe der menschlichen Milz, 500mal vergr. Rand eines Schüttelpräparates gezeichnet. Technik Nr. 49, pag. 94.

Fig. 53.

Drei Korntheilungsbilder aus einem Schnitte durch die Milz eines Hundes, 500mal vergrössert. Die Fäden sind bei dieser Vergrösserung nicht zu sehen. Technik Nr. 50, pag. 91.

denen der Lymphknoten, zwischen den Maschen des Milzbalkennetzes gelegen sind. Die Stränge hängen zuweilen mit den Malpighi'schen Körperchen zu-

sammen. Die Milzpulpa besteht aus sehr feinem retikulärem Bindegewebe (pag. 52) und zahlreichen zelligen Elementen. Letztere sind theilweise Leuko- cyten, theils etwas grössere mehrkernige Zellen, ferner farbige Blutkörperchen enthaltende Zellen und freie farbige Blutkörperchen; endlich findet sich da- selbst ein körniges Pigment.

Blutgefässe. Die Arterien der Milz geben Aeste an die Balken und die Pulpastränge ab und speisen das dichte Kapillarnetz der Malpighi'schen Körperchen. Die Venen sammeln sich aus einem weiten Netze von Kapillaren („kapillare Venen“), welches zwischen Balken und Pulpasträngen gelegen ist. Die grösseren Venen laufen neben den Arterien. Die Art und Weise des Zusammenhanges der Arterien und Venen ist noch nicht end- gültig festgestellt. Die Arterien gehen in langgestreckte Kapillaren über,

Fig. 54.

Aus einem Querschnitte einer Katzenmilz, 50mal vergrössert. Im Malpighi'schen Körperchen ist rechts des Querschnitts der Arterie sichtbar. Die dunklen Blutgefässe sind meist kapillare Venen, welche zwischen Pulpasträngen und Milzbalken liegen. Technik Nr. 48, pag. 94.

welche nicht mit einander anastomosiren. Diese (arteriellen) Kapillaren hängen nach der Meinung der Einen direkt mit den kapillaren Venen zusammen; nach dieser Ansicht würde die Blutbahn der Milz allseitig geschlossen sein. Nach der Meinung anderer Autoren gehen die arteriellen Kapillaren in Räume ohne eigene Wandung, in „intermediäre Lakunen“ über, welchen sich siebförmig durchbrochene Venen anschliessen. Letztere vermitteln den Zu- sammenhang mit geschlossene Wandung besitzenden Venen.

Die Lymphgefässe sind an der Oberfläche der Milz bei Thieren reich, beim Menschen dagegen nur spärlich entwickelt. Die tiefen im Innern der Milz verlaufenden Lymphgefässe sind ebenfalls nur spärlich vorhanden und in ihrem genaueren Verhalten noch nicht aufgeklärt.

Die Nerven bestehen zumeist aus marklosen Fasern, welche für die Blutgefässe bestimmt zu sein scheinen.

TECHNIK.

Nr. 32. Herz und grössere Blutgefässe. Man schneide einen Papillarmuskel aus einem menschlichen Herzen, ein Stück der Aorta von 2 cm Seite, ein 1—2 cm langes Stück der Arteria brachialis mitsammt Venen und umgebendem Bindegewebe und 1 cm langes Stück der Vena renalis aus und hänge die Theile an einem Faden in einem Glase mit ca. 40 cem absolutem Alkohol auf. Nach 24—48 Stunden sind sämtliche Objekte schnittfähig. Man klemme sie in Leber ein (Arterie und Vene können zusammen eingeklemmt werden und leiden selbst durch starke Kompression keinen Schaden) und fertige feine Querschnitte an, die man mit Böhmer'schem Haematoxylin 2—5 Min. lang färbt (pag. 17). Einschluss in Damarfirniss (pag. 23) (Fig. 39, 41, 42, 44). Die elastischen Fasern bleiben ungefärbt, können jedoch oft erst mit starken Vergrösserungen deutlich erkannt werden.

Querschnitte geben über den Verlauf der Adventitiaelemente ungenügenden Aufschluss. Oft sieht es aus, als ob sämtliche Adventitiaelemente sirkulär angeordnet seien¹⁾. Die wahre Anordnung kann erst mit Zuhilfenahme von Längsschnitten, welche auch die Muskelfasern der Adventitia deutlich zeigen, erkannt werden.

Nr. 33. Kleine Blutgefässe und Kapillaren. Man ziehe von einem menschlichen Gehirn an der Basis langsam Stückchen Pia von 1—3 cm Seite ab (dabei werden die senkrecht in das Gehirn eindringenden feinen Blutgefässe mit ausgezogen), befreie sie durch Schütteln in Müller'scher Flüssigkeit von den anhängenden Gehirnmassen und lege sie in 50 cem Müller'sche Flüssigkeit auf 3—10 Tage; dann bringe man die Stückchen auf 1—3 Stunden in Wasser (in fließendes 1 Stunde) und härte sie endlich in ca. 40 cem allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14). Betrachtet man ein solches Stückchen in einer Uhrschale auf schwarzem Grunde, so sieht man die feinen Gefässchen isolirt. a) Mit einer feinen Scheere werden kleine Gefässbäumchen abgeschnitten, 2—5 Min. in Böhmer'schem Haematoxylin gefärbt (pag. 17) und in Damarfirniss (pag. 23) eingeschlossen. Fig. 40. b) Von den grösseren Stämmchen der Hirngefässe schneide man ein ca. 5 mm langes Stückchen der Länge nach auf, färbe es in Böhmer'schem Haematoxylin und lege es so auf den Objektträger, dass die Adventitiaseite auf dem Glase aufliegt. Konserviren in Damarfirniss. Man kann durch wechselnde Einstellung des Tubus sehr schön die drei Schichten und deren Verlaufsrichtung sehen.

Kapillaren findet man auch bei der Untersuchung frischen Gehirns. Man erkennt sie an den parallel verlaufenden Konturen und den ovalen Epithelkernen; ferner auch an anderen Präparaten, w. z. B. an Nr. 8 (pag. 59).

Nr. 34. Gefäss epithel. Man tödte ein Kaninehen durch Halsabschneiden, öffne mit der Scheere den Bauch durch einen Kreuzschnitt und schiebe unter das Mesenterium, ohne dasselbe mit dem Finger viel zu berühren, einen Korkrahmen von ca. 2 cm Seite, spanne dasselbe mit einigen Igelstacheln glatt auf, schneide es rings um den Rahmen ab und lege das aufgespannte Stück in 20—30 cem der 1%igen Silberlösung (pag. 20). Nach ca. 30 Sekunden ist eine milchige Trübung der Lösung erfolgt; nun

¹⁾ Ein Theil derselben, z. B. die innersten Abschnitte der elastischen Haut der Adventitia, verläuft in der That sirkulär.

nehme man den Rahmen heraus, spüle die aufgespannte Haut mit destillirtem Wasser vorsichtig ab, und setze das Ganze in einer weissen Schale mit ca. 100 ccm dest. Wasser dem direkten Sonnenlichte aus. Nach wenigen Minuten schon ist die Bräunung erfolgt. Nun wird das Ganze in ca. 50 ccm 70%igen Alkohol übertragen (die Haut muss in den Alkohol tauchen); nach einer halben Stunde schneide man mit einer Scheere Stücke von 5—10 mm Seite aus, und konservire in Damarfirniss (pag. 23). Hat man kein Sonnenlicht, so wird das aus der Silberlösung genommene Präparat abgespült und ca. 20 Stunden in ca. 30 ccm 70%igen Alkohol, dann in ebensoviel 90%igen Alkohol gebracht und in diesem beim ersten Sonnenblicke dem Lichte ausgesetzt. Man vergesse nicht, dass man keine Schnitte, sondern wie in Nr. 33, das ganze Gefässe vor sich hat, so dass nur die richtige Einstellung auf die Fläche des Gefässes ein Bild wie Fig. 42 ergibt.

Nr. 35. Elastische gefensterter Membranen s. Technik Nr. 12. pag. 35.

Nr. 36. Neubildung von Kapillaren. Man tödte ein 7 Tage altes Kaninchen durch Chloroform, spanne es mit Nadeln auf (pag. 10), öffne durch einen Kreuzschnitt die Bauchhöhle, nehme rasch Milz, Magen und das daranhängende grosse Netz heraus und lege diese Theile in ca. 80 ccm gesättigte, wässrige Pikrinsäurelösung (pag. 5). Hier breitet sich das sonst schwer abzulösende grosse Netz leicht aus. Nach 1 Stunde schneide man nun dasselbe ab, übertrage es in 60 ccm destillirtes Wasser und theile es mit der Scheere in ca. 1 qcm grosse Stücke. Ein solches Stück wird auf einen trockenen Objektträger gebracht (das Wasser durch Fliesspapier abgezogen), und dann mit Nadeln möglichst glatt ausgebreitet, was um so leichter gelingt, je weniger Flüssigkeit dem Präparate anhängt. Dann bringe man 1—2 Tropfen Böhmer'sches Haematoxylin auf das Präparat. Nach 1—5 Minuten lasse man das Haematoxylin ablaufen und lege den Objektträger mit dem Präparate in eine flache Schale mit destillirtem Wasser; das Präparat wird sich bald vom Objektträger abheben, bleibt aber glatt und wird nun nach 5 Minuten mit dem Spatel in ein Uherschälchen voll Eosin (s. pag. 18) übertragen, wo es 3 Minuten verbleibt. Dann wird das Präparat in destillirtem Wasser eine Minute lang ausgewaschen und auf den Objektträger gebracht; das Wasser wird wieder mit Filtrirpapier abgesogen, etwaige Falten mit Nadeln ausgeglichen und endlich ein Deckglas, an dessen Unterseite ein Tropfen verdünntes Glycerin angehängt ist, aufgesetzt. Man kann statt Glycerineinschluss auch Damarfirniss (d. h. Alkohol abs., Bergamottöl, Firniss) nehmen, doch gehen feinere Details leicht verloren. Die rothen Blutkörperchen sind durch Eosin glänzend roth gefärbt. (Fig. 45.)

Nr. 37. Farbige Blutkörperchen des Menschen. Man reinige einen Objektträger und ein kleines Deckglas sorgfältig (zuletzt mit Alkohol). Dann steche man sich mit einer gereinigten Nadel in die Seite der Fingerspitze; der zuerst hervortretende Blutstropfen wird mit einem Tuche abgewischt, der zweite Tropfen durch leichtes Aufdrücken des Deckglases aufgefangen, das Deckglas selbst ohne weiteren Zusatz rasch auf den Objektträger gelegt und mit heissem Paraffin umrandet (pag. 26). Man erblickt bei starker Vergrösserung oft viele mit den Flächen an einander geklebte rothe Blutkörperchen, „Geldrollenformen“ (Fig. 46, 4), sowie isolirte farbige und farblose Blutkörperchen. Die zackigen Ränder mancher Blutkörperchen

sind durch Verdunstung entstanden. Setzt man nach Abkratzen des Paraffinrandes an der einen Seite einen Tropfen Wasser an den Rand des Deckglases, so tritt alsbald eine Entfärbung der Blutkörperchen ein, während das Wasser gelblich wird¹⁾; dabei werden die Blutkörperchen kugelförmig, erscheinen nur mehr als blasser Kreise, die schliesslich ganz verschwinden. Es empfiehlt sich, die Entfärbung an einem Blutkörperchen zu studiren.

Dauerpräparate lassen sich herstellen, wenn man das mit dem Deckglase aufgefangene Blut an der Luft trocknen lässt und dann ohne Zusatz auf einen Objektträger festkittet (pag. 22). Ausser vielen verunstalteten Körperchen wird man an Stellen, wo die Blutkörperchen einzeln liegen, auch gut erhaltene Formen erblicken.

Nr. 38. Die Blutplättchen erhält man, indem man vor dem Stiche in den Finger auf diesen einen Tropfen einer **filtrirten** Mischung von ca. 5 Tropfen wässrigem Methylviolett (pag. 8) mit ca. 5 cem Kochsalzlösung (pag. 4) bringt und durch den Tropfen in den Finger sticht. Das heraustretende Blut mischt sich mit dem Methylviolett, ein Tropfen davon wird mit der Deckglasunterfläche aufgefangen und bei starker Vergrösserung untersucht. Die Plättchen sind intensiv blau gefärbt, von eigenthümlichem Glanze, scheibenförmig (Fig. 46) und nicht zu verwechseln mit den gleichfalls gefärbten weissen Blutkörperchen. Ihre Menge ist individuell sehr verschieden, im Blute des Einen sind sie in grosser Menge, im Blute des Andern nur ganz vereinzelt zu finden. Man hüte sich vor Verwechslungen mit körnigen Verunreinigungen, die auch in der filtrirten Farblösung vorkommen.

Nr. 39. Farbige Blutkörperchen von Thieren (Frosch) sind dem frisch getödteten Thiere (pag. 9) zu entnehmen und in gleicher Weise zu behandeln wie Nr. 37.

Nr. 40. Für forensische Zwecke, in denen es sich ja meistens um Untersuchung schon eingetrockneten Blutes handelt, weiche man kleine Partikelchen in 35 %iger Kalilauge auf dem Objektträger auf; blutbefleckte Leinwandstückchen zerpulpe man in einem Tropfen Kalilauge. Obwohl die farbigen Blutkörperchen unserer einheimischen Säugethiere kleiner sind, als die des Menschen, so ist es doch unmöglich, aus der Grösse der Blutkörperchen die Frage zu entscheiden, ob das Blut vom Menschen oder vom Säugethiere stamme. Leicht ist es dagegen, die ovalen Blutkörperchen der anderen Wirbelthiere von den scheibenförmigen der Säuger zu unterscheiden.

Nr. 41. Farblose Blutkörperchen, Leukocyten in Bewegung. Vorbereitung: Man reinige mit Spiritus sorgfältig einen Objektträger und ein Deckglas. Man fasse einen Frosch an den Hinterbeinen, trockne die untere Rückengegend mit einem Tuche etwas ab und mache mit einer feinen Scheere einen ca. 1 cm langen Einschnitt parallel der Wirbelsäule, dicht neben derselben. Nun führt man eine Pipette in die kleine Wunde (Spitze der Pipette kopfwärts gerichtet) und saugt die Spitze voll. Ein kleiner Tropfen genügt schon; er wird auf den Objektträger geblasen, rasch mit dem Deckglase bedeckt und dieses mit heissem Paraffin (pag. 26) umrandet.

¹⁾ In Fig. 46, 6 ist die gelbliche Umgebung der blassen Blutkörperchen etwas zu dunkel dargestellt.

Ein solches Präparat zeigt farbige und farblose Blutkörperchen; anfangs sind die Kerne der ersteren undeutlich. Die Kerne der lebenden farblosen Blutkörperchen sind überhaupt nicht zu sehen. Zum Studium der Bewegung wähle man solche Leukocyten, deren Protoplasma theilweise körnig ist und die nicht rund sind. Die Bewegungen folgen langsam; man kann sich am besten davon überzeugen, wenn man in Intervallen von 1 bis 2 Minuten kleine Skizzen eines und desselben Leukocyten verfertigt. Starke Vergrößerung (Fig. 4).

Nr. 42. Blutkrystalle. a) die Herstellung der Haeminkrystalle ist leicht. Man schneide ein Läppchen (von ca. 3 mm Seite) einer blutgetränkten, trockenen Leinwand aus und bringe es mit einem höchstens stecknadelkopfgrossen Stückchen Kochsalz auf einen reinen Objektträger. Dann gebe man einen grossen Tropfen Eisessig hinzu und stosse mit einem stumpfen Glasstabe Salz und Leinwand so lange, bis der Eisessig sich bräunlich färbt. Das muss rasch geschehen, da sonst der Eisessig verdunstet. Dann erhitze man den Objektträger über der Flamme bis zu einmaligem Aufkochen der Flüssigkeit. (Man sieht dies am leichtesten in der nächsten Umgebung des Läppchens.) Nun wird das Läppchen weggenommen und die trockenen braunen Stellen auf dem Objektträger mit starker Vergrößerung (von 240 mal an) untersucht. Man sieht zuweilen schon ohne Deckglas, ohne Konservierungsflüssigkeit die braunen Krystalle (Fig. 47, 1) neben zahlreichen Fragmenten von weissen Kochsalzkrystallen. Zum Konserviren bedecke man den Objektträger direkt mit einem grossen Tropfen Damarfirniss und einem Deckglase. Form und Grösse der Haeminkrystalle sind sehr verschieden. Man erhält von demselben Blut gut ausgebildete Krystalle, theils einzeln, theils kreuzweise übereinanderliegend, theils zu Sternen vereint (Fig. 47), neben wetzsteinähnlichen Formen und kleinsten, kaum die Krystallform zeigenden Partikelchen. Der Nachweis der Haeminkrystalle ist in forensischer Hinsicht von grosser Wichtigkeit. So leicht es oft ist, aus grösseren Flecken an Kleidungsstücken die Krystalle herzustellen, so schwierig ist es, von kleinen Flecken, besonders an rostigem Eisen, den Nachweis zu liefern, dass sie von Blut stammen. Die bei solchen Untersuchungen zu verwendenden Instrumente und Reagentien müssen absolut rein sein.

b) Haematoidinkrystalle findet man beim Zerzupfen alter Blutextravasate, die schon makroskopisch durch ihre rostbraune Farbe kenntlich sind (z. B. in apoplektischen Cysten, im Corpus luteum).

c) Haemoglobinkrystalle. Ein der eigenen Fingerspitze entnommener Tropfen Blut (Nr. 37) wird auf einen reinen Objektträger gebracht und mit der Nadel umgerührt, bis das Blut lackfarben wird, dann wird ein Deckgläschen aufgelegt und dieses umrandet (pag. 26). Nach einiger Zeit, oft erst nach Stunden bilden sich die Krystalle.

Nr. 43. Lymphgefässe. Zum Studium der Wandung grösserer Lymphgefässe wähle man die in die Inguinaldrüsen einmündenden Lymphgefässe, die gross genug sind, um mit Messer und Pincette herauspräparirt zu werden. Behandlung wie grössere Blutgefässe Nr. 32 oder Nr. 33 b.

Nr. 44. Bezüglich der Darstellung feiner Lymphgefässe, ihres Verlaufes und ihrer Anordnung bedient man sich oft der Injektion durch Einstich, d. h. man stösst die Nadel einer mit Berlinerblau gefüllten Pravaz'schen Spritze in das betreffende Gewebe und injizirt; eine rohe Methode,

deren Resultate sehr zweifelhaften Werth besitzen. Wenn es auch hie und da gelingt, wirkliche Lymphgefäße dadurch zu füllen, wird in vielen anderen Fällen die Injektionsmasse mit dieser Methode einfach gewaltsam zwischen die Spalten des Bindegewebes getrieben. Daraus ergibt sich von selbst, welche Beurtheilung die so dargestellten „Lymphräume“ und „Lymphgefäßwurzeln“ verdienen.

Nr. 45 Zu Uebersichtsbildern der Lymphknoten sind die im Mesenterium gelegenen Lymphknoten junger Katzen am geeignetsten. Man fixire und härte dieselben in ca. 30 cm absolutem Alkohol; nach drei Tagen lassen sich leicht feine Schnitte anfertigen, die so gelegt sein müssen, dass sie den makroskopisch an einer Einenkung leicht kenntlichen Hilus treffen. Längsgerichtete, beide Pole des Knotens treffende Schnitte sind die besten, doch sind auch Querschnitte brauchbar. 6—8 Schnitte werden in Böhmer'schem Haematoxylin (2—3 Min.), dann in Eosin (höchstens 1 Min.) gefärbt (pag. 18), dann in ein zur Hälfte mit destillirtem Wasser gefülltes Reagenzglaschen gebracht und 3—5 Minuten lang geschüttelt. Giesst man die geschüttelten Schnitte in eine flache Schale, so kann man schon makroskopisch Rinde und Mark unterscheiden; erstere ist gleichmässig blau, letzteres ist gefleckt. Konserviren in Damarfirniss (pag. 23); bei schwachen Vergrößerungen sieht man an günstigen Stellen Bilder ähnlich der Fig. 48. Die Trabekel sind nur wenig entwickelt. Man verwechsle nicht die den Knoten aufsitzenden Reste von Fett mit retikulärem Gewebe. Starke Vergrößerungen bieten keinerlei Vortheil; es verschwinden nur die scharfen Konturen, das Bild verliert an Deutlichkeit.

Nr. 46. Lymphknoten älterer Thiere und des Menschen sind schwer verständlich, da die ganze Rinde in eine zusammenhängende Masse, in die unregelmässig Keimcentra eingestreut sind, verwandelt ist. Durch Schütteln kommen die Lymphsinus der Follikel nur undeutlich zum Vorschein, die Keimcentra fallen gern aus und erscheinen, makroskopisch schon erkennbar, als runde Lücken. Dagegen eignen sich zur Darstellung des Netzes der Markstränge und Trabekel sehr gut die mesenterialen Lymphknoten des Rindes. Man legt 2 cm lange Stücke derselben in 200 cm konzentrirte wässrige Pikrinsäurelösung und versuche nach 24 Stunden mit scharfem, mit Wasser benetztem Messer feine Schnitte anzufertigen. Das gelingt freilich nicht so gut wie nach Alkoholfixirung, allein selbst etwas dickere Schnitte sind noch brauchbar. Die Schnitte werden auf 1 Stunde in 100 cm öfter zu wechselndes destill. Wasser gebracht, dann mit Böhmer'schem Haematoxylin und Eosin gefärbt und geschüttelt (s. Nr. 45). Einschluss in Damarfirniss (pag. 23). Die Balken sind roth, die Markstränge blau; bei schwachen Vergrößerungen sieht man Bilder, wie Fig. 49, bei starken Vergrößerungen sehr schön das retikuläre Bindegewebe der Lymphsinus; die in dessen Maschen früher befindlichen Leukocyten sind durch die Pikrinsäurebehandlung gelockert und durch das Schütteln meist entfernt worden.

Nr. 47. Elemente der Milz. Man durchschneide eine frische Milz, streiche mit schräg aufgesetztem Skalpell über die Schnittfläche und untersuche die der Skalpellklinge anhaftende rothe Masse in einem Tropfen Kochsalzlösung. Starke Vergrößerung! Man findet (besonders bei Thieren) oft nur rothe und weisse Blutkörperchen, letztere enthalten zum Theile kleine Körnchen. Bei menschlichen Milzen sind neben zahlreichen, in ihrer Gestalt

veränderten farbigen Blutkörperchen (Fig. 51, 3) stets die früher sog. Milzfaser, d. s. Epithelzellen der Blutgefäße (Fig. 51, 2) zu finden. Blutkörperchen haltige Zellen (Fig. 51, 4) und mehrkernige Zellen sucht man auch in vielen menschlichen Milzen oft vergebens.

Nr. 48. Milz. Man fixire die ganze Milz, ohne sie anzuschneiden, in Müller'scher Flüssigkeit. (Bei menschlicher Milz 1 Liter, bei Katzenmilz 200—300 ccm.) Nach 2 (bei Thieren) bis 5 (beim Menschen) Wochen wasche man die Milz 1—2 Stunden in womöglich fliessendem Wasser, schneide Stücke von ca. 2 cm Seite aus und härte sie in ca. 60 ccm allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14). Man sieht auf der Schnittfläche die Malpighi'schen Körperchen schon mit unbewaffnetem Auge. Nicht zu feine Schnitte färbe man mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17) und konservire sie in Damarfirniss (pag. 23). Will man die Balken färben, so lege man die mit Haematoxylin gefärbten Schnitte $\frac{1}{2}$ Minute¹⁾ in Eosin (pag. 18). Bei gelungenen Präparaten erscheinen die Pulpastränge und die Malpighi'schen Körperchen blau, die Balken rosa, die mit Blutkörperchen strotzend gefüllten Gefäße braun. Möglichst schwache Vergrösserungen liefern die besten Bilder (Fig. 50), bei stärkeren Vergrösserungen sind die so scharf gewesenen Konturen oft undeutlich.

Nr. 49. Zur Darstellung des retikulären Bindegewebes der Milz schüttele man einen nach Nr. 48 fixirten und mit Böhmer'schem Haematoxylin und Eosin gefärbten feinen Schnitt ca. 5 Minuten lang in einem Reagenzglaschen, das zur Hälfte mit destillirtem Wasser gefüllt ist. Glycerineinschluss. Die Leukocyten fallen nur schwer heraus; man findet nur an den Rändern des Präparates kleine Stückchen des engmaschigen Netzwerkes (Fig. 52).

Nr. 50. Kerntheilungsbilder in Milz und Lymphknoten. Zu diesem Zwecke müssen Stückchen (von 5—10 mm Seite) von Milz und Lymphknoten lebenswarm in Chromosmium-Essigsäure fixirt (pag. 14), in Alkohol gehärtet und die feinen Schnitte mit Saffranin gefärbt werden (pag. 19). Einschluss in Damarfirniss (pag. 23). Die Kerntheilungsbilder der Leukocyten der Säugethiere sind aber so klein, dass sie nur von ganz Geübten mit den üblichen starken Vergrösserungen (560mal) gefunden werden. Sie sind durch ihre tiefrothe Farbe zu erkennen (Fig. 53).

II. Organe des Skeletsystemes.

Das Skeletsystem besteht hauptsächlich aus einer grossen Anzahl fester Körper, den Knochen, welche durch besondere Verbindungsmittel zu einem Ganzen, dem Skelet, vereint werden.

In embryonaler Zeit besteht das Skelet grösstentheils aus Knorpelgewebe, welches erst im weiteren Verlaufe der Entwicklung durch Knochengewebe verdrängt wird und bis auf wenige Reste verschwindet; solche Reste sind die knorpeligen Rippen und die Gelenkknorpel, welche die Verbindungsflächen vieler Knochen überkleiden. Knorpelige Skelettheile finden sich ferner an den Luftwegen und an den Sinnesorganen.

¹⁾ Färbt man länger, so werden die Blutkörperchen ziegelroth, die Balken dunkelroth; dadurch geht die leichte Unterscheidbarkeit verloren.

Die Knochen.

Durchsägt man einen frischen Röhrenknochen, so sieht man ohne Weiteres, dass dessen Gefüge nicht allenthalben das gleiche ist, das Knochengewebe tritt vielmehr hier in zwei Formen auf; die eine bildet die Hauptmasse der Peripherie und stellt eine sehr feste, harte, anscheinend gleichartige Substanz dar; wir nennen diese „*Substantia compacta*“. Gegen die axiale Höhle des Knochens finden wir dagegen feine Knochenplättchen und -bälkchen, die unter den verschiedensten Richtungen zusammenstossend ein unregelmässiges Maschenwerk bilden; diese Form des Knochengewebes heisst *Substantia spongiosa*. Die Maschen der *Substantia spongiosa*

Fig. 55.

Stück eines Längsschnittes durch einen Metakarpusknochen des Menschen. 30 mal vergrössert. Im Präparate sind in den Havers'schen Kanälchen Fettropfen zu sehen. Bei X münden die Havers'schen Kanäle auf die äussere, bei X X auf die innere Oberfläche des Knochens. Technik Nr. 53, pag. 108.

sowie die axiale Höhle des Knochens sind mit einer weichen Masse, dem Knochenmarke, ausgefüllt; die Oberfläche des Knochens wird von einer faserigen Haut, dem Periost, überzogen. Das Verhältniss zwischen kompakter und spongiöser Substanz ist etwas anderes bei kurzen Knochen, indem dieselben vorwiegend aus spongiöser Substanz bestehen und die kompakte Substanz nur auf eine schmale Zone an der Peripherie beschränkt ist. Platte Knochen haben bald dickere, bald dünnere Rinden kompakter Substanz, während das Innere von spongiöser Substanz erfüllt

wird. Die Epiphysen der Röhrenknochen verhalten sich in dieser Hinsicht wie kurze Knochen, bestehen also vorwiegend aus spongiöser Substanz.

Die *Substantia spongiosa* besteht nur aus Knochengewebe (pag. 55), die *Substantia compacta* enthält dagegen ausser den bekannten Knochenkanälchen und -höhlen ein zweites System gröberer, 22 bis 110 μ weiter Kanäle, welche sich ab und zu dichotomisch theilen und ein weitmaschiges Netzwerk bilden. Diese gröberen Kanäle enthalten die Blutgefässe und heissen die Havers'schen Kanäle. Ihre Verlaufsrichtung ist in den Röhrenknochen, in den Rippen, im Schlüsselbeine und im Unterkiefer eine der Längsachse des Knochens parallele; in kurzen Knochen wiegt

eine Richtung vor, z. B. bei Wirbelkörpern die senkrechte; in platten Knochen endlich verlaufen die Havers'schen Kanäle der Oberfläche der Knochen gleich, nicht selten in Linien, die von einem Punkte sternförmig ausstrahlen, z. B. am Tuber parietale. Die Havers'schen Kanäle münden an der äusseren (Fig. 55 $\times$), wie inneren (Fig. 55 $\times\times$), gegen die Substantia spongiosa gekehrten Fläche frei aus. Die Grundsubstanz des kompakten Knochengewebes ist zu Lamellen geschichtet, d. h. die Knochenfibrillen (pag. 56) sind zu Bündeln vereint und diese bilden, indem sie neben einander gelegen sind, dünne Platten oder Lamellen. Nach dem Verlaufe derselben lassen sich drei Systeme (Fig. 56) unterscheiden: ein System ringförmig um die Havers'schen Kanäle verlaufender Lamellen, sie erscheinen an Querschnitten als eine Anzahl (8—15) konzentrisch um

Fig. 56.

Stück eines Querschnittes eines Metakarpusknochens des Menschen 50mal vergrössert. In den Havers'schen Kanälen findet sich noch zum Theile Mark (Fettzellen). *h* Havers'sche Räume (pag. 107). Technik Nr. 53, pag. 108.

den Havers'schen Kanal gelegter Ringe. Man nennt diese Lamellen die Havers'schen oder Spezial-Lamellen. Die Durchschnitte der Havers'schen Lamellensysteme stossen zum Theil aneinander, zum Theil aber werden sie von in anderer Richtung geschichteten Knochenlamellen auseinander gehalten. Wir nennen diese mehr unregelmässig zwischen den Havers'schen Lamellensystemen verlaufenden Lamellen die interstitiellen oder Schalt-Lamellen; sie

hängen mit einem dritten oberflächlichen Lamellensysteme zusammen, das der äusseren Oberfläche des Knochens gleich verläuft: das ist das System der äusseren Grundlamellen; an der inneren Oberfläche findet man zuweilen ähnlich verlaufende Lamellen, welche innere Grundlamellen heissen. — Die Grundlamellen enthalten in sehr wechselnder Anzahl noch eine andere Art von Gefässkanälen, welche nicht von ringförmig angeordneten Lamellen wie die Havers'schen Kanäle umgeben sind. Man nennt solche Kanäle die „Volkmann'schen Kanäle“, die darin enthaltenen Gefässe die „perforirenden Gefässe“. Sie hängen mit den Gefässen der Havers'schen Kanäle vielfach zusammen; der Uebergang der Volkmann'schen in die Havers'schen Kanäle ist ein ganz allmählicher. Die Knochenhöhlen haben in der Substantia compacta ganz bestimmte Stellungen. In den Havers'schen Lamellensystemen stehen sie mit ihrer Längsachse der Längsachse der Havers'schen Kanäle parallel, der Fläche nach gebogen, so dass sie auf Querschnitten zum Querschnitte des Havers'schen Kanales konzentrisch gekrümmt erscheinen. In

den interstitiellen Lamellen sind die Knochenhöhlen unregelmässig, in den Grundlamellen aber derart gestellt, dass sie mit ihren Flächen den Flächen dieser Lamellen gleich laufen. Die Knochenkanälchen münden sowohl in die Havers'schen Kanäle als auch frei an der Aussen- resp. Innenfläche der Knochen.

Das Knochenmark nimmt die axialen Höhlen der Röhrenknochen ein, füllt die Maschen der spongiösen Substanz aus und findet sich selbst noch in grösseren Havers'schen Kanälen. Es ist entweder von rother oder gelber Farbe, man unterscheidet deshalb rothes oder gelbes Mark. Das rothe Mark findet sich in den platten Knochen, in den Wirbelkörpern, in der Schädelbasis, im Brustbein und in den Rippen, sowie in allen jugendlichen Knochen (auch in den ganzen Röhrenknochen kleiner Thiere), das gelbe Mark in den kurzen und langen Knochen der Extremitäten. Bei alten und kranken Personen wird das Mark schleimig, röthlich gelb und wird dann gelatinöses Knochenmark genannt; es ist lediglich durch seine Armuth an Fett charakterisirt.

Die Elemente des rothen Knochenmarkes sind: Eine geringe Menge fibrillären Bindegewebes, wenige Fettzellen, Leukocyten, welche hier Knochenmarkzellen genannt werden, und Riesenzellen („Myeloplaxen“); letztere sind

Fig. 57.

Elemente des Knochenmarkes frisch aus einem Kalbswirbel isolirt, 560mal vergr., 1. in Kochsalzlösung, 2. mit Pikrokarmine gefärbt, 3. nach Zusatz von angesäuertem Glycerin, *k* Knochenmarkzellen, *k'* zwei Knochenmarkzellen Pigmentkörnerchen enthaltend, der rechte von der Seite, der linke von der Fläche gesehen, *b* farbige (kernlose) Blutkörperchen, *r* Riesenzellen. Die rechte zeigt zwei sich abschnürende Kerne von der Seite und einen ebenselchen von der Fläche $\times$. Technik Nr. 54, pag. 109.

grosse, äusserst unregelmässig gestaltete Gebilde, welche aus Protoplasma und einem oder mehreren Kernen bestehen. Es giebt Riesenzellen mit hellen und Riesenzellen mit glänzenden, sich intensiv färbenden Kernen. Die Form der Kerne ist sehr vielgestaltig, bald rund, bald gelappt, band-, ringförmig (Fig. 57, 2 *r*) oder ein Netzwerk bildend. Aus einkernigen Riesenzellen können

durch Abschnürung einzelner Kernpartikel vielkernige Zellen werden (Fig. 57, 3 *r*) oder es schnürt sich mit einem Kerntheile auch eine entsprechende Partie Protoplasma ab („Knospung“ s. pag. 38), woraus einkernige Zellen resultiren¹⁾. Endlich giebt es im rothen Knochenmarke kernhaltige

1) Die Auffassung, dass die als Theilung gedeuteten Vorgänge Erscheinungen eines in umgekehrter Reihenfolge verlaufenden Prozesses, also Verschmelzung mehrerer Zellen zu einer einzigen, seien, hat wenig Wahrscheinlichkeit für sich, seitdem der Abschnürungsvorgang an der lebenden Zelle beobachtet worden ist.

Zellen mit gelb gefärbtem, den rothen Blutkörperchen gleichendem Protoplasma; sie sind die Mutterzellen („Haematoblasten“) der rothen Blutkörperchen. Gelbliche in verschiedenen Zellen vorkommende Pigmentkörnchen werden als Reste zu Grunde gegangener rother Blutkörperchen betrachtet.

Das gelbe Mark besteht aus viel Fett und aus Bindegewebe. Markzellen und Haematoblasten kommen hier nur im Humerus- und Femurkopf vor.

Das Periost (Beinhaut) ist eine aus derben Bindegewebsfasern bestehende Haut, an welcher wir zwei Lagen unterscheiden können. Die äussere ist charakterisirt durch ihren Reichthum an Blutgefässen und stellt die Verbindung mit Nachbargeweben (Sehnen, Fascien etc.) her; die innere ist arm an Blutgefässen, dagegen sehr reich an elastischen Fasern; an ihrer Innenfläche findet sich stellenweise eine Lage kubischer Zellen, die für die

Fig. 58.

Stück eines Querschliffes des Femur eines erwachsenen Menschen, 80 mal vergr. Technik Nr. 52, pag. 108. Die Lamellen sind an der Stellung der Knochenhöhlen zu erkennen.

Entwicklung des Knochens von Bedeutung sind. Das Periost ist bald fester, bald lockerer mit dem Knochen verbunden; die Verbindung wird hergestellt durch die in den Knochen ein- resp. austretenden Blutgefässe, sowie durch die Sharpey'schen Fasern pag. 56, welche sich in die äusseren Grund- und in die an diese anschliessenden Schalt-Lamellen einbohren und nach den verschiedensten Richtungen verlaufen. Fig. 58.

Die Blutgefässe des Knochens, des Markes und der Beinhaut stehen untereinander in ausgiebigster Verbindung, wie sie auch mit ihrer Umgebung in Zusammenhang stehen. Von den zahlreichen venösen und arteriellen Gefässen des Periosts treten überall in die Havers'schen und Volkmann'schen Kanälchen kleine Aeste (kleine Kapillaren), welche an der Innenfläche des Knochens mit den Gefässen des Markes zusammenhängen. Dieses bezieht sein Blut durch die Arteriae nutritiae, welche auf dem Wege durch die Substantia compacta an dieselbe Aeste abgeben und sich im Marke in ein

reiches Blutgefässnetz auflösen. Die aus den Kapillaren des Markes hervorgehenden Venen sind klappenlos. Lymphgefässe finden sich nur in den oberflächlichsten Periostlagen.

Die zahlreichen Nerven sind theils im Periost gelegen, wo sie zuweilen in Vater'schen Körperchen endigen, theils treten sie in die Havers'schen Kanäle und in das Knochenmark. Sie sind theils markhaltig, theils marklos.

Verbindungen der Knochen.

Wir unterscheiden 1. Verbindung der Knochen ohne Gelenke, Synarthrosis, 2. Verbindung der Knochen mit Gelenken, Diarthrosis.

ad 1. Bei Synarthrosis erfolgt die Verbindung der Knochen entweder a) durch Bänder — Bandverbindung, Syndesmosis — oder b) durch Knorpel — Knorpelhaft, Synchondrosis.

ad a) Die Bänder sind theils fibröse Bänder, welche den gleichen Bau wie die Sehnen zeigen, theils elastische Bänder. Diese letzteren sind durch zahlreiche, starke elastische Fasern ausgezeichnet, welche jedoch nie zu Bündeln oder Lamellen zusammentreten, sondern stets durch lockeres Bindegewebe auseinandergehalten werden (vergl. Fig. 18 C). Das Lig. nuchae, Lig. stylohyoideum und die Ligamenta flava zwischen den Wirbelbogen gehören zu den elastischen Bändern.

Auch die Nahtverbindung, Sutura, gehört zu den Syndesmosen, indem kurze fibröse Bänder von einem gezackten Knochenrande zum anderen ziehen.

ad b) Der Knorpel ist selten nur hyaliner Knorpel, gewöhnlich besteht er zum Theil aus Bindegewebsknorpel, zum Theil (besonders an der Grenze gegen den Knochen) aus hyalinem Knorpel, dessen Zellenkapseln oft verkalkt sind.

Die Ligamenta intervertebralia, welche gleichfalls zu den Synchondrosen gehören, besitzen in ihrem Centrum eine weiche gallertartige Masse, den Nucleus gelatinosus, der grosse Gruppen von Knorpelzellen enthält; er ist ein Rest der Chorda dorsalis, des embryonalen Vorläufers der Wirbelsäule. Die Peripherie der Lig. intervertebr. wird von einem sehnigen Ring hergestellt.

ad 2. Bei den Diarthrosen haben wir die Gelenkenden der Knochen, die Labra cartilaginea, die Zwischenknorpel (Menisci) und die Gelenkkapseln zu betrachten.

Die Gelenkenden der Knochen sind von einer 0,2 — 5 mm dicken, nach den Rändern hin sich verdünnenden Lage hyalinen Knorpels überzogen. Die Knorpelzellen sind an der Oberfläche des Gelenkknorpels parallel dieser gestellt und abgeplattet; in den mittleren Schichten des Knorpels sind die Knorpelzellen rundlich, oft zu Gruppen vereint; in den tiefsten Schichten endlich sind die Zellengruppen theilweise in Längsreihen, senk-

recht zur Knochenoberfläche gestellt; daran schliesst sich durch einen Streifen getrennt eine schmale Schicht verkalkten Knorpels, welche die Verbindung zwischen hyalinem Knorpel und Knochen vermittelt (Fig. 59).

Nicht alle Gelenkknorpel zeigen den eben beschriebenen Bau; so ist der Knorpel der Rippenknorpelgelenke, des Sternoclavicular-, des Acromioclaviculargelenkes, des Kiefergelenkes und des Capitulum ulnae kein hyaliner, sondern Bindegewebsknorpel; die distale Gelenkfläche des Radius ist von straffem Bindegewebe überzogen.

Fig. 59.

Senkrechter Schnitt durch das Köpfchen eines Metakarpus des erwachsenen Menschen. 50mal vergrößert.
Technik Nr. 55, pag. 109.

Die Labra glenoidea und die Zwischenknorpel entbehren der charakteristischen knorpeligen Grundsubstanz; sie bestehen aus einem derben Bindegewebe und aus z. Th. rundlichen Zellen¹⁾.

Nerven und Gefässe fehlen den Gelenkknorpeln Erwachsener: auch die Labra glenoidea und die Zwischenknorpel sind nerven- und gefässlos.

Die Gelenkkapseln bestehen aus einer äusseren Faserhaut der „fibrösen Gelenkkapsel“, die von sehr verschiedener Dicke ist und den gleichen Bau wie die oben beschriebenen fibrösen Bänder besitzt, und aus einer inneren an der freien Innenfläche glän-

zend glatten Haut, der Synovialmembran. Diese besteht zunächst der fibrösen Kapsel aus lockerem, elastische Fasern und stellenweise Fettzellen enthaltendem Bindegewebe; weiter nach innen folgt eine dünne Schicht parallel verlaufender Bindegewebsbündel, welche an ihrer gegen die Gelenkhöhle zugekehrten freien Innenfläche von einer ein- bis vierfachen Epithel-(Endothel-)lage überzogen werden. Die Epithelzellen sind klein (11—17 μ), rundlich polygonal und enthalten einen grossen Kern.

Die Synovialmembran bildet oft frei in die Gelenkhöhle hineinragende fetterfüllte Falten und trägt auf ihrer Oberfläche die Synovialzotten (Fig. 60); das sind sehr verschieden gestaltete Fortsätze von meist mikro-

¹⁾ In die gleiche Kategorie gehören auch die sogen. Sesamknorpel; die Sehnen-scheide am Os cuboideum enthält dagegen echten Knorpel.

skopischer Grösse, welche vorzugsweise dicht am Rande der Gelenkflächen sitzen und der Synovialhaut ein röthlich sammtartiges Aussehen verleihen. Sie bestehen aus Bindegewebe und werden von einer einfachen oder doppelten Lage von Epithel überzogen.

Die grösseren Blutgefässe der Synovialmembran liegen in der lockeren Bindegewebsschicht; von da aus ziehen Kapillaren in die innere dünne Bindegewebsschicht und dringen auch in die Zotten ein. Doch giebt es auch gefässlose Zotten. Lymphgefässe liegen dicht unter dem Epithel.

Die Nerven liegen in der lockeren Bindegewebsschicht und enden zum Theil in Vater'schen Körperchen.

Die Synovia, Gelenkschmiere, enthält keine geformten Bestandtheile; sie besteht zum grössten Theile aus Wasser; nur 6% feste Bestandtheile (Eiweiss, Schleim, Salze) finden sich darin.

Fig. 60.

Synovialzotten mit Blutgefässen aus dem menschlichen Kniegelenke 50 mal vergr. An der Spitze der linken Zotte ist das Epithel abgelöst, so dass das Bindegewebe zum Vorschein kommt. Technik Nr. 56, pag. 109.

Die Knorpel.

Die Rippenknorpel bestehen aus hyalinem Knorpel, dessen Grundsubstanz die (pag. 54) erwähnten Eigenthümlichkeiten zeigt, dessen Zellen häufig Fett enthalten. Die Oberfläche der Rippenknorpel ist von einer festen faserigen Haut, dem Perichondrium, überzogen, welches

aus nach verschiedenen Richtungen verlaufenden Bindegewebsbündeln und elastischen Fasern besteht.

Die Gelenkknorpel (siehe auch „Verbindungen der Knochen“) sind nur an ihren Seitenflächen, nicht aber an ihren Berührungsflächen von Perichondrium überzogen.

Da, wo Knorpel und Perichondrium sich berühren, erfolgt ein allmählicher Uebergang der einen Gewebsart in die andere; in Folge dessen haftet das Perichondrium sehr fest am Knorpel. Das Perichondrium ist der Träger der Nerven und der Blutgefässe, welche letztere bei wachsenden Knorpeln auch in diesem selbst in eingegrabenen Kanälen liegen. Beim Erwachsenen sind die Knorpel gefässlos; die Ernährung erfolgt durch Diffusion von der Oberfläche her. Die Rippenknorpel erhalten bei ihrer im Alter häufig auftretenden Verknöcherung Blutgefässe.

Die Knorpel der Athmungsorgane und der Sinnesorgane siehe in den entsprechenden Kapiteln.

Entwicklung der Knochen.

Die Knochen sind verhältnissmässig spät auftretende Bildungen. Es giebt eine embryonale Zeit, in welcher Muskeln, Nerven, Gefässe, Hirn, Rückenmark etc. schon wohl ausgebildet sind, vom Knochen aber noch keine Spur vorhanden ist. In jener Zeit wird das Skelet des Körpers durch hyalinen Knorpel gebildet. Mit Ausnahme einiger Theile des Schädels und fast aller Theile des Gesichtes sind alle später knöchernen Theile des Skeletes erst durch Knorpel vertreten; so finden wir z. B. bei der oberen Extremität Humerus, Radius, Ulna, Carpus und die Skelettheile der Hand als Knorpelstücke, die aber nicht wie der spätere Knochen hohl, sondern durchaus solid sind. An die Stelle dieses Knorpelskeletes tritt nun allmählich das knöcherne Skelet; man nennt alle jene Knochen, die in embryonaler Zeit durch Knorpel vertreten waren, knorpelig vorgebildete (oder primäre) Knochen. Die anderen Knochen, welche keine knorpeligen Vorläufer haben, heissen Bindegewebsknochen (oder sekundäre Knochen).

Zu den knorpelig vorgebildeten Knochen gehören: sämtliche Knochen des Stammes, der Extremitäten, der grösste Theil der Schädelbasis (Hinterhauptbein mit Ausnahme des oberen Theiles der Schuppe desselben, Keilbein mit Ausnahme der inneren Lamelle des Proc. pterygoideus, Felsenbein und die Gehörknöchelchen, Siebbein und die untere Nasenmuschel) und das Zungenbein.

Zu den Bindegewebsknochen gehören: die Seitentheile des Schädels, das Schädeldach und fast alle Gesichtsknochen.

I. Erste Entwicklung der Knochen.

a) Entwicklung der knorpelig vorgebildeten Knochen.

Hier sind zwei Vorgänge zu betrachten: 1. Bildung von Knochensubstanz im Innern des vorhandenen Knorpels, enchondrale (enchondrale) Ossifikation und 2. Knochenbildung in der unmittelbaren Umgebung, also auf dem Knorpel, periostale oder besser perichondrale Ossifikation. Die auch phylogenetisch ältere perichondrale Ossifikation beginnt meist früher, soll aber aus didaktischen Gründen erst in zweiter Linie beschrieben werden.

1. Enchondrale Ossifikation. Die ersten Veränderungen bestehen hier darin, dass an einer bestimmten Stelle des Knorpels die Zellen sich vergrössern, sich theilen, so dass mehrere in einer Knorpelhöhle liegen; dann wird die Grundsubstanz selbst durch Einlagerung von Kalksalzen feinkörnig getrübt, sie verkalkt. Solche Stellen sind bald mit unbewaffnetem Auge zu bemerken und heissen Ossifikationspunkte (oder besser Verkalkungspunkte, Fig. 61). Die vom Verkalkungspunkte entfernteren Knorpelpartien wachsen weiter in die Dicke und Länge, während am Verkalkungspunkte selbst kein Wachsthum mehr stattfindet, dadurch erscheint jene Stelle des Skeletstückes

wie eingeschnürt (Fig. 61). Unterdessen ist an der Oberfläche des Verkalkungspunktes ein an jungen Zellen und Blutgefässen reiches Gewebe, das osteogene¹⁾ Gewebe, aufgetreten. Dieses dringt in den Knorpel ein und bringt die verkalkte Knorpelgrundsubstanz zum Zerfalle; die Knorpelzellen werden frei und gehen zu Grunde; so ist eine kleine Höhle im Verkalkungspunkte entstanden, sie heisst der primordiale Markraum.

Fig. 61.

Aus einem dorsoplantaren Längsschnitte der grossen Zehe eines 4 monatlichen menschlichen Embryo. Zwei Drittel der ersten Phalanx gezeichnet. 50 mal vergr. 1 Knorpelhöhlen vergrössert, viele mehrere Knorpelzellen enthaltend. Die Zellen selbst sind hier bei der schwachen Vergrösserung nicht zu erkennen, sondern nur deren punktförmige Kerne. Bei 2 wachsender Knorpel; man sieht die Knorpelzellen in Gruppen von 3-4 Zellen gelagert, jede Gruppe ist durch wiederholte Theilung einer Knorpelzelle hervorgegangen.

Technik Nr. 57, pag. 110.

Fig. 62.

Aus einem dorsopalmaren Längsschnitte eines Fingers eines 4 monatlichen menschlichen Embryo. Zwei Drittel der zweiten Phalanx gezeichnet. 50 mal vergrössert. Der enchondrale Knochen ist nur in Form feiner Blättchen gebildet. (Siehe starke Vergrösserung Fig. 63.) Technik Nr. 57, pag. 110.

Die nächste Umgebung desselben macht nun die gleichen Prozesse durch wie zu Beginn, d. h. die Knorpelgrundsubstanz verkalkt, die Knorpelzellen vergrössern sich. Allmählich erfolgt eine immer mehr vorschreitende Vergrösserung des Markraumes, indem neue Partien des Knorpels einschmelzen. Dabei werden die Kapseln ganzer Knorpelzellengruppen eröffnet, während die zwischen diesen gelegene, verkalkte Knorpelgrundsubstanz sich noch in Form zackiger, in den Markraum ragender Fortsätze (Fig. 62) erhält. Der Markraum ist jetzt eine buchtige Höhle, gefüllt mit Blutgefässen und Zellen, die Knorpel-

¹⁾ Ein schlechter Name; denn das Gewebe ist nicht vom Knochen entstanden, sondern soll erst zu Knochen werden.

markzellen genannt werden. Das Schicksal dieser Zellen gestaltet sich nun im weiteren Verlaufe der Entwicklung sehr verschieden. Die Zellen werden entweder mit Beibehaltung ihrer Form zu Markzellen des Knochens oder sie werden zu Fettzellen, oder — und das ist das Wichtigste — sie werden Knochenbildner, Osteoblasten, d. h. eine Anzahl Zellen legt sich nach Art eines einschichtigen Epithels an die Wände des Markraumes an und erzeugt daselbst Knochengrundsubstanz (s. pag. 57).

Fig. 63.

Aus einem Längsschnitte der ersten Fingerphalanx eines 4 monatlichen menschlichen Embryo; 240 mal vergr. Im enchondralen Knochen sieht man schon zackige Knochenhöhlen mit Knochenzellen. Die beiden obersten Osteoblasten $\times$ sind schon zur Hälfte von Knochengrundsubstanz umgeben. Technik Nr. 57, pag. 110.

Bald ist nun der Markraum durch die Thätigkeit der Osteoblasten mit einer dünnen, allmählich dicker werdenden Knochentapete ausgekleidet; die oben erwähnten zackigen Blätter verkalkter Knorpelgrundsubstanz sind rings von jungen Knochen umgeben. So wird nach und nach das früher solide Knorpelstück in spongiösen Knochen umgewandelt, dessen Bälkchen noch Reste verkalkter Knorpelgrundsubstanz enthalten (Fig. 64).

2. Perichondrale Ossifikation. Sie erfolgt ebenfalls durch Osteoblasten, welche aus dem oben erwähnten, an der Oberfläche des Verkalkungspunktes befindlichen osteogenen Gewebe hervorgegangen sind (Fig. 61). Durch die Thätigkeit der Osteoblasten werden Schichten von grobfaseriger Knochensubstanz auch auf der Oberfläche des Knorpels gebildet (Fig. 61); diese Knochenmassen unterscheiden sich besonders dadurch von dem enchondral gebildeten Knochen, dass sie keine Reste verkalkter Knorpelgrundsubstanz enthalten, da ja die Knochenbildung hier nur im Umkreise, nicht im Innern des Knorpels erfolgt. Am perichondralen Knochen lässt sich auch die Bildung der ersten Havers'schen Kanälchen verfolgen (Fig. 64). Die perichondrale Knochenrinde entsteht nämlich nicht in fortlaufender, gleichmässig dicker Schicht, sondern man bemerkt an vielen Stellen Vertiefungen der Knochen-

rinde (Fig. 64 *hh*), in denen Blutgefäße, umgeben von Osteoblasten liegen; anfangs sind die Vertiefungen nur gegen die Peripherie offene Rinnen; mit

Fig. 64.

Querschnitt der oberen Hälfte der Humerusdiaphyse eines 4monatlichen menschlichen Embryo. 35mal vergrößert. Technik Nr. 57, pag. 110.

immer vorschreitender Verdickung der perichondralen Knochenschichten werden die Rinnen von aussen geschlossen (*h'*), und stellen nun gefäßshaltige Kanäle, Havers'sche Kanäle, dar. Durch die Thätigkeit der in die Havers'schen Kanäle eingeschlossenen Osteoblasten werden neue Knochenschichten (die späteren Havers'schen Lamellen) gebildet.

Fig. 65.

Aus einem Querschnitte des Unterkiefers eines neugeborenen Hundes. 240mal vergr. Motaplastischer Typus. Technik Nr. 57, pag. 110.

Aus dem Knorpelstücke ist durch Auflösung des Knorpels und durch Ersatz desselben durch Knochen (enchondrale Ossifikation), sowie durch Auflagerung neuer Knochenmassen von aussen (perichondrale Ossifikation) ein Knochen geworden.

Das Wesen der vorstehend beschriebenen Prozesse besteht in einer Auflösung des ursprünglichen Skeletstückes und in einer Neubildung desselben durch Entwicklung von Knochen-

substanz. Man nennt diesen Modus der Knochenbildung den neoplastischen Typus im Gegensatze zu einem nur selten (z. B. am Unterkieferwinkel) vorkommenden Modus, nach welchem der Knorpel nicht zerstört, sondern einfach zu Knochen wird, indem die Knorpelgrundsubstanz zu Knochengrundsubstanz, die Knorpelzellen zu Knochenzellen werden. Dieser Modus heisst metaplastischer Typus (Fig. 65).

b) Entwicklung der Bindegewebssknochen.

Hier ist die Grundlage, auf welcher die Knochenbildung erfolgt, nicht Knorpel, sondern Bindegewebe. Einzelne Bindegewebsbündel verkalken, an diese legen sich aus embryonalen Zellen hervorgegangene Osteoblasten (Fig. 66) und bilden auf die oben beschriebene Weise Knochen. Es gehört zum Begriff „Bindegewebsknochen“, dass derselbe allseitig von Bindegewebe umgeben ist; berührt Knochengewebe auf einer Seite direkt ohne Zwischenlagerungen von Bindegewebe Knorpelgewebe, so hat man keinen Bindegewebsknochen, sondern perichondralen Knochen vor sich.

Fig. 66.

Aus einem Flächenschnitte des Scheitelbeines eines menschlichen Embryo. 240mal vergrößert. Technik Nr. 57, pag. 110.

II. Weiteres Wachstum der Knochen.

1. Knorpelig vorgebildete Knochen.

a) Röhrenknochen. Viel später als die Verknöcherung der Diaphyse beginnt diejenige der Epiphysen¹⁾; Blutgefäße wachsen in den verkalkenden Knorpel, welcher anfangs nur auf dem Wege der enchondralen später auch der perichondralen Ossifikation zu Knochen umgewandelt wird. Knorpelig bleiben nur: 1 immer, die Oberfläche als Gelenkknorpel, 2 vorübergehend, bis zu vollendetem Wachstum, eine zwischen Diaphyse und Epiphyse bestehende Zone, die Epiphysenfuge; hier findet ein lebhaftes Wachstum des Knorpels statt, der durch Ausdehnung der primordialen Markräume der Diaphyse und der Epiphysen fortwährend in Knochen umgewandelt wird. Auf diese Weise wächst der Knochen in die Länge. Das Dickenwachstum geschieht durch Auflagerung, „Apposition“, immer neuer periostaler Knochenschichten.

b) Kurze Knochen ossifizieren wie die Epiphysen anfangs nur enchondral; erst nach Auflösung der letzten oberflächlichen Reste von Knorpelsubstanz wird eine perichondrale Knochenrinde gebildet.

¹⁾ So entsteht im Humerus der Ossifikationspunkt in der Diaphyse in der 8. Foetalwoche, in den Epiphysen im ersten Lebensjahre.

c) Bei platten Knochen beginnt die Verknöcherung erst perichondral, dann enchondral.

2. Bindegewebsknochen.

Diese wachsen durch Bildung immer neuer Knochenmassen an den Rändern (flächenhaftes Wachstum) und an den Oberflächen (Dickenwachsthum). Die Knochenmassen bestehen anfangs aus grobfaseriger, später (etwa vom ersten Lebensjahre ab) aus feinfaseriger Knochengrundsubstanz (pag. 56).

III. Resorption der Knochen

Sofort mit der ersten Anlage von Knochengewebe macht sich ein entgegengesetzter Vorgang, die Resorption, bemerkbar, durch welche die verkalkte Knorpelgrundsubstanz sowie viele Theile des eben erst angelegten (knorpelig vorgebildeten wie Bindegewebs-) Knochens wieder aufgelöst werden. Resorption findet in ausgedehntester Masse in Röhrenknochen bei der Bild-

ung der Markhöhle¹⁾, (in geringerem Grade in anderen Knochen), und an der Oberfläche von Knochen bis zur Ausbildung ihrer typischen Gestalt statt. Auch im Innern der Substantia compacta sieht man unregelmässige, durch Auflösung der inneren Havers'schen Lamellen entstandene Hohlräume, die sogen. Havers'schen Räume, welche indessen durch Ablagerung neuer Knochenmassen

Fig. 67.

Aus einem Querschnitte des Humerus einer neugeborenen Katze. 240 mal vergrössert. *H* Havers'sches Kanälchen, zwei Gefässe und Markzellen enthaltend.
Technik Nr. 57, pag. 110.

zum Theil wieder ausgefüllt werden können (s. Fig. 56 *h*).

Ueberall, wo eine Resorption von Knochensubstanz stattfindet, sieht man Riesenzellen in grubigen Vertiefungen („Howship'sche Lakunen“) des Knochens gelegen. Die Riesenzellen führen hier den Namen „Ostoklasten“, Knochenbrecher (Fig. 67).

Auch am völlig ausgebildeten Skelet bestehen noch an einzelnen Stellen die Prozesse der Apposition und der Resorption fort.

TECHNIK.

Nr. 51. Knochenschliffe. Die zu Schliffen zu verwendenden Knochen dürfen nicht vor der Maceration getrocknet sein, sondern müssen frisch auf mehrere Monate in Wasser, das mehrmals gewechselt wird, eingelegt werden. Dann werden sie getrocknet, ein Stück wird zwischen zwei Korkstücken oder zwischen Tuch in einen Schraubstock geklemmt und mit einer

¹⁾ Ein Femur eines dreijährigen Kindes enthält z. B. fast nichts mehr von dem Knochengewebe des Femur eines Neugeborenen.

Laubsäge ein 1—2 mm dickes Blatt der Quere resp. der Länge nach abgeschnitten. Das Blatt wird mit Siegelack auf die Unterfläche eines Korkstöpsels fest angeklebt (der Siegelack muss das Blatt rings umgeben), das Ganze einen Moment in Wasser getaucht und dann zuerst mit einer flachen groben und nachher mit einer feinen Feile ganz eben gefeilt; dabei muss die Feile öfter in Wasser getaucht werden, um die ihr anhängenden Theile abzuspülen und um die Erwärmung des Siegelackes durch die Reibung zu verhindern.

Dann löst man durch Erwärmen des Siegelackes das Knochenblatt ab und klebt es mit der anderen, geebneten Seite auf den Stöpsel. Jetzt wird das Blatt mit der Feile so lange bearbeitet, bis es so dünn geworden ist, dass der Siegelack durchscheint. Alsdann bringt man das Ganze in 90%igen Alkohol, wo sich binnen wenigen Minuten das Knochenblatt leicht ablösen lässt. Nun nimmt man einen groben Schleifstein, befeuchtet ihn mit Wasser, stellt durch Reiben mit einem zweiten Schleifstein, etwas Schmirgel her, legt das Knochenblatt hinein und schleift es auf beiden Seiten in kreisförmiger Bewegung, indem man einen glatten (keine Risse tragenden) Korkstöpsel einfach auf das Knochenblatt aufsetzt; ein Ankleben des Blattes ist nicht nöthig. Hat der Schliff die nöthige Dünne erreicht — man überzeugt sich davon, indem man ihn zwischen Filtrirpapier abtrocknet und dann bei schwacher Vergrößerung betrachtet: der Schliff muss durchsichtig sein —, dann glättet man ihn auf einem feinen Schleifsteine (die Manier ist dieselbe wie das Schleifen auf dem groben Steine) auf beiden Seiten, trocknet ihn dann mit Filtrirpapier ab und polirt ihn. Zu letzterem Zwecke nagele man ein Stückchen Rehlleder (Waschleder) glatt auf ein Brett, bestreiche das Leder mit Kreide, und reibe den mit etwas Speichel an die Fingerspitze geklebten Schliff auf und ab. Der bisher matte Schliff wird dadurch eine glänzende Oberfläche erhalten. Zuletzt entferne man die anhaftende Kreide durch Streichen auf reinem Waschleder. Der fertige Schliff wird trocken unter ein Deckglas gebracht, welches man mit Kitt (pag. 22) umrahmt (Fig. 26).

Betrachten zuerst mit schwachem, dann mit starken¹⁾ Vergrößerungen. Die Knochenhöhlen und Knochenkanälchen sind mit Luft erfüllt, welche bei der üblichen Beleuchtung der Objekte von unten her schwarz erscheint.

Nr. 52. Sharpey'sche Fasern. Man stelle nach der in Nr. 51 angegebenen Methode einen Knochenquerschliff von der Diaphysenmitte des Röhrenknochens, am Besten eines jungen Individuums, her. Der fertige, trockene Schliff wird auf 2—5 Minuten in 4 ccm Terpentinöl gelegt und dann in Damarfirniss konservirt. Die an nach anderen Methoden (Nr. 51 und 53) hergestellten Präparaten unsichtbaren Fasern treten hier schon bei schwachen Vergrößerungen deutlich hervor (Fig. 58).

Nr. 53. Für Havers'sche Kanälchen und Knochenlamellen mache man Längs- und Querschnitte durch Knochen, welche man nach vorhergegangener vierwöchentlicher Fixirung mit Müller'scher Flüssigkeit und Härtung mit Alkohol (s. pag. 14) in 3—9%iger Salpetersäure entkalkt (pag. 15) und dann wieder gehärtet hat. Man wählt dazu einen Metakarpus-knochen eines völlig erwachsenen Individuum; kompakte Stücke grösserer Knochen (z. B. des Femur) erfordern zu lange Zeit (mehrere Wochen) zur

¹⁾ Ist der Schliff zu dick, so ist oft die Betrachtung mit starken Vergrößerungen unmöglich, da das Objektiv nicht nahe genug an das Präparat gebracht werden kann.

Entkalkung. Das Periost lasse man am Knochen sitzen. Für Längsschnitte der Havers'schen Kanäle müssen sehr dicke (0,5 mm und mehr) Schnitte angefertigt werden, welche in verdünntem Glycerin zu konserviren sind (Fig. 55). Für Querschnitte und Lamellensysteme braucht man ebenfalls keine sehr dünnen Schnitte; die Lamellen sieht man am besten, wenn man den Schnitt in einigen Tropfen destillirten Wassers betrachtet und den Spiegel so dreht, dass das Objekt nur halb beleuchtet ist; dann sieht man auch die von den Knochenkanälchen herrührenden feinen Streifen, die senkrecht zu den Lamellen verlaufen (Fig. 56). Man konservire in verdünntem Glycerin, das indessen die Lamellensysteme theilweise undeutlich macht. Nicht jede Stelle des Knochens zeigt sämmtliche Lamellensysteme; so fehlen häufig die äusseren und auch die inneren Grundlamellen; macht man Schnitte nahe den Epiphysen, so sieht man, wie sich die kompakte Substanz in die Bälkchen der Substantia spongiosa fortsetzt. Die Knochenhöhlen und Knochenkanälchen sind an feuchten Präparaten viel weniger deutlich als an trockenen Schliffen, weil die Konservierungsflüssigkeit die in ihnen enthaltene Luft herausgedrängt hat. (Vergl. Fig. 26 und 27 mit einander.)

Nicht selten findet man, dass die konzentrischen Ringe der Havers'schen Lamellen durch eine unregelmässige Linie unterbrochen werden. Bis zu dieser Linie war der schon gebildete Knochen wieder resorbiert worden (pag. 107). Alles, was innerhalb der Linie liegt, ist neuangesetzte Knochenmasse. Diese Bildungen sind also theilweise ausgefüllte Havers'sche Räume (Fig. 56 h).

Nr. 54. Roth's Knochenmark. Man quetsche einen aus dem Schlachthaus bezogenen halbirten Wirbel oder eine Rippe eines Kalbes¹⁾ in einem Schraubstock oder mit einer Zange, sauge von der an der Schnittfläche herausgepressten Flüssigkeitsmenge mit einer Pipette einen kleinen Tropfen ab, der auf den Objektträger gebracht, ohne Zusatz mit einem kleinen Deckglase oder besser mit einem Bruchstückchen eines solchen bedeckt wird. Untersucht man dann mit starker Vergrösserung, so sieht man rothe Blutkörperchen, Haematoblasten, Markzellen in verschiedener Grösse und Riesenzellen, aber nicht immer deren Kerne (Fig. 57, 1). Nun lässt man einen Tropfen Pikrokarmine zufließen (pag. 26); die Kerne werden schon nach 1—2 Minuten roth, sind aber noch blass (Fig. 57, 2). Ersetzt man das Pikrokarmine erst durch Kochsalzlösung, und dann durch verdünntes, angesäuertes Glycerin (pag. 26), so werden die Kerne dunkel, scharf konturirt (Fig. 57, 3). Zuweilen sucht man vergeblich nach Riesenzellen.

Nr. 55. Zu Schnitten des Gelenkknorpels wähle man Metakarpusköpfchen erwachsener Individuen, die nach der Nr. 53 angegebenen Methode behandelt werden. Man fertige Längsschnitte an, welche in verdünntem Glycerin konservirt werden (Fig. 59). Die im hyalinen Knorpel oft vorhandenen parallelen Streifen rühren vom Messer her. Die Körnchen des verkalkten Knorpels sind durch die Entkalkung verschwunden.

Nr. 56. Synovialzotten. Man schneide von einer möglichst frischen Leiche am Rande der Kniescheibe ein Stückchen Gelenkkapsel von ca. 4 cm Seite aus, trage von der röthlich glänzenden sammtartigen Innenfläche desselben mit der Scheere einen 2—3 mm breiten Streifen ab, den man, mit einem Tropfen Kochsalzlösung befeuchtet, ohne Deckglas mit schwacher

¹⁾ Auch menschliche Rippen sind oft noch zu gebrauchen.

Vergrosserung betrachtet. Am Rande des Streifens bemerkt man die Zotten, deren Blutgefässe oft noch Blutkörperchen enthalten; die glänzenden Kerne der Epithelzellen liegen dicht bei einander (Fig. 60). Will man das Präparat konserviren, so färbe man unter dem Deckglase mit Pikrokarmın und konservire in verdünntem Glycerin (pag. 26), doch geht viel von der ursprünglichen Schönheit verloren.

Nr. 57. Zu Präparaten über Knochenentwicklung sind menschliche Embryonen aus dem 4.—5. Monat und thierische Embryonen, Schaf, Schwein oder Rind von 10—14 cm Länge¹⁾ geeignet. Letztere sind leicht aus Schlachthäusern zu beschaffen. Man bestelle sich die ganzen Uteri („Tragsäcke“). Man lege die ganzen Embryonen (2—3 Stück in 1 Liter) in Müller'sche Flüssigkeit auf 4 Wochen. Oefter wechseln (pag. 12). Dann lege man dieselben auf 1—6 Stunden in (womöglich fließendes) Wasser und härte sie in 200—400 ccm allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14). Nachdem die Embryonen 1 Woche oder länger in 90%igem Alkohol gelegen haben, schneide man den Kopf, die Extremitäten dicht am Rumpfe²⁾ ab und lege sie zum Entkalken (pag. 15) in ca. 200 ccm destillirtes Wasser, welchem man 2—4 ccm reine Salpetersäure zugesetzt hat. Nach 2—5 Tagen, während welcher man die Entkalkungsflüssigkeit etwa 3 mal gewechselt hat, werden die Extremitäten herausgenommen (der Kopf wird noch nicht ganz entkalkt sein und muss noch einige Tage in der 20%igen Salpetersäure liegen bleiben), in (womöglich fließendem) Wasser 1—6 Stunden ausgewaschen und abermals in allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14) gehärtet. Nach etwa 5 tägigen Liegen in 90%igem Alkohol schneide man die Extremitäten in ca. 1 cm lange Stücke, die man, wenn sie noch zu weich sein sollten, auf 1—2 Tage in ca. 30 ccm Alkohol absol. einlegen kann.

Zu Präparaten über die ersten Vorgänge der Knochenentwicklung (Fig. 61, 62, 63) mache man von der Beugeseite zur Streckseite gerichtete (sagittale) Längsschnitte durch die in Leber eingeklemmten Phalangen und die (bei den genannten Thieren sehr langen) Metakarpen; gute Schnitte müssen die Achse der Extremitäten treffen, Randschnitte geben unklare Bilder.

Für vorgeschrittenere Stadien mache man vorzugsweise Querschnitte durch Humerus und Femur. Schnitte durch die Diaphyse liefern mehr perichondralen, Schnitte durch die Epiphysen mehr enchondralen Knochen.

Die schönsten Osteoblasten erhält man an Unterkieferquerschnitten, die auch zu Präparaten über Zahnentwicklung zu verwerthen sind.

Für noch spätere Stadien sind Skeletstücke neugeborener Thiere zu verwenden, deren Phalangen zum Theile noch ziemlich frühe Vorgänge erkennen lassen³⁾. Die Entkalkung nimmt hier etwas mehr Zeit (bis 8 Tage) in Anspruch.

Für Bindegewebsknochen lege man Flachschnitte durch Scheitel- und Stirnbein der Embryonen.

Sämmtliche Schnitte werden auf 2—10 Minuten in ca. 4 ccm Böhmer'sches Haematoxylin (pag. 17) eingelegt, auf 10 Minuten in ca. 10 ccm

1) Von der Schnauzenspitze bis zur Schwanzwurzel gemessen.

2) Stücke der Wirbelsäule, Rippen geben ebenfalls instructive Bilder.

3) Die Carpalknochen zeigen noch die ersten Anfänge.

destillirtes Wasser übertragen, dann 10 Minuten lang in ca. 4 cem Pikrokarmין (pag. 19) gefärbt, auf $\frac{1}{4}$ —1 Stunde in ca. 20 cem destillirtes Wasser gebracht und in Damarfirniß (pag. 23) konservirt.

Ist die Färbung gelungen, so sind Knorpel (besonders die verkalkten Partien) blau, Knochen roth. Zuweilen färbt sich der Knorpel nicht lebhaft blau, alsdann lege man die Schnitte anstatt in die gewöhnliche Haematoxylinlösung in 5 cem destill. Wasser + 5 Tropfen der filtrirten Haematoxylinlösung. Nach 6—14 Stunden wird der Knorpel blau sein. Die Pikrokarminfärbung des Knochens ist oft nicht gleichmässig, die jüngsten Knochenpartien, z. B. die Ränder der Knochenbälkchen sind oft am lebhaftesten gefärbt.

III. Organe des Muskelsystems.

Das Muskelsystem setzt sich zusammen aus einer grossen Anzahl kontraktile Organe, den Muskeln, welche, aus quer gestreiftem Muskelgewebe bestehend, meist durch Vermittlung besonderer bindegewebiger Formationen, der Sehnen, mit dem Skelet, mit der Haut, mit den Eingeweiden etc. in Verbindung treten. Dazu kommen noch gleichfalls bindegewebige Hilfsapparate, wie die Fascien, Sehnenscheiden und Schleimbeutel.

Muskeln. Jeder Muskel besteht aus quergestreiften Muskelfasern (pag. 62), die in der Regel der Art mit einander verbunden sind, dass sie sich der Länge nach neben und hinter einander legen und durch lockeres Bindegewebe, das Perimysium, zusammengehalten werden; quere Durchflechtungen kommen nur selten (z. B. in der Zunge) vor. Niemals berühren sich benachbarte Muskelfasern mit ihrem Sarkomlemm direkt, sondern jede einzelne Muskelfaser ist von einer zarten

Fig. 68.

Stück eines Querschnittes durch einen Schenkelmuskel (Adduktor) des Kaninchens. 60mal vergr. *P* Perimysium intern., bei *g* zwei Blutgefässdurchschnitte enthaltend. *m* Muskelfasern; sie sind an vielen Stellen aneinandergewichen, so dass man *p* das Perimysium der einzelnen Muskelfasern sehen kann. Bei *x* ist ein Muskelfaserquerschnitt herausgefallen. Technik Nr. 58, pag. 114.

bindegewebigen Hülle, dem Perimysium der einzelnen Muskelfaser (Fig. 68 *p*) umgeben, welche mit den Nachbarhüllen zusammenhängt.

Indem eine sehr verschieden grosse Anzahl von Fasern durch eine etwas dickere Bindegewebshülle (Perimysium intern. *P*) umfasst wird, kommt es zur Bildung eines Muskelbündels.

Eine Summe von Muskelbündeln¹⁾ bildet alsdann einen Muskel, der an seiner Oberfläche von einer noch dickeren Bindegewebshülle, dem Perimysium externum, umgeben wird. Sämmtliche Perimysien hängen unter sich zusammen.

Das Perimysium besteht aus fibrillärem Bindegewebe, feinen elastischen Fasern²⁾, enthält zuweilen Fettzellen und ist der Träger der Nerven, Blut- und Lymphgefäße. Im Perimysium der einzelnen Muskelfaser sind nur Kapillaren und die Endäste der Nerven enthalten.

Die Sehnen sind durch den parallelen Verlauf ihrer Fasern, durch ihre feste Vereinigung, sowie durch die Armuth an elastischen Fasern charakterisirt.

Fig. 69.

A Stück eines Querschnittes einer getrockneten Sehne eines erwachsenen Menschen, 50mal vergr. Technik Nr. 59, pag. 114. — B Stück eines Querschnittes einer mit Chromsäure fixirten Sehne eines erwachsenen Menschen. Technik Nr. 60, pag. 115.

Sie bestehen aus straff-faserigen Bindegewebsbündeln, den „Sehnenbündeln“ welche von lockerem Bindegewebe zusammen gehalten werden. Jedes dieser (sogen. sekundären) Sehnenbündel besteht aus einer Anzahl ganz gerade verlaufender Fibrillen, die durch eine geringe Menge von Kittsubstanz zu kleineren (sogenannten primären) Bündeln vereinigt werden. Zwischen den primären Bündeln sind die zelligen Elemente der Sehnen gelegen, das sind bald spindel- oder sternförmige, bald vierseitige, platte, reihenweise hinter einander gestellte Bindegewebszellen, welche hohlziegelartig gekrümmt die primären Bündel unvollkommen umfassen und sich durch Ausläufer mit Nachbarzellen verbinden. Elastische Fasern sind nur im lockeren Binde-

1) Die Eintheilung in sekundäre Bündel, die in einer gewissen Anzahl tertiäre Bündel bilden, aus deren Vereinigung endlich ein Muskel sich aufbauen soll, ist eine durchaus willkürliche und lässt sich an vielen Präparaten gar nicht erkennen.

2) Im Perimysium externum sind sie besonders reichlich vorhanden.

gewebe in grösserer Menge vorhanden, in den straffen Sehnenbündeln selbst sind sie nur sehr spärlich in Form feiner, weitmaschiger Netze zu finden.

Die Verbindung der Muskeln mit Sehnen und fibrösen Häuten (Periost, Fascien) erfolgt so, dass das Perimysium der einzelnen Muskelfaser in das Gewebe der Sehne (resp. des Periostes etc.) übergeht; das Sarkolemm hat dabei keinen Antheil, sondern endet der Muskelfaser eng anliegend, als ein geschlossener, schräg abgestutzter (Fig. 71) oder zugespitzter Schlauch. Beim Ausstrahlen quergestreifter Muskelfasern in die Haut setzen sich diese mit zugespitzten oder getheilten Enden an das Bindegewebe der Haut.

Fig. 70.

Stücke von Sehnen aus dem Schwänze einer Ratte 240 mal vergr.
A Sehnenzellen von der Kante, B von der Fläche gesehen; bei X ist der Kern so gebogen, dass man ihn theils von der Kante (die dunkle Partie), theils von der Fläche (die helle Partie) sieht.
Technik Nr. 61, pag. 115.

Fig. 71.

Stück eines sagittalen Längsschnittes des Musc. gastrocnemius des Frosches 50 mal vergrössert. Der oberste Strich deutet auf Perimysium von der Fläche (als quere Linien) gesehen.
Technik Nr. 62, pag. 115.

Die Fascien zeigen zum Theil den gleichen Bau wie die Sehnen, zum Theil sind sie mit elastischen Fasern reichlich versehene bindegewebige Häute; letzteres ist der Fall da, wo die Fascien nur Hüllen um die Muskeln, nicht aber Ansatzflächen für Muskelfasern bilden.

Die Sehnenscheiden und die Schleimbeutel bestehen aus einer verschieden dicken Lage von Bindegewebe mit elastischen Fasern, dessen Innenfläche stellenweise von einem „Endothel“, das ist eine meist einfache Lage polygonaler Zellen, überkleidet wird. Wo das Endothel fehlt, ist das Bindegewebe derb und reich an rundlichen den Knorpelzellen ähnlichen Elementen. In den meisten Sehnenscheiden kommen kleine, den Synovialzotten vollkommen gleichende, blutgefässführende Fortsätze vor.

Die Blutgefässe der quergestreiften Muskeln sind sehr zahlreich, die Kapillaren gehören zu den feinsten des menschlichen Körpers

und bilden ein Netz langgestreckt rechteckiger Maschen. Die spärlichen Lymphgefäße verlaufen mit den Verästelungen der kleineren Blutgefäße.

Ueber die theils sensiblen, theils motorischen Nerven der quergestreiften Muskeln s. bei Nervenendigungen.

Die Blutgefäße der Sehnen und der schwächeren Fascien sind sehr spärlich und nur in dem lockeren, die Sehnenbündel umhüllenden Bindegewebe enthalten; die Sehnenscheiden dagegen und die Schleimbeutel sind reich an Blutgefäßen. Lymphgefäße finden sich nur an der Oberfläche der Sehnen.

Die markhaltigen Nerven der Sehnen laufen zum Theil in ein dichtes Netz markloser Nervenfasern aus, zum Theil aber gehen sie in spindelförmige Auftreibungen der Sehnen, in die sog. „Sehnenspindeln“ über, woselbst sie in einer den motorischen Endplatten (pag. 135) ähnlichen Bildung enden. Auch Endkolben und Vater'sche Körperchen (s. pag. 133) finden sich in Sehnen, Fascien und Sehnenscheiden.

TECHNIK.

Nr. 58. Bündel quergestreifter Muskeln. Man mache mit einem scharfen Rasirmesser in einen parallelfaserigen Muskel (z. B. in einen Adduktor des Kaninchens) einen tiefen, quer zum Faserverlauf gerichteten Einschnitt und 2—3 cm abwärts von diesem einen zweiten Schnitt, verbinde beide durch Längsschnitte und präparire, ohne zu zerren, das so umschriebene Stück vorsichtig heraus. Fixiren in 100 ccm 0,1%iger Chromsäure (pag. 5), nach 14 Tagen 2—3 St. in fließendem Wasser auswaschen, und in 50 ccm allmählich verstärktem Alkohol härten (pag. 14). Querschnitte ungefärbt in verdünntem Glycerin betrachten (Fig. 68). Man sieht sehr verschieden dicke Muskelfasern, die ganz dünnen sind querdurchschnittene Enden. Obwohl die Muskelfasern cylindrisch sind, also im Durchschnitte rund sein sollen, erscheinen sie hier durch gegenseitigen Druck unregelmässig polygonal. Die Farbe der Querschnitte ist sehr verschieden, einzelne ganz dunkel, andere ganz hell; der Grund dieser Erscheinung ist mir unbekannt. Das Perimysium der einzelnen Muskelfaser ist besser bei starken Vergrößerungen (240 mal) zu sehen.

Nr. 59. Sehnen. Man schneide ein 5—10 cm langes Stück einer Sehne aus und lasse dasselbe an der Luft (nicht an der Sonne) trocknen. Dünne Sehnen (z. B. die des *M. flexor. digit. pedis*) sind bei Zimmertemperatur schon nach 24 Stunden hinreichend trocken, dickere bedürfen mehrere Tage. Dann stelle man mit dem Skalpell (nicht mit dem Rasirmesser) eine glatte Querschnittfläche dar, und schnitzte feine Spähne von der Sehne, indem man den Daumen der rechten Hand an die eine Seite, das von den übrigen Fingern gehaltene Skalpell an die andere Seite der Sehne ansetzt. Die meist sehr kleinen Spähne werden in ein Schälchen mit destillirtem Wasser geworfen und nach 2 Minuten in einem Tropfen destillirten Wassers betrachtet (Fig. 69, A); will man konserviren, so färbe man in 3 ccm Pikrokarmine (5 Minuten lang) und schliesse in verdünntem Glycerin (pag. 6) ein. Sehr häufig sieht man auf dem Querschnitte eine das ganze Präparat durchziehende Streifung, welche durch die Messerführung entstanden ist.

Einen zweiten Schnitt bringe man ungefärbt in einem Tropfen Wasser auf den Objektträger und lasse dann unter dem Deckglase einen Tropfen Essigsäure zufließen. Die Randpartien des Querschnittes werden alsbald zu gewundenen Bändern aufquellen.

Nr. 60. Zum Studium des feineren Baues der Sehne, der Zellen und ihrer Ausläufer lege man möglichst frische, dünne Sehnen (z. B. die des *M. palmar. long.*) in ca. 3 cm langen Stücken in 100 cem 0,5⁰/₁₀₀ige Chromsäure auf mindestens 4 Wochen. Mehrmaliger Wechsel der Chromsäure während dieser Zeit zu empfehlen. Dann werden die Stücke 1—2 Stunden in (womöglich fließendem) Wasser ausgewaschen und in ca. 40 cem allmählich verstärktem Alkohol gehärtet (pag. 14). Die Querschnitte sind mit sehr scharfem Messer anzufertigen, denn oft sind die Sehnen noch sehr spröde und blättern beim Schneiden. Die Schnitte selbst brauchen nicht sehr dünn zu sein. Man konservire sie ungefärbt in verdünntem Glycerin. Schon schwache Vergrößerung ergibt zierliche Bilder, die bei auffallendem Lichte (bei verhülltem Spiegel) viel schöner sind, als die nach Nr. 59 hergestellten Präparate. Starke Vergrößerungen zeigen Bilder, wie Fig. 69, *B*. Die schwarzen zackigen Hohlräume (*z*) sind theilweise von den Sehnenzellen eingenommen.

Nr. 61. Sehnenzellen. Man schneide aus dem Schwanz einer Ratte oder einer Maus Sehnenstückchen von 0,5—1 cm Länge und lege sie in ca. 5 cem Alaunkarmin. Am nächsten Tage (oder später) bringe man die aufgequollenen Stückchen auf einen trockenen Objektträger und zerfasere sie rasch (pag. 10). Man braucht keine sehr feinen Sehnenbündel herzustellen, man achte nur darauf, dass die Bündel gestreckt liegen. Dann bedecke man das Präparat mit einem Tropfen destillirtem Wasser und einem Deckglase. Bei schwachen Vergrößerungen sieht man die Reihen von Zellen meist nur als dunkle Striche, das sind die Zellkerne von der Kante gesehen; andere Stellen zeigen die Kerne mattröth: Flächenbilder. Den Körper der Zellen, das Protoplasma, sieht man erst bei Anwendung der starken Vergrößerung als scharfen, dunklen Strich in der Seitenansicht (Fig. 70 *A*), dagegen mehr blass und zart in der Flächenansicht (Fig. 70, *B*). Nicht selten sieht man die Zellen geknickt, so dass die Zelle theils von der Kante, theils von der Fläche sichtbar ist. Die Bindegewebsfasern sind als feine parallel laufende Striche zuweilen zu sehen; stets sieht man die feinen scharf konturirten, elastischen Fasern. Man versäume nicht, mit Hilfe der Mikrometerschraube die ganze Dicke des Präparates zu durchmustern. Sind die Zellen nicht deutlich, so lasse man einen Tropfen Essigsäure zufließen (pag. 26). Will man konserviren, so ersetze man das Wasser durch verdünntes Glycerin (pag. 6).

Nr. 62. Muskel und Sehne. Man präparire einem soeben getödteten Frosche die Haut des Unterschenkels ab, schneide mit einer Scheere das Bein über dem Kniegelenke (dem Ursprung des *M. gastrocnemius*) ab und fixire Unterschenkel und Fuss in 50 cem Kleinenberg'scher Pikrinschwefelsäure (pag. 13). Nach ca. 24 Stunden direkt in 50 cem 70⁰/₁₀₀igen Alkohol zur allmählichen Härtung (pag. 14); nach ca. 6 Tagen schneide man den *M. gastrocnemius* mit einem Stücke der Achillessehne ab und bringe ihn zum Durchfärben in Boraxkarmin (pag. 19); dann abermaliges Härten mit 90⁰/₁₀₀igem Alkohol. Beim Schneiden (sagittale, dicke Längsschnitte) setze man das Rasirmesser zuerst an die auf der Hinterfläche des Muskels befind-

liche Sehne. Konserviren in Damarfirniß (pag. 23). Die Querstreifung ist an den Muskelfasern oft spurlos verschwunden (Fig. 71).

IV. Organe des Nervensystems.

1. Centrales Nervensystem.

Rückenmark.

Das Rückenmark besteht aus zwei, schon mit unbewaffnetem Auge unterscheidbaren Substanzen, einer weissen und einer grauen, deren Lagerungsbeziehungen am besten an Querschnitten des Rückenmarks erkannt werden können.

Die weisse Substanz schliesst die graue Substanz rings ein und wird durch einen tiefen vorderen Längsspalt, die *Fissura longitudinalis anterior*, und ein hinteres Septum (früher „*Fiss. long. post.*“) unvollständig in eine rechte und linke Hälfte getrennt. Jede Hälfte zerfällt durch die Austrittsstellen der vorderen und hinteren Nervenwurzeln in einen grossen Seitenstrang, in einen Vorder- und einen Hinterstrang. Im unteren Hals- und oberen Brusttheile des Rückenmarkes lässt jeder Hinterstrang zwei Abtheilungen unterscheiden, von denen die mediale zarter Strang (*Goll'scher Str.*, *Funic. gracil.*), die laterale Keil-Strang (*Funiculus cuneatus*) heisst.

Die graue Substanz erscheint auf dem Querschnitte in Form eines H, besteht also im Ganzen aus zwei seitlichen Säulen, welche durch ein frontal gestelltes Blatt, die graue Kommissur, mit einander verbunden werden. An jeder Säule unterscheiden wir ein dickeres Vorderhorn und ein schlankeres Hinterhorn. Am lateralen Theile des Vorderhorns in gleicher Frontalebene mit dem Centralkanale findet sich das besonders im oberen Theile des Brustmarkes deutlich ausgeprägte Seitenhorn. Vom vorderen Umfange der Vorderhörner entspringen in mehreren Bündeln die vorderen, von der medialen Seite der Hinterhörner die hinteren Wurzeln der Spinalnerven. An der lateralen Seite der Hinterhornbasis finden sich verflochtene Fortsätze der grauen Substanz, der *Processus reticularis*. Etwas rückwärts von diesem liegt eine, besonders makroskopisch gut wahrnehmbare, gallertartige Masse, die *Substantia gelatinosa Rolandi*, an deren hinterem Rande die Randzone, ein Feld quer durchschnittener feiner Nervenfasern sich befindet. In der grauen Kommissur liegt der Querschnitt des das ganze Rückenmark durchziehenden Centralkanales, welcher von einer ähnlichen Masse, der *Substantia gelatinosa centralis*, umgeben ist. Der Centralkanal ist 0,5—1 mm weit und nicht selten obliterirt. Der vor dem Centralkanale liegende Abschnitt der grauen Kommissur wird vordere, der hinter dem Kanale befindliche hintere Kommissur genannt. Die graue Substanz ist im Hals- und

Lendentheile des Rückenmarkes mächtiger als im Brusttheile entwickelt; dem entsprechen Formvariationen der H-Figur. Das Ende des Conus medullaris besteht fast nur aus grauer Substanz.

Was den feineren Bau des Rückenmarkes betrifft, so besteht die weisse Substanz nur aus markhaltigen Nervenfasern (pag. 68), bei denen die Schwann'sche Scheide jedoch nicht vorhanden ist. Die Dicke der Fasern ist sehr verschieden; die dicksten Fasern finden sich in den Vordersträngen

Fig. 72.

Querschnitt durch den Brusttheil des Rückenmarkes eines drei Wochen alten Kindes, 13mal vergrössert. Die vorderen Wurzelfasern sind, da sie schräg absteigen, im Querschnitte nur wenig zu sehen. Die hellen Fäden gehören dem Stützgerüste des Rückenmarkes an. X Blutgefäss. Technik Nr. 64, pag. 137.

und an den lateralen Theilen der Hinterstränge, die feinsten in den medialen Theilen der Hinterstränge, und in den Seitensträngen da, wo die weisse Substanz an die graue stösst. In den übrigen Partien sind dicke und dünne Fasern gemischt vorhanden. Die meisten Nervenfasern verlaufen der Längsachse des Rückenmarkes parallel, sind also im Querschnitte quer getroffen. Ausserdem kommen schräg verlaufende Fasern vor. Solche liegen in grösserer Anzahl vor der grauen Commissur und bilden, sich spitzwinkelig kreuzend, die weisse Commissur (Fig. 72).

Die graue Substanz besteht nicht nur aus Nervenfasern, sondern auch aus Nervenzellen. Die Nervenfasern sind zum Theil markhaltig, zum Theil marklos. Erstere verästeln sich vielfach und treten zum Theil

aus der weissen Substanz herüber; ein anderer Theil der markhaltigen Fasern wird zu marklosen Fasern, die sich vielfach theilend in einem sehr dichten Gewirr feinsten Fibrillen frei enden, welches bekanntlich auch durch die Fortsätze

Fig. 73.

Aus einem Querschnitte des menschlichen Rückenmarkes. Weisse Substanz, 560 mal vergr. Technik Nr. 65, pag. 138.

der Nervenzellen gebildet wird (pag. 67). Die Nervenzellen (Ganglienzellen) sind von sehr verschiedener Grösse; sie finden sich theilweise vereinzelt, theilweise in Gruppen, vorzugsweise im Vorderhorn, das auch die grössten Nervenzellen enthält. Ein anderer Theil der (hier kleineren) Nervenzellen liegt in der Substantia gelatinosa Rolandi und in den Hinterhörnern. Im unteren Brust- und oberen Lendentheile (weniger deutlich im Sakral- und Halstheile) des Rückenmarkes ist jederseits eine Gruppe von Zellen als

Clarke'sche Säule (Fig. 72) bekannt. Sie befindet sich in der medialen Hälfte des Hinterhornes nahe der grauen Kommissur. Die Fortsätze der Nervenzellen verhalten sich sehr verschieden; die grossen motorischen Nervenzellen der Vorderhörner sind durch reichverzweigte Protoplasmafortsätze ausgezeichnet; ihr Nervenfortsatz tritt in die vordere Wurzel ein (siehe unten); andere Nervenzellen der Vorderhörner und auch der Hinterhörner schicken ihren Nervenfortsatz nur in die weisse Substanz derselben Seite, woselbst dieser zuerst parallel der Rückenmarkslängsachse verläuft, dann aber unter rechtem Winkel in die graue Substanz umbiegend dort frei verästelt endet. Während des Längsverlaufes zweigen sich zahlreiche Seitenäste („Collateralen“) rechtwinklig ab um ebenfalls in der grauen Substanz frei verästelt zu enden. Wieder andere Zellen der Vorderhörner schicken ihren Nervenfortsatz durch die vordere Kommissur in die weisse Substanz der anderen Seite, theilen sich hier in einen auf- und einen absteigenden Ast, dessen Verzweigung und Endigung die gleiche ist wie bei den letztgenannten Zellen. Die Nervenfortsätze der Zellen der Clarke'schen Säulen treten in den Seitenstrang über.

Die (motorischen) vorderen Wurzeln des Rückenmarkes bestehen aus markhaltigen Nervenfasern, deren Achsencylinder die direkte ungetheilte Fortsetzung des Nervenfortsatzes einer motorischen Ganglienzelle ist. Die (sensitiven) hinteren Wurzeln bestehen aus Nervenfasern, deren Achsencylinder von den centralen Ausläufern der Spinalganglienzellen stammt. Jeder derselben theilt sich alsbald nach seinem Eintritt in die weisse Substanz des Rückenmarkes noch im Bereich der Hinterstränge oder in der Randzone in zwei „Stammfasern“, deren eine auf- deren andere abwärts verläuft und endlich in die graue Substanz umbiegend dort frei verästelt endet. Auch von diesen Stammfasern gehen rechtwinklig zahlreiche Collateralen ab, die ebenfalls in die graue Substanz eintretend dort frei verästelt enden.

Das Stützgerüst des Rückenmarkes (sowie das des Gehirnes) wird durch zwei genetisch scharf getrennte Bildungen hergestellt: 1. durch Fort-

setzungen der bindegewebigen Pia mater, welche als Hüllen von Gefässen in die weisse Substanz eindringen. Dieses bindegewebige Stützgerüst wird gegen die graue Substanz zu immer dünner und erstreckt sich nicht in diese hinein. 2. Durch die Neuroglia (Nervenkitt), eine weiche, gleichartige Substanz, die aus der gleichen embryonalen Anlage wie das Centralnervensystem stammt. Die Neuroglia ist zwischen den einzelnen Nervenfasern und Ganglienzellen gelegen, wie die Kittsubstanz zwischen Epithelzellen und enthält Fasern und diesen anliegend, platte, kernhaltige Zellen, die Gliazellen, in sehr wechselnder Menge (Fig. 74). Die

Fig. 74.

Aus einem Durchschnitt der weissen Substanz des menschlichen Gehirnes. Die feinen Fasern sind keine Fortsetzungen der Gliazellen, wie es an solchen Präparaten den Anschein hat, sondern liegen den Zellen nur an. 260mal vergrössert. Technik Nr. 68, pag. 138.

Gliafasern bilden in der weissen Substanz des Grosshirns, ferner an der Oberfläche des Rückenmarkes und des Gehirns dichte Netze. Sie sind dort als granulirte Substanz, gelatinöse Rindenschicht, oder die Hornspongiosa bekannt. Relativ arm an Neuroglia ist die weisse Substanz des Rückenmarkes und des verlängerten Markes, am spärlichsten aber sind die Neurogliafasern in der Substantia gelatinosa Rolandi, welche in einer reichlichen Grundsubstanz durchtretende Nervenfasern und sensitive Ganglienzellen enthält. Zur Neuroglia gehören noch die cylindrischen „Ependymzellen“, welche in einfacher Lage das Lumen des Centralkanales auskleiden. Sie sind in der Jugend mit Flimmerhaaren besetzt und reichen mit ihren zugespitzten, vielfach verzweigte Seitenäste abgehenden Basen bis zur Rückenmarksoberfläche. Durch diese Seitenäste bilden die Zellen einen ansehnlichen Theil der Neuroglia. Später kommt es nicht selten zu einer vollkommenen Obliteration des Centralkanales, wobei die Cylinderzellen selbst sehr verändert sind. Die nächste Umgebung des Centralkanales (Substantia gelatinosa centralis) enthält die dichtesten Gliafasernetze. Diese und die Cylinderzellen werden auch centraler Ependymfaden des Rückenmarkes genannt.

Gehirn.

Die verhältnissmässig einfache Gruppierung der Theile des Rückenmarkes erfährt schon in der Medulla oblongata eine namhafte Komplikation

Fig. 75.

Stück eines senkrechten Schnittes der Grosshirnrinde des Menschen. 60mal vergr. Technik Nr. 66, pag. 133.

und zwar durch Umlagerung der schon vorhandenen Gebilde sowie durch Auftreten neuer grauer Substanzmassen, die „Kerne“ (z. B. Nucleus dentatus olivae) genannt werden. Und doch sind die daselbst befindlichen Komplikationen gering zu nennen im Vergleiche mit den in Klein- und Grosshirn bestehenden Einrichtungen. Hier reichen die der mikroskopischen Anatomie zur Verfügung stehenden Mittel nicht aus, hier sind wir auf die Hilfe der Entwicklungsgeschichte, sowie auf die Erfahrungen angewiesen, welche wir aus dem Studium des erkrankten Centralnervensystems (der unter gewissen Bedingungen eintretenden sekundären Degenerationen) schöpfen. Eine eingehende Benutzung dieser Hilfsmittel, ein Wiedergeben der durch sie gewonnenen Resultate würde von unserem hier gesteckten Ziele weitab führen und den Umfang dieses Buches über Gebühr ausdehnen. Unter diesen Umständen kann die Beschreibung des Gehirnes nur in fragmentarischer Behandlung zur Ausführung gelangen.

Das Gehirn besteht wie das Rückenmark aus weisser und grauer Substanz, welche hinsichtlich ihres feineren Baues im Ganzen mit jenen des Rückenmarkes übereinstimmen. Die Vertheilung der beiden Substanzen aber ist im Gehirn eine viel mannigfaltigere, als im Rückenmarke.

Die graue Substanz kommt im Gehirn in vier Anhäufungen vor:

a) Als eine die gesammte Ober-

fläche der Grosshirnhemisphären überziehende Ausbreitung, die Grosshirnrinde,

- b) in Form diskreter Herde, welche in den Grosshirnganglien (Streifenhügel, Sehhügel und Vierhügel) ihren Sitz haben,
- c) als Auskleidung der Hirnhöhlen: Grau der centralen Höhlen („centrales Höhlengrau“); dasselbe ist die direkte Fortsetzung der grauen Substanz des Rückenmarkes,
- d) als eine die Kleinhirnoberfläche überziehende Ausbreitung, die Kleinhirnrinde.

Auch im Innern des Kleinhirns finden sich diskrete Herde.

Alle diese Anhäufungen stehen durch Faserzüge weisser Substanz mit einander in vielfacher Verbindung.

ad a) Grosshirnrinde.

Sie besteht aus vier nicht scharf von einander abgrenzbaren Schichten. Der Oberfläche am Nächsten liegt 1. die Neurogliaschicht, die zum grössten Theile aus vielen Gliazellen und dicht verfilzten Gliafasern besteht; sie enthält ausserdem kleine polygonale und spindelförmige Ganglienzellen, ferner die Endverzweigungen der Pyramidenzellen und ein dichtes Flechtwerk markhaltiger Nervenfasern. Die Richtung dieser sog. Tangentialfasern ist meist eine der Oberfläche parallele. Auf diese folgt 2. die Schicht der kleinen Pyramidenzellen. Hier finden sich ausser einem Flechtwerke dünner, markhaltiger Nervenfasern und kleinen, unregelmässig gestalteten Ganglienzellen (sog. „Körnern“) kleine Ganglienzellen von pyramidenförmiger Gestalt; die Spitze derselben ist der Gehirnoberfläche, die Basis, aus welcher der Nervenfortsatz entspringt, der weissen Substanz (dem Marke) zugewendet. Der grösste Theil der Nervenfortsätze verläuft zum Mark, ein Theil aber geht umbiegend in die Tangentialfasern über. Diese zweite Schicht geht ohne scharfe Grenze über in 3. die Schicht der grossen Pyramidenzellen, die von gleicher Form wie die kleinen Pyramidenzellen sich von diesen nur durch ihre bedeutende Grösse ¹⁾ unterscheiden. Sie setzt sich fort in 4. die Schicht der kleinen Nervenzellen, Zellen von geringer Grösse und unregelmässiger Gestalt. Beide letzteren Schichten enthalten zahlreiche markhaltige Nervenfasern, welche zu „radiären“ Bündeln geordnet aus dem Marke heraufsteigen und erst gegen die Schicht der kleinen Pyramidenzellen hin sich auflösend enden; ausserdem besteht ein interradiäres Flechtwerk markhaltiger Nervenfasern, die meist senkrecht zu den Radiärbündeln verlaufen. Dieses Flechtwerk ist an der Grenze gegen das in der zweiten Schicht befindliche superradiäre Flechtwerk etwas verdichtet und bildet so den Gennari'schen (oder Baillarger'schen) Streifen.

¹⁾ Die Länge schwankt zwischen 11 und 120 μ .

Der Bau der Grosshirnrinde erfährt an bestimmten Stellen gewisse Modifikationen. So sind am Gyrus hippocampi und G. uncinatus die Tangentialfasern in grösserer Menge vorhanden und bilden eine netzförmig ausgebreitete, weisse Lage (Substantia reticularis alba). In der Umgebung der Fissura calcarina ist der Gennari'sche Streifen zu dem schon mit unbewaffnetem Auge wahrnehmbaren Vicq d'Azyr'schen Streifen entwickelt. Ausserdem finden sich an vielen Stellen geringere und bedeutendere Abweichungen, welche eine Eintheilung nach der oben gegebenen Schilderung sehr erschweren können.

Endlich betheiligen sich an dem Aufbaue der Grosshirnrinde noch die von der Pia her eindringenden, Blutgefässe führenden, bindegewebigen Fortsetzungen sowie Neuroglia (pag. 119).

ad b) Grosshirnganglien.

Die graue Substanz der Grosshirnganglien besteht aus Ganglienzellen von verschiedener Grösse, markhaltigen Nervenfasern und Neuroglia. Die makroskopisch zu Tage tretenden Farbenunterschiede beruhen auf verschiedenen Mischungsverhältnissen von multipolaren Ganglienzellen und Nervenfasern; Reichthum an Ganglienzellen macht sich durch eine dunkle, rothbraune, Reichthum an Nervenfasern durch eine helle, gelbgraue Farbe bemerklich.

ad c) Grau der centralen Höhlen.

Dasselbe erstreckt sich vom Boden der Rautengrube durch den Aqueductus Sylvii bis in die mittlere Gehirnkammer und bis zu dem Tuber cinereum und dem Infundibulum. Das Grau ist als die Ursprungsstätte der Hirnnerven besonders bemerkenswerth. Es besteht aus Neuroglia, Nervenfasern und Ganglienzellen, die meist multipolar sind, an einzelnen Stellen aber durch ihre Grösse (z. B. im Hypoglossuskerne) oder durch ihre eigenartige Gestalt (kugelige Ganglienzellen im oberen Vierhügelpaare) ausgezeichnet sind.

Wie der Centralkanal des Rückenmarkes von Neuroglia und Cylinderzellen ausgekleidet wird, so wird auch die Fortsetzung desselben (Boden der Rautengrube, Aqueductus Sylvii, innere Oberfläche der mittleren und der seitlichen Gehirnkammer) von dem ebenso zusammengesetzten Ependym der Ventrikel ausgekleidet, dessen cylindrische oder kubische Zellen bei Neugeborenen und z. Th. auch noch bei Erwachsenen Flimmerhaare tragen.

ad d) Kleinhirnrinde.

Sie besteht aus drei Schichten, von denen die innerste und die äusserste schon makroskopisch, die mittlere dagegen nur mikroskopisch erkennbar ist.

1. Die innerste Schicht (rostfarbene oder Körnerschicht) besteht aus vielen Lagen kleiner Zellen, deren Kern gross, deren Protoplasma nur

gering entwickelt ist. Sie sind theils Gliazellen, grösstentheils aber multipolare Ganglienzellen, deren Nervenfortsatz senkrecht in die äusserste Schicht

Fig. 76.

Stück eines senkrechten Schnittes durch die Kleinhirnrinde des Menschen, 50mal vergrössert.
Technik Nr. 67, pag. 138.

zieht und dort unter rechtem Winkel in zwei Aeste sich theilt, welche längs der Windung, parallel der Oberfläche derselben verlaufen und unverästelt frei enden¹⁾. In dieser Schicht findet sich ein dichtes Geflecht markhaltiger Nervenfasern; eine Anzahl derselben tritt in die äusserste Schicht über und bildet dort dichte Geflechte (die „kletternenden Plexus“), welche die Verzweigungen der Purkinje'schen Zellen umspinnen. Die Verbindung besteht hier — wie überall — nur durch Kontakt, nicht durch direkten Zusammenhang.

2. Die mittlere Schicht besteht nur aus einer einfachen Lage grosser, rundlicher, multipolarer Ganglienzellen („Purkinje'sche Zellen“).

Fig. 77.

Stück eines senkrechten Schnittes der Kleinhirnrinde des Menschen. Purkinje'sche Zelle, 80mal vergrössert.
Technik Nr. 68, pag. 138.

Von der der Kleinhirnoberfläche zugewendeten Seite der Zellen gehen meist zwei (Protoplasma-)Fortsätze aus, deren nächste Verästelungen mit der Form eines Hirschgeweihes grosse Ähnlichkeit haben. Von der entgegengesetzten Seite entspringt der Achsencylinderfortsatz (Fig. 77), welcher die innerste Schicht durchziehend in die weisse Substanz des Kleinhirns übergeht; noch innerhalb der innersten Schicht schiebt er einen Seitenast ab, der wieder in die Höhe steigend sich nahe dem Körper der Purkinje'schen Zelle verästelt. An der Grenze zwischen innerer und mittlerer Schicht verlaufen in horizontaler

¹⁾ Ausserdem finden sich noch hier spärliche grössere multipolare Ganglienzellen mit vielfach verästelttem Nervenfortsatz, der nicht über die innerste Schicht hinauszureichen scheint.

Richtung markhaltige Nervenfasern, von welchen eine Menge in die graue Schicht übertreten.

3. Die äusserste „graue“ Schicht ist durch ihre graue Farbe charakterisirt. Sie besteht aus Neuroglia, aus Nervenfasern, aus den Fortsätzen der sub 1 und 2 beschriebenen Zellen und aus einer ziemlichen Anzahl kleiner multipolarer Ganglienzellen („Korbzellen“). Letztere senden, soweit sie in der unteren Hälfte der grauen Schicht liegen, je einen langen in der Querrichtung der Windungen verlaufenden Nervenfortsatz aus, von diesem entstehen feine Aeste, die mit ihren Endverzweigungen die Purkinjeschen Zellen korbartig umfassen.

Die weisse Substanz des Gross- wie des Kleinhirns, das „Mark“, besteht abgesehen von den Elementen des Stützgerüsts (Bindegewebe und Neuroglia), durchaus aus markhaltigen Nervenfasern, deren Dicke zwischen 2,5 und 7 μ schwankt. Die Schwann'sche Scheide fehlt.

Die Hypophysis cerebri besteht aus zwei genetisch verschiedenen Theilen: 1. einem hinteren, kleineren Lappen, der dem Gehirn (Fortsetzung des Infundibulum) angehört; derselbe enthält aber nur wenig Nervenfasern, sondern meist Bindegewebe, viele Blutgefässe und Zellen, die bipolaren oder multipolaren Ganglienzellen sehr ähnlich sind; 2. einem vorderen grösseren Lappen, welcher einer Ausstülpung der embryonalen Mundbucht sein Dasein

Fig. 78.

Stück eines Horizontalschnittes der Hypophysis cerebri des Menschen. 220mal vergrössert. Es ist die Grenze zwischen vorderem und hinterem Lappen getroffen. Links enthalten zwei Drüsen-schläuche je eine dunklere Epithelzelle. Technik Nr. 70, pag. 139.

verdankt. Dieser Lappen enthält eingebettet in lockeres, Gefässe tragendes Bindegewebe Drüsen-schläuche, die meist solid sind und von kubischen bald helleren, bald dunkleren Epithelzellen ausgefüllt werden (Fig. 78). Nur wenige (an der Grenze gegen den kleineren Lappen befindliche)

Schläuche sind hohl und enthalten zuweilen eine dem Colloid (siehe Schilddrüse) ähnliche Masse.

Die Zirbel (Epiphysis) ist aus einer Falte der primitiven Hirnwand hervorgegangen und besteht aus (Epithel-) Zellen, die theilweise mit zarten Ausläufern versehen sind, und einer bindegewebigen Hülle, von welcher Fortsetzungen in's Innere der Zirbel gehen. In der Zirbel finden wir fast regelmässig den Hirnsand, *Acervulus cerebri*, sehr verschieden grosse,

Fig. 79.

Hirnsand aus der Zirbel einer 70-jährigen Frau, 50 mal vergr. Technik Nr. 71, pag. 139.

Fig. 80.

Aus einem Zupfpräparate der grauen Höhlenschicht des Menschen, 240 mal vergrössert. *a* Corpuscula amyloacea. *b* Myelintropfen. *c* Rote Blutkörperchen. *d* Ependymzellen. *e* Markhaltige Nervenfasern. *f* Ganglienzellen. Technik Nr. 72, pag. 140.

rundliche Konkretionen mit unebener maulbeerartiger Oberfläche (Fig. 79). Sie bestehen aus einer organischen Grundlage und kohlensaurem Kalk nebst phosphorsaurem Magnesia.

Nicht selten (besonders im Alter) finden sich in der Hirnsubstanz runde oder biskuitförmige Körper (Fig. 80 *a*) mit deutlicher Schichtung, welche sich mit Jod und Schwefelsäure violett färben, also dem Amylum verwandt sind. Diese

Corpuscula amyloacea sind fast regelmässig an den Wänden der Hirnhöhlen, aber auch noch an vielen anderen Orten, sowohl in der grauen, wie in der weissen Substanz vorhanden.

Hüllen des Centralnervensystems.

Zwei bindegewebige Häute umschliessen Hirn und Rückenmark: die harte und die weiche Hirn- (resp. Rückenmarks-) Haut.

Die harte Rückenmarkshaut (*Dura mater spinalis*) besteht aus straffaserigem Bindegewebe und vielen elastischen Fasern, dazu kommen platte Bindegewebs- und Plasmazellen (s. pag. 51 und Figur 83). Ihre innere Oberfläche ist mit einer einfachen Lage platter Epithelzellen überzogen. Sie ist arm an Blutgefässen und Nerven.

Die harte Hirnhaut (*Dura mater cerebri*) ist zugleich Periost der inneren Schädelfläche und besteht aus zwei Schichten: 1. aus einer inneren, welche der *Dura mater spinalis* entspricht und ebenso gebaut ist wie diese und 2. aus einer äusseren Schicht, welche dem Periost des Wirbelkanals entspricht. Sie besteht aus den gleichen Elementen wie die innere Schicht, nur verlaufen die äusseren Fasern in einer die inneren Fasern kreuzenden Richtung. Die äussere Schicht ist reich an Blutgefässen, welche von da in die Schädelknochen eindringen.

Die weiche Hirn- (resp. Rückenmarks-) Haut ist ein zweiblättriger Sack. Das äussere Blatt („Arachnoidea“ der Autoren) ist an seiner freien Oberfläche mit einer einfachen Epithelzellenschicht bekleidet und steht mit der Dura mater in keiner festen Verbindung. Das innere Blatt („Pia mater“) liegt der Hirn- (resp. Rückenmarks-) oberfläche fest auf und schickt gefässhaltige Fortsätze in die Substanz dieser. Arachnoidea und Pia sind durch zahlreiche von der Innenfläche der Arachnoidea zur Aussenfläche der Pia ziehende Bälkchen und Plättchen miteinander verbunden. Von der Aussenfläche der Arachnoidea erheben sich an bestimmten Stellen (zu Seiten des Sinus longitud. sup.) hernienartige Ausbuchtungen, welche die verdünnte Dura mater vor sich herstülpend in die venösen Sinus der letzteren hineinragen. Das sind die sogenannten Arachnoidealzotten, welche unter dem Namen „Pacchionische Granulationen“ lange Zeit für pathologisch gehalten wurden. Die weiche Hirnhaut besteht aus feinen Bindegewebsbündeln und platten Zellen, welche die Innenfläche der Arachnoidea und die oben erwähnten Bälkchen überkleiden.

Die Telae chorioideae und Plexus chorioidei bestehen aus Bindegewebe und zahlreichen Blutgefässen, deren feine Verästlungen zu Läppchen vereint in die Hirnhöhlen hinabhängen. Sie sind von einer einfachen Lage kubischer, beim Neugeborenen flimmernder Epithelzellen überzogen, welche Pigmentkörnchen oder auch Fettpfropfen einschliessen.

Gefässe des Centralnervensystems.

Die Blutgefässe des Centralnervensystems bilden ein in der grauen Substanz engmaschiges, in der weissen Substanz weites Netz von Kapillaren, welche überall mit einander zusammenhängen. Sämmtliche Blutgefässe besitzen noch eine zweite sog. adventitielle Scheide, welche oft nur aus einer einfachen Schicht platter Epithelzellen hergestellt wird (s. ferner unten). Die Wand der venösen Sinus durae matris wird nur durch eine aus platten Epithelzellen gebildete Haut hergestellt.

Lymphbahnen des Centralnervensystems:

1. Zwischen Dura und Arachnoidea findet sich ein kapillarer Spalt, der Subduralraum, welcher mit den tiefen Lymphgefässen und Lymphknoten des Halses (wenigstens bei Kaninchen und Hund), ferner mit den Lymphbahnen der peripherischen Nerven, mit den Lymphgefässen der Nasenschleimhaut, mit feinen Spalten (Saftbahnen) in der Dura und endlich um die Arachnoidealzotten mit den venösen Durasinus zusammenhängt. Die im Subduralraum befindliche Flüssigkeit ist eine sehr spärliche.

2. Der Subarachnoidealraum, das ist der von Balken und Blättchen durchzogene Raum zwischen beiden Blättern der weichen Hirnhaut. Er hängt zusammen mit den Saftbahnen der peripherischen Nerven, mit den Lymphgefässen der Nasenschleimhaut, mit dem Binnenraume der Hirnventrikel

und des Centralkanales. Die im Subarachnoidealraume befindliche Flüssigkeit ist eine sehr reichliche, sie heisst *Liquor cerebrospinalis*.

3. Vom Subarachnoidealraume aus lassen sich noch die innerhalb der adventitiellen Scheide der Blutgefässe befindlichen Räume injizieren. Sie heissen adventitielle Lymphräume.

Dem Lymphgefässsystem können nicht direkt zugezählt werden Räume, welche nur durch Injektion in die Hirnsubstanz selbst gefüllt werden. Diese Räume finden sich 1. in der Umgebung der grösseren Ganglienzellen der Grosshirnrinde, sowie vieler Gliazellen, pericelluläre Räume, 2. ausserhalb der adventitiellen Blutgefässscheiden, perivascular R., 3. zwischen Pia und Hirnsubstanz, epicerebrale R. Sie können als ein eigenes Saftbahnsystem bezeichnet werden.

2. Peripherisches Nervensystem.

Nerven.

Die cerebrospinalen Nerven bestehen zumeist aus markhaltigen Nervenfasern von verschiedener Dicke und nur vereinzelt marklosen Nervenfasern; sie erscheinen deshalb bei auffallendem Lichte weiss. Die Art und Weise ihrer Vereinigung zeigt viele Uebereinstimmung mit derjenigen der quergestreiften Muskelfasern. Dem entsprechend umgibt eine aus lockerem Bindegewebe und elastischen Fasern gebildete, oft Fettzellengruppen enthaltende Hülle, das Epineurium (Fig. 81) den ganzen Nerven. Ins Innere des

Fig. 81.

Stück eines Querschnittes des Nervus medianus des Menschen. 20mal vergröss. Technik Nr. 74, pag. 140.

Nerven ziehende, bindegewebige Fortsetzungen des Epineurium umhüllen die (sogen. sekundären) Nervenfaserbündel, deren jeder von konzentrischen Bindegewebslamellen, dem Perineurium, umfasst wird. Von diesem ausgehende Septa dringen ins Innere des (sekundären) Nervenfaserbündels; man hat sie

Endoneurium genannt. Endlich zweigen sich von diesen wiederum feine Blätter, die „Fibrillenscheiden“ ab, welche (entsprechend dem Perimysium der einzelnen Muskelfaser) jede einzelne Nervenfaser umgeben. Die genannten Hüllen stehen mit Fortsetzungen der harten und weichen Hirnhaut in direkter Verbindung. Perineurium und Endoneurium bestehen nicht nur aus Bindegewebsfasern, sondern auch aus elastischen Fasern und aus einer variablen Zahl konzentrischer Häutchen. Jedes derselben wird durch eine einfache Lage platter Bindegewebszellen gebildet, deren Grenzen durch Höllensteinlösungen sichtbar gemacht werden können. Auch die Fibrillenscheide besteht neben feinen Bindegewebsbündeln aus solchen platten Zellen. Theilungen

Fig. 82.

Stück eines Querschnittes des Nervus medianus des Menschen. 220mal vergr. Technik Nr. 74, pag. 140.

der Nervenfasern kommen während des Verlaufes nicht vor (erst an der Peripherie); dagegen zweigt sich nicht selten eine verschieden grosse Anzahl von Nervenfasern von einem Nervenfaserbündel ab, um sich einem anderen Nervenfaserbündel anzuschliessen. Daraus resultirt ein spitzwinkeliges Geflecht von Faserbündeln.

Die sympathischen Nerven sind theils von mehr weisser, theils von mehr grauer Farbe, welche von der mehr oder weniger grossen Anzahl feiner markhaltiger Nervenfasern herrührt, so enthalten z. B. die Nn. splanchnici viele markhaltige Nervenfasern; in den grauen Sympathicusnerven, z. B. in den Zweigen der Bauch- und Beckengeflechte sind sehr wenige feinste markhaltige, dagegen viele marklose Nervenfasern vorhanden. Ihre Vereinigung geschieht durch Bindegewebe, durch welches sie zu Bündeln zusammengehalten werden. Die grossen Aeste der sympathischen Nerven der Leber, Niere und Milz sind nicht zu soliden Bündeln geordnet, sondern zu Röhren, welche einen axialen Raum (Lymphraum?) begrenzen.

Die Blutgefässe verlaufen innerhalb des Epineurium in longitudinaler Richtung und bilden langgestreckte Kapillarnetze, deren Träger das Peri- und Endoneurium sind.

Die Lymphbahnen finden sich in den kapillaren Spalten zwischen den Lamellen des Perineurium und zwischen den einzelnen Nervenfasern, so dass jede Nervenfaser von Lymphe umspült ist. Sie stehen nur in Zusammenhang mit dem Subdural- und Subarachnoidealraum; gegen die die Nerven umgebenden Lymphgefässe sind sie geschlossen.

Ganglien.

Unter Ganglien verstehen wir im Verlaufe der peripherischen Nerven eingeschaltete Ganglienzellengruppen, die meist makroskopisch sichtbar sind. Alle Ganglien bestehen aus Nervenfasern, die zu kleinen Bündeln vereint sind und zwischen sich die theils in Längsreihen, theils in rundlichen Gruppen gelagerten Ganglienzellen fassen. Eine bindegewebige Hülle, die Fortsetzung des Perineurium, umgibt die äussere Oberfläche des Ganglion und sendet Nerven und Ganglienzellen umfassende Fortsetzungen ins Innere des Ganglion. Die Ganglien sind sehr reich an Blutgefässen, deren Kapillaren die einzelnen Zellen umspinnen. Hinsichtlich des feineren Baues bestehen Unterschiede zwischen den Spinalganglien und den sympathischen Ganglien.

Die Spinalganglien enthalten meist grosse, rundliche Ganglienzellen, welche von einer kernhaltigen Hülle (Fig. 83) umgeben werden; diese Hülle

Fig. 83.

Stück eines Querschnittes des Ganglion Gasseri des Menschen, 240mal vergrössert. Bei X hat sich das Protoplasma der Ganglienzelle retrahirt und täuscht einen Fortsatz vor. In der Achse der querdurchschnittenen Nervenfasern sieht man den Achsencylinderquerschnitt. Technik Nr. 75, pag. 141.

besteht aus platten Bindegewebszellen, welche in konzentrischen Lagen der Ganglienzelle aufliegen und von einer Fortsetzung der Schwann'schen Scheide herrühren. Die oft Pigmentkörnchen enthaltenden Ganglienzellen der Spinalganglien sind unipolar; der Fortsatz enthält sehr bald nach dem Austritte eine Markscheide und theilt sich regelmässig nach kurzem Verlaufe T förmig

(pag. 67) in zwei Aeste. Der eine derselben zieht als Achsencylinder einer sensitiven Faser in die Peripherie des Körpers, der andere, gewöhnlich schwächere, verläuft als Bestandtheil einer hinteren Rückenmarkswurzel zum Rückenmark, in dessen grauer Substanz er frei verästelt endet (pag. 118). Es ist also gewissermassen jede Spinalganglienzelle mit dem noch ungetheilten Fortsatze in den Verlauf einer sensiblen Nervenfasers eingeschaltet. Nur ein kleiner Theil von Nervenfasern durchsetzt das Ganglion, ohne mit dessen Ganglienzellen zusammen zu hängen; sie kommen von Vorderhornzellen. Die meisten Nervenfasern der Spinalganglien sind markhaltig und besitzen eine Schwann'sche Scheide; es finden sich aber auch hier marklose aus den sympathischen Ganglien kommende Nervenfasern, welche sich um die Spinalganglienzellen plexusartig verzweigen.

Fig. 84.

Stück eines Querschnittes des Gangl. cervic. supr. des Menschen, 240mal vergr. Technik Nr. 76, pag. 141.

Den gleichen Bau wie die Spinalganglien besitzen: Das Gangl. Gasseri, Gangl. jugul. n. vagi, Gangl. petros. n. glossopharyngei, die Ganglien im Stamme des N. acusticus und vielleicht des G. geniculi nervi facialis.

Die sympathischen Ganglien enthalten kleinere, oft pigmentirte, ebenfalls mit einer kernhaltigen Hülle umgebene Ganglienzellen, die mit einem oder zwei (Kaninchen, Meerschweinchen) Kernen ausgestattet sind. Die Ganglienzellen der sympathischen Ganglien sind multipolar¹⁾. Die Nervenfasern sind theils feine, markhaltige, theils marklose (Remak'sche).

Periphere Nervenendigungen.

Endigungen der sensitiven Nerven.

Die peripherischen Endigungen der sensitiven Nerven stimmen mit der centralen Endigung völlig überein d. h. auch das periphere Ende ist eine

¹⁾ Die sympathischen Ganglienzellen der Fische sind bipolar; bei den Amphibien finden sich Ganglienzellen, deren einziger, weiterhin T förmig getheilter Fortsatz von einer „Spiralfaser“ umfasst wird, die sich frei verästelt die Ganglienzelle in ähnlicher Weise, wie bei den Spinalganglienzellen, umspinnt.

freie Verästlung. Die Endäste laufen entweder nackt aus — freie Nervenendigungen — oder sie werden von Epithel- oder Bindegewebszellen umfasst, die mit der Nervenendigung zusammen das Terminalkörperchen bilden¹⁾.

Die freien Nervenendigungen finden in der Weise statt, dass die Nervenfasern nach Verlust ihrer Markscheide sich wiederholt theilend in

Fig. 85.

Senkrechter Schnitt durch die Haut der grossen Zehe eines 25-jähr. Mannes, 240 mal vergrössert. Zellenkerne des Strat. muc. nur in der tiefsten Schicht deutlich. *l* Langerhans'sche Zellen. *n* Intraepitheliale Nervenfasern. *PP*¹ Zwei Coriumpapillen. *P* enthält eine Kapillarschlinge *c*, von der nur ein Schenkel sichtbar ist. *P*¹ enthält ein Tastkörperchen *t*, an welches zwei markhaltige Nervenfasern *m* herantreten. Ausserdem sind in beiden Papillen marklose Nervenfasern gelegen. Technik Nr. 77, pag. 141.

feine Spitzen auslaufen oder mit einer knopfförmigen Anschwellung enden. Derartige Endigungen kommen vorzugsweise im geschichteten Epithel vor. Sie sind mit Sicherheit im Hornhautepithel (s. Fig. 197) gefunden worden, ferner in der Schleimhaut der Mundhöhle (s. Fig. 214) und in den tieferen Schichten der Epidermis. In letzteren sieht man auch mit langen, verästelten Ausläufern versehene Zellen, die Langerhans'schen Zellen, die wahrscheinlich aus dem Corium eingedrungene Wanderzellen (pag. 35) sind (Fig. 85). Auch in den Muskeln hat man sensible Nerven gefunden, die in

marklose kernhaltige Fasern übergehen und fein langgestreckt zwischen den Muskelfasern frei enden.

Die Terminalkörperchen zerfallen in 2 Hauptarten: in Tastzellen und Endkolben. Bei den Tastzellen findet die Nervenendigung an einer oder zwischen zwei Zellen statt, bei den Endkolben dagegen im Innern eines feinkörnigen Körpers, des sog. Innenkolbens.

1. Tastzellen.

Wir unterscheiden: a) einfache Tastzellen, das sind ovale, kernhaltige, 6—12 μ grosse Zellen (Fig. 86), welche entweder in den tiefsten Schichten der Epidermis oder in den angrenzenden Partien des Corium gelegen sind. Marklose Nervenfasern legen sich mit einer schalenförmigen Verbreiterung, dem Tastmeniscus, an die Unterfläche der Tastzellen.

1) Ueber Nervenendigung an Sinneszellen siehe bei den Sinnesorganen.

b) Zusammengesetzte Tastzellen (Grandry'sche, Merkel'sche Körperchen); sie bestehen aus zwei oder mehreren kuchenförmigen Zellen,

Fig. 86.

Aus einem senkrechten Schnitte durch die Haut der grossen Zehe eines 25jährigen Mannes, 240mal vergr. Grenzkonturen der Zellen und Kerne der Epidermis (Strat. muc.) nur undeutlich zu sehen. $\times$ Tastzellen im Corium, den Verästelungen einer feinen Nervenfaser aufsteigend. Technik Nr. 77, pag. 141.

deren jede, grösser wie die einfachen Tastzellen, 15μ hoch und 50μ breit ist und einen bläschenförmigen Kern enthält. Eine markhaltige Nervenfasern (Fig. 87) tritt an die zusammengesetzte Tastzelle und umfaßt mit dem gablig getheilten Achsencylinder eine flache Scheibe (*ts*), die Tastscheibe, die zwischen zwei gegeneinanderabgeplatteten Tastzellen (*tz*) gelegen ist. Das Nervenmark hört an der Eintrittsstelle der Faser auf, das Perineurium setzt

sich in die bindegewebige Umhüllung (*h*) der zusammengesetzten Tastzelle fort. Die aus zwei Tastzellen bestehenden Gebilde heissen Zwillingstastzellen (*B 2*), die aus mehreren, drei und vier Tastzellen aufgebauten wurden „einfache Tastkörperchen“ genannt (*A, B 1*). Die zusammengesetzten

Fig. 87.

Aus senkrechten Schnitten durch die Wachshaut des Oberschnabls einer Gans, 240mal vergr. A Zusammengesetzte Tastzelle (einfaches Tastkörperchen) parallel der Nerveintrittsstelle durchschnitten. *n* Markhaltiger Nerv nur stückweise vom Schnitte getroffen. *a* Achsencylinder; die Theilung desselben ist hier im Profil nicht zu sehen. *ts* Tastscheibe senkrecht durchschnitten. *h* Bindegewebige Hülle. *tz* Tastzellen, die unterste nur wenig angeschnitten.

B Zwei zusammengesetzte Tastzellen quer zur Nerveintrittsstelle durchschnitten. 1. Aus 4 Tastzellen bestehendes „einfaches Tastkörperchen“. 2. Zwillingstastzelle. *ts* Tastscheiben. *d* Achsencylinderquerschnitt, vor der Theilung. *n* Markhaltige Nerven. *c* Corium. Technik Nr. 78, pag. 142.

Tastzellen sind bis jetzt nur in der Haut des Schnabls, sowie in der Zunge der Vögel, besonders der Schwimmvögel, gefunden worden; sie haben ihren Sitz fast ausschliesslich in den höchsten Schichten des Corium.

2. Endkolben.

Die Endkolben sind rundliche oder ovale Körper, in deren einen

Pol sich eine Nervenfasern einsenkt. Es giebt verschiedene Formen von Endkolben:

a) Die sog. cylindrischen Endkolben, die einfachste Form, bestehen zum grossen Theile aus einer modifizirten Fortsetzung der eintretenden Nervenfasern: 1. Aus einer durch platte Bindegewebszellen hergestellten Hülle, der Fortsetzung des Perineurium; 2. aus dem Innenkolben, einer feinkörnigen Masse, welche konzentrische Schichtung zeigt und an der Peripherie spärliche Kerne aufweist. 3. Aus dem Achsencylinder; die Nervenfasern

verliert beim Eintritte in den Innenkolben ihr Mark, ihr Achsencylinder steigt jedoch als ein plattes Band in demselben in die Höhe und endet nahe dessen oberem Pole frei abgerundet oder mit einer knopfförmigen Verdickung. Die cylindrischen Endkolben finden sich in der Tunica propria von Schleimhäuten, z. B. in der Con-junctiva bulbi von Säugethieren, in der Schleimhaut der Mundhöhle.

Fig. 88.

Cylindrischer Endkolben aus der Con-junctiva bulbi eines Kalbes, 240mal vergr. Technik Nr. 79, pag. 142.

einer grossen Anzahl ineinander geschachtelter Kapseln, deren jede von ihrer Nachbarin durch eine einfache Lage platter Bindegewebszellen geschieden ist. Jede Kapsel enthält Flüssigkeit und theils längs-, theils querverlaufende

Fig. 89.

Kleines Vater'sches Körperchen aus dem Mesenterium einer Katze, 50mal vergr. Die zwischen den Kapseln gelegenen Zellen sind an ihren dunkelgezeichneten Kernen zu erkennen. Man sieht das Nervenmark bis zum Innenkolben reichen. Technik Nr. 80, pag. 143.

Bindegewebsfasern. Wie die Hülle des cylindrischen Endkolbens, so gehen auch die Kapseln aus der Bindegewebs-scheide (Perineurium) der eintretenden Nervenfasern hervor. Die Kapseln sind um so schmaler, je näher sie dem Innenkolben liegen. An dem dem Nerveneintritte entgegengesetzten Pole hängen sie nicht selten durch einen in der Richtung des Innenkolbens verlaufenden Strang, das Ligamentum interlamellare, zusammen. Mit der Nervenfasern tritt auch eine kleine Arterie in das Vater'sche Körperchen, welche sich in ein zwischen den peripherischen Kapseln gelegenes Kapillarnetz auflöst.

Die Vater'schen Körperchen finden sich theils oberflächlich (im subkutanen Bindegewebe der Vola manus und der Fuss-sole, am N. dorsal penis et clitoridis),

theils in der Tiefe (in der Umgebung der Gelenke), endlich in der Nachbarschaft des Pankreas, im Mesenterium und an anderen Orten.

Die bei den Vögeln vorkommenden Key-Retzius'schen und Herbst's-

1) In den Vater'schen Körperchen ist der Achsencylinder nicht selten am Ende getheilt.

schen Körperchen sind ebenfalls Vater'sche Körperchen, die sich nur durch ihre viel geringere Grösse und durch eine dem Innenkolben entlang ziehende doppelte Kernreihe auszeichnen.

c) Die Genitalnervenkörperchen, bei Säugethieren ovale, beim Menschen mehr rundliche 0,15—0,2 mm grosse Gebilde, bestehen (beim Kaninchen) aus einem feine, unregelmässig konzentrische Schichtung zeigenden kernlosen Innenkolben und einer bindegewebigen, mit protoplasmareichen Zellen versehenen Kapsel. Die Nervenfasern verliert vor dem Eintritt in den Innenkolben ihr Mark und theilt sich im Innenkolben in viele gewundene Aestchen mit knopfförmigen Enden. Einen ähnlichen Bau haben die sogen. „kugligen“ (in Wirklichkeit theils runden, theils ovalen) Endkolben, welche in der Conjunctiva und den angrenzenden Theilen der Hornhaut des Menschen gelegen sind und einen grössten Durchmesser von 0,02—0,1 mm besitzen. Auch die Gelenknervenkörperchen gehören wohl in die gleiche Kategorie.

d) Die Tastkörperchen (Wagner'sche, Meissner'sche Körperchen) sind elliptische 40—100 μ lange, 30—60 μ breite Gebilde, welche durch

eine quere Streifung charakterisirt sind. An jedes Tastkörperchen treten eine oder zwei markhaltige Nervenfasern (Fig. 90 *n*), welche in quergestellten Touren den unteren Pol des Tastkörperchens umkreisen, sich vielfach theilen und als marklose Nerven mit abgeplatteten Anschwellungen (*e*) enden, während ihr Perineurium in die bindegewebige äussere Hülle des Tastkörperchens übergeht. Das Tastkörperchen selbst besteht ausser der genannten Hülle aus abgeplatteten Zellen, deren Grenzen, ebenso wie deren quergestellte Kerne die obenerwähnte Querstreifung bedingen. Das Perineurium der Nervenfasern setzt sich in die bindegewebige Hülle (*h*) des Tastkörperchens fort. Als dem Innenkolben entsprechende Bildung werden helle um die geschlängelten Nerven befindliche Höfe angesehen. Die Tastkörperchen liegen in den Cutispapillen und werden vorzugsweise an der Hohlhand, an den Fingerspitzen und an der Fusssohle gefunden.

Fig. 90.

Tastkörperchen aus einem senkrechten Schnitte der grossen Zehe eines 25 jähr. Mannes, 560mal vergrössert. *n* Markhaltige Nervenfasern. *e* Endverästlung mit platten Anschwellungen. *h* Bindegewebige Hülle, Kerne nicht sichtbar. Technik Nr. 77, pag. 141.

Endigung der motorischen Nerven.

Die an die quergestreiften Muskeln herantretenden Nervenstämmchen zerfallen in Aeste, diese wieder in Zweige, die mit einander anastomosirend ein Geflecht, den intermuskulären Nervenplexus, bilden. Von den Zweigen (Nervenfaserbündeln) entspringen feine, aus einer Nervenfasern bestehende Aestchen, die sich endlich mit je einer Muskelfaser verbinden. Dies geschieht in der Weise, dass die bis dahin noch markhaltige Nervenfasern sich zuspitzt

und unter Verlust ihrer Markscheide sich auf die Muskelfaser auflegt; dabei zerfällt der Achsencylinder in leicht gewundene, kolbig angeschwollene Endästchen (Fig. 91), welche diesogen. motorische (End-)Platte bilden und auf

Fig. 91.

Motorische Nervenendigungen an Interkostalmuskelfasern eines Kaninchens, 150 mal vergrößert. Technik Nr. 81 a, pag. 143.

Fig. 92.

Motorische Nervenendigung an einer Augenmuskelfaser des Kaninchens, 240 mal vergr. N Markhaltige Nerven-faser. K Kerne der Scheibe. Die Querstreifung der Muskelfaser ist nur in der hinteren Hälfte deutlich. Technik Nr. 81 b, pag. 144.

einer rundlichen, feinkörnigen, zahlreiche bläschenförmige Kerne enthaltenden Scheibe gelegen sind. Ob die motorischen Platten auf oder unter dem Sarkolemm liegen, ist noch nicht mit Sicherheit entschieden.

Die an die glatten Muskeln tretenden Nerven bilden ein Geflecht, aus dem marklose Nervenfaserbündel hervorgehen; letztere theilen sich wiederholt und bilden mehrfache Netze, aus denen endlich feinste Nervenfäserchen entspringen. Diese sollen mit den glatten Muskelfasern in Verbindung stehen. Eigentliche Endapparate sind hier noch nicht nachgewiesen.

Anhang. Die Nebennieren.

Der Reichthum der Nebennieren an nervösen Elementen, die auf experimentellem Wege festgestellten Beziehungen zum Centralnervensystem, sowie vergleichend anatomische Thatsachen rechtfertigen die Beschreibung der Nebennieren im Kapitel „Nervensystem“.

Jede Nebenniere besteht aus einem zelligen Parenchym und einer bindegewebigen Kapsel, welche feine Fortsetzungen in's Innere des Organes entsendet. Das Parenchym selbst besteht aus einer äusseren Schicht, der Rindensubstanz, welche die innere Masse, die Marksubstanz, rings umschliesst (Fig. 93, A). Die Rindensubstanz ist von faserigem Bruche, frisch von gelber Farbe und ist aus Zellen zusammengesetzt, die, ca. 15 μ gross,

von rundlicher Gestalt sind und ein grobkörniges, zuweilen Fettkörnchen enthaltendes Protoplasma und einen hellen Kern besitzen. Diese Zellen sind in der äussersten Zone der Rindensubstanz (Fig. 93, *B*) zu rundlichen Ballen, in der mittleren Zone zu cylindrischen Säulen geordnet, während die Zellen der innersten Zone regellos in einem netzförmigen Bindegewebe zerstreut liegen; die Zellen der innersten Zone sind durch Pigmentirung ausgezeichnet. Aus

Fig. 93.

A Stück eines Querschnittes der Nebenniere eines Kindes, 15mal vergrössert. Technik Nr. 82, pag. 144.
B Stück eines Querschnittes der menschlichen Nebenniere, 50mal vergrössert. Technik Nr. 84, pag. 144.

genannter Anordnung ergibt sich die Eintheilung der Rindensubstanz in: 1. Zona glomerulosa, 2. Zona fasciculata und 3. Zona reticularis. Die Marksubstanz ist frisch bald heller, bald dunkler als die Rindensubstanz und besteht aus vieleckigen, feinkörniges Protoplasma und einen hellen Kern besitzenden Zellen. Diese sind zu rundlichen oder länglich ovalen Strängen angeordnet, welche netzartig unter sich verbunden sind.

Die Arterien der Nebenniere theilen sich schon in der bindegewebigen Kapsel in viele kleine Aeste, welche in die Rindensubstanz eindringen und dort ein langmaschiges Kapillarnetz bilden. In der Marksubstanz angelangt wird das Kapillarnetz rundmaschig, aus diesem sammeln sich die Venen, von denen die grösseren von Längszügen glatter Muskelfasern begleitet werden.

Noch innerhalb der Marksubstanz vereinen sich die Venen zur Hauptvene, der Vena suprarenalis.

Die zahlreichen Nerven (beim Menschen ca. 33 Stämmchen) dringen mit den Arterien in die Rinde ein und gelangen bis zur Marksubstanz, woselbst sie ein dichtes Geflecht bilden. Es sind marklose, vorzugsweise dem Plexus coeliacus entstammende Fasern, denen Gruppen von Ganglienzellen beigemischt sind, die auch noch in der Marksubstanz gefunden werden.

TECHNIK.

Nr. 63. Rückenmark. Zum Studium der Vertheilung weisser und grauer Substanz fixire man das Rückenmark eines Kindes in toto in etwa einem Liter Müller'scher Flüssigkeit, die öfters gewechselt werden muss. Nach 4—5 Monaten kann man ohne weitere Behandlung dicke Querschnitte von Hals, Brust und Lendenmark etc. anfertigen, die in verdünntem Glycerin (pag. 6) oder auch nach der üblichen Vorbehandlung (pag. 23) in Damarfirniss eingeschlossen werden.

Nr 64. Rückenmark, Färbung der markhaltigen Fasern. Das Gelingen des Präparates hängt von dem Erhaltungszustande dieses Organs ganz besonders ab; je frischer dasselbe eingelegt wird, um so besser ist es. Das ganze Rückenmark wird in grosse Quanten Müller'scher Flüssigkeit gelegt, die häufig (in der ersten Woche täglich) gewechselt werden muss. Will man nur Theile des Rückenmarkes untersuchen, so legt man ca. 2 cm lange Stücke des frischen Rückenmarkes aus 1. der unteren Halsgegend, 2. der mittleren Brustgegend, 3. der Lendengegend in 200—500 ccm Müller'sche Flüssigkeit ein (noch besser ist aufhängen). Nach 4—6 Wochen, während welcher Zeit die Flüssigkeit mehrmals gewechselt werden muss, kommen die Stücke direkt, ohne vorher ausgewässert zu werden, in ca. 150 ccm 70⁰/oigen und am nächsten Tage in ebensoviel 90⁰/oigen Alkohol. Das Glas ist im Dunkeln zu halten (pag. 15), der Alkohol während der ersten 8 Tage mehrmals zu wechseln. Dann kann das Rückenmark geschnitten werden. Die Schnitte werden in eine Schale mit ca. 20 ccm 70⁰/oigen Alkohol gebracht, und aus diesem möglichst bald in ca. 30 ccm Weigert'sches Haematoxylin, denen man 1 ccm der Lithionlösung (pag 7, 27 a) zugesetzt hat, übertragen. Nach 5—6 Stunden kommen die nun tief dunkeln, undurchsichtigen Schnitte in 50 ccm destillirtes Wasser + 1 ccm der Lithionlösung. Nach einer halben Stunde, während welcher die Flüssigkeit mehrmals gewechselt werden muss, geben die Schnitte keine Farbe mehr ab, und werden zum Differenziren in 30 ccm übermangansaure Kalilösung (27, b) gebracht. Nach $\frac{1}{2}$ —3 Minuten werden die Schnitte in destillirtem Wasser kurz (1 Min.) abgespült und dann in 20 ccm Säuremischung¹⁾ (27 c) übertragen. Hier erfolgt in 10—50 Sekunden die Entfärbung, die graue Substanz wird hellgelb, fast weiss, die weisse Substanz (die markhaltigen Nervenfasern) erscheinen tief dunkel²⁾. Nun werden die Schnitte in eine erste und nach

1) Die Schale mit der Säuremischung ist zuzudecken!

2) Erfolgt die Entfärbung nicht ausreichend, wird die graue Substanz nicht gelblichweiss, so kann man die Procedur wiederholen, d. h. die Schnitte kommen wieder in destill. Wasser (1 Min.), dann in übermangansaures Kali (1—3 Min.), dann in destill. Wasser (1 Min.) und endlich wieder in die Säuremischung. Die angegebene Menge der Kalilösung, sowie der Säuremischung reicht nur für eine geringe (ca. 20) Anzahl von Schnitten hin; will man mehr Schnitte behandeln, so müssen neue Quanten dieser Flüssigkeiten verwendet werden.

5 Minuten in eine zweite Schale mit ca. 30 ccm destillirtem Wasser gebracht und kommen nach weiteren 10 Minuten dann in 10 ccm Alaunkarmin, woselbst sie 3—15 Stunden verweilen können. Konserviren in Damarfirniß (pag. 23). Die Alaunkarminfärbung kann auch wegbleiben.

Nr. 65. Rückenmark, Färbung der Achsencylinder und der Zellen. Stücke von 1 höchstens 2 cm Länge werden in ca. 200 ccm Müller'scher Flüssigkeit, die in den ersten 8 Tagen täglich, später wöchentlich einmal zu wechseln ist, fixirt. Nach 4 Wochen werden die Stücke direkt aus der Müller'schen Flüssigkeit in ca. 50 ccm karminsaures Natron (1% wässrige Lösung) auf 3 Tage übertragen. Während dieser Zeit muss das Glas mit den Stücken öfter geschüttelt werden. Die so gefärbten Stücke werden 24 Stunden in (womöglich fließendem) Wasser ausgewaschen, dann 5 Stunden in ca. 150 ccm 70%igen Alkohol und von da in ebensoviel 96%igen Alkohol übertragen. Die Querschnitte werden in Damarfirniß (pag. 23) konservirt (Fig. 73).

Nr. 66. Gehirn, Färbung der markhaltigen Nervenfasern. Man wende die Nr. 64 angegebene Methode an. Legt man ein ganzes Gehirn des Menschen ein, so müssen viele tiefe Einschnitte gemacht und entsprechend mehr (bis 3 Liter) Müller'sche Flüssigkeit verwendet werden.

Nr. 67. Gehirn, Zellen. Man behandle Stücke (von 1—2 cm Seite) der Grosshirnrinde (Centralwindung) und der Kleinhirnrinde wie Nr. 65.

Fig. 94.

Stückchen eines Schnittes der menschlichen Grosshirnrinde. 240 mal vergrößert.
p Kleine Pyramidenzellen. a Nervenfortsatz einer solchen.

In der Grosshirnrinde findet man ausser den beschriebenen Zellenformen auch blasige Hohlräume (Fig. 94 z) in sehr verschiedener Menge, welche Reste von Zellen (Protoplasma und Kern) enthalten: wahrscheinlich pericelluläre Lymphräume, welche durch postmortale Veränderung der Hirnsubstanz und die Einwirkung der Fixierungsflüssigkeit unnatürlich erweitert sind.

Die Schnitte durch die Kleinhirnrinde müssen quer zur Längsrichtung der Windungen gemacht werden, da die Ausläufer der Purkinje'schen Zellen nur in den Querschnittsebenen der Windungen verlaufen. In den Tiefen der Windungen liegen nur wenige Purkinje'sche Zellen.

Nr. 68. Ganglienzellen und Gliazellen des Hirnes und Rückenmarkes nach Golgi. Man fixire Stücke der Grosshirnrinde (von 2—3 cm Seite), ebenso grosse Stücke der Kleinhirnrinde und des Rückenmarkes in 200—500 ccm Müller'scher Flüssigkeit. Nach 6 Wochen¹⁾, während deren die Flüssigkeit mehrmals gewechselt werden muss, bereite man sich a) eine dünne Höllesteinlösung (Sol. arg. nitr. 1% 25 ccm + Aq. dest. 25 ccm) und b) eine etwas stärkere Lösung: Sol. arg. nitr. 1% 60 ccm + Aq. dest. 20 ccm. Die Stücke werden direkt aus der Müller'schen Flüssigkeit in ein trockenes Schälchen gebracht und mit einem Drittheil der Lösung a) übergossen. Sofort tritt ein rothbrauner Niederschlag auf; die Lösung wird gleich abgegossen. Nun giesst man das zweite Drittel der Lösung a) auf die Stücke: der Niederschlag wird schon geringer sein.

¹⁾ Stücke, die noch länger in Müller'scher Flüssigkeit gelegen haben, färben sich schwerer; es empfiehlt sich dann, statt der Lösung b) eine 1%ige Silberlösung anzuwenden.

Abermaliges Abgiessen und Uebergiessen des letzten Drittels. Von da kommen die Stücke in eine Schale, auf deren Boden ein Stückchen Filtrirpapier liegt, und werden mit der Lösung b) übergossen, in welcher sie verbleiben. Am nächsten Tage oder später¹⁾ werden die nun braunrothen Stückchen geschnitten. Man fülle eine flache Schale mit 70%igen Alkohol, in welchem man das Rasirmesser taucht, umwickele das Stückchen mit einem dicken Streifen Filtrirpapier (um das Schwärzen der Finger zu vermeiden) und mache genau senkrecht zur Oberfläche gerichtete Schnitte. Der erste Schnitt ist undurchsichtig rothbraun, er ist unbrauchbar; die nächsten Schnitte sind gut, sie werden von der Messerklinge auf den Objektträger hinübergezogen, das Wasser wird abgetupft und ein Tropfen unverdünntes Glycerin aufgesetzt. Kein Deckglas! Nun durchmustere man mit schwacher Vergrößerung die Schnitte. Zunächst wird man sehr viele störende Niederschläge bemerken, die sich nicht entfernen lassen, dazwischen sieht man die Zellen mit ihren Ausläufern. Fig. 74 und 77.

Es sind keineswegs alle Zellen sichtbar; nur einzelne sind geschwärzt. (Tiefen Schichten des Stückchens entnommene Schnitte zeigen wenig oder gar keine geschwärzten Zellen.) Ausser den Zellen sind auch Blutgefässe geschwärzt. Die besten Schnitte werden vorsichtig vom Objektträger in destillirtes Wasser übertragen, abgespült und nach einer Minute auf 2 bis 5 Minuten in ein Uhrschälchen mit absolutem Alkohol eingelegt; dann kommen sie auf 2 Minuten in 3 ccm reines Kreosot, dann ebenso lange in 5 ccm Terpentinöl und werden endlich in Damarfirniss konservirt. Ein Deckglas darf nicht aufgelegt werden, weil dadurch die im Präparat befindliche Feuchtigkeit nicht verdunsten kann und diese die Golgi'schen Präparate verdirbt. Solche unbedeckten Präparate haben aber Nachtheile, die sich dadurch vermeiden lassen, dass man den Schnitt auf einem Deckgläschen einbettet und dieses mit Wachs- oder Kittfüsschen auf den Objektträger mit nach oben gerichteter freier Rückfläche aufklebt. Natürlich darf die Damarfirnisschicht den Objektträger nicht berühren. Betrachten zuerst mit mittelstarken Vergrößerungen.

Nr. 69. Sehr zu empfehlen zur Darstellung langer Strecken der Nervenfortsätze, sowie der Fasern ist folgende kurze Methode Golgi's: Man bereite sich eine Lösung von 3 gr Kali bichrom. in 100 ccm destillirtem Wasser²⁾, setze dazu 15 ccm 1%ige Osmiumsäure. In diese Mischung lege man $\frac{1}{2}$ höchstens 1 cm dicke Stücke von Hirn oder Rückenmark neugeborener oder junger Thiere auf 24—48 Stunden. Dann werden die Stücke direkt mit Höllesteinlösung nach der Nr. 68 angegebenen Methode behandelt, nur nehme man als dünne Lösung: Sol. argent nitric. 1% 25 ccm + Aq. dest. 75 ccm, und als stärkere Lösung: Sol. argent nitric. 1% 75 ccm + Aq. dest. 25 ccm. In letzterer Lösung verbleiben die Stücke 30—48 Stunden. Weitere Verarbeitung wie Nr. 68. (Siehe ferner Technik Nr. 114.)

Nr. 70. Hypophysis cerebri behandeln wie Nr. 75.

Nr. 71. Hirnsand. Man zerzupfe die Epiphysis in einem Tropfen Kochsalzlösung. Ist viel Hirnsand vorhanden, so kann man beim Zupfen

¹⁾ Die Stückchen können Monate lang in der Silberlösung verweilen, ohne Schaden zu nehmen; Fig. 77 stammt von einem Stückchen, das 5 Monate darin gelegen hat.

²⁾ Die Krystalle können wegen ihrer langsamen Löslichkeit (pag. 5) in warmem Wasser gelöst werden.

schon das Knirschen der Körnchen hören und die grössten auch mit unbewaffnetem Auge wahrnehmen. Betrachten mit schwacher Vergrösserung ohne Deckglas (Fig. 79). Oft ist die Unebenheit der Oberfläche sehr wenig deutlich. Dann streife man die grössten Körnchen mit der Nadel zur Seite, bedecke einige kleine mit dem Deckglas und lasse 2—3 Tropfen Salzsäure zufließen (pag. 26). Die scharfen Konturen der Körnchen verschwinden alsbald unter Entwicklung von Blasen.

Nr. 72. *Corpuscula amylacea*. Gehirn älterer Personen. Man streiche mit einem Skalpell über die mediale, dem 3. Ventrikel zugekehrte Fläche des Sehhügels und zertheile den so gewonnenen Brei mit der Nadel in einigen Tropfen Kochsalzlösung. Deckglas! Die *Corpuscula* sind, wenn vorhanden, leicht zu finden und durch ihre bläulichgrüne Farbe und die Schichtung erkennbar. Fig. 80 *a*. Man verwechsle sie nicht mit Tropfen ausgetretenen Nervenmarkes (*b*), die stets hell und nur doppelt konturirt sind. Ausserdem finden sich in solchen Präparaten zahlreiche rothe Blutkörperchen, Ependymzellen (*d*), markhaltige Nervenfasern von verschiedener Dicke (*e*) und Ganglienzellen, letztere sind oft sehr blass und nur durch ihre Pigmentirung aufzufinden (*f*). Selbst nicht mehr ganz frische, menschliche Gehirne sind noch tauglich.

Nr. 73. Ein ca. 1 cm langes Stück des Plexus chorioideus wird in einem Tropfen Kochsalzlösung ausgebreitet, mit einem Deckglase bedeckt. Man sieht die gewundenen rothen Blutgefässe und das Epithel des Plexus.

Nr. 74. Querschnitte der Nervenfaserbündel. Ein Stück eines Nerven z. B. des N. ischiadicus, womöglich vom Menschen der ein gut

Fig. 95.

Stück eines Querschnittes eines peripherischen (Spinal-) Nerven des Kaninchens, 50mal vergr. Im rechten unteren Nervenfaserbündel sind die Nervenfaserschnitte theils herausgefallen, theils durch Druck auf die Seite gelegt. Das Kaninchen besitzt ein nur gering entwickeltes Endoneurium.

scharfem Messer feine Querschnitte an¹⁾. Der Schnitt wird in Pikrokarmen gefärbt (Zeitdauer der Färbung sehr verschieden) und in Glycerin konservirt. Die

entwickeltes Endoneurium besitzt, wird nach der Nr. 29 (pag. 71) angegebenen Methode auf 6 Tage in 0,1% ige Chromsäurelösung (pag. 5) eingelegt. Dann wird das Stück in (womöglich fließendem) Wasser 3 bis 4 Stunden ausgewaschen und dann in allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14) gehärtet. Ist die Härtung vollendet, so fertige man mit

¹⁾ Einbetten in Leber ist rathsam, noch besser aber ist Einbetten in Hollundermark (oder in das Mark der Sonnenblume). Man bohrt zu diesem Zwecke in das trockene Hollundermark mit der Nadel ein Loch und fügt den Nerven vorsichtig ein; legt man nun das Ganze ca. 1/2 Stunde in Wasser, so quillt das Hollundermark und umschliesst fest den Nerven.

Schnitte müssen sehr sorgtätig behandelt werden, besonders ist jeder Druck mit dem Deckglase zu vermeiden, denn sonst legen sich alle querdurchschnittenen Fasern, die ja keine Scheiben, sondern kurze Säulen sind, auf die Seite und man erblickt keinen einzigen Faserquerschnitt (vergl. Fig. 95). Ist der Schnitt gelungen, so sieht man den meist etwas zackig geschrumpften Achsencylinder, wie einen rothen Kern, umgeben von dem gelblichen Marke, das seinerseits wieder von einer röthlichen Hülle (Schwann'sche Scheide und Fibrillenscheide) umfasst wird. Die Querschnitte der Nervenfasern hat man „Sonnenbildchenfigur“ genannt (Fig. 82).

Nr. 75. Spinalganglien sind schwer erreichbar; man schneide deshalb das lateral von der Spitze der Felsenbeinpyramide gelegene Ganglion Gasseri aus und fixire es in ca. 100 ccm Müller'scher Flüssigkeit¹⁾; nach 4 Wochen wasche man dasselbe ca. 3 Stunden in fliessendem Wasser aus und härte es dann in 50 ccm allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14). Möglichst feine Quer- und Längsschnitte färbe man 30 Sekunden in Haematoxylin und dann 2—5 Minuten in Eosin (pag. 18) und konservire sie in Damarfirniss. Die Ganglienzellen sind blassroth, die Achsencylinder tiefroth, die Markscheide bräunlich, die Kerne blau (Fig. 83). War der Schnitt nicht hinreichend fein, so lässt die grosse Menge der dunkelgefärbten Kerne nur schwer ein deutliches Bild erkennen. Dicke Schnitte färbt man deshalb besser mit Pikrokarmine (pag. 19) 2—3 Tage und konservirt sie in Damarfirniss. Die Kerne sind alsdann nicht so intensiv gefärbt. Zuweilen kontrahirt sich das Protoplasma der Ganglienzellen und erhält dadurch eine sternförmige Gestalt (Fig. 83 X), die den Ungeübten leicht zu einer Verwechslung mit einer multipolaren Ganglienzelle veranlassen könnte.

Nr. 76. Sympathische Ganglien. Das grosse Gangl. cervicale supremum n. sympath. wird fixirt und erhärtet wie Nr. 75. Auch hier ist wegen des grossen Kernreichthums ein Kernfärbemittel nur bei sehr feinen Schnitten anwendbar. Nach den für Nr. 75 angegebenen Methoden treten die Fortsätze der multipolaren Ganglienzellen nur wenig hervor. Man lege deshalb die möglichst feinen Schnitte auf 24 Stunden in 5 ccm Nigrosinlösung (Lösung wie Methylviolet (pag. 8)), bringe sie dann für 5 Minuten in 5 ccm Alkoh. absol. und konservire sie in Damarfirniss. Schon bei schwacher Vergrösserung erkennt man als Characteristicum die vielen Schräg- und Querschnitte markloser Nervenfaserbündel; die Ganglienzellen sind zwar deutlich zu sehen, ihre Fortsätze treten aber erst mit Anwendung starker Vergrösserung und bei genauem Zusehen zu Tage (Fig. 84). An vielen Ganglienzellen sucht man in den Schnitten vergeblich nach Fortsätzen.

Nr. 77. Einfache Tastzellen, intraepitheliale Nervenfasern, Langerhans'sche Zellen, Tastkörperchen. Zuerst bereite man sich eine Mischung von Goldchlorid und Ameisensäure (pag. 21), koche sie und lasse sie erkalten. Dann schneide man von der Volarseite eines frisch amputirten Fingers (einer Zehe) mit flach aufgesetzter Scheere mehrere kleine ca. 5 mm lange und breite, ca. 1 mm dicke Stückchen der Epidermis und der obersten Schichten des Corium ab (etwa anhaftendes Fett der unteren Coriumschichten muss sorgtätig entfernt werden) und lege sie in die Goldameisensäure auf 1 Stunde. Im Dunkeln zu halten! Dann bringe man die Stückchen mit Glasnadeln in ca. 10 ccm destill. Wasser und nach einigen

¹⁾ Auch Fixirung in Kleinenberg's Pikrinschwefelsäure (pag. 13) giebt sehr gute Resultate.

Minuten in destill. Wasser, dem man Ameisensäure zugesetzt hat (pag. 21) und setzt das Ganze dem Tageslichte (Sonne unnöthig) aus. Nach 24 bis 48 Stunden sind die Stückchen dunkelviolet geworden; sie werden nun in ca. 30 cem allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14) gehärtet. Nach acht Tagen können die Stückchen in Leber eingeklemmt und geschnitten werden. Konserviren in Damarfirniß (pag. 23). Die Epidermis ist rothviolett in verschiedenen Nuancen, die Kerne sind nur stellenweise deutlich, oft gar nicht wahrzunehmen; das Corium ist weiss, die Kapillaren, die Ausführungsgänge der Knäueldrüsen und die Nerven sind dunkelviolet bis schwarz. Für die einfachen Tastzellen sind möglichst feine Schnitte anzufertigen. Man findet sie oft in der Nähe der Knäueldrüsenausführungsgänge. Man hüte sich vor Verwechslungen mit geschrumpften Epithelzellenkernen. Fig. 86.

Die intraepithelialen Nervenfasern erscheinen als feine Fäden; ihr Zusammenhang mit den in der Cutis verlaufenden Nervenfasern ist nur schwer zu finden. Ausläufer von Langerhans'schen Zellen können an feinen Schnitten zur Verwechslung mit intraepithelialen Nervenfasern führen (Fig. 85).

Langerhans'sche Zellen und Tastkörperchen sind leicht zu sehen; an dicken Schnitten sind die Tastkörperchen tief schwarz (Fig. 85), an dünnen Schnitten rothviolett (Fig. 90).

Nr. 78. Zusammengesetzte Tastzellen. Man schneide vom Schnabel einer frisch getödteten Ente oder Gans die gelbe, den Seitenrand des Oberschnabels überziehende Haut ab und lege 1—2 mm dicke, ca. 1 cm lange Stückchen in 3 cem der 2%igen Osmiumlösung + 3 cem destill. Wasser und stelle das Ganze auf 18—24 Stunden ins Dunkle. Dann wasche man die Stückchen in (womöglich fliessendem) Wasser 1 Stunde lang aus und übertrage sie in ca. 20 cem 90%igen Alkohol. Schon nach 6 Stunden sind die Objekte schneidbar. Man klemme die Stückchen in Leber und schneide in der Richtung vom Corium gegen das Epithel (nicht umgekehrt!). Die Schnitte können ungefärbt in Damarfirniß konservirt werden. Die olivgrünen Tastzellen sind leicht, selten ist dagegen die Eintrittsstelle der Nervenfasern zu sehen (Fig. 87). Ausserdem finden sich in den Schnitten Herbst'sche Körperchen (pag. 133). Will man färben, so nehme man Kernfärbungsmittel (pag. 17).

Nr. 79. Cylindrische Endkolben. Man präparire mit Scheere und Pincette von dem frisch aus dem Schlachthause bezogenen Auge eines Kalbes ein ca. 1 qcm grosses Stück der Conjunctiva sclerae bis dicht an den Cornealrand ab. Dabei hüte man sich, das abpräparirte Stück zu verwickeln, man lasse vielmehr selbst die schon von der Sklera getrennten Theile auf dieser glatt liegen. Ist die Präparation vollendet, so wird das Stück vorsichtig, die Epithelseite nach oben gekehrt, auf eine Korkplatte hinübergezogen und dort mit Nadeln aufgespannt. Nachdem man die Oberfläche des Stückchens mit ein Paar Tropfen Glaskörperflüssigkeit, die man aus dem Kalbsauge entnimmt, befeuchtet hat, präparire man mit feiner Scheere und Pincette ein dünnes Häutchen, welches aus der obersten dünnen Lage Bindegewebes und dem aufsitzenden Epithel besteht, ab. Diese Operation ist sehr sorgfältig zu vollziehen; dabei suche man Faltungen und Verdrehungen des Häutchens möglichst zu vermeiden. Das Häutchen wird jetzt (die Epithelseite nach oben) auf einen trockenen Objektträger hinübergezogen und ausgebreitet. Anfangs zieht es sich immer wieder zusammen, nach 1 bis 2 Minuten aber trocknen die Ränder etwas an das Glas und nun macht

die Ausbreitung keine grosse Schwierigkeiten mehr. Jetzt wird der Objektträger mit dem Präparat in eine Schale mit 65 ccm destill. Wasser, dem 2 ccm Essigsäure zugesetzt sind, gelegt. Nach etwa einer Stunde (oder später), während dessen das Häutchen zu einem dicken Kuchen aufgequollen ist und sich vom Objektträger abgelöst hat, suche man durch vorsichtiges¹⁾ Berühren mit einer reinen Nadelspitze das Epithel zu entfernen, das sich ohne Mühe in feinen weissen Fetzen ablösen lässt. Je vollkommener das Epithel entfernt ist, um so besser. Nachdem das Häutchen im Ganzen 4—5 Stunden in der verdünnten Essigsäure gelegen hat, bringe man es in einigen Tropfen der gleichen Flüssigkeit auf einen Objektträger, bedecke es mit einem Deckglase und drücke dasselbe mit den gespreizten Branchen einer Pincette auf das gequollene Häutchen. Die Untersuchung mit schwachen Vergrösserungen zeigt die durch die scharf hervortretenden Kerne deutlichen Blutgefässe, sowie die markhaltigen Nervenfasern²⁾. Einer solchen Faser folgt man, bis das Mark aufhört; derartige Stellen untersuche man jetzt mit starken Vergrösserungen, indem dort am ehesten Endkolben gefunden werden. In vielen Fällen wird man nichts wie zahlreiche Kerne erblicken, auch dann, wenn wirklich eine günstige Stelle getroffen ist (Fig. 88), ist die Wahrnehmung der Endkolben wegen ihrer Blässe sehr schwierig; auch der Achsencylinder ist oft schwer zu sehen. Nur dem Geübten wird das Auffinden gelingen; Anfängern ist die Anfertigung solcher Präparate nicht zu rathen.

Nr. 80. Die Vater'schen Körperchen entnimmt man am besten dem Mesenterium einer frisch getödteten Katze. Sie sind dort mit unbewaffnetem Auge meist leicht als milchglasartig durchscheinende, ovale Flecke zu erkennen, die zwischen den Fettsträngen des Mesenterium liegen. Ihre Anzahl wechselt sehr, zuweilen sind sie nur spärlich vorhanden und von so geringer Grösse³⁾, dass ihr Auffinden schon genaues Zusehen erfordert. Man schneide mit der Scheere das das Körperchen enthaltende Stückchen Mesenterium heraus, breite es in einem Tropfen Kochsalzlösung auf dem Objektträger (schwarze Unterlage!) aus und suche es mit Nadeln von den anhaftenden Fetträubchen zu befreien. Man hüte sich, dabei das Körperchen selbst anzustechen. Bei schwacher Vergrösserung (ohne Deckglas) überzeuge man sich, ob das Körperchen hinreichend isolirt ist und bedecke es dann nochmals mit einem Tropfen Kochsalzlösung und einem Deckglase. Druck muss sorgfältig vermieden werden (Fig. 89).

Bei starken Vergrösserungen sieht man deutlich die Kerne der zwischen den Kapseln gelegenen Zellen; undeutlich blass, oft gar nicht dagegen die im Innenkolben befindlichen, länglichen Kerne. Will man konserviren, so lasse man 1—2 Tropfen der 1%igen Osmiumsäure unter dem Deckglase zufließen (pag. 26) und ersetze die Säure, nachdem das Nervenmark schwarz, der Innenkolben braun geworden ist, durch sehr verdünntes Glycerin.

Nr. 81. Motorische Nervenendigungen. a) Endverästelungen. Man bereite sich eine Mischung von 24 ccm 1%iger Goldchloridlösung + 6 ccm Ameisensäure, koche sie und lasse sie erkalten. Dann schneide

1) Zu rohe Berührung, sowie unvorsichtiges Abpinseln des Epithels reisst die dieht unter diesem liegenden Endkolben mit ab.

2) Beim Kalbe ist ein Theil der Nervenfasern noch marklos, diese empfehlen sich nicht zur Benützung.

3) Dieser Fall lag bei der Anfertigung des Fig. 89 abgebildeten Präparats vor; das Körperchen ist sehr klein.

man 3—4 cm lange, 2—3 Interkostalräume umfassende Stücke der Thoraxwand eines Kaninchens aus und behandle sie in der Nr. 77 angegebenen Weise. Nachdem die dunkelvioletten Stückchen 3—6 Tage in 70%igem Alkohol gelegen haben, breite man ca. 5 mm breite Bündel der Muskelfasern in einem Tropfen verdünntem Glycerin aus, dem man einen ganz kleinen Tropfen Ameisensäure zugesetzt hat. Ein auf das Deckglas ausgeübter leichter Druck ist oft von Vortheil. Zum Aufsuchen der Endverästelungen verfolge man die schon bei schwacher Vergrößerung kenntlichen, tiefschwarzen Nervenfasern. (Fig. 91.) Zusatz eines weiteren Tropfens Ameisen- oder Essigsäure macht das Bild oft deutlicher.

b) Kerne der motorischen Platte. Man lege die vorderen Hälften der Augenmuskeln eines frisch getödteten Kaninchens in 97 ccm destill. Wasser + 3 ccm Essigsäure. Nach 6 Stunden übertrage man die Muskeln in destill. Wasser, schneide ein flaches Stückchen mit der Scheere ab und breite es auf dem Objektträger aus. Schon mit unbewaffnetem Auge sieht man die Verästelungen der weiss aussehenden Nerven deutlich; bei schwachen Vergrößerungen (50 mal) erblickt man die Anastomosen der Nervenbündel, sowie die durch ihre quergestellten Kerne (der glatten Muskelfasern) leicht kenntlichen Blutgefässe. Das Auffinden der Endplatten ist wegen der grossen Anzahl der scharf konturirten Kerne, welche den Muskeln, dem intermuskulären Bindegewebe etc. angehören, nicht leicht. Verfolgt man eine Nervenfaser, so sieht man bald, dass deren doppelt konturirte Markscheide plötzlich aufhört und sich in eine Gruppe von Kernen verliert. Das sind die Kerne der motorischen Platte, deren übrige Details nicht deutlich sichtbar sind. Die Querstreifung der Muskelfasern, die sehr blass ist, ist oft sehr wenig deutlich. (Fig. 92.)

Nr. 82. Nebenniere, Uebersichtsbild. Man fixire die ganze kindliche Nebenniere in ca. 200 ccm 0,1%iger Chromsäure und härte sie nach 8 Tagen in ca. 150 ccm allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14). Ungefärbte Querschnitte in verdünntem Glycerin konserviren (Fig. 93, A).

Nr. 83. Zur Herstellung der Elemente der Nebenniere mache man Zupfpräparate des frischen Organs in einem Tropfen Kochsalzlösung. Die Elemente sind sehr zart, verletzte Zellen deshalb sehr häufig.

Nr. 84. Zum Studium des feineren Baues der Nebenniere werden Stücke (von 1—2 cm Seite) des möglichst frischen Organs in ca. 100 ccm Kleinenberg'scher Pikrinsäure fixirt und nach 12—24 Stunden in ebensoviel allmählich verstärktem Alkohol gehärtet (pag. 14). Die feinen Schnitte werden mit Böhmer'schem Haematoxylin gefärbt (pag. 17) und in Damarfirniss eingeschlossen (pag. 23). (Fig. 93, B.)

V. Verdauungsorgane.

Schleimhaut.

Die innere Oberfläche des gesammten Darmtrakts, der Respirationsorgane, sowie gewisser Bezirke des Urogenitalsystems und einzelner Sinnesorgane ist von einer weichen, feuchten Haut, der Schleimhaut Tunica mucosa überzogen. Dieselbe besteht aus einem weichen Epithel und aus Bindegewebe. Letzteres ist gewöhnlich dicht unter dem Epithel zu einer

strukturlosen Haut, der Membrana propria (pag. 52), verlichtet; darauf folgt die Tunica propria (Stroma), welche allmählich in die locker gewebte Tunica submucosa übergeht, die ihrerseits die Verbindung mit den unterliegenden Theilen z. B. Muskeln oder Knochen vermittelt. Von dem Epithel der Schleimhaut aus sind die Drüsen hervorgegangen (s. pag. 44).

Die Schleimhaut der Mundhöhle.

Die Schleimhaut der Mundhöhle besteht 1. aus Epithel, 2. einer Tunica propria und 3. einer Submucosa (Fig. 96). Das Epithel ist typisches geschichtetes Pflasterepithel (s. pag. 42). Die Tunica propria wird von reichlich mit elastischen Fasern untermengten Bindegewebsbündeln gebildet,

welche sich in den verschiedensten Richtungen durchflechten. Die Bündel der obersten Lagen sind sehr fein und bilden ein dichtes, fast homogen aussehendes Filzwerk. Auf der Oberfläche der Tunica propria stehen zahlreiche, meist einfache Papillen (Fig. 96, 1), deren Höhe in den einzelnen Bezirken der Mundhöhle sehr verschieden ist. Die höchsten (0,5 mm hohen) Papillen finden sich am Lippenrande und am Zahnfleische. Die Tunica propria geht ohne scharfe

Fig. 96.

Senkrechter Durchschnitt durch die Lippenschleimhaut eines erwachsenen Menschen, 30 mal vergrößert. 1. Papillen. 2. Drüsenansführungsgang, dessen Lumen nur an einer Stello angeschnitten ist. 3. Accessorische Drüse. 4. Querschnitt eines Zweiges des Ausführungsganges. 5. Durch Bindegewebe in mehrere Lappen getheilte Drüsenkörper. 6. Ein Tubulus-Querschnitt. Technik Nr. 86, pag. 176.

Grenze in die Submucosa über, welche aus etwas breiteren Bindegewebsbündeln besteht; elastische Fasern sind hier spärlicher vertreten. Die Submucosa ist meist locker an die Wandungen der Mundhöhle angeheftet, nur am harten Gaumen und am Zahnfleische ist sie fester und hier innig mit dem Periost verbunden. Die Submucosa ist die Trägerin der Drüsen; dieselben sind, mit Ausnahme der am Lippenrande zuweilen vorkommenden Talgdrüsen, verästelte, tubulöse Schleimdrüsen von 1—5 mm Grösse. Ihr Hauptausführungsgang (Fig. 96, 2) ist an seinem unteren Ende etwas erweitert und im grössten Theile seiner Länge mit geschichtetem Pflaster-

epithel ausgekleidet; die aus ihm hervorgehenden Aeste und Zweige tragen geschichtetes (die grösseren) oder einfaches (die kleineren Aeste) Cylinder-epithel. Nicht selten nimmt der Hauptausführungsgang die Ausführungsgänge kleiner accessorischer Schleimdrüsen auf (3). Der feinere Bau der Tubuli wird mit den Schleimdrüsen der Zunge erörtert werden. Die reichlichen Blutgefässe der Mundschleimhaut sind in zwei flächenhaft ausgebreiteten Netzen angeordnet, von denen das eine gröbere in der Submucosa, das andere feinere in der Tunica propria liegt. Von letzterem steigen kapillare Schlingen in die Papillen. Die Lymphgefässe bilden gleichfalls in die Submucosa eingebettete (weite) und in der Tunica propria gelegene (enge) Netze. Die (markhaltigen) Nerven bilden in der Submucosa ein weitmaschiges Netz, von dem aus viele sich verästelnde Fasern in die Tunica propria empor-

steigen. Hierenden dieselben entweder in Endkolben (s. pag. 132) oder sie dringen unter Verlust ihrer Markscheide als marklose Fasern in das Epithel ein, wo sie nach wiederholten Theilungen frei aufhören (Fig. 214).

Fig. 97.

Längsschliff eines menschlichen Scheidezahnes, 4mal vergrössert. Technik Nr. 87, pag. 176.

Die Zähne.

Die Zähne des Menschen und der höheren Thiere sind Hartgebilde, welche in ihrem Innern eine mit weicher Masse, der Zahnpulpa, gefüllte Höhle, die Pulpahöhle, einschliessen. Der in der Alveole steckende Zahnabschnitt heisst Wurzel, der freiliegende Theil Krone; da, wo Wurzel und Krone aneinander grenzen, befindet sich der Hals des Zahnes, der noch vom Zahnfleische bedeckt wird. Die Hartgebilde bestehen aus drei verschiedenen Theilen: 1. dem Zahnbeine, 2. dem Schmelze mit dem Schmelzoberhäutchen, 3. dem Zement. Die Anordnung dieser Theile ist folgende: Das Zahnbein, welches die Hauptmasse jedes Zahnes bildet und dessen Form bestimmt, um-

schliesst allein die Pulpahöhle, bis auf einen kleinen an der Wurzel befindlichen Kanal, durch welchen Nerven und Gefässe zur Pulpa treten.

Das Zahnbein wird an der Krone vom Schmelze, an der Wurzel vom Zement überzogen, sodass seine Oberfläche nirgends frei zu Tage liegt (Fig. 97).

ad 1. Das Zahnbein (Dentin) ist eine weisse, undurchsichtige Masse, härter als Knochen. Es besteht aus einer scheinbar homogenen, in Wirklichkeit sehr feine Fibrillen enthaltenden Grundsubstanz, welche von zahlreichen Kanälchen, den Zahnkanälchen, durchzogen wird (Fig. 98). Dieselben beginnen mit einer Weite von ca. $2,5 \mu$ an der der Pulpahöhle zugewendeten Fläche des Zahnbeines, beschreiben alsbald eine S-förmige Krümmung und ziehen dann

Fig. 98.

Aus einem Längsschliffe des Seitentheiles der Krone eines menschlichen Backzahnes, 240 mal vergrössert. 1. Zahnkanälchen, theilweise bis in den Schmelz hineinlaufend. 2. Zahnbeinkugeln gegen 3. die Interglobularräume vorspringend. Technik Nr. 87, pag. 176.

Fig. 99.

Aus einem Längsschliffe der Wurzel eines menschlichen Backzahnes, 240mal vergr. 1. Zahnkanälchen unterbrochen durch eine körnige Schicht mit vielen 2. kleinen Interglobularräumen. 3. Knochenkörperchen mit vielen Ausläufern. Technik Nr. 87, pag. 176.

immer mehr an Kaliber abnehmend, leicht geschlängelt in radiärer Richtung gegen die Zahnbeinoberfläche; dort enden sie entweder fein auslaufend an der Schmelzgrenze oder biegen schlingenförmig in Nachbarkanälchen um. Während ihres ganzen Verlaufes geben sie zahlreiche Seitenäste ab, welche Verbindungen mit Nachbarkanälchen herstellen. Die die Zahnkanälchen begrenzende Grundsubstanz ist besonders fest und bildet die sog. „Zahn-scheiden“; das Lumen der Zahnkanälchen wird von weichen „Zahnfasern“ (s. Pulpa) ausgefüllt. In den peripherischen Gegenden des Zahnbeines liegen die Interglobularräume (Fig. 98 und 99), sehr verschieden grosse, mit einer weichen Substanz erfüllte Lücken, gegen welche das Dentin in Form meist halbkugelter Vorrangungen, die „Zahnbeinkugeln“ heissen, vorspringt. Am Hals und an der Wurzel des Zahnes sind viele Interglobularräume, sehr klein, und bilden die dicht unter dem Zement liegende sogen. Körnerschicht.

ad. 2. Der Schmelz (Email) ist noch härter, wie das Zahnbein; er besteht durchaus aus langen sechseckigen $3-6 \mu$ dicken homogenen¹⁾

¹⁾ Erst nach Behandlung mit Reagentien erscheinen sie quergebändert.

Fasern (Fig. 100), den Schmelzprismen, welche durch eine spärliche wasserreiche Kittsubstanz fest miteinander verbunden sind. Sie verlaufen unter mehrfacher Biegungen radiär von der Zahnbeinoberfläche bis zur freien Schmelzfläche; diese wird von einem sehr dünnen, aber sehr widerstandsfähigen Häutchen, dem Schmelzoberhäutchen, bedeckt.

ad. 3. Das Zement stimmt in seinem Baue mit dem des Knochens überein; es enthält viele Sharpey'sche Fasern. Havers'sche Kanälchen kommen nur im Zement älterer Individuen vor; Schichtung in Lamellen ist selten ausgeprägt. In der Nähe des Halses fehlen die Knochenkörperchen.

Fig. 100.

Vom Neugeborenen. Technik Nr. 89, pag. 176.

Fig. 101.

Sechs Odontoblasten in Zahnfasern *f* auslaufend; *p* Pulpa-fortsätze, 240mal vergrössert. Aus der Pulpa eines neugeborenen Knaben. Technik Nr. 88, pag. 176.

Der Raum zwischen Zahnwurzel und Alveole wird durch das an Nerven reiche Periost der Alveole ausgefüllt, das mit dem Zement dadurch fest verbunden ist, dass die Sharpey'schen Fasern des Unterkiefers das Periost durchsetzend bis in das Zement eindringen. Der oberste Theil des Alveolarperiostes heisst *Ligamentum circulare dentis*. Die *Zahn-pulpa* wird durch ein weiches, feinfaseriges, nicht zu Bündeln vereintes Bindegewebe hergestellt, dessen zellige Elemente an der Oberfläche zu einer Schicht länglicher, kernhaltiger Zellen, „*Odontoblasten*“, ausgebildet sind; dieselben schicken ausser kleinen Fortsätzen, *Pulpa-fortsätzen* (Fig. 101, *p*), die mit anderen Elementen der Pulpa in Verbindung stehen, lange Ausläufer in die Zahnkanälchen hinein, die oben genannten *Zahnfasern* (Fig. 101 *f*). Gefässe und Nerven des Zahnes sind nur auf die Pulpa beschränkt.

Entwicklung der Zähne.

Die Entwicklung der Zähne hebt beim Menschen gegen Ende des 2. Foetalmonates an und äussert sich zuerst durch eine Wucherung der gesamten Schleimhaut der Kieferränder; die hierdurch entstehende Verdickung heisst *Kieferwall*. Bald darauf entsteht eine längs des ganzen Kiefer-

walles verlaufende Furche, die Zahnfurche (Fig. 102 *Zf*), deren seitliche Begrenzungen Zahnwälle (*Zw*) genannt werden. Nun erfolgt eine reichliche

Fig. 102.

Schematische Darstellung der ersten Vorgänge der Zahnentwicklung. Vier Querschnitte (Frontalschnitte) des embryonalen Unterkiefers, Epithel grau punktiert, Bindegewebe quer schraffiert. 1. *Zf* Zahnfurche, *Zw* Zahnwall, *K* Unterkieferknochen (schwarz). 2. *Sk* Schmelzleiste. 3. *p* Zahnpapille. 4. *So* Schmelzorgan, *St* Stiel des Schmelzorganes.

Vermehrung der Schleimhautepithelzellen, welche nicht nur die Zahnfurche ausfüllen, sondern auch in Form eines fortlaufenden Streifens in das unterliegende Bindegewebe hinabwachsen. Dieser Streifen heisst Schmelzleiste (Fig. 102, 2 *Sk*) und besteht aus cylindrischen Zellen (Fig. 103, 3), Fort-

Fig. 103.

Frontalschnitt des Kopfes eines 4 cm langen Schalembryo. 15mal vergrößert. Technik Nr. 90, pag. 177.

setzungen der tiefstliegenden Epithelzellenschicht. Während die Schmelzleiste an ihrem unteren Ende eine der Zahl der Milchzähne entsprechende Anzahl kolbiger Verdickungen treibt (Fig. 102, 3), entstehen in der Tunica propria

ebensoviel Haufen von dichtgedrängten Bindegewebszellen, die jungen Zahnpapillen (Fig. 102, *p*). Indem Schmelzleiste und Zahnpapille gegen einander wachsen, stülpt sich erstere

hutförmig über die Papille (Fig. 102, 4).

Die so in ihrem unteren Abschnitte umgestaltete Schmelzleiste heisst nunmehr Schmelzorgan (Fig. 102, 4 *So*). Der unveränderte obere Abschnitt der Schmelzleiste soll fortan Stiel (*St*) heissen. Als bald erfahren die Elemente des Schmelzorganes weitere Ausbildung und zwar werden die der Papille aufsitzenden inneren Zellen hohe Cylinder, denen die Bildung des Schmelzes obliegt; sie heissen Schmelzzellen (Fig. 104, 3 *c*), ihre innere Oberfläche ist mit

Fig. 104.

Aus einem Querschnitte (Frontalschnitte) des Unterkiefers eines 4 Monate alten menschlichen Embryo, 40 mal vergr. 1. Zahnwall. 2. Stiel des Schmelzorganes. 3. Schmelzorgan, *a* periphere Zellen, *b* Schmelzpulpa, *c* cylindrische Zellen desselben. 4. Papille. Technik Nr. 90, pag. 177.

einem Cuticularsaum versehen; die peripherischen Zellen (Fig. 104, 3 *a*) werden dagegen immer niedriger und gestalten sich schliesslich zu abgeplatteten Elementen; die zwischen beiden liegenden Zellen (Fig.

Fig. 105.

Querschnitt des Unterkiefers eines neugeborenen Hundes, 40 mal vergr. Das Zahnsäckchen ist nur an der linken Seite gezeichnet. Die Gewebe bindegewebiger Abkunft sind von der linken, die Gewebe epithelialer Abkunft von der rechten Seite her bezeichnet. Technik Nr. 90, pag. 177.

104, 3 *b*) wachsen zu sternförmigen, mit einander anastomosirenden Zellen aus und bilden die Schmelzpulpa. Das in der Umgebung der ganzen Zahnanlage befindliche Bindegewebe ordnet sich unterdessen zu einer dichten

teren Haut, dem Zahnsäckchen, an dem man späterhin eine innere, mehr lockere und äussere, dickere Lage unterscheiden kann (Fig. 105). Während nun der Stiel des Schmelzorganes schwindet¹⁾, erfolgt die Bildung der bleibenden Zahngewebe. Die oberflächlichen Zellen der Zahnpapille wachsen zu den Odontoblasten (Fig. 105) heran, welche das Zahnbein bilden; die Schmelzzellen liefern den Schmelz (Fig. 105), indem jede Zelle eine alsbald verkalkende Substanz absondert, welche zu einem Schmelzprisma wird. Das Schmelzoberhäutchen entsteht dadurch, dass die Cuticularsäume der Schmelzzellen zu einer festen, homogenen Haut zusammenfliessen. Das Zement entsteht erst nach der Geburt, kurz vor Durchbruch des Zahnes; es ist ein Produkt des Periostes der Alveole.

In gleicher Weise wie die Milchzähne entwickeln sich die bleibenden Zähne, deren Schmelzleisten seitlich aus den Stielen der Schmelzorgane der Milchzähne hervorwachsen. Der fertige Zahn ist somit theils epithelialer Herkunft (Schmelz), theils stammt er von der bindegewebigen Zahnpapille (Zahnbein), deren Rest als Zahnpulpa beim Erwachsenen fortbesteht. Das Zement ist gewissermassen eine accessorische, von Nachbargeweben gelieferte Bildung.

Die Zunge.

Die Zunge wird in ihrer Hauptmasse von quergestreiften Muskeln gebildet, die, in Bündeln und Fasern aufgelöst, sich vielfach durchflechten und am grössten Theile ihres Umfanges von einer Fortsetzung der Mundschleimhaut überzogen werden. Die Verlaufsrichtung der Muskeln ist theils eine senkrecht aufsteigende (Mm. geniogloss., lingual. und hyogloss.), theils eine transversale (M. transversus linguae), theils eine longitudinale (M. lingual. und styloglossus.). Indem die Muskelbündel sich (meist rechtwinkelig) durchkreuzen, entsteht ein zierliches, auf Durchschnitten sichtbares Flechtwerk. Eine mediane Scheidewand, das Septum linguae, trennt die Muskelmassen der Zunge in eine rechte und eine linke Hälfte. Das Septum beginnt niedrig am Zungenbeinkörper, erreicht seine grösste Höhe in der Mitte der Zunge und verliert sich nach vorn allmählich wieder niedriger werdend; es durchsetzt nicht die ganze Hälfte der Zunge, sondern hört ca. 3 mm vom Zungenrücken entfernt auf. Das Septum besteht aus derben Bindegewebsfasern.

Die Schleimhaut der Zunge besteht, wie diejenige der Mundhöhle, aus Epithel, Tunica propria und Submucosa, ist aber durch anscheinliche Entwicklung und komplizierte Gestaltung der Papillen ausgezeichnet. Man unterscheidet drei Formen von Papillen: 1. P. filiformes (conicae), 2. P. fungiformes (clavatae), 3. P. circumvallatae. Die Papillae filiformes (Fig. 106)

¹⁾ Reste desselben sind noch im Zahnfleisch neugeborener Kinder zu finden und irrthümlicher Weise für Drüsen („Glandulae tartaricae“) gehalten worden.

sind cylindrische oder konische Erhebungen der Tunica propria, deren oberes Ende 5—20 kleine sekundäre Papillen (2) trägt. Sie bestehen aus deutlich faserigem Bindegewebe, sowie aus zahlreichen elastischen Fasern und werden

Fig. 106.

Längsschnitt der Schleimhaut des menschlichen Zungenrückens, 30mal vergrößert. 1. Durchschnitte zweier Papillae filiformes, deren jede drei sekundäre Papillen (2) trägt. 3. Doppelter, 4. einfacher Fortsatz des Epithels, an der Oberfläche mit Massen lose anhaftender Plattenepithelzellen bedeckt.

Technik Nr. 91, pag. 177.

Fig. 107.

Längsschnitt der Zungenschleimhaut des Menschen, 30mal vergrößert. 1. Papilla fungiformis mit 2. sekundären Papillen. 3. Stiel der P. fungiformis. 4. Kleine P. filiformis. Technik Nr. 91, pag. 177.

von einer mächtigen Lage geschichteten Plattenepithels überzogen, das nicht selten über den sekundären Papillen eine Anzahl fadenförmiger, verhornter Fortsätze (3) bildet. Die P. filiformes sind in grosser Menge über die ganze

Fig. 108.

Senkrechter Schnitt durch eine Papilla circumvallata des Menschen, 30mal vergr. Technik Nr. 91, pag. 177.

Zungenoberfläche verbreitet; ihre Länge schwankt zwischen 0,7—3,0 mm. Die Papillae fungiformes (Fig. 107) sind kugelige, mit etwas eingeschnürtem Stiele der Tunica propria aufsitzende Gebilde, deren ganze Oberfläche mit sekundären Papillen (2) besetzt ist. Sie bestehen aus einem deutlichen Flechtwerke von Bindegewebsbündeln, die nur wenige elastische Fasern

enthalten. Das sie überziehende Epithel ist etwas dünner und an der Oberfläche nicht verhornt. Die *P. fungiformes* sind, nicht so zahlreich wie die *P. filiformes*, über die ganze Zungenoberfläche verbreitet und am Lebenden wegen ihrer rothen Farbe (die von den durch das Epithel durchschimmernden Blutgefässen herrührt) meist leicht sichtbar. Ihre Höhe schwankt zwischen 0,5—1,5 mm. Die *Papillae circumvallatae* (Fig. 108) gleichen breiten, plattgedrückten *P. fungiformes* und sind von einer verschieden tiefen, kreisförmigen Furche von der übrigen Schleimhaut abgesetzt; den jenseits der Furche liegenden Schleimhauttheil bezeichnet man als Wall. Die Papille besteht aus demselben Bindegewebe wie die *P. fungiformes*; sekundäre Papillen finden sich nur auf der oberen, nicht an der seitlichen Fläche. Im Epithel der Seitenfläche der *Papillae circumvallatae* und zuweilen auch des Walles liegen die Endapparate der Geschmacksnerven, die Geschmacksknospen (s. Geschmacksorgane). Die *P. circumvallatae* finden sich in beschränkter Zahl (8—15) nur am hinteren Ende der Zungenoberfläche. Ihre Höhe beträgt 1—1,5 mm bei 1—3 mm Breite. *Papilla foliata* wird eine jederseits am hinteren Seitenrande der Zunge gelegene Gruppe von parallelen Schleimhautfalten genannt, die durch ihren Reichthum an Geschmacksknospen ausgezeichnet sind. Die *P. foliata* ist besonders beim Kaninchen entwickelt.

Die Submucosa ist an der Spitze und an dem Rücken der Zunge fest und derb („Fascia linguae“) und innig mit den unterliegenden Theilen verbunden.

Zungenbälge. Eine besondere Beschaffenheit gewinnt die Schleim-

Fig. 109.

Senkrechter Schnitt durch die Mitte eines Zungenbalges des erwachsenen Menschen, 20mal vergrössert. 1. Balghöhle, ausgewanderte Leukocyten enthaltend. 2. Epithel der Balghöhle, links und unten von durchwandernden Leukocyten durchsetzt, rechts grossentheils intakt. 3. Adonoides Gewebe, Knötchen mit Keimcentren enthaltend, a Knötchen in der Mitte durchgeschnitten, b Knötchen seitlich getroffen, c Knötchen am äussersten Umfange angeschnitten. 4. Fasorhülle. 5. Querschnitt eines Schleimdrüsenausführungsganges. 6. Blutgefäss. Technik Nr. 91, pag. 177.

haut der Zungenwurzel von den *P. circumvallatae* an bis zum Kehldeckel durch die Entwicklung der Zungenbälge. Das sind kugelige, 1—4 mm

grosse Anhäufungen adenoiden Gewebes, die, in der obersten Schichte der T. propria gelegen, makroskopisch leicht wahrnehmbare Erhabenheiten bilden. In der Mitte derselben sieht man eine punktförmige Oeffnung¹⁾, den Eingang in die Balghöhle. Das adenoide Gewebe enthält eine verschieden grosse Anzahl von Knötchen mit Keimcentren (pag. 84) und ist scharf gegen das fibrilläre Bindegewebe der Tunica propria abgegrenzt, welches bei gut ausgeprägten Bälgen sich in kreisförmigen Faserzügen um das adenoide Gewebe ordnet. Man nennt diese Faserzüge die Faserhülle (Fig. 109, 4). Die Balghöhle (1) wird rings von adenoidem Gewebe umschlossen und ist mit einer Fortsetzung des geschichteten Plattenepithels der Oberfläche ausgekleidet. Unter normalen Verhältnissen wandern fortwährend zahlreiche Leukocyten des adenoiden Gewebes durch dieses Epithel in die Balghöhle und gelangen von da in die Mundhöhle, in deren Sekret sie als „Schleim-“ und Speichel-Körperchen“ leicht gefunden werden. Das Epithel wird dabei oft in grosser Ausdehnung zerstört oder ist derart mit Leukocyten infiltrirt, dass seine Grenzen nicht mehr mit Sicherheit nachgewiesen werden können.

Drüsen. Zwei Arten tubulöser Drüsen (pag. 44) sind in der Zungenschleimhaut und in den oberflächlichen Schichten der Zungenmuskulatur gelegen. Die Drüsenzellen der einen Art liefern ein schleim(mucin-)haltiges Sekret; wir heissen solche Drüsen Schleimdrüsen. Das Sekret der zweiten Art ist eine wässrige, seröse Flüssigkeit, welche sich durch ihren hohen Eiweissgehalt auszeichnet; solche Drüsen heissen seröse oder Eiweissdrüsen.

Die Schleimdrüsen sind von gleichem Bau wie diejenigen der Mundhöhle und finden sich entlang der Zungenränder und in grösserer Menge an

Fig. 110.

I, II. Aus einem Durchschnitte einer Schleimdrüse der menschlichen Zungenwurzel. I. Tubulusquerschnitt mit *b* sekretleeren Drüsenzellen, *c* sekretgefüllten Drüsenzellen, *d* Lumen. II. Tubulusquerschnitt, nur sekretgefüllte Zellen enthaltend. III und IV. Aus der Zungenschleimhaut eines Kaninchens. III. Querschnitt eines Schleimdrüsentubulus. IV. Mehrere Tubuli einer Eiweissdrüse, bei *d* das sehr kleine Lumen. V. Mehrere Tubuli einer Eiweissdrüse des Menschen mit grösserem (*d'*) und kleinerem (*d*) Lumen. Sämmtliche Schnitte 240mal vergrössert. Technik Nr. 91, pag. 177.

der Zungenwurzel, wo ihre mit einem (zuweilen Flimmerhaare tragenden) Cylinderepithel ausgekleideten Ausführungsgänge nicht selten in die Balghöhlen münden. Die Wandung der Tubuli besteht aus einer strukturlosen Membrana propria und cylindrischen, mit einer derben Zellenmembran ausgestatteten Drüsenzellen, deren Aussehen nach ihrem jeweiligen Funktions-

¹⁾ Dieselbe wurde früher für den Ausführungsgang des Zungenbalges, dieser selbst für eine Drüse gehalten, daher der noch gebräuchliche Name „Balgdrüse“.

zustande verschieden ist. Im sekretleeren Zustande ist die Zelle schmaler, der an der Basis befindliche Kern queroval (Fig 110, Ib); im sekretgefüllten Zustande ist die Zelle breiter, der Kern platt an die Wand gedrückt (Fig. 110, Ic, II). Meist zeigt ein und dieselbe Schleimdrüse, ja oft ein und derselbe Tubulus Drüsenzellen in verschiedenen Sekretionsphasen (I), trotzdem kommt es hier nicht zur Bildung von „Halbmonden“ (s. pag. 47), weil die starre Membran der Drüsenzellen ein Abdrängen vom Lumen nicht gestattet¹⁾. Die in der Zungenspitze befindliche Nuhn'sche Drüse ist gleichfalls eine Schleimdrüse.

Die Eiweißdrüsen sind nur auf die Gegend der P. circumvall. und foliat. beschränkt; ihre in die Furchen zwischen Papille und Wall einmündenden Ausführungsgänge (s. Fig. 108) sind mit einem ein- oder mehrschichtigen (nicht selten flimmernden) Cylinderepithel ausgekleidet; die kleinen Tubuli bestehen aus einer zarten Membrana propria und kurzcyllindrischen oder konischen, membranlosen Zellen, deren trübes, körniges Protoplasma einen in der Mitte gelegenen kugeligen Kern einschliesst (Fig. 110 IV und V). Das Lumen der Tubuli (*dd'*) ist (besonders bei Thieren) sehr eng.

Die Blutgefäße der Zungenschleimhaut bilden der Fläche nach ausgebreitete Netze, von welchen Zweige in sämtliche Papillen bis in die sekundären Papillen hinein sich erstrecken. An der Zungenwurzel durchbohren kleine Arterien die Faserhülle der Zungenbälge und lösen sich in Kapillaren auf, welche bis ins Innere der Knötchen hineinreichen. Die Blutgefäße der Drüsen bilden ein die Tubuli umspinnendes Kapillarnetz.

Die Lymphgefäße der Zunge sind in zwei Netzen angeordnet: ein tieferes, aus gröberen Gefäßen bestehendes, und ein oberflächliches Netzwerk, welches letztere Lymphgefäße der Papillen aufnimmt. Sehr reichlich sind die Lymphgefäße der Zungenwurzel entwickelt, welche an den Balgdrüsen ein die Knötchen umspinnendes Netz bilden.

Die Nerven der Zungenschleimhaut (N. glossopharyngeus und N. lingualis) sind in ihrem Verlaufe mit kleinen Gruppen von Ganglienzellen ausgestattet; ihre Enden verhalten sich theils wie die der übrigen Mundschleimhaut, theils treten sie zu den Geschmacksknospen in enge Beziehung (s. Geschmacksorgan).

Der Pharynx.

Die Wand des Pharynx besteht aus drei Häuten: Schleimhaut, Muskelhaut und Faserhaut. Die Schleimhaut besitzt wie die Mundhöhlenschleimhaut ein geschichtetes Pflasterepithel, eine papillenträgende Tunica propria, ferner reichliche Schleimdrüsen. Im Cavum pharyngonasale dagegen ist das Epithel geschichtetes, flimmerndes Cylinderepithel, dessen untere Grenze ziem-

1) Nur die Zungenschleimdrüsen der Katze, sowie die Schleimdrüsen der menschlichen Uvula enthalten Halbmonde.

lichen Schwankungen unterliegt. Sehr reichlich ist die Entwicklung des adenoiden Gewebes. Dasselbe bildet zwischen beiden Gaumenbögen jederseits eine unter dem Namen Tonsille bekannte, ansehnliche Anhäufung, die hinsichtlich ihres Baues beim Menschen und bei vielen Thieren einer Summe grosser Zungenbälge entspricht (s. pag. 153): hier wandern so zahlreiche Leukocyten durch das Epithel in die Balghöhlen, dass die Tonsillen als die ausgiebigste Quelle der Speicheldrüsenkörperchen zu betrachten sind. In der Nachbarschaft der Tonsille sind viele Schleimdrüsen gelegen. Auch im Cavum pharyngonasale ist das adenoide Gewebe stark vertreten; es bildet am Dache des Schlundkopfes eine ansehnliche, als „Pharynxtonsille“ bekannte Masse, die hinsichtlich ihres Baues mit dem der Gaumentonsillen übereinstimmt, nur ist das adenoide Gewebe weniger scharf von der übrigen Tunica propria abgegrenzt. Auch hier wandern viele Leukocyten durch das Epithel. Die Entwicklung des gesammten adenoiden Gewebes der Mundhöhle und des Pharynx ist bedeutenden Schwankungen unterworfen.

Die Muskelhaut (Mm. constrictores pharyngis) besteht aus quergestreiften Fasern, deren Anordnung in das Gebiet der makroskopischen Anatomie gehört. Die Faserhaut ist ein derbfaseriges, mit zahlreichen elastischen Fasern durchsetztes Bindegewebe. Blut-, Lymphgefässe und Nerven verhalten sich wie in der Mundhöhle.

Die Speiseröhre.

Die Wandung der Speiseröhre setzt sich aus Schleimhaut, Muskelhaut und Faserhaut zusammen. Die Schleimhaut besteht aus geschichtetem

Fig. 111.

Stück eines Querschnittes des Mittelstückes der menschlichen Speiseröhre, 10mal vergrössert. 1. Pflasterepithel. 2. Tunica propria. 3. Muscularis mucosae. 4. Submucosa. 5. Ringmuskeln. 6. Längsmuskeln. 7. Blutgefäss. Technik Nr. 93, pag. 178.

Pflasterepithel (Fig. 111, 1), einer papillentragenden Tunica propria (2), welcher eine Schichte längsverlaufender glatter Muskelfasern, die Muscularis mucosae (3), folgt; unter dieser ist die aus lockeren Bindegewebsbündeln gewebte Submucosa (4) gelegen, welche (in der oberen Hälfte der Speiseröhre) kleine Schleimdrüsen einschliesst. Die Muskelhaut besteht im Halstheile der Speiseröhre aus quergestreiften Muskelfasern, an deren Stelle weiter unten

glatte Muskelfasern treten. Sie sind dort in zwei Lagen, einer inneren Ring- (5) und einer äusseren Längsfaserlage (6) geordnet. Die Faserhaut be-

steht aus derbem, mit zahlreichen elastischen Elementen untermischtem Bindegewebe. Blut-, Lymphgefäße und Nerven verhalten sich wie die des Pharynx. Zwischen Ring- und Längsfaserlage bilden die Nervenstämmchen, denen kleine Gruppen von Ganglienzellen beigegeben sind, ein netzförmiges Geflecht (s. Auerbach's Plexus pag. 182).

Der Magen.

Die 2—3 mm dicke Wand des Magens setzt sich aus drei Häuten zusammen: 1. der Schleimhaut, 2. der Muskelhaut und 3. der Serosa.

ad. 1. Schleimhaut. Die durch ihre röthlichgraue Farbe von der weissen Speiseröhrenschleimhaut sich scharf absetzende Magenschleimhaut besteht aus Epithel, einer Tunica propria, einer Muscularis mucosae und einer Submucosa (Fig. 112).

Das Epithel ist einfaches Cylinderepithel, dessen Elemente Schleim produziren. Man kann an ihnen meist zwei Abschnitte unterscheiden, einen oberen schleimigen (Fig. 12 c) und einen unteren, protoplasmatischen (ρ) Abschnitt, welcher letzterer den ovalen oder runden oder selbst platten Kern enthält. Die Ausdehnung des schleimigen Abschnittes ist je nach dem Funktionsstadium eine sehr verschiedene (vergl. Fig. 12). Epithelzellen, deren schleimiger Inhalt ausgetreten ist, sehen Becherzellen sehr ähnlich (pag. 160).

Fig. 112.

Senkrechter Schnitt quer durch die Magenwand des Menschen. 15mal vergrößert. Die T. propria enthält so dicht nebeneinander stehende Drüsen, dass ihr Gewebe nur am Grunde der Drüsen gegen die Muscularis mucosae sichtbar ist. Technik Nr. 94, pag. 178.

Die Tunica propria besteht aus einer Mischung von fibrillärem und retikulärem Bindegewebe und aus einer sehr wechselnden Menge von Leukoeyten, die, zuweilen in dichten Haufen beisammenliegend, Solitärknötchen bilden. Die T. propria enthält so zahlreiche Drüsen, dass ihr Gewebe nur auf schmale Scheidewände zwischen und eine dünne Schichte unter den Drüsen beschränkt ist. Im Pylorustheile stehen die Drüsen weiter auseinander; die dort ansehnlich entwickelte Tunica propria erhebt sich nicht selten zu faden- oder blattförmigen Zotten.

Man unterscheidet zwei Arten von Magendrüsen; die eine Art ist vorzugsweise im Körper und im Fundus des Magens gelegen, man nennt sie

Fundusdrüsen¹⁾, die andere Art ist nur auf die schmale Regio pylorica beschränkt, diese Drüsen heissen Pylorusdrüsen. Beide sind einfache

Fig. 113.

Senkrechter Schnitt durch die Magenschleimhaut des Menschen. Fundusgegend. 220mal vergrößert.
Technik Nr. 97, pag. 179.

¹⁾ In den älteren Lehrbüchern heissen die Fundusdrüsen Labdrüsen oder Pepsindrüsen, ein Name, der sich auf eine jetzt in Frage gezogene Funktion dieser Drüsen gründet.

oder mehrfach (besonders die Pylorusdrüsen) getheilte tubulöse Einzeldrüsen, welche allein oder zu mehreren in grubige Vertiefungen der Schleimhautoberfläche, in die Magenrübchen, münden; der in diese sich einsenkende Theil der Drüse wird Hals, der darauffolgende Theil Körper, das blinde Ende Grund genannt (Fig. 113). Jede Drüse besteht aus einer Membrana propria und aus Drüsenzellen.

Die Fundusdrüsen haben zweierlei Zellen: Hauptzellen und Belegzellen¹⁾. Erstere sind helle, kubische oder kurzcyindrische Zellen, deren körniges Protoplasma einen kugeligen Kern umgiebt. Die Hauptzellen sind sehr vergänglich. Die Belegzellen sind meist bedeutend grösser, dunkler, von rundlich eckiger Gestalt; ihr feinkörniges Protoplasma umgiebt einen runden Kern. Die Belegzellen sind besonders durch die Fähigkeit, sich mit

Fig. 114.

Querschnitt einer Fundusdrüse des Menschen.
240mal vergrössert.
Technik Nr. 97, pag. 179.

Anilinfarben intensiv zu färben, ausgezeichnet. Die Vertheilung beider Zellarten ist keine gleichmässige; die Hauptzellen bilden die Hauptmasse der Drüsen-schläuche, die Belegzellen sind unregelmässig vertheilt; in besonders reichlicher Menge finden sie sich in Hals und Körper. Hier liegen sie in einer Reihe mit

den Hauptzellen, gegen den Drüsengrund zu jedoch sind die Belegzellen aus der Reihe der Hauptzellen gegen die Peripherie gedrängt und reichen nur mehr mit einem schmalen Fortsatze bis zum Lumen der Drüse (Fig. 114).

Die Pylorusdrüsen haben fast durchaus²⁾ cylindrische, mit rundlichem, der Zellenbasis nahegerücktem Kerne versehene Zellen, welche in der intermediären Zone (d. i. die Grenzzone zwischen Pylorus- und Fundusschleimhaut) so sehr den Hauptzellen gleichen, dass sie mit diesen verglichen worden sind.

Obige Beschreibung bezieht sich auf den hungernden Magen; im Zustande der Verdauung sind die Belegzellen grösser, Hauptzellen sowohl wie Pylorusdrüsenzellen sind dunkler, der Kern letzterer ist mehr in die Mitte der Zelle gerückt.

Fig. 115.

Unteres Stück einer Pylorusdrüse.
(Aus einem senkrechten Schnitt durch die menschliche Magenschleimhaut) 240mal vergrössert.
Technik Nr. 97, pag. 179.

1) Die von verschiedenen Seiten aufgestellte Behauptung, dass Haupt- und Belegzellen verschiedene Funktionsbilder einer Zellart seien, sowie die Angabe, dass bei der Verdauung Belegzellen sich vermehren, nach langem Hungern aber verschwinden, sind einer eingehenden Begründung noch sehr bedürftig. Selbst der Magen nach langem Winterschlaf getödteter Thiere enthält noch Belegzellen.

2) Beim Menschen finden sich auch hier vereinzelte Belegzellen, bei Thieren, z. B. beim Hunde, einzelne dunklere, kegelförmige Zellen, welche durch Nachbarzellen bewirkte Kompressionserscheinungen sind.

Die Muscularis mucosae besteht aus zwei oder drei in verschiedener Richtung sich durchflechtenden Lagen glatter Muskelfasern, von denen einzelne Züge sich abzweigen, um in senkrechter Richtung zwischen den Drüenschläuchen emporzusteigen.

Die Submucosa besteht aus lockeren Bindegewebsbündeln, elastischen Fasern und zuweilen kleinen Anhäufungen von Fettzellen.

ad 2. Muskelhaut. Nur am Pylorustheile lassen sich zwei deutlich gesonderte Schichten, eine stark innere Ringschicht und eine schwächere äussere Längsschicht glatter Muskelfasern unterscheiden; in den anderen Regionen des Magens wird der Verlauf durch Uebertreten der Muskelschichten des Oesophagus auf den Magen, sowie durch die im Verlaufe der Entwicklung erfolgende Drehung des Magens sehr kompliziert; Durchschnitte ergeben dann in allen möglichen Richtungen getroffene Faserbündel.

ad 3. Serosa s. Bauchfell (pag. 175).

Gefässe und Nerven s. pag. 165 u. f.

Der Darm.

Die Darmwand wird, wie die des Magens, aus 1. Schleimhaut, 2. Muskelhaut und 3. Serosa gebildet.

ad 1. Die Schleimhaut besteht aus Epithel, einer Tunica propria, einer Muscularis mucosae und einer Submucosa.

Das Epithel ist ein einfaches Cyliinderepithel, dessen Elemente an der freien Oberfläche eine für sie charakteristische Kutikularbildung, den sog. Basalsaum (s. Fig. 9 c pag. 42), tragen. Das Protoplasma der Zellen ist körnig und enthält bei Fettresorption zahlreiche Fettpartikelchen. Unter Um-

ständen kann jede Darmepithelzelle eine schleimige Umwandlung erfahren, welche zur Bildung einer Becherzelle führt. Dieselbe hat eine rundlich ovale, nicht selten kelchglasähnliche Form, ihr oberer, der Darmsurface zugekehrter Theil wird in verschieden grosser Ausdehnung von dem zu Schleim umgewan-

Fig. 116.

Becherzellen, 560 mal vergr. A Des Kaninchens, isolirt nach Technik Nr. 99b, pag. 180. X Hervorquellender Schleim. B aus einem Schnitte der Dünndarmschleimhaut des Menschen; nach Technik Nr. 97, pag. 179. b Eine Becherzelle zwischen Cylinderzellen.

delten Protoplasma eingenommen, der Kern mit dem übrigen Protoplasma liegt an der Basis der Zelle; ein Basalsaum fehlt der Becherzelle, an dessen Stelle befindet sich eine scharf begrenzte kreisförmige Oeffnung (Fig. 116, A), durch welche der Schleim auf die Darmsurface sich ergiesst. Zwischen den Epithelzellen sind in wechselnder Anzahl durchwandernde Leukocyten gelegen.

Die Tunica propria besteht vorwiegend aus retikulärem¹⁾ Bindegewebe, das sehr wechselnde Mengen von Leukocyten enthält (s. pag. 162).

Fig. 117.

A Zotte mit Kontraktionsfalten aus dem Dünndarme eines Kaninchens, 70mal vergrössert. Technik Nr. 99, pag. 180. B 1 Drei Lieberkühn'sche Drüsen des Dickdarmes vom Kaninchen. e Epithel der Oberfläche, 80mal vergrössert. Technik Nr. 103, pag. 181.

von cylindrischen Zellen ausgekleidet und von einer zarten Membrana propria umhüllt werden. Im Dünndarm sind die Mündungen der Lieber-

Durch die Einlagerung zahlreicher Drüsen ist sie nur auf die Zwischenräume zwischen den Drüsen und auf eine schmale Schicht am Grunde der Drüsen beschränkt und zeigt so, wenigstens im Bereiche des Dickdarmes, vollkommene Uebereinstimmung mit jener des Magens; im ganzen Dünndarm jedoch erhebt sich die Tunica propria zu zahlreichen ca. 1 mm hohen, cylindrischen (im Duodenum blattförmigen) Bildungen, den Darmzotten, welche über die freie Darmoberfläche hinausragen. Die in die Tunica propria eingelagerten Drüsen, die Lieberkühn'schen Drüsen oder Krypten sind tubulöse Einzeldrüsen, einfache Blindschläuche, welche

Fig. 118.

Senkrechter (Längs-) Schnitt durch das Duodenum einer Katze, 30mal vergr. Von der ersten Zotte links hat sich das Epithel vom Bindegewebe abgehoben. Die beiden äusseren Zotten rechts sind schräg angeschnitten. Von der mittleren Zotte ist das Epithel oben abgefallen, so dass der Bindegewebskörper der Zotte frei liegt. Die Serosa ist nur als Linie unterhalb der Längsmuskellage zu sehen. Technik Nr. 98, pag. 180.

Die Muscularis mucosae besteht aus einer inneren, cirkulären und einer äusseren, longitudinalen Lage glatter Muskelfasern. Senkrecht

kranzartig um die Basen der Zotten gelagert. Weder die Krypten des Dünndarmes, noch jene des Dickdarmes scheinen ein spezifisches Sekret abzusondern; dagegen ist es sicher, dass sich hier fortwährend neue Zellen (durch mitotische Theilung) bilden, welche zum Ersatz der an der Schleimhautoberfläche zu Grunde gehenden Epithelzellen allmählich in die Höhe geschoben werden.

¹⁾ Bei Katze und Hund besteht die T. propria z. Th. aus fibrillärem Bindegewebe.

von ihr aufsteigende Fasern reichen bis nahe zur Spitze der Zotte; ihre Kontraktion bewirkte eine Verkürzung der Zotte¹⁾.

Die Submucosa besteht aus lockerem fibrillärem Bindegewebe; sie enthält im Gebiete des Duodenum (in dessen oberer Hälfte) verästelte tubulöse Einzeldrüsen, die Brunner'schen Drüsen. Ihr mit cylindrischen Zellen ausgekleideter Ausführungsgang durchbricht die Muscul. mucosae und verläuft in der Tunica propria parallel mit den Lieberkühn'schen Drüsen. Cylindrische Drüsenzellen und eine strukturlose Membrana propria bilden die Wandung der Tubuli.

Lymphknötchen.

Es ist oben (pag. 85) schon erwähnt worden, dass die Tunica propria der Schleimhäute wechselnde Mengen von Leukocyten enthält, die entweder diffus vertheilt oder zu umschriebenen Massen zusammengeballt sind. In letzterem Falle bilden sie 0,5 bis 2 mm grosse Knötchen, welche entweder einzeln stehen, Solitärknötchen („Solitäre Follikel“), oder zu Gruppen von Knötchen, Peyer'schen Haufen („Plaques“), vereint sind.

Fig. 119.

Querschnitt eines Peyer'schen Haufens des Dünndarms der Katze, 10 mal vergrößert. Die Kuppen von vier Knötchen sind nicht vom Schnitt getroffen. Technik Nr. 101, pag. 181.

Die Solitärknötchen finden sich in sehr wechselnder Menge in der Magenschleimhaut, in grösserer Anzahl noch im Darne. Sie haben meist

¹⁾ Ausser diesen longitudinalen Muskelfasern sind beim Menschen auch zahlreiche quere Muskelfasern in den Zotten beschrieben worden.

eine länglich runde Form und liegen zu Beginn ihrer Entwicklung stets in der Tunica propria; ihre Kuppe reicht bis dicht unter das Epithel, die Basis ist gegen die Muscularis mucosae gerichtet. Mit vorschreitendem Wachstume (bei Katzen schon um die Zeit der Geburt) durchbrechen sie die Muscularis mucosae und breiten sich in der Submucosa, deren lockeres Gewebe ihnen wenig Widerstand entgegensetzt, aus. Der in der Submucosa gelegene Theil des Knötchens hat eine kugelige Gestalt und wird bald bedeutend grösser als der in der Tunica propria gelegene Abschnitt. Die Gesamtform des fertigen Solitärknötchens gleicht also einer Birne; der schmale

Fig. 120.

Aus einem senkrechten Schnitte des Dünndarmes einer 7 Tage alten Katze, 250mal vergr. Kuppe eines Solitärknötchens. Links viele in Durchwanderung durch das Epithel begriffene Leukocyten. Rechts ist das Epithel bis auf drei Leukocyten noch ganz frei. Technik Nr. 101, pag. 181.

Theil der Birne ist gegen das Epithel gekehrt. Wo die Knötchen stehen, da fehlen die Zotten und sind die Drüsenschläuche zur Seite gedrängt. Hinsichtlich ihres feineren Baues bestehen die Solitärknötchen aus adenoidem Gewebe; sie enthalten meist ein Keimcentrum (pag. 84). Die daselbst gebildeten Leukocyten gelangen zum Theil in die benachbarten Lymphgefässe, zum Theil wandern

sie durch das Epithel in die Darmhöhle. Das die Kuppen der Solitärknötchen überziehende Cylinderepithel enthält stets in Durchwanderung begriffene Leukocyten (Fig. 120).

Die Peyer'schen Haufen sind Gruppen von 10—60 Knötchen, die nebeneinander, nie übereinander gelegen sind und deren jedes wie ein Solitärknötchen beschaffen ist. Nur die Form der einzelnen Knötchen erfährt in sofern zuweilen eine Aenderung, als sich die Knötchen an den Seiten durch Druck abplattten (Fig. 119). Sie sind vorzugsweise im unteren Theile des Dünndarmes gelegen, entweder gut von einander isolirt oder auch in eine diffuse Masse von Leukocyten verwandelt, in welcher nur die einzelnen Keimcentra sichtbar sind. Letzteres findet sich nicht selten im Proc. vermiformis des Menschen.

ad 2. Die Muskelhaut des Darmes besteht aus einer inneren, stärkeren cirkulären und einer äusseren, schwächeren longitudinalen Schicht glatter Muskelfasern. Am Dickdarme ist die Längsmuskelschicht nur an den Taenien wohl entwickelt, dazwischen jedoch äusserst dünn.

ad 3. Serosa s. Lauchfell (pag. 175).

Die Blutgefässe des Magens und des Darmes.

Die Blutgefässe des Magens und des Darmes verhalten sich hinsichtlich ihrer Vertheilung bei Magen und Dickdarm ganz gleich, während beim Dünn-

darme durch die Anwesenheit der Zotten eine Modifikation des Verlaufes eintritt. In Magen und Dickdarm geben die herantretenden Arterien zuerst feine Aestchen an die Serosa ab, durchsetzen alsdann die Muskularis, welche sie ebenfalls versorgen und bilden dann in der Submucosa ein der Fläche nach ausgebreitetes Netz. Von diesem steigen feine Zweige durch die Muscularis mucosae auf, um, in der Tunica propria angelangt, am Grunde der Drüsenschläuche abermals ein der Fläche nach ausgebreitetes Netz zu bilden. Aus diesem Netzwerke entwickeln sich feine ($4,5-9\ \mu$ weite) Kapillaren, welche die Drüsenschläuche umspinnen und an der Schleimhautoberfläche in noch einmal so weite ($9-18\ \mu$) Kapillaren übergehen, welche kranzförmig um die Mündungen der Drüsen gelegen sind. Aus den weiten Kapillaren gehen Venenstämmchen hervor, welche senkrecht zwischen den Drüsenschläuchen hinabsteigend in ein der Fläche nach ausgebreitetes venöses Netz münden, das in der Tunica propria gelegen ist. Weiterhin verlaufen die Venen neben den Arterien; die von dem submucösen Venennetze ausgehenden Venen sind bis zu ihren Mündungen in die dem Darm annähernd parallel laufenden Sammelvenen mit Klappen versehen. Die weiteren Aeste und der Stamm der Pfortader sind klappenlos.

Fig. 121.

Stück eines Querschnittes eines injizierten Dünndarmes des Kaninchens, 50mal vergr. Das Lymphknötchen ist so durchschnitten, dass in seiner oberen Hälfte das oberflächliche Kapillarnetz, in der unteren Hälfte die im Innern des Knötchens befindlichen Kapillarschlingen sichtbar sind. Die Lieberkühn'schen Drüsen sind an dem sehr dicken, ungefärbten Schnitte nicht zu sehen. 1 Blutgefäßnetz der Muscularis, 2 der Submucosa, 3 der Tunica propria. Technik Nr. 104, pag. 182.

Im Dünndarme verhalten sich nur die für die Lieberkühn'schen Drüsen bestimmten Arterien wie diejenigen des Dickdarmes, in die Zotten gelangt eine (bei breiten Zotten mehrere) Arterie, die dort der Vene gegenüberliegt;

von ersterer entspringen dicht unter dem Epithel gelegene Kapillaren, die senkrecht oder schräg zur Zottenlängsachse verlaufend in die Venen übergehen¹⁾. Weiterhin verhalten sich die Venen wie die des Dickdarmes.

Die Brunner'schen Drüsen werden von einem Kapillarnetze umgeben, welches von den submukösen Blutgefäßen gespeist wird.

Die Lymphknötchen („Follikel“) sind von einem oberflächlichen Blutkapillarnetze umgeben, aus welchem feine Fortsetzungen ins Innere des Knötchens dringen (Fig. 121). Oft erreichen diese das Centrum des Knötchens nicht, dann besteht ein gefäßloser Fleck in Mitten des Knötchens.

Die Lymphgefäße des Magens und des Darmes.

Die Lymph(Chylus-)gefäße des Magens und des Darmes beginnen in der Schleimhaut des Magens und des Dickdarmes als oben blinde, zwischen den Drüsenschläuchen herabsteigende, ca. 30 μ weite Kapillaren; in der Schleimhaut des Dünndarmes sind die Anfänge der Lymphgefäße in der Achse der Zotten gelegen und stellen daselbst bei cylindrischen Zotten einfache, bei blattförmigen Zotten mehrfache, 27—36 μ weite, am oberen Ende geschlossene Gänge („centrale Zottenräume“) dar. Alle diese Gefäße senken sich in ein am Grunde der Drüsenschläuche gelegenes, der Fläche nach ausgebreitetes, engmaschiges Kapillarnetz, das durch viele Anastomosen mit einem in der Submucosa befindlichen, weitmaschigen Flächennetze zusammenhängt; die daraus entspringenden, Klappen führenden Lymphgefäße durchsetzen die Muscularis und nehmen hier die abführenden Gefäße eines Netzes auf, welches zwischen Ring- und Längsmuskelschicht gelegen ist. Dieses Netz heisst interlaminäres Lymphgefäßnetz und nimmt die vielen, in beiden Muskelschichten befindlichen Lymphkapillaren auf. Unter der Serosa laufen die Lymphgefäße („subseröse Lymphgefäße“) bis zum Ansätze des Mesenterium, zwischen dessen Platten sie dann weiter ziehen.

Der eben geschilderte Verlauf erfährt in der Schleimhaut an einzelnen Stellen eine Modifikation. Diese Stellen sind die Peyer'schen Haufen; durch die Knötchen, welche niemals Lymphgefäße enthalten, werden die Kapillaren zur Seite gedrückt und verlaufen zwischen den Interstitien der Knötchen als an Zahl verminderte, an Weite jedoch vergrößerte Kanäle. Es ist wahrscheinlich, dass die Lymphsinus des Kaninchens (pag. 86 Anmerkung) nichts anderes, als solche kolossal erweiterte, breit gequetschte Kapillaren sind.

1) So ist es auch beim Hund; bei Kaninchen aber und bei Meerschweinchen verlaufen die zu den Zotten ziehenden Arterien als feine Aestchen (Fig. 121, a) bis zur Basis der Zotte und lösen sich dann in ein Kapillarnetz auf, das dicht unter dem Epithel gelegen ist. An der Spitze der Zotte münden die Kapillaren in ein Venenstämmchen (Fig. 121, v), welches in seinem senkrecht absteigenden Verlaufe die die Drüsenmündungen umspinnenden Kapillaren aufnimmt.

Nerven des Magens und des Darmes.

Die zumeist aus marklosen Fasern bestehenden, zahlreichen Nerven bilden unter der Serosa ein Netzwerk, durchsetzen dann die Längsmuskelschicht und breiten sich zwischen dieser und der Ringmuskelschicht zu einem

Fig. 122.

A Flächenbild des Auerbach'schen Plexus eines neugeborenen Kindes, 50mal vergrößert. *g* Gruppen von Ganglienzellen. *r* Ringmuskelschicht, an den gestreckten Kernen kenntlich. Technik Nr. 105 a.
B Flächenbild des Meissner'schen Plexus desselben Kindes, 50mal vergrößert. *g* Ganglienzellengruppen.
b Durchscheinendes Blutgefäß. Technik Nr. 105 b, pag. 183.

ansehnlichen Geflechte, dem Plexus myentericus (Auerbach'scher Plexus) aus, das mit zahlreichen, meist an den Knotenpunkten des Netzes befindlichen Gruppen multipolarer Ganglienzellen ausgestattet ist. Die Maschen des Geflechtes sind rundlich eckig. Aus diesem Geflechte entspringen marklose Fasern, die theils an den glatten Muskelfasern enden (s. pag. 135), theils die Ringmuskelschicht durchbohren und, in der Submucosa angelangt, einen zweiten feinen Plexus bilden, den Meissner'schen Plexus, dessen Ganglienzellengruppen kleiner, dessen Maschen enger sind. Von da entspringen feine Fasern, welche zwischen den Drüsen bis in die Zotten verlaufen; ihre Endigung ist unbekannt.

Auch zwischen den Muskelschichten des Oesophagus kommt ein dem Plexus myentericus entsprechendes Geflecht vor.

Die Speicheldrüsen.

Die Speicheldrüsen — Gland. submaxillaris, sublingualis, parotis und das Pankreas — sind tubulöse, zusammengesetzte Drüsen, welche entweder

Schleim oder eiweissreiche, seröse Flüssigkeit, oder auch beides absondern. Wir unterscheiden demnach: 1. Schleim(speichel)drüsen (Gl. sublingual.

Fig. 123.

Aus einem feinen Durchschnitte der Gl. sublingualis des Menschen, 240mal vergrössert. Von den sieben gezeichneten Tubulusschnitten sind nur drei (1, 2, 3) so glücklich getroffen, dass sie sich zu Studien eignen. In 2 sieht man sechs sekretgefüllte Zellen, (*s.g*); zwei sekretleere Zellen (*s.l*) sind vom Lumen abgedrängt und bilden einen „Halbmond“. In 3 sind nur sekretgefüllte Zellen, deren Inhalt sich dunkel gefärbt hat. 4. Tangentialschnitt eines solchen Tubulus. 5, 6, 7 Schrägschnitte von Tubuli wie 1 und 2, welche die Halbmonde, nicht aber das Drüsenlumen getroffen haben. *mp* Membrana propria. *b* Bindegewebe mit zahlreichen Leukocyten z. Technik Nr. 106, pag. 183.

deshalb sehr gross. Das zwischen den Tubuli und Läppchen liegende Bindegewebe ist reich an Leukocyten (Fig. 123).

Gl. parotis. Der Ausführungsgang (Duct. Stenonianus) verhält sich wie derjenige der Gl. sublingualis. Er geht sich theilend in die Speicherröhren über, deren cylindrische Zellen deutlich jene oben (pag. 47) erwähnte Streifung besitzen. An diese schliessen sich die Schaltstücke (Fig. 124, *s*) an, welche mit lang ausgezogenen, oft spindelförmigen Zellen ausgekleidet sind. Die Schaltstücke endlich setzen sich fort bis zu den Endstücken, welche aus einer zarten Membrana propria und aus kubischen Eiweissdrüsenzellen bestehen; diese sind im sekretleeren Zustande klein, trüb-körnig, im sekretierten Zustande grösser und etwas heller.

Gl. submaxillaris. Der Ausführungsgang (Duct. Whartonianus), welcher im Bau mit denen der Gl. sublingualis und parotis übereinstimmt, setzt sich in Schleimspeicherröhren mit charakteristischem Epithel (Fig. 125, *A*) fort, welche in mit kubischen Zellen ausgekleidete, kurze Schaltstücke übergehen. Diese führen in Endstücke, die entweder von serösen Drüsenzellen

bei Mensch, Kaninchen, Hund, Katze, Gl. submaxill. bei Hund und Katze), 2. seröse (Speichel-) Drüsen (Parotis bei Mensch, Kaninchen, Hund und Katze, Gl. submaxill. bei Kaninchen, Pankreas) und 3. gemischte (Speichel-) Drüsen (Gl. submaxillaris bei Mensch, Affe, Meerschweinchen, Maus).

Gl. sublingualis. Der Ausführungsgang (Ductus Bartholini) wird von geschichtetem Cylinderepithel und Bindegewebe mit elastischen Fasern gebildet. Er setzt sich fort in die Schleimröhren (s. pag. 47), deren niedrige, cylindrische Zellen nur an wenigen Stellen jene charakteristische Streifung (Fig. 125, *A*) zeigen. Schaltstücke sind nicht mit Sicherheit nachzuweisen, es ist vielmehr wahrscheinlich, dass sich die Schleimröhren direkt in die Endstücke fortsetzen. Diese letzteren bestehen aus einer Membrana propria und aus Schleimzellen. Die Membr. propria wird durch kernhaltige Bindegewebszellen hergestellt (s. pag. 52, Anmerk. 2); die sekretleeren Schleimzellen stehen in Gruppen beisammen (Fig. 123, 1, 2), die „Halbmonde“ (s. pag. 47) sind

(wie die der Parotis) oder von Schleimdrüsenzellen mit Halbmonden ausgekleidet werden.

Fig. 124.

Aus einem feinen Schnitte durch die Parotis des Menschen, 240mal vergrößert. *s* Schaltstück. Das sehr enge Lumen der Tubuli ist nur bei *l* getroffen, die übrigen Tubuli sind schräg durchschnitten. Die Form der Zellen der Schaltstücke ist nicht zu erkennen. Technik Nr. 106, pag. 183.

Fig. 125.

Aus einem feinen Schnitte durch die Gl. submaxillaris des Menschen, 240mal vergrößert. *A* Speichelröhre (Querschnitt). Die Epithelzellen desselben haben sich rechts von dem umgebenden Bindegewebe *b* etwas abgelöst; gerade hier sieht man am besten die Streifung derselben. *k* Kerne durchwandernder Leukocyten. *s* Sekret. *B, m* Tubuli mit Schleimdrüsenzellen. *e* Tubuli mit Eiweissdrüsenzellen. Von ersteren sind vier Lumina, von letzteren nur eines sichtbar. *b* Blutgefäße, von denen das unterste, der Länge nach getroffen, mit farbigen Blutkörperchen gefüllt ist. Technik Nr. 106, pag. 183.

Pankreas. Der Ausführungsgang (Duct. Wirsungianus) wird von einem Cylinderepithel und von Bindegewebe gebildet, welch' letzteres unter dem Epithel fester, nach der Peripherie hin dagegen lockerer ist. Der Hauptausführungsgang und seine grösseren Aeste tragen in ihrer Wand kleine Schleimdrüschchen. Speichelröhren mit den charakteristisch gestreiften Zellen fehlen. Die Aeste des Ausführungsganges setzen sich direkt in die Schaltstücke fort, indem ihre cylindrischen Epithelzellen immer

Fig. 126.

A Drüsenzellen des Pankreas der Katze, 560mal vergrößert. Oben Gruppen von Zellen, wie sie meistens zur Anschauung kommen, unten zwei isolierte Zellen. *B* Aus einem Querschnitte des Pankreas eines neugeborenen Kindes, 240mal vergrößert. Technik Nr. 107, pag. 183.

niedriger werden und endlich in die platten, parallel der Längsachse der Schaltstücke gestellten Zellen übergehen. Die Schaltstücke sind sehr lang und dünn; gegen die Endstücke theilen sie sich und enden dann plötzlich am Epithel der Endstücke. Dieses besteht aus kurzcyllindrischen oder kegelförmigen Zellen, welche vor allen anderen Drüsenzellen dadurch charakterisirt sind, dass ihr dem Lumen

zugekehrter Abschnitt zahlreiche, stark lichtbrechende Körnchen „Zymogenkörnchen“ enthält (Fig. 126, *A*). Der hellere periphere Abschnitt der Zelle enthält den runden Kern. Körniger und heller Abschnitt der Zelle

wechseln in ihren Grössenverhältnissen je nach den Funktionszuständen der Zelle. Im Beginne der Verdauung schwinden die Körnchen, während der helle Zellenabschnitt grösser wird. Dann vergrössert sich der körnige Abschnitt so, dass er fast die ganze Zelle einnimmt. Im Hungerzustande sind beide Abtheilungen gleich gross.

Die Blutgefässe der Speicheldrüsen sind sehr ansehnlich entwickelt. Die artcriellen Stämmchen laufen in der Regel neben dem Hauptausführungsgange her und geben von da sich theilend zahlreiche Aeste ab, welche, zwischen den Drüsenläppchen verlaufend, endlich in die Läppchen selbst eindringen und mit einem dichten Kapillarnetze die Tubuli umspinnen. Die Kapillaren liegen dicht an den Drüsenzellen (s. auch pag. 46). Die grösseren Venen verlaufen mit den Arterien.

Ueber die Lymphgefässe fehlen noch sichere Angaben. Spalträume zwischen den Läppchen und den Tubuli sind als Lymphbahnen beschrieben worden.

Die Speicheldrüsen sind reich an markhaltigen und marklosen Nervenfasern, welche in ihrem Verlaufe mikroskopische Gruppen von Ganglienzellen enthalten. Enden markloser Nervenfasern reichen bis zwischen die Drüsenzellen ohne in diese einzudringen.

Die Leber.

Die Leber ist eine tubulöse zusammengesetzte Drüse. In dieser Form besteht sie jedoch nur bei niederen Thieren (Amphibien, Reptilien) zeitlebens; bei den Säugethieren dagegen treten bald nach der Geburt derartige Veränderungen ein, dass es dann unmöglich ist, zu entscheiden, welcher Drüsenart man die Leber zutheilen soll. Eine besondere Eigenthümlichkeit besitzt die Leber durch die Art und Weise des Verlaufes der zu- und abführenden Blutgefässe; ganz entgegen dem gewöhnlichen Verhalten verlaufen die zuführenden Gefässe in einer ganz anderen Richtung als die abführenden Gefässe. Diese Umstände erschweren ungemein das Verständniss des Aufbaues der Leber und erheischen eine von der bisher geübten Betrachtungsweise der Organe ganz verschiedene Inangriffnahme. Untersuchen wir Leber niederer Thiere oder neugeborener (oder embryonaler) Säugethiere, so gelingt es den oben (pag. 46) erwähnten Grundsatz, dass die Drüsenzellen eine Seite dem Drüsenlumen, die andere Seite den Blutgefässen zukehren, zu bestätigen. Die Drüsenlumina sind hier nur sehr eng ($1-2 \mu$) und führen den Namen Gallenkapillaren (Fig. 127). Man hat ihnen eine selbstständige, strukturlose, nicht von Epithelzellen gebildete Wandung zugeschrieben.

Versuchen wir den gleichen Nachweis an Leberschnitten älterer Säugethiere, so wird derselbe nicht gelingen; wir sehen vielmehr, dass jede Drüsen-

zelle nicht an einer Seite, sondern an vielen Seiten mit Blutgefäßen in Berührung steht (Fig. 128); ebenso grenzt jede Drüsenzelle¹⁾ mit mehreren Seiten an Gallenkapillaren. Trotzdem liegen Blutkapillaren und Gallenkapillaren an keiner Stelle dicht neben einander, sondern immer ist zwischen

Fig. 127.

Aus Schnitten einer Froschleber, 240mal vergrößert. Die Drüsenzellen der Leber umgeben allseitig das sehr kleine Drüsenlumen (= die Gallenkapillare) und sind ihrerseits von Blutkapillaren umgeben. Die Drüsenzellen zeigen verschiedene Sekretionsstadien. v Vacuolen.
Technik Nr. 112, pag. 184.

Fig. 128.

Aus einem Schnitte durch eine Kaninchenleber, deren Pfortaderkapillaren roth, deren Gallenkapillaren blau injiziert worden waren. 240 mal vergrößert. Die Leberzellen stehen auf dem Schnitte an beiden Seiten mit Blutkapillaren in Berührung. (An einzelnen Stellen hat sich die rothe Leimmasse retrahirt, so dass Lücken *l* zwischen Leberzellen und Blutkapillaren entstanden sind.) Die Gallenkapillaren berühren nirgends die Blutkapillaren, sondern sind immer durch eine halbe Zellenbreite von ihnen getrennt. Die dunklen Flecke der Blutkapillaren sind optische Querschnitte von Blutkapillaren, welche vertikal durch die Dicke des Schnittes verlaufen.

beiden ein Theil einer Drüsenzelle eingeschaltet. Man drückt das gewöhnlich durch den Satz aus: die Blutkapillaren verlaufen an den Kanten, die Gallenkapillaren auf den Flächen der Leberzellen. So verhält es sich wenigstens beim Kaninchen; beim Menschen verlaufen Gallenkapillaren auch an den Kanten. Die Leber unterscheidet sich somit von anderen Drüsen dadurch, dass zwischen Drüsenlumen und Blutkapillaren nicht eine ganze Zelle, sondern nur ein Theil einer Zelle eingeschaltet ist, dass also die Blutkapillaren zu den Drüsenzellen in viel innigeren Beziehungen stehen, als in anderen Drüsen.

1. Drüsenzellen und Blutgefäße.

Die Drüsenzellen der Leber, die Leberzellen, sind unregelmässige vieleckige Gebilde, welche aus einem körnigen Protoplasma und einem oder

¹⁾ Die Drüsenzellen enthalten zuweilen Vacuolen, welche durch einen feinen Gang mit den Gallenkapillaren in offener Verbindung stehen. (Fig. 128 zeigt dieses Verhältniss nicht.)

mehreren Kernen bestehen; eine Membran fehlt. Das Protoplasma enthält Pigmentkörnchen und verschieden grosse Fetttropfen, welch' letztere bei

1 Fig. 129. B

Leberzellen des Menschen, 560mal vergr.
A Isolierte Leberzellen, kleinere u. grössere Fetttropfen *f* enthaltend. Bei *b* Eindruck von einem Blutgefäss berührend.

Technik Nr. 108, pag. 184.

B Aus einem Schnitte. 1. Sekretleere Zellen. 2. Sekretgefüllte Zellen.

Technik Nr. 110, pag. 184.

saugenden Thieren und gut genährten Personen regelmässig gefunden werden. Die Grösse der Zellen beträgt 18—26 μ . Auch bei den Leberzellen bestehen sichtbare Funktions-Unterschiede (Fig. 129, B). Sie sind entweder klein, trüb, undeutlich konturirt — solche Zustände finden sich vorzugsweise im nüchternen Zustande — oder grösser, im Centrum hell, in der Peripherie mit einem grobkörnigen Ringe versehen, solche Bilder sind hauptsächlich während der Verdauung zu konstatiren. Beim Menschen trifft man oft beide Zustände in einer Leber.

Die Anordnung der Drüsenzellen lässt sich auf Durchschnitten der Leber erkennen; hier sieht man schon bei Anwendung schwacher Vergrösserung polygonale Felder, welche durch Bindegewebe bald mehr, bald weniger scharf

Fig. 130.

Stück eines Flächenschnittes der menschl. Leber, 40mal vergrössert. Man sieht zwei ganze und (rechts oben) $\frac{2}{3}$ eines Leberläppchens. Die Läppchen sind wenig scharf von einander abgegrenzt und nur kenntlich durch die in ihrem Centrum befindliche V. centralis und die dazu radiär gestellten Leberzellen. Technik Nr. 110, pag. 184.

von einander abgegrenzt sind. Das sind die Leberläppchen (Leberinseln, fälschlich auch Acini genannt), welche ganz aus Leberzellen und Blutgefässen bestehen. Die Gestalt eines Läppchens ist eine annähernd ovale (im Querschnitt polygonale), ihre Länge beträgt 2, ihre Breite ca. 1 mm.

Im Umkreise jedes Läppchens liegen die Verzweigungen der Pfortader, Venae interlobulares, von denen aus zahlreiche Kapillaren

in die Läppchen eindringen und von der Vena centralis (s. unten) aufgenommen werden (Fig. 131). Die Kapillaren besitzen die ansehnliche Weite von 10 bis 14 μ und anastomosiren während ihres Verlaufes durch das Leberläppchen vielfach mit einander. Der Raum zwischen den Kapillaren wird von den Leberzellen eingenommen, die somit in radiär gestellten Strängen (oder besser Blättern), den sog. Leberzellenbalken angeordnet sind.

In der Achse jedes Läppchens verläuft eine kleine Vene, Vena centralis (intralobularis), deren Quer- und Längsschnitt auch an nicht

Fig. 131.

Stück eines Flächenschnittes einer Kaninchenleber. Injektion von der Pfortader aus, 40mal vergr. Man sieht drei Leberläppchen. Die Injektionsmasse hat nur die Pfortaderäste (Vv. interlobul.) gefüllt, im oberen Läppchen ist sie bis zur Ven. centr. vorgedrungen. Technik Nr. 113.

Fig. 132.

Stück eines Flächenschnittes einer Katzenleber. Injektion von der V. cava inf. aus, 40mal vergr. Man sieht vier Leberläppchen. Die Injektionsmasse hat die Ven. centr. und die in sie einmündenden Kapillaren gefüllt, ist aber nicht bis zu den Pfortaderästen (Vv. interlobul.) vorgedrungen. Technik Nr. 113, pag. 185.

injizierten Lebern sichtbar ist (Fig. 130). Die Venae centrales stellen die Wurzeln der Lebervenen dar und münden in die Venae sublobulares,

Fig. 133.

Stück eines senkrechten Schnittes durch eine Katzenleber. Injektion von der V. cava infer. aus, 15mal vergr. Eine Vena sublobularis, der Länge nach getroffen, nimmt Venae centrales auf. Die Injektionsmasse ist aus den weiten Gefäßen grösstentheils ausgefallen. Technik Nr. 113, pag. 185.

welche an der einen etwas abgeplatteten Seite des Leberläppchens, der sog. Basis, verlaufen (Fig. 133).

Die Aeste der Leberarterie verlaufen mit denen der Pfortader und verzweigen sich nur in dem interlobularen Gewebe, woselbst sie die grösseren Gallengänge, Pfortader- und Lebervenenäste umspinnen. Die aus der Arterie resp. deren Kapillaren hervorgehenden Venen münden in Pfortaderzweige (*Venae interlobulares*) oder auch in die Anfänge der Pfortaderkapillaren. In der Leberkapsel (s. unten) bildet die Leberarterie ein weitmaschiges Kapillarnetz. Der Verlauf der Blutgefässe ist somit folgender: an der Leberpforte tritt die Pfortader ein, theilt sich wiederholt in immer feiner werdende Aeste, welche zwischen den Leberläppchen verlaufen (*Venae interlobulares*). Aus ihnen gehen Kapillaren hervor, welche gegen die Achse des Leberläppchens ziehen und in die hier befindliche *Vena centralis* (*V. intralobul.*) münden. Mehrere solcher Venen treten zusammen zur Bildung einer *Vena sublobularis*, welche wie die aus ihrer Vereinigung hervorgehenden grösseren Lebervenen, interlobular verläuft.

Die Verästlungen der Leberarterie, sowie die aus ihnen hervorgehenden Kapillaren liegen gleichfalls nicht in, sondern zwischen den Leberläppchen.

2. Drüsenlumina (Gallenkapillaren) und Ausführungsgänge (Gallengänge).

Es ist oben auseinander gesetzt worden, dass, abweichend von dem gewöhnlichen Verhalten, nicht viele Leberzellen das Lumen (i. e. die Gallenkapillaren) begrenzen, sondern nur deren wenige, meist zwei (Fig. 128), ferner, dass nicht an einer, sondern an vielen Seiten der Leberzellen Gallenkapillaren liegen. Dieselben stehen mit einander in vielfacher winkelliger Verbindung und bilden auf diese Weise ein polygonales, die Leberzellen umspinnendes Maschenwerk (Fig. 128). Die Gallenkapillaren liegen selbstverständlich in den Leberläppchen und heissen deshalb auch „intralobuläre Gallengänge“. Sie gehen an der Peripherie der Läppchen in die feinen interlobularen Gallengänge über, welche eine eigene Wandung besitzen; diese baut sich auf aus einer strukturlosen *Membrana propria* und aus niedrigen Epithelzellen, die sich direkt an die Leberzellen anfügen. Durch fortwährenden Zusammenfluss der feinen interlobularen Gallengänge entstehen immer grössere Gallengänge, deren Wandung aus Bindegewebe, elastischen Fasern und einer einfachen Lage von Cylinderzellen besteht, welche letztere mit einer Cuticula versehen sind. Auch Becherzellen kommen hier vor. In den grösseren Gängen und den *Ductus hepaticus*, *cysticus* und *choledochus* ist das Bindegewebe in *Submucosa* und *Tunica propria* geschieden; letztere enthält longitudinal und quer verlaufende glatte Muskelfasern, sowie die Gallengangdrüsen, meist kurze, birnförmige mit Schleinzellen ausgekleidete Schläuche. Das Epithel ist ein einfaches Cylinderepithel. Die Wandung der Gallenblase zeigt den gleichen Bau wie diejenige der grossen Gallengänge, doch erhebt sich

die unter dem Cylinderepithel gelegene Bindegewebsschicht, die *Tunica propria*, zu anastomosirenden Falten, welche Züge glatter Muskelfasern einschliessen.

Als *Vasa aberrantia* bezeichnet man ausserhalb des Leberparenchyms verlaufende, blind endende Gallengänge. Sie finden sich vorzugsweise am linken Leberrande (*Lig. triangul. sinistr.*), an der Leberpforte und in der Umgebung der *Vena cava*. Sie stellen die letzten Reste früher (in embryonaler Zeit) daselbst befindlicher Lebersubstanz dar.

Fig. 134.

Stück eines geschüttelten Schnittes der menschlichen Leber, 240mal vergrössert. *c* Blutkapillaren, bei *x* noch Blutkörperchen enthaltend, *b* interlobuläres Bindegewebe. Die meisten Leberzellen sind aus den Maschen des Kapillarnetzes herausgefallen, nur rechts sitzen noch fünf Zellen.
Technik Nr. 111, pag. 184.

Die Leber ist mit einer aus Bindegewebe und elastischen Fasern bestehenden Hülle, der Leberkapsel, versehen, welche an der Leberpforte besonders reichlich entwickelt ist (sie heisst da *Capsula Glissonii*) und als besondere Scheide der verschiedenen Gefässe¹⁾ ins Innere der Leber eindringt; hier findet sich das Bindegewebe zwischen den Leberläppchen (interlobuläres Bindegewebe) in meist geringer Menge, so dass die Abgrenzung der Läppchen eine sehr unvollkommene ist (s. Technik Nr. 110 u. 111). Vom interlobulären Bindegewebe dringen

auch feine Fasern ins Innere der Läppchen ein; sie bilden das intralobuläre Bindegewebe; ein grosser Theil desselben ist in Form eines feinen vorzugsweise radiär gestellten Gitterwerkes (Gitterfasern) angeordnet. Das intralobuläre Bindegewebe enthält sternförmige Zellen, deren Natur noch nicht sicher erkannt ist.

Die Lymphgefäße begleiten die Pfortaderäste, indem sie dieselben netzartig umspinnen; mit den Pfortaderkapillaren treten sie ins Innere der Leberläppchen, welche sie angeschmiegt an die *Venae centrales* wieder verlassen. Diese tiefen Lymphgefäße stehen mit einem engmaschigen Lymphgefässnetze in vielfacher Verbindung, welches sich in der Leberkapsel befindet.

Die Nerven bestehen vorzugsweise aus marklosen Nervenfasern, denen nur wenige markhaltige Nervenfasern beigemischt sind; sie treten ins Innere der Leber mit der Leberarterie und folgen deren Verästelungen; ihre Endigung ist unbekannt. Im Verlaufe der Nerven finden sich Ganglienzellen.

Das Sekret der Leber, die Galle, enthält häufig Fetttropfen, sowie körnige Haufen von Gallenfarbstoff. Cylinderzellen aus den Gallengängen sind als zufällige Beimengung zu betrachten.

1) Die Wandungen der Lebervenen werden durch dieses Bindegewebe fest an die Lebersubstanz geheftet; deswegen fallen die durchschnittenen Lebervenen nicht zusammen, sondern bleiben klaffend.

Das Bauchfell.

Das Bauchfell besteht hauptsächlich aus Bindegewebsbündeln und aus zahlreichen elastischen Fasernetzen; die freie Oberfläche des Bauchfelles wird von einer einfachen Lage platter, polygonaler Epithelzellen überzogen, die Vereinigung mit den unterliegenden Theilen (Bauchwand, Eingeweide etc.) erfolgt durch lockeres („subseröses“) Bindegewebe.

Die Bindegewebsbündel sind in dünnerer (im visceralen Bauchfelle) oder dickerer (im parietalen Bauchfelle im Gekröse) Schicht vorzugs-

Fig. 135.

Stück des Omentum majus eines Kaninchens, 240mal vergrößert. Dicke und dünne Bindegewebsbündel bilden Maschen. Die wellige Streifung der Bündel ist an dem Damarfirnispräparat nur undeutlich zu sehen. Bei X schimmern die Epithelzellen der anderen Seite durch.
Technik Nr. 115, pag. 185.

weise der Fläche nach angeordnet und durchkreuzen sich in verschiedenen Richtungen; an einzelnen Stellen (am Omentum majus, in der Mitte des Omentum minus) bilden die Bündel ein zierliches Netz mit polygonalen oder rechteckigen Maschen. Die Fäden des Netzes werden ebenso von platten Epithelzellen überkleidet (Fig. 135).

Die Zahl der den Bündeln beigemengten Bindegewebszellen ist im Ganzen keine grosse; nur bei jungen Thieren findet man grössere Gruppen von Plasmazellen ähnlichen Zellen, die wahrscheinlich alle in näherer Beziehung zur Gefässbildung stehen (s. pag. 79).

Die elastischen Fasern sind in den tieferen Lagen des Bauchfelles, besonders am parietalen Blatte reichlich und stark entwickelt.

Das subseröse Gewebe besteht aus lockerem Bindegewebe, vielen elastischen Fasern und Fett in sehr verschiedenen Mengen; es ist da wo das Bauchfell leicht verschieblich ist, reichlich vorhanden, auf der Leber und dem Darne aber derartig reduziert, dass es nicht mehr als eine besondere Schicht nachweisbar ist.

Blutgefässe und Nerven sind spärlich vorhanden, letztere enden zum Theil in Vater'schen Körperchen (pag. 133). Lymphgefässe finden sich in den oberflächlichen und tiefen Schichten des Bauchfelles (vergl. ferner pag. 83).

TECHNIK.

Nr. 85. Isolierte Plattenzellen des Mundhöhlenepithels. Man kratze mit einem Skalpell von der Oberfläche der eigenen Zunge etwas

Schleim ab und mische denselben auf dem Objektträger mit einem Tropfen Kochsalzlösung. Deckglas. Ausser den isolirten blassen Plattenepithelzellen (Fig. 6, pag. 41) findet man noch Leukocyten („Speichelkörperchen“) sowie (bei starkem Abkratzen) abgerissene Spitzen der Papillae filiformes, die nicht selten von einer feinkörnigen, dunklen Masse (Mikrokokken) umgeben sind; Pilzfäden, *Leptothrix buccalis*, haften in ganzen Büscheln auf den Mikrokokkenhaufen. Man kann unter dem Deckglase mit Pikrokarmine färben (pag. 26) und dann verdünntes, angesäuertes Glycerin zufließen lassen, wenn nicht zu viel Luftblasen die Konservierung des Präparates unmöglich machen.

Nr. 86. Die Schleimdrüsen der Lippen sind als etwa hirsekorn-grosse Knötchen durchzufühlen und makroskopischer Präparation zugänglich. Für mikroskopische Präparate schneide man aus der Schleimhaut der menschlichen Unterlippe (nicht des Lippenrandes) Stückchen von ca. 1 cm Seite, fixire sie in 50 ccm Kleinenberg's Pikrinschwefelsäure (pag. 13) und härte sie nach 24 Stunden in 50 ccm allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14). Nach drei Tagen sind die Stückchen schnittfähig. Man mache viele, nicht zu dünne Schnitte und färbe dieselben mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17). Mit unbewaffnetem Auge suche man von den in Wasser gebrachten Schnitten diejenigen aus, welche den Ausführungsgang getroffen haben und konservire sie nach den üblichen Vorbereitungen (pag. 25) in Damarfirniss. Schwache Vergrößerung. (Fig. 96.)

Nr. 87. Zahnschliffe. Die womöglich frisch ausgezogenen Zähne werden, wenn sie zu Querschliffen verarbeitet werden sollen, in (ca. 2 mm dicke) Querscheiben zersägt, oder wenn Längsschliffe hergestellt werden sollen, im Ganzen auf Kork und Siegellack geklebt und behandelt wie Nr. 51 (pag. 107). Längsschliffe sind mehr zu empfehlen, da sie an einem Präparate alle Theile zeigen. (Fig. 97, 98, 99.)

Will man Zähne Erwachsener entkalken, so verfähre man wie in Nr. 53 (pag. 108). Der nur 3—5% organische Substanz enthaltende, sonst aus Erdsalzen bestehende Schmelz löst sich bei dieser Methode vollkommen auf, so dass nur Zahnbein und Zement übrig bleiben.

Nr. 88. Odontoblasten. Man lege die aus den Kiefern neugeborener Kinder herausgebrochenen Zähne in 60 ccm Müller'sche Flüssigkeit. Nach 6 Tagen kann man mit einer Pincette leicht die Pulpa in toto herausziehen; nun schneide man mit der Scheere ein linsengrosses Stückchen der Pulpaoberfläche ab und zerzupfe das ziemlich zähe Gewebe ein wenig in einem Tropfen Müller'scher Flüssigkeit. Deckglas, leichter Druck, starke Vergrößerung, man sieht an den Rändern der Stückchen die langen Fortsätze der Odontoblasten wie Haare herausstehen; dort liegen auch vereinzelt vollkommen isolirte Odontoblasten. (Fig. 101.) Will man konserviren, so lasse man erst dest. Wasser unter dem Deckglase durchfliessen (2 Min.), dann Pikrokarmine (pag. 26); nach vollendeter Färbung setze man verdünntes angesäuertes Glycerin zu.

Nr. 89. Schmelzprismen erhält man, wenn man die Oberfläche des Seitentheiles der Zähne von Nr. 88 in einem Tropfen Müller'scher Flüssigkeit zerzupft und mit starker Vergrößerung betrachtet. Man wird Gruppen von 3 und mehr Schmelzprismen erhalten, die sich durch ihre dunklen Umrisse und eine meist wenig deutliche Querstreifung auszeichnen (Fig. 100). Konserviren in Glycerin (pag. 22).

Die prismatische Gestalt der Schmelzprismen erkennt man, wenn man der Oberfläche solcher Zähne parallel gerichtete feine Schnitte anfertigt¹⁾. Nur einzelne Theile des Schnittes zeigen regelmässige Sechsecke, d. h. die Querschnitte der Schmelzprismen (Fig. 100).

Nr. 90. Zu Präparaten über Zahnentwicklung wähle man für die ersten Stadien Schwein- oder Schafembryonen, die am leichtesten aus Schlachthäusern zu beziehen sind (vergl. pag. 110). Für das erste Stadium (Fig. 103) sollen die Schweinembryonen ein Grösse von ca. 6 cm haben²⁾, für das zweite Stadium (Fig. 104) ist eine Grösse von 10—11 cm zu empfehlen. Für spätere Stadien (Fig. 105) sind die Unterkiefer neugeborener Hunde oder Katzen sehr geeignet. Man fixire die Köpfe (resp. die Unterkiefer) in 100 ccm Kleinenberg'scher Pikrinschwefelsäure³⁾ (12—24 Stunden pag. 13) und härte sie in 80—120 ccm allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14). Nachdem die Köpfe 6—8 Tage im 90%igen Alkohol gelegen haben, werden sie in 100 ccm destill. Wasser + 1 oder 2 ccm Salpetersäure entkalkt (pag. 15). Nach vollendeter Entkalkung (nach 3—8 Tagen) abermalige Härtung mit Alkohol. Nach weiteren 5—6 Tagen schneide man die Unterkiefer ab, theile sie vorn in der Mitte (grössere Unterkiefer schneide man der Quere nach in 1—2 cm lange Stücke) und färbe die Stücke mit Boraxkarmin durch⁴⁾ (pag. 19). Nach vollendeter Durchfärbung und Entfärbung müssen die Stücke mehrere Tage in (womöglich absolutem) Alkohol verweilen; dann werden sie endlich, in Leber eingeklemmt, in Querschnitte zerlegt. Es ist die Anfertigung vieler (20—40) dicker Schnitte nothwendig, da nur diejenigen Schnitte, welche die Mitte des Zahnes resp. der Zahnanlage getroffen haben, brauchbar sind. Konserviren in Damarfirniss (pag. 23). Nicht selten hebt sich an den Schnitten das Schmelzorgan von der Papille, so dass zwischen beiden ein freier Raum besteht. Das Zahnbein ist oft in verschiedenen Tönen roth gefärbt; die Ursache ist das verschiedene Alter (verkalkte und unverkalkte Schichten) des Zahnbeins.

Nr. 91. *Papillae filiformes, fungiformes, circumvallatae*, Zungenbälge. Man schneide Stückchen (von ca. 2 cm Seite) der menschlichen Zungenschleimhaut von der Oberfläche der Zunge heraus (etwas Muskulatur soll der Unterfläche des ausgeschnittenen Stückes noch anhaften) und zwar für *Papillae fungiformes* von der Zungenspitze, für *P. filif.* von der Mitte des Zungenrückens, für *P. circumvall.* von der Zungenwurzel, endlich Zungenbälge, deren punktförmige Höhleneingänge mit unbewaffnetem Auge zu sehen sind, von der Zungenwurzel und lege sie in 100 bis 200 ccm Müller'sche Flüssigkeit ein; mehrmaliger Wechsel der Flüssigkeit; nach 14 Tagen werden die Stücke gewaschen und in 50—100 ccm allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14) gehärtet. Für *Pap. filiform.* mache man dicke sagittale Schnitte der Zunge, die man nicht färbt; sonst Färbung der Schnitte mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17), Einschluss in Damarfirniss (pag. 23) Fig. 106 bis 108. Zu Fig. 109 und 110 waren die Zungenstücke in 50 ccm absolutem Alkohol fixirt und gehärtet worden. Kaninchenzungen können in

1) Der Schmelz junger Zähne ist ohne vorhergegangene Entkalkung schneidbar.

2) Von der Schnauzenspitze bis zur Schwanzwurzel gemessen.

3) Auch in Müller'scher Flüssigkeit fixirte Objekte (pag. 13) sind brauchbar.

4) Die Durchfärbung ist trotz der Länge der Procedur der Einzelfärbung (mit Haematoxylin) vorzuziehen, da man sonst zu viele Schnitte färben muss, die bei genauer Betrachtung unbrauchbar sind.

toto in 200 cem Müller'sche Flüssigkeit eingelegt werden. Die Weiterbehandlung ist dieselbe. Dicke Querschnitte durch die vordere Hälfte der ganzen Zunge geben guten Aufschluss über die Anordnung der Muskulatur, feine Schnitte der Zungenwurzel zeigen schöne Schleim- und auch Eiweissdrüsen.

Nr. 92. Tonsille. Die Tonsille des erwachsenen Menschen giebt nur wenig instruktive Bilder. Die Vorbereitung ist dieselbe wie für Nr. 91.

Dagegen sind die Tonsillen des Kaninchens, der Katze zu empfehlen. Um dieselben aufzufinden, verfahre man folgendermassen. Man präparire die Vorderfläche des Halses frei, schneide Trachea und Oesophagus über dem Sternum mit einer starken Scheere durch, fasse das durchschnittene Ende der Trachea mit der Pincette, präparire mit der Scheere beide Röhren nach aufwärts heraus (dabei werden die Hörner des Zungenbeines durchgeschnitten) und dringe, immer sich dicht auf der Wirbelsäulenvorderfläche haltend, bis zum Schlundkopfe hinauf. Hier wird die Rachenwand durchgeschnitten; dann durchschneide man die Muskulatur dicht an den medialen Rändern der Unterkiefer bis vor zum Winkel, ebenso das Zungenbändchen. (Beim Kaninchen empfiehlt es sich, beide Mundwinkel einzuschneiden und das Zungenbändchen, sowie den M. geniogloss. mit in die Mundspalte eingeführter Scheere zu lösen.) Nun ziehe man die Trachea etc. nach abwärts, dränge die Zunge zwischen den Unterkieferästen durch und schneide die letzten Verbindungen (Gaumensegel) dicht am Knochen ab. Die Zunge wird nun so hingelegt, dass ihre freie Oberfläche nach oben sieht; dann schneide man mit einer feinen Scheere die hintere Rachenwand in der Medianlinie bis hinab zum Kehlkopfe durch und klappe die Wände auseinander; die Tonsillen erscheinen alsdann als ein paar ovale ca. 5 mm lange Prominenzen der seitlichen Rachenwand. Man kann sie in 60 cem Kleinenberg'scher Pikrinschwefelsäure (pag. 13) fixiren und in ca. 50 cem allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14) härten. Färben mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17) oder mit Eosin (pag. 18) und mit Haematoxylin. Einschluss in Damarfirniss (pag. 23).

Nr. 93. Oesophagus. Vom Menschen sind Stückchen von ca. 2 cm Seite, von Kaninchen, Katze etc. unaufgeschnittene, ca. 2 cm lange Stückchen des ganzen Rohres in 60 cem Müller'scher Flüssigkeit zu fixiren und nach 14 Tagen in ca. 50 cem allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14) zu härten. Färbung mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17). Einschluss in Damarfirniss. (Fig. 111.)

Nr. 94. Für topographische Präparate des Magens, Magenhäute, lege man Stücke von 2—5 cm Seite auf 6 Stunden in 100 cem 3⁰/oige Salpetersäure¹⁾ (pag. 4), die nach einer halben Stunde durch neue zu ersetzen ist, und härte sie dann in ca. 60 cem allmählich verstärktem Alkohol; dicke ungefärbte Schnitte konservire man in Damarfirniss (pag. 23) (Fig. 112).

Nr. 95. Magendrüsen frisch. Man schneide aus dem Fundus ventriculi eines frisch getödteten Kaninchens ein Stückchen von ca. 2 cm Seite, entferne die nur lose anhaftende Muskelhaut von der Schleimhaut, fasse letztere mit einer Pincette am linken Rande und schneide mit einer feinen Scheere einen möglichst schmalen Streifen (0,5—1 mm dick) ab, der in einem Tropfen 0,5⁰/oiger Kochsalzlösung fein zerzupft wird. Es gelingt

¹⁾ An der Schleimhaut anklebender Mageninhalt ist durch langsames Schwenken in der Salpetersäurelösung zu entfernen.

ohne grosse Mühe, Körper und Grund der Fundusdrüsen zu isoliren. Die Körper der Belegzellen (Fig. 136 B.) treten deutlich hervor, die Hauptzellen sind nicht sichtbar; die Kerne kann man mit Pikrokarmin (pag. 26) färben, das Präparat in verdünntem Glycerin (pag. 6) konserviren. Die Isolation von Pylorusdrüsen ist nur durch sorgfältiges Zerzupfen möglich.

Fig. 136.

Untere Hälfte
einer isolirten
Fundusdrüse des
Kaninchens, 240
mal vergrössert.
B Belegzellen.

Nr. 96. Isolirte Magenepithelien. Man lege ein 1 qcm grosses Stückchen der Magenschleimhaut auf ca. 5 Stunden in ca. 30 ccm Ranvier's Alkohol (s. weiter pag. 11). An den meisten Zellen nimmt der schleimige Theil einen grossen Abschnitt ein; man sieht demnach Bilder ähnlich der Fig. 12 c. Man kann unter dem Deckglase mit Pikrokarmin färben und in verdünntem, angesäuertem Glycerin konserviren (pag. 26).

Nr. 97. Drüsen. Magen von Hund oder Katze, die womöglich 1 bis 2 Tage gehungert haben, ist am meisten zu empfehlen. Kaninchenmagen ist wegen der sehr geringen Grösse der Hauptzellen weniger geeignet. Man präparire die der Muskelhaut nur lose aufsitzende Schleimhaut ab und lege Stückchen von ca. 1 cm Seite in ca. 10 ccm Alkohol absol.; nach einer halben Stunde wird der Alkohol durch neuen (ca. 20 ccm) ersetzt (pag. 12). Die Form der Drüsen lässt sich schon an mittel-feinen Schnitten erkennen, erschwerend ist nur der Umstand, dass die Drüsenschläuche sehr nahe bei einander stehen. Der Magen des Menschen, der indessen nur wenige Stunden nach dem Tode noch brauchbar ist, zeigt diesen Uebelstand weniger. Zur Feststellung des feineren Baues der Drüsen, sowie des Oberflächenepithels, sind möglichst feine, in Klemmleber (pag. 16) eingebettete Schnitte nöthig.

a) Für Fundusdrüsen, Haupt- und Belegzellen färbe man senkrechte oder noch besser Flächenschnitte der Schleimhaut mit Böhmer'schem Haematoxylin (s. pag. 17) 2—4 Minuten; die gut ausgewaschenen Schnitte¹⁾ werden in 5 ccm $\frac{1}{30}$ ige Lösung von Kongoroth (s. pag. 8) 3—6 Minuten gebracht, in dest. Wasser 2 Minuten ausgewaschen und dann in Damarfirniss eingeschlossen (s. pag. 23). Zu dicke Schnitte zeigen alles roth gefärbt, die grossen, rothen Belegzellen verdecken die kleinen Hauptzellen. Man untersuche die feinsten Stellen des Schnittes, besonders den Drüsengrund, wo die Belegzellen nicht so übermässig reichlich sind. Man erkennt die Belegzellen dann schon bei schwachen Vergrösserungen als rothe Flecke diskontinuirlich auf rosarothem Grunde. Bei starken Vergrösserungen sieht man auch die leicht blau gefärbten kleineren Hauptzellen. Das sehr enge Lumen der Fundusdrüsen ist auf Querschnitten der Schläuche (Flächenschnitten der Schleimhaut) noch am besten zu sehen. Die Fortsätze der Belegzellen sind nur an glücklichen Schnitten wahrzunehmen (Fig. 114). Fig. 113 ist aus mehreren feinen Längsschnitten combinirt.

b) Für Pylorusdrüsen sind senkrechte und Flächenschnitte der Schleimhaut mit Böhmer'schem Haematoxylin (s. pag. 17) zu färben und in

1) Die Schnitte müssen eine halbe Stunde in 30 ccm destill. Wasser, das so oft es noch bläulich wird, gewechselt werden muss (1—2 mal), verbleiben.

Damarfirniß zu konserviren (pag. 23). Das Lumen der Pylorusdrüsen ist weiter (Fig. 115).

Nr. 98. Brunner'sche Drüsen. Man schneide Magen- und Duodenum einer Katze etwa 1 Stunde nach dem Tode¹⁾ heraus, öffne beide der Länge nach, entferne den Inhalt durch sanftes Bewegen in Kochsalzlösung (pag. 4) und lege den Pylorustheil und die obere Hälfte des Duodenum, also im Ganzen ein 5—6 cm langes Stück auf 6 Stunden in 100 ccm 3%ige Salpetersäure ein. Weiterbehandlung wie Nr. 94. Man mache Längsschnitte, welche gleichzeitig Pylorus und Duodenum treffen. Färbung mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17). Konserviren in Glycerin oder in Damarfirniß (Fig. 118).

Nr. 99. Dünndarm-Epithel und Zotten. Man nehme vom Dünndarme eines soeben getödteten Kaninchens ein ca. 1 cm langes Stückchen, schneide dasselbe der Länge nach auf und entferne durch vorsichtiges Uebergiessen mit 0,75%iger Kochsalzlösung etwa aufliegenden Darminhalt. Dann fasse man das Stückchen am linken Rande mit der Pincette und trenne mit einer feinen Scheere einen schmalen Streifen ab, den man in einem Tropfen Kochsalzlösung auf einen Objektträger bringt und auf schwarzer Unterlage ausbreitet. Mit unbewaffnetem Auge schon sieht man die Zotten über den Rand des Streifens herausragen. Das Präparat wird zunächst ohne Deckglas bei schwacher Vergrößerung betrachtet. Man erblickt die Zotten theils gestreckt, theils kontrahirt; letzterer Zustand ist an quer über die Zotten verlaufenden Falten zu erkennen (Fig. 117, A). Einzelheiten sind zunächst nicht zu bemerken. Nun lege man ein Deckglas auf, die dadurch breit gequetschten Zotten werden heller, man erkennt deutlich das Cylinder-epithel und dicht unter diesem die Blutgefäßsschlinge. Enthält das Epithel Becherzellen, so erscheinen diese als hellglänzende, rundliche Flecken.

Zur Untersuchung des Epithels kann man

a) das Stückchen etwas zerpupfen, dabei lösen sich einzelne und Gruppen von Cylinderzellen, welche mit starken Vergrößerungen zu betrachten sind. Nicht selten findet man einzelne Cylinderzellen kugelig aufgebläht; der Basalsaum ist manchmal in sehr deutliche Stäbchen zerfallen. Becherzellen sind, wenn vorhanden, durch ihren gleichartigen Glanz kenntlich, ihre Oeffnung ist bei guter Einstellung scharf konturirt wahrzunehmen. Zuweilen lösen sich die Epithelzellen schwer von ihrer Unterlage; in solchen Fällen stelle man nach einer Stunde eine zweite Untersuchung an, bis dahin ist das Epithel hinreichend macerirt, um abgestreift werden zu können.

b) Zur Herstellung von Dauerpräparaten lege man ein ca. 1 cm grosses der Länge nach geöffnetes Darmstückchen in 30 ccm Müller'sche Flüssigkeit, nach 3—5 Tagen nehme man das Stückchen heraus, streiche mit der Spitze eines Skalpells über die Oberfläche und zertheile ein Wenig des Abgetrichenen in einem Tropfen verdünntem Glycerin. Deckglas. Starke Vergrößerung (Fig. 116 A).

Nr. 100. Zu Schnitten des Dünndarmes lege man 2—4 cm lange Stücke des Darmes eines Kaninchens (besser eines jungen Hundes oder einer jungen Katze) in 100—200 ccm 3%ige Salpetersäure. Nach

¹⁾ Geschieht das Einlegen sofort nach dem Tode, so kontrahirt sich die glatte Muskulatur des Darmes derart, dass eine förmliche Verkrümmung der Darmwände eintritt.

6 Stunden werden die Stücke in ca. 100 ccm allmählich verstärktem Alkohol gehärtet (pag. 14). Man kann Querschnitte durch das ganze Darmrohr machen; in den meisten Fällen erhält man dabei nur Stücke von Zotten; will man ganze Zotten erhalten, so schneide man das gehärtete Darmstück mit einem Rasirmesser der Länge nach auf, stecke es mit Nadeln auf eine Korkplatte, die Schleimhautfläche nach oben gerichtet. Man sieht alsdann schon mit unbewaffnetem Auge die Zotten sich ausspreizen. Nun mache man von dem aufgesteckten Stücke dicke Querschnitte, welche man etwa 1 Minute lang mit Böhmer'schem Haematoxylin¹⁾ färbt (pag. 17) und in Damarfirniß konservirt (pag. 23). Sehr häufig findet man Becherzellen im Epithel (Fig. 116, B). Menschlicher Darm muss vor dem Einlegen in die Salpetersäure aufgeschnitten und mit derselben Flüssigkeit abgespült werden. Es empfiehlt sich, Stücke von ca. 5 cm Seite sofort auf Kork aufzuspannen und so zu fixiren und zu härten. Wenn der Darm nicht ganz frisch ist, löst sich das gesammte Oberflächenepithel ab, so dass die nackten bindegewebigen Zotten vorliegen.

Flächenschnitte des Darmes liefern sehr zierliche Bilder. Nicht selten fallen die Drüsenquerschnitte heraus, so dass alsdann nur die (bindegewebige) Tunica propria zur Anschauung gelangt.

Nr. 101. Peyer'sche Haufen (Plaques) sieht man schon durch die unverletzte frische Darmwand des Kaninchens durchschimmern, bei Hunden und bei Katzen sind sie jedoch oft (wegen der dicken Muscularis) gar nicht wahrzunehmen. Letztere Thiere haben konstant Plaques an der Einmündungsstelle des Dünndarmes in den Dickdarm. Bei Kaninchen schneide man Peyer'sche Haufen enthaltende Darmstücke aus und verfare in gleicher Weise wie in Nr. 100. Bei Katzen schneide man das unterste Stück des Ileum (ca. 2 cm lang) mit einem ebenso langen Stücke des Coecum ab, schneide beide Stücke der Länge nach auf und spanne sie auf eine Korkplatte, die Schleimhautseite nach oben. Meist liegt hier ein zäher Koth, der nur sehr schwer durch Spülen zu entfernen ist und die Zotten aufeinander klebt, so dass man nur Schrägschnitte der Zotten enthält. Im Uebrigen ist die Behandlung wie Nr. 100.

Der Processus vermiformis des Kaninchens enthält in seiner blinden Hälfte dicht beisammenstehende Knötchen, welche die Schleimhaut auf so schmale Bezirke zusammendrängen, dass das Durchschnittsbild sehr komplizirt und für Anfänger kaum verständlich wird.

Fixiren in 0,1%iger Chromsäure (pag. 13) und Härten in allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14) macht die Keimcentra sehr deutlich, ist jedoch für die übrigen Elemente nicht so gut wie die Salpetersäure.

Nr. 102. Dickdarm. Leere Stücke werden behandelt wie Nr. 100. Gefüllte Stücke müssen aufgeschnitten, abgespült und auf Kork gespannt werden.

Nr. 103. Dickdarmdrüsen des Kaninchens frisch. Man schneide ein ca. 1 cm langes Stückchen des untersten Theiles des Dickdarmes (zwischen zwei der rundlichen Kothballen) heraus, lege es auf den trockenen Objektträger, öffne es mit der Scheere und breite es so aus, dass die Schleimhautfläche nach oben sieht; nun gebe man einen Tropfen der 0,75%igen Kochsalzlösung darauf, fasse das Stück mit einer feinen Pinzette am linken Rande

1) Auch Durchfärben mit Boraxkarmin (pag. 19) ist sehr zu empfehlen.

und schneide mit einer feinen Scheere einen möglichst dünnen Streifen ab. Diesen übertrage man mit einem Tropfen Kochsalzlösung auf einen neuen Objektträger, löse mit Nadeln die Muscularis von der Mucosa und zerzupfe letztere ganz wenig. Deckglas, leichter Druck. Man sieht bei schwachen Vergrösserungen die Drüsenschläuche sehr gut (Fig. 117 B), die Mündungen dagegen nur schwer. Die Drüsenzellen sind oft an der dem Lumen zugewendeten Seite körnig. Bei starken Vergrösserungen sieht man das Cylinder-epithel der Oberfläche, sowohl von der Seite, wie von der Fläche, sehr schön. Der Inhalt der Becherzellen ist oft nicht hell, wie bei Schnittpräparaten, sondern dunkelkörnig.

Nr. 104. Blutgefässe des Magens und des Darmes. Von der Aorta descend. aus injizierte, in 50—200 ccm Müller'scher Flüssigkeit fixirte und in allmählich verstärktem Alkohol gehärtete (pag. 14) Magen- und Darmstücke werden theils in dicke (bis 1 mm) Schnitte zerlegt und ungefärbt in Damarfirniss konservirt (Fig. 121), theils aber auch zu Flächenpräparaten verwendet, die bei wechselnder Tubuseinstellung und schwacher Vergrösserung sehr instruktiv sind. Zu dem Zwecke kann man Dickdarmstücke von 1 qcm Grösse aus absolutem Alkohol zum starken Aufhellen in 5 ccm Terpentinöl (statt Bergamott) einlegen und in Damarfirniss konserviren. Es ist auch leicht, die Muscularis von der Mucosa abzuziehen und die einzelnen Häute in Damarfirniss zu konserviren. Fig. 14 stammt aus einem solchen Präparate.

Nr. 105. Auerbach'scher und Meissner'scher Plexus. Hierzu eignen sich vorzugsweise Därme mit dünner Muscularis, also von Kaninchen und Meerschweinchen, nicht von Katzen; es ist nicht nothwendig, dass das Objekt ganz frisch sei, auch Dünndärme seit mehreren Tagen verstorbener Kinder sind noch vollkommen brauchbar. Zunächst bereite man sich 200 ccm verdünnte Essigsäure: 10 Tropfen Eisessig (oder 25 Tropfen gewöhnlicher Essigsäure) zu 200 ccm destill. Wasser. Dann präparire man ein 10—30 cm langes Dünndarmstück vom Mesenterium, schneide das Stück ab und streiche den Darminhalt mit leicht aufgesetztem Finger heraus. Dann binde man das untere Ende des Darmes zu, fülle vom oberen Ende aus mit der verdünnten Essigsäure prall den Darm, binde ihn oben auch zu und lege nun das ganze Stück in den nicht zur Füllung verwendeten Rest der Essigsäure. Nach 1 Stunde wechsele man die Flüssigkeit. Nach 24 Stunden übertrage man den Darm in destill. Wasser, öffne mit der Scheere den Darm seitlich vom Mesenterialansatze und schneide ein ca. 1 cm langes Darmstückchen ab. Es gelingt leicht, mit zwei spitzen Pincetten die Muscularis von der Mucosa zu trennen; beide haften nur am Mesenterialansatze fester.

a) Auerbach'scher Plexus. Legt man schwarzes Papier unter die Glasschale, so sieht man jetzt schon mit unbewaffnetem Auge die weissen Knotenpunkte des Auerbach'schen Plexus. Ein Stückchen der Muscularis von ca. 1 cm Seite in einem Tropfen der verdünnten Essigsäure auf den Objektträger gebracht, giebt bei schwachen Vergrösserungen ein sehr hübsches Bild (Fig. 122, A). Will man konserviren, so lege man die Stückchen auf 1 Stunde in ca. 30 ccm destill. Wasser, das man mehrmals wechselt, und bringe sie dann auf 8—16 Stunden in 5—10 ccm einer 1%igen Osmiumsäurelösung, die ins Dunkle gestellt wird. Dann wasche man das Stückchen mit destill. Wasser kurz ab und konservire in verdünntem Glycerin. So schön wie die frisch aus der Essigsäure genommenen Präparate sind die Osmiumpräparate nicht. Beim Meerschweinchen lassen sich leicht beide

Schichten der Muscularis von einander abziehen¹⁾; an einer haftet dann der Plexus; solche Stückchen kann man 1 Stunde in destill. Wasser legen, dann vergolden (pag. 21) und in Damarfirniss konserviren. Für menschlichen Darm ist die Vergoldung weniger geeignet, da die beiden Muskelschichten, sich gleichfalls roth färbend, den Plexus theilweise verdecken.

b) Meissner'scher Plexus. Man kratze mit einem Skalpell das Epithel von der isolirten Mucosa, bringe ein Stückchen von ca. 1 cm Seite auf den Objektträger, bedecke es mit einem Deckglase, das man etwas aufdrücken darf, und untersuche mit schwachen Vergrößerungen (Fig. 122 B).

Zum Konserviren kann man wie bei Nr. 105 a verfahren; nur empfiehlt es sich, das Stückchen aufzuspannen und vor dem Einlegen aus dem absol. Alkohol in das Bergamottöl etwas zu pressen, damit der Alkohol aus der schwammigen Mucosa vollkommen heraustritt.

Ausser Nerven sieht man auch viele Blutgefässe, die an der Struktur ihrer Wandlung, z. Th. schon an den quergestellten Muskulariskernen leicht erkennbar sind.

Nr. 106. Gl. parotis, submaxillaris und sublingualis. Man schneide von den genannten Drüsen des Menschen (im Winter noch nach 3—4 Tagen tauglich) mehrere Stückchen von 0,5—1 cm Seite und bringe sie in 30 cem absoluten Alkohol, der nach 5—20 Stunden gewechselt wird; nach weiteren 3 Tagen sind die Stückchen schon schnittfähig und können jetzt oder beliebig später verarbeitet werden. Eines der Stückchen färbe man mit Boraxkarmin durch, das andere zerlege man, ungefärbt in Leber eingeklemmt, in möglichst feine Schnitte; es genügen schon ganz kleine Fragmente von ca. 2 mm Seite. Färben in Böhmer'schem Haematoxylin 2—3 Minuten (pag. 17); das Uebertragen der Schnitte in die Farblösung muss langsam geschehen, sonst zerfahren die feinsten Schnitte in kleinste Lappchen. Dann Färbung mit Eosin (pag. 18), Einschluss im Damarfirniss (pag. 23). (Ganz feine Schnitte betrachte man nach der Haematoxylinfärbung in Wasser, da die Zellengrenzen hier viel deutlicher sind.) Sind die Färbungen gelungen, so erscheinen die Speicheldrüsen und die Halbmonde roth. An der Gl. sublingual. und an den Schleimzellen der Gl. submaxillaris färbt sich auch die Membr. propria roth; man verwechselte sie nicht mit Randschnitten von Halbmonden, welche letztere granulirt sind, während die M. propria homogen glänzt (Fig. 123). Die Schleimzellen erscheinen bei den Boraxkarminpräparaten durchweg hell; mit Haematoxylin gefärbt sind sie bald hell, bald verwachsen blau in verschiedenen Nuancen (Figur 123, tub. 3); was sich färbt ist ein Reticulum, welches sich in einem gewissen Funktionsstadium in jeder Schleimzelle findet. Die sehr kurzen Schaltstücke der Gl. submaxillaris sind nur schwer zu finden; leicht dagegen sind sie an der Parotis (auch an der des Kaninchens) zu sehen. Von den Endstücken sind nur diejenigen zum Studium tauglich, welche genau halbirt sind (Fig. 123, 1, 2, 3), deren Lumen sichtbar ist; die zahllosen Schräg- und Tangential-schnitte (Fig. 123, 4, 5, 6, 7) sind oft sehr schwer zu verstehen.

Nr. 107. Pankreas. Vom Menschen meist schon untauglich. Behandlung wie Parotis Nr. 106. Die charakteristische Körnung der dem Lumen zugewendeten Abschnitte der Drüsenzellen ist bei dieser Methode

¹⁾ Jedoch nur dann, wenn die Füllung des Darmes sofort nach dem Tode vorgenommen war. Möglicherweise ist beim Menschen der Grund des festen Zusammenhängens beider Muskelschichten nur im Alter des Objectes gelegen.

nicht zu sehen (Fig. 126, *B*). Zerzupft man dagegen ein stecknadelkopfgrosses Stückchen eines frischen Pankreas der Katze in einem Tropfen Kochsalzlösung (0,75%), so sehen bei schwachen Vergrösserungen die Endstücke wie gefleckt aus; das sind die theils hellen, theils körnigen Abschnitte der Zellen. Stärkere Vergrösserungen ergeben dann Bilder wie Fig. 126, *A*.

Nr. 108. Leberzellen. Man schneide eine frische Leber durch und streiche mit schräg aufgesetzter Skalpellklinge über die Schnittfläche. Die der Klinge anhaftende braune Lebermasse übertrage man in einen auf den Objektträger gesetzten Tropfen Kochsalzlösung. Deckglas. Erst schwache, dann starke Vergrösserung (Fig. 129, *A*). Das Präparat enthält ausserdem zahlreiche farbige und farblose Blutkörperchen.

Nr. 109. Leberläppchen. Kleine Stücke (von ca. 2 cm Seite) einer Schweinsleber werfe man in 30—50 ccm absoluten Alkohol. Die Eintheilung in meist sechseckige Läppchen, die mit unbewaffnetem Auge schon gut an der Leberoberfläche zu sehen war, tritt schon nach einer Minute scharf an den Schnittflächen hervor; auch der Durchschnitt der Venae centrales wird sichtbar. Nach ca. 3 Tagen angefertigte, mit Böhmer'schem Haematoxylin gefärbte (pag. 17) Schnitte zeigen zwar die Eintheilung in Läppchen auch bei schwacher Vergrösserung gut, die Leberzellen aber, sowie die Gallengänge sind zum Studium weniger zu empfehlen. Besser eignet sich hierzu die

Nr. 110. Leber des Menschen¹⁾, von der man möglichst frische Stücke von ca. 2 cm Seite ca. 4 Wochen in 200 ccm Müller'scher Flüssigkeit fixirt und in 100 ccm allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14) gehärtet hat. Man betrachte ungefärbte Schnitte und färbe andere mit Böhmer'schem Haematoxylin (oder auch noch dazu mit Eosin pag. 18), Einschluss in Damarfirniss (pag. 23). Die Läppchen sind wegen des geringer entwickelten interlobularen Bindegewebes nicht so deutlich abgegrenzt. Makroskopische Betrachtung ermöglicht viel eher die Unterscheidung der Läppchen, als die Untersuchung mit dem Mikroskop. Zur Orientirung möge der Anfänger berücksichtigen, dass die einzelnen Gefässdurchschnitte Lebervenen, mehrere beisammen dagegen Verästelungen der Pfortader, der Arterie und der Gallengänge, also stets interlobularen Gebilden entsprechen. Genau quer durchschnittenene Venae centrales sind auch durch die radiär zu ihnen gestellten Leberzellen kenntlich (Fig. 130).

Nr. 111. Zur Sichtbarmachung der Kapillaren und des intra-lobularen Bindegewebes schüttele man einige feine, doppeltgefärbte Schnitte der menschlichen Leber (Nr. 110) 2—3 Min. in einem zur Hälfte mit destill. Wasser gefüllten Reagenzgläschen. Dadurch fallen die Leberzellen theilweise aus; die Ränder des Präparates werden in einem Tropfen Wasser untersucht (Fig. 134). Man kann solche Schüttelpräparate auch in Damarfirniss konserviren; nur verschwinden darin die feineren Bindegewebsfasern.

Nr. 112. Leber des Frosches. Gallenkapillaren. Man lege die frische Leber eines Frosches in toto in ca. 150 ccm Müller'sche Flüssig-

¹⁾ Zum Studium des Baues der Gallenblase, sowie der grossen Gallengänge ist nur ganze frische Leber zu gebrauchen, da die alkalisch reagirende Galle bald nach dem Tode die Wandung der Gallenblase durchtränkt, gelb färbt und zu mikroskopischen Untersuchungen untauglich macht.

keit auf 3 Wochen, wasche dann 1 Stunde in (womöglich fliessendem) Wasser aus und härte die Leber in 100 cem allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14) unter Lichtausschluss. Feine, senkrecht zur Oberfläche, parallel dem scharfen Leberrande geführte Schnitte werden mit Böhmer'schem Haematoxylin ca. 3 Minuten gefärbt (pag. 17) und in Damarfirniss konservirt (pag. 23). Bei starken Vergrösserungen sieht man die Durchschnitte der Gallenkapillaren als feine glänzende Punkte (Fig. 127). Der Anfänger hüte sich, die in gewissen Funktionsstadien in den Leberzellen auftretenden Vakuolen (Fig. 127, *v*), die nicht so scharf konturirt und von verschiedener Grösse sind, mit den Gallenkapillaren zu verwechseln.

Nr. 113. Blutgefässe der Leber. a) Man lege ein Leberstück (von ca. 2 cm Seite) eines mit Chloroform getödteten Kaninchens schnell, ohne es viel ausbluten zu lassen, in 50 cem absoluten Alkohol. Nach 2 Tagen sieht man schon auf der Oberfläche die natürliche Injektion durch braune, im Centrum der Läppchen befindliche Flecke markirt. Der Oberfläche parallel geführte, dicke Schnitte werden ungefärbt in Damarfirniss eingeschlossen. Schwache Vergrösserung. Oft enthalten nur die oberflächlichen Schichten der Leber gefüllte Blutgefässe.

b) Von allen Injektionen gelingen diejenigen der Leber am leichtesten. Man injizire (pag. 21) Berlinerblau entweder von der Pfortader aus oder von der Vena cava inferior aus. In letzterem Falle empfiehlt es sich, das Thier über dem Zwerchfelle zu durchschneiden, das Herz auf dem Zwerchfelle sitzen zu lassen und vom rechten Vorhofe aus die Kanüle in die Cava inferior einzubinden. Die injizierte Leber wird zunächst in toto in circa 500 cem Müller'sche Flüssigkeit eingelegt; nach ca. 6 Tagen werden Stücke von ca. 2 cm Seite von den bestinjizirten Stellen ausgeschnitten, abermals auf 2—3 Wochen in ca. 150 cem Müller'sche Flüssigkeit gebracht und endlich in ca. 100 cem allmählich verstärktem Alkohol gehärtet (pag. 14). Dicke Schnitte der Leber konservire man ungefärbt in Damarfirniss (Fig. 131, 132, 133).

Nr. 114. Gallenkapillaren. Vorbereitung. Man löse 2 gr Kali bichrom. in 67 cem destillirtem Wasser, das man zu schnellerer Lösung des Kali erwärmen kann. 32 cem dieser Lösung werden mit 4 cem der 2^oigen Osmiumlösung (pag. 5) gemischt¹⁾. In ca. 12 cem dieser Mischung wird frische Leber in kleinen, höchstens 1 cm dicken Stückchen eingelegt. Nach 72 Stunden werden die Stückchen direkt in Solut. argent. nitr. 1^o/₁₀ (pag. 6) 30 cem + Aqua destill. 10 cem übertragen. Nach weiteren 24 Stunden kommen die Stückchen in destill. Wasser (15 Min.) und werden endlich in allmählich verstärktem Alkohol gehärtet. Die Schnitte werden behandelt wie Nr. 68 pag. 138. Gelungene Präparate zeigen ausser den bekannten Chromsilberverunreinigungen an einzelnen Stellen die polygonalen Maschen der Gallenkapillaren.

Nr. 115. Bauchfellepithel. Man verfare wie Nr. 34 pag. 89, nehme aber statt des Mesenterium, das übrigens auch brauchbare Bilder liefert, das Omentum majus. Die Stücke können in Böhmer'schem Haema-

¹⁾ Diese Mischung ist von Ramon y Cajal als eine Modifikation der kurzen Golgischen Färbung (Nr. 69, pag. 139) für das Centralnervensystem angegeben worden. Die Anwendung hiefür ist die gleiche wie Nr. 114 und für sehr kleine Stücke zu empfehlen.

toxylin (pag. 17) gefärbt und in Damarfirniß (pag. 23) konservirt werden (Fig. 135).

Nr. 116. Netz der Bindegewebsbündel erhält man durch Ausbreiten des frischen menschlichen Netzes in einigen Tropfen Pikrokarmine. Konserviren in (nicht angesäuertem) verdünntem Glycerin (pag. 6).

VI. Athmungsorgane.

Der Kehlkopf.

Die Schleimhaut des Kehlkopfes ist eine Fortsetzung der Rachen Schleimhaut und besteht, wie diese, aus Epithel, einer Tunica propria und einer Submucosa, welche letztere die Verbindung der Schleimhaut mit den unterliegenden Theilen vermittelt. Das Epithel ist fast überall ein geschichtetes Flimmerepithel; die durch die Wimperhaare erzeugte Strömung ist gegen die Rachenhöhle gerichtet; an den wahren Stimmbändern, an der Vorderfläche der Giessbeckenknorpel und an der Hinterfläche der Epiglottis¹⁾ ist dagegen das Epithel ein geschichtetes Pflasterepithel. Die Tunica propria besteht aus zahlreichen elastischen Fasern und aus fibrillärem Bindegewebe, welches sich bei Thieren an der Epithelgrenze zu einer Membrana propria verdichtet. Die T. propria ist Sitz einer wechselnden Menge von Leukocyten; bei Hunden und Katzen finden sich in der Schleimhaut des Ventr. Morgagni sogar Solitärknötchen (pag. 85.) Papillen besitzt die Schleimhaut hauptsächlich im Bereiche des geschichteten Pflasterepithels. Die Submucosa enthält verästelte tubulöse Schleimdrüsen von 0,2—1 mm Grösse.

Die Knorpel des Kehlkopfes bestehen meist aus hyalinem Knorpel, welcher zum Theil die Eigenthümlichkeiten des Rippenknorpels (s. pag. 54) zeigt. Dahin gehören der Schildknorpel, Ringknorpel, der grösste Theil der Giessbeckenknorpel und oft die Cartilagines triticeae. Aus elastischem Netzkorpel bestehen dagegen der Kehldeckel, die Wrisberg'schen und Santorini'schen Knorpel, ferner Spitze und Processus vocales der Giessbeckenknorpel. Faserknorpelig sind zuweilen die Cartilagines triticeae. Zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr beginnt eine (vorwiegend enchondrale) Verknöcherung des Schild- und Ringknorpels.

Der Kehlkopf ist reich an Blutgefäßen und Nerven. Erstere bilden mehrere (2—3) der Fläche nach ausgebreitete Netze, welchen ein dicht unter dem Epithel gelegenes Kapillarnetz folgt. Auch die Lymphgefäße bilden zwei der Fläche nach ausgebreitete, mit einander zusammenhängende Netze, von denen das oberflächliche aus engeren Gefäßen besteht, und unter dem Blutkapillarnetze liegt.

¹⁾ Hier liegen auch Geschmacksknospen (s. Geschmacksorgan).

Die Nerven enthalten in ihrem Verlaufe mikroskopische Ganglien. Sie enden zum Theil in Endkolben und in Geschmacksknospen (s. Geschmacksorgan).

Die Luftröhre.

Die flimmernde Schleimhaut der Luftröhre ist ebenso gebaut, wie diejenige des Kehlkopfes; ein Unterschied besteht nur insofern, als die elastischen Fasern sich zu einem dichten Netzwerke mit vorwiegend longitudinaler Faserichtung ausbilden. Dieses Netz ist dicht unter dem Epithel über den Drüsen gelegen. Die Knorpel sind hyalin; die Hinterwand der Luftröhre wird durch glatte Muskelfasern gebildet. Die Schleimdrüsen der Hinterwand sind durch ihre Grösse (2 mm) ausgezeichnet; sie durchbohren nicht selten die Muskeln, so dass sie zum Theil hinter diesen gelegen sind.

Blut-, Lymphgefässe und Nerven verhalten sich wie im Kehlkopfe.

Die Bronchen und die Lungen.

Die Lungen können als alveoläre zusammengesetzte Drüsen betrachtet werden, an denen wir, wie bei allen Drüsen, ausführende und sekretorische (d. h. hier respiratorische) Abschnitte unterscheiden. Die ausführenden Abschnitte werden durch Kehlkopf, Luftröhre und deren Aeste, die Bronchen, dargestellt. Jeder Bronchus theilt sich beim Eintritte in die Lunge wiederholt und erfährt auch innerhalb derselben eine fortwährende Theilung, die durch direkte Abgabe kleiner Seitenäste und durch spitzwinkelige Theilung und allmähliche Abnahme des Kalibers der grossen Aeste stattfindet; so löst sich jeder Bronchus in feinste Aestchen auf, die nirgends mit einander anastomosiren und bis zu einem Durchmesser von 0,5 mm den Charakter der Ausführungsgänge beibehalten.

Von da an beginnt der respiratorische Abschnitt. An der Wand der kleinen Bronchen treten halbkugelige Ausbuchtungen auf, die Alveolen, die vereinzelt und unregelmässig stehen. Solche Bronchen heissen *Bronchioli respiratorii*. Diese theilen sich und gehen in Alveolengänge über, welche sich von den Bronchioli nur durch eine grössere Anzahl wandständiger Alveolen unterscheiden. Die Alveolengänge theilen sich unter rechtem oder spitzem Winkel und gehen ohne scharfe Grenze in die etwas erweiterten blinden Endbläschen (schlechter „Infundibula“) über, deren Wandung dicht mit Alveolen besetzt ist.

Der ganze respiratorische Abschnitt wird durch Bindegewebe in 0,3—3 cm grosse Läppchen getheilt. Sämmtliche ausführenden Abschnitte liegen bis zu einem Durchmesser von 1,5—1 mm herab zwischen den Läppchen, interlobular.

Der feinere Bau der Bronchen unterscheidet sich in den grössten Bronchialästen nicht von jenem der Luftröhre. Allmählich aber treten Modi-

fikationen auf, welche sich zuerst an den Knorpeln und an der Muskulatur äussern. Die Knorpel bilden bald keine C-förmigen Ringe mehr, sondern sind unregelmässige, an allen Seiten der Bronchialwand gelegene Plättchen geworden. Sie nehmen mit der Abnahme des Durchmessers der Bronchen an Grösse und Dicke ab und hören an den feineren Bronchen (von 1 mm Durchmesser) ganz auf.

Fig. 137.

Querschnitt eines 2 mm dicken Bronchus eines Kindes, 30mal vergrössert. Technik Nr. 118, pag. 193.

Die glatten Muskeln bilden eine den ganzen Umfang des Rohres umgreifende Ringfaserlage, welche nach innen von den Knorpeln gelegen ist. Die Dicke der Muskellage nimmt mit dem Durchmesser der Bronchen ab; es sind jedoch selbst an den Alveolengängen noch Muskelfasern vorhanden. Dagegen fehlen sie an den Infundibula.

Die Schleimhaut ist in Längsfalten gelegt und besteht aus einem geschichteten, mit Becherzellen untermischtem Flimmerepithel, das in den feineren Bronchen allmählich einschichtig wird, und einer bindegewebigen Tunica propria. Letztere enthält zahlreiche, längs verlaufende Netze elasti-

scher Fasern und Leukocyten in sehr wechselnder Menge. Zuweilen kommt es auch hier zur Bildung von Solitärknötchen, von deren Kuppe aus Leukocyten durch das Epithel in das Brochialrohr wandern.

Soweit die Knorpel reichen, finden sich verästelte, tubulöse Drüsen, die unter der Muskelhaut ihren Sitz haben (Fig. 137). Sie sind in grosser Menge vorhanden und hören erst bei Beginn der respiratorischen Bronchiolen auf.

Fig. 138.

Stück eines Schnittes durch die Lunge eines erwachsenen Menschen, 50mal vergr. Der Bronchiolus respiratorius theilt sich nach rechts in zwei Aeste. Eine Strecke weit ist auch seine untere Wand in den Schnitt gefallen. Man sieht hier die Eingänge in die Alveolen von oben her; in dem unteren Aste sieht man die Alveolen von der Seite. Das Epithel der Bronchiolus ist ein gemischtes. Die epitheliale Auskleidung der Alveolen ist bei dieser Vergrößerung nur zum Theil sichtbar. Technik Nr. 119, pag. 193.

Nach aussen von den Knorpeln befindet sich eine aus faserigem Bindegewebe und elastischen Fasern bestehende Faserhaut, welche den ganzen Bronchus und die mit diesem verlaufenden Gefässe und Nerven umhüllt.

Der feinere Bau der respiratorischen Abschnitte unterscheidet sich, nachdem Knorpel und Drüsen sich allmählich verloren haben, vorzugsweise durch die Beschaffenheit des Epithels.

Die den ausführenden kleinsten Bronchen folgenden Bronchioli respiratorii tragen anfangs noch

ein einschichtiges Flimmerepithel, im weiteren Verlaufe verlieren sich die Flimmerhaare, die Zellen werden kubisch und es tritt zwischen diesen eine zweite Art von Epithelzellen in Form von grossen, dünnen, kernlosen Platten auf. Diese Platten heissen respiratorisches Epithel. Dabei

Kubische, platte Epithelzellen.

Kubische, platte Epithelzellen.

Fig. 139.

Stücke von Schnitten durch die Lunge A und B des Menschen, C einer 9 Tage alten Katze, 240mal vergrössert. A Gemischtes Epithel eines Bronchiolus respiratorius. B und C Alveolen bei verschiedener Einstellung gezeichnet. Der Rand der Alveole ist dunkel gehalten; man sieht, dass er von demselben Epithel überzogen ist wie der (helle) Grund der Alveole, die Kerne der Zellen sind nicht sichtbar. Technik Nr. 119, pag. 193.

erfolgt der Uebergang des kubischen Epithels in das respiratorische Epithel nicht mit scharfer Grenze, sondern in der Art, dass an der einen Seite des Bronchiolus kubisches, an der anderen Seite respiratorisches Epithel sich befindet, oder dass Gruppen kubischer Zellen von respiratorischem Epithel umgeben werden und umgekehrt. Die Bronchioli respiratorii enthalten somit gemischtes Epithel (Fig. 138 und 139, A). Indem das respiratorische Epithel immer mehr an Ausdehnung gewinnt, und die Gruppen kubischer Zellen immer seltener werden, geht das Epithel der Bronchiolen in dasjenige der Alveolengänge über.

Das Epithel der Alveolengänge und der Alveolen ist gleich beschaffen; es besteht aus den bekannten grossen, kernlosen Platten und ganz kleinen Gruppen oder vereinzelt kleinen polygonalen Zellen, die den kubischen Epithelzellen der Bronchiolen gleichen. Wie die Entwicklungsgeschichte lehrt, gehen die kernlosen Platten aus ebenfalls kubischen Epithelzellen hervor und zwar nehmen diese die platte Gestalt durch die Athmung, d. h. durch die dabei sich vollziehende Ausdehnung der Alveolenwand, an. Die Alveolen älterer Embryonen und todtegeborener Kinder sind nur von kubischen Zellen ausgekleidet. Die Wandung der Alveolengänge und der Alveolen besteht ausser den schon erwähnten Muskelfasern der Alveolengänge noch aus einer leichtstreifigen Grundlage und vielen elastischen Fasern. Diese sind an den Alveolengängen cirkulär angeordnet; an der Eingangsstelle („Basis“) der Alveole bilden die elastischen Fasern einen Ring, von welchem feine, die ganze Wandung der Alveole stützende Fäserchen ausgehen. Indem die elastischen Ringe benachbarter Alveolen an den Berührungspunkten mit einander verwachsen, bilden sie die Alveolensepta.

Das zwischen den Lungenläppchen befindliche interlobuläre Bindegewebe enthält ausser feinen elastischen Fasern und einzelnen Bindegewebszellen beim Erwachsenen schwarze Pigmentkörnchen und kleinste Kohlentheilchen, die durch Inhalation dahin gelangt sind. Bei Kindern ist das interlobuläre Bindegewebe reichlicher entwickelt, die Abgrenzung in Läppchen also deutlicher.

Die Oberfläche der Lungen wird von der Pleura visceralis überzogen; diese besteht aus Bindegewebe, zahlreichen, feinen elastischen Fasern und ist an der freien Oberfläche von einer einfachen Schicht platter, polygonaler Epithelzellen überkleidet. Die gleich gebaute Pleura parietalis ist nur ärmer an elastischen Fasern.

Blutgefässe der Lungen. Die Aeste der Art. pulmon. dringen in den Lungenhilus ein, und laufen an der Seite der Bronchen, Bronchiolen und Alveolengänge zwischen die Infundibula, wo sie sich in ein sehr engmaschiges Kapillarnetz auflösen, das dicht unter dem respiratorischen Epithel der Bronchioli respiratorii, der Alveolengänge und der Alveolen gelegen ist. Die Venen entstehen am Grunde je eines Alveolus (Fig. 140) und sammeln sich zu Stämmchen, die neben Bronchen und Arterien herlaufen. Die Wan-

derung der Bronchen wird durch eigene Blutgefäße, die *Art. bronchiales*, versorgt, welche ein tiefes, für Drüsen und Muskeln und ein oberflächliches für die *Tunica propria* bestimmtes Kapillarnetz speisen. Der Abfluss erfolgt theils durch eigene *Venae bronchiales*, theils in die *Ven. pulmonales*.

Fig. 140.

Aus einem Schnitte durch die von der *Art. pulmonalis* aus injizierte Lunge eines Kindes, 80mal vergrößert. Von den fünf gezeichneten Alveolen sind die drei oberen vollkommen injiziert. Technik Nr. 121, pag. 194.

Die zahlreichen, von *Sympathicus* und *Vagus* stammenden Nerven der Lungen enthalten theils markhaltige, theils marklose Nervenfasern und kleine Gruppen von Ganglienzellen. Die Nervenenden sind nicht bekannt.

Anhang.

Die Schilddrüse.

Die Schilddrüse ist eine tubulöse zusammengesetzte Drüse, deren am *Foramen coecum* der Zunge mündender Ausführungsgang (*Ductus thyroglossus*) jedoch schon in embryonaler Zeit obliterirt und sich bis auf ein-

Fig. 141.

Ein Läppchen aus einem feinen Durchschnitte der Schilddrüse eines erwachsenen Menschen, 220mal vergrößert. Man beachte den verschiedenen Durchmesser der Tubuli. Technik Nr. 122, pag. 194.

zelne Reste zurückbildet. Sie besteht dann nur aus vollkommen geschlossenen Tubuli, welche durch lockeres Bindegewebe zu Läppchen mit einander verbunden werden. Die Tubuli sind sehr verschieden gross ($40\text{--}120\ \mu$ im Durchmesser) und mit einer einfachen Lage kubischer Epithelzellen ausgekleidet. Der Inhalt der Tubuli ist eine homogene zähe Masse, die colloide Substanz, welche auch in den Lymphgefässen der Schilddrüse gefunden wird. Die colloide Substanz ist charakteristisch für die Schilddrüse. Die sehr zahlreichen Blutgefässe lösen sich in ein die Tubuli umspinnendes Netz von Kapillaren auf, welche dicht unter dem Epithel liegen. Die ebenfalls zahlreichen Lymphgefässe bilden ein zwischen den Tubuli gelegenes Netzwerk. Nerven sind nur spärlich vorhanden, ihre Endigung ist unbekannt.

Thymus.

Die Thymus, ein in der ersten Anlage epitheliales Organ, besteht im Kindesalter aus $4\text{--}11$ mm grossen Lappen, welche von faserigem, mit feinen elastischen Fasern vermengtem Bindegewebe umhüllt werden. Dieses Bindegewebe schiebt in jeden einzelnen Lappen Septa, wodurch eine Unterabthei-

Fig. 142.

Durchschnitt einiger sekundären Läppchen der Thymus eines 7 Tage alten Kaninchens, 50mal vergr. Die unteren Läppchen sind nur tangential angeschnitten, so dass meist nur Rinde sichtbar ist. Technik Nr. 123, pag. 194.

lung in kleinere, 1 mm grosse („sekundäre“) Läppchen erzielt wird. Jedes dieser Läppchen besteht durchaus aus adenoidem Gewebe, welches in der Peripherie dichter als im Centrum entwickelt ist, so dass man einen dunkleren Rindentheil (Fig. 142) von einer helleren Marksubstanz unterscheiden kann.

Die Blutgefässe sind sehr reichlich entwickelt und speisen ein in Mark und Rinde gelegenes Kapillarsystem. Die Lymphgefässe sind ebenfalls in grosser Anzahl vorhanden; die grösseren Stämm-

chen liegen an der Oberfläche der Thymus, ihre Aeste verlaufen in den bindegewebigen Septen und dringen von da in die Marksubstanz ein.

Später treten gewebliche Umbildungen die Thymus ein und zwar in der Weise, dass der grösste Theil des adenoiden Gewebes vergeht und Fett an dessen Stelle tritt. Um diese Zeit findet man in ihr in sehr wechselnder Anzahl konzentrisch gestreifte Körperchen von $15\text{--}180\ \mu$ Durchmesser, welche wahrscheinlich veränderte Ballen von Epithelzellen sind. Sie werden Hassal'sche Körperchen genannt.

TECHNIK.

Nr. 117. Kehlkopf, Luftröhre und Schilddrüse. Man präparire die Luftröhre¹⁾ über dem Manubrium sterni frei, schneide sie und den Oesophagus quer durch und präparire beide nach aufwärts los (s. Nr. 92). Die Zunge kann gleichfalls mit herausgenommen werden. Die Schilddrüse lässt man am Kehlkopf hängen. Das Ganze wird auf 2—6 Wochen in 200—400 ccm Müller'sche Flüssigkeit eingelegt, dann eine Stunde lang in (womöglich fließendem) Wasser ausgewaschen und in ca. 200 ccm allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14) gehärtet. Nach ca. 8 Tagen fertige man Quer- und Längsschnitte durch die Stimmbänder und durch Stücke der Trachea an, färbe sie ca. 5 Min. mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17) und konservire sie in Damarfirniss (pag. 23). Besonders instruktiv sind Schnitte quer durch die Stimmbänder, auf denen Schleimhaut, Drüsen, Muskeln, Gefässe, Nerven und Knorpel Stoff zu den verschiedensten Studien geben.

Nr. 118. Bronchus. Die dem soeben getödteten Thiere (Kaninchen²⁾) entnommenen Lungen werden wie Nr. 117 in Müller'scher Flüssigkeit fixirt und in allmählich verstärktem Alkohol gehärtet. Nach 8 Tagen schneide man ein ca. 1 ccm grosses Stück Lunge heraus, das ein längsverlaufendes Stück Bronchus enthält, entferne mit einer Scheere den grössten Theil des anhängenden Lungengewebes, klemme den Bronchus in Leber und mache feine Querschnitte, welche man mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17) färbt und in Damarfirniss (pag. 23) konservirt (Fig. 137). Die Methode ist auch zur Darstellung der Alveolen und Alveolengänge zu verwenden.

Nr. 119. Lungenepithel. Zur Darstellung desselben können nur ganz frisch getödtete Thiere verwendet werden; zu empfehlen sind junge (nicht neugeborene) Katzen, die durch Kopfab schneiden getödtet werden. Trachea und Lungen werden sorgfältig herausgenommen und mit einer vorher bereiteten verdünnten Lösung von Argent. nitr.³⁾ vermittelst einer Glaspritze prall gefüllt. Die Trachea wird dann fest zugebunden und das Ganze auf 1—12 Stunden in den Rest der nicht zum Injizieren verwendeten Silberlösung eingelegt und ins Dunkle gestellt. Alsdann werden die Lungen mit destill. Wasser kurz abgespült und in ca. 150 ccm allmählich verstärkten Alkohol übertragen, woselbst sie beliebig lange im Dunkeln aufbewahrt werden können. Die Reduktion kann eine Stunde oder beliebig später nach der Silberinjektion vorgenommen werden. Zu dem Zwecke werden die Lungen in Alkohol dem Sonnenlichte ausgesetzt, woselbst sie sich in wenigen Minuten tief bräunen. Dann mache man mit sehr scharfem Messer Schnitte (man vermeide dabei, das Präparat zu drücken). Das Lungengewebe ist trotz der Alkoholhärtung noch sehr weich und erlaubt nur dicke Schnitte anzufertigen; am leichtesten gelingen parallel der Oberfläche gerichtete Schnitte. Die Schnitte werden 10—60 Minuten lang in 5—10 ccm destillirtes Wasser, dem man ein linsengrosses Stückchen Kochsalz zugefügt hat, gelegt und ungefärbt in Damarfirniss (pag. 23) konservirt⁴⁾. Es ist

1) Von Thieren ist die erwachsene Katze am meisten zu empfehlen.

2) Katzenlungen sind wegen der oft ansehnlichen, die Bronchen begleitenden Fettmassen weniger zu empfehlen.

3) 50 ccm der 1%igen Lösung zu 200 ccm destill. Wasser.

4) Kernfärbungen sind nicht zu empfehlen, da sich nicht nur die Kerne der Epithelzellen, sondern auch die der Kapillaren etc. färben, wodurch das Bild sehr kompliziert wird.

nicht gerade leicht, sich an solchen Durchschnitten zu orientiren; man beginne die Untersuchung mit schwachen Vergrößerungen. Die kleinen Alveolen sind leicht kenntlich, die etwas grösseren Lücken entsprechen Alveolengängen. Die Epithelzeichnung ist im Ganzen zierlicher bei mittelstarken (80 : 1) Vergrößerungen und durchaus nicht an allen Stellen gleich gut ausgeprägt. Die kubischen Epithelzellen sind meist etwas dunkler braun gefärbt. Man suche sich eine gute Stelle aus und betrachte sie mit starker Vergrößerung (240 : 1), wobei man nicht zu vergessen hat, durch verschiedene Einstellung (Heben und Senken des Tubus) sich über das Relief des Präparates zu orientiren. Man sieht nämlich bei starker Vergrößerung entweder nur den Grund oder nur den Rand einer Alveole deutlich. Fig. 139 ist bei wechselnder Einstellung gezeichnet.

Nr. 120. Elastische Fasern der Lunge erhält man, wenn man mit einer Scheere von einer frisch angefertigten Schnittfläche einer Lunge (die Lunge kann schon alt sein) ein ca. 1 qcm grosses flaches Stückchen abschneidet, mit Nadeln auf dem trockenen Objektträger ausbreitet, mit dem Deckglase bedeckt und ein paar Tropfen zur Hälfte mit Wasser verdünnter Kalilauge (pag. 6) zufließen lässt (pag. 26). Die verdünnte Lauge zerstört die übrigen Theile, nur die elastischen Fasern bleiben erhalten, deren Dicke und Anordnung bei starker Vergrößerung (240 : 1) leicht zu untersuchen sind.

Nr. 121. Blutgefässe der Lungen. Man injizire die Lungen von der Arterie pulmonalis aus mit Berliner Blau, fixire sie dann in Müller'scher Flüssigkeit und härte sie in Alkohol. Man mache dicke, vorzugsweise parallel den Flächen der Lungen geführte Schnitte. (Fig. 140.)

Nr. 122. Schilddrüse. Feine Schnitte der in toto gehärteten Drüse (s. Nr. 117) werden mit Pikrokarmín gefärbt (pag. 19) und in Damarfirniss konservirt (Fig. 141). Die retrahirten Colloidmassen färben sich intensiv gelb. Dicke Schnitte betrachte man in Glycerin, woselbst die mit Colloid gefüllten Lymphgefässe oft deutlich hervortreten.

Nr. 123. Thymus. Man fixire die Thymus eines jungen Thieres 2—4 Wochen in Müller'scher Flüssigkeit und härte in allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14), färbe mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17) und konservire in Damarfirniss (pag. 23) (Fig. 142). Man verwechsle die Gefässquerschnitte, deren Lumina beim Heben und Senken des Tubus sich verrücken (wenn sie nicht genau quergeschnitten sind), nicht mit den konzentrisch gestreiften Körpern.

VII. Harnorgane.

Die Nieren.

Die Nieren sind zusammengesetzte tubulöse Drüsen, welche ganz aus Röhrchen, den Harnkanälchen, bestehen; die schon makroskopisch bemerkbaren Unterschiede zwischen peripherischen und centralen Schichten der Nieren, der sog. Rinden- und Marksubstanz, werden hauptsächlich bedingt durch den Verlauf der Harnkanälchen, indem die in der Rinde gelegenen Abschnitte der Kanälchen einen gewundenen, die in der Marksubstanz befindlichen aber einen gestreckten Verlauf nehmen.

Jedes Harnkanälchen beginnt in der Rindensubstanz mit einer kugeligen Auftreibung, dem Malpighi'schen Körperchen (Fig. 143, *a*), welches mit einer Einschnürung, dem Hals, von dem nächsten, vielfach gewundenen

Fig. 143.

Schema des Verlaufes der Harnkanikeln (links und der Nierengefäße (rechts). *R* Rindensubstanz, *M* Marksubstanz; *a*, *b*, *c* Markstrahlen, *d*, *e*, *f*, *g* drei Nierenlappchen, *a* Malpighi'sches Körperchen, *b* Tubul, contort., absteigender, *d* aufsteigender Schenkel der Henle'schen Schleife, *e* Schaltstück, *f* Sammelröhrchen, *g* Stücke von Sammelröhrchen, *g* Duct. papillar. 1 Ast der Nierenarterien, 2 Art. interlobul., 3 Vas. afferens, 4 V. efferens, 5 Ven. interlobul., 6 Ast der Nierenvenen. $\times \times \times$ s. pag. 199. Nach einem Querschnitte der Niere eines 7wöchentlichen Kindes bei 10malig. Vorgrüßung entworfen.

Fig. 144.

Harnkanälchen eines 4 Wochen alten Kaninchens isolirt, 30mal vergr. *a* Malpighi'sches Körperchen, *b* Tubul. contort., *c* Henle'sche Schleife, absteigender Schenkel, *d* aufsteigender Schenkel, *f* Sammelröhren, *g* Ductus papillaris.
Technik Nr. 124, pag. 201.

Abchnitt, dem gewundenen Kanälchen, Tubulus contortus (*b*), abgesetzt ist. Dieses geht in einen gestreckten Theil über, der anfangs centralwärts gerichtet ist, alsbald aber wieder umbiegt und so eine Schleife, die Henle'sche Schleife, bildet, an welcher wir einen absteigenden (*c*) und einen

aufsteigenden Schenkel (*d*) unterscheiden können. Letzterer geht in ein gewundenes Stück, das Schaltstück (*e*), über, das weiterhin einen gestreckten Verlauf annimmt und dann Sammelröhrchen (*f*) heisst. Diese Sammelröhrchen nehmen während ihres centralwärts gerichteten Verlaufes noch andere Schaltstücke auf, vereinigen sich weiterhin unter spitzen Winkeln mit benachbarten Sammelröhrchen (*f*₁) und streben gegen die Spitze der Nierenpapillen zu, wo sie, an Zahl verringert, im Kaliber dagegen bedeutend verstärkt, als Ductus papillares (*g*) münden. Henle'sche Schleifen und Sammelröhrchen werden Tubuli recti genannt. Jedes Harnkanälchen hat somit bis zum Sammelröhrchen einen völlig isolirten Verlauf. Indem die Henle'schen Schleifen und die peripherischen Abschnitte der Sammelröhrchen zu Bündeln vereint gegen die Marksubstanz ziehen, bedingen sie die als Markstrahlen (Ferrin'sche Pyramiden) (*m. s.*) bekannten Bildungen.

Fig. 145.

Stück eines Schnittes der menschlichen Niere in der Richtung von der Rinde gegen 'das Mark geführt. 20mal vergr. Bei X sind zwei Malpighi'sche Körperchen herausgefallen. Technik Nr. 125, pag. 202.

Der feinere Bau der Harnkanälchen ist in den verschiedenen Abtheilungen ein sehr differenter, so dass eine gesonderte Betrachtung jedes Abschnittes nöthig ist. Das Malpighi'sche Körperchen, 0,13—0,22 mm gross, besteht aus einem kugeligen Blutgefässplexus, dem Glomerulus, der in das sackförmig erweiterte blinde Anfangsstück des Harnkanälchens, die

Bowman'sche Kapsel, der Art eingestülpt ist, dass er von der Kapsel grösstentheils umfasst wird. Die Einstülpung ist etwa so, wie im Grossen das Herz in den Herzbeutel eingestülpt ist. Demnach können wir an der Bowman'schen Kapsel zwei Blätter unterscheiden, ein inneres (quasi visce-

Fig. 146.

Schema. Links Arterie, die nach rechts ein Vas afferens abgibt; dasselbe löst sich in Aeste auf, welche in die Wurzeln des Vas efferens (nach rechts gerichtet) einbiegen. Die drei Schleifen sollen den Glomerulus darstellen; dieser steckt in der Bowman'schen Kapsel, deren beide Blätter sichtbar sind; unten geht dieselbe in das Harnkanälchen über.

Fig. 147.

Aus einem Schnitte durch eine Mausniere, 240mal vergr. Das den Glomerulus überkleidende Epithel (d. i. das innere Blatt der Bowman'schen Kapsel) ist nicht zu erkennen. Technik Nr. 127, pag. 202.

rales) dem Glomerulus dicht anliegendes — es besteht bei jungen Thieren aus kubischen, später sich immer mehr abplattenden Zellen — und ein äusseres (quasi parietales) Blatt, welches aus platten, polygonalen Zellen aufgebaut wird (Fig. 146).

Das äussere Blatt der Kapsel geht am Halse in die Wandung des Tubulus contortus über, welcher 40—60 μ dick, durch ein sehr enges Lumen ausgezeichnet ist. Die Zellen dieses Abschnittes sind abgestumpft kegelförmig; die nach aussen stehende Basis derselben ist in radiär zum Lumen ge-

Fig. 148.

A Isolierte Zelle eines Tubul. contortus. Auf-faserung der Basis in feine Stäbchen.

B Querschnitt eines Tubul. contortus; man sieht die Stäbchen als feine Striche. Beides aus einer Katzeniere, 240mal vergrössert.

Technik Nr. 125, pag. 202.

Fig. 149.

Aus einem Querschnitte der Marksubstanz der menschlichen Niere, 240mal vergr. Der Schnitt ist durch die Basis der Papille geführt. 1 absteigende, 2 aufsteigende Schenkel Henle'scher Schleifen. 3 Sammelröhrchen. 4 Mit Blutkörperchen gefüllte Blutgefässe. Technik Nr. 125, p. 202.

stellte Stäbchen zerfasert (Fig. 148, A B). Der absteigende Schenkel ist 9—15 μ dick, das Lumen sehr weit. Die Epithelzellen sind platte Zellen, deren Kerne oft gegen das Lumen vorspringen (Fig. 149, 1). Der aufsteigende Schenkel ist 23—28 μ dick, das Lumen relativ enger. Die Epithelzellen gleichen denjenigen der gewundenen Harnkanälchen, sind jedoch etwas niedriger (Fig. 149, 2). Der Uebergang des dünnen Abschnittes der Henle'schen Schleife in den dicken Abschnitt erfolgt nicht immer an der Umbiegungsstelle. Die Schaltstücke sind 39—46 μ dick, ihre Epithelzellen cylindrische oder kegelförmige Zellen von eigenthümlichem

Glanze. Die Sammelröhrchen werden um so dicker, je näher sie der Spitze der Papille kommen, die dünnsten haben einen Durchmesser von $45\ \mu$, die dicksten (Ductus papillares) einen solchen von $200\text{--}300\ \mu$. Die Epithelzellen sind theils helle, theils dunkle Cylinderzellen (Fig. 149, 3), deren Höhe mit dem Kaliber der Sammelröhren zunimmt.

Die Harnkanälchen sind in ihrer ganzen Länge nach aussen vom Epithel mit einer strukturlosen Membrana propria überzogen, welche am absteigenden Schleifenschenkel am dicksten ist. Die Harnkanälchen werden von einer geringen Menge lockeren Bindegewebes („interstitielles Bindegewebe“) umhüllt, welches an der Nierenoberfläche zu einer fibrösen, glatte Muskelfasern enthaltenden Membran, der Tunica albuginea, verdichtet ist. Das interstitielle Bindegewebe ist der Träger der Gefäße.

Blutgefäße der Nieren. Die Arteria renalis theilt sich im Nierenhilus in Aeste, welche nach Abgabe kleiner Zweige für die Tunica albuginea

Fig. 150.

Aus einem Längsschnitte einer injizierten Meerschweinchen-niere, 30mal vergr. Technik Nr. 128, pag. 203.

und für die Nierenkelche sich im Umkreise der Papillen in das Parenchym der Niere (Fig. 143, 1) einsenken und astlos bis zur Grenze zwischen Mark- und Rindensubstanz vordringen. Hier biegen die Arterien unter rechtem Winkel um und verlaufen in peripherisch konvexem Bogen der Grenze entlang. Von der konvexen Seite der Bogen entspringen in regelmässigen Abständen peripherisch verlaufende Aeste, die Arteriae interlobulares¹⁾, (Fig. 143, 2, 150), welche nach den Seiten hin kleine Zweige abgeben, deren jeder einen Glomerulus speist. Dieser entsteht durch rasche Theilung in eine Anzahl kleiner Zweige, die alsbald wieder zu einem (arteriellen) Gefässe zu-

sammentreten²⁾; man nennt dieses letztere das Vas efferens (Fig. 143, 4, 150), es ist etwas schwächer, als das den Glomerulus speisende Gefäss,

¹⁾ Als Nierenläppchen bezeichnet man mikroskopisch nicht scharf begrenzbare Bezirke der Rindensubstanz, in deren Achse ein Markstrahl gelegen ist, entlang deren Peripherie die Arter. interlobulares aufsteigen. In Fig. 143 sind drei Läppchen l_1 l_2 l_3 durch Strichelung angedeutet. Diese Läppchen haben zu den in der Entwicklungsgeschichte bekannten Läppchen keinerlei Beziehungen.

²⁾ Jeder Glomerulus ist somit ein arterielles Wundernetz (s. pag. 83).

welches Vas afferens heisst (Fig. 143, 3, 150). Das Vas efferens löst sich in ein Kapillarnetz auf, welches im Bereiche der Markstrahlen gestreckte Maschen, im Bereiche der gewundenen Harnkanälchen runde Maschen bildet; aus letzteren entstehen Venen, *Venae interlobulares* (Fig. 143, 5, 150), welche dicht neben den *Arter. interlob.* liegen und auch im weiteren Verlaufe sich stets an der Seite der Arterien halten. Die Venen der äussersten Rinde vereinigen sich zu sternförmig gestellten Wurzeln (*Stellulae Verheyinii*), welche mit den *Venae interlobulares* zusammenhängen. Die vorstehend beschriebene Gefässausbreitung ist lediglich in der Rindensubstanz und in den Markstrahlen gelegen; die Marksubstanz bezieht ihr Blut durch die *Arteriola rectae*, welche theils aus den *Vasa efferentia* der tiefstgelegenen (und auch grössten) *Glomeruli* (Fig. 143, $\times$, 150) theils direkt aus centralverlaufenden Aestchen der *Art. interlobulares* oder der bogenförmigen Arterien (Fig. 143 $\times\times$) kommen. Die Venen der Marksubstanz wurzeln in einem weitmaschigen, die *Ductus papillares* umspinnenden Netze und münden in die an der Grenze zwischen Mark- und Rindensubstanz verlaufenden bogenförmigen Venen.

Die Lymphgefäße liegen theils oberflächlich in den Hüllen der Niere, theils begleiten sie die im Parenchym verlaufenden Arterienstämmchen; die wenigen Nerven verlaufen gleichfalls mit den Gefässen.

Die ableitenden Harnwege.

Nierenkelche, Nierenbecken und Ureter bestehen aus 3 Schichten. Zu innerst liegt 1. die Schleimhaut, dann folgt 2. die Muskelhaut,

welche 3. von einer Faserhaut bedeckt wird (Fig. 151).

Fig. 151.

Querschnitt der unteren Hälfte des menschlichen Ureter, 15mal vergr.
 e Epithel, t Tunica propria, s Submucosa, l innere Längsmuskeln,
 r Ringmuskeln, l, accessorische äussere Längsmuskeln.
 Technik Nr. 129, pag. 203.

ad 1. Die Tunica propria der Schleimhaut (t) besteht aus feinen Bindegewebsfasern, welche, reichlich untermengt mit zelligen Elementen, ohne scharfe Grenze in die Submucosa (s) übergehen. Das die Tunica propria überziehende Epithel (e) ist sog. Uebergangsepithel, d. h. ein geschichtetes, aus wenigen Lagen bestehendes Pflasterepi-

thel, dessen oberste Zellenlage aus cylindrischen oder kubischen, nur wenig abgeplatteten Elementen besteht (Fig. 152). Zuweilen sind statt dieser grosse platte Zellen vorhanden, die mehrere durch amitotische Theilung (pag. 36, Anmerk. 3) entstandene Kerne enthalten. Spärlich verästelte, tubulöse Einzeldrüsen („traubige Drüsen“ pag. 4, Anm. 4) finden sich im Nierenbecken und im oberen Theile des Ureter.

Fig. 152.

Stück eines senkrechten Durchschnittes der menschlichen Blasenschleimhaut, 560mal vergrössert.
Technik Nr. 130, pag. 203.

ad 2. Die Muskelhaut besteht aus einer inneren Längslage (l) und einer äusseren cirkulären Lage (r) glatter Muskelfasern, welchen in der unteren Hälfte des Ureter noch eine diskontinuirliche Lage äusserer longitudinaler Muskelbündel (l_1) aufliegt.

ad 3. Die Faserhaut besteht aus lockeren Bindegewebsbündeln.

Die Schleimhaut der Nierenkelche setzt sich auf die Oberfläche der Nierenpapillen fort, die cirkulären Muskelfasern bilden einen Ringmuskel um die Papille.

Blut- und Lymphgefässe finden sich besonders reichlich in der Schleimhaut; die Nerven verbreiten sich vorzugsweise in der Muskelschicht; einzelne Fasern gehen bis ans Epithel.

Die Harnblase besteht ebenfalls aus Schleimhaut, Muskelhaut und Faserhaut. Das Epithel gleicht vollkommen demjenigen des Nierenbeckens und des Ureter, eine Unterscheidung von diesen ist unmöglich. In der Tunica propria des Blasengrundes findet man verästelte, tubulöse Einzeldrüsen; auch Solitärknötchen sind in der Blasenschleimhaut vorhanden. Die Muskelschicht besteht aus glatten Muskelfaserlagen, einer inneren und einer äusseren Längslage, welche eine Ringlage zwischen sich fassen. Die Lagen sind derartig miteinander verflochten, dass eine strenge Abgrenzung derselben nicht möglich ist. Am Blasengrunde verstärkt sich die innere Längsmuskellage, die Ringmuskelschicht bildet den M. sphincter vesicae internus. Blut-

und Lymphgefässe verhalten sich wie am Ureter; die Nerven sind mit Einlagerungen kleiner Gruppen von Ganglienzellen versehen.

Die Harnröhre des Weibes besteht aus Schleimhaut und einer mächtigen Muskelhaut. Die *Tunica propria mucosae* wird durch ein feinfaseriges, mit Zellen reich untermischtes Bindegewebe hergestellt, das sich an der Oberfläche zu zahlreichen, an der äusseren Harnröhren-Mündung besonders wohl entwickelten Papillen erhebt. Das Epithel ist individuell verschieden, entweder ein geschichtetes Plattenepithel oder häufiger einschichtiges Cylinder-epithel; verästelte, tubulöse Einzeldrüsen sind nur in geringer Anzahl vorhanden. Kleine Gruppen solcher finden sich an der Harnröhrenmündung, sie werden „periurethrale“ Drüsen genannt. Die Muskelhaut besteht aus einer inneren Längs- und einer äusseren Kreislage glatter Muskelfasern, zwischen denen ein mit vielen elastischen Fasern vermischtes, derbes Bindegewebe sich ausbreitet. Die Schleimhaut ist reich an Blutgefässen.

Die Harnröhre des Mannes (besser der männliche *Sinus urogenitalis*) besteht wie die des Weibes aus Schleimhaut und Muskelhaut; jedoch gestaltet sich in den einzelnen Bezirken ihr Bau verschieden. In der *Pars prostatica* ist das Epithel ähnlich dem der Harnblase; es geht in der *Pars membranacea* allmählich in geschichtetes Cylinder-epithel über, welches sich endlich in der *Pars cavernosa* zu einem einfachen Cylinder-epithel umgestaltet. Von der *Fossa navicularis* an ist das Epithel geschichtetes Plattenepithel. Die an elastischen Fasern reiche *Tunica propria* trägt besonders in der *Fossa navicularis* wohl entwickelte Papillen. Verästelte, tubulöse Einzeldrüsen („Littre'sche Drüsen“) finden sich vereinzelt in der ganzen Harnröhre. Die Muskelhaut besteht in der *Pars prostatica* innen aus einer glatten Längs- und aussen aus einer eben solchen Ringfaserschicht. Beide sind noch in der *Pars membranacea* gut ausgebildet, hören aber in der *Pars cavernosa* allmählich auf, indem zuerst die im *Bulbus urethrae* noch ansehnliche Ringfaserlage ganz verschwindet; in den vorderen Partien der *Pars cavernosa* finden sich nur einige schräg- und längsverlaufende Bündel. Fig. 159. Die Schleimhaut der männlichen Harnröhre ist reich an Blutgefässen (s. *Corp. cavernos. urethrae* pag. 210). Die Lymphgefässe liegen unter den Blutgefässen.

TECHNIK.

Nr. 124. Harnkanälchen isolirt. Am besten eignen sich Nieren junger Thiere, z. B. neugeborener Katzen. Die Niere wird halbirt, die eine Hälfte a) zur frischen Untersuchung zurückgestellt, b) die andere in mehrere, Rinden- und Marksubstanz umfassende Stückchen zerschnitten und in ca. 30 cem reine Salzsäure eingelegt.

ad a) Erbsengrosse Stückchen werden in einem Tropfen der 0,75%igen Kochsalzlösung zerzupft; man sieht bei schwacher Vergrösserung die rothen Glomeruli, die gewundenen und geraden Harnkanälchen; die *Tubul. contorti* sind dunkel, körnig, die anderen Abtheilungen hell. Bei starker Vergrösse-

nung sieht man deutlich die Kerne der hellen Abschnitte der Harnkanälchen, die Zellengrenzen sind am besten in den Sammelröhrchen erkennbar. In den Tubul. contort. sieht man nur die feine Strichelung der Basen der Drüsenzellen; Zellengrenzen und Kerne dagegen sind nicht sichtbar.

ad b) Nach ca. 2 Stunden werden die roth aussehenden Nierenstückchen in eine Schale mit ca. 50 ccm destillirtem Wasser gebracht, woselbst sie rasch schmutzig grau werden, mit schmieriger Oberfläche. Wasser wechseln! Nach wenigen Minuten kann man mit Nadeln kleine Stücke ablösen, die sich leicht in Wasser auf dem Objektträger in Kanälchen auflösen lassen. Will man Harnkanälchen in grösserem Zusammenhange erhalten, so übertrage man ein ca. 2 mm grosses Nierenstückchen in ein Uhrschildchen, in welches man ein grosses Deckglas und so viel destillirtes Wasser gebracht hat, dass dieses das Deckgläschen oben überspült. Nun sucht man mit Nadeln die Kanälchen zu isoliren. In der Isolation gelungen — man kann sich davon mit Lupe oder schwacher Vergrösserung überzeugen — so saugt man vorsichtig mit einer Pipette oder mit Filtrirpapier das Wasser aus dem Uhrschildchen und zuletzt vom Deckgläschen, nimmt dieses heraus, reinigt dessen freie Fläche und setzt es mit den anhaftenden Harnkanälchen leise auf einen Objektträger, auf welchen man vorher einen Tropfen verdünntes Glycerin gebracht hat. Man kann nachher mit Pikrokarmin unter dem Deckglase färben (pag. 26). (Fig. 144).

Nr. 125. Rinden- und Marksubstanz. Zu Schnitten kann man die andere Katzeniere, oder andere Nierenstücke von 2—3 cm Seite in 200 bis 300 ccm Müller'scher Flüssigkeit fixiren und nach 4 Wochen in ca. 100 ccm allmählich verstärktem Alkohol härten (pag. 14). Dicke Quer- und Längsschnitte durch Rinden- und ebensolche durch Marksubstanz betrachte man ungefärbt in verdünntem Glycerin mit Lupe und schwachen Vergrösserungen. Feine Schnitte *a*) quer durch die Spitze der Papille für Ductus papillares¹⁾, *b*) quer durch die Basis der Papille (Fig. 149), *c*) durch die Rindensubstanz werden mit Böhmer'schem Haematoxylin gefärbt (pag. 17) und in Damarfirniss (pag. 23) eingeschlossen.

Geübtere wollen versuchen, grosse, dicke Schnitte, welche Rinde und Mark zusammen treffen, anzufertigen, also von der Grenze zwischen Mark und Rinde (Fig. 145), die gleichfalls ungefärbt in Glycerin unter schwachen Vergrösserungen gute Uebersichtsbilder gewähren. Oft sind die Blutgefässe noch mit Blutkörperchen gefüllt und lassen sich auf weite Strecken übersehen.

Nr. 126. Markstrahlen und Henle'sche Schleifen sind besonders schön an gefärbten, senkrechten Schnitten von Nieren junger Thiere (Methode Nr. 125) zu sehen.

Nr. 127. Zum Studium des Glomerulus und der Bowman'schen Kapsel, sowie des Zusammenhanges der letzteren mit dem Harnkanälchen ist die Niere der Maus am besten geeignet. Man fixire und härte die halbirte Niere in 15 ccm absolutem Alkohol, der nach einigen Stunden gewechselt wird. Nach drei Tagen oder später werden feine Schnitte der Rinde angefertigt, die 2—3 Minuten in Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17) gefärbt und in Damarfirniss eingeschlossen werden (Fig. 147). Das innere Blatt der Kapsel ist wegen der gleichfalls gefärbten Kerne der Gefässwände nicht zu unterscheiden.

¹⁾ Fixirung mit absolutem Alkohol (nach Nr. 127) ist hierfür noch mehr zu empfehlen.

Nr. 128. Nierengefässe. Man kann eine Niere isolirt injiziren (pag. 13), in ca. 300 cem Müller'scher Flüssigkeit (pag. 21) fixiren und nach 4 Wochen in ca. 150 cem allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14) härten. Makroskopisch sind die Stellulae Verheyinii zu beobachten. Ungefärbte dicke Längs- und Querschnitte sind mit Lupe (s. pag. 29) und schwachen Vergrösserungen zu studiren (Fig. 150).

Nr. 129. Nierenbecken und Ureter. Von ersterem sind ca. 1 qcm grosse, von letzterem 1—2 cm lange Stücke in 100 cem Müller'scher Flüssigkeit zu fixiren und nach ca. 14 Tagen in ca. 100 cem allmählich verstärktem Alkohol zu härten (pag. 14); Schnitte sind mit Böhmer'schem Haematoxylin zu färben (pag. 17) und in Damarfirniss (pag. 23) aufzuheben (Fig. 151).

Nr. 130. Blase wie Nr. 129.

Nr. 131. Epithelzellen des Nierenbeckens, des Ureter und der Blase. Von jedem dieser Theile ist ein ca. 1 qcm grosses Stückchen (Ureter aufschneiden) in ca. 30 cem Ranvier'schen Alkohol einzulegen. Isolation und Färbung mit Pikrokarmine (pag. 11). Konserviren in verdünntem, angesäuertem Glycerin (pag. 26).

Nr. 132. Weibliche Harnröhre. Man schneide ein ca. 2 cm langes Stück der weiblichen Harnröhre zusammen mit der anhängenden vorderen Vaginalwand aus, fixire dasselbe in 100—200 cem Müller'scher Flüssigkeit und härte es nach 2—3 Wochen in ca. 100 cem allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14). Querschnitte färben mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17) und konserviren in Damarfirniss (pag. 23).

Nr. 133. Männliche Harnröhre. 1—3 cm lange Stücke der Pars prostatica, Pars membranacea, Pars cavernosa und der Fossa navicularis behandeln wie Nr. 132. Man verwechsle Querschnitte der Morgagni'schen Lacunen (d. s. blinde Ausbuchtungen der Harnröhrenschleimhaut) nicht mit Drüsendurchschnitten.

VIII. Geschlechtsorgane.

A. Die männlichen Geschlechtsorgane.

Die Hoden.

Die Hoden (Testes) sind aus verästelten schlauchförmigen Kanälchen, den Hodenkanälchen (Samenkanälchen), bestehende Drüsen, welche von einer bindegewebigen Hülle umgeben werden. Diese Hülle, die Tunica albuginea s. fibrosa (Fig. 153) ist eine derbe Haut, welche das Hodenparenchym rings einschliesst und hinten oben einen dickeren, in das Innere des Hodens vorspringenden Wulst, das Corpus Highmori, entwickelt. Von diesem entstehen eine Anzahl Blätter, die Septula testis, welche divergirend gegen die Tunica albuginea ziehen und so das Hodenparenchym in pyramidale Läppchen abtheilen, deren Basis gegen die Tunica albuginea, deren Spitze gegen das Corpus Highmori gerichtet ist. Die Tunica albuginea besteht aus strafffaserigem Bindegewebe, welches an seiner freien Oberfläche

von einer einfachen Lage platter Epithelzellen¹⁾ überzogen wird, nach innen aber an eine lockere Bindegewebslage stösst; diese ist die Trägerin vieler Gefässe und heisst *Tunica vasculosa*; sie hängt mit den *Septula testis* zusammen. Das aus derbem Bindegewebe aufgebaute *Corpus Highmori* schliesst ein aus vielfach mit einander anastomosirenden Kanälen gebildetes Netzwerk, das *Rete testis* (*Rete vasculosum Halleri*) in sich. Die *Septula testis* bestehen aus Bindegewebsbündeln, welche mit dem die einzelnen Hodenkanälchen umstrickenden Bindegewebe zusammenhängen. Dieses „interstitielle“ Bindegewebe ist reich an zelligen Elementen, die theils in Form platter Bindegewebszellen, theils als rundliche, Pigment- oder Fettkörnchen führende Zellen (sog. „Zwischenzellen“) auftreten.

Fig. 153.

Querschnitt des Hodens eines neugeborenen Knaben, 10mal vergrössert. Technik Nr. 134, pag. 218.

Die Hodenkanälchen lassen während ihres Verlaufes drei Abschnitte unterscheiden: sie beginnen 1. als *Tubuli contorti*, werden dann 2. zu *Tubuli recti*, welche sich 3. in das *Rete testis* fortsetzen. Die *Tubuli contorti* sind drehrunde, ca. 140 μ dicke Röhrchen, über deren Anfang man noch nicht hinreichend orientirt ist; wahrscheinlich hängen sie an der Peripherie unter

¹⁾ D. i. das viscerele Blatt der *Tunica vaginalis propria*.

der Tunica vasculosa mit einander vielfach zusammen und bilden so ein Netzwerk¹⁾, aus welchem zahlreiche Kanälchen abbiegen und unter vielfachen Windungen gegen das Corpus Highmori ziehen. Während dieses Verlaufes tritt eine Verminderung der Zahl der Kanälchen ein, indem dieselben fortgesetzt unter spitzem Winkel sich miteinander vereinigen. Nicht weit vom Corpus Highmori entfernt gehen die gewundenen Kanälchen in die Tubuli recti über (Fig. 153), welche bedeutend verschmälert, 20—25 μ dick, nach kurzem Verlaufe in das Corpus Highmori eindringen und hier das Rete testis bilden, dessen Kanäle 24—180 μ messen.

Die Wandung der Tubuli contorti besteht von aussen nach innen gezählt 1. aus einer mehrfachen Lage platter Bindegewebszellen, 2. einer feinen Membrana propria, 3. aus einem geschichteten Epithel, dessen Aussehen in den einzelnen Abschnitten der Kanälchen ein sehr verschiedenes ist.

Fig. 154.

Aus einem Querschnitte eines Stierhodens, 50mal vergrössert. Das Epithel hat sich durch Fixirung und Härtung etwas zurückgezogen, so dass zwischen ihm und dem interstitiellen Bindegewebe Lücken entstanden sind. Technik Nr. 135, pag. 218.

Entweder befindet sich das Epithel im Zustande der Ruhe, dann erscheinen die Kanälchen ausgekleidet von einer mehrfachen Schicht rundlicher Zellen, deren Kerne bald mehr, bald minder intensiv sich färben (Fig. 154). Oder das Epithel zeigt Zustände der Thätigkeit, d. h. eine Reihe von Bildern, die sich auf die Samenbildung, die Spermatogenese, beziehen. Die der Membrana propria zunächst liegende „Wandschicht“ von Epithelzellen besteht aus zwei Arten; die eine — die Sertoli'schen Zellen (Fig. 155) haben mit der Erzeugung der Samenfäden direkt nichts zu thun; die andern dagegen, die Spermatogonien (Stammzellen) sind die eigentlichen Samenbildner. Sie vermehren sich durch indirekte Theilung und wachsen zu grossen Zellen heran, die in der nächstinneren Schicht liegen. Das sind die Mutterzellen, welche durch zweimalige Theilung je vier in den weiter centralwärts befindlichen Schichten gelegene Zellen, die Spermatiden (Samenzellen) hervorgehen lassen. Letztere werden nun zu Samenfäden („Sperma-

¹⁾ Auch blinde Enden der Samenkanälchen sind beobachtet worden.

tosomen“), indem der Kern jeder Spermatide zum Kopfe, ein kleiner Theil des Protoplasma zum Schwanze des Samenfadens wird. Während dieser Vorgänge hat sich eine grössere Anzahl von Spermatiden mit je einer unterdessen centralwärts in die Länge gewachsenen Sertoli'schen Zelle¹⁾ verbunden; durch diese „Copulation“ empfangen die Spermatiden höchst wahrscheinlich Ernährungsmaterial.

Fig. 155.

Durchschnitte von Hodenkanälchen einer Maus, 360mal vergrössert. Man beachte, wie die anfangs runden Kerne der Spermatiden (links unten) oval werden (oben) und sich zu Sameufädenköpfen umbilden (rechts unten). Technik Nr. 137, pag. 218.

Die Wandung der Tubuli recti besteht aus einer Membrana propria und nach Innen von dieser aus einer einfachen Lage niedriger Cylinderzellen.

Die Kanäle des Rete testis werden von einer einfachen Lage kubischer oder platter Epithelzellen ausgekleidet.

Die Arterien des Hodens sind Aeste der A. spermatica interna, welche theils vom Corpus Highmori, theils von der Tunica vasculosa in die Septula testis eindringen und sich von hier aus in ein die Hodenkanälchen umspinnendes Kapillarnetz auflösen. Die daraus entspringenden Venen verlaufen mit

1) Dadurch entsteht der „Spermatoblast“ der Autoren s. Technik Nr. 137, p. 218.

den Arterien. Die Lymphgefäße bilden ein unter der Tunica albuginea gelegenes Netzwerk, welches mit den die Samenkanälchen umstrickenden Lymphkapillaren in Zusammenhang steht. Ueber die Nerven ist nichts Näheres bekannt.

Der Samen.

Das Sekret der Hoden, der Samen (Sperma) besteht fast allein aus den Samenfäden (Spermatozoa, Spermiosomen), stecknadelnähnlichen Gebilden, an denen wir Kopf und Schwanz unterscheiden (Fig. 156). Beim Menschen ist der Kopf 3—5 μ lang, 2—3 μ breit, abgeplattet, von der Seite gesehen birnförmig, das spitze Ende nach vorn gerichtet, von der Fläche gesehen dagegen oval, vorn abgerundet. Der Schwanz zeigt bei sehr starken Vergrößerungen einen seine ganze Länge durchsetzenden Faden, den

Fig. 156.

1. 2. 3. Samenfäden des Menschen, 360mal vergr. 1. Von der Fläche, 2. von der Kante gesehen. 3. Oesenartig eingerollter Samenfaden. 4. Samenfaden des Stieres, a Kopf, b Verbindungsstück, c Hauptstück. Das Endstück, sowie die Grenzen dieser Theile sind bei dieser Vergrößerung noch nicht wahrzunehmen.
Technik Nr. 133, pag. 218.

Achsenfaden, der aus feinen Fibrillen zusammengesetzt ist. Man unterscheidet am Schwanze verschiedene Abschnitte: zunächst dem Kopfe liegt das drehrunde Verbindungsstück („Mittelstück“), welches 6 μ lang und kaum 1 μ breit ist; dann folgt das 40—60 μ lange, sich nach hinten allmählich verschmälernde Hauptstück. Die Spitze des Schwanzes, das Endstück, wird durch den etwa 10 μ frei hervorragenden Achsenfaden gebildet¹⁾. Die Samenfäden sind (wahrscheinlich wegen ihres Kalkgehaltes) durch ihre grosse Widerstandsfähigkeit ausgezeichnet. Die schlängelnden Bewegungen der Samenfäden kommen nur dem Schwanze zu, welcher den Kopf vor sich her schiebt; sie fehlen meist im reinen Sekret des Hodens und stellen sich erst ein bei Verdünnung des Samens, wie es bei der Entleerung auf natürlichem Wege durch Beimengung des Sekretes der Samen-

leiterampullen, der Samenbläschen, der Prostata und der Cowper'schen Drüsen geschieht. In dieser Flüssigkeitsmischung erhält sich die Bewegung selbst noch einige Zeit nach dem Tode (24—48 Stunden), wie auch längere Zeit im Sekrete der weiblichen Genitalien. Wasser sistirt die Bewegung, welche jedoch durch Zusatz mässig konzentrierter, alkalisch reagirender thierischer Flüssigkeiten auf's Neue angefacht werden kann; überhaupt sind die genannten Flüssigkeiten, ferner 1%ige Kochsalzlösung, den Bewegungen der

¹⁾ Auf die verschiedenen Formen der Thiersamenfäden kann hier nicht eingegangen werden. Ein bei Vögeln und geschwänzten Amphibien zuerst entdeckter Spiralfaden, der durch eine glashelle Membran mit dem Achsenfaden verbunden ist, ist zwar auch bei einzelnen Säugethieren, z. B. bei der Ratte, gefunden worden, konnte aber beim Menschen bis jetzt noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden.

Samenfäden günstig, während Säuren und Metallsalze die Bewegung aufheben. Bewegungslose Samenfäden sind häufig ösenartig eingerollt (Fig. 156, 3).

Die ableitenden Samenwege.

Die ableitenden Samenwege werden gebildet durch den Nebenhoden (Epididymis), den Samenleiter (Vas deferens), das Samenbläschen und den Ductus ejaculatorius¹⁾. Aus dem oberen Ende des Rete testis treten etwa

Fig. 157.

Querschnitt des Vas epididymidis vom Menschen, 80mal vergrößert. Technik Nr. 141, pag. 219.

15 Vasa efferentia testis hervor, die immer stärker sich schlängelnd ebenso viele konische Läppchen, Coni vasculosi, bilden. Die Summe der Coni stellt den Kopf des Nebenhodens dar. Aus der Vereinigung der Vasa efferentia geht das Vas epididymidis hervor, welches, vielfach gewunden, Körper und Schwanz des Nebenhodens bildet und sich in das Vas deferens fortsetzt.

Die Vasa efferentia bestehen zu Innerst aus einem geschichteten cylindrischen Flimmerepithel, dem eine streifige Membrana propria und eine aus mehreren Lagen glatter Muskeln gebildete Ringfaserlage aufliegt. Ebenso ist das Vas epididymidis beschaffen, dessen Windungen durch lockeres, blutgefäßreiches Bindegewebe zusammengehalten werden; gegen den Samenleiter zu verdickt sich die Ringmuskellage. Der Samenleiter besteht aus einem nicht flimmernden Cylinderepithel (Fig. 158), einer in Tunica propria und Submucosa geschiedenen Bindegewebslage, ferner aus einer inneren Ringlage und einer äusseren Längslage glatter Muskelfasern. Im Anfangstheile des Samenleiters findet sich in der Submucosa auch eine dünne Schicht longitudinaler glatter Muskelfasern. Der Endtheil des Samenleiters schwillt zur Ampulla an,

Fig. 158.

Querschnitt des Anfangstheiles des Samenleiters vom Menschen, 20mal vergrößert. Die querdurchschnittenen Längsmuskeln der Submucosa sind als kleine Ringe und Punkte zu sehen. Technik Nr. 141, pag. 219.

findet sich in der Submucosa auch eine dünne Schicht longitudinaler glatter Muskelfasern. Der Endtheil des Samenleiters schwillt zur Ampulla an,

¹⁾ Tubuli recti und Rete testis gehören auch zu den ableitenden Samenwegen, sind aber wegen des innigen Anschlusses an die Drüse mit dieser beschrieben worden.

deren Wandungen nur dünner sind, sonst aber einen ähnlichen Bau zeigen. In der Schleimhaut der Ampulle finden sich verzweigte Drüsenschläuche; das aus Cylinderzellen bestehende Epithel enthält zahlreiche Pigmentkörnchen. Ebenso sind die Samenblasen gebaut. Die Ductus ejaculatorii bestehen aus einer einfachen Lage Cylinderepithels und dünnen, inneren cirkulären und äusseren longitudinalen Lagen glatter Muskelfasern.

Das zwischen den Elementen des Samenstranges gelegene Organ von Giralddès (Paradidymis) ist ebenso wie das Vas aberrans Halleri ein Rest der (embryonalen) Urniere. Beide bestehen aus einem mit kubischem Flimmerepithel ausgekleideten Kanälchen, welches von blutgefässhaltigem Bindegewebe umhüllt wird. Die „ungestielte Hydatide“ (Morgagni'sche H.) ist ein mit einem kurzen Stiele versehenes, aus gefässreichem Bindegewebe aufgebautes, solides Lämpchen, welches von flimmerndem Cylinderepithel überzogen wird. Der Stiel enthält ein mit Cylinderepithel ausgekleidetes Kanälchen. Die inkonstante gestielte Hydatide ist ein mit kubischen Zellen ausgekleidetes, klare Flüssigkeit enthaltendes Bläschen. Beide Hydatiden sind aus dem oberen Ende des beim Weibe zur Tube werdenden (embryonalen) Müller'schen Ganges entstanden.

Anhangsdrüsen der männlichen Geschlechtsorgane.

Die Prostata besteht zum kleineren Theile aus Drüsensubstanz, zum grösseren Theile aus glatten Muskelfasern. Die Drüsensubstanz setzt sich zusammen aus 30—50 verästelten tubulösen serösen Einzeldrüsen, welche durch ihren lockeren Bau ausgezeichnet sind. Die Drüsen münden mit zwei grösseren und einer Anzahl kleinerer Ausführungsgänge in die Harnröhre. Die Drüsenzellen sind niedrige Cylinderzellen, welche in einfacher Lage die Röhrchen auskleiden. In den grösseren Ausführungsgängen ist Uebergangsepithel (pag. 199), wie in der Pars prostatica urethrae, vorhanden. In den Endstücken finden sich bei älteren Leuten die sog. Prostatasteine, runde, bis 0,7 mm grosse, geschichtete Sekretklumpen. Die glatten Muskelfasern, welche überall in grosser Menge zwischen den Drüsenläppchen gelegen sind, verdicken sich gegen die Harnröhre zu einer stärkeren Ringmuskellage (M. sphincter vesicae intern.); auch an der äusseren Oberfläche der Prostata finden sich reichlich glatte Muskelfasern, die an Bündel quergestreifter Muskelfasern (M. sphincter vesicae extern., d. i. ein Theil des M. transversus perin. prof.) angrenzen. Die Prostata ist mit vielen Blutgefässen versehen; über Nerven ist nichts Näheres bekannt.

Die Cowper'schen Drüsen sind tubulöse zusammengesetzte Drüsen, deren weite Röhrchen mit einer einfachen Schicht heller Cylinderzellen, deren Ausführungsgänge mit 2—3 Schichten kubischer Zellen ausgekleidet sind.

Der Penis.

Der Penis besteht aus drei cylindrischen Schwellkörpern: den beiden Corpora cavernosa penis und dem Corpus cavernosum urethrae, welche von Fascie und Haut eingehüllt werden.

Jedes Corpus cavernosum penis besteht aus einer Tunica albuginea und einem Schwammgewebe. Die Tunica albuginea ist eine feste, durchschnittlich 1 mm dicke, bindegewebige, mit vielen feinen elastischen Fasern untermischte Haut, an der eine äussere Längslage und eine innere Ringlage zu unterscheiden ist. Das Schwammgewebe wird durch Bündel glatter Muskelfasern enthaltende Bindegewebstrahlen und -blätter hergestellt,

Fig. 159.

Stück eines Querschnittes der Pars cavernosa urethrae des Menschen, 20mal vergr. *i* Littre'sche Drüsen (pag. 201). Der unterste Strich deutet auf den Drüsenkörper, die oberen auf Stücke des Ausführungsganges. *g* Blutgefässe. *m* Querschnitt von Längsmuskelfasern. *r* Oberflächliches Rindennetz. Technik Nr. 133, pag. 203.

die vielfach mit einander zusammenhängend ein Netzwerk bilden, dessen Lücken mit einer einfachen Lage platter Epithelzellen ausgekleidet werden. Diese Lücken sind mit venösem Blute erfüllt. Die dickwandigen Arterien gehen theils in Kapillaren über, theils münden sie direkt in das tiefere Rindennetz. Die Kapillaren bilden ein unter der Tunica albuginea gelegenes Netz, das oberflächliche (feine) Rindennetz, welches mit einem mehrschichtigen Netze weiterer venöser Gefässe, dem tiefen (groben) Rindennetze, zusammenhängt. Letzteres ist in den oberflächlichen Schichten des Schwammgewebes gelegen und geht allmählich in die venösen Räume des Schwammgewebes über. Die sogen. Rankenarterien (*A. helicinae*) sind in dünnen Bindegewebssträngen gelagerte

Aestchen, welche bei kollabirtem Gliede schlingenförmig umgebogen sind und bei unvollkommener Injektion blind zu endigen scheinen. Die das Blut aus den Corpora cavernosa penis zurückführenden Venen (*Venae emissariae*) entstehen theils aus dem groben Rindennetze, theils aus der Tiefe des Schwammgewebes. Sie münden, nachdem sie die Tunica albuginea durchbohrt haben, in die *Vena dorsalis penis*.

Das Corpus cavernosum urethrae besteht aus zwei differenten Abschnitten; die centrale Partie wird durch ein Netz der ansehnlich entwickelten Venen der Submucosa der Harnröhrenschleimhaut gebildet; die peripherische Partie gleicht im Baue dem Corpus cavernosum penis, nur fehlt hier eine direkte Kommunikation der Arterien mit den Venenräumen. Die Glans penis

besteht nur aus vielfach gewundenen Venen, die durch ein sehr ansehnlich entwickeltes Bindegewebe, dem Träger der feinen Arterien, sowie der Kapillaren zusammengehalten werden.

B. Die weiblichen Geschlechtsorgane.

Die Eierstöcke.

Die Eierstöcke bestehen aus Bindegewebe und Drüsensubstanz. Das derbe Bindegewebe, Stroma ovarii, ist in verschiedenen Schichten angeordnet; zu äusserst liegt 1. die Tunica albuginea (Fig. 160), eine aus zwei oder mehr in sich kreuzenden Richtungen verlaufenden Bindegewebslamellen zusammengesetzte Bildung, welche ganz allmählich 2. in die Rindensubstanz (Fig. 160) übergeht; diese schliesst die Drüsensub-

Fig. 160.

Querschnitt des Ovarium eines 8 Jahre alten Mädchens, 10 mal vergrössert. Tunica albuginea noch schwach entwickelt. Technik Nr. 143, pag. 219.

stanz in sich und hängt 3. mit der Marsubstanz zusammen, welche die Trägerin zahlreicher, geschlängelter, von Zügen glatter Muskelfasern begleiteter Gefässe ist. Die Drüsensubstanz wird gebildet durch zahlreiche (beim Menschen ca. 36,000) kugelige Epithelsäckchen, die Eifollikel, deren jedes ein Ei einschliesst. Die meisten Follikel sind mikroskopisch klein ($40\ \mu$) und bilden in den äusseren Schichten der Rindensubstanz liegend eine bogenförmige Zone (Fig. 160), die nur am Hilus des Eierstockes, der Eintrittsstelle der Gefässe, fehlt. Die grösseren Follikel liegen etwas tiefer. Die grössten, mit unbewaffnetem Auge leicht wahrnehmbaren Follikel reichen im höchsten Grade der Ausbildung von der Marsubstanz bis zur Tunica albuginea. Die Oberfläche des Eierstockes ist vom Keimepithel, d. i. einer einfachen Lage sehr kleiner, kurzcyklindrischer Zellen überzogen.

Nur die erste Entwicklung der Eier vollzieht sich in embryonaler Zeit; die weitere Ausbildung der Eier bis zur vollendeten Reife ist in jedem zeugungsfähigen Ovarium in allen Stadien zu beobachten. In der Foetalperiode und selbst noch nach der Geburt findet man zwischen den Cylinderzellen des Keimepithels grössere mit Kern und Kernkörperchen versehene, rundliche Zellen, die Primordialeier (Ureier, Fig. 161), die durch besondere Aus-

Fig. 161.

Aus einem senkrechten Durchschnitte des Eierstockes eines vier Wochen alten Mädchens, 240mal vergr. Das Primordialei hat einen grossen Kern mit Kernkörperchen. Der Eiballen enthält drei Eier, umgeben von Cylinderzellen. Technik Nr. 143, pag. 219.

derzellen umgiebt und sich von den übrigen Eiern abschnürt, entsteht ein kugeligter Körper, der Primärfollikel, der somit aus dem Ei und den dieses einschliessenden Epithelzellen, dem sog. Follikelepithel, besteht. Soweit sind es vorzugsweise foetale Vorgänge. Nun werden die Follikelepithelzellen erst höher (Fig. 162, 2), dann mehrschichtig, das Ei wird grösser, gewinnt eine excentrische Lage und erhält eine allmählich sich verdickende

Fig. 162.

Aus einem Durchschnitte durch die Rinde eines Kanincheneierstockes, 90mal vergr. 1. Primärfollikel, 2. Follikel mit einschichtigem Cylinder-epithel. Technik Nr. 143, pag. 219.

fein radiär gestreifte Randschicht, die Zona pellucida (Oolemma). Mit der Vergrösserung des Eies vollzieht sich auch eine Sonderung seines Protoplasma; der grösste Theil desselben verwandelt sich in eine krümeliche Masse, das Deutoplasma, von dem ursprünglichen Protoplasma, dem „Eiprotoplasma“, bleibt nur eine um den excentrisch gelegenen Kern befindliche Zone, sowie eine die Oberfläche des Eies überziehende schmale Schicht erhalten. Deutoplasma und Eiprotoplasma nennen wir zusammen Dotter, den Kern Keimbläschen (Vesicula germinativa), das Kernkörperchen Keimfleck (Macula germinativa). An letzterem sind amoeboiden Bewegungen beobachtet worden. Zwischen Dotter und Zona pellucida befindet sich ein schmaler $1,3 \mu$ breiter Spalt, der perivitelline Spaltraum.

Nun wächst der Follikel weiter; unter fortwährender Vermehrung der Follikelepithelzellen entsteht zwischen ihnen eine Lücke, die von einer

bildung einzelner Zellen des Keimepithels entstanden sind. Im Verlaufe der Entwicklung wachsen Gruppen von Cylinderzellen, welche mehrere Primordialeier einschliessen, in das Ovarialstroma hinein. Diese Gruppen heissen Eiballen (Eischläuche). Indem sich nun jedes Ei mit den kleinen Cylind-

derzellen umgiebt und sich von den übrigen Eiern abschnürt, entsteht ein kugeligter Körper, der Primärfollikel, der somit aus dem Ei und den dieses einschliessenden Epithelzellen, dem sog. Follikelepithel, besteht. Soweit sind es vorzugsweise foetale Vorgänge. Nun werden die Follikelepithelzellen erst höher (Fig. 162, 2), dann mehrschichtig, das Ei wird grösser, gewinnt eine excentrische Lage und erhält eine allmählich sich verdickende

wässrigen Flüssigkeit, dem Liquor folliculi, ausgefüllt wird. Der Liquor ist theils ein Transsudat aus den den Follikel umspinnenden Blutgefässen, theils ist er durch Verflüssigung einzelner Follikelepithelzellen entstanden; er erfährt eine immer fortschreitende Vermehrung, so dass der Follikel bald ein mit Flüssigkeit erfülltes Bläschen, den Graaf'schen Follikel, dessen Durchmesser 0,5—12 mm beträgt, darstellt. Um grössere Follikel ordnet sich das Bindegewebe des Stroma zu kreisförmigen Zügen, die wir Theca folliculi (Fig. 162) nennen. Der Graaf'sche Follikel besteht somit 1. aus einer bindegewebigen Hülle, der Theca folliculi, welche zwei Schichten, a) eine äussere, faserige Tunica fibrosa (Fig. 163) und b) eine

Fig. 163.

Durchschnitt eines Graaf'schen Follikels eines 8jährigen Mädchens, 90mal vergr. Der helle Raum in der Mitte enthielt den Liquor folliculi. Technik Nr. 143, pag. 219.

innere, an Zellen und Blutgefässen reiche Tunica propria unterscheiden lässt; 2. aus dem mehrschichtigen Follikelepithel, das sich beim Zerzupfen frischer Follikel in grossen Fetzen darstellen lässt und seit langer Zeit als Membrana granulosa bekannt ist. Eine verdickte Stelle des Follikelepithels, der Cumulus ovigerus (Discus proligerus), schliesst das Ei ein; die der Zona pellucida zunächst liegenden Epithelzellen sind radiär zum Ei gestellt und bilden die Corona radiata (Fig. 164). Der grösste Theil des Binnenraumes des Follikels wird vom Liquor folliculi eingenommen.

Hat der Graaf'sche Follikel seine völlige Reife erreicht, so platzt er an der der Eierstockoberfläche zugekehrten Seite, die schon vorher durch Vorwölbung und starke Verdünnung kenntlich war; das Ei gelangt in die

Beckenhöhle, der leere Follikel bildet sich zum gelben Körper (Corpus luteum) zurück. Erfolgt keine Befruchtung des ausgestossenen Eies, so verschwindet das Corpus luteum nach wenigen Wochen; wir nennen solche Gebilde falsche gelbe Körper; tritt dagegen Schwangerschaft ein, so entwickelt sich der geborstene Follikel zum wahren gelben Körper, der einen Durchmesser von ca. 1 cm besitzt und sich Jahre lang erhält. Er besteht anfangs aus einer Faserhaut (der ehemaligen Tunica fibrosa) und aus einer gelben Masse, die vorzugsweise durch Wucherung der Zellen der Tunica

Fig. 164.

Ei aus einem Graaf'schen Follikel der Kuh. A 50 mal, B 240 mal vergrössert. Die Streifung der Zona und der perivitelline Spaltraum sind hier nicht zu sehen. Technik Nr. 144, pag. 220.

propria, sowie durch die Reste des verfetteten Follikelepithels entstanden ist und in ihrem Centrum eine mit Blut gefüllte Höhle enthält. Das Blut stammt aus den zerrissenen Gefässen der Tunica propria. Späterhin wird ein Theil der Zellen zu jungem Bindegewebe, das Centrum enttärbt sich und an Stelle des Blutes tritt eine krümelige, zuweilen Haematoidinkrystalle (pag. 81) enthaltende Masse.

Nicht alle Primärfollikel entwickeln sich bis zu völliger Reife. Ein Theil bildet sich zurück; auch Rückbildung grösserer Follikel kommt vor¹⁾.

Die Arterien des Eierstockes, Aeste der A. spermatica intern. und der A. uterina, treten am Hilus ein, theilen sich in der Marksubstanz und sind durch ihren geschlängelten Verlauf charakterisirt (Fig. 160). Von da verlaufen sie in die Rindensubstanz, wo sie vorzugsweise in der Tunica propria der Follikel ausgebreitete Kapillarnetze speisen. Die Venen bilden

¹⁾ Dieser Prozess vollzieht sich in der Weise, dass zuerst das Ei abstirbt und dann Zellen, theils Elemente der Membrana granulosa, theils Leukocyten, in das Ei einwandern und die Stoffe desselben aufnehmen und erweichen. Die eingewanderten Zellen gehen nach vollzogener Auflösung und Resorption des Dottermaterials zu Grunde.

am Hilus ovarii einen dichten Plexus. Die zahlreichen Lymphgefässe lassen sich bis zur Tunica propria der Follikel verfolgen. Marklose und markhaltige Nerven treten in grosser Zahl mit den Blutgefässen vom Hilus aus in die Marksubstanz, woselbst sie grösstentheils in der Wand der Blutgefässe enden. Ein kleiner Theil geht bis zur Rindenschicht; dieser bildet dort ein dichtes Geflecht feiner, meist markloser Fasern, welches die Follikel umspinnt und feine Aestchen theils zur Wand der Blutgefässe, theils (bei der Katze) zwischen das Epithel der grösseren Follikel entsendet.

Das Epoophoron (Parovarium) und das Paroophoron sind Reste embryonaler Bildungen. Ersteres, im lateralen Abschnitte des Fledermausflügels am (beim Thiere im) Hilus ovarii gelegen, besteht aus blind endigenden, geschlängelten Kanälchen, die mit flimmernden Cyliinderepithelzellen ausgekleidet sind. Das Epoophoron ist ein Rest des Sexualtheiles des Wolff'schen Körpers. Das Paroophoron liegt im medialen Abschnitte des Fledermausflügels und besteht aus verästelten, mit Cylinderzellen ausgekleideten Kanälchen; es stellt einen Rest des Uterientheiles des Wolff'schen Körpers dar.

Eileiter und Uterus.

Die Wandung des Eileiters, der Tuba Fallopieae, besteht aus drei Häuten: 1. einer Schleimhaut, 2. einer Muskelhaut und 3. einem serösen Ueberzuge. Die Schleimhaut ist in zahlreiche Längsfalten gelegt, so dass der Querschnitt des Eileiterlumens ein sternförmiger ist. Am höchsten sind die Falten in der Eileiterampulle, woselbst dieselben auch durch schräge kleine Falten unter einander verbunden sind. Die dicke Schleimhaut besteht a) aus einer einfachen Schicht flimmernden Cyliinderepithels; der Flimmerstrom ist gegen den Uterus gerichtet, b) aus einer an Binde-substanzzellen reichen Tunica propria, c) aus einer sehr dünnen Muscularis mucosae: glatten längs verlaufenden Muskelfasern und d) aus einer Submucosa, welche durch eine dünne Lage fibrillären Bindegewebes gebildet wird. Die Muskelhaut besteht aus einer inneren dickeren Lage cirkulärer und einer äusseren, nur dünnen Lage longitudinaler glatter Muskelfasern. Der seröse Ueberzug wird durch eine ansehnliche Lage lockeren Bindegewebes und durch das Bauchfell gebildet. Die Blutgefässe sind besonders in der Schleimhaut reichlich vertreten, woselbst sie ein engmaschiges Kapillarnetz bilden. Die grösseren Venen verlaufen längs den Schleimhautfalten. Die Kenntniss des genaueren Verhaltens der Lymphgefässe und Nerven fehlt noch.

Die Wandung des Uterus besteht, wie diejenige des Eileiters, aus Schleimhaut, Muscularis und Serosa. (Fig. 165.) Die 1,5—2 mm dicke Schleimhaut trägt auf ihrer Oberfläche ein einschichtiges, flimmerndes, im Mittel 30 μ hohes Cyliinderepithel (a); der Flimmerstrom ist gegen die Cervix uteri gerichtet. Die Tunica propria (b) besteht aus feinfaserigem, zahlreiche Binde-substanzzellen und Leukoeyten, sowie eine geringe Menge

homogener Zwischensubstanz enthaltendem Gewebe und ist die Trägerin vieler einfacher, oder gabelig getheilter Drüsenschläuche (*c*), die aus einer zarten Mem-

Fig. 165.

Stück eines Querschnittes durch die Mitte des Uterus eines 15jährigen Mädchens, 10mal vergrößert. *a* Epithel, *b* Tunica propria, *c* Drüsen. 1. Stratum submucosum.

2. Str. vasculare, 3. Str. supravasculare.

Technik Nr. 147, pag. 220.

brana propria und einer einfachen Lage kurze Flimmerhaare tragender Cylinderzellen bestehen. Eine Submucosa fehlt; das Gewebe der Tunica propria geht unmerklich in das interstitielle Bindegewebe der Muscularis über. Diese besteht aus glatten Muskelfasern, welche, zu Bündeln vereint, in den verschiedensten Richtungen sich durchflechten, so dass eine scharfe Abgrenzung einzelner Lagen nicht möglich ist. Man kann im Allgemeinen drei Schichten unterscheiden: 1. eine innere, Stratum submucosum, aus längsverlaufenden Bündeln zusammengesetzte, 2. eine mittlere, die mächtigste, die vorwiegend aus cirkulären Muskelbündeln besteht und weite Venen enthält

(daher „Stratum vasculare“) und 3. eine äussere, theils von cirkulär, theils von längs verlaufenden Bündeln (letztere dicht unter der Serosa) gebildet: „Stratum supravasculare“ (Fig. 165). Die Serosa zeigt keine besonderen Eigenthümlichkeiten.

In der Cervix uteri ist die Schleimhaut dicker und trägt in den oberen zwei Dritteln eine einfache Lage grosser, im Mittel 60 μ hoher Flimmerzellen¹⁾, während gegen das Orificium uteri extern. Papillen mit geschichtetem Plattenepithel überzogen auftreten. Ausser vereinzelt Schlauchdrüsen kommen noch 1 mm weite, mit vielen Ausbuchtungen versehene Schleimdrüsen, sog. Schleimbälge, vor, die durch Retention ihres Sekretes sich zu Cysten, den Ovula Nabothi, umgestalten können. Die Muscularis zeigt eine deutlich ausgesprochene Schichtung in eine innere und äussere longitudinale und eine mittlere cirkuläre Muskellage.

Die Blutgefässe lösen sich in der Muscularis in Aeste auf, die besonders im Stratum vasculare stark entwickelt sind. Die Endäste treten in die Schleimhaut, wo sie ein die Drüsen umspinnendes Kapillarnetz bilden. Die Lymphgefässe bilden in der Schleimhaut ein weitmaschiges mit blinden Ausläufern versehenes Netzwerk. Von diesem treten durch die Mus-

¹⁾ Auch Umwandlung dieser Zellen in Becherzellen kommt vor.

cularis Stämmchen, welche mit einem dichten subserösen Netze grösserer Lymphgefässe zusammenhängen. Die zahlreichen theils markhaltigen, theils marklosen Nerven verästeln sich — nachdem die markhaltigen ihre Markscheide verloren haben — zum grössten Theile in der Muscularis. Ihr Verhalten zur Schleimhaut ist noch unbekannt.

Zur Zeit der Menstruation wird die Schleimhaut dicker (bis 6 mm) in Folge von Vermehrung der homogenen Zwischensubstanz, sowie der Leukocyten. Die Drüsen werden ebenfalls länger. Die Blutgefässe der Uterusschleimhaut, aus denen vorzugsweise das Menstrualblut stammt, sind erweitert. Das Epithel wird grossentheils abgestossen (aber nicht in grösseren Fetzen). Die Veränderungen in der Schwangerschaft beruhen neben einer Verdickung der Schleimhaut auf einer Zunahme der Muscularis, welche durch bedeutende Vergrösserung der vorhandenen Muskelfasern (pag. 60) und Bildung neuer Muskelfasern erfolgt.

Scheide und äussere weibliche Genitalien.

Die Scheide, Vagina, wird gebildet durch eine Schleimhaut, eine Muskelhaut und eine Faserhaut. Die Schleimhaut besteht: 1. aus einem geschichteten Plattenepithel, 2. einer papillentragenden Tunica propria, die, von einem Geflechte feiner Bindegewebsbündel aufgebaut, spärliche elastische Fasern, sowie Leukocyten in wechselnder Menge enthält. Letztere treten zuweilen in Form von Solitärknötchen auf; in diesem Falle findet man an der betreffenden Stelle zahlreiche Leukocyten auf der Durchwanderung durch das Epithel begriffen. Die tiefste Schicht der Schleimhaut wird hergestellt: 3. durch eine Submucosa, welche aus lockeren Bindegewebsbündeln und starken elastischen Fasern zusammengesetzt ist. Drüsen fehlen der Scheidenschleimhaut. Die Muskelhaut wird von einer inneren cirkulären und äusseren longitudinalen Schicht glatter Muskeln gebildet. Die äussere Faserhaut ist ein festes, mit elastischen Fasern reichlich versehenes Bindegewebe. Blutgefässe und Lymphgefässe sind in der Tunica propria und in der Submucosa zu flächenhaft ausgebreiteten Netzen angeordnet. Zwischen den Bündeln der Muskelhaut liegt ein dichtes Netz weiter Venen. Die Nerven bilden in der äusseren Faserhaut ein mit vielen kleineren Ganglien besetztes Geflecht. Der weitere Verlauf ist unbekannt.

Die Schleimhaut der äusseren weiblichen Genitalien ist insofern von der Scheidenschleimhaut verschieden, als in der Umgebung der Clitoris und der Harnröhrenmündung zahlreiche 0,5—3 mm grosse Schleimdrüsen und an den Labia minora Talgdrüsen (von 0,2—2,0 mm Grösse) ohne Haarbälge sich finden. Die Clitoris wiederholt im Kleinen den Bau des Penis; an der Glans clitoridis kommen Tastkörperchen, sowie Endkolben vor. Die Bartholini'schen Drüsen gleichen den Cowper'schen Drüsen des Mannes. Die Labia majora sind wie die äussere Haut gebaut.

Der saure Vaginalschleim enthält abgestossene Plattenepithelzellen und Leukocyten, sowie nicht selten ein Infusorium, *Trichomonas vaginalis*.

TECHNIK.

Nr. 134. Zu Uebersichtspräparaten des Hodens schneide man den Hoden und Nebenhoden neugeborener Knaben¹⁾ quer durch²⁾, fixire die beiden Stücke in ca. 50 ccm Kleinenberg'scher Pikrinsäure (pag. 13) und härte sie in ca. 30 ccm allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14). Dicke, vollständige Querschnitte färbe man mit verdünntem Karmin (pag. 18) und mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17) und konservire sie in Damarfirniss (pag. 23). Zu betrachten mit Lupe (pag. 29) oder mit ganz schwachen Vergrößerungen (Fig. 153).

Nr. 135. Für den feineren Bau der Hodenkanälchen fixire man Stückchen (von ca. 2 cm Seite) des frisch aus dem Schlachthause bezogenen Stierhodens in ca. 200 ccm Müller'scher Flüssigkeit (pag. 13) und härte sie nach ca. 14 Tagen in ca. 50 ccm allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14). Möglichst feine Schnitte sind mit Böhmer'schem Haematoxylin zu färben (pag. 17) und in Damarfirniss zu konserviren (pag. 23). Schon bei schwachen Vergrößerungen (50 mal) kann man die Kanälchen im Zustande der Thätigkeit von den ruhenden Kanälchen unterscheiden. Die thätigen Kanälchen erkennt man an den sich intensiv blau färbenden Köpfen der jungen Spermatofilen (Fig. 154).

Nr. 136. Noch bessere Präparate erhält man, wenn man den ganzen Hoden einer Maus³⁾ in 10 ccm Platinchlorid-Osmium-Essigsäure (pag. 5) 24 Stunden fixirt, dann die Stücke mehrere Stunden lang in (womöglich fliessendem) Wasser auswäscht und sie in ca. 20 ccm allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14) härtet. Die ungefärbten Schnitte konservire man in Damarfirniss (pag. 23) (Fig. 155).

Fig. 166.

Isolierte Elemente des Stierhodens. a, c Mutterzellen, b „Spermatoblast“, d unfertiger, e fertiger Samenfaden. 240mal vergrößert.

Nr. 137. Zur Isolation der Hodenelemente lege man ca. 1 ccm grosse Stückchen des frischen Stierhodens in ca. 20 ccm Ranvier's Alkohol (pag. 10) und zerpufe nach 5—6 Stunden in einem Tropfen desselben Alkohols den Inhalt der Kanälchen. Färben mit Pikrokarmin unter dem Deckglase (pag. 26) und konserviren in verdünntem Glycerin. Man versäume nicht, mehrere Präparate von verschiedenen Stellen anzufertigen. Man erhält dann nicht selten Sertolische Zellen, die mit den Spermatocyten oder mit den aus ihnen hervorgegangenen Samenfäden zusammenhängen (Fig. 166 b), Bildungen, die früher als „Spermatoblasten“ beschrieben worden sind.

Nr. 138. Elemente des Samens. Man bringe einen Tropfen von der aus der Schnittfläche eines frischen Nebenhodens⁴⁾ hervortreten-

1) Hoden von Kaninchen, Katzen und Hunden haben das Corpus Highmori nicht am Rande, sondern in der Mitte des Hodens.

2) Unangeschnittene Hoden lassen sich wegen der festen Tunica albuginea nicht hinreichend härten.

3) Bei Hoden grösserer Thiere dringt die Platinchlorid-Mischung nicht vollkommen durch; nur die Randschichten sind dann brauchbar.

4) Zur Beobachtung des oben (pag. 207 Anmerk.) erwähnten Spiralfadens, der nur mit sehr starken Objektiven (Immersionssystemen) gesehen werden kann, empfehle ich Samenfäden der Ratte in Wasser zu untersuchen.

den milchweissen Flüssigkeit auf einen reinen Objektträger, setze einen Tropfen Kochsalzlösung zu, lege ein Deckglas auf und betrachte mit starken Vergrösserungen. Nach einiger Zeit lasse man einen Tropfen destillirtes Wasser unter das Deckglas fließen (pag. 26). Die Bewegung der Samenfäden wird alsbald aufhören; die Köpfe der meisten Samenfäden präsentieren sich dann von der Fläche, der Schwanz krümmt sich ösenförmig (Fig. 156, 3). Nicht vollkommen reife Samenfäden tragen noch Protoplasmareste. Man kann die Samenfäden konserviren, indem man mit Wasser verdünnten Samen auf dem Objektträger eintrocknen lässt, ein Deckglas auflegt und dieses mit Kitt festklebt (pag. 22 ad 2). Zu starke Beleuchtung giebt bei solchen Präparaten störende Reflexe.

Nr. 139. Die Haltbarkeit der Samenfäden gestattet auch Untersuchungen zu forensischen Zwecken. Es handle sich z. B. um die Frage, ob die an einem leinenen Hemd befindlichen Flecken von Samen herrühren. Man schneide von den verdächtigen steifen Flecken Stückchen von 5—10 mm Seite aus, weiche sie in einem Uhrschildchen mit destillirtem Wasser 5—10 Minuten lang auf und zerzupfe einige Fasern des Stückchens auf dem Deckglase. Bei starken Vergrösserungen (500 : 1) untersuche man hauptsächlich die Ränder der einzelnen Leinenfasern, an denen die Samenfäden ankleben. Nicht selten brechen die Köpfe ab; sie sind durch ihren eigenthümlichen Glanz, ihre Gestalt und ihre (beim Menschen geringe) Grösse kenntlich.

Nr. 140. Samenfäden vom Frosch. Der männliche Frosch ist durch gut ausgebildete Warzen am Daumenballen kenntlich. Man öffne die Bauchhöhle; die Hoden sind ein paar (Säugethiernieren ähnliche) ovale Körper, die zu Seiten der Wirbelsäule liegen. Dem querdurchschnittenen Hoden entnommene Flüssigkeit zeigt, mit einem Tropfen Kochsalzlösung verdünnt, die grossen Samenfäden, deren Kopf dünn und langgestreckt, deren Schwanz so fein ist, dass er im ersten Augenblick übersehen wird. Unreife Samenfäden liegen zu ganzen Büscheln vereint beisammen.

Nr. 141. Zu Schnitten für Nebenhoden, Vas deferens, sowie für Samenbläschen, fixire man 1—2 cm grosse Stücke in ca. 200 cem Müller'scher Flüssigkeit (pag. 13) 14 Tage und härte sie in ca. 60 cem allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14). Die Schnitte färbe man mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17) und konservire sie in Damarfirniss (pag. 23) (Fig. 157 und 158).

Nr. 142. Prostata und die verschiedenen Abtheilungen der männlichen Harnröhre behandle man in 2—3 cm grossen Stücken wie Nr. 141 (Fig. 159).

Nr. 143. Eierstöcke kleiner Thiere fixire man im Ganzen, solche grösserer Thiere und die des Menschen mit einigen quer zur Längsachse gerichteten Einschnitten versehen, in 100—200 cem Kleinenberg'scher Pikrinsäure (pag. 13) und härte sie in ca. 100 cem allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14). Zu Uebersichtsbildern (Fig. 160) müssen dicke Schnitte angefertigt werden, weil sonst der Inhalt grosser Follikel leicht ausfällt. Nicht jeder Schnitt trifft grössere Follikel; man muss oft viele Schnitte machen, bis man eine günstige Stelle trifft. Man färbe mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17) oder färbe die Stücke mit Boraxkarmin durch (pag. 19). Konserviren in Damarfirniss (pag. 23).

Nr. 144. Frische Eier erhält man auf folgende Weise. Man verschaffe sich aus dem Schlachthause ein paar frische Eierstöcke einer Kuh. Die grossen Graaf'schen Follikel sind durchscheinende Bläschen von Erbsengrösse, welche sich mit einer Scheere leicht in toto herauschälen lassen. Nun übertrage man den isolirten Follikel auf einen Objektträger und steche ihn mit der Nadel vorsichtig an¹⁾. In dem ausfliessenden Liquor folliculi findet sich, umgeben von Zellen des Cumulus ovigerus, das Ei (Fig. 164, A), welches, ohne dass das Präparat mit einem Deckglase bedeckt wird, mit schwacher Vergrösserung aufgesucht werden muss. Will man mit starken Vergrösserungen untersuchen, so bringe man zu Seiten des Eies ein paar feine Papierstreifen und lege dann ein Deckglas vorsichtig auf.

Der Anfänger wird manchen Follikel opfern, ehe es ihm gelingt, ein Ei zu finden. Oft tritt das Ei nicht sofort beim Anstechen heraus und wird erst nach wiederholtem Zerpupfen des Follikels gefunden.

Nr. 145. Froscheier. Man bringe ein etwa linsengrosses Stückchen des frischen Froscheierstockes auf einen Objektträger und steche alle grossen schwarzen Eier an, sodass deren Inhalt ausfliesst. Den Rest lege man nun in eine Uherschale mit destill. Wasser und wasche ihn da durch Bewegen mit Nadeln aus. Stellt man die Schale auf eine schwarze Unterlage, so sieht man die kleineren, noch unpigmentirten Eifollikel. Nun bringe man das gewaschene Objekt auf einen reinen Objektträger, bedecke es mit einem Deckglas und untersuche. Die Eier haben ein sehr grosses Keimbläschen, der Keimfleck verschwindet frühzeitig und ist meist nicht zu sehen. Dagegen findet sich im Dotter ein dunkler Fleck, der Dotterkern. Im Umkreise des Eies sieht man eine feinstreifige Haut mit, ihrer Innenseite anliegenden, flachen Zellen: die Theca folliculi mit dem einschichtigen Follikelepithel.

Nr. 146. Für Tubenpräparate fixire man 1—2 cm lange Stücke in ca. 50 cem 3%iger Salpetersäure (pag. 13) und härte sie nach 5 Stunden in ca. 60 cem allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14). Färben mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17) und konserviren in Damarfirniss (pag. 23).

Nr. 147. Der Uterus des Menschen ist in sehr vielen Fällen zur Herstellung übersichtlicher Präparate nicht geeignet. Besonders stösst die Sichtbarmachung der Drüenschläuche oft auf unüberwindliche Schwierigkeiten²⁾. Die (zweihörnigen) Uteri vieler Thiere lassen die oft stark gewundenen Drüenschläuche besser erkennen; die Anordnung der Muskelschichten ist eine andere, regelmässiger, wie beim Menschen.

Behandlung wie Nr. 146.

IX. Die Haut.

Die äussere Haut (Integumentum commune, Cutis) besteht in ihrer Hauptmasse aus Bindegewebe, welches jedoch nirgends frei zu Tage liegt, sondern mit einem zusammenhängenden epithelialen Ueberzuge versehen ist.

¹⁾ Das Anstechen muss an der auf dem Objektträger liegenden Seite des Follikels vorgenommen werden, sonst spritzt der Liquor im Bogen heraus und mit ihm das Ei.

²⁾ Die Fig. 165 ist nach einem ungefärbten Präparate gezeichnet. Die Drüsen waren nicht so deutlich, wie sie sich auf der Abbildung finden.

Der bindegewebige Antheil der Haut heisst Lederhaut (Corium, Derma), der epitheliale Antheil Oberhaut (Epidermis). Die Anhänge der äusseren Haut, die Nägel und die Haare, sind, ebenso wie die in der Tiefe der Lederhaut eingegrabenen Haarwurzelscheiden und Drüsen, Produkte der Epidermis.

Die äussere Haut.

Lederhaut. Die Oberfläche der Lederhaut ist von vielen feinen Furchen durchzogen, welche entweder sich kreuzend rautenförmige Felder abgrenzen oder auf längere Strecken parallel laufend schmale Leisten zwischen sich fassen. Die rautenförmigen Felder sind am grössten Theile der Körperoberfläche zu sehen, während die Leisten auf die Beugeseite der Hand und des Fusses beschränkt sind. Auf den Feldern und Leisten stehen zahlreiche kegelförmige Wärzchen, die Papillen, deren Zahl und Grösse an den verschiedenen Stellen des Körpers bedeutenden Schwankungen unterworfen ist. Die meisten und grössten (bis zu 0,2 mm hohen) Papillen finden sich an der Hohlhand und an der Fusssohle; sehr gering entwickelt sind sie in der Haut des Gesichtes.

Die Lederhaut besteht vorzugsweise aus netzartig sich durchflechtenden Bindegewebsbündeln, welchen elastische Fasern, Zellen und glatte Muskel-

Fig. 167.

Senkrechter Schnitt durch die Haut des Fingers eines erwachsenen Menschen, 25 mal vergrössert. Das Stratum granulosum ist bei dieser Methode und bei dieser Vergrösserung nicht sichtbar.
Technik Nr. 148, pag. 233.

fasern beigemischt sind. Die Bindegewebsbündel sind in den oberflächlicheren Schichten der Lederhaut fein und zu einem dichten Flechtwerke vereinigt, in den tieferen Schichten dagegen gröber; hier bilden sie, indem

sie sich unter spitzen Winkeln überkreuzen, ein grobmaschiges Netzwerk. Man unterscheidet deshalb an der Lederhaut zwei Schichten: eine oberflächliche papillenträgende Schicht, *Stratum papillare*, und eine tiefe Schicht, *Stratum reticulare*. Beide Schichten sind nicht scharf von einander getrennt, sondern gehen ganz allmählich in einander über (Fig. 167). Das *Stratum reticulare* hängt in der Tiefe mit einem Netze lockerer Bindegewebsbündel zusammen, in dessen weiten Maschen Fetträubchen gelegen sind. Diese Schicht heisst *Stratum subcutaneum*; massenhafte Fettablagerung in den Maschen dieser Schicht führt zur Bildung des *Panniculus adiposus*. Die Bündel des *Stratum subcutaneum* endlich hängen fester oder lockerer mit den bindegewebigen Umhüllungen der Muskeln (den Fascien) oder der Knochen (dem Periost) zusammen. Die elastischen Fasern, welche im *Stratum papillare* feiner, im *Stratum reticulare* dicker sind, bilden gleichmässig im *Corium* vertheilte Netze. Die Zellen sind theils platte, theils spindelförmige Bindegewebszellen, theils Leucocyten, theils Fettzellen. Die Anzahl der zelligen Elemente ist eine sehr wechselnde. Die Muskelfasern gehören fast durchweg der glatten Muskulatur an, sie sind meist an die Haarbälge gebunden (pag. 225), nur an wenigen Körperstellen finden sie sich als häutige Ausbreitung (*Tunica dartos*, Brustwarze). Quergestreifte Muskeln finden sich als Ausstrahlung der mimischen Muskeln in der Haut des Gesichtes.

Die Oberhaut. Die Oberhaut besteht aus geschichtetem Pflasterepithel, welches mindestens zwei scharf von einander getrennte Lagen unterscheiden lässt: eine tiefe, weichere, die sogen. Schleimschicht, *Stratum mucosum* (*Str. Malpighii*), welches die zwischen den *Corium*papillen befindlichen Vertiefungen ausfüllt, und eine oberflächliche, festere, die Hornschicht, *Stratum corneum*. Beide Schichten bestehen durchaus aus Epithelzellen, welche in den einzelnen Lagen ein verschiedenes Aussehen zeigen. Die Zellen der tiefsten Lage der Schleimschicht sind cylindrisch mit oblongem Kerne; darauf folgen mehrere Lagen rundlicher Zellen, die mit zahlreichen feinen Stacheln besetzt sind (Stachelzellen). Diese Stacheln sind feine, fadenförmige Fortsätze, welche die zwischen den Zellen befindliche geringe Menge von Kittsubstanz durchsetzen und die Verbindung benachbarter Zellen unter einander vermitteln. Deshalb nennt man sie Intercellularbrücken oder Riffelfortsätze (Fig. 7). In der Schleimschicht findet eine fortwährende Neubildung zelliger Elemente durch indirekte Kerntheilung statt; sie wird deshalb ganz passend auch Keimschicht genannt. Die Hornschicht ist nicht überall gleich gebaut, man kann vielmehr zweierlei Typen unterscheiden: 1. An Stellen mit dicker Epidermis (Beugefläche der Hand und des Fusses) ist die der Keimschicht zunächst gelegene Zellschicht durch stark glänzende Körnchen (Keratinkörnchen) ausgezeichnet, welche durch Verhornung einzelner Theile des Zellprotoplasma entstanden sind. Diese Schicht heisst *Stratum granulosum*. Indem diese Körnchen mit einander verschmelzen, bilden sie zu-

sammen mit den nicht verhornten Theilen des Protoplasma eine zweite, gleichmässig glänzende Schicht: das Stratum lucidum. Diese wird bedeckt von dem breiten eigentlichen Stratum corneum. Hier sind alle nicht verhornten Theile der Zellen unter dem Einflusse der Luft vertrocknet; so kommt es, dass jede Zelle ein feines Hornmaschenwerk enthält und — indem zuletzt auch die Intercellularbrücken verhornen — sich mit einer Hornmembran umgiebt. Der Kern vertrocknet; die Höhle, in welcher er gelegen war, erhält sich aber noch lange. Die so theilweise verhornten, theilweise ausgetrockneten Zellen sind wenig abgeplattet. 2. An Stellen mit dünner Epidermis (übrige Hautoberfläche) ist das Stratum granulosum dünn und von Lücken unterbrochen. Ein Stratum lucidum fehlt vollkommen. Die Zellen des Stratum corneum verhornen total, sind stark abgeplattet und verbinden sich zu Lamellen. Vom Kern geht auch die letzte Spur verloren.

Die Oberfläche der Hornschicht unterliegt einer beständigen Abschilferung, der hierdurch entstehende Verlust wird durch Nachrücken der Elemente der Schleimschicht ausgeglichen.

Die Färbung der Haut hat ihren Grund in der Einlagerung feiner Pigmentkörnchen zwischen und in den Zellen der tieferen Lagen des Stratum mucosum. Die Körnchen stammen von meist rundlichen oder spindelförmigen Pigmentzellen, die in sehr wechselnder Zahl in der obersten Coriumschicht liegen. Diese Zellen sind beim Menschen am ausgeprägtesten in der Haarpapille zu finden und wandern von hier aus in das Epithel, woselbst sie aufgelöst werden.

Die Nägel.

Die Nägel sind Hornplatten, welche auf einer besonderen Modifikation der Haut, dem Nagelbette, aufliegen. Das Nagelbett wird seitlich von ein paar sich nach vorn abflachenden Wülsten, den Nagelwällen begrenzt. Nagelbett und Nagelwall umfassen eine Rinne, den Nagelfalz, in welchen der Seitenrand des Nagels eingefügt ist (Fig. 168). Der hintere Rand des Nagels, die Nagelwurzel, steckt in einer ähnlichen nur noch tieferen Rinne; hier findet das hauptsächlichste Wachsthum des Nagels statt; die Stelle heisst Matrix¹⁾. Der vordere, freie Nagelrand überragt den Nagelsaum, einen schmalen saumartigen Vorsprung am Vorderende des Nagelbettes.

Das Nagelbett besteht aus Corium und aus Epithel. Die Bindegewebsbündel des Corium verlaufen theils der Länge nach, parallel der Längsachse des Fingers, theils senkrecht vom Periost der Phalange zur Oberfläche. Die Oberfläche des Corium besitzt keine Papillen, sondern feine longitudinal ziehende Leisten. Dieselben beginnen niedrig an der Matrix, nehmen

1) Andere Autoren nennen das ganze Nagelbett Matrix, was insofern berechtigt ist, als auch hier ein Wachsthum des Nagels, in die Dicke, stattfindet.

nach vorn an Höhe zu und enden plötzlich an der Stelle, wo der Nagel sich von seiner Unterlage abhebt. Das Epithel ist ein mehrschichtiges Pflaster-epithel, von gleichem Baue wie das Stratum mucosum der Epidermis. Es

Fig. 168.

Dorsale Hälfte eines Querschnittes des dritten Fingergliedes eines Kindes, 15mal vergrößert. Die Leisten des Nagelbettes sehen im Querschnitte wie Papillen aus. Technik Nr. 149, pag. 234.

bedeckt die Leisten, füllt die zwischen denselben befindlichen Furchen aus und ist gegen die Substanz des Nagels scharf abgesetzt. Die Matrix besteht ebenfalls aus Corium und Epithel; das Corium ist durch hohe Papillen

Fig. 169.

Elemente des menschlichen Nagels, 240 mal vergrößert. Technik Nr. 150, pag. 234.

ausgezeichnet, das mehrschichtige Pflaster-epithel ist sehr dick und ist von der Nagelsubstanz nicht scharf abgesetzt, sondern geht allmählich in diese über. Hier ist die Stelle, wo durch fortwährende Theilung der Epithelzellen das Material zum Wachstume des Nagels geliefert wird. Deswegen heisst das Epithel auch Keimschicht des Nagels. Die Ausdehnung der Matrix ist durch die mit unbewaffnetem Auge sichtbare Lunula,

ein weisses nach vorn convexes Feld gekennzeichnet; sie wird bedingt durch die dicke, gleichmässig ausgebreitete Keimschicht. Der Nagelwall zeigt den gewöhnlichen Bau der äusseren Haut. Das Stratum mucosum desselben geht allmählich in das Epithel des Nagelbettes über. Seine Hornschicht reicht bis in den Nagelfalz und überzieht noch einen kleinen Theil des Nagelrandes, hört aber bald sich verdünnend auf (Fig. 168).

Der Nagel selbst besteht aus verhornten Epidermisschüppchen, die sehr fest mit einander verbunden sind und sich von den Schüppchen des Stratum corneum der Epidermis dadurch unterscheiden, dass sie einen Kern besitzen (Fig. 169).

Haare und Haarbälge.

Die Haare sind biegsame, elastische Hornfäden, welche fast über die ganze Körperoberfläche verbreitet sind. Man nennt den frei über die Haut hervorragenden Theil des Haares Schaft, Scapus; der in die Haut schräg

eingesenkte Theil wird Haarwurzel, *Radix pili* genannt, diese ist an ihrem unteren Ende zu einem hohlen Knopf, der Haarzwiebel, *Bulbus pili*, aufgetrieben, welcher von einer Corium-

bildung, der Haarpapille, ausgefüllt wird (Fig. 170).

Jede Haarwurzel steckt in einer Modifikation der Haut, dem Haarbalge, an dessen Aufbau sich Corium und Epidermis betheiligen; die von letzterer gelieferten Theile werden Wurzelscheiden genannt; was vom Corium abstammt, wird

bindegewebiger Haarbalg genannt. In den Haarbalg münden seitlich oben zwei bis fünf Drüsen, die Haarbalgdrüsen, *Glandulae sebaceae*.

Fig. 170.

Aus einem dicken Durchschnitte der menschlichen Kopfhaut, 20mal vergrößert. Technik Nr. 154, pag. 235.

Schräg von der Coriumoberfläche herabziehende Bündel glatter Muskelfasern, *M. arrector pili*, setzen sich unterhalb einer Haarbalgdrüse an den bindegewebigen Haarbalg; die Insertionsstelle dieser Fasern findet sich stets an der schräg abwärts geneigten Seite des Haarbalges; ihre Kontraktion wird also eine Aufrichtung von Haarbalg und Haar zur Folge haben.

Das Haar besteht durchaus aus Epithelzellen, welche in drei scharf unterscheidbare Schichten geordnet sind:

1. das Oberhäutchen des Haares, *Haarcuticula*, welches die Oberfläche des Haares überzieht,
2. die Rindensubstanz, welche die Hauptmasse des Haares bildet,
3. die Marksubstanz, welche in der Achse des Haares gelegen ist.

Das Oberhäutchen besteht aus dachziegelförmig übereinander gelegten durchsichtigen Schüppchen: verhornten, kernlosen Epithelzellen. Die Rindensubstanz besteht am Haarschaft aus langgestreckten, verhornten, mit einem linienförmigen Kerne versehenen Epithelzellen, welche sehr innig mit einander verbunden sind; an der Haarwurzel werden die Zellen um so weicher und runder, ihr Kern wird um so rundlicher, je näher sie der Haarzwiebel gelegen sind. Die Marksubstanz fehlt vielen Haaren; auch da, wo sie vorhanden

ist, (an dickeren Haaren) erstreckt sie sich nicht durch die ganze Länge des Haares. Sie besteht aus kubischen, feinkörnigen Epithelzellen, welche meist in doppelter Reihe neben einander gelegen sind und einen rudimentären Kern enthalten. Die gefärbten Haare enthalten Pigment und zwar sowohl gelöst,

Fig. 171.

Elemente des menschlichen Haares und Haarbalges, 240mal vergr. 1 Weisses Haar, 2 Schüppchen des Haaroberhäutchens, 3 Zellen der Rindensubstanz des Schaftes, 4 Zellen der Huxley'schen Schicht, 5 Zellen der Henle'schen Schicht, wie eine gefensternte Membran ansiehend. 6 Zellen der Rindensubstanz der Wurzel. Technik Nr. 152 und 153, pag. 234.

als auch in Form von Körnchen, welche theils zwischen, theils in den Zellen der Rindensubstanz gelegen sind¹⁾. Ferner befinden sich in jedem Haare, welches seine volle Entwicklung erreicht hat, kleinste Luftbläschen; sie finden sich sowohl in der Rindensubstanz, als auch in der Marksubstanz und zwar intercellular.

Der Haarbalg feinerer (Woll-) Haare wird nur durch die epidermoidalen Wurzelscheiden gebildet, bei stärkeren Haaren dagegen theilhaftig auch das Corium am Aufbau desselben. Wir unterscheiden am Haarbalge stärkerer Haare folgende Schichten: Zu äusserst eine gefäss- und nervenreiche, aus lockeren Bindegewebsbündeln gebildete Längsfaserlage; darauf folgt eine dickere Lage ringförmig geordneter, feiner Bindegewebsbündel, die Ringfaserlage, welcher sich eine den elastischen Häuten nahestehende, glashelle Membran, die Glashaut, anschliesst. Diese drei Schichten sind Abkömmlinge des Corium und werden zusammen bindegewebiger Haarbalg genannt. Nach innen von der Glashaut liegt die äussere Wur-

¹⁾ Ueber die Herkunft des Pigments s. pag. 223.

zelscheide, welche als Fortsetzung der Schleimschicht der Epidermis aus geschichtetem Pflasterepithel besteht und einwärts an die innere Wurzelscheide stösst. Diese zeigt im oberen Theile des Haarbalges den gleichen Bau, wie das Stratum corneum; unterhalb der Mündungen der Haarbalgdrüsen aber differenzirt sich die innere Wurzelscheide in zwei scharf getrennte Schichten. Die äussere derselben, die Henle'sche Schicht, besteht aus einer einfachen oder doppelten Lage kernloser Epithelzellen, während die

Fig. 172.

Aus einem Flächenschnitte der menschlichen Kopfhaut. 240 mal vergrössert. Querschnitt eines Haares und Haarbalges in der unteren Hälfte der Wurzel. Technik Nr. 151, pag. 235.

innere, die Huxley'sche Schicht, sich aus einer einfachen Lage kernhaltiger Zellen aufbaut. Die Innenfläche dieser Schicht endlich wird von einem Häutchen, der Scheidencuticula, ausgekleidet, welches den gleichen Bau wie die Haarcuticula zeigt. Gegen den Grund des Haarbalges hört die äussere Wurzelscheide sich verschmälernd auf, die Schichten der inneren Wurzelscheide verlieren ihre scharfe Abgrenzung und gehen allmählich in die rundlichen Zellen des Bulbus pili über.

Entwicklung der Haare.

Die erste Anlage des Haares und des Haarbalges tritt Ende des dritten Embryonalmonates auf und zwar in Form eines Höckers der Epidermis (Fig. 173 1 ×) und gleichzeitig eines in das Corium hinabwachsenden soliden Epidermiszapfens, des Haarkeimes (I, II, *hk*). Während der Höcker rasch wieder verschwindet, wird der Haarkeim länger und verdickt sich kolbig an seinem unteren Ende (III); unterdessen entwickelt sich aus dem Bindegewebe des Corium die Papille (III, *p*) und der bindegewebige Haarbalg (III, *hb*). Dann sondert sich der Haarkeim in eine äussere Schicht und in einen in

der Achse des Haarkeimes gelegenen Strang (iv, s). Die äussere Schicht wird zur äusseren Wurzelscheide (aw), der axiale Strang wird in seinem peripherischen Abschnitte zur inneren Wurzelscheide (iw), in seinem innersten Theile zum Haar (h). Die Haarbalgdrüsen (t) entstehen durch lokales Auswachsen aus der äusseren Wurzelscheide.

Auch nach der Geburt bis in das spätere Alter können Haare in der eben beschriebenen Weise entstehen.

Haarwechsel.

Nach der Geburt vollzieht sich ein totaler Haarwechsel, aber auch beim erwachsenen Menschen findet ein beständiger, nicht periodischer, Ersatz für die ausfallenden Haare statt. Die feineren Vorgänge

Fig. 173.

Aus senkrechten Schnitten I der Wangenhaut eines 4monatl., II, III, IV der Stirnhaut eines 5 $\frac{1}{2}$ monatl. menschl. Embryo, 80mal vergr. E Epidermis, noch durchaus aus kernhaltigen Epithelzellen bestehend, C Corium, X Höcker, hk Haarkeim, hb bindegew. Haarbalg, p Papille, aw äussere Wurzelscheide, s axialer Strang, in dessen oberem Abschnitte schon die Sonderung in iw innere Wurzelscheide und h Haar sichtbar ist. t Haarbalgdrüsenanlage. Technik Nr. 155, pag. 235.

bestehen darin, dass die Haarpapille atrophirt und der von ihr innegehabte Raum von den Elementen der Haarzweifel ausgefüllt wird. Dadurch wird

letztere zu einem soliden Gebilde, der Vollwurzel (Haarkolben) Fig. 174, deren Bildung mit einer Verkürzung des gesammten Haarbalges verbunden ist. In der Umgebung der alsbald besenartig sich auffasernden Vollwurzel gehen äussere und innere Wurzelscheide in eine gemeinschaftliche Zellenmasse, das Keimlager des Haares, über, von welchem ein neuer Haarkeim in die Tiefe wächst. An und in diesem spielen sich nunmehr die gleichen Vorgänge ab, wie im embryonalen Haarkeim. Das hieraus entstehende neue Haar schiebt sich unter und neben

Fig. 174.

Aus einem senkrechten Schnitte durch das Augenhaut eines Neugeborenen, 80mal vergrössert. Untere Hälfte eines Haarbalges gezeichnet. Technik Nr. 156, pag. 235.

dem alten Haar in die Höhe, während letzteres ausfällt.

Drüsen der Haut.

Die Haarbalgdrüsen (Talgdrüsen, Glandul. sebaceae) sind entweder unverästelte oder verästelte alveoläre Einzeldrüsen. Wir unterscheiden

einen kurzen Ausführungsgang (Fig. 175 *A a*) und den von einer verschieden grossen Anzahl von Schläuchen gebildeten Drüsenkörper (*t*). Der Ausführungsgang wird von einer Fortsetzung der äusseren Wurzelscheide, also von geschichtetem Plattenepithel ausgekleidet, welches unter allmählicher Verminderung seiner Lagen in die epitheliale Auskleidung des Drüsenkörpers übergeht. Dieser besteht zu äusserst aus niedrigen kubischen Zellen (*B 1*); nach innen davon liegen verschieden grosse, rundliche oder polygonale Zellen (2, 3, 4), welche den ganzen Drüenschlauch erfüllen und alle Uebergänge bis zur Umbildung in das Sekret erkennen lassen. Das

Fig. 175.

A Aus einem vertikalen Schnitte durch den Nasenflügel eines Kindes, 40mal vergrössert, *C* Stratum corneum. *M* Stratum mucosum, *t* aus 4 Säckchen bestehende Talgdrüse, *a* Ausführungsgang derselben, *w* Wollhaar, im Ausfallen begriffen, *h* Haarbalg desselben, an der Basis zur Bildung eines neuen Haares ansetzend $\times$.

B Aus einem vertikalen Schnitte der Nasenflügelhaut eines neugeborenen Kindes, 240mal vergrössert. Säckchen einer Talgdrüse, Drüsenzellen in verschiedenen Stadien der Sekretbildung enthaltend. Technik Nr. 157, pag. 235.

Sekret, der Hauttalg (Sebum), ist ein im Leben halbflüssiger Stoff, der aus Fett und zerfallenden Zellen besteht. Während die Talgdrüsen der gröberen Haare als Anhänge der Haarbälge auftreten (Fig. 170), waltet bei den Wollhaaren das umgekehrte Verhältniss, indem nämlich die Wollhaarbälge wie Anhänge der mächtig entwickelten Talgdrüsen erscheinen (Fig. 175 *A*). Mit den Haaren sind die Talgdrüsen über den ganzen Körper verbreitet und fehlen nur wie jene am Handteller und an der Fusssohle. Indessen giebt es auch Talgdrüsen, die mit keinem Haarbalge verbunden sind, z. B. am rothen Lippenrande, an den Labia minora, an Glans und an Praeputium penis, an welch' letzterem Orte sie unter dem Namen der Tyson'schen Drüsen bekannt sind. Die Talgdrüsen sind stets in den oberflächlichen Schichten des Corium, im Stratum papillare gelegen. Ihre Grösse schwankt von 0,2 mm bis zu 2,2 mm; letztere finden sich in der Haut der Nase, wo ihre Ausführungsgänge schon mit unbewaffnetem Auge sichtbar sind.

Die Knäuel- (Schweiss-) drüsen (*Glandul. sudoriparae*) sind lange, unverästelte Röhren, die an ihrem unteren Ende zu einem rundlichen Knäuel zusammengeballt sind. Wir unterscheiden den Ausführungsgang (Fig. 167) vom Knäuel. Der Ausführungsgang verläuft gerade oder geschlängelt durch das Corium, tritt zwischen zwei Papillen in die Epidermis, in deren Stratum corneum er spiralig gewunden ist, und mündet mit einem rundlichen, mit unbewaffnetem Auge eben noch sichtbaren Lumen, der Schweisspore, auf die Hautoberfläche. Die Wandung des Ausführungsganges besteht aus einer mehrfachen Schicht kubischer Zellen; nach aussen von diesen verlaufen der Länge nach angeordnete Bindegewebsbündel. Der Knäuel ist ein einziger, vielfach gewundener Kanal, dessen Wandung von einer einfachen Lage kubischer Zellen, die Pigment- und Fettkörnchen enthalten, gebildet wird; nach aussen davon liegt eine zarte *Membrana propria*. Bei stark entwickelten Knäueldrüsen finden sich zwischen *Membr. propr.* und Drüsenzellen longitudinale glatte Muskelfasern. Das Sekret ist gewöhnlich eine fettige, zum Einölen der Haut bestimmte Flüssigkeit; nur unter dem Einflusse veränderter Innervation kommt es in den Knäueldrüsen zur Absonderung jener wässerigen Flüssigkeit, die wir Schweiss nennen. Die Knäueldrüsen sind über die ganze Oberfläche der Haut verbreitet und fehlen nur an der Glans penis und an der Innenfläche der Vorhaut. Am reichlichsten sind sie an Handteller und Fusssohle zu finden.

Die Blutgefäße, Lymphgefäße und Nerven der Haut.

Die arteriellen Blutgefäße der Haut entspringen aus einem über den Fascien gelegenen Gefässnetze und ziehen gegen die Oberfläche der Haut empor. Auf diesem Wege versorgen sie drei von einander unabhängige Kapillargebiete; das tiefste ist für das Fettgewebe bestimmt (Fig. 176, *a'*), das nächste tritt in Form korbartiger, die Knäueldrüsen umspinnender Geflechte auf (*a''*). Das Dritte entsteht aus den Endverästelungen der Arterie (*a'''*). Diese letzteren bilden ein in dem Stratum papillare corii der Fläche nach ausgebreitetes Netz, aus welchem sowohl kapillare Schlingen in die Papillen emporsteigen, als auch die für Haarbälge und Talgdrüsen bestimmten Aestchen hervorgehen. Die Venen wurzeln in einem gleichfalls in dem Strat. papill. cor. gelegenen, zuweilen doppelten Flächennetze, welches die Enden der Kapillarschlingen und die von den Haarbälgen und Talgdrüsen herkommenden Blutgefäße aufnimmt. Das neben der Arterie herabsteigende Venenstämmchen nimmt im weiteren Verlaufe die von den Schweissdrüsen und dann die von den Fettläppchen herkommenden Venen auf. Bemerkenswerth ist noch, dass von den Venen der Schweissdrüse ein Ast längs des Ausführungsganges zum venösen Netze des Stratum papillare zieht (Fig. 176 *v* $\times$), und dass die Haarpapille ein selbständiges arterielles Aestchen erhält.

Die Lymphgefäße bilden zwei kapillare Flächennetze, von denen das aus feineren Röhren und engeren Maschen bestehende in dem Strat. papill. corii unterhalb des Blutgefäßnetzes liegt, das andere, weitmaschigere im Stratum subcutaneum seinen Sitz hat. Auch in der Umgebung der Haarbälge, der Talg- und der Knäueldrüsen befinden sich besondere Lymphkapillarnetze.

Fig. 176.

Stück eines senkrechten Schnittes der Haut der menschlichen Fußsohle, 50mal vergr. *sc* Strat. cor. muc., *sm* Strat. muc., *a* Arterie, *v* Vene, *a'* *v'* deren Aeste für die Fett-schicht, *a''* *v''* deren Aeste für die Knäueldrüsen, *a'''* *v'''* deren Aeste für die Papillen, *k* Knäueldrüse, *k* Ausführungsgang derselben, *v x* längs diesem verlaufende Vene. Technik Nr. 158, pag. 236.

fettzellenhaltiges Bindegewebe zu einem gemeinschaftlichen Körper verbunden werden. Jede dieser Drüsen hat einen eigenen, auf der Brustwarze mündenden Ausführungsgang, der kurz vor seiner Mündung mit einer ansehnlichen spindelförmigen Erweiterung, dem Milchsäckchen (*Sinus lactiferus*), versehen ist und durch baumförmige Verästelungen mit den kugeligen Endstücken, den Alveolen, zusammenhängt. Letztere bilden, dicht bei einander liegend, durch Bindegewebe umfasste kleine Läppchen.

Was den feineren Bau betrifft, so bestehen die Ausführungsgänge aus

Die (an der Handfläche und an der Fußsohle sehr reichlich vorhandenen) Nerven enden theils im Stratum subcutaneum in Vater'schen Körperchen (pag. 133), theils finden sie in Tastkörperchen, in Tastzellen und als intraepitheliale Fasern (Fig. 85) ihre Endigung. Auch an die Haare treten markhaltige Nervenfasern, welche bis unterhalb der Einmündungsstelle der Haarbälgrüsen verlaufen; hier theilen sie sich, verlieren ihr Mark und senken sich als nackte Achsen-cylinder in die Glashaut des Haarbälges¹⁾.

Anhang. Die Milchdrüse.

Die Milchdrüse besteht zur Zeit der Schwangerschaft und des Stillens aus 15—20 alveolären Drüsen, welche durch lockeres,

1) An den grossen Spürhaaren (Sinushaaren) der Thiere treten Nervenfasern bis in die äussere Wurzelscheide und enden daselbst in Tastzellen.

einem cylindrischen Epithel¹⁾, dem nach aussen eine Membrana propria und meist cirkulär verlaufende Bindegewebsbündel folgen. Die Alveolen sind von einer einfachen Lage von Epithelzellen ausgekleidet, deren Höhe sehr wechselt; sie sind niedrig bei gefüllten Alveolen, kubisch bis cylindrisch bei leeren Alveolen. Die Drüsenzellen sitzen einer aus Zellen bestehenden Membr. propria (pag. 52) auf, jenseits welcher mit einer wechselnden Anzahl von Leukocyten und Plasmazellen vermischtes, lockeres Bindegewebe sich befindet.

Fig. 177.

Stück eines feinen Querschnittes der Milchdrüse eines trächtigen Kaninchens, 240mal vergr. f Fett in den Drüsenzellen, m Membrana propria. Technik Nr. 160, pag. 236.

Ist das Säugegeschäft beendet, so findet eine allmähliche Rückbildung statt, die sich zunächst durch reichliche Entwicklung des zwischen den Drüsenläppchen gelegenen Bindegewebes äussert (Fig. 178). Die Läppchen werden kleiner, die Alveolen beginnen zu schwinden. Bei älteren Personen sind alle Alveolen und Läppchen verschwunden und nur mehr die Ausführungsgänge vorhanden.

Fig. 178.

Stück eines dicken Schnittes durch die Milchdrüse einer Frau, die vor 2 Jahren zum letzten Mal geboren hat. 50mal vergr. 1 grober, 2 feiner Ausführungsgang, 3 Drüsenläppchen, durch Bindegewebe von einander getrennt. Technik Nr. 159, pag. 236.

Bei Kindern beiderlei Geschlechtes besteht die Milchdrüse vorzugsweise aus Bindegewebe, welches die verästelten, an ihren Enden kolbig angeschwollenen Drüsenausführungsgänge einschliesst. Drüsenbläschen fehlen. Ebenso verhält sich die Brustdrüse des erwachsenen Mannes.

Beim erwachsenen Weibe ist die Milchdrüse bis zum Eintritte der Schwangerschaft ein schei-

benförmiger Körper, der vorwiegend aus Bindegewebe und aus den Drüsenausführungsgängen besteht. Alveolen sind nur in beschränkter Anzahl an den feinsten Enden der Ausführungsgänge vorhanden.

Die Haut der Brustwarze und des Warzenhofes ist durch starke Pigmentirung, — Pigmentkörnchen in den tiefsten Schichten der Epidermis — durch hohe Papillen und durch glatte Muskelfasern ausgezeichnet, welche letztere theils cirkulär um die Mündungen der Ausführungsgänge, theils senkrecht zur Warzenspitze aufsteigend angeordnet sind. In der Haut des Warzen-

1) Nicht selten trifft man in den Stämmen der Ausführungsgänge statt des Cylinder-epithels ein geschichtetes Plattenepithel.

hofes finden sich bei Schwangeren und Stillenden accessorische Milchdrüsen, die sogen. Montgomery'schen Drüsen.

Die Blutgefässe treten von allen Seiten an die Milchdrüse heran und bilden ein die Alveolen umspinnendes Kapillarnetz. Die Lymphgefässe bilden zwischen und in den Drüsenläppchen kapillare Netze. Auch in der Umgebung der Milchsäckchen und im Warzenhofe finden sich Lymphgefässnetze. Die Nerven stehen ebensowenig wie in anderen Drüsen mit den Drüsenzellen in direktem Zusammenhang, sondern sind wahrscheinlich insgesamt Gefässnerven.

Die Milch besteht mikroskopisch aus einer klaren Flüssigkeit, in welcher 2—5 μ grosse Fettröpfchen, die Milchkügelchen suspendirt sind. Aus der Thatsache, dass die Fettröpfchen nicht zusammenfliessen, hat man auf das Vorhandensein einer feinen (Casëin-) Membran geschlossen. Ausserdem finden sich vereinzelt, Fetttropfen einschliessende Zellen (Leukocyten?) in der Milch.

Fig. 179.

A Milchkügelchen aus der Milch einer Stillenden, 560mal vergr. Technik Nr. 159.
B Elemente des Kolostrums einer Schwangeren, 560mal vergr. 1 ungefärbte Fettröpfchen enthaltende Zelle, 2 gefärbte kleine Fettröpfchen enthaltende Zelle, 3 Leukocyt, 4 Milchkügelchen.
Technik Nr. 162, pag. 236.

Etwas anders sehen die Elemente der vor und in den ersten Tagen nach der Geburt abgesonderten Milch aus. Hier finden sich ausser den Milchkügelchen die sogen. Kolostrumkörperchen, kernhaltige Zellen, welche theils kleine, gelblich gefärbte und grössere, ungefärbte Fettröpfchen, theils nur ungefärbte Fettröpfchen enthalten.

In welcher Weise das Drüsenepithel bei der Bildung der Milchkügelchen und der Kolostrumkörperchen sich betheiligt, ist noch nicht ganz klar. Sicher ist nur soviel, dass die Drüsenzellen bei der Sekretion nicht zu Grunde gehen. Wahrscheinlich ist, dass das Fett in den Drüsenzellen gebildet und mit dem dem Drüsenlumen zugewendeten Abschnitte der Zelle ausgestossen wird.

TECHNIK.

Nr. 148. Schichten der Haut, Knäueldrüsen. Man schneide von der möglichst frischen Haut der Fingerbeere oder des Handtellers oder der Fusssohle Stückchen (von 1—2 cm Seite) mitsamt einer dünnen Schicht des darunter liegenden Fettes aus und lege sie in ca. 30 cem absoluten Alkohol. Will man das Einrollen vermeiden, so stecke man die Stückchen auf kleine Korktafeln, die Epidermisseite gegen die Korkfläche gekehrt und lege das Ganze in absoluten Alkohol. Am nächsten Tage nehme man die Stückchen von den Korkplatten und lege sie auf 3—4 Wochen in 50 cem 90%igen Alkohol. Dann werden die Stücke in ca. 30 cem Boraxkarmin durchgefärbt (pag. 19), nach 2—3 Tagen entfärbt, dann in ca. 30 cem 90%igen Alkohol (eventuell später in Alk. abs.) übertragen und, wenn sie genügend hart sind, geschnitten. Man mache feinere und dickere Schnitte.

Letztere sind unerlässlich, wenn man die Ausführungsgänge der Knäueldrüsen in ihrer ganzen Länge erhalten will¹⁾. (Fig. 167.) Man sieht die rothen Knäuel schon mit unbewaffnetem Auge. Konserviren in Damarfirniß (pag. 23). Schwache Vergrößerung. An dicken Schnitten sind die Papillen oft undeutlich, weil sie von dem rothgefärbten Stratum mucosum rings umgeben sind; die schraubenförmig gewundenen Enden der Ausführungsgänge treten erst dann scharf hervor, wenn man das Objekt nur wenig beleuchtet oder den Spiegel zur seitlichen Beleuchtung einstellt (pag. 28 Anmerk.).

Nr. 149. Für Nagelpräparate fixire man das letzte Fingerglied von 8—12jährigen Kindern, bei Erwachsenen dasjenige des kleinen Fingers (womöglich von Frauen), 2—4 Wochen lang in 100—200 ccm Müller'scher Flüssigkeit (pag. 13), härte es dann in ca. 100 ccm allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14), entkalke (pag. 15), härte abermals und färbe die dicken Querschnitte²⁾ mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17). Konserviren in Damarfirniß (pag. 23) (Fig. 168). Die Substanz des Nagels zeigt oft verschieden gefärbte Schichten. An Nägeln von älteren Leichen löst sich oft die Keimschicht von den Leisten.

Nr. 150. Nagelemente erhält man, wenn man ein 1—2 mm breites Stückchen des abgeschnittenen Nagels in einem Reagenzglaschen mit ca. 5 ccm konzentrierter Kalilauge über der Flamme bis zu einmaligem Aufwallen erhitzt. Man übertrage dann den Nagel mit einem Tropfen der Lauge auf den Objektträger und schabe etwas von der weich gewordenen Oberfläche desselben ab. Deckglas! Bei starker Vergrößerung findet man Zellen, wie sie Fig. 169 zeigt. Zum Vergleich untersuche man die verhornten Zellen des Stratum corneum, welche man durch leichtes Abschaben die Fingerbeere mit einem steil aufgesetzten Skalpell erhält. Man betrachte die polygonalen Schüppchen in einem Tropfen destill. Wasser mit starker Vergrößerung.

Nr. 151. Haare lege man in einem Tropfen Kochsalzlösung auf einen Objektträger und betrachte sie mit schwachen und starken Vergrößerungen. Am besten sind weisse Haare und Barthaare. Die Haarcuticula des Menschen ist sehr fein und lässt die dachziegelartige Zeichnung oft nur sehr unvollkommen erkennen; meist sind nur feingewellte Linien sichtbar. Viele thierische Haare zeigen dagegen die Cuticula sehr schön; z. B. Schafwolle.

Nr. 152. Zur Darstellung der Haarelemente bringe man ein 1—2 cm langes Stück eines Haares in einem Tropfen reiner Schwefelsäure auf den Objektträger und lege ein Deckglas auf. Drückt man nun leicht mit einer Nadel auf das Glas, so lösen sich Fasern von der Rindensubstanz ab, welche aus verklebten Rindenzellen bestehen. Nun erwärme man den Objektträger leicht, drücke dann abermals mit der Nadel, so dass sich das Deckglas etwas verschiebt; man wird alsdann zahlreiche freie Elemente, Oberhautschüppchen und Rindenzellen, wahrnehmen.

Nr. 153. Zur Darstellung der Elemente des Haarbalges (und des Haares) schneide man von einer schnurrbarttragenden menschlichen Oberlippe ein Stück von 2 cm Seite aus und lege es in verdünnte Essigsäure

¹⁾ Am besten ist hierfür die Fusssohlenhaut von Kindern, weil die Knäueldrüsen-gänge hier ganz senkrecht stehen.

²⁾ Beim Schneiden setze man das Messer an die Volarseite, nicht an die Nagel-seite des Fingergliedes an.

(5 cem Essigsäure zu 100 cem destill. Wasser). Nach zwei Tagen lassen sich einzelne Haare sammt den Scheiden leicht ausziehen und durch Zerzupfen in einem Tropfen destill. Wasser in ihre Elemente zerlegen. (Fig. 171.) Die Zellen der Henle'schen Schicht schwimmen in kleinen Komplexen im Präparate und sehen gefensterten Membranen oft täuschend ähnlich (Fig. 171, 5). Nicht selten erhält man Haarbälge, an deren Grund ein Ersatzhaar sich bildet (ähnlich Fig. 174).

Nr. 154. Zu Studien über Haar und Haarbalg fixire man Stückchen (von 2—3 cm Seite) der möglichst frischen Kopfhaut in ca. 200 cem 2,5%iger Lösung von Kali bichrom. (Nr. 9 pag. 5) 4—8 Wochen lang, wasche sie 1—3 Stunden in (womöglich fließendem) Wasser aus und härte sie unter Lichtausschluss in ca. 100 cem allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14). Längsschnitte, welche bei genügender Feinheit die ganze Länge des Haarbalges treffen, sind sehr schwer anzufertigen. Man orientire sich zuerst makroskopisch über die Richtung der Haare. Zu Präparaten, wie Fig. 170, sind dicke Schnitte ungefärbt in Glycerin einzuschliessen. Feine Schnitte treffen fast regelmässig nur Stücke des Haarbalges. Leichter ist es, feine Querschnitte zu erzielen; man muss nur darauf achten, genau senkrecht zur Längsrichtung der Haare, nicht parallel der Oberfläche der Haut zu schneiden. Man erhält dann auf einem Schnitte Durchschnitte in verschiedenen Höhen der Haare und Haarbälge. Solche Schnitte färbe man mit dünnem Karmin (pag. 18) und Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17) oder noch besser, zuerst mit Haematoxylin und dann mit Pikrokarmin (10 Min.) (pag. 19) und konservire sie in Damarfirniss (pag. 23). Besonders schön sind die Stellen, an denen die Haarbälge nahe über dem Bulbus durchschnitten sind (Fig. 172).

Nr. 155. Für Haarentwicklung schneide man Stücke (von ca. 2 cm Seite) der Stirnhaut (nicht der behaarten Kopfhaut) eines 5—6 Monate alten menschlichen Embryo aus, spanne sie auf (Nr. 148), fixire sie 14 Tage in 100—200 cem Müller'scher Flüssigkeit (pag. 13) und härte sie in ca. 100 cem allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14). Durchfärben der Stücke mit Boraxkarmin (pag. 19) ist zu empfehlen¹⁾. Man klemme das Stück in Leber und suche möglichst genau in der Richtung der Haarbälge zu schneiden, was viel leichter gelingt, als bei der Kopfhaut Erwachsener. Konserviren in Damarfirniss (pag. 23). Die Schnitte zeigen alle Entwicklungsstadien (Fig. 173). Die Höcker sind nur bei ganz gut erhaltener Epidermis (die bei Embryonen ja oft etwas macerirt ist) zu sehen; man findet sie leichter bei thierischen Embryonen (z. B. beim Rind).

Nr. 156. Für Haarwechsel sind sagittale Durchschnitte der Augenhäuter neugeborener Kinder geeignet. Behandlung wie Nr. 176.

Nr. 157. Talgdrüsen. Man fixire und härte Nasenflügel neugeborener Kinder in 100 cem 2,5%iger Lösung von Kali bichrom. (wie Nr. 154); dickere (Fig. 175 A) und feinere (Fig. 175 B) Schnitte färbe man mit dünnem Karmin (pag. 18) und mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17) und konservire sie in Damarfirniss (pag. 23). Längs dem Nasenrücken geführte Schnitte treffen öfter Talgdrüse und Haarbalg zugleich, nur müssen die Schnitte genau senkrecht geführt sein. Nasenflügel Erwachsener geben wegen

¹⁾ Man kann auch die Schnitte mit Böhmer'schem Haematoxylin färben.

der sehr grossen, mit weiten Ausführungsgängen versehenen Talgdrüsen keine schönen mikroskopischen Bilder. Kleine Talgdrüsen mit Haarbälgen sieht man mit unbewaffnetem Auge beim Abziehen macerirter Epidermis von älteren Leichen.

Nr. 158. Blutgefässe der Haut. Man injizire von der Art. ulnaris (resp. A. tibial. postic.) aus mit Berliner Blau eine ganze Hand (resp. einen Fuss) eines Kindes, fixire sie in 1—2 Liter Müller'scher Flüssigkeit (pag. 13), schneide nach einigen Tagen Stücke (von 2—3 cm Seite) des Handtellers (resp. der Sohle) aus, welche man 2—4 Wochen in 100—200 ccm Müller'scher Flüssigkeit fixirt und dann in ca. 100 ccm allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14) härtet. Es müssen dicke Schnitte angefertigt werden, die man ungefärbt in Damarfirniss konservirt (pag. 23). Die Papillen sind an solchen Schnitten nur an den Kapillarschlingen kenntlich. Dem Ungeübten scheint es, als ob die Schlingen sich bis in die Schleimschicht hinein erstreckten.

Nr. 159. Zu Uebersichtspräparaten der Milchdrüse fixire und härte man die Brustwarze und einen Theil (von 3—4 cm Seite) der Drüse in 60—100 ccm absolutem Alkohol. Womöglich nehme man Drüsen von Individuen, die vor nicht zu langer Zeit geboren haben, ferner jungfräuliche Drüsen etc. Senkrecht durch die Warze und in beliebiger Richtung durch die Drüsensubstanz gelegte Schnitte färbe man mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17) und konservire sie in Damarfirniss (pag. 23).

Nr. 160. Für den feineren Bau der Milchdrüse lege man lebenswarme Stückchen der Milchdrüse (von 3—5 mm Seite) eines trächtigen oder säugenden Thieres in 5 ccm der Chromosmium-Essigsäure (pag. 5) und härte nach 1—2 Tagen dieselben in ca. 30 ccm allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14). Die sehr feinen Schnitte färbe man mit Saffranin (pag. 19, 4), konservire sie in Damarfirniss (pag. 23). (Fig. 177.) Die Bilder sind wegen der kleinen Drüsenzellen (beim Kaninchen) oft schwer verständlich.

Nr. 161. Elemente der Milch. Man bringe einen Tropfen Kochsalzlösung auf einen reinen Objektträger, fange mit einem auf die Brustwarze einer Stillenden aufgelegten Deckglas einen Tropfen herausgedrückter Milch auf und setze das Deckglas auf die Kochsalzlösung. Starke Vergrösserung! (Fig. 179 A).

Nr. 162. Elemente des Kolostrum. Man verfare wie bei Nr. 161 an der Brust einer Schwangeren kurz vor der Geburt. Man vermeide auf das Deckglas zu drücken. Die Kerne der Kolostrumkörperchen sind selten ohne Weiteres deutlich zu sehen; auf Zusatz eines Tropfen Pikrokarmine (pag. 26) erscheinen sie als mattrothe Flecke.

X. Sehorgan.

Das Sehorgan besteht aus dem Augapfel (Bulbus oculi), dem Sehnerven, aus den Augenlidern und dem Thränenapparate.

Der Augapfel.

Der Augapfel ist eine Hohlkugel, welche theils geformten, theils flüssigen Inhalt einschliesst. Die Wandung der Hohlkugel besteht aus drei

Häuten: 1. der Tunica externa, einer bindegewebigen Haut, welche einen vorderen durchsichtigen Abschnitt, die Hornhaut (Cornea), von der übrigen undurchsichtigen Lederhaut (Sklera) unterscheiden lässt; 2. der Tunica media, die, reich an Gefäßen, in drei Abschnitte, die Aderhaut (Chorioidea), den Strahlenkörper (Corpus ciliare) und die Regenbogenhaut (Iris) zerfällt und 3. der Tunica interna, Netzhaut (Retina), welche die Endapparate des Sehnerven enthält. Der geformte Inhalt des Augapfels besteht aus der Linse und dem Glaskörper.

Tunica externa.

Die Cornea besteht aus fünf Schichten, welche von vorn nach hinten gezählt, folgende Lagen bilden (Fig. 180): 1. das Hornhautepithel, 2. die vordere Basalmembran, 3. die Substantia propria corneae, 4. die hintere Basalmembran, 5. das „Hornhautendothel“.

Fig. 180.

Senkrechter Durchschnitt der Hornhaut des Menschen, 100mal vergrößert. Technik Nr. 163 b, pag. 260.

ad 1. Das Hornhautepithel ist ein geschichtetes Pflasterepithel und besteht zu unterst aus einer Lage cylindrischer, scharf konturirter Zellen, welchen drei bis vier (bei Thieren mehr) Lagen rundlicher Zellen folgen, die ihrerseits von mehreren Schichten abgeplatteter, aber noch kernhaltiger Zellen überdeckt werden. Die Dicke des Epithels beträgt beim Menschen 0,03 mm. Am Rande der Hornhaut setzt sich das Epithel in dasjenige der Conjunctiva sclerae fort.

ad 2. Die vordere Basalmembran (Lamina elastica anterior, Bowman'sche Membran) ist eine beim Menschen deutlich sichtbare, bis zu 0,01 mm dicke Schicht von fast homogenem Aussehen. Sie ist an ihrer Oberfläche mit feinen Zacken und Leisten zur Verbindung mit den Cylinderzellen des Hornhautepithels versehen; an ihrer Unterfläche geht sie allmählich in die Substantia propria corneae über, als deren Modifikation die vordere Basalmembran gilt.

ad 3. Die Substantia propria corneae bildet die Hauptmasse der Cornea. Sie besteht aus feinen, gerade verlaufenden Fibrillen, welche durch eine interfibrilläre Kittsubstanz zu fast gleich dicken Bündeln vereinigt sind; die Bündel werden ihrerseits durch eine interfascikuläre Kittsubstanz zu platten Lamellen verbunden, die in vielen Schichten übereinander gelegen

sind und durch eine interlamelläre Kittsubstanz zusammengehalten werden. Die Lamellen sind parallel der Hornhautoberfläche gelagert und verlaufen in senkrecht aufeinander stehenden Meridianen, so dass ein vertikal durch die Mitte der Hornhaut geführter Schnitt abwechselnd längs und quer getroffene Bündel zeigt. Einzelne schräg verlaufende Bündel (sogen. *Fibrae arcuatae*) verbinden die einzelnen Lagen mit ihren nächstoberen resp. nächstunteren Nachbarn; besonders ausgeprägt finden sich solche Bündel in den vorderen Schichten der *Substantia propria*. In die Kittsubstanz ist ein vielfach (bei manchen Thieren [z. B. beim Frosch] rechtwinkelig), verzweigtes Kanalsystem eingegraben, die Saftkanälchen („Hornhautkanälchen“) welche an vielen Stellen zu breiteren, ovalen Lücken, den Saftlücken

Saftkanälchen. Saftlücken.

Fig. 181.

Flächenschnitt der Cornea des Ochsens. Negatives Silberbild, das Kanalsystem ist hell auf dunklem Grunde. ca. 240mal vergrößert.
Technik Nr. 167, pag. 262.

Hornhautzellen.

Fig. 182.

Flächenschnitt der Cornea des Kaninchens. Fixe Hornhautzellen. ca. 240mal vergrößert.
Technik Nr. 169, pag. 263.

(„Hornhautkörperchen“) (Fig. 181) erweitert sind. Letztere liegen zwischen den Lamellen, während die Saftkanälchen ausserdem noch zwischen den Bündeln verlaufen. Saftlücken und Saftkanälchen enthalten eine seröse Flüssigkeit; ausserdem finden sich daselbst auch Zellen und zwar: a) fixe Hornhautzellen; das sind abgeplattete, der einen Wand des Kanalsystems angeschmiegte, mit einem grossen Kerne versehene Binde-substanzzellen (Fig. 182) und b) Wanderzellen (Leukocyten).

ad 4. Die hintere Basalmembran (*Membrana Descemetii*, *Lamin. elast. poster.*) ist eine glashelle, elastische Haut von nur 0,006 mm Dicke. Ihre Hinterfläche ist bei erwachsenen Menschen an der Peripherie der Hornhaut mit halbkugeligen Erhabenheiten, sog. Warzen, besetzt.

ad 5. Das „Hornhautendothel“ wird durch eine einschichtige Lage polygonaler, platter, mit leicht prominirenden Kernen versehener Zellen hergestellt.

Die Sklera besteht vorzugsweise aus Bindegewebsbündeln, welche sich in verschiedenen, hauptsächlich in meridionalen und äquatorialen Richtungen durchflechten. Ausserdem befinden sich da-

Fig. 183.

Sonkrechter Schnitt durch einen Theil der Sklera und die ganze Chorioidea des Menschen, 100mal vergr. *g* Größere Gefässe, *p* Pigmentzellen, *c* Querschnitte von Kapillaren. Technik Nr. 163c, pag. 260.

selbst feine elastische Fasern in Netzen angeordnet, sowie platte Binde-substanzzellen, welche, wie die fixen Hornhautzellen, in Saftlücken liegen, die in der Sklera nur unregelmässiger gestaltet sind. Zwischen Sklera und Chorioidea befindet sich ein lockeres, reichlich mit elastischen Fasern und verästelten Pigment- und platten pigmentfreien Zellen („Endothelzellen“) versehenes Gewebe, welches beim

Lösen der Sklera von der Chorioidea theils ersterer, theils letzterer anhaftet, und Lamina fusca sclerae oder Lamina suprachorioidea heisst. Die Dicke der Sklera ist hinten am mächtigsten (1 mm) und nimmt nach vorn zu allmählich ab.

Tunica media.

Die Chorioidea ist durch ihren grossen Reichthum an Blutgefässen ausgezeichnet, welche in zwei Schichten geordnet sind. Die oberflächliche, nach Innen von der Lamina suprachorioidea befindliche Lage, die „Schicht der gröberen Gefässe“ (Fig. 183), enthält die Verästelungen der arteriellen und venösen Gefässe, die in eine aus feinen elastischen Fasernetzen und zahlreichen verästelten Pigmentzellen bestehende Grundsubstanz (Stroma) eingebettet sind. Das Stroma enthält ausserdem als Begleiter der grösseren Arterien fibrilläres Bindegewebe, glatte Muskelfasern und platte, nicht pigmentirte Zellen, die zu feinen Häutchen („Endothelhäutchen“) verbunden sind. Die tiefere Schicht, Membrana choriocapillaris wird durch ein engmaschiges Netz weiter Kapillaren, zwischen denen keinerlei geformte Elemente gelegen sind, gebildet. Zwischen beiden Gefässschichten liegt die meist pigmentlose, aus feinen elastischen Fasernetzen bestehende Grenzschicht der Grundsubstanz; an ihre Stelle treten bei Wiederkäuern und Pferden wellig verlaufende Bindegewebsbündel, welche dem Auge dieser

Thiere einen metallischen Glanz verleihen. Diese glänzende Haut ist unter dem Namen *Tapetum fibrosum* bekannt. Das gleichfalls irisirende *Tapetum cellulosum* der Raubthiere wird hingegen durch mehrere Lagen platter Zellen, die zahlreiche, feine Krystalle enthalten, hergestellt. An die

Fig. 184.

A Aus einem Zupfpräparate der menschlichen Chorioidea, 240mal vergr. p Pigmentzellen, e elastische Fasern, k Kern einer platten, nicht pigmentirten Zelle; der Zellenkörper ist hier nicht sichtbar. B Stückchen der menschlichen Chorio-capillaris und der anhaftenden Glashaut, 240mal vergr., c weite Kapillaren, theilweise noch Blutkörperchen (b) enthaltend, e Glashaut, eine feine Gitterung zeigend.

Technik Nr. 164 a, pag. 261.

Membrana choriocapillaris schliesst sich die Glashaut, eine strukturlose, bis 2μ dicke Lamelle, welche auf ihrer äusseren Oberfläche mit einer feinen, gitterförmigen Zeichnung versehen ist. Eine auf der inneren Oberfläche bemerkbare polygonale Felderung wird durch Abdrücke des Retinalpigmentes hervorgerufen. Die Glashaut steht den elastischen Häuten nahe.

Das *Corpus ciliare* wird gebildet von den *Proc. ciliares* und einem diesen aufliegenden muskulösen Ringe, dem *Musc. ciliaris*. Die *Processus ciliares* sind 70—80 meridional gestellte Falten, welche von der *Ora serrata*

Fig. 185.

Meridionalschnitt durch den rechten Cornealfalz (s. pag. 242) des Menschen. 30mal vergrößert. 1 Epithel, 2 Bindegewebe der Conjunctiva, 3 Sklera, 4, 5, 6, 7 und 8 *Corpus ciliare*, 4 meridionale, 5 radiäre, 6 circumkuläre Fasern des *M. ciliaris*, 7 *Processus ciliaris*, 8 *Fars ciliaris retinae*, 9 *Fars iridica retinae*, 10 Stroma der Iris, 11, 12, 13 Cornea, 11 hintere Basalmembran, 12 *Substantia propria*, 13 Epithel, 14 Schlemm'scher Kanal, 15 Iriswinkel. Technik Nr. 163 a, pag. 260.

(pag. 243) an niedrig beginnend sich allmählich bis zu einer Höhe von 1 mm erheben und nahe dem Linsenrande plötzlich abfallend enden. Jeder Ciliarfortsatz besteht aus fibrillärem Bindegewebe, das zahlreiche Blutgefässe ent-

hält und einwärts durch eine Fortsetzung der Glashaut, die hier durch sich kreuzende Fältchen gekennzeichnet ist, abgegrenzt wird. Der *Musculus ciliaris* ist ein ca. 3 mm breiter, vorn 0,8 mm dicker Ring, der an der inneren Wand des Schlemm'schen Kanals entspringt. Seine glatten Elemente verlaufen nach drei verschiedenen Richtungen. Wir unterscheiden: 1. meridionale Fasern (Fig. 185, 4); es sind dies die der Sklera zunächst gelegenen zahlreichen Muskelbündel, welche bis zum glatten Theile der Chorioidea reichen; sie sind unter dem Namen *Tensor chorioideae* bekannt, 2. radiäre Fasern, den meridionalen zunächst gelegene Bündel, welche von Aussen nach Innen eine immer mehr radiäre (zum Mittelpunkte des Bulbus orientirt) Richtung annehmen und hinten, noch im Bereiche des Ciliarkörpers, in cirkuläre Richtung umbiegen (5), 3. cirkuläre (äquatoriale) Fasern, den sogenannten Müller'schen Ringmuskel. (6).

Die Regenbogenhaut, Iris, besteht aus einem in drei Schichten gesonderten Stroma, das vorn von einer Fortsetzung des Hornhautendothels, hinten von einer modifizirten Fortsetzung der Retina überzogen wird. Wir unterscheiden demnach in der Iris fünf Lagen:

Fig. 186.

Senkrechter Schnitt durch den pupillaren Theil der menschlichen Iris. 100 mal vergr. Es ist etwa ein Fünftel der ganzen Irisbreite gezeichnet. *g* Blutgefäss mit dicker Bindegewebsscheide, *m* Musc. sphincter pupillae, quer durchschnitten, *p* Pupillarrand der Iris. Technik Nr. 164 c, pag. 261.

1. Das „Endothel“ der vorderen Irisfläche; es besteht, wie das der Hornhaut, aus einer einfachen Lage abgeplatteter, polygonaler Zellen.

2. Die vordere Grenzschicht (retikuläre Schicht); sie besteht aus 3—4 Lagen von Netzen, welche durch sternförmige Bindesubstanzzellen gebildet werden. Dieses dem Reticulum des adenoiden Gewebes ähnliche Netzwerk geht an seiner hinteren Fläche allmählich über in

3. Die Gefässschicht der Iris, welche in einem lockeren, von feinen Bindegewebsbündeln gebildeten Stroma zahlreiche radiär (zur Pupille) verlaufende Gefässe enthält. Blutgefässe und Nerven sind mit besonders dicken

Bindegewebsscheiden umhüllt. In der Gefässschicht sind glatte Muskelfasern gelegen und zwar a) ringförmig um den Pupillarrand der Iris angeordnete Faserbündel: der bis zu 1 mm breite *Musc. sphincter pupillae* und b) von diesem in radiärer Richtung ausstrahlende, spärliche Fasern, welche keine zusammenhängende Schicht bilden; der *Musc. dilatator pupillae*. In der vorderen Grenzschicht und in der Gefässschicht sind in sehr wechselnden Mengen pigmentirte Zellen gelegen, die jedoch bei blauen Augen fehlen.

4. Die hintere Grenzschicht, eine glashelle Membran, welche elastischer Natur ist.

5. Die Pigmentschicht der Iris (*Pars iridica retinae*); sie wird durch zwei Lagen gebildet; die vordere enthält spindelförmige, die hintere polygonale Pigmentzellen. Beide Lagen sind derart von Pigmentkörnchen durchsetzt, dass ein Erkennen der einzelnen Elemente meist unmöglich ist. Das Pigment fehlt hier nur bei Albinos. Die hintere Fläche der Pigmentschicht wird von einem sehr feinen Häutchen, der *Limitans iridis*, einer Fortsetzung der *Membrana limitans interna retinae* (pag. 249) überzogen.

Cornealfalz. So nennt man die Uebergangsstelle der Sklera in die Cornea, die insofern von besonderem Interesse ist, als daselbst Iris, Cornea und *Corpus ciliare* an einander stossen. Der Uebergang der Sklera in die Cornea erfolgt ganz direkt; die mehr wellig verlaufenden Sklerabündel gehen kontinuierlich in die gestreckten Fibrillenbündel der Hornhaut über, das Saftkanalsystem der Sklera kommuniziert mit dem der Cornea. Die mikroskopisch nicht scharf nachzuweisende Uebergangslinie ist eine schräge, indem die Umwandlung der Sklera in das Corneagewebe in den hinteren Partien der *Tunica externa* früher erfolgt, als vorn. Der hinterste Abschnitt der *Substantia propria corneae*, sowie die hintere Basalmembran stossen in der Peripherie mit dem Ciliarrande der Iris zusammen, die Stelle heisst der Iriswinkel (Fig. 185, 15). Hier sendet die Iris gegen die Hinterfläche der hinteren Basalmembran bindegewebige Fortsätze, die Irisfortsätze, die, bei Thieren (Rind, Pferd) mächtig entwickelt, das sogen. *Ligamentum iridis pectinatum* darstellen. Beim Menschen sind diese Fortsätze kaum ausgebildet. Mit den Irisfortsätzen vereinigt sich die hintere Basalmembran, indem dieselbe sich in ihrer ganzen Peripherie in Fasern auflöst, die mit den Irisfortsätzen verschmelzen; diese Fasern erhalten noch Verstärkungen von Seiten der elastischen Sehnen und des intermuskulären Bindegewebes des Ciliarmuskels, sowie in geringerem Grade Zuwachs von Seiten der Sklera. Somit theiligen sich am Aufbaue der im Iriswinkel ausgespannten Fasern sämtliche am Cornealfalz auf einander treffende Gewebe: Cornea, Sklera, Iris und *M. ciliaris*; das von der Hinterfläche der hinteren Basalmembran auf die Irisoberfläche sich fortsetzende Endothel hüllt die Fasern ein. Die zwischen den Fasern befindlichen Räume, die, in offener Verbindung mit der vorderen Augenkammer stehend, dieselbe Flüssigkeit wie diese enthalten, werden die Fontana'schen Räume genannt. Sie sind beim Menschen kaum entwickelt.

Tunica interna.

Die Netzhaut, Retina, erstreckt sich von der Eintrittsstelle des Sehnerven bis zum Pupillarrande der Iris und lässt in diesem Bereiche drei Zonen unterscheiden: 1. Die Pars optica retinae, das eigentliche Ausbreitungsgebiet des Nerv. opticus. Dieser allein lichtempfindende Theil der Netzhaut erstreckt sich, den ganzen Augenhintergrund auskleidend, bis nahe an den Ciliarkörper und hört dort mit einer scharfen, gezackten, makroskopisch schon wahrnehmbaren Linie, der Ora serrata, auf. 2. Die Pars ciliaris retinae, von der Ora serrata bis zum Ciliarrande der Iris reichend. 3. Die Pars iridica retinae, welche die Hinterfläche der Iris vom Ciliarrande bis zum Pupillarrande überzieht.

ad 1. Die Pars optica retinae zerfällt in zwei Abtheilungen, eine äussere, die Schicht der Sehzellen (Neuroepithelschicht) und eine innere, die Gehirnschicht; jede dieser Abtheilungen lässt wieder mehrere Lagen unterscheiden und zwar die Neuroepithelschicht drei, die Gehirnschicht fünf; rechnen wir dazu noch die genetisch zur Retina gehörende Pigmentschicht (Pigmentepithel), welche dicht unter der Chorioidea gelegen ist, so ergeben sich neun Schichten, die von aussen nach innen gezählt in folgender Weise angeordnet sind:

Fig. 187.

Senkrechter Schnitt der Retina des Menschen, 240mal vergrössert. Die Nervenfaserschicht ist quer durchgeschnitten und nur sehr dünn, da der Schnitt nicht vom Augenhintergrunde stammt. *b* Blutgefässe, *k* Radiärfasergekel. Technik Nr. 164 e, pag. 261.

Die Elemente vorstehender Schichten sind nur zum Theil nervöser resp. epithelialer Natur; der andere Theil wird durch Stützsubstanz, die indessen nicht bindegewebiger Natur ist (s. Rückenmark pag. 119), gebildet. Die hervorragendsten Elemente der Stützsubstanz sind die Radiärfasern (Müller'sche Stützfasern), langgestreckte Zellen, welche von der Innenfläche der Retina durch sämtliche Schichten bis zu den Stäbchen und Zapfen

1) Dazu wird noch die Membr. limitans interna als 10. Lage gezählt, die indessen keine selbständige Haut darstellt (siehe Müller'sche Stützfasern.)

hinaufreichen. Ihr inneres Ende ist durch einen kegelförmigen Fuss, den Radiärfaserkegel (*b*), charakterisirt; indem die verdickten Basen dieser Kegel sich dicht aneinanderfügen, täuschen sie eine an der inneren Oberfläche der Retina liegende Membran, die sog. Membrana limitans interna (Fig. 188, *l*) vor. Von der Spitze des Kegels an sich immer mehr ver-

Fig. 188.

Senkrechter Schnitt der Netzhaut eines Kaninchens, 240mal vergr. *k* Kegelförmiger Fuss der Radiärfasern, *n* kernhaltiger Theil derselben, *l* „Membrana limitans interna“.

Technik Nr. 164 e, pag. 261.

schmälernd ziehen die Stützfaser durch die innere retikuläre Schicht (ohne mit dieser Verbindung einzugehen) in die innere Körnerschicht; hier entsenden sie feine, runde und abgeplattete Fortsätze, hier sind sie auch mit einem Kerne versehen (Fig. 188, *n*); von da ziehen die Fasern, überall Stütze abgebend, durch äussere retikuläre und äussere Körnerschicht bis zur Membrana limitans (externa), mit welcher sie sich verbinden. Ausser diesen radiären Stützzellen kommen in der äusseren retikulären Schicht konzentrische Stützzellen vor; sie sind der Fläche nach ausgebreitete, mit langen Ausläufern versehene

Zellen, die theils kernhaltig, theils kernlos sind. Von der Oberfläche der Membrana limitans ext. erheben sich noch feine Fasern, welche hürdenförmig die Basen der Stäbchen und Zapfen umfassen, die sog. Faserkörbe (Fig. 189). Zur Stützsubstanz gehört endlich der grösste Theil der beiden retikulären Schichten, sowie die geringen Mengen der Kittsubstanz in der Ganglienzellenschicht.

Die genauere Schilderung der einzelnen Retinaschichten geschieht aus praktischen Gründen in umgekehrter, von Innen nach Aussen zählender Reihenfolge.

Gehirnschicht.

Die Nervenfaserschicht besteht aus nackten Achsencyclindern, welche zu Bündeln angeordnet sich plexusartig verbinden. An der Eintrittsstelle des N. opticus am dicksten gelagert, breiten sich die Fasern in radiärer Richtung bis zur Ora serrata aus. Die radiäre Anordnung der Fasern erleidet eine Störung im Bereiche der Macula lutea (pag. 247). Die Achsencyclinder sind zum grössten Theile centripetale Fasern, welche von den in der Retina gelegenen Ganglienzellen herkommen; zum andern Theil aber sind die Achsencyclinder Fortsätze von Ganglienzellen des Gehirns, centrifugale Fasern, welche in der inneren Körnerschicht frei verästelt enden. Fig. 189.

Die Ganglienzellenschicht („Ganglion nervi optici“) besteht aus einer einfachen Lage grosser multipolarer Ganglienzellen, welche einen ungetheilten Fortsatz (Nervenfortsatz) centralwärts, gegen die Nervenfaserschicht, einen oder mehrere verästelte Fortsätze (Protoplasmafortsätze)

peripheriewärts, gegen die innere retikuläre Schicht entsenden; dort bilden die Fortsätze sich theilend feine der Fläche nach ausgebreitete Flechtwerke, welche mit Fortsätzen anderer Ganglienzellen ein dichtes Gewirr herstellen (Fig. 189).

Die innere retikuläre Schicht („granulirte Schicht“, „Neurospongium“) besteht aus einem sehr feinen Netzwerke der Stützsubstanz, welches ein dichtes, von Fortsätzen sämtlicher Ganglienzellen der Retina gebildetes, z. Th. nervöses Gewirr trägt.

Die innere Körnerschicht; ihre „Körner“ benannten Elemente sind sehr verschiedener Natur. Die innerste Lage wird durch grosse Ganglienzellen¹⁾ hergestellt, welche verästelte Fortsätze in die innere retikuläre

Fig. 189.

Schema, links Stützelemente, rechts nervöse u. epitheliale Elemente der Netzhaut.

Schicht senden. Von vielen — nicht von allen — dieser Zellen geht ein Nervenfortsatz in die Optikusfaserschicht über (Fig. 189). Die übrigen Lagen bestehen grösstentheils aus kleinen bipolaren Ganglienzellen („Ganglion retinae“), deren centraler Fortsatz bis in die innere retikuläre Schicht reicht

¹⁾ Diese Zellen wurden früher Spongioblasten genannt, weil man sie irriger Weise für die Erzeuger des Neurospongium hielt; sie sind als Elemente des Ganglion n. optici zu betrachten, welche nicht, wie die anderen, durch die innere retikuläre Schicht durchgewandert sind.

und sich dort in feine varicöse Aeste auflöst, während der periphere Fortsatz bis zur äussersten retikulären Schicht zieht; dort theilt er sich gabelig, breitet sich der Fläche nach aus und geht in feinste Fibrillen zerfallend in ein subepitheliales Gewirr über, dass durch die Verfilzung mit Fortsätzen benachbarter Ganglienzellen gebildet wird. Alle bipolaren Ganglienzellen schicken einen Fortsatz zwischen die Sehzellen in die Höhe, der nahe der Membrana limitans mit einer kleinen Verdickung endet (Fig. 189). Endlich finden sich in dieser Schicht die Kerne der Radiärfasern.

An der Grenze gegen die nächst äussere Schicht liegen kleinere und grössere sternförmige Zellen; dieselben nehmen mit vielen Fortsätzen Theil an der Bildung des subepithelialen Gewirres, ein Fortsatz verläuft gegen die innere reticuläre Schicht, wo er feinverästelt endet und ein Fortsatz — der Achsencylinderfortsatz — biegt nach längerem horizontalem Verlaufe in vertikale Richtung um und geht in die Nervenfaserschicht über (Fig. 189).

Die äussere retikuläre Schicht („Zwischenkörnerschicht“, „subepitheliale Schicht“) ist ebenfalls ein feines Netzwerk der Stützsubstanz, welches das eben erwähnte nervöse Gewirr trägt. Von Zellen finden sich hier die konzentrischen Stützzellen (s. pag. 244), sowie „subepitheliale Ganglienzellen“; letztere sind nichts anderes, als dislocirte Elemente des Ganglion retinae, die sich von den bipolaren Ganglienzellen nur durch ihre gedrungene Gestalt unterscheiden, hinsichtlich ihrer Endverästlung aber vollkommen mit diesen übereinstimmen (Fig. 189).

Neuroepithelschicht.

Die Neuroepithelschicht besteht aus zweierlei Elementen: den Stäbchen-Sehzellen und den Zapfen-Sehzellen, die beide dadurch ausgezeichnet sind, dass ihr Kern in der unteren Hälfte der Zelle gelegen ist, während der obere kernlose Abschnitt durch eine durchlöchernte Membran (die Membrana limitans extern.) von dem unteren Theile scharf abgegrenzt wird. Dadurch wird das Bild verschiedener Schichten hervorgerufen; die innere, aus den kernhaltigen Theilen der Sehzellen bestehende Schicht ist als äussere Körnerschicht, die äussere, kernlose Abtheilung als Schicht der Stäbchen und Zapfen bekannt. Zwischen beiden liegt die Membrana limitans.

1. Stäbchenzellen. Die äusseren Hälften derselben sind die Stäbchen, langgestreckte Cylinder ($60\ \mu$ lang, $2\ \mu$ dick), welche aus einem homogenen Aussengliede und einem feinkörnigen Innengliede bestehen. Die Aussenglieder sind der ausschliessliche Sitz des Sehpurpurs. Das Innenglied besitzt in seinem äusseren Ende einen ellipsoiden faserigen Körper, den Fadenapparat. Die inneren Hälften der Stäbchensehzellen werden Stäbchenfasern genannt; sie sind sehr feine Fäden, welche mit einer kernhaltigen Anschwellung, dem Stäbchenkorne versehen sind. Der Kern ist durch 1—3 helle Querbänder ausgezeichnet.

2. Zapfenzellen. Die äusseren Hälften derselben, die Zapfen, bestehen gleichfalls aus einem Aussengliede und einem Innengliede. Die

Fig. 190.

Elemente der Retina des Affen isolirt, 240mal vergr.

1 Verstimelte Ganglionzelle des Gangl. nerv. optic.

2 Elemente des inneren Körnerschicht.

3 Stäbchenzellen und Fragmente derselben unten zwei Aussenglieder, von denen das eine eine quere Streifung, den Beginn des Zerfalles in quere Plättchen, zeigt; darüber zwei Stäbchen; Aussenglied des unteren im Zerfalle begriffen. Oben vollständiger Stäbchenzellen, *a* Aussenglied, *i* Innenglied, *k* Stäbchenkorn, *X* Fadenapparat.

4 Zapfenzelle, *a* Anssenglied, *i* Innenglied, *k* Zapfenkorn, *f* Zapfenfaser, am unteren Ende abgerissen, *X* Fadenapparat.

5 Müller'sche Stützfaser (Radiärfaser), *k* Kern derselben, *r* Radiärfaserkegel. Technik Nr. 166, pag. 266.

Aussenglieder sind konisch und kürzer als diejenigen der Stäbchen. Die Innenglieder sind dick, bauchig aufgetrieben; die Gesamtgestalt der Zapfen ist somit eine flaschenförmige. Auch das Innenglied der Zapfen enthält einen Fadenapparat. Die inneren Hälften der Zapfenzellen sind die Zapfenfasern; diese sind breit und sitzen mit kegelförmig verbreitertem Fusse auf der äusseren retikulären Schicht. Die kernhaltige Anschwellung, das Zapfenkorn, liegt gewöhnlich dicht nach Innen von der Membr. limitans.

Die Zahl der Stäbchen ist eine viel grössere, als die der Zapfen. Letztere stehen in regelmässigen Abständen, so dass immer je drei bis vier Stäbchen zwischen je zwei Zapfen liegen (Fig. 187).

Das Pigmentepithel besteht aus einer einfachen Lage sechsseitiger Zellen, welche an ihrer äusseren, der Chorioidea zugewendeten Fläche pigmentfrei sind (hier liegt auch der Kern [Fig. 188]), während der innere Abschnitt derselben zahlreiche stabförmige, 1—5 μ lange Pigmentkörnchen enthält; von diesem Theil ziehen zahlreiche feine Fortsätze zwischen die Stäbchen und Zapfen. Bei Albinos und am Tapetum (s. o. pag. 240) ist das Epithel pigmentfrei.

Der vorstehend geschilderte Bau der Retina erleidet an der Macula lutea und Fovea centralis, sowie an der Ora serrata bemerkenswerthe Modifikationen.

Macula lutea und Fovea centralis. Im Bereiche der Macula erfahren die Retinaschichten folgende Veränderungen. Feine Optikusfasern verlaufen von der Eintrittsstelle des Sehnerven gerade zum nächstgelegenen, medialen Theile der Macula; die über und unter diesen Fasern aus der Eintrittsstelle kommenden dickeren Nervenfasern verlaufen dagegen in aufwärts resp. abwärts konvexen Bogen und vereinigen sich am lateralen Rande der Macula. Die Ganglienzellschicht wird bedeutend dicker, indem die hier bipolaren Ganglienzellen statt in einfacher Lage in vielen (bis 9) Lagen übereinander angeordnet sind. Innere retikuläre, innere Körner- und äussere retikuläre Schicht erleiden keine wesentlichen Veränderungen. Die Neuro-

epithelschicht wird einzig allein durch Zapfensehzellen hergestellt. Schon am Rande der Macula vermindert sich die Zahl der Stäbchensehzellen, in der Macula selbst fehlen sie vollkommen: in Folge dessen sind die Zapfenfasern deutlich sichtbar und werden als Faserschicht beschrieben. Die Zapfenkörner liegen hier wegen ihrer grossen Menge in mehreren Lagen übereinander.

Fig. 191.

Rechte Hälfte eines senkrechten Schnittes durch die Macula lutea und Fovea centralis eines erwachsenen Mannes, 70mal vergr. Rechts sind die verdickten Schichten der Macula sichtbar, die nach links in die Fovea übergehen. Von Optikusfasern sind nur Spuren, von der Membr. limitans externa ist bei dieser Vergrösserung nichts zu sehen. Die Aussenglieder der Zapfen sind abgebrochen. Technik Nr. 164 f, pag. 261.

Gegen die in der Mitte der Macula lutea gelegene Fovea centralis verdünnen sich allmählich die Retinaschichten und hören zum Theil gänzlich auf. Zuerst verschwindet die Nervenfaserschicht, dann die Schicht der Ganglienzellen, weiterhin die innere retikuläre, die innere Körnerschicht und, bis auf einen feinen Saum, die äussere retikuläre Schicht, so dass im Centrum der Fovea („Fundus foveae“) nur die Neuroepithelschicht vorhanden ist.

Ein diffuser, gelber Farbstoff durchtränkt die Gehirnschicht, fehlt aber in der Neuroepithelschicht, der Fundus foveae ist somit farblos.

Im Gebiete der Ora serrata erfolgt sehr rasch eine Abnahme der

Fig. 192.

Meridionalschnitt der Ora serrata und des angrenzenden Theiles der Pars ciliar. retinae einer 78 Jahre alten Frau, 70mal vergrössert. 1 Pigmentepithel, 2 Zapfen, der Aussenglieder entbehrend, 3 Membr. limit. extern., 4 äussere Körnerschicht, 5 äussere retikuläre Schicht, 6 innere Körnerschicht, 7 innere retikuläre Schicht, 8 Müller'sche Stützfaser, 9 Lücke in der Netzhaut, bei 10 konfluieren äussere und innere Körnerschicht und gehen in 11 die Zellen der Pars ciliar. retinae über. Technik Nr. 164 d, pag. 261.

Retinaschichten. Optikusfasern und Ganglienzellen sind schon vor der Ora verschwunden. Von den Sehzellen verschwinden zuerst die Stäbchensehzellen; die Zapfensehzellen sind noch erhalten, scheinen aber der Aussenglieder zu entbehren. Dann verliert sich die äussere retikuläre Schicht, so dass äussere und innere Körnerschicht konfluieren, endlich hört die innere retikuläre Schicht auf.

Dagegen persistiren und sind stark entwickelt die Müller'schen Stützfaser. Die Ora serrata ist häufig der Sitz seniler Veränderungen. Am

häufigsten sind Lücken, die zuerst in der äusseren Körnerschicht auftreten und sich auch weiter auf centrale Schichten ausdehnen können (Fig. 192).

ad 2. Die Pars ciliaris retinae besteht aus einer einfachen Lage gestreckter Cylinderzellen (Fig. 192, 11), welche allmählich aus der zu einer Schicht vereinten äusseren und inneren Körnerschicht hervorgehen. Diese Zellen werden an ihrer centralen Oberfläche von einer Cutikularmembran, einer ächten Membrana limitans interna, welche in der Pars optica der Retina nicht vorhanden ist, überzogen; ihre periphere Oberfläche hängt mit pigmentirten Zellen, einer Fortsetzung des Pigmentepithels, zusammen.

ad. 3. Pars iridica retinae s. Pigmentschicht der Iris (pag 242).

Was den Zusammenhang der nervösen Netzhautelemente betrifft, so ergibt sich aus dem Geschilderten, dass die Achsencylinderfortsätze der Ganglienzellen des Ganglion nervi optici, sowie die sternförmigen Zellen der inneren Körnerschicht die centripetalen Optikusfasern liefern, während die centrifugalen Nervenfasern frei in der inneren Körnerschicht enden. Die Ganglienzellen des Ganglion retinae scheinen keine Achsencylinderfortsätze zu besitzen, ihre Verbindung mit den andern nervösen Elementen geschieht nur mittelst der nervösen Gewirre in den beiden reticulären Schichten (Fig. 189). Die Verbindung mit den Sehzellen geschieht mittelst der intraepithelialen Fortsätze der Zellen des Ganglion retinae, die zwischen (nicht in) den Sehzellen enden. Physiologische Untersuchungen machen im hohen Grade wahrscheinlich, dass die Sehzellen die lichtempfindenden Theile der Netzhaut sind.

Der Sehnerv.

Der Nervus opticus ist in seinem ganzen intraorbitalen Verlaufe von Scheiden, welche Fortsetzungen der Gehirnhäute sind, eingehüllt. Zu äusserst befindet sich die aus derben longitudinalen Bindegewebsbündeln bestehende Duralscheide (Fig. 193); ihr folgt nach innen die sehr zarte Arachnoidealscheide, welche zahlreiche, verhältnissmässig dicke Bindegewebsbalken nach einwärts zur Pialscheide sendet, während die Verbindung mit der Duralscheide nur durch wenige feine Fasern hergestellt wird. Zu Innerst endlich liegt die Pialscheide, welche den Sehnerven eng umschliesst und zahlreiche, die einzelnen Nervenfaserbündel einhüllende bindegewebige Blätter abgibt. Diese Blätter stehen durch quere Bälkchen mit einander in Verbindung, woraus ein queres Gitterwerk resultirt.

Das Gewebe der Pialscheide dringt nicht in die Nervenfaserbündel ein, sondern umhüllt sie nur von aussen. Die Nervenfaserbündel bestehen aus feinen, markhaltigen, der Schwann'schen Scheide entbehrenden Fasern; sie werden durch Neuroglia verkittet, welche reich an ovalen Kernen ist. An der Eintrittsstelle des Sehnerven in den Bulbus geht die Duralscheide in die Sklera über, die Arachnoidealscheide löst sich an ihrem vorderen Ende in

Fasern auf, so dass der nach aussen von der Arachnoidealscheide gelegene Subduralraum mit dem nach innen von der Arachnoidealscheide gelegenen Subarachnoidealraum kommuniziert. Die Pialscheide verschmilzt mit der Sklera, die dort von vielen Löchern für die durchtretenden Nervenfasern durchbohrt

Fig. 193.

Längsschnitt der Eintrittsstelle des N. opticus vom Menschen, 15mal vergr. Oberhalb der Lam. cribr. ist die Verschmälerung des N. opticus sichtbar; Arteria und Vena centralis sind grösstentheils der Länge nach, weiter oben aber mehrfach der Quere nach durchschnitten. Technik Nr. 163 d, pag. 260.

ist; diese Stelle heisst *Lamina cribrosa*. Auch die *Chorioidea* beteiligt sich, wenn auch in geringerem Maasse, an der Bildung der *Lamina cribrosa*. Die Nervenfasern verlieren an der Eintrittsstelle ihr Mark, wodurch eine bedeutende Verschmälerung des ganzen Nerven bewirkt wird.

In der distalen Hälfte des N. opticus ist in dessen Achse die *Arteria* und die *Vena centralis retinae* gelegen; das diese Gefässe umhüllende Bindegewebe steht in vielfacher Verbindung mit der Pialscheide sowohl, wie mit der *Lamina cribrosa*.

Die Linse.

Die Linse besteht aus einer *Substantia propria*, die an ihrer Vorderfläche vom Linsenepithel bedeckt ist; das Ganze wird von der Linsenkapsel umgeben. Die *Substantia propria* lässt eine weichere Rindensubstanz und einen festeren Kern unterscheiden und besteht durchaus aus kolossal in die Länge gezogenen Epithelzellen, den Linsenfasern. Diese haben die Gestalt sechsseitiger, prismatischer Bänder, die an ihrem hinteren Ende kolbig verdickt sind. Die Linsenfasern der Rindensubstanz haben glatte Ränder und in der Nähe des Aequators einen ovalen Kern. Die Linsenfasern der

centralen Linsenpartie haben gezähnelte Ränder und sind kernlos. Sämtliche Fasern werden durch eine geringe Menge von Kittsubstanz mit einander verbunden, die am vorderen und hinteren Pole der Linse stärker angehäuft ist und bei Macerationsversuchen zur Bildung des sog. vorderen und hinteren Linsensternes Veranlassung giebt. Alle Linsenfaseru verlaufen in meridionaler Richtung vom vorderen Linsenstern beginnend bis zum hinteren Linsenstern; jedoch umgreift keine Linsenfaser die ganze Hälfte der Linse; je näher dem vorderen Pole eine Faser entspringt, desto weiter vom hinteren

Fig. 194.

Linsenfaseru eines neugeborenen Kindes. *A* Isolierte Linsenfaseru, drei haben glatte, eine hat gezähnelte Ränder, 240mal vergr. Technik Nr. 172, pag. 264. *B* Querdurchschnittene Linsenfaseru des Menschen, *C* Durchschnitte kolbiger Enden, 560mal vergr. Technik Nr. 173, pag. 265.

Fig. 195.

Linsenkapsel und Linsenepithel des erwachsenen Menschen. *C* Von der Innenfläche, 240mal vergr., Technik Nr. 174 a. *D* von der Seite gesehen, aus einem Meridionalschnitt durch den Linsenäquator. 1 Kapsel, 2 Epithel, 3 Linsenfaseru, 240mal vergr. Technik Nr. 174 b, pag. 265.

Pole entfernt findet sie ihr Ende. Das Linsenepithel wird durch eine einfache Lage kubischer Zellen gebildet, welche, die vordere Linsenfläche überziehend, bis zum Aequator reicht; hier geht das Epithel unter allmählicher Verlängerung seiner Elemente in Linsenfaseru über (Fig. 195, *D*). Die Linsenkapsel ist eine vorne 11—15 μ , hinten nur 5—7 μ dicke, glashelle elastische Membran, die genetisch theils Cuticularbildung (von den Linsenepithelzellen ausgeschieden), theils bindegewebiger Natur (Umwandlungsprodukt embryonaler Bindegeweshüllen) ist.

Der Glaskörper.

Der Glaskörper (Corpus vitreum) besteht aus einer flüssigen Substanz, Humor vitreus, und Faseru, welche nach allen Richtungen durch die Flüssigkeit ausgespannt sind. Die Oberfläche des Glaskörpers ist von einer stärkeren Haut, der Membrana hyaloidea, überzogen und enthält auf bestimmte Stellen beschränkte Fibrillen sowie spärliche Zellen. Von letzteren können zwei Formen unterschieden werden: 1. runde, den Leukocyten

gleichende Zellen, 2. stern- und spindelförmige Zellen. Helle Blasen (Vacuolen) enthaltende Zellen sind wahrscheinlich Untergangsformen.

Die Zonula ciliaris.

Von der Oberfläche der Membrana hyaloidea erheben sich in der Gegend der Ora serrata feine, homogene Fasern, welche in meridionaler Richtung gegen die Linse ziehen. Sie hängen an der Innenfläche der Ciliarfortsätze und springen von den Spitzen derselben hinüber zum Aequator der Linse, wo sie vor, hinter und an dem Aequator selbst an der Linsenkapsel ihre Anheftung finden. Die Fasern bilden in ihrer Gesamtheit eine nirgends vollkommen geschlossene Membran, die Zonula ciliaris, das Strahlenbändchen, das Befestigungsmittel der Linse. Als Canalis Petiti wird der zwischen hinteren Zonulafasern und vorderer Glaskörperfläche befindliche Raum bezeichnet¹⁾. Der Kanal ist gegen die hintere Augenkammer nicht vollkommen geschlossen.

Blutgefäße des Augapfels.

Die Blutgefäße des Augapfels sind in zwei scharf getrennte Gebiete gesondert, welche nur an der Sehnerveneintrittsstelle mit einander in Verbindung stehen.

I. Gebiet der Vasa centralia retinae. (Fig. 196.) Die A. centralis retinae (a) tritt, 15—20 mm vom Augapfel entfernt, in die Achse des Sehnerven und verläuft daselbst bis zur Oberfläche des Sehnerveneintrittes. Hier zerfällt sie in zwei Hauptäste, von denen der eine aufwärts, der andere abwärts gerichtet ist, und deren jeder, sich weiter verzweigend, die ganze Pars optica retinae bis zur Ora serrata versorgt. Während des Verlaufes im Sehnerven giebt die Arterie zahlreiche kleine Aeste ab, welche eingeschlossen in die Fortsetzungen der Pialscheide zwischen den Nervenfaserbündeln verlaufen und sowohl mit kleinen, aus dem umliegenden Fettgewebe in die Optikusscheiden eingetretenen Arterien (b) als auch mit Zweigen der Aa. ciliares posticae breves (Fig. 196 bei c) anastomosiren. In der Netzhaut selbst löst sich die Arterie in Kapillaren auf, welche bis in die äussere retikuläre Schicht hineinreichen²⁾. Die aus den Kapillaren hervorgehenden Venen laufen parallel mit den Zweigen der Arterie und sammeln sich endlich zu einer gleichfalls in der Achse des Sehnerven eingeschlossenen Vena centralis retinae (Fig. 196, a').

1) Von anderen Autoren wird der zwischen den an die Vorderfläche und den an die Hinterfläche der Linsenkapsel tretenden Zonulafasern befindliche dreieckige Raum Petit'scher Kanal genannt.

2) Es ist also nur die Gehirnschicht der Netzhaut gefäßhaltig, im Fundus foveae centralis fehlen mit der Gehirnschicht auch die Gefäße.

Beim Embryo geht ein Zweig der A. centr. retin., die Arterie hyaloidea, durch den Glaskörper bis zur hinteren Linsenfläche. Diese Arterie

Fig. 196.

Gefäße des Auges, Schema mit Benützung der Darstellung Leber's. Tunica externa gekörnt, Tunica media weiss, Tunica interna u. N. opticus gekreuzt gekörnt. Arterien hell, Venen schwarz. Gebiet der Vasa centralia retinae (kleine lateinische Buchstaben). *a* Arteria, *a'* Vena central. retin. *b* Anastomose mit Scheidengefäßen. *c* Anastomose mit Ästen der Aa. ciliar. postic. brev. *d* Anastomose mit Chorioidealgefäßen. Gebiet der Scheidengefäße (grosse lateinische Buchstaben). *A* Innere, *B* äussere Scheidengefäße. Gebiet der Vasa ciliar. postic. brev. (römische Ziffern). *I* Arteriae, *I'* Venae ciliar. postic. breves. *II* Arterielle episklerale, *II'* venöse episklerale Äeste derselben. *III* Kapillaren der Membrana choriocapillaris. Gebiet der Vasa ciliar. post. long. (arabische Ziffern). *1* A. ciliar. post. longa. *2* Circulus iridis major, quer durchschnitten. *3* Äeste zum Corpus ciliare. *4* Äeste für die Iris. Gebiet der Vasa ciliar. ant. (griechische Buchstaben). *α* Arteria, *α'* Vena ciliaris antic., *β* Verbindung mit dem Circulus iridis major, *γ* Verbindung mit der Membr. choriocapill., *δ* arterielle, *δ'* venöse episklerale Äeste, *ε* arterielle, *ε'* venöse Äeste zur Conjunctiva sclerae, *η* arterielle, *η'* venöse Äeste zum Kornealrande, *V* Vena vorticosa, *S* Querschnitt des Schlemm'schen Kanales.

bildet sich schon vor der Geburt zurück, der sie einschliessende Kanal jedoch lässt sich noch im Glaskörper des Erwachsenen nachweisen, er heisst der Cloquet'sche Kanal oder der Canalis hyaloides.

II. Gebiet der *Vasa ciliaria*. Dasselbe ist dadurch charakterisirt, dass die Venen ganz anders verlaufen wie die Arterien.

1. Von den Arterien versorgen a) die *Arteriae ciliares posticae breves* (Fig. 196, röm. Zahlen) den glatten Theil der Chorioidea, während b) die *Arteriae ciliares posticae longae* (Fig. 196, arab. Zahlen) und c) die *Arteriae ciliares anticae* (Fig. 196, griech. Buchstaben) vornehmlich für *Corpus ciliare* und Iris bestimmt sind.

ad a) Die etwa 20 Aeste der *Aa. ciliares posticae breves* (I) durchbohren in der Umgebung des Sehnerveneintrittes die Sklera; nach Abgabe von Zweigen (II), welche die hintere Hälfte der Skleraoberfläche versorgen, lösen sich die Arterien in ein engmaschiges Kapillarnetz auf, die *Membrana choriocapillaris* (III). Am Optikuseintritte anastomosiren die Arterien mit Aesten der *Arter. centralis retin.* (Fig. 196, c) und bilden hierdurch den *Circulus arteriosus nervi optici*; an der *Ora serrata* bestehen Anastomosen mit rücklaufenden Zweigen der *A. ciliar. postic. longa* und der *Aa. ciliar. anticae* (letztere Anastomose s. Fig. 196, γ).

ad b) Die beiden *Aa. ciliares anticae longae* (1) durchbohren die Sklera gleichfalls in der Nähe des Sehnerveneintrittes; die eine Arterie zieht an der nasalen, die andere an der temporalen Seite des Augapfels zwischen Chorioidea und Sklera bis zum *Corpus ciliare*, wo jede Arterie in zwei divergirende, längs dem Ciliarrande der Iris verlaufende Aeste sich spaltet; indem diese Aeste mit den Aesten der anderen langen Ciliararterie anastomosiren, wird ein Gefäßring, der *Circulus iridis major* (2) gebildet, aus welchem zahlreiche Zweige für den Ciliarkörper (resp. für die *Proc. ciliares*) (3), sowie für die Iris (4) hervorgehen. Nahe am Pupillarrande der Iris bilden die Arterien einen unvollkommen geschlossenen Ring, den *Circulus iridis minor*.

ad c) Die *Aa. ciliares anticae* kommen von den die geraden Augenmuskeln versorgenden Arterien, durchbohren in der Nähe des Kornealrandes die Sklera und senken sich theils in den *Circulus iridis major* ein (β), theils versorgen sie den Ciliarmuskel, theils geben sie rücklaufende Aeste zur Verbindung mit der *M. choriocapillaris* ab (γ). Ehe die vorderen Ciliararterien die Sklera durchbohren, geben sie nach hinten Zweige für die vordere Hälfte der Sklera, (δ) nach vorn Zweige zur *Conjunctiva sclerae* (s) und zum Kornealrande (ι) ab. Die Cornea selbst ist gefäßlos, nur am Rande besteht ein in den vorderen Lamellen der *Substantia propria* gelegenes Randschlingennetz.

2. Sämmtliche Venen verlaufen gegen den Aequator, woselbst sie zu vier (seltener fünf oder sechs) Stämmchen, den Wirtelvenen, *Venae vorticosae* zusammentreten, welche sofort die Sklera durchbohren (Fig. 196) und in eine der *Venae ophthalmicae* münden. Ausgenommen von diesem Verlaufe sind kleine den *Arteriae ciliar. postic. breves* und den *Art. ciliares antic.* parallel ziehende *Venae ciliares postic. breves* (Fig. 196, I') und *Venae*

ciliares anticae (Fig. 196, α'); letztere erhalten Zweige aus dem Ciliarmuskel, von dem episkleralen Gefäßnetze (Fig. 196, δ'), von der Conjunctiva sclerae (ϵ') und von dem Randschlingennetze der Hornhaut (η'). Die episkleralen Venen stehen am Aequator auch mit den Ven. vorticosae in Verbindung (bei V). Die vorderen Ciliarvenen verbinden sich endlich auch mit dem Schlemm'schen Kanal (S). Dieser Kanal ist ein ringförmig um die Hornhaut verlaufender Spalt, der noch in der Sklera gelegen ist. Er wird bald als ein Lymphraum betrachtet, der mit der vorderen Augenkammer in offener Kommunikation steht, bald zu den Venen gerechnet.

Die Lymphbahnen des Augapfels.

Das Auge besitzt keine eigentlichen Lymphgefäße, sondern eine Reihe von untereinander zusammenhängenden Spalträumen; man kann am Auge zwei Komplexe solcher Räume unterscheiden, ein vorderes und ein hinteres Gebiet. Zum vorderen Gebiete gehören 1. die Saftkanälchen der Cornea und Sklera; 2. die vordere Augenkammer, welche mit dem Schlemm'schen Kanal und durch die kapillare Spalte zwischen Iris und Linse mit 3. der hinteren Augenkammer kommuniziert. Diese letztere steht in offener Verbindung mit 4. dem Petit'schen Kanal. Diese drei letzteren Räume hängen zusammen und lassen sich durch Injektion von der vorderen Augenkammer aus füllen. Zum hinteren Gebiete gehören: der Canalis hyaloideus (pag. 253), ferner die zwischen den Optikusscheiden gelegenen Spalten: der Subduralraum und der Subarachnoidealraum, dann der enge Spalt zwischen Chorioidea und Sklera: der Perichorioidealraum, und endlich der Tenon'sche Raum, der sich auf die Duralscheide des N. opticus bis zum For. opticum fortsetzt. Diese Räume lassen sich vom Subarachnoidealraume des Gehirnes aus füllen. Der Inhalt der Räume ist ein von den Gefäßen geliefertes Filtrat, welches auch den Glaskörper durchtränkt. Die Menge dieser Flüssigkeit ist im Perichorioidealraume, sowie im Tenon'schen Raume normalerweise eine ganz minimale. Diese beiden Räume dienen zur Ermöglichung der Bewegung der Aderhaut resp. des Augapfels und können als Gelenkräume aufgefasst werden.

Die Nerven des Augapfels.

Die Nerven des Augapfels durchbohren im Umkreise des Sehnerveneintrittes die Sklera und verlaufen zwischen Sklera und Chorioidea nach vorne; nachdem sie mit Ganglienzellen versehene Bündel an die Chorioidea abgegeben haben, bilden sie einen auf dem Corpus ciliare gelegenen, mit Ganglienzellen untermischten Ringplexus, dem Orbiculus gangliosus (ciliaris), von welchem Aeste für den Ciliarmuskel, die Iris und die Hornhaut entspringen. Die für die Hornhaut bestimmten Nerven treten zuerst in die Sklera über und bilden hier ein ringförmig den Kornealrand umge-

bendes Geflecht, den Plexus annularis, aus welchem Aeste für die Bindehaut und für die Cornea hervorgehen. Erstere enden beim Menschen in den kugeligen Endkolben (pag. 134)

Fig. 197.

Aus einem senkrechten Schnitte durch die menschliche Cornea, 240mal vergrössert. *n* sich theilender Nerv, die vordere Basalmembran durchbohrend, *s* subepithelialer Plexus unter den Cylinderzellen liegend, *a* zwischen den Epithelzellen aufsteigende Fasern, zum intraepithelialen Plexus gehörig. Technik Nr. 171, pag. 264.

die dicht unter dem Epithel der Bindehaut gelegen sind, die aber auch noch in der Substantia propria corneae 1—2 mm nach Innen vom Cornealrande gefunden werden. Letztere verlieren nach dem Eintritte in die Substantia propria corneae ihre Markscheide und durchsetzen als nackte Achsen-cylinder die ganze Hornhaut. Dabei bilden sie Netze, die nach ihrer Lage als Stromaplexus

in den tieferen Schichten der Hornhaut, subbasaler Plexus unter der vorderen Basalmembran, subepithelialer Plexus dicht unter dem Epithel beschrieben werden. Von letzterem Plexus erheben sich feinste Nervenfibrillen, die zwischen den Epithelzellen abermals ein sehr feines Geflecht, den intraepithelialen Plexus, bilden, dessen Ausläufer endlich frei zwischen den Epithelzellen enden.

Die Augenlider.

Die Augenlider, Palpebrae, sind Falten der äusseren Haut, welche Muskeln, lockeres und festes Bindegewebe, sowie Drüsen einschliessen. Die äussere Platte des Augenlides behält den Charakter der gewöhnlichen äusseren Haut bei, die innere, dem Augapfel zugekehrte Platte ist dagegen in erheblicher Weise modifizirt und heisst Conjunctiva palpebralis. Die äussere Haut des Augenlides überzieht noch den unteren freien Lidrand und geht erst an dessen hinterer Kante, der Lidkante, in die Conjunctiva palpebralis über. Man studirt die Zusammensetzung des Augenlides am besten an Sagittalschnitten (Fig. 198). Wir treffen von vorn nach hinten gezählt, folgende Schichten: 1. Die äussere Haut; sie ist dünn, mit feinen Wollhaaren besetzt, deren Bälge sie einschliesst; im Corium finden sich ferner kleine Schweissdrüsen, sowie pigmentirte Bindesubstanzzellen, die bekanntlich anderen Stellen des Corium selten zukommen. Das subcutane Gewebe ist sehr locker, reich an feinen elastischen Fasern, dagegen arm an Fettzellen, die selbst vollkommen fehlen können. Gegen den Lidrand zu ist das Corium derber und mit höheren Papillen besetzt. Schräg in den vorderen Lidrand sind in 2—3 Reihen die grossen Wimperhaare, Cilien (*W*), eingepflanzt, deren Bälge bis tief in das Corium reichen. Die Cilien sind einem raschen Wechsel unterworfen, ihre Lebensdauer wird auf 100—150 Tage geschätzt; dem ent-

sprechend findet man häufig Ersatzhaare in verschiedenen Entwicklungsstadien (s. p. 228). Die Haarbälge der Cilien sind mit kleinen Talgdrüsen ausgestattet, ausserdem nehmen sie die Ausführungsgänge der sog. Moll'schen Drüsen (*M*) auf, welche

in ihrem feineren Baue den Knäueldrüsen gleichen und sich von diesen nur dadurch unterscheiden, dass ihr unteres Ende zu keinem so entwickelten Knäuel verschlungen ist.

2. Hinter dem subcutanen Gewebe liegen die transversalen Bündel des quergestreiften *M. orbicularis palpebrarum*; die hinter den Cilien liegende Abtheilung dieses Muskels wird Lidrandmuskel, *M. ciliaris* Riolani (*McR*), genannt.

3. Hinter dem Muskel trifft man auf die Ausstrahlung der Sehne des *M. levator palpebrae*; ein Theil derselben verliert sich in dem dort befindlichen Bindegewebe, (der sog. *Fascia palpebralis*) ein anderer Theil, welcher auch glatte Muskelfasern, den Müller'schen Augenlidmuskel, *Musc. palpebr. super.* (*mps*), einschliesst, setzt sich an den oberen Rand des Tarsus¹⁾.

4. Der Tarsus ist eine derbfaserige bindegewebige Platte, welche dem Augenlide Festigkeit und Stütze verleiht. Er liegt dicht vor der *Conjunctiva palpebr.*, welcher er auch zugezählt wird und

Fig. 198.

Sagittaler Durchschnitt des oberen Augenlides eines halbjährigen Kindes, 10mal vergr. 1 Hauttheil. *E* Epidermis, *C* Corium, *Sc* subcutanes Gewebe, *Hb* Haarbälge der Wellhaare, *K* Knäueldrüse, *W* Wimperhaar mit Anlage eines Ersatzhaares (*EH*), *W'*, *W''* Stücke von Wimperhaarbälgen, *M* Stück einer Moll'schen Drüse. 2 Gebiet des *M. orbicul. palpebr.*, *O* Querdurchschnittene Bündel dieses Muskels, *McR* *M. ciliaris* Riolani. 3 Ausstrahl. der Sehne des *M. levator palp. sup.*, *mps* *M. palp. sup.*, 4 *Conjunctivaltheil*, *c* *Conjunctivae* epithel, *tp* *Tunica propria*, *at* accessoriae Thränen-drüse, *t* Tarsus, *m* Meibom'sche Drüse, deren Abführungsgang an der Mündung nicht getroffen ist, *a* Querschnitt des *Arcus tarsus*, *a'* Querschnitt des *Arcus tarsus* externus. 5 Lidkante. Technik Nr. 176, pag. 266.

nimmt die zwei unteren Drittel der Höhe des ganzen Augenlides ein. In seiner Substanz sind die Meibom'schen Drüsen (*m*) eingebettet, langgestreckte Körper, welche aus einem weiten, vor der Lidkante sich öffnenden Ausführungsgang und rings in diesen mündenden, kurz gestielten Bläschen

¹⁾ Im unteren Augenlide enthält die Ausstrahlung des *M. rect. inf.* gleichfalls glatte Muskelfasern: *M. palpebr. inferior*.

bestehen. Hinsichtlich des feineren Baues stimmen die Meibom'schen Drüsen mit den Talgdrüsen überein. Am oberen Ende des Tarsus, zum Theil noch von dessen Substanz umschlossen, liegen verästelte tubulöse Drüsen, die im feineren Bau mit der Thränendrüse übereinstimmen und deshalb accessorische Thränendrüsen (Fig. 198 *at*) genannt werden; sie finden sich vorzugsweise in der inneren (nasalen) Hälfte des Augenlides.

Hinter dem Tarsus liegt die eigentliche *Conjunctiva*, welche aus Epithel (*e*) und einer *Tunica propria* (*tp*) besteht. Das Epithel ist geschichtetes Cylinderepithel, mit mehreren Lagen rundlicher Zellen in der Tiefe und einer Lage meist kurzer, cylindrischer Zellen an der Oberfläche. Letztere tragen einen schmalen hyalinen Kutikularsaum. Auch Becherzellen finden sich in wechselnder Anzahl. An der Lidkante geht das Epithel allmählich in das geschichtete Pflasterepithel über, das sich zuweilen weit auf die *Conjunctiva palpebr.* erstreckt. Der untere Theil der *Conjunctiva palpebr.* ist glatt. Im oberen Theile dagegen bildet das Epithel unregelmässig buchtige Einsenkungen, die „*Conjunctivabuchten*“, die, individuell sehr verschieden entwickelt, in höheren Graden der Ausbildung auf Durchschnitten das Bild von Drüsen gewähren können. Die *Tunica propria conjunctivae* besteht aus Bindegewebe, Plasmazellen in verschiedener Menge und aus lymphoiden Zellen, deren Anzahl gleichfalls sehr wechselnd ist. Bei Thieren, besonders bei Wiederkäuern bilden die letzteren wahre Knötchen, sog. *Trachomdrüsen*, von deren Kuppe aus Leukocyten durch das Epithel auf die Oberfläche wandern; auch beim Menschen ist die Durchwanderung von Leukocyten, jedoch nur in geringerem Grade, nachweisbar. Im Gebiete der *Conjunctivabuchten* wird die *Tunica propria* durch die oben erwähnten Epithelsenkungen in Papillen abgetheilt, daher auch der Name „*Papillarkörper*“.

Die *Conjunctiva palpebralis* springt oben (am unteren Augenlide unten) auf den Augapfel über, dessen Vorderfläche sie überzieht. An der Umschlagsstelle, dem *Fornix conjunctivae*, findet sich unter der *Tunica propria* ein aus Bindegewebsbündeln bestehendes lockeres subconjunctivales Gewebe. Das Epithel ist dasselbe wie am Lidtheile der *Conjunctiva*; die *Tunica propria* ist ärmer an Leukocyten, enthält jedoch auch beim Menschen normaler Weise kleine Knötchen in verschiedener Anzahl (bis zu 20) und einzelne Schleimdrüsen. Die *Conjunctiva sclerae* ändert sich insofern, als ihr Epithel in einiger Entfernung vom Hornhautrande geschichtetes Pflasterepithel wird, das sich in jenes der Cornea fortsetzt (s. auch Fig. 185).

Das rudimentäre dritte Augenlied (*Plica semilunaris*) besteht aus Bindegewebe und einem geschichteten Pflasterepithel. Die *Caruncula lacrymalis* gleicht im feineren Baue der äusseren Haut (nur das *Stratum corneum* fehlt) und enthält feine Haare, Talg- und accessorische Thränendrüsen.

Die Blutgefäße der Augenlider gehen von Stämmchen aus, welche vom äusseren und inneren Augenwinkel aus herantretend einen Bogen am

Lidrande, Arcus tarseus (Fig. 198 *a*), und einen zweiten Bogen am oberen Ende des Tarsus, den Arcus tarseus externus (*a'*) bilden. Sie verbreiten sich im Hauttheile, umspinnen die Meibom'schen Drüsen, durchsetzen den Tarsus, um ein unter dem Conjunctivaepithel liegendes Kapillarnetz zu speisen; sie versorgen ferner den Fornix conjunctivæ, die Conjunctiva bulbi und anastomosiren mit den Art. ciliar. antice.

Die Lymphgefäße bilden in der Conjunctiva tarsi ein sehr dichtes, an der Vorderseite des Tarsus dagegen ein sehr dünnes Netz. Die Lymphgefäße der Conjunctiva bulbi enden nach den Angaben der einen Autoren am Hornhaustrande geschlossen, nach anderen Angaben reichen sie mit feinen Ausläufern in das Gewebe der Hornhaut und stehen durch diese mit dem Saftkanalsystem in Zusammenhang.

Die Nerven bilden am Lidrande einen reichen Plexus, in der Conjunctiva bulbi enden die Nerven in Endkolben (s. pag. 132 u. 134), die dicht unter dem Epithel liegen.

Das Thränenorgan.

Die Thränendrüse ist eine mit mehreren Ausführungsgängen versehene, zusammengesetzte tubulöse Drüse. Die Ausführungsgänge (Fig. 199, *B*)

Fig. 199.

Aus einem feinen Durchschnitte der Thränendrüse des Menschen, 240mal vergr. A Drüsenkörper, *a* Tubulus rein quer durchschnitten, *a'* Gruppe von grösstentheils schräg durchschnittenen Tubulis, das Lumen eines Tubulus nur unten sichtbar, *s* Schaltstück mit (oben links) kubischen, (unten rechts) platten Epithelzellen, *s'* Schaltstück im Querschnitte, mit ziemlich hohen Cylinderzellen ausgekleidet, *b* Bindegewebe. B Querschnitt des Ausführungsganges, *c* zweischichtiges Cylinderepithel, *b* Bindegewebe. Technik Nr. 177, pag. 266.

sind mit einem zweischichtigen cylindrischen Epithel ausgekleidet und setzen sich in lange Schaltstücke, enge mit niedrigem Epithel ausgekleidete Gänge fort (*A s, s'*). Diese endlich gehen in Tubuli über, die mit Eiweissdrüsenzellen ausgekleidet sind.

Die Wandung der Thränenkanälchen besteht aus geschichtetem Pflasterepithel, aus einer Tunica propria, die reich an elastischen Fasern und unter dem Epithel auch reich an zelligen Elementen ist, und

aus grösstentheils longitudinal verlaufenden quergestreiften Muskelfasern.

Thränensack und Thränennasengang bestehen aus einem zweischichtigen Cylinderepithel, einer Tunica propria, welche vorzugsweise adenoiden Charakters ist und von dem darunter befindlichen Periost durch ein dichtes Geflecht von Venen getrennt wird.

TECHNIK.

Nr. 163. Der frische Augapfel wird vorsichtig aus der Augenhöhle geschnitten, wobei der N. opticus in möglichster Länge zu erhalten ist; dann wird mit der Scheere die anhängende Muskulatur und das Fett entfernt und am Aequator mit einem scharfen Rasirmesser ein alle Augenhäute durchdringender, ca. 1 cm langer Einschnitt gemacht. Nun lege man den Bulbus in ca. 150 ccm 0,05 %ige Chromsäurelösung (pag. 5) ein; nach 12—20 Stunden wird der Bulbus von dem bereits gemachten Einschnitte aus mit einer Scheere vollkommen in eine vordere und hintere Hälfte getrennt und die Flüssigkeit gewechselt. Nach weiteren 12—20 Stunden wasche man aus und härte die Stücke in ca. 100 ccm allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14).

Nr. 163 a. Von der vorderen Bulbushälfte wird die Linse vorsichtig herausgehoben und zu Schnitten verwendet (Nr. 173); dann wird ein Quadrant ausgeschnitten und sammt dem daranhängenden Corpus ciliare und der Iris in Leber eingeklemmt und zu Präparaten über Cornealfalz geschnitten. Die dicken Schnitte färbe man mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17) und konservire sie in Damarfirnis (pag. 23, Fig. 185).

Nr. 163 b. Aus den übrigen drei Vierteln der vorderen Bulbushälfte wird ein Stück Cornea von 5—10 mm Seite herausgeschnitten und dieses, in Leber eingeklemmt, zu Präparaten über die Schichten der Hornhaut verarbeitet (Fig. 180). Die abwechselnden Lamellen der Substantia propria sind nur gut an ungefärbten, in verdünntem Glycerin konservierten Schnitten zu sehen.

Nr. 163 c. Aus der hinteren Augenhälfte schneide man ein alle drei Häute umfassendes Stückchen von 5—10 mm Seite und fertige davon nicht zu feine Schnitte zum Studium der Schichten der Sklera und Chorioidea (Fig. 183) an. Färben mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17) und konserviren in Damarfirnis (pag. 23). Beim Schneiden löst sich die Retina meist ab.

Nr. 163 d. Zur Darstellung von Präparaten über die Eintrittsstelle des N. opticus schneide man im Umkreise der Eintrittsstelle, etwa 5 mm von derselben entfernt, alle Augenhäute durch, klemme sie mit dem ca. 1 cm langen N. opticus in Leber und fertige nicht zu dünne Schnitte an. Dabei setze man das Messer so an, dass dasselbe zuerst Retina, dann Chorioidea, Sklera und N. opticus der Länge nach trifft. Färben mit dünnem Karmin und mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17) und konserviren in Damarfirnis (pag. 23). Möglichst schwache Vergrößerung (Fig. 193).

Nr. 164. Der frische Bulbus wird nach der in Nr. 163 angegebenen Weise herausgenommen, am Aequator eingeschnitten ¹⁾ und in 100—200 ccm Müller'sche Flüssigkeit eingelegt; nach 12—20 Stunden zerlege man ihn mit der Scheere in eine vordere und hintere Hälfte. Nach 2—3 Wochen werden beide Hälften vorsichtig in (langsam fließendem) Wasser 1—2 Stunden ausgewaschen. Dann schneide man ein alle Häute umfassendes Stückchen von ca. 8 mm Seite heraus, welches man zu

¹⁾ Man kann auch den uneröffneten Bulbus 2—3 Wochen in der Müller'schen Flüssigkeit liegen lassen und erst dann nach dem Auswaschen vor dem Einlegen in Alkohol die Hälbung vornehmen.

Nr. 164 a. Zupfpräparaten der Chorioidea verwendet. In einem Tropfen verdünntem Glycerin konservirte Fetzen der Chorioidea zeigen bald grössere Gefässe, bald die Kapillaren der Choriocapillaris, bald verästelte Pigmentzellen und elastische Fasern, bald die Glashaut, deren Gitterung oft nur wenig deutlich zu sehen ist. Man kann isolirte Häutchen mit Böhmer'schem Haematoxylin färben (pag. 17,) (Fig. 184) und in Damarfirniss konserviren (pag. 23), doch werden dabei die feinen Strukturen undeutlich.

Nr. 164 b. Ferner wird das Stückchen zur Darstellung der Retinaelemente verwendet; man zerpupfe ein Stückchen der Retina in einem Tropfen der Müller'schen Flüssigkeit vorsichtig mit Nadeln. Neben vielen Bruchstücken der Elemente wird man auch mehr oder weniger gut erhaltene Theile finden. Die Augen des Menschen haben sehr schöne, grosse Zapfen, während diejenigen vieler Säugethiere nur klein sind¹⁾. Leider sind die menschlichen Augen, wenn sie zur Untersuchung gelangen, meist nicht mehr in genügend frischem Zustande; die Aussenglieder sowohl der Zapfen, als der Stäbchen sind äusserst zart und zerfallen rasch nach dem Tode in quere Plättchen, dabei krümmen sie sich hirtentabförmig; später gehen sie ganz verloren. Wer schöne Zapfen sehen will, untersuche nach der eben angegebenen Methode Augen von Fischen. (S. ferner Nr. 165 und 166.)

Nr. 164 c. Die übrigen Theile des Bulbus werden aus dem Wasser in ca. 80 ccm allmählich verstärkten Alkohol (pag. 14) gebracht. Nach vollendeter Härtung schneide man die Iris aus, klemme sie in Leber und mache meridionale Durchschnitte, welche man mit Böhmer'schem Haematoxylin färbt (pag. 18) und in Damarfirniss (pag. 23) konservirt (Fig. 186).

Nr. 164 d. Ferner schneide man ein ca. 1 cm langes Stück der Retina, welches die makroskopisch als eine gewellte Linie sichtbare Ora serrata in sich fasst, aus, klemme es in Leber ein und mache meridionale Schnitte, die man gleichfalls mit Böhmer'schem Haematoxylin färbt (pag. 17) und in Damarfirniss (pag. 23) konservirt (Fig. 192).

Nr. 164 e. Ebenso verfahre man mit einem Stücke Retina, welches man am Besten aus dem Augenhintergrunde nimmt, weil daselbst die Optikusfaserschicht am dicksten ist. Die Müller'schen Stützfasern sieht man in ihrer ganzen Länge nur auf genau senkrechten Schnitten (Fig. 187 und Fig. 188).

Nr. 164 f. Auf gleiche Weise werden Meridionalschnitte durch die Macula und Fovea²⁾ behandelt (Fig. 191). Es ist nicht schwer, Schnitte der Macula, dagegen sehr schwer, genügende Schnitte durch die sehr zarte Fovea anzufertigen. Man löse die an jener Stelle der Chorioidea fester anhaftende Retina nicht von der Chorioidea, sondern schneide Chorioidea und Retina zusammen.

Nr. 165. Will man Elemente der Retina frisch untersuchen, so wähle man noch warme Augen soeben getödteter Thiere. Der Bulbus wird am Aequator halbirt, der Glaskörper aus der hinteren Augenhälfte sorgfältig herausgenommen; von der ganz durchsichtigen Retina werden kleine Stückchen

1) Ganz ungeeignet sind in dieser Hinsicht die Augen von Kaninchen.

2) Von Säugethiern besitzen nur Affen eine gelbe Macula und eine Fovea centralis. Dagegen kommt eine nicht gelb pigmentirte, ähnlich der Macula gebaute Stelle, die „Area centralis“, den meisten Säugethiern, Insectivoren und gewisse Nager ausgenommen, zu; Vögel und Reptilien haben stets eine einfache oder mehrfache Fovea; auch bei Knochenfischen ist eine Fovea gefunden worden.

von ca. 3 mm Seite ausgeschnitten und in einem Tropfen der Glaskörperflüssigkeit auf dem Objektträger leicht zerzupft. Dann bringe man 2 dünne Papierstreifen zu Seiten des Präparates (pag. 26) und setze ein Deckglas auf. Isolirte Elemente wird man nur sehr vereinzelt finden, dagegen erhält man nicht selten recht hübsche Flächenbilder, an denen Stäbchen und Zapfen im optischen Querschnitte, erstere als kleinere, letztere als grössere Kreise wahrzunehmen sind. Hat man gleichzeitig ein Stückchen Pigmentepithel auf den Objektträger gebracht, so treten die regelmässig sechseckigen Zellen desselben schon bei schwacher Vergrößerung deutlich hervor. Die hellen Flecke in den Zellen sind deren Kerne (Fig. 8). Auch diese Zellen sind sehr vergänglich und verlieren bald ihre scharfen Konturen; Molekularbewegung der Pigmentkörnchen ist hier sehr häufig zu beobachten.

Nr. 166. Die beste Methode zur Isolirung der Retinaelemente ist folgende: Man lege das uneröffnete, von Fett und Muskeln befreite Auge¹⁾ in 1%ige Osmiumlösung; nach 24 Stunden durchschneide man dasselbe am Aequator und lege es zur Maceration auf 2—3 Tage in destillirtes Wasser. Dann schneide man ein Stückchen Retina von ca. 2 mm Seite mit der Scheere aus und zerzupfe es in einem Tropfen Wasser. Man kann auch mit Pikrokarmin unter dem Deckglase färben (pag. 26) und in verdünntem Glycerin konserviren (pag. 6). Mit starken Vergrößerungen findet man ausser vielen Bruchstücken, deren Zugehörigkeit nicht immer mit Sicherheit zu erkennen ist, Elemente, wie sie in Fig. 190 abgebildet sind.

Nr. 167. Saftlücken und -kanälchen der Hornhaut. Man nehme ein möglichst frisches Auge; von thierischen Augen sind Ochsenaugen (aus dem Schlachthause zu beziehen) am meisten zu empfehlen. Man kratze mit einem steil aufgesetzten Skalpell das Epithel der Hornhaut weg, spüle alsdann mit einem Strahle destillirten Wassers die Hornhautoberfläche ab, durchschneide das Auge vor den Ansätzen der Augenmuskeln und lege die vordere, die ganze Hornhaut enthaltende Hälfte auf die Epithelseite; dann entferne man mit Pincette und Skapell das Corpus ciliare, Linse, Iris, so dass nur mehr der vordere Theil der Sklera und die Cornea übrig bleiben, welche in ca. 40 ccm einer 1%igen Lösung von Argent. nitr. eingelegt werden. Das Ganze wird auf 3—6 Stunden in's Dunkle gestellt und nach Ablauf derselben in ca. 50 ccm destill. Wasser dem Sonnenlichte ausgesetzt (Siehe weiter pag. 20). Von dem in ca. 50 ccm allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14) gehärteten Objekte werden Flächenschnitte angefertigt, die am leichtesten gelingen, wenn man die Cornea über den linken Zeigefinger stülpt. Es empfiehlt sich, die Schnitte von der hinteren Hornhautfläche zu nehmen, da die Lücken und Kanälchen daselbst regelmässiger sind. Die Schnitte können mit Böhmer'schem Haematoxylin gefärbt (pag. 17) und in Damarfirniss konservirt (pag. 23) werden. Die Bilder sind negativ, die Lücken und Kanälchen weiss auf braunem oder braungelbem Grunde (Fig. 181). Man beachte besonders die meist etwas dünneren Ränder der Schnitte. Bei Haematoxylinfärbung sieht man die mattblauen grossen Kerne der fixen Hornhautzellen; die Konturen der Zellen selbst sind nur selten wahrzunehmen.

¹⁾ Es empfiehlt sich, das Auge kleiner Thiere zu nehmen, z. B. eines kleinen Molches (*Triton taeniatus*), dessen Sklera dünn ist und die Osmiumlösung leicht eindringen lässt. Zu einem solchen Auge sind 1—2 ccm der Osmiumlösung hinreichend. Die Form der Stäbchen ist allerdings von den Stäbchen der Säugethiere verschieden; sie sind dick und mit langen Aussengliedern versehen; die Zapfen sind klein.

Nr. 168. Vergoldung der fixen Hornhautzellen nach einer von dem pag. 21 angegebenen Verfahren etwas abweichenden Methode. Eine frische Citrone wird ausgepresst, der Saft durch Flanell filtrirt. Nun tödtet man das Thier¹⁾ und lege die ausgeschnittene Cornea 5 Minuten lang in den Saft, woselbst sie durchsichtig wird. Dann wird die Hornhaut in ca. 5 ccm destill. Wasser kurz (1 Minute) ausgewaschen und in ca. 10 ccm der 1^o/oigen Goldchloridlösung (pag. 6) auf 15 Minuten in's Dunkle gestellt. Darauf wird die Hornhaut mit Glasstäben in ca. 10 ccm destill. Wasser übertragen, kurz ausgewaschen und in 50 ccm destill. Wasser, dem 2 Tropfen Eisessig zugesetzt sind, dem Tageslichte ausgesetzt. Nach 24—48 Stunden ist die Reduktion (s. pag. 21) vollendet; das Objekt wird in ca. 10 ccm 70^o/oigen Alkohol eingelegt und in's Dunkle gestellt. Am nächsten Tage schneide man ein Stückchen Hornhaut heraus und ziehe mit Skalpell und Nadel, die man immer am Rande des Objektes ansetzt, feine Lamellen von der hinteren Hornhautfläche ab. Das gelingt bei einiger Aufmerksamkeit ohne grosse Mühe. Die Lamellen werden in Damarfirniss eingeschlossen (pag. 23) und bieten sehr schöne Bilder.

Nr. 169. Sehr schöne Präparate der fixen Hornhautzellen erhält man nach der Methode von Drasch. Die Objekte werden nicht dem frisch getödteten Thiere, sondern zwischen der 12.—24. Stunde nach dem Tode, während welcher Zeit der Kadaver an einem kühlen Orte aufbewahrt werden muss, entnommen. Kleine (von ca. 6 mm Seite) Stücke der Hornhaut werden ausgeschnitten, in 5 ccm 1^o/oige Goldchloridlösung (pag. 6) + 5 ccm destill. Wasser gelegt und eine Stunde lang in's Dunkle gestellt; während dieser Zeit rühre man öfter mit dem Glasstabe um. Dann werden die Stückchen mit Glasstäben in 30 ccm destill. Wasser übertragen, woselbst sie im Dunkeln 8—16 Stunden verweilen, dann werden sie in 25 ccm destill. Wasser + 5 ccm Ameisensäure dem Tageslichte ausgesetzt. Nach vollendeter Reduktion (pag. 21) werden die nun dunkelvioletten Stückchen in allmählich verstärktem Alkohol gehärtet und nach ca. 6 Tagen dünne der Fläche nach gerichtete Schnitte (Fig. 182) angefertigt, die in Damarfirniss (pag. 23) konservirt werden.

Nr. 170. Nerven und Blutgefässe der frischen Hornhaut. Man schneide von einem Ochsenauge die Cornea und den angrenzenden Theil der Sklera vor den Ansätzen der Augenmuskeln ab, entferne mit Skalpell und Pincette das Corpus ciliare, Iris und Linse, schneide alsdann einen Quadranten der Hornhaut aus, lege ihn mit der Epithelseite nach oben auf einen Objektträger und bedecke ihn mit einem Deckglase; als Zusatzflüssigkeit verwende man einige Tropfen der Glaskörperflüssigkeit. Das sehr dicke Präparat untersuche man mit schwacher Vergrösserung. Die schlingenförmig umbiegenden Blutgefässe sind bei Einstellung des Tubus auf die oberflächlichen Hornhautschichten (Heben des Tubus) am Skleralrande zu finden; sie enthalten meist noch Blutkörperchen. Markhaltige Nerven findet man ebendasselbst, wie auch in tieferen Schichten. Sie sind zu ganzen Bündeln geordnet und lassen sich nur eine kurze Strecke weit in der Hornhaut selbst verfolgen. Die lang gestreckten Pigmentstreifen, die an den Ochsenaugen sich finden, haben nichts mit Nerven zu thun.

Für den feineren Verlauf der Nerven leistet diese Methode nichts.

¹⁾ Besonders zu empfehlen sind Frösche, deren Hornhautkanälehen sehr regelmässig sind und deren hintere Hornhautlamellen sich leicht abziehen lassen.

Nr. 171. Nerven der Hornhaut. a) Vergoldung.

Die 12—24 Stunden nach dem Tode ausgeschnittene Hornhaut wird von Corpus ciliare und Iris befreit und nach den Nr. 169 angegebenen Regeln vergoldet. Nach vollendeter Härtung mache man Flächenschnitte, welche Epithel und die obersten Hornhautschichten enthalten und senkrecht zur Dicke der Hornhaut gerichtete Schnitte, welche man in Damarfirniss konservirt (Fig. 197).

b) Methylenblaufärbung.

Vorbereitung. Man bereite: 1. eine Stammlösung von 1 g Methylenblau in 100 ccm destillirtem Wasser. Davon stelle man eine verdünnte Lösung ($\frac{1}{15}$ 0/0 ig) dar, indem man 2 ccm der Stammlösung zu 30 ccm destillirtem Wasser giesst.

2. eine Lösung von 3 g pikrinsaurem Ammoniak in 100 ccm destillirtem Wasser.

Beide Lösungen sind mindestens einen Tag vor dem Gebrauch herzustellen.

Man tödte ein Kaninchen, schneide den Augapfel im Ganzen heraus und entferne die noch anhängenden Reste der Augenmuskeln und der Bindehaut. Dann lege man den Augapfel in eine Uhrschale und mache mit einem scharfen Skalpell einen tiefen alle Augenhäute durchdringenden Schnitt am Aequator; die dabei austretende Glaskörperflüssigkeit wird in der Uhrschale aufgefangen. Dann trenne man mit einer Scheere von dem gemachten Einschnitt aus die ganze Cornea ab, lege sie auf einen Objektträger — die concave Hornhautfläche nach aufwärts gerichtet — und streife Corpus ciliare, Iris und die etwa noch anhängende Linse mit einem Skalpellstiel ab, was leicht gelingt. Die so gereinigte Hornhaut wird sofort in eine zweite Uhrschale gebracht, in welche man 3—10 Tropfen der aufgefangenen Glaskörperflüssigkeit und 3—4 Tropfen der $\frac{1}{15}$ 0/0 igen Methylenblaulösung gebracht hat. Die Farbe muss auch die concave nach aufwärts gekehrte Hornhautfläche etwas bedecken. Nun decke man die Uhrschale leicht zu¹⁾.

Nach 1—1½ Stunden haben sich die Achseneylinder schön blau gefärbt; da der Eintritt der Färbung nicht zu genau festsetzbarer Zeit erfolgt, empfiehlt es sich nach etwa einer Stunde die Hornhaut mit nach oben gekehrter convexer Fläche auf einen reinen Objektträger zu bringen und ohne Deckglas mit schwachem Objektiv (Leitz III) zu betrachten. Ist die Färbung nicht genügend, so bringe man die Cornea wieder in die Uhrschale etwas zurück und wiederhole etwa nach 10 Minuten die gleiche Procedur.

Sobald die Nerven deutlich sind, wird die Hornhaut auf 18—20 Stunden in 20 ccm der Ammoniaklösung übertragen; dann schneide man einen Quadranten aus und konservire ihn in dünnem Glycerin (pag. 22), dem man noch einen Tropfen Ammoniaklösung zugesetzt hat. Nach ca. 24stündigem Aufenthalt im Dunkeln ist das Präparat durchsichtig genug geworden, um auch mit starken Vergrößerungen untersucht zu werden.

Die Präparate dürfen nicht lange dem Sonnenlichte ausgesetzt werden, da sie sonst abblassen.

Nr. 172. Linsenfasern. Der Bulbus wird hinter dem Aequator mit einer Scheere aufgeschnitten, Glaskörper und Linse werden herausgenommen; dabei bleibt das die Ciliarfortsätze überziehende Pigment am Linsen-

¹⁾ Der Deckel darf nicht luftdicht schliessen; um das Eintrocknen zu verhindern, setze man mehrmals noch etwas Glaskörperflüssigkeit und Methylenblaulösung zu.

rande hängen. Man löse nun die Linse vom Glaskörper und lege sie in 50 ccm Ranvier'schen Alkohol (pag. 4). Nach ca. 2 Stunden steche man mit Nadeln an der vorderen und hinteren Linsenfläche ein und ziehe die Kapsel an einer kleinen Stelle etwas ab; das gelingt leicht; bleiben an der Kapsel Linsenfasern hängen, so schadet das nicht. Beim Einstechen hat sich eine trüb-weiße Flüssigkeit aus der Linse entleert. Dann schüttele man den Alkohol und lasse die Linse weitere 10 oder mehr (—40) Stunden liegen. Man kann nach Ablauf dieser Zeit die Linse in dem Alkohol leicht in schalenförmige Stücke zerlegen, ein kleiner Streifen eines solchen Stückes wird in einem kleinen Tropfen Kochsalzlösung auf dem Objektträger zerzupft (pag. 10). Deckglas unter Vermeidung von Druck auflegen. Will man die Fasern konserviren, so färbe man mit Pikrokarmin (färbt meist in wenigen Minuten) (pag. 26) und setze dann angesäuertes dünnes Glycerin unter das Deckglas (Fig. 194, A.)

Nr. 173. Linsenfasern im Querschnitte. Man lege eine Linse in 50 ccm 0,05 %ige Chromsäure. Man muss auf den Boden des Gefässes etwas Watte legen, sonst klebt die Linse an und platzt. Das Ankleben lässt sich auch verhindern durch öfteres Schütteln des Gefässes. Nach 24 bis 48 Stunden spalte man mit Nadeln die Linse in schalenförmige Stücke, übertrage dieselben nach weiteren 10—15 Stunden in ca. 30 ccm 70 %igen Alkohol, der am nächsten Tage durch ebensoviel 90 %igen Alkohol ersetzt wird. Nun schneide man mit einer Scheere die Schalen in der Gegend des Aequator durch und klemme ein Stück so in Leber, dass die ersten Schnitte die dem Aequator zunächst liegende Zone treffen. Hat der Schnitt, der gar nicht dünn zu sein braucht, die Fasern quer getroffen, so erscheinen dieselben als scharf begrenzte Sechsecke; ist dagegen der Schnitt zu schräg geführt worden, so sind die einzelnen Fasern durch unregelmässig gezackte Linien von einander getrennt oder gar theilweise der Länge nach getroffen. Die Schnitte werden von der Klinge direkt auf den Objektträger gebracht und in verdünntem Glycerin konservirt (Fig. 194, B).

Nr. 174. Für Präparate der Linsenkapsel und des Linsenepithels lege man von Muskeln und Fett befreite Bulbi in 100—200 ccm Müller'sche Flüssigkeit. Will man

Nr. 174 a. Flächenpräparate der Linsenkapsel und des Epithels herstellen, so schneide man nach 2—3 Tagen das Auge auf, nehme die Linse heraus, ziehe mit einer spitzen Pincette ein Stückchen der vorderen Linsenkapsel ab, lege dasselbe auf ca. 5 Minuten in ein Uhrschälchen mit destillirtem Wasser, das man einmal wechselt und färbe es dann mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17). Einschluss in Damarfirniss (pag. 23). Die Kapsel ist homogen lichtblau gefärbt, die Kerne und die Konturen der Epithelzellen treten scharf hervor (Fig. 195, C). Will man die Linsenkapsel allein haben, so ziehe man ein Stückchen der hinteren Linsenkapsel ab.

Nr. 174 b. Zur Herstellung von Schnitten durch Kapsel und Epithel lasse man den Augapfel ca. 14 Tage in der Müller'schen Flüssigkeit liegen, nehme alsdann die Linse heraus, bringe sie auf 1 Stunde in (womöglich fließendes) Wasser und härte sie in ca. 50 ccm allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14). Man mache meridionale Schnitte durch die Vorderfläche und durch den Aequator der Linse, welche man mit Böhmer'schem Haematoxylin färbt (pag. 17) und in Damarfirniss (pag. 23) konservirt (Fig. 195, D).

Nr. 175. Zu Studien über die Gefässe des Auges sind besonders Flächenpräparate zu verwenden. Öffnet man ein frisches Auge am Aequator, so sieht man makroskopisch den Verlauf der A. central. retinae. Zur Darstellung der Gefässe der Chorioidea lege man den von Fett und Muskeln vollkommen befreiten Augapfel auf einen kleinen Glastrichter, den man in eine niedrige Glasflasche gesteckt hat und trage vorsichtig, am Aequator beginnend, mit Scheere und Pincette die Sklera ab; bei einiger Uebung gelingt es, die ganze¹⁾ Sklera bis nahe hinter die Ora serrata und bis zur Optikus-eintrittsstelle zu entfernen, ohne die Chorioidea zu verletzen; man muss sich nur hüten, zu reissen; alle festeren, die Sklera mit der Chorioidea verbindenden Stränge (die Vv. vorticosae) müssen abgeschnitten werden. Dann entferne man durch vorsichtiges Streichen mit einem in Wasser getauchten Pinsel die der Chorioidea noch anhaftenden Theile der Lamina suprachorioidea; durch diese Manipulation wird der Verlauf der gröberen Gefässe vollkommen deutlich. Soweit lassen sich die Untersuchungen auch am nicht-injizirten Auge vornehmen (vergl. ausserdem Nr. 164 a). Für die Gefässe des Corpus ciliare und der Iris verwende man injizirte, in Müller'scher Flüssigkeit fixirte und in Alkohol gehärtete Augen, welche man vor dem Aequator halbt. Iris und Corpus ciliare lassen sich leicht von der Sklera abziehen; man konservire sie nach Wegnahme der Linse in Damarfirniss (pag. 23). Man untersucht am Besten zuerst mit der Lupe (pag. 29).

Nr. 176. Man fixire das obere Augenlid eines Kindes in ca. 100 ccm 0,5%iger Chromsäure 1—3 Tage und härte es nach 2stündigem Auswaschen in (womöglich fliessendem) Wasser in ca. 50 ccm allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14). Zu Uebersichtspräparaten mache man dicke (Fig. 198), zur Darstellung feinerer Einzelheiten dünne Schnitte (Fig. 20, C). Färbung mit Böhmer'schem Haematoxylin gelingt anfangs schwer, leichter nach mehrmonatlichem Liegen der Stücke in Alkohol (vergl. auch pag. 17 Anmerk.). Einschluss in Damarfirniss (pag. 23).

Nr. 177. Thränendrüse. Die untere Thränendrüse ist beim Menschen leicht, ohne eine äusserlich sichtbare Verletzung zu setzen, vom Fornix conjunctivae aus herauszunehmen. Beim Kaninchen ist die Drüse nur klein, frisch blassem Muskelfleisch ähnlich; man verwechsle sie nicht mit der im medialen Augenwinkel gelegenen Harder'schen Drüse. Behandeln wie Nr. 106 (pag. 183). Selbst kleinste 1 qmm grosse Schnitten sind noch tauglich. Ausführungsgang und Tubuli sind leicht zu sehen; sehr schwer dagegen die Schaltstücke, deren Epithel, von sehr verschiedener Höhe, zuweilen so niedrig ist, dass man sich vor Verwechslung mit Blutkapillaren in Acht nehmen muss.

XI. Das Gehörorgan.

Das Gehörorgan besteht aus drei Abtheilungen; die innerste, inneres Ohr, schliesst in sich den Endapparat des Hörnerven; die beiden anderen Abtheilungen, Mittelohr und äusseres Ohr, sind nur Hilfsapparate.

Inneres Ohr.

Dasselbe besteht aus zwei häutigen Säckchen, die durch einen feinen Gang, den Ductus endolymphaticus, mit einander kommunizieren. Das

¹⁾ Anfänger mögen sich begnügen, nur einen Quadranten der Sklera zu entfernen.

eine Säckchen, der Utriculus (*Sacculus ellipticus*), steht mit häutigen Röhren, den Bogengängen, in Verbindung, deren jede an der Einmündungsstelle in das Säckchen je eine Erweiterung, die Ampulle, besitzt. Das andere Säckchen, der Sacculus (*Sacculus sphaericus*), hängt mit einem langen, spiralig aufgewickelten, häutigen Schlauche, der Schnecke, zusammen.

Säckchen, Bogengänge und Schnecke heissen das häutige Labyrinth. Dasselbe ist in ähnlich gestalteten Hohlräumen des Felsenbeines, dem knöchernen Labyrinth, eingeschlossen, füllt aber dieses nicht vollkommen aus. Der nicht ausgefüllte Raum wird von einer wässerigen Flüssigkeit, der Perilymphe, eingenommen. Eine ähnliche Flüssigkeit, die Endolymphe, ist im Innern des häutigen Labyrinthes enthalten.

Während beide Säckchen, sowie die Bogengänge einen übereinstimmenden Bau zeigen, ist die Schnecke so wesentlich verschieden, dass sie eine gesonderte Beschreibung erheischt.

Sacculus, Utriculus, Bogengänge.

Ihre Wandung besteht aus drei Lagen. Zu äusserst liegt ein an elastischen Fasern reiches Bindegewebe; daun folgt eine feine, mit kleinen Warzen besetzte Basalmembran, deren Innenfläche endlich mit einem einschichtigen Pflasterepithel überzogen ist. Dieser einfache Bau ändert sich an den Ausbreitungsstellen des Hörnerven, welche an den beiden Säckchen *Maculae*, an den Ampullen der Bogengänge *Cristae acusticae* heissen. Bindegewebe und Basalmembran werden hier dicker, das Pflasterepithel wird schon im Umkreise der *Maculae* (resp. *Cristae*) zu einem Cuticularsaum tragenden Cylinderepithel und dieses geht in das Neuroepithel der *Macula* selbst über. Das Neuroepithel ist gleichfalls einschichtig und besteht aus zwei Arten von Zellen: 1. aus den Fadenzellen, das sind lange, die ganze Höhe des Epithels einnehmende Zellen, die sowohl am oberen wie am unteren Ende etwas verbreitert sind und einen ovalen Kern enthalten; sie gelten als Stützzellen. 2. Aus den Haarzellen, das sind ovale, nur die obere Hälfte des Epithels einnehmende Zellen, welche an ihrem unteren Abschnitte einen grossen, kugeligen Kern enthalten und auf ihrer freien Oberfläche ein zu einem „Hörhaar“ verklebtes Bündel langer, feiner Fäden tragen. Mit den Haarzellen stehen Nervenfasern in Verbindung und zwar in der Weise, dass die markhaltigen Aeste des *Ramus vestibularis nervi acustici* beim Eintritte in das Epithel ihre Markscheide verlieren und als nackte Achsencylinder sich kelchartig ausbreitend, die Haarzellen umfassen, ohne jedoch in dieselben einzudringen. Die Haarzellen sind somit die Endapparate des Hörnerven. Die freie Oberfläche des Neuroepithels ist von einer Fortsetzung des Cuticularsaumes, einer „*Limitans*“, überzogen, welche von den Hörhaaren

Fig. 200.

Otolithen aus dem Sacculus eines neugeborenen Kindes, 560mal vergr. Technik Nr. 178, pag. 276.

durchbrochen wird. Die beiden *Maculae acusticae* sind von einer weichen Substanz (einer *Cuticula*?) bedeckt, welche zahllose $1-15\ \mu$ grosse, prismatische Krystalle von kohlensaurem Kalk, die *Otholithen*, einschliesst. Auf den *Cristae acusticae* findet sich die sogen. *Cupula*, eine an frischen Präparaten unsichtbare Gallerte, die durch die Anwendung fixirender Flüssigkeiten gerinnt und dadurch sichtbar wird.

Säckchen und Bogengänge sind durch bindegewebige Stränge (*Ligamenta sacculorum et canaliculorum*) an die mit einem dünnen Periost und platten Bindegewebszellen ausgekleidete Innenfläche des knöchernen Labyrinthes befestigt.

Schnecke.

Auch die häutige Schnecke, der *Ductus cochlearis*, füllt nicht den ganzen Binnenraum der knöchernen Schnecke aus. Sie liegt mit der einen Wand der äusseren ¹⁾ knöchernen Schneckenwand (Fig. 201) an, die obere

Fig. 201.

Durchschnitt der zweiten Schneckenwindung eines neugeborenen Kindes, 25mal vorgrössert. Der Modiolus enthält schräg angeschnittene Längskanäle. S Knöcherne Scheidewand zwischen zweiter und dritter (halber) Schneckenwindung. Die Reissner'sche Membran ist durchgerissen, das obere Stück nach aufwärts geschlagen. Die Membr. tectoria war nicht zu sehen. Technik Nr. 180, pag. 277.

(vestibulare) Wand, *Lamina Reissneri*, grenzt gegen die *Scala vestibuli*, die untere (tympanale), *Lamina spiralis membranacea*, gegen die *Scala tympani*. Der Winkel, in welchem vestibulare und tympanale Wand zusammenstossen, liegt auf dem freien Ende der *Lamina spiralis ossea* auf. Dort ist das Bindegewebe des *Ductus cochlearis* besonders stark entwickelt und stellt einen Wulst *Limbus* s. *Crista spiralis* dar, welcher breit

¹⁾ Ich folge hiermit der üblichen Beschreibung, bei welcher die Schnecke der Art aufgestellt wird, dass die Basis abwärts, die Kuppel aufwärts gerichtet ist; demnach ist „innen“ = der Schneckenachse näher, „ausen“ = peripherisch.

auf der Lamina spiralis ossea aufsitzt und mit einem aufwärts sich zuschärfenden Rande endet. Dieser Rand wird Labium vestibulare, der freie Rand der Lam. spir. ossea Labium tympanicum¹⁾ genannt, zwischen beiden verläuft der Sulcus spiralis internus (Fig. 207). Die inneren Flächen des Ductus cochlearis sind von einem, an den einzelnen Orten sehr verschieden beschaffenen Epithel überzogen, die der Scala vestibuli resp. tympani zugekehrten äusseren Flächen werden von einer feinen Fortsetzung des Periostes, welches die beiden Scalae auskleidet, bedeckt. An der äusseren Schneckenwand verdickt sich das Periost zu einem mächtigen, auf dem Querschnitte halbmondförmigen Streifen, dem Ligamentum spirale, das sowohl über wie unter die Ansatzfläche des Ductus cochlearis hinausreicht (Fig. 201).

Nach dieser allgemeinen Uebersicht muss der feinere Bau der drei Wände der häutigen Schnecke erörtert werden. Zwei derselben, die äussere und die vestibulare Wand sind verhältnissmässig einfach gebaut, die dritte, tympanale Wand dagegen zeigt einen äusserst komplizirten Bau.

a) Aeussere Wand und Ligamentum spirale bestehen zusammen aus Epithel und Bindegewebe. Letzteres ist zunächst dem Knochen derbfaserig (Periost) und geht dann in lockeres Bindegewebe über, welches die Hauptmasse des Lig. spirale ausmacht. Das Epithel besteht aus einer Lage kubischer Epithelzellen. Ein dichtes Netz von Blutgefässen, die Stria vascularis, nimmt drei Viertel der Höhe der äusseren Schneckenwand ein und begrenzt sich nach abwärts durch eine stärker gegen das Schneckenlumen vorspringende Vene, das Vas prominens (Prominentia spiralis) (Fig. 201). Die Kapillaren der Stria vascularis liegen dicht unter dem Epithel; sie sind die Quelle der Endolymphe.

b) Die vestibulare Wand, Reissner'sche Membran (Fig. 201), besteht aus einer Fortsetzung des Periostes der Scala vestibuli d. i. aus platten Zellen und einem feinfaserigen Bindegewebe, welches auf der dem Ductus zugekehrten Seite mit einer einfachen Lage polygonaler Epithelzellen bekleidet ist.

c) Die tympanale Wand zerfällt in zwei Abschnitte 1. in den Limbus spiralis mit dem freien Rande der Lamina spiralis ossea und 2. in die Lamina spiralis membranacea.

ad 1. Der Limbus spiralis besteht aus einem derben, an spindelförmigen Zellen reichen Bindegewebe, welches nach unten mit dem Periost der Lamina spiralis ossea verwachsen ist, an der freien Oberfläche aber sonderbar gestaltete Papillen besitzt. Sie haben die Form unregelmässiger Halbkugeln; gegen das Labium vestibulare wachsen sie zu schmalen, langen

¹⁾ Diese Namen stammen noch aus der Zeit, in welcher man den Limbus spiralis zur Lamina spiralis ossea rechnete.

Platten, den Huschke'schen Gehörzähnen, aus (Fig. 202 und Fig 205), die in einfacher Reihe neben einander liegen. Eine einfache Lage stark abgeplatteter Epithelzellen überzieht die Oberfläche des Limbus und geht an der Kante des Labium vestibulare in das kubische Epithel des Sulcus spiralis über (Fig. 205, A).

Fig. 202.

Aus einem Flächenpräparate der Lam. spir. der Katze, 240mal vergrössert. Lam. vestib. von oben gesehen, zwischen den Gehörzähnen sieht man zwei Kerne der Epithelzellen. Links ist der Tubus auf die Höhe der Gehörzähne, rechts auf die Ebene der Zona perforata eingestellt.
Technik Nr. 179, pag. 276.

Der freie Rand der Lam. spir. ossea ist an seiner oberen Fläche von einer einfachen Reihe schlitzförmiger Oeffnungen, Foramina nervina, (Fig. 202) durchbrochen, durch welche die in die knöcherne Lamina eingeschlossenen Nerven hervortreten, um in das Epithel der Lam. spiralis membran. einzudringen. Deshalb heisst diese Zone der knöchernen Lamina spiralis Zona (Habenula) perforata.

ad. 2. Die Lamina spiralis membranacea besteht aus der Membrana basilaris, d. i. aus einer Fortsetzung des Limbus spiralis sowie des Periostes der Lamina spiralis ossea, ferner aus der tympanalen Belegschicht, die eine Fortsetzung des Periostes der Scala tympani ist, welche die Unterfläche der Membrana basilaris bekleidet, und endlich aus dem Epithel des Ductus cochlearis, welches der Oberfläche der Membr. basil. aufsitzt.

Fig. 203.

Aus einem Flächenpräparate d. Lamina spir. membran. der Katze, 240mal vergr. Schichten der Zona pectinata bei wechselnder Einstellung des Tubus gezeichnet. e Hohe Einstellung auf das indifferente Epithel (Claudius'sche Zellen) des Ductus cochlearis. f Mittlere Einstellung auf die Fasern der Membr. bas. b Tiefe Einstellung auf die Kerne der tympanalen Belegschicht
Techn. Nr. 179, p. 276.

Die Membrana basilaris besteht aus einer strukturellen Haut, welche starre, ganz gerade, vom Labium tympan. bis zum Lig. spirale verlaufende Fasern, sowie oblonge Kerne enthält. Dadurch erhält die Membran ein feinstreifiges Aussehen (Fig. 203 j).

Die tympanale Belegschicht besteht aus einem feinen, Spindelnzellen enthaltenden Bindegewebe, dessen Fasern auf der Faserrichtung der Elemente der Membr. basil. senkrecht stehen (Fig. 203, b).

Das Epithel ist auf der der Schneckenachse zugekehrten Hälfte zum Neuroepithel, dem Corti'schen Organ, entwickelt, während die äussere dem Lig. spirale zugekehrte Hälfte aus indifferenten Epithelzellen besteht. Man theilt die Lam. spir. membr. deshalb in zwei Zonen: eine innere, vom Corti'schen Organe bedeckte, Zona tecta, und eine äussere, Zona pectinata¹⁾.

Die auffallendste Bildung des Corti'schen Organes sind die Pfeilerzellen, eigenthümlich geformte, grösstentheils starre Gebilde, die in zwei

1) Von den durchschimmernden Streifen der Membr. basilaris so genannt.

Reihen in der ganzen Länge des Ductus cochlearis stehen. Die innere Reihe bilden die Innenpfeiler, die äussere die Aussenpfeiler (Fig. 205).

Fig. 204.

Lamina spiralis der Katze von der vestibularen Fläche aus gesehen. Die Membr. tectoria ist entfernt. 50mal vergr. Lo Lamina spiralis ossea in der inneren Hälfte mehrfach gesprungen und zerbrochen; am hinteren Rande derselben ragen Zellen des Ganglion spirale vor. Im Lamina spir. membranacea. Die Claudius'schen Zellen sind theilweise abgefallen, so dass man die Fasern der Membr. basilaris als feine Streifung sieht. Technik Nr. 179, pag. 276.

Indem beide schräg gegeneinander geneigt sind, bilden sie einen Bogen, den Arcus spiralis, welcher einen mit der Basis gegen die Membr. basilaris gerichteten dreiseitigen Raum, den Tunnel überbrückt. Der Tunnel ist nichts anderes, als ein sehr grosser Intercellularraum, der mit einer weichen Masse, Intercellularsubstanz, erfüllt ist. Hinsichtlich des feineren Baues der Pfeilerzellen ist folgendes zu betrachten: Die inneren Pfeilerzellen sind starre Bänder, an denen wir einen dreiseitig verbreiterten Fuss, einen schmalen Körper und einen auswärts konvexen Kopf unterscheiden. Der Kopf trägt eine schmale „Kopfplatte“ (Fig. 205). Körper und Fuss der Zelle sind von wenig Protoplasma umgeben, das nur aussen vom Fusse in der Umgebung des Kernes in etwas grösserer Menge vorhanden ist. Die äusseren Pfeilerzellen zeigen dasselbe Detail; nur ist

der kernhaltige Theil einwärts vom Fusse gelegen; der rundliche Gelenkkopf ruht in dem konkaven Ausschnitte des Innenpfeilers, die (breitere) Kopfplatte wird von der Kopfplatte des Innenpfeilers grösstentheils bedeckt. Nach Innen von den Innenpfeilern liegt eine einfache Reihe von Zellen, die inneren Haarzellen, kurzcyindrische, mit der abgerundeten Basis nicht bis zur Membr. basilaris reichende Zellen, die an ihrer freien Oberfläche ca. 20 starre Haare tragen. Nach Innen von den inneren Haarzellen liegt das kubische Epithel des Sulcus spir. intern. Nach aussen von den Aussenpfeilern liegen die äusseren Haarzellen; sie gleichen den inneren Haarzellen, nur sind sie durch einen dunklen, in der oberen Hälfte der Zelle gelegenen Körper, den (Hensen'schen) Spiralkörper, charakterisirt¹⁾. Die äusseren Haarzellen sind nicht in einfacher, sondern in mehrfachen (gewöhnlich 4) Reihen angeordnet; sie liegen nicht nebeneinander, sondern werden auseinander gehalten durch die Deiters'schen Zellen, das sind gestreckte Zellen, die einen starren Faden enthalten und an ihrem oberen Ende je einen kutikularen Aufsatz tragen; dieser hat die Gestalt einer Finger-Phalanx, die zwischen den Phalangen frei bleibenden Lücken werden durch die oberen Enden der äusseren Haarzellen ausgefüllt (Fig. 205). Die Deiters'schen Zellen sind Stützzellen, die viele Uebereinstimmung mit den Pfeilerzellen zeigen; wie diese bestehen

¹⁾ Im Schema (Fig. 205 A) durch einen dunklen, dicht unter den Hörhaaren gelegenen Fleck angedeutet.

sie aus einem starren Faden und einem protoplasmatischen Theil, wie diese haben sie eine Kopfplatte (hier Phalanx genannt). Der Unterschied besteht

Fig. 205.

Schema des Baues der tympanalen Wand des Schneckenkanals, *A* von der Seite, *B* von der Fläche gesehen; bei letzterer Ansicht ist die Einstellung des Tubus auf die freie Oberfläche gewählt. Es ist einleuchtend, dass das in anderen Ebenen liegende Epithel des Sulcus spiralis, sowie die Claudius'schen Zellen nur durch Senken des Tubus scharf eingestellt werden können. Die Membrana tectoria ist nicht eingezeichnet. Die Spiralnervenstränge (s. pag. 273) sind durch Punkte angedeutet.

nur darin, dass die Umwandlung in starre Theile bei den Deiters'schen Zellen nicht so weit vorgeschritten ist. Indem die Phalangen unter sich zusammen-

hängen, bilden sie eine zierlich genetzte Membran, die Membrana reticularis.

Die äusseren Haarzellen reichen nicht bis zur Membr. basil. herab, füllen also nur die obere Hälfte der Räume zwischen den Deiters'schen Zellen aus, die unteren Hälften dieser Räume bleiben frei; wir nennen sie die Nuel'schen Räume, oder das je mit einander zusammenhängende, den Nuel'schen Raum (Fig. 205 A). Auch der Nuel'sche Raum hat die Bedeutung eines Interzellularraumes und steht mit dem Tunnel in Verbindung.

Fig. 206.

Aus einem Flächenpräparate der Lam. spir. membran. der Katze, 240mal vergrössert. *A* Aeusserer Pfeiler. *k* Kopfplatten derselben bei hoher Einstellung. *ap* Körper und Fussenden derselben unter allmählichem Senken des Tubus gezeichnet. *kip* Stücke der Kopfplatten der inneren Pfeiler. *B*, *lt* Labium tympanic. theilweise bedeckt vom Epithel des Sulc. spiralis. *ih* innere, *ah* äussere Haarzellen, zwischen diesen die Phalangen *ph*, die Membr. reticularis bildend. *ap* Kopfplatten der äusseren, *ip* der inneren Pfeiler. Technik Nr. 179, pag. 276.

Nach aussen von der letzten Reihe Deiters'scher Zellen liegen die Hensen'schen Zellen, langgestreckte Cylinder, die unter allmählicher Abnahme ihrer Höhe in das indifferente Epithel des Ductus cochlearis übergehen, dessen Elemente, soweit sie noch die Membr. basilaris bedecken, die Claudius'schen Zellen heissen.

Fig. 207.

Senkrechter radiärer Schnitt durch die periphere Hälfte der Lam. spir. ossea und durch die Lam. spir. membr. eines neugeborenen Kindes, 80mal vergrössert. Die Membr. tectoria war von ihrer Anheftungsstelle am Labium vestibulare abgerissen. Technik Nr. 180, pag. 277.

Ueber dem Sulcus spiralis und dem Corti'schen Organe liegt eine weiche elastische Kutikularbildung, die Membrana tectoria (Fig. 207). Sie ist am Labium vestibulare befestigt und reicht bis zur äussersten Reihe der Haarzellen.

Der Ramus cochlearis des Nervus acusticus dringt bekanntlich

in die Achse der Schnecke ein und giebt in spiralig fortlaufender Linie Aeste ab, welche gegen die Wurzel der Lamin. spir. ossea ziehen; hier erfahren die Nervenfaserbündel eine Einlagerung zahlreicher Ganglienzellen, wodurch ein die ganze Peripherie der Schneckenachse umwindendes Ganglion spirale (Fig. 201) gebildet wird; von da aus verlaufen die in die Lamin. spir. ossea eingeschlossenen, einen weitmaschigen Plexus bildenden Nervenbündel gegen den Limbus tympanicus, wo die Fasern unter Verlust ihrer Markscheide durch die Foramina nervina (pag. 270) treten und im Epithel enden. Das geschieht in der Weise, dass sie in der Richtung der Schneckenwindung umbiegen und so in spiraligen Strängen verlaufen, von denen der erste nach Innen von der inneren Pfeilerzelle (Fig. 205 A), der zweite im Tunnel, der dritte zwischen äusserer Pfeilerzelle und erster Deiters'scher Zelle, die übrigen drei zwischen den Deiters'schen Zellen verlaufen. Von diesen Strängen aus ziehen feine Fasern zu den Haarzellen, an (nicht in) denen sie enden.

Die Arterien des Labyrinthes stammen aus der A. auditiva und aus der A. stylomastoidea, welche durch die Fenestra rotunda einen Ast zur Schnecke schickt. Aus der A. auditiva gehen hervor: 1. Aeste zu den Säckchen und den Bogengängen, welche im Allgemeinen ein weitmaschiges, an den Maculae und Cristae dagegen ein dichtes Gefässnetz speisen; 2. ein Schneckenast, welcher bei dem Eintritte in die Schnecke in eine grössere Anzahl kleinerer Aeste zerfällt. Diese treten theils direkt zur ersten Windung, theils steigen sie in der Schneckenachse empor. Von letzteren Aesten treten successive kleine Zweige in die knöcherne Wand des Modiolus und bilden hier die Wurzeln kleinerer und grösserer Knäuel, Glomeruli arteriosi

cochleae minores et majores. Erstere sind etwas über der Ursprungsstelle der *Lam. spir. ossea* gelegen und speisen die *Crista spiralis*, sowie die Kapillaren der Reissner'schen Membran. Letztere liegen an der Wurzel der Scheidewand zweier Windungen¹⁾ und speisen zwei von einander unabhängige Gefässgebiete: die nächstuntere *Stria vascularis* und die *Lamina spiralis membranacea*. Die Venen sammeln sich zum *Vas prominens* (Fig. 201) und zum *Vas spirale* (Fig. 205, A), welche in eine im *Modiolus* (unterhalb des *Gangl. spirale* gelegene) Vene (*Vena spiralis modioli*) münden. Letztere ergiesst sich wahrscheinlich durch den *Aquaeductus cochleae* in die *V. jugul. intern.*

Die Anordnung der Blutgefässe in der Schnecke ist somit eine derartige, dass die *Scala vestibuli* von Arterien, die *Scala tympani* von Venen umkreist wird. Die oberwärts an die *Lam. spir. membr.* grenzende *Scala tympani* ist so der Einwirkung arterieller Pulsationen vollkommen entrückt.

Lymphbahnen. Die im Innern des häutigen Labyrinthes befindliche Endolymph steht durch feine Röhrchen, welche vom Grunde des *Ductus endolymphaticus* (dem *Saccus endolymphaticus*) ausgehen, mit den subduralen Lymphräumen in Zusammenhang. Die perilymphatischen Räume (s. pag. 267) stehen durch ein durch den *Aquaeductus cochleae* verlaufendes Lymphgefäss, den „*Ductus perilymphaticus*“, mit dem Subarachnoidealraum in Verbindung.

Mittelohr.

Die Schleimhaut der Paukenhöhle ist innig mit dem darunter liegenden Perioste verwachsen. Sie besteht aus dünnem Bindegewebe und einem einschichtigen kubischen Epithel, das manchmal am Boden, zuweilen auch in grösseren Bezirken der Paukenhöhle Flimmerhaare trägt. Drüsen (kurze, 0,1 mm lange Schläuche) kommen nur spärlich in der vorderen Hälfte der Paukenhöhle vor. Die Schleimhaut der Ohrtrompete besteht aus fibrillärem (in der Nähe der Pharynxmündung zahlreiche Leukocyten enthaltendem) Bindegewebe und einem geschichteten, cylindrischen Flimmerpithel; der durch die Flimmerharre erzeugte Strom ist gegen den Rachen gerichtet. Schleimdrüsen finden sich besonders reichlich in der pharyngealen Hälfte der Tube. Der Knorpel der Ohrtrompete ist da, wo er sich an die knöcherne Tube anschliesst, hyalin und hie und da mit Einlagerungen starrer (nicht elastischer) Fasern versehen (vergl. pag. 54); weiter vorn enthält die Grundsubstanz des Knorpels dichte Netze elastischer Fasern. Die Blutgefässe bilden in der Paukenhöhlenschleimhaut ein weitmaschiges, in der Tube ein engmaschiges, oberflächliches und ein tiefes die Schleimdrüsen umspinnendes

¹⁾ Etwa da, wo in Fig. 201 der obere Strich von „knöcherne Schneckenachse“ hindeutet.

Kapillarnetz. Die Lymphgefässe verlaufen in der Paukenhöhle im Periost. Ueber die Endigungen der Nerven fehlen noch genauere Angaben.

Äusseres Ohr.

Das Trommelfell besteht aus einer Bindegewebsplatte („Lamina propria“), deren Faserbündel an der lateralwärts gekehrten Oberfläche radiär verlaufen und mit dem Periost des Sulcus tympanicus zusammenhängen; an der der Paukenhöhle zugekehrten Oberfläche sind die Faserbündel cirkulär angeordnet. Das Trommelfell wird innen von der Paukenhöhlenschleimhaut, aussen von der Auskleidung des äusseren Gehörganges (äussere Haut) überzogen. Beide Ueberzüge haften sehr fest an der Lamina propria, sind glatt und tragen keine Papillen. Da, wo der Hammer dem Trommelfell anliegt, ist er mit einem Ueberzuge hyalinen Knorpels versehen.

Der äussere Gehörgang wird von einer Fortsetzung der äusseren Haut ausgekleidet, welche durch einen grossen Reichthum eigenthümlicher Knäueldrüsen, der *Glandulae ceruminosae* (Ohrschmalzdrüsen), ausgezeichnet ist. Dieselben stimmen in manchen Beziehungen mit den gewöhnlichen grösseren Knäueldrüsen („Schweissdrüsen“) der Haut überein; sie besitzen wie diese einen mit mehreren Lagen von Epithelzellen ausgekleideten Ausführungsgang und die Kanäle des Knäuels selbst haben eine einfache Lage meist kubischer Drüsenzellen, welchen glatte Muskelfasern und eine ansehnliche *Membrana propria* aussen anliegen (Fig. 209); sie unterscheiden

Fig. 208.

Aus einem senkrechten Schnitte durch die Haut des äusseren Gehörganges eines neugeborenen Kindes, 50mal vergrössert. Der Ausführungsgang mündet in den Haarbalg. Technik Nr. 182, pag. 278.

Fig. 209.

A. Ein Querschnitt des Knäuelkanales ebendaher. B. Längsschnitt eines Knäuelkanales aus dem Gehörgange eines 12jährigen Knaben, 240mal vergröss. Technik Nr. 182, pag. 278.

sich von den Schweissdrüsen dadurch, dass die Knäuelkanäle ein sehr grosses Lumen haben, das besonders bei Erwachsenen stark erweitert ist,

dass die Drüsenzellen viele Pigmentkörnchen und Fetttröpfchen enthalten und häufig einen deutlichen Kutikularsaum tragen. Die Ausführungsgänge sind eng und münden bei Kindern in die Haarbälge, bei Erwachsenen dicht neben den Haarbälgen auf die Oberfläche.

Das Sekret, das Ohrschmalz (Cerumen), besteht aus Pigmentkörnchen, Fetttropfen und fetterfüllten Zellen; letztere stammen wahrscheinlich aus den Haarbalgdrüsen.

Der Knorpel des knorpeligen Gehörganges und der Ohrmuschel ist elastischer Knorpel.

Die Gefässe und Nerven verhalten sich so wie in der äusseren Haut, nur am Trommelfelle zeigen sie besondere Eigenthümlichkeiten. Dort steigt neben dem Hammergriffe eine Arterie herab, welche sich in radiär verlaufende Aeste auflöst; der Rückfluss erfolgt durch ebenfalls dem Hammergriff entlang verlaufende Venen. Diese Gefässe liegen in dem von der äusseren Haut gelieferten Ueberzuge des Trommelfelles. Auch der Schleimhautüberzug des Trommelfelles ist mit einem dichten Kapillarnetz versehen, welches durch durchbohrende Aestchen mit dem Hautgefässnetze anastomosirt.

Lymphgefässe finden sich vorzugsweise in der Hautschicht des Trommelfelles.

Die Nerven bilden feine, unter beiden Ueberzügen verlaufende Geflechte.

TECHNIK.

Grundbedingung ist genaue Kenntniss der makroskopischen Anatomie des Labyrinthes. Die Schwierigkeiten, die Misserfolge beruhen zum guten Theile auf ungenauer Kenntniss der Anatomie des knöchernen Labyrinthes. Zu Beginn der Präparation müssen alle Theile, die lateral vom Promontorium liegen (Os tympanic. und Gehörknöchelchen), entfernt werden, so dass dieses deutlich vorliegt.

Nr. 178. Otholithen. Man meissele das Promontorium, vom oberen Rande der Fenestra stapedii angefangen bis zum unteren Rande der Fenestra rotunda, weg. Dann erblickt man — besonders wenn man das Felsenbein unter Wasser betrachtet — die weissen Flecken (Maculae) im Sacculus und Utriculus. Man hebe nun mit einer feinen Pincette die Säckchen heraus und breite ein Stückchen davon auf den Objektträger in verdünntem Glycerin aus. Die Otholithen sind in grosser Menge vorhanden, sind aber sehr klein, so dass ihre Gestalt erst bei starken Vergrösserungen (240 mal) deutlich erkennbar wird (Fig. 200). Man hüte sich, zu dickes Glycerin zu nehmen; in welchem die Otholithen vollkommen unsichtbar werden.

Bei dem Herausheben der Säckchen ziehen sich nicht selten Stücke der Bogengänge mit heraus, die man mit Pikrokarmine (pag. 19) färben und in verdünntem Glycerin (pag. 5) konserviren kann. Man sieht nur das Epithel und hin und da an optischen Querschnitten die feine Glashaut; das Bindegewebe ist sehr spärlich.

Nr. 179. Flächenpräparate der Schnecke. Man erinnere sich, dass die Basis der Schnecke im Grunde des inneren Gehörganges liegt und

dass die Spitze gegen die Tube gekehrt ist, dass also die Schneckenachse horizontal und quer zur Längsachse der Felsenbeinpyramide steht.

Man meissele den freien Theil der Schnecke auf, d. h. man entferne das Promontorium dicht vor der Fenestra rotunda, öffne die Spitze der Schnecke und lege dann das von überflüssiger Knochenmasse thunlichst befreite Präparat in 20 cem 0,5 0/oige Osmiumsäure (5 cem 2 0/oige Osmiumsäure zu 15 cem Aq. dest.). Nach 12—20 Stunden wässere man das Präparat ca. 1 Stunde lang aus und bringe es dann in 200 cem Müller'sche Flüssigkeit (pag. 13). Nach 3—20 Tagen (oder später) breche man die Schnecke vollends auf und betrachte sie nun unter Wasser. Man sieht da die Lamin. spir. ossea und membranacea als ein feines Blättchen, resp. Häutchen, an der Schneckenachse befestigt; nun breche man mit einer feinen Pincette ein Stückchen der Lamin. spir. ossea ab, hebe dasselbe nicht mit der Pincette, sondern vorsichtig mit Nadel und Spatel aus der Flüssigkeit und bringe es mit einigen Tropfen verdünntem Glycerin unter den Objektträger. Man thut gut, den axialen Theil der Lam. spir. ossea auf dem Objektträger mit Nadeln abzubrechen, da das verhältnissmässig dicke Knochenblatt das Auflegen des Deckglases erschwert. Die vestibuläre Fläche der Lamina muss nach oben gerichtet sein, man erkennt das daran, dass bei hoher Einstellung des Tubus die Gehörzähne (Fig. 202) zuerst sichtbar sind, während die anderen Theile erst beim Senken des Tubus (bei tieferer Einstellung) deutlich werden. Bei schwacher Vergrösserung sind anfangs nur die Interstitien der Gehörzähne als dunkle Striche sichtbar (Fig. 204 Lab. vestib.), die Papillen sind auch bei starken Vergrösserungen nicht sofort zu erkennen, sondern werden erst am zweiten oder dritten Tage deutlich. Die Hauptschwierigkeit liegt nicht in der Anfertigung, sondern in der richtigen Beobachtung des Präparates; bei der geringsten Tubushebung resp. Senkung ändert sich sofort das Bild. In Fig. 205, B ist in schematischer Weise die Lamin spir. membr. von oben her betrachtet in hoher Einstellung gezeichnet, man sieht also nur die freie Oberfläche der in A von der Seite gezeichneten Gebilde. Es leuchtet ein, dass bei einer Senkung des Tubus z. B. nicht mehr die Kopfplatten der Pfeilerzellen, sondern deren Körper (als Kreise im optischen Querschnitt) sichtbar sein werden, ebenso verschwindet die Membr. reticularis, die nur bei ganz hoher Einstellung sichtbar ist, etc. Man kann noch färben mit Pikrokarmün (pag. 26) und konserviren in verdünntem Glycerin. Vorstehende Angaben beziehen sich auf das Gehörorgan des Menschen (Kinderlabyrinth sind zu empfehlen) und der Katze.

Nr. 180. Um Schnitte durch die knöcherne und häutige Schnecke anzufertigen, meissele man die Schnecke eines Kindes¹⁾ aus dem Labyrinth. Die kompakte Knochensubstanz der Schnecke ist von so weicher schwammiger Knochensubstanz umgeben, dass sich letztere auch mit einem starken Federmesser entfernen lässt; hat man so im Groben die Form der Schnecke hergestellt, so lege man mit einem Meissel an 2—3 Stellen der Schnecke kleine, ca. 1 mm grosse Oeffnungen an, um das Eindringen der Fixirungsflüssigkeit zu erleichtern. Dann bringe man die Schnecke in 15 cem destill. Wasser + 5 cem der 2 0/oigen Osmiumsäure. Nach 24 Stunden wird das Objekt herausgenommen, eine Viertelstunde in (womöglich fliessendes)

¹⁾ Von thierischen Schnecken sind die des Meerschweinchens und der Fledermaus deswegen zu empfehlen, weil solche Schnecken nicht in schwammige Knochensubstanz eingebettet sind und ohne weiteres Abmeisseln und Oeffnen sofort eingelegt werden können.

Wasser gelegt und dann in ca. 60 ccm allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14) gehärtet. Nach vollendeter Härtung wird die Schnecke entkalkt und zwar in Chlorpalladium-Salzsäure. Man stelle sich folgende Mischung dar: Von einer 1⁰/oigen wässrigen Chlorpalladiumlösung giesse man 1 ccm zu 10 ccm Salzsäure und füge 100 ccm destillirtes Wasser hinzu. Die Schnecke wird in ca. 100 ccm dieser Mischung eingelegt, die Mischung öfter gewechselt. Nach vollendeter Entkalkung (pag. 15) wird das Objekt nochmals gehärtet und in Klemmleber eingebettet geschnitten. Die Schnitte müssen die Achse der Schnecke der Länge nach enthalten, werden mit Pikrokarmín gefärbt (pag. 19) und in Damarfirniss konservirt (pag. 23). Es ist nicht sehr schwer, Uebersichtspräparate zu erhalten. Die *Lam. Reissneri* ist gewöhnlich eingerissen, so dass Ductus chochlearis und Scala vestibuli einen gemeinsamen Raum bilden (Fig. 201). Das Corti'sche Organ lässt meist zu wünschen übrig; nur feine Schnitte, welche das Organ senkrecht getroffen haben, geben völlig klare Bilder; meist enthält ein Schnitt mehrere innere und äussere Pfeiler, zum Theil nur Bruchstücke solcher, die Hensen'schen Zellen sehen blasig gequollen aus (Fig. 207), so dass die Orientirung dem Anfänger viele Schwierigkeiten bereitet.

Nr. 181. Um Querschnitte der Ohrtrumpete (Knorpel und Schleimhaut zu erhalten, orientire man sich zunächst über die schräg median vor- und abwärts gerichtete Stellung der Tube. Man schneide die ganze pharyngeale Abtheilung der Tube sammt umgebenden Muskeln heraus, fixire das Stück in 200—300 ccm Müller'scher Flüssigkeit, wasche es nach 3—6 Wochen in (womöglich fliessendem) Wasser aus und härte es in ca. 100 ccm allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14). Man kann die Schnitte mit Böhmer'schem Haematoxylin färben (pag. 17) und in Damarfirniss (pag. 23) einschliessen. Vorzugsweise als Uebersichtspräparate mit ganz schwachen Vergrösserungen zu betrachten.

Nr. 182. Ohrschmalzdrüsen. Man schneide das Ohr mit dem knorpeligen Gehörgange dicht am knöchernen Gehörgange ab, schneide vom knorpeligen Gehörgange ca. 1 qcm grosse Stücke aus, die man ca. 30 ccm absoluten Alkohol einlegt. Schon am nächsten Tage kann man Schnitte anfertigen, die ziemlich dick (— 0,5 mm) sein müssen, wenn man Knäuel und Ausführungsgang zuammentreffen will (Fig. 208). Kernfärbung mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17). Man betrachte auch feinere, ungefärbte Schnitte in verdünntem Glycerin; hier kann man die Fett- und Pigmentkörnchen sehen. Ganz besonders sind Präparate neugeborener Kinder zu empfehlen; bei Erwachsenen sind die Kanäle stark erweitert und geben keine schönen Uebersichtsbilder. Dagegen sieht man bei mehr Erwachsenen die Kutikula der Drüsenzellen gut, die ich bei Neugeborenen vermisse (vergl. Fig. 209).

XII. Geruchsorgan.

In diesem Kapitel soll der Bau der gesammten Nasenschleimhaut beschrieben werden. Die eigentliche Riechschleimhaut ist nur auf die vorderen zwei Drittel der oberen und mittleren Muschel, sowie auf den entsprechenden Theil der Nasenscheidewand beschränkt; die übrigen Partien der Nasenhöhle (die Nebenhöhlen inbegriffen) sind mit respiratorischer Schleimhaut überzogen.

Ausgenommen hiervon ist der im Bereiche der beweglichen Nase befindliche Abschnitt (*Vestibulum nasi*), welcher mit einer Fortsetzung der äusseren Haut bekleidet ist. Wir haben demnach drei, im Bau differente Abschnitte der Nasenschleimhaut zu unterscheiden.

1. Regio vestibularis.

Die Schleimhaut besteht aus einem geschichteten Pflasterepithel und aus einer papillenträgenden *Tunica propria*, in welche zahlreiche Talgdrüsen und die Haarbälge der steifen Nasenhaare (*Vibrissae*) eingesenkt sind.

2. Regio respiratoria.

Die Schleimhaut besteht aus einem geschichteten flimmernden Cylinderepithel (Fig. 11) das bald viele, bald wenige Becherzellen enthält, und einer ansehnlichen an der unteren Nasenmuschel bis zu 4 mm dicken *Tunica propria*, welche sich aus fibrillärem Bindegewebe und verschiedenen grossen Mengen von Leukocyten aufbaut; letztere sind zuweilen zu Solitärknötchen zusammengeballt. Auch hier findet eine Durchwanderung von Leukocyten durch das Epithel in die Nasenhöhle statt (vergl. pag. 154).

Fig. 210.

Dicker Schnitt senkrecht durch die Schleimhaut der menschlichen Nasenscheidewand; Regio respiratoria, 20 mal vergrössert. Bei zwei Drüsen ist der Ausführungsgang getroffen. *t* Trichterförmige Vertiefung, *v* Venen. Technik Nr. 184, pag. 262.

Die *Tunica propria* des Menschen schliesst verästelte tubulöse Drüsen ein, die theils Schleim, theils Eiweiss absondern, also gemischte Drüsen sind (vergl. pag. 167). Sie münden nicht selten in trichterförmige Vertiefungen (*t*) ein, welche von einer Fortsetzung des Oberflächenepithels ausgekleidet und an der

unteren Muschel mit unbewaffnetem Auge wahrnehmbar sind. In den Nebenhöhlen der Nase sind Epithel und *Tunica propria* bedeutend dünner (— 0,02 mm), sonst von gleichem Baue; nur spärliche und kleine Drüsen finden sich daselbst.

3. Regio olfactoria.

Die Schleimhaut dieser Gegend ist durch ihre gelblichbraune Färbung schon makroskopisch von der röthlichen Schleimhaut der Regio respiratoria unterscheidbar. Sie besteht aus einem Epithel, dem Riechepithel, und aus

einer Tunica propria. Im Riechepithel kommen zwei Zellenformen vor. Die eine Form (Fig. 211 *st*) ist in der oberen Hälfte cylindrisch und enthält

Fig. 211.

Isolierte Zellen der Regio olfactoria des Kaninchens. 560 mal vergrößert. *st* Stützzellen, *s* austretende Schleimzapfen, die Flimmerhaaren ähnlich sind. *r* Riechzellen, bei *r'* ist der untere Fortsatz abgerissen. *f* Flimmerzelle. *b* Zellen der Bowman'schen Drüsen. Technik Nr. 183, pag. 282.

Fig. 212.

Senkrechter Schnitt der Regio olfactoria des Kaninchens, 50mal vergrößert. *zo* Zone der ovalen, *ar* Zone der runden Kerne. *dr* Bowman'sche Drüsen, *a* Ausführungsgang, *k* Körper, *g* Grund der Drüse, *n* Querschnitte der Aeste des N. olfactorius, *v* Venen, *ar* Arterie, *b* Querdurchschnittenne Bindegewebsbündel. Technik Nr. 185, pag. 282.

hier gelbliches Pigment und kleine, oft in Längsreihen gestellte Körnchen; das obere Ende scheint besonders modifiziert, der an Schnitten zu Tage tretende Saum (Fig. 213 *s*) wird von den einen Autoren für eine dem Kutikularsaum des Darmepithels ähnliche Bildung („Membrana limitans olfactoria“), von Anderen für feine Flimmerhärchen, von noch Anderen für kleine Zapfen austretenden Schleimes (Fig. 211 *s*) erklärt. Die untere Hälfte ist schmaler, am Rande mit Zacken und Einbuchtungen versehen, das untere Ende ist gegabelt und soll mit den gegabelten Enden benachbarter Zellen sich zu einem protoplasmatischen Netzwerke verbinden. Diese Zellen heissen Stützzellen. Ihre meist ovalen Kerne liegen in einer Höhe und nehmen auf senkrechten Schnitten eine schmale Zone, die Zone der ovalen Kerne (Fig. 212) ein. Die zweite Form (Fig. 211 *r*) besitzt nur in der Umgebung des meist runden Kernes eine grössere Menge Protoplasma; von da erstreckt sich nach oben ein schmaler cylindrischer, härchentragender, nach unten ein sehr feiner Fortsatz, der sich direkt in den Achsenzylinder einer Nervenfasers fortsetzt. Diese Zellen, die „Riechzellen“ sind Ganglienzellen, ihr unterer Fortsatz ist eine centripetale Nervenfasers. Ihre mit Kernkörperchen versehenen runden Kerne liegen in verschiedenen Höhen und nehmen eine breite Zone, die Zone der runden Kerne (Fig. 212, *ar*) ein. Ausser diesen beiden Formen giebt es Zwischenformen, die bald mehr den Stützzellen, bald mehr den Riechzellen sich nähern. An der Grenze des Epithels gegen das Bindegewebe ist ein mit Kernen versehenes protoplasmatisches Netzwerk, die sog. Basalzellen (Fig. 213 *b*), gelegen.

Die Tunica propria stellt einen aus starren Bindegewebsfasern gewebten, mit feinen elastischen Fasern untermengten lockeren Filz dar, welcher

bei manchen Thieren (z. B. bei der Katze) gegen das Epithel zu einer strukturlosen Haut verdichtet ist. Zahlreiche Drüsen, die sog. Bowman'schen

Fig. 218.

Senkrechter Schnitt durch die Regio olfact. des Kaninchens. 560mal vergrößert. *s* Saum. *zo* Zone der ovalen, *zr* Zone der runden Kerne. *b* „Basalzellen“, *dr* Stücke der Bowman'schen Drüsen, an dem rechten ist der unterste Theil des Ausführungsganges getroffen. *n* Ast des Nervus olfactorius.

Technik Nr. 185, pag. 282.

marklosen Fasern, die sehr leicht in Fibrillen zerfallen; die Fasern sind die zu Bündeln vereinten unteren Fortsätze der Riechzellen, welche in flachen Bogen sich vom Epithel her in die Tunica propria einsenken und durch Vereinigung mit Nachbarbündeln die Olfaktoriusäste bilden.

Von den Blutgefäßen der Nasenschleimhaut verlaufen die Arterienstämmchen in den tieferen Schichten der Tunica propria (Fig. 210 u. 212); sie speisen ein bis dicht unter das Epithel reichendes Kapillarnetz; die Venen sind durch ihre ansehnliche Entwicklung ausgezeichnet (Fig. 210); sie bilden besonders am hinteren Ende der unteren Muschel ein so dichtes Netzwerk, dass die Tunica propria daselbst kavernösem Gewebe ähnlich ist.

Die Lymphgefäße bilden in den tieferen Schichten der Tunica propria gelegene grobmächtige Netze. Injectionen von Lymphgefäßen der Regio olfactoria vom Subarachnoidealraume aus, erklären sich durch die Scheiden, welche die durch die Lamina cribrosa tretenden Olfaktoriusäste von den Hirnhäuten erhalten.

Markhaltige Zweige des Trigemini sind sowohl in der Regio respiratoria wie olfactoria nachzuweisen.

Drüsen, sind in die Tunica propria eingebettet; es sind entweder einfache oder (z. B. beim Menschen) verästelte Schläuche, an denen man einen im Epithel gelegenen Ausführungsgang (Fig. 212 *a*), einen Drüsenkörper und einen Drüsengrund unterscheidet. Die Zellen des Drüsenkörpers sind pigmentirt. Die Bowman'schen Drüsen (auch diejenigen des Menschen) sind bis vor Kurzem für Eiweißdrüsen gehalten worden. In neuerer Zeit hat man sie für Schleimdrüsen erklärt. Die Tunica propria ist ferner Trägerin der Verästelungen des N. olfactorius. Die Äste desselben werden von Fortsetzungen der Dura mater bekleidet und bestehen durchaus aus

TECHNIK.

Nr. 183. Riechzellen. Man durchsäge den Kopf eines soeben getödteten Kaninchens in der Medianlinie. Die Riechschleimhaut ist an ihrer braunen Farbe leicht kenntlich. Ein Stückchen von ca. 5 mm Seite wird sammt der dazu gehörigen knöchernen Muschel mit einer kleinen Scheere vorsichtig ausgeschnitten und in 20 ccm Ranvier'schen Alkohol (pag. 4) eingelegt. Nach 5—7 Stunden übertrage man dasselbe in 5 ccm Pikrokarmine, am nächsten Tage in 10 ccm destill. Wasser. Nach etwa 10 Minuten wird das Stückchen herausgenommen und leicht auf einen Objektträger gestossen, auf welchen man einen Tropfen verdünntes Glycerin gesetzt hat. Umrühren mit der Nadel ist zu vermeiden, das Deckglas vorsichtig aufzulegen. Man sieht ausser vielen Bruchstücken von Zellen, viele gut erhaltene Stützzellen; an den Riechzellen fehlt häufig der äusserst feine und centrale Fortsatz (Fig. 211).

Nr. 184. Zu Präparaten der Schleimhaut der *Regio respiratoria* umschneide man Stückchen von 5—10 mm Seite auf der unteren Hälfte des Septum narium, ziehe sie ab und fixire und härte sie in ca. 20 ccm absolutem Alkohol (pag. 12). Zu feineren Schnitten verwende man die Nasenschleimhaut des Kaninchenkopfes (Nr. 183), klemme die Stückchen in Leber ein (pag. 16) und färbe die Schnitte mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17). Konserviren in Damarfirniss (pag. 23). Zu Uebersichtsbildern genügt auch die Schleimhaut menschlicher Leichen, welche in gleicher Weise behandelt wird, nur mache man dicke, ungefärbte Schnitte, die man in verdünntem Glycerin konservirt (Fig. 210).

Nr. 185. Zu Präparaten der Schleimhaut der *Regio olfactoria* löse man Stückchen (von 3—6 mm Seite) der braunen Riechschleimhaut vom oberen Theile des Septum des Kaninchens (Nr. 183) und lege sie auf 3 Stunden in 20 ccm Ranvier'schen Alkohol (pag. 4), welcher die Elemente des Riechepithels etwas lockert; alsdann übertrage man die Stückchen vorsichtig in 3 ccm 2%ige Osmiumlösung + 3 ccm destill. Wasser und stelle das Ganze auf 15—24 Stunden in's Dunkle. Nach Ablauf derselben werden die Stückchen auf eine halbe Stunde in 20 ccm destillirtes Wasser gelegt und dann in 30 ccm allmählich verstärktem Alkohol gehärtet (pag. 14). Die gehärteten Stücke werden in Leber geklemmt und geschnitten, die Schnitte 20—30 Sekunden mit Böhmer'schem Haematoxylin (pag. 17) gefärbt und in Damarfirniss eingeschlossen (pag. 23).

Will man gute Bilder der Drüsen erhalten (Fig. 212), so mache man dicke, quer zum Verlaufe der Nervenfasern gerichtete Schnitte. Für die Darstellung der Nervenfasern und des Epithels empfiehlt es sich, dünne längs des Nervenfaserverlaufes gerichtete Schnitte zu machen (Fig. 213).

XIII. Geschmacksorgan.

Die Endäste des N. glossopharyngeus enthalten theils markhaltige, theils marklose Fasern; während erstere mit einander anastomosiren und im Bindegewebe (z. Th. in Endkolben) ihre Endigung finden, dringen die marklosen Fasern in das Epithel und enden daselbst entweder frei (nach dem sie vorher ein Netzwerk gebildet haben) (Fig. 214) oder in besonderen Endappa-

raten, den Geschmacksknopfen (Schmeckbechern). Das sind länglich ovale, ca. 80 μ lange, 40 μ breite Körper, welche vollkommen im Epithel

Nerven, frei endigend. Nerven, in die Geschmacksknospe eintretend.

Fig. 214.

Aus einem senkrechten Schnitte durch die Pap. circumvallata eines Affen (Hapale), 240mal vergrößert.
Technik Nr. 188, pag. 284.

Fig. 215.

Aus einem senkrechten Schnitte durch die Papilla foliata des Kaninchens. 560mal vergrößert.
Technik Nr. 187, pag. 284.

eingebettet sind; sie sitzen mit der Basis auf der Tunica propria auf, das obere Ende reicht bis zur Epitheloberfläche, welche hier eine kleine, oft trichterförmige Vertiefung, den Geschmacksporus, zeigt. Jede Geschmacksknospe besteht aus zwei Arten

langgestreckter Epithelzellen; die einen sind entweder von überall gleicher Breite, haben dann die Gestalt von Fassdauben oder sie sind an ihrem basalen Ende verjüngt, zuweilen gabelig geteilt, während das obere Ende zugespitzt ausläuft. Diese Zellen bilden die Hauptmasse der Geschmacksknospe, sind vorzugsweise in der Peripherie der Knospe gelegen und heissen Deckzellen. Sie dienen zur Stütze und Hülle der schmalen Geschmackszellen (Schmeckzellen), welche die eigentlichen Sinnesepithelien sind. Die Geschmackszellen sind schmal, nur in der Mitte, wo

Fig. 216.

Senkrechter Durchschnitt durch zwei Leisten der Papilla foliata des Kaninchens, 80mal vergrößert. Jedes Leistchen *l* trägt drei sekundäre Leistchen *l'*. *g* Geschmacksknospen. *n* Markhaltige Nerven. *d* Eiweißdrüsen. *a* Stück eines Ausführungsganges einer solchen. *M* Muskelfasern der Zunge. Technik Nr. 187, pag. 284.

der Kern sitzt, etwas verdickt. Ihr oberer Abschnitt ist cylindrisch oder — und das ist häufiger — kegelförmig und trägt an seinem freien Ende ein glänzendes Stiftchen (Fig. 215), eine Kutikularbildung; die Mitte ist etwas dicker und enthält den Kern; der untere Abschnitt ist feiner, bei Einwirkung mancher Reagentien mit Knötchen besetzt. Es ist möglich, dass hier ähnliche

Verhältnisse wie bei den Riechzellen (pag. 280) vorliegen, dass also die Geschmackszellen Ganglienzellen sind.

Die Geschmacksknospen finden sich vorzugsweise an den Seitenwänden der Papillae circumvallatae (vergl. auch Fig. 108, pag. 152) und der Leisten der Papillae foliatae (Fig. 216), (s. auch pag. 153), in geringer Zahl auf den Papillae fungiformes, am weichen Gaumen und auf der hinteren Kehldeckelfläche.

TECHNIK.

Nr. 186. Zur ersten Orientirung über Zahl und Lage der Geschmacksknospen sind die in Nr. 91 (pag. 177) angegebenen Methoden ausreichend. Als passende Objekte sind die Papillae circumvallatae eines beliebigen Thieres (vergl. auch Fig. 108) und die Papilla foliata des Kaninchens zu empfehlen. Letztere ist eine erhabene Gruppe paralleler Schleimhautfalten, welche sich am Seitenrande der Zungenwurzel befindet. Schon mittelfeine, senkrecht zur Längsachse der Falten gerichtete Schnitte lassen bei schwachen Vergrößerungen die Geschmacksknospen als helle Flecke erkennen.

Nr. 187. Zum Studium des feineren Baues der Geschmacksknospen trage man mit einer flachen Scheere die Papilla foliata eines soeben getödteten Kaninchens so ab, dass möglichst wenig Muskelsubstanz anhängt. Das Stückchen wird mit Igelstacheln auf einen Korkstöpsel gesteckt (die Muskelseite gegen den Kork gekehrt) und ca. 1 Stunde Osmiumdämpfen ausgesetzt (s. weiter pag. 14, 6). Feine Schnitte des in Leber eingeklemmten, gehärteten Präparates werden ca. 30 Sekunden in Böhmer'schem Haematoxylin gefärbt (pag. 17) und in Damarfirniss eingeschlossen (pag. 23) (Fig. 215).

Nr. 188. Zur Darstellung der Nerven schneide man eine Papilla circumvallata (ohne Wall, nur das kugelige Wärzchen) mit einer Scheere aus, lege sie auf 10 Minuten in den filtrirten Saft einer frisch ausgepressten Citrone; dann bringe man die Papille in 5 ccm 1%ige Goldchloridlösung und stelle das Ganze auf 1 Stunde in's Dunkle. Dann hebe man die Papille mit Holzstäbchen aus der Goldlösung, bringe sie in ein Uherschälchen mit destill. Wasser und bewege zum Abspülen die Papille darin etwas hin und her und übertrage sie endlich in 20 ccm destill. Wasser, dem 3 Tropfen Essigsäure zugesetzt sind. Darin setze man die Papille dem Tageslichte aus, bis die Reduktion vollendet ist (gewöhnlich nach 3 Tagen). Dann härte man die Papille im Dunkeln in ca. 30 ccm allmählich verstärktem Alkohol (pag. 14). Die Schnitte durch das eingeklemmte Objekt müssen möglichst fein gemacht werden. Einschluss in Damarfirniss (pag. 23). Die Nervenfasern sind dunkelroth bis schwarz, auch die Geschmackszellen färben sich dunkel (vergl. Fig. 214). Die Papilla foliata des Kaninchens ist zu solchen Präparaten nicht geeignet.

Die in vorstehenden 186 Nummern angegebenen technischen Vorschriften verhalten sich hinsichtlich der Leichtigkeit, mit der sie ausgeführt werden können, sehr verschieden. Ein Theil derselben ist so einfach, dass schon beim ersten Versuche gute Resultate erzielt werden können, ein anderer Theil dagegen setzt eine gewisse Geschicklichkeit voraus, die nur durch Uebung zu erreichen ist.

Die Reihenfolge der Vorschriften ist, gebunden an den Text des Lehrbuches, nun keineswegs geeignet, den Anfänger vom Leichterem zum Schweren zu führen, im Gegentheil, eine grosse Anzahl der in den ersten Nummern gegebenen Vorschriften gehört zu den schwierigeren, wie denn überhaupt die Herstellung der Elemente zu den höheren Aufgaben des jungen Mikroskopikers zählt.

Unter diesen Umständen schien es mir rathsam, die technischen Regeln in einer Weise zu ordnen, dass der Anfänger an der Hand dieser Reihenfolge fortschreitend leichter im Stande ist, die Aufgaben zu bewältigen.

I. K a p i t e l.

1. Reihe.

S c h n i t t e.

Nr.	Seite	
14	59	Rippenknorpel
15	60	Elastischer Knorpel
11	59	Elastisches Band
59	114	Sehne
14	59	Knorpel
125	202	Niere
92	178	Speiseröhre
129	203	Ureter
110	184	Leber
90	177	Zungenpapillen und Zungenbälge
141	219	Nebenhoden
48	94	Milz
154	235	Kopfhaut
53	108	Knochen
55	109	Gelenkknorpel ¹⁾
102	181	Dickdarm ²⁾
		frisch.
		getrocknet.
		fixirt in Müller'scher Flüssigkeit und gehärtet in allmählich verstärktem Alkohol.
		fixirt in Salpetersäure und gehärtet in allmählich verstärktem Alkohol.

¹⁾ Die beiden Nummern 53 und 55 müssen später noch entkalkt werden.

²⁾ Kann auch in Müller'scher Flüssigkeit fixirt werden.

2. Reihe.

Frische Präparate ohne Zerzupfen.

Nr.	Seite	
108	184	Leberzellen
85	175	Plattenepithel
151	234	Haare
4	58	Bindegewebsbündel
138	218	Samenelemente (Stier)
140	219	Samenelemente (Frosch)
103	181	Dickdarmdrüsen
99	180	Dünndarmepithel und Zotten
161	236	Elemente der Milch
9	59	Feineelastische Fasern
116	186	Omentum
54	109	Knochenmark
8	59	Fettzellen
162	236	Elemente d. Kolostrum
5	58	Bindegewebszellen

in 0,75 % iger Kochsalzlösung.

mit Essigsäurezusatz.

mit Zusatz von Pikrokarmen.

3. Reihe.

Isoliren.

131	203	Epithel von Nierenbecken, Ureter und Blase	mit Ranvier's Alkohol.
96	179	Magenepithel	
172	264	Linsenfasern	mit Kalilauge.
21	65	Muskelfaserenden	
23	66	Glatte Muskelfasern	mit Pikrinsäurelösung.
150	234	Elemente des Nagels	
6	58	Bindegewebsfibrillen	mit Schwefelsäure.
152	234	Elemente des Haares	
153	234	Elemente des Haarbalges	mit Essigsäure.
22	65	Verästelte Muskelfasern	
99b	180	Darmepithel	mit Salpetersäure und chlorsaurem Kali.
			mit Müller'scher Flüssigkeit.

II. Kapitel.

1. Reihe.

Schnitte.

82	144	Nebenniere	} fixirt in Chromsäurelösungen und gehärtet in allmählich verstärktem Alkohol.
58	114	Muskelbündel	
109	184	Leber (Schwein)	} fixirt und gehärtet in absolutem Alkohol.
184	282	Nasenschleimhaut (Reg. respir.)	
182	278	Ohrschmalzdrüsen	
159	236	Milchdrüse	

Nr.	Seite		
16	60	Ligament.intervertebr.	} fixirt in Kleinenberg's Pikrinsäure und gehärtet in allmählich verstärktem Alkohol.
86	176	Lippendrüsen	
134	218	Hoden	
143	219	Eierstock	} fixirt in Salpetersäure und gehärtet in allmählich verstärktem Alkohol.
94	178	Magenhäute	
98	180	Brunner'sche Drüsen	
101	181	Peyer'sche Haufen	
100	180	Dünudarm	

2. Reihe.

Frische Präparate ohne Zerzupfen.

13	59	Hyaliner Knorpel	} in 0,75 % iger Kochsalzlösung.
56	109	Synovialzotten	
124	201	Harnkanälchen	
145	220	Eier vom Frosch	
2	48	Flimmerepithel	
73	140	Plexus chorioideus	
80	143	Vater'sche Körperchen	
107	183	Pankreas	
83	144	Nebenniere	
42 ^b	92	Haematoidinkristalle	

3. Reihe.

Isoliren.

88	176	Odontoblasten	} mit Müller'scher Flüssigkeit
89	176	Schmelzprismen (auch Schneiden)	
61	115	Sehnenzellen	mit Alaunkarmin

4. Reihe.

Zerzupfen.

95	178	Magendrüsen	} in 75 % iger Kochsalzlösung.
71	139	Hirnsand	
10	59	Starke elastische Fasern	
17	64	Quergestreifte Muskelfasern	
18	65	Sarkolemm	mit Brunnenwasser-Zusatz.
19	65	Kerne quergestreifter Muskelfasern	mit Essigsäure-Zusatz.

III. Kapitel.

1. Reihe.

Schnitte.

65	138	Rückenmark	} fixirt in Müller'scher Flüssigkeit und gehärtet in allmählich verstärktem Alkohol.
3	57	Gallertartiges Bindegewebe	

Nr.	Seite	
123	194	Thymus
130	203	Blase
133	203	Männliche Harnröhre
132	203	Weibliche „
142	219	Prostata
146	220	Eileiter
149	234	Nagel
181	278	Ohrtrumpete
117	193	Kehlkopf etc.
147	220	Uterus
155	235	Haarentwicklung
70	139	Hypophyse
68	138	Ganglienzellen nach Golgi
75	141	Ganglion spinale
111	184	Leber (Bindegewebe)
49	94	Milz (Reticulum)
164 ^c	261	Iris
32	89	Herz und Blutgefäße
45	93	Lymphknoten
118	193	Bronchus
148	233	Haut
157	235	Talgdrüsen
127	202	Mausniere
156	235	Augenlid
176	266	
60	115	Sehne
92	178	Tonsille
62	115	Muskel und Sehne
84	144	Nebenniere
90	177	Zahnentwicklung
46	93	Lymphknoten
78	142	Zusammengesetzte Tastzellen
77	141	Tastkörperchen

fixirt in Müller'scher Flüssigkeit und gehärtet in allmählich verstärktem Alkohol.

fixirt und gehärtet in absolutem Alkohol.

fixirt in 0,5 % iger Chromsäure und gehärtet in allmählich verstärktem Alkohol.

fixirt in Kleinenberg's Pikrinsäure und gehärtet in allmählich verstärktem Alkohol.

Pikrinsäure.

Osmiumsäure.

Goldchlorid.

2. Reihe.

Frische Präparate ohne Zerzupfen.

47	93	Elemente der Milz	in 0,75 % iger Kochsalzlösung.
144	220	Eier der Kuh	
72	140	Corpuscula amyacea	
12	59	Gefensterte Membran	mit Kalilauge-Zusatz.
120	194	Elastische Fasern der Lunge	
40	91	Blut	
42	92	Haeminkrystalle	mit Essigsäure-Zusatz.
7	58	Umspinnende Zellen	
37	90	Farbige Blutkörperchen des Menschen	ohne Zusatz.

Nr.	Seite		
39	91	Farbige Blutkörperchen des Frosches	} ohne Zusatz
42c	92	Haemoglobinkristalle	
38	91	Blutplättchen	mit Methylviolett.
178	276	Otolithen	mit verdünntem Glycerin.

3. Reihe.**I s o l i r e n .**

137	218	Elemente des Hodens	mit Ranvier's Alkohol.
25	70	Multipolare Ganglienzellen	mit verdünnter Chromsäure.
124b	202	Harnkanälchen	mit Salzsäure.

4. Reihe.**Z e r z u p f e n .**

26	70	Markhaltige Nerven-	
26a	71	fasern	in 0,75 ⁰ / ₁₀ iger Kochsalzlösung.
27	71	Markscheide	mit Wasser-Zusatz.
28	71	Achseneylinder	mit Alkohol-Zusatz.
24	70	Ganglien-Zellen	mit Pikrokarmin-Zusatz.
30	71	Schnürring	mit Argent. nitr.
31	71	Marklose Nervenfasern	mit Osmiumsäure.
29	71	Achseneylinder	nach Chromsäurebehandlung.

5. Reihe.**H ä u t e .**

33	89	Kleine Blutgefäße	} mit Müller'scher Flüssigkeit.
174a	265	Linsenkaps.u.-Epithel	
36	90	Kapillarenentwicklung	mit Pikrinsäure.
115	185	Bauchfellepithel	mit Argent. nitr.
171b	264	Hornhautnerven	Methylenblau.

6. Reihe.**S c h l i f f e .**

51	107	Knochen.
52	108	Sharpey's Fasern.
87	176	Zähne.

7. Reihe.**I n j e k t i o n e n .**

113	185	Leber.
128	203	Niere.
121	194	Lunge.

IV. K a p i t e l.

1. Reihe.

S c h n i t t e.

Nr.	Seite	
66	138	Gehirn
64	137	Rückenmark
65	138	Rückenmark
76	141	Symph. Ganglien
135	218	Hodenkanälchen
186	284	Geschmacksknospen
57	110	Knochenentwicklung
43	92	Lymphgefäße
97	179	Magendrösen
106	183	Speicheldrüsen
177	266	Thrändrüse
107	183	Pankreas
163 ^b	260	Cornea
163 ^c	260	Sklera u. Chorioidea
163 ^d	260	Eintrittsstelle des N. optic.
163 ^a	260	Kornealfalz
74	140	Nervenbündel
50	94	Milz
160	236	Milchdrüse
187	284	Geschmacksknospen
171 ^a	264	Hornhautnerven
168	263	Hornhautkanälchen
167	262	
136	218	Hoden
69	139	Gehirn und Rückenmark nach Golgi
114	185	Gallencapillaren

Fixirt in Müller'scher Flüssigkeit und gehärtet in allmählich verstärktem Alkohol.

Fixirt und gehärtet in absolutem Alkohol.

Fixirt in Chromsäure und gehärtet in allmählich verstärktem Alkohol.

fixirt in Chromosmium-Essigsäure und gehärtet in allmählich verstärktem Alkohol. Osmiumsäure. Goldchlorid.

Argent. nitr. fixirt in Platinchlorid-Osmium-Essigsäure.

Kali bichrom.-Osmiumsäure.

2. Reihe.

Frisehe Präparate ohne Zerzupfen.

170	263	Hornhautgefäße und Nerven	in Glaskörperflüssigkeit.
41	91	Farblose Blutkörperchen in Bewegung	in Lymphe.

3 Reihe.

I s o l i r e n.

20	65	Muskelfibrillen	mit Chromsäure.
----	----	-----------------	-----------------

4. Reihe.

Z e r z u p f e n.

164 ^a	261	Elemente der Chorioidea	Müller'scher Flüssigkeit.
81 ^a	143	Motorische Nervenendigung	Goldchlorid.

5. Reihe.

Häute.

Nr.	Seite		
1a	39	Kernstruktur	} Chromosmium-Essigsäure.
1b	40	Kerntheilungsbilder	
105	182	Darmnervenplexus	Essigsäure.
105	182	Darmnervenplexus	Goldchlorid.
34	89	Epithel (der Gefäße)	Argent. nitric.

6. Reihe.

Injektionen.

104	182	Magen und Darm
158	236	Haut
175	266	Auge

V. K a p i t e l.

1. Reihe.

S c h n i t t e.

185	282	Regio olfactoria	Osmiumsäure.
173	265	Linse	Chromsäure.
112	186	Froschleber	} fixirt in Müller'scher Flüssigkeit und ge- härtet in allmählich verstärktem Alkohol.
164e	261	Retina	
164d	261	Ora serrata	
174	265	Linsenkapsel	
164f	261	Macula (und Fovea)	} Argent. nitr.
119	193	Lunge	
188	284	Geschmacksknospen	
180	277	Schnecke	Osmiumsäure.

2. Reihe.

Frisehe Präparate ohne Zerzupfen.

165	261	Retina	Glaskörperflüssigkeit.
-----	-----	--------	------------------------

3. Reihe.

I s o l i r e n.

164b	261	Elemente der Retina	Müller'sche Flüssigkeit.
166	262	Elemente der Retina	Osmiumsäure.
183	282	Riechzellen	Ranvier's Alkohol.

4. Reihe.

Z e r z u p f e n.

139	219	Samenflecken	Wasser.
-----	-----	--------------	---------

5. Reihe.

Häute.

169	263	Hornhautzellen	Goldchlorid.
81b	144	Motorische Endplatte	Essigsäure.
179	276	Lamina cochleae	Osmiumsäure.
79	142	Endkolben	Essigsäure.

Anhang.

Die Mikrotomtechnik.

I. Mikrotome.

Die gebräuchlichsten Mikrotome sind nach zwei verschiedenen Prinzipien konstruirt.

Das Prinzip der einen Art besteht darin, dass das zu schneidende Objekt durch Verschiebung des Objekthalters auf einer schräg aufsteigenden Ebene gehoben wird.

Bei der anderen Art wird das Objekt in vertikaler Richtung durch eine Mikrometerschraube gehoben.

Beide Arten von Mikrotomen leisten Vorzügliches¹⁾.

Alle Theile des Mikrotoms sind möglichst sauber zu halten. Bei häufigem Gebrauche schütze man dasselbe, mit einem leichten Holzkasten bedeckt, vor Staub. Die Bahn, auf welcher der Messerschlitten läuft, muss vollkommen rein sein; man putze dieselbe hie und da mit einem in Benzin getauchten Lappen und fette sie dann mit Knochenöl oder mit Vaseline so reichlich ein, dass der Schlitten auch bei leichtem Anstosse die ganze Bahn gleichmässig durchläuft²⁾. Besondere Sorgfalt ist auf die Messer zu verwenden. Nur mit sehr scharfen Messern wird man Serien sehr feiner Schnitte herstellen können. Ein wirklich scharfes Messer muss ein feines Haar, das man an dem einen Ende zwischen den Fingern hält, mit Leichtigkeit durchschneiden.

II. Einbetten.

A. In Paraffin.

Hierzu bedarf man

1. Paraffin: zwei Sorten, eine weichere (45° Celsius Schmelzpunkt) und eine härtere (52° Celsius Schmelzpunkt). Davon stelle man sich eine

¹⁾ Aus eigener Erfahrung kenne ich die Thoma'schen Schlittenmikrotome mit schräger Hebung von R. Jung in Heidelberg, die trefflich gearbeitet sind. Das Format Nr. IV. (Katalog 1886 p. 18) ist besonders zu empfehlen. Seit mehreren Jahren arbeite ich mit einem Mikrotom mit vertikaler Hebung von Schanze in Leipzig, Modell B Nr. 9 (Preisverzeichniss 1888), dessen Konstruktion nichts zu wünschen übrig lässt; auch die nach gleichem Princip konstruirten Mikrotome von Gustav Miede in Hildesheim sind sehr zu empfehlen. Sehr gut sind die Mikrotome von A. Becker in Göttingen.

²⁾ Die an den Thoma'schen Mikrotomen befindliche Objektschlittenbahn darf dagegen nur sehr wenig eingeölt werden, damit nicht der Schlitten durch den Messerzug zurückgeschoben werde.

Mischung her, die bei ca. 50° Celsius schmelzbar ist. Von dem richtigen Mischungsverhältnisse beider Sorten hängt viel ab; mancher Misserfolg wird nur durch eine ungenügende Mischung herbeigeführt.

Eine genaue Angabe der Mengenverhältnisse lässt sich nicht liefern, da die Konsistenz des Paraffins in hohem Grade von der äusseren Temperatur abhängig ist. Auch bedingen härtere Objekte, ferner der Wunsch, sehr feine Schnitte herzustellen, die Anwendung härterer Mischungen als gewöhnlich. Für den Winter, bei einer Zimmertemperatur von 20° Celsius, dürfte eine Mischung von 30 gr weichem mit 25 gr hartem Paraffin¹⁾ den meisten Anforderungen genügen.

2. Chloroform 20 ccm.

3. Paraffinchloroform, eine gesättigte Lösung (5 gr der Mischung in 25 ccm Chloroform). Diese Lösung ist bei Zimmertemperatur flüssig.

4. Ein Wärmekasten aus Weissblech mit doppelten Wänden, deren Zwischenraum mit Wasser gefüllt ist²⁾. Unter dem Kasten brennt eine kleine Gasflamme. Oben befinden sich zwei Oeffnungen: die eine führt in den erwähnten Zwischenraum, hier wird ein Reichert'scher Regulator³⁾ eingesetzt. Die zweite Oeffnung führt in den Luftraum des Kastens. Hier wird ein Thermometer eingesetzt. Die Vorderwand wird durch eine Glasplatte, die sich in einem Blechfalz in die Höhe ziehen lässt, gebildet. Der Luftraum des Kastens wird durch zwei herausnehmbare Platten in drei Fächer getheilt. Ein solcher Kasten soll ca. 25 cm lang, 23 cm hoch, 16 cm tief sein.

Der Wärmekasten mit Zubehör ist für denjenigen, der viel mit Paraffin arbeitet, kaum entbehrlich. Man kann jedoch statt dessen das Paraffin auf dem Wasserbade schmelzen und durch eine kleine Spiritusflamme flüssig erhalten.

5. Ein Einbettungs-Rähmchen⁴⁾. Dasselbe besteht aus zwei geknickten Metallplatten, die so an einander gesetzt werden.

Statt dieses Rähmens kann man sich aus Staniol oder steifem Papier (alten Korrespondenzkarten) geformter Kästchen bedienen.

Die einzubettenden Objekte müssen vollkommen wasserfrei sein, 1 bis 3 Tage in mehrmals gewechseltem absolutem Alkohol gelegen haben. Dann werden sie in ein Fläschchen mit ca. 20 ccm Chloroform übertragen, woselbst sie bis zum nächsten Tage verweilen⁵⁾. Danach kommen die Objekte in Paraffinchloroform (s. oben) und nach 2—8 Stunden je nach der Grösse der Stücke in ein Schälchen geschmolzenen, aber nicht zu heissen Paraffins⁶⁾. Nach etwa einer halben Stunde werden die Stückchen in ein zweites Schälchen geschmolzenen Paraffins gebracht⁷⁾, woselbst sie je nach der Grösse 1 bis 5 Stunden bleiben.

1) Von Dr. Grübler (Leipzig) bezogen; das Kilo jeder Sorte kostet 4 Mark.

2) Wird von R. Jung (Heidelberg) angefertigt (Nr. 102 des Katalogs von 1886).

3) Ebendaher zu beziehen (Nr. 108 des Katalogs).

4) Bei Jung Nr. 101 des Katalogs 1886, bei Schanze Nr. 35 des Preisverzeichnisses pro 1888.

5) Das reicht für alle Fälle, bei kleinen Objekten genügen 1—2 Stunden.

6) Das Paraffin darf nur 2—3 Grade über seinen Schmelzpunkt erhitzt sein; für die oben angegebene Mischung soll die Luft im Wärmekasten eine Temperatur von 50° Cels. haben. Hat man das Paraffin auf dem Wasserbade geschmolzen, so stelle man die Flamme so, dass die Oberfläche des Paraffins mit einem dünnen Häutchen erstarrten Paraffins bedeckt bleibt.

7) Das geschieht, um den letzten Rest des Chloroforms aus dem Objekte zu entfernen. Selbstverständlich muss immer das gleiche Schälchen für die Uebertragung aus

Nach Ablauf derselben nehme man einen tiefen Teller, lege einen Objektträger hinein und stelle auf diesen das Einbettungsrähmchen, in welches jetzt Paraffin und Objekt gegossen werden. Dann gebe man, so lange das Paraffin noch flüssig ist, dem Objekt mit erhitzten Nadeln die gewünschte Lage. Sobald das geschehen ist, giesse man in den Teller vorsichtig kaltes Wasser bis zum oberen Rande des Rähmchens; das Paraffin beginnt sofort zu erstarren, worauf man noch mehr Wasser zugiesst, bis das ganze Rähmchen unter Wasser steht. Durch diese Manipulation erhält das Paraffin eine homogene Beschaffenheit, während es sonst leicht krystallinisch wird und dann sowohl schwerer zu schneiden ist, als auch auf die Struktur der eingeschlossenen Theile schädlich einwirkt. Nach etwa zehn Minuten werden die Metallplatten abgenommen und der Paraffinblock bis zur vollkommenen Erstarrung auf dem Objektträger im Wasser belassen.

Das so eingeschmolzene Objekt ist schon nach einer halben Stunde schneidbar; soll es später verarbeitet werden, so wird es mit einer Nadel signirt und kann bis zum Schneiden unbegrenzt lange Zeit aufgehoben werden.

B. In Celloidin.

Hierzu bedarf man

a) einer dünnen Lösung von Celloidin. Das bei Dr. Grübler käufliche Celloidin hat die Konsistenz speckigen Käses; ein 30 gr schweres Stück wird in kleine Würfel geschnitten und mit ca. 30 ccm absolutem Alkohol + ebensoviel Aether übergossen,

b) eine etwas dickere Lösung von ca. 30 gr Celloidin in 20 ccm absol. Alkohol + 20 ccm Aether. Diese Lösung hat die Konsistenz eines dicken Syrups.

Beide Lösungen sind in gut verschlossenen weithalsigen Flaschen aufzubewahren und können, wenn sie zu sehr eingedickt sind, durch Zugiessen von Aether-Alkohol verdünnt werden¹⁾.

Die einzubettenden Stücke müssen vollkommen wasserfrei sein, 1—2 Tage in mehrmals gewechseltem absolutem Alkohol gelegen haben. Aus diesem werden die Stücke in die dünne und am nächsten Tage in die dicke Celloidinlösung übertragen. Hier können die Stücke beliebig lange verweilen. Meist sind sie nach weiteren 24 Stunden hinreichend durchtränkt; nur grosse, viele Binnenräume enthaltende Objekte müssen länger (bis zu 8 Tagen) in der dicken Lösung verweilen. Dann wird das Stück rasch auf einen Korkstöpsel aufgesetzt und etwas Celloidin darübergegossen. Dabei ist zu beachten, dass das Objekt nicht fest auf den Kork aufgedrückt werde, sonst löst es sich leicht. Es muss sich eine 1—2 mm dicke Schicht²⁾ zwischen Kork und Objekt befinden. Nun wird das Ganze auf $\frac{1}{2}$ (zarte Objekte) — 4 Stunden unter

dem Paraffinchloroform benützt werden. Enthält das Schälchen nach häufigerem Gebrauche viel Chloroform, so kann man dieses durch stärkeres Erhitzen des Paraffins austreiben. So lange das Paraffin noch Chloroform enthält, steigen von einer eingetauchten heissen Nadel Bläschen auf.

1) Nach einiger Zeit werden die Lösungen trüb und milchig; es ist dann besser, die Lösung vollkommen eintrocknen zu lassen und die Stücke von Neuem in Aether-Alkohol zu lösen.

2) Dicker darf die Schicht nicht sein; auch gut gehärtetes Celloidin ist elastisch, eine dicke Schicht solch elastischen Materiales würde zu einem Ausweichen des Objektes beim Schneiden Veranlassung geben.

eine nicht fest schliessende Glasglocke¹⁾ zu langsamer Trocknung gebracht und dann in eine Glasdose mit ca. 30 ccm 80%igem Alkohol übertragen. Damit die Objekte untertauchen, klebe man die Korkstöpsel mit ihrer unteren Fläche mittelst Celloidin an die Innenfläche des Dosendeckels. Am nächsten Tage wird der Alkohol durch 70%igen Alkohol ersetzt, in welchem die Stücke lange aufgehoben werden können.

Zur Anfertigung feinerer Schnitte kann man das Celloidin noch härten. Zu diesem Zwecke bringe man die in Celloidin eingeschlossenen Stücke aus dem 80%igen Alkohol auf 2 Tage oder beliebig länger in ein Alkohol-Glyceringemisch (Alkohol 80% 1 Theil, reines concentrirtes Glycerin 6—10 Theile. Je grösser das Verhältniss von Glycerin zu Alkohol ist, desto härter wird das Celloidin²⁾). Um das Federn der elastischen Celloidinblöcke zu verhindern, trockne man den aus dem Alkohol-Glycerin entnommenen Block mit Filtrirpapier sorgfältig ab, mache ein paar seitliche Einkerbungen und tauche ihn in flüssiges Paraffin. Solche Blöcke lassen sich nicht trocken aufheben. Man lege sie in das Alkohol-Glycerin zurück.

III. Schneiden.

A. Paraffinobjekte.

1. Bei schräger Messerstellung.

Der das Objekt enthaltende Paraffinblock wird bei den Jung'schen Mikrotomen auf einen der beigegebenen, mit hartem Paraffin ausgegossenen Hohlcylinder, bei den Schanz'schen Mikrotomen auf ein statt der Objektklammer einzusetzendes Tischchen aufgeschmolzen³⁾. Bei dem Tischchen geschieht das einfach durch Aufdrücken des Paraffinblockes auf das erwärmte Tischchen. Bei dem mit hartem Paraffin ausgefüllten Hohlcylinder erwärme man dieses sowie die Grundfläche des Paraffinblockes, drücke beide leicht an einander und stelle durch Einstechen heisser Nadeln an der Berührungsfläche beider Theile eine feste Verbindung her. Um rasche Erstarrung herbeizuführen, lege man jetzt den Hohlcylinder resp. das Tischchen auf 5 Minuten in kaltes Wasser. Dann wird der oberste, das Objekt bergende Theil des Paraffinblockes durch schichtweises Abtragen des Paraffins zu einer vierseitigen kleinen Säule zurecht geschnitten, deren Grundfläche ein rechtwinkliges Viereck ist.

Die Säule soll nicht höher als 1 cm, das Objekt soll nur von einer schmalen (1—2 mm breiten) Paraffinschicht umgeben sein. Der Hohlcylinder (resp. das Tischchen) wird nun in das Mikrotom eingesetzt. Man schneidet mit trockener Klinge. Die Stellung des Messers hängt von der Natur des Objectes ab.

Schneiden bei schräger Messerstellung.

Handelt es sich um grosse Objekte von ungleichem Gefüge, so soll das Messer in einem zur Längsachse des Mikrotoms möglichst spitzen Winkel

¹⁾ Zu dem Zwecke lege man eine Nadel oder dergleichen unter den Glockenrand.

²⁾ Man kann die Mischung noch mehr ändern. Als äusserste Grenze dürfte 1 Theil Alkohol zu 30 Theilen Glycerin zu bezeichnen sein; noch stärkere Differenzen führen zu einem starken Rollen der Schnitte.

³⁾ Statt des Tischchens benütze ich cylindrische Stückchen weichen Holzes von ca. 3 cm Höhe und einem Durchmesser von 1½ cm, welche in die Objektklammer eingeschraubt werden.

festgeschraubt werden. Die Paraffinsäule muss so zur Messerschneide stehen, dass diese zuerst eine Kante der Säule trifft. Der Messerschlitten ist langsam zu bewegen, jeder Druck ist dabei zu vermeiden.

Schneiden bei querer Messerstellung¹⁾.

Das Messer wird senkrecht zur Längsachse des Mikrotoms eingeschraubt, die Paraffinsäule so gedreht, dass die Messerschneide zuerst eine Fläche der Säule trifft. Der Messerschlitten wird rasch in hobelnder Bewegung geführt, dadurch kleben die Schnitte an den Rändern an einander und bilden lange Bänder. Bei richtiger Konsistenz der Paraffins legt sich oft schon der erste Schnitt glatt auf die Klinge und wird durch den zweiten Schnitt in der Richtung gegen den Messerrücken zu verschoben. Zeigen aber die ersten Schnitte Neigung, sich zu rollen und nach vorne über die Schneide wegzufallen, so müssen sie vorsichtig mit einem zarten Pinsel in die richtige Lage zurückgeführt werden. Am besten gelingt das Bänderschneiden bei einer Schnittfläche von 0,01 mm. Schnitte von mehr als 0,01 mm Dicke rollen sich leicht um und kleben mit den Rändern schwerer an einander.

Misstände beim Schneiden und deren Beseitigung.

Jeder, der mit Paraffin gearbeitet hat, wird über manchen misslungenen Versuch zu berichten wissen.

1. Das Messer gleitet über das Objekt und trennt einen Schnitt entweder unvollkommen oder gar nicht.

Die Ursache hierfür kann zunächst im Mikrotom liegen. Die Bahn des Messerschlittens ist nicht sauber; man achte auch auf den vertikalen Theil der Schlittenbahn. Oder das Messer ist nicht scharf genug, oder ist an der Unterfläche mit Paraffin beschmutzt. In letzterem Falle wird der Messerschlitten herausgehoben, das Messer vorsichtig mit Terpentinöl und einem weichen Lappen gereinigt. Messer mit dünnem Rücken federn, wenn man den vordersten Theil der Schneide benutzt; so kommt es, dass bei schräger Messerstellung die Schneide nur im Anfange des Schnittes eingreift und über den letzten Theil des Präparates erfolglos weggleitet. Bei Mikrotomen älterer Konstruktion liegt der Grund oft in ungenügender Feststellung des Paraffinblockes.

In zweiter Linie ist die Ursache im Objekt zu suchen. Dasselbe ist vielleicht zu hart, oder sehr ungleichen Gefüges, oder schlecht eingebettet. In letzterem Falle liegen zwei Möglichkeiten vor. Entweder das Präparat war nicht gehörig entwässert, dann zeigt es undurchsichtige Flecken, oder es enthält noch Chloroform; in diesem Falle ist es weich, ein leichter Druck mit der Nadel auf die Oberfläche des Präparates ausgeübt, hinterlässt eine Delle oder presst gar Flüssigkeit aus. In beiden Fällen muss die Einbettungsprozedur in umgekehrter Reihenfolge bis zum absoluten Alkohol (in letzterem Falle bis zum Paraffinbade) wiederholt werden.

Endlich kann die Konsistenz des Paraffins schuld sein.

¹⁾ Bei den Schanz'schen Mikrotomen muss in diesem Falle eine Umstellung des Objektklammerträgers vorgenommen werden, so dass die Klammer in der Mitte des Mikrotoms steht. Man stelle zuerst durch Druck am Hebel den Klammerträger möglichst hoch über die Drehscheibe, nehme dann die Klammer resp. das Tischchen ab und drehe den Klammerträger um 180 Grad um die senkrecht zur Mikrotomlängsachse stehende Achse. Dann wird die Klammer wieder eingesetzt und der Klammerträger bis zur Scheibe gesenkt.

2. Die Schnitte rollen sich.

Das kann verhindert werden, indem man einen Pinsel oder eine gehogene Nadel gegen den sich rollenden Schnitt hält¹⁾. Der Grund des Rollens liegt in zu hartem Paraffin, dass auch schuld ist, wenn

3. die Schnitte bröckeln.

Die Brauchbarkeit des Paraffins ist in hohem Grade abhängig von der äusseren Temperatur. Ist das Paraffin zu hart, so suche man nicht sogleich durch Beimischung von weichem Paraffin eine passende Konsistenz herzustellen — das sei der letzte Ausweg —, sondern versuche zuvor einfachere Mittel. Man schneide in der Nähe des Ofens oder (bei Gasbeleuchtung) mit nahegerückter Lampe. Oft führt schon ein leichtes Erwärmen des Messers zum Ziele²⁾.

4. Die Schnitte falten sich und werden zusammengedrückt. Dadurch erhalten die geschnittenen Objekte eine falsche Form. Der Grund liegt in zu weichem Paraffin. Oefteres Einlegen des Blockes in kaltes Wasser, Schneiden im kalten Zimmer (im Sommer in den Morgenstunden) beseitigen diesen Uebelstand.

B. Celloidinobjekte.

Die das Objekt umgebende Celloidinschicht ist bis auf eine 1—2 mm breite Schicht abzutragen.

Man schraube das Messer in einem zur Längsachse des Mikrotoms möglichst spitzen Winkel fest. Das Messer muss mit 70%oigem Alkohol befeuchtet werden, der mit einem Pinsel nach jedem zweiten oder dritten Schnitte aufgetragen wird. Die Schnitte werden mit einem Pinsel abgehoben und in eine Schale mit 70%oigem Alkohol übertragen.

Sehr feine Schnitte (unter 0,02 mm) lassen sich von nicht gehärteten (pag. 295) Celloidinobjekten nicht anfertigen.

IV. Einlegen der Schnitte.

A. Paraffinobjekte.

Sofern es sich nicht um Serien oder um sehr feine Schnitte handelt, werden die Schnitte in ein Schälchen mit 5 ccm Terpentinöl gebracht und nachdem das Paraffin aufgelöst ist, in ein zweites Schälchen mit Terpentinöl übertragen. Aus diesem werden die Schnitte, wenn sie von einem durchgefärbten Stücke stammen, auf den Objektträger gebracht und nach den oben (pag. 23) angegebenen Regeln eingelegt. Sollen die Schnitte aber noch gefärbt werden, so kommen sie aus dem Terpentinöl in ca. 5 ccm Alkohol absolutus, der nach 2 Minuten gewechselt wird. Nach weiteren 2 Minuten können die Schnitte beliebig gefärbt werden.

Handelt es sich dagegen um Serien und sehr feine Schnitte, so müssen die trocknen Schnitte zuerst aufgeklebt werden. Die hier zu verwendenden Objektträger müssen ganz rein sein; man putze sie mit etwas Alkohol und einem sauberen, nicht fetten Tuche oder lege sie auf eine halbe Stunde in kaltes Seifenwasser. Auf den gut getrockneten Objektträger werden nun die

1) Jung und Schanze, sowie Instrumentenmacher Stöber in Würzburg verfertigen Schnittstrecker, die an das Messer befestigt werden und das Rollen verhindern; sie sind beim Bänderschneiden entbehrlich.

2) Selbst ganz gutes Paraffin bröckelt, wenn es mit kaltem Messer geschnitten wird.

Schnitte (event. ein Stück des Schnittbandes) gelegt und an den Rand derselben mit einem feinen Pinsel ein Tropfen reine dünne Gummilösung gebracht¹⁾. Nun wird der nächste Schnitt (resp. das Schnittbandstück aufgelegt, wieder Gummi zugesetzt und so weiter, bis der Objektträger besetzt ist. Es schadet nicht, wenn die Schnitte schwimmen. Nun ziehe man den Objektträger durch eine Spiritusflamme oder bringe ihn 1—3 Minuten in den Wärmkasten²⁾. Durch die leichte Erwärmung breiten sich die Schnitte glatt aus. Dann ordne man die Schnitte noch einmal mit einer Nadel, lasse durch leichte Neigung des Objektträgers die überflüssige Gummilösung abfließen und sauge sie mit einem Streifen Filtrirpapier ab und lasse das Ganze, vor Staub geschützt, gut trocknen. Am nächsten Tage wird der Objektträger mit Terpentinöl übergossen und, wenn die Schnitte schon gefärbt sind, in Damarfirniss (pag. 23) eingeschlossen. Sollen dagegen die Schnitte auf dem Objektträger noch gefärbt werden, so wird das Terpentinöl abgewischt und der Objektträger in absoluten Alkohol übertragen³⁾. Nach ca. 5 Minuten wird der Objektträger aus dem Alkohol genommen, in der Umgebung der Schnitte rasch abgewischt³⁾, angehaucht und entweder in die Farbe gelegt oder mit einigen Tropfen der Farblösung z. B. Haematoxylin (direkt auf die Schnitte) bedeckt. Von da wird der Objektträger langsam in eine Schale mit destillirtem Wasser gebracht und dann entweder in dünnes Glycerin (pag. 12) oder nach bekannter Vorbehandlung mit absolutem Alkohol und Bergamottöl (pag. 23) in Damarfirniss eingeschlossen.

B. Celloidinobjekte.

Die Schnitte werden in eine Schale mit 20 cem 90⁰/oigem Alkohol gebracht. Stammen sie nicht von durchgefärbten Stücken — die zu empfehlen sind — so können sie noch nachträglich gefärbt werden; doch sind Anilinfarben nicht anwendbar, da diese auch das Celloidin färben; selbst Haematoxylin verleiht dem Celloidin oft einen leichtblauen Ton. In absoluten Alkohol dürfen die Schnitte nicht gebracht werden, da dieses das Celloidin löst. Sie werden aus 90⁰/oigem Alkohol in chemisch-reinen Amylalkohol und dann in Xylol übertragen; wenn sie aufgehellte sind (pag. 23), werden sie in mit Xylol verdünntem Kandabalsam eingeschlossen.

Schnittserien von Celloidinobjekten kommen nur für ganz spezielle Zwecke z. B. für das Centralnervensystem in Betracht. In dieser Hinsicht seien die Artikel von Weigert⁴⁾ in der Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie bestens empfohlen.

1) Die Lösung ist jedesmal frisch zu bereiten. Ein kleiner Tropfen der officinellen Lösung von arabischem Gummi wird in ein Uhrschälchen gegeben und mit 5 cem destill. Wasser gut vermischt.

2) Das Paraffin darf nicht schmelzen, die aus geschmolzenem Paraffin und Gummi entstandene Mischung ist in Terpentinöl nicht mehr löslich.

3) Das Abwischen sowohl des Terpentinöles, sowie des Alkohols muss rasch geschehen, die Schnitte dürfen dabei nicht eintrocknen, sonst sind sie unbrauchbar; auch beim Aufträufeln der Farblösung ist darauf zu achten, dass diese wirklich die Schnitte bedeckt. Ein Ablösen der Schnitte kommt nur dann vor, wenn die Gummilösung nicht in genügender Menge — zwischen Schnitten und Objektträger muss die Lösung ganz ausgebreitet sein — zugesetzt war.

4) Band II. pag. 490, Band III. pag. 480, Band IV. pag. 209. Der im letzten Artikel empfohlene Negativlack ist bei Dr. Grübler (Leipzig) zu haben.

Namens- und Sachregister.

A.

Acervulus cerebri 125.
 Acini 45.
 Achromatin 34.
 Achsencylinder 68.
 — — — -Fortsatz 67.
 — — — -faden 207.
 Adenoides Gewebe 53.
 Aderhaut 237.
 Alaunkarmin 7.
 — — Anwendung 18.
 Alkohol, absoluter 4.
 — — Anwendung 12.
 — — 90% 4.
 — — 70% 4.
 — — allmählich verstärkter 14.
 — — Ranvier's 4.
 — — Anwendung 11.
 — — salzsaurer 8.
 Alveolen 44, 187.
 — — -gänge 187.
 — — -septa 190.
 Ameisensäure 6.
 Amoeboide Bewegung 35.
 Ampulle der Bogengänge 267.
 — — des Eileiters 215.
 — — des Samenleiters 208.
 Ampullen der Lymphknoten 83.
 Anaphase 38.
 Anatomie, mikroskopische 33.
 Anisotrope Substanz 62.
 Annuli fibrosi 73.
 Aorta 76.
 Appositionelles Wachsthum 106.
 Aquaeductus cochleae 274.
 Arachnoidea 126.
 Arachnoidalscheide 249.
 Arachnoidealzotten 126.
 Arcus spiralis 271.
 — — tarseus 259.
 — — — externus 259.

Area centralis 261.
 Arteria auditiva 273.
 — — stylomastoidea 273.
 — — centralis retinae 252.
 — — hyaloidea 253.
 Arteriae ciliares 254.
 — — helicinae 210.
 — — interlobulares 198.
 Arterien 74.
 Arteriolae rectae 199.
 Athmungsorgane 186.
 Auerbach'scher Plexus 166.
 Aufbewahren der Dauerpräparate 27.
 Aufhellen 22.
 Augapfel 236.
 Augenlid, drittes 258.
 Augenlider 256.
 Augenlidmuskel, Müller'scher 257.
 Aussenglied der Stäbchen 246.
 — — der Zapfen 247.
 Aussenpfeiler 271.

B.

Bänder elastische 99.
 — — fibröse 99.
 — — schneiden 296.
 Bandverbindung 99.
 Balgdrüsen 153.
 Bartholini'sche Drüsen 217.
 Basalmembran der Cornea, hintere 239.
 — — — — vordere 237.
 Basalsaum s. Kutikularsaum 52, 160.
 Basalzellen 280.
 Basement membrane 52.
 Bauchfell 175.
 Becherzellen 160.
 Belegschicht, tympanale 270.
 Belegzellen 159.
 Beleuchtung, seitliche 28.
 — — centrale 28.
 Bewegung, amoeboide 35.
 Bindegewebe 48.

Bindegewebe, adenoides 53.
 — — cytogenes 52.
 — — fibrilläres 48.
 — — formloses 52.
 — — gallertartiges 48.
 — — geformtes 52.
 — — interlobulares, der Leber 174.
 — — — der Lungen 190.
 — — interstitielles, der Nieren 198.
 — — intralobulares 174.
 — — lockiges 49.
 — — retikuläres 52.
 — — subseröses 175.
 — — welliges 49.
 Bindegewebsbündel 49.
 — — -fibrillen 49.
 — — -knorpel 55.
 — — -knochen 102.
 — — -zellen 50.
 Bindehaut s. Conjunctiva 256.
 Blau, Berliner 21.
 Blut 80.
 Blutgefäße des Augapfels 252.
 — — der Augenlider 258.
 — — des äusseren Ohres 276.
 — — des Bauchfelles 175.
 — — des Centralnervensystems 126.
 — — des Eierstockes 214.
 — — der Eileiter 215.
 — — der glatten Muskeln 61.
 — — der Haut 230.
 — — des Herzens 74.
 — — des Hodens 206.
 — — des Kehlkopfes 186.
 — — der Knochen 98.
 — — des Labyrinthes 273.
 — — der Leber 170.
 — — der Lungen 190.
 — — der Lymphknoten 85.
 — — des Magens und des Darmes 163.
 — — der Milchdrüse 233.
 — — der Milz 88.
 — — des Mittelohres 274.
 — — der Mundschleimhaut 146.
 — — der Nasenschleimhaut 281.
 — — der Nebennieren 136.
 — — der Nieren 198.
 — — der peripherischen Nerven 128.
 — — des Penis 210.
 — — der quergestreiften Muskeln 113.
 — — der Scheide 217.

Blutgefäße der Schilddrüse 192.
 — — der Speicheldrüsen 169.
 — — der Thymus 192.
 — — des Uterus 216.
 — — der Zungenschleimhaut 155.
 Blutgefässsystem 73.
 Blutkörperchen, farbige 80.
 — — — Stroma ders. 80.
 — — — Entwicklung 82.
 — — — farblose (weisse) 80.
 Blutkrystalle 81.
 Blutkuchen 81.
 Blutplättchen 81.
 Blutwasser 81.
 Bogengänge 267.
 Boraxkarmin 7.
 — — Anwendung 19.
 Bowman'sche Drüsen 281.
 — — Kapsel 197.
 — — Membran 237.
 Bronchen 187.
 Bronchioli respiratorii 187.
 Brunner'sche Drüsen 162.
 Brustwarze 232.
 Bulbus pili 225.
 — — oculi 236.

C.

Canalis, hyaloideus 253.
 — — Petiti 252.
 Capsula Glissonii 174.
 Caruncula lacrymalis 258.
 Centrales Höhlengrau 122.
 Centralkanal 116.
 Centralnervensystem 116.
 Centrosoma 34.
 Cerumen 276.
 Cervix uteri 216.
 Chondrin 53.
 Chorda dorsalis 99.
 Chorioidea 239.
 Chromatin 34.
 Chromessigsäure 5.
 Chromosmiumessigsäure 5.
 — — Anwendung 14.
 Chromosomen 37.
 Chromsäure 4.
 — — Anwendung 13.
 Chyluskörperchen 81.
 Ciliarmuskel 241.
 Cilien 256.

Circulus arteriosus nerv. opt. 254.
 — — iridis major 254.
 — — iridis minor 254.
 Cirkulationsorgane 73.
 Clarke'sche Säulen 118.
 Clitoris 217.
 Cloquet'scher Kanal 253.
 Compacte Knochensubstanz 95.
 Coni vasculosi 208.
 Conjunctiva 256.
 — — -buchten 258.
 — — palpebralis 256.
 — — sclerae 258.
 Conserviren der Präparate 21.
 Corium 221.
 Cornea 237.
 Cornealfalz 242.
 Corona radiata 213.
 Corpora cavernosa penis 210.
 Corpus cavernos. urethrae 210.
 — — ciliare 240.
 — — Highmori 203.
 — — luteum 214.
 Corpuscula amylacea 125.
 Corti'sches Organ 270.
 Cowper'sche Drüsen 209.
 Cristae acusticae 267.
 Crista spiralis 268.
 Cruor sanguinis 81.
 Cumulus ovigerus 213.
 Cupula 268.
 Cutis 220.
 Cylinderepithel, einfaches 42.
 — — geschichtetes 43.
 Cylinderglas, graduirtes 3.
 Cylinderzellen 40.
 Cytoblastema 36.

D.

Damarfirniß 6.
 — — Anwendung 23.
 Darm 160.
 Darmdrüsen 161.
 — -epithel 160.
 — -schleimhaut 160.
 — -zotten 161.
 Deckgläschen 2.
 Deckglaskitt 6.
 — — Anwendung 22.
 Deckzellen 283.
 Deiters'sche Zellen 271.

Dentin 147.
 Deutoplasma 212.
 Diarthrosis 99.
 Discs 63.
 Discus proligerus 213.
 Dotter 212.
 Dotterkern 220.
 Drüsen 44.
 — — acinöse 46.
 — — alveoläre 45.
 — — -ausführungsgang 46.
 — — Bartholini'sche 217.
 — — Bowman'sche 281.
 — — Brunner'sche 162.
 — — Cowper'sche 209.
 — — dehiscirende 46.
 — — der Bronchen 189.
 — — des Magens 157.
 — — der Mundschleimhaut 145.
 — — der Zunge 154.
 — — gemischte 167.
 — — -gewebe 44.
 — — Harder'sche 266.
 — — -körper 46.
 — — -läppchen 46.
 — — Lieberkühn'sche 161.
 — — Littre'sche 201.
 — — Meibom'sche 257.
 — — Moll'sche 257.
 — — Montgomery'sche 233.
 — — Nuhn'sche 155.
 — — seröse 154, 167.
 — — -Substanz des Ovarium 211.
 — — traubige 46.
 — — tubulöse 44.
 — — Tyson'sche 229.
 — — -zellen 43.
 Ductus Bartholini 167.
 — — cochlearis 268.
 — — ejaculatorii 209.
 — — endolymphaticus 266.
 — — papillares 198.
 — — Stenonianus 167.
 — — thyreoglossus 191.
 — — Whartonianus 167.
 — — Wirsungianus 168.
 Dura mater cerebialis 125.
 — — — spinalis 125.
 Duralscheide 249.
 Durchfärben 19.
 Dyaster 38.

E.

Ei 211.
 Eiballen 212.
 Eierstöcke 211.
 Eifollikel 211.
 Eileiter 215.
 Einbetten 16.
 — — in Celloidin 294.
 — — in Paraffin 292.
 Einbettungsrähmchen 293.
 Einkerbungen, Lantermann'sche 69.
 Einklemmen 16.
 Einrichtung des Laboratorium 1.
 Einschliessen u. Konserviren d. Präparate 21.
 Eiprotoplasma 212.
 Eischläuche 212.
 Eisessig 4.
 Eiweissdrüsen der Zunge 154.
 Elastische Fasern 49.
 — — Häute 49.
 — — Innenhaut 74.
 Elementarkörnchen 81.
 Elementarorganismus 33.
 Email 147.
 Endbläschen 187.
 Endigung der sensitiven Nerven 130.
 — — der motorischen Nerven 134.
 Endkolben, cylindrische 132.
 — — kugelige 134.
 Endogene Zellenbildung 38.
 Endokardium 73.
 Endolympe 267.
 Endoneurium 128.
 Endothel 42.
 — — -zellen 42.
 Endplatte 135.
 Entkalken 15.
 Endstücke 47.
 Eosin 7.
 — — Anwendung 18.
 Ependym der Ventrikel 122.
 — — -faden, centraler 119.
 Epicerebrale Räume 127.
 Epidermis 221.
 Epididymis 208.
 Epineurium 127.
 Epithel 41.
 — — -gewebe 40.
 — — respiratorisches 189.
 — — -zellen 40.
 Epopphoron 215.
 Essigsäure 4.

F.

Fadenapparat 246.
 Fadenzellen 267.
 Färben 17.
 — — unter dem Deckglase 26.
 Färbung, diffuse 18.
 — — der chromatischen Substanz 19.
 Fascia linguae 153.
 Fascien 111, 113.
 Faserhaut des Pharynx 156.
 — — der Speiseröhre 156.
 Faserhülle der Zungenbälge 154.
 Faserkörbe 244.
 Fasern, elastische 49.
 — — Remak'sche 69.
 — — Sharpey'sche 56.
 — — umspinnende 51.
 Faserschicht der Retina 248.
 Faserstoff 81.
 Ferrëin'sche Pyramiden 196.
 Fettgewebe 51.
 Fettzellen 51.
 — — seröse 51.
 Fibrae arcuatae 239.
 Fibrillen des Bindegewebes 49.
 — — des Knochens 56.
 — — der Muskeln 62.
 — — -scheiden 128.
 Fibrin 81.
 Filarmasse 33.
 Filtrirpapier 3.
 Fissura longit. ant. 116.
 — — — post. 116.
 Fixiren 12.
 Flechtwerk, interradiäres 121.
 — — superradiäres 121.
 Fleischtheilchen, primitive 63.
 Flimmerepithel, einfaches 42.
 — — geschichtetes 43.
 Flimmerzellen 41.
 Follikel der Lymphknoten 85.
 — — des Eierstocks 211.
 — — Graaf'scher 213.
 — — solitäre 85, 86.
 Fontana'sche Räume 242.
 Foramina nervina 270.
 Fornix conjunctivae 258.
 Fovea centralis 248.
 Fragmentirung 36.
 Fundus foveae 248.
 Fundusdrüsen 159.

Funiculus cuneatus 116.

— — gracilis 116.

G.

Galle 174.

Gallenblase 173.

Gallenkapillaren 169, 173.

Gallengänge 173.

Gallengangdrüsen 173.

Gallertartiges Bindegewebe 48.

Ganglien 129.

— — sympathische 130.

Ganglienzellen 66.

— — apolare 66.

— — bipolare 66.

— — multipolare 66.

— — T förmige 67.

— — unipolare 66.

Ganglienzellenschicht 244.

Ganglion intercaroticum 79.

— — nervi optici 244.

— — retinae 245.

— — spirale 273.

Gangsystem 44.

Gefässe, perforierende 96.

Gefässchicht der Iris 241.

Gegenpolseite 37.

Gehirn 119.

Gehirnschicht der Retina 244.

Gehörgang, äusserer 275.

Gehörorgan 266.

Gehörzähne, Huschke'sche 270.

Gelenkkapsel 100.

Gelenknervenkörperchen 134.

Generatio aequivoca 36.

Genitalnervenkörperchen 134.

Gennari'scher Streifen 121.

Geruchsorgan 278.

Geschmacksknospen 283.

Geschmacksorgan 282.

Geschmacksporus 283.

Geschmackszellen 283.

Gewebe 32.

— — adenoïdes 53.

— — cytogenes 52.

Gewebelehre 33.

Gewebe, osteogenes 103.

— — animale 33.

— — vegetative 33.

Gewebsaft 57, 83.

Giannuzzi'sche Halbmonde 47.

Gitterfasern 174.

Glandula coccygea 79.

— — parotis 167.

— — sublingualis 167.

— — submaxillaris 167.

Glandulae ceruminosae 275.

— — sebaceae 225, 228.

— — sudoriparae 230.

— — tartaricae 151.

Glans penis 210.

Glasfläschchen 2.

Glashäute 52.

Glashaut der Chorioidea 240.

— — des Haarbalges 226.

Glaskörper 251.

Glasstäbe 3.

Glastrichter 3.

Gliazellen 119.

Glisson'sche Kapsel 174.

Glomeruli cochleae 273.

Glomerulus 196.

Glutin 49.

Glycerin 6.

— — Anwendung 22.

Goldchlorid 6.

— — Anwendung 21, 263.

Goll'scher Strang 116.

Graaf'scher Follikel 213.

Graaf'sche Körperchen 132.

Granulationen, Pacchioni'sche 126.

Grau der centralen Höhlen 122.

Grenzschicht der Chorioidea 239.

— — hintere der Iris 242.

— — vordere der Iris 241.

Grosshirnganglien 122.

Grosshirnrinde 121.

Grundlamellen, äussere 96.

— — innere 96.

Grundmembranen 52.

Grundsubstanzen 39.

Grundsubstanz des fibrillären Bindegewebes 48.

— — des Knochens 55.

— — des Knorpels 53.

II.

Haarbalg 224.

Haarbalgdrüsen 225, 228.

Haare 224.

— — Entwicklung der 227.

Haarkeim 227.

Haarkutikula 225.

Haaroberhäutchen 225.
 Haarpapille 225.
 Haarschaft 224.
 Haarwechsel 228.
 Haarwurzel 225.
 Haarzellen 267, 271.
 Haarzwiebel 225.
 Habenula perforata 270.
 Haematin 81.
 Haematoblasten 82, 98.
 Haematoidin 81.
 Haematoxylin, Böhmer'sches 6.
 — — Anwendung 17.
 — — Weigert'sches 7.
 — — Anwendung (nach Pal) 137.
 Haemin 81.
 Haemoglobin 80.
 Halbmonde, Giannuzzi'sche 47.
 Hals der Harnkanälchen 194.
 — des Zahnes 146.
 Harder'sche Drüse 266.
 Harnblase 200.
 — -kanälchen 194.
 — -organe 194.
 — -röhre 201.
 — -wege, ableitende 199.
 Härten 14.
 Hassal'sche Körperchen 192.
 Häute, elastische 49.
 Haufen, Peyer'sche 86, 162.
 Haut, äussere 220.
 — elastische der Adventitia 76.
 Hauttalg 229.
 Havers'sche Lamellen 96.
 — — Kanäle 95.
 — — Räume 107.
 Henle'sche Schicht 227.
 — — Schleifen 195.
 Hensen'scher Spiralkörper 271.
 — — Zellen 273.
 Herbst'sche Körperchen 133.
 Herz 73.
 Herzklappen 74.
 Hilus der Lymphknoten 83.
 Hinterhorn 116.
 Hinterstrang 116.
 Hirnhaut, harte 125.
 — — weiche 126.
 Hirnsand 125.
 Histologie 33.
 Hoden 203.

Hodenkanälchen 203.
 — — -läppchen 203.
 Höhlengrau, centrales 122.
 Hörhaar 267.
 Hornhaut 237.
 — — -endothel 238.
 — — -epithel 237.
 — — -kanälchen 239.
 — — -körperchen 239.
 — — -zellen 239.
 Hornschicht 222.
 Hornspongiosa des Rückenmarkes 119.
 Howship'sche Lakunen 107.
 Hüllen des Centralnervensystems 125.
 Humor vitreus 251.
 Huschke'sche Gehörzähne 270.
 Huxley'sche Schicht 227.
 Hyaloplasma 33.
 Hydatide, gestielte 209.
 — — Morgagni'sche 209.
 — — ungestielte 209.
 Hypophysis cerebri 124.

I.

Infundibula 187.
 Injizieren 21.
 Innenglieder der Stäbchen 246.
 — — der Zapfen 247.
 Innenkolben 132.
 Innenpfeiler 271.
 Instrumente 1.
 Integument 220.
 Interellularbrücken 41.
 Intercellularsubstanzen 39.
 Interfilarmasse 33.
 Interglobularräume 147.
 Interradiäres Flechtwerk 121.
 Interstitialgewebe 52.
 Interstitielle Körnchen 63.
 — — Lamellen 96.
 Interstitielles Bindegewebe der Nieren 198.
 Iris 241.
 — — -fortsätze 242.
 — — -winkel 242.
 Isoliren 10.
 — — von Epithelien 10.
 — — von Drüsenkanälchen 11.
 — — von Muskelfasern und Drüsen 11.
 Isotrope Substanz 62.

K.

- Kali, doppeltchromsaures 5.
 — übermangansaures 7.
 Kalilauge, konzentrierte 6.
 Kammer, feuchte 26.
 Karminlösung, neutrale 7.
 — — Anwendung 18.
 — — -saures Natron 8.
 Kanäle, Havers'sche 95.
 — — Volkmann'sche 96.
 Kanal, Cloquet'scher 253.
 — — Petit'scher 252.
 — — Schlemm'scher 255.
 Kapillaren 78.
 — — Neubildung 79.
 Kapsel, Bowman'sche 197.
 — — Glisson'sche 174.
 — — der Lymphknoten 84.
 — — der Milz 86.
 Karotisdrüse 79.
 Kehlkopf 186.
 Keilstrang 116.
 Keimbläschen 212.
 — — centrum 84.
 — — epithel 211.
 — — fleck 212.
 — — lager des Haars 228.
 — — schicht der Haut 222.
 — — des Nagels 224.
 Keratinkörnchen 222.
 Kern 34.
 — — bildung, freie 36.
 — — färbung 17, 19.
 — — gerüst 34.
 — — grundsubstanz 34.
 — — körperchen 34.
 — — membran 34.
 — — saft 34.
 — — spindel 38.
 — — theilung 36.
 Kieferwall 148.
 Kittsubstanz 39.
 Kleinhirnrinde 122.
 Knäuel, dichter 37.
 — — lockerer 37.
 Knäueldrüsen 230.
 Knochen 95.
 — — Bindegewebs- 102.
 — — Entwicklung der 102.
 — — — der knorpelig vorgebildeten 102.
 — — — der Bindegewebskn. 106.
 Knochenfibrillen 56.
 — — Gelenkenden der 99.
 — — -gewebe 55.
 — — feinfaseriges 56.
 — — grobfaseriges 56.
 — — grundsubstanz 55.
 — — höhlen 56.
 — — -kanälchen 56.
 — — knorpelig vorgebildeter 102.
 — — körperchen 56.
 — — mark 97.
 — — Resorption der 107.
 — — Substantia compacta der 95.
 — — spongiosa des 95.
 — — Verbindungen der 99.
 — — Wachstum der 106.
 — — -zellen 56.
 Knorpelgewebe 53.
 — — Bindegewebs- 55.
 — — der Bronchen 188.
 — — des Kehlkopfes 186.
 — — der Luftröhre 187.
 — — elastischer 54.
 — — grundsubstanz 53.
 — — hyaliner 53.
 — — -kapsel 53.
 — — -markzellen 103, 104.
 — — -zellen 53.
 Knospung 38, 97.
 Knötchen 85.
 Kochsalzlösung 4.
 Kolostrumkörperchen 233.
 Kommissur, graue 116.
 — — hintere 116.
 — — vordere 116.
 — — weisse 117.
 Kongoroth 8.
 — — Anwendung 179.
 Körnchen, interstitielle 63.
 Körnerschicht, äussere 243.
 — — innere 243.
 Körperchen, Grandry'sche 132.
 — — Hassal'sche 192.
 — — Herbst'sche 133.
 — — Key-Retzius'sche 133.
 — — Malpighi'sche der Milz 87.
 — — — der Niere 96.
 — — Meissner'sche 134.
 — — Merkel'sche 132.
 — — Pacini'sche 133.
 — — Vater'sche 133.

Körperchen, Wagner'sche 134.
 Kopfplatte 127.
 Krone des Zahnes 146.
 Krypten, Lieberkühn'sche 161.
 Kutikularbildungen 41.

L.

Labdrüsen 158.
 Labia majora 217.
 — — minora 217.
 Labium tympanicum 269.
 — — vestibulare 269.
 Labra glenoidea 100.
 Labyrinth, häutiges 267.
 — — knöchernes 267.
 Lakunen, Howship'sche 107.
 Lamellen, Havers'sche 96.
 — — der Hornhaut 237.
 — — interstitielle 96.
 Lamina cribrosa 250.
 — — elastica anterior 237.
 — — — posterior 238.
 — — fusca 239.
 — — Reissneri 268.
 — — spiralis membranacea 268, 270.
 — — suprachorioidea 239.
 Langerhans'sche Zellen 131.
 Leber 169.
 — — -inseln 171.
 — — -kapsel 174.
 — — -läppchen 171.
 — — -zellen 170.
 — — -zellenbalken 171.
 Lederhaut 221.
 Leptothrix buccalis 176.
 Leukocyten 80.
 Lidkante 256.
 Lieberkühn'sche Drüsen 161.
 Ligamentum circulare dentis 148.
 — — iridis pectinatum 242.
 — — interlamellare 133.
 — — intervertebrale 99.
 — — nuchae 99.
 — — spirale 269.
 — — stylohyoideum 99.
 Limbus spiralis 269.
 Linin 34.
 Linse 250,

Linsenepithel 251.
 — — -fasern 250.
 — — -kapsel 251.
 Liquor cerebrospinalis 127.
 — — folliculi 213.
 Lithion carbonicum 7.
 Littre'sche Drüsen 201.
 Luftröhre 187.
 Lungen 187.
 Lunula 224.
 Lymphbahnen des Augapfels 255.
 — — des Centralnervensystems 126.
 — — des Labyrinthes 274.
 — — der peripherischen Nerven 129.
 Lymphdrüsen 83.
 Lymphe 86.
 Lymphgefäße 82.
 — — der Augenlider 259.
 — — des äusseren Ohres 276.
 — — des Bauchfelles 175.
 — — der Blutgefäße 79.
 — — der Conjunctiva 259.
 — — des Eierstockes 215.
 — — der glatten Muskeln 61.
 — — der Haut 230.
 — — des Herzens 74.
 — — des Hodens 207.
 — — des Kehlkopfes 186.
 — — der Leber 174.
 — — der Lungen 191.
 — — des Magens und des Darmes 165.
 — — der Milchdrüse 233.
 — — der Milz 88.
 — — des Mittelohres 275.
 — — der Mundschleimhaut 146.
 — — der Nasenschleimhaut 128.
 — — der Nieren 199.
 — — der quergestreiften Muskeln 114.
 — — der Scheide 217.
 — — der Schilddrüse 192.
 — — der Speicheldrüsen 169.
 — — der Thymus 192.
 — — des Uterus 216.
 — — der Zungenschleimhaut 155.
 Lymphgefässsystem 82.
 Lymphknötchen des Darmes 162.
 Lymphknoten 83.
 — — periphere 83.
 Lymphkörperchen 86.
 Lymphräume, adventitielle 79, 127.
 Lymphsinus 86.

M.

Macula lutea 247.
 — — germinativa 212.
 Maculae acusticae 267.
 Magen 157.
 — — -schleimhaut 157.
 — — -drüsen 157.
 Magengrübchen 159.
 Malpighi'sche Körperchen der Milz 87.
 — — der Niere 196.
 Mark, gelatinöses 97.
 — gelbes 97.
 — rothes 97.
 — -raum primordialer 103.
 — -scheide 68.
 — -strahlen 196.
 Markstränge 84.
 Marksubstanz des Eierstockes 211.
 — — des Haares 225.
 — — der Lymphknoten 84.
 — — der Nebenniere 136.
 — — der Niere 194.
 Markzellen 81.
 Mastzellen 35.
 Material, Beschaffen des 9.
 Matrix des Nagels 223.
 Meibom'sche Drüsen 257.
 Meissner'sche Körperchen 134.
 Meissner'scher Plexus 166.
 Membrana basilaris 270.
 — — choriocapillaris 239, 254.
 — — Descemetii 238.
 — — granulosa 213.
 — — hyaloidea 251.
 — — limitans externa 243.
 — — — interna 249.
 — — propria 46, 51.
 — — reticularis 272.
 — — tectoria 273.
 Membranen, gefensterte 49.
 Menisci = Zwischenknorpel 100.
 Merkel'sche Körperchen 132.
 Messen 92.
 Metaphase 37.
 Methylenblau 264.
 Methylviolett B. 8.
 — — Anwendung 20.
 Mikron (Mikromillimeter) 35.
 Mikroskop 1.
 — — Handhabung des 27.
 Mikrotom 292.

Milch 233.
 Milchdrüse 231.
 — — -kügelchen 233.
 — — -säckchen 231.
 Milz 86.
 — -balken 86.
 — -pulpa 86.
 Mitose 36.
 Mittelohr 274.
 Mittelscheiben 62.
 Molekularbewegung 36.
 Moll'sche Drüsen 257.
 Monaster 38.
 Montgomery'sche Drüsen 233.
 Morgagni'sche Hydatide 209.
 Müller'scher Augenlidmuskel 257.
 — — Ringmuskel 241.
 Müller'sche Flüssigkeit 5.
 — — — Anwendung 13.
 — — Stützfasern 243.
 Mundhöhlenschleimhaut 145.
 Musculus arrector pili 225.
 — — ciliaris 241.
 — — — Riolani 257.
 — — dilatator pupillae 242.
 — — orbicularis palpebr. 257.
 — — palpebralis 257.
 — — sphincter pupillae 242.
 — — — vesicae internus 200.
 Muskelfasern des Herzens 61.
 — — glatte 66.
 — — quer gestreifte 62.
 — — gewebe 60.
 — — -säulchen 63.
 Mutterstern 38.
 Mutterzellen 205.
 Myelin 68.
 Myeloplaxen 97.

N.

Nadeln 2.
 Nagel 223.
 — — -bett 223.
 — — -falz 223.
 — — -saum 223.
 — — -wall 223.
 — — -wurzel 223.
 Natron, karminsaures 8.
 Nebeneierstock (Epophoron) 215.
 Nebenhoden 208.
 Nebenkern 35.
 Nebennieren 135.

Nerven cerebrospinale 127.
 — — des Augapfels 255.
 — — der Augenlider 259.
 — — des Bauchfelles 175.
 — — der Blutgefäße 79.
 — — des Eierstockes 215.
 — — der Haut 230.
 — — des Herzens 74.
 — — des Hodens 207.
 — — des Kehlkopfes 187.
 — — der Knochen 99.
 — — der Leber 174.
 — — der Lungen 191.
 — — der Lymphknoten 85.
 — — des Magens und des Darmes 166.
 — — der Milchdrüse 233.
 — — der Milz 88.
 — — der Mundschleimhaut 146.
 — — der Nebennieren 137.
 — — der Nieren 199.
 — — der Scheide 217.
 — — der Schilddrüse 192.
 — — der Speicheldrüsen 169.
 — — des Uterus 217.
 — — der Zungenschleimhaut 155.
 Nervenendigungen 130.
 — — freie 131.
 — — — in Terminalkörperchen 131.
 Nervenfasern 68.
 — — — -schicht der Retina 243.
 — — — -fortsatz 67.
 — — — -gewebe 66.
 — — markhaltige 68.
 — — marklose 69.
 — — Remak'sche 69.
 Nerven kitt 70, 119.
 Nerven, cerebrospinale 127.
 — — sympathische 128.
 — — -system, "centrales 116.
 — — -zellen 66.
 Nervus acusticus 273.
 — — opticus 249.
 Netzhaut 243.
 Neurilemma 69.
 Neuroepithelschicht der Retina 246.
 Neuroglia 70, 119.
 Neurospongium 245.
 Nieren 194.
 — — -becken 199.
 — — -kelche 199.
 — — -läppchen 198.

Nucläin 34.
 Nucleus gelatinosus 99.
 Nuel'scher Raum 272.
 Nuhn'sche Drüse 155.

O.

Oberhaut 222.
 Oberhäutchen des Haares 225.
 Objektivmikrometer 29.
 Objektträger 2.
 Odontoblasten 151.
 Ohr, äusseres 275.
 — inneres 266.
 — -schmalz 276.
 — — -drüsen 275.
 — -trompete 274.
 Okularmikrometer 29.
 Oolemma 212.
 Ora serrata 243, 248.
 Orbiculus gangliosus 255.
 Organ, Corti'sches 270.
 — — von Giralde's 209.
 Organe des Muskelsystems 111.
 — — des Nervensystems 116.
 — — des Skelettsystems 94.
 Ossifikation, enchondrale 102.
 — — perichondrale 102, 104.
 — — periostale 102.
 — — -punkt 102.
 Osmiumsäure 5.
 — — Anwendung 14.
 Osteoblasten 57.
 Osteogenes Gewebe 102.
 Ostoklasten 107.
 Otolithen 267.
 Ovarium (Eierstock) 211.
 Ovula Nabothi 216.

P.

Pacchioni'sche Granulationen 126.
 Pacini'sche Körperchen 133.
 Palpebrae 256.
 Pankreas 168.
 Panniculus adiposus 222.
 Papillae circumvallatae 153.
 — — filiformes 151.
 — — foliatae 153, 284.
 — — fungiformes 152.
 Papillarkörper 258.
 Papillen der Haut 221.
 Paradidymis 209.

Paraffin 292.
 Paraffinchloroform 293.
 Paraplasma 33.
 Paroophoron 215.
 Parotis 167.
 Parovarium 215.
 Pars retinae ciliaris 249.
 — — iridica 249.
 — — optica 243.
 Paukenhöhle 274.
 Penis 210.
 Pepsindrüsen 158.
 Pericelluläre Räume 127.
 Perichondrium 101.
 Perichorioidealraum 255.
 Pericardium 73.
 Perilymphe 267.
 Perimysium 111.
 Perineurium 127.
 Periost 96.
 Perivaskuläre Räume 127.
 Perivitelliner Spaltraum 212.
 Peyer'sche Haufen 85, 163.
 Pfeilerzellen 270.
 Pflasterepithel, einfaches 42.
 — — geschichtetes 42.
 Pflasterzellen 41.
 Phalangen 272.
 Pharynx 155.
 Pharynxtonsille 156.
 Pia mater 126.
 Pialscheide 249.
 Pigmentepithel 247.
 — — -schicht der Iris 242.
 — — -zellen 51.
 Pikrinsäure 5.
 Pikrinschwefelsäure 5.
 — — Anwendung 13.
 Pikrokarmün 7.
 — — Anwendung 19.
 Pincette 2.
 Pipette 3.
 Placenta sanguinis 81.
 Plaques 163.
 Plasma sanguinis 80.
 Plasmazellen 51.
 Platin 33.
 Platinchlorid 5.
 — — Osmium-Essigsäure 5.
 — — — — Anwendung 14.
 Platte, motorische 135.

Plattenzellen 41.
 Pleura 190.
 Plexus annularis 256.
 — — Auerbach'scher 166.
 — — chorioidei 126.
 — — Meissner'scher 166.
 — — myentericus 156.
 — — intraepithelialer der Cornea 256.
 — — subbasaler der Cornea 256.
 — — subepithelialer der Cornea 256.
 Plica semilunaris 258.
 Polseite 37.
 Polstrahlung 38.
 Präparatengläser 3.
 Präparatenschalen 3.
 Primärfollikel 212.
 Primordialeier 212.
 Processus ciliaris 240.
 — — reticularis 116.
 Prominentia spiralis 369.
 Prophase 37.
 Prostata 210.
 — — -steine 210.
 Protoplasma 33.
 — — -fortsätze 67.
 Pulpahöhle 146.
 Pulpa der Lymphknoten 85.
 — — der Milz 86.
 — — der Zähne 146, 148.
 Purkinje'sche Zellen 123.
 Pylorusdrüsen 158, 159.
 Pyramiden, Ferri'n'sche 196.
 — — -zellen 121.

R.

Radiärfasern 243.
 — — -kegel 244.
 Randzellenkomplexe 47.
 Randzone 116.
 Ranvier's Drittelalkohol 4.
 — — — — Anwendung 11.
 Rasirmesser 2.
 Raum, Tenon'scher 255.
 Räume, epicerebrale 127.
 — — Fontana'sche 242.
 — — Havers'sche 107.
 — — Nuel'sche 267.
 — — pericelluläre 127.
 — — perivaskuläre 127.
 Reagirgläschen 3.
 Reagentien 3.

Regenbogenhaut 241.
 Regio olfactoria 279.
 — — respiratoria 279.
 — — vestibularis 279.
 Remak'sche Fasern 69.
 Reissner'sche Membran 269.
 Resorptionsflächen 107.
 Rete testis 204.
 — vasculosum Halleri 204.
 Retina 243.
 Riechzellen 280.
 Riesenzellen 97.
 Riffzellen 41.
 Riffelfortsätze 222.
 Rindennetz, oberflächliches 210.
 — — tiefes 210.
 Rindenssubstanz des Eierstockes 211.
 — — des Haares 225.
 — — der Lymphknoten 84.
 — — der Niere 194.
 — — der Nebenniere 135.
 Rückenmark 116.
 Rückenmarkshaut, harte 125.
 — — weiche 126.

S.

Sacculus ellipticus 267.
 — — rotundus 267.
 Säulen, Clarke'sche 118.
 Safranin 8.
 — — Anwendung 19.
 Saftkanälchen 57.
 — — der Cornea 238.
 Safttlücken 57.
 — — der Hornhaut 238.
 Salpetersäure 5.
 — — Anwendung 13, 15.
 Salpetersaures Silberoxyd 6.
 — — — Anwendung 20.
 Salzsäure 4.
 Samen 207.
 — — -blasen 209.
 — — -fäden 207.
 Samenleiter 208.
 — — -zellen 205.
 Sammelröhrchen 196, 198.
 Sarcous elements 63.
 Sarkolemma 64.
 Sarkoplasma 62.
 Scala tympani 268.
 — vestibuli 268.

Schaltlamellen 96.
 Schaltstück 47.
 — — der Niere 196, 197.
 Scheere 2.
 Scheide 217.
 Scheiden, adventitielle der Milz 86.
 Scheidenkutikula 227.
 Scheide, Schwann'sche 69.
 Schicht, äussere retikuläre 243.
 — — der gröberen Gefässe 239.
 — — granulierte 243.
 — — Henle'sche 227.
 — — Huxley'sche 227.
 — — innere, retikuläre 243.
 — — rostfarbene 122.
 Schilddrüse 191.
 Schleife, Henle'sche 195, 197.
 Schleifstein 2.
 Schleimbeutel 113.
 Schleimdrüsen der Zunge 154.
 — — (speichel)-drüsen 167.
 Schleimhaut 144.
 — — -körperchen 154.
 — — -röhren 47.
 — — -schicht der Oberhaut 222.
 Schlemm'scher Kanal 255.
 Schmeckbecher 283.
 — — -zellen 283.
 Schmelz 147.
 — — -leiste 149.
 — — -oberhäutchen 148.
 — — -organ 150.
 — — -prismen 148.
 — — -pulpa 150.
 — — -zellen 150.
 Schnecke 267, 268.
 Schneiden 16.
 — — von Celloidinobjekten 297.
 — — von Paraffinobjekten 295.
 Schnürring 69.
 Schweissdrüsen 230.
 — — -pore 230.
 Schwesterschleifen 38.
 Sebum 229.
 Segmente 37.
 — — cylindrokonische 69.
 — — interannuläre 69.
 Segmentierung 36.
 Sehnen 112.
 — — -bündel 112.
 — — -scheiden 113.

- Sehnenspindeln 114.
 Sehnerv 249.
 Sehorgan 236.
 Seitenhorn 116.
 — — -strang 116.
 Sekrettröhen 47.
 Sekundärknötchen 83.
 Septum linguae 151.
 — — longitudinale posterius 116.
 Septula testis 203.
 Seröse Drüsen 154, 167.
 Sertolische Zellen 205.
 Sharpey'sche Fasern 56.
 Sinnesepithelzellen 41.
 Sinus der Dura mater 126.
 Sklera 238.
 Solitärknötchen 85.
 — — des Darmes 163.
 Sonnenbildchenfigur 141.
 Spatel 2.
 Speicheldrüsen 167.
 — — -körperchen 154.
 — — -röhren 47.
 Speiseröhre 156.
 Sperma 207.
 Spermatiden 205.
 Spermatoblast 218.
 — — -fila 207.
 — — -gonie 205.
 — — -somen 205, 206.
 Speziallamellen 96.
 Spinalganglien 129.
 Spindel 38.
 Spiralfaden 207.
 Spiralkörper 271.
 Spongioblasten 245.
 Spongioplasma 33.
 Stachelzellen 41, 222.
 Stammzellen 205.
 Stäbchen 246.
 — — -fasern 246.
 — — -korn 246.
 — — -sehzellen 246.
 Steissdrüse 79.
 Stellulae Verheyneii 199.
 Stomata 83.
 Strahlenbündchen 252.
 Strang, Goll'scher 116.
 — zarter 116.
 Stratum corneum 223.
 — — granulosum 222.
 Stratum lucidum 223.
 — — Malpighii 222.
 — — mucosum 222.
 — — papillare 222.
 — — reticulare 222.
 — — subcutaneum 222.
 — — submucosum 216.
 — — supravasculare 216.
 — — vasculare 216.
 Streichriemen 2.
 Streifen, Viq d'Azyr'scher 122.
 — — Gennari'scher 121.
 — — Baillarger'scher 121.
 Stria vascularis 269.
 Stromaplexus 256.
 Stützfasern, Müller'sche 243.
 Stützgerüst des Rückenmarks 119.
 Stützgewebe 48.
 Stützsubstanz der Retina 243.
 Stützzellen der Geruchsschleimhaut 280.
 Subarachnoidealraum 126.
 — — des Sehnerven 255.
 Subduralraum 126.
 — — des Sehnerven 255.
 Substantia compacta 95.
 — — gelatinosa centralis 116.
 — — gelatinosa Rolandi 116.
 — — propria corneae 237.
 — — spongiosa 95.
 Substanz, achromatische 34.
 — — anisotrope 62.
 — — chromatische 34.
 — — colloide 192.
 — — fibrinogene 81.
 — — fibrinoplastische 81.
 — — granulirte des Rückenmarks 119.
 — — graue — — 117.
 — — isotrope 62.
 — — weisse, des Gehirns 124.
 — — des Rückenmarks 117.
 Sulcus spiralis 269.
 Superradiäres Flechtwerk 121.
 Sutura 99.
 Synarthrosis 99.
 Synchrondrosis 99.
 Syndesmosis 99.
 Synovia 101.
 Synovialmembran 100.
 — — -zotten 100.
 T.
 Talgdrüsen 228.

Tangentialfasern 121.
 Tapetum 240.
 Tarsus 257.
 Tastkörperchen 134.
 — — -meniscus 131.
 — — -scheibe 131.
 — -zellen, einfache 131.
 — — — zusammengesetzte 132.
 Telae chorioideae 126.
 Tenon'scher Raum 255.
 Tensor chorioideae 241.
 Terminalkörperchen 131.
 Theca folliculi 213.
 Thränendrüse 259.
 — — accessorische 258.
 Thränenkanälchen 259.
 — — -nasengang 259.
 — — -organ 259.
 — — -sack 259.
 Thymus 192.
 Tochtersterne 38.
 Tödten und Seziren der Thiere 9.
 Tonsille 155.
 Trabekel der Lymphknoten 83.
 — — der Milz (Milzbalken) 86.
 Trachomdrüsen 258.
 Trichomonas vaginalis 218.
 Trommelfell 275.
 Tuba Eustachii (Ohrtrumpete) 274.
 — — Fallopie (Eileiter) 215.
 Tubuli contorti des Hodens 204.
 — — — der Niere 195.
 — — recti des Hodens 204.
 — — — der Niere 196.
 Tunnel 271.
 Tunica adventitia der Arterien 76.
 — — — der Venen 78.
 — — albuginea des Eierstockes 211.
 — — — des Hodens 203.
 — — — der Niere 198.
 — — — des Penis 210.
 — — intima der Arterien 75.
 — — — der Venen 77.
 — — media der Arterien 75.
 — — — der Venen 77.
 — — mucosa 144.
 — — propria 145.
 — — submucosa 145.
 — — vasculosa 204.
 Typus, metaplastischer 106.
 — — neoplastischer 106.

Tyson'sche Drüsen 229.

U.

Uebergangsepithel 199.
 Uhrgläser 3.
 Umspinnende Fasern 51.
 Untersuchung frischer Objekte 25.
 Ureter 199.
 Urethra s. Harnröhre 201.
 Urzeugung 36.
 Uterus 215.
 Utriculus 267.

V.

Vagina 217.
 Vas aberrans Halleri 209.
 — afferens 199.
 — efferens 198.
 — epididymidis 208.
 — deferens 208.
 — prominens 269.
 — spirale 274.
 Vasa aberrantia der Leber 174.
 — afferentia der Lymphknoten 83.
 — centralia retinae 252.
 — ciliaria 254.
 — efferentia der Lymphknoten 83.
 — — testis 208.
 — vasorum 79.
 Vasoformative Zellen 79.
 Vater'sche Körperchen 133.
 Vena centralis retinae 252.
 — — spiralis modioli 274.
 Venae centrales der Leber 172.
 — — interlobulares der Leber 171.
 — — — der Niere 199.
 — — intralobulares 172.
 — — sublobulares 172.
 — — vorticosae 254.
 Venen 77.
 Venenklappen 78.
 Verbindungsstück 207.
 Verdauungsorgane 144.
 Vereinigung der glatten Muskelfasern 61.
 Vergolden 21, 263.
 Verkalkungspunkt 102.
 Versilbern 20.
 Vesuvius 8.
 — — Anwendung 20.
 Vibrissae 279.
 Viq d'Azyr's Streifen 122.

Vollwurzel 228.
Vorderhorn 116.
Vorderstrang 116.

W.

Wachsthum der Knochen 106.
Wärmkasten 293.
Wagner'sche Körperchen 134.
Wanderzellen 35, 51.
Warzenhof 233.
Wasser, destillirtes 4.
Weigert'sches Haematoxylin 6.
— — Anwendung (nach Pal) 137.
Wimperzellen 41.
Wollustkörperchen s. Genitalnervkörperchen 134.
Wundernetz 83.
Wurzel des Zahnes 146.
Wurzelscheiden des Haares 226, 227.

Z.

Zähne 146.
— — Entwicklung der 148.
Zahnbein 147.
— — -kugeln 147.
— — -fasern 137, 148.
— — -furche 149.
— — -kanälchen 147.
— — -papillen 150.
— — -pulpa 147, 148.
— — -säckchen 151.
— — -scheiden 147.
— — -wälle 149.
Zapfen 247.
— — -fasern 247.
— — -korn 247.
— — -sehzellen 247.
Zarter Strang 116.
Zeichnen 29.
Zelle 33.
Zellen, Ausscheidungen der 39.
— — Bewegungserscheinungen der 35.
— — Bildung und Fortpflanzung der 36.
— — -bildung, endogene 38.
— — des fibrillären Bindegewebes 50.

Zellen, Claudius'sche 273.
— — Deiters'sche 271.
— — Form der 34.
— — Fütterung der 35.
— — Grösse der 35.
— — Hensen'sche 273.
— — des Knorpels 53.
— — Langerhans'sche 131.
— — Lebensdauer 38.
— — membran 34.
— — Purkinje'sche 123.
— — Sekretionerscheinungen der 38.
— — Sertoli'sche 205.
— — -substanz 33.
— — Theilung der 36.
— — vasoformative 79.
— — vitale Eigenschaften der 35.
— — Wachsthum der 38.
— — Wandern der 35.
Zement 148.
Zerzupfen 10.
Zirbel 125.
Zona fasciculata 136.
— — glomerulosa 136.
— — der ovalen Kerne 280.
— — pectinata 270.
— — pellucida 212.
— — perforata 270.
— — reticularis 136.
— — der runden Kerne 280.
— — tecta 270.
Zonula ciliaris 252.
Zotten 161.
Zunge 151.
Zungenbälge 153.
— — -drüsen 154.
— — -muskeln 151.
— — -papillen 151.
— — -schleimhaut 151.
Zwillingstastzellen 132.
Zwischenknorpel 100.
Zwischenkörnerschicht 246.
Zwischenscheibe 62.
Zwischenzellen 204.
Zymogenkörnchen 168.

QM51

St6

1892

Stöhr

Lehrbuch der histologie ...