UNIVERSITY OF B.C. LIBRARY

3 9424 00126 0865

H. Jäger. Ernst Benary.
Die
Erziehung der Pflanzen
aus Samen.

STORAGE ITEM
PROCESSING-ONE

1p1-F19C

U.B.C. LIBRARY

Library
of the University of
British Columbia

*This book is the gift of
Estate of W. A. Latus, Esq.*

Date May, 1941.

Accession No. ~~127364~~ Call No. ~~SB454~~. J2

Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of British Columbia Library

Die
**Erziehung der Pflanzen
aus Samen.**

Ein Handbuch
für
Gartenfreunde, Gärtner und Samenhändler
von
H. Jäger
Grossherzoglicher Hof-Garteninspector in Eisenach
und von dem
Herausgeber.

Im Selbstverlag des Herausgebers

Ernst Benary,
Samen-Handlung.

ERFURT.

1887.

Alle Rechte vorbehalten.

Druck von G. A. Koenig in Erfurt.

Vorwort.

Sehr häufig wird der Samenhändler um Belehrung über die Aussaat und Cultur der verschiedensten Gemüse und Zierpflanzen aufgefordert und ist oft nicht in der Lage, solchen Gesuchen in erschöpfender, ihm selbst genügender Weise zu entsprechen. Dies hat den Herausgeber veranlasst, sich mit Hof-Garteninspector Jäger in Verbindung zu setzen, um das Wissenswerthe über die Erziehung der Pflanzen „aus Samen“ in einem möglichst knappen Rahmen zusammenzufassen. Die Verfasser glauben hiermit dem Wunsche vieler Gartenfreunde nachzukommen und eine Lücke in der deutschen Garten-Literatur auszufüllen. Ausserdem hoffen sie, dass auch der Fachmann mancherlei Anregungen aus dem vorliegenden Werke schöpfen, und dass es dem Samenhändler als Nachschlagebuch willkommen sein wird. Für letzteren Zweck wurde die Tabellenform, welche in der 2., 3. und 4. Abtheilung zur Anwendung kommt, als besonders geeignet erachtet. Um die Grenze der Aufgabe nicht zu überschreiten, wurde die Cultur der Sämlinge möglichst genau bis zu dem Zeitpunkte, wo das Gedeihen derselben als gesichert zu betrachten ist, für die weitere Behandlung hingegen nur das Wichtigste angegeben.

Am Schlusse ihrer Arbeit angelangt, verhehlen sich die Verfasser nicht, dass die stetig fortschreitende Entwicklung des Gartenbaues schon jetzt reichliches Material zu Verbesserungen und Ergänzungen liefern würde; sie werden sich für jeden nützlichen Wink, welchen die Leser ihnen zu diesem Zwecke geben mögen, verpflichtet fühlen. Auch sagen sie denjenigen Herren, deren freundlicher Belehrung über gewisse Specialculturen sie sich zu erfreuen hatten, den verbindlichsten Dank.

Erfurt und Eisenach, im April 1887.

Inhalts-Uebersicht.

Einleitung:	
Nutzen und Vorzüge der Anzucht aus Samen.....	Seite 8—11

Erste Abtheilung.

Allgemeines über Aussaaten.

I. Die Bestellung und Aufbewahrung der Samen	12
II. Wahl der Sorten	13
III. Einfluss des Klimas, der Lage und des Bodens	16
IV. Ueber die bei der Pflanzencultur gebräuchlichen Hilfs- erden und das Erdmagazin.....	18
V. Düngung und Düngstoffe: Mistdünger. Dünger in trockener Form und Abfälle. Gründüngung. Flüssige Düngung. Anwendung des Düngers.....	23—35
VI. Die Bodenbearbeitung	35
VII. Das Unkraut und seine Vertilgung.....	37
VIII. Ueber Wasser und Bewässerung.....	38
IX. Gefässe und Geräthe zur Aussaat und Anzucht junger Pflanzen.....	44
X. Saatkästen mit Fenstern, sowie Mistbeete und ihre Anlage	47
XI. Allgemeine Regeln über Samenbehandlung und Aussaaten: Dauer der Keimfähigkeit. Die Keimprobe. Dauer der Keimzeit. Dichtigkeit der Saat. Stärke der Bedeckung. Das Vorkeimen, Einquellen und Stratifi- cieren. Feinde der Saaten.....	51—59
XII. Die verschiedenen Saatmethoden.	
A. Im freien Lande und Mistbeete. Die Breitsaat. Die Reihensaat. Die Büschel- und Stufensaat. Die Dibbel- oder Löchersaat. Schlussbemerkungen....	61—64
B. Die Aussaaten in Töpfen oder anderen Gefässen ..	65
XIII. Die den Saaten in Gefässen und Kästen günstige Tem- peratur und Saatzeit.....	65
XIV. Allgemeines über die Behandlung der Aussaaten.....	66

XV. Die Saat von Grassamen und Rasenpflanzen zu Gartenrasen und Wiesen. Garten- oder Schmuck- rasen. Wahl der Grasarten und Grasmischungen. Feiner Garten- und Bleichrasen. Wiesen- und Weidegräser..	67—76
XVI. Oeconomische, medicinische u. technische Handelspflanzen	79—82
XVII. Aussaat und schnelle Vermehrung der Kartoffel.....	82
XVIII. Das Verstopfen oder Pikiren der Sämlinge.....	83

Zweite Abtheilung.

Anzucht und Anbau der Gemüse aus Samen, im freien Lande, wie in Mistbeeten.

A. Allgemeines.

Gemischter Gemüsebau. Vor- und Nachanbau. Anzucht von Winter-Gemüsepflanzen	85—89
--	-------

B. Cultur der einzelnen Gemüse.

I. Kohlarten. Blumenkohl oder Carviol. Broekoli oder Spargelkohl. Kopfkohl oder Kraut. Das Strunkkraut. Tronehuda- oder Rippenkohl. Wirsing, Savoyer-, Börs- oder Herzkohl. Rosen- oder Sprossenkohl. Blätterkohle. Kohlrabi. Kohlrüben oder Unterkohlrabi.....	90—103
II. Wurzeln und Rüben. Carotten oder Möhren. Cicho- rienwurzel. Hafer- oder Weisswurzel. Die Kerbelrübe. Pastinakwurzel. Petersilienwurzel. Rapontikawurzel. Rapunzelwurzel. Goldwurzel oder Cardonille. Scorzoner- oder Schwarzwurzel. Zuckerwurzel. Knollen- und Stengelsellerie. Rhabarber. Weisse Rüben, Herbstrüben. Salatrüben oder Beete. Futter- und Zuckerrüben....	104—121
III. Salatpflanzen. Kopfsalat. Das Treiben des Kopf- salats. Römischer oder Bindsalat. Sommer-Endivien. Spargelsalat. Schnitt- und Pflücksalat. Endivien. Ra- binschen oder Feldsalat. Brunnenkresse. Gartenkresse. Cichoriensalat oder Kapuzinerbart. Löwenzahn. Löffel- kraut. Kapuzinerkresse. Amerikanische Winter- oder Staudenkresse. Süsser Fenchel. Hirschehornsalat. Rauke	121—136
IV. Zwiebel- und Laucharten. Die gemeine Zwiebel oder Zipolle. Andere absterbende Zwiebelarten. Porree oder Lauch.....	136—141
V. Rettige und Radieschen. Rettig. Radies oder Mo- natsrettig. Schlangen- oder Schotenrettig	141—144
VI. Gartenspinat und Spinatpflanzen.	
A. Gartenspinat.	
B. Spinatpflanzen. Mangold. Neuseeländischer Spi- nat. Eiskraut. Gartenmelde. Saucrampfer. Gemüse- ampfer oder englischer Winter-Spinat. Cuba-Spinat. Peruanischer oder Reis-Spinat.....	144—149

	Seite
VII. Gurken, Melonen und Kürbis.....	149—160
VIII. Erbsen.....	161—165
IX. Bohnen.....	166—175
X. Kernsorten. Artischocken. Cardy oder Gemüse-Carden. Spargel. Meer- oder Seekohl.....	176—185
XI. Küchenkräuter. Alant. Angelika. Anis. Basilikum. Bohnen- oder Pfefferkraut. Boretsch oder Gurkenkraut. Chenille oder Pflanzenraupen. Coriander. Dill. Eier- frucht. Erdmandel. Erdnuss. Esdragon. Fenchel. Isop. Kerbel. Lavendel. Liebstock. Majoran. Melisse. Minze. Petersilie. Spanischer Pfeffer. Garten-Pimpinelle. Por- tulak. Rosmarin. Salbei. Senf. Thymian. Tomaten oder Liebesapfel. Waldmeister. Raute oder Weinraute. Wermuth.....	185—199
Erdbeeren.....	200
Champignon.....	201
Selten angebaute Gemüsepflanzen.....	205—208
Tabellarische Zusammenstellung der in der 2. Ab- theilung behandelten Artikel in Bezug auf Gewicht, Keim- zeit und Keimdauer ihrer Samen.....	209—212

Dritte Abtheilung.

Ueber die Anzucht aus Samen der Freiland- und Gewächshaus- (Topf-) Zierpflanzen.

Erster Abschnitt: Pflanzen des freien Landes.

A. Allgemeines.

I. Sommergewächse oder einjährige (annuelle) Pflanzen....	213—216
II. Zweijährige (bisannuelle) Pflanzen.....	216—217
III. Stauden oder perennirende Pflanzen.....	218—219
IV. Zwiebel- und Knollengewächse des freien Landes.....	219—220
V. Ziergräser, Schlingpflanzen, Cucurbitaceen, Immortellen. Vorsichtsmassregeln beim Auspflanzen der Sämlinge in das Freie.....	220 221

B. Aussaat der wichtigsten Freilandblumen, Pflege der Sämlinge und ihre Verwendung.

Althaea (Malven). Amarantus. Antirrhinum (Löwenmaul). Aster. Campanula. Celosia (Hahnenkamm). Cheiranthus (Levkoyen und Goldlack). Dahlia (Georginen). Delphinium (Rittersporn). Dianthus (Garten- und Chineser-Nelken). Balsaminen. Lobelia. Mimulus. Myosotis (Vergissmännchen). Petunia. Phlox Drummondii. Portulaca. Primula. Reseda. Verbena. Viola (Stiefmütterchen). Zinnia.....	222—267
---	---------

Tabellarische Zusammenstellung der meisten, in den Samen-Verzeichnissen enthaltenen Freiland-Gartenpflanzen, deren Dauer, Eigenart, Aussaat, Blüthezeit und Verwendbarkeit	268—313
--	---------

Zweiter Abschnitt: Topfpflanzen.

Seite

A. Allgemeines.

Die Behandlung sehr feiner Samen. Das Pikiren der Topfsämlinge 314—318

B. Anzucht und Pflege der Sämlinge einiger wichtiger Topfpflanzen-Gattungen und Familien.

Amaryllis hybrida. Die Aroideen des Warmhauses. Begonia. Bromeliaceen. Cacteen. Calceolaria. Canna. Chrysanthemum indicum und frutescens. Cineraria hybrida. Coleus. Cyclamen. Die Aussaat der Farnkräuter. Fuchsia. Gesneriaceen 318—334

Die Aussaat der wichtigsten Haideerdepflanzen.

Azalea. Camellien. Epacris. Erica. Rhododendron 335—338

Orchideen (tropische). Palmen, Cycadeen und Pandaneen. Pelargonium 338—342

Wasserpflanzen 342

Tabellarische Zusammenstellung einer bedeutenden Anzahl solcher Topfpflanzen, von welchen sich Samen in den Verzeichnissen ziemlich regelmässig angeboten findet, deren Aussaat, Eigenart, Verwendbarkeit etc. 344—367

Vierte Abtheilung.

Ueber die Anzucht der Gehölze aus Samen.

I. Laubbäume und Sträucher 368—370

II. Die Aussaat der Coniferen oder Zapfenträger 371—374

III. Die Obstbäume. a. Die Aussaat behufs Erzielung neuer Sorten. b. Die Freilandaussaat 374—376

IV. Die Aussaat der Beerenobststräucher 376—377

Die Anzucht der Rosen aus Samen 378—380

Die Anzucht der Weissdornpflanzen (Crataegus Oxyacantha) 380—382

Schutz des Samens gegen Ungeziefer. Aufbewahrung.. 382

Schlussbemerkungen 383—384

Tabellarische Zusammenstellung der bekanntesten Gehölze, mit besonderer Berücksichtigung des Verfahrens bei der Aussaat. 384—413

Alphabetisches Register 414—421

Druckfehler und Verbesserungen 422

Einleitung.

Nutzen und Vorzüge der Anzucht aus Samen.

Unter allen Fortpflanzungsarten, welche die Natur zur Erhaltung der Pflanzen eingerichtet hat, und welche wir in Garten, Feld und Wald nachahmen, ist die Anzucht aus Samen die natürlichste, und, wo sie anwendbar ist, auch in den meisten Fällen die beste, bei vielen Pflanzen die einzig mögliche. Diese geschlechtliche Fortpflanzung sichert die lebenskräftigste Entwicklung des Pflanzenwesens und der Nachkommenschaft, kräftigt ungeschlechtlich vermehrte Pflanzen und schützt dieselben so vor Ausartung durch Schwäche, welche bei dieser Fortpflanzungsweise allmählig einzutreten pflegt. Wenn sie nun aber auch im allgemeinen die Pflanzenart und Nachkommenschaft rein erhält, so ist diese Vermehrung auf der anderen Seite bei den Culturpflanzen wiederum das Mittel zur Fortbildung und zur Erzielung derjenigen Formen, welche wir als Vervollkommnung, sei es an Schönheit, sei es an Güte, Ertragsfähigkeit und (bei essbaren Pflanzen) Wohlgeschmack, betrachten. Dieser Neigung der Culturpflanzen zur Bildung neuer Formen (Varietäten) verdanken wir alle jene schönen Abweichungen von der Stammform, welche wir Sorten nennen, und es ist gegenwärtig eine der Hauptaufgaben der höheren Gärtnerei, die so entstandenen Sorten zu erhalten und durch Auswahl zu vervollkommen. Nur durch besondere Belehrung und den öfteren Besuch von Samenzuchtgärtnereien ist der Dilettant im Stande, sich einen Begriff davon zu machen, mit welcher Sorgfalt der gewissenhafte Samenzüchter bei der Auswahl verfahren muss. Jede Pflanze, welche eine Abweichung von den bestehenden Formen zeigt und als eine Verbesserung derselben

oder eine Bereicherung des vorhandenen Sortiments erscheint, wird ausgezeichnet, wennmöglich abgesondert und im folgenden Jahre versuchsweise getrennt von ähnlichen Sorten cultivirt, bis die neue fixirt ist, wie man sagt, d. h. Beständigkeit zeigt. Allerdings ist oft die Mühe umsonst, denn zuweilen sind solche Abweichungen nicht oder nur in ungenügender Zahl beständig, oder die neue Form ist in Bezug auf Schönheit oder Güte nicht werthvoll genug, um als Sorte beibehalten zu werden.

Auf die oben angedeutete Art sind die meisten Sorten entstanden: die früh- oder spätblühenden Blumensorten, die niedrigen und die hohen, die grossblumigen und die gefüllten Sorten, die neuen Farben, die frühen und späten Gemüse- und Obstsorten. Diese fast unbegrenzte Mannigfaltigkeit entsteht einestheils aus der Neigung gewisser Pflanzen zur Erzeugung sogenannter, in Form oder Farbe abweichender Spielarten, welche oft erst nach Jahren bei lange cultivirten Pflanzen ohne erkennbare Ursache eintritt, andernteils aus zufälliger Befruchtung durch Wind oder Insekten, durch welche Mischlinge erzeugt werden. Die Kenntniss des Befruchtungs-Vorganges und der Bastard-Bildung hat in neuerer Zeit zur ausgedehntesten Anwendung der künstlichen Befruchtung geführt, wodurch überraschende Resultate erzielt werden. Es sind jedoch nur bestimmte Pflanzenarten und Familien, bei welchen auf guten Erfolg zu hoffen ist, und meist befassen sich Gärtner und Dilettanten nur mit gewissen Specialitäten. Allerdings kann ein zu grosser Sortenreichthum recht beschwerlich werden, fast noch mehr für die Züchter und Verkäufer, als für die Käufer, denn erstere haben die Last der sorgfältigen Reinerhaltung, der Etikettirung und Einstellung in die Cataloge, letztere nur die Mühe des Aussuchens unter so Vielem und gelegentlich eine Enttäuschung. Dem mit Sorten gänzlich unbekannten Käufer wird die Auswahl durch Herstellung fertiger Sortimente der beliebtesten Gartenblumen sowie der hauptsächlichsten Gemüsesorten erleichtert. Der Käufer möge sich die Sorten merken, welche ihm am besten gefallen, diese künftig wieder bestellen und nebenbei alljährlich einige ihm unbekannte zum Versuch anbauen. Bei Beurtheilung einer neuen Sorte kommt der Spruch: „Eines

schiekt sich nicht für Alle“ sehr zur Geltung. Was dem Einem missfällt, gefällt Anderen, und eine gerühmte Pflanze, die hier enttäuscht, entwickelt sich dort, in anderer Lage und Bodenbeschaffenheit zu ganz ungeahnter Schönheit. Oft ist auch die Enttäuschung auf falsche Behandlung oder Verwendung zurückzuführen. Das Urtheil gewisser Versuchsstationen und Gartenbau-Vereine (durch beauftragte Mitglieder) über neue Gemüse und Blumen ist nicht immer zutreffend und es werden über den Werth ein und derselben Pflanze zuweilen ganz abweichende Ansichten ausgesprochen. Würden die vielen, von manchen Leuten als entbehrlich betrachteten Pflanzen und Sorten nicht verlangt, so würden die Züchter sie nicht anbauen. Es giebt aber für den Züchter und Verkäufer noch eine besondere, zwingende Nothwendigkeit, Pflanzen und Sorten zu erziehen und zu verbreiten, welche in den Augen vieler Blumenfreunde als nutzlos oder überflüssig erscheinen: die Mode, welche auch in den Gärten und bei den Blumen tyrannisirend auftritt. Wer könnte das verkennen, wenn er sieht, wie die schönsten älteren Pflanzenarten anderen, weniger werthvollen weichen müssen und so gering geachtet werden, dass der Gärtner sie vernachlässigen muss? Als Beispiel führen wir die einfach blühenden Georginen (*Dahlia*) und die Sonnenrosen (*Helianthus*) auf, welche gegenwärtig in England und Amerika so beliebt sind.

Es sollte eben Jeder nicht nur nach seinem Geschmack, sondern auch nach seinen Verhältnissen die zu ziehenden Pflanzen auswählen. So wäre es z. B. ganz falsch, wenn der Besitzer eines kleinen Gartens eine Menge gerühmter Blattpflanzen ziehen wollte, weil sie ihm in einem grossen Garten, im Park oder in öffentlichen Anlagen, schön erschienen. Solche Anlagen verlangen Abwechslung, und dazu tragen auch Pflanzen bei, deren Schönheit an und für sich zweifelhaft genannt werden kann.

Uebrigens nöthigt schon die immer mehr anwachsende Menge der Sorten zur Einziehung älterer geringwerthiger, und wenn trotzdem bei gewissen Pflanzen-Familien eine Ueberzahl von Sorten besteht, so wird dieses Uebel fast ganz aufgewogen durch die Schönheit vieler neuer Spielarten, welche durch absichtliche oder

zufällige Befruchtung entstanden sind und noch entstehen können. Manche, für vollkommen gehaltene Blumen sind in ihrer ursprünglichen Form durch ihre neuen Varietäten vollständig übertroffen und verdrängt worden. Man denke nur an die hauptsächlichsten Florblumen: Asten, Levkoyen, Balsaminen, Nelken, Phlox, Stiefmütterchen, Petunia, Pelargonium, Fuchsia, Begonia, Azalea, Rhododendron, Camellia etc. etc.

Die Anzucht der Pflanzen aus Samen ist auch da, wo eine ungeschlechtliche Vermehrung durch Ausläufer, Ableger, Stecklinge etc. möglich und gebräuchlich ist, in den meisten Fällen noch der bedeutend geringeren Kosten wegen unbedingt zu empfehlen, wenn auch der Erfolg bei Samen, welche besonders schwierig zu behandeln sind, schwer keimen oder bald ihre Keimfähigkeit verlieren, zuweilen nicht befriedigt.

Den grössten Vorthail davon aber haben diejenigen Gartenbesitzer, welche weit entfernt von grösseren Gärtnereien und Pflanzenhandlungen wohnen. Ist auch der Transport bei unseren Verkehrsmitteln ein sehr schneller und oft bis in die weite Entfernung unbedenklich, so wird er doch im Verhältniss zu dem Werthe der Pflanzen vielfach zu theuer, während das Porto für Samen ein sehr geringfügiges ist.

Ein weiterer Vorzug der Erziehung durch Samen liegt darin, dass sie dem Dilettanten Gelegenheit giebt, seine Liebhaberei in der Zucht neuer Sorten zu befriedigen. Vielen Gartenfreunden gewährt es eine besondere Freude, aus Samen und oft mit grosser Mühe Blumen- und Gemüse-Sorten heranzuziehen, welche sie überall und billig als Pflanzen haben könnten. Man freut sich über die allmähliche Entwicklung, das Grosswerden und das Blühen. Die Hoffnung, etwas Hübsches zu erziehen, beschäftigt angenehm und anregend. Das Ergebniss einer einzigen Aussaat, die Freude an einer schönen Sorte oder Farbe entschädigen den Liebhaber für mancherlei Enttäuschung, und die Pflanze hat höheren Werth als eine vorhandene bessere, nur weil sie selbst gezogen wurde.

Erste Abtheilung.

Allgemeines über Aussaaten.

I. Die Bestellung und Aufbewahrung der Samen.

Die meisten Samenhändler sind bemüht, ihre Cataloge alljährlich zu verbessern, vor allem leicht verständlich und für die Besteller bequem einzurichten. Um die Fülle des Materials, welches in einem solchen Cataloge bearbeitet werden muss, auf den möglichst knappen Raum zu beschränken, müssen Classificationen, Abkürzungen und Zeichen angewandt werden, deren sorgfältige Beachtung seitens der Käufer zur Verhütung von Missverständnissen und Enttäuschungen unbedingt erforderlich ist. Der bei weitem grösste Theil der Sämereien wird im Frühjahr gesäet. Man wird jedoch gut thun, auch den Bedarf an den im Sommer und Herbst zu säenden Samen der Frühjahrs-Bestellung beizufügen, denn es kommt sehr häufig vor, dass später, kurz vor der Saatzeit, die betreffenden Samen entweder nicht mehr vorrätig sind oder die neue Ernte noch nicht reif oder versandtfertig ist. Es werden auch von den Grosshandlungen besondere „Herbst-Cataloge“ verschickt, oder eine Liste den Blumenzwiebel-Verzeichnissen beigelegt, in welcher Gemüse- und Blumensamen, welche im Herbst (Spätsommer) gesäet werden müssen oder können, aufgeführt sind.

Es ist rathsam, die zu Mistbeet- und anderen Treibculturen bestimmten Samen bereits vor der Hauptbestellung für das Frühjahr zu verschreiben, weil es für diese sonst leicht zu spät werden würde. Die Samencataloge erscheinen im Laufe des Monats Januar und wir können nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Bestellungen so schleunig wie möglich nach Empfang derselben einzusenden, wenn man zu spätes Eintreffen der Samen

vermeiden will. Hat man noch Samen vorrätig, so unterwerfe man dieselben, falls man die dazu nöthigen Vorrichtungen besitzt, einer Keimprobe. Hierbei kommt viel darauf an, ob die Samen in einem günstigen oder kühlen, nassen Sommer gereift sind, und es kommt vor, dass Samen aus einem vorhergehenden, den Samen günstigen, samenreichen Jahre, besser keimen und kräftigere Pflanzen liefern, als die der jüngsten Ernte. — Durchaus nöthig ist es, die Samen nach ihrer Ankunft sogleich auszupacken und sie bis zur Zeit der Aussaat in einem möglichst hellen, sowohl gegen Feuchtigkeit als auch gegen Kälte geschützten Raum aufzubewahren.

II. Wahl der Sorten.

Sortenkenntniß ist eine der ersten Bedingungen für die gute Einrichtung einer Gärtnerei, denn nur durch eine richtige Wahl werden günstige Erfolge der Culturen gesichert. Die besseren Cataloge geben, namentlich bei Gemüsen, die Tauglichkeit zum Treiben, zur Früh- oder Spätcultur mit kurzen Worten an und heben gewisse Sorten besonders hervor. Ebenso sind bei manchen Sorten andere Eigenschaften, z. B. die Höhe oder Art des Wuchses, der Geschmack, die grössere oder geringere Ergiebigkeit, kurz angedeutet. Verhalten sich auch nicht alle Sorten, besonders bei den Gemüsen, in allen Gegenden gleich, so sind sie doch in Bezug auf die Zeit der Reife, sowie in Bezug auf hohen oder niedrigen Wuchs, fast immer beständig. Frühsorten von Gemüsen gedeihen im allgemeinen auch im Sommer gut, Mistbeetsorten meist weniger gut im Freien. Späte Sorten gedeihen zwar häufig auch bei früher Pflanzung oder Saat, aber ihre Bestimmung ist dann verfehlt. Pflanzte man z. B. frühe Salatsorten für die Sommerzeit, so gedeihen zwar einige und sind auch ergiebig, aber sie halten sich nicht und bilden bald Samenstengel; pflanzte man aber Sommer-Salate als frühe, so bekommt man keinen frühen Salat. Aehnlich ist es mit anderen Frühgemüsen, z. B.: Erbsen, Bohnen, Carotten, Kohlrabi, Wirsing und Kraut (Kopfkohl). Welcher Nachtheil durch eine solche falsche Wahl oder eine Verwechslung entstehen kann, braucht nicht besonders betont zu werden. Wer nur zum eigenen Bedarf Gemüse zieht, hat hierbei den kleineren Schaden, dagegen haben Herrschaftsgärtner dadurch Verdriesslichkeiten, Marktgärtner aber empfindliche Verluste, indem ihnen die erste Frühlingseinnahme verloren gehen

würde. Da der Preis für derartige Gemüse von Woche zu Woche niedriger wird, so kommt es darauf an, stets die am Orte früheste Sorte anzubauen. Ebenso wichtig ist die Qualität und das Grössenverhältniss. Wer nur für die Familie Gemüse zieht und dabei nicht viele Kostgänger hat, wird naturgemäss die wohl-schmeckendsten Sorten anbauen, wenn sie auch weniger ergiebig sind. Vielen Consumenten ist es unbekannt, welcher grosse Unterschied im Geschmack zwischen den einzelnen Sorten besteht, wie die eine ohne grosse Zuthat wohl-schmeckend und zart, die andere trotz aller Zuthaten weniger schmackhaft ist. Das erstreckt sich auf fast alle Gemüse, ist aber besonders bemerkbar bei denjenigen, welche roh genossen werden, namentlich bei Salaten und Endivien, Radieschen und Rettigen. Wer dagegen zahlreiche Dienstleute zu beköstigen hat, wie dies oft auf dem Lande der Fall ist, der wird, ausser auf den Wohlgeschmack, auch auf die Ergiebigkeit sein Augenmerk richten. In noch höherem Masse ist dies bei öffentlichen Anstalten, wie Kasernen, Strafanstalten etc., die ihr eigenes Gemüse ziehen, sowie bei den Markt- und Feld-Gärtnereien geboten. Wer zum Verkauf zieht, muss zunächst solche Sorten anbauen, welche am meisten verlangt werden und das sind — oft zum Nachtheile der Käufer — meistens die grössten.

Ausserdem muss der Gemüsezüchter, welcher in grossem Massstabe anbaut, besonders auf Haltbarkeit und geringe Empfindlichkeit gegen den Transport sehen. Bei manchen Gemüsen ist die Grösse kein Gewinn; riesige Kohlköpfe (besonders Weisskraut) sind oft locker und starkrippig, wiegen nicht schwerer als gewisse mittelgrosse Sorten, werden aber doch vorgezogen. Aehnlich ist es bei den Bohnen. Grosse, breite Schwertbohnen verkaufen sich meist besser als dickfleischige, rundliche Sorten, wie die rheinische Zucker-Brech- oder Speckbohne und ähnliche Sorten, obschon letztere meist schwerer wiegen, fleischiger und länger zart sind. Der Verkäufer muss sich in erster Linie nach den Gewohnheiten und dem Geschmack seines Publikums richten, sonst findet er seine Rechnung nicht, und solche Localsorten haben ja allerdings den grossen Vorzug, dass sie gut gedeihen.

Trotzdem sollten aber die Gemüsegärtner nicht versäumen, bessere Sorten bei dem intelligenteren Theil ihrer Kunden allmählig einzuführen. Leider hält es in Deutschland schwerer, als z. B. in Frankreich, Belgien, Holland und England, gute neue oder

verbesserte Gemüsesorten einzubürgern. Unser Publikum ist in diesem Punkte sehr conservativ und misstraut den Neuheiten.

Besonders wichtig ist es, die Auswahl der Sorten so zu treffen, dass eine ununterbrochene Folge besteht, d. h. dass die der Jahreszeit angemessenen Gemüse nie oder nur auf kurze Zeit ausgehen. Das wird bei einigen Gemüsen durch nacheinander folgende Aussaaten, bei anderen durch den Anbau verschiedener Sorten erreicht. Die Praxis muss lehren, welche Sorten besser zu gewissen Jahreszeiten gedeihen.

Die Samencataloge sind heutzutage für aufmerksame Benutzer belehrend genug, bezeichnen gewisse Sorten als zum Früh-, andere zum Sommer-, wieder andere zum Herbst-Anbau besonders geeignet. Wir erinnern nur an die im Herbst zu pflanzenden Winter-salatsorten, Winterkraut, gewisse Blumenkohlsorten und wir heben hier noch besonders die Erbsen hervor. Man brauchte ja nur eine Sorte, eine frühe, ergiebige anzubauen, indem man zu verschiedenen Zeiten aussät, aber man würde dann die wohlschmeckenden späteren, grossen Markerbsen entbehren.

Endlich ist das Klima, die Lage und der Boden für die Auswahl der Sorten entscheidend, denn die meisten Gemüse-Sorten gedeihen nicht gleich gut in jeder Lage, in jedem Boden; die eine verkümmert in warmen, trockenen Lagen, während die andere ein rauhes Klima nicht verträgt.

Bei den Blumen walten andere Rücksichten. Abgesehen von klimatischen Einflüssen, welche die Cultur der einen oder anderen Pflanze schwierig und bedenklich machen, entscheidet hier für den Liebhaber der persönliche Geschmack, zuweilen auch die Mode. Der Gärtner und Pflanzenfreund muss wissen, welche Blumen ihm am meisten nützen, mit welchen er bei verhältnissmässig leichter Cultur den grössten Schmuck erzielt. Der angestellte Gärtner hat überdies darauf Rücksicht zu nehmen, zu welcher Zeit seine „Herrschaft“ einen Landsitz oder einen Stadtgarten bewohnt. Er wird seine Kräfte nicht durch Blumenculturen zersplittern, welche nicht bemerkt werden, sondern den Garten für die Zeit, wo er besucht wird, so glänzend wie möglich schmücken und die entsprechenden Pflanzen auswählen. Andere Rücksichten hat der Handelsgärtner für das Lokalgeschäft zu nehmen; er muss vor allem beliebte Sorten ziehen, welche sich, sei es als Topfpflanzen zum „Marktverkauf“, oder im Bouquet- und Kranzgeschäft gut absetzen.

III. Einfluss des Klimas, der Lage und des Bodens.

1. Im allgemeinen sollte man die Pflanzen, für welche das Klima, mit welchem man zu rechnen hat, zu rauh ist, von den Culturen im Freien ausschliessen. Was die Gemüse des freien Landes betrifft, so kann für den allgemeinen Anbau nur die Cultur derjenigen befürwortet werden, welche ohne künstliche Hilfsmittel gut gedeihen. Wenn jedoch gewisse ausländische oder südliche Gemüsearten gezogen werden sollen, wie z. B. in manchen Herrschaftsgärten, so gehören dazu ausser Mistbeeten auch heizbare Kästen, Treibhäuser etc.

Der Temperaturunterschied im Klima ein und desselben Ortes an seinen verschiedenen Lagen ist oft sehr bedeutend, namentlich in Berggegenden. Es giebt Orte, wo man in den Gärten an der Sonnenseite schon säet und pflanzt, während auf der Winterseite der Boden noch nicht zu bearbeiten ist. In warmen, dabei trockenen Lagen, wo das Land nicht leicht hinreichend zu bewässern ist, sind Culturen von Gemüse, welche viel Feuchtigkeit verlangen, selten lohnend, oft unmöglich.

In gut bewässerten, wenigstens nicht trockenen Ebenen mit gutem Boden können alle Gemüse gezogen werden; nur wenige erfordern eine warme Lage oder besondere Schutzvorrichtungen. Von Gebäuden eingeschlossene Gärten sind ungünstig, denn viele Pflanzen werden, nach Licht strebend, zu hoch. Kohlarten werden darin von Raupen, Erdflöhen und Blattläusen mehr angegriffen, als in freien Lagen.

Nahrhafter, tiefer, dabei lockerer Gartenboden ist den Culturen im ganzen am günstigsten, obgleich einzelne sich mit geringerem Boden begnügen. Was dem Boden an eigener Kraft, d. h. an Nährstoffen fehlt, muss durch Düngung hineingebracht werden. Sollen Culturen einträglich werden, so muss der Boden wenigstens so beschaffen sein, dass er durch Düngung ein guter Culturboden werden kann. Fast jeder Boden lässt sich mit einigem Erfolg bebauen. Als nicht culturwürdig für Gartenproducte möchten wir den Keupermergel und Lettenschiefer der Keuperformation betrachten. Sandboden, welcher nicht ganz ohne thonige Beimischung ist, bewährt sich überall da, wo es nicht an Bodenfeuchtigkeit fehlt und die Bewässerung und Düngung keine Schwierigkeiten bieten.

Bei grossen Städten sehen wir vielfach auf Sandboden Gemüsebau im grossen, von welchem sich ganze Ortschaften nähren.

Wir erinnern nur an Gonsenheim bei Mainz, Frankfurt a. Main und Umgegend, Darmstadt, Bamberg, Dresden u. v. A.; als lehrreichstes Beispiel aber dient die Umgegend von Berlin, wo durch den Fleiss der Gemüsegärtner der ärmste Sand in tiefen Lagen mittelst reichlicher Düngung noch hohe Erträge bringt.

Jeder nicht normal gute Culturboden, der zu leichte einerseits, der zu schwere andererseits, hat seine guten und schlechten Eigenschaften. Sandboden ist warm, daher zum Frühanbau geeignet, und lässt sich jederzeit leicht und daher billig bearbeiten. Hat er zugleich viele Laub-, Nadel- oder Moor-Bestandtheile, wie es auf Neuland häufig der Fall ist, so können darauf gewisse Pflanzen mit Leichtigkeit gezogen werden, deren Cultur sonst nur in eigens zubereiteter Erde möglich ist (z. B. Rhodanthe Manglesi, junge Coniferen und andere). Dagegen kann er in trockenen Zeiten bei ungenügender Bewässerung so unfruchtbar werden, dass die Culturen völlig misslingen. Der in diesem Falle nöthige Aufwand zum Begiessen steht meist in keinem Verhältniss zu dem zu erwartenden Nutzen. Wir wiederholen, dass es sich nur um Culturen im Grossen handelt, nicht um Blumengärten und Gemüseculturen aus Liebhaberei zum Selbstbedarf. Schwerer, d. h. viel Thon enthaltender Boden, wozu auch manche Lehm- und Lössarten gehören, ist im Allgemeinen fruchtbar, und einmal eingewurzelt, wachsen die Pflanzen darin sehr kraftvoll. Aber er ist nur halb trocken und immer schwer zu bearbeiten, verlangt oft tiefe Lockerung, also viel Bearbeitung, was die Cultur theuert; auch ist er für Frühculturen weniger geeignet als lockerer Boden, weil er für die warme Luft verschlossen und deshalb kalt ist. Das Eindringen der Wurzeln junger Pflanzen ist so erschwert, dass manche nur gut gedeihen, wenn man in die Saat- oder Pflanzreihen oder Löcher Composterde bringt, ein theures Verfahren, welches natürlich im Grossen nicht anwendbar ist. Wir schliessen aus den vorhergehenden Erörterungen, dass der Gartenbesitzer und Herrschaftsgärtner zum eigenen Bedarf alle Gemüse ziehen kann, dass es aber vernünftig ist, diejenigen, welche wegen Ungunst der Lage, des Klimas und Bodens an einem Platze nicht gedeihen, wegzulassen; endlich dass der Anbau zum Verkauf unter solchen Verhältnissen nicht einträglich ist.

Was wir über den Boden sagten, gilt zwar auch theilweise für die Blumenzucht im freien Lande im Grossen, wie z. B. in

den Samenzuchtgärten, wo die Blumen in Feldern gezogen werden; aber wo es sich um Schmuckgärten, Blumengärten und Blumenbeete im Parkgarten handelt, ist der natürliche Boden des Platzes weniger von Bedeutung, denn er kann und muss nach Bedürfniss für die darauf bestimmten Culturen verändert resp. hergestellt werden.

Dagegen ist die Beschaffenheit des Bodens für Rasenanlagen von grosser Wichtigkeit und verlangen dieselben oft Bodenverbesserung und Veränderung, wenigstens bei Verwendung gewisser feiner Gräser. Auf thonigem und armen kieselig-steinigem Boden bilden z. B. nur zwei Festuca-Sorten, ovina und rubra, dichten kurzen Gartenrasen. Grosse Flächen mit schlechtem Boden lassen sich schwer verbessern.

IV. Ueber die bei der Pflanzencultur gebräuchlichen Hilfserden und das Erdmagazin.

2. Verbesserte, nahrhafte oder besondere Erde sind bei der Cultur der Gemüse und Blumen im Grossen wenig gebräuchlich, auch entbehrlich, obschon Compost- oder Düngererde rechtzeitig angewendet, die Erträge und Güte der Producte ungemein befördert. In noch rohen, oder zu schweren, oder auch nahrungsarmen Bodenarten ist Compost- oder Düngererde gar nicht zu entbehren. Pflanzen in Mistbeeten und Töpfen verlangen ebenfalls eine bessere Erde als im Lande zu finden ist, und eine grosse Anzahl von Zierpflanzen gedeiht nur in einer besonderen Erde, der Haide-, Moor- oder Walderde; endlich ist ein guter reiner Sand als Zusatz bei vielen Culturen unentbehrlich. Aus diesem Bedürfniss geht hervor, dass zu einer grösseren Gartencultur verschiedene Erdarten und ein sogenanntes Erdmagazin nöthig sind, und dass jeder Blumenfreund ersterer bedarf, wenn er sich nicht ganz in die Hände fremder Gärtner begeben will. Wenn irgend ausführbar, sollte jeder Gartenbesitzer suchen, sich wenigstens ein kleines Erdmagazin zu schaffen.

Die am meisten gebrauchte Erde ist eine Normalerde, gewöhnlich Compost genannt. Man unterscheidet davon zweierlei

Arten, deren erste man auf folgende Weise erhält: Man wirft alle organischen Abfälle (mit Ausnahme von Knochen), besonders aus dem Garten und der Küche, dazu Holzasche und Russ auf einen Haufen, welcher mindestens dreimal im Jahre so umgearbeitet wird, dass das Unterste zu oberst kommt. Hierzu mischt man je nach Bedürfniss Düngstoffe, besonders Mist, und begiesst den Haufen, so oft sich Gelegenheit dazu bietet, mit flüssigem Dünger, Blut, Urin, Mistjauche u. s. w. Nach zwei Jahren ist die Erde meist brauchbar, um so früher, je öfter sie fortgearbeitet wird. Hat man grosse Mengen von Pflanzenabfällen, z. B. junges, kurzes Gras, so werden diese schnell zu Erde, wenn man gebrannten Kalk schichtweise dazwischen bringt, und solche Erde thut besonders auf kalkarmem Boden gute Dienste. Man hüte sich, auf den Composthaufen Samen tragendes Unkraut zu werfen, weil solche Erde durch das Uebermass der daraus keimenden Unkräuter eher schädlich als nützlich wird. Man mache lieber davon einen besonderen Haufen, welcher zu Erde geworden, auf den Rasen gebracht wird. Die zweite Art, guten Compost zu bilden, ist, dass man vorkommende, entbehrliche Culturerde, aber nicht steinige oder klumpig thonige, ferner abgeschälten Rasen, Teichschlamm etc. schichtenweise mit Mist, Strassenkehricht, Asche, Russ etc. vermischt und mit flüssigen Düngstoffen begiesst. Solche Erde ist früher zu gebrauchen und bringt weniger Unkraut. Es ist zweckmässig, zweierlei Compost zu verwenden, gewöhnlichen für Mistbeete, zur Verbesserung von schlechtem Culturboden und Pflanzen in Gefässen; ferner einen düngerreichen, grossentheils aus verwestem Mist, Strassenkehricht, Asche, Russ etc. bestehenden Compost, welcher als Dünger angewendet wird und zur Verbesserung anderer Erden, sowie auch für manche Topfpflanzen dient. Wer einen grossen Vorrath von Compost hat und ihn richtig anwendet, kann seine Culturen zu grosser Vollkommenheit bringen.

Auf neuem Boden sind Saaten (besonders Rasensaaten) ohne einen Ueberzug mit Compost von wenigstens 2 cm, gar nicht aufzubringen. Die Anwendung von Compost ist um so nothwendiger, je schlechter der Gartenboden, sei es wegen Uebermass von Sand oder Thon, beschaffen ist. So kann man auf Thonboden oder schwerem Lehm nie gute Radieschen und Rettige ziehen, wenn man nicht Composterde anwendet. Auch andere Wurzelgemüse

werden auf schlechtem Boden ohne Compost nicht wohlschmeckend. Selbstverständlich ist die Anwendung von Composterde bei der Blumenzucht noch gebräuchlicher und nützlicher. Jedem nicht von Natur sandigen Compost muss reiner Wasser- oder Grubensand zugesetzt werden. Die Erde wird besser, weniger klumpig, wenn dies vor dem Verbrauch, etwa beim ersten Fortarbeiten geschieht.

Wo man Laub, Tannennadeln, alte Sägespäne und andere feine Holzabfälle haben kann, bildet man daraus Laub-, Nadel- und Holzerde. Diese Erden müssen in nicht sehr hohen Haufen an schattigen Plätzen aufgeschichtet, oft fortgearbeitet und vor der Zersetzung mit Sand vermischt werden. Sie sind dann schon nach zwei Jahren brauchbar und bis zum vierten Jahre am besten, später verlieren sie sehr an Güte. Solche Erde wird locker, nicht klumpig und fast der Haideerde gleich, deren Ersatz oder Zusatz sie oft bilden muss. Die beste Lauberde erhält man von weichholzigen und weichlaubigen Bäumen, das harte Eichenlaub gilt für schlecht. Ebenso bereitet man die beste und am schnellsten verwendbare Holzerde aus Sägespänen von weichen Holzarten. Man verwendet die Laub- und Holzerde vorzugsweise bei der Blumenzucht, doch kann sie auch als Zusatz zur Normalerde und Verbesserung von schwerem Boden dienen. Eine bei der Blumenzucht viel gebräuchliche Erde ist die Haide- und Moorerde, ohne welche viele Culturen gar nicht möglich sind. Beim Gemüsebau braucht man sie nicht, doch kann damit bei Neuanlagen schwerer oder humusleerer Boden verbessert werden, wenn solche Erde nahe, also billig zu haben ist. Die Haideerde ist immer sandig, manche jedoch nicht sandig genug, und Uebergänge in Moor kommen häufig vor. Sie enthält wenig Nährstoffe, gleichwohl entwickeln sich darin alle junge Pflanzen kräftig und viele werden darin sogar zu holzigen Sträuchern, z. B. Rhododendron, Azaleen u. a. m. Was an Pflanzennahrung darin fehlt, scheint die Lockerheit und Durchlässigkeit zu bewirken und man wendet sie, abgesehen von feinen Aussaaten, nur ungesiebt an. Jede Haideerde ist frisch, höchstens drei Jahre nach der Entnahme aus dem Walde am besten, mit der Zeit verliert sie so sehr an Brauchbarkeit, dass in alter, sehr verwesten Erde fast keine Pflanze mehr wächst, ein Nachtheil, welcher durch Aufbewahrung in hohen Haufen noch verstärkt wird.

Die Farbe der Haideerde ist verschieden, doch ist eine dunkelbraune Erde der fast schwarzen oder helllohfarbigen vorzuziehen.

Man lässt beim Aufbewahren die grossen, meist von Haidekrautwurzeln durchwachsenen Stücken, sogenannte „Knotten“, unzerkleinert bis zum Verbrauch, weil diese die Eigenschaft der Frische länger bewahren.

Gartenfreunde, welche nahe bei Haide- und Nadelwald wohnen, können sich ihren kleinen Bedarf leicht beschaffen; auch geben die grossen Handelsgärtnereien Haideerde an Dilettanten käuflich ab.

Die Moorerde aus Torfmooren und moorigen Wiesen ist sehr verschieden in der Güte, je nachdem sie lagert. Manche Moorerde steht der besten Haideerde gleich. Man findet solche an den Rändern der Moore, von wo sich das Wasser zurückgezogen und wo sich, begünstigt von dem durch Wind herbeigeführten Sand, Haidekraut angesiedelt hat; man darf aber von der sehr stark liegenden Masse nur die obere Schicht, nicht über 10 cm tief, nehmen.

Solche Erde ist schon frisch brauchbar. Aber jedenfalls sind erst Versuchsculturen damit zu machen. Moorerde, welche von Wasser durchdrungen ist, gewöhnlich die oberste Schicht von Torflagen, muss, nicht hoch aufgeschichtet, mindestens ein Jahr vor dem Gebrauch liegen, um die Humussäuren zu entfernen. Sie hat fast nie Sand und muss bei dem Gebrauch reichlich damit vermischt werden. Wir gedenken hierbei auch des Fasertorfs, welcher neuerdings so viel als Streumaterial für Ställe, aber auch in der Gärtnerei als Füllmaterial für Vermehrungsbeete verwendet wird, und auch untermischt mit Laub- und Haideerde gute Dienst leistet, indem er Lockerheit bewirkt.

Eine vorzügliche Erde zu vielen Topfculturen ist die Rasenerde, namentlich Aussticherde aus Gräben sumpfiger Wiesen. Sie ist natürlich so verschieden, wie der Boden, worauf sie vorkommt, am besten von Wiesen von lehmiger Bodenbeschaffenheit. Es giebt solche Erde, welche dem vorzüglichen englischen Loam gleich steht, sich förmlich mürbe, wie Mehl anfühlt, ohne Spur von Klebrigkeit. Man wendet solche Erde meist mit Humuserden vermischt an, mit Vortheil besonders für Palmen.

Des Schlammes wurde zwar schon als Material zu Composterde gedacht, aber viele Gärtner lieben es, denselben für sich

allein anzuwenden und benutzen ihn für gewisse Culturen, z. B. Levkoyen und Nelken als Normalerde. Die Beschaffenheit und Güte der Schlammerde ist aber sehr verschieden, je nach dem Ursprunge und der Beschaffenheit des umgebenden Bodens. Teichschlamm ist nur locker, wenn die Umgebung sandig ist, wo er theils durch Zuflusswasser, theils durch Wind herbeigeführt wird. Fluss- und Bachschlamm aus Mühlgräben ist immer etwas sandig, selbst in Lehm- und Kalkgegenden, denn der Ursprung der Gewässer liegt meist weiter in Gebirgen mit Sandbestandtheilen. Teiche, in welche aus Ställen oder Dörfern Düngerwasser fliesst, besonders aber diejenigen, auf welchen Wasservögel, Enten und Gänse sich viel aufhalten und in welchen viele Wasserpflanzen verwesen, liefern den nahrhaftesten Schlamm. Solcher Schlamm enthält meist viel Pflanzennahrung, er darf jedoch nur angewendet werden, nachdem er wenigstens ein Jahr mit der Luft in Berührung gekommen, durchfrozen und fleissig fortgearbeitet worden ist.

Fast alle Erdarten bedürfen des Sandes, um sie locker, für die Luft zugänglich, für das Wasser durchlassend, zu machen. Es ist kaum eine Topfpflanzencultur, besonders keine Anzucht junger Pflanzen aus Samen, ohne Sandzusatz möglich. Je reiner derselbe ist, desto besser. Mit Schlammtheilen vermischter Sand muss für gewisse Culturen, namentlich zur Untermischung mit Haideerde, gewaschen werden. Guter Sand besteht nur aus Quarzkörnern und sieht weiss aus. Grubensand hat oft eine röthliche oder gelbe Farbe, erstere meist von rothem Thon, letztere meist von Eisen. Der röthliche Sand wird durch Waschen meist weiss, und die unlösliche, gelbe Farbe schadet nicht. Leider ist nicht überall reiner Quarzsand zu haben, und dann muss man sich mit Sande aus leichter versetzbaren Gesteinen behelfen.

Dieser Sandmangel hat zur Anwendung von Surrogaten geführt, welche aber sämmtlich den Sand nur für gewöhnliche Pflanzen zur Noth ersetzen, indem sie Lockerheit bewirken. Man benutzt ausgesiebte und gewaschene sogenannte Koaks- und Steinkohlenasche und grobes Backsteinnmehl. Wir halten nicht viel davon, und würden in Ermangelung von Sand zerhacktes Moos, grobe, frische Sügespäähne, rohes Knochenmehl und Holzkohlenstaub vorziehen. Aber wie gesagt: zu Culturen in Haideerde und für feine Aussaaten in Töpfen ist nur wirklicher Quarzsand brauchbar.

V. Düngung und Düngstoffe.*)

3. Die richtige Verwendung des Düngers ist eine der ersten Bedingungen für Pflanzenculturen jeder Art, denn wenn einerseits die Pflanzen durch Düngung zur grössten Vollkommenheit gebracht werden können, so kann dagegen durch eine falsche, namentlich übertriebene Anwendung der Erfolg geradezu in Frage gestellt werden. Aller Culturboden erschöpft sich, denn die Pflanzen entnehmen so viele Bestandtheile aus demselben, wie sie zu ihrem Aufbau brauchen, wenn auch Luft und atmosphärisches Wasser einen Theil der Nahrung liefern. Die mineralischen Bestandtheile zu besprechen, gehört nicht hierher.

Wir nehmen an, dass sich der Boden zu den beabsichtigten Culturen eignet, mag darin Kalk, Thon, oder Kieselerde vorherrschen. Jedenfalls muss das dem Boden durch die Pflanze Entnommene theils ersetzt werden, theils müssen Stoffe zugeführt werden, welche selbst Pflanzennahrung enthalten, ausserdem aber die Mineralstoffe lösen und dieselben so für die Wurzeln der Pflanzen in den Zustand der Aufnahmefähigkeit bringen.

Die Wirkung dieser Stoffe ist ausser durch die in vielen Düngemitteln enthaltenen (unverbrennlichen) Aschenbestandtheile hauptsächlich bedingt durch die Gegenwart von a. Stickstoff (Ammoniak-Salze, Chilisalpeter, Hornspäne, Blut, Mistjauche); b. Phosphorsäure (Baker-Guano, Knochenkohle, Superphosphate); c. Kali (Holz- und Pottasche, Stassfurter Abraum-Salz); d. Stickstoff und Phosphorsäure (Peruguano, Oelkuchenhohl, Knochenmehl, diverse Poudretten-Arten).

Das Nahrungs- und Düngungsbedürfniss der Pflanzen ist sehr verschieden, und ebenso kommt viel darauf an, wie die Düngung geboten wird. Bei dem Gemüsebau haben langjährige Erfahrungen zu bestimmten Annahmen geführt, welche Gemüse frische Mistdüngung verlangen und ertragen, und welche nicht. Daraus hat sich in der Praxis der Gebrauch gebildet, alljährlich nur einen Theil des Culturlandes mit Mist zu düngen, und so eine zwei-

*) Anmerkung: Denjenigen, welche sich gründlich über Boden und Dünger belehren wollen, empfehlen wir das Buch: „Boden- und Düngerkunde für Gartenbau, Obst- und Weinbau“ von H. Jäger. Zweite Auflage. Hannover 1876. Verlag von Philipp Cohen.

oder dreijährige Wechselwirthschaft ausgebildet. Der erste Schriftsteller, welcher dies theoretisch begründete, war der berühmte Erfurter Rathsherr Chr. Reichart, in seinem, 1753 erschienenen Buche „Land- und Gartenschatz“.

Eines zweijährigen Düngungssturnus bedarf ein von Natur armer Boden, wenn er gute Erträge liefern soll, während gutes Gartenland nur alle drei Jahre gedüngt zu werden braucht und dennoch auch in den beiden Jahren, in welchen es nicht gedüngt wurde, eine reiche und gute Ernte von gewissen Gemüsen liefert.

Wir werden das Düngerbedürfniss der Gemüse bei der Specialcultur derselben kennen lernen und erwähnen vorläufig nur, dass Kohlarten, Gurken, Kürbis, Melonen, Sellerie, Cardy, Lattig- und Endiviensalat, Porree, Meerrettig, Spinat- und Spinatsurrogate, Mangold, Puffbohnen (auch ungedüngt) reichliche Mistdüngung vertragen oder verlangen, dass dagegen auf ungedüngtem Boden (in zweiter Tracht) Erbsen und Gartenbohnen bessere Erträge geben und nicht so üppig in das Kraut wachsen, ferner die meisten Wurzel- und Knollenfrüchte besser gedeihen und wohlschmeckender, Zwiebeln fester und haltbarer werden. Ausser diesen in der Düngung und dem Platze wechselnden ein- und zweijährigen Pflanzen giebt es in jedem Garten noch solche, die zuweilen lange Jahre auf demselben Platze stehen, wie Spargel, Rhabarber, Artischocken, Meerkohl, Schnittlauch (Graslauch), Sauerampfer, Meerrettig, Salbei, Thymian, Melisse, Raute, Staudenmajoran etc. Diese werden, je nach Bedürfniss, jedes Jahr, oder in längeren Zwischenräumen gedüngt. Ausnahmen von dieser Regel kommen häufig vor. Auf magerem Boden haben die Hülsenfrüchte nichts von einer schwachen Mistdüngung zu fürchten, wenn die Eintheilung der Beete, oder ein grösserer Bedarf es nöthig machen, sie auf das gedüngte Landstück zu bringen. Ebenso können, wo es nicht anders geht, düngerbedürftige Pflanzen auch auf ein ungedüngtes Stück kommen, und kann dann das betreffende Beet nachgedüngt werden. Einige Pflanzen, z. B. Porree, zehren den Boden so aus, dass auf der Stelle keine guten Erträge zu erwarten sind, wenn im folgenden Jahre nicht schwach gedüngt wird. Solche Dinge lernt man bald aus Erfahrung. — In manchen Fällen hängt die zwei- oder dreijährige Mistdüngung davon ab, ob man jedes Jahr nur wenig oder immer reichlich Dünger bekommen kann. Wird dem Gärtner, wie es auf Landgütern meistens der

Fall ist, der Mist knapp zugemessen, so thut man besser, alle zwei Jahre oder für manche Pflanzen sogar alljährlich zu düngen, während bei unbeschränktem Düngerverbrauch das zum Düngen bestimmte Stück nur nach je drei Jahren sehr reichlich gedüngt wird.

Bei der Blumenzucht im Lande lässt sich eine solche Wechselwirthschaft nicht einrichten. Im Allgemeinen lieben die Blumen ein nicht düngerreiches, d. h. nicht frisch gedüngtes Land. Viele Blumen blühen nur in ganz düngerarmem Boden reich, z. B. *Saponaria multiflora* (calabrica), *Tagetes*, *Tropaeolum*, welche auf frisch gedüngtem Lande viel zu üppige Stengel und Blätter entwickeln und nur sehr wenig blühen. Gleichwohl ist eine lange Cultur ohne Düngung nicht möglich, und aus diesem Grunde müssen auf frisch gedüngtes Land solche Blumen gewählt werden, welche es erfahrungsmässig vertragen. Als solche nennen wir beispielsweise das Stiefmütterchen, welches nicht leicht zu viel Düngung bekommen kann, wenn der frische Mist nicht gerade an die Pflanze kommt, und flüssiger Dünger nicht zu scharf und zu stark angewendet wird. Ferner Asters, Georginen, Canna, Malven, Zinnia etc. (Siehe die Einzelculturen). Zweckmässiger und gebräuchlicher ist aber die Einrichtung, alle Blumen, welche Düngung vertragen, nur mit älterem halberdigem Mist zu düngen, von welchem man Haufen anlegt, die wie Erdhaufen umgearbeitet, und wenn möglich mit flüssigen Düngstoffen übergossen werden.

Bei der Blumenzucht im Grossen auf Feldern wechselt man die Culturstücke, je nach der Düngung. — Was bisher gesagt wurde, bezieht sich nur auf Beetblumengärten. Im modernen Ziergarten liegen die Verhältnisse anders. Hier gilt zwar auch als Regel, dass Blumen im Allgemeinen mit weniger Dünger bessere Erfolge geben, aber man düngt jedes Beet, je nach den dafür bestimmten Blumen mehr oder weniger oder gar nicht. Hierzu wird meistens nur alter Mist oder Dünger-Compost verwendet.

In Blumen- und Parkgärten kommt aber noch eine andere Düngung vor, wobei der frische Mist, vorzugsweise Pferdemist, nicht als Düngung, sondern zur Erwärmung dient, indem er nach Art der Mistbeete in Gruben unterhalb der Erde angebracht wird. Allerdings tritt, wenn die Wurzeln den Mist erreicht haben, ein erhöhtes Wachsthum ein, und wir erziehen auf diese Art gewisse Blattpflanzen, z. B. Canna, Musa, Papyrus, Wigandia, Ricinus, Zea etc. in grösster Vollkommenheit.

4. Den Stoffen und der Verwendung nach, unterscheidet man folgende Arten von Dünger: 1. Mist, einschliesslich Fäkalstoffe, 2. Mistsurrogate in trockener oder erdiger Form, 3. Gründüngung, 4. flüssige Düngung.

Mistdünger. Gewöhnlicher, gemischter Stallmist, meist aus Rinder- und Pferdemist bestehend, bildet die Hauptmasse aller Düngstoffe, kommt aber auch für sich von einer Thiergattung vor, während Schafmist stets für sich bleibt. Kauft man Mist in Städten, so überzeuge man sich an Ort und Stelle, dass er nicht hauptsächlich aus Kehricht, Küchenabfällen und etwas Stroh besteht. Solcher Mist hat wenig Werth. Wo Schweinemist unter den Hofmist kommt, entscheidet die Fütterung über dessen Güte. Zur Mastzeit ist in Folge der Fütterung mit stickstoff- und phosphorreichen Hülsenfrüchten der Mist viel gehaltvoller als im Sommer, und aus Bäckerhäusern bekommt man besseren Mist als von Tagelöhnern. Rindermist hat viel Nährkraft, wirkt aber langsam, macht und erhält den Boden feucht, und wirkt daher auf leichtem Boden günstiger als auf schwerem. Der sonst von Viehweiden leicht zu bekommende reine, streulose Kuhmist, welcher von den Gärtnern sehr gesucht wird und die beliebteste Düngererde bildet, ist durch die fast allgemein eingeführte Stallfütterung so selten geworden, dass er nur noch in wenigen Gegenden, am ersten noch an grossen Eisenbahnstationen aus den Viehwagen zu bekommen ist. Mist von Pferden und Eseln ist trockener, strohiger, reich an flüchtigem Ammoniak, und wirkt frisch verwendet am kräftigsten, verliert aber alt, z. B. aus Mistbeeten und Champignonlagern, sehr an Werth. Da er den Boden locker erhält, so ist er in allem das Gegentheil von Rindermist. Es ist selbstverständlich, dass ein aus beiden Ställen gemischter Mist als Normaldünger für weder sehr sandiges, noch sehr schweres Land am besten sein muss. — Schaf- und Ziegenmist ist arm an Stroh, trocken und zerfällt nicht leicht. Er enthält und verflüchtigt viel Ammoniak und zersetzt sich trocken langsam, im Boden schnell. Er gilt für hitzig (scharf), und man giebt ihm Schuld, dass er gewissen Gemüsen immer unangenehmen Geschmack gäbe, was aber noch bewiesen werden muss. Schweinemist ist wässerig, hat zur Zeit der Grünfütterung wenig, zur Mastzeit ziemlichen Werth, wird aber selten für sich allein verwendet. Unter dem

Geflügelmist hat der von Tauben, welche sich nur von Samen und kleinen Thieren, besonders Schnecken nähren, bekanntlich den grössten Nährgehalt, der von Hühnern weniger, der von Wasservögeln am wenigsten Düngerwerth. Man verwendet Taubenmist meist allein und in flüssiger Form, nur selten trocken.

Die Fäkalstoffe, welche die Abtritte liefern, haben fast den höchsten Düngerwerth, sind aber sehr verschieden und wirken frisch verwendet auch selten günstig. Gut behandelt ist Abtrittsmist der beste, wirksamste Düngstoff, aber es ist im Allgemeinen die rechte Behandlung und Verwendung noch nicht gefunden worden, ebenso die Art der Entfernung aus Städten.

Auf Rieselfelder geleitet, wie bei Berlin, hat er die gehegten Erwartungen nicht erfüllt, denn durch die unaufhörliche Zuführung in flüssiger Form werden fast alle Gemüse grobzellig und wässerig, wofür die ungewöhnliche Grösse nicht entschädigen kann. Wo man es einrichten kann, ist die beste Verwendung folgende: Man streut wöchentlich mindestens einmal lockere, erdige Stoffe, als steinfreie Erde, Sägespäne, Holz-, Torf- und Braunkohlenasche, Torfstaub, endlich zerkleinerten Fasertorf, welcher jetzt als Torfstreu vielfach verwendet wird und in stark gepresstem Zustande in den Handel kommt — in die Abtritte, theils in die Gruben, theils von oben. Dies ist zugleich die beste Desinfection. Wenn die Fäkalstoffe in Tonnen abgefahren werden, was jetzt in den meisten Städten vorgezogen wird und wodurch am wenigsten Düngkraft verloren geht, richte man sich auf seinem Grundstücke eine Grube oder einen Haufen her, wo die üble Masse mit den genannten Stoffen reichlich vermischt wird. Solcher Dünger ist schon nach 6 Monaten fast geruchlos und bei der Verwendung wie Composterde zu behandeln. Gegen desinficirten Abtrittsmist, besonders bei Anwendung von Carbolsäure, haben wir berechtigtes Misstrauen. Wo flüssige Düngung eingeführt ist (siehe § 6), kann der meiste Fäkalstoff in den Behälter für Düngewasser gebracht werden, und es ist zweckmässig, den Abtritt für die Gartenarbeiter dabei anzubringen.

Dünger in trockener Form und Abfälle. Wo die im vorigen § besprochenen Düngstoffe nicht ausreichend zu haben sind, werden als Beidünger andere Stoffe meist in Pul-

verform verwendet, einige derselben sind überhaupt allgemein zu empfehlen. Voran steht in der Wirkung der peruanische Guano, welcher rechtzeitig als Oberdüngung verwendet, sehr gute Dienste leistet, namentlich auch auf Rasen. — Für viele Culturen fast ebenso kräftig ist Chilisalpeter, doch bleibt bei trockener Witterung seine Wirkung aus, und der Preis ist oft ein verhältnissmässig zu hoher. Der schnellen, sicheren Wirkung nach stellen wir Hornspäne, Horn- und Klauenmehl oben an, jedoch nur für die Blumenzucht, Hornmehl überhaupt nur für Pflanzen in Töpfen. Der Preis für Hornspäne ist immerhin noch so, dass man sie mit Vortheil anwenden kann, während Hornmehl zu theuer ist, um es in grösseren Gärtnereien anzuwenden, dagegen sehr bequem für den Dilettanten. — Von Knochenmehl gilt fast dasselbe, nur wirkt es viel schwächer, manchmal im ersten Jahre nicht sichtbar, aber anhaltend. Dies gilt aber nur von rohem Knochenmehl, welches zugleich lockernd wirkt, nicht von dem mit Säure „aufgeschlossenen“ und gebranntem Knochenmehl (Spodium), welches als feines Pulver bei gewissen Topfpflanzen mit Vortheil mit der Erde untermischt bei dem Verpflanzen benutzt wird. Knochenmehl steht übrigens an Düngerwerth weit unter den Hornstoffen. —

Holzasche ist ein vorzüglicher Dünger für das freie Land und auf Rasen, wird aber bei der Topfpflanzencultur nicht benutzt. Bei dem Gemüsebau empfiehlt sie sich besonders für Hülsenfrüchte. Was die Rasendüngung betrifft, wo Holzasche vielleicht den üppigsten Graswuchs erzeugt und zugleich das Moos vertilgt, so hat diese in Ziergärten den Nachtheil, dass sie Klee und kleeartige Pflanzen zur grössten Entwicklung bringt, was auf feinem Gartenrasen unerwünscht ist. Wenn auch kein Kleesamen bei der Aussaat verwendet worden ist, so befinden sich doch meistens verkümmerte Kleepflanzen im Boden und diese werden dann sichtbar. Torf- und Braunkohlenasche gelten als unwirksam oder gar schädlich. Das Letztere mag selten der Fall sein, und so ganz ohne Düngerwerth sind diese Stoffe nicht, schon aus dem Grunde, weil sie stets eine Beimischung verschiedener Kalisalze enthalten. Man verwendet sie hauptsächlich zur Wiesendüngung, kann sie aber auch in schwerem Boden untergraben, was eine vorübergehende Lockerheit bewirkt. Von Steinkohlen- und Coaksbrand sind nur die staubig-sandigen Theile verwendbar, jedoch nur auf nassen Wiesen und zur Lockerung thoniger Bodenarten. — Russ jeder Art bildet

einen guten Dünger, der auch, mit Vorsicht angewendet, bei der Blumenzucht in Töpfen benutzt werden kann.

Hierzu kommen noch die unter dem Collectivnamen „Stassfurter Abraumsalz“ bekannten, aus ca. zehn verschiedenen Mineralien (u. A. Kieserit, Carnellit, Kainit) bestehenden Doppelsalze aus schwefelsaurem Kali und schwefelsaurem Magnesia, denen meist noch reichliche Mengen von Chlornatrium (und Chlormagnesium) sowie von Kalksalzen beigelegt sind. Diese Abraumsalze sind leicht löslich und ihres Kali- und Magnesiumgehalts wegen als Düngemittel — zumal für einen kaliarmen Boden — höchst beachtungswerth; das in ihnen bis zu 30 % enthaltene Kochsalz dient nebenbei für gewisse im Boden schon vorhandene Nährstoffe als Lösungsmittel und übt somit indirect auf die Vegetation einen günstigen Einfluss aus. Sie wirken ähnlich wie Holzasche, doch muss, da sie sich für manche Bodenarten gar nicht eignen, ihre Anwendung stets von passend ausgeführten Boden-Untersuchungen und Düngungsversuchen abhängig gemacht werden. Sie kommen auch concentrirt in den Handel (drei- bis fünffach, und dementsprechend 30—50 % Kali enthaltend), in welchem Falle sie nur stark mit Erde vermischt verbraucht werden dürfen. Wir haben gute Erfolge bei Spargel gesehen, welche nach dieser wiederholten Düngung weit grösser wurden.

Das rohe Kali- und Magnesiasalz ist sehr schwer, enthält viel Krystallisationswasser und kann mit Vortheil nur da benutzt werden, wo die Kosten des Transportes nicht zu hoch sind. Wir hatten zuweilen gute Erfolge damit auf Wiesen, benutzten es aber auch schon ganz erfolglos, obschon das nasse Wetter für die Wirkung günstig war. Es scheint, dass die Qualität dieser rohen Salze sehr verschieden ist, und dass auch gemeines, fast nur aus Gyps bestehendes Düngesalz als Kalisalz in den Handel kommt. Die jetzt vielfach, auch von Handelsgärtnern verkauften Düngepulver bestehen vorzugsweise aus salpeter-, phosphor- und schwefelsauren Kalk- und Magnesiasalzen. Der Dilettant, welcher für seine Zimmerpflanzen nur wenig Blumendünger braucht, mag ein oder das andere Präparat benutzen, aber zum grösseren Verbrauch sind sie zu theuer. Uebrigens sei man in der Anwendung vorsichtig, denn es giebt Blumendünger, welcher etwas zu stark angewendet, die Pflanzen tödtet. Man mache stets erst Versuche an werthlosen Pflanzen, streue nur ein wenig auf eine

Stelle, auf eine andere mehr. Scharf nach Säuren riechende Stoffe benutze man nicht. Wir haben erfahren, dass Pflanzen schon zwölf Stunden nach der Anwendung abstarben. Wer künstlichen Dünger verwendet, überzeuge sich stets durch Probeculturen von dem Erfolge, ehe er grössere Quantitäten bezieht. Koch- und Seesalz werden in manchen Gegenden zur Spargeldüngung allgemein verwendet, und man lässt Seesalz dazu weit herkommen. Gewöhnliches Viehsalz wird wohl dieselben Dienste thun.

Zum mineralischen Dünger können noch kohlensaurer Kalk, Gyps oder schwefelsaurer Kalk und manche Mergelarten gezählt werden. Man wendet sie nur selten und in grossen Zeitzwischenräumen an, würde aber gut thun, kalkarmen Boden häufiger mit gebranntem Kalk zu düngen. Wo Gyps lagert, ist meist auch Kalk zu haben, aber in Ermangelung des letzteren ist bei billigem Bezug von Gyps auch dieser zu gebrauchen. Am meisten wirkt Kalk auf saurem Moorboden und durch langjährige Mist- und Compostdüngung vorherrschend aus Humus bestehendem Culturboden.

Zum Dünger gehören noch viele Abfallstoffe und Rückstände aus Fabriken, die man in Ermangelung von Mistdünger benutzt, wenn man sie billig am Platze haben kann. Hier und da werden Oelkuchen (Rapsmehl) in Pulverform mit grossem Erfolg für den Rübenbau angewendet. — Aus Gerbereien erhält man sogenannten Schund, welcher meist aus schleimigen Fleischtheilen besteht. Unter dem Schund aus Weissgerbereien ist viel Kalk. Leimsiedereien liefern das sogenannte Flechsenmehl, welches nicht so kräftig wirkt, namentlich nicht schnell, während der Leimkäse, ein schleimiger Bodensatz, einen guten Dünger bildet. — Ein oft angebotener, aber fast werthloser Stoff, ist das Ledermehl, aus gegerbten Abfällen bereitet. — Wollenabfälle kommen fast nicht mehr vor, da die sog. Kämmlinge nochmals verarbeitet und die Reste zur Gasbereitung verwendet werden. Ebenso wollene Lumpen, die zu anderen Zwecken dienen.

Haare kommen rein kaum als Dünger vor, sind zwar, wie man von den Chinesen weiss, düngerreich, liegen aber Jahre lang unverwest in der Erde, wenn sie nicht vorher geröstet werden.

Diese Abfälle werden an Pflanzennährstoff weit übertroffen durch die Malzkeime, welche man theils aus Bierbrauereien und

Malzfabriken, theils von Düngerhändlern bekommt. Ihre Wirkung ist ungemein schnell und in manchen Fällen fast dem Guano gleich. Dies ermahnt aber auch zur vorsichtigen, schwachen Anwendung, denn schon manche Cultur ist damit zu Grunde gerichtet worden. Man wendet die Malzkeime fein zerstoßen oder flüssig an.

Gründüngung. Die Gründüngung mit rein vegetabilischen Stoffen kommt bei der Gärtnerei nicht oft vor, aber sie kann zuweilen von Nutzen sein. Sie besteht in dem Eingraben grüner Pflanzentheile, oft solcher, die auf dem Boden gewachsen sind. Erfolg hat man mit der Gründüngung nur auf ganz humusarmem Sandboden.

In den Fällen, woran wir denken können, würde eine solche Düngung nur als eine Vorbereitung zu Rasensaat nützlich sein. Auf Sandfeldern baut man zur Gründüngung Lupinen; an Meeresufern benutzt man zu diesem Zwecke das sogenannte Seegras (*Fucus*, *Tang*), welches die Wellen an den Strand werfen und welches auch viele kleine Seethiere enthält.

Flüssige Düngung. Flüssiger Dünger kommt entweder schon flüssig vor, oder er wird künstlich bereitet. Da die Pflanzen die Nahrung nur gelöst, also in flüssigem Zustande aufnehmen, so heisst „flüssig düngen“ den Pflanzen direct fertige Nahrung zuführen. Man könnte die flüssige Düngung als einzig richtige und Hauptdüngung bezeichnen, wenn sie sich überall anwenden liesse, nicht in vielen Fällen zur Anwendung zu theuer wäre, endlich wenn Düngewasser dieselbe physikalisch-mechanische Wirkung auf den Boden ausübte wie der Mist. Aber diese lockernde, erwärmende und „Boden-Garheit“ bewirkende Eigenschaft fehlt dem flüssigen Dünger.

Fertige Düngewasser sind hauptsächlich: Harn jeder Art, Mistjauche aus Ställen und Miststätten, Ammoniakwasser aus Gasbereitungsanstalten und Blut aus Schlachthäusern, wozu man noch das Fleischwasser aus der Küche zählen kann.

Reiner Harn geht meistens verloren, wäre nur aus öffentlichen Anstalten zu bekommen. Wir wollen daher von seiner Benutzung absehen, obschon derselbe oft recht gut verwendet werden könnte.

Thierharn kommt nur als Mistjauche vor und ist schon mit Auslaugungen von Mist vermischt. Die von Ställen gesammelte

Jauche ist zu scharf, um sofort an die Pflanzen gebracht werden zu können, muss daher zu diesem Zwecke einige Zeit stehen und kann nur sehr mit Wasser verdünnt angewendet werden. Am nützlichsten wird sie, wenn sie auf leeres Kulturland oder auf Composthaufen geschüttet wird, namentlich auf die zu Grasplätzen bestimmten Flächen. Bei Regenwetter kann solche Jauche unbedenklich zur Düngung des Rasens gebraucht werden. Besser, weil ohne Nachtheil zu verwenden, ist die Mistjauche, welche sich in den Düngergruben ansammelt. Sie besteht zwar zum Theil ebenfalls aus Harn, hat aber gegoren und ist in der Hauptmasse durch Regenwasser aufgelöster Mist. In der Regel muss dieses Düngerwasser zum Begiessen der Pflanzen mit Wasser sehr verdünnt werden, aber bei anhaltendem Regen ist es verdünnt genug, und schadet auf dem ebenfalls vom Regenwasser durchdrungenen Boden nicht. — Blut ist nur unmittelbar nach dem Schlachten flüssig, gerinnt bald und eignet sich nur zur Verbesserung von Composthaufen. — Fleischwasser, das ist dasjenige Wasser, in welchem Fleisch vor dem Kochen oder Braten gewaschen wurde, hat einen sehr schwachen Düngergehalt, aber fortwährend angewendet, z. B. zum täglichen Begiessen der Topfpflanzen und nahe liegender Blumenbeete, ist die Wirkung auffallend günstig. — Ammoniakwasser aus Gasbereitungsanstalten ist ebenfalls ein sehr schwacher Düngstoff, wirkt aber höchst günstig. Zum weiteren Transport eignet es sich seines geringen Ammoniakgehaltes wegen nicht.

Künstliches Düngerwasser bereitet man durch Auflösen verschiedener Düngstoffe, indem man sie in beliebigen Wasserbehältern reichlich mit Wasser vermischt und zur Wachstumszeit der Pflanzen zum Begiessen verwendet, mit anderen Worten, indem man ihnen einen Düngerguss giebt. Die dazu benutzten Stoffe sind sehr verschieden, je nachdem man sie haben und brauchen kann. Da alle Mistlösungen übel riechen, so benutze man für die Zimmerpflanzen Salze, am besten Chilisalpeter oder (weil man diesen in geringer Menge selten kaufen kann) einen der erwähnten Blumendünger.

Ein zu allen Zwecken ausser für Zimmerpflanzen brauchbares Düngerwasser bildet man durch Taubenmist, Schafmist, Malzkeime und Hornspäne, oder auch nur aus einem oder zweien dieser Stoffe. Hat man Russ gesammelt, so kommt auch dieser mit zur Verwendung. Fehlt es auch an diesen Stoffen — wiewohl Hornspäne

leicht zu haben sind — so löst man Guano auf, etwa $1\frac{1}{2}$ —2 Kilo auf 100 Liter Wasser, und verdünnt beim Giessen noch so, dass die Flüssigkeit in der Hand durchsichtig erscheint. Bei grossem Bedarf wirft man in einen wasserdichten Behälter oder grossen Bottich Rinder- und Pferdemist, einschliesslich Fäkalstoffe, überhaupt jede Art Mist die man haben kann, rührt die Masse oft um und setzt bei anhaltendem Gebrauch häufig frischen Mist zu. Um schmutzfreies Wasser zu bekommen, bringt man einen sog. Rechen oder Gitter an, oder man schöpft aus einem eingesenkten weiten Korbe, oder wendet eine Pumpe an. — Dass jede Düngung nur dann nützlich wirkt, wenn die Pflanzen im Wachsthum begriffen sind, gilt auch vom flüssigen Dünger, welcher bei Blumen nur bis zum Erscheinen der Blüthen angewendet werden darf, nie bei bereits Samen bildenden Pflanzen und bei Beginn der Ruhezeit. Man benutze das Düngerwasser stets in schwacher Lösung, aber oft.

Jeder concentrirte (d. h. sehr düngerreiche) Guss wirkt schädlich, während schwacher von den Pflanzen ohne Vorbereitung aufgenommen wird.

Die Anwendung des Düngers.

5. Die Anwendung des Düngers ist so verschieden wie das Material selbst. Mist wird entweder im Herbst bei dem Graben (sog. Felgen) oder im Frühjahr unmittelbar vor der Bestellung (dem Säen und Pflanzen) untergegraben, oder auch nur oben ausgebreitet und bei der Bestellung entweder wieder entfernt oder untergehackt. Man nennt dies Oberdüngung, welche sich für manche Culturen, z. B. Saatzwiebeln, bewährt.

Hierbei ist aber die Düngung, welche eigentlich eine flüssige ist, durch Auslaugung vermittelst Regen nicht der alleinige Zweck, sondern auch die Veränderung des Bodens unter dem Miste, die sogenannte Gare. Breitete man nämlich im Herbst auf kloses Land, nachdem es umgegraben, Mist nur zwei Finger hoch aus, so ist im Frühjahr die Erde darunter mürbe und locker und zur Aufnahme von Samen oder zum Bepflanzen bereit, während untergegrabener Mist erst spät wirkt und die kleinen Pflänzchen in dem ungaren Boden nicht wachsen könnten. Uebrigens wirkt eine Decke von Stroh ganz ähnlich, nur nicht düngend. Auf Rasen kommt selbstverständlich nur Oberdüngung in Anwendung.—

Alter, sog. speckiger Mist, in welchem die Streu kaum mehr zu erkennen ist, ist frischem oder halbverwestem fast immer vorzuziehen. Ganz verwesten Mist wendet man nur während der Wachsthumzeit als Beidünger an, wenn gewisse Pflanzen (Gemüse und Blumen) frischen Mist nicht vertragen, gleichwohl aber Dünger lieben. Dass bei manchen Culturen, z. B. Spargel, die Düngung anders als durch Untergraben beigebracht wird, soll hier nur angedeutet werden.

Die § 4 genannten Düngstoffe wendet man mit Rücksicht auf ihre weichere oder harte Beschaffenheit an, wonach sich meistens die schnelle oder langsame Wirkung richtet. Leicht zersetzbare Düngstoffe, wie Taubenmist, Guano, Chilisalpeter, Hornmehl und aufgeschlossenes Knochenmehl verwendet man entweder unmittelbar vor dem Bestellen des Landes oder während der Saat, oder auch nach dem Bestellen vermittelt Aufstreuens. Für Topfpflanzen werden sie unter die Erde gemischt, zuweilen nur unten, oder auch blos oben auf, dann aber stärker als bei Mischung mit der ganzen Erde. Grobe, harte Düngstoffe, z. B. gewöhnliche Hornspäne, rohes Knochenmehl etc., werden wie Mist vor dem Winter untergegraben, oder man vermischt sie mit Erde und verwendet sie bei dem letzten Graben sowie für Topfculturen.

Da die flüssige Düngung sofort wirkt, so ist die Zeit ihrer Anwendung im Allgemeinen die Zeit des Wachsthums. Man hat es förmlich in der Hand, jeder Pflanze das richtige Maass von Nahrung zu geben. Es kommt aber vor, wie wir schon bei der Verwendung der Stall- und Mistjauche erfahren haben, dass dieser flüssige Düngstoff ausser der Wachstumszeit unnöthig ist, und in diesem Falle wird er auf Composthaufen und düngerbedürftiges Land gegossen.

Für die Düngung lassen sich schwer feste Regeln aufstellen. Wir haben schon § 3 gesehen, wo eine stärkere oder schwächere Düngung zweckmässig ist. Wer über viel Mist verfügt, giebt dem düngerbedürftigen Lande viel, und erzielt, wenn sonst nichts verfehlt wird, gute Erfolge. Wer weniger zu verbrauchen hat, der muss eben auch auskommen. Als allgemeine Regel gilt, dass magerer und neuer Boden mehr Dünger braucht als von Natur nahrungsreicher, lange cultivirter. Aller Dünger muss gleichmässig vertheilt werden; daher ist das an vielen Orten übliche Verfahren, beim Graben den Mist massenhaft in die Gräben

zu werfen, ganz falsch, weil dann immer gedüngte und ungedüngte Stellen entstehen, überdies das Land sich ungleich setzt. — Hierher gehört auch die Düngung der Grasplätze im Park und Parkgarten. Wenn die Anlage durch Saat mit gutem reinen Samen auch gelungen ist, so wird doch nach einigen Jahren zur Erhaltung eine Düngung nöthig, welche, je nach der Güte und Beschaffenheit des Bodens, alle zwei bis drei Jahre wiederholt werden muss. Das Düngen ist besonders nothwendig, wenn der Rasen nicht bewässert werden kann, weil er dadurch dichter wird und weniger von der Trockenheit leidet. Zum Düngen des Rasens können alle in diesem Kapitel erwähnten Düngstoffe dienen, sofern sie schnell wirken und sich gut vertheilen lassen. Es geschieht theils im Winter, theils im Frühling. Mist- und Composterde, welche am häufigsten benutzt werden, sollten nicht später als im Januar auf den Rasen gebreitet werden; schneller wirkende Düngarten, wie Guano und Chilisalpeter, werden erst bei Beginn der Vegetation, und zwar womöglich vor oder bei Regen gestreut. Stalljauche und Urin sollte man nicht unmittelbar auf Rasen giessen, weil es nie gleichmässig geschieht, und an Stellen, wohin zu viel gekommen, das Gras sehr hoch und unten gelb wird, während daneben Stellen kümmerlichen Graswuchs zeigen. Wenn man daher nicht Composthaufen verwendet, welche man mit der Mistjauche schon länger vorher versetzt hatte, so lege man im Herbst Erdhaufen an verschiedenen gut gelegenen Plätzen an, z. B. auf den im Herbst leer werdenden Blumenbeeten und schütte die Jauche darauf. Mit dieser Erde vertheilt sich der Düngstoff ganz gleichmässig. Auch die genannten Pulverdünger und Taubenmist werden am besten mit feiner Erde vermischt ausgestreut.

VI. Die Bodenbearbeitung.

6. Auch für diejenigen Leser unseres Buches, welche ihren Boden nicht selbst bearbeiten, ist es wichtig, die dazu nöthigen Verrichtungen zu kennen, welche oft von Gartenarbeitern ohne die nöthige Sorgfalt gehandhabt werden. Mit Recht wird behauptet, eine gute Bodenbearbeitung sei gleichsam halbe Düngung. Besonders wird das Graben oft schlecht ausgeführt. Man gräbt nicht tief genug, vielfach zu grob und sieht nur darauf, dass die Oberfläche mit dem Rechen (Harke) glatt geebnet ist. Dies ist geradezu ein

Betrug. Auch viele tiefgrabende und den Boden zerkleinernde Arbeiter machen es dadurch schlecht, dass sie die Erde zu hoch aufwerfen, so dass der den Rechen führende Arbeiter die zu hoch liegende obere Erde wieder in den Graben ziehen muss und dieser dann jedesmal gefüllt wird. Dadurch geht nicht nur Zeit und Arbeitslohn verloren, sondern es kommt dabei die feinzerbröckelte Erde, welche oben aufliegt, in die Tiefe statt an die Oberfläche, und bei dem Pflanzen und den Säearbeiten stösst man stets auf Erdklumpen, wohl auch auf Mist.

Die Franzosen, welche gute practische Gärtner sind, dulden wegen dieses Unfugs meistens das Glätten mit dem Rechen überhaupt nicht, sondern richten das Land mit dem Spaten her und glätten nur zu feinen Saaten leicht die Oberfläche. Es giebt auch Fälle, wo ein tiefes Graben nicht nöthig, oder schädlich ist, selbstverständlich auf Boden mit schlechtem Untergrund, wo der Culturboden nur allmählig vertieft und verbessert werden darf; ferner, wenn auf Boden, welcher im Herbst tief gegraben wurde, nur eine oberflächliche Lockerung nöthig ist, z. B. bei Zwiebelbau mit Oberdüngung, sowie auch für kleine Saatzpflanzen, welche nicht tief wurzeln z. B. Rabinschensalat, Portulak und manche Blumen.

Vor Winter und noch während desselben wird das Graben oder Felgen auf allen zur Zeit leeren Ländern und Beeten vorgenommen. Hierbei werden die Stücke ganz gelassen und recht grosse Schollen gemacht, damit sie hohl liegen und der Frost tief eindringen kann. Wenn man aber recht früh pflanzen oder säen will, ist so behandeltes Land in manchen Lagen nasser und schwerer zu bearbeiten als ungegrabenes. Die Spatenarbeit wird bei der Cultur im Grossen oft durch das Pflügen ersetzt.

Die zweitwichtigste und gebräuchlichste Bodenlockerung ist das Behacken. Wir verstehen darunter aber nur das Behacken der Gemüse- und Blumenstücke während der Culturzeit, nicht das hier und da gebräuchliche Hacken vor dem Bestellen, als Ersatz für das Graben. Mit diesem sind wir nur einverstanden, wenn schon früher gegrabene Beete unbenutzt liegen blieben, sodass eine harte Kruste, vielleicht auch Unkraut vorhanden ist. Aber auch in diesem Falle ist ein oberflächliches Graben dienlicher. Ein Behacken während der Culturzeit ist um so nothwendiger, je schwerer der Boden ist, je leichter er nach Regen oder Begiessen eine Kruste bildet, wird aber auch in lockerem Boden mehrmals vorgenommen,

zuerst bald nach dem Aufgehen der Samen und einige Wochen nach dem Pflanzen. Es bezweckt ein oberflächliches Lockern des Bodens und bewirkt Zutritt der Luft an die Wurzeln, auch wird dabei zugleich das Unkraut vertilgt. Gegen das Ende der Wachstumszeit wird das Behacken eingestellt, besonders wenn die Pflanzen so gross geworden sind, dass man es ohne Beschädigung nicht mehr ausführen kann, und weil die Gefahr der Verunkrautung vorüber ist. Man behackt in der Regel nur Pflanzbeete und Reihensaaten, am besten mit der Zackenhacke, mit welcher auch nicht zu dichte Breitsaaten gelockert werden können. Zum Hacken benutzt man schmalere oder breitere Hacken mit langem, leichten Stiel, aber mit viel grösserem Vortheile die Zinkenhacke (in Süddeutschland Krail genannt) von etwa 10 cm Breite mit drei 10 bis 12 cm langen Zinken. Mit dieser Hacke leistet man noch einmal so viel, schneidet keine Wurzeln ab und kann unter jede Pflanze, selbst solche mit ausgebreiteten Wurzelblättern kommen. Hat man nach Regen nicht Zeit genug, um alle der Lockerung bedürftigen Beete gründlich zu behacken, so reisst man mit der schräg gehaltenen Zinkenhacke nur die harte Kruste auf, was so schnell geht wie man gehen kann, und holt das Behacken später gründlicher nach.

Eine besondere Art des Behackens ist das Behäufeln; dieses geschieht bei verschiedenen Gemüsen, Kartoffeln und allen Hülsenfrüchten, wenn sie eine gewisse Grösse erreicht haben und nicht mehr behackt werden, dadurch dass man die umgebende Erde mit der gewöhnlichen Gartenhacke anhäufelt.

VII. Das Unkraut und seine Vertilgung.

7. Wir wollen nur hervorheben, dass die Vertilgung des Unkrautes nicht allein nothwendig ist, sondern auch, dass sie rechtzeitig geschieht, ehe die Pflanzen leiden. Besonders werden die Saaten jeder Art vom Unkraut bedrückt, und es kann der Erfolg gewisser Culturen geradezu auf das Spiel gesetzt werden, wenn man das Unkraut nicht früh genug entfernt. Dies erstreckt sich sogar auf den Rasen, und manche gut gekeimte Rasensaat misslingt nur wegen Benachtheiligung durch Unkraut.

Hierzu kommt noch der Schaden, welchen das Unkraut durch Nahrungsentziehung verursacht. Die Mühseligkeit des Jätens mit

der Hand, welche besonders bei Breitsaaten sich geltend macht, sollte uns immer mehr veranlassen, die Reihensaat (s. §. 20) bei allen Aussaaten, wo sie möglich ist, anzuwenden, denn da dieselbe behackt werden kann, so ist das Jäten verhältnissmässig leicht.

VIII. Ueber Wasser und Bewässerung.

8. Es würde über die Grenzen des Buches führen, die Beschaffenheit verschiedener Wasser-Arten ausführlich zu erörtern, daher wollen wir hier nur andeuten, wie die Nachtheile von schlechtem Wasser zu vermeiden sind.

Fliessendes Wasser, sowie stehendes aus Teichen und Seen ist fast immer gut, und da städtische Wasserleitungen ihren Bedarf meist aus solchen Gewässern entnehmen, so ist auch dieses Wasser unbedenklich zu gebrauchen. Ausnahmen bilden kalte Teiche und die aus solchen abfliessenden Bäche oder sehr kalte Quellen. Schädlich ist das Wasser, wenn es zu kalt ist oder Stoffe, welche die Pflanzen nicht verarbeiten können, in zu grosser Menge enthält, z. B. kohlensauen Kalk oder Gyps (schwefelsauren Kalk). Zu kaltes Wasser aus Pump- oder Laufbrunnen muss daher in Bassins oder anderen Behältern stehen, bis es auf die Lufttemperatur erwärmt ist. Die Erwärmung findet noch schneller statt, wenn solches Wasser über Stroh, Baumzweige etc. fliessen oder als Springbrunnen fein zertheilt mit der Luft in Berührung kommen kann. Während ganz kaltes Wasser schädlich wirkt, ist über die Lufttemperatur erwärmtes immer von wohlthuendem Einfluss, besonders für Pflanzen aus warmen Ländern. Sogenanntes hartes, d. h. kalkiges und gypsiges Wasser verbessert sich für den gewöhnlichen Gebrauch durch längeres Stehen in beliebigen Wasserbehältern; sollten aber gewisse Culturen von Topfpflanzen erwiesenermassen in solchem Wasser schlecht gedeihen, so kann man es bei geringerem Bedarf vorher abkochen, während bei grösserem Verbrauch durch die den Kesselstein in Dampfkesseln beseitigenden Mittel eine Besserung erzielt wird.

Vom richtigen Giessen hängt der Erfolg vieler Culturen ab. Ein gewöhnlicher Fehler ist, dass in Culturen, bei denen eine durchdringende Bewässerung nöthig wäre, zu wenig begossen wird. Man glaubt es recht gut zu machen, wenn man jeden Tag begiesst, aber das Wasser kommt in vielen Fällen nicht dahin,

wo es nöthig wäre. Man begiesse Saaten, welche noch nicht gekeimt haben oder eben aufgegangen sind, oft aber mässig, dagegen grössere Pflanzen seltener aber durchdringend. Aussaaten brauchen nur so viel Wasser, dass die Erde feucht bleibt; wo es möglich ist, die Oberfläche der Erde durch Bedecken oder Beschatten vor dem Austrocknen zu schützen, ist ein erneuertes Begiessen mit der Brause nicht öfter nöthig, als bis die Erde theilweise abgetrocknet ist, ohne ganz trocken geworden zu sein. Bei schon vorgekeimten Samen darf ein eigentliches Austrocknen nie vorkommen. Nachdem die Samen gekeimt haben und mit ihren Samenblättern über der Erde erscheinen, muss das Begiessen schon verstärkt werden, damit das Wasser bis an die kleinen Wurzeln gelangt. Mit zunehmendem Wachsthum wird stärker begossen, es braucht aber nicht mehr so häufig zu geschehen, denn die jungen Wurzeln finden in der Tiefe stets etwas Feuchtigkeit. So wird das Begiessen allmählig stärker aber seltener, bis es ganz aufhört, oder nur noch bei allgemeiner Trockenheit vorgenommen wird. Da in Mistbeeten und bei Topfsaaten wohl ein Beschatten, nicht aber ein Bedecken möglich ist, so trocknet die Erde, je nachdem die Luft wärmer oder kälter, feuchter oder trockner ist, mehr oder weniger aus.

Aehnlich ist es mit schon bewurzelten frisch gepflanzten jungen Pflanzen. Sie können noch keine Feuchtigkeit aus der Tiefe holen, müssen nur durch Begiessen erhalten, daher eben so oft wie Saaten begossen werden. Dies ist aber nur eine kurze Zeit lang nöthig, denn es bilden sich bald neue Wurzeln, welche die Feuchtigkeit tiefer suchen. In dieser Wachstumszeit wird seltener aber stärker begossen, wenn es überhaupt noch nöthig ist. So kommt bei Saaten, wenn sie auf demselben Platze bleiben, und bei Pflänzlingen nach und nach die Zeit, wo sie bei trockner Witterung im freien Lande noch durchdringender begossen werden müssen. Um diese Zeit wird oft dadurch gefehlt, dass man Saaten zwar oft, aber nicht stärker als früher begiesst, daher dringt das Wasser nie so tief ein, wie es nöthig ist, nämlich nicht bis an die Wurzeln. Giebt man einem Beete einmal wöchentlich 10 Kannen Wasser, so nützt das bei den meisten Culturen mehr, als wenn täglich 3—4 Kannen, also in 6 Tagen 18—24 Kannen daraufgegossen werden. Oberflächliches Giessen erfrischt meist nur einige Stunden lang die Pflanzen.

Man giesse im Freien vorzugsweise abends, weil dann die Verdunstung langsamer vor sich geht als morgens, wo die Sonne die Oberfläche des Bodens schnell austrocknet. Um die Mittagszeit von 10—4 Uhr sollte man das Giessen, wenn irgend möglich, vermeiden. Bei anhaltender Trockenheit ist es in grösseren Gärten und bei grossen Culturen leider nicht möglich, nur abends zu giessen, und man ist oft genöthigt, dies früh noch Stunden lang nachzuholen. Bei grossem Gartenbetrieb sind besondere Bewässerungsvorrichtungen zu empfehlen. Kann die Bewässerung nicht durch förmliches Berieseln oder Bespritzen aus einer Wasserleitung geschehen oder wie in dem von Wassergräben durchschnittenen „Dreienbrunnen“ bei Erfurt durch Wasserwerfen vermittelt Schaufeln (Giessschüsseln), so lässt es sich doch meist einrichten, das Wasser in Behälter zu leiten, welche den Beeten nahe liegen, sodass ein weites Tragen in Kannen, welches die Culturen erheblich vertheuert, vermieden wird.

Von grossem Einfluss auf die Bewässerung ist die Bodenbeschaffenheit. Leichter, lockerer, besonders sandiger Boden trocknet schneller und tiefer aus, als schwerer bindiger Lehm Boden, welcher die Feuchtigkeit lange hält.

Bei den Pflanzen in Töpfen, Mistbeeten, Samenschalen und Pflanzenkästen ist für das Giessen noch manches Andere zu beachten. Bei Mistbeeten, wo die Pflanzen in der Erde stehen, kommt es darauf an, ob das Beet warm oder kälter ist, ob viel oder wenig gelüftet wird. Geschlossene Beete, die selten gelüftet werden, trocknen wenig aus, selbst wenn sie von unten warm sind, während stark gelüftete schneller austrocknen. Eine Ausnahme von dieser Regel werden wir bei der Cultur der Levkoyen kennen lernen. In Erde, Sand, Lohe und andere Stoffe eingegrabene Gefässe trocknen seltener aus, werden daher weniger gegossen als freistehende. Selbstverständlich macht auch hier stärkeres oder geringeres Lüften einen grossen Unterschied.

Die im Freien, in Glashäusern, Zimmern, Blumenfenstern etc. stehenden Pflanzen in Gefässen, begiesse man nicht eher, als bis sie trocken sind, ohne ein wirkliches Austrocknen abzuwarten, dann aber durchdringend.

Manche geben in der besten Absicht jeden Tag Wasser; hierbei gehen die Pflanzen oft zu Grunde, entweder weil sie nicht genug bekommen, oder weil sie das Wasser erhalten, wenn sie noch

nass sind. Wer nur wenige Pflanzen im Zimmer cultivirt, thut am besten, sie in Untersetzer zu stellen und diese mit Wasser zu füllen; dann saugt die Erde davon so viel auf, wie sie kann, selten mehr als die Pflanze braucht. Man darf aber nicht versäumen, namentlich im Winter in nicht warmen Räumen, das nach einigen Stunden nicht aufgesogene Wasser abzugliessen.

Die Frage, wann und wie oft man Topfpflanzen giessen solle, wird an alle Gärtner unzählige Male gestellt, und es ist schwer, dieselbe befriedigend zu beantworten, denn von den erwähnten Regeln giebt es viele Abweichungen je nach dem Wasserbedürfniss und den Wachstumsverhältnissen der Pflanzen, der Erde, der Grösse der Gefässe, der Jahreszeit und dem Standorte. Pflanzen, welche in ihrer Heimath nur an feuchten Standorten vorkommen, verlangen viel, manche Pflanzen von Felsen und Steppen ein sehr geringes Maass von Wasser. Junge, noch nicht in Töpfen eingewurzelte Pflanzen brauchen so lange nur wenig Wasser, bis sie stark zu wachsen anfangen. Frisch umgetopfte und aus dem Lande eingepflanzte brauchen wenig Wasser, weil die Wurzeln von neuer feuchter Erde umgeben sind, dürfen sogar nur sparsam begossen werden, weil die abgeschnittenen Wurzeln sonst anfaulen könnten. Dagegen brauchen stark verwurzelte Pflanzen zum Theil eine so grosse Menge von Wasser, dass sie in heissen Tagen, frei in der Sonne stehend, zweimal begossen werden müssen, wenn sie trauern. Selbstverständlich trocknen kleine Gefässe schneller aus als grössere. Glasirte Töpfe, welche man überhaupt nicht verwenden sollte, trocknen langsamer aus als gewöhnliche poröse, dünnwandige schneller als stärkere, schmutzige, mit Erde oder grüner Algenmasse überzogene weniger als neue oder gewaschene. Lehmige, schwere Erde hält die Feuchtigkeit länger als lockere, und am schnellsten trocknen die in Haide- oder Moorerde stehenden Pflanzen aus. Pflanzen, welche in starkem Wachsthum begriffen sind, brauchen viel, solche, deren obere Theile oder Blätter zu Zeiten regelmässig absterben, nur eine geringe Menge Wasser, welche nach und nach beschränkt, endlich ganz entzogen wird, wie bei vielen Knollengewächsen.

Da der Wachstums-Stillstand meistens in die Wintermonate fällt, so wird demgemäss weniger gegossen. Dies wird schon durch die verminderte Wärme und Trockenheit der Luft bedingt.

Eine besondere Art von Giessen ist das sogenannte Angiessen frisch versetzter Pflanzen, um den durch das Verpflanzen herbeigeführten Nachtheil der Wurzelverletzung und Entziehung der Bodenfeuchtigkeit einigermaßen auszugleichen, ferner bei Aussaaten, um durch Befeuchten der Erde das Keimen anzuregen. Bei letzteren sollte zwar die Erde zu diesem Zwecke feucht genug sein, doch trocknet auch dann die Oberfläche meist sehr rasch, und es ist daher das Angiessen fast immer nöthig. Im Allgemeinen muss das sehr vorsichtig geschehen. Bei feinen, nicht oder schwach zu bedeckenden Samen, und bei denen während der Keimung Fäulniss zu befürchten ist, empfiehlt es sich sogar, nur vor dem Säen anzugiessen, nach dem Säen aber bloß leicht zu überspritzen. Auch dieses Ueberspritzen fällt weg, wenn das Saatgefäß mit einer Glastafel überdeckt wird. Das Angiessen oder Bespritzen der Landsaaten weicht nicht von dem gewöhnlichen Giessen mit der Brause ab, aber es ist streng darauf zu achten, dass das Wasser nicht schlemmt und dabei Erde und Samen mit sich führt, wie es an abhängigen Beeten leicht vorkommt. Bei der Saat in Gefäßen muss man sich einer Kanne mit sehr feiner Brause bedienen und vorsichtig giessen, damit das Wasser gleichmäßig vertheilt wird und an keine Stelle zu stark kommt. Bei sehr feinen Samen kann das starke Durchwässern einer Stelle, besonders während des Keimens, den Verlust sämtlicher dahin gefallener Samen oder Pflänzchen nach sich ziehen. Man beobachte nur eine Tropfstelle bei Aussaaten, unter liegenden Fenstern, wie auf derselben und im Umkreise in Folge von Fäulniss Lücken in der Saat vorkommen. Wer Aussaaten von sehr feinen Samen, wie *Calceolaria*, *Gloxinia*, *Begonia*, *Rhododendron*, *Mimulus* etc. nicht mit Glas bedeckt, unter welchem sie nicht austrocknen, lege Löschpapier auf und befeuchte dieses. (Siehe auch §. 25). Bei Glasbedeckung muss man übrigens vorsichtig sein, wenn die Tafeln abgenommen oder gewendet werden. Hält man sie schräg über das Samengefäß, so stürzen die vereinigten Tropfen des Dunstwassers als eine kleine Fluth auf die Saatfläche und richten Unheil an. — Nach dem Keimen der Pflänzchen ist doppelte Vorsicht geboten, denn auf Tropfstellen und zu stark bewässerten Stellen gehen kleine Sämlinge in wenigen Stunden zu Grunde, um so mehr, je dichter sie aufgehen. In diesem Falle kann sie oft nur schleuniges Pikiren (Verstopfen) in trockene sandige Erde retten.

Das Angiessen frisch versetzter Pflanzen wirkt wie das Einstellen abgeschnittener Pflanzentheile in Wasser: die Wurzeln saugen das gegebene Wasser auf und ersetzen dadurch das Verdunstungswasser, bleiben daher frisch oder erfrischen sich, wenn sie welk geworden sind. Die Wirkung des Angiessens wird verstärkt, wenn man die Pflänzlinge oft überspritzt oder unter geschlossenen Fenstern hält, endlich, wenn man sie beschattet, weil dadurch die Verdunstung durch die Blätter vermindert wird. Wenn man im freien Lande jede Pflanze einzeln angiesst, so muss es von der Seite geschehen, wo das Pflanzloch ist, weil bei dem Giessen von der andern Seite oft die Pflänzchen umfallen. Ist man gezwungen, in einer regenlosen Periode bei sehr heissem Wetter in das freie Land zu pflanzen, so wird das Gelingen dadurch sehr erleichtert, dass man die Pflanzreihen vorher (z. B. am Abend, wenn man am nächsten Morgen pflanzen will), tüchtig (für starke Pflanzen mit dem Rohr) durchgiesst.

Bei Samenpflanzen wird selten eine Bewässerung des Untergrundes nöthig, es ist jedoch zu beachten, dass sehr tiefwurzelnde Pflanzen sich nur dann vollkommen entwickeln, wenn das Wasser sehr in die Tiefe dringt, was bei dem gewöhnlichen (selbst starken) Bewässern nicht der Fall ist. Braucht es nur einmal zu geschehen, dann macht man um die Pflanze herum mit einem Pfahleisen oder spitzen Pfahl, bei hartem Boden mit dem Erdbohrer tiefe Löcher und giesst diese einigemal voll Wasser, gelegentlich auch Düngerwasser. Soll aber eine solche Tiefwässerung oft geschehen, so stellt man Drainröhren aufrecht in die Löcher und giesst in diese, verstopft aber darauf die Oeffnungen mit Moos. Selbstverständlich giebt man sich diese Mühe nur mit einzelnen grossen Zierpflanzen.

Das Spritzen.

9. Wenn auch ein Bespritzen der Pflanzen ähnlich wie das Begiessen wirkt, so ist dies doch nicht der Zweck. Das Spritzen soll die Pflanzen selbst und die Luft anfeuchten, um die Verdunstung aus den grünen Pflanzentheilen zu vermindern, wahrscheinlich auch, um ein Aufsaugen durch die Oberhaut möglich zu machen. Dass dabei gelegentlich auch die Erde angefeuchtet wird, ist Nebensache. Das Bespritzen erweist sich fast zu allen Zeiten, am meisten bei trockner Luft sehr wohlthuend und ist für

viele Culturen dem Gärtner ganz unentbehrlich. Im Mistbeete und Vermehrungshause mit Fensterbedeckung können Pflanzen durch Bespritzen lange Zeit ohne Begiessen frisch erhalten werden, wenn man sie täglich ein- oder mehreremale überspritzt. Gewisse Pflanzen bilden, so behandelt, schneller neue Wurzeln, als wenn sie stark begossen werden. Zum Bespritzen dient theils die Brause der Giesskanne, theils eine gute Handblumenspritze. *)

Auch bei Saaten ist ein öfteres Ueberspritzen bei trockenem Wetter vom grössten Nutzen, zuweilen sogar unerlässlich für ein gutes Gedeihen. Endlich hilft das Bespritzen zum Vertreiben von Ungeziefer, Blattläusen, Erdflöhen etc.

IX. Gefässe und Geräthe zur Aussaat und Anzucht junger Pflanzen.

10. Wer nicht so viele Aussaaten macht, um ein Mistbeet nöthig zu haben, benutzt hierzu Samenschalen von gebranntem Thon, tragbare Holzkästchen und gewöhnliche Blumentöpfe; alle eigentlichen Topfpflanzen, von denen man nur wenige Pflanzen braucht, werden in Töpfe und kleine Samenschalen gesät.

Die Samenschalen oder Samentöpfe sind verschieden gross, und im Verhältniss niedrig, etwa $\frac{1}{4}$ des Durchmessers hoch, bei weiten Schalen weniger, nicht über 8—10 cm. Zweckmässig sind viereckige Schalen, weil sie, nebeneinander gestellt, am wenigsten Platz einnehmen. Die grösseren müssen am Boden 3—5 Abzugslöcher haben. Blumentöpfe haben das richtige Verhältniss, wenn sie oben so weit wie innen hoch sind. Töpfe und Schalen müssen scharf und hart gebrannt und haltbar sein; grössere fasse man von zwei Seiten an, um ein Zerbrechen zu vermeiden.

Für manche Culturen würden höhere oder niedrigere Töpfe als die gewöhnlichen zweckmässig sein, man kann aber dem Blumenfreund nicht zumuthen, eine solche Auswahl zu haben. Als Ersatz grosser Samenschalen von gebranntem Thon dienen flache Holzkästchen, welche mehr Pflanzen fassen und besonders zum Pikiren (Verstopfen) der Sämlinge zweckmässig sind. Wer sich ohne Mistbeet behelfen und doch eine ausgedehnte Blumenzucht

*) Anmerkung. Die grösseren Handelsgärtnereien führen gute, meistens englische Handspritzen.

betreiben will, braucht viele solche Kästen. Der Boden derselben sollte auch mit Löchern versehen oder sonst nach zwei Seiten abhängig und nicht zu dicht angenagelt sein, damit das überflüssige Giesswasser abziehen kann. Zur Noth können auch flache Cigarrenkästchen zur Aussaat und Anzucht von Blumen dienen.

Unentbehrliche Werkzeuge für Blumenzucht sind die kleine und grosse Giesskanne mit der Spritzbrause. Für den Gartenbesitzer und Blumenfreund wollen wir hier nur eine zweckmässige Einrichtung andeuten. Die Blumengiesskanne, welche auch zum Befeuchten der Samen in Mistbeetkästen dienen kann, sei nicht zu gross und schwer, namentlich nicht zu breit. Das Giessrohr braucht nur wenig länger zu sein, als die Kanne hoch ist. Die Oeffnung der Kanne sei nicht weiter als nöthig, um bequem mit der Hand hineinzukommen; die Oeffnung des Rohres, wenn dasselbe auch zum Aufsetzen eines Spritzkopfes (der Brause) dient, $1\frac{1}{2}$ —2 cm weit, wenn aber für diesen Zweck eine besondere Kanne dient, wenig über 1 cm. Ein Fehler an vielen Kannen besteht darin, dass die untere Weite des Ausgussrohres im Verhältniss zur oberen zu gering ist. Wenn das Wasser ohne Stockung fliessen soll, so muss das Verhältniss der oberen Weite zur unteren wie 1 zu 2 sein. Besonders wichtig ist die Einrichtung der Spritzköpfe, welche weder zu gewölbt noch zu grosslöcherig sein dürfen. Man bedarf zweierlei Brausen, eine mit eng begrenztem Spritzstrahlenkreis, um einzelne Samenschalen und Töpfe zu giessen und eine gröber und breiter spritzende für Mistbeet- resp. Freiland-Saaten. Wenn die durchlöchernte Platte zum Abschrauben ist, so genügt eine Brause mit zwei verschiedenen durchlöchernten Platten, welche aus Messing gefertigt sein sollten. Zur Gartengiesskanne gehören zwei Brausen, eine feinstrahlige für flache Breitsaaten, und eine grosslöcherige. Die sogenannten Cylinderbrausen haben sich nicht bewährt; sie spritzen allerdings gut, lassen aber das Wasser zu reichlich ausfliessen. An Giessbutten mit Schlauch sind sie dagegen zweckmässig. — Zum Erfrischen der gekeimten Samen im Zimmer benutzt man eine Zimmerblumenspritze oder auch den bekannten Raffraichisseur mit Luftdruck, wovon es verschiedene Constructionen giebt. —

Als ein sehr nützliches Werkzeug auch in kleinen Gärten, wo Reihensaat anwendbar ist, kann ferner der Handreihenzieher für 3—6 Reihen bezeichnet werden. Man kann ihn so einrichten,

dass die eine Seite 3—6, eine andere 4—8 Zähne zum Furchenziehen hat. Je weiter die Reihen werden sollen, desto breiter und tiefer müssen die furchenziehenden Zähne sein. *) Es giebt auch verstellbare Furchenzieher für Reihen von verschiedener Weite, bei denen zu beachten ist, dass sie, mit Erde beschmutzt, sich schwer stellen lassen. Für das gewöhnliche Bedürfniss genügt eine schmale, aber lange Gartenhacke zum Furchenziehen, mit welcher eine geschickte Hand Furchen von jeder Tiefe und Breite nach der Schnur zieht. Bei der Cultur im Grossen werden die bei dem Ackerbau gebräuchlichen Furchenzieher, häufiger noch Drillmaschinen, welche zugleich die Saat besorgen, verwendet.

Zur Erzielung ganz regelmässiger Saaten, so dass jede Pflanze gleich weit von der anderen zu stehen kommt und somit alle sich gleich ausbilden können, z. B. für Radieschen und Spargelsalat, sei das Dibbelholz und Dibbelbrett (siehe Dibbelsaat §. 22), auch Rettigstupfer genannt, besonders empfohlen. Es ist entweder ein Werkzeug wie ein Rechen (Harke) ohne Stiel, mit dicken, nur 2—3 cm langen, wenig spitzen Zinken, oder ein mit mehreren Reihen solcher Zinken versehenes Brett mit einem Stiel in der Mitte. Durch einen schwachen oder stärkeren Druck werden je nach Einrichtung des Dibbelholzes flachere oder tiefere Löcher in die frische Erde gedrückt, in welche man die Samen legt. — Zur Reihensaat, die wir nicht warm genug empfehlen können, benutzt man mit Vortheil ein Säehorn**) oder eine Glasflasche ohne Boden, durch deren Hals der Same durch Schütteln gleichmässiger fällt, als mit der Hand. Das Säehorn ist eine Art Blechtrichter mit becherartigem Trichterkelch und schräg angebrachtem Rohre, oben mit einem Griff oder Henkel, und gut schliessendem Deckel. Das Rohr muss durch Ansätze zu feinem oder grobem Samen zu verschiedenen Saaten brauchbar gemacht werden.

Zum Festdrücken der fertigen Saat, was für die meisten Aussaaten zu empfehlen ist, weil sie bei nicht genügender Boden-

*) Anmerkung. Abgebildet in Jäger's „Allgemeines illustriertes Gartenbueh“ Fig. 34 und 38 der vierten Auflage (Verlag bei Philipp Cohen in Hannover).

**) Anmerkung. Abgebildet in Jäger's „Allgemeines illustriertes Gartenbueh“ Fig. 37 der vierten Auflage.

feuchtigkeit sicherer und gleichmässiger keimen, dienen für Breit-saaten im Freien Treibretter (sog. Zwiebeltreter), welche an den Füßen befestigt werden, oder Holzpatschen (Rasenpatschen) mit langem Stiel an einem starken, und geraden Stück Holz, bei grösseren Flächen leichte Walzen; während bei Reihensaaten eine Vorrichtung ähnlich einem Rechen (Harke) ohne Zinken das Festdrücken gut und schnell besorgt. Zum Festdrücken der Erde der Saaten in Töpfen und Samenkästen bedient man sich eines runden oder viereckigen Brettchens mit in der Mitte senkrecht angebrachtem Stiel, für Töpfe aber auch eines passenden, unten geraden (nicht gewölbten) Topfbodens.

X. Saatkästen mit Fenstern, sowie Mistbeete und ihre Anlage.

11. Die Saatkästen mit Fenstern oder „kalten Mistbeete“ auch Sommerkästen genannt, unterscheiden sich von den eigentlichen Mistbeeten durch den Mangel künstlicher Bodenwärme. Sie werden aus Brettern gefertigt und bleiben entweder fest am Platze oder sie werden beliebig aufgestellt, sogar auf Beete im Anzuchtgarten, um gewisse Pflanzen zu schützen oder früher zu bekommen. Feststehende Kästen sind oft Erdbeete und dienen dann meist zum Pikiren (siehe §. 36) von Sommerblumen und Stauden, aber auch zur Anzucht solcher Blumen, welche bis zu einer gewissen Grösse nur unter Fenstern gedeihen. Andere Kästen von verschiedener Höhe dienen zum Aufstellen von Topfpflanzen und sind sehr nützlich, indem man im Frühling alle möglichen krautartigen Topfgewächse, besonders die für die Blumenbeete bestimmten, hineinstellt und hierdurch recht gedrungene, gesunde Pflanzen erzielt.

Wir erwähnen hier auch die gemauerten kalten Kästen, welche zum Ueberwintern grösserer harter Pflanzen, im Sommer zum Aufstellen von Warmhaus-Pflanzen dienen. Die Mauern gehen dann bis 1 Meter und noch tiefer in den Boden.

Auch die eigentlichen Mistbeetkästen sind entweder fest oder beweglich. Erstere, in die Erde versenkt, sind zu empfehlen, weil sie reinlicher sind, doch halten sie die vom Mist erzeugte Wärme kürzere Zeit als andere Kästen, weil sie, wenn man nicht

unbequem grosse Fenster haben will, zu wenig Raum für den einzupackenden Mist darbieten. Die beweglichen Kästen sind rahmenartig und so eingerichtet, dass sie sich auf das etwa 1 M. breitere und längere Mistlager, nachdem dieses gehörig zubereitet ist, aufsetzen lassen, sodass an den äusseren Seiten noch Mistumsätze angebracht werden können. Das Mistlager wird der Reinlichkeit wegen mit einer Einfassung begrenzt, welche als Verschalung so tief in den Boden reicht, wie die Grube tief ist. Diese Tiefe braucht meistens nicht über $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ m zu betragen. Für die Einrichtung der eigentlichen Mistbeetkästen wollen wir keine Vorschriften geben, da überall Kästen als Muster dienen können; wir empfehlen jedoch, sie von mittelstarken, trockenen, kiefernen Bohlen anfertigen und, soweit sie in die Erde kommen, mit Theer streichen zu lassen, auch diesen Anstrich zeitweise zu erneuern, natürlich einige Zeit vor dem Gebrauch. Wasser darf sich an keiner Stelle des Holzes ansammeln, sondern muss überall rasch abfliessen können.

Man fertige die einzelnen Kästen nicht grösser als zu 3—4 Fenstern und die Fenster nicht über 1,50 m lang und verhältnissmässig breit, weil sie sonst unbequem werden. Ob man hölzerne oder eiserne Fenster wählen soll, oder Fenster mit Holzrahmen und Eisensprossen, wollen wir Jedem selbst überlassen und bemerken nur, dass Eisen sich in der Sonne oft zu stark erhitzt und durch Ausstrahlung die Culturen beeinträchtigt, andererseits auch durch grössere Dauerhaftigkeit Vorthelle gewährt. Wir rathen jedoch, starkes Glas und keine zu grossen Scheiben zu nehmen, was von der Weite der Sprossen abhängt; auch wollen wir nicht verhehlen, dass wir bei feinen Saaten üble Erfahrung mit eisernen Fenstern gemacht haben, weil der Tropfenfall darunter zu stark ist. Bei rein hölzernen Fenstern ist der untere Querschenkel besonders dauerhaft (z. B. aus Eichenholz) herzustellen, da er der Fäulniss am meisten ausgesetzt ist. Ein wiederholter Oelfarbe-Anstrich erhöht die Dauerhaftigkeit der Mistbeetfenster ungemein.

Zur Erzeugung der Wärme dient frischer Pferdemist, oder die Kästen werden heizbar eingerichtet und sind dann gemauert. Letztere finden sich vielfach in grossen Gärtnereien und wir empfehlen sie besonders in den Fällen, wo grosse Heizanlagen mit Dampf oder Heisswasser schon vorhanden sind, denen

man sie ohne grosse Kosten leicht anschliessen kann. Ausser dem Pferdemist werden noch andere Fermentationsstoffe verwendet, wenn sich Gelegenheit dazu bietet, unter welchen wir trocknes Laub und die geölten Baumwollenabfälle aus Spinnereien erwähnen, welche aber nur an wenigen Orten vorkommen. Laub ist ein sehr gutes Material zum Untermischen mit Pferdemist, es wird dadurch eine gelindere, länger anhaltende Wärme erzeugt; man kann auch zur Anzucht von späteren Gemüsepflanzen und Sommergewächsen die Mistbeete ausschliesslich aus Laub herstellen. Auch die Beete im Ziergarten, welche Bodenwärme bekommen sollen, können aus Laub bereitet werden.

Bei der Zubereitung der Mistbeete ist Einiges zu beachten. Der Mist muss womöglich frisch aus dem Stalle sein, darf wenigstens nicht gebrannt haben, wenn auch eine vorherige Erhitzung oft nicht zu vermeiden ist. Er darf eher etwas zu trocken als zu nass sein, weil er so vorher nicht heiss werden kann. Ist der Mist sehr trocken, so wird er bei dem Setzen angefeuchtet oder mit nassem Laub vermischt. Sollte er sehr nass und wenig strohig sein, was in regnerischer Zeit und bei theuren Strohpreisen vorkommt, so muss irgend ein trockner Stoff darunter gemischt werden, am besten Laub oder trocknes Wirrstroh, und wenn nichts anderes da ist, müssen Sägespäne von weichem Holze, Gerstenspreu oder ähnliche trockene Stoffe genügen. Erst wenn warme Tage eintreten, erhitzt sich nasser Mist, worüber bisweilen Wochen vergehen; die Culturen werden dadurch verzögert, und folglich ihr Gelingen oft beeinträchtigt. Man vermische bei dem Setzen — so wird die Bereitung des Mistlagers genannt — den kurzen mit strohigem Mist. Wird Laub verwendet, so wird es ebenfalls bei dem Setzen vermischt, oder man schüttelt vorher Laub und Mist durcheinander. Das Setzen geschieht mit einer guten Mistgabel, am besten mit einer vierzinkigen amerikanischen. Der Mist wird ganz gleichmässig durch Schütteln auseinander gebreitet und dann mit der Gabel geschlagen, wobei man fühlt, wo Klumpen oder Vertiefungen sind, welche ausgeglichen werden müssen.

Nachdem ein Satz von etwa 30 cm Stärke durch den ganzen Kasten fertig ist, wird diese Schicht gleichmässig getreten, und, wenn es nöthig ist, mittelst der Brause mit erwärmtem Wasser angefeuchtet. So setzt man Schicht auf Schicht, bis die Höhe erreicht ist. Hierauf wird der Kasten aufgesetzt und mit

Fenstern bedeckt, dann noch der Umsatz (Düngerpackung ausserhalb des Kastens zur Erhaltung der Wärme) bereitet. Bei grosser Kälte, wenn der Mist theilweise gefroren ist, wird er nicht sogleich in das Mistbeet gebracht, denn er würde sich dort vielleicht nicht erwärmen, sondern auf einen Haufen fest zusammengesetzt, wobei die gefrorenen Klumpen mit heissem Wasser begossen werden, dann mit Strohmatten oder Stroh bedeckt, bis der Haufen zu dampfen anfängt. Erwärmt sich ein fertiges Mistbeet wegen schlechter Beschaffenheit des Mistes, oder weil er zu kalt gesetzt wurde, nicht nach 3—5 Tagen, so muss das Beet künstlich erwärmt werden. War der Mist trocken, so hilft hierzu starkes Begiessen mit sehr heissem Wasser, jedoch mit dem Rohre der Giesskanne, war er dagegen zu nass, oder vielleicht theilweise gefroren, so gräbt man heisse Steine, mit heissem Wasser gefüllte Giesskannen und Töpfe etc., gleichmässig vertheilt in den Mist ein, so dass sie davon bedeckt werden. Ferner sind grosse Stücke von ungelöschtem Kalk, welche man angefeuchtet etwa 50 cm von einander in halber Tiefe des Mistlagers eingräbt, ein vortreffliches Mittel zur Erwärmung. Nach 2—5 Tagen, manchmal auch später, je nach der Luftwärme und der Beschaffenheit des Mistes, meist aber am dritten Tage, hat sich das Mistbeet bis zum Dampfen erwärmt. Dann erst ist es Zeit, die Erde oder die Füllstoffe zum Eingraben von Töpfen, nämlich gebrauchte Lohe oder Sägespäne in das Mistbeet zu bringen, nachdem der Mist vorher nochmals getreten ist, wobei nöthigenfalls noch Mist (auch alter) nachgefüllt wird und Unebenheiten ausgeglichen werden. Bei diesem Aufbringen von Erde begehen die Dilettanten häufig einen Fehler dadurch, dass sie es sofort nach dem Setzen des Mistes vornehmen, wodurch die Erwärmung verhindert oder wenigstens sehr verzögert wird.

Die Stärke der Auffüllungsstoffe richtet sich nach den Culturen und den einzustellenden Pflanzen, ebenso die Entfernung von dem Glase. Zu Sämereien, welche sogleich in das Mistbeet oder in Töpfe gesät werden, macht man die Erd- und Füllschicht nicht stark, bringt sie aber so nahe an die Fenster wie möglich. Sollen höhere Pflanzen in das Mistbeet kommen, so werden die Kästen danach eingerichtet. Das Wärmeverhältniss der Saaten und Pflanzen ist sehr verschieden, und hiernach richtet sich die Beschaffenheit und Stärke der Fermentationsstoffe. Bohnen, Gurken

und Melonen brauchen höhere Wärme als Carotten, Radieschen, Erbsen und Saaten von Sommerblumen oder zum Auspflanzen bestimmter Gemüsepflanzen. Von grösstem Einfluss ist aber die Jahreszeit. Mistbeete, die noch zur Winterzeit zubereitet werden, müssen wärmer und daher stärker im Lager sein, als später angelegte.

Zur Erhaltung und Vermehrung der Wärme müssen die Mistbeete sofort nach der Fertigstellung mit Strohecken und Läden, je nach der Witterung wenig oder mehr, gedeckt werden; vor der Bestellung, wenn keine Sonne scheint, auch bei Tage. Muss man zum Theil gefrorene Erde verwenden, so bilde man davon, wenn der Mist warm ist, kleine Haufen in der Mitte, ohne sie auszubreiten, bis sie zerfallen.

Das Säen und Pflanzen wird frühestens einen Tag nach dem Einbringen der Erde vorgenommen, nachdem diese vorher nochmals oberflächlich umgestochen wurde. Sollte die Erde zum Pflanzen zu heiss erscheinen, so macht man stellenweise Löcher bis auf den Mist, damit die stärkste Hitze entweichen kann. Für diesen Fall kann man auch nach dem Pflanzen schwache Drainröhren eingraben und einige Zeit darin lassen. Der Abzug des Dunstes muss durch reichliches Lüften befördert werden.

XI. Allgemeine Regeln über Samenbehandlung und Aussaaten.

Dauer der Keimfähigkeit.

12. Alle Samen haben eine begrenzte Dauer der Keimfähigkeit, d. h. sie verlieren ihre Keimkraft nach kürzerer oder längerer Zeit. Es kommt dabei viel auf die Güte des Samens an, auf seine vollkommene oder unvollkommene Ausbildung. Die Vollkommenheit hängt einerseits von einer sorgfältigen Cultur, andererseits von der Witterung des Jahres ab. Sonnenarme, regnerische Sommer bringen schlechte Samenernten nicht nur dem Ertrage, sondern auch oft der Qualität nach. Namentlich ist die Witterung im Spätsommer von Einfluss. Kopfblüthige Pflanzen, wie die Familien der Compositen und Dipsaceen bringen in regnerischen Sommern häufig nur wenige vollkommene Samen, weil die Blumen fast nicht trocken werden. Darauf sind auch, wie

schon in der Einleitung bemerkt wurde, viele Klagen über schlechten, alten Samen zurückzuführen, während doch alter Samen in solchen Fällen oft besser keimen würde als der neue.

Jeder gewissenhafte Samenhändler wird selbstverständlich nach bester Ueberzeugung seinen Kunden nur solche Samen liefern, welche geeignet sind, dieselben zufriedenzustellen. Je vertrauter sich die Abnehmer mit der Behandlung der Samen machen, je besser sie die Ansprüche, welche an die Keimfähigkeit derselben zu stellen sind und die Dauer dieser Keimfähigkeit kennen lernen, desto seltener werden Reclamationen vorkommen, bei deren Prüfung es sich oft herausstellt, dass der Samen ganz verkehrt behandelt wurde oder überhaupt in der Zeit, welche er zum Keimen braucht, noch nicht aufgegangen sein konnte u. dergl. m. Uebrigens lassen die grossen Samenhandlungen diejenigen Pflanzengattungen, welche nur in südlichen Gegenden Samen von guter und haltbarer Qualität ergeben, in den entsprechenden Ländern anbauen, ganz abgesehen von den Artikeln, welche überhaupt bei uns nicht zur Reife gelangen und in milderer Climaten gezüchtet werden müssen. Samen von vielen Warmhauspflanzen und Palmen werden für die grossen Geschäftshäuser von ihren Sammlern in überseeischen Ländern an Ort und Stelle eingeerutet, und es kommt oft genug vor, dass derartige Sendungen total verunglücken und die darauf verwendete Zeit und Ausgabe verloren sind. Dass an solche Samen, welche zu ihrem Transport einer so langen Zeit bedürfen und während desselben den schädlichsten Einflüssen unterworfen sind, bezüglich der Keimkraft nicht dieselben Anforderungen gemacht werden können wie z. B. an Kohl- oder Gurkensamen, ist wohl einleuchtend.

Ueber die Dauer der Keimfähigkeit der Gemüse- und Blumensamen geben wir am Ende des Buches eine Liste. Im Allgemeinen verhalten sich die Gattungen derselben Familie in der Keimdauer fast gleich, doch giebt es grosse Ausnahmen. So behalten z. B. die meisten Doldengewächse (Umbelliferen) die Keimkraft sehr lange, dagegen Pflanzen aus eben dieser Familie, wie *Heracleum*, *Pastinaca* und besonders die hartsamige Körbelrübe nur kurze Zeit. Noch bestimmter verhalten sich die Arten derselben Gattung, z. B. von *Cheiranthus*, *Dianthus*, *Phlox*, *Lupinus* u. a. m. Merkwürdigerweise behalten, nach langen Erfahrungen, die meisten sehr feinkörnigen Samen die Keimkraft länger, als

sehr grosse; als Beispiele hierfür nennen wir unter den Gemüsen Sellerie, unter Blumen Mimulus, Petunia, Lobelia, Lisianthus etc.

Sehr unsicher sind die Erfahrungen über die Dauer der Keimfähigkeit der Gehölze, obschon wir über die bekannteren unserer Sache ganz gewiss sind. Unter den Gehölzsamen sind viele, welche entweder ihre Keimkraft schnell verlieren, oder die sich überhaupt kaum bis zum Frühjahr halten, weil die Keime bereits entwickelt sind.

Dieselbe Unsicherheit gilt von vielen technisch oder medizinisch nutzbaren Pflanzen, während die Erfahrungen über die eigentlichen landwirthschaftlichen Pflanzen ziemlich sicher sind. Bei manchen Samen sind neue und alte Samen für den Kenner in der Farbe zu unterscheiden, und er findet z. B. bei Kleesamen leicht heraus, ob und wie viel alter Samen darunter ist.

Uebrigens hängt die Dauer der Keimfähigkeit auch sehr von einer guten Aufbewahrung des Samens ab. Der Aufbewahrungsort muss vollkommen trocken, darf aber nicht zu warm sein. Trockner Samen ist gleichsam ein schlafender Organismus, dem selbst hohe Kältegrade, wie versuchsweise festgestellt ist, nichts anhaben. So wie aber der Keim angeregt ist, schadet sowohl Trockenheit als hohe Kälte. Wer Samen länger als bis zur nahen Saatzeit aufbewahren will, verschliesse ihn in trockne Gefässe oder Säcke, wohin die Luftfeuchtigkeit wenig dringen kann, und bewahre denselben in ungeheizten trocknen Räumen auf. Ein gutes Mittel ist es, gewisse Samen mit trockner Erde oder frischem Sand vermischt aufzubewahren, was jedoch nur ausnahmsweise geschieht. Bei der Aussat werden dann Erde resp. Sand mit dem Samen ausgestreut. (Siehe auch §. 17). Es ist nothwendig, die angekommenen Samenpakete, Kisten u. s. w. sogleich zu öffnen (auch der Controle wegen) und abtrocknen zu lassen.

Die Keimprobe.

13. Bei dem Bezug aus zuverlässigen Handlungen kommen Samen, die bei richtiger Behandlung nur schwach oder gar nicht keimen, selten vor. Obschon auch das Nichtkeimen gewisser in geringer Menge gebrauchter Samen Verlegenheiten zur Folge haben kann, so ist doch in diesem Falle der Geldverlust nicht gross, wird jedoch empfindlicher, wenn es sich um grosse Aussaaten, z. B. Grassamen, handelt.

Bei vielen Samen kann man durch Aufschneiden der Körner und Prüfung des Keims die Güte derselben feststellen. Wo dies nicht möglich, empfehlen wir vorsichtigen und ängstlichen Leuten in allen Fällen, wo sie Bedenken haben, Keimproben anzustellen, und die Stärke der Saat nach dem verlangten Resultat einzurichten oder die wirkliche Aussaat gar nicht vorzunehmen. Der Verkäufer wird Mittheilungen über schlechtes Keimen von Personen, denen er richtige Behandlung und Gewissenhaftigkeit zu- traut, mit Dank annehmen. Diese Feststellung der Keimfähigkeit ist aber auch bei selbstgezogenen Samen nöthig, besonders aber bei Samen aus früheren Jahrgängen.

Die Keimprobe ist verschieden auszuführen, und es giebt dafür mehrere Vorrichtungen, welche jedoch mehr für systematisch auszuführende Versuche als für den Bedarf des Gartenfreundes und Gärtners passen. Die beste Samenprobe ist das Aussäen in Töpfe oder Mistbeete, aber das Ergebniss tritt oft spät ein, wenn der Zweck der Probe schon vorüber ist. Gewöhnliche Samen legt man in einen wollenen Lappen, taucht diesen in warmes Wasser und legt ihn, um das schnelle Austrocknen zu verhindern, in ein Gefäss, welches bedeckt an einen warmen Ort gestellt wird. Besser ist es, die Samen zwischen zwei nasse Filzstücke zu legen und diese durch Umwickeln gegen schnelles Austrocknen zu schützen. Grobe Samen, wie Mais, Ricinus, Mirabilis, Lathyrus, Gurken, Kürbis, Melonen, neuseeländischen Spinat u. s. w. kann man zwischen nasse Sägespäne oder Sand legen. Keimtafeln von Thon dienen zur gleichzeitigen Probe vieler Samen.*)

Die zur Keimprobe bestimmten Samen dürfen nie trocken werden.

Dauer der Keimzeit.

14. Es ist sehr nützlich, die Dauer der Keimzeit kennen zu lernen, denn es hängt nicht nur die Zeit der Aussaat, sondern auch die Aussaatstelle davon ab. Sät man schnell keimende Samen zu früh, so erfrieren die von zärtlichen Gewächsen im freien Lande oft noch im Monat Mai, während die Samenpflanzen im Mistbeete oder in Töpfen zu gross werden, ehe sie ohne Frost-

*) Anmerkung. Die in H. Jäger's „Allgemeines illustriertes Gartenbuch“ (vierte Auflage) abgebildete Keimplatte gestattet die Probe von 24 Samenarten zugleich.

gefahr gepflanzt werden können. Wir nennen als Beispiel unter den Gemüsen Gartenbohnen, Gurken, Melonen, Kürbis, Tomaten, unter den Blumen Balsaminen, Perilla, Tagetes, Tropaeolum und Zinnia, welche keinen Frost vertragen und doch schnell keimen und pflanzbar werden, während Asten zwar auch nicht langsam keimen, aber, wenn sie kräftig genug dafür sind, schon Ende April in das Freie kommen können. Andere Uebelstände treten ein, wenn langsam keimende Samen zu spät aufgehen.

Aber auch die Art der Aussaat hängt von der Keimzeit ab. Es giebt Samen, welche ein Jahr und länger in der Erde liegen, ehe sie keimen, besonders wenn sie älter sind. Wollte man diese zwischen andere, bald keimende Samen säen, so würden sie, nachdem alle anderen gekeimt haben, auf diesem Platze verloren gehen, z. B. bei den Stauden Dictamnus und Viola odorata. Man muss solche Samen entweder in Töpfe und Samenkästen oder an eine gesicherte Stelle in das Land säen, wo der Saatplatz sorgfältig von Unkraut reingehalten, am besten im ersten Jahre mit Moos, Tannenreisig, wohl auch mit Dachziegeln oder Schiefer bedeckt wird.

Bei gewissen, hartsamigen Gehölzen kürzt man die Keimzeit durch die sogenannte Stratification (Einschichten) ab, indem man sie mit feuchtem Sand vermischt in Gefässe thut, die man an einem nur mässig warmen Orte aufbewahrt. So werden Wildrosen- und Weissdornsamen stratificiert, und manche Samenhändler führen auch solche präparirte Samen, welche jedoch vor dem Säen nicht austrocknen dürfen.

Selbstverständlich hängt die Keimzeit sehr von der Temperatur, sowie von der Luft- und Bodenfeuchtigkeit ab und wird durch höhere Wärme und Feuchtigkeit beschleunigt, durch Kälte und Trockenheit verzögert. Davon kommt der Unterschied in der Aufgangszeit bei Land- und Mistbeetsaat. Mistbeetsaaten sind immer sicherer, selbst im Sommer in kalten Kästen, weil sie feucht und schattig gehalten werden können, auch gegen Ungeziefer geschützter sind.

Bei grossen, langsam keimenden Samen, z. B. Canna, Acacia, Palmen etc. wird das Keimen durch Anfeilen, Anschneiden, Abbrühen mit heissem Wasser, im Allgemeinen aber durch Einquellen beschleunigt. Das Anfeilen und Anschneiden nahe der Stelle, wo der Keim sitzt, muss sehr vorsichtig geschehen, damit man diesen

nicht verletzt. Dem Ueberbrühen mit heissem Wasser, was mit Vortheil bei Canna, grosssamigen Acacia, und ähnlichen Samen angewendet wird, muss ein Einquellen oder sofortige Aussaat folgen.

Dichtheit der Saat. Samenverbrauch.

15. Die Saatmenge und Dichtheit der Aussaat hängt erstens von der Grösse der Samen und ferner davon ab, ob die Keimlinge verpflanzt werden, oder auf dem Platze bleiben.

Es ist schwer, hierfür bestimmte Regeln anzugeben, wir können aber nicht genug empfehlen, die Aussaat stets recht reichlich zu bemessen, denn der Werth des auszusäenden Samens ist im Verhältniss zu dem des daraus zu erzielenden Productes meist ein sehr geringer. Man hat dabei in Betracht zu ziehen 1) den Procentsatz des Aufgangs, 2) dass stets ein kleiner Theil der Pflanzen schwächlich aufgehen und nicht zur Entwicklung gelangen, 3) dass ein weiterer Procentsatz durch ungünstige Witterung, oder durch schädliche Thiere (Insecten, Würmer, Maulwürfe, Schnecken, Vögel) am Keimen verhindert oder nach demselben zerstört wird. Hat man zu viel Pflanzen, so hat man doch nur die Mühe, sie zu verdünnen, hat man aber zu wenig, so ist es in den meisten Fällen für eine zweite Aussaat zu spät. Unter „reichlich bemessen“, verstehen wir aber durchaus nicht dichte Saat, denn bei derselben erzieht man fast stets schwache Pflanzen, und ist gezwungen, die Pflänzchen zu pikiren, was sonst nicht nöthig wäre, jedenfalls zu verdünnen. Als Beispiel führen wir *Lobelia erinus* und ähnliche, sowie *Mimulus* an. Da eine Prise (Portion) dieser feinen Samen das zehn- bis hundertfache gegenüber anderen Samen (z. B. *Zinnia*, *Scabiosa*, *Tropaeolum*, *Lupinus* etc.) enthält, so muss man ganz dünn säen. Unter den Gemüsesamen hat man dies hauptsächlich bei Sellerie zu beobachten. Im Lande ist bei mehreren Wurzelgewächsen, namentlich gelben Rüben (Carotten) dünn zu säen, sonst ist der Ertrag schlecht oder die Arbeit des Verdünnens gross, denn es keimt fast jedes Korn; auch leiden diese Sämereien weniger vom Ungeziefer.

Stärke der Bedeckung.

16. Nach der Grösse der Samen richtet sich auch die Stärke ihrer Bedeckung. Grobe Samen vertragen eine starke Bedeckung, verlangen sie sogar, z. B. Puffbohnen bis über 10 cm;

kleinere Samen dagegen eine schwache; ganz feine Samen bedeckt man gar nicht, sondern schützt sie bloß durch eine Glastafel gegen das Austrocknen. Andere Samen, besonders feinsamige Stauden mit schwieriger Keimung, z. B. Gentianen, Alpenprimeln bedeckt man wohl auch mit zerhacktem Moos, welches das Austrocknen erschwert. Wir werden auf die Samenbedeckung öfter zurückkommen, stellen aber als allgemeine Regel auf, dass die Bedeckung ungefähr die Stärke des Durchmessers der Samen haben kann. Aber auch die Bodenbeschaffenheit macht einen Unterschied, wenigstens im freien Lande. In sehr lockerem Boden, namentlich im Sand, vertragen oder bedürfen die meisten Samen eine doppelt so starke Bedeckung.

Das Vorkeimen. Einquellen und Stratificieren.

17. Das Vorkeimen und Einquellen kommt besonders bei denjenigen Samen in Anwendung, welche unter gewöhnlichen Verhältnissen erst im zweiten Jahre aufgehen würden, und man gewinnt durch eine somit bewirkte Verfrühung des Keimens sowohl Zeit als auch den anderen Vortheil, dass diese Samen das dafür bestimmte Land nicht zu lang in Anspruch nehmen. Auch wendet man das Einquellen für solche Samen an, welche in Berührung mit der Luft ihre Keimkraft schnell verlieren würden. Harte Samen, welche man am besten sogleich nach der Reife säen sollte, kommen in der Entwicklung des Keimens durch Stratification weiter, als wenn sie in der Erde liegen. Kernobstsamen z. B., welche selbst bei der Herbstsaat im nächsten Frühjahr nur zum Theil keimen, sind bis März oder April in dem Stratificationsgefäße oft schon mit Keimen versehen, je nachdem der Ort der Aufbewahrung wärmer oder kühler war. Ein weiterer Zweck des Vorkeimens ist aber, den Nachtheil der im Freien durch kaltes Wetter verzögerten oder unmöglichen Aussaat zu verhindern, z. B. bei Gartenbohnen, Gurken und Kürbis, wo das Vorkeimen am allgemeinsten angewendet wird. In den meisten Gegenden Deutschlands kann man diese kaum vor Mitte Mai ins Freie säen, wo sie, wenn kaltes Wetter eintritt, noch lange liegen, wenn nicht gar verderben; wendet man dagegen gekeimte Samen an, so kann man bis zum Eintritt warmer Witterung mit dem Säen warten und hat dann die Freude, schon nach einigen Tagen die Keimblätter zu sehen. Besonders nütz-

lich wird die Verwendung vorgekeimter Samen zum Nachsäen, wenn Samen schlecht aufgegangen sind und entweder durch Zwischensaat ergänzt oder durch eine verspätete Neusaat ersetzt werden, oder wenn z. B. Gurken und Bohnen durch Spätfröste vernichtet worden sind, und schneller Ersatz Noth thut. Diese Nachsaat holt dann die aufgegangenen Sämlinge schneller ein, als es nicht vorgekeimter (nicht eingequollener) Samen thut. Wir möchten aber auch nur zu diesem Zwecke das Einquellen und Vorkeimen allgemein empfehlen, denn es sind damit auch viele Bedenken verbunden. Erstens müssen solche Saaten sehr schnell bewirkt werden, damit sie nicht austrocknen, deshalb auch nicht bei warmem Sonnenschein. Dann müssen sie, womöglich vor dem Bedecken mit Erde, stark angegossen und bis zum Aufgehen immer feucht gehalten werden. Auch das Säen ist umständlicher und muss vorsichtiger geschehen, damit die Keimwürzelchen nicht abgestossen werden, und gleichmässige Vertheilung geschieht. Es ist daher dieses Vorkeimen im Grossen nicht anwendbar.

Bei dem eigentlichen sog. Stratificieren, welches besonders ein Erweichen harter Samen bezweckt, werden die Samen schichtenweise zwischen feuchten Sand in Töpfe oder Kästen gelegt, und, um sie gegen Frost zu schützen, am besten im Freien oder im Keller eingegraben. Stehen die Gefässe zu warm, so kann es vorkommen, dass die Samen früher keimen, als die Aussaat möglich ist, und es leiden bei längerem Warten die Keime selbst bei vorsichtiger Behandlung. Soll die Operation im Grossen ausgeführt werden, so verwendet man Fässer dazu. Nach dem Herausnehmen im Frühjahr säet man dann die Samen mit dem daranhängenden Sand. Das Stratificieren schützt zugleich gegen Schaden durch Mäuse, welche den im Herbst gesäeten Samen der Kernobstbäume sehr nachgehen.

Das Vorkeimen im Frühjahr wird durch Einquellen in warmem Wasser an einem warmen Standort bewirkt. Im Wasser dürfen die Samen nur bleiben, bis sie anschwellen; manche Samen können eine Woche im Wasser liegen, andere vertragen es nicht länger als 24 Stunden. Bis zum Durchbruch der Keime darf es im Wasser nicht kommen. Werden einzelne Samen weich, so dass man sie zerdrücken kann, wie es oft bei Gurken vorkommt, dann waren sie nicht keimfähig. Können die eingequellten, angeschwollenen Samen noch nicht der Erde übergeben werden, so

müssen sie, mit Erde oder Sägespänen vermischt, in flachen Gefässen warm aufbewahrt und öfter umgerührt, auch bei Trockenheit angefeuchtet werden. Grosse Samen, wie Gurken, Melonen und Kürbis lässt man gern in Töpfen, welche mit groben (weichholzigen) Sägespänen gefüllt sind oder in Säeöfen vorkeimen. Samen von Warmhauspflanzen werden wie oben angegeben stratificiert, nur werden sie in ihren Gefässen dann warm, resp. in das Warmhaus gestellt und stets feucht gehalten. Sehr grosskörnige Samen, z. B. gewisse Palmenarten, werden dadurch vorgekeimt, dass man sie mit Erde untermischt, in beständig warmer Feuchtigkeit erhält, bis der Keim durchbricht, wonach sie dann einzeln in Töpfe gepflanzt werden.

Feinde der Saaten.

18. Unter den Feinden der Saaten ist wohl der grösste der Maulwurf, welcher viel Unheil anrichtet. Kaum ist ein Saatbeet im Freien fertig, so kommt dieser schlimme Gast, wühlt Gänge und Haufen, wirft die Etiquetten um und verdirbt oft einen grossen Theil der Saat. Selbst Mistbeete verschont er nicht. Man muss ihn schleunigst wegzufangen suchen und zwar geschieht dies am sichersten morgens zwischen 10 und 12 Uhr, wo er während des Wühlens durch einen geschickten Schlag mit der Hacke aus der Erde an die Luft befördert und getödtet wird. Man kann ihm den Besuch in Saatbeeten auch durch zahlreich eingesteckte, mit Steinkohlentheer bestrichene Stäbchen verleiden. Dann kommt der Sperling, dessen grosse Schädlichkeit, soweit Gartenbetrieb in Frage kommt, unzweifelhaft ist, da er nicht nur den reifen Samen frisst, sondern auch die aufgehenden Samen, besonders Erbsen und Grassamen anhackt und herausreisst. Zur Vertreibung dieses Schlaukopfs scheint Pulver und Schrot das einzig wirksame Mittel zu sein. Man thut dann gut, die getödteten Thiere an Ort und Stelle liegen zu lassen. Gewöhnliches Spiegelglas an der zu schützenden Stelle an Fäden aufgehängt, schützt ebenfals bei Sonnenschein durch die so entstehenden Strahlen, welche dem Spatz unerträglich sind. Keimende frühe Erbsen, welche am meisten zu leiden haben, sichert man dadurch, dass man sie etwas tiefer legt als eigentlich nöthig ist, so dass die Keimblätter spät erscheinen und dann schon zu hart für das Leckermaul sind. Bei der Gemüsesamenzucht stellen sich noch mehrere andere

Vögel als Feinde ein. So die Buchfinken, welche über den Spinatsamen herfallen, wobei ihm noch Goldammern und andere Körnerfresser helfen; Stieglitze und Hänflinge, welche den Samen der Schwarzwurzel und ähnliche Compositen-Pflanzen abfressen, ehe er noch reif ist. Zuletzt gedenken wir noch eines schlimmen Saatenvernichters, des Erdflohes, welcher sich allerdings auf die Pflanzen aus der Familie der Cruciferen beschränkt, aber hier in trocknen Zeiten wahrhaft vernichtend wirkt, wie wir an Kohlsaaten, Radieschen, Kresse, Levkoyen u. a. leider oft erfahren. Ausser Wegfangen an Streichbrettern und Stäben, die mit Theer bestrichen sind, kennen wir als Gegenmittel nur noch das Bestreuen der nassen Blätter mit Asche, sowie Düngerguss, um die Pflanzen schnell vorwärts zu bringen. Mit grossem Erfolg wendet man in neuerer Zeit das Einstreuen von etwas Kochsalz in die Saatbeete bei Radieschen und dergl. oder das Ueberbrausen mit schwachem Salzwasser an. Es vertreibt das Ungeziefer, zieht Feuchtigkeit bei trockenem Wetter aus der Luft und bewirkt im allgemeinen eine schnellere Keimung und Kräftigung. Bei trockenem Frühlingswetter richtet auch die Ackerspinne an jungen Saaten Verwüstungen an; wir empfehlen gegen dieselbe häufiges Bespritzen. Den Saaten in Mistbeeten schaden die kleinen Nachtschnecken oft bedenklich, indem sie junge wie auch grosse Pflanzen abfressen, besonders sehr feine Keimlinge oft in einer Nacht vertilgen. Hauptsächlich haben Calceolarien- und Primelsämlinge im Herbst zu leiden. Einzelne Samentöpfe mit werthvollen Sämlingen stellt man desshalb erhöht und umgiebt sie mit einem Ring von Kalkstaub oder Asche. Auch im Lande richten die Schnecken in manchen Jahren an Herbstsaaten, Salat, Schwarzwurzel, Spinat u. s. w. die grössten Verwüstungen an und fressen oft ganze Beete ab. Das sicherste Mittel ist Absuchen der Schnecken bei Licht und Aufsuchen am Morgen unter Holzstücken, Scherben und unter den Blumentöpfen und Saatkästen. Als Lockspeise wendet man Salat-Herzblätter an, an welchen man bei feuchtem Wetter die Schnecken morgens massenhaft findet, die man dem Geflügel als willkommenes Futter vorwerfen kann. Auch lässt man Enten über die Beete gehen, welche Massenvertilger von Schnecken sein, und so lange sie solche finden, die Pflanzen nicht berühren sollen. Tauben vertilgen massenhaft kleine Schnecken, dürfen daher nicht von den Beeten vertrieben werden.

Seltener, aber empfindlicher ist der Schaden, welchen Spitzmäuse, Kellerasseln und Heimchen verursachen, denn sie fressen auch grössere Pflanzen und Wurzeln ab. Heimchen finden sich selten und nur zuweilen in Vermehrungshäusern in den Ritzen der Heizungen. Sie können von da nur durch energisches Feuchthalten vertrieben werden.

XII. Die verschiedenen Saatmethoden.

A. Im freien Lande und Mistbeete.

Die Breitsaat.

19. Bei der Breitsaat wird der Samen mit der Hand möglichst gleichmässig über das ganze Land oder Beet ausgestreut, damit die daraus entstehenden Pflanzen eine ziemlich gleichmässige Entfernung erhalten. Aber das gleichmässige Säen verlangt viel Uebung; oft wird die Saat nicht nur ungleich, sondern auch zu schwach oder zu dicht ausgeführt. In ersterem Falle bleibt der Ertrag unter der Erwartung, im zweiten Falle verkümmern die zu dicht stehenden Pflanzen, wenn sie nicht verdünnt werden, was viel Arbeit verursacht. Die Breitsaat ist gebräuchlich bei den meisten feinsamigen, kleinbleibenden Pflanzen, aber auf Grund der angegebenen Nachtheile wird sie immer mehr durch die Reihensaat verdrängt. Unbedingt nothwendig ist die Breitsaat bei der Anlage von Grasflächen jeder Art (siehe §. 27 und 28).

Im Mistbeete, sowohl bei Blumen als Gemüsen, wird die Breitsaat häufiger angewendet als die Reihensaat, weil man sie sorgfältig ausführen kann und bei der Anzucht von Blumen- und Gemüsepflanzen dadurch mehr auf einem Platze erzielt als bei anderen Verfahren. Hierzu kommt, dass viele in Mistbeeten gezogene junge Pflanzen pikirt (verstopft) werden, wodurch die bleibenden mehr Platz bekommen. Bei der Saat im Lande werden gröbere Samen (z. B. Carotten, Zwiebeln u. a.) mit einem engzinkigen Rechen so tief eingehackt, wie die Erdbedeckung im Verhältniss zu ihrer Grösse betragen muss, in Sandboden mehr, in Leimboden weniger, jedoch meist nicht über 2 cm tief; während feinere Samen nur durch Hin- und Herschieben des Rechens eingekratzt (eingerecht) werden, wozu jedoch der Boden frisch gegraben oder wenigstens vorher rauh gemacht

(aufgekratzt) sein muss. Beide Arten der Bedeckung verlangen Sorgfalt und eine leichte geschickte Hand. Beim Einhacken darf nie mehr als 3 cm breit Erde in den durch das Hacken entstehenden kleinen Graben gezogen, oder vielmehr geschlagen werden, und das fertige Stück darf keine Lücken und Vertiefungen zeigen, sondern muss wie frisch geharkt aussehen. Bei dem Einkratzen muss der Rechen leicht über den Boden hingezogen werden, darf nicht eigentlich aufliegen, sondern ziehend und schiebend nur die Erdklümpchen erfassen, wodurch die Samen in die kleinen Vertiefungen fallen. Bei der Saat in Mistbeeten verfährt man, wenn ganze Fenster mit einer Sorte bestellt werden, ebenso, nimmt aber einen kleineren Rechen. Kommen aber mehrere Sorten unter ein Fenster, wie es bei Blumen der Fall ist, so wird der Samen mit der Hand oder auch vermittelt eines feinen Draht- oder Blechsiebes mit gesiechter Erde bedeckt und dann mit einem Brettstück festgedrückt.

Die Reihensaat.

20. Wir haben die Vorzüge der Reihensaat schon wiederholt hervorgehoben, weil dabei die Sämlinge nach zwei Seiten Platz finden und leicht behackt werden können, wodurch einerseits das Handjäten fast ganz wegfällt, andererseits der Boden gelockert wird. Bei der Reihensaat wird Samen erspart. Wir empfehlen dieselbe nicht nur für sehr grosse Samen, wie alle Hülsenfrüchte, sondern auch für Spinat, Petersilie, Körbel (wegen bequemen Abschneidens) und für Carotten, Schwarzwurzeln, Pastinaken, Haferwurzeln, kurz alle unverpflanzt bleibenden Wurzelgemüse und Rüben, ferner für Zwiebeln (mit Ausnahme der zu Steckzwiebeln bestimmten, welche sehr dicht breit gesät werden müssen), alle nicht feinsamigen Gehölze; endlich selbstverständlich für alle nicht zu verpflanzenden Einfassungsblumen. Hierher gehört auch die Ringsaat für Blumen, welche in Privatgärten auf Rabatten häufig angewendet wird. Sie unterscheidet sich nur durch die einen Ring von 15—25 cm Durchmesser bildende Saatzfurche. Die künftigen Pflanzen bilden zusammen einen runden Busch und werden, wenn es überhaupt nöthig ist, durch einen in der Mitte eingesteckten Stab gehalten.

Die Entfernung der Reihen richtet sich nach der Grösse, welche die Pflanzen erreichen, und wechselt von 10 bis zu 30 cm.

Man könnte für manche Pflanzen die Reihen noch enger ziehen, wenn nicht dabei die Breite der Hacken berücksichtigt werden müsste. Die Saatrinnen macht man für kleinen Samen etwa 2, für gröbere 5—10 cm tief, gleichviel ob es Gemüse, Blumen oder Gehölze sind, wobei ebenfalls die grössere oder geringe Schwere des Bodens zu beachten ist.

Die Saadfurchen werden für gewöhnlich mit einer schmalen, leichten Hacke, bei der Cultur im Grossen mit dem vielreihigen Furchenzieher gemacht, oder die Säemaschine macht zugleich die Saadfurchen. Diese Reihen- oder Furchenzieher und Säemaschinen sind entweder für die Hand oder Pferdekraft eingerichtet, und es sind erstere auch bei dem kleinen Gartenbetrieb verwendbar.

Das Ziehen der Saadfurchen oder Rinnen mit der Hand geschieht nach der Schnur, am besten nicht an der gespannten Schnur, sondern nach den durch Hin- und Herziehen der Schnur gebildeten Linien, denn die Schnur wird durch die Hacke leicht aus der geraden Richtung gebracht. Für feinen Samen zieht man die Furchen mit der Spitze des Rechenstiels oder mit einem Stocke. Werden die Reihen quer über die Beete gemacht, z. B. für ein kleines Stück mit Petersilie oder Körbel, sowie für Blumen, so ritzt man sie am besten durch Hin- und Herschieben eines scharfkantigen Brettstücks ein. Das Ziehen einer guten, gleichmässigen Saadfurche ist nicht ganz leicht; die Hacke muss ziehend und drückend zugleich arbeiten und wie eine Pflugschar den Boden gleichmässig seitwärts werfen.

Bedarf der Boden Düngung für gewisse Pflanzen, so kann man diese bei der Reihensaat vor dem Säen geben, indem man entweder Trockendünger (Taubenmist, Asche, Guano etc. oder Düngererde) in die Saatrinnen streut, oder indem man Mistjauche hineingiesst, wodurch zugleich die Bodenfeuchtigkeit verstärkt und das Keimen beschleunigt wird. Das Säen geschieht mit der Hand oder dem §. 10 erwähnten Säehorn von Blech. Bei dem Bedecken nach der Saat verwendet man für feinere Aussaaten gern bessere Garten- oder Lauberde, sonst aber die zu beiden Seiten der Saadfurche lagernde; dabei dürfen die Samen nicht verschoben werden, und man thut wohl, die Furchen nicht ganz auszufüllen. Das zu tiefe Säen wird durch eine geringe Tiefe der Saadfurchen am sichersten verhindert.

Die Büschel- und Stufensaat.

21. Dieselbe ist blos bei sehr grossen Samen, besonders bei Stangenbohnen gebräuchlich, indem man eine gewisse Anzahl von Bohnen rings um eine Stange steckt. Nach Ansicht vieler Gärtner ist sie aber auch für Buschbohnen und Zwergerbsen zweckmässiger als die Reihensaat, indem sie früher Früchte bringen sollen, weil die Sonne die angehäuften Pflanzenbüschel mehr bescheinen kann. Bei den Erbsen und Buschbohnen macht man mit einer breiten Hacke eine 15—20 cm breite, flache Grube mit ebenem Boden, legt nach Bedürfniss Samen hinein und deckt sie mit der Hacke oder einem Rechen zu, ohne die Grube ganz zu füllen. Die übrig bleibende Erde dient später zum Anhäufeln. Diese Gruben werden an vielen Orten Stufen genannt (Stufensaat). Gelegentlich werden auch andere Pflanzen so gesäet, z. B. Rettige zwischen den Beeten in den Fusswegen, abwechselnd mit Trittplätzen.

Die Dibbel- oder Löchersaat.

22. Diese Methode ist weniger verbreitet, als sie sein sollte, denn es wird durch sie die denkbar gleichmässigste Saat bewirkt. Die Dibbelsaat wird, wie schon §. 10 angedeutet, durch Eindringen eines Dibbelholzes- oder Brettes mit kurzen Zinken bewirkt. Dadurch erhält man eine Anzahl gleich tiefer und gleich weit entfernter Saatlöcher, in welche die Samen gelegt werden. Wenn die Güte des Samens nicht zweifelhaft ist, genügt ein Samenkorn für jedes Loch, im anderen Falle lässt man 2—3 hineinfallen, zieht aber später die überflüssigen Pflanzen heraus.

So säet man Radieschen, Rettige, Salatrüben, Cardy und Spargel, könnte aber grosskörnige Blumensamen, bei denen es auf gleichmässige Entfernung ankommt, ebenso säen. Man begreift, dass diese Saatmethode wegen ihrer Umständlichkeit nur im Kleinen angewendet werden kann. Die Samen werden leicht gedeckt oder nur mit der Brause eingegossen, so dass die Löcher halb offen bleiben.

Schlussbemerkungen.

23. Wir erwähnen noch, dass es bei kleinen Culturen zweckmässig, auch gebräuchlich ist, bei trockenem Wetter die Saatbeete mit Zweigen, besonders Tannenreisig, oder auch mit Moos, Sägespänen, kurzem Mist, lockerem Stroh u. s. w. zu bedecken, um sie zu beschatten und gegen Vögel zu schützen. Hierher gehören auch die §. 18 erwähnten Schutzmittel.

Bei der Aussaat von Gehölzen sind besondere Rücksichten zu nehmen, weil die Sämlinge meist mehrere Jahre auf demselben Platze bleiben, daher sehr dünn gesäet oder, wenn sie zu dicht aufgehen, verdünnt oder verstopft werden müssen. Dies gilt für Land- und Topfsaaten. Sehr grosskörnige Gehölzsamen werden einzeln in gleiche Entfernungen gelegt.

B. Die Aussaaten in Töpfen oder anderen Gefässen.

24. Dieselben sind sehr verschieden, doch kann man sie, abgesehen von manchen Ausnahmen, im allgemeinen eintheilen in 1) grosssamige und mittelgrosse, 2) sehr feinsamige. Die ersteren sind am häufigsten; darunter sind viele, welche sich von den Landsaaten nur dadurch unterscheiden, dass die Bedeckung mit Erde durch die Hand erfolgt. Auch von den Topfsaaten wird ein grosser Theil nur aus Vorsicht oder weil man wenig Pflanzen davon braucht in Töpfe gesäet, und manche Gartenliebhaber säen sogar ihre Levkoyen und andere Sommerblumen in Töpfe und Samenschalen oder Holzkisten. — Auf die genaueren Angaben über Topfsaaten in der dritten Abtheilung verweisend, erwähnen wir hier, dass die Erde für alle Topfsaaten, mit Ausnahme der Farnkräuter, nur gesiebt und reichlich mit Sand vermischet angewendet wird, ferner, dass in nicht ganz flachen Gefässen eine den Wasserabzug befördernde Unterlage von durchlassenden Stoffen, z. B. Moos, Coaksstücke, Torf, grober Sand u. s. w., bei Saaten in Haideerde eine solche von Torf- oder Haideerdstücken gegeben werden muss. Werden die die Aussaat enthaltenden Töpfe, Terrinen etc. in Gewächshäuser oder Mistbeete gebracht, so achte man darauf, dass sie dem Glase möglichst nahe stehen.

XIII. Die den Saaten in Gefässen und Kästen günstige Temperatur und Saatzeit.

25. Die zum Keimen der Samen günstige Temperatur richtet sich nach dem natürlichen Standorte der Pflanzen in ihrem Vaterlande. Viele Gartenfreunde und Gärtner vermeinen gut zu thun, wenn sie alle Samen, welche in Töpfen sind, in ein warmes Mistbeet stellen; dies vertragen aber manche Samen nicht, indem sie entweder gar nicht keimen, sondern schon bei

dem Anschwellen verfaulen, oder keimend schon dadurch verdorben werden, dass sie zu lang und dünn werden und die Samenblätter (Cotyledonen) anstatt dicht an der Erde, gleichsam hochstämmig tragen, und, wenn sie nicht zeitig durch Pikiren gerettet werden, umfallen. Es bedürfen eigentlich nur wenige Samen einer sehr hohen Temperatur zum Keimen, wie die Bromeliaceen, Gesneriaceen u. e. a. Die übrigen befinden sich besser in einer Temperatur zwischen $+ 10$ und 15° , andere gedeihen in der Lufttemperatur, wie sie sich zur wärmeren Jahreszeit im Kasten hält. Es ist sogar ein etwas kühler Stand für viele günstiger, und der Samen gewisser Alpenpflanzen, z. B. Aurikeln, keimt schneller, wenn man die Erde mit Schnee bedeckt. Jedenfalls muss man Alpenpflanzen frühzeitig säen, wenn es nicht sofort nach der Samenreife geschieht. Topfpflanzen können das ganze Jahr hindurch gesät werden. Alle Gewächse, welche innerhalb desselben Jahres zur Blüthe resp. zur Perfection kommen sollen, säet man unter Berechnung der Zeit aus, welche sie zu ihrer Entwicklung brauchen. Man beginnt bereits im Januar mit der Aussaat solcher Pflanzen, welche sich bald entwickeln sollen, und darf zu diesem Zwecke die meisten spätestens bis Mitte März säen. Einige schnell keimende, welche bei früherer Saat bis zur Zeit des Auspflanzens, Mitte Mai, zu gross werden würden, säet man erst im April. Solche sind z. B. *Mirabilis*, *Tagetes*, *Zinnia*, *Tropaeolum*, *Balsaminen*. Um diese Zeit werden auch alle holzigen *Kalthauspflanzen*, sowie *Gehölze* gesät, *Warmhauspflanzen* etwas früher. Nach einer kurzen Pause beginnt im Mai und Juni das Säen der *Stauden* und *zweijährigen Pflanzen*, dann im August und September die Aussaat von *Calceolaria*, *Primula chinensis*, *Cineraria*, *Ipomopsis*, *Humea elegans*, *Viola tricolor maxima* etc., gelegentlich auch von *Cyclamen*. Im Herbst bringt man diejenigen *Freilandaussaaten* in die Erde, welche den Winter vertragen können, wie *Rittersporn*.

XIV. Allgemeines über die Behandlung der Aussaaten.

26. Wenn man das Pikiren ausnimmt, so beschränkt sich die Behandlung der Aussaaten auf das Reinhalten von Unkraut, an welches nicht genug erinnert werden kann, das Begiessen

und Beschatten. Wir wiederholen, dass im freien Lande die Reihen- und Dibbelsaat (§. 20 und 22) das Jäten erleichtert, und dass noch nicht aufgelaufene Saaten oft und schwach, gekeimte dagegen weniger häufig, aber durchdringender begossen werden müssen (§. 9). Bei den feinen Topfsaaten erfordert das Ausziehen des Unkrautes eine fortwährende Aufmerksamkeit, sonst dringen die Wurzeln desselben tief in die Erde, so dass man beim Ausziehen die kleinen, guten Pflänzchen mit hebt oder gar herausreisst. Man muss dann entweder das Unkraut dicht am Boden mit dem Messer abschneiden, oder beim Ausziehen mit zwei Fingern auf die umgebende Erde drücken, um das Heben derselben zu verhindern. Bei allen nicht stark mit Erde bedeckten Saaten ist bei Sonnenschein ein Beschatten unerlässlich, um das Austrocknen zu verhindern und manchen jungen Pflänzchen Schutz zu gewähren. Im Freien unterbleibt es gewöhnlich wegen der Grösse der Flächen; die einzige, allgemein anwendbare Beschattung ist eine Bedeckung mit Reisern, Tannenzweigen, allenfalls auch mit Rohr- und Bastdecken. Wo es sich um Aussaaten handelt, auf die man besonderen Werth legt, sollte das Beschatten nicht versäumt werden. Die Aussaaten in Mistbeeten, sei es im Lande oder in Gefässen, müssen unbedingt gleichmässig beschattet werden.

XV. Die Saat von Grassamen und Rasenpflanzen zu Gartenrasen und Wiesen.

Garten- oder Schmuckrasen.

27. Der Gartenrasen lässt sich in drei Rubriken bringen: 1. Der Gartenrasen im allgemeinen Sinne für den Park und parkartigen Garten; 2. für Teppichgärten; 3. Bleichrasen. Für diese Abtheilungen werden in allen grossen Samenhandlungen Mischungen zusammengestellt. Bleichrasen gehört eigentlich nicht zum Schmuckrasen, man versteht darunter einen kurzen, dichten Gartenrasen. Dieser soll im allgemeinen aus niedrig bleibenden Gräsern bestehen, welche nicht oder selten zur Stengelbildung kommen. Aus den feinsten Arten solcher Gräser bestehen die kostspieligeren Mischungen für Teppich- und Blumengärten. Da die ganze Wirkung der auf Rasenplätzen angebrachten Blumen oder Blattpflanzen von der Schönheit der Grasfläche abhängt, so

muss darauf die grösste Sorgfalt verwendet werden. Diese besteht in guter Zubereitung des Bodens und in Anwendung des besten Saatgutes.

Bei der Samenbestellung gebe man stets die Lage, sowie die Beschaffenheit des Bodens an, wenn die erstere trocken oder nass, letzterer nicht normaler Gartenboden ist.

Da sich unter günstigen Umständen auf wüstem und der Cultur entzogenen Plätzen und Feldern von selbst Rasen bildet, und der Bauer ein Uebriges zu thun glaubt, wenn er sogenannten Heusamen auf den aufgekratzten Boden streut, so sind Viele der irrigen Ansicht, die Anlage von Grasplätzen erfordere wenig Mühe. Aber dem ist nicht so, wenigstens nicht, wo es sich um eine dichte, grüne Grasnarbe und wirkliche Schönheit des Rasens handelt. Die Bedingungen eines guten Erfolges der Grasanlagen sind folgende: 1. genügende Bodenvorbereitung; 2. richtige Wahl der Grasarten je nach Verschiedenheit des Bodens, der Lage und der Bestimmung; 3. richtiges Verfahren bei der Aussaat; 4. gute Pflege nach dem Aufgehen des Samens.

Eine dieser Bedingungen ist fast so wichtig wie die andere, aber keine wird so vernachlässigt wie die erste. Sollen Gräser gut gedeihen und zur dichten, reinen Grasnarbe werden, so muss der Boden gut vorbereitet sein. Gut cultivirtes Garten- und Ackerland, zum Theil auch alter Wiesen- und Weideboden ist meist ohne andere Vorbereitung als Boden-Ausgleichung und Bearbeitung zu benutzen. Sehr wesentlich ist die Ausgleichung, das Abtragen und die Auffüllung von Boden. Dabei wird oft dadurch gefehlt, dass man bei Abtragungen den oberen guten Boden in die Vertiefungen schafft, welche ohne dies den besten Boden haben, so dass an der abgetragenen Stelle roher Boden bleibt, welcher nur einen kümmerlichen Graswuchs ermöglicht. Der gute, sogenannte Mutterboden muss vor dem Abtragen beiseit geworfen werden. In Vertiefungen bringe man erst schlechten Boden, welcher so gestampft wird, dass er sich nicht sehr setzen kann, sonst giebt es an der Stelle üppigeres Gras, was der Umgebung gegenüber unangenehm auffällt. Werden Gartenwege verlegt, so müssen sie so tief ausgegraben und mit Culturerde angefüllt werden, dass die Stellen der Umgebung gleichen; zudem ist es zweckmässig, bei dem Umgraben der ehemaligen Wegränder den Boden mit dem herbeigeschafften zu vermischen, sonst

sieht man noch jahrelang die ehemaligen Weglinien an der Beschaffenheit des Grases. Zum Auffüllen alter Wege dient die aus den neuen Wegen ausgegrabene Erde.

Rodeland, wo ehemals Wald und Gebüsch stand, neues Ackerland und Wiesenboden müssen nach dem Ausgleichen (Planiren) und Umarbeiten wenigstens noch ein Jahr mit Hackfrüchten bebaut werden, um das Unkraut daraus zu beseitigen, wobei Waldboden durch Düngung verbessert wird.

Beobachtet man das nicht, so ist die Folge davon, dass noch vor dem Aufgehen des Grassamens Unkraut in Masse hervorbricht und den Rasen so verdirbt, dass er nach kurzer Zeit nochmals angesäet werden muss. Will man keine Hackfrucht in der neuen Anlage, so säe man nur einjährige und kurzlebige Gräser, welche auch wohlfeil sind, besonders Raigras (*Lolium perenne tenue*) und einjähriges Rispengras (*Poa annua*). Diese Vorbereitungsgräser säet man alljährlich oder nach zwei Jahren wieder, bis das Land in der Hauptsache unkrautfrei geworden ist. Auch *Aira flexuosa*, der sog. falsche Goldhafer (nicht der echte *Avena flavescens*), giebt ein schönes, kurzes dunkelgrünes Gras und bestockt sich stark, verschwindet aber von selbst, sobald der frische Humus verzehrt oder zersetzt ist. Diese wohlfeile Grasart ist zu provisorischen Saaten auf Waldrodungen nicht zu unterschätzen. Werden solche vorbereitende Bodenverbesserungen versäumt, dann kann die Rasensaat verunglückt genannt werden, und in diesem Falle giebt man das Misslingen oft schlechtem Samen schuld, besonders, wenn im Gartenrasen viele hohe, grobe Büschelgräser aufkommen, deren Samen bereits in dem Boden war.

Die gewöhnliche und in allen Fällen nothwendige Bodenvorbereitung wird ganz wie zum Anbau von Culturpflanzen im Garten und Feld ausgeführt. Der obere Culturboden muss eben so sorgfältig bearbeitet werden wie für Gemüse und Blumen, nur weniger tief. Auf keinen Fall darf man rohen Boden obenauf bringen, sonst bilden solche Stellen Jahre lang einen Schandfleck auf dem Rasen, welcher nur wiederholter Oberdüngung, besonders mit Guano und Taubenmist oder Mistjauche, weicht. Bei kleinen Anlagen wird der Boden flach, aber fein gegraben und geglättet, grosse Flächen aber werden mit dem Pfluge vorbereitet. War das Land vorher Acker mit Furchen, so müssen diese erst ver-

schwinden, zu welchem Zwecke man das Land zuerst quer (im rechten Winkel mit den Furchen), dann nochmals der Länge nach pflügt. Sind die Beete oder Sattel in der Mitte ziemlich hoch, so bleiben auch nach dem Querpflügen die Furchenvertiefungen. Man lässt dann zuerst die Furchen von zwei Seiten zuackern (Zusammenackern), so dass die Endfurchen auf den Beetrücken kommen. Ein vollständiges Planiren wird indess erst dadurch erreicht, dass man mit Hacke und Schaufel oder Spatenarbeit die nach dem Zuziehen der Furchen noch bleibenden Rücken abträgt und in die Vertiefungen wirft. Werden diese Ausgleichungen versäumt, so erkennt man noch nach vielen Jahren das Ackerland. Bei dem Pflügen von Wald- und Wiesenboden darf der Pflug nicht wenden, weil sonst Furchen entstehen, sondern man muss so pflügen, dass der Boden nur nach einer Seite fällt, man darf also keine Sattel, sondern muss die ganze Fläche von der Mitte nach zwei Seiten pflügen, wo dann nur bei dem Zusammentreffen der zwei ersten Furchen ein wenig bemerkbarer, schmaler Rücken entsteht. Nach dem Pflügen wird die Egge über das ganze Land gezogen, wobei vorhandenes Unkraut, Stroh und Wurzelwerk entfernt werden.

Nun folgt in allen Fällen ein Festmachen der Oberfläche des gelockerten, planirten Landes. Dies geschieht im Garten durch Treten, am besten mit angeschnallten Trittbrettern (Zwiebeltreter), bei grossen Flächen im Park durch Walzen mit der Holzwalze. Dieses Fusstreten oder Walzen ist durchaus nothwendig, nicht nur weil der Samen auf festem Boden besser keimt, sondern auch, weil beim Säen und Bedecken in dem lockeren Boden tiefe Tritte entstehen, in welche der Same fällt. Wir ziehen das Treten dem Walzen auf lockerem Boden vor, wo die Fläche nicht zu gross ist, denn durch das Walzen, besonders mit schweren Gartenwalzen, entstehen oft wellige Formen, durch das Treten dagegen bleibt die Bodenfläche gleich, wenn diese Operation sorgsam und geschickt bewirkt wird. Nach dem Treten oder Walzen wird der Boden mit dem Rechen oder einer leichten Hand-Dornegge wieder rauh gemacht, wobei auch die Trittstellen zugezogen werden.

Ist das Land richtig vorbereitet, so nimmt man die Aussaat morgens oder abends an einem windstillen Tage vor und zwar am besten, wenn Regen zu erwarten oder ein solcher, der das Land nicht verschlemmt hat, bereits gefallen ist.

Man säet im Frühjahr bis Ende Juni (je nach der Witterung), dann wieder von Anfang September an. Die späte Frühjahrssaat im Mai und Juni geräth meistens besser als eine zeitige im März, wo trockene Winde vorherrschen und Kälte das Keimen verzögert, zuweilen sogar ganz verhindert. Ist der April nicht ungewöhnlich kalt, so dürfte derselbe als bester Saatmonat zu betrachten sein. Das in den Mischungen enthaltene Raigras keimt zuerst, die anderen Gräser folgen nach und nach, und bis Ende Juni ist der junge Rasen gesichert. Nur selten verunglücken Frühlingssaaten durch Trockenheit; dies ist häufiger im September der Fall, wenn sich ein heisser Nachsommer einstellt und der Nachthau schwach ist. Man wirft in solchen Fällen die Schuld oft auf die Qualität des Samens, während doch das Keimen desselben Samens auf feuchtem Boden beweist, dass er gut war. Fällt die Zeit der Aussaat in eine trockene Periode, so scheint uns eine vorherige gründliche Boden-Bewässerung für den Aufgang sehr förderlich.

Die Ursache ungenügenden Aufgangs ist in den meisten Fällen auf mangelhafte Bodenbeschaffenheit und Bearbeitung oder auf Ungunst der Witterung zurückzuführen. Zugegeben, dass unter den leichten Grassamen zahlreiche, nicht keimfähige sich befinden, die nicht zu erkennen ist, so wird doch meist so dicht gesäet, dass weniger als die Hälfte der Samen genügen würde, um einen vollen Rasen zu erzielen. Man kann sich leicht vor der Saatzeit durch Keimproben (§. 13) von der Tauglichkeit des Saatgutes ein Bild machen.

28. Das eigentliche Aussäen des Grassamens hat bei einiger Uebung keinerlei Schwierigkeit. Um die Dichtigkeit der Saat zu bestimmen und sich zu überzeugen, ob oder wie weit der gekaufte Samen ausreicht, kann man leicht eine Probe aufstellen, indem man auf eine Einheit eine bestimmte Menge von Samen vertheilt und sich überzeugt, ob er dicht genug fällt. Früher rechnete man auf eine Quadratruthe $\frac{1}{2}$ —1 u. Samen, ersteres für Wiesen und grosse Saatflächen, letzteres Quantum für feinen, schnell dicht werdenden Gartenrasen, wobei die bei Gartenrasen gebräuchliche grössere Quantität von schwerem Raigrassamen im Gewicht von Einfluss ist. Will man ohne Samenverschwendung säen, so dürfte $\frac{1}{4}$ Kilo ($\frac{1}{2}$ u.) für die □ Ruthe, d. h. 45—50 Kilo für den alten preussischen Morgen, 180—200 Kilo für den Hektare genügen. Nehmen wir die alte □ Ruthe zu 14 □ Meter an.

Man wiege also von der fertigen Mischung $\frac{1}{4}$ Kilo ab und besäe damit die abgegränzte Fläche. Erscheint die Saat nicht dicht genug, so wird so viel zugewogen, wie man nöthig zu haben glaubt.

Zu dicht wird die Saat selten werden, denn nach Sinclair fand man auf einem englischen $\square$ Fuss durchschnittlich 1000 Graspflanzen, auf schlechtem, trockenen Boden $\frac{1}{3}$ weniger, auf Wasserwiesen bis 1800 Pflanzen. Es kommt also nur der Kostenpunkt in Betracht. An den Wegen macht man die Saat dichter, am dichtesten, wenn auch die Kanten der Wege angesäet werden. An steileren Anhöhen muss oben ebenfalls dichter gesäet werden, nicht nur weil es oben trockener ist, sondern auch, weil der Regen den noch nicht gekeimten Samen fortschwemmt und unten ansetzt. Ist Samen bei starkem Regen durch Wasserrisse abgeschwemmt, so nehme man Erde und Samen zusammen und streue sie an abgeschwemmten Stellen wieder aus. Sind durch Wasserrisse bereits gekeimte Samen fortgeschwemmt, so feuchte man die Erde mit dem Samen zu einem Brei an und streiche diese Masse mit der Maurerkelle in die Risse. An sehr steilen Böschungen kann man auf diese Art die ganze Saat bewirken.

Nachdem die Saatquantum-Probe gemacht ist (die natürlich im Grassäen geübte Leute nicht nöthig haben), wird zum Säen geschritten. Dieses ist insofern schwierig, als keine Furchen vorhanden sind, welche die Grenzen der fertig gesäeten Theile und die gerade Linie des Saatganges bezeichnen. Eine Sicherheit für Gleichmässigkeit erhält man, wenn ein im gradlinigen Gehen geübter Mann einen langen spitzen Stock unter den Arm nimmt und damit eine Linie in den Boden einritzet. Diese gerade Linie erzielt man sicher nur, wenn man den Blick auf einen vorher gewählten Gegenstand fest richtet, und auch gehend im Auge behält. Wer hierin keine Sicherheit hat, mag einen langen Faden spannen. Diese Linien werden über das ganze Saatland höchstens 1 m von einander gezogen und bezeichnen die Saatstreifen, in deren Mitte man zu gehen hat, und welche auch den die Saat bedeckenden Leuten als Richtschnur dienen. Wir empfehlen, den Grassamen stets zur Hälfte mit nicht ganz trockener, staubiger Erde, Asche (auch von Braunkohlen), in Ermangelung anderer Stoffe mit feinen Sägespänen gut zu vermischen, um das Zusammenballen feiner Samen in Klumpen, sowie das nur zu leicht vorkommende Verwerfen der leichtesten Samen zu verhüten. Die

Grösse und Schwere der Grassamen ist so verschieden, dass z. B. von *Agrostis capillaris* (alba) und *A. stolonifera* 5 Millionen, von *Poa pratensis* 2 Millionen, von *Lolium perenne tenue* nur 220,000 Samen auf $\frac{1}{2}$ Kilo gehen. Und doch kommen alle drei in der Mischung vor. Man ersieht hieraus, wie sorgfältig die Mischung sein und wie geschickt das Ausstreuen geschehen muss. Das Mischen geschieht am besten auf dem Saatplatze, z. B. in einem Waschtrog. Der Samen wird aus voller (aber nicht gefüllter) Hand ausgestreut, entweder mit gleichmässigem Strich, wie bei Getreide oder durch eine Zickzackbewegung des Armes quer über die Saatreihen. Hierbei hat man sich nach dem herrschenden Luftzuge zu richten und darauf zu sehen, dass auch die etwa nicht getroffenen Nebengrenzen ihr Theil bekommen. Zum Säen bedient man sich einer Schürze oder eines Sätuches.

Soll Klee unter die Grassaat kommen, so wird er wie auf dem Felde mit drei Fingern für sich ausgesät, weil er sich beim Mischen und Säen immer zu Boden setzt, daher nicht gleichmässig fallen würde. Dasselbe gilt auch von anderen schweren Samen, z. B. Wicken, Hornklee (*Lotus corniculatus*), Esparsette, Luzerne etc., welche man zuweilen auf Wiesen zusetzt, während Schafgarbe (*Achillea millefolium*) sich gut mit Grassamen mischt. — Das Bedecken geschieht wie bei der Breitsaat (§. 19) angegeben, durch Einhacken oder Einkratzen. Um eine noch vollständigere Vertheilung der verschiedenen Grasarten zu erzielen, schiebt man den Rechen erst längs der Säelinien, dann nochmals im rechten Winkel davon über das Land.

Nachdem so der Samen schwach bedeckt ist, wird eine nicht zu schwere Gartenwalze langsam über die Saatfläche gerollt. Das Umwenden derselben darf nicht auf der Saatfläche geschehen, es sei denn in grossem Bogen. Zum Walzen muss der Boden abgetrocknet sein.

Wahl der Grasarten und Grasmischungen.

29. Guter dauerhafter Rasen kann nur durch Ansaat verschiedener Grasarten erreicht werden. Das charakteristische der Grasnarbe ist, dass sich viele Arten von Kräutern gegenseitig ergänzen. Bald bekommen die einen die Oberhand, bald die andern, je nach der Bodenbeschaffenheit und Witterung, und

schliesslich behält diejenige Art die Oberherrschaft, welcher der Boden am besten zusagt. Es giebt nur einige Grasarten, welche für sich allein einen schönen, aber nie lange dauernden Rasen bilden, nämlich feines Raigras (*Lolium perenne tenue*), welches entweder schon im ersten Winter so ausfriert, dass das Stück nicht bleiben kann oder doch im zweiten Jahre lückenhaft wird, ferner das niedrige einjährige Rispengras (*Poa annua*) und das Wiesenrispengras (*Poa pratensis*), welches nicht abstirbt, aber auf gutem Boden leicht durch üppigen Stand faulende Stellen bekommt und dann schlecht aussieht. Sonst ist es ein frühes Gras und von wunderschönem Grün. Es giebt Gärtner, welche ihre kleinen Rasenplätze alljährlich neu durch die Aussaat mit solchen Grasarten oder auch nur aus Raigras herstellen, und im Sommer einen Rasen von unübertrefflicher Schönheit haben. Gleichwohl wollen wir Niemanden dazu verleiten, denn erstens missrath zuweilen die Aussaat, wie schon oben bemerkt wurde, durch trockene Frühjahrswitterung, zweitens fehlt im Winter, da das Land am besten bereits im Spätherbst zu diesem Behufe umgegraben werden muss, sowie im ersten Frühjahr das treue Grün der Rasenfläche, welches das Auge so erfreut.

Wir haben also zur Anlage von Rasen eine Mischung aus verschiedenen Grasarten nöthig. Hierbei entscheidet besonders die Bodenbeschaffenheit, obschon einige Arten überall gedeihen. Auf trockenem, sandigem und steinigem Boden müssen die Bergtriften-Schwingel, nämlich *Festuca ovina* und *rubra* das Beste thun, wozu noch *Agrostis* in mehreren Arten kommen. Für eigentlich nassen Boden und Moorland fehlen gute Gartenrasengräser, denn *Agrostis stolonifera* (Fioringras) ist fast das einzige. Auf gewöhnlichem guten Boden gedeihen alle Grasarten üppig, und man wählt dann die schönsten oder ergiebigsten, wobei auch oft der Preis den Ausschlag giebt. Man hat für verschiedene Zwecke und Bodenarten Rezepte aus den verschiedensten Grasarten in sehr von einander abweichendem Mischungsverhältniss zusammengestellt, und jedes einigermassen vollständige Gartenbuch enthält deren mehrere. Jede Samenhandlung hält Mischungen zu verschiedenen Zwecken und für verschiedene Bodenarten vorrätbig, deren Preis nicht nur von dem Werth der darin enthaltenen Gattungen sondern auch von der Reinheit und Schwere des Saatgutes abhängig ist.

Einen Hauptbestandtheil der verschiedenen Rasen-Mischungen bildet überall das englische Raigras. Es hat dies seinen Grund darin, dass man es stets rein und keimfähig bekommt, dass es schnell (schon nach 6—8 Tagen) aufgeht, also die Fläche begrünt und dadurch die später keimenden Grasarten beschattet und schützt.

Feiner Garten- und Bleichrasen.

30. In den hier folgenden hauptsächlichlichen Rasen-Mischungen werden die Gewichtsmengen der darin enthaltenen Sorten unter Berücksichtigung der verschiedenen Bodenverhältnisse zusammen gestellt.

1. Feiner Garten- oder Bleichrasen für jeden Boden passend, besteht aus:

Lolium perenne tenue, englisches Raigras,
Festuca duriuscula, harter Schwingel,
Poa pratensis, Wiesen-Rispengras,
Agrostis stolonifera, Fioringras,
Cynosurus cristatus, Kammgras.

2. Gartenrasen für leichten und Sandboden, sogenannte Berliner Thiergartenmischung:

Lolium perenne tenue, englisches Raigras,
Festuca ovina, Schafschwingel,
Agrostis capillaris (alba), Haargras oder
 „ *stolonifera*, Fioringras,
Poa pratensis, Wiesen-Rispengras.

3. Feinster Gartenrasen, für Teppichgärten, Parterres und Schmuckrasen:

Lolium perenne tenue, englisches Raigras,
Poa pratensis, Wiesen-Rispengras,
Agrostis stolonifera, Fioringras,
Festuca ovina angustifolia (tenuifolia), schmal-
 blättriger Schwingel,
Cynosurus cristatus, Kammgras.

4. Gartenrasen für schattige Lagen.

Die wirklichen Wald-Schattengräser haben meist breite Blätter, wie *Brachypodium sylvaticum*, *Melica coerulea*

und *Carex arenaria*, begrünen nur, sind aber nicht rasenbildend. Als beste Schattengräser sind zu empfehlen:

- Cynosurus cristatus*, Kammgras,
- Festuca duriuscula*, harter Schwingel,
- „ *ovina*, Schafschwingel,
- „ *rubra*, rother Schwingel,
- Poa nemoralis*, Hain-Rispengras,
- „ *pratensis*, Wiesen-Rispengras,

welche Arten wir zu dieser Mischung anwenden und derselben noch *Lolium perenne tenue*, englisches Raigras, beifügen.

5. Trocadero-Mischung, zur raschen Erzielung des feinsten Rasens, bestehend aus:

- Lolium perenne tenue*, englisches Raigras,
- Cynosurus cristatus*, Kammgras,
- Poa pratensis*, Wiesen-Rispengras.

6. Mischung für Rasenkanten.

Um den Rasen an den Wegen entlang einen festen Halt zu geben, empfiehlt es sich, namentlich bei Anlagen grösserer Flächen, Rasenkanten anzusäen, für welche wir eine Mischung bilden aus:

- Cynosurus cristatus*, Kammgras,
- Festuca ovina angustifolia*, schmalblättriger Schwingel,
- Trifolium repens*, Weissklee.

Ob man weissen Steinklee (*Trifolium repens*) unter den feinen Gartenrasen mischen soll oder nicht, ist eine streitige Frage. Wo aus Gräsern allein ein schöner dichter Gartenrasen entsteht, wie überall auf gutem Boden, rathen wir nicht dazu; wo aber auf trockenem Boden jeder Art der Rasen nie dicht wird, daher von der Sonne ausdorrt, da ist Weissklee fast unersetzlich. Wo der Rasen mit der Maschine immer kurz gehalten wird, kommt der Klee nicht zur Blüthe, treibt nicht einmal die beim Mähen schwer zu treffenden, liegenden Stengel (Ranken) und bildet mit Schwingelgräsern einen dichten, schönen Rasen.

Wiesen- und Weidegräser.

31. Wenn auch die Anlage von Weideplätzen und Wiesen nicht in den Rahmen dieses Buches gehört, so wollen wir doch einige kurze Andeutungen darüber geben. Die Boden-Vorberei-

tung ist im vorigen Abschnitt ausführlich beschrieben; was die Samenmenge betrifft, so geht man bei Wiesen sparsamer zu Werke als bei Gartenrasen: 80 bis 100 Kilo für den Hektare sind vollkommen hinreichend. Viele Saaten werden sogar schwächer gemacht, und auf gutem Boden genügen selbst 50 Kilo für den Hektar. Für steile Böschungen, Flussufer, Eisenbahndämme u. s. w. werden Mischungen aus den billigsten Grasarten, vorwiegend aus Schafschwingel (*Festuca ovina*) und Honiggras (*Holcus lanatus*) bestehend, mit einem Zusatz von gelbem Steinklee, zusammengesetzt. An oft überschwemmten Ufern und lockeren Dämmen sollte die Quecke (*Triticum repens*) nicht fehlen, da sie den Boden besonders befestigt.

Bei der Ansaat von Wiesen handelt es sich hauptsächlich um den Futterwerth und die Futtermenge. Es gilt daher, nicht nur die nahrhaftesten, sondern auch die auf jedem besonderen Boden ergiebigsten Gräser und Futterkräuter auszuwählen.

Zu diesem Zwecke führen wir folgende Mischungen: 1) für gewöhnlichen guten Boden, 2) für trockenen Boden, 3) für nasse Wiesen. Diese Gräser müssen theils solche sein, welche Massenfutter geben, sogenannte Obergräser mit langen Stengeln und Blättern, welche aber allein nie dichten Rasen bilden, und Füllgräser, welche Sprossen oder Stolonen treiben, sich dadurch ausbreiten und die Grasnarbe dicht machen. Zu den ersteren gehören unter den guten Gräsern: Das Knaulgras (*Dactylis glomerata*), das Timothygras (*Phleum pratense*), der Wiesenfuchsschwanz (*Alopecurus pratensis*), französisches Raigras (*Avena elatior*), italienisches Raigras (*Lolium italicum*), Wiesenschwingel (*Festuca pratensis*), rauhes Rispengras (*Poa trivialis*) u. a. m.

Auf trockenem Boden ist das Honiggras (*Holcus lanatus*), und der noch bessere *Holcus mollis* (Samen jedoch seltener und theuer), welcher sich sehr bestockt und durch Sprossen ausbreitet, werthvoll. Des köstlichen Heugeruchs wegen sollte auf nicht nassem Boden das Ruchgras (*Anthoxanthum odoratum*) nie fehlen. Füllgräser sind in der Hauptsache die bei dem Gartenrasen genannten, und es kann darin auf jedem Boden das überall gedeihende Fioringras (*Agrostis stolonifera*) vorherrschen, obschon es andere bessere Arten giebt, die mehr „Schmalz“ (d. h. kurzes, feinblättriges Gras) liefern. Solche sind das Kammgras (*Cynosurus cristatus*), Wiesen-Rispengras (*Poa pratensis*) und harter

Schwingel (*Festuca duriuscula*). Hierzu gehören noch die erwähnten andern Futterkräuter. Wir bemerken dabei nur, dass rother Kopfklee im Rasen selten ausfriert, schwedischer Bastardklee (*Trifolium hybridum*) für nassen Boden geeigneter und ebenfalls sehr ergiebig ist; ferner, dass Incarnatklee und gelber Hopfenklee nur einen Sommer dauern, *Lotus corniculatus* sowohl trocken als nass gedeiht, Esparsette (*Hedysarum Onobrychis*) und Luzerne (*Medicago sativa*) in kalkarmen Boden bald aussterben, dagegen in Kalkboden 8—10 Jahre in ungeschwächter Ergiebigkeit dauern. Schaafgarbe (*Achillea millefolium*) kann nur auf sehr trockenem Boden, namentlich auf Viehweiden als Füllgras benutzt werden, breitet sich dort aber leicht zu sehr aus. Dagegen wird Kümmel und Pimpinelle auf Wiesen gern gesehen. Spitzwegerich (*Wegebreit*) ist ein gutes Futter für sich allein, wir warnen aber vor Untermischung, weil auf trockenem Boden der Samen vor der Heuernte reift und diese Pflanze allmählich die Gräser verdrängt. —

Wer Wiesenblumen liebt, möge Ackeley (*Aquilegia vulgaris*), Gaisraute (*Galega officinalis*), perennirende Lupinus, Alpenvergissmeinnicht etc. zwischen den Wiesengrassamen säen.

32. Die §. 27 erwähnte Pflege der jungen Grassaat besteht hauptsächlich im häufigen Mähen und Walzen, sowie im Ausjäten des Unkrauts. Sobald die Grasblätter hart genug sind, muss die Sense darüber gehen, damit sich die Pflanzen bestocken und die noch kleinen oder keimenden Füllgräser, welche später als andere Gräser, besonders als das Raigras keimen, Luft und Licht bekommen. Die Mähmaschine, welche in ihrer heutigen Vollkommenheit für das Instandhalten feiner Grasnarben nicht genug empfohlen werden kann, eignet sich zu diesem ersten Mähen weniger als die Sense. Dieses Mähen wird wiederholt, so oft das Raigras Blütenstengel treibt und je nach der Witterung bis zum Herbst wenigstens 5—6 mal, zuletzt noch auf bereits gefrorenem Boden. Lässt man im Herbst solches Gras stehen, so nisten sich unter dem Schnee Mäuse ein, welche ganze Stellen verderben. Nach jedesmaligem Mähen muss das Gras gut abgekehrt werden, und unterbleibt dies nur ausnahmsweise an sehr heißen Tagen, um durch die abgeschnittenen Spitzen dem Rasen einen leichten Schatten zu gewähren. Bei dem Jäten hat man hauptsächlich die ausdauernden Unkräuter auszuziehen oder auszustechen, denn die einjäh-

rigen werden meist durch das Abmähen vertilgt. Stehen solche aber dicht, so könnten sie der Grassaat schaden, müssen daher ausgezogen werden.

Zur Pflege der Grassaat ist auch das Begiessen bei Trockenheit zu rechnen, welches für kleine Flächen nicht genug befürwortet werden kann. Bei Grasplätzen von grosser Ausdehnung verbietet es sich jedoch der bedeutenden Kosten wegen in den meisten Fällen von selbst, denn nur durch nachhaltiges, tägliches Giessen ist bei grosser Trockenheit der Rasen schön zu erhalten. Wir bemerken noch, dass das Giessen vorsichtig und gleichmässig auszuführen ist, weil sonst der Samen leicht weggeschlemmt oder ein ungleichmässiges Grün hervorgerufen wird. — Die herrlichen Grasflächen der englischen Parks lehren uns, was bei aufmerksamer Behandlung und steter Pflege erzielt werden kann, aber es sind letztere beiden Punkte gerade hier auch unerlässliche Bedingungen.

XVI. Oekonomische, medizinische und technische Handels-Pflanzen.

33. Auch der Anbau dieser Pflanzen streift schon über die Grenzen unseres Buches; wir greifen daher nur einige heraus, bei deren Cultur oft Fehler gemacht werden, oder welche sich besonders auch für den Anbau im Kleinen eignen. *)

1. Baldrian (*Valeriana officinalis*), ist eine ausdauernde Pflanze, welche in einigen Gegenden Thüringens auf schwerem, kalkreichen Lehm Boden vielfach gezogen wird. Der Same wird breit auf frisch gepflügtes Land gestreut und nur eingewalzt, oder man sät in engstehende Reihen, wodurch stärkere Wurzeln erzielt werden. Dieselben brauchen meist drei Jahre, ehe sie gegraben werden können.

2. Bilsenkraut (*Hyoscyamus niger*), verlangt trockenen, kalkhaltigen Boden, nimmt mit dem schlechtesten fürlieb, doch muss dieser vor der Saat oberflächlich fein bearbeitet werden. Cultur ziemlich wie Mohn. Der sehr feine Samen darf nur eingewalzt werden. Wird vollkommen ausgewachsen geerntet und meist grün verkauft.

*) Ueber den Anbau aller in Mittel-Europa zu ziehenden medizinischen und vieler technischer Pflanzen giebt der „Apothekergarten“ von H. Jäger (zweite Auflage, Hannover bei Philipp Cohen) ausführliche Belehrung.

3. Fingerhut (*Digitalis purpurea*), jedoch nur die wilde Art, wird fast nur grün verbraucht, deshalb gern angebaut. Der Samen der zweijährigen Pflanze wird im Juni gesäet und ganz schwach bedeckt. Die Pflanzen bekommen etwa 20—25 cm Abstand. Das Sammeln der Blätter darf erst geschehen, wenn der Blütenstengel halb ausgewachsen ist.

4. Die Kamille (*Matricaria Chamomilla*), eignet sich für den landwirthschaftlichen Anbau, namentlich für den Kleinbesitzer. Man baut sie entweder als Vorfrucht, wozu sie im März bis April gesäet wird, oder nach der Getreideernte auf die Stoppel. Sie braucht von der Aussaat bis zur Blüthe nur 8 Wochen. Der Samen wird dünn breit ausgesäet und wie Grassamen behandelt.

5. Kümmel (*Carum Carvi*). Einträgliche Cultur, welche zu wenig bekannt ist. Man säet im Spätsommer oder zeitig im Frühjahr sehr dicht in enge Reihen oder breit, oder man pflanzt ihn. Die erstere Art ist für den Selbstbedarf, die zweite für den Handel. Der Kümmel ist zwar einjährig, aber von den dicht und im Grase stehenden Pflanzen bleiben die schwachen mit der Stengelbildung zurück und halten sich mehrere Jahre. Von den dicht gesäeten Pflanzen treiben die stärksten und freier als andere stehenden Samenstengel und werden im Juli ausgezogen. Hier auf entwickeln sich im folgenden Jahre andere in grösserer Menge, welche Samen tragen. Und so geht es einige Jahre fort, bis der Ertrag zu gering wird, und das Unkraut im Feld überwuchert. Bei Reihensaat und Behacken ist der Ertrag höher. In der Gegend von Erfurt, wo Kümmel im Grossen angebaut wird, ist folgende Cultur gebräuchlich und ergiebig. Die Aussaat geschieht zeitig im Frühjahr, und zwar wird der Samen in Reihen von ca. 30 cm Entfernung gedrillt. Während des Sommers ist nochmaliges Durchhacken nöthig und sind die Pflanzen, wenn sie stark genug geworden, zu verziehen, sodass sie in den Reihen auf ca. 15 cm Entfernung von einander stehen; gleichzeitig bessert man mit den ausgezogenen Pflanzen etwa vorhandene Lücken aus. Der Samen reift im zweiten Jahre von Anfang bis Mitte Juli; da er leicht ausfällt, so schneidet man ihn vor der völligen Reife (und zwar sehr früh am Tage) ab und lässt ihn in Bündeln nachreifen, worauf er auf Tüchern auf dem Felde gedroschen wird. Sehr zweckmässig ist auch die Mischcultur mit Wintergetreide oder Raps, allenfalls auch mit Gerste. Nach der Ernte liefert das Kümmelfeld eine gute Viehweide.

6. Mais (*Zea Mais*). Die Verwendung des Mais zu Gemüsen und Suppen ist bei uns gegenüber dem massenhaften Bedarf in den Vereinigten Staaten, wo man denselben als ein Nationalgericht (Sweet Corn) betrachtet, nur wenig bekannt. Der Samen fast aller Sorten kann, bevor er hart geworden, gekocht und verspeist werden, jedoch eignen sich die verschiedenen sehr frühen amerikanischen Zuckermais-Arten mit meist runzligem, durchsichtigen Korn besonders für diesen Zweck. — Der Mais fürchtet den Frost; in das freie Land säet man ihn daher nicht gern vor Mai. Wir empfehlen für unser Klima, ihn an geschützten Lagen oder in das Mistbeet zu säen, gegen Ende Mai in Reihen von 50—60 cm Entfernung an Ort und Stelle zu pflanzen und im Anfang mehrmals zu hacken. Die frühen Sorten werden bei uns im Laufe des August zu gedachten Zwecken verwendbar, namentlich wenn man der Pflanzung bei andauernder Trockenheit mit Bewässerungen zu Hülfe kommt. Zu bemerken ist noch, dass man den Samen entweder am Kolben oder von diesem losgelöst wie weisse Bohnen kochen und geniessen kann. Die ganz jungen 6—8 cm langen Kolben schmecken, in Essig wie Pfeffergurken eingemacht oder zwischen Mixed-Pickles, sehr pikant.

7. Malven, schwarze (*Althaea rosea* var. *nigra*). (Schwarze Pappel.) Die Cultur dieser Pflanze, deren Blüthen zum unschädlichen Färben des Rothweins sehr gesucht werden, ist einträglich. Die Pflanze ist zweijährig; der Samen wird von Ende Mai bis Ende Juni gesät. Die Pflanzreihen sowohl als die Pflanzen erhalten einen Abstand von $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ m. War das Land im Jahre vorher gedüngt, so ist keine Düngung nöthig, andernfalls mit altem Mist. Zweckmässig ist es, die schwarzen Malven nach Frühkartoffeln zu bauen.

8. Tabak (*Nicotiana Tabacum*). Diese Cultur wollen wir nur andeuten. Die durch Zollmassregeln verursachte Beschränkung ist bekannt. Unsere Tabake liefern nur auf sandigem Boden gute Waare. Es werden zwei Sorten angebaut, der lang- und schmalblättrige mit vielen Unterarten und *Nicotiana rustica*, der dickblättrige, gelblich blühende Veilchen- oder Bauerntabak. Letzterer wird nur selten und nur auf schweren Bodenarten angebaut und hat als Handelsartikel keine Bedeutung. Dagegen haben die aus dem Virginia-Tabak in Europa herausgebildeten Sorten die grösste Verbreitung und liefern das zur Cigarrenfabrikation sehr gesuchte Deckblatt, welches selbst in das Ausland verschickt wird.

Je besser die Sorte, desto einträglicher ist die Waare. Der Tabak liebt lockeren aber dabei substantiellen Boden und ist für Sandboden die lohnendste Pflanze. Er verlangt reichliche, frische Düngung. Da Tabak leicht erfriert, gleichwohl bald gepflanzt werden muss, so wird er im Mistbeet angezogen und erst nach Mitte Mai gepflanzt. Vorzüglicher Tabak wird nur in ebenen, warmen Gegenden gezogen, allein der Anbau in hochgelegenen Gegenden Thüringens zeigt, dass er auch da noch von Vortheil ist.

9. Tollkirsche (*Atropa Belladonna*). Die Pflanze ist ausdauernd und liefert nach 3 Jahren starke Wurzeln, schon im ersten Jahre nach der Vollendung des Wachstums Blätter. Cultur etwa wie bei Tabak, auf tiefem, lehmigen oder lockerem, thonigen Boden. Die Pflanzreihen erhalten $\frac{1}{2}$ m Abstand, die Pflanzen $\frac{1}{4}$ m. Waldbesitzer sollten die Belladonna auf Holzschläge als Zwischencultur anbauen. Die tödtlich giftige Eigenschaft der Samen (Tollkirschen) erfordert Vorsicht.

XVII. Aussaat und schnelle Vermehrung der Kartoffel.

34. Abgesehen von dem Falle, dass es an sogenannten Legkartoffeln fehlt, wird man sich mit der Heranzucht aus Samen nur dann befassen, wenn man neue Varietäten erzielen will, was ja nur auf diesem Wege möglich ist.

Um von der Kartoffelsaat noch eine beachtenswerthe Ernte zu bekommen, muss man den Samen schon im März in ein warmes Mistbeet säen und die Pflänzchen rechtzeitig in ein weniger warmes Beet verstopfen, damit sie stämmig werden; dicht stehende können die freie Luft nicht vertragen. Das Auspflanzen geschieht nach Mitte Mai. Wünscht man nur Saatknohlen für das nächste Jahr, so kann man eng pflanzen. Die Knöllchen, welche man dann erntet, werden in einem gegen Frost geschützten Ort überwintert und im Frühjahr wie andere gelegt. Erwartet man aber eine gute Knollenernte, so werden die Pflanzen in gewöhnliche Entfernung gesetzt und später behäufelt. Aus Samen gezogene Kartoffeln werden seltener von der Krankheit befallen.

Die Cultur der Kartoffel im Grossen liegt ausser den Grenzen dieses Buches, und wollen wir nur angeben, wie man neue, theure Sorten schnell vermehrt.

Man lege die Knollen von Mitte bis Ende April in ein mässig warmes Mistbeet oder, in Ermangelung eines solchen, in einen Kasten, Korb etc., welche man an einen warmen Ort, z. B. in den Stall stellt. Wenn die Keime mit einigen Blättern über der Erde sind, dann haben sie auch reichlich Wurzeln. Man löst sie nun vorsichtig von der Knolle, und pflanzt sie in das Freie, ohne dabei fest zu drücken, weil die Wurzeln sehr weich sind. Ebenso verfährt man, wenn neue Keime erscheinen. Endlich nimmt man die Knolle mit den Wurzeln heraus, und zerschneidet sie in so viele Stücken als Augen vorhanden sind, um sie ebenfalls auszupflanzen. Durch dieses Verfahren kann man die Knollenernte verdreifachen. Das Treiben der Kartoffeln geschieht im Mistbeet vom December bis März und die Ernte ist dem entsprechend von März bis Mai. Die Sechswochen-Kartoffel ist zu diesem Zwecke die geeignetste Sorte.

XVIII. Das Verstopfen oder Pikiren der Sämlinge.

35. Verstopfen (Versömmern, Pikiren) heisst ein Verpflanzen der Sämlinge im jugendlichsten Zustande, wenn sie noch so klein sind, dass sie weder sofort in das freie Land, noch auch einzeln in die zur Weitercultur bestimmten Töpfe etc. gepflanzt werden können.

Durch das Pikiren gewinnen zu dicht stehende Sämlinge Platz, werden wurzelreich, abgehärtet, stämmig, können sich allseitig ausbilden und ertragen dann besser einen freien Standort. Ausserdem hat das Verstopfen den Vortheil, dass man früher säen und die gegen kalte Witterung empfindlichen Pflanzen, ohne sie im Wachsthum zurück zu halten, schützen kann, wenn das Wetter noch ungünstig ist. Ferner ist das Verstopfen das einzige Mittel, um Pflänzchen, welche leicht von Schimmel und Moos leiden (besonders feinsamige Pflanzen wie Calceolarien, Gesneriaceen etc.), zu erhalten, indem man sie schon der Samenschale entnimmt, sobald man sie mit der Pincette erfassen kann.

Wo es nicht an Zeit und Platz mangelt, sollte das Verstopfen nie versäumt werden; bei manchen Pflanzen würde diese Versäumniss unbedingt schädlich wirken. Zu entbehren ist es am ersten bei den Landpflanzen von gewöhnlichen Gartenblumen, Gemüsen oder Gehölzen, fast unerlässlich dagegen bei Gemüsen für Mistbeete und bei Zierpflanzen in Töpfen, mögen dieselben später ausgepflanzt oder im

Topfe weiter cultivirt werden. Dem Mangel an Platz hilft man durch eigens dazu eingerichtete Gartenbeete ab, indem man eine Anzahl davon mit Brettern einfassen lässt, so dass sie zeitweise mit Fenstern, wenigstens mit Läden gedeckt werden können (so genannte Nothkästen). Zu berücksichtigen ist, dass die Pflänzchen durch das Verstopfen zuerst eine Störung im Wachsthum erleiden, was für Pflanzen, welche man zu einer bestimmten Zeit zur Einzelpflanzung fertig haben muss, nicht unwichtig ist. Bei Massenzucht von Pflanzen zum Verkauf ist es häufig nicht anwendbar.

Verstopft man Sämlinge, z. B. Gehölze, Obstbäumchen und Gemüse in das Freie, so muss für Beschattung und häufiges Begiessen, bei übler Witterung auch für Schutz gesorgt werden, denn die geringste Beschädigung der zarten Sämlinge durch Sonnenbrand, rauhe Luft und Frost tödtet sie fast unfehlbar.

Das Pikiren beginnt mit den Topfsaaten im Winter im Vermehrungshause. Diese Pflänzchen sind sämmtlich sehr klein, so dass man sie oft nur mit der Pincette fassen kann. Hierzu dienen runde und viereckige Samenschaalen, Holzkästchen und Töpfe. Die Entfernung der Pflänzchen von einander richtet sich nach der zu erwartenden Grösse der Pflanzenart und der Zeitdauer bis zum Pflanzen in Töpfe oder in das freie Land. Pflanzen, welche schon im Aufgehen gross sind, z. B. Kürbissgewächse, Ricinus u. a. m. werden nicht erst pikirt, sondern gleich einzeln in Töpfe gepflanzt. Man pikirt auch frühe Gemüsepflanzen, z. B. Kohlarten (Blumenkohl, Kohlrabi etc.), Salat und Pflanzzwiebeln (Madeira- und Tripoli-Zwiebeln), welche man schon sehr frühzeitig säet und theils für das Mistbeet bestimmt, wenn keine durchwinterten Pflanzen vorhanden sind, theils für das freie Land.

Zweite Abtheilung.

Anzucht und Anbau der Gemüse aus Samen, im freien Lande, wie in Mistbeeten.

A. Allgemeines.

36. Auf die in der ersten allgemeinen Abtheilung gegebene Anleitung über Lage, Boden, Düngung, Wasser und Bewässerung, Bodenbearbeitung und Reinigung, Mistbeete, Wahl der Sorten, Saatverfahren u. s. w. verweisend, haben wir nur wenig Besonderes über Gemüse nachzutragen. Wer frühe Gemüse im freien Lande ziehen will, muss eine warme, geschützte Lage haben. Er erhält dann seine Produkte mehrere Wochen früher als in weniger warmen Lagen. Aber solche vorzugsweise warme Lagen sind ungünstig, selbst unbrauchbar für gewisse Sommergemüse; an den Anbau von Blumenkohl (Carviol), Broekoli, ist nicht zu denken, und auch andere Kohllarten, besonders Kopfkohl (Kraut), Sellerie u. a. gedeihen nur in nassen Sommern. Aus dem Gesagten geht hervor, dass man schwerlich eine Lage finden wird, welche für das Gedeihen sämmtlicher Gemüseegattungen günstig wäre.

Man muss eben für jede Art die beste Lage auswählen, und es kommt hauptsächlich für den Marktproduzenten darauf an, von den Gemüsesorten, welche auf dem gegebenen Platze am besten und ohne besonders erschwerte Arbeit gedeihen, diejenigen zu ziehen, welche am meisten gebraucht werden und daher am leichtesten verkäuflich sind. Hierbei entscheidet auch namentlich die Entfernung von den Märkten. Wer weit von grösseren Städten wohnt, kann sich auf den Anbau von Salat, Kohllarten (ausser Blumenkohl) und anderen, vom Transport leidenden, dabei viel Raum ein-

nehmenden Gemüsen nicht einlassen, kann aber Gurken, Zwiebeln, Spargel, Melonen und andere stets gesuchte, transportfähige Gemüse bauen. Dies gilt nur im Allgemeinen, denn bei günstigen Transportverhältnissen kann die Anzucht der erstgenannten Gemüse auch für ferner gelegene Absatzgebiete recht einträglich werden, von frühen Treibgemüsen ganz abgesehen. Hat man die Wahl, so ziehe man für den grossen Anbau ein Landstück vor, welches neben feuchtem, aber entwässerbarem Tieflande noch Land von normaler Feuchtigkeit enthält. Liegt dann ein solcher Platz einigermassen günstig für den Absatz, so wird der Gemüsebau ein lohnender.

Zum eigenen Bedarf kann ein Hausgarten durch Arbeit, Bodenverbesserung und Düngung stets in brauchbares Gartenland umgewandelt werden. Anders bei dem Gemüsebau im Grossen. Hier hat man genau zu berechnen, ob die Bodenverbesserung nicht zu kostspielig wird. Geringer Boden ist für den Gemüsebau als Gewerbe an und für sich kein Hinderniss, sondern kann sogar einträglich sein. Dies ist häufig nahe bei grossen Städten und anderen günstigen Absatzgebieten der Fall, wo Düngstoffe, besonders Mist, genügend und billig zu haben sind.

Auf die rationelle Auswahl der Sorten resp. Varietäten kommt schliesslich alles an. Eine falsche Wahl kann den Ertrag grosser Flächen sehr schmälern, in manchen Fällen ganz verhindern. Wir erinnern hier nochmals daran, dass gute und berühmte Sorten sich nicht überall und in jeder Lage bewähren, und dass die Cultur kostspielig, dabei der Erfolg zweifelhaft werden kann, wenn man solche gerühmte Sorten ohne vorherige Versuche im Kleinen sofort im Grossen anbauen wollte. Besonders vorsichtig muss man mit dem Kopfkohl- (Kraut-) und Blumenkohlsorten sein.

Ehe wir zu den einzelnen Gemüsen übergehen, wollen wir nochmals an die Eintheilung in gedüngtes und ungedüngtes Land erinnern, zugleich aber bemerken, dass beim Gemüsebau der Wechsel zwar im Allgemeinen günstig, keineswegs aber in allen Fällen nothwendig ist. Es giebt grössere Bodenflächen, welche für Gemüse so geeignet sind, dass man auf ihnen ununterbrochen dieselben Sorten ziehen kann. Dies beweisen die sogenannten Krautländer in tiefen Lagen vieler Dörfer, wo seit undenklicher Zeit immer nur Kohlköpfe gezogen werden, allerdings mit ungewöhnlich starker Düngung. Hat

man aber Gelegenheit zum Wechseln, so versäume man es trotzdem nicht, denn die Wechselwirthschaft ist besser und dabei wohlfeiler. Sehr günstig wirkt bei den Feldern mit nicht wechselndem Anbau das Rigolen und Bearbeiten mit dem Untergrundpfluge. Ferner ist es sehr vortheilhaft, wenn das Land durch neu aufgetragenen Boden insbesondere Schlamm etc. verbessert werden kann. Dass aber selbst an sich nicht fruchtbarer Boden zur Verbesserung und Aufschliessung lange cultivirten, überdüngten Landes mit grösstem Erfolg beigezogen werden kann, beweist Gonsenheim bei Mainz, wo die Gemüsezüchter von Zeit zu Zeit feinen röthlichen Grubensand auf ihre Grundstücke fahren und untergraben.

Gemischter Gemüsebau, Vor- und Nachanbau.

37. Viele Gemüse werden häufig nicht für sich allein, sondern mit andern vermischt gezogen. Man nennt dies Misch- oder Zwischenanbau. Viele Sorten erreichen eine solche Grösse, dass sie weit gepflanzt oder gesäet werden müssen. Da nun solche Pflanzen lange Zeit zu ihrer Ausbildung bedürfen, so würden grosse Zwischenräume unbenutzt bleiben. Man bepflanzt oder besäet sie daher gern mit anderen, kleineren Gemüsen, welche schnell ihre Ausbildung und Nutzbarkeit erreichen und nennt dies Zwischenfrucht oder Unterbau, z. B. „Kohl unterbaut mit Kopfsalat“. Dieses Unterbauen ist fast überall im Gebrauch, wird leider sogar vielfach übertrieben. So pflanzt man Kopfsalat oft zwischen Kohl und Sellerie oder man bringt Stengelsalat (sogenannte Sommerendivien) auf die Ränder von Gurken- oder Spargelbeeten (nachdem das Stechen vorüber ist). Rabinschen kann man im August zwischen Winter-Porre (Lauch) und Perlzwiebeln säen, nachdem diese zum letzten Mal gehackt sind. Wenn man mehrere Beete mit Erbsen oder Stangenbohnen zusammenbringt, ist es zweckmässig, weitere Zwischenräume zu lassen als den gewöhnlichen, fussbreiten Weg. Man bringt daher die Erbsen oder Bohnen mehr in die Mitte, sodass ein breiter Beetrand bleibt, welchen man zur Ansaat einer Reihe von schnell keimenden und wachsenden Gemüsen, z. B. Gartenkresse, Spinat, Kerbel etc. benutzen kann.

Eine andere Art des gemischten Anbaues besteht darin, dass man zu gleicher Zeit mehrere Gemüse auf dieselben Beete säet. Zwischen Möhren (Mohrrüben, Carotten) kann man Dill und

Fenchel, ferner Lattichsalat und Kohlpflanzen sowie Radieschen ziehen. Radieschen und Frühlkohlrabi sind sehr gut als Zwischenkulturen in Kohlpflanzungen zu verwenden. Salatpflanzen zieht man fast allgemein zwischen anderen Gemüsesaaten. Wenn man Zwiebeln für den Markt zieht und im Sommer verkauft, können dieselben recht gut zugleich mit Petersilien-, Pastinak- und Haferwurzeln gesäet werden. Es giebt Gärtner, welche auf demselben Beete Schmittsalat, Radieschen, frühe Kohlrabi, Möhren, Zwiebel- und Lauchpflanzen u. s. w. ziehen. Wir empfehlen aber diese Methode nicht. So vernünftig auch ein mässiger Zwischenanbau ist, so schädlich wirkt eine übertriebene Anwendung desselben auf das Hauptgemüse, welchem er Nahrung entzieht, die dann oft in einer oder der andern Form wieder ersetzt werden muss.

Nachdem das Zwischengemüse abgeerntet ist, werden die Beete behackt, selbst die mit Breitsaat bestellten flüchtig mit der Zinkenhacke gelockert. Bei Kopfsalat, wo die Wurzeln im Boden bleiben, werden diese beim Hacken entfernt. Der Erfolg dieser Bodenlockerung ist schon nach wenigen Tagen erkennbar.

Bei dem gemischten Anbau in Mistbeeten hat man noch darauf zu achten, dass die vereinigten Gemüse gleiches Wärmebedürfniss haben, sonst leidet sicher das eine. So gerathen z. B. Radieschen nicht in Gurkenbeeten, weil diese bei kühlem Wetter nicht gelüftet werden, und in Melonenbeeten, welche immer warm gehalten werden, kann man keine festen Salatköpfe ziehen.

Da nur wenige Gemüse die Beete im ganzen Jahre einnehmen, so baut man auf denselben vor oder nach der Hauptfrucht andere, kürzere Zeit zur Ausbildung brauchende Sorten, welche man als Vor- oder Nachfrucht bezeichnet. In manchen Fällen treffen jedoch diese Bezeichnungen nicht ganz zu, z. B. wenn man auf Erbsenbeeten, oder nach Frühkartoffeln Endivien, Rapontika, Kohlrabi, Krauskohl etc. zieht; auch bei Schwarzwurzeln (*Scorzoner*) und Spinat, die man im August säet, ist die Benennung „Nachfrucht“ zweifelhaft, denn beide Gemüse bleiben länger als die vorhergegangenen Erbsen, Frühkartoffeln, frühe Kohlrabi und Wirsing etc. Jeder aufmerksame Gärtner muss sofort an die neue Benutzung leer gewordener Beete denken, ja er muss bereits bei dem Anbau der ersten Frucht wissen, welches Gemüse nachfolgen soll.

Anzucht von Winter-Gemüsepflanzen.

38. Gewisse Pflanzen entwickeln sich kräftiger, reifen jedenfalls früher, wenn sie im Herbst gesät und durchwintert werden, und es bildet die Zucht der Gemüsepflanzen, namentlich des Blumenkohls, eine sehr ergiebige Einnahmequelle des Gemüsegärtners, die erste im Jahre aus dem Freien. Man hat dabei besonders gegen die Mäuse auf der Hut zu sein. Am allgemeinsten wird Blumenkohl durchwintert, doch ist es auch für viele Krautsorten, wie Yorker, Maispitz und ähnliche, auch für frühes Rothkraut zu empfehlen. Ausser Kopfkohl (Kraut) wird noch Lattichsalat überwintert, welcher früher Köpfe bildet als der erst im Winter gesäete. Kohlrabi können nicht so behandelt werden, weil sie, gepflanzt, meist Schossen, d. h. Blütenstengel bilden.

Das Verfahren für die genannten Kohlarten ist folgendes: man sät den Samen von frühem Blumenkohl etc. von Anfang bis Ende September, im Mistbeete noch lieber im October, weil die Pflanzen bei warmer Herbstwitterung zu gross werden und sich weniger gut durchwintern und verkaufen. Man pikirt die Pflänzchen, um sie stämmiger zu machen, entweder auf den Saatplatz oder sogleich auf den Durchwinterungsplatz, also in ein gut schliessendes, kaltes Mistbeet ohne Mistunterlage (weil diese Mäuse herbeizieht), oder auf trocken gelegene Beete, welche später bedeckt werden. In Frankreich ist das Durchwintern unter grossen Glasglocken sehr beliebt, man hält es für sicherer gegen Mäusefrass und erzielt stämmigere Pflanzen. Obschon es scheint, als ob diese Glockencultur bei uns niemals Eingang finden werde, so wollen wir sie doch erwähnen. Wenn man unter Glocken, welche bis 50 cm Durchmesser haben, pflanzen will, wird der Rand erst auf den frisch gegrabenen Beeten abgedrückt, dann gepflanzt. Nachdem die Pflänzchen angewachsen sind, wird täglich gelüftet, bis man endlich die Glocken ganz weglässt, und nicht eher wieder aufsetzt, als bis der Boden gefroren ist. Bei grösserer Kälte deckt man die Glockenreihen mit beliebiger Streu, Stroh etc. zu. Werden die Pflanzen unter Glocken und im Fensterbeete zu gross, so verpflanzt man sie im October nochmals, wodurch dem Wachsthum Einhalt gethan wird.

Lattichsalat wird meist sogleich auf Beete in Rinnen gepflanzt, aber die Cultur des Wintersalates ist nur sicher, wenn Schnee genug liegt. Will man zarteren Salat haben, so durchwintert man frühe Sorten ebenso wie Blumenkohl, muss aber etwas später säen.

B. Cultur der einzelnen Gemüse.

Bei der folgenden Besprechung der einzelnen Gemüsearten richten wir uns im Allgemeinen nach der in deutschen Samenverzeichnissen üblichen Eintheilung und Reihenfolge, ohne uns genau daran zu binden, indem wir, wo es möglich ist, diejenigen Sorten, welche ihrer Cultur nach zusammen gehören, zu einer Gruppe vereinigen.

I. Kohllarten.

Die Kohllarten, wahrscheinlich aus einer gemeinschaftlichen Stammpflanze durch Cultur entstanden, verlangen sämmtlich **sehr** guten Boden resp. reichliche Mistdüngung. Wir unterscheiden: 1. Blumenkohl oder Carviol mit der Unterabtheilung Brockoli (Spargelkohl), 2. Kraut oder Kopfkohl (Kappus), 3. Wirsing oder Börskohl (Savoyer Kohl), 4. Rosenkohl (Sprossenkohl), 5. Blätterkohl, und zwar Krauskohl (Winterkohl, Braunkohl), sowie den ähnlichen Palmen- und Baum- oder Kuhkohl und den kleinen Schnittkohl, 6. Kohlrabi (Oberkohlrabi), endlich 7. die Kohlrüben (Unterkohlrabi). Die Samen sämmtlicher Kohllarten sind schwer von einander zu unterscheiden, doch ist Blumenkohl-Samen braun und klein, Blätterkohl-Samen dunkel und klein im Vergleich mit anderen Kohlsamen. Das Keimen erfolgt wenige Tage nach der Aussaat. Der schlimmste, fast einzige Feind der Kohlsaaten ist der Erdflöth. Reich gedüngter Boden und fleissiges Giessen, wodurch die Pflanzen bald erstarken, helfen dagegen, auch bewährt sich öfteres Bestreuen der angefeuchteten Pflanzen am frühen Morgen mit Tabakstaub, Holzasche, Russ oder gebranntem Kalk. Sät man neben die Kohlpflanzung Gartenkresse, so greifen die Insecten hauptsächlich diese an, und man kann sie darauf auf einem mit Theer bestrichenen Brettchen fangen.*) Gegen die Raupe des Kohlweisslings, welche in manchen Jahren so grosse Verwüstungen anrichtet, giebt es kein anderes Mittel als zeitiges Vertilgen, besonders der Eier.

Blumenkohl oder Carviol.

39. Der Blumenkohl ist bekanntlich eins der feinsten Gemüse. Die Cultur desselben, welche allerdings Sorgfalt und Ver-

*) Siehe Jäger's „Allgemeines illustirtes Gartenbuch“ 4. Auflage, Seite 177, sowie dessen Gemüse Gärtner II. Theil, Fig. 1 der 3. Auflage.

ständniß erfordert, ist daher recht lohnend. Das Bestreben des Gärtners geht hauptsächlich auf Grösse, Festigkeit und Weisse der Köpfe. Von den zahlreichen Sorten sind die frühen im allgemeinen zarter als die späten. Jedes Land, ja jede Provinz hat eine Lieblingssorte, welche dort am besten gedeiht; trotzdem sollten die Gärtner auch mit anderen empfohlenen Sorten Versuche machen. Hauptsächlich kommt es bei der Wahl auf die Jahreszeit an und den Gebrauch, ob für das Land oder Mistbeet. Früher zog man in Mistbeeten nur hohe Sorten, besonders den grossen weissen Erfurter, oder auch Pariser Sorten, niedrigen Lenormand, zarten Pariser u. a. Aber als der früheste Erfurter (sogenannte Haage'sche) Zwergblumenkohl eingeführt worden war, wurde derselbe nicht nur für die Cultur in Mistbeeten, sondern auch im Lande anderen bei weitem vorgezogen. Diese Sorte hat sich seitdem Bahn gebrochen und ist da, wo überhaupt Blumenkohl gezogen wird, als die beste bekannt. Der Verkauf von Pflanzen und Samen derselben ist zu einem wichtigen Geschäftszweig Vieler geworden. Wir führen dies Beispiel als Beweis an, wie nützlich die Erzeugung und Verbreitung neuer Sorten, welche Manchem so entbehrlich und nachtheilig erscheint, werden kann.

Der Blumenkohl ist eine Pflanze für den Norden, verlangt feuchte Luft und sehr nahrhaften, stark gedüngten Boden. In südlichen Ländern ist der Anbau nur möglich, wenn die Bodenfläche förmlich unter Wasser gesetzt werden kann, und auch dann nur in der kühleren Jahreszeit. Es haben sich dort auch Sorten ausgebildet, welche besonders gute Erfolge geben, so der Blumenkohl von Algier und der italienische Riesen-Blumenkohl. In rauheren, hochliegenden Gegenden, wenn dieselben luftfeucht sind, sowie in nordischen Ländern, soweit noch die Cultur möglich ist, gedeiht der Blumenkohl sehr gut, und oft findet man im Spätsommer, wo er in der warmen Ebene selten ist, in kühlen Gebirgsthalern den schönsten Blumenkohl, und wir empfehlen, dieses köstliche, einträgliche Gemüse in solchen Gegenden häufiger anzubauen. —

Für den Anbau des Blumenkohls im Freien lassen sich unterscheiden: 1. der frühe (Aussaat im September), welcher im Juni, selten später Köpfe liefert, 2. der Sommerblumenkohl (Aussaat Mitte Januar bis Anfang März), 3. der Herbstblumenkohl

(Aussaat Mai bis Juni). Nr. 1 ist, wenn sonst der Boden und Ort geeignet ist, fast immer sicher, Nr. 2 und 3 weniger, weil die Ausbildung sehr von der Witterung abhängt. Den frühesten Blumenkohl erhält man durch Benutzung überwinterter Pflanzen (§. 38), etwas späteren durch die in warmen Mistbeeten gezogenen Frühjahrspflanzen. Wir glauben wiederholen zu müssen, dass es nothwendig ist, die Winterpflanzen in kalten Kästen oder Glocken abzuhärten, indem man Fenster oder Glocken nicht eher auflegt, als bis der Boden etwas gefroren ist. Durch dieses Abhärten werden die Pflanzen auch stämmiger, kürzer und widerstandsfähiger gegen Winter- und Frühjahrskälte. Hoch aufgewachsene, grossblättrige Pflanzen haben wenig Werth. Das Auspflanzen auf die Beete im Freien oder in kalte Mistbeete wird, je nach der Gegend und Lage, im März und April vorgenommen; die Pflanzen halten meist Erdballen, den sie freilich beim Transport in Verpackung verlieren. Zu Sommerblumenkohl säet man ebenfalls frühe Sorten von Mitte Januar bis Anfang März in ein kaltes Beet und pflanzt im Monat Mai an kühle, feuchte Plätze. Bei trockenem Wetter muss man mit täglichem Giessen zu Hülfe kommen, sonst hat diese Pflanzung nur in regnerischen Sommern Aussicht auf Erfolg, in Gebirgen mehr als in der Ebene. Ebenso wird der grosse und der frühe italienische (Frankfurter) sowie der ebenso grosse Blumenkohl von Algier angebaut, welche erst im Herbst ihr Produkt liefern, dann aber im günstigen Falle riesige Köpfe bilden. In geeigneten kühlen Lagen säet man späte Sorten nochmals Anfang April mit den Krautsorten und pflanzt sie mit diesen, an manchen Orten sogar vermischt auf das Feld. Wir empfehlen zu diesem Zwecke den Standholder (Stadtholder), den von Walcheren und den frühen italienischen oder Non plus ultra-Riesen-Blumenkohl. Im Mai und Juni kann man nochmals Frühsorten säen, deren Wachstumszeit in die kühleren Sommermonate fällt; ist der Spätsommer nicht besonders heiss und trocken, so liefert diese Pflanzung schöne Köpfe für den Winter, im anderen Falle ist wenig Hoffnung.

Die Pflanzweite des Blumenkohls richtet sich nach den Sorten. Man bringt auf ein 1,30 m breites Beet drei Reihen und giebt den Pflanzen niedriger und mittelhoher Sorten durchgängig einen Abstand von 0,65 m, dem grössten italienischen Riesen- und Algier-Blumenkohl bis 1 m.

Zum Treiben wählt man durchwinterte Pflanzen der niedrigsten, frühesten Sorten, und es wird hierfür wie schon gesagt fast allgemein der früheste Erfurter Zwerg- und der kleinblättrige allerfrüheste Erfurter Zwerg-Blumenkohl, trotz des hohen Preises des Samens, allen andern Sorten vorgezogen.

Andere Treibsorten für hohe Kästen sind der Pariser Salomon-, der Kaiser- (Imperial) und der Lenormand-Blumenkohl mit niedrigem Strunk. Zum Treiben des Blumenkohls gehören hohe, grossfenstrige Kästen; in Herrschaftsgärten findet man auch oft gemauerte. Zweckmässig ist es, gewöhnliche, nicht zu niedrige Kästen so einzurichten, dass sie einen genau passenden Aufsatz erhalten, wenn die Pflanzen grösser werden. Das Mistlager muss stark sein, damit die Wärme lange anhält. Die Wärme darf nie zu hoch steigen, weshalb auch Kästen, welchen zur Hälfte Laub beigemischt ist, besser sind, als solche von reinem frischen Pferdemist hergestellt. Die Erdschicht muss 30 bis 40 cm betragen. Durchwinterte Pflanzen werden im Januar und Februar in das Mistbeet gepflanzt, je nach der Sorte im Verhältniss weiter oder enger. Man kann Kopfsalat dazwischen pflanzen. Sobald es warm ist, muss viel gelüftet, durchdringend begossen und täglich bespritzt werden. Bei warmem Wetter nimmt man die Fenster erst bei Tage, später auch bei Nacht ab. Von diesem Blumenkohl erntet man je nach der Pflanzzeit, Sorte und Wärme des Kastens vom April bis Anfang Juni. Man kann annehmen, dass der spätere und weniger warm gehaltene Blumenkohl schöner ist und sicherer einen Ertrag liefert; auch hat sehr früher Blumenkohl weniger Werth als sonst, seitdem derselbe zu sehr niedrigem Preise von Algier und andern südlichen Gegenden importirt wird, während er von Ende April bis Juni selten und desshalb willkommen ist.

Es ist sogar zweckmässig, bald nach der ersten Anlage des Treib-Blumenkohls einen kalten, nur durch Umsätze erwärmten Kasten mit Blumenkohl zu bepflanzen, welcher dann etwas früher als der im freien Lande gezogene zur Reife kommt.

Es kommt bei jeder Pflanzung von Blumenkohl vor, dass einzelne Pflanzen keine Köpfe zeigen, namentlich in freier Lage, wenn sie Fröste bekommen haben. Solche Pflanzen (sog. Schalke) zeigen noch keine Spur eines Kopfes, wenn alle anderen bereits ausgebildet sind; man entferne dieselben, damit sie nicht das

Land auszehren. — Durch reichliche, namentlich auch flüssige Düngung während der Culturzeit, besonders aber durch reichliches Bewässern und bei Trockenheit tägliches Ueberspritzen gelingt es, fast zu jeder Zeit auch im Sommer schönen Blumenkohl zu erziehen. In den Pariser Markthallen sieht man 9 Monate des Jahres frischen, im Lande gezogenen Blumenkohl. Die dortigen Gärtner säen den ersten Blumenkohl wie wir, Anfang September und dann in Zwischenräumen von 3 bis 4 Wochen bis zum Monat Juni. Im Sommer erhält man die Köpfe länger, und dieselben bewahren ein gutes weisses Ansehen, wenn man, sobald sie sich zeigen, ein Blatt einknickt und es darüber legt; dies setzt man fort bis man den Kopf schneidet, ein in Erfurt allgemein angewendetes Verfahren. Ist mehr Blumenkohl vorhanden, als verbraucht oder verwerthet werden kann, so grabe man die Pflanzen mit Wurzeln aus, entferne die Blätter bis auf einige um den Kopf und pflanze sie in den Keller oder in einen anderen kühlen Raum. — Zur Zwischencultur eignen sich, ausser Kopf- und Bindsalat, für späte Pflanzungen Knollensellerie, Salatrüben, selbst Carotten (an den Rändern), jedoch zehren sie stets auf Kosten des Blumenkohls.

Brockoli oder Spargelkohl.

40. Der Anbau des Brockoli (Brocoli) ist in Deutschland wenig verbreitet, dagegen in Ländern mit gelinden Wintern, z. B. in Frankreich, Italien und England ziemlich allgemein. Man genießt die Köpfe, welche fast wie die des Blumenkohl schmecken, jedoch feiner sind, und die Blütenstengel. Die Brockoli-Pflanze wird höher als die niedrigen und mittelhohen Blumenkohlsorten und hat schmale, am Rande gewellte Blätter. — Man sät den Samen im April und Mai und pflanzt nach einmaligem Pikiren im Juni oder Juli mit einem Abstand von etwa 70 cm. Die Pflanzen verlangen häufiges Hacken und reichliche Bewässerung. Der Brockoli bringt seine Köpfe erst im zweiten Jahre und muss daher bei uns frostfrei überwintert oder gedeckt werden. In milden Gegenden lässt man die Pflanzen unbedeckt, was besonders der Mammoth-Brockoli verträgt, in rauheren legt man sie um und deckt lockere Streu und Tannenreiser darüber. Wer freie, tiefe Mistbeetkästen hat, thut besser, die Pflanzen im Spätherbst mit Ballen in dieselben zu pflanzen und mit Fenstern zu bedecken, wodurch

man früher einen Ertrag erzielt. Man schneidet den Broccoli von Mitte März bis Anfang Juni, also gerade zu einer Zeit, wo Blumenkohl wenig zu haben ist. Neuerdings sind von England Sorten, welche bei früher Pflanzung schon im Herbst Köpfe bilden, eingeführt worden, sie haben aber neben dem zu jener Zeit häufigen Blumenkohl wenig Werth.

Kopfkohl oder Kraut (Kappus).

41. Bei der Cultur des Kopfkohls kommt es besonders auf die richtige Wahl der Sorten an. Man hat die frühen und die späten, die zum Hobeln (zum Einnachen und zu Salat) und die zum Kochen bestimmten Sorten sorgfältig auszuwählen, abgesehen von den vorerwähnten allgemeinen Gesichtspunkten, welche bei der Sortenwahl zu berücksichtigen sind (Seite 11). Als süßes Gemüse sind die Spitzkrautsorten mit starken, zarten Blättern angenehmer als feste runde Köpfe, und es befinden sich darunter auch die frühesten, wie York'scher und Maispitz-Kopfkohl, für die Herbstzeit Filder, Winnigstedter, Casseler Kraut u. a. m. Aber diese Zuckerhutsorten, wenigstens die frühen, halten sich nicht lange, platzen nachdem sie ausgewachsen sind, und auch die Herbstsorten lassen sich weniger gut im Winter aufbewahren, als festere Sorten. Von Kraut-Sorten giebt es erstens die sehr grossköpfigen, späten oder Centnerkraute z. B. Braunschweiger, Erfurter, Magdeburger (diese Sorte wird am meisten zum Sauerkraut verwendet), Schweinfurter, griechisches etc., zweitens die mittelgrossen Sorten, wie Erfurter mittelgrosses festes, Casseler etc. und endlich die kleinköpfigen, frühen festen Sorten, wie das frühe Johanniskraut (Joanet), das Erfurter kleine weisse und die frühen Rothkrautsorten. Unter den grossen und grössten Sorten sind das Schweinfurter und Bleichfelder die frühesten; sie kommen schon im August auf den Markt und erzielen als die ersten, gute Preise. Die grössten Sorten haben plattrunde Köpfe, die mittleren und kleinen meist breit eiförmige oder fast runde. Von Rothkraut (Blaukraut) giebt es weniger Sorten und die grössten Köpfe erreichen nur den Umfang der mittelgrossen Weisskraute. Die grössten Rothkrautsorten sind nicht rein blutroth, sondern weiss geädert und weissrippig, sehen daher als Salat nicht so gut aus wie blutrothe kleine Sorten. Dagegen eignen sich diese hellrothen Sorten neben dem Erfurter grossen weissen auch zu sogenanntem Kums- oder

Kumstkraut (gekochte, eingesäuerte Köpfe). Gute frühe blutrothe Sorten sind das früheste Erfurter und das Utrechter; mittelfrüh ist das Berliner, spät das blutrothe Ulmer und das grosse Holländische.

Um frühes, schon von Juni an geniessbares Roth- und Weisskraut zu bekommen, säet man im Februar in das warme Mistbeet und pflanzt Ende März bis Anfang April; man wählt hierzu die genannten frühesten, kleinen Sorten. Noch früheres Kraut liefern wie Blumenkohl durchwinterte Pflanzen (s. §. 38), wozu man in Frankreich und Westdeutschland meistens York'sches Kraut nimmt, aber auch andere Sorten, z. B. das vorzügliche kleine Erfurter Weisskraut, sowie Rothkraut verwenden kann. In Rheinland, Westfalen u. a. O. baut man sogenanntes Winterkraut (Winter-Kappus). Man säet es im August und setzt die Pflanzen Anfangs October in die Ackerfurchen, um sie etwas gegen kalten Wind zu schützen, deckt sie bei schneeloser Kälte wohl auch mit Streu oder Tannenreisig. Kommt das Kraut gut durch den Winter, so hat es im Frühjahr einen guten Preis, aber es leidet oft in kalten Wintern und wird in offenen Gärten und Feldern von Kaninchen und Hasen abgefressen. Wir empfehlen versuchsweise das Amager (dänische) Winterkraut. — Die Haupt-Aussaat für den Winter wird im März und April, je nach der Gegend und Witterung, in das Freie oder in kalte Kästen gemacht. Diese Pflanzen werden vom Anfang bis Mitte Juni pflanzbar und kommen meistens auf das Feld. Hat man leeres Land zu erwarten, so kann man nochmals im Mai und Juni frühe kleine Sorten Roth- und Weisskraut säen, welche im glücklichen Falle noch schöne kleine Köpfe bilden.

Eine eigentliche Mistbeetcultur kommt selten vor. Wer indess Blumenkohl treibt, kann, wenn Bedürfniss oder Absatz dafür vorhanden ist, untenhin einige Reihen frühestes Kraut pflanzen. Da man Krautköpfe selten länger als bis April aufbewahren kann, so ist von dieser Zeit an jedes frische Gemüse willkommen. Aus demselben Grunde empfiehlt es sich auch, ein kaltes Mistbeet mit Kraut zu bepflanzen, in welchem die Köpfe 3—4 Wochen früher als im Freien zur Ausbildung gelangen.

Das Kraut verlangt keine andere Culturarbeit als mindestens zweimaliges Behacken. Ein Behäufeln ist nicht allgemein gebräuchlich, aber nützlich, indem die Strunke bei feuchter Witte-

Wurzeln bilden, wodurch die Nahrungszufuhr erhöht wird. Grosse Köpfe kann man nur bei reichlicher Düngung ziehen. Die Pflanzweite richtet sich nach der Grösse der Sorten, dieselbe wechselt zwischen 35 und 60 cm. Kraut wächst zwar in jedem Boden, wenn dieser richtig behandelt, resp. genügend gedüngt wird, giebt aber in leichtem oder locker kalkigem Boden nur in Tiefen gute Erträge, während es in gutem Lehm Boden auch auf Anhöhen gedeiht, und zwar um so besser, je kühler solche liegen. Alle Kraut-Sorten wachsen erst dann üppig, wenn sich im Spätsommer kühle Nächte mit viel Thau einstellen. In heissen Sommern werden die Kosten der Bewässerung der Krautländer durch erhöhte Erträge reichlich aufgewogen.

Das Strunkkraut.

42. Das Strunkkraut, gewöhnlich Altenburger Strunkkraut genannt, wird im östlichen Theile des Herzogthums Altenburg seit langer Zeit angebaut. Die Köpfe finden als Gemüse in der Küche Verwendung, die dicken markigen Stämme (Strunke) dienen den Milchkühen als Futter. Zu diesem Zwecke werden die auffallend süssen, kohlrabi-ähnlich schmeckenden Strunke, welche der Milch einen angenehmen, süssen Geschmack verleihen und nicht abführend wirken, von den altenburger Landwirthten höher geschätzt als Runkeln und Kohlrüben.

Tronchuda oder Rippenkohl.

43. Der Rippen-Kopfkohl oder Couve Tronchuda (Chou à grosse côte) steht seinem Wuchse nach zwischen Kopf- und Blätterkohl und bildet theils feste Köpfe, theils nur lockere mit gekräuselten Blättern (Gekröse-Kohl). Er wird besonders in England, Schweden und Italien angebaut und kommt in Paris gegen das Frühjahr hin auf den Markt. Dieser Kohl hat den Vorzug, dass er grosse Kälte erträgt, daher im Freien eingeschlagen bleiben kann, bis das aufbewahrte Kraut zu Ende geht. Der nicht sehr feste Kopf ist zart bis auf die äusseren Blätter, und man legt den grössten Werth auf die dicken fleischigen Blattrippen, die man mit holländischer Sauce geniesst. Die Cultur ist dieselbe wie die der späten Krautsorten, doch pflanze man in Zwischenräumen von etwa 80 cm, damit die Blätter ihre volle Grösse erreichen und schöne Rippen liefern können. Durch Aussaat in richtigen Intervallen kann man die Production sehr verlängern.

Wirsing, Savoyer-, Börs- oder Herzkohl.

44. Der Wirsing gedeiht in jedem reich gedüngten Boden, auch an Plätzen, wo Kraut nicht gut wächst, z. B. in eingeschlossenen Hausgärten. Natürlich sind freiliegende Gärten und Felder besser geeignet. Da der Verbrauch von Wirsing viel geringer ist als der von Kraut, so eignet er sich weniger zum gewerblichen Gemüsebau auf dem Felde, ist auch im Herbst niedriger im Preise und erträgt aus diesem Grunde weniger die Kosten eines weiten Transports. Dagegen wird früher Wirsing in den Städten gesucht und gut bezahlt. Die früheste Sorte ist der allerfrüheste niedrige Ulmer Treib-, dann folgt der etwas klein bleibende niedrige Wiener Treib- und, als früheste Freilandsorte, der spitze Kitzinger Wirsing. Der gelbe Frankfurter ist eine gute Sommersorte. Gewöhnliche späte, gute Sorten sind: der grosse späte Ulmer, der grosse gelbe Erfurter Winter-, Victoria- und Waterloo-Wirsing (die englischen Sorten haben fein gekrauste graugrüne Blätter). Sehr winterharte, daher auch lange haltbare Sorten sind: Marzelin-Wirsing (Chou Marcelin), Vertus (sehr gross) und der norwegische grosse späte Wirsing. Letzterer ist sehr glatt und starkblättrig und steht dem Weisskraut nahe, von welchem er, ehe er ausgewachsen, kaum zu unterscheiden ist; er erträgt von allen Sorten die grösste Kälte.

Man pflanzt Wirsing je nach der Grösse der Sorte 36—50 cm weit. Die Aussaaten finden für Fröhsorten wie bei Kraut und um dieselbe Zeit in das Mistbeet statt, und entsprechend die Aussaat der späten Sorten für Herbst und Winter, aber man säet auch noch in der Zwischenzeit kleine Partien, selbst noch im Mai und Juni Fröhsorten, um damit nach Bedarf die abgeernteten Erbsen-etc. Beete besetzen zu können. In diesem Falle muss gedüngt werden, sei es vor dem Pflanzen oder später. Die Herbstsaat bewährt sich selten, denn die meisten Pflanzen bilden Blütenstengel anstatt Köpfe.

Ein Treiben des Wirsings ist nicht so gebräuchlich wie es der Fall sein sollte. Wo man Blumenkohl treibt, können die unteren Reihen von Wirsing eingenommen werden. Man benutzt hierzu den allerfrühesten Ulmer und den Wiener Treib-Wirsing, welcher im Mistbeet zarter wird als im Lande. Noch mehr empfehlen wir die Cultur sehr früher Sorten in kalten oder nur durch Mistumsätze erwärmten Kästen, wodurch man 3—4 Wochen früher als im Freien einen Ertrag erzielt.

Rosen- oder Sprossenkohl.

45. Der Rosenkohl, auch Brüsseler Sprossenkohl genannt, steht zwischen Wirsing und hohem Blätterkohl; er artet leicht aus, weshalb der Samenanbau grosse Sorgfalt erfordert. Dieses sehr feinschmeckende Gemüse wird bei uns noch nicht so häufig angebaut, wie es verdient. Der Rosenkohl gilt mit Unrecht für wenig ertragreich, denn er ist fast ebenso ergiebig wie Wirsing und hat beim Kochen fast keine Abfälle. Dazu kommt die Nutzung der Blätter als Viehfutter im Herbst und Winter. Der Rosenkohl bildet einen 0,50 bis 1 m hohen geraden Stamm, an dessen Spitze sich ein lockerer, dem Wirsing ähnlicher Kopf befindet. Dieser Stamm ist ringsum dicht mit langgestielten, runzligen, grossen Blättern besetzt, in deren Achsen sich von August an die sogenannten Rosen bilden. Während die untersten schon fest sind, bleiben die oberen noch zurück, vergrössern sich aber in demselben Maasse, wie die unteren abgenommen werden. So verlängert sich die Ernte bis tief in den Winter hinein, und es kann der Rosenkohl, einigermaßen gegen Kälte geschützt, bis zum April aufbewahrt bleiben. In Belgien schätzt man besonders die sehr kleinen, zarten Köpfchen, in Deutschland und Frankreich zieht man solche von der Grösse einer ansehnlichen Walnuss vor. Der niedrige Rosenkohl wird 50 bis 60 cm hoch, steht im Ertrag aber nicht gegen den hohen zurück, denn bei ihm stehen Blätter und Rosen dichter und sind runder und grösser.

Eine verbesserte, niedrige Sorte ist der halbhohle Erfurter Rosenkohl, welchen wir als eine Mittelsorte zwischen hoch und niedrig, besonders zum grossen Anbau empfehlen wollen. Neuerdings sind einige englische Sorten bekannt geworden, die sich durch besonders feste Köpfe auszeichnen. So Scrymger's Giant und Non plus ultra, welcher ungewöhnlich grosse Rosen liefert.

Mit der Aussaat des Rosenkohls kann man bereits Ende Februar beginnen; in Belgien, wo er schon im Sommer verlangt wird, säet man ihn sogar mit den Frühlupflanzen in's Mistbeet. Will man Rosenkohl bis zum Frühjahr haben, so säet man in Zwischenräumen vom März bis Ende Mai. Er liebt eine ganz freie Lage und muss weit, nicht unter 40 cm, am besten nur in einzelnen Reihen, gepflanzt werden. Man kann ihn zwischen andere Kohlarten oder an die Ränder der Krautländer bringen. Der Rosenkohl liebt gedüngten Boden, doch wird er, in zu reich

gedüngtes Land gepflanzt, zu üppig und bildet spät Rosen. Die Blätter dürfen erst entfernt werden, wenn die Rosen ausgebildet sind, was leider oft versehen wird. Ende August kann man die Spitzen (Herzen) ausschneiden, die sehr zart schmecken. In Gegenden mit milden Wintern lässt man Rosenkohl, wenn der Platz gegen Hasen und Kaninchen geschützt liegt, im Freien, während man ihn in kälteren Lagen in Gruben oder hellen Kellern einschlägt. Im ersteren Falle lässt man zum Schutze die Blätter daran.

Blätterkohle.

46. Wir unterscheiden die Sorten für den Tisch, die Zierkohle und die Blätterkohle zum Viehfutter. Zu den ersten gehört der sogenannte Kraus-, Grün-, Blau- oder Winterkohl und der Schnittkohl.

Man cultivirt niedrige und hohe Varietäten des grünen und braunen (blauen) Winterkohls. Von dem gewöhnlichen Winterkohl giebt es verschiedene verbesserte Sorten, welche so feingekraust und von einem so schönen Grün sind, dass man sie als effectvolle Zierpflanzen verwenden kann. Im Ertrag stehen dieselben nicht zurück; sie sind zarter im Geschmack, aber auch etwas empfindlicher gegen Kälte, während der gewöhnliche und der noch bessere Erfurter Dreienbrunnen-Krauskohl der Kälte widerstehen. Die feinsten krausen Sorten sind: der halbhohe grüne mooskrause und der hohe grüne feingekrauste Kohl. Der Braunkohl ist weniger gekraust, verträgt hohe Kälte und wird erst geniessbar, nachdem die Blätter gefroren waren; er ist aber auch als Gemüse weniger zart als Grünkohl. Gleichwohl wird er an vielen Orten, besonders in Norddeutschland, dem Grünkohl vorgezogen. Die Höhe des Kohls hat auf seine Güte keinen Einfluss. Hoher Kohl braucht mehr Platz und hat höchstens den Vorzug, dass die im Sommer nicht in der Küche gebrauchten Blätter als Viehfutter dienen können. — Man säet den krausen Winterkohl vom Mai bis Juli, kann sogar kleine Sorten noch später säen, darf dann aber nur kleine Blätter erwarten. Die Pflanzweite richtet sich nach der Grösse, nicht unter 40, nicht über 60 cm, späte Pflanzungen nur 30—35 cm.

Der Schnittkohl bildet ganz kurzstämmige Pflanzen mit tiefeingeschnittenen Blättern, welche man geniesst, ehe das Gewächs seine volle Grösse erreicht hat. Im Freien gezogen hat dieses Ge-

müße wohl nur als erster frischer Kohl einen culinarischen Werth. Zarter ist im Mistbeet gezogener Schnittkohl. Es giebt davon mehrere Sorten, von welchen besonders 4 angebaut werden: der gewöhnliche grüne, der braune, der gelbe oder Butter- und der eine Art Kopf bildende, sog. selbstschliessende gelbe Butter-Schnittkohl. Da man den Schnittkohl nur des frühen Ertrages wegen zieht, so säet man ihn so zeitig wie möglich, am besten unter Fenster in einen kalten Kasten, wo er früher und zarter wird und nicht vom Erdfluh zu leiden hat; man säet, um bequemer schneiden zu können, in engen Reihen.

Zu den Zierkohlen gehört vor allem der Plumagekohl, ein Kraus- oder Winterkohl mit farbigen, weissen, rothen oder gelblichen Blattstielen und Blattrippen und mit oft nur am Rande grünen Blättern; der geschlitztblättrige rothe ist fast ganz roth gefärbt. Auch der gewöhnliche Braunkohl nimmt im Herbst eine so schöne bläuliche Metallfarbe an, dass man ihn als Zierpflanze gern verwendet. Man behandelt ihn wie Winterkohl und pflanzt ihn ausgewachsen entweder im Spätherbst auf Beete oder häufiger in Töpfe, welche man auf Treppen, Gängen, Vorsälen u. a. O. aufstellt. — Ferner sind der Palmbaumkohl und der Kohl von Neapel als Zierkohle zu nennen. Der Palmbaumkohl wird bis $1\frac{1}{2}$ m hoch und hat mit seiner ausgebreiteten Blätterkrone das Ansehen einer kleinen Palme. Er eignet sich nur zur Einzelstellung und muss reich gedüngt werden, um eine vollkommene Pflanze zu bilden. Der feingekrauste, breitblättrige Kohl von Neapel, dem moosgrünen Winterkohl ähnlich, aber abweichend durch die weissrippigen, nicht so krausen Blätter, ist in Gruppen mit anderen Blattpflanzen wirkungsvoll.

Die grossen Futter-Kohle, wie Baum- oder Kuhkohl (Riesenkohl), Poitou, Markkohl etc., werden sehr viel in Frankreich angebaut. Sie haben einen hohen Futterwerth, ertragen grosse Kälte, geben Grünfutter bis in den Winter hinein und sind sehr ergiebig. Diese Kohlarten, besonders der Kuhkohl (*chou cavalier*) verdienen Berücksichtigung. In Westfalen, am Niederrhein sowie in Ostpreussen ist dieser Kohl bereits eingebürgert und ersetzt das Runkelfutter. Alle diese Sorten werden sehr gross und hoch, müssen daher weit gepflanzt werden. Von dem Markkohl, welcher dem Altenburger Strunkkraut ähnelt, werden hauptsächlich die dicken markigen Stämme (Strunke) benutzt.

Kohlrabi, Glaskohlrabi.

47. Die Kohlrabi, zum Unterschied von dem Unterkohlrabi (Kohlrübe) auch Oberkohlrabi genannt, gehören zu den beliebtesten Gemüsen. Sie haben den Vorzug, dass sie sehr früh im Jahre genossen werden können, sich aber auch im Winter halten. Man unterscheidet frühe und späte Kohlrabi. Die ersteren sind die feinsten für den Familientisch, sie werden nicht gross und werden genossen, wenn sie noch ganz zart und halb ausgewachsen sind, während sie älter nicht nur holzig werden, sondern auch ihren feinen Geschmack verlieren. Die grossen Sorten, namentlich die sog. Riesen-Kohlrabi, sind zwar auch zart, haben aber nie den feinen Wohlgeschmack der kleinen frühen Sorten. Sie erreichen die Grösse eines Kinderkopfes, ohne holzig zu werden und sind ein vortheilhaftes Gemüse für einen grossen Tisch. Zum Frühhanbau werden die verschiedenen Sorten Wiener Glaskohlrabi vorgezogen. Zum späteren Anbau für den Sommer, Herbst und Winter nimmt man die grösseren, aber ebenso zarten englischen weissen und blauen Kohlrabi, sowie den Erfurter frühen weissen Dreienbrunnen, die beste Frühsorte für das Land. Als grosse Sorten empfehlen wir besonders die sogenannten Riesen-, vor allen den blauen Goliath-Kohlrabi.

Der Anbau der grossen Sorten unterscheidet sich in nichts von dem der vorhergehenden Kohlarten, jedoch kann man die für den Winter bestimmten noch im Mai oder Juni säen. Kleine Sorten für den Familientisch säet man ausser in das Mistbeet, wie andere Frühpflanzen vom März bis Mitte Juli. Wir erwähnen hierbei, dass in Frankreich und auch anderwärts grosse Kohlrabisorten als Futter für Rindvieh angebaut werden, wofür sich der grosse weisse späte empfiehlt. Sie haben denselben Werth wie Strunkkraut (§. 42).

Kleine Sorten pflanzt man 20—25 cm, grosse 35 cm von einander. Der Boden muss reich, aber nicht zu frisch gedüngt sein. Auf trockenem, mageren Boden werden die Kohlrabi nie gut. Die Behandlung weicht nicht von der anderer Kohlarten ab, doch ist bei Trockenheit reichliches und häufiges Giessen unerlässlich, sonst bekommt man holzige Kohlrabi.

Das Treiben der Glaskohlrabi in Mistbeeten und kalten Kästen ist sehr lohnend und geht schneller als bei anderen Kohlgemüsen. Man nimmt hierzu den Wiener allerfrühesten

Treibkohlrabi. Das Beet wird wie für Blumenkohl hergerichtet, doch braucht die Erdschicht nicht so stark wie für diesen, die Entfernung der Pflanzen nicht über 20 cm zu sein. Manche Gärtner pflanzen Kohlraabi zwischen Blumenkohl, was aber erstem nicht gut thut, wenn der Blumenkohlkasten bei zunehmender Höhe der Pflanzen einen Aufsatz bekommt, weil in tiefen Kästen die Entfernung der Kohlraabi vom Glase zu gross ist. Diese Kohlraabi müssen bei milder Witterung täglich gelüftet werden. Fast noch mehr als die Cultur in warmen Mistbeeten ist die in kalten Kästen mit wärmenden Umsätzen zu empfehlen. Mit den andern Mistbeet-Kohlraabi im Februar gepflanzt, sind diese im April geniessbar und halten aus, bis es Ende Mai Kohlraabi im Freien giebt.

Kohlrüben oder Unterkohlraabi.

48. Von dieser, auch Wrucken, Dorschen oder Rutabaga genannten Kohlart giebt es einige Sorten, welche sich für den Tisch eignen, und solche zum Futter für Rinder und Schafe. Als Gemüse werden vorzugsweise die gelbfleischigen Sorten gezogen, obschon auch weisse schmackhaft sind und auf dem Lande allgemein gegessen werden. Am meisten werden die gelbe und die kurzlaubige weisse Schmalz-Kohlrübe angebaut. Eine frühere Abart der gelben ist die kleine plattrunde Apfel-Kohlrübe, welche schon jung genossen wird, daher auch im Sommer brauchbar ist.

Die Cultur ist der des Kopfkohls oder Krautes gleich. Man säet im April und pflanzt Anfang Juni mit 35 cm Abstand, wobei die Spitzen der Wurzeln abgeschnitten werden, weil dies die Grösse der Rübe befördert und die Bildung starker Seitenwurzeln verhindert. Gewöhnlich pflanzt man die Kohlrüben mit den Runkeln auf das Feld und behackt sie wenigstens einmal; in eingeschlossenen Gärten gedeihen sie nicht. — Von den Futter-Kohlrüben werden die grosse gelbe und die grosse gelbe rothgrauhäutige wegen ihrer Ergiebigkeit vorgezogen, doch ist bei guter Cultur und bei besonders reichlicher Düngung wenig Unterschied zwischen diesen und andern Sorten. Die Kohlrüben ertragen viel Kälte, leiden dagegen in heissen Sommern in ihrer Entwicklung, wenn man ihnen nicht mit Wasser zu Hülfe kommen kann. Die zum Verspeisen bestimmten Sorten werden wohlschmeckender, wenn sie in Land kommen, welches mit altem Mist gedüngt ist.

II. Wurzeln und Rüben.

Für die Gemüsesorten, welche wir unter dieser Rubrik vereinigen, lassen sich allgemeine Culturregeln nicht geben. Wenn wir in der Einleitung sagten, dass Wurzeln und Rüben besser in nicht frisch gedüngtem, in zweiter Tracht stehendem Boden gedeihen, so bezieht sich dies nicht auf Sellerie, Rhabarber und Cichorien.

Unter Wurzeln und Rüben hätte auch die Kohlrübe mit demselben Recht wie die weissen oder Wasserrüben und englischen Futterrüben (Turnips), welche zur Familie der Kohlarten gehören, besprochen werden können. Der Mangold ist zwar eine der Runkel verwandte Pflanze, wird von uns aber bei den Spinatgemüsen besprochen werden, weil er keine Rübe bildet.

Carotten oder Möhren (*Daucus Carota*).

49. Die Möhren oder Moorrüben (gelbe Rüben, gelbe Wurzeln) zerfallen in lange, mittellange und kurze, letztere meist Carotten genannt. Im Geschmack, namentlich in der Feinheit und Süssigkeit, weichen die Sorten mehr oder weniger von einander ab.

Es giebt frühe und späte Sorten. Zu den ersteren gehören alle sogenannten Treib-Carotten, welche schon halb ausgewachsen gut schmecken, während lange Sorten, ehe sie nicht die Stärke eines kleinen Fingers haben, fast geschmacklos sind. Die Frühsorten stehen einander an Werth ziemlich gleich. Am frühesten sind die Pariser kürzeste Treib-, die fast runde Duwicker und die etwas längere, daher ertragreichere holländische Treib-Carotte. Noch etwas länger und nur wenig später sind die halblange stumpfe rothe Treib-, die Münchener Treib- und die scharlachrothe Carentan-Carotte, welche letztere, nebst der schönen, etwas grösseren stumpfen Nantes-Carotte von fast cylindrischem Bau für die frühe und späteste Landcultur besonders zu empfehlen sind. Nur wenig später ist die mittellange dunkelrothe Frankfurter, eine sehr beliebte Marktsorte. Die langen Möhren sind für die grosse Küche und, alle von fast gleichem Werth, nur in der Länge und ein wenig auch in der Frühzeitigkeit abweichend; für den guten Tisch ist unter ihnen die süsse und zarte Altringham-Möhre sehr zu empfehlen, welche in lehmigem, tiefen Boden besonders gut gedeiht. Als recht haltbar im Winter bezeichnen wir die Braunschweiger und die Erfurter rothe Möhre, als sehr süss die blassgelbe dicke Saalfelder und die halblange spitze gelbe (Yellow

Indermediate). Ausschliesslich zu Futter dienen die weissen und orangerothern grünköpfigen sogenannten Riesenmöhren, deren Ertrag fast dem der Runkeln gleichkommt. Diese grünköpfigen Möhren sind schnellwachsende, daher für leichten Boden geeignete glatte Sorten. Hingegen ist die ebenfalls grünköpfige Altringham-Möhre auch vortrefflich für die Küche.

Die Cultur der Carotten ist sehr einfach. Es ist vorthailhaft, den Samen vor dem Säen abzureiben (von den gangbarsten Sorten wird er auch abgerieben verkauft), weil sich sonst mehrere Körner zusammenhängen. Er muss stets dünn gesäet werden, weil jede zu dichte Saat schlechte Ernten giebt und das Ausziehen der überzähligen Pflanzen, welches bald nach dem Aufgehen geschehen muss, viel Mühe macht. Dieses Ausziehen muss man im richtigen Verhältniss zur Grösse, welche die cultivirte Sorte erreicht, ausführen. Das Land muss gut vorbereitet sein und besonders für die langen Sorten tief gegraben werden. Ist wegen Bodenarmuth Düngung nöthig, so verwende man alten Mist oder Compost. Für das freie Land empfehlen wir durchgängig die Saat in Reihen, welchen man 10—20 cm Abstandsweite giebt, so dass man die Beete behacken kann. Will man nur sehr grosse Wurzeln, so müssen die Reihen noch weiter von einander entfernt sein.

In das Mistbeet säet man so bald wie möglich, schon von Ende November an, denn die Carotten haben um so grösseren Werth, je früher sie kommen. Man säet meist Salat zum Verpflanzen oder zum Schneiden, wohl auch Kohlrabi und andere Kohlarten dazwischen, was auch die zu dichte Saat verhindert. Selbst wenn man nur zwei Fenster für Carotten bestimmt, sollte man das eine mit der frühesten runden Pariser Treib-Carotte bestellen, weil diese Sorte, wenn auch klein, 2 Wochen früher geniessbar ist als jede andere. Die übrigen Fenster oder Kästen besetzt man mit einer mittellangen, ergiebigen Sorte. Die Carotten-Treibbeete müssen stets reichlich gelüftet werden, sonst werden die Blätter zu lang und die Rübchen bleiben schwach. Wer Spargel in Mistbeeten treibt, kann, wenn das Stechen zu Ende geht, Carotten einsäen, ohne die Spargelstücke herauszunehmen. Im Freien säet man so frühzeitig wie möglich, am besten schon im Februar und zwar lange Sorten zuerst, denn der Samen braucht Wochen zum Keimen, während er im Mistbeet schon nach acht Tagen aufgeht.

Da die grossen, namentlich die in Kellern aufbewahrten gelben Sorten für die Tafel vielfach nicht beliebt sind, so zieht man noch im Herbst junge Carotten, welche man im Juni bis Juli säen und bei eintretender Kälte so stark bedecken muss, dass die Erde nicht zufriert. Man nimmt an, dass die so gezogenen Carotten wohlschmeckender bleiben als die im Keller aufbewahrten; dies liegt vielleicht aber nur im jugendlichen Zustand der Wurzel. Wenn man die Aussaaten in das Mistbeet und Freie in richtigen Zwischenräumen bewirkt, kann man vom April bis November ohne Unterbrechung junge Carotten haben. Oft gelingt es sogar, Freiland-Herbstaussaaten durch den Winter zu bringen, wenn man die Pflanzen bei dem ersten Frost bedeckt, den gegebenen Schutz aber jedesmal, wenn warme Tage kommen, entfernt. Zu diesem Zwecke muss man im September aussäen, um im Frühjahr hübsche Carotten zu haben. Carotten lieben häufiges, durchdringendes Begiessen und wiederholtes Behacken. Indessen hat trotz der sorgsamsten Cultur die Bodenbeschaffenheit eine oft nicht zu verkennende Einwirkung auf Form und Farbe der Carotten. In gutem, lockeren Boden werden dieselben besonders schön dunkelroth. Bei den vielen guten Sorten, welche in den Verzeichnissen stehen, kann indessen Jeder leicht die für seine Boden- und Klima-Verhältnisse passenden ausfindig machen. Gegen die Erd-Spinnen, von welchen die eben aufgegangenen Carotten-Pflanzen oft angegriffen werden, hilft häufiges Giessen mit der Brause, sowie Bestreuen mit Russ oder pulverisirtem Kalk.

Cichorien-Wurzel (*Cichorium Intybus*).

50. Die Cichorie wird im Grossen angebaut, um aus der Wurzel das bekannte Kaffee-Surrogat zu bereiten, als Gartenpflanze wird sie nur zum Blättersalat-Gewinn gezogen.

Zum Anbau im Felde als Wurzeln wählt man die grossen Sorten, wie die Braunschweiger und Magdeburger, bringt sie in tief bearbeitetes Land, denn sie werden sehr lang, die erstere 40—50 cm, die letztere noch länger, aber weniger dick.

Man sät im April in Reihen von 20 cm Entfernung und verdünnt später die Pflanzen in den Reihen auf 20—25 cm Abstand. Es ist öfteres Behacken des Landes, bis dasselbe von den Blättern ganz bedeckt ist, nothwendig. Die Cultur derjenigen Sorten, welche besonders als Salat genossen werden, ist unter der Rubrik „Salate“ aufgeführt.

Hafer- oder Weisswurzel (*Tragopogon porrifolius*).

51. Die Hafer- oder Weisswurzel ist eine zweijährige Composite, der Schwarz- oder Scorzonewurzel ähnlich; sie wird ganz wie diese benutzt und angebaut. Die Wurzeln werden 20—30 cm lang und sind oben ziemlich dick, äusserlich gelblich, innen ganz weiss, die Blätter sehr schmal und lang. In Frankreich und anderen Ländern ist sie beliebter und allgemeiner als in Deutschland, wo man die kräftiger und etwas aromatischer schmeckende Schwarzwurzel vorzieht. Die Haferwurzel ist aber ergiebiger und liefert in einem Sommer stärkere Wurzeln als jene in 18 Monaten; der Samen ist kleiner. Man geniesst die gekochten Wurzeln; auch werden die zartesten Blätter zu Salat benutzt.

Man säet von März bis Mai in Reihen von circa 25 cm Entfernung ziemlich dünn, auf nahrhaftes, möglichst tief gegrabenes, aber nicht frisch gedüngtes Land und begiesst die Aussaat bei trockenem Wetter, da sie sonst leicht misslingt. Nach dem Aufgang lässt man so viel Pflanzen, dass sie etwa 10 cm von einander stehen, behackt einigemal und nimmt die Wurzeln vom Spätherbst an aus der Erde. Für den Frühjahrsbedarf thut man gut, sie in Kellern und Gruben einzuschlagen, kann sie aber auch, wenn sie vor Mäusen sicher stehen, unter Bedeckung im Freien lassen, bis sie treiben; dann liefern die Blätter den erwähnten Salat. Die Pflanzung muss von Unkraut rein gehalten werden, auch ist bei Trockenheit Bewässerung sehr erspriesslich. Ein grosser Theil der Pflanzen blüht schon im ersten Jahre.

Die Kerbelrübe.

52. Man cultivirt zwei Arten dieser Umbellifere, die gemeine bei uns in Hecken und Gebüsch einheimische (*Chaerophyllum bulbosum*) und die sibirische Kerbelrübe (*Chaerophyllum Prescottii*). Letztere wird etwas grösser, ist aber weniger süss und mehlig trocken. Die gemeine Kerbelrübe erreicht die Grösse und Stärke einer holländischen Carotte, der sie auch in der Form gleicht, hat aber die Eigenschaft, sich zu theilen oder oft Gabeln zu bilden. Dies kann nur durch sorgfältige Auswahl der zu Samen bestimmten Rüben vermindert werden.

Die Kerbelrübe ist zweijährig und muss von August bis October gesäet werden, was schon darum nöthig ist, weil nur ganz frischer Samen sicher keimt. Bekommt man den Samen zu einer Zeit,

wo er nicht auf den bestimmten Platz gebracht werden kann, so muss man ihn mit feuchtem Sand vermischt aufheben und vorkeimen lassen (§. 17.) Die Kerbelrübe verlangt guten, milden, nicht frisch gedüngten Boden und gedeiht am besten in schattiger Lage in sandigem, mit altem Mist oder Humus vermischten Lehm. Man sät am besten in 10 cm entfernten Reihen und bedeckt den Samen schwach oder drückt ihn auch nur fest an. Man muss die Aussaatbeete von Unkraut ganz rein halten, denn erst im Februar und März zeigen sich die feingeschlitzten Blätter. Von dieser Zeit an muss unbedingt gegossen werden, wenn es trocken ist. Versäumt man dies, so bleiben die Pflanzen klein und bringen, vorzeitig ausgebildet, bei erneuerter Feuchtigkeit Samenstengel oder verkümmerte Rübchen. Bereits Ende Juni fangen die Blätter an abzusterben. Dann muss man die Rüben bald aus der Erde nehmen, welches am besten mit einem eisernen Rechen (Harke) geschieht, und sie in trockenem Sand, gegen Mäuse geschützt aufbewahren. Schon nach einigen Wochen sind sie geniessbar und halten sich bis über den Winter, gewinnen durch das Aufheben sogar an Wohlgeschmack. Die Kerbelrüben werden gekocht oder geschmort genossen; wegen der ihnen eigenen aromatischen Süssigkeit gelten sie als ein feines Gemüse, und werden von Vielen den Kastanien vorgezogen. Ein anderes Cultur-Verfahren ist folgendes: Man sät im Herbst sehr dicht, so dass die Rübchen im Juli nur die Grösse einer grossen Erbse erreichen. Diese runden Knöllchen werden bis zum Herbst trocken aufbewahrt und dann in Reihen gelegt, etwa 5 cm von einander; grössere Rübchen legt man nicht. Man wendet diese Cultur an, um vorzüglich grosse Rüben zu erzielen, muss dabei aber durch fleissiges Giessen verhindern, dass die Pflanzen Stengel bilden. Letztere gleichen täuschend denen des gefleckten Schierlings.

Die Pastinakwurzel (*Pastinaca sativa*).

53. Diese Umbellifere liefert ein einträgliches und leicht zu ziehendes Gemüse. Man cultivirt die runde Pastinake, ferner die lange, welche 40 cm lang wird, und die besonders in Frankreich verbreitete halblange Guernsey, zu welcher auch die Student-Pastinake zu rechnen ist; die kurzen Sorten eignen sich besser für nicht tiefen Boden.

Die Behandlung gleicht im allgemeinen der für Möhren gebräuchlichen. Die Pastinake ist zwei- oder mehrjährig, kann daher im Sommer gesät werden; man zieht sie indessen lieber innerhalb eines Jahres, indem man die Aussaat schon Ende Februar bewirkt. Sie liebt lehmigen, guten, aber nicht frisch gedüngten, tief gegrabenen Boden, in welchem die Wurzeln sehr gross werden. Man sät den Samen, welcher schnell die Keimfähigkeit verliert, etwas dick in 20—30 cm entfernte Reihen und giesst im Anfang häufig, sonst ist der Aufgang ungleich. Im Sommer werden beim Behacken die zu dicht stehenden Pflanzen entfernt. Auf dem Felde, wo man das Land mit dem Pfluge bearbeitet, kommen die Reihen weiter von einander. Der Verbrauch der Wurzeln beginnt im Spätsommer, aber nur als Bouillonwürze, wozu die Pastinake sehr geeignet ist. Als Gemüse verspeist man sie erst im Winter und zieht sie, da sie unempfindlich gegen Kälte sind, ganz nach Bedarf aus der Erde, vorzugsweise nachdem sie Frost bekommen haben. Die übrig bleibenden Pflanzen bilden bald Samenstengel und sind ein gutes frühes Pferdefutter.

Petersilienwurzeln.

54. Man benutzt die weissen, etwas trocknen, wenig süssen und nach Petersilie schmeckenden Wurzeln meist nur als Suppenwürze, an manchen Orten, z. B. in Mittelfranken aber auch als Gemüse. Man cultivirt die gewöhnliche lange spätere, welche etwa 20 cm lang und 5 cm stark wird, und die kurze dicke, frühere Sorte. Beide sind im Geschmack gleich.

Die Cultur weicht nicht von der für lange Möhren oder Pastinaken massgebenden ab.

Rapontikawurzel (Oenothera biennis).

55. Diese Nachtkerze (aus Nordamerika) bildet eine kurze röthliche Wurzel, welche etwa 10 cm lang, 5 cm stark und unterhalb sehr verzweigt ist. Die fleischigen Wurzeln werden abgekocht und dann als Salat zubereitet; sie liefern so ein sehr fein schmeckendes Gericht, welches grössere Verbreitung verdient.

Die Pflanze ist zweijährig. Die langen rothgeaderten Blätter breiten sich wie Endivien aus und bedecken einen Raum von 30 □ cm, wonach man sich beim Pflanzen richten muss. Deswegen

ist die Rapontika auch ein Luxusgemüse. Man säet dünn, vom April bis Ende Mai. Bei zu früher Aussaat bilden sich oft Samenstengel, aber keine Wurzeln; säet man aber erst im Juni, dann bleiben die Wurzeln zu schwach. Man pflanzt auf nicht frisch gedüngtes Land, z. B. auf Beete, wo Frühlkohl, Kohlrabi etc. standen. Da die Wurzel nicht erfriert, so lässt man sie im Winter in der Erde, doch gehen Mäuse und Erdratten gern danach. Der Samen erhält sich trocken nicht lange, kommt er jedoch zufällig tief in die Erde, so keimen selbst nach zehn Jahren noch Pflanzen.

Rapunzel-Wurzel (*Campanula Rapunculus*).

56. Die Rapunzel, eine Glockenblumen-Art, welche bei uns auch wild vorkommt, ist eine zweijährige Pflanze mit einer schlanken 7—8 cm langen und kaum $1\frac{1}{2}$ cm breit werdenden, fleischigen, unverzweigten Rübe und etwa 3 cm breiten Wurzelblättern, welche auf dem Rübchen einen Schopf oder Kopf bilden. Dieser wird zugleich mit den Rübchen als Salat genossen. Es ist eine bei uns selten, in Frankreich häufig angebaute Pflanze, welche dort die Rabinschen vielfach vertritt.

Man säet die Rapunzel auf guten, lockeren Boden im Mai und Juni ganz wie Rabinschen, oder auch in Reihen von etwa 20 cm Entfernung. Frühe Aussaaten bringen leicht Blüthenstengel, weshalb wir nur zu späteren rathen. Der sehr feine Samen wird am besten ohne Bedeckung gelassen und nur ange-drückt; man thut wohl, ihn vor dem Säen mit Erde zu vermischen, damit er nicht zu dicht fällt, denn dann erzielt man wohl Blätter, aber nur vereinzelte Rübchen. Wenn die Saat zu dicht ausfällt, so verdünnt man sie nach und nach durch Verbrauch der Pflanzen zu Salat. Man muss bis zum Keimen häufig aber vorsichtig mit der feinen Brause giessen, damit der Samen nicht verschwemmt wird. Man erntet die Pflänzchen mit den Wurzeln vom October an den ganzen Winter hindurch. Will man sie im Winter nicht entbehren, so wird entweder ein Stück Beet locker bedeckt, so dass man auch, wenn Schnee liegt, dazu kann, oder man schlägt einen Theil der Pflanzen im Keller in Sand ein, in welchem Falle allerdings oft die Blätter faulen.

Der Geschmack dieses Salats ist ganz eigen und noch zarter als der von Rabinschen; ein allgemeinerer Anbau desselben ist daher zu empfehlen.

Die Goldwurzel oder Cardouille (*Scolymus hispanicus*).

57. Diese in südlichen Ländern häufig angebaute Composite ist zweijährig, wie die Schwarzwurzel, und kann diese nöthigenfalls ersetzen. Sie bildet eine Rübe, welche etwas dünner als die Haferwurzel, zur oberen Hälfte cylindrisch und unten ästig ist. Dieselbe hat einen starken holzigen Kern, welcher nicht essbar ist, so dass man im Süden meist nur die fleischige dicke Schale zum Verkauf bringt. Da dies bei uns nur wenig bekannt ist, so sind Viele, welche die Goldwurzel versuchsweise angebaut haben, sehr enttäuscht von diesem Gemüse. Zugegeben, dass die Goldwurzel an Güte und Ergiebigkeit hinter der Hafer- und Schwarzwurzel steht, so hat sie doch einen anderen, kräftigeren Geschmack. Die Cultur ist derjenigen der Haferwurzel ganz gleich.

Scorzoner- oder Schwarzwurzel (*Scorzonera hispanica*).

58. Die Schwarzwurzel ist eine mehrjährige Composite, wird aber zweijährig oder auch einjährig cultivirt, weil die Wurzeln in späterem Alter an Güte und Zartheit verlieren. Sie wird in Deutschland der ihr ähnlichen Haferwurzel vorgezogen und daher mehr angebaut als diese. Die Wurzel wird 25—30 cm lang und ist fast cylindrisch, nach unten schwächer, aber selten über 3—4 cm dick. Sie ist sehr milchig und brüchig und muss daher vorsichtig ausgegraben werden. Die Wurzeln werden als Gemüse mit Fleischbrühe, aber auch in Suppen und Fricassés gegessen.

Man müsste eigentlich die Schwarzwurzel im Frühjahr säen und erst im Herbst des folgenden Jahres ernten, denn nur so erreichen die Wurzeln ihre grösste Vollkommenheit; allein da die Mäuse denselben sehr nachstellen, so säet man sie meist erst im August auf tief gegrabenes, nicht frisch gedüngtes Land, so dass die Wurzeln bis zum Winter nur dünn werden und die Mäuse ihnen weniger nachstellen. Auf sehr gutem Boden und bei sehr zeitiger Aussaat erreichen aber die Wurzeln, wie gesagt, schon in einem Jahre eine brauchbare Grösse.

Um die Culturzeit zu verlängern und grössere Wurzeln in einem Jahre zu erzielen, haben wir auch schon den Versuch gemacht, den Samen im Februar in ein halbwarmes Mistbeet zu säen und die Pflanzen im April mit dem Pflanzholze zu pflan-

zen, was auch von Erfolg war, wenn die Setzlinge vorsichtig ausgegraben, nicht beschnitten und mit aller Sorgfalt, nur mässig angedrückt, in sehr tiefe Löcher gesetzt wurden, während bei Versäumniss dieser Massregeln die Wurzeln kurz, ästig und gekrümmt wurden. Man sät die Schwarzwurzel am besten in Reihen von 15 cm Entfernung in tiefe Saatrinnen und bedeckt die grossen Samen stark. Viele Pflanzen blühen schon im ersten Jahre und tragen Samen. Es ist sehr darauf zu achten, dass die Schwarzwurzeln im Keller feucht gehalten werden, denn wenn sie austrocknen, verlieren sie den Saft und sind dann ungeniessbar.

In Russland hat sich eine Sorte mit stärkeren Wurzeln und etwas breiteren Blättern, die dicke russische Schwarzwurzel ausgebildet, welche vielseitig der gewöhnlichen Sorte vorgezogen wird.

Die Zuckerwurzel (*Sium Sisarum*).

59. Diese Umbellifere stammt aus China und ist ausdauernd. In einigen Theilen Deutschlands kennt man sie bereits seit mehreren Jahrhunderten, in anderen überhaupt nicht. Die Pflanze bildet 30 cm hohe, ästige Stengel, mit einfach gefiederten Blättern und Doldenblüthen. Obschon man sie auch durch Wurzelstücke vermehren und verpflanzen kann, so ist doch die Anzucht aus Samen einfacher und ertragreicher. Die Zuckerwurzel bildet Wurzelbündel (sogenannte Klauen) wie Spargel, aber die 10—15 einzelnen Wurzeln von 20—30 cm Länge sind stärker und fleischig. Sie sind aussen schmutzig-weiss, innen weiss, etwas gekrümmt und mit Einschnürungen (als wären sie mit einem Faden zusammengeschmürt) versehen. An diesen Stellen brechen sie leicht ab und werden dadurch für den Markt unansehnlich. Im Geschmack gleicht die Zuckerwurzel fast der Kerbelrübe und ist eben so süss und mehlig, wird auch ähnlich wie diese zubereitet, nachdem man die holzige Mitte entfernt hat. Man sät die Zuckerwurzel im August oder auch später an Ort und Stelle oder verpflanzt sie und erntet im Herbst des folgenden Jahres. Auch kann man im Frühjahr säen und sie so lange in der Erde lassen, bis die Beete durch das Ausnehmen unordentlich geworden sind, da jedes grosse Wurzelstück eine neue Pflanze giebt. Die Zuckerwurzel liebt kräftigen Boden und reichliche Bewässerung. Der Samen hat Aehnlichkeit mit dem des Kümmels, ist braun und fast cylindrisch.

Knollen- und Stengelsellerie (*Apium graveolens*).

Wir halten es für angemessen, den Knollen- und Bleichsellerie vereint zu besprechen, da in Deutschland hauptsächlich der erstere (Sellerie-Wurzel) angebaut wird. In der Cultur weichen sie von einander ab, doch ist für beide die Aussaat dieselbe, auch ist der Samen nicht zu unterscheiden. Man sät den Samen vom Februar bis März sehr dünn in ein warmes Mistbeet, bedeckt ihn schwach und hält ihn feucht. Da er etwa 3—4 Wochen zum Keimen braucht, so kann man ihn durch Einquellen und Vermischen mit feuchtem Sand vorkeimen lassen. Sollte die Saat zu dicht aufgehen, so muss man sie bald verdünnen und kann die Pflanzen verstopfen. Solche pikirte Pflanzen wachsen rasch und gedeihen am besten.

60. Der Knollensellerie wird im April und Mai gepflanzt. Wo zeitig im Jahre frischer Sellerie als Suppenkraut verlangt wird, pflanzt man früh, für den Winterbedarf jedoch nicht vor Mitte Mai. Die Pflanzweite beträgt etwa 30 cm. In manchen Gegenden ist es üblich, zwischen je zwei Reihen noch eine enger gepflanzte anzubringen, welche zuerst, ehe die Knollen ganz ausgebildet sind, in Verbrauch kommt. Man nimmt aus diesen enger gepflanzten Reihen erst eine Pflanze um die andere, endlich die ganze Reihe. Dadurch bekommen die bleibenden Reihen Platz und die Knollen bilden sich aus. Der Sellerie verlangt sehr reich mit Mist gedüngtes Land, dreimaliges Behacken, und bei Trockenheit öfteres durchdringendes Begiessen, wobei ein Düngguss (s. Seite 31) besonders wirksam ist. Auf schwerem, aber stark und frisch gedüngten Boden oder gar mit Düngerwasser überrieselten Feldern wird der Sellerie stets sehr gross, aber grobfaserig, oft hohl und zum Salat wenig brauchbar, weil die Scheiben beim Schneiden zerfallen.

Im Geschmack ist zwischen den verschiedenen Sorten kaum ein Unterschied, wohl aber in der Beschaffenheit des Fleisches. Sehr verbreitet ist der weisse Erfurter Sellerie, welcher sehr gross wird. Ein Abkömmling von diesem, der Erfurter grosse kurzlaubige Sellerie, ist früher und giebt in eingeschlossenen Gärten bessere Erfolge, weil die kleinen Blätter die Sonne nicht abhalten. Nur 15 cm. hoch ist der Erfurter Tom Thumb, welcher gern zur Einfassung in Küchengärten und als Suppenkraut benutzt wird, da die Knollen nicht gross werden. Der vorzügliche Apfelsellerie hat grosse, runde Knollen, fast ohne Seitenwurzeln. Der Prager und der Naumburger Riesen-Sellerie sind besonders grossknollige Sorten.

Eine neue Sorte ist der dreifarbigte Sellerie, mit bunten Blättern, welche zur Zierde der Schüsseln benutzt werden können.

61. Der Schnittsellerie ist eine gleichsam in die wilde Form zurückgegangene, niedrige Pflanze, welche kleine Blätter aber keine Knollen bildet und in gelinden Wintern im Freien aushält. Man benutzt die Blätter als Suppenkraut und zum Aufputz der Fleisch- und Fischschüsseln. Der Anbau hat nur den Zweck, Blätter zu liefern, wenn der Knollensellerie im Keller zu Ende ist. Da dies aber oft erst im Mai der Fall ist und man zu dieser Zeit schon junge Blätter aus dem Freien haben kann, so wird der Schnittsellerie selten benutzt. In manchen Küchen darf jedoch Schnittsellerie nicht fehlen und er wird desshalb auch im Mistbeet angebaut. Ausser der gewöhnlichen Sorte giebt es noch eine feingekraute. Man säet den Samen meist in das warme Mistbeet und setzt die Pflanzen dicht in Reihen, damit sich die Blätter bequem abschneiden lassen. Die Pflanzen treiben wie Petersilie bis zum Herbst neue Blätter.

62. Der Stengel- oder Bleichsellerie wird in Frankreich, England u. a. O. allgemein angebaut und roh wie Radieschen oder auch als Salat genossen. Auch in grossen Städten Deutschlands cultivirt man jetzt den Bleichsellerie, und wir empfehlen dieses feinschmeckende Gewächs ganz besonders. Als kleine Pflanze weicht er nicht vom Knollensellerie im Ansehen ab. Der Unterschied besteht bei der entwickelten Pflanze in der Vollkommenheit der Blätter und Blattstiele. Während diese beim Knollensellerie dünn, weich und locker, dabei selten über 20 cm lang sind, erreichen die Blätter des Bleichsellerie eine Länge von 30—50 cm und eine Blattstielbreite von 3—4 cm und entsprechende Dicke; die Blattstiele sind fest, markig und fleischig. Nachdem man die äusseren Blätter abgelöst und die faserige, harte Schale vom unteren Theile des Stengels entfernt hat, schneidet man Stengel und Blattstiele der Länge nach in mehrere Stücke und bringt diese roh auf den Tisch. Auf den Markt kommt die ganze Pflanze ohne Wurzeln und ohne die grünen Blätter; die Blattstiele sind oben zusammengebunden.

Es giebt vom Bleichsellerie mehrere Sorten: mit weissen, gelblichen, rothen und violet gestreiften Blattstielen und Rippen. Im allgemeinen sind die niedrigen Sorten besser, d. h. fester im Fleisch; wir empfehlen besonders Sandringham's niedrigen weissen, den niedrigen weissen breitrippigen, Baillie's rosenrothen und Cole's Crystal.

Unter den grossen Sorten ist der violette von Tours unübertroffen und auch auf dem Londoner Markt sehr beliebt, obschon dort eine grosse Anzahl anderwärts unbekannter Sorten feilgeboten werden.

Die Cultur weicht von der des Knollensellerie erst dann ab, wenn die Pflanze eine Grösse erreicht hat, die es ermöglicht, mit dem Bleichen zu beginnen, welches durch Entziehung von Licht bewirkt wird. In England sind verschiedene Cultur- und Bleichmethoden gebräuchlich. Wir empfehlen folgendes einfache Verfahren, welches wir seit Jahren mit bestem Erfolg anwenden. Man hebt einen etwa 30 cm tiefen Graben aus, wirft die Erde gleichmässig zu beiden Seiten auf, bedeckt die Sohle 10 cm hoch mit gut verrottetem Dünger und pflanzt je nach der Grösse der Sorte in 30—50 cm Entfernung, in eine oder höchstens zwei Reihen, welche 30—40 cm Abstand haben müssen. Im Sommer muss fleissig behackt und stark gegossen werden. Anfang August werden die Pflanzen von beiden Seiten mit etwa der Hälfte der ausgeworfenen, klaren Erde vorsichtig angehäufelt und zwar so, dass das Herz der Pflanze noch frei bleibt. Dieses Anhäufeln wird nach einiger Zeit bis zum vollständigen Verbrauch der ausgeworfenen Erde fortgesetzt. Gegen Ende August sind die Pflanzen für die Tafel geeignet und werden nach Bedarf aus dem Boden genommen. Einige Gärtner wickeln sie in starkes, dunkelfarbiges Packpapier ein. Bei bevorstehenden Frösten nimmt man die noch nicht gebleichten Pflanzen mit den Wurzeln aus der Erde, schneidet die Blätter ab und pflanzt sie in einen dunklen Keller oder in eine Grube ein. Ist der Aufbewahrungsplatz hell, dann muss man die zusammengebundenen Pflanzen mit trockenem Sand bedecken.

Rhabarber (Rheum).

63. Die Rhabarberpflanze liefert ein vorzügliches Compot, welches ganz ähnlich dem von Stachelbeeren, eher noch feiner schmeckt. Da dies in manchen Theilen Deutschlands unbekannt ist, so bemerken wir ausdrücklich, dass nur die Blattstiele, so lange sie noch zart sind, genossen werden. In einigen älteren Gartenbüchern wird der Rhabarber fälschlich ein Kochgemüse wie Mangold etc. genannt. Der Vorzug des Rhabarber-Compots besteht darin, dass man es haben kann, wenn das Winterobst zu Ende, das Frühobst noch nicht reif ist, nämlich von Mitte April bis zur Zeit der Stachelbeeren, dann wieder, wenn diese für Compot zu gross, die ersten

Kirschen aber noch nicht weit genug sind. Die Engländer, welche seit länger als einem halben Jahrhundert Rhabarber genießen, bringen ihn in den verschiedensten Zubereitungen in Torten und Kuchen auf den Tisch und bereiten sogar wohlschmeckenden Wein daraus. In jeder Form indessen verlangt der Rhabarber Zusatz von sehr viel Zucker.

Die Cultur des Rhabarbers erfordert fast keine Arbeit, aber den besten, tiefsten, reichgedüngten Boden, womöglich von etwas feuchter Beschaffenheit. Die von England aus in Cultur gekommenen Sorten von *Rheum hybridum* unterscheiden sich sowohl in Bezug auf Ansehen, Geschmack und Ertrag, als auch auf die frühere oder spätere Brauchbarkeit. Royal Albert ist zart, sehr früh, rothfleschig und köstlich von Geschmack. Queen Victoria, sowie Linnaeus treiben später und sind sehr ergiebige, allgemein geschätzte Sorten.

Rhabarber wird aus Wurzeltrieben und durch Samen vermehrt. Auf erstere Art, welche vorgezogen wird, kommt man am sichersten zu einer schönen Pflanzung, wenn hinreichend Wurzelstücke von den besten Sorten beschafft werden können. Man pflanzt im Herbst oder noch besser im Frühjahr in Abständen von 1 m zwischen Reihen und Pflanzen. Im ersten Jahre hält man die Rhabarber-Anlage nur frei von Unkraut, erst im zweiten Jahre fängt man zu schneiden an und zwar nur mässig bis zum Sommer, wo die Blattstiele nur noch zur Weinbereitung Werth haben. Jedes abgeschnittene Blatt schwächt naturgemäss die Pflanze, man darf sie also auch später nicht zu sehr entblättern, wenn man sich ihrer Jahre hindurch erfreuen will, wie das bei richtiger Behandlung leicht zu erreichen ist. Die Cultur aus Samen ist ebenfalls vortheilhaft, da die meisten Sorten ganz constant sind. Fallen daraus geringwerthigere Pflanzen, so erkennt man diese bald und kann sie entfernen oder durch bessere ersetzen. Man säet im Frühjahr dünn in Reihen, zieht die zu dicht stehenden Pflänzchen aus, um sie zu verstopfen und lässt die Pflanzen bis zum nächsten Frühjahr auf dem Platze. Um diese Zeit haben sie schon fingerstarke rübenartige Wurzeln, die sich später zur Kugelform verdicken. Von diesen Sämlingen hebt man mit Schonung der Wurzeln so viele aus, um sie weiter zu verpflanzen, dass die bleibenden und die verpflanzten 0,60—1 m weit von einander stehen. Darauf wird das Land gelockert und dann stark gedüngt. Im zweiten Jahre erkennt

man schon, welche Sämlinge starke, steif stehende Blattstiele bilden, und kann sie auf das dafür bestimmte, vorher stark im Untergrund gedüngte, rigolte Land pflanzen. Um das Land dazwischen nicht unbenutzt zu lassen, kann man Spinat, Buschbohnen, Zwergerbsen etc. einsäen oder Salat hinein pflanzen. Von hier an beschränkt sich die Cultur darauf, dass man die Pflanzung von Unkrautrein hält und mindestens jedes zweite Jahr stark düngt, wozu besonders Cloakenmist sowie Knochendung wirksam ist. Man kann die jungen Sämlinge auch in Töpfen unter Glas heranziehen, wodurch man schneller starke Exemplare für das Freie erhält. Der Rhabarber lässt sich gut treiben, und man erhält dadurch besonders zarte Blattstiele. Es geschieht dies am besten in einem mässig warmen Raum und zwar im Dunkeln; man pflanzt die Wurzeln in leichte Erde, oder bedeckt sie nur mit feuchtem Moos.

Weisse Rüben, Herbstrüben (Brassica Napus).

64. Die zahlreichen Sorten, welche unter diese Rubrik fallen, weichen in Bezug auf Form, Farbe, Grösse und Geschmack sehr von einander ab. Unsere Besprechung soll sich auf die hauptsächlichsten beschränken. Die vorzügliche Münchener Treibrübe ist die früheste. Es ist eine plattrunde, mittelgrosse Sorte mit schwacher Belaubung. Die neue Mailänder ist ebenfalls sehr früh und dabei haltbarer, sie ist ebenso wie die gelbe plattrunde Petrowski-Rübe sehr zu empfehlen. Die Teltower oder märkische Rübe ist nur wallnussgross, grau von Ansehen und sehr früh, sie erreicht, auch, wenn erst spät im August gesäet, doch noch die beliebte Grösse. Sie gedeiht besonders gut im Sandboden der Mark Brandenburg, während sie in gutem, schweren Boden ausartet. Die unter dem Namen gelbe und weisse Mairübe verkauften Sorten sind in Deutschland am bekanntesten. Die amerikanische weisse rothköpfige ist sehr früh und eignet sich wegen ihrer kurzen Blätter zum Treiben unter Glas. Croissy und des Vertus sind vorzügliche, für Februar-Aussaat geeignete Pariser Marktsorten. Die Goldball-Rübe ist eine fast runde, schön gelbfleischige Sorte, von etwas bitterem Geschmack. Die kleine gelbe finnländische Rübe ist platt, unten concav, früh, und wenig empfindlich gegen Kälte; man muss sie jung geniessen. Die Frencuse ist eine etwa 10 cm lange, trockne Rübe, im Geschmack der Teltower ähnlich, welche vorzüglich auf magerem, kiesigen oder sandigen Boden gedeiht und

in Paris sehr beliebt ist. Die schwarze lange Rübe ist mittelfrüh, 15—20 cm lang, mit schwarzer Rinde, festem süßem Fleisch und sehr haltbar. Die Ottersberger gelbe lange Rübe wird bis 20 cm lang, 4—6 cm stark und hat feines, haltbares, süßes Fleisch. Sie wird schon Mitte Juli gesät und bildet sich erst im October aus. Auch die Acker- und Stoppelrüben werden im Herbst und Vorwinter gern gegessen.

In Bezug auf die Cultur haben alle miteinander gemein, dass sie sich schwer verpflanzen lassen, daher sofort auf den Platz gesät werden müssen, und zwar, je nach den Sorten von Ende Juni bis Mitte September. Man zieht allerdings die Rüben auch im Frühjahr, doch ist diese Cultur unsicher, indem die Pflanzen an manchen Orten Blüthenstengel bilden und dann keine Rüben liefern.

Die Hauptsaat für den Herbst geschieht breitwürfig oder zweckmässiger in Reihen Ende Juli bis Mitte August, doch kann man frühe kleine Sorten noch im September säen. Es ist nicht leicht, die Saat mit der Hand dünn genug herzustellen, wesshalb sich bei der Cultur im Grossen auch der Gebrauch der Säemaschine empfiehlt. Nach der Sommerbestellung muss die Saat bei Trockenheit gewalzt oder getreten werden, um einen günstigen Ausgang zu ergeben. Sobald die Pflänzchen einige Blätter haben, müssen sie sorgfältig ein oder mehrere Male verdünnt werden, bis sie weit genug von einander stehen. Will man wohlschmeckende Rüben erzielen, so darf man dieselben nicht auf frisch gedüngtes Land bringen und muss man bei Trockenheit reichlich giessen. Am besten schmecken alle Rüben kurz ehe sie ihre volle Ausbildung erreicht haben.

Die spätere Culturarbeit beschränkt sich auf Jäten und einmaliges Behacken der grossen Sorten. Im October muss man die Rüben und Rübchen aus der Erde nehmen und in Gruben, Mieten oder Kellern einschlagen. Manche Marktgärtner, welche die Rüben im Winter und Frühjahr verkaufen, schneiden die Blätter schon auf dem Lande etwa 8 Tage vor dem Ausmachen ab, um eine längere Haltbarkeit zu erzielen.

Zur Frühcultur eignen sich nur die frühesten und zartesten Sorten, wie die Münchener und Mailänder. Man sät entweder im Herbst, so dass sich nur sehr kleine Rübchen bilden, welche im Winter bedeckt werden, oder im Februar unter Fenster in kaltem oder nur schwach erwärmtem Kasten, später auch bis Ende

März in das Freie, auf Land, welches im Jahre vorher gedüngt war. Spätere Frühjahrs-Aussaaten verunglücken fast immer. Die Herbst- (Acker- oder Stoppel-) Rüben säet man auf die Stoppel, nachdem der Boden mit dem fünfschaarigen Pflug oder auch nur mit der Egge oberflächlich aufgerissen wurde.

Die kleinen Teltower und ähnlichen Rübchen halten sich, mit wenig feuchtem Sand vermischt, bis zum Frühjahr. Man muss den lange aufzubewahrenden Rüben die Köpfe (das sog. Herz) abschneiden, sonst treiben sie bald aus und verlieren an Werth. Uebrigens geben die im Dunkeln getriebenen Stengel aller Sorten ein spargelartiges Gemüse, die Blätter einen nicht üblen Salat. Die Blätter der Wasserrüben liefern ein am Niederrhein und in Westfalen bekanntes und beliebtes Gemüse, welches Rübstieler oder Stielmus genannt wird. *) Um diese jungen Triebe im Frühjahr zu erhalten, säet man dort auch vom Februar an gemeine Stoppelrüben ganz dicht und bedeckt dieselben, sobald sie eine gewisse Höhe erreicht haben, mit Sand oder sandiger Erde. Auf gleiche Weise kann man auch im Lande durchwinterte Rüben benutzen, indem man die treibenden Stengel bedeckt und sie im Dunkeln bleicht.

In der Schweiz und Südfrankreich werden die Herbstrüben wie unser Sauerkraut eingemacht und schmecken so diesem ganz ähnlich.

Die Rüben erfrieren im Lande zwar nur bei sehr starker Kälte, aber sie verlieren ganz ihre Festigkeit und den Zuckergeschmack.

Salatrüben oder Beete (*Beta vulgaris*).

65. Die Beete, auch rothe Rübe genannt, ist aus der Runkelrübe gewonnen. In den meisten Gegenden diesseits der Alpen werden nur Sorten mit dunkelrothem Fleisch angebaut, während im Süden auch hellfleischige Sorten beliebt sind. Im Geschmack weichen die Sorten wenig von einander ab. Die Salatrüben, namentlich die dunkellaubigen, sind sehr zum Ausarten geneigt und man wird wohl nie zu einer vollständigen Reinheit gelangen, trotzdem dieses Degeneriren durch fortgesetzt beobachtete, sorgfältigste Auswahl jetzt auf ein Minimum beschränkt ist.

Die Grösse der Salatrüben schwankt zwischen 5 und 20 cm Stärke, die Länge annähernd in demselben Verhältniss. Es sind jedoch grosse, besonders dicke Salatrüben nicht beliebt, wesshalb

*) Das Kochbuch von Henriette Davidis giebt Anleitung zur Zubereitung von Rübstieler.

man sie spät aussäet und selten auswachsen lässt. Die langen, dünnen Sorten werden bei uns zum Einmachen vorgezogen.

Unter den Sorten mit dunkelrothem Fleisch ist die Erfurter schwarzrothe Salatrübe am bekanntesten; sie ist sehr schlank, nicht zu gross und lässt sich leicht schälen. Die gleichnamige Sorte mit dunklem Laube ist von derselben Güte, jedoch wesentlich kürzer und oben dick. Die Crapaudine ist oben stark, verjüngt sich aber in eine kurze Spitze; sie hat eine schwarze, rauhe, unschöne Haut, jedoch vortreffliches Fleisch. Victoria, Dell's, Non plus ultra und Kronprinz-Beete sind, abgesehen von der guten Qualität ihrer Rüben, höchst decorativ durch ihre dunkle Belaubung. Castelnau-dry ist vorzüglich süss, fein und fest, auch früh, aber wenig ertragreich. Nutting's Selected Dwarf, Chelsea, Belvoir Castle und Osborn's sind kurz- und dunkellaubige englische Sorten. Unter den runden und plattrunden dunkelfleischigen Sorten erwähnen wir die rothe runde frühe, ferner die Eclipse und die ägyptische plattrunde Salatrübe. Letztere ist frei von Seitenwurzeln, dabei sehr früh und zart. Die Bassano-Rübe ist hellrothfleischig, weissgeringelt, vorzüglich im Geschmack, fein, süss und ergiebig. Dasselbe gilt noch mehr von den gelbfleischigen Sorten: der gelben runden frühen und gelben langen Zuckerbeete. Die runden Sorten wachsen sämmtlich mit den Knollen von $\frac{1}{3}$ bis zu $\frac{1}{2}$ über der Erde, können daher leicht ausgezogen werden.

Die starken Samen oder vielmehr Früchte der Runkeln und Salatrüben bestehen aus mehreren schwer theilbaren Samenkeimen, so dass ein Korn meist mehrere Pflanzen hervorbringt.

Man säet dünn in 20 cm entfernten Reihen auf reich, aber nicht frisch gedüngtes, tief bearbeitetes Land, und zieht die zu dicht stehenden Pflanzen aus, um dieselben nöthigenfalls weiter zu verpflanzen, so dass sie in den Reihen mindestens 10 cm, die runden Sorten noch etwas weiter, entfernt stehen. Etwa vorkommende Pflanzen mit grünen Blattrippen sind wegzuwerfen, da nur die mit rothen Blattrippen sicher dunkelrothe Rüben bilden. Zum Frühanbau säet man zeitig im März, in Süddeutschland sogar in das Mistbeet, für den Winterbedarf erst im Mai. Begiessen ist nur bei grosser Trockenheit nöthig. Das Ausnehmen der Rüben geschieht Ende October vor Eintritt stärkerer Fröste. Nachdem die Köpfe abgeschnitten und der Schnitt abgetrocknet, gräbt man die Rüben im Keller ein, oder bewahrt sie in Mieten wie Runkeln auf.

Futter- und Zuckerrüben.

66. Der Anbau dieser Rüben gehört zum landwirthschaftlichen Grossbetrieb und es soll hier nur einiges Allgemeine darüber gesagt werden. In Bezug auf Güte und Ertrag sind die Futterrunkeln wenig verschieden. Jede Gegend hat ihre Lieblingssorten, deren Gedeihen zweifellos von der Bodenbeschaffenheit abhängt. Die gelben Runkeln gelten im Allgemeinen für ertragreicher und nahrhafter; sie erreichen in kalkhaltigem Boden ihre grösste Vollkommenheit. Die runden Oberndorfer haben die allgemeinste Anerkennung gefunden. Sie werden gross und schwer, unten tellerförmig, wodurch man sie sehr leicht aus dem Boden nehmen kann. Die langen Pfahl- und Flaschen-Runkelrüben gedeihen überall.

Die Zuckerrübe ist erst in Deutschland durch sorgfältige Auswahl zu ihrer jetzigen Vollkommenheit gebracht worden, daher der deutsche Samen für ganz vorzüglich gilt. Die Zuckerrüben werden auf den Platz in Reihen gesäet, Futterrüben meist ebenfalls, jedoch werden letztere in einigen Gegenden auch gepflanzt. Wo das Unkraut im Felde nicht überhand genommen hat, ist jedenfalls die Saat auf den Platz vorzuziehen, denn durch das Pflanzen erleiden die Rüben einen Stillstand von mindestens zwei Wochen. Die Aussaat muss so früh wie möglich geschehen, spätestens Mitte April.

III. Salatpflanzen.

Zu den Salatpflanzen zählen wir alle diejenigen, deren Blätter oder Stengeltheile roh mit Essig genossen werden können. Durch das Verlangen nach Abwechslung in den pikanten Essigspeisen aus grünen Blättern sind manche Pflanzen von zweifelhaftem Werth unter die Salate gebracht worden. Die wichtigsten Salatpflanzen sind: Lattich- oder Gartensalat mit den Unterabtheilungen Kopf- und Bindsalat (Sommerendivien), Schnitt- und Pflücksalat; Endivien, Rabinschen oder Feldsalat, Brunnenkresse, Rapunzel (S. 110), Gartenkresse, Cichoriensalat, Löwenzahn, Kapuzinerkresse (*Tropaeolum*). Von den untergeordneten und nur in einigen Gegenden bekannten Salatpflanzen kommen für uns in Betracht: Löffelkraut (*Cochlearia officinalis*), amerikanische Staudenkresse (Winterkresse, *Erysimum praecox*), Fenchel, grosser süsser und Florentiner und Rauke (*Brassica Eruca*).

Lattich- oder Gartensalat (*Lactuca sativa*).

Der Lattichsamen hat weisse, gelbe, braune oder schwärzliche Farbe; auf die Güte der Sorten hat die Farbe des Samens keinen Einfluss.

Der Lattich braucht fetten Boden und wird am besten mit frischem Stallmist gedüngt. Auf armem Boden bleiben die Köpfe klein und schossen bald. Die Pflanzweite richtet sich nach der Grösse der Sorten und schwankt zwischen 25 cm bei Fröhsalat und 40 cm bei grossem Sommer-Kopfsalat und Bindsalat.

A. Kopfsalat (*Lactuca capitata*).

67. Wir theilen die Sorten nach ihrer Wachstumszeit in drei Gruppen: 1. Wintersalat, 2. Fröh- oder Treibsalat, 3. Sommersalat.

Der Wintersalat muss widerstandsfähig gegen Kälte sein, ist aber aus diesem Grunde von harter Beschaffenheit und wird wenig mehr beachtet, sobald Fröhsalat zu haben ist. Seine Cultur ist unsicher, weil die Pflanzen in schneeclosen, kalten Wintern zu Grunde gehen oder bei nassem Herbstwetter von den Schnecken gefressen werden; aber wenn er gut durch den Winter gebracht wird und früh zum Verkauf kommt, so bildet er die erste gute Einnahme, welche der Gemüsegärtner aus Landgewächsen erzielt. Der Fröhsalat ist meist klein und festköpfig, bildet früh Köpfe, hält sich aber nicht lange, sondern geht bald in Blüthen- und Samenstengel. Im Mai oder später gepflanzt, bildet er entweder gar keine festen Köpfe, oder dieselben schossen bei Eintritt heisser Temperatur. Ein Versehen bei der Wahl der Sorten bringt hierbei grossen Schaden. Grosse Sommersorten z. B. sind zum Treiben ganz unbrauchbar. Die Treibsalate bilden gleichsam eine besondere Abtheilung, werden desshalb auch in den Samenverzeichnissen als solche zusammengestellt.

Die Treibsorten sind zwar auch gut für das freie Land, bilden sich früher aus als andere frühe Sorten, bleiben aber kleiner und gehen bald in Samen. Einige derselben jedoch, welche im warmen Mistbeete zart werden, schliessen sich im Freien nicht zu festen Köpfen und bleiben hart, sind desshalb nur für Mistbeete geeignet. Die Sommer-Sorten bilden grosse, meistens feste Köpfe, die grössten wohl der „Cyrius“ genannte Salat und Bossin's Riesensalat, welche bis 40 cm Durchmesser erreichen. Da fast alle Sommersalat-Sorten im

Geschmack einander gleich stehen, so schätzt man als beste Eigenschaft, dass sich die Köpfe lange halten, bevor sie Blütenstengel treiben. Bekanntlich hängt dieses sogen. Schossen von der Witterung und Bodenfeuchtigkeit ab. Bei Hitze und Trockenheit treibt der Salat sofort nach der Ausbildung der Köpfe Stengel, was nur durch reichliches Begiessen und durch Umstechen (Verpflanzen) absichtlich herbeigeführte Beschädigung der Wurzeln verzögert werden kann. Einige besonders dauerhafte Sorten bleiben zuweilen so lange festköpfig, dass es schwer hält, davon eine genügende Menge Samen zu gewinnen, namentlich bei anhaltender Nässe, wo die Köpfe während der Stengelbildung faulen. Für die Herbstzeit werden theils Sommer-sorten, theils Frühsorten angebaut; letztere werden natürlich spät gesäet und in kalte Mistbeete gepflanzt, wo sie sich bis zum November halten.

Dem Marktgärtner ist am meisten an frühen Sorten gelegen, wenn die Köpfe auch nicht lange haltbar sind, denn er verkauft um so theurer, je früher er sie auf den Markt bringt. Dann hat er dafür zu sorgen, dass Nachfolge von späteren Sorten oder später gepflanztem Salat vorhanden ist. Er muss grosse Sorten auf den Markt bringen, besonders wenn er am Verkaufsorte wohnt, wogegen er bei entfernterer Lage nur solche anbauen darf, die den Transport gut vertragen. Für den eigenen Bedarf entscheidet der individuelle Geschmack, doch wird man nur gegen die Hitze widerstandsfähige Sorten wählen. Wie wir schon bei den Krauten bemerkten, wird Jeder leicht die für seine Zwecke und besonders für seine Boden- und climatischen Verhältnisse geeigneten Sorten ausfindig machen.

Die Cultur ist bei allen Kopfsalatsorten dieselbe, nur die Saat- und Pflanzzeit verschieden. Der Wintersalat, von welchem man den gewöhnlichen grünen, den blutrothen, braunen und den vortrefflichen Roquette mit rothgerandeten Blättern cultivirt, wird von Mitte August bis Ende September ausgesäet. Es ist in allen Fällen rathsam, zwei Aussaaten in Zwischenräumen von zwei Wochen zu machen, denn bei warmer Herbstwitterung werden die Pflanzen der frühesten Saat oft zu gross und kommen dann nicht gut durch den Winter, oder sie werden, wie schon erwähnt, von Schnecken gefressen, in welchem Falle man nachpflanzen aber zugleich Vorkehrungen zum Abhalten und Fangen der Schnecken treffen muss. Werden die ersten Salatpflanzen zu gross, so bringt man Pflanzen der zweiten Saat dazwischen, damit Ersatz

für die etwa im Winter ungekommenen da ist. Kommen beide Pflanzungen gut durch den Winter, so verdünnt man sie beim Behacken. Das erste Behacken findet im Herbst, ein zweites im März, bei günstiger Witterung noch früher, statt. Manche Gemüsegärtner pflanzen den Wintersalat in flach vertiefte Gräben, wo er mehr Schutz findet, aber beim Frühjahrsbehacken auch leicht zu tief kommt. Andere decken im Winter Tannenreisig darüber. Ein besseres und sicheres Verfahren ist, dass man die Pflanzen erst verstopft und gegen Ende October mit Schonung der Wurzeln an eine gegen Nord- und Ostwind geschützte Stelle (Mauer, Holzplanke) pflanzt, darüber ein ganz niedriges Stangengerüst anbringt und dieses bei strenger schneeloser Kälte mit Strohecken belegt. Fällt rechtzeitig viel Schnee, so ist ein Bedecken zwecklos, denn dieser schützt hinlänglich. Bei mildem Wetter, aber nicht bei Sonnenschein nach kalten Nächten, wird die Deckung entfernt.

Zur Frühlingspflanzung säet man die frühesten Sorten im März in ein nicht zu warmes Mistbeet, meist zwischen Kohl, zugleich macht man aber auch eine Aussaat in ein kaltes Beet. Die warm gezogenen Pflanzen werden oft schon Ende März, jedenfalls Anfangs April ausgepflanzt, meist zwischen frühe Kohlarten (s. §. 39, 40, 41), die kalt erzogenen für sich allein, am besten auf ein mit Fenstern zu bedeckendes Beet. Marktgärtner säen die frühesten Sorten schon im Februar reihenweise in das freie Land, ohne sie weiter zu verpflanzen, vielmehr verdünnen sie dieselben nur. Als Zwischenfrucht dienen häufig Radieschen. Die ersten Köpfe von Frühsalat im freien Lande erhält man, je nach der Gegend und Temperatur, von Mitte Mai bis Mitte Juni. Als gute Frühsorten für das Land empfehlen wir Bruine geel (gelber rothkantiger Prinzenkopf), Chavigny, Erfurter Dreienbrunnen, erstere beiden, als grossköpfige Sorten, zur Hauptpflanzung; ausserdem die Treibsorten: gelber Eier-, gelber, goldgelber und grüner Steinkopfsalat, mit kleinen aber sehr festen Köpfen und um 8—12 Tage früher als Bruine geel. Der Kaisertreibsalat eignet sich nur für das Mistbeet. Da es nach dem Verbrauch der Frühsorten zuweilen an Salat fehlt, bis die grossen Sommerarten schliessen, so empfiehlt es sich, geeignete Sommersorten zugleich mit den frühen zu säen und zu pflanzen. Solche sind z. B. die Forellensalate, Haarlemer Blankkopf, Prinzenkopf, Berliner Königskopf, gelber Dresdener, Simpson u. a. m.

Von den bei grosser Hitze lange haltbaren Sorten nennen wir besonders: asiatischer grosser gelber, Cyrius oder Mogul, Dresdener grosser gelber, Drumhead oder Trommelkopf, Coblenzer (brauner Haarlemer), Pariser Zucker-, Perpignanener Dauerkopf (besonders verbesserter Perpignanener), Schweizer und Trotzkopf. Man darf die grossen Sommer-Kopfsalate nicht zwischen Kohlarten, Sellerie etc. pflanzen, sonst schliessen sie nicht gut. Auch verlangen sie reichlichste Bewässerung, das einzige wirksame Mittel, um das Schossen zu verhindern. Der braune Trotzkopf-Salat ist eine Sorte, welche sich bis spät in den Herbst hinein hält und einige Grad Kälte verträgt. Durch schönes Aussehen zeichnen sich die Forellensalate aus, besonders der Goldforellen-, der feste Vollblut- und der kleine blutrothe Forellen-. Als Kochsalat sind nur hartblättrige Sorten, wie Chou de Naples, Sanct Angelo etc. brauchbar.

Die Herbstcultur ist wenig und fast nur in vornehmen Häusern und in grossen Städten gebräuchlich. Sie besteht darin, dass man geeignete, nicht grosse Sorten, am besten Frühlingsalate, entweder im Spätsommer sogleich in kalte Mistbeetkästen pflanzt, oder dass man späten Sommersalat vor der Kopfbildung mit Erdballen in Kästen setzt. So erhält man zuweilen Kopfsalat bis Anfang Dezember, allein er steht im Geschmack und Ansehen weit hinter dem Sommersalat zurück.

Ein fast nur in Frankreich gebräuchliches Verfahren ist die Wintercultur unter Glasglocken. Man sät die dazu geeigneten kleinköpfigen Sorten Crêpe und Gotte (unserem Steinkopf gleich), im August und pflanzt sie rechtzeitig auf ein Beet vor einer schützenden Mauer, entweder unter Glasglocken (wie schon beim Blumenkohl §. 38 angegeben wurde), oder so, dass ein niedriger Mistbeetkasten darübergestellt werden kann. Bei Eintritt der Kälte werden die Glocken oder Fenster stark mit Decken oder Stroh bedeckt, bei mildem Wetter gelüftet. In gelinden, sonnenreichen Wintern erhält man so zuweilen schon im Februar brauchbare, allerdings kleine, wenig geschlossene Köpfe.

Das Treiben des Kopfsalats.

68. Das Treiben von Kopfsalat ist sehr zu empfehlen, denn es ist leicht und wenig kostspielig. Man beginnt mit der Pflanzung in Gurken- und Melonenkästen; allein dies ist nur ein Nothbehelf, um

den Platz zu benutzen, denn da jene Pflanzen warm stehen wollen, der Lattich aber viel Luft verlangt, so schliessen entweder die Köpfe nicht fest, oder es leidet die Hauptpflanze (Gurken, Melonen). Man darf hierzu nur die kleinen Treibsorten verwenden. Zum Treiben kann man schon im Herbst aussäen und die Pflanzen frostfrei durchwintern, es genügt aber auch, wenn man sie im Januar in das warme Mistbeet, im Warmhause oder warmen Zimmer säet. Die Pflänzchen werden bald verstopft und dürfen nicht zu gross werden. Die für Salat bestimmten Mistbeete werden nicht zu warm gemacht (§. 11). Der Abstand der Pflanzen richtet sich nach der Grösse der Sorten, doch kann er geringer sein als im Lande, weil man die zu dicht stehenden Pflanzen, auch wenn sie keine Köpfe haben, verwerthen kann. So oft es milde Witterung erlaubt, wird gelüftet, denn nur so bilden sich feste Köpfe. Von Ende Februar an bepflanzt man auch kalte oder nur mit Laub erwärmte Kästen mit Salat, welcher die Lücke zwischen Mistbeet- und Landsalat ausfüllt. Der von Ende März bis Mitte Mai gewonnene Kopfsalat erzielt gute Preise.

Die Treibsalate sind sämmtlich vorzügliche, bewährte Varietäten, man wird sich meist mit zwei Sorten begnügen, Steinkopf-, Eier- oder Kaisersalat, oder eine der neuen kleinen Sorten für den ersten Bedarf, Bruine geel für spätere Zeit und kalte Kästen. Der neue gelbe Kaiser-Treibsalat ist vorzüglich; Sutton's brauner Treibsalat bildet sehr bald kleine Köpfe, während der zarte Wheeler's Tom Thumb ganz grün bleibt und die festen Köpfe am längsten hält.

B. Römischer- oder Bindsalat

Sommer - Endivien.

69. Der Bindsalat, auch Sommer-Endivien genannt, weil er zum Theil wie Endivien gebunden wird, zeichnet sich dadurch aus, dass er lange, schmale, gewölbte Blätter mit starker, dabei zarter Mittelrippe bildet. Die Cultur weicht nur insofern ab, dass man ihn (wenigstens in Deutschland) nicht früh anbaut, sondern erst mit dem Sommer-Kopfsalat oder noch später. In anderen Ländern dagegen schätzt man den römischen Salat so hoch, dass man ihn auch im Frühjahr anbaut, sogar treibt und noch im Herbst für den Winterbedarf pflanzt. In Gegenden, wo er allgemein angebaut wird, geniesst man von Ende Juli an, wo die Kopfsalate

selten werden, fast nur noch römischen Salat, und es ist zu bedauern, dass er in Mittel- und Norddeutschland wenig bekannt ist. Wir können seine Cultur nicht genug befürworten. Ausserdem liefern die Bindsalate ein eben so gutes Kochgemüse, wie z. B. der Kopfsalat Chou de Naples. Der Bindsalat wird mindestens 35 cm entfernt gepflanzt und muss, um gut und ertragreich zu werden, stark gedüngt werden. Man hüte sich jedoch vor scharfem Stalldünger, in welchem die Pflanzen leicht fleckig werden und von Würmern und Maden zu leiden haben. Die Sorten schliessen sich theils von selbst zu länglichen Köpfen, oder sie müssen wie Endivien locker gebunden werden, damit die Blätter gut bleichen, d. h. gelb und zart werden. Man darf aber nie mehr Pflanzen binden, als in gewisser Zeit verbraucht werden können. Zum Binden muss natürlich das Wetter ganz trocken sein. Bei Trockenheit ist reichliches Bewässern unerlässlich, weil der Bindsalat sonst leicht Stengel bildet, die neben dem Bunde durchwachsen. Wenn mehr ausgewachsene Pflanzen da sind, als verwendet werden können, so nehme man bei dem ersten Anzeichen von Stengelbildung die fertigen Pflanzen heraus und hebe sie in einem luftigen Keller auf, wo sie sich mehrere Wochen halten, wenn sie nicht gedrängt aneinander liegen. Das Aufbewahren im Herbst hält schwer. Mit dem Treiben beginnt man später als bei Kopfsalat und nimmt etwas höhere Kästen. In Frankreich verwendet man besonders den Pariser gelben selbstschliessenden Bindsalat, eine sehr beliebte, auch für die Landcultur vorzügliche Sorte; diesem ähnlich sind der Sachsenhäuser, und der Pariser grüne selbstschliessende. Der blutrothe Bindsalat (Romaine rouge) wird nicht gross, ist aber ergiebig und sehr schön; die inneren Blätter sind grün. Der rothgesprenkelte Forellen-Bindsalat wird gross und breitet sich sehr aus, muss daher sorgfältig gebunden werden. Victoria oder Florence Cos ist gross, zart und weiss. Ausserdem giebt es noch verschiedene englische Sorten.

Spargelsalat (*Lactuca angustana*).

70. Die Cultur dieses Salats (nur eine, allerdings höchst charakteristische Abweichung des gewöhnlichen Gartensalats) zum Gewinn von Stengeln (Strünke) verdient Beachtung; sie ist besonders in einigen Gegenden Hessens und Hannovers gebräuchlich, wo man diese Strünke auch für den Winter wie Bohnen mit Salz einmacht. Zu diesem Zwecke lässt man die Pflanzen in die Höhe gehen und verbraucht sie bevor

sich die ersten Knospen zeigen, d. h. wenn sie ungefähr fusshoch sind. Beim Ausnehmen dreht man die Pflanzen an der Wurzel ab und kann diejenigen, welche nicht gleich gebraucht werden, im Keller aufbewahren. Der Name zeigt, dass die Stengel wie Spargel zubereitet werden.

C. Schnitt- und Pflücksalat.

71. Unter dieser Rubrik vereinigt man einige Salate, welche, statt Köpfe zu bilden, Blätter in grosser Menge liefern, die sich nach dem Schneiden erneuern. Sie nehmen wenig Platz ein und geben ihr Product auch im Hochsommer, wenn es an Kopfsalat mangelt. Ausser den gelben Sorten giebt es krausblättrige, welche wie Endivien in der Schüssel gut aussehen. Schnittsalat wird in das halbwarme Mistbeet, aber auch in das Land gesät. Der im Lande gezogene ist weniger zart. Man sät ihn breit, oft zwischen andere Gemüse, besonders Carotten.

Der Pflücksalat amerikanischer Einführung ist als eine distincte Form und wesentliche Verbesserung der Schnittsalate zu betrachten. Er bildet sehr schnell 40—60 cm. hohe, dicht mit kleinen zarten Blättern besetzte Stengel. Der Ertrag ist sehr bedeutend. Man behandelt den Pflücksalat wie andere Lattichsorten, kann ihn aber auch in Reihen säen und später verdünnen. Marktgärtner sollten den Pflücksalat mit den Stengeln zum Verkauf bringen.

Endivien (*Cichorium Endivia*).

72. Die Endivien sind die feinsten Blättersalate für Herbst und Winter, liefern ein gutes Kochgemüse und dienen als Zusatz zu Suppen. In Frankreich sind dieselben so beliebt, dass man sie immer auf den Märkten finden kann, was bei diesen schnellwachsenden Pflanzen den Gärtnern nicht viel Schwierigkeiten bietet, wenn sie über die nöthigen Hilfsmittel verfügen. Man unterscheidet die eigentlichen Endivien mit feingekrausten, hirschhornartig getheilten Blättern und den Escariol mit fast ganzrandigen, breiten Blättern und sehr dicken Blattrippen. Der Escariol wird nicht überall cultivirt; wo man jedoch den Wohlgeschmack seiner dicken Blattrippen kennt, schätzt man ihn hoch, und es giebt Orte, wo man fast nur Escariol anbaut, welcher sich auch im Winter lange gut hält. Von krausen Endivien giebt es viele, mehr oder weniger fein gekrauste, lang- und kurzblättrige Sorten; gebleicht sind sie

jedoch im Geschmack einander fast gleich. Auch in der Ergiebigkeit besteht kein grosser Unterschied, denn die langen grossen Blätter sind dünn, die kurzen, z. B. die der Moosendivien, sehr dicht und vollherzig. Die gelben Sorten, wie Imperial und die gewöhnliche gelbe feingekrauste haben das Ansehen von gebleichten Pflanzen, sind daher auf dem Markte beliebt und früher verkäuflich. Die ganz fein gekrausten Sorten nehmen weniger Platz ein, denn die Blätter sind kürzer, aber sie lassen sich nicht so gut binden wie Sorten mit längeren Blättern und halten sich im Winter weniger gut. Es giebt frühe und späte Sorten, unter den ersteren einige, welche zur Frühjahrspflanzung geeignet sind, sogar in Mistbeeten und unter Glocken getrieben werden; sie halten sich aber im Herbst und Winter nicht lange. Solche Sorten sind die frühen fein gekrausten Sommerendivien und die *courte à cloche* der Franzosen. Unter den wenigen Escariol-Sorten sind die breite grüne, gelbe und breite grüne vollherzige Pariser am meisten zu empfehlen.

Die Hauptregeln für die Cultur sind folgende: Man säet für das Land zum Sommerbedarf im April, für den Herbst und Winter Ende Mai bis Mitte Juni (in Frankreich bis Ende August), sobald es warm ist in das freie Land. Da der Samen sehr fein ist, und nur starke Pflanzen gut anwachsen, so muss man sehr dünn säen. Dies geschieht am besten in engstehenden Reihen, so dass man die stärksten Pflanzen auf dem Platze lassen kann, wodurch sie um zwei Wochen früher brauchbar werden und weniger leicht Samenstengel bilden. Die übrigen Pflanzen werden auf gedüngtes Land etwa 30—40 cm von einander gebracht. Mit der zweiten Saat für den eigentlichen Winterbedarf wartet man bis Mitte Juni, weil die Pflanzen der frühen Saaten leicht Blütenstengel bilden. Auf heissem, sandigen Boden ist es gut, die Beete vor dem Pflanzen mit kurzem Mist zu bedecken, ein im Süden allgemein gebräuchliches Verfahren. Die Pflanzen müssen sehr stark sein, sonst widerstehen sie der Hitze nicht. Die grossen Blätter werden vor dem Pflanzen abgeschnitten, da sie doch von der Sonne verbrennen. Die Beete werden wiederholt behackt und zwar zum letzten Male, bevor die Blätter sich auf dem Boden ganz ausbreiten. Bei Trockenheit ist häufiges und reichliches Giessen das einzige Mittel, die Bildung von Stengeln zu verhüten. Sobald die Endivien so ausgewachsen sind, dass der Boden nicht mehr durchsicht, bleicht man sie. Dies geschieht mei-

stens durch Zusammenbinden der Blätter mit Bast, Stroh oder dergleichen. Gewöhnlich genügt ein Band. Das Binden muss bei ganz trockenem Wetter und nach dem Abtrocknen des Thaues geschehen. Seltener benutzt man zum Bleichen übergestellte Glasflaschen ohne Boden, Blumentöpfe oder besonders dazu hergestellte Glocken von Thon. Sind schöne Endivienpflanzen bei Eintritt starker Herbstfröste noch nicht gebunden, so bleicht man sie unter einer Bedeckung von Laub oder Strohmatten. Dilettanten bleichen ihre wenigen Pflanzen auch unter Tellern und Schüsseln. Da die gebleichten Endivien sich nicht lange halten, ausser im Gemüsekeller, so bleicht man nicht mehr auf einmal, als man zu verbrauchen oder zu verkaufen gedenkt. Das Bleichen dauert, je nach der Witterung und Lage 2—3 Wochen. Auch nach dem Binden muss bei Trockenheit noch gegossen werden, es darf dann jedoch kein Wasser in das Innere der gebundenen Pflanze kommen, weil diese sonst fault.

Für den Winterbedarf läst man die Endivien bis Mitte oder Ende October im Lande, bis zu welcher Zeit sie gebleicht sein müssen. Die zuerst zu verbrauchenden werden (nicht zu dicht) mit Wurzeln in einen Mistbeetkasten eingeschlagen und luftig aber dunkel gehalten. Ueberhaupt kann man alle Endivien, bevor Winterkälte eintritt, in Kästen so aufbewahren. Die Pflanzen für den späteren Winterbedarf schlägt man mit Wurzeln im Gemüsekeller oder auch in tiefen, frostfreien Kästen ein.

Die Endivien sind in Bezug auf ihre Haltbarkeit im Winter verschieden. Am wenigsten halten sich die mit sehr fein gekrausten, weichen Blättern. Am meisten kommt aber auf den Aufbewahrungsraum an; in guten, reingehaltenen Kellern kann man Endivien bis März aufbewahren.

Da es vom Januar bis zum späten Frühjahr im Blättersalat keine Abwechslung giebt, sollte man sich auch bei uns mit dem Treiben von Endivien mehr befassen. Man verfährt ungefähr wie bei dem Salat, und es eignen sich dazu nur kurzblättrige, vollherzige Sorten, wie Moos-Endivien, Guilande, Meaux und vollherzige Eskariol.

Rabinschen oder Feldsalat (*Fedia* oder *Valerianella olitoria* und *Locusta*).

73. Die Cultur dieser ergiebigen kleinen Pflanze, auch Schafmälchen, Nüsschen oder Rapunzel genannt, welche vom Herbst bis März einen wohlschmeckenden Salat liefert, ist höchst einfach.

Man säet von August bis September auf gutes, nur oberflächlich gelockertes Land, am besten zweimal in Zwischenräumen von 14 Tagen, und zwar mit Vorliebe ein Jahr alten Samen. Hat man kein leeres Land zur Verfügung, so kann man die Rabinschen zwischen Perlzwiebeln oder dergleichen säen. Das gewöhnliche Gartenrabinschen wird dichter gesäet, als die grösseren, vollherzigen Sorten, welche eine Art Kopfrosette bilden. Falls zur Saatzeit trockenes Wetter herrscht, so ist es gut, den Samen festzutreten und einmal tüchtig zu giessen. Unkraut ist besonders gleich nach dem Aufgehen der Saat, aber auch später sorglich zu beseitigen. Die Erndte geht nach und nach vor sich, je nachdem man den Salat braucht, die kleinen Pflanzen sind die zartesten. Wer ihn im Winter bei uns im nördlichen Deutschland nicht entbehren will, muss ein Stück Land bedecken. Ausser dem gemeinen Rabinschen cultivirt man das breitblättrige holländische, das grössere langstielige gelbgrüne italienische Regence (*V. eriocarpa*) und das dunkelgrüne vollherzige. Letzteres übertrifft alle an Zartheit und Wohlgeschmack und bildet förmliche Köpfchen.

Brunnenkresse (*Sisymbrium Nasturtium*).

74. Die Brunnenkresse gedeiht nur in Quellwasser, dessen Temperatur Sommer und Winter ziemlich gleich bleibt, aber auch Wasser aus Lauf-Brunnen ist für kleine Anlagen oft brauchbar.

Da die Brunnenkresse fast ausschliesslich durch Stecklinge vermehrt wird, so wollen wir diese Methode hier kurz beschreiben. Lässt man Stecklinge kommen, welche am unteren Theile stets bewurzelt sind, so bildet man mit der Hand kleine Büschel und drückt diese reihenweise in den Schlamm, und zwar schräg mit den Spitzen in der Richtung des fliessenden Wassers. Weil das Wasser durchaus fliessen muss, wenn auch schwach, so muss die Sohle des Wassers etwas geneigt sein. Nach dem Pflanzen darf der Strom nur schwach sein, damit er die unbewurzelten Pflanzen nicht fortschwemmt. Das Pflanzen wird im August und September vorgenommen und in guten Culturen alljährlich wiederholt, denn die bleibenden Kresseanlagen verwildern schnell durch Wasserunkräuter. Bei Erneuerung alter Anlagen müssen diese sorgfältig aus dem Schlamme entfernt werden. Durch Düngung wird die Brunnenkresse zarter und grösser. In Erfurt, wo diese Cultur auf der höchsten Stufe steht, düngt man nicht nur beim Pflanzen, indem man

den Schlamm mit stark verwesenen Mist vermischt, sondern auch mehrmals im Herbst, indem man solchen Mist oder fette Composterde einstreut, wobei der Wasserzufluss abgestellt wird. In einem laufenden Brunnen kann man den Hausbedarf an Brunnenkresse ziehen, indem man das ablaufende Wasser in einen Graben leitet. Wenn man denselben bei Kälte bedeckt, so kann das sonst übliche Untertauchen der Kresse mittelst Schlagen mit einer Schaufel unterbleiben. Die Brunnenkresse wird nur im Winter benutzt und treibt im Mai oder früher Blütenstengel. Bis zur Erneuerung im August hat man nichts daran zu thun, nur etwa auffallend grosses Unkraut auszuziehen. *) Man geniesst von der Brunnenkresse die Spitzen mit den Blättern roh mit Salz oder als Salat, an manchen Orten jedoch auch als Gemüse.

Es ist wenig gebräuchlich, die Brunnenkresse aus Samen zu ziehen, aber nur dadurch ist es möglich, diesen köstlichen Salat weit entfernten Gegenden zuzuführen und ausgeartete Culturen zu erneuern.

Man säet in breite Samenschalen oder Schüsseln oder sogleich in das dazu bestimmte Wasserbeet (Becken). Bis nach dem Keimen genügt feuchter Boden. Wenn die Pflänzchen in den Saatgefässen einige Blätter haben, stellt man sie in flaches Brunnenwasser, so dass die Spitzen über demselben stehen. Allmählig werden sie mehr unter die Oberfläche versenkt. Haben die Pflanzen etwa 5 cm Höhe erreicht, so zerreisst man den Erdballen und pflanzt büschelweise in 10 cm Entfernung in das bis dahin trocken gehaltene Beet (Klinge). Dasselbe erhält eine Breite von 1,50—2 m (bei grossen Anlagen mehr) und eine Tiefe von 30 cm. Der Boden muss wenigstens 5 cm tief aus sandigem Schlamm bestehen, den man zweckmässig mit altem, erdigen Mist vermischt. Nach dem Bepflanzen wird der Graben vorsichtig unter Wasser gesetzt, erst nur einige Centimeter hoch, allmählig höher; hat er keinen ständigen Zu- und Abfluss, so muss man täglich frisches Wasser zulassen.

Man säe zeitig im Frühjahr, so dass im August die Pflanzung vorgenommen werden kann. Die Ernte (das Schneiden) beginnt Ende October und wird bis zum Frühjahr fortgesetzt. Da die aus dem

*) Wer zu gewerblichen Zwecken grössere Brunnenkresse-Culturen einrichten will, würde gut thun, die Erfurter Anlagen kennen zu lernen, findet aber auch in H. Jäger's „Gemüsegarten“ Band II. ausführliche Belehrung nach der Erfurter Cultur-Methode.

Wasser wachsenden Blätter und Stengel von grosser Kälte braun und hart werden, so müssen sie, wenn solche eintritt, mit einem schaufelartigen Werkzeug unter das Wasser geschlagen werden. Statt dessen kann man auch bei Kälte den Graben mit Brettern und Stroh überdecken. Soll eine Brunnenkresse-Anlage lange ergiebig sein, so muss regelmässig im Herbst gedüngt werden. Zu diesem Zwecke verwendet man Schaf-, Rinder- oder verrotteten Stallmist, welchen man gleichmässig in die Gräben streut. Das Wasser wird während dieser Operation, und auch während einiger Tage nach derselben abgestellt.

Gartenkresse (*Lepidium sativum*).

75. Die Cultur der Gartenkresse ist desshalb so einfach, weil man zu jeder Jahreszeit und in jedem Terrain mit sicherem Erfolge aussäen kann. Nur bei sehr heissem Wetter muss man schattige Lagen wählen. Man säet in Reihen, etwa wie Kerbel, begiesst bis zum Aufgehen und hat nach wenigen Wochen die ausgewachsenen Blätter zum Verbrauch. Das schnelle Keimen des Kresse-Samens ist sprichwörtlich (innerhalb 1—2 Tagen). Wer fortwährend Kresse haben will, muss alle 2 Wochen säen; man beschränkt sich jedoch meist auf das Frühjahr.

Die sogenannte gefüllte Kresse, mit gekrausten Blättern, sieht sehr hübsch aus, die breitblättrige und goldgelbe englische sind im Geschmack nicht verschieden. Man zieht auch Kresse als Nebepflanze im Mistbeete, sogar im Zimmer in Töpfen und anderen Gefässen, oft nur um sich des frühen Grüns zu erfreuen.

Cichoriensalat oder Kapuzinerbart (*Cichorium Intybus*).

76. Wir haben hier noch über die Anzucht kleiner Wurzeln zur Erzeugung von Salat im Winter und Frühling zu sprechen und verweisen betreffs der Aussaat auf §. 50. Man benutzt hierzu besonders die in Belgien sehr beliebte vollherzige Witloof-Cichorie, welche weniger bitter ist, und die verbesserte buntblättrige. Der Cichoriensalat kann nur gebleicht genossen werden, und ist auch dann für manchen Gaumen noch hart und bitter. Immerhin ist er gegen Ende des Winters, wenn es keine Endivien mehr giebt, von Werth. Zarter und weniger bitter wird dieser Salat, wenn man ihn mit Anwendung von Wärme treibt. Gewöhnlich begnügt man sich damit, die im Dunkeln gewachsenen, daher gebleichten Triebe

der im Keller eingeschlagenen Wurzeln zu geniessen. Man nimmt die Wurzeln Ende October aus der Erde, und pflanzt, nachdem sie von allen Seitentrieben befreit worden sind, entweder in tragbare Kästen, die man an einen warmen Ort bringt, oder man richtet eine vollkommene Treiberei ein. Zu diesem Zwecke stellt man im Keller ein Mistlager her wie zu Mistbeeten, bringt, nachdem der Mist erwärmt ist, 30 cm hoch Erde oder Sand darauf und legt die fingerdicken Wurzeln, welche hier rasch treiben, schräg und sehr dicht ein. Man hat hierbei regelmässig und zwar durchdringend bis auf den Mist zu giessen. Legt man grossen Werth auf diesen Salat, so bepflanze man ein mässig warmes Mistbeet dicht mit Wurzeln und halte es ganz dunkel. Beim Abnehmen der Blätter hüte man sich, die noch nicht ausgebildeten zu beschädigen, weil diese nachwachsen. Wenn man den Cichoriensalat erst im Frühjahr braucht, so bedeckt man ein Beet, wenn die ersten Blätter sich zeigen, 10—15 cm hoch mit Sand oder Sägespänen oder auch mit lockerer Erde. Die unter dieser Bedeckung wachsenden Blätter werden sehr zart.

Löwenzahn (*Leontodon Taraxacum*).

77. Diese bekannte, bei uns als Unkraut so häufig vorkommende Pflanze (franz. Pissenlit) giebt, wie Cichorien behandelt, einen zarten, angenehmen Salat, der besonders in Frankreich geschätzt wird. Man sät im April dünn in Reihen von etwa 40 cm Abstand. Man kann gleich an Ort und Stelle säen oder im Mai die Sämlinge verpflanzen. Die Anlage verlangt dann hin und wieder Behacken und Giessen; die Ernte findet vom Herbst bis zum Frühjahr statt. Je nährhafter der Boden, desto reicher ist die Ernte an Blättern. Durch Bleichcultur unter Bedeckung, wie bei Cichorien angegeben, gewinnt dieser Salat an Zartheit und verliert die Bitterkeit. Durch sorgfältige Zuchtwahl sind die allein culturwerthen, verbesserten vollherzigen und grossblättrigen Sorten erzielt worden.

Löffelkraut (*Cochlearia officinalis*).

78. Das Löffelkraut, welches namentlich als officinelle Pflanze geschätzt wird, hat einen kresseartigen Geschmack. Man geniesst hier und dort als Salat die Blättchen, bevor sie Samenstengel bilden. Die Cultur ist derjenigen der Gartenkresse gleich; das Löffelkraut überdauert jedoch den Winter und wird meist im Herbst in schattiger Lage gesät.

Kapuzinerkresse (*Tropaeolum majus* und *T. minus*).

79. Die Blüten dieser bekannten Gartenblume werden in manchen Gegenden zum Aufputz von Salaten benutzt; sie schmecken angenehm kresseartig. Man legt die grossen Samen weitläufig an eine Stelle, wo sie sich ausbreiten und über eingesteckte Reiser oder Stäbe ranken können. Die Knospen und namentlich die grünen, unreifen Früchte benutzt man vielfach wie Kapern (zum Einlegen in Salz und Essig); hierzu verwendet man vorzugsweise *Tropaeolum minus*, sowie nicht rankende Sorten von *T. majus* (*T. majus nanum*).

Amerikanische Winter- oder Staudenkresse (*Barbarea praecox*, *Erysimum praecox*).

80. Die Blätter dieser ausdauernden Pflanze gleichen im Geschmack etwas der Brunnenkresse, nur sind sie bitterer. Wo man sich Brunnenkresse nicht verschaffen kann, finden Liebhaber in diesem Salat einen nothdürftigen Ersatz. Die Cultur bietet keinerlei Schwierigkeit, da man vom Frühjahr bis zum Herbst aussäen kann und diese Pflanze überall gedeiht, mit Vorliebe an feuchten Stellen.

Süsser Fenchel.

81. Unter diesem Namen begreift man zwei unserem Gartenfenchel nahestehende Pflanzen, nämlich *Foeniculum officinale* oder *Anethum Foeniculum*, der grosse süsse und *F. dulce*, der Florentiner Fenchel. Ersterer wird roh, wie Bleichsellerie, letzterer gekocht genossen und zwar bis jetzt fast ausschliesslich in Italien. Indessen ist der Anbau dieser wohlschmeckenden Pflanze auch für Deutschland zu empfehlen. Der grosse süsse Fenchel bildet kurze Stengel mit dicht stehenden Blättern und breiten, fleischigen Blattstielen. Diese sind es, welche nebst dem noch zarten Stengel genossen werden. Bei dem Florentiner sind die Blattstiele noch breiter und schuppenartig, 10 cm lang und 5—6 cm breit. Die Cultur ist nur in warmen Lagen lohnend. Man sät diese Fenchelsorten in ca. 40 cm von einander entfernte Reihen sehr dünn, jätet, behackt, giesst fleissig und durchdringend und behäufelt die Pflanzen, wenn die noch von den Schuppen umschlossenen Pflanzen etwa fauststark sind, bis über die Hälfte, wodurch sie zart werden. In Italien sät man den Fenchel im Winter und im Sommer und erntet das ganze Jahr hindurch, bei uns ist aber nur die Saat im Frühling möglich.

Hirschhornsalat (*Plantago Coronopus*).

82. Dieses Salatgewächs wird selten angebaut; es hat das Ansehen einer dünnen Endivienpflanze mit mattgrünen Blättern. Man säet in Reihen, wie bei Spinat, verdünnt die zu dicht stehenden Pflanzen, behackt, jätet und giesst wiederholt. Bei dem Abschneiden der Blätter beseitigt man die älteren. Die Pflanze ist einjährig; sie wird fast nur im Süden Europas genossen, wo sie auf Sandboden, besonders am Meere, häufig wächst.

Rauke (*Brassica Eruca*).

83. Dieses einjährige, niedrige Gewächs ist in Frankreich als Salatpflanze ziemlich bekannt. Zwei Monate, sogar noch früher nach der Aussaat, welche vom April ab an Ort und Stelle in das freie Land bewirkt wird, können die Blätter geschnitten werden. Durch häufiges Giessen werden diese besonders zart, auch verhindert man hierdurch, dass die Pflanzen schnell Samenstengel bilden.

IV. Zwiebel- und Laucharten.

Unter dieser Rubrik kommen für uns in Betracht: A. die eigentlichen Zwiebeln, B. einige andere absterbende Zwiebelarten, C. Porree oder Lauch. Nicht alle Zwiebelpflanzen können aus Samen gezogen werden, diejenigen, welche man auf andere Weise vermehrt, entziehen sich unserer Besprechung.

A. Die gemeine Zwiebel oder Zipolle (*Allium Cepa*).

84. Die Zwiebeln werden nur aus Samen gezogen. Man unterscheidet je nach der Form plattrunde, runde oder länglichrunde und spitze oder Birnzwiebeln; die Form hat auf den Geschmack so wenig wie auf die Grösse oder Haltbarkeit Einfluss. Die weissen Sorten sind vom Geschmack milder als die andern. In Bezug auf Grösse, Zeit der Reife, Haltbarkeit im trockenen Zustande und Geschmack besteht zwischen den Sorten ein grosser Unterschied. Gewisse Sorten eignen sich nur als Speisewürze, andere sind zum Einmachen, einige als Kochgemüse geeignet. Unter den vielen Sorten, welche in den Catalogen geführt werden, wollen wir nur die gangbarsten und werthvollsten besonders erwähnen.

Eine sehr verbreitete blassrothe, plattrunde Sorte führt den Namen Erfurter. Sie ist mittelgross, fest und hält sich gleich der

holländischen gelben runden sehr gut. Die silberweisse plattrunde wird ihrer frühen Reife wegen viel zum Einmachen benutzt, ist jedoch nicht so haltbar wie die später reifenden Sorten. Die schwefelgelbe plattrunde ist wegen ihres milden Geschmacks beliebt. Die gelbe Birnzwiebel wird gross, ist haltbar, süss und in der Küche beliebt, jedoch für den Markt im Sommer nicht geeignet, weil die noch nicht ausgewachsenen Zwiebeln dünner und unansehnlicher als runde Sorten erscheinen. Die gelbe runde Zittauer Zwiebel, über mittelgross und länglichrund, ist eine sehr gute haltbare Sorte. James's Zwiebel ist oval, gelb und gut haltbar. Danvers ist eine mittelgrosse, runde dunkelgelbe Zwiebel von langer Dauer. Magnum bonum ist röthlichgelb, dauerhaft, sie wird noch grösser als die Zittauer. Besonders süss, aber dabei stark von Geschmack sind die rothen Zwiebeln, wie die Braunschweiger und holländische plattrunde. Sie eignen sich gut für den Winterverbrauch. Die südländischen Zwiebel-Sorten müssen, um in unserem Klima zu gedeihen, sämmtlich erst in das Mistbeet gesäet und dann verpflanzt werden. Dieselben erreichen zum Theil eine bedeutende Grösse, halten sich jedoch nur bis in den Monat Dezember. Die weissen Zwiebeln dieser Kategorie sind von sehr mildem Geschmack und die kleinen, frühen Sorten besonders zum Einmachen geeignet. Die früheste und kleinste weisse ist die Queen, sie wird kaum so gross wie eine Wallnuss und stirbt meist nach dem zweiten Blatte ab; im Juni ist sie bereits ausgewachsen, hält sich aber nicht lange. Nur um 2—3 Wochen später ist die kleine silberweisse Nocera, welche auch zum Einmachen in Essig sehr beliebt ist. Dieser folgt in der Reife die Neapolitan Marzajola, eine mittelgrosse, platte, weisse Zwiebel, dann die Tripoli, weisse Riesen- und als späteste und grösste die platte weisse Mammuth. Unter den sehr grossen Zwiebeln, welche man besonders zum Kochen benutzt, sind die Madeira-Zwiebeln, Tripoli, Bassano am bekanntesten. Sie erreichen nur in warmen Ländern ihre volle Grösse und den ganzen Wohlgeschmack und reifen bei uns in kühlen Sommern nicht aus; man behandelt sie stets als Pflanzzwiebeln. Diese Zwiebeln sind sämmtlich lockerer und gröber von Fleisch, als unsere kleineren Sorten. Am besten scheint sich unter denselben die Bassano und die Riesen-Rocca (Giant Rocca) für nördlichere Gegenden zu eignen. Letztere ist ohne Zweifel für den Norden die beste unter den grossen Zwiebeln südlicher Abstammung und hält sich länger als die spanischen und Madeira-

Zwiebeln. Die spanischen weissen Zwiebeln werden in Frankreich und England in grossen Massen angebaut, doch sehr jung verspeist, nachdem sie kaum die Grösse einer Walnuss erreicht haben. Die Teneriffa-Zwiebeln sind mittelgross, platt und von feinem Geschmack; die braune Sorte ist eine der haltbarsten unter den Pflanzzwiebeln.

Die Zwiebel liebt guten, etwas lehmigen, mässig düngerreichen Boden, scheut aber frischen Mist. Im Grossen baut man sie daher am besten in zweiter Tracht nach solchen Gemüsen, welche im Jahr vorher mit starker Düngung cultivirt wurden. Glaubt man das Land noch düngerbedürftig, so empfiehlt sich Oberdüngung nach vorhergegangenem Graben oder Pflügen.

Die Cultur der Küchenzwiebeln ist ein- oder zweijährig. Bei ersterer, zum grossen Anbau allein gebräuchlichen, wird der Same auf den Platz gesät, oder man erzieht Pflanzen im halbwarmen Mistbeete. Man sät im März, sogar früher, wenn es geht, entweder breitwürfig sehr dünn auf frisch gelockertes Land, oder um behacken zu können, in 10 cm entfernte Reihen, und walzt oder tritt die Saat fest. Bei dem Feldanbau empfiehlt sich die Drillsaat mit der Säemaschine. Das Verdünnen der Sämlinge muss entsprechend der Grösse, welche die betreffende Sorte erreicht, geschehen. Ausser Jäten und Behacken (mit der Zinkenhacke), sowie Begiessen während des Keimens, ist an den Zwiebeln nichts zu thun. Die Ernte beginnt, sobald das Grün abstirbt, indem man zuerst die reifen Zwiebeln ausnimmt. Vor dieser Zeit aber benutzt man, nachdem die Steckzwiebeln (der zweijährigen Cultur) verbraucht sind, die anderen grössten grünen Salat-Zwiebeln mit den Schlotten (Blättern) besonders als Gemüse. Die Pflanzzwiebeln werden im März in das Mistbeet gesät und Ende April, wenn sie stark sind auch früher, (in südlichen Ländern bereits Anfang Winters) verpflanzt, wobei die Pflänzchen nicht tief kommen und nicht stark angedrückt werden dürfen. Die Reihen müssen bei den kleinen Sorten 10 cm, bei den grösseren und grössten 20—30 cm, die Pflanzen in den Reihen 8 cm resp. 15—25 cm entfernt stehen. Diese Zwiebeln liefern nächst den Steckzwiebeln den Sommerbedarf; die grossen südlichen Zwiebeln werden nur auf diese Weise gezogen.

Die zweijährige Cultur besteht darin, dass man im ersten Jahre möglichst kleine, sogenannte Steckzwiebeln zieht. Man gewinnt dieselben am besten, indem man ein Stück mageres Land im Frühjahr recht dick besät und die Pflanzen nicht verdünnt. Wenn der Sommer

nicht ungewöhnlich nass ist, so erreichen z. B. die mittelgrossen Sorten etwa die Grösse einer Haselnuss. Diese Steckzwiebeln hebt man in Netzen oder undichten Säcken in einem trocknen geheizten Raume auf, wodurch das Keimen am besten verhindert wird. Ende März oder Anfang April werden sie gepflanzt (gesteckt) und ganz wie grosse Pflanzzwiebeln behandelt. Bilden sich Samenstengel, so drückt man die Pflanze, nachdem der Stengel ausgezogen, mit dem Fusse nieder, wodurch man noch brauchbare Zwiebeln erhält.

Die trocknen Zwiebeln werden womöglich über einem geheizten Raume aufbewahrt und bei grosser Kälte mit Strohmatte etc. bedeckt. Frieren sie hier auch, so leiden sie doch keinen Schaden, wenn man sie unter den Decken aufthauen lässt. Noch besser ist ein ganz frostfreier trockner Raum zur Aufbewahrung.

B. Andere absterbende Zwiebelarten.

85. Die folgenden Zwiebelarten werden in der Regel nur dann aus Samen gezogen, wenn ein älterer Bestand mangelt, um auf diese Weise die Art zu erhalten oder um dieselbe auf billige Weise weither zu beziehen. Es sind Schalotten, Schnittlauch, Winterzwiebel (Welsche oder Winterhecke), Goldknoblauch, Bärlauch, Kartoffelzwiebel und Perlwiebel. Hierbei sei bemerkt, dass auch die sehr kleinen Zwiebeln von Roccambol oder Schlangenknolauch und egyptischen Zwiebeln, welche sich anstatt der Samen in den Blüthenköpfen bilden, als Samen gelten. Dieselben werden sämmtlich auf die gleiche Weise behandelt: in ein nicht warmes Mistbeet gesät, dann verstopft und endlich weitergepflanzt. Da es bei dieser Cultur nicht auf einen Ertrag abgesehen ist, sondern nur auf die Anzucht von Brutzwiebeln, so kann man die Sämlinge ziemlich dicht pflanzen. Die trocknen Zwiebelchen werden im folgenden Jahre wie Steckzwiebeln behandelt. Schnittlauch (Graslauch) und Winterzwiebeln dürfen nicht absterben. Ueber die ebenfalls genannten bis jetzt selten zum Küchengebrauch cultivirten Goldknoblauch (*Allium Moly*) und Bärlauch (*Allium ursinum*) bemerken wir, dass beide den wahren Knoblauch, welcher keinen Samen bringt, ersetzen können, und dass beide reizende Zierpflanzen sind, erstere gelb-, letztere weissblühend. Die Winterzwiebeln werden meist sogleich in das Land gesät, und man sieht sie oft als Einfassung. Man kann sie mehrere Jahre stehen lassen, doch

zieht man sie meistens alljährlich aus Samen und behandelt sie als zweijährige Pflanzen. Die Schlotten bleiben im Winter grün und leiden nicht durch die Kälte. Man benutzt die freilich klein bleibenden Winterzwiebeln, wenn die anderen Zwiebel-Sorten verbraucht sind. Egyptische und Kartoffelzwiebeln, welche nur einen schwachen Zwiebelgeschmack haben, werden im Frühjahr gelegt, erreichen eine ansehnliche Grösse und bilden daneben Brutzwiebeln zur Fortpflanzung. Nur kurz sei der Schalotten erwähnt. Deren Zwiebeln verlangen denselben Boden und die gleiche Cultur wie die anderen Steckzwiebeln. Das Stecken geschieht entweder im Winter, im October oder November oder zeitig im Frühjahr, sobald der Boden zugänglich ist. Man pflanzt sie nur so tief, dass sie eben mit Erde bedeckt sind, und häufelt sie im Frühjahr. Im Winter gepflanzte Schalotten sind der Sicherheit wegen mit Laub, trockenem Mist, oder dergleichen zu bedecken. Im Juli beginnen die Zwiebeln abzusterben, werden dann herausgenommen, getrocknet und während des Winters an einem frostfreien Orte aufbewahrt.

C. Porree oder Lauch (*Allium Porrum*).

86. Der Porree stirbt im Herbst nicht ab, sondern hält sich grün bis zur Bildung von Samenstengeln im zweiten Jahre; die Zwiebel selbst ist schwach. Man unterscheidet Sommer- und Winterporree. Der erstere ist früh, erträgt jedoch den Winter nicht. Die Sorten des Winterporrees sind im Geschmack und Ertrag ziemlich gleich. Die bei uns verbreitetste Sorte ist der Winterlauch (meistens Erfurter W. genannt), welcher auch die strengsten Winter verträgt; die folgenden Sorten können zwar als hart bezeichnet werden, bei sehr starker Kälte geht indessen zuweilen ein Theil davon ein. Es sind dies der sehr grosse, dicke kurze von Rouen, der grosse Musselburgher, der Riesenporree von Carentan, Bangholm's Prizetaker oder verbesserter Musselburgher und Coldstream Giant. Der Lauch ist eine der am meisten Nahrung-, nämlich Stickstoff bedürftigen Pflanzen, er verlangt die reichlichste frische Düngung, liebt zur Zeit des späteren Wachsthum's flüssigen Dünger und zehrt das Land durch seine vielen Wurzeln ungemein aus, so dass nach beendigter Porree-Cultur stets gedüngt werden muss.

Man säet den Porree im März in ein mässig warmes oder kaltes Mistbeet oder in das Land in Reihen, wo man die Pflanzen verdünnt und später anhäufelt. Zum Verpflanzen müssen die Säm-

linge etwa von der Dicke eines Gänsefederkiels an der Basis sein. Die gewöhnliche Pflanzzeit für Winterlauch ist der Mai. Die Reihen erhalten, je nach der Grösse der Sorten, 20—40, die Pflanzen 25—30 cm Entfernung. Es sind verschiedene Pflanzmethoden gebräuchlich. Wir empfehlen, besonders die langen Sorten, tief zu pflanzen. Dies geschieht entweder dadurch, dass man in kleine Gräben pflanzt, diese später zuzieht, und darauf die Pflanzen anhäufelt, oder man pflanzt sogleich 12—15 cm tief die Pflanzen in der angegebenen Stärke. Man macht entsprechend tiefe Pflanzlöcher mit dem Pflanzholze, schneidet die Wurzeln sehr kurz, die Blätter zur Hälfte ab, und stellt die Pflanzen in die Löcher, ohne Erde anzudrücken; durch Begiessen wird die nöthige Erde angeschlemmt. So bleiben die Beete bis Unkraut sich einstellt, dann werden die Löcher beim Behacken mit Erde bedeckt, worauf nach einigen Tagen die Porreeblätter wieder vorwachsen. Für den Hausbedarf kann man leicht den Sommer- und Winterbedarf auf folgende Art auf demselben Beete ziehen: Man pflanzt so eng, dass eine Pflanze um die andere, oder auch ganze Reihen nach und nach verbraucht werden, so dass im Spätsommer die Pflanzen die oben vorgeschriebene Entfernung haben. Würde man 5 Reihen auf ein Beet pflanzen, so wären 3 zum Bleiben bestimmt. Man lässt entweder die Pflanzen im Winter bis zum Verbrauch auf dem Lande, oder schlägt sie, wenn das Land gedüngt und gegraben werden soll, im Freien ein und nimmt nur soviel in den Keller, wie man für einige Zeit braucht. Wenn man den im April noch vorhandenen Porree an einer kühlen Stelle einschlägt, so hält er sich noch einige Wochen, im Keller sogar bis Juni. Wir erwähnen noch, dass man durch Mistbeetaussaaten im frühen Winter schon Anfang August Porree ernten kann, während der im Mai gepflanzte nicht vor September nutzbar wird. Andererseits ist es leicht, durch spätes Ausäen im Frühjahr die Produktion zu verlängern. Schneidet man die starken Strunke des Porree bis über die Erde ab, so bilden sich an dem stehen gebliebenen Theile kleine Zwiebelchen.

V. Rettige und Radieschen

(*Raphanus sativus*).

Monatsrettig oder Radieschen und der grosse Rettig gehören zu einer Art, sind jedoch in der Cultur sehr verschieden; im Geschmack ist das Radieschen zarter.

A. Rettig.

87. Man theilt die Rettige in Sommer- und Winterrettige. In der Güte besteht kein Unterschied, nur sind erstere früher, vertragen die Sommercultur besser, während zu früh gesäete Winterrettige, oft halb ausgewachsen, Blüthenstengel treiben. Die als Herbstrettige bezeichneten Sorten können als Sommerrettige betrachtet werden, denn früh genug gesäet, werden sie schon im Sommer geniessbar. Unter den Rettigen giebt es Sorten, welche einen Uebergang zwischen Rettig und Radies bilden. In manchen Gegenden werden nur diese Sommerrettige genannt, doch in den meisten Catalogen als Mairettige aufgeführt. Dieselben werden sowohl frühzeitig in kalte Mistbeetkästen unter Glas als auch später in das freie Land gesäet. Hierher gehören: der runde gelbe Dresdener Mairettig, der ovale goldgelbe Mairettig, der Stuttgarter runde weisse Mairettig und der russische lange weisse Treibrettig (für Mistbeete). Von Sommerrettigen sind besonders zu empfehlen: der Stuttgarter weisse Riesen-, oben 12—15 cm dick, spitz zulaufend, der runde schwarze feinlaubige und runde weisse feinlaubige, welchen sich als Herbstrettige anschliessen: der rothschalige Herbst- und der chinesische rosenrothe, mit rosenrother Haut und feinem, weissen Fleisch. Anerkannt gute Winterrettige sind: Der Erfurter lange schwarze, der weisse halblange, der Augsburger lange weisse, der Pariser lange kohlschwarze, sämmtlich conisch-lang. Der Augsburger, eine vorzügliche Sorte, darf nicht seine ganze Grösse erreichen, sonst wird er hart und beissend. Dies gilt auch von anderen grossen Sorten. Der graue Winterrettig von Laon wird sehr gross und bleibt dabei zart. Unter den grossen runden Rettigen giebt es vorzügliche Sorten, so z. B. der Münchener runde weisse und der Erfurter runde schwarze. Uebrigens hat jede Gegend, ja fast jede Stadt, besonders in den Bierländern, ihre bestimmte Lieblingssorte. Der Rettig verlangt fetten, mürben Boden und gedeiht gut in zweiter Tracht nach vorjähriger starker Düngung. Muss gedüngt werden, so verwende man nur alten oder Compostdünger. Eine besondere Güte und Zartheit erlangen Rettige in Erde aus Holz und Laubabfällen, z. B. von Zimmerplätzen. Bei Trockenheit brauchen sie reichliche Bewässerung, sonst werden sie hart und holzig oder bilden Blüthenstengel. Man hüte sich, mit Mistjauche zu begiessen, was dem Rettig einen übeln, beissigen Geschmack mittheilt.

Man säet die Rettige in Reihen in das freie Land vom April bis Juni, frühzeitig aber nur Mai- und Sommerrettige. Den Bedarf für den Winter säe man nicht vor Ende Mai, in wärmeren Gegenden noch bis Anfang August. Entfernung je nach der Grösse der Sorte 20—50 cm. Man cultivirt den Rettig oft an den Rändern der Beete mit anderen Gemüsen, wohl auch aus Sparsamkeit zwischen den Fusswegen, indem man nur den nöthigsten Platz lässt.

B. Radies oder Monatsrettig.

88. Die zahlreichen Sorten Radies theilen sich der Form nach in runde, ovale oder halblange und lange. Der Unterschied im Geschmack ist zumeist auf Boden-, Cultur- und Witterungsverhältnisse zurückzuführen. Die leicht brechenden, fast glasartig hellen langen Radieschen, sind wässriger und weniger beissend als andere Sorten. Auch bei den Radieschen entscheidet persönlicher Geschmack, Form und Farbe; die Sorten mit weissem Knollenende sind für die Tafel besonders zierend. Die Frühzeitigkeit ist ausserdem eine wichtige Eigenschaft, sowohl bei dem Selbstverbrauch wie für den Verkäufer. Die frühesten runden Sorten sind die kurzlaubigen weissen, rosenrothen und scharlachrothen, welche fast ausschliesslich in Mistbeeten gezogen werden, aber für das freie Land weniger passen. Bei richtiger Bodentemperatur und Behandlung sind diese Treibsorten oft schon nach 3 Wochen geniessbar, werden aber später schnell lockerfleischig, pilzig und geschmacklos. Eine sehr gute, nicht zu kleine und haltbare Sorte ist das Erfurter Dreienbrunnen Radies, vorzüglich zur zweiten Saat und in das Freie. Die ovalen rosenrothen, scharlachrothen, weissen, sowie zweifarbigen (mit weissen Spitzen) sind nur wenig später. Dasselbe gilt von dem kegelförmigen scharlachrothen Radieschen, welches zum Treiben sehr zu empfehlen ist. Das gelbe Wiener Treibradies wird grösser als andere Sorten, ist jedoch von etwas gröberem, dem der Mairettige ähnlichen Geschmack. Die Radieschen werden meist breitwürfig gesäet, sorgfältig verdünnt, bei trockenem Wetter häufig begossen und frei von Unkraut gehalten. Noch besser ist es, wenn man mit dem sogenannten Rettigstupfer, einem Brettchen mit Zinken, gleichweit entfernte Saatlöcher macht. Radieschen machen an den Boden grössere Ansprüche als Rettige, gedeihen am besten in Composterde, während sie in schlechtem Boden klein und holzig werden. Am zartesten sind die im Mistbeete gezogenen Radieschen, der Kasten darf

aber nicht sehr warm sein, und man muss so viel lüften, als es die Witterung erlaubt. Wer nur wenig Platz für Radieschen im Mistbeete hat, sät sie zwischen andere Gemüse, besonders Carotten und Lauch. Um auch in der Zeit Radieschen zu haben, wo die Ernte aus den warmen Mistbeeten vorüber ist, die aus dem freien Lande aber noch nicht begonnen hat, ist es zweckmässig, solche auch in kalte Kästen unter Glas zu säen. Will man einen dieser Kästen früher abernten, so bringt man von aussen einen Mistumsatz an. Im Freien gerathen die Radies nur bis Mitte Juni sicher, vorausgesetzt, dass sie immer reichlich bewässert werden. Man thut daher am besten, die Aussaaten von Mitte Mai an zu unterlassen und erst Ende Juli wieder anzufangen. Den ersten Freiland-Aussaaten gebe man eine sonnige, den letzten eine möglichst schattige Lage. Es giebt übrigens Gärten in feuchter, kühler Lage, wo die Radieschen den ganzen Sommer gerathen, und wer in dieser Hinsicht bevorzugt ist, kann durch Aussaaten in Intervallen von etwa 14 Tagen ununterbrochen ernten. Wo stets Radieschen verlangt werden, sät man bis Anfang October frühe Sorten in kalte Kästen. Man muss besonders darauf achten, dass die Pflanzen nach dem Verdünnen recht gleichmässig vertheilt sind, so dass jede Pflanze genügend Platz zur Ausbildung ihres Knöllchens hat.

Der Schlangen- oder *Schotenrettig (*Raphanus caudatus*).

89. Diese Species bildet ungewöhnlich lange, gekrümmte Samenschoten, welche einen pikanten Geschmack haben und vor ihrer vollkommenen Entwicklung roh wie Radieschen oder hier und dort auch mit Essig zubereitet genossen werden. Man sät den Schlangenrettig erst im Mai in das freie Land, um im August geniessbare Schoten zu haben; er verlangt einen sonnigen Standort.

VI. Gartenspinat und Spinatpflanzen.

Das Verlangen nach leicht verdaulichem, frischen Gemüse hat zur Cultur verschiedener Pflanzen Anlass gegeben, deren Blätter wie Spinat zubereitet werden. Man hat dabei besonders auf solche Bedacht genommen, welche ohne zu grosse Aufmerksamkeit auch im Sommer zu ziehen sind, weil dann der eigentliche Spinat schwer zu haben ist. *)

*) Einige Samencataloge führen Spinat und Spinatpflanzen als eine besondere Abtheilung, andere unter der Rubrik „Küchenkräuter“.

A. Gartenspinat (*Spinacia oleracea*).

90. Es giebt Spinatsorten mit eckigen stechenden Samen und schmalen, pfeilförmigen, aufrecht stehenden Blättern und solche mit glatten runden Samen und grossen ausgebreiteten Blättern, welche beiden Sorten von einigen Botanikern als zwei distincte Species betrachtet werden. Der erstere wird unter dem Namen grosser langblättriger scharfsamiger (spitzsamiger) geführt. Derselbe ist besonders winterhart und desshalb bei Marktgärtnern sehr beliebt. Von spitzsamigen Sorten giebt es ausserdem den rundblättrigen spitzsamigen und den grossen gelben (hellgrünen) Savoyer oder Schweizer Spinat. Unter den breit- und rundblättrigen (rundsamigen) Sorten ist am verbreitetsten der grosse rundblättrige Spinat, welcher aber neuerdings von dem spät aufschliessenden dunkelgrünen verdrängt wird. Dieser eignet sich besonders zur Frühjahrssaat, er kommt jedoch fast 2 Wochen später zum schneiden, als andere Sorten, wesshalb man, wenn es an Winterspinat fehlt, gleichzeitig eine andere frühere Sorte säen muss. Die grössten Blätter liefert der rundblättrige Riesen- oder Viroflay-Spinat, eine Pflanze derselben kann bei weitläufigem Stand und auf gutem Boden einen Durchmesser von 70 cm erreichen. Der Spinat wird an Ort und Stelle in Reihen von 25 cm Entfernung ausgesät, und da er im Sommer sehr schnell in Samen übergeht, so müssen die Aussaaten vom Frühjahr an etwa alle 2—3 Wochen erneuert werden, wenn man ihn den ganzen Sommer hindurch haben will. Man kann vom März bis October säen. Kein anderes Gemüse verlangt ein so häufiges und reichliches Giessen; unterlässt man dies, so erntet man wenig und das Wenige ist von geringer Qualität, auch kann man nur durch Giessen das schnelle Aufschliessen der Samenstengel verhüten. Man thut wohl, die Spinatbeete wenigstens einmal zu behacken. Der Spinat liebt reichlich und frisch gedüngtes Land. Er kommt hauptsächlich im Herbst und als sehr geschätztes erstes Frühjahrgemüse schon von Mitte März an auf den Tisch. Dem entsprechend säet man für den Herbst- und Winterbedarf im August, für den ersten Frühlingsverbrauch im September—October und im neuen Jahr, sobald die Erde offen ist.

B. Spinatpflanzen.

Mangold (*Beta vulgaris*).

91. Man unterscheidet den Schnitt-Mangold oder Beisskohl und den Rippen- (Schweizer) Mangold oder Silberbeete.

Letzterer kann eigentlich nicht als Spinatpflanze gelten, da die Blätter nur theilweise, hauptsächlich die Rippen und Blattstengel genossen werden.

a. Schnittmangold oder Beisskohl.

Der Schnittmangold, in der Schweiz, wo er allgemein gebaut wird, Beisskohl genannt, liefert ein gutes Gemüse für den bürgerlichen Tisch, dabei ist er ergiebig, mühelos zu ziehen und versagt nie. Er bildet kleine, selten über 20 cm lange Blätter, welche mit den Stielen abgeschnitten werden; die Pflanzen treiben hiernach wieder aus, so dass man von Anfang Juni bis zum Spätherbst ohne Mühe einen reichlichen Ertrag hat. Sie überdauern sogar unter Schnee oder Bedeckung oft den Winter und liefern dann ein sehr frühes Gemüse. Vortrefflich ist eine Mischung von Mangold und Sauerampfer, für welche man den gelben (hellgrünen) Schweizer-Mangold vorzieht. Man sät den Schnittmangold vom April bis Mai in Reihen, wie Petersilie oder schmalblättrigen Spinat, nicht zu dicht.

b. Rippenmangold, Silberbeete oder Römischkohl.

Diese Pflanze erreicht eine bedeutende Grösse, denn die Blätter werden auf gutem Boden grösser und breiter als Runkelblätter und haben einen 6—10 cm breiten Blattstiel, welcher sich als Mittelrippe wenig schmaler im Blatte fortsetzt. Hierdurch werden die Blätter steif und gerade getragen. Es giebt eine Sorte mit weissen, eine mit gelben und eine dritte mit rothen Blattstielen, doch werden als Gemüse fast ausschliesslich die ersteren gezogen. Man geniesst die breiten, sehr zarten Blattstiele und Blattrippen, welche ein wohl-schmeckendes Gemüse liefern und zwar werden die am besten entwickelten untersten Blätter zuerst benutzt.

Bei der Wahl der Sorten sollte nur die Ergiebigkeit und Grösse der Blätter und Rippen entscheidend sein. Nach unserer Erfahrung sind der grosse Silbermangold (Silberbeete, in Frankreich „Poirée à carde blanche“ genannt), und der mit gekrausten Blättern die besten Sorten.

Um grosse Blätter mit breiten Rippen zu bekommen, muss der Mangold in fettem, stark und frisch gedüngten Boden gezogen werden. Man sät ihn, da er meist erst im Spätsommer und Herbst verbraucht wird, gewöhnlich Ende April, entweder auf den Platz (wie Runkelrüben) in ca. 40 cm entfernte Reihen und verdünnt die Pflanzen, indem man sie als Spinatgemüse verbraucht, bis auf

35 cm, oder man zieht die Pflanzen auf Saatbeeten und pflanzt sie in der angegebenen Weise. Die auf den Platz gesäeten Pflanzen kommen etwas früher; sie verlangen Behacken und gründliches Giessen. In Gegenden, wo der Mangold Nationalgericht ist, begnügt man sich nicht mit spätem Mangold, sondern zieht die Pflanzen im Mistbeete an, um sie Ende April auszupflanzen. Auch kann der Rippenmangold, in Keller oder Gruben gepflanzt, sehr gut überwintert und im Frühjahr wieder zeitig ausgepflanzt werden, wodurch man ein sehr frühes Gemüse erhält.

Neuseeländischer Spinat (*Tetragonia expansa*).

92. Diese einjährige Pflanze liefert gerade in den heissen Sommermonaten ein sehr feines, dem Spinat vielfach vorgezogenes Gemüse, welches verbreiteter sein würde, wenn die Aussaat nicht in unserem Klima oft misslänge. Die Pflanze liebt guten, lockeren, frisch gedüngten Boden. Man sät im Mai an Ort und Stelle, entweder in das Mistbeet oder in das freie Land. Um jedoch sicher zu gehen, ist es rathsam, ausser einer dieser Aussaaten noch in kleine 5 bis 8 cm weite Töpfe zu säen, welche man mit Composterde füllt. Man kann die Samen auch vorher, wie Gurken und Melonen, in Sägespänen und zwar im Zimmer oder Mistbeet keimen lassen. Die Sämlinge werden dann gegen Ende Mai mit Ballen, 80—90 cm von einander entfernt, ausgepflanzt; auf diese Weise werden sie leicht anwachsen, sich in kurzer Zeit weit ausbreiten und den Boden überziehen. Die weitere Cultur bietet keinerlei Schwierigkeit. Die Blätter sind selten über 8 cm breit, fast viereckig und sehr dick und fleischig. Zum Küchengebrauch schneidet man die Spitzen der Triebe mit Blättern finger- oder handlang ab. 5 Pflanzen, welche ausgewachsen eine Fläche von etwa 6 □m bedecken, liefern wöchentlich ein reichliches Gericht für eine grössere Familie.

Eiskraut (*Mesembryanthemum crystallinum*).

93. Das Eiskraut ist einjährig und wird meistens wegen der wie mit Eiskrystallen überzogenen Blätter als Zierpflanze gezogen. Man kann es jedoch auch wie Spinat benutzen, dem es allerdings an Ergiebigkeit nachsteht. Der feine Samen keimt sehr leicht, in Töpfen oder Mistbeeten ausgesät. Man verstopft die jungen Sämlinge und pflanzt sie im Mai in recht sonnige Lage, wenn möglich vor eine Mauer in kräftigen, dabei lockeren, sandigen Boden, etwa 50 cm von einander entfernt, da sie sich ausbreiten.

Gartenmelde (*Atriplex hortensis*).

94. Man kann die zarten Blätter der auch als Zierpflanzen dienenden einjährigen Melden wie Spinat geniessen, verwendet aber hierzu fast nur die gelblichgrüne Gartenmelde mit grossen Blättern. Allerdings dauert die Benutzung nur kurze Zeit und fällt in eine Zeit, wo Ueberfluss an besseren Gemüsen ist. Man muss die Pflanzen, sollen sie nicht leiden, fast auswachsen lassen, ehe man die Blätter schneiden kann, und da dieselben 1,50 bis 1,80 m hoch werden, so erfordert dies viel Zeit und Platz. Es ist daher rathsam, erst die dicht stehenden Pflanzen auszuziehen und zu verbrauchen. Man sät Anfang April dünn in Reihen in das freie Land, verzieht die Pflanzen auf 50 cm Entfernung und hat dann nur zu jäten, zu behacken und bei grosser Hitze zu giessen, da sich schnell Samensengel bilden. Wer grossen Bedarf für dieses Gemüse hat, muss auch einige spätere Aussaaten vornehmen. Je nach der Güte des Bodens ist die Melde mehr oder weniger ergiebig.

Sauerampfer (*Rumex Acetosa*).

95. Die Blätter dieser Staude werden entweder allein wie Spinat, oder mit diesem vermischt gekocht, ferner auch als Suppenkraut vielfach benutzt.

Der Sauerampfer hält sich, einmal ausgesät, viele Jahre lang; er wird als Einfassung an Rabatten oder beetweise angebaut. Man sät im Frühjahr oder im August dünn in Reihen in kräftigen Gartenboden, ohne stark zu bedecken. Später werden die Pflanzen auf etwa 15 cm Entfernung verdünnt. Der Verbrauch kann schon beginnen, wenn dieselben 4—5 Blätter haben. Im Sommer bildet der Sauerampfer Blütenstengel, welche abgeschnitten werden müssen, damit junge Blätter nachwachsen. Eine neue Aussaat ist erst dann nöthig, wenn die Pflanzen geschwächt sind und nicht mehr viel Blätter liefern; man giebt der Pflanzung dann einen anderen Platz. Die Vermehrung kann übrigens auch durch Theilung der Pflanzen geschehen. Ausser dem gewöhnlichen, grossblättrigen deutschen wird vorzugsweise der breitblättrige hellgrüne Belleville, auch französischer Sauerampfer genannt, angebaut, welcher milder im Geschmack ist und sich gut zu Einfassungen eignet. Es sind noch zwei bei uns wenig bekannte Arten in Cultur, der Berg-S. (*Rumex montanus*) mit grossen, milden und der römische S. (*Rumex scutatus*) mit kleinen, sehr scharfspitzigen Blättern.

Gemüseampfer oder englischer Winter-Spinat

(*Rumex Patientia*).

96. Dieses Staudengewächs liefert Blätter, welche weniger herb sind als die des Sauerampfers, diesem jedoch im Geschmack nachstehen. Es wird seines hohen Ertrags, noch mehr aber seiner besonderen Frühzeitigkeit wegen gezogen; in dieser Hinsicht steht es allen anderen Spinatpflanzen voran. Die Cultur ist genau dieselbe wie die des Sauerampfers, doch müssen die Pflanzen einen grösseren Abstand erhalten, da sie sich ziemlich ausbreiten.

Cuba-Spinat (*Claytonia perfoliata*).

97. Die dicken, fleischigen Blätter dieser Annuelle, welche aufrecht wie kleine Schüsseln auf langen Stielen sitzen, werden als Salat oder wie Spinat, noch häufiger wie Portulak zubereitet. Man säet den feinen Samen Anfangs Mai breitwürfig oder in Reihen und bedeckt denselben nicht, sondern drückt ihn nur fest. Die Blätter kommen dann von August an zum Verbrauch.

Peruanischer oder Reisspinat (*Chenopodium Quinoa*).

98. Mehrere Arten dieser in Süd-Amerika angebauten einjährigen Mehlpflanze werden dort als Spinat benutzt und sind auch bei uns dazu empfohlen worden. Die eine, welche sich in den Catalogen findet, erreicht die Höhe einer Gartenmelde und liefert eine grosse Menge von Blättern. Die Cultur ist dieselbe wie die der Gartenmelde. Der Maifröste wegen säet man in sonnige Lage erst Ende April oder im Mai. Die Pflanzen werden auf 25 cm Entfernung verdünnt und bei Trockenheit reichlich gegossen.

VII. Gurken, Melonen und Kürbis.

Die Pflanzen aus der Familie der Cucurbitaceen, welcher diese Gattungen angehören, sind sehr empfindlich gegen Kälte und grosse Feuchtigkeit, auch verlangen sie zu ihrem Gedeihen durchaus guten oder reichlich gedüngten Boden.

Gurken.

99. Wir haben die Cultur der Landgurken und der Mistbeet- oder Treibgurken zu unterscheiden. Erstere werden entweder in das freie Land gesäet oder gepflanzt. Da die Landsaat aber durch

Frost, nasskalte Witterung oder Schnecken zu Grunde gehen kann, so thut man in allen Fällen wohl, zugleich so viel Samen wie zum Ersatz nöthig sein würde, in Töpfe oder Samenschalen zu säen und an einem warmen Orte keimen zu lassen. Die Freilandaussaat darf in unsern Gegenden erst vorgenommen werden, wenn Fröste nicht mehr wahrscheinlich sind, also ungefähr Mitte Mai. Man theilt Beete von 1,50 m Breite ab, bildet in der Mitte einen Graben, legt die Samen einzeln, nicht zu weitläufig, drückt sie fest und bedeckt sie stark, jedoch so, dass die Furche noch offen bleibt. Ist das Wetter so günstig, dass schnelles Keimen erwünscht ist, so giesst man die Samen vor dem Bedecken stark ein. Auf schlechteren Boden muss man eine tiefere Saatzfurche herstellen und diese zum Theil mit Compost- oder Mysterde auffüllen. Bei Trockenheit muss fleissig begossen und, nachdem die Pflanzen einige Blätter haben, behackt werden, wobei die Erde bis an die Keimblätter herbeigezogen wird. An den Seiten kann Kopfsalat in 2 Reihen, am Rande auch Bindsalat gepflanzt werden. Sind die Samen gut aufgegangen, so zieht man die entbehrlichen Pflanzen aus und ergänzt damit etwa fehlende. Da sie sich sehr ausbreiten, so können die Pflanzen 30—50 cm weit von einander stehen. Die Entfernung richtet sich nach der Grösse, welche die Sorten erreichen. Rechtzeitiges, wiederholtes Behacken und bei warmem Wetter häufiges Begiessen sind die einzigen Culturarbeiten. Sobald die Pflanzen drei ausgebildete Blätter haben, wird man stets gut thun, sie zu entspitzen, damit sich schnell Seitenranken mit weiblichen Blüthen bilden; die Ranken werden gleichmässig vertheilt. Wer sich die Mühe geben will, in der Mitte des Beetes eine Art Spalier anzubringen und die zu dicht stehenden Ranken daran zu befestigen, wird finden, dass solche Pflanzen besseren Widerstand gegen anhaltenden Regen leisten und reichlich tragen.

Die Wahl der Sorten hängt von der Benutzung der Früchte ab. Zum gewöhnlichen Bedarf wähle man Sorten, welche mittellange Früchte bringen, die theils als Salat, theils zum Einnachen dienen können; die grössten Früchte können nach der Reife zu Senf-, die kleinsten als Pfeffergurken verwendet werden. Solche Sorten sind die mittellange grüne, die mittellange grünbleibende weisstachelige und die lange grüne volltragende. Will man Einnach- (Salz-) Gurken ziehen, so sind ausser diesen drei Sorten auch die weisse und die grünbleibende Trauben- zu empfehlen. Solche Gurken müssen be-

sonders dünnchalig und ausgewachsen, nicht zu gross sein; die halb entwickelten Früchte grosser Sorten eignen sich nicht dazu. Gurken, welche für den Markt als Salatfrüchte bestimmt sind, müssen lang und schön von Ansehen sein. Solche sogenannten Schlangengurken werden 50—60 cm lang und geben auch riesige Senfgurken. Die besten hierher gehörigen Sorten sind: die lange grüne verbesserte Schlangen-, die chinesische grünbleibende, die Goliath- und die Walzengurke von Athen. Für Pickles- und Pfeffergurken ist die russische kurze am verbreitetsten, indessen ist ihr die Pariser Traubengurke wegen ihrer schlanken Form noch vorzuziehen. Die grünbleibende und die weisse Trauben- sind im Geschmack die feinsten dieser Kategorie. Die kurze russische grüne Gurke ist sehr früh und ebenfalls zu obigem Zwecke zu verwenden. Die im südlichen und asiatischen Russland allgemein angebaute russische Netzgurke, welche dort roh mit Salz genossen wird, ist bei uns ihrer rauen Schale wegen wenig in Cultur. Für das Land wählt man fast nur grüne Sorten, weil die weisschaligen in der Regel zarter sind; wer aber die weissen Gurken liebt, wird in warmen Lagen und Gegenden mit der weissen Schlangen- und der holländischen frühen Gurke auch gute Erfolge haben.

Das Treiben der Gurken ist ebenso lohnend für Gärtner wie für Liebhaber. Letztere können leicht in einem Mistbeete von Mitte April an ihren Bedarf cultiviren, bis es Gurken im freien Lande giebt. An den dazu geeigneten Sorten sind die Samen-Verzeichnisse sehr reich, und wir könnten kaum einzelne Sorten vor anderen empfehlen. Sehr geschätzt sind: Arnstädter Riesen-Schlangen-, Arnstädter schneeweisse Riesen-, Berliner Aal- und Schwanenhals-Gurke, letztere ist halb ausgewachsen schon 80 cm lang. Von neuen Sorten werden namentlich von Marktgärtnern in grösserem Massstabe angebaut und sind sehr zu empfehlen: Rollisson's Telegraph, Noas Treib-, hellgrüne weissstachelige kleinlaubige und Königsdörffers unermüdliche Treibgurke. Mehrere Sorten eignen sich auch zur Cultur im freien Lande, von denen wir Berliner Aal-, Arnstädter grosse Riesen-Schlangen-, Gladiator, Non plus ultra, Emperor und Schwanenhals erwähnen.

Will man Gurken sehr früh haben, ohne auf grosse, schöne Früchte sehen zu müssen, so benutze man zum ersten Treiben die Traubengurke, welche allerdings höchstens 8 cm lang, dabei mehr als halb so dick wird. Sie ist sehr feinschalig, füllt sich aber mit vielen

Kernen und muss zum Salat halb ausgewachsen verwendet werden. Liebhaber von frischen Salzgurken ziehen diese Sorte auch gern im Lande. In Mistbeeten pflanzt man 2—3 Stück in ein Fenster und braucht daran nichts zu schneiden.

Man unterscheidet das Treiben im gewöhnlichen Mistbeete, in geheizten Kästen und in Treibhäusern. Obgleich in grossen Treibereien schon Ende December Mistbeete zu Gurken angelegt werden, so rathen wir doch, es nicht vor Februar zu thun, denn solche frühe Anlagen missglücken oft, wenn der Winter trüb und nass ist, oder ein Nachwinter eintritt. Das Mistbeet darf bei dem Pflanzen höchstens 25 Grad warm sein.

Die zum Treiben nöthigen Pflanzen, 2 für jedes Mistbeetfenster, zieht man vorher in Töpfen an, indem man sie im Treibhause oder Wohnzimmer in feuchten, groben Sägespänen keimen lässt und dann einzeln in Töpfe pflanzt; die Treibkästen lüftet man nur an milden Tagen und zwar nur so viel wie nöthig ist, um zu grosse Feuchtigkeit zu entfernen. So lange es trübfeucht und noch nicht warm ist, braucht selten gegossen zu werden. Bei Eintritt warmen, sonnigen Frühlingswetters wird stärker, auch abwechselnd von unten und den Seiten gelüftet und reichlich mit erwärmtem Wasser begossen. Man versäume nicht, die Spitzen über dem 3. Blatte auszukneifen und die ersten 2—3 Seitenranken über dem 6.—7. Blatte zu entspitzen, damit sich früher sekundäre Ranken bilden; die nicht entspitzen Ranken würden sonst zu früh Blüthen erzeugen und zwar meist männliche. Die Ranken werden gleichmässig mit Holzhäkchen festgehalten. Hat man Salat im Gurkenkasten, so muss er mit den Wurzeln entfernt werden, sobald er die Gurken beengt. Wenn nach Mitte Mai die Ranken nicht mehr genügend Platz im Mistbeetkasten haben, so wird dieser erst gehoben, so dass sie darunter weg sich ausbreiten können, endlich wird nach Eintritt der Sommerwärme der Kasten ganz entfernt. In kalten Sommern, wo die Gurken im Freien zurückbleiben, liefern solche Mistbeetgurken oft bis August Früchte. In rauen Gegenden empfiehlt es sich, Gurken im April in kalte Kästen zu säen und bis zum Eintritt der warmen Witterung unter Fenstern zu halten. — Die Gurkencultur in geheizten Kästen, sowie die Gurkenzucht in Treibhäusern wird nur von erfahrenen Gärtnern betrieben, denen eine kurze Anleitung, wie wir sie hier geben könnten, nicht genügen würde. Wir verweisen daher auf Schriften über Gemüse-

treiberei. *) Noch erwähnen wir, dass manche, besonders englische Gärtner, die zum Treiben bestimmten Gurken durch Stecklinge heranziehen.

Die Meinungen darüber, welches Alter der zu verwendende Samen haben soll, gehen auseinander. Die einen vermeiden gern ganz frischen Samen, namentlich für Mistbeetcultur, die Anderen hüten sich vor altem, weil sie annehmen, dass die daraus entstehenden Pflanzen sehr früh Früchte ansetzen, aber nur kurze, schwächliche Ranken bilden, daher weder viele, noch grosse Früchte bringen.

Melonen.

100. Die Cultur der Melonen erfordert mehr Sorgfalt und höhere Wärme als die der Gurken. Sie können nur in wärmeren Gegenden ohne alle Schutzvorrichtungen im Freien gezogen werden und werden dort ganz wie Gurken behandelt. In günstig liegenden Gegenden von Mitteleuropa gedeihen sie zwar im freien Lande und erreichen in warmen Sommern auch Wohlgeschmack, sie bedürfen aber doch gewisser Schutzvorrichtungen. Schliesslich ist doch auch in Mitteleuropa die Cultur unter Glas in Mistbeeten am allgemeinsten. Die so gezogenen Früchte stehen an Güte weit über den Landmelonen, werden grösser und kommen früher zum Verbrauch, während im Lande die Haupternte bei uns erst dann beginnen würde, wenn die Melonen als ungesund zu betrachten sind.

Die Melonenpflanze unterscheidet sich von der Gurkenpflanze besonders durch rundlappige Blätter und Früchte von verschiedener Rundung, mit mehr oder weniger tiefen Rippeneinschnitten. Diese sind entweder glatt, warzig oder genetzt, d. h. mit einer netzartig verflochtenen grauen oder bräunlichen, korkartigen Oberhaut überzogen. Auf diese Verschiedenheit gründet sich die gebräuchliche Eintheilung in Cantaloupen und Netzmelonen. Das Fleisch ist roth, gelb, gelblichgrün oder grün. Wenn die Früchte reifen, entströmt ihnen ein köstlicher Duft, und der Stiel fängt an, sich von der Frucht zu lösen. Alle Melonen, welche sich einige Zeit halten sollen, müssen, sobald sich diese Zeichen bemerkbar machen, abgeschnitten werden. Nur die Wintermelonen und einige grünschalige Sorten lösen sich nicht, haben auch keinen Geruch.

*) Jäger's „Gemüse Gärtner“ dritter Theil, vierte Auflage, Hannover, Verlag von Philipp Cohen.

Ueber das Alter des zu verwendenden Samens gilt dasselbe, was wir bei den Gurken sagten. Die Melonen sind noch mehr als Gurken dem Ausarten der Sorten aus Samen unterworfen, wenn verschiedene in demselben Garten oder auch nur nah bei einander cultivirt werden. Der Sorten sind fast unzählige. Für die Freiland-Cultur muss man kleinfrüchtige Sorten wählen, denn die grossen reifen bei uns nicht. Es sind meist nordamerikanische und südrussische Sorten und am sichersten ist die kleine amerikanische M. für das freie Land. Diese Frühsorte wird auch bei uns in warmen Lagen ganz frei gezogen, höchstens im Anfang bei kaltem Wetter (wie Kürbis §. 102) mit einer Glasglocke bedeckt. Nachdem man Gruben oder einen 50 cm tiefen Graben mit frischem Mist, am besten kurzem Pferdemist, angefüllt und letzteren fest getreten hat, so dass er sich etwas über den Boden wölbt, bringt man 20—30 cm hoch Composterde darauf und pflanzt Ende Mai 2—3 Melonenpflanzen aus dem Topfe (am besten 3 in einem Topfe stehende) mit Ballen auf den kleinen Hügel oder in der Entfernung von etwa 1 m auf den über dem Graben entstandenen Rücken. Tritt kaltes Wetter ein, so stellt man Glasglocken oder dazu besonders eingerichtete Glaskästchen über die Pflanzen, lüftet bei Wärme und hebt oder entfernt diese Schutzglocken, sobald die Pflanzen mit den Spitzen anstossen.

Ein in Frankreich ziemlich allgemein verbreitetes Verfahren der Melonenzucht unter Glasglocken ist folgendes. Man bringt an einer warmen, geschützten Stelle, doch nicht unmittelbar vor einer Mauer (weil die Melonen wohl Wärme, aber keine sehr beengte Lage lieben), zwischen Pfähle, die mit Flechtwerk verbunden sind, ein Mistlager, halb aus frischem Pferdemist, halb aus Laub, oder, in Ermangelung dieses aus altem Pferdemist, wie ein Mistbeet an und zwar etwas schräg, in südlicher Richtung abfallend. Oder man bildet in der Richtung von Norden nach Süden einen beliebig langen, am Boden 1,50 m breiten rückenförmigen, 60—80 cm hohen Haufen. *) Hierauf bedeckt man kurz vor der Pflanzzeit diesen Mistrücken mindestens 20 cm hoch mit einer düngerreichen, mit Lehm untermischten Composterde, welche auf der Kante des Rückens soweit es geht wagerecht geebnet wird. Die Richtung des Rückens von

*) Vergleiche Jägers „Gemüsegärtner“ mit Abbildungen, kürzer in dessen „Allgemeines illustriertes Gartenbuch“, vierte Auflage 1882.

Nord nach Süd oder in annähernder Lage ist nöthig, damit die Seiten des Haufens gleichmässiger erwärmt werden. Die Samen werden spätestens Anfang April in Sägespänen zum Keimen gebracht, wie bei den Gurken angegeben wurde. Die gekeimten Pflanzen werden erst in kleine Töpfe und, sobald sie durchgewurzelt sind, in grössere von 10 cm Weite in die beste Erde gepflanzt. Sollten Anfangs Mai auch diese durchgewurzelt sein, so muss man nochmals grössere Töpfe geben, denn es darf kein Stillstand im Wachsthum eintreten, weil die Pflanzen sonst Blüthen ansetzen, ohne kräftig zu wachsen. Ende Mai, aber nur bei warmem Wetter, werden sie mit Erdballen auf die abgeplattete Spitze des Hügels bis an die Keimblätter eingepflanzt. Bei einzelnen Hügeln setzt man 2 Pflanzen neben einander, auf Rücken pflanzt man in 1 m Entfernung. Die Melonen werden nun mit grossen Glasglocken, oder mit Glaskästen von 30—40 cm Durchmesser und 15 cm Höhe bedeckt. Anfangs lüftet man nur wenig durch untergelegte Hölzchen, bei Wärme mehr, jedoch nur von 10—4 Uhr, indem man beliebige Stützen unter den Glocken anbringt, am besten 3—4 dreistufige unten zugespitzte Mistbeet-Lufthölzer unterstellt. Begossen wird bei Wärme täglich, dabei immer über die Pflanzen gespritzt, anfangs nur in der nahen Umgebung, später über den ganzen Haufen oder über das ganze Beet durchdringend, aber stets mit warmen Wasser. Um bei hoher Wärme das Austrocknen zu vermindern, wird die ganze Erdoberfläche 5—8 cm hoch mit kurzem Mist bedeckt. Wenn die Früchte gross werden, so bringt man unter jeder ein wagerecht liegendes Brettchen an. Durch Erfahrung hat man gewisse Sorten kennen gelernt, welche bei dieser Cultur besser gedeihen als andere. Solche sind: die Melone von Honfleur, die noch bei Le Havre gut reift und dort besonders für den englischen Markt in Massen gezogen wird, die gelbe und weisse französische Landmelone, die Zucker-M. von Tours und andere Zucker-M., überhaupt die meisten Netz-M. Unter den Cantaloupen, die im Mistbeet so köstlich werden, eignet sich nur die kleine Orangen-Cantaloupe zu dieser Cultur. Auf diese Art cultivirt liefern die Melonen in guten Jahren bis Ende Juli und Anfang August reife Früchte. Um grosse Melonen zu ziehen, dürfen an einer Pflanze nicht mehr als 3—4 bleiben; je nachdem man sich mit mittleren oder kleineren Früchten begnügt, lässt man 8—10 Stück an einer Pflanze reifen. Ueber den Melonenschnitt später.

Mistbeetcultur.

Die zu Melonen bestimmten Mistbeete werden von Anfang Januar bis Ende März sehr warm, daher mit starken Mistlagen hergestellt, die späteren weniger warm. Sollte zur Zeit der beabsichtigten ersten Anlage starke Kälte herrschen, so thut man besser, diese erst vorüber gehen zu lassen. Die Kästen müssen höher als die für Gurken sein, weil sonst die grossen Früchte an die Fenster anstossen; noch besser ist es, die Kästen, wenn die Früchte gross werden, zu heben. Wenn das Mistbeet zur Aufnahme fertig ist, müssen die Pflanzen in Töpfen bereits herangezogen und mit mindestens zwei Blättern versehen sein. Zum Pflanzen wird ein nicht kalter Tag und die wärmste Tagesstunde gewählt. Für jedes Fenster mittlerer Grösse würde eine Pflanze von normalem Wachsthum genügen, es ist jedoch sicherer, zwei zu pflanzen, weil weniger Früchte an zwei kleineren Pflanzen vollkommener werden, als die gleiche Zahl an einer grossen. Von nun an gilt es, die Melonen und das Beet warm zu halten, was durch erneuerte Umsätze von frischem Pferdemist geschieht. Bis zum Eintritt der Frühlingswärme wird nicht mehr gelüftet, als nöthig scheint, um zu grosse Feuchtigkeit zu entfernen, aber stets vorsichtig, damit die Pflanzen von keinem kalten Luftzuge getroffen werden. Auch später bei warmem Wetter lüftet man nur während der wärmsten Tagesstunden. Nur zur Zeit der vollsten Blüthe soll man die Fenster bei Tage ablegen, weil so die Befruchtung durch Insecten besser vor sich geht. Ist das Wetter dazu nicht geeignet, so müssen die weiblichen Blüthen mit den Pollen der männlichen, welche, wie bei allen Pflanzen dieser Familie, früher erscheinen und näher am Stamm sitzen, befruchtet werden. Begossen wird nur mit erwärmtem Wasser, stark nur bei späteren Culturen, wenn viel gelüftet wird. Nach warmen Tagen wird täglich mit der Brause überspritzt, dann das Fenster geschlossen.

Die frühesten Melonen kann man Mitte bis Ende Mai haben; solche Frühculturen werden hauptsächlich in grossen Treibgärten angelegt. Sobald die Melonenpflanzen das zweite oder dritte wirkliche Blatt gebildet haben, wird die Spitze ausgeschnitten, worauf sich bald die zwei Hauptranken bilden. Benutzt man grössere Pflanzen, so nimmt man dieses Entspitzen schon in den Töpfen vor. Die sich neu bildenden Ranken werden in entgegengesetzten Richtungen mit Häkchen am Boden befestigt, was später mit allen

Ranken geschieht. Da dieselben sich oft bewurzeln, so hüte man sich, diejenigen mit Früchten bei Gelegenheit der Verdünnung (worauf wir noch kommen) auszureissen. Ueber dem 5.—7. Blatte werden die Spitzen abgeschnitten, worauf sich im gewöhnlichen Falle eben so viele Seitenranken bilden, deren Richtung durch Festhaken bestimmt wird. Früher schnitt man die Seitenranken abermals zurück, jetzt ist man davon abgekommen und schneidet die Spitzen erst ab, nachdem sich genügend Früchte angesetzt und diese eine gewisse Grösse erreicht haben. Zeigen sich schwache Ranken mit nur männlichen Blüten, so werden dieselben dicht an der Hauptranke abgeschnitten, da sie den fruchtbaren Ranken im Wege sind. Man entferne überflüssig angesetzte Früchte erst, wenn die bleibenden in grösseren Sorten mindestens die Grösse eines Hühnereies erreicht haben, denn zuweilen gehen junge Früchte zurück, oder es werden aus Unvorsichtigkeit Ranken beschädigt. Nachdem so der Fruchtausatz gesichert ist, schneidet man die Fruchtranken einige Blätter über der äussersten Frucht ab, damit den Früchten alle Nahrung zugeführt wird. Da solche Ranken meist wieder treiben, so entspitzt man sie abermals. Ist das Beet mit nichttragenden, also entbehrlichen Ranken überfüllt, so schneidet man diese vorsichtig und zwar nach und nach ab; man hüte sich, dabei die Fruchtranken zu verrücken, denn wenn eine dichte Blättermasse plötzlich stark gelichtet wird, so leiden und verbrennen die bleibenden leicht an der Sonne. Man muss die überflüssigen Ranken auch so abschneiden, dass noch ein Blatt bleibt, aus dessen Winkel sich eine neue Ranke bilden kann. Schneidet man so viele Ranken ab, dass nur die mit Früchten bleiben, so entsteht oft Saftstockung, welche den Früchten schaden kann. Wenn die Melonen fast ausgewachsen sind, so legt man unter jede ein Stück Schiefer, eine Dachziegel oder ein Brett. Platzen schöne, nicht leicht entbehrliche Früchte, so kann man sie durch breite Bänder zusammenziehen, auf welche Art der Spalt sich meist schliesst. Man muss sie dann so legen, dass der Spalt auf die Seite kommt. Würde man wegen grosser Früchte den Kasten sehr hoch heben müssen, so thut man besser, die Früchte durch eine Grube zu vertiefen, muss aber dann sorgen, dass kein Wasser darin stehen bleibt.

Wir erwähnen noch die Gurken-Melone, welche unreif wie Gurkenfrucht zu Salat, reif wie Melone in Zucker benutzt werden

kann; ferner die kleinfrüchtige, zierliche grüne Klettermelone, welche man am Spalier zieht und wie die kleinfrüchtigen Kürbissorten behandelt.

Wassermelone oder Arbuse (*Cucurbita Citrullus*).

101. Die Wassermelone, welche in allen heissen Ländern fast unentbehrlich, auch in Südrussland und Italien sehr verbreitet ist, daher im Grossen angebaut wird, hat sich in Deutschland und anderen Ländern mit gleichem Klima bis jetzt nicht eingebürgert. Die Cultur, welche in wärmeren Ländern im freien Felde vorgenommen wird und keinerlei Mühe macht, liefert bei uns selbst im Mistbeete keine erfreulichen Resultate.

Man zieht die Pflanzen wie Melonen an, lässt sie aber wachsen ohne zu schneiden. Da sie nur an den Spitzen der Ranken Früchte bringen, so beschneidet man sie erst, wenn die Ranken genügend Früchte angesetzt haben. Meistens füllen die Ranken schon vor dem Fruchtansatz das Mistbeet, und in diesem Falle muss der Kasten gehoben werden, so dass die Ranken unten durch wachsen können. In wärmeren Gegenden mit guten Lagen werden Wassermelonen bei der eben beschriebenen Loisel'schen Hügelcultur mit Erfolg zu ziehen sein. Die Wassermelone ist eine grosse, kürbisartige, meist dunkelgrüne Frucht, mit lockerem, sehr saftigen, süssen, etwas gurkenartig schmeckenden Fleisch. Die beliebtesten Sorten sind die mit dunkelrothem Fleisch. Dieselben haben breite, dicke, den Kürbissamen ähnliche Kerne, von brauner, gelber, schwarzer oder weisser Farbe. Die Frucht hält sich reif lange, wenn sie kühl aufbewahrt wird. Empfehlenswerte Sorten sind: die Wassermelone von Astrachan, die rothfleischige von Castellamare und die nordamerikanischen Sorten.

Speise- und Zierkürbisse.

102. Nach Naudin vertheilen sich die bekannten Sorten auf drei botanisch verschiedene Arten: *Cucurbita maxima*, *moschata* und *Pepo*. Ausserdem finden wir unter den Zierkürbissen in einigen Samenverzeichnissen auch Pflanzen aus anderen Gattungen, welche zuweilen unter den Zierpflanzen als „Cucurbitaceen“ vereinigt werden.

Der Nutzen des Kürbis als Nahrungspflanze wird in Deutschland bis jetzt nur wenig gewürdigt, während er in anderen Ländern, z. B. Nord-Amerika, als solche eine grosse Rolle spielt.

Die Kürbisse verlangen reich gedüngten, lockeren und tiefen Boden, viel Wärme, dabei eine freie Lage und zur Wachstumszeit sehr viel Wasser, endlich einen grossen Raum zum Ausbreiten. In wärmeren Gegenden legt man die Samen Anfang bis Mitte Mai in das freie Land, während es in weniger günstig gelegenen nöthig ist, die Pflanzen (wie Melonen) in Töpfen anzuziehen, damit sie, wenn keine Maifröste mehr zu erwarten sind, schon gross in das freie Land gepflanzt werden können. Will man sehr grosse Früchte ziehen, so füllt man eine Grube mit frischem Mist, wie bei den Melonen angegeben, oder bildet aus dem bei der Frühjahrsreinigung des Gartens gesammelten Laub, Moos u. s. w. mit oder ohne Mist grössere Haufen, die sich erwärmen. Viele Gärtner pflegen ihre Compost-Erdhaufen mit Kürbissen zu bepflanzen und erzielen auf diese Weise grosse Früchte, allerdings leidet die Güte der Erde darunter. Ausser dem Begiessen und Vertheilen der Ranken hat man nur für eine gute, sichere Lage der grossen Früchte Sorge zu tragen. Hochwachsende, kleinfrüchtige Sorten zieht man an Spalieren, Wänden und Lauben, andere an Bäumen. Ein mit Kürbis überzogener Laubengang bietet einen eigenthümlichen Anblick, wenn die grossen, oft seltsam geformten Früchte herabhängen. Wenn ein ganzes Spalier mit Kürbis besetzt werden soll, so thut man am besten, längs desselben einen Graben auszuheben und mit Mist zu füllen, um darauf zu pflanzen. Man hüte sich, lange Ranken zu verlegen, weil sie nie wieder in die rechte Lage kommen und dann von der Sonne verbrennen; noch schädlicher ist es, angewurzelte Ranken loszureissen.

Die Kürbisfrüchte halten sich ausgewachsen bis tief in den Winter, manche an kühlen, trockenen Orten über ein Jahr. Sie eignen sich noch besonders zur Dekoration von Garten- und Treppenhäusern. Mehrere Kürbisarten gelangen nur in südlichen Gegenden, bei uns allenfalls in Glashäusern zur Ausbildung, so der Flaschenkürbis, die Herkuleskeule u. a. m.

Aus der grossen Anzahl von Sorten, welche angebaut werden, wollen wir nur eine Auswahl der besten Speise- und schönsten Zierkürbisse hier anführen. Die Melonen- auch Centnerkürbisse genannt, zeichnen sich durch ungeheure Grösse und festes süssliches Fleisch aus, sind übrigens, wie alle sehr grossfrüchtigen Arten inwendig hohl. Die gelbe, gelbrothe oder grünliche Farbe des Fleisches hat auf die Güte keinen Einfluss, doch sind die beiden

ersteren beliebter. Man darf die Früchte zum Verbrauch nicht völlig reif werden lassen. Sehr grosse Früchte lassen sich nur verwerthen, wenn sie auf dem Markte nach Gewicht ausgeschnitten verkauft oder zum Verkauf in Gläser eingemacht werden. Vorzüglich zum Einmachen sind auch die Valparaiso-Kürbissorten. Der Türkenbundkürbis gilt allgemein für einen Zierkürbis, er hat jedoch sehr schönes, festes, feines Fleisch und eignet sich vortrefflich zum Einmachen. Die langfrüchtigen Mark- oder Schmer-Kürbissorten (Vegetable Marrow) geben ein schmackhaftes Gemüse und werden auch für Suppen benutzt; in Amerika und England sind sie sehr verbreitet. Zu gleichem Zwecke dienen in Amerika der Ohiokürbis und der etwas kleinere, dickschalige, besonders haltbare Hubbard Squash. Die Bischofs- oder Kurfürsten-Mütze, auch Artischocke von Jerusalem genannt, und der weisse Markkürbis bilden keine Ranken, sondern bringen die Früchte an kurzen Zweigen. Sie werden unreif als Gemüse gegessen und sind in England sehr beliebt; die Früchte der Bischofsmütze gehören zu den kleinsten unter den Speisesorten. Der Honigkürbis (Cource gaufree) ist zuckerreich und eine in Frankreich geschätzte Sorte. Alle grossfrüchtigen Speisekürbisse liefern ein vorzügliches Viehfutter; zu diesem Zwecke werden ausser dem gewöhnlichen Feldkürbis besonders der grosse gelbe und grüne Speise-, gelbe Centnerkürbis, Connecticut Field und Mammoth Pumpkin angebaut. Auch die Zahl der Zierkürbissorten ist eine hohe. Unter den grossfrüchtigen ist ganz besonders der Angurien-Kürbis zu empfehlen. Derselbe ist schön belaubt und überzieht sehr schnell grosse Flächen, eignet sich daher zur Bekleidung von Laubengängen etc., wie wenig andere Pflanzen, er bildet grosse, ovale, grüne, weiss gefleckte und gestreifte, höchst decorative Früchte, welche sich sehr lange halten, auch zum Einmachen vorzüglich geeignet sind. Wir erwähnen die oben besprochenen Türkenbund-Kürbisse nochmals und befürworten den Anbau der kleinen und kleinsten Zierkürbissorten: die verschiedenen Apfel-, Birn-, Eier- und Zwiebelkürbisse. Diese sind sämmtlich prächtige Schlingpflanzen; man kann sie auch mit Vortheil zur vorläufigen Belaubung von Flächen benutzen, welche mit jungen, langsam wachsenden Schlingsträuchern, z. B. mit Pfeifenstrauch bepflanzt sind.

VIII. Erbsen (*Pisum sativum*).

103. Die Erbsen zerfallen in Kneifel- oder Pahlrerbsen und Zuckererbsen. Von ersteren werden nur die Kerne grün oder trocken genossen, von letzteren besonders die fleischigen Schoten (Hülsen) mit den kaum halb ausgebildeten Samen.

Die Erbsen gedeihen in jedem Boden und jeder Lage, sind aber auf schwerem Boden ergiebiger und besser als auf leichtem. Besonders bei trockenem Frühjahr ist die Cultur auf leichtem, heissen Boden misslich, während die Erbsen auf Lehm Boden, zumal in ebenen oder tiefen Lagen, Hitze und Trockenheit besser ertragen. Eine freie, offene Lage ist desshalb vorzuziehen, weil die Erbsen weniger hoch werden als in eingeschlossenen Gärten. Hohe Erbsen sind aber nicht nur unbequem zu pflücken, sondern es werden auch dabei die Ranken leicht geknickt und verdorben. Der Boden soll nahrhaft, aber weder frisch noch stark gedüngt sein, denn bei reichlicher Nahrung werden die Erbsen zu üppig, zu hoch und blühen und tragen weniger. Muss auf armen Boden gedüngt werden, so verwende man alten, halberdigen Mist oder Holz- asche. Wenn auch Bodenwechsel im allgemeinen günstig ist, so kann man doch mit einer Düngung von Asche oder Knochenmehl, oder beiden zusammen, Jahre lang gute Erträge auf demselben Grundstück erzielen. Man sät die Erbsen von Februar bis Mitte April, ausnahmsweise früher, schon im Winter, oder später, um auch im Spätsommer junge Erbsen zu erziehen, was jedoch nur in regnerischen Sommern oder in feuchten Lagen gelingt. Zu diesen späten Aussaaten muss man natürlich die frühesten Sorten wählen. Es kommt häufig vor, dass die 4 Wochen später gesäeten Erbsen die früheren einholen. Dabei hängt viel von Boden und Lage ab. Auf leichtem Boden in warmen Lagen muss man immer bald säen, damit die jungen Pflanzen noch die Vortheile der Winterfeuchtigkeit geniessen. Jedenfalls entwickeln sich früh gesäete Erbsenpflanzen, wenn auch langsamer, doch kräftiger und gedrungener. Die ersten Erbsen lege man stets an eine geschützte, warme Stelle, nahe an eine Mauer. Wenn solche Plätze fehlen, stellen Gemüsegärtner Schutzwände von Schilf oder Stroh her, oder legen nach Süden stark geneigte Beete, sogenannte Erbsenleiten, an. Vortrefflich zum Früherbsenanbau geeignet sind Terrassen und steile Weinberge.

Man säet die Erbsen in etwa 20—30 cm entfernte Reihen, deren man 2—3 auf ein Beet bringt. Halbhohe und niedrige Sorten werden hie und da auch büschelweise (§. 21) gesäet und tragen bei dieser Cultur oft früher und reichlicher, weil sie freier stehen und der Boden nicht so stark beschattet ist, wie bei Reihensaaten. Da bei engem Stand der Ertrag geringer und das Pflücken erschwert wird, so bringe man die Reihen so an, dass neben den Fusswegen ein breiter leerer Raum bleibt, so dass der Weg zwischen den Beeten zur Zeit der Ernte wenigstens 50 cm breit ist. Reich tragen Erbsen, wenn man, wie es im Felde gebräuchlich ist, die Beete vereinzelt zwischen andern Gemüsen anbringt, so dass sie von beiden Seiten frei liegen. Hierzu eignen sich alle nicht frisch gedüngten Gemüse. Im Garten bringe man womöglich nur zwei Beete zusammen, die andern in Zwischenräumen von wenigstens zwei Beeten. Das Säen geschieht mit der Hand, im Felde mit der Hand- oder Zug-Säemaschine. Die Saatsfurchen müssen mindestens 10 cm tief sein, damit die Samen stark genug bedeckt werden können. Bei Frühsaaten ist dies nöthig, um die keimenden Samen gegen Vögel zu schützen, bei späteren, um die Feuchtigkeit zu erhalten. Die Dichtigkeit der Saat hängt von den Sorten und der Entfernung der Reihen ab. Hohe Sorten werden weiter gelegt als niedrige; meist legt man Früherbsen dichter.

Um eine wünschenswerthe Folge der Ernte zu bekommen und den Erbsengenuss lange auszudehnen, legt man entweder nur eine gute Sorte zu verschiedenen Zeiten (bei den ersten Saaten in Zwischenräumen von 2—3 Wochen, später von nur 8—10 Tagen), oder man baut frühe und späte Sorten an. Das letztere Verfahren ist vorzuziehen, denn während man bei dem Anbau einer einzigen Sorte nur eine frühe verwenden kann, nimmt man bei der Cultur verschiedener Sorten auf die bessere Qualität Rücksicht und säet für die Haupternten bessere und ertragreichere Sorten, als unter den Früherbsen zu finden sind. Es sind dies besonders die gross-körnigen, süssen Markerbsen.

Will man vor Enttäuschungen und Misserfolgen bewahrt bleiben, so beachte man bei der Bestellung die in vielen Samenverzeichnissen gegebene Eintheilung in frühe, mittlere und späte Sorten, sowie die Notizen über Zeit der Benutzung und die Höhe.

Die Culturarbeiten beschränken sich auf Behacken bald nach dem Auflaufen der Pflanzen, Behäufeln etwa 8 Tage später, wenn die Pflanzen 2—3 Stengelglieder haben, Stängeln mit Reisern (mit

Ausnahme der Zwergsorten) und Giessen bei anhaltender Trockenheit.

Bei der Aussaat der Erbsen muss man Sorge tragen, so viel zu säen, dass jedes Pflücken für einige Mahlzeiten ausreicht, dass aber nicht zu viele Erbsen auf einmal küchenreif sind, es sei denn, dass man den Ueberfluss einmachen will. Wer viele Erbsen so conservirt oder nach russischer Manier in Backöfen und Obstdarren trocknet, muss so viel Beete bestellen, dass es bei jedem Pflücken genug Erbsen giebt, um die Mühe des Einmachens oder Trocknens zu lohnen.

Welche Erbsensorten den Bedürfnissen am besten entsprechen, und wieviel von jeder Sorte auszusäen ist, lernt man leicht durch Versuchsanbau verschiedener Sorten. Gemüsezüchtern, welche vorzügliche Erbsen-Culturen haben wollen, rathen wir, einige Jahre nach einander eine Anzahl Sorten in kleinen Quantitäten zur Probe anzubauen und Buch darüber zu führen, um dadurch die zur Folge am geeignetsten, dabei besten und ertragreichsten kennen zu lernen.

Man kann auch Früherbsen in Gefässen an warmen Orten anziehen und mit beginnendem Frühling pflanzen. Dies darf schon zeitig im April geschehen, denn Erbsenpflanzen ertragen 6 Grad Kälte und darüber, wenn sie abgehärtet sind. In Frankreich, wo man schon im November Früherbsen säet, kommen diese meist gut durch den Winter. Nachdem die Erbsen in Kästen, Töpfen oder im halbwarmen Mistbeete gekeimt und die Pflanzen 3—4 ausgebildete Blätter haben, werden sie mit beschnittenen Wurzeln etwas schräg ausgepflanzt, und zwar ohne die Wurzeln stark anzudrücken, welche nur einzuschlemmen sind. Solche Pflanzen tragen nicht so voll wie in das Land gelegte, jedoch früher, und es lohnt wohl der Mühe, diese vermehrte Arbeit auszuführen. Die Marktgärtner Nordhollands, namentlich in der Nähe grosser Städte, wo der Boden so werthvoll ist, pflanzen Erbsen das ganze Jahr hindurch. Man sieht in dortigen Gärten meist einige Fenster mit jung gekeimten Erbsenpflanzen, welche, sobald im Garten Beete leer geworden, ausgepflanzt werden. Besseren Ertrag hat man, wenn man 5—7 Erbsen in 12—15 cm weite Blumentöpfe legt, diese nach dem Keimen an einen mässig warmen Ort ganz nahe an das Licht stellt, und zur geeigneten Zeit, ohne die Büschel zu theilen, mit Erdballen auspflanzt.

Von Zuckererbsen hat man, ausser wenn sie zum Verkauf gezogen werden, nicht so viel auszusäen, weil man weniger davon braucht und alte Schoten nicht geniessbar sind. Gleichwohl darf

man sie nicht zu jung pflücken, sonst kochen sie sich zu weich. Die Sorten mit grossen, fleischigen Schoten wie die grosse weisse Schwert-, die grosse grüne holländische und die Riesen-Schwert-Zuckererbse (die beste von Geschmack) werden sehr hoch und müssen gestängelt werden. Hat man viel Erbsen, so kann man einen Theil früher tischreif bringen, wenn man die Spitzen 2 bis 3 Blätter über den obersten Blüthen ausschneidet, so dass die ganze Nahrung den bleibenden Blüthen und Schoten zufliesst, während die unbeschnittenen auch höher noch Früchte ansetzen, die klein und des Aufhebens nicht werth sind. So behandelte Erbsenbeete werden auch eher frei und für andere Culturen nutzbar.

Die Erbsensorten sind in den Samenverzeichnissen meist in Bezug auf Höhe, Schotenlänge, Frühzeitigkeit und Ergiebigkeit so sorgfältig beschrieben, dass wir nicht nöthig haben, die umfangreiche Sortenliste hier wiederzugeben; auch kommen jährlich neue Sorten hinzu.

Das Treiben von Erbsen ist wenig gebräuchlich, hauptsächlich wohl desshalb, weil sich dieses Gemüse so vorzüglich in luftdicht verschlossenen Gefässen conservirt. Zum Treiben eignen sich nur die niedrigsten Sorten, wie Wunder von Amerika, de Grace, Mac Lean's Little Gem u. a.; von Zuckererbse: de Grace (kleinschotig) und die russische früheste. Je kälter ein Land ist, desto gründlicher versteht man sich daselbst auf das Treiben von Gemüse und Blumen, und so ist auch die Erbsen-Treiberei in Russland besonders ausgebildet. Man bereitet ein nur mässig warmes Mistbeet, füllt es mit nicht zu leichter und zu düngerreicher Erde und pflanzt die vorher in einem anderen Mistbeete gezogenen Pflanzen in Reihen, deren Entfernung sich nach der Sorte richtet. Dies geschieht vom Januar an. Wenn man nicht ganz niedrige Sorten treibt, so muss die oberste Reihe so weit vom Beetrande stehen, dass man die Pflanzen bis unter den ersten Stengelknoten mit Blüthen umlegen kann. Dies geschieht durch Auflegen von Lattenstücken, welche so lange bleiben, bis die Pflanze sich hinter denselben wieder aufgerichtet hat. Das Beet wird gelüftet, so oft es das Wetter erlaubt und darf nicht warm gehalten werden. Besonders reichlich muss zur Zeit der Blüthe bis zur halben Schotenbildung gelüftet werden, sonst ist der Fruchtsatz und das Wachsthum der Schoten unvollständig. Sehr frühe Anlagen missglücken daher oft, weil die Kälte zu dieser Zeit ein reichliches Lüften ver-

hindert. Sobald die Schoten des untersten Stengelknotens halb ausgebildet sind, werden die Spitzen ein Blatt über den obersten Blütenstengeln ausgeschnitten, was eine frühere Ausbildung der Früchte bewirkt.

Mehr als das Treiben in warmen Mistbeeten ist die Frühlkultur in kalten Beeten unter Glas zu empfehlen, wobei man ganz wie bei der Landkultur verfährt und doch 2—4 Wochen früher junge Erbsen erzielt. Hierzu wählt man natürlich nur niedrige, nicht über 40 cm hoch wachsende Sorten.

Spargel- oder Flügel-Erbse (*Lotus Tetragonolobus*).

104. Diese einjährige lupinenähnliche Hülsenfrucht, in Süd-Europa einheimisch, wurde früher als Kaffeesurrogat empfohlen, weil man die trockenen, plattgedrückten Samen in dieser Weise zu verwerthen suchte. Die Pflanze bildet gerade, 35 cm hohe Stengel mit schönen, purpurrothen Blumen und aufrechtstehenden Früchten; sie eignet sich für Einfassungen in Küchengärten. Die jungen Schoten werden von den Flügeln befreit und wie Schneidebohnen gekocht; sie schmecken, als Salat zubereitet, spargelähnlich. Man behandelt dieses Gewächs wie Puffbohnen.

Malaga- oder spanische Kicher-Erbse (*Cicer arietinum*).

105. Die Kicher-Erbse wird nur in südlichen Gegenden im Felde gebaut, wo die ausgewachsenen grünen und reifen Früchte zur Bereitung von Brei (*Purée*) beliebt sind. Die Kicher-Erbse hat nur 2 Samen in einer Schote, ist also wenig ertragreich. Sie gedeiht nur an warmen Standorten, verträgt allerdings grosse Trockenheit. Man sät gegen Ende April in Abständen von 40 cm für die Reihen und von 20 cm für die Pflanzen und behackt die Anlage einige Male; die gerösteten Samen liefern ein Kaffeesurrogat.

Essbare Platt-Erbse (*Lathyrus sativus*).

106. Diese Annuelle, auch deutsche Kicher und spanische Linse genannt, wird noch seltener und ebenfalls nur im Süden im Felde gezogen und wie die Kicher verwendet. Die noch grünen Samen werden wie junge Erbsen, die älteren als Brei zubereitet, genossen. Die Behandlung ist die der gewöhnlichen Erbse. In manchen Samenverzeichnissen wird sie als Futterpflanze aufgeführt.

IX. Bohnen.

In dieser Rubrik vereinigen wir die Gartenbohne, die Puff- oder grosse Bohne und die Sojabohne. Einige Phaseolus- und Dolichos-Arten, welche man im Süden als Gemüsepflanzen anbaut, erwähnen wir unter dem Titel „Südländische Bohnen“.

Gartenbohnen.

107. Die Gartenbohne, auch Vietsbohne und Fisoie genannt, umfasst 2 Arten: *Phaseolus vulgaris*, mit weissen, gelblichen und bläulichen Blüten, und *Phaseolus multiflorus*, die türkische, arabische oder Feuerbohne, mit feuerrothen Blüten.

Die Bohnen zerfallen in Busch- oder Krupbohnen ohne Ranken, und Stangenbohnen, welche hoch, oft über 3 m werden und daher an Stangen gezogen werden müssen.

In Bezug auf Boden und Düngung macht die Bohne etwas grössere Ansprüche als die Erbse; sie gedeiht besser in mürbem, lockeren, humusreichen Boden und verträgt schwere, noch wenig cultivirte Bodenarten weniger. Muss man ausgezehrtes Land zu Bohnen düngen, so nehme man nur halberdigen Mist oder Compost-erde. Was die Lage betrifft, so verlangen die Bohnen mehr Wärme als die Erbsen, widerstehen auch dem geringsten Frost nicht, tragen aber gleichwohl, wenigstens Stangenbohnen, nur in freien Lagen reich. Wer grosse Erträge erzielen will, muss diese Bedingungen zu vereinigen suchen. Das Land sollte stets erst vor der Aussaat gegraben werden, damit es sich sogleich erwärmt. Die günstigste Saatzeit für uns fällt mit derjenigen für Gurken zusammen, jedoch säet man Bohnen auch früher. Erfrieren sie noch, dann ist der Verlust meist unbedeutend, kommen sie aber gut durch, so ist der Nutzen so früher Bohnen gross. Man kann, jedoch nur bei warmen Wetter, die frühesten Buschbohnen Ende April an warme, geschützte Plätze säen, darf aber die Hauptaussaat in den meisten Gegenden erst Mitte Mai vornehmen. Diese April-Aussaaten keimen erst nach Mitte Mai, wenn Fröste in der Regel nicht mehr zu befürchten sind. Um aber bei ausnahmsweise frühen Saaten auf alle Fälle gesichert zu sein, säe man Ende April bis Anfang Mai frühe Sorten in Töpfe, wie bei den Erbsen angegeben, und pflanze, nachdem die Frostzeit vorüber ist, am besten büschelweise, ohne die Saattöpfe zu theilen.

Buschbohnen zieht man entweder bei grossem Bedarf auf Beeten, wovon viele neben einander liegen können, oder an den Rändern der Quartiere von anderen Gemüsen, selbst an Kartoffelfeldern. Hierzu wählt man den wärmsten Standort und vermeidet tiefe, feuchte Lagen. Wer keine durch Mauern oder Gebäude geschützte Lage hat, stelle, wie bei den Erbsen angegeben, besondere Schutzwände her. Man sät die Buschbohnen entweder in 30—40 cm entfernte Reihen, 15 cm von einander, oder büschelweise. Kräftig wachsende, höhere Sorten sät man besser auf letztere Art, die Büschel nicht unter 40 cm von einander, so dass sich die Blätter nicht berühren und die Pflanzen bei anhaltender Nässe nicht durch Fäulniss leiden.

Stangenbohnen müssen so angebracht werden, dass sie möglichst frei stehen. Dies geschieht am besten, wenn zwischen anderen Gemüsen nur einzelne lange Reihen oder Beete mit zwei Reihen angebracht werden. Da sich dieses aber der Düngungsverhältnisse wegen oft nicht einrichten lässt, so bringe man, wie bei den Erbsen angegeben, womöglich stets nur 2 Beete mit je 2 Reihen in gehörigen Zwischenräumen neben einander. Ist man gezwungen, viele Beete zusammen zu bringen, so mache man den Zwischenraum der Beete von einer Reihe zur andern wenigstens 1 m weit und gebe den Reihen die Richtung von Nord nach Süd, damit alle Beete gleichviel Sonne bekommen. Je höher und freier die Bohnenfelder liegen, desto enger können die Reihen neben einander kommen. Bei dem Säen, Legen genannt, ist es Gebrauch, erst die Stangen zu stecken, dann 5—6 Bohnen um dieselben zu legen, so dass der Durchmesser des so entstehenden Kreises der Pflanzen nicht über 20 cm beträgt und die Ranken leicht an die Stangen gelangen können. Die Entfernung der Reihen und Stangen unter einander darf nicht unter 50 cm für kurzlaubige, nicht hoch werdende Sorten, muss aber im allgemeinen 55—60 cm betragen. Die Befestigung der Stangen muss sehr sorgfältig geschehen. Das gebräuchlichste Verfahren ist, dass je 2 Stangen, welche einander gegenüber stehen müssen, in $\frac{2}{3}$ oder $\frac{3}{4}$ der Höhe kreuzweise zusammengebogen werden. Hierauf werden in die so entstandenen Gabeln des ganzen Beetes Längsstangen gelegt und befestigt. Diese Art der Befestigung ist sehr standhaft, und wenn auch an der Kreuzungsstelle die Blättermasse etwas zu dick wird, so haben doch die Pflanzen oberhalb viel Platz. Bei einzelnen Beeten ist diese Befestigung jedenfalls

die beste, wo aber viele Beete vereinigt werden, ist die Beschattung dabei leicht zu stark. Dann kann man die Stangen senkrecht einstecken und durch Querstangen verbinden, oder man vereinigt je 4 Stangen mit den Spitzen. Solche Pyramiden halten gut Stand und sind in stürmischen Lagen zweckmässig, aber sie haben den Nachtheil, dass sich oben die Ranken und Blätter zu sehr anhäufen, und dass die nach innen hängenden Bohnen schwer zu erreichen sind.

Die Samen beider Abtheilungen werden 3—5 cm tief gelegt. Die Erde muss vollkommen locker sein. War der Boden noch zu roh und schwer, so thut man wohl, bei Stangenbohnen um jede Stange, und bei büschelweise zu säenden Buschbohnen, oder in die Furchen Composterde zu bringen. Wird der Boden hart, so lüftet man die Kruste über der Saatstelle vorsichtig mit der Zinkenhacke, damit das Durchbrechen der Keime erleichtert wird. Keimen die Bohnen mangelhaft, so untersuche man die Stelle, und lege ebenso viele Samen wie fehlen eine Nacht in lauwarmes Wasser, dann an die betreffenden Stellen, wobei bei trockenem Boden die Saat eingeschemmt werden muss. Man thut gut, überjährige Samen vor dem Legen stets einer Keimprobe zu unterziehen.

Die Culturarbeit besteht in Behacken und Behäufeln, indem man die Erde bis an die Samenblätter herbeizieht. Bei den Stangenbohnen müssen die abwärts hängenden Ranken an die Stangen gebunden, bei Buschbohnen, welche geneigt sind, kurze Ranken zu treiben, diese ausgebrochen werden. Hohe Buschbohnen-Sorten legen sich bei Regen oft um und müssen durch Baumzweige (Reiser) gestützt werden.

Man unterscheidet gewöhnliche Speise- oder Schneidebohnen, auch grüne Bohnen genannt, weil sie mit der grünen Schale halb ausgewachsen verspeist werden, und Trockenbohnen, von denen die reifen Samen genossen, welche aber auch, in Ermangelung anderer, grün in der Küche verwendet werden. Bei ersteren ist eine fleischige, bei den Trockenbohnen eine dünne Schale geschätzt. Der Anbau von Trockenbohnen wird meist landwirthschaftlich betrieben, wer aber Land genug hat, sollte sie auch im Garten ziehen, weil er dann sicher ist, einjährige, leicht kochende Bohnen auf den Tisch zu bekommen und Sorten wählen kann, welche besser sind als die gewöhnlich im Handel vorkommenden.

Die Buschbohnen sind an Güte den Stangenbohnen gleich, sie tragen jedoch früher als diese, weil sich schon nahe über den

ersten Blättern Blüthen bilden, und durch die grössere Nähe des Bodens den Buschbohnen eine wärmere Temperatur zu Theil wird. Unter den Stangenbohnen ist nur die arabische oder Feuer-, sowie die Flageolet-Wachsbohne fast ebenso früh, da sie schon nahe am Boden blühen. Die Stangenbohnen übertreffen dagegen die Buschbohnen im Ertrag und in der Dauer desselben. Bei den Buschbohnen ist die Haupternte kurz, denn wenn auch manche Sorten danach fortblühen und Bohnen ansetzen, so sind doch letztere klein, und man zieht vor, das Land abzuräumen und zu anderen Gemüsen zu benutzen. Dagegen tragen Stangenbohnen bis zum Herbst, bis sie erfrieren. Zu Trockenbohnen werden bei uns fast nur Buschbohnen benutzt, während man anderwärts auch die ergiebigen Stangen- und Reiserbohnen zieht, z. B. im Norden Frankreichs die Soissons- und Perlbohnen.

Unter den Stangenbohnen nennen wir zunächst die arabische oder Feuerbohne mit den prächtigen, feuerrothen oder zweifarbigen Blüthen. Diese, wenn auch nicht so zart wie andere und mit dem ausgesprochensten Bohnengeschmack, ist die früheste und liefert auch in kühlen, trüben Sommern, verträgt älter einen gelinden Reiffrost und trägt bis in den October hinein; wir schätzen sie ausserdem als Zierpflanze. Ein Abkömmling davon ist die russische weisse Riesenbohne mit starken, grossen Schoten, welche der Feuerbohne als Gemüse vorzuziehen ist. Die blauschotige Speckbohne ist im Geschmack den Schwertbohnen fast gleich, dickfleischig, dabei zart und ungemein volltragend. Sie gedeiht auch in kühlen Sommern; die blaue Farbe der Schoten verliert sich beim Kochen. Diese Sorte ist eine Bohne für die bürgerliche Küche, reichtragend und gut; man kann sie jung auch als Brechbohne zu Gemüse und Salat verwenden. Die sogenannten Schwertbohnen sind lang und breit, gekrümmt, obschon nur dünn von Fleisch und bald hart werdend; sie sind unter allen Sorten die verbreitetsten und auf den Märkten gesucht. Gleichwohl stehen sie gegen viele andere dickfleischige Bohnen zurück, müssen sehr jung gepflückt werden und haben starke Fäden. Die Speckbohne, welche auch als rheinische-, dickschotige- und Blasen-Zucker-Brechbohne bekannt ist, von der Länge der Schwertbohne, aber fast gerade, ist dickfleischig und markig, liefert eben so ergiebig, lässt sich brechen und bleibt lange zart. Wir empfehlen diese und ähnliche dickfleischige Sorten als Hauptbohnen zu jedem Gebrauch. Eine frühere Sorte davon, die

früheste Zucker-Brechbohne, ist nächst der Feuerbohne die früheste Stangenbohne. Die Riesen-Zucker-Brechbohne mit wachsgelben Schoten ist früh und trägt sehr reich. Eine Uebergangsform, fast die Breite und Länge der Schwertbohnen erreichend, aber eben so fleischig wie die Speckbohne, ist die Siebenbürgener mit 20—25 cm langen Schoten. Sie ist in vieler Hinsicht ein Ersatz für die Speck- und Schwertbohnen, da sie bis in den Spätherbst hinein, noch trägt, nachdem alle andern Sorten schon aufgehört haben. Die Zucker-Perl- oder Prinzessbohne hat kleine schmale Schoten, in welchen man schon jung die Samen erkennt, ist ziemlich früh, sehr reichtragend, zart und süß und vorzüglich zu Salat, auch zum Einmachen in Essig und zu Pickles. Die nur erbsengrossen weissen Samen liefern ein feines Trockengemüse.

Eine besondere Gruppe bilden die Wachsbohnen. Aus der für Salat vorzüglichen schwarzen römischen Wachsbohne mit gelben Schoten sind andere entstanden, welche sich in der Form den Schwert- und Brechbohnen nähern. Nächst dieser sind die beliebtesten jetzt die grosse weissschalige Algierbohne, die goldgelbe früheste, ungemein reichtragende Mont d'or (schnell wegzupflücken) und die Zucker-Perl-Wachsbohne, beide mit gelben Schoten; endlich die sehr frühe, lange tragende Flageolet-Wachsbohne. Alle Wachsbohnen beanspruchen eine warme Lage.

Die Zahl der Buschbohnen ist gross. Wer seinen Bedarf hauptsächlich durch Stangenbohnen deckt, ziehe ausserdem entweder eine früheste Buschbohne oder als zweite noch eine spätere, ergiebigere. Als früheste Wachs-Buschbohne empfehlen wir die Neger-Wachs-, die Wachs-Dattel-, Mont d'or und die vorzügliche Flageolet-Wachs- mit sehr langen, gelben Schoten. Leider ertragen letztere zwei Sorten kein anhaltend nasses Wetter, da sie dann leicht fleckig werden. Etwas später sind die reichtragenden, schwarz-samigen, sowie weiss-samigen gelbschotigen Wachs- und Schirmer's Wachs-; die späteste ist die Wachs-Schlachtschwert-. Wachsbohnen darf man nicht in tiefe Lagen oder an beschattete Plätze pflanzen. Unter den grünschotigen Buschbohnen ist die früheste die sehr frühe Negerbohne, wir empfehlen dieselbe nur für Mistbeete und Treibhäuser, wo sie durch die Sicherheit des Erfolges fast alle anderen Sorten übertrifft, aber im Lande wird sie zu schnell hart, sie hat kleine, schmale Schoten. Dieser folgt Kaiser Wilhelm, die allerfrüheste Schwert-Buschbohne, welche bestimmt scheint, die

etwas spätere weisse holländische Schwert- zu ersetzen, da sie breitere Schoten liefert und gleich vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land ist. Fast gleichzeitig mit Kaiser Wilhelm reifen die gelbe englische Treib-, gelbe Prinzess-, bunte Ilseburger sowie die allerfrüheste feinschalige weisse Zucker-Perl-. Die grosse weisse Schlachtschwert-Buschbohne hat dieselben Eigenschaften wie die Stangen-Schwertbohne und ist mittelfrüh, aber sie leidet bei anhaltender Nässe. Die französischen Flageoletsorten sind anerkannt gute, ertragreiche Bohnen. In manchen Orten wird die bunt-samige frühe Adlerbohne allgemein angebaut. Hundert für Eine ist eine der ertragreichsten, aber weder ansehnlich noch fein. Hinch's Riesen-Zucker-Brech- ist eine frühe, sehr langschotige, äusserst ergiebige Sorte, welche namentlich in den Rheinlanden in grossem Massstabe als Marktbohne angebaut wird.

Als Trockenbohnen werden bei uns fast ausschliesslich die weiss-samigen Feldbohnen angebaut, obgleich es bessere Sorten giebt. Vor allen empfehlen wir die gelbe Pariser mit erbsengrossen, runden Samen, welche zartschaliger und früher als weisse Bohnen sind, also auch in nassen, kalten Sommern gut reifen, was bei den weissen Feldbohnen nicht der Fall ist. Allerdings ist diese Sorte nicht so ergiebig, denn die Pflanzen, Schoten und Samen bleiben klein. In Frankreich schätzt man die weisse Flageoletbohne (auch eine sehr gute Schneidebohne), und die ähnliche, aber bessere, frühere Flageolet von Étampes, sowie die zu Conserven beliebte, auch nach dem Kochen die grüne Farbe der Samen behaltende Chevrier's Flageolet, besonders zum Auskernen der unreifen Samen.

Wir machen bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam, dass bei uns der Genuss der noch grünen, weichen Bohnensamen (Flageolets), wozu sich besonders die kleineren Sorten eignen, noch wenig bekannt ist. Sie werden wie grüne Erbsen benutzt und zubereitet, sind sehr nahrhaft, dabei leichter verdaulich als trockene Bohnen und vermehren die Mannigfaltigkeit der Nahrungsmittel. Hierzu kommt, dass man alle zum Schneiden zu alt gewordenen Bohnen auf diese Art benutzen kann.

Das Treiben der Bohnen in Mistbeeten, heizbaren Kästen und Treibhäusern ist sehr lohnend, über ersteres möge hier das Wichtigste Platz finden. Man beginnt im Januar oder Februar, je nach dem Klima, und fährt damit fort bis zum März; in manchen grossen Treibgärten treibt man nochmals im Herbst. Da die Bohne

gegen feuchte Luft sehr empfindlich ist, so ist es nicht gerathen, sehr früh mit dem Treiben zu beginnen, wenn es nicht durchaus nöthig ist, weil es später, wenn gelüftet werden kann, dankbarer und sicherer ist. Das Mistlager wird eben so stark und warm gemacht wie für Gurken, dagegen muss der Kasten höher sein. Für die Erdschicht genügt eine Stärke von 15 cm. Die nöthigen Pflanzen werden entweder in einem anderen warmen Mistbeete, oder auch in breiten Töpfen oder tragbaren Kästen herangezogen. Man füllt diese mit recht sandiger Compost- oder Mistbeeterde. Das Säen wird etwa 2 Wochen vor der Anlage des Mistbeetes vorgenommen. Da nun dieses frühestens 8 Tage nach der Anlage bepflanzt werden darf, so haben die Bohnenpflanzen 2—4 Wochen Zeit zum Wachsen. Stehen sie sehr warm, z. B. im Ananas- oder Treibhause, so kann es kommen, dass die Pflanzen der ersten Aussaat bis zum Fortpflanzen in das Mistbeet zu alt werden. Um daher sicher gute Pflanzen zu erhalten, säet man 10—12 Tage nach der ersten Saat noch einmal. Diese Samentöpfe stellt man in ein Treibhaus oder warmes Mistbeet, in Ermangelung beider in ein warmes Wohnzimmer, erst warm und dunkel, nach dem Keimen so nahe wie möglich an das Licht, damit die Pflanzen nicht zu lang werden. Das Aussäen auf dem Platze wird seltener und nur bei späten Culturen angewendet, ist aber in diesem Falle vorzuziehen; das Beet muss dann aber seine grösste Wärme verloren haben, sonst verbrennen die Wurzeln. Sobald die Pflanzen über den ersten zwei wirklichen Blättern den Anfang der folgenden zeigen, werden die Spitzen ausgekniffen, damit sich die Seitentriebe bilden. Dadurch wird zwar die Blüthe, also auch die Frucht etwas verspätet, aber die Pflanzen bleiben niedriger, was im Mistbeete durchaus nöthig ist. Uebrigens kommt dabei alles auf die Sorte an. Das Auskneifen geschieht entweder schon vor dem Pflanzen oder erst im Mistbeete, nachdem die Pflanzen zu wachsen begonnen, nie zugleich bei dem Pflanzen, weil dies eine Störung im Wachsthum nach sich ziehen würde. Man pflanzt oder säet die Bohnen im Mistbeete entweder einzeln oder zu zwei durchschnittlich 15 cm von einander, oder in 30 cm entfernten Querreihen enger. Dieser grössere Zwischenraum hat den Zweck, dass die Pflanzen, wenn sie hoch werden, durch eine Latte niedergelegt werden können. Ueberhaupt ist ein weites Pflanzen sicherer und einträglicher als ein enges, denn die Bohne setzt nur freistehend gut Frucht an. Das Pflanzen darf

erst geschehen, wenn die grösste Hitze und der Dunst verflogen sind. Die 2 Samenblätter werden bei dem Pflanzen abgeschnitten, weil sie leicht Fäulniss verursachen. Da die Erdschicht nicht stark und nach unten warm ist, so müssen die Bohnen, um die Wurzeln nicht in den Mist zu bringen, schräg, mit der Spitze nach oben (Nordseite) gepflanzt und die Stengel leicht, am besten mit Sand, bedeckt werden. Manche Gärtner bringen stets 2 Pflanzen nebeneinander, weil es oft vorkommt, dass einzelne verkümmern und dann leere Plätze entstehen. Das Mistbeet ist reinlich zu halten und zu lüften, so lange es dunstig ist, hauptsächlich während der Blüthe. Gelbe Blätter und alle verblühten Blumen muss man entfernen; letztere sitzen oft an den jungen Bohnen fest und verursachen Fäulniss. Je später die Bohnen getrieben werden, desto schöner und ergiebiger, aber auch schneller gedeihen sie. Vom April an brauchen die Kästen nur mässig warm zu sein. Sehr lohnend ist auch das Treiben im Herbst. Hierzu benutzt man abgetriebene Gurken- und Melonenbeete, welche man Ende Juli aufräumt, von dem alten Mist befreit und zur Hälfte mit frischem Pferdemist vermischt. Hierbei werden die Bohnen zugleich in das Beet gelegt. Wenn man hohe Aufsatzkästen hat, so kann man zur späten Frühjahrs- und zur Herbsttreiberei auch grössere und ergiebigere Sorten verwenden. — Man kann auch im Wohnzimmer Bohnen ziehen und bereits im März ernten. Natürlich gehört dazu ein grosser Fenster-Raum und eine Lage nach Süden. Man legt die Bohnen im Januar, zu 5 Stück in 15—20 cm weite Töpfe, welche nur $\frac{2}{3}$ mit Erde gefüllt werden. Nachdem die Pflanzen über den Topfrand gewachsen, füllt man die Töpfe bis zum Rande an.

Sicherer und fast lohnender ist das Treiben der Bohnen in geheizten Kästen und in Treibhäusern, wozu auch Ananas- und Erdbeerhäuser benutzt werden; in Treibhäusern erzieht man mit Leichtigkeit fast den ganzen Winter hindurch junge Bohnen.

Was die zum Treiben verwendeten Sorten betrifft, so ist jede frühe, niedrige Sorte zu gebrauchen, besonders beliebt sind die schwarze Neger-Buschbohne, Kaiser Wilhelm, die frühe holländische Schwert- und die früheste gelbe englische Treibbohne.

Südländische Bohnen.

108. Man zieht in südlichen Ländern mehrere, Bohnen genannte und diesen ähnliche Pflanzen, welche jedoch für unser Klima

unter gewöhnlichen Verhältnissen sich nicht zum Anbau eignen. Sie verlangen viel Wärme, tragen bei uns, selbst an den wärmsten Mauern, erst im September und reifen nie Samen. Man muss sie jedenfalls in Töpfen anziehen und erst Ende Mai an eine südliche Mauer pflanzen. Diese Bohnen gehören den Gattungen *Dolichos* und *Phaseolus* an. Am bekanntesten sind folgende: die Lima-Bohne (*Phaseolus lunatus*) aus Südamerika, auch in Nordamerika cultivirt, mit kurzen, breiten, äusserlich rauhen Schoten wie die Feuerbohne. Sie ist als Trockenbohne sehr mehlig; es giebt davon mehrere Sorten. Die Riesen-Spargelbohne (*Dolichos sesquipedalis* oder *Phaseolus ensiformis gigas*) liefert 60—80 cm lange Schoten. Diese wird schon in der Provence angebaut. Aehnlich sind *Dolichos cubensis*, die Cuba-Bohne, ferner der in Italien verbreitete *Dolichos anguiculatus*, ostindische Riesen-Spargel-Bohne, die Assab-Bohne (*Dolichos formosus*) und die für uns nur als decoratives, schön blühendes Schlinggewächs zu empfehlende Lablab Fasel (*Dolichos Lablab*).

Sojabohne (*Soja hispida*).

109. Die Sojabohne ist eine neuere Einführung aus China, wo sie so verbreitet ist, dass sie nächst dem Reis das Hauptnahrungsmittel bildet. Ob ihre Akklimatisation für Mitteleuropa von bleibendem Werth sein wird, muss sich erst zeigen, ein solcher wird ihr von einigen Seiten des grossen Proteingehaltes wegen für Futterzwecke zugesprochen. Ihr entschiedener Vorzug besteht ausser einer grossen Ergiebigkeit darin, dass sie in wärmeren Gegenden Süddeutschlands, Oesterreichs u. s. w., wo sie zur Reife kommt, nie von Nässe leidet, welche Felderbsen, Bohnen und Linsen so schadet. Es giebt viele Varietäten der Sojabohne, und bereits sind in Oesterreich frühere Sorten gezogen worden; für die Gartencultur scheint sich allein die niedrige braune zu eignen. Von dieser Bohne sind nur die grünen und trockenen Samen, wie Puffbohnen zubereitet, essbar, und es müssen die trockenen vor dem Kochen erst 24 Stunden im Wasser liegen, um den Gerb- und Bitterstoff theilweise zu verlieren. Die Sojapflanze verästelt sich von unten und braucht daher viel Platz. Die Cultur ist der von Buschbohnen gleich.

Puffbohne oder grosse Bohne (*Vicia Faba*).

110. Die Cultur der Puffbohnen, auch Sau- oder Pferdebohnen genannt, ist sehr einfach; sie gedeihen am besten in fettem, frisch gedüngten oder in schwerem, lehmigen Boden. Die Pflanze verzweigt sich nicht und beansprucht wenig Platz. Man säet, je nach der Grösse der Sorte, in 20—30 cm entfernte Reihen, und mit 15 cm Pflanzenabstand, häufig als Einfassung um hohe Gemüse, auch in einzelnen Reihen zwischen niedrigen Gemüsen, wo sie oft zugleich als Scheidung dienen. Da diese Pflanze eben so viel Kälte verträgt wie die Erbse, so kann man sie schon im Februar säen; gewöhnlich legt man indessen erst Anfang April. Nach einmaligem Behacken pflügt man die Pflanzen zu behäufeln. Da die obersten Blüthen nur kleine Früchte bringen, bei Trockenheit oft gar nicht ansetzen, so thut man wohl, die Pflanzen zu entspitzen, nachdem sie hinreichend Frucht angesetzt haben. Dadurch erhält man frühere Bohnen und die Genusszeit wird verlängert, auch schützt es die Pflanzen gegen Ungeziefer. Zu Gunsten des Anbaues der Puffbohnen spricht nicht nur die Frühzeitigkeit, sondern auch der Nährwerth und die leichte Verdaulichkeit. In manchen Gärten Frankreichs werden Puffbohnen in halbwarmen Mistbeeten getrieben. Die Erfolge sind sehr sicher, wenn nicht zu früh angefangen wird.

Die frühesten und niedrigsten Sorten sind: die frühe oder Büschel-Zwerg-Puffbohne, welche nur 40 cm hoch wird und sehr nahe am Boden trägt, meist auch mehrere Stengel bildet. Etwas höher ist die fast ebenso frühe niedrige Mazagan. Diese kleinbohnigen Sorten sind sehr wohlschmeckend. Die gewöhnliche Erfurter Garten-Puffbohne wird etwa 1 m hoch, trägt mittelgrosse Schoten mit 3—4 grossen Bohnen, die lange zart bleiben. Diese Sorte ist ziemlich früh und kann alle übrigen ersetzen, ist jedoch nur bei hinreichender Feuchtigkeit ertragreich. Lange Zeit galt die Windsor-Puffbohne für die grösste, sie setzt spät an und wird übertroffen von der Sevilla-Puffbohne, welche die längsten Schoten unter allen Sorten und darin selten weniger als 4, zuweilen 8 grosse Bohnen bildet, dabei früh ist; leider ist sie empfindlicher gegen Kälte als andere. Sehr beliebte englische Sorten sind: Hangdown (mit hängenden Schoten), Johnson's Wonderful und Monarch. Leviathan oder neue Riesen- und Agua Dulce sind sehr langschotige, sich ähnelnde Sorten. In Frankreich schätzt man Julienne, eine nicht grosse aber ertragreiche und frühe, der Hitze widerstehende Sorte.

X. Kernsorten.

Unter dieser Benennung pflegt man in den Samen-Verzeichnissen einige Gemüse, mit meist grossen Samen (Kernen) zu vereinigen, welchen wir noch den Meer- oder Seekohl hinzufügen. Wir besprechen hier: 1. Artischocken, 2. Cardy oder Carden, 3. Spargel, 4. Meer- oder Seekohl.

Artischocken (*Cynara Scolymus*).

111. Die Artischocke ist eine ausdauernde Pflanze mit ausbreiteten, doppelt gefiederten sehr grossen Blättern von malerischer Form, weshalb man sie auch als Blattzierpflanze benutzt. Den geniessbaren Theil liefern die distelartigen Knospen, welche einen Durchmesser von 5—8 cm haben, doch können auch die starken Blattstiele und noch weichen Stengelspitzen (wenn sie sich im Herbst nicht mehr zu Knospen entwickeln), wie Carden gebleicht und zubereitet werden. Von der eigentlichen Frucht geniesst man den Blüthenboden und den unteren fleischigen Theil der Blüthenschuppen gekocht, ferner die kleinen zarten Spätlinge roh mit Essig, Oel und Pfeffer. Dieses feine Gemüse wird in Deutschland nur im Südwesten, ferner in der Schweiz, Oesterreich und Holland, am allgemeinsten jedoch in Südeuropa angebaut.

Die Artischocke wird in der Regel nicht aus Samen erzogen, obschon dies leicht und vortheilhaft ist, sondern durch Keime oder „Kindel“, welche von der Mutterpflanze mit einem Stück derselben sehr vorsichtig im Frühjahr abgelöst, sauber hergerichtet (die Blätter etwas zurückgeschnitten), erst pikirt und Ende Juni an Ort und Stelle gepflanzt werden. Bei der Anzucht aus Samen ist man nicht sicher, dieselbe Sorte rein wieder zu erhalten, man kann aber ebenso gut bessere erzielen. Was Boden, Düngung und Lage betrifft, so machen Artischocken die gleichen Anforderungen wie Rhabarber. Sie verlangen äusserst reich gedüngtes, tief bearbeitetes, feuchtes Terrain; am besten gedeihen sie auf dem Schlamm Boden ehemaliger Wasserbecken und auf Wiesenboden. Man sät den Samen schon im Februar, entweder in warmes Mistbeet oder zu 3 Samen in Töpfe, die warm gestellt werden. Die Samen keimen schnell, und die Sämlinge aus den Mistbeeten werden bald verpflanzt (pikirt), während die in Töpfen ungetheilt bleiben. Nach und nach muss man die Pflanzen kühler halten, so dass sie Anfangs Mai an Ort und Stelle kommen, und zwar die Topfpflanzen mit ungetheilten

Erdballen. Die Reihen sowie die Pflanzen erhalten 1 m Abstand von einander; man muss die Pflanzen fest andrücken, aber nicht zu tief setzen und stark angießen. Die grossen Zwischenräume werden für andere, kleine Gemüse benutzt. Häufiges Behacken und wiederholtes, durchdringendes Begiessen sind durchaus nöthig, um sowohl von den Kindeln wie von den Februar-Samenpflanzen im Herbst desselben Jahres schon einen Ertrag zu erzielen. Uebrigens kann man auch Ende April an Ort und Stelle säen, doch erntet man dann erst im folgenden Jahre. Die Artischocken-Pflanzen verlangen sicheren Schutz gegen Kälte. Zu diesem Zwecke schneidet man die Stengel, welche geblüht haben, möglichst dicht über den Wurzeln ab, schneidet auch die langen Blätter zurück und behäufelt dann die Pflanze wenigstens 20 cm hoch mit der sie umgebenden Erde; in unserm Klima muss man auf diese Erddecke eine weitere von Stroh oder anderen Deckstoffen bringen. Bei Eintritt milderer Witterung wird die Bedeckung zeitweise entfernt, sonst faulen die Pflanzen. Sind die Fröste vorüber, so gräbt man, düngt und vertheilt die angehäuften Erde.

Wir empfehlen besonders die sehr grosse, ergiebigste Artischocke von Laon. Die Sorten mit violetten Blütenköpfen und Stengeln sind von Form spitzer und schmaler, haben daher keinen so breiten Blütenboden und werden mehr roh (à la poivrade) mit Essig und Pfeffer genossen. Die Artischocken tragen 3—4 Jahre, demgemäss müssen die Pflanzungen erneuert werden. Man wird jedoch gut thun, alljährlich eine Partie junger Pflanzen zum Ausbessern heranzuziehen.

Cardy oder Gemüse-Carden (*Cynara Cardunculus*).

112. Die Gemüse-Carden ist ausdauernd, wird jedoch als Annuelle behandelt und nur aus Samen gezogen. Sie wird 1—1½ m hoch und hat lange, dabei schmale, mit langen, scharfen Stacheln besetzte, wollig behaarte, unterhalb weisse Blätter mit langen dicken Blattstielen. Letztere (d. h. die innersten) bilden den geniessbaren Theil. Cardy verlangen tiefen, nahrhaften, gedüngten Boden. Man sät sie meist Ende April in das Land, 2—3 Samen neben einander, lässt jedoch nur eine der gewonnenen Pflanzen stehen. In Töpfe zu säen und aus diesen an Ort und Stelle zu pflanzen, ist wenig gebräuchlich. Das Auspflanzen geschieht im Mai in Entfernung von mindestens 1 m. Wenn der Boden schwer und

nicht mürbe ist, so bringt man an die Pflanzstellen etwas Composterde. Da alles darauf ankommt, grosse Pflanzen zu erziehen, so ist es unerlässlich, bei Trockenheit stark zu begiessen, zuweilen sogar mit Düngerwasser. Die Blattstiele, welche eine bedeutende Stärke erreichen, sind nur gebleicht geniessbar. Dabei wird wie bei dem Staudensellerie verfahren, nur ist die Operation der Stacheln wegen schwieriger. Man schnürt die Blätter mit Strohseilen oder dergleichen zusammen, packt dann die ganzen Pflanzen in Stroh ein und behäufelt dieselben mit der sie umgebenden Erde. Schon 3 Wochen darauf sind die Blattstiele gebleicht und geniessbar. Man darf daher nicht zu viele auf einmal einbinden, sondern vom September bis Ende October alle 2 Wochen nur so viel wie man braucht, weil die zu lange zusammengeschnüpften Pflanzen leicht faulen. Die für den Winterverbrauch bestimmten Pflanzen bindet man locker zusammen, schneidet die Blätter oben ab und schlägt sie, sobald kaltes Wetter eintritt, an einem dunkeln aber trocknen Orte ein, wo sie sich lange halten. Cardy werden bei uns selten angebaut, auch scheint es hier unbekannt zu sein, dass die starke, fleischige Hauptwurzel geniessbar und von eben so zartem Geschmack ist wie die Blattstiele.

Die beliebteste Sorte ist die kaum 1 m hohe, vollrippige frühe Carde von Tours. Die vollrippige ohne Stacheln wird etwas höher, hat längere Blätter mit breiten, aber nicht dicken Blattstielen (Rippen). Die spanische Carde ist der vorigen ähnlich. Puvis ist stachellos und hat schöne breite Rippen; auch giebt es eine rothrippige Sorte.

Spargel (*Asparagus officinalis*).

Anzucht der Spargelpflanzen aus Samen.

113. Man verschaffe sich vor allem Samen bester Qualität, und nehme denselben nie von einer beliebigen Pflanze. Man sät im April am besten in 10—15 cm entfernte Reihen in reichen, dabei lockeren Boden, bedeckt die Samen leicht und verdünnt die aufgegangenen Pflanzen, so dass jede 5—6 cm von der anderen entfernt steht. Hebt man die überflüssigen so vorsichtig aus, dass die Wurzeln nicht verletzt werden, so kann man sie in entsprechender Entfernung weiter pflanzen. Diese Spargelsämlinge müssen sehr sauber von Unkraut gehalten, mithin oft behackt werden, wobei grosse Vorsicht geboten ist, um die Wurzeln der

jungen Pflanzen nicht zu beschädigen. Man lasse es nicht an der nöthigen Nahrung fehlen. Im Sommer und Herbst wird daher oft gegossen, mehrmaliges Giessen mit Dungwasser trägt besonders zur vollkommenen Ausbildung bei. Die Meinungen gehen darüber auseinander, ob ein-, zwei- oder dreijährige Pflanzen die besten für die Spargelanlagen sind. Junge Pflanzen bieten den Vortheil, dass sie mit allen Wurzeln und wenig verletzten Spitzen ausgehoben und gepflanzt werden können, ältere haben lange Wurzeln, welche häufig beim Ausheben verletzt und abgestochen werden. Wir glauben zweijährige Pflanzen besonders empfehlen zu dürfen. Zur Pflanzzeit, wenn der Kopf der Pflanzen bereits hervortritt, ist zu beachten, dass manche derselben breite, andere spitze Köpfe (Keime) haben. Diese spitzen sondere man aus, denn sie bringen meist schwächere Spargel als die breitköpfigen. Man pflanze jene allein auf ein Schulbeet, um später mit den besten die etwa in der Pflanzung entstehenden Lücken auszufüllen.

Anlage und Unterhaltung der Spargelbeete.

Die Anlage der Spargelbeete richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit. Wenn dieser von Natur sandig und einigermaassen wasserdurchlassend ist, so sind weitere Vorbereitungen nicht nöthig; ist das Land dagegen feucht, weil der Untergrund nicht durchlassend, so muss vorher für genügende Drainage gesorgt werden. Diese (d. h. den Abfluss der Feuchtigkeit) verschafft man sich entweder durch Leitung des Wassers in ein Bassin oder ein eingegrabenes Fass, oder, wenn dies nicht möglich, in einem unmittelbar unter dem Spargelland angebrachten Sickerschacht. Es ist zweckmässig, Beete einzurichten, weil man die Spargelländer die erste Zeit täglich begehen muss; später können die Fusswege aufgehackt und bepflanzt werden. Bei grösseren Anlagen lässt man gern zwischen je zwei Beeten eins leer, welches man mit nicht tief wurzelnden Pflanzen, z. B. Erdbeeren bebaut, die sich hierzu ganz besonders eignen. Den einzelnen Spargelpflanzen giebt man 50—80 cm Abstandsweite; bei grossem Terrain mag man sogar eine weitere Entfernung beobachten; die Anlagen dauern dadurch länger, und es wird an Düngung gespart.

Bei kleinen Anlagen im Garten verfährt man nun wie folgt: Man sticht die Beete einen Spatenstich tief aus und gräbt eine grosse Menge von Mist in den etwa 30 cm tiefer liegenden Boden

ein, und zwar geschieht dieses am besten vor Winter. Sollte jedoch die untere Erde nicht sehr gut sein, so wirft man den oberen Stich bei Seite, gräbt einen zweiten Spatenstich tief aus, welchen man fortschafft, bedeckt den Boden mindestens 15—20 cm stark mit Mist und wirft dann die bei Seite geworfene Erde (den ersten Spatenstich) wieder in die Grube. Das Beet würde also bis auf ca. 15 cm vom Rande der Oberfläche angefüllt sein. Die Erde zieht man nun mit dem Rechen glatt, spannt sodann eine Schnur in die Mitte des Beetes und steckt in einer Entfernung von je 60 cm Pfähle ein, welche so lang sein müssen, dass sie mindestens 30 cm über die Oberfläche des Beetes hinwegragen. Die Beete werden meistens 1,60 m breit angelegt und mit drei Reihen bepflanzt. Die zwei äusseren Reihen werden je 60 cm von der Mittelreihe entfernt gezogen und die Pfähle so gesteckt, dass sie mit der Mittelreihe in Verband (· · · · ·) stehen. Man bereitet mit der Hand neben jedem Pfahle einen 8—10 cm hohen Kegel von guter, sandiger Composterde, breitet auf jedes derselben je eine Spargelpflanze so aus, dass die Wurzeln nach allen Seiten kommen und bedeckt sie sofort mit fetter, sandiger Erde. Vorher werden alle beschädigten Wurzeln an den Spitzen glatt abgeschnitten, dagegen lässt man die Wurzeln mit unverletzten Spitzen unbeschnitten. Sobald alle Pflanzen eines Beetes gesetzt sind, wird dasselbe mit der Schaufel so angefüllt, dass die Keime der Pflanzen wenigstens $2\frac{1}{2}$ cm hoch bedeckt sind. Es empfiehlt sich, auch zur Anfüllung der Beete recht gute Erde zu nehmen. Auch thut man gut, die Pflanzung bei trockenem Wetter vorzunehmen und nach Beendigung derselben die Beete tüchtig anzugiessen.

Bei grösseren Anlagen wird folgendermaassen verfahren: Man breitet im Herbst auf dem dazu bestimmten Lande 15 cm hoch Mist aus, welchen man möglichst tief untergräbt. Zur Pflanzzeit im Frühjahr sticht man Löcher von 30 cm Weite und 45 cm Tiefe aus, indem man die dabei gewonnene, mit Mist vermischte Erde auf Haufen neben das Loch wirft, um später damit auszufüllen; zwischen den Pflanzen und Reihen ist eine Entfernung von 60 bis 80 cm zu beobachten. In jede Pflanzengrube schüttet man nun 8 cm hoch alten Mist (Taubenmist ist besonders dazu geeignet), macht kleine Erdkegel, auf welche man die Pflanzen genau wie vorher angedeutet setzt. Sobald die Pflanzen ausgetrieben haben, werden die Löcher nach und nach ausgefüllt.

Folgendes neuere und sehr zu empfehlende Verfahren wird in Erfurt bei grösseren Anlagen beobachtet: Man legt einen Spatenstich tiefe und 1 m breite Gräben an, breitet darin 15 cm hoch Mist aus, welchen man mit Erde vermischt, und richtet die Oberfläche des Grabens so her, dass sie in der Mitte einen Rücken bildet. Darauf tritt man die Erde mit dem Fusse (die Spitze nach der erhöhten Mitte) fest und pflanzt auf den so entstandenen Erdrücken, welcher vorher mit dem Rechen glatt gezogen ist, in einer Entfernung von 1 m, wie vorher angegeben, indem man die Wurzeln gut ausbreitet und jede Pflanze durch ein Pfälchen bezeichnet. Die durch den Stich des nächsten Grabens gewonnene Erde wird nun zum Ausfüllen des eben angelegten benutzt und in dieser Weise fortgefahren. Es ist rathsam, schon vor der Anlage im Herbst das ganze Land stark zu düngen, damit die später zur Bedeckung dienende obere Erdschicht gut mit Mist vermischt ist; später wird das Spargelland nur von oben gedüngt.

Bei sehr schwerem Boden muss man von dem zu Spargelbeeten bestimmten Lande die Erde vorher mindestens 60 cm tief ausstechen und durch vorbereitete Spargelerde, welche mit Mist und Holzasche vermischt ist, bis zur Pflanzhöhe ersetzen.

Das Pflanzen kann man Mitte März bis Ende April vornehmen, je nach der Lage und Witterung. Hat man diese Zeit jedoch versäumt, so kann es noch im September nach Ausbildung der Triebe der Samenpflanzen geschehen; man schneidet jedoch in diesem Falle die Stengel um die Hälfte zurück, giesst tüchtig an und bedeckt die Pflanzen mit Mist, soweit die Wurzeln reichen.

Man hat bis zum Herbst an dem jungen Spargel nichts zu thun, als die Beete von Unkraut rein zu halten, die Oberfläche, sobald sie zu hart ist, mit der Zinkenhacke zu lockern und bei dauernder Trockenheit zu giessen; letzteres namentlich kurz nach der Pflanzzeit. Wenn sich grosse, schwere Stengel bilden, so verhütet man deren Abbrechen durch Anbinden an die Pfähle und schneidet dieselben im Herbst, nachdem sie gelb geworden sind, 2—3 cm hoch über der Erde ab. Im Winter bedeckt man die Beete mit einer dünnen Schicht Mist und hackt zeitig im nächsten Frühjahr das Land mit der Zinkenhacke, wobei man den darauf gebliebenen Mist unterarbeitet. Auch thut man gut, auf das Spargelland nach seiner Anlage jährlich eine Schicht fetten Compost zu bringen. Wenn man weitläufige Spargelreihen hat, pflegt man

die Erde zwischen denselben im Frühjahr zur stärkeren Bedeckung nach den Pflanzen hinzuziehen, wodurch es möglich wird, längere Pfeifen zu stechen. Ende Juni wird diese Erde wieder bei Seite gezogen, damit die Wurzeln der Spargelpflanzen mehr mit der Luft in Berührung kommen. Zwischenculturen darf man erst einige Jahre nach der Anlage vornehmen und zwar nur von solchen Pflanzen, welche nicht viel zehren, wie Radies, Kerbel, Spinat etc.

Das Stechen des Spargels geschieht vom dritten Jahre an; man steche aber zuerst nur einige der schönsten von jedem Stocke und zwar nur bis Ende Mai, damit die Pflanzen noch erstarken können. Je mehr man die Pflanzung in ihrer Jugend schont, desto länger dauert sie, und desto schöneren Spargel zieht man. Ist die Anlage einmal im Schwunge, so sticht man alle Pfeifen; es ist jedoch rathsam, nicht länger als bis Mitte Juni zu stechen, dadurch schont man die Anlagen.

Man bedient sich zum Stechen der bekannten, eigens zu diesem Zwecke construirten Spargelmesser. Die Spargelpfeife hält man mit der linken Hand fest und sticht, nachdem man vorher die Erde etwas davon entfernt hat.

Will man Spargel etwas früher erhalten, ohne ihn förmlich zu treiben, so hebt man im März die Erde 8 cm hoch ab, wirft sie bei Seite, deckt eine 25 cm hohe Schicht von kurzem, frischen Pferdemist darauf, welcher vorher bereits auf Haufen erwärmt worden ist, und breitet die abgenommene Erde dann wieder darauf aus. Auf diese Weise kann man schon mehrere Wochen früher als gewöhnlich schöne Pfeifen stechen.

Man giebt den Spargelländern, um sie bei Kraft zu erhalten, jährlich, meist im Frühjahr, beim Graben und Behacken eine 15 bis 18 cm tiefe, in der Nähe der Pflanzen jedoch flachere Düngung. Dieselbe braucht nur oberflächlich in die Erde gebracht zu werden, da der Spargel nur Oberdüngung verlangt. Es eignet sich hierzu jeder Dünger, doch sind Taubenmist, Abtrittsdünger, sowie alle sehr salzhaltigen Dungarten die besten.

Eine practisch vorbereitete, richtig unterhaltene Spargelanlage kann 20—25 Jahre lang einen ziemlich guten Ertrag geben, die Menge und Stärke des Spargels lässt jedoch in den letzten Jahren sehr nach. Wenn dies eintritt, so muss man zeitig auf eine Ersatzpflanzung bedacht sein. Es empfiehlt sich, in jedem Falle $\frac{1}{6}$

bis $\frac{1}{4}$ mehr Pflanzen zu kaufen, als man nöthig zu haben glaubt. Braucht man diese Pflanzen später nicht zur Ergänzung eingegangener oder schwach gebliebener Pflanzen, so kann man sie zum Treiben benutzen.

Die Sorten unterscheiden sich wenig durch Geschmack, denn dieser scheint allein vom Boden und der Cultur abzuhängen; die Farbe der Köpfe zur Zeit wo sie über dem Boden erscheinen, ist weiss, grün, röthlich oder violet. Die besten Sorten zur allgemeinen Anpflanzung sind die sogenannten Riesenspargel (Erfurter, Ulmer u. a.). Es sind dies einfach durch sorgfältige Samenauswahl im Laufe vieler Jahre vervollkommnete Sorten, deren Samen fast nur starke Spargel hervorbringt. Gut behandelt liefern dieselben Stengel (Pfeifen) von grosser Länge und Stärke, dabei durchaus zart. Eine neue amerikanische Sorte „Connover's Colossal“, zeichnet sich schon als Samenpflanze durch Grösse von anderen aus. Wir lassen dahingestellt, ob dieselbe andere Sorten an Feinheit übertrifft, jedenfalls ist sie um 2 Wochen früher als die übrigen, hört jedoch auch ebenso viel früher auf zu liefern. Der frühe grösste Spargel von Argenteuil ist eine zarte, schöne Sorte, welche den Pariser Markt füllt. In Frankreich und England lässt man die Spargel „grün“ (oder auch röthlich) werden, indem man sie erst sticht, wenn sie 3—5 cm über der Erde stehen; solcher Spargel hält sich länger zart und schmeckt kräftig, muss jedoch vorsichtig gekocht werden. Dafür sind aber auch diese Spargel nicht in ihrer ganzen Länge so zart wie die deutschen, sondern die untere Hälfte ist meist ungeniessbar.

Meer- oder Seekohl (*Crambe maritima*).

114. Der Seekohl ist kein Kohl im Sinne des Gärtners, aber ein feinschmeckendes, besonders in England geschätztes Gemüse. Es werden davon die sehr dicken, etwa 15 cm langen Blattstiele vor und in der ersten Entwicklung der Blätter im gebleichten Zustande, ähnlich wie Spargel zubereitet, genossen. Ein weiterer Vorzug dieses Gemüses ist seine Frühzeitigkeit, da man es noch vor dem Spargel aus dem Freien haben kann. Es ist allerdings ein Luxusgemüse; wer jedoch einen grösseren Garten mit geeignetem Boden hat, sollte sich den Genuss desselben verschaffen. Diese Staude bildet bis 50 cm lange, krause, dicke, harte Blätter von blaugrüner Farbe; die Blütenstengel, welche sich alljährlich im Sommer bilden, sind hoch

und dick. Die Pflanze verlangt sandigen Boden, welchen man gegebenen Falles künstlich herstellen muss. Ausser aus Samen vermehrt man sie durch Theilung der alten Pflanze oder durch Stecklinge von Seitentrieben. Wer auf letztere Art vorgehen kann, muss Anfang März vermehren und die Pflanzen-Abschnitte resp. Stecklinge sogleich an Ort und Stelle in sehr guten, bestens durchgearbeiteten Boden pflanzen, so dass eine Staude 80 cm von der andern nach jeder Richtung entfernt steht. Obwohl man schon im nächsten Frühjahr von diesen Pflanzen schneiden könnte, zieht man doch vor, dieselben noch ein weiteres Jahr erstarken zu lassen. Man säet, sobald man sich frischen Samen verschaffen kann (ohne die Hülse der Körner zu zerstören), entweder büschelweise mit 80 cm Abstand an Ort und Stelle in das Freie oder in ein lauwarmes Mistbeet. Da auch von den besten Samen mehr oder weniger nicht keimen, so säe man ziemlich dicht. Von den bei der ersteren Weise aufgegangenen Pflanzen lässt man an jeder Stelle nur die stärkste stehen, man entfernt die übrigen aber erst, wenn die Pflanzen genügend erstarkt sind, um dem Erdflor, der sie gern angreift, zu widerstehen. Die im Mistbeet ausgesäeten lässt man zum Pflanzen in das Freie ziemlich stark werden, so dass sie 4—5 Blätter haben. Man bringt auf ein breites Beet nur 2 Reihen, welche wenigstens 50 cm von einander entfernt liegen müssen; in den Reihen können die Pflanzen etwas näher beisammen stehen. Das Land muss vor dem Pflanzen oder Säen tief gegraben und gut gedüngt sein, und es wird eine Düngung mit altem Mist alljährlich im Herbst bei dem Graben wiederholt, ferner muss die Anlage durch häufiges Behacken sehr sauber gehalten werden, auch reichliches Giessen ist eine unerlässliche Bedingung zum Gelingen der Cultur. Eine starke Winterbedeckung mit kurzem Mist ist in jedem Falle von Nutzen, weil sie den Boden wärmer hält und eine Oberdüngung giebt. Die Benutzung der aus Samen gewonnenen Pflanzen beginnt erst im dritten Frühjahr. Das Bleichen wird so ausgeführt, dass man zeitig im Frühjahr jede Pflanze mit einem Topf vollständig überdeckt und diesen mit sandiger Erde, Sägespänen oder Tannennadeln etc. bedeckt, so dass das Licht durchaus abgeschlossen ist. Nach 14 Tagen muss man prüfen, wie lang die Triebe sind; die gewöhnliche Grösse ist 15 cm. Die Frühzeitigkeit hängt von der Frühlingswärme ab. Zu beachten ist, dass man im Frühling die Bedeckung nicht auf gefrorenen Boden anbringt, weil dann der Trieb verspätet wird.

Man kann auch ohne Töpfe bleichen, wenn man schon im Spätherbst die Pflanzen 20—30 cm hoch mit Sand, etc. bedeckt. An der von den jungen Trieben gehobenen Bedeckung erkennt man, dass die Stengel (Blätter) geschnitten werden können.

Um Meerkohl zu treiben, entfernt man von den Beeten die gewöhnliche Winterdecke, stellt die Bleichtöpfe darauf und überzieht das Ganze mit frischem Pferdemist, so dass die Töpfe wenigstens 15 cm stark bedeckt sind; man hat auf diese Weise schon nach einigen Wochen schneidbare Blattstiele. Man kann auch in Gewächshäusern, Mistbeeten und an andern heizbaren Orten treiben, wenn man die ganzen Pflanzen aus dem Freien dahin bringt, sie in frischen Sand pflanzt und ihnen das Licht in der oben ange deuteten Weise entzieht. Da das Bleichen dieselben schwächt, thut man wohl, sie nur ein Jahr um das andere zu benutzen. Im Herbst müssen die Pflanzen von den abgestorbenen Blättern sowie von schwachen und überflüssigen Seitentrieben befreit werden. Eine sorgsam unterhaltene Anlage kann 8 und mehr Jahre reichlich tragen.

XI. Küchenkräuter.

Unter diesem Titel vereinigen die Samenhändler nicht nur alle Zuthat- und Würzpflanzen, sondern auch einige andere Gemüsepflanzen, wie z. B. Gartenmelde, Spinat, Sauerampfer, Eierfrucht, Tomaten; von letzteren haben wir die wichtigsten bereits an anderer Stelle behandelt. Folgende den Labiaten angehörige Küchenkräuter: Basilikum, Bohnenkraut, Isop, Lavendel, Majoran, Melisse, Rosmarin, Salbei, Thymian sind zugleich gute Bienenfutterpflanzen, ebenso Boretsch.

Alant (*Inula Helenium*).

115. Der Alant ist eine ausdauernde Pflanze des freien Landes, deren fingerdicke Wurzeln in manchen Gegenden in Zucker (wie Kürbis) oder, wie Kalmus, überzuckert genossen werden, hauptsächlich aber haben sie medicinischen Werth. Dieselben schmecken angenehm aromatisch, und man hält sie für verdauungsbefördernd. Man säet den schwer keimenden Samen im Sommer, pflanzt später in guten Boden in Reihen, ziemlich weitläufig, denn die Pflanzen werden 50—70 cm hoch. Nach 2 Jahren ist die Wurzel am brauchbarsten, später wird sie hart.

Angelika oder Engelwurz (*Angelica Archangelica*).

116. Die jungen, fingerstarken Stengel und Blattstiele dieser etwa meterhoch wachsenden, ausdauernden Pflanze werden in Zucker gekocht oder candirt genossen, sie schmecken angenehm bitter und befördern die Verdauung. Die Wurzel ist officinell, der Samen wird zur Bereitung mancher Liqueurs benutzt, und im Norden isst man die Blattstiele auch als Gemüse. Man behandelt die Pflanze zweijährig und sät im Sommer (da die Frühjahrs-Aussaat erst im folgenden Jahre aufgeht) in Reihen, etwas dünner als Schwarzwurzeln, zieht die zu dicht stehenden Pflanzen aus, begiesst und düngt die Anlage öfters reichlich und benutzt die Stengel oder Blätter im zweiten Jahre. Stärkere Pflanzen erzielt man, wenn man nicht gleich an Ort und Stelle sät, sondern in Reihen von 30—40 cm Abstand verpflanzt. In dritten Jahre treiben die Pflanzen Blüthen- und Samenstengel, wonach man auf eine neue Anlage bedacht sein muss. Angelika verlangt tiefen, nahrhaften, aber nicht frisch gedüngten Boden, liebt Feuchtigkeit und gedeiht im Schatten; man kann sie auch durch Wurzelstücke vermehren.

Anis (*Pimpinella Anisum*).

117. Ausser seiner Verwendung zu Liqueurs und ätherischen Oelen dient der Anis als Würze unter Brod und feineres Backwerk. Die Pflanze ist einjährig, wird wie Dill cultivirt, verlangt aber einen lockeren, warmen und guten Boden.

Basilikum oder Basilienkraut (*Ocimum Basilicum*).

118. Man unterscheidet von dieser Annuelle die grössere und kleinere oder feinblättrige Form, die beide in der grünen und violetten Varietät vertreten sind, sowie das sehr grossblättrige oder Löffel-Basilikum. Die Blätter, welche man zur Blüthezeit der Pflanzen schneidet, dienen als Suppenzuthat und Saucenwürze. Diese Pflanze verlangt hohe Wärme, wird im Frühjahr in Töpfe oder in das Mistbeet ausgesät und warm gehalten, dann in unseren Gegenden im Mai in (meist abgeerntete) Mistbeete gepflanzt, aber im Sommer nicht unter Fenster gehalten. In warmen Theilen Süd-deutschlands kann man sie auch in das freie Land an sonnige Lagen verpflanzen. Ganz in Töpfen cultivirt, sehen die sehr wohlriechenden Basilikum besonders hübsch aus.

Bohnen- oder Pfefferkraut (*Satureja hortensis*).

119. Diese sehr wohlriechende, niedrige Annuelle ist auch unter den Namen Kölle und Saturey bekannt. Man benutzt die aromatischen, etwas beissig schmeckenden Blätter und die jungen Triebe als Würze, besonders an Bohnen und an Essiggurken. Den feinen Samen säet man erst Anfang Mai an Ort und Stelle in gute, lockere Erde und bedeckt ihn nicht oder nur sehr schwach. Man kann auch Anfang April in das Mistbeet säen und Ende Mai in das Freie verpflanzen. Wo Pfefferkraut stand, geht es meistens im Jahre darauf von selbst wieder auf.

Winter-Bohnenkraut (*Satureja montana*).

120. In gleicher Weise wie die einjährige verwendet man die perennirende Species, welche sich mehr auf dem Boden ausbreitet. Man säet im Frühjahr oder zu Anfang Herbst in Reihen von 40 cm Abstand in kräftigen, dabei nicht zu feuchten Boden. Im Frühjahr thut man wohl, die Stiele auf 10 cm Länge zurückzuschneiden.

Boretsch, Borage oder Gurkenkraut (*Borago officinalis*).

121. Das Gurkenkraut, welches von dem gurkenartigen Geschmacke und Geruche der Blätter seinen Namen hat, ist eine etwa 40 cm hohe Annuelle, mit breiten, ovalen Blättern und schönen, himmelblauen, zuweilen röthlichweissen Blüthen. In einigen Gegenden werden die jungen Blätter zu Kräutersaucen oder fein gehackt zu Salat, in anderen nur die Blumen als Salat-Aufputz benutzt. Man säet im Frühjahr oder auch im Herbst an Ort und Stelle und verdünnt nach dem Aufgang. Boretsch macht weder auf Pflege noch besonders guten Boden Anspruch, er gedeiht überall.

Chenille oder Pflanzenraupen und Schnecken.

122. Es giebt einige einjährige Pflanzen aus der Familie der Papilionaceen, deren Schoten grosse Aehnlichkeit mit verschiedenen Raupen haben. Man verwendet diese als scherzhaften, unschädlichen Aufputz von Salat und Kohl. Die Species, welche man zu diesem Zwecke anbaut, gehören der Gattung *Scorpiurus*, Raupenklee, an, es sind: *S. muricatus*, *S. subvillosus*, *S. sulcatus* und *S. vermiculatus*. Demselben Zwecke dienen auch mehrere Arten von *Medicago*, als Schnecken- und Igelsamen bekannt. Die Cultur beschränkt sich auf die Aussaat in das Land im April, am besten in Reihen; nach wenigen Monaten können die Pflanzen, welche keiner weiteren Pflege bedürfen, wie angedeutet verwendet werden.

Coriander (*Coriandrum salesium*).

123. Die Pflanze ist einjährig und nimmt mit geringem Boden vorlieb. Der Samen wird im April in Reihen von 16 cm Abstand oder breitwürfig dünn gesät. Es wird nur der Samen verwendet, und zwar zum Einnachen von Früchten und als Würze an Speisen und Zuckerwerk.

Dill (*Anethum graveolens*).

124. Der Dill ist eine bis 1 m hohe, einjährige, in allen Theilen sehr gewürzhafte Doldenpflanze mit fein zertheilten, fadenförmigen Blättern. Man benutzt: 1. die noch weichen Blätter zu Salatwürze; 2. die grünen Stengel mit den unreifen Samendolden im Juli und August zum Einnachen der Salzgurken; 3. den reifen Samen zu gleichem Zwecke, namentlich an Sauerkraut. Man sät den Dill meist im April an Ort und Stelle, vorzugsweise zwischen Möhren und andere Wurzelgewächse, oder bei grossem Bedarf und zu Handelszwecken dicht in 6—10 cm entfernte Reihen. Um aber bis zum Herbst grüne Blätter zu haben, muss man ausserdem noch ein zweites Mal im Juni säen. Wer mehrmals im Sommer Kerbel oder Spinat sät, thut am besten, einige Körner Dill darunter zu streuen. Da der Samen nach und nach reift und leicht ausfällt, so muss man die Dolden einzeln ausschneiden, sobald die Samen braun werden.

Eierfrucht (*Solanum Melongena*).

125. Dieses, in den Mittelmeer-Ländern, ferner in Amerika, China etc. sehr beliebte Fruchtgemüse, fängt an, auch bei uns bekannter zu werden. Die Sorten unterscheiden sich in der Form und Farbe. Die weissfrüchtigen (*Solanum ovigerum*) werden nicht genossen, für die Küche nimmt man fast ausschliesslich die blauen Varietäten. Die im Süden am meisten angebaute ist die lange blaue Eierfrucht, welcher die runde und riesenfrüchtige am nächsten stehen. Von derselben giebt es eine frühe und früheste Zwerg-Abart, welche in erster Linie für unsere klimatischen Verhältnisse zu berücksichtigen sein würden, falls die Eierfrüchte Eingang fänden, besonders die letztere, welche einen Monat früher als jede andere Sorte reift. Die violette von New-York und die schwarze von Peking eignen sich nur für warme Gegenden; die gestreifte Guadeloupe bringt interessante Früchte. In wärmeren Ländern ist

die Cultur dieser Pflanzen sehr einfach. In Mitteleuropa dagegen gedeihen sie fast nur bei Anwendung künstlicher Wärme. Man cultivirt sie daher entweder ganz in Töpfen oder im Mistbeet, indem man Ende Februar warm aussäet und die aufgegangenen Pflänzchen ein- oder zweimal pikirt. Wer aber über recht sonnige geschützte Lagen verfügt, sollte auch mit den frühen Varietäten im Mai ein Auspflanzen in das Freie wagen. Die Pflanzen verlangen reichliches Giessen; auch ist es rathsam, namentlich bei den Sorten mit grossen Früchten, einige derselben zu unterdrücken und die Spitzen der Zweige auszukneifen.

Erdmandel (*Cyperus esculentus*).

126. Diese kleine Staude bildet an den Wurzeln zahlreiche braune, runde und ovale Knöllchen von mehlig süßem, angenehmen Geschmack, welche man roh oder geröstet genießt. Sie dienen auch zur Vermehrung der Pflanze und werden in den Samengeschäften verkauft. Man hebt diese Knöllchen trocken und gegen Kälte geschützt bis zur Pflanzzeit im Mai auf und erntet gegen Ende October. Uebrigens kann man auch durch Theilung der alten Pflanzen vermehren. Die Erdmandel verlangt lockeren, nahrhaften Boden in sonniger Lage, zeitweiliges Giessen sowie Schutz gegen Mäuse und Maulwürfe.

Erdnuss (*Arachis hypogea*).

127. Die Erdnuss, eine niedrige, einjährige Papilionacee, gedeiht bei uns zuweilen in sehr sonniger, geschützter Lage, sicher jedoch nur im warmen Mistbeet und verlangt lockeren, leichten Boden. Man säet im März, pflanzt Anfang Mai in 20 cm Entfernung, um im Herbst die nussartigen Samen, welche sich zu zwei in jeder Schote vorfinden, zu ernten. Diese bilden sich, ähnlich wie bei den Alpenveilchen, in dem Boden aus und werden roh oder geröstet in Amerika und im Süden viel gegessen; auch liefern sie ein verschiedenen Zwecken dienendes Oel.

Esdragon (*Artemisia Dracunculus*).

128. Diese Pflanze, auch Dragun genannt, ist ausdauernd; die echte Sorte trägt bei uns keinen Samen, sondern wird sehr leicht durch Theilung der Wurzelstöcke im Herbst oder Frühjahr oder durch Stecklinge vermehrt, welche sich schon im kalten Mistbeet

bald, im Warmhaus jedoch sehr rasch bewurzeln. Die schmalen dunkelgrünen Blätter sind höchst aromatisch und liefern eins der beliebtesten Gewürzkräuter; aus denselben wird der Esdragon-Essig dargestellt. Der Esdragon gedeiht in jedem guten Gartenboden, nur bei sehr strenger Kälte wird man gut thun, die Pflanzen etwas zu bedecken. Der im Handel befindliche Samen von Esdragon wird von dem sogenannten russischen Esdragon gewonnen. Dieser hat mattgrüne Blätter und besitzt kein so kräftiges Aroma wie die deutsche Sorte. Der Samen ist im Frühjahr in Töpfe oder in das Mistbeet zu säen; wenn die Sämlinge stark genug geworden sind, pflanzt man sie in 35 cm Entfernung in das freie Land.

Fenchel, gewöhnlicher (*Foeniculum vulgare*).

129. Der gewöhnliche Fenchel ist eine wichtige, officinelle Pflanze. Im Grossen wird er hauptsächlich des Samens wegen angebaut, welcher in Mengen bei der Liqueurbereitung und zu Essenzen gebraucht, bei uns auch als Würze für Gurken, Gebäck und Schwarzbrot verwendet wird. Es ist eine harte, europäische Staude, welche jedoch als Annuelle behandelt wird, keiner besonderen Pflege bedarf und wie Dill zu cultiviren ist; sie verlangt kräftigen, lockeren Boden.

Isop (*Hysopus officinalis*).

130. Der Isop ist ein ausdauernder Halbstrauch; er gehört zu den aromatischen Pflanzen, welche Wohlgeruch mit bitterem Geschmack verbinden. Die Pflanze lässt sich leicht durch Theilung der vielstengelligen Stücke vermehren, wird jedoch meist aus Samen gezogen. Man säet mit schwacher Bedeckung im April und pflanzt später mit etwa 35 cm Abstand entweder auf Beete oder auf Rabatten, wo die Anlage 3—4 Jahre bleiben kann, ehe sie erneuert wird. Der Isop liebt trockenen Boden und warme Lagen. Man schneidet die Blätter und Stengelspitzen, wenn die ersten Blüthen sich öffnen; sie dienen als Gewürz an Speisen, auch ist die Pflanze officinell.

Kerbel oder Körbel (*Anthriscus Cerefolium*).

131. Von diesem so viel verwendeten Würzkrout unterscheidet man den gewöhnlichen, der Petersilie ähnlichen und den krausblättrigen Kerbel. Letztere Varietät ist früher und ergiebiger, verdient auch wegen ihres zierlichen Aussehens den Vorzug. Der Kerbel ist

einjährig; er bildet im Sommer schnell Blütenstengel (was man durch reichliches Giessen verzögern kann) und ist dann unbrauchbar; man muss ihn daher bis zum August wiederholt säen, jedoch nie viel auf einmal. Man sät an Ort und Stelle in das freie Land; die erste Saat wird im März und April vorgenommen, die zweite im Mai und so fort. Von Mitte August an bildet der Kerbel selten Samenstengel und überwintert grün, so dass man ihn noch im Spätherbst und zeitig im Frühling schneiden kann, wo er dann allerdings viel an seinem Aroma eingebüsst hat. Der Kerbel gedeiht überall, auch in schattigen Lagen; man sät ihn in eng stehende Reihen, um ihn leichter schneiden zu können; dies kann 6—8 Wochen nach der Aussaat geschehen. Die abgeschnittenen Pflanzen wachsen nicht nach, sondern sterben meist ab.

Grosser spanischer wohlriechender Kerbel (*Myrrhis odorata*.)

132. Die Blätter dieser weniger bekannten Staude dienen ebenfalls als Gewürz, sie haben einen anisartigen Geruch und Geschmack. Die Pflanze wird fast 1 m hoch, blüht in weissen Dolden und hält sich lange Jahre hindurch, ohne besonderer Pflege zu bedürfen. Der Samen keimt recht schwierig, der im Herbst gesäte geht erst im Frühjahr, der im Frühjahr gesäte ebenfalls erst im folgenden Jahre auf. Wenn die Sämlinge einige Blätter haben, pflanzt man an Ort und Stelle mit etwa 50 cm Abstand.

Lavendel (*Lavandula Spica*).

133. Der Lavendel, auch Spike genannt, ist ein in Europa einheimischer, sehr aromatischer Halbstrauch, welcher Büsche von etwa 50 cm Höhe bildet. Die Lavendelblätter kommen wenig in der Küche als Gewürz zur Verwendung, hingegen werden die Blüten mit kurzen Stengeln zur Parfümerie vielfach gebraucht. Auch legt man die blauen Blüten gern in Wäsche- und Kleiderschränke, was zugleich gegen Motten schützt. Obschon der Lavendel in Deutschland in warmen, trockenen Lagen gedeiht, so ist der Anbau im Grossen doch ungewöhnlich. Man zieht die Sämlinge im kalten Mistbeet oder auf einem Gartenbeet heran und verpflanzt sie später an Ort und Stelle, meistens als Einfassung. Die Anlage hält sich dann 5—6 Jahre ohne besondere Pflege; lässt die Triebkraft der Pflanzen nach, so kann man sie durch Herabschneiden der kleinen Sträucher nahe am Boden neu beleben.

Liebstock (*Levisticum officinale*).

134. Diese ausdauernde Pflanze wird 1 m hoch und hat einen sehr starken aromatischen Geruch. Man findet sie nur in einzelnen Gärten, wo sie als Vieharznei, oder als Branntweinwürze benutzt wird; auch sind die gebleichten Blattstiele geniessbar. Hauptsächlich wird der Liebstock zu Confituren verwendet. Der Samen muss im Herbst gleich nach der Reife in das Land gesäet werden. Man verpflanzt noch im Herbst oder im Frühjahr und giebt den Sämlingen einen Abstand von 50 cm. Der Liebstock, auch Liebstöckel genannt, gefällt sich in kräftigem, tiefen Boden und schattiger Lage. Die Pflanzung hält sich einige Jahre, besonders wenn es ihr nicht an Wasser und zeitweiliger Oberdüngung mangelt.

Majoran (*Origanum Majorana*).

135. Die getrockneten Blätter des Majoran spielen in Deutschland bekanntlich eine grosse Rolle bei der Wurstfabrikation, wesshalb man die Pflanze bei uns mehr als in andern Ländern anbaut. Die Spitzen der jungen Triebe dienen ausserdem als Würze, auch ist das Gewächs officinell. Es ist eine buschigwachsende, ganz niedrige Staude, welche jedoch allgemein als Sommergewächs behandelt wird; die zahlreichen Stengel sind voll mit rundlichen, graugrünen Blättern besetzt. Man schneidet die Stengel, sobald eine Knospenbildung sichtbar wird. Im Süden säet man den Majoran an Ort und Stelle, bei uns wird der Samen gegen Ende März dünn, am besten stark mit Sand vermischt, in ein mässig warmes Mistbeet oder in das Freie auf ein recht warm gelegenes Beet gebracht und schwach bedeckt, bis zum Keimen feucht gehalten, später nur mässig begossen. Fällt die Saat zu dicht aus, so müssen die Pflanzen verdünnt und in ein anderes Mistbeet pikirt werden. Zum Hausbedarf genügt eine Aussaat im Topfe. Bei dem Auspflanzen im Mai erhalten die Reihen 15 cm, die Pflanzen in den Reihen 10 cm Abstand. Säet man den M. in das Freie, so werden die Reihen verdünnt. Die Ernte fällt in den Monat Juli; das Land kann dann noch weiter benutzt werden. Man kann auch im Mai in ein kaltes Mistbeet säen und im Juli pflanzen. Der Majoran verlangt guten, lockeren, nicht frisch gedüngten Boden.

Perennirender oder Winter-Majoran (*Origanum vulgare*).

136. Die Cultur dieser harten Staude, welche etwa 50 cm hoch wird und deren Blätter als Speisewürze dienen, erfordert keinerlei

Mühe; nur ist eine sehr vorsichtige Aussaat durch den feinen Samen geboten. Man säet im Frühjahr oder Herbst und verpflanzt an Ort und Stelle; die Pflanze wächst in jedem Boden.

Citronen-Melisse (*Melissa officinalis*).

137. Die Melisse wird als Würzkraut angebaut, ausserdem sind die Blätter hauptsächlich für die Liqueur- und Essenzenfabrikation von Bedeutung. Es ist eine Staude von etwa 50 cm Höhe, vielstengelig, reich mit grossen, rundlichen Blättern besetzt. Die Vermehrung geschieht meistens durch Theilen der alten Stöcke im Frühjahr oder Herbst, oder auch durch Samen. Dieser wird im kalten Mistbeet oder im Garten im Frühjahr oder Herbst ausgesät, worauf man die Pflanzen mit 25—30 cm Abstand an Ort und Stelle, auf Rabatten oder als Einfassung, bringt.

Die Melisse fürchtet die Kälte, besonders wenn die Wurzeln in feuchten Untergrund kommen; man wähle daher vorzugsweise einen gesunden, durchlassenden Boden in warmer Lage. Die Blätter werden im Juni und Herbst geschnitten.

Minze (*Mentha*).

138. Die verschiedenen Minze-Arten, welche sich im Handel befinden und als Gewürz und officinelle Pflanzen, sowie zur Bereitung von ätherischen Oelen und Essenzen zum Theil unentbehrlich sind, geben nur selten Samen und werden durch Pflanzentheilung oder Wurzelausläufer vermehrt. Hierher gehören *Mentha crispa*, Krauseminze, *M. piperita*, Pfefferminze, *M. Pulegium*, Polei, und die in England zur Darstellung der Mint-Sauce dienende *M. viridis*. Sie sind sämmtlich ausdauernd, verlangen feuchten, humusreichen Boden, öfteres Verpflanzen, reichliches Giessen und wiederholte Oberdüngung. Das gemeine Katzenkraut (*Nepeta Cataria*), auch Katzenminze genannt, welches leicht aus Samen zu ziehen ist, wird ebenfalls in der Küche verwendet.

Petersilie (*Apium Petroselinum*).

139. Jeder kennt dieses unentbehrliche Würz- und Suppenkraut, wie auch dessen Werth als Zierde so vieler Schüsseln. Die gewöhnliche Petersilie ist die billigste Sorte, dieselbe sieht aber unserem so giftigen Garten-Schierling, Hundspetersilie oder Gartengleisse (*Aethusa Cynapium*), so ähnlich, dass man schon aus diesem

Grunde nur die gefüllten, d. h. krausblättrigen Sorten anbauen sollte, welche ebenso aromatisch und durch ihre zierlichen Blätter viel decorativer sind. Wir empfehlen die gewöhnliche gefüllte oder krause und besonders die spanische feingekrauste Zwerg-Petersilie. Aeusserst zierend ist auch die farnblättrige Sorte. Von der grossblättrigen neapolitanischen Riesen-Petersilie sind auch die gebleichten Blattstiele zu geniessen; zu diesem Zwecke muss man die Pflanze in gleicher Weisse wie Bleichsellerie behandeln. Man säet die Petersilie von Frühjahrsanfang bis zum Herbst in Reihen von 15—20 cm Abstand, nicht zu dicht. Die Saat muss anfangs sehr nass gehalten werden, wie man auch bei Trockenheit durch starkes Begiessen den Ertrag fördert, welcher dadurch noch erhöht wird, dass man nicht zu viele Blätter, sondern nur die einzelnen best entwickelten auf einmal von jeder Pflanze schneidet. Ausser Behacken und Jäten hat man zuweilen die ältesten Blätter abzuschneiden. Die Petersilie liebt guten, gedüngten Boden; die Blätter sind gegen strenge Kälte empfindlich. Für den Winterbedarf bedeckt man entweder im Sommer ausgesäete Pflanzen mit Mistbeetfenstern, oder man hebt grosse gesunde Stöcke (die Petersilie ist zweijährig) aus, um sie im Gewächshaus oder Mistbeet anzutreiben, oder um sogenannte Petersilientöpfe damit zu bepflanzen.

Spanischer Pfeffer (*Capsicum annuum*).

140. Diese Pflanze, auch unter dem Namen Piment-Pfeffer und Paprika bekannt, wird in nördlichen Gegenden besonders an Pickles und Pfeffergurken benutzt, während in Südeuropa die Früchte auch als Gewürz dienen, und die der grossen Sorten, welche die milderen sind, wie Eierfrucht zubereitet werden. Von dieser einjährigen Pflanze sind viele, an Grösse, Form und Farbe der Schotenfrucht sehr verschiedene Varietäten entstanden. Die Farbe der Frucht ist zuerst stets grün, bevor sie in gelb, roth oder schwarzblau übergeht. Die Grösse wechselt von der einer Kirsche bis zu 8 cm Länge bei den rundlichen und bis zu 20 cm bei den langfrüchtigen Sorten; die grössten langen Sorten haben am Stiele bis 8 cm Durchmesser. Die am schärfsten schmeckende Sorte ist der rothe Cayenne-Pfeffer, welcher nur reif verwendet wird und auch getrocknet in den Handel kommt.

In heissen Ländern zieht man den Pfeffer ganz im Freien, säet ihn im März in das freie Land, um ihn später zu verpflanzen.

Aber schon im südlichen Frankreich säet man zur grösseren Sicherheit in das Mistbeet. Bei uns muss er unbedingt in Töpfen oder im warmen Mistbeete (wie Eierfrucht) ausgesäet, dann entweder in diesen weiter cultivirt oder im Mai an die wärmste Stelle des Gartens, mit etwa 40 cm Abstand, gepflanzt werden. Wer indessen blos grüne Schoten der gewöhnlichen Sorte mit rother langer Frucht zum Einmachen in Essig ziehen will, kann dies ohne grosse Mühe durch Auspflanzen in das Freie erreichen. Ein grosser Theil der Pfeffer-sorten eignet sich vorzüglich als Zierpflanzen zur Topfcultur.

Garten-Pimpinelle (*Poterium Sanguisorba*).

141. Die Garten-Pimpinelle ist die durch Cultur verbesserte gewöhnliche Pimpinelle oder Pimpernelle, eine niedrige, bei uns einheimische Staude, welche auf Bergwiesen in der Grasmischung ein vorzügliches Viehfutter liefert. Sie ist kleinblättriger und niedriger als diese, bildet auch kleinere Samen. Man benutzt davon die jungen, gurkenartig schmeckenden Blätter, welche, nachdem man die niedrigen Blüthenstengel abgeschnitten, immer nachtreiben. Sie werden fein gehackt als Salatwürze und zu Kräutersaucen vielfach benutzt. Man säet den Samen im März und April oder im Herbst sogleich in das Land an Ort und Stelle, meist als Einfassung, breitwürfig oder in Reihen von etwa 30 cm Abstand.

Portulak (*Portulaca oleracea*).

142. Der Portulak, eine ganz niedrige, sich am Boden ausbreitende Annuelle, ist ein beliebtes Suppenkraut, dessen dicke, kurze, fleischige Blätter auch als Gemüse und Salat dienen können. Er verlangt einen warmen Standort, wird aber vom Mai bis August sehr dünn und ohne Bedeckung gleich in das Freie gesäet, nur mit dem Rechen eingekratzt, dann getreten oder geschlagen. Man kann auch in den Wintermonaten im warmen Mistbeet aussäen. Durch wiederholtes Giessen verlängert man die Production der Pflanzen und kann dann mehrmals schneiden. Es giebt grün- und gelbblättrigen Portulak, ferner die gelbe Sorte mit breiten Blättern; letztere scheint die beste für Gemüse zu sein.

Rosmarin (*Rosmarinus officinalis*).

143. Wo der Rosmarin wild vorkommt, z. B. auf den Seealpen, bildet er einen Halbstrauch. Bei uns wird diese officinelle

Pflanze, deren Blätter als Speisewürze dienen können, mehr zur Zierde gezogen und muss frostfrei durch den Winter gebracht werden. Man säet in ein warmes Mistbeet oder in Töpfe unter Glas und verpflanzt in kleine Töpfe. Wer eine besonders geschützte, sonnige Stelle im Garten hat, sollte versuchen, die Pflanzen im Freien zu überwintern, wo sie dann lange Jahre hindurch benutzt werden könnten.

Salbei (*Salvia officinalis*).

144. Der (die) Gartensalbei wird in vielen Küchen gebraucht, kann Bohnenkraut ersetzen und wird an Kräuternessig und Braten benutzt. Der Salbei ist ein Halbstrauch, der sich in milden Wintern grün hält, sonst aber aus der Wurzel treibt. Bei der Cultur im Grossen kann man den Samen weitläufig drillen, meistens säet man jedoch entweder in eine geschützte Lage im Freien oder in das Mistbeet, bei geringem Bedarf sogar in Töpfe, hält die Aussaat feucht und verpflanzt später. Die Pflanzen kommen in Reihen oder dienen als Einfassung; sie lieben einen warmen trockenen Standort und verlangen keine Pflege.

In Frankreich werden auch die Blätter der Muskatellersalbei (Scharlachkraut) *Salvia Sclarea*, an manchen Orten als Speisewürze und als Weinzusatz benutzt. Diese Pflanze wird als Biennale behandelt: im April ausgesät und im Mai an Ort und Stelle gepflanzt.

Senf, gelber und brauner (*Sinapis alba* und *S. nigra*).

145. Die Samen dieser Annuelle finden bekanntlich in der Küche die vielfachste Verwendung. Der gelbe Senf nimmt mit jedem, nur nicht zu mageren Boden vorlieb, während der braune feuchtes, tiefgrundiges Terrain beansprucht, daher in Holland mit Erfolg angebaut wird. Man säet in sonnige Lagen im April in Reihen von 25 cm Abstand. Sind die Pflänzchen etwas stark geworden, so werden sie, wo sie zu dicht stehen, auf eine Entfernung von 6 cm verdünnt. Im Sommer muss man öfters behacken.

Thymian (*Thymus vulgaris*).

146. Der Gartenthymian ist ein ganz niedriger Halbstrauch, welcher viel als hübsche Einfassung gezogen wird. Man benutzt, abgesehen von der officinellen Verwendung der Pflanze, die Stengelspitzen mit den sehr kleinen, schmalen Blättern als Speisewürze.

Der feine Samen wird im April auf ein geschütztes Beet oder in das Mistbeet gesäet und mässig feucht gehalten; im Juni werden die jungen Pflanzen an Ort und Stelle gebracht; sie brauchen nur 10 cm Abstand von einander. Im Süden säet man in das freie Land und verdünnt nach dem Aufgang. Man gebe den Pflanzen guten Boden und eine sonnige Lage; sie lassen sich übrigens auch durch Theilung und durch Stecklinge vermehren. Alle 2 Jahre erneuert man die Anlage. Es befinden sich zwei Sorten Thynian im Handel: der französische und der deutsche; ersterer ist der kleinblättrige, zartere, er erträgt unseren Winter nicht gut, ist aber höchst aromatisch.

Tomaten oder Liebesapfel (*Solanum Lycopersicum*).

147. Früher wurden die Tomaten bei uns nur als Zierpflanzen cultivirt, sie verbreiten sich aber jetzt mit Recht in weitere Kreise und kommen bereits an vielen Orten Deutschlands und Oesterreichs auf den Markt. Im südlichen Europa, und noch weit mehr in Amerika, herrscht ein Bedarf an Tomaten, von welchem man sich bei uns keine Vorstellung macht. Sie werden, abgesehen von der bei uns bekannten Verwendung als Gemüse, zu Saucen und Conserven, dort noch in den verschiedensten Formen genossen, so z. B. als Salat, geröstet und nicht am wenigsten im rohen Zustande. Es giebt eine Menge Sorten; die Früchte sind lachsroth, rosa, scharlach, carmoisin, hell- und dunkelgelb, orange, auch weiss und violet. Die Form derselben ist sehr verschieden; die glatten, apfel-, birn- oder pflaumenförmigen Tomaten werden jedoch den gerippten vorgezogen. Auch die Grösse schwankt ungemein, es giebt Früchte von der Grösse einer Kirsche und solche, die 1 Kilo und mehr wiegen.

Der Anbau war bei uns noch deswegen kein allgemeiner, weil in kühlen Sommern die Früchte nicht gut zu reifen pflegten, es giebt indessen jetzt eine Reihe sehr früher, vortrefflicher Sorten, welche auch in unserem Klima bei sorgsamer Cultur nur selten missrathen. Wir verweisen hierfür auf gute Samenverzeichnisse und rathen jedem Liebhaber, durch Versuchsanbau die für seine Verhältnisse geeignetsten Sorten auszufinden.

Die Tomate ist einjährig; sie ist sehr empfindlich gegen Frost, darf daher bei uns erst Ende Mai ausgepflanzt werden. Man säet gegen Ende März in warmes Mistbeet und pikirt nach 3—4 Wochen ebenfalls in das Mistbeet, in Holzkästen oder Töpfe. In letzterem

Falle lässt man beim Auspflanzen die kleinen Erdballen an den Sämlingen. Je nach den Sorten giebt man ihnen 35—75 cm Abstand; je weiter und freier die Pflanzen stehen, desto besser ist der Erfolg, weil sie dann nicht so sehr „in's Kraut“ wachsen. Natürlich wählt man den Platz möglichst sonnig für die Pflanzung; die Tomaten lieben humusreichen, lockeren Boden und verlangen in unserem Klima bei heissem Wetter reichliches Giessen. Sobald die Pflanzen etwa 40 cm hoch sind, muss man sie aufbinden. Dies geschieht entweder an einem Stabe oder am zweckmässigsten, indem man ein kleines Holzgitter aus einigen Stücken hinter jeder Pflanze herstellt, an welchem die Zweige, ähnlich wie bei dem Spalierobst, befestigt werden. Mit dieser Culturmethode kann man auch bei uns sehr schöne Resultate erzielen, besonders wenn man nicht alle Früchte sich entwickeln lässt, sondern einige Triebe beim Entstehen ausschneidet. Im August reifen die ersten Früchte, die dann noch vorhandenen Blüthen werden ebenfalls entfernt. Die bei Eintritt der Fröste noch unreifen Tomaten werden mit den Stengeln abgeschnitten; man lässt sie in warmen Räumen nachreifen.

Es liegt nahe, die Tomaten von Anfang bis Ende im Mistbeet zu ziehen; wegen der grossen Blatt- und Stengelbildung ist dies jedoch nur denen vergönnt, welche über sehr tiefe Kästen verfügen. Im Süden werden die Tomaten auch getrieben und zu diesem Zwecke ganz im Mistbeet cultivirt. Man säet hierfür im Januar oder sogar im Herbst aus, pikirt ein- oder zweimal und bringt dann je 4 Pflanzen unter ein Fenster, deren jede man nur 2—3 Hauptzweige bilden lässt; das Mistlager darf hierbei nie erkalten. Bei dieser Cultur kann man im April reife Tomaten ernten.

Waldmeister (*Asperula odorata*).

148. Der Waldmeister ist eine niedrige, bei uns einheimische Waldstaude, welche bekanntlich zur Bereitung des „Maiwein“ dient. Sie wird hierfür auch in Gärten gezogen und gedeiht, wenn ihr die Bedingungen des natürlichen Standortes im Laubwalde geboten werden. Diese sind frischer Blätterhumus und Schatten. Die Anzucht aus Samen ist am einfachsten, nur liegen dieselben lange, bis sie keimen. Um eine Pflanzung anzulegen, genügt ein Quadratmeter Boden, welchen man mit halberdigem Laub, mit grober Holzerde oder mit frischer Haideerde, 10 cm hoch mit Sand vermischt, anfüllt; darüber bringt man 1 cm gesiebte Haideerde oder

sandige Lauberde und schlägt das Ganze fest. In dieses Beetchen macht man entweder flache Rinnen oder Löcher und legt jedesmal einige Körner, 3 cm entfernt und etwa 1 cm tief. Dies geschieht am besten im Herbst. Hierauf deckt man das festgeschlagene Beet mit halbverfaultem Laub oder mit Moos. Von April an sieht man zuweilen nach, ob die Samen keimen; dann verdünnt man erst die Laubdecke und legt endlich nur noch Fichtenreisig oder feines Gezweig locker darüber; die Pflanzen bleiben an Ort und Stelle. Ausser Begiessen und Jäten ist nichts zu thun, und es darf auch nicht behackt werden. Im folgenden Herbst deckt man wieder Laub oder Moos auf die Anlage. Im Frühling stehen die Pflanzen schon enger, und es verfilzen sich in wenigen Jahren die Wurzeln und Stengel zu dichtem Rasen.

Raute oder Weinraute (*Ruta graveolens*).

149. Diese officinelle Pflanze, ein $\frac{1}{2}$ m hoch wachsender Halbstrauch mit zierlichen, gefiederten, blaugrünen Blättern, wurde früher sehr viel als Speisewürze gezogen, wozu sie jetzt kaum noch benutzt wird. Die Blätter schmecken scharf, etwas bitter und sind übelriechend. Man sät im Frühjahr oder Herbst, entweder in das Mistbeet oder auf ein Saatbeet im Freien und verpflanzt später. Die Weinraute, welche lange Jahre stehen bleiben kann, dient am besten als Einfassung. Die Pflanze liebt kräftigen Boden und warme Lage, bedarf im übrigen keiner Pflege; sie kann auch durch Theilung vermehrt werden.

Wermuth (*Artemisia Absinthium*).

150. Diese ausdauernde Pflanze dient weniger zum Küchenkraut, als vielmehr zur Bereitung von Essenzen, Liqueurs und der meisten bittern Branntweine, besonders zur Darstellung des in Frankreich so bekannten Absinth. Man benutzt die Blätter der zum Blühen vorgeschrittenen Pflanze. Die Vermehrung geschieht durch Theilung oder aus Samen. Die Behandlung ist die für die Weinraute angegebene, nur muss man den Wermuth in eine geschützte, dabei sonnige Lage bringen, da er bei strenger Kälte leidet.

Es sei hier noch der gewöhnliche Beifuss (*Artemisia vulgaris*) erwähnt, welcher sehr selten in der Küche, besonders officinell verwendet, aus Samen vermehrt und ganz wie Wermuth behandelt wird.

Erdbeeren.

151. Bekanntlich vermehrt man die Erdbeeren fast immer durch die Ausläufer, welche während der Blüthezeit entstehen, sich im Sommer weiter entwickeln und an ihren Endpunkten Pflanzen bilden. Diese Art der Fortpflanzung ist bei weitem die einfachste, schnellste und sicherste, da man die bewurzelten Pflänzchen nur im Spätsommer abzuschneiden und in gut durchgearbeitetes, stark gedüngtes Land zu bringen braucht, um sich im nächsten Jahre einer ergiebigen Erdbeer-Anlage zu erfreuen.

Erdbeeren aus Samen zu erziehen, ist indessen eine angenehme, lehrreiche Beschäftigung, und neue Sorten können natürlich nur auf diese Weise gewonnen werden. Soll das Resultat lohnen, d. h. will man Erdbeeren erzielen, welche die Muttersorten an Vollkommenheit übertreffen, so verwende man vor allen Dingen nur Samen von vorzüglich bewährten Varietäten oder solchen, welcher aus interessanten Befruchtungen hervorgegangen ist. Da die Erdbeersamen sehr hart sind, so empfiehlt es sich, sie einen Tag lang in lauwarmes Wasser zu legen und dann zwischen Sand anschwellen zu lassen. Man säet im März in ein mässig warmes Mistbeet oder auch in ein flaches Saatgefäss in leichte, durchgesiebte Erde und hält das Mistbeet geschlossen, eher feucht als trocken. Nach dem Aufgang pikirt man die zu dicht stehenden Pflanzen und hält sie nach dem Anwachsen luftiger, um sie im Mai wie andere Erdbeeren in das Land zu pflanzen, und zwar die Ananas- oder grossfrüchtigen Sorten mit 35—40 cm, die Monatserdbeeren mit 20—25 cm Abstand, als Einfassung noch enger. Für letztere ist übrigens die Vermehrung durch Aussaat besonders zu empfehlen, da sie treu aus Samen kommen. Für die weitere Behandlung der Samenpflanzen gelten die allgemeinen Regeln der Erdbeercultur. Sie lieben einen tiefgrundigen durchlassenden, nahrhaften, frischen Boden, und es kann durch richtige Bearbeitung und Zufuhr von Dünger jede Bodenart dazu geeignet gemacht werden. Auf leichtem Boden empfiehlt sich eine Bedeckung mit kurzem Mist. Erdbeeren scheuen Zugwind sowie jede stagnirende Feuchtigkeit, auch im Winter, bei Trockenheit ist jedoch reichliches Begiessen unerlässlich, namentlich wenn die Erdbeeren zu blühen anfangen, sonst erzielt man weder viele noch grosse Früchte. Die Ausläufer werden sorgfältig abgeschnitten, bis auf diejenigen, welche man zur Vermehrung benutzen will. Von Ende August an tragen von den Frühjahrssäm-

lingen bereits die Monatserdbeeren, während die grossfrüchtigen Sorten erst im folgenden Jahre liefern. Wenn man bei letzteren unter die sich dicht über der Erde entwickelnden Früchte Brettschen, Glas- oder Schieferstücke legt, so erzielt man saubere, schöne Exemplare.

Wir bemerken noch in Bezug auf Erdbeersämlinge, dass die erste Jahresernte nicht genügt, um den Werth einer Frucht festzustellen; man muss also jede Sorte wenigstens zwei Jahre hinter einander prüfen. Die Erdbeeranlagen tragen ausgiebig nur 2 bis 3 Jahre.

Das Treiben der Erdbeeren geschieht vom Herbst an im Gewächshaus, warmen oder heizbaren Mistbeetkasten; die Pflanzen werden zu diesem Zwecke in Töpfen herangezogen.

Champignon (*Agaricus edulis*).

152. Obgleich bei der Champignon-Cultur von Aussaat nicht gesprochen werden kann, halten wir es doch für angemessen, unsere Erfahrungen über diesen interessanten Gegenstand desshalb mitzutheilen, weil der Liebhaber so oft Misserfolge zu beklagen hat. Wir können nicht daran denken, alle die verschiedenen Methoden, welche man anwendet, zu beschreiben, vielmehr beschränken wir uns darauf, diejenige anzugeben, bei welcher wir bisher sehr günstige Resultate erzielten. Sie bietet keine grossen Schwierigkeiten, und der Erfolg ist bei genauer Beobachtung der gegebenen Anweisungen ziemlich sicher.

Der Champignon zeigt sich in einem grossen Theile des gemässigten Europa im Spätsommer und Herbst, bei feuchtwarmer, nicht nasskalter Witterung meist truppweise auf abgeweideten Wiesen und Triften, obschon er auch in Wäldern und an anderen Orten vorkommt. Immer lässt sich jedoch an den Stellen, wo er auftritt, natürliche, animalische, verrottete Düngung des Bodens nachweisen. Dieses natürliche Vorkommen giebt die Fingerzeige für die künstliche Anzucht. Es ist dabei zu berücksichtigen: die Lokalität, der Nährboden, die Temperatur und der Feuchtigkeitsgrad. Alle Räume, welche eine gleichmässig warme Temperatur von durchschnittlich 9—18° R. haben, eignen sich zu dieser Cultur, vorausgesetzt dass sie möglichst geschlossen und nicht zu hell sind. Scharfer Luftzug ist sehr schädlich. Versteckte Orte im Freien, nicht zu feuchte und dumpfe Keller und Höhlen

(die berühmten, lucrativen Pariser Culturen werden in alten Steinbrüchen betrieben), Viehställe, Souterrains und Gewächshäuser bieten passende Gelegenheit zum Anbau. Wenn eine Heizvorrichtung zu Gebote steht, um nöthigenfalls die Temperatur zu erhöhen, was zur Zeit des Durchbruches der jungen Pilze aus dem Brutnest ebenfalls von grossem Nutzen ist, oder um der Luft bei vorherrschender Trockenheit mehr Feuchtigkeit in Gestalt von Wasserdämpfen zuzuführen, so ist noch grössere Aussicht auf Erfolg. Für die Anzucht im Grossen haben sich eigene Champignonhäuser als sehr nutzbringend erwiesen. Auf dem Fussboden dieser Räume, oder auch behufs grösserer Ausnutzung auf etagenweise erbauten Stellagen, wird nun das Lager mit dem Nährboden gefertigt. Dieser besteht in der Hauptsache aus Pferdemist, welchen der Pilz bevorzugt. Der Pferdemist, welcher weder zu nass noch zu frisch sein darf, damit er nicht in Fäulniss übergeht, wird gut mit der Gabel durchgearbeitet, um das allzulange und trockne Stroh, sowie andere ungehörige Gegenstände zu entfernen und an einem trocknen Ort auf Haufen, deren Grösse sich nach dem Bedürfnisse richtet, in fester Schichtung meterhoch in quadratischer Form aufgesetzt. Sollte der Mist zu trocken sein, so muss er dabei etwas angefeuchtet werden. Bei günstigem Wetter ist er schon nach 8 Tagen gekocht und zeigt innen weisse Stellen; er wird alsdann nochmals umgearbeitet, wobei das Aeussere nach innen gebracht und er gleichzeitig wieder auf die nöthige Feuchtigkeit geprüft wird. Nach weiteren 8 Tagen hat der Mist die rechte Milde (er fühlt sich dann etwas fettig an), ist ohne Stall- und Fäulnissgeruch und gerade so feucht, dass er sich zusammenkneten lässt, ohne von Nässe zu tropfen. Regnet es etwa in der Zwischenzeit darauf, so wird dadurch häufig der Mist unbrauchbar, die Anlage jedenfalls verzögert, denn es muss eventuell der Haufen nochmals umgesetzt werden. Dabei geht aber gewöhnlich dem Mist die zur Produktion nöthige Kraft verloren. Es empfiehlt sich daher, das Mistlager zu bedecken. Mist von Arbeitspferden, welche in Trockenfutter stehen, wird dem von Luxuspferden vorgezogen, ebenso gut ist der von Eseln und Mauthieren. Solcher von kranken Thieren setzt das Gelingen der Cultur in Frage und erzeugt Krankheiten im Pilzlager.

Hat nun der Mist die gehörige Beschaffenheit erlangt, so wird er an Ort und Stelle gebracht, und es werden Beete aus ihm gebildet. Er wird auf das Gleichmässigste, am besten mit den

Händen, und zwar sehr fest, zusammengeschichtet, in Höhe von 50 bis 60 cm und beliebiger Breite, bei freistehenden Beeten so, dass die Mitte etwas gewölbt ist, um das ungleichmässige Eindringen des Giesswassers zu verhindern. An kalten und offenen Orten macht man noch einen Mantel von Stroh darum und lässt so das Beet einige Tage stehen. In sehr trocknen und luftigen Räumlichkeiten ist es gut, die Beete mit einer Brettereinfassung zu umgeben, auch eine Vorkehrung zu treffen, sie mit Brettern decken zu können, welche aber 15 cm von der Oberfläche des Beetes entfernt bleiben. Wenn der erste Dunst vorüber, wird das Beet mit Brut besetzt.

Bevor wir aber hierauf eingehen, wollen wir eines in England üblichen Verfahrens gedenken, welches sich darauf gründet, eine langsamere und anhaltendere Fermentation des Pferdemistes bei gleichzeitiger Anlage des Schwämme liefernden Beetes zu erreichen. Zu diesem Zwecke wird der Mist mit $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ altem Wiesenlehm (lehmige Rasenerde) untermischt, so dass er sich nicht stark erhitzen kann. In diese Mischung werden die Schwammsporen (Brut) ohne weitere Vorbereitung eingesetzt, nachdem das Beet eine gleichmässige Wärme von etwa 20° R. bekommen hat. In Deutschland verfahren manche Gärtner ähnlich, indem sie den frischen Mist sogleich (ohne das beschriebene Umsetzen) in die Zuchtkästen bringen, festschlagen, mit Brettern oder Strohmatten bedecken und mit Champignonbrut füllen, wenn er sich bis auf 20° abgekühlt hat.

Champignonbrut (Blanc de Champignon) nennt man diejenigen Fladen von Mist, welche aus Champignonbeeten und zwar aus solchen Stellen entnommen sind, an denen sich der eigentliche Pilz noch nicht gebildet hatte, und welche von weissen Fäden (den Pilzkeimen, Mycelium) durchzogen sind. Diese Pilzfäden besitzen die Eigenschaft, in trockenem Zustande jahrelang ihre Wachsthumfähigkeit zu bewahren, bis sie in ihnen zusagenden Verhältnissen wieder aufleben und wachsen. Von dieser Champignonbrut, welche sich in loser und gepresster (Backstein-)Form im Handel befindet, wird nun in kleine, 5 cm breite und tiefe Oeffnungen in geregelten Abständen von 20 zu 20 cm Entfernung so viel in das Beet eingebracht, dass die Oeffnungen damit ausgefüllt sind, um sie darauf mit etwas Mist ganz zu schliessen. Wieder bleibt dann das Beet wie vorher einige Tage stehen, um nach Ablauf dieser Zeit ca 3 cm

hoch gleichmässig mit mürbem und durch ein Erdsieb geworfenen sandigen Lehm (am besten von alten Baustätten) überzogen zu werden, über welchen schliesslich noch eine ganz schwache Decke von leichter, nahrhafter, von allen Fäulniss erregenden und fremden Bestandtheilen freier Composterde kommt. Diese Lehmdecke sichert dem Beete die milde Feuchtigkeit und Wärme. In den wenigsten Fällen braucht das Beet sogleich, und nur bei anhaltend trockenem Wetter oder bei bewirkter Heizung danach begossen zu werden, was stets vorsichtig, unter Anwendung von etwas erwärmtem Wasser und mit der Brause gleichmässig geschehen muss. Beide Extreme: zu grosse Trockenheit sowie übermässige Feuchtigkeit sind sehr schädlich und müssen durchaus vermieden werden. Man kann sich überzeugen, ob die Brut gedeiht, indem man vorsichtig in den Mist ein kleines Loch macht. Schon nach kurzer Zeit sieht man da oft, wie die weissen Fäden sich ausgebreitet haben und das Beet durchwachsen. Wäre dies auch nach längerer Zeit nicht der Fall und es zeigten sich statt frischer, weisser Fäden die eingelegten Brutstücke braun, so ist die Anlage meist als misslungen zu betrachten, und versuchsweise nochmals mit frischer Brut zu besetzen. Jene Fäden sind sehr empfindlich gegen Störung; sie sind die eigentlichen Pflanzen, der an der Oberfläche erscheinende Pilz ist als Blüthenzustand zu betrachten. Bis diese Blüthen und somit die Ernte erscheinen, vergehen gewöhnlich 4—6 Wochen nach Einbringen der Brut. Fast so viele Monate hält die Ernte vor, und es kann ein Beet von 5 □ Meter bis 100 Kilo junge, etwas über wallnussgrosse Champignons ergeben, in welcher Form sie am liebsten in der Küche verwendet werden. Lässt man die Pilze sich voll entfalten, so werden sie weniger schmackhaft, zehren auch das Beet unverhältnissmässig rasch aus und beeinträchtigen so dessen Ertragsfähigkeit. Die Pilze werden nicht aus der Erde gezogen, weil sonst das Mycelium verletzt würde, sondern vorsichtig dicht über der Erde abgedreht oder geschnitten. Kommen auf einmal mehr Schwämme als man braucht, so verdoppele man für einige Zeit die Erdbedeckung, auch kann man die Entwicklung durch aufgelegte Bretter, Dachziegel, Schieferplatten etc. etwas zurückhalten. Die Beete sind reinlich, frei von wilden Pilzen und von Ungeziefer zu halten. Schnecken muss man absuchen, Kellerwürmer in ausgehöhlten Kartoffeln, Kohlrabi oder dergleichen fangen.

Selten angebaute Gemüsepflanzen.

Wir begreifen darunter verschiedene Pflanzen, von welchen Samen im Handel ist; theils solche, welche nicht mit vollem Recht unter die bisher besprochenen Gruppen gebracht werden konnten, theils andere, deren Verwendung in der Küche bei uns entweder unbekannt ist oder sich auf sehr vereinzelte Gegenden beschränkt. Hierbei machen wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

153. **Amarantus oleraceus.** Diese Fuchsschwanz-Art findet sich unter dem Namen Chinesischer Spinat in einigen Verzeichnissen; die Blätter liefern ein gutes Spinatgemüse. Man sät entweder an Ort und Stelle in das Freie oder in das Mistbeet. In letzterem Falle pflanzt man erst Ende Mai aus, da die Pflanze Kälte fürchtet, und giesst im Sommer reichlich.

154. **Basella rubra und alba,** Rankenspinate. In Süd-Asien und China werden diese beiden Pflanzen geschätzt; sie gedeihen auch bei uns in warmen Lagen und liefern ein wohlschmeckendes Spinatgemüse. Dieselben sind zweijährig, man cultivirt sie jedoch als Annuellen. Sie werden bis 2 m hoch, so dass man sie entweder an eine Mauer bringt oder an Stangen resp. Reisern zieht. Man sät im März in das Mistbeet und pflanzt Mitte Mai auf guten, lockeren Boden und in möglichst sonnige Lage, wobei man den Pflanzen 50—60 cm Abstand giebt. Man kann dann die grossen, fleischigen Blätter den ganzen Sommer hindurch pflücken.

155. **Blitum capitatum,** Erdbeerspinat. Hier und da wird wohl diese Annuelle als Spinatpflanze gezogen, doch ist ihr ein besonderer Werth als solche nicht zuzusprechen; die erdbeerartigen Früchte schmecken gezuckert nicht übel. Sie wird hauptsächlich als Zierpflanze cultivirt (siehe nächste Abtheilung).

156. **Brassica chinensis,** Pak-Choi und Pe-Tsai. Nach ihrem Aussehen würde man diese Pflanzen nicht für Kohle, sondern erstere eher für Mangold, letztere für römischen Salat halten. Die Blätter wie auch die weissen Blattrippen derselben werden als Gemüse gegessen. Um zu verhindern, dass sie bei ihrem schnellen Wachsthum Samenstengel bilden, sät man erst im Sommer und zwar in Reihen von 45 cm Abstand. Die Pflanzen werden dann gehörig verdünnt und liefern bereits im Herbst grosse schöne Blätter.

157. **Bunias orientalis,** Zackenschote, perennirender Spinat. Von dieser Futterpflanze, welche sehr früh in Vegetation

tritt, kann man die zarten Blätter, wie auch die jungen Triebe als Salat oder gekocht geniessen. Man säet im Frühjahr oder Herbst an Ort und Stelle in Reihen, die Anlage ist mehrere Jahre ergiebig.

158. **Calendula officinalis**, Ringelblume. Die gelben Blüthen dieses beliebten Sommergewächses scheinen an manchen Orten in der Küche verwendet zu werden, man gebraucht sie auch zum Färben der Butter. Die einfache Cultur geben wir in der nächsten Abtheilung.

159. **Capparis spinosa**, Kapernstrauch. Man cultivirt den Kapernstrauch nur in südlichen Klimaten; als Kapern werden die Knospen dieses niedrigen, auf felsigen Boden gedeihenden Strauches genommen, wenn sie erbsengross sind.

160. **Corchorus olitorius**, Nusskraut. In den heissen Ländern, wo diese Annuelle ohne Pflege gedeiht, geniesst man die jungen Blätter als Salat. Wir würden sie in das Mistbeet aussäen, daselbst weiter cultiviren oder an einen sehr sonnigen Standort pflanzen müssen.

161. **Crithmum maritimum**, Meerfenchel, See-Bazille. Diese kleine Staude findet sich an den europäischen Küsten; die Blätter werden in Essig eingemacht und dienen so als Speisewürze. Man würde sie bei uns im Herbst säen und gegen Kälte schützen müssen.

162. **Cuminum Cyminum**, Pfefferkümmel. Von dieser Pflanze werden die Samen, abgesehen von ihrem officinellen Gebrauch, auch in der Küche verwendet, sowie an Gebäck und in Liqueurs gethan. Es ist eine ganz niedrige Annuelle, welche man gegen Ende April an Ort und Stelle säet und schon im Sommer abernten kann.

163. **Fedia cornucopiae**, Algerischer Baldrian. Die Blätter dieses meist zur Zierde angebauten Sommergewächses können als Salat dienen. Man säet in Reihen von 30 cm Abstand, am besten im Frühjahr; wenn die Pflanzen reichlich bewässert werden, können sie schon in den ersten Sommermonaten obigem Zwecke dienen.

164. **Hibiscus esculentus**, Gombo oder Okra. In überseeischen Ländern spielt diese annuelle Malvacee eine Rolle; die zarten, jungen, schleimigen Früchte werden daselbst vielfach für Suppen und Saucen benutzt. Während sie dort ganz üppig wächst, gedeiht sie bei uns nur in besonders geschützten Lagen. Die Pflanzen werden im Mistbeet, sehr früh ausgesäet, herangezogen, und im Mai ausgepflanzt; zum Gelingen der Cultur gehört auch reichliches Begiessen.

165. **Humulus Lupulus**, Hopfen. Es sei hier erwähnt, dass die jungen Triebe der Hopfenpflanze in Belgien als ein sehr geschätztes, spargelähnliches Gemüse (jets de houblon) bekannt sind.

166. **Lappa edulis**, Japanische Klette. Die jungen Wurzeln dieser zweijährigen Pflanze, welche wie Schwarzwurzel cultivirt wird, liefern ein nahrhaftes Gemüse.

167. **Malva crispa**, krausblättrige oder Kohlmalve. Besonders in Frankreich werden die sehr zierlichen Blätter dieser einjährigen, bis 2 m hoch wachsenden Malvenart zur Garnitur von Speisen und Früchten benutzt. Man sät im April in das freie Land an einen sonnigen Standort und verdünnt auf 40 cm Abstand. Die Pflanze, welche kräftigen Boden liebt, erfordert in ihrer Cultur keinerlei Sorgfalt; sie ist einjährig und kann wie Melde behandelt werden. Als Spinatpflanze hat dieselbe keinen Werth, dagegen schätzen wir sie als decorative Blattpflanze.

168. **Marrubium vulgare**, weisser Andorn. Das Kraut dieser in Europa einheimischen, ausdauernden Labiate hat medicinischen Werth, wird aber auch als Speisewürze benutzt. Man kann sie durch Theilung und aus Samen vermehren, letzterer wird im Frühjahr an Ort und Stelle gesät. Die Pflanze gedeiht überall und ohne Pflege, vorzugsweise in trockenem Boden.

169. **Martynia**, Gemenhorn. Mehrere Species dieser Gattung werden ihrer schönen Blüthen wegen als Zierpflanzen gezogen, man kann aber auch die Früchte, so lange sie jung sind, in Essig zu Pickles verwenden, was besonders in den Vereinigten Staaten gebräuchlich ist. Die Pflanze verlangt viel Wärme, muss in das Mistbeet ausgesät und in diesem weiter cultivirt oder an einen sehr sonnigen Standort ausgepflanzt werden.

170. **Nigella sativa**, Schwarzkümmel. Der Samen dieser bekannten Futterpflanze, welche im Grossen angebaut wird, dient ausser in Apotheken und zur Oelbereitung auch als Gewürz an manche Speisen. Man sät Mitte April breitwürfig in das Freie; die Pflanze ist einjährig und gedeiht ohne besondere Pflege.

171. **Physalis pubescens**, Alkekengi. In südlichen Ländern geniesst man die rohe Frucht dieser südamerikanischen Annuelle. Dort gedeiht die Pflanze auch ohne jede Pflege, während man bei uns in das Mistbeet aussät und am besten darin weiter cultivirt oder an eine sonnige Stelle des Gartens pflanzt. In ähnlicher Weise macht man auch vom *Physalis peruviana* Gebrauch.

172. **Phytolacca esculenta**, Kermesstaude. Diese ausdauernde Pflanze aus Brasilien liefert ein etwas hartes Spinatgemüse; der Anbau derselben beschränkt sich jedoch bis jetzt wohl auf Versuchsculturen. Die Pflanze wächst sehr hoch und ist gegen harte Winter empfindlich. Die zweckmässigste Cultur scheint darin zu bestehen, dass man die Pflanzen im Mistbeet heranzieht und weitläufig in lockeren, sandigen Gartenboden an recht geschützte, sonnige Lage bringt. Die Beete sind im Winter zu bedecken, oder die knolligen Wurzeln herauszunehmen und frostfrei zu überwintern. Wir geben diese Notizen mit allem Vorbehalt.

173. **Sedum reflexum**, Tripmadam, Mauerpfeffer. Als Suppenkraut ist diese kleine, perennirende Mauerpflanze in einigen Gegenden beliebt. Man kann sie durch Wurzeltheilung und Samen vermehren, welch letzteren man im Frühjahr in das Mistbeet säet. Die Pflanzen kommen dann in sonnige Lage und lockeren Boden.

174. **Sinapis pekinensis**, chinesischer Senfspinat. Dieses Gewächs liefert ein in heissen Ländern geschätztes, sehr wohl-schmeckendes, pikantes Spinat-Gemüse. Es ist eine einjährige, kohl-artige Pflanze mit grossen, gekrausten Blättern, welche ca. 1,30 m hoch wird und entsprechend weit gepflanzt werden muss. Nach Vil-morin säet man diesen Senfspinat Mitte August in das freie Land an Ort und Stelle in Reihen von 40—50 cm Abstand, begiesst bis zum Aufgehen und sorgt durch Behacken für das Gedeihen, behandelt ihn also ungefähr wie grossblättrigen Spinat. Nach sechs Wochen kann das Abpflücken der Blätter beginnen und bis zum Erfrieren fortgesetzt werden. Frühjahrssaaten sind weniger zu empfehlen, weil die Pflanzen bald Blütenstengel bilden.

175. **Spilanthus oleracea**, Husarenknopf, Parakresse. Man verwendet das Kraut dieser auch als Zierpflanze bekannten An-nuelle in der Medicin und die Blätter in manchen Orten an den Salat. Man säet im Frühjahr in kaltes Mistbeet, verpflanzt im Mai in das Freie und giesst bei Trockenheit.

176. **Tanacetum vulgare**, Rainfarn, Wurmkraut. Diese Pflanze ist officinell, und man kann auch die Blätter als Speisewürze verwenden. Sie ist meterhoch und ausdauernd, und kann durch Theilung oder aus Samen vermehrt werden. Man säet im Frühjahr in das Mistbeet und pflanzt später in das Freie auf beliebigen Boden.

Tabellarische Zusammenstellung

fast sämmtlicher

in der zweiten Abtheilung behandelter Artikel

mit Angabe

- 1) des Familiennamens,
- 2) der in einem Gramm Samen annähernd enthaltenen Kornzahl,
- 3) des annähernden Gewichts von einem Liter Samen,
- 4) der Keimzeit, d. h. der Zeit, welche der Samen ungefähr bis zum Aufgang braucht,
- 5) der durchschnittlichen Keimdauer, d. h. der Zeit, während welcher der Samen eine genügende Keimfähigkeit behält.

Wir bemerken hier ausdrücklich, dass die angegebenen Zahlen nur für solche Jahre als gültig betrachtet sind, in denen die Samen ihre volle Reife erlangt haben. Sowohl bezüglich der Grösse Schwere, als auch der Keimzeit und Keimdauer der Samen würden sich in Jahren, welche der Bildung des Samens ungünstig sind, oft wesentlich andere Zahlen herausstellen. Die Keimzeit durch sehr günstiges Wetter beschleunigt, durch nachtheilige Witterung verzögert werden.

N a m e n.	Familie.	Samen- Kornzahl enthalten in	Samen- Gewicht von 1 Liter: Gramm	Keimzeit, d. h. der Samen braucht bis zum Aufgang: Tage	Keimdauer, d. h. der Samen bleibt keimfähig: Jahre
t (Inula Helenium)	Compositae	1 Gramm 475	225	20—30	1—2
orn (Marrubium vulgare)....	Labiatae	1075	590	10—12	2—3
lika (Engelwurz).....	Umbelliferae	215	165	200	1—2
.....	"	310	210	20—24	2—3
chocken	Compositae	15—20	650—660	10—12	5—6
rian, algerischer	Valerianeae	250	115	10—14	4—6
ikum	Labiatae	600—650	590—600	10—14	4—5
erkohl (Blaukohl, Grünkohl)	Cruciferae	250—410	680—690	5—6	4—5
nenkohl (Carviol)	"	290—380	700—715	4—6	3—5
en (Fisolen), grosskörnige ..	Papilionaceae	in 100 Gramm 80—90	700—780	6—10	3—4
" mittelkörnige ..	"	140—150	790—800	6—10	3—4
" kleinkörnige ..	"	860—870	880—890	6—10	3—4
enkraut (Pfefferkraut)	Labiatae	in 1 Gramm 1640	535	8—10	1—2
perennirendes	"	2075	455	10—12	1—2
tsch (Gurkenkraut).....	Boragineae	65	465	6—8	2—3
koli (Spargelkohl).....	Cruciferae	260—310	690—710	5—6	3—4
as orientalis	"	35	500—520	20—25	2—3
ndula officinalis.....	Compositae	150	190	8—10	3—7
en (Cardy, Cardonen)	"	20—25	680—690	10—12	5—6
obenedikten	"	25	355	12—14	2—3
ten (Möhren, Gelbwurzel)....	Umbelliferae	500—520	110—120	10—12	3—4
Samen mit Bart	}	500—520	110—120	10—12	3—4
abgeriebener Samen					
	"	890—900	350—370	10—12	3—4

Namen.	Familie.	Samen- Kornzahl enthalten in	Samen- Gewicht von 1 Liter: Gramm	Keimzeit, d. h. der Samen braucht bis zum Aufgang: Tage	Keimda- t. h. der Samen keimfähig Jahr
Chenille (Raupen, Würmer), in Schoten	Papilionaceae	1 Gramm	210	12—14	4—
Cichorienwurzeln	Compositae	690—700	440—450	6—8	6—
Coriander	Umbelliferae	125	385	16—18	4—
Dill	"	665	400	8—10	2—
Eierfrucht	Solanae	240—250	550—560	10—12	4—
Eiskraut	Ficoideae	6500	750	8—10	3—
Endivien, Sommer- (Bindsalat) ..	Compositae	1030—1060	430—440	8—10	3—
" Winter-	"	890—910	330—340	6—8	4—
Erbsen, grosskörnige	Papilionaceae	in 10 Gramm	820—830	6—8	3—
" mittelkörnige	"	30—35	835—845	6—8	3—
" kleinkörnige	"	40—45	850—860	6—8	3—
" ruzliche Mark-, grosskörn.	"	50—60	780—790	8—10	2—
" " Mark-, kleinkörnige ..	"	20—25	750—760	8—10	2—
" Spargel- oder Flügel-	"	50—55	850	6—8	3—
Erdmandeln (Knöllchen)	Cyperaceae		650	14—20	1—
Erdnuss, in Schoten	Papilionaceae		350	14—20	1—
Esdragon (Dragun)	Compositae	in 1 Gramm	680	12—14	2—
Fenchel, gewöhnlicher	Umbelliferae	5000	365	12—14	2—
" Bologneser	"	125	265	12—14	2—
" Florentiner	"	100	400	12—14	2—
Goldwurz (Scolymus hispanicus)	Compositae	200	155	12—14	2—
Gurken, lange	Cucurbitaceae	310	560—570	5—8	6—
" kurze	"	30—40	590—600	5—8	6—
Haferwurzel	Compositae	50—60	200	8—10	2—
Hopfensamen	Urticeae	85	245	30—40	2—
Isop	Labiatae	165	615	8—10	3—
Kapernstrauch	Capparidaceae	945	485	40—60	3—
Kerbel (Körbel), gewöhnlicher ..	Umbelliferae	165—170	440—540	5—6	3—
" spanischer	"	560—570	245	360	1—
Kerbelrüben	"	35	570—590	200	1—
Kohlrabi (Oberkohlrabi)	Cruciferae	390—400	640—700	4—6	5—
Kohlrüben (Steckrüben, Unter- kohlrabi, Wurcken)	"	250—260	670—710	4—6	5—
Kraut (Kopfkohl, Kappus)	"	350—380	650—700	5—6	4—
Kresse, Brunnen- oder Wasser- ..	"	250—390	575	6—8	4—
" Kapuziner- (Tropaeolum) ..	Tropaeoleae	5000	310—320	6—8	3—
" Garten-	Cruciferae	7—8	750—760	2—5	3—
" amerikanische Winter-	"	500—520	615	6—8	3—
		830			

Namen.	Familie.	Samen- Kornzahl enthalten in	Samen- Gewicht von 1 Liter: Gramm	Keimzeit, d. h. der Samen braucht bis zum Aufgang: Tage	Keimdauer, d. h. der Samen bleibt keimfähig: Jahre
Erbsen, Speise-, grosskörnige..	Cucurbitaceae	5 Gramm			
" " kleinkörnige....	"	10—12	400—420 460—470	6—8 6—8	5—8 5—8
		in 1 Gramm			
Wendel (Spike).....	Labiatae	925	645	14—18	4—5
Lebstock.....	Umbelliferae	235	235	14—18	2—3
Wasserkraut.....	Cruciferae	1800	640	6—8	4—5
Wendelzahn.....	Compositae	1720—1740	280—290	12—14	1—2
Majoran, französischer.....	Labiatae	5000	560—570	10—14	2—3
" perennirender.....	"	12000	675	10—14	2—3
Malva crispa (Kohlmalve).....	Malvaceae	300	540	12—15	4—5
Wasserdill (Beisskohl, Römisch Kohl)	Chenopodeae	40—90	240—300	8—10	4—6
Wasserpflanz (Gemsenhorn).....	Bignoniaceae	20—25	290—300	25—30	1—2
Wasserkohl (Seckohl).....	Cruciferae	15	165	25—30	1
Wasserdill, Garten-.....	Chenopodeae	150—350	170—180	12—14	1—2
Wasserpflanz, Citronen-.....	Labiatae	1650	700	20—30	2—3
Wasserpflanz.....	Cucurbitaceae	20—70	400—430	5—8	5—8
" Wasser- (Arbusen).....	"	6—36	550—640	5—8	5—8
Wasserpflanz (Mentha).....	Labiatae	13500	700	15—20	2—3
Wasserpflanzwurzeln (Moorwurzeln).	Umbelliferae	180—200	230—240	10—14	1—2
Wasserpflanzsilie.....	"	870—880	520—530	14—18	2—3
Wasserpflanzsilienwurzel.....*	"	740—760	510—530	14—18	2—3
Wasserpflanz, spanischer.....	Solaneae	150—160	480—490	8—10	3—4
Wasserpflanzkummel.....	Umbelliferae	240	350	16—20	1
Wasserpflanzpinelle, Garten-.....	Rosaceae	235	325	14—18	1—2
Wasserpflanzree (Lauch).....	Asphodeleae	390—400	580—590	12—15	2—3
Wasserpflanztulak.....	Portulacaceae	2000	640—650	8—10	3—4
		in 100 Gramm			
Wasserpflanzbohnen, grosskörnige.....	Papilionaceae	40	650—660	5—8	4—5
" kleinkörnige.....	"	120—130	830—840	5—8	4—5
		in 1 Gramm			
Wasserpflanzbinschen (Feldsalat, Schaf- männchen), gewöhnliche. }	Valerianaceae	940	280	8—12	4—5
" holländische grossblättrige	"	650	215	8—12	4—5
" dunkelgrüne breitblättrige	"	1500	315	8—12	4—5
" italienische.....	"	1100	335	10—14	2—3
Wasserpflanzdies (Monatsrettig).....	Cruciferae	100—110	670—690	5—8	4—5
Wasserpflanzttig.....	"	100—110	670—690	5—8	5—6
" Schlangen-.....	"	45	735	5—8	5—6
Wasserpflanzpontika.....	Onagrarieae	1700	375	7—10	1—2
Wasserpflanzpunzelwurzel.....	Campanulaceae	25,000	740	10—14	4—5
Wasserpflanzabarber.....	Polygoneae	70—80	140—150	8—10	2—4

Namen.	Familie.	Samen- Kornzahl enthalten in 1 Gramm	Samen- Gewicht von 1 Liter: Gramm	Keimzeit, d. h. der Samen braucht bis zum Aufgang: Tage	Keimdauer d. h. der Samen bleibt keimfähig Jahre
Rosenkohl (Sprossenkohl).....	Cruciferae	340—410	680—690	4—6	4—5
Rosmarin.....	Labiatae	900	365	24—30	2—3
Rüben, Speise-.....	Cruciferae	490—650	670—710	4—6	5—6
„ „ Teltower.....	„	825	700	4—6	5—6
„ Herbst-, Acker- od. Stoppel-.....	„	360—370	680—690	4—6	5—6
„ englische Futter- (Turnips). ..	„	520—530	690—700	4—6	5—6
Salat, Kopf-, Schnitt-, Pflück-...	Compositae	840—1240	390—480	8—10	4—5
„ Cichorien-.....	„	600—620	440—450	8—10	4—5
Salatrüben (Roth Rüben, Beete)	Chenopodeae	40—90	240—300	8—10	4—6
Salbei.....	Labiatae	150	665	10—14	2—3
Sauerampfer.....	Polygoneae	1260—1270	680—690	8—10	3—4
Scorzonerwurzel (Schwarzwurzel)	Compositae	90—100	270—280	10—12	2
Schalottensamen.....	Asphodeleae	300	475—480	14—16	1—2
Schnittlauchsamen.....	„	900		14—16	1—2
Schwarzkümmel.....	Ranunculaceae	340—350	570—580	12—15	2—3
Sellerie, Knollen-.....	Umbelliferae	2100—2200	510—530	14—16	5—6
„ Bleich- oder Stengel-.....	„	1900—2000	470—490	14—16	5—6
Senf, gelber.....	Cruciferae	215	750	8—10	3—4
„ brauner.....	„	890	750	6—8	3—4
Soja-Bohne.....	Papilionaceae	8	770	6—10	1—2
Spargel.....	Asphodeleae	50—60	760—790	20—30	3—4
Spilanthes oleracea.....	Compositae	3400	200	8—10	5—7
Spinat, rundsamiger.....	Chenopodeae	100—120	520—540	5—6	4—5
„ scharfsamiger.....	„	70—90	380—410	5—6	4—5
„ cubanischer.....	Portulacaceae	1980	700	8—10	4—5
„ neuseeländischer.....	Ficoideae	10	350	16—20	4—5
„ englischer perennirender...	Polygoneae	400	685	8—10	3—4
„ peruanischer Reis-.....	Chenopodeae	625	750	12—14	1—2
„ Erdbeer-.....	„	5000	800	8—10	3—4
Thymian.....	Labiatae	5400	670—680	12—15	2—3
Tomate (Liebesapfel).....	Solaneae	340—350	310—320	6—8	4—6
Waldmeister.....	Rubiaceae	175	415	12—15	1—2
Weinraute.....	Rutaceae	485—490	600	16—20	2—3
Wermuth.....	Compositae	13,000	660	12—14	3—4
Wirsing (Börskohl, Savoyerkohl)	Cruciferae	280—370	690—700	4—6	5—6
Zwiebeln.....	Asphodeleae	200—220	530—540	10—14	2—3
„ Winterhecke.....	„	450	460	10—14	3—4
Zuckerwurzel.....	Umbelliferae	950	420	30—40	1—2

Dritte Abtheilung.

Ueber die Anzucht aus Samen der Freiland- und Gewächshaus- (Topf-) Zierpflanzen.

Betreffs Bodenbearbeitung, Erdarbeiten, Düngung, Bewässerung und alles Allgemeine über Aussaaten verweisen wir den Leser auf die erste Abtheilung dieses Buches.

Erster Abschnitt: Pflanzen des freien Landes.

A. Allgemeines.

I. Sommergewächse oder einjährige (annuelle) Pflanzen (☉).

177. Unter dieser Bezeichnung versteht man alle Gewächse, welche in demselben Kalenderjahre, in welchem sie aus Samen keimen, zur vollen Entwicklung gelangen, ihre Früchte reifen und absterben. Die Leichtigkeit der Cultur ist ein besonderer Vorzug dieser Pflanzen und es gehören dazu die beliebtesten Gartenblumen. Dieselben werden entweder in das freie Land gesät (bleiben daselbst mit wenigen Ausnahmen unverpflanzt), oder man sät in das Mistbeet, Kästen, Terrinen etc. Eine Reihe zweijähriger und ausdauernder Pflanzen lassen sich ebenfalls wie Sommergewächse behandeln.

a. Aussaat in das freie Land.

Die Aussaat in das freie Land wird besonders bei solchen Sommergewächsen angewendet, welche so zu sagen keiner, oder doch

sehr geringer Pflege bedürfen, ferner bei denjenigen, welche ein Verpflanzen nur schwer oder überhaupt nicht vertragen. Das Klima ist dabei entscheidend. In südlichen Gegenden säet man eine Menge von Pflanzen in das Freie, welche bei uns der Spätfröste wegen erst im Mistbeet, wenigstens im kalten, herangezogen werden müssen. Daraus ergibt sich, dass man nicht zu früh aussäen darf; der Liebhaber sind viel mehr, welche in dieser Beziehung Fehler machen, als solcher, welche zu spät aussäen. Man säet breitwürfig oder in Reihen, sehr selten büschelweise; die erste Methode ist für die feinsamigen Sorten geboten. Die Haupt-Aussaatzeit fällt in die Monate April bis Juni. Man achte darauf, dass der Samen in lockere Erde kommt; bei schwerem Boden stelle man sich also eine lockere Oberfläche her. Zum Säen wähle man die frühen Morgen- oder Abendstunden, windstilles und, wenn es angeht, feuchtes Wetter. Die in Reihen gebrachten Samen werden dann mit der anliegenden Erde ungefähr so stark bedeckt, wie ihr eigenes Volumen beträgt (eine Regel, die wir schon früher, für alle Aussaaten geltend, aufstellten); für die breitwürfig gesäeten, besonders für die feinsamigen, genügt es, wenn sie mit einem Brett angedrückt oder mit dem Rechen leicht eingeharkt werden. Die Freiland-Aussaaten werden nicht angegossen, und nur bei anhaltender Dürre wird ein zeitweiliges Ueberbrausen den Aufgang beschleunigen. Wer derartige Aussaaten nicht in sehr grossem Massstabe vorzunehmen hat, wobei ja selten alle Bedingungen erfüllt werden können, und in obiger Weise verfährt, wird kaum einen Misserfolg zu befürchten haben. Uebrigens gehen die meisten Sommergewächse, welche sich zur Freilandsaat eignen, sehr rasch auf. Wenn die gekeimten Pflanzen greifbar sind, müssen sie, entsprechend den Dimensionen, welche sie erreichen, verdünnt und sorgsam mit der Hand gejätet werden. Bei beiden Verrichtungen hüte man sich, den Boden aufzureissen, weil sonst zu viel Nachbarpflanzen zerstört werden. Für die in Reihen gesäeten Gattungen genügt ein einmaliges Behacken, welches ebenfalls sehr vorsichtig auszuführen ist. Bei der Aussaat in das freie Land gebraucht man etwas mehr Samen als bei anderen Methoden, dies wird jedoch ausgeglichen durch die geringe Mühe, welche die Ausführung der angedeuteten Massregeln verursacht.

Gewisse Gattungen Sommergewächse werden im Herbst, am besten im October, ausgesät, wenn man einen baldigen Frühjahrsflor erzielen will. Bei den Abhandlungen über die einzelnen Culturen

findet sich für jede derselben die geeignete Aussaatzeit angegeben, und wird bemerkt, ob die Herbstsaat überhaupt anwendbar ist; das Verfahren ist für letztere das gleiche wie bei der Frühjahrssaat.

b. Aussaat in das Mistbeet etc. (vergl. §. 11, S. 47—51).

Mit Ausnahme der meist feinsamigen Sorten, welche man in Töpfe oder andere Gefässe zu säen pflegt, kommen in das Mistbeet die Samen aller Sommergewächse, welche nicht in das freie Land ausgesät werden. Bei den später folgenden Cultur-Besprechungen nennen wir für die einzelnen dahin gehörenden die Zeit der Aussaat und geben ferner an, ob dieselben in ein kaltes oder warmes Mistbeet zu säen sind. Kurz bevor man aussät, wird die Erde gut geharkt und mit einem Holzstab geebnet, ohne dass man sie dabei andrückt. Nun sät man breitwürfig, möglichst gleichmässig und nicht zu dicht, drückt den Samen mit einem Brett fest und giesst mit einer feinen Brause jedes fertigbesäete Mistbeetfenster an. Erst hierauf erfolgt die Bedeckung des Samens durch vorsichtiges und gleichmässiges Aufsieben guter Erde. Die Aussaaten werden bis zum Verpflanzen mässig feucht gehalten, aber nur mit der Brause begossen, und es ist besonders darauf zu achten, dass sie weder austrocknen, noch zu nass stehen. Für die Mistbeet-Aussaaten ist Wärme, Licht und Luft von grösster Bedeutung. Die ersten Aussaaten hat man gegen Erfrieren, die letzten gegen Verbrennen durch die Sonne zu schützen. Die besäeten Fenster werden in allen Fällen bis zum Aufgang der Samen geschlossen gehalten und müssen, so lange noch kaltes Wetter herrscht, durch Belegen mit Strohecken u. dergl. gegen jeden Frost geschützt sein; während der warmen Tagesstunden kann man sie jedoch aufdecken. Bei schönem, frostfreien Frühjahrswetter und wenn die Sonne nicht brennt, bleiben die Fenster unbeschattet. Dagegen werden die Aussaaten, welche in warmes Wetter fallen, gegen die Sonnenstrahlen dadurch geschützt, dass man die Fenster durch Auflegen irgend eines Schattenmaterials dunkel hält. Sobald die Samen aufgegangen sind, werden sie an Luft gewöhnt; das Lüften muss jedoch allmählig geschehen, da jeder plötzliche Uebergang die zarten, gekeimten Pflänzchen zerstört. Wenn die Sämlinge etwas stärker sind und ausser den Cotyledonen (Samenlappen) zwei oder drei Blättchen gebildet haben, kann man sie bei schönem Wetter nach und nach von Fenster und Decken frei halten;

das Schutz-Material muss aber für den Fall plötzlichen Wetterwechsels stets in Bereitschaft gehalten werden. Ein Verdünnen ist nur für diejenigen Sämlinge erforderlich, welche im Mistbeet weiter cultivirt werden, hingegen werden alle sehr vorsichtig, sorgsam und ehe das Unkraut erstarkt, mit der Hand gejätet. Die meisten Sommergewächse kann man sofort aus dem Mistbeet in das Freie bringen, und wenn man unsere Andeutungen verständig befolgt hat, wird man kräftige, gedrungene Pflanzen erzielt haben, welche dann schnell anwachsen. Zu lang gewordene (vergeilte) Sämlinge wurzeln schwer und fallen leicht um. Wenn es aber noch zu früh zum Auspflanzen und Raum vorhanden ist, so wird ein vorheriges Pikiren denselben sehr wohl thun; für einige Gattungen, z. B. Balsaminen, Zinnien, Petunien, Mirabilis, Lobelien, Phlox, ist dies sogar höchst wünschenswerth. Auch wenn man diese Pflanzen ganz eng pikirt, so kommen sie dann doch mit einem, wenn auch noch so kleinen Ballen guter Mistbeeterde in das Freie, was ihr weiteres Gedeihen natürlich sehr fördert. Diese frisch pikirten Pflanzen müssen übrigens auch sehr vorsichtig behandelt werden, da sie bei heissem Wetter leicht umfallen; während der ersten 24 Stunden nach dem Pikiren hält man sie unter geschlossenem Fenster. Die Aussaat sehr feinsamiger Gattungen besprechen wir an anderer Stelle.

Es kommt sehr häufig vor, dass in dasselbe Mistbeet verschiedene Sorten gesäet werden müssen. In diesem Falle stellt man vor der Aussaat durch Eindrücken dünner Brettchen oder Dachsparren Vierecke her, welche je eine derselben aufnehmen. Jedem Viereck giebt man eine Etiquette, welche Namen der Sorte sowie Datum der Aussaat trägt. Für solche gemeinschaftliche Aussaaten in ein Beet wähle man Sorten, welche ungefähr die gleiche Zeit zum Aufgehen brauchen, dasselbe Wärmebedürfniss haben und auch in den Dimensionen, welche sie im Kasten erreichen, sich ähneln.

II. Zweijährige (bisannuelle) Pflanzen (♂).

178. Unter Bisannuellen versteht man solche Pflanzen, welche erst in dem der Aussaat folgenden Jahre zur Blüthe gelangen und dann absterben; dieselben umfassen eine Anzahl sehr dankbar blühender, beliebter Gartenpflanzen. Es giebt indessen dabei solche, welche man wie Annuelle behandelt, weil sie bei sehr zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre zur Blüthe gelangen. Ebenso befindet sich

auch eine Reihe von Stauden darunter, welche zweijährig cultivirt, mithin jährlich frisch ausgesäet werden, weil sie nur beim ersten Flor wirklich schöne Blüthen entwickeln (z. B. Gartennelken).

Die Hauptzeit der Aussaat ist für die Bisannuellen Mai und Juni; nur wenige, sehr schnell wachsende Sorten werden im August ausgesäet. Säet man früher, so wachsen die Pflanzen zu stark oder blühen im ersten Jahre mit geringen Blumen, während sie bei zu später Aussaat nicht die nöthige Kraft erlangen, um den Winter ertragen zu können. Man säet auf besondere Saatbeete im Freien oder in kaltes Mistbeet. Erstere müssen, wenn sie nicht ganz schattig liegen, mit leichtem Material beschattet und mässig feucht gehalten werden. Wir wiederholen, dass es sich in jedem etwas grösseren Garten empfiehlt, einige schattige und gegen Wind geschützte Beete aus gutem, lockeren Boden für derartige Aussaaten herzurichten. Auch wenn es an diesen fehlt, können solche Beete zweckmässig zum Pikiren dienen und werden sich stets gut verwerthen lassen. Man pikirt auf ein zweites derartiges Reserve-Beet. Die Aussaat in kalte Mistbeete ist verbreiteter, wohl besonders, weil solche um diese Zeit von andern Culturen frei sind. Man hält die Fenster bis zum Aufgang des Samens dunkel und geschlossen; erst nach dem Keimen gewöhnt man die zarten Sämlinge an Luft und Licht und pikirt später wieder in kalte Mistbeete, wo die Pflanzen sich sehr bald abhärten. Das Auspflanzen der Bisannuellen geschieht von Ende Juli bis September, man wählt dazu einen kühleren Tag. Die Pflanzen, welche hierher gehören, nehmen meist grössere Dimensionen an, man muss ihnen also genügende Entfernung geben. Dass sie nicht auf Land kommen, welches vorher durch zehrende Culturen erschöpft wurde, darf nicht übersehen werden; am besten kommen sie auf Land, welches bis zur Pflanzzeit brach gelegen hat. Wenn es sich nur um eine kleine Zahl zweijähriger Pflanzen handelt, so kann man dieselben in Töpfen heranziehen und in Mistbeetkästen oder an einem geschützten Ort, selbst im Keller, leicht durchwintern. Man hat dann nur bei manchen Sorten für Abfluss des Giesswassers zu sorgen, dies geschieht u. A. dadurch, dass man sie in groben Kies stellt. Einige Bisannuellen, welche im Herbst an Ort und Stelle in das Freie gesäet werden können, werden in gleicher Weise wie im Herbst gesäete Sommergewächse behandelt. Die wichtigsten Bisannuellen oder wie diese zu behandelnde Pflanzen sind: Alpen-Vergiss-

meinnicht. Bartnelken, Gartennelken, Goldlack, Winter- und Kaiser-Levkoyen, Malven, Stiefmütterchen, Campanula Medium, Digitalis.

III. Stauden oder perennirende Pflanzen (¶).

179. Die Aussaatzeit der Stauden fällt in die Monate April bis October, je nachdem die Pflanzen schnell oder langsam wachsen. Man säet entweder auf Saatbeete in das Freie oder in kaltes Mistbeet oder auch in Kästen, Terrinen, Töpfe u. dergl., welche schattig in das Freie, am besten jedoch in das kalte Mistbeet gestellt werden. Da von den Stauden ein grosser Theil längere Zeit bis zum Aufgehen des Samens braucht, sich also mehr schädliche Einflüsse als bei schnellkeimenden Sorten geltend machen können, so sind dabei Enttäuschungen resp. Misserfolge nichts Seltenes.

Es giebt Samen, welche, im Spätsommer und Herbst, sogar im Frühjahr ausgesäet, erst im folgenden Jahr aufgehen, z. B. der des Veilchens, des Diptams, der Pfingstrosen. Für diese ist es von der grössten Wichtigkeit, dass die Aussaat bis zum Aufgehen ungestört bleibt. Auf welche Weise man auch vorgehe, stets muss der Aussaatort ganz schattig, mässig feucht und sauber gehalten, sowie gegen Ungeziefer geschützt werden. Bei den langsam keimenden Samen ist ein Uebermass von Feuchtigkeit sehr schädlich, man verhütet es bei den Aussaaten im Freien durch Auflegen von Moos, Stroh, Rohrdecken u. s. w., bei denen im Mistbeet durch reichliches Lüften. Handelt es sich nicht um eine Massenzucht von Pflanzen, so befürworten wir für solche Samen die Aussaat in Holzkästen, Terrinen und Töpfe, welche leicht zu translociren sind. Gewöhnlich bildet sich nach einigen Wochen an der Oberfläche dieser Saatgefässe ein Ueberzug von grünem Moos, die Erde wird „sauer“. Es ist sehr verführerisch, diese Moosdecke einfach mit der Hand zu entfernen oder mit einem Stäbchen abzukratzen, dabei stört man jedoch unbedingt die Aussaat, verwundet und tödtet viele Körner. Vielmehr rathen wir, etwas frische, gute Erde aufzustreuen oder aufzusieben und das Gefäss luftig zu stellen. Unter den Stauden giebt es einige, die sehr schnell ihre Keimkraft verlieren, daher am besten unmittelbar nach der Ernte gesäet werden, z. B. Helleborus und Phlox decussata.

Die Stauden werden entweder im Herbst oder Frühjahr an Ort und Stelle in das Freie gepflanzt; einige derselben, z. B. As-

olepias tuberosa, *Iberis jucunda* u. a. m., sind gegen sehr strenge Kälte oder anhaltende Winterfeuchtigkeit empfindlich, sie leiden, wenn sie auch nicht ganz zu Grunde gehen; man wird daher gut thun, solche Sorten ein wenig mit Reisig oder dergl. im Winter zu decken.

Manche wirkliche Stauden entwickeln sich sehr rasch in einem Jahre vom Samen zur Blüthe und werden ganz wie die im Frühjahr warm auszusäenden Sommergewächse behandelt; solche sind: *Antirrhinum*, mehrere *Delphinium*-Arten, *Dahlia* (Georginen), *Mimulus*, *Mirabilis*, *Valeriana* u. a. m.

Viele Stauden, besonders solche mit gefüllten Blumen, tragen keinen Samen und werden durch Stecklinge oder durch Senker vermehrt; die übrigen gewinnt man ausser aus Samen auch durch Pflanzentheilung. Letztere wird sogar nothwendig, wenn die Pflanzen zu stark und unschön werden, sie geschieht im Herbst oder besser im Frühjahr, wo die Stöcke noch sicherer anwachsen. Wir erwähnen noch, dass es für die Dauer der Staudenpflanzung gut ist, nach dem Flor die Blüthenstiele abzuschneiden.

IV. Zwiebel- und Knollengewächse des freien Landes.

180. Die Zwiebel- und knollenbildenden Stauden werden, abgesehen von einigen Arten, nur dann aus Samen gezogen, wenn man neue Varietäten oder Formen erzielen will, denn die meisten brauchen mehrere Jahre, bis sie aus Samen zur Blüthe gelangen. Bei weitem schneller vermehrt man diese Pflanzen nach der Reife der Zwiebeln durch die sogenannten Brutzwiebeln. Die Aussaat ist jedoch interessant und lohnender, als man im allgemeinen glaubt; sie wird z. B. bei Gladiolen jetzt vielfach angewendet. Auch giebt es Knollengewächse, welche bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre dankbar blühen, z. B. Anemonen, Ranunkeln, *Anomatheca cruenta* u. a. Sie verlangen zur Aussaat sehr sandige, leichte Erde mit gutem Wasserabzug, welche man bis zum Aufgehen mässig feucht hält. Da alles darauf ankommt, dass die aus Samen erzogenen Zwiebeln und Knollen im ersten Jahre ungestört bleiben, so bietet nur die Saat in Töpfe oder Terrinen Sicherheit. Dazu kommt, dass die Samen einiger Arten sehr lange liegen, ehe sie keimen. Man lässt die gekeimten Pflänzchen ungestört und befördert später durch allmähliche Entziehung von Wasser ihr Absterben in den Saatgefässen bis auf die kleinen Zwiebeln oder Knollen. Noch früher kommt

man jedoch zu starken Pflanzen, wenn man schon im Januar oder Februar säet, die Pflänzchen verstopft und noch vor der Zwiebel- und Knollenbildung einzeln in kleine Töpfe pflanzt. So bleiben sie länger als sonst oder ununterbrochen in Vegetation und haben, wenn endlich eine Ruhezeit (Absterben der Blätter) eintritt, schon Zwiebeln oder Knöllchen von ziemlicher Grösse gebildet, welche die Ueberwinterung, d. h. den Zustand der Ruhe, besser ertragen als kleinere.

Das Pflanzen der so gewonnenen Zwiebeln und Knollen an Ort und Stelle geschieht im Frühjahr, und im Herbst nimmt man die der meisten Sorten wieder aus der Erde, um sie trocken an einem geschützten Ort zu überwintern und im Frühjahr wieder zu pflanzen. Sie würden, im Lande gelassen, entweder erfrieren oder, namentlich in den ersten Jahren, der Vernichtung, sei es durch allerlei wühlende Thiere, durch anhaltende Feuchtigkeit oder andere Ursachen, preisgegeben sein. Bei den hierher gehörenden Pflanzen ist das Abschneiden der Blüthenstiele nach dem Flor besonders wichtig.

V. Zierpflanzen, Schlingpflanzen, Cucurbitaceen, Immortellen.

181. Diese Pflanzengruppen werden in vielen Samenverzeichnissen besonders aufgeführt. Sie gehören theils den Sommergewächsen, theils den Bisannuellen und Stauden an und müssen dementsprechend ausgesät und behandelt werden. Wir führen die wichtigsten in der später folgenden tabellarischen Zusammenstellung mit auf, wo jeder dieser Gruppen (wie auch noch vielen anderen) eine Rubrik gewidmet und die Behandlung der einzelnen Gattungen angegeben ist; die Cucurbitaceen sind daselbst aus der Columnne „Familie“ ersichtlich.

Die Ziergräser begnügen sich im allgemeinen mit gewöhnlichem Gartenboden. Die einjährigen Sorten, welche hauptsächlich zum Schneiden für Bouquets dienen, entwickeln sich sehr rasch und bedürfen keiner besonderen Pflege. Andere jedoch erfüllen erst dann ihren Zweck vollkommen, wenn sie üppig wachsen, was sie nur in gutem, nahrhaften Boden thun. Es giebt darunter Gattungen, welche sogar flüssige oder andere Unterdüngung (Hornspäne, Kuhdung u. dergl.) vertragen, z. B. der buntblättrige Mais, *Arundo*, *Eulalia*, *Gymnothrix*, *Gynarium*, *Erianthus* u. a. m., welche

sich zu herrlichen Pflanzen ausbilden können. Diejenigen Ziergräser, welche, wie die eben genannten, als Einzelpflanzen auf Rasen oder in grossen Gruppen Effect machen sollen, werden am besten gleich in Töpfe gesät, oder von dem Aussaatkasten in solche gepflanzt, so dass man sie später mit Erdballen an Ort und Stelle pflanzen kann. Ein vorhergehendes, öfteres Verpflanzen in immer grössere Töpfe ist für obige Zwecke sehr nützlich.

Auch bei Cucurbitaceen und solchen Schlingpflanzen, welche grössere Flächen bedecken sollen, erzielt man besonders dann ein rasches Wachsthum, wenn man sie aus Töpfen mit Ballen auspflanzt. Besonders bei ersteren ist es angebracht, in jedes Pflanzloch etwas Hornspäne, verrotteten Kuhdung oder dergl. zu bringen. Im Uebrigen verweisen wir betreffs der Cucurbitaceen auf das (S. 159) über die Anzucht der Kürbispflanzen Gesagte und rathen, dieselben nicht vor April auszusäen und stets in Töpfen heranzuziehen; sie fürchten den geringsten Frost und verlangen sonnige Lage, nahrhaften Boden und reichliche Bewässerung, um üppig zu gedeihen.

Für die Immortellen haben wir allgemein nur zu bemerken, dass sie in recht sonnige Lagen gebracht werden müssen.

Vorsichtsmassregeln beim Auspflanzen der Sämlinge in das Freie.

182. Das Gedeihen aller derjenigen in §. 177—181 besprochenen Freilandpflanzen, welche nicht durch Aussaat an Ort und Stelle entstanden sind, kann, auch wenn die Sämlinge durch richtige Behandlung die erforderliche Kraft erlangt haben, noch an dem Auspflanzen in das Freie scheitern, wenn hierbei Fehler begangen werden. Namentlich muss man vorsichtig zu Werke gehen, wenn man gezwungen ist, bei trockenem, heissem Wetter zu pflanzen. Vor allem müssen die Mistbeetpflanzen einige Stunden vor dem Auspflanzen gut begossen werden, damit sie frisch bleiben und die kleinen Saugwurzeln beim Herausnehmen nicht zerrissen werden; die pikirten Pflanzen werden dann auch „Ballen halten“, d. h. die die Wurzeln umgebende Erde wird nicht abfallen, sondern sie kommt mit in das Pflanzloch. Handelt es sich um den Transport bei heissem Wetter nach einer entfernten Pflanzstelle, so bringt man von den Pflanzen, damit sie nicht welken, eine Schaufel-, Hebeeisen- oder Handvoll nach der andern mit dem vollen Wurzelwerk aus dem Mistbeet in eine Trage oder eine andere, dem Transport dienende

Vorrichtung und überdeckt diese mit einem kühlen. schattengebenden Material (z. B. alter Leinwand, gebrauchten Säcken, Bastdecken u. dergl.), welches mit der Brause begossen wird. Am Pflanzort angelangt, nimmt man unter der Decke immer nur eine Handvoll Pflanzen hervor, die man erst beim Auspflanzen selbst von einander löst. Die Pflanzen werden in trockenem Boden recht tief gesetzt und fest mit dem Pflanzstock angedrückt. Bei besonders grosser Trockenheit übergiesst man kurz vor dem Pflanzen die Pflanzreihen mit dem Rohr der Kanne (Vorgiessen). — Ist der Boden im Gegentheil übermässig nass, so empfiehlt es sich, mit dem Auspflanzen zu warten. Falls dies nicht angeht, so pflanze man nicht so tief wie sonst und auch nicht allzu fest, drücke also nur lose mit dem Pflanzholz an.

B. Aussaat der wichtigsten Freilandblumen, Pflege der Sämlinge und ihre Verwendung.

Althaea rosea flore pleno, gefüllte Malve (*Malvaceae*). 2

183. Die Malven sind ausdauernde, krautartige Pflanzen, werden aber als Bisannuelle behandelt. Bei früher Aussaat kann man sie sogar im ersten Jahre zur Blüthe bringen, doch ist der Flor im ersten Jahre nach der Frühlings-Aussaat bei weitem der dankbarste. In den folgenden Jahren werden nicht allein die Blumen kleiner, sondern es gehen auch im Winter häufig Pflanzen zu Grunde, daher macht sich eine jährliche Aussaat nothwendig. Wir empfehlen, dieselbe Ende Mai vorzunehmen. Man säet entweder auf ein geschützt liegendes Saatbeet (vergl. S. 217) in Reihen oder in kaltes Mistbeet. Die Topfsaat unter Glas ist nicht ausgeschlossen, wenn man auf baldige Abhärtung der Sämlinge Bedacht nimmt. Unter den Samen finden sich häufig Körner, welche von einem Insekt durchlöchert sind, diese braucht man, wenn der Keim unverletzt blieb, nicht zu verwerfen. Der Aufgang erfolgt nach 10 bis 14 Tagen.

Nachdem die Sämlinge einige Blätter gebildet haben, pikirt man sie entweder in das Freie mit einer Abstandsweite von 20 cm oder pflanzt in kleine Töpfe in gute Gartenerde. In dieser Grösse werden die Pflanzen mässig feucht und noch schattig gehalten, während sie später die volle Sonne lieben. An Ort und Stelle werden die Malven mit 80 cm bis 1 m Entfernung im Herbst oder zeitig im

Frühjahr mit möglichst starkem Ballen gepflanzt und gründlich angegossen. Im ersten Falle empfiehlt es sich für rauhe Gegenden, die Pflanzen während des Winters leicht zu bedecken, ferner eine Anzahl Reservepflanzen in Töpfen zu überwintern, um im Frühjahr etwa entstandene Lücken damit auszufüllen. Die Malven lieben kräftigen, gut durchlassenden Boden und brauchen nur bei anhaltend trockenem Wetter begossen zu werden.

Der Flor der Malven fällt in die Monate Juli bis September. Mit diesen herrlichen Pflanzen, welche zuweilen 3 m hoch wachsen, lassen sich die schönsten Effekte erzielen; besonders als Einzelpflanzen, in grossen Gruppen, in einzelnen Reihen auf Rabatten, zwischen Sträuchern, auf Abhängen und vor Mauern und Bäumen. Wenn sie zwischen halbhohen Pflanzen stehen, welche den sich häufig entblätternden Hauptstamm der Malven verdecken, so erhöht dies die Wirkung. Mit Knospen besetzte Blütenstiele entfalten sich auch voll, wenn sie in Gläsern im Zimmer stehen. Die Schönheit der Malven beruht nicht nur auf dem imposanten Bau der Pflanzen und den gedrängt aufeinander sitzenden, dichtgefüllten Blumen, sondern auch auf dem Farbenreichtum der letzteren. Weiss, Chamois, Gelb, Rosa, Kirsch- und Dunkelroth, sowie Violet finden sich rein und in schönen Verbindungen, in den zartesten und gesättigtesten Schattirungen vertreten. Diese Farben werden durch die Aussaat zwar nicht vollständig tren, aber doch annähernd wieder hervorgebracht; wer genau die Muttersorte erhalten will, muss, um ganz sicher zu gehen, zu andern, weniger gebräuchlichen Vermehrungsmethoden greifen (Stecklinge, Veredlung, Theilung).

Leider wird die Cultur zuweilen recht erschwert oder sogar vereitelt durch den Malvenkäfer und den Malvenpilz. Ersteren muss man durch Abschütteln von den Blättern zu entfernen suchen, ehe er in Massen erscheint. Gegen den neuerdings in Europa aufgetretenen Pilz, welcher die Rückseite der Blätter bräunlich überzieht, so dass sie bald absterben, wurde bisher noch kein wirksames Mittel gefunden.

Amarantus, Fuchsschwanz (*Amarantaceae*).☉

184. Bei einer Anzahl von Sorten bilden die theils aufrechtstehenden, theils hängenden Blütenähren den Hauptschmuck (*abys-sinicus*, *caudatus*, *cruentus* etc.), während andere besonders durch ihre schön gefärbte Belaubung hervorstechen (*bicolor*, *Henderi*,

tricolor etc.). Hiernach richtet sich auch ihre Verwendung. Die folgenden Sorten kann man Anfang Mai gleich an Ort und Stelle in das freie Land säen: *atropurpureus*, *cruentus*, *giganteus*, *monstrosus*, *sanguineus*, *speciosus aureus*, *viridis*. Die Sämlinge sind auf etwa 40 cm Entfernung zu verdünnen. Sicherer geht man, wenn sie im April in das Mistbeet gesät, womöglich einmal pikirt und Anfang Juni ausgepflanzt werden. Die mit schön gefärbten Blättern: *amabilis tricolor*, *bicolor*, *bicolor ruber*, *Henderi*, *melancholicus ruber*, *Princess of Wales*, *Queen Victoria*, *salicifolius* und *tricolor* sind etwas zarter; man sät sie von März bis April in das warme Mistbeet, die jungen Sämlinge werden pikirt oder einzeln in Töpfe gepflanzt, bis zu gehöriger Erstarkung unter Glas gehalten und bei fortschreitendem Wachsthum allmählig an Luft gewöhnt. Mit gutem Wurzelballen ausgepflanzt, nach Bedürfniss durchdringend bewässert und zeitweise mit Düngguss versehen, entfalten sie sich in voller Pracht und sind als Topfpflanzen, Einzelpflanzen auf Rasen, in Blattpflanzengruppen, im Vordergrund von Gehölz- und Strauchpartieen höchst wirkungsvoll. Durch ungünstige Witterung, aber auch durch fehlerhafte Cultur, wird die Schönheit der Blattfärbungen häufig beeinträchtigt. *A. Henderi*, mit graziös gebogenen, bunten Blättern, leidet im freien Lande oft durch die Unbilden der Witterung und eignet sich daher besser zur Topfcultur; verpflanzt man ihn öfters in immer grössere Töpfe und hält ihn luftig unter Fenstern, so erzielt man prächtige Schaupflanzen. Auch *A. salicifolius* ist schön als Topfpflanze. Sämmtliche *A.* lieben leichten, lockeren Boden, recht sonnige Lage und reichliche Bewässerung.

Antirrhinum majus, Löwenmaul (*Scrophularineae*).

185. Die *Antirrhinum* sind einjährig, je nach dem Einfluss des Winters auch zwei- und mehrjährig. Zur Erzielung eines schönen Sommerflors ist die geeignetste Zeit der Aussaat Mitte März bis Mitte April; doch ist auch Herbstaussaat anwendbar. Man säe den ziemlich feinen Samen in das kalte Mistbeet, in geschützte Saatbeete oder Saatgefässe, in Normal-Erde, drücke ihn mässig an und bedecke ihn leicht. Das Keimen geht etwas langsam vor sich, und ist die Saat bis zum vollen Aufgang gleichmässig feucht und geschlossen zu halten. Es ist vorthellhaft, die jungen Sämlinge zu verstopfen und nach einiger Erstarkung auszupflanzen. Man giebt den hohen und halbhohen Sorten einen Abstand von 25—30 cm, damit

sie sich gut verzweigen können, wodurch ihr Ansehen sehr gewinnt. Sie gedeihen fast in jedem Boden, sind zur Ausschmückung von Blumengruppen, Rabatten, Terrassen und Felspartien, sowie zum Schneiden sehr beliebt. Die ganz niedrigen, prächtigen Tom Thumb-Varietäten werden etwas enger gepflanzt und zu niedrigen Gruppen, Einfassungen und Teppichbeeten verwendet. Die Blüthezeit dauert von Juli bis zum Spätherbst; schneidet man die zuerst verblühten Stengel ab, so blühen andere Triebe bei schönem Herbstwetter reichlich nach. Oft kommt eine grössere Anzahl Pflanzen gut durch den Winter, doch ist es nicht ratsam, sie zum nächsten Flor stehen zu lassen, da durch Auswintern Lücken entstehen, ältere Pflanzen auch viel von ihren Blütenfärbungen verlieren und zuletzt unschön werden. Der Samen bringt stets einen Theil von der Muttersorte abweichender Pflanzen, dabei häufig solche mit neuen, interessanten Färbungen. Die A. lassen sich übrigens auch leicht durch Herbststecklinge vermehren, welche unter Glas überwintert und im Frühjahr ausgepflanzt werden.

Aster chinensis (Callistephus), Aster (*Compositae*). ☉

186. Die Cultur der A stern ist äusserst einfach, und man darf behaupten, dass dieser Umstand nicht wenig zu der Beliebtheit beiträgt, deren sie sich erfreuen. Die Aussaat fällt in die Monate März-April, und zwar ist es bei der langen Zeit, welcher die Pflanzen zu ihrer Entwicklung bedürfen, geboten, dieselbe vorzunehmen, sobald es die Witterung erlaubt. Widerstandsfähigkeit gegen Kälte ist einer ihrer grossen Vorzüge. Man säet genau nach den auf Seite 215 angegebenen Vorschriften und zwar in ein mässig erwärmtes Mistbeet in gute Gartenerde, breitwürfig aber ziemlich dicht, besonders dicht die edlen Gattungen, da deren Samen selten mehr als zur Hälfte keimt. Der Aufgang erfolgt, je nach dem Wetter, innerhalb 2 bis 3 Wochen. Anfang Mai sind die Sämlinge meist stark genug zum Auspflanzen (vergl. §. 182, S. 221); man pflanzt natürlich die späten Classen zuerst; die Abstandsweite beträgt je nach den Racen 20 bis 50 cm. — Der schlimmste Feind der A stern ist der Engerling (die Larve des Maikäfers) und in einigen Gegenden die sogenannte graue Made (*Plusia gamma*). Von diesen angefressene Pflanzen, welche sich durch Trauern kenntlich machen, sind verloren, man kann und muss aber die Thiere gerade von solchen Pflanzen entfernen und vertilgen, weil sie sonst zu

den nächsten, gesunden wandern. In Zeiten grosser Dürre werden bei ausgedehnten Culturen, wo ein Giessen unmöglich ist, oft ganze Flächen Atern rostig, namentlich nach starkem Thau. Die Aster entwickelt sich zu grösster Vollkommenheit nur in nahrhaftem, möglichst durchlassenden Boden und liebt häufige, reichliche Bewässerung.

Die hohe Bedeutung und grosse Beliebtheit dieser so dankbaren Pflanze beruht darauf, dass sie erst im Spätsommer, wenn an anderen Blumen bereits Mangel eintritt, ihren lange andauernden, überaus reichen Flor entwickelt, und dass sie durch die Farben- und Formen-Mannichfaltigkeit ihrer Blumen die meisten anderen Annuellen in den Schatten stellt und dadurch beinahe allen Decorationszwecken dienen kann. Hierdurch erklärt es sich, weshalb die Samenzüchter keine Mühe scheuen, neue, schöne Farben und Formen dieser Lieblingsblume zu schaffen und die schon bestehenden zu verbessern oder besser zu fixiren; in dieser Beziehung scheint uns das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein: es ist eben der Bedarf ein sehr bedeutender und jede Classe findet ihre Liebhaber. In den für den Samenbau tonangebenden Städten Deutschlands werden die Atern hectarenweise cultivirt und gewähren diese grossen Flächen während der Blüthezeit einen prächtigen, dem Hyazinthenflor in Holland gleichkommenden Anblick. Zweifellos ist diese Blume zu grosser Vollkommenheit gebracht worden, andererseits hat aber auch die dichte Füllung zur Folge, dass bei ungünstigem, feuchten Herbstwetter die Samenkörner sich nur mangelhaft entwickeln können, so dass dann gerade die Samen der edelsten Sorten, wie bereits oben erwähnt, wesentlich an Keimkraft einbüssen.

Bei der grossen Rolle, welche die Atern spielen, halten wir es für angezeigt, die hauptsächlichsten Gruppen aufzuzählen und anzugeben, welchen Zwecken dieselben vornehmlich dienen können. Die nachfolgende tabellarische Zusammenstellung wird dem Laien genügende Information darüber, welche Classen seinen Bedürfnissen am besten entsprechen, und auch dem Gärtner manchen willkommenen Fingerzeig geben. Bei den Höhenangaben ist eine normale Entwicklung vorausgesetzt. Hier nicht aufgeführte Classen sind entweder unwichtig oder nähern sich sehr der einen oder andern genannten Gruppe. Wir erwähnen noch, dass neuerdings in den Atern ein Scharlachroth erzielt wurde, welches (namentlich in den niedrigen und halbhohen Classen) die grösste Beachtung verdient.

Namen der Astergattung.	Höhe (ungefähr) in Centimetern.							Besondere Bemerkungen.
	Für niedrigste Gruppen, Beete und Einfassungen.	Für niedrige Gruppen, Beete und Einfassungen.	Für Topfcultur.	Für mittelhohe Gruppen und Beete.	Für frische Bouquets, Kränze etc.	Zum Trocknen u. Färben.	Für Ausstellungswecke (* Pflanzen in Töpfen, x einzelne Blumen).	
espeare-.....	25	x						Von compactem Habitus, reichblühend.
g-.....	25	x						Blumen geröhrt, sehr früh- und reichblühend.
g-Bouquet- (Boltze)....	25	x		x			*	Früh- und reichblühend, edle Classe.
g-Pyramiden-.....	35		x	x				Von andauerndem Flor.
g-Bouquet-Pyramiden-..	35		x	x			*	Besonders reich- und lange blühend.
g-Chrysanthemum-....	30		x	x		x	xx	Sehr grossblumig, spät.
g-Victoria-.....	35		x	x			xx	Edle, reichblühende Classe, grossblumig, spät.
g-Kronen-.....	30		x	x		x	x	Blumen mit weisser Mitte.
g-Paeonien-.....	40		x	x		x	x	Edle Classe, sehr reichblühend.
g- oder Röhr-.....	45			x	x			Reich- jedoch kleinblumig.
-.....	45			x	x			Reichblühend, Blumen geröhrt.
nt-.....	45			x	x	x		} Blumen sehr klein, straff getragen. Die reichstblühenden Gattungen, lang andauernder Flor.
er-.....	45			x		x		
nienblüthige Kugel- (Uhland).....	50			x	x			Grossblumig, reichblühend.
n-.....	50			x	x	x	x	Grossblumig, reichblühend, effectvoll.
ria-.....	50			x	x	x	x	Edelste Classe, sehr reichblühend, Blumen hochgewölbt.
qué-Pompon-.....	55			x	x	x	x	Reich- und lange blühend.
nien (Truffaut's).....	65				x	x	x	Die Pflanzen mit ihren schweren Blumen müssen bei vollem Flor häufig gestengelt werden.
niden-.....	75				x		x	Blumen geröhrt, gross.
en- (Kranz- oder Cocardeau-)	75				x	x	x	Blumen mit weisser Mitte, reichblühend.
ridge- (verbesserte Reid's)	80				x		x	Sehr verzweigt, reichblühend, Blumen geröhrt.
Chrysanthemum- (Imbriqué)	60				x	x	x	Sehr grossblumig und von langdauerndem Flor.
oder Nadel-.....	75				x		x	Petalen nadelartig.
n-Kaiser-.....	65						x	Pflanzen bringen meistens nur eine Blume von bedeutender Grösse.
ington-.....	60				x		x	Edle Classe, enorme Blumen, welche lange dauern.

Campanula, Glockenblume (*Campanulaceae*).

187. Diese feinsamige Gattung ist reich an annuellen, bisannuellen und perennirenden Arten. Von ersteren säet man die folgenden je nach der Witterung von März bis Mai in das Freie in Reihen, und zwar dünn und nicht zu tief: *attica*, *Loreyi*, *Speculum u. V.*, *stricta*, sie blühen dann im Juni bis Juli und eignen sich durch ihren gefälligen, gleichmässig niedrigen Wuchs und Blütenreichtum vorzüglich zu niedrigen Gruppen und Einfassungen. Die sehr reichblühenden *C. Speculum procumbens* breiten sich stark auf dem Erdboden aus, so dass man die jungen Pflanzen auf 30 cm Abstand verdünnen muss; noch sicherer ist es, sie im April in das kalte Mistbeet zu säen und später in dieser Entfernung auszupflanzen. Ueberhaupt kann man obige Sorten, die auch hübsche Topfpflanzen bilden, im kalten Mistbeet oder auf dem Saatbeet heranziehen und verpflanzen. Im Herbst gesäet, blühen sie im Mai bis Juni, während man durch Aussaat im Sommer einen dankbaren Herbstflor erzielt. Auch *C. macrostyla*, mit grossen, sehr schön gebauten Blumen, ist einjährig; man säet sie von März bis April in das kalte Mistbeet, pikirt die jungen Pflanzen zeitig und pflanzt im Mai in guten, lockeren Gartenboden und in vor Wind geschützte Lagen.

Zu den Bisannuellen gehört die herrliche Gruppe *C. Medium*, die grösstblumige und zugleich reichstblühende. Man säet dieselbe von Ende Mai bis Mitte Juni in normale Erde in kalte Mistbeete, auf geschützte Saatbeete oder in transportable Gefässe, die Aussaat ist schwach zu bedecken und bis zum Aufgang mässig feucht und schattig zu halten. Die jungen Pflänzchen werden pikirt und im September mit 40—50 cm Abstandsweite ausgepflanzt. Ihre Blüthezeit dauert von Anfang Juni bis Ende Juli. Von schönem, pyramidalen Wuchs und reicher Verzweigung eignen sie sich vorzüglich für kleine Gruppen und auf Rabatten und geben, in Töpfe gepflanzt, ein prächtiges Decorationsmittel.

Für die vielen ausdauernden C., von welchen wir nur die schönsten und bekanntesten besprechen wollen, verfährt man bei der Aussaat meistens wie bei den Medium Var. Das Pikiren ist für alle, hauptsächlich nach sehr dichtem Aufgang, nothwendig. Sind die Pflanzen bis zum September stark genug, so pflanzt man sie in nicht zu schweren Gartenboden an sonnige Lagen aus. Andernfalls überwintert man sie frostfrei und pflanzt im folgenden Frühjahr. Folgende sind auf diese Weise mit Leichtigkeit heranzuziehen: die

niedrigen, besonders für breite Einfassungen schönen *C. carpatica* und *turbinata*; ferner *grandis*, *macrantha*, *persicifolia*, *trachelioides*, welche sehr reich blühen und sich zur Bepflanzung von Rabatten, Gruppen und Strauchpartieen eignen. Eine der schönsten als Einzelpflanze in Töpfen und auf Rabatten ist die $1\frac{1}{2}$ —2 m hohe, reichblühende *C. pyramidalis*, welche durch mehrmaliges Verpflanzen in grössere Töpfe zu stark bewurzelten Pflanzen herangezogen und gut mit Ballen und unter Schonung der Wurzeln mit 50 cm Abstand in gut gedüngten Boden zu pflanzen ist. Sie blüht meist erst im dritten Jahre von Juli bis September und stirbt zuweilen nach dem Verblühen ab, weshalb man wohl thut, jährlich neue Anzucht vorzunehmen. Die zarteren Arten: *C. pusilla*, *rhomboidea*, *rotundifolia*, *Saxifraga* und mehrere alpine *C.* werden zur Ausschmückung von Terrassen und Felspartien verwendet; da sie jedoch bei anhaltend strengen Wintern leicht leiden, so bedeckt man sie mit Reisig oder Haidekraut oder man pflanzt einige im Herbst in Töpfe und überwintert sie im Kasten. Unter den in Töpfen zu cultivirenden und frostfrei zu überwinternden Arten nennen wir besonders die bis $1\frac{1}{2}$ m hoch werdende *C. laciniata*, welche nach einigen Jahren einen starken Stamm bildet, mit schön geschlitzten, weisslichen, sehr langen Blättern und langer Rispe mit grossen, hellblauen Blumen; sie eignet sich für Gruppen sowie auch als Einzelpflanze an geschützter Stelle. *C. Leutweini* ist buschig und hat schön geformte, weisse Glocken; sie wird zur Aufstellung in niedrigen Gruppen, auf Etageren etc. verwendet. Bemerkenswerth ist ferner *C. Vidali* mit ihrem kurzen, holzigen Stamm, welcher sich oben candelaberartig verzweigt und mit schmalen, glänzend grünen Blättern bedeckt; ihre grossen, weissen Glocken erscheinen erst nach mehreren Jahren. Sämmtliche Campanula sind sehr genügsam in Bezug auf Lage und Boden; ein guter, etwas lockerer Gartenboden sagt ihnen am besten zu.

Celosia cristata, Hahnenkamm (*Amarantaceae*). ☉

188. Was wir unter Hahnenkamm verstehen, ist eine Verkrüppelung zahlreicher Blüthenzweige zu einem breiten, bandartigen Gebilde. Der als Blume erscheinende Theil ist keine Blüthe, sondern das Ganze ist nur ein Blüthenboden; die kleinen Blüthen sitzen vielmehr kaum bemerkbar unter dem „Kamme“.

Die hohen Sorten sind weniger beliebt und wir empfehlen, die als *Celosia cristata nana* bezeichneten niedrigen (25—30 cm hoch)

anzubauen, deren Aussaat recht befriedigende Resultate ergibt, und zwar sind die leuchtend rothen Sorten die dankbarsten. Man säet den sehr feinen Samen nicht vor April dünn und ihn schwach bedeckend auf warmes Mistbeet oder in Samentöpfe, welche unter Glas warm gestellt werden. Der Aufgang erfolgt binnen einer Woche. Die Pflänzchen werden so klein wie möglich pikirt, und, sobald sie einander beengen, nochmals weiter gepflanzt. Ein zweites Verpflanzen findet im Mai statt und zwar wiederum in ein Mistbeet, welches noch nicht erkaltet ist. Man beobachtet dabei einen Abstand der Pflanzen von etwa 20 cm, giebt ihnen die beste, nahrhafteste Mistbeeterde und pflanzt etwas tiefer, als sie vorher gestanden. Nun Sorge man dafür, dass keine Stockung im Wachsthum eintritt, sei es durch kühle Temperatur, oder Trockenheit und Nahrungsmangel der Erde, denn sonst bilden sich die Kämme zu früh und bleiben klein. Alle in den Blattwinkeln erscheinenden kleinen Kämmlchen müssen ausgebrochen werden. Gelüftet wird bei kühler Witterung nur so viel, um die nassen Pflanzen abzutrocknen, bei Wärme aber reichlich; erst allmählich können die Fenster abgelegt werden. An reichlichem Begiessen darf es nicht fehlen, und wenn das Wachsthum nicht üppig genug scheint, ist durch flüssige Düngung nachzuhelfen. Wenn die Kämme an der Spitze der Pflanze erscheinen, lässt sich erkennen, ob sie gross (breit) oder klein werden; auch zeigen sich schlecht geformte; derartige Pflanzen muss man entfernen. Das Auspflanzen an Ort und Stelle erfolgt Anfang Juni oder später, falls die Kämme dann noch nicht ausgebildet sind. Sollen die Halmenkämme sich auf den Blumenbeeten in voller Schönheit entfalten, so müssen sie 1. mit starkem Erdballen vorsichtig angehoben werden, 2. in vorzüglich durchgearbeitetes, reichgedüngtes Land kommen und 3. durch reichliche Bewässerung bei trockenem Wetter, zuweilen unter Anwendung flüssiger Düngemittel (bei sorgsamer Schonung der Kämme), gepflegt werden. Geschieht dies, dann kann man mit solchen Halmenkammbeeten herrliche Effecte erzielen, besonders wenn in sonniger Lage und so gepflanzt wurde, dass die Kämme dem Beschauer die breite Seite zeigen. In südlichen Klimaten erhält man von diesen Pflanzen im Freien allerdings ungleich schönere Exemplare als bei uns. Vortrefflich gedeihen sie jedoch auch bei der Topfcultur, wenn man sie mit beschnittenen Wurzeln in nahrhafte, aber nicht zu feste Erde bringt und nicht unverhältnissmässig grosse Töpfe wählt; sie halten sich dann sehr lange im Zimmer oder Glashaus. Uebrigens halten

sich auch die abgeschnittenen Kämme einige Zeit und können so, da sie die Farbe nicht schnell verlieren, zu mancherlei Decorationszwecken Verwendung finden.

Die Cultur der federbuschartigen Sorten (in den Katalogen unter den Namen *C. pyramidalis* und *plumosa*) ist der eben behandelten gleich. Es sind dies ebenfalls sehr schöne Pflanzen, die kleine Pyramiden bilden, im Norden aber im Freien bei weitem nicht so schön werden wie im Süden. Wir empfehlen sie zur Verwendung in Bouquets, wo die „Federbüsche“ sehr schön wirken.

Auch *C. japonica*, welche zahlreiche Kämme bildet, wird so cultivirt, während *C. Huttoni*, eine decorative, dunkellaubige Pflanze, sehr warm ausgesät werden muss.

Cheiranthus, Levkoye (*Cruciferae*).

189. Die Levkoyen zerfallen in Sommer- und Winterlevkoyen. Erstere sind einjährig, blühen daher im ersten Sommer, letztere sind mehrjährig, blühen im zweiten Jahre, oder, bei sehr früher Aussaat, im Spätherbst und Winter des ersten Jahres. Die Herbstlevkoye steht zwischen beiden Gruppen, sie blüht bei zeitiger Aussaat und nach warmen Sommern im Herbst sehr dankbar, verhält sich dagegen in kühlen Sommern bei später Aussaat wie die Winterlevkoye, d. h. blüht, frostfrei überwintert, erst im Jahre nach der Aussaat. Levkoyensamen, welcher aus zuverlässiger Quelle stammt, bringt etwas über die Hälfte gefüllt blühender Pflanzen. Die Bemühungen des Samenzüchters sind darauf gerichtet, diesen Procentsatz zu erhalten resp. zu erhöhen. Letzteres ist bei einigen Gattungen in hohem Grade gelungen, welche nur wenig „Einfache“ bringen und deren Samen in Folge dessen sehr kostspielig ist. Die gefüllten Blumen sind bekanntlich unfruchtbar.

A. Sommer- und Herbstlevkoyen.

Cheiranthus annuus (*Matthiola annua*). ☉

Dieselben sind nach Habitus der Pflanzen, Form und Grösse der Blumen in Gruppen eingetheilt, von welchen wir die bekanntesten mit ihren Hauptmerkmalen (die jedoch nur bei der Cultur im Freien vollständig zum Ausdruck kommen), anführen:

- I. Englische oder Erfurter: ca. 30 cm hoch, reich verzweigt, etwas gedrunken, Blumen mittelgross; für Topf- und Landcultur, für Bouquets.

- II. Grossblumige: ca. 35 cm hoch, breitblättrig, kräftiger und von längerer Blüthezeit als I., mit starken, gewölbten, mit grossen Blumen dicht besetzten Rispen; für Topf- und Landcultur, für Bouquets.
- III. Immerblühende: ca. 30 cm hoch, im Bau I. ähnlich, jedoch stärker verästelt, mit kleinen Blüthenrispen; durch Abschneiden der verblühten Rispen bis zum Herbst in Flor zu erhalten; für Topf und Land.
- IV. Zwerg-Bouquet: ca. 20 cm. hoch, sehr buschig, bouquetbildend, mit zahlreichen, feinbelaubten, fast gleichzeitig blühenden Seitentrieben; für Topfcultur, zu Einfassungen und niedrigen Gruppen.
- V. Grossblumige Pyramiden: ca. 45 cm hoch, von kräftigem, pyramidalen Wuchs, mit starker Mittelrispe und Verzweigung, sehr grossblumig; schön für das freie Land, auch für Töpfe und grosse Bouquets.
- VI. Grossblumige Zwerg-Pyramiden: ca. 20 cm hoch, von sehr gedrungenem Bau mit starker Mittelrispe und wenig Verzweigung, grossblumig; für Topfcultur, niedrige Gruppen und Einfassungen; liefern den höchsten Procentsatz gefülltblühender Pflanzen.
- VII. Grossblumige Riesen-Baum: ca. 60 cm hoch, robust, grossblättrig; mit besonders kräftig entwickelter Hauptachse, langen, starken Blüthenrispen, sehr grossblumig; für Gruppen, grosse Bouquets und Töpfe.
- VIII. Grossblumige Riesen-Bomben: ca. 70 cm hoch, mit umfangreichen, pyramidalen Blüthenrispen, erreichen grosse Dimensionen, ausserordentlich grossblumig. Von langer Blüthendauer; für hohe Gruppen, auf Rabatten, in grosse Bouquets.
- IX. Sommerlepkoyen mit Lackblatt (*Cheiranthus graecus*): englische (Erfurter) und grossblumige. Entsprechen I. und II., jedoch mit glänzend dunkelgrüner Belaubung, wodurch die Farben der Blumen sich schön abheben; für Bouquets, Topf und Land.
- X. Halbenenglische: ca. 60 cm hoch, von schlankem Wuchs mit mittelgrossen Blüthen an langen, dünnen, biegsamen Stielen, von andauerndem Flor; für Bouquets.

Aussaat. Die Sommerlevkoyen werden von Ende Februar bis April ausgesät, entweder an sonnig und luftig gelegenen Stellen im kalten Mistbeet, oder in Saatgefässen, welche man in mässig warmen Räumen aufstellt, oder auch, von April bis Mai, auf geschützten, gut zubereiteten Saatbeeten im freien Lande. Für die Mistbeet-Aussaat verwende man einen etwas durch Dünger angewärmten Kasten oder ein sogenanntes laues Mistbeet, wobei zu beachten ist, dass kein Mistdampf mehr vorhanden sein darf und der Kasten gut bedeckt werden muss.

Man benutzt reine, düngerfreie, gut mit Sand vermischte Garten- oder Acker-Erde. Nachdem die Erde geebnet, streut man den Samen nicht zu dicht darauf und giesst dann vorsichtig mit feiner Brause an. Hierauf bedeckt man die Saat leicht mit ebensolcher, jedoch feingesiebter Erde, ohne nochmals zu begiessen, und hält sie bis zum Aufgang dunkel. Das Keimen tritt, je nach den Sorten, in 6 bis 10 Tagen ein, die hellen Körner (von weissen und rothen Sorten) keimen rascher als die dunklen (von blauen und braunen Sorten). Zeigt sich ein gleichmässiges Keimen, so zögere man nicht, allmählich zu lüften, bei gutem Wetter reichlich, bei rauhem vorsichtig, bis man anfänglich am Tage, später auch des Nachts, die Bedeckung ganz fortnimmt. Vor dem Begiessen überzeuge man sich, dass die Erde ganz trocken ist, und giesse dann vormittags, damit die Pflänzchen bis zum Abend wieder abtrocknen. Bei starkem Sonnenbrand sind die jungen Pflanzen zu beschatten.

Die in Saatgefässen (Töpfen, Kästchen etc.) in Zimmern etc. vorgenommenen Aussaaten sind ebenso zu behandeln. Man bedeckt die Gefässe bis zum Aufgang mit einer Glasscheibe oder mit einem passend geschnittenen starken Löschpapier und bewirkt die Abhärtung der jungen Pflänzchen durch Oeffnen der Fenster und bei gelinder Witterung dadurch, dass man sie am Tage an geschützten Stellen in das Freie bringt.

Zur **Topfcultur** nimmt man gute, abgelagerte, sandige Gartenerde, welcher man noch trockene Schlamm- oder Rasen-Erde beimischen kann. Die geeignetsten Töpfe haben eine Höhe von ca. 15 cm und oben einen Durchmesser von ca. 18 cm. Sie werden gleichmässig mit Erde angefüllt, welche man etwas andrückt. Die jungen Pflänzchen, bei welchen das vierte Blatt ausgebildet sein muss, bringt man mittels eines passenden Pflanzholzes senkrecht in das Pflanzloch und drückt sie fest an, und zwar so, dass die

Wurzeln nicht nach oben oder seitwärts verbogen werden. Je nach Höhe und Ausbreitung der Sorten pflanzt man 6—8 Pflanzen in einen Topf. Wer nicht über Töpfe von der oben angeführten Grösse verfügt, benutze kleinere und pflanze entsprechend weniger Pflanzen.

Der Standort für die Topflevkoyen muss sonnig gelegen und gegen Wetterschlag geschützt sein, z. B. auf eigens dazu errichteten Stellagen, an Mauern, unter vorspringenden Dächern u. dergl.; so dass man auch bei eintretenden Nachtfrosten geeignete Schutzmittel anwenden kann. Die Entwicklung der Pflanzen hängt jedoch hauptsächlich von einem sachgemässen Begiessen ab. Anfangs giesse man mit der Brause, bis sich eine festere Erdkruste gebildet hat, welche das Giessen mit dem Rohre gestattet. Besonders wenn die Pflanzen zu blühen anfangen, ist Vorsicht geboten. Man giesse dann nur die völlig ausgetrockneten Töpfe gründlich und zwar bei warmem Wetter gegen Abend, bei kühlem morgens. Bei anhaltend trüber oder regnerischer Witterung wird schwächer und seltener gegossen, da die Levkoyen dann anziehen und frisch bleiben. Nur durch correctes Giessen schützt man die Pflanzen gegen jene kleinen, weissen Maden, welche sonst kurz vor der Blüthe, auch schon während der Knospenbildung auftreten und dadurch, dass sie die Pfahlwurzel bis zum Stamm zerfressen, ein Welken und Hinsterben vieler Levkoyen herbeiführen. Ein anderer Feind der Levkoyen ist der Erdflöhen (s. S. 60), welcher oft in grossen Massen erscheint und die Blätter der jungen Pflanzen zerfrisst. Bei den Levkoyen darf man ihn mit keinen schärferen Mitteln als öfteres Ueberspritzen mit Wasser zu Leibe gehen. Wir bemerken noch, dass in günstigen Lagen auch eine Herbstsaat der Sommerlevkoyen anwendbar ist. Die Pflanzen werden, auf Mistbeet pikirt, überwintert und im April eingepflanzt, wodurch man natürlich einen sehr frühen Flor erzielt.

Freilandcultur. Hierzu lässt man die Pflanzen etwas kräftiger als die in Töpfe gepflanzten werden und bringt sie von April an, je nach der Witterung, an ihren Bestimmungsort. Obgleich die Levkoyen mit beinahe jedem Boden vorlieb nehmen, so kann man schöne Exemplare doch nur in nahrhaftem, etwas sandigen, genügend gedüngten Lande oder, in Ermangelung desselben, durch Giessen mit flüssigen Düngemitteln erzielen. Die Abstandsweite der Pflanzen hängt von den Racen ab, ferner davon, ob die einfach blühenden entfernt werden sollen. Im freien Lande sind die Levkoyen, wenn sie erst angewachsen, viel weniger empfindlich als die in Töpfen

gezogenen; man halte nur die Beete von Unkraut rein, lockere mehrere Male die Oberfläche des Bodens und giesse bei Trockenheit, besonders während der Blüthezeit, oft und durchdringend.

Um wirklich schöne Exemplare im Lande zu haben, empfehlen wir dringend, die Sämlinge auf dem Mistbeete und später womöglich nochmals auf ein geschütztes Beet zu pikiren. Ersteres geschieht, sobald die Pflanzen einige Blätter haben, unter geschlossenen und gut beschatteten Fenstern. Wenn die Bewurzelung stattgefunden, werden sie durch Lüften und später durch Entfernen der Fenster abgehärtet. Das zweite Verstopfen findet statt, wenn die pikirten Pflänzchen einander beengen; man pflanzt möglichst bei trübem Wetter oder abends, beobachtet wenigstens 15 cm Abstandsweite und giesst regelmässig und vorsichtig. Der grosse Vorzug solcher mehrere Male pikirter Pflanzen besteht nicht allein darin, dass man sie mit Ballen an Ort und Stelle bringen, sondern hiermit sogar warten kann, bis sie Knospen zeigen. Dann ist man in der Lage, die einfach blühenden vorher auszuschneiden und mit den gleichmässig gewachsenen Pflanzen, bei richtiger Wahl und Farbenzusammenstellung, prächtige Beete und Gruppen herzustellen.

Die **Herbstlevkoyen** werden etwa 40 cm hoch, sie bilden stark verzweigte, sehr reich- und grossblumige Pyramiden. Sollen die Herbstlevkoyen einen schönen Flor im Aussaatjahre entfalten, so müssen sie spätestens Mitte März ausgesäet werden; man pflanzt sie nur zu zwei in einen Topf. Hat man sie im Freien ausgepflanzt, so lohnt es der Mühe, diejenigen Pflanzen, welche dort nicht zur Blüthe kommen, jedoch gefüllte Knospen zeigen, einzutopfen und in einem hellen, trockenen Raum blühen zu lassen. — Man säet diese Gruppe auch im Juli oder August, um sie im Frühjahr in Flor zu haben, während des Winters wird ihnen in diesem Falle dieselbe Behandlung wie den mehrjährigen Sorten (B) zu Theil. — Prächtig sind die schottischen Herbstlevkoyen; sie werden nur 25 cm hoch, sind pyramidenförmig, jedoch gedrungen gebaut, sehr grossblumig und liefern einen hohen Prozentsatz gefüllt blühender Pflanzen.

B. Mehrjährige Levkoyen.

Unter diesen dauern manche Sorten oft länger als zwei Jahre und werden strauchartig, sie verlieren dann jedoch an Schönheit; aus diesem Grunde zieht man sie in jedem Jahre neu heran und behandelt sie wie Bisannuelle. Als gemeinsame Eigenschaft heben wir

an ihnen den stärkeren Wohlgeruch als bei den Sommerlevkoyen hervor. Sie liefern einen hohen Procentsatz gefülltblühender und gehören zu den hervorragendsten Marktpflanzen. Wir unterscheiden:

- I. Kaiser- oder perpetuelle: 30 bis 35 cm hoch, von gedrungenem, buschigen Bau mit dichter, blaugrauer Belaubung. Die zahlreichen, straffen Seitenzweige endigen in gedrängt mit Blüthen besetzten Rispen; letztere sind bei den grossblumigen Sorten schön gewölbt. Eine der schönsten Racen für Fensterschmuck, Gruppen, Rabatten etc., welche oft schon im Spätwinter zur Blüthe kommt, im Frühjahr aber einen bis Anfang Sommer fortschreitenden Blüthenreichthum entwickelt.
- II. Winterlevkoyen (*Cheiranthus incanus* L.): 50 bis 60 cm hoch, einige Sorten noch höher. Unterscheiden sich von I. durch ihre längeren Blätter; die Nebenzweige sind aufrecht strebend und endigen in mehr oder weniger lockeren Blüthenrispen an längeren Stielen. Unter den zahlreichen Sorten bauen sich einige schlank, andere buschig, wieder andere haben das schöne Lackblatt. Blüthezeit und Verwendung wie bei den Kaiserlevkoyen, auch zum Schneiden für Bouquets etc. besonders geeignet.
- III. Zwerg-Kugel- oder Zwerg-Bouquet-Winterlevkoyen: Ca. 20 cm hoch, von compactem Bau, buschig verzweigt, sehr reichblühend; für kleinere Töpfe und Gruppen.
- IV. Cocardeau- oder Baum-Winterlevkoyen: 35 bis 45 cm hoch, mit sehr starkem, bis zur Mitte blattlosen Hauptstamm, nach oben baumartig in straffe, abstehende Seitentriebe verzweigt, welche durch die Mittelrispe überragt werden. Auffallend durch lange, breite, dicht gedrängt stehende Blätter. Blüthenrispen etwas lockerer, aber mit grossen Blumen besetzt. Blühen lange und eignen sich vorzüglich für Topfeultur, zu Gruppen im freien Lande, auf Rasenplätzen in Parks und im Vordergrund von Gehölzpartieen.

Es giebt noch Stangen-Winterlevkoyen, deren Stamm in einer einzigen, sehr langen und starken Blüthenrispe endigt und sich nicht verzweigt. Sie bringen jedoch einen verhältnissmässig geringen Procentsatz gefüllter Blumen. — Erwähnung verdient

noch die sonderbare Erscheinung, dass an manchen Sorten der mehrjährigen (sehr selten an den einjährigen) Levkoyen die Blumen zuweilen weiss gestrichelt erscheinen, was sich auch während der Blüthezeit nicht verliert. Ob die Ursache in unregelmässiger Witterung oder in zu leichtem Boden zu suchen ist, lassen wir dahingestellt.

Cultur. Die beste Aussaatzeit ist der Monat Mai, es zeigen sich dann, mit Ausnahme der Cocardeau-L., viele Sorten im Herbst mit Knospen. Sät man früher, so blühen die Pflanzen nach warmen Sommern schon im Herbst und liefern dann zur erwünschten Blüthezeit (im Spätwinter und Frühjahr) einen schwächeren Flor. Das Aussaatverfahren ist dasselbe wie bei den Sommerlevkoyen, der vorgerückten Jahreszeit wegen hat man jedoch auf richtiges Beschatten und Begiessen der jungen Pflänzchen ganz besonders zu achten. Zunächst pikire man dieselben eng in nicht zu tiefliegende Kästen oder auf ein Pflanzbeet im freien Lande und verpflanze sie von hier Ende Juni oder Anfang Juli in das Land in möglichst freier Lage in einer Abstandsweite von wenigstens 25 cm. In der ersten Zeit nach dem Pflanzen begiesse man mehrere Male gründlich und lockere den Erdboden um die Pflanzen herum etwas auf; später können die Pflanzen ziemliche Trockenheit ertragen. Das Einpflanzen in Töpfe geschieht im September und October, man lässt dabei diejenigen weg, welche sich als einfach blühend deutlich kenntlich machen. Man benutzt düngerfreie, etwas sandige Garten-erde und bringt je nach ihrer Grösse eine oder zwei Pflanzen in einen Topf. Bei dem Ausheben aus dem Lande fällt die Erde von den Wurzeln ab, was jedoch nichts schadet. Letztere werden etwas beschnitten und beim Pflanzen fest angedrückt. Hierauf stellt man die Töpfe an einen schattigen Ort, giesst sie durchdringend an und überspritzt sie ausserdem noch einige Male während des Tages. So lange schönes Wetter herrscht, bleiben sie im Freien stehen, müssen aber gegen anhaltenden Regen geschützt werden. Bei Eintritt nebeliger oder rauher Witterung und Kälte stellt man sie unter Glas oder in ein Gartenzimmer, nachdem sie von den verwelkten und kranken Blättern befreit wurden. Das Winterlocal muss hell, trocken und frostfrei sein. Mistbeetkästen eignen sich nicht gut dazu, denn wenn sie wegen Kälte lange Zeit gedeckt bleiben, gehen viele Pflanzen durch Verschimmeln der Blätter und Stengel zu Grunde. Auch im gewöhnlichen Kalthouse, mit anderen

Pflanzen zusammen, halten sich Levkoyen nur dann gut, wenn sie dem Licht nahe stehen und durch die Cultur jener nicht schädlich beeinflusst werden. Man stellt sie aber gern dort auf, wenn sie bereits im Spätherbst blühen und im Frühjahr. Am besten durchwintern die Levkoyen im Kalthaus für sich allein oder in Gartenhäusern und anderen luftigen, zur Noth heizbaren Räumen.

Während des Winters muss man beim Giessen die rechte Mitte zwischen Trockenheit und Feuchtigkeit der Erde zu treffen wissen, so dass die Pflanzen weder faulen noch vertrocknen. In strengen, anhaltenden Wintern wird wenig gegossen, in milderer öfter, weil dann mehr gelüftet werden kann; man muss eben hierbei dem gerade herrschenden Wetter Rechnung tragen. Gelüftet wird stets reichlich am Tage, wenn die Temperatur über 0 Grad beträgt. Wenn das Frühjahr naht, putzt man die Pflanzen an hellen Tagen noch einmal gut aus.

Es ist auch ausführbar, Winterlevkoyen von vorn herein im Topfe zu erziehen, aber mühsam und undankbar, weil man sie mehrmals verpflanzen muss und demungeachtet keine besonders schönen Exemplare erzielt.

Cheiranthus Cheiri, Goldlack (*Cruciferae*). ♂

190. **Gefüllter Lack.** Man unterscheidet Stangenlack und Buschlack, ersterer bildet meist nur einen kräftigen, auf seiner halben Länge dicht mit gefüllten Blumen besetzten Stengel, während sich der Buschlack von vornherein in zahlreiche, ziemlich gleichmässig lange Aeste verzweigt. Von beiden Sorten giebt es hohe und niedere Classen (Zwerg-Stangen- und Zwerg-Buschlack). Bei dem Stangenlack sind die einzelnen Blumen meist dichter gefüllt als bei dem Buschlack, dafür ist letzterer blüthenreicher, also auch für Bouquets geeignet. Im Topfe gut cultivirt, liefert der gefüllte Lack prächtige, bestechende Marktpflanzen, deren Schönheit durch das dunkelgrüne Laub noch erhöht wird.

Der Samen ist sehr kostspielig, denn wirklich gut gefüllter Lack trägt sehr spärlich und selbst der von den besten Blumen gewonnene bringt einen kleinen Theil einfach blühender Pflanzen.

Man säet gleichzeitig mit den Winterlevkoyen von Mitte Mai an und verfährt wie bei diesen; die jungen Pflänzchen werden eng pikirt und, wenn kräftig genug, in das freie Land möglichst auf im Vorjahre gedüngten, lockeren Boden, bei einem Abstand von

ca. 25 cm verpflanzt, daselbst behackt und bei grosser Trockenheit gegossen. Von September bis October werden sie einzeln in Töpfe mit nahrhafter Erde gesetzt. Mischt man dieser noch verrotteten Kuhdünger bei, so erzielt man besonders kräftige Pflanzen. Die Ueberwinterung geschieht in tiefen Mistbeetkästen, luftigen, nicht zu dunklen Kellern oder ähnlichen Räumen. Wegen des Giessens richte man sich nach dem, was wir hierüber bei den mehrjährigen Levkoyen sagten. Mit Eintritt gelinder Frühjahrswitterung bringt man die Töpfe in das Freie auf Stellagen oder andere überdachte Stellen, so dass man sie gegen Frost schützen kann.

Die Blüthezeit fällt in die Monate Mai-Juni. Sollen die Pflanzen früher blühen, so setzt man die am meisten vorgeschrittenen unter Mistbeetfenster oder in das warme Zimmer, allerdings blühen sie dabei nicht so üppig. Der Goldlack ist zwar etwas härter als die mehrjährigen Levkoyen, aber seine Blumen (besonders die des violetten) sind gegen starken Sonnenbrand sehr empfindlich, weshalb man bei solchem beschatten muss. Auch gegen Sturmwind treffe man Vorkehrungen. Einmal in das Freie gestellt, verlangen die Topfpflanzen reichliches, durchdringendes Giessen, falls das Wetter nicht anhaltend trübe ist. Eine hohe Vollkommenheit erreichen die Blumen (auch in ihrer Dauer), wenn man bei Eintritt der Blüthezeit zuweilen mit flüssigem Kuhdünger, aufgelöstem Blutmehl u. dergl. gießt. Aber auch hiernit kommt man schwer zum Ziele, wenn man mit sehr heissem Wetter zu kämpfen hat.

Man kann die Pflanzen im Frühjahr wieder aus den Töpfen nehmen und im freien Lande zu Gruppen, auf Rabatten etc. verwenden; wegen seines ausgezeichneten Wohlgeruchs hat man den Lack gern in der Nähe der Wohnungen.

Der einfache Goldlack wird wie der gefüllte, jedoch einige Wochen später, ausgesäet, dann aber ohne vorheriges Pikiren an seinen Bestimmungsort in das Land gepflanzt, hält die meisten Winter ohne Bedeckung aus und verlangt keine besondere Pflege. Wegen seines niedrigen, buschigen Baues und grossen, andauernden Blüthenflors ist er zu weitleuchtenden Frühjahrsgruppen, in Parks etc. sehr zu empfehlen, er erfreut sich in Deutschland durchaus noch nicht der verdienten Beachtung. Der frühe schwarzbraune Dresdener eignet sich besonders zum Treiben (von Ende Februar an unter Glas) und ist eine geschätzte Marktpflanze, als welche auch die neue Tom Thumb-Gruppe zu empfehlen ist.

Dahlia variabilis, Georgine (*Compositae*). 4

191. Die Georginen werden fast ausschliesslich und mit grösster Leichtigkeit durch Stecklinge vermehrt, weniger häufig durch Knollentheilung, am seltensten zieht man sie aus Samen. Wer sich hiermit befasst, wird hauptsächlich die Erzielung neuer Varietäten im Auge haben. Selbst der von den besten Blumen gewonnene Samen bringt jedoch einen Theil geringwerthige Pflanzen. Bedenkt man, welche Mannichfaltigkeit in Form und Farbe dieser Blumen bereits besteht, so scheint die Cultur aus Samen fast zwecklos; gleichwohl finden Viele Freude daran, und der wirkliche Georginenfreund ist schon durch eine interessante, neue Blume, welche er in seine Sammlung aufnehmen kann, befriedigt, wobei ihm zu statten kommt, dass die Sämlinge im ersten Jahre ohne Schwierigkeit zum Blühen gebracht werden. Man hüte sich jedoch, über die Pflanzen nach ihren ersten Blumen endgültig zu urtheilen; häufig wird man von den späteren enttäuscht oder auch angenehm überrascht. Ist man unklar in dieser Beziehung, so überwintere man die betreffenden Knollen, damit sie im folgenden Jahre nochmals „Probe blühen“.

Man sät im März oder April in ein warmes Mistbeet oder in Töpfe, welche unter Glas gebracht werden, und zwar in sehr nahrhafte aber lockere Erde (welche die D. auch später im Freien verlangen). Die Samen gehen in 6 bis 10 Tagen auf. Alle Dahlien sind höchst empfindlich gegen Kälte, daher ist es, wenigstens in kälteren Gegenden, zu empfehlen, die Pflanzen, sobald sie einige Blätter haben, entweder auf dem Mistbeet auf ungefähr 12 cm Abstand zu pikiren, damit sie nicht zu lang werden, oder sie einzeln in Töpfchen zu bringen, auf alle Fälle, nachdem sie angewurzelt sind, durch Lüften abzuhärten und erst in das Freie zu pflanzen, wenn jede Frostgefahr ausgeschlossen ist. Beim Auspflanzen ist zu beachten, dass jede Pflanze 80 cm bis 1 m Bodenfläche gebraucht. Die Dahlien lieben eine sonnige Lage und reichliche Bewässerung. Im Spätsommer zeigen sich die ersten Blumen der jungen Samenpflanzen; diejenigen über deren Werthlosigkeit man klar ist, sind sogleich auszureissen, damit sie das Land nicht nutzlos auszehren.

Wir erwähnen noch, dass die Knollen erst wenn der Frost Laub und Stengel vernichtet hat, bei klarem Wetter mit etwa handlangem Stamm ausgehoben und, nachdem sie abgetrocknet, an einem gegen Kälte und Nässe geschützten, jedoch nicht warmen und nicht hellen Ort (z. B. im Keller oder Kalthaus), frei am Boden oder auf

Brettern, in trockener Erde oder trockenem Sand liegend, überwintert werden.

Da der Flor der Georginen in die Herbstmonate fällt und bis zum Frost andauert, so sind sie, wie die Asten, dem Gärtner in diesen Monaten, sei es zum Bepflanzen von Gruppen und Rabatten, oder für Bouquets, Kränze und Zimmervasen, fast unentbehrlich; sie lassen sich auch leicht in Töpfen ziehen.

Seitdem sich die Vorliebe für einfach blühende Dahlien geltend gemacht hat, wurden auch hierin bereits überraschende Resultate erzielt. Die Aussaat der einfach blühenden *D.* ist sehr lohnend, trotzdem sie die Muttersorte nichts weniger als treu reproduciren; die Pflege ist dieselbe wie oben besprochen. Ebenso werden die alten einfachen Species, z. B. *D. coccinea* und *Zimapani* cultivirt, jedoch annuell behandelt, also jährlich frisch ausgesät. *D. imperialis* ist Staude, kommt aber ohne Anwendung hoher Wärme schwer zur Blüthe. Wir möchten diese Besprechung nicht schliessen, ohne der sogenannten Cactus-Dahlie (*D. Juarezi*) zu gedenken, welche mit den enormen, scharlachrothen, gefüllten Blumen bei ihrer Einführung berechtigtes Aufsehen erregte; unseres Wissens erzeugte der Samen dieser herrlichen Pflanze bisher nichts Schönes.

Delphinium Ajacis und Consolida,

Rittersporn (*Ranunculaceae*). ☉

192. Folgende sind die wichtigsten Gruppen, welche von dieser so beliebten Sommerblume angebaut werden und treu aus Samen kommen:

a. Varietäten von Delphinium Ajacis.

- I. Hyacinthen-R. 50 cm hoch. Die Pflanzen, fast unverzweigt, bilden eine mit gefüllten Blumen dicht besetzte schöne Rispe. Zwar nicht lange, jedoch äusserst dankbar blühend, prächtig zu niedrigen Gruppen, Einfassungen und Bouquets.

Die Riesen- und Tom Thumb-H.-R., jene 1,25 m, diese nur 30 cm hoch, sind in der Form der Blumen den H.-R. gleich, erstere jedoch stark verzweigt.

- II. Ranunkel- und Zwerg-Ranunkel-R. Ersterer ebenso hoch, letzterer (fast ohne Nebenzweige) etwas niedriger als I., bilden sehr zierliche, runde, dicht aneinander

sitzende, stark gefüllte Blüten. Beide für niedrige Gruppen, erstere auch für Bouquets.

- III. Hoher R. Wird ca. 1—1,20 m hoch, in kräftigem Boden noch höher. Verzweigt sich stark, bringt zahlreiche, jedoch weniger dicht gefüllte Blumen. Vorzüglich für hohe Gruppen und Bouquets.

b. *Varietäten von Delphinium Consolida.*

- IV. Levkoyen-R. Ca. 1—1,20 m hoch, stark verzweigt, sehr reich, später und länger blühend als I., II. und III. Prächtig für Bouquets und grosse Gruppen, auch einzeln zwischen andere Pflanzen, ausserdem zum Trocknen.
- V. Kaiser-R. Etwa 60 cm hoch, levkoyenblüthig; die Pflanzen bilden reich verzweigte, kräftige Büsche mit straffen, aufrecht getragenen, dicht besetzten Rispen. Besonders für Gruppen geeignet.
- VI. Bismarck-R. Der Classe V. sehr ähnlich, jedoch in allen Theilen noch robuster und dichter belaubt. Der mittlere Blütenkolben baut sich fast kugelförmig. Für Gruppen.
- VII. Candelaber-R. 35 bis 40 cm hoch. Der Stamm verzweigt sich dicht über der Erde und trägt seine zahlreichen Blütenrispen aufrecht. Reizende, jedoch recht empfindliche Gruppe. Sehr schön für Einfassungen.

Man sät 1. in das freie Land im Herbst (Sept.-October).

2. „ „ „ „ „ Frühjahr.

3. „ kaltes Mistbeet, Anfang März.

Die kräftigsten und schönsten Pflanzen liefert unbedingt die Aussaat im Herbst; hierbei gehen die Rittersporn im folgenden Frühjahr auf, sie blühen dann sämmtlich ungemein dankbar, die Gruppen I., II., III. schon Anfang Juni, die übrigen von Juli an. Die Frühjahrsaussaat in das freie Land ist daher nur anzuwenden, wenn man im Herbst kein Land für diese Cultur frei gehabt hat. Man sät dann jedenfalls sobald es die Witterung irgend gestattet, denn bei dieser Aussaatzeit kommen sämmtliche Gattungen 3 bis 4 Wochen später als bei der Herbstsaat zum Flor. Die Aussaat (breitwürfig oder in Reihen) in das freie Land hat genau nach den in §. 177 a, S. 214 gegebenen Vorschriften zu erfolgen. Bei dem Verdünnen ist zu beachten, dass die Pflanzen aus den Gruppen III. bis VI., da sie mehr Raum beanspruchen, weiter von einander

entfernt kommen, als die der übrigen. Wer nicht an Ort und Stelle säen kann, muss zur Frühljahrsaussaat im kalten Mistbeet schreiten. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Sämlinge sehr jung an Ort und Stelle gebracht werden müssen, da sie nur dann ein Verpflanzen vertragen; die Gruppen IV. bis VII. sind indessen in dieser Beziehung nicht so empfindlich wie I. bis III. Die Rittersporn gedeihen zwar in jedem Boden, selbst in trockenen Lagen, um aber schöne Pflanzen zu erzeugen, muss das Land gut (jedoch nicht frisch) gedüngt und durchgearbeitet sein.

Dianthus caryophyllus fl. pleno,

Gartennelke (*Caryophylleae*). ¶

193. Die Fortpflanzung der Gartennelken kann geschehen durch Stecklinge, Absenker (marcottes) und Aussaat. Die erste und zweite Methode dienen dazu, die Muttersorte genau zu erhalten und sind dem wirklichen Nelkenfreunde und Sammler dieser prächtigen Blumen ebenso unentbehrlich, wie die Aussaat es demjenigen ist, welcher Neues erzielen will. Dieser findet aber auch, wenn er zuverlässigen Samen verwendet, bei Musterung der blühenden Pflanzen eine Fülle des Interessanten und Schönen. Vor allem muss Jeder die Nelken säen, der Blumen zum Schneiden braucht, denn die üppigen, kräftigen Samenpflanzen liefern deren wohl zehn Mal so viel wie die auf andere Weise gewonnenen Exemplare. Es giebt in der That wenig Pflanzen, welche die ihnen gewidmete, geringe Pflege so reichlich lohnen wie die Nelken. Allerdings sind unter den gewonnenen Pflanzen wenigstens ein Drittel mit einfachen oder geringwerthigen gefüllten Blumen; wenn man für diese keine Verwendung hat, entferne man sie, sobald sie sich erkennen lassen (bei den einfachen schon an der ersten Blume), weil dann noch die entstandenen Lücken von den übrigen Pflanzen bald ausgefüllt werden, während sie sich sonst gerade zu den stärksten, zehrendsten Büschen ausbilden würden. — Unter Wiener N. versteht man eine etwas niedrigere Classe der Gartennelken; sie blühen etwa zwei Wochen früher und zwar ungemein reich, bringen einen sehr hohen Procentsatz gefüllter, unter denen sich jedoch selten Musterblumen finden. Sie sind ebenso zu empfehlen wie die prächtigen, niedrigen, scharlachrothen und äusserst frühblühenden Grenadin-N.

Man kann die Gartennelken von April bis Juli aussäen und zwar säet man nicht zu dicht nach den auf S. 215—216 gegebenen

Regeln in ein kaltes Mistbeet, in Töpfe oder Saatkästen unter Glas oder auf Saatbeete des freien Landes. Sie gedeihen in jeder gut durchgearbeiteten, kräftigen Gartenerde, welcher man vortheilhaft etwas Sand zusetzt. Der Samen, welcher verhältnissmässig stark bedeckt wird, geht binnen 2 bis 3 Wochen auf und zwar ungleichmässig.

Ogleich die jungen Sämlinge gleich an Ort und Stelle gepflanzt werden könnten, so ist es doch besser, sie durch wenigstens einmaliges, enges Pikiren sich kräftigen zu lassen und, erst wenn sie mindestens 6 Blättchen haben, an ihren Bestimmungsort zu bringen, und zwar am besten im Spätsommer. Sie werden daselbst mit 20 cm Entfernung gepflanzt und dann einige Male leicht (flach) behackt. Die Nelken im freien Lande verlangen im Winter keinerlei Schutz, höchstens gegen Hasen, Kaninchen oder Mäuse, denen sie allerdings Leckerbissen sind. Bei Trockenheit muss im Frühjahr öfters sehr gründlich begossen werden; ob dies weniger nöthig, wenn man, wie es in Frankreich vielfach gebräuchlich, die Pflanzen mit etwas kurzem, verrottetem Mist umgiebt, lassen wir dahingestellt sein. Für Nelken ist übergrosse Trockenheit ebenso schlimm wie anhaltende Nässe. Man kann beim Giessen flüssige (besonders Faekal-) Düngemittel anwenden. — Diese Samenpflanzen bilden sich bis zum Juni zu so üppigen Büschen aus, dass man oft gezwungen ist, sie durch Aufbinden gegen starken Wind und Regen zu schützen; sie beginnen um diese Zeit zu blühen und liefern eine Fülle der schönsten, wohlriechendsten Blumen, eine Zierde für jeden Strauss. Abgeschnittene junge Blumen mit nicht zu kurzen Stielen halten sich sehr lange im Zimmer, besonders wenn diese in feuchten Sand gesteckt werden. Des starken Geruchs wegen muss man jedoch mit dem Aufstellen sehr vieler Blumen in Schlafzimmern vorsichtig sein.

Hat man nun durch die Aussaat Sorten erzielt, welche man beibehalten möchte, so müssen von den betreffenden Pflanzen Stecklinge oder Absenker *) gemacht werden. In den folgenden Jahren

*) Das Absenken geschieht im Topf wie im freien Lande gegen Ende der Blüthezeit an den unteren Zweigen. Man entfernt die unteren Blätter bis zum 3. oder 4. Knoten und schneidet von den übrigen die Spitzen ab. Hierauf entfernt man etwa 2 Finger hoch die alte Erde und füllt dafür sandige, nicht zu grobe Gartenerde auf. Weder zu weit nach oben, noch zu weit nach unten, durchsticht man mit einem feinen, spitzen Messer die Mitte des Stengels, führt nach unten einen Schnitt durch einen Knoten hindurch und schneidet etwas weiter den so gespaltenen Stengel durch Umbiegen des Messers vorsichtig nach rechts auf der untern Seite durch. Nun biegt man

blühen die Pflanzen nicht mehr so dankbar; sie werden überhaupt unschön, und wir rathen entschieden davon ab, sie nach dem ersten Flor aufzubewahren, sondern empfehlen die alljährliche Aussaat.

Der wirkliche Liebhaber dieser herrlichen Blumen kann ohne die Topfcultur, die es ihm ermöglicht, die Pflanzen zusammenzustellen, zu vergleichen und zu schützen, nicht zu einer schönen Sammlung gelangen. Er hat im Herbst die bewurzelten Stecklinge oder Senker in kleine Töpfe zu pflanzen und sie, sorgsam etikettirt, im Mistbeet oder einem anderen, gegen starke Kälte geschützten und hellen Raum zu überwintern, in welchem, so oft es angeht, gelüftet wird, und im Frühjahr in grosse Töpfe zu verpflanzen.

Es ist sehr vortheilhaft, wenn die Erde, welche man hierzu verwendet, schon im Herbst vorbereitet war. Humusreiche Garten- oder alte Mistbeeterde eignet sich am besten und es empfiehlt sich, derselben etwas verrotteten Kuhdung und wenig Sand beizumengen. Je öfter sie fortgearbeitet wurde, desto besser; vor dem Pflanzen wird sie natürlich nochmals gesiebt. Muss man frische Gartenerde nehmen, so setze man derselben etwas Lauberde zu. Auf guten Wasserabzug und festes Andrücken der Pflanzen hat man Bedacht zu nehmen. Sie werden regelmässig gegossen und sehr bald aufgebunden. Das Aufbinden hat, da die Stengel leicht umknicken, nicht nur vorsichtig, sondern auch wiederholt zu geschehen, wenn die Pflanzen weiter wachsen. Viele Liebhaber bedienen sich grün bestrichener Blumenstäbe als Stützen, und kleiner Metallringe, die in jene leicht eingedrückt werden, statt des sonst üblichen Bastes. Will man recht grosse Blumen haben, so muss man einen Theil der Seitentriebe bei Zeiten unterdrücken. Es ist gut, die Pflanzen, um sie der Luft recht auszusetzen, etwas hoch zu stellen, aber doch so, dass sie bei argem Wetter geschützt werden können. Hierzu haben sich für grössere Culturen bisher am besten Stellagen bewährt, welche eben hoch genug sind, um das Giessen ohne Anwendung einer Leiter zu ermöglichen, und mit derzeit disponiblen Mistbeetfenstern bedeckt werden, welche man vom Juni an weiss bestreicht.

behutsam den Zweig nach der aufgefüllten Erde herunter und zwar so, dass der abgeschnittene Theil (an welchem sich die Wurzeln bilden) senkrecht darin steht, der andere, mit dem Hauptstamm in Verbindung stehende, waagrecht auf der Erde liegt. Die Schnittfläche ist auf alle Fälle offen zu halten. Hierauf hakt man den Senker mit einem Holzhäkehen (Nelkenhaken) in die Erde fest. Beim Giessen darf die Erde nicht weggespült werden.

Für den Nichtspecialisten genügen wohl die obigen Fingerzeige einer rationellen Nelkencultur. Dem wirklichen Liebhaber darf indessen die einschlägige Literatur so wenig fremd sein wie die Kennzeichen einer guten Nelke. Bei den zahllosen Varietäten hat sich eine Classification derselben nöthig gemacht, welche auf der Zeichnung der Petalen beruht. Das in Deutschland am besten bekannte ist das Weissmantel'sche System, dessen Grundzüge in den meisten Special-Verzeichnissen von Nelken zu finden sind.

Die Gruppe der **Remontantnelken** (*D. caryophyllus semperflorens*), welche sich stark verzweigen, gewinnt auch in Deutschland immer mehr Freunde. Sie blühen nicht reichlich auf einmal, dafür jedoch so lange, dass sie den ganzen Winter hindurch Blumen liefern können, vorausgesetzt, dass man die Pflanzen während des Sommers durch mehrmaliges Entspitzen der Seitentriebe zurückgehalten hat. Die Pflanzen werden aus Samen in gleicher Weise, wie oben mitgetheilt, gezogen; man findet unter denselben wenig einfach blühende.

Die Remontant-N. sind allerdings etwas empfindlicher bei uns, es heisst aber zu ängstlich sein, wenn man meint, sie ganz in Töpfen cultiviren zu müssen, wir befürworten im Gegentheil, sie wie die andern G.-N. in das Freie auszupflanzen, sie dort zu pflegen, im September in grosse Töpfe einzusetzen und im Kalthaus oder luftigen Zimmer, dem Licht möglichst nahe, zu bringen, wo sie mässig feucht (bei ca. 5° R.) zu halten sind.

Von dieser Classe sind im Verhältniss noch nicht viele Varietäten vorhanden, man ist daher in den Ansprüchen auf besonders schöne Petal-Zeichnungen vorläufig bescheiden und freut sich der immerhin guten Blumen, die man zu einer Zeit schneiden kann, wo an Material für Bouquets meist grosser Mangel herrscht. Wo solche gut bezahlt werden, kann daher die Anzucht der R.-N. den Gärtnern nicht dringend genug empfohlen werden. Auch die neue niedrige Classe (*à tige de fer*) verdient Beachtung. Das Absenken der R.-N. bietet im Topfe nicht geringe Unbequemlichkeiten; im allgemeinen wird jetzt die Vermehrung durch Stecklinge derjenigen durch Senker vorgezogen.

Dianthus chinensis und Heddewigi,

Chineser Nelke etc. (*Caryophylleae*). ☉ ♂

194. Die Cultur dieser Nelkengruppe ist so einfach wie möglich. Sie sind eigentlich zweijährig, doch säet man sie wie Annuelle

von März bis April nach den Vorschriften des §. 177 b. (S. 215—216) und sucht möglichst gedrungene Pflanzen zu erzielen, welche im Mai an Ort und Stelle gebracht werden und zwar, je nach den Sorten, mit 15 bis 25 cm Abstand. Ausserdem ist (jedoch nur in besonders günstigen Lagen) sowohl die Herbst- wie die Frühjahrs-Aussaat an Ort und Stelle anwendbar.

Wir widmen den Chineser Nelken und den daraus gewonnenen Abarten eine besondere Besprechung nur, um auf die Mannichfaltigkeit, Farbenpracht und vielseitige Verwendbarkeit dieser herrlichen Sommerblumen hinzuweisen und zu betonen, dass wenige Gramm guten Samens genügen, um den Garten prächtig damit zu schmücken. Ihr Farbenglanz wiegt reichlich ihre Geruchlosigkeit auf, und es sind die einfach blühenden ebenso schön wie die gefüllten. Während bei den eigentlichen Chineser Nelken stets mehrere Blumen an einem Stiel sitzen und so ein Miniatur-Bouquet bilden, zeichnet sich die Unterabtheilung der Kaisernelken durch die zahlreich verästelten Pflanzen aus, deren mittelgrosse Blumen ungemein zierlich sind, hingegen bestehen die Heddwigs-Nelken, von denen es eine Reihe Varietäten mit einfachen, gefüllten und geschlitzten Blumen giebt, durch Grösse und besondere Farbtöne ihrer Blüthen. Von fast allen diesen Nelken sind sowohl ganz niedrige Formen wie auch einzelne Farben aus Samen fixirt worden, die Cataloge geben hierüber am besten Auskunft. — Es giebt wenige Sommerpflanzen, welche diesen Nelken in Bezug auf reiches und dauerndes Blühen (vom Juni bis zum Frost) ebenbürtig zur Seite stehen. Sie sind unschätzbar für Bouquets, eignen sich sehr gut zum Bepflanzen von Rabatten, kleinen Beeten, sowie als Einfassung, und, was wir hervorheben, vorzüglich zur Topfcultur, da sie sich leicht mit Erdballen aus dem freien Lande ausheben lassen. Es sind dankbare, Jedem zugängliche Pflanzen.

Impatiens Balsamina (*Balsamina hortensis*),

Balsamine (*Balsamineae*). ☉

195. Auch diese Annuelle ist durch die Cultur jetzt zu hoher Vollkommenheit gebracht worden und wird in den verschiedensten Formen und Farben aus Samen gezogen. Schöne Zeichnung der Petalen finden wir bei den verschiedenen *Camellien-* oder *gefleckten*, sowie bei den *nelkenartig gestreiften B.*, dichte Füllung der Blumen hauptsächlich bei den *hohen Rosen-* oder *Andrieux-* und *verbesser-*

ten *Camellien-B.* Ausserdem cultivirt man die *Zwerg-B.*, die selten über 20 cm hoch werden, sehr treu aus Samen kommen, aber gering gefüllt blühen. Auch der Samen der gefülltesten Sorten bringt stets einige einfach blühende Pflanzen.

Bei der Cultur der Balsaminen hat man zu beachten, dass diese Pflanzen grosse Feuchtigkeit brauchen, um dankbar zu blühen, und dass sie sehr empfindlich gegen Frost sind: sie unterliegen dem geringsten Nachtreif. Da der Samen, welcher übrigens 6 Jahre und oft noch länger keimfähig bleibt, nach einigen Tagen aufgeht, so bilden die B. gewöhnlich den Beschluss der Frühjahrs-Aussaaten. Man säet auf ein warmes Mistbeet, oder in Töpfe und andere Saatgefässe unter Glas. Die jungen Sämlinge werden auf dem Mistbeet mit 10 cm Abstand pikirt und zwar so, dass die Cotyledonen dicht auf der Erde liegen, vorsichtig durch allmähliches Lüften abgehärtet und, wenn keine Fröste mehr zu befürchten, mit möglichst starkem Erdballen in gut bearbeitetes, fettes Land tief ausgepflanzt, und zwar je nach den Sorten mit 25 bis 55 cm Abstand. Wer dies früher wagen will, thut wohl daran, die Hälfte seiner Pflanzen in Reserve zu halten. Es kommt hierbei der grosse Vorzug der B. zu Statten, in jedem Alter, also auch wenn sich die Blumen zeigen, das Verpflanzen zu vertragen, vorausgesetzt, dass sie reichlich gegossen werden. Dadurch wird es also möglich, Beete, aus einer Farbe und nur gefülltblühenden Pflanzen bestehend, herzustellen, die ungemein prunken, besonders wenn sie etwas erhöht liegen.

Sehr dankbar und einfach ist die Topfcultur der B. Für diesen Zweck können sie früher ausgesäet und mit grösseren Abständen pikirt werden. Man pflanzt sie dann mit starkem Ballen in möglichst nahrhafte, dabei aber lockere Erde in grosse Töpfe, welche, bis die Bewurzelung erfolgt, schattig zu halten sind. Im Zimmer oder Kalthaus blühen die Balsaminen lange und dankbar.

Wir betonen, dass es trotz ihrer einfachen Cultur nicht möglich ist, schöne B.-Blumen zu erzielen, wenn man es dem Boden an Nahrung oder den Pflanzen an reichlichem Begiessen fehlen lässt. Viele Gärtner schneiden, um recht schöne, dicht besetzte Blumenstengel zu erzielen, einen Theil der Seitentriebe aus; bei einigen Sorten, welche sonst sehr buschig werden würden, ist dies sogar geboten.

Die B. können im Garten überall: zu Beeten, Rabatten. Einfassungen, wie auch zu Bouquets verwendet werden. und es ist wichtig, zu wissen, dass sie es lieben, der vollen Sonne ausgesetzt

zu werden und in schattigen Lagen nicht so gut gedeihen. Trotz ihres starken Laub- und Wurzelwerks zehren sie den Boden wenig aus. Sie blühen von Ende Juni an ununterbrochen, bis der erste Frost ihr Dasein beendet.

Lobelia (*Lobeliaceae*). ☉ ♀

196. *L. Erinus* und deren Abarten können zwar, wenn sie während der kalten Jahreszeit unter Glas stehen, oft mehrere Jahre erhalten werden, man behandelt sie jedoch meistens als Annuelle. Es sind reizende, sehr lange und ungemein reichblühende Pflanzen, welche man ungern im Garten vermisst. Die ältere Gruppe umfasst die ganz niedrigen, sich verästelnden Sorten von *L. Erinus* in blau, weiss und rosa, besonders gut zu Einfassungen geeignet, da sie den Boden ganz bedecken, aber auch vorzügliche Topfpflanzen, welche im Zimmer lange blühen, ausserdem prächtig für Ampeln in hellen, kühlen Räumen: Verandas u. dergl., und auch zierlich für Bouquets. Die compacten Varietäten (*gracilis erecta* oder *compacta*) sind für die Teppichgärtnerei fast unentbehrlich: die kleinen, ganz mit Blumen bedeckten Büschchen gewähren, wenn Lücken vermieden sind, einen reizenden Anblick; sie eignen sich ebenfalls trefflich für kleine Töpfe. Man vermehrt diese *L.* auch aus Stecklingen, doch ist die Anzucht aus Samen weit wohlfeiler, um so mehr, als die Sorten jetzt so treu kommen, dass nur wenige Sämlinge entfernt zu werden brauchen.

Die *L.* haben sehr feinen Samen, derselbe wird vom März bis April ausgesät und zwar entweder in ein kaltes Mistbeet oder in Töpfe, Terrinen oder Saatkästen mit gutem Wasserabzug, welche unter Glas oder in ein Mistbeet gestellt werden. Der Samen wird nicht oder nur sehr wenig bedeckt; im übrigen ist die Behandlung die im §. 177 b (S. 215—216) angegebene. Die Sämlinge werden bald ganz eng auf ein kaltes Mistbeet pikirt und können von Mitte Mai an in das freie Land gepflanzt werden, und zwar die compacten Sorten mit ca. 15 cm Abstand, die andern etwas weiter. Sie lieben nahrhaften, aber lockeren Boden, besonders einen Zusatz von Haideerde. Ausserdem kann man eine Herbstaussaat im September vornehmen, wobei die Sämlinge am besten, in Terrinen oder Töpfen pikirt, im Mistbeet oder Gewächshaus überwintert werden; solche Pflanzen blühen natürlich sehr früh. Schneidet man die Pflanzen nach der Blüthe zurück, so entwickeln sie bei günstigem Wetter

noch einen zweiten hübschen Flor. — *L. ramosa* ist einjährig und etwas empfindlicher, sie verlangt Aussaat im Warmen, liebt sandige Haide- oder Lauberde und wird ausserdem wie die obigen Sorten behandelt und verwendet.

Eine besondere Gruppe bilden *L. fulgens*, *cardinalis*, *syphilitica* und *Fabri*, welche sämmtlich bei frostfreier Ueberwinterung ausdauern, über meterhoch werden, weit weniger, jedoch sehr grosse Blumen bringen, sehr lange blühen und als grössere Gruppen oder in kleinen Trupps auf Rasen, auch als Vordergrund von Gehölzpflanzungen sehr schön wirken, und sich zur Topfcultur eignen. Besondere Erwähnung verdient die herrliche, scharlachblühende *L. fulgens Queen Victoria*, welche mit ihrem dunkelrothen Laube, schon ehe sie zur Blüthe gelangt, ungemein decorirt. Die Anzucht aus Samen der hierher gehörenden Sorten, welche auch durch Theilung vermehrt werden können, ist sehr dankbar, wenn es auch selbst tüchtigen Gärtnern oft misslingt, dieselben im ersten Jahre zum Blühen zu bringen. Man säet im Februar oder im Herbst in Kästen, Terrinen oder Töpfe, welche man in das Warmhaus oder auf ein warmes Mistbeet stellt, am besten in sandige Haideerde oder, wenn diese fehlt, in Lauberde mit einem Zusatz von Mistbeet- oder Rasenerde. Die Aussaaten werden feucht und warm gehalten, die ganz jung zu pikirenden Sämlinge, welche in dieselbe Erdmischung kommen, ebenfalls. Ein zweites Verstopfen auf das Mistbeet, oder besser noch in kleine Töpfe, in nahrhafte, sandige, lockere Erde, nach welchem die Pflanzen durch Lüften abzuhärten sind, ist nothwendig, bevor dieselben in das Freie oder in grössere Töpfe kommen. In ersterem Falle giebt man ihnen 50 cm Abstand und sorgt später für reichliche Bewässerung; die Blüthen selbst sind indessen gegen anhaltenden Regen sehr empfindlich. — Die selten angebauten Species *L. picta*, *Mitchelli* und *trigonicaulis* verlangen ebenfalls warme Aussaat und werden am sichersten in Töpfen gezogen.

Mimulus, Gauklerblume. (*Scrophularineae*). 4 ☉

197. Auch diese ausdauernden Pflanzen werden einjährig cultivirt. Die Samen, welche unendlich fein sind, wie auch die jungen Sämlinge, werden ebenso behandelt wie die der *Lobelia* (§. 196). Mitte Mai pflanzt man sie je nach der Grösse der Sorte 10 bis 30 cm von einander aus oder auch in Töpfe und hält sie ziemlich feucht. Schon nach zwei Wochen zeigen sich die ersten Blüthen und kräftige

Pflanzen treten bald in vollen Flor, welcher sich bis in den September, wenn auch nicht in stets gleicher Fülle, verlängert. Wenn man übrigens bei den Pflanzen, die keine volle Blüthe versprechen, die Stengel zurückschneidet, Düngererde 2 cm hoch darüber streut und einigemal stark giesst, so bilden sich von neuem zahlreiche Blüthenstengel, welche bis zum Herbst anhaltend blühen. Es gilt dies indessen nicht für die Gruppe der *M. cardinalis*. Die *M.* wachsen zwar überall, entwickeln sich jedoch in feuchten Bodenarten bei weitem am besten und müssen vor starken Winden geschützt stehen; bei grosser Hitze leiden die Blumen. Sehr gut stehen die *M.* an Wasserrändern, wo sie sehr üppig blühen und sich zuweilen Jahre hindurch halten. Auch die Herbstaussaat wendet man mit gutem Erfolge an. Beim Auspflanzen beachte man, dass die Varietäten von *M. cardinalis* am höchsten wachsen, die anderen zahlreichen Sorten bleiben theils mittelhoch, theils klein. Für niedrige Gruppen und Einfassungen empfehlen wir besonders *M. cupreus*, die übrigen eignen sich mehr für ersteren Zweck und sind hauptsächlich wegen der schönen und oft bizarren Zeichnungen ihrer Blumen sehr beliebt; die neuen grosblumigen *M.* verdienen die grösste Beachtung. Alle *M.* sind dankbare Topfpflanzen, wenn sie in kräftige, lockere Erde kommen und reichlich gegossen werden; man pflanzt gern mehrere in ein Gefäss. Es ist sehr leicht, sie im Frühjahr durch Stecklinge und Theilung zu vermehren, dies kann auch (ausser bei *cardinalis*) in Teichen oder an den Rändern ruhig fliessender Bäche geschehen, in welche man sie einfach wirft, und wo sie förmlich zu Wasserpflanzen werden.

In grossen Mengen wird ihres Wohlgeruchs wegen die bekannte, zu Einfassungen und zur Topfcultur sehr geeignete Moschuspflanze, *M. moschatus*, gezogen. Sie gedeiht am besten in schattiger Lage in Haide- oder Moorboden, blüht vom Mai bis October und hält bei etwas Bedeckung auch im Winter im Freien aus.

Myosotis, Vergissmeinnicht (*Boraginaceae*).

198. *M. alpestris*, Alpen-Vergissmeinnicht, ist eine der besten Bisannuellen und gehört zu den sehr früh und sehr dankbar blühenden Gartenpflanzen, mit welchen man prächtig wirkende Gruppen herstellt. Es sind davon niedrige, compacte Formen (*M. a. nana compacta* und *elegantissima*) neuerdings gezogen worden, welchen für Einfassungen und Topfcultur der Vorzug vor den hohen zu geben

ist, während diese, wie auch die prächtige, grossblumige „*Elisa Fonrobert*“, wieder zum Schneiden für Bouquets die besseren sind, hauptsächlich wegen ihrer längeren Blütenstiele, die auch abgeschnitten im Wasser dankbar blühen. Die Cultur ist äusserst einfach. Man kann von Juli bis August in ein kaltes Mistbeet aussäen, pikirt wiederum auf ein solches mit 3 bis 4 cm Abstand und pflanzt im October an Ort und Stelle mit 20 bis 25 cm Entfernung; die niedrigen Sorten erhalten etwas weniger Abstand. Bei dieser Behandlung blühen die Pflanzen schon Anfang Mai. Man kann das erste Verstopfen auch auf ein geschütztes Beet bewirken und das endgültige Pflanzen im Frühjahr vornehmen, wobei natürlich der Flor etwas später eintritt. Nur in ganz besonders strengen und dabei schneelosen Wintern leiden die Alpen-V., daher geben wir dem Pflanzen im Herbst den Vorzug. Die Frühjahrs-Aussaat, bei welcher man keinen dankbaren Flor erzielt, ist zu verwerfen.

M. sylvatica ist eine Annuelle und *M. oblongata* wird als solche behandelt; erstere Anfang, letztere Ende März in derselben Weise wie die Alpen-V. ausgesät, blühen beide von Ende Mai an lange und reichlich.

Für alle obigen *M.* ist die Freiland - Aussaat an Ort und Stelle ebenfalls anwendbar.

Das herrliche, grösstblumige *M. dissitiflora* wird wie das Alpen-V. behandelt, muss jedoch unbedingt gegen Frühjahrsfrost geschützt werden. Hingegen eignet sich *M. rupicola*, ein reizendes Miniatur-V. von kaum 12 cm Höhe, nur zur Topfcultur oder zum Auspflanzen in ganz schattige Lagen und verlangt eine lockere, sandige Mistbeet- oder Lauberde. Auch das Sumpf-V., *M. palustris* und dessen Garten-Varietäten, ebenso schön für Bouquets wie für Topfcultur, sind leicht in derselben Weise aus Samen zu ziehen und man kann dabei sowohl die Frühjahrs- wie die Herbst-Aussaat anwenden. Sie gedeihen naturgemäss am besten an Teichen oder Bächen, aber in kräftigem Boden und bei reichlicher Bewässerung blühen sie lange und reichlich überall im Garten, wenn auch ihre Blätter nicht so dunkelgrün werden. Dieselben eignen sich zum Treiben, wozu man starke Pflanzen im September eintopft; bei anfänglich mässiger, später mehr Wärme, blühen sie schon zu Weihnachten.

M. azorica, eine prächtige, sehr dankbar blühende Classe, vorzüglich zur Topfcultur, auch für Gruppen und für Bouquets, ist viel empfindlicher als die obigen V. Man sät entweder im Herbst

oder im Januar-Februar in sandige Mistbeeterde in Kästen oder Terrinen, sei es im Warmhaus oder warmen Mistbeet und hält die Aussaat feucht; die jung in Kästen pikirten Sämlinge pflegt man unter denselben Bedingungen. Für die weitere Cultur in Töpfen oder im Mistbeet pflanzt man im April, während sie in das freie Land erst im Mai kommen dürfen; man giebt den Pflanzen 20 cm Abstand. Sie verlangen dann nicht zu schweren, jedoch nährhaften Gartenboden, schattige Lage und während der Haupt-Vegetationszeit starkes Gießen. Herbstsämlinge sind frostfrei und hell zu durchwintern.

Die *M.* leiden zuweilen durch Schimmel, welcher besonders bei starker Hitze nach vorhergegangenen feuchten Wetter eintritt und durch Bestreuen der Pflanzen mit Schwefelblüthe meist mit Erfolg bekämpft wird. — Der Marktgärtner wird für alle oben besprochenen *V.*, wenn er sie in Töpfen gut cultivirt hat, stets reichlichen, lohnenden Absatz finden. Sie können übrigens, mit Ausnahme der *M. azorica* (diese durch Stecklinge) sämmtlich, besonders die Sumpfv., durch Pflanzentheilung vermehrt werden.

Petunia hybrida, Petunie (*Solaneae*). ☉

199. Die grosse Beliebtheit dieser Pflanze beruht ebenso auf ihrer leichten Cultur, welche sie Jedem zugänglich macht, wie darauf, dass sie auch auf sehr armen Boden gedeiht, überaus dankbar blüht und den verschiedensten Zwecken dienen kann. In Folge dessen haben die Samenzüchter mit dieser Pflanze von jeher mit besonderer Vorliebe experimentirt, und die Erfolge ihrer Bemühungen werden diejenigen am besten zu beurtheilen wissen, welche sich erinnern, wie man noch vor einigen Jahrzehnten die wenigen damals bekannten besseren Sorten fast nur aus Stecklingen vermehrte. Was jetzt auf diese Weise an *P.* gezogen und an überwinterten Pflanzen verkauft wird, dient nur dazu, besonders schöne Sämlinge (namentlich gefüllte) zu erhalten und verschwindet der Zahl nach vollständig gegen die Massenzucht aus Samen. Dabei darf nicht unerwähnt bleiben, dass der Samen, gerade der edelsten Gruppen, die Muttersorten nur zur Hälfte bis zwei Drittel wiedererzeugt. Dies bezieht sich namentlich auf die grossblumigen und gefransten *P.*, deren Samen nur durch künstliche Befruchtung zu gewinnen und aus diesem Grunde sehr kostspielig ist. Auf die gleiche Weise wird von verschiedenen Züchtern, welche die *P.*-Zucht

als Specialität betreiben, Samen gewonnen, welcher, je nach den Sorten, zwischen 20 und 50 Procent gefülltblühender Pflanzen er giebt. Da die gefüllten Blumen selbst unfruchtbar sind, so ist dies nur dadurch möglich, dass von denselben gewonnener Pollen auf den Stempel einfacher Blüthen gebracht wird, welche letztere diesen gefüllten Petuniensamen ergeben.

Man sät die P. vom Februar bis April in das Warmhaus oder warme Beet und hält die Aussaat regelmässig feucht bis zum Aufgang (meist innerhalb 14 Tagen); die edlen Sorten bringt man gern in Töpfe, Terrinen oder Saatkästen. Die jungen Sämlinge, welche man vor dem Giessen stets austrocknen lässt, werden sehr bald pikirt und sobald sie einander beengen in kleine Töpfe gepflanzt. Die gewöhnlichen, für das freie Land bestimmten Sorten können nach einmaligem Pikiren und nach gehöriger Abhärtung gegen Ende Mai an Ort und Stelle gebracht werden, wenn es sich aber nur um kleine Pflanzungen handelt, ist es auch bei diesen richtiger, vorher die Sämlinge sich in Töpfchen gut bewurzeln zu lassen. Die P. lieben sonnige Lage, sie gedeihen fast in jedem Boden und breiten sich im Lande sehr aus; man kann sie daher, wenn man nicht gleich volle Beete haben will, mit 40 bis 60 cm Abstand auspflanzen.

Alle P. eignen sich sowohl für Topf- wie Landcultur; zu Gruppen und Prunkbeeten verwendet man indessen besser die alten kleinblumigen Sorten *phoenicea*, *Countess of Ellesmere* und die sehr wohlriechende *nyctaginiiflora*, welche treu aus Samen kommen, ferner *hybrida kermesina* und *venosa*, wie auch die besonders effectvollen, gefleckten und gesternt (Inimitable). Von letztgenannten existiren auch ganz niedrige, sowie gefüllte (*Liliput*) Varietäten, die wir für kleine Töpfe besonders empfehlen. Die grossblumigen Hybriden mit glattem oder gefranstem Rand, einfach oder gefüllt, werden hauptsächlich für die Cultur in Töpfen, wo man ihnen nahrhafte Erde giebt, gewählt. Man muss sie hierbei vor starkem Regen behüten, gegen welchen die Blumen sehr empfindlich sind. Diese Gattung ist an den grossen dunkelgrünen, behaarten Blättern sofort kenntlich. Wir erwähnten bereits, dass nur $\frac{1}{2}$ bis $\frac{2}{3}$ Pflanzen, bei den gefüllten noch weniger, echt kommen und bemerken noch ausdrücklich, dass die geringen und unechten Pflanzen zuerst und die besten gewöhnlich zuletzt zur Blüthe kommen. Es ist daher geboten, auch die scheinbar schwachen oder verkrüppelten Sämlinge, welche häufig die schönsten Blumen bringen, zu pflegen, bis man die

ersten Blüten gesehen hat. Diese P. in Töpfen müssen sorgfältig durch Stäbe gestützt und aufgebunden werden.

Alle P. sind äusserst dankbare Zimmerpflanzen, auch zum Schmuck der Verandas, Balcons, Vasen, Ampeln, sowie ferner in Holzkästen zur Zierde der Fensterbretter besonders geeignet. Da sie sehr rasch wachsen, können sie auch vortheilhaft zur schnellen Bekleidung niedriger Spaliere oder Gitter dienen. Da P., in kleinen Töpfen herangezogen, selbst wenn sie schon blühen, noch ausgepflanzt werden können, so ist es oft sehr angenehm, eine Anzahl davon in Reserve zu haben, um etwaige Lücken oder kahl gebliebene Stellen des Gartens damit zu schmücken. Der Flor der P. dauert den ganzen Sommer hindurch, diejenigen in Töpfen blühen, wenn sie bei eintretendem Frost geschützt zu stehen kommen, noch bis zum Winter. Der Wohlgeruch der P., am stärksten bei den eaderten und grünrandigen, macht sich namentlich abends bemerkbar.

Phlox Drummondii, Flammenblume (*Polemoniaceae*). ☺

200. Auch hier haben wir es mit einer höchst populären, durch allmälige Veredlung zu grösster Vollkommenheit gelangten, wegen ihrer einfachen Cultur Jedem zugänglichen Sommerpflanze zu thun. Am besten werden die Phlox von Mitte Februar bis Mitte März in ein mässig warmes oder kaltes Mistbeet oder in dahin zu stellende Saatgefässe gesäet, nach den in §. 177 b (S. 215—216) angegebenen Regeln. Die Aussaat geschieht deshalb so früh, weil die Ph. 2—3 Wochen Keimzeit bedürfen und sehr frühes Auspflanzen (Anfangs Mai), ohne Gefahr des Erfrierens bei Spätfrösten vertragen. Die Aussaat wird ziemlich feucht gehalten, und es ist sehr vortheilhaft, die jungen Sämlinge vor dem Auspflanzen eng in ein kaltes Mistbeet zu pikiren. An Ort und Stelle erhalten die Pflanzen 20—30 cm Abstand; sie zeigen schon Anfang Juni die ersten Blüten und entwickeln bald einen vollen Flor, welcher sich bis in den Spätherbst verlängert. — Ph. können auch in ein Warmhaus ausgesäet werden, wenn man die Saatgefässe nach dem Aufgang kühl stellt. Ferner ist in begünstigten Lagen sogar die Aussaat im freien Lande an Ort und Stelle anwendbar, sowohl im Frühjahr wie im Herbst. Um Phlox früher in Blüthe zu haben, kann man sie auch im Hochsommer aussäen und kühl überwintern. — Die Ph. lieben kräftigen Gartenboden, der auch frisch gedüngt sein darf, sonnige Lage und

reichliche Bewässerung. Wenn sie sich wohl fühlen, so entwickeln sich die Pflanzen zu starken Büschen und ein in vollem Flor prangendes Ph.-Beet zeigt ein Meer von Blumen.

Wir glauben, dass es kaum dankbarere Pflanzen für niedrige Gruppen und Einfassungen (auch von Gehölzgruppen) giebt, abgesehen von ihrer grossen Nützlichkeit als Schnittblumen. Für beide Zwecke ist es überaus wichtig, dass die Ph. ungemein farbenreich sind und die Sorten trenn aus Samen kommen. Die Abstufungen von weiss bis zum gesättigten Dunkelroth sind in reinen Farbtönen oder auch combinirt vertreten; es giebt ferner reizende Sorten mit weiss geängelten, gesternt und gestreiften Blumen. Die neuen *Ph.-D. grandiflora*, welche an Grösse und runder Form den Blumen der perennirten Ph. gleichkommen und die alten Ph.-D. bereits verdrängen, haben eine Reihe prächtiger neuer Färbungen geliefert.

Die Topfcultur der Ph.-D. ist sehr lohnend und in Deutschland noch nicht genügend angewendet. Es ist dabei sehr nützlich, die ersten Blüthen zu unterdrücken und die ersten Zweige zu entspitzen, um die Entwicklung von Seitentrieben zu befördern. Für kleine Töpfe ist ausser den Classen *Ph.-D. Heynholdi* und *Ph.-D. Graf Gero* noch die neuere Gruppe der *Ph.-D. nana compacta* besonders wichtig. Letztere sind reizende Pflanzen, welche ganz kleine, mit Blüthen sich dicht bedeckende Büsche bilden, für Einfassungen, kleine Beete und auch in der Teppichgärtnerei vorzüglich anwendbar.

Alle Ph.-D. lieben die Sonne und sehen bei Regenwetter mit den verwaschenen Blumen unerfreulich aus, erholen sich jedoch schnell. Sie werden gern vom Engerling angegriffen.

Portulaca grandiflora, Portulak (*Portulacaceae*). ☉

201. Von dem grossblumigen Portulak sind sowohl einfach- wie gefülltblühende Sorten, letztere sehr bezeichnend P.-Röschen genannt, in Cultur; beide Classen sind äusserst dankbar. Diese reizenden, ganz niedrigen Pflanzen breiten ihre kurzen, tannennadel-förmigen, dicken, fleischigen Blätter dicht über der Erde aus und entfalten an den Spitzen der Zweige grosse, leuchtende Blumen in weiss, gelb und roth, welche sich jedoch nur bei Sonnenschein öffnen. Die P. können unter Glas mehrere Jahre erhalten werden, man behandelt sie jedoch fast nur einjährig.

Man säet den sehr feinen Samen entweder von Ende März an in das Mistbeet oder in Töpfe, welche man mit sandiger Erde füllt,

schwach bedeckt und in das Mistbeet stellt, oder von Anfang Mai an sogleich in das freie Land, wo der Samen nur eingekratzt und festgeschlagen wird. Bis zum Keimen muss die Saat feucht gehalten werden. Die Aussaat im Mistbeete oder in Töpfen fällt leicht etwas zu dicht aus, in welchem Falle die Pflänzchen schon klein pikirt werden müssen, was auch um Fäulniss zu verhüten nothwendig ist. Das Pflanzen in das Freie findet erst nach Mitte Mai statt, da die P.-Pflanzen sehr empfindlich gegen Frost sind; man giebt ihnen ca. 25 cm Abstand. Unter den Sämlingen der gefüllten P. sind stets viele einfache. Will man daher ein Beet von nur gefüllten Blumen, so pflanze man ein Mistbeetfenster oder einen Saatkasten dicht voll Sämlinge; sobald sich einfache Blumen zeigen, entfernt man die betreffenden Pflanzen, von den gefüllten macht man, wenn deren nicht genügend aus Samen gewachsen sind, sofort nach dem Erscheinen der ersten Blüthe, Stecklinge in ein Mistbeet oder Kästchen mit sehr sandiger Erde, welche in zwei Wochen Wurzeln bilden und nach abermals zwei Wochen auf Beete ausgepflanzt werden. Die P. lieben festen, sandigen, auch kalkhaltigen Boden, sie leiden bei anhaltender Nässe. Es ist daher vortheilhaft, wenn man den Beeten Wasserabzug giebt, oder dieselben abhängig macht.

Die P. eignen sich prächtig für Gruppen, kleine Beete und Einfassungen, sie gedeihen auch sehr gut auf armen Boden, sind daher zur Bepflanzung von Böschungen, Terrassen u. dergl. von hohem Werth. Ferner sind sie prächtig für Topfcultur oder Kästen im Zimmer und vor die Fenster, in Ampeln auf Verandas u. s. w. Auch die P. gehören zu den wenigen Annuellen, welche das Verpflanzen in jedem Alter vertragen.

Primula (Freiland-Sorten) (*Primulaceae*). 4

202. **Pr. Auricula.** Die Anzucht dieser herrlichen Pflanzen aus Samen ist gerade wegen der Sorgfalt, welche sie erheischt, eine ebenso interessante wie dankbare Beschäftigung. Der von guten, sogenannten Luiker-A. gesammelte Samen wird fast stets einige neue Collections-A. geben und auch von den übrigen Pflanzen wird man nur einen kleinen Theil ganz zu verwerfen haben. Man kann im März, April, Juli und August oder auch im Winter aussäen und zwar können die Samen in milden Climates auf Saatbeete in das Freie, müssen bei uns jedoch unter Glas gebracht werden; wo es aber auch sei, verlangen sie einen schattigen, geschützten, kühlen

Standort und dürfen nie austrocknen. Bei der Aussaat im Freien erreicht man dies durch Auflegen von kurz geschnittenem Moos, Reisig etc. Frischer Samen geht meist nach etwa 4 Wochen, älterer erst in dem der Aussaat folgenden Frühjahr auf. Man säet in eine Mischung von Garten-, Haideerde und Sand in Schalen, Kästen oder Töpfe (bei Winteraussaat auch vielfach auf eine Schicht Schnee, die man obenauf gebracht hat), stellt diese ganz schattig in einen kalten Kasten oder in ein ungeheiztes Zimmer und bedeckt mit Glasscheiben. Die Samen gehen meist dicht auf und bilden bald vierblättrige Pflänzchen, welche in ähnliche, mit derselben Erdmischung gefüllte Kasten oder Schalen pikirt, zum Anwurzeln unter Fenster gestellt, später an einen schattigen Platz in das Freie, im Winter in einen kalten Kasten gestellt werden. Im Frühling, bevor neue Blätter treiben, pflanzt man die Aurikel mit Erdballen, mit ca. 20 cm Abstand auf ein etwas beschattetes, aber nicht ganz sonnenloses Beet, welches mit einer Mischung von Moor- oder Haideerde mit lehmiger Rasen- oder Schlammerde hergestellt ist, Wasserabzug hat und gegen starkes Austrocknen geschützt wird. Sehr gut stehen sie am Fusse von Mauern oder Hecken, wenn sie durch einen schmalen Weg von denselben getrennt sind. Bei anhaltender Trockenheit wird täglich bespritzt, jedoch nur, wenn die Sonne nicht auf das Beet scheint. Die Aurikeln wachsen langsam, gegen den Herbst zeigen einige der stärksten Pflanzen allerdings schon Blüthen, die Mehrzahl blüht aber erst im folgenden April oder Mai, während andere auch dann noch zurück bleiben. Auf jenem Beete müssen die Pflanzen Probe ablegen, ob sie culturwürdig sind, denn auch Nachkommen von guten Blumen bringen zuweilen unscheinbare gelbe oder bräunliche Blumen. Letztere entfernt man sofort, während die schönen bezeichnet und Ende August mit Ballen ausgehoben und für sich gepflanzt werden. Das Probeflühen dauert zuweilen mehrere Jahre. — Für die Freiland-Cultur ist es rathsam, eine Anzahl Pflanzen zum Ausbessern der Lücken, welche weniger durch Winterkälte als durch Spätfröste oder plötzlichen Temperaturwechsel entstehen, in Reserve zu haben. Die Aurikel ist keine Pflanze, welche durch Massenanpflanzung blendet, vielmehr sind es Farbe, Form und Bau der einzelnen Blüthe, die man in grösster Vollkommenheit verlangt. Hierfür wurden sogar vor einigen Jahrzehnten, als die erst seit Kurzem wieder erwachte Liebhaberei für diese Pflanze auf ihrem Höhepunkte stand, bestimmte Gesetze aufgestellt, welche auch jetzt noch massgebend sind. Die

A. werden, wo sich das Clima dazu eignet, besonders in England und in den Niederlanden, mit Vorliebe in Töpfen gezogen, sie sind dann auch dankbare Pflanzen für das kühle Zimmer. Auch für letztere Cultur empfehlen wir die erwähnte Erdmischung, die Töpfe müssen ferner guten Wasserabzug haben, möglichst viel frische Luft bekommen, dürfen nur mässig feucht erhalten und der Sonne höchstens früh am Morgen ausgesetzt werden. Für die gefüllten und gepuderten englischen A., welche am empfindlichsten sind, ist die Topfcultur vorzuziehen. Die Ueberwinterung der Topf-A. kann im kalten Mistbeet oder anderen geschützten, freiliegenden oder bedeckten Räumen geschehen, wo man reichlich lüften kann. Ein Umtopfen nimmt man, wenn die Pflanzen gut zu gedeihen scheinen, nur alle 2 oder 3 Jahre vor. Wenn die A. alt werden, so verlieren sie meistens an Ansehen, es ist daher rathsam, durch öftere Aussaat die Sammlungen zu erhalten resp. zu verbessern.

Pr. cortusoides wird im Frühjahr oder Sommer ausgesät; es wird hierbei, wie auch bei der Anzucht der Sämlinge, in gleicher Weise wie bei Pr. Auricula verfahren. Diese äusserst reichblühende, sehr schöne Species, aus welcher die herrliche Pr. c. amoena entstanden ist, liebt schattige Lagen und entwickelt sich auch sehr schön bei Topfcultur. Die jungen Sämlinge lieben sandige Haide-, Laub- oder Moor-erde, später setzt man Lehm oder lehmige Gartenerde hinzu. Die Pflanzen werden im Alter unschön und es ist zweckmässig, jährlich neu anzusäen.

Pr. japonica. Man hört oft Klagen, dass die Aussaat dieser schönen Pr.-Gruppe scheitert; folgendes Verfahren können wir empfehlen, da wir es seit Jahren mit stets gleich gutem Erfolge anwenden: Man säet Anfang Januar in Saatkästen, welche mit feingesiebter, mit etwas Lauberde gemischter, kräftiger, sandiger Mistbeeterde gefüllt sind und reichlich Wasserabzug haben, stellt dieselben in den ersten 4 Wochen kalt und dunkel, dann auf ein halbwarmes Mistbeet. In 6 bis 7 Wochen nach der Aussaat zeigen sich die Pflänzchen sehr dicht; sie sind dann bald in Kästen, Terrinen oder grosse Töpfe, welche wiederum auf ein kaltes Mistbeet kommen, zu pikiren. Im Mai bringt man sie in kleine und im Spätsommer in grössere Töpfe unter Anwendung der obigen Erdart und überwintert im kalten Mistbeet. Die Pflanzen werden im Freien halbschattig aufgestellt und kommen gegen Anfang Mai zur Blüthe; sie sind dann empfindlich gegen Spätfröste. Nach dem ersten Flor ver-

pflanzt man wieder, auch diese Pflanzen verlieren jedoch allmählich an Ansehen, und es ist daher besser, sie jährlich neu auszusäen. Die Herbstaussaat ist nicht zu empfehlen. — Herrlich entwickelt sich *Pr. j.*, wenn man sie im Herbst in das freie Land in Gruppen schattig verpflanzt. Sie verträgt grosse, aber keine schneelose Kälte, leidet auch durch plötzlichen Temperaturwechsel; ist aber eine solche Gruppe im Freien gut durch den Winter gekommen, so wirkt dieselbe im Frühjahr (in den Frankfurter Anlagen z. B.) überraschend schön.

Pr. veris (elator), Gartenprimel. Diese gehören zu den ersten Frühjahrsblumen, welche in jedem Boden und in jeder Lage gedeihen, wenn sie nicht gerade der vollen Sonne ausgesetzt sind; sie bilden ungemein schöne Einfassungen (auch von Gehölzgruppen) und Rabatten und sind ausserdem für Bouquets sehr werthvoll. In Folge dessen werden sie in grossen Mengen herangezogen und zwar mit Vorliebe aus Samen, der, falls er nur von sorgsam ausgewählten Pflanzen gesammelt war, ein sehr befriedigendes Resultat ergibt, so dass man nur wenige Exemplare zu verwerfen hat. Auf diese Weise erzielte schöne Sorten, welche man einer Sammlung einverleiben will, vermehrt man durch Theilung im Spätsommer. Man sät die Gartenprimel am besten im Januar aus, doch erzielt man auch bei späterer Aussaat (bis im Mai) einen baldigen Aufgang. Die Herbstaussaat keimt erst im folgenden Frühjahr. Die Behandlung des Samens und der jungen Sämlinge ist wie bei den Aurikeln, sie sind indessen weniger empfindlich und wachsen schneller, so dass man schon im Spätsommer ziemlich kräftige Exemplare auspflanzen kann. Man giebt den Pflanzen etwa 25 cm Entfernung und wählt mit Vorliebe schattige Lage. *Pr. veris duplex* mit doppelten Blumen, sowie die reizenden *Goldrand-Varietäten* verdienen besondere Beachtung; diese Sorten kommen fast ganz treu aus Samen. Die Gartenprimeln sind nicht gerade dankbar zur Topfcultur; man kann indessen stärkere Pflanzen im Herbst aus dem Lande in Töpfe bringen. Die stengellosen *Pr. acaulis* werden gleich den *Pr. veris* behandelt.

Wir gedenken noch einer Anzahl herrlicher Species von Freiland-*Pr.*, da deren Anzucht aus Samen sehr dankbar ist und so gehandhabt wird, wie wir es für die Aurikeln angegeben haben, nur geht der Samen weit schneller als bei diesen auf. Es sind dies *Pr. capitata* (*Cachemiriana*), eine besonders herrliche, sehr frühblühende Art, deren Samen sehr leicht keimt, ferner *Pr. denticulata*, *farinosa*, *luteola*, *pulcherrima*, *purpurea*, *rosea* und andere alpine Species.

Für die besprochenen Freiland-Primeln resumiren wir als gemeinsame Eigenschaften: Sie ertragen grosse Kälte bei genügendem Schneefall ohne jeden Schutz, aber keine rapiden Wetterwechsel, leiden in der Blüthe durch Spätfröste und fürchten die volle Sonne; sie werden bei zunehmendem Alter unschön und müssen daher öfters durch Aussaat erneuert werden; sie sind äusserst reichblühend und mit den Veilchen diejenigen Stauden, welche zu Anfang des Frühjahrs zuerst in Blüthe kommen, eignen sich auch, mit Ausnahme der Garten-Pr., vorzüglich zur Topfcultur.

Reseda odorata, Reseda (*Resedaceae*). ☉

203. Die Freilandcultur der R. ist einfach und so bekannt wie diese duftende Pflanze selbst. Sie wächst so zu sagen überall, gedeiht jedoch besser in frischem als trockenem Boden, mag lieber sonnig und frei als eingeschlossen und sehr schattig stehen. Bei kühlem Frühjahr keimt der Samen langsam, und es misslingen häufig die zu frühen Aussaaten. Man säe gegen Ende April und zwar dünn; man kann dann die R. vom Juni an im Flor haben, welcher besonders lange anhält, wenn man die verblühenden Blumenstiele abschneidet.

Hingegen ist es durchaus nicht ganz leicht, wirklich schöne Reseda in Töpfen zu ziehen, um sie im Winter und Frühjahr, besonders aber zur Weihnachtszeit blühend zu haben, was eine Hauptbeschäftigung der Marktgärtner grosser Städte bildet. Zu diesem Zwecke säet man in mehreren Zwischenräumen im Juli (zum Herbstflor), August (zum Weihnachtsflor) und September (zum Flor im Februar-März). Für die ersten Aussaaten kann man einer lockeren, nährhaften Erde etwas Düngererde, Taubenmist oder dergl., für die späteren etwas mehr Sand beimischen. Zur Kräftigung der in ungedüngter Erde cultivirten Pflanzen empfiehlt es sich, von Februar an öfters mit flüssiger Düngung zu giessen. Die Töpfe müssen guten Wasserabzug haben, und brauchen nicht über 12 cm weit zu sein. Es kommen in jeden derselben 10—15 Samen, welche mit dem Finger leicht eingedrückt und dann mit Erde bedeckt werden. Die Gefässe werden dicht unter das Fenster eines kalten Mistbeets oder in einen Zimmer-Pflanzenkasten, in welchem die Erde nicht schnell austrocknet, gebracht und mässig feucht gehalten; nach dem Aufgang wird möglichst häufig gelüftet. Eine geringe Feuchtigkeit kann man auch durch Glas- oder Papierbedeckung erhalten. Von

den gekeimten Pflanzen entfernt man zunächst nur die einander beengenden und lässt später überhaupt nur 3—4. Ein Pikiren der Topfsämlinge in andere Töpfe ist nicht erforderlich. Die Pflanzen wachsen dabei nur gut an, wenn sie noch ganz klein sind. Die R. wird am schönsten, wenn sie frei aufgestellt wird. Man wähle daher einen sonnigen Platz und entferne die Fenster, sobald die Pflanzen zu wachsen anfangen, sonst werden sie hochstengelig und müssten dann sorgsam an Stäbchen aufgebunden werden.

Die Pflanzen sind regelmässig und gründlich zu giessen, die sich zu früh zeigenden Knospen auszukneifen. Man kann die R. in Töpfen baumartig oder buschig ziehen, im ersteren Falle werden alle Seitentriebe unterdrückt, im zweiten das Herz der Pflanzen, so dass nur die Nebenzweige bleiben. R. ist einjährig, lässt sich aber in Töpfen durch dieses Entspitzen mehrere Jahre hindurch halten. Um R. im Mai und Juni blühend zu haben, säe man von Februar bis März in ein kaltes Mistbeet und pikire sobald wie möglich 3 bis 4 Pflanzen in einen Topf. Von der gewöhnlichen R. sind prächtige Varietäten gewonnen worden, zum Theil compact wachsende, starkstengelige Sorten, welche auch in Töpfen des Aufbindens nicht bedürfen und sich ausserdem durch dunkelgrünes Laub und grosse, dicht besetzte Blüthenrispen auszeichnen. Vorzügliche Sorten für Topf und Land sind *R. Victoria*, *pumila erecta* oder *nana compacta multiflora*, *aurea*, *Gabriele* und *Machet*, letztere besonders schön in Töpfen. Mit diesen lassen sich auch treffliche Resultate mit einer Pflanze pro Topf erzielen. — Für die Landcultur der guten Sorten bemerken wir noch, dass man prachtvolle Büsche mit zahllosen Blumen erzielt, wenn man sich zum Auspflanzen die Sämlinge in kleinen Töpfen heranzieht (jung in dieselben pikirt), so dass sie mit Ballen an Ort und Stelle kommen.

R. wird, namentlich bei grossen Culturen im Freien, zuweilen von Erdflöhen heimgesucht.

Verbena hybrida, Verbena (*Verbenaceae*). ♀ ♂

204. Die Schwierigkeit, welche das Ueberwintern der Stecklinge bereitet, hat zur Anzucht aus Samen geführt, und diese leichte Methode hat sich überraschend schnell verbreitet. Sie verdient auch an und für sich den Vorzug, da die Sämlinge kräftiger und blüthenreicher als die Stecklinge werden. Ueberdies sind fast alle Sorten und Farben jetzt so weit fixirt, dass sie sich aus Samen annähernd

treu fortpflanzen; wer also nicht ganz bestimmte Sorten verlangt, kann aus Samenpflanzen die prächtigsten Beete herstellen, wenn er die V., welche sich unter Glas mehrere Jahre halten, als Sommergewächse behandelt. Man kann dann immer noch die schönsten Sorten unter den Sämlingen durch Stecklinge fortpflanzen.

Man sät am besten schon im Februar oder Anfang März in Töpfe oder Saatkästen, welche unter Glas warm gestellt werden, oder in ein warmes Mistbeet, und giesst häufig; die Samen gehen allmählig auf, und zwar zeigen sich die ersten Pflänzchen nach etwa 14 Tagen. Muss man im Zimmer aussäen, so bedecke man die Erde mit dickem Löschpapier, welches immer feucht gehalten wird. Die Pflänzchen werden, wenn möglich, pikirt, sobald sie zwei wirkliche Blätter haben. Wenn man sie indessen sogleich an ihren Bestimmungsort bringen will, so sind sie durch reichliches Lüften abzu härten, man kann sie dann schon Anfang Mai auspflanzen. Dies geschieht mit möglichst viel Erdballen und unter Beobachtung grosser Abstände von ca. 80 cm bis 1 m, da die V. sich sehr stark auf der Erde ausbreiten. Früher bringt man die V. zur Blüthe, wenn man sie im April einzeln in Töpfe pflanzt, wozu recht nahrhafte Erde genommen wird. Giebt man ihnen im Mai nochmals grössere Töpfe und hält sie unter Glas, so kann man sie bereits Ende Mai blühend auspflanzen oder auch in Töpfen weiter cultiviren. Wenn man Beete mit einfarbigen Sorten wünscht, z. B. feuerroth, blau, weiss, so pflanze man eine Anzahl in Töpfe als Reserve, da einige falsche Farben bei Aussaaten unvermeidlich sind, welche dann durch die Topfpflanzen ersetzt werden. Ebenso verfährt man bei *V. hybrida* in Mischung, um die geringwerthigen Pflanzen (zu unbändig wachsende oder solche mit matten Farben der Blüthen) gegen gute einzutauschen. Die V. nehmen mit dem geringsten Boden vorlieb; man vermeidet, sie in frisch gedüngtes Land zu bringen und giesst nur bei sehr grosser Dürre, dann aber auch täglich. Sollen die V. nicht zu wild wachsen, so ist ein wiederholtes Niederhaken mit Nelkenhaken unerlässlich. Auch lassen sie sich durch Auskneifen der Spitzen zurückhalten, was namentlich bei der Topfcultur nöthig ist.

Durch die Leichtigkeit ihrer Cultur, ihre bescheidenen Ansprüche in Bezug auf Boden, ihren Reichthum an oft wohlriechenden Blumen, welche bis zum Frost ununterbrochen erscheinen, ferner durch ihre vielfache Verwendbarkeit zu Gruppen, Einfassungen, Prunkbeeten, Bouquets und auch zur Topfcultur (bei welcher sie

öfters verpflanzt und regelmässig gegossen werden müssen), stehen die Verbenen unter den beliebten Gartenpflanzen in erster Linie. Eine schöne *V.* darf nicht wild wachsen und muss grosse, etwas gewölbte, blüthenreiche Dolden tragen. Die Blumen selbst verlangt man von lebhafter, klarer Farbe. Es giebt eine Classe mit schön geäugelten, eine andere mit gestreiften Blumen, erstere als aurikelblüthige, letztere als gestreifte oder italienische *V.* bekannt, beide Classen kommen jedoch nur zur Hälfte treu aus Samen. Die reinweisse *V. hybrida candidissima* ist sehr grossdoldig und fast ganz constant.

V. Aubletia, *Drummondi*, *pulchella* und *pulcherrima* sind annuell und werden im März oder April in das kalte Mistbeet (§. 177 b) ausgesäet und im Mai mit etwa 40 cm Abstand ausgepflanzt; sie blühen sämmtlich reich und lange und sind für Beete, Einfassungen auch Bouquets sehr geschätzt. Sie gehen leichter und schneller auf als *V. Niveni* (*teucroides*) und *V. venosa*, welche eine Keimzeit von 3—4 Wochen verlangen. Letztere ist eine harte, blau blühende, besondere prächtige Art, welche im Uebrigen wie die andern *V.* behandelt wird, sich aber nicht ausbreitet.

***Viola tricolor maxima*,**

Pensée, Stiefmütterchen, Sammtveilchen (*Violaceae*). 40

205. Mit Recht erfreuen sich die St. einer so allgemeinen Beliebtheit, wie wenig andere Blumen. Bei ihnen vereinigen sich Leichtigkeit der Cultur, Schönheit der Blumen, Mannichfaltigkeit der Färbung und dankbares Blühen. Viele Liebhaber suchen die Schönheit dieser Pflanzen in der Grösse der Blumen, andere verlangen besondere Zeichnung, klare und zarte Farben oder die Vereinigung dieser Eigenschaften zu einem harmonischen Ganzen. Der Werth der jetzigen Pensées liegt aber nicht zum kleinsten Theil in der Beständigkeit der Farben. Es ist den Züchtern gelungen, durch sorgfältige Auswahl eine Reihe von Farben so zu fixiren, dass aus Samen die Kinder der Mutter fast gleichen. Natürlich ist es sehr angenehm, auf so leichte Weise Beete von nur einer Farbe herstellen und die Farbe eines Beetes nach Farbenregeln oder auch persönlichem Geschmack zusammenstellen zu können. Einige dieser Sorten zeichnen sich weniger durch Grösse als durch Farbenreinheit der Blumen aus. Unter den reinfarbigten Sorten mit einer Grundfarbe (denn ganz einfarbig giebt es nicht) sind besonders folgende geeignet für die

Herstellung von Gruppen und Prunkbeeten: *gelb, weiss, Schneewittchen, hellblau, azurblau, schwarzblau, Kaiser Wilhelm, Lord Beaconsfield*, doch sind auch einige Sorten mit mehrfarbigen Blumen, wie z. B. die ungemein frischen *violet bordé blanc, Silbersaum und Goldrand*, in Beeten höchst wirkungsvoll. Wieder andere fesseln durch Eigenthümlichkeit der Farbentöne, z. B. *Faust (schwarz), mahagonifarben, havanabraun* u. a. m. Zu vielfarbigen Beeten eignen sich ausser *den gestreiften, den englischen und französischen Pensées* noch besonders die *Odier- und Trimardeau-St.* Diese beiden Classen stellen das Vollendetste sowohl in Grösse wie Färbung dar, was in diesen Blumen bisher erzielt wurde, sie blenden hauptsächlich durch die enormen Flecken der Petalen und man findet darunter Blumen von edelster Form und überraschender Schönheit. Die Mannichfaltigkeit ist eben bei den St. so gross, dass Jeder nach seinem Geschmack wählen kann.

Viola tricolor ist eine mehrjährige Pflanze, sie bringt jedoch im 2. und 3. Jahre kleinere Blumen und wird daher fast nur zweijährig cultivirt; man kann sie auch einjährig behandeln, wenn man sehr früh aussäet. Die St. kommen zwar in jedem Boden fort, um aber schöne und grosse Blumen zu erzielen, ist ausser freier Lage die Hauptbedingung guter, düngerreicher Boden, wobei jedoch ganz frischer und scharfer Mist ausgeschlossen ist, weil dadurch leicht Fäulniss der unteren Stengeltheile verursacht wird. Hat man keinen Mist zur Düngung, so können andere, stickstoffreiche Dünger, z. B. Guano, Hornspäne und Chilisalpeter benutzt werden. Uebermässiges Düngen ist zu vermeiden. Die *Pensées* entwickeln ihre Blüthen nur in der kühleren Jahreszeit vollkommen, besonders im Frühling vom März bis Mitte oder Ende Mai. Tritt heisses, trockenes Wetter ein, so werden die Blumen kleiner, jedoch erholen sich die Pflanzen zuweilen wieder im Herbst. Um einen schönen Frühlingsflor zu erzielen, säet man von Ende Juli bis Mitte September, in rauen Lagen früher, in wärmeren später. Hierzu benutzt man entweder ein sehr geschützt liegendes Saatbeet, oder am besten ein kaltes Mistbeet, in welchem man die Saat bis zum Aufgang (binnen 2—3 Wochen) feucht und schattig hält. Wer kein Mistbeet hat, säe in Saatkästchen oder Schalen, die zur Erhaltung der Feuchtigkeit mit Papier oder Glas bedeckt werden. Wenn man die ziemlich grossen Samen dünn säet, brauchen die Sämlinge nicht pikirt zu werden, gehen sie aber dicht auf, so ist dies durchaus nothwendig. Es ist Sorge zu tragen, dass zur Pflanz-

zeit (Ende August bis Ende September) die für die Pensées bestimmten Plätze im Garten vorbereitet sind. An Ort und Stelle erhalten die Pflanzen durchschnittlich 20—30 cm Entfernung. Nachdem sie angewachsen sind, werden sie vor Winter, jedoch nicht nach Mitte October noch einmal behackt. Die St. sind zwar sehr hart, es gehen aber doch manche Pflanzen bei schneeloser, strenger Kälte zu Grunde, besonders wenn Mittags die Sonne den Boden erweicht. Um daher Lücken zu vermeiden, halte man stets eine Partie Pflanzen zum Ausbessern in Reserve. Bei einjähriger Behandlung säet man im Februar und pflanzt wenn möglich schon im April. Diese Frühljahrs-pflanzen sind zwar gegen die sogenannte Spinne, welche die St. im Sommer häufig ruinirt, widerstandsfähiger als die im Spätsommer gesäeten, sie sind aber weder so blüthenreich, noch so grossblumig wie diese. Ein schöner St.-Flor im Herbst lässt sich durch Aussaat Anfang Juli erzielen, aber nur, wenn man die Sämlinge bald pikirt hat. Die St. lassen sich blühend mit Ballen verpflanzen, wobei man sich hüten muss, sie zu tief zu setzen. Solche Pflanzen sind aber eher dem Absterben bei Hitze ausgesetzt, als im Herbst an Ort und Stelle gepflanzte. Die Blumen können durch Einlegen in Sand getrocknet werden.

Zinnia, *Zinnia (Compositae)*. ☉

206. Man säet im April in ein Mistbeet oder in warm zu stellende Saatgefässe und bedeckt die Samen ziemlich stark. Sie gehen bei günstiger Witterung schon in 5—6 Tagen auf und wachsen dann sehr schnell. An warmen Tagen ist zu lüften, und sobald die Pflanzen einander beengen, zu pikiren, wodurch sie besonders kräftig werden. Ende Mai, wenn keine Nachtröste mehr zu befürchten sind, pflanze man mit etwas Erdballen in kräftigen, nicht zu festen Boden, an sonniger, freier Lage, bei einem Abstand von 40—50 cm. Die einfachen Z. begnügen sich mit ärmerem Lande. Durch mehrmaliges Behacken und durchdringendes Begiessen bei Trockenheit erreichen die Pflanzen einen starken Umfang. Sie entwickeln ihren Flor von Juli bis zum Frost. Unter den gefüllten Sorten, welche aus Samen variiren, erscheinen stets eine Anzahl geringwerthiger Pflanzen mit einfachen oder halbgefüllten Blumen; man darf indessen nicht von der ersten Blume endgültig auf die späteren schliessen, da jene zuweilen gering blüht und diese sich dabei doch vollkommen entwickeln. Sind aber mehrere Blumen derselben Pflanze gering, so entferne man

solche Pflanzen schnelligst, damit die entstehenden Lücken von den umgebenden Pflanzen rasch ausgefüllt werden. Für die Wirkung eines vollblühenden Beetes gefüllter Z. im ganzen, ist es übrigens von wenig Einfluss, ob einige solcher Pflanzen stehen bleiben. Ausserdem bemerken wir, dass sich alle Z. auch blühend mit Erdballen verpflanzen lassen.

Die Z. sind prächtige, mittelhohe Pflanzen und überaus dankbar, sowohl durch die Menge wie Farbenpracht ihrer Blumen und die lange Dauer derselben. Sie sind nicht allein für leuchtende Gruppen und Rabatten, sondern auch zum Schneiden, in Bouquets u. dergl. vortrefflich geeignet. Von den gefüllten Z. giebt es eine sehr schöne niedrigere Classe (*Z. elegans pumila fl. pl.*), in welcher noch einige andere, im Sortiment der hohen nicht vertretene Farben existiren. Auch die kleinblumigen gefüllten Z. (*Z. Darwini*) verdienen Beachtung, obgleich sie noch sehr wenig constant aus Samen kommen. In höchst geringem Grade ist dies auch bei den gestreiften gefüllten Z. der Fall, denen man in einigen Catalogen begegnet.

Z. mexicana (*Haageana*, *Ghiesbreghtii*) und die gefüllte Varietät dieser reizenden, ganz niedrigen, goldgelben Art wird ebenso cultivirt wie obige Z. Sie eignet sich vorzüglich für Einfassungen und zur Bepflanzung von Rabatten.

Die Z. lieben heisses Wetter, sollen sie sich jedoch in ihrer vollen Schönheit entfalten und erhalten, so muss man ihnen bei anhaltender Dürre durch reichliches Giessen zu Hülfe kommen. Die Blumen der Z. lassen sich durch Einlegen in Sand trocknen und werden so vielfach zu trockenen Bouquets verwendet.

Die folgenden Seiten geben eine

Tabellarische Zusammenstellung

der meisten, in den Samen-Verzeichnissen enthaltenen

Freiland-Gartenpflanzen,

deren Dauer, Eigenart, Aussaat, Blüthezeit und Verwendbarkeit.

Erläuterungen.

Die besonders behandelten Gattungen (S. 222 bis 267) sind hier nicht wiederholt. — Betreffs der hier fehlenden Gattungen verweisen wir auf das Register. — Bei Gattungen, deren sämtliche Arten die gleiche Behandlung und Verwendung haben, ist nur der Gattungsname (z. B. *Armeria*, *Aubrieta*) angegeben, während einzelne Arten, welche in der Behandlung, Lebensdauer etc. und Verwendung von den übrigen derselben Gattung abweichen (z. B. *Artemisia annua*, *Asclepias tuberosa*), besonders angegeben sind. — Die Abkürzung „u. V.“ bedeutet „und Varietäten“. — In Colonne 3 ist der sog. Character der Pflanze, bezüglich ihrer Lebensdauer, ob einjährig (☉), zweijährig (♂), perennirend und krautartig (♀) oder holzartig (h) angegeben. Wo sich in dieser Colonne zwei Zeichen befinden (z. B. ♂☉ oder ♀☉), bezeichnet das erste die Lebensdauer der Pflanze (Bisannuelle oder perennirend), das zweite jedoch, dass dieselbe wie eine Annuelle behandelt werden kann. Für letzteren Fall ist der früheste Aussaattermin zu wählen. — Die Buchstaben in Colonne 9 bedeuten: Z = Zwiebel, K = Knolle, R = Rhizome (Wurzelsankläufer). — In den Columnen 10 und 14 entsprechen die Zahlen 1 bis 12 den Monaten Januar bis December. — In Colonne 10 geben wir nicht

N a m e n.	Familie.	Character der Pflanze bezüglich ihrer Dauer.	Schlingpflanze.	Immortelle.	Wohlriechende Pflanze.	Bienenfutterpflanze.	Ziergras.	Zwiebel-, Knollen-, Rhizombildend.	A u s s a a t		
									Monat.	im freien Lande, an Ort und Stelle.	im kalten Mistbeet oder Zimmer.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Abobra	Cucurbitaceae	☿	×		×			K	3—4		
Abronia	Nyctagineae	☿			×			R	2—4		
Acanthus	Acanthaceae	☿						R	2—5		×
Achillea	Compositae	☿			×				3—5 8—10		×
Aconitum	Ranunculaceae	☿						R	2—4 9—10		×
Acroclinium	Compositae	☉		×					3—4		×
Actaea	Ranunculaceae	☿						R	5—7		×
Adenophora	Campanulaceae	☿							5—7		×
Adlumia	Fumariaceae	♂	×						5—7		×
Adonis	Ranunculaceae	☉							3—4	×	
vernalis	"	☿						R	3—4 8—10		×
Aethionema	Cruciferae	☿				×			5—7		×
Buxbaumi	"	☉							3	×	×
Ageratum conspicuum Lasseauxi	Compositae	☿	☉						2—3		

etwa alle Monate an, in denen die Aussaat überhaupt möglich ist, sondern diejenigen, welche uns als die geeignetsten erscheinen. — Colonne 12. In südlichen Climaten sät man viele der hier einschlägigen Pflanzen in das Freie; in nördlicheren ist die Möglichkeit für eine derartige Behandlung bei sehr günstigen Lagen für einzelne Gewächse häufig ebenfalls vorhanden. Bei Samen, welche einer längeren Keimzeit bedürfen, ist es wünschenswerth, die Saatgefässe, welche anfangs in einem kalten Mistbeet gestanden haben, während der Sommermonate im Freien geschützt aufzustellen (vergl. §. 179). — Colonne 12 und 13. Es soll hier ausgedrückt werden, dass die Aussaat nicht nur direct in kalte resp. warme Mistbeete sondern auch in Saatgefässe erfolgen kann, welche auf solche gebracht werden. — Wenn sich unter „Besondere Bemerkungen“ über die der Pflanze zusagende Erdart nichts angegeben findet, gilt als maassgebend, dass gewöhnliche, nicht zu arme Gartenerde genügt, welche zur Aussaat jedoch fein gesiebt und mit etwas Sand vermischt anzuwenden ist. — Bei allen Samen, deren Keimzeit unter günstigen Verhältnissen länger als 3 Wochen dauert, findet sich eine diesbezügliche Notiz unter „Besondere Bemerkungen.“ — Das Wort „Pikiren“ geben wir für diejenigen Artikel an, für welche das Verstopfen zur besseren Entwicklung der Pflanze von Vortheil ist.

Eignet sich:												Besondere Bemerkungen.
Lith.- zeit fällt die Monate	für Blumenbeete, Gruppen u. Rabatten.	für Einfassungen.	für Lauben, Spaliere, Wände etc.	für Blattpflanzengrup- pen im Freien.	als Einzelpflanze auf Rasen od. Rabatten.	für den Vordergrund von Gehölzgruppen.	für Terrassen und Felspartien.	für Topfcultur.	für frische Bouquets.	für trockene Bouquets, Kränze etc.		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
-10			x					x			Schnellwachsend, trägt rothe zierliche Früchte. Verlangt geschützte, warme Lage. Frostfrei zu überwintern.	
-10	x							x			Gedeiht auf leichtem Boden in warmer Lage. Herbstsaat anwendbar, frostfreie Ueberwinterung.	
-8				x	x	x					In strengen Wintern zu bedecken. Lieben kräftigen Boden, sonnige Lage. Prüchtig belaubt.	
-8	x						x		x	x	Für trockene Lagen.	
-8	x				x	x					Enthält das giftige Aconitin. Samen keimt meist erst im folgenden Frühjahr. Sehr kräftiger Boden. Alle aus Theilung, einige nicht aus Samen vermehrbar.	
-8	x							x		x	Herbstsaat anwendbar, blühen dann im Mai, wenn frostfrei durchwintert. Freie, sonnige Lage.	
-6						x					Officinell. Der Samen liegt lange, ehe er keimt.	
-7	x					x	x				Pikiren. Gedeihen am besten in lockerem Boden.	
-9			x								Einzelstehend an Stangen als Pyramide gezogen, reizend. Pikiren und bis zum Anspflanzen einzeln in Töpfen zu ziehen.	
-8	x							x	x		Mit Knospen besetzte Stengel in Töpfe oder Wasser gestellt, blühen lange und dankbar. Herbstsaat an Ort und Stelle zu empfehlen, blühen dann Mai-Juni.	
-5	x	x					x	x	x		Der Samen liegt lange, ehe er keimt.	
-7		x					x				Pikiren. Für sonnige Lagen.	
-7		x									Miniaturpflanze.	
-10	x								x		Lieben recht sonnige Lage; frostfrei zu überwintern. Blühen im ersten Jahre und sind als Sommergewächse zu behandeln.	

N a m e n.	Familie.	Character der Pflanze bezüglich ihrer Dauer.	Schlingpflanze.	Immortelle.	Wohlriechende Pflanze.	Bienenfütterpflanze.	Ziergras.	Zwiebel-, Knollen-, Rhizomebildend.	Aussaat:			
									Monat.	im freien Lande, an Ort und Stelle.	im kalten Mistbeet oder Zimmer.	im warmen Mistbeet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ageratum mexicanum u. V....	Compositae	⊙							3—4		x	
mexicanum Imperial Dwarf, Little Dorrit, Swanley Blue)	"	⊙							3—4		x	
Agrostemma Coeli-Rosa u. V..	Caryophylleae	⊙							3—5	x		
coronaria u. V., Flos Jovis .	"	⌘							5—7		x	
Agrostis	Gramineae	⊙					x		4—5	x	x	
Allium	Liliaceae	⌘						Z	3—4		x	
Alonsoa.....	Scrophularineae	⊙							3—4		x	
Alsine	Caryophylleae	⌘							5—6		x	
Alstroemeria	Amaryllideae	⌘						K	3—5			
Alyssum, ausdauernde	Cruciferae	⌘				x			5—7		x	
Benthami (maritimum).....	"	⊙			x	x			3—6	x	x	
Ammobium	Compositae	⌘⊙		x					3—4		x	
Anagallis	Primulaceae	⊙							2—4 8—9			
Anarrhinum	Scrophularineae	♂							5—7		x	
Anchusa, ausdauernde	Boragineae	⌘				x			6—7		x	
capensis	"	⊙				x			3—4		x	
Andropogon	Gramineae	⌘					x		3—4		x	
formosus	"	⌘					x		3—4		x	
Sorghum	"	⊙					x		3—4		x	
Androsace, ausdauernde	Primulaceae	⌘							6—7		x	
Anemone	Ranunculaceae	⌘							3—6			
chinensis, fulgens u. V.....	"	⌘						K	2—3 6—7			
japonica u. V.	"	⌘							3—5			
Anomatheca	Irideae	⌘						Z	3—4			
Antennaria	Compositae	⌘		x					5—7		x	
Anthemis, einjährige	"	⊙							3—4	x		

	Eignet sich:									Besondere Bemerkungen.			
ithenheit kult die onate	für Blumenbeete, Gruppen u. Rabatten.	für Einfassungen.	für Lauben, Spaliere, Wände etc.	für Blatt- pflanzengrup- pen im Freien.	als Einzelpflanze auf Rasen od. Rabatten.	für den Vordergrund von Gehölzgruppen.	für Terrassen und Felspartien.	für Topfkultur.	für frische Bouquets,	für trockene Bouquets, Kranze etc.			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
-10	x								x		} Unter Glas ausdauernd, wenn in Töpfen kultivirt. Gewinnen sehr durch Pikiren und Verpflanzen.		
-10	x	x						x					
-8	x	x									Blühen bei Herbstsaat und frostfreier Ueberwinterung schon im Mai.		
-8	x								x		Lieben volle Sonne.		
-8		x						x	x	x	Zu getrockneten Bouquets vor der Reife zu schneiden. Herbstsaat anwendbar, blühen dann von Mai an.		
-7							x	x			Lieben leichten Boden und sonnige Lage. A. neapolitanum sehr schön für Bouquets. Aussaat siehe §. 180, S. 219 u. 220.		
-10	x							x	x		Können im Gewächshaus überwintern. Der Flor kann durch Zurückschneiden der Blütenstiele verlängert werden.		
-7		x					x				Für sonnigen Standort und sandigen Boden. Sämmtlich sehr blüthenreich.		
-9	x							x	x		Auf mit Haideerde und Sand zubereitete Beete zu pflanzen und frostfrei zu überwintern. Aussaat siehe §. 180, S. 219 u. 220.		
-6	x	x					x	x			Für sonnige Lagen.		
-10	x	x						x			Wird zweilen stark von Erdflöhe beschädigt. Blüht, nach dem ersten Flor zurückgeschnitten, zum zweiten Male.		
-10	x							x	x	x	Als Sommergewächs zu behandeln. Herbstsaat anwendbar, frostfreie Ueberwinterung.		
-9	x							x			Für sonnige Standorte. Herbstsämlinge sind in kleine Töpfe zu pikiren und unter Glas zu überwintern. Auch zur Teppichgärtnerci.		
-9	x							x			Frostfrei zu überwintern.		
-8	x					x					Gedeihen in jedem Boden, in sonniger Lage.		
-9	x							x					
-9				x	x	x			x	x	} Lieben während des Sommers reichliche Bewässerung. A. formosus ist frostfrei zu überwintern.		
-9					x			x	x	x			
-9				x	x	x					Breitblättrig.		
-6		x					x				Pikiren. Für recht sonnige Lagen.		
-6	x	x				x	x		x		Der Samen liegt oft lange, ehe er keimt.		
-9	x	x				x	x	x	x		} Lieben sonnige Lage, guten, reichgedüngten, dabei lockeren, durchlassenden Boden. Die Knollen frostfrei und trocken überwintern oder im Lande zu bedecken. Der Samen bedarf oft einer längeren Keimzeit; man reibt ihn gern vor der Aussaat ab. Fürchten Nässe.		
-10	x					x		x	x				
-6	x	x						x			Frostfrei und trocken zu überwintern. Aussaat siehe §. 180, S. 219 u. 220.		
-8	x	x					x			x	Gedeihen in den trockensten Lagen.		
-9	x												

N a m e n.	Familie.	Character der Pflanze bezüglich ihrer Dauer.	Schlingpflanze.	Immortelle.	Wohlfriechende Pflanze.	Bienenfutterpflanze.	Ziergras.	Zwiebel-, Knollen-, Rhizomgeklend.	Aussaats:			
									Monat.	im freien Lande, an Ort und Stelle.	im kalten Mistbeet oder Zimmer.	im warmen Mistbeet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Anthemis, ausdauernde	Compositae	☞							5—7		x	
Anthericum, Freiland-	Asphodeleae	☞			x			K	5—7		x	
Anthoxanthum	Gramineae	⊙					x		4	x	x	
Apocynum	Apocynaeae	☞			x	x		R	5—7		x	
Aquilegia	Ranunculaceae	☞				x			4—5 8—9		x	
Arabis	Cruciferae	☞				x			4—7		x	
Aretotis breviscapa	Compositae	⊙							2—3			
grandiflora argentea	„	☞							5—7		x	
Arenaria, ausdauernde	Caryophylleae	☞							4—5		x	
Argemone	Papaveraceae	⊙							3—4	x		
Armeria	Plumbagineae	☞							5—7		x	
Artemisia annua	Compositae	⊙			x				3—4		x	
ausdauernde	„	☞			x				5—7		x	
Arundo	Gramineae	☞					x	R	3—4			
Asclepias, im Freien ausdauernde	Asclepiadeae	☞				x		R	4—7		x	
tuberosa	„	☞				x		K	4—6		x	
Asperula azurea setosa	Rubiaceae	⊙			x	x			3—4	x		
ausdauernde	„	☞			x				5—6		x	
Asphodelus	Asphodeleae	☞						K	4—7		x	
Aster, ausdauernde	Compositae	☞							4—7		x	
Astragalus, ausdauernde	Papilionaceae	☞							4—7		x	
Astrantia	Umbelliferae	☞							4—7		x	
Athanasia annua (Linas)	Compositae	⊙		x					3—4		x	
Atriplex hortensis	Chenopodeae	⊙							3—4	x		
Aubrietia	Cruciferae	☞				x			4—6		x	
Avena	Gramineae	⊙					x		3—4	x		

Eignet sich:											Besondere Bemerkungen.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
the- eit illt die nate	für Blumenbeete, Gruppen u. Rabatten.	für Einfassungen.	für Lauben, Spaliere, Wände etc.	für Blattpflanzengrup- pen im Freien.	als Einzelpflanze auf Rasen od. Rabatten.	für den Vordergrund von Gehölzgruppen.	für Terrassen und Felsparien.	für Topfkultur.	für frische Bouquets.	für trockene Bouquets, Kränze etc.	
											25
-9	x						x	x			
-7	x						x	x			Lieben trockenen Standort. Die Sämlinge blühen nicht vor dem 3. Jahre.
-8		x							x	x	Für Bouquets vor der Reife zu schneiden.
-9						x					Als kräftige Pflanzen an Ort und Stelle zu bringen. Junge Sämlinge frostfrei durchwintern. Insektenfänger.
-6	x					x		x	x		Herbstaussaat keimt zuweilen erst im Frühjahr. A. chrysantha und Skinneri blühen bis August.
-5	x	x					x				Für Böschungen sehr geeignet.
-9	x	x					x				Liebt sonnige Lage.
-8	x					x	x				Der Samen liegt lange, ehe er keimt. Frostfrei zu überwintern.
-6		x					x				Lieben sonnigen Standort und sandigen Boden.
-9	x										Der Samen liegt oft 4 bis 6 Wochen, ehe er keimt. Liebt sonnige Lagen.
-7	x	x					x	x	x		Als Einfassungen sind A. öfters unzureichend. Begnügen sich mit dem geringsten Boden.
then unbe- tend				x	x	x					Bis zum Auspflanzen in Tüpfen unter Glas zu halten. Hochwachsend.
-10						x	x				Für trockene Lagen.
-9					x	x	x				Im Sommer reichliche Bewässerung. Schöne Pflanzen erzielt man nur in sehr kräftigen Boden. Gute Uferpflanze, auch zur Bedeckung unschöner Stellen des Gartens. Ueberwinterung frostfrei.
-9	x					x	x		x		Lieben lockeren Boden und sonnige Lage. Durch schnelles Wachstum der Rhizomen werden einige Arten leicht zum Unkraut.
-9	x						x		x		In Haideerde anzusäen und den Standort womöglich aus Haide- oder Torfmoos herzurichten.
-6	x	x									Sehr reichblühend. Herbstaussaat an Ort und Stelle ebenfalls anwendbar.
-7		x					x				Der Samen bedarf einer längeren Keimzeit. A. odorata (Waldmeister) eignet sich zum Treiben.
-9					x	x					Vertragen Steinboden. Der Samen braucht oft 4 bis 5 Wochen, ehe er keimt. Officinell. Blühen erst als 3- oder 4jährige Pflanzen.
-10	x					x	x		x		Einige Species zur Topfkultur geeignet. Begnügen sich mit jedem Boden. Bilden decorative, blüthenreiche Büsche; auch grosse Exemplare leicht zu verpflanzen. A. alpinus auch Col. 16.
-8	x					x	x				Einige Species sehr hochwachsend.
-7						x	x				Der Samen liegt lange, ehe er keimt. Officinell.
-9	x	x							x	x	Liebt sonnigen Standort.
-9				x	x	x					Hochwachsende, durch die schönen Färbungen ihrer Blätter effectvolle Pflanzen.
-6	x	x					x				Eine der besten Felsenpflanzen-Gattungen. Für sonnige Lagen. Sehr frühblühend.
-8									x	x	

Namen.	Familie.	Character der Pflanze bezüglich ihrer Dauer.	Schlingpflanze.	Immortelle.	Wohlriechende Pflanze.	Bienenfutterpflanze.	Ziergras.	Zwiesel-, Knollen-, Rhizombildend.	Aussaat:		
									Monat.	im freien Lande, an Ort und Stelle.	im kalten Mistbeet oder Zimmer.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Baptisia	Papilionaceae	♀				x			4—6		x
Barbarea vulg. fol. aureo-varieg.	Cruciferae	♂							5—7		x
Bartonia aurea	Loaseae	○				x			3—5	x	
Bellis perennis fl. pleno	Compositae	♀○							²⁻³ 7—8		x
Benincasa	Cucurbitaceae	○	x						4—5		
Beta brasiliensis n. V.	Chenopodeae	○							3—5	x	x
Betonica	Labiatae	♀				x			5—7		x
Bidens atrosanguinea	Compositae	♀○						K	3—4		
Blitum	Chenopodeae	○							4—5	x	
Bocconia, perennirende	Papaveraceae	♀						R	4—7		x
Brachycome	Compositae	○							3—4		x
Briza, einjährige	Gramineae	○					x		⁴⁻⁵ 9—10	x	
Brizopyrum	"	○					x		4—5		x
Bromus brizaeformis	"	♂					x		³⁻⁴ 9—10	x	
ausdauernde	"	♀					x		5—7		x
Browallia abbreviata	Scrophularineae	○							3—5		
elata und Varietäten	"	○							3—5		
Roezli	"	○							2—3		
Bryonia	Cucurbitaceae	♀	x					K	⁷⁻⁹ 8—10	x	
Bryonopsis	"	○	x						3—5		
Buphthalmum	Compositae	♀							4—6		x
Cacalia coccinea (Emilia)	"	○							3—5	x	
Cajophora lateritia (Loasa) ...	Loaseae	○	x						2—4		
Calamintha	Labiatae	♀			x				5—7		x
Calampelis (Eceremocarpus) ..	Bignoniaceae	♀○	x						³⁻⁴ 6—8		
Calandrinia, einjährige	Portulacaceae	○							³⁻⁵ 7—9	x	
umbellata	"	♀○							²⁻⁴ 7—9		

Eignet sich:												Besondere Bemerkungen.
Blüthezeit in die Monate	für Blumenbeete, Gruppen u. Rabatten.	für Einfassungen.	für Lauben, Spaliere, Wände etc.	für Blattpflanzengruppen im Freien.	als Einzelpflanze auf Rasen od. Rabatten.	für den Vordergrund von Gehölzgruppen.	für Terrassen und Felspartien.	für Topfcultur.	für frische Bouquets.	für trockene Bouquets, Kränze etc.		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
-7					x	x			x		Blühen erst, wenn einige Jahre alt.	
-7	x	x					x				Ganz tren aus Samen. Die Blüthenstiele können ausgeschnitten werden.	
-9	x										Liebt sonnigen Standort und fürchtet Nässe.	
-11	x	x					x	x	x		Aussaat Februar-März sehr zu empfehlen. Der Samen bringt einen Theil einfachblühender Pflanzen.	
-8			x					x			Gedeiht gut an geschützter, warmer Lage. Bringt lange, glatte Früchte.	
Blüthen überlebend				x	x						Verpflanzte Sämlinge, reichlich und wenn möglich zuweilen mit flüssigem Dünger bewässert, entwickeln sich zu riesigen Pflanzen.	
-7	x					x	x					
-10	x								x		Frostfrei zu überwintern.	
Blüthen überlebend	x					x					Mit rothen, erdbeerartigen Früchten.	
-9					x	x					Verbreitet sich sehr durch Wurzelaufläufer. Hochwachsend. Der Samen liegt lange, ehe er keimt.	
-9	x	x						x			Sehr reichblühend. Herbstsaat anwendbar, wenn man die Sämlinge, zu mehreren in Töpfe pikirt, überwintert.	
-8		x							x	x	} Für trockene Bouquets vor der Reife zu schneiden.	
-8		x							x	x		
-9		x							x	x		
-9						x			x	x		
-9								x			Gegen starken Sonnenbrand und Regen zu schützen. Liebt leichte Erde.	
-9	x							x			Ungemein blüthenreiche Pflanzen. Pikiren.	
-9	x							x			Liebt lockeren Boden und vor Nässe geschützte Lage. Blüht sehr dankbar.	
-8			x								Der Samen liegt lange, ehe er keimt. Officinell. Frühjahrsaussaat unsicher.	
-9			x					x			An warmer, geschützter Lage verwenden. Bringt reizende, gestreifte Früchtchen.	
-8					x	x					Lieben trockenen Boden. Sehr hochwachsend. Blühen erst dankbar, wenn einige Jahre alt.	
-9	x										Reichblühend.	
-10			x								Berührung der Blätter verursacht Brennen auf der Haut. Pikiren der Sämlinge in Töpfe zu empfehlen.	
-7		x					x				Lieben sonnigen Standort. Officinell.	
-10			x					x	x		Frostfrei zu überwintern. An sonnig gelegene hohe Mauern oder Spaliere zu pflanzen.	
-8	x	x									Für sonnige Lagen und lockeren Boden.	
-9	x	x					x	x			Liebt gut durchgearbeiteten, sandigen Boden in sonniger Lage. Im Winter zu bedecken.	
											Blühen nur bei Sonnenschein.	

N a m e n.	Familie.	Charakter der Pflanze bezüglich ihrer Dauer.	Schlingpflanze.	Innortelle.	Wohnliche Pflanze.	Bienenfutterpflanze.	Ziergras.	Zwiebel-, Knollen-, Rhizombildend.	Aussaat		
									Monat.	im freien Lande, an Ort und Stelle.	im kalten Mistbeet oder Zimmer.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Calceolaria pinnata scabiosaefolia	Scrophulariaceae	⊙							3—4		x
Calendula, einjährige		Compositae	⊙							3—5	x
Callichroa platyglossa	"	⊙							3—5	x	
Calliopsis, einjährige	"	⊙							3—4		x
ausdauernde	"	⌘							5—7		x
Callirhoë macrorrhiza	Malvaceae	⌘						K	2—4		
pedata u. V.	"	⊙							3—4		x
verticillata	"	⌘						K	2—4		x
Camassia	Asphodeleae	⌘						Z	3—4		x
Cannabis gigantea	Urticeae	⊙							3—4		x
Capsicum	Solaneae	⊙							3—4		
Cardiospermum Halicacabum	Sapindaceae	⊙	x						3—5		
Carduus Marianus	Compositae	⊙							3—4	x	
Carthamus tinctorius	"	⊙							4—5	x	
Castilleja indivisa	Scrophulariaceae	⌘⊙							2—4		
Catananche coerulea u. V.	Compositae	⌘		x					5—7		
Cedronella cana	Labiatae	⌘⊙			x	x			3—4		x
Centaurea americana	Compositae	⊙							3—4		x
Cyanus u. V., depressa u. V.	"	⊙							3—5	x	
moschata u. V., suaveolens.	"	⊙			x	x			3—4	x	
im Freien ausdauernde	"	⌘							5—7		x
Centauridium	"	⊙							3—4		x
Centranthus macrosiphon u. V.	Valerianeae	⊙							3—4	x	
Cephalaria	Dipsaceae	⌘				x			5—7		x
Cerastium, ausdauernde	Caryophylleae	⌘							4—6		x

Blüthe- zeit fällt in die Monate	Eignet sich:												Besondere Bemerkungen.
	für Blumenbeete, Gruppen u. Rabatten.	für Einfassungen.	für Lauben, Spaliere, Wände etc.	für Blattplanzengrup- pen im Freien.	als Einzelpflanze auf Rasen od. Rabatten.	für den Vordergrund von Gehölzgruppen.	für Terrassen und Felspartien.	für Topfcultur.	für frische Bouquets.	für trockene Bouquets, Kränze etc.			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	
3—9	x							x				Sehr feinsamig.	
7—10	x					x		x	x			Die Varietäten von <i>C. officinalis</i> liefern oft bis December Kranzblumen. Die niedrigen Sorten können auch als Einfassungen dienen.	
7—9	x	x										Liebt volle Sonne.	
3—9	x							x	x			Sehr reichblühend. Für freie, sonnige Lagen. Niedrige Sorten auch für Topfcultur und Einfassungen.	
3—9	x								x				
7—10								x				In Töpfen unter Glasbedeckung oder auf gut zubereiteten, vor Nässe zu schützenden Beeten; frostfrei zu überwintern.	
7—10	x							x	x			<i>C. p. nana compacta</i> auch für Einfassungen und Topfcultur.	
7—10	x						x					Mit niederliegenden Zweigen, welche sich auch etwas emporleiten lassen.	
3—7	x							x				In strengen Wintern bedecken, gegen andauernde Feuchtigkeit schützen.	
Blüthen unbe- eutend				x	x	x						Die weiblichen Pflanzen sind wenig decorativ, müssen aus den Gruppen entfernt werden. Es ist vorthellhaft, die <i>C.</i> bis zum Auspflanzen in kleinen Töpfen zu ziehen.	
3—8								x				Vorzügliche Marktpflanzen. Verlangen sonnigste Lage und reichliches Giessen. Sehr zierend durch lebhaft gefärbte Früchte und buschigen Habitus.	
7—8			x									An niedrigen Spaliere in sonniger Lage. Interessante Früchte.	
7—9				x	x	x						Die Dauer der Pflanze kann durch Ausschneiden der Blütenstiele verlängert werden.	
7—9	x											Die orangegelben Blumen liefern einen Farbstoff.	
7—9								x	x			Vorzugsweise in Töpfen in einer Mischung von sandiger Laub- und Mistbeeterde. Anfangs unter Glas zu cultiviren, später an ge- schützten Orten aufzustellen. Bildet nur einige Blütenstengel.	
3—8	x								x	x		Liebt trockenen Standort. Alle Pflanzen werden unschön.	
7—10	x							x				Ältere Pflanzen leiden in strengen Wintern.	
7—9	x					x						Herbstaussaat anwendbar. Verlangt die volle Sonne.	
3—9	x								x	x		Die Blumen können durch Einlegen in Sand getrocknet werden.	
7—9	x								x			Die annuellen <i>C.</i> gedeihen in jedem nicht zu schweren Boden; sie fürchten grosse Nässe.	
7—9					x	x			x			<i>C. montana</i> blüht früh.	
7—9	x											Für sonnigen Standort.	
7—8	x	x										Blühen, wenn die Stengel nach dem ersten Flor abgeschnitten werden, dankbar weiter.	
7—8					x	x						Wird über 2 Meter hoch.	
7—7		x					x					Die weissblüthigen Sorten für Teppichbeete.	

N a m e n.	Familie.	Character der Pflanze bezüglich ihrer Dauer.	Schlingpflanze.	Immortelle.	Wohlriechende Pflanze.	Bienenfutterpflanze.	Ziergras.	Zwiebel-, Knoll-, Rhizombildend.	Aussaat:			
									Monat.	im freien Lande, an Ort und Stelle.	im kalten Mistbeet oder Zimmer.	im warmen Mistbeet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cerithe, einjährige	Boragineae	⊙				x			3—4	x		
Chaenostoma	Scrophularineae	♀ ⊙							3—4			
Chamaepeuce	Compositae	♂							3—4 8—9			
Cheiranthus maritimus u. V...	Cruciferae	⊙			x				3—4	x		
Chelone barbata u. V.	Scrophularineae	♀				x			5—7		x	
Chenopodium Atriplicis	Chenopodeae	⊙							3—4		x	
altissimum, scoparium (Kochia)	"	⊙							3—4		x	
Chionodoxa	Liliaceae	♀						Z	5—7		x	
Chlora grandiflora	Gentianeae	⊙							3—4			
Chloris	Gramineae	♀					x		4		x	
Chrysanthemum, einjährige...	Compositae	⊙							3—5		x	
inodorum fl. pleno	"	♀ ⊙							3—4		x	
Chrysurus (Lamarekia)	Gramineae	⊙					x		4		x	
Cirsium	Compositae	♀							5—7		x	
Clarkia elegans u. V.	Onagrariceae	⊙				x			3—4 8—9		x	
pulegiella u. V.	"	⊙							3—4 8—9		x	
Clematis, Standen	Ranunculaceae	♀							3—5 8—9			x
Cleome	Capparideae	⊙							3—4			
Clintonia	Lobeliaceae	⊙							3—4		x	
Cobaea scandens	Cobaeaceae	♀ ⊙	x						2—4			
Coccinia indica	Cucurbitaceae	♀ ⊙	x						4			
Coix	Gramineae	⊙					x		4			
Colchicum	Colchicaceae	♀						Z	4—7		x	
Collinsia	Scrophularineae	⊙				x			3—5 8—9		x	

Blüthezeit fällt in die Monate	Eignet sich:												Besondere Bemerkungen.
	für Blumenbeete, Gruppen u. Rabatten.	für Einfassungen.	für Lauben, Spaliere, Wände etc.	für Blattpflanzengruppen im Freien.	als Einzelpflanze auf Rasen od. Rabatten.	für den Vordergrund von Gehölzgruppen.	für Terrassen und Felsparthen.	für Topfcultur.	für frische Bouquets.	für trockene Bouquets, Kränze etc.			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
—8	x												
—10	x	x						x				Im Gewächshause ausdauernd. Sehr blüthenreich.	
—7				x	x	x	x	x				Bis zur Auspflanzung einzeln in Töpfen zu cultiviren und auch, in Töpfen stehend, auf Gruppen zu verwenden. <i>Ch. diacantha</i> kann auch in das freie Land gesät werden, keimt dann aber oft spät und unregelmässig. Blätter stachelig.	
—8	x	x					x	x				Leidet zuweilen durch Erdflöhe.	
—9	x					x			x			Alte, starke Pflanzen sind auch einzeln höchst decorativ.	
blüthen unbedeutend				x	x							Nur in Massen vereinigt von Effect.	
"				x	x			x				} Bis zum Auspflanzen in das freie Land in Töpfen zu ziehen.	
—4	x	x					x	x	x				
—9								x				In Saatgefässen auszusäen. Der Samen liegt lange, ehe er keimt. Siehe Aussaat von Zwiebelgewächsen, §. 180, S. 219 u. 220.	
—8												Gedeiht besonders in einer Mischung von Haide-, Mistbeelerde und Sand an sonniger, vor Nässe geschützter Lage. Herbstsaat anwendbar bei Durchwinterung unter Glas.	
—10	x					x			x			Einige Sorten sind mehrjährig, man behandelt sie jedoch als Sommergewächse.	
—10	x								x	x		} Chr. coronarium kann im Gewächshaus überwintert werden. Sämlinge blühen im ersten Jahre; im Gewächshaus auch während des Winters.	
—8		x								x			
—8					x	x						} Zur Ausschmückung von Ufern.	
—9	x							x					
—9	x	x							x			} Herbstsaat geht bei langen Wintern zu Grunde. Werden zuweilen von einem Käfer beschädigt.	
—9	x					x				x			
—10					x	x		x				Keimen oft langsam.	
—8		x						x				Bis zum Auspflanzen in sandiger Lauberde einzeln in Töpfen zu ziehen. Der Samen keimt langsam. Verlangen viel Wärme. Unter Glas mehrjährig.	
—10			x					x				Gedeihen am besten in lockerer, sandiger Laub- und Mistbeelerde. Bei anhaltender Trockenheit reichlich zu bewässern. Auch als Ampelpflanzen zu benutzen.	
—9			x					x				Bis zum Auspflanzen an ihren Bestimmungsort in Töpfen zu cultiviren; liebt humusreichen Boden und reichliche Bewässerung. Frostfrei zu überwintern.	
—8				x	x							Für geschützte, recht sonnig gelegene Stellen. Ueberwinterung unter Glas, warm. Bringt rothe Früchte.	
—10		x					x					Interessante Früchte, welche man als Zierrath industriell verwerthet.	
—8	x	x						x				Giftig. Sämlinge blühen erst im 2. oder 3. Jahre. Können auf Rasenplätze gepflanzt werden. Vergl. §. 180, S. 219 u. 220.	
—8	x	x						x				Reichblühend.	

N a m e n.	Familie.	Character der Pflanze bezüglich ihrer Dauer.	Sehlingpflanze.	Immortelle.	Wolltrieblende Pflanze.	Bienenfutterpflanze.	Ziergras.	Zwiebel-, Knollen-, Rhizomebildend.	Aussaat:			
									Monat.	im freien Lande, an Ort und Stelle.	im kalten Mistbeet oder Zimmer.	im warmen Mistbeet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
Collinsia verna.	Scrophulariaceae	⊙							3-4 9-10	x		
Collomia.	Polemoniaceae	⊙							3-4 8-9	x		
Commelina.	Commelineae	⊙						K	3-4			
Convallaria majalis.	Smilacaceae	⊙			x			R	4-6		x	
japonica.	"	⊙							4-6			
Convolvulus aureus superbus.	Convolvulaceae	⊙	x						2-3			
tricolor u. V.	"	⊙							3-5	x	x	
Cortusa.	Primulaceae	⊙							5-7		x	
Corydalis.	Fumariaceae	⊙						K	5-7		x	
Cosmanthus.	Boraginaceae	⊙							3-4	x		
Cosmea (Cosmos), einjährige ..	Compositae	⊙							3-4		x	
Cosmidium.	"	⊙							3-4		x	
Crepis, einjährige.	"	⊙							3-4	x		
Crucianella.	Rubiaceae	⊙							5-7		x	
Cucumis, einjährige.	Cucurbitaceae	⊙	x						4			
perennis.	"	⊙	x		x			K	4-5			
Cucurbita.	"	⊙	x						4			
Cuphea emineus.	Salicariae	⊙							2-3			
platycentra, strigulosa.	"	⊙							2-3			
einjährige.	"	⊙							3-4		x	
Cyclanthera.	Cucurbitaceae	⊙	x						4			
Cynoglossum coelestinum.	Boraginaceae	⊙				x			3-4		x	
linifolium.	"	⊙							3-4 8-9	x		
Cynosurus.	Gramineae	⊙					x		4	x	x	
Datisca.	Resedaceae	⊙							5-7		x	
Datura, einjährige.	Solaneae	⊙			x				2-4			
Delphinium cardiopetalum.	Ranunculaceae	⊙							3-4 8-10	x	x	

Lüthe- zeit fällt in die Sonate	Eignet sich:										Besondere Bemerkungen.			
	für Blumenbeete, Gruppen u. Rabatten.	für Einfassungen.	für Lauben, Spaliere, Wände etc.	für Blattpflanzengrup- pen im Freien.	als Einzelpflanze auf Rasen od. Rabatten.	für den Vordergrund von Gehölzgruppen.	für Terrassen und Felspartien.	für Topfcultur.	für frische Bouquets.	für trockene Bouquets, Kranze etc.				
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
6	x	x					x	x	x		Herbstaussaat, welche einen prächtigen Frühlingsflor ergibt, ist bei weitem vorzuziehen. Frühjahrssämlinge blühen Juli-August.			
8	x	x						x			Gedeiht in jedem Boden.			
9	x							x			Blüht im ersten Jahre. Frostfrei überwinterte Knollen im Früh- jahr auszupflanzen.			
10	x							x			Der Samen liegt lange, ehe er keimt. Verlangt lehmige, sandige Lauberde. Winterblüher, zum Trauben geeignet.			
6		x				x		x	x		Frostfrei überwintern. Wird in Ober-Italien für immergrüne Rasen benutzt. Samen verliert schnell die Keimkraft.			
8		x						x			Liebt lockeren Boden und sonnige Lage.			
10			x					x			} Für Ampeln verwend- bar.			
10	x	x						x						
5		x						x	x		Recht schattig zu pflanzen.			
9	x	x				x	x		x		Der Samen liegt lange, ehe er keimt, bei manchen Arten zuweilen 1 Jahr. Nicht alle Species bilden Knollen.			
9	x	x									Liebt trockenen Standort.			
10	x					x			x		Mit zierlicher Belaubung. Stark verzweigte Pflanzen.			
10	x								x		Liebt sonnigen Standort.			
9	x	x									C. rubra und alba eignen sich zur Herbstaussaat an Ort und Stelle. Lieben volle Sonne.			
8	x	x					x				Es ist vortheilhaft, sie im Frühjahr zurückzuschneiden.			
8			x								} Lieben sonnige Lage und reichliche Bewässerung. Bringen interess- ante Früchte. Es ist vorzuziehen, die Körner einzeln oder je nach Grösse zu zweien in Töpfe zu säen. C. perennis im Winter zu bedecken.			
8			x		x		x							
8			x											
10	x					x		x			} Blühen im ersten Jahre aus Samen und sind frostfrei zu über- wintern.			
10	x	x						x	x					
10	x	x						x	x		Sehr dankbar blühende Pflanzen.			
8			x								In Töpfe zu säen. Besonders für sonnige Lagen. Ungemein schnell- wachsend. Bringen kleine, gurkenartige Früchte.			
9	x								x		Durch mehrmalige Aussaat in Intervallen kann man einen Flor bis September erzielen.			
9	x	x					x	x	x					
9		x							x		Aus Samen erhält man männliche und weibliche Pflanzen, letztere sind die schöneren. Im Winter zu bedecken.			
9				x	x									
9	x			x	x	x		x			Man muss die D. im nördlichen Europa bis zur Aussaat in den Bestimmungsort in Töpfen kultiviren. Sie verlangen humus- reichen Boden, häufiges Gießen und warme Lage.			
9	x	x						x	x		Aeusserst reichblühend. Herbstaussaat nach Colonne II, Frühjahrs- aussaat nach Colonne 12.			

N a m e n.	Familie.	Character der Pflanze bezüglich ihrer Dauer.	Schlingpflanze.	Immortelle.	Wohnriechende Pflanze.	Bienenfutterpflanze.	Ziergras.	Zwiebel-, Knollen-, Rhizombildend.	Aussaat:			
									Monat.	im freien Lande, an Ort und Stelle.	im kalten Mistbeet oder Zimmer.	im warmen Mistbeet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Delphinium chinense</i> (grandi- florum) u. V.	Ranunculaceae	☿ ⊙							4—7		×	
<i>elatum</i> u. übrige ausdauernde	„	☿							4—7		×	
<i>formosum</i>	„	☿							4—7		×	
<i>indicaule</i>	„	☿ ⊙						K	2—4		×	
<i>Dianthus barbatus</i> u. V.	Caryophyllaceae	☿ ♂							4—6		×	
<i>plumarius</i> u. V.	„	☿			×				4—6		×	
„ <i>scoticus flore pleno</i> ...	„	☿			×				4—6		×	
übrige ausdauernde	„	☿							4—6		×	
<i>Dictamnus</i>	Rutaceae	☿			×	×			5—7		×	
<i>Dielytra</i>	Fumariaceae	☿						K	4—6		×	
<i>Digitalis purpurea</i> u. V., <i>glox-</i> <i>niaceiflora</i> , <i>maculata</i> , <i>mon-</i> <i>strosa</i>	Scrophulariaceae	☿ ♂				×			5—7		×	
übrige	„	☿				×			5—7		×	
<i>Dodecatheon</i>	Primulaceae	☿							2—3			×
<i>Dolichos</i> , einjährige	Papilionaceae	⊙	×						3—4			×
<i>Doronicum</i>	Compositae	☿							5—7		×	
<i>Dracocephalum moldavicum</i> ..	Labiatae	⊙			×	×			3—4	×		
ausdauernde	„	☿				×			5—6		×	
<i>Dryas octopetala</i>	Rosaceae	☿							5—7		×	
<i>Echinacea</i>	Compositae	☿							5—7		×	
<i>Echinocystis lobata</i>	Cucurbitaceae	☿ ⊙	×					K	3—4	×		
<i>Echinops</i> , ausdauernde	Compositae	☿							5—6	×	×	
<i>Echium creticum</i>	Boraginaceae	⊙				×			3—4		×	
<i>Eleusine</i>	Gramineae	⊙					×		4	×		

Blüthezeit fällt in die Monate	Eignet sich:												Besondere Bemerkungen.
	für Blumenbeete, Gruppen u. Rabatten.	für Einfassungen.	für Lauben, Spaliere, Wände etc.	für Blattpflanzengruppen im Freien.	als Einzelpflanze auf Rasen od. Rabatten.	für den Vordegrund von Gehölzgruppen.	für Terrassen und Felspartien.	für Topfcultur.	für frische Bouquets.	für trockene Bouquets, Kränze etc.			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
-9	x					x		x	x	x	Blühen bei Aussaat im Februar-März noch im Spätsommer des ersten Jahres. In strengen Wintern zu bedecken.		
-9	x				x	x		x	x	x	Die einzelnen Blumen aller ausdauernden D. können durch Einlegen in Sand getrocknet werden. Blühen bei Februar-März-Aussaat im Herbst. D. cordata verlangt Bederkung im Winter.		
-9	x				x	x		x	x		Wird oft im besten Wachsthum von einem weissen Pilze befallen. Bei Februar-März-Aussaat blüht D. f. im Herbst.		
-8	x	x						x			Orangeroth blühend. Marktpflanze. Frischer Samen keimt binnen 4 bis 5 Wochen. Pikiren.		
-7	x					x			x		Sind zu pikiren. Im Spätsommer nicht zu eng auszupflanzen. Die D. nanus compactus u. V. auch für Einfassungen, wenn man die hohen entfernt. Jährlich neu aussäen, ältere Pflanzen werden unschön.		
-7	x	x						x	x	x	Der Samen der gefüllten Varietäten bringt sehr viel einfachblühende Pflanzen.		
-7	x	x						x	x	x	Zu pikiren. Im Spätsommer in das freie Land oder in Töpfe zu pflanzen. Letztere sind in hellen, trockenen Räumen zu überwintern. Auch durch Absenker und Stecklinge zu vermehren.		
-8	x	x						x	x		Die jungen Pflanzen der zarteren Sorten sind frostfrei zu überwintern. Lieben sonnigen Standort. Einige Species sind wohlriechend. Man kann auch in Töpfe säen; der Samen liegt zuweilen ein Jahr, ehe er keimt. Sämlinge blühen selten vor dem 4. Jahre, werden dann aber immer schöner.		
-7	x				x	x	x		x		Der Samen liegt lange, ehe er keimt. D. spectabilis ist Marktpflanze und eignet sich zum Treiben.		
-9	x				x	x		x	x		Verlieren im Alter an Ansehen, daher alle 2 Jahre frisch ansäen. Giftig. Begnügen sich mit steinigem, trockenen Boden.		
-8	x				x	x					Blühen sämmtlich gelb oder bräunlich.		
-8	x					x	x				In Töpfe mit sandiger Haideerde zu säen. Man pflanzt in schattige Lage und in kräftige, lockere Erde.		
-8			x						x		Die Körner einzeln in kleine Töpfe zu säen. Verlangt sehr sonnige Lage. Kommt nur im südlichen Klima zur vollen Entfaltung.		
-5	x					x			x		Gehören zu den ersten Frühlingsblumen und prunken.		
-8	x										Reichblühend.		
-9	x							x	x		Freitandaussaat anwendbar.		
-5		x						x	x		Pikiren. Liebt Haideerde. Junge Pflanzen frostfrei überwintern.		
-9	x					x					Gedeiht auch im Halbschatten.		
-8			x					x			Sehr raschwachsend. Interessante Früchte. Während des Winters zu bedecken.		
-8					x	x					Werden bis 2 m hoch und gedeihen in jedem Boden.		
-8	x							x	x		Gedeiht in steinigem, trockenen Boden ohne jede Pflege.		
-9		x									Interessant durch die Stellung der Blüthenähren.		

N a m e n.	Familie.	Character der Pflanze bezüglich ihrer Dauer.	Schlingpflanze.	Immortelle.	Wohlriechende Pflanze.	Bienenfutterpflanze.	Ziergras.	Zwiebel-, Knollen-, Rhizombildend.	Aussaat:			
									Monat.	im freien Lande, an Ort und Stelle.	im kalten Mistbeet oder Zimmer.	im warmen Mistbeet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
<i>Elichrysium apiculatum</i> , brachyrhynchum, elegans... }	Compositae	⊙		x					3—4			
<i>bracteatum</i> , <i>monstrosum</i> n. V.	"	⊙		x					3—4		x	
<i>Elsholzia cristata</i>	Labiatae	⊙			x	x			3—4		x	
<i>Elymus</i> , ausdauernde	Gramineae	☿					x		5—7		x	
<i>Eopepon</i>	Cucurbitaceae	⊙	x					K	3—4			
<i>Epilobium</i> , ausdauernde	Onagraceae	☿				x			5—7		x	
<i>Eragrostis</i>	Gramineae	⊙					x		4	x		
<i>Eremostachys</i>	Labiatae	☿				x			4—6		x	
<i>Eremurus</i>	Asphodelaceae	☿							3—4		x	
<i>Erianthus</i>	Gramineae	☿					x		2—4			
<i>Erigeron</i> , ausdauernde	Compositae	☿							5—7		x	
<i>Erinus alpinus</i>	Scrophulariaceae	☿				x			4—6		x	
<i>Eriogonum umbellatum</i>	Polygoneae	☿							4—6		x	
<i>Erodium Grinum</i>	Geraniaceae	⊙							3—4	x		
ausdauernde	"	☿			x				4—6		x	
<i>Erpetion</i>	Violaceae	☿							4—6		x	
<i>Eryngium</i> , ausdauernde	Umbelliferae	⊙							4—7		x	
<i>Erysimum</i> , einjährige	Cruciferae	⊙							3—4 8—9	x		
<i>puchellum</i> , <i>rupestre</i>	"	☿							5—7		x	
<i>Erythraea Mühlenbergi</i>	Gentianeae	☿							2—3			
<i>Eschscholtzia</i>	Papaveraceae	⊙♂							3—4 8—9	x		
<i>Eucharidium</i>	Onagraceae	⊙							3—4	x		
<i>Euchlaena luxurians</i>	Gramineae	☿					x		3—4		x	
<i>Eucnide bartonioides</i>	Loaseae	⊙							3—4			
<i>Eulalia japonica</i>	Gramineae	☿					x		2—3			
<i>Eupatorium</i>	Compositae	☿							3—4			

Litho- zeit fällt in die Monate	Eignet sich:											Besondere Bemerkungen.
	für Blumenbeete, Gruppen u. Rabatten.	für Einfassungen.	für Lauben, Spalliere, Wände etc.	für Blattpflanzengrup- pen im Freien.	als Einzelpflanze auf Rasen od. Rabatten.	für den Vordergrund von Gehölzgruppen.	für Terrassen und Felspartien.	für Topfcultur.	für frische Bouquets.	für trockene Bouquets, Kranze etc.		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
—9	x							x	x	x	Sonnig liegende Pflanzbeete mit lockerer, sandiger Erde zubereiten. Gegen anhaltende Nässe zu schützen.	
—10	x							x	x	x	Lieben sonnigen Standort.	
—9	x							x			Reichblühend.	
—10				x		x	x				Für sandigen Boden besonders passend.	
—9			x					x			Für geschützte, sonnige Lagen. Schöne Früchte.	
—9	x					x	x		x		Freilandaussaat anwendbar. Auch zur Ausschmückung von Teich- und Flussrändern.	
—10		x						x	x	x	Für Bouquets vor der Reife zu schneiden.	
—8					x	x					Bis zum Auspflanzen in Töpfen zu ziehen. In strengen Wintern zu bedecken. Blüht im 2. oder 3. Jahre.	
—8					x	x					Mit oft über 1 Meter langen Blütenähren.	
—9					x	x					Anfangs in Töpfen ziehen; frostfrei überwintern.	
—8	x	x				x	x		x		Für trockene Lagen. Blüht bei früher Aussaat (Februar-März) im ersten Jahre.	
—5		x					x	x			Lieben Haideerde; bis zum Auspflanzen in Töpfen ziehen; fürchten Nässe. Frostfrei überwintern.	
—9		x					x				Liebt sonnigen Standort.	
—9											Der Samen wird als Wetterzeiger benutzt.	
—9		x					x	x			Sehr reichblühende Pflanzen.	
—10		x					x	x			Frostfrei zu überwintern. Wird von Schnecken heimgesucht. Zier- liche Ampelpflanze. Blüht bei Februar-März-Aussaat im 1. Jahre.	
—8					x	x	x				Lieben sonnigen Standort. Abgeschnittene Blütenstiele halten sich lange.	
—8	x								x		Werden oft durch Erdflöhe beschädigt.	
—9	x	x					x				Für trockene Lagen.	
—9	x	x						x			Bedarf lockerer Rasen- und Laub-, oder sandiger Haideerde; gegen Sonnenbrand und anhaltende Nässe schützen.	
—10	x	x						x			Mit Knospen abgeschnittene Stengel blühen im Wasser auf.	
—8	x	x						x			Wird häufig durch Erdflöhe beschädigt.	
—9				x	x	x					Frostfrei zu überwintern. Schnellwachsend.	
—9	x							x			Bald pikiren und möglichst lange in Töpfen unter Glas halten. Lockere Laub- oder Mistbeerde. Empfindlich, namentlich gegen Nässe.	
—10				x	x	x		x			Frostfrei zu überwintern. Erreicht nach einigen Jahren grosse Dimensionen.	
—10	x					x			x		E. Fraseri kann als Annuelle behandelt werden.	

N a m e n.	Familie.	Character der Pflanze bezüglich ihrer Dauer.	Schlingpflanze.	Immortelle.	Wohlriechende Pflanze.	Bienenfutterpflanze.	Ziergras.	Zwiebel-, Knollen-, Rhizombildend.	Aussa at:			
									Monat.	im freien Lande, an Ort und Stelle.	im kalten Mistbeet oder Zimmer.	im warmen Mistbeet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Euphorbia variegata	Euphorbiaceae	⊙							3—4		x	x
Eutoca	Hydrophyllaeae	⊙				x			4	x		
Fedia	Valerianeae	⊙							3—4	x		
Fenzlia dianthiflora n. V.	Polemoniaceae	⊙							3—4		x	
Ferula	Umbelliferae	♀							2—3		x	
Festuca, ausdauernde	Gramineae	♀					x		3—6		x	
glauca, viridis	"	♀					x		3—6		x	
einjährige	"	⊙					x		3—4	x		
Fragaria indica	Rosaceae	♀							2—3			x
Fritillaria	Liliaceae	♀						Z	5—7		x	
Funkia	Heimerocallideae	♀							5—7		x	
Gaillardia, einjährige	Compositae	⊙							3—4		x	
ausdauernde	"	♀							3—7		x	
Galega	Papilionaceae	♀				x			5—7		x	
Gamolepis Tagetes	Compositae	⊙							4	x		
Gardoquia betonicoides	Labiatae	♀ ⊙			x	x			3—4		x	
Gaura Lindheimeri	Onagrarieae	♀ ⊙							3—4		x	
Gentiana, ausdauernde	Gentianeae	♀							5—6		x	
acaulis	"	♀							5—6		x	
Geranium, ausdauernde	Geraniaceae	♀							5—7		x	
Geum	Rosaceae	♀							5—7		x	
Gilia	Polemoniaceae	⊙							3—4 8—9	x		
Gladiolus	Irideae	♀						Z	2—3			x
Glaucium phoeniceum	Papaveraceae	⊙							4		x	

Eignet sich:														Besondere Bemerkungen.
Blüthezeit fällt in die Monate	für Blumenbeete, Gruppen u. Rabatten.	für Einfassungen.	für Lauben, Spaliere, Wände etc.	für Blattpflanzengruppen im Freien.	als Einzelpflanze auf Rasen od. Rabatten.	für den Vordergrund von Gehölzgruppen.	für Terrassen und Felspartien.	für Topfcultur.	für frische Bouquets.	für trockene Bouquets, Kränze etc.				
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
üthen unbe- ntend				x				x					Verlangt sonnige Lage. Die Panachirung der Blätter tritt erst auf, wenn die Pflanzen zu blühen beginnen.	
-8	x	x											Reichblühend.	
-8	x	x											Gedeiht ohne alle Pflege.	
-8								x					In sandiger Laub- und Mistbeete und in Küsten oder Beeten unter Glas zu ziehen. Sehr feinsamig. Reichblühende Miniaturpflanze.	
-6					x	x							Herbstaussaat anwendbar. Der Samen keimt oft erst nach einem Jahre. Im Winter zu bedecken. Erreichen grosse Dimensionen. Officinell.	
-9									x	x			Für Bouquets vor der Reife zu schneiden.	
-8		x					x	x					Zur besseren Entwicklung der Büsche sind die Blüthenhalme auszuscheiden.	
-8									x	x			Für Bouquets vor der Reife zu schneiden.	
-9							x	x					Früchtige Ampelpflanze. Die rothen Früchte sind nicht essbar. Vermehrung auch durch Ausläufer.	
-5	x				x	x	x						Sämlinge blühen selten vor dem 4. Jahre. (§. 180, S. 219 u. 220.)	
-9	x	x			x	x	x	x					Der Samen liegt lange, ehe er keimt. Sämlinge blühen erst nach einigen Jahren. Gegen Schnecken zu schützen.	
-10	x					x		x	x				Lassen sich unter Glas überwintern.	
-8	x					x			x				Blühen bei früher Aussaat schon im ersten Herbst. Auch durch Stecklinge vermehrbar. Vertragen trockenen Standort.	
-8	x				x	x			x				Freilandaussaat an Ort und Stelle anwendbar. Blüht, nach dem ersten Flor abgeschnitten, dunkbar nach.	
-8	x	x											Fürchtet die Nüsse.	
-10	x							x					Ueberwinterung frostfrei.	
-10	x					x		x	x				Freilandaussaat anwendbar. Im freien Lande während des Winters zu bedecken. Winterblüher im Glashause.	
-7	x	x				x	x	x	x		} In Sauggefässe zu säen. Aelterer Samen liegt sehr lange, ehe er keimt und ist schwach zu bedecken. G. acutis auch für Teppichbeete geeignet.			
-7	x	x				x	x	x	x					
-5	x					x	x		x				Einige Species bilden Knollen und sind frostfrei zu überwintern.	
-8	x					x	x		x				Aeltere Pflanzen gehen bei strengen Wintern zu Grunde.	
-9	x	x						x	x				Herbstaussaat anwendbar, musser für G. tinifolia.	
													Zu pikiren. Die abgetrockneten Zwiebeln im Winter in frostfreien, trockenen Räumen aufzubewahren. (Vergl. §. 180, S. 219 u. 220.) Während der Vegetationszeit reichlich bewässern. Vermehrung auch durch Brutzwiebeln. Zum Treiben geeignet. Abgeschnittene Blumenstengel blühen, in Wasser gestellt, lange und dunkbar. Einige Sämlinge blühen schon im Jahre der Aussaat, die Güte der Blumen ist aber erst bei nochmaligem Probblühen zu beurtheilen.	
-10	x					x		x	x					
-8	x					x							Freilandaussaat vorzuziehen.	

N a m e n.	Familie.	Character der Pflanze bezüglich ihrer Dauer.	Schlingpflanze.	Immortelle.	Wohlriechende Pflanze.	Bienenfutterpflanze.	Ziergras.	Zwiebel-, Knollen-, Rhizomebildend.	Aussa at:			
									Monat.	im freien Lande, an Ort und Stelle.	im kalten Mistbeet oder Zimmer.	im warmen Mistbeet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
Glaucium, ausdauernde.....	Papaveraceae	♂ ①							3—4 8—9	x	x	
Globularia, krautartige.....	Globulariaceae	♀							5—7		x	
Gnaphalium decurrens.....	Compositae	♀		x					5—7		x	
Leontopodium.....	"	♀		x					5—7		x	
orientale flore pleno.....	"	♀		x					5—7		x	
foetidum.....	"	⊙		x					3—4		x	
Godetia.....	Onagrariceae	⊙							3—4	x	x	
Gomphrena globosa.....	Amarantaceae	⊙		x					3—4			
Grahamia.....	Compositae	⊙			x				3—4	x	x	
Grammanthes.....	Crassulaceae	⊙							3—4		x	
Grindelia.....	Compositae	♀							5—7		x	
Gunnera.....	Urticeae	♀							4—6			
Gymnopsis.....	Compositae	⊙							3—4		x	
Gymnothrix.....	Gramineae	♀					x		2—3			
Gynerium.....	"	♀					x		2—3			
Gypsophila, ausdauernde.....	Caryophylleae	♀						R	4—6		x	
cerastioides, repens.....	"	♀							4—6		x	
elegans u. V.	"	⊙							4	x		
muralis.....	"	⊙							3—4		x	
Hedysarum coronarium u. V. .	Papilionaceae	♂ ♀			x				5—7		x	
humile.....	"	⊙							3—4		x	
Helenium Douglasi.....	Compositae	⊙							3—4		x	
Helianthemum, ausdauernde..	Cistaceae	♂							5—7		x	
Helianthus, einjährige.....	Compositae	⊙							4—5	x		
argophyllus, cucumerifolius,)	"	⊙							4		x	
peruvianus.....)												
Heliophila.....	Cruciferae	⊙							3—4		x	

Lithographie Zeit fällt die Monate	Eignet sich:											Besondere Bemerkungen.
	für Blumenbeete, Gruppen u. Rabatten.	für Einfassungen.	für Lauben, Spaliere, Wände etc.	für Blattpflanzengrup- pen im Freien.	als Einzelpflanze auf Rasen od. Rabatten.	für den Vordergrund von Gehölzgruppen.	für Terrassen und Felspartien.	für Topfcultur.	für frische Bouquets.	für trockene Bouquets, Kränze etc.		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
-9	x					x	x				Freilandaussaat vorzuziehen.	
-7	x	x					x	x			Liebt sandigen Boden.	
-10								x	x	x	Frostfrei überwintern.	
-10	x	x					x	x		x	In Töpfen heranziehen.	
-10	x	x					x	x		x	Frostfrei überwintern.	
-10										x	} Sehr feinsamig. Lieben die volle Sonne, sandige Erde und trockene Standort.	
-9	x	x						x	x			Werden zuweilen von Käfern heimgesucht. Mistbeet-Aussaat vor- zuziehen. Die hohen Sorten nicht Col. 16.
-9	x	x						x	x	x		An sonnigen Lagen in nahrhafte Mistbeeterde; gegen anhaltende Nässe zu schützen.
-9												
-9		x					x	x			In Saatgefäße säen und pikiren. Topfcultur am sichersten. Lieben recht sandige, lockere Erde, sonnigen Standort; vor Regen zu schützen. Sehr feinsamig.	
-9	x					x						
-9				x	x	x					Bis zur Auspflanzung in Töpfen ziehen. Der Samen liegt oft 1 Jahr, ehe er keimt. Verlangt sehr nahrhaften Boden, im Winter Be- deckung im Freien.	
-9	x								x		Sehr buschig und reichblühend.	
-10				x	x	x		x			} In Töpfen cultiviren und nach gehöriger Erstarkung auspflanzen. Im Winter bedecken oder in das Gewächshaus bringen. Säm- linge blühen im 2. oder 3. Jahre.	
-10				x	x	x		x		x		
-8	x				x	x			x	x	Die Sämlinge müssen beim Auspflanzen schon recht kräftig sein.	
-8		x					x				Rasenbildend.	
-9	x						x	x	x		Sehr reichblühend.	
-9	x	x					x	x			Pikiren.	
-8	x					x			x		In rauhen Lagen frostfrei überwintern.	
-9	x	x					x				Ganz niedrige, kriechende Pflanze.	
-9	x					x					Freilandaussaat anwendbar.	
-8	x	x					x	x			Lieben recht sonnige Lagen.	
-9				x	x	x					Anzucht der Sämlinge in Töpfen ist zu empfehlen.	
-9				x	x	x					Bis zur Auspflanzung in Töpfen ziehen. H. cucumerifolius auch für Bouquets.	
-9		x						x			Für halbschattigen Standort, empfindlich gegen Nässe; wird oft von Erdflöhen heimgesucht.	

N a m e n.	Familie.	Character der Pflanze bezüglich ihrer Dauer.	Schlingpflanze.	Immortelle.	Wohlriechende Pflanze.	Bienenfutterpflanze.	Ziergras.	Zwiebel-, Knollen-, Rhizomebildend.	Aussaat:			
									Monat.	im freien Lande, an Ort und Stelle.	im kalten Mistbeet oder Zimmer.	im warmen Mistbeet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
Helipterum	Compositae	⊙		×					3—4		×	
Helleborus	Ranunculaceae	⌘							6—7		×	
Hemerocallis	Hemerocallideae	⌘			×			R	5—7		×	
Heracleum	Umbelliferae	⌘							5—7		×	
Hesperis matronalis	Cruciferae	⌘ ♂			×	×			5—7		×	
tristis	"	♂			×	×			5—7		×	
Hibiscus, einjährige	Malvaceae	⊙							3—4 8—9	×		
Hieracium aurantiacum	Compositae	⌘							5—7		×	
Hordeum jubatum	Gramineae	⊙					×		4		×	
Humea	Compositae	♂			×				5—7		×	
Hunnemannia	Papaveraceae	⌘							6—8		×	
Hyacinthus candicans	Asphodeleae	⌘						Z	1—4			
orientalis	"	⌘			×			Z	8—9		×	
Hymenoxys (Shortia)	Compositae	⊙							4	×		
Hypericum, Stauden	Hypericineae	⌘							5—7		×	
Iberis, einjährige	Cruciferae	⊙				×			3—4 8—9	×		
ansdauernde	"	⌘				×			5—7		×	
gibraltarica u. V.	"	b							3—4		×	
Impatiens glanduligera	Balsamineae	⊙							4			
Involueraria	Cucurbitaceae	⊙	×						4			
Ipomoea purpurea u. V.	Convolvulaceae	⊙	×						4—5	×		
bona nox, coccinea, hederacea, limbata, mexicana, Nil, Qua- moclit, rubro-violacea u. V. }	"	⊙	×						3—4			
Ipomopsis	Polemoniaceae	♂							7—8		×	

Eignet sich:												Besondere Bemerkungen.
Blüthezeit fällt in die Monate	für Blumenbeete, Gruppen u. Rabatten.	für Einfassungen.	für Lauben, Spaliere, Wände etc.	für Blattplanzengruppen im Freien.	als Einzelpflanze auf Rasen od. Rabatten.	für den Vordergrund von Gehölzgruppen.	für Terrassen und Felspartien.	für Topfcultur.	für frische Bouquets.	für trockene Bouquets, Kränze etc.		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
3-9										x	Aussaat in sandige Laub-, Mistbeet- oder Haideerde. Auf sonnig gelegene Beete oder in Kästen, welche gegen Nässe durch Fenster geschützt werden, zu pflanzen.	
12-3	x	x					x	x	x		Der Samen liegt, wenn ganz frisch, nur 14 Tage, sonst oft 1 Jahr, ehe er keimt. Pikiren in Haide- oder Lauberde, mit lehmiger Rasenerde gemischt. Sämlinge nur im 1. Jahre frostfrei durchwintern, blühen zum Theil schon im 2. Jahre. Schattig pflanzen. Zum Treiben geeignet. Officinell.	
5-7					x	x			x		Der Samen liegt lange, ehe er keimt. Zur Uferbepflanzung geeignet.	
5-8				x	x	x					Der Samen liegt lange, ehe er keimt, wenn er nicht sogleich nach der Reife gesät wird.	
5-7	x					x			x		Freilandaussaat anwendbar. Die gefüllten H. n. tragen keinen Samen. Wenigstens jedes 2. Jahr neu ansäen.	
5-7						x					Freilandaussaat anwendbar.	
5-9	x											
5-9	x	x					x		x		Rasenbildend. Wuchert stark.	
5-9	x	x				x			x	x	Herbstaussaat anwendbar. Für Bouquets vor der Reife zu schneiden.	
5-9				x	x		x	x	x		Aussaat in Saatgefässe mit sandiger, lockerer Haideerde, pikiren, dann einzeln in kleine Töpfe pflanzen, frostfrei überwintern, im Frühjahr in grössere Töpfe resp. an Ort und Stelle bringen. Aufbinden.	
7-9	x							x			Liebt sandigen Boden, fürchtet Nässe, frostfrei überwintern.	
7-10	x				x	x		x	x		Sämlinge blühen im 2. Jahre. Pikiren, frostfrei überwintern. Vermehrung auch durch Brutzwiebeln.	
10-12 1-5	x							x	x		Aussaat in Saatgefässe mit lockerer Erde, stark bedecken. Keimen erst im folgenden Frühjahr.)	
7-9	x	x									Liebt sonnigen Standort.	
7-9						x	x				Gedeihen in fast allen Bodenarten.	
3-7	x	x						x	x		Werden häufig von Erdflöhen heimgesucht. Frühjahrsaussaat vorzuziehen.	
4-6	x	x					x	x	x		Sehr reichblühende Pflanzen.	
3-6	x						x	x	x		Blühen im 2. Jahre. Frostfrei zu überwintern.	
7-9				x	x	x					Reichlich zu bewässern.	
5-7			x								Sonnige Lage, reichlich bewässern. Sehr raschwachsend, rothe Früchte. Bis zum Auspflanzen in Töpfen ziehen.	
7-10			x					x			Man kann auch im April je 3-4 Körner per kleinen Topf säen, warm stellen und Ende Mai mit Ballen auspflanzen. Lieben warmen Standort. Schön in Töpfen oder Kästen, vor den Zimmerfenstern emporzuleiten, auch an Stangen zu Säulen und Pyramiden zu ziehen.	
7-10			x					x			Anfangs in Töpfen zu ziehen. Schön in Töpfen oder Kästen, vor den Zimmerfenstern emporzuleiten. Eignen sich (besonders rubrocoerulea) zur Cultur im Gewächshaus.	
7-10	x				x	x			x		Pikiren, später einzeln in kleine Töpfe pflanzen, frostfrei, hell und trocken überwintern. Erst wenn Frostgefahr vorüber, in das Freie pflanzen.	

N a m e n.	Familie.	Charakter der Pflanze bezüglich ihrer Dauer.	Schlingepflanze.	Immortelle.	Wohlbriechende Pflanze.	Bienenfutterpflanze.	Ziergras.	Zwiebel-, Knollen-, Rhizombildend.	Aussaat:			
									Monat.	im freien Lande, an Ort und Stelle.	im kalten Mistbeet oder Zimmer.	im warmen Mistbeet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Iris	Irideae	♀						K R	4—6		x	
Isotoma	Lobeliaceae	♀ ⊙							3—4			x
Jasione montana	Campanulaceae	♂ ♀							5—7		x	
Jonopsidium	Cruciferae	⊙							3—4		x	
Kaulfussia	Compositae	⊙							3—4	x		
Koeleria, ausdauernde	Gramineae	♀					x		5—7		x	
Lagenaria	Cucurbitaceae	⊙	x						4			x
Lagurus	Gramineae	⊙					x		3—4		x	
Lasiagrostis argentea	"	♀					x		5—7		x	
Lasthenia	Compositae	⊙							4	x		
Lathyrus, ausdauernde	Papilionaceae	♀	x			x			4—6		x	
odoratus	"	⊙	x		x	x			3—4	x		
Lavatera trimestris	Malvaceae	⊙							3—4	x		
Layia	Compositae	⊙			x				3—4		x	
Leptochloa	Gramineae	⊙					x		4		x	
Leptosiphon	Polemoniaceae	⊙							4	x		
Leptosyne maritima	Compositae	♀ ⊙						K	3—4		x	
Leucanthemum maximum	"	♀ ⊙							5—6		x	
Liatris	"	♀						K	5—7		x	
Lilium	Liliaceae	♀			x			Z	4—7		x	
Limnanthes	Limnantheae	⊙							3—4 8—9	x		
Linaria alpina	Scrophulariaceae	♂ ⊙							3—5		x	
Cymbalaria	"	♀ ⊙							3—4		x	
bipartita, maroccana u. V. . .	"	⊙				x			4	x		
multipunctata, reticulata an- reo-purpurea.	"	⊙				x			3—4		x	
triornitophora	"	♂ ⊙				x			2—3			

Eignet sich:												Besondere Bemerkungen.
Blüthe- zeit fällt in die Monate	für Blumenbeete, Gruppen u. Rabatten.	für Einfassungen.	für Lauben, Spaliere, Wände etc.	für Blattpflanzengrup- pen im Freien.	als Einzelpflanze auf Rasen od. Rabatten.	für den Vordergrund von Gehölzgruppen.	für Terrassen und Felspartien.	für Topfcultur.	für frische Bouquets.	für trockene Bouquets, Kranze etc.		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
4—7	x	x			x	x	x				In sandige Laub- und Mistbeerde zu säen. Der Samen liegt lange, ehe er keimt. Sämlinge in den ersten Jahren frostfrei überwintern. <i>I. iberica</i> , <i>Kaempferi</i> , <i>Susiana</i> während des Winters bedecken. Andere z. B. <i>I. Pseudo-Acorus</i> vorzüglich zur Uferbepflanzung.	
6—9	x	x					x	x			Pikiren; lieben lockere, nährhafte Erde. Ueberwinterung im Glashause.	
6—9		x					x	x			Liebt freien, sandigen Standort.	
5—7		x					x	x			Miniaturopflanze.	
6—8	x	x									Liebt sonnigen Standort.	
7—9		x					x		x	x		
6—9			x								Für recht warme Lagen. Interessante Früchte.	
7—9	x	x						x	x	x	Für Bouquets vor der Reife zu schneiden.	
6—9					x	x			x	x	Gehört zu den schönsten Ziergräsern.	
6—9	x	x										
6—10			x		x	x			x		Der Samen keimt langsam und unregelmässig. Bis zum Auspflanzen einzeln in kleinen Töpfen ziehen.	
6—9			x						x		Besonders für niedrige Geländer, auch für Kästen vor den Zimmerfenstern.	
7—9	x								x		Werden in der Blüthezeit oft von einem rostartigen Pilz befallen. Gedeihen in jedem Boden.	
6—8	x	x									Freilandaussaat anwendbar.	
7—8									x	x		
6—9	x	x					x	x			Für sonnige Lagen.	
7—10	x					x	x	x	x		Frostfrei zu überwintern. Winterblüher.	
6—9	x								x		Blüht im 1. Jahre.	
8—9	x				x		x		x		In rauen Gegenden während des Winters zu bedecken. In Töpfen heranziehen und als starke Pflanzen an Ort und Stelle bringen.	
5—7	x				x	x		x	x		Aussaat in flache Saatgefäße mit sandiger Laub- oder Haideerde. Viele Sorten keimen erst in dem der Aussaat folgenden Frühjahr. Vergl. S. 180, S. 219 u. 220.	
6—9	x	x					x				Frühjahrsaussaat vorzuziehen.	
6—8		x					x	x			Liebt leichten sandigen Boden und wenig Feuchtigkeit. Sät sich oft von selbst aus.	
5—10							x	x			Vorzügliche Ampelpflanze. Freiland- aussaat anwendbar. } Sämlinge blühen im ersten Jahre.	
6—9	x	x						x	x		Herbstaussaat anwendbar, wenn Durchwinterung unter Glas.	
6—10	x	x						x	x		Freilandaussaat in günstigen Lagen anwendbar.	
7—10	x							x			Ueberwinterung im Glashaus oder Zimmer.	

N a m e n.	Familie.	Character der Pflanze bezüglich ihrer Dauer.	Schlingpflanze.	Immortelle.	Wohlriechende Pflanze.	Bienenfutterpflanze.	Ziergras.	Zwiebel-, Knollen-, Rhizomebildend.	Aussaat:			
									Monat.	im freien Lande, an Ort und Stelle.	im kalten Mistbeet oder Zimmer.	im warmen Mistbeet oder Zimmer.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Linum, ausdauernde	Lineae	☿							5—7		x	
grandiflorum rubrum u. V. . .	"	⊙							4	x		
Loasa Herberti, lateritia	Loaseae	⊙	x						2—4			
hispidula	"	⊙							3—4			
Lotus Jacobaeus	Papilionaceae	☿⊙							3—4			
Luffa	Cucurbitaceae	⊙	x						4			
Lunaria biennis u. V.	Cruciferae	♂							5—7		x	
Lupinus affinis, nanus, texanus	Papilionaceae	⊙			x				4—5	x		
übrige einjährige	"	⊙			x				4—5	x		
ausdauernde	"	☿							4—6		x	
Lychnis alpina, lapponica	Caryophylleae	☿							4—6		x	
chalcidonica u. V.	"	☿							5—7		x	
fulgens, Haageana u. V., Senno striata, Sieboldi	"	☿⊙							2—6		x	
Preissi (Preslii)	"	☿⊙							3—4		x	
Viscaria	"	☿							5—7		x	
Lysimachia	Primulaceae	☿							5—7		x	
Nummularia	"	☿							5—7		x	
Lythrum, ausdauernde	Salicariae	☿				x			5—7		x	
Madia elegans	Compositae	⊙							3—4	x		
Magydalis tomentosa	Umbelliferae	☿							5—7		x	
Malope	Malvaceae	⊙							3—5	x		
Malva crispa, mauritiana	"	⊙							4	x		
miniata	"	☿⊙							3—4			
moschata	"	☿⊙			x				3—4		x	
Marshallia caespitosa	Compositae	☿							5—7		x	
Martynia	Bignoniaceae	⊙							3—4			

Blüthe- zeit fällt in die Monate	Eignet sich:										Besondere Bemerkungen.
	für Blumenbeete, Gruppen u. Rabatten.	für Einfassungen.	für Lauben, Spaliere, Wände etc.	für Blattpflanzengrup- pen im Freien.	als Einzelpflanze auf Rasen od. Rabatten.	für den Vordergrund von Gehölzgruppen.	für Terrassen und Felspartien.	für Topfcultur.	für frische Bouquets.	für trockene Bouquets, Kranze etc.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6—8	x	x				x	x	x	x		Freilandaussaat anwendbar. Es empfiehlt sich, alle 2 Jahre neu auszusäen.
6—9	x	x					x	x			Herbstsaat nach Col. 11 lohnend; Sämlinge, mehrere in einem Topf, blühen dann im Februar; frostfrei und hell überwintern.
7—10			x								} Die Berührung der Blätter verursacht Brennen auf der Haut. Können im Kalthause überwintern.
6—8								x			
7—9	x							x			Von mehrjähriger Dauer bei Durchwinterung im Kalthause.
7—8			x								Je 2—3 Körner in Töpfe säen und nach Erstarkung recht sonnig auspflanzen, reichlich zu bewässern. Tragen gurkenartige Früchte.
5—7	x					x	x		x		Freilandaussaat anwendbar. Beste Pflanzzeit September.
6—9	x	x							x		} Gedeihen in fast allen Lagen, können jedoch das Verpflanzen nicht gut vertragen. Leiden leicht durch Nässe.
6—10	x					x				x	
6—8	x				x	x			x		Wenn die verblühten Stengel bald abgeschnitten werden, so wachsen neue nach.
5—6		x					x	x			Reizende Miniaturpflanzen, besonders für Felsenbeete.
6—8	x				x	x			x		Die gefülltblühenden L. ch. tragen keinen Samen.
6—9	x	x				x		x			Der Bestimmungsort im Freien ist mit lockerer, nahrhafter Erde zuzubereiten. Blühen bei zeitiger Aussaat im 1. Jahre.
5—7	x	x				x	x	x	x		} Sehr reichblühend. Erstere blüht schon im ersten Jahre.
5—7	x	x				x	x	x	x		
6—7					x	x				x	Lieben grosse Feuchtigkeit; zur Uferbepflanzung geeignet.
6—7						x					Gute Ampelpflanze. Reichlich bewässern.
6—8	x				x	x			x		Stark gießen. L. Salicaria und besonders L. roseum superbum sind treffliche Uferpflanzen.
7—9	x										
7—8					x	x					Samen keimt schwer.
7—9	x								x		Lieben sonnige Lage.
7—10				x	x	x					Die abgeschnittenen Blätter der M. crispa eignen sich zur Garnitur von Schüsseln etc. Vergl. S. 207.
7—10	x							x			Hübsch zum Auspflanzen im Sommer, hält sich unter Glas überwintert, mehrere Jahre.
6—8	x					x		x			Freilandaussaat an Ort und Stelle anwendbar.
6—8	x	x					x				Liebt sandigen Boden.
6—9	x				x			x			Für recht warme Lagen. Samen keimen langsam, können vor der Aussaat einen Tag in warmen Wasser liegen. Bringen interessante Früchte.

N a m e n.	Familie.	Character der Pflanze bezüglich ihrer Dauer.	Sellingpflanze.	Immortelle.	Wohlriechende Pflanze.	Bienenfutterpflanze.	Ziergras.	Zwiebel-, Knollen-, Rhizombildend.	Aussaat:			
									Monat.	in freien Lande, an Ort und Stelle.	im kalten Mistbeet oder Zimmer.	im warmen Mistbeet od warmstimmer.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Matricaria capensis, eximia n. V.	Compositae	☉			x				3—4		x	
Matthiola bicornis.....	Cruciferae	☉			x	x			4	x		
Maurandia.....	Scrophularineae	☉	x						2—3			x
Melica.....	Gramineae	☉					x		4		x	
Melothria.....	Cucurbitaceae	☉	x						4			x
Mentha.....	Labiatae	☉			x	x			5—7		x	
Mesembryanthemum, ein- jährige.....	Ficoideae	☉							3—4			x
Michauxia campanuloides	Campanulaceae	♂							3—4		x	
Mirabilis Jalapa u. V.....	Nyctagineae	☉						K	3—5			x
longiflora.....	„	☉			x			K	3—5			x
multiflora.....	„	☉						K	3—4			x
Momordica.....	Cucurbitaceae	☉	x						4			x
Monarda.....	Labiatae	☉			x	x			5—7		x	
Morina longifolia.....	Dipsaceae	☉							2—4		x	
Mukia.....	Cucurbitaceae	☉	x						3—4			x
Muscari.....	Asphodeleae	☉			x			Z	2—4		x	
Narcissus.....	Amaryllideae	☉			x			Z	2—5		x	
Nemesia.....	Scrophularineae	☉							4		x	
Nemophila.....	Hydrophyllaeae	☉							3—4	x		
Nepeta.....	Labiatae	☉			x	x			5—7		x	
Nicotiana affinis, decurrens, sua- veolens.....	Solancae	☉			x				3—4			x
grandiflora atropurpurea, ma- crophylla gigantea, Taba- cum fol. var.	„	☉							3—4			x
Nierembergia.....	„	☉							2—4			x

Eignet sich:												Besondere Bemerkungen.
Blüthezeit fällt in die Monate	für Blumenbeete, Gruppen u. Rabatten.	für Einfassungen.	für Lauben, Spallere, Wände etc.	für Blattplanzengruppen im Freien.	als Einzelpflanze auf Rasen od. Rabatten.	für den Vordergrund von Gehölzgruppen.	für Terrassen und Felspartien.	für Topfcultur.	für frische Bouquets.	für trockene Bouquets, Kränze etc.		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
7—10	x					x		x	x		Die neuen niedrigen Varietäten vortrefflich für Einfassungen.	
6—8	x	x									Gedeiht in fast allen Bodenarten.	
6—10			x					x			In Töpfen mit sandiger Mistbesterde heranziehen und gut durchwurzelt pflanzen, kann unter Glas überwintern. Ampelpflanzen. Vorzügliche, dankbar blühende Sehtingypflanzen.	
7—9						x				x	Für Bouquets vor der Reife zu schneiden.	
7—9			x								Für sonnige Lagen. Reichlich zu bewässern. Tragen zierliche Früchte. Hochwachsend.	
7—9						x	x				Auch zur Uferbepflanzung geeignet. Officinelle Pflanzen.	
6—9	x	x					x	x			Blühen nur bei Sonnenschein und scheuen Nässe.	
7—8	x				x			x			In Töpfen heranziehen, frostfrei überwintern, im 2. Jahre in guten lehmig-sandigen Boden auspflanzen. Empfindlich gegen starke Winterfeuchtigkeit.	
7—10	x					x		x	x		Blühen im 1. Jahre und bilden Knollen, welche trocken und frostfrei überwintert und im Frühjahr wieder ausgepflanzt werden können. Es ist jedoch einfacher, sie als Sommergewächse zu behandeln. Reichlich bewässern. Schliessen sich bei rother Sonne, blühen jedoch nachts.	
7—10	x											
7—10	x							x			Blüht bei früher Aussaat im 1. Jahre.	
7—9			x					x			Für recht warme Lagen. Reichlich zu bewässern. Tragen schöne Früchte.	
6—8	x					x						
7—8	x				x	x	x				Sämlinge in kleinen Töpfen heranziehen und frostfrei überwintern. Leidet zuweilen durch Winterfeuchtigkeit.	
7—9			x					x			Für sonnige Lagen. Trägt scharlachrothe Früchte.	
4—5		x				x	x	x	x		Am schönsten auf Gartenwiesen und Grasplätzen. Recht dicht pflanzen. Aussaat wenig gebräuchlich.	
4—6		x				x		x	x		Aussaat nicht gebräuchlich. Samen bedürfen oft einer zweijährigen Keimzeit, Sämlinge blühen erst im 5. Jahre oder noch später.	
6—9	x	x						x	x		Aeusserst reichblühend.	
5—7	x	x						x	x		Durch mehrmaliges Aussäen in Intervallen kann man einen Flor bis September erzielen. Für Teppichbeete. Herbstaussaat anwendbar.	
6—7	x					x	x		x		Blühen bei Frühjahrsaussaat oft schon im 1. Jahre.	
5—10	x					x		x	x		Es ist (besonders bei der 2. Gruppe) vorthcilhaft, sie bis zum Auspflanzen einzeln in Töpfen zu ziehen. Lieben lockeren, nährhaften, tiefbearbeiteten Boden und reichliche Bewässerung, zuweilen mit Düngguss.	
8—10					x	x	x					
6—10	x	x						x	x		Lieben sandigen Boden. Gegen anhaltende Nässe zu schützen. Piktiren. N. gracilis eignet sich für Ampeln. Herbstaussaat anwendbar bei Durchwintern unter Glas.	

N a m e n.	Familie.	Character der Pflanze bezüglich ihrer Dauer.	Schlingpflanze.	Immortelle.	Wohlriechende Pflanze.	Bienenfutterpflanze.	Ziergras.	Zwiebel-, Knollen-, Rhizombildend.	Aussaat:			
									Monat.	im freien Lande, an Ort und Stelle.	im kalten Mistbeet oder Zimmer.	im warmen Mistbeet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nigella	Ranunculaceae	⊙				x			3—5	x		
Nolana	Nolaneae	⊙							3—4	x		
Nycterinia capensis	Scrophulariaceae	♀ ⊙			x				3—4 8—9			
selaginoides	„	♀ ⊙							3—4 8—9			
Obeliscaria pulcherrima	Compositae	♀ ⊙							3—4		x	
Ocimum, einjährige	Labiatae	⊙			x				3—4		x	
Oenothera, einjährige	Onagrariceae	⊙							4		x	
taraxacifolia	„	♂ ⊙							3—4		x	
rosea (mexicana)	„	⊙							3—4			
Lamarckiana	„	♂ ⊙							5—7		x	
ausdauernde	„	♀							6—7		x	
Ononis	Papilionaceae	♀							4—6		x	
Onopordon	Compositae	♂							5—7		x	
Orchideen, Freiland-	Orchideae	♀						K R	6—7		x	
Ornithogalum	Asphodeleae	♀						Z	2—4		x	
Orobis	Papilionaceae	♀							4—6		x	
Oxalis floribunda u. V.	Oxalideae	♀ ⊙							3—4 8—9		x	
rosea u. V.	„	⊙							3—4 8—9		x	
tropaeoloides (corniculata) } purpurea	„	⊙							3—4		x	
Valdiviana	„	♀ ⊙							3—4	x	x	
Paeonia herbacea (chinensis), officinalis	Ranunculaceae	♀			x			K	4—5 8—9	x	x	
Palafoxia	Compositae	⊙							3—4		x	
Palava flexuosa	Malvaceae	⊙							3—4		x	
Panicum, einjährige	Gramineae	⊙					x		3—4	x		
ausdauernde	„	♀					x		3—4		x	
Papaver, einjährige	Papaveraceae	⊙							3—4 8—9	x		

Eignet sich:												Besondere Bemerkungen.
Blüthezeit fällt in die Monate	für Blumenbeete, Gruppen u. Rabatten.	für Einfassungen.	für Lauben, Spaliere, Wände etc.	für Blattpflanzengruppen im Freien.	als Einzelpflanze auf Rasen od. Rabatten.	für den Vordergrund von Gehölzgruppen.	für Terrassen und Felspartien.	für Topfcultur.	für frische Bouquets.	für trockene Bouquets, Kränze etc.		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
6—9	x	x							x		Herbstaussaat anwendbar.	
7—9	x	x					x				Sonnigen Standort wählen.	
7—9	x	x						x			Lieben sandige Laub- und Mistbeerde, blühen im 1. Jahre und sind im Gewächshaus zu überwintern. Frühjahrsaussaat vorzuziehen. <i>N. capensis</i> des herrlichen Geruchs wegen in die Nähe der Wohnungen pflanzen. Pikiren.	
7—9	x	x						x				
7—10	x					x					Sonniger Standort am besten. Jährliche Aussaat, sonst frostfreies Durchwintern nöthig.	
6—9		x						x			Gewürzpflanzen.	
6—9	x					x					Die Blumen sind vom Abend bis Morgen und bei trübem Wetter geöffnet. Einige Sorten sind wohlriechend.	
7—10	x	x										
7—10		x					x	x				
7—10	x					x						
6—9	x					x	x	x			Freilandaussaat anwendbar.	
5—7	x	x				x	x				Der Samen keimt zuweilen langsam. Aussaat und Pikiren in Töpfen zu empfehlen.	
6—8					x	x					Freilandaussaat anwendbar. Pikiren. Erreichen colossale Dimensionen. Säen sich oft von selbst aus. Im ersten Jahre sehr schön.	
5—7						x	x		x		Aussaat wenig gebräuchlich. Nach §. 208 behandeln.	
5—6		x				x		x			Auf Grasplätzen wie verwildert. Aussaat siehe §. 180 S. 219 und 220. Samen liegt 3—4 Wochen ehe er keimt.	
4—6	x	x				x	x		x		Der Samen keimt zuweilen etwas langsam. Liebt Schatten.	
6—9	x	x						x			Pikiren. Lieben sonnigen Standort.	
6—9	x	x					x	x			Verlangt lockeren, sandigen Boden und sonnige Lage.	
7—9	x	x					x	x			Für Teppichbeete und zur Garnirung von Ampeln. Gedeiht in fast jedem Boden und sät sich oft von selbst aus.	
7—9	x	x					x				Blüht im 1. Jahre. Sät sich oft von selbst aus.	
5—6	x				x	x	x		x		Der Samen liegt oft ein Jahr, ehe er keimt. Bei Freilandaussaat mit Moos oder Laub zu bedecken. Sämlinge blühen nicht vor dem 3., meistens erst im 5. Jahre.	
7—10	x	x						x			Liebt sonnigen Standort.	
6—9	x	x						x			Muss, wenn es die Witterung gestattet, so früh als möglich ausgepflanzt werden.	
7—10						x			x	x	Für Bouquets vor der Reife zu schneiden. Säen sich häufig von selbst aus.	
7—10					x	x		x	x	x	Verlangen nahrhafte Erde, Bedeckung im Winter.	
6—7	x					x			x		Die jungen Pflänzchen frühzeitig verdünnen. Stengel mit Knospen blühen im Wasser völig auf.	

N a m e n.	Familie.	Character der Pflanze bezüglich ihrer Dauer.	Schlingpflanze.	Immortelle.	Wolbrüchende Pflanze.	Bienenfutterpflanze.	Ziergras.	Zwiebel-, Knollen-, Rhizombildend.	Aussaat:			
									Monat.	im freien Lande, an Ort und Stelle.	im kalten Mistbeet oder Zimmer.	im warmen Mistbeet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
Papaver alpinum u. V.	Papaveraceae	4 ⊙							5—6		x	
croceum, nudicaule.	"	4 ⊙							5—6		x	
übrige ausdauernde	"	4							5—6		x	
Pardanthus (Moraea)	Irideae	4						Z	4—6		x	
Paspalum elegans	Gramineae	⊙					x		4		x	
Passiflora foetida, gracilis ...	Passifloreae	⊙	x						2—3			
Pennisetum	Gramineae	⊙					x		3—4		x	
Pentstemon centranthifolius ..	Scrophularineae	4 ⊙							4—7		x	
Cobaea, Eatonii, Lobbi, Murray- anus, cordifolius, Jeffrey- anus, Palmeri, spectabilis	"	4							4—7		x	
gentianoides (hybridus)	"	4 ⊙							2—7		x	
Wrightii	"	♂							4—7		x	
ausdauernde	"	4				x			4—7		x	
Perilla nankinensis u. V.	Labiatae	⊙							3—4			
Phacelia	Boragineae	⊙				x			3—4 8—9	x		
Phalacraea	Compositae	4 ⊙							3—4		x	
Phalaris arundinacea var. picta	Gramineae	4					x		4—7		x	
einfährige	"	⊙					x		4		x	
Phaseolus ensiformis gigas ..	Papilionaceae	⊙	x						2—3			
Phlox decussata, omniflora	Polemoniaceae	4							2—4 9—10		x	
Nelsoni, nivalis, setacea, pilosa, subulata, frondosa, verna	"	4							4—6		x	
Phyteuma	Campanulaceae	4							4—7		x	
Phytolacca decandra	Phytolacaeae	4							4—7		x	
Platygonia Kaempferi	Cucurbitaceae	4 ⊙	x					K	2—3			

Blüthe- zeit fällt in die Monate	Eignet sich:										Besondere Bemerkungen.
	für Blumenbeete, Gruppen u. Rabatten.	für Einfassungen.	für Lauben, Spaliere, Wände etc.	für Blattpflanzengrup- pen im Freien.	als Einzelpflanze auf Rasen od. Rabatten.	für den Vordergrund von Gehölzgruppen.	für Terrassen und Felsarten.	für Topfcultur.	für frische Bouquets.	für trockene Bouquets, Kränze etc.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6—8		x					x	x			<i>Pikiren. Erfrieren leicht ohne Schneedecke, verfaulen aber unter dichter Bedeckung. Im Frühjahr ausgesät, blühen sie im 1. Jahre.</i>
6—8	x	x					x	x	x		
6—8	x				x	x					
6—8	x							x	x		<i>Pikiren.</i>
7—9	x	x							x		
7—9			x					x			Liebt lockeren Boden, auch Haudeerde. Muss im Winter gut bedeckt werden.
7—9								x			Für geschützte warme Lagen, Gewächshaus oder Zimmer. Tragen zierliche Früchte.
7—10	x				x	x		x	x	x	Bei Hitze reichlich giesen. Für Bouquets vor der Reife schneiden. Liebt lockeren, nahrhaften Boden. In Töpfen unter Glas überwintern.
6—10	x					x		x	x		<i>Schöne reichblühende Stauden. Pikiren und bis zum Auspflanzen einzeln in Töpfen ziehen. Unter Glas frostfrei überwintern. Lieben lockeren, nahrhaften Boden.</i>
6—10	x				x	x		x	x		
6—10	x				x	x		x	x		<i>Pikiren und einzeln in Töpfen ziehen. Lieben nahrhafte, dabei lockere Erde. Im Sommer reichlich giesen. Ueberwinterung im Kalthaus oder Zimmer. Vortreffliche Marktpflanzen.</i>
6—10	x				x	x		x	x		Frostfrei überwintern. Sehr reichblühend.
6—10	x				x	x		x	x		Sehr dankbar blühende Stauden. Die niedrigen P., z. B. pubescens eignen sich zu Einfassungen.
Blüthen unbe- deutend	x	x		x	x	x		x			<i>Pikiren oder noch besser bis zur Auspflanzung einzeln in Töpfen cultiviren. Kann durch Beschneiden in Form erhalten werden.</i>
6—9	x	x						x	x		Frühjahrsaussaat vorzuziehen. Der Flor kann durch Abschneiden der verblühten Stengel verlängert werden.
7—10	x	x						x	x		Für Teppichbeete. Im Kalthaus oder Zimmer überwintern.
Blüthen unbe- deutend		x			x	x	x	x	x		Den Hauptschmuck bilden die gestreiften Blätter. Uferpflanze. Die Aussaat ergibt nur einen Theil echter Pflanzen.
6—7									x	x	Für Bouquets vor der Reife zu schneiden.
7—9			x								Verlangt zur vollen Entwicklung sehr warme Lage.
6—9	x	x			x	x		x	x		Aussaat möglichst sofort nach der Reife, da die Samen sonst 6 bis 12 Monate liegen, ehe sie keimen. Die Sämlinge pikiren und 50—60 cm von einander pflanzen.
4—5		x					x	x			Reichblühende, ganz niedrige, meist rasenbildende Sorten für Frühjahrsteppichbeete, von denen Samen zuweilen angeboten wird. Sämlinge pikiren und bis zum Auspflanzen einzeln in kleinen Töpfen ziehen.
5—7						x	x	x	x		Lieben etwas feuchten Standort.
7—10	x			x	x	x					Interessante hübsche Beeren. Sät sich oft von selbst aus.
7—9			x					x			In Töpfe säen. Verlangt sonnigen Standort und ist während des Winters zu bedecken. Trägt rothe, beerenartige Früchte.

N a m e n.	Familie.	Character der Pflanze bezüglich ihrer Dauer.	Schlingpflanze.	Immortelle.	Wohlriechende Pflanze.	Bienenfutterpflanze.	Ziergras.	Zwiebel-, Knollen-, Rhizombildend.	Aussaat:			
									Monat.	im freien Lande, an Ort und Stelle.	im kalten Mistbeet oder Zimmer.	im warmen Mistbeet oder Zimmer.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Platystemon californicus	Papaveraceae	⊙							3—4		x	
Poa, einjährige	Gramineae	⊙					x		3—4		x	
ausdauernde	"	⊙					x		5—7		x	
Podolepis	Compositae	⊙							3—4		x	
Polemonium	Polemoniaceae	⌘			x				4—6		x	
Polycolymna Stuarti	Compositae	⊙		x					3—4			x
Polygonum orientale u. V.	Polygoneae	⊙							3—4		x	
Potentilla, Stauden.	Rosaceae	⌘							4—6		x	
Prunella	Labiatae	⌘				x			5—7		x	
Pulmonaria	Boraginaceae	⌘				x			5—7		x	
Pyrethrum, ausdauernde.	Compositae	⌘⊙							3—7		x	
parthenifolium aureum u. V.	"	♂⊙							3—4		x	
Tehilhatchewi	"	⌘							3—4		x	
Ramondia pyrenaica	Solaneae	⌘							3—4		x	
Ranunculus africanus u. V., asiaticus u. V.	Ranunculaceae	⌘						K	3—5 8—10		x	
Stauden	"	⌘							4—7		x	
Rheum	Polygoneae	⌘							4—6		x	
Rhodanthe	Compositae	⊙		x					3—4		x	
Rhynchoarpa	Cucurbitaceae	⌘⊙	x					K	4			x
Ricinus	Euphorbiaceae	⊙							3—4			x
Romneya Coulteri	Papaveraceae	⌘⌘			x				4—7		x	
Rudbeckia, einjährige	Compositae	⊙				x			4		x	
ausdauernde	"	⌘				x			3—4 8—9		x	

Eignet sich:												Besondere Bemerkungen.
Blüthezeit fällt in die Monate	für Blumenbeete, Gruppen u. Rabatten.	für Einfassungen.	für Lauben, Spaliere, Wände etc.	für Blattpflanzengruppen im Freien.	als Einzelpflanze auf Rasen od. Rabatten.	für den Vordergrund von Gehölzgruppen.	für Terrassen und Felspartien.	für Topfcultur.	für frische Bouquets.	für trockene Bouquets, Kränze etc.		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
7—10	x	x						x			Liebt lockeren Boden.	
7—9									x	x	Für Bouquets vor der Reife zu schneiden.	
7—9						x			x	x		
7—10	x							x	x		Lieben durchlassenden Boden und sonnigen Standort.	
6—8	x	x			x	x	x	x	x		Freilandaussaat anwendbar. Oeftern neu ansäen, verliert im Alter an Ansehen.	
7—10	x									x	Liebt lockeren Boden und sonnigen Standort.	
7—10				x	x	x					Freilandaussaat anwendbar. Säen sich oft von selbst aus. Entwickeln sich bei reichlicher Bewässerung besonders stark.	
6—8	x					x		x	x		Die Säumlinge sind zu pikiren und im Spätsommer auszupflanzen.	
7—9	x	x				x					Sehr reichblühend. Gedeihen in trockenen Lagen.	
6—5	x	x				x	x		x		Liebt Halbschatten.	
6—8	x					x		x	x		Pikiren. Blühen im 1. Jahre nur bei sehr früher Aussaat. Lieben nahrhaften, schweren Boden und sonnige Lage.	
6—9		x					x				Pikiren. Vorzügliche Teppichbeetpflanzen. Bei Verwendung als solche schneidet man die Blütenstiele aus.	
5—6		x					x				Niedrige, dichten Rasen bildende Pflanze von grosser Dauer, gedeiht in den trockensten Lagen.	
5—6		x					x	x			Aussaat nach §. 208, liegt oft 1 Jahr, ehe sie keimt. Pikiren. Verlangt sandige Haide-, Torf- oder Moorerde, Halbschatten und fortwährend mässige Feuchtigkeit. Während des Winters im Freien bedecken oder im Kasten überwintern. Felsenpflanze.	
6—8	x	x						x	x		Aussaat in Saatgefässe siehe §. 180 S. 219 u. 220. R. asiaticus blüht bei sehr früher Aussaat im 1. Jahre. Zum Treiben geeignet. Knöllchen während des Winters trocken und frostfrei aufzubewahren.	
4—7	x					x			x		Die Samen keimen oft langsam. Lieben feuchten Standort. Einige R. für Einfassungen, andere für Uferbepflanzung geeignet.	
6—8				x	x	x					Pikiren. Gedeihen besonders gut in tief bearbeitetem, nahrhaften Gartenboden. Hauptsächlich Blattpflanze.	
6—9	x							x	x	x	In sandiger Laub- und Haideerde zu cultiviren und gegen Nässe zu schützen. Vortreffliche Marktpflanzen. Für diesen Zweck zu mehreren in einen Topf pflanzen. Auch für Kalthaus, unter Glas jedoch stets nahe an das Licht stellen.	
7—8			x					x			Aussaat in Töpfe. Liebt sonnige Lage. Sehr schnellwachsend, trägt beerenartige, orangerothe Früchte; frostfrei zu überwintern.	
8—10				x	x	x					Werden am practischsten in Töpfen, je 1 Korn per Topf, gesät und mit Ballen nach den Frösten ausgepflanzt. Reichliche Bewässerung unerlässlich, um schöne Exemplare zu gewinnen. Die R. sind in der Heimath holzartige, 8—12 m hoch wachsende Stauden. Offineitell.	
6—8	x			x	x	x					Liebt nahrhaften, sandigen Boden.	
7—10	x					x			x		Sehr reichblühend.	
7—10					x	x	x		x		Pikiren. Herbstsäumlinge frostfrei durchwintern. Einige R., z. B. purpurea blüht bei sehr früher Aussaat im 1. Jahre.	

N a m e n.	Familie.	Character der Pflanze bezüglich ihrer Dauer.	Schlingpflanze.	Immortelle.	Wohlrüchende Pflanze.	Bienenfutterpflanze.	Ziergras.	Zwiebel-, Knollen-, Rhizombildend.	Aussa at:			
									Monat.	im freien Lande, an Ort und Stelle.	im kalten Mistbeet oder Zimmer.	im warmen Mistbeet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rumex, ausdauernde	Polygoneae	⌘							4—6		x	
Sabbatia campestris	Gentianeae	⊙							2—3			x
Saccharum	Gramineae	⌘					x		2—3			x
Salpiglossis	Scrophularineae	⊙			x				3—4	x	x	
Salvia, ausdauernde	Labiatae	⌘				x			4—7		x	
argentea	„	♂							5—7		x	
coccinea u. V., farinacea . . .	„	⊙				x			3—4		x	
Horminum u. V.	„	⊙				x			3—4	x		
Roemeriana	„	⊙							3—4		x	x
Sanguisorba	Rosaceae	⌘							4—7		x	
Sanvitalia	Compositae	⊙							3—4		x	
Saponaria multiflora u. V. . . .	Caryophylleae	⊙							3—4 8—9	x	x	
ocymoides	„	⌘							4—7		x	
Saxifraga	Saxifrageae	⌘				x			4—7		x	
Scabiosa, einjährige	Dipsaceae	⊙			x	x			3—4		x	
ausdauernde	„	⌘				x			4—7		x	
Schizanthus	Scrophularineae	⊙							4 8—9	x		
Grahami, retusus u. V.	„	⊙							3—4 8—9		x	
Schizopetalum Walkeri	Cruciferae	⊙			x				3—4 8—9		x	
Scilla, ausdauernde	Asphodeleae	⌘						Z	2—4		x	
Scotanthus tubiflorus	Cucurbitaceae	⊙	x						3—4			x
Scrophularia	Scrophularineae	⌘				x			5—7		x	
Scutellaria	Labiatae	⌘				x			4—7		x	
Scyphanthus elegans	Loaseae	⊙	x						2—3 8—9			x

Blüthezeit fällt in die Monate	Eignet sich:										Besondere Bemerkungen.
	für Blumenbeete, Gruppen u. Rabatten.	für Einfassungen.	für Lauben, Spaliere, Wände etc.	für Blüthpflanzengruppen im Freien.	als Einzelpflanze auf Rasen od. Rabatten.	für den Vordergrund von Gehölzgruppen.	für Terrassen und Felspartien.	für Topfcultur.	für frische Bouquets.	für trockene Bouquets, Kranze etc.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
7—10						x					Für Uferbepflanzung. Pikiren. Lieben tiefbearbeiteten Boden.
6—9		x						x			Schr feinsamig. Aussaat und Pikiren in Gefässe. Liebt lockere Rasen- und Laub- oder sandige Haideerde; gegen starken Sonnenbrand und anhaltende Nässe schützen.
8—9				x	x	x		x			Bis zur Auspflanzung in Töpfen cultiviren und frostfrei überwintern.
6—9	x								x		Wirken besonders in Massen. Eng pflanzen. Abgeschnittene Blüthenstiele halten sich lange im Wasser.
5—9	x					x	x		x		Begnügen sich mit den geringsten Bodenarten.
7—8		x		x	x	x		x			Pikiren und einzeln in kleinen Töpfen heranziehen, mit Ballen auspflanzen. Hauptschmuck die silberweissen Blätter; die Blüthenstiele können unterdrückt werden.
6—10	x							x	x		Halten sich bei frostfreier Ueberwinterung unter Glas mehrere Jahre.
6—9	x								x		Herbstaussaat anwendbar. Sonnige Lage. Officinell.
7—10	x	x						x	x		Keimt ziemlich langsam und unregelmässig. Pikiren; hält sich, unter Glas durchwintert, mehrere Jahre. Winterblüher.
6—8	x					x			x		Zur Uferbepflanzung geeignet.
6—10	x	x					x	x	x	x	Liebt sonnigen Standort.
7—10	x	x						x			Für Teppichbeete. Freiland- und Herbstaussaat anwendbar. Dürfen nicht zu eng stehen.
5—7	x	x					x	x			Ampelpflanze für die Frühlingszeit und im Freien.
4—9		x			x	x	x	x			Aussaat nach §. 208. Pikiren. S. Huetti ist ♂.
7—10	x					x		x	x		Freilandaussaat anwendbar. Lieben sonnigen Standort. Lassen sich in jedem Alter verpflanzen. S. atrop. nana fl. pl. vortreflich für Einfassungen.
6—9	x					x			x		Lieben sonnigen Standort.
5—9	x	x						x	x		Frühljahrsaussaat vorzuziehen.
6—9	x							x	x		Herbstaussaat vorzuziehen. Freilandaussaat anwendbar. Einige S., besonders retusus minus, eignen sich für Einfassungen.
6—9		x						x			Liebt nahrhaften, lockeren Boden. Herbstaussaat in Töpfe pikiren und frostfrei durchwintern. Frühljahrsaussaat, direct an den Bestimmungsort, ohne zu verpflanzen. Leidet häufig durch Erdflöhe. Fürchtet Nässe, besonders während des Flors. Blüthen schliessen sich meist von 10 bis 6 Uhr.
3—6	x	x				x	x	x	x		Der Samen keimt unregelmässig. Aussaat wenig gebräuchlich, weil zu langsam. (§. 180, S. 219 u. 220.)
7—8			x								Liebt sonnigen Standort und reichliche Bewässerung. Trägt scharlachrothe Früchte.
5—7						x					Zur Ausschmückung von Ufern.
6—8	x	x				x	x	x	x		Lieben lockeren und feuchten Boden.
8—10			x					x			Pikiren. In Töpfen heranziehen und mit Ballen auspflanzen, mässig giessen. Gegen anhaltende Nässe schützen. Herbstsämlinge frostfrei durchwintern. Hält sich unter Glas mehrere Jahre.

N a m e n.	Familie.	Character der Pflanze bezüglich ihrer Dauer.	Schlingpflanze.	Immortelle.	Wohnende Pflanze.	Bienenfutterpflanze.	Ziergras.	Zwiebel-, Knollen-, Rhizomhaltend.	Aussaat:			
									Monat.	im freien Lande, an Ort und Stelle.	im kalten Mistbeet oder Zimmer.	im warmen Mistbeet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Sedum coeruleum</i>	Crassulaceae	⊙				×			3—4 8—9		×	
ausdauernde	"	⌘				×			5—7		×	
<i>Sempervivum</i>	"	⌘				×			5—7		×	
<i>Senecio elegans</i> fl. pl. u. V. ...	Compositae	⊙							3—4		×	
ausdauernde	"	⌘							4—7		×	
<i>Setaria</i>	Gramineae	⊙					×		4		×	
<i>Sicyos angulata</i>	Cucurbitaceae	⊙	×			×			4		×	
<i>Sidalcea candida</i>	Malvaceae	⌘							5—7		×	
<i>Silene alpestris, saxatilis, Saxi- fraga, Schafta</i>	Caryophylleae	⌘							4—7		×	
<i>Armeria</i> u. V.	"	⊙							3—4 8—9	×		
<i>orientalis</i> u. V.	"	♂							5—7		×	
<i>pendula</i> u. V.	"	⊙							4—5	×		
übrige einjährige	"	⊙							3—4	×		
<i>Silphium</i>	Compositae	⌘							5—7		×	
<i>Sisyrinchium</i>	Irideae	⌘⊙							3—4		×	
<i>Soldanella</i>	Primulaceae	⌘							4—7		×	
<i>Solidago</i>	Compositae	⌘							4—7		×	
<i>Sorghum aegyptiacum</i>	Gramineae	⌘					×		5—7		×	
einjährige	"	⊙					×		5—7		×	
<i>Spergula pilifera</i>	Caryophylleae	⌘							4—7		×	
<i>Sphenogyne speciosa</i>	Compositae	⊙							4		×	
<i>Spiraea</i> , Standen-... ..	Rosaceae	⌘							4—7		×	
<i>Spraguea</i>	Portulacaceae	⊙							2—3			

Blüthe- zeit fällt in die Monate	Eignet sich:													Besondere Bemerkungen.
	für Blumenbeete, Gruppen u. Rabatten.	für Einfassungen.	für Lauben, Spaliere, Wände etc.	für Blattpflanzengrup- pen im Freien.	als Einzelpflanze auf Rasen od. Rabatten.	für den Vordergrund von Gehölzgruppen.	für Terrassen und Felspartien.	für Topfcultur.	für frische Bouquets.	für trockene Bouquets, Kränze etc.				
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
6—9	x	x					x	x			In lockere, sandige Erde an sonniger Lage, mässig begiessen. Sehr feinsamig (§. 208). Herbstaussaat in Töpfe, welche unter Glas zu durchwintern. Für Teppichbeete, auch für Jardinieren.			
6—9	x	x					x	x			Sehr feinsamig (§. 208). Aussaat in Saatgefässe. Pikiren.			
6—8		x					x	x			Pikiren. Lieben sandigen Boden und bedürfen keinerlei Pflege. Die jungen Rosetten für Teppichbeete. Sehr feinsamig (§. 208). Aussaat wenig gebräuchlich.			
6—10	x	x						x	x		Lieben sonnige Lage und reichliche Bewässerung. Können, durch Herbstaussaat im Gewächshaus überwintert, mehrere Jahre erhalten werden. Unter den Sämlingen stets ein geringer Theil einfach blühender. Pikiren vorthellhaft.			
5—9	x						x	x	x		Pikiren.			
7—8						x			x	x				
8—9			x								Trägt kleine, gurkenartige Früchte. Sät sich oft von selbst aus. Sehr schnell- und hochwachsend.			
6—8	x				x	x		x			Leidet oft durch den sog. Malvenkäfer. Abgeschnittene Blüthenstiele halten sich lange im Wasser. Bei sehr früher Saat (2—3) blühen einige Pflanzen bereits im 1. Herbst.			
5—9	x	x					x	x	x		Pikiren. Lieben sonnige Lage.			
6—9	x	x						x	x		Werden die verblühten Stengel bald abgeschnitten, so erfolgt ein Nachflor. Säen sich oft von selbst aus.			
7—9	x							x	x		Pikiren. Liebt sandigen Boden.			
6—9	x	x					x	x	x		Für Teppichbeete. Herbstsämlinge gehen bei strengen, unhalten den Wintern oft zu Grunde.			
6—9	x	x					x	x	x					
7—9					x	x					Pikiren. Erreichen nach Jahren grosse Dimensionen. Sämlinge blühen oft erst im 3. Jahre.			
6—7	x						x	x	x		Mit Ausnahme von S. anceps frostfrei zu überwintern.			
5—6							x	x			Sehr feinsamig (§. 208). Samen liegen zuweilen 1 Jahr, ehe sie keimen. Pikiren. Liebt schattigen, feuchten Standort und Haldeerde. Blüht im Kasten überwintert schon im April.			
7—9					x	x	x		x		Gedeihen in jedem Boden, eignen sich auch zur Uferbepflanzung. Aussaat wenig gebräuchlich.			
8—9				x	x	x					Temperirt zu durchwintern.			
3—9				x	x	x								
6—7	x						x	x			Sehr feinsamig (§. 208). Die Saatgefässe können auch im Freien schattig stehen. Pikiren und in kleinen Töpfen heranziehen. Liebt frischen, feuchten Boden. Ausserst zierlich, niedrig, vorzüglich rasenbildend. Für Teppichbeete.			
6—9	x	x						x			Liebt sonnigen Standort. Die Blüthen sind nur bei Sonnenschein geöffnet.			
6—8	x				x	x	x		x		Feinsamig. Pikiren. Fast alle S. lieben feuchten Standort und können auch zur Ausschmückung von Ufern dienen.			
7—9	x							x	x		Sehr feinsamig (§. 208). Pikiren. Am lohnendsten ist die Topfcultur. Liebt sehr sandige Lauberde. Gegen starken Sonnenbrand und Nässe schützen.			

N a m e n.	Familie.	Character der Pflanze bezüglich ihrer Dauer.	Schlingpflanze.	Immortelle.	Wohlfriechende Pflanze.	Bienenfutterpflanze.	Ziergras.	Zwiebel-, Knollen-, Rhizombildend.	Aussaat:			
									Monat.	im freien Lande, an Ort und Stelle.	im kalten Mistbeet oder Zimmer.	im warmen Mistbeet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
Stachys alpina, lanata	Labiatae	⌘				x			4—7		x	
coccinea	"	⌘ ⊙				x			3—4		x	
Statice Bonduelli, sinuata, Thouini u. V. }	Plumbagineae	♂ ⊙		x					2—4			
spicata, Suworowi.	"	⊙							2—4			
ausdauernde (Standen)	"	⌘							4—6		x	
Stellaria graminea aurea.	Caryophylleae	⌘							4—6		x	
Stenactis speciosa (Erigeron) ..	Compositae	⌘							4—7		x	
Stevia	"	⌘ ⊙							3—4			
Stipa	Gramineae	⌘					x		3—7		x	
elegantissima	"	⌘					x		5—7		x	
Symphitum asperrimum.	Boragineae	⌘				x		R	4—7		x	
Tagetes erecta, patula, hohe ..	Compositae	⊙							4—5		x	
erecta nana, patula nana, nie- drige. }	"	⊙							4—5		x	
lucida	"	⌘ ⊙			x				3—5		x	
signata pumila	"	⊙							3—5		x	
Telekia	"	⌘							4—7		x	
Teucrium, ausdauernde	Labiatae	⌘				x			4—7		x	
Thalictrum	Ranunculaceae	⌘				x			4—7		x	
Thermopsis	Papilionaceae	⌘						R	4—7		x	
Thladiantha dubia	Cucurbitaceae	⌘	x					K	4			
Thunbergia alata u. V.	Acanthaceae	⌘ ⊙	x						2—4			
Tigridia (Ferraria).	Irideae	⌘						Z	3—4			
Tournefortia heliotropioides. . .	Boragineae	⌘ ⊙							3—4		x	

Blüthezeit fällt in die Monate	Eignet sich:										Besondere Bemerkungen.		
	für Blumenbeete, Gruppen u. Rabatten.	für Einfassungen.	für Lauben, Spaliere, Wände etc.	für Blattpflanzengruppen im Freien.	als Einzelpflanze auf Rasen od. Rabatten.	für den Vordergrund von Gehölzgruppen.	für Terrassen und Felspartien.	für Topfkultur.	für frische Bouquets.	für trockene Bouquets, Kränze etc.			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
7—8	x	x			x	x	x				<i>Pikiren. St. lanata</i> auch wegen der schönen weissen Blätter zu <i>Teppichbeeten</i> , wenn man die Blütenstiele ausschneidet.		
7—9	x					x		x			<i>Pikiren. Bedeckung im Winter.</i>		
6—10	x							x	x	x	<i>Pikiren</i> oder anfangs einzeln in kleinen Töpfen ziehen. Lieben trockenen Boden und sonnigen Standort. Herbstsaat bei frostfreier Ueberwinterung anwendbar.		
6—10		x						x	x		Aussaat in Saatgefässen; <i>pikiren</i> . Lieben sandigen Boden, gegen Nässe schützen. Abweichend von anderen <i>St.</i> , da die Blüten in Rispen stehen.		
6—10	x				x	x	x	x	x	x	<i>Pikiren</i> . Lieben sandigen aber nicht zu armen Boden und volle Sonne. Fürchten anhaltende Winterfeuchtigkeit. Zum Trocknen sind die Blütenstengel gleich nach dem Aufblühen zu schneiden.		
5—6		x					x	x			<i>Pikiren. Zu Teppichbeeten.</i>		
6—8	x					x		x	x		Sehr dankbar, bedarf keiner Pflege.		
7—10	x							x	x		Blühen im 1. Jahre. Können durch frostfreies Ueberwintern erhalten werden. Winterblüher unter Glas.		
6—8					x	x			x	x	Lieben warmen Standort.		
6—10								x	x	x	In Töpfen heranziehen und gegen ungünstige Witterung geschützt auspflanzen. Frostfrei durchwintern.		
5—7					x	x					Zur Uferbepflanzung geeignet. Officinell.		
7—10	x				x	x		x	x		Nach dem Aufgang durch Lüften abhärten oder <i>pikiren</i> ; werden leicht zu lang. Gegen Frühjahrsfröste schützen. Werden im Flor häufig von Stieglitzen heimgesucht. Alle <i>T.</i> besitzen einen ausgeprägten aromatischen Geruch.		
7—10	x	x				x		x	x				
7—10	x	x				x		x	x		Kann bei frostfreier Ueberwinterung mehrere Jahre erhalten werden.		
7—10	x	x			x	x		x	x		Für <i>Teppichbeete</i> . Nicht zu eng pflanzen. Die Muttersorte, <i>T. signata</i> , ist verzweigt, Behandlung wie <i>T. s. pumila</i> .		
7—9				x	x	x					Erreichen nach Jahren grosse Dimensionen.		
5—8		x						x	x	x	Auch zur Bepflanzung von trockenen Abhängen, Böschungen etc. geeignet. Officinell.		
6—8	x				x	x			x		Auch für feuchte Lagen geeignet.		
6—8	x					x			x		Sämlinge blühen meist erst im 3. Jahre.		
6—8			x								<i>In Töpfen heranziehen. Schön an einzelnen Sträuchern und an schon begrüntem Spalieren. Scharlachrothe Früchte.</i>		
6—9			x					x			<i>Pikiren</i> und am besten einzeln in Töpfen heranziehen. Halten sich bei frostfreier Durchwinterung mehrere Jahre. Die Farben kommen nicht treu aus Samen. Lieben volle Sonne. Auch für <i>Ampeln</i> .		
7—9	x	x						x			<i>Pikiren. In das freie Land oder in Töpfe, in sandigen, nährhaften Boden, Laub- oder Haideerde pflanzen. Lieben volle Sonne. Die Zwiebeln sind im Herbst herauszunehmen, frostfrei und trocken zu überwintern. Aussaat lohnend, einige Sämlinge blühen im 1., die meisten im 2. Jahre.</i>		
7—10	x						x	x	x		Herbstsaat anwendbar, wenn frostfrei überwintert. Sät sich oft von selbst aus.		

N a m e n.	Familie.	Character der Pflanze bezüglich ihrer Pauer.	schlingpflanze.	Immortelle.	Wohlrichemie Pflanze.	Bienenfutterpflanze.	Ziergras.	Zwiebel-, Knollen-, Rhizomebildend.	Aussaats:			
									Monat.	im freien Lande, an Ort und Stelle.	im kalten Mistbeet oder Zimmer.	im warmen Mistbeet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Trachelium coeruleum u. V...	Campulaceae	⊙♂							3-4 6-7		x	
Trachymene coerulea u. V...	Umbelliferae	⊙							3-4 6-9			
Tradescantia, ausdauernde...	Commelineae	♀							4-7		x	
Tricholaena	Gramineae	♀⊙					x		4		x	
Trichosanthes	Cucurbitaceae	⊙	x						4			
Tricyrtis	Melanthaceae	♀						R	3-4		x	
Trifolium, ausdauernde	Papilionaceae	♀				x			4-7		x	
suaveolens	"	⊙			x	x			4	x		
Tripsacum	Gramineae	♀					x		3-4		x	
Trollius	Ranunculaceae	♀							5-7		x	
Tropaeolum canariense (pere- grinum)	Tropaeolaceae	⊙	x						3-4	x	x	
Lobbianum	"	⊙♂	x						3-4 8-10	x	x	
majus	"	⊙	x						4-5	x		
" nanum Tom Thumb	"	⊙							4-5	x		
minus u. V.	"	⊙							4-5	x		
Tulipa	Liliaceae	♀						Z	3-4 8-10			x
Tunica (Gypsophila)	Caryophyllae	♀⊙							4	x	x	
Umbilicus Semenowi	Crassulaceae	♀♂							4-7		x	
Uniola	Gramineae	♀					x		4-7		x	
Valeriana, ausdauernde	Valerianeae	♀							3-7		x	
Venidium	Compositae	⊙							3-4 8-9		x	
Veratrum	Melanthaceae	♀							4-7		x	

Blüthe- zeit fällt in die Monate	Eignet sich:										Besondere Bemerkungen.
	für Blumenbeete, Gruppen u. Rabatten.	für Einfassungen.	für Lauben, Spaliere, Wände etc.	für Blattpflanzengrup- pen im Freien.	als Einzelpflanze auf Rasen od. Rabatten.	für den Vordergrund von Geländegruppen.	für Terrassen und Felspartien.	für Topfkultur.	für frische Bouquets.	für trockene Bouquets, Kränze etc.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
7—9	x	x					x	x	x		<i>Pikiren. Liebt lockeren Boden.</i> <i>Pikiren. Bedarf lockerer, sandiger, womöglich Haldeerde, vorsichtig begossen; gegen anhan- tende Nässe schützen. Bis zum Auspflanzen einzeln in kleinen Töpfen ziehen.</i> <i>Lassen sich bei Sommer-Aussaat und frostfreiem Durchwintern als ♂ behandeln.</i>
7—9	x							x	x		
5—7	x					x	x	x			
7—9		x						x	x		<i>Sehr hübsches Ziergras, dessen Blüthchen jedoch beim Schneiden leicht abfallen.</i>
6—8			x								<i>Einzeln in Töpfen heranziehen. Sonnige Lage und reichliche Bewässerung im Sommer. Interessante schlangenförmige Früchte.</i>
8—10	x							x			<i>Aussaat in Saatgefäße. Pikiren. Liebt Halde-, Moor- oder Laub- erde. Während des Winters bedecken.</i>
6—8	x	x				x	x		x		<i>Gedeihen in den trockensten Lagen und lassen sich wie Rasen schneiden.</i>
6—8	x										<i>Wächst ungemein üppig.</i>
8—9						x		x			<i>Interessante Samenbildung.</i>
5—7	x					x	x	x	x		<i>Der Samen liegt lange, ehe er keimt. Alle T. lieben schattige Lagen und etwas feuchten Boden.</i>
7—10			x					x	x		<i>Am besten in Töpfen heranziehen und mit Ballen auspflanzen, gegen Wind und Wetterschlag geschützt. Auch zur Cultur in Kästen vor Fenstern, an welchen man sie emporleitet, geeignet. Wird zuweilen von Eritrhöhen heimgesucht.</i>
6—10	x		x				x	x	x		<i>Es ist dankbar, sie einzeln in kleinen Töpfen heranzuziehen. An Stangen, Pyramiden, Bäu- men und Fenstern emporleiten. Unter Glas oder im Zimmer überwintert prächtige Winter- blüher, besonders T. Lobbianum. Auch Am- pelpflanzen. Bei Herbstaussaat frostfreie Ueberwinterung.</i> <i>Die unreifen Früchte in Essig eingelegt, gelten als falsche Kaperen.</i>
6—10	x		x				x	x	x		
6—10	x	x					x	x	x		
6—10	x	x					x	x	x		<i>Marktpflanzen.</i>
6—10	x	x					x	x	x		<i>Sehr reichblühend.</i>
3—5	x	x						x	x		<i>Vergl. S. 180 S. 219 u. 220. Herbstaussaat keimt meist erst im folgenden Frühjahr. Man sät fast nur zur Erzielung von Neuheiten. Stängel blühen selten vor dem 4. Jahre und müssen dann weiter Probetreiben.</i>
6—9	x	x					x	x			<i>Herbstaussaat unvereinbar. Liebt sonnige Lage. Sät sich oft vom selbst aus.</i>
6—8	x	x					x	x			<i>Für Teppichbeete. Sehr feinsamig (S. 208). Pikiren. Verlangen leichte, sandige Erde und sonnigen Standort.</i>
8—9						x	x	x	x	x	<i>Für Bouquets vor der Reife zu schneiden.</i>
6—9	x					x	x		x		<i>V. alba, coccinea, rubra blühen bei Aussaat im März und April im 1. Jahre.</i>
6—9	x	x						x			<i>Für recht sonnige Lagen. Blüht nur bei Sonnenschein. Herbstsäm- linge frostfrei in Töpfen durchwintert, liefern schöne Pflanzen.</i>
6—8					x	x					<i>Aussaat in Saatgefäße. Der Samen liegt oft Monate lang, ehe er keimt und liefert erst nach einigen Jahren blühende Pflanzen. Pikiren. Liebt Schatten und feuchten Boden auch Haldeerde. Wurzeln giftig.</i>

N a m e n.	Familie.	Character der Pflanze bezüglich ihrer Dauer.	Schlingpflanze.	Immortelle.	Wohlrüchende Pflanze.	Bienenfutterpflanze.	Ziergras.	Zwiebel-, Knollen-, Rhizombildend.	Aussaat:			
									Monat.	im freien Lande, an Ort und Stelle.	im kalten Mistbeet oder Zimmer.	im warmen Mistbeet od warmen Zimmer.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verbascum, ausdauernde	Scrophularineae	☿							4—7		×	
Veronica glauca, syriaca. . . .	"	⊙				×			8—9		×	
im Freien ausdauernde	"	☿				×			4—7		×	
alpina, repens	"	☿							4—7		×	
Vicia, einjährige	Papilionaceae	⊙	×						3—4	×		
ausdauernde	"	☿	×						5—7		×	
Viola cornuta u. V., lutea u. V., Munbyana, pinnata	Violarieae	☿⊙							3—7		×	
odorata semperflorens u. V..	"	☿			×	×			3—8	×	×	
Viscaria	Caryophylleae	⊙							3—4	×		
Wahlenbergia (Platycodon)...	Campanulaceae	☿						K	4—7		×	
Waitzia	Compositae	⊙		×					3—4			×
Whitlavia	Hydrophylleae	⊙				×			4	×		
Wulfenia	Scrophularineae	☿							4—6		×	
Xeranthemum	Compositae	⊙		×		×			3—4 8—9	×	×	
Zauschneria	Onagrarieae	☿							4—8			×
Zea japonica fol. var.	Gramineae	⊙							3—4		×	
gracillima	"	⊙							3—4		×

Blüthe- zeit fällt in die Monate	Eignet sich:										Besondere Bemerkungen.	
	für Blumenbeete, Gruppen u. Rabatten.	für Einfassungen.	für Lauben, Spaliere, Wände etc.	für Blattplantengruppen im Freien.	als Einzelpflanze auf Rasen od. Rabatten.	für den Vordergrund von Gehölzgruppen.	für Terrassen und Felspartien.	für Topfcultur.	für frische Bouquets.	für trockene Bouquets, Kränze etc.		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
5—8						x					<i>V. olympicum</i> und <i>Thapsus imosant</i> als Einzelpflanzen; öfters neu aussäen, weil viele nach dem Flor zu Grunde gehen.	
6—8	x	x					x	x			Bei Herbstsaat und frostfreier Ueberwinterung in Töpfen sehr früh- und reichblühend.	
6—9	x					x	x	x	x		Gedeihen in den trockensten Lagen, auch an Abhängen etc.	
4—6		x					x	x	x		Ganz niedrig, rasenbildend.	
5—8			x			x			x		} Sämmtliche Arten reizend zwischen Parkgebüsch. Einige Species ranken nicht.	
5—8			x		x	x	x		x			
5—10	x	x				x	x	x	x		Pikiren. Auch für Teppichbeete. Pflanzen (ausser <i>V. pinnata</i>) öfter durch Aussaat erneuern, da sie nach mehreren Jahren unschön werden.	
1—12	x	x				x	x	x	x		Aussaat am besten sofort nach der Reife in Saatgefäße. Der Samen liegt lange, bei Frühjahrssaat 1 Jahr und keimt meist im März. Zum Treiben geeignet. Winterblüher. Sät sich zuweilen von selbst aus.	
6—9	x	x						x	x		Herbstsaat anwendbar bei frostfreiem Ueberwintern. <i>V. nanav.</i> eignen sich auch für Teppichbeete. Sehr blüthenreich. Fürchten Nässe.	
6—9	x							x	x		Pikiren. Liebt recht nahrhaften Boden. Sehr dankbare Pflanzen.	
6—8	x								x	x	Pikiren. In sandiger Haide- und Lauberde cultiviren, vorsichtig begießen und gegen Regen schützen. Kann auch als ♂ behandelt werden.	
6—9	x	x						x			Lieben sonnige Lagen.	
6—8		x					x	x			Pikiren. Liebt etwas sandigen, halbschattigen Standort.	
6—10	x							x	x	x	Bei der Herbstsaat an Ort und Stelle in das freie Land gehen bei lange anhaltenden Wintern viele Pflanzen zu Grunde. Lieben volle Sonne.	
6—10	x	x					x	x	x		Pikiren, am besten einzeln in kleine Töpfe. Frostfrei überwintern. Liebt Haideerde, dabei trockenen Standort.	
				x	x	x		x			} Die Panachirung tritt meist mit dem 5. Blatte ein. Ein Korn per Topf aussäen oder in Töpfe pikiren und mit Ballen auspflanzen.	
				x	x	x		x

Zweiter Abschnitt: Topfpflanzen.

A. Allgemeines.

207. Unter diesem Titel besprechen wir sowohl die Zierpflanzen, welche man stets in Töpfen cultiviren muss, wie auch diejenigen, welche im Sommer in das freie Land gepflanzt werden können, jedoch unter Glas zu durchwintern sind. (Von letzteren wurden gewisse Gattungen bereits im ersten Abschnitt behandelt).

Zur Anzucht eines grossen Theiles der Topfgewächse aus Samen bedarf es besonderer Aufmerksamkeit. Obgleich viele derselben in gewöhnliche Land- oder Normalerde gesäet werden können und Haide- oder feine Humuserde nur für feinere Sämereien, Neuholländer- und Cap-Pflanzen unbedingt erforderlich ist, so kann man letztere doch stets anwenden, denn fast alle junge Pflänzchen befinden sich gerade in solcher Erde sehr wohl.

Die Erde muss in allen Fällen sandig und frei von groben Theilen, das obere Dritttheil fein gesiebt sein. Da die Samen fast alle langsam keimen und die Pflänzlinge meist längere Zeit unverpflanzt in den Samengefässen bleiben, so ist es durchaus nothwendig, für Wasserabzug zu sorgen (siehe §. 24, S. 65), wozu Topfscherben, grobe Kieselsteine, Coaks-, Torf- und Haideerde-Stücke verwendet werden. Bei der Aussaat in Töpfen muss das durchlassende Material etwa 2 cm des Bodens bedecken, während es bei flachen Gefässen, z. B. Terrinen, niedriger sein kann. Man füllt nun das Saatgefäss mit der geeigneten Erde bis zu $1\frac{1}{2}$ cm vom oberen Rande des Topfes. Darauf säet man, drückt die Samen leicht an, bedeckt sie mit derselben Erde im Verhältniss zu ihrem Volumen und überbraust sie auf das Vorsichtigste. An Stelle des Letzteren kann man auch das Saatgefäss in einen Untersatz mit Wasser stellen, so dass

es die Feuchtigkeit von unten einsaugt, wobei man sich jedoch vor übergrosser Nässe zu hüten hat. Wo sich erfahrungsmässig schnell Moos auf der Erde bildet, deckt man besser mit feinkörnigem, reinen Sand. Als Gefässe verwendet man, je nach der Menge der Samen und Wurzelvermögen der Sämlinge, flache Töpfe, Samenschalen (Terrinen) oder Holzkästen.

Es giebt unter den Topfpflanzen auch solche, welche nicht in Erde, sondern in Sägespäne, reinen Sand, Cocosmehl, gehacktes Moos (welches auch als Deckung der Aussaat sehr zu empfehlen ist) oder auf Torf gesäet werden, wie wir es an anderer Stelle für die einzelnen Gattungen angeben. Man muss für gleichmässige Wärme, sowie dafür Sorge tragen, dass die Saatgefässe nicht weit vom Licht entfernt stehen; auch kann man sie in das Mistbeet stellen und darin, wenn es nicht zu heiss ist, in die Erde bis einige Centimeter unter den Topfrand eingraben. Die Aussaat wird mässig feucht gehalten und nur mit der Brause gegossen.

Die Saatzeit für Topfpflanzen ist sehr verschieden (vergl. Seite 66). Man säet von Januar bis März diejenigen, welche sich im Laufe des Sommers entwickeln sollen; einige schnellkeimende, die bei früher Saat zu gross werden würden, erst im April, ebenso alle holzigen Kalthauspflanzen, sowie Gehölze. In die Monate Juli—August fällt die Aussaat der wichtigsten krautartigen Pflanzen, welche im Frühjahr blühen sollen. Unter den Topfpflanzen giebt es viele, von denen nicht regelmässig Samen zu haben ist; von diesen kann man sagen, dass man sie säen würde, wenn man Samen erhalten kann; immerhin sind die heissen Monate wenn möglich dabei zu vermeiden. Andere verlieren sehr schnell ihre Keimkraft, müssen also gleich nach der Reife gesäet werden.

Man thut wohl, alle Samen der Leguminosen (Papilionaceen) etc. mit harter, hornartiger Schale, z. B. *Acacia*, *Chorizema*, *Kennedya* etc., entweder vor der Aussaat anzufeilen oder anzuschneiden, und zwar so, dass man die Schale lüftet, ohne den Kern zu verletzen, oder sie vor der Aussaat zwei Tage lang in warmes Wasser, zum 100. Theil mit Chlor, Kleesalz oder Salzsäure versetzt, zu legen, wodurch Sämereien, welche sonst einen oder mehrere Monate liegen, binnen 2—4 Wochen aufgehen. Mit dem Lüften darf man auch nach dem Aufgang der Samen nicht gleich beginnen, überhaupt muss dasselbe mit äusserster Vorsicht angewendet werden.

Zur Ergänzung dieses Paragraphen vergleiche man §. 8, Seite 42 Angiessen, §. 12, S. 52 Dauer der Keimfähigkeit, §. 14, S. 55 Dauer der Keimzeit, §. 17, S. 59 Vorkeimen, §. 25, S. 66 Temperatur für Topfgewächs-Aussaaten.

Die Behandlung sehr feiner Samen.

208. Einige Pflanzen, und unter ihnen eine Reihe der schönsten und beliebtesten, bilden so feinen Samen, dass 1 Gramm desselben weit über 100,000 Körner, ja sogar die doppelte Zahl, enthält. Diese Samen zeigen zwar durchschnittlich eine längere Keimkraft als viele grosskörnige, aber ihre Behandlung ist insofern schwieriger, als sie, namentlich wenn sie im Keimen begriffen oder eben aufgegangen sind, keinem Uebermaass an Feuchtigkeit, Luft oder Licht Widerstand zu leisten vermögen. Es genügen oft wenige grosse Wassertropfen, die in das Saatgefäss fallen, um eine solche Aussaat zu zerstören. — Die Art der Aussaat ist für diejenigen feinsamigen Annuellen, welche nicht in das freie Land gesät werden, z. B. *Lobelia*, *Mimulus* u. v. a., die gleiche wie für die feinsamigen Topfgewächse. Es ist zu empfehlen, diese Samen mit etwas klarem gewaschenen Sand zu vermischen, damit sie nicht zu dicht fallen.

Man nehme zu diesen Aussaaten keine zu hohen Töpfe, vielmehr flache Gefässe: Samenschalen (Terrinen) oder Holzkästen, fülle reichlich $\frac{1}{3}$ mit Topfscherben oder anderem, dem Wasserabzug dienenden Material (§. 24, S. 65), welches hierbei recht grob sein kann, und den übrigen Theil der Höhe mit der der Aussaat zusagenden Erde bis auf die Oberfläche, welche mit sandiger, sehr fein gesiebter Erde ganz horizontal hergestellt und leicht angedrückt wird. Zwischen dieser und dem Topfrand bleibt etwa $\frac{1}{2}$ cm Raum. Der Samen wird dann breitwürfig und nicht zu dicht aufgestreut und, mit Ausnahme der schon genannten Sommergewächse, meist nicht mit Erde bedeckt, sondern nur mit dem Finger, einem Brettchen oder dergleichen leicht angedrückt. Wer nicht über eine ganz feine Brause verfügt, oder im Begiessen solcher Aussaaten keine sichere Hand hat, giesse die Erde vor dem Säen, oder lege nach dem Säen ein Löschpapier oder Moosstücke auf die Erde und giesse auf diese, wobei kein Samen verschwenmt werden kann. Sehr empfehlenswerth ist es, das Saatgefäss mit einer passend zugeschnittenen Glastafel zu belegen, unter welcher die Samen sich feucht halten. Auch unter diesen Samen giebt es einige, welche eine grössere Feuchtigkeit vertragen können

als andere. Unbedingt muss das Aussaatgefäß bis zum Aufgehen regelmässig beschattet, aber nicht nahe an das Licht, nach dem Aufgehen jedoch, ebenfalls unter Schutz gegen Sonnenbrand, so dicht wie möglich an dasselbe gebracht werden.

Handelt es sich darum, feine Saaten in das Freie zu bringen, wie es mit feinsamigen Gehölzen und Stauden, z. B. *Gentiana* zuweilen geschieht, so müssen die Plätze von unten durch Platten oder Schiefer gegen Maulwürfe, Regenwürmer etc. geschützt sein, und es werden die Samen mit Moos bedeckt, um das Austrocknen zu erschweren und sie zu beschatten. Es ist aber sicherer, auch solche Samen in Gefässe zu säen.

Das Pikiren der Topfsämlinge.

209. Ueber das Pikiren im allgemeinen wurde in §. 35, S. 83 bis 84 einiges gesagt; wir haben hier nur noch einige Bemerkungen über das Pikiren der Topfsämlinge zu geben. Für diejenigen, welche später starke Pflanzen bilden, muss es, auch wenn sie dünn aufgingen, zeitig geschehen, damit sich die Hauptwurzel, welche im Aussaatgefäß lang werden würde, bald verzweigt. Zum ersten Pikiren verwendet man nicht allein dieselbe Erdart wie zu den Aussaaten selbst, sondern man giebt den Gefässen auch ein ebenso starkes Abzugsmaterial. Das Pikiren muss an einem schattigen Ort geschehen, und die jung pikirten Pflanzen, welche noch sehr empfindlich sind, müssen schattig und unter Fenster gestellt und ebenso vorsichtig behandelt werden wie die Aussaaten selbst. Bei den feinsamigen Pflanzen, wie *Calceolarien*, *Gloxinien* u. dergl., erfordert das Pikiren eine geschickte Hand; auch muss das erste Ueberbrausen jedes mit solchen pikirten Pflänzchen besetzten Gefässes äusserst vorsichtig geschehen. Namentlich muss man die aus sehr feinen Samen gewonnenen Pflänzchen so schleunig wie möglich (sobald sich die Pflänzchen überhaupt mit der Pincette fassen lassen) pikiren, weil sich sonst meist an Stellen, wo sie sehr dicht stehen (und diese sind auch bei der vorsichtigsten Behandlung der Aussaat unvermeidlich) durch darauf fallende Wassertropfen Fäulniss bildet, welche rasch die ganze Oberfläche überzieht. Gegen die Verbreitung der Fäulniss schützt, wenn nicht gleich pikirt werden kann, ein Bestreuen der Pflänzchen mit pulverisirter, weicher Holzkohle. Das Pikiren ist auch das einzige Mittel gegen das Umfallen der Pflänzchen, welches durch dumpfe Luft, Mangel an Licht oder ebenfalls durch Tropfen herbei-

geführt wird. Zum Pikiren dieser winzigen Sämlinge bedient man sich am besten einer kleinen hölzernen, vorn gabelförmig eingeschnittenen Pincette; die zu beobachtende Entfernung richtet sich nach der Stärke der Sämlinge.

B. Anzucht und Pflege der Sämlinge einiger wichtiger Topfpflanzen-Gattungen und Familien.

Amaryllis hybrida.

210. Diese herrlichen Pflanzen aus Samen zu ziehen, ist nur für besondere Liebhaber oder für Denjenigen lohnend, welcher Neues erzielen will, denn die Sämlinge blühen selten vor dem 5. Jahre. Man sät am besten im Januar-Februar in sandige, gute Haideerde in Terrinen oder Töpfe, bedeckt die flachen Körner ganz wenig und stellt die Saatgefässe im Warmhaus schattig auf, womöglich geschlossen und auf warmen Fuss. Die Samen, welche mässig feucht zu erhalten sind, keimen bei genügender Wärme und wenn sie frisch waren, meist binnen 2 bis 3 Wochen. Die Pflänzchen, welche rasch wachsen und schon bis Jahresschluss über haselnussstarke Zwiebeln bilden, bedürfen in den ersten Jahren keiner Ruheperiode und werden nach zweimaligem Pikiren bereits in Töpfe gebracht, wo man ihnen schon etwas humusreichere Erde giebt. In den ersten Tagen nach jedesmaligem Umpflanzen ist es gut, sie geschlossen warm zu halten. Bei dem weiteren Verpflanzen in immer grössere Töpfe ist bereits ein gründliches Giessen erforderlich, sobald die Pflanzen angewachsen sind.

Die Topfcultur der erstarkten A. ist etwas schwieriger, als die Aussaat selbst, namentlich durch die Zerbrechlichkeit der Wurzeln. Man überwintert sie im temperirten Hause, wo sie am besten auf einer Tablette stehen. Mitte December werden sie verpflanzt und zwar in beste alte Lauberde mit einem geringen Zusatz von Sand. Hierbei werden auf das Vorsichtigste von der Zwiebel und den Wurzeln entfernt: alle verbrauchte alte Erde, die verfaulten oder schlechten Wurzeltheile, sowie diejenigen verdorbenen Theile der Zwiebelumhüllung, welche sich an der Basis der Zwiebel befinden. (Was an den Seitenflächen verdorben erscheint, bleibt, dem es tritt später wieder in Vegetation.) Man hält beim Verpflanzen die Zwiebel mit den guten Wurzeln in den leeren Topf, schüttet lockere

Erde allmählich erst um diese, dann um die Zwiebel bis zum Hals und drückt schliesslich die Zwiebel ganz mässig an. Die Pflanzen werden dann in einem temperirten oder Warmhaus (je nachdem man sie früher oder später blühend haben will) dem Licht möglichst nahegestellt; mit mässigem Giessen beginnt man erst, wenn sie zu wachsen anfangen, man giesst jedoch sehr reichlich, sobald sie sich in voller Vegetation befinden. Nach der Blüthe werden die Töpfe in das Freie; am besten in offene, der vollen Sonne ausgesetzte Mistbeete eingegraben, sei es in Gartenerde oder in trockene Lohe, und zwar muss man unter dem Loch des Topfes mit einem Stock ein Loch in die Erde oder Lohe herstellen, um die Regenwürmer von den Wurzeln fernzuhalten. Das Giessen wird, wenn das Wachsthum nachlässt, allmählich ganz eingestellt. Sobald im Herbst die ersten kühlen Nächte auftreten, kommen die A. wieder in das Gewächshaus, wo die Zwiebeln abtrocknen und die Blätter welken. Die Pflanze tritt dann in eine Ruheperiode, welcher sie unbedingt bedarf, wenn sie im folgenden Jahre gut blühen soll. Das Verpflanzen — die wichtigste Manipulation bei der A.-Cultur — kann auch nach der Blüthezeit vorgenommen werden, man erzielt dann häufig einen schöneren Flor. Wählt man diesen Modus, so stellt man die Töpfe nach dem Umpflanzen anfangs recht schattig, am besten zwischen Bäume, im Garten auf und zwar so lange, bis trübes Wetter eintritt, wo sie dann wieder in der oben angegebenen Weise im Freien eingegraben werden.

Die Aroideen des Warmhauses.

211. Die Aussaat der Warmhaus-Gattungen dieser Familie, namentlich der buntblättrigen *Caladium* und *Anthurium* ist dankbar, wenn man frischen Samen besitzt; sie erfordert jedoch hohe Wärme. Man sät bei einer Minimal-Temperatur von 20° R. und zwar in Terrinen oder Töpfe, welche in ein geschlossenes Vermehrungsbeet und auf warmen Fuss gestellt werden. Die Samen kommen in eine Mischung von fein gehacktem Sphagnum mit Haideerde (ohne Sand) und werden nicht bedeckt; ferner ist durch häufiges Bespritzen mit temperirtem Wasser eine fortwährende Feuchtigkeit zu erhalten. Die Pflänzchen pflegen sich dann binnen 14 Tagen zu zeigen. Auch nach dem Pikiren in ebensolche Erde und Saatgefässe hält man die Sämlinge noch geschlossen, pflanzt sie später einzeln in ganz kleine Töpfe und gewöhnt sie dann erst durch Lüften an die eigent-

liche Gewächshaustemperatur. Die Samen der *A.* bewahren ihre Keimkraft selten länger als ein Jahr.

Zur weiteren Cultur dieser Familie erwähnen wir, dass alle Gattungen einer grossen Feuchtigkeit bedürfen. Die knollenbildenden, namentlich die *Caladium*, verlangen indessen eine längere Ruheperiode, während welcher man das Giessen einstellt; ihnen giebt man eine kräftige Mischung sandiger Laub- und düngerreicher Mistbeeterde, während man die übrigen, Luftwurzeln bildende Gattungen, z. B. *Anthurium* und *Philodendron* in lockerer, grober Moor- oder Haideerde cultivirt.

Begonia.

212. Die Manipulation der Aussaat dieser Gewächse unterscheidet sich nicht von derjenigen anderer feinsamiger Gewächshauspflanzen (vergl. §. 208, Seite 316). Man sät in Schalen oder Kästen in feingesiebte sandige Haideerde. Der Samen wird möglichst gleichmässig und nicht zu dicht obenaufgestreut. Diese Saatgefässe müssen bei *B. Rex*, *smaragdina* und *discolor Rex* mit Glas tafeln bedeckt und recht warm in feuchte Atmosphäre gestellt werden. Der Niederschlag an den Glastafeln wird auf das Sauberste täglich einmal mit einem Tuch oder Schwamm abgetrocknet. Gewöhnlich dauert es 10—14 Tage, ehe die Saat aufläuft, einige Sorten der knollentragenden *B.* zögern damit etwas länger. Je früher und wärmer die Aussaat bewirkt wird, desto rascher wird man fertige Pflanzen erzielen. December-Januar sind daher die geeignetsten Monate, doch können auch spätere Aussaaten bei sachgemässer Behandlung günstige Resultate liefern. Am vorsichtigsten im Begiessen ist *B. metallica* und *B. Roezli* (beide treffliche Winterblüher) zu halten. Ziemlich feucht hält man die Warmhaus-*B. ricinifolia*, *manicata* und dergl., weniger die, kühlere Temperatur vertragenden *B. fuchsioïdes*, *incarnata*, *semperflorens* u. s. f. Besonders vorsichtig im Begiessen sind die Samenschalen der knollentragenden Arten, darunter *B. Veitchi*, zu behandeln, deren Sämlinge leicht umfallen. Das erste Pikiren geschieht sobald sich die winzigen Pflänzchen mit der Pincette fassen lassen und es ist ein ferneres wiederholtes Fortpflanzen in neue Erde durchaus nöthig, um das Wachsthum zu fördern. Sind die Pflänzchen erstarkt, so vertragen und verlangen die *B.* sowohl reichliche Bewässerung, wie öfteres Ueberspritzen. *B. Rex* und die warmen Species werden auch ferner in geschlossener

Temperatur gehalten und in leichte Erde gepflanzt, hingegen die zum sommerlichen Auspflanzen geeigneten *B. semperflorens*, *discolor* und knollentragenden Arten nach und nach an die Luft gewöhnt und in kräftigere Erde versetzt. Vor dem Auspflanzen müssen die jungen Triebe recht abgehärtet sein, da Sonne und Wind sie sonst vernichten, oder die Entwicklung doch Verzögerung erleidet.

Mit den Spielarten der *B. semperflorens*, sowie *Martiana gracilis* und ähnlichen Sorten lassen sich gut wirkende, gleichförmige Beete und Einfassungen (auch von Gehölzgruppen) schaffen. Am meisten prunken jedoch die in allen Farbenabstufungen von roth bis weiss und gelb erscheinenden, knollentragenden B., wenn man sie in das Freie auspflanzt und gruppenbildend verwendet. Mit dem Auspflanzen in das Freie beginnt man, aus Furcht vor Spätfrösten, nicht gern vor Ende Mai und stellt die Beete aus einer Mischung guter Haide- und Lauberde mit Sand her. Einmal in Vegetation, verlangen solche B.-Gruppen nicht mehr Pflege, als z. B. die von Pelargonium, es wäre denn, dass man in der heissen Jahreszeit den Pflanzen noch häufiger und gründlicher mit Giessen zu Hülfe kommen muss als diesen. Lässt man die B. unter Glas, so müssen sie luftig und hell, jedoch gegen stechende Sonne geschützt stehen, um zur höchsten Vollendung zu kommen. Nach dem Flor stellt man das Giessen allmählich ein, die Blätter welken dann ab und die Knollen ruhen bis zum nächsten Frühjahr in trockener Erde oder ganz frei auf Tabletten unter Dach und gegen Frost geschützt. Zeitig im Frühjahr werden sie wieder angetrieben und blühen dann von Juni bis November.

Lieulich und überraschend sind die gefülltblühenden Knollen-B., gleich werthvoll zur Freiland- wie Topfzucht, und wie alle diese B. eine schöne Fensterpflanze. Der Samen derselben, durch künstliche Befruchtung gewonnen, bringt zur Hälfte einfachblühende Pflanzen. Man kann wirklich behaupten, dass, so leicht die Fortpflanzung aller Begonien auch aus Stecklingen (die Vermehrung durch Blätter bei *B. Rex* ist bekannt) sich bewirken lässt, es doch nicht leicht eine zweite Pflanzenfamilie giebt, welche durch Aussaaten mehr Vergnügen und willig sich bietende Erfolge gewährt, als diese B., deren Sämlinge so ungemein üppig blühen. Sie spielen heute bei uns noch nicht die wichtige Rolle, welche ihnen ohne Zweifel gebührt.

Bromeliaceen.

213. Diese herrlichen Pflanzen des warmen und temperirten Hauses sind äusserst feinsamig. Sie werden hauptsächlich durch Aussaat vermehrt, deren Behandlung die grösste Sorgfalt erfordert. Einige Gärtnerverfahren damit wie bei Farnen (vergl. §. 221, S. 331). Wir geben indessen der in Versailles, wo sehr viel Br. gezogen werden, gebräuchlichen Methode den Vorzug. Dort säet man geschlossen im Vermehrungshaus in Terrinen oder Töpfe, deren untere Hälfte mit Topfscherben, die obere Hälfte mit sandiger und mit ganz fein gehacktem, feinem Moos (*Sphagnum*) vermischter Haideerde gefüllt sind, und verfährt im Uebrigen wie bei anderen feinen Aussaaten (§. 208, S. 316). Die Sämlinge zeigen sich nach wenigen Wochen; nach zwei- bis dreimaligem Pikiren sind sie stark genug, um einzeln in Töpfchen zu kommen. Man fügt dann der erwähnten Erdmischung einige kleine Stücke Holzkohle bei; dieser Zusatz wird mit wachsender Stärke der Pflanzen entsprechend vergrössert. Um das Versauern der Erde zu verhüten, bedeckt man bei dem ersten Pikiren die Oberfläche mit ganz klar zerstoßenen Topfscherbenstückchen oder grobem Quarzsand, sonst würde das Moos häufig schneller als die Samenpflänzchen wachsen. Bei der späteren Cultur beachte man besonders, dass das Giesswasser sich nicht im Herzen der Pflanzen ansammele, wodurch Fäulniss entsteht und der Flor leidet. Ueberhaupt braucht man nur die grosswachsenden Sorten dieser Familie in Töpfen zu ziehen (wo man ihnen die genannte Erde und Abzugsmaterial giebt), denn sie verlangen sehr wenig Nahrung und gedeihen erfahrungsmässig fast sämmtlich wie viele tropischen Orchideen: die Wurzeln mit *Sphagnum* umgeben und an einem Brett befestigt, aufgehängt.

Cacteen.

214. Die Anzucht dieser Pflanzen aus Samen ist sehr lohnend. Mit wenigen Ausnahmen haben die hierher gehörigen Gattungen feinen Samen und eine Keimzeit von $1\frac{1}{2}$ —3 Wochen. Man säet dieselben im Warmhaus, warmen Mistbeet oder warmen Zimmer (es genügt eine Temperatur von 18° R) in möglichst flache Töpfe oder in Terrinen und sorgt für reichlichen Wasserabzug. Die gut zerriebene Haideerde, mit Lauberde und gewaschenem Sand vermischt, welche man hierauf in die Aussatgefässe bringt, wird ziemlich fest angedrückt; die Samen werden nur wenig bedeckt. Durchaus nöthig ist

es, den Samen dünn zu streuen, weil die Pflänzchen nicht dicht aneinander stehen dürfen. Bis zum Aufgang werden die Samen fortwährend feucht gehalten. Es ist nicht zweckmässig, die Pflänzchen bald zu pikiren, sondern besser zu warten, bis sie sich charakteristisch ausgebildet haben, dann sind sie mit kleinen Erdballen auszustechen und weiter, entweder einzeln in kleine Töpfchen oder nochmals in Samentöpfe zu pflanzen, wozu abermals obige Erdmischung genommen wird. Geht die Saat sehr dicht auf, so ist es besser, einzelne Büschel mit dem Messer auszuheben und einstweilen weiter zu verpflanzen, als die zarten Pflänzchen sogleich zu vereinzeln. Nach dem Pikiren empfiehlt es sich, das Gefäss, in welchem sie stehen, einige Tage lang mit einer Glasglocke zu überdecken. Am schnellsten keimen die Gattungen *Mammillaria* und *Echinocactus*, dagegen brauchen *Cereus*, *Pilocereus* und *Opuntia* oft 4—8 Wochen zum Aufgehen.

Die weitere Pflege dieser Pflanzen ist leichter als man im allgemeinen glaubt; sie eignen sich vortrefflich zur Cultur in hellen Zimmern, und viele derselben können während der schönen Jahreszeit in das Freie gestellt, resp. gepflanzt werden. In einer mittleren Temperatur von ungefähr 12° R., fühlen sie sich am wohlsten, vertragen jedoch fast ausnahmslos, falls sie nicht gerade feucht stehen, auch vorübergehende kühle Luft bis zum Gefrierpunkt herab. Die Pflanzen verlangen sehr hellen, nach Süden gelegenen Standort; bei grosser Hitze muss man sie durch Halbschatten gegen die Sonnenstrahlen schützen. Die im Gewächshaus cultivirten Sorten werden bei etwa 5° R. überwintert. Ein solches Cacteen- oder Succulentenhaus muss sehr hell und mit guten Ventilations-Vorrichtungen versehen sein, denn während der heissen Tagesstunden muss gut gelüftet werden, wodurch die Pflanzen auch gegen das sehr schädliche Herabtropfen von condensirtem Wasser geschützt bleiben. Mit Beginn der Vegetation im Frühjahr bis gegen Mitte Juni verlangen diese Pflanzen eine höhere Wärme, und bringt man sie zu diesem Zwecke gern auf warmes Mistbeet unter Glas; auch müssen sie dann reichlich begossen und abends gespritzt werden. Gegen Ende August bereitet man sie auf die, bei den meisten um diese Zeit beginnende Ruhezeit dadurch vor, dass man mit dem Giessen nachlässt. Von October bis Januar müssen sie (mit Ausnahme der in Vegetation stehenden, z. B. *Epiphyllum*) fast ganz trocken gehalten und nur gegen Kälte geschützt werden. Wir empfehlen zur späteren Cul-

tur dieser Pflanzen Haide- oder gute Lauberde, zum geringen Theil mit Sand, kleinen Holzkohlenstücken und trockenem, erdigen Kuh- oder Schafdünger vermischt.

Calceolaria (*Scrophularineae*).

215. Die Aussaat der krautartigen *C.* geschieht im Juli und August. Die Samen sind äusserst fein, werden genau nach §. 208 (S. 316) ausgesät und zwar in sandige Haideerde in Terrinen oder nicht zu hohe Töpfe, welche in ein kaltes, schattiges, geschlossenes Mistbeet auf Sand gestellt werden. Nach 14 Tagen zeigen sich gewöhnlich die Pflänzchen, dann wird das Saatgefäss unverzüglich erhöht, dicht unter dem Glas aufgestellt. Bei günstigem Wetter kann man dann schon allmählich lüften. Sobald sich die Pflänzchen mit der Pincette greifen lassen, werden sie pikirt, wobei sie 8 Tage lang geschlossen zu halten sind. In diesem Stadium werden die Sämlinge häufig durch Schnecken heimgesucht, welche grossen Schaden anrichten können und am besten dadurch ferngehalten werden, dass man den Gefässrand mit pulverisirter Holzkohle bestreut. Nach zweimaligem Pikiren pflanzt man im September-October in kleine Stecklingstöpfe, welche wieder in das kalte Mistbeet kommen. Hierzu und zu dem nächsten Verpflanzen, welches im Januar-Februar mit Ballen und in mittelgrosse Töpfe bewirkt wird, mischt man der sandigen Haide- etwas Lauberde zu. Nach dem Verpflanzen bleibt der Kasten stets einige Tage geschlossen, wobei man durch Bespritzen eine genügende Feuchtigkeit aufrecht erhält. Später muss aber reichlich gelüftet, gespritzt und mit dem Rohr etwas gründlicher gegossen werden; unterlässt man das Bespritzen, so stellen sich sofort die grünen Läuse ein. Auch muss der Kasten gut geschlossen und gegen Mäuse sicher sein. Die *C.* vertragen, besonders bei guter Schneedecke, niedrige Temperatur und können bis zum Gefrierpunkt herab überwintert werden. Das letzte Verpflanzen mit Ballen erfolgt im März-April in grosse Töpfe, welche man zu $\frac{1}{3}$ mit groben Haide- oder Lauberdestücken, um guten Abzug zu haben, zu $\frac{2}{3}$ mit womöglich noch kräftigerer Erde, als oben bemerkt, füllt. Die Pflanzen verlangen einen luftigen, schattigen Standort, denn sowohl gegen Regen wie Sonnenbrand sind die Blumen sehr empfindlich.

Alle *C.* sind vortreffliche Zimmerpflanzen. Zum Auspflanzen in das Freie eignen sich besonders die ganz kleinblumigen, strauch-

artigen *C. rugosa*, mit denen man sehr schöne Gruppen und Einfassungen herstellen kann. Diese wachsen im Winter langsamer; man kann sie mehr abhärten und säet sie gern schon im Mai-Juni. Der Samengewinn dieser Classe ist ganz besonders mühsam, erfordert aber auch bei den getigerten, getuschten und gestreiften die grösste Mühe und ist nur durch künstliche Befruchtung möglich. Bei Beginn und während des Flors, d. h. im Mai und Juni, verlangen die *C.* reichliches Giessen. Für die hohen Varietäten ist ein sehr sorgfältiges Aufbinden der Pflanzen an Stäbe geboten.

Zur Vertreibung der grünen Läuse empfehlen wir einem Theil abgebrühten und durchgeseihten Tabakstaub 3 Theile Wasser hinzuzusetzen und damit die Pflanzen mehrmals zu bespritzen.

Canna, Blumenrohr (*Cannaceae*).

216. Die Samen dieser herrlichen Gattung sind äusserst hartschalig und es ist rathsam, sie vor der Aussaat im warmen Wasser einzuquellen oder zu stratificiren. Für letzteren Zweck legt man sie in eine Schicht Sand, welcher feucht erhalten und warm gestellt wird. Mit so präparirtem Samen, welcher unregelmässig in 1 bis 2 Wochen aufgeht, ist es leicht, wenn man zur rechten Zeit, d. h. im Januar aussäet, Pflanzen zu ziehen, welche noch in demselben Sommer zur Blüthe gelangen. Die Aussaat ist also sehr lohnend, daher auch viel verbreitet. Man säet entweder im Warmhaus oder geschlossenen warmen Mistbeet, in Töpfe oder Terrinen, welche nahe am Glas stehen müssen.

Sobald die Sämlinge einander beengen, werden sie einzeln in Stecklingstöpfchen pikirt, wo sie so schnell wachsen, dass sie bereits gegen Ende Mai, falls warmes Wetter eingetreten ist, mit kleinen Ballen in das Freie ausgepflanzt werden können, wobei man einen Abstand von 60 bis 80 cm beobachtet. Die *C.* verlangen sehr reichliche Bewässerung, womöglich zuweilen mit flüssigem Dünger, wenn man starke, schöne Gruppen- oder Schaupflanzen erzielen will; hat man aber behufs Züchtung von Neuheiten ausgesäet, so giesst man weniger, um sie früher blühen zu sehen.

Die *C.* gedeihen am besten in heissen Jahren, man pflanze sie möglichst sonnig und gegen Wind geschützt. Beim ersten Frost erfrieren die Blätter, worauf man die Pflanzen mit ihrem ganzen Wurzelwerk, ihren dicken Rhizomen aus der Erde nimmt. Diese

werden durch Schütteln von der Erde befreit, dann schneidet man alle alten Wurzeln, von den Stengeln aber nur die fauligen Theile, ab und bringt sie in einen trockenen, gegen Kälte geschützten Ort, vom Licht entfernt, Kalthaus, kaltes Mistbeet oder Keller, wo sie vollends abtrocknen und bis zum März ruhen; dann beginnen sie von selbst wieder zu vegetiren. Indessen können auch schon früher (durch Anwendung künstlicher Wärme) die Augen der Rhizomen jederzeit in Vegetation gebracht werden. Im Frühjahr hat man die Rhizomen zu theilen (die Theilung im Herbst ist nicht günstig), wobei man sie gern so zerschneidet, dass jedes Stück 2—3 Augen erhält. Diese Stücke werden (bei empfindlichen Sorten mit Holzkohlenpulver bestreut) in Töpfe gepflanzt und auf warmen Fuss gebracht, um im Mai wiederum in das Freie zu kommen. Handelt es sich um Massenvermehrung, so kann man (allerdings nicht bei allen Sorten) noch kleinere Stücke schneiden und durch Anwendung hoher Wärme jedes einzelne Auge zum Wachsen bringen und nutzbar machen. Auf diese Weise lassen sich aus einem starken Wurzelstock gegen 100 Pflanzen erzielen, welche wie Stecklinge behandelt werden. Je weniger man indessen theilt, desto stärkere Pflanzen erzielt man natürlich, doch ist andererseits ein begrenztes Theilen wenigstens jedes zweite Jahr erforderlich. — Die *C.* wachsen zwar in jedem tief bearbeiteten Boden, zu voller Schönheit entwickeln sie sich jedoch nur in möglichst düngerreicher, lockerer Erde. Vorzüglich ist alte Laub- und Haideerde mit verrottetem Kuhdung oder auch Laub- und Mistbeeterde gemischt.

Für Blattpflanzengruppen sind die *C.* unübertroffen; hell- und dunkellaubige Varietäten zu einer Gruppe vereinigt, wirken überraschend schön, man muss dabei nur die Höhe, welche jede derselben erreicht, genau berücksichtigen. Treten die Pflanzen in Blüthe, was gewöhnlich im Juli-August der Fall ist, so wird der Effect noch erhöht. Die prächtigen Blüthen sind werthvoll für Bouquets und halten sich an den Stielen lange im Wasser. Auch zur Cultur in grossen Töpfen eignen sich viele der zahlreichen Hybriden. Sie werden dann zwar nicht so üppig wie im Lande, doch kann man sie so nach Belieben aufstellen und ausserdem im Winter im Warmhaus leicht zur Blüthe bringen; man verwendet dazu die oben erwähnte Erdmischung gut durchsiebt. Einzeln auf Rasen, sowie zur Bepflanzung von Ufern und zwischen Gehölzgruppen lassen sich *C.* ebenfalls gut verwenden.

Chrysanthemum indicum und frutescens u. V.*(Compositae).*

217. Bei der Leichtigkeit, mit welcher sich die *Chr. indicum* mit den Pompon- und japonicum-Varietäten durch Stecklinge vermehren lassen, sollte die Aussaat dieser Pflanzen nur von Denen unternommen werden, welche neue Varietäten zu erzielen wünschen und auch sie müssen sich bewusst sein, dass aus Samen nur eine bescheidene Zahl mustergiltiger Pflanzen zu erwarten ist. Indessen beweisen die jährlich eingeführten Neuheiten zur Genüge, dass viel ausgesäet wird; es kommt hierbei zu statten, dass die Sämlinge bei günstigen Sommern leicht im ersten Jahre zum blühen gebracht werden können. Zu diesem Zweck säet man schon im Februar, im temperirten Haus oder mässig warmen Beet, in lockere, sandige Haideerde, in Terrinen oder flache Töpfe, welche schattig und feucht zu halten sind. Die bald zu pikirenden Sämlinge werden, wenn es die Witterung gestattet, durch Lüften frühzeitig abgehärtet, später einzeln in Töpfchen gepflanzt und schattig, mit Vorsichtsmassregeln gegen etwaige Spätfroste, im Freien aufgestellt. In diesen kleinen Töpfen lässt man die *Chr.* bis sie die erste Blüthe zeigen, verwirft die geringen, während man die schönen versprechenden in grössere Töpfe verpflanzt, wo sie im nächsten Jahre nochmals Probeblühen. Die *Chr.* lassen sich in jedem Alter mit Ballen verpflanzen. In Töpfen giebt man ihnen kräftige Mistbeeterde, mit etwas Lehm, Sand und Haide- oder Lauberde vermischt. Sie gedeihen beinahe überall, wenn sie im Sommer bei Trockenheit reichlich gegossen werden. Sollten bei regnerischen, ungünstigen Sommern die *Chr.*-Sämlinge keine Blüthe versprechen, so erreicht man einen Flor dadurch, dass man sie im Herbst unter Glas stellt und etwas zurückschneidet. Die Menge, sowie die Farben- und Formen-Schönheit ihrer Blumen, welche hauptsächlich im Spätherbst und Winter sich entfalten und dadurch doppelt willkommen sind, verleihen den *Chr.* einen hohen Werth als Zimmer-Marktpflanzen und Bouquetblumen und bilden hierdurch für viele Gärtner einen der einträglichsten und durch die Leichtigkeit der Cultur angenehmsten Artikel.

Chr. frutescens u. V. werden aus Samen in derselben Weise herangezogen, sie blühen bereits im Juli. Diese Sorten haben sowohl zum Auspendeln in das Freie, für Gruppen, Beete und Einfassungen, wie auch zum Schneiden grossen Werth. Alle hier besprochenen *Chr.* verlangen frostfreie Ueberwinterung.

Cineraria hybrida (*Compositae*).

218. Die Aussaatzeit der C. richtet sich danach, in welchem Winter- oder Frühlingsmonate man dieselben in Blüthe haben will; säet man z. B. im Juli, so entwickeln sie vom April bis Mai ihren farbenreichen Flor. Nach unsern Erfahrungen ist dies der günstigste Zeitpunkt, man kann indessen schon im April und bis Ende August säen. Man bringt die feinen Samen nach §. 208 (S. 316) in Terrinen oder Töpfe in sandige Mistbeet- oder Schlammerde in ein Warmhaus oder warmes Beet. Der Aufgang erfolgt meist nach 6 bis 8 Tagen, wenn das Saatgefäss mässig feucht und schattig gehalten wird. Dies verlangen die Pflänzchen auch nach dem schleunigst vorzunehmenden Pikiren und nachdem sie Anfang September in kleine Töpfe gebracht worden sind (vom Auspflanzen in das Mistbeet rathen wir ab, weil die Pflanzen zu gross werden). In diesen werden sie durch allmähliches Lüften bald abgehärtet, regelmässig gespritzt und möglichst nahe am Licht im Kalthaus oder Mistbeetkasten bei $+ 1$ bis $+ 6^{\circ}$ R überwintert.

Zu Beginn des Frühjahrs erfolgt das Einpflanzen in grosse Töpfe, in welchen die C. zum Blühen gebracht und marktfähig werden. Man wählt dazu eine recht kräftige Mistbeet- oder Schlammerde, welcher etwas Lauberde beigemengt ist, stellt die Pflanzen luftig und schattig und spritzt sie regelmässig weiter. Wer hierin etwas versäumt, wird unfehlbar Läuse an den C. auftreten sehen, welche diesen Pflanzen besonders hold und meist nicht schnell zu entfernen sind. Das bei der Calceolaria-Cultur angegebene Mittel würde auch hier dagegen anzuwenden sein.

Die C., sowohl die einfach- wie gefüllt blühenden, sind heutzutage zu grosser Vollkommenheit gebracht (letztere bringen jetzt gegen 90 % echter), und man kann sich bei Beobachtung obigen, seit Jahren vom Herausgeber mit grösstem Erfolg angewendeten Verfahrens aus einer Prise guten Samens einen reichen Flor dieser trefflichen Marktpflanzen schaffen. Die neuen grossblumigen englischen C. finden auch bei uns jetzt die ihnen gebührende Beachtung. Alle C. hybrida sind ein vorzüglicher Schmuck für das Zimmer, für temperirtes und Kalthaus, sowie für Wintergärten und Orangerien. Sie blühen lange und in Fülle; ausserdem ist ihnen ein besonders feiner Wohlgeruch eigen. Durch Anwenden sehr grosser Töpfe beim letzten Verpflanzen und durch Giessen mit flüssigem Dünger lassen sich prächtige Schaupflanzen erzielen.

Coleus (*Labiatae*).

219. Die geeignetste Zeit für die Aussaat der Coleus ist Ende Januar bis Mitte Februar. Man sät auf warmen Mistbeet oder im Warmhaus in Terrinen oder Töpfe, in sandige, leichte Erde, drückt die Samen etwas an und bedeckt sie erst dann, wenn sie zu keimen beginnen. Im übrigen verfährt man nach § 208 (S. 316). Durch baldiges Pikiren, öfteres Verpflanzen, zuerst einzeln in kleinste Stecklingstöpfe, dann in immer grössere Töpfe, und zeitweiliger Anwendung von Dungguss erhält man bald üppige Pflanzen, welche nahe unter Glas und der Sonne ganz ausgesetzt zu halten sind. Wenn nicht anhaltend trübes, vielmehr recht sonniges Wetter herrscht, so entfalten sich die herrlichen Farben der Belaubung bald, meistens nach Entwicklung des 6. bis 8. Blattes. Im Herbst schneidet man die Köpfe der Pflanzen ab und bringt sie in kleine Stecklingstöpfe, worin sie sich schnell bewurzeln und überwintert sie im Warmhaus oder warmen Zimmer. Die Coleus lieben sandige, recht lockere Haide-, Mist- oder Laub-erde, oder besser eine Mischung dieser Erdarten, sie bilden nach jedesmaligem Verpflanzen sehr schnell ein starkes Wurzelwerk und lassen sich desshalb in jedem Alter verpflanzen. So ist es leicht erklärlich, wie in verhältnissmässig kurzer Zeit jene riesigen Schaupflanzen heranzuziehen sind, welche wir in den Ausstellungen bewundern.

Diese Pflanze hat einigen Spezialisten ein williges Operationsfeld zu Befruchtungen geboten, deren Erfolg wir jetzt überall in den so zahlreichen, alle möglichen Farbenvereinigungen bietenden Hybriden begegnen. Somit ist sie zu einer sehr angenehmen Marktpflanze geworden, welche in jedem nicht zu kalten Zimmer, im temperirten und Warmhaus vortrefflich gedeiht, vorausgesetzt, dass sie genügend Nahrung und Licht erhält. Zum Auspflanzen in das Freie eignen sich nur die robusteren Varietäten, z. B. *Verschaffelti*, *Hero*, *multicolor splendens*; mit diesen lassen sich aber auch herrliche, der vollen Sonne auszusetzende Gruppen bilden. Aus dem Gesagten geht hervor, dass die C. zahlreichen Decorationszwecken dienen können, und wir bemerken noch, dass einige Prisen Samen genügen, um eine schöne Sammlung derselben in wenigen Monaten heranzuziehen.

Cyclamen (*Primulaceae*).

220. Zur Anzucht dieser prächtigen Pflanzen aus Samen empfehlen wir das folgende bewährte Verfahren: Man säet den Samen zwischen den 15. Dezember und 15. Februar in mit sandiger Haideerde gefüllte Schalen und stelle sie in einen Vermehrungskasten ziemlich warm. Die Sämlinge werden möglichst bald in ebensolche Samenschalen oder hölzerne Saatkästen pikirt. Hierzu nimmt man Haideerde, Lauberde und Sand. Hell unter den Fenstern stehend, bleiben sie im Warmhause, bis im März ein Mistbeet für sie bereit ist. Sobald die Pflänzchen hinreichend erstarkt sind, meistens Anfang April, setzt man sie einzeln in kleine Töpfe, welchen man durch zerschlagene Topfscherben, grobkörnigen Sand etc. guten Wasserabzug verschafft. Die Erdmischung besteht aus $\frac{1}{2}$ Haideerde, $\frac{1}{4}$ Lauberde, 20 Theilen Sand und 5 Theilen nicht zu alter Misterde. Im Laufe des Sommers werden die Pflanzen noch zweimal in nur wenig grössere Töpfe versetzt und dann von neuem in einen mässig warmen Kasten gebracht, anfangs in geschlossener Luft, später von Ende Juli an luftiger gehalten. Mitte August giebt man ihnen zum letzten Verpflanzen 12—15 cm weite Töpfe, und kann dann noch mehr Misterde untermischen. In diesen Töpfen kommen die C. bereits im Herbst zur Blüthe, und gut gezogene Pflanzen bringen mehr als hundert Blumen. Diese C. bleiben nun unter Glas, werden aber reichlich gelüftet. Mit Eintritt des Winters bekommen sie einen Platz im temperirten Hause, dicht unter den Fenstern. Um das Blühen zu beschleunigen, wird eine beliebige Zahl von Töpfen wärmer gestellt. Man kann die Samen auch vor der Aussaat 12 Stunden in Wasser legen, um ein schnelleres Keimen zu erzielen, und ferner für das Einpflanzen in Töpfe Haideerde, Lauberde, Düngererde und Sand zu gleichen Theilen nehmen. Die ganze Anzucht bis zur Blüthe dauert nur 9—12 Monate. Um Platz und Töpfe zu sparen, und besonders zur Massen-Anzucht kann man aus den Pikirschalen gleich in ein mit sandiger, in der Hauptsache aus Haideerde zubereitetes warmes Mistbeet pflanzen. Möglichst warm forcirt, können sie im September in die Verkaufstöpfe eingepflanzt werden. Es giebt dies reichblühende Exemplare für den Winterflor, den man durch Anwendung kühlerer Temperatur leicht bis Frühjahr verzögern kann. Möglichst viel Licht, reichliches Giessen, wenn die Pflanzen in lebhafter Vegetation stehen, und mässiges Feuchthalten derselben im Winter, sind die Haupt-

erfordernisse zum Gelingen einer Cyclamen-Cultur. Die C. leiden leicht vom Trips, rother Spinne und Blattläusen, denen man nur durch aufmerksames Abwarten, besonders häufiges Spritzen, vorbeugen kann. Zur Bekämpfung empfehlen wir Bespritzen mit Tabaksabsud. Gegen zu grelle Sonne sind sie in allen Entwicklungsstadien durch Schattiren zu schützen. Auch gegen scharfen Wind sind die C. empfindlich; zu nass gehalten, werden sie leicht gelb. Wir haben bei diesem Culturverfahren hauptsächlich die *C. persicum* und deren herrliche grossblumige Abart *giganteum* (*universum*) und Var. im Auge gehabt; es lassen sich darnach jedoch sämtliche andere C.-Species behandeln, von denen aber die härteren, wie *C. europaeum* und *Coum* (*vernum*) kühler und luftiger zu behandeln sind. Die Aussaat für *C. europaeum*, *macrophyllum*, *neapolitanum* etc. geschieht besser im Frühjahr.

Die Aussaat der Farrnkräuter.

221. Man nimmt zur Aussaat Torfstücke, welche in 4—5 cm starke Tafeln geschnitten sind. Auf diese wird der Samen (Sporen) dünn gestreut. Die vor dem Säen durchdringend eingeweichten Torftafeln werden in ununterbrochener Feuchtigkeit erhalten, welche sie am besten aus einem Wasser enthaltenden Untersatz aufsaugen; die Oberfläche mit dem Samen wird nicht begossen. Hat man keine reinen Samen, sondern Blattstücke auszusäen, und das ist meistens der Fall, so legt man dieselben mit der Unterseite platt auf die Torf-Oberfläche und hält sie dort durch Auflegen von Kieselsteinchen fest, oder man schabt mit einem Messer von den Blättern die Sporen vorsichtig ab und lässt sie auf die Torftafeln fallen. Es empfiehlt sich, letztere mit einer Glasglocke zu bedecken und sie in den Vermehrungskasten oder in ein schattig gehaltenes, sehr warmes Mistbeet zu stellen. Bald überzieht sich das Torfstück mit kurzem, grünen Moos, aus welchem sich nach einiger Zeit kleine, durchscheinende Schuppenblättchen, meist von glänzend grüner Farbe erheben. Diese bilden den Anfang der Pflanze, indem am Fusse ein Knötchen, eine Knospe entsteht, aus welcher sich die ersten unvollkommenen Blättchen (Wedel) entwickeln. Man hebt diese mit ein wenig Torf aus und pflanzt sie in ganz kleine Töpfe, welche warm, schattig und feucht gestellt werden. Wenn sich andere Farrnkräuter in der Nähe der ausgesäeten befinden, so keimen häufig zuerst, statt der ausgesäeten, andere cultivirte Arten, die

man erst später erkennt. Nachdem diese beseitigt, darf man das besäete Torfstück nicht wegwerfen, denn es ist dadurch das Keimen der wirklich ausgesäeten Art meist nur verzögert worden. Die Aussaat der Farrnkräuter misslingt häufig; grosse Feuchtigkeit, hohe Wärme und reichliche Beschattung sind die Punkte, in denen dabei nichts versäumt werden darf. Man kann sie auch wie andere sehr feinsamige Gattungen, z. B. wie Gesneriaceen, aussäen und würde dann das Saatgefäss mit gehacktem Moos belegen. Das angegebene Verfahren ist jedoch bei Weitem gebräuchlicher und sicherer; viele Sorten brauchen Monate, bevor der Samen aufgeht. Manche Species, z. B. einige den *Pteris*, *Asplenium* und *Adiantum* zugehörige, säen sich durch abspringenden Samen von selbst aus. Sandige Haideerde, mit Torf und Lauberde vermischt, sagt ihnen später am besten zu; sie verlangen sehr reichliche Bewässerung.

Der Samen hält sich viele Jahre keimfähig. An Baumfarn- und Cycadeen-Stämmen, welche aus dem Vaterlande kommen, keimen häufig verschiedene Farrnkräuter, ebenso in der Erde aus Verpackungskisten importirter Pflanzen, besonders der Orchideen. So wurde schon manche fremde Pflanze nach Europa geführt.

Fuchsia hybrida (*Onagrarieae*).

222. Die Anzucht dieser schönen Pflanzen aus Samen darf als recht dankbar hingestellt werden, sie wird, wenn man mit gutem Samen arbeitet, ausser den neuen oder interessant Abweichenden wenig Pflanzen liefern, welche nicht auf die eine oder andere Weise verwendet werden könnten. Sie empfiehlt sich daher auch zur Massenzucht, da die meisten Sämlinge im ersten Jahre zur Blüthe gelangen. Man sät im Februar-März im Warmhaus oder warmen Mistbeete in Terrinen in feingesiebte, recht sandige Haideerde und sorgt für guten Wasserabzug. Die Saat wird schwach bedeckt, mässig feucht und schattig gehalten, dann keimen die Samen schnell. Sobald die Pflänzchen etwa 4 Blätter haben, pikirt man sie einzeln in Stecklingstöpfchen und verpflanzt in allmählig grössere Töpfe, sobald sie sich stark bewurzelt haben. Je öfter man verpflanzt, desto schneller kommt man zum Ziele. Als bewährte Erdmischung zur F.-Cultur in Töpfen empfehlen wir $\frac{1}{3}$ sandige Haide-, $\frac{1}{3}$ alte Laub- oder Mistbeet- und $\frac{1}{3}$ Gartenerde. Durch Zusatz von animalischen oder chemischen Düngstoffen lassen sich leicht Schaupflanzen erzielen. Wichtig ist noch das Auskneifen überflüssiger

Triebe und ein sorgsames Aufbinden der Pflanzen. Im Sommer wird reichlich, im Winter sehr wenig gegossen. Im Freien verlangen die *F.* schattige und gegen Wind geschützte Lage. Ihr hoher Werth als Marktpflanzen und für Bouquets ist bekannt.

Auch unter den anderen Species sind viele schöne, welche in obiger Weise cultivirt, leicht im ersten Jahre dankbar blühende Sämlinge geben, wir erwähnen besonders *F. boliviana*, *coccinea*, *fulgens*, *globosa*, *gracilis*, *microphylla*, *procumbens* und *serratifolia*.

Gesneriaceen.

223. Die Pflanzen aus dieser Familie gehören entweder in das temperirte oder in das Warmhaus; man kann sie jedoch auch im warmen, resp. heizbaren Mistbeet cultiviren. Die Anzucht aus Samen ist nicht bei allen Gattungen möglich und bei denjenigen, welche Schuppenknöllchen bilden, schwieriger als bei den übrigen mit starken, rundlichen Knollen. Am dankbarsten ist die Aussaat für Gloxinien, welche innerhalb 6 Monate aus dem Samen zur vollen Blüthe gebracht werden können. Diese Gattung ist in dem letzten Jahrzehnt in Bezug auf Mannigfaltigkeit der herrlichsten Blüthenfärbungen, Grösse und gute Form der Blumen, aber auch hinsichtlich des Baues der Pflanzen zu einer grossen Vollkommenheit gebracht worden. Wir denken dabei besonders an die jetzt so verbreitete „*crassifolia*“-Rasse und die zartgefärbten und fein punktirten französischen Gloxinien. Man darf behaupten, dass eine Prise Samen genügt, um sich eine Sammlung dieser schönen Hybriden heranzuziehen.

Sämmtliche Gesneriaceen haben äusserst feinen Samen und müssen nach §. 208 S. 316 ausgesät werden. Sandige Haideerde zur Hälfte mit bester Lauberde und etwas Holzkohle vermischt, sagt ihnen vortrefflich zu. Die Bedeckung des Saatgefässes mit einer Glastafel oder Glasglocke ist angebracht. Das Giessen muss äusserst vorsichtig geschehen; es genügt sogar, das Saatgefäss, wenn nothwendig, eine kurze Zeit lang in einen, mit lauwarmen Wasser gefüllten Untersatz zu stellen. Der Aufgang erfolgt 10 bis 12 Tage nach der Aussaat. Sobald sich die Pflänzchen mit der Pincette fassen lassen, pikirt man sie in flache Samenschalen und giebt ihnen $1\frac{1}{2}$ —2 cm Entfernung nach jeder Richtung. Nach wenigen Wochen sind die Pikirschalen vollständig mit den schnellwachsenden Pflanzen bedeckt, dann ist es an der Zeit, sie einzeln

in möglichst kleine, 5--7 cm weite Töpfe zu bringen. Aus diesen werden die Sämlinge, nachdem sie gut durchgewurzelt sind, in grosse, 12—15 cm weite Töpfe verpflanzt, wobei es sehr wichtig ist, sie nur leicht anzudrücken. Die Töpfe werden so weit auseinander gestellt, dass sich die Blätter nicht berühren; die Pflanzen entwickeln sich dadurch schöner, und es kann sich nicht so leicht Fäulniss bilden. Diese entsteht häufig auch dann, wenn beim Giessen Wasser an die Blätter kommt, was sorgsam zu verhüten ist. Jedes angefaltete Blatt muss schleunigst entfernt werden. Die Pflanzen verlangen fortwährend feuchte Wärme; man darf mit dem Giessen nicht nachlassen, bis der Flor vorüber ist. Dieser hält übrigens länger an, wenn man die Töpfe gleich beim Beginn in einen mässiger warmen, halbschattigen Raum bringt. Nach dem Flor lässt man allmählig mit dem Giessen nach und hört damit ganz auf, wenn die Blütenstiele vertrocknet sind; dann müssen die Pflanzen in einen ganz trocknen Raum kommen. Die Knollen bleiben am besten bis zum Frühjahr in ihren Töpfen, werden dann herausgenommen, von den alten Wurzeln vorsichtig befreit, um wieder in grosse Töpfe gepflanzt zu werden. Im warmen Raume beginnen sie nach 2—3 Wochen wieder kräftig zu treiben. Will man Exemplare von sehr grossen Dimensionen erzielen, so kann man dies auch durch Giessen mit Düngwasser erreichen, was jedoch einzustellen ist, sobald sich Knospen zeigen. Die hochwachsenden Gattungen der *G.* müssen an Stäbchen aufgebunden werden. Vom Ungeziefer befreit man die Pflanzen leicht durch Bespritzen mit Tabakwasser oder Bestreuen mit Tabakstaub. Schwieriger ist die rothe Spinne zu bekämpfen, welche sich namentlich an Gloxinien zeigt, wenn die Pflanzen zu trocken standen. Die davon befallenen Exemplare entferne man sofort von den gesunden, bringe sie möglichst dunkel in ein geschlossenes Mistbeet und wende Tabak oder Schwefelblüthe dagegen an; sie dürfen aber später nur allmählig dem vollen Licht wieder ausgesetzt werden.

Gloxinien säet man in den ersten Tagen des Februar, die meisten übrigen Gesneriaceen, z. B. *Naegelia*, *Tydaea*, *Gesneria*, würden jedoch im ersten Jahre nur ärmlich blühen; man thut daher besser, sie zweijährig zu behandeln. Es genügt dann, wenn man im März oder April aussäet.

Die Aussaat der wichtigsten Haideerdepflanzen.

224. **Azalea.** In ganz gleicher Weise wie bei den Rhododendron (228) geschieht die Aussaat der A. Für A. pontica und mollis gilt ebenfalls, was wir über die harten Rhododendron-Sorten sagten. Es ist nur zu bemerken, dass die Sämlinge der A. weit schneller als bei jenen wachsen und bereits als zweijährige Pflanzen, einzeln in Töpfe gepflanzt, als Unterlage zu benutzen sind. Sehr dankbar ist bei den A. ausserdem die Aussaat, wenn man Neuheiten ziehen will. Die Sämlinge kommen bei guter Pflege im 2. spätestens 3. Jahre zur Blüthe, und wenn auch nicht immer neue Varietäten auftreten, welche die in grosser Vollendung bereits vorhandenen überbieten, so wird man doch nur wenig Pflanzen ausrangiren müssen, welche dann noch zur Veredelung verwendet werden. A. indica kann man auch im Herbst säen, doch ist die Frühjahrssaat vorzuziehen. Die Sämlinge sind nach dem ersten Pikiren noch recht warm, erst kurz vor dem zweiten, im Sommer stattfindenden, etwas kühler zu stellen. Dieses zweite Pikiren geschieht, mit 6—8 cm Abstand der Pflänzchen in Saatkästen, vortheilhafter jedoch in ein im Gewächshaus hergestelltes Haideerde-Beet, welches mit Glas bedeckt werden kann, da die Sämlinge, so lange die Bewurzelung vor sich geht, geschlossen stehen müssen und erst später durch allmähliches Lüften und nachher gänzliches Abnehmen der Fenster abzuhärten sind. Wenn die Pflanzen soweit sind, dass sie einander beengen, so kommen sie einzeln in Töpfe, in welchen sie blühen oder veredelt werden.

225. **Camellien.** Man sät Camellien ebenfalls nur, um entweder Unterlagen für die Veredelungen oder um neue Varietäten zu gewinnen. Der Samen büsst bald an seiner Keimfähigkeit ein; schon wenn er 6—8 Monate alt ist, braucht er eine Keimzeit von einem Jahre und länger (falls er überhaupt noch aufgeht). Man muss daher gleich nach der Reife säen und zwar in einem warmen Beet und in klare Haideerde, welche vortheilhaft mit feuchtem Moos zu bedecken ist. Dann zeigen sich die Pflänzchen schon nach einem Monat. Dieselben werden pikirt, sobald sie 4 oder 5 Blätter haben, dann einzeln oder zu mehreren erst in kleine, später grössere Töpfe gepflanzt, je nach dem Zwecke, welchen sie erfüllen sollen. Im dritten Jahre sind die Sämlinge stark genug, um als Wildlinge zum Veredeln zu dienen, während die zum Blühen bestimmten nicht vor dem 4. oder 5. Jahre die ersten Blumen zeigen.

226. **Epacris.** Einer der erfolgreichsten, jetzt leider so seltenen Spezialisten dieser herrlichen Pflanzen, Herr Obergärtner Herrmann in Wachenheim, hatte die Güte, uns über die Zucht der *Epacris* aus Samen folgendes zu schreiben:

Im Februar säe ich in flache Terrinen auf sandige Haideerde und bedecke den Samen schwach mit derselben Erde, jedoch fein gesiebt. Diese Saatteller stelle ich im Vermehrungshaus geschlossen unter Glas bis zum Aufgang, welcher in 3—4 Wochen erfolgt. Da das Begiessen von oben leicht schadet, stelle ich die Terrinen bis dahin in Untersatteller, die, wenn nöthig, mit Wasser gefüllt werden. Nach dem Aufgang bringe ich dieselben frei in's Haus dicht unter Glas. Im Mai, sobald die Pflänzchen greifbar, etwa 1—2 cm hoch sind, werden dieselben in obige Erde in Terrinen oder Kästchen pikirt und unter Glas geschlossen gestellt. Nach 2—3 Wochen sind sie angewachsen und müssen nun, damit sie nicht geil werden, wieder frei in's Haus dicht unter Glas gestellt und bei Sonne beschattet werden. Hier bleiben sie bis zur vollständigen Bewurzelung, etwa 1 Monat, dann stelle ich sie schattig und gegen Regen geschützt in das Freie. Ein zweites Pikiren, etwa im September, ist nur dann nöthig, wenn sie zu dicht stehen. Bei aufmerksamer Behandlung gedeihen sie im Freien sehr gut, und es werden, sobald sie über 6 cm hoch, die Spitzen eingekneipt, um buschige Pflanzen zu ziehen. Im October beim Einwintern bringe ich sie dicht unter Glas des Gewächshauses. Im Februar pflanze ich sie einzeln in Töpfchen und stelle sie, bis sie angewachsen sind, in das Warmhaus, worin sie etwa 4 Wochen bleiben. Beim Ausräumen im halben Mai bringe ich sie an einen Ort, wo sie den Sommer über gegen starke Sonne und Regen geschützt werden können. Sind die Pflanzen in den Töpfchen stark bewurzelt, so werden sie in grössere Töpfe gepflanzt, jedoch nicht nach September oder vor März, da sie sich in dieser Zeit schlecht bewurzeln. Einjährige Sämlinge haben nun, wenn sie zur Zeit eingeschnitten wurden, mehrere Triebe 10—15 cm hoch, zweijährige 30—40 cm, welche zum grossen Theil schon etwas Blüthe bringen. Von jetzt ab werden die Triebe nur einmal jährlich, sogleich nach der Blüthe, zurückgeschnitten. Zweijährige Sämlinge lassen sich zu Prachtpflanzen ziehen, wenn man sie den Sommer über in ein mit reiner Haideerde präparirtes Beet auspflanzt. Dieselben werden jedoch gewöhnlich nicht so alt, wie die immer in Töpfe cultivirten. Mit 3 Jahren sind die Pflanzen vollkommen ausgebildet

und liefern vom Januar bis April einen sehr reichen und durch ihre zarten Farben, vom reinsten weiss bis zum tiefsten roth übergehend, herrlichen Flor. Die Blumen der *E. hybrida* dürfen nicht hängen, sie müssen geradeaus stehen und entweder gross oder langröhrig sein. Die Keimkraft des Samens hält sich 5—8 Jahre. Die *E.* lassen sich aus Samen leicht in Massen ziehen, sind nicht so empfindlich wie die meisten Haidesorten und liefern einen sicheren Flor.

227. Erica. Das für die *Epacris*-Anzucht und Cultur Gesagte, lässt sich in allen Theilen auf die ihnen so nahestehenden *Erica* anwenden. Leider geben diese in Europa äusserst selten Samen, und man ist auf den vom Cap bezogenen angewiesen, welcher nie voll aufgeht. Die *Erica* sind noch härter als die *Epacris*; bei dem Aufenthalt im Freien während des Sommers setzt man sie der vollen Sonne aus und giesst reichlich; auch kann man die Pflanzen nach dem Flor bis auf das alte Holz zurückschneiden.

Die Ueberwinterung beider Haidegattungen geschieht am besten im Kalthause, bei wenigen Graden über Gefrierpunkt; die Pflanzen müssen ganz hell gestellt, so oft wie möglich gelüftet, dürfen jedoch nur ganz wenig begossen werden. Es ist ein berechtigter Wunsch, dass diese dankbaren, fast das ganze Jahr hindurch blühenden Pflanzen wieder mehr in Aufnahme kommen möchten.

228. Rhododendron. Die Aussaat ist zwar die langsamste Vermehrungsweise der *Rh.*, wird aber zur Heranzucht von Unterlagen vielfach angewendet, da sie die kräftigsten, sowie zur Veredelung tauglichsten Pflanzen liefert, ferner ist sie der einzige Weg, um neue Sorten zu erzielen, auch manche Arten wurzelecht zu vermehren.

Man säet vom April bis Mai im Gewächshaus, am besten in Terrinen genau nach §. 208 S. 316, und zwar in reine Haideerde und indem man durch Belegen des Bodens mit Topfscherben, Kohlen u. dergl. eine wenigstens fingerdicke Schicht herstellt, welche den Wasserabzug bewirkt. Je höher die Temperatur ist, welcher die Saatgefässe bis zum Aufgang ausgesetzt sind, desto besser. Dieselben werden regelmässig feucht gehalten; wenn die Sämlinge ungefähr 4 Blättchen haben, schreitet man zum ersten Pikiren; man nimmt hierzu wieder Terrinen oder besser hölzerne Saatkästen, giebt ihnen dabei die gleiche Erde wie vorher und eine Abstandsweite von 1—1½ cm und giesst nach Bedarf weiter mit sehr feiner Brause. Sind die Pflänzchen bewurzelt, so können sie schon etwas kühler zu

stehen kommen. Ein weiteres Pikiren wird für die Rh. erst im folgenden Jahre nöthig werden; es kann dies für die härteren Gattungen, Rh. ponticum z. B., mit Vortheil im Freien geschehen, wenn man über ein sehr schattig liegendes Haideerde-Beet verfügt. Im dritten Jahre nochmals verpflanzt, wird der grösste Theil dieser Sämlinge stark genug zum Veredeln sein; die schwächeren bleiben für später zurück. Die edlen Sorten werden bei uns meistens unter Glas cultivirt; als ein praktisches Verfahren hat es sich dabei bewährt in Töpfe, je 40—50 Pflänzchen per Topf, zu pikiren. Geschieht dies, so kann man sie mit grossem Nutzen während der schönen Jahreszeit im Freien ohne Gefahr schattig aufstellen, da sie bei Unwetter leicht zu transportiren sind. Die jungen Rh. fürchten grosse Kälte und schroffen Temperaturwechsel.

In derselben Weise wie bei den harten Rh. verfährt man mit der Aussaat der Gattungen *Clethra*, *Gaultheria*, *Kalmia*, *Vaccinium*.

Orchideen (tropische).

229. Die Aussaat dieser äusserst feinen Samen kann auf zweierlei Art geschehen. Entweder man nimmt 20—30 cm lange und 8—10 cm hohe Torfstücke, welche man allmählig sich ganz mit Wasser vollsaugen lässt und streut dann den Samen auf die Oberfläche. Oder man zerkleinert Torfstücke, vermischt sie mit zerhacktem Torfmoos (*Sphagnum*), befeuchtet beides, füllt damit flache Kästen oder Näpfe, bringt den Samen oben auf und bedeckt mit einer Glasscheibe, so dass etwas Zwischenraum bleibt. Auch säet man mit Erfolg auf die Oberfläche eines Gefässes, in welchem bereits eine entsprechende Orchidee gut gedeiht oder auch auf die Stämme von Baumfarren.

Gleichmässige ununterbrochene Feuchtigkeit und Wärme von 16—20 ° R. ist zum Keimen unerlässlich. Die Befeuchtung darf durchaus nicht von oben, sondern muss unbedingt durch Einsaugen des Wassers von unten geschehen, da selbst beim vorsichtigsten Bespritzen von oben der Samen hinweggeschwemmt wird.

Einige Arten, wie *Cattleya*, *Coelogyne*, *Cypripedium*, *Maxillaria*, *Phalaenopsis* keimen nach wenigen Monaten, andere liegen bisweilen länger als ein Jahr. Die jungen Sämlinge erscheinen als kleine, fleischige Knöllchen bis zu Linsengrösse. Meistens gehen, bevor die wirklichen Orchideensamen keimen, auf den Torfstücken und dem Moos noch andere Pflanzen, wie Farne und Erica, auf,

welche man nicht durch Ausrupfen entfernen darf, da sonst die wirklichen Keimlinge gestört werden.

Man lasse die Sämlinge 1—2 Jahre an dem Orte, wo sie ausgesät wurden und pikire sie dann in die obengenannte Erdmischung, welcher auf der Oberfläche etwas feingesiebte Haideerde beizugeben ist. Für die weitere Cultur müssen wir bei dieser Familie, deren Gattungen je nach ihrer Heimath eine verschiedene und in vielen Fällen schwierige Behandlung verlangen, von der Angabe allgemeiner Regeln absehen.

Palmen, Cycadeen und Pandaneen.

230. Die Samen dieser Familie sind für uns am zweckmässigsten in schnell- und langsamkeimende einzutheilen. Erstere, theils klein-, theils mittelgroschkörnige Species, beanspruchen eine Keimzeit von 3—4 Wochen, letztere, welche die groschkörnigen und eine Reihe mittelgroschkörniger Sorten umfassen, verlangen 3—12 Monate zum Aufgehen. Daraus erhellt, dass das Gelingen der Aussaat für letztere Gruppe oft recht schwierig ist, da die Samen während dieser langen Zeit in den zu ihrem Keimen nöthigen Bedingungen ununterbrochen unterhalten werden müssen. Die darauf verwendete Mühe wird natürlich nur dann gelohnt, wenn man wirklich guten Samen aussät; wir rathen daher dringend, vor der Aussaat einige Körner anzuschneiden, den Keim blozulegen und sich von seiner Frische Rechenschaft zu geben. Findet man den Keim gelblich grün, glatt anliegend, so besitzt er volle Keimkraft, erscheint er dagegen braun oder schwarz und vertrocknet, so ist er werthlos. Dazwischen giebt es, wir möchten sagen, mittelmässige Qualitäten von Samen, die ein entsprechendes Resultat erwarten lassen und unter den seltenen Species sind viele, bei welchen man sich hiermit begnügen muss, weil die Samen angesichts der Entfernungen, welche sie zurücklegen, der verschiedenen Zonen, die sie passiren, uns kaum in einem besseren Zustande erreichen können.

Alle hierher gehörenden Samen müssen sehr warm ausgesät werden; es giebt zwar einige europäische Palmen, z. B. Phönix, welche sogar im Zimmer leicht zum Keimen zu bringen sind, aber selbst diese gedeihen bei Anwendung von Wärme doch weit besser. Diese Wärme muss dem Samen bis zum Aufgang ohne Unterbrechung zu Theil werden, auch den Kalthaus- und Zimmerpalmen, mit deren Abhärtung man am besten erst beginnt, wenn die Pflan-

zen, einzeln in Töpfen stehend, eine gewisse Widerstandskraft erlangt haben. Ausser Wärme verlangen die Aussaaten dauernde Feuchtigkeit, sowie schattige Lage. Man säet im Warmhaus oder warmen Mistbeet, in Töpfe, Terrinen, oder, bei grossen Quantitäten, in ein im Warmhaus hergestelltes Saatbeet, auch wohl direct in sehr warme, hierzu besonders vorbereitete Mistbeete. Holzkästen wendet man ebenfalls vielfach an, vermeidet sie aber für Samen von langer Keimzeit, weil sie dabei sehr leiden oder durch die fortwährende Feuchtigkeit ganz faulen. Man verwendet dazu reine sandige Haideerde, aber auch reinen Sand und Sägespäne und Torfmull. In der Jugend gedeihen diese Pflanzen sehr gut in reiner Haideerde. Die Samen selbst können dicht aneinander liegen. Die Sorten mit langer Keimzeit keimen ganz unregelmässig, es giebt dabei solche, bei deren Aussaat einige Pflanzen nach einigen Monaten, die letzten aber zuweilen erst nach 18 Monaten sich zeigen. Bei diesen entfernt man die gekeimten Samen, sobald sie das erste Blatt zeigen und pflanzt sie in einzelne kleine Töpfe ziemlich tief ein. Die Palmen nutzen die ihnen zugeführte Erde schnell ab, ein öfteres Verpflanzen ist ihnen daher sehr zuträglich. Bei der späteren Entwicklung verwendet man die Haideerde nicht mehr allein, sondern mit etwas lehmiger Gartenerde vermischt, oder auch eine Mischung von letzterer mit guter Laub- und etwas Moorerde. Nach jedem Umpflanzen ist es rathsam, die Töpfe eine Zeit lang auf warmen Fuss zu bringen, die Zimmerpalmen bringt man am liebsten in das Mistbeet und gräbt die Töpfe bis zur halben Höhe ein. Solche Pflanzen scheinen sich besonders gut in oder auf Gerberlohe zu befinden, wenigstens wird diese in Belgien, wo die Palmen-cultur auf einer hohen Stufe steht, fast ausschliesslich verwendet. Die Palmen verlangen reichlich Wasser, besonders in den warmen Monaten, während man im Winter sparsam giessen muss. Auch ein regelmässiges Ueberbrausen der Pflanzen, sowie zeitweiliges Waschen der Blätter mit weichem Schwamm, ist unerlässlich und schützt gegen Ungeziefer. Stellt sich dieses (Blatt- und Schildläuse) dennoch ein, so entfernt man es dadurch, dass man die Blätter mit schwarzer Seife abwäscht.

Alle Cycadeen und Pandaneen haben grosse Samen und brauchen wenigstens 4—6 Wochen zum Aufgehen. In den einzelnen Pandanus-Früchten finden sich stets mehrere (4—6) Keime; daher kommt es, dass die Pflänzchen büschelweise erscheinen.

Pelargonium, Geranium (*Geraniaceae*). 2 t

231. Die zahlreichen neuen Varietäten dieser Pflanzen, welche alljährlich in den Handel kommen, beweisen am besten, wie dankbar die Aussaat der P. ist. Hierzu kommt das einfache Verfahren und die Raschheit, mit welcher die Sämlinge zur Blüthe gelangen. — Man säet im März-April oder auch Juli-August mit geringer Bedeckung des Samens, welchen man von seiner Umhüllung vorher befreit, in gut verrottete, sandige Haide- mit Mistbeeterde gemischt, welche in der oberen Hälfte der Saatgefässe feingesiebt angewendet wird. Als solche werden Terrinen oder Töpfe gewählt, welche möglichst hell, aber bei Sonnenbrand beschattet, in ein Warmhaus oder warmes Mistbeet, in der schönen Jahreszeit aber ebenso gut mit einer Glasscheibe bedeckt, in ein Zimmer oder in das Freie kommen können und regelmässig bespritzt werden. Der Samen keimt meist nach 14 Tagen und hat man nach dem Aufgang sehr prompt für ein Abhärten der Pflänzchen durch allmähliches Lüften zu sorgen. Man pikirt die Sämlinge, sobald sie 3—4 Blätter haben, sofort einzeln in Stecklingstöpfe wieder in dieselbe Erdmischung und hält sie bis zur Bewurzelung unter Luftabschluss. Beim späteren Verpflanzen in wenig grössere Töpfe, verwendet man hauptsächlich Mistbeet- mit geringem Zusatz von Haideerde und von sehr wenig Sand. Nachdem sich das 5. und 6. Blatt entwickelt hat, entspitzt man die Pflanzen, damit sie sich verzweigen, eine Operation, welche zu wiederholen ist, bis man schönbuschige Exemplare hat.

Man findet P., namentlich die Zonal- oder Scarlet-P., wohl in jedem Garten; dies spricht deutlich für die Anspruchslosigkeit dieser nützlichen Pflanzen. Sie verlangen Luft, Licht und trockenen Standort, während der Vegetation mässige Feuchtigkeit, und bei Topfcultur verhältnissmässig kleine Töpfe. Sie sind leicht in hellen Mistbeetkästen, Zimmern oder Kalthäusern zu überwintern und ist es gut, wenn sie hierbei nicht über 2—6 ° R. erhalten, damit sie nicht zu früh wieder austreiben. Zum Auspflanzen in das Freie, Beete und Gruppen aller Art verwendet man die grün-, weiss- und buntblättrigen, einfach- und gefülltblühenden (diese blühen, aus verlässlichem Samen gezogen, etwa zur Hälfte gefüllt) Zonal-P., welche in jedem nahrhaften, durchlassenden Gartenboden, am besten in recht sonniger Lage gedeihen; sie kommen im Juni heraus und im October wieder unter Glas. Die aus dem Lande mit Ballen ausgehobenen werden von den Blättern befreit, trocken und frostfrei durchwintert

und im Frühjahr zum Antreiben wieder in Töpfe gebracht. Bei denen, welche in Töpfen cultivirt waren, kann man leicht durch mässiges Giessen in einer Temperatur von 8—10 Gr. einen Winterflor erzielen, lässt sie jedoch im Januar und Februar durch Einstellen des Giessens ruhen, schneidet, bevor sie wieder in Vegetation treten, alle Zweige auf 2 Augen zurück und verpflanzt in etwas grössere Töpfe. Als ungemein dankbare Zimmerpflanzen werden die ephenblättrigen, von denen einige Sorten, z. B. *Mad. Crousse*, überaus prächtig für Ampeln sind, und die englischen P. (Odier-, grossblumige, Fancy- etc.) den Scharlach-P. noch vorgezogen. Für die letztere nimmt man wohl auch etwas alten, mürben Lehm in die Erde und verpflanzt sie jährlich zweimal, im Frühjahr und nach der Blüthe, wobei sie in der ersten Woche von der Luft abzuschliessen sind. Nach dem Flor werden sie, um ihnen die buschige, gedrungene Form zu erhalten, geschnitten, indem man alle schwachen Zweige entfernt und die übrigen auf 2 Augen zurückschneidet.

Wasserpflanzen.

232. Eine Reihe von Wasserpflanzen wird vorthellhaft aus Samen erzogen, und wer überhaupt auf die Cultur derselben eingerichtet ist, hat bei der Aussaat nur geringe Schwierigkeiten zu bekämpfen. Der beste Beweis hierfür ist, dass ausfallender Samen dieser Pflanzen häufig von selbst im Wasser keimt. Die Arten: *Alisma*, *Caltha*, *Carex*, *Cyperus*, *Juncus*, *Papyrus*, *Sagittaria*, *Scirpus* werden wie Landpflanzen (in Saatgefässen, feucht und schattig gehalten) ausgesät, und, wenn stark genug, an ihren Bestimmungsort gepflanzt; die, welche bei uns im freien Wasser gedeihen, können auch ebenda gesät werden, während die Gewächshaus-Arten Wasser von etwa 20 ° R. verlangen. Man sät letztere in etwas mit Sand vermischte, nahrhafte, lehmige Gartenerde, und zwar die schwerkörnigen Arten einzeln in Töpfe, die feinsamigen in Terrinen, die in flaches Wasser gestellt werden; es ist gut, wenn sich letzteres mässig bewegt. Der in Terrinen gebrachte, feine Samen wird fest angelrückt und ein wenig mit sandiger Erde bedeckt, die Terrinen, welche Samen von Frei-Wasser-Arten enthalten, kommen 1 cm unter die Oberfläche, die mit Gewächshaus-Arten besäten nur bis zum Rand des Gefässes in das Wasser; der Samen keimt nach wenigen Wochen. In den Terrinen lässt man die Pflänzchen sich soweit entwickeln, dass sie gleich einzeln in Töpfchen pikirt

werden können, welche dann tiefer in das Wasser gestellt werden. Dagegen stellt man die grosskörnigen, einzeln in Töpfe gelegten Samen, welche meist sehr hart sind und lange Zeit zum Keimen brauchen, von vornherein 8—10 cm unter die Oberfläche des Wassers. Die einjährig cultivirten Arten, z. B. *Euryale ferox*, werden im Februar gesäet und im April an Ort und Stelle gebracht; die übrigen säet man so schleimig wie möglich nach der Reife des Samens. Grosse Samen von Wasserpflanzen sind bis zur Aussaat in verkorkten Flaschen in Wasser aufzubewahren.

Es würde uns zu weit führen, auf die Cultur der Wasserpflanzen, welche für die einzelnen Gattungen sehr verschieden ist, näher einzugehen; wir erwähnen nur, dass die meisten, um sich schön zu entfalten, reines Wasser (Regenwasser) und viel, reichlich Düngstoff enthaltende Erde brauchen; wir empfehlen auch zur Weitercultur die oben genannte Mischung, zu welcher bei den Gewächshaus-Arten noch etwas Composterde tritt.

Auf den folgenden Seiten befindet sich eine

Tabellarische Zusammenstellung

einer bedeutenden Anzahl solcher Topfpflanzen, von welchen sich Samen in den Verzeichnissen ziemlich regelmässig angeboten findet und die in den §§. 210 bis 232 noch nicht besprochen wurden. Für die Behandlung aller dieser Samen gilt ausser dem in der ersten Abtheilung (Allgemeines über Aussaaten) Gesagten beziehungsweise dasjenige, was wir in den §§. 207 bis 209 mitgetheilt haben. — Wenn in der Rubrik „Besondere Bemerkungen“ keine Erdart angegeben ist, darf man annehmen, dass die betreffenden Pflanzen in der für die Aussaat vorgeschriebenen Erde weiter cultivirt werden. — Bei den Colonnen 11, 12 und 13 haben wir die climatischen Verhältnisse Mitteld Deutschlands zu Grunde gelegt; für südliche Climaten würden diese Colonnen in manchen Fällen hier nicht richtig ausgefüllt sein. — Zuweilen finden sich von den Colonnen 3, 4 und 5 mehrere ausgefüllt, in solchen Fällen kann die betreffende Gattung in beiden Gewächshäusern, z. B. im kalten und temperirten, cultivirt werden oder sie enthält den verschiedenen Häusern angehörende Species. Die in der Tabelle enthaltenen Gattungen werden sowohl nach Col. 9 wie 10 ausgesäet werden können, wir haben diejenige Erdart bezeichnet, welche den Samen nach unsern Erfahrungen am schnellsten zum Keimen bringt.

Namen.	Familie.	Kalthauspflanze.	Warmhauspflanze.	Pflanze für temperiertes Haus.	Zwiebel- oder Knollenbildend.	Schlingpflanze.	Wohlfriehend.	Aussaat:	
								in Haideerde m. Sand.	in Misch. v. Haideerde, Mischbeete n. Sand.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Abelia floribunda</i> , <i>rupestris</i>	Caprifoliaceae	x					x		x
<i>Abutilon</i>	Malvaceae			x					x
<i>Acacia</i>	Papilionaceae	x						x	
<i>Adansonia digitata</i>	Bombaceae		x					x	
<i>Aeschynanthus</i>	Cyrtandraceae		x			x		x	
<i>Agapanthus umbellatus</i>	Liliaceae	x			K				x
<i>Agave</i>	Amaryllideae	x	x	x				x	
<i>Allamanda</i>	Apocynaceae		x					x	
<i>Aloë</i>	Liliaceae	x	x	x				x	
<i>Amorphophallus Rivieri</i>	Aroideae		x		K			x	
<i>Angelonia grandiflora</i>	Scrophularineae			x			x		x
<i>Anona</i>	Anonaceae		x	x				x	
<i>Anthericum</i> (<i>Phalangium</i>) <i>variegatum</i> .	Asphodeleae	x		x					x
<i>Antigonon leptopus</i>	Polygoneae			x		x		x	
<i>Aphelandra</i>	Acantaceae		x					x	
<i>Aralia</i>	Araliaceae	x	x	x					x
<i>Ardisia</i>	Myrsineae			x				x	
<i>Aristolochia</i>	Aristolochiaceae		x	x		x			x
<i>Arundinaria falcata</i> , <i>japonica</i>	Gramineae	x							x
<i>Asclepias curassavica</i>	Asclepiadeae		x	x					x
<i>Aucuba japonica</i> u. <i>V.</i>	Corneae	x							x
<i>Bambusa aurea</i> , <i>nigra</i>	Gramineae	x		x					x

Eignet sich:				Hauptzierde:			Marktpflanze.	Besondere Bemerkungen.
als Zimmerpflanze.	im Sommer im Freien in Topf aufzustellen.	im Sommer im Freien auszupflanzen.	für Bouquets.	Blatt und ganzer Habitus.	Blüthe.	Frucht.		
11	12	13	14	15	16	17	18	19
x	x		x		x		x	Blühen den ganzen Sommer hindurch.
x	x	x	x	x	x		x	Winterblüher. Lassen sich zurückschneiden und auch zu Hochstämmen ziehen.
x	x	x		x	x		x	Die Sorten mit gefiederten Blättern sind prächtige Gruppenpflanzen. <i>Acaciophanthia</i> u. <i>V.</i> besonders dankbar und rasch aus Samen. Ein grosser Theil Winterblüher. Aussaat sehr lohnend, keimen rasch, aber unregelmässig. Reichlich lüften und im Sommer stark giessen.
				x		x		Verlangt während des oft langsamen Keimens hohe, feuchte Wärme.
x			x		x			Schön für Ampeln. Erdmischung: grobe Haideerdstücke mit Holzkohle. Scherben und Sphagnum. Reichlich giessen. Sehr feinsamig (§. 208, S. 316), Sämlinge blühen nicht vor dem 3. Jahre.
	x	x	x		x		x	Prächtig auf Gruppen und Rasenplätzen. Im Winter fast trocken halten, im Sommer sehr reichlich giessen.
	x			x	x			Prächtige Decorationspflanzen. Besonders schön als Einzelpflanzen, auch in grossen Vasen.
			x		x			Gedeihen am besten, wenn im freien Grund des Hauses ausgepflanzt. Verlangen humusreiche, lockere Erde.
x	x			x	x			Wenig bewässern, besonders sparsam im Winter. Behandlung wie bei Cacteen (§. 214, S. 322).
		x		x				Interessante und schöne Blattpflanze. Sehr schnellwachsend.
								Feinsamig. Anfang Februar nach §. 208 S. 316 aussäen und pikiren. Im März einzeln in kleine, im Mai in grössere Töpfe pflanzen, dann in das Freie, der vollen Sonne ausgesetzt, aber gegen Regen geschützt, aufstellen. Blüht von Mitte Mai bis in den Spätherbst. Auch als Winterblüher verwendbar. Mischung von zwei Drittel sandiger Haide- mit ein Drittel Laub- oder Mistbeerde. Mässig giessen, fault leicht.
						x		Wächst leicht aus Samen. Obstbäume in den Tropen.
x		x		x			x	Vorzüglich für Ampeln, Ständer und zu Decorationszwecken.
			x		x			Die Bergrose mit Trauben rosenrother Blüthen verdient ihrer leichten Cultur wegen Verbreitung.
				x	x		x	Reichlich giessen und häufig besprühen. Während der Ruhezeit etwas kühler halten. Höchst decorativ und treffliche Winterblüher. Sehr feinsamig.
x	x	x		x			x	A. Sieboldi ist eine der besten Zimmerpflanzen. Alte höchst decorativ. Die Samen der A. reifen im März bis Mai und verlieren die Keimkraft sehr bald. Verlangen sehr nährhafte, düngerreiche, dabei poröse Erde und während der Vegetation reichliches Giessen.
x				x	x	x	x	Samen keimt langsam. Aussaat tiefert die schönsten Pflanzen. Mischung von Haide- und bester Mistbeerde; reichlich Wasserabzug. A. crenulata mit corallenrothen Beeren.
					x			In den freien Grund des Hauses ausgepflanzt und an dessen Balken oder Fenstern in die Höhe geleitet, besonders schön. Mit eigenthümlichen, grossen Blüthen. Einige Sorten stark riechend. Lieben recht nährhafte Erde.
	x	x		x				Mächtige, Bambus-ähnliche Gräser. Herrlich in Parkanlagen. Bedarf nur frostfreier Durchwinterung. Frische, nährhafte Gartenerde.
x	x	x	x		x			Im Frühjahr aussäen; im Juni auspflanzen. Sämlinge blühen im Herbst des ersten Jahres. Hält sich im Gewächshaus durchwintert mehrere Jahre, daselbst Winterblüher. Im Sommer reichlich giessen.
x	x			x		x	x	Vortrefflich für Decorationszwecke. Rote Früchte. Samen zu stratificiren.
	x	x		x				Verlangen nur frostfreies Durchwintern. Nährhafte Gartenerde.

N a m e n.	Familie.	Kalthauspflanze.	Warmhauspflanze.	Pflanze für temperiertes Haus.	Zwiebel- oder Knollenbildend.	Schlingpflanze.	Wohlrichend.	Aussaat: in Haideerde mit Sand, in Misch. v. Haideerde, Mischbeerde u. Sand.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Banksia	Proteaceae	x						x	
Bauhinia	Papilionaceae		x			x			x
Beaucarnea	Liliaceae	x	x	x					x
Bertolonia	Melastomaceae		x					x	
Beschorneria	Liliaceae	x		x					x
Bignonia	Bignoniaceae	x	x	x		x			x
Billardiera	Pittosporaeae			x		x			x
Bocconia frutescens	Papaveraceae	x		x					x
Boehmeria	Urticeae		x	x					x
Boronia	Diosmeae	x					x	x	
Bossiaea	Papilionaceae	x		x				x	
Bougainvillea	Nyctagineae		x	x		x		x	
Bouvardia	Rubiaceae	x		x				x	
Brachysema	Papilionaceae	x				x		x	
Calla aethiopica	Aroideae	x	x						x
Callistemon	Myrtaceae	x						x	
Cantua	Polemoniaceae	x							x
Carica Papaya	Cucurbitaceae		x				x		x
Cassia	Papilionaceae	x		x				x	
Centaurea argentea vera (candidissima), Clementei, gymnocarpa	Compositae	x							x
Chironia	Gentianeae	x						x	
Chorizema	Papilionaceae	x						x	
Cineraria acanthifolia, maritima u. V. .	Compositae	x							x

Eignet sich:				Hauptzieder:			18	19	Besondere Bemerkungen.
als Zimmerpflanze.	im Sommer im Freien in Topf aufstellen.	im Sommer im Freien auspflanzen.	für Bouquets.	Blatt und ganzer Habitus.	Blüthe.	Frucht.			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	x			x	x	x			In der Jugend vorsichtig giessen. Im Winter recht hell stellen und so oft es angeht lüften. Kräftige, durchlassende Erde.
				x	x				Schöne Lianen, am besten in den freien Grund des Hauses auspflanzen und an den Trägern ranken lassen, auch nicht rankend zu ziehen.
	x			x					Vergl. Bemerkungen über Agave.
				x					Sehr feinsamig (§. 208, S. 316). Saatgefässe mit gehacktem Sphagnum bedecken. Aussaat sehr dankbar. Wollen recht feuchtwarm stehen.
	x	x		x	x				Vergl. Bemerkungen über Agave.
	x		x		x				In den freien Grund des Hauses pflanzen und an Sparren oder Gittern emporgeleitet. Im Sommer oft spritzen. Nahrhafte Erde. Nach der Blüthe zurückschneiden. Einige Species wohlriechend. B. stans rankt nicht.
x	x				x	x			Im Gewächshaus auspflanzen in gemischte Haide- und Mistbeerde, oder in grosse Töpfe mit reichlichem Wasserabzug. Aussaat dankbar.
		x		x					Aussaat im Frühjahr in warmes Mistbeet. Die Samen liegen oft sehr lange, ehe sie keimen. Schnellwachsende Blattpflanze, einzeln auf Rasen. Sandige Haideerde mit Lehm.
		x		x					Feinsamig. Während des Sommers reichlich bewässern.
x	x				x		x		Dem Licht recht nahe stellen. Junge Pflanzen behufs Verzweigung auskneifen, nach der Blüthe zurückschneiden. Im Winter wenig giessen. Lockere Haideerde. Winterblüher.
x	x			x	x				Winterblüher. Möglichst viel lüften. Haideerde.
			x		x				Im Gewächshaus auspflanzen und emporleiten. Während des Flors stark giessen, geile Zweige kürzen. Jährliches Beschneiden bewirkt kräftigere Blüthenriebe. Am meisten zieren die rothen Bracteen.
x	x	x	x		x		x		Leicht im warmen Mistbeet zu cultiviren. Unter Glas ausgepflanzt dankbarste Schneideblumen. Auskneifen um buschige Pflanzen zu erzielen. B. longiflora sehr wohlriechend, verlangt Warmhaus. B. Jacquini im Winter trocken. Winterblüher. Haideerde oder auch Lauberde mit Lehm.
	x				x				Frühjahrsaussaat dankbar. Blüht im Februar, März.
x	x	x		x	x		x		Verlangt viel Wasser. Auch zur Decoration von Teichen, Bassins der Gewächshäuser etc.
x	x		x	x	x		x		Blühen schon als kleine Pflanzen. Zur Erzielung buschiger Pflanzen öfters entspitzen. Leichte Cultur. Aussaat dankbar. Haide- und Gartenerde gemischt.
x	x	x			x				In Haideerde cultiviren. Sehr schnellwachsend. Können im Kalthaus ausgepflanzt werden.
x	x	x			x	x			Verlangt viel Wärme. In Lehm mit etwas Lauberde vermischt cultiviren. Officinell.
	x	x	x	x	x		x		Keimen leicht bei hoher Wärme. Sehr dankbare Blüher, schnellwachsend, im Sommer und Herbst nicht im Gewächshaus lassen. Düngerreiche Garten- oder Lauberde. Nach der Blüthe zurückschneiden.
x	x	x			x				Schöne weissblättrige Pflanzen für Gruppen auf Parterres, Rasen etc. Bequemen sich mit jedem nicht sterilen Boden. Herbstaussaat dankbar. Sämlinge bald einzeln in Stecklingstöpfchen bringen. Auch im Sommer nur mässig feucht halten.
	x				x				Einige Arten blühen sehr reich. Verlangen im Winter hellen Standort und vorsichtiges Giessen.
x	x				x				Samen keimt unregelmässig. Zurückschneiden nach der Blüthe zur Erziehung buschiger Pflanzen nothwendig. Aussaat sehr dankbar. Alle Pflanzen werden unschön.
x	x	x		x					Feinsamig. Aussaat Mai—Juni oder Februar—März. Letztere liefert bei baldigem Pikiren in Töpfe schon im ersten Jahre verwendbare Pflanzen. Für Teppichgärtnerei.

N a m e n.	Familie.	Kalthauspflanze.	Warmhauspflanze.	Pflanze für temperiertes Haus.	Zwiebel- oder Knollenbildend.	Schlingpflanze.	Wohlfriechend.	Aussaat:	
								in Haideerde mit Sand.	in Misch. v. Haideerde, Mistbeeteerde u. Sand.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cissus	Ampelideae	x	x			x		x	
Citrus Aurantium, Bigaradia, Limonium, sinensis etc.)	Aurantiaceae	x					x		x
Clerodendron	Verbenaceae		x	x					x
Rollissoni, Thomsonae	"		x	x		x			x
Clanthus Dampieri	Papilionaceae			x				x	
magnificus, puniceus	"	x						x	
Clitoria	"		x	x		x		x	
Clivia (Imantophyllum)	Amaryllideae		x	x			x		x
Coffea arabica, liberica	Rubiaceae		x						x
Combretum	Combretaceae		x			x			x
Conoclinium (Hebeclinium)	Compositae		x						x
Convolvulus mauritanicus	Convolvulaceae	x				x			x
Correa	Rutaceae	x						x	
Crassula	Crassulaceae	x					x		x
Crinum	Amaryllideae		x	x	Z		x		x
Crotalaria	Papilionaceae	x		x					x
Croton	Euphorbiaceae		x					x	
Cryptostegia	Aselepiadeae		x			x		x	
Cuphea Galeottiana, Roezli	Salicariaceae		x	x					x
Cyperus alternifolius n. V.	Cyperaceae		x						x
Papyrus	"		x						x

Eignet sich:				Hauptzierde:			Marktpflanze.	Besondere Bemerkungen.
als Zimmerpflanze.	im Sommer im Freien in Töpf. aufzustellen.	im Sommer im Freien auszupflanzen.	für Bouquets.	Blatt und ganzer Habitus.	Blüthe.	Frucht.		
11	12	13	14	15	16	17	18	19
x				x				Samen keimt sehr langsam. Herrliche Schlingpflanzen der warmen Zimmer oder Gewächshäuser. Vor Ungeziefer auf der Hut sein.
x	x		x		x	x	x	Aussaat nur gebräuchlich, um Unterlagen für die edleren Sorten zu erhalten. Samen keimt langsam. Junge Topfpflanzen sind treffliche Marktpflanzen.
x			x	x	x			Im Sommer reichlich giessen und durch häufiges Spritzen gegen Insecten schützen. Durch Auspflanzen im Gewächshaus erzielt man besonders schöne Exemplare. Im Ruhezustand nach der Blüthe mässig trocken halten.
x			x		x			
								Sehr geeignet zur Bekleidung von Gewächshaussäulen etc.
x	x	x	x		x			Aussaatgefässe auf warmen Grund stellen. Einzeln in Töpfchen säen oder doch nach dem Aufgang sofort einzeln in solche pflanzen und nahe dem Licht aufstellen. Wenn durchgewurzelt wieder verpflanzen, sonnig und luftig halten. Weil von einander ausgepflanzt in eine Mischung von Haide- mit Compost- oder Moorerde, wobei guter Wasserabzug nöthig ist, erreicht C. D. grosse Dimensionen. Vorsicht beim Giessen, damit der Stamm nicht benässt wird. Durch Veredelung auf Cl. puniceus erzielt man sehr schöne und weniger empfindliche Pflanzen.
x	x	x	x		x		x	Beide von leichter Cultur. Winterblüher, nachdem die jungen Pflanzen im Sommer im Lande erstarkt sind. Blühen schon im 1. Jahre nach der Saat.
		x	x		x			Anzucht aus Samen leicht; derselbe keimt unregelmässig. Beim Verpflanzen Wurzeln schonen. Im Sommer lüften, spritzen, schattiren. Im Winter Standort dicht am Licht.
x			x	x	x		x	Vergl. Amaryllis S. 318. Zimmerpflanzen und Winterblüher. Darf nie absterben.
x				x			x	Keimen, wenn gleich nach der Reife gesät, schnell, sonst hohe Wärme erforderlich. Hell und luftig stellen, häufig spritzen, im Frühjahr reichlich giessen. Bekommen leicht Schild- und Wollläuse.
			x		x			In den freien Grund des Hauses auspflanzen. Leiden leicht durch Ungeziefer, verlangen daher viel Luft und häufiges Spritzen. Zuweilen mit flüssigem Dünger giessen. C. grandiflorum rankt nicht.
x				x	x			Sehr feinsamig. Jung öfters verpflanzen, im Sommer reichlich giessen. C. janthinum für Jardinières geeignet.
x	x	x			x		x	Aussaat sehr dankbar. Schön für Ampeln, sowie zum Auspflanzen auf Felsenbeete.
x	x		x		x		x	Vorsichtig giessen, im Sommer täglich spritzen, um sie vor Ungeziefer zu schützen. Warmer Standort im Winter nahe dem Licht beschleunigt das Blühen. Oefters auskneifen. Winterblüher.
x	x			x	x		x	Sehr feinsamig. Für Felsenpartien in Wintergärten. Lieben volle Sonne, fürchten Nässe, sehr wenig giessen.
x			x		x			Bedürfen in der Vegetationszeit vieler Wärme, Feuchtigkeit und Luft. In der Ruhezeit kühler und nicht ganz trockener Standort. Aussaat und Cultur vergl. S. 318.
	x				x			Luftig und sonnig aufstellen. Blüht ausgepflanzt am schönsten.
				x				Samen keimen meist langsam. Verlangen feuchte, hohe Wärme. Durch häufiges Spritzen gegen Insecten schützen.
					x			Gedeihen besonders gut, wenn im Gewächshaus ausgepflanzt und an Säulen, Balken etc. geleitet.
x	x	x	x		x			Winterblüher.
x				x			x	Trefflich für Aquarien, Jardinières und dergl. Aussaat sehr lohnend.
	x	x		x				Zum Auspflanzen resp. Aufstellen an Teichen etc.

Namen.	Familie.	Kalthauspflanze.	Warmhauspflanze.	Pflanze für temperiertes Haus.	Zwiebel- oder Knollenbildend.	Schlingepflanze.	Wohlräuchernd.	Aussaat:	
								in Haideerde mit Sand.	in Misch. v. Haideerde, Mistbeete u. Sand.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cyrtanthera	Acantaceae		x	x					x
Cytisus	Papilionaceae	x					x		x
Dalechampia	Euphorbiaceae		x					x	
Datura (Brugmansia)	Solaneae			x			x	x	
Daubentonia	Papilionaceae			x				x	
Desmodium Dilleni, gyrans	"			x				x	
Dianella coerulea	Asphodeleae	x							x
Dioclea (Camptosema)	Papilionaceae			x		x		x	
Diosma	Diosmeae	x					x	x	
Diotis candidissima (Santolina)	Compositae	x					x		x
Disemma coccinea	Passifloreae			x		x		x	
Doryanthes	Amaryllideae		x					x	
Dracaena arborea, australis, cannaefolia, congesta, Draco, indivisa, rubra, stricta	Asphodeleae			x					x
übrige (Warmhaus-)	"		x					x	
Echeveria	Crassulaceae	x		x					x
Edwardsia (Sophora)	Papilionaceae	x							x
Eranthemum	Acantaceae		x						x
Eriostemon	Diosmeae	x						x	
Erythrina	Papilionaceae	x	x						x
Escallonia	Saxifrageae	x						x	
Eucalyptus	Myrtaceae	x					x	x	
Eugenia	"	x					x	x	
Euphorbia	Euphorbiaceae		x	x					x
Exacum	Gentianeae	x		x			x	x	

Eignet sich:				Hauptzierde:			Markpflanze.	Besondere Bemerkungen.
als Zimmerpflanze, im Sommer im Freien in Töpfen aufstellen.		im Sommer im Freien auszupflanzen.	für Bouquets.	Blatt und ganzer Habitus.	Blüthe.	Frucht.		
11	12	13	14	15	16	17	18	19
x	x				x			Durch Zurückschneiden zum leichteren Blühen zu veranlassen. Winterblüher.
x	x	x	x		x		x	Winterblüher. Schmuck der Kalthäuser im Frühjahr.
				x	x			Die mit der Blüthe erscheinenden Bracteen sind die eigentliche Zierde.
		x	x	x	x		x	Im Winter trocken, während der Vegetation sehr feucht halten. Jährlich zurückschneiden. D. arborea schön auf Rasenplätze. D. suaveolens blüht im Herbst und Winter.
x	x				x			Entwickelt sich sehr gut, wenn im Gewächshaus ausgepflanzt. Blühen lange.
				x	x			D. gyrans (Telegraphenpflanze) interessant wegen der Beweglichkeit der Seitenblättchen.
	x	x			x			Eignet sich zum Auspflanzen auf gemischte Beete. Schöne blaue Blumen.
					x			Kann zur Bekleidung grosser Flächen dienen. Für kleine Spaliere.
x	x		x	x	x		x	Verlangen viel Licht, Luft und Wasser, sowie häufiges Zurückschneiden.
x	x	x		x				Süßerblättrige Teppichbeetpflanze, welche sich jedem Schnitt unterwirft. Liebt trockenen Standort und verlangt helle Ueberwinterung.
		x			x			Kann grössere Flächen bedecken. Gedeiht auch in gutem Gartenboden.
x	x	x		x	x			Stirbt nach der Blüthe, wie die Agaven.
x	x			x			x	Bekannte, sehr dankbare, schönblättrige Zimmerpflanzen, die zum Theil als Cordylone bezeichnet werden. Verlangen Halbschatten. Die Anzucht wird sehr erfolgreich in warmen resp. heizbaren Mistbeeten im Grossen betrieben. Aussaat sehr lohnend. Nach zweimaligem Pikiren einzeln in Töpfchen bringen.
x				x			x	
x	x			x	x		x	Sehr feinsamig. Fast alle Winterblüher und viele zur Teppichgärtnerei verwendbar. Während der Ruhezeit recht trocken halten. Blätter nicht waschen. Einige E., z. B. pulverulenta, sind empfindlich.
	x			x				Pflanzen mit feingefiederten Blättern.
x	x	x			x			Blühen im Winter und sind wie Aphelandra zu behandeln.
x	x		x	x	x			Winterblüher. Viel Luft, Licht und Wasser geben.
		x	x		x			Viele Sorten blühen ausgepflanzt im Freien, wo man herrliche Gruppen daraus herstellt, sie verlangen dann ein gutes Mistlager, viel Humus und reichliches Gießen. Die Sorten mit knollenartigen kurzen Stämmen sind wie die Knollen der Dahlien zu überwintern.
x	x	x			x		x	Dankbar blühend. Hübsche Grünpflanzen.
	x	x		x				Im Februar oder Herbst und zwar nicht zu dicht säen. Zur Weitercultivirung kräftigere Erde nehmen. Erstauulich schnellwachsend.
x	x		x	x	x		x	Samen liegt lange, ehe er keimt. Vortheilhaft im Gewächshaus auszupflanzen. Zurückschneiden.
x	x		x		x			Samen keimen unregelmässig. Prächtig, zum Theil im Winter blühend. Nach dem Flor zurückschneiden. Einige cactusartig, E. splendens Zimmerpflanze.
	x				x			Feucht und warm halten bis zur Blüthe, dann kühler und schattig stellen und trockener halten. Sehr feinsamig.

N a m e n.	Familie.	Kalthauspflanze.	Warmhauspflanze.	Pflanze für temperirtes Haus.	Zwiebel- oder Knollen-bildend.	Selbstopf-pflanze.	Wohlfriebeend.	Aussaat:	
								in Haideerde mit Sand.	in Misch. v. Haideerde, Mistbeete u. Sand.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Fabricia laevigata</i>	Myrtaceae	x						x	
<i>Ferdinanda eminens</i> (<i>Cosmophyllum</i>) ..	Compositae			x			x		x
<i>Ficus Cooperi</i> , <i>imperialis</i> , <i>Parcelli</i> u. <i>A.</i>	Artocarpeae		x					x	
<i>elastica</i>	„		x					x	
<i>repens</i> , <i>scandens</i>	„	x	x	x		x		x	
<i>Franciscea</i> (<i>Brunfelsia</i>)	Solaneae		x	x			x	x	
<i>Gardenia</i>	Rubiaceae		x				x	x	
<i>Gazania splendens</i>	Compositae	x							x
<i>Genista</i>	Papilionaceae	x		x					x
<i>Gloriosa</i> (<i>Methonica</i>)	Liliaceae		x		K	x		x	
<i>Gnaphalium lanatum</i> u. <i>V.</i>	Compositae	x							x
<i>Goodia</i>	Papilionaceae			x			x	x	
<i>Gossypium</i>	Malvaceae		x						x
<i>Grevillea</i>	Proteaceae	x						x	
<i>Greyia Sutherlandi</i>	Chenopodiaceae		x						x
<i>Habrothamnus</i>	Solaneae	x		x				x	
<i>Hakea</i>	Proteaceae	x						x	
<i>Hedychium</i>	Zingiberaceae		x		K		x	x	
<i>Heliotropium</i>	Boragineae	x		x			x		x
<i>Hibiscus Cooperi</i> <i>tricolor</i>	Malvaceae		x						x
übrige Topfsorten	„		x	x					x
<i>Hoya</i>	Asclepiadeae		x	x		x	x	x	x
<i>Illicium</i>	Magnoliaceae	x					x		x
<i>Impatiens</i>	Balsamineae		x	x					x
<i>Incarvillea</i>	Bignoniaceae	x						x	
<i>Indigofera</i>	Papilionaceae	x		x					x

Eignet sich:				Hauptzierde:			Marktpflanze.	Besondere Bemerkungen.
als Zimmerpflanze.	im Sommer im Freien in Töpf. aufzustellen.	im Sommer im Freien auspflanzen.	für Bouquets.	Blatt und ganzer Habitus.	Blätter.	Frucht.		
11	12	13	14	15	16	17	18	19
x	x			x	x			Anzucht aus Samen leicht und dankbar. Winterblüher vom Ansehen einer Erica.
	x	x		x				Bis 4 m hoch werdende Blattpflanze, besonders schön wenn einzubestehend ausgepflanzt. Sehr feinsamig.
				x				Humusreiche Erde geben und während der Vegetationszeit sehr reichlich giessen. Sehr feinsamig. F. Parcetti mit reizenden, weissgestreiften Früchten.
x				x			x	Sehr feinsamig. Nahrhafte Erde und reichlich Wasser geben. In warmen Lagen auch zum Auspflanzen brauchbar.
				x				Ampelpflanzen. Auch zur Bekleidung der inneren Gewächshauswände geeignet. Wachsen ungemein üppig.
			x		x			Während der Vegetation feucht halten, sonst nur sehr vorsichtig giessen. Zum Theil Winterblüher.
x			x		x		x	Verlangen gute Bodewärme und reine Haideerde. Bei starker Sonnenwärme öfters besprühen, werden sonst geil und bekommen Läuse.
x		x			x			Zur Decoration von Steinpartien und kleinen Beeten geeignet. Liebt volle Sonne und leichte, sandige Erde.
x	x		x		x		x	Dankbare Winterblüher. Anzucht aus Samen dankbar.
					x			Zur Bekleidung der Säulen der Gewächshäuser geeignet. Der Stengel stirbt gegen den Winter zu ab. Die Knollen während der Ruhezeit ziemlich trocken halten und im Frühjahr stets neu verpflanzen. Aussaat dankbar.
		x		x				Für Teppichbeete; verträgt Beschneiden und Niederhaken. Sehr feinsamig.
			x		x			Zum Auspflanzen im Gewächshaus oder Wintergarten.
				x		x		Baumcottonpflanze. Wenn man im Februar aussäet und gleich einzeln in Töpfchen pikirt, so erzielt man schon im Herbst Pflanzen mit zahlreichen Früchten.
x	x			x	x		x	Sehr decorativ, auch im Sommer als Einzelpflanze auf Rasen. Gegen anhaltende Nässe schützen. G. robusta belichte Blattpflanze.
x				x	x			Auffallend schöne carmoisinrothe Blumen.
	x	x	x		x			In Töpfen oft verpflanzen. Zum Auspflanzen auch in Wintergärten besonders schön. Winterblüher.
x				x	x			H. satigna ist eine vorzügliche Unterlage für alle Grevillea. Leiden leicht durch Schildläuse.
	x	x		x	x			Wie Camma behandeln. Auch schön für Wintergärten zum Auspflanzen. Sehr wohlriechend.
x	x	x	x		x		x	Im März auf warmen Mistbeet ausgesäet, blühen die H. bereits im Herbst. Lieben sehr humusreichen Boden. In Töpfen oft verpflanzen.
		x		x				Schöne Belaubung.
x		x	x		x		x	Anzucht aus Samen lohnend. Blühen bereits im 2. Jahre nach der Aussaat. Dankbare, meist Winterblüher. Im Freien sonnige Lage und reichlich giessen.
x				x	x			Beliebte, harte Zimmerpflanzen. Wachsblume.
		x	x	x	x			Gedeihen am besten, wenn ausgepflanzt, auch im Gewächshaus.
x	x	x	x		x		x	Aussaat sehr lohnend. Dankbare Blüher. I. Sultani einjährig behandeln, sehr schnellwachsend, auch fürs Freie im Sommer auf schattige feuchte und warme Beete.
	x				x			Mässig feucht halten.
x	x				x			Frühjahrsaussaat kann schon im Herbst blühende Pflanzen ergeben.

N a m e n.	Familie.	Kalthauspflanze.	Warmhauspflanze.	Pflanze für temperiertes Haus.	Zwiebel- oder Knollenbildend.	Sehlingpflanze.	Wohlrüchend.	Aussaat:	
								in Haideerde m. Sand.	in Misch. v. Haideerde, Mistbeete u. Sand.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Inga	Papilionaceae			x					x
Ipomoea bonariensis, ficifolia, Hardingi, Jalapa, palmata, tuberosa	Convolvulaceae		x	x	K	x			x
übrige	„		x	x		x			x
Isolepis gracilis	Cyperaceae	x		x					x
Ixia	Iridaceae	x		x	Z				x
Ixora	Rubiaceae		x	x				x	
Jacaranda	Bignoniaceae		x					x	
Jasminum	Jasmineae	x	x	x			x		x
Jatropha	Euphorbiaceae		x						x
Jochroma coccinea	Solaneae			x			x	x	
Justicia	Acanthaceae		x					x	
Kennedyia	Papilionaceae	x		x		x		x	
Lagerstroemia	Salicariaceae	x							x
Lantana hybrida	Verbenaceae			x					x
Lapageria	Smilacaceae	x		x		x		x	x
Lasiandra	Melastomaceae		x	x				x	
Laurus Cinnamomum	Laurineae		x						x
nobilis, Camphora, Sassafras, Benzoin	„	x							x
Lavatera arborea u. Var.	Malvaceae	x							x
Leonotis Leonurus	Labiatae	x							x
Leptospermum	Myrtaceae	x					x	x	
Leucadendron	Proteaceae	x						x	
Leucopogon	Epacrideae	x						x	

Eignet sich:				Hauptzierde:			Markt- pflanze.	Besondere Bemerkungen.
als Zimmerpflanze.	im Sommer im Freien in Topf aufzustellen.	im Sommer im Freien auszupflanzen.	für Bouquets.	Blatt und ganzer Habitus.	Blüthe.	Frucht.		
11	12	13	14	15	16	17	18	19
				x	x			Sehr decorativ, besonders wenn im Gewächshaus ausgepflanzt. Zu schneiden oder auszukneifen, damit die Pflanzen eher blühen.
		x			x			Blühen leichter, wenn in den freien Grund der Gewächshäuser gepflanzt und emporgeteilt. Eignen sich auch zum Auspflanzen im Sommer in das Freie an südlich gelegenen Mauern, Lauben etc. Die knollenbildenden I. treiben im Winter keine Stengel aus und sind ziemlich trocken zu halten. Während der Vegetationszeit sind alle I. reichlich zu bewässern.
x		x			x			
x				x			x	Sehr feinsamig. Verlangt viele Feuchtigkeit. Beliebt für Ampeln, Aquarien und zur Einfassung der Gruppen von Gewächshauspflanzen.
x		x	x		x		x	Nach dem Abblühen allmählig mit Giessen aufhören und im Ruhezustand ganz trocken halten. Im September verpflanzen. Etwas lehmige Erde beismischen. Sämlinge blühen im zweiten Jahre.
			x		x		x	Können auch jung in ein Beet des Hauses ausgepflanzt und später in Töpfe gebracht werden. Mischung von Haide, Lauberde mit Sand. Oefsters entspitzen. Vor Ungeziefer hüten. Sehr dankbar blühend.
				x	x			Im Sommer trocken und luftig halten, im Winter reichlich giessen. Verlangen nahrhafte Erde.
x	x		x		x			Einige Species ranken. Blühen am dankbarsten, wenn in gute Lauberde ausgepflanzt. Die nicht rankenden beschneiden.
					x			Während der Vegetation hohe Wärme. Blühen sehr lange.
		x			x			Im Winter mässig bewässern.
				x	x			Während der Vegetationszeit reichlich, sonst mässig bewässern. Einige Species sind gute Winterblüher. Beanspruchen viel Nahrung.
					x			Der Samen keimt oft unregelmässig. Gedeihen gut, wenn in den freien Grund des Gewächshauses oder Wintergartens ausgepflanzt. Im Winter mässig bewässern. Frühjahrsaussaat dankbar.
	x				x			L. reginae verlangt temperirtes Haus. Blühen nur, wenn kurz zurückgeschnitten, besonders im freien Grunde eines Wintergartens. Im Winter trocken halten. L. indica ist einer der schönsten Blütensträucher.
x	x	x	x		x		x	Vorzüglich für sonnig gelegene Freilandgruppen im Sommer. Lieben humusreichen Boden. Im Winter zurückschneiden und in Töpfen hell bei etwa 12° C. durchwintern.
			x		x			Der Samen liegt lange, ehe er keimt. Sämlinge blühen im dritten Jahre, besonders reich in grossen Töpfen oder ausgepflanzt. Liebt nahrhafte Erde.
					x			Sehr feinsamig. Schöner Winterblüher. Zur Weitercultur sandige gute Laub- und Haideerde vermisch. Reichlich Wasserabzug.
				x				Officinell. Keimt langsam, wenn nicht gleich nach der Ernte gesät.
x	x			x				Die Lorbeerarten sind anspruchslos in Bezug auf die Erde, verlangen jedoch im Sommer reichliches Giessen. L. Benzoïn hält im Freien aus.
		x	x		x			Bei L. a. variegata tritt die Panachirung erst mit dem 6.—8. Blatte auf. Prächliche Solitärpflanzen. Während des Winters mässig bewässern. Durch öfteres Verpflanzen von Wintersämlingen erzielt man bereits im 1. Jahre schöne Exemplare.
		x	x		x			Verlangt kräftige Erde und hellen Standort.
x	x		x	x	x		x	Sehr feinsamig. Weissblühend. Im Freien schattig stellen.
	x				x			Vertieft leicht die Keimkraft. Gegen Nässe schützen und mit temperirtem Wasser giessen.
	x				x			Cultur wie Epacris (vergl. S. 336).

N a m e n.	Familie.	Kalthauspflanze.	Warmhauspflanze.	Pflanze für temperirtes Haus.	Zwiebel- oder Knollenbildend.	Schlingpflanze.	Wohlfriehend.	Aussaat:	
								in Haideerde m. Sand.	in Misch. v. Haideerde, Mistbeete u. Sand.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Libonia floribunda</i>	Acanthaceae	x							x
<i>Lisianthus Russelianns</i>	Gentianeae			x				x	
<i>Littonia modesta</i>	Liliaceae			x	K	x		x	
<i>Lomatia</i>	Proteaceae	x						x	
<i>Lophospermum</i>	Scrophularineae	x				x			x
<i>Luculia gratissima</i>	Rubiaceae	x		x				x	
<i>Malva</i>	Malvaceae	x		x					x
<i>Mandevillea snaveolens</i>	Apocynaeae	x		x		x	x		x
<i>Medeola asparagoides</i> (Myrsiphyllum) ..	Smilaceae	x		x	K	x			x
<i>Medinilla</i>	Melastomaceae		x					x	
<i>Melaleuca</i>	Myrtaceae	x					x	x	
<i>Melastoma</i>	Melastomaceae		x					x	
<i>Melianthus major</i>	Zygophylleae	x							x
<i>Mesembrianthemum</i> , Topfsorten	Ficoideae	x							x
<i>Metrosideros</i> (Callistemon)	Myrtaceae	x						x	
<i>Mikania scandens</i>	Compositae	x				x			x
<i>Mimosa pudica</i>	Mimoseae			x					x
<i>Montagnaea</i>	Compositae			x					x
<i>Montbretia crocosmiaeflora</i>	Irideae	x			Z			x	
<i>Muehlenbeckia</i>	Polygoneae	x				x			x

Eignet sich:				Hauptziede:			Besondere Bemerkungen.
als Zimmerpflanze.	im Sommer im Freien in Töpf. aufzustellen.	im Sommer im Freien auszupflanzen.	für Bouquets.	Blatt und ganzer Habitus.	Blüthe.	Frucht.	
11	12	13	14	15	16	17	18
							19
x			x		x	x	Williger und dankbarer Winterblüher.
							Sehr feinsamig. Aussaat Juni—Juli in sandige Haide- mit Lauberde, stets feucht halten, keimt binnen 4 Wochen. In flache Schalen mit gutem Abzug pikiren, feucht und kühl halten, dann einzeln in Stecklingstöpfe pflanzen, auf warmen Fuss bringen und öfters spritzen. Wenn 3—4 Blätter vorhanden, die Spitzen auskneifen, wonach sich die Pflanzen bestocken. Frostfrei und hell, mässig feucht im Haus durchwintern und erst im Frühjahr in grössere Töpfe verpflanzen. Laub-, Schlamm- und sandige Mysterde gemischt. Auf warmen Fuss zuerst, nach dem Anwachsen lüften. Auch Nachts abdecken, um die Spinne fernzuhalten. ♂ Blüht im August.
			x		x		
							Häufig verpflanzen. Liebt feuchte Wärme.
				x	x		Liebt reine Haideerde. Fürchtet stagnirende Feuchtigkeit.
							Aussaat dankbar, Samen schwach bedecken. Aussaat im Juli oder Frühjahr, letztere bringt noch im ersten Jahre blühende Pflanzen. In Stecklingstöpfe einzeln pikiren. Prädigt zur Bekleidung von Verandas, Zimmerfenstern, Spalieren, Mauern. Auch für Ampeln.
x	x	x			x		Früchtiger Winterblüher. Im Sommer fast trocken, im Winter sehr feucht halten und oft spritzen. Luftig und halbschattig stellen. In Haideerde ausgepflanzt am schönsten.
						x	
		x			x		Beanspruchen sehr reiche Nahrung.
			x		x		Aussaat sehr dankbar. Während der Ruheperiode ganz trocken halten. Blüht nur dankbar, wenn im freien Gniad des Gewächshauses ausgepflanzt.
x			x	x			Reizende Ampelpflanze. Die Ranken werden häufig als Haarschmuck benutzt. Beim zweiten Pikiren schon einzeln in Töpfchen bringen. Sehr raschwachsend. Sünlinge sind binnen Jahresfrist zum Schneiden zu benutzen.
				x	x		Feinsamig. In reiner oder mit Lauberde gemischter Haideerde cultiviren. Reichlich giessen und für guten Wasserabzug sorgen.
x	x		x	x	x	x	Sehr feinsamig. Das Aussaatgefäss mit Moos oder Sphagnum bedecken. Leicht-Cultur, blühen bald. Im Freien Halbschatten geben. Liefert schönes Bindegrün.
				x	x		Sehr feinsamig. Verlangen einen recht hellen Platz des Warmhauses.
x	x	x		x			Im Sommer reichlich, im Winter mässig bewässern. Blüthen sehr honigreich. Liebt humusreiche Erde. Am schönsten ausgepflanzt.
x	x	x	x	x	x	x	Sehr feinsamig. Zierlich für sonnige Fensterbretter, Steinpartien etc. Blühen nur an hellen Tagen. Fürchten Nässe. In Lauberde mit sehr viel Sand vermischt cultiviren.
x	x		x	x	x		Prädigt blühende Neuholländer; leicht keimend. Vergl. Callistemon.
x			x	x	x		Zur Decoration der Wände und Säulen des Gewächshauses, woselbst in humusreichen Boden auszupflanzen. Sehr raschwachsend.
x				x			Jährlich durch Frühljahrsaussaat heranzuziehen. Topfcultur am besten. Öfters pikiren. Reichlich giessen, ohne die Blätter zu bewässern. Bekannt wegen der besonders in der Wärme starken Reizbarkeit der Blätter, welche sich schliessen, wenn man sie berührt.
	x	x		x			Wird nur in das freie Land ausgepflanzt vollkommen. Verlangt daselbst reichliches Giessen. Am schönsten als Einzelpflanze.
x	x	x	x		x		Sehr dankbar und reich blühend.
x	x	x		x			Harte Ampelpflanzen für kühle Zimmer oder in das Freie.

N a m e n.	Familie.	Kalthauspflanze.	Warmhauspflanze.	Pflanze für temperiertes Haus.	Zwiebel- oder Knollenbildend.	Schlingpflanze.	Wohnstauden.	Aussaat:	
								in Haideerde mit Sand.	in Misch. v. Haideerde, Mistbeete u. Sand.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Musa	Musaceae		x	x					x
Muschia	Campanulaceae	x		x					x
Myoporum	Myoporineae	x							x
Myrtus	Myrtaceae	x					x		x
Nandina	Berberideae	x							x
Nepenthes	Nepentheae		x			x		x	
Nerium Oleander u. Var.	Apocynaeae	x							x
Nertera depressa	Rubiaceae	x		x				x	
Nicotiana glauca, wigandioides	Solaueae	x		x					x
Osbeckia	Melastomaceae		x	x				x	
Oxylobium	Papilionaceae	x						x	
Paneratium illyricum, maritimum	Amaryllideae	x			Z		x	x	
caribaeum, speciosum	„		x		Z		x	x	
calathinum (Ismene)	„			x	Z		x	x	
Panicum plicatum, sulcatum	Gramineae		x	x					x
Passiflora coerulea	Passifloreae	x		x		x			x
edulis, maliformis	„		x			x			x
amabilis, glauca, incarnata, laurifolia, ornata, quadrangularis	„		x			x	x		x
trifasciata	„		x			x	x		x
übrige Sorten	„		x			x			x
Peperomia	Piperaceae		x					x	
Phaseolus Caracalla	Papilionaceae	x		x		x	x		x

Eignet sich:				Hauptzierde:			Marktplanze.	Besondere Bemerkungen.
als Zimmerpflanze.	im Sommer im Freien in Topf aufstellen.	im Sommer im Freien auspflanzen.	für Bouquets.	Blatt und ganzer Habitus.	Blüthe.	Frucht.		
11	12	13	14	15	16	17	18	
				x			x	Man sät auch in reine Sägespäähne; die Samen liegen oft einige Monate bis zum Keimen. <i>M. rosacea</i> , <i>speciosa</i> , <i>coccinea</i> und namentlich die raschwachsende <i>Ensata</i> (sehr grosssamig) können im Sommer in das Freie gepflanzt werden und sind besonders als Einzelpflanzen auf Rasen herrlich. Sie sind empfindlich gegen starken Wind. Auch die im Gewächshaus bleibenden entfalten sich nur schön, wenn sie daselbst ausgepflanzt werden. Alle <i>M.</i> verlangen den besten, düngerreichsten, dabei lockeren Boden und sehr reichliches Gießen. In der Jugend lieben sie häufiges Verpflanzen.
		x	x		x			Kann ausgepflanzt werden und blüht dann sicherer. Im Winter hell stellen und mässig giessen.
x	x			x	x		x	Sehr reichblühend. Kann durch Schnitt in den verschiedensten Formen gezogen werden.
x	x			x	x	x	x	Dankbare und leichte Cultur.
		x	x	x		x		Bildet Bäumchen mit gefiederten Blättern.
					x			Samen selten. Aussaat unter Glas in flache Gefässe, welche unten mit groben Haideerdeestücken belegt sind, auf diese kommt kurzgehacktes Sphagnum und obenauf sehr feingesiebte, sandige Haideerde. Feuchtigkeit von unten geben.
x	x		x	x	x		x	Die Samen keimen am besten in einem Stück ihrer Scheidenumhüllung, in recht warmen Wasser, nahe an der Oberfläche gehalten. Lieben Garten- und Lanterde gemischt. Grosse Pflanzen in Kübeln, deren Oberfläche man mit einer öfters zu erneuernden Schicht verrotteten Pferdedüngers herstellt.
x	x					x	x	Kriechend. Ueberzieht die Töpfe rasenartig. Wegen der reizenden korallenrothen Beeren dankbar für Miniaturbeete.
		x	x	x				Sehr feinsamig. Aeusserst raschwachsende Blattpflanzen für Gruppen und einzeln auf Rasen. <i>N. glauca</i> ist zweijährig. Sehr schleunig pikiren. Reichlich giessen. Lieben kräftige Erde.
					x			Feinsamig. Muss zuweilen zurückgeschnitten werden. Feuchtwarm und hell halten. Während der Vegetation stark giessen.
		x			x			Verlangt im Sommer freien, im Winter hellen Standort. Cultur wie bei <i>Chorizema</i> .
x	x	x			x			Blühen im freien Lande in sandiger Erde, wenn sie bedeckt durchwintert werden.
x	x				x			Verlangen auch im Ruhezustand Wärme und ganz geringe Feuchtigkeit.
x	x				x			
x		x		x				Schön für Blattpflanzengruppen, auch Zimmerdecoration. Erstes Pikiren in kleinste Töpfe.
x		x	x		x	x		Sehr reichblühend. Auch im Kalt-hause.
					x	x		Früchte essbar.
				x	x	x		<i>P. incarnata</i> im Sommer an warme Wände auspflanzen.
				x	x			Schön gefärbte Blätter. Verlangt feuchte Wärme.
				x		x	x	<i>P. princeps coccinea</i> sehr früh und reichblühend.
x			x	x	x			Sehr feinsamig. Reizend für Jardinieren, Terrinen und kleine Blumentische.
		x	x		x			Zur Bekleidung von Wänden. Verlangt sonnige Lage und freie Luft. Höchst originelle Blumen.

N a m e n.	Familie.	Aussaats:							
		Kalthauspflanze.	Warmhauspflanze.	Pflanze für temperirtes Haus.	Zwiebel- oder Knollenbildend.	Schlingpflanze.	Wohlfriechend.	in Heideerde mit Sand.	in Misch- u. Heideerde, Mistbeeteerde u. Sand.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Phormium tenax u. V.	Asphodeleae	x							x
Phygelius	Scrophularineae	x							x
Phyllanthus	Euphorbiaceae			x				x	
Pilea callitrichoides, serpyllifolia	Urticeae		x					x	
Pimelea	Thymelaeae	x						x	
Piper nigrum	Piperaceae		x			x		x	
Pittosporum	Pittosporae	x		x			x		x
Plectranthus	Labiatae		x	x			x		x
Plumbago	Plumbagineae	x		x					x
Poinciana	Papilionaceae			x				x	
Poinsettia pulcherrima	Euphorbiaceae		x	x				x	
Polygala cordata, Dahmaisiana, grandiflora, myrtifolia, speciosa	Polygaleae	x						x	
Protea	Proteaceae	x						x	
Psidium	Myrtaceae			x					x
Pultenaea	Papilionaceae	x						x	
Punica Granatum	Myrtaceae	x							x
Raphiolepis	Pomaceae	x							x
Ravenala (Uranaia)	Musaceae		x					x	
Reidia glaucescens	Euphorbiaceae		x	x				x	
Rhodochiton volubile	Scrophularineae	x		x		x			x
Rhynchospermum jasminoides	Apocynae	x		x		x	x	x	

Eignet sich:				Hauptzierde:			Marktpflanze.	Besondere Bemerkungen.
als Zimmerpflanze.	im Sommer im Freien in Topf aufzustellen.	im Sommer im Freien auszupflanzen.	für Bouquets.	Blatt und ganzer Habitus.	Blüthe.	Frucht.		
11	12	13	14	15	16	17	18	19
	x	x		x				Im Sommer stark bewässern. Ältere Pflanzen in Kübel. Prächtigt für grosse Vasen, auf Rasenplätze, Ufer, Gedeiht in voller Sonne wie auch im Schatten. Liebt lockere, dabei frische, humusreiche Erde. Vermehrung aus Samen langsam.
x	x	x	x		x		x	Feinsamig. Anzucht aus Samen sehr lohnend, Sämlinge blühen im Jahre nach der Aussaat. Auch für Gruppen.
x				x	x			Lieben im Sommer reichlich Luft und Wasser. Sehr feinsamig. Interessant durch die Blütenstellung unter den Blattzweigen.
x				x				Merkwürdig durch die Knospen, welche bei Bespritzung mit Wasser explodiren. Sehr feinsamig.
x	x		x		x		x	Sehr elegante Neuholländer. Nach dem Flor zurückschneiden. Zuweilen im Kathhaus auspflanzen. Durch Luft und Licht vor Ungeziefer schützen. Verlangen reichlichen Wasserabzug und häufiges Spritzen. In humusreicher Haideerde cultiviren. Im Freien halbschattig und vor Schlagregen geschützt aufstellen.
x				x				Von hängendem oder kriechendem Wuchs; zu Gewächshaus-Ampeln verwendbar.
x	x	x	x	x	x		x	Gute Blattpflanzen zur Decoration. Lieben Mischung von Haide- und sandiger Gartenerde. Blüthen von feinem Orangenduft.
x	x	x		x	x		x	Das bekannte Mottenkraut, <i>P. fruticosus</i> , ist eine auscultliche Gruppenpflanze.
x	x	x	x		x			Herrlich zur Bekleidung von Säulen, Spaliren, Wänden, am besten ausgepflanzt. Schön für blühende Gruppen. Lässt sich auch als Hochstamm ziehen. Nach dem Flor zurückschneiden.
					x			Im Sommer reichlich giessen. Dungreiche Haideerde. Blühen am reichlichsten in recht sonnigen Lagen und sind in der Vegetationszeit sehr dankbar für warmen Fuss.
					x			Prachtvoller Winterblüher. Nach dem Flor zurückschneiden. Scheuen feuchte Atmosphäre und bedürfen einer mehrmonatlichen Ruhezeit.
x	x		x		x			Während des Sommers im Freien gegen Regen zu schützen, im Winter mässig begiessen. Verlangen viel Luft, Licht und Wasserabzug. Auspflanzen im Gewächshaus bei vorangegangener Entspitzen sehr vorthellhaft.
	x			x	x	x		Verlangen guten Wasserabzug, nährhafte, durchlassende Haideerde und im Freien gegen Nässe und Sonnenbrand geschützten Standort.
					x	x		Sehr nährhafte Erde. Im Gewächshaus auspflanzen, guten Wasserabzug. Aussaat dankbar. Die Früchte sind von angenehmen Geschmack.
		x			x			Behandlung wie bei Chorizema.
x	x		x	x	x	x	x	Samen der Granatbäume keimt langsam. Im Sommer stark, im Winter wenig giessen. Im Herbst zu beschneiden. Lassen sich im Winter im Warmhaus treiben. Im Freien in recht sonnige Lage bringen. Nährhafte Laub- und Haideerde.
x			x		x			Samen keimen langsam. Decorative immergrüne Pflanzen. Zuweilen zurückschneiden. Humusreiche Erde. Winterblüher.
				x		x		Verlangt zum Keimen viel Wärme. Behandlung wie bei Musa. Wird nur durch Samen vermehrt. In jungem Zustand schön für's Zimmer.
x				x	x			Anzucht aus Samen dankbar. Interessant durch die Blütenstellung unter den Blattzweigen.
x					x			Zur Bekleidung der Fenster und Säulen der Gewächshäuser, auch in den freien Grund gepflanzt; reizend für Topfgitter. Liebt Mischung von Laub- und Haideerde. Luftig, schattig und mässig feucht halten; sehr reichlichen Wasserabzug. Januar-Sämlinge blühen bereits im Juli.
			x		x			Samen keimen etwas langsam. Sowohl in Töpfen wie im Gewächshaus ausgepflanzt sehr schön. Nährhafte Laub- und Haideerde gemischt. Fürchtet während der Ruhezeit Feuchtigkeit. Langer Flor.

N a m e n .	Familie.	Kalthauspflanze.	Warmhauspflanze.	Pflanze für temperiertes Haus.	Zwiebel- oder Knollen-bildend.	Schlingpflanze.	Wohlbriehend.	Aussaat:	
								in Haideerde mit Sand.	in Misch. v. Haideerde, Mistbeete u. Sand.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Richardia africana u. V.	Aroideae	x		x	K				x
Rivina humilis	Phytolaccaceae		x	x					x
Rochea	Crassulaceae	x		x					x
Rondeletia	Rubiaceae			x				x	
Rogiera	"			x					x
Ruellia	Acanthaceae		x	x				x	
Russelia juncea	Scrophulariaceae		x	x					x
Salvia	Labiatae	x		x					x
Santolina Chamaecyparissus	Compositae	x					x		x
Saxifraga sarmentosa	Saxifrageae	x	x	x					x
Schizolobium excelsum	Papilionaceae			x				x	
Schizostylis coccinea	Irideae	x			Z			x	
Scutellaria	Labiatae	x							x
Selinum decipiens	Umbelliferae	x							x
Sempervivum	Crassulaceae	x							x
Senecio	Compositae	x		x					x
Sida	Malvaceae	x		x				x	
Siphocampylus	Lobeliaceae			x				x	
Skimmia	Illiciaceae	x					x	x	
Solanum capsicastrum, ciliatum, Hender- soni, Lobeli, Pseudo-Capsicum, racemigerum, texanum, Weatherilli	Solaneae	x							x
atropurpureum, cyananthum, gigan- teum, laciniatum, marginatum, py- racanthum, reclinatum, robustum, Warszewiczoides u. a.	"	x		x					x
jasminiflorum	"			x		x	x		x

Eignet sich:				Hauptzierde:			Marktpflanze.	Besondere Bemerkungen.
als Zimmerpflanze.	im Sommer im Freien in Topf aufzustellen.	im Sommer im Freien auszupflanzen.	für Bouquets.	Blatt und ganzer Habitus.	Blüthe.	Frucht.		
11	12	13	14	15	16	17	18	19
x	x	x		x	x		x	Schön an Bassins, Aquarien etc. Theilung im Herbst. Bei beginnender Vegetation mässig, nachher stärker giessen.
x					x	x		Raschwachsend mit Trauben schartachrother Beeren. Reizende Tafeldecoration. Vermehrung nur durch Samen. Blühen hübsch, weiss.
x					x		x	Sehr feinsamig. Prachtvolle feuerrothe grosse Blumen. Langer Flor. Lustig halten. Auch in sandiger Lauberde und im Mistbeet zu cultiviren. Aussaat dankbar. R. odoratissima sehr wohlriechend.
			x		x			Fürchtet Feuchtigkeit im Gewächshaus und will luftig stehen.
	x	x			x			Auspflanzen im Gewächshaus vorthelhaft. Nach dem Flor zurückschneiden. R. amoena wohlriechend.
x				x	x			Lieben Schatten. Für Blumentische, Wintergärten etc. Ofters zurückschneiden. Sandige poröse Lauberde zuzugend.
x					x			Gute Hängepflanze, dankbar und sehr lange blühend.
x	x	x	x		x		x	Herrlich für Rabatten und Gruppen. Mehrere S. blühen im Winter, einige sind wohlriechend. S. patens wird fast trocken überwintert. Nahrhafte Mischung von Laub- und Haiderde. Im Sommer reichlich giessen. Vor dem Überwintern alles Kraut wegschneiden.
x		x		x				Zur Teppichgärtnerei und Einfassungen geeignete Pflanze, welche sich dem Schnitt ganz unterwirft und sich so niedrig und in Form halten lässt.
x				x	x		x	Sehr feinsamig. Eine der schönsten Ampelpflanzen, auch für Terrarien, Aquarien etc.
				x				Der Samen keimt zuweilen langsam. Schöne raschwachsende Blattpflanze.
x	x	x	x		x		x	Winterblüher. Die im Herbst einzupflanzenden Zwiebeln dürfen anfänglich nicht zu warm gestellt und auch erst später reichlich gegossen werden.
x	x	x	x		x			Reichtblühend. Im Winter mässig bewässern. Behandlung analog Salvia.
	x	x		x				Wenn nicht gleich nach der Reife gesät, keimt der Samen langsam. Hübsche Einzelpflanze auf kleine Parterres, Rasen etc. Palmenartiger Wuchs.
x	x	x		x	x			Sehr feinsamig. Lieben leichte, sehr sandige Lauberde und verlangen sonnigen Standort. Im Winter vorsichtige Bewässerung. Für Steinpartien und Teppichgärtnerei.
	x	x		x	x			Zum Theil sehr schönblühende Species. Humusreiche Laub- und Gartenerde gemischt. S. scandens ist wohlriechend und eine dankbare Schlingpflanze.
x		x	x		x			Im Sommer reichlich Luft und Wasser, im Winter Standort hell und luftig. Buschige Pflanzen erzielt man durch Entspitzen im Frühjahr.
x			x		x			Feinsamig. Gute Winter- und Frühlingsblüher. Aussaat dankbar.
x	x				x	x	x	Die Samen liegen lange, ehe sie keimen. Die rothen Früchte halten sich den ganzen Winter hindurch. Aussaat dankbar. Fürchtet Sonnenbrand.
x	x	x		x		x	x	Im Sommer reichlich bewässern, lieben volle Sonne. S. ciliatum, Lobeli, racemigerum, teranum sind ☉.
								Durch ihre Belaubung effectvoll als Einzelpflanzen, auf Gruppen, Rosenplätze etc. Im Sommer stark giessen. S. atropurpureum, lucinatum, reclinatum sind ☉, können aber im Warmhaus mehrere Jahre erhalten werden.
		x			x	x		Ausserst dankbare Schlingpflanze mit weissen, wohlriechenden Blumen. Herbst- und Winterblüher. Blaue Eierfrüchte.

Die Aussaat ist die bei weitem gebräuchlichste Vermehrungsart. Durch öfteres Verpflanzen sind schnell starke Pflanzen zu erzielen. Da mehrjährige Pflanzen an Ansehen einbüßen, sät man jährlich frisch aus und zwar nicht vor März-April, da man sonst befürchten muss, dass die Sämlinge vorzeitig vergehen, ehe man ihnen die nöthige freie Luft zukommen lassen kann.

N a m e n.	Familie.	Kalthauspflanze.	Warmhauspflanze.	Pflanze für temperiertes Haus.	Zweifel- oder Knollenbildend.	Schlingpflanze.	Wohlfriechend.	Aussaat:	
								in Haideerde mit Sand.	in Misch- u. Haideerde, in Mischbeeten, Sand.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sollya	Pittosporaceae			x		x		x	
Sonchus	Compositae	x		x					x
Sonerila	Melastomaceae		x					x	
Sparaxis	Irideae	x			Z			x	
Sparrmannia africana	Tiliaceae	x						x	
Spartocytisus nubigenus	Papilionaceae	x					x	x	
Spathodea	Bignoniaceae		x						x
Stachytarpheta mutabilis	Verbenaceae			x				x	
Stapelia	Asclepiadeae	x		x					x
Statice arborea, Halfordi, imbricata, macrophylla, pectinata	Plumbagineae	x						*	x
Stephanophysum longifolium	Acanthaceae		x					x	
Stephanotis floribunda	Asclepiadeae		x			x	x		x
Strelitzia	Musaceae		x					x	
Streptocarpus (Didymocarpus)	Cyrtandraceae			x				x	
Stylidium	Stylidiaceae	x		x				x	
Sutherlandia (Colutea)	Papilionaceae	x							x
Swainsonia	"	x		x				x	
Tabernaemontana	Apocynaceae		x				x	x	
Tacsonia	Passifloreae			x		x		x	
Testudinaria (Tamus) elephantipes	Dioscoreae			x	K	x		x	
Tetranema mexicanum	Scrophulariaceae			x					x
Thea	Camellieae	x					x	x	

Eignet sich:				Hauptziede:			18	Besondere Bemerkungen.
als Zimmerpflanze.	im Sommer im Freien in Töpfe aufzustellen.	im Sommer im Freien auszupflanzen.	für Bouquets.	Blatt und ganzer Habitus.	Blüthe.	Frucht.		
11	12	13	14	15	16	17	18	19
x					x	x		Ranken nicht sehr hoch, daher schön für Topfzylinder. Im Gewächshaus auspflanzen oder in grössere Töpfe in Haide- und Gartenerde gemischt mit gutem Abzug cultiviren. Aussaat dankbar.
		x		x				Blattpflanzen mit zierlicher Belaubung. Sämlinge robuster als Stecklingspflanzen.
				x	x			Sehr feinsamig; wollen besonders warm und geschlossen stehen. Guten Wasserabzug geben.
x			x		x		x	Blühen meist schon im 2. Jahre nach der Aussaat. Nach dem Verblühen trocken halten und zeitig im Frühjahr oder im October umpflanzen.
x	x	x		x	x			Erreicht bei guter Düngung und in humusreicher Erde grosse Dimensionen, blüht bald und sehr lange im Spätwinter. Höchst decorativ.
x		x	x		x			Sonnigen Standort und sandige Erde.
						x		Düngreiche Mischung von Haide- und Lauberde. Mässig warm und trocken während der Ruhezeit halten, hohe Wärme bei Eintritt und während der Vegetation. Blüht wiederholt, wenn die abgeblühten Rispen nach dem ersten Flor abgeschnitten werden.
		x	x	x	x			Verlangt humusreiche Erde und im Sommer reichlich Luft und Wasser, im Freien sonnige Lage. Aussaat dankbar.
x	x			x				Nicht zu tiefe Töpfe mit gutem Wasserabzug wählen. Sandige lockere Lauberde. Im Sommer reichlich gessen, im Winter trocken aber hell halten. Im Freien halbschattig stellen.
x	x		x		x		x	Blühen bei sehr früher Aussaat noch im 1. Jahre. Verlieren alt an Ansehen, daher alle 2 Jahre neu aussäen. Cultur in Mischung von Garten- und guter Lauberde mit viel Sand. Reichlichen Wasserabzug. Sehr dankbare Pflanzen.
			x		x			Aussaat sehr dankbar. Sämlinge blühen im 1. Jahre. Winterblüher, liebt sonnigen Standort.
			x		x			In den freien Grund des Warmhauses auspflanzen und an Säulen, Fenstern, Wänden emporleiten. Liebt Feuchtigkeit und Schatten. Blüht aus Samen erst nach Jahren. Durch öfteres Waschen vor Ungeziefer schützen.
				x	x			Recht warm aussäen. In sehr düngerreicher Mischung von Garten- und Lauberde cultiviren. Im Sommer reichlich, im Winter mässig bewässern. Grössere Pflanzen in Kübel bringen oder im Gewächshaus auspflanzen.
				x	x			Sehr feinsamig. Cultur der Gesneriaceen. Stets mässig feucht und schattig halten. Aussaat sehr dankbar. Winterblüher.
					x			Schöne Winterblüher. Erstarkte Pflanzen in gemischte sandige humusreiche Erde verpflanzen.
x	x	x	x		x			Aussaat dankbar; entweder im März-April oder Juni-Juli. Sämlinge blühen im 2. Jahre. Leichte Erde.
x	x	x	x		x		x	Können bei sehr früher Aussaat schon im 1. Jahre zum Blühen gebracht werden.
					x			Während der Vegetation hohe, feuchte Wärme. Auch sandige Laub- und Mistbede gemischt sagt ihnen zu. Eingraben der Töpfe vorthellhaft.
			x		x			Nicht zu warm, sondern luftig und hell stellen, dadurch vor Ungeziefer schützen. Am besten in den freien Grund des Gewächshauses auspflanzen und emporleiten. Laub- und Haideerde gemischt.
	x							Die aus den enormen, Elephantenfuss-ähnlichen, hölzigen Knollen austreibenden, windenden Stengel sind an Stäben oder Bindfäden emporzuleiten. Sie sterben nach der Vegetationszeit ab, die Knolle ist während der Ruhezeit (April-August) fast trocken zu halten. Kräftige Erde.
x					x			Sehr reichblühend. Winterblüher.
	x			x				Wie Camellia zu behandeln. Vor Ungeziefer durch luftigen Standort schützen.

N a m e n.	Familie.	Kalthauspflanze.	Warmhauspflanze.	Pflanze für temperirtes Haus.	Zwiebel- oder Knollenbildend.	Schlingpflanze.	Wohlrüchend.	Aussaaf:	
								in Heideerde mit Sand.	in Misch. v. Heideerde, Mistbeeteerde u. Sand.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Thunbergia (Hexacentris)	Acanthaceae		x	x		x			x
Thyrsacanthus	"		x						x
Torenia Fournieri (edentula)	Scrophularineae		x	x				x	
Bailloni	"			x				x	
Tradescantia discolor	Commelineae		x						x
multicolor, zebrina	"		x	x		x			x
Tristania	Myrtaceae	x						x	
Tritoma	Liliaceae	x			K			x	
Tropaeolum Moritzianum	Tropaeolaceae			x		x			x
albiflorum, azureum, brachyceras, tri- color u. V.	"	x			K	x			x
pentaphyllum, speciosum	"	x			K	x			x
Tupa	Lobeliaceae	x						x	
Turnera	Portulacaceae	x						x	
Tweedia coerulea (Oxypetalum)	Asclepiadeae	x							x
Verbena citriodora (Aloysia, Lippia) ..	Verbenaceae	x					x		x
Verbesina	Compositae	x							x
Veronica (Topf-)	Scrophularineae	x							x
Viburnum Tinus (Laurus)	Caprifoliaceae	x							x
Viminaria	Papilionaceae	x							x
Vinca rosea u. V.	Apocynae		x	x				x	
Wigandia	Hydroleaceae		x					x	
Yucca	Liliaceae	x			K			x	

Eignet sich:				Hauptzierde:				Besondere Bemerkungen.
als Zimmerpflanze.	im Sommer im Freien in Töpf. aufzustellen.	im Sommer im Freien auszupflanzen.	für Bouquets.	Blatt und ganzer Habitus.	Blüthe.	Frucht.	Marktpflanze.	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
		x			x			Die Samen liegen lange, ehe sie keimen. Nach dem Frühjahrsfrost verpflanzen. Auch sehr schön, wenn im Gewächshaus ausgepflanzt und emporgeleitet. Im Sommer durch häufiges Spritzen vor der Spinne bewahren.
					x			Schattig halten. Schöne Winterblüher mit lang herunterhängenden Blüthentrauben.
x			x		x		x	Reich und lange blühend. { Sehr feinsamig. Vertragen keine anhaltende Nässe. Blühen aus Samen in kurzer Zeit.
x	x	x	x		x			Blüthen goldgelb mit braun. }
x				x	x			Zu Jardinieren und Terrinen. { Lieben Schatten und während der Vegetation reichliches Giesen.
x				x				Bekannte gute Ampelpflanzen. }
					x			Besonders schön, wenn im Kalthaus oder Wintergarten ausgepflanzt. Sandige Laub- mit Haideerde.
								Prächtigt sowohl in Gruppen wie einzeln. Lieben im Freien, wo sie, stark bedeckt, auch überwintern können, die volle Sonne. Düngerreiche aber durchlassende Laub- oder Mistbeeterde. Im Sommer sehr reichlich giesen. Frühjahrssämlinge, bald pikirt, blühen im Jahre nach der Aussaat.
		x			x			Hält sich, im Gewächshaus überwintert, mehrere Jahre.
x			x		x		x	Frische Samen keimen bei hoher Wärme schnell, ältere liegen länger. Knollen während der Ruhezeit in trockenem Sand aufbewahren. In Vegetation heller, luftiger Standort. Aeusserst zierliche Schlinger für feine Drahtgitter.
x		x	x		x		x	Ebenfalls schön für Drahtgitter. Halten gut bedeckt im Freien aus, wo sie eine herrliche Bekleidung von Mauern, Spalieren u. dergl. liefern.
		x	x		x			Sandige Laub- und Haideerde gemischt. Blühen schön, wenn im Haus ausgepflanzt. T. assurgens verlangt Warmhaus.
x	x				x			Sämlinge blühen im 1. Jahre.
		x			x			Vermehrung aus Samen. Blüht in dem der Aussaat (März bis Juli) folgenden Jahre. In Stecklingstöpfchen pikiren. Mässig giesen. Lockere Erde.
x	x	x	x	x	x		x	Nur durch ihren grossen Wohlgeruch bemerkenswerth.
		x			x			Besonders raschwachsende, elegante Blattpflanzen. Im Freien sowohl einzeln, wie für Gruppen; weit auseinanderpflanzen. Sehr reichlich giesen.
x	x	x	x	x	x		x	Feinsamig. Mehrmals entspitzen, um buschige Pflanzen zu ziehen. Dankbar blühende immergrüne Decorationspflanzen. Nahrhafte dungreiche Laub-erde. Cultur wie Fuchsia.
x	x		x	x	x		x	Gedeiht in jeder nahrhaften Erde. Im Sommer reichlich giesen.
					x			Heller luftiger Standort, im Kalthaus oder Wintergarten, am besten ausgepflanzt.
x		x	x	x	x		x	Blühen bei früher Aussaat im 1. Jahre. Sehr reichblühende Pflanzen, prächtig für Sommergruppen im Freien, sowie in Töpfen, für das Zimmer und den Markt. Reichlich giesen.
		x		x				Feinsamig. Aus Samen raschwachsend. Schöne Blattpflanzen für Gruppen, auch einzeln auf Rasen. Erreichen bei guter Mistunterlage und Bewässerung grosse Dimensionen. Zur Topfcultur Haide- und Lauberde gemischt. Im Winter heller Standort im Gewächshause. Die Berührung der Blätter verursacht Brennen auf der Haut.
x	x	x		x	x		x	Aussaat dankbar, besonders wenn gleich nach der Reife des Samens bewirkt. Ältere Samen liegen oft viele Monate lang, ehe sie keimen. Sämlinge möglichst bald einzeln in Stecklingstöpfchen pikiren. Schöne Decorationspflanzen von langer Dauer; blühen erst nach Jahren.

Vierte Abtheilung.

Ueber die Anzucht der Gehölze aus Samen.

I. Laubbäume und -Sträucher.

233. Die natürlichste und bei weitem gebräuchlichste Vermehrungsart dieser Pflanzen ist die Aussaat. Dieselbe wird entweder an Ort und Stelle im Freien, meistens jedoch auf geschützten Saatbeeten, und für empfindlichere Sorten im Mistbeet oder Gewächshaus ausgeführt. Viele der hierher gehörenden Samen müssen vor der Aussaat stratificiert werden (vergl. §. 17). Es sind dieses erstens solche, bei denen die Umhüllung des Samenkorns eine so harte ist, dass ohne vorherige Stratification eine lange Keimzeit erforderlich sein würde, z. B. die meisten Steinfrüchte, ferner die sehr grosskörnigen, im Spätherbst reifenden Samen, die man erst im Frühjahr säen will, z. B. Eicheln, Kastanien etc., und welche sonst ihre Keimkraft verlieren würden. Im Freien bietet die Aussaat in Reihen in jeder Hinsicht die grössten Vortheile; die breitwürfige, sowie die Büschelsaat werden jedoch zuweilen ebenfalls, letztere nur für bestimmte Gattungen, angewendet. Die Samen der empfindlicheren Sorten werden in Töpfe oder Terrinen, diese wiederum unter Glasglocke in das Freie oder auf ein kaltes resp. warmes Mistbeet oder in das Gewächshaus gebracht. Für die Aussaaten im Freien genügt meistens eine gute, sandig-lehmige Erde, bei den feineren Sorten wird derselben etwas Laub- oder Haideerde beigemischt. Es sind dabei die Saaten der langsam keimenden von denen der rasch keimenden, die feinkörnigen von den grosskörnigen Sorten getrennt zu halten, weil sonst später Störungen im Betriebe eintreten. Auch hier gilt die Regel, die Samen

ebenso stark zu bedecken wie ihr eigenes Volumen beträgt, nur in besonders trockenen Lagen ist es für die Freilandsaaten angezeigt, die Samen etwas tiefer zu bringen.

Fast alle Gehölze, die harten ohne Ausnahme, würde man am besten gleich nach der Reife des Samens, also im Herbst säen; in feuchten Gegenden und solchen mit harten Wintern, also auch bei uns, würden indessen die Samen vieler Gattungen zu Grunde gehen, besonders solche, welche in südlichen Climates gereift sind. In solchen Lagen bietet daher die Frühjahrssaat im ganzen grössere Sicherheit und ist vorzuziehen; bis zu dieser Zeit werden die Samen nöthigenfalls stratificiert. Die Saatbeete sind von Unkraut freizuhalten. Im allgemeinen werden die Sämlinge der harten Gattungen verpflanzt, wenn sie ein Jahr alt sind, und zwar in Reihen, wobei man gern die Hauptwurzel etwas beschneidet (um die Bildung von Nebenwurzeln zu veranlassen) und zu stark getriebene Sträucher auch in den oberen Theilen ein wenig kürzt. Fehlt es bei grossem Betrieb an Zeit zum Verpflanzen, so wird dieses durch die Operation der Wurzelbeschneidung annähernd ersetzt; sie wird im grossen dadurch ausgeführt, dass man von beiden Seiten mittels eines scharfen Spatens in geeigneter Tiefe unter die Pflanze sticht. Bei Pflanzen mit ausgesprochener Pfahlwurzel (z. B. Buchen, Kastanien, Eichen) ist es gerathen, hiermit bis zum 2. Jahre zu warten. Ist die Saat zu dicht ausgefallen, so muss man die Sämlinge möglichst bald, im Jahre der Aussaat, durch Herausnehmen eines Theils derselben verdünnen; die zu entfernenden kann man auf vorbereitete Beete fortschulen, doch sind solche vorzeitig verpflanzte Sämlinge besonders empfindlich gegen Trockenheit.

Erwähnung verdienen noch die mit Flügeln und Federn versehenen Gehölzsamen. Dieselben kommen theils abgerieben (ohne den Flugapparat), häufiger aber mit demselben in den Handel, weil er bei gewissen Samen die Echtheit bezeugt. Die Arten der *Acer*, *Fraxinus* und *Ulmus* unterscheiden sich ziemlich sicher durch die Flügel von einander. — Bei Weiden und Pappeln finden wir seidenartige Federn, welche den Flug bewirken. Obschon diese Samen klein sind, so muss man sich doch hüten, sie dicht zu säen, weil die „Wolle“ leicht Fäulniss bewirkt. Es empfiehlt sich ein Vermischen derselben mit Sand, Erde etc. Einige wenige Samen kommen mit den Hülsen in den Handel, z. B. *Amorpha* und *Tilia*; sie können mit denselben gesät werden.

Die Samenverzeichnisse enthalten eine Anzahl Spielarten, die meist nur durch Veredeln, Stecklinge etc. fortgepflanzt werden. Es ist jedoch die Möglichkeit vorhanden, dass aus diesen Samen dieselbe Sorte wieder entsteht, es können also z. B. Blutbuchen, Pyramideneichen, Rothdorn aus Samen erzeugt werden; der Samenhändler ist daher wohl berechtigt, solche anzubieten.

Bei der Aussaat flachsamer Gattungen z. B. Birken, Erlen, Ulmen, kommt es häufig vor, dass die Samenkörner zu tief in der Erde liegen und ersticken oder gar nicht bedeckt werden und dann bei trockener Witterung zu Grunde gehen. Es hat sich daher bewährt, solche Samen auf gut zubereitete Saatbeete auszustreuen, darauf die Oberfläche der Beete anzudrücken, dann leicht mit der Harke zu lockern und mit nicht zu starken, dicht benadelten Kiefer- oder Fichtenzweigen leicht zu bedecken. In Folge der Bedeckung bleibt die Oberfläche frisch und locker.

Für die einzelnen Gattungen verweisen wir auf die Tabelle am Schlusse und bemerken im allgemeinen noch, dass man für die Aussaaten im Freien das beste Land nehmen muss, über welches man verfügt, dass dasselbe jedoch nicht frisch gedüngt sein darf.

234. Für die Aussaaten in das Mistbeet, in Gefässe und unter Glas bei einzelnen kostbaren, selteneren und zarteren Gehölzen gelten die für Topfgewächse aufgestellten Regeln. Auch die sogenannten Moor- und Haidebeetpflanzen sind in der Tabelle betont. Ihre Aussaat finden dieselben ebenfalls am geeignetsten in Schalen, Terrinen oder Kästen, gefüllt mit grobstückiger, mit Sand vermischter Haideerde, welche mit einer Schicht dergleichen in feingesiebttem Zustande überzogen ist, in oder auf welche gesäet wird. Die aufgegangenen Sämlinge werden nach Bedürfniss sodann weiter pikirt und nach und nach an die Freilandcultur gewöhnt. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Gewächse aus der Familie der Ericaceen, z. B. *Andromeda*, *Arctostaphylos*, *Arbutus*, *Bejaria*, *Clethra*, *Gaultheria*, *Ledum*, *Leucothö*, *Menziesia*, *Zenobia* u. dergl., ferner um die harten Arten der Alpenrosen und einige Stechpalmen. In reinem Moorboden gedeihen diese Pflanzen übrigens nicht, gewöhnen sich im Gegentheil an jeden durchlassenden und sandigen Boden. An ihren bleibenden Standort können sie in sandige Laub- oder Nadelholzerde, Haideerde und Mischungen von solchen verpflanzt werden. Sie alle lieben Feuchtigkeit, verlangen dabei aber doch Sonne. (Vergl. §. 228, S. 338).

II. Die Aussaat der Coniferen oder Zapfenträger.

235. Die Coniferen gedeihen in ihrer Jugend bei weitem am besten in Haideerde und diese ist auch für die Aussaat allein zu empfehlen. Die Freilandsaat, welche wir später erwähnen werden, wendet man nur an, wenn es sich um Massenzucht von Pflanzen handelt; der Liebhaber und kleine Gärtner säet nicht nur seltene, sondern die auch bei uns harten Coniferen, wenn er davon nur eine beschränkte Zahl Exemplare heranziehen will, in Töpfe, Terrinen oder ähnliche Saatgefässe. Man füllt solche etwa zur Hälfte mit Topfscherben an, um einen reichlichen Wasserabzug herzustellen, und dann bis einige Centimeter unter der Oberfläche mit etwas sandiger Haideerde, die nicht sehr fest angedrückt wird, und auf welche die Samen gestreut werden. Die Bedeckung muss auch hier der Grösse der Körner entsprechen. Sie kann sehr gering sein, wenn die Saat fortwährend feucht und schattig gehalten und, um den Aufgang zu beschleunigen, auf warmen Fuss, sei es im Gewächshaus oder Mistbeet, gebracht wird. Es ist indessen recht empfehlenswerth, die Samen ohne Anwendung künstlicher Wärme zum Keimen zu bringen, indem man die Saatgefässe geschützt und schattig im Freien oder im kalten Mistbeet aufstellt, weil man dadurch widerstandsfähigere Pflanzen erzielt. — Für die Coniferen mit mittel- und sehr grosskörnigen Samen, z. B. *Araucaria*, *Cedrus Deodara*, besteht die bewährteste Aussaatmethode darin, dass man in die wie eben besprochen vorbereiteten Saatgefässe die Samen, Korn an Korn, und zwar mit der Spitze stets nach unten, so hineinsticht, dass das obere Viertel frei über der Erde steht. Die frei bleibenden Theile werden mit Moos bedeckt. Die Gefässe werden dann in ein warmes Mistbeet eingegraben. Sobald ein Korn gekeimt hat (was man daran erkennt, dass es sich hebt) wird es herausgenommen und zwar mit grösster Vorsicht (damit die junge Wurzel nicht abbricht) und für sich in Haideerde in einen Stecklingstopf gepflanzt, welcher wiederum auf warmen Fuss in ein Mistbeet gebracht und anfangs geschlossen gehalten, allmählig durch Lüften abgehärtet wird. Grosskörnige Samen mit sehr harter Umhüllung werden in gleicher Weise behandelt, doch ist es für diese sehr vortheilhaft, wenn man sie vor der Aussaat einige Stunden in warmes Wasser legt und die Schale dann vorsichtig anfeilt oder mit einem Hammer oder Nussknacker zum Spalten bringt. So oft die Erde bei solchen Aussaa-

ten, welche zum Theil einer sehr langen Keimzeit bedürfen, versauert, wird sie erneuert, d. h. die Körner werden in frisch bereitete Gefässe fortbekirt, wobei man die verdorbenen, an daran haftender modriger Erde kenntlichen, ausscheidet.

Bei der Freilandsaat im grossen, also in Baumschulen (wir sprechen natürlich nicht vom forstwirtschaftlichen Betriebe, bei welchem, wenn es sich um Aufforstungen handelt, auch breitwürfige und Büschelsaaten häufig vorkommen) wendet man fast ausschliesslich die Reihensaat, wie in §. 20 S. 62 angegeben, an. Hier hat man ja den Boden meistens so zu nehmen, wie man ihn findet, und wenn er nicht gerade ganz lehmig und undurchlassend ist, in welchem Falle man allerdings nichts erreichen würde, so lassen sich Saatbeete, welche man in möglichst schattiger Lage wählt, durch die nöthigen Vorarbeiten, namentlich Rigolen, passend herstellen. Die Samen werden, um gedrungene Pflanzen zu erzielen, nicht dicht gesäet, leicht mit Erde und ausserdem, zum Schutz gegen Austrocknen, Schlagregen u. s. w., mit Tannennadeln, Moos oder dergl. überdeckt, die Beete von Unkraut freigehalten.

Die beste Aussaatzeit für das freie Land ist in unserem Clima das Frühjahr, nur ausnahmsweise der Herbst, denn die Herbstsämlinge haben durch unseren harten Winter schwer zu leiden. Samen mit fleischiger Umhüllung, welche man schon im Herbst erhalten haben sollte, z. B. *Juniperus*, *Taxus*, werden bis zum Frühjahr aufbewahrt oder, wenn möglich, stratificiert. Mit Ausnahme der sehr hartschaligen, sowie der erwähnten fleischigen, gehen die Samen der meisten Coniferen, je nach den Sorten, binnen 2 bis 5 Wochen auf. Verzögert, unregelmässig und überhaupt sehr beeinträchtigt wird der Aufgang durch trockenes Frühjahrswetter; in der That ist für junge Coniferen Trockenheit besonders schädigend. Man sieht häufig, besonders, wenn man nicht durch Schattiren (Ueberdecken mit Laub, leichtem Reisig etc.) vorgebeugt hat, durch Dürre einen grossen Procentsatz der jungen Keimlinge hinstirben, ohne dass man mit Giessen viel dagegen ausrichtet; das einzig wirksame Mittel ist in solchem Falle schleuniges Pikiren.

Wenn jedoch die Freiland-Aussaat gelungen ist und die Sämlinge gesund stehen, so wartet man, wenn nicht zwingende Gründe vorliegen, wenigstens ein Jahr bis zum ersten Pikiren auf dem Saatbeet. Das Pikiren im grossen wird meistens im Sommer (Juni-Juli) des der Aussaat folgenden Jahres vorgenommen, wenn die Pflanzen

in Vegetation getreten sind. Man pikirt in Töpfe in Haideerde die zarteren Sorten, welche Winterschutz verlangen oder auch gewöhnliche, wenn sie als Veredelungs-Unterlagen für Topfsorten dienen sollen. Die pikirten Pflanzen werden anfangs wieder geschlossen gehalten und an Luft und Licht erst nach und nach gewöhnt. Bei dem Pikiren im Freien und im grossen richtet sich die Entfernung der Reihen nach der Grösse der Pflanzen und auch nach der Zeit, während welcher sie an dem neuen Platze bleiben sollen. Das Pikiren geschieht je nach der Grösse der Pflanzen mit dem Pflanzstock oder dem Handspaten; die Pflanzen werden angegossen und es sind dann die Beete nur von Unkraut frei zu halten. Später, d. h. so lange sie sich handhaben lassen, werden diese Pflanzen jährlich aus der Erde genommen und mit gekürzten Wurzeln gleich wieder eingepflanzt, damit sie „Ballen bilden“. Man thut dies wenn möglich bei trübem Wetter, wässert die Pflanzen bei der Gelegenheit gründlich durch und giebt ihnen dabei von Jahr zu Jahr grössere Entfernung. Das Einpflanzen in Töpfe ist gerade deshalb besonders vortheilhaft, weil in denselben eine frühzeitige Ballenbildung erzielt wird. Jedes Pikiren oder Verpflanzen der Coniferen im Freien muss rasch geschehen, d. h. die Wurzeln dürfen der Luft so wenig wie möglich ausgesetzt sein; aus diesem Grunde ist es, wie gesagt, am besten, dasselbe bei trübem Wetter vorzunehmen.

Was schon über die Spielarten der Laubgehölze wegen der Unbeständigkeit und Unsicherheit der Anzucht aus Samen gesagt wurde, gilt bei den Coniferen in noch höherem Grade. Durch Aussaaten und Ausartungen einzelner Zweige (Sportzweige), wahrscheinlich auch durch Stecklinge von noch nicht ausgebildeten Trieben sind Sorten entstanden, welche mit der Stammpflanze keine Aehnlichkeit mehr haben. Gleichwohl tragen manche keimfähigen Samen, welcher in den Katalogen geführt wird. Diese abweichenden Formen kommen fast bei allen Coniferen vor, am meisten bei *Thuja*, *Chamaecyparis* und *Cupressus*. Die von denselben stammenden Sämlinge gehen zwar häufig zur Mutterpflanze zurück, aber sie geben zuweilen auch die Form des Samenträgers wieder.

Es ist durchaus irrig, zu glauben, dass die Samen der Coniferen ihre Keimkraft sehr schnell verlieren. Dies trifft nur bei den mehrfach erwähnten fleischigen Samen, ferner bei denen der *Abies*- und *Cedrus*-Arten, *Araucaria* und einigen anderen ganz zu. Die Samen der *Cupressus*, *Thuja* und der diesen nahestehenden Gattungen

keimen noch im zweiten Jahre zu 20—60 %. Bei diesen hängt die Dauer der Keimkraft hauptsächlich davon ab, auf welche Weise der Samen geerntet wird. Wenn derselbe unter Anwendung künstlicher Wärme aus den Zapfen entfernt wird, so büsst er allerdings bedeutend an Keimkraft ein. Am längsten behält dieselbe der Samen der eigentlichen *Pinus*-, d. h. der Kiefern- oder Föhren-Arten (*P. sylvestris*, *austriaca* etc.), zuweilen über 10 Jahre, wenn er in den an der Sonne getrockneten Zapfen aufbewahrt wird. Man lasse also den Samen der Coniferen so lange wie möglich in den Zapfen, welche trocken und ausgebreitet aufzubewahren sind.

III. Die Obstbäume.

a. Die Aussaat behufs Erzielung neuer Sorten.

236. Bei der Heranzucht der Obstbäume aus Samen haben wir vor allem zwei Gesichtspunkte zu unterscheiden: ob es sich um die Erzielung neuer Sorten oder um eine Massenzucht von Wildlingen handelt. Im ersteren Falle kommt natürlich alles darauf an, dass der Liebhaber solche Samen aussäet, welche ihm auch eine Wahrscheinlichkeit bieten, dass dieselben den bereits existirenden mindestens ebenbürtige oder diese noch übertreffende Sorten hervorbringen. Derartiger Samen ist nicht aus den Handlungen zu beziehen, sondern muss von besonders schön geformten, vollständig gereiften Früchten gesammelt werden. Er muss ferner von Sorten stammen, welche diejenige Eigenschaft, die man zu verbessern oder zu vervollkommenen erstrebt, z. B. Form, Wohlgeschmack, Süssigkeit, Frühzeitigkeit, Tragbarkeit, Widerstandsfähigkeit, unter den vorhandenen bereits am besten entwickelt repräsentiren oder aus Befruchtungen derartiger Sorten hervorgegangen sein. Nicht allein setzt dieses ein hohes Verständniss voraus, sondern es erfordern solche Aussaaten auch grosse Geduld, da die Sämlinge gewisser Obstbäume zum Theil erst im 8.—12. Jahre oder noch später Früchte bringen. Ueber die Qualität der Frucht kann man sich übrigens schon nach 4—5 Jahren nach der Aussaat Rechenschaft dadurch geben, dass man einige Augen der erzielten Sämlinge auf die der betreffenden Obstart entsprechende Unterlage veredelt und auch diese Veredelungen nochmals mit sich selbst veredelt; man wird dann bald dieselbe Frucht zu sehen bekommen, wie sie der Sämling selbst erst nach vielen Jahren tragen würde. Sät man, um neue Sorten zu erzielen, in grossem Massstabe, so verfährt man

nicht anders wie bei den später zu besprechenden Landsaaten. Handelt es sich jedoch um kleine Aussaaten, so säet man, sobald die Früchte voll gereift sind, im Herbst. Wartet man bis zum Frühjahr, so empfiehlt der bekannte Obstzüchter, Herr Baltet, die Samen vorher etwa 24 Stunden lang in mit etwas Holzasche versetztes Wasser zu bringen. Man säet nach dem Verfahren des genannten Herrn in Töpfe, Terrinen oder andere Saatgefässe mit gutem Wasserabzug, so dass die Körner dicht liegen, ohne sich zu berühren, mit entsprechender Bedeckung in sandige Lauberde, stellt das Gefäss geschützt, sei es in das Gewächshaus oder z. B. in den Keller und giesst mässig, falls die Erde ausgetrocknet ist. Sobald die Samen keimen, bringt man das Saatgefäss an die Luft, giebt halbschattigen Standort und spritzt öfters und mässig. Wenn die Sämlinge 4 Blättchen über den Cotyledonen entwickelt haben, kommen sie einzeln in Töpfe von 14 bis 16 cm Durchmesser in gleiche Erdart und zwar unter möglichster Schonung der Wurzeln, deren Spitzen abgeschnitten werden. Dies geschieht auch bei den späteren Verpflanzungen in grössere Töpfe, welche mindestens einmal jährlich im Herbst vorzunehmen sind. Sind die Pflanzen genügend stark, so werden sie im Herbst, bei feuchtem Boden und in rauen Gegenden jedoch im Frühjahr an Ort und Stelle in das Freie, in gut vorbereitetes Land gepflanzt, wobei man die Wurzelspitzen wieder beschneidet, die Pflanzen ca. 1,50 m von einander entfernt bringt und jede an einem soliden Stab aufbindet. Diese Sämlinge werden keinem Schnitt unterworfen, weil man dadurch den Fruchtansatz verzögert, nur die etwa zu stark wuchernden Seitenzweige werden im Sommer durch Zurückschneiden geschwächt. Die kräftigsten Pflanzen werden nach 2—3 Jahren nochmals verpflanzt. Die gewonnenen Neuheiten sind nicht nach dem ersten, sondern erst nach wiederholtem Tragen zu beurtheilen. Es gehört eine grosse Ausdauer und Liebe zur Sache zu dieser Art von Aussaaten, um so mehr, als trotz jahrelanger Mühe Enttäuschungen nicht ausbleiben.

b. Die Freilandaussaat der Obstbäume.

237. Für diese Saaten ist es von der grössten Wichtigkeit, dass man frisch geernteten Samen der Erde übergiebt. Wenn es auch ein Vorurtheil ist zu glauben, dass jähriger Samen unkeimfähig sei, so steht doch fest, dass solcher einer längeren Keimzeit

bedarf und meistens erst im zweiten Jahre aufgeht, so dass dadurch das besäete, oft grosse Terrain ein Jahr hindurch nichts hervorbringt. Die Aussaaten im grossen, welche uns hier beschäftigen, haben den Zweck, Wildlinge, d. h. Unterlagen für spätere Veredlungen heranzuziehen. Man sät entweder im Herbst den frischen Samen oder man stratificiert denselben durch Einschichten in, oder Vermengen mit Sand bis zur Frühjahrssaat. Bei Steinobst verdient die Herbstsaat entschieden den Vorzug, weil diese hartschaligen Samen eine lange Keimzeit beanspruchen. Kernobstsamen in den Träbern von Obstpressen bewahrt sich gut auf; die hierher gehörigen Kernobst-Gattungen *Pyrus*, *Malus*, *Cydonia*, *Sorbus* werden in den grossen Saatstationen, z. B. in Orléans mit Vorliebe im Winter stratificiert und sobald die Erde offen, im Februar oder März ausgesät. Die Saatbeete legt man gern in der Richtung von Osten nach Westen. Es wird ausschliesslich die Reihensaat angewendet und die Reihen werden so weit von einander entfernt, dass man später bequem behacken kann. Man sät unter entsprechender Bedeckung nicht zu dicht. Häufiges Behacken und die Wahl eines frischen Standortes sind die besten Mittel, um die jungen Sämlinge gegen andauernde Trockenheit zu schützen, denn bei Aussaaten in grösserem Massstabe kann man nur im äussersten Nothfalle zu dem kostspieligen gründlichen Giessen Zuflucht nehmen. Die Zeit bis zum ersten Verpflanzen ist je nach den Gattungen verschieden, es ist vorzunehmen, sobald die Sämlinge stark genug sind, um es zu vertragen, je eher desto besser. Es werden dabei alle Schwächlinge ausgeschieden, bei den übrigen wird die Hauptwurzel verkürzt, damit sich zahlreiche Nebenwurzeln bilden. Manche der hier in Betracht kommenden Gattungen fürchten in ihrer ersten Jugend unsere harten Winter, man muss daher solche Sämlinge mit kurzgehacktem Stroh, Tannennadeln oder dergl. während der rauhen Jahreszeit bedecken.

IV. Die Aussaat der Beerenobststräucher.

238. Unter diesen verstehen wir die *Rubus*-Arten: Himbeeren, Brombeeren und die *Ribes*: Johannisbeeren und Stachelbeeren. Die Aussaat derselben ist weit einfacher als die der Obstbäume, denn sie beansprucht wenig Raum und wenig Zeit, bereits nach 2 bis spätestens 5 Jahren geben die Sämlinge Früchte. Wenn es sich um Erzielung neuer Sorten handelt, so gilt auch hier, was wir über

denselben Punkt bei den Obstbäumen sagten, denn es ist unerlässlich, dass nur voll ausgereifter Samen von tadellosen Früchten solcher Sorten verwendet wird, welche diejenige Eigenschaft der Frucht, die man verbessern will, in der höchsten Vollkommenheit bereits besitzen.

Wenn man nur wenige Pflanzen heranziehen will, so säet man in Töpfe oder andere Saatgefässe im Gewächshaus oder kalten Mistbeet. In grösserem Maasstabe säet man möglichst im Herbst gleich nach der Ernte, sonst stratificierten oder 1 Tag lang eingewässerten Samen im Frühjahr und zwar in kräftigen Boden. Es ist indessen wünschenswerth, dass die Oberfläche der Erde der Saatbeete mit etwas Haide- oder sandiger Lauberde vermischt und leicht beharkt wird, besonders gilt dies bei den Himbeeren. Die Samen werden nur wenig bedeckt oder etwas eingeharkt, dann wird die Erde angedrückt. Ein Auflegen von etwas kurzem Stroh, Moos, Reisig oder dergl. erhält die Feuchtigkeit und verhindert das Wegschwemmen der Samen. Man pikirt in enge Reihen. Die Himbeeren blühen im Jahre nach der Aussaat, ja, wenn man mehrmals fortpikirt, sogar schon während des Aussaatjahres. Die Brombeeren setzen selten vor dem 3. Jahre Frucht an. Wie lohnend die Aussaat derselben ist, das lehren uns die sehr wohlschmeckenden, grossfrüchtigen Sorten, welche in den Vereinigten Staaten gezüchtet worden sind und dort mit Vorliebe gepflegt werden. Um schnell Früchte zu erzielen, pikire man die Sämlinge der Brombeeren in die sonnigste Lage. Diese Pflanzen begnügen sich bekanntlich mit dem geringsten Boden, wenigstens die gewöhnlichen Sorten. Auch ist es gut, die zu üppig wachsenden durch Ausschneiden der überflüssigen Zweige zu lichten und durch Entspitzen oder auch durch Ritzen der Hauptäste oder -Triebe die Bildung von Seitenzweigen hervorzurufen, auf welchen die Früchte kommen. Die Samen der *Ribes*-Arten keimen sehr leicht, was schon daraus hervorgeht, dass die Körner aus den zur Erde gefallen Früchten häufig von selbst aufgehen. Sämlinge von Johannisbeeren tragen bereits im 3. Jahre, und zwar kommen die weiss-, roth- und schwarzfrüchtigen in der Farbe ganz treu aus Samen. Bei den Stachelbeeren erzielt man den Fruchtausatz der Sämlinge meist zwischen dem 3. und 5. Jahre. Auch alle *Ribes*-Samenpflanzen werden in enge Reihen pikirt und die übermässigen wuchernden Zweige sind wegzuschneiden.

Die Anzucht der Rosen aus Samen.

239. Die Aussaaten von Rosen geschehen in zweierlei Absicht; einmal um neue Varietäten, und dann um kräftige Wildlinge zu Veredelungsunterlagen zu beschaffen. Nur die einfachblühenden oder wilden Rosenrassen setzen mit Sicherheit Früchte an. Sorten mit lockerer Füllung fructificieren jedoch nicht selten und Sämlinge von ihnen zeigen mitunter ganz gut gefüllte Varietäten. Auch unter den edlen und beliebten Gartensorten giebt es einige, welche fast jährlich Samen tragen. Es ist selbstverständlich, dass man aus letzterem mit grösserer Sicherheit Schönes erzielt. Gewöhnlich wird jedoch ein derartiger Sämling ohne das Hinzutreten einer vorausgegangenen sorgsamten Befruchtung der Blüthen nur die Art und Erscheinung der Mutterpflanze wiedergeben. Um also wirklich Neues, womöglich Besseres hervorzurufen, muss der Züchter das Seine dazu thun. Die künstliche Befruchtung der Rosenblüthen, welche hauptsächlich in der peinlichen Entfernung der Staubfäden beruht, damit das Pistill nur den beigetragenen Pollenstaub ausgewählter Varietäten empfangt, hat jedoch insofern ihre Schwierigkeit, als in den vollen Blumen die Staubgefässe sich zum Theil verstecken, auch bei der allmählichen Entwicklung der Blüthe immer wieder welche auftauchen, so dass eine vollständige Verhütung der Selbstbefruchtung fast unmöglich wird. Es hat sich daher bewährt, die zu kreuzenden Sorten gemischt durcheinander zu pflanzen, am Fusse einer Mauer eine Sorte neben die andere, und nun am Spalier die Zweige durcheinander zu binden, und so der natürlichen Befruchtung einen breiten Spielraum zu bieten. Die indischen Rosen, vorzüglich die Bengalrosen, haben bei Kreuzung mit edlen Sorten die günstigsten Resultate gezeigt.

Die Anzucht der Rosenwildlinge aus Samen ist zwar ein langsamer Weg, nach Ueberwindung des ersten Anfangs wird jedoch eine rationelle, jährlich wiederholte Aussaat eine fortlaufende Folge an brauchbarem Material ergeben. Man bedient sich dazu des Samens von *Rosa canina*, es werden indessen auch *R. rubiginosa* und *Manetti* zu Unterlagen aus Samen gezogen. Durchaus ist es nöthig, den gewonnenen Wildlingen ein eigenes, feststehendes, gutes Quartier einzuräumen, auf welchem dieselben wuchern und starke Schösslinge treiben können. Dieses Quartier kann bei Ueberdüngung einen langen Zeitraum hindurch zur Ausbeute dienen.

Die Aussaat wird entweder im Herbst gleich nach der Reife des Samens (September-November) oder im folgenden oder, noch besser, zweiten Frühjahr bewirkt. Im ersteren Falle wird der Samen alsbald von den Schalen befreit und unmittelbar in die Erde gebracht. Er liegt jedoch ein Jahr in der Erde, ehe er keimt, und ist daher das Verfahren der Frühjahrssaat vorzuziehen. Für diese stratificiert man entweder den Samen im October-November in reinem Zustande oder, wie es sich, vorzüglich bei grösseren Quantitäten, bewährt hat, man kann ihn in den Hagebutten lassen und diese auf Haufen, ähnlich wie wir es bei den Weissdornen sehen werden, in den Keller oder an einen sonst geschützten Ort bringen. Die Hülsen kommen wohl etwas in Gährung und schimmeln auch, dies schadet jedoch dem Samen durchaus nicht. Sobald im Frühjahr Saatbeete im Freien zubereitet werden können, werden die Samen ausgewaschen und gesäet. Es kann dies bei der Saat in geschützten Kästen, bei geringen Mengen und bei Probesaaten feiner und befruchteter Sorten in Terrinen schon im Februar geschehen. Im Freien und bei Massencultur, besonders bei Wildlingszucht, bringt man die Saat in Reihen. Die Saatbeete sind auf lockerem, dabei kräftigem, sandigem Boden und in schattiger, doch warmer Lage zu wählen. Es ist zu beachten, dass die Samenkerne der verschiedenen Rosen verschiedene Stärke haben. Da der Samen nur wenige Centimeter mit Erde bedeckt werden darf, so thut man gut, denselben nach Stärke zu sortiren, damit die schwachen oder kleinen Körner nicht zu tief in die Erde kommen. In der Periode des Keimens muss das Beet vor Trockenheit geschützt werden und zwar so lange, bis die Pflänzchen 20 bis 30 cm hoch gewachsen sind. Der Samen keimt im Mai und Juni. Ungleichmässig geernteter oder Samen von Früh- und Spätsorten durcheinander gesäet, läuft unregelmässig auf und liegt zum Theil viel länger, Spätsorten kommen oft erst im nächsten Jahre hervor. Im folgenden Frühjahr werden nun diese Sämlinge in ein neu zubereitetes Beet im Abstand von 20, bei besseren Qualitäten von 30 cm verstopft. Zu dieser Operation wählt man die ersten schönen Tage. Manche wiederholen dies im zweiten Frühjahr darauf; es ist jedoch nur bei schlechtem Boden nöthig. Die Wildlinge kommen im folgenden Jahre auf das für sie bestimmte Quartier. Ein Zurückschneiden findet beim erstmaligen Verpflanzen nicht statt.

Die der Gewinnung neuer Varietäten gewidmeten Sämlingspflanzen bleiben auf den Pikirbeeten, bis sie ihre Blüthe gezeigt

haben, was im 3., 4. oder spätestens im 5. Jahre eintritt. Durch fortwährende Topfcultur hat man sogar schon im 2. Jahre Sämlinge zur Blüthe gebracht. Die Sämlinge der chinesischen oder indischen Rosen und deren Hybriden, welche sich auch durch früheres Keimen auszeichnen, blühen oft schon im 1. Jahre. Es sei noch bemerkt, dass die Rosen frische, reine Luft lieben und an geschlossenen, stagnirend heissen Standorten vom Mehlthau befallen werden.

Die Anzucht der Weissdornpflanzen

(*Crataegus Oxyacantha*).

240. Die Cultur des Weissdorns bildet einen wichtigen Handelsartikel vieler Baumschulgärtner. Wir verdanken den folgenden interessanten Bericht dem freundlichen Entgegenkommen eines der bedeutendsten Weissdornzüchters in Holstein. Derselbe schreibt:

„Für den Betrieb im grossen wird der Weissdornsamen im September oder October gesammelt. Es ist darauf zu achten, dass man nur einsteinigen Samen (*C. O. monogyna*) erhalte. Der zweisteinige keimt grösstentheils 1 Jahr später als ersterer, auch wachsen die Pflanzen nicht so schnell und geben keine so dichte Hecke. Der geerntete Samen darf nicht längere Zeit in Säcken lagern oder in grösseren Haufen aufgeschüttet werden, weil er sonst heiss wird und seine Keimfähigkeit verliert. — Jetzt folgt die Mengung des Samens mit feuchtem Sande; man nimmt von jedem Theile etwa gleich viel. Der so gemengte Samen wird in Haufen von $1\frac{1}{2}$ m Breite und 1 m Höhe aufgeschüttet und am besten mit Grassoden bedeckt.

Als Aufbewahrungsort wählt man thunlichst einen halbschattigen Raum. Hat der Samen zu viel Schatten, so pflügt ein grosser Theil nicht zu keimen; sind die Samenmiethen zu sehr der Sonne ausgesetzt, so beginnt die Keimung zu früh. — Es empfiehlt sich die im Herbst hergestellten Samenmiethen im nächsten Sommer einmal umzustechen. — In der Miethe bleibt der Samen $1\frac{1}{2}$ Jahr liegen; Samen, der im Herbst 1886 geerntet, wird also im Frühling 1888 gesät. Beste Saatzeit ist der Monat März. Sät man früher, etwa schon im Herbst, so wird der Boden zu hart und die zarten Keime können nicht hervorkommen. Weissdornpflanzen gedeihen am besten auf leichterem, gut gedüngten Boden; Leimboden ist zur Zeit des Aufgehens der Pflanzen in der Regel schon zu hart.

Der im März gesäte Weissdornsamen geht sehr bald auf, oft schon nach 14 Tagen. Die Zeit des Aufgehens ist abhängig von

grösserer oder geringerer Wärme im Februar oder März. Sehr oft ist der Samen im März schon stark gekeimt; dies ist jedoch nicht gut, weil dadurch der Wurzelhals der jungen Pflanzen sich später stark krümmt, solche Pflanzen unschön werden und sich schwer verkaufen.

In Holstein kommt es oft vor, dass man des Frostes wegen nicht säen kann. Man pflegt dann die Samenmiethen mit schlechten Wärmeleitern zu bedecken, um dadurch das starke Keimen zu verhindern. — Die jungen Pflanzen ertragen sehr starke Nachtfröste, wenn nicht kurz vorher Niederschläge stattgefunden haben. Zuweilen war der Boden so hart gefroren, dass ich mit einem schwer beladenen Wagen darüber fahren konnte, und doch waren fast keine Pflanzen erfroren. Grösseren Schaden thun die Nachtfröste, wenn die Oberfläche des Ackers nass ist. Ich pflege den Samen nicht zu decken, — woher sollte man auch so viel Deckmaterial nehmen? — sondern säe lieber etwas dicht, so dass, wenn auch mehrere Tausend erfrieren, immer noch genug übrig bleiben. Durch das Decken werden die Pflanzen auch zu zart; kommt dann etwa im Mai rauher, kalter Ostwind, so sterben sehr viele ab. Um verschulte 3jährige zu erzielen, ist es am besten, wenn die Pflanzen als 1jährige versetzt werden. Was die Pflanzzeit betrifft, so muss ich hier den Frühling wählen, da die Pflänzlinge sonst durch Frost aus dem Boden gehoben werden (in die Höhe frieren). Wo dies nicht geschieht, so ist die Herbstpflanzzeit vorzuziehen. Die Pflanzen wurzeln sich früher fest und werden im ersten Jahre viel stärker.

Die Behandlung der Weissdornpflanzen in der Hecke betreffend, ist man meistens der Ansicht, dass die Pflanzen im ersten Jahre nicht zurückgeschnitten werden dürfen, sondern es soll dieses erst im zweiten Frühling nach dem Auspflanzen stattfinden. Ich halte dieses für falsch. Ich schneide vor dem Pflanzen den Dorn bis auf circa 15 cm zurück. Der Hauptvortheil der so behandelten Pflanzen besteht darin, dass sie viel sicherer anwachsen.*) In den ersten Jahren muss die Hecke zweimal jährlich (nach dem 1. und 2. Safttrieb) gestutzt werden. Dadurch wird sie ungemein dicht und undurchdringlich. Das Ueberkreuzpflanzen ist zu verwerfen.“

*) Hier ist vorausgesetzt, dass die Wurzeln ganz frisch sind, also nicht etwa durch den Transport an Kraft verloren haben. Sonst ist es besser, erst im zweiten Jahre zu schneiden, bis wohin die neuen Wurzeln sich wieder gekräftigt haben. Die Spitzen wie auch die Wurzeln müssen aber bei trockenen Pflanzen jedesmal etwas beschnitten werden.

Weissdornsamen, wie man ihn von Samenhändlern bekommt, kann nicht so behandelt werden. Man weicht ihn einige Tage in Wasser, vermischt ihn dann mit feuchtem Sand und säet sogleich oder hebt ihn in Gefässen auf, die in die Erde gegraben werden (s. Stratificieren). Die sofortige Aussaat hat den Vortheil, dass immerhin schon im ersten Jahre Samen keimen, aber den Nachtheil, dass die Saatbeete unter Unkraut leiden, was am besten durch Bedecken mit kurzem Mist verhindert wird.

Schutz des Samens gegen Ungeziefer. Aufbewahrung.

241. Viele Gehölz-Aussaaten haben theils vor, theils nach dem Aufgehen des Samens durch Ungeziefer zu leiden und es ist von grösster Wichtigkeit, sie dagegen zu schützen. Es sind hauptsächlich Mäuse, Maulwurfgrillen und auch Vögel, welche den Samen sehr gern fressen oder im Keim zerstören. Als wirksamstes Mittel hat sich das Färben des Samens mit Mennige, oder Vermengen desselben mit Phosphorpillen vor der Aussaat bewährt. Das Färben geschieht durch Bestreuen des Samens mit der rothen Mennige, nachdem derselbe zuvor ein wenig mit Wasser besprengt wurde, hierauf reibt oder schaufelt man ihn tüchtig durcheinander (zu 100 Kilo Samen gehört ca. 1 Kilo Mennige). — Das Mergen mit Phosphorpillen verhütet besonders den Mäusefrass, Mennige gleichzeitig das Zerstören der jungen Pflänzchen durch Vögel. Falls der Witterung und Bodenbeschaffenheit wegen nicht sogleich nach Empfang der Sämereien gesäet werden kann, schütte man solche, wenn irgend möglich, aus den Säcken und lagere sie bis zur Aussaat in luftigem, frostfreiem aber ungeheiztem, Eicheln und Bucheln (Bucheckern) in nicht zu trockenem Raume. Bei den zuletzt genannten Sorten empfiehlt sich ausserdem noch das Einquellen in Wasser vor der Aussaat.

Schlussbemerkungen.

242. Das Folgende verdanken wir den gefälligen Mittheilungen eines der ersten in Orléans wohnenden Gehölzzüchters, welcher jährlich grosse Massen von Sämlingen heranzieht.

Man muss für den Betrieb im grossen die zur Aussaat bestimmten Gehölzsamen in drei Abtheilungen bringen: 1. in solche von sehr langer Keimzeit (bis 2 Jahre), 2. in solche, welche mehrere Wochen bis Monate in der Erde liegen, 3. in bald nach der Aussaat keimende. Zu 1 gehören alle hartsamigen Pflanzen mit starker, zuweilen steiniger Umhüllung. Diese müssen entweder stratificiert werden

(vergl. §. 17), oder man muss sie, wenn es damit keine Eile hat, auf besondere schattige Plätze säen, damit sie die Culturen der zeitig keimenden Pflanzen nicht stören. Das Stratificieren hat auch den Vortheil, dass man nicht nur gegen Ungeziefer gesichert ist, sondern dass diese Absonderung der langsam keimenden von den bald keimenden nicht nöthig ist und dass man das zur Aussaat bestimmte Land noch zu andern Zwecken benutzen kann. Alle sehr öligen Samen verlieren ihre Keimfähigkeit bald.

Unser Gewährsmann lässt die zum Stratificieren bestimmten Samen je nach ihrer Härte 12 bis 48 Stunden im Wasser liegen und versenkt sie in geeigneten Gefässen an gegen die Sonne geschützten Stellen in die Erde. Harte Samen, welche wegen später Ernte nicht vor Winter stratificiert werden können, lässt er einige Tage in 20 bis 25 Grad warmem Wasser liegen, vermischt sie dann mit Sand und bewahrt sie an einem warmen Orte auf. Er will ferner, dass alle Aussaaten im freien Lande mit einer dünnen Schicht von nicht zu frischem, möglichst strohfreiem Pferdemist bedeckt werden, welche Schicht das Festschlagen des Bodens durch Regen verhindert, die Feuchtigkeit erhält und zugleich düngt. Zur Aussaat grösserer Mengen von feinsamigen Coniferen und anderen werthvollen feinen Sämereien empfiehlt er, ein nicht warmes Mistbeet unten mit Steinplatten, Schiefer oder Backsteinen und Dachziegeln auszustreuen, um das Eindringen von Maulwürfen und Mäusen zu verhüten, und darauf sehr sandige Haideerde zu bringen.

Für den gefährlichsten Feind der Gehölzsaaten im freien Lande und Saat-Mistbeete hält unser Gewährsmann die Maulwurfsgriffe, welche durch ihre Gänge die Wurzeln der keimenden Pflanzen beschädigt, ein Vertrocknen derselben und das Versinken der gekeimten oder noch keimenden Samen in die Tiefe veranlasst. Da die gewöhnlichen Vertilgungsmittel dieses in manchen Gegenden so häufigen, schädlichen Insekts bei Saaten oft nicht anwendbar sind, so hat es sich bewährt, Kapseln von Gelatine mit 10 Gramm Schwefelalkohol (leicht entzündlich) in die Gänge zu legen. Durch die Feuchtigkeit erweicht die Gelatine und lässt die tödtliche Masse von sich. 6 bis 8 Kapseln sollen auf einen Quadratmeter genügen. Das von uns empfohlene Färben gewisser Samen mit Mennige zum Schutz gegen Mäuse und Vögel, soll bei Saaten, welche sehr lange in der Erde liegen, sich nicht bewähren, weil dieser Stoff sich in der feuchten Erde nach längerer Zeit ablöst und wohl auch an Kraft verliert.

Tabellarische Zusammenstellung

derjenigen Gehölzgattungen, von welchen sich Samen ziemlich regelmässig in den Catalogen angeboten finden, mit besonderer Berücksichtigung des Verfahrens bei der Aussaat.

N a m e n.	Familie.	Baum.	Strauch.	Schlingend.	Obst:				Sommergrün.	Sommer- u. wintergrün.	Winterschutz im Freien (Bedeckung, Einbinden).	Frostfrei überwintern.
					Beerenobst.	Kernobst.	Steinobst.	Schalenobst.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Acacia Julibrissin	Papilionaceae	x							x		x	x
Acer, Ahorn	Acerineae	x							x			
japanische Arten	"	x	x						x		x	
Negundo, N. violaceum (californicum)	"	x							x			
striatum (pennsylvanicum)	"	x							x			
Aesculus, Rosskastanie	Hippocastaneae	x							x			
Ailanthus glandulosa, Götterbaum	Zanthoxyleae	x							x			
Alnus, Erle	Betulaceae	x							x			
Amelanchier, Traubenbirne	Rosaceae		x						x			
Amorpha, Uniform, Bastard-Indigo	Papilionaceae		x						x			
Ampelopsis, wilder Wein, Jungfernwine	Ampelideae			x					x			
Amygdalus communis, essbare Mandel	Amygdaleae	x						x	x		x	

(Wenn ausser der Colonne 16 gleichzeitig auch 14 oder 15 ausgefüllt ist, so deute man dies dahin, dass gewöhnlich die Aussaat in Saatgefässen unter Glas auszuführen ist, dass man jedoch in besonders günstigen Lagen auch in das freie Land säen kann. — Gattungen, welche sich weder in Col. 12 noch 13 vorgemerkt finden, sind winterhart. — Betreffs der hier fehlenden Gattungen verweisen wir auf das Register.)

Aussaat:			in das Land	in Saatgefässe unter Glas.	Schönblühend; der Flor fällt in die Monate	Eignet sich:			Blüthen wohlriechend.	Besondere Bemerkungen.
Frühjahr.	Herbst.					als Einzelpflanze.	für Gehölzgruppen und im Park.	für Hecken.		
14	15	16			17	18	19	20	21	
										22
x		x			6—8	x			x	Aussaat unter Glas nicht vor Mai. Leichte Erde. Kann nur in Südeuropa im Freien stehen, dort wegen Wohlgeruchs der Blüthen sehr beliebt. Höchst decorativ.
										Schöne Alleeabäume, besonders auch zu Nutzholzpflanzungen zu empfehlen. A. Negundo fol. var. ist der schönste buntblättrige kleine Baum. Auch andere, namentlich die nordamerikanischen Arten zieren durch bunte Blätter und Herbstfärbung. Herbstaussaat oder im Frühjahr stratifizierte Saat. Samen schwach oder nur mit Moos oder Laub bedecken. Die Sämlinge der harten Arten werden nach 2 Jahren verpflanzt und im 4. Jahre an Ort und Stelle gebracht. Die jungen Sämlinge sind empfindlich gegen Frühjahrsfröste. A. Pseudo-platanus purpureus kommt ziemlich constant aus Samen.
x	x					x	x			Die japanischen Arten, besonders A. polymorphum (japonicum) werden durch Zurückfrieren oft strauchartig. Die Herbstfärbung ist prächtig roth.
x	x					x	x			Der wahre N. californicum, ein sehr raschwachsender Baum, erfriert in Deutschland oft. Die Art ist selten echt in den Gärten, dafür gilt A. Negundo violaceum. Lieben kräftigen Boden.
x		x				x	x			Nur bei aus Samen erzeugenen oder ganz tief veredelten Bäumen kommt die eigenthümliche, hell gestreifte Rinde zur vollen Geltung.
x	x									Frische Kastanien werden im October, stratifizierte meistens im Februar—März 8 bis 10 cm tief in die Erde gelegt. Die Saat ist gegen das Wild zu schützen. A. macrostachya (parviflora) trägt in Europa selten Früchte. Die Varietäten kommen aus Samen nicht sicher echt. Die amerikanischen Arten mit glattschaligen Früchten kommen auch als Pavia vor. Gedeihen überall, besonders gut in etwas feuchten Bodenarten.
x		x				x	x			Jung frostfrei überwintern. Aussaat leicht mit Moos oder dergl. bedecken. 3 bis 4 jährige Sämlinge können an Ort und Stelle gepflanzt werden. Liebt sonnige, gegen starke Winde geschützte Lage. Wächst ungemein rasch. Das Laub dient als Futter für eine Art Seidenraupe. Vorzüglicher Alleebaum.
x	x									Gedeihen überall, besonders in feuchten und nassen Lagen; die Weisserte (Bergerte) dicht säen und mit kurzem Moos bedecken. Saatbeete fortwährend feucht halten. Im Spätherbst verpflanzen. 3—4 jährige Sämlinge können an Ort und Stelle gepflanzt werden.
x	x				4—5		x		x	Gedeiht auf etwas frischem, aber auch auf trockenem oder steinigem Boden. Die Blätter färben sich im Herbst roth. Zur Frühjahrsaussaat wird der Samen stratifiziert.
x										Jung frostfrei überwintern. Schön für niedrige Gebüsche. Herrliche Belaubung. In kalten Wintern frieren die nicht verästeten Stengel oft bis zum Boden ab, treiben aber kräftig wieder aus. Die Stengel liefern Blumenstäbe. Fürchten starken Wind. Lieben feuchten Boden. Aussaat im April, Samen vorher 24 Stunden in Wasser legen.
x					6—8	x	x			Die beliebteste hotzige Schlingpflanze für Wände, Geländer, Bäume, Felsen. Im Herbst werden die Blätter schön roth. Einige Arten kommen auch als Cissus und Vitis vor. Wächst sehr rasch aus Samen, der am besten in den Beeren gleich nach der Ernte stratifiziert und im März—April gesät wird.
x	x				3—4			x		Um Untertagen für süsse Mandeln und Pfirsiche heranzuziehen, säet man die bittere Mandel. Auch aus Samen der süssen Mandel entstehen fast immer nur Bäume mit bitteren Früchten. Sämlinge, welche tragen sollten, an Ort und Stelle weit pflanzen, da dieselben oft erst nach 6—10 Jahren Früchte bringen.

N a m e n.	Familie.	Baum.	Strauch.	Schlingend.	Obst:				Sonnergrün.	Sommer- u. wintergrün.	Winterschutz im Freien (Bedeckung, Einbinden).	Frostfrei überwintern.
					Beerenobst.	Kernobst.	Steinobst.	Schalenobst.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Amygdalus persica, Pfirsiche	Amygdaleae	x					x		x		x	
strauchartige, nana etc.	„		x						x		x	
Andromeda	Ericaceae		x							x	x	
Anona (Asimina) triloba	Anonaceae	x	x						x		x	
Aralia japonica, spinosa	Araliaceae		x						x		x	
Araucaria	Coniferae	x								x		x
Arbutus, Erdbeerbaum	Ericaceae	x	x							x		x
Arctostaphylos, Bärentraube	„		x						x	x		
Aristolochia, Pfeifenstrauch oder Heberblume	Aristolochieae		x	x					x			
Arthrotaxis	Coniferae	x									x	x
Azalea americana, mollis, occiden- talis, pontica	Rhodoraceae		x						x		x	
Benthamia	Cornaceae		x							x	x	x
Berberis, Sauerdorn und Mahonia	Berberideae		x		x				x	x		
Betula, Birke	Amentaceae	x							x			

Aussaat:			in das Land	Herbst.	in Saatkübeln unter Glas,	Schönbühnd; der Flor fällt in die Monate	Eignet sich:			Blüthen wohlriechend.	
Frühjahr.							als Einzelpflanze.	für Gehölzgruppen und im Park.	für Hecken.		
14	15	16	17	18	19	20	21				
Besondere Bemerkungen.											
										22	
x	x	x	3—4								Zur Zierde werden ausser der rothblüthigen meist nur gefülltblühende Sorten gepflanzt, welche man auf Pfäulen oder Mandeln veredelt. Sie lassen sich gut treiben und werden zu diesem Zwecke in Töpfen gezogen. Die Pflänzlinge bringen nach 3—4 Jahren Früchte.
x	x	x	3—4	x	x						Man sät entweder frisch geernteten Samen im October oder stratificierten im Februar bis März, sobald offenes Wetter. Die jungen Sämlinge sind gegen Frühjahrsfröste zu schützen. Vergl. §. 23.
		x	6—8		x						Hierher gehören auch die Gattungen Cassandra, Zenobia, Pieris, Oxydendrum, Leucothoe, Lycopodium. Die feinen Samen werden in sandige, fein gesiebte Haide- oder Moorerde gesät, die jungen Pflanzen in Töpfen cultivirt. Auch später verlangen sie ein Moorbeet und Nadelstreuendeckung. Lieben Halbschatten. Vergl. §. 224.
x	x	x	5—6								Liebt leichten, nährhaften Boden oder Haideerde. Aussaat wie bei Amygdalus angegeben. Frucht essbar. Eine sehr (besonders jung) zärtliche Pflanze. A. glabra ist noch empfindlicher und die übrigen Species verlangen Warmhaus-Cultur.
		x		x			x				Schöne Blattpflanze, die als Strauch mit mehreren Stämmchen schöner ist, als Bäumchen. Erfriert oft tief herab, was aber der Schönheit nicht schadet. Aussaat März—April. Haideerde zur Cultur und bei der Saat anwenden. Gedeihen in jedem Boden. A. spinosa hat wohlriechende Blumen.
		x		x			x				Im Süden und noch in England winterhart. Die tangen Samen keimen am besten, wenn man sie nur halb mit der Spitze in die Erde steckt, oberhalb nur mit Moos bedeckt. Vergl. §. 23.
x		x	8—9	x	x						Kann nur im Süden im Freien stehen und zielt dort besonders durch die erdbeer-ähnlichen geniessbaren Früchte, und die bei einigen Arten rothe Rinde. Freiland-aussaat im Frühjahr mit im Januar stratificierten Samen in begünstigten Lagen möglich. Saat frisch und schattig halten. Verlangt leichte, sandige und doch nährhafte Erde.
x		x									Diese in Haiden und hohen Alpenhöhlen vorkommenden Pflanzen wachsen am Boden ausgebreitet und eignen sich für Felsenbeete. A. uva ursi ist rothfrüchtig und wintergrün, A. alpina schwarzfrüchtig und sommergrün. Zieren durch ihre Beeren. Sie gedeihen auf humusreichem Sandboden. Aussaat wie bei Andromeda.
x		x									Beliebte Schlingpflanze mit 20 cm grossen Blättern. Besonders schön zur Bekleidung von Lauben, Gängen u. dergl. Liebt sehr nährhaften Boden und Schatten. Junge Pflanzen gedeihen am besten, wenn sie 2—3 Jahre in Töpfen gezogen werden. Aussaat am besten im März.
		x									Kalthaus-Cultur. In sandiger, lockerer Haideerde in Töpfen mit gutem Wasserabzug cultiviren. Im Sommer in das Freie aufstellen, A. selaginoides ziemlich hart. Erreichen bei uns keine grossen Dimensionen.
		x	5		x			x		x	Diese prächtigen Blütensträucher müssen wie andere Haideerdepflanzen bis zu einer gewissen Grösse in Töpfen cultivirt werden, gedeihen auch später am besten im Moorbeet. Die Farben kommen aus Samen selten echt, nur bei der gelben A. pontica, lassen sich leicht treiben. Ueber Aussaat vergl. §. 224.
x		x		x	x						Kann nur im Süden ganz im Freien als kleiner Baum cultivirt werden, lässt sich aber als kleiner Strauch bedeckt im Freien durchwintern und treibt, wenn in den oberen Theilen erfroren, vom Wurzelstock aus. Samen keimt leicht. Sämlinge anfangs einzeln in Töpfe pflanzen. Früchte, welche sich bei etwa 5jährigen Sämlingen zeigen, erdbeerähnlich.
x	x		5				x	x			Wintergrün sind nur B. Darwini, dulcis und buxifolia und alle Mahonia. Diese vertragen keine hohe Kälte und werden besser frostfrei durchwintert. Die zahlreichen harten B. blühen in gelben hängenden Trauben, zieren aber noch mehr durch hochrothe Früchte, welche auch als Beerenobst gelten. Aussaat in leichte Erde. Sämlinge in das freie Land oder noch besser einzeln in Töpfe pflanzen, sie bringen ungefähr im 4. Jahre Früchte. Gedeihen in jedem leichten Boden, am besten in sandigem Humusboden und lieben Schatten.
x	x			x	x						Die B. sind vorzugsweise Wald- und Parkbäume. Dicht säen, die Saat mit kurzem Moos bedecken und fortwährend feucht erhalten. Birkenamen wird häufig mit Erfolg auf Schnee ausgesät. Vergl. §. 233.

N a m e n.	Familie.	Baum.	Strauch.	Schlingend.	Obst:				Sommergrün.	Sommer- u. wintergrün.	Winterschutz im Freien (Bedeckung, Einbinden).	13
					Beerenobst.	Kernobst.	Steinobst.	Schalenobst.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bignonia capreolata, grandiflora, radicans (Tecoma).....)	Bignoniaceae			x					x		x	
Broussonetia, Papier - Maulbeer- baum	Urticeae	x	x						x		x	
Buddleya	Scrophularineae		x							x	x	x
Bupleurum fruticosum	Umbelliferae		x							x		
Buxus, Buchsbaum	Euphorbiaceae		x							x		
Callicarpa, Schönfrucht	Verbenaceae		x						x		x	
Callitris	Coniferae	x								x		x
Calluna, gemeine Haide	Ericaceae		x							x		
Calophaca wolgarica.....	Papilionaceae		x						x			
Calycanthus, Gewürzstrauch	Calycanthaceae		x						x			
Capparis, Kapernstrauch	Capparidaceae			x						x		x
Caragana, Erbsenbaum	Papilionaceae		x						x			
Carpinus Betulus, Hainbuche, Weiss- buche	Cupuliferae	x							x			
Carya, Hickorybaum	Juglandaceae	x							x			
Castanea vesca, essbare Kastanie	Cupuliferae	x						x	x		x	x
Casuarina	Casuarineae	x								x		x
Catalpa, Trompetenbaum	Bignoniaceae	x							x		x	

Aussaat:			in das Land	in Saatgefäße unter Glas.	in Saatgefäße unter Glas.	Schönblühend; der Flor fällt in die Monate	Eignet sich:			Blüthen wohlriechend.	Besondere Bemerkungen.
Frühjahr.	Herbst.						als Einzelpflanze.	für Gehölzgruppen und im Park.	für Hecken.		
14	15	16	17	18	19	20	21				
		x	6—9								Die rankenden, herrlich blühenden B. kommen jetzt meistens als <i>Tecoma</i> vor, und man cultivirt <i>B. radicans</i> und die niedrig bleibende <i>grandiflora</i> . Dieselben verlangen die volle Sonne, am besten eine Mauer ohne Spalter, worin sie Wurzeln machen. <i>B. grandiflora</i> muss bedeckt werden. Vor der Aussaat sind die Samen 24 Stunden in Wasser einzuweichen. In leichten Boden säen und recht schattig halten.
x	x			x	x						Im Süden ein kleiner Baum, bleibt sie nördlicher ein 1—2 m hoher Strauch. Sie zielt durch grosse, schön geformte Blätter. Erfriert häufig, treibt jedoch gut wieder aus. Liebt leichten Boden ohne stagnirende Feuchtigkeit. Freilandaussaat im späten Frühjahr, da die jungen Sämlinge sehr empfindlich gegen Frost sind.
		x	7—9		x				x		Gedeihen in jedem Boden, leiden jedoch in strengen Wintern, daher geschützt zwischen andere Sträucher oder in südliche Lagen pflanzen. Erst im Frühjahr zurückschneiden. Sehr reichblühend. <i>B. globosa</i> ist wohlriechend, kann aber nicht im Freien gezogen werden.
x	x				x						Auf trockenem, steinigem Boden und der vollen Sonne ausgesetzt zu pflanzen. Blüthen unschön.
		x			x	x	x				Für nördlichere Gegenden fast der einzige winterharte Strauch, welcher sich auch zu Schmuckhecken verwenden lässt. Der zu Beeteinfassungen benutzte niedrige B. wird nicht aus Samen erzogen. Die Saat in Gefässe und Cultur der jungen Pflanzen in Töpfen ist vorzuziehen. Gedeiht in jedem Boden, liebt jedoch Schatten und unterwirft sich willig dem Schnitt. Samen gleich nach der Ernte aussäen.
		x	7—8		x	x					Seltene Sträucher, sehr züchtlich; ihre Hauptzierde, die grossen rothen Früchte, kommen in nördlichen Gegenden nicht zur Ausbildung. Die C. lieben feuchten, lockeren Boden und gedeihen am besten im Moorbeete.
		x			x						Diese Conifere ist nur im Süden im Freien zu überwintern, dort aber in den Gärten sehr beliebt. Es sind cypressenartige Pflanzen.
x	x	7—10									Gedeiht nur auf Sandboden und in Haideerde. In Masse wohlriechend. Der feine Same wird in Gefässe gesät und schwach oder nur mit einer Glastafel bedeckt. Vergl. S. 226 und 227.
x		4—6			x						Hübscher Strauch mit goldgelben Blüthen, welcher fast nur aus Samen erzogen wird. Gedeiht in jedem Boden. Aussaat nicht vor April—Mai.
x		5—6		x	x				x		Sträucher mit köstlich duftenden Blüthen. Ganz winterhart, nur <i>C. occidentalis</i> (macrophyllus) verlangt in nördlicheren Gegenden Winterschutz. Samen wird im Februar stratificiert und im April gesät. Gedeihen in jeder Lage.
		x	5—8								Dieser halb kriechende kleine Strauch kann nur im Süden im Freien gezogen werden, wo er zwischen Steinen wächst. Bei uns würde Topfcultur nöthig sein. Die Blumen sind prächtig. Verlangt sandige Erde.
x		4—6		x	x	x					Sträucher von sehr verschiedener Grösse. Zu Hecken eignet sich nur <i>C. arborescens</i> . Wachsen rasch, auch in sehr geringem Boden.
x	x				x	x	x				Als Waldbaum und, da er den Schnitt gut erträgt, besonders zu Hecken geschützt. Die Samen werden am besten mit Moos oder Laub leicht bedeckt. Gleich nach der Ernte stratificieren und im 2. Jahr säen. Gedeiht in jedem Boden.
x	x				x	x					Bilden durch herrliche Belaubung schöne Parkbäume, sollten aber auch waldartig für Nutzholz angebaut werden, welches zu dem besten, zähesten gehört. Lieben feuchten Boden. Die Nüsse etwas anfeilen, oder tief säen und feucht halten.
x	x				x	x					Schöner Parkbaum; gedeiht besonders im Gebirge auf kieselreicherhaltigem Boden, weniger auf Kalk. In milden Gegenden als Waldbaum der Eiche gleichwerthig, aber rascher wachsend. Aussaat in kräftigen Boden. Bei Frühjahrssaat empfiehlt es sich, die Kastanien vorher 48 Stunden in Wasser einzuweichen.
		x									Ist nur im Süden im Freien zu ziehen, wo sie herrliche, vorzüglich zähes und hartes Holz liefernde hohe Bäume bilden. Lieben kräftigen Boden und während des Wachstums reichliche Bewässerung. Aussaat unter Glas oder im Warmhaus, in Töpfen heranziehen. Raschwachsend. Jährlich verpflanzen.
x	x	7—8		x							Prächtiger kleiner Baum mit denen der Kösskastanie ähnlichen Blüthen. Gedeiht gut auf Anhöhen. Liebt kräftigen Boden und Halbschatten. Freilandaussaat im späten Frühjahr, da die jungen Sämlinge empfindlich gegen Frost sind.

N a m e n.	Familie.	Baum.	Strauch.	Schlingend.	Obst:				Sommergrün.	Sommer- u. wintergrün.	Winterschutz im Freien (Bedeckung, Einbinden).	Frostfrei überwintern.
					Beerenobst.	Kernobst.	Steinobst.	Schalenobst.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ceanothus, Säckelblume	Rhamneae		x						x		x	
Cedrus, Ceder	Coniferae	x								x	x	
Celastrus, Baumwürger	Rhamneae			x					x			
Celtis, Zürgelbaum	Urticeae	x							x		x	
Cephalanthus occidentalis	Rubiaceae		x						x		x	
Cephalotaxus	Coniferae		x							x	x	
Cerasus, Weichsel- od. Sauerkirsche	Drupaceae	x	x				x		x			
Ceratonia, Johannisbrotbaum	Papilionaceae	x								x		x
Cercis, Judasbaum	"	x	x						x		x	
Chamaecyparis	Coniferae	x								x		
Chionanthus, Schneeflockenbaum .	Oleaceae		x						x		x	
Cissus	Ampelideae			x						x		x
Cistus	Cistineae		x							x		x
Clematis, Waldrebe	Ranunculaceae			x					x		x	
Clethra	Ericaceae		x						x			x
Colutea, Blasenstranch	Papilionaceae		x						x			

Ansaat:			in das Land	Frühjahr.	Herbst.	in Saatgefäße unter Glas.	Schönblühend; der Flor fällt in die Monate	Eignet sich:			Blüthen wohlriechend.	Besondere Bemerkungen.
								als Einzelpflanze.	für Gehölzgruppen und im Park.	für Hecken.		
14	15	16	17	18	19	20	21					
x		x	5—8	x	x							Sehr schön und lange blühende Sträucher; die weissblühenden sind vollkommen winterhart, die bläulichen sind nur unter guter Bedeckung zu durchwintern. Gedeihen überall, besonders gut in leichtem Boden und halbschattiger Lage. Aussaat nicht vor April-Mai.
		x		x								Die Cedern sind besonders für milde Gegenden geeignet, doch kommen auch in Norddeutschland grosse Bäume vor. Sie lieben schattige Lagen. C. Deodara verlangt nahrhaften Boden. Saatgefäße schattig stellen, einzeln in Töpfe pikiren und in solchen bis zum Auspflanzen gross ziehen. Samen hält sich nur 1 Jahr lang. Diese etwas wild wachsende Schlingpflanze eignet sich zur Bedeckung von Mauern und Lauben. Bäume umringt sie so stark, dass diese darunter oft leiden. Besonders hübsch, wenn mit ihren orangerothen Früchten bedeckt. Aussaat April bis Mai in leichter Erde.
x												Diese ulmenartigen Bäume gedeihen gut in südlichen Gegenden, sie erfrieren in nördlichen häufig an den Spitzen. Im Süden gelten sie als gutes, zähes Nutzholz. Zur Frühjahrssaat stratificierten Samen. Saat etwas bedecken und feucht halten. Nach 2 Jahren pikiren. An Ort und Stelle pflanzen, wenn etwa 1 m hoch. Sonnige Lage, lockerer, dabei frischer Boden sagt ihnen zu. C. orientalis besonders empfindlich.
x	x							x				Etwas empfindlich; geschützt und schattig zwischen andere Sträucher in kräftigen Boden pflanzen. Wird nur ca. 1 1/2 m hoch, bringt kleine, gelblich weisse Blume.
x		x						x				Die echten C. sind in südlichen Gegenden kleine Bäume, nördlicher meist Sträucher, den Tazus verwandt. Sie verlangen eine geschützte, schattige Lage. Samen im Januar stratificieren, im April unter Glas aussäen.
x	x		4—5	x	x							Im Frühjahr säet man stratificierten Samen. Die Sämtlinge tragen im 4. oder 5. Jahre Früchte. Wir besprechen die einzelnen Species, welche vielfach unter C. geführt werden, unter Prunus in dieser Tabelle.
x		x										Für den Süden geeignet, wo die Früchte ein Pferdeulm liefern. Sehr sonnig stellen. Die grossen Samen stark bedecken. Freilandsaat nur in besonders geschützten Lagen erfolgreich. Saat wenig giessen. In Töpfen heranziehen.
x		x	4—5	x	x							Interessante Sträucher, bei denen die Blüthentrauben am alten Holze erscheinen. C. canadensis ist ganz winterhart, C. Siliquastrum zärtlicher. Lieben nahrhaften, durchlassenden Boden. Aussaat im Mai. Sämtlinge empfindlich gegen Frost. Verpflanzung im Herbst an Ort und Stelle, wenn etwa 2 m hoch.
		x						x	x	x		Diese Gattung enthält sehr verschiedene Arten, welche auch unter den Namen Thuja, Cupressus etc. vorkommen. Sie stehen Thuja nahe. Aussaat in leichte Haideerde, oft aber vorsichtig giessen und stets schattig halten. Einzeln in Töpfen heranziehen. Die japanischen Arten sind sehr empfindlich.
x			5—6	x	x							Prächtig deblauer und schön blühender Struch oder kleiner Baum, alter ganz hart. Liebt kräftigen Boden und halbschattige Lage. Der Samen wird im Herbst stratificiert und am besten erst im zweiten Frühjahr gesät.
x		x										Die wenigen Species, welche man in das Freie pflanzen kann, wie C. japonica und orientalis verlangen Winterschutz oder Durchwintern an geschützter Stelle.
		x	5—10	x								Die C. sind bei uns im Kalthause zu überwintern und in Töpfen zu halten. Sie lieben sehr kräftige, sandige Erde und verlangen im Freien den sonnigsten Standort. Die Saat darf nicht zu nass gehalten werden.
x	x	x	6—9	x						x		Die C. sind verschieden in Bezug auf Winterhärte und Geruch. Nur die japanischen Arten und die davon stammenden Hybriden bedürfen Winterschutz. Samen gleich nach der Ernte stratificieren. Können schon im Juli ausgesät werden. Keimen langsam. Saat durch Decken mit Moos oder feuchtem Laub stets schattig halten. Sie lieben die volle Sonne und durchlassenden, nicht schweren Boden. Der Samen verliert rasch die Keimkraft.
x		x	7—10		x							C. alnifolia ist winterhart und wohlriechend. Gedeiht am besten in schattiger Lage im Laide- oder Moorbeete, aber auch in anderen feuchten Bodenarten. C. arborea ist wintergrün und nur frostfrei zu durchwintern.
x			6—9	x	x							Schön und lange blühend und durch blasse Samenschatten ziehend. Die Zweige müssen alljährlich zurückgeschnitten werden. Die C. werden leicht von Hasen und Kaninchen abgefressen. Gedeihen in jedem Boden. Aussaat nicht vor April-Mai.

N a m e n.	Familie.	Baum.	Strauch.	Schlingend.	Obst:				Sommergrün.	Sommer- u. wintergrün.	Winterschutz im Freien (Bedeckung, Einbinden).	Frostfrei überwintern.
					Beerenobst.	Kernobst.	Steinobst.	Schalenobst.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Coriaria myrtifolia, Gerberstrauch	Coriariaceae		x							x	x	
Cornus, Hartriegel	Cornaceae		x						x			
mas, Kornelkirsche oder Herlitzke	"	x	x				x		x			
Coronilla glauca, Kronenwicke ...	Papilionaceae		x						x			
Corylus Avellana u. V., Haselnuss	Cupuliferae		x					x	x			
Cotoneaster, Quittenmispel	Pomaceae		x						x	x		
Crataegus, Dorn	Rosaceae	x	x						x			
Cryptomeria	Coniferae	x	x							x	x	
Cunninghamia	"		x							x	x	
Cupressus, Cypresse	"	x	x							x		x
im Freien aushaltende (Chamaecyparis	"	x	x							x		
Cydonia chinensis, japonica (Pyrus)	Rosaceae		x						x			
vulgaris, Quitte	"		x			x			x			

Besondere Bemerkungen.

Aussaat:			in das Land	Eignet sich:	Elfilien wohlriechend.	22
Frühjahr.	Herbst.	in Saatgefäße unter Glas.				
14	15	16	Schönblühend; der Flor fällt in die Monate	als Einzelpflanze, für Gebüschgruppen und im Park.	für Hecken.	21
x		x		x		Zärtlicher immergrüner Strauch mit zierenden schwarzen Früchtchen, welcher bei uns auch bedeckt den Winter selten ohne Beschädigung aushält. Treibt jedoch meist wieder aus. Liebt sandigen Boden und sonnige Lage.
x	x		5—8	x		Gedeihen fast überall, ziehen frisches Terrain und schattige Lage vor. Frühjahrs-aussaat im März mit Samen, welcher im Dezember eingeschichtet worden ist.
x	x		3—4	x	x	Die einzige Art, die als Obstfrucht gezogen wird, sowohl als kleiner Baum wie in Strauchform. Schön für Hecken. Samen gleich nach der Ernte säen oder sofort stratificieren und im 2. Frühjahr säen. Herbstaussaat keimt im folgenden Frühjahr. Sämlinge bringen im 3. oder 4. Jahre Früchte.
		x	5—8	x	x	Betiebter Bocketstrauch, in harten Wintern oft erfrierend und von Hasen und Kaninchen gesucht, treibt aber gut wieder aus. Lässt sich durch Auskneifen resp. Beschneiden in beliebigen Formen ziehen. In recht sandige Erde unter Glas säen und nicht zu feucht halten. In Töpfen heranziehen.
x	x			x	x	Bekannter Obststrauch; im Ziergarten werden besonders die rothblättrige Blutnuss und die geschlitzblättrige Haselnuss gepflanzt. Die Varietäten kommen nicht immer echt aus Samen. Man stratificiert die Haselnüsse im October und säet solchen Samen im Frühjahr. Wegen des Schadens, welchen das Ungeziefer der Herbstaussaat thut, wird die Frühjahrssaat vorgezogen. Die C. können in jedem Boden gesät und cultivirt werden. Die Samen keimen rasch und liefern schon im 1. Jahre hübsche Pflanzen, welche nach 3—5 Jahren, in armen Bodenarten noch eher, Früchte tragen. C. columna wird baumartig.
x	x		4—6	x	x	Die Arten mit immergrünen Blättern und schönen Früchten eignen sich für Felsenpartien und Einfassungen, werden auch durch Veredelung auf Crataegus zu Bäumchen gebildet. Samen wird gleich nach der Ernte gesät oder im September-October eingeschichtet und im 2. Frühjahr gesät. Aussaat und Cultur in beliebigem Boden. Ueber die Aussaat des Weissdorn C. oxyacantha s. §. 249.
x	x		5—6	x	x	Die Arten von C. sind sehr zahlreich, daher ist auch die Verwendung verschieden. Die beliebteste Varietät, C. oxyacantha rubra, der Rothdorn, pflanzt sich nicht immer echt aus Samen fort. C. pyracantha siehe Mespilus.
x		x		x	x	Mehr für Südeuropa und die wärmsten Lagen von Mitteleuropa, haben sich die C. doch hier und da, auch bei uns als winterhart erwiesen. Sie lieben Schatten, Feuchtigkeit und Schutz von Nadelholzbäumen, und müssen bis zu einer gewissen Grösse in Töpfen cultivirt werden. Sämmtlich in leichte Haideerde aussäen; oft aber wenig auf einmal gessen, Aussaat stets schattig halten.
x	x			x	x	Im Süden kleiner Baum, kann nördlicher nur als Strauch im Freien gezogen werden. Liebt Schatten und Baumschutz und muss jung in Töpfen cultivirt werden. Freilandaussaat nur in besonders geschützten Lagen im späten Frühjahr. Vergl. §. 235.
		x		x		Die japanischen Arten, ferner C. funebris, Knightiana, luscitana, torulosa u. a. säet man besser unter Glas. Auch die wahre Pyramiden-Cypresse hält nördlich der Alpen nur in wenigen geschützten Lagen im Freien aus.
x	x			x		Hierher gehört besonders C. Lawsoniana mit vielen Varietäten, thuyoides (sphaeroides), thuyifera und Chamocyparis nutkaensis (Thujopsis borealis), welche nur in sehr kalten Wintern leicht beschädigt werden. Lieben Feuchtigkeit.
x	x		4—6	x	x	Beliebte Ziersträucher, verschiedene roth, auch weiss blühend. Die Samenpflanzen sind veränderlich in der Farbe. Durch Anbinden und Beschneiden lassen sich Pyramiden bilden. Lassen sich früh und mit wenig Wärme treiben. Gedeihen in jedem Boden und wachsen rasch. C. chinensis ist wohlriechend. Aussaat im Herbst gleich nach der Ernte oder besser im ersten Frühjahr mit im Winter stratificiertem Samen. Vergl. §. 237.
x	x		5	x		Die essbare Quitte ist zugleich schön blühender Zierstrauch, auch wird sie besonders viel als Veredelungs-Unterlage für Dornen gebraucht. Verlangt feuchte Lagen. Sämlinge bringen vom 5.—8. Jahre an die ersten Früchte.

N a m e n.	Familie.	Baum.	Strauch.	Schlingend.	Obst:				Sommergrün.	Sommer- u. wintergrün.	Winterschutz im freien (Bedeckung, Einbinden).	Frostfrei überwintern.
					Beerenobst.	Kernobst.	Steinobst.	Schalenobst.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cytisus, Goldregen	Papilionaceae		x						x			
Dammara	Coniferae	x								x		x
Daphne Mezereum, Kellerhals, Seidelbast	Thymeleae		x						x			
wintergrüne	"		x							x	x	x
Desmodium	Papilionaceae		x						x			
Deutzia	Philadelphaeae		x						x			
Diervilla canadensis	Caprifoliaceae		x						x			
Diospyros, Dattel- und Parsimon- pflaume	Ebenaceae	x					x		x			
Elaeagnus, Ölweide	Elaeagneae	x	x						x			
Ephedra	Coniferae		x							x	x	x
Erica, Heidesträucher	Ericaceae		x							x	x	x
Evonymus, Spindelbaum, Pfaffen- hütchen	Celastrineae		x						x			
immergrüne	"		x							x		x
Fagus, Buche u. V.	Cupuliferae	x							x			

Aussaat:			Schönblühend; der Flor fällt in die Monate	Eignet sich:			Blüthen wohlriechend.	Besondere Bemerkungen.
in das Land	Herbst.	in Saatgefäße unter Glas.		als Einzelpflanze.	für Gehölzgruppen und im Park.	für Hecken.		
Frühjahr.								
14	15	16	17	18	19	20	21	
x		x	5—6	x	x			Herrlich blühende, an interessanten Arten reichhaltige Gattung. Niedrige Arten und kleine Laburnum lassen sich treiben. Fast alle ganz hart. <i>C. albus</i> und <i>nubigenus</i> fürchten starke Kälte. <i>C. sessilifolius</i> , <i>capitatus</i> u. c. a. unterwerfen sich willig dem Schnitt. Nicht vor Mai aussäen, d. h. wenn die Erde erwärmt ist.
								Kalthausconifere. Samen, welche ausserdem die Keimkraft sehr schnell verlieren, sind äusserst selten. Behandlung derselben wie bei <i>Araucaria</i> .
	x	x	3—4		x		x	Einige alpine Arten sind zur Cultur auf Felsen verwendbar, obgleich sie eine schattige und geschützte Lage vorziehen. Der giftige, gemeine Kellerhals (<i>D. Mezereum</i>) ist der zuerst im Jahre blühende Strauch. Im Frühjahr gesät, liegt der Same über ein Jahr, ohne zu keimen.
		x	1—3				x	<i>D. Laureola</i> , obgleich im Süden Deutschlands und besonders in Oesterreich wildwachsend, erträgt doch hohe Kälte nur im Schutz von Bäumen. Man benutzt Sämlinge zu Unterlagen für fremdländische immergrüne Arten. <i>D. Cneorum</i> wohlriechend. Diese <i>D.</i> eignen sich für Orangerie und Topfdecoration.
x	x		7—9	x	x			Reichblühender Halbstrauch, im Herbst bis auf den Wurzelstock absterbend. Einer der schönsten Blütensträucher für warme sonnige Plätze, für Rabatten sich eignend. Aussaat nach der Ernte oder im späten Frühjahr in Haideerde, auf vorbereitete Beete pikiren und im Herbst oder Frühjahr an Ort und Stelle pflanzen. Nahrhafte durchlassende Erde.
x		x	5—7	x	x			Vorzüglich schöne Blütensträucher, welche nur bei strenger Kälte etwas leiden. Alle <i>D.</i> lassen sich treiben, aber nur <i>D. gracilis</i> ist dazu besonders zu empfehlen und im Topfe eine beliebte Marktpflanze. Aussaat im April in gewöhnlicher Erde. Gedeihen in jedem Boden, blühen besonders gut in schattigen Lagen.
x	x		6—9	x	x			Sehr reich gelbblühend, niedrig, ganz hart. Gedeiht in fast jedem Boden, am besten in lehmigem, und licht Schatten.
x				x				Im Süden mittelgrosser Baum erreicht er nördlicher und in sehr geschützten Lagen eine mässige Grösse. Die Früchte aller <i>D.</i> sind sehr wohlschmeckend; <i>D. Kaki</i> , die zürllichste Sorte, welche bei uns Winterschutz verlangt und unter Glas zu säen ist, wird in Japan als beliebter Obstbaum viel gezogen. Diese sowie <i>D. virginiana</i> verlangen sehr nahrhafte, dabei lockere Erde, während <i>D. Lotus</i> trockenes, warmes Terrain liebt. Man stratificirt den Samen der letzteren beiden im Januar-Februar und säet im März-April.
x		x		x	x		x	Raschwachsende Sträucher, zuweilen Bäume, meist mit grauweissen Blättern. Einige Arten haben sehr wohlriechende Blüten und essbare Früchte. Lockere, nahrhafte Erde. Man säet ein Jahr hindurch stratificierten Samen, oder auch gleich nach der Ernte (der Samen liegt dann jedoch sehr lange, ehe er keimt).
x			3 8—9					Wenig cultivierte Coniferen, die im Freien der vollen Sonne auszusetzen sind. <i>E. mitgaris</i> (<i>distachya</i>) am härtesten. In Töpfe pikiren und in solchen heranziehen.
x	x							Von diesen niedrigen Sträuchern hatten nur wenige Arten im Freien aus, sicher nur <i>E. herbacea</i> (<i>carnea</i>), welche besonders für Felsenbeete geeignet ist. Ueber Aussaat siehe S. 234, S. 370.
x	x				x			Zieren hauptsächlich durch die rothen Früchte und im Herbst rothen Blätter. Lieben Feuchtigkeit. <i>E. americanus</i> und <i>angustifolius</i> gedeihen gut in Haideerde. Zur Frühjahrssaat verwendet man im Herbst stratificierten Samen; diese vorzuziehen, da der im Herbst gesäte frische Samen ein Jahr lang zum Aufgehen braucht.
x	x							Die immergrünen japanischen Arten sind dadurch, dass sie im schlechtesten Boden und in der vollen Sonne gedeihen, sehr nützlich, sie liefern ausserdem vorzügliche Topf-Decorationspflanzen.
x	x			x	x			Von Samen der <i>Althea</i> fallen nicht alle in die echte Art, manchmal jedoch bis 75 Procent. Bei der Frühjahrssaat (Februar-März in jedem Boden) empfiehlt es sich, die Samen vorher 24 Stunden in Wasser einzuweichen. Bei der Stratificierung sind sie nicht zu feucht zu halten. Die Buchen gedeihen in den schattigsten Lagen und in jedem etwas frischen Boden.

N a m e n.	Familie.	Baum.	Strauch.	Schlingend.	Obst:				Sommergrün.	Sommer- u. wintergrün.	Winterschutz im Freien (Bedeckung, Einblenden).	Frostfrei überwintern.
					Berenobst.	Kernobst.	Steinobst.	Schalenobst.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ficus Carica, Feigenbaum	Urticeae	x	x		x				x			x
Fitzroya patagonica	Coniferae	x								x		x
Fontanesia	Oleaceae		x						x	x	x	
Forsythia	"		x						x			
Fraxinus, Esche	"	x							x			
Fremontia	Malvaceae		x						x		x	
Frenela	Coniferae	x								x	x	x
Fuchsia	Onagrariae		x						x		x	x
Gaultheria	Eriaceae		x							x	x	
Genista, Ginster	Papilionaceae		x						x			
Gleditschia	"	x							x			
Glycine (Wistaria)	"			x					x		x	
Gymnocladus, Geweihbaum	"	x							x			
Halesia	Styracineae		x						x			x
Halimodendron argenteum, Salz- strauch	Papilionaceae	x	x						x			
Hamamelis, Zaubernuss	Hamamelideae		x						x			

Aussaat:			in das Land	in das Sauggefässe unter Glas.	Schönbildung; der Flor fällt in die Monate	Eignet sich:			Blüthen wohlriechend.	Besondere Bemerkungen.
Frühjahr.	Herbst.	als Einzelpflanze.				für Gehölzgruppen und im Park.	für Hecken.			
14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		x		x						Die Feigenbäume werden bei uns am besten im kalten Wein-Treibhause gezogen, wenn man Früchte erzielen will. Sie zieren jedoch auch den Garten durch schöne Belaubung. Dasselbst giebt man ihnen die sonnigste Lage und nahrhafte, lockere Erde. Aussaat unter Glas und Anzucht stets in Töpfen.
		x								Hier als Kalthaus-Conifere zu behandeln. Samen selten. Aussaat und Cultur wie bei Frenela.
x		x								F. Fortunei ist sommergrün und ganz hart, F. phylliroides wintergrün und etwas empfindlicher. Sind der vollen Sonne auszusetzen und in leichten, trockenen Boden zu pflanzen.
x		x	3—5	x	x					Die schönen gelben Blüthen gehören zu den ersten des Jahres. Gedeihen in jedem Boden. Schön an Abhängen.
x	x			x	x					Sowohl die europäischen als auch die zahlreichen nordamerikanischen Arten sind ganz hart und gedeihen besonders gut in nahrhaftem, etwas feuchtem Boden. Aus Samen der ganzblättrigen Esche (F. heterophylla) erzeugen sich nur wenig echt. Der Samen wird entweder gleich nach der Ernte gesät oder stratificirt und im 2. Frühjahr gesät. Die Saatbeete der amerikanischen Eschen sind über Winter mit Laub zu decken.
		x	7—8		x					Dieser schöne Strauch mit grossen gelben Blüthen ist an verschiedenen Orten mit Erfolg im Freien durchwintert worden. Verpflanzt sich schwer.
x		x		x						Die echten F. sind cypressenartige kleine Bäume, welche nur in Südewropa im Freien aushalten. Bei uns sind sie als Kalthauspflanzen zu behandeln, unter Glas auszusäen, einzeln in Töpfe zu pikiren und in solchen gross zu ziehen. Die Samen verlieren die Keimkraft rasch. Vergl. §. 235.
		x	7—10	x	x					Einige Arten von F., namentlich F. gracilis und coccinea, lassen sich unter Bedeckung im Freien durchwintern, erfrieren zwar oft bis zum Boden, treiben aber gutwieder aus. Allerdings blühen sie später, als frostfrei durchwinterte. Vergl. §. 222.
x		x	7—8							Die G. sind niedrige Sträucher mit ausgebreiteten, meist liegenden Zweigen, grossen Blättern und hübschen glockenförmigen, weissen Blumen. Sie gedeihen im Halde- und Moorbete und auf feuchtem Sandboden. Für Felsenschmuck geeignet. Vergl. §. 234.
x			5—8		x		x			Niedrige Sträucher, mit schönen, meist gelben Blüthen, die auf ganz trockenem und sandigem Boden und in sonnigster Lage gut gedeihen. Die Aussaat gelingt in jedem Boden, ist jedoch nicht vor April-Mai vorzunehmen, wenn der Erdboden erwärmt ist. Für Felsen und Abhänge gut verwendbar.
x				x	x					Mit Ausnahme von G. caspica, welche niedrig bleibt und oft an den Spitzen erfriert. grosse schöne Bäume, mit gefährlichen Stacheln, doppelt gefiederten, erst Ende Mai erscheinenden Blättern. Sie fallen durch die grossen Schoten auf und liefern vorzügliches Holz zu Möbeln. Die jungen Pflanzen müssen zurückgeschnitten und bedeckt werden, im folgenden Jahr sind sie hart. Lieben nahrhaften Boden, Aussaat April-Mai in jedem Terrain.
x		x	5—8				x			Für milde Climaten eine der schönsten blühenden Schlingpflanzen und in der Rheingegend fast in jedem Garten. Die in langen hängenden Trauben stehenden blauen Blüthen erscheinen meist zweimal, erst im Mai, dann nochmals im August. Lieben sonnige Lage, nahrhaften, sandigen Boden. In der Jugend im Herbst zurückschneiden und decken. Aussaat im April-Mai.
x				x	x					Einer der schönsten Parkbäume, mit grossen, doppelt gefiederten Blättern. Ganz winterhart und besonders gut in nahrhaftem, dabei lockerem Boden gedeihend. Aussaat im Februar-März.
		x	4—5							Kleine Bäume, in den Gärten meist Sträucher, mit schöner Belaubung und zierenden Früchten. Der Samen liegt 1½ Jahr bis zum Keimen, wenn im Herbst gesät. Man stratificirt ihn daher nach der Ernte und säet im zweiten Frühjahr.
x			6—7	x						Kleiner Baum, öfter Strauch, mit feinen Zweigen, kleinen silbergrauen Blättern und hellrothen Blumen. In den Steppen Mittelasiens wildwachsend, gedeiht er am besten auf Sandboden und in warmer Lage.
x					x					Ein der Hasel ähnlicher Strauch, dessen deutscher Name davon kommt, dass er im October blüht, aber erst im folgenden Jahre Früchte bringt. Gedeiht in leichtem Boden und halbschattiger Lage.

[illegible]

Aussaat:			in das Land	Frühjahr.	Herbst.	in Saatgefäße unter Glas.	Schönheitszeit; der Flor fällt in die Monate	Eignet sich:			Blüthen wohlriechend.	Besondere Bemerkungen.
								als Einzelpflanze.	für Gehölzgruppen und im Park.	für Hecken.		
14	15	16	17	18	19	20	21					
x		x										Ueber diese allbeliebte Schlingpflanze sei nur bemerkt, dass die Varietäten nicht treu aus Samen kommen. Liebt Schatten und wird am besten in den ersten Jahren in Töpfen gezogen. Auch die Aussaat, welche am sichersten erst im Mai geschieht, ist schattig zu halten.
x		x	8—9	x	x							Einer der prächtigsten Blütensträucher, noch werthvoller, weil er zu einer Zeit blüht, wo alle andern vorüber sind. Liebt die volle Sonne, gedeiht in jedem Boden und unterwirft sich willig dem Schnitt. Aussaat nicht vor Ende April.
x	x			x	x	x						Ein Dünenstrauß mit schönen silbergrauen Blättchen und (an den weiblichen Pflanzen) orangeröthen Beeren. Für Sandboden und Ufergebüsch, gedeiht übrigens in jedem Boden. Aussaat am besten mit stratificirtem Samen im April—Mai.
		x	6—10	x	x							Die Arten sind in Bezug auf Winterhärte sehr verschieden. Die meisten müssen frostfrei durchwintert werden. Eine der schönsten, <i>H. paniculata</i> , ist auch die fröhlteste. Verlangen nahrhaften, durchlassenden Boden und sehr reichliches Gießen. Lieben Halbschatten. Cultur auch in Töpfen und Kübeln. Marktpflanzen.
x		x	7—9	x	x							Halbsträucher, zum Theil Bodensträucher, wovon die schönste Art, <i>H. corymbosum</i> , im Winter grün bleibt, aber später am oberen Theile ganz absterbt. Diese liebt Halbschatten und nahrhaften, die übrigen trockenen Boden und die volle Sonne. In sandige Haideerde zu säen.
		x	7—8		x					x		Die wintergrünen sind buschige Sträucher mit meist gelben Blüten, die sommergrünen meist Schlingpflanzen mit sehr wohlriechenden weissen Blüten. <i>J. nudiflorum</i> treibt sich früh. Werden nur schön an geschützten warmen und trockenen Plätzen. <i>J. officinale</i> als Schlingpflanze an Mauern.
x	x			x	x	x						Immergrüne Sträucher mit stacheligen Blättern und schönen rothen Beeren. In mehreren Gegenden Norddeutschlands und im Schwarzwald als Unterholz wild wachsend, erfriert selbst die gemeine St. in kalten Wintern an freien Standorten. Verlangt nahrhafte Erde und schattige Lage. Die Samen liegen oft 1½ Jahr, bevor sie keimen. Man stratificirt am besten im Herbst und sät im zweiten Frühjahr. Die Saat ist schattig zu halten und gegen Vögel zu schützen.
x		x	7—9	x								Frieren zurück, treiben aber gut wieder auf. Lieben sandigen Boden und sonnige Lage. Aussaat im Freien erst wenn die Erde erwärmt ist, im April—Mai. Mehrere Arten müssen im Kalthause überwintert werden.
x	x			x	x							Die hierher gehörenden Arten sind in Nordamerika heimisch und liefern auch bei uns das gesuchte schwarze Wallnussholz. Sie gedeihen auf tiefem, etwas feuchtem Boden, im Walde nur bei lichter Stellung.
x	x			x	x							Auch schöner Parkbaum. Gedeiht am besten auf Anhöhen und erfriert dort seltener, als im Tieflande. Vor dem 6. Jahre bringen die Sämlinge keine Früchte.
x	x	x		x	x							Werden am besten an Ort und Stelle gesät. Herbstsaat gegen Ungeziefer, namentlich Mäuse, zu schützen. Aussaat im Februar—März, mit Nüssen, welche vorher 48 Stunden lang in Wasser eingeweicht wurden, gibt sicheren Erfolg. Die jungen Sämlinge sind sehr empfindlich gegen Frost.
x	x	x		x	x							Die meisten <i>J.</i> sind winterhart, einige sind Sträucher, oft mit liegenden Aesten. Der Samen geht nicht immer im 1. Jahre auf. Die rolhe Ceder (<i>J. virginiana</i>) mit wohlriechendem Holze, kann auch bei uns als Nutzholz gezogen werden. Zur Freilandaussaat stratificirt man bei grossem Betrieb am besten den Samen gleich nach der Ernte und sät im zweiten Frühjahr. Vergl. §. 235.
x		x	5—8		x							Niedrige, herrlich blühende Haide- oder Moorbeesträucher, welche am besten einige Jahre in Töpfen gezogen werden. Vergl. Azalea. Ueber Aussaat etc. s. §. 238.
x		x	4—7		x							Nur die einfach glänzend gelb blühende Art (<i>K. japonica</i>) ist aus Samen zu erziehen. Liebt Halbschatten. Aussaat in gewöhnliche Erde.
x			6—7	x	x							Kleiner Baum mit gefiederten Blättern und schönen gelben, in hängenden Rispen stehenden Blüten. Liebt Sonne und verlangt nahrhaften, lockeren Boden, um sich schön zu entfalten. Aussaat März—April in jedem Boden.
x	x	x	6—8	x								Nur in Südeuropa im Freien aushaltend, bei uns als Kübelpflanze cultivirt. Nahrhafte, lockere Erde. Gleich nach der Ernte säen, da die Samen sonst sehr lange liegen. Aussaat feucht und schattig halten.

N a m e n.	Familie.	Baum.	Strauch.	Schlingend.	Obst:				Sommergrün.	Sommer- u. wintergrün.	Winterschutz im Freien (Bedeckung, Einblinden).	Frostfrei überwintern.
					Bereenobst.	Kernobst.	Steinobst.	Schalenobst.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ledum, Waldrosmarin, Porst	Ericaceae		x							x		x
Lepedeza	Papilionaceae		x						x		x	
Leycesteria formosa	Caprifoliaceae		x						x		x	x
Libocedrus	Coniferae	x								x		x
Ligustrum, Rainweide	Oleaceae		x						x	x		
Liquidambar	Balsamifluae	x							x			
Liriodendron, Tulpenbaum	Magnoliaceae	x							x		x	
Lonicera, strauchige	Caprifoliaceae		x						x	x		
rankende oder Gaisblatt (Je- längerjelieber)	"			x					x			
Lycium, Bocksborn	Solaneae		x	x					x			
Maclura, Osagendorn	Urticeae	x							x		x	
Magnolia	Magnoliaceae	x	x						x	x	x	x
Melia	Meliaceae	x							x		x	x
Mespilus germanica, Mispel	Rosaceae		x			x			x			

Aussaat:			Schönbühnd; der Flor fällt in die Monate	Eignet sich:			Blüthen wohlriechend.	Besondere Bemerkungen.
in das Land	Herbst.	in Saatgefäße unter Glas.		als Einzelpflanze.	für Gehölzgruppen und im Park.	für Hecken.		
Frühjahr.	Herbst.							
14	15	16	17	18	19	20	21	22
x	x		5-7					Niedrige Sträucher mit kleinen haarigen, balsamisch riechenden Blüthern, wild in Sümpfen und feuchtem Waldboden wachsend. Für das Haide- und Moorbeet. Vergl. §. 234.
x	x		7-8	x	x			Indigofera ähnlich. Mit zahlreichen hübschen keltrothen Blüthen. Auch mit Desmodium penduliflorum verwandt. Ist in sandige Lauberde auszusäen. Liebt sandigen Boden und sonnige Lage. Wintert zuweilen aus.
		x	7-8		x			Hält schwer im Winter aus. Liebt leichte Erde und schattige Lage. Aussaat in sandiger Laub- und Haideerde.
		x		x	x			L. decurrens, auch als Thuja gigantea bezeichnet, hält im Freien in milderen Gegenden, L. chilensis in besonders geschützten Lagen aus. Die übrigen sind werthvolle Kalthauspflanzen. Sie wollen recht sonnig, einzeln und frei stehen und verlangen lockeren, nahrhaften Boden. Aussaat unter Glas. Die einjährigen Sämlinge einzeln in Töpfchen pikiren und in Töpfen heranziehen.
x	x	x	6-8		x	x	x	Die wintergrünen japanischen und die californischen Arten sind zärtlich im Winter und in Saatgefäße zu säen. Nur der gemeine L. vulgare eignet sich zu Hecken. Unterwerfen sich gut dem Schnitt. Frühjahrssaat im April mit stratificiertem Samen. Saat feucht halten.
x		x		x				Ahornartige Blätter mit schöner violetrother Herbstfärbung. L. styraciflua leidet in strengen Wintern. Lieben etwas feuchten Boden und warme geschützte Lage. In Haideerde im April-Mai säen. Selten verpflanzen. Sämlinge nicht vor dem 5. Jahre an Ort und Stelle bringen. Auch zur Uferbepflanzung schön.
x	x		7-8	x	x		x	Lässt sich gross unsicher verpflanzen, am besten, wenn die Wurzeln ganz in Sand kommen oder der Trieb bereits sich ausgebildet hat, also im Vorssommer. Herrlicher Alleebaum. Liebt sehr nahrhaften, tiefen, auch schweren Boden und sonnige Lage. Am besten ist es, den Samen im Herbst zu stratificieren und im April zu säen. Die Saatbeete müssen mit Haideerde oder kurzem Mist bedeckt werden.
x			3-6		x		x	Hierher gehört vor allem L. tatarica und Standishi, mit rosenrothen oder weissen Blüthen, und L. Xylosteum und Ledebouri, mit gelben Blüthen. L. Standishi ist wintergrün und verlangt eine Lage nach Norden. Lieben meistens etwas feuchten, kräftigen Boden.
x	x		3-6				x	Beliebte Schlingsträucher, besonders für Bäume, Gebüsche, Spaliere und andere Bekleidungen geeignet. Lieben lockeren, dabei nahrhaften Boden.
x			5-6					Sehr langzweigige Sträucher mit hübschen Früchten. Für Mauern und Abhänge, wo die Stengel lang hängen können. Gedeiht auf ganz sterilem Boden.
x					x	x		Undurchdringliche Heckenpflanze, aber gegen Kälte empfindlich, so dass sie nur in milden Gegenden dazu brauchbar ist. Auch zur Uferbepflanzung. Liebt sehr nahrhaften Boden. Aussaat im April in beliebigen guten Boden. Früchte wie Orangen, essbar.
		x	4-5 8	x	x		x	M. grandiflora, welche nur im Süden im Freien aushält, ist wintergrün. Sie blüht im Sommer, während die übrigen im Frühjahr blühen. Die empfindlichen Arten wachsen bei uns nur strauchartig. Manche Species haben sehr wohlriechende Blüthen. Alle M. verlangen sehr nahrhaften Boden, einige Haideerde, und gedeihen gut in nördlicher Lage. Viele sind härter als man glaubt, z. B. M. Soulangiana, tripetala u. a. Die niedrigen chinesischen Arten lassen sich leicht treiben. Samen gleich nach der Ernte stratificieren und unter Glas im Mistbeet oder Gewächshaus in recht gute Erde aussäen, die beste Zeit ist der Mai.
		x	7-9				x	Entfaltet sich nur in Südeuropa zur vollen Grösse und Schönheit; als Topfpflanzen nie vollkommen, weil sie viel Nahrung beanspruchen. Von Natur sehr schön. Aussaat unter Glas, einzeln in Töpfe pikiren und in solchen grossziehen. Im Sommer reichlich giessen.
	x		5-6					Aus Samen liefert dieser bekannte Obststrauch nur kleinfrüchtige Pflanzen, welche aber zugleich Blüthensträucher sind. Die edeln Sorten werden auf Sämlinge, häufiger aber auf Weissdorn veredelt. Aussaat, wenig gebräuchlich, wie bei Crataegus; Sämlinge beginnen zu tragen, wenn sie 4 Jahre alt sind.

[illegible]

Aussaat:			Schönlithend; der Flor fällt in die Monate	Eignet sich:			Blüthen wohlriechend.	Besondere Bemerkungen.
in das Land	Frühjahr.	Herbst.		als Einzelpflanze.	für Gehölzgruppen und im Park.	für Hecken.		
14	15	16	17	18	19	20	21	
		x	4—6		x			Hierher gehört besonders der immergrüne Feuerbusch, <i>M. pyracantha</i> , mit orangerothen Früchten. Uebrige unter <i>Crataegus</i> und <i>Cotoneaster</i> . Aussaat wie bei <i>Crataegus</i> .
		x	4—5		x		x	Wird bei uns nur ein gegen Frost empfindlicher Strauch. Verlangt guten Boden; nicht zu schneiden.
x		x		x		x		Als Obst werden die Früchte von <i>M. nigra</i> und <i>rubra</i> genossen, welche im Vaterlande (Nordamerika) und im Süden Bäume von 10—15 m Höhe bilden, während die Früchte von <i>M. alba</i> fade sind. Letztere wird ausschliesslich zur Seidenraupenzucht gezogen, im Süden als Bäume, nördlicher in Heckenform. Lieben frischen, dabei durchlassenden Boden. Aussaat im Mai in nahrhafte Haideerde; stets feucht halten. Im 2. Jahre pikiren. Wachsen langsam und tragen erst im Alter von 6 bis 8 Jahren.
		x						Theils mit immergrünen Blättern. Gedeihen nur auf feuchtem Boden, am besten im Moorbeete, zieren aber wenig. Samen brauchen lange Zeit zum Keimen.
		x	6—9				x	Nur für Südeuropa für das Freie geeignet. Aus Samen erzieht man fast nur die grossblättrige Myrthe. Einzeln in Töpfe pikiren und in solchen heranziehen.
x		x		x				Gedeiht nur auf nassem Boden, in Sand- oder Humuserde. Zur Uferbepflanzung.
x		x		x				Nur für Südeuropa. Die Cultur der Olivenbäume ist in der Provence bekanntlich von hoher commercieller Bedeutung. Man sät indessen nur, um neue Sorten zu gewinnen, und zwar stratificierten Samen und pikirt im folgenden Frühjahr. <i>O. europaea</i> verlangt sehr gut gedüngten, tiefen Boden, während der Vegetation viel Sonneneinstrahlung, fürchtet jedoch stagnierende Feuchtigkeit.
x		x			x		x	<i>O. aquifolius</i> ist ein dem <i>Ilex Aquifolium</i> ähnlicher Strauch, welcher meist buntblättrig vorkommt. Er hält in Holland und der Schweiz im Freien aus. Die wohlriechenden Blüthen von <i>O. fragrans</i> dienen zum Parfümiren des Thees.
		x			x		x	Stark aromatisch duftender Strauch aus Californien, welcher bis jetzt als Kalthauspflanze cultivirt worden, in milden Gegenden aber wohl Freilandstrauch ist.
x	x			x				Diese schönen Bäume haben das Ansehen von Hainbuchen, werden auch so wie diese behandelt. Die weiblichen Blüthen haben Aehnlichkeit mit Hopfen.
x		x	5	x				Man sät im Frühjahr in Laub- und Haideerde, hält die Aussaat bedeckt und stets schattig. Der Aufgang erfolgt erst nach einem Jahre. Die Sämlinge brauchen 6 bis 8 Jahre, bis sie blühen, nur wenn man sie auf die Knollen anderer Sorten veredelt, kann man schon 2 bis 3 Jahre früher einen Flor erzielen. Während desselben stark giessen, sonst eher trocken als feucht halten. In nahrhaftem Gartenboden mit einem Zusatz von Haideerde cultiviren.
x		x				x		Im Süden zu Hecken in trockenen Lagen beliebt, noch am Südabhange der Alpen ganz hart. Verlangt luftigen und sonnigen Standort. Samen im April in gute Gartenerde säen, leicht keimend.
		x	5—6	x			x	Ziert besonders durch die sehr grossen Blätter, in milden Gegenden auch durch schöne, früher als die Blüthen erscheinende bläuliche Blüthentrauben. Liebt südliche Lage und warmen, lockeren Boden; äusserst schnellwachsend. Man kann P. i. jährlich zurückschneiden. Aussaat April—Juni unter Glas, stets feucht halten. Der sehr feine Same keimt am besten, wenn wenig oder nicht bedeckt. Hat Aehnlichkeit mit Catalpa. Gegen starke Winde geschützt zu pflanzen.
		x	7—8					Durch schöne Belaubung und settsam schöne Blüthen culturwerth. Liebt sehr sonnige Lage und um zu blühen ein Verdünnen der überflüssigen schwachen Zweige. Für Wände geeigneter als für Lauben. Freilandaussaat nicht vor April.
x			6—7		x		x	Beliebte Sträucher in vielen, auch gefüllt blühenden Arten. Den stärksten, oft betäubenden Geruch hat der gemeine <i>Ph. coronaria</i> , dieser sollte daher nicht zu häufig angepflanzt werden. Der ebenso schöne <i>Ph. inodorus</i> ist geruchlos, auch <i>Ph. grandiflorus</i> hat nur schwachen Wohlgeruch. Gedeihen in jedem Boden und lieben Schatten. Aussaat im April, Samen schwach mit guter Lauberde bedecken und häufig bespritzen.
x	x	x				x	x	Im Süden beliebte Park- und Heckensträucher, im Norden nur in sehr warmen Boden und sonniger Lage gedeihend. Zur Frühjahrsaussaat (April—Mai) stratificierten Samen verwenden.

N a m e n.	Familie.	Baum.	Strauch.	Schlingend.	Obst:				Sommergrün.	Sommer- u. wintergrün.	Winterschutz im Freien (Bedeckung, Einbinden).	Frostfrei überwintern.
					Beerenobst.	Kernobst.	Steinobst.	Schalenobst.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Photinia	Rosaceae		x							x		x
Pinus, Gruppe Pinus, Kiefer oder Föhre)	Coniferae	x								x		
Gruppe Abies und Tsuga,) Tanne	"	x								x		
Gruppe Picea, Fichte	"	x								x		
Gruppe Larix, Lärche	"	x							x			
Pirus communis, Birnbaum	Rosaceae	x				x			x			
Malus, Apfelbaum	"	x				x			x			
zierende Arten	"	x				x			x			
Pistacia, Pistazie	Terebintaceae	x	x					x	x	x		x
Platanus, Platane	Platanaceae	x							x			
Podocarpus	Coniferae	x								x		x
Polycarpa japonica (Idesia)	Bixaceae	x			x						x	x
Populus, Pappel, Espe	Salicaceae	x							x			
Potentilla fruticosa	Rosaceae		x						x			
Prunus Armeniaca, Aprikose	"	x					x		x			
domestica (oecconomica), Pflaume oder Zwetsche, u. V., Mira- bella, Reine Claude etc.	"	x					x		x			

Aussaaf:			Schönlühend; der Flor fällt in die Monate	Eignet sich:			Blüthen wohlriechend.	Besondere Bemerkungen.
in das Land	Frühjahr.	Herbst.		als Einzelpflanze.	für Gehölzgruppen und im Park.	für Hecken.		
14	15	16	17	18	19	20	21	22
x					x			Bilden starke, schöne, wenn auch unregelmässige Büsche mit grossen Blättern. <i>P. arbutifolia</i> ist härter als <i>P. glabra</i> (Crataegus). Sie verlangen guten Boden und tiefen nördliche Lage. Blüthen unbedeutend.
x		x		x	x			Die eigentlichen Kiefernarten liefern Samen mit härterer Schale, aber auch von weit höherem Keimfähigkeits-Procentsatz, als die anderen grossen Coniferengruppen. Der Samen einiger Species, z. B. <i>Cembra</i> , <i>contorta</i> , <i>Coulteri</i> , <i>Peuce</i> , wird im Januar-Februar stratificiert und dann wie die übrigen harten Sorten im April-Mai in das freie Land gesät. Die 3—5nadeligen Kiefern verlangen besseren Boden als die anderen. Vergl. §. 235.
x		x		x	x	x		Die Samen der eigentlichen <i>Abies</i> und <i>Picea</i> verlieren die Keimkraft rasch und haben auch in den günstigsten Jahren selten eine Keimkraft von mehr als 40 bis 60 Procent, sehr häufig jedoch ist dieselbe geringer. Die Freilandsaaten sind in recht schattiger Lage vorzunehmen, da die jungen Sämlinge sehr empfindlich gegen Sonnenbrand sind. Vergl. §. 235.
x		x		x	x	x		
x		x		x	x			Der Samen der <i>L.</i> keimt meistens zwischen 30 bis 40 Procent. Die Freilandaussaat geschieht nicht vor April-Mai in guter lockerer Erde, welche etwas kräftiger als bei den übrigen Coniferen sein darf. Allen <i>L.</i> ist das Bedürfniss nach viel Luft und Licht gemeinsam. Sie gedeihen in wärmeren Gegenden überhaupt nur auf Bergen; je höher sie stehen, desto besser. Das Holz dieser Bäume ist für vielerlei industrielle Zwecke ohne Gleichen.
x	x		4—5	x				Die Anzucht der Obstbäume aus Samen ist in §. 236 und 237 ausführlich besprochen worden. Die Kerne dieser beiden Obstgattungen stratificiert man im December-Januar und sät im Februar-März, dies gilt als die zweckmässigste Aussaatmethode. Sämlinge von Birnen müssen ungefähr 6 bis 12, solche von Äpfeln 6 bis 10 Jahr alt sein, bevor sie Früchte zu tragen beginnen.
x	x		4—5	x				
x	x		4—5	x	x			Die <i>M.</i> werden, ausser den echten Species, sicher nur durch Veredlung fortgepflanzt, wozu auch die eigenen Wildlinge als Unterlagen dienen können. Es sind darunter Sorten mit essbaren oder zierenden (<i>M. baccata</i>) Früchten, sehr schönen (<i>M. spectabilis</i>), bei einigen wohlriechenden (<i>M. coronaria</i>) Blüthen.
		x						Die <i>P.</i> haben zum Theil immergrüne Blätter, sind aber nur für den Süden im Freien verwendbar. <i>P. lentiscus</i> ist bei uns eine schöne immergrüne Kalthauspflanze. Lieben sandige Erde und sehr sonnige Lage. Sämlinge einzeln in Töpfe pikiren. <i>P. vera</i> , die härteste, bringt eine wohlschmeckende mandelartige Frucht. <i>P. terebinthus</i> liefert das Terpentin.
x		x		x				Bekannte prächtige Park- und Alleeabäume für mildere Lagen. Gegen starken Wind geschützt pflanzen. <i>P. occidentalis</i> verträgt feuchten, <i>P. orientalis</i> liebt lockeren, durchlassenden Boden. Aussaat möglichst gleich nach der Ernte, mit gehacktem Moos decken und gut feucht halten.
		x		x				Unter Glas in Haideerde aussäen, in Töpfchen pikiren und in solchen heranziehen. Sind im nördlicheren Europa als Kalthauspflanzen zu behandeln.
		x						Grosser, schönbelaubter Baum aus Japan mit zahlreichen gelben Blumen in Rispen und gelben, essbaren Früchten von pflaumenähnlichem Geschmack. Die sehr grossblüthige <i>P. Maximowiczii</i> hat sich als ein harter kleiner Baum erwiesen.
6-7				x				Aussaat wenig gebräuchlich. Die schon im Mai reifenden Samen werden am besten im Sommer gesät, Behandlung derselben wie bei <i>Platanus</i> . Alle <i>P.</i> , ausser <i>italica</i> , lieben sehr kräftigen, einige Species verlangen sogar feuchten Boden.
		x	6—8	x	x			Reichblühender niedriger Zierstrauch mit gelben Blumen. Samen schwach bedecken. Bald pikiren. Liebt warme Lage. Auch für Felsenpartien.
x	x		4—5					Behandlung der Aussaat wie bei <i>Amygdalus</i> , die Sämlinge tragen vom 4. bis 6. Jahre an. Vergl. §. 236 und 237.
x	x		3—5					Da sich die Sorten aus Samen nicht treu wiedererzeugen, so dienen die Sämlinge meist nur als Veredlungs-Unterlagen. Auch die Hauszetsche pflanzt sich nicht immer rein aus Samen fort. Entweder gleich nach der Ernte säen oder den Samen im Herbst stratificieren und im ersten Frühjahr säen. Die Sämlinge der Kirschen tragen gewöhnlich vom 4. bis 5., die der Zwetschen und Pflaumen vom 6. bis 7. Jahre an. Vergl. §§. 236 und 237.

N a m e n.	Familie.	Baum.	Strauch.	Schlingend.	Obst:				Sommergrün.	Sommer- u. wintergrün.	Winterschutz im Freien (Bedeckung, Einbinden).	Frostfrei überwintern.
					Beerenobst.	Kernobst.	Steinobst.	Schalenobst.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prunus Myrobalana (cerasifera), Kirschpflaume	Rosaceae	x					x		x			
Mahaleb, Steinweichsel	"	x	x						x			
Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer...	"		x							x	x	
lusitanica	"	x	x							x	x	x
Padus, Trauben- oder Ahlkirsche	"	x	x						x			
insititia, Pflaumen- oder Hafer- schlehe	"	x					x		x			
spinosa, Schlehe	"		x				x		x			
americana, serotina, virginiana etc.	"	x							x			
Ptelea trifoliata, Lederbaum	Zanthoxyleae		x						x			
Pterocarya, Flügelnuss	Juglandaeae	x							x			
Quercus, Eiche	Cupuliferae	x							x			
immergrüne Arten	"	x								x	x	
Retinospora	Coniferae	x	x							x		
Rhamnus, Wegdorn	Rhamneae		x						x			
immergrüne	"		x							x	x	
Rhodora	Rhodoraceae		x						x			x
Rhodotypus	Rosaceae		x						x			
Rhus, Sumach	Terebinthaceae	x	x						x			

Aussaat:			Schönblüthe; der Flor fällt in die Monate	Eignet sich:			Blüthen wohlriechend.	Besondere Bemerkungen.
in das Land	Frühjahr.	Herbst.		als Einzelpflanze.	für Gehölzgruppen und im Park.	für Hecken.		
14	15	16	17	18	19	20	21	
x	x		3—4	x				Da diese Pflaume fad von Geschmack ist, so dient <i>P. Myrobalana</i> mehr als Zierbaum. Die Sämlinge werden gern als Veredlungs-Unterlagen für Zwerg- und Halbhochstämme von Aprikosen verwendet.
	x		5—6		x		x	Ausser zu Parkpflanzungen wird die Steinweichsel als Nutzholz (zu Pfeifenrohren und Cigarrenspitzen) angepflanzt. Gedeiht auf steinigten Anhöhen. Die Sämlinge, welche wie die der anderen <i>P.</i> herangezogen werden, liefern die beste Unterlage für Kirschen. Aussaat wie bei <i>Cerasus</i> etc.
x	x	x			x			Im Süden Bäume bildend und als solche bei uns auch in Kübeln als Orangerie-Pflanze cultivirt, ist der Kirschlorbeer bei uns Strach, der in rauen Lagen im Winter leicht gedeckt werden muss.
		x		x				Ist noch zärtlicher als die vorige und wird meist als Kalthauspflanze gezogen.
x	x		5—7		x		x	Frühzeitig grünender und blühender Park- und Waldbaum, dessen kleine Beeren die Vögel sehr anziehen.
x	x					x		Frucht kaum geniessbar, die Sämlinge werden hauptsächlich als Unterlagen für halbhoch Pflaumensorten verwendet.
x	x		3—4		x	x	x	Die Schlehe wird zu Hecken und Gebüsch auf trockenem, steinigem Boden, aber auch als Unterlage für Zwergbäume von Pflaumen, Aprikosen und Pfirsichen verwendet.
x	x		5—6	x	x			Theils Bäume, theils Sträucher, welche zur Zierde gepflanzt werden.
x					x		x	Ziemlich hoher Strauch, auch als Bäumchen zu ziehen. Schöne handförmige Blätter. Aussaat im April in gewöhnlicher Erde. Liebt Schatten.
x	x			x			x	Schnellwuchsende Bäume, Walnussbaum ähnlich, doch das junge Laub nicht so hart gegen Spätfröste. Zieren durch gefiederte, hängende Blätter. Die Früchte sind gross und hart, werden wie bei <i>Juglans</i> angegeben gesät. Lieben kräftigen Boden und Feuchtigkeit.
x	x			x	x			Wenn Eichen als Waldbäume dienen sollten, werden die Samen am besten an Ort und Stelle gesät und nicht verpflanzt. Von buntblüttrigen Eichen kommt nur die goldgelbblüttrige und die rothblüttrige Spielart zu geringem Procentsatz treu aus Samen. Die amerikanischen Arten, welche kräftigen Boden vorziehen, besonders die Sumpfeiche und die Scharlacheiche, färbten sich im Herbst schön roth und sind ausgezeichnet zur Forstcultur.
x	x			x	x			Diese, auch Stacheln genannten Bäume sind nur für die Mittelmeerküsten in das Freie geeignet. Die hierher gehörenden Species nehmen mit sehr geringem Boden vorlieb; sie fürchten stagnirende Feuchtigkeit.
x		x		x				Die echten <i>R.</i> werden wie <i>Cupressus</i> und <i>Chamaecyparis</i> behandelt. Aussaat und Cultur in leichter, durchlassender Haldeerde, Saatgefässe häufig leicht spritzen.
x					x			Für sterile Plätze, <i>R. Frangula</i> auch für sumpfigen Boden. In nicht zu trockenem Boden gedeihend.
x		x			x			Lieben frischen Boden und Schatten. <i>R. Alaternus</i> hält bei uns nicht im Freien aus.
	x		5		x			Stehen den Azulea und Rhododendron sehr nahe und blühen am noch unbeblätterten Strauche. Aussaat und Cultur wie Rhododendron. §. 228.
x			5—6		x			Schönbeblätterter Strauch, welcher ganz winterhart ist. Die weissen Blüthen stehen vereinzelt, fatten aber durch Grösse auf.
x	x			x	x			Theils kleine Bäume, theils Sträucher; einige der letzteren empfindlich gegen strenge Winter. Betaubung mancher Species im Herbst schön roth. Einige Species giftig. Aussaat und Cultur in beliebigen Boden. Erstere am besten im April mit im Herbst stratificirtem Samen.

Aussaat wie bei *P. domestica* etc. Sämlinge vor Frühjahrsfrösten schützen. Vergl. §§. 236 und 237.

Man sät die Eicheln in beliebigen Boden entweder gleich nach der Ernte aus oder hebt sie an einem gegen Frost geschützten Raum bis zur Aussaat im März auf.

N a m e n.	Familie.	Baum.	Strauch.	Schlingend.	Obst:				Sommergrün.	Sommer- u. wintergrün.	Winterschutz im Freien (Bedeckung, Einbinden).	Frostfrei überwintern.
					Beerenobst.	Kernobst.	Steinobst.	Schalenobst.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ribes, zierende Arten	Grossulariaceae		x						x			
Robinia Pseudacacia, Akazie.....	Papilionaceae	x							x			
Rubus, zierende Species	Rosaceae		x	x					x			
arctiens foecundus	"		x		x				x			
Ruscus aculeatus	Asphodeleae		x							x		
Salisburia (Gingko)	Coniferae	x							x			
Salix, Weide	Amentaceae	x	x						x			
Sambucus, Hollunder	Caprifoliaceae		x		x				x			
Schinus molle, falscher Pfeffer....	Terebinthaceae	x								x		x
Sciadopitys, Schirmtanne	Coniferae	x								x	x	
Smilax	Smilacaceae			x						x		x
Sophora	Papilionaceae	x							x		x	
Sorbus americana, hybrida, inter- media, nepalensis, sambuci- folia, sibirica	Rosaceae	x							x			
Aria (Aria nivea), Schneebaum, Mehlbirne	"	x					x		x			
Aucuparia, Eberesche, Vogel- beere	"	x							x			
domestica (Cormus), Spierapfel, Speierling	"	x					x		x			
terminalis, Elsbeere	"	x					x		x			
Spartium junceum, Binsenbaum ..	Papilionaceae		x						x		x	

Aussaat:			Schönblühend; der Flor fällt in die Monate	Eignet sich:			Blüthen wohlriechend.	Besondere Bemerkungen.
in das Land	Erstjahr.	Herbst.		als Einzelpflanze.	für Gehölzgruppen und im Park.	für Hecken.		
14	15	16	17	18	19	20	21	22
x		x	4—6	x	x		x	<i>R. sanguineum</i> friert oft zurück, treibt aber gut wieder aus. <i>R. alpinum</i> giebt dichte niedere Hecken. <i>R. aureum</i> wird neuerdings viel als Veredlungs-Untertage zu hochstämmigen Stachelbeersträuchern benutzt. Aussaat vergl. §. 238.
x			6—7	x	x		x	Als Park- und Nutzholzbaum ist <i>R. Pseudacacia</i> gleich bedeutend. Die Varietäten werden nur durch Veredlung rein erhalten. Alle <i>R.</i> sind gegen starke Winde geschützt zu pflanzen, sie sind anspruchlos in Bezug auf den Boden. Man stiet nicht vor Mai, d. h. wenn Bodenwärme vorhanden, bei feuchtem Wetter. 3—4jährige Sämlinge können an den bleibenden Standort gepflanzt werden.
x			7—8	x	x		x	Gehören theils zu den Brombeeren, mit rankenden Zweigen, theils sind es himbeerartige Ziersträucher. Der feine Samen wird am sichersten in Gefässe gesät. Vergl. §. 238.
x		x						Zwerghimbeere, im hohen Norden einheimisch und bis zum 60° s. Br. als Frucht hochgeschätzt. Für Kühle und hohe Lagen. Aussaat lohnend.
x				x	x			Die korallenrothen Früchte halten sich den Winter hindurch und sind sehr zierend. Samen im Winter stratificieren und im April in schattiger Lage säen. Die übrigen Species sind sehr empfindlich gegen Kälte.
x		x		x				In der Jugend zärtlich, später ganz hart. Verpflanzt sich leicht. Liebt feuchten Grund und sonnigen Stand. Samen in gute, lockere Erde gleich nach der Ernte oder im April säen, in letzterem Falle einen Monat vorher stratificieren.
x	x			x	x			Sämlinge zeigen oft Abweichungen von der Mutterpflanze, indem selbst wilde Arten leicht Bastarde bilden. Aussaat am besten sofort nach der Ernte, da die Samen sehr schnell die Keimkraft verlieren. Beim Säen mit etwas Sand zu vermischen.
x	x		6—7	x	x		x	<i>S. nigra</i> ist sowohl Zier- als Obststrauch und wird auch medicinisch verwendet. Die Samen aller <i>S.</i> dürfen nur schwach bedeckt werden. Sie werden entweder gleich im Herbst gesät oder besser im Herbst stratificiert und im folgenden Frühjahr in leichte Erde gesät. Die <i>S.</i> lieben frischen Boden und Schatten.
x		x		x				Bei uns Kathauspflanze, im Süden schöner, Grevillea ähnlicher Baum, dessen Blätter einen starken Pfeffergeruch entwickeln.
x		x		x				Besonders schöne japanische Conifere mit quirlständigen Nadeln. Aussaat stets schattig halten. In Töpfen heranziehen, aber später unbedingt auspflanzen. Liebt etwas kräftige, sandige Haldeerde und fürchtet grosse Feuchtigkeit.
x		x						Unmühsame, reich mit Stacheln bewehrte Kletterpflanzen, besonders an Bäumen und niedrigen Mauern zu ziehen. Sie können nur in den wärmsten Lagen Süddeutschlands im Freien gezogen werden.
x		x	7—8	x				Für das Freie ist nur <i>S. japonica</i> geeignet. Herrlicher Baum mit zierlichen gelblichen Blättern und reichen Blüthen. Aussaat nicht vor April-Mai, Samen vorher 24 Stunden in Wasser einweichen.
x	x		5—6	x	x			Kleine Bäume, wie <i>S. Aucuparia</i> , zu behandeln und zu verwenden. <i>S. americana</i> hat dunklere und grössere Beeren. <i>S. hybrida</i> und <i>intermedia</i> sind Bastarde, Samenpflanzen daher oft in die Art zurückgehend.
x	x		5—5	x	x			Schmückt Laubholzgebüsche auf Kalkboden durch seine unterhalb weissen, grossen Blätter. Verdient um so mehr Anpflanzung, als er auch auf trockenem, steinigem Boden noch gut gedeiht. Aussaat wie bei <i>S. Aucuparia</i> .
x	x		5	x	x			Ziert besonders durch die korallenrothen Früchte (Vogelbeeren), welche vielen Vögeln, aber auch Hochwild zur Nahrung dienen. Aussaat am besten im April mit im December stratificirtem Samen, häufig gessenen.
x	x		5	x	x			Wird hier und da als Fruchtbaum, besonders in Weinbergen angebaut und gleicht der gemeinen Eberesche, nur sind die Früchte und Blätter grösser.
x	x		5	x	x			Bildet einen grossen Baum, welcher vorzügliches Nutzholz (auch zu Möbeln) liefert und dessen mispelartigen Früchte geniessbar sind. Schöne hochrothe Herbstfärbung der Blätter.
x		x	6	x	x		x	Sehr reichblühender, gegen Kälte empfindlicher Strauch, liebt warme Lage und trockenen Boden. Aussaat April-Mai in gewöhnlicher Erde. Vergl. Genista.

N a m e n.	Familie.	Baum.	Strauch.	Schlingend.	Obst:				Sommergrün.	Sommer- u. wintergrün.	Winterschutz im Freien (Bedeckung, Einbinden).	Frostfrei überwintern.
					Beerenobst.	Kernobst.	Steinobst.	Schalenobst.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Spiraea	Rosaceae		x						x	x		
Staphylea, Pimpernuss	Celastrineae		x						x			
Sterculia	Bombaceae	x							x			x
Styrax	Styraceae	x	x						x			x
Symphoricarpus	Caprifoliaceae		x						x			
Syringa, Flieder	Oleaceae		x						x			
Tamarix, Tamariske	Tamariscineae		x						x		x	
Taxodium, Sumpfeypresse und Eibeneypresse	Coniferae	x	x						x	x	x	
Taxus, Eibenbaum		x	x							x		
Thuja und Biota, Lebensbaum....	"	x	x							x	x	
Thujopsis	"	x	x							x		
Tilia, Linde	Tiliaceae	x							x			
Torreya	Coniferae	x								x	x	
Ulex, Stechginster	Papilionaceae		x							x	x	
Ulmus, Ulme, Rüster	Ulmaceae	x							x			

Aussaat:			Schönblüthig; der Flor fällt in die Monate	Eignet sich:			Blüthen wohlriechend.	Besondere Bemerkungen.
in das Land	Frühjahr.	Herbst.		als Einzelpflanze.	für Gehölzgruppen und im Park.	für Hecken.		
14	15	16	17	18	19	20	21	22
x		x	4—8	x	x			Diese Gattung ist reich an schönblühenden Arten. Viele Arten eignen sich zu Zierhecken. Einige, z. B. lanceolata, sind wintergrün. Um sich schön zu entwickeln, verlangen viele S. nahrhaften, dabei lockeren Boden und Schatten, so z. B. callosa, corymbosa, ariæfolia, sorbifolia. Andere wie S. cana, hypericifolia, Thunbergi, gedeihen auch auf trockenen Lagen. Aussaat am besten im April in leichter Erde, mit einer dünnen Schicht Haideerde bedecken.
x	x		5—6	x	x		x	Schön blühende hohe Sträucher, welche in jedem Boden gedeihen. St. cotchica ist eine gute Treibpflanze. Bei grösserem Betriebe werden die Samen im October stratificiert und erst im zweiten Frühjahr ausgesät.
x		x		x				Im Süden ein schöner Baum von der Tracht einer Platane, kann nördlicher nur im Kalthause gezogen werden. Verlangt jährliches Verpflanzen, sehr nahrhaften Boden und während der Vegetation sehr reichliche Bewässerung. Aussaat im April, gegen Spätfröste zu schützen.
x		x	5—6					Zärtliche Sträucher oder kleine Bäume, welche nur in den wärmsten Lagen von Mitteleuropa im Freien aushalten.
x					x	x		Sehr verbreitete Parksträucher, welche ohne jede Pflege gedeihen. Zieren besonders durch die weissen, bei einigen Species rothen Früchte, welche sich den ganzen Winter hindurch halten. S. mexicana (montana) verlangt Bedeckung im Winter.
x			5—6	x	x		x	Lieben kräftigen Boden und gedeihen sowohl im Schatten wie der vollen Sonne ausgesetzt. Das Treiben der S., besonders S. vulgaris purpurea bildet die Specialität einiger grossstädtischen Gärtnereien. Zur Aussaat stratificiert man den Samen sofort nach der Ernte und sät im folgenden März.
x		x	8—9		x			Fein belaubte, schön blühende Sträucher, welche besonders auf feuchtem Sandboden gut gedeihen und sich dem Schnitt willig unterwerfen. Der feine Samen darf nur schwach bedeckt werden.
x		x		x				Theils Blätter abwerfend (T. distichum), theils wintergrün (T. sempervirens). Ersterer gedeiht am besten auf nassem Boden und ist winterhart, letzterer, Taurus-ähnlich, leidet oft von der Kälte. Aussaat in gute Haideerde, oft leicht besprühen.
x	x			x	x	x		Die T. sind die härtesten und in Bezug auf Boden und Lage mit wenigen Ausnahmen anspruchslosesten Coniferen. Bei grossem Betrieb stratificiert man den Samen gleich nach der Ernte und sät im zweiten Frühjahr danach. Aussaat gegen Vögel schützen.
x		x		x	x	x		Die nordamerikanischen Arten, von denen einige grosse Bäume bilden, sind ganz winterhart, die zur Gattung Biota gehörenden orientalischen L. leiden mitunter in kalten Wintern. Die zahlreichen Varietäten erzeugen sich nicht immer echt aus Samen. Viele nur strauchartig. T. occidentalis giebt prächtige Hecken. Aussaat in leichte Erde, schattig halten, häufig spritzen, gegen Vögel schützen. Vergl. S. 235.
x		x		x				Höchst ornamentale, in einigermaßen geschützter Lage harte Coniferen von leichter Cultur. Lieben leichte, durchlassende, dabei nahrhafte Erdmischung und fürchten grosse Feuchtigkeith. Aussaat wie bei Thuja.
x	x		6—7	x	x		x	Die Samen der Linden brauchen lange Zeit zum Keimen. In leichte Erde säen, für grossen Betrieb erst im zweiten, der Einschlebung im September folgenden Frühjahr. Junge Sämlinge nicht nur gegen Spätfröste, sondern auch gegen einen sehr kleinen Pilz, welcher sich auf die Blüthen setzt, schützen. Letzteres geschieht bei trockenem, sonnigem Wetter durch Bestreuen der Pflänzchen mit Schwefelblüthe.
x		x						Ausser T. grandis ziemlich harte kleine Bäume, theils aus Nordamerika, theils aus Japan. Sie gedeihen nicht gut in Tüpfen, am besten im Schutz und Schatten grösserer Nadelholzbäume. Man behandelt die grossen Samen, welche schnell die Keimkraft einbüssen und lange liegen, wie bei Cedrus Deodara (S. 390) angegeben.
x		x	2—4 6—7		x	x		Auf Sand in der Nähe der Küsten wild wachsend oder zu Hecken angepflanzt, erfriert U. doch oft in harten Wintern bis zum Boden oder an einzelnen Aesten. Für abschüssige Terrains und trockene, sterile Boden besonders nützlich. Aussaat nicht vor April-Mai in leichte Erde.
	x		3—4	x	x			Entwickelt sich besonders schön auf gutem, tiefem, feuchtem Boden. Der Samen reift schon im Mai und Juni und wird am besten dann spätestens Juli-August in gute, leichte Erde gesät, nur schwach bedeckt und stets feucht gehalten.

N a m e n.	Familie.	Baum.	Strauch.	Schlingend.	Obst:				Sommergrün.	Sommer- u. wintergrün.	Winterschutz im Freien (Bedeckung, Einbinden).	Frostfrei überwintern.
					Beerenobst.	Kernobst.	Steinobst.	Schalenobst.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ungnadia	Hippocastaneae	x							x		x	
Vaccinium macrocarpum, Cran- beere, amerikanische Moos- beere	Ericaceae		x		x					x	x	
Myrtillis, Heidelbeere, Bickbeere	"		x		x				x			
Oxycoccox, Moosbeere	"		x		x					x		
Vitis idaea, Preisselbeere, Krons- beere	"		x		x					x		
amerikanische Arten	"		x						x	x		x
Viburnum, Wasserholder, Schneeb- ball	Caprifoliaceae		x						x			
Virgilia (Cladrastis), Gelbholz	Papilionaceae	x							x			
Vitex, Kuschbaum	Verbenaceae		x						x		x	x
Vitis vinifera, Weinstock	Ampelideae			x	x				x		x	
andere Arten	"			x					x		x	
Weigelia (Diervilla)	Caprifoliaceae		x						x		x	
Wellingtonia gigantea (Sequoja) .	Coniferae	x								x	x	
Zanthoxylum, Gelbholz, Zahnweh- holz	Zanthoxyleae	x	x						x		x	x
Zizyphus volubilis (Berchemia), (Jujuba)	Rhamneae	x		x					x		x	x

Aussaat:			Schönblühend; der Flor fällt in die Monate	Fignet sich:			Blüthen wohlriechend.	Besondere Bemerkungen.
in das Land	Herbst.	in Saatgefässe unter Glas.		als Einzelpflanze.	für Gehölzgruppen und im Park.	für Hecken.		
14	15	16	17	18	19	20	21	22
x		x	7—8					Weisslichblühend mit gefiederten Blättern und von schönem Wuchs, bei uns jedoch sich nicht voll entwickelnd. Liebt lockere, dabei nährhafte Erde.
x		x	5—6					Ein Bodenstrauch, welcher Aehnlichkeit mit der Preisel- und Moosbeere hat. Die grossen, lange haltbaren Früchte übertreffen an Wohlgeschmack die einheimischen Arten. Können nur auf bewässerbaren Plätzen in Humuserde gezogen werden.
x			5—6					Bekannter kleiner Strauch, welcher nur auf Waldboden gezogen werden kann.
x			5—6					Die Moosbeere, welche auf sandigem Moorboden, besonders an Grabenrändern wächst und an solchen in somiger Lage gezogen werden kann, übertrifft die ähnliche Preiselbeere an Wohlgeschmack.
x			5—6					Kann auf Sandboden in lichten Nadelwäldern, besonders hoch im Gebirge gezogen werden. Verlangt Luft und Sonne, um ihre Beeren zu reifen.
x		x	5—6					Als Zierpflanzen angebaute V. sind in den Gärten selten, und daher wenig erprobt. Sie verlangen ein Moorbeet, einige Arten Cultur im Kalthause.
x	x		5—6	x	x			Beliebte, herrlich blühende Sträucher, auch für Schatten und Unterholz geeignet. Gedeihen in jedem etwas frischen Boden. Die schönste Art ist V. plicatum, als welcher auch fälschlich V. dentatum vorkommt. Die aus China stammenden Species verlangen leichte Bedeckung im Winter. V. Tinus s. S. 396. Für Aussaaten in grösserem Massstabe stratificiert man den Samen unmittelbar nach der Ernte und sät erst im zweitfolgenden Frühjahr.
x		x	6—7	x				Bei uns noch ungenügend bekannter, sehr empfehlenswerther schöner kleiner Baum mit grossen, akazienähnlichen Blättern und grossen, weissen Blüthen in hängenden Trauben. Liebt guten kräftigen Boden. Aussaat im April bis Mai in guter Gartenerde.
x		x	7—9	x				Erfrieren bei uns oft bis zum Boden und verpflanzen sich schwer. Warme Lage, sandige Erde. Aussaat im April.
x	x	x						Aussaat ergibt meistens früher reifende Trauben, als sie die Mutterpflanze liefert. Man verwendet nur Samen gutgeformter Beeren von mustergiltigen Trauben. Zur Frühjahrsaussaat legt man die reinen Samen vorher 1 bis 2 Tage in Wasser. Die Freilandsaat wird, um die Feuchtigkeit zu erhalten, leicht mit Stroh bedeckt. Die Sämlinge einzeln in Töpfe oder in die sonnigste Lage des Gartens verpflanzen und jährlich beschneiden. Von gewissen Sorten gewonnen, können dieselben schon im 4. Jahre tragen, oft dauert dies jedoch 8—10 Jahre. Vergl. s. 236.
x		x						Unter den nordamerikanischen wilden Beben sind sehr schöne, zum Theil mit essbaren Beeren; sie eignen sich vorzüglich für Wände, Spaliere und Lauben und an einzeln stehende Bäume. V. riparia mit sehr wohlriechenden Blüthen.
x		x	5—7	x	x			Die W. gehören zu den prächtigsten Blütensträuchern, welche indessen in manchen Gegenden durch frühe Fröste leiden. Sie lassen sich, in Töpfe gebracht, gut treiben. Lieben lockeren, ziemlich nährhaften Boden. Aussaat März-April. Durch häufiges Spritzen stets feucht erhalten. W. (Calypotrostigma) Müdden-dorfiana ist zärtlicher und muss erst im Topfe erstärken.
x		x		x				An vielen Orten erfrierend, hat sich dieser schöne Baum doch an anderen selbst in den kältesten Wintern gut erhalten und bildet in einigen Gegenden bereits hohe Bäume. Bedeckung nützt wenig. Aussaat wie bei Retinospora. Verpflanzt sich nur gut, wenn mit starkem Ballen versehen, liebt lockeren, sandigen, dabei nährhaften Boden. In Töpfen heranziehen.
x		x		x				Wenig cultivirt, dicke, mit Stacheln besetzte Zweige und eschenähnliche Blätter. Lieben kräftigen, feuchten Boden.
		x		x				In Süd-Europa häufig anzutreffender Baum mit essbaren Früchten. Liebt tiechten sandigen Boden und verlangt im Freien die südlichste Lage. Die Samen sind sehr hart und liegen ein Jahr in der Erde, wenn sie nicht ebenso lange stratificiert werden.

Die Aussaat dieser Moorbeetsträucher hat in Haideerde zu geschehen, analog den in §§. 224-228 gegebenen Andeutungen.

Alphabetisches Register.

Die in starker Schrift gedruckten Artikel sind besonders behandelt.

A.	Seite		Seite		Seite
Abelia	341	Ampelopsis	384	Astrantia	272
Abies s. Pinus	401	Ampfer	148	Athanasia	272
Abobra	368	Amygdalus	384, 386	Atriplex	148, 272
Abrobia	368	Anagallis	270	Atropa	82
Absinth	199	Ananassa (Bromeliaceae)	322	Anubria	272
Abutilon	344	Anarrhinum	270	Aucuba	344
Acacia	344, 384	Anchusa	270	Aurikel.	257
" s. Robinia	408	Andorn	207, 209	Avena	77, 272
Acanthus	268	Andromeda	386	Azalea	335, 386
Acer	384	Andropogon	270		
Achillea	78, 268	Androsace	270		
Achimenes (Gesneriaceae)	333	Aucumone	270		
Ackerrüben	119	Angelika	186, 209		
Aconitum	268	Angonia	344		
Acroclitum	268	Angiopteris (Farn)	331		
Acrocomia (Palmae)	339	Anis	186, 209		
Acrostichum (Farn)	331	Annellen, Aussaat der	213		
Actaea	268	Anomatheca	270		
Adansonia	344	Anona	341, 386		
Adenophora	268	Antennaria	270		
Adiantum (Farn)	331	Anthemis	270, 272		
Admia	268	Anthericum	272, 344		
Adonis	268	Anthoxanthum	77, 272		
Aechmea (Bromeliaceae)	322	Anthurium (Aroideae)	319		
Aerides (Orchideae)	338	Antigonon	344		
Aeschynanthus	344	Antirrhinum.	224		
Aesculus	384	Apfelbaum s. Pirus	404		
Aethionema	268	Aphelandra	344		
Aethusa	193	Apocynum	272		
Agapanthus	344	Apogoneton (Wasserpflanze)	342		
Agaricus edulis	301	Aprikose s. Prunus	404		
Agarista s. Andromeda	386	Aquilegia	272		
Agave	344	Arabis	272		
Ageratum	268, 270	Arahis	189		
Agrostemma	270	Aralia	344, 386		
Agrostis	73, 270	Araucaria	386		
Ahlkirsche s. Prunus	406	Arbuse	158, 211		
Ahorn s. Acer	384	Arbutus	386		
Ailanthus	384	Arctostaphylos	386		
Akelei s. Aquilegia	272	Arctotis	272		
Alant	185, 209	Ardisia	344		
Alisma (Wasserpflanzen)	312	Areca (Palmae)	339		
Alkekengi	207	Arenaria	272		
Althamunda	344	Argemone	272		
Allium	136, 270	Aristolochia	341, 386		
Alnus	384	Armeniaea s. Prunus	404		
Allocasia (Aroideae)	319	Armeria.	319		
Aloi	344	Aroideen des Warmhauses	272		
Alonsoa	270	Aronia s. Pirus	404		
Alopecurus	77	Artemisia	189, 199, 272		
Aloysia s. Verbena citriodora	366	Arthrotaxis	386		
Alpenveilchen s. Cyclamen	330	Artischocken	176, 209		
Alpine	270	Arum (Aroideae)	319		
Alsophila (Farn)	331	Arundinaria	344		
Alstroemeria	270	Arundo	272		
Althaea rosea fl. pl.	222	Asclepias	272, 344		
Alyssum	270	" s. Hoya	352		
Amarantus	205, 223	Asimina s. Auona	386		
Amaryllis	318	Asperula	198, 272		
Amelanchier	384	Asphodelus	272		
Ammobium	270	Aspidium (Farn)	331		
Amorpha	384	Asplenium (Farn)	331		
Amorphophallus	344	Aster	225, 272		

B.

Bactris (Palmae)	339
Bärlauch	139
Balanium (Farn)	331
Baldrian	79, 206, 209
Balsamine	247
Bambusa	344
Banksia	346
Baptisia	274
Barbarea	274
Barthelemy s. Dianthus	282
Bartonia	274
Basella	205
Basilienkraut	186
Basilikum.	186, 209
Bastardklee	78
Bauhinia	346
Baumkohl	101
Baumwolle s. Gossypium	352
Baumwürger s. Celastrus	390
Bazille	206
Beaucarnea	346
Beerenobst, Aussaat	376
Beete	119, 212
Begonia	320
Beifuss	199
Beiskohl	146, 211
Bejaria	370
Bellis	274
Benincasa	274
Benhamia	386
Benzoin s. Laurus	354
Berberis	386
Berchemia s. Zizyphus	412
Bertolonia	346
Beschornia	346
Beta	274
Betonica	274
Betula	386
Bickbeere s. Vaccinium	412
Bidens	274
Bignonia	346, 388
Billardiera	346
Billbergia (Bromeliaceae)	322
Bilsenkraut	79
Bindsalat	126, 210
Binsenbaum s. Spartium	408
Biota s. Thuja	410
Birke s. Betula	386
Birnbaum s. Pirus	404
Bisannuellen, Anzucht	216
Blätterkohle.	100, 209
Blanc de Champagne	203

	Seite
Blasenstrauch s. <i>Coletea</i> . . .	390
Blaukohl . . .	100, 309
Blaukraut . . .	95
Flechnum (Farn) . . .	331
Fleischraser . . .	67, 75
Fleischsellerie . . .	114, 212
Filix . . .	205, 274
Blumenkohl . . .	90, 209
Hocconia . . .	274, 346
Bocksdorn s. <i>Lycium</i> . . .	400
Boehmeria . . .	346
Boerskohl . . .	98, 212
Bohnen . . .	166, 209
Bohnenkraut . . .	187, 209
Bomarea s. <i>Alstroemeria</i> . . .	270
Bonaparteia (Bromeliaceae) . . .	322
Borassus (Palmae) . . .	339
Boretsch . . .	187, 209
Boronia . . .	346
Bossiaea . . .	346
Bougainvillea . . .	346
Bouvardia . . .	346
Brachycome . . .	274
Brachysema . . .	346
Brakea (Palmae) . . .	339
Brassica chinensis . . .	205
Braunkohl . . .	100
Briza . . .	274
Brizopyrum . . .	274
Broccoli . . .	94, 209
Brombeere . . .	376
Bromelia (Bromeliaceae) . . .	322
Bromeliaceen . . .	322
Broussin . . .	274
Broussonetia . . .	388
Browallia . . .	274
Brüsseler Sprossenkohl . . .	90
Brugmansia s. <i>Datura</i> . . .	350
Brunnenkresse . . .	131, 210
Brunfelsia s. <i>Franciscia</i> . . .	352
Bryonia . . .	274
Bryonopsis . . .	274
Buche s. <i>Fagus</i> . . .	394
Buddleya . . .	388
Buchsbaum s. <i>Buxus</i> . . .	388
Bunias . . .	205, 209
Euphthalmum . . .	274
Eupleurum . . .	388
Butterkohl . . .	101
Buxus . . .	388

C.

Cacalia . . .	274
Cacteen . . .	322
Cajophora . . .	274
Caladium (Aroideae) . . .	319
Calanthe . . .	274
Calamagrostis . . .	274
Calamus (Palmae) . . .	339
Calandrinia . . .	274
Calanthe (Orchideae) . . .	338
Calceolaria . . .	276, 324
Calendula . . .	206, 209, 276
Calla . . .	346
Calliopsis . . .	388
Calliopsis . . .	276
Calliopsis . . .	276
Calliopsis . . .	276
Callistemon . . .	346
" s. <i>Metrosideros</i> . . .	356
Callistephus (Asterchin.) . . .	225
Callitris . . .	388
Calluna . . .	388
Calophaca . . .	388
Caltha (Wasserpflanzen) . . .	342
Calycanthus . . .	388
Calyptrostigma s. <i>Weigelia</i> . . .	412

Camassia . . .	276
Camellia . . .	335
Campanula . . .	238
Camptosema s. <i>Diodea</i> . . .	350
Canna . . .	325
Cannabis . . .	276
Cantua . . .	346
Capparis . . .	205, 388
Capsicum . . .	194, 276
Caragana . . .	388
Caraguata (Bromeliaceae) . . .	322
Carden. Gemüse . . .	177
Cardiospermum . . .	276
Cardobenedikten . . .	209
Cardouille . . .	111
Carduus . . .	276
Cardy . . .	177, 209
Carex (Wasserpflanzen) . . .	342
Caria . . .	346
Carludovica (Palmae) . . .	339
Carotten . . .	104, 209
Carpinus . . .	388
Carthamus . . .	276
Carviol . . .	90, 209
Carya . . .	388
Caryota (Palmae) . . .	339
Cassandra s. <i>Andromeda</i> . . .	386
Cassia . . .	346
Castanea . . .	388
Castilleja . . .	276
Casuarina . . .	388
Catalpa . . .	388
Catananche . . .	276
Cattleya (Orchideae) . . .	388
Ceanothus . . .	390
Cedronella . . .	276
Cedrus . . .	390
Celastrus . . .	299
Celosia . . .	322
Celtis . . .	390
Centaurea . . .	276, 346
Centauridium . . .	276
Centranthus . . .	276
Cephalanthus . . .	390
Cephalaria . . .	276
Cephalotaxus . . .	390
Cerastium . . .	276
Cerasus . . .	390
Cerantonia . . .	390
Cereis . . .	390
Cerinth . . .	278
Chaenostoma . . .	278
Chamaecyparis . . .	390
" s. <i>Cupressus</i> . . .	392
Chamaedorea (Palmae) . . .	339
Chamaepeuce . . .	278
Chamaerops (Palmae) . . .	339
Champignon . . .	201
Cheilanthes (Farn) . . .	331
Cheiranthus . . .	231, 278
Chelone . . .	278
Chenille . . .	187, 210
Chenopodium . . .	149, 278
Chymonanthus s. <i>Calycanthus</i> . . .	388
Chionanthus . . .	390
Chionodoxa . . .	278
Chironia . . .	346
Chlora . . .	278
Chloris . . .	278
Chorizema . . .	346
Chrysanthemum . . .	278, 327
Chrysurus . . .	278
Cibolium (Farn) . . .	331
Cichoriensalat . . .	133, 212
Cichorienwurzel . . .	106, 210
Cineraria . . .	328, 346
Cirsium . . .	278

Cissus . . .	348, 390
Cistus . . .	390
Citron s. <i>Citrus</i> . . .	348
Citronen-Melisse . . .	193, 211
Citrus . . .	348
Cladrastis s. <i>Virgilia</i> . . .	412
Clarkia . . .	278
Claytonia perfoliata . . .	149
Clematis . . .	278, 390
Cleome . . .	278
Cherodendron . . .	348
Clethra . . .	390
Clianthus . . .	348
Clintonia . . .	278
Clitoria . . .	348
Clivia . . .	348
Cobaea . . .	278
Coccinia . . .	278
Cocos (Palmae) . . .	339
Coelogyne (Orchideae) . . .	338
Coffea . . .	348
Coix . . .	278
Colegium . . .	278
Coleus . . .	329
Collinsia . . .	278, 280
Collomia . . .	280
Colocasia (Aroideae) . . .	319
Columnea (Gesneriaceae) . . .	333
Colutea . . .	390
" s. <i>Sutherlandia</i> . . .	361
Columbia s. <i>Aracaria</i> . . .	386
Combretum . . .	348
Commelina . . .	280
Coniferen, Aussaat der . . .	371
Conoclinium . . .	348
Convallaria . . .	280
Convolvulus . . .	280, 348
Corehorus s. <i>Kerria</i> . . .	398
Cordylone s. <i>Draecena</i> . . .	350
Coriander . . .	188, 210
Coriaria . . .	392
Cornus . . .	392
Coronilla . . .	392
Correa . . .	348
Cortusa . . .	280
Corydalis . . .	280
Corylus . . .	392
Corypha (Palmae) . . .	339
Cosmanthus . . .	280
Cosmea . . .	280
Cosmidium . . .	280
Cosmophyllum s. <i>Ferdinanda</i> . . .	352
Cosmos s. <i>Cosmea</i> . . .	280
Cotoneaster . . .	392
Couve Tronchuda . . .	97
Cranbe maritima . . .	183
Crassula . . .	348
Crataegus . . .	280, 392
Crepis . . .	280
Crinum . . .	348
Crithmum maritimum . . .	206
Crotalaria . . .	348
Croton . . .	348
Crucianella . . .	280
Cryptomeria . . .	392
Cryptostegia . . .	348
Cuba-Bohne . . .	174
Cuba-Spinat . . .	149
Cucumis . . .	280
Cucurbitaceen, Aussaat . . .	221
Cunninghamia . . .	392
Cuphea . . .	230, 348
Cupressus . . .	392
Cyathea (Farn) . . .	331
Cycadeen . . .	339
Cyclamen . . .	330
Cyclanthera . . .	280

	Seite
Cydonia	392
Cymbidium (Orchideae)	338
Cynoglossum	280
Cynosurus	75, 280
Cyperus	189, 348
Cypresse s. Cupressus	392
Cyrtopodium (Orchideae)	338
Cyrtanthera	350
Cyrtotium (Farrn)	331
Cystopteris (Farrn)	331
Cytisus	350, 394

D.

Dactylis	77
Dahlia	240
Dalechampia	350
Dammara	394
Daphne	394
Dasylirion (Bromeliaceae)	322
Datisca	280
Dattelpflaume s. Diospyros	394
Datura	280, 350
Daubentonia	350
Davallia (Farrn)	331
Delphinium	241, 280
Dendrobium (Orchideae)	338
Desmanthus (Wasserpflanze)	342
Desmodium	350, 394
Deutzia	394
Dianella	350
Dianthus	243, 282
Dicksonia (Farrn)	331
Dictamnus	282
Dicentra (Gesneriaceae)	333
Didymocarpus s. Strepto-	
carpus	364
Dieffenbachia (Aroideae)	319
Dielytra	282
Diervilla	394, 412
Digitalis	80, 282
Dill	188, 210
Dimorphanthus s. Aralia	386
Dioecia	350
Diosma	350
Diospyros	394
Diotis	350
Diplazium (Farrn)	331
Diplothemium (Palmae)	339
Ditryceae (Gesneriaceae)	333
Disa (Orchideae)	338
Disemma	350
Dodecatheon	282
Dolichos	174, 282
Dorn s. Crataegus	380, 392
Doronicum	282
Dorschen	103
Doryanthes	350
Doryopteris (Farrn)	331
Dracaena	350
Dracocephalum	282
Dracun	189, 210
Dryas	282
Drymonia (Gesneriaceae)	333
Düngung	23
Dyckia (Bromeliaceae)	322

E.

Eberesche s. Sorbus	408
Eccremocarpus s. Calampelis	274
Echeveria	350
Echinacea	282
Echinocystis	282
Echinops	282
Echium	282
Edwardsia	350
Ehrenpreis s. Veronica	312, 366
Eibenbaum s. Taxus	410

Eiche s. Quercus	406
Eierfrucht	188, 210
Einjährige Pflanzen,	
Aussaat der	213
Eiskraut	147, 210
Elaeagnus	394
Elaeis (Palmae)	339
Elaeone	282
Elichrysium	284
Elisheere s. Sorbus	408
Elsholzia	284
Elymus	284
Emilia s. Cacalia	274
Endivien	126, 128, 210
Engelwurz	186, 209
Enzian s. Gentiana	286
Eoepion	284
Epacris	336
Ephebra	394
Epheu s. Hedera	338
Epidendrum (Orchideae)	388
Epilobium	284
Episcia (Gesneriaceae)	333
Eragrostis	284
Eranthemum	350
Erbsen	161, 210
Erbsenbaum s. Caragana	388
Erdbeeren	200
Erdbeerbaum s. Arbutus	386
Erdbeerspinat	205, 212
Erde	18
Erdmandel	189, 210
Erdnuss	189, 210
Eremostachys	284
Eremurus	284
Erianthus	284
Erica	337, 394
Erigeron	284
„ s. Stenactis	308
Erinus	284
Eriobotrya s. Mespilus	402
Eriogonum	284
Eriostemon	350
Erie s. Alnus	384
Erodium	284
Eription	284
Eryngium	284
Erysimum	284
Erythraea	284
Erythrina	350
Escallonia	350
Esche s. Fraxinus	396
Esdragon	189, 210
Eschscholtzia	284
Esparsette	78
Espe s. Populus	404
Eucalyptus	350
Eucharidium	284
Euchlaena	284
Eucnide	284
Eugenia	350
Eulalia	284
Eupatorium	281
Euphorbia	286, 350
Euryale (Wasserpflanze)	342
Euterpe (Palmae)	339
Eutoca	286
Evonymus	394
Exacum	350

F.

Fabricia	352
Fagus	394
Farnkräuter	331
Federgras s. Stipa	308
Federnelken s. Dianthus	282

Fedia	286
Feigenbaum s. Ficus	369
Feldsalat	130, 211
Fenchel	135, 190, 210
Fenzlia	286
Ferdinandia	352
Ferraria s. Tigridia	308
Ferula	286
Festuca	75–77, 286
Fichte s. Pinus	404
Ficus	352, 396
Fingerhut s. Digitalis	80, 282
Florigras	75
Fisolen	166, 209
Fitzroya	396
Flammenblume s. Phlox	255, 300
Flleder s. Syringa	410
Flügelerbse	165
Flügelnuss s. Pterocarya	406
Fontanesia	396
Forsythia	396
Föhre s. Pinus	404
Fraxaria indica	286
Francisceae	352
Fraxinus	396
Fremontia	396
Frenela	396
Fritillaria	286
Fuchsia	332, 396
Fuchsschwanz	223
„ Wiesen	77
Funkia	286
Furcraea (Bromeliaceae)	322
Futterkohle	101
Futerrüben	121

G.

Gaillardia	286
Galega	286
Ganolepis	286
Gänseblümchen s. Bellis	274
Gardenia	352
Gardonia	286
Gartenbohnen	166
Gartengleisse	153
Gartenkresse	183, 210
Gartenmelde	148, 211
Gartenrasen	67–76
Gartensalat	122, 212
Gaultheria	396
Gaultheria	396
Gaura	286
Gazania	352
Geisblatt s. Lonicera	400
Gekrösekohl	97
Gelbbolz s. Virgilia	412
„ s. Zanthoxylon	412
Gelbe Rüben	104
Gelbe Wurzeln	104, 209
Gemsenhorn	207, 211
Genista	352, 396
Gentiana	286
Geonoma (Palmae)	339
Georgine	240
Geranium	286, 341
Gerberstrauch s. Coriaria	392
Gesneria (Gesneriaceae)	333
Gesneriaceen	333
Geum	286
Gewürzstrauch s. Calycanthus	388
Gilia	286
Ginkgo s. Salisburia	408
Ginster s. Genista	396
Glaskohlraabi	102
Gladiolus	286
Glaucium	286
Glaziovla (Palmae)	339

	Seite
Gleditschia	396
Gleichenia (Farn)	331
Globularia	288
Glockenblume	228
Gloriosa	352
Gloxinia (Gesneriaceae)	333
Glycine	396
Gnaphalium	288, 352
Godetia	288
Goldknoblauch	139
Goldlack	238
Goldregen s. Cytisus	394
Goldwurz	111, 210
Gombo	206
Gomphrena	288
Goodia	352
Gossypium	352
Grahamia	288
Grammanthes	288
Granate s. Punica	360
Graslauch	139
Grasmischungen	73
Grevillea	352
Greyia	352
Grindelia	288
Grünkohl	100
Gummibaum s. Ficus elastica	352
Gurken	149, 210
Gurkenkraut	187, 209
Gurkenmelone	157
Gunnera	288
Guzmania (Bromeliaceae)	322
Gymnocladus	396
Gymnogramma (Farn)	331
Gymnopsis	288
Gymnothrix	288
Gynerium	288
Gypsophila	288
„ s. Tunica	310

H.

Haargras	75
Habenbranthus s. Amaryllis	318
Habrothamnus	252
Haferschele s. Prunus	406
Haferwurz	107, 210
Hahnenkamm	229
Haide s. Erica	337
„ s. Calluna	394
Hainbuche s. Carpinus	388
Hakea	352
Halesia	396
Haliomodendron	396
Hamelis	396
Hauf s. Cannabis	276
Hardenbergia s. Kennedyia	354
Hartriegel s. Cornus	392
Haselnuss s. Corylus	392
Hebelclim s. Conoclinium	348
Hedera	398
Hedysarum	352
Hedysarum	78, 288
Heidelbeere s. Vaccinium	412
Helenium	288
Helianthemum	288
Helianthus	288
Heliophila	288
Heliotropium	352
Helipterum	290
Helleborus	290
Hemerocallis	290
Heraclum	290
Herbstrüben	119
Herlitz s. Cornus	392
Herzkohl	98
Hesperis	290
Hexacentris s. Thunbergia	396

Hibiscus	206, 290, 352, 398
Hickorybaum s. Carya	388
Hieracium	290
Himbeere	376
Hippophaë	398
Hirschhornsalz	136
Holcus	77
Hollunder s. Sambucus	408
Honiggras	77
Hopfen	207, 210
Hopfenbuche s. Ostrya	402
Hopfenklee	78
Hordeum	290
Hortensia s. Hydrangea	398
Hoya	352
Humea	290
Humulus	207
Hundspetersilie	193
Hunnemannia	290
Husarenknopf	208
Hyacinthus	290
Hydrangea	398
Hydrocharis (Wasserpflanze)	342
Hydroclea (Wasserpflanze)	342
Hymenoxis	290
Hyphorbe (Palmae)	339
Hyoscyamus	79
Hypericum	290, 398
Hysopus	190

I.

Iberis	290
Idesia s. Polycarpa	404
Ilex	398
Illicium	352
Imantophyllum s. Clivia	348
Immortellen	220
Impatiens	290, 352
Impatiens Balsamina	247
Incarumklee	78
Incarvillea	352
Indigofera	352, 398
Inga	354
Inula	185, 209
Involucraria	290
Ipomoea	290, 354
Ipomopsis	290
Iris	292
Ismene s. Paneratum	358
Isoplepis	354
Isoloma (Gesneriaceae)	333
Isop	190, 210
Isotoma	292
Ixia	354
Ixora	354

J.

Jacaranda	354
Jambosa s. Eugenia	350
Jasione	292
Jasminum	354, 398
Jasmin, wilder, s. Philadelphus	402
Jatropha	354
Jelängerjelieber s. Lonicera	400
Jochroma	354
Johannisbeere	376
Johannisbrodbaum s. Cera- tonia	390
Jonopidium	292
Jubaea (Palmae)	339
Judasbaum s. Cercis	390
Judenbart s. Saxifraga	362
Juglans	398
Jujuba s. Zizyphus	412
Juncus (Wasserpflanze)	342
Jungfernwein s. Ampelopsis	354

Juniperus	398
Justicia	354

K.

Kaffeebaum s. Coffea	348
Kalnia	398
Kamille	80
Kammgras	75
Kapernstranch	206, 210
Kappus	95, 210
Kapuzinerbart	133
Kapuzinerkresse	135, 210
„ s. Tropaeolum	310
Kartoffel	82
Kartoffelzwiebel	139
Kastania s. Aesculus	384
„ s. Castanea	388
Katzeminze	193
Kaulfussia	292
Kellerhals s. Daphne	394
Kennedyia	354
Kentia (Palmae)	339
Kerbel (Körbel)	190
Kerbelrube	107, 210
Kermesstaude	208
Kerria	398
Keuschbaum s. Vitex	412
Kichererbse	165
Kiefer s. Pinus	404
Kirsche s. Cerasus	390
Kirschlorbeer s. Prunus	406
Kirschpflaume s. Prunus	406
Klee	78
Klette, japanische	207
Knaulgras	77
Knoblauch	139
Knollengewächse des freien Landes, Aus- saat der	219
Knollensellerie	113, 212
Kochia s. Chenopodium	278
Koeleria	278
Koellicheria (Gesneriaceae)	333
Koeleruteria	398
Kohlarten	90
Kohlmalve	207, 211
Kohlrabi	102, 210
Kohlrüben	103, 210
Kopfklee	78
Kopfkohl	95, 210
Kopfsalat	122, 212
Kornblume s. Centaurea	276
Kornelkirsche s. Cornus	392
Krauseminze	193
Krauskohl	100
Kraut	95, 210
Kresse, amerikanische	
„ Winter	135, 210
„ Brunnen	131, 210
„ Garten	133, 210
„ Kapuziner	135, 210
„ s. Tropaeolum	310
„ Stauden	135
Kreuzkraut s. Senecio	306, 362
Kruppbohnen	166
Kuhkohl	101
Küstenkraut	96
Küchenkräuter	185
Kümmel	80
Kürbisse	158, 211

L.

Lack	238
Laelia (Orchideae)	338
Lärche s. Pinus Larix	404
Lagenaria	292
Lagerstroemia	354

	Seite
Lagurus	292
Lamarkia s. Chrysurus	278
Lantana	354
Lapageria	354
Lappa edulis	207
Larix s. Pinus	404
Lasiagrostis	292
Lasiandra	354
Lasthenia	292
Lastrea (Farn)	331
Latania (Palmae)	339
Lathyrus	292
Lattichsalat	122
Laubbäume und Sträucher , Aussaat der	368
Lauch	140, 211
Laurus	354, 398
" s. Viburnum	366
Lavatera	292, 354
Lavendel	191, 211
Laya	292
Lederbaum s. Ptelea	496
Ledum	400
Lein, rothblüh. s. Linum	294
Leontis	354
Leptochloa	292
Leptosiphon	292
Leptospermum	354
Leptosyne	292
Lespedeza	400
Leucadendron	354
Leucanthemum	292
Leucopogon	354
Leucothoe s. Andromeda	356
Levkoyen	231
Leycesteria	400
Liatis	292
Libocedrus	400
Lilbonia	356
Licuala (Palmae)	339
Liebesapfel	197, 212
Liebeshain s. Nemophila	296
Liebstock	192, 211
Lietzia (Gesneriaceae)	333
Lignstrum	400
Linum	292
Linna-Bohne	174
Linumanthus	292
Linaria	292
Linde s. Tilia	410
Linse, spanische	165
Linum	294
Lippia s. Verbena citriflora	366
Liquidambar	400
Liriodendron	400
Lisianthus	356
Littonia	356
Livistona (Palmae)	339
Loasa s. Cajophora	294
Lobelia	249
Locheria (Gesneriaceae)	333
Löffelkraut	134, 211
Löwenmaul	224
Löwenzahn	134, 211
Lolium	73, 75, 77
Lomaria (Farn)	331
Lomatia	356
Lonas s. Athanasia	272
Lonicera	400
Lophospermum	356
Loorbeer s. Laurus	354, 398
Lotus	78, 294
Laculia	356
Luflia	294
Lunaria	294
Lupinus	294
Luzerne	78

	Seite
Lycaste (Orchideae)	338
Lychnis	294
Lyceum	400
Lyonia s. Andromeda	386
Lysimachia	294
Lythrum	294

M.

Machura	400
Madia	294
Magnolia	400
Magydaris	294
Mahonia s. Berberis	386
Maiblume s. Convallaria	280
Mais	81
" s. Zea	312
Majoran	192, 211
Malaga-Erbse	165
Malope	294
Malus s. Pirus	404
Malva	207, 211, 294, 356
Malve, gefüllte	222
" schwarze	81
Mandel s. Amygdalus	384
Mandevilla	356
Mangold	145, 211
Mariendistel s. Carduus	276
Markkohl	101
Marrubium	207, 209
Marshallia	294
Martinezia (Palmae)	339
Martynia	207, 211, 294
Masdevallia (Orchideae)	338
Matthiola	296
" s. Cheiranthus	231
Matricaria	80, 296
Manerpfeffer s. Sedum	208, 306
Maulbeerbaum s. Morus	402
Maurandia	296
Mauritia (Palmae)	339
Maxillaria (Orchideae)	338
Medeola	356
Medicago	78
Medinilla	356

Medizinische Handelspflanzen

Meerfenchel	79
Meerkohl	183, 211
Meihbirne s. Sorbus	408
Melaleuca	356
Melastoma	356
Melde	148, 211
Melia	400
Melianthus	356
Melica	296
Melisse	193, 211
Melonen	153, 211
Mentha	193, 211, 296
Mesembryanthemum	147, 296, 356
Mespilus	400, 402
Methonica s. Gloriosa	352
Metrosideros	356
Michauxia	296
Mikania	356
Miltonia (Orchideae)	338
Mimosa	356
Minulus	250
Minze	193, 211
Mirabelle s. Prunus	404
Mirabilis	296
Mispel s. Mespilus	400
Mitraria (Gesneriaceae)	333
Mohn s. Papaver	298, 300
Monardica	296
Monarda	296
Monatsrettig	143, 211
Montagnaea	356

	Seite
Montbretia	356
Moorrüben	104
Moorwurzeln	108, 211
Moosbeere s. Vaccinium	412
Moraea s. Pardonthus	300
Morina	296
Morus	402
Moschuspflanze s. Mimulus	251
Mottenkraut s. Plectranthus	360
Möhren	104, 209
Muehlenbeckia	356
Mukia	296
Musa	358
Muscari	296
Muschia	358
Myoporum	358
Myosotis	251
Myrica	402
Myrsiphyllum s. Medeola	356
Myrtus	358, 402

N.

Nachtkerze s. Oenothera	109, 298
Nachtviole s. Hesperis	290
Naegelia (Gesneriaceae)	333
Nandina	358
Narcissus	296
Nelken	243
Nelumbium (Wasserpflanze)	342
Nemesia	296
Nemophila	296
Nepenthes	358
Nepeta	193, 296
Nephrolepis (Farn)	331
Nerium	358
Nertera	358
Nicotiana	81, 296, 358
Nidularium (Bromeliaceae)	322
Nierembergia	296
Nigella	207, 298
Niphaea (Gesneriaceae)	333
Nolana	298
Nnesschen s. Rabinsechen	130
Nuphar (Wasserpflanze)	342
Nussbaum s. Inglaus	398
Nusskraut	206
Nycteria	298
Nymphaea (Wasserpflanze)	342
Nyssa	402

O.

Obeliscaria	298
Oberkohlraabi	102, 210
Obstbäume , Aussaat der	374
Ocimum	180, 298
Odontoglossum (Orchideae)	338
Oekonomische, medizinische u. technische Handelspflanzen	79
Oelweide s. Elaeagnus	394
Oenothera	109, 298
Okra	206
Olea	402
Oleander s. Nerium	358
Olivebaum s. Olea	402
Oncidium (Orchideae)	338
Ononis	298
Onopordon	298
Orchideen , Freiland	298
" tropische	338
Oreodaphne	402
Oreodoxa (Palmae)	339
Ornithogalum	298
Orobol	298
Osbeckia	358
Osmanthus s. Olea	402
Osmunda (Farn)	331

Ostrya	402
Oxalis	298
Oxylobium	358
Oxydendrum s. Andromeda	386
Oxyptalum s. Tweedia	366

P.

Paeonia	298, 402
Pak-Choi	205
Palafoxia	298
Palava	298
Paliurus	402
Palmbaumkohl	101
Palmen	339
Paupasgras s. Gynierum	288
Pancratium	358
Pandanus	358
Panicum	298, 358
Papaver	298, 300
Papiermaulbeerbaum	
s. Broussonetia	388
Pappel s. Populus	404
" schwarze (Malve)	81
Paprika	194
Papyrus (Wasserpflanze)	342
Parakresse	208
Pardanthus	300
Paspalum	300
Passiflora	300, 358
Passionsblume s. Passiflora	358
Pastinakwurzel	108, 211
Paulownia	402
Pelargonium	341
Pennisetum	300
Pensée s. Viola	264
Pentstemon	300
Peperomia	358
Perennirende Pflanzen,	
Aussaat der	218
Perilla	300
Periploca	402
Perlwiebel	139
Perrückenstrauch s. Rhus	406
Persica s. Amygdalus	386
Petersilie	193, 211
Petersilienwurzel	109, 211
Pet-Tsai	205
Petunia	253
Pfaffenhütchen s. Evonymus	394
Pfeffer, spanischer	194, 211
Pfefferkraut	187, 209
Pfefferkümmer	206, 211
Pfefferminze	193
Pfeifenstrauch s. Aristolochia	386
" s. Philadelphus	402
Pferdebohne	175
Pfingstrose s. Paeonia	298, 402
Pfirsche s. Amygdalus	386
Pflaume s. Prunus	404
Pflaumschlehe s. Prunus	406
Pflücksalat	128
Phacelia	300
Phajus (Orchideae)	338
Phalaceria	300
Phalacopsis (Orchideae)	338
Phalangium s. Arctium	344
Phalaris	300
Phaseolus	166, 174, 300
" Caracalla	358
Phegopteris (Farn)	331
Philadelphus	402
Phillyrea	402
Philodendron (Aroideae)	319
Phleum	77
Phlomis s. Eremostachys	284
Phlox Drummondii	255
" ausdauernde	300

Phoenix (Palmae)	339
Phornium	358
Photinia	404
Phygelius	358
Phyllanthus	358
Physalis	207
Phyteuma	300
Phytolaca	208, 300
Picea s. Pinus	401
Pieris s. Andromeda	386
Pilea	358
Pinelea	358
Piment-Pfeffer	194
Pimpernuss s. Staphylea	410
Pimpinelle	195, 211
Pinecneetitia (Beaucarnea)	346
Pinus	404
Piper	358
Pirus	404
" s. Cydonia	382
Pissenlit	134
Pistacia	404
Pistia (Wasserpflanze)	342
Pitcairnia (Bromeliaceae)	322
Pittosporum	358
Plantago	136
Platanus	404
Platterbse	165
Platycerium (Farn)	331
Platyodon s. Wahlenbergia	312
Platygonia	300
Platystemon	302
Plectopoma (Gesneriaceae)	333
Plectranthus	358
Plumagekohl	101
Plumbago	358
Poa	73-77, 302
Podocarpus	404
Podolepis	302
Poinciana	358
Poinsettia	358
Polei	136
Polemonium	302
Polycarpa	404
Polycolymna	302
Polygala	358
Polygonum	302
Polypodium (Farn)	331
Polystichum (Farn)	331
Pontederia (Wasserpflanze)	342
Populus	404
Porree	140, 211
Portulaca grandiflora	256
Portulak, Suppen-	195, 211
Potamogeton (Wasserpflanze)	342
Potentilla	302, 404
Pourretia (Bromeliaceae)	322
Preisselbeere s. Vaccinium	412
Primula	257
Pritchardia (Palmae)	339
Protea	358
Prunella	302
Prunus	401, 406
Psidium	358
Ptelea	406
Pteris (Farn)	331
Pterocarya	406
Ptychosperma (Palmae)	339
Puffbohne	175, 211
Pulmonaria	302
Pultanea	358
Punica	358
Puya (Bromeliaceae)	322
Pyrethrum	302

Q.

Quecke	77
Quercus	406
Quitte s. Cydonia	392
Quittemispel s. Cotoncaster	392

R.

Rabinschen	130, 211
Radies	143, 211
Raigras	75-77
Rainfarn	208
Rainweide s. Ligustrum	400
Ramondia	302
Rankenspinat	205
Ranunculus	302
Raphanus caudatus	144
Raphiolepis	358
Rapunzel (Rabinschen)	130
Rapunzelwurzel	110, 211
Rapontikawurzel	109, 211
Rasenkanten-Mischung	76
Rasenpflanzen	67
Rauke	136
Raute	199
Ravenala	358
Reidia	358
Reisspinat	149
Reseda	261
Retinospora	406
Rettig	142, 211
Rhabarber	115, 211
" s. Rheum	302
Rhaunus	406
Rhapis (Palmae)	339
Rheum	115, 302
Rhodantha	302
Rhodochiton	358
Rhododendron	337
Rhodora	406
Rhodotypos	406
Rhus	406
Rhynchoscarpa	302
Rhynchospermum	358
Rhytidophyllum (Gesneriaceae)	333
Ribes	408
Richardia	362
Ricinus	302
Riesenkohl	101
Ringelblume s. Calendula	206, 276
Rippenkohl	97
Rippenmangold	146
Rispengras	75-77
Rittersporn s. Delphinium	
Samen	241, 280
Rivina	362
Robinia	408
Rocambol	139
Rocha	362
Rogiera	362
Romneya	302
Rondeletia	362
Rosanovia (Gesneriaceae)	333
Rosen , deren Anzucht aus	
Samen	378
Rosenkohl	99, 212
Rosmarin	195, 212
Roskastanie s. Aesculus	384
Rothé Rüben	119
Rothkraut	95
Römischer Salat	126
Römischkohl	146, 211
Rubus	408
Ruchgras	77
Rudbeckia	302
Ruellia	362
Rumex	119, 304
Runkeln	121

	Seite
Ruscus	408
Russelia	362
Rutabaga	103
Rüben	117—119, 212
Rübstiel	119
Rüster s. Ulmus	410

S.

Sabal (Palmae)	339
Sabbatia	304
Saccharum	304
Saccolabium (Orchideae)	338
Säckelblume s. Ceanothus	330
Sagittaria (Wasserpflanze)	342
Sagus (Palmae)	339
Salat	122, 136, 212
Salatrüben	119, 212
Salbei	196, 212
" s. Salvia	304, 362
Salisburya	408
Salix	408
Salpiglossis	304
Salvia	196, 304, 362
Sambucus	408
Samtveilchen s. Viola	264
Sandorn s. Hippophaë	398
Sanguisorba	304
Santolina	350, 362
Sauvitalia	304
Saponaria	396
Sarothamnus s. Genista	304
Sarracenia (Wasserpflanze)	342
Saturei	187
Saubohne	175
Sauerampfer	148, 212
Saucdorn s. Berberis	386
Sauerklee s. Oxalis	298
Sauerkraut	95
Saurornatum (Aroideae)	319
Savoyerkohl	98, 212
Saxifraga	304, 362
Scabiosa	304
Schafgarbe	78
Schafnädelchen	130, 211
Schalotten	139, 212
Scheeria (Gesneriaceae)	333
Schiefblatt s. Begonia	320
Schinus	408
Schizanthus	304
Schizolobium	362
Schizopetalum	304
Schizostylis	362
Schlangenknolauch	139
Schlangenrettig	144, 211
Schlehe s. Prunus	406
Schlinge s. Periploca	402
Schlingpflanzen	220—221
Schneeball s. Viburnum	412
Schneeflockenbaum s. Chio-	
nanthus	390
Schnittkohl	100
Schnittlauch	139, 212
Schnittsalat	128, 212
Schnittsellerie	114
Schöngesicht s. Calliopsis	276
Schotenrettig	144
Schwarzkümmel	207, 212
Schwarzwurz	111, 212
Schwertlilie s. Iris	292
Schwingel	75—77
Sciadocalyx (Gesneriaceae)	333
Sciadopitys	408
Scilla	304
Scirpus (Wasserpflanze)	342
Scolopendrium (Farn)	331
Scolymus	111
Scorzonnerwurz	111, 212

Scotanthus	304
Scrophularia	304
Scutellaria	304, 362
Scyphanthus	304
Seaforthia (Palmae)	339
Seekohl	183, 211
Sedum	208, 306
Seidelbast s. Daphne	394
Selinella (Farn)	331
Selinum	362
Sellerie	113, 212
Sempervivum	306, 362
Senecio	306, 362
Senf	196, 212
Senfspinat	208
Sequoia s. Cupressus	392
" s. Taxodium	410
" s. Wellingtonia	412
Setaria	306
Shepherdia s. Hippophaë	398
Shortia s. Hymenoxis	290
Sicyos	306
Sida	362
Sidalcea	306
Silberbeete	146
Silene	306
Silphium	306
Sinnpflanze s. Mimosa	356
Siphocampylus	362
Sisyrinchium	306
Skimmia	362
Smilax	408
Sorjabohne	174, 212
Solanum	188, 197, 362
Soldanella	306
Solidago	306
Sollya	364
Sommergewächse , Aus-	
saat der	213
Sonchus	364
Sonerila	364
Sonnenblume s. Helianthus	288
Sophora	408
" s. Edwardsia	350
Sorbus	408
Sorghum	306
Sparaxis	364
Spargel	178, 212
Spargelerbse	165, 210
Spargelkohl	94, 209
Spargelsalat	127
Sparrmannia	364
Spartium	408
Spartocytisus	364
Spathiphyllum (Aroideae)	319
Spathodea	364
Spergula	306
Sphaeralcea s. Malva	356
Sphenogyne	306
Splianthes	208, 212
Spinat	145, 205, 212
Spinatpflanzen	144
Spindelbaum s. Evonymus	394
Spiraea	306, 410
Spitzwegerich	78
Sparguarea	306
Sprekia s. Amaryllis	318
Sprenkohl	99, 212
Stachelbeere	376
Stachys	308
Stachytarpheta	364
Stangenbohnen	167
Stanhopea (Orchideae)	338
Stapelia	364
Staphylea	410
Statice	308, 364
Stauden , Aussaat der	218

Staudenkresse	Seite 135
Stechginster s. Ulex	410
Stechpalme s. Ilex	398
Steckrüben	103, 210
Steckzwiebeln	138
Steinlinde s. Phillyrea	402
Stellaria	308
Stenactis	308
Stephanophysum	364
Stephanotis	364
Sterculia	410
Stevia	308
Stiefmütterchen	264
Stielmaus	119
Stipa	308
Stoppelrüben	119
Stratiotes (Wasserpflanze)	342
Streptocarpus	364
Strelitzia	364
Strobis s. Pinus	404
Strohblumen s. Elichrysium	284
Schrunkkraut	97
Struthiopteris (Farn)	331
Studentenblume s. Tagetes	308
Stundenblume s. Hibiscus	290, 352
Stylidium	354
Styrax	410
Sumach s. Rhus	406
Sutherlandia	364
Swainsonia	364
Sweet Corn	81
Symphitum	308
Symphoricarpus	410
Syringa	410

T.

Tabak	81
" s. Nicotiana	296, 358
Tabernaemontana	364
Tacsonia	364
Tagetes	308
Tanarix	410
Tamus s. Testudinaria	364
Tanacetum	208
Tanne s. Pinus	404
Tapeinotes (Gesneriaceae)	333
Taxodium	410
Taxus	410
Technische Handels-	
pflanzen	79
Tecoma s. Bignonia	388
Telekia	308
Teltower Rübe	117
Testudinaria	364
Tetragonia	167
Tetraena	364
Teucrium	308
Thalia (Wasserpflanze)	342
Talictum	308
Thea	364
Thermopsis	308
Thladiantha	308
Thrinax (Palmae)	339
Thuja	410
Thujopsis	410
Thunbergia	308, 366
Thymian	196, 212
Thyracanthus	366
Tigridia	308
Tilia	410
Tillandsia (Bromeliaceae)	322
Timothygras	77
Todea (Farn)	331
Tollkirsche	82
Tomaten	197, 212
Topfpflanzen , Aussaat der	314

	Seite
Torenia	366
Torreyia	410
Tournefortia	308
Trachelium	310
Trachymene	310
Tradescantia	310, 366
Trapa (Wasserpflanze)	342
Traubenbirne s. Amelanchier	384
Traubenkirsche s. Prunus	406
Treibsalate	126
Tricholaena	310
Trichopilia (Orchideae)	338
Trichosanthes	310
Tricyrtis	310
Trifolium	76, 310
Tripmadam	208
Tripsacum	310
Tristania	366
Triticum repens	77
Tritoma	366
Trollius	310
Trompetenbaum s. Catalpa	388
Tronchuda-Kohl	97
Tropaeolum	135, 310, 366
Tulipa	310
Tulpenbaum s. Liriodendron	400
Tunica	310
Tupa	366
Turnera	366
Tweedia	366
Tydaea (Gesneriaceae)	333

U.

Ulex	410
Ulmus	410
Umbilicus	310
Uniform s. Amorpha	384
Ungnadia	412
Uniola	310
Unterkohlrabi	103, 210
Urania s. Ravenala	366

V.

Vaccinium	412
Valeriana	79, 310
Vallisneria (Wasserpflanze)	342
Vanda (Orchideae)	338
Vanilla (Orchideae)	338
Veilchen s. Viola odorata	312
Veltheimia	366
Venidium	310
Veratrum	310
Verbascum	312

	Seite
Verbena	262, 366
Verbesina	366
Verghissmeinnicht	251
Veronica	312, 366
Verschaffeltia (Palmae)	339
Viburnum	366, 412
Vicia	312
Victoria (Wasserpflanze)	342
Vietsbohne	166
Villarsia (Wasserpflanze)	342
Viminaria	366
Viua	366
Viola	264, 312
Virgilia	412
Viscaria	312
Vitex	412
Vitis	412
Vogelbeere s. Sorbus	408
Vriesia (Bromeliaceae)	322

W.

Wacholder s. Juniperus	398
Wahlenbergia	312
Waitzia	312
Waldmeister	198, 212
Waldrebe s. Clematis	390
Walnuss s. Juglans regia	398
Washingtonia (Palmae)	339

Wasserpflanzen, Aussaat	342
der	342
Wassermelonen	158, 211
Wasserrüben	119
Wegdorn s. Rhamnus	406
Wegbreit	78
Weichsel s. Cerasus	330
" s. Prunus	406
Weide s. Salix	408
Weidegräser	76
Weigelia	412
Weihnachtsrose s. Helleborus	290
Weinstock s. Vitis	412
Weinraute	199, 212
Wein, wilder, s. Ampelopsis	384
Weissdorn	380
Weissbuche s. Carpinus	388
Weisse Rüben	117
Weissklee	76
Weisskraut	95
Weisswurz	107
Wellingtonia	412
Welsche Zwiebel	139
Wermuth	199, 212
Whitavia	312

	Seite
Wiesen	67
Wiesenfuchsschwanz	77
Wiesengräser	76
Wicken, wohlriech., s. La- thyrus	292
Wigandia	366
Winde s. Convolvulus	280, 348
" s. Ipomoea	290, 354
Winterheckenzwiebel	139
Winterkohl	100
Winterkresse	135, 210
Wintersalat	122
Winterspinat	149
Winterzwiebel	139
Wirsing	98, 212
Wistaria s. Glycine	396
Woodwardia (Farn)	331
Wrucken	103, 210
Wulfenia	312
Wunderbaum s. Ricinus	392
Wunderblume s. Mirabilis	296
Wurmkraut	208
Wurzeln und Rüben	104

X.

Xeranthemum	312
-----------------------	-----

Y.

Yucca	366
-----------------	-----

Z.

Zanthoxylum	412
Zaubernuss s. Hamamelis	396
Zauschneria	312
Zea	81, 312
Zenobia s. Andromeda	386
Ziergräser, Aussaat der	220
Zierkohle	101
Zinnia	266
Zipolle	136
Zittergras s. Briza	274
Zizyphus	412
Zuckerrüben	121
Zuckerwurz	112, 212
Zürgelbaum s. Celtis	390
Zweijährige Pflanzen, Aussaat der	216—218
Zwetsche s. Prunus	404
Zwiebel	136, 139, 212
Zwiebel- und Knollen- Gewächse des freien Landes, Aussaat	219—220
Zygopetalum (Orchideae)	338

Druckfehler und Verbesserungen.

Seite	Zeile	
22	6	von unten, zu lesen: zersetzbaren statt versetzbaren.
29	8	" oben, " " beigesellt statt beigestellt.
46	16	" " " " Spargelsaat statt Spargelsalat.
47	16	" unten, " " §. 35 statt 36.
60	19	" " " " Nacktschnecken statt Nachtschnecken.
67	5	" oben, " " §. 8 statt 9.
71	19	" unten, " " sind statt ist.
132	2	" oben, " " nochmals statt mehrmals.
138	14	" unten, " " Saatzwiebeln statt Salat-Zwiebeln.
188		Ueberschrift, zu lesen: sativum statt salesium.
212		Tabelle, Colonne 2, Z. 13, 14, 36 u. 37, zu lesen: Liliaceae statt Asphodeleae.
216	14	von unten, zu lesen: Dachspäne statt Dachsparren.
220		Ueberschrift, zu lesen: Ziergräser statt Zierpflanzen.
249	7	von unten, zu lesen: 10—15 statt 15.
250	12	" " " " 25—40 " 50.
269		Tabelle, Colonne 25, bei Aconitum, zu lesen: durch statt aus.
271		" " 25, " Andropogon, zu lesen: temperirt statt frostfrei.
313		" " 25, " Wulfenia, hinzufügen liebt Haideerde.
347		" " 19, " Chironia, " liebt Haideerde.
364		" " 19, " Swainsonia, " im Winter hell halten und mässig giessen.
392	4	von oben, Colonne 1, zu lesen: Coronilla Emerus statt C. glauca und Col. 22 hinzufügen: C. glauca ist Gewächshauspflanze.

Old
Books

Date

AGRICULTURE FORESTRY LIBRARY

THE UNIVERSITY OF
BRITISH COLUMBIA

FORESTRY
AGRICULTURE
LIBRARY