sectoris radii ad alae apicem pertingente; procubito distincto usque ad alae apicem. Venulae costales paucae, radiales inter radium et sectorem numero variabiles, 3—6, ante furcam 0—2.

Long. corp. 5 mm, long. al. ant. 5 mm, long. al. post. 4,5 mm.

Patria: Brazil: Ceará, 1915, Dias da Rocha (meine Coll.).

Neue Beiträge zur Kenntnis der Cleriden (Col.) VI.

Von Sigm. Schenkling (Berlin-Dahlem).

Thanasimus mutilloides Hintz.

Bei dieser Art tragen die Flügeldecken jederseits neben dem Schildchen einen mehr oder weniger ausgebildeten Längshöcker, der bei intakten Exemplaren dicht mit Haaren besetzt ist. Hintz erwähnt diesen Höcker in seiner Beschreibung nicht, doch findet sich derselbe bei einem in der Museumssammlung befindlichen Cotypus, wenn auch in schwächerem Maße, ausgebildet. Sehr kräftig ist der Höcker bei einigen Exemplaren von Northwest-Rhodesia unserer Sammlung (von Staudinger erhalten).

Ommadius amberbakii Kuw.

Bei einem Stück dieser Art (die wohl nur eine Form des *O. semicarinatus* Chevr. darstellt) von den Salomons-Inseln sind die Schenkel sowie die Vorder- und Mittelschienen schön grün.

Pelonium (?) *fossipenne* nov. spec.

Elongatum, opacum, albo vestitum, nigrum, capite postice, macula laterali elytrorum, pectore, femorum basi, tibiarum maculis duabus flavo-rufis, elytris pone medium fascia irregulari alba, capite pronotoque denissime sat fortiter punctatis, elytris ad fasciam usque fere seriatim punctatis, deinde irregulariter densissime minute punctatis et fossulatis. — Long. 5,5—7,5 mm. — Argentinien: Mendoza.

Der ganze Käfer zottig weißgelb behaart und mit einzelnen langen weißen Forsten besetzt. Die Fühlerkeule bei ♂ mit sehr lang gestreckten Gliedern, bei ♀ von der gewöhnlichen Form. Halsschild vor den Hinterwinkeln nur schwach erweitert, in der Längsmitte etwas eingedrückt, zuweilen der Vorderrand und ein kleiner Fleck an den Seiten rot. Flügeldecken nach hinten verbreitert, bis hinter die Mitte mit dicht gestellten Punkten, die in fast regelmäßigen Längsreihen stehen, dann bis zur Spitze unregelmäßig dicht fein punktiert

1917. "Neue Beitrage zur Kenntnis der Cleriden. vi." *Entomologische Mitteilungen* 6, 282–282. <https://doi.org/10.5962/bhl.part.10106>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/38722>

DOI: <https://doi.org/10.5962/bhl.part.10106>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/10106>

Holding Institution

Smithsonian Libraries

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.