Communications.

Notes sur la synonymie de plusieurs espèces
de la famille des Thomisides [ARACHN.]

par E. SIMON.

I. — Quelques auteurs, notamment P. PAVESI, ont rapporté à notre *Thomisus* le plus commun l'*Aranea alba* Gmelin (Syst. Nat., ed. 13, I, pars 5, p. 2961), mais certainement à tort, car rien dans la description ne convient à un *Thomisus* : « sp. 98. *Ar. alba, basi abdominis depressa, bicorni, apice globoso* (Lepechin, It., I, p. 245, tab. 20, fig. 1). — *Habitat in Sibiria sub arborum cortice, abdomine punctis impressis* 5. » — L'espèce doit garder le nom de *Thomisus onustus* Walckenaer.

II. — *Misumena personata* E. Simon, in *Bull. Soc. ent. Fr.* [1916], p. 209 (juillet 1916), était décrit antérieurement du Portugal par KULCZYNSKI (Fragm., IX, 1911, p. 63), sous le nom de *M. vatia occidentalis*, mais cet auteur le considérait, je crois à tort, comme une forme ou sous-espèce de *M. vatia* (Cl.).

III. — Je suis arrivé à la conviction que LATREILLE et WALCKENAER n'ont connu qu'une seule espèce du genre *Heriaeus*, celle qui est de beaucoup la plus abondante dans la région méditerranéenne et qui correspond à *H. Savignyi* E. Simon; LATREILLE dit avoir reçu son *Thomisus hirtus* (par PÉRON et LESUEUR) de Nice où l'espèce en question se trouve exclusivement; WALCKENAER, dans la « Faune française », parle d'après LATREILLE, mais en altérant l'orthographe du nom spécifique en *hirsutus*; dans les « Aptères », *Thomisus villosus* W. n'est qu'un nouveau changement de nom pour la même espèce. Les auteurs modernes, THORELL, nous même, KULCZYNSKI, ont à tort donné des sens différents à ces trois noms synonymes.

Her. hirsutus Thorell, E. Simon, devra prendre le nom nouveau d'***Heriaeus oblongus***, nom. nov.

Her. (Th.) hirtus C. Koch, décrit de Grèce (Arachn., IV, p. 42, fig. 275-276) est une espèce très différente, qui prendra le nom nouveau d'***Heriaeus orientalis***, nom. nov.

Thomisus villosus Lucas (Alg., tab. 10, fig. 8) se rapporte plutôt à *Th. (Heriaeus) Buffoni* Audouin.

IV. — *Aranea fucata* Walckenaer (Fn. paris., II, p. 232) est une espèce toute différente de *Thomisus robustus* Hahn, comme l'indique cette phrase : « forme et grosseur de la précédente [*Aranea cristata*] »

et plus tard (Apt., I, p. 505) : « il y a une raie plus claire sur le devant du corselet » ; c'est bien à tort que WALCKENAER a cité en synonymie le *Thomisus robustus* Hahn et même l'*Aranea fusco-marginata* De Geer, qui est un *Philodromus*.

V. — *Xysticus pini* (Hahn) doit, à mon avis, reprendre le nom de *X. audax* (Schrank) que lui avait appliqué C. Koch ; la diagnose de SCHRANK est à la vérité insignifiante et peut aussi bien convenir à tous nos *Xysticus*, mais C. KOCH étudiant surtout, comme SCHRANK, la faune de Bavière, était mieux placé que nous pour établir cette synonymie. C'est à tort que BÖSENBERG (Sp. Deutschl., p. 350, tab. 23, fig. 517) a rapporté *X. audax* C. Koch au *X. luctuosus* Blackwall.

VI. — Nous avons autrefois confondu deux espèces sous le nom de *Xysticus bufo* : la femelle est notre *Oxyptila albigera* ; le mâle (d'après un spécimen d'Orient) est probablement celui du *X. graecus* C. Koch (espèce étrangère à la France) ; il est à noter que C. KOCH n'a d'abord connu que la femelle de son *X. graecus* et y a plus tard rapporté un mâle tout à fait hétérogène décrit depuis sous le nom de *X. thessalonicus* E. Simon (Ann. Soc. ent. Fr. [1916], p. 275). — Quant au *Thomisus bufo* L. Dufour (Ann. Sc. phys., V, p. 206, tab. 76, fig. 4), décrit de Catalogne et d'Aragon, il n'est pas impossible qu'il soit le même que notre *Oxyptila albigera* ; il est cependant à noter que L. DUFOUR décrit les chélicères comme d'un roux orangé, ce qui ne convient pas, et qu'il ne parle pas des lignes blanches transverses de l'abdomen, toujours si visibles.

VII. — *Philodromus laricum* E. Simon, 1875, est synonyme de *Philodr. corticinus* C. Koch 1837 et doit prendre ce nom.

VIII. — *Philodromus alpestris* L. Koch, 1876, est synonyme de *Philodr. vagulus* E. Simon 1875 et doit prendre ce nom.

IX. — *Philodromus auronitens* Ausserer, 1867, est synonyme de *Philodr. collinus* C. Koch, 1830, et doit prendre ce nom.

X. — *Philodromus bistigma* E. Simon 1871 et *Philodr. debilis* E. Simon sont synonymes de *Philodr. pulchellus* H. Lucas 1846.

Simon, Eugène. 1918. "Notes sur la synonymie de plusieurs espèces de la famille des thomisides." *Bulletin de la Société entomologique de France* 1918, 51–52. <https://doi.org/10.5962/bhl.part.11420>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/35447>

DOI: <https://doi.org/10.5962/bhl.part.11420>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/11420>

Holding Institution

Smithsonian Libraries

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.