MITGETEILT AN DER GENERALVERSAMMLUNG DER SCHWEIZERISCHEN
ZOOLOGISCHEN GESELLSCHAFT IN GENÈVE, DEN 21. UND 22. MÄRZ 1936.

Stehen die Erscheinungen der Otocephalie und der Zyklopie bei Triton mit Axialgradienten oder mit Störungen bestimmter Organisatorregionen im Zusammenhang?

von

F. E. LEHMANN

(Zoologisches Institut der Universität Bern).

Mit 1 Textfigur.

(Ausgeführt mit Unterstützung der Stiftung Dr. Joachim de Giacomi
der S.N.G.)

1. *Erzeugung lokalisierter Entwicklungsstörungen im Kopfbereich durch zeitlich begrenzte Behandlung von Gastrulastadien mit LiCl.*

Vor drei Jahren habe ich darüber berichtet (LEHMANN 1933, *Revue Suisse de Zool.* 40, S. 253), dass Zyklopie auch bei *Triton* durch Chlorbutol oder Phenol erzeugt werden kann. Neue Versuche mit LiCl haben insofern weiter geführt, als es mit dieser Substanz gelang, nicht nur im vorderen Kopfbereich Zyklopie, sondern ausserdem auch im hinteren Kopfbereich tiefgreifende Entwicklungsstörungen vom Typus der Otocephalie zu erzielen. Die beiden Typen, die bisher nur summarisch charakterisiert worden waren (LEHMANN, *Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. Zürich* 1934), seien im Folgenden etwas ausführlicher dargestellt. Diese Befunde sollen ferner auf ihre Vereinbarkeit mit den Postulaten der Gradiententheorie geprüft werden.

A. *Otocephaler* Typus mit normalem Vorderende und paarigen Augen (Fig. 1). Die äussere Form des Kopfes ist normal, ebenso

die Ausdehnung der Kiemen. Im Inneren des Kopfes sind folgende Organe normal entwickelt: *a*) Das gesamte knorpelige Visceralcranium ist vollständig ausgebildet und zeigt im ganzen eine normale Topographie (Fig. 1 *a* u. 1 *b*). *b*) Die Trabeculae cranii sind vom Opticusaustritt nach vorne normal gelagert und normal

FIG. 1.

Querschnitte durch die hintere Kopfregion von Tritonlarven. *a* und *c* in der Region des m. temporalis unmittelbar hinter den Augen (A), *b* und *d* in der Region des Labyrinths (L). *a* und *b* otocephaler Typus, *c* und *d* normaler Vergleichskeim. Mit Tusche überzeichnete Mikrophotos. Knorpel dunkel gefeldert, Muskelquerschnitte hell gefeldert, Muskellängsschnitte gestrichelt. M = Medulla oblongata. Vergr. 32 $\times$. Für weitere Erklärungen siehe Text.

gebaut. *c*) Ebenfalls von normalem Bau sind die Nasengruben, die Augen, die Bulbi olfactorii und das Vorderhirn. Sehr stark reduziert sind folgende Organe: *a*) Die Trabeculae cranii caudal vom Sehnervenaustritt, die hier nur einen unpaaren Stab bilden (Fig. 1 *a*, tr), und die ganze Basalplatte, mitsamt dem ganzen cranialen Teil der Chorda, welche die caudalen Hirnbereiche unterlagert (Fig. 1 *b*). Es ist somit das ganze Knorpelskelett betroffen,

soweit es aus der prächordalen Platte entsteht (RAVEN 1931, Roux'Archiv 125, S. 258). *b*) Stark reduziert sind die Muskeln im Kopfbereich, besonders der *m. temporalis* (Fig. 1 *a*, *t*) und *m. masseter* (Fig. 1 *a*, *m*). *c*) Sämtliche Gehirnteile sind reduziert, soweit sie in der Region liegen, wo das Knorpelskelett defekt ist und die Chorda fehlt, also die Regionen vom Zwischenhirn (Fig. 1 *a*) zur Medulla oblongata (Fig. 1 *b*, *M*). Der Massendefekt ist sehr stark und die Architektur der Nervensubstanz ist abnorm (« Basalmassentypus », LEHMANN 1935, Rev. Suisse de Zool. 42, S. 408). *d*) Die Hörblasen (Fig. 1 *b*, *L*) sind in der Mediane so stark genähert, dass sie sich fast berühren und so das Bild der Otocephalie bieten.

B. *Zyklopischer*, bzw. *synophthalter* Typus mit normaler Hörblasenregion. Die äussere Form des Kopfes ist stark verjüngt im vorderen Bereich. Auf der ventralen Seite findet sich ein unpaares Auge. Die Mundöffnung fehlt. Normalen Bau zeigen folgende Kopforgane: *a*) Das Chordavorderende und die parachordalen Knorpel. *b*) Das Gehirn von der Medulla oblongata bis zur Mittelhirnregion. *c*) Die Hörblasen. Abnorm ausgebildet sind folgende Organe: *a*) Die Knorpel des Mandibular- und Hyoidbogens sind sehr stark gestaucht und verkürzt. *b*) Die Trabeculae sind in ihrem vorderen Bereich durch einen unpaaren Knorpelstab repräsentiert. *c*) Der *m. temporalis* ist zum Teil median verschmolzen. *d*) Die Mundhöhle beginnt erst auf der Höhe des Mittelhirns. *e*) Die Riechgrube und der *bulbus olfactorius* sind unpaar und sehr klein. Das Auge ist unpaar. *f*) Das Vorderhirn ist stark reduziert. *g*) Der Hypothalamus ist schwach reduziert (vergl. dazu die Schnittbilder von zyklopischen Keimen in ADELMAN 1934, J. exp. Zool. 67, S. 217).

Entweder können die beiden beschriebenen Typen rein auftreten, oder kombiniert, d. h. bei den kombinierten Typen sind sämtliche Kopfbereiche abnorm. Die tabellarische Uebersicht der verschiedenen Versuchsserien zeigt, dass nach Behandlung der jüngeren Gastrulationsstadien rein *otocephale* oder kombinierte Typen, aber keine rein zyklopischen Typen entstehen. Nach Behandlung älterer Stadien treten rein *zyklopische* oder kombinierte, aber keine rein *otocephalen* Typen auf. Demnach liegt die kritische Phase für den hinteren Kopfbereich am Beginn der Gastrulation und ist bereits abgeschlossen, wenn das Material des vorderen Kopfbereiches maximal empfindlich ist.

TABELLE 1.

Das Auftreten des otocephalen und des zyklischen Typus in den verschiedenen Versuchsserien.

	Rein otocephale Typen	Kombinierte Typen	Rein zyklische Typen
a) 6-stündige Li-Behandlung von Gastrulae mit:			
1. beginnendem Urmund . .	!! 50%	50%	0%
2. sichelförmigem Urmund .	38,5%	!! 54%	7,5%
3. Dotterpfropf	0%	17%	!! 83%
b) 24-stündige Li-Behandlung:			
1. Blastula	!! 50%	50%	0%
2. Gastrula mit beginnendem Urmund	22,5%	!! 77,5%	0%
3. sichelförmiger Urmund . .	0%	0%	!! 100%

2. Zurückführung der Entwicklungsstörungen des Kopfes auf primäre Störungen des Urdarmdaches in der Kopfregion.

Die Gesamtheit der Entwicklungsstörungen des Kopfes zeigt dieselben Bilder, wie sie nach operativen Eingriffen im Bereich des vorderen Urdarmdaches erhalten werden können (LEHMANN 1926, Roux'Archiv 108, O. MANGOLD 1931, Erg. Biol. 7, A. ALDERMAN 1935, J. exp. Zool. 70). Die Ausdehnung der Defekte im Nervensystem geht genau parallel mit der Ausdehnung der Störungen im Bereich der Derivate des Urdarmdaches. Die kritische Phase der Li-Empfindlichkeit liegt am Anfang der Gastrulation, also in einer Periode, wo das Ektoderm noch kaum eigene Differenzierungstendenzen besitzt, der Organisator aber bereits deutliche Anzeichen der Aufteilung in Chorda- und Somitenbereich erkennen lässt (B. MAYER 1935, Roux'Archiv 133). Diese exakte zeitliche Lokalisierung der empfindlichen Phase macht es noch wahrscheinlicher, dass die Li-Behandlung die Leistung des Kopforganisators herabsetzt und dass diese Veränderung des Organisators das Abnormwerden des Gehirns veranlasst (LEHMANN 1936. Naturwiss., im Druck). Untersuchungen von RÖHLICH (Roux'Archiv 129, 1933) zeigen, dass auch in der Normalentwicklung das Urdarmdach, das den Hirnbereich unterlagert, in zwei deutlich unterscheidbare Regionen unterteilt werden kann: eine hintere

Region, wo das mediane Material schon auf dem Neurulastadium deutlich vom unterlagernden Entoderm geschieden ist, und eine vordere Region, wo Kopfdarmdach und Mesoderm während dieser Phase in der Mediane noch eine einheitliche Platte bilden. Die Grenze zwischen beiden Bereichen liegt in der Zwischenhirnregion. Auch bei der Bildung des Kopfskeletts zeigt sich ein Unterschied zwischen den beiden Regionen (RAVEN 1931, *l.c.*). In der hinteren Region entstehen Basalplatte und Trabekel aus der prächordalen Platte, in der vorderen Region entsteht der Knorpel der Trabekel aus dem Mesektoderm. Dabei müssen wir auf Grund der Beobachtungen von HOLTFRETER (Roux'Archiv 129, 1933) vermuten, dass die Lage der Trabekel, wie überhaupt die Lage der aus dem Mesektoderm entstehenden Visceralknorpel durch die Architektur der entodermalen Vorderdarmwand, die nachweislich autonome Gestaltungstendenzen hat, bestimmt wird. Eine Störung in der Architektur der entodermalen Schlundbogen kann nachgewiesenermassen Grösse und Form der Knorpel mesektodermaler Herkunft beeinflussen.

Die Scheidung des Urdarmdaches im Kopfbereich lässt sich somit auf Grund morphologischer und physiologischer Kriterien durchführen; es liegen hier offenbar zwei verschiedene organbildende Territorien vor:

A. Ein vorderer Bereich der 1. enger mit dem Entoderm des Vorderdarmes zusammenhängt, 2. das Vorder- und Zwischenhirn unterlagert, und 3. dessen sensible Phase gegen die Mitte der Gastrulation liegt, zugleich mit der kritischen Phase des entodermalen Schlundbogenmaterials.

B. Ein hinterer Bereich, der 1. stärker mit der Chordamesodermpalte zusammenhängt, 2. das Gehirn vom Mittelhirn bis zur Medulla oblongata unterlagert, und 3. dessen kritische Phase zu Beginn der Gastrulation liegt, gleichzeitig mit der kritischen Phase des Chordamesoderms in der vorderen Rumpfreion.

3. Die Li-Empfindlichkeit des Organisators und die Axialgradienten.

Ausgehend von Versuchen von BELLAMY (Biol. Bull. 41, 1921. Am. J. Anat. 30, 1922), haben CHILD, COTRONEI, HUXLEY und DE BEER (The elements of exp. Embryol. Cambridge 1934) die

Meinung vertreten, dass es möglich sei, sämtliche Entwicklungsstörungen, die bei Amphibienkeimen mit chemischen Mitteln erzeugt wurden, als Ausdruck eines axialen Empfindlichkeitsgefälles anzusehen. Würde man im Sinne dieser Theorie annehmen, dass der Organisator im Verlaufe der Gastrulation zur sekundär-dominanten Region würde, dann wäre zu erwarten, dass zuerst die vorderste Region des Organisators die höchste Empfindlichkeit gegenüber LiCl zeigt (Vergl. HUXLEY und DE BEER *l.c.*, S. 348). Das ist nicht der Fall. Zuerst zeigt der Organisator der hinteren Kopfregion gleichzeitig mit dem vorderen Rumpfororganisator eine empfindliche Periode, und dann folgt erst der vorderste Organisatorbereich. Dieser Befund lässt sich m. E. nicht mit den Postulaten der Gradiententheorie in Einklang bringen.

Es stellt sich die Frage, aus welchen experimentellen Befunden die Postulate der Gradiententheorie für den Fall der Amphibienembryonen abgeleitet wurden. Hier scheinen sehr erhebliche Mängel in der experimentellen Fundierung der Theorie vorzuliegen. In den erwähnten Arbeiten BELLAMYS finden sich 1. keinerlei Angaben über die Variabilität der Reaktionen gegenüber bestimmten chemischen Einwirkungen und 2. keinerlei Angaben über den histologischen Bau der Froschembryonen, welche Missbildungen aufwiesen. Die Abbildungen und Beschreibungen von BELLAMY sind so summarisch gehalten, dass aus ihnen nicht mit Sicherheit entnommen werden kann, ob in den angeführten Fällen tatsächlich ein eindeutiger Empfindlichkeitsgradient vorliegt. Dieser Mangel in der Fundierung der Gradiententheorie liegt nicht nur bei den Amphibien vor, sondern ist auch von BÄSCHLIN (Zool. Jb. Physiol., 52; 1932) für die Untersuchungen an den Hydroiden aufgezeigt worden. So lange sich also die Gradiententheorie auf Material stützt, dessen morphologische und vor allem histologische Charakterisierung unzureichend ist, wird sich nicht mit Sicherheit entscheiden lassen, ob die Gradiententheorie die allgemeine Geltung hat, die ihr von manchen Forschern zugeschrieben wird.

Die vorliegenden Resultate führten zu der Auffassung, dass die Erscheinungen der Zyklopie und der Otocephalie mit Störungen bestimmter Bereiche

des Urdarmdaches in der Kopfreion zusammenhängen. Diese Bereiche können während kurzdauernder kritischer Phasen durch Li-Behandlung selektiv verändert werden. Unsere Feststellungen lassen es ferner als höchst zweifelhaft erscheinen, ob sich die Gradiententheorie als Erklärungsprinzip für die geschilderten Befunde eignet. Denn einerseits ist die experimentelle Fundierung dieser Theorie durch exakte histologische Befunde noch nicht erfolgt und andererseits nimmt die ganze Konzeption der Gradiententheorie zu wenig Rücksicht auf das Vorhandensein verschiedener Embryonalbezirke mit charakteristischen Entwicklungspotenzen, so wie wir sie für die Bereiche des Kopforgansators aufzeigen konnten.

Lehmann, F E. 1936. "Stehen die Erscheinungen der Otocephalie und der Zyklopie bei Triton mit Axialgradienten oder mit Störung bestimmter Organisatorregionen im Zusammenhang." *Revue suisse de zoologie* 43, 535–541. <https://doi.org/10.5962/bhl.part.117670>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/148563>

DOI: <https://doi.org/10.5962/bhl.part.117670>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/117670>

Holding Institution

American Museum of Natural History Library

Sponsored by

BHL-SIL-FEDLINK

Copyright & Reuse

Copyright Status: In copyright. Digitized with the permission of the rights holder.

Rights Holder: Muséum d'histoire naturelle - Ville de Genève

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.