***Malacoptila torquata minor* nov. subsp.**

Von Dr. **Moriz Sassi** (Wien).

Unter einer von Herrn Hofrat Steindachner dem K. K. Hof-Museum zum Geschenk gemachten Serie von Bälgen aus Miritiba (Maranhão, Brasilien) fanden sich drei Stücke (2 ♂, 1 ♀) von „*Malacoptila torquata*“, die sich jedoch auf den ersten Blick von den 7 Stücken, die bereits im Besitz des Museums waren, unterschieden und denen ich den Namen *Malacoptila torquata minor* geben möchte; auch Herr Kustos Hellmayer in München, dem ich die Bälge sandte, ist der Ansicht, daß es sich hier um eine gute Subspecies handelt.

Malacoptila torquata minor zeigt unterhalb des schwarzen Brustbandes eine circa 2 cm breite, licht zimtrote Binde, der Rest der Unterseite ist fast rein weiß, besonders seitlich mit licht bräunlichgrau verwaschen; bei den beiden jüngeren Exemplaren (1 ♂ und 1 ♀) ist das Weiß stärker verwaschen, so daß es mehr schmutzig grauweiß aussieht.

Bei *Malacoptila torquata* Hahn dagegen ist die zimtrote Brustbinde höchstens halb so breit, der übrige Unterkörper grau-bräunlich mit lichten, an der Unterbrust zimtrötlichen, weiter unten in Licht-Ocker übergehenden Endsäumen, an der Brust auch mit zimtrötlichen Schaftstrichen; nur die Bauchmitte ist weiß. Es macht also hier die Unterseite unterhalb des zimt-roten Brustbandes einen gewellten, an der Brust auch gestrichelten Eindruck, was bei *Malacoptila torquata minor* nicht der Fall ist.

Der zweite Hauptunterschied liegt in der Gröfse.

Malacoptila torquata minor:

				(Typ)
Fl.	84.5.	83.	83.	83.
Schw.	91.	88.	90.	90.
L.	18.5.	18.5.	19.	19.
Schn.	26.	25.	27.5.	27.5.

Malacoptila torquata Hahn:

Fl.	93.	94.	91.	98.	93.	99.5.	94.
Schw.	93.	94.	98.	101.	93.	93.	95.
L.	20.5.	21.	20.	20.5.	20.5.	20.5.	20.5.
Schn.	27.	28.	27.	28.	26.	26.5.	27.5.

Vor allem sind also die Flügel von *Malacoptila torquata minor* bedeutend kürzer, ebenso, aber nicht in demselben Grade, der Schwanz, der Lauf und der Schnabel.

Die Strichelung des Kopfes ist im großen und ganzen breiter und auch etwas lebhafter gefärbt, als bei *M. torquata*. Der Fundort von *Malacoptila torquata minor* liegt nördlicher als der von *M. torquata*.

Typ im k. k. naturhistorischen Hofmuseum in Wien No. 30940 ♂ ad. Miritiba, Maranhão, Bras. 8. VIII. 07. Schwanda coll.

1911. "Malacoptila torquata minor nov. subsp." *Journal
fu*
..

r Ornithologie 59, 181–181. <https://doi.org/10.1007/bf02135105>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/43503>

DOI: <https://doi.org/10.1007/bf02135105>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/142757>

Holding Institution

MBLWHOI Library

Sponsored by

MBLWHOI Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: No known copyright restrictions as determined by scanning institution.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.