Neue Arten.

Von Reichenow.

Oreopsittacus arfaki intermedius n. sp.

Gleicht im Fehlen des roten Bauchbandes dem *O. grandis*, ist aber viel kleiner, steht in der Gröfse zwischen *O. arfaki* und *grandis*. L. 160—170, Fl. 80, Schw. 80, Schn. von der Wachshaut 13 mm.

Neuguinea (Schraderberg, Sepikgebiet).

Centropus senegalensis tschadensis n. sp.

Ähnelt am meisten dem *C. s. aegyptius*, aber Schulterfedern, Rücken und innerste Armschwingen sind fahler braun, graubraun. Wie es scheint, findet ein Zwischenbrüten zwischen dieser Form und dem gleichfalls im Tschadgebiet vorkommenden typischen *C. senegalensis* statt.

Tschadgebiet (Mittelfrika).

Aethomyias nigrifrons n. sp.

♂: Oberkopf und Ohrgegend schwarzbraun, an der Stirn tiefschwarz, Rücken düster olivengrün, auf dem Bürzel ins Rostbräunliche ziehend, Kehle weiß mit rundlichen oder ovalen schwarzen Tüpfeln, Kropf grau verwaschen, Unterkörper gelblichweiß, die Seiten dicht trübolivengrün längsgestreift, Flügeldecken und Schwingen schwarzbraun düster olivengrünlich gesäumt, Schwanzfedern rostbräunlich, die äußeren mit schwarzem Fleck vor dem Ende auf der Innenfahne, Schnabel fleischfarben (am Balge horn gelblich), Füße graubraun. L. 115, Fl. 60, Schw. 43, Schn. 13, L. 18 mm.

♀: Kleiner, Oberkopf und Ohrgegend dunkelbraun, Tüpfel der Kehle kleiner und schwarzgrau. L. 105, Fl. 55, Schw. 38, Schn. 12, L. 17 mm.

Der schwärzliche Oberkopf und die tiefschwarze Stirn unterscheiden diese Art leicht von *A. spilodera* und *guttata*.

Neuguinea (mittleres Sepikgebiet).

Microeca poliocephala n. sp.

Kopf und Nacken grau, Rücken grauolivengrün, Zügel und vordere Wangen weiß getüpfelt, Kehle vorn weiß, nach hinten zu grauer, Unterkörper blaßgelb, an den Seiten grauolivengrün, Flügeldecken gleich dem Rücken, Unterflügeldecken blaßgelb,

Schwingen und Schwanzfedern dunkel graubraun, aufsen olivengrünlich gesäumt, Oberschnabel schwarz, Unterschnabel und Füße gelb. L. 135, Fl. 72, Schw. 53, Schn. 12, L. 12—13 mm¹⁾.
Neuguinea (mittleres Sepikgebiet).

Pachycephala hypoleuca n. sp.

♀: Oberkopf düster grau, Kopfseiten, Rücken und Flügeldecken braun, Unterseite weiß, Brust und Weichen graubraun verwaschen, Schwingen und Schwanzfedern schwarzgrau, aufsen bräunlich gesäumt, Unterflügeldecken und Innensaum der Schwingen weiß, Schnabel schwarz, Füße schwarzgrau. L. 150, Fl. 82, Schw. 60, Schn. 13, L. 23 mm. Sehr ähnlich *P. griseonota*, aber Kehle und Bauch reinweiß, Brust und Körperseiten sehr blaß bräunlichgrau.

Neuguinea (Schraderberg, mittleres Sepikgebiet).

Melanorhynchus umbrinus n. sp.

Oberkopf grauschwarz, Kopfseiten heller, schwärzlichgrau, Oberkörper und Flügeldecken düster braun, Kehle vorn grau, hinten in Braun übergehend, Unterkörper trüb rostbraun, Unterflügeldecken lebhafter rostbraun, Unterschwanzdecken rostbraun, Schwingen und Schwanzfedern grauschwarz, Schnabel schwarz, Füße schwarzgrau. L. 200, Fl. 85, Schw. 80, Schn. 21, L. 27 mm.

Neuguinea (Schraderberg, Sepikgebiet).

Ploceus melanolaema n. sp.

Sehr ähnlich *P. melanogaster* vom Kamerungebirge, aber das Gelb des Oberkopfes auch auf den Hinterkopf ausgedehnt.
Fernando Po.

Zosterops setschuana n. sp.

Ähnlich *Z. palpebrosa*, aber oberseits fahl olivengrün, Stirn blaßgelb, schwarzer bis unter das Auge ausgedehnter Zügelstrich, Kehle und Unterschwanzdecken blaßgelb, Mitte des Unterkörpers und Unterflügeldecken weiß, Körperseiten blaßgrau. L. etwa 100, Fl. 55, Schw. 45, Schn. 10, L. 15 mm.

Ta-tsieng-lu-ting in Setschuan.

Cleptornis palauensis n. sp.

Oberseits olivengrün, Oberkopf ins Gelbolivengrünliche, Oberschwanzdecken ins Rostbräunliche ziehend, Schwanzfedern

¹⁾ *M. griseiceps* und *punctata* De Vis konnten bei Kennzeichnung dieser neuen Art wegen Unzugänglichkeit der Beschreibung nicht berücksichtigt werden.

braun, aufsen olivenbräunlich gesäumt, Schläfenband blafs oliven-gelbgrünlich, Ohrfedern graubräunlich mit hellen Schaftstrichen, Unterseite fahl olivengelbgrünlich, Bauch ins Rostbräunliche ziehend, Unterschwanzdecken reiner rostbräunlich, Schwingen schwarzbraun, aufsen olivenrostbräunlich, innen weiflich gesäumt, Unterflügeldecken fahl graubräunlich, Schnabel blafsbräunlich, Unterkiefer noch blasser, Füfse hornbraun. L. etwa 150, Fl. 80, Schw. 55, Schn. 19—20, L. 25 mm.

Babelduap (Palauinseln).

Ich stelle den Vogel unter Vorbehalt in die Gattung *Cleptornis*. Der Schnabel hat die gleiche Form wie der von *C. marchei*, ist aber bedeutend stärker. Auffallender Weise aber hat der Vogel nur 9 Handschwingen und müfste danach unter die *Dicaeidae* gestellt werden. Jedoch entspricht das Längenverhältnis der einzelnen Schwingen nicht der für die Dicaeiden maßgebenden Flügelform. Die erste Schwinge hat die Länge der Armschwingen, dritte bis fünfte sind am längsten. Man möchte vermuten, dafs dem Vogel zufällig die erste Schwinge fehlt, obgleich eine Lücke in der Befiederung nicht wahrnehmbar ist. Fernere Stücke müssen über diesen Umstand Aufschluss geben.

Melirrhophetes rufocrissalis n. sp.

Sehr ähnlich *M. leucostephes*, aber Augenbrauenstreif gelb anstatt weifs, Rückenfedern grauschwarz mit weissen Säumen anstatt braunschwarz, Brust- und Bauchfedern düster grau mit weissen Säumen und Unterschwanzdecken rotbraun. L. 280, Fl. 130, Schw. 110, Schn. 40, L. 30 mm.

Wie die Art zu *M. griseirostris* Rothsch. sich verhält, läfst sich bei der ungenügenden Beschreibung dieser Art nicht beurteilen.

Neuguinea (Schraderberg, Sepikgebiet).

Melilestes chloreus n. sp.

Wie *M. novaeguinae*, aber bedeutend gröfser. L. 130, Fl. 70—75, Schw. 40, Schn. 28, L. 16 mm.

Neuguinea (mittleres Sepikgebiet).

Philemonopsis meyeri canescens n. sp.

Gleicht *Ph. meyeri*, nur ist der Grundton der Gesamtfärbung bedeutend grauer, oberseits graubraun, unterseit bräunlichgrau.

Neuguinea (mittleres Sepikgebiet).

Ptilotis simplex n. sp.

Eintönig braun, unterseits blasser, Kopfseiten grauer, Oberkopffedern mit deutlichem dunkleren Mittelfleck, Innensaum der Schwingen und Unterflügeldecken rostfarben. L. 175—190, Fl. 80—88, Schw. 70—80, Schn. 16—18, L. 19—22 mm.

Scheint der *P. proxima* am nächsten zu stehen, ist aber kleiner.
Neuguinea (mittleres Sepikgebiet).

Xanthotis chlorolaema n. sp.

Oberseits olivengrün, Oberkopf düsterer, Rückenfedern mit dunkelbraunem Mittelstrich ein gelbes Band über die Ohrgegend, dahinter ein weißes längs des Halses, Kehle blafsgelb, Wurzel der Kehlfedern grau, Kropf grau, Unterkörper blafs gelblichgrau, die einzelnen Federn fahlgrau mit blafsgelbem Saum, Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun mit olivengrünem Aufensaum, Innensaum der Schwingen blafsgelb, Unterflügeldecken hell isabellgelbbraun, Schnabel schwarz, Füße grau. L. 175—185, Fl. 90—95, Schw. 75—80, Schn. 24, L. 21 mm.

Neuguinea (mittleres Sepikgebiet).

Xanthotis melanolaema n. sp.

Oberseits olivenbraun, grünlich verwaschen, Oberschwanzdecken reiner braun, Oberkopf dunkler, Kopfseiten und Kehle schwarz, gelber Streif über Wange und Ohrgegend, hinter dem Ohr in einen weißen Streif sich fortsetzend, unterseits olivengraubraun, Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun, aufsen olivengrün gesäumt, Unterflügeldecken und Innensaum der Schwingen rostfarben. L. 210, Fl. 98, Schw. 98, Schn. 21, L. 23 mm.

Neuguinea (Schraderberg, mittleres Sepikgebiet).

Thelazomenus n. g.

Wie *Xanthotis*, aber Schnabelfirste nicht scharfkantig, sondern abgerundet, Lauf kürzer, kürzer als Mittelzehe, Schwanz gerundet, kein auffallender Ohrstreif.

Thelazomenus poecilocercus n. sp.

Kopf dunkel schiefergrau, Rücken, Flügel und Schwanz braun, Schwanzfedern mit schwärzlichem Fleck vor dem blassen Endsaum, äußerste oder die beiden äußersten mit rostfarbenen und schwarzen Querbinden auf der Innenfahne, Innensaum der Schwingen rostfarben, Unterseite und Unterflügeldecken auf blafsrostfarbenem bis bräunlichweißem Grunde fein grau gewellt, Unterschwanzdecken blafsrostfarben und grau quergebändert, Schnabel schwarz, Füße grauschwarz. L. 200, Fl. 95, Schw. 80, Schn. 23, L. 17 mm.

Neuguinea (mittleres Sepikgebiet).

Chalcomitra adamauae n. sp.

Ähnlich *Ch. senegalensis*, aber das Rot der Kehle heller, ähnlich dem von *Ch. azik*, nicht glänzend und weniger von stahlglänzenden Querbinden durchzogen; das Braun der Flügel dunkler, auch dem von *Ch. azik* gleichend, aber Schwanz heller.

Adamaua.

Chalcomitra verticalis (Lath.).

Von *Ch. verticalis* habe ich 1891 eine Abart *viridisplendens* vom mittelafrikanischen Seengebiet gesondert, weil sie im allgemeinen mehr stahlgrünlich anstatt blaugrünlich glänzende Kehle, mehr ins Messinggelbliche schimmernden Oberkopf und etwas längeren Schnabel hat. Wie es scheint, müssen aber noch zwei andere Abarten gesondert werden: 1) eine Form vom nordwestlichen Westafrika, die blauerer Kopf als *Ch. verticalis* und ins Veilchenblaue ziehende Kehle hat. Diese Form, die mir von Bissao in Portugiesisch Guinea vorliegt, wird den Namen *chloronotus* Sw. führen müssen. 2) eine Form vom Urwald westlich des Tanganjika, die ebenfalls blauerer Kopf und noch stärker ins Veilchenfarbene ziehende Kehle, außerdem aber auffallend langen Schnabel hat. Dieser misst 31, bei *verticalis* nur 23 mm. Diese Form nenne ich *Ch. v. tanganjicae* n. sp.

Phyllastrephus leucolaema camerunensis n. sp.

Sehr ähnlich *Ph. l. albigularis* von Oberguinea, aber Oberkopf reiner grau, dort grünlich verwaschen, Oberkörper etwas dunkler und mehr olivenfarben.

Kamerun (Duma), auch Kongo.

Camaroptera caniceps n. sp.

Kopf grau, Kehle weiß (oder grauweiß, was an dem beschädigten Balge nicht deutlich zu sehen ist), Körpergefieder und Flügel grün, Unterkörper blasser, Schwanz gelbgrün. L. 115, Fl. 62, Schw. 43, Schn. 15, L. 15 mm.

Duma, Kamerungebiet.

Crateroscelis virgata n. sp.

Oberseits braun, Oberkopf mehr erdbraun, Rücken mehr ins Olivenbraune ziehend, Kopfseiten heller braun, schmaler weißlicher Strich oberhalb des Zügels, Kehle trübweiß, grau gestrichelt, Kropf grau, Unterkörper weiß, Schnabel dunkel hornbraun, Füße graubraun. L. 115, Fl. 55, Schw. 37, Schn. 15, L. 18 mm.

Neuguinea (mittleres Sepikgebiet).

Crateroscelis albigula n. sp.

Erdbraun Unterkörper blasser, in der Mitte weißlich, Kehle reinweiß, Schnabel schwarzbraun, Unterkiefer blasser, Füße graubraun. L. 120, Fl. 60, Schw. 40, Schn. 15, L. 27 mm.

Neuguinea (Schraderberg, mittleres Sepikgebiet).

Pseudopitta n. g.

Typ.: *Eupetes incertus* Salvadori. Diese Art weicht vom Gepräge der Gattung *Eupetes* in Form und Färbung doch so bedeutend ab, daß sie generisch gesondert werden muß. Die Läufe sind auffallend lang, länger als die doppelte Schnabellänge, dagegen ist der stufig gerundete Schwanz wesentlich kürzer als die Flügellänge. Da die Urbeschreibung von *Eupetes incertus* nach einem noch nicht vollständig ausgefärbten Vogel entworfen wurde, gebe ich eine Beschreibung des mir vom Schraderberg vorliegenden Stückes.

Pseudopitta incerta (Salvad.).

Oberseits rostbraun, Ohrfedern mit gelbbraunlichem Mittelfleck, weißer Zügelstrich, Kehlfedern weiß, die seitlichen mit schmalem schwärzlich graubraunen Endsaum, Brust blafsbräunlich, Bauch und Steiß weiß, Schwingen und Schwanzfedern schwarzbraun mit rostbraunem Aufensaum, Armschwingen mit gelbbraunem Fleck an der Wurzel der Innenfahne. L. 165, Fl. 78, Schw. 55, Schn. 17, L. 37 mm.

Crateropus jardinei hypobrunneus n. sp.

Dem *C. jardinei hypostictus* am ähnlichsten, aber Unterkörper eintönig fahlbraun, dort blasser und mehr graubräunlich, auf der Bauchmitte aber weißlich. Bei *C. j. kirki* sind die Körperseiten mehr rostbräunlich. Die weißen Spitzen der Unterhalsfedern sind bei *C. j. hypobrunneus* kürzer als bei den anderen Formen, und die vordere Wange ist weißlich.

Amadi (oberer Uelle im Kongogebiet).

Bradornis pallidus tessmanni n. sp.

Von allen Arten der Gattung die dunkelste im Ton der Oberseite, dunkler als *B. modestus*. Oberseits erdbraun, das Graubraun von Kropf und Körperseiten dunkler als bei *B. modestus*, Unterflügel- und Unterschwanzdecken ins Isabellfarbene ziehend, Innensäume der Schwingen blafs rostisabellfarben. L. etwa 170, Fl. 86, Schw. 73, Schn. 14, L. 21 mm.

Carnot (Ost-Kamerun).

1915. "Neue Arten." *Journal*

fu

..

r Ornithologie 63, 124–129. <https://doi.org/10.1007/bf02094972>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/43484>

DOI: <https://doi.org/10.1007/bf02094972>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/142972>

Holding Institution

MBLWHOI Library

Sponsored by

MBLWHOI Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: No known copyright restrictions as determined by scanning institution.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.