Le *Sturmia semitestacea* a été décrit par le Dr J. VILLENEUVE dans les *Annals of the South African Museum* [1916], p. 477. On ignorait jusqu'ici son genre de vie.

Communications.

Diagnoses préliminaires de Cétonides nouveaux
recueillis par M. R. Vitalis de Salvaza en Indo-Chine, 2^e note ⁽¹⁾

[COL. SCARABAEIDAE]

par A. BOURGOIN.

1. **Macronota elegantula**, n. sp. — *M. Argodi* Bourgoïn vicina, sed brevior. Fronte medio nigra, carinata, lateribus ochraceo-squamosis, fulvo-pilosis; clypeo fulvo-piloso, nigro, nitido, dense punctato, ♂ fere toto ochraceo-squamoso; pronoto nigro, opaco, dense punctato, fulvo-piloso, ochraceo-trivittato, vitta mediana lata, antice furcata; scutello nigro, opaco, medio ochraceo-squamoso; elytris flavo-testaceis, unicostatis, sexstriatis, nigro-fasciatis; pygidio nigro, fulvo-piloso, fere toto ochraceo-squamulato; corpore subtus nigro, lateribus ochraceo-squamosis, rufo-pilosis; femoribus tibiisque longius pilosis; tibiis intermediis extus medio ♂ vix visibiliter, ♀ fortiter unidentatis.

Haut-Tonkin : Chapa.

Types : 2 ♂, 1 ♀ (coll. R. VITALIS et A. BOURGOIN).

2. **Macronota Garnieri**, n. sp. — ♀. Tota nigra, sordide squamoso-maculata, flavo-pilosa, supra opaca, subtus nilida. Capite parce piloso, fronte rugoso-punctata, medio carinata; clypeo rugoso-punctato, antice leviter emarginato; pronoto creberrime, sat grosse punctato, dense piloso, squamoso-trivittato, vitta mediana lata, ad basin rotundata, antice furcata; scutello squamoso, punctato, piloso; elytris pubescentibus, quinquestriatis, ad suturam squamosis, lateribus trimaculatis; pygidio macula media rotundata ornato; pectore lateribus squamosis, longius pilosis; segmentis ventralibus convexis, pilosis, punctatis, 1-4 lateraliter a medio squamulatis; pedibus brevius pilosis, tibiis anticis extus tridentatis, intermediis et posticis medio fortius spinosis.

Laos : Kam-Kent, 7 octobre 1915.

Type : une femelle (coll. A. BOURGOIN).

(1) Voir *Bull. Soc. ent Fr.* [1916], p. 297.

3. **Ingrisma Mayi**, n. sp. — ♀. *I. nasutae* Fairm. vicina, sed minor et gracilior. Capite olivaceo, medio sat convexo, dense punctato, lateribus apiceque grosse punctatis, clypeo antice dilatato, brunneo, reflexo; pronoto olivaceo, disco fere laevi, lateribus minute et dense punctatis; scutello olivaceo, fere laevi; elytris testaceo-viridibus, subseriato-punctatis; sutura, marginibus apiceque olivaceis; pygidio rubro-brunneo, transversim striolato, rugoso, rufo-piloso; processu mesosterni elongato; metasterno viridi, medio laevi, lateribus obsolete punctatis; segmentis ventralibus medio laevibus, lateribus obsolete punctatis, 1-2 viridibus, 3-6 viridi-rufescentibus, ultimo rufo, transversim striolato; femoribus rufis, haud pilosis, tibiis fusco-olivaceis, intus brevius rufo-pilosis, tarsis nigris.

Laos : Pak-Lay (A. MAY).

Type : une femelle (coll. A. BOURGOIN).

4. **Rhomborrhina nitida**, n. sp. — ♂. *R. Fortunei* Saund. similis, sed longior et nitidior. Elytris haud pubescentibus, tibiis concoloribus, abdominis ultimo segmento haud nigro.

Tonkin : Hagiang.

Types : 5 ♂ (coll. R. VITALIS et A. BOURGOIN).

5. **Rhomborrhina nigriventris**, n. sp. — ♀. *R. distinctae* affinis sed minor. Supra viridi-aurata, elytris ab basin lineato-punctatis, a medio rugoso-punctatis, punctis plurimis arcuatis, transversis, pupillatis; apicibus rugosis, spinosis, concoloribus, haud nigris; pectore medio abdomineque nigris, nitidis.

Haut-Tonkin : Chapa, 27 mai 1916.

Type : une femelle (coll. A. BOURGOIN).

6. **Rhomborrhina sapphirata**, n. sp. — ♀. *R. Chatanayi* Bourg. vicina, sed gracilior, cyanea. Fronte inter oculos rugosa, clypeo rugoso; pronoto valde alutaceo, dense ac regulariter punctato; elytris disco minutissime punctatis, lateribus apiceque punctato-striolatis, sutura nigra; pygidio rugoso, apice rufo-piloso, tibiis tarsisque nigris, pedibus posticis haud pilosis.

Haut-Tonkin : Viétri, mai 1915.

Type : une femelle (coll. A. BOURGOIN).

7. **Cetonia (Potosia?) chalcitis**, n. sp. — ♀. Elongata, cuprea, supra opaca, leviter olivacea, subtus nitida. Capite cupreo, nitido, sat grosse punctato, clypeo antice vix emarginato; pronoti disco obsolete punctato, albo-guttulato, lateribus striolatis, marginatis; scutello im-

punctato; elytris albo-maculatis, disco antice fere laevi, postice leviter depressis, bicostatis, arcuato-signatis, lateribus sat grosse punctatis, angulis posticis fere rectis, haud spinosis; pygidio transversim striolato, rufo-piloso; processu mesosterni leviter transverso, antice rotundato; metasterno medio laevi, lateribus striolatis, griseo-pilosis, angulis posticis albo-signatis; segmentis ventralibus 1-2 medio laevibus, 3 parce, 4 sat dense, 5 dense, 6 rugose punctatis; lateribus arcuato-signatis, griseo-pilosis, albo-maculatis; pedibus griseo-pilosis.

Laos : Xieng-Khouang, 10 juillet 1916.

Type : une femelle (coll. A. BOURGOIN).

8. **Cetonia (Protaetia?) albovermiculata**, n. sp. — ♂. *Rubro-cuprea, leviter olivacea, supra opaca, subtus sat nitida. Fronte plana, sparse punctata, opaca, utrinque, ad oculos, albo bipunctata, clypeo ad basin opaco, parce punctato, antice nitido, dense punctato, vix emarginato, angulis anticis fere rectis; pronoto linea media impunctata, lateribus dense punctatis, marginatis; scutello laevi, epimeris sat crebre punctatis; elytris post medium subtiliter punctatis, albo-vermiculatis, angulis posticis rectis, haud spinosis; pygidio vix visibiliter punctato-striolato, medio convexo, lateribus depressis, minute griseo-maculatis; processu mesosterni fortiter transverso, antice angulato, metasterno medio laevi, sulcato, lateribus striolatis, griseo-pilosis, minute squamosis; segmentis ventralibus haud depressis, 1-5 fere opacis, lateribus parce punctatis et griseo-pilosis, ultimo nitido, medio laevi; pedibus nitidis, longius griseo-pilosis, tibiis anticis extus tridentatis, intermediis et posticis medio extus unidentatis.*

Haut-Tonkin : Chapa, 25 mai 1916.

Type : un mâle (coll. A. BOURGOIN).

9. **Protaetia rubrocuprea**, n. sp. — ♂. *P. inani* Wallace vicina, sed longior. *Tota rubro-cuprea, supra opaca, velutina, subtus nitida. Propygidio producto, angulato, pygidio sat dense striolato, apice vix striolato.*

Tonkin : Hagiang (n° 1065).

Type : un mâle (coll. A. BOURGOIN).

Bourgoin, A. 1917. "Diagnoses preliminaires de Cétonides nouveaux re-cueillis par M. R. Vitalis de Salvaza en Indo-Chine. 2e note [Col. Scarabaeidae]." *Bulletin de la Société entomologique de France* 1917, 68–70.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/34147>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/146740>

Holding Institution

Smithsonian Libraries

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.