dans chaque carpelle n'a paru avoir aucune valeur pour sectionner le genre *Michelia*, parce que tous les autres concordent; pourquoi donc séparerait-on, en vertu de ce même caractère, les *Manglietia* des *Magnolia*. Les *Talauma* se distinguent des autres Magnoliées par « *carpellis nunquam dorso apertis* », mais l'importance de ce caractère est-elle réelle?

M. Baillon fait voir qu'il existe à cet égard beaucoup de variations dans les diverses Magnoliacées. Dans les nombreuses variétés d'une seule espèce cultivée, le Noyer, on voit le fruit ou demeurer dur et indéhiscent, ou s'ouvrir ou se pourrir plus ou moins rapidement. L'axillarité des fleurs et l'intervalle que présente le réceptacle entre le sommet de l'androcée et la base des carpelles inférieurs, ont été quelquefois négligés, dans le classement des espèces, par M. Spach lui-même.

Dans le groupe des Schizandrées, que M. Baillon rattache aux Magnoliacées, il ne croit pas convenable de distinguer le genre *Schizandra* du genre *Madsura*. Il montre qu'on connaît, dans le genre *Magnolia*, tous les intermédiaires entre le raccourcissement et l'allongement extrême de l'axe floral.

Le rapprochement proposé par M. Miers entre les Canellacées et les Winterées paraît à l'auteur rationnel et logique. Les organes de la végétation et les propriétés médicinales sont les mêmes dans toutes ces plantes.

Quand on compare les Magnoliacées aux Anonacées qui leur sont si analogues, il devient évident que, par la placentation même, les Canellacées sont aux Monodorées ce que la plupart des Magnoliacées sont aux Anonacées dialycarpellées, comme les *Unona*, *Uvaria* et autres genres voisins. Les différentes pièces qui constituent le périanthe des Canellacées ont été soumises à beaucoup de discussions. Payer a regardé les trois pièces extérieures du bouton de ces fleurs comme un calice, et les cinq pièces intérieures comme une corolle pentamère produite par le dédoublement de deux de ses éléments primordiaux, comme cela se passe dans les *Helianthemum*. Les Canellacées sont pour M. Baillon des Magnoliacées à placentation pariétale.

Mémoire sur le groupe des Tiliacées, par M. H. Bocquillon (*Adansonia*, t. VII, pp. 17-64).

M. Bocquillon expose d'abord l'histoire taxonomique de la famille des Tiliacées; il traite ensuite, dans un second chapitre, des caractères du groupe, de la recherche des types, de l'exposition des genres; il passe ensuite à la description de quelques genres qu'il éloigne du groupe des Tiliacées et qu'il répartit dans les ordres voisins; il termine par l'examen des affinités de la famille.

Dans toutes les plantes qu'il range dans le groupe des Tiliacées, on trouve réunis les caractères suivants : un androcée formé d'étamines en plus grand nombre que celui des pièces du calice; un ovaire à carpelles réunis, et des placentas toujours pariétaux dans le jeune âge.

Les sections du genre sont établies d'après la situation que présentent la superposition ou l'alternance des étamines; le degré d'adhérence des filets staminaux, l'existence, la composition et la position réciproque des faisceaux stériles ou fertiles formés par ces filets; la présence ou l'absence du disque; la conformation du réceptacle floral; l'existence ou l'absence de fausses cloisons dans l'ovaire; l'existence ou l'absence d'un calicule; les étamines introrses ou extrorses, leur mode de déhiscence; la conformation de la corolle, etc. L'auteur établit sur ces caractères onze sections.

Savoir :

A. Section des *Tilleuls*; fruit globuleux ou piriforme, sec, indéhiscent, cymes axillaires : 1. *Tilia* T. — 2. *Plagiopteron* Griff. — 3. *Leptonychia* Turcz.

B. Section des *Corchoropsis*; fruit siliquiforme : 4. *Corchoropsis* Sieb. et Zucc.

C. Section des *Entelea*; étamines superposées par faisceaux aux sépales, absence de disque, nombre des placentas ou des loges non égal à celui des sépales, fruit épineux et déhiscent : 5. *Entelea* R. Br. — 6. *Sparmannia* L. — 7. *Honckenya* Willd. — 8. *Apeiba* Aubl.

D. Section des *Muntingia*; fruit bacciforme; portions libres des deux placentas voisins s'accolant, grossissant démesurément, et formant dans chaque loge une masse chargée d'ovules qui, à l'époque de l'anthèse, semble descendre du haut de cette loge : 9. *Muntingia* L. — 10. *Hasseltia* HBK. — 11. *Prockia* L.

E. Section des *Corchorus*; étamines toutes fertiles, superposées par faisceaux aux sépales; un disque ou un pied entre l'insertion de la corolle et celle de l'androcée; fruit capsulaire : 12. *Corchorus* L. — 13. *Glyphæa* Hook. f.

F. Section des *Triumfetta*; corolle placée entre deux disques ou deux pieds; étamines superposées par faisceaux aux sépales; fausses cloisons ovariennes; fruit sec : 14. *Triumfetta* L. — 15. *Heliocarpus* L. — 16. *Eriocarpus* Nimmo. — 17. *Luhea* Willd.

G. Section des *Grewia*; pétales munis à leur base d'un renflement charnu ou d'une écaille; insertion des pétales séparés par un long pied de celle des étamines toutes fertiles; ovaire muni de fausses cloisons : 18. *Grewia* L. — 19. *Belotia* A. Rich. — 20. *Columbia* Pers. — 21. *Diplophractum* Desf.

H. Section des *Sloanea*; un très-grand nombre d'étamines à filets libres, le plus souvent portées sur un disque annulaire et charnu. Les pétales, lorsqu'ils existent, ne sont jamais involutés; fruit sec, souvent garni d'épines : 22. *Sloanea* L. — 23. *Dasynema* Schott. — 24. *Echinocarpus* Bl. — 25. *Forgetina* Bocq. n. gen. — 26. *Antholoma* Labill. — 27. *Duboscia* Bocq. n. gen. — 28. *Desplatsia* Bocq. n. gen. — 29. *Ancistrocarpus* Oliv. — 30. *Græffea* Seem.

I. Section des *Elæocarpus*; étamines toutes fertiles disposées par faisceaux

au-dessus d'un disque annulaire ; anthères dont la déhiscence se fait au sommet de fentes longitudinales ; pétales souvent involutés : 31. *Elæocarpus* L. — 32. *Vallea* Mutis. — 33. *Tricuspidaria* R. et P. — 34. *Dubouzetia* Panch.

J. Section des *Aristotelia* ; réceptacle concave : 35. *Aristotelia* L'Hér.

K. Section des *Berrya* ; fruit et direction des ovules des Malvacées ; styles souvent indépendants, semblant prolonger les placentas : 36. *Berrya* Roxb.

Le *Trichospermum* Bl. et le *Mollia* Mart. sont rapportés par l'auteur aux Bixacées ; la *Brownlowia* Roxb., le *Pentace* Hassk., le *Pityranthe* Thw. et le *Ropalocarpus* Boj. aux Sterculiacées.

Étudiant les affinités naturelles des Tiliacées, M. Bocquillon reconnaît que ces plantes ne forment pas une famille distincte de celle des Malvacées ; il faudrait, dit-il, prendre la même conclusion pour les Bombacées, les Hermanniées, les Buettneriacées. Mais on conçoit très-bien, dit-il, qu'il soit commode, dans la pratique, de conserver comme distincte la famille des Tiliacées, qui, si l'on ne s'en rapportait qu'aux caractères absolus, se confondrait encore d'autre part avec les Bixacées ; ainsi que vient de le faire voir M. Baillon dans un récent mémoire.

Ueber die Vertheilung der Spaltöffnungen auf den Blättern (*De la répartition des stomates sur les feuilles*) ; par M. S. Kareltschikoff (*Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou*, 1866, n° 1, pp. 160-297).

Plusieurs auteurs ont déjà traité ce sujet important. On trouvera résumées les principales conclusions qui résultent de leurs travaux dans les *Éléments de botanique* de M. Duchartre, qui y a joint l'exposé de ses propres observations.

M. Kareltschikoff commence par faire observer que les stomates existent beaucoup plus souvent qu'on ne le croit sur la face supérieure de la feuille. Sur trois cents végétaux qu'il a étudiés, cette face n'en était dépourvue que chez douze d'entre eux. Il a même observé deux ou trois fois que les stomates étaient plus nombreux à la face supérieure. Il entre ensuite dans beaucoup de détails sur la manière de choisir les feuilles que l'on veut observer pour obtenir la véritable moyenne du nombre de leurs stomates. Il faut, dit-il, pour avoir des indications d'une valeur réelle, compter non pas le nombre absolu de stomates que l'on observe dans un espace donné, mais le nombre de cellules qui séparent les stomates. Alors le résultat que l'on obtient est indépendant de la grandeur de ces cellules, c'est-à-dire du développement de la feuille. Or, la relation est très-constante entre le nombre des stomates et celui des cellules épidermiques. Il est évident que cette méthode ne saurait être appliquée aux feuilles sur lesquelles les stomates sont inégalement répartis et rassemblés en agglomérations.

La plus grande différence que l'auteur ait observée entre les nombres ex-

primant la quantité de stomates répandue sur chacune des deux faces de la feuille lui a été offerte par quelques Rubiacées, quelques Labiées et quelques Ombellifères, plantes chez lesquelles ce nombre dépassait cent pour la face inférieure et atteignait à peine dix pour la face supérieure. Il n'en a pas trouvé à la face supérieure sur les *Glechoma hederacea*, *Stachys palustris*, *Galeobdolon luteum*. Déjà M. Duchartre avait constaté qu'ils manquent à cette place sur deux *Teucrium*. L'auteur en a trouvé cependant chez d'autres Labiées. Parmi les plantes où ces organes manquent encore à la face supérieure de la feuille, l'auteur cite encore, parmi les Renonculacées, *Aconitum lycoctonum*, *Delphinium elatum*, *Actæa spicata*, diverses espèces de *Thalictrum*, *Pæonia officinalis*, *Trollius europæus* (?), *Anemone ranunculoides* (?); parmi les Rosacées, des espèces des genres *Rosa*, *Rubus*, *Potentilla*, *Fragaria*, *Spiræa*; parmi les Scrofularinées, *Melampyrum nemorosum*; parmi les Fumariacées, *Dielytra spectabilis*; parmi les Campanulacées, *Campanula bononiensis* et *C. glomerata*.

Dans la famille des Papilionacées, il arrive souvent que la face supérieure des feuilles offre plus de stomates que l'inférieure; chez le *Vicia silvatica*, pour trente-neuf stomates de la face supérieure, on ne trouve que deux à quatre de ces organes à la face inférieure. La répartition des stomates varie selon les espèces des mêmes genres. Ainsi, on trouve chez le *Trifolium pratense* des stomates presque en nombre semblable sur chacune des deux faces de la feuille, tandis que chez le *Tr. repens* et le *Tr. hybridum* il y en a davantage du côté supérieur et chez le *Tr. agrarium* davantage du côté inférieur. Des différences de même ordre se rencontrent entre les diverses espèces de *Vicia*. Les stomates des Chénopodiacées et des Crucifères, qui sont fort petits, sont plus nombreux sur leurs feuilles que sur celles des autres végétaux.

Dans la suite de son mémoire, l'auteur examine la forme des cellules épidermiques des végétaux qu'il a observés, ainsi que la disposition de leurs nervures; et il recherche quelle influence cette forme et cette disposition exercent sur la répartition des stomates.

Il fait ensuite remarquer que la structure de la feuille est beaucoup moins affectée qu'on ne le croirait par la répartition des stomates; que le tissu lacuneux de la face inférieure de cet organe et le tissu serré de la face supérieure y persistent même quand la relation numérique ordinaire des stomates est renversée.

D'un autre côté, la répartition des stomates est modifiée, chez certains végétaux, par l'habitat de la plante. Il ne s'agit pas ici des modifications à produire artificiellement en soumettant des plantes à un régime différent de leurs conditions normales d'existence; la séquestration et l'obscurité notamment, comme l'ont prouvé en dernier lieu d'assez nombreuses expériences de M. J. Sachs, n'ont pas d'influence sur le développement des stomates. Mais il n'en est pas ainsi chez les végétaux qui peuvent changer de milieu sans que leur vi-

Clos, Dominique. 1867. "De La Postfoliation." *Bulletin de la Société botanique de France* 14, 64–67. <https://doi.org/10.1080/00378941.1867.10827481>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/8637>

DOI: <https://doi.org/10.1080/00378941.1867.10827481>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/158679>

Holding Institution

Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by

Missouri Botanical Garden

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.