

*Rumex salicifolius* Weinm. — Décombres, Charenton, Vigneux.

*Juncus tenuis* Willd. — Entre Saint-Leu et Seine-Port près Cesson, allée sablonneuse.

*Allium paniculatum* L. — Côteaux à Moulin Galand; haies, côteaux, parc à Athis-Mons.

*Vallisneria spiralis* L. — Sablonnière à Ris.

*Epipactis violacea* Dur.-Duq. — Brunoy, ancien parc de la Faisanderie.

*Bromus inermis* Leyss. — Villeneuve-le-Roi.

*Elymus Caput-Medusæ* L. — Décombres, parc de Versailles, Charenton.

*Scolopendrium officinale* Lam. — Créteil, passerelle de la Pie, à côté du *Pteris aquilina*.

M. Perceval m'a indiqué le *Pirola rotundifolia* L. et le *Wahlenbergia hederacea* Reich. près d'Arbonne.

## Une nouvelle station du *Pirola maculata* dans la forêt de Fontainebleau;

PAR M. CH. BROYER.

Ne pouvant assister à la séance de ce jour je vous transmets la communication suivante :

Le 18 septembre dernier le hasard m'a fait découvrir une nouvelle localité de *Pirola maculata* aux alentours de la Croix du Grand Veneur. J'en ai communiqué le schéma à MM. Dumée et Jeanpert le lendemain; cette localité comprend six pieds bien vigoureux au-dessous d'un Chêne et doit être la quatrième connue.

Le 25 du même mois j'ai visité la station classique de la Croix du Grand Maître; la plante était en parfait état et se dissémine

fort bien du Nord au Sud, j'ai compté environ 500 pieds dont une cinquantaine fructifiés. Donc aucune crainte sur le sort de cette jolie *Pirole* adventice.

M. F. Pellegrin fait la communication suivante :

## De quelques bois du Mayombe (Gabon);

PAR M. FRANÇOIS PELLEGRIN.

Les bois de nos colonies, et en particulier de notre Congo, sont l'objet à l'heure présente, où le ravitaillement en bois est si nécessaire et si onéreux, de nombreux projets et commencements d'exploitation. Mais un gros obstacle à la mise en valeur de la forêt équatoriale est son hétérogénéité. Les bois les plus dissemblables se présentent côte à côte; chaque espèce est sporadique. On trouve une nouvelle preuve de ce fait bien connu dans l'énumération systématique qui suit. C'est l'inventaire aussi exact que possible des principales essences rencontrées en un point précis du Gabon, d'accès facile en bordure du cours d'eau, dans la vallée inférieure du Kouibou, entre Magne et Congotali.

Le commandant Sargos, forestier expérimenté, a effectué en ce lieu de nombreuses prospections et rapporté d'intéressants documents dont une collection a été donnée au Muséum, au service de M. le Professeur Lecomte.

En collaboration avec le commandant Sargos, nous avons entrepris l'étude de ces bois dont la plupart sont encore mal connus, plusieurs même tout à fait nouveaux. Chaque nom spécifique est suivi, dans notre liste, dans l'ordre suivant : du numéro d'ordre de la collection Sargos; — du nom vernaculaire de l'arbre en langue vili; — du nom commercial proposé; — de l'ordre de hauteur de l'arbre (chiffres romains); — de l'ordre de grosseur de l'arbre (chiffres arabes).



Broyer, Ch. 1920. "Une nouvelle station du *Pirola maculata* dans la forêt de Fontainebleau." *Bulletin de la Société botanique de France* 67, 378–379.

<https://doi.org/10.1080/00378941.1920.10836178>.

**View This Item Online:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/8687>

**DOI:** <https://doi.org/10.1080/00378941.1920.10836178>

**Permalink:** <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/161183>

**Holding Institution**

Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

**Sponsored by**

Missouri Botanical Garden

**Copyright & Reuse**

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.