rétrécis en ligne droite en avant et sinueusement en arrière où ils forment avec le bord postérieur un angle bien net, presque droit.

Élytres noirs, assez brillants, avec la suture et deux côtes lisses. Les intervalles des côtes couverts de stries obliques très fines et très serrées.

Pygidium striolé transversalement, avec deux petites touffes de poils blanchâtres.

Pièces thoraciques striolées latéralement et pubescentes; abdomen ponctué et pubescent, sauf au milieu des quatre premiers segments. Tibias antérieurs à bord externe tranchant, élargi à partir du milieu; intermédiaires et postérieurs ayant, vers les deux tiers de leur longueur, une saillie externe peu marquée.

Tonkin : Chapa (L. DUPORT).

Une ♀ (coll. A. BOURGOIN).

Description d'un genre et d'une espèce nouvelle de *Meloidae* [COL.]

par Pierre DENIER.

Eolydus, nov. gen. ⁽¹⁾. — Gen. *Lydo affinis*. Caput convexum, macula frontali ovali. Pronotum subquadratum, convexum, margine laterali antice haud deleto. Tibiarum posticarum internum calcar breve, spiniforme, arcuatum : externum validum, dilatatum, oblique truncatum. Unguiculi usque ad basin fissi, haud pectinati.

Se rapproche des *Halosimus* et des *Lydus* du groupe de *L. praeustus* Redt. par la présence d'une tache frontale rouge. S'éloigne de ces deux genres par le pronotum entièrement rebordé et surtout par les ongles non pectinés.

E. atro-coeruleus, n. sp. — *Elongatus, subnitidus, atro-coeruleus*. Caput latum, convexiusculum, dense et grosse punctatum, macula frontali rubra. Antennae breves, art. 1° valido, sat elongato, 2° brevissimo, articulis 3-4 latitudine paulo longioribus, 5-10 crassiusculis, sensim brevioribus, ultimo articulo longiore, piriformi. Pronotum nitidulum, subquadratum, convexum, antice et longius postice attenuatum, angulis rotundatis, rugoso-punctatum, in disco leviter bimpresum. Scutellum magnum, medio carinatum. Elytra prope basin pronoto paulo minus duplo latiora, apicem versus sensim leviter dilatata, lineis tribus elevatis

(1) Ἠώς, Orient; *Lydus*, nom générique.

subtilissimis et ante apicem evanescentibus, apice singulatim rotundata, coriacea, ut in prothorace sparse ac brevissime vix conspicue nigro-hirtula. Abdomen nigrum, pilosulum. Pedes robusti, nigri, tibiis compressis, leviter arcuatis; tarsi postici robusti, art. 1° 2° duplo longiore, 3° brevi, ultimo graciliore, longitudine 1^{um} aequante. — Long. 21-24 mill.

♂ *Robustior; antennarum articuli crassiores; abdomen minus dilatatum, ultimo segmento emarginato.*

Perse : provinces du Louristan (E. VON BODEMEYER) et du Kourdistan : Tidar (*type* in coll. P. DENIER).

D'un bleu profond, assez brillant, robuste, couvert d'une pubescence noire très courte et invisible à l'œil nu. Tête forte, plus large que le pronotum, fortement et très densément ponctuée; front rugueux, légèrement aplati, taché de rouge, séparé de l'épistome par un sillon procurvé assez profond; épistome moins densément ponctué, presque lisse en avant, atténué à sa marge antérieure; labre transverse, fortement bilobé, ponctué seulement en avant et terminé par deux houppes de poils jaunâtres assez longs. Palpes maxillaires assez courts, le dernier article tronqué sans être sécuriforme. Labium très brillant, presque lisse, déprimé; palpes labiaux peu développés, à dernier article obconique. Antennes robustes, surtout chez le ♂, à articles globuleux, brièvement pubescents; le 1^{er} aussi long que les 2^e et 3^e réunis; 2^e très court, en forme de bouton; articles 3-10 obconiques, épais, de plus en plus courts; le dernier plus long et pyriforme. Prothorax aussi long que large, convexe, brillant, à angles arrondis, complètement rebordé, atténué en avant et plus longuement en arrière, couvert d'une ponctuation très dense, souvent emmêlée, surtout en arrière et sur le disque qui est légèrement déprimé latéralement et détermine deux fossettes plus brillantes. Scutellum grand, canaliculé. Élytres un peu moins larges à la base que le double de la largeur de la base du prothorax, rugueux, légèrement élargis en arrière, arrondis séparément; nervures dorsales peu saillantes et s'effaçant au tiers postérieur. Corps d'un noir peu brillant, couvert d'une pubescence noire assez longue. Dernier segment de l'abdomen échancré chez le ♂. Pattes robustes, tibias légèrement arqués. Éperon interne des tibias postérieurs court, spiniforme, arqué; l'externe fort, dilaté à son extrémité qui est brièvement tronquée. Articles du tarse dentelés en scie, couverts en dessous d'une pubescence brune assez longue; longueur de l'ensemble du tarse égalant celle du tibia.

Je conserve à cette espèce le nom d'*atro-coeruleus* que M. E. REITTER lui avait donné dans sa collection.

1913. "Description d'un genre et d'une espece nouvelle de Meloidae." *Bulletin de la Société entomologique de France* 1913, 231-232.

<https://doi.org/10.5962/bhl.part.16283>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/36377>

DOI: <https://doi.org/10.5962/bhl.part.16283>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/16283>

Holding Institution

Smithsonian Libraries

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.