XXIV. *Species of Erica.* By Richard Anthony Salisbury, Esq.

F.R.S. & L.S.

Read October 6, 1801.

ERICAS, in absolutâ monographiâ nunc illustrare, minime mihi propositum est. Attamen, quandoquidem in hoc genere nonnihil desudaverim, et multæ ejus pulcherrimæ species, sub ineptis ne dicam falsis hortulanorum titulis, iterum a *Willdenow* evulgantur, meos Characteres, et Nomina, demum profero.

Species ordinavi secundum earum affinitates, adeo ut inter se proxime collocentur simillimæ: cuivis diversæ methodo parum amicus. Etenim, si e numero foliorum separas, hunc non solum in unâ eâdemque stirpe mire ludentem offendes, sed tales divisiones magnitudine suâ laborantes fere nihil juvant: idem fortius objiciatur sectionibus ex antheris muticis calcaratisve petitis, quippe quæ valde propinquas species, imo ipsas varietates distrahunt: nec magis naturalem distributionem, vel e bracteis, vel ex inflorescentiâ, vel e filamentis, vel e fructu, adhuc extorquere potui. Jamdudum nos docuit *Linnè*, in Regno Vegetabili novæ prolis Herbam sequi patrem, Florem vero matrem: inde Clavis vastissimorum generum, ut mihi videtur, haud ita difficilis. Quamobrem cohortes e structurâ corollæ antherarumque potissimum desumpsi, gradumque affinitatis per comma, semicolon, rariusve colon, pone singula nomina appositum, indicavi: ubi nullum vidi præter communem generis nexum, ista species periodo notatur: multas enim similitudines oculis conspiciamus, quas tamen verbis exprimere admodum difficile sit. Nihilominus in Differentiis Specificis, puras certissimasque notas eligere conatus sum, haud
magis

magis quod opus esset dicere, quam quod non opus esset, non dicere, sollicitus.

Mirum fortasse nonnullis videatur, *Ericam vulgarem* desiderari in sequentibus paginis: sciant autem velim, hancce stirpem, si quæ alia in toto Ordine, proprium constituere genus: jure antiquiore profecto suum nomen retinisset, sed cum tot aliæ stirpes, apud omnes Botanicos jam eodem cognomine gaudeant, satius duxi hanc unam novo insignire titulo: itaque *Callunam* appellavi, ob usum ejus frequentissimum in scopis conficiendis: essentia generis, quâ differt ab *Ericâ*, est in pericarpîi valvis ad latera loculorum dehiscentibus, septis axi relictis: habitus, absque ullo rudimento petioli pedunculive, omnino sessilis. Alterum genus, cum illo pariter confusum, ob stigma grande *Salaxis* mihi audit, cujus calyx irregularis, et pericarpium drupaceum, triloculare, trispermum: quatuor species innotuere, faciem *Ericæ scopariæ* præ se ferentes.

Paucas observatiunculas, in editione Dissertationis *Ericæ a Thunberg*, quam nuper typis mandabam, inserui. Hallucinationes graviores in tam vasto genere pene inevitabiles, Synonyma infra tacite indicabunt: cæterum hæc non nisi ex speciminibus ipsis auctorum unquam citavi. Maximâ profecto beneficiâ sua Herbaria mihi patefecerunt omnes, atque frustula vel rarissimorum exemplarium communicaverunt: adeo ut ducentas et quinquaginta legitimas species nunc possideam, quarum dimidiam circiter partem in vivis alo. Hæc omnes, numerosissimis varietatibus mistas dignoscere, et prout verum Botanicum decet exponere, haud labor erit paucorum annorum: nimis felix si qua hætenus videar vestigiis institisse admirandi *Linne*, qui non absque divino quodam afflatu, cum Vegetabilium differentias tradidit, longissimo intervallo omnes superavit.

Synopsis Specierum, secundum earum Affinitates.

Scoparia. 3. m. i. p: ax.

Tenuis. 3. c. i. t.

Spiculifolia. 3. m. i. ax.

Humilis: 3. c. i. t.

Virgularis, 3. m. i. t.

Peduncularis: 3. c. i. t.

Asperifolia, 3. mc. i. t.

Ferox. 3. m. i. t.

Amœna. 3. c. i. t.

Oxycoccifolia, 3. c. i. ax?

Glomiflora, 3. c. i. t.

Thymifolia. 3. c. ie. ax.

Formosa. 3. c. i. t.

Axillaris. 3:4. c. i. ax.

Carduifolia. . c. i. t.

Sicæfolia. 3. c. i. t.

Tubercularis. 3. m. i. t.

Urceolaris, 3. c. i. t.

Campanularis. 3. m. i. t.

Fauſta, 3. c. i. t.

Pallida, 3. c. i. t.

Medioliflora. 3. m. i. t.

Tomentosa, 3. c. i. t.

Auricularis, 3. c. i. t.

Blanda, 3. m. i. t.

Lamellaris, 3. c. i. t.

Hottoniæflora, 5. c. i. ax.

Marifolia, 3. c. i. t.

Seriphiifolia, 5. m. i. ax.

Helianthemifolia. 2. c. i. t.

Lavandulæfolia, 3. m. i. t.

Calathiflora. 3. c. i. t.

Humifusa, 3. m. i. t.

Cristæflora, 3. m. i. t.

Procera, 3:5. c. i. t.

Lyfimachiæflora, 3. m. i. t.

Polytrichifolia. 3:5. c. i. t.

Passerinæfolia: 3. m. i. t.

Byffina,

Byssina, 3. *m. i. t.*
 Velleriflora, 3. *m. e. t.*
 Carbasina: 3. *m. e. t.*

Scariofa, 3. *c. e. t.*
 Sexfaria, 3. *c. e. t.*
 Corydalis, 3. *c. i. t.*
 Azaleæfolia, 3. *m. e. t.*
 Petiolaris, 3. *m. i. t.*
 Vesicularis, 3. *c. i. t.*
 Verniciflua, 3. *c. i. t.*
 Lachneæfolia, 3. *c. i. t.*
 Volutæflora, 3. *c. m. i. t.*
 Lyrigera, 3. *c. i. t.*
 Salax, 3. *c. i. t.*

Gnidiafolia, 3. *c. i. t.*
 Cumuliflora, 3. *m. i. t.*
 Genistæfolia, 3. *m. i. t.*
 Periplocæflora, 3. *c. i. t.*
 Lucida, 3. *c. i. t.*
 Munda, 3. *c. i. t.*
 Gnaphaliiflora. 3. *c. i. t.*

Fabrilis, 3. *c. i. t.*
 Dianthifolia, 2. *c. i. t.*
 Brevifolia, 3. *c. i. t.*
 Chlamydisflora, 3. *c. i. t.*
 Selaginifolia. 3. *c. i. t.*

Pannosa. 3 : 5. *c. i. t.*

Hirsuta, 4. *m. i. t.*
 Plumosa, 4. *c. i. t.*
 Ciliciiflora. 3. *m. i. t.*
 Xeranthemifolia, 3. *m. e. t.*
 Nodiflora, 3. *m. e. t.*
 Flosculosa, 4. *m. c. t.*
 Exilis, 4. *m. e. t.*
 Labialis, 3. *m. e. t.*
 Embolifera, 4. *c. e. t.*
 Dumosa, 4. *c. e. t.*
 Barbigera, 4. *m. e. t.*
 Paleacea, 4. *m. e. t.*
 Bruniafolia, 6. *c. e. t.*
 Turmalis, 6. *m. e. t.*
 Equisetifolia. 3. *m. e. t.*

Diotæflora, 3. *m. e. p: ax.*
 Sertiflora, 3. *m. e. p: ax.*

Flexilis. 4. *m. e. ax.*

Saxatilis, 3-5. *m. e. p: ax.*
 Lugubris, 4. *m. e. p: ax.*
 Multiflora, 5-6. *m. c. p: ax.*
 Manipuliflora, 3. *m. c. p: ax.*
 Vaga. 5-6. *m. c. p: ax.*

Lentiformis: 3. *m. e. t.*
 Pudibunda. 3-4. *m. e. t.*

Filiformis, 3. *c. e. t.*

Turgida,

Turgida. 3. c. e. t.

Holofericea. 3. c. i. t.

Fusiformis ; 3 : 4. m. e. t.

Glauca : 3. c. i. t.

Fragilis ; 3. m. e. t.

Vestiflua, 3. m. e. t.

Variifolia. 3. c. i. t.

Baculiflora, 3. m. e. t.

Cothurnalis, 3. m. e. t.

Rupestris. 3. c. i. t.

Socciflora, 3. m. e. t.

Furfurosa, 3. m. e. t.

Versicolor, 3. m. i. t.

Follicularis, 3. m. e. t.

Decora, 3. c. i. t.

Penicilliflora. 3. m. e. t.

Cupressiformis, 3. c. i. t.

Melliflua. 3. c. i. t.

Placentæflora, 3. m. e. t.

Nana, 4. c. i. t.

Pyramidalis, 3. m. e. t.

Spissifolia, 6. c. i. t.

Squamæflora, 3. m. e. t.

Sacciflora, 4. c. i. t.

Cæsia, 3. m. e. t.

Cylindriflora. 6. c. i. t.

Flexuosa, 3. m. e. t.

Lasciva, 3. m. e. t.

Paludosa, 6. m. i. t.

Stylosa, 3. m. e. t.

Lituiflora. 4. m. i. t.

Spirææflora, 3. m. e. t.

Milleflora. 3. c. e. t.

Obpyramidalis, 4. m. i. t.

Diosmæfolia, 3. c. i. t.

Cyrillæflora, 4. m. i. t.

Palliiflora, 3. c. i. t.

Velitaris. 4. c. i. t.

Fugax, 3. c. i. t.

Pyrolæflora, 3 : 4. c. i. t.

Culcitæflora, 4. c. i. t.

Tegulæfolia, 3. c. i. t.

Tubiflora, 4. c. i. t.

Baccæformis. 4 : 3. c. i. t.

Curviflora, 4. c. i. t.

Cuspidigera, 4. c. i. t.

Modesta : 3. c. i. t.

Bibax, 4. c. i. t.

Buccinæformis, 4. c. i. t.

Fastuosa,

Fastuosa. 4. c. i. t.

Stagnalis, 4. m. i. t.

Conspicua, 4-5. m. i. t.

Longiflora, 6. m. i. t.

Verticillaris, 5-6. m. i. t.

Floccosa. 5-6. m. i. t.

Radiiflora, 8. c. i. p: lat.

Lycopodiifolia. 6. m. i. p: lat.

Pharetræformis, 6. m. i. p: ax.

Grandiflora, 6. m. e. p: ax.

Cerviciflora, 5-6. c. e. p: ax?

Pinifolia, 6. c. i. p: ax.

Calamiformis, 6. m. i. p: ax.

Longifolia, 6. m: c. i. p: ax.

Costæflora, 6. m. i. p: ax.

Onosmæflora, 6. m. i. p: ax.

Pulviniformis, 6. m. i. p: ax.

Froncosa, 6. m. i. p: ax.

Phylicæflora, 6. m. i. p: ax.

Argutifolia. 6. m. i. p: ax.

Favosa, 6. c. i. p: ax.

Sceptriformis, 8. c. i. p: ax.

Clavæflora, 6. c. i. p: ax.

Alveiflora, 6. c. i. p: ax.

Mammosa. 4. c. i. p: ax.

Brachialis. 4. m. i. t.

VOL. VI.

Hystericiflora, 4. m? i. t.

Strigilifolia, 4. c. i. t.

Pectinifolia, 4. c. i. t.

Crinifolia. 6. c. i. t.

Cernua. 4. c. i. t.

Doliiformis. 6. c. i. t.

Pistillaris 4. c. i. t.

Ciliaris: 3. m. i. ax.

Botuliformis, 4. c. i. t.

Multicaulis. 6. c. i. t.

Mutabilis. 3. c. i. lat.

Uncifolia. 4. c. i. p: ax.

Caduceifera. 3. c. i. p: ax.

Empetrifolia, 6. c. i. p: ax.

Malleolaris, 6. c. i. p: ax.

Pyxidiflora, 6. c. i. p: ax.

Nolæflora. 6. c. i. p: ax.

Festa, 4. c. i. p: ax.

Fallax, 6. c. i. p: ax.

Parilis, 6. c. i. p: ax.

Viscida. 6. c. i. p: ax.

T t

Catervæflora;

Catervæflora; 4. c. i. t.

Pubigera, 4. c. i. t.

Mitræformis, 4. c. i. t.

Tardiflora, 4. c. i. t.

Parviflora, 4. c. i. t.

Exigua, 4. c. i. t.

Pusilla. 4. c. i. t.

Tragulifera, 4. c. i. t.

Guttæflora, 4. c. i. t.

Curvirostris, 4. c. i. t.

Obesa, 4. c. i. t.

Gracilis, 4. c. i. t.

Intervallaris, 4. c. i. t.

Quadræflora, 4. c. i. t.

Prolifera, 4. c. i. t.

Cyathiformis, 4. c. i. t.

Pelviformis. 4. c. i. t.

Turrigera, 4. c. i. t.

Lacunæflora, 3-5. c. i. t.

Florida. 4. c. i. t.

Turbiniflora, 4. c. i. t.

Bullularis, 3-4. c. i. t.

Mucofa, 4-6. c. i. t.

Piluliformis, 4-5. c. i. t.

Obliqua, 6. c. i. lat.

Sequax, 4-6. c. i. t.

Blenna. 4-5. c. i. t.

Verecunda. 4. c. i. lat.

Glabella. 4. c. i. t.

Embothriifolia, 3. c. i. lat.

Glutinosa, alt. c. i. lat.

Curvifolia: 3. c. i. lat.

Squarrosa, 6. c. i. t.

Gorteriæfolia, 4. m. i. t.

Ampullæformis, 4. m. i. t.

Capax, 4. m. i. t.

Lagenæformis, 3-4. m. i. t.

Jasminiflora: 3-4. m. i. t.

Pavettæflora, 4. c. i. t.

Fasciformis, 4. m. i. t.

Fistulæflora, 4. m. i. t.

Fragrans, 4. c. m. i. t.

Galiiflora, 4. c. i. t.

Nidiflora, 4. c. i. t.

Denticularis, 4. m. i. t.

Pulchra, 4. m. i. t.

Daphniflora, 4. m. i. t.

Pellucida. 4. m. i. t.

Amabilis, 4. c. i. ax.

Venusta; 4. c. i. ax.

Imbellis, 2. c. i. ax.

Linifolia, 2. c. i. ax.

Borboniæfolia, 2. c. i. ax.

Corifolia,

Corifolia, 3. c. i. ax.

Pugionifolia, 3. c. i. p : ax.

Obvallaris, 3. c. i. ax.

Viminalis. 3. c. i. p : ax.

Hyssopifolia, 3. c. i. ax.

Taxifolia: 3. c. i. ax.

Figuræ Arabicæ numerum foliorum in singulis verticillis indicant:

Litera c. filamenta calcarata, m. mutica; e. antheras exsertas, i. inclusas; ax. inflorescentiam axillarem, p : ax. pseudo-axillarem, t. terminalem, lat. lateralem.

ERICA.

Character Generis.

Corolla persistens. Antheræ 4—10, ante anthesin per foramina duo lateralìa connexæ. Pericarpium membranaceum, 4—8-loculare: Valvæ 4—8, medio loculorum una cum septis ab axi dehiscentes. Semina 10—100 in singulis loculis, decidua.

Differt ab *Andromedâ*, corollâ non deciduâ, et structurâ antherarum: a *Menziesiâ*, præter easdem notas, necnon fructu; ad quam *Erica Daboecii* referenda.

Characteres Specierum.

E. caule pubescentulo: corolla $\frac{3}{4}$ -lineari, lævi; tubo cyathiformi: filamentis muticis: stigmate peltato.

Scoparia.

E. fucata. *Thunb. Diff. n. 9.* E. scoparia. *Linn. Mant.*

p. 372. E. scoparia. *Linn. Diff. n. 13. cum fig. floris.*

E. coris folio II II I. *Clus. Hist. Pl. lib. I. p. 42.*

Cum suâ *Arboreâ* in Horto Cliffortiano olim confudit Linnè, neque postea filamenta esse mutica unquam animadvertit.

Spiculifolia.

E. pedunculis ebracteatis: calyce breviter 4-fido: corollâ 1-lineari, lævi; tubo cyathiformi, 4-angulo: filamentis muticis.

E. olympiaca. Sibth. MS.

Sponte nascentem in summitate Montis *Olympus*, legit heu defunctus Sibthorpe.

Perfingularis est defectus bractearum.

Virgularis,

E. foliorum laminis plus minus ovatis: corollâ $\frac{2}{3}$ —1-lineari, viscidâ; tubo sphærico: stigmate peltato.

Variat α : *E. absinthoides. Linn. Mant. p. 66.*

β : *E. virgata β . Thunb. Diff. n. 18.*

γ : *E. virgata γ . Thunb. Diff. n. 18.*

δ : *E. hispidula. Linn. Suppl. p. 222.*

ϵ : *E. hispida. Thunb. Diff. n. 20.*

Ab hisce omnibus longe discrepat *E. virgata δ . Thunb.* quæ, ni fallor, *Salaxis* est.

Asperifolia,

E. foliorum laminis linearibus: corollâ 1½-lineari, viscidâ; tubo sphærico: filamentis sæpius calcariatis: pericarpio lanato.

E. setacea. Andr. Er. n. 62. cum Ic. bonâ.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.

Ferox.

E. calyce ferrato: corollâ 1½-lineari, lævi; tubo ventricoso, dein iterum dilatato: pericarpio glabro.

E. totta. Thunb. Diff. n. 17.

Sponte nascentem in *Konde Bockveldt*, legit F. Masson. Bractææ 3 juxta calycem.

Oxycoccifolia,

E. caule decumbente, filiformi: foliorum laminis ovatis:

ovatis: corollâ $1\frac{1}{2}$ -lineari, campanulatâ, hirsutâ: filamentis muticis.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, solo humido, legit I. Mulder.

Pulchella species: utinam ad vivam accuratius describere mihi quandoque liceat: tum caulis, tum folia *Oxycoccum Palustrem* ad amissim simulant.

E. caule diffuso: foliorum laminis ovatis: corollâ $1-1\frac{1}{2}$ -lineari: filamentis basi valde dilatatis: pericarpio hirsuto.

Thymifolia.

Variat α : Corolla 1-linearis, viscido-pubescent. Antheræ inclusæ.

E. planifolia. *Thunb. Diff. n. 60.* E. planifolia. *Berg. Pl. Cap. p. 10.* E. planifolia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 508.*

β : Corolla $1\frac{1}{3}$ -linearis, minutissime viscido-pubescent. Antheræ exsertæ.

E. planifolia. *Willd. Sp. Pl. v. 2. p. 362.*

E. africana hirsuta, &c. *Plukn. Mant. p. 69. tab. 347. pl. 1.*

γ : Corolla $1\frac{1}{2}$ -linearis, lævis. Antheræ exsertæ.

E. thymifolia. *Wendl. Obs. p. 48.*

Margo foliorum in omnibus constanter recurvulus.

E. foliorum laminis fetulosis: bracteis 2, minutis: corollâ $1\frac{1}{2}$ -lineari, lævi: calcaribus subulatis, hirtis.

Axillaris.

E. strigosa. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 17.* E. arborea. *Thunb. Diff. n. 63.*

Sponte nascentem in *Taffelberg*, legit F. Masson.

Variat floribus albis purpureisque.

E. foliorum

Sicæfolia.

E. foliorum laminis mucronatis : corollâ $1\frac{2}{3}$ -lineari, extus hirsutâ ; tubo cyathiformi : calcaribus lineari-attenuatis : pericarpio glabro.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder. Nulli mihi cognitæ affinis est.

Urceolaris,

E. foliorum laminis fetosis : corollâ 3-lineari, extus pubescente ; tubo urceolari : calcaribus lineari-attenuatis.

E. dura. Soland. MS. E. hirta. Thunb. Diff. n. 56.

Flores pallide purpurei.

Fausta,

E. foliorum laminis fetosis : corollâ $2\frac{1}{3}$ -lineari, extus pubescente ; tubo urceolari : calcaribus aurito-attenuatis, valde ferratis.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, solo humido, legit I. Mulder.

Valde similis antecedenti : sed Foliorum laminæ basi latiores ; Pubescentia alia ; et Antheræ omnino diversæ, in hac lineares seu totæ æqualis latitudinis, in illâ versus apicem sensim angustatæ.

Pallida,

E. foliorum laminis linearibus : calyce lateribus reduplicato : corollâ 2-lineari, utrinque pubescente : calcaribus brevibus.

E. pubescens pilosa. Thunb. Diff. n. 61. E. pubescens. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 506. auctoritate speciminis in ejus herbario a Burman.

Variat magnitudine et pubescentiâ foliorum ; sed, ni fallor, constanter 3-na sunt.

E. foliorum

E. foliorum laminis anguste linearibus : calyce planiusculo : corollâ $1\frac{1}{2}$ -lineari, utrinque tomentosâ : calcaribus longis, recurvis.

Tomentosa,

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.

Bractææ juxta basin pedunculi sitæ, cum quo et calyce corollæ concolores.

E. foliorum laminis lineari-lanceolatis : corollâ 2-lineari, extus pubescente ; tubo ovato : calcaribus minutis, auricularibus.

Auricularis,

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.

Herba sequentis : cæterum ab omnibus hujus cohortis, calcaribus minutis fere ut in *Galiiflorâ*, diversa.

E. foliorum laminis lineari-lanceolatis : corollâ 3-lineari, tubo pyramidali, extus pubescente : calcaribus glabris.

Lamellaris,

E. urceolaris. Pl. Kew. t. 16. E. urceolaris. Berg. Pl. Cap. p. 107. E. pentaphylla. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 506. E. caffra. Linn. Sp. Pl. ed. 1. et 2. auctoritate speciminis Cliffortiani.

Nulla pars in hac specie urceolaris est : a foliis longis planiusculis, titulum saltem non falsum offero.

E. foliorum laminis late ovatis, planiusculis : corollâ $1\frac{2}{3}$ -lineari, utrinque pubescente ; tubo ovato : calcaribus pubescentibus.

Marifolia,

E. marifolia.

E. marifolia. *Andr. Er. n. 29. cum Ic.* *E. marifolia.*
Pl. Kew. t. 14. optima. *E. marifolia. Soland. in Ait.*
Hort. Kew. v. 2. p. 15.

Sponte nascentem juxta *Constantia* abunde, legit F. Masson.

Helianthemifolia. *E. foliis 2-nis; laminis obovatis planiusculis: corollâ 2-lineari, utrinque pubescente: calcaribus longis.*

E. Promontorio Cap.

Communicavit primum cum viginti aliis speciebus *Georgius Hibbert*, ob raras difficillimasque stirpes quas introduxit, merito celebris.

Calathiflora. *E. calyce tomentoso: corollâ 1-lineari, lævi: calcaribus cuneatis, hirtis: pericarpio tomentoso: stigmate longe exserto.*

E. bicolor. Thunb. Diff. n. 57.

Procera, *E. caule tomentoso: bracteis approximatis: calyce basi medioliformi: corollâ 1—2-lineari: stigmate peltato.*

E. scoparia. Thunb. Diff. n. 80. E. arborea. Linn. Diff. n. 14. cum fig. floris. E. caffra. Linn. Diff. n. 22. cum fig. floris. auctoritate speciminum ad quæ ibi descripsit. E. triflora. Berg. Pl. Cap. p. 118. E. arborea. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 502. E. scoparia. Linn. Sp. Pl. ed. 1. p. 353, exclusis synonymis. E. coris folio 1. Clus. Hist. Pl. lib. 1. p. 41.

Sponte nascentem juxta *Baia*, legit amicissimus Smith. Variat admodum in diversis regionibus, stigmate etiam incluso.

E. caule

E. caule tomentoso: bracteis remotis: calyce basi sensim angustato: corollâ $1\frac{1}{2}$ —2-lineari: calcaribus cuneatis. *Polytrichifolia.*

Sponte nascentem prope *Lisboa*, legit Banks.

Prioris nonnullis varietatibus similis, sed hæc mihi videtur legitima species. Foliorum laminæ angustiores, magis attenuatæ. Flores in nostrâ stirpe cultâ plane inodori. Corolla oblonga: tubo poculiformi. Stigma fibulæ-forme, nec late peltatum. Pericarpium pyriforme.

E. caule divaricato: foliorum laminis linearibus: corollâ $\frac{3}{4}$ -lineari, campanulatâ, lævi: filamentis brevissimis: calcaribus lineari-attenuatis. *Tenuis.*

E. divaricata. Hortulanis.

E. caule glabro: foliorum laminis argute reduplicatis: corollâ $2\frac{1}{3}$ -lineari: calcaribus longis, subulatis, hirtis. *Humilis.*

E. depressa. Thunb. Diff. n. 50. cum Ic.

E. foliorum laminis linearibus: corollâ 3-lineari: tubo globofo: antheris longissime foraminosis, lanatis. *Peduncularis.*

E. rubens. Thunb. Diff. n. 83.

Sponte nascentem in *Koude Bockveldt*, montibus, legit F. Masson.

Pedunculi pollicem longi sunt.

E. foliorum laminis lanceolatis: corollâ 4—5-lineari: tubo urceolari; limbo brevissimo: antheris breviter foraminosis, glabris. *Amæna.*

E. incarnata. *Thunb. Diff. n. 84.*

Toto cœlo diversa ab *E. incarnatâ* hortulanorum, et non nisi ex specimine *Thunbergiano* mihi cognita.

Glomiflora,

E. foliorum laminis anguste cuneatis: calyce bracteis imbricato: corollâ $2\frac{1}{2}$ -lineari, viscidâ; tubo sphærico: calcaribus villosissimis.

E. vesicaria. *Soland. MS.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit *E. Masson*.

Formosa.

E. calyce incurvo-deflexo: corollâ $1\frac{1}{4}$ -lineari, viscidâ; tubo sphærico, 8-angulo: antheris basi valde arcuatis: stigmate lato.

E. formosa. *Thunb. Diff. n. 82. cum Ic.*

Sponte nascentem in *Lange Kloof*, regionibus orientalibus, legit *F. Masson*.

Carduifolia.

E. foliorum laminis fetosis: pedunculis longis: corollâ $2\frac{1}{2}$ -lineari, lævi; tubo globofo: filamentis brevissimis.

Communicavit *Hibbert*.

Inflorescentia adhuc mihi dubia: forte in rudimentis ramulorum terminalis. Stigma angustum.

Tubercularis.

E. corollâ $1\frac{1}{3}$ -lineari, tuberculis asperâ; tubo globofo: filamentis muticis: pericarpio longe stipitato.

E. inclyta. *Soland. MS.*

Antheræ minutæ, totæ læves.

Campanularis.

E. caule glabro: foliorum laminis angustis: corollâ $2\frac{1}{2}$ -lineari,

$2\frac{1}{2}$ -lineari, campanulatâ, lævi: filamentis brevissimis, muticis.

E. tenuifolia. Hortulanis.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, locis humidis, legit F. Maffon.

Flos *Convallariæ majalis Linn.* sed luteus.

E. calyce tetraphyllo: corollâ 4-lineari, lævi; tubo medioliformi; limbo basi integro: antheris papulosis. Medioliflora.

E. Thunbergii. Linn. Suppl. p. 220.

Genus jam tanto nomini sacrum, nec cum specificis, hujusmodi titulos miscendos esse censeo.

E. floribus glomeratis; corollâ $1\frac{1}{3}$ -lineari; limbo tubo $\frac{1}{2}$ longiore, laciniis femiorbicularibus: stigmatate lato. Blanda,

E. cornuta. Roxb. MS.

In hac pulcherrimâ cohorte, Antheræ ipsæ ultra foramen in cristam plus minus producuntur.

E. calycis foliolis ferrulatis: corollâ $2\frac{1}{2}$ -lineari; limbo basi integro, emarginulato: filamentis calcaratis. Hottoniæflora,

E. cubica. Andr. Er. n. 39. cum Ic. malâ. E. cubica. Linn. Mant. p. 233.

E. calycis foliolis minute ciliatis: corollâ $1\frac{1}{2}$ -lineari; limbo basi integro, obtuso: filamentis muticis. Seriphiifolia,

E. cubica. Thunb. Diff. n. 46.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, montibus, legit I. Mulder.

Nullam *cubicam* partem in his duabus speciebus unquam detegere potui: præter notas autem supra

memoratas, discrepant Proportione, situ Bractearum, et colore Antherarum. Flores in utraque axillares.

Lavandulæfolia, E. caule incano : bracteis juxta calycem : corollâ 2-lineari ; tubo 4-angulo ; limbo incurvo : filamentis inferne latissimis.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

Humifusa, E. foliis 2-nis ; laminis ovalibus ; corollâ $1\frac{1}{3}$ -lineari, limbo amplo : stylo longe exserto.

E. humifusa. *Hibbert MS.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.

Herba tota glabra videtur.

Cristæflora, E. calyce tetraphyllo : corollâ 2-lineari ; limbo tubo triplo longiore, basi integro : pericarpio lævi.

E. melanthera. *Thunb. Diff. n. 12.*

Sponte nascentem prope *Constantia*, legit I. Mulder.

Lyfimachiæflora, E. calyce quadrifido : corollâ 2-lineari ; limbo tubo duplo longiore, basi integro : pericarpio sericeo.

E. melanthera. *Linn. Mant. p. 232,*

Stigma in hac longe exsertum.

Passerinæfolia : E. bracteis minutis : calyce breviter quadrifido, denſe tomentoso : corollâ $2\frac{1}{2}$ -lineari : pericarpio tomentoso.

E. passerinæ. *Linn. Suppl. p. 221.* E. Cap. Coridis fol.

fol. fl. rubello. *Pet. Gaz. t. 3. f. 7. Cat. Top.*
n. 469.

Folia in nostris exemplaribus terna.

E. calyce dense sericeo, bracteis imbricato, quadrifido: corollâ 2-lineari, calyce parum longiore: nectario cotyliformi, rare hirto. *Byssina,*

E. capitata. Andr. Er. n. 38. cum Ic. E. capitata. Linn. Mant. p. 373. E. capitata. Linn. Diff. n. 36. cum fig. floris. E. capitata. Berg. Pl. Cap. p. 94.

E. africana calyce lanuginoso &c. Seb. Thes. v. 1. p. 30. t. 20. f. 1.

Flores pallide lutei: antheris sæpius inclusis.

E. calyce dense sericeo, bracteis remoto, quadrifido: corollâ $1\frac{3}{4}$ -lineari, calyce parum longiore: nectario cotyliformi, glabro. *Velleriflora,*

E. bruniades. Andr. Er. n. 61. cum Ic. E. capitata. Thunb. Diff. n. 15. auctoritate ejus speciminis. Eriocephalos Bruniades æthiopica, Corios, &c. Plukn. Mant. p. 69. t. 347. f. 9. auctoritate ejus speciminis.

Sponte nascentem in *Drakenstein*, locis humidis, legit F. Masson.

Flores pallide purpurei.

E. calyce dense sericeo, bracteis remoto, tetraphyllo: corollâ $1\frac{3}{4}$ -lineari, calyce multo longiore: nectario astragaliformi, sericeo. *Carbasina.*

E. bruniades. Linn. Mant. p. 378. E. bruniades. Linn. Diff. n. 52. cum fig. floris.

Flores albidî, pallide rosei, vel etiam lutei: dignoscas

autem

autem a *Byssinâ*, bracteis calyce remotis; a *Velleriflorâ*, foliis latioribus et magis tomentosis.

Scariofa, E. bracteis suborbiculatis: corollâ $1\frac{1}{2}$ -lineari; limbo longitudine tubi; laciniis semilanceolatis: stigmatibus angustis.

E. scariofa. *Berg. Pl. Cap. p. 102.* E. spumosa. *Berg. Pl. Cap. p. 103.* auctoritate speciminum, quæ amicissimo Swartz debeo. E. spumosa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 508.*

Nullam differentiam extricare potui in speciminibus Bergianis: hoc modo ante plenam explicationem florum, illud diu post, decerptum fuisse videtur. Filamenta rite calcarata sunt. Antheræ in herbariis cito caduæ.

Sexfaria, E. foliis glabris; corollâ $1\frac{1}{3}$ -lineari, calyce obtektâ: calcaribus longis, marginalibus: pericarpio lævi.

E. sexfaria. *Pl. Kew. f. 11.* E. spumosa. *Thunb. Diff. n. 14.*

Antheræ hujus quoque post exsiccationem mox cadunt, proculdubio exsertæ.

Corydalis, E. foliorum laminis lanceolato-cuneatis: corollâ 2-lineari, limbo basi integro: antheris dorso alatis.

Communicavit *Hibbert*.

Nomen ab antheris galeam aliquatenus referentibus.

Azaleæfolia, E. foliorum laminis lanceolatis: corollâ $1\frac{1}{2}$ -lineari, hirtâ: antheris exsertis, pene totis foraminosis.

E. spumosa. *Roxb. MS.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.

Petiolaris, E. petiolis longis, cuneatis, fimbriatis: corollâ $2\frac{1}{3}$ -lineari, apice pubescentulâ: pericarpio rare hirtis.

E. petiolata.

E. petiolata. *Thunb. Diff. n. 7. cum Ic. bonâ.*

Facies Rosmarini Officinalis, *Linn.*

E. foliis vesiculis nigris aspersis: corollâ 1-lineari, Vesicularis,
viscido-pubescente: calcaribus parallelis, cuneatis:
pericarpio sericeo.

E. conacea. Hortulanis.

Sponte nascentem prope *Stellenbosch* inter montes,
legit I. Mulder.

Frutex 3-pedalis; ramis erectis, valde fastigiatis.

E. foliis viscidis: corollâ $2\frac{1}{3}$ -lineari, limbo recurvo: Verniciiflua,
calcaribus aurito-cuneatis, hirtis: pericarpio lævi.

E. glutinosa. Roxb. MS.

Foliorum laminæ obtuse acuminulatæ, reduplicaturâ
dense glandulosæ, unde nitent glutine effuso.

E. foliorum laminis ovalibus, pubescentibus: corollâ Lachnæfolia,
2-lineari, limbo recurvo: calcaribus longis, an-
guste cuneatis.

E. lachnæa. Hortulanis.

Spontenascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

Differt ab antecedente foliorum laminis penitus ob-
tusis, nec viscidis: calcaribus lævibus.

E. foliis lucidis: calycis lateribus inferne recurvis: co- Volutæflora,
rollâ $1\frac{2}{3}$ -lineari; limbo revoluta: filamentis sæpe
muticis: pericarpio tomentoso.

E. nigrita. Thunb. Diff. n. 53. E. nigrita. Linn. Diff.
n. 11. cum fig. floris, pessimâ. E. nigrita. Linn.

Mant. p. 65. E. laricina. Berg. Pl. Cap. p. 94.

E. africana, &c. Seb. Thes. v. 2. p. 11. t. 9. f. 7.

Calcaria brevia, parallela, cuneata, interdum omnino deficiunt.

Lyrigera,

E. foliis lucidis: corollâ $1\frac{2}{3}$ -lineari; limbo recurvo: calcaribus ferratis: antheris lyræformibus, hirtis: pericarpio tomentoso.

E. nigrita. *Roxb. MS.*

Hujusce speciei diagnosi pulcherrima, antheris ante anthesin tot lyras referentibus.

Salax,

E. foliis lucidis; calyce adpresso: corollâ $1\frac{2}{3}$ lineari: filamentis brevissimis: pericarpio lævi: stigmate lato.

E. ramosissima. *Roxb. MS.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, montibus, legit F. Masson.

Facies *Volutæ floræ*, sed præter differentias supra datas, corollæ lacinia in hac, ni fallor, basi distinctæ.

Gnidiaefolia,

E. foliorum laminis lineari-lanceolatis, pubescentulis: calyce late obcuneato: corollâ 2-lineari: calcaribus auricularibus.

E. vespertina. *Linn. Suppl. p. 221.* *E. calycina*. *Thunb. Diff. n. 78.* *E. calycina*. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 507.*

Cumuliflora,

E. fasciculis 7—12-floris: calyce incano: corollâ $2\frac{1}{2}$ -lineari; limbo inferne ciliato: pericarpio hirtio: stigmate angusto.

E. aggregata. *Roxb. MS.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.

E. fasciculis

E. fasciculis 3-floris: calyce viscido: corollâ 2-lineari; *Genistæfolia*, limbo inferne ciliato: pericarpio lævi: stigmate lato.

E. tetraloba. *Roxb. MS.*

Species ab antecedente penitus distincta; huic femina lævia, minute alveolata; illi lucida, æquata.

E. foliorum laminis lanceolato-cuneatis: pedunculis *Periplocæflora*, longis: calyce brevi, orbiculari: corollâ $1\frac{1}{2}$ —2-lineari: stigmate angusto.

Communicavit *Hibbert*.

Flores in siccis saturate purpurei. Filamenta sæpius calcaribus brevibus cuneatis armata, interdum vero prorsus mutica.

E. calyce minute ciliato, lucido: corollâ 1-lineari: *Lucida*, calcaribus auricularibus, inciso-ferratis: stigmate angusto, incluso.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.

E. bracteis calyceque integerrimis: corollâ 1-lineari: *Munda*, calcaribus auricularibus, ciliatis: pericarpio hirsuto.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

Specimen nostrum imperfectum est, ante explicationem florum lectum.

E. calyce patente, margine exquisitè glanduloso: corollâ 1-lineari, calyce vix longiore: pericarpio lævi: stigmate grandi 4-fido. *Gnaphaliiflora*,

E. gnaphalodes. *Thunb. Diff. n. 75.* *E. gnaphalodes*. *Linn. Diff. n. 25. cum fig. floris*, pessimâ. *E. gnaphalodes*. *Berg. Pl. Cap. p. 119.*

- Fabrilis*; E. foliis dense imbricatis: corollâ 1-lineari, calyce vix longiore: calcaribus integerrimis: antheris minutis, pene didymis.
Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Maffon.
Herba recta, quasi Fabri manu artificiose imposita.
- Dianthifolia*; E. foliis 2-nis, longis: calyce ovato-cuneato: corollâ 3-lineari: calcaribus ferratis: pericarpio glabro.
Communicavit *Hibbert*.
Flores pallidissime purpurei.
- Brevifolia*, E. foliorum laminis ovatis: corollâ $1\frac{2}{3}$ -lineari, calyce $\frac{1}{2}$ longiore: calcaribus lineari-attenuatis: feminibus striatis.
E. brevifolia. *Soland. MS.*
Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Maffon.
- Chlamydisflora*, E. foliorum laminis linearibus, hirsutis; corollâ 2-lineari, calyce vix longiore: calcaribus auricularibus: feminibus æquatis.
E. viscaria. *Roxb. MS.*
Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Maffon.
Calycis foliola fere distincta, erecto-recurva.
- Selaginifolia*. E. caule tomentoso: corollâ $1\frac{2}{3}$ -lineari, lævi: tubo globofo: calcaribus latissimis, orbicularibus.
Sponte nascentem in *Lange Kloof*, legit G. Paterson:
Omnium specierum, quas detexerunt *Roxburgh*, *Paterson*, *Maffon*, largo suo more copiam mihi fecit, summum nostræ ætatis decus, *Banks*.

E. foliorum

E. foliorum laminis parum reduplicatis: corollâ 2-lineari, lanatâ: filamentis latis, breviter calcaratis: stylo exserto. *Pannosa.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.
Affinitatem nescio: confer cum *Byssinâ*, sed folia videntur 4-na et antheræ diversissimæ.

E. bracteis calyceque pilosissimis: corollâ 2-lineari, hirtâ, 4—5-andrâ: filamentis apice latissimis, muticis. *Hirsuta,*

E. hirsuta. Thunb. Prodr. p. 72.

E. foliis 4-nis, minutis: calyce pilosissimo: corollâ 1½-lineari, hirtâ, 4—5-andrâ: filamentis calcaratis. *Plumosa,*

E. plumosa. Thunb. Prodr. p. 73. Blæria ciliaris. Linn. Suppl. p. 122.

Nomen pessimum est, verum ex frustulo nostro aliud aptum excogitare nequeo.

E. foliis 3-nis, minutis: calyce pilosissimo, bracteis distincto: corollâ 1½-lineari, hirtâ, 4-andrâ: filamentis muticis. *Ciliciflora,*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.
Antheræ pene didymæ, valde barbatae.

E. foliis 3-nis: laminis valde incurvis: calyce lanato, imbricato: corollâ 1¾-lineari, lanatâ, 4-andrâ. *Xeranthemifolia,*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, solo arido, legit F. Masson.

Facies diversissimi generis.

- Nodiflora*, E. foliis 3-nis: calyce infundibuliformi, villosissimo: corollâ $1\frac{1}{2}$ -lineari, hirtâ, 4-andrâ: antheris breviter foraminosis.
Communicavit *Hibbert*.
Folia villosa, nec lanata.
- Flosculosa*, E. calyce fimbriato: corollâ $\frac{3}{4}$ -lineari; tubo angustissimo, superne repente dilatato; 4-andrâ: filamentis angustissimis.
Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.
Corolla refert flosculum disci in Ordine Naturali Compositarum.
- Exilis*, E. foliis 4-nis: calyce infundibuliformi, glabro: corollâ $\frac{3}{4}$ -lineari, glabrâ, 4-andrâ: filamentis muticis.
E. scabra. *Thunb. Prodr. p. 72*.
Inflorescentiam non rite intelligo, specimen enim unicum dilacerare nolui: videtur axillaris bracteis duabus in pedunculo brevissimo.
- Labialis*, E. foliis 3-nis; laminis glabris: calyce 2-labiato, fimbriato: corollâ $1\frac{1}{3}$ -lineari, 2-labiata, 4—5-andrâ.
Blæria labiata. *Soland. MS*.
Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.
- Embolifera*, E. bracteis solitariis: calyce infundibuliformi, quadrangulo: corollâ 2-lineari, 4-andrâ: calcaribus recte deflexis.
E. glabella. *Thunb. [Prodr. p. 73]*. Blæria pusilla. *Linn. Mant. p. 39*. auctoritate ejus speciminis. Blæria purpurea. *Berg. Pl. Cap. p. 34*.
Folia,

Folia, in numerosissimis quæ vidi, tam cultis, quam indigenis exemplaribus, sunt hirsuta. Inflorescentia, ut in aliis hujusce cohortis est spica fasciculum mentiens, pedunculis brevissimis verticillatis, bractea loco folii singulis subjecta.

E. foliorum laminis fimbriatis, subtus glabris: corollâ *Dumosa*,
 $1\frac{1}{3}$ -lineari, 4—5-andrâ: calcaribus recte exstantibus.

E. Blæria. *Thunb. Prodr. p. 72.* Blæria ericoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 162.*

E. calyce bracteis imbricato, profunde 4-fido, barbato: *Barbigera*,
 corollâ 2-lineari, glabrâ, 4—5-andrâ: filamentis muticis: stylo angustissimo.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

E. bracteis solitariis: calyce infundibuliformi, toto hirsuto: corollâ $1\frac{1}{2}$ -lineari, 4—5-andrâ: filamentis muticis. *Paleacea*,

E. articulata. *Thunb. Prodr. p. 71.* Blæria articulata. *Linn. Mant. p. 198.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

Herba valde ludit; foliorum verticillis nunc distinctis quasi caulis articulatus esset, nunc approximatis; laminis nunc brevibus, nunc longis et linearibus.

E. foliis longis: bracteis juxta calycem, exteriori longissimâ: corollâ $1\frac{1}{2}$ -lineari, 6-andrâ: filamentis calcaratis. *Bruniæfolia*,

E. hemisphærica. *Soland. MS.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

E. pedunculis

- Turmalis*, *E. pedunculis brevissimis*: calyce minuto, adpresso: corollâ 2-lineari, 4—5-andrâ: filamentis muticis: antheris latis.
Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.
Facies antecedentis, sed penitus distincta, calyce triplo minore.
- Equisetifolia*, *E. foliis 3-nis*: fasciculis 3—5-floris: pedunculis longis, glabris: corollâ $1\frac{1}{2}$ -lineari, 4—5-andra: filamentis muticis.
E. articularis. Hortulanis.
Herba ut in *Imbelli*, sed etiam gracilior.
- Sertiflora*, *E. calyce anguste cuneato*: corollâ $1\frac{1}{3}$ -lineari; tubo urceolari: antheris totis exsertis: pericarpio lævi.
E. nudiflora. Smith Pl. Ic. ined. n. 57! E. nudiflora. Linn. Mant. p. 229.
Sponte nascentem in *Taffelberg*, legit G. Paterson.
Bractææ, minutæ quidem, pro certo adfunt in exemplare Linnæano!
- Diotæflora*. *E. calyce late cuneato*: corollâ $1\frac{1}{2}$ -lineari; tubo amphoræformi: antheris parum exsertis: pericarpio pubescente.
E. pistillaris. Soland. MS.
Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.
Flores in rudimentis ramulorum axillaribus.
- Flexilis*. *E. pedunculis viscidis, axillaribus*: corollâ $1\frac{1}{2}$ -lineari; tubo ovato: filamentis muticis: pericarpio lanato.

E. racemosa.

E. racemosa. *Thunb. Diff. n. 47. cum Ic.*

Inflorescentia in axillis simplex, nec racemosa.

E. foliorum laminis argute reduplicatis : corollâ $2\frac{1}{3}$ -lineari; tubo pyramidalis : antheris a medio foraminosis. *Saxatilis,*

E. carnea. Curt. Bot. Mag. n. 11. cum Ic. mediocri. E. carnea. Jacq. Fl. Austr. v. 1. p. 21. f. 31. E. carnea. Scop. Fl. Carn. ed. 2. v. 1. p. 275. E. purpurascens. Linn. Diff. n. 55. E. herbacea. Linn. Diff. n. 57. cum fig. floris. E. foliis, &c. Hall. Hist. Helv. n. 1013. E. herbacea. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 501. E. carnea. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 504. E. purpurascens. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 503. exclusis omnibus synonymis præter sequens. E. procumbens foliis in summitate, &c. Seg. Ver. v. 2. p. 280. auctoritate speciminis a Fabroni, cui folia 5-na. E. procumbens, ternis foliis, carnea. C. Baub. Pin. p. 486. E. procumbens herbacea. C. Baub. Pin. p. 486. E. coris folio vii. viii. ix. Clus. Hist. Pl. lib. 1. p. 46.

Foliorum numerus certe ludit, adeo ut non amplius dubitaverim omnia supra citare synonyma.

E. foliorum laminis anguste cuneatis; floribus secundis; corollâ 1½—2-lineari; tubo urceolari : antheris ab infra medium foraminosis. *Lugubris,*

E. mediterranea. Curt. Bot. Mag. n. 471. cum Ic. E. mediterranea. Linn. Mant. p. 229. E. mediterranea. Linn. Diff. n. 59. cum fig. floris. E. major florib. &c. C. Baub. Pin. p. 485. E. coris folio 111. Clus. Hist. Pl. lib. 1. p. 42.

A saturo colore foliorum jamdudum distinxit *Clusius*.

E. foliorum

- Multiflora*, E. foliorum laminis linearibus : corollâ $1\frac{1}{2}$ —2-lineari ; tubo urceolari : antheris juxta apicem foraminosis.
 E. multiflora. *Linn. Diff. n.* 58. *cum fig. floris.* E. multiflora. *Linn. Sp. Pl. ed.* 1. p. 355. E. juniperifolia, &c. *Garid. Pl. Aix. p.* 16c. t. 32. E. foliis corios multiflora. *I. Baub. Hist. Pl. lib.* 10. p. 356. E. coris folio altera. 2. quæ Narb. &c. *Clus. Hist. Pl. lib.* 1. p. 42. E. juniperifol. &c. *Lob. Obs. p.* 620.
 Flores quoquoversi, pedunculis longiusculis.

- Manipuliflora*, E. caule incano : floribus in axillis interruptis : corollâ $1\frac{1}{2}$ -lineari ; tubo cyathiformi : antheris in sertum erectis.
 E. verticillata. *Forsk. Fl. p.* 210.
 Juxta *Bujuchtar* a se lectam misit amicissimus Sibthorpe.

- Vaga*. E. caule glabro : floribus in axillis contiguis : corollâ $1\frac{1}{3}$ -lineari ; tubo cyathiformi : antheris in sertum erectis.
 E. vagans. *Smith in Engl. Bot. n.* 3. *cum Ic.* E. multiflora. *Bulliard Fl. Par. t.* 203. E. didyma. *Stokes in With. Arr. ed.* 2. p. 400. E. purpurascens. *Lamarck in Encycl. Bot. v.* 1. p. 488. E. vagans. *Linn. Mant. p.* 230. E. vagans. *Linn. Diff. n.* 56. *cum fig. floris.*
 E. foliis corios multiflora. *Ray Syn. ed.* 3. p. 471.
 E. procumbens dilute purpurea. *C. Baub. Pin. p.* 486.
 Antheræ non revera didymæ.

- Lentiformis*. E. bracteis calyci adpressis : corollâ $1\frac{1}{2}$ -lineari ; tubo lentiformi, basi 8-angulo : antheris juxta apicem foraminosis.

E. umbellata.

E. umbellata. *Pl. Kew.* t. 5. *E. umbellata*. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 501.* *E. umbellata*. *Loest. Res. p. 138.*
E. coris folio v. *Clus. Hist. Pl. lib. 1. p. 43.*

Flores ramis ultra folia productis terminales, nec umbellati.

E. foliis 3—4-nis: corollâ 2-lineari, viscidâ; tubo ovato: antheris latis, exsertis, hirtis: pericarpio turbinato, hirtis. *Pudibunda.*

E. nutans. *Wendl. Er. fasc. 3. p. 5. cum Ic.*

Hanc unice omnium quas proposui *Ericarum*, non vidi: icones autem a *Wendland*, si rudes, fidelissimæ.

E. bracteis juxta calycem: corollâ 1-lineari, glabrâ; limbo recurvo: antheris longe foraminosis: stigmate angusto. *Filiformis*;

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder. Caulis tenuis, diffusus. Folia 3-na, verticillis remotis: Laminæ angustæ, recurvæ, viscido-pubescentes. Flores terminales. Filamenta ad apicem lata. Pericarpium læve.

E. pedunculis brevissimis: corollâ $1\frac{1}{2}$ -lineari, hirtâ; tubo modiali: calcaribus cuneatis: antheris brevissimis. *Turgida.*

E. fusco-rubens. *Roxb. MS.*

E. calyce bracteis remoto, cuneato, longitudine mire vario: corollâ 4—7-lineari, lævi; tubo ovato-pyramidali. *Fusiformis*;

Variat α : Calyx $1\frac{1}{3}$ -linearis. Corolla punicea, 6—7-linearis.

E. Pluknetii. *Linn. Sp. Pl. ed. 1. p. 356.*

β : Calyx $2\frac{1}{2}$ —3-linearis. Corolla punicea, 6—7-linearis.

E. Pluknetiana. *Pl. Kew. t. 9. optima.*

E. Pluknetii. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 506.*
exclusis synonymis.

γ : Calyx 1-linearis. Corolla albida, $3-3\frac{1}{2}$ -linearis.

E. Petiverii β . *Thunb. Diff. n. 21.*

δ : Calyx $2\frac{1}{2}$ -linearis. Corolla albida $3-3\frac{1}{2}$ -linearis.

In nostro horto, cæteris elatior.

ϵ : Calyx 5-linearis. Corolla albida, 5-linearis.

Postrema varietas maxime insignis est.

Fragilis;

E. foliorum laminis acute mucronatis: corollâ 7—9-linearis; limbo recurvo-horizontali: pericarpio barbato.

E. Banksia. *Andr. Er. n. 26. cum Ic.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, locis rupestribus, legit F. Maffon.

Vestiflua,

E. foliorum laminis incurvo-patentibus, junioribus pilosis: floribus solitariis: corollâ 7—9-linearis; tubo cylindræo.

E. Petiveriana. *Roxb. MS.*

Corolla rufa.

Baculiflora,

E. foliorum laminis recurvo-patentibus: floribus solitariis:

litariis : corollâ 6—8-lineari ; tubo cylindraceo : pericarpio ovato.

Variat α : Corolla lutea.

E. Petiveri. *Linn. Mant. p. 235.* E. Petiveri.

Linn. Diff. n. 50. cum fig. floris.

β : Corolla fordide rufa.

E. Petiverii α . *Thunb. Diff. n. 21.*

Limbus Corollæ obtusus, et instar affinium crenulatus in ipso specimine Linnæano.

E. foliorum laminis recurvo-patentibus ; corollâ 7—9-lineari ; tubo cylindraceo basi ventricosâ : pericarpio ovali. *Cothurnalis,*

Variat α : Bractææ et Calyx glabriusculæ.

E. Sebana. *Pl. Kew. t. 10. optima.* E. coccinea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 505.* E. africana, &c. *Seb. Thes. v. 1. p. 32. t. 21. f. 4.*

β : Bractææ et Calyx pubescentes.

E. Pluknetii. *Berg. Pl. Cap. p. 92.*

Corolla in utraque læte rufa, et demum 4-angula.

E. foliorum laminis recurvo-patentibus : corollâ 4—6-lineari ; tubo ovato-pyramidali : pericarpio ovato. *Socciflora.*

Variat α : Corolla lutea.

E. Sebana viridis. *Andr. Er. n. 59. cum Ic. bonâ.*

β : Corolla fordide rufa.

E. Sebana fordida. *Hortulanis.*

γ : Corolla læte punicea.

E. Petiveri. Hortulanis.

Limites, quibus stirpes sub hoc et tribus præcedentibus titulis traditas distinguerem, vix inveni: omnes forsitan rectius conjungendæ.

Furfurosa, *E. foliorum laminis incurvo-patentibus: corollâ 4—6-lineari, viscidâ: filamentis latis: nectario cotyliformi.*
E. monodelphia! Andr. Er. n. 22. cum Ic.
 Filamenta forte latissima hujus generis.

Follicularis, *E. foliorum laminis patentibus: floribus solitariis: corollâ 5—7-lineari, basi inflatâ; nectario plinthiformi.*

Variat α : Corollæ limbus mox ferrugineus.

E. Petiveriana. Andr. Er. n. 25. cum Ic. bonâ.

β : Corollæ Limbus mox atrobadius.

E. melastoma. Andr. Er. n. 43. cum Ic.

Folia penultima ultimaque basi nonnihil dilatata.

Penicilliflora. *E. corollâ 2-lineari, calyce obductâ; tubo sphaerico: antheris in penicillum acutum convergentibus.*

E. Petiveri vera! Hortulanis.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.

Pulchra species, bracteis calyceque niveis.

Placentæflora, *E. foliis obtusissimis: corollâ calyce obductâ: tubo rapæformi: filamentis sensim dilatatis: stigmate angusto.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.
 Herba pallidissime incana.

E. calyce

E. calyce bracteis imbricato: corollâ 1-lineari, longitudine calycis: antheris angustis, longis: pericarpio late gigartoideo. *Pyramidalis,*

E. imbricata. Linn. Mant. p. 372. E. imbricata. Linn. Diff. n. 53. cum fig. floris. E. quinquangularis. Berg. Pl. Cap. p. 117. E. imbricata. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 503.

E. bracteis supra medium pedunculi sparsulis: corollâ $\frac{2}{3}$ -lineari, calyce brevior: antheris acuminulatis: pericarpio late ovato. *Squamæflora,*

E. imbricata. Roxb. MS.

Sponte nascentem prope *Baay Fals*, legit I. Mulder.

E. calyce bracteis imbricato: corollâ $\frac{2}{3}$ -lineari, calyce brevior: antheris obtusis, septo lato: pericarpio ovato. *Cæsia,*

Communicavit *Thunberg*.

Stigma latiusculum, quod in antecedente angustum.

E. bracteis supra medium pedunculi sparsulis: corollâ 1-lineari, calyce longior: antheris obtusis septo angusto: nectario grandi. *Flexuosa,*

E. flexuosa. Andr. Er. n. 33. cum Ic.

Sponte nascentem juxta *Duyvelsberg* abunde, legit I. Mulder.

Pericarpium in hac turbinatum.

E. calyce bracteis imbricato: corollâ $\frac{2}{3}$ -lineari, calyce *Lasciva,*

parum

parum brevior : antheris a basi foraminosis : stigmate peltato.

E. imbricata. *Thunb. Diff. n. 11.* auctoritate ejus specimenis.

Facile dignoscas, Antheris longe foraminosis.

Stylosa;

E. pedunculis longis : bracteis juxta calycem sparsulis : corollâ 1-lineari, calyce parum longiore : antheris acuminulatis : pericarpio ovali.

E. bracteata. *Roxb. MS.*

Stylus longissimus.

Spirææflora ; *E. pedunculis glabris* : corollâ 1—1½-lineari ; limbo longitudine tubi, integerrimo : antheris juxta apicem foraminosis.

E. leucanthera. *Linn. Suppl. p. 223.*

Variat caule vix pubescente, et magnitudine florum.

Milleflora.

E. caule tomentoso : corollâ $\frac{2}{3}$ -lineari ; laciniis basi imbricatis : calcaribus linearibus, lævibus : stigmate exserto.

E. milleflora. *Berg. Pl. Cap. p. 96.* *E. paniculata*. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 508.*

Si quæ alia, legitima species : flores non paniculati, sed fasciculis trifloris terminalibus : a *Cyathiformi* stylo longe exserto dignoscenda.

Diosmæfolia.

E. foliis lucidis : corollâ 2-lineari ; laciniis imbricatis : filamentis angustissimis : calcaribus exquisite attenuatis, ferrulatis.

E. subferrata. *Roxb. MS.*

Sponte

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.
Folia latiora quam in plurimis.

E. caule angulato: foliorum laminis lanceolato-cuneatis: corollâ $1\frac{1}{3}$ -lineari, calyce parum longiore: calcaribus auricularibus, glabris. *Palliiflora*;

E. candida. *Soland. MS.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

E. foliorum laminis cuneatis: calyce obcuneato; corollâ $1\frac{3}{4}$ -lineari; tubo parum 4-angulo, turbinato: calcaribus anguste cuneatis. *Fugax*,

E. triflora aristata. *Wendl. Obs. p. 47.* *E.* triflora. *Thunb.*

Diff. n. 79. cum Ic. *E.* triflora. *Linn. Mant. p. 374.*

E. triflora. *Linn. Diff. n. 23. cum fig. floris.*

Hujus speciei florescentia citissime peragitur: non est triflora. *Linn. Sp. Pl.* quare nomen mutavi.

E. foliorum laminis cuneatis: calyce ovato-cuneato: corollâ 2-lineari; tubo valde 4-angulo, sphaerico: calcaribus late auricularibus. *Pyrolæflora*,

E. triflora. *Willd. Sp. Pl. v. 2. p. 356.* exclusis synonymis.

Sponte nascentem infra *Duyvelsberg*, legit I. Mulder.

Perfimilis antecedenti, sed accuratius inspecta valde differt; tubo corollæ apice intus sub sinibus limbi, in tot carinas canaliculatas, extremitate pilis aliquot minutis barbatas, prominente.

E. foliorum laminis ovalibus, pubescentibus: corollâ *Tegulæfolia*,
 $1\frac{1}{2}$ -lineari;

$1\frac{1}{2}$ -lineari; tubo parum 4-angulo, turbinato: calcaribus grandibus, orbicularibus.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

Folia lata, et ordine recto imbricata.

Baccæformis. E. caule angulato: foliis sæpius 4-nis: corollâ $2\frac{1}{3}$ -lineari; tubo valde 4-angulo, turbinato: calcaribus auricularibus.

E. baccans. *Curt. Bot. Mag. n.* 358. E. baccans. *Linn.*

Mant. p. 233. E. africana glabra fruticosa arbuti flore. *Seb. Thes. v.* 1. *p.* 32. *t.* 21. *f.* 3.

Folia interdum terna: quamobrem Corifoliam *Linn. Sp. Pl. ed.* 1 et 2. ad hanc quoque pertinere suspicor.

Modesta: E. foliis parvis, dense imbricatis: corollâ $3\frac{1}{2}$ -lineari, tomentosâ; tubo late ovato; limbo recurvo: calcaribus lineari-attenuatis.

Communicavit *Hibbert*.

Flores pallidissime carnei.

Holofericea: E. foliorum laminis argute reduplicatis: corollâ 3-lineari, holofericeâ: tubo ovato: antheris hirtis.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

Species pulcherrima, ab omnibus huc usque cognitis corollâ suâ holofericea facile dignoscenda. Primo intuitu *Taxifoliæ* affinem esse putavi, longe autem differt, cum inflorescentiâ, tum numero bractearum.

Glaucæ: E. foliis glaucis, succulentulis: corollâ 3-lineari, extus rorida: calcaribus suborbicularibus.

E. glauca. *Andr. Er. n. 47. cum Ic.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.
Caulis 3-pedalis, teres. Folia 3-na, pene Sedi Reflexi
Linn. laminis tamen subtus pubescentibus. Flores
terminales. Pedunculi longi, una cum bracteis, calyce
et corollâ omnes livido-purpurei. Stigma inclusum.

E. foliorum laminis lineari-attenuatis ovatisque: calyce recurvo-patente: corollâ 7—9-lineari: pericarpio globofo, 4-angulo. *Variifolia.*

E. Monsoniæ. *Pl. Kew. t. 7.* *E. Monsoniana.* *Thunb. Diff. n. 52. cum Ic.* *E. Monsonia.* *Linn. Suppl. p. 223.*

E. calyce adpresso: corollâ 7—8-lineari; limbo pyramidali, convoluto apice recurvulo: pericarpio hemisphærico. *Rupestris.*

E. halicacaba. *Pl. Kew. t. 2.* *E. halicacaba.* *Thunb. Diff. n. 51. auctoritate ejus speciminis.* *E. halicacaba.* *Linn. Diff. n. 3. cum fig. floris.* *E. halicacaba.* *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 507.* *E. halicacaba.* *Linn. Amæn. Acad. v. 5. p. 85.*

Sponte nascentem in *Taffelberg, Steenberg*, locis rupestribus, legit F. Masson.

E. calyce incurvo erecto: corollâ 8—10-lineari; tubo plus minus costato: filamentis muticis, basi dilatatis. *Verficolor,*
Variat α: Folia viridia. Corolla coccinea: tubo parum costato. Antheræ basi recte emarginatæ.

E. verficolor. *Andr. Er. n. 12. cum Ic.*

β : Folia viridia. Corolla faturate coccinea: tubo parum costato. Antheræ basi sursum obliquæ.

Communicavit G. Aiton, princeps hortulanorum.

γ : Folia cæsia. Corolla faturate coccinea: tubo parum costato. Antheræ basi sursum obliquæ.

E. discolor coccinea. *Hortulanis*.

δ : Folia cæsia. Corolla rosea: tubo valde costato. Antheræ basi deorsum obliquæ.

E. costata. *Andr. Er. n. 46. cum Ic.*

Multas alias varietates nunc describere supersedeo.

Decora,

E. calyce plano marginibus crassis: corollâ 8—10-lineari, viscido-pubescente; tubo clavato: calcaribus longis, pubescentibus.

E. Eweri. *Hortulanis*.

Flores pulcherrime roseo-virides.

Cupressiformis,

E. calyce adpresso: corollâ 9—11-lineari, glutine illitâ; tubo tenuissime striato: calcaribus brevibus, glabris.

E. discolor. *Andr. Er. n. 3. cum Ic. malâ.*

Dignoscas ab omnibus varietatibus *Versicoloris*, filamentis angustioribus, et calcaratis.

Melliflua.

E. bracteâ infimâ juxta basin pedunculi: corollâ 9—12-lineari, lucidâ; tubo clavato, plus minus compresso: pericarpio ovato.

Variat

Variat α : Calyx valde ferratus. Corolla cruenta.

E. cruenta. *Pl. Kew. t. 13. optima.*

β : Calyx parum ferratus. Corolla punicea.

E. cruenta. *Andr. Er. n. 17. cum Ic.* E. cruenta. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 16.*

Posterior varietas est longe pulchrior, et robustior.

E. caule humifuso: foliis obtusis: corollâ 9—11-lineari, extus rorulentâ; tubo clavato, compresso: calcaribus longis. *Nana,*

E. depressa. *Hortulanis.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, locis rupestribus, legit F. Masson.

Floret Octobri, Novembri.

Perfingularis est hæc Erica, flores grandes luteos cauli humillimo jungens.

E. foliis densissimis: calyce longe cuspidato: corollâ 6—8-lineari, glabrâ; tubo cylindræo: calcaribus longis. *Spissifolia,*

E. Patterfonia. *Wendl. Er. fasc. 1. p. 15. cum Ic.* E. Patterfonia. *Andr. Er. n. 7. cum Ic. bonâ.* E. abietina. *Linn. Diff. n. 20. cum fig. floris.* E. abietina. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 506.*

Sponte nascentem juxta *Cap Fals*, legit G. Paterfon.

E. calyce late ovato, acuminulato: corollâ 6—8-lineari, glabrâ; tubo cylindræo: calcaribus longis: antheris linearibus, valde papulosis. *Sacciflora,*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

Cylindriflora. E. foliis ciliatis fetis decompositis: calyce recurvulo: corollâ 9-lineari, glabrâ: tubo cylindraceo: calcaribus brevibus.

E. ferratifolia. *Andr. Er. n. 36. cum Ic.*

Filamenta in nostris exemplaribus nunquam mutica.

Paludosa, E. corollâ 7—9-lineari, pubescente, tubo parum clavato: antheris basi rostratis: pericarpio apice cotyligero.

E. abietina. *Andr. Er. n. 64. cum Ic.* E. concinna. *Schneev. Ic. n. 31.* E. concinna. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 23.* E. verticillata. *Berg. Pl. Cap. p. 99.* E. africana erecta, paludosa, &c. *Herm. Cat. Pl. Afr.*

Nomen antiquum, et hortulano utilissimum, restitui.

Lituiflora: E. calyce obovato: corollâ 6—8-lineari, pubescente; tubo valde clavato: filamentis dorso apicis barbatis.

E. perspicua. *Wendl. Er. fasc. 1. p. 7. cum Ic.* E. Linnæi! *Hortulanis.*

Pericarpium in hac, et antecedente, 6—8-loculare.

Obpyramidalis, E. corollâ $3\frac{1}{2}$ —4-lineari, pubescente; tubo infundibuliformi; limbi interstitiis extrorsum tumidis: pericarpio sphaerico.

E. pyramidalis. *Curt. Bot. Mag. n. 366. cum Ic.* E. pyramidalis. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p. 401.*

Sponte nascentem juxta *Zwart Rivier*, locis humidis, legit F. Masson.

Ad stirpem vix naturalem, suum nomen proposuit Solander,

lander, rami enim debiles, et penduli sunt: itaque a tubo corollæ *Obpyramidalem* dixi.

E. caule tenui: corollâ $2\frac{1}{2}$ —3-lineari, pubescente: tubo *Cyrillæflora*; anguste campanulato; limbo brevi: filamentis muticis.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, locis humidis, legit I. Mulder.

Flores pallide coccinei.

E. corollâ $2\frac{1}{2}$ —3-lineari, pubescente; tubo obovato; Velitaris. limbo recurvo-patente: calcaribus longis, argute cuneatis, parum ferratis.

E. glabra. Roxb. MS.

Nomen nostrum a foliis perangustis, Velitum jacula referentibus, petium.

E. calyce ovato-cuneato: corollâ 7—8-lineari, pubescente; tubo cylindraceo-urceolari; limbo revoluta; Culcitæflora, pericarpio obpyramidali.

E. spuria. And. Er. n. 46. cum Ic.

Facies *Tubifloræ*, cui certo proxima, sed nequaquam varietas. Filamenta evidenter calcarata, quæ mutica ostendit figura citata.

E. pedunculis glabris: calyce anguste lyrato: corollâ *Tubiflora*, 9—10-lineari, pubescente: limbi interstitiis basi lanceolatis.

Variat α : Corolla pallide carnea.

E. tubiflora.

E. tubiflora. Linn. *Diff.* n. 40. cum fig. floris.

E. tubiflora. Linn. *Sp. Pl.* ed. 2. p. 505.

β: Corolla læte carnea.

E. coccinea. Linn. *Diff.* n. 42. cum fig. floris.

E. foliis, &c. Linn. *Hort. Cliff.* p. 148. n. 10.

Antheræ in postremâ varietate longius foraminosæ.

Curviflora, *E. pedunculis* pubescentibus: calyce ovato-cuneato: corollâ 9-lineari, pubescente; limbi interstitiis basi lanceolatis.

E. simpliciflora. Willd. *Sp. Pl.* v. 2. p. 402. *E. curviflora*. Linn. *Syst. Veg.* ed. 13. p. 305. auctoritate ipsius speciminis.

Haud facile est hanc in herbariis a *Tubiflorâ* semper dignoscere, etsi facies viva multum abludat: foliorum laminæ autem in hac constanter lineari-attenuatæ, in illâ lineari-lanceolatæ: flores insuper rufi.

Cuspidigera, *E. pedunculis* glabris: calyce ovato-cuspidato: corollâ 11—12-lineari, pubescente; limbi interstitiis basi lanceolatis: antheris hirtis.

Sponte nascentem juxta *Berg Rivier*, legit I. Mulder.

Filamenta rare villosa.

Bibax, *E. calycis* foliolis imbricatis, inæqualibus: corollâ 8-lineari, pubescente; tubo valde clavato; laciniis basi imbricatis.

E. curviflora. Thunb. *Diff.* n. 30. *E. Flammea*. *Hortulanis*.

Sponte nascentem juxta *Palmit Rivier*, legit F. Masson.

E. pedunculis

E. pedunculis pubescentibus: corollâ 9—10-lineari, pubescente; limbo recurvo-patente: filamentis pubescentibus. *Buccinæformis,*

E. tubiflora. Thunb. Diff. n. 31.

E. pedunculis glabris: corollâ 10—11-lineari, glabrâ; limbo recurvo-patentissimo: pericarpio late turbinato. *Faustuosa,*

E. curviflora. Wendl. Er. fasc. 3. p. 7. cum Ic. E. curviflora. Andr. Er. n. 40. cum Ic. E. curviflora. Linn. Diff. n. 41. cum fig. floris, pessimâ.

Species in solo natali forsan procera, nam culta in quatuor annis jam quindecim-pedalis est.

E. foliorum laminis hirsutis: pedunculis glabris: corollâ 10—11-lineari, hirsutâ: antheris rectis, papulosis. *Stagnalis,*

E. tubiflora. Roxb. MS.

Herba tota hirsuta est: cæterum facies sequentis, floribus pariter flavis.

E. pedunculis pubescentibus: calyce incurvo-erecto basi extus concavâ: corollâ 15-lineari, pubescente; limbo retuso. *Conspicua,*

E. conspicua. Pl. Kew. t. 12. optima. E. conspicua. Andr. Er. n. 29. cum Ic. E. conspicua. Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 22.

Sponte nascentem prope *Stellenbosch*, legit F. Masson.

E. pedunculis glabris: calyce recurvo-patente basi extus convexâ: *Longiflora,*

convexâ: corollâ 18—20-lineari, pubescente; limbo obtuso.

E. elata. Hortulanis.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder. Herba, si probe observas, exquisite pulverulenta.

Verticillaris, E. ramis verticillatis, lanatis: calyce incurvo-patente basi extus concavâ: corollâ 9—11-lineari, rare lanatâ.

E. lanata. Wendl. Obs. p. 45?

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder. Flores saturate rufo-fulvi.

Floccosa. E. ramis sparsis, lanatis: floribus sæpius 1-riis: calyce adpresso basi extus convexâ: corollâ 12-lineari, rare lanatâ.

E. fordida. Andr. Er. n. 56. cum Ic. quæ revera titulo respondet. E. laniflora. Wendl. Er. fasc. 2. p. 23. cum Ic.

Affinis præ cæteris antecedenti: sed differt omnino Habitu, Tempore florendi, Foliorum laminis recurvis reclinativæ, Floribus sæpius tantum solitariis, Corollis latioribus limbo magis revolutis, Antherarum valvis basi sursum oblique emarginatis.

Radiiflora, E. petiolis angustissimis: corollâ 13-lineari, viscidâ; tubo cylindræo-urceolari apice ventricoso: calcariibus subulatis.

E. octophylla. Willd. Sp. Pl. v. 2. p. 372. E. fascicularis. Willd. Sp. Pl. v. 2. p. 372. E. fascicularis. Pl. Kew.

Pl. Kew. t. 6. *E. coronata. Andr. Er. n. 10. cum Ic.*
bonâ. E. octophylla. Thunb. Diff. n. 72. cum Ic.
E. fascicularis, Linn. Suppl. p. 219.

Sponte nascentem juxta *Hotientots Holland Kloof*, legit
 F. Masson.

E. foliis hirsutis: corollâ 10—11-lineari, viscidâ; tubo *Lycopodii-*
cylindraceo-urceolari apice ventricoso: pericarpio sti- *folia.*
pitato.

E. Massoni. Pl. Kew. t. 18. cæteris longe antecellente.
E. Massoni. Curt. Bot. Mag. n. 356. cum Ic. E. Mas-
sonia. Andr. Er. n. 9. cum Ic. E. Massoni. Linn.
Suppl. p. 219.

E. foliorum laminis recurvis, acutis: corollâ 13—15- *Pharetræ-*
lineari, viscidâ; tubo infundibuliformi; laciniis ova- *formis,*
to-cuneatis.

Variat α : Corolla aurantiaca.

E. exfurgens. Andr. Er. n. 13. cum Ic.

β : Corolla rutila.

E. abietina. Roxb. MS.

Dignoscas ab omnibus mihi visis, corollæ laciniis versus
 apicem attenuatis bifidulisque.

E. foliorum laminis reclinatis, obtusiusculis: corollâ *Grandiflora;*
12—14-lineari, viscidâ; tubo clavato: filamentis
exfertis.

E. grandiflora. Pl. Kew. t. 8. E. grandiflora. Curt.
Bot. Mag. n. 189. cum Ic. E. grandiflora. Thunb.

Diff. n. 28! auctoritate ejus speciminis. *E. grandiflora*. *Linn. Suppl. p. 223.*

Sponte nascentem juxta *Breede Rivier*, solo arenoso, legit F. Maffon.

Cerviciflora; *E. corollâ 5—6-lineari, pubescentulâ; tubo anguste urceolari; limbo patente: filamentis minute calcaratis.*

E. inaperta. Hortulanis.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.

Hæc species primâ vice adhuc parcius floruit, nec ejus inflorescentiam omnino intelligo, an revera hujus cohortis: bractææ autem certo tres in singulis pedunculis.

Pinifolia, *E. calycis foliolis imbricatis, longe cuspidatis: corollâ 6—7-lineari, glabrâ; tubo clavato: filamentis calcaratis: pericarpio lævi.*

E. pinea. Thunb. Diff. n. 26.

Sponte nascentem prope *Baay Fals*, legit G. Robertson.

Calamiformis, *E. calyce adpresso: corollâ 9—10-lineari, glabrâ; tubo cylindraceo-urceolari; limbo recurvo: pericarpio lævi.*

E. radiata. Andr. Er. n. 53. cum Ic.

Bractææ infra medium pedunculi.

Longifolia, *E. petiolis angustissimis: corollâ 9—11-lineari, pubescente; tubo plus minus clavato: filamentis sæpius muticis: pericarpio superne sericeo.*

Variat

Variat α : Corolla alba.

E. vestita alba. *Andr. Er. n. 20. cum Ic.* *E. vestita*. *Thunb. Diff. n. 25.*

β : Caulis coarctatus. Corolla alba.

E. pinifolia. *Hortulanis.*

γ : Caulis coarctatus. Corolla rubra.

E. pinifolia. *Roxb. MS.*

δ : Caulis valde crassus. Corolla pallidissime carnea.

E. longifolia. *Pl. Kew. t. 4. optima.*

ϵ : Corolla purpurea.

E. vestita purpurea. *Andr. Er. n. 8. cum Ic.*

ζ : Corolla coccinea.

E. vestita coccinea. *Andr. Er. n. 33. cum Ic.*

E. vestita coccinea. *Curt. Bot. Mag. n. 402. cum Ic.*

η : Caulis crassus. Corolla carnea.

E. pinea. *Andr. Er. n. 57. cum Ic.*

In foliis omnium est etiam quædam differentia.

E. calyce adpresso: corollâ 5—6-lineari, viscidâ; tubo *Costæflora,*
clavato, costato: antheris juxta apicem foraminosis.

E. Leea. *Andr. Er. n. 20. cum Ic. bonâ.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.

E. calyce apice recurvulo: corollâ 9—10-lineari, viscidâ; *Onosmæ-*
tubo clavato, costato: antheris a medio foraminosis. *flora,*

E. glutinosa. *Andr. Er. n. 31. cum Ic. bonâ.*

Flores fulphurei.

Pulviniformis,

E. foliorum laminis attenuatis, ferrulato-ciliatis: floribus in rudimentis ramorum longiusculis: corollâ 7—9-lineari, viscidâ; tubo cylindræo-urceolari.
 Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder. Faciem *Crinifoliæ* mire simulat, sed distinctissima est et inflorescentiâ, et filamentis, quæ prorsus mutica, atque instar sequentis pubescentia.

Frondeosa,

E. caule angulato: foliorum laminis attenuatis: calyce patulo: corollâ 9—10-lineari, viscidâ; tubo vix clavato.

E. coccinea. Wendl. Er. fasc. 3. p. 9. cum Ic. E. coccinea. Andr. Er. n. 41. cum Ic. E. coccinea. Thunb. Diff. n. 27. E. coccinea. Berg. Pl. Cap. p. 93. E. abietina. Linn. Sp. Pl. ed. 1. p. 355. E. foliis subulatis, &c. Linn. Hort. Cliff. p. 148. n. 9. auctoritate ipsius speciminis.

Sponte nascentem juxta *Baay Fals*, legit G. Paterfon.

Phylicæfolia,

E. caule tereti: foliorum laminis brevibus, parum attenuatis: calyce incurvo-erecto: corollâ 8—9-lineari, viscidâ; tubo vix clavato.

E. purpurea. Andr. Er. n. 4. cum Ic.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder. Diu hærebam animi dubius, an tantum pro varietate antecedentis proponerem: ob herbæ multas differentias, et calycem, tandem separavi.

Argutifolia.

E. foliorum laminis valde attenuatis, argute reduplicatis:

tis : corollâ 5—6-lineari, viscidâ ; tubo infundibuliformi.

E. pulchella. *Thunb. Diff. n. 24. cum Ic.*

Nescio quæ facies torva et scabra hanc ab affinibus primo intuitu distinguit.

E. pedunculis brevissimis : calyce calloso : foliolis rhombo-spatulatis, integerrimis : corollâ 5—9-lineari, rorulentâ.

Favosa,

Variat α : Corolla 7—9-linearis ; laciniis basi contiguis.

E. spicata. Wendl. Er. fasc. 2. p. 27. E. spicata. Thunb. Diff. n. 71. cum Ic. E. sessiliflora. Linn. Suppl. p. 222.

β : Corolla 5—7-linearis ; laciniis basi imbricatis.

E. spicata. Andr. Er. n. 6. cum Ic.

Inflorescentia e collatione affinium specierum tantummodo intelligenda, rudimentis ramulorum pedunculos simulantibus, veris pedunculis sane omnium brevissimis, aut nullis.

E. caule stricto : pedunculis brevissimis : calyce calloso, foliolis late spatulatis, inciso-ferratis : corollâ 7—10-lineari, rorulentâ.

*Sceptri-
formis,*

E. enneaphylla. Roxb. MS.

Foliorum numerus ultra 4-narium, in toto genere valde inconstans est.

E. pedunculis brevissimis : calycis foliolis orbiculato-

*Clavæflora,
spatulatis,*

spatulatis, integerrimis: corollâ 10—12-lineari, rorulentâ.

Communicavit *Hibbert*.

Herba ad amussim sequentis.

Alveiflora, E. pedunculis glabris: corollâ 7—9-lineari, rorulentâ; tubo cylindraceo-urceolari, inferne 4-angulo.

E. gelida. *Hortulanis*.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, solo humido, legit F. Masson.

Mammosa. E. pedunculis pubescentibus: corollâ 8—10-lineari, rorulentâ; tubo cylindraceo-urceolari, juxta basin 4-fosso.

Variat α : Corolla coccinea.

E. verticillata. *Willd. Sp. Pl. v. 2. p. 370.*

E. verticillata. *Andr. Er. n. 21. cum Ic.*

E. speciosa. *Schneev. Pl. n. 3. cum Ic.*

β : Corolla læte purpurea.

E. mammosa. *Andr. Er. n. 58. cum Ic.*

E. abietina. *Schneev. Pl. n. 23. cum Ic.* E. a-

bietina. *Thunb. Diff. n. 68. auctoritate ejus speciminis.* E. mammosa. *Linn. Mant.*

p. 234. E. mammosa. *Linn. Diff. n. 21.*

cum fig. floris. E. abietina. *Berg. Pl. Cap.*

p. 105. auctoritate ejus speciminis. E. fo-

lio Juniperi, &c. *Buxb. Cent. 4. p. 25.*

t. 41. 42. E. african. arborescens, &c.

Barth. Act. v. 2. p. 57. cum Ic.

γ : Corolla fordide purpurea.

E. abietina. *Willd. Sp. Pl. v. 2. p. 369.*

Hæ tres, et aliæ varietates, omnes ludunt stigmatibus interdum exsertis.

E. corollâ 6—8-lineari, utrinque hirsutâ; tubo curvo, pyramidali: antheris inclusis, longissimis. *Brachialis.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.
Herba Sexfariæ.

E. foliorum laminis lineari-attenuatis, fetis aspersis: calyce cuneato: corollâ 4—6-lineari, extus totâ fetosâ. *Hystri-*

E. Spaarmanni. Thunb. Diff. n. 33. E. Spaarmanni. Linn. Suppl. p. 219. E. Spaarmanni. Linn. in Act. Holm. 1778. p. 24. t. 2. *flora,*

Sponte nascentem juxta *Kromme Rivier*, legit A. Spaarman.

E. foliorum laminis ovato-cuneatis, breviter pectinatis: calyce cuneato: corollâ 6—7-lineari, extus versus apicem fetosâ. *Strigilifolia,*

E. transparens. Thunb. Prodr. p. 71. E. cerinthoides γ. Thunb. Diff. n. 33.

Filamenta in hac calcarata.

E. foliorum laminis anguste ovato-cuneatis, pectinatis: calyce rhombeo-spatulato: corollâ 5—7-lineari, intus lanatâ. *Pectini-*

E. cerinthoides β. Thunb. Diff. n. 33. *folia,*

Sponte nascentem in *Lange Kloof*, legit F. Masson.

E. foliorum laminis lineari-lanceolatis, pilosis: calyce cuneato: corollâ 8—10-lineari, extus viscido-pilosâ. *Grinifolia.*

E. cerinthoides. Andr. Er. n. 25. cum Ic. E. cerin-

thoides.

thoides. *Curt. Bot. Mag. n. 220. cum Ic.* *E. cerinthoides* α . *Thunb. Diff. n. 33.* *E. cerinthoides. Berg. Pl. Cap. p. 104.* *E. cerinthoides. Linn. Diff. n. 43. cum fig. floris.* *E. cerinthoides. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 505.* *E. coris folio, &c. Breyn. Cent. p. 25. t. 13.* *E. africana umbellata, &c. Barth. Aët. v. 2. p. 57.*

Ludit interdum una eademque stirps, corollis multo brevioribus, erectis, stigma longe exserto. Filamenta constanter calcarata sunt, nec mutica.

Cernua.

E. bracteis decurrentibus: calyce valde fimbriato: corollâ 2½-lineari; tubo globofo: calcaribus auricularibus.

E. cernua. Linn. Suppl. p. 222. E. cernua. Montin in Nov. Aët. Ups. v. 2. p. 291. t. 9. f. 3.

Sponte nascentem in *Koude Bockveldt*, legit F. Masson.

Doliiformis.

E. foliis hirsutis: bracteis juxta calycem: corollâ 4—5-lineari, viscidâ; tubo urceolari: calcaribus brevibus, cuneatis.

E. mammosa. Thunb. Diff. n. 69. cum fig. in ed. nostrâ. Nulla mihi cognitæ affinis, nisi forte *Pallidæ*.

Pistillaris.

E. pedunculis foliolis gemmaceis obsitis: corollâ 3-lineari, lævi; tubo curvulo, infundibuliformi; limbo recurvo.

E. australis. Linn. Mant. p. 231. E. coris folio 11. Clus. Hist. Pl. lib. 1. p. 42.

Semina ad hilum, appendiculam fungosam exferunt.

Ciliaris.

E. foliorum laminis ovatis; corollâ 4-lineari, lævi; tubo ovato-pyramidali latere superiore ventricosiore.

E. ciliaris.

E. ciliaris. *Curt. Bot. Mag. n. 484. cum Ic. bonâ.* *E. ciliaris*. *Linn. Diff. n. 39. cum fig. floris.* *E. ciliaris*. *Linn. Sp. Pl. ed. 1. p. 354.* *E. ciliaris*. *Loefl. Ref. p. 138.* *E. xii. Clus. Hist. Pl. lib. 1. p. 46.*

Folia terna sunt, at juxta sequentem in serie naturali, ni fallor, locanda est, ob corollæ similitudinem.

E. foliorum laminis ciliatis: calyce adpresso: corollâ 3-lineari, apice extus pubescente: calcaribus lanceolatis. *Botuliformis.*

E. Tetralix. Curt. Fl. Lond. fasc. 1. t. 21. bona. E. Tetralix. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 507.

E. foliorum laminis subtus bifulcis: calyce patente: corollâ 2½-lineari, lævi: calcaribus auricularibus. *Multicaulis.*

E. stricta. Willd. Sp. Pl. v. 2. p. 366.

Sponte nascentem in Inf. *Corfica*, legit G. Jones.

Caules undique diffusi, nequaquam stricti.

E. floribus caule nudo verticillatis: corollâ 3-lineari; tubo urceolari: calcaribus auricularibus. *Mutabilis.*

E. cinerea. Curt. Fl. Lond. fasc. 1. t. 25. bona. E. cinerea. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 501. E. cinerea. Loefl. Ref. p. 137.

Flores purpurei, mox cum primum marcescunt cærulei, ut descripsit Loefling.

E. caule glabro: foliorum laminis recurvis, attenuatis: corollâ 1¼-lineari, obovatâ: calcaribus longissimis. *Uncifolia.*

E. regerminans. Linn. Mant. p. 322.

Flores in rudimentis ramulorum axillaribus, nec racemosi: ad exemplar Linnæanum characterem concinnavi, nec in ullo alio herbario adhuc vidi.

Caduceifera. *E.* foliorum laminis cuneatis ovatifve: corollâ $\frac{2}{3}$ -lineari: filamentis juxta medium calcaratis.

E. pulchella. *Andr. Er. n.* 51. *cum Ic.* mediocri. *E.* articularis. *Thunb. Diff. n.* 58. *E.* pulchella. *Houtt. Nat. Hist. v.* 4. *p.* 504. *t.* 23. *f.* 1.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson. Hæc species, primum, veram insertionem calcarium *Ericarum* mihi docuit, cujus stamina Mercurii fabulosum caduceum lepide simulant: nempe in omnibus non ab antheris sed e filamentis ortum suum ducunt.

Empetrifolia, *E.* calyce tetraphyllo: corollâ-2-lineari, hirsutâ; tubo urceolari; limbo recurvo-patente: stigmate longe exserto.

E. empetrifolia. *Thunb. Diff. n.* 70. *E.* empetrifolia. *Linn. Mant. p.* 374. *E.* empetrifolia. *Linn. Diff. n.* 15. *cum fig. floris*, pessimâ.

Sponte nascentem juxta *Baay Fals*, legit F. Masson.

Molleolaris, *E.* calyce quadrifido: corollâ $1\frac{2}{3}$ -lineari, lævi; tubo urceolari; limbo recurvo-patentissimo: pericarpio hirsuto.

E. empetrifolia. *Schneev. Pl. n.* 17. *cum Ic.* *E.* empetrifolia. *Houtt. Nat. Hist. v.* 4. *p.* 517. *t.* 23. *f.* 2. *E.* empetrifolia. *Berg. Pl. Cap. p.* 120. auctoritate ejus speciminis.

Herba antecedentis, sed flores diversissimi.

E. calyce

E. calyce quadrifido: corollâ 2-lineari, lævi; tubo ob-
ovato; limbo incurvo-patente: pericarpio hemisphæ-
rico, glabro. *Pyxidiflora*,

E. empetroides. *Hortulanis*.

Flores odorem ceræ Apum spirant.

E. calyce tetraphyllo: corollâ 2-lineari, lævi; tubo
calathiformi; limbo recurvo-patente: stigmatibus in-
cluso. *Nolæflora*.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.
Pedunculi multo longiores quam affinium, floribus in
meâ stirpe cultâ ultra folia extantibus.

E. caule valde angulato: foliis 4-nis: corollâ $2\frac{1}{2}$ -lineari,
viscidâ; tubo anguste urceolari: filamentis muticis. *Festa*,
Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.
Flores fulvi: in cæteris hujusce cohortis mihi visis folia
semper 5—6-na.

E. corollâ 2-lineari, viscidâ; tubo urceolari, parum cos-
tato: filamentis longitudine tubi, calcaratis: peri-
carpio viscido. *Fallax*,

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.
Antheræ 2-partitæ, vix tamen revera didymæ.

E. corollâ 3-lineari, viscidâ; tubo urceolari, parum costa-
to: filamentis vix longitudine tubi, minute calcaratis. *Parilis*,
Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.
Habitus prioris, sed præter calycis foliola basi angusti-
ora, Antheræ duplo majores sunt, et calcaria fila-
menti apicem pene tota decurrunt.

Viscida.

E. corollâ 3-lineari, viscidâ; tubo cyathiformi, costato: filamentis brevissimis: pericarpio sericeo.

Variat α : *Folia incana, 1½—3 lineas longa.*

E. viscaria. Thunb. Diff. n. 40. E. viscaria.

Linn. Mant. p. 231. E. viscaria. Linn. Diff.

n. 46. cum fig. floris, pessimâ.

β : *Folia viridia, 3—5 lineas longa.*

E. viscaria. Andr. Er. n. 55. cum Ic. E. viscaria. Pl. Kew. t. 1. optima, partibus dissectis exceptis.

Facie admodum discrepant hæ varietates.

Catervæflora. E. caule angulato: corollâ 2-lineari, pubescente; tubo anguste obovato: antheris longe foraminosis.

E. pubescens 3. villosa. Thunb. Diff. n. 61.

Sponte nascentem in summitate Taffelberg, legit C. P. Thunberg.

Species legitima proculdubio, gravis enim est differentia caulis antherarumque.

Pubigera,

E. calyce patente, ovato-acuminato: corollâ 1½-lineari, pubescente; limbo longiusculo, recurvo: pericarpio hirto.

Communicavit Hibbert.

Facile dignoscas limbo corollæ longiusculo, recurvo, et penitus obtuso.

Mitræformis, E. foliorum laminis parum reduplicatis, fimbriatis: corollâ 1½-lineari, pubescente; limbo erecto: pericarpio glabro.

E. pubescens.

E. pubescens. *Andr. Er. n. 60. cum Ic.* *E. hirtiflora*.
Curt. in Bot. Mag. n. 481. cum Ic. optimâ. *E. pube-*
scens 2: hispida. Thunb. Diff. n. 61.

Folia aliquando sparsula, cæterum, ut in ipso specimine
 Thunbergiano, quaterna.

E. calyce adpresso, anguste ovato-cuneato: corollâ $1\frac{1}{3}$ - *Tardiflora,*
lineari, pubescente; limbo brevissimo, recurvo: pe-
ricarpio hirto.

E. pubescens. Curt. in Bot. Mag. n. 480. cum Ic. optimâ.
 Sponte nascentem juxta *Taffelberg*, legit F. Masson.

Hanc ab antecedente probe distinxit *Curtis*: differt
 enim caule graciliore; ramis floriferis multo brevi-
 oribus; foliorum laminis magis incurvis, lateribus
 valde reduplicatis, integerrimis; corollæ laciniis re-
 curvis, latius imbricatis; calcaribus angustioribus;
 antheris glabris, foraminibus brevioribus; denique
 feminibus scrobiculatis.

E. calyce adpresso, rhombeo-cuneato: corollâ $1\frac{1}{3}$ -line- *Parviflora,*
ari, pubescente; calcaribus auricularibus: pericarpio
glabro.

E. pubescens. Linn. Diff. n. 19. cum fig. floris. *E. pube-*
scens. Berg. Pl. Cap. p. 121. *E. parviflora. Linn. Sp.*
Pl. ed. 2. p. 506.

Folia quaterna, laminis valde reduplicatis.

E. calyce adpresso, ovato-acuminato: corollâ 1-li- *Exigua.*
neari, pubescente; tubo ovali; limbo brevissimo:
calcaribus lineari-attenuatis: pericarpio glabro.

E. pubescens 4 : parviflora. *Thunb. Diff. n. 61.*
Folia interdum terna, sæpius quaterna.

Pusilla.

E. calyce adpresso, late ovato-cuneato : corollâ $\frac{3}{4}$ -lineari, pubescente ; tubo calathiformi ; limbo longitudine tubi : pericarpio glabro.

Sponte nascentem prope *Baay Fals*, legit I. Mulder.

Non solum parvitate, sed etiam proportionem omnium partium floris, a cæteris hujus cohortis abludit.

Tragulifera ; E. calyce imbricato : corollâ $2\frac{1}{3}$ -lineari ; tubo urceolari ; limbo recurvo : calcaribus hirsutis : antheris latissime foraminosis, hirsutis.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

Guttæflora,

E. foliorum laminis lineari-attenuatis : corollâ 1— $2\frac{1}{2}$ -lineari ; laciniis apice guttâ illitis : calcaribus pubescentibus.

Variat α : Caulis fastigiatus. Corolla 1— $1\frac{1}{2}$ -linearis, tubo hemisphærico. Stigma longe exsertum.

E. lateralis. Willd. Sp. Pl. v. 2. p. 380.

β : Caulis demissus. Corolla 2-linearis, tubo late ovato. Stigma breviter exsertum.

E. incarnata. Andr. Er. n. 27. cum Ic.

γ : Caulis demissus. Corolla $2\frac{1}{2}$ -linearis, tubo ovato. Stigma breviter exsertum.

E. rubens humilis. Wendl. Er. fasc. 3. p. 13. cum Ic.

Flores non vere axillares, sed rudimentis ramulorum.

- E. foliorum laminis linearibus: calyce adpresso: corollâ $1\frac{1}{2}$ -lineari; tubo sphærico: calcaribus pubescentibus: stylo fursum curvo.* *Curvirostris,*
- E. declinata. Hortulanis.*
- Frutex humilis, vix pro varietate prioris habendus, Antheris nimium diversis. Flores gravem, et plane nauseosum odorem spargunt.
- E. pedunculis glabris: calyce incurvo-patente: corollâ $1\frac{3}{4}$ -lineari; tubo sphærico: calcaribus auricularibus, glabris.* *Obesa,*
- E. margaritacea. Andr. Er. n. 54. cum Ic. malâ. E. margaritacea. Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 20.*
- Sponte nascentem juxta *Stellenbosch*, legit F. Maffon.
- E. calyce minuto: corollâ $1\frac{1}{3}$ -lineari; tubo ovali; limbo recurvo: calcaribus lineari-attenuatis, hirtis.* *Gracilis,*
- E. imbecilla. Hortulanis.*
- Caulis quamvis gracilis recte attollitur, minime imbecillis.
- E. caule tenui: foliis verticillis remotis: corollâ $1\frac{1}{2}$ —2-lineari; tubo ovato-cylindræo, ore lato: pericarpio hirtio.* *Intervallaris,*
- E. elongata. Roxb. MS.*
- Species pulcherrima, ramulo fere omni floribus parvis, rubris, oblongis, nutantibus onusto.
- E. caule glabro: corollâ $1\frac{1}{4}$ -lineari; tubo poculiformi; limbo erecto: calcaribus lanceolato-cuneatis, integerimis.* *Quadræflora,*
- E. quadrangularis. Prodr. p. 297.* *Sponte*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.
Flores inconspicui, sed in vasto genere distinctissimi.

Prolifera,

E. caule hirsuto: corollâ $1\frac{1}{2}$ -lineari; tubo cyathiformi;
limbi interstitiis acutis: calcaribus rectis: pericarpio
hirsuto.

E. caffra. *Andr. Er. n.* 50. *cum Ic.* *E. strigosa*. *Wendl. Er. fasc.* 2. *p.* 25. *cum Ic.* *E. strigosa*. *Willd. Sp. Pl.* v. 2. *p.* 365. synonymo et descriptione exclusis.
E. persoluta 2. *Thunb. Diff. n.* 62. *E. persoluta*.
Linn. Mant. p. 230. *E. persoluta*. *Linn. Diff. n.* 16.
cum fig. floris. *E. subdivaricata*. *Berg. Pl. Cap.* *p.* 114.

Florescentiâ peractâ, rami plerumque e centro florum
ultra producuntur.

Cyathiformis,

E. pedunculis glabris: corollâ $1\frac{1}{2}$ -lineari; tubo cyathi-
formi; limbi interstitiis acutis: calcaribus falcatis.

E. lævis. *Hortulanis*.

Valde affinis sequenti, antheris pene ad amussim re-
spondentibus: ob limbi interstitia tamen ægre varieta-
tem esse concedam.

Pelviformis.

E. pedunculis rare pubescentibus: corollâ $1\frac{1}{2}$ -lineari;
tubo pelviformi; limbi interstitiis basi ovalibus: cal-
caribus falcatis.

E. persoluta. *Curt. in Bot. Mag. n.* 342. *E. persoluta* 1.
Thunb. Diff. n. 62. *E. viridi-purpurea*. *Linn. Diff.*
n. 9. *cum fig. floris.* auctoritate ipsius speciminis.
E. mauritanica. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *p.* 1002.

Variat floribus albis, purpureis.

E. foliis

E. foliis angustis: calyce recurvo-horizontali: corollâ 2-lineari; tubo hemisphærico; laciniis basi imbricatis. *Turrigera,*

E. cupressina. Hortulanis.

Foliorum laminæ pene enerves videntur.

E. foliis latis: calyce reclinato-deflexo: corollâ $2\frac{1}{3}$ -lineari; tubo late ovato: limbi interstitiis basi ovatis. *Lacunæflora,*

E. Bergiana. Wendl. Er. fasc. 2. p. 29. cum Ic. E. quadriflora. Willd. Sp. Pl. v. 2. p. 379. E. Bergiana. Schneev. Pl. n. 46. cum Ic. E. Bergiana. Linn. Mant. p. 235. E. Bergiana. Linn. Diff. n. 6. cum fig. floris, pessimâ.

Foliorum Laminæ evidenter 1-nerviæ.

E. bracteis minutissimis: calyce incurvo-deflexo: corollâ 2-lineari; tubo globofo; laciniis basi imbricatis. *Florida.*

E. florida. Thunb. Diff. n. 64.

In hac Calcaria lanceolata.

E. caule glabro: corollâ $1\frac{1}{2}$ -lineari, lævi; tubo turbinato, 8-angulo; limbo incurvo: calcaribus auricularibus, glabris. *Turbiniflora,*

Communicavit *Hibbert.*

Flores pallide purpurei.

E. caule viscidulo: corollâ $1\frac{1}{3}$ -lineari; tubo sphærico, valde 8-angulo: limbo recurvo-erecto: pericarpio hirto. *Bullularis,*

E. granulata. *Linn. Mant. p.* 234. *E. ramentacea*.
Linn. Mant. p. 65. *E. multumbellifera*. *Berg. Pl. Cap. p.* 110. *E. pilulifera*. *Berg. Pl. Cap. p.* 111.

Mucosa,

E. caule glabro: corollâ 2-lineari, viscidâ; tubo plus minus obovato; limbi interstitiis parum tumidis.
E. mucosa. *Pl. Kew. t.* 15. bona. *E. mucosa*. *Linn. Mant. p.* 232. *E. ferrea*. *Berg. Pl. Cap. p.* 112.
 Folia mire ludunt; laminis linearibus, lineari-lanceolatis, vel etiam ovalibus.

Piluliformis,

E. foliis sparsis: corollâ $2\frac{1}{2}$ -lineari, lævi; tubo longitudine calycis: calcaribus lineari-attenuatis: pericarpio lævi.
E. nudicaulis. *Berg. Pl. Cap. p.* 113. *E. pilulifera*.
Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 507.
 Foliorum Laminæ reduplicaturâ minute ciliatæ.

Obliqua,

E. foliis oblique verticillatis: spicis coarctatis: corollâ $3\frac{1}{2}$ -lineari, viscidâ; limbi interstitiis in uncum tumidis.
E. obliqua. *Pl. Kew. t.* 3. optima. *E. obliqua*. *Thunb. Diff. n.* 73. cum *lc.* bonâ.
 Flores pallide purpurei.

Sequax,

E. foliis teneris glutine arachnoideis: fasciculis 4—6-floris: corollâ 3—4-lineari, viscidâ; limbi interstitiis in uncum tumidis.
 Variat α : Corollâ 3-linearis; tubo late ovato.
E. phyfodes. *Thunb. Diff. n.* 89. *E. phyfodes*.

fodes. *Linn. Diff. n. 32. cum fig.* E. phyfodes. *Berg. Pl. Cap. p. 101.* E. phyfodes. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 506.*

β: Corolla 4-linearis; tubo ovato.

E. phyfodes. *Andr. Er. n. 44. cum Ic.* E. phyfodes. *Curt. Bot. Mag. n. 443. cum Ic.*

Semina immatura tuberculata, postea tuberculis depressis evidenter scrobiculata.

E. foliorum laminis ovato-cuneatis: corollâ 4—5-lineari, viscidâ; tubo urceolari; laciniis basi imbricatis: filamentis latissimis. *Blenna.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder. Pulchra species, corollis luteis ore viridi.

E. foliis 4-nis: spicis coarctatis: corollâ $2\frac{1}{2}$ -lineari, lævi; tubo amphoræformi; limbo crenulato. *Verecunda.*

E. cernua. *Andr. Er. n. 48. cum Ic.*

Flores pallide carnei.

E. corollâ 2-lineari, glabra; tubo urceolari, parum 4-gono: calcaribus cuneatis, hirsutis: antheris hirsutis. *Pulchella.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder. Facies aliqua *Galiifloræ*, sed veram ejus affinitatem adhuc nescio.

E. foliorum laminis lineari-lanceolatis: spicis coarctatis: corollâ 4-lineari; tubo superne admodum ventricoso: antheris exsertis. *Embothriifolia,*

Communicavit *Hibbert*.

Nomen aptius e singulari figurâ corollæ forsan exco-
gitandum: specimen siccum tantum vidi.

Glutinosa,

E. foliis sparsis: spicis coarctatis: corollâ 3—5-lineari, viscidâ; tubo ovato-pyramidali: calcaribus auricularibus.

Variat α : Corolla 3-linearis.

E. glutinosa. Pl. Kew. t. 17. optima. Chamæcistus roris folis foliis. Pet. Mus. p. 22. t. 161.

β : Corolla 5-linearis.

E. Droseroides. Andr. Er. n. 30. cum Ic.

E. glutinosa. Thunb. Diff. n. 48. Andromeda droseroides. Linn. Mant. p. 239.

E. glutinosa. Berg. Pl. Cap. p. 98. auctoritate ejus speciminis.

Hujusce generis est proculdubio, nec, quicquid fuadeat
Habitus, ad *Andromedam* referenda.

Curvifolia.

E. foliis ternis: laminis recurvis: spicis coarctatis: corollâ 4-lineari, viscidâ; tubo ovato-pyramidali: calcaribus lineari-attenuatis.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.
Pericarpium minutissime hirtum.

Squarrosa,

E. corollâ 5—6-lineari, viscidâ: tubo ovato-pyramidali; limbo obtuso: calcaribus marginalibus: antheris lævibus.

Sponte

Sponte nascentem in *Lange Kloof*, legit F. Masson.

Folia densissima.

E. corollâ 8—11-lineari, viscidâ; tubo ovato-pyr- *Gorteriæ-*
midali; limbo acuto: filamentis muticis: antheris *folia,*
lanatis.

Variat α : Corolla 8—9-linearis.

In hac Tubus pene totus albus.

β : Corolla 10—11-linearis.

E. retorta. *Curt. Bot. Mag. n. 362. cum Ic.*

E. retorta. *Andr. Er. n. 15. cum Ic.*

E. retorta. *Thunb. Diff. n. 91. E. retorta.*

Linn. Suppl. p. 220. E. retorta. Montin. in

Act. Holm. 1774. p. 297. t. 7.

Herba simpliciter recurva: diversissimam directionem
exprimit nomen auctorum, quam in Ordine Naturali
Graminum aliquando videas.

E. foliorum laminis lanceolato-cuneatis: corollâ 8—10- *Ampullæ-*
lineari, viscidâ; tubo ampullæformi; limbo obtuso. *formis,*

E. ampullacea. *Andr. Er. n. 34. cum Ic. E. ampullacea.*

Curt. Bot. Mag. n. 303. cum Ic. bonâ.

In hac cohorte, Antheræ apicibus incurvis et valde at-
tenuatis consimiles, fere dabunt characterem.

E. foliorum laminis ovato-cuneatis: corollâ 9—11-line- *Capax,*
ari, viscidâ; tubo late ampullæformi; limbo retuso.

E. prægnans. *Soland. MS.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit F. Masson.

E. foliis

Lagenæ-
formis,

E. foliis 3-nis: corollâ 12—14-lineari, viscidâ; tubo ovato apice ventricoso; limbo tubo 4-plo brevior, ovato.

E. jasminiflora! Andr. Er. n. 49. cum Ic. mediocri.

Sponte nascentem in *Platte Kloof*, locis humidis, legit F. Masson.

Jasminiflora. E. foliis 3-nis: corollâ 16—19-lineari, viscidâ; tubo cylindræo apice ventricoso; limbo tubo 3-plo brevior, ovali.

E. Aitonia. Curt. Bot. Mag. n. 429. cum Ic. E. Aitonia. Andr. Er. n. 21. cum Ic. malâ. E. Jasminiflora. Prodr. p. 293.

Flos ad amussim *Jasmini Grandiflori, Linn.*

Pavettaflora, E. pedunculis brevissimis: corollâ 9—10-lineari; limbo intus farinoso: filamentis juxta apicem antheræ calcaratis.

E. infundibuliformis. Roxb. MS.

Communicavit *Hibbert*: splendidum donum, ejus nomine, si talia admittere potuisssem, certe condècorandum. Calcaria etiam in hac potius e filamentis, quam ipsâ antherâ, exferuntur.

Fasciformis, E. pedunculis brevissimis: corollâ 5—6-lineari; limbo intus farinoso: filamentis muticis: antheris rectis.

E. fastigiata. Thunb. Diff. n. 37. E. fastigiata. Linn. Diff. n. 44. cum fig. floris. E. fastigiata. Linn. Mant. p. 66.

Sponte nascentem in *Platte Kloof*, legit F. Masson.

E. calyce minute ciliato: corollâ 5—6-lineari; tubo anguste cylindraceo-urceolari; limbo brevissimo; filamentis muticis. *Fistulæflora*,

E. cylindrica. *Thunb. Diff. n.* 39.

Pericarpium obovatum, glabrum.

E. caule glabro: corollâ 3-lineari; tubo anguste pyramidalis basi planâ: calcaribus femilanceolatis: pericarpio obpyramidalis. *Fragrans*,

E. Muscari. *Andr. Er. n.* 1. cum *Ic.* mediocri.

Sponte nascentem juxta torrentem in *Zout Rivier*, legit F. Masson.

E. caule pubescente: corollâ 2½-lineari; tubo ovato-pyramidalis: calcaribus auricularibus: pericarpio sphaerico. *Galiiflora*,

Variat α : Corolla albida.

E. transparens. *Berg. Pl. Cap. p.* 108.

β : Corolla rubra.

E. comosa. *Pl. Kew. t.* 18. mala. *E.* comosa.

Thunb. Diff. n. 38. *E.* comosa. *Linn. Diff.*

n. 48. cum *fig. floris.* *E.* comosa. *Linn.*

Mant. p. 234.

Vox comosus, prout usurpatur apud Botanicos, in hanc speciem minime quadrat.

E. caule pubescente: calyce obcuneato, ferrato: corollâ 3-lineari; limbo tubo ½-breviore: calcaribus minutissimis, auricularibus. *Nidiflora*,

E. denticulata. *Roxb. MS.*

In hortis quoque confunditur cum sequente, cui similis: vix tamen pro varietate habenda, ob filamenta calcarata, et foramina antherarum breviora.

Denticularis, E. caule pubescente: calyce obcuneato, ferrato: corollâ 3-lineari; limbo tubo $\frac{1}{2}$ -breviore: antheris longe foraminosis.

E. dentata. *Thunb. Diff. n. 39.* E. denticularis. *Linn. Mant. p. 22.* auctoritate speciminis ex Herbario Bergiano.

Flores purpurei.

Pulchra, E. caule glabro: calyce anguste lanceolato, ferrato: corollâ 4—5-lineari; limbo tubo duplo brevior: antheris breviter foraminosis.

E. Walkeria. *Andr. Er. n. 45. cum Ic. bonâ.*

Daphniflora, E. calyce ovato-cuspidato, vix ferrato: corollâ 3-lineari; limbo tubo duplo brevior, recurvo-deflexo: filamentis muticis.

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, legit I. Mulder.

Pellucida. E. caule gracili: calyce spatulato, ferrato: corollâ 5—6-lineari; limbo tubo triplo brevior; filamentis muticis.

E. pellucida. *Soland. MS.*

Sponte nascentem in *Hottentots Holland*, solo humido, legit F. Masson.

Caulis fastigiatus, verticillis foliorum, in ramis vegetioribus, remotis. Foliorum Laminæ angustæ, lineari-

attenuatæ. Corolla albida cum rubore aliquo, ita pellucida, ut literas tubo explanato subjectas facile distinguas.

E. bracteis duabus: corollâ 5—6-lineari; tubo ovato-pyramidali; limbo brevissimo: calcaribus longissimis, subulatis. *Amabilis.*

E. inflata. Thunb. Diff. n. 67. cum Ic.

Species apud nos adhuc rarissima.

E. bracteis duabus: corollâ 6—7-lineari; tubo ovato-pyramidali apice ventricosulo: calcaribus brevissimis, auricularibus. *Venusta.*

E. ventricosa. Wendl. Er. fasc. 3. p. 11. cum Ic. malâ.

E. ventricosa. Curt. Bot. Mag. n. 350. cum Ic.

E. ventricosa. Andr. Er. n. 2. cum Ic. E. ventricosa.

Thunb. Diff. n. 36. cum Ic.

Sponte nascentem juxta *Franfche Hoek*, legit F. Masson.

E. foliis 2-nis: calyce 1½-lineari, anguste ovato-cuneato: corollâ 2½-lineari; tubo ovato-pyramidali: pericarpio obovato. *Imbellis,*

Variat α : Corolla albida.

β : Corolla pallide lutea.

γ : Corolla lutea.

E. lutea. Wendl. Er. fasc. 1. p. 13. cum Ic.

E. lutea. Andr. Er. n. 11. cum Ic. E. lu-

tea. Thunb. Diff. n. 49. E. lutea. Linn.

Diff. n. 2. cum fig. floris. E. lutea. Linn.

Mant. p. 234. E. lutea. Berg. Pl. Cap.

p. 115.

Corollæ Laciniæ æquales sunt: inæquales, ut describit Willdenow, in toto genere haud ferme invenias.

Linifolia,

E. foliis 2-nis: calyce $1\frac{1}{2}$ -lineari, late ovali-acuminulato: corollâ 2-lineari; tubo ovato: pericarpio turbinato.

Variat α : Corolla pallidissime rubra.

E. foliis lanceolatis oppositis imbricatis, &c.

Linn. Hort. Cliff. p. 148.

β : Corolla læte rubra.

E. tenuifolia. Linn. Diff. n. 33. cum fig. floris.

E. tenuifolia. Berg. Pl. Cap. p. 116. E. tenuifolia. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 507. E. africana, altera, &c. Seb. Thes. v. I. p. 157. t. 73. f. 6.

E. tenuifolia. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 507. E. africana, altera, &c. Seb. Thes. v. I. p. 157. t. 73. f. 6.

E. tenuifolia. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 507. E. africana, altera, &c. Seb. Thes. v. I. p. 157. t. 73. f. 6.

E. tenuifolia. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 507. E. africana, altera, &c. Seb. Thes. v. I. p. 157. t. 73. f. 6.

Filamenta, æque ac in *Imbelli*, calcarata.

Borboniæ-folia.

E. foliis 2-nis: calyce $3\frac{1}{2}$ -lineari, late ovali-acuminulato: corollâ $3\frac{1}{2}$ -lineari; tubo ovato: pericarpio obovato.

Communicavit *Hibbert*.

Hæc tres, foliis 2-nis, puras legitimasque esse species, minime pro certo affirmarem: calycis enim proportio, in quibusdam aliis admodum variabilis.

Corifolia,

E. calyce reclinato-patente: corollâ $1\frac{1}{2}$ -lineari, calyci plus minus æquali; tubo urceolari; laciniis acutis.

E. articularis. Curt. Bot. Mag. n. 423. cum Ic. E. calycina. Andr. Er. n. 17. cum Ic. E. corifolia. Thunb. Diff. n. 77. E. corifolia. Linn. Diff. n. 26. cum fig. floris tenelli, pessimâ. E. articularis. Linn. Mant. p. 65. An sit Corifolia Sp. Pl. ed. 2. solum ab Herbario Burmanniano discendum.

E. articularis. Curt. Bot. Mag. n. 423. cum Ic. E. calycina. Andr. Er. n. 17. cum Ic. E. corifolia. Thunb. Diff. n. 77. E. corifolia. Linn. Diff. n. 26. cum fig. floris tenelli, pessimâ. E. articularis. Linn. Mant. p. 65. An sit Corifolia Sp. Pl. ed. 2. solum ab Herbario Burmanniano discendum.

E. articularis. Curt. Bot. Mag. n. 423. cum Ic. E. calycina. Andr. Er. n. 17. cum Ic. E. corifolia. Thunb. Diff. n. 77. E. corifolia. Linn. Diff. n. 26. cum fig. floris tenelli, pessimâ. E. articularis. Linn. Mant. p. 65. An sit Corifolia Sp. Pl. ed. 2. solum ab Herbario Burmanniano discendum.

E. articularis. Curt. Bot. Mag. n. 423. cum Ic. E. calycina. Andr. Er. n. 17. cum Ic. E. corifolia. Thunb. Diff. n. 77. E. corifolia. Linn. Diff. n. 26. cum fig. floris tenelli, pessimâ. E. articularis. Linn. Mant. p. 65. An sit Corifolia Sp. Pl. ed. 2. solum ab Herbario Burmanniano discendum.

An sit *Corifolia* *Sp. Pl. ed. 2.* solum ab Herbario Burmanniano discendum.

Obvallaris,

E. bracteis grandibus, obovatis, supra medium pedunculi: corollâ 2-lineari; laciniis totis crenulatis.

E. bracteata.

E. bracteata. *Thunb. Diff. n. 3.*

Sponte nascentem ad *Platte Kloof* montibus, legit C. P. Thunberg.

Filamenta certe calcarata.

E. foliorum laminis pube densâ ciliatis : corollâ 2-lineari, Hyssopifolia,
versus apicem hirtâ ; laciniis crispis, retusis.

E. pigra. Soland. MS.

Sponte nascentem juxta *Baay Fals*, legit G. Robertson.

Bractæ tantummodo duæ, ut in omnibus hujus cohortis : vicem tertiæ supplet folium pedunculo subjectum, dilatatum, et plerumque coloratum.

E. foliorum laminis reclinatis, acute mucronatis : corollâ 3-lineari ; laciniis ovato-cuneatis, 2-fidulis. Taxifolia.

E. taxifolia. Wendl. Er. fasc. 2. p. 19. cum Ic. E. taxifolia. Pl. Kew. t. 19.

Calcaria in hac recte delineavit *Wendland* : hinc ab alio auctore ejus differentiam specificam, quæ antheras muticas sistit, concinnatam fuisse suspicor.

E. floribus in rudimentis axillaribus : calyce cuspidato, Pugionifolia,
longe ciliato : corollâ 4-lineari, pyramidali : antheris a medio foraminosis.

E. tetragona. Thunb. Diff. n. 5. cum Ic.

Flores lutei.

E. floribus in rudimentis axillaribus : calyce acuminato : Viminalis.
corollâ 3-lineari, ovatâ : antheris juxta apicem foraminosis.

E. albens. Curt. Bot. Mag. n. 440. cum Ic. *E. albens.*
Linn. Diff. n. 34. cum fig. floris. *E. albens.* Linn.
Mant. p. 231.

Flores ochroleuci.

Paucula nunc in vacuo chartæ spatulo, de nostris nominibus, inferere liceat. Satis scio, his temporibus periculum quid novandi; etiam doctissimos Botanicos, qui nullum, quantumvis licet absurdum vocabulum, quod ipsi non antea irrifui damnaverint, mutari patiuntur. Tantis viris, me nil contra rationem unquam mutasse, modo respondeam: quibus autem hortulanorum gentis prudentissimæ nomina adulatoria magis placeant, omnibus istis religiose a me citatis, prout cuique libido est, utantur.

Salisbury, Richard Anthony. 1802. "XXIV. Species of Erica." *Transactions of the Linnean Society of London* 6, 316–388.

<https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1802.tb00489.x>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/46586>

DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1802.tb00489.x>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/18042>

Holding Institution

Natural History Museum Library, London

Sponsored by

Natural History Museum Library, London

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.