

## Communications.

### Araignée nouvelle d'Australie [ARACHN. PSECHRIDAE]

par le Comte DE DALMAS.

La collection E. Simon renferme une Araignée inédite, du Queensland septentrional, qui a de grandes affinités avec la forme néo-zélandaise *Matachia ramulicola* Dalmas, pour laquelle j'ai proposé la sous-famille des *Matachiinae* dans les Pséchrides (1). La présence d'un mâle adulte confirme, par l'analogie de constitution de son membre copulateur avec celui des *Fecenia*, la justesse de la position systématique indiquée, avec un certain doute, dans cette famille.

### Paramatachia, nov. gen.

Voisin du genre *Matachia* Dalmas, avec céphalothorax, groupe oculaire, pièces buccales, sternum, pattes, abdomen et cribellum analogues. Il en diffère par les caractères suivants :

Les deux lignes oculaires droites, le groupe des yeux médians pas beaucoup plus large que long, ni plus large en arrière qu'en avant; bandeau également très étroit, mais sans pièce triangulaire le prolongeant après ressaut; chélicères de même type, mais plus courtes, avec le crochet moins long et étranglé vers le centre, leurs marges moins obliques, la supérieure armée de même, l'inférieure présentant deux fortes dents, au lieu de deux granulations très éloignées de la base du crochet; tache basale triangulaire obtuse et non circulaire; calamistrum occupant toute la longueur de l'article, qui est plus court et cintré au lieu d'être droit; patte-mâchoire de la femelle moins puissante, son tarse plus court, sans longue pilosité.

La denture des chélicères et la forme du métatarse de la quatrième paire, avec son calamistrum s'étendant sur toute la longueur, justifient la séparation générique. Les deux sexes ne diffèrent pas sensiblement de taille et d'aspect général.

### *Paramatachia decorata*, n. sp. — TYPE du genre.

Long. : ♂ 6, 4 mm.; ♀ 6 à 7,3 mm. — Céphalothorax, pièces buccales et sternum marron rouge foncé, chélicères noires; pattes claires, les postérieures parfois vaguement annelées. Abdomen orné en dessus de marques noires, soit : une large bande longitudinale antérieure, une autre parallèle de chaque côté, plus en arrière une bande latérale

(1) *Ann. Soc. ent. Fr.* [1917], p. 325.

émettant sur le flanc deux bandes obliques, enfin une grosse tache de chaque côté à l'extrémité postérieure; entre ces parties noires, le fond testacé pâle est abondamment moucheté de points blanc mat; sur la face ventrale, une large bande longitudinale s'élargissant en arrière, plus ou moins foncée, s'étend du pli épigastrique au cribellum. Filières supérieures un peu plus longues que les inférieures, surtout chez le mâle; dans les deux sexes, cribellum indivis énorme et calamistrum élevé, dressé sur une carène, occupant toute la longueur de l'article. — ♀ Pattes de proportions et armature analogues à celles de *Matachia ramulicola* Dalmas (voir *Ann.* [1917], p. 327), un peu plus courtes et plus grêles, la patte-mâchoire bien plus faible. Chélicères dépassant de peu seulement les lames maxillaires, leurs marges obliques, la supérieure armée de quatre dents égales, sauf la seconde basale plus grande, assez voisines les unes des autres, leur groupe éloigné de la base du crochet; l'inférieure armée de deux fortes dents rapprochées, l'apicale très puissante, située au voisinage immédiat de la base du crochet; ce dernier assez court et robuste. Région épigastrique laissant voir par transparence quatre taches rondes très foncées (deux petites antérieures et deux beaucoup plus grosses au-dessus du pli). — ♂ Diffère de l'autre sexe par les pattes un peu plus longues, ainsi que les filières, les chélicères et leur crochet; les marges sont bien plus obliques, les deux dents de l'inférieure beaucoup plus écartées l'une de l'autre et de la base du crochet, les chélicères sont en outre garnies en dessus de nombreux poils de plus en plus denses vers l'extrémité. Patte-mâchoire assez courte; fémur près de deux fois plus long que la patella et le tibia réunis; patella aussi large que longue, son bord antéro-externe prolongé par une apophyse conique à pointe recourbée du côté interne; le bord supéro-antérieur porte vers la naissance de l'apophyse une petite brosse nettement délimitée de poils noirs raides très courts et très denses; tibia sans apophyse, de même longueur que la patella, un peu convexe et dilaté en dessus, creux sur la face inférieure où se dresse une mince carène oblique à bord apical roulé; tarse ovale large, très convexe, s'atténuant en courte pointe conique densément pileuse; bulbe saillant non convexe, détaché, libre à la base et au sommet, n'atteignant pas l'extrémité du tarse, sans pointe de style apparente.

1 ♂, 15 ♀ et nombreux jeunes. — Cooktown (Queensland septentrional).

---



Dalmas, Raymond de. 1918. "Araignée nouvelle d'Australie (Arachn. Psechridae)." *Bulletin de la Société entomologique de France* 1917, 350–351.  
<https://doi.org/10.5962/bhl.part.19244>.

**View This Item Online:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/34147>

**DOI:** <https://doi.org/10.5962/bhl.part.19244>

**Permalink:** <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/19244>

**Holding Institution**

Smithsonian Libraries and Archives

**Sponsored by**

Smithsonian

**Copyright & Reuse**

Copyright Status: NOT\_IN\_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.