DESCRIPTION

D'UN

TELIPNA NOUVEAU DU CONGO

PAR

J. DEVOS

Le Lycénide nouveau que je décris ici fait partie des collections du Musée du Congo à Tervueren. Il a été récolté (un exemplaire ♀) à Api, le 27-X-1908, par le commandant LAPLUME, à qui je me permets de le dédier.

***Telipna acraeoides* Laplumei** n. sp.

Dessus des ailes d'un noir mat. L'aile supérieure dans toute sa partie postérieure d'un rouge-orangé, de teinte rappelant la figure 4 de *Telipna sanguinea* in SMITH et KIRBY, *Rhopal. Exot., Lycaen.*, pl. I : extérieurement cette coloration ne laisse au niveau de la nervure 2 qu'une bordure noire large de 3 mm.; au niveau de la nervure 1, elle mesure 1.5-2 mm. La coloration claire s'étend en avant jusque dans la plus grande partie de la cellule, sauf à son bord antérieur. Une bande subapicale blanche, séparée, formée de trois taches, allongées, en 4-6 et d'un point en 9. La frange tachée de blanc (plus pur dans les premiers champs) entre les nervures.

Aile inférieure d'un rouge-orangé également, avec une bordure assez large, mesurant 4.5 mm. à nervure 4, se rétrécissant vers l'avant; la frange marquée également de taches blanches dans les espaces internervuraux; pas de taches submarginales blanches.

En dessous, la coloration rappelle tout à fait celle de la figure 6 (*T. acraea*) de la planche citée ci-dessus de SMITH et KIRBY. Elle est donc d'un orangé jaunâtre, à dessins noirs, entrecoupés de blanc. Bordure antérieure de l'aile supérieure noire, mais avec dix taches blanches, dont les quatre premières atteignent la marge (la première est à la base même de l'aile); cette bordure pousse en dedans vers la cellule des saillies de plus en plus longues jusqu'au bord apical de cette dernière, qui est presque entièrement couvert par la quatrième de ces saillies; la cinquième est encore un peu plus longue. A la suite de celle-ci vient une tache blanche qui correspond à la bande signalée à la face supérieure de l'aile, et au sommet de laquelle il y a une petite tache anguleuse noire; les saillies suivantes de la bordure ne dépassent pas la nervure 6. En dehors, des taches noires triangulaires sur l'extrémité des nervures, celle qui se trouve sur 2 émettant à son sommet deux branches divergentes.

Aile inférieure de même coloration en arrière, mais devenant blanchâtre dans sa région antérieure, qui est ornée de six traits noirâtres, dont les quatre premiers sont plus longs et les deux externes (dans 6) courts; le troisième de ces traits se trouve sur la nervure transverse de la cellule, le quatrième est aussi long que lui et est zigzagué; le deuxième forme un point dans la cellule. En arrière, une large bordure noire, s'arrêtant en 5 où elle se rétrécit assez brusquement; cette bordure est marquée en 1-4 d'une tache submarginale blanche et d'une tache marginale de même couleur, séparée d'une autre tache occupant la frange au niveau du champ par la marge même linéairement noire; dans le champ 5 il n'y a que cette marge qui soit noire, avec épaississement au niveau de la nervure, le champ même est pour le reste de la coloration foncière, tandis que la frange correspondante est marquée de blanc.

L'individu type, et unique exemplaire que j'ai sous les yeux, mesure, ailes étalées, 45 mm.

Dans la table des *Telipna* que donne AURIVILLIUS in SEITZ, *Grossschmetterlinge, Fauna Africana*, 34. Lfg., p. 300, cette forme se place auprès de *T. acraeoides* SM. et KIRB., dont elle a la bande subapicale de l'aile antérieure bien développée, la cellule fortement envahie de clair, le quatrième trait de l'aile inférieure en dessous irrégulier. J'ai donc cru devoir rattacher ce *Telipna* nouveau à l'espèce de SMITH et KIRBY. La coloration du dessous rappelle toutefois beaucoup celle de *T. acraea*, les parties noires étant moins étendues; en outre il n'y a pas de taches submarginales en dessus à l'aile inférieure, ce qui, il est vrai, se présente également chez certains *T. acraeoides*, selon AURIVILLIUS.

1919. "Description d'un *Telipna* nouveau du Congo." *Revue zoologique africaine* 6, 62–64. <https://doi.org/10.5962/bhl.part.19451>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/42079>

DOI: <https://doi.org/10.5962/bhl.part.19451>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/19451>

Holding Institution

American Museum of Natural History Library

Sponsored by

Biodiversity Heritage Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.