

Waldlichtung bei Forstkasten eine verdunkelte ab. *thalia* Hb. von *Argynnis selene* Schiff.

Am 10. Juli 1912 endlich erbeutete ich das beifolgend abgebildete Exemplar von *Phalera bucephala* L. Dasselbe ist sehr kräftig gezeichnet und fällt durch eine besonders dunkle, W-förmige Mittelbinde der Hinterflügel auf, weshalb ich das Stück in meiner Sammlung als ab. *fasciata* bezeichnet habe, ohne aber damit eine neue Benennung beanspruchen zu wollen.

Dabei muß ich bemerken, daß ich die einheimischen Schmetterlinge schon seit Jahren nicht mehr intensiv sammle, sondern eigentlich nur das nehme, was mir gerade in den Weg fliegt. Ich bin deshalb überzeugt, daß andere Sammler noch viel mehr Aberrationen aus den beiden heißen Jahren beibringen können, zu deren Veröffentlichung ich hiermit eine Anregung geben möchte.

Nachtrag zum Köderfang im Schleißheimer und Dachauer Moor 1912,

4. Jahrgang 1913 und 6. Jahrgang 1915.

Von Martin Best.

<i>Diptera alpium</i> Osb.	17. VI. 15
<i>Colocasia coryli</i> L.	27. V. 15
<i>Euxoa nigricans</i> L.	10. VII. 15
<i>Harmodia rivularis</i> F.	20. V. 16
<i>Monima gothica</i> L.	30. III. 15
„ <i>incerta</i> Hufn. ab. <i>subcarnea</i> Warr.	30. III. 15
„ „ „ „ <i>fuscatus</i> Haw.	30. III. 15
„ <i>pulverulenta</i> Esp. ab. <i>rufa</i> Tutt	30. III. 15
„ <i>stabilis</i> View.	5. IV. 15
„ <i>gracilis</i> F.	7. IV. 18
„ <i>opima</i> Hbn.	15. IV. 15
<i>Lithophane furcifera</i> Hufn.	2. VIII. 15, 7. X. 15
<i>Oligia bicoloria</i> Vill.	25. VII. 17, 10. VIII. 16, 16. VIII. 16
„ „ ab. <i>vinctuncula</i> Hbn. .	12. VIII. 17

<i>Crymodes furva</i> Hbn.	24. V. 15	
<i>Phytometra confusa</i> Steph.	8. VIII. 16	
<i>Conistra vaccinii</i> L. ab. <i>ochrea</i> Tutt . . .	22. X. 16	
„ „ „ <i>mixta</i> Stgr.	22. X. 16	
„ „ „ <i>glabroides</i> Fuchs . . .	22. X. 16	
„ „ „ <i>spadicea</i> Hbn.	22. X. 16	
<i>Apamea nictitans</i> Bkh. ab. <i>auricula</i> Haw. . .	20. IX. 15	
„ „ „ <i>erythrostigma</i> Haw.	20. IX. 15	
„ „ „ <i>obscura</i> Tutt	20. IX. 15	
mit vielen Übergängen und Aberrationen.		
<i>Xanthoecia flavago</i> Esp.	13. IX. 16, 7. X. 16	
<i>Hydroecia micacea</i> Esp.	10. VIII. 15, 19. VIII. 15	
<i>Phragmatiphila typhae</i> Thnbg.	10. VIII. 16	
<i>Rhizedra lutosa</i> Hbn. ab. <i>rufescens</i> Tutt . .	26. IX. 15	} Lichtfang am Schilf.
„ „ „ <i>crassicornis</i> Haw.	26. IX. 15	
<i>Chloridea ononis</i> F. ab. <i>intensiva</i> Warr. . .	5. VIII. 17	
<i>Eustratia olivana</i> Schiff, Juli häufig, Birken Schlag, bei Tag erbeutet.		
<i>Panemeria tenebrata</i> Sc.	15. V. 18	
bei Tag erbeutet.		
<i>Catocala nupta</i> L. trans. ab. <i>rubridens</i> Warr. .	15. IX. 12	
der keilförmige Zahn längs Ader 2 nicht ganz so spitz und tief vorspringend wie Abb. Seitz Tafel Bd. III Seite 55 a, während der Hufeisenfleck auf Ader 1 vorhanden ist.		
<i>Catocala fraxini</i> L.	12. IX. 18	
nur einmal am Köder beobachtet.		



Best, Martin. 1919. "Nachtrag zum Köderfang im Schleissheimer und Dachauer Moor 1912." *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft* 9, 15–16.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/94450>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/200343>

Holding Institution

Field Museum of Natural History Library

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.