

OUEST : bords d'une doline, sur le plateau d'Ankara (Boina) vers 300 m. d'alt., *Perrier* 1093.

8. ***Ammania quadriciliata*** spec. nov.

Hygrophila, ~~glabra~~, biennis (?), e rhizomate repenti ramosa; rami 4-6, 7-10 cm. longi, eleganter erecto-recurvi, dense foliosi. Folia decussata vulgo reflexa, lanceolata (5-10 $\times$ 1-3 mm) basi truncato-auriculata, e basi apicem, versus acute-attenuata, omnia florifera. Flores 4-meri axillares, sessiles, bibracteolati, semper solitarii. Receptaculum obconicum haud costatum : appendiculae 4, minusculae, dentiformes, pilounico longo (5 mm) terminatae; calycis lobi triangulares : petala 4, minutissima : stamina 2; capsula sphaerica irregulariter rumpens.

OUEST : près d'une source d'eau vive, sur calcaire, env. de Maroadabo (Boina), connu de cette seule localité, *Perrier* 6613.

NOTE SUR « **CLEMATIS PSEUDOSCABIOSAEFOLIA** » NOM. NOV.
DE MADAGASCAR

Par H. PERRIER DE LA BATHIE

Nous avons décrit en 1949 et 1950 sous le nom erroné de *C. scabiosae-folia* D. C., espèce dont nous n'avions vu qu'un spécimen très incomplet, un *Clematis* du centre de Madagascar. M. le Dr J. LÉONARD a eu l'extrême bienveillance de nous prévenir de cette erreur et de nous demander, pour faire disparaître toute confusion à ce sujet, de donner un nom nouveau à l'espèce de Madagascar, qui est en effet très différente du vrai *C. scabiosae-folia* d'Afrique tropicale. Cette rectification, que la courtoisie du Docteur J. LÉONARD nous permet de faire, et une description de cette nouvelle espèce, seront donc l'objet de cette courte note.

Clematis pseudoscabiosaefolia nom. nov. - *C. scabiosaefolia* Vig. et Perr. (non D.C.) in *Mém. Inst. Sc. Mad.*, II, fasc. 1-2 (1949), 223 et in Humbert *Fl. Madag. et Com.*, Renonculacées (1950), 20, t. VI.

Fa. ***normalis*** ignota.

Fa. ***pyromorpha***.

Omnino albido-velutina; folia caulina breviter petiolata v. subsessilia, circuitu subduplo latiora quam longiora; foliola 3, raro 5, sessilia subsessiliave, basi cuneata, trifida v. trisecta, segmentis saepe trifidis v. inciso-dentatis, pagina superiore sparsim pilosa, pilis longis saepe bi v. ternis. Flores terminales 1-5; alabastrum globosum apiculatum. Achaenia pilis fuscatis brevibus dense vestita.

Lieux dénudés sur quartzites ou cipolins, entre 1500 et 2000 m. d'alt.

CENTRE : Ambatofangena à l'Ouest d'Ambositra, *Perrier* 4915, type ! ; *Baron* sans n° ni localité.



Perrier de La

Ba

^

thie, H. 1952. "Note sur Clematis pseudoscabiosaefolia nom. nov. de Madagascar." *Notulae systematicae* 14(4), 309–309.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/7370>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/208288>

Holding Institution

Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by

Missouri Botanical Garden

Copyright & Reuse

Copyright Status: In copyright. Digitized with the permission of the rights holder.

License: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Rights: <https://biodiversitylibrary.org/permissions>

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.