Erklärung der Abbildungen auf Taf. I. und II.

Tafel I.

- Fig. 1. Larve von *Rhodites Rosae* nahe der Verpuppung mit ihrem Tracheensystem, von oben gesehen.
- 2. Reife Larve von *Aulax Hieracii* mit ihrem Tracheensystem, von der Seite.
 - 3. Larve von *Aulax Hieracii* kurz vor der Verpuppung mit ihrem Tracheensystem, von der Seite.
 - 4. Hinterende des Haupttracheenstammes der Larve von *Aulax Hieracii* mit den sich ablösenden Stigmenästen.
 - 5. Puppe von *Aulax Hieracii* ♂. Das Stigma am vorletzten Segmente zeigt noch keine hakenförmigen Schläuche.
 - 6. Hinterleib der Puppe von *Aulax Hieracii* ♀. Am Stigma des vorletzten Segments sind die hakenförmigen Schläuche sowie in den vorhergehenden Segmenten die Narben der früheren Stigmen sichtbar.
 - 7. Hälfte des siebenten Hinterleibssegments von *Aulax Hieracii* mit dem Stigma, dem hinteren Ende des Haupttracheenstammes und einem Stück des hintern Querstranges. Am Stigma die Reste der hakenförmigen Schläuche.
 - 8. Mandibel der Larve von *Aulax Hieracii*.
 - 9. - - - - *Decatoma*.
 - 10. - - - - *Pteromalus*.
 - 11. - - - - *Eupelmus*.
 - 12. - - - - *Callimome*.

Tafel II.

- 13. Puppe von *Rhopalotus cothurnatus* ♀ von der Rückenseite. st. st. Metathorax- und Hinterleibsstigma.
- 14. Dieselbe von der Bauchseite; am Hinterrande des sechsten Bauchsegments das Grübchen der künftigen Geschlechtsöffnung. — st. Hinterleibsstigma.
- 15. Hintere Hälfte der Puppe von *Rhopalotus cothurnatus* ♂ mit dem dem Penis entsprechenden Höcker des achten Bauchsegments.

Fig. 16. Larve von *Formica* mit ihren Stigmen.

- 17. Larve von *Apis mellifica* mit den Stigmen.

- 18. Thorax von *Vespa crabro*, von der Seite. *A.* derselbe ganz, *B.* derselbe in seine Bestandtheile zerlegt.

1. Pronotum, an der bewimper-	6. Mesophragma.
ten Stelle des Hinterrandes die	7. Mesosternum.
Lage des Stigma andeutend.	8. Mittelhüfte.
2. Prosternum.	9. Metanotum.
3. Vorderhüfte.	10. Metasternum mit dem Dor-
4. Mesoscutum mit dem Flügel-	salhalbringe des 4. Segments
schüppchen.	verschmolzen.
5. Scutellum.	11. Hinterhüfte.

Fig. 19. Thorax von *Tenthredo atra*. *A.* ganz, *B.* in seine Bestandtheile zerlegt.

1. Pronotum.	8. Episternum } des
2. Prosternum.	9. Epimerum } Mesothorax.
3. Episternen des Prothorax.	10. Mittelhüfte.
4. Vorderhüfte.	11. Metanotum.
5. Mesoscutum mit d. Scutellum.	12. Metasternum.
6. Mesophragma.	13. Hinterhüfte.
7. Mesosternum.	14. Dorsalhalbring d. 4. Segments.

Fig. 20. Kopf und Thorax einer *Ctenophora* (Tipulid.).

1. Prothorax.	6. Mittelhüfte.
2. Vorderhüfte.	7. Metanotum.
3. Mesonotum.	8. Metasternum mit dem Epime-
4. Mesophragma.	rum.
5. Mesosternum. 5'. Epimerum.	9. Hinterhüfte.

Fig. 21. *A.* Thorax einer *Ctenophora* } in der Mittellinie senkrecht
B. Thorax einer Hornisse } durchschn. (halbschematisch).

a. großer Rückenmuskel, abaisseur des ailes.

b. Schildchen.

c. Metanotum.

1865. "Erklärung der Abbildungen auf Taf. I. und II." *Berliner entomologische Zeitschrift* / herausgegeben von dem Entomologischen Vereine in Berlin 9(3-4), 217-218. <https://doi.org/10.1002/mmnd.18650090305>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/34938>

DOI: <https://doi.org/10.1002/mmnd.18650090305>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/210235>

Holding Institution

Smithsonian Libraries

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.