

Monotoma picipes (Coleoptera: Monotomidae) aan de westrand van Brussel

Willy Troukens

Abstract. *Monotoma picipes* (Coleoptera: Monotomidae) at the westside of Brussels, Belgium

The author discusses the capture of 2 specimens of *Monotoma picipes* Herbst, 1793 in a light trap at Dilbeek (VB). This little beetle is rather common in Belgium.

Résumé. *Monotoma picipes* (Coleoptera: Monotomidae) à la périphérie ouest de Bruxelles, Belgique

L'auteur mentionne la capture de 2 exemplaires de *Monotoma picipes* Herbst, 1793 dans un piège lumineux à Dilbeek (VB). En Belgique ce petit coléoptère est plutôt commun.

Key words: *Monotoma picipes* – Monotomidae – Faunistics – Belgium – Coleoptera.

Troukens, W.: Ninoofsesteenweg 782/8, B-1070 Anderlecht. nicole.sengier@skynet.be

Op 11.ix.2011 vond ik in mijn kleine Heath-val op het Roelandsveld te Dilbeek (VB) 2 exemplaren van *Monotoma picipes* Herbst, 1793 (fig. 1). Dit kevertje is een typische vertegenwoordiger van de familie Monotomidae waartoe in België nog een 10-tal andere soorten behoren. In de klassieke kevergidsen worden de Monotomidae nog ten onrechte ingedeeld bij de Cucujidae (Voght 1967:85).




Fig. 1. *Monotoma picipes* Herbst, 1793.

Monotoma picipes is 1,8 à 2,5 mm lang en overwegend zwart of roodbruin (Keer 1930: 506). Ogen groot. Slapen korter dan de halve doorsnede van een oog. Wangen, net voor elk oog, met een puntig tandje. Halsschild grof en dicht bestippeld met stompe, tandvormige voorhoeken; de zijranden heel fijn gezaagd. Dekschilden donkerbruin tot roodbruin; relatief kort, waardoor een deel van het achterlijf onbedekt blijft. De dekschilden bovendien met stippelstrepen en bezet met

rijen borstelharen. Sprieten met een ronde eindknots. Zowel sprieten als poten roodbruin.




Fig. 2. Vindplaatsen van *Monotoma picipes* Herbst, 1793 in België.

In Europa is *Monotoma picipes* de meest algemene *Monotoma*-soort (Voght 1967:85). Ook in België is dit kevertje overal te vinden (fig. 2). De imago's zijn van mei tot oktober vaak in grote aantallen aan te treffen in composthopen en onder rottende planten (Harde & Severa 1982: 176).

Dankwoord

Informatie en gegevens voor dit artikel werden mij vriendelijk bezorgd door Guido Bonamie (Nevele), Luc Crevecoeur (Genk) en Stefan Kerkhof (KBIN, Brussel). Hiermee kon het verspreidingskaartje samengesteld worden. Hartelijk dank!

Bibliografie

- Harde K. W. & Severa F. 1982. *Thieme's kevergids*. — W. J. Thieme & Cie, Zutphen.
Keer P. M. 1930. *Calwer keverboek*. — W. J. Thieme & Cie, Zutphen.
Voght H. 1967. Cucujidae. — In: Freude, Harde & Lohse. Die Käfer Mitteleuropas. Band 7. — Goecke & Evers Verlag, Krefeld.



Troukens, Willy. 2014. "Monotoma picipes (Coleoptera: Monotomidae) aan de westrand van Brussel." *Phegea* 42(3), 71–71.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/212603>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/210556>

Holding Institution

Natural History Museum Library, London

Sponsored by

Natural History Museum Library, London

Copyright & Reuse

Copyright Status: In copyright. Digitized with the permission of the rights holder.

Rights Holder: Vlaamse Vereniging voor Entomologie

License: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Rights: <https://biodiversitylibrary.org/permissions>

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.