


# ANALECTA ORTHOPTEROLOGICA

AUCTORE

IGNATI O BOLÍVAR.

(Sesion del 4 de Setiembre de 1878.)



**Aphlebia virgulata** Bol.—Tabula iv, fig. 1, 1 *a-e*.

*Aphlebia virgulata*, *Bolívar*, Ann. de la Soc. ent. de Belgique, 1878, p. 67.

Nitida, flava, longitudinaliter nigro-bivittata et maculata. Capite nigro, epistomate, vertice, vittisque duabus frontalibus flavis; antennis corpore longioribus, fuscis, basi rufâ: pronoto anticè rotundato vel subtruncato, posticè rectè truncato, marginibus pellucidis, disco flavo, lateribus nigro-vittato, ad medium maculis nigris, virgulatis picto; elytris lobiformibus, intus obliquè truncatis, longè inter se distantibus, in ♂ marginem posticam metanoti non attingentibus, in ♀ brevioribus: abdomine suprà flavo, maculis nigro-fuscis plus minusve obtecto, infrà nigro, flavo-maculato: laminâ supra-anali ♂ trianguli, ♀ subtruncata; segmento ultimo ventrali ♂ magno, convexo, subacuminato; ♀ longitudine sua parùm latiore; cercis annulatis.

Hab. *Pedro do Cerro (Lusitania)*. (Van Volxem! in Mus. Bruxell.)

**Bacillus hispanicus** Bol.—Tab. iv, fig. 2, 2*a*.

*Bacillus gallicus* (partim), *Bolívar*, Sinópsis de los ortópt. de Esp. y Port., págs. 68-70, lám. 2, fig. 4 ♀.

♂ Suprà fuscus, longitudinaliter nigro-trivittatus, infrà flavo-albidus; capite suprà livido; lateribus, lineâque mediâ fus-

cis; vertice à fronte sulco arcuato profundoque distinto; antennis capite duplò longioribus, 15-16 articulatis; articulo primo cœteris longiori, depresso, subexplanato, secundo reliquis paullò latiori, flavo: pronoto capite breviori; meso- et metathorace æquè longis, lèvissimis, minimè granulatis; pedibus anticis femoribus triquetris, metathorace plùs duplò longioribus; tibiis sulcatis, femoribus paullò longioribus, brevissimè pilosis, tarsorum articulo primo capiti pronotoque simùl sumptis longitudine ferè æquali; femoribus intermediis et posticis bisulcatis, subtùs prope apicem bidentatis: abdominis segmento ultimo posticè ampliato, semicircularitè inciso et ferè bidentato, cercis arcuatis, apicè subspathulatis.

♀ Flava vel viridi-flava; capite flavo, suprà planiusculo; antennis capite ferè brevioribus, 10-11 articulatis; articulis duobus primis colore viridi-flavo distinctis; primo magno, lato, depresso, albo-villoso, reliquis subcylindricis, fusco-pilosis: pronoto capite breviori, meso- et metathorace æquè longis, minutissimè granulatis, carinatis; pedibus anticis femoribus metathorace vix duplò longioribus, modicè incrassatis, tarsorum articulo primo capite pronotoque breviori; femoribus posticis brevibus, inermibus, triquetris: abdomine lèvi, segmentis tribus ultimis suprà valdè carinatis, octavo duobus posticis longiori, ultimo medio producto, acuto; cercis brevissimis.

♂ Long. corporis, 0<sup>m</sup>,042; antenn., 0<sup>m</sup>,005; pron., 0<sup>m</sup>,0015; meson., 0<sup>m</sup>,008; metan., 0<sup>m</sup>,0085; femor. ant., 0<sup>m</sup>,0185; interm., 0<sup>m</sup>,012; post., 0<sup>m</sup>,015.

♀ Long. corp., 0<sup>m</sup>,058; antenn., 0<sup>m</sup>,0038; pron., 0<sup>m</sup>,0025; meson., 0<sup>m</sup>,009; met., 0<sup>m</sup>,009; femor. ant., 0<sup>m</sup>,0165; interm., 0<sup>m</sup>,010; postic., 0<sup>m</sup>,013.

Hab., Logroño!, Madrid!, Escorial!, Alcarria!.

*Obs.* Appendicibus analibus diversissimis facilè à *B. Rossi* et *gallico* dignoscendus.

### Gomphocerus (Omocestus) minutissimus Bol.

Gomphocerus (Stenobothrus) Uhagonii, Bolivar, Sinóp. de los ortópt. de Esp. y Port., pág. 418; (partim) fig. excl.

Rufo-testaceus, pilosus: antennis ♂ apice lèvissimè depresso, pronoto longioribus, ♀ subbrevioribus; articulis duobus

primis colore flavo-albido distinctissimis; pronoto carinis lateralibus angulatis, anticè et posticè divergentibus, vittam atram secantibus; elytris ♂ abdomine non longioribus, ♀ multò brevioribus: campo mediastino subparallelo, basi non lobato; venâ mediastinâ crassiusculâ, usquè ad apicem ductâ; campo anali propè medium lato; venis ulnaris basi divergentibus, externâ fuscâ, internâ pallidâ: alis elytris brevioribus: tibiis longè pilosis; femoribus posticis indistinctè transversim nigro-bifasciatis, infrâ, intùsque flavo-viridis: tibiarum spinis apicè nigris.

♂ Long. corp., 0<sup>m</sup>,009; antenn., 0<sup>m</sup>,005; pron., 0<sup>m</sup>,0018; fem. post., 0<sup>m</sup>,007.

♀ Long. corp., 0<sup>m</sup>,011; antenn., 0<sup>m</sup>,0035; pron., 0<sup>m</sup>,0022; fem. post. 0<sup>m</sup>,0065.

Hab., *Cascante* (Perez Arcas!); *Escorial!*

### Gomphocerus (*Chorthippus*) *declivus* Bris.

*Obs.* *Gryllus elegans* *Rambur*, Faun. ent. de l'And., t. II, pag. 87, 14 (non *Charpentier*) = *Gomphocerus declivus* *Bris.* Specimina dua quæ sub nomine *Grylli elegantis* in coll. Ramburiana vidi, ad *G. declivum* *Bris.* referenda.

### Tabula synoptica specierum generis Gomphoceri Thunb.

1. Antennis fortitè depressis, lanceolatis, distinctè 18-20 articulatis, absque ocellis? — Subgen. **Phlocerus** Fisch. W.—1. *G. Menetriesii* Fisch. W.
1. 1. Antennis filiformibus vel subdepressis, rarò apice clavatis; ocellis conspicuis.
2. Antennis clavatis vel in ♀ prope apicem depressis. — Subgen. **Gomphocerus** Thunb.
3. Pronoti carinis lateralibus geniculatis; elytris alisque perfectè explicatis.

4. Venis ulnariis ante medium elytrorum junctis vel in ♀ maximè approximatis, subcognatis; pronoto plùs minùsve gibboso.—2. *G. sibiricus* L.
4. 4. Venis ulnariis basi divergentibus; pronoto non gibboso.
5. ♂ margine externâ elytrorum flexuosâ; areâ mediastinâ prope basim ampliatâ, ferè in lobulum productâ: ♀ elytris abdominis longitudine vel brevioribus, sæpè inmaculatis: clavâ antennarum nigrâ, apicè albo.—3. *G. rufus* L.
5. 5. ♂ elytrorum margine externâ regularitè arcuatâ; areâ mediastinâ subparallelâ; elytris ♀ abdomine longioribus, maculatis: clavâ antennarum nigro-fuscâ.
6. Frontis costâ mediâ excavatâ; elytris angustis, subparallelis; antennis ♂ capite pronotoque multò longioribus, clava latâ, depresso; ♀ pronoto vix longioribus, apice paullò latioribus.—4. *G. antennatus* Fieb.
6. 6. Costâ frontali punctatâ, planâ vel convexâ; elytris ovalibus; antennis ♂ capite pronotoque paullò longioribus, clava angustâ, subdepressâ, ♀ pronoto subbrevioribus; apicem versus incrassatis.—5. *G. maculatus* Thunb.
3. 3. Pronoti carinis lateralibus sub-rectis; elytris alisque abdome brevioribus, plerùmque brevissimis.—6. *G. brevipennis* Bris.
2. 2. Antennis filiformibus, apicem versus attenuatis, rarò in ♂ sub-dilatatis.
7. Venâ ulnariâ unicâ, vel duabus prope basim junctis vel parallelis et approximatis usquè ad medium, deindè subitò divergentibus.—Subgen. **Stenobothrus** Fisch. Fr.
8. Elytris brevissimis, ferè abortivis, venâ ulnariâ unicâ: antennis ♂ apicem versus lævitè ampliatis.—7. *G. crassipes* Oesk.
8. 8. Elytris perfectè explicatis, venis ulnariis duabus: antennis filiformibus.
9. Venis ulnariis ante medium junctis.
10. Areâ mediastinâ prope basim ampliatâ, brevi, rarò ad medium elytrorum extensâ.
11. Venis ulnariis pone basim junctis; alis elytrisque apice infumatis: staturâ majore ( $\sigma^{\text{m}},023$ ; ♀  $0^{\text{m}},028$ ).—8. *G. melanopterus* Borck.
11. 11. Venis ulnariis ante medium elytrorum junctis, alis elytrisque versus apicem non infumatis; staturâ minore ( $\sigma^{\text{m}},014$ ; ♀  $0^{\text{m}},020$ ).—9. *G. apricarius* L.
10. 10. Areâ mediastinâ subparallelâ, ultrà medium elytrorum extensâ.
12. Venâ radiali mediâ evidentè sinuosâ; elytris ♂ abdomine longioribus, ♀ ejus longitudinis.—10. *G. lineatus* Panz.

12. 42. Venâ radiali mediâ sub-sinuosâ; elytris ♂ abdominis longitudinis; ♀ hoc brevioribus.—44. *G. nigro-maculatus* H. Sch.
9. 9. Venis ulnariis parallelis, usquè ad medium approximatis, deindè subitò divergentibus.—42. *G. miniatus* Charp.
7. 7. Venis ulnariis basi divergentibus.
13. Areâ mediastinâ parallelâ vel paulatim attenuatâ, plerùmque ultra medium elytrorum extensâ; pronoti carinis lateralibus flexuosis vel angulatis.—Subgen. **Omocestus** Bol.
14. Elytris ovalibus, latissimis, abdome subbrevioribus, campo anali et discoidali prope medium æquè latis; areâ mediastinâ scapulari latiori; antennis longis, versus apicem subdepressis; pronoti carinis lateralibus flexuosis, anticè approximatis.—43. *G. Uha-gonii* Bol.
14. 44. Elytris ad medium subdilatatis, vel abortivis; campo anali discoidali angustiori, rarò æquè lato (*G. minutissimus* Bol.), sed tunc pronoti carinis lateralibus angulatis; areâ mediastinâ scapulari angustiori.
15. Elytris longis, plerùmque in ♂ abdome longioribus; campo anali discoidali angustiori.
16. Pronoti carinis lateralibus anticè subparallelis, vel subdivergentibus, posticè valdè divergentibus, subcurvatis; elytris ♂ abdome paullò longioribus, ♀ brevioribus.—44. *G. stigmaticus* Ramb.
46. 46. Pronoti carinis lateralibus angulatis, vel sinuatis; pone marginem anticam approximatis; elytris abdome æquè longis vel longioribus.
47. Pronoti carinis lateralibus flexuosis, posticè plus quam anticè divergentibus.
18. Elytris ovalibus, campo anali lato, areâ mediastinâ ultra medium elytrorum ductâ.—45. *G. viridulus* L.
48. 48. Elytris angustis; campo anali parum ampliato; areâ mediastinâ usque ad medium elytrorum ductâ.—46. *G. rufipes* Zett.
47. 47. Pronoti carinis lateralibus valdè flexuosis vel angulatis, anticè posticèque subæquè divergentibus.
49. Areâ interradiali anticâ et scapulari prope medium elytrorum ferè æquè latis.
20. ♂ venis radialibus sinuosis, ♀ areâ mediastinâ et scapulari æquè latis.—47. *G. Bolivarii* Brunn.
20. 20. ♂ Venis radialibus regulariter curvatis, ♀ areâ mediastinâ angustissimâ.—48. *G. haemorrhoidalis* Charp.
49. 49. Areâ interradiali anticâ prope medium elytrorum scapulari angustiori; sèpè angustissimâ, venis duabus radialibus externis valdè approximatis.

21. Tibiis posticis obscurè rubris; long. corp. ♂ 0,⁹⁰¹³, ♀ 0,⁹⁰²⁰-  
0,⁹⁰²² (ex Yersin).—19. *G. Raymondi* Yers. (mihi ignot.)
21. 21. Tibiis posticis flavescentibus, long. corp. ♂ 0,⁹⁰¹¹, ♀ 0,⁹⁰⁴⁴-  
0,⁹⁰¹⁵.—20. *G. petraeus* Bris.
15. 15. E'ytris brevibus, ♂ apicem abdominis subattingentibus, ♀ multò  
brevioribus; campo anali discoidalí paullò angustiori. — 21.  
*G. minutissimus* Bol.
13. 13. Areâ mediastinâ brevi, ♂ rarò usquè ad medium elytrorum extensâ;  
subitò attenuatâ, et prope basim plûs minùsve ampliatâ et lo-  
batâ; prono'i carinis lateralibus angulatis, flexuosis vel rectis. —  
Subgen. **Chorthippus** Fieb.
22. Pronoti carinis lateralibus distinctissimè angulatis vel valdè flexuo-  
sis et approximatis, plerùmque vittam atram secantibus: corpore  
sæpissimè flavo-rufescenti vel fusco-griseo.
23. Pronoti carinis lateralibus angulatis; areâ mediastinâ ♂ brevissimâ,  
sæpè absque venâ accesoriâ.
24. Elytris ♂ abdominis longitudine, ♀ multò brevioribus; geniculis  
nigris.—22. *G. pullus* Philippi.
24. 24. Elytris ♂ ♀ abdomine longioribus, rarò in ♀ subbrevioribus.
25. Margine posticâ pronoti sub-rotundatâ; lobulo antico postico paullò  
longiore; capite oculisque magnis; areâ mediastinâ venâ accesoriâ  
instructâ; elytris ♂ abdomine paullo longioribus, ♀ abdo-  
minis longitudine vel subbrevioribus.—23. *G. vagans* Fieb.
25. 25. Margine posticâ pronoti angulatâ; lobulo antico postici longitudinis  
vel breviori; areâ mediastinâ sæpè absque venâ accesoriâ; ely-  
tris ♂ et ♀ abdomine longioribus.—24. *G. biguttulus* L.
23. 23. Pronoti carinis lateralibus valdè flexuosis, approximatis; areâ me-  
diastinâ minùs brevi.
26. Femoribus posticis nigro-triannulatis, annulo postico apicem ver-  
sus; tibiis sanguineis, prope basim flavo-annulatis, pronoto in  
vivo cœruleo, in sicco griseo, areâ axillari occlusâ.—25. *G. bino-  
tatus* Charp.
26. 26. Femoribus tibiisque posticis flavescentibus, indistinctè nigro-nota-  
tis; pronoto flavescenti vel rufescenti; areâ axillari rarò occlusâ  
areâ scapulari plerùmque opacâ, flavâ.—26. *G. apicalis* H. S.
22. 22. Pronoti carinis lateralibus sinuosis, ante medium lævitè aproxi-  
matis et posticè divergentibus vel rectis: corpore virescenti vel  
flavescenti, rarò rufescenti.
27. Pronoti carinis lateralibus lævitè flexuosis, ante medium sub-  
aproximatis, posticè divergentibus.
28. Vertice parùm producto, ♀ obtuso; carinis lateralibus pronoti sub-  
aproximatis anticè posticèque paullò divergentibus, elytris ra-  
rissimè explicatis, sæpè ♂ abdominis longitudinis vel paullò

longioribus, ♀ subbrevioribus vel abortivis; alis abbreviatis.—  
27. *G. pratorum* Fieb.

28. 28. Vertice producto, acuto vel subacuto; carinis lateralibus pronoti posticè subdivergentibus, anticè parallelis; elytris alisque explicatis, genua postica attingentibus, rarò in ♀ abdominis longitudinis.— 28. *G. dorsatus* Zett.
27. 27. Pronoti carinis lateralibus rectis, parallelis vel posticè subdivergentibus.
29. Pronoto posticè plùs minùsve rotundato vel subangulato; carinis lateralibus rectis et parallelis, vel lèvissimè curvatis.
30. Alarum disco hyalino.
31. Venis radiali internâ mediâque divergentibus usquè ad medium elytrorum, deindè parallelis; internâ bifurcâ.— 29. *G. elegans* Charp.
31. 31. Venis radiali internâ mediâque usque ad apicem subdivergentibus internâ mediò integrâ.— 30. *G. declivus* Bris.
30. 30. Alarum disco roseo.— 31. *G. hispanicus* Ramb.
29. 29. Pronoto posticè angulato; carinis lateralibus rectis, subdivergentibus; antennis longissimis.— 32. *G. jucundus* Fisch. Fr.

### Pamphagodes Bol.

Capite crasso, magno, obtusè conico; ad imam frontem parùm ampliato; costâ frontali versùs apicem capitis angustissimâ, infrà sub-parallelâ et prope suturam epistomatis subitò ampliatâ, planâ, integrâ, vertice multò angustiore; hoc subhorizontali, fastigio producto, apice sulcato; oculis generum parte infraoculari longioribus; frontis carinis lateralibus integris; antennis filiformibus, sub-depressis, articulo primo parùm crassiori; fronte infra ocellum medium utrinque sulco brevi, arcuato, instructa: labro magno, convexo, sulcato; apice emarginato; palpis brevissimis, filiformibus, articulo ultimo penultimo longiore; labio profundè diviso, mandibulis validissimis, externè carinatis: pronoto capiti longitudine subæquali, anticè posticèque subtruncato, suprà cylindrico, carinis duabus elevatis, approximatis, sulco postico intersectis, inter carinas subconcaviusculo; lateribus deflexis, supra insertionem elytrorum obtusè rotundato-angulato-productis, et carinâ vel rugâ longâ, crassiusculâ, subsinuatâ instructis, infrà obtusissimè subangulatis; elytris abbreviatis, squamifor-

mibus, longè inter se distantibus; mesonoto obtecto: prosterni tuberculo transverso, exerto, apice emarginato, mesosterno proximo; laminâ meso-metasternali anticè angustatâ, lobis mesosterni intùs rotundatis, spatio hisce angustiore sejunctis; pedibus anterioribus brevissimis, gracilibus, tibiis femoribus brevioribus, infrà spinosis; femoribus posticis abdomine parùm longioribus: carinis nec serratis nec lobatis; tibiis posticis femoribus brevioribus, teretibus posticè bifariam spinosis, spinis internis externisque subæqualibus: tarsorum posticorum articulo primo tertio longiore, secundo brevissimo: unguiculis infrà emarginatis, arolio magno.

Genus *Pamphagodes* *Goniæ* Stål affine?

**Pamphagodes Riffensis** Bol.—Tab. v, fig. 1, 1a-e.

♀ Flavo-rufescens, fusco-nigroque-notata: capite suprà longitudinaliter tricarinato, carinâ mediâ utrinque, lateralibus externè tenuissimè nigro-marginatis; vertice obtusè angulato, strigâ obliquâ sub-arcuatâ postoculari flavâ, nigro-marginatâ; costâ frontali, punctis nigris ornatâ, utrinque nigro-maculatâ; carinis lateralibus extùs plagâ nigrâ longitudinali: pronoto suprà subcylindrico, sulco postico longè ultra medium sito, carinis mediis posticè minùs inter se distantibus, extùs nigro-marginatis, lateralibus anticè conspicuis, infrà plagâ magnâ nigrâ, anticè tuberculis minutis flavis: lobis deflexis, prope marginem lateralem nigro-variegatis, suprà rugâ crassiusculâ flavâ anticè sinuatâ, biinterruptâ; margine posticâ supra insertionem elytrorum obtusè angulatâ: elytris marginem posticam abdominis segmenti primi subattingentibus, extùs nigris, intùs flavis; metanoto abdomineque tricarinatis, carinis lateralibus crassiusculis, flavis, extùs nigris: corpore subtùs, pedibusque quatuor anterioribus, nec non femoribus posticis flavis, his externè fusco-nigro-bivittatis, intùs fuscis; fasciâ arcuatâ supra genua, tibiarumque spinarum apice nigris: valvulis inferioribus analibus infrà bispinosis, apice nigris.

Long. corp., 0<sup>m</sup>,023; pronoti, 0<sup>m</sup>,0055; femorum post., 0<sup>m</sup>,0115.  
Hab. *Mauritania*, prope *Melilla*. (Coll. mea.)

**Pamphagus (Acinipe) deceptorius** Bol.—Tab. iv, fig. 5.

Flavescens, rufescens, vel griseus, albo-nigroque marmoratus; capite rugoso, carinis frontalibus acutiusculis, nigro-maculatis, mediis infernè divergentibus, pone ocellum approximatis et valdè depressis; vertice rectangulari, declivi, anticè fisso, medio et lateribus carinato, carinâ mediâ minus elevatâ; antennis capite pronotoque longioribus, 16-17 articulatis; articulis primis transversis, depressis, apicalibus longioribus, sub-cylindricis; pronoto compresso, anticè producto, posticè angulatim exciso, carinâ mediâ acutâ, sulco postico intersectâ, parùm curvatâ, plerùmque ferè rectâ; marginibus pronoti nigro-marmoratis, anticâ subsinuatâ, posticâ supra insertionem elytrorum in angulum obtusum productâ; elytris griseis, rufo- vel nigro-venosis, abdominis segmentum primum non superantibus, apicè dilatatis, subtruncato-rotundatis: prosterni tuberculo lævi, elevato, margini anticæ cognato: femoribus anticis in ♂ subincrassatis; posticis externè transversè nigro-bifasciatis, carinis externis internis subparallelis, nec dilatatis, nec serratis; tibiis posticis albido-pilosis, intùs nigro-cæruleis, spinis externis flavis, apice nigris, internis nigro-cæruleis, maculâ flavâ extùs pone basim: abdomine compresso, supra subcarinato, rufo-nigroque variegato.

Long. corp. ♂ 0<sup>m</sup>,023 — 0<sup>m</sup>,028; ♀ 0<sup>m</sup>,035 — 0<sup>m</sup>,039; pron. 0<sup>m</sup>,0045 — 0<sup>m</sup>,007; fem. post., 0<sup>m</sup>,010 — 0<sup>m</sup>,014.

Hab. *Bürgos*, à D. Sanz de Diego captus; magnitudine, formâ elytrorum, carinâ mediâ pronoti, etc., à *P. Mabilleo* Bol. facile distinctus.

**Pamphagus (Acinipe) Mabillei** Bol.—Tab. v, fig. 6.

*Acocera hesperica*, Bolivar, Sinóp., pág. 82 (non Ramb.).

Flavo-albidus vel rufescens, rufo-nigroque marmoratus; rugoso-reticulato: capite rugoso, punctato; carinis frontalibus acutiusculis, mediis infernè divergentibus, pone ocellum approximatis et depressis; vertice anticè angusto, fisso, con-

caviusculo, ♂ lævi, ♀ rugoso-punctato, carinis lateralibus elevatis, mediâ versus apicem oblitteratâ; antennis 16-17 articulatis, ♂ capite pronotoque longioribus, ♀ brevioribus; subtriquetris, articulis basalibus transversis, subdepressis, apicalibus longioribus, subcylindricis: pronoto compresso, anticè producto, posticè truncato, carinâ mediâ elevatâ, arcuatâ in ♂ compressâ, sulco postico intersectâ, pronoti lateribus versus marginem anticam et posticam longitudinaliter et irregulariter nigro- vel rufo-fasciatâ, margine posticâ supra insertionem elytrorum in angulum obtusum productâ; elytris griseis, rufo-venosis, ♀ usquè, ♂ ultra marginem posticam abdominis segmenti primi extensis, pone medium ampliatis, deinde ovali-angustatis, apice in ♂ plûs quam in ♀ rotundatis; prosterni tuberculo lævi, elevato, subcompresso, infrâ non sulcato, declivi, margini anticæ cognato; femoribus anticis ♂ incrassatis; posticis indistinctè ferrugineo-maculatis, carinis externis inermibus, nec foliaceis nec dilatatis, internis subparallelis; intùs extùsque pinnato-carinulatis, carinulâ areæ externæ basi subreticulatis: lineâ arcuatâ geniculorum nigrâ, tibiis posticis intùs ferrugineo-cæruleis, spinis apice nigris; abdome subcompresso, suprà carinato, segmentorum margine posticâ rufâ, nigro-maculatâ.

Long. corp. ♂ 0<sup>m</sup>,040; ♀ 0<sup>m</sup>,055 — 0<sup>m</sup>,060; pron., 0<sup>m</sup>,007 — 0<sup>m</sup>,011; fem. post., 0<sup>m</sup>,014 — 0<sup>m</sup>,020.

Hab. *Valencia*, à D. Boscá captus.

Domino Profesori *Mabille* qui collectionem Ramburianam benevolentissimè mihi communicavit, dicatus.

### **Eunapius cucullatus Bol.**

Acocera monticola? *Ramb.*, *Bolívar*, Sinóp., pág. 82, lám. II, fig. 4, 4a.

Flavo-rufescens, capite granoso, carinis frontalibus acutiusculis, mediis infra ocellum subemarginatis, lateralibus usquè ad apicem frontis; vertice subdeclivi, anticè fisso, suprà granoso, carinâ mediâ posticè tantùm conspicuâ, lateralibus subelevatis, ante ocellum utrinque angulatis, posticè convergentibus; antennis subdepressis: pronoto tectiformi, anticè obtusè producto, posticè mesonotum basimque meta-

noti tegente, supra insertionem elytrorum lèvissimè subangulato; carinâ mediâ sulco postico subinterruptâ, suprà sulco subtili longitudinali instructâ; rugis minutis, subelevatis, ferè tuberculatis, confertissimè obsito; elytris oblongis, mediò ampliatis, fuscis, intùs pallidis; metanoto abdominis que segmento primo rugis flavis subreticulatis; prosterni tuberculo anticè fisso, apice sulcato et utrìnque unituberculato: femoribus posticis depresso, pronoto paullò longioribus, carinis parùm vel minimè dilatatis, superiore ferè indistinctè serrulatâ, paginâ externâ carinulis reticulatis et punctatis, carinâ inferiori internâ submuticâ; tibiis posticis intùs concoloribus vel fuscoribus, spinis apice nigris: abdomine subcompresso, suprà carinato, segmentis primis subproductis.

Long. corp. ♂ et ♀, 0<sup>m</sup>,030 — 0<sup>m</sup>,040; pron., 0<sup>m</sup>,009 — 0<sup>m</sup>,010; fem. post., 0<sup>m</sup>,012 — 0<sup>m</sup>,013.

Hab. Aranjuez? (Lopez Seoane!).

### Tabula synoptica generum specierumque Pamphagidorum Europæ.

1. Prosterni tuberculo exerto, lèvi, integro, rarissimè granulis vel tuberculis minutis prædicto, margini anticæ plùs minusve cognato; laminâ meso-metasternali latitudine sua multò longiore; pronoto plùs minusve compresso, sèpè tectiforme, lèvi, vel tuberculato-rugoso, vel reticulato, rarò granoso, suprà insertionem elytrorum obtusè angulato; metanoto non obtecto, margine posticâ mesonoti plerùmque conspicuâ: elytris angustis, pone medium dilatatis, margine inferiore recta: femoribus posticis angustis; antennis filiformibus vel ensiformibus. — Gen. **Pamphagus** Thunb.

1.1. Prosterni tuberculo distincto, bifido vel quadrifido, margini anticæ cognato, vel nullo, tunc prosterni disco prope marginem plùs minusve reflexam et productam subconvexo: laminâ meso-metasternali latiore quam longiore, rarò latitudine sua paullò longiore; pronoto tectiforme, cristâ compressâ destituto; suprà elytrorum insertionem obtusissimè angulato vel convexo; rarò lèvi, sèpè granoso; basi metanoti plerùmque obtecta; mesonoto sèpè inconspicuo: elytris latis, ad medium ampliatis, margine inferiori arcuatâ, vel brevissimis, vel nullis; femoribus posticis latis; carinis compresis, undulatis vel dentatis vel serratis; antennis subdepressis, minimè ensiformibus.

2. Prosterni tuberculo distincto, bifido vel quadrifido, margini anticæ cognato; elytris latissimis, fuscis, intùs plerūmque pallidis; lobi mesosternales intùs parùm angustatis.—Gen. **Eunapius** Stål.
2. 2. Prosterno absque tuberculo, disco subconvexo et versus marginem anticam medio reflexam et plùs minùsve productam subascendente; elytris sæpè nullis, vel brevissimis, rarò marginem posticam abdominis segmenti primi attingentibus, tunc marginibus arcuatæ et corpore concoloribus.—Gen. **Nocarodes** Fisch. W.

**GEN. Pamphagus** Thunb.

Costâ frontali infra ocellum coarctatâ, depressâ; antennis filiformibus, subtriquetris, rarò ensiformibus: pronoto tectiformi, carinâ mediâ sulco postico intersectâ, rarò integrâ (*P. elephas* L.), compressâ et subcristatâ, vel leviter elevatâ, posticè subemarginato-truncato (in *P. elephanti* L. et *marmorato* Burm. posticè obtusè angulato, mesonotum suprà tegente), supra insertionem elytrorum obtusè et distinctè angulato: metanoto apiceque mesonoti non obtectis; elytris angustis, pone medium ampliatis, margine inferiori rectâ: prosterni tuberculo exerto, distincto, levi vel tuberculis minutis prædicto, margini anticæ reflexæ, mediò elevatæ à mesosterno distanti, plùs minùsve cognato; laminâ meso-metasternali latitudine suâ multò longiore; lobis mesosternalibus intùs rarò subangustatis; femoribus posticis gracilioribus, carinis minimè dilatatis, integris vel minutissimè et ferè indistinctè subserratis.

1. Costa frontali infra ocellum subitò depressâ, emarginatâ; oculis crassiusculis, subglobosis, parte genarum infra-oculari æquè longis ♀, vel longioribus ♂; antennis ensiformibus, subtriquetris; pronoto posticè truncato vel subemarginato; carinâ vel cristâ mediâ sulco postico intersectâ; metanoto apiceque mesonoti non obtectis; elytris oblongis, concoloribus; margine anticâ prosterni perpendiculariter reflexâ, mediò altiore; tuberculo crasso, granulis vel tuberculis minutis armato ei subcognato; laminâ meso-metasternali latitudine sua multò longiore; lobis mesosternalibus intùs rotundatis, spatio his angustiore sejunctis; femoribus posticis crassiusculis, angustatis, vel ferè triplò longioribus.—Subgen. **Orchamus** Stål.—*P. Raulini* Luc. Yersin.—*P. syriacus* Bris. sp. distincta?

4. 1. Costâ frontali infra ocellum plûs minusve emarginatâ; oculis non globosis, genarum parte infra-oculari æquè longis ♂, vel brevioribus ♀; antennis filiformibus, rarò subensiformibus; pronoto posticè plerùmque truncato vel subemarginato (in *P. elephante* L. et *marmorato* Burm. in angulum obtusum subproducto); carinâ vel cristâ mediâ rarò integrâ; elytris angustis, unicoloribus vel intûs pallidis; femoribus posticis pronoto sesqui- vel plûs duplò longioribus.
2. Pronoto posticè truncato vel subemarginato, metanotum apicemque mesonoti non tegente, tectiforme, cristâ compressâ sæpè destituto, vel abdomine suprà fortitè lobato-cristato.
3. Elytris angustis, unicoloribus, margine internâ subrectâ; lobis mesosternalibus spatio his angustiore sejunctis, tuberculo prosternali lævi; pronoti carinâ suprà sulco subtili longitudinali destitutâ.
4. Pronoto cristâ altâ compressâ, sulco postico profundè emarginatâ; abdomine lobato-cristato; femoribus posticis depresso brevibus; antennis subensiformibus; vertice subhorizontali; corpore granoso. — Subgen. **Prionosthenus** Bol. — *P. galericulatus* Stål. Tab. v, fig. 4.
4. 4. Pronoto tectiformi, cristâ altâ, compressâ destituto; carinâ mediâ sulco postico lævitè subexcissâ; abdomine nec lobato nec serrato; femoribus posticis angustis, parùm depresso, longiusculis; antennis filiformibus; vertice declivi; corpore non granoso. — Subgen. **Acinipe** Ramb.
5. Pronoto tuberculato-rugoso; antennis capite pronotoque multò longioribus; femoribus posticis intûs reticulatis; tuberculo prosternali crasso, convexo, lævi; elytris prope basim intûs subdilatatis; carinâ mediâ occipitali ferè inconspicuâ: abdominis segmento primo rugoso, ejus incisuris dorsalibus flavis, obliquè nigrofasciatis. — *P. hespericus* Ramb. Tab. iv, fig. 4.
5. 5. Pronoto lævi vel reticulato-rugoso; antennis capite pronotoque brevioribus vel parùm longioribus; femoribus posticis intûs pinnatis; tuberculo prosternali compresso, apice planiusculo et subdeclivi; elytris prope basim, intûs, vix vel minimè dilatatis: carinâ mediâ occipitali valdè conspicuâ: abdominis segmento primo reticulato-rugoso: segmentorum dorsalium incisuris fuscis vel testaceis, nigro-maculatis.
6. Elytris apice ampliatis, posticè rotundato-truncatis; pronoto subtuberculoso, abdominis incisuris fuscis; corpore albo, nigro-rufoque vario. — *P. deceptorius* Bol. Tab. iv, fig. 5.
6. 6. Elytris ante apicem ampliatis, posticè angustatis; pronoto lævi vel reticulato-rugoso; abdominis incisuris testaceis, nigro-maculatis; corpore rufo vel albido, fusco-nigroque marmorato.

7. Elytris oblongis, ante apicem distinctè ampliatis, minutissimè reticulatis; tuberculo prosternali integro; prosterni margine anticâ subemarginatâ; pronoti carinâ mediâ parùm elevatâ, minimè compressâ, lateribus subconvexis; frontis carinis lateralibus nigro-maculatis; corpore albido, rufo-nigroque marmorato.—*P. Mabillei* Bol. Tab. v, fig. 6.
7. 7. Elytris subparallelis, angustissimis, ante apicem subampliatis, grossè reticulatis; tuberculo prosternali apicè sulcato; prosterni margine anticâ unidentatâ; pronoti carinâ mediâ elevatâ, sub-compressâ, lateribus declivibus, planiusculis; frontis carinis lateralibus concoloribus; corpore rufo, fusco maculato.—*P. similis* Yersin.—*P. reticulatus* Fisch. distinctus?
3. 3. Elytris latiusculis, fuscis, intùs pallidis, margine internâ arcuatâ; lobis mesosternalibus intùs subangustatis, spatio his latoiore se-junctis; tuberculo prosternali granulis vel tuberculis parvis munito; pronoti carinâ suprà sulco subtili longitudinali instructâ.—Subgen. **Eumigus** Bol.—*P. monticola* Ramb. Tab. iv, fig. 6.
2. 2. Pronoto posticè obtusè angulato et producto: metanoto non obtecto, mesonoti apice lateribus conspicuo; cristâ mediâ compressâ, elevatâ et arcuatâ, sulco postico vix vel minimè intersectâ; elytris fuscis, intùs pallidis, margine internâ arcuatâ; prosterni tuberculo magno, margini anticæ cognato, subcompresso: abdome carinato: antennis sub-filiformibus.—Subgen. **Pamphagus** Thunb.
8. Pronoto valdè compresso, cristâ elevatâ posticè subinterruptâ, angulo postico ad marginem posticam mesonoti extenso ( $\sigma$ ), vel minùs producto ( $\varphi$ ), lateribus tuberculato-rugoso; carinâ occipitali conspicuâ: corpore rufo-fusco, subtùs flavescente; abdomis incisuris pallidis, nigro-maculatis.—*P. marmoratus* Burm.
8. 8. Pronoto minùs compresso, cristâ minùs elevata, posticè minimè interruptâ; angulo postico, ultra mesonotum producto, lateribus sub-lævibus; carinâ occipitali subinconspicuâ; corpore flavo, in vivo viridi abdominis incisuris fuscioribus.—*P. elephas* L. Tab. v, fig. 5.—*numidicus* Luc.

#### GEN. **Eunapius** Stål.

Costâ frontali integrâ vel infra ocellum lævissimè emarginatâ; antennis filiformibus, crassiusculis; pronoto sæpè tectiformi, posticè in angulum obtusum producto, mesonotum basimque metanoti tegente, supra insertionem elytrorum non

vel lèvissimè producto; carinâ mediâ rarò sulco-postico intersectâ; elytris latis, plerùmque latissimis, mediò ampliatis, sèpè fuscis et intùs pallidis, marginibus arcuatis; prosterni tuberculo exerto, bifido vel quadrifido, mesosterno proximo, margini cognato; laminâ meso-metasternali transversâ vel latitudine suâ parùm longiore, lobis mesosternalibus intùs angustatis, spatio his latiore sejunctis: femoribus posticis sèpissimè depresso, breviusculis, carinâ superiori plus minùsve serratâ.

1. Pronoto tectiformi vel compressissimo et cristato, cristâ mediâ sulco postico vix vel minimè interruptâ, angulo postico lateralî non reflexo; femoribus posticis plus minùsve compressis, externè planiusculis, carinâ superiori plus minùsve subdilatata, carinâ inferiori internâ dentibus validis destitutâ.
2. Elytris fuscis, intùs flavescentibus, femorum posticorum carinâ superiori minutè serratâ; metanoto, abdominisque segmento primo tenuissimè reticulato-rugosis; pronoti margine posticâ supra insertionem elytrorum haùd vel lèvissimè productâ.
3. Pronoto carinâ integrâ, sulco subtili longitudinali destitutâ, ferè ad marginem posticam metanoti producto; prosterni tuberculo transverso, magno, cuneiformi, apice emarginato; pronoto lateribus ferè lèvi, punctato-subrugoso; elytris ovalibus, latissimis intùs areâ flavâ strigâ fuscâ notatâ. — *E. Bolivarii* Stål. Tab. v, fig. 7, 7 a, b.
3. 3. Pronoto carinâ sulco subtili longitudinali instructâ, sulco postico subincisâ; posticè basim metanoti tantùm tegente; prosterni tuberculo parùm transverso et bifido, vel longitudinali et subquadrifido; pronoto lateribus vermiculato-rugoso, vel tuberculis parvis et plurimis obsito.
4. Elytris ovalibus, mediò latissimis, areâ internâ flavâ strigâ fuscâ notatâ; pronoto vermiculato-rugoso; costâ frontali minimè interruptâ; prosterni tuberculo bifido; frontis carinis lateralibus anticè evanescentibus, occipitali lèvitè conspicuâ. — *E. rugulosus* Stål. Tab. v, fig. 9.
4. 4. Elytris elongatis, oblongis, areâ internâ flavâ: pronoto subtuberulato-granoso; costâ frontali sub-emarginatâ: prosterni tuberculo apice sulcato, anticè emarginato, posticè biproducto; frontis carinis lateralibus integris. — *E. cucullatus* Bol.
2. 2. Elytris rufis; femorum posticorum carinâ superiori valde serratâ; metanoto, abdominisque segmento primo granoso tuberculatis; pronoti margine posticâ supra insertionem elytrorum rotundato-productâ, ad medium utrinque sinuatâ et denticulis majusculis

subcurvatis armatâ: prosterni tuberculo-angusto, apice bifido; pronoto granulis acutiusculis obsito: femoribus posticis latis, brevibus, carinâ inferiori ultrâ medium maximè compressâ et dilatatâ.—*E. granosus* Stål. Tab. v, fig. 8. 8 a.—*P. terrulentus* Fisch. Fr. sec. Stål. ad hanc speciem maximè affinis.

1. 1. Pronoto nec tectiformi nec compresso, carinâ mediâ parùm elevatâ, sulco postico valdè interruptâ, angulo postico lateralî reflexo et incrassato: femoribus posticis incrassatis, externè subconvexis, carinâ inferiori internâ denticulis validis armatâ; elytris latissimis, ovalibus, fuscis; strigâ interiori flavâ; tuberculo prosternali longitudinaliter sulcato, utrinque bifido; carinâ occipitali subobsoletâ, costâ frontali integrâ, latâ, vix sulcatâ; pronoti angulo postico metanoti basim tantum tegente.—*E. Brunnerii* Stål. Tab. v, fig. 10. 10 a-c.—? *E. sitifensis* Bris.

#### GEN. **Nocarodes** Fisch. W.

Costâ frontali integrâ vel infra ocellum lèvissimè emarginatâ; antennis filiformibus, brevibus; pronoto tectiformi, posticè plûs minûsve truncato, carinâ mediâ integrâ vel sulco postico subinterruptâ, sulcis transversis plerûmque nullis, sàpè carinulis lateralibus anticè conspicuis; margine posticâ supra insertionem elytrorum arcuatâ, rarò obtusissimè productâ; elytris nullis, vel brevissimis vel basi angustissimâ, posticè rotundatis, corpore concoloribus; prosterno absque tuberculo, disco versus marginem anticam convexo, subascendentî, margine mediò reflexâ, integrâ vel subexcissâ, mesosterno plerûmque proximâ; laminâ meso-metasternali ferè transversâ vel latitudine suâ parùm longiore; lobis mesosternalibus intûs distinctè angustatis, spatio his latiore sejunctis, margine posticâ oblicuâ; femoribus posticis latis, depressis, carinis compresso-dilatatis, undulatis, rarissimè minutè serratis.

1. Elytris metanoti marginem posticam superantibus, basi angustis, posticè latis, corpore concoloribus; pronoto supra insertionem elytrorum obtusè angulato.
2. Pronoto posticè subtruncato, metanotum apicemque mesonoti non tegente, prosterni margine anticâ mesosterno remotâ, mediò reflexâ, lobulatâ; femorum posticorum paginæ externæ carinulis reticulatis et punctatis.—*N. Brunnerii* Bol. Tab. v, fig. 44.

2. 2. Pronoto posticè obtusè angulato, metanoti apice tantùm conspicuo; paginæ externæ femorum posticorum carinulis pinnatis, vel reticulatis et subindistinctis.
3. Abdominis dorso compresso, segmentis primis posticè longè productis; pronoto rugoso-tuberculato, tuberculis elevatis, acutiusculis, prosterni margine anticà reflexà et unidentatà.—*N. nigropunctatus* Luc.
3. 3. Abdominis dorso subcarinato, segmentis posticè acutè dentatis; prosterni margine anticà, mesosterno proximà, reflexà, mediò subelevata.—*N. canonicus* Fisch. Fr. Tab. v, fig. 3.
1. 1. Elytris nullis; pronoto posticè lateribus rotundato; supra insertiōnem elytrorum vix vel minimè obtusè angulato.
4. Pronoti carinà sulco longitudinali destitutà, pronoto acutè tectiformi.
5. Pronoti carinulis lateralibus elevatis, medià parùm convexà, subpellucida, lèvi; infra carinam lateralem rugà oblicuà, flavà; femorum posticorum carinis intègris, parùm explicatis.—*N. Volexemi* Bol.
5. 5. Pronoti carinulis lateralibus subinconspicuis, medià convexà, rugosà; femorum posticorum carinis undulatis, nigro-maculatis.—*N. longicornis* Bol.
4. 4. Pronoti carinà sulco subtili longitudinali instructà; pronoto obtusè tectiformi.
6. Pronoti carinà anticè tantum sulcatà; prosterni margine anticè reflexà, et acutè unidentatà.—*P. Straubei* Fisch. Tab. v, fig. 2.
6. 6. Pronoti carinà sulcatà; prosterni margine anticà reflexà, in lobulum rotundatum vel subtruncatum desinente.—*P. cyanipes* Fisch. W.

### **Barbitistes Sanzii Bol.**

Barbitistes sp.? ♀, *Bolivar*, Sinóps. de los Ortóp., págl. 302, lám. v, fig. 42.

—Anales de la Soc. Esp. de H. N., t. vii, págl. 92 et t. vi, lám. iv, fig. 42.

Suprà viridis vel rufo-fuscus, subtùs dilutior, lineâ flavâ laterali ab oculis usquè ad basim cercorum ductâ, in ♀ abdome sèpè obsoletâ; verticis tuberculo compresso, subacuto, suprà sulcato; antennis corpore plùs duplò longioribus, albo annulatis; pronoto mediò subconstricto, anticè posticèque subelevato et truncato, lineâ flavâ mediâ subtili, lateralibus

infernè nigro-marginatis: elytris ♂ pronoti ferè longitudinis, ♀ dimidiò brevioribus; flavis, extùs pone marginem lineolâ fusco-nigrâ ornatis; femorum carinis inferioribus nigris; abdome viridi-rufo, fusco-maculato, incisuris segmentorum flavo-notatis.

♂ Laminâ infra-anali magnâ, profundè incisâ, fortitè carinatâ; carinâ in lobulo subscabro, rotundato, posticè subsinuato elevatâ; margine granosâ, fuscâ, brevitè pilosâ; cercis gracilibus, curvatis, apice lèvitè flexuosis, infra laminam decussatis.

♀ Laminâ supra-anali brevi, triangulari, mediò lèvissimè carinatâ; cercis brevibus, subcurvatis; oviscapto abdomine paullò breviori, suprâ lèvitè curvato, infrâ recto, subsinuato, apicem versus acutè dentato, basi flavo, apice viridi; laminâ infra-anali carinatâ, semicirculari, posticè subproductâ.

Variat occipite, dorso pronoti abdominisque, nec non vittâ externâ femorum posticorum ferrugineo-fuscis; abdominis lineâ mediâ angustissimè flavo-pictâ.

♂ Long. corp., 0<sup>m</sup>,019; pronoti, 0<sup>m</sup>,0035.

♀ — 0<sup>m</sup>,022; — 0<sup>m</sup>,0045 — 0<sup>m</sup>,005; oviscapti, 0,<sup>m</sup>010 — 0<sup>m</sup>,011.

*B. Fischeri* Yers. affinis; tamen tuberculo verticis acuto et sulcato, colore, cœterisque notis distinctus.

Hab. *Albarracin* (Zapater!) specimen mutilatum tantùm vidi; *Castroceniza* (Burgos) (Sanz!) à D:no M. Sanz de Diego benevolè ad describendum communicatus.

### Paradrymadusa Krausii Bol. — Tab. iv, fig. 7, 7a.

♀ Fusco-cinerea, nigro-fuscoque maculata; antennis corpore cum oviscapto longioribus; pronoto brevissimo, anticè pone marginem utrinque impresso, posticè subtruncato, dorso obscuriore, prope elytra flavo; elytris pronoto brevioribus, posticè subrotundato-ampliatis, externè angustissimè cinereo-pictis, venis fuscis; femoribus quatuor anterioribus pronoti longitudine vel sublongioribus, infrâ spinis destitutis, tibiis anticis externè spinis tribus, intùs quinque vel sex instructis; femoribus posticis abdomine multò longioribus, internè nigro-

vittatis: plantulis tarsorum posticorum articulo primo brevioribus; abdominis segmentis dorsalibus ad basim subcinerascentibus, apicè rufo-fuscis; infrà flavescentibus: laminâ supra-anali transversâ, posticè subexcissâ, processo brevi, trigono; infra-anali magnâ, medio longitudinalitè profundèque sulcata, lateribus sinuatis, posticè attenuatâ et angulatim excissâ: oviscapto corpore longiore, lèvissimè sursùm curvato, apice acuto.

Long. corp., 0<sup>m</sup>,015; pron., 0<sup>m</sup>,0045; ovisc., 0<sup>m</sup>,017.

A *P. spinibrachiâ* Fisch Fr. (Bol.), staturâ minore, plantulis tarsorum posticorum articulo primo brieoribus, oviscapto sursùm curvato differt.

Hab. *Albarracin*. D. B. Zapater legit.


### **Pycnogaster inermis Ramb.**

*Bradyporus inermis*, *Rambur*, Faune ent. de l'And., t. II, pág. 57, pl. 4, fig. 1, 2, ♂ et ♀.

A *P. jugicola* Graells carinis lateralibus pronoti albidis, callosis, ferè impunctatis, anticè subparallelis, posticè lèviter curvatis, prope sulcum posticum incisis, sulcis parùm profundis; pedibus posticis femoribus versus apicem extùs intùsque spinosis, tibiis femoribus vix longioribus, *suprà externè teretibus, muticis vel tantùm duobus vel tribus spinis minutissimis*, carinâ internâ superiori 3-4 spinis brevibus instructis; abdominis dorso utrinque lineâ albâ longitudinali ornato; cercis ♂ subcylindricis, apice rotundatis, intùs obliquè subtruncatis, dente nigro curvato propè apicem armatis; laminâ supra-anali ferè truncatâ, processo... (in specimine mihi examinato deformato); laminâ infra-anali ♀ posticè lateribus incrassatâ; oviscapto longissimo subrecto differt.

Long. corp. ♂ et ♀, 0<sup>m</sup>,033 — 0<sup>m</sup>,035; pron. carinis lateralibus, 0<sup>m</sup>,011 — 0<sup>m</sup>,012; tibiarum post., 0<sup>m</sup>,0155 — 0<sup>m</sup>,0165; oviscapti, 0<sup>m</sup>,033.

Specimina depicta in tabulâ 4, fig. 1 et 2 operis citati, à D. Mabille benevolentissimè communicata.



**Ephippiger (Ephippiger) Saussurianus Bol.**

Tab. iv. fig. 8.

Corpus flavum vel rufum, thorace lateribus nigro maculato; abdомine concolore vel transversim nigro-fasciato.

Capite magno; verticis tuberculo compresso, subacuto, super profundi sulcato, sulco anticè angusto; antennis corpore duplò longioribus; pronoto transversim bisulcato, sulco antico margini subparallelo, postico recto; carinâ mediâ conspicuâ, lateralibus nullis vel rotundatis et vix perspicuis; marginibus lateralibus pronoti sinuatis, posticè lèvitèr subascendentibus, angulo antico ferè recto, postico rotundato; elytris distinctissimè reticulatis, margine externâ subexplanatâ, non areolatâ; femoribus posticis pronoto triplò longioribus, carinâ internâ spinosâ, externâ inermi: processo laminæ supra-analis ♂ cognato, rotundato et foliaceo, marginibus non incrassato, longitudinaliter canaliculato, cercis conicis, intùs mucronatis longiore; in ♀ trigono, cercorum longitudinis; ovis-capto tibiis posticis multò longiore, ferè recto, gracili, apice subscabro, infrà prope laminam analem compresso.

Long. corp. ♂ et ♀, 0<sup>m</sup>,025; pronoti, 0<sup>m</sup>,005 — 0<sup>m</sup>,0055; ovis-capti, 0<sup>m</sup>,025.

Hab. Burgos. A D:no M. Sanz de Diego captus.

**Ephippiger (Ephippiger) dilutus Bol.**

Tab. iv, fig. 9, 9 a.

Corpus flavum, sulco antico pronoti nigro; abdомine concolore, basi segmentorum fasciâ nigrâ posticè undulatâ.

Capite magno; verticis tuberculo subglobuliformi, apice rotundato, sulco subtili longitudinali instructo; antennis corpore multò longioribus; pronoto transversim bisulcato; sulco antico margini convergente, postico recto, lobulo postico pronoti subvarioloso, carinâ mediâ perspicuâ, lateralibus nullis; margine posticâ angulatim excissâ; lateralibus sinuatis, posticè lèvitèr subascendentibus, angulo antico recto, postico rotundato; elytris flavis, distinctissimè reticulatis, margine

externâ subexplanatâ, confusè areolatâ; femoribus posticis pronoto triplò longioribus, carinâ internâ spinosâ, externâ muticâ, processo laminæ supra-analis cognato, triangulari, marginibus incrassato, mediò sulcato, cercis obliquè truncatis intùs mucronatis breviore; in ♀ trigono, cercorum graciliorum ferè longitudinis; oviscapto tibiis posticis multò longiore, lèvitè curvato, subrugoso, infrà prope laminam analem compresso.

Long. corp. ♂ et ♀, 0<sup>m</sup>,030 — 0<sup>m</sup>,032; pronoti, 0<sup>m</sup>,006; oviscapti, 0<sup>m</sup>,031.

Hab. *Villalba*, *Matritum circa*. A D:no Ruiz Madrid communicatus.

### Ephippiger (*Steropleurus*) *Ramburii* Bol.

Tab. iv, fig. 10, 10 a.

*Ephippiger monticola?* (*Ramb.*), *Serville*, Hist. Nat. des Orth., pág. 476.

♂ Corpus suprà ochraceum, infrà flavum: capite levi, vertice tuberculo parvo, suprà fossulato: antennis corpore longioribus; pronoto anticè subemarginato, sulco antico subtili, postico recto, parùm profundo, carinâ mediâ posticè subconspicuâ, lateralibus acutissimis, granosis, margine inferiore subrectâ, angulo antico recto, postico obtuso, lobis deflexis lèvissimis, dorso versus apicem rugoso, ad basim subfossulato: elytris reticulatis, disco areolisque obscurè fuscis, venis flavescentibus, costâ externâ valdè incrassatâ, marginem plùs minusve obtegente, confusè foveolata: femoribus anterioribus pronoti longitudinis, posterioribus duplò longioribus, infrà versus apicem bifariam spinosis, tibiis anticus supernè inermibus: laminâ supra-anali posticè longè productâ, in lobulos triangulares divisâ; processo infra lobulos ferè obtecto, triangulari; cercis conicis, processo paulò longioribus, apice intùs curvatis, prope medium valdè mucronatis; laminâ infra-anali magnâ, subtransversâ, posticè rotundatâ, mediò excisâ.

Long. corp., 0<sup>m</sup>,028; pronoti, 0<sup>m</sup>,008; fem. post., 0<sup>m</sup>,017.

Hab. A D. García Eguia prope *Bilbao* captus et mihi benevolè communicatus.

*Eph. Seoanei* Bol. primo intuitu simillimus, tamen formâ insolitâ appendiculum analium distinctissimus; deniquè ca-

pite minùs robusto, verticis tuberculo lèvitè prominulo; pronoto breviori, minùs profundè sulcato, marginibus lateralis rectis, non sinuatis, differt.

*Eph. monticola* Ramb. ad hanc speciem fortè referendus; specimen ♀ mutilatum ex collectione Ramburiana summâ benevolentia à Domino Mabille communicatum tantùm vidi, quod oviscapto brevi, parùm curvato ad *Eph. Seoanei* Bol., formâ pronoti ad *Eph. Ramburii* Bol. accedit.

### **Ephippiger (Steropleurus) Martorellii Bol.**

Tab. iv, fig. 12.

♂ Siccus: viridi-flavus, abdomine rufo, immaculato; capite magno; verticis tuberculo superiore compresso, prominulo, suprà sulcato; antennis....; pronoto magno, anticè truncato, posticè subemarginato, sulcis transversis profundè impressis, antico nigro, rufo-marginato, postico recto, concolore, lobulo postico pronoti subfossulato, carinâ mediâ subconspicuâ, lateralibus exsertis, acutis, lobulis deflexis, excavatis, angulo antico recto, margine inferiore anticè rectâ, supra foramen sinuatâ, posticè rotundatâ, ascendentē: elytris distinctè areolatis, areolis magnis, nigris, venis flavescentibus; margine sub-explanatâ, areolatâ: femoribus posterioribus pronoto plùs duplò longioribus; processo laminæ supra-analis triangulare, longitudine sua angustiore; cercis conicis, brevioribus, laminâ infra-anali magnâ, excissâ, stylis teretibus, longiusculis.

Long. corp., 0<sup>m</sup>,031; pron., 0<sup>m</sup>,010; tibiar. post., 0<sup>m</sup>,025.

Hab. A Domino M. Martorell et Peña prope *Barcinonem* captus et ad describendum benevolè communicatus.

### **Ephippiger (Steropleurus) castellanus Bol.**

Tab. iv, fig. 11.

♀. Suprà ochraceus, subtùs dilutior, carinis lateralibus sulcisque duobus pronoti obscurioribus: capite lèvi, verticis tuberculo compresso, prominulo, subacuto, suprà sulcato: antennis corpore multò longioribus; pronoto nitido, ferè quadrato, marginibus incrassatis, lateralibus anticè rectis, suprà

foramen subsinuatis, posticè subangulatis; sulco postico antico profundiore, lobulo postico antico multò breviore, transverso, fossulato; carinis lateralibus acutissimis ad marginem lateralem ductis, mediā in lobulo postico conspicuā; elytris nigris, venis rarīs, crassiusculis, flavis, margine explicatā: femoribus posterioribus intūs spinosis, extūs muticis: oviscapto ferè recto, gracili, tibiis posticis longiore; processo laminæ supra-analis triangulare; cercis conicis, brevibus.

Long. corp., 0<sup>m</sup>,018; pron., 0<sup>m</sup>,006; tibiarum ant., 0<sup>m</sup>,011; posticarum, 0<sup>m</sup>,021; oviscapt., 0<sup>m</sup>,025.

Hab. *Burgos*, à Domino Maximino Sanz de Diego captus.

### **Ephippiger (Steropleurus) pseudolus Bol.**

Siccus. Corpus flavum; capite lāvi; verticis tuberculo superiori compressissimo, inferiore nullo; antennis annulis plurimi obscurioribus ornatis; pronoto anticè subemarginato, posticè subtruncato, marginibus incrassatis, sulco antico obscuriore, curvato, postico ponè medium sito; carinis lateralibus, exsertis, subrugosis, mediā posticè conspicuā, marginibus lateralibus horizontalibus, sinuosis, mediò ferè lobatis; elytris flavis, reticulatis, costā externā brevissimā, margine subexplicatā et reticulatā: femoribus anterioribus pronoto sesqui-, posticis triplò longioribus, his intūs spinosis, extūs muticis; processo laminæ supra-analis ♂ sublibero, latitudine sua breviore, posticè acuto; cercis conicis, crassiusculis, processo longioribus; oviscapto tibiarum posticarum longitudinis, basi curvato, deindè ferè recto, gracili, lāvi, apicè infuscato; processo laminæ supra-analis ♀ triangulari, ad medium depresso.

Long. corp., 0<sup>m</sup>,026—0<sup>m</sup>,029; pronoti, 0<sup>m</sup>,0065—0<sup>m</sup>,007; tibiar. ant., 0<sup>m</sup>,012; postic., 0<sup>m</sup>,023; ovisc., 0<sup>m</sup>,0235.

Hab. A D:no Prof:re Martinez et Saez prope *Huelva*, cum *E. hispanicus* (Koll.) Fieber captus.

### **Ephippiger (Steropleurus) flavo-vittatus Bol.**

♀. Siccus: viridis, flavo-maculatus; capite lāvi; verticis tuberculo superiore parùm compresso, suprà sulcato, inferiore

ferè nullo; antennis viridibus (in vivo annulatis?), corpore multò longioribus, pronoto anticè truncato, posticè obtusè emarginato; marginibus, anticâ exceptâ, incrassatis, sulco antico ferrugineo, curvato, postico recto, profundo, pone medium sito; carinis lateralibus exsertis, subrugosis, mediâ posticè conspicuâ; margine inferiore anticè horizontali, supra foramen sinuatâ, ascendentे, posticè subrotundatâ; dorsi apice flavo, basi viridi, subfossulato; elytris flavis, reticulatis, costâ externâ parùm distinctâ, brevi; margine explicatâ et subareolatâ, rufâ; femoribus anterioribus pronoto sesqui-, posticis triplò longioribus, intùs spinosis, extùs inermibus; segmentorum ventralium rudimentis transversim elevatis; abdominis dorso viridi-rubo, utrinque longitudinaliter flavo-vittato, margine posticâ segmentorum viridi; abdomine infrà viridi, lineis duabus longitudinalibus, segmentorumque rudimentis albidis; oviscapto tibiis posticis longiore, basi inflato, sensim attenuato, viridi, lævi, apicè rufo, granoso; processo laminæ supra-analis triangulari; cercis conicis, brevibus.

Long. corp., 0<sup>m</sup>,027; pron. 0<sup>m</sup>,0065; tibiar. ant., 0<sup>m</sup>,0124; posticarum, 0<sup>m</sup>,024; oviscapt., 0<sup>m</sup>,028.

Habitat..? Ex coll. Ramburii à D:no Prof:re P. Mabille communicatus.

## Ephippigeris Serv. nova tabula analytica.

1. Processo laminæ supra-analis ♂ basi coartato, posticè ampliato, cochleariforme; oviscapto brevi, falcato, forma ferè ut in *Platykleidibus*, pronoto anticè constricto, posticè latissimo.— Subgen. **Uromenus** Bol.—1. *E. Durieui* Bol.—2. *E. rugosicollis* Serv.—3. *E. latipennis* Fisch. Fr.—4. *E. laticollis* Luc.
1. 1. Processo laminæ supra-analis ♂ rarò basi coartato, tunc non cochleariformi; oviscapto longiore, recto vel parùm curvato.
2. Corpore opaco; segmentis abdominalibus margine posticâ non incrassatis, segmento postico ventrali ♀ piano, lævissimè subconvexo.
3. Vertice tuberculato; tuberculo exerto, plùs minùsve compresso; laminâ supra-anali rarò in lobulos triangulares productâ, tunc processo triangulari, posticè acuto.

4. Carinis lateralibus pronoti rotundatis vel nullis; processo laminæ supra-analis raro trigono; cercis plerumque subcylindricis, apice obliquè truncatis.— Subgen. **Ephippiger** Serv.
5. Femoribus posticis pronoto duplo vel ferè triplò longioribus.
6. Pronoto posticè non ampliato, parùm elevato vel subdepresso.
7. Processo laminæ supra-anali cognato; disco areolisque elytrorum sæpè rufis, raro nigris.
8. Pronoti marginibus lateralibus rectis, anticè horizontalibus, posticè obliquè ascendentibus; angulo postico laterali nullo vel inconspicuo; processo laminæ supra-analis ♂ rotundato, foliaceo; oviscapto tibiis posticis breviore vel vix longiore.
9. Processo laminæ supra-analis ♂ latitudine sua longiore, cercorum longitudinis; oviscapto tibiis posticis longiore.— 5. *E. longicauda* Bol.
9. 9. Processo laminæ supra-analis cercis longiore, vel multùm breviore; oviscapto tibiarum posticarum longitudinis vel breviore.
10. Processo laminæ supra-analis ♂ latitudine sua ac cercis longiore.— 6. *E. areolarius* Bol.
10. 10. Processo laminæ supra-analis ♂ latitudine sua ac cercis breviore, minuto.— 7. *E. carinatus* Bol.
8. 8. Pronoti marginibus lateralibus sinuatis, posticè lævitè subascendentibus, angulo postico rotundato; laminæ supra-analis processo ♂ rotundato vel triangulari; oviscapto tibiis posticis multò longiore.
11. Verticis tuberculo compresso, suprà sulcato, abdome suprà flavo vel transversim nigro-fasciato; fasciis ad basim segmentorum undulatis, posticè non productis.
12. Verticis tuberculo compresso, subacuto, suprà profundè sulcato, sulco anticè angusto; processo laminæ supra-analis ♂ rotundato, subtruncato, foliaceo, canaliculato, marginibus non incrassato; oviscapto breviore (0<sup>m</sup>,025).— 8. *E. Saussurianus* Bol.
12. 12. Verticis tuberculo subglobuliforme, apice rotundato, sulco subtili longitudinali instructo; processo laminæ supra-analis ♂ triangulari, marginibus incrassato, mediò sulcato; oviscapto longiore (0<sup>m</sup>,031).— 9. *E. dilutus* Bol.
11. 11. Verticis tuberculo non sulcato; abdome suprà viridi-flavo, transversim nigro-fasciato, fasciis ad basim segmentorum, in medio ferè usquè ad marginem posticam productis. — 10. *E. nigromarginatus* Luc.
7. 7. Processo laminæ supra-anali articulato; elytrorum disco areolisque plerumque nigris vel fusco nigris; basi pronoti minus angustâ.
13. Tibiis anticis supernè spinis nigris numerosis instructis; cercis ♂

- gracilibus, processo multò longioribus; oviscapto femoribus posticis subbreviore.— 11. *E. hispanicus* Fieb.
13. 13. Tibiis anticis supernè spinis 2-3 instructis; cercis ♂ crassiusculis, processi ferè longitudinis vel parùm longioribus; oviscapto femoribus posticis longiore.
14. Processo laminæ supra-analis ♂ triangulari; cercis obliquè truncatis, in ♀ processo brevioribus; oviscapto tibiis posticis longiore.— 12. *E. Paulinoi* Bol.
14. 14. Processo laminæ supra-analis ♂ rectangulari, posticè lateribus producto; cercis apice emarginatis, ferè bifidis, in ♀ conicis, processi longitudinis; oviscapto tibiis posticis vix longiore.— 13. *E. limbatus* Fischer. Fr.
6. 6. Pronoto posticè ampliato, elevato, plus minusve cucullato et convexissimo.
15. Lobulo postico pronoti rotundato, absque carinis.
16. Pronoto anticè constricto, posticè latiore et cucullato.
17. Oviscapto femorum posticorum longitudinis vel paullò longiore; processo laminæ supra-analis ♂ rectangulari, angulis posticis acutè productis.— 14. *E. vitium* Serv.
17. 17. Oviscapto femoribus posticis tertiatâ parte longiore; processo laminæ supra-analis ♂ triangulari vel rectangulari sed posticè plus minusve rotundato.
18. Elytris parùm convexis, areâ discoidali magnâ, marginali angustâ; processo laminæ supra-analis ♂ latitudine sub-longiore, posticè plus minusve rotundato.— 13. *E. perforatus* Rossi.
18. 18. Elytris convexissimis; areâ discoidali angustâ, marginali magnâ, processo triangulari.— 16. *E. Zapaterii* Bol.
16. 16. Pronoto subparallelo; anticè vix vel minimè constricto.
19. Elytris externè nigro-areolatis; processo laminæ supra-analis ♂ angusto, apice bifido; oviscapto subrecto.— 17. *E. compressicollis* Fisch. Fr.
19. 19. Elytris externè indistintè areolatis; margine fuscâ vel pallidâ.
20. Laminâ supra-anali ♂ magnâ, aperturam analem tegente; cercis basi latis, subitò attenuatis, intùs ad apicem productis; laminâ supra-anali ♀ inflexâ, posticè excissâ? (♀ mihi ignota).— 18. *E. provincialis* Yers.
20. 20. Laminâ supra-anali ♂ transversâ; cercis subcylindricis, apice obliquè truncatis; processo laminæ supra-analis ♀ triangulari, plano.
21. Occipite rufo vel fusco-rufo; pronoto suprà ochraceo, minimè nigro-maculato; cercis ♂ conicis, apice angustè obliquè truncatis, oviscapto leviter curvato; tuberculis basalibus valvularum inferiorum prominulis.— 19. *E. Cunii* Bol.
21. 21. Occipite nigro, nitido, sulco anteriore, lineaque mediâ longitudi-

- nali pronoti nigris; cercis ♂ subcylindricis, apice latè obliquè truncatis; oviscapto curvato, tuberculis basalibus valvularum inferiorum minutissimis, vix prominulis.—20. *E. biterrensis* Marq.
45. 45. Pronoti lobulo postico carinis lateralibus rotundatis.—21. *E. Zelleri* Fisch. Fr.—22. *E. terrestris* Yers.—23. *E. Idomenæi* Luc., mihi ignoti.
3. 5. Femoribus posticis pronoto parùm longioribus.—24. *E. ustulatus* Ramb.—25. *E. Burmeisteri* Fieb.=*cucullatus* Burm., mihi ignotus, forte hùc referendus.
4. 4. Pronoti carinis lateralibus exsertis, acutiusculis, integris vel rugosis; inter lobulos pone sulcum posticum valdè conspicuis; processo laminæ supra-analis trigono, cercis conicis, ad apicem haùd obliquè truncatis.—Subgen. **Steropleurus** Bol.
22. Elytris minutissimè reticulatis, ferè punctatis, rarò distinctè reticulatis; costâ externâ margini subparallelâ instructis; margine infra hanc costam plerùmque plus minusve obtectâ vel perpendiculari et irregulariter reticulatâ.
23. Pronoto posticè latiore, convexissimo; carinis lateralibus prope marginem posticam ferè obliteratis; carinâ mediâ nullâ. —26. *E. Stålii* Bol.
23. 23. Pronoto posticè in plurimis subparallelo, utrinque planiusculo, carinis lateralibus usquè ad marginem posticam ductis, mediâ conspicuâ.
24. Elytris convexissimis, margine externâ ferè obtectâ; sulco antico pronoti nigro.—27. *E. Perezii* Bol.
24. 24. Elytris subdepressis, margine externâ subexplanatâ, non areolatâ; pronoti sulco antico concolore.
25. Pronoto anticè constricto; cercis ♂ brevibus, conicis, intùs mucronatis.—28. *E. selliger* Charp.—29. *E. costaticollis* Luc. et 30. *E. elegans* Fisch. Fr. mihi ignoti ad hanc divisionem pertinent?
25. 25. Pronoto parallelo vel anticè lèvissimè constricto, elytris distinctè areolatis, costâ externâ margini subparallelâ, crassâ, nitidâ; margine irregulariter reticulatâ.
26. Pronoti marginibus lateralibus supra foramen sinuatis; laminâ supra-anali ♂ posticè truncatâ; processo minuto, trigono; cercis basi latissimis, posticè subitò attenuatis.—31. *E. Seoanei* Bol.
26. 26. Pronoti marginibus lateralibus ferè rectis; laminâ supra-anali ♂ posticè longè productâ, medio profundè excissâ; processo ferè obtecto, triangulari; cercis conicis, apice intùs curvatis—32. *E. Ramburii* Bol.
22. 22. Elytris apertè reticulatis, margine externâ explanatâ et areolatâ; costâ margini subparallelâ, rudimentariâ vel parùm perspicuâ vel nullâ.

27. Tibiis anticis pronoto dimidiò longioribus, margine externâ elytrorum nigro-areolatâ; carinâ externâ femorum posticorum plerùmque spinosâ (exc. *E. Martorellii* Bol.)
28. Cercis ♂ deppressis, apice obliquè truncatis.— 33. *E. brevicollis* Fisch. Fr.
28. 28. Cercis ♂ conicis, intùs mucronatis.
29. Processo laminæ supra-analis ♂ cognato, rotundato, cercis multò breviori.— 34. *E. maculatus* Yers.
29. 29. Processo laminæ supra-analis ♂ triangulari, latitudine suâ longiori, cercis breviori.— 35. *E. Martorellii* Bol.
27. 27. Tibiis anticis pronoto ferè duplò longioribus; elytris omnino flavis vel rufis, rarissimè nigro-areolatis; carinâ externâ femorum posticorum muticâ.
30. Elytris nigris; venis raris, crassiusculis, flavis; oviscapto ferè recto, attenuato, tibiis posticis quartâ parte longiore.— 36. *E. castellanus* Bol.
30. 30. Elytris flavis vel fusco-areolatis, venulis pluribus, gracilibus; oviscapto tibiarum posticarum longitudinis vel parùm longiori.
34. Corpore pallido; abdomine concolore vel fusco-purpureo maculato; oviscapto pronoto plus triplò longiore.
32. Sulco transverso postico pronoti ferè ad medium sito; verticis tuberculo superiori compresso, inferiori granuliformi, subacuto; oviscapto tibiis posticis parùm longiore; antennis concoloribus; staturâ minore (corp. 0<sup>m</sup>,020 — 0<sup>m</sup>,023; pron. 0<sup>m</sup>,0045 — 0<sup>m</sup>,005 tib. ant. 0<sup>m</sup>,010; post. 0<sup>m</sup>,020; ovisc. 0<sup>m</sup>,022). — 37. *E. Brunneri* Bol.
32. 32. Sulco transverso postico pronoti pone medium sito; verticis tuberculo superiori compresissimo, inferiori nullo, oviscapto tibiarum posticarum longitudinis, antennis annulis obscurioribus numerosis ornatis; staturâ majore (corp. 0<sup>m</sup>,026 — 0<sup>m</sup>,029; pron. 0<sup>m</sup>,065 — 0<sup>m</sup>,007; tib. ant. 0<sup>m</sup>,012; post. 0<sup>m</sup>,023; ovisc. 0<sup>m</sup>,023 — 0<sup>m</sup>,024). — 38. *E. pseudolus* Bol.
34. 34. Corpore viridiflavo, abdomine viridi-rufo, utrinque flavo-fasciato; oviscapto pronoto plus quadruplicò longiore.— 39. *E. flavo-vittatus* Bol.
3. 3. Vertice inter antennas subfossulato, absque tuberculo; laminâ supra-anali posticè longè productâ, processo trapezoidalì, posticè multò latiore.— Subgen. **Platystolus** Bol.
33. Pronoti carinis lateralibus scabris; elytris ♂ pronoto ferè obtectis, in ♀ magis prominulis, margine posticâ indistinctè areolatâ; femoribus nigro-punctatis. ♂ flavus vel viridis; segmentis posticis abdominis denticulo spiniformi armatis; laminâ supra-anali posticè productâ, angulatim excisâ; processo obtecto; cercis

gracilibus, apice intùs curvatis et mucronatis, extùs spinâ brevi armatis. ♀ flavo-rufescens, elegantissimè nigro-fuscoque picta; oviscapto sensim acuminato.—40. *E. surcularius* Bol.

33. 33. Pronoti carinis lateralibus subintegris, lèvibus; elytris exsertis; margine externâ explanatâ, nigro-areolatâ; corpore pedibusque flavis; laminâ supra-anali ♂ posticè productâ, mediò sulcatâ, processo non obtecto; oviscapto subparallelo, apice acuminato, lèvissimè denticulato.—41. *E. Martinezii* Bol.
2. 2. Corpore nitidissimo; segmentis abdominalibus margine posticâ in-crassatis vel subreflexis; segmento postico ventrali ♀ conico, plus minusve elevato; pronoti carinis lateralibus acutissimis; stylis brevibus.—Subgen. **Lamprogaster** Bol.
34. Verticis tuberculo prominulo, suprà excavato; pronoti sulco postico anticè carinâ transversâ à lobulo antico sejuncto; lobulo postico magno, convexo, subfossulato; carinâ mediâ ferè obliteratâ, lateralibus nigris; lobulo antico brevissimo; abdome utrinque fasciâ latâ nigrâ ornato, segmentorum marginibus flavis inter-ruptâ, processo laminæ supra-analis rotundato; cercis conicis, intùs prope basim mucronatis; oviscapto subcurvato.—42. *E. Bolivarii* Seoan.
- 34 34. Verticis tuberculo ferè nullo; pronoti sulco postico anticè carinâ transversâ destituto, prope medium sito, lobulo postico subru-goso; carinâ mediâ conspicuâ, lateralibus flavis; processo laminæ supra-analis ovali, brevi; cercis depressis, basi latioribus, intùs mucronatis; oviscapto lèvitè curvato, sensim acuminato.—43. *E. Miegii* Bol.
- 

Amicissimus A. Durieu, Comes Dubrony, sequentes species novas ex Mauritaniâ ad describendum nuperrimè communica-tivit.

### **Pamphagus (Acinipe) mauritanicus Bol.**

♀. Flavo-virescens; capite viridi, anticè granulis albis obsito, carinis frontalibus exsertis, mediis infernè divergentibus, infra ocellum approximatis et levissimè, ferè indistinctè sub-depressis, vertice angusto, parùm declivi, anticè fisso, mediò et lateribus carinato, carinâ mediâ anticè obsoletâ, lateralibus crassiusculis; antennis.....; pronoto compresso, acutè tec-tiforme, anticè producto, posticè ferè emarginato, carinâ mediâ acutâ, sulco postico intersectâ, parùm arcuatâ; lateribus

declivibus, granulis albis prope marginem posticam in rugas desinentibus confertissimè obsito; elytris griseo-ferrugineis, abdominis marginem posticam segmenti primi subattingentibus, pone medium ampliatis, basi angustissimis, prosterni tuberculo levi, subpresso, margini anticæ emarginatæ cognato: femoribus posticis carinis nec dilatatis nec serratis, granulatis, paginæ externæ carinulis confusis, punctatis, geniculorum lineâ arcuatâ nigrâ; tibiarum spinarum apice plagâque magnâ basali nigro-rufis: abdome obtusè tectiformi, mediò longitudinalitè subsulcato; incisuris rufis.

Long. corp., 0<sup>m</sup>,050; pron., 0<sup>m</sup>,009; fem. post., 0<sup>m</sup>,022.

### **Nocarodes Durieui Bol.**

♀. Flavo-rufescens; confertissimè albido-granosus; capite parvo, occipite elevato, convexo, vertice devexo, minimè carinato, carinis frontalibus mediis infernè subdivergentibus, infra ocellum lèvissimè emarginatis, lateralibus nullis vel subindistinctis; antennis cylindricis..... articulo primo magno; pronoto obtusissimè tectiforme, cristâ compressâ destituto, carinâ mediâ sulco postico lèvitè intersectâ, anticè utrinque subemarginato, posticè truncato, supra elytrorum insertionem obtusè producto, margine posticâ mediò irregularitè et parùm distinctè lobato-dentatâ, lateribus ferè integrâ; mesonoti margine posticâ conspicuâ; metanoto abdominalisque segmento primo carinâ vel cristâ mediâ destitutis, minimè compressis; elytris ovali-angustatis, ferè ad marginem posticam abdominis segmenti primi extensis, ferrugineis; prosterni disco tumidulo, margine anticâ obtusè emarginatâ, angustè reflexâ; femorum posticorum carinis lèvissimè compressis, minutissimè dentato-granulatis, paginæ externæ carinulis reticulatis, intùs extùsque fasciâ arcuatâ supra genicula nigrâ, intùs maculâ flavâ; tibiis pilosis, intùs cœruleis, extùs corpore concoloribus, basi, apiceque, nec non spinis, apice nigro excepto, flavis; abdome obtusè tectiforme, segmentis posticè dente obtussissimo subpresso armatis.

Long. corp., 0<sup>m</sup>,028—0<sup>m</sup>,031; pron., 0<sup>m</sup>,006; fem. post., 0<sup>m</sup>,010.

# CATALOGUS ORTHOPTERORUM EUROPÆ ET CONFINIUM.

---

## SECT. I. **Dermoptera.**

### FAM. I. **Forficulidæ.**

<b>Labidura</b> Leach.	<b>Labia</b> Leach.
<i>Forficesila</i> Serv.	<i>Copiscelis</i> Fieb.
1. <i>riparia</i> Pall. Eur. Afr. As.	4. <i>minor</i> L. Eur.
<i>gigantea</i> Fabr.	
var. <i>marginella</i> Costa.	
— <i>Fischeri</i> Motsch. Turcia.	
2. <i>pallipes</i> Duf. Eur. mer.	
<i>lividipes</i> Duf.	
<i>meridionalis</i> Serv.	
3. <i>vicina</i> Luc. Algeria.	
<b>Forcinella</b> Dohrn.	<b>Forficula</b> L.
<i>Forficula</i> Fisch. Fr. ex. p.	1. <i>biguttata</i> Latr. Eur.
1. <i>annulipes</i> Luc. Eur. mer.	<i>bipunctata</i> Fabr.
<b>Brachylabis</b> Dohrn.	var. <i>bipunctata</i> Kitt. Asia centr.
<i>Anisolabis</i> Fieb.	2. <i>Orsinii</i> Géné. Italia.
1. <i>mauritanica</i> Luc. Mauritania.	3. <i>smyrnensis</i> Serv. Turc. As. min.
2. <i>maritima</i> Bon. Eur. mer.	4. <i>ruficollis</i> F. Hisp. Afr. bor.
3. <i>moesta</i> Géné. Medit.	<i>bætica</i> Ramb.
<i>maritima</i> Ramb.	5. <i>Lucasi</i> Dohrn. Syria, Ægypt.
<i>hispanica</i> H. S.	6. <i>auricularia</i> L. Eur.
4. <i>taurica</i> Motsch. Tauria.	var. <i>infumata</i> Charp.
	7. <i>lurida</i> Fisch. Fr. Turcia.
	8. <i>bicolor</i> Fisch. W. Tauria.
	9. <i>decipiens</i> Géné. Eur. mer.
	<i>brevis</i> Ramb.
	var. <i>Hellmanni</i> Kitt. Kirgis.
	10. <i>albibennis</i> Meg. Eur.
	<i>pedestris</i> Bon.
	<i>Freyi</i> Dohrn.

41. Fedtschenkoi <i>Sauss.</i>	Tartaria.	4. acanthopygia <i>Géné.</i>	Eur.
42. arachidis <i>Yers.</i>	Gallia mer.?	5. Bolivarii <i>Dubr.</i>	Escurial.
43. pubescens <i>Géné.</i>	Sardinia, Hisp.	6. aptera <i>Charp.</i>	Eur.
44. Yersini <i>Bris.</i>	Eur. mer.	dilatata <i>Lafr.</i>	
45. serrata <i>Serv.</i>	Chartum.	pyrenaica <i>Géné.</i>	
		var. alpina <i>Géné.</i>	
		— simplex <i>Lafr.</i>	
<b>Chelidura Latr.</b>		7. ? thoracica <i>Fisch. W.</i>	Finlandia.
1. analis <i>Ramb.</i>	Andalusia.		
2. ? setulosa <i>Fieb.</i>	Lusitania.		
3. sinuata <i>Lafr.</i>	Gallia mer.	Forfic. inc. sedis.	
var. Dufourii <i>Serv.</i>		1. Tomis <i>Kol.</i>	
paupercula <i>Géné.</i>		2. anthracina <i>Kol.</i>	

## SECT. II. Orthoptera, sens. str.

### FAM. II. Blattidæ.

#### Ectobia Westw.

1. lapponica <i>L.</i>	Eur.
2. Haeckelii <i>Bol.</i>	Hispania.
3. ericetorum <i>Wesm.</i>	Eur.
arenicola <i>F. Fr.</i>	
concolor <i>Hagenb.</i>	
4. albicincta <i>Brunn.</i>	Eur. mer.
5. ? nicaensis <i>Bris.</i>	Nizza.
6. vittiventris <i>Cost.</i>	Eur. mer.
7. livida <i>Fabr.</i>	Eur. Algeria.
var. brevipennis <i>Brunn.</i>	Eur. mer.

#### Aphlebia Brunn.

1. marginata <i>Schr.</i>	Eur. mer.
2. cincticollis <i>Luc.</i>	Algeria.
3. maculata <i>Schr.</i>	Eur. c. et mer.
4. punctata <i>Charp.</i>	Eur. c. et mer.
5. tartara <i>Sauss.</i>	Tartaria.
6. brevipennis <i>Fisch. Fr.</i>	Istr. Serb.
7. carpetana <i>Bol.</i>	Hispania.
8. virgulata <i>Bol.</i>	Lusitania.
9. trivittata <i>Serv.</i>	Sardinia.
10. subaptera <i>Ramb.</i>	Andalus.

#### Loboptera Brunn.

	Polyzosteria <i>Fisch. Fr.</i>
1. decipiens <i>Germ.</i>	Eur. mer.
	limbata <i>Charp.</i>
2. tartara <i>Sauss.</i>	Tartaria.

#### Blatta L.

	Phyllodromia <i>Serv.</i>
1. germanica <i>L.</i>	Eur. Cosmop.
2. bivittata <i>Serv.</i>	Ægypt.?
3. cordofana <i>Brunn.</i>	Cordof. Chart.
4. supellectilium <i>Serv.</i>	Chartum.

#### Periplaneta Burm.

	Subgen. Stylopyga <i>Fisch. W.</i>
1. orientalis <i>L.</i>	Eur. Asia.
	Subgen. Periplaneta, s. str.
2. tartara <i>Sauss.</i>	Tartaria.
3. americana <i>L.</i>	Cosmopol.
4. Australasiæ <i>Fabr.</i>	Cosmopol.

#### Oxyhaloa Brunn.

1. minor <i>Brunn.</i>	Chartum.
------------------------	----------

**Panchlora Burm.**

1. surinamensis L. Cosmopol.  
2. Maderæ F. Cosmopol.

**Perisphæria Burm.**

1. unicolor Burm. Ægypt.  
2. stylifera Burm. Toscana, Afr.

**Holocompsa Burm.**

1. fulva Burm. Ægypt.

**Polyphaga Brullé.**

- Heterogamia* Burm.  
1. ægyptiaca L. Medit.  
trichoptera F. W.  
2. algerica Brunn. Algeria.  
3. africana L. Ægypt. Syria.  
ursina Burm.  
4. syriaca Sauss. Ægypt. Syria.  
conspersa Brunn.  
5. livida Brunn. Cyprus.

FAM. III. **Mantidæ.****Heteronychotarsus Lefeb.**

1. ægyptiacus Lefeb. Ægypt.

**Eremiaphila Lefeb.**

1. Tiphon Lefeb. Ægypt. Syria.  
Ehrenbergii Burm.  
2. Audouini Lefeb. Cairo, Suez.  
3. Cerisyi Lefeb. Luxor.  
4. Genei Lefeb. Liban. Ægypt.  
5. Burmeisteri Sauss. Arabia.  
Zetterstedtii Burm.  
6. denticollis Luc. Algeria.  
7. Zetterstedtii Lefeb. Suez.  
8. arabica Sauss. Arabia.  
9. Luxori Lefeb. Luxor.  
10. Bovei Lefeb. Suez.  
11. hebraica Lefeb. Ægypt.  
12. Savignyi Lefeb. Ægypt.  
13. brevipennis Sauss. Ægypt.  
14. Anubis Lefeb. Ægypt.  
15. Khamsini Lefeb. Suez.  
16. Hralili Lefeb. Ægypt.  
17. nilotica Sauss. Ægypt.  
18. Kheychi Lefeb. Ægypt.  
19. barbara Bris. Algeria.  
20. sabulosa Sauss. Suez.  
21. Lefebvrii Burm. Ægypt.  
22. dentata Sauss.  
Bovei Burm.  
23. Petiti Lefeb. Ægypt.

**Gonypeta Sauss.**

1. femorata Sauss. Arabia.

**Hierodula Burm.**

1. bioculata Burm. Hisp. mer. Afr.  
bimaculata Burm.  
simulacrum Serv.  
2. tenuidentata Sauss. Tartaria.  
  
**Mantis L.**

1. religiosa L. Eur.  
radiata Motsch.  
2. sacra Thunb. Tartaria.  
pia Serv.

**Ameles Burm.**

1. alata Sauss. Tartaria.  
2. Wagnerii Kitt. Kirgisia.  
3. Spallanzania Rossi. Eur. mer.  
nana Charp.  
brevis Ramb.  
\* soror Serv.  
4. decolor Charp. Medit.  
5. Assoi Bol. Hisp. centr.  
6. Picteti Sauss. Andalusia.  
nana Ramb.  
7. ? pusilla Eversm. Tartaria.

**Yersinia Sauss.**

1. brevipennis Yers. Gallia. mer.

**Miomantis Sauss.**

1. *pellucida* *Sauss.* Ægypt.

**Iris Sauss.**

1. *oratoria* *L.* Eur. mer.  
*fenestrata* *Brullé.*  
*bella* *Germ.*

**Bolivaria Stål.**

1. *brachyptera* *Pall.* Rossia, Asia.  
*commutata* *Fieb.*  
 2. *Moseri* *Sauss.* Tartaria.

**Fischeria Sauss.**

- Mantis* auct.  
 1. *bætica* *Ramb.* Eur. mer.  
*Pallasi* *Fieb.*  
*syriaca* *Sauss.*  
 2. *caucasica* *Sauss.* Caucasus.

**Oxythespis Sauss.**

1. *Turcomaniæ* *Sauss.* Turcom.

**Blepharis Serv.**

1. *mendica* *F.* Afr. sept.

**Empusa Illig.**

1. *Stollii* *Sauss.* Rossia, Ægypt.  
 ? *pauperata* *Charp.* (H. ent.)  
 2. *pennicornis* *Pall.* Ross. Turc.  
*orientalis* *Burm.*  
*pauperata* *Fisch.* W.  
*brachyptera* *Fisch.* W.  
 3. *egena* *Charp.* Eur. mer. Afr. bor.  
*pauperata* *Illig.*  
*europaea* *Fieb.*

**Idolomorpha Burm.**

1. *longifrons* *Sauss.* Barbar. Tunis.

FAM. IV. **Phasmidæ.****Bacillus Latr.**

1. *Rossii* *Fabr.* Eur. As.  
 2. *gallicus* *Charp.* Eur. mer.  
*granulatus* *Brullé.*

3. *lobipes* *Luc.*

Algeria.

4. *gracilis* *Burm.*

Arabia.

5. *hispanicus* *Bol.*

Hispania.

*Rossius* *Ramb.*

FAM. V. **Acrididæ.****Dericorys Serv.**

*Cyphophorus* *Fisch.* W.

1. *albidula* *Serv.* Ægypt.  
*maculata* *Fisch.* W.  
 2. *acutispina* *Stål.* Ægypt.  
 3. *tibialis* *Fieb.* Asia min.  
 4. *annulata* *Fieb.* Asia min.

2. *aegyptium* *L.* (1764.) Eur. Afr.

*cristatum* *Asso* (1784.)

*lineola* *Thunb.*

*migratorium* *Scop.*

*tartaricum* *Fisch.* Fr.

3. ? *assector* *Fisch.* W. Turcia.

4. *albidiferum* *Walk.* Arabia.

Subgen. **Schistocerca** *Stål.*

5. *peregrinum* *Ol.* Afr. bor. Hisp.

*flaviventre* *Burm.*

*rufescens* *Thunb.*

**Acridium Serv.**

Subgen. **Acridium** *Serv.*

1. *tartaricum* *L.* Tartaria.

**Caloptenus Burm.**Subgen. **Sphodromerus** Stål.

1. Serapis Serv. Ægypt. Arabia.

Subgen. **Caloptenus** pr. dict

2. italicus L. Eur. Afr. bor.

var. siculus Burm.

— marginellus Serv.

— cerasinus Serv.

— barbarus Cost.

— hispanicus Koll.

3. ? ictericus Serv. Gades, Algeria.

4. calcaratus Stål. Massaua.

5. ? marmoratus Fisch. W. Ros. mer.

6. ? Tarsius Fisch. W. Caucasus.

**Paracaloptenus Brunn.***Calliptenus* p. Stål.*Platyphyma* Brunn. (*olim.*)

1. typus Brunn. Eur. mer. Brussa.

caloptenoides Brunn.

Brunnerii Stål.

**Euprepocnemis Fieb.**

1. morbosa Serv. Ægypt. Arabia.

2. syriaca Brunn. Syria.

3. littoralis Ramb. Hisp. Lusitania.

4. Charpentierii Stål. Tunis, Nubia.

5. cærulescens Stål. Massaua.

6. dorsata Fisch. W. Georgia.

Fischerii Fieb.

7. plorans Charp. Medit.

8. similis Brunn. Ægypt. Syria.

9. testacea Walk. Arabia.

10. discoidalis Walk. Ægypt.

11. scriptipennis Walk. Arabia.

12. turbida Walk. Ægypt.

13. mutator Walk. Ægypt. Arabia.

14. cincticollis Walk. Sinai.

**Pezotettix Burm.**

Podisma Latr.

Subgen. **Pezotettix** sens. str.

1. alpina Koll. Eur. c. et bor.

2. pedestris L. Europa.

apterum de Geer. (*Acrydium.*)

3. mendax Fisch. Fr. Carniola.

4. salamandra Fisch. Fr. Carniola.

5. Schmidtii Fieb. Alpes.

6. pyrenæa Fisch. Fr. Pyren.

Subgen. **Melanoplus** Stål.

7. frigida Boh. Eur. c. et bor.

rufipes Fisch. W.

borealis Fieb. (*Caloptenus.*)

8. primnoa Fisch. W. Sibir.

**Platyphyma** Fisch. Fr.

1. Giornæ Rossi. Eur. mer.

2. platycerca Stål. Syria.

3. rugulosa Stål. Asia min.

**Tropidopola** Stål.*Opomala* Fisch. Fr. p.

4. cylindrica Marsh. Sicil. Balear.

fasciculata Charp.

sicula Serv.

**Pamphagodes** Bol.

1. Riffensis Bol. Mauritania.

**Pamphagus** Thunb.

Porthetis Serv.

Subgen. **Orchamus** Stål.

1. Raulinii Luc. Candia, Syria.

2. ? syriacus Bris. Syria.

Subgen. **Prionosthenus** Bol.

3. galericulatus Stål. Ægypt.

Subgen. **Acinipe** Ramb.

4. hespericus Ramb. Andalusia.

5. deceptorius Bol. Hisp. centr.

6. Mabillei Bol. Hispania.

hespericus Bol. (*Sinops.*)

7. mauritanicus Bol. Maur.

8. simillimus Yers. Sicil.

? reticulatus Fisch. Messina.

Subgen. **Eumigus** Bol.

9. monticola Ramb. Andalusia.

- Subgen. **Pamphagus** *sens. str.*
10. *marmoratus* Burm. Sicilia.
  11. *elephas* L. Algeria.  
    *numidicus* Poir.
  4. *flexuosa* Serv. Hispania.
  5. *maculinervis* Stål. Asia. min.

**Eunapius** Stål.

1. *Bolivarii* Stål. Hisp. mer.
2. *rugulosus* Stål. Hisp. mer.
3. *granosus* Stål. Afr. bor.
4. *terrulentus* Serv. Hispania.
5. *Brunnerii* Stål. Algeria.  
    *? sitifensis* Bris. Algeria.

**Nocarodes** Fisch. W.

1. *Brunnerii* Bol. Hispania.
2. *Durieui* Bol. Maur.
3. *nigro-punctatus* Luc. Algeria.
4. *canonicus* Fisch. Fr. Eur. mer.
5. *Volxemii* Bol. Algeria.
6. *longicornis* Bol. Algeria.
7. *Straubei* Fieb. Turcia.
8. *cyanipes* Fisch. W. Armenia.  
    *rubripes* Fisch. W. Turc. Rum.  
    *? serricollis* Fisch. W.

*Pamphaginae inc. sedis.*

1. *quadridentatus* Bris. Algeria.
2. *microptera* Bris. Algeria.  
    *decipiens* Bris.
3. *variegatus* Fisch. W. Caucasus.
4. *femoralis* Fisch. W. Caucasus.
5. *brevicornis* Cost. Italia. mer.
6. *affinis* Fieb. Hispania.
7. *tibialis* Fieb. Lusitania.

**Bryodema** Fieb.

1. *baicalensis* F. W. Karabagh.

**Cuculligera** Fisch. Fr.

- Prionotropis* Fieb.
1. *hystrix* Germ. Eur. mer.
  2. *appula* Cost. Apulia, Sicilia.
  3. *Perezii* Bol. Hispania.

4. *flexuosa* Serv. Hispania.
5. *maculinervis* Stål. Asia. min.

**Eremobia** Serv.

- Thrinchus* Fisch. Fr.
1. *cisti* Fabr. Hispania, Ægypt.
  2. *pulchripennis* Serv. Ægypt.
  3. *Clavellii* Luc. Boghar.
  4. *Jaminii* Luc. Biskra.
  5. *muricata* Pall. Ross. mer.  
    *muricata* ♀ Fisch. W.  
    *turrita* ♂ Fisch. W.
  6. *limbata* Charp. Turcia.
  7. *obtusa* Fieb. (*Glyphanus*) Rum.
  8. *gibbera* Stål. Syria.
  9. *accesoria* Fisch. W. Georg.
  10. *carinata* Fabr. Sinai.
  11. *continuata* Serv. Afr.
  12. *campanulata* Fisch. W. Georg.
  13. *biloba* Stål. Daghestan.
  14. *cinerascens* Stål. Persia.
  15. *subsulcata* Stål. Persia.

**Thrinchus** Fisch. W.

1. *Schrankii* Fisch. W. Ross. mer.

**Œdipoda** Latr.

- Clyphippus* Stål (olim.)
1. *tuberculata* Fabr. Eur. or.
  2. *barbarensis* Fisch. W. Afr. bor.  
    *Thunbergi* Stål.
  3. *granulosa* Walk. Belukistan.

**Egnatius** Stål

1. *apicalis* Fieb. Sarepta.

**Acrotylus** Fieb.

- Œdipoda* Fisch. Fr. (ex. part.)
1. *insubricus* Scop. Eur. mer.
  2. *patruelis* Sturm. Eur. mer.
  3. *concinus* Serv. Sibir. Ægypt.
  4. *longipes* Charp. Sic. Ture. Alg.
  5. *octofasciatus* Serv. Ægypt.

**Sphinctonotus** Fieb.*Edipoda* ex. part. auct.

1. azurescens Ramb. Hisp. Algeria.  
? arenarius Luc.
2. cœrulans L. Eur. c. et mer.
3. cyanopterus Charp. Eur. c. et mer.
4. ? callosus Fieb. Hispania.
5. Kittaryi Fieb. Rossia mer.
6. ? Clausii Kitt. Rossia mer.

**Ctyphippus** Fieb.*Edipoda* Serv. p.

1. cœrulescens L. Eur. Africa.  
fasciatus Sieb.  
cyanopterus Ramb.  
? fusco-cinctus Luc.  
var. miniatus Pall.  
germanicus Latr.
2. gratiosus Serv. Eur. mer.  
mauritanicus Luc.
3. variabilis Pall. Eur. mer.  
subcœruleipennis Charp.  
Pallasi Fieb.  
rhodoptilus Charp.  
affinis F. W.
4. Wagnerii Eversm. Ross. mer.
5. algerianus Luc. Algeria.
6. sculus Fieb. Sicilia.
7. Charpentieri Fieb. Græcia.  
venustus Fieb.

**Pyrgodera** Fisch. W.*Pachytylus* Fisch. Fr. p.

1. armata Fisch. W. Eur. or. Asia.

**Pachytylus** Fieb.Subgen. **Pachytylus** sens. str.

1. migratorius L. Tartaria, Eur. or.
2. cinerascens Fabr. Eur.  
migratorius Ramb.
- Subgen. **Œdaleus** Fieb.
3. nigro-fasciatus De Geer. Eur.  
flavus Fabr. (Gryllus).

**Psophus** Fieb.

1. stridulus L. Eur.

**Cosmorthyssa** Stål.

1. sulcata Thunb. Syria, Afr.

**Epacromia** Fisch. Fr.*Aiolopus* Fieb.

1. thalassina Fabr. Eur. c. et mer.  
? pulverulenta Fisch. W.  
gracilis Charp.
2. strepens Latr. Eur. mer.
3. tergestina Charp. Ross. mer. Istr.
4. angustifemur Ghil. Italia.

**Stetheophyma** Fisch. Fr.

1. grossum L. Europa.  
rubripes De Geer.

**Parapleurus** Fisch. Fr.

4. typus Fisch. Fr. Eur. centr.  
parapleurus Hag. (Gryllus).

**Stauronotus** Fisch. Fr.*Dociostaurus* Fieb.

4. maroccanus Thunb. Medit.  
cruciatus Charp.  
? crucigerus Ramb.
2. Hauensteini Brunn. (in litt.) Syr.
3. Genei Ocsk. Eur. mer.
4. histrio Fisch. Fr. Tauria, Sibir.
5. labiatus Brullé. Græcia.
6. annulipes Türk. Austria.
7. brevicollis Eversm. Hungaria.
8. turcomanus (F. W.) Br. Turcom.

**Arcyptera** Serv.*Stetheophyma* et *Stauronotus*  
Fisch. Fr. par.

1. tibialis Brullé. Græcia.
2. flavicosta Fisch. Fr. Eur. mer.  
cruciatus Ph. (Gryllus.)  
Stollii Fieb.

- |   |                     |  |                 |
|---|---------------------|--|-----------------|
| 3. fusca <i>Pallas.</i>                   | Eur. c. et mer.     | 19. Raymondii <i>Yers.</i>               | Hyeres.         |
| variegata <i>Sulz.</i>                    |                     | 20. petraeus <i>Bris.</i>                | Eur. mer.       |
| cothurnata <i>Serv.</i>                   |                     | 21. minutissimus <i>Bol.</i>             | Hisp.           |
| 4. brevipennis <i>Krauss.</i>             | Istr.               | Subgen. <b>Chorthippus.</b> <i>Fieb.</i> |                 |
| <b>Chrysocochaon</b> <i>Fisch. Fr.</i>    |                     | 22. rufipes <i>Zett.</i>                 | Eur.            |
| 1. dispar <i>Hey.</i>                     | Eur. centr.         | ventrale <i>Bris.</i> (Acridium).        |                 |
| 2. brachypterus <i>Ocsk.</i>              | Eur. c. et mer.     | Zetterstedtii <i>Fieb.</i>               |                 |
| <b>Gomphocerus</b> <i>Thunb.</i>          |                     | cruentata <i>Brullé.</i> (Edip.)         |                 |
| <i>Stenobothrus</i> <i>Fisch. Fr.</i>     |                     | 23. viridulus <i>L.</i>                  | Eur.            |
| <i>Chorthippus</i> <i>Fieb.</i>           |                     | ♂ nigro-terminatum <i>De Geer.</i>       |                 |
| Subgen. <b>Phlocerus</b> <i>Fisch. W.</i> |                     | (Acridium.)                              |                 |
| 1. Menetriesi <i>Fisch. W.</i>            | Caucasus.           | ♀ rufo-marginatum <i>De Geer.</i>        |                 |
| Subgen. <b>Gomphocerus</b> <i>Thunb.</i>  |                     | (Acridium.)                              |                 |
| 2. rufus <i>L.</i>                        | Eur. centr. et mer. | 24. pullus <i>Phil.</i>                  | Transsilv.      |
| 3. ? deserticola <i>Eversm.</i>           | Ural.               | 25. vagans <i>Fieb.</i>                  | Eur. c. et mer. |
| 4. maculatus <i>Thunb.</i>                | Eur. c. et bor.     | subsinguatus <i>F. Fr.</i>               |                 |
| biguttatus <i>Fisch. Fr.</i>              |                     | 26. biguttulus <i>L.</i>                 | Eur.            |
| 5. antennatus <i>Fieb.</i>                | Hung. Ross.         | variabilis <i>Fieb.</i>                  |                 |
| 6. brevipennis <i>Bris.</i>               | M. Pyren.           | var. lutescens <i>Fieb.</i>              |                 |
| 7. sibiricus <i>L.</i>                    | Eur. centr.         | — virescens <i>Fieb.</i>                 |                 |
| caucasicus <i>Fieb.</i>                   |                     | — purpurascens <i>Fieb.</i>              |                 |
| Subgen. <b>Stenobothrus</b> <i>F. Fr.</i> |                     | — prasinus <i>Fieb.</i>                  |                 |
| 8. melanopterus <i>Borck.</i>             | Eur.                | — nigrinus <i>Fieb.</i>                  |                 |
| morio <i>Charp.</i> (Gryllus.)            |                     | — murinus <i>Fieb.</i>                   |                 |
| scalaris <i>Fisch. W.</i> (Edipoda.)      |                     | — cognatus <i>Fieb.</i>                  |                 |
| 9. apricarius <i>L.</i>                   | Eur. c. et bor.     | 27. apicalis <i>H. S.</i>                | Hispania.       |
| 10. lineatus <i>Panz.</i>                 | Eur.                | hyalinus <i>Yers.</i>                    |                 |
| 11. nigro-geniculatus <i>Krauss.</i>      | Istr.               | 28. binotatus <i>Charp.</i>              | Hisp. Lusit.    |
| 12. nigro-maculatus <i>H. S.</i>          | Eur.                | 29. albomarginatus <i>De Geer.</i>       | Eur.            |
| var. istrianus <i>Krauss.</i>             |                     | dorsatus <i>Fisch. Fr.</i>               |                 |
| 13. crassipes <i>Ocsk.</i>                | Hung. Cauc.         | 30. parallelus <i>Zett.</i>              | Eur.            |
| 14. miniatus <i>Charp.</i>                | Eur.                | pratorum <i>Fieb.</i>                    |                 |
| Subgen. <b>Omocestus</b> <i>Bol.</i>      |                     | ? dimidiatus <i>Brullé.</i> (Podisma.)   |                 |
| 15. Uhagonii <i>Bol.</i>                  | Hisp. centr.        | ? tenuis <i>Brullé.</i> (Podisma.)       |                 |
| 16. stigmaticus <i>Ramb.</i>              | Eur.                | longicornis <i>Latr.</i>                 |                 |
| Ramburi <i>Fieb.</i>                      |                     | var. parallelus <i>Zett.</i>             |                 |
| 17. haemorrhoidalis <i>Charp.</i>         | Eur.                | — montanus <i>Charp.</i>                 |                 |
| ? minuta <i>Brullé.</i> (Edipoda.)        |                     | — elegans <i>Fisch. Fr.</i> (olim.)      |                 |
| var. velatus <i>Charp.</i>                |                     | 31. elegans <i>Charp.</i>                | Eur.            |
| 18. Bolivarii <i>Brunn.</i>               | Hisp. centr.        | 32. declivus <i>Bris.</i>                | Medit.          |
| ? Kollari <i>Fieb.</i>                    |                     | ? albolineata <i>Luc.</i> (Edipoda.)     |                 |
|   |                     | 33. hispanicus <i>Ramb.</i>              | Eur. mer.       |
|   |                     | 34. jucundus <i>Fisch. Fr.</i>           | Hispania.       |

*Species incertæ sedis.*

- |                   |         |              |
|-------------------|---------|--------------|
| 35. abruptipennis | Borck.  | Suecia.      |
| 36. geniculatus.  | F.W.    | Rossia. mer. |
| 37. carbonarius   | Eversm. | Ross. mer.   |
| 38. luteicornis   | F.W.    | Ross. mer.   |
| 39. discoidalis   | Eversm. | Ural.        |
| 40. ?moderatus    | Eversm. | Ural.        |
| 41. Lucasi        | Bris.   | Algeria.     |
| 42. amaeus        | Bris.   | Algeria.     |
| 43. simplex       | Eversm. | Ural.        |
| 44. latus         | Walk.   | Cairo.       |
| 45. tricarinatus  | Steph.  | Anglia.      |
| 46. albicornis    | Eversm. | Volga.       |
| 47. ?latus        | Brullé. | Candia.      |

### **Oxycoryphus** *Fisch. Fr.*

*Calephorus* Fieb.

*Gryllus* Ramb.

1. *compressicornis* *Latr.* Gallia mer.  
Hispania, Ægypt.  
*dubius* *Ramb.*  
*elegans* *Fieb.*

2. ? *fractus* *Fieb.* Syria.  
3. ? *venustus* *Walk.* Cairo.

**Paracinema** Fisch. Fr.

1. tricolor Thunb. Eur. mer. Alg.  
bisignatum Charp.  
2. sylvestre Thunb. Algeria.  
virescens Luc. (Edipoda.)

## Ochrilidia Stål.

*Opomala* Fisch. Fr. ex p.

*Platypterna* Fieb.

4. *tryxalicera* Fisch. Fr. Sicilia.  
    *longicornis* Fieb.  
    *tibialis* Fieb.

### **Acrida** Stål.

*Truxalis* auct.

1. *lineata* Thunb. Mauritania.  
 2. *turrita* L. Eur. mer. Afr. bor.  
     *nasuta* Fischer. Fr.

3. *nasuta* L. Hisp. Afr. bor.  
     *miniata* Klug.  
     *procera* Klug.  
     *unguiculata* Ramb.

## **Pyrgomorpha** Serv.

4. *rosea* Charp. Eur. mer.  
2. *granosa* Stål. Syria.

## **Chrotogonus** *Serv.*

*Ommexechia* Brullé, Blanch. p.

1. lugubris *Blanch.*      Ägypt.  
 2. homalodema *Blanch.*      Sennaar.

### Pœcilocerus Serv.

- |                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| 4. <i>roseipennis</i> <i>Serv.</i>    | Ægypt. |
| 2. <i>bufonius</i> <i>Klug.</i>       | Ægypt. |
| 3. <i>Vulcanus</i> <i>Serv.</i>       | Cairo. |
| 4. <i>punctiventris</i> <i>Serv.</i>  | Ægypt. |
| 5. <i>hieroglyphicus</i> <i>Klug.</i> | Ægypt. |

### **Tettix** Charp.

1. brachyptera *Luc.* Algeria.  
uncinata *Luc.* (non *Serv.*)

2. bipunctata *L.* Eur. Afr.  
Linnei *Fieb.*  
Schrankii *Fieb.*

*var.* conspersa *Fieb.*

  - circumscripta *Fieb.*
  - carinalis *Fieb.*
  - punctulata *Fieb.*
  - bipunctata *Fieb.*
  - deltigera *Fieb.*
  - hilaris *Fieb.*
  - punctatosignata *Fieb.*
  - hieroglyphica *Fieb.*
  - marmorata *Fieb.*
  - discolor *Fieb.*
  - equestris *Fieb.*
  - dorsalis *Fieb.*
  - ziczac *Fieb.*
  - limbata *Fieb.*
  - vittata *Fieb.*

## FAM. VI. Gryllidæ.

## Gryllotalpa Latr.

4. *vulgaris* *Latr.* Eur. As. Afr.  
2. *unispina* *Sauss.* Tartaria.

### **Tridactylus Ol.**

Xya Illig.

4. variegatus *Latr.* Eur. mer.  
 2. Savignyi *Guér.* Ægypt.  
     fasciatus *Guér.*  
 3. tartarus *Sauss.* Tartar. Ural.  
     variegatus *Kitt.*

## Nemobius Serv.

1. *silvestris* *Fabr.* Eur.
  2. *lineolatus* *Brullé*. Gall. mer. Hisp.  
hirticollis *Duf.*
  3. *tartarus* *Sauss.* Tartar. Cauc.
  4. *lateralis* *Costa*. Italia. mer.
  5. *Heydenii* *Fisch. Fr.* Eur. c. et mer.

## **Brachytrypes** Serv.

- #### 4. *megacephalus* Serv. Sicil. Afr.

### **Liogryllus** *Sauss.*

*Gryllus* Fisch. Fr. p.

1. *campestris* L. Eur. Medit.
  2. *bimaculatus* De Geer. Medit.  
capensis Fabr.
  3. *morio* Fabr. Massana.

**Gryllus L.**

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. <i>desertus Pall.</i>   | Medit. Asia.       |
| <i>var. desertus Pall.</i> |                    |
| — <i>tristis Serv.</i>     |                    |
| — <i>melas Charp.</i>      |                    |
| 2. <i>Brunnerii Selys.</i> | Maur.              |
| 3. <i>domesticus L.</i>    | Medit. Cosm.       |
| 4. <i>hispanicus Ramb.</i> | Hisp. mer. Afr.    |
| 5. <i>frontalis Fieb.</i>  | Eur. c. et mer. As |

6. *gossypii* Cost. Italia. mer.
7. *tartarus* Sauss. Tartar. Cauc.
8. *burdigalensis* Latr. Medit.  
*var. Cerisyi* Serv.
- *cinereus* Cost.
- *arvensis* Ramb.
9. *cyprius* Sauss. Cyprus.
10. *algerius* Sauss. Alg. As. min.  
*Species dubiae.*
11. *aegyptiacus* De Haan. Ægypt.
12. *tomentosus* Eversm. Kirgisia.

**Gryllodes** Sauss.

1. *apricus* Sauss. Ægypt.
2. *hebraeus* Sauss. Palæstina.
3. *niloticus* Sauss. Ægypt.
4. *lateralis* Fieb. M. Casp.
5. *pipiens* Duf. Hispania.
6. *terrestris* Sauss. Tartaria.

**Platyblemmus** Serv.

1. *lusitanicus* Serv. Hisp. Afr.  
*maculatus* Fieb.  
*var. Ramburi* Serv.
2. *umbraculatus* L. Mauritania.
3. *caliendum* Fisch. Fr. Hisp. mer.  
Kollari Fieb.
4. *barbarus* Sauss. Mauritania.

**Gryllomorpha** Fieb.

1. *dalmatina* Ocsk. Eur. mer.  
*aptera* H. S.  
*longicauda* Ramb.  
*fasciata* Fieb.

**Myrmecophila** Latr.

- Sphaerium* Charp.
1. *acervorum* Panz. Eur. c. et mer.  
*mauritanica* Luc.  
*hirticauda* Fisch. W.  
*bifasciata* Fisch. W.
  2. *ochracea* Fisch. Fr. Sicilia.

**Mogisoplistus** Sauss.

- Mogopistes* Serv.
1. *squamiger* Fisch. Fr. Eur. mer.  
*talitrus* Costa.
  2. *brunneus* Serv.  
*marginatus* Costa.

**Arachnocephalus** Costa.

- Physoblemma* Brunn.
1. *Yersini* Sauss. Eur. mer.
  2. *vestitus* Costa. Ital. mer.
  3. *dalmatinus* Sauss. Dalmatia.  
*angustatus* Brunn.

**Œcanthus** Serv.

1. *pellucens* Scop. Eur. c. et mer.  
*aqueus* Fabr.

**Trigonidium** Serv.

1. *cicindeloides* Serv. Eur. mer.

**Anaxiphus** Sauss.

1. *?averni* Costa. Ital. mer.

**Heterotrypus** Sauss.

1. *africanus* Sauss. Chartum.

**FAM. VII. Locustidæ.****Orphania** Fisch. Fr.

1. *denticauda* Charp. Eur. c. et mer.

2. *affinis* Fieb. Serbia, Mehadia.
3. *ornatus* Schmidt. Istr. Dalm.  
Fieberi Ulrich.

**Pœcilimon** Fisch. Fr.

1. *obesus* Fieb. Epirus, Parnassus.

4. *Sancti-Pauli* Br. Ephess. Smyr.
5. *hamatus* Brunn. Smyr. Rhodus.

6. concinnus <i>Fieb.</i>	Amas.	11. amplipennis <i>Brunn.</i> Bos. Bruss.
7. unispinosus <i>Brunn.</i>	Smyrn.	12. rectipennis <i>Brunn.</i> Brussa.
8. flavescentia <i>H. S.</i>	Rossia, Turcia.	13. acuminata <i>Brunn.</i> Amasia.
9. bosphoricus <i>Brunn.</i>	Bosphorus.	14. Savignyi <i>Brunn.</i> Berytus.
10. propinquus <i>Fieb.</i>	Parn. Athen.	15. major <i>Brunn.</i> Taur. Cyprus.
11. amicus <i>Brunn.</i>	Smyrn.	
12. Brunneri <i>Friv.</i>	Mehad. Serbia.	
13. elegans <i>Fieb.</i>	Istria, Maced.	
14. ampliatus <i>Brunn.</i>	Istria.	
15. Fussii <i>Fieb.</i>	Serb. Mehad.	
16. intermedius <i>Fieb.</i>	Ross. mer.	
17. thoracicus <i>Fieb.</i>	Serb. Mehad.	
18. levissimus <i>Fisch. Fr.</i>	Messina.	
19. Jonicus <i>Koll.</i>	Eur. mer.	
	superba <i>F. Fr.</i>	
20. nobilis <i>Fieb.</i>	Athen.	
21. Schmidtii <i>Fieb.</i>	Mehad.	
	♂ laticauda <i>Friv.</i>	

**Barbitistes Charp.**

1. serricauda <i>Fabr.</i>	Eur. centr.
	sanguinolentus <i>Motsch.</i>
	assimilis <i>Fieb.</i>
2. constrictus <i>Brunn.</i>	Bukowina.
3. Yersini <i>Brunn.</i>	Istr. Dalm.
4. Fischerii <i>Yersin.</i>	Hyeres.
5. Sanzii <i>Bol.</i>	Hispania.
6. Frivaldszkyi <i>Brunn.</i>	Mehad.
7. Oczkayi <i>Charp.</i>	Fiume.
8. nigro-vittatus <i>Brunn.</i>	Maced.
9. pulchripennis <i>Cost. Calabri.</i> Ligur.	

**Isophya Brunn.**

1. Straubei <i>Brunn.</i>	Turc. Smyrna.
2. Pavelii <i>Brunn.</i>	Const. Brussa.
3. modesta <i>Fieb.</i>	Mehad.
4. costata <i>Brunn.</i>	Austria.
5. taurica <i>Eversm.</i>	Tauria.
6. camptoxypha <i>Fieb.</i>	Eur. centr.
7. Kraussii <i>Brunn.</i>	Suabia.
8. brevipennis <i>Brunn.</i>	Tanssilvania.
9. speciosa <i>Fieb.</i>	Mehad.
10. Schneideri <i>Brunn.</i>	Baku.

11. amplipennis <i>Brunn.</i>	Bos. Bruss.
12. rectipennis <i>Brunn.</i>	Brussa.
13. acuminata <i>Brunn.</i>	Amasia.
14. Savignyi <i>Brunn.</i>	Berytus.
15. major <i>Brunn.</i>	Taur. Cyprus.

**Odontura Ramb.**

1. aspericauda <i>Ramb.</i>	Hisp. mer.
2. spinulicauda <i>Ramb.</i>	Andalus.
	Charpentieri <i>Fieb.</i>
	? glabricauda <i>Charp.</i>
3. stenoxypha <i>Fieb.</i>	Sic. Mesin.
	pyrenaea <i>Fisch. Fr.</i>
4. algerica <i>Brunn.</i>	Algeria.
5. Borrei <i>Bol.</i>	Algeria.

**Leptophyes Fieb.**

Odontura <i>Fisch. Fr. p.</i>	
1. laticauda <i>Friv.</i>	Eur. mer.
	ruficosta <i>Frey-Gesn.</i>
2. punctatissima <i>Bosc.</i>	Eur.
	autumnalis <i>Charp.</i>
	virescens <i>Steph. (Ephippigera.)</i>
3. albovittata <i>Koll.</i>	Eur. c. et bor.
	punctatissima <i>Fieb.</i>
4. Boscii <i>Fieb.</i>	Eur.
5. discoidalis <i>Fieb.</i>	Mehad.
6. vittata <i>Mots.</i>	Karkoff.

**Acrometopa Fieb.**

Phaneroptera <i>Burm. Serv.</i>	
1. macropoda <i>Burm.</i>	Eur. mer.
2. Servillea <i>Brullé.</i>	Morea, Const.
3. syriaca <i>Brunn.</i>	Berytus, Smyrna.

**Phaneroptera Serv.**

1. falcata <i>Scop.</i>	Eur.
2. quadripunctata <i>Brunn.</i>	Eur. mer.
3. nana <i>Charp.</i>	Lusit. Hisp.
4. minima <i>Brunn.</i>	Ægyptus.

**Diogena Brunn.**

1. fausta <i>Burm.</i>	Ægypt.
------------------------	--------

**Tylopsis** Fieb.

1. *liliifolia* *Fabr.* Eur. mer.  
var. *margineguttata* *Serv.*  
2. *bilineolata* *Serv.* Syria.

**Meconema** *Fabr.*

1. *varium* *Fabr.* Eur. med. et bor.  
2. *brevipenne* *Yersin.* Gall. Ital.  
meridionale *Cost.*

**Cyrtaspis** *Fisch. Fr.*

1. *scutata* *Charp.* Eur. mer.  
*variopicta* *Cost.*

**Conocephalus** Thunb.

1. *mandibularis* *Charp.* Eur. mer.

**Xyphidium** *Serv.*

1. *fuscum* *Fabr.* Eur. med. et bor.  
2. *dorsale* *Latr.* Eur. med. et bor.  
3. *aethiopicum* *Thunb.* Hisp. Afr.  
4. *concolor* *Burm.* Medit.  
5. *hastatum* *Charp.* Hungar. Serbia.  
6. *stramineum* *Klug.* Ægyptus.

**Locusta** *Fabr.*

1. *viridissima* *L.* Eur.  
2. *Savignyi* *Luc.* Algeria.  
3. *caudata* *Charp.* Eur. mer.  
4. *cantans* *Fuessly.* Eur.  
gaverniensis *Serv.*  
5. *thoracica* *F. W.* Ross. mer.

**Saga** *Charp.*

1. *serrata* *Fabr.* Ross. Hung.  
2. *longicaudata* *Krauss.* Taur.  
3. *ornata* *Burm.* Ægypt. Beryt.  
4. *ephippigera* *Fisch. W.* Caucas.  
5. *monstrosa* *Krauss.* Palæst.  
6. *vittata* *Fisch. W.* Ross. mer. Epir.  
7. *Natoliæ* *Serv.* Turc.  
synophrys *Charp.*  
8. *syriaca* *Luc.* Syrie.

**Thamnotrizon** *Fisch. F.*

1. *Chabrieri* *Charp.* Eur. mer.  
Schmidtii *Fieb.*  
magnificus *Costa.*  
2. *sorrezensis* *Marquet.* Gall. mer.  
3. *noctivagus* *Krauss.* Istria.  
fallax *Yersin.*  
4. *fallax* *Fisch. Fr.* Eur. mer.  
austriacus *Türk.*  
viennensis *Brunn.*  
5. *pustulipes* *Motsch.* Tauria.  
6. *dalmaticus* *Krauss.* Dalmatia.  
? femoratus *Fieb.*  
7. *littoralis* *Fieb.* Dalmat. Græc.  
8. *signatus* *Brann.* Tauria.  
9. ? *caucasicus* *Fisch.* Caucasus.  
10. *punctifrons* *Burm.* Syr. Ægypt.  
Ehrenbergii *Fieb.*  
11. *Frivaldszkyi* *Herm.* Transsilv.  
12. *transsilvanicus* *F. Fr.* Transs.  
13. *Mikoi* *Herm.* Transsilvania.  
14. *apterus* *Fabr.* Eur. mer.  
? *Ramburi* *Serv.* (Pterol.)  
lugubris *Fieb.*  
15. *similis* *Brann.* Mehadia.  
16. *diformis* *Brann.* Carniola.  
17. *striolatus* *Fieb.* Croat. Ital.  
appendiculatus *Brann.*  
18. *gracilis* *Brann.* Hung. Serb. Carn.  
19. *cinereus* *L.* Eur. mer. et bor.  
clypeatus *Panz.*  
20. *specularis* *F. W.* Eur. mer. et b.  
21. *tartarus* *Sauss.* Tartaria.  
22. ? *Ledereri* *Fieb.* Beryt.  
23. ? *radiatus* *Fisch. W.* Sibiria.  
24. ? *dorsalis* *Fieb.* Turc.  
25. *Erberi* *Brann.* Epirus.  
26. *smyrnensis* *Brann.* Ephessus.  
  
**Rhacocleis** *Fieb.*  
1. *annulatus* *Fieb.* Sicilia.  
2. *modesta* *Fisch. Fr.* Ital. Sicil.  
discrepans *Fieb.*

- |                                     |                   |                                  |               |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|
| 3. <i>Raymondi Yers.</i>            | Dalmatia.         | 6. <i>bicolor Ph.</i>            | Eur. med.     |
| dorsata <i>Brunn.</i>               |                   | var. <i>Sieboldi Fisch. Fr.</i>  |               |
| 4. <i>Brissouti Yers.</i>           | Sicilia.          | 7. <i>alpinus Koll.</i>          | Eur. med.     |
| 5. <i>germanica H. S.</i>           | Carinthia.        | ? <i>Saussurianus Frey Gesn.</i> |               |
| 6. <i>spoliata Ramb.</i>            | Andal.            | 8. <i>strictus Zeller.</i>       | Eur. med.     |
| 7. <i>Buchichii Brunn.</i>          | Dalmat.           | assimilis <i>Fieb.</i>           |               |
| <br><b>Pterolepis Ramb.</b>         |                   |                                  |               |
| 4. <i>Brunnerii Krauss.</i>         | Tyrol.            | 9. <i>decoratus Fieb.</i>        | Hispania.     |
| 2. ? <i>alpina Yers.</i>            | Alpes.            | 10. <i>tessellatus Charp.</i>    | Eur. mer.     |
| 3. <i>pedestris Charp.</i>          | Eur. med.         | 11. <i>Fedtschenkoi Sauss.</i>   | Tartaria.     |
| <br><b>Paradrymadusa Herm.</b>      |                   |                                  |               |
| 1. <i>sordida Herm.</i>             | Caucasus.         | 12. <i>Tamerlanus Sauss.</i>     | Tartaria.     |
| 2. <i>spinibrachia Fisch. Fr.</i>   | Hisp.             | 13. <i>montanus Koll.</i>        | Alemania.     |
| 3. <i>Kraussii Bol.</i>             | Hispania.         | Eversmanni <i>Kitt.</i>          |               |
| <br><b>Drymadusa Stein.</b>         |                   |                                  |               |
| 1. <i>spectabilis Stein.</i>        | Græc. As. min.    | 14. <i>intermedius Serv.</i>     | Eur. Asia.    |
| <br><b>Gampsocleis. Fieb.</b>       |                   |                                  |               |
| 1. <i>abbreviata Brunn.</i>         | Dalmat.           | Krynickii <i>Fisch. W.</i>       |               |
| 2. <i>glabra Herbst.</i>            | Eur.              | 15. <i>affinis Fieb.</i>         | Eur. mer.     |
| <br><b>Thyreonotus Serv.</b>        |                   |                                  |               |
| 1. <i>corsicus Serv.</i>            | Hisp. Cors.       | Boscae <i>Bol.</i>               |               |
| <br><b>Ctenodecticus Bol.</b>       |                   |                                  |               |
| 1. <i>pupulus Bol.</i>              | Hisp. centr.      | 16. <i>griseus Fabr.</i>         | Eur.          |
| <br><b>Psorodonotus Brunn.</b>      |                   |                                  |               |
| 1. <i>Fieberi Friv.</i>             | Serbia.           | 17. <i>Trockii Kitt.</i>         | Tartaria.     |
| Pancicii <i>Brunn.</i>              |                   | 18. <i>striatus Kitt.</i>        | Tartar. Ross. |
| <br><b>Platycleis Fieb.</b>         |                   |                                  |               |
| 1. <i>andalusicus Bol.</i>          | Huelva.           | 19. <i>marmoratus Fieb.</i>      | Illyria.      |
| 2. <i>modestus Fieb.</i>            | Eur. or.          | 20. <i>vittatus Eversm.</i>      | Tartar. Ross. |
| vittatus <i>F. Fr. (non Charp.)</i> |                   | Species <i>dubiae.</i>           |               |
| 3. <i>sepium Yersin.</i>            |                   | 21. <i>tibialis Fisch. W.</i>    | Sibiria.      |
| 4. <i>brachypterus L.</i>           | Eur. med. et bor. | 22. <i>nigrosignatus Costa.</i>  | Calabria.     |
| 5. <i>brevipennis Charp.</i>        | Eur. med. et bor. | 23. <i>Stchukini Fisch. W.</i>   | Sibiria.      |
| sinuatus <i>F. W.</i>               |                   | 24. <i>Sedakovii Fisch. W.</i>   | Sibiria.      |
| dilutus <i>Eversm.</i>              |                   | 25. <i>macrocephalus F. W.</i>   | Kirgisia.     |
| <br><b>Decticus Serv.</b>           |                   |                                  |               |
| 1. <i>assimilis Fieb.</i>           |                   | Tiflis.                          |               |
| 2. <i>syriacus Fieb.</i>            |                   | Syria.                           |               |
| 3. <i>albifrons Fabr.</i>           |                   | Eur. mer.                        |               |
| monspeliensis <i>Rb. Serv.</i>      |                   |                                  |               |
| 4. <i>verrucivorus L.</i>           |                   | Eur.                             |               |
| <br><b>Onconotus Fisch. W.</b>      |                   |                                  |               |
| 1. <i>Servillei Fisch. W.</i>       |                   | Ross. mer.                       |               |
| 2. <i>Laxmanni Pall.</i>            |                   | Sibiria.                         |               |
| 3. <i>Eversmanni Fisch. W.</i>      |                   | Ross. mer.                       |               |
| 4. <i>Motschoulskii Fisch. W.</i>   |                   | Caucas.                          |               |
| 5. <i>coriaceus Fisch. W.</i>       |                   | Caucas.                          |               |
| 6. <i>Boschniakii Fisch. W.</i>     |                   | Ross. mer.                       |               |
| 7. ? <i>marginatus Fabr.</i>        |                   | Ross. mer.                       |               |

**Amphiestris** Fieb.*Barbitistes* Ramb.

1. *bætica* Ramb. Andalusia.

**Callimenus** Fisch. W.

1. *oniscus* Charp. Ross. mer. Turc.  
*dasypus* Serv. (Bradypl.)  
*macrogaster* Lef.  
*var. longicollis* Fieb.  
— *brachynotus* Fieb.

2. *dilatatus* Stål. As. min.  
3. *restrictus* Fisch. W. Ross. mer.

**Dinarchus** Stål.

- Callimenus* F. Fr. p.  
1. *dasypus* Illig. Hungaria.  
*armadillo* Thunb.

**Deracantha** Fisch. W.

1. *onos* Pall. Ross. mer.  
*cincta* Fisch. W.  
2. *camelus* Fisch. W. Dauria.  
3. *antilope* Fisch. W. Sibiria.  
4. *aranea* Fisch. W. Dauria.

**Eugaster** Serv.

- Anepisceptus* Fieb.  
*Hetrodes* Serv.  
1. *horridus* Burm. Syria, Arabia.  
2. *Guyoni* Serv. Algeria.

**Pycnogaster** Graells.*Bradyporus* Ramb.

1. *inermis* Ramb. Andalusia.  
2. *jugicola* Graells. Hisp. med.  
3. *cucullatus* Charp. Lusit. Alg.  
4. *Graellsii* Bol. Hisp. med.

**Ephippiger** Serv.*Barbitistes* Charp.Subgen. **Uromenus** Bol.

1. *Durieui* Bol. Barcino.  
2. *rugosicollis* Serv. Gall. mer.

3. *latipennis* Fisch. Fr. Algeria.

4. *laticollis* Luc. Algeria.

Subgen. **Ephippiger** Serv.

5. *longicauda* Bol. Hisp. c.

6. *areolarius* Bol. Hisp. c.

7. *carinatus* Bol. Aranjuez.

8. *Saussurianus* Bol. Burgos.

9. *dilutus* Bol. Hisp. c.

10. *nigro-marginatus* Luc. Algeria.

11. *hispanicus* Fieb. Andal.

12. *Paulinoi* Bol. Andalusia.

13. *limbatus* F. Fr. Dalm. Lusit.? discoidalis Fieb.

*selenophorus* Fieb.

14. *sphacophilus* Krauss. Istria.

15. *vitium* Serv. Eur. centr. perforatus Burm.

*Rossii* Fieb.*Fibigii* Fieb.*Fabricii* Fieb.

16. *perforatus* Rossi. Italia.

17. *Zapaterii* Bol. Hispan. or.

18. *compressicollis* Fisch. Fr. Alg.

19. *provincialis* Yers. Hyeres.

20. *Cunii* Bol. Barcino.

21. *bitterrensis* Marq. Gall. mer.

22. *Zelleri* Fisch. Fr. Italia.

23. *terrestris* Yers. Provenza.

24. *Idomenæi* Luc. Candia.

25. *ustulatus* Ramb. Andalusia.

26. *Burmeisteri* Fieb. As. min. Afr. cucullatus Burm.

Subgen. **Steropleurus** Bol.

27. *Stål's* Bol. Escurial.

28. *Perezii* Bol. Osca.

29. *selliger* Charp. Hisp. mer.

*scabricollis* Ramb.*andalusius* Ramb.

30. *costaticollis* Luc. Algeria.

31. *elegans* Fisch. Fr. Ital. mer.

32. *Seoanei* Bol. Ferrol.

33. *Ramburii* Bol. Bilbao.

*? monticola* Ramb.

- |                                  |            |                                 |            |
|----------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| 34. brevicollis Fisch. Fr.       | Algeria.   | 51. vacca Fisch. W.             | Sibiria.   |
| 35. maculatus Yers.              | Sicilia.   | 52. ? spinosus F. W.            | Sibiria.   |
| 36. Martorellii Bol.             | Barcino.   | 53. ? verrucosus F. W.          | Dauria.    |
| 37. castellanus Bol.             | Burgos.    |                                 |            |
| 38. Brunnerii Bol.               | Hisp. c.   |                                 |            |
| 39. pseudolus Bol.               | Andalusia. |                                 |            |
| 40. flavovittatus Bol.           | Patr. ign. |                                 |            |
| Subgen. <b>Platystolus</b> Bol.  |            |                                 |            |
| 41. surcularius Bol.             | Matrictum. | 4. cavicola Koll.               | Carniola.  |
| 42. Martinezii Bol.              | Hisp. c.   | latebrarum H. S.                |            |
| Subgen. <b>Lamprogaster</b> Bol. |            | 2. neglectus Krauss.            |            |
| 43. Bolivarii Seoane.            | Ferrol.    | cavicola Fisch. Fr.             |            |
| 44. Miegii Bol.                  | Escurial.  | 3. palpata Sulz.                | Eur. mer.  |
| <i>Species incertæ sedis.</i>    |            | araneiformis Germ.              |            |
| 45. crucigerus Fieb.             | Sicil.     | 4. geniculata Cost.             | Cors.      |
| 46. dorsalis Fieb.               | Sicil.     | 5. Linderii Duf.                | Pyren. or. |
| 47. pachygaster Luc.             | Algeria.   | <i>Locust. incerti generis.</i> |            |
| 48. sculus Koll.                 | Sicil.     | Pterolepis neglecta Cost.       | Calabria.  |
| 49. verticalis Fieb.             | Sicil.     | Decticus phyllopterooides F. W. | Daur.      |
| 50. taurus Eversm.               | Kirgis.    | Lezina concolor Walk.           | Ægypt.     |

### Explicatio tabularum.

TAB. IV.

1. *Aphlebia virgulata Bol.*; ♂ elytrum sinistrum, ampliatum.
- 1a. — — ♀ — —
- 1b. — — ♂ segmentum postremum ventrale, ampliatum.
- 1c. — — ♀ — —
- 1d. — — ♂ apex abdominis suprà.
- 1e. — — ♀ — —
2. *Bacillus hispanicus Bol.*; ♂ abdominis segmentum postremum, cercique ampliati.
- 2a. — — ♀ abdominis apex ampliatus.
3. *Nocarodes Volxemii Bol.*; pronotum.
4. *Pamphagus (Acinipe) hespericus Ramb.*; pronotum et elytrum sinistrum.
5. — — deceptorius *Bol.* ♀
6. — — (*Eumigus*) monticola *Ramb.*; pronotum et elytrum sinistrum.
7. *Paradrymadusa Kraussii Bol.*; ♀ corpus.
- 7a. — — ♀ lamina infra-analis, ampliata.
8. *Ephippiger (Ephippiger) Saussurianus Bol.*; ♂ lamina supra-analis, cercique ampliati.
9. — — dilutus *Bol.*; pronotum.
- 9a. — — ♂ lamina supra-analis, cercique ampliati.
10. — — (*Steropleurus*) *Ramburii Bol.*; ♂ pronotum.
- 10a. — — — — ♂ lamina supra-analis cercique ampliati.
11. — — — — castellanus *Bol.*; ♀ pronotum ampliatum.

12. Ephippiger (Steropleurus) Martorellii *Bol.*; ♂ pronotum ampliatum.  
 13. — (Lamprogaster) Bolivarii *Seoane*; ♂ pronotum.

## TAB. V.

1. Pamphagodes Riffensis *Bol.*; ♀ parùm ampliata.  
 1a. — ♀ facies parùm ampliata.  
 1b. — ♀ lamina meso-metasternalis, tuberculumque prosteruale ampliata.  
 1c. — ♀ caput, pronotumque parùm ampliata.  
 2. Nocarodes Straubei *Fieb.*; ♀ pronotum.  
 3. — canonicus *Fisch. Fr.*; ♀ lamina meso-metasternalis parùm ampliata.  
 4. Pamphagus (Prionosthenus) galericulatus *Stål.*; ♀ caput, pronotum, abdominisque basis.  
 5. — (Pamphagus) elephas *L.*; ♀ pronotum elytrumque sinistrum.  
 6. — (Acinipe) Mabillei *Bol.*; ♀ lamina meso-metasternalis, parùm ampliata.  
 7. Eunapius Bolivarii *Stål.*; ♂ corpus.  
 7a. — ♂ pronoti dorsum.  
 7b. — ♀ pes posticus.  
 8. Eunapius granosus *Stål.*; ♂ pronotum, elytrumque sinistrum.  
 8a. — ♂ pes posticus.  
 9. Eunapius rugulosus *Stål.*; ♀ pronotum elitrumque sinistrum.  
 10. — Brunnerii *Stål.*; ♀ — — —  
 10a. — — — ♀ pes posticus.  
 10b. — — — ♀ lamina meso-metasternalis, ampliata.  
 10c. — — — ♀ pronoti dorsum.  
 11. Nocarodes Brunnerii *Bol.*; ♀ pes posticus.
-



Bolívar y Urrutia, Ignacio. 1878. "Analecta Orthopterologica." *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural* 7, 423–470.

**View This Item Online:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/47821>

**Permalink:** <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/21175>

**Holding Institution**

MBLWHOI Library

**Sponsored by**

MBLWHOI Library

**Copyright & Reuse**

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.