Catalogue des Types de Gastéropodes marins conservés au Laboratoire de Malacologie

III. — PURPURA et genres voisins ; TRITONIDAE

Par E. Fischer-Piette et J. Beigbeder [1].

Genre **Purpura** Bruguière 1792.

Purpura alba Hombron et Jacquinot 1854, Voy. pôle Sud, p. 91, pl. 22, fig. 30-31.

Holotype. Long. 23 mm. Provenance : Mangareva.

[Purpura alba Risso. Voir *Euthria.*]

Purpura ascensionis Quoy et Gaimard 1832, Voy. Astrolabe, Zool., II, p. 159, pl. 37, fig. 20-23.

Holotype. Long., 37,5 mm. Provenance : Ascension. Et 3 paratypes, long., 53 mm. ; 38 mm. ; 29 mm.

Purpura aterrima Lesson 1842, Revue zoologique, p. 186 (sans figure).

Holotype. Long., 11 mm. Provenance : Iles Gambier.

Purpura aurantiaca Hombron et Jacquinot 1854, Voy. pôle Sud, p. 91, pl. 22, fig. 28-29.

Holotype. Long., 32 mm.

Purpura avenacea Lesson 1842, Revue zoologique, p. 186 (sans figure).

Deux échantillons paratypes, long. 10 et 9,5 mm. Provenance : îles Gambier.

[Purpura baccata Hombron et Jacquinot. Voir *Siphonalia.*]

Purpura bicolor Lesson 1842, Revue zoologique, p. 187 (sans figure).

Un échantillon, long., 15 mm., collection Lesson.

Purpura bicarinata Blainville 1832. Esp. genres Pourpre etc., p. 215.

1. Suite des notes parues dans ce *Bulletin*, pp. 203 et 324. Pour la façon dont a été conçu ce catalogue, et pour le sens donné aux mots holotype, syntype, paratype, voir ci-dessus, p. 203. Nous rappelons que ce catalogue comporte l'identification des types de Savigny et de Risso.

Holotype, long., 43,5 mm., constituant en même temps le type de *Purpura helena* Quoy et Gaimard. Provenance : Sainte-Hélène.

Purpura celtica Locard 1886, Prodr. malac. fr., Catal. gén. Moll. viv. Fr., Moll. mar., p. 147 et 556.

Cette espèce est fondée sur des figures d'autres auteurs, et sur des exemplaires de la collection Locard. 11 échantillons : de Trouville (2), Granville (2), Brest (6), Augoulin (1).

Purpura Chusani Souleyet 1852, Voy. de la Bonite, p. 604, pl. 39, fig. 20-22.

Holotype. Long., 43,5 mm. Provenance : Macao. Et un paratype, long., 42 mm., même provenance.

Purpura cornigera Blainville 1832, Esp. genres Pourpre etc., p. 213, pl. 9, fig. 10.

La coquille figurée. Long., 24 mm. Provenance : Mazatlan (Mr Botta). Et 3 paratypes, même provenance, long., 28 ; 28 ; 26 mm.

Purpura costata Blainville 1832, Esp. genre Pourpre etc., p. 231, pl. 11, fig. 8.

Holotype. Long., 24 mm. Provenance : Mazatlan (Mr Botta).

Purpura Dumasi Vélain 1876, C. R. Ac. Sc., 24 juill., et Arch. Zool. exp. gén., VI, 1877, p. 102, pl. 2, fig. 13-15.

Holotype. Long., 29 mm. Les types des variétés *multistriata* (long., 19 mm.), *semicosta* (18 mm.), *cincta* (18 mm.). Et quatre paratypes. Provenance de tous ces échantillons : île Saint-Paul.

Purpura elongata Blainville 1832, Esp. genres Pourpre etc., pl. 10, fig. 9 (sans description).

La coquille figurée. Long., 34,5 mm. Provenance : île King. Et un paratype, même provenance, long., 27 mm.

Purpura helena Quoy et Gaimard 1832, Voy. Astrolabe, p. 573, pl. 39, fig. 7-10.

Holotype. Long., 23 mm. ; constituant en même temps le type de *Purpura bicarinata* Blainv. Provenance : Sainte-Hélène. Et 3 paratypes, long., 26 ; 25 ; 23 mm.

Purpura hiula Valenciennes 1846, Voy. de la Venus, pl. 8 fig. 2 *a*, 2 *b*. La coquille figurée. Long., 41 mm.

Purpura infumata Hombron et Jacquinot 1854. Voy. pôle Sud, p. 85, pl. 22, fig. 3-4.

Holotype. Long., 17 mm. Provenance : îles Samoa.

[Purpura Lamarckii Risso. Voir *Columbella*].

Purpura Lefevrei Lesson 1840, Revue zoologique, p. 335 (sans figure).

Un exemplaire, collections Lesson. Long., 51 mm. ; Provenance : Callao.

Purpura lineolata Blainville 1832, Esp. genres Pourpre etc., p. 206 (sans figure).

Holotype. Long., 20 mm. Provenance : Payta. Et l'autre exemplaire cité dans le texte (paratype, même provenance, long. 22,5 mm.).

Purpura Magellani Vélain, 1876, C. R. Ac. Sc., 24 juill., et Arch. Zool. exp. gén., VI, 1877, p. 104, pl. 2, fig. 8-11.

Les deux coquilles figurées. Long., 35 et 36 mm. Provenance : île Saint-Paul. Et un paratype, même provenance, long., 28 mm.

Purpura marginalba Blainville 1832, Esp. genres Pourpre etc., p. 219, pl. 10, fig. 6.

La coquille figurée. Long., 18,5 mm. Et 7 échantillons paratypes, mesurant de 12 à 32 mm.

[Purpura marginata Valenciennes. Voir *Rapana*].

Purpura marginatra Blainville 1832, Esp. genres Pourpre etc., p. 218, pl. 10, fig. 1.

Sept échantillons, étiquetés par Blainville, et mesurant de 21 à 26 mm. L'holotype n'est pas parmi eux.

[Purpura monodonta Quoy et Gaimard 1832. Voir *Coralliophila*].

Purpura monstruosa Lesson 1842, Revue zoologique, p. 103 (sans figure).

Deux échantillons des îles Gambier, collection Lesson. L'un, de 25 mm., est peut-être l'holotype ; l'autre, de 28 mm., est un paratype.

Purpura muricina Blainville 1832, Esp. genres Pourpre etc., p. 218, pl. 10, fig. 2-4.

Dix échantillons paratypes, provenance « Océanie », long., 13 à 25 mm.

Purpura muricoides Blainville 1832, Esp. genres Pourpre etc., p. 219, pl. 10, fig. 5.

Sept échantillons étiquetés par Blainville. Long., 16 à 29 mm.

Purpura muricoides Hombron et Jacquinot 1854, Voy. pôle Sud, p. 87, pl. 22, fig. 11-12.

Holotype. Long., 15,5 mm. Provenance : île Hogoleu.

Purpura nodosa Hombron et Jacquinot 1854, Voy. pôle Sud, p. 86, pl. 22, fig. 5-6.

Holotype. Long., 18,5 mm. Provenance : îles Salomon.

Purpura oceanica Locard 1886, Prodr. malac. fr., Catal. gén. Moll. viv. Fr., Moll. mar., p. 145 et p. 555.

Cette espèce est fondée sur des figures d'autres auteurs, et sur des échantillons de la collection Locard. Un spécimen, Cap Breton.

Purpura ochrostoma Blainville 1832, Esp. genres Pourpre etc., p. 205. Figuré par Quoy et Gaimard, Voy. Astrolabe, pl. 38, fig. 8.

Holotype. Long., 18 mm. Provenance : Tonga.

Purpura patens Hombron et Jacquinot 1854, Voy. pôle Sud, p. 85, pl. 22, fig. 1-2.

Holotype. Long., 21 mm. Provenance : Nouvelle-Zélande.

Purpura pica Blainville 1832, Esp. genres Pourpre etc., p. 213, pl. 9, fig. 9.

La coquille figurée. Long., 40 mm. Provenance : Tonga-Tabou. Et un paratype, même provenance, long. 57 mm.

Purpura Pothuaui Souleyet 1852, Voy. Bonite, p. 605, pl. 39, fig. 30-31.

Holotype. Long., 22 mm. Provenance : Manille. Et un paratype, même provenance, long., 20 mm.

Purpura reticulata Quoy et Gaimard 1832, Voy. Astrolabe, Zoologie, II, p. 566, pl. 38, fig. 17, 18.

Holotype. Long., 15,5 mm. Provenance : Port Western.

[Purpura reticulata Risso. Voir *Cantharus*].

Purpura rupestris Valenciennes 1846, Voy. de la Vénus, pl. 9, fig. 1 (sans description).

Les deux exemplaires figurés, mesurant 47,5 et 46 mm. Provenance : Nouvelle-Zélande. Et six paratypes, même provenance, long. 19 à 34 mm.

Purpura Savignyi Deshayes 1844, Anim. s. Vert., 2e édit., p. 112 ; figuré par Savigny, Expéd. d'Egypte, Coq., pl. 6, fig. 1 et 2.

Les deux exemplaires figurés, l'un de 42 mm. (fig. 1), l'autre de 39,5 mm. (fig. 2). Dautzenberg (1929, Moll. test. mar. Madagasc., p. 427) considère que cette espèce doit, en raison de sa columelle entièrement blanche, être séparée du *P. hippocastanum* des auteurs = *P. pseudohippocastanum* Dautz.

Purpura saxicola Valenciennes 1846, Voy. de la Vénus, pl. 8, fig. 4 (sans description).

La coquille figurée. Long., 36,5 mm. Provenance : Kamtschatska. Et quatre paratypes, même provenance, long., 37,5 à 43 mm.

Purpura scobina Quoy et Gaimard 1832, Voy. Astrolabe, Zool., II, p. 567, pl. 38, fig. 12, 13.

Holotype. Long., 27,5 mm. Provenance : Nouvelle-Zélande. Et quatre paratypes, même provenance, long. 18 à 32 mm.

Purpura spirata Blainville 1832, Esp. genres Pourpre etc., p. 252, pl. 12, fig. 8.

Holotype. Long., 27 mm. Provenance : îles Sandwich.

[Purpura stellaris Hombr. et Jacquin. Voir *Cuma*].

Purpura striata Quoy et Gaimard 1832, Voy. Astrolabe, Zool., II, p. 562, pl. 37, fig. 12-14.

Holotype. Long. 45 mm. Provenance : Port Dorey. Et un para type, même provenance, long., 41 mm.

Purpura tritoniformis Blainville 1832, Esp. genres Pourpre etc., p. 221, pl. 10, fig. 10.

Un échantillon étiqueté par Blainville. Long. 21,5 mm. Ed. Lamy (Bull. Muséum, 1918, p. 357) le considère comme le type de l'espèce ; mais ce n'est pas la coquille figurée.

Purpura tuberculata Blainville 1832, Esp. genres Pourpre etc., p. 204, pl. 9, fig. 3.

L'échantillon figuré. Long., 25 mm. Provenance : Mer Rouge. Et trois paratypes, même provenance, long., 20 à 24 mm.

[Purpura variegata Risso. Voir *Pisania*].

Purpura violacea Lesson 1842, Revue zoologique, p. 186 (sans figure).

Deux exemplaires, collection Lesson : probablement syntypes. Long., 22,5 et 18,5 mm. Provenance : Iles Gambier.

Genre **Monoceros** Lamarck 1822.

Monoceros giganteum Lesson 1832, Voy. de la Coquille, p. 169, pl. 11, fig. 4.

Trois paratypes. Long. 90 ; 77 ; 61 mm. Proveonce : Chili, M. Lesson.

Genre **Pseudomurex** Monterosato 1872. Voir *Coralliophila*.

Genre **Coralliophila** H. et A. Adams 1853.

Purpura monodonta Quoy et Gaimard 1832, Voy. Astrolabe, Zool., II, p. 561, pl. 37, fig. 9-11.

Deux échantillons de 14 à 13 mm. Provenance : Tonga-Tabou. Nous les considérons comme des syntypes.

Pseudomurex Monterosatoi Locard 1897, Exp. sc. Travailleur Talisman, I, p. 315, pl. 15, fig. 21-23.

Holotype. Long. 23 mm. Provenance : dragage 1 du Travailleur. Et un paratype, dragage 2.

Genre **Concholepas** Lamarck 1801.

Concholepas densestriatus Mabille 1886, *Ann. de Malacologie*, p. 271 (sans figure).

Deux échantillons. Long. 65 et 59 mm. Provenance : Chili.

Concholepas granosus Mabille 1886, *Ann. de Malacologie*, p. 270 (sans figure).

Deux échantillons du Pérou, longs de 114 mm., marqués comme types, mais qui ne sont probablement même pas des paratypes.

Concholepas patagonicus Mabille 1886, *Ann. de Malacologie*, p. 278 ; figuré dans Miss. du Cap Horn, pl. 2, fig. 6.

Deux échantillons du Cap Horn, long. 61 et 56 mm.

Concholepas rhombicus Mabille 1886, *Ann. de Malacologie*, p. 273 (sans figure).

Holotype. Long. 65 mm. Et deux paratypes, long. 57 et 56 mm. Ces trois exemplaires proviennent de M. A. Bouvier 1886.

Concholepas similis Mabille 1886, *Ann. de Malacologie*, p. 267, fig., pl. 4.

Deux échantillons, marqués comme types, longs de 125 et 109 mm. Provenance : Patagonie.

Concholepas verecundus Mabille 1886, *Ann. de Malacologie*, p. 275 (sans figure).

Deux échantillons, long. 49 et 42 mm. Provenance : Chili.

Genre **Cuma** Humphrey 1797.

Purpura stellaris Hombron et Jacquinot 1854. Voy. au pôle Sud, p. 88, pl. 22, fig. 13, 14.

Holotype. Long. 16 mm. Provenance : Iles Salomon.

Genre **Rapana** Schumacher 1817.

Purpura marginata Valenciennes 1846, Voy. de la *Vénus*, pl. 7, fig. 3 (sans description).

La coquille figurée. Long. 84 mm. Provenance : Asie.

Genre **Latiaxis** Swainson 1840.

Latiaxis Sallei Jousseaume 1883, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, VIII, p. 186, pl. 10, fig. 3.
Holotype. Long. 34,5 mm. Provenance : Japon.

Genre **Lataxiena** Jousseaume 1883.

Lataxiena elegans Jousseaume 1883, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, VIII, p. 190 (sans figure).
Holotype. Long. 27 mm. Et un autre échantillon de 33 mm.

Lataxiena lataxiena Jousseaume 1883, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, VIII, p. 189, pl. 10, fig. 1.
Holotype. Long. 44 mm. Provenance : Japon.

Genre **Cymatium** Röding 1798. Voir *Triton.*

Genre **Tritonium** Link 1807. Voir *Triton.*

Genre **Triton** Montfort 1810.

(Tritonium Bayani Jousseaume. Voir *Buccinum*).

Tritonium curtum Locard 1886, Prodr. Malac. fr., Catal. gén. Moll. mar., p. 156.
Cette espèce est fondée sur une figure de Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus, et sur des échantillons de la collection Locard provenant de Brest. Deux exemplaires de cette localité (30 et 28 mm.).

Tritonium Danieli Locard 1886, Prodr. Malac. fr., Catal. gén., Moll. mar., p. 156.
Cette espèce est fondée sur des figures d'Hidalgo et sur des exemplaires de Brest cités par Daniel. Plusieurs échantillons de diverses localités, dont deux de Brest.

Ranella gyrinata Risso 1826, Hist. nat. Eur. mérid., IV, p. 203, pl. 8, fig. 115.

Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus (Moll. mar. Roussillon, I, p. 32) ont assimilé à juste titre la fig. 115 de Risso à *Triton pilearis* L., espèce antillaise. Mais l'échantillon de *Ranella gyrinata* conservé dans la collection Risso avec l'étiquette originale, est un *Triton tuberosus* Lamk. (espèce indo-pacifique) dont le canal est tronqué. Cet exemplaire, long de 31 mm., a été figuré sous ce nom de *Ranella gyrinata*, sur la planche inédite n° 46 (voir Th. Monod, Inventaire manuscrits Risso, *Arch. Mus.*, 6e s., VII, 1931).

Ranella lemania Risso 1826, Hist. nat. Eur. mérid., IV, p. 202, pl. 8, fig. 113.

Holotype, long. 10 mm. C'est un jeune de *Triton cutaceus* L.

Murex trigonus Gmelin 1790, Syst. Nat., éd. XIII, p. 3549.

Espèce fondée uniquement sur « Le Samier « d'Adanson (1757, Hist. nat. Sénég., p. 122 ; pl. 8, fig. 14). Le type d'Adanson est conservé au Muséum. Il a été ré-étudié par E. Fischer-Piette (1942, Les Moll. d'Adanson, p. 219) sous le nom *Cymatium trigonum* Gmel.

Genre **Tutufa** Jousseaume 1881. Voir *Ranella*.

Genre **Ranella** Lamarck 1812.

Ranella ampullacea Valenciennes 1858, *C. R. Ac. Sciences*, t. 46, p. 761 (sans figure).

Un échantillon, longueur 46 mm., probablement holotype. Provenance : Tartarie (M. Barthe 1858).

Tutufa caledonensis Jousseaume 1881, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, p. 6 (sans figure).

Holotype, long. 120 mm. Provenance : Nouvelle-Calédonie (Abbé Lambert) ; et quatre paratypes, mesurant : 114 mm. ; 85 mm. ; 65 mm. ; 57 mm.

[Ranella gyrinata Risso. Voir *Triton*].

[Ranella lemania Risso. Voir *Triton*].

Fischer-Piette, Édouard and Beigbeder, J. 1943. "Catalogue des Types de Gastéropodes marins conservés au Laboratoire de Malacologie. III. Purpura et genres voisins ; Tritonidae." *Bulletin du Muse*

um national d'histoire naturelle 15(6), 429–436.

View This Item Online: https://www.biodiversitylibrary.org/item/220796
Permalink: https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/220983

Holding Institution
Muséum national d'Histoire naturelle

Sponsored by
Muséum national d'Histoire naturelle

Copyright & Reuse
Copyright Status: In copyright. Digitized with the permission of the rights holder.
Rights Holder: Muséum national d'Histoire naturelle
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Rights: https://biodiversitylibrary.org/permissions

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at https://www.biodiversitylibrary.org.

This file was generated 16 April 2022 at 16:35 UTC