

Beitrag zur Nord-Afrikanischen Käfer-Fauna.

(Aufzählung der Quedenfeldt'schen Dytisciden-Hydrophiliden.)

Der verstorbene Prem.-Lieut. M. Quedenfeldt übergab mir s. Z. die Ausbeute seiner in Marocco erbeuteten Wasserkäfer zur Bestimmung. Da nach seinen Mittheilungen jene durchsuchten Gebiete wasserarm sind, so dürfte es nicht ohne Interesse sein, die Sammelergebnisse hier angeführt zu sehen und dies um so mehr, als viele Sammler im Besitz von Quedenfeldt'schem Material sein werden.

Haliplus siculus Wehn. (M.), *guttatus* Aub. (Cas.), *andalusicus* Wehn. (M.), *Heydeni* Wehn. (M.), *lineatocollis* Marsh. var. (Cas. u. T.); *Cnemidotus caesus* Dft. (M.); *Pelobius tardus* Hrbst. (Cas.); *Hyphydrus variegatus* Aub. (Cas.); *Hygrotus musicus* Klug (Tunis); *Coelambus parallelogrammus* Ahr. (Cas.), *9-lineatus* Steph. (U.), *pallidulus* Aub. (Mog.), *confluens* F. (M.); *Bidessus bicarinatus* Latr. v. *obscurior* Desbr. (M.), *Goudoti* Lap. (T.), *geminus* F. (M.), var. (U.); *Deronectes Ceresyi* Aub. (Cas.), *Clarki* Woll. (U.); *Graptodytes* (*lepidus* Ol. (T.), *varius* Aub. (T.), *flavipes* Ol. (T.); *Hydroporus meridionalis* Aub. (Tunis), *marginatus* Dft. (U.), *pubescens* Gyll. var. (T.), *fuscipennis* Schaum (U.), *discretus* Fairm. (T.); *Noterus laevis* St. (M.); *Laccophilus obscurus* Pz. (U.), *interruptus* Pz. (M.), v. *testaceus* Aub. (M.); *Gaurodytes didymus* Ol. (U.); *Xanthodytes nebulosus* Forst. (M.); *Rantus notatus* F. (Mog.); *Cymatopterus fuscus* L. (M.), *Paykulli* Er. (Cas.); *Eunectes sticticus* L. (Teneriffa); *Macrodytes circumflexus* F. (Settat); *Cybister laterimarginalis* Deg. (Settat), *tripunctatus* Ol. (Settat). — *Gyrinus striatus* F. (U.), *urinator* Ill. (M. U.), *Dejeani* Brull. (Cas. Marakosch). — *Hydrophilus flavipes* Stev. (Marakosch); *Hydrobius convexus* Brull. (T.); *Helochares erythrocephalus* F. (M.); *Philydrus grisescens* Gyll. (M.), *politus* Küst. (T.); *Anacaena bipustulata* Marsh. (T.); *Laccobius gracilis* Mot. (U.), *alutaceus* Thms. (U.); *Berosus affinis* Brull. (Cas.), v. *hispanicus* Küst. (T.); *Cercyon quisquilius* L. (M. T.); *lugubris* Payk. (Cas.), *flavipes* F. (M.); *Sphaeridium bipust.* v. *4-macul.* Mrsh. u. v. *2-maculatum* Kuw. (M.); *Coelostoma orbiculare* F. (U. Cas.); *Helophorus aequalis* Thms. (M.), *granularis* L. (M.), v. *affinis* Mrsh. (U.), *rugosus* Ol. (U.), *algiricus* Mot. (M.); *Hydrochus nitidicollis* Muls. (Cas.); *Ochthebius torrentum* Coye (M. U.), *deletus* Reg. (Mog.).

T. = Tanger, U. = Urika, M. = Marocco, Mog. = Mogador, Cas. = Casablanca.



1894. "Beitrag zur Nord-Afrikanischen Käfer-Fauna." *Deutsche entomologische Zeitschrift* 1894(5), 176–176. <https://doi.org/10.1002/mmnd.48018940508>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/103425>

DOI: <https://doi.org/10.1002/mmnd.48018940508>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/235556>

Holding Institution

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Sponsored by

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.