Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1908,

geordnet nach dem Katalog europäischer Käfer von 1906.

Von J. Gerhardt, Liegnitz.

Abkürzungen: Gb. = Gabriel, Generalmajor z. D., Neisse.

G. = Gerhardt, Oberlehrer a. D., Liegnitz.

K. = Kolbe, Rektor, Liegnitz.

Schr. = Schreiber, Lehrer, Neusalz.

v. V. = von Varendorff, Amtsrichter, Guhrau,
Bez. Breslau.

Die selbständigen Arten sind durch fortlaufende Numerierung angedeutet.

Cicindela germanica a. *obscura* F. Liegnitz: Weissenrode. 1 Stück. (G.)

Carabus nitens L. (Hermaphrodit.) Gelegentlich der Trennung der Geschlechter kam ich auf diesen interessanten Fall. Das linke Vorderbein zeigt die deutliche Erweiterung der Tarsen des ♂, das rechte die einfache Tarsenbildung des ♀. — Gefunden zwischen Kaiserswaldau bei Haynau und dem Gröditzberge auf einem sandigen Waldwege mit zahlreichen normalen Stücken.

1. ***Bembidium Milleri*** Duv. Lindenbusch bei Liegnitz in einer Ziegelei. (Mittelschullehrer Richard Scholz-Liegnitz.)

2. ***Bembidium Millerianum*** Heyd. Fürstentum Teschen: Rzekau und Ostrawitza-Bett. (7. K.)

3. ***Bembidium Redtenbacheri*** K. Dan. In Gebirgsbächen n. s. (das frühere *B. tibiale* v. *affine* Rdtb.). Nach K. kommt das echte *B. tibiale* unvermischt nur in den Beskiden vor.

4. ***Bembidium lunulatum*** Fourer. Liegnitz: Ziegelei bei Hummel (K.), Katzbach (G.).

Chlaenius nigricornis a. *obscuripes* m. Beine mit Ausnahme der helleren Mittelschenkel dunkelbraun, z. T. schwarz, Fühlerglied 1 gelb. — Liegnitz: Bruch. 1 Exemplar. (G.)

Badister bipustulatus a. *binotatus* Fisch. Liegnitz: Unter Laub. 3 Stück. (G.)

Pterostichus diligens v. *anomalis* m. Halsschildbildung von *diligens*, aber die deutliche Punktierung der Vorderbrust von *strenuus*. Liegnitz. 1 Exemplar. (G.)

Bidessus unistriatus m. *opacus* m. Wenigstens die Flügeldecken ganz matt, ohne deutliche Punktierung. Liegnitz. (G.) Das Gegenteil davon ist die Var. *Vorbringeri* Gerh. mit sehr kräftig punktierten Flügeldecken, in Ostpreußen heimisch, im Katalog von 1906 noch fehlend.

Hydroporus granularis v. *fenestratus* Schilsky. Bruch bei Liegnitz. s. — *H. gr.* v. *unicolor* m. Decken einfarbig gelb, erhärtet. Wie Voriger. s. (G.)

- Hydroporus bilineatus* a. *varians* m. So nenne ich alle die Formen, welche weder ganz der Stammform noch der ganz schwarzen v. *Hopffgarteni* angehören, also Formen, bei denen der helle Medianstreifen in der Mitte unterbrochen oder nur nach vorn angedeutet ist. Liegnitz: Bruch. n. s. Die Var. v. *Hopffgarteni* ist mir als solche nicht ganz unzweifelhaft, da sie aufer der Färbung auch noch durch schmalere Gestalt und weitläufigere Punktierung der Decken von der Stammform sich unterscheidet. Sie könnte als gute Art gelten. (G.)
- Hydroporus erythrocephalus* v. *subcostatus* m. Flügeldecken mit schwachen Rippen. n. s. mit der Stammform. (G.)
- Hydroporus umbrosus* a. *luteipennis* m. Decken einfarbig gelb, aber erhärtet. Nur 1 Exemplar. Liegnitz: Bruch. (G.)
5. ***Phyllodrepa puberula* Bernh.** Liegnitz. n. ss. Mit *Ph. floralis* und *nigra* gefunden.
- Phloeonomus pusillus* v. *punctipennis* Thoms. dürfte als Var. wohl gelten, wenn die Decken deutlich punktiert erscheinen. Ich besitze solche namentlich aus den schlesischen Gebirgen. Fehlt als Var. im Katalog.
- Oxyporus maxillosus* a. *angularis* Gebl. Beskiden: Jaworowy. (K.)
- Stenus glacialis* v. *densatus* Kolbe. Kräftiger gebaut, weniger grob und wesentlich dichter punktiert. Beskiden: Kamitzer Platte. Kommt nach Dr. Bernhauer auch in den Karpathen und Alpen vor. (K.)
6. ***Baptolinus longiceps* Fauv.** Glatzer Geb. (Gb.), Spindelmühl. (G.)
- Philonthus marginatus* Stroem a. *rubro-marginatus* Gabriel. Naht lebhaft rot. Glatzer Geb. (Gb.) s. s.
7. ***Philonthus spermophili* Ganglb.** Unter faulenden Pflanzstoffen und im Anspülicht des Jakobsdorfer Sees. Nach Breitschen Exemplaren bestimmt. (K.)
8. ***Staphylinus tenebricosus* Grav.** Galt als Var. von *olens* und ist wie dieser verbreitet. Von Ganglbauer zur sp. pr. erhoben.
- Quedius collaris* a. *maculicollis* Kolbe. Vorderwinkel des Halsschildes mit rundlichem rotgelben Fleck. (K.)
- Tachyporus hypnorum* a. *armeniacus* Kolen. Liegnitz. 1 Stück. (G.)
9. ***Leptusa alpicola* Brancsik.** Unter der Rinde alter Fichtenstöcke. Beskiden: Jaworowy. (K.)
10. ***Atheta (Microdota) puberula* Sharp.** Ein Pilzkäfer aus dem Waldenburger Geb. bei Neuhaus. 2 Exemplare (♂ und ♀). (G.)
11. ***Atheta (Microdota) spatula* Fauv.** Unter faulendem Heu. Beskiden: Kamitzer Platte und Jaworowy. (K.)

12. ***Callicerus Kaufmanni* Epp.** Ein Pärchen im Wasserwalde bei Kaltwasser, Kr. Lüben, in einem Rehlager unter dem schimmlichen Rhizom von *Carex brizoides*. (G.) Neu für Deutschland.

Die von mir D. E. Z. Jahrg. 1907 veröffentlichte *Atheta Gabrieli* m. ist nach freundlicher Mitteilung von Dr. Bernhauer *Ocyusina rufescens* Kr. — Ganglbauer beschreibt als *rufescens* Kr. die *rufescens Baudi* = *pilosicollis* Bernh.

13. ***Oxyptoda pilosicollis* Bernh.** Rabengeb. unter Wildfutter. (G.) s. s. Glatzer Geb. (Gb.) Wurde lange mit *O. rufescens* Kr., *Ocyusida ruf.* Kr., vermengt.

Trimium brevicorne a. *atrum* m. Ganz schwarz. Liegnitz: Lindensch. 1 Exemplar. (G.)

14. ***Brachygluta Lefebvrei* Aub.** In der Kletteschen Sammlung 1 Stück aus Schlesien ohne nähere Fundortsangabe. (Gb.)

15. ***Cyrtusa subferruginea* Reitt.** Liegnitz: In einer Sandgrube von *Sisymbrium sophiae*. 2 Exemplare. (G.)

16. ***Trichopteryx ambigua* v. *bovina* Motsch.** n. s. mit *sericans* Heer, von der sie bisher als Var. galt.

17. ***Helophorus nivalis* Giraud.** Altvater (Dr. Lokay). Riesengeb. Albendorf (v. Rottenberg). Wurde früher mit *H. glacialis* vermengt.

Anacaena limbata v. *ochracea* Steph. und v. *nitida* Heer. n. s. mit der Stammform. *A. bipustulata* Marsh. fehlt in Schlesien.

Cymbiodyta marginella a. *testacea* Speiser. s. Liegnitz (G.), Kottwitz (Gb.).

18. ***Pachysternum pusillum* Kuw.** Beskiden (Reitter).

Homalisus fontisbellaquei Geoffr. v. *monochloros* Torre. s. Altvater und Zuckmantel (Gb.), Görbersdorf (Schilsky).

Cantharis fusca v. *conjuncta* Schilsky. z. s. Liegnitz (G.), Quanzendorf (Gb.).

Cantharis discoidea a. *flavicollis* m. Halsschild ganz gelb. s. Waldenburger Geb., Buchwald im Riesengeb. (G.)

Malachius viridis v. ♀ *elegans* F. n. s. mit der Stammform.

Cateretes pedicularius a. *scutellaris* Leinb. und a. *nigriventris* Leinb. Beide n. s. mit der Stammform.

Cateretes rufilabris a. *junci* Steph. und a. *pallidus* Heer. Beide z. s.

Epuraea longula a. *ornata* Rtrr. Riesengeb., Moisdorfer Höhen (K.) a. *Erichsoni* Rtrr. Beskiden: Ziegenrücken (K.).

Omosiphora limbata a. *Skalitzkyi* Rtrr. s. Waldenburger Geb. (G.)

Meligethes aeneus v. *dauricus* Motsch. Neisse, Kottwitz. (Gb.)

Meligethes viridescens a. *discolor* Rtrr. z. s.

Rhizophagus dispar a. *Gyllenhali* Thoms. z. s.

- Rhizophagus politus* a. *Brucki* Rtrr. Liegnitz, 1 Exemplar (G.), Glatzer Geb. (Gb.).
- Laemophloeus ater* a. *capensis* Walzl. Breslau. (Gb.)
- Cryptophagus acutangulus* m. *Waterhousei* Rye. In einem faulenden Queckenhaufen. Liegnitz: Rehberg bei Panten. (K.)
- Grobbenia fimetarii* a. *brunnea* m. Oberseite einfarbig braun. a. *flavescens* m. Oberseite einfarbig gelb, Halsschild s. s. noch heller. Körper erhärtet. m. *opaca* m. Flügeldecken ganz matt, s. s. Sämtliche Aberr. im Nordpark von Liegnitz mit der Stammform (Halsschild schwarz) von Gras gestrichen. In der Nähe reichlich der Tintenpilz, der nach Schilsky in Beziehung zu *Grobbenia* steht.
- Ephistemus globulus* v. *dubius* Fowler. Liegnitz. (G.)
- Tritoma bipustulata* v. *binotata* F. Häufiger als die Stammform mit dem schwarzen Schulterpunkt.
- Phalacrus fimetarius* v. *Humberti* Rye und v. *picipes* Steph. Beide in Schlesien n. s.
- Olibrus corticalis* v. *adustus* Fisch. n. s. mit der Stammform.
- Olibrus affinis* v. *discoideus* Küst. Quanzendorf, Kr. Nimptsch, und Neisse. (Gb.)
- Olibrus bicolor* v. *apicatus* Guilleb. und v. *obscurus* Guilleb. Beide n. s. s. mit der Stammform.
- Stilbus testaceus* v. *unicolor* Flach. Liegnitz n. s. (G.) Wohl überall.
- Stilbus atomarius* v. *sulcatus* m. Jede Flügeldecke mit 2—4 furchenartig vertieften Längsstreifen zwischen Mitte und Seitenrand. s. (G.)
- Stilbus oblongus* v. *uniformis* Flach. Liegnitz. 2 Exemplare. (G.)
- Mycetophagus 4-pustulatus* v. *ruficollis* Schilsky. Nur 1 Stück. Liegnitz. (G.)
- Mycetophagus piceus* a. *8-punctulatus* m. Aufser den 2 großen Humeralpusteln noch 8 sehr kleine Pusteln. a. *6-punctulatus* m. mit 5—6 kleinen Pusteln aufser den Humeralpusteln. a. *2-punctulatus* m. mit 1—2 kleinen Pusteln und 2 großen Humeralpusteln. Schlesisch sind noch die von Ganglbauer aufgeführten Aberr.
- Scymnus frontalis* a. *Suffriani* Ws. s. s. (G.) a. *immaculatus* Sffr. Nimptsch. (Gb.)
- Microcara testacea* v. *obscura* Steph. Peist bei Panten. 1 Exemplar. (G.)
- Cyphon variabilis* v. *nigriceps* Ksw. Wohl die in Schlesien häufigste Var., meist ♀♀; v. *nigricornis* Schilsky, n. s. namentlich unter den ♀♀.
- Cyphon variabilis* m. *rugulosus* m. Nur 1 Stück ♀. Sehr ausgezeichnet durch Färbung, Glanz, Behaarung und Skulptur. Schwarz, Beine, Fühlerwurzel (3 Glieder) und Halsschild

gelb, Kopf, Schulterbeule und Scheibe der Flügeldecken fast von der Farbe des Halsschildes, wenig dunkler. Basis der Decken, ein vorn und hinten abgekürzter Wisch an der Naht und ein breiter Seitenwisch schwarz; Halsschild glänzend, Decken matt, dicht, anliegend und grau behaart, ganz undeutlich punktiert, aber überall dicht quer gerunzelt. Jakobsdorfer See.

Cyphon padi v. *discolor* Pz. n. s. mit der Stammform.

Adrastus nitidulus a. *pallens* Er. Liegnitz. s. (G.)

Meloe violaceus v. *montanus* m. Nur das Halsschild mit schwachem bläulichen Schimmer und ebenso die letzten Dorsalsegmente, sonst ganz schwarz, höchstens mit sehr schwachem Metallschimmer. Riesengeb., auch aus der Schweiz (Zermatt).

19. ***Meloe cicatricosus* Leach.** Carolath. (Schr.) 1 Stück. 5. *Mordellistena lateralis* a. *atricollis* Schilsky. Buchwald im Riesengeb. 1 Stück. (G.)

Gonodera arenaria a. *testaceipennis* m. So nenne ich die Form mit den gelben Flügeldecken, welche mit der schwarzdeckigen Stammform, aber etwas seltener, auftritt.

Cortodera femorata a. *flavipennis* Rtt. Vorderheide bei Liegnitz. (G.)

Pidonia lurida a. *Ganglbaueri* Ormay. Glatzer und Altvatergeb., Beskiden. (Gb.)

Evodinus clathratus a. *brunnipes* Muls. Riesengeb.

Leptura revestita a. *rufomarginata* Muls. Quanzendorf Kr. Nimptsch. (Gb.)

Leptura 4-fasciata L. a. *abbreviata* Gabriel. Basalbinde wie bei a. *interrupta* Heyd. unterbrochen, aber die Medianbinde nur zuweilen die Naht, nie den Seitenrand erreichend. Lähn (G.), Quanzendorf Kreis Nimptsch (Gb.).

Grammoptera variegata a. *nigrescens* Ws. Kaltwasser Kr. Lüben. (G.).

Tetropium castaneum a. *luridum* L. Glatzer und Riesengeb. (Gb.).

Phymatodes testaceus a. *melanocephalus* Ponza und a. *similaris* Küst. Schlesien (Klettesche Sammlung, Gb.).

Hylotrupes bajulus a. *lividus* Muls. Liegnitz (G.), Riesengeb. (Klette), Quanzendorf, Neisse (Gb.).

20. ***Clytanthus varius* F.** Schlesien (Klettesche Sammlung, Gb.).

Tetrops praeusta a. *nigra* Kr. Riesengeb. (Klettesche Samml., Gb.)

Zeugophora flavicollis a. *australis* Ws. Altvater. (Gb.)

Lema cyanella a. *obscura* Steph. Schlesien. (Gb., G.) n. s. s.

Lema melanopus a. *atrata* Walth. Riesengeb., Ebene. (Gb., v. V.).

Coptocephala unifasciata a. *4-maculata* Lac. n. s.

Cryptocephalus coryli a. *temesiensis* Sffr. Riesengeb. (Gb.)

Cr. 6-punctatus a. *thoracicus* Ws. Riesengeb. (Gb.)

- Cr. aureolus* a. *discolor* m. Decken grün, Halsschild goldig. Riesengeb., Waldenb. Geb. (G.)
- Cr. sericeus* a. *pratorum* Sffr. Waldenb. Geb. (G.) a. *purpurascens* Ws. Vorderheide bei Liegnitz. (G.)
- Cr. cristula* a. *auratus* m. Oberseite goldfarbig. s. a. *violaceus* m. Oberseite blau. s. s. a. *bicolor* m. Halsschild goldglänzend, Decken grün. z. s. a. *frigidus* Jac. Riesengeb. (Klettesche Sammlung, Gb.)
- Cr. parvulus* a. *Klettei* Gabriel. Von oben rein schwarz, seitlich blauschimmernd. Riesengeb. (Klettesche Sammlung, Gb.) 3 Exemplare.
- Cr. 10-maculatus* a. *scenicus* Ws. n. s., auch a. *f.* nach Ws. (G.)
- Cr. Moraei* a. *vittiger* Mars. Ziegenhals, Quanzendorf. (Gb.) a. *arquatus* Ws. ibid. u. Altvater. (Gb.)
- Cr. vittatus* a. *lineellus* Gabriel. In der Mitte der schwarzen Binde der Flügeldecke eine gelbe Längslinie.
- Cr. labiatus* a. *exilis* Steph. und a. *ocularis* Heyd. Die letzte a. s. s. — Ebene und Vorgeb. (G.)
- Cr. pygmaeus* a. *orientalis* Ws. Neisse. (Gb.)
- Cr. ocellatus* a. *nigrifrons* Bedel. s. s. Liegnitz. (G.)
- Chrysomela marcatitica* a. *cupreopurpurea* m. Altvater (Kofsmann). 1 Exemplar. Mehr purpurfarbig als kupfrig.
- Chr. purpurascens* a. *picea* Ws. Altvater (Kofsmann).
- Chr. göttingensis* a. *Sturmi* Westh. Ebene und Gebirge. n. s.
- Chr. geminata* a. *cuprina* Dft. Glatzer und Altvatergeb., Neisse. (Gb.) a. *nigra* Ws. Lähn. 1 Exemplar. (G.)
- Chr. hyperici* a. *privigna* Ws. Kottwitz (Gb.), Liegnitz (G.).
- Chr. cerealis* a. *8-vittata* Schrnk. u. a. *livonica* Motsch. Gebirge und Ebene.
- Chr. graminis* a. *fulgida* Fbr. Neisse. 1 Exemplar. (Gb.)
- Chr. menthastri* a. *herbacea* Dft. Quanzendorf, Neifse (Gb.), Liegnitz (G.).
- Chr. varians* a. *aethiops* For. Liegnitz. (Kofsmann, G.)
- Chryochloa cacaliae* a. *coeruleo-lineata* Dft. Riesengeb. (Gb.) Bisher nur Alpenform.
- Phytodecta 5-punctata* Fbr. Außer der bekannten Aberr. *obscurus* sind zu vermerken: *nigriventris* Penecke, *unicolor* Ws., *flavicollis* Dft., *aucupariae* Jakobs, *padi* Penecke und *melanopterus* Pen.
- Phytodecta pallidus* a. *decipiens* Ws., a. *borealis* Oliv. und *frontalis* Ol. Bewohner der Sudeten.
- Phaedon cochleariae* a. *neglectus* Sahlb. hfg. a. *hederae* Sffr. s.
- Melasoma aenea* a. *vitellinae* Scop. Waldenb. Geb. (G.)
- Lochmaea capreae* v. *scutellata* Chevr. Riesengeb. (Gb.) Liegnitz. (G.) s. s.
- Crepidodera femorata* a. *infuscipes* Foudr. Glatzer Geb. (Gb.)

- Chalcoides aurea* a. *laeta* Ws. und a. *cyanea* Marsh. Beide n. s.
Chaetoenema semicoerulea a. *femoralis* Ws. (Gb.) a. *saliceti* Ws. 1 Stück.
 (G.)
Psylliodes chrysocephala a. *erythrocephala* L. Quanzendorf, Schweinsdorf. (Gb.)
Ps. hyoscyami a. *cupreonitens* Först. Neisse. (Gb.)
Haltica brevicollis a. *azurea* Ws. Liegnitz, hfg. (G.), Quanzendorf (Gb.).
H. lythri a. *aenescens* Ws. Altvater. (Gb.)
H. oleracea a. *nobilis* Ws. n. s. a. *lugubris* Ws. Riesengeb. Liegnitz. hfg. (G.)
Phyllotreta exclamationis a. *vibex* Ws. Riesengeb., Kottwitz, Neifse (Gb.), Liegnitz (G.).
Phyllotreta flexuosa a. *fenestrata* Ws. Kottwitz (Gb.). Liegnitz (G.).
Longitarsus echii a. *tibialis* Dft. hfg., a. *coerulescens* Ws. z. s. und a. *dimidiatus* All. s. s. Liegnitz. (G.)
L. apicalis a. *4-maculata* Ws. Riesengeb., Altvater. (Gb.)
L. luridus a. *nigricans* Ws. n. s. a. *cognatus* Ws. hfg. a. *4-signatus* Dft. 1 Stück. (G.)
L. suturellus v. *paludosus* Ws. Beskiden, Kottwitz, Neifse. (Gb.)
L. melanocephalus a. *atriceps* Kutsch. Liegnitz (G.)
L. rubiginosus a. *fumigatus* Ws. Neifse. 1 Stück. (Ws. det.) (Gb.)
L. pellucidus a. *nigriventris* Ws. Quanzendorf (Gb.) und Liegnitz, je 1 Stück. (G.)
Cassida hemisphaerica a. *nigriventris* v. Heyd. Quanzendorf und Liegnitz. s. s. (Gb., G.)
C. vibex a. *discoidea* Ws. n. s.
C. margaritacea a. *melanocephala* Sffr. n. s. Neifse, Liegnitz.
C. Murraea a. *maculata* L. n. s.
Anthribus fasciatus a. *ventralis* Rey. Neifse (Gb.), Liegnitz (G.).
Otiorrhynchus inflatus a. *salebrosus* Boh. Rotbeinig häufiger.
Phyllobius glaucus v. *ater* Stierl. hfg. besonders auf dem Hochgebirge.
 v. *densatus* Schilsky, besonders ♂♂. Verbreitet.
Polydrosus cervinus a. *maculosus* Hbst. s. Riesengeb., Peist b. Liegnitz. s.
P. tereticollis a. *uniformis* Stierl. Quanzendorf, Hochwald b. Brieg. s. (Gb.)
Plinthus Tischeri v. *germanicus* Rtr. und v. *anceps* Boh. Riesengeb. je 1 Stück. (G.)
 21. ***Limnobaris pilistriata* Steph.** Mit *T.*-Album L. vorkommend und anscheinend bei uns n. s. s. Zuerst von Gb. unterschieden. Neifse, Liegnitz.
Tychius juncus a. *metallescens* m. Alle Schuppen der Oberseite mit Messingglanz. Nur 1 Exemplar. Liegnitz.

- Gymnetron bipustulatum* a. *fuliginosum* Rosenh. Schlesien. (Gb.)
G. tetrum v. *subrotundatum* Rtttr. g. hfg.
Apion aeneum a. *obscurum* Gabriel und a. *chalceum* Marsh. Neifse. Quanzendorf (Gb.), Liegnitz (G.). Bei *obscurum* die Flügeldecke fast schwarz.
A. flavipes a. *Lederi* Kirsch (*apicirostre* Desbr.). s. mit der Stammform.
Rhynchites aeneo-virens a. *virens* Gabriel. s. Flügeldecken grün. a. *fragariae* Gyll. die häufigste Form.
Byctiscus populi a. *cuprifer* Schilsky. Lähn u. a. O. n. s. (G.)
B. betulae a. *violaceus* Scop. hfg. a. *nitens* Marsh. s.
Apoderus coryli a. *nigricollis* Esch. Fehlt im Katalog von 1906. Halsschild ganz schwarz. s. s.
Aphodius erraticus a. *fumigatus* Muls. n. s.
A. subterraneus a. *fuscipennis* Muls. n. s.
A. sordidus a. *4-punctatus* Pz. Ellgut Kr. Falkenberg. (Gb.)
A. rufus a. *arcuatus* Moll. z. s.
A. pusillus a. *rufulus* Muls. s. s.; a. *suturalis* m. Decken hell rotbraun, Naht u. 1 Seitenwisch schwarz.
A. punctato-sulcatus a. *marginalis* Steph. Liegnitz. (G.)
A. luridus a. *nigripes* F. n. s.; a. *nigrosulcatus* Mrsh. s. s. (G.)
Onthophagus vacca v. *medius* Pz. 1 Stück in der Kletteschen Sammlung (Gb.), Liegnitz. n. s. (G.).
Melolontha hippocastani a. *rex* Torre (Gb.), a. *fuscicollis* Kr. Liegnitz (G.).
M. melolontha a. *obscuripes* Gabriel. Beine dunkel. 1 Stück. Neisse.
Polyphylla fullo a. *marmorata* Muls. Sammlung Klette (Gb.), Liegnitz: Pantener Höhen, ebenso hfg. wie die Stammform (G.)
Anomala aenea a. *Frischi* F., a. *tricolor* Torre, a. *bicolor* Torre, a. *cyanea* Torre (schlesisch).
Phyllopertha horticola a. *maculata* Torre (Gb.), a. *ustulatipennis* Villa. n. s.
Trichius fasciatus a. *scutellaris* Kr. Nicht selten mit der Stammform.

Der Numerus schlesischer Käfer beträgt z. Z. 4421.

Gerhardt, Julius. 1909. "Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1908, geordnet nach dem Katalog europäischer Käfer von 1906." *Deutsche entomologische Zeitschrift* 1909(3), 415–422.

<https://doi.org/10.1002/mmnd.48019090310>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/103377>

DOI: <https://doi.org/10.1002/mmnd.48019090310>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/235960>

Holding Institution

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Sponsored by

Biodiversity Heritage Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.