Vorarlberg, **nicht** Vogesen!

Einige Berichtigungen zu den Kuhntschen Bestimmungstabellen der Käfer Deutschlands. (Col.)

Von **Paul Scherdlin**, Straßburg i. E.

Es ist eine eigentümliche Tatsache, daß in sonst vorzüglichen Werken mit der geographischen Verbreitung der Tiere oder auch der Pflanzen leichtsinnig umgegangen wird. Solange ein solches Werk kein Bestimmungsbuch ist oder keine lokale Fauna oder Flora behandelt, ist das Unglück nicht groß zu nennen, da man sich schließlich in Spezialarbeiten vergewissern kann, ob dieses Tier oder jene Pflanze auch wirklich in den angegebenen Lokalitäten oder Gegenden zu finden ist. Wenn aber eine Spezialarbeit grobe geographische Schnitzer aufweist, die alle Bezug auf eine und dieselbe Gegend haben und die bei einiger Aufmerksamkeit hätten vermieden werden können, so müssen eben diese Fehler wegen der Konsequenz, mit welcher sie durchgeführt sind, bekannt gemacht werden. Dies ist der Fall mit dem von Herrn Paul Kuhnt aus Berlin herausgegebenen Werk: „*Illustrierte Bestimmungstabellen der Käfer Deutschlands*“, Stuttgart 1912, E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung.

Es sei hier gleich voraus geschickt, daß das erwähnte Werk, obgleich es verschiedene Mängel besitzt und manchmal unzuverlässig wird, als Bestimmungsbuch doch gut brauchbar, und der Fleiß des Verfassers sehr anzuerkennen ist. Als Forscher der elsässischen Käferfauna sehe ich mich jedoch gezwungen, gegen Herrn Kuhnt Stellung zu nehmen, da derselbe in seinen Bestimmungstabellen überall als Fundort „*Vogesen*“ setzt, wo Schilsky in seinem vorzüglichen Verzeichnis „*Vorarlberg*“ angibt (J. Schilsky, *Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands und Deutsch-Österreichs*, Stuttgart 1909, Verlag von Strecker & Schröder).

Schilsky hat auf Seite X u. a. folgende Abkürzungen:

Vog = *Vogesen*,

Vo und *Vor* = *Vorarlberg*.

Wo im Schilskyschen Verzeichnis *Vog* steht, gibt Herr Kuhnt richtig *Vogesen* an, wie z. B. bei *Hydroporus opatrinus* Germ. und *H. depressus* F. (Kuhnt S. 137, Schilsky S. 25). Wo Schilsky *Vo* und *Vog* schreibt, gibt Herr Kuhnt ebenfalls *Vorarlberg* und *Vogesen* an, z. B. bei *Chrysochloa a. coeruleolineata* Duft. und *C. a. senecionis* Schumm. (Kuhnt S. 845, Schilsky S. 146, 147). Wo hingegen im Schilskyschen Verzeichnis nur *Vo* steht, schreibt

Herr Kuhnt *Vogesen*, obwohl es sich um *Vorarlberg* handelt. Wo Schilsky *Vo* und *Els* (also *Vorarlberg* und *Elsass*) setzt, gibt Herr Kuhnt nur *Elsass* an, z. B. bei *Xanthochroa carniolica* Gistel (Kuhnt S. 690, Schilsky S. 119), ein Beweis, daß letzterer in der Abkürzung *Vo* die elsässischen *Vogesen* vermutet. Des öfters übersieht auch Herr Kuhnt die Angabe *Vog* von Schilsky, z. B. bei *Arrhenocoela lineata* Rossi (Kuhnt S. 863, Schilsky S. 150).

In der Folge habe ich nun, um späteren Unannehmlichkeiten vorzubeugen, eine Liste aufgestellt, aus der zu ersehen ist, bei welchen Käfern von Herrn Kuhnt *Vorarlberg* mit *Vogesen* verwechselt wurde, oder die Bezeichnung *Vogesen* zufällig richtig ist.

Kuhnt, Seite 27, Schilsky, Seite 2. — *Cicindela litterata* Sulz. Vorarlberg, nicht *Vogesen*.

K. 28, S. 1. — *Cicindela a. tristis* D Torre. Vorarlberg, nicht *Vogesen*.

K. 28, S. 1. — *C. a. monticola* Heer. Vorarlberg, nicht *Vogesen*.

K. 37, S. 2. — *Cychrus angustatus* Hoppe. Vorarlberg, nicht *Vogesen*.

K. 41, S. 3. — *Carabus v. Hornschuchi* Hoppe. Vorarlberg, nicht *Vogesen*.

K. 47, S. 6. — *Nebria Gyllenhali* Schönh. Vorarlberg, nicht *Vogesen*.

K. 47, S. 6. — *N. Jockischi* Strm. Vorarlberg, nicht *Vogesen*.

K. 47, S. 6. — *N. Bremii* Germ. Vorarlberg, nicht *Vogesen*.

K. 47, S. 6. — *N. Germari* Heer. Vorarlberg, nicht *Vogesen*.

K. 47, S. 6. — *N. castanea* Bon. Vorarlberg, nicht *Vogesen*.

Diese alpine Art könnte jedoch in den Hochvogesen (Belchen, Hohneck, Schlucht usw.) vorkommen, da sie auf der Hornisgrinde, im Bad. Schwarzwald, erbeutet wurde (*Conf. L. v. Heyden, Deut. Ent. Zeitschr.* 1890, S. 212).

K. 47, S. 6. — *N. v. brunnea* Duft. Vorarlberg, nicht *Vogesen*.

K. 48, S. 6. — *Notiophilus rufipes* Curt. Vorarlberg und *Vogesen*.

K. 55, S. 8. — *Bembidion a. sexpunctatum* Heer. Vorarlberg, nicht *Vogesen*.

K. 56, S. 9. — *B. inustum* Duv. Vorarlberg, nicht *Vogesen*. Dürfte jedoch in letzteren vorkommen, da das Tier von Eichhoff bei Mülhausen i. E., und von Goubert bei Nancy erbeutet wurde.

K. 60, S. 9. — *B. Millerianum* Heyd. Vorarlberg, nicht *Vogesen*.

K. 60, S. 9. — *B. decoratum* Duft. Vorarlberg, nicht *Vogesen*.

Von Geh. Rat Dr. Fischer jedoch bei Mülhausen i. E. gefangen.

K. 60, S. 8. — *B. Starki* Schaum. Vorarlberg, nicht *Vogesen*.

K. 62, S. 8. — *B. eques* Sturm. Vorarlberg, nicht *Vogesen*.

- K. 62, S. 9. — *B. Stephensi* Crotch. Vorarlberg, nicht Vogesen.
Dürfte jedoch in Südwest-Deutschland zu finden sein.
- K. 63, S. 8. — *B. tricolor* F. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 63, S. 8. — *B. conforme* Dej. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 67, S. 10. — *Tachys sexstriatus* Duft. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 69, S. 11. — *Trechus nigrinus* Putz. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 77, S. 13. — *Badister a. suturalis* Steph. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 97, S. 17. — *Amara Quenseli* Schönh. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 102, S. 19. — *Pterostichus pumilio* Dej. Vorarlberg und Vogesen.
- K. 104, S. 18. — *P. marginalis* Dej. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 105, S. 19. — *P. unctulatus* Duft. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 107, S. 20. — *P. Panzeri* Panz. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 107, S. 20. — *P. v. intermedius* Heer. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 107, S. 20. — *P. v. Heeri* Heer. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 107, S. 20. — *P. fasciatopunctatus* Creutz. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 107, S. 20. — *P. multipunctatus* Dej. Vorarlberg, nicht Vogesen. Auch Fauvel erwähnt das Tier irrtümlich aus den Vogesen (*Conf. J. Sainte-Claire Deville, Ann. Soc. ent. Fr. 1902, p. 610*).
- K. 117, S. 23. — *Lionychus v. major* Mill. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 140, S. 26. — *Hydroporus morio* Heer. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 141, S. 26. — *H. foveolatus* Heer. Vorarlberg, nicht Vogesen.
Nach Wencker wurde der Käfer jedoch bei Vendenheim in der Nähe Straßburgs beobachtet.
- K. 143, S. 26. — *Agabus Solieri* Aubé. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 183, S. 30. — *Anthobium aucupariae* Kiesw. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 191, S. 32. — *Amphichroum hirtellum* Heer. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 192, S. 32. — *Lesteva monticola* Kiesw. Vorarlberg und Vogesen. Riehn hat diese alpine Art in den Hochvogesen (Gebweiler Belchen) erbeutet.
- K. 192, S. 32. — *Geodromicus v. curtipennis* Fauv. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 194, S. 33. — *Anthophagus scutellaris* Er. Vorarlberg, nicht Vogesen.

- K. 196, S. 33. — *Thinobius linearis* Kr. Vorarlberg, nicht Vogesen, wurde jedoch von Fauvel bei Straßburg und von Leprieur bei Colmar erbeutet.
- K. 215, S. 37. — *Stenus coarcticollis* Epp. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 219, S. 38. — *Scopaeus sericans* Rey. Vorarlberg, nicht Vogesen. Das Vorkommen im Elsass ist zweifelhaft.
- K. 219, S. 38. — *S. v. intermedius* Rey. Vorarlberg und Vogesen. Wurde daselbst beim Forsthaus Sägmatten, im oberen Lauchthal, erbeutet.
- K. 222, S. 38. — *Lathrobium bicolor* Er. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 231, S. 40. — *Philonthus montivagus* Heer. Vorarlberg und Vogesen, wo ich das Tier kurz vor dem Krieg auf dem Hohnneck fing.
- K. 232, S. 41. — *P. aerosus* Kiesw. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 238, S. 42. — *Staphylinus chloropterus* Panz. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 242, S. 43. — *Quedius v. nigrocoeruleus* Fauv. Vorarlberg und Vogesen. Bei Epinal von J. Sainte-Claire Deville in Maulwurfsbauten gefunden.
- K. 244, S. 43. — *Q. dubius* Heer. Vorarlberg und Vogesen. Von Markkirch, Altweier und dem Hochfeld bekannt.
- K. 244, S. 43. — *Q. anceps* Fairm. Vorarlberg und Vogesen. Wurde von Riehn im Juli 1911 auf dem Gebweiler Belchen und am Lauchensee erbeutet.
- K. 245, S. 44. — *Q. alpestris* Heer. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 246, S. 44. — *Q. paradisiacus* Heer. Vorarlberg und Vogesen. Von Dr. Puton in der Nähe von Remiremont erbeutet.
- K. 297, S. 56. — *Oxygaster induta* Rey. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 303, S. 57. — *Aleochara Milleri* Kr. Vorarlberg, nicht Vogesen. Die Angabe von Mathieu, nach der das Tier bei Nancy gefunden wurde, ist zweifelhaft.
- K. 310, S. 58. — *Euplectus nubigena* Reitt. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 313, S. 59. — *Brachygluta tristis* Hampe. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 316, S. 60. — *Bythinus v. extremitalis* Reitt. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 329, S. 63. — *Nargus badius* Sturm. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 347, S. 66. — *Agathidium dentatum* Muls. Vorarlberg, nicht Vogesen.

- K. 357, S. 68. — *Actidium Boudieri* Allib. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 360, S. 69. — *Baeocrara littoralis* Thoms. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 394, S. 191. — *Aphodius Satyrus* Reitt. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 411, S. 196. — *Hoplia v. Karamani* Reitt. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 420, S. 71. — *Helophorus porculus* Bedel. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 420, S. 71. — *H. Schmidtii* Villa. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 421, S. 72. — *H. nivalis* Giraud. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 421, S. 72. — *H. glacialis* Villa. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 424, S. 72. — *Ochthebius granulatus* Muls. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 428, S. 73. — *Hydraena polita* Kiesw. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 452, S. 78. — *Rhagonycha a. Scopoli* Gredl. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 454, S. 79. — *Malthodes v. atramentarius* Kiesw. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 454, S. 79. — *M. alpicola* Kiesw. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 455, S. 79. — *M. chelifera* Kiesw. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 458, S. 80. — *Malachius affinis* Mén. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 459, S. 80. — *M. a. immaculatus* Rey. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 461, S. 81. — *Dasytes alpigradus* Kiesw. Vorarlberg und Vogesen. Von Bourgeois und Cuny bei Gerardmer gefunden.
- K. 469, S. 82. — *Trichodes irkutensis* Laxm. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 469, S. 82. — *T. favarius* Ill. Vorarlberg, nicht Vogesen. Das Tier dürfte jedoch in letzteren vorkommen, da es bei Straßburg gefunden wurde.
- K. 472, S. 83. — *Byturus a. flavescens* Marsh. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 474, S. 83. — *Calitys scabra* Thunb. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 479, S. 83. — *Cateretes dalmatinus* Sturm. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 520, S. 89. — *Cryptophagus croaticus* Reitt. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 523, S. 91. — *Atomaria v. hiemalis* Baudi. Vorarlberg, nicht Vogesen.

- K. 536, S. 92. — *Lathridius Pandellei* Bris. Vorarlberg und Vogesen. Von Dr. Puton bei Remiremont gefangen; auch in der Umgebung von Barr beobachtet.
- K. 569, S. 97. — *Subcoccinella a. zonata* Heyd. Vorarlberg und Vogesen. Von Pfarrer Umhang in den Hochvogesen (Belchen, Molkenrain, Hartmannsweiler Kopf) und von Zürcher bei Epinal erbeutet.
- K. 569, S. 97. — *S. v. meridionalis* Motsch. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 570, S. 97. — *Hippodamia a. 11-maculata* Harrer. Vorarlberg und Vogesen. Kommt am Hohneck und Schwarzen See vor.
- K. 571, S. 98. — *Adonia a. Carpini* Geoffr. Vorarlberg und Vogesen. Wurde auf dem Hochfeld und in der Umgegend von Colmar erbeutet.
- K. 572, S. 98. — *Semiadalia notata* Laich. Vorarlberg und Vogesen (Hohneck, Urbach, Altweier, Schirmeck).
- K. 573, S. 98. — *Adalia a. destitua* Ws. Vorarlberg und Vogesen (Abhang des Donon).
- K. 577, S. 99. — *Coccinella a. lineolata* Marsh. Vorarlberg, nicht Vogesen. Könnte jedoch daselbst vorkommen, da nach einer Mitteilung von Bourgeois das Tier von Pfarrer Blind im Ober-Elsafs gefangen wurde. Der genaue Fundort ist nicht festzustellen.
- K. 581, S. 100. — *Propylaea tetragonata* Laich. Vorarlberg, nicht Vogesen. Von Pfarrer L. Vouaux jedoch in der Umgebung von Nancy gefunden.
- K. 589, S. 101. — *Helodes Hausmanni* Gredl. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 613, S. 105. — *Byrrhus gigas* F. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 613, S. 105. — *B. glabratus* Heer. Vorarlberg und Vogesen.
- K. 613, S. 105. — *B. picipes* Duft. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 613, S. 105. — *B. a. inornatus* Reitt. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 615, S. 106. — *Syncalypta setosa* Walzl. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 622, S. 106. — *Corymbites testaceipennis* Duft. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 623, S. 107. — *Diacanthus a. ochropterus* Steph. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 624, S. 106. — *D. rugosus* Germ. Vorarlberg und Vogesen. Ein Ex. vom Gebweiler Belchen.
- K. 627, S. 108. — *Cryptohypnus rivularius* Gyll. Vorarlberg, nicht Vogesen.

- K. 634, S. 109. — *Elater v. concolor* Stierl. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 643, S. 111. — *Hypocoelus procerulus* Mannh. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 643, S. 111. — *H. v. musculus* Rosenh. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 652, S. 113. — *Anthaxia v. helvetica* Stierl. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 652, S. 113. — *A. v. angulicollis* Küst. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 679, S. 117. — *Episernus striatellus* Bris. Vorarlberg, nicht Vogesen. Das Tier wurde jedoch von Wencker bei Hagenau und von mir im Brumather Wald gefunden.
- K. 686, S. 118. — *Ochina ptinoïdes* Marsh. Vorarlberg und Vogesen (Zabern, Wanzel, Frankenburg, Epinal).
- K. 690, S. 119. — *Sparedrus testaceus* Andersch. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 691, S. 119. — *Anoncodes fulvicollis* Scop. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 713, S. 123. — *Mordella a. seriatoguttata* Muls. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 714, S. 123. — *M. a. femoralis* Baud. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 715, S. 124. — *Mordellistena Schusteri* Schils. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 715, S. 123. — *M. a. axillaris* Gyll. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 715, S. 124. — *M. confinis* Cost. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 718, S. 124. — *Anaspis latiuscula* Muls. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 719, S. 124. — *A. Kiesenwetteri* Em. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 734, S. 126. — *Gonodera semiflava* Küst. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 734, S. 126. — *G. v. icteropa* Küst. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 750, S. 130. — *Helops Rossi* Germ. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 763, S. 131. — *Evodinus interrogationis* L. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 763, S. 131. — *E. a. ebeninus* Muls. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 763, S. 131. — *E. a. marginellus* F. Vorarlberg und Vogesen. Von mir in Rufach gefangen.

- K. 764, S. 131. — *E. clathratus* F. Vorarlberg **und** Vogesen. Bereits von Kampmann und Silbermann aus dem Elsaß erwähnt, wurde der Käfer von mir bei Sennheim erbeutet.
- K. 764, S. 131. — *E. a. brunnipes* Muls. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 764, S. 132. — *Acmaeops a. nigricollis* Muls. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 765, S. 132. — *A. septentrionis* Thoms. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 776, S. 134. — *Cerambyx v. helveticus* Stierl. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 779, S. 134. — *Phymatodes pusillus* F. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 780, S. 135. — *Callidium coriaceum* Payk. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 822, S. 141. — *Gynandrophthalma diversipes* Letz. Vorarlberg **und** Vogesen (Hohneck, Schlucht, Spitzköpfe).
- K. 824, S. 142. — *Cryptocephalus villosulus* Suffr. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 825, S. 143. — *C. a. aethiops* Ws. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 826, S. 142. — *C. a. albolineatus* Suffr. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 827, S. 142. — *C. a. pictus* Suffr. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 833, S. 143. — *Pachybrachis haliciensis* Mill. Vorarlberg **und** Vogesen. Kommt auch bei Straßburg und Mülhausen i. E. vor.
- K. 845, S. 147. — *Chrysochloa a. nubigena* Ws. Vorarlberg **und** Vogesen. Auf dem Hohneck von Dr. Puton erbeutet.
- K. 847, S. 146. — *C. a. ignita* Com. Vorarlberg **und** Vogesen. Ebenfalls auf dem Hohneck.
- K. 848, S. 146. — *C. a. virgo* Ws. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 848, S. 146. — *C. a. nubila* Ws. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 848, S. 146. — *C. a. atramentaria* Ws. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 848, S. 146. — *C. a. excellens* Ws. Vorarlberg **und** Vogesen.
- K. 851, S. 148. — *Phyllodecta a. coeruleus* Ws. Vorarlberg **und** Vogesen. Wurde bei Thann gefunden.
- K. 851, S. 148. — *P. a. Cornelii* Ws. Vorarlberg **und** Vogesen. Kommt auch bei Straßburg vor.
- K. 851, S. 148. — *P. a. nigricus* Motsch. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 851, S. 148. — *P. v. major* Stierl. Vorarlberg **und** Vogesen. Wurde bei Bitsch gefangen.
- K. 853, S. 148. — *Phaedon a. violaceus* Ws. Vorarlberg **und** Vogesen. Im Wormsatal gefunden.

- K. 857, S. 149. — *Luperus a. silvestris* Ws. Vorarlberg und Vogesen. Auf dem Hohnneck.
- K. 862, S. 150. — *Crepidodera frigida* Ws. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 863, S. 150. — *C. rhaetica* Kutsch. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 865, S. 150. — *Chalcoides a. jucunda* Ws. Vorarlberg und Vogesen.
- K. 865, S. 151. — *Hippuriphila a. chalybaea* Ws. Vorarlberg und Vogesen. Kommt auch bei Metz vor.
- K. 869, S. 151. — *Psylliodes subaenea* Kutsch. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 871, S. 152. — *P. thlaspis* Foudr. Vorarlberg und Vogesen.
- K. 880, S. 153. — *Longitarsus fusco-aeneus* Reitt. Vorarlberg und Vogesen.
- K. 881, S. 153. — *L. pinguis* Ws. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 882, S. 154. — *L. rubellus* Foudr. Vorarlberg und Vogesen.
- K. 885, S. 154. — *L. viduus* All. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 892, S. 156. — *Cassida atrata* F. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 898, S. 157. — *Bruchidius pusillus* Germ. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 898, S. 157. — *B. a. seminarius* Baud. Vorarlberg und Vogesen.
- K. 922, S. 161. — *Otiorrhynchus chrysocomus* Germ. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 922, S. 161. — *O. v. pabulinus* Panz. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 924, S. 160. — *O. teretirostris* Stierl. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 925, S. 160. — *O. anthracinus* Scop. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 925, S. 160. — *O. alpicola* Boh. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 926, S. 160. — *O. eremicola* Rosenh. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 926, S. 160. — *O. auricomus* Germ. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 926, S. 160. — *O. squamosus* Mill. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 926, S. 158. — *O. rhaeticus* Stierl. Vorarlberg und Vogesen. In letzteren durch Geh. Rat Dr. Fischer erbeutet; der genaue Fundort ist jedoch nicht mehr festzustellen.
- K. 927, S. 159. — *O. a. rugipennis* Boh. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 927, S. 159. — *O. a. montanus* Boh. Vorarlberg und Vogesen. Auf der Schlucht und bei Gerardmer gefunden.

- K. 927, S. 159. — *O. v. memnonius* Gyll. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 928, S. 159. — *O. subcostatus* Stierl. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 929, S. 159. — *O. foraminosus* Boh. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 930, S. 161. — *Peritelus rusticus* Boh. Das Vorkommen in den Vogesen ist zweifelhaft (*Conf. Bourgeois, Catalogue des coléoptères de la chaîne des Vosges, p. 434*).
- K. 942, S. 164. — *Strophomorphus porcellus* Schönh. Das Vorkommen in den Vogesen ist ebenfalls zweifelhaft (*Conf. loc. cit. p. 442*).
- K. 944, S. 165. — *Sitona longulus* Gyll. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 944, S. 165. — *S. cylindricollis* Fahr. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 949, S. 166. — *Lepyrus a. canus* Gyll. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 956, S. 168. — *Larinus turbinatus* Gyll. Vorarlberg **und** Vogesen.
- K. 957, S. 168. — *Tropiphorus obtusus* BOND. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 963, S. 170. — *Hypera segnis* Cap. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 963, S. 170. — *H. velutina* Boh. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 967, S. 171. — *Pissodes scabricollis* Mill. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 968, S. 171. — *Grypidius v. atrirostris* F. Vorarlberg **und** Vogesen.
- K. 971, S. 172. — *Dorytomus a. rectirostris* Faust. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 971, S. 171. — *D. nebulosus* Gyll. Vorarlberg **und** Vogesen.
- K. 973, S. 172. — *Smicronyx seriepilosus* Tourn. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 975, S. 172. — *Bagous a. nigripes* Sahlb. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 1001, S. 178. — *Limnobaris pusio* Boh. Vorarlberg, nicht Vogesen. Wurde jedoch von mir in der Nähe Straßburgs (Ruprechtsau) auf *Carex* gefangen.
- K. 1005, S. 179. — *Anthonomus undulatus* Gyll. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 1005, S. 179. — *A. a. piri* Kollar. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 1009, S. 179. — *Tychius crassirostris* Kirsch. Vorarlberg, nicht Vogesen.

- K. 1009, S. 179. — *T. haematopus* Gyll. Vorarlberg, nicht Vogesen. Wurde jedoch im Neuhofer Wald bei Straßburg erbeutet.
- K. 1013, S. 180. — *Orchestes a. depressus* Marsh. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 1020, S. 182. — *Nanophyes annulatus* Arag. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 1021, S. 182. — *N. a. Mülleri* Reitt. Vorarlberg, nicht Vogesen. Kommt jedoch bei Straßburg vor (Neuhofer Wald).
- K. 1035, S. 185. — *Apion gracicolle* Gyll. Vorarlberg und Vogesen.
- K. 1037, S. 185. — *A. juniperi* Boh. Vorarlberg und Vogesen.
- K. 1038, S. 185. — *A. punctirostre* Gyll. Vorarlberg, nicht Vogesen.
- K. 1052, S. 187. — *Polygraphus subopacus* Thoms. Vorarlberg, nicht Vogesen.

In den Kuhnt'schen Tabellen befinden sich noch manche andere Elsaßs-Lothringen betreffende Angaben, die zum Teil zweifelhaft, zum Teil falsch sind. Letztere zu verbessern, gehört jedoch nicht in den Rahmen dieser kleinen Arbeit; es wird sich später die Gelegenheit finden, eingehender darauf zurückzukommen. Die meisten dieser Fehler hätten aber vermieden werden können, wenn Herr Kuhnt ein Verzeichnis der elsässischen Käfer zu Rate gezogen hätte. Die Kataloge von Kampmann, Wencker-Silbermann und Bourgeois hätte er nicht ignorieren und sich nicht mit Fauvels *Faune gallo-rhénane* begnügen sollen, die zahlreiche unrichtige Angaben enthält (*Conf.* Kuhnt, Seite 1128). In zweifelhaften Fällen würden die elsässischen Entomologen Herrn Kuhnt auch gern Auskunft gegeben haben. Zum Schluß will ich noch erwähnen, daß mir der Gedanke fern liegt, die Illustrierten Tabellen in irgend einer Weise herabsetzen zu wollen. Wenn dieselben, was die elsässische Fauna anbelangt, auch versagen, so leistet das Werk, als Bestimmungsbuch, gute Dienste.

Scherdlin, Paul. 1916. "Vorarlberg, nicht Vogesen! Einige Berichtigungen zu den Kuhntschen Bestimmungstabellen der Käfer Deutschlands. (Col.)." *Deutsche entomologische Zeitschrift* 1916(2), 191–201.
<https://doi.org/10.1002/mmnd.48019160211>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/103197>

DOI: <https://doi.org/10.1002/mmnd.48019160211>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/236244>

Holding Institution

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Sponsored by

Biodiversity Heritage Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.