

Übersicht der Arten der Coleopteren-Gattung *Deporaus* Samou.¹⁾ aus Europa und dem Kaukasus.

Gegeben von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

(Kopf am Hinterrande halsartig eingeschnürt).

- 1" Flügeldecken in der Umgebung des Schildchens verworren punktiert, um die Hälfte länger als zusammen breit; Rüssel länger als der Kopf. Schwarz, Flügeldecken blau, selten grün. Fühlerkeule (3-gliedrig) oval, die Glieder dicht aneinandergeschlossen.
- 2" Oberseiteschwarz behaart. — Mittel und Südeuropa. — *tristis* Fbr.
- 2' Oberseite greis behaart, die Behaarung etwas kürzer und weniger gehoben. Flügeldecken häufig grün. — Kaukasus. *seminiger* Reitt.
- 1' Flügeldecken im Umkreis des Schildchens nicht verworren punktiert, ohne abgekürzten Scutellarstreifen.
- 3" Halsschild breit und quer scheibenförmig, an den Seiten stark gerundet, die dreigliederige Fühlerkeule stark abgesetzt, die Glieder nicht gedrängt aneinander gegliedert, das letzte schmaler als das vorhergehende. Flügeldecken mit breiten, dicht punktierten Zwischenräumen.

Schwarz, die Flügeldecken und Schenkel blauschwarz, fein grau behaart. Rüssel dick, beim ♂ so lang als der Kopf, beim ♀ länger, Stirn vom Rüssel quer abgesetzt, Augen stark vortretend, Schläfen nach hinten leicht verengt, ziemlich kurz, Hals schwach eingeschnürt. Halsschild querelliptisch, dicht hinter der Mitte am breitesten, wie der Kopf dicht und fein punktiert, manchmal mit angedeuteter Mittellinie. Schildchen quadratisch. Flügeldecken breit wie bei *tristis*, $\frac{1}{2}$ mal länger als zusammen breit, parallel, mit starken Punktstreifen, die Zwischenräume breiter als die Streifen und wie der Thorax dicht verworren punktiert. Beine normal, Tarsen ziemlich schlank. Long. 3.5—4 mm ohne Rüssel. *punctatissimus* n. sp.

Befand sich in einiger Zahl in den Vorräthen des Herrn Cristoph, unter dem kaukasischen Materiale. Nachdem Cristoph auch in Ostsibirien gesammelt hatte und dort Arten vorkommen, die dieser näher verwandt sind als die kaukasischen, so musste auch auf die sibirischen Arten um so mehr Rücksicht genommen werden, als dieser ja möglich nur durch Verwechslung unter die Kaukasier kam. — Von

1) Siehe Faust, D. 1887 163.



Reitter, Edmund. 1899. "Übersicht der Arten der Coleopteren-Gattung Depbraus Samou. aus Europa und dem Kaukasus." *Entomologische Nachrichten* 25, 306–307.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/42396>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/240292>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.