médiane jaune pâle, plus étendue que dans l'espèce précédente, et des poils plus courts que dans *M. Vuilleti*, pâles sur la tache, bruns sur le reste de la surface. Dessous et pattes à pubescence gris jaunâtre pâle sur le pectus et l'abdomen, un peu plus foncée sur les hanches, les pattes et l'avant-dernier arceau ventral; cette pubescence assez courte sur le milieu du corps, longue et dense latéralement. Saillie mésosternale large, lisse, peu avancée, séparée par une longue frange de poils jaunâtres du métasternum qui est éparsément ponctué et pubescent en son milieu, densément ponctué-striolé sur les côtés; abdomen convexe, assez fortement ponctué et pubescent en son milieu, densément et totalement striolé sur les côtés; cinquième segment avec une frange de poils roux, le sixième glabre, densément striolé en travers sur toute sa surface.

Longueur (du bord antérieur du pronotum à l'extrémité des élytres), 13,8 mm.; largeur maxima 7,8 mm.

Type : 1 ♂, de Chine : Fo-kien (ex DONCKIER). — Coll. A. BOURGOIN.

M. Vuilleti et *M. olivaceofusca* sont deux espèces très voisines de *M. (Pleuronota) sexmaculata* Kraatz; elles s'en distinguent aisément par la ponctuation fine de la région antérieure des élytres, cette région étant rugueusement striolée chez *M. sexmaculata*.

Je ne puis comprendre pourquoi KRAATZ (*Deutsche ent. Zeitschr.*, [1894], p. 141) a placé *M. sexmaculata* dans le genre *Pleuronota* créé par lui pour *P. octomaculata* de Java (*loc. cit.*, [1892], tab. 4, fig. 7). En effet, d'après les caractères génériques indiqués par cet auteur, on peut faire rentrer dans le genre *Pleuronota* presque tous les *Macronota* qui ont le clypéus échancré en avant, sauf toutefois *M. sexmaculata*, *M. Vuilleti* et *M. olivaceofusca*, qui ont le clypéus relevé en rebord et nullement échancré.

Deux Coléoptères nouveaux de la Faune française

par le Dr H. NORMAND.

STAPHYLINIDAE

Leptotyphlus Lavagnei, n. sp. — Testacé, filiforme, assez brillant, n'ayant que l'abdomen alutacé. Tête un peu plus longue que large, presque quadrangulaire, à bords parallèles, à carène frontale peu marquée, couverte d'une ponctuation fine, assez régulièrement clairsemée. Ocelles situés au quart postérieur de la tête, très rappro-

chés l'un de l'autre, plus que de la limite postérieure du vertex. Antennes courtes; 1^{er} article volumineux, plus long que large; 2^e plus court et plus étroit; 3^e et 4^e égaux, légèrement transverses, de dimensions beaucoup plus réduites que celles de tous les autres articles; les suivants augmentant progressivement de largeur jusqu'à la massue, formée de trois articles séparés, les deux premiers fortement transverses, le dernier conique, plus long que les deux précédents réunis. Prothorax, dans sa partie antérieure, de même largeur que la tête, mais rétréci fortement en arrière; ponctuation obsolète, clairsemée, sillons larges, peu marqués à fond à peine alutacé. Élytres en triangle isocèle, finement pointillés, beaucoup plus courts et plus étroits que le corselet. Abdomen couvert d'une réticulation nette, mais bien moins serrée que chez les espèces voisines. Dernier segment ventral relativement court, une fois et demie plus long que le précédent.

Long. 4,4 mm.

♂. Dernier segment ventral sans impression, à échancrure large, subarrondie, peu profonde, comprenant presque toute la largeur du segment.

Cette espèce, voisine des *L. tuniseus* Norm. et *L. tyrrhenius* Dod. par les caractères sexuels et la structure des antennes, s'en distinguera facilement par la longueur de la tête et la disposition de ses ocelles.

Environs de Montpellier.

Capturé en un grand nombre d'exemplaires par M. H. LAVAGNE, au moyen de mon procédé d'« inondation artificielle » légèrement modifié.

SCYDMAENIDAE

Cephennium (Cephennarium) Lavagnei, n. sp. — Court, trapu, assez convexe; ferrugineux, avec les membres plus clairs; couvert d'une ponctuation râpeuse, peu serrée, et d'une pubescence fauve, assez longue. Tête lisse, allongée; yeux petits, bien marqués; antennes robustes, atteignant les angles postérieurs du prothorax; 1^{er} et 2^e articles épais, allongés; 3^e, 4^e et 5^e un peu plus longs que larges; 6^e et 8^e carrés, plus étroits, 7^e plus long et plus épais; trois derniers articles formant massue; 9^e carré, 10^e transversal; 11^e conique, égalant les deux précédents réunis. Prothorax plus large que long, élargi en avant, rétréci en ligne droite en arrière; angles antérieurs arrondis, postérieurs presque droits, à impression obsolète. Élytres convexes, atténués en arrière; fovéole basale profonde, arrondie, située à égale distance entre la suture et l'angle huméral; pas de strie humérale.

1916. "Deux Coleopterea nouveaux de la faune franYaise." *Bulletin de la Société entomologique de France* 1916, 137–138.

<https://doi.org/10.5962/bhl.part.24172>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/37021>

DOI: <https://doi.org/10.5962/bhl.part.24172>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/24172>

Holding Institution

Smithsonian Libraries

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.