Phytophages nouveaux [COL. MEGALOPIDAE ET CRIOCERIDAE]

par Maurice PIC.

1. **Mastostethus Donckieri**, n. sp. — *Oblongum, nitidum, pro parte nigrum, pro parte pallido-testaceum; capite testaceo, postice nigro; thorace transverso, testaceo, ad medium transverse nigro fasciato; elytris nigris, testaceo bifasciatis, lateribus antice testaceo maculatis.*

Oblong, brillant, peu pubescent en dessous, en partie noir et en partie testacé pâle. Tête testacée, noire postérieurement, labre et épistome tachés de brun. Antennes noires, courtes et robustes. Prothorax transversal, très large, rétréci en avant, presque lisse, testacé, avec une bande transversale médiane noire complète, un peu ondulée. Écusson noir en arrière. Élytres assez courts, peu convexes, subsinués sur les côtés, médiocrement ponctués, noirs avec une macule antérieure externe arquée, une fascie antémédiane subarquée et une autre fascie avant le sommet, celles-ci testacées; épipleures testacés en avant. Dessous du corps testacé, poitrine maculée de foncé. Pattes noires, avec les fémurs en partie maculés de testacé; tibias arqués. — Long. 8 mm.

Pérou. — Dédié à notre collègue M. DONCKIER DE DONCEEL ⁽¹⁾.

Cette espèce, voisine de *M. Erichsoni* Jac., est très distincte par la bande noire transversale du prothorax, ainsi que par la disposition des bandes claires des élytres.

2. **Mastostethus Gounellei**, n. sp. — *Oblongum, nitidum, rubrum, capite thoraceque nigro maculatis, antennis, tibiis tarsisque nigris, elytris pallido-testaceis, nigro cinctis et ad medium transverse nigro fasciatis.*

Oblong, brillant, peu pubescent en dessous, rouge, maculé sur l'avant-corps, avec les membres noirs et les cuisses rouges. Élytres d'un testacé pâle, bordés de noir, plus largement à la base et au sommet, avec une fascie transversale médiane assez étroite et presque droite, noire, remontant un peu sur la suture en avant, celle-ci noire. Tête rouge, à labre et ligne allongée sur le vertex noir. Antennes assez longues, un peu épaissies. Prothorax transversal, angulé aux

(1) J'ai acquis, il y a quelques années, la collection de Mégalopides et de Criocérides réunie par cet entomologiste.

angles, éparsement ponctué, roux avec une macule discale noire. Écusson roux et noir. Élytres assez courts, subdéprimés, légèrement sinués latéralement, distinctement et éparsement ponctués, moins en arrière, d'un testacé pâle, bordure latérale et fascie médiane noires. Dessous du corps rouge. Pattes noires; cuisses rouges, les postérieures tachées de noir en dessous; tibias arqués. — Long. 10 mm.

Brésil : Val du Rio Pardo (É. GOUNELLE). — Dédié à la mémoire du regretté collègue à qui je dois cette jolie espèce ⁽¹⁾.

Voisin de *M. erythrosoma* Blanch., mais les dessins noirs sont un peu différents et très réduits sur les élytres; en outre l'avant-corps est autrement maculé.

3. *Lema erycina* var. *inapicalis*, n. var. — *Elytris concoloribus, nigris*.

Guinée : Benito (coll. Pic).

Cette variété se distingue de *L. erycina* Baly typique par l'absence de macule apicale rousse aux élytres.

4. *Bradylema leonensis*, n. sp. — *Oblonga, nitida, rufo-testacea, antennis, articulo primo testaceo excepto, tarsisque pro parte nigris, elytris antice sat late piceo maculatis*.

Oblong, brillant, roux testacé, avec les antennes, moins le premier article qui est testacé, et une partie des tarses noirs. Élytres ornés chacun, près de la base, d'une macule subtriangulaire d'un noir de poix, celle-ci n'atteignant ni les côtés, ni la suture. Tête petite, faiblement impressionnée entre les yeux. Antennes longues, subfiliformes. Prothorax un peu plus long que large, nettement étranglé au milieu, dilaté anguleusement en avant, élargi vers la base et muni d'un faible sillon transversal, indistinctement ponctué. Élytres pas très longs, subparallèles, ayant des rangées de points assez gros en avant, petits en arrière. Pattes postérieures à cuisses gibbeuses et fortement dentées vers leur sommet, tibias denticulés en dedans; pattes intermédiaires à cuisses médiocrement dentées et tibias courtement échancrés à la base. — Long. 9 mm.

Sierra Leone : Rhobomp.

Cette espèce, très distincte par ses élytres maculés, ainsi que par la conformation de ses pattes postérieures, peut prendre place près de *B. jolofa* Lac.

(1) É. GOUNELLE m'avait cédé, quelques années avant sa mort, certaines familles de sa collection, entre autres ses Mégalopides.

1916. "Phytophages nouveaux." *Bulletin de la Société entomologique de France* 1916, 186–187. <https://doi.org/10.5962/bhl.part.24178>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/37021>

DOI: <https://doi.org/10.5962/bhl.part.24178>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/24178>

Holding Institution

Smithsonian Libraries

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.