

Synopsis Molluscorum marinerum Indiarum occidentalium imprimis insularum danicarum.

autore O. A. L. Mörch.

Taenioglossata Troschel.

1. Rostrifera.

Fam. Rissoidae.

Gen. Rissoina d'Orb.

Sbg. Zebina H. & A. Adams.

T. polita, labro crasso; Eulimae peraffinis.

172. Rissoina (Zebina) vitrinella Mörch.

Differt a sequente specie t. majore minus pellucida, lactea; anfr. planis angustioribus; labro crasso lato striato; striæ incrementi insculptæ, distinctæ, obliquæ regulares sat remotæ; fascia suturalis coloris testae lactea lata, linea pellucente candidissima marginata Long. 5 mm.; lat 2 mm.

Hab. St. Thomas (A. H. Riise.) spm. 2.

Var. major long. $5\frac{1}{3}$ mm.; lat. 2 mm. (Krebs).

173. Rissoina (Zebina) vitrea C. B. Ad.

T. hydrphana, pellucida, nitidissima pallidissime caerulescens; sutura et labro opacis albis; striae incrementi paucae obsoletissimæ; sutura linea subtilissima impressa marginata. (Ad.)

Long. 0,29 poll., lat. 0,105 poll (Ad.) Long. 4,5 mm.; lat: 1,7 mm (Schwartz.)

Rissoa vitrea C. B. Ad. Contr. 1850. p. 115, Rissoina vitrea Schwartz Wien. Denkschr XIX. 1861. P. 84. f 82.

(sed apertura non bene quadrat)

Hab. Jamaika (Ad.) St Thomas Riise, som. 1).

174. Rissoina (Zebina) lævigata C. B. Ad.

T. candida, subpellucida, laevis; anfr 7 convexis, sutura

coarctata; fascia cinerea latiuscula marginata; labro postice ad suturam planato; differt a sequente t. minore concolore, anfr. paucioribus. (Schw.)

Long. 0,12 poll.; lat. 0,045 poll. (Ad.) Long. 3 mm.; lat. $1\frac{1}{3}$ mm. (Schw.)

Major: long. fere 5 mm.; lat. fere 2 mm. (Riise.)

Labro interdum antice dente verruciforme.

Rissoa laevigata C. B. Ad. Contr. l. c. p. 14.

Rissoina laevigata Schwartz l. c. Nr. 81. f. 79.

Hab. Jamaica (Ad.) St. Thomas (Riise, Krebs.)

175. *Rissoina (Zebina) Browniana* d'Orb.

T. solida, laevissima, lucida, plerumque in anfr. ult. rufo bifasciata et semper aperturam versus bimaculata; anfr. 8—9 planiusculi.

Long. 4 mm.; lat. $1\frac{1}{3}$ mm.

Rissoina Browniana d'Orb. Cuba 2. 1842. p. 28. t. 12. f. 33—35.

Rissoina Browniana Schw. l. c. Nr. 80. fig. 78.

Rissoa laevissima C. B. Ad. Contr. 1850 p. 115.

Hab. St. Thomas (Candé, Riise, Krebs) Martinique, Haiti (Candé) Cuba (Schw.)

Ut sequente saepe labro bidentato.

176. *Rissoina (Zebina) Sloaniana* d'Orb.

T. conica, laevigata, lucida; anfr. 5; apertura ovali antice posticeque sinuata, labro crasso.

Long. 2 mm.; diam. $\frac{2}{3}$ mm. d'Orb.

Differt a precedente t. dimid. minore, latiore, anfr. 5, labro extus incrassato apud nonnulla exemplaria intus dentibus duobus mamillaribus instructo. (Schw.)

Rissoina Sloaniana d'Orb. Cuba p. 28 t. XII. „f. 36. 38.“ *)

Rissoina Sloaniana Schw. l. c. n. 82. f. 80.

Hab. St. Thomas in astropectine (Riise) Krebs. St. Croix (Ovesen) Jamaica (Candé).

*) Figuræ citatæ desunt in tab.

Sbg. Zebinella Mörch. Zebina H. & A. Ad. p. p.

T. costellata, spiraliter striata.

177. *Rissoina* (*Zebinella*) *princeps* C. B. Ad. l. c.
p. 116.

T. costellis confertissimis in anfr. ult. evanescentibus;
lirulæ spirales fortiores in anfr. ult.; sutura subcontracta.
Long. 0,37; lat. 0,14 poll. (Ad.)

Long. 12 mm.; lat. 5 mm. (Schw.)

Rissoina reticulata „Sow. gen.“ Schw. l. c. Nr. 41.
f. 40. 90.

(non Sow. gen. quæ R. striata Q. & G.)

Hab. Jamaica (Ad.) Cuba (Riise, Schw.) St. Thomas.
(Riise, Krebs, H. Koch.) Rocksound New Providence
1866 sub corallio (Krebs).

178. *Rissoina* (*Zebinella*) *decussata* Mtg.

T. costellis 25—28, in parte antica anfr. evanescentibus;
lineæ spirales confertissimæ, sutura constricta, linea
impressa spirali marginata.

Long. 0,2 poll.; lat. 0,08 poll. (Ad.) Long. 8¼ mm.
lat. 3¼ mm. (Schw.)

Helix decussata Mtg. Brit. Test. p. 399. t. XV. f. 7.

Turbo decussatus Dill, 2. p. 882.

Turbo arenarius Mat. & Rack. Lin. Trans. VIII,
p. 209.

Rissoa alata Mke. Synop. p. 138 (ex Schw. Forb.
& Hanl.)

Rissoa pyramidella Brown Ill. ed. 2. pl. 9. f. 63.

Rissoa striosa C. B. Ad. Contr. p. 116.

Rissoina decussata Schwartz l. c. Nr. 45. f. 44.

var. α gracilior, minor, tenuis. Long. 6 mm. lat.
2¼ mm.

Rissoina striato-costata d'Orb. Cuba. p. 27. t. 12.
f. 30—32.

Hab. Cuba (Sagra) Haiti (Candé) St. Thomas (Scholten,
Riise, Krebs.) Porto Plata (Krebs.) Jamaica (Ad.)

179. *Rissoina* (*Zebinella*) *albida* C. B. Ad. Bost.
Proc. 1845. p. 6.

T. tenuis, diaphana; anfr. 10 a costulis pluribus (obliquis) exilissimis ad cujusque inferam partem obsoletis, et striis exilissimis decurrentibus, eleganter decussatis; striis juxta suturam profundioribus, anfr. angustantibus; labio a labro supra sinu disjuncto. (Ad.)

Long. 0,₃₁ poll.; lat. 0,₁₁ poll. — (Ad.)

Rissoina albida Schw. l. c. Nr. 20 f. 68.

Hab. Jamaica (Ad.) St. Thomas (Riise) Porto Plata (Krebs).

var. *R. affinis* Ad. Bost. Proc. 1845. p. 6.

„Praecedenti affinis, spira graciliore; striis juxta suturam nullis, costulis ad suturam infra productis. For-
san var.“ Ad. l. c.

180. *Rissoina* (*Zebinella*) *sigmifer* Mörch.

T. forma praecedentis, solida, albescens, anfr. convexis; costae validae continuae oblique leviter arcuatae circa 25 in anfr. ult. columellam versus angustiores, ubique lirulis confertissimis spiralibus decussati; sutura angustata, linea marginata; apertura antice effusa, labro medio subangulato extus costellis 3 confertis.

Long 11 mm., lat. $4\frac{3}{4}$ mm. spm. max.

Long. 8 mm. lat. 4 mm. spm. min.

Hab. New- Providence. 1866. (H. Krebs).

var. *a* T. brevior, tenuior, costis paucioribus (21) distantioribus, magis obliquis; in anfr. ult. basin versus evanescentibus —

Hab. ? (H. Krebs).

Rissoa duplicata d'Orb. Schw. l. c. f. 86^a simillima.

Subg. *Rissoina* d'Orb. sens. strict.

T. subcylindrica, costis validis.

181. *Rissoina Catesbyana* d'Orb.

T. costis 14—15 in anfr. ult., labro saepe intus et postice tuberculo parvo. Long. 4 mm.; diam. 2 mm.

Rissoina Catesbyana d'Orb. Cuba 2. p. 24. t. XII.
f. 1—3.

Rissoa scalarella C. B. Ad. Proc. Bost. 11. 1845. f. 6.

Rissoa scalarella C. B. Ad. Contr. p. 114.

Rissoina Chesneli „Michaud“ Schw. l. c. n. 70. f. 39.
non 38.

Hab. St. Thomas (Candé, Riise, Krebs) Cuba (Sagra.)

Martinique, Haiti (Candé) Jamaica (Ad.)

var. ? *floridana*. T. fasciis 2 angustis aurantiis ut
R. taeniata Mörch Mal. Blätter 1857.

Hab. Florida (spm. 2 mala).

182. *Rissoina subangulata* C. B. Ad. Contr. p. 112.

T. crassa; costis superne angulatis XI—XII in anfr.
ult.; lateribus convavis, interdum lineis spiralibus micro-
scopicis; axis saepe distorta.

Long 0,21 poll. lat. 0,095 poll. (Ad.)

Rissoina subangulata Ad. Schw. l. c. n. 21. f. 20.

Hab. Jamaica (Ad., Riise) St. Croix (Krebs) Terrafirma
(Hornb.)

183. *Rissoina Bryerea* Mtg.

T. turrita, costis 14—16 interstitia haud aequantibus;
apertura tertiam circiter longitudinis partem aequante.
alt. $2\frac{3}{4}$ ". (Phil.)

Long. 55 mm., lat. 2 3 mm (Schw.)

Turbo costatus Don. 1803 V pl. 178. f. 3. ?

Turbo Bryereus Mtg. p. 313. t. 15. f. 8.

Rissoina Bryerea Schw. l. c. Nr. 38. f. 36 (non.
36 *).

Rissoina scalarioides Adams Phil. Mk. Zeitschr
1848 p. 14.

Rissoina scalaroides Adams Contr. p. 113.

Rissoi Dunkeri Pfr. coll. Riise.

Hab. St. Thomas (Riise, Krebs) Bahama (Riise).

184. *Rissoina dubiosa* C. B. Ad. Contr. p. 114.

T. solida, sordide alba vel flavescente; anfr. sub-

convexis, sutura impressa undulata; costis circiter 18—20 rectis, elevatis; labro ad mediam et inferiorem partem prominente, extus varice longitudinaliter striato incrassato.

Long. 5 mm.; lat. 2 mm. (Schw.)

Rissoina dubiosa C. B. Ad. Schw. l. c. Nr 33.

Rissoina Dunkeri Pfr. coll. spm. min. Schw. ib. p. 135. an var. R. Bryerea Schw. l. c. p. 140.

Hab. Jamaica (Ad.) Cuba, St. Thomas (Riise, Krebs.)

* 185. Rissoina firmata „C. B. Ad.“ Schw.

T. costis remotis robustis XII; apertura utrinque effusa. (Ad.)

Long. 4,7 mm.; lat. 1,9 mm. (Schw.)

Rissoina firmata „C. B. Ad.“ Schw. l. c. n. 39 f. 37.

Hab. Cuba (Schw.) Matanzas (Pugg.)

an var. R. Bryerea Schw. l. c.

186. Rissoina multicostata C. B. Ad. Contr. p. 114.

T. ovato-conica, costis circ. XXVIII; anfr. convexi dimid. ant. anfr. ult. lineis spiralibus distinctissimis numerosissimis decussantibus; lineis spiralibus microscopicis in interstitiis costarum; labro crasso.

Long. 0,18 poll. lat. 0,07 poll. Ad.

Rissoina elegantissima d'Orb. l. c. f. 27—29 ? (od.)

Rissoina dubiosa Ad. p. p. Schw. l. c. fig. 31^a ?

Hab. Jamaica (Ad.) St. Thomas ? (Krebs.)

187. Rissoina Krebsii Möreh.

T. tenuissima, abbreviato-conica, costis confertissimis parvis, sutura marginata, ubique confertim spiraliter striata.

Long. $3\frac{1}{8}$ mm. lat. $1\frac{1}{2}$ mm.

Rissoina multicostata „Ad.“ Schw. l. c. Nr. 49. f. 48. (non Ad.)

Hab. Cuba (Schw.) St. Thomas ? (Krebs spm. 1).

Differt a praecedente t. minore, tenuiore, ubique spiraliter striata.

188. *Rissoina elegantissima* „d'Orb.“ Schw.

T. crassa, elongata, lutescente; spiraliter tenuissime striata, costis confertis; anfr. convexis, ultimo antice transversim impresso; suturis excavatis, marginatis; apertura semilunari antice posticeque canaliculata; labro crasso externe longitudinaliter plicato.

Long. $3\frac{1}{2}$ mm; diam. 1 mm. (d'Orb.)

Rissoina elegantissima d'Orb. Cuba. 2. p. 26. (vix f. 27—28) Schw. l. c. Nr. 13. f. 12.

Hab. Cuba (Desh.) Haiti (d'Orb.) St. Thomas (Krebs.)

Sbg. *Phosinella* Mörch.

T. reticulata; apertura profunde sinuata, operculo apophysi styliformi, postice denticulo.

189. *Rissoina* (*Phosinella*) *labrosa* Schw.

l. c. Nr. 59. f. 58.

T. subsplendida, anfr. planis; costellis 24—26 rectis lirulis transversis 8—9 unde granosa; labro tumido crasso extus varice latissimo.

Long. 9,5 mm.; lat. 3,7 mm. (Schw.)

Hab. Cuba (Schw.) St. Thomas (Ravn, Krebs.)

* 190. *Rissoina* (*Phosinella*) *Sagraiana*
„d'Orb.“ Schw.

T. solida, alba, striis spiralibus transversis granulato-decussatis 6—7; labro sinuato extus varice transversim crasse et longitudinaliter exiliter striato valde incrassato.

Long. 4,3 mm.; lat. 1,5 mm. (Schw.) ex spm. d'Orb.

Rissoina Sagra d'Orb. Cuba 2. t. 13. f. 4. vix descr.

Rissoina Sagraiana d'Orb. Schw. l. c. Nr. 55. f. 54.

Hab. St. Thomas, Martinique (Candé).

191. *Rissoina* (*Phosinella*) *pulchra* C. B. Ad.

T. alba, fasciis 2 pallidis flavis distantibus; lineis spiralibus 4—5 in anfr. penult. et 7 in anfr. ult.; costis

20—22, intersectionibus nodosis; ad basin costis spir. 3 approximatis, sulco lato discretis.

Long. 0,225 poll. lat. 0,08 poll. (C. B. Ad.)

Operculum flavum, convexiusculum apophysi valida styliformi postice denticulo parvo.

Rissoa pulchra C. B. Ad. Contr. p. 114.

Rissoa Philippiana Pfr. Dkr.

Rissoina cancellata Schw. l. c. Nr. 53. f. 52^a

Hab. Cuba (Pfr.) Jamaica (Ad.) St. Thomas (Krebs, Riise) Vieques (Riise) Bahama (Riise?)

Lineae spirales expressiores.

192. *Rissoina* (*Phosinella*) *cancellata* Phil.

T. candida, costis 16—18; liris spiralibus 4—5 in anfr. sup., 7—8 in anfr. ult., omnibus interstitiis haud aequantibus. Alt. $3\frac{1}{3}$ " Phil. Long. 6,4 mm., lat. 2,3 mm. (Schw.)

Rissoina cancellata Phil. Mk. Zeitschr. 1847. p. 127.

Rissoina cancellata Schw. l. c. Nr. 53 p. p.

Hab. Cuba (Pfr.) St. Thomas (Krebs, Riise) Terra firma (Homb.) Vieques (Riise).

var. ? elongata. Bermuda (Krebs).

* 193. *Rissoina* (*Phosinella*) *Privati* Folin.

Rissoina Privati Folin Les fonds de la mer 1867. p. 16 t. 1. f. 8.

Hab. Port au Prince Haiti, Rade de Colon, Aspinwal. (Folin). an var. praecedentis. ?

194. *Rissoina* (*Phosinella*) *fenestrata* Schw. p. 52. f. 51.

T. turrita, costis erectis 12—14, liris spiralibus 5 in anfr. ult. intersectionibus nodosis; apertura angustata, labro extus varice longitudinali, exile et transverso crassestriato, valde incrassato.

Hab. Cuba (Desh.)

* 195. *Rissoina* (*Phosinella*) *bicollaris* Schw l. c. Nr. 51 f. 50.

T. costis 18—20 interstitiis magnis; in anfr. ult.

liris spiralibus 8; antice collaribus duobus transverse instructo.

Long. 7.₃ mm.; lat. 2.₉ mm. (Schw.)

Hab. Ind. occ. Habana (Schw.)

Nota. Rissoa aberrans C. B. Ad. Contr. p. 113 = Cerithium.

Cingulina A. Ad. Ann. 1860 Decbr. p. 414.

196. *Cingulina? carinata* n. sp.

T. minuta, candidissima, subulato-cylindrica; anfr. 8—9 angustis planis, carinis spiralibus duabus validis acutis, posteriore validissima; apex decollatus; apertura parva irregulariter pentagona, extus obsolete marginata. Long. 1³/₄, lat. 1¹/₂ mm.

Hab. St. Thomas (Riise).

Rissoina insolita Desh Moll. Reunion pl. 40. f. 15—17 affinis sed differt anfr. ult. quadricarinato.

Rissoa Fréminv.

197. *Rissoa gradata* d'Orb.

T. pupoidea, alba, longitudinaliter oblique costato-undata; spira inflata apice acuminato; anfr. 6 complanatis, sutura crenulata, gradata, canaliculata; apertura exigua ovali; anfr. ult. antice sulcato.

Rissoa gradata d'Orb. Cuba 1842 p. 23 t. XI. f. 37—39.

Hab. Jamaica (d'Orb.)

198. *Rissoa* sp. var. *praecedentis*?

T. pupoidea, costis XII. in anfr. ult. ad basin liris 2 distantibus decussantibus interstitiis quadratis; antice lirula in anfr. penult.

Long. 2 ¹/₂ mm.; lat 1 ¹/₄ mm.

Hab. St. Thomas spm. tritum (Riise).

199. *Rissoa gradatula* Mörch.

T. obsoletissime perforata, cretacea, abbreviata, spira anfr. ult. parum superans, apice decollato; anfr. conta-

bulati; anfr. ult. costis 13 obliquis leviter sigmoideis sublamellosis margine reflexo ad axin continuis; liris spiralibus ad basin et post medium anfr. ult.; liris 4 in antica parte anfr. penult.; apertura auriformis.

Long. $2\frac{1}{4}$ mm.; lat. $1\frac{1}{4}$ mm.

Hab. St. Thomas (Riise) sub. nom. *R. gradata*.

200. *Rissoa (Alvania) caribæa* d'Orb.

T. oblongo-ovata, crassiuscula, alba fasciis binis fuscis spiraliter et longitudinaliter costata; spira elongata, apice obtuso; liris 2 in anfr. penult. 5 in ult., quarum 3 anticis minoribus, intersectionibus nodosis; labio crasso.

Long. 2 mm.; diam. 1 mm.

Rissoa caribæa d'Orb. Cuba 2. p. 21. t. XI. f. 31—33.

Hab. Cuba (Sagra) Jamaica (Candé) St. Thomas (Riise).

201. *Rissoa (Alvania) emaciata* Mörch.

T. alba vel ferruginea, crassa, ovata, spira breviuscula, liris spiralibus 2 in anfr. sup., in anfr. penult. 3, in anfr. ult. 7; anteriores minores; costulae numerosae, aequales, in intersectionibus nodosae; labro crasso crenulato.

Long. $2\frac{1}{4}$ mm.; lat. $1\frac{1}{2}$ mm.

Hab. St. Thomas (Riise) sub nomine *R. caribæae*.

202. *Rissoa (Alvania) Auberiana* d'Orb.

T. ovato-conica, ferruginea, tenuis, alba, maculis fuscis; anfr. angulati, spiraliter lirati, liris 3 in anfr. penult., costis validis in anfr.; labro crasso, apertura rotunda.

Long. $1\frac{1}{2}$ mm.; lat. $\frac{3}{4}$ mm.

Rissoa Auberiana d'Orb. Cuba 2. p. 22 t. XI. f. 34—36.

Hab. Cuba (Sagra) Jamaica (Candé) St. Thomas (Candé, Riise.)

var. T. ferruginea, fascia mediana alba; apex cereus.

Cingula C. B. Ad. non autt.

T. latere sinistro labri reflexo, apertura axin parallela; lateribus spirae rectilineis.

* 203. *Cingula?* solida C. B. Ad. Contr. 1850 p. 70.

T. subconica, elata, badia; labro et apice albo; lineis spiralibus paucis remotis subgranosis, interstitialibus minutissimis; antice glabra; apex obtusus; spirae lateribus subcurvilineis; anfr. 5 subangulati vix convexi; sutura distincta; apertura orbicularis axin parallela; labro ad sinistrum et antice reflexo; regione umbilicali subimmerso.

Long. 0,085, lat. 0,095. long. spir. 0,05 poll. (Ad.)

Hab. Jamaica, specim. unicum (C. B. Ad.)

204. *Cingula?* conica C. B. Ad. Contr. p. 70.

T. elongata, conica, albida, maculis magnis cereis; apex cereus, acutus; solida; liris spiralibus 3—4 obtusis, prominentibus ad peripheriam anfr. 2—3 adjectis; transversim subtiliter striata; in anfr. inferioribus lirulis latis subobsoletis; antice glabra; spira lateribus rectilineis; anfr. 6½, sutura subimpressa; anf. ult. periphæria subacuto; apertura quadrato-orbiculari axin subparallela.

Long. spirae 0,065 poll.; long. 0,105 poll.; lat. 0,06 poll. (Ad.)

Hab. Jamaica spm. unic. (Adams.)

Diala A. Adams?

205. *Diala?* concinna C. B. Ad.

T. late-ovata, conica, subpellucida, castanea, ad suturam saturatior, nitida; superne lira angusta vix elevata, sed linea impressa discreta; apex obtusus; lat. spirae subconvexa; anfr. 5 convexis, sutura impressa; anfr. ult. magno; ap. subovata acuminata; labro ad sinistrum subreflexo; regione umbilicali impressa.

Long. spirae 0,03 poll., long. tot. 0,075, lat. 0,053 poll.

Cingula concinna C. B. Ad. Contr. p. 70.

Rissoa umbilicata Phil. ? Dkr. Coll. Riise. Krebs.
Cat. f. 56.

Hab. Jamaica C. B. Adams.

206. *Diala* ? sp. nov. ?

T. elongata, nitida, spira elata, sutura marginata,
alba et ferruginea interdum 3—fasciata.

Hab. St. Thomas (Riise.)

* 207. *Cingula turriculus* H. C. Lea.

„*T. elevato-conica*, perforata, laevi, crassa, fulva;
spira valde exerta, conica, obtusa; suturis parvis; anfr.
6 convexis; anfr. ult. subbullato; perforatione parva, arc-
tata, lunata; apertura ovata; columella crassa, anfractu
ultimo pene disjuncto.“

Long. 0.₁₂ lat. 0.₀₅ poll.

Cingula turriculus H. C. Lea Proc. Bost. Soc.
1844. I. p. 205.

Cingula turriculus Gould Bost. Journ. 1845. p.
289. t. 24. f. 6.

Hab. South Carolina (H. C. Lea.)

* 208. *Cingula robusta* H. C. Lea ib. p. 204.

Hab. Cap. mag.

* 209. *Cingula modesta* H. C. Lea ib. p. 205.

Cingula modesta Gould Bost. Journ. 1845.
p. 288. t. 24. f. 5.

Hab. Long Island near Brooklyn (Gould.)

Fenella A. Adams Ann. of N. Hr. 1864.

Finella A. Ad 1860. err. typ.

210. *Fenella dubia* d'Orb.

T. oblongo-elongata, tenui albida vel fulva; fascia
alba cincta; longitudinaliter undulato-plicata, transversim
striata; spira inflata, elongata, anfr. X. primis transversis
sulcatis; ultimis longitudinaliter plicatis; ultimo antice
transv. striato. ap: ovali; labro tenui.

Long. 4 mm. lat. 1 $\frac{1}{4}$ mm. (d'Orb.)

Chemnitzia dubia d'Orb. Am. mer. Nr. 293.

Chemnitzia dubia Cuba 1. p. 226. t. XVII. f. 4—6.

Hab. Jamaica, Guadeloupe, Martinique, St. Thomas (d'Orb. Riise Krebs.) Cuba (Sagra) Rio Janeiro (d'Orb.) Haiti (Verkr.)

Alaba H. & A. Adams. Annals. 1862.

211. *Alaba tervaricosa* C. B. Ad.

T. tenui, diaphana, albida, interdum pallide fusco exilissime tessellata; sutura profunda; anfr. 9. convexis, singulatim ter-varicosis, varicibus candidissimis, in seriebus tribus continuis, et striis exilissimis distantibus decurrentibus ornatis.

Spir. long. 0_{,17} poll.; long. tot. 0_{,225} poll.; lat. 0_{,08} poll. (Ad.)

Rissoa tervaricosa C. B. Ad. Bost. Proc. 1845. p. 6.

Hab. Jamaica (Ad.) St. Thomas (Riise) Vera Cruz (Liebm.) Variat varicibus (plerumque) alternantibus nec continuis.

212. *Alaba melanura* C. B. Ad.

T. conica, turrita; alba, subpellucida, apice piceo; læviuscula, nitida; striis spiralibus nonnullis, antice distinctissimae postice obsoletissimae; latera spirae fere rectilinea; anfr. 8 convexi; sutura subimpressa; apertura subeffusa; labro tenui; columella recta, subtruncata (Ad.) Long. spirae 0_{,21} poll.; long. tot. 0_{,28} poll. lat. 0_{,11} poll.

Rissoa? melanura Ad. Conch. 1850 p. 116.

Cerithium præustum, Recluz. ubi?

Hab. Jamaica (C. B. Ad.) St. Thomas (Riise).

var. albo-tessellata. Vera Cruz, Liebman.

213. *Alaba incerta* d'Orb.

T. elongata, lævigata, polita, conica, albescente, maculis albis transversim cincta; spira conica; anfractibus octonis, antice gradatim scalaribus, ultimo anguloso, antice transversim striato; apertura subrhomboidali, labro tenui. d'Orb.

Long. 3 mm.: diam. $1\frac{1}{4}$ mm.

Eulima? incerta d'Orb. Cuba 2 p. 218. t. 16. f. 7—9.

Hab. Jamaica (Candé) St. Thomas (Riise spm. 1?)

~~~~~

## B e m e r k u n g e n

### zu den 8 Bänden meiner Monographia Heliceorum.

Von

Dr. L. Pfeiffer.

In einem Zeitpunkte, wo die (in dieser Form wohl gewiss letzten) neuen Supplemente zu allen meinen Monographien der Landschnecken im Druck und theilweise schon veröffentlicht sind\*) scheint es mir dienlich, noch einmal die Gesichtspunkte zu erläutern, aus welchen ich sowohl die ursprünglichen Werke in der Form wie sie erschienen sind, abfasste, als auch für die zu verschiedenen Zeiten herausgegebenen Supplemente dieselbe Form beibehielt, ungeachtet seitdem eine Menge von mehr oder weniger ausgebildeten systematischen Anordnungen, welche sich vorzugsweise auf die anatomische Beschaffenheit des Thieres gründeten, vorgeschlagen worden waren — und mir auch häufig der Wunsch nahe gelegt wurde, mein Werk in einer solchen, allerdings wissenschaftlichern, Form zu besitzen.

Ich betone nochmals, obwohl es dem unbefangenen

---

\*) Der 7. Band der Mon. Helix ist bereits ausgegeben, der 8. im Druck und wird hoffentlich noch in diesem Jahre vollendet werden. Von dem 3. Suppl. der Mon. Pneumonop. und Auriculaceorum ist die grössere Hälfte ebenfalls bereits publicirt und wird der Ueberrest bald nachfolgen.



Mörch, Otto Andreas Lawson. 1876. "Synopsis Molluscorum marinarum Indiarum occidentalium imprimis insularum danicarum." *Malakozoologische Blätter* 23, 45–58.

**View This Item Online:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/53851>

**Permalink:** <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/246572>

**Holding Institution**

Smithsonian Libraries and Archives

**Sponsored by**

Smithsonian

**Copyright & Reuse**

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.