

Skifflingar,

iakttagna i Mustiala trakten den 3 November 1878.

AF

P. A. KARSTEN.

(Anmältdt den 7 December 1878.)

Amanita	porphyria	Fr.	
Lepiota	rhacodes	(Vitt.)	Förvissnad.
—	cinnabarina	Fr.	
—	carcharias	(Pers.)	Frisk.
—	amianthina	(Scop.)	Luxurierande.
Armillaria	mellea	(Vahl.)	
—	var. bulbosa.	På lös jord,	fullkomligt utbildad.
Cortinellus	imbricatus	(Fr.)	Dito dito.
—	vaccinus	(Pers.)	Dito dito.
Tricholoma	eqvestre	(Linn.)	Luxurierande.
—	portentosum	Fr.	Aftynande.
—	rutilans	(Schaeff.)	Frisk och frodig.
—	saponaceum	Fr.	Vissnad.
—	subsp. luridum	(Schaeff.)	Vissnad.
—	virgatum	Fr.	Frisk.
—	inamoenum	Fr.	Frisk, luxurierande.
—	cerinum	(Pers.)	Frisk.
—	subsp. obscuratum	Karst. *).	Luxurierande.

*) Pileus convexo-planus, repandus, alutaceo- vel fusco-rufus, 3—9 cm. latus. Stipes fibroso-striatus, fusciscente griseus, 2,5—6 cm. altus, 2—15 mm. crassus. — In Syrjöås sub umbra Abietis sat frequens.

- Tricholoma linctum* Karst. *) Frisk.
 ——— *ulmarium* (Bull.) Karst. Lifligt vegeterande.
 ——— *Schumacheri* Fr. Luxurierande.
 ——— *oreinum* Fr. Förvissnad.
 ——— *leucocephalum* Fr.
 ——— *personatum* Fr. Frisk.
 ——— *sordidum* Fr. Frisk.
Clitocybe clavipes (Pers.). Förvissnad.
 ——— *hirneola* Fr. Lifligt vegeterande.
 ——— *cerussata* Fr. Luxurierande.
 ——— *phyllophila* Fr. Vissnad.
 ——— *candicans* Fr. Förvissnad.
 ——— *gilva* (Pers.). Frisk.
 ——— *cyathiformis* (Bull.). Luxurierande.
 ——— *vibecina* Fr. Frisk.
 ——— *orbiformis* Fr. Frisk.
 ——— *metachrous* Fr. Frisk.
 ——— *diatreta* Fr. Frodig.
Collybia semitalis Fr.
 ——— *maculata* (Alb. et Schw.). Frisk.
 ——— *butyracea* (Bull.). Aftynande.
 ——— var. *leucophylla* (Pers.). Frisk.
 ——— *velutipes* (Curt.). Lifligt vegeterande.
 ——— *confluens* (Pers.). Förvissnad.
 ——— *conigena* (Pers.). Fullt utvecklad.
 ——— *esculenta* (Wulf.). Väl utbildad.
 ——— *coracina* Fr. Lifligt vegeterande.
 ——— *misera* Fr. Fullt utbildad.

*) A *Tricholomate boreali*, pro quo antea habuimus quocumque statura et colore convenit, pileo haud rivuloso odoreque nullo recedit; quoque cum *Trich. civili* multum commune habet, sed pileo epelliculoso lamellisqve haud decolorantibus mox dignotum.

Collybia	cessans Karst. I mängd framträdande.
Mycena	rosella Fr. Frisk.
—	pura (Pers.). Exolet.
—	lactea (Pers.). Lifligt vegeterande.
—	pithya Fr. Frisk.
—	rugosa Fr. Frisk.
—	galericulata (Scop.). Luxurierande.
—	filopes (Bull.). Frisk.
—	debilis Fr. Frisk.
—	cruenta Fr. Lifligt vegeterande.
—	epipterygia (Scop.). Frisk.
—	stylobates (Pers.).
Omphalia	maura Fr. Frisk.
—	incomis Karst. Frisk.
—	umbellifera (Linn.).
—	var. grisella Weinm. Frisk.
—	stellata Fr. Outbildad.
—	campanella (Batsch.). Frisk.
—	grisea Fr. Frisk och frodig.
—	vulgaris (Pers.). Frisk.
—	pyxidata (Bull.). Aftynande.
—	deflexa Karst. *). I rask tillväxt stadd.
—	fibula (Bull.) Frisk..
Pleurotus	serotinus (Schrad.). Lifligt vegeterande.
—	mitis (Pers.). Lifligt vegeterande.
—	nidulans (Pers.). I bästa växtkraft.
—	septicus Fr. Ymnigt framträdande.
Marasmius	putillus Fr. Frisk.

*) *Omphaliae reclinii* proxima, sed pileo haud expanso, haud vel minute umbilicato, margine haud reflexo, colore obscuriori stipiteqve pallido differens. Sporae ellipsoideo-sphaeroideae vel sphaeroideae, longit. 6—7 mmm., crassit. 4—6 mmm.

- Marasmius** androsaceus (Linn.). Frisk.
 ——— perforans Fr. Frisk.
Panus stipticus (Bull.). I frisk växtkraft.
Lentinus cochleatus (Pers.). Lifligt vegeterande.
Trogia crispa (Pers.).
Cantharellus cibarius Fr. Frisk.
 ——— aurantiacus (Wulf.). Frisk.
 ——— umbonatus Fr. Frisk.
Hygrophorus hypothejus Fr. Frisk.
 ——— agathosmus Fr. Frisk.
 ——— lividoalbus Fr. Frisk.
 ——— pratensis (Pers.). Frisk.
 ——— var. virgineus Fr. Frisk och frodig.
 ——— ceraceus (Wulf.). Lifligt vegeterande.
 ——— coccineus (Schaeff.). Lifligt vegeterande.
 ——— miniatus Fr. Frisk.
 ——— psittacinus (Schaeff.). Lifligt vegeterande.
 ——— laccatus (Scop.). Frisk.
Lactarius vellereus Fr. Frisk.
 ——— torminosus (Schaeff.). Halfrutten.
 ——— turpis (Weinm.). Frisk.
 ——— deliciosus (Linn.). Rutten.
 ——— vietus Fr.
 ——— rufus (Scop.). Förvissnad.
 ——— lilacinus (Lasch.). Förvissnad.
 ——— glyciosmus Fr. Frisk.
Russula adusta (Pers.). Frisk.
 ——— integra (Linn.). Aftynande.
 ——— rubra (DeC.). Aftynande.
Entoloma majale Fr. Yppigt vegeterande.
Clitopilus prunulus (Scop.). Förvissnad.
Nolanea mammosa (Linn.). Vissnad.

Claudopus	variabilis (Pers.).	Lifligt vegeterande.
Pholiota	togularis (Bull.).	Lifligt vegeterande.
——	mutabilis (Schaeff.).	Fullt utvecklad.
——	marginata (Batsch.).	Luxurierande.
Inocybe	fibrosa (Sow.).	
——	geophylla (Sow.).	Frisk.
——	var. lilacina.	Frisk.
——	vaticosa Fr.	Lifligt vegeterande.
Hebeloma	punctatum Fr.	
——	crustuliniforme (Bull.).	Skämd.
Flammula	lenta (Pers.).	Luxurierande.
——	carbonaria Fr.	Frisk.
——	penetrans Fr.	Förvissnad.
——	hybrida Fr.	
Naucoria	camerina Fr.	Frisk.
——	furfuracea (Pers.).	Frisk.
——	escharoides Fr.	Aftynande.
Galera	tenera (Schaeff.)*).	Frisk.
——	Hypnorum (Batsch.).	Frisk.
Stropharia	aeruginosa (Curt.).	Vissnad.
——	semiglobata (Batsch.).	Frisk.
Nematoloma**)	capnoides (Fr.).	Lifligt vegeterande.
——	elaeodes (Fr.).	Frisk.
——	fasciculare (Huds.).	
Hypholoma	appendiculatum (Bull.).	Frisk.
Psilocybe	atrorufa (Schaeff.).	Skämd.

*) Enligt Gill. »Les Champignons qui croissent en France« är *Galera* generis masculini, *Tricholoma* o. *Hypholoma* gen. neutrius, men *Entoloma* o. *Hebeloma* gen. masculini, *Clitocybe* gen. feminini, men *Inocybe* et *Psilocybe* gen. masculini.

**) *Nematoloma* gen. nov. Ab *Hypholomate* pileo tenaci, haud hygrophano, laete colorato diversum.

- Psilocybe* *spadicea* Fr. Rutten.
 — *dichroa* (Pers.) var.
Psathyra *pennata* Fr.
Panacolus *separatus* (Linn.). Frisk.
 — *campanulatus* (Linn.). Frisk.
Psathyrella *caudata* Fr. Frisk.
Coprinus *tardus* Karst. *)
 — *atramentarius* (Bull.). Rutten.
 — *ephemeroides* (Bull.).
Cortinarius *triumphans* Fr. Frisk.
 — *balteatus* Fr. Frisk.
 — *gentilis* Fr. Aftynande.
 — *cinnamomeus* (Linn.). Aftynande.
 — *armeniacus* (Schaeff.). Aftynande.
 — *rigens* Fr. Frisk.
 — *obtusus* Fr. Frisk.
 — *acutus* (Pers.). Frisk.
Schizophyllum *commune* (Linn.).

*) *Caespitosus*. Pileus ex ovoideo expansus, glaber, luridus, sulcatus, 3—5 cm. latus. Stipes fistulosus, e sericello-pruinoso glabratus, striatulus, albus, 5—10 cm. longus, basi usque ad 0,5 cm. crassus. Lamellae adnatae, ex albido nigrae. Sporae ovoideae vel subangulato-ellipsoideae, atrae (sub lente), longit. 12—15 mm., crassit. 7—9 mm — In horto Mustialensi supra terram nudam legit Onni Karsten.

Mustiala den 10 November 1878.



Karsten, P. A. 1879. "Skiflingar, iakttagna i Mustiala trakten den 3. November 1878." *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 5, 57–62.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/23882>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/246669>

Holding Institution

MBLWHOI Library

Sponsored by

MBLWHOI Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.