VIAGGIO DI LEONARDO FEA
IN BIRMANIA E REGIONI VICINE

LXVIII.

COLYDIIDES ET MONOTOMIDES

PAR A. GROUVELLE

1. **Atyscus minutus**, n. sp. — *Oblongo-ovatus, convexus, nigricans, parce setosus, fulvo-fasciculatus; prothorace cordiformi, capite latiore, in longitudinem sulcato, basin versus transversim striato, lateribus antice dentatis, disco medio duobus fasciculis ornato; elytris prothorace latioribus, apice subacuminatis, punctato-striatis, intervallis tuberosis, singulo elytro 4-fasciculato.* — Long. 3 mill.

Oblong, convexe, noirâtre, vêtu de soies dressées peu serrées et de squamules fauves condensées par places et formant même des fascies saillantes. Tête subrectangulaire, de chaque côté une strie anguleuse. Prothorax plus large que la tête, transversal, cordiforme, granuleux, marge antérieure saillante en avant sur la tête, bordée au milieu de soies dressées; bords latéraux dentés en avant, frangés dans cette partie de soies; sur le disque deux élévations tuberculiformes ornées de fascies de soies et de squamules, un sillon longitudinal médian et une strie transversale devant la base. Ecusson ponctiforme. Elytres plus larges que le prothorax, une fois un tiers aussi longs que larges, subparallèles à la base, subacuminés au sommet, relevés en toit dans la partie basilaire de la suture, ponctués-striés; intervalles garnis de petits tubercules surtout sur les côtés; sur chaque élytre quatre fascies de soies ou de squamules dressées, les deux premières sur une ligne oblique partant de l'écusson, les deux

autres un peu plus écartées que les premières placées dans le tiers apicale et déterminant une ligne à peu près parallèle à la direction déterminée par les deux premières taches.

Carin Asciuii Ghecù. Mars-Avril.

2. **Hyberis inflatus**, n. sp. — *Oblongo-ovatus, niger, nitidus, tuberculato-setosus, prothorace transverso, basin versus angustato, angulis anticis acutis, antice productis, lateribus antice dentatis, disco transversim quadri-gibbosus; elytris prothorace latioribus.* — Long. 4 mill. $\frac{1}{2}$.

Oblong, ovale, convexe, noirâtre, brillant lorsqu'il est nettoyé, couvert de tubercules garnis de soies dressées. Prothorax transversal, cordiforme; marge antérieure saillante au milieu sur la tête, profondément sinuée de chaque côté; angles antérieurs aigus, saillants en avant; côtés dentés dans la moitié apicale; disque avec quatre élévations tuberculiformes disposées sur une ligne transversale, élévations internes plus saillantes, séparées par une dépression longitudinale profonde. Ecusson petit, orbiculaire. Elytres plus larges que le prothorax, ovales, subacuminés ensemble au sommet, couverts de tubercules disposés en lignes; sur chacun trois petites fascies jaunes, la première peu éloignée de la base et de la suture, les deux autres placées sur une ligne oblique coupant l'élytre dans la partie apicale. Tarses rougeâtres.

Carin Asciuii Chebà, Janvier; Carin Chebà, Décembre; Carin Ghecù, Février à Mars.

Nous rapportons à cette espèce une série d'exemplaires provenant du Tenasserim, de taille généralement plus petite et de forme assez variable, mais également caractérisée par la ligne transversale de protubérances du prothorax.

3. **Coxelus birmanicus**, n. sp. — *Elongato-ovatus, convexus, subopacus, nigro-brunneus, hispidus; capite prothoraceque granosis; labro haud occulto, rufo, margine antico capitis truncato, lateribus subparallelis, juxta oculos emarginatis; prothorace capite latiore, transverso, utrinque explanato, angulis anticis productis; margine antico stricte elevato, medio prominulo, lateribus arcuatis, crenulatis, disco in longitudinem subimpresso; elytris punctato-striatis, punctis striis latioribus, intervallis asperis.* — Long. 3 mill. $\frac{1}{2}$.

Ovale allongé, convexe, presque opaque, brun foncé, couvert de soies dressées plus longues sur les elytres. Antennes rougeâtres; neuvième article un peu plus large que les précédents, dernier plus étroit que le dixième. Labre roux. Tête granuleuse, tronquée au sommet, côtés subparallèles en avant des yeux, échancrés au niveau de ceux-ci. Prothorax plus large que la tête, transversal, largement explané de chaque côté; bords réfléchis rougeâtres; marge antérieure, largement échancrée, saillante au milieu sur la tête, étroitement relevée en bourrelet; angles antérieurs aigus, bords latéraux arqués, crénelés; base arquée, sinuée vers les angles postérieurs, disque granuleux. Ecusson caché. Elytres subparallèles, subacuminés au sommet, environ deux fois aussi longs que larges, de la largeur du prothorax dans sa plus grande largeur, assez fortement relevés en une forte et courte carène de chaque côté de l'écusson, ponctués striés, points plus larges que les stries, intervalles raboteux. Pattes rougeâtres.

Mont Mooleyit (Tenasserim).

4. **Xuthia sicana**, Pasc. Bhamo (Birmanie), Mai à Août; Thagatà (Tenasserim), Avril; Carin Asciuii Ghecù, Janvier.

5. **Colobicus parilis**, Pasc. Bhamo (Birmanie), Juillet et Septembre; Thagatà (Tenasserim), Avril.

6. **Colobicus conformis**, Pasc. Carin Chebà, Carin Ghecù, Carin Asciuii Ghecù.

Les six exemplaires que nous rapportons à cette espèce, présentent des différences assez sensibles; nous avons vu un nombre d'exemplaires trop restreint pour apprécier la valeur absolue de ces différences.

7. **Colobicus uniformis**, Reitt. Bhamo (Birmanie), Juillet-Août.

Nous avons sous les yeux de nombreux exemplaires de cette espèce; parmi eux trois présentent la coloration ferrugineuse spéciale du *C. conformis* Reitter; les autres sont d'une nuance brun marron analogue à celle des *C. emarginatus* Latr. et *parilis* Pasc. La coloration claire signalée par Reitter doit provenir d'un manque de développement.

8. **Trachypholis Deyrollei**, Reitt. Bhamo (Birmanie), Septembre; Carin Chebà, Carin Ghecù, Janvier à Mars.

9. **Trachypholis Erichsoni**, Reitt. Bhamo, Teinzò (Birmanie), Mai à Septembre; Carin Chebà, Mai à Décembre.

10. **Trachypholis fasciculata**, Reitt. Carin Ghecù, Février, Mars.

11. **Labromimus Gestroi**, n. sp. — *Oblongus, convexus, subnitidus, niger, dense umbrino-squamosus; squamis plus minusve erectis, nigro cinereoque variegatis; prothorace transverso, antice posticeque angustato, lateribus rotundatis, dorso medio duobus fasciculis nigris ornato; elytris ad apicem subacuminatis, punctatis, fasciculatis; 1.º fasciculo humerali, obliquo, cinereo, 2.º prope scutellum oblongo, nigro, 3.º discoidali juxta suturam elongato, nigro; 4.º proprius apicem, punctiformi nigro; 5.º laterali obliquo; 6.º subapicali punctiformi cinereo.* — Long. 5 mill.

Oblong, convexe, peu brillant, noir, couvert de squamules serrées d'une nuance terreuse se redressant par places et formant des fascies noires ou grises. Tête obliquement sillonnée de chaque côté; yeux squameux. Prothorax transversal, plus rétréci au sommet qu'à la base, présentant sa plus grande largeur vers le tiers basilaire; bord antérieur profondément sinué de chaque côté, saillant dans le milieu sur la tête, bordé dans cette partie de deux courtes fascies noires; bords latéraux arrondis, frangés de squamules; marges latérales presque explanées; dos portant un peu en avant du milieu deux fascies noires. Ecusson orbiculaire. Elytres de la largeur du prothorax, une fois et demie aussi longs que larges, subacuminés au sommet, ponctués en lignes serrées, onduleuses suivant les reliefs de la surface, ornés de fascies; la 1.^{ère} humérale oblique, grise, accompagnée en dessous d'un petit trait noir, la 2.^{me} près de la suture, longitudinale, oblongue, noire; la 3.^{me} discoidale, près de la suture, allongée, noire; la 4.^{me} entre la 3.^{me} et le sommet, un peu plus éloigné de la suture, oblongue, noire; la 5.^{me} sur le côté de la 4.^{me} oblique, grise, accompagnée d'un petit trait noir; la dernière entre la 5.^{me} et le sommet, punctiforme, grise.

Carin Chebà, Mai.

12. **Labromimus Feae**, n. sp. — *Oblongus, convexus, subnitidus, niger, dense squamosus; squamis plus minusve erectis, in capite prothoraceque umbrinis, basin versus elytrorum ochraceis et ad*

apicem ochraceo-cinereis; prothorace transverso, antice posticeque angustato, lateribus rotundatis dorso utrinque concavo, medio duobus fasciculis ornato; elytris ad apicem subacuminatis, lineato-fasciculatis, punctato-striatis, punctis striis latioribus. — Long. 5 mill. $\frac{1}{2}$.

Oblong, assez large, convexe, peu brillant, noir. Tégument caché par des squamules en général aplaties, terreuses sur la tête et le prothorax, jaunâtres à la base des élytres et variées de gris au sommet de celles-ci. Antennes garnies de squamules allongées, massue plus claire. Tête impressionnée longitudinalement de chaque côté, yeux squameux. Prothorax plus large que la tête, très transversal, plus rétréci au sommet qu'à la base, présentant la plus grande largeur vers le tiers basilaire; bord antérieur profondément sinué de chaque côté, saillant dans le milieu sur la tête, rebordé dans cette partie, sauf tout à fait au milieu, par des squamules allongées et dressées; bords latéraux arrondis, frangés de squamules; dos concave de chaque côté, portant un peu en avant du milieu deux protuberances armées chacune d'un faisceau de squamules allongées et dressées. Bouclier petit orbiculaire. Elytres de la largeur du prothorax, une fois et demie aussi longs que larges, subacuminés au sommet, striés, ponctués; points plus larges que les stries, donnant aux intervalles un aspect rugueux; bords latéraux frangés de squamules allongées et dressées; sur chaque élytres trois lignes longitudinales de faisceaux de squamules filiformes, dressées.

Plapoo (Tenasserim), Avril. Carin Asciiu Ghècù, Février à Mars. Carin Ghècù, Février à Mars.

13. **Neotrichus cylindricus**, n. sp. — *Elongatus, parallelus, convexus, setosus, opacus, nigro-brunneus; ultimo articulo antennarum dilutiore; capite prothoraceque granosis, capite antice truncato, utrinque oblique vix impresso; prothorace subelongato, margine antico arcuato, lateribus parallelis, crenulatis, setosis, elytris punctato-striatis, punctis setosis.* — Long. 4 mill.

Presque cylindrique, opaque, brun noir. Dernier article des antennes globuleux, roux clair. Tête et prothorax granuleux, garnis de soies épaissies vers le sommet, courtes et dressées; front

tronqué en avant, obliquement impressionné de chaque côté; yeux assez gros, placés aux angles postérieurs de la tête. Prothorax un peu plus long que large; bord antérieur arqué en avant; côtés parallèles, dentelés, denticules armés de soies; disque vaguement sillonné dans la longueur. Ecusson ponctiforme. Elytres environ trois fois et demie aussi longs que larges, ponctués striés, garnis de soies dressées insérées dans les points des stries.

Carin Chebà, Mai à Décembre.

Voisin de *N. serratus* Sharp, mais plus étroit et plus cylindrique.

14. **Teredolaemus concolor**, n. sp. — *Elongatus, parallelus, convexus, glaber, niger; margine antico capitis, antennis, pedibusque rufis; capite parce punctato, angulis posticis acutis, temporibus fere nullis; prothorace quadrato, parce punctato, apice arcuato, angulis anticis rotundatis, basi marginata; scutello orbiculari; elytris subtiliter punctato lineatis, stria suturali ad apicem impressa.* — Long. 3 mill.

Allongé, parallèle, subcylindrique, glabre, noir; bord antérieur de la tête, antennes et pattes rougeâtres. Massue de l'antenne presque globuleuse, semblant formé d'un article sphérique enchassé dans un article en forme de coupe. Tête éparsement et assez fortement ponctuée, tronquée en avant, yeux placés contre les angles postérieurs, ceux-ci droits, bien marqués. Prothorax sensiblement aussi long que large, arrondi en avant, faiblement rétréci à la base, ponctué comme la tête; bords latéraux très étroitement rebordés, base plus largement; disque vu de profil convexe. Ecusson circulaire. Elytres environ trois fois aussi longs que larges, arrondi ensemble au sommet, finement ponctués en lignes, ponctuation obsolète au sommet, strie suturale bien marquée vers le sommet.

Carin Asciuii Chebà, Mars à Avril.

15. **Dastarcus excisus**, Ancey. Carin Chebà, Mai à Décembre.

16. **Dastarcus costulatus**, Fairm. Katha (Birmanie), Juin; Carin Chebà, Carin Ghecù, Janvier à Décembre.

17. **Bothrideres Andrewesi**, Grouv. De Yenang Young à Mandalay, Mai.

18. **Bothrideres insularis**, Pasc. Thagatà (Tenasserim); Carin Asciuii Chebà, Décembre.

19. **Bothrideres nocturnus**, Pasc. Thagatà (Tenasserim), Avril.

20. **Bothrideres Feae**, n. sp. — *Elongato-ovatus*, *convexus*, *opacus*, *nigro-piceus*; *antennis pedibusque rufo-piceis*; *capite prothoraceque dense profunde, fortiterque punctatis, intervallis punctorum angustissimis*; *prothorace subelongato, basin versus angustato, disco in longitudinem subfoveolato, foveola stria integra et profunda inclusa, basi foveolae cum basi prothoracis tribus sulcis juncta*; *elytris striatis, intervallis alternis, extra in disco, elevatis*. — Long. 6 mill. $\frac{1}{2}$.

Allongé, ovale, convexe, opaque, noir de poix. Antennes et pattes rougeâtres. Ponctuation de la tête et du prothorax forte, profonde et très serrée, parfois confluyente. Prothorax présentant sa plus grande largeur un peu avant le sommet, sensiblement aussi long que large dans sa plus grande largeur; côtés rebordés, arqués; angles antérieurs un peu saillants en avant, emoussés, postérieurs obtus; sur le disque une impression longitudinale, à peine enfoncée, enfermée par une strie profonde, transversale au sommet, sinuée au dedans sur les côtés, vers le sommet, arrondie à la base. Entre la base de cette impression et la base du prothorax trois sillons, le premier médian, assez large limité de chaque côté par une strie, les deux autres obliques, plus profonds. Ecusson ovale. Elytres allongés, striés; intervalles alternes relevés en carènes, sauf sur le disque; première carène en partant de la suture atteignant le sommet de l'élytre, deuxième et troisième réunis ensemble avant ce sommet; intervalles ponctués en ligne.

Plapoo, Mont Mooleyit.

Beaucoup plus large que *B. Andrewesi* Grouv.

21. **Bothrideres frater**, n. sp. — *Elongatus*, *convexus*, *nitidus*, *piceus*; *capite prothoraceque parce profundeque punctatis*; *prothorace elongato basin versus angustato, disco in longitudinem profunde excavato; excavatione antice abbreviata, postice basin prothoracis attingente, ante medium transversim dilatata, basi prothoracis utrinque bifoveolata*; *singulo elytro tri-costato*. — Long. 5 mill. $\frac{1}{2}$.

Allongé, convexe, brillant surtout sur le prothorax, couleur de poix. Ponctuation de la tête profonde, assez forte et peu serrée. Une impression profonde de chaque côté de la tête à la naissance de l'antenne. Prothorax plus long que large, rétréci à la base, subtrapèziforme; sur le disque une impression longitudinale très profonde, surtout au sommet, n'atteignant pas la marge antérieure du prothorax, dilatée transversalement avant le milieu et réunie à la base par un canal limité de chaque côté par une carène; de chaque côté de ce canal, le long de la base deux impressions profondes séparées par une carène; l'externe contigue à l'angle postérieur; bords latéraux rebordés, rebord déterminant de chaque côté dans la moitié basilaire une fossette longitudinale. Ecusson ovale. Elytres trois fois plus longs que le prothorax, tri-carenés, carènes un et deux réunies avant le sommet; intervalles concaves.

Carin Chebà, Mai à Décembre.

22. *Erotylathris elongatus*, n. sp. — *Elongatus, parallelus convexus fuscus, opacus; antennis pedibusque rufo-fuscis; ultimo articulo antennarum dilutior; capite profunde punctato, in longitudinem subcarinato; prothorace elongato, basin versus angustato, lateribus rectis, medio obtuse dentatis, disco in longitudinem sexcarinato, carinis intermediis basin versus transversim incisis; elytris elongatis, ad apicem conjunctim rotundatis, disco bicarinato, intervallis bilineato-punctatis.* — Long. 4 mill. $\frac{1}{2}$.

Allongé, parallèle, convexe, brun noirâtre, opaque. Antennes et pattes brun rougeâtre, dernier article de la massue plus clair. Tête densément et profondément ponctuée, intervalles formant presque des saillies longitudinales; front longitudinalement subcarené. Prothorax plus long que large, rétréci à la base, trapèziforme; bords latéraux obtusement dentés au milieu; sur le disque six carènes longitudinales, les deux intermédiaires transversalement coupées à la base, intervalles rugueux. Ecusson oblong. Elytres plus de trois fois plus longs que larges, arrondis ensemble au sommet, chacun avec deux carènes longitudinales sur le disque et une carène latérale, toutes plus saillantes vers le sommet; première carène dorsale atteignant presque le sommet,

deuxième un peu raccourcie, troisième se soudant au bord latéral; dans les intervalles des carènes deux lignes de points enfoncés.

Carin Asciuii Chebà, Janvier.

Beaucoup plus allongé que les autres espèces du genre *Erotylathris*.

23. **Leptoglyphus Feae**, n. sp. — *Elongatus, parallelus, convexus, rufo-piceus subnitidus; fronte excavato; prothorace quadrato, basin versus angustato, dense fortiterque punctato, punctis elongatis, intervallis substrigosis, basi breviter bi-carinata; scutello quadrato; elytris elongatis, singulo tri-carinato, carinis ad apicem flavo-pilosis*. — Long. 2 mill. $\frac{3}{4}$.

Allongé, parallèle, convexe, roux un peu foncé, peu brillant. Disque de la tête profondément et assez largement excavé. Prothorax plus large que la tête, sensiblement aussi long que large, un peu rétréci à la base, densement et assez fortement ponctué, points gros, peu enfoncés, allongés; angles antérieurs droits, postérieurs obtus, côtés bi-sinués; contre la base, devant l'écusson, deux courtes élévations longitudinales en forme de carènes obtuses. Ecusson environ aussi long que large. Elytres de la largeur du prothorax, trois fois aussi longs que larges, arrondis ensemble au sommet, chacun avec trois carènes longitudinales en dehors de la suture, la première et la deuxième s'arrêtant un peu avant le sommet, la troisième se réunissant au rebord latéral, extrémités des carènes garnies de petits poils jaunes, dressés; intervalles concaves, ponctué en lignes, points assez gros, très peu enfoncés.

Carin Asciuii Ghecù, Mars à Avril.

Nous rapportons avec un certain doute, cette espèce au genre *Leptoglyphus* Sharp.

24. **Penthelispa longicollis**, Reitt. Carin Chebà, Mars à Décembre.

25. **Cerylon quadricolle**, Sharp. Bhamò (Birmanie), Septembre.

26. **Cerylon gracilipes**, Sharp. Meetan (Tenasserim), Avril.

Nous rapportons avec un certain doute au *C. gracilipes* Sharp, l'unique exemplaire que nous avons sous les yeux.

L'insecte recolté par M.^r Fea est pubescent; les stries ponctuées de ses élytres sont superficielles et ses antennes sont un

peu allongées. Le 2.^{me} article est aussi long que large, et le 3.^{me} transversal.

27. **Cerylon frater**, n. sp. — *Elongato-ovatum subconvexum, nitidum, dilute castaneum; antennis gracilibus, articulis 2.^o et 3.^o elongatis, prothorace subquadrato, sat dense fortiterque punctato, basi utrinque leviter impresso; elytris punctato-striatis, striis sat validis, ad apicem evanescentibus.* — Long. 2 mill. $\frac{1}{4}$.

Ovale, allongé, faiblement convexe, brillant, chatain clair. Antennes grêles, deuxième et troisième articles plus longs que larges, massue ovale. Prothorax un peu moins long que large, subrectangulaire fortement et un peu éparsement ponctué, faiblement impressionné de chaque côté le contre de la base. Elytres ovales, environ deux fois aussi longs que larges dans la plus grande largeur, ponctués striés, stries fortes, atténuées sauf la suturale vers le sommet; 5.^{me} strie dorsale dans le prolongement de la pointe de l'angle postérieur du prothorax.

Mont Mooleyit (Tenasserim), Mars.

Voisin du *C. tibiale* Sharp comme forme et comme coloration, mais plus densément ponctué; chez le *C. tibiale* les fossettes basilaires du prothorax sont beaucoup plus marquées et la 5.^{me} strie dorsale est interne par rapport au sommet de l'angle postérieur du prothorax.

Monotomopsis, n. gen.

Antennae 10-articulatae, clava bi-articulata.

Caput prothoraxque profunde foveolati.

Tempora ampla, angulis posticis rectis.

Elytra profunde punctato-striata.

Processus abdominis, inter coxas posticas, latum; antice subrotundatum.

Primum segmentum abdominis utrinque carinatum, carinis, post coxas parallelis.

Le genre *Monotomopsis* vient se placer entre les genres *Monotoma* et *Phyconomus*.

28. **Monotomopsis monotomoides**, n. sp. — *Elongata, subdepressa, nitida, picea, antennis pedibusque rufis; antennis satis*

elongatis, art. 3.^o *subelongato*; *capite triangulari*, *antice inter bases antennarum profunde lateque biimpresso*, *fronte bipunctata*, *occipite fortissime punctato*; *prothorace elongato*, *lateribus modice arcuatis*, *crenulatis*, *disco in longitudinem profunde bi-sulcato*, *sulcis valde punctatis*, *basin versus excavatis*; *scutello minuto*, *suborbiculari*; *elytris prothorace latioribus*, *punctato sulcatis*, *sulco 3-4 fortius punctatis*, *intervallo 5.^o elevato*. — Long. 3 mill.

Allongé, subdéprimé, brillant, brun de poix; antennes et pattes rougeâtres. Antennes atteignant presque le milieu du prothorax, 3.^{me} article suballongé. Tête triangulaire, profondément et largement biimpressionnée en avant; deux points sur le front, quelques gros points, contre le bord interne des yeux et une ligne transversale de gros points, presque de petites fossettes sur l'occiput au niveau de la base des yeux. Prothorax sensiblement de la largeur de la tête y compris les yeux; une fois et $\frac{1}{2}$ plus long que large, aussi large à la base qu'au sommet, bords latéraux faiblement arqués, crénelés; sur le disque deux sillons longitudinaux n'atteignant ni la base, ni le sommet, grossièrement ponctués, élargis dans la partie basilaire et séparés alors par une carène; intervalles entre les sillons et les bords latéraux avec deux lignes de gros points très serrés. Ecusson petit, suborbiculaire. Elytres plus larges à la base que le prothorax, faiblement élargis vers le milieu, atténués ensuite vers le sommet, ponctués sillonnés; points des sillons garnis de petits poils flaves dressés; sillons 3-4 plus fortement ponctués; intervalles 5 élevé, subcaréné. Pygidium pubescent éparsement et assez grossièrement ponctué, marqué à la base de deux impressions ponctiformes contigues aux élytres.

Thagatà (Tenasserim), Avril. Musée Civique de Gênes. Java, Sumatra (Deli), Malacca (Perak). Collection A. Grouvelle.

29. **Europs (Nomophloeus) depressus**, n. sp. — *Elongatus*, *depressus*, *nitidulus*, *glaber*; *alutaceus*, *rufo-piceus*; *antennis pedibusque rufis*; *elytris rufo-testaceis ad apicem infuscatis*; *capite subquadrato*, *parce profundeque punctato*, *antice subsinuato*, *utrinque basin versus antennarum oblique breviterque sulcato*; *prothorace vix transverso*, *basin versus subangustato*, *parce profundeque punc-*

tato, angulis anticis obtusis, posticis rotundatis, crenulatis, disco in longitudinem vix bisulcato, medio haud punctato; scutello subquadrato, apice rotundato, elytris punctato-striatis, striis apicem poene attingentibus; pygidio dense punctato. — Long. 2 mill. $\frac{1}{3}$.

Allongé, déprimé, assez brillant; glabre, alutacé, roux enfumé. Antennes et pattes plus claires, élytres rousses-enfumées au sommet. Tête subquadrangulaire, obliquement sillonnée de chaque côté près de la base de l'antenne; ponctuation forte, éparse sur le disque, serrée près des yeux; epistome subsinué. Prothorax presque aussi long que large; faiblement rétréci à la base, densement et profondément ponctué sur les côtés, éparsement sur le disque; ponctuation laissant sur le disque un espace lisse longitudinal, plus large dans la partie basilaire; angles antérieurs obtus, postérieurs arrondis, crénelés; bord antérieur arrondi en avant. Ecusson quadrangulaire, largement arrondi au sommet. Elytres en ovale très allongé, ponctués striés, stries atteignant presque le sommet. Pygidium densement ponctué surtout vers le sommet. Dessous brun de poix, segments 2 à 4 crénelés à la base.

Carin Chebà, Mai à Décembre. Musée Civique de Gênes. Sumatra (Deli). Collection A. Grouvelle.

30. **Monotoma hindustana**, Mots. Rangoon (Birmanie), Mai. Musée Civique de Gênes. Sumatra, Collection Grouvelle.

31. **Holocephala longiceps**, n. sp. — *Elongata, subcylindrica, nitida, glabra, testacea, capite prothoraceque rufo-testaceis, subtilissime strigosis; antennis brevibus, 10-articulatis, clava bi-articulata; capite elongato, parce punctato; prothorace capite subangustiore, elongato, parce punctato, lateribus parallelis, disco in longitudinem subsulcato, elytris punctato-striatis, apice truncatis, abdomen haud obtegentibus.* — Long. 4 mill.

Allongé, subcylindrique, brillant, glabre, testacé. Antennes courtes de 10 articles, massue bi-articulée, dernier article ovoïde partagée dans sa partie apicale en deux zones transversales pubescentes. Tête et prothorax roux-testacé, couvert dans la longueur de strigosités, très fines et très serrées. Tête environ deux fois et demie aussi longue que large, éparsement ponctuée,

obliquement sillonnée de chaque côté vers la base des antennes; marge antérieure profondément échancrée; yeux petits, tempes très développées, angles postérieurs arrondis. Prothorax un peu plus étroit que la tête, rectangulaire, environ une fois et demie aussi long que large; base et côtés finement rebordés; angles postérieurs émoussés, disque longitudinalement subsillonné; ponctuation allongée, relativement dense sur les côtés, groupée de chaque côté du sillon dorsal dans une zone presque linéaire. Ecusson triangulaire. Elytres de la largeur du prothorax, un peu plus de deux fois plus longs que larges, ponctués-striés, tronqués au sommet, laissant à découvert le dernier segment de l'abdomen.

Bhamò (Birmanie), Juillet. Musée Civique de Gènes. Sumatra, Collection Grouvelle.

Cette espèce se distingue de *H. termitiformis* Fairm. par sa ponctuation plus forte et par les stries des élytres toutes très nettement marquées. L'*H. termitiformis* est plus petite. Cette dernière espèce se retrouve à Sumatra et à Singapore. L'*H. longiceps* se rapprocherait plutôt de *H. chlorotica* Fairm. de Madagascar dont les stries des élytres sont également toutes marquées, mais elle s'en sépare par sa forme sensiblement plus étroite et par la ponctuation des côtés du prothorax qui est profonde alors qu'elle est presque nulle chez l'espèce de Madagascar.

32. **Shoguna Feae**, n. sp. — *Elongata, parallela, convexa, glabra, fusco-testacea; antennis 10 articulatis, clava uni-articulata; capite subquadrato parce punctato, utrinque antice oblique impresso, margine antico sinuato; prothorace elongato, in longitudinem subimpresso utrinque punctato, punctis elongatis; elytris truncatis, punctato-striatis, striis profundis apicem haud attingentibus, pygidio subogivali, parce punctato, parce villosa.* — Long. $4\frac{1}{2}$ -5 mill.

Allongé, parallèle, convexe, glabre, brillant, brun-testacé. Antennes plus claires, grossissant progressivement vers le sommet, de dix articles, terminées par un article beaucoup plus gros, ovoïde lisse dans la moitié apicale. Tête à peu près aussi longue que large, subparallèle, rétrécie en avant des yeux, très éparsement ponctuée; yeux petits, tempes très grandes, marge

antérieure échancrée de chaque côté, vers la base de l'antenne une petite impression oblique. Prothorax un peu plus étroit que la tête, subparallèle, environ une fois et demie aussi long que large, longitudinalement subsillonné, très éparsement ponctué de chaque côté, points allongés. Ecusson oblong. Elytres de la largeur du prothorax environ deux fois et demi aussi longs que larges, tronqués au sommet, profondément striés ponctués sur le disque, stries effacées un peu avant le sommet. Pygidium visible, subogival, éparsement et profondément ponctué, garni de longs poils flaves peu serrés.

Thagatà (Tenasserim), Avril. Musée Civique de Gênes. Sumatra. Collection Grouvelle.

1896. "Viaggio di Leonardo Fea in Birmania e regioni vicine. LXVIII. Colydiides et Monotomides." *Annali del Museo civico di storia naturale di Genova* 36, 29–42.
<https://doi.org/10.5962/bhl.part.25037>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/32715>

DOI: <https://doi.org/10.5962/bhl.part.25037>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/25037>

Holding Institution

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Sponsored by

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.