Verzeichnis der bis jetzt bekannten Arten der Dipterengattung *Drapetis* Meigen.

Von **Prof. M. Bezzi**, Sondrio, Italien.

In meiner Arbeit über die indoaustralischen Empididen, gesammelt von Herrn L. Biró (Annales Musei nationalis hungarici II, 320—361, 1904) habe ich die Gattung *Drapetis* in zwei Untergattungen (*Drapetis* s. str. und *Ctenodrapetis*) geteilt; leider ist es unmöglich, die bis jetzt bekannt gewordenen Arten nach den Beschreibungen in diesen zwei Abteilungen zu ordnen. Die Arten scheinen in tropischen Gegenden besonders häufig zu sein, sind aber sehr klein und daher leicht zu übersehen; nichtsdestoweniger ist eine ziemlich große Anzahl von Arten bekannt, wie aus folgendem Verzeichnis zu ersehen ist.

Eine ausführlichere Synonymie der paläarktischen Arten ist im zweiten Bande des Kataloges der paläarktischen Dipteren, p. 272—274, zu finden; diese Arten sind hier ohne Citate angeführt.

aenea Walk., Kat. 272. — Africa sept.

aenescens Wied., Kat. 272. — Africa, Asia, Europa.

brunnipes Macq.

crassa Loew.

affinis Lw. = **assimilis** Fall.

ambigua Macq. = **flavipes** Macq.

apicis Will., Trans. ent. Soc. London 1896, 442, 3. T, XIV, Fig. 167 (1896); Mel., Trans. am. ent. Soc. XXVIII. 209 (1902). — America centr.

arcuata Loew, Kat. 272. Europa.

minima Zett. nec Meig.

assimilis Fall., Kat. 272. — Europa.

affinis Lw.

minima Meig.

nigra Meig.

pygmaea v. Ros.

aterrima Curt., Kat. 273. — Europa.

atra Walk.

bihamata Bezzi, Ann. Mus. nat. hung. II, 353, 35 (1904). — N.-Guinea.

brunnipes Macq. = **aenescens** Wied.

callosotibia Bezzi, Annal. Mus. nat. hung. II. 354, 37 (1904). — N.-Guinea.

ciliatocosta Bezzi, Ann. Mus. nat. hung. II., 355, 39, Fig. 6 (1904). — Australia.

crassa Lw. = **aenescens** Wied.

curvinervis Zett. = **moriella** Zett.

curvipes Meig. = **flavipes** Macq.

discoidalis Bezzi, Ann. Mus. nat. hung. II., 355, 38 (1904). — India.

distans nom. nov. — N.-Guinea.

divergens Bezzi (nec Loew), Ann. Mus. nat. hung. II., 353, 34 (1904).

divergens Bezzi = **distans** nom. nov.

divergens Loew, Berl. ent. Zeitschr. XVI. 90, 62 (1872); Mel., Trans. am. ent. Soc. XXVIII. 210, T. V, Fig. 15 (1902). — America sept.

minuta Will., Trans. ent. Soc. London. 1896, 442, 4. T. XIV. Fig. 168 (1896); Mel., Trans. am. ent. Soc. XXVIII. 210 (1902).

dividua Mel., Trans. am. ent. Soc. XXVIII, 208, T. V. Fig. 16, 18, 23 (1902). — America sept.

exilis Meig., Kat. 273. — Europa.

exilis Zett. = **pusilla** Lw.

fascipes v. Ros. = **flavipes** Macq.

femoralis Wheel. et Mel., Biolog. centr. amer. I. 376. 1 (1901); Mel., Trans. am. ent. Soc. XXVIII. 211, T. V, Fig. 13 (1902). — America centr.

flavipes Macq., Kat. 273. — Europa.

ambigua Macq.

curvipes Meig.

exilis Macq. p. p.

fascipes v. Ros.

nigra Fll.

flavipes Will. = **gilvipes** Lw.

flexuosa Loew = **moriella** Zett.

fulvida Will. = **Tachista** eadem.

gilvipes Loew, Berl. ent. Zeitschr. XVI. 89, 61 (1872); Mel., Trans. am. ent. Soc. XXVIII. 213 et 340 (1902). — America sept.

flavipes Will. (nec Macq.) Trans. ent. Soc. London 1896. 441 (1896).

xanthopoda Will., Trans. ent. Soc. London 1896, 308, 1, T. XI, Fig. 85 (1896); Mel., Trans. am. ent. Soc. XXVIII, 212 (1902).

gracilis Bezzi, Ann. Mus. nat. hung. II., 354, 37 (1904). — N.-Guinea.

latipennis Mel., Trans. am. ent. Soc. XXVIII. 209. (1902).

T. V. F. 11, 19. — America sept.

luteipes Ol., Kat. 273. — Europa.

marginata Meig., Kat. 273. — Europa.

medetera Mel. = **Elaphropeza** *eadem*.

minima Meig. = **assimilis** Fall.

minima Zett. = **arcuata** Lw.

minuta Will. = **divergens** Lw.

moriella Zett., Kat. 273. — Europa.

curvinervis Zett.

flexuosa Lw.

nervosa Lw. = **nigritella** Zett.

nigra (Fall.?) Zett. = **flavipes** Macq.

nigra Meig. = **assimilis** Fall.

nigripes Zett., Kat. 274. — Europa.

nigritella Zett., Kat. 274. — Europa.

nervosa Lw.

nitida Mel. = **unipila** Lw.

obscuripennis Bezzi = **phaeoptera** nom. nov.

obscuripennis Phil., Verh. zool. bot. Ges. Wien XV. 768,
2 (1865). — America mer.

phaeoptera nom. nov. — N.-Guinea.

obscuripennis Bezzi (nec Phil.), Ann. Mus. nat. hung. II. 351.
32 (1904).

pilipes Loew, Kat. 274. — Europa.

pubescens Loew, Berl. ent. Zeitschr. VI. 210, 57 (1862);
Mel., Trans. am. ent. Soc. XXVIII. 210 et 340 (1902).
— America sept.

pusilla Loew., Kat. 274. — Europa.

exilis Zett. nec Meig.

pygmaea v. Ros. = **assimilis** Fall.

rubrithorax Bezzi, Ann. Mus. nat. hung. II. 356, 40 (1904).
— N.-Guinea.

septentrionalis Mel., Trans. am. ent. Soc. XXVIII. 211
(1902). — America sept.

setigera Loew, Kat. 274. — Europa.

spectabilis Mel., Trans. am. ent. Soc. XXVIII., 212, T. V.
Fig. 9—20 (1902). — America sept.

unipila Loew, Berl. ent. Zeitschr. XVI. 88, 60 (1872); Mel., Trans. am.
ent. Soc. XXVIII. 211 et 339 (1902). — America sept.

nitida Mel., Trans. am. ent. Soc. XXVIII. 207, T. V. Fig. 10, 14, 21 (1902).

valdiviana Phil., Verh. zool. bot. Ges. Wien XV. 768, 1 (1865).
— America mer.

xanthopoda Will. = **gilvipes** Lw.

xanthopoda Will. 1896, p. 441 = **Tachista fulvida** (Will.)
Coquill.

xanthopyga Bezzi, Ann. Mus. nat. hung. II. 352, 33 (1904).
— N.-Guinea.

Es sind im ganzen 36 Arten bekannt, von denen wahrscheinlich *aenea* Walk. = *aenescens* Wied. und *luteipes* Ol. = *flavipes* Macq. sind. Von diesen 36 Arten gehören 14 dem paläarktischen Faunengebiete an, 10 dem nearktischen, 2 dem neotropischen, 1 dem südasiatischen, 8 dem australischen; eine Art (*aenescens* Wied.) scheint in Europa und Afrika (und Asien) weit verbreitet zu sein.

Abbildungen von Grottenkäfern aus Bosnien und der Herzegowina.

Von **Edm. Reitter** in Paskau (Mähren).

Hiezu Tafel I., Fig. 1 bis 9.

Erklärung der Figuren:

1. *Antroherpon Leonhardi* Reitt. Wiener Ent. Zeitg. 1902, 208. (Herzegowina).
2. *Antroherpon Matuliči* Reitt. Wien. Ent. Ztg. 1903, 216. (Herzegowina).
3. *Antroherpon Loreki* Zoufal, Wien. Ent. Ztg. 1904. 20, vom 1. Februar.
= *A. Kraussi* Müll., Münch. Kol. Zeitschr. 1904. (II.) pg. 38, vom 16. Februar.
4. *Pholeuonopsis Sequensi* Reitt. Wien. Ent. Ztg. 1902. 223, aus dem nördlichen Teile von Bosnien.
5. *Anillocharis Ottonis* Reitt. Wien. Ent. Ztg. 1903. 231. (Herzegowina).
6. *Leonhardella angulicollis* Reitt. Wien. Ent. Ztg. 1903. 209. (Herzegowina).
7. *Silphanillus Leonhardi* Reitt. Wien. Ent. Ztg. 1903. 211. Herzegowina. Unter einem großen, tief in der Erde eingebetteten Steine an der höchsten Stelle der Vlasulja entdeckt.
8. *Bathyscia (Aphaobius) eurycnemis* Reitt. Wien. Ent. Ztg. 1904. 26. (Herzegowina).
9. *Anophthalmus Hilfi* Reitt. Wien. Ent. Ztg. 1903. 212. (Herzegowina).

Bezzi, Mario. 1904. "Verzeichnis der bis jetzt bekannten Arten der Dipterengattung *Drapetis* MEIGEN." *Wiener entomologische Zeitung* 23, 143–146. <https://doi.org/10.5962/bhl.part.27198>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/44102>

DOI: <https://doi.org/10.5962/bhl.part.27198>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/27198>

Holding Institution

Smithsonian Libraries

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.