

Catalogue critique des types de poissons du Muséum national d'Histoire naturelle

(Suite)

(Familles des Centranchidae, Dipterygonotidae et Emmelichthyidae)

par M. L. BAUCHOT *

En 1830, dans le tome VI de l'Histoire Naturelle des Poissons, VALENCIENNES créait la famille des Ménides pour les poissons rangés par ARTÉDI auprès des *Sparus*, mais qui se distinguent de ces derniers par la protractilité de leur museau. VALENCIENNES y reconnaissait les quatre genres suivants : *Maena* (Mendoles), *Smaris* (Picarels), *Caesio* et *Gerres*.

Après VALENCIENNES, la définition, les limites et la dénomination de la famille subirent plusieurs changements. A la suite de REGAN (1913), JORDAN (1923) classait les *Gerres* et les *Caesio* dans des familles différentes, respectivement les Gerridae et les Pomadasidae.

Les Ménides, orthographiés Maenidae, comprenaient alors les seuls Mendoles et Picarels décrits par les auteurs anciens sous des noms génériques divers : *Centracantus* Rafinesque, 1810, émendé en *Centranchus* ; *Merolepis* Rafinesque, 1810 ; *Spicara* Rafinesque, 1810 ; *Smaris* Cuvier, 1814 ; *Maena* Cuvier, 1829 ; et *Maenas* (Klein) Bleeker, 1876.

FOWLER (1936), le premier semble-t-il, employa le nom de Centranchidae à la place de Maenidae, et nous l'adoptons — avec la graphie Centranchidae — puisque les recherches synonymiques ont établi la priorité du genre *Centranchus* Rafinesque, 1810.

Dans la classification la plus récente, due à GREENWOOD, ROSEN, WEITZMAN et MYERS (1966), ces auteurs groupent sous le terme plus large d'Emmelichthyidae les Erythrichthidae, Erythroclidae, Dipterygonotidae, Inermidae, Maenidae, Spicaridae, Merolepidae, Centranchidae et Centranchidae des anciens auteurs.

Pour cette raison, nous établissons le catalogue des types de nos collections appartenant à ces diverses unités.

La grande variabilité de la morphologie et de la coloration de ces poissons explique que les diverses espèces aient été décrites sous tant de noms différents. Les difficultés posées par la systématique des Centranchidae tiennent à cette synonymie complexe, établie souvent sans que les auteurs aient consulté tous les types correspondants.

Après examen de plusieurs travaux parmi lesquels ceux de DE BUEN (1926), TORTONESE (1935), ZEI (1941), TORTONESE et TROTTI (1950), LOZANO CABO (1953), PLANAS et VIVES (1955), DIEUZEIDE et ROLAND (1957 [1958]), POLLARD et PICHOT (1971), nous recon-

* Laboratoire de Zoologie (Reptiles et Poissons), 25, rue Cuvier, 75005 Paris.

naissions dans la famille des Centracanthidae les genres *Centracanthus* Rafinesque, 1810, *Spicara* Rafinesque, 1810, *Pterosmaris* Fowler, 1925, et *Coleosmaris* Norman, 1931.

Pour vérifier ou préciser la synonymie des espèces reconnues, j'ai examiné tous les exemplaires anciens et récents des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, et j'ai constaté que les types y sont nombreux.

J'ai pu identifier 68 exemplaires-types correspondant à 13 taxons spécifiques dus à CUVIER, VALENCIENNES, GUICHENOT et CHABANAUD.

Trois taxons (2 de Risso et 1 de VALENCIENNES) ne sont pas représentés par leurs types qui ont été perdus ou n'ont jamais été déposés dans les collections (annexe I).

12 spécimens historiques, mentionnés et décrits par VALENCIENNES, mais appartenant à des espèces antérieures, ont pu être reconnus (annexe II).

J'indique également (annexe III) la liste des noms substitués attribués par LACEPÈDE et Risso à des espèces décrites antérieurement et dont ils citent les noms. A ces noms nouveaux ne correspond aucune espèce nouvelle pour la Science.

Enfin, je mentionne une espèce nouvelle de QUOY et GAIMARD décrite sous le nom générique de *Smaris* et qui, en fait, n'appartient pas à l'une des familles de ce catalogue (annexe IV).

J'ai transcrit, pour chaque taxon, l'orthographe de la description originale, mais j'ai appliqué les règles du Code de Nomenclature zoologique pour indiquer le statut actuel.

Pour chaque exemplaire-type je mentionne, dans l'ordre, le numéro des catalogues d'inventaire, la valeur typique, la provenance, le donateur, le mode et l'état de conservation et les longueurs standard (L.S.) et totale (L.T.).

FAMILLE DES CENTRACANTHIDAE

Genre **MAENA** Cuvier, 1829

CUVIER, 1829, Règne animal, 2^e éd., II : 186.

Espèce-type : *Sparus maena* Linnaeus, 1758.

Maena jusculum Cuvier, 1829, Règne animal¹, 2^e éd., II : 186, et Valenciennes, 1830, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VI : 395.

= *Spicara maena maena* (Linnaeus).

9105. — Syntypes.

Messine.

BIBRON.

2 spécimens en alcool.

L. S. : 133 et 134 mm.

L. T. : 165 et 166 mm.

9151. — Syntypes.

Martigues.

DELALANDE.

2 spécimens en alcool.

L. S. : 127 et 138 mm.

L. T. : 156 et env. 168 mm.

9313. — Syntypes.

Malaga.

BAILLON.

2 spécimens en alcool.

L. S. : 68 et 74 mm.

L. T. : — et 92 mm.

Maena vomerina Valenciennes, 1830, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VI : 400, pl. 164.

= *Spicara maena maena*² (Linnaeus).

9107. — Syntype.

Malte.

1. Les espèces nouvelles parues dans le Règne animal sont décrites très sommairement et les descriptions ne mentionnent pas d'échantillons. Aussi reconnaissons-nous dans les exemplaires décrits dans l'Histoire Naturelle des Poissons les types des espèces nouvelles du Règne animal.

2. Cet exemplaire est à rapprocher de *S. maena maena* pour les caractères dentaires — très nombreuses dents disposées en coussinet sur le vomer — et les proportions du corps. Mais il faut le rapprocher de *S. maena flexuosa* pour le nombre d'écaillés de la ligne latérale (79) et la configuration de la nageoire dorsale — la dorsale épineuse est plus haute que la dorsale molle, les rayons 5 et 6 étant les plus élevés.

LEACH.

1 spécimen en alcool.

L. S. : 106 mm.

L. T. : 131 mm.

Maena vulgaris Valenciennes, 1830, *in* Cuv. VAL., Hist. Nat. Poiss., VI : 390.

= *Spicara maena maena* (Linnaeus).

9100. — Syntype.

Toulon.

KIENER.

1 spécimen en alcool.

L. S. : 149 mm.

L. T. : env. 181 mm.

9101. — Syntypes.

Toulon.

KIENER.

3 spécimens en alcool.

L. S. : 98, 100 et 100 mm.

L. T. : 120, 125 et 125 mm.

9102. — Syntype.

Iviça.

DELAROCHE.

1 spécimen en alcool.

L. S. : 150 mm.

L. T. : 186 mm.

9152. — Syntype.

Corse.

PEYRAUDEAU.

1 spécimen en alcool.

L. S. : 149 mm.

L. T. : 186 mm.

9153. — Syntype.

Sicile.

BIBRON.

1 spécimen en alcool.

L. S. : 138 mm.

L. T. : 172 mm.

9154. — Syntype.

Naples.

SAVIGNY.

1 spécimen en alcool.

L. S. : 158 mm.

L. T. : 195 mm.

9179. — Syntypes.

Iviça.

DELAROCHE.

2 spécimens en alcool.

L. S. : 76 et 82 mm.

L. T. : 95 et 102 mm.

Genre **SMARIS** Cuvier, 1814

CUVIER *apud* A.D. [= A. G. DESMAREST], 1814, *Bull. Soc. Philom. Paris* : 92.
(nec *Smaris* Latreille, 1796).

Espèce-type : *Sparus smarís* Linnaeus, 1758.

Smaris balteatus Valenciennes, 1830, *in* CUV. VAL., *Hist. Nat. Poiss.*, VI : 424.

= *Dipterygonotus leucogrammicus* Bleeker (Dipterygonotidae).

9312. — Syntypes.

Ceylan.

RAYNAUD.

4 spécimens en alcool.

L. S. : 72, 69, 69, 69 mm.

L. T. : 88, 82, —, 84 mm.

Smaris chryselis Valenciennes, 1830, *in* CUV. VAL., *Hist. Nat. Poiss.*, VI : 419, pl. 165.

= *Spicara maena flexuosa* Rafinesque.

9309. — Syntype.

Corse.

PEYRAUDEAU.

1 spécimen en alcool.

L. S. : 147 mm.

L. T. : 182 mm.

9319. — Syntype.

Sicile.

BIBRON.

1 spécimen en alcool.

L. S. : 149 mm.

L. T. : 186 mm.

Smaris gagarella Valenciennes, 1830, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VI : 420.

Espèce nommée *Smaris cagarella* Cuvier, 1829, Règne animal, 2^e éd., II : 187.

= *Spicara maena flexuosa* Rafinesque.

9109. — Syntypes.

Martigues.

DELALANDE.

2 spécimens en alcool.

L. S. : 167 et 172 mm.

L. T. : 205 et 215 mm.

9135. — Syntypes.

Marseille.

DELALANDE.

2 spécimens en alcool.

L. S. : 141 et 148 mm.

Caudales tronquées.

Smaris insidiator Valenciennes, 1830, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VI : 414.

= *Centracanthus cirrus* Rafinesque.

9311. — Syntypes.

Sicile.

BIBRON.

2 spécimens en alcool.

L. S. : 139 et 142 mm.

L. T. : 169 et 172 mm.

9318. — Syntype.

Sicile.

BIBRON.

1 spécimen en alcool.

L. S. : 81 mm.

L. T. : env. 95 mm.

Smaris martinicus Valenciennes, 1830, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VI : 424.

= *Spicara martinicus* (Valenciennes *in* Cuv. Val.).

9094. — Holotype.

Martinique.

PLÉE.

1 spécimen en alcool.

L. S. : 87 mm.

Caudale tronquée.

Smaris melanurus Valenciennes, 1830, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VI : 422 .

Espèce-type du genre *Pterosmaris* Fowler, 1925.

= *Pterosmaris melanurus* (Valenciennes *in* Cuv. Val.).

9314. — Holotype.

Gorée.

RANG.

1 spécimen en alcool.

L. S. : 195 mm.

L. T. : 253 mm.

Smaris vulgaris Valenciennes, 1830, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VI : 407.

= *Spicara smaris* (Linnaeus).

A. 5499. — Syntype.

Méditerranée.

DELALANDE.

1 spécimen sec.

L. S. : 145 mm.

L. T. : env. 264 mm.

9108. — Syntypes.

Naples.

SAVIGNY.

2 spécimens en alcool.

L. S. : 101 et 138 mm.

Caudales tronquées.

9138. — Syntypes.

Morée.

Commission scientifique.

3 spécimens en alcool.

L. S. : 91, 97 et 129 mm.

L. T. : 109, 116 et 157 mm.

9303. — Syntype.

Iviça.

DELAROCHE.

1 spécimen en alcool.

L. S. : 134 mm.

L. T. : 163 mm.

9304. — Syntypes.

Toulon.

KIENER.

4 spécimens en alcool.

L. S. : 100, 104, 107 et 108 mm.

L. T. : 119, 123, 125 et 128 mm.

9306. — Syntype.

Sicile.

BIBRON.

1 spécimen en alcool.

L. S. : 56 mm.

L. T. : 69 mm.

FAMILLE DES DIPTERYGONOTIDAE

Genre **DIPTERYGONOTUS** Bleeker, 1849

BLEEKER, 1849, *Journ. Ind. Arch.*, 3 : 70.

Espèce-type : *Dipterygonotus leucogrammicus* Bleeker, 1849.

Dipterygonotus gruvelli Chabanaud, 1924, *Bull. Mus. Hist. nat., Paris*, 30 : 57.

23-86. — Holotype.

Côte d'Annam.

A. KREMPF.

1 spécimen en alcool.

L. S. : 66,4 mm.

L. T. : 77,7 mm.

23-87 à

23-100. — Paratypes.

Côte d'Annam.

A. KREMPF.

18 spécimens en alcool.

L. S. : 30 à 62,9 mm.

L. T. : 35,8 à 75,5 mm.

Espèce décrite sous un nom de genre n'appartenant pas à cette famille.

Smaris balteatus Valenciennes, 1830, in CUV. VAL., *Hist. Nat. Poiss.*, VI : 424.

= *Dipterygonotus leucogrammicus* Bleeker, 1849.

9312. — Syntypes.

Ceylan.

RAYNAUD.

4 spécimens en alcool.

L. S. : 72, 69, 69 et 69 mm.

L. T. : 88, 82, — et 84 mm.

FAMILLE DES EMMELICHTHYIDAE

Genre **BOXAODON** Guichenot, *in* GAY, 1848GUICHENOT, *in* GAY, 1848, Historia fisica y politica de Chile, Zool., II : 208.Espèce-type : *Boxaodon cyanescens* Guichenot *in* Gay, 1848.**Boxaodon cyanescens** Guichenot, 1848, *in* GAY, Historia fisica y politica de Chile, Zool., II : 209, et Atlas, 1854, pl. 5, fig. 1.= *Emmelichthys cyanescens* (Guichenot *in* Gay).

9128. — Holotype.

Valparaiso.

GAY.

1 spécimen en alcool.

L. S. : 113 mm.

Caudale tronquée.

ANNEXE I

EXEMPLAIRES-TYPES NON RETROUVÉS
OU JAMAIS DÉPOSÉS A PARIS

CENTRACANTHIDAE

Smaris angustatus : Valenciennes, 1830, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VI : 421.

Pour un poisson de Madère figuré par PARKINSON et nommé par SOLANDER
Sciaena angustata.

Smaris italicus : Risso, 1826, Hist. nat. Eur. mérid. : 346, pl. 230.

Pour l'espèce identifiée par RISSO, 1810, Ichthyol. Nice : 252, à *Sparus bilobatus* Lacepède.

Sparus alcedo : Risso, 1810, Ichthyol. Nice : 258.

Pour une espèce de Nice qui sera redécrite *in* RISSO, 1826, Hist. nat. Eur. mérid., III : 346, sous le nom de *Smaris alcedo*.
= *Spicara smarís* (Linnaeus).

ANNEXE II

EXEMPLAIRES HISTORIQUES

Cette liste comprend les poissons étudiés et cités par VALENCIENNES, mais appartenant à des espèces décrites auparavant.

CENTRACANTHIDAE

Maena Osbeckii : Valenciennes, 1830, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VI : 397.

Pour *Sparus osbeck* Lacepède *in* Risso, 1810, Ichthyol. Nice : 246, redécrit *Smaris gora* *in* Risso, 1826, Hist. nat. Eur. mérid., III : 347, pl. 223.

Sparus osbeck Lacepède, 1802, Hist. Nat. Poiss., IV : 33 et 108, est taxon nominal substitué pour *Sparus lineatus* Bonnaterre, 1788, lui-même taxon nominal substitué pour *Sparus radiatus* Osbeck, 1762.

= *Spicara maena* (Linnaeus).

9103. — Martigues — DELALANDE — 1 sp. alcool.

9104. — Naples — SAVIGNY — 1 sp. alcool.

9165. — Corse — PEYRAUDEAU — 1 sp. alcool.

9167. — Messine — BIBRON — 2 sp. alcool.

A. 5430. — Anc. collection — LESCHENAULT — 1 sp. sec.

A. 5503. — Martigues — DELALANDE — 1 sp. sec.

Smaris alcedo : Valenciennes, 1830, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VI : 416.

Pour le Sparus alcyon de Risso — *Sparus Alcedo* Risso, 1810, Ichthyol., Nice : 258.

= *Spicara smaris* (Linnaeus).

9136. — Naples — SAVIGNY — 1 sp. alcool.

9307. — Nice — LAURILLARD — 3 sp. alcool.

9308. — Marseille — ROUX — 1 sp. alcool.

L'exemplaire 9136, non mentionné explicitement dans la description originale, porte une étiquette manuscrite de VALENCIENNES.

ANNEXE III

NOMS SUBSTITUÉS

Cette liste comprend des noms nouveaux, attribués par LACEPÈDE et RISSO à des espèces décrites antérieurement et dont ils citent les noms. A ces noms substitués ne correspond aucune espèce nouvelle pour la Science.

CENTRACANTHIDAE

Smaris gora : Risso, 1826, Hist. nat. Eur. mérid., III : 347, pl. 223.

Pour *Sparus osbeck* Lacepède in Risso, 1810, Ichthyol., Nice : 246.

= *Spicara maena* (Linnaeus).

Sparus osbeck : Lacepède, 1802, Hist. Nat. Poiss., IV : 33 et 108.

Pour *Sparus lineatus* Bonnaterre, 1788, lui-même taxon nominal substitué pour *Sparus radiatus* Osbeck, 1762.

= *Spicara maena* (Linnaeus).

Sparus massiliensis : Lacepède, 1802, Hist. Nat. Poiss., IV : 33 et 108.

Pour *Sparus zebra* Brunnich, 1768.

= *Spicara maena* (Linnaeus).

Sparus mendola : Lacepède, 1802, Hist. Nat. Poiss., IV : 27 et 85.

Pour *Sparus maena* Linné, édit. Gmelin.

= *Spicara maena* (Linnaeus).

ANNEXE IV

ESPÈCES NOUVELLES PLACÉES PAR ERREUR, PAR LEUR AUTEUR,
DANS L'UNE DES FAMILLES DE CE CATALOGUE

Smaris mauritianus : Quoy et Gaimard, 1824, Voy. « Uranie », Zool. : 290, pl. 44, fig. 3.
Fondée sur un poisson de l'île de France, long de 4 pouces (env. 108 mm).
Rapportée par VALENCIENNES, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VI : 436
à *Caesio caerulaureus* Lacepède (Lutianidae).
Cet exemplaire n'a pas été retrouvé.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- BLEEKER, P., 1876. — Systema Percarum revisum. *Archs. néerl. Sci., Sci. nat.*, **11**, pars I : 247-288 ; pars II : 289-340.
- BUEN, F. DE, 1926. — Catalogo ictiologico del Mediterraneo Español y de Marruecos, recopilando lo publicado sobre peces de las costas mediterraneas y proximas del Atlantico (Mar de España). *Resultados Camp. int. Inst. esp. Oceanogr.*, **2** : 1-221, carte.
- CUVIER, G., 1829. — Le Règne animal distribué d'après son organisation... Nouvelle édition, Paris, II : 122-406.
- DESMAREST, A. G., 1814 (= A. D.). — Observations et recherches critiques sur différens Poissons de la Méditerranée et, à leur occasion, sur des Poissons des autres mers plus ou moins liées avec eux ; par M. G. CUVIER. *Bull. Soc. philomath. Paris* : 80-92.
- DIEUZEIDE, R., et J. ROLAND, 1958. — Étude biométrique sur les Centranchidae du genre *Spicara* des côtes algériennes. *Bull. Stn. Aquic. Pêch. Castiglione*, n. sér., **9**, 1957 (1958) : 135-200.
- FOWLER, H. W., 1925. — New taxonomic names of west-african marine fishes. *Am. Mus. Novit.*, **162** : 1-5.
- 1936. — The Marine fishes of West Africa, based on the collection of the American Museum Congo Expedition 1909-1915. *Bull. Am. Mus. nat. Hist.*, **70** (1) : VII + 606 p., fig. 1-275 ; (2) : 607-1493, fig. 276-567.
- GREENWOOD, P. H., D. E. ROSEN, S. H. WEITZMAN and G. S. MYERS, 1966. — Phyletic studies; of Teleostean Fishes with a provisional classification of Living forms. *Bull. Am. Mus. nat. Hist.*, **131**, art. 4 : 339-455.
- JORDAN, D. S., 1923. — A classification of Fishes including families and genera as far as known. *Stanford Univ. Publs., Univ. Ser., Biol. Sci.*, **3** (2) : 77-243 + X.
- LOZANO CABO, F., 1953. — Monografía de los Centranchidos mediterráneos, con un estudio especial de la biometría, biología y anatomía de *Spicara smarís* (L.). *Mems R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madrid*, **17** : 1-128, 42 fig.
- NORMAN, J. R., 1931. — Four new fishes from the Gold Coast. *Ann. Mag. nat. Hist.*, ser. 10, **7** : 352-359, 4 fig.
- PLANAS, A., et F. VIVES, 1955. — Contribucion a la sistematica de los Centranchidos con un estudio especial de la biometria y biologia de la Xucla (*Spicara chryselis* L.). *Invest. Pesquera*, **1** : 87-135, 21 fig.
- POLLARD, D. A., et P. PICHOT, 1971. — The systematic status of the Mediterranean centranchid fishes of the genus *Spicara* and in particular *S. chryselis* (Valenciennes), as indicated by electrophoretic studies of their eye-lens proteins. *J. Fish. Biol.*, **3** : 59-72.
- RAFINESQUE-SCHMALTZ, C. S., 1810. — Caratteri di alcuni nuovi generi e nuove specie di animali (principalmente di pesci) e piante della Sicilia, con varie osservazioni sopra i medesimi. Palermo, 105 p., 20 pl.
- 1810. — Indice d'ittologica siciliana ossia catalogo metodico dei nomi latini, italiani, e siciliani dei pesci, che si rinvencono in Sicilia. Palermo, 69 p., 2 pl.
- REGAN, C. T., 1913. — The classification of the Percoid Fishes. *Ann. Mag. nat. Hist.*, ser. 8, **12** : 111-145.
- VALENCIENNES, A., 1830. — In G. CUVIER et A. VALENCIENNES, Histoire Naturelle des Poissons, VI, Paris, Levrault.

- TORTONESE, E., 1935. — Elenco dei pesci italiani con annotazioni, sistematiche. *Boll. Pesc. Piscic. Idrobiol.*, fasc. 2 : 241-254.
- TORTONESE, E., et L. TROTTI, 1950. — Catalogo dei Pesci del Mare Ligure. *Atti. Accad. Lig. Sci. Let.*, 1949 (1950), **6** : 118 p.
- ZEI, M., 1941. — Studies on the morphology and taxonomy of the Adriatic species of Maenidae. *Act. adriat. Split.*, **2** (4) : 135-191, 21 fig., 4 pl.

Manuscrit déposé le 7 juillet 1972.

Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris, 3^e sér., n° 143, mai-juin 1973,
Zoologie 107 : 881-995.

Achévé d'imprimer le 31 janvier 1974.



Bauchot, Marie-Louise. 1973. "Catalogue critique des types de poissons du Muséum national d'Histoire naturelle (Suite) (Familles des Centranchidae, Dipterygonotidae et Emmelichthyidae)." *Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle* 143(107), 981–995.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/258579>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/272729>

Holding Institution

Muséum national d'Histoire naturelle

Sponsored by

Muséum national d'Histoire naturelle

Copyright & Reuse

Copyright Status: In copyright. Digitized with the permission of the rights holder.

Rights Holder: Muséum national d'Histoire naturelle

License: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Rights: <http://biodiversitylibrary.org/permissions>

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.