NOTE SUR UNE ESPÈCE NOUVELLE D'EUMOLPIDE (COL. CHRYSOMÉLIDES)
DE LA CHINE MÉRIDIONALE,

PAR M. J. BERLIOZ.

Dans un petit lot de Coléoptères provenant du sud de la Chine et acquis récemment par le Laboratoire d'Entomologie du Muséum, l'espèce suivante, qui appartient à l'un des genres les plus remarquables de la tribu des Eumolpides, nous a paru encore inédite et digne d'être signalée. Nous nous faisons un plaisir de la dédier à M. Lesne, Assistant au Laboratoire d'Entomologie, qui nous l'a communiquée :

Heteraspis Lesnei nov. sp.

Corps ovalaire, convexe, à épaules saillantes, entièrement d'un brun sombre à reflets bronzés sur les élytres, cuivreux sur le thorax et les pattes, et recouvert d'une pubescence de deux sortes, l'une hérissée, formée de longs poils noirâtres, assez épars, — l'autre couchée, beaucoup plus courte, formée de poils d'un cuivreux doré brillant, très denses sur les élytres et orientés suivant différentes directions, simulant ainsi des ondes et des dessins irréguliers et laissant à découvert de nombreux espaces punctiformes dénudés.

Tête et pronotum très densément et rugueusement ponctués. Yeux entiers; antennes assez longues, faiblement épaissies vers le sommet, rougeâtres, surtout à la base. Pronotum convexe, presque globuleux, ses rebords latéraux marqués seulement par une fine carène peu distincte. Élytres sensiblement plus larges à la base que le pronotum, arrondis au sommet, à ponctuation assez dense, mais non rugueuse, plus forte à la base qu'en arrière. Tibias rougeâtres, carénés et longuement pubescents, les intermédiaires échancrés au sommet sur le bord externe; fémurs antérieurs finement dentés en dessous. Ongles divergents et bifides. — Long. : 6,5 millim.

Habitat : Sud-ouest de Kouy-Tchéou.

Cet Insecte frappe dès l'abord par la disposition et les caractères si particuliers de sa pubescence, qui ne lui octroient quelque analogie parmi ses congénères qu'avec l'*H. japonica* Motsch., du nord de la Chine et du

Japon, l'*H. morosa* Lef., de Siam, l'*H. evanescens* Baly, des îles de la Sonde, et surtout l'*H. cupreata* Baly, de Malacca, auquel il ressemble beaucoup par son aspect, sa coloration et la ponctuation rugueuse du pronotum. Mais nous ne connaissons que fort peu d'exemplaires de cette dernière espèce, et l'*H. Lesnei*, d'une provenance d'ailleurs toute différente, paraît s'en distinguer aisément par les espaces dénudés des élytres qui lui donnent en quelque sorte l'apparence d'être couvert de gros points varioliques.

C'est certainement un des types les plus particuliers de ce beau genre *Heteraspis*, dont on a déjà décrit plus de 35 espèces, toutes caractéristiques de la région orientale et des contrées avoisinantes. Ce genre est surtout défini, comme l'on sait, par la longue pubescence hérissée qui recouvre les téguments, par les tibias intermédiaires échancrés au sommet sur le bord externe, et par les crochets des tarses divergents et bifides.

1921. "Note sur une espece nouvelle d'Eumolpide (Col. Chrysomelides) de la Chine meridionale." *Bulletin du Muse*

um national d'histoire naturelle 1921, 332–333.
<https://doi.org/10.5962/bhl.part.27734>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/27554>

DOI: <https://doi.org/10.5962/bhl.part.27734>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/27734>

Holding Institution

New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library

Sponsored by

MSN

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.