

Catalogue critique des types de Poissons du Muséum national d'Histoire naturelle

(Suite)

(Familles des Carangidae et des Nematistiidae)

par W. F. SMITH-VANIZ, M. L. BAUCHOT et M. DESOUTTER *

La famille des Carangidae comprend environ cent cinquante espèces valides de poissons marins, très diverses dans leur forme et leur organisation ; un grand nombre d'entre elles manifestent au cours de leur croissance de grandes variations dans la coloration, les proportions du corps et des nageoires, la denture et les caractères méristiques.

Ces caractères des Carangidae, joints au fait qu'ils sont généralement abondants sur les marchés et que de nombreuses espèces ont une vaste distribution géographique, font qu'un très grand nombre d'espèces nominales ont été créées par les anciens auteurs à partir de descriptions insuffisantes.

L'importance économique croissante des Carangidae comme source de nourriture, particulièrement dans la région indo-pacifique, a entraîné un besoin accru de publications sérieuses traitant de la taxinomie et de la biologie de ce groupe.

Malheureusement, de nombreux spécimens-types, d'une importance historique incontestable, n'ont pas été étudiés avec tout le soin nécessaire et il en est résulté une confusion considérable sur l'identité de nombreuses espèces nominales. Aussi est-il indispensable et urgent de localiser et identifier les types de plusieurs centaines d'espèces nominales afin de fixer la nomenclature.

En préparant ce catalogue, nous avons essayé de retrouver et mentionner tous les types de Carangidae et Nematistiidae déposés au Muséum national d'Histoire naturelle. Le genre monotypique *Nematistius* a, suivant les auteurs, été considéré comme un membre des Carangidae ou comme appartenant à une famille distincte. Dans une étude récente, ROSENBLATT et BELL (1976) donnent des arguments en faveur du maintien des Nematistiidae.

Nous discutons plus loin les problèmes posés par la nomenclature générique des Carangidae et nous donnons la liste de tous les genres mentionnés dans ce travail, avec pour chacun d'eux la référence de leur description originale, leur espèce-type et son mode de désignation.

* W. F. SMITH-VANIZ, *Department of Ichthyology, The Academy of Natural Sciences, 19th and the Parkway, Philadelphia, Pennsylvania 19103 U.S.A.*

M. L. BAUCHOT et M. DESOUTTER, *Laboratoire d'Ichtyologie générale et appliquée, Muséum national d'Histoire naturelle, 43, rue Cuvier, 75231 Paris Cedex 05.*

Ce catalogue concerne la plus grande et une des plus importantes collections de types de Carangidae. Trois cent neuf spécimens-types ont été retrouvés, représentant les types primaires (holotypes, paratypes, lectotypes ou syntypes) de cent vingt-huit espèces nominales décrites par GEOFFROY SAINT-HILAIRE, CUVIER, VALENCIENNES, QUOY et GAIMARD, EYDOUX et SOULEYET, GUICHENOT, CASTELNAU, etc. Nous considérons que quarante-deux de ces espèces nominales sont valides (synonymes senior).

Chaque espèce nominale est mentionnée suivant l'ordre alphabétique des noms de genre et d'espèce utilisés dans la description originale. L'orthographe originale est respectée, y compris dans quelques cas l'initiale majuscule du nom spécifique. Pour chaque espèce nominale, nous indiquons : 1) le nom d'auteur, la date, la référence et la page de la description originale ; 2) le statut actuel du taxon s'il est différent du statut original ; 3) le numéro de catalogue d'enregistrement ; 4) le statut typique (holotype, lectotype, syntype ou paratype) ; 5) la localité ou l'origine du type ; 6) le collecteur ou donateur ; 7) le nombre d'exemplaires et leur mode de conservation ; 8) les mensurations suivantes : L.S. longueur standard, L.F. longueur à la fourche, L.T. longueur totale.

Nous indiquons brièvement les caractères distinctifs des holotypes et lectotypes de quelques espèces. Dans quelques cas, des lectotypes ont été choisis afin de fixer la nomenclature ou d'attirer l'attention sur des synonymes plus anciens (synonymes senior). Quelques références bibliographiques récentes sont citées pour aider à l'identification.

Après avoir donné la liste des exemplaires-types présents dans nos collections, nous donnons dans l'annexe I la liste des espèces décrites par des ichtyologistes français et dont les types n'ont pas été retrouvés, ainsi que les espèces nominales décrites seulement à partir de figures ou manuscrits non publiés dus à des voyageurs naturalistes. Vingt-neuf espèces nominales appartiennent à cette catégorie.

Dans une annexe II, nous donnons la liste des cent quarante-neuf exemplaires historiques qui ont servi à CUVIER et VALENCIENNES pour redécrire trente espèces de leurs prédécesseurs.

L'annexe III fournit la liste de dix noms substitués créés par LACEPÈDE, RISSO, CUVIER, VALENCIENNES et CASTELNAU pour des espèces décrites auparavant et dont ils citent les noms et les auteurs. A ces noms substitués ne correspond aucune espèce nouvelle pour la Science, mais, lorsqu'ils existent, les exemplaires ayant servi à établir ces noms nouveaux peuvent être considérés comme types des taxons nominaux substitués.

L'annexe IV concerne une espèce nouvelle décrite sous un nom de genre de la famille des Carangidae, mais rapportée actuellement à la famille des Arripidae.

Enfin, dans l'annexe V, toutes les espèces nominales mentionnées dans ce catalogue sont données par ordre alphabétique, avec, en regard, leur statut taxinomique actuel.

Nous sommes reconnaissants à plusieurs collègues pour l'aide qu'ils nous ont apportée en déterminant le statut taxinomique de certains types : F. H. BERRY (*Selene* et *Trachinotus*), F. J. MATHER (*Seriola*), et le Dr F. WILLIAMS (espèces du groupe *Citula armata*). Le premier auteur remercie la Food and Agricultural Organisation des Nations Unies qui lui a accordé une bourse de voyage pour qu'il puisse travailler au Muséum national d'Histoire naturelle. Il est particulièrement reconnaissant au Dr W. FISCHER pour l'aide et les encouragements qu'il lui a prodigués dans ses recherches sur les Carangidae.

Les genres de CARANGIDAE

La nomenclature générique utilisée dans ce catalogue de types est provisoire, car de nombreux genres de Carangidae n'ont pas encore été définis ou révisés de façon satisfaisante, et les relations intrafamiliales ne sont pas bien établies. L'unanimité en ce qui concerne les limites génériques des Carangidae est particulièrement difficile à obtenir car, même si cette famille présente une diversité morphologique exceptionnellement grande, il y a peu de changements brusques ou complets et ceux qui existent peuvent être d'une valeur limitée pour l'établissement des relations phylogénétiques. Dans ce travail, nous considérons comme valides tous les noms du groupe genre dont les espèces composantes constituent à nos yeux un groupe monophylétique.

Quand nous connaissons mieux la phylogenèse des Carangidae, les relations entre quelques-uns de ces taxons seront sans aucun doute mieux traduites par la création de quelques sous-genres, mais créer des sous-genres de Carangidae en se fondant essentiellement sur l'intuition ne nous semble pas à conseiller. Pour le moment, nous croyons préférable, pour la stabilité de la nomenclature, de nous limiter aux genres. Soulignons qu'un certain nombre de genres de Carangidae, largement utilisés dans la littérature récente (*Decapterus*, *Selar*, *Uraspis*, etc.) ne semblent pas plus distincts morphologiquement que ne le sont des genres moins bien connus tels que *Pseudocaranx*, *Hemicaranx* et *Alepes* utilisés dans ce travail.

Après avoir discuté de l'emploi d'un certain nombre de ces noms génériques, nous donnerons la liste de tous les genres utilisés dans ce travail.

Caranx Lacepède. — Quelques auteurs (par exemple WAKIYA, 1924 ; WEBER et DE BEAUFORT, 1931) ont adopté une classification dans laquelle *Caranx* pris au sens large est subdivisé en plusieurs sous-genres. Nous limiterons ici l'emploi de ce nom aux espèces de Carangidae qui ont au moins la partie postérieure de la ligne latérale pourvue de scutelles larges et dures, et la mâchoire supérieure avec une seule rangée externe de canines subégales, de taille moyenne à forte, doublée intérieurement de dents plus petites, en bande. Pour l'attribution générique de *Caranx rhonchus*, voir la discussion p. 17.

Citula Cuvier. — Nous attirons spécialement l'attention sur le fait que nous reconnaissons la validité du genre *Citula*, synonyme senior de *Carangoides*. Ce dernier nom a été utilisé par WILLIAMS (1958), SMITH (1972) et tout récemment par WILLIAMS et VENKATARAMANI (1978), mais ces auteurs ou bien n'ont fait aucune référence à *Citula*, ou bien n'ont employé *Carangoides* que pour des raisons de commodité. Les derniers auteurs à avoir reconnu la validité de *Citula* furent WAKIYA (1924) et SUZUKI (1962) mais ce genre était très largement utilisé dans la littérature plus ancienne. *Citula* est un genre « fourre-tout » comprenant environ vingt-quatre espèces valides. Les espèces de *Citula* constituent un ensemble morphologiquement varié, dont quelques-unes ressemblent beaucoup aux espèces de *Caranx* si ce n'est qu'elles n'ont pas de rangée externe de canines subégales à la mâchoire supérieure. Deux espèces atlantiques rangées ici dans *Citula* (*C. ruber* et *C. bartholomaei*) ont habituellement été rapportées à *Caranx*. Enfin, quand sera achevée l'étude de la phylogenèse des Carangidae, à l'échelle mondiale, il est probable que quelques espèces que nous rapportons ici à *Citula* constitueront un sous-genre de *Caranx*.

Pseudocaranx Bleeker. — Les quatre espèces de *Pseudocaranx* ont généralement été rapportées à *Caranx* mais elles s'en distinguent facilement par leur denture prémaxillaire qui comprend seulement une ou deux rangées (une seule chez les adultes de grande taille) de dents coniques émoussées, et par leur dorsale épineuse plus haute que la dorsale molle.

Alepes Swainson. — Il est évident que *A. melanoptera* Swainson (espèce-type d'*Alepes*) est un synonyme senior de *Selar malam* Bleeker que WILLIAMS (1958) et SEAMAN (1972) ont placé, avec *Caranx mate* (espèce-type d'*Atule*), dans le genre *Atule*. Nous suivons ces auteurs en attribuant ces espèces à un seul et même genre mais nous considérons *Alepes* comme un synonyme senior d'*Atule*. Au moins en ce qui concerne la denture, les quatre espèces d'*Alepes* peuvent être réparties en trois groupes pour lesquels on pourrait utiliser les noms génériques suivants : *Alepes* (*melanoptera*, *djedaba* et *vari*) ; *Atule* (*mate*) ; *Pantolabus* (*para*). En attendant de mieux connaître leur ostéologie et leurs relations interspécifiques, nous préférons réunir toutes ces espèces dans le genre *Alepes*.

Selene Lacepède. — Nous suivons F. H. BERRY (*com. pers.*) qui inclut *Vomer* dans la synonymie de *Selene*.

LISTE DES GENRES

Cette liste comprend, par ordre alphabétique, tous les genres nominaux mentionnés dans ce catalogue, avec leur espèce-type et son mode de désignation. L'espèce-type de certains genres est douteuse et nous en discutons brièvement.

Alectis Rafinesque, 1815, *Analyse de la Nature* : 84 (substitué pour *Gallus* Lacepède, 1802, préoccupé par *Gallus* Moehring, 1758, non binominal et *Gallus* Brisson, 1760, Aves).

Alepes Swainson, 1839, *Natural history of fishes, amphibians, and reptiles*, II : 176, 248 (espèce-type : *A. melanoptera* Swainson, 1839, par monotypie).

Argyreosus Lacepède, 1802¹, *Hist. Nat. Poiss.*, IV : 566 (espèce-type : *Zeus vomer* Linnaeus, 1758, par monotypie).

Atropus Oken, 1817, *Isis* : 1182 (espèce-type : *Brama atropus* Bloch et Schneider, 1801, par monotypie).

Atule Jordan et Jordan, 1922, *Mem. Carneg. Mus.*, **10** (1) : 38 (espèce-type : *Caranx affinis* Rüppell, 1836 = *Caranx mate* Cuvier in CUVIER et VALENCIENNES, 1833, par désignation originale).

Blepharis Cuvier, 1816, *Règne animal*, 1^{re} édit., II : 322 (espèce-type : *Zeus ciliaris* Bloch, 1788, par monotypie).

Caesiomorus Lacepède, 1801, *Hist. Nat. Poiss.*, III : 92 (espèce-type : *C. baillonii* Lacepède, 1801, par désignation subséquente de JORDAN, 1917, *Genera of Fishes*, pt. 1 : 16).

Carangoides Bleeker, 1851, *Natuurk. Tijdschr. Ned.-Indië.*, **1** : 343, 352 (espèce-type : *Caranx praeustus* Bennett, 1830, par désignation subséquente de JORDAN, 1919, *Genera of Fishes*, pt. 2 : 248).

*Caranx*² Lacepède, 1801, *Hist. Nat. Poiss.*, III : 57 (espèce-type : *Scomber carangus* Bloch, 1793 = *Scomber hippos* Linnaeus, 1766, par désignation subséquente de JORDAN et GILBERT, 1882, *U.S. Nat. Mus. Bull.*, **16** : 970, non 433).

1. Pour les dates exactes de l'« Histoire Naturelle des Poissons » de LACEPÈDE, voir ROUX, 1973.

2. L'espèce-type de *Caranx* est douteuse et il n'y a à cet égard aucun consensus parmi les récents auteurs. Pour la discussion de ce problème, voir GINSBURG (1952 : 91-92).

- Chorinemus* Cuvier in CUVIER et VALENCIENNES, 1832, Hist. Nat. Poiss., VIII : 367 (espèce-type : *Scomberoides comersonnianus* Lacepède, 1801, par désignation subséquente de JORDAN, 1917, Genera of Fishes, pt. 1 : 137).
- Citula* Cuvier, 1816, Règne animal, 1^{re} édit., II : 315 (espèce-type : « l'espèce est nouvelle » = *Caranx citula* Cuvier in CUVIER et VALENCIENNES, 1833 = *Citula armata* Rüppell, 1830, par monotypie).
- Decapterus* Bleeker, 1851, *Natuurk. Tijdschr. Ned.-Indië.*, **1** : 342, 352, 358 (espèce-type : *Caranx kurra* Cuvier in CUVIER et VALENCIENNES, 1833 (= *Caranx russelli* Rüppell, 1830) par désignation subséquente de JORDAN et GILBERT, 1882, *U. S. Nat. Mus. Bull.*, **16** : 432).
- Elagatis* Bennett, 1840, *Narr. Whaling Voy.*, **2** : 283 (espèce-type : *E. bipinnulata* Bennett, 1840 = *Seriola bipinnulata* Quoy et Gaimard, 1824, par monotypie).
- Gallichthys* Cuvier in CUVIER et VALENCIENNES, 1833, Hist. Nat. Poiss., IX : 264 (espèce-type : *G. major* Cuvier, 1833 = *Scyris indicus* Rüppell, 1828, par désignation subséquente de JORDAN, 1919, Genera of Fishes, pt. 2 : 178).
- Gallus* Lacepède, 1802, Hist. Nat. Poiss., IV : 583 (espèce-type : *G. virescens* Lacepède, 1802 = *Zeus ciliaris* Bloch, 1788, par monotypie ; préoccupé par *Gallus* Moehring, 1758, non binominal et *Gallus* Brisson, 1760, Aves).
- Gnathanodon* Bleeker, 1851, *Natuurk. Tijdschr. Ned.-Indië.*, **1** : 343, 352 (espèce-type : *Scomber speciosus* Forsskal, 1775, par monotypie).
- Hemicaranx* Bleeker, 1862, *Versl. Kon. Akad. Wet.*, **14** : 135, 137 (espèce-type : *H. marginatus* Bleeker, 1862 = *Caranx bicolor* Günther, 1860, par désignation originale).
- Hynnys* Cuvier in CUVIER et VALENCIENNES, 1833, Hist. Nat. Poiss., IX : 195 (espèce-type : *H. goreensis* Cuvier, 1833 = *Gallus alexandrinus* Geoffroy Saint-Hilaire, 1817, par monotypie).
- Hypacanthus* Rafinesque, 1810, *Caratteri Alcuni Nuovi generi* : 43 (mal orthographié *Hypacantus*) (espèce-type : *Centronotus vadigo* Lacepède, 1801 = *Scomber amia* Linnaeus, 1758, par désignation subséquente de SMITH-VANIZ et STAIGER, 1973, *Proc. Calif. Acad. Sci.*, **39** (13) : 228).
- Irex* Valenciennes, 1862, *C.r. Acad. Sci.*, **54** : 1205 (espèce-type : *I. indicus* Valenciennes, 1862 = *Seriola bipinnulata* Quoy et Gaimard, 1824, par désignation subséquente de JORDAN, 1919, Genera of Fishes, pt. 3 : 321).
- Lichia* Cuvier, 1816, Règne animal, 1^{re} édit., II : 321 (espèce-type : *Scomber amia* Linnaeus, 1758, par monotypie).
- Naclerus* Cuvier in CUVIER et VALENCIENNES, 1833, Hist. Nat. Poiss., IX : 184 (espèce-type : *N. compressus* Valenciennes, 1833 = *Gasterosteus ductor* Linnaeus, 1758, par désignation subséquente de JORDAN, 1917, Genera of Fishes, pt. 1 : 142).
- Naucrates* Rafinesque, 1810, *Caratteri Alcuni Nuovi generi* : 43 (espèce-type : *N. conductor* Rafinesque, 1810 = *Gasterosteus ductor* Linnaeus, 1758, par désignation subséquente de JORDAN et GILBERT, 1882, *U.S. Nat. Mus. Bull.*, **16** : 443).
- Nematistius* Gill, 1862, *Proc. Acad. nat. Sci. Philad.*, **14** : 258 (espèce-type : *N. pectoralis* Gill, 1862, par monotypie).
- Oligoplites* Gill, 1863, *Proc. Acad. nat. Sci. Philad.*, **15** : 166 (espèce-type : *Chorinemus occidentalis* Günther, 1860 = *Scomber saurus* Bloch et Schneider, 1801, par désignation subséquente de JORDAN et GILBERT, 1882, *U.S. Nat. Mus. Bull.*, **16** : 447). Les auteurs ont cité aussi *Gasterosteus occidentalis* Linnaeus, 1758 (= un *nomen dubium*) comme espèce-type et indiqué *C. occidentalis* Günther comme synonyme.

- Olistus* Cuvier, 1829, Règne animal, 2^e éd., II : 209 (espèce-type : *O. malabaricus* Cuvier in CUVIER et VALENCIENNES, 1833, par désignation subséquente de JORDAN, 1917, Genera of Fishes, pt. 1 : 129, préoccupée par *Scomber malabaricus* Bloch et Schneider, 1801 = *Olistus hedlandensis* Whitley, 1934, premier nom valide).
- Pantolabus* Whitley, 1931, *Rec. Aust. Mus.*, **18** (3) : 108 (espèce-type : *Caranx parasitus* Garman, 1903 = *Caranx para* Cuvier in CUVIER et VALENCIENNES, 1833, par désignation originale et monotypie).
- Porthmeus* Valenciennes in CUVIER et VALENCIENNES, 1833, Hist. Nat. Poiss., IX : 255 (espèce-type : *P. argenteus* Valenciennes, 1833 = *Scomber amia* Linnaeus, 1758, par monotypie).
- Pseudocaranx* Bleeker, 1863, *Natuurk. Verh. holland Maatsch. Wet. Haarlem*, **18** (2) : 82 (espèce-type : *Scomber dentex* Bloch et Schneider, 1801, par désignation subséquente de FOWLER, 1936, *Amer. Mus. Nat. Hist. Bull.*, **70** (2) : 692).
- Scomberoides*¹ Lacepède, 1801, Hist. Nat. Poiss., III : 50 (espèce-type : *S. commersonianus* Lacepède, 1801, par désignation subséquente de JORDAN, 1917, Genera of Fishes, pt. 1 : 60).
- Scyris* Cuvier, 1829, Règne animal, 2^e éd., II : 209 (espèce-type : *Gallus alexandrinus* Geoffroy Saint-Hilaire, 1817, par monotypie).
- Selar* Bleeker, 1851, *Natuurk. Tijdschr. Ned.-Indië*, **1** : 343, 352 (espèce-type : *Caranx boops* Cuvier in CUVIER et VALENCIENNES, 1833, par désignation subséquente, entre parenthèses, de JORDAN et EVERMANN, 1896, *U.S. Nat. Bull.*, **47** (pt. 1) : 916).
- Selaroides* Bleeker, 1851, *Natuurk. Tijdschr. Ned.-Indië*, **1** : 343, 352 (espèce-type : *Caranx leptolepis* [Kuhl et Van Hasselt] Cuvier in CUVIER et VALENCIENNES, 1833, par monotypie).
- Selene* Lacepède, 1802, Hist. Nat. Poiss., IV : 560 (espèce-type : *S. argentea* Lacepède, 1802 = *Zeus vomer* Linnaeus, 1758, par désignation subséquente de JORDAN et GILBERT, 1882, *U.S. Nat. Mus. Bull.*, **16** : 439).
- Seriola* Cuvier, 1816, Règne animal, 1^{re} éd., II : 315 (espèce-type : *Caranx dumerili* Risso, 1810, par monotypie).
- Seriolina* Wakiya, 1924, *Ann. Carneg. Mus.*, **15** (2-3) : 222, 230 (espèce-type : *Seriola intermedia* Temminck et Schlegel, 1845 = *Nomeus nigrofasciata* Rüppell, 1829, par monotypie).
- Seriolophus* Guichenot, 1867, *Mém. Soc. natn. Sci. nat. math. Cherbourg* : 93 (espèce-type : *S. carangoides* Guichenot, 1867 = *Nematistius pectoralis* Gill, 1862, par monotypie).
- Trachinotus* Lacepède, 1801, Hist. Nat. Poiss., III : 78 (espèce-type : *Scomber falcatus* Forsskål, 1775, par monotypie, préoccupée par *Labrus falcatus* Linnaeus, 1758 = *Caesiomorus blochii* Lacepède, 1801, premier nom valide).
- Trachurus*² Rafinesque, 1810, Caratteri Alcuni Nuovi generi : 41 (espèce-type : ? *Caranx suareus* [Risso] Cuvier in CUVIER et VALENCIENNES, 1833 = *Seriola picturata* Bowdich, 1825).
- Ulua* Jordan et Snyder, 1908, *Mem. Carneg. Mus.*, **4** (2) : 39 (espèce-type : *U. richardsoni* Jordan et Snyder, 1908 = *Caranx mentalis* [Ehrenberg] Cuvier in CUVIER et VALENCIENNES, 1833, par monotypie et par originale désignation).
- Uraspis* Bleeker, 1855, *Natuurk. Tijdschr. Ned.-Indië*, **8** : 417 (espèce-type : *U. carangoides* Bleeker,

1. SMITH-VANIZ et STAIGER (1973 : 191-192), dans leur révision récente, ont montré que *Scomberoides* est un synonyme senior de *Chorinemus*. Malheureusement, ils ignoraient la désignation par JORDAN et GILBERT (1882 : 446) de *S. noelii* comme espèce-type de *Scomberoides*. *S. noelii* étant un *nomen dubium*, *Scomberoides* ne peut être valide. Toutefois, comme *Scomberoides* a été reconnu comme valide dans la plus récente révision du genre, et a été largement employé (mais pas exclusivement) dans un grand nombre de publications, et parce que son rejet n'entraînerait qu'une grande confusion, ce nom est ici retenu comme synonyme senior.

2. Voir BERRY et COHEN (1974 : 184-185) pour la discussion détaillée concernant l'espèce-type de *Trachurus*.

1855 [homonyme secondaire junior dans *Caranx*] = *U. uraspis* Günther, 1860, par désignation subséquente, entre parenthèses, de JORDAN et EVERMANN, 1896, *U.S. Nat. Mus. Bull.*, **47** (pt. 1) : 916).

Vomer Cuvier, 1816, Règne animal, 1^{re} éd., II : 316 (espèce-type : *V. brownii* Cuvier in CUVIER et VALENCIENNES, 1833 = *V. brownii* Agassiz in SPIX et AGASSIZ, 1831, par désignation subséquente de JORDAN et GILBERT, 1882, *U.S. Nat. Mus. Bull.*, **16** : 440).

Famille des CARANGIDAE

Genre **BLEPHARIS** Cuvier, 1816

Blepharis indicus Cuvier, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 154.

= *Alectis ciliaris* (Bloch, 1788).

A. 6841. — Holotype. Moluques. PÉRON. Voy. « Géographe » (1800-1804). 1 ex. alcool, mauvais état. L.S. : 109 mm.

Blepharis major Cuvier, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 163.

= *Alectis ciliaris* (Bloch, 1788).

A. 7451. — Holotype. Antilles. PLÉE. 1 ex. sec. L.S. : 357 mm ; L.F. : 381 mm ; L.T. : 415 mm.

Blepharis sutor Cuvier, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 161, pl. 253.

= *Alectis ciliaris* (Bloch, 1788).

A. 6842. — Holotype. La Martinique. PLÉE. 1 ex. alcool. L.S. : 63 mm ; L.F. : 69,4 mm.

Genre **CARANX** Lacepède, 1801

Caranx amblyrhynchus Cuvier, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 100, pl. 248.

= *Hemicaranx amblyrhynchus* (Cuvier, 1833).

5843. — Syntypes. Brésil. DELALANDE. 2 ex. alcool. L.S. : 140 et 141 mm ; L.F. : 150 et 151 mm ; L.T. : 180 et 180 mm.

Caranx auroguttatus [Ehrenberg] Cuvier¹, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 71.

= *Citula bajad* (Forsskål, 1775).

La photographie excellente et la radiographie du type de *Scomber bajad* Forsskål, publiées par KLAUSEWITZ et NIELSEN (1965) ainsi que les renseignements complémentaires que nous a aimablement fournis NIELSEN (*in litt.*) ont permis de reconnaître cette espèce comme synonyme senior de *C. auroguttatus*.

A. 5587. — Syntype. Mer Rouge. EHRENBURG. 1 ex. sec. L.S. : 326 mm ; L.F. : 351 mm.

A. 5752. — Syntype. Mer Rouge. RÜPPELL, 1830 (donné sous le nom de *Scomber fulvoguttatus*). 1 ex. sec. L.S. : 370 mm ; L.F. : 395 mm ; L.T. : 435 mm.

1. CUVIER attribue cette espèce à EHRENBURG, mais ce nom étant emprunté à une source manuscrite, la description originale revient bien à CUVIER. Pour le problème des « auteurs secondaires », voir BAUCHOT *et al.*, 1970.

Un exemplaire sec du musée de Berlin (n° 1537) rapporté de Mer Rouge par EHRENBURG peut être considéré comme syntype de l'espèce. Un autre exemplaire, non numéroté, porte la mention *C. immaculatus* ; CUVIER le mentionne comme « n'étant peut-être qu'une variété ».

Caranx Bartholomaei Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 100.

= *Citula bartholomaei* (Cuvier, 1833).

5840. — Holotype. Ile de Saint-Barthélémi. CHORIS. 1 ex. alcool. L.S. : 144 mm ; L.F. : 153 mm ; L.T. : 169 mm.

Caranx Belengerii Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 116.

= *Caranx sexfasciatus* Quoy et Gaimard, 1824.

A. 540. — Syntypes. Malabar. BÉLENGER. 2 ex. alcool. L.S. : 115 et 126 mm ; L.F. : 123,5 et 136 mm ; L.T. : 136 et 153 mm.

Caranx Blochii Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 69.

Taxon nominal substitué pour *Scomber ruber* Bloch, 1793.

= *Citula ruber* (Bloch, 1793).

940. — Syntype du taxon nominal substitué. Saint-Thomas. PLÉE. 1 ex. alcool. L.S. : 182 mm. L.F. : 197 mm ; L.T. : 221 mm.

4360. — Syntype du taxon nominal substitué. Martinique. GARNOT. 1 ex. alcool. L. S. : 207 mm ; L.F. : 220 mm ; L.T. : 257 mm.

5846. — Syntype du taxon nominal substitué. Cuba. RAMON DE LA SAGRA. 1 ex. alcool. L.S. : 228 mm ; L.F. : 244 mm ; L.T. : 283 mm.

= *Selar crumenophthalmus* (Bloch, 1793).

5845. — Syntype du taxon nominal substitué. Cuba. RAMON DE LA SAGRA. 1 ex. alcool. L.S. : 215 mm ; L.F. : 234 mm ; L.T. : 257 mm.

Caranx boops Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 46.

= *Selar boops* (Cuvier, 1833).

5815. — Syntype. Vanicolo. QUOY et GAIMARD. 1 ex. alcool. L.S. : 242 mm ; L.F. : 260 mm ; L.T. : 291 mm.

Les exemplaires originaires d'Amboine n'ont pas été retrouvés.

Caranx cambon Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 60.

= *Alepes para* (Cuvier, 1833).

5860. — Syntypes. Batavia. REYNAUD. 6 ex. alcool. L.S. : 74, 74, 74, 79, 80 et 86 mm ; L.F. : 82, 82, 82, 87, 88 et 95 mm ; L.T. : 93, 94, 94, 101, 98 et 108 mm.

Caranx chilensis Guichenot, 1848, in GAY, Hist. Fis. Pol. Chile : 235, pl. 6, fig. 2.

= *Pseudocaranx chilensis* (Guichenot, 1848).

5844. — Holotype. Ile Juan Fernandez. GAY. 1 ex. alcool. L.S. : 254 mm ; L.F. : 272 mm ; L.T. : 320 mm.

Caranx chrysophrys Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 77, pl. 247.

= *Citula chrysophrys* (Cuvier, 1833).

A. 560. — Holotype. Les Séchelles. DUSSUMIER. 1 ex. alcool. L.S. : 252 mm ; L.F. : 274 mm ; L.T. : 312 mm.

Caranx ciliaris Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 129.

= *nomen dubium*.

L'exemplaire-type ne présente plus d'arcs branchiaux et puisque la description originale ne mentionne pas le nombre de branchiospines, *Caranx ciliaris* doit être considéré comme un *nomen dubium*. Cette espèce nominale est probablement synonyme soit de *Citula armata* Rüppell soit de *Citula hedlandensis* (Whitley) mais, comme le montrent WILLIAMS *et al.* dans un travail sous presse, le nombre de branchiospines est un caractère essentiel pour distinguer ces deux espèces très voisines.

A. 5547. — Holotype. Pondichéry. SONNERAT. 1 ex. sec. L.S. : 92,5 mm ; L.F. : 102 mm ; L.T. : 116,5 mm.

L'exemplaire rapporté de Java par KUHLE et VAN HASSELT n'a pas été retrouvé.

Caranx citula Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 126, pl. 250.

SMITH (1973) mentionne *C. citula* comme synonyme junior de *Citula ciliaria* Rüppell, mais WILLIAMS *et al.*, dans un travail sous presse, expliquent pourquoi *C. ciliaria* doit être considéré comme un *nomen dubium*.

A. 6182. — Holotype = *Citula armata* Rüppell, 1830. Origine inconnue. Cabinet du Stadhouder. 1 ex. alcool. L.S. : 165 mm ; L.F. : 178 mm ; L.T. : 205 mm.

A. 6181. — Paratype = *Citula armata* Rüppell, 1830. Mer Rouge. EHRENBURG. 1 ex. alcool, mauvais état. L.S. : 171 mm ; L.F. : 183 mm ; L.T. : 205 mm.

A. 6102. — Paratype = *Citula hedlandensis* (Whitley, 1934). Nouvelle-Guinée. QUOY et GAIMARD. 1 ex. alcool. L.S. : 163 mm ; L.F. : 172 mm ; L.T. : 196 mm.

B. 2881. — Paratype = *Ulua mentalis* (Cuvier, 1833). Mer Rouge. EHRENBURG. 1 ex. alcool, mauvais état. L.S. : 206 mm ; L.F. : 222 mm ; L.T. : 258 mm.

Les deux exemplaires dus à EHRENBURG, A. 6181 et B. 2881, avaient été nommés par lui *Caranx cirrhosus*. Ce nom n'ayant pas été publié, *Caranx citula* n'est pas un taxon nominal substitué.

Le musée de Berlin possède deux exemplaires (n^{os} 1571 et 1572) dus à EHRENBURG, également paratypes.

Caranx Dumerili Risso, 1810, Icht. Nice : 175, pl. 6, fig. 20.

Redécrite in RISSO, 1826, Hist. Nat. Eur. Merid., III : 424, sous le nom de *Seriola Dumerili* et par CUVIER, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 201, pl. 258, sous le nom de *Seriola Dumerili*.

= *Seriola dumerili* (Risso, 1810).

B. 868. — Holotype. Nice. RISSO. 1 ex. sec, en mauvais état. L.S. : 283 mm ; L.F. : 305 mm ; L.T. : env. 325 mm.

Caranx ekala Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 117.

CUVIER identifie cette espèce au poisson figuré par RUSSEL sous le nom de Ekalaparah, pl. 146 et décrit in II : 35.

= *Caranx ignobilis* (Forsskål, 1775).

A. 6116. — Syntype. Malabar. DUSSUMIER. 1 ex. alcool. L.S. : 129 mm ; L.F. : 138 mm ; L.T. : 164 mm.

L'exemplaire originaire de Bombay n'a pas été retrouvé.

Caranx fallax Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 95.

= *Caranx latus* Agassiz in SPIX et AGASSIZ, 1831.

A. 539. — Syntype désigné ici comme lectotype. Ile de la Trinité. LHERMINIER. 1 ex. alcool. L.S. : 154 mm ; L.F. : 165 mm ; L.T. : 190 mm. Gorge entièrement écailleuse ; mâchoire supérieure allant jusqu'au niveau du bord postérieur de l'œil ; Dorsale VIII-I, 21 ; Anale II-I, 16. Branchiospines (rudiments compris) 7 + 17 ; scutelles : 36.

A. 6056. — Syntype et paralectotype. Cuba. DESMAREST. 1 ex. alcool. L.S. : 115 mm ; L.F. : 124 mm ; L.T. : 141 mm.

A. 6136. — Syntype et paralectotype. Porto-Rico. PLÉE. 1 ex. sec. L.S. : 241 mm ; L.F. : 250 mm ; L.T. : 277 mm.

700. — Syntype et paralectotype. Brésil. DELALANDE. 1 ex. alcool. L.S. : 130 mm ; L.F. : 140 mm ; L.T. : 158 mm.

= *Caranx* sp.

A. 6057. — Syntype et paralectotype. Brésil. GUÉRIN. 1 ex. alcool. L.S. : 79 mm ; L.F. : 91 mm.

Nous ne sommes pas en mesure d'attribuer un nom spécifique à ce paralectotype, mais il est clair qu'il n'appartient pas à la même espèce que le lectotype de *C. fallax* dont il se distingue très nettement par la gorge complètement nue, les nageoires dorsale et anale fortement falciformes, deux rayons mous de plus à l'anale, et un plus grand nombre de branchiospines (8 + 20 à droite et 7 + 19 à gauche). Aucun *Caranx* atlantique, à notre connaissance, ne présente l'ensemble de ces caractères.

Caranx Forsteri Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 107.

= *Caranx sexfasciatus* Quoy et Gaimard, 1824.

A. 563. — Syntype désigné ici comme lectotype. Ile de France. DESJARDIN. 1 ex. alcool. L.S. : 258 mm ; L.F. : 272 mm ; L.T. : 299 mm. Longueur de la tête : 74,8 mm ; diamètre de l'œil : 20,8 mm ; gorge entièrement écailleuse ; dorsale : VIII-I, 19 ; anale : II-I, 16 ; branchiospines (rudiments compris) 5 + 19 ; scutelles : 33.

A. 6058. — Syntypes et paralectotypes. Côte de Malabar. BÉLENGER. 2 ex. alcool. L.S. : 88 et 111 mm ; L.F. : 93 et 116 mm ; L.T. : 101 et 130 mm.

A. 6059. — Syntype et paralectotype. Nouvelle-Guinée. QUOY et GAIMARD. 1 ex. alcool. L.S. : 116 mm ; L.F. : 126 mm ; L.T. : 143,5 mm.

A. 6060. — Syntypes et paralectotypes. Célèbes. QUOY et GAIMARD. 2 ex. alcool. L.S. : 101 et 111 mm ; L.F. : 108 et 118 mm ; L.T. : 116 et 128 mm.

= *Caranx melampygus* Cuvier, 1833.

739. — Syntypes et paralectotypes. Vanicolo. QUOY et GAIMARD. 3 ex. alcool. L.S. : 73, 80 et 82 mm ; L.F. : 77, 86 et 87 mm ; L.T. : 89, 95 et 95 mm.

L'exemplaire rapporté de Nouvelle-Irlande n'a pas été retrouvé.

Caranx fusus E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817. Descr. Égypte, Paris, Atlas, 1, pl. 24, fig. 3 ; description par I. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, 1827. Descr. Égypte, Paris : 330.
Redécrite par CUVIER, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 52.

= *Caranx crysos* (Mitchill, 1815).

5857. — Holotype. Alexandrie. E. GEOFFROY SAINT-HILAIRE. 1 ex. alcool. L.S. : 123 mm ; L.F. : 134 mm ; L.T. : 146 mm.

Quelques auteurs (F. H. BERRY, *comm. pers.*) pensent que *C. fusus* (de l'Atlantique est) et *C. crysos* (de l'Atlantique ouest) sont des espèces jumelles distinctes. En attendant la publication des données qui justifient cette opinion, nous préférons réunir ces deux espèces sous le nom valide le plus ancien comme l'ont fait HUREAU et TORTONESE (1973).

Caranx georgianus Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 85.

= *Pseudocaranx dentex* (Bloch et Schneider, 1801).

5854. — Syntypes. Port du Roi George (Nouvelle-Hollande). QUOY et GAIMARD. 2 ex. alcool. L.S. : 130 et 153 mm ; L.F. : 142 et 166 mm ; L.T. : 155 et 187 mm.

Voir plus loin la discussion au sujet de *Caranx platessa*.

Caranx gymnostethus Cuvier, 1833 in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 73.

= *Citula gymnostethus* (Cuvier, 1833).

A. 5582. — Holotype. Les Seychelles. DUSSUMIER. 1 ex. sec. L.S. : 388 mm ; L.F. : 414 mm ; L.T. : 456 mm.

Caranx ire Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 57.

= *Citula praeustus* (Bennett, 1830).

5847. — Holotype. Baie de Pondichéry. LESCHENAULT. 1 ex. alcool. L.S. : 130 mm ; L.F. : 139 mm ; L.T. : 165 mm.

Caranx Jacobeus Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 42.

= *Decapterus macarellus* (Cuvier, 1833).

5849. — Holotype. Praia-San-Iago (îles du Cap Vert). QUOY et GAIMARD. 1 ex. alcool. L.S. : 260 mm ; L.F. : 274 mm ; L.T. : 295 mm.

Caranx kalla Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 49.

= *Alepes djedaba* (Forsskål, 1775).

L'excellente photographie et la radiographie du type de *Scomber djedaba* Forsskål, publiées par KLAUSEWITZ et NIELSEN (1965), ainsi que les renseignements complémentaires aimablement

fournis par NIELSEN (*in litt.*), permettent de reconnaître cette espèce comme un synonyme senior de *Caranx kalla*. Voir également la discussion au sujet de *Caranx para*.

A. 6081. — Syntype désigné ici comme lectotype (fig. 1). Côte de Malabar. DUSSUMIER. 1 ex. alcool. L.S. : 103 mm ; L.F. : 114 mm. Dents en une seule rangée sur le prémaxillaire et le dentaire ; dorsale : VIII-I, 23 ; anale : II-I, 20 ; branchiospines : 12 + 28 (à droite), 27 (à gauche) ; écailles et scutelles de la ligne latérale (à droite et à gauche) respectivement 34-32 et 44-43.

A. 6082. — Syntype et paralectotype. Mer Rouge. GEOFFROY SAINT-HILAIRE. 1 ex. alcool. L.S. : 107,6 mm ; L.F. : 120 mm.

A. 6126. — Syntype et paralectotype. Pondichéry. LESCHENAULT. 1 ex. sec. L.S. : 212 mm ; L.F. : 235 mm.

A. 6127. — Syntype et paralectotype. Pondichéry. LESCHENAULT. 1 ex. sec. L.S. : 202 mm ; L.F. : 223,5 mm.

A. 6128. — Syntype et paralectotype. Pondichéry. SONNERAT. 1 ex. sec. L.S. : 163 mm ; L.F. : 177 mm ; L.T. : 203 mm.

A. 6129. — Syntype et paralectotype. Mer des Indes. 1 ex. sec. L.S. : 174 mm ; L.F. : 191 mm ; L.T. : 221 mm.

A. 6145. — Syntype et paralectotype. Pondichéry. LESCHENAULT. 1 ex. alcool. L.S. : 152 mm ; L.F. : 166 mm.

5858. — Syntype et paralectotype. Pondichéry. DUSSUMIER. 1 ex. alcool. L.S. : 243 mm ; L.F. : 261 mm ; L.T. : 292 mm.

A. 6204. — Syntypes et paralectotypes. Malabar. BÉLENGER. 2 ex. alcool. L.S. : 123 et 135 mm ; L.F. : 134 et 147 mm ; L.T. : 153 et 161 mm.

A. 6203. — Syntypes et paralectotypes. Malabar. BÉLENGER. 2 ex. alcool. L.S. : 153 et 162 mm ; L.F. : 167 et 175 mm ; L.T. : env. 190 et 201 mm.

Caranx kiliche Cuvier, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 43.

= *Decapterus russelli* (Rüppell, 1830).

5848. — Holotype (fig. 2). Pondichéry. LESCHENAULT. 1 ex. alcool. L.S. : 134 mm ; L.F., 142 mm ; L.T. : 155 mm.

Après l'examen d'un grand nombre de *Decapterus* de la mer Rouge, il semble que deux *Decapterus* seulement apparaissent dans cette aire : *D. macarellus* et une espèce cospécifique avec le type de *D. kiliche*. De ces deux *Decapterus* de la mer Rouge, la dernière espèce s'accorde le mieux avec la description originale de *Caranx russelli* Rüppell. Dans une publication ultérieure, le premier auteur a l'intention de désigner un exemplaire de la mer Rouge, cospécifique avec *D. kiliche*, comme néotype de *C. russelli*. Cette désignation stabilisera la nomenclature et conservera *C. russelli* comme le plus ancien nom valide pour une espèce de *Decapterus*.

Notons que la désignation par BERTIN et DOLLFUS (1948 : 7) d'un néotype de *C. russelli*, fondé sur un spécimen du Japon, n'est pas valide ; en effet, elle ne satisfait pas pleinement aux exigences de l'article 75 (c-5) du Code international de nomenclature zoologique, selon lequel « le néotype provient d'une localité aussi voisine que possible de la localité-type originale ». De plus, ce spécimen (coll. Carnegie Museum n° 7706, maintenant FMNH 59 432) est cospécifique avec *Decapterus muroadsi* (Temminck et Schlegel, 1844), espèce connue seulement du Japon et d'Hawaï.

Caranx leptolepis [Kuhl et van Hasselt] Cuvier, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 63.

= *Selaroides leptolepis* ([Kuhl et van Hasselt] Cuvier, 1833).

A. 6080. — Holotype. Java. KUHL et VAN HASSELT. 1 ex. alcool. L.S. : 113 mm ; L.F. : 121 mm ; L.T. : 138 mm.

Caranx Lessonii Cuvier *in* Lesson, 1830, Voy. « Coquille », II : 155, pl. 31, fig. 1.

Redécrite par CUVIER, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 113.

= *Caranx ignobilis* (Forsskål, 1775).

A. 6048. — Holotype. Nouvelle-Guinée. LESSON et GARNOT. 1 ex. alcool. L.S. : 116 mm ; L.F. : 124 mm ; L.T. : 142 mm.

Caranx luna E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817. Descr. Égypte, Paris, Atlas, 1, pl. 23, fig. 3-4.

Description par I. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, 1827. Descr. Égypte, Paris : 327.

Redécrite par CUVIER, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 80.

= *Pseudocaranx dentex* (Bloch et Schneider, 1801).

5855. — Holotype. Alexandrie. GEOFFROY SAINT-HILAIRE. 1 ex. alcool. L.S. : 224 mm ; L.F. : 241 mm ; L.T. : 278 mm.

Caranx macarellus Cuvier, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 40.

= *Decapterus macarellus* (Cuvier, 1833).

5850. — Lectotype désigné par F. H. BERRY (1968 : 161). La Martinique. PLÉE. 1 ex. alcool. L.S. : 256 mm ; L.F. : 269 mm ; L.T. : 295 mm.

B. 2880. — Syntype et paralectotype. La Martinique. PLÉE. 1 ex. alcool. L.S. : 127 mm ; L.F. : 138 mm ; L.T. : 148 mm.

A. 6245. — Syntype et paralectotype. La Martinique. GARNOT. 1 ex. alcool. L.S. : 243 mm ; L.F. : 256 mm ; L.T. : 266 mm.

Caranx mate Cuvier, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 54.

= *Alepes mate* (Cuvier, 1833).

A. 5489. — Syntype. Pondichéry. LESCHENAULT. 1 ex. sec. L.S. : 179 mm ; L.F. : 188 mm ; L.T. : env. 195 mm.

A. 5523. — Syntype. Pondichéry. LESCHENAULT. 1 ex. sec. L.S. : 239 mm ; L.F. : 255 mm ; L.T. : 266 mm.

5838. — Syntype. Séchelles. DUSSUMIER. 1 ex. alcool. L.S. : 253 mm ; L.F. : 271 mm ; L.T. : 297 mm.

5839. — Syntype. Détroit d'Antjer. RAYNAUD. 1 ex. alcool. mauvais état. L.S. : 81 mm.

5837. — Syntype. Nouvelle-Guinée. QUOY et GAIMARD. 1 ex. alcool. L.S. : 184 mm ; L.F. : 193 mm.

Caranx mauritianus Quoy et Gaimard, 1824, Voy. « Uranie », Zool : 359.

Redécrite par CUVIER, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 60.

= *Selar crumenophthalmus* (Bloch, 1793).

A. 6169. — Holotype. Ile de France. QUOY et GAIMARD. 1 ex. alcool. L.S. : 147 mm ; L.F. : 158 mm ; L.T. : 172 mm.

Caranx melampygnus Cuvier, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 116.

A. 6083. — Syntype. Waigiou. LESSON et GARNOT d'après CUVIER ; QUOY et GAIMARD d'après le registre d'entrée. 1 ex. alcool. L.S. : 230 mm ; L.F. : 246 mm ; L.T. : 290 mm.

A. 6028. — Syntype. Bourou. LESSON et GARNOT. 1 ex. alcool. L.S. : 205 mm ; L.T. : 260 mm.

A. 6162. — Syntype. Vanicolo. QUOY et GAIMARD. 1 ex. alcool. L.S. : 168 mm ; L.F. : 180 mm ; L.T. : 210 mm.

A. 6163. — Syntype. Vanicolo. QUOY et GAIMARD. 1 ex. alcool. L.S. : 85 mm ; L.F. : 90 mm ; L.T. : 103 mm.

A. 6069. — Syntype. Ile de France. DESJARDINS. 1 ex. alcool. L.S. : 108 mm ; L.T. : 137 mm.

Caranx microchir Cuvier, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 59.

= *Alepes para* (Cuvier, 1833).

A. 6171. — Syntypes. Détroit de la Sonde. RAYNAUD. 5 ex. alcool, en mauvais état. L.S. : 20,4, 23,1, 24, 28,5 et 34 mm ; L.F. : — — — — et 39,2 mm ; L.T. : 23,7, — — — — mm

Caranx nigripes Cuvier, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 122.

= *Atropus atropus* (Bloch et Schneider, 1801).

A. 5508. — Syntype. Pondichéry. LESCHENAULT. 1 ex. sec. L.S. : 182 mm ; L.F. : 192 mm ; L.T. : 217 mm.

A. 6133. — Syntype. Pondichéry. LESCHENAULT. 1 ex. sec. L.S. : 181 mm ; L.F. : 205 mm ; L.T. : 217 mm.

A. 5475. — Syntype. Pondichéry. SONNERAT. 1 ex. sec en très mauvais état.

CUVIER mentionne aussi un exemplaire du musée de Bloch. Il a été retrouvé à Berlin (n° 8605) ; c'est également un syntype de l'espèce de CUVIER.

Caranx Novae Guineae Cuvier, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat., Poiss., IX : 63.

= *Selar crumenophthalmus* (Bloch, 1793).

A. 6112. — Syntypes. Nouvelle-Guinée. QUOY et GAIMARD (exp. Dumont d'Urville 1826-1829). 2 ex. alcool. L.S. : 73 et 74 mm ; L.F. : 80 et 82 mm ; L.T. : 87 et 89 mm.

Caranx oblongus Cuvier, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 128.

= *Citula oblongus* (Cuvier, 1833).

A. 6172. — Holotype. Vanicolo d'après CUVIER ; Nouvelle-Guinée sur registre d'entrée. QUOY et GAIMARD. 1 ex. alcool. L.S. : 265 mm ; L.F. : 281 mm ; L.T. : 338 mm.

Caranx para Cuvier, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 58.

= *Alepes para* (Cuvier, 1833).

A. 6161. — Holotype (fig. 3). Côte de Malabar. BÉLENGER. 1 ex. alcool. L.S. : 97 mm ; L.F. : 107 mm ; L.T. : 122 mm. Dents multisériées sur le prémaxillaire, surtout postérieurement, irréguli-

lièrement bisériées sur le dentaire ; dorsale : VIII-I, 25 ; anale : II-I, 19 ; branchiospines : 10 + 28 ; scutelles : à gauche 35, à droite 37.

A. 6104. — Paratype. Côte de Malabar. DUSSUMIER. 1 ex. alcool. L.S. : 113 mm ; L.T. : 143 mm.

A. 6105. — Paratypes. Pondichéry (côte de Coromandel). DUSSUMIER d'après CUVIER, LESCHENAULT sur registre d'entrée. 2 ex. alcool. L.S. : 119 et 128 mm ; L.F. : 130 et 139 mm ; L.T. : 151 et 162 mm.

Ogilby (1915) et Weber et de Beaufort (1931) ont contribué à rendre confuse la synonymie des *Alepes* en donnant d'assez bonnes description et illustration de cette espèce sous le nom d'*Alepes* (ou *Caranx*) *kalla*.

Caranx Peronii Cuvier, 1833, in Cuv. Val., Hist. Nat. Poiss., IX : 112.

= *Caranx sexfasciatus* Quoy et Gaimard, 1824.

6324. — Holotype. Origine inconnue. Voyage de PÉRON (1800-1804). 1 ex. alcool. L.S. : 78 mm L.F. : 85,5 mm ; L.T. : 97 mm.

A. 6067. — Paratype. Vanicolo. QUOY et GAIMARD. 1 ex. alcool. L.S. : 114 mm ; L.F. : 125 mm ; L.T. : env. 142 mm.

= *Caranx melampygus* Cuvier, 1833.

A. 562. — Paratype. Amboine. QUOY et GAIMARD. 1 ex. alcool. L.S. : 57 mm ; L.F. : 60 mm

Les exemplaires mentionnés de Java et du Malabar n'ont pas été retrouvés mais un petit exemplaire en alcool enregistré A. 6830, rapporté des Moluques par QUOY et GAIMARD, est inscrit comme type.

Caranx petaurista E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817. Descr. Égypte, pl. 23, fig. 1-2. Description par I. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, 1827 : 325.

Identifiée par CUVIER, 1833, in Cuv. Val., Hist. Nat. Poiss., IX : 130 à *Caranx speciosus* = *Scomber speciosus* Forsskål.

= *Gnathanodon speciosus* (Forsskål, 1775).

1964. — Holotype. Suez. GEOFFROY SAINT-HILAIRE. 1 ex. alcool. L.S. : 253 mm ; L.F. : 275 mm.

Caranx pinnulatus Eydoux et Souleyet, 1841, Voy. « Bonite » : 163, pl. 3, fig. 1.

= *Decapterus macarellus* (Cuvier, 1833).

5851. — Syntypes. Iles Sandwich. EYDOUX et SOULEYET. 2 ex. alcool. L.S. : 195 et 197 mm ; L.F. : 204 et 208 mm ; L.T. : 227 et 229 mm.

Caranx pisquetus Cuvier, 1833, in Cuv. Val., Hist. Nat. Poiss., IX : 97.

= *Caranx crysos* (Mitchill, 1815).

A. 6103. — Syntype. Saint-Domingue. RICORD. 1 ex. alcool. L.S. : 315 mm ; L.F. : 333 mm ; L.T. : 395 mm.

A. 6100. — Syntype. La Havane. POEY. 1 ex. alcool. L.S. : 157 mm ; L.F. : 167 mm ; L.T. : 191 mm.

A. 6252. — Syntype. Cuba. RAMON DE LA SAGRA. 1 ex. alcool. L.S. : 272 mm ; L.F. : 288 mm ; L.T. : 335 mm.

A. 6111. — Syntype. Origine inconnue. 1 ex. alcool. L.S. : 76 mm ; L.F. : 81 mm ; L.T. : 88 mm.

Caranx platessa Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 84.

= *Pseudocaranx dentex* (Bloch et Schneider, 1801).

5856. — Holotype. Mer des Indes. PÉRON, Voy. « Géographe » (1800-1804). 1 ex. alcool. L.S. : 202 mm ; L.F. : 217 mm ; L.T. : 246 mm.

Dans leur révision de *Caranx georgianus* des eaux tempérées d'Australasie, JAMES et STEPHENSON (1974) ont conclu avec raison que *C. platessa* en était synonyme, mais ils n'ont pas considéré *Scomber dentex* Bloch et Schneider décrit originellement du Brésil et que nous reconnaissons ici comme un synonyme senior de *C. georgianus*.

Caranx punctatus Cuvier, 1829, Règne animal, 2^e éd., II : 208 et CUVIER, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 38.

= *Decapterus punctatus* (Cuvier, 1829).

5951. — Syntypes. La Martinique. PLÉE, 1826. 3 ex. alcool. L.S. : 87, 89 et 90 mm ; L.F. : 90, 93 et 97 mm ; L.T. : 97, 100 et 103 mm.

5952. — Syntypes. La Martinique. PLÉE, 1826. 2 ex. alcool. L.S. : 141 et 152 mm ; L.F. : 149 et 158 mm ; L.T. : 160 et 170 mm.

Caranx rhonchus E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817. Descr. Égypte, Paris, Atlas, 1, pl. 24, fig. 1 et 2. Description par I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1827. Descr. Égypte, Paris : 328.

Redécrite par CUVIER, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 35.

A. 5977. — Holotype. Alexandrie. GEOFFROY SAINT-HILAIRE. 1 ex. alcool. L.S. : 173 mm ; L.F. : 186 mm ; L.T. : env. 212 mm.

Il y a eu désaccord entre les auteurs récents quant à l'attribution générique de *Caranx rhonchus*. Plusieurs chercheurs qui ont publié des révisions de *Decapterus* (NORMAN, 1935 ; BERTIN et DOLLFUS, 1948 ; BERRY, 1968) ont préféré placer *C. rhonchus* dans le genre *Decapterus*, tandis que pour HUREAU et TORTONESE (1973), en accord avec BLANC et BAUCHOT (1961), *C. rhonchus* n'appartient pas à ce genre.

C. rhonchus se distingue de *Decapterus* (sensu stricto) par l'absence d'une pinnule postérieure nettement séparée aux nageoires dorsale et anale et par l'absence, sur le bord de la ceinture pectorale (cleithrum), d'une protubérance largement arrondie et du sillon peu profond qui lui est associé.

C. rhonchus diffère des *Caranx* (sensu stricto) par l'absence d'une rangée externe de canines prémaxillaires moyennes à fortes, et par la hauteur de la dorsale épineuse qui est égale ou plus grande que la hauteur du lobe de la seconde dorsale.

C. rhonchus se distingue à la fois du genre *Caranx* et du genre *Decapterus* par la présence de petites écailles sur la partie postérieure du maxillaire, caractère présenté également par les *Trachurus*.

C. rhonchus devra sans doute être rapporté à un genre ou sous-genre monotypique, mais jusqu'à ce que son étude ostéologique ait été faite convenablement, et dans l'intérêt de la stabilité de la nomenclature, nous préférons conserver l'attribution générique originale.

Caranx Sanctae Helenae Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 37.

= *Decapterus sanctaehelenae* (Cuvier, 1833).

5852. — Lectotype désigné par H. BERRY (1968 : 161). Sainte-Hélène. QUOY et GAIMARD (Exp. Dumont d'Urville 1826-1829). 1 ex. alcool. L.S. : 176 mm ; L.F. : 187 mm ; L.T. : 191 mm.

B. 2532. — Syntypes et paralectotypes. Sainte-Hélène. QUOY et GAIMARD (Exp. Dumont d'Urville 1826-1829). 2 ex. alcool. L.S. : 150 et 162 mm ; L.F. : 160,5 et 171,5 mm.

5948. — Syntypes et paralectotypes. Sainte-Hélène. QUOY et GAIMARD. 2 ex. alcool, dont l'un en mauvais état. L.S. : 162 et 172 mm ; L.F. : 174 et 180 mm ; L.T. : 180, — mm.

5947. — Syntype et paralectotype. Sainte-Hélène. LESSON et GARNOT. 1 ex. alcool. L.S. : 194 mm ; L.F. : 205 mm.

5946. — Syntypes et paralectotypes. Sainte-Hélène. DUSSUMIER. 8 ex. alcool. L.S. : 74, 77, 81, 84, 84, 86, 87 et 102 mm ; L.F. : 79, 82, 85 — 88, 92, 93 et 107 mm ; L.T. : 85, 89 — — 93, 100, 100 et 114 mm.

Caranx scombrinus Valenciennes, 1855, Voy. « Vénus » : 332.

= *Decapterus scombrinus* (Valenciennes, 1855).

A. 5691. — Holotype. Galapagos. DUPETIT-THOUARS. 1 ex. sec. L.S. : 325 mm ; L.F. : 357 mm ; L.T. : 395 mm.

Caranx sem Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 105.

A. 6055. — Syntype désigné ici comme lectotype (fig. 4). Pondichéry. LESCHENAULT. 1 ex. alcool. L.S. : 155 mm ; L.F. : 167 mm ; L.T. : 194 mm. Gorge ventralement nue avec une petite zone écailleuse en avant des pelviennes. Extrémités du lobe supérieur de la caudale et du lobe de la dorsale sombres ; dorsale : VIII-I, 19 ; anale : II-I, 15 ; branchiospines (rudiments compris) : 7 + 18.

A. 5515. — Syntype et paralectotype. Pondichéry. LESCHENAULT. 1 ex. sec. L.S. : 202 mm ; L.F. : 215 mm ; L.T. : 237 mm.

J. L. B. SMITH (1969) dans sa description de *Caranx williamsi* ne fait aucune référence à *C. sem* que nous reconnaissons ici comme un synonyme senior.

Caranx senegallus Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 78.

A. 6019. — Syntypes. Sénégal. ROGER. 2 ex. alcool. L.S. : 71 et 73 mm ; L.F. : 80 et 80 mm.

5841. — Syntype. Gorée. RANG. 1 ex. alcool. L.S. : 211 mm ; L.F. : 221 mm ; L.T. : 279 mm.

Caranx sexfasciatus Quoy et Gaimard, 1824, Voy. « Uranie » : 358, pl. 65, fig. 4.

Redécrite par CUVIER, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 110.

A. 6054. — Holotype. Waigiou. QUOY et GAIMARD. 1 ex. alcool. L.S. : 52 mm ; L.F. : 58 mm.

Caranx solea Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 86.

= *Caranx crysos* (Mitchill, 1815).

A. 6115. — Holotype (fig. 5). Brésil. DELALANDE. 1 ex. alcool. L.S. : 221 mm ; L.F. : 238 mm ; L.T. : 272 mm.

Un autre exemplaire sec, A. 5698, rapporté du Brésil par DELALANDE, 1816, est indiqué dans nos registres avec la mention « type ». Il a vraisemblablement été étudié par CUVIER, mais dans la description originale de l'espèce, CUVIER ne mentionne que l'exemplaire en alcool : « Notre individu conservé dans la liqueur est long de 10 pouces. »

Caranx stellatus Eydoux et Souleyet, 1841, Voy. « Bonite » : 167, pl. 3, fig. 2.

= *Caranx melampygus* Cuvier, 1833.

A. 6068. — Holotype. Iles Sandwich. EYDOUX et SOULEYET. 1 ex. alcool. L.S. : 333 mm ; L.F. : 350 mm ; L.T. : 406 mm.

Caranx suareus Risso in Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 33.

= *Trachurus picturatus* (Bowdich, 1825).

Cette espèce a été décrite par CUVIER d'après la figure et la description que Risso lui avait communiquées. Les poissons de Risso ont été retrouvés dans sa collection personnelle et déposés ensuite dans les collections du Muséum.

B. 869. — Syntype. Nice. Risso. 1 ex. sec. L.S. : 435 ; L.F. : 460 mm.

B. 1144. — Syntype. Risso. 1 ex. sec. L.S. : 315 mm ; L.F. : 331 mm ; L.T. : 340 mm.

Caranx tille Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 124.

A. 5569. — Holotype (fig. 6). Pondichéry. LESCHENAULT. 1 ex. sec, sur socle. L.S. : 487 mm ; L.F. : 528 mm ; L.T. : 565 mm.

Bien que largement distribué à travers tout l'océan Indien, *Caranx tille* a été peu mentionné dans la littérature. *Caranx cynodon* Bleeker, 1851, semble être le seul autre nom utilisé pour cette espèce. Le premier auteur a examiné deux des types de BLEEKER (RMNH 6109 et 25911) et choisi le premier comme lectotype.

WILLIAMS (1958) a donné des photographies et fait une bonne comparaison entre *Caranx tille* et *C. sexfasciatus*. Malheureusement, dans ce travail, le *C. sexfasciatus* de WILLIAMS est un *tille* et son *C. elacate* est un *sexfasciatus*. *Caranx tille* se distingue très nettement de *C. sexfasciatus* par ses yeux plus petits, à toutes les tailles, le profil dorsal de la tête différent et 14 vertèbres caudales (au lieu de 15) ; en plus, les adultes de *C. sexfasciatus* ont, contrairement à *C. tille*, l'extrémité du lobe de la nageoire dorsale nettement blanche.

Caranx valenciennei Castelnau, 1873, Proc. Zool. Accl. Soc. Victoria, II : 102.

= *Caranx melampygus* Cuvier, 1833.

A. 6434. — Syntypes. Noble Island (Australie). CASTELNAU. 2 ex. alcool. L.S. : 81 et 94 mm ; L.F. : 87 et 100 mm ; L.T. : 96 et 111 mm.

Caranx vari Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 48.

= *Alepes vari* (Cuvier, 1833).

A. 5497. — Syntype désigné ici comme lectotype (fig. 7). Pondichéry. LESCHENAULT. 1 ex. sec. L.S. : 211 mm ; L.F. : 225 mm ; L.T. : env. 247 mm. Une seule rangée de dents sur le prémaxillaire et le dentaire ; dorsale : VIII-I, 24 ; anale : II-I, 20 ; scutelles : 60.

A. 5511. — Syntype et paralectotype. Pondichéry. LESCHENAULT. 1 ex. sec. L.S. : 214 mm ;

L.F. : 227 mm ; L.T. : env. 243 mm.

A. 6123. — Syntype et paralectotype. Pondichéry. LESCHENAULT. 1 ex. sec. L.S. : 187 mm ; L.F. : 197 mm ; L.T. : 212 mm.

Cette espèce est un synonyme senior de *Selar macrurus* Bleeker, 1851.

Caranx xanthurus [Kuhl et van Hasselt] ¹ Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 55.

= *Alepes mate* (Cuvier, 1833).

A. 6118. — Syntype. Java. KUHLE et VAN HASSELT. 1 ex. alcool. L.S. : 162 mm ; L.F. : 174 mm ; L.T. : 194 mm.

Un autre syntype sec est déposé au musée de Leyde n° D. 925.

Genre **CHORINEMUS** Cuvier, 1832

Chorinemus guaribira Cuvier, 1832, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 393.

= *Oligoplites saliens* (Bloch, 1793).

A. 5579. — Holotype. Brésil. Prince Maximilien DE WIED. 1 ex. sec. L.S. : 465 mm ; L.F. : 488 mm ; L.T. : 545 mm.

Chorinemus mauritanus Cuvier, 1832, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 382.

= *Scomberoides lysan* (Forsskål, 1775).

A. 6649. — Syntype. Isle de France. LESSON et GARNOT. 1 ex. alcool. L.S. : 83 mm ; L.F. : 91 mm ; L.T. : 100 mm.

A. 570. — Syntype. Isle de France. LESSON et GARNOT. 1 ex. alcool. L.S. : 104 mm ; L.F. : 111 mm ; L.T. : 127 mm.

A. 6612. — Syntypes. Célèbes. QUOY et GAIMARD. 2 ex. alcool. L.S. : 70 et 76 mm ; L.F. : 74 et 82 mm ; L.T. : 84 et 91 mm.

Les syntypes cités de Vanicolo par QUOY et GAIMARD et de Mahé par BÉLENGER n'ont pas été retrouvés.

Chorinemus moadetta [Ehrenberg] Cuvier ¹, 1832, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 382, pour *Lichia moadetta* Ehrenberg.

= *Scomberoides lysan* (Forsskål, 1775).

A. 569. — Syntype. Mer Rouge. EHRENBURG. 1 ex. alcool. L.S. : 214 mm ; L.F. : 230 mm ; L.T. : 262 mm.

Le syntype cité de Trinquemalé par RAYNAUD n'a pas été retrouvé.

Chorinemus palometa Cuvier, 1832, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 392.

= *Oligoplites palometa* (Cuvier, 1832).

A. 6130. — Holotype. Lac Maracaïbo. PLÉE. 1 ex. sec. L.S. : 455 mm ; L.F. : 479 mm ; L.T. : env. 550 mm.

1. Voir note infrapaginale p. 000.

A. 5528. — Paratype. Lac Maracaïbo. PLÉE. 1 ex. sec. L.S. : 330 mm ; L.F. : 346 mm ; L.T. : 397 mm.

A. 6125. — Paratype. Lac Maracaïbo. PLÉE. 1 ex. sec. L.S. : 347 mm ; L.F. : 370 mm ; L.T. : 418 mm.

Chorinemus quiebra Cuvier, 1832, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 396.

= *Oligoplites saurus* (Bloch et Schneider, 1801).

A. 5487. — Syntype. Brésil. DELALANDE. 1 ex. sec. L.S. : 141 mm ; L.F. : 152 mm ; L.T. : 169 mm.

A. 6653. — Syntype. Martinique. GARNOT. 1 ex. alcool. L.S. : 202 mm ; L.F. : 212 mm ; L.T. : 241 mm.

Chorinemus saltans Cuvier, 1832, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 393.

Taxon nominal substitué pour *Gasterosteus occidentalis* Linnaeus.

= *Oligoplites saurus* (Bloch et Schneider, 1801).

A. 6590. — Syntype du taxon nominal substitué. Saint-Domingue. RICORD. 1 ex. alcool. L.S. : 240 mm ; L.F. : 256 mm ; L.T. : 282 mm.

A. 6591. — Syntypes du taxon nominal substitué. Saint-Domingue. RICORD. 2 ex. alcool. L.S. : 78 et 103 mm ; L.F. : 87 et 112 mm ; L.T. : 96 et 124 mm.

A. 6592. — Syntypes du taxon nominal substitué. Saint-Domingue. RICORD. 2 ex. alcool. L.S. : 76 et 78 mm ; L.F. : 81 et 84 mm ; L.T. : 90 et 94 mm.

A. 6594. — Syntype du taxon nominal substitué. La Martinique. PLÉE. 1 ex. alcool. L.S. : 220 mm ; L.F. : 236 mm ; L.T. : 267 mm.

Le(s) (autres) exemplaire(s) reçu(s) du Brésil n'ont pas été retrouvés.

Chorinemus Sancti-Petri Cuvier, 1832, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 379, pl. 236.

= *Scomberoides lysan* (Forsskål, 1775).

5893. — Holotype. Côte de Malabar. DUSSUMIER. 1 ex. alcool. L.S. : 467 mm.

Deux autres exemplaires (nos A. 568 et A. 573) rapportés de Malabar par DUSSUMIER ont vraisemblablement été étudiés par CUVIER, mais la description originale ne mentionne qu'un seul individu long de 20 pouces. Les exemplaires A. 568 et A. 573 ne méritent donc pas le statut de types.

Chorinemus tala Cuvier, 1832, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 377.

= *Scomberoides tala* (Cuvier, 1832).

A. 6588. — Holotype. Côte de Malabar. BÉLENGER. 1 ex. alcool. L.S. : 298 mm ; L.F. : 317 mm.

Par suite d'une mauvaise lecture du registre d'entrée, cet exemplaire avait été considéré comme syntype de l'espèce et désigné comme lectotype par W. SMITH-VANIZ et J.-C. STAIGER (1973) (voir *Chorinemus tol*).

Chorinemus tol Cuvier, 1832, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 385.

= *Scomberoides tol* (Cuvier, 1832).

A. 6605. — Lectotype désigné par W. SMITH-VANIZ et J.-C. STAIGER (1973 : 210). Côte de Malabar. BÉLENGER. 1 ex. alcool. L.S. : 137 mm ; L.F. : 150 mm.

B. 2650. — Syntypes et paralectotypes. Côte de Malabar. BÉLENGER. 2 ex. alcool. L.S. : 122 et 134 mm ; L.F. : 135 et 147 mm ; L.T. : 148 et 160 mm.

A. 6620. — Syntype et paralectotype. Amboine. QUOY et GAIMARD. 1 ex. alcool. L.S. : 111 mm ; L.F. 119 mm ; L.T. : 131 mm.

A. 6585. — Syntype et paralectotype. Bourou. QUOY et GAIMARD. 1 ex. alcool. L.S. : 161 mm ; L.F. : 170 mm ; L.T. : 193 mm.

A. 5542. — Syntype et paralectotype. Pondichéry. LESCHENAULT. 1 ex. alcool. L.S. : 237 mm ; L.F. : 250 mm ; L.T. : 276 mm.

A. 567. — Syntype et paralectotype. Côte de Malabar. DUSSUMIER. 1 ex. alcool. L.S. : 235 mm ; L.F. : 250 mm ; L.T. : 285 mm.

A. 571. — Syntype et paralectotype. Côte de Malabar. DUSSUMIER. 1 ex. alcool. L.S. : 145 mm ; L.F. : 155 mm ; L.T. : 175 mm.

A. 802. — Syntype et paralectotype. Pondichéry. LESCHENAULT. 1 ex. sec. L.S. : 242 mm ; L.F. : 262 mm ; L.T. : 276 mm.

A. 6587. — Syntypes et paralectotypes. Côte de Malabar. BÉLENGER. 2 ex. alcool. L.S. : 283 et 283,5 mm ; L.F. : 296 et 302 mm.

Par suite d'une mauvaise lecture du registre d'entrée, ces deux derniers exemplaires avaient été interprétés par SMITH (1970 : 221) comme syntypes de *C. tala*. W. SMITH-VANIZ et J.-C. STAIGER (1973 : 210) avaient signalé cette erreur et les avaient mentionnés comme « putative paralectotypes » de *C. tol*.

Genre **DECAPTERUS** Bleeker, 1851

Decapterus normani Bertin et Dollfus, 1948, *Mém. Mus. natn. Hist. nat.*, **26** (1) : 21.

= *Alepes mate* (Cuvier, 1833).

1947-7. — Holotype. Nossi-Bé (Madagascar). 1 ex. alcool. L.S. : 250 mm ; L.F. : 272 mm ; L.T. : env. 285 mm.

A. 6147. — Paratype. Tor (mer Rouge). RÜPPELL. 1 ex. sec. L.S. : 187 mm ; L.F. : 201 mm ; L.T. : 212 mm.

Puisque l'exemplaire A. 6147 est dû à RÜPPELL et vient de la localité-type du *Caranx russelli* de RÜPPELL, et qu'à l'exception du nombre des rayons à la dorsale et à l'anale, il correspond tout à fait bien à la description originale de cette espèce, on pourrait avancer que ce paratype représente aussi l'holotype perdu (KLAUSEWITZ *in litt.*) de *C. russelli*. Cependant la différence entre les nombres de rayons mous de la dorsale et de l'anale de cet exemplaire (respectivement 22 + 1 et 18 + 1) et ceux qui sont indiqués dans la description originale (31 + 1 et 26 + 1) jette un doute considérable sur cette possibilité.

Voir la discussion à propos de *Caranx kiliche* p. 13.

Decapterus tabl Berry, 1968, *Contr. Mar. Sci.*, **13** : 152.

1968-3. — Paratype. Oregon st. 4843 : 11°08,5' N — 74°29'W, off Colombia, 17.5.1965, in 40 ft flat, shrimp trawl, bottom depth 100-120 fathoms. F. BERRY. 1 ex. alcool. L.S. : 177 mm ; L.F. : 188 mm ; L.T. : 206 mm.

Genre **GALLICHTHYS** Cuvier, 1833

Gallichthys aegyptiacus [Ehrenberg] Cuvier¹, 1833, *in* CUV. VAL., *Hist. Nat. Poiss.*, IX : 176.

= *Alectis alexandrinus* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817).

1. Voir note infrapaginale p. 8.

A. 6876. — Syntypes. Côtes d'Égypte près d'Alexandrie. EHRENBURG. 2 ex. alcool. L.S. : 38 et 45 mm ; L.F. : 45 et 51 mm ; L.T. : 50 et 58 mm.

Six autres syntypes de L.S. 26,9 à 48,1 mm sont déposés au Musée de Berlin sous le n° 1595.

Gallichthys major Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 168, pl. 254.

= *Alectis indicus* (Rüppell, 1830).

A. 5704. — Syntype. Pondichéry. SONNERAT. 1 ex. sec (peau). L.S. : 103 mm ; L.F. : 117 mm ; L.T. : 135 mm.

A. 5705. — Syntypes. Pondichéry. SONNERAT. 2 ex. secs (peau), dont un en très mauvais état. L.S. : 162 mm ; L.F. : 175 mm ; L.T. : 214 mm.

1103. — Syntypes. Pondichéry. LESCHENAULT. 2 ex. alcool, dont un en très mauvais état. L.S. : 101 mm ; L.F. : 112 mm.

A. 6851. — Syntype. Malabar. DUSSUMIER. 1 ex. alcool. L.S. : 148 mm ; L.F. : 158 mm ; L.T. : 192 mm.

Genre **HYNNIS** Cuvier, 1833

Hynnys goreensis Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 195, pl. 257.

= *Alectis alexandrinus* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817).

A. 795. — Syntype. Gorée. RANG. 1 ex. sec. L.S. : 535 mm ; L.F. : 575 mm.

A. 6854. — Syntype. Gorée. RANG. 1 ex. alcool. L.S. : 313 mm ; L.F. : 322 mm ; L.T. : 374 mm.

Genre **IREX** Valenciennes, 1862

Irex americanus Valenciennes, 1862, C. r. Acad. Sci., **54** : 1206.

= *Elagatis bipinnulata* (Quoy et Gaimard, 1824).

A. 5537. — Holotype. Saint-Thomas. PLÉE. 1 ex. sec. L.S. : 322 mm ; L.F. : 344 mm ; L.T. : 390 mm.

Genre **LICHIA** Cuvier, 1816

Lichia quiebra Quoy et Gaimard, 1824, Voy. « Uranie », Zool. : 365.

= *Oligoplites saurus* (Bloch et Schneider, 1801).

A. 6899. — Holotype. Rio de Janeiro. QUOY et GAIMARD. 1 ex. alcool. L.S. : 182 mm ; L.F. : 196 mm ; L.T. : 216 mm.

Genre **NAUCLERUS** Cuvier, 1833

Nauclerus abbreviatus Valenciennes, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 251.

= *Naucrates ductor* (Linnaeus, 1758).

A. 6570. — Syntype. Voyage du « Géographe » et du « Naturaliste » (1800-1804). PÉRON. 1 ex. alcool. L.S. : 29 mm ; L.F. : 31 mm ; L.T. : 35 mm.

Les exemplaires rapportés de l'Atlantique par QUOY et GAIMARD n'ont pas été retrouvés.

Nauclerus annularis Valenciennes, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 254.

= *Naucrates ductor* (Linnaeus, 1758).

A. 6576. — Syntype. Entre Le Cap et Sainte-Hélène. DUSSUMIER. 1 ex. alcool. L.S. : 42 mm ; L.F. : 45 mm ; L.T. : 50 mm.

A. 6575. — Syntypes de la « variété à bandes moins bien marquées sous le ventre ». Milieu du golfe du Bengale. DUSSUMIER. 3 ex. alcool. L.S. : 25, 29 et 30 mm ; L.F. : 28, 32 et 33 mm ; L.T. : 30, 35 et 36 mm.

Nauclerus brachycentrus Valenciennes, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 252.

= *Naucrates ductor* (Linnaeus, 1758).

A. 6571. — Syntype. Océan Indien. QUOY et GAIMARD. 1 ex. alcool. L.S. : 42 mm ; L.F. : 46 mm ; L.T. : 50 mm.

A. 6572. — Syntype. Mer des Moluques. QUOY et GAIMARD. 1 ex. alcool, mauvais état. L.S. : 47 mm.

Nauclerus compressus Valenciennes, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 249, pl. 263.

= *Naucrates ductor* (Linnaeus, 1758).

A. 6568. — Syntypes. Mer des Moluques. QUOY et GAIMARD (Exp. Dumont d'Urville, 1826-1829). 2 ex. alcool. L.S. : 35 et 38 mm ; L.F. 38 et 42 mm.

A. 6567. — Syntypes d'après nos registres mais l'origine (océan Indien) n'est pas mentionnée par VALENCIENNES. Océan Indien. QUOY et GAIMARD. 2 ex. alcool. L.S. : 33 et 38 mm ; L.F. : 35 et 42 mm ; L.T. : 39 et 45 mm.

Nauclerus leucurus Valenciennes, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 255.

= *Naucrates ductor* (Linnaeus, 1758).

A. 6577. — Syntypes. Milieu du golfe du Bengale. DUSSUMIER. 3 ex. alcool. L.S. : 20, 21 et 24,5 mm ; L.F. : 21,5, 22,5, et 26 mm ; L.T. : 25, 25,5 et 29 mm.

Nauclerus triacanthus Valenciennes, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 253.

= *Naucrates ductor* (Linnaeus, 1758).

A. 6573. — Holotype. Atlantique. QUOY et GAIMARD. 1 ex. alcool. L.S. : 41,5 mm ; L.F. : 46,5 mm ; L.T. : 51 mm.

Genre **NAUCRATES** Rafinesque, 1810

Naucrates indicus Lesson, 1830, Voy. « Coquille » : 137, pl. 14.

Redécrite par CUVIER, 1832, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 326.

= *Naucrates ductor* (Linnaeus, 1758).

A. 5398. — Holotype. Amboine. LESSON et GARNOT. 1 ex. alcool. L.S. : 161 mm ; L.F. : 170 mm ; L.T. : 185 mm.

Naucrates noveboracensis Cuvier, 1832, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 325.

= *Naucrates ductor* (Linnaeus, 1758).

A. 5397. — Holotype. New York. MILBERT. 1 ex. alcool. L.S. : 81 mm ; L.F. : 88 mm ; L.T. : 96 mm.

Genre **OLISTUS** Cuvier, 1829

Olistus malabaricus Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 137, pl. 251.

= *Citula hedlandensis* (Whitley, 1934).

Olistus malabaricus Cuvier, 1833 est préoccupé par *Scomber malabaricus* Bloch et Schneider, 1801, rangé dans le genre *Citula* ; le premier taxon valide pour l'espèce de CUVIER devient alors *Citula hedlandensis* (Whitley, 1934).

3061. — Holotype. Malabar. DUSSUMIER, 1827. 1 ex. alcool. L.S. : 263 mm ; L.F. : 283 mm ; L.T. : 330 mm.

A. 588. — Paratype. Seychelles. DUSSUMIER. 1 ex. alcool. L.S. : 225 mm ; L.F. : 243 mm ; 267 mm.

Genre **PORTHMEUS** Valenciennes, 1833

Porthmeus argenteus Valenciennes, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 256, pl. 264.

= *Hypacanthus amia* (Linnaeus, 1758).

A. 6580. — Syntypes. Océan Indien. QUOY et GAIMARD (Voy. « Astrolabe », 1826-1829). 6 ex. alcool. L.S. : 29, 30, 30, 31, 33 et 36 mm ; L.F. : 33, 35, 35, 35, 39 et 41 mm ; L.T. : 35, 40 — 40 — 45 mm.

A. 6581. — Syntypes. Océan Indien. QUOY et GAIMARD (Voy. « Astrolabe », 1826-1829). 6 ex. alcool. L.S. : 25, 25, 27, 28, 29 et 29 mm ; L.F. : 28 — 30, 32, 32 et 33 mm ; L.T. : 30 — 32, 35, 35 et 35 mm.

A. 6884. — Syntypes. Cap de Bonne-Espérance. VERREAUX. 2 ex. alcool. L.S. : 39 et 32 mm ; L.F. : 43 — mm ; L.T. : 47 — mm.

Genre **SERIOLA** Cuvier, 1816

Seriola binotata Valenciennes, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 215.

= *Seriolina nigrofasciata* (Rüppell, 1829).

A. 6648. — Holotype. Origine inconnue. PÉRON. Voy. « Géographe » (1800-1804). 1 ex. alcool. L.S. : 41 mm ; L.F. : 45 mm ; L.T. : 50 mm.

A. 6647. — Paratype. Rade de Pondichéry. DUSSUMIER. 1 ex. alcool. L.S. : 34,5 mm.

Seriola bipinnulata Quoy et Gaimard, 1824, Voy. « Uranie », Zool. : 363, pl. 61, fig. 3.

= *Elagatis bipinnulata* (Quoy et Gaimard, 1824).

2233. — Paratype. Origine inconnue. PÉRON. Voy. « Géographe » (1800-1804). 1 ex. alcool. L.S. : 193 mm ; L.F. : 209 mm ; L.T. : 250 mm.

L'holotype, figuré dans la description originale et originaire de l'île des Papous, a été perdu.

Seriola Bonariensis Valenciennes, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 211.

= *Seriola rivoliana* Valenciennes, 1833.

A. 6619. — Holotype. Buenos-Ayres. BAILLON. 1 ex. alcool. L.S. : 79 mm ; L.F. : 84 mm ; L.T. : 94 mm.

Seriola Boscii Valenciennes, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 209.

= *Seriola dumerili* (Risso, 1810).

A. 6826. — Holotype. Caroline. Bosc. 1 ex. alcool. L.S. : 116 mm ; L.F. : 126 mm ; L.T. : 138 mm.

Seriola carpenteri Mather III, 1971, *Proc. biol. Soc. Wash.*, **84** (22) : 177.

1967-834. — Paratypes. Côtes du Togo : 06°05' N — 01°38' E, prof. : 50 m, 26-7-1964. J. MARTEAU et A. CROSNIER. 2 ex. alcool. L.S. : 182 et 187 mm ; L.F. : 203 et 205 mm ; L.T. : 229 et 233 mm.

Seriola Dussumieri Valenciennes, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 217.

= *Naucrates ductor* (Linnaeus, 1758).

A. 6646. — Syntypes. Milieu du golfe du Bengale. DUSSUMIER. 3 ex. alcool. L.S. : 35,5, 36,5 et 40 mm ; L.F. : 39, 39,5 et 43 mm ; L.T. : 42, 44,5 et 46 mm.

Seriola falcata Valenciennes, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 210.

= *Seriola rivoliana* Valenciennes, 1833.

A. 781. — Holotype. Porto Rico (golfe du Mexique). PLÉE. 1 ex. sec. L.S. : 562 mm ; L.F. : 610 mm ; L.T. : env. 680 mm.

Dans sa révision des Carangidés du golfe du Mexique, GINSEBURG (1952) emploie le nom de *S. falcata* à la place de *S. rivoliana* (localité-type « Archipel grec ») parce qu'il a pensé, non sans hésitation, que les populations est et ouest atlantiques pouvaient représenter des espèces ou sous-espèces distinctes. D'après MATHER (1971) qui a fait une étude complète du genre *Seriola*, *S. rivoliana* est une espèce circumtropicale.

Seriola grandis Castelnau, 1872, *Proc. Zool. Accl. Soc. Victoria*, 1 : 115.

= *Seriola lalandi* (Valenciennes, 1833).

A. 5667. — Syntype. Melbourne. CASTELNAU. 1 ex. sec. L.S. : env. 670 mm ; L.F. : 705 mm.

Seriola lalandi Valenciennes, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 208.

A. 780. — Syntype. Brésil. DELALANDE. 1 ex. sec. L.S. : 850 mm ; L.F. : 895 mm.

A. 803. — Syntype. Brésil. DELALANDE. 1 ex. sec. L.S. : env. 342 mm ; L.F. : 382 mm.

A. 5574. — Syntype. Brésil. DELALANDE. 1 ex. sec. L.S. : env. 430 mm ; L.F. : 460 mm.

Seriola leiarchus Valenciennes, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 213.

= *Seriola zonata* (Mitchill, 1815).

A. 6645. — Holotype. Philadelphie. LESUEUR. 1 ex. alcool. L.S. : 210 mm ; L.F. : 236 mm ; L.T. : 266 mm.

Seriola Rivoliana Valenciennes, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 207.

A. 6633. — Holotype. Archipel grec. DUC DE RIVOLI. 1 ex. alcool. L.S. : 205 mm ; L.F. : 233 mm ; L.T. : 254 mm.

Seriola succinta Valenciennes, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 218.

= *Naucrates ductor* (Linnaeus, 1758).

A. 6578. — Holotype. Atlantique, entre le Cap et l'île Sainte-Hélène. 1 ex. alcool. L.S. : 41 mm ; L.F. : 44 mm ; L.T. : 50 mm.

Genre **TRACHINOTUS** Lacepède, 1801

Trachinotus affinis Cuvier, 1832, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 428.

= *Trachinotus mookalee* Cuvier, 1832.

A. 575. — Syntypes. Côte de Malabar. DUSSUMIER. 2 ex. alcool. L.S. : 80,5 et 90,5 mm ; L.F. : 89 et 101 mm ; L.T. : 99 et 114 mm.

Trachinotus argenteus Cuvier, 1832, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 413.

= *Trachinotus carolinus* (Linnaeus, 1766).

A. 6797. — Syntype. Rio de Janeiro. DELALANDE. 1 ex. alcool. L.S. : 79 mm ; L.F. : 90 mm ; L.T. : 105 mm.

L'exemplaire rapporté de New York par MILBERT n'a pas été retrouvé.

Trachinotus cayennensis Cuvier, 1832, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 417.

A. 6840. — Holotype. Cayenne. Cabinet de M. RICHARD. 1 ex. alcool. L.S. : 46,5 mm ; L.F. : 51 mm ; L.T. : 60 mm.

Trachinotus cupreus Cuvier, 1832, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 414.

= *Trachinotus carolinus* (Linnaeus, 1766).

2791. — Syntype. Martinique. PLÉE. 1 ex. alcool. L.S. : 72 mm ; L.F. : 87 mm ; L.T. : 94 mm.

Trachinotus drepanis Cuvier, 1832, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 429.

= *Trachinotus blochi* (Lacepède, 1801).

A. 574. — Syntypes. Séchelles (îles Seychelles). DUSSUMIER. 3 ex. alcool dont 2 en mauvais état. L.S. : 104 mm ; L.F. : 116 mm ; L.T. : 144 mm ; L.S. : env. 59,2 et 79 mm.

Trachinotus falciger Cuvier, 1832, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 428.

= *Trachinotus blochii* (Lacepède, 1801).

6377. — Syntype. Côte de Malabar. DUSSUMIER. 1 ex. alcool. L.S. : 107 mm ; L.F. : 120 mm ; L.T. : 149 mm.

Trachinotus fuscus Cuvier, 1832, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 410.

= *Trachinotus falcatus* (Linnaeus, 1758).

A. 6850. — Syntype. Brésil. DELALANDE. 1 ex. alcool. L.S. : 69 mm ; L.F. : 78,5 mm ; L.T. : 91 mm.

A. 5505. — Syntype. Brésil. DELALANDE. 1 ex. sec. L.S. : 95 mm ; L.F. : 108 mm.

A. 6849. — Syntype. Brésil. DELALANDE. 1 ex. alcool. L.S. : 131 mm ; L.F. : 143 mm ; L.T. : 176 mm.

Trachinotus goreensis Cuvier, 1832, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 419.

6229. — Syntypes. Gorée. RANG. 2 ex. alcool. L.S. : 85 et 92 mm ; L.F. : 96 et 101 mm ; L.T. : 107 et 118 mm.

6231. — Syntypes. Gorée. RANG. 2 ex. alcool. L.S. : 118 et 148 mm ; L.F. : 135 et 168 mm ; L.T. : 165 et 202 mm.

A. 6812. — Syntypes. Gorée. RANG. 2 ex. alcool. L.S. : 88 et 109 mm ; L.F. : 99 et 121 mm ; L.T. : 116 et 149 mm.

Trachinotus marginatus Cuvier, 1832, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 411.

A. 6822. — Syntypes. Montevideo. D'ORBIGNY. 2 ex. alcool, en mauvais état. L.S. : 125 et 129 mm ; L.F. : — 143 mm ; L.T. : 168 et 179 mm.

Trachinotus maxillosus Cuvier, 1832, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 420.

6239. — Holotype. Gorée. RANG. 1 ex. alcool. L.S. : 390 mm ; L.F. : 415 mm ; L.T. : 510 mm.

Trachinotus mookalee Cuvier, 1832, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 423.

Identifiée au mookalee-parah de RUSSELL, fig. 154.

2981. — Syntype. Pondichéry. LESCHENAULT. 1 ex. alcool. L.S. : 116 mm ; L.F. : 130 mm ; L.T. : 151 mm.

A. 6823. — Syntypes. Malabar. DUSSUMIER. 1 ex. alcool. L.S. : 111 mm ; L.F. : 145 mm ; L.T. : 163 mm.

Trachinotus myrias Cuvier, 1832, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 421.

= *Trachinotus goreensis* Cuvier, 1832.

6220. — Holotype. Gorée. M. EIDORE. 1 ex. alcool. L.S. : 202 mm ; L.F. : 222 mm ; L.T. : 283 mm.

Trachinotus oblongus Cuvier, 1832, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 437.

= *Trachinotus bailloni* (Lacepède, 1801).

A. 6824. — Syntype. Pondichéry. DUSSUMIER. 1 ex. alcool. L.S. : 104 mm ; L.F. : 117 mm ; L.T. : 131 mm.

Le(s) exemplaire(s) envoyé(s) de Java par KUHL et VAN HASSELT n'a (ont) pas été retrouvé (s).

Trachinotus paitensis Cuvier, 1832, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 438.

A. 6814. — Holotype. Païta (Pérou). LESSON et GARNOT. 1 ex. alcool. L.S. : 54 mm ; L.F. : 62 mm ; L.T. : 69 mm.

Trachinotus pampanus Cuvier, 1832, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 415, pl. 237.

= *Trachinotus carolinus* (Linnaeus, 1766).

A. 6650. — Holotype. Brésil. DELALANDE. 1 ex. alcool. L.S. : 285 mm ; L.F. : 312 mm ; L.T. : 395 mm.

2790. — Paratypes. Brésil. DELALANDE. 2 ex. alcool. L.S. : 97,5 et 112 mm ; L.F. : 109 et 123 mm ; L.T. : 124 — mm.

2857. — Paratypes. Charlestown (Caroline du Sud). HOLBROOCK. 2 ex. alcool, mauvais état. L.S. : 158 et 162 mm.

A. 5529. — Paratype. Bahia. Prince de (NEU)WIED. 1 ex. sec. L.S. : 240 mm ; L.F. : 268 mm ; L.T. : 325 mm.

L'exemplaire de la collection de BROUSSONNET n'a pas été retrouvé.

Trachinotus Russelii Cuvier, 1832, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 436.

Identifiée au botla-parah de RUSSELL, pl. 142.

= *Trachinotus botla* (Shaw, 1803).

A. 5663. — Syntype. Pondichéry. SONNERAT. 1 ex. sec. L.S. : 285 mm ; L.F. : 314 mm ; L.T. : 418 mm.

Comme l'a fait remarquer OGILBY (1915 : 95), SHAW et CUVIER ont tous les deux nommé leur espèce d'après la figure de RUSSELL du « botla-parah ». Les caractères distinctifs apparaissent suffisamment bien sur la figure de RUSSELL, aussi n'y a-t-il aucune raison de rejeter le premier nom. *Trachinotus botla* a été très souvent utilisé dans la littérature ichthyologique australienne comme un synonyme senior.

Trachinotus teraia Cuvier, 1832, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 418.

6223. — Syntype désigné ici comme lectotype (choisi par F. BERRY, 1972). Côtes du Sénégal. ROGER et JUBELIN, 1828. 1 ex. alcool, caudale endommagée. L.S. : 145 mm ; L.F. : 157 mm ; L.T. : env. 185 mm. Dents absentes sur la langue ; dorsale : VI-I, 20 ; anale : II-I, 17 ; branchiospines (rudiments compris) : 7 + 11.

A. 577. — Syntype et paralectotype. Côtes du Sénégal. ROGER et JUBELIN, 1828. 1 ex. alcool. L.S. : 83 mm ; L.F. : 93 mm.

= *Trachinotus maxillosus* Cuvier, 1832.

6217. — Syntype, paralectotype et holotype de *Trachinotus teraoides* Guichenot, 1860, Côtes du Sénégal. ROGER et JUBELIN, 1828. 1 ex. alcool, caudale endommagée (« terratological caudal vertebrae distorted », BERRY, 1972). L.S. : 137 mm ; L.F. : 153 mm ; L.T. : env. 184 mm.

Trachinotus teraiodes Guichenot, 1860, in DUMÉRIL, Poiss. Afr. occid., Arch. Mus. Hist. Nat., 10 : 246.

= *Trachinotus maxillosus* Cuvier, 1832.

6217. — Holotype et syntype de *Trachinotus teraia* Cuvier, 1832. Côtes du Sénégal. ROGER et JUBELIN, 1828. 1 ex. alcool, caudale endommagée (« terratological caudal vertebrae distorted », BERRY, 1972). L.S. : 137 mm ; L.F. : 153 mm ; L.T. : env. 184 mm.

Genre **TRACHURUS** Rafinesque, 1810

Trachurus novae-zelandiae Richardson, 1843, Report of the 12th Meeting of the British Association for the Advancement of Science, 1842 : 21.

Pour le poisson décrit par CUVIER, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 26 « Le Saurel de la Nouvelle-Zélande », *Caranx trachurus* Lacepède.

= *Trachurus novaezelandiae* Richardson, 1843.

A. 5997. — Lectotype désigné par STEPHENSON et ROBERTSON (1977 : 247). Nouvelle-Zélande. LESSON et GARNOT. 1 ex. alcool. L.S. : 96 mm ; L.F. : 104 mm.

Dans leur récente révision du genre *Trachurus*, BERRY et COHEN (1974) ont reconnu comme

valides les espèces *T. maccullochi* Nichols, 1920, et *T. japonicus* (Temminck et Schlegel, 1844). Plus récemment, STEPHENSON et ROBERTSON ont montré que *T. novaezelandiae* est un synonyme senior de *T. maccullochi* et avancent les arguments qui prouvent également que *T. japonicus* est aussi synonyme de *T. novaezelandiae*.

Trachurus trecae Cadenat, 1949, *Bull. Mus. natn. Hist. nat.*, 2^e sér., **21** (6) : 668.

1950-71. — Syntypes. Mauritanie. Collection IFAN. 2 ex. alcool. L.S. : 159 et 179 mm ; L.F. : 180 et 194 mm ; L.T. : 197 et 218 mm.

Genre **URASPIS** Bleeker, 1855

Uraspis cadenati Blache et Rossignol, 1961, *Bull. Mus. natn. Hist. nat.*, 2^e sér., **33** (5) : 479.

= *Uraspis secunda* (Poey, 1860).

1961-308. — Holotype. Fond de 40 m par le travers de l'embouchure du fleuve Gabon. Chalut. 30.IX.1960. BLACHE. 1 ex. alcool. L.S. : 155 mm ; L.F. : 178 mm ; L.T. : 190 mm.

Genre **VOMER** Cuvier, 1816

Vomer Brasiliensis Guichenot, 1866, *Annls Soc. linn. Maine-et-Loire* : 43.

= *Selene setapinnis* (Mitchill, 1815).

2927. — Syntypes. Brésil. LESSON et GARNOT (Exp. Duperrey, 1822-1825). 3 ex. alcool. L.S. : 47, 48 et 49,7 mm ; L.F. : 50,4, 51,5 et 54,8 mm.

Vomer Brownii Cuvier, 1833, in CUV. VAL., *Hist. Nat. Poiss.*, IX : 189, pl. 256.

= *Selene browni* (Agassiz in Spix et Agassiz, 1831).

Voir WHITEHEAD et MYERS, 1971, pour le nom d'auteur et la date des espèces décrites dans l'ouvrage d'AGASSIZ, *Brazilian fishes* (1829-1831). Les exemplaires-types décrits par SPIX et AGASSIZ n'existent plus mais la figure grandeur nature de *Vomer brownii* qu'AGASSIZ donne pl. 57 est suffisamment détaillée pour permettre son identification.

2917. — Syntype désigné ici comme lectotype (fig. 8). Holotype de *Vomer Martinicensis* Guichenot, 1866. Martinique. PLÉE. 1 ex. alcool. L.S. : 238 mm ; L.F. : 250 mm ; L.T. : 290 mm. Plus grande hauteur : 143 mm ; hauteur du lobe de la nageoire dorsale : 38,6 mm ; rayons mous de la dorsale : 22 ; rayons mous de l'anale : 18 ; branchiospines : 6 + 26.

2921. — Syntype et paralectotype. Holotype de *Vomer Dominicensis* Guichenot, 1866. Saint-Domingue. RICORD. 1 ex. alcool. L.S. : 94,5 mm ; L.F. : 105 mm.

2926. — Syntype et paralectotype. Holotype de *Vomer Cubae* Guichenot, 1866. La Havane. POEY. 1 ex. alcool. L.S. : 34,5 mm ; L.F. : 38,5 mm.

= *Selene setapinnis* (Mitchill, 1815).

2923. — Syntype et paralectotype. New York. DEKAY. 1 ex. alcool. L.S. : 164 mm ; L.F. : 176 mm ; L.T. : 202 mm.

2927. — Syntypes et paralectotypes. Syntypes de *Vomer Brasiliensis* Guichenot, 1866. Brésil. LESSON et GARNOT (Exp. Duperrey, 1822-1825). 3 ex. alcool. L.S. : 47, 48 et 49,7 mm ; L.F. : 50,4, 51,5 et 54,8 mm.

= *Selene dorsalis* (Gill, 1862).

2924. — Syntypes et paralectotypes. Syntypes de *Vomer Goreensis* Guichenot, 1866. Gorée. RANG. 2 ex. alcool. L.S. : 117 et 137 mm ; L.F. : 128 et 152 mm ; L.T. : env. 144 et 171 mm.

= *Selene peruvianus* (Guichenot, 1866).

2922. — Syntype et paralectotype. Holotype de *Vomer Peruvianus* Guichenot, 1866. Païta (Pérou). LESSON et GARNOT. 1 ex. alcool. L.S. : 124 mm ; L.F. : 136 mm.

Vomer Cayennensis Guichenot, 1866, *Annls Soc. linn. Maine-et-Loire* : 43.

= *Selene setapinnis* (Mitchill, 1815).

2925. — Syntypes. Cayenne. DANIEL. 2 ex. alcool. L.S. : 40,9 et 42,5 mm ; L.F. : 44,5 et 48,5 mm ; L.T. : env. 52 — mm.

Vomer Columbiensis Guichenot, 1866, *Annls Soc. linn. Maine-et-Loire* : 39.

= *Selene browni* (Agassiz, 1831).

2920. — Holotype. Sainte Marthe (Colombie). FONTANIER. 1 ex. alcool. L.S. : 194 mm ; L.F. : 206 mm.

Vomer Cubae Guichenot, 1866, *Annls Soc. linn. Maine-et-Loire* : 44.

= *Selene browni* (Agassiz, 1831).

2926. — Holotype. Syntype et paralectotype de *Vomer Brownii* Cuvier, 1833. La Havane. POEY. 1 ex. alcool. L.S. : 34,5 mm ; L.F. : 38,5 mm.

Vomer Dominicensis Guichenot, 1866, *Annls Soc. linn. Maine-et-Loire* : 40.

= *Selene browni* (Agassiz, 1831).

2921. — Holotype. Syntype et paralectotype de *Vomer Brownii* Cuvier, 1833. Saint-Domingue. RICORD. 1 ex. alcool. L.S. : 94,5 mm ; L.F. : 105 mm.

Vomer Gabonensis Guichenot, 1866, *Annls Soc. linn. Maine-et-Loire* : 42.

= *Selene dorsalis* (Gill, 1862).

2928. — Holotype. Gabon. AUBRY-LECONTE. 1 ex. alcool. L.S. : 54 mm ; L.F. : 59,5 mm.

Vomer Goreensis Guichenot, 1866, *Annls Soc. linn. Maine-et-Loire* : 37.

= *Selene dorsalis* (Gill, 1862).

2924. — Syntypes. Syntypes et paralectotypes de *Vomer Brownii* Cuvier, 1833. Gorée. RANG. 2 ex. alcool. L.S. : 117 et 137 mm ; L.F. : 128 et 152 mm ; L.T. : env. 144 et 171 mm.

Vomer Martinicensis Guichenot, 1866, *Annls Soc. linn. Maine-et-Loire* : 39.

= *Selene browni* (Agassiz, 1831).

2917. — Holotype. Lectotype de *Vomer Brownii* Cuvier, 1833. Martinique. PLÉE. 1 ex. alcool. L.S. : 231 mm ; L.F. : 247 mm ; L.T. : 290 mm.

Vomer Novae-Boracensis Guichenot, 1866, *Annls Soc. linn. Maine-et-Loire* : 41.

= *Selene setapinnis* (Mitchill, 1815).

2929. — Syntypes. La Nouvelle-Orléans. TRECUL. 4 ex. alcool. L.S. : 61, 62, 63 et 64,5 mm ; L.F. : 69, 69, 70 et 72,5 mm ; L.T. : 80 — — et 83 mm.

Vomer Peruvianus Guichenot, 1866, *Annls Soc. linn. Maine-et-Loire* : 38.

= *Selene peruvianus* (Guichenot, 1866).

2922. — Holotype. Syntype et paralectotype de *Vomer Brownii* Cuvier, 1833. Païta (Pérou). LESSON et GARNOT (Exp. Duperrey, 1822-1825). 1 ex. alcool. L.S. : 124 mm ; L.F. : 136 mm.

Vomer Sanctae-Marthae Guichenot, 1866, *Annls Soc. linn. Maine-et-Loire* : 38.

= *Selene browni* (Agassiz, 1831).

2919. — Holotype. Sainte-Marthe (Colombie). FONTANIER. 1 ex. alcool. L.S. : 251 mm ; L.F. : 267 mm ; L.T. : 300 mm.

Vomer Sancti-Petri Guichenot, 1866, *Annls Soc. linn. Maine-et-Loire* : 41.

= *Selene browni* (Agassiz, 1831).

2930. — Syntypes. Martinique. ROUSSEAU. 4 ex. alcool. L.S. : 51,5, 53,4, 55,8 et 59,2 mm ; L.F. : 56, 49,4, 51 et 54,3 mm.

Vomer Senegalensis Guichenot, 1866, *Annls Soc. linn. Maine-et-Loire* : 35.

= *Selene dorsalis* (Gill, 1862).

2918. — Holotype. Sénégal. HEUDELOT. 1 ex. alcool. L.S. : 302 mm ; L.F. : 324 mm ; L.T. : 359 mm.

Famille des NEMATISTIIDAE

Genre **SERIOLOPHUS** Guichenot, 1867

Seriolophus carangoides Guichenot, 1867, *Mém. Soc. natn. Sci. nat. math. Cherbourg* : 93.

= *Nematistius pectoralis* Gill, 1862.

4420. — Syntypes. Mer des Indes. JAURÈS (frégate Danaïde). 2 ex. alcool. L.S. : 214 et 239 mm ; L.F. : 228 et 252 mm ; L.T. : 238 et 268 mm.






FIG. 1-4. — 1, *Caranx kalla* ; 2, *C. killiche* ; 3, *C. para* ; 4, *C. sem.*




FIG. 5-7. — 5, *Caranx solea* ; 6, *C. tille* ; 7, *C. vari*. FIG. 8. — *Vomer brownii*.

ANNEXE I

EXEMPLAIRES-TYPES NON RETROUVÉS
OU JAMAIS DÉPOSÉS A PARIS

Cette liste comprend des espèces décrites par LACEPÈDE, RISSO, GEOFFROY SAINT-HILAIRE, CUVIER, VALENCIENNES, QUOY et GAIMARD, GUICHENOT et CASTELNAU, et dont les types n'ont pas été retrouvés dans nos collections, soit qu'ils aient été perdus, soit qu'ils n'y aient jamais été déposés (exemplaires observés dans les musées étrangers). Elle comprend également les espèces décrites d'après des dessins et descriptions manuscrites des voyageurs naturalistes.

Famille des CARANGIDAE

Genre **CAESIOMORUS** Lacepède, 1801

Caesiomorus Baillonii Lacepède, 1801, Hist. Nat. Poiss., III : 92 et 93, pl. 3, fig. 1.

Fondée sur une figure des manuscrits de COMMERSON.

La description détaillée du poisson, pris en novembre 1770 près de Fort-Dauphin à Madagascar, fut retrouvée par CUVIER dans les manuscrits de COMMERSON et publiée par CUVIER, 1832, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 431, sous le nom de *Trachinotus Baillonii*.

L'exemplaire historique dû à PÉRON, et mentionné sous ce nom par CUVIER, n'a pas été retrouvé.

= *Trachinotus bailloni* (Lacepède, 1801).

Caesiomorus Blochii Lacepède, 1801, Hist. Nat. Poiss., III : 92 et 95, pl. 3, fig. 2.

Fondée sur une figure des manuscrits de COMMERSON.

La description détaillée du poisson, long de 17 pouces (env. 460 mm), pris en octobre 1768 près de Fort-Dauphin à Madagascar, fut retrouvée par CUVIER dans les manuscrits de COMMERSON et publiée par CUVIER, 1832, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 425, sous le nom de *Trachinotus Blochii*.

= *Trachinotus blochi* (Lacepède, 1801).

Genre **CARANX** Lacepède, 1801

Caranx Daubentonii Lacepède, 1801, Hist. Nat. Poiss., III : 58 et 71.

Fondée sur un poisson représenté d'après PLUMIER par AUBRIET dans les peintures sur vélin du Muséum d'Histoire naturelle.

CUVIER, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 65, indique que la même esquisse a servi à BLOCH pour décrire son *Scomber Plumieri*, pl. 344.

Redécrite par CUVIER sous le nom de *Caranx Plumieri*.

= *Selar crumenophthalmus* (Bloch, 1793).

Caranx fasciatus Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 70.

Fondée sur une figure de la collection de MM. MOCIGNO et SESSÉ représentant une espèce des mers d'Amérique.

D'après BERRY (1963) ce nom doit être considéré comme un *nomen dubium*.

Caranx jarra Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 109.

Fondée sur un poisson de 10 pouces — « jarra-dandrée-parah » — représenté, pl. 147, par RUSSELL.

La description de *C. jarra* est trop incomplète pour permettre son identification ; étant donné l'absence de type, nous considérons ce nom comme un *nomen dubium*.

Caranx Mertensi Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 64.

Fondée sur une figure, montrée par M. MERTENS, d'un *Caranx* recueilli à Manille.

= *Selaroides leptolepis* ([Kuhl et van Hasselt] Cuvier, 1833).

Caranx analis Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 88.

Fondée sur un poisson long de 14 pouces (env. 380 mm) rapporté de l'île de Sainte-Hélène par DUSSUMIER.

= *Pseudocaranx dentex* (Bloch et Schneider, 1801).

Caranx gervaisi Castelnau, 1875. Researches on the Fishes of Australia. Intercol. Exhib. Essays, Victoria Dept., n° 2 : 18.

Fondée sur un poisson long de 6 inches (env. 152 mm) originaire de Cape York.

= *Selar boops* (Cuvier, 1833).

Bien que la description originale soit très courte, nous sommes d'accord avec McCULLOCH (1929 : 190) qui considère cette espèce comme synonyme de *Selar boops*.

Caranx kurra Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 44.

La description est faite uniquement d'après une figure très médiocre de RUSSELL (vol. II, pl. 139) du « Kurra-Wodagahwah ». Comme RÜPPELL (1830) avait auparavant décrit son *Caranx russelli* d'après un seul exemplaire de la mer Rouge qu'il pensait être aussi le Kurra-Wodagahwah de RUSSELL, la plupart des auteurs ont considéré que *Caranx kurra* Cuvier était synonyme de *Caranx russelli* Rüppell.

Voir la discussion à propos de *Caranx kiliche*, p. 13.

Caranx mentalis [Ehrenberg] Cuvier¹, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 124.

Fondée sur un poisson long de 2 pieds (env. 640 mm) rapporté de mer Rouge par EHRENBURG.

Cet holotype, enregistré au Zoologische Museum de Berlin, sous le n° 5226, est un exemplaire sec de L.S. 525 mm et L.T. 660 mm.

= *Ulua mentalis* ([Ehrenberg] Cuvier, 1833).

1. Voir note infrapaginale p. 8.

Caranx xanthopygus Cuvier, 1833, *in* Cuv. Val., Hist. Nat. Poiss., IX : 109.

Fondée sur un poisson long de 13 pouces (env. 342 mm) et un autre plus petit, rapportés de l'Isle de France par DUSSEMIER.

En accord avec J. L. B. SMITH (1968 : 180), nous pensons qu'en l'absence de type, *C. xanthopygus* ne peut pas être identifié avec certitude. Nous le considérons comme *nomen dubium*.

Genre **CENTRONOTUS** Lacepède, 1801 (non Bloch et Schneider, 1801)

Centronotus glaycos Lacepède, 1801, Hist. Nat. Poiss., III : 315.

Pour la troisième espèce de *Glaucus* décrite par RONDELET, 1558 : 203.

= *Campogramma glaycos* (Lacepède, 1801).

Centronotus vadigo Lacepède, 1801, Hist. Nat. Poiss., III : 318.

Pour la seconde espèce de *Glaucus* décrite par RONDELET, 1558 : 203, sous le nom de Liche.

= *Hypacanthus amia* (Linnaeus, 1758).

Genre **CHORINEMUS** Cuvier, 1832

Chorinemus exoletus [Ehrenberg] Cuvier ¹, 1832, *in* Cuv. Val., Hist. Nat. Poiss., VIII : 379.

Fondée sur le dessin fait par EHRENBURG d'un poisson long de 8 à 9 pouces, observé à Lohaia sur les côtes de la mer Rouge et appelé *Lichia exoleta* par EHRENBURG.

= *Scomberoides commersonnianus* Lacepède, 1801.

SMITH-VANIZ et STAIGER (1973) ont discuté l'identité de *Chorinemus exoletus* Cuvier et montré que c'était un synonyme de *Scomberoides commersonnianus* Lacepède.

Chorinemus Farkharii Cuvier, 1832, *in* Cuv. Val., Hist. Nat. Poiss., VIII : 388.

Fondée sur une peinture exécutée à Malacca pour le major FARKHAR.

= *nomen dubium*.

Chorinemus toloo Cuvier, 1832, *in* Cuv. Val., Hist. Nat. Poiss., VIII : 377.

Pour un poisson long de 8 pouces (env. 216 mm) rapporté de Malabar par BÉLENGER. Cet exemplaire n'a pas été retrouvé.

= *Scomberoides ? tala* (Cuvier, 1831).

1. Voir note infrapaginale p. 8.

Dans leur révision du genre *Scomberoides*, SMITH-VANIZ et STAIGER (1973) mentionnent *C. toloo* comme synonyme probable de *Scomberoides tala* (Cuvier, 1831), comme plusieurs auteurs l'avaient fait auparavant. Une identification sûre fondée sur la seule description originale est impossible.

Genre **CITULA** Cuvier, 1816

Citula plumbea Quoy et Gaimard, 1824, Voy. « Uranie », Zool. : 315.

Fondée sur un poisson long de 5 pouces (env. 135 mm), originaire de l'Isle de France.

= *nomen dubium*.

D'après SMITH (1973 : 353), la description de *C. plumbea* est si insuffisante que cette espèce nominale doit être considérée comme un *nomen dubium*.

Citula Bancksii Risso, 1820, *J. Phys. Chim. Hist. nat.*, **91** : 254.

Fondée sur un poisson long de 600 mm, originaire de « la mer de Nice ».

= *Pseudocaranx dentex* (Bloch et Schneider, 1801).

L'illustration de *Citula Bancksii* publiée plus tard par Risso (1826 : 422, pl. 6) montre clairement que cette espèce est un synonyme junior de *Pseudocaranx dentex* (Bloch et Schneider, 1801).

Genre **GALLICHTHYS** Cuvier, 1833

Gallichthys chevola Cuvier, 1833, in CUV. VAL., *Hist. Nat. Poiss.*, IX : 175.

Fondée sur la description, par RUSSEL, d'un poisson de 2,5 pouces, le chevola-parah, n° 58, t. I : 46.

= *Alectis indicus* (Rüppell, 1830).

Genre **GALLUS** Lacepède, 1802

Gallus alexandrinus E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817, *Descr. Égypte*, pl. 22, fig. 2.

Décrite en 1827 par I. GEOFFROY SAINT-HILAIRE (p. 321), sous le nom de *Vomer alexandrinus*.
Fondée sur un poisson de la mer Rouge.

= *Alectis alexandrinus* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817).

Genre **HYNNIS** Cuvier, 1833

Hynn timer Valenciennes, 1862, *C. r. hebd. Séanc. Acad. Sci., Paris*, **54** : 1203.

Fondée sur un poisson long de 0,70 m rapporté de l'île Bourbon par MOREL.

Genre **IREX** Valenciennes, 1862

Irex indicus Valenciennes, 1862, *C. r. hebd. Séanc. Acad. Sci., Paris*, **54** : 1205.

Fondée sur un poisson long de 0,88 m rapporté de l'île Bourbon par MOREL.

Cet exemplaire-type, donné aux collections par l'intermédiaire de VALENCIENNES en 1864, a été enregistré sous le n° 1883-840 ; il n'a pas été retrouvé.

= *Elagatis bipinnulata* (Quoy et Gaimard, 1824).

Genre **LICHIA** Cuvier, 1816

Lichia albacora Guichenot, 1848, in GAY, *Hist. Fis. Pol. Chile* : 231.

Fondée sur un poisson long de 45 pouces (env. 1,20 m) originaire des mers du Chili.

= ? *Oligoplites altus* (Günther, 1868).

Genre **SCOMBEROIDES** Lacepède, 1801

Scomberoides commersonnianus Lacepède, 1801, *Hist. Nat. Poiss.*, III : 50 et 53, figurée sous le nom de Scomberoide commersonnien in 1800, II, pl. 20 fig. 3.

Fondée sur une courte description manuscrite et une figure de COMMERSON d'un poisson provenant de la « mer voisine de Fort-Dauphin à Madagascar ».

Redécrite sous le nom de *Chorinemus commersonianus* par CUVIER, 1832, in CUV. VAL., *Hist. Nat. Poiss.*, VIII : 370, qui a retrouvé une « bonne description dans les papiers de COMMERSON ».

= *Scomberoides commersonnianus* Lacepède, 1801.

Dans leur révision du genre *Scomberoides*, SMITH-VANIZ et STAIGER (1973) ont réhabilité le nom *S. commersonnianus* Lacepède, 1801, longtemps considéré comme synonyme de *S. lysan* (Forsskål, 1775).

Scomberoides Noelii Lacepède, 1801, *Hist. Nat. Poiss.*, III : 51.

Fondée sur « un individu desséché et bien conservé qui faisait partie de la collection cédée à la France par la Hollande et envoyée au Muséum d'Histoire naturelle ».

Scomberoides saltator Lacepède, 1801, *Hist. Nat. Poiss.*, III : 50 et 55, figurée sous le nom de Scomberoide sauteur in 1800, II, pl. 19, fig. 2.

Fondée sur un dessin de poisson conservé dans les manuscrits de PLUMIER déposés à la Bibliothèque nationale.

Redécrite sous le nom de *Scomber saliens* Bl. par CUVIER, 1832, in CUV. VAL., *Hist. Nat. Poiss.*, VIII : 389.

= *Oligoplites saliens* (Bloch, 1793).

Genre **SELENE** Lacepède, 1802

Selene argentea Lacepède, 1802, Hist. Nat. Poiss., IV : 560 et 562.

Fondée sur un dessin de PLUMIER représentant un poisson de l'Amérique méridionale.

= *Selene vomer* (Linnaeus, 1758).

Selene quadrangularis Lacepède, 1802, Hist. Nat. Poiss., IV : 561 et 564.

Fondée sur un dessin et une description de SLOANE d'un poisson de la Jamaïque, long de 5 pouces anglais.

= *nomen dubium*.

Genre **VOMER** Cuvier, 1816

Vomer alexandrinus Geoffroy Saint-Hilaire, 1827. Desc. Égypte : 321.

Fondée sur le poisson figuré in 1817, pl. 22 fig. 2 sous le nom de *Gallus alexandrinus*.

= *Alectis alexandrinus* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817).

ANNEXE II

EXEMPLAIRES HISTORIQUES

Cette liste comprend les poissons étudiés et cités par CUVIER et VALENCIENNES, mais appartenant à des espèces décrites auparavant.

Famille des CARANGIDAE

Genre **ARGYREYOSUS** Lacepède, 1802

Cette orthographe due à CUVIER est une émendation de l'orthographe originale *Argyreiosus*.

Argyreyosus vomer Lacepède : Cuvier, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 177, pl. 255.

= *Selene vomer* (Linnaeus, 1758).

- A. 6190. — Saint-Domingue, RICORD. 2 ex. alcool.
- A. 6191. — Saint-Domingue, RICORD. 1 ex. alcool.
- A. 5646. — Porto-Rico, PLÉE. 1 ex. sec.
- A. 5645. — Rio de Janeiro, A. SAINT-HILAIRE. 1 ex. sec.
- A. 6189. — New York, MILBERT. 1 ex. alcool.
- A. 5647. — Philadelphie, LESUEUR. 1 ex. sec.
- A. 6007. — Surinam, LEVAILLANT. 1 ex. alcool.
- A. 6196. — Surinam, LEVAILLANT. 2 ex. alcool.
- A. 5648. — Ancienne collection. 1 ex. sec.
- A. 6197. — Saint-Barthélémy, PLÉE, 1826. 1 ex. alcool.

Genre **CARANX** Lacepède, 1802

Caranx analis : Valenciennes, 1837, *in* WEBB et BERTHELOT, Ichth. Canaries, pl. XII et 1843, (pt. 2) : 57.

= *Pseudocaranx dentex* (Bloch et Schneider, 1801).

- A. 6250. — Canaries, WEBB et BERTHELOT. 1 ex. alcool.

Caranx armatus : Cuvier, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 127.

Pour *Citula armata* Rüppell.

= *Citula armata* RÜPPELL, 1830.

- A. 6146. — Mer Rouge, RÜPPELL. 1 ex. sec.
- A. 6179. — Mer Rouge, RÜPPELL. 1 ex. alcool.

Bien que l'exemplaire A. 6179 soit enregistré dans nos catalogues avec la mention « Type *Citula armata* Rüppell », en l'absence de documents (lettre ou note manuscrite de RÜPPELL ou CUVIER) établissant que ces exemplaires faisaient partie des syntypes de l'espèce de RÜPPELL, nous préférons les considérer seulement comme historiques, réservant la qualité de syntypes aux trois exemplaires déposés au Senckenberg Museum de Francfort sous le n° 1601.

Caranx carangus : Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 91.

Pour *Scomber carangus* Bloch.

= *Caranx hippos* (Linnaeus, 1758).

A. 5492. — Porto-Rico, PLÉE. 1 ex. sec.

A. 6131. — Porto-Rico, PLÉE. 1 ex. sec.

A. 6086. — Mers d'Amérique. 1 ex. alcool.

= *Caranx crysos* (Mitchill, 1815).

A. 6263. — Cayenne, DANIEL. 1 ex. alcool.

Caranx caeruleopinnatus Rüppell : Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 119.

= *Caranx melampygus* Cuvier, 1833.

5836. — Nouvelle-Guinée, QUOY et GAIMARD. 1 ex. alcool.

Caranx fusus Geoffroy Saint-Hilaire : Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 52.

= *Caranx crysos* (Mitchill, 1815).

A. 6117. — Égypte, LEFEBVRE. 1 ex. alcool.

Caranx malabaricus : Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 121.

Pour *Scomber malabaricus* Bloch.

= *Citula malabaricus* (Bloch et Schneider, 1801).

A. 6903. — Mer Rouge, RÜPPELL. 1 ex. sec.

A. 6121. — Pondichéry, LESCHENAULT. 1 ex. sec.

A. 5693. — Pondichéry, LESCHENAULT. 1 ex. sec.

Le type de l'espèce est déposé au Zoologische Museum de Berlin sous le numéro 8760.

Caranx mauritianus Quoy et Gaimard : Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 60.

Pour *Caranx macrophthalmus* Rüppell.

= *Selar crumenophthalmus* (Bloch, 1793).

A. 6213. — Bourbon, LESCHENAULT. 1 ex. alcool.

A. 537. — Ile de France, QUOY et GAIMARD. 1 ex. alcool.

A. 589. — Ile de France, DESJARDIN. 2 ex. alcool.

A. 6071. — Seychelles, DUSSUMIER. 3 ex. alcool.

A. 6072. — Seychelles, DUSSUMIER. 2 ex. alcool.

A. 6070. — Mer des Indes. Coll. BROUSSONNET. 1 ex. alcool, étiqueté *Scomber dimidiatus* par BROUSSONNET.

Caranx Plumieri : Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 65.

Pour *Scomber Plumieri* Bloch.

= *Selar crumenophthalmus* (Bloch, 1793).

A. 538. — Saint-Barthélémy, PLÉE. 2 ex. alcool.

Caranx rhonchus Geoff. : Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 35.

= *Caranx rhonchus* Geoffroy Saint-Hilaire, 1817.

A. 5975. — Alexandrie, EHRENBURG. 1 ex. alcool.

A. 5976. — Alexandrie, EHRENBURG. 1 ex. alcool.

(Ces exemplaires étiquetés *Caranx alexandrinus* par EHRENBURG.)

A. 5978. — Gorée, RANG. 1 ex. alcool.

Caranx Rotleri : Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 29.

Pour *Scomber Rotleri* Bloch et *Scomber cordyla* Lin. ?

= *Megalaspis cordyla* (Linnaeus, 1758).

A. 6143. — Coromandel, LESCHENAULT. 1 ex. sec.

A. 6018. — Pondichéry, LESCHENAULT. 1 ex. alcool.

A. 6017. — Bombay, DUSSUMIER, 1820. 1 ex. alcool.

A. 6106. — Malabar, DUSSUMIER. 2 ex. alcool.

6319. — Malabar, DUSSUMIER, 1827. 1 ex. alcool.

A. 6108. — Mer Rouge, RÜPPELL. 1 ex. alcool.

Caranx sexfasciatus Quoy et Gaimard : Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 110.

= *Caranx sexfasciatus* Quoy et Gaimard, 1824.

A. 6053. — Mer des Indes (Batavia ?). 1 ex. alcool.

A. 561. — Vanikolo, QUOY et GAIMARD. 1 ex. alcool.

Caranx speciosus : Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 130.

Pour *Scomber speciosus* Forsskål.

= *Gnathanodon speciosus* (Forsskål, 1775).

A. 6014. — Vanicolo, QUOY et GAIMARD. 1 ex. alcool.

A. 5979. — Trinquemale, RAYNAUD. 1 ex. alcool.

542. — Mer Rouge (Massuah), RÜPPELL. 1 ex. alcool.

A. 6012. — Nouvelle-Hollande, BUSSEUIL (Exp. Bougainville 1824-1826). 1 ex. alcool.

Caranx trachurus Lacepède : Cuvier, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 11, pl. 246.

Pour *Scomber trachurus* Linn. Bl.

= *Trachurus mediterraneus* (Steindachner, 1868).

A. 6009. — La Rochelle, D'ORBIGNY. 2 ex. alcool.

A. 6016. — La Rochelle, D'ORBIGNY. 1 ex. alcool.

A. 6005. — Messine, Sicile, BIBRON. 1 ex. alcool.

= *Trachurus trachurus* (Linnaeus, 1758).

A. 5981. — Messine, Sicile, BIBRON. 1 ex. alcool.

= *Trachurus picturatus* Bowdich, 1825.

A. 5994. — Ténériffe, D'ORBIGNY. 3 ex. alcool.

A. 6017. — Madère, KUHLE et VAN HASSELT. 1 ex. alcool.

A. 5999. — Iviça, DELAROCHE. 1 ex. alcool.

A. 5367. — Iviça, DELAROCHE. 1 ex. alcool.

= *Trachurus capensis* Castelnau, 1861.

A. 6034. — Le Cap, DELALANDE. 2 ex. alcool.

A. 6124. — Le Cap, DELALANDE. 1 ex. sec.

A. 6140. — Le Cap, DELALANDE. 1 ex. sec.

= *Trachurus novaezelandiae* Richardson, 1843.

A. 5998. — Baie des Chiens Marins (Nouvelle-Hollande), QUOY et GAIMARD. 2 ex. alcool.

5737. — Amboine, LESSON et GARNOT. 1 ex. alcool.

= *Trachurus murphyi* Nichols, 1920.

A. 6535. — Valparaiso, D'ORBIGNY. 2 ex. alcool.

Carangue jaune : Cuvier, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 98.

Pour *Scomber chrysos* Mitchill = *Scomber hippos* Linn.

= *Caranx hippos* (Linnaeus, 1758).

A. 6088. — New York, MILBERT. 1 ex. alcool.

A. 6089. — New York, MILBERT. 3 ex. alcool.

Genre **CHORINEMUS** Cuvier, 1832

Chorinemus aculeatus : Cuvier, 1832, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 384.

Pour *Scomber aculeatus* Bloch.

= *Scomberoides lysan* (Forsskål, 1775).

A. 5317. — Pondichéry, LESCHENAULT. 1 ex. alcool.

A. 6746. — Isle de France, DESJARDINS. 2 ex. alcool.

Chorinemus commersonianus : Cuvier, 1832, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 370.

Pour *Scomberoides commersonnianus* Lacepède.

= *Scomberoides commersonnianus* Lacepède, 1801.

A. 6135. — Pondichéry, LESCHENAULT. 1 ex. sec.

A. 6137. — Pondichéry, LESCHENAULT. 1 ex. sec.

A. 6138. — Pondichéry, LESCHENAULT. 1 ex. sec.

Chorinème sauteur : Cuvier, 1832, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 389.

Pour *Scomber saliens* Bl. = *Scomberoides saltator* Lac.

= *Oligoplites palometa* (Cuvier, 1832).

A. 6654. — Brésil, DELALANDE. 1 ex. alcool.

A. 6132. — Brésil, DELALANDE. 1 ex. sec.

Genre **LICHIA** Cuvier, 1817

Lichia amia : Cuvier, 1832, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 348.

Pour *Scomber amia* Linn.

= *Hypacanthus amia* (Linnaeus, 1758).

A. 5612. — Le Cap, VERREAUX. 1 ex. sec.

A. 804. — Le Cap, DELALANDE. 1 ex. sec.

A. 6811. — Gorée, RANG. 1 ex. alcool.

A. 6810. — Gorée, RANG. 1 ex. alcool.

A. 6715. — Embouchure du Sénégal, JUBELIN. 2 ex. alcool.

A. 6698. — Naples, SAVIGNY. 1 ex. alcool.

A. 6699. — Naples, SAVIGNY. 1 ex. alcool.

A. 6803. — Naples, SAVIGNY. 3 ex. alcool.

A. 6807. — Naples, SAVIGNY. 3 ex. alcool.

A. 6800. — Naples, SAVIGNY. 2 ex. alcool.

Lichia glaucus : Cuvier, 1832, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 358, pl. 234.

Pour *Scomber glaucus* Linn.

= *Trachinotus ovatus* (Linnaeus, 1758).

A. 6783. — Naples, SAVIGNY. 1 ex. alcool.

A. 6782. — Naples, SAVIGNY. 2 ex. alcool.

A. 6747. — Naples, SAVIGNY. 2 ex. alcool.

A. 6788. — Morée, BORY SAINT-VINCENT. 1 ex. alcool.

A. 5995. — Côtes d'Égypte, GEOFFROY SAINT-HILAIRE — 1 ex. alcool.

A. 6780. — Côtes d'Égypte, LEFEBVRE. 1 ex. alcool.

A. 6779. — Algesiras, Voy. Astrolabe. 2 ex. alcool.

A. 6791. — Madère, CUVIER. 2 ex. alcool.

- A. 6792. — Ténériffe, D'ORBIGNY. 2 ex. alcool.
A. 6784. — Gorée, RANG. 2 ex. alcool.
A. 6774. — Gorée, RANG. 1 ex. alcool.
A. 6770. — Gorée, RANG. 1 ex. alcool.
A. 6658. — Sainte-Hélène, DUSSUMIER. 1 ex. alcool.
A. 6659. — Sainte-Hélène, DUSSUMIER. 1 ex. alcool.
A. 6781. — Le Cap, QUOY et GAIMARD. 2 ex. alcool.
A. 6122. — Le Cap, DELALANDE. 1 ex. sec.
A. 5662. — Ancienne collection. 1 ex. sec.
A. 5507. — Ancienne collection. 1 ex. sec.

CUVIER mentionne également un exemplaire rapporté du Brésil par DELALANDE. Cet exemplaire A. 5509 est effectivement un *Trachinotus ovatus*. Or, cette espèce étant inconnue du Brésil, il y a tout lieu de penser que la localité indiquée par CUVIER est erronée.

Lichia glaucus : Valenciennes, 1838, in WEBB et BERTHELOT, Hist. Nat. Canaries, pl. 13, fig. 1, et 1843, 2 (pt. 2) : 56.

= *Trachinotus ovatus* (Linnaeus, 1758).

A. 6148. — Canaries, WEBB et BERTHELOT. 1 ex. sec.

Lichia vadigo : Cuvier, 1832, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 363, pl. 235.

Pour *Centronotus vadigo* Risso.

= *Campogramma glaycos* (Lacepède, 1801).

A. 6859. — Nice, LAURILLARD. 1 ex. alcool.

83-845. — Nice, LAURILLARD. 1 ex. sec.

Genre **NAUCRATES** Rafinesque, 1810

Naucrates ductor : Cuvier, 1832, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 312, pl. 232.

Pour *Scomber ductor* Linn.

= *Naucrates ductor* (Linnaeus, 1758).

A. 5686. — Ancienne collection. 1 ex. sec.

A. 5392. — Naples, SAVIGNY. 2 ex. alcool.

A. 5393. — Naples, SAVIGNY. 1 ex. alcool.

Genre **SCYRIS** Cuvier, 1829

Scyris alexandrina : Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 152.

Identifiée au Gal d'Alexandrie *Gallus alexandrinus* Geoffroy Saint-Hilaire, 1817, pl. 22 fig. 2.

= *Alectis alexandrinus* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817).

A. 6846. — Alexandrie, EHRENBURG. 1 ex. alcool.

A. 6845. — Gorée, RANG. 1 ex. alcool.

Scyris indica : Cuvier, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 145, pl. 252.

Cette espèce ayant été décrite par RÜPPELL en 1828, nous ne pouvons pas considérer les exemplaires de CUVIER comme types bien que CUVIER semble ignorer la description de RÜPPELL.

= *Alectis indicus* (Rüppell, 1828).

A. 6856. — Java, KUHLE et VAN HASSELT. 1 ex. alcool.

A. 5694. — Pondichéry, LESCHENAULT. 1 ex. sec.

Genre **SERIOLA** Cuvier, 1816

Seriola cosmopolita : Cuvier, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 219, pl. 259.

Pour *Scomber chloris* Bloch.

= *Chloroscombrus chrysurus* (Linnaeus, 1766).

6410. — Saint-Domingue, RICORD. 1 ex. alcool.

A. 6623. — Saint-Domingue, RICORD. 3 ex. alcool.

A. 6624. — Saint-Domingue, RICORD. 2 ex. alcool.

A. 6627. — Gorée, RANG. 1 ex. alcool.

A. 6625. — Pondichéry, LESCHENAULT. 1 ex. alcool.

A. 6628. — La Martinique, ACHARD. 1 ex. alcool.

Seriola Dumerilii : Cuvier, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 201.

Pour *Caranx Dumeril* Risso.

= *Seriola dumerili* (Risso, 1810).

A. 5688. — Naples, SAVIGNY. 1 ex. sec.

A. 6833. — Sicile, BIBRON. 1 ex. alcool.

A. 6636. — Morée, BORY SAINT-VINCENT. 1 ex. alcool.

A. 6638. — Nice, LAURILLARD. 2 ex. alcool.

Seriola fasciata : Cuvier, 1833, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 211.

Pour *Scomber fasciatus* Bloch.

= *Seriola fasciata* (Bloch, 1797).

A. 6644. — Caroline, Bosc. 1 ex. alcool.

Genre **TRACHINOTUS** Lacepède, 1801

Trachinotus glaucus : Cuvier, 1832, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 406.

Pour *Chaetodon glaucus* Bloch.

= *Trachinotus goodei* Jordan et Evermann, 1896.

A. 6693. — Martinique, PLÉE. 1 ex. alcool.

A. 6695. — Martinique, PLÉE. 1 ex. alcool.

A. 5560. — Brésil, DELALANDE. 1 ex. sec.

Trachinotus quadripunctatus : Cuvier, 1832, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 434.

Pour *Caesiomorus quadripunctatus* Rüppell.

= *Trachinotus bailloni* (Lacepède, 1801).

A. 6818. — Se(y)chelles, DUSSUMIER. 2 ex. alcool.

Trachinotus rhomboides : Cuvier, 1832, *in* CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 407.

Pour *Chaetodon rhomboides* Bloch.

= *Trachinotus falcatus* (Linnaeus, 1758).

A. 797. — Porto-Rico, PLÉE. 1 ex. sec.

ANNEXE III

NOMS SUBSTITUÉS

Cette liste comprend des noms nouveaux attribués par LACEPÈDE, RISSO, CUVIER, VALENCIENNES et CASTELNAU à des espèces décrites antérieurement et dont ils citent les noms. A ces noms substitués ne correspond aucune espèce nouvelle pour la Science. Lorsqu'il existe des exemplaires ayant servi à établir ces noms nouveaux, ils sont types du taxon nominal substitué.

Famille des CARANGIDAE

Genre **CARANX** Lacepède, 1801

Caranx erithrurus Lacepède, 1801, Hist. Nat. Poiss., III : 68.

Pour *Scomber hippos* Linn. ed. Gmel.

= *Caranx hippos* (Linnaeus, 1758).

Caranx Blochii Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 69

Pour *Scomber ruber* Bloch.

= *Citula ruber* (Bloch, 1793).

Voir p. 9.

Genre **CENTRONOTUS** Lacepède, 1801 (non Bloch et Schneider, 1801)

Centronotus argenteus Lacepède, 1801, Hist. Nat. Poiss., III : 316.

Pour *Gasterosteus occidentalis* Linn. ed. Gmel.

= *Oligoplites saurus* (Bloch et Schneider, 1801).

Genre **CHORINEMUS** Cuvier, 1832

Chorinemus saltans Cuvier, 1832, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., VIII : 393.

Pour *Gasterosteus occidentalis* Linn.

= *Oligoplites saurus* (Bloch et Schneider, 1801).

Voir p. 21.

Genre **LICHIA** Cuvier, 1816

Lichia Pappi Castelnau, 1861, Poiss. Afr. Austr. : 40.

Pour *Scomber capensis* Pappe.

= *Seriola lalandi* Valenciennes, 1833.

Genre **GALLUS** Lacepède, 1802

Gallus virescens Lacepède, 1802, Hist. Nat. Poiss., IV : 583.

Pour *Zeus gallus* Linn. ed. Gmel.

Genre **OLISTUS** Cuvier, 1829

Olistus ? Ruppelii Cuvier, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 144.

Pour *Citula ciliaria* Rüppell, Atl. Zool. : 102, pl. 25, fig. 8.

= *Citula armata* Rüppell, 1830.

Genre **SCOMBER** Linnaeus, 1758

Scomber guara Lacepède, 1800, Hist. Nat. Poiss., II : 603.

Pour *Scomber cordyla* Linn. ed. Gmel.

= *Megalapsis cordyla* (Linnaeus, 1758).

Genre **SERIOLA** Cuvier, 1816

Seriola Rafinesquii Risso, 1826, Hist. Nat. Eur. mérid. : 425.

Pour *Trachurus aguilus* Rafinesque.

Seriola Ruppelii Valenciennes, 1833, in CUV. VAL., Hist. Nat. Poiss., IX : 216.

Pour *Nomeus nigrofasciatus* Rüppell, 1828 : 82, pl. 24, fig. 1.

= *Seriolina nigrofasciata* (Rüppell, 1828).

ANNEXE IV

Espèce nouvelle décrite sous un nom de genre de la famille des Carangidae et n'appartenant pas à cette famille.

Genre **LEPIDOMEGAS** Thominot, 1880

THOMINOT, 1880, *Bull. Soc. Philomath. Paris*, 7^e sér., 4 : 173.

Espèce-type : *Lepidomegas muelleri* Thominot, 1880. Mis en synonymie par de nombreux auteurs avec *Seriola* Cuvier, 1816. Est en fait synonyme d'*Arripis* Jenyns, 1842, de la famille des Arripiidae.

Lepidomegas Mulleri Thominot, 1880, *Bull. Soc. Philomath. Paris*, 7^e sér., 4 : 173.

= *Arripis trutta* [Forster] Bloch et Schneider, 1801.

1116. — Syntype. Melbourne. MUELLER. 1 ex. alcool. L.S. : 292 mm ; L.F. : 314 mm ; L.T. : 350 mm.

1432. — Syntype. Melbourne. MUELLER. 1 ex. alcool. L.S. : 331 mm ; L.F. : 347 mm ; L.T. : 396 mm.

Le troisième exemplaire mentionné, rapporté par FILHOL de la Nouvelle-Zélande, n'a pas été retrouvé.

ANNEXE V

Cette liste comprend toutes les espèces nominales de Carangidae et de Nematistiidae dont les types sont déposés au Muséum national d'Histoire naturelle, plus les espèces nominales de l'annexe I. Sont donnés, dans l'ordre : les noms scientifiques dans leur orthographe originale et par ordre alphabétique ; les noms du ou des auteurs (Cuvier et Valenciennes sont abrégés en C. et V.) ; la date de publication ; le statut actuel.

ESPÈCE NOMINALE	STATUT ACTUEL
1. <i>Naclerus abbreviatus</i> Valenciennes in C. & V., 1833.	<i>Naucrates ductor</i> (Linnaeus, 1758).
2. <i>Gallichthys aegyptiacus</i> [Ehrenberg] Cuvier in C. & V., 1833.	<i>Alectis alexandrinus</i> (G. Saint-Hilaire, 1817).
3. <i>Trachinotus affinis</i> Cuvier in C. & V., 1832.	<i>Trachinotus mookalee</i> Cuvier, 1832.
4. <i>Gallus alexandrinus</i> G. Saint-Hilaire, 1817.	<i>Alectis alexandrinus</i> (G. Saint-Hilaire, 1817).
5. <i>Vomer alexandrinus</i> G. Saint-Hilaire, 1827.	<i>Alectis alexandrinus</i> (G. Saint-Hilaire, 1817).
6. <i>Caranx amblyrhynchus</i> Cuvier in C. & V., 1833.	<i>Hemicaranx amblyrhynchus</i> (Cuvier, 1833).
7. <i>Irex americanus</i> Valenciennes, 1862.	<i>Elagatis bipinnulata</i> (Quoy et Gaimard, 1824).
8. <i>Caranx analis</i> Cuvier in C. & V., 1833.	<i>Pseudocaranx dentex</i> (Bloch et Schneider, 1801).
9. <i>Naclerus annularis</i> Valenciennes in C. & V., 1833.	<i>Naucrates ductor</i> (Linnaeus, 1758).
10. <i>Selene argentea</i> Lacepède, 1801.	<i>Selene vomer</i> (Linnaeus, 1758).
11. <i>Porthmeus argenteus</i> Valenciennes in C. & V., 1833.	<i>Hypacanthus amia</i> (Linnaeus, 1758).
12. <i>Trachinotus argenteus</i> Cuvier in C. & V., 1832.	<i>Trachinotus carolinus</i> (Linnaeus, 1766).
13. <i>Caranx auroguttatus</i> [Ehrenberg] Cuvier in C. & V., 1833.	<i>Citula bajad</i> (Forsskål, 1775).
14. <i>Caesiomorus Baillonii</i> Lacepède, 1801.	<i>Trachinotus bailloni</i> (Lacepède, 1801).
15. <i>Citula Bancksii</i> Risso, 1820.	<i>Pseudocaranx dentex</i> (Bloch et Schneider, 1801).
16. <i>Caranx Bartholomaei</i> Cuvier in C. & V., 1833.	<i>Citula bartholomaei</i> (Cuvier, 1833).
17. <i>Caranx Belengerii</i> Cuvier in C. & V., 1833.	<i>Caranx sexfasciatus</i> Quoy et Gaimard, 1824.
18. <i>Seriola binotata</i> Valenciennes in C. & V., 1833.	<i>Seriolina nigrofasciata</i> (Rüppell, 1829).
19. <i>Seriola bipinnulata</i> Quoy et Gaimard, 1824.	<i>Elagatis bipinnulata</i> (Quoy et Gaimard, 1824).
20. <i>Caesiomorus Blochii</i> Lacepède, 1802.	<i>Trachinotus blochi</i> (Lacepède, 1801).
21. <i>Caranx Blochii</i> Cuvier in C. & V., 1833.	<i>Citula ruber</i> (Bloch, 1793).
22. <i>Seriola Bonariensis</i> Valenciennes in C. & V., 1833.	<i>Seriola rivoliana</i> Valenciennes, 1833.
23. <i>Caranx boops</i> Cuvier in C. & V., 1833.	<i>Selar boops</i> (Cuvier, 1833).
24. <i>Seriola Boscii</i> Valenciennes in C. & V., 1833.	<i>Seriola dumerili</i> (Risso, 1810).
25. <i>Naclerus brachycentrus</i> Valenciennes in C. & V., 1833.	<i>Naucrates ductor</i> (Linnaeus, 1758).
26. <i>Vomer Brasilensis</i> Guichenot, 1866.	<i>Selene setapinnis</i> (Mitchill, 1815).
27. <i>Vomer Brownii</i> Cuvier in C. & V., 1833.	<i>Selene browni</i> Agassiz, 1831.
28. <i>Uraspis cadenati</i> Blache et Rossignol, 1961.	<i>Uraspis secunda</i> (Poey, 1860).
29. <i>Caranx cambon</i> Cuvier in C. & V., 1833.	<i>Alepes para</i> (Cuvier, 1833).

30. *Seriolophus carangoides* Guichenot, 1867.
31. *Seriola carpenteri* Mather, 1971.
32. *Trachinotus cayennensis* Cuvier in C. & V., 1832.
33. *Vomer Cayennensis* Guichenot, 1866.
34. *Gallichthys chevola* Cuvier in C. & V., 1833.
35. *Caranx chilensis* Guichenot, 1848.
36. *Caranx chrysophrys* Cuvier in C. & V., 1833.
37. *Caranx ciliaris* Cuvier in C. & V., 1833.
38. *Caranx citula* Cuvier in C. & V., 1833.
39. *Vomer Columbiensis* Guichenot, 1866.
40. *Scomberoides commersonnianus* Lacepède, 1801.
41. *Nauclerus compressus* Valenciennes in C. & V., 1833.
42. *Vomer Cubae* Guichenot, 1866.
43. *Trachinotus cupreus* Cuvier in C. & V., 1832.
44. *Caranx Daubentonii* Lacepède, 1801.
45. *Vomer Dominicensis* Guichenot, 1866.
46. *Trachinotus drepanis* Cuvier in C. & V., 1832.
47. *Caranx Dumerili* Risso, 1810.
48. *Seriola Dussumieri* Valenciennes in C. & V., 1833.
49. *Caranx ekala* Cuvier in C. & V., 1833.
50. *Chorinemus exoletus* [Ehrenberg] Cuvier in C. & V., 1832.
51. *Seriola falcata* Valenciennes in C. & V., 1833.
52. *Trachinotus falciger* Cuvier in C. & V., 1832.
53. *Caranx fallax* Cuvier in C. & V., 1833.
54. *Chorinemus Farkharii* Cuvier in C. & V., 1832.
55. *Caranx fasciatus* Cuvier in C. & V., 1833.
56. *Caranx Fosteri* Cuvier in C. & V., 1833.
57. *Trachinotus fuscus* Cuvier in C. & V., 1832.
58. *Caranx fusus* G. Saint-Hilaire, 1817.
59. *Vomer Gabonensis* Guichenot, 1866.
60. *Caranx georgianus* Cuvier, in C. & V., 1833.
61. *Caranx gervaisi* Castelnau, 1875.
62. *Hynnys goreensis* Cuvier in C. & V., 1833.
63. *Trachinotus goreensis* Cuvier in C. & V., 1832.
64. *Vomer Goreensis* Guichenot, 1866.
65. *Seriola grandis* Castelnau, 1872.
66. *Chorinemus guaribira* Cuvier in C. & V., 1832.
67. *Caranx gymnostethus* Cuvier in C. & V., 1833.
68. *Blepharis indicus* Cuvier in C. & V., 1833.
69. *Irex indicus* Valenciennes, 1862.
70. *Naucrates indicus* Lesson, 1830.
- Nematistius pectoralis* Gill, 1862.
- Seriola carpenteri* Mather, 1971.
- Trachinotus cayennensis* Cuvier, 1832.
- Selene setapinnis* (Mitchill, 1815).
- Alectis indicus* (Rüppell, 1830).
- Pseudocaranx chilensis* (Guichenot, 1848).
- Citula chrysophrys* (Cuvier, 1833).
- nomen dubium*
- Citula armata* (Rüppell, 1830).
- Selene browni* Agassiz, 1831.
- Scomberoides commersonnianus* Lacepède, 1801.
- Naucrates ductor* (Linnaeus, 1758).
- Selene browni* Agassiz, 1831.
- Trachinotus carolinus* (Linnaeus, 1758).
- Selar crumenophthalmus* (Bloch, 1793).
- Selene browni* Agassiz, 1831.
- Trachinotus blochi* (Lacepède, 1801).
- Seriola dumerili* (Risso, 1810).
- Naucrates ductor* (Linnaeus, 1758).
- Caranx ignobilis* (Forsskål, 1775).
- Scomberoides commersonnianus* Lacepède, 1801.
- Seriola rivoliana* Valenciennes, 1833.
- Trachinotus blochi* (Lacepède, 1801).
- Caranx latus* Agassiz, 1831.
- nomen dubium*.
- nomen dubium*.
- Caranx sexfasciatus* Quoy et Gaimard, 1824.
- Trachinotus falcatus* (Linnaeus, 1758).
- Caranx crysos* (Mitchill, 1815).
- Selene dorsalis* (Gill, 1862).
- Pseudocaranx dentex* (Bloch et Schneider, 1801).
- Selar boops* (Cuvier, 1833).
- Alectis alexandrinus* (G. Saint-Hilaire, 1817).
- Trachinotus goreensis* Cuvier, 1832.
- Selene dorsalis* (Gill, 1862).
- Seriola lalandi* Valenciennes, 1833.
- Oligoplites palometa* (Cuvier, 1832).
- Citula gymnostethus* (Cuvier, 1833).
- Alectis ciliaris* (Bloch, 1788).
- Elagatis bipinnulata* (Quoy et Gaimard, 1824).
- Naucrates ductor* (Linnaeus, 1758).

71. *Caranx ire* Cuvier in C. & V., 1833.
 72. *Caranx Jacobeus* Cuvier in C. & V., 1833.
 73. *Caranx jarra* Cuvier in C. & V., 1833.
 74. *Caranx kalla* Cuvier in C. & V., 1833.
 75. *Caranx kiliche* Cuvier in C. & V., 1833.
 76. *Caranx kurra* Cuvier in C. & V., 1833.
 77. *Seriola lalandi* Valenciennes in C. & V., 1833.
 78. *Seriola leiarchus* Valenciennes in C. & V., 1833.
 79. *Caranx leptolepis* [Kuhl et Van Hasselt] Cuvier in C. & V., 1833.
 80. *Caranx Lessoni* Cuvier in Lesson, 1830.
 81. *Naucratus leucurus* Valenciennes in C. & V., 1833.
 82. *Caranx luna* G. Saint-Hilaire, 1817.
 83. *Caranx macarellus* Cuvier in C. & V., 1833.
 84. *Gallichthys major* Cuvier in C. & V., 1833.
 85. *Olistus malabaricus* Cuvier in C. & V., 1833.
 86. *Trachinotus marginatus* Cuvier in C. & V., 1832.
 87. *Vomer Martinicensis* Guichenot, 1866.
 88. *Caranx mate* Cuvier in C. & V., 1833.
 89. *Caranx mauritanus* Quoy et Gaimard, 1824.
 90. *Chorinemus mauritanus* Cuvier in C. & V., 1832.
 91. *Trachinotus maxillosus* Cuvier in C. & V., 1832.
 92. *Caranx melampygus* Cuvier in C. & V., 1833.
 93. *Caranx mentalis* [Ehrenberg] Cuvier in C. & V., 1833.
 94. *Caranx Mertensi* Cuvier in C. & V., 1833.
 95. *Caranx microchir* Cuvier in C. & V., 1833.
 96. *Chorinemus moadetta* [Ehrenberg] Cuvier in C. & V., 1832.
 97. *Trachinotus mookalee* Cuvier in C. & V., 1832.
 98. *Trachinotus myrias* Cuvier in C. & V., 1832.
 99. *Caranx nigripes* Cuvier in C. & V., 1833.
 100. *Decapterus normani* Bertin et Dollfus, 1948.
 101. *Naucratus novaboracensis* Cuvier in C. & V., 1832.
 102. *Vomer Novae-Boracensis* Guichenot, 1866.
 103. *Caranx Novae Guineae* Cuvier in C. & V., 1833.
 104. *Trachurus novae zelandiae* Richardson, 1843.
 105. *Caranx oblongus* Cuvier in C. & V., 1833.
- Citula praeustus* (Bennett, 1830).
Decapterus macarellus (Cuvier, 1833).
nomen dubium.
Alepes djedaba (Forsskål, 1775).
Decapterus kiliche Cuvier, 1833.
nomen dubium.
Seriola lalandi Valenciennes, 1833.
Seriola zonata (Mitchill, 1815).
Selaroides leptolepis ([Kuhl et Van Hasselt] Cuvier, 1833).
Caranx ignobilis (Forsskål, 1775).
Naucratus ductor (Linnaeus, 1758).
Pseudocaranx dentex (Bloch et Schneider, 1801).
Decapterus macarellus (Cuvier, 1833).
Alectis indicus (Rüppell, 1830).
Citula hedlandensis (Whitley, 1934).
Trachinotus marginatus Cuvier, 1832.
Selene browni Agassiz, 1831.
Alepes mate (Cuvier, 1833).
Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793).
Scomberoides lysan (Forsskål, 1775).
Trachinotus maxillosus Cuvier, 1832.
Caranx melampygus Cuvier, 1833.
Ulua mentalis (Cuvier, 1833).
Selaroides leptolepis ([Kuhl et Van Hasselt] Cuvier, 1833).
Alepes para (Cuvier, 1833).
Scomberoides lysan (Forsskål, 1775).
Trachinotus mookalee Cuvier, 1832.
Trachinotus goreensis Cuvier, 1832.
Atropus atropus (Bloch et Schneider, 1801).
Alepes mate (Cuvier, 1833).
Naucratus ductor (Linnaeus, 1758).
Selene setapinnis (Mitchill, 1815).
Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793).
Trachurus novaezelandiae Richardson, 1843.
Citula oblongus (Cuvier, 1833).

106. *Trachinotus oblongus* Cuvier in C. & V., 1832. *Trachinotus bailloni* (Lacepède, 1801).
107. *Trachinotus paitensis* Cuvier in C. & V., 1832. *Trachinotus paitensis* Cuvier, 1832.
108. *Chorinemus palometa* Cuvier in C. & V., 1832. *Oligoplites palometa* Cuvier, 1832.
109. *Trachinotus pampanus* Cuvier in C. & V., 1832. *Trachinotus carolinus* (Linnaeus, 1758).
110. *Caranx para* Cuvier in C. & V., 1833. *Alepes para* (Cuvier, 1833).
111. *Caranx Peronii* Cuvier in C. & V., 1833. *Caranx sexfasciatus* Quoy et Gaimard, 1824.
112. *Vomer Peruvianus* Guichenot, 1866. *Selene peruvianus* (Guichenot, 1866).
113. *Caranx pinnulatus* Eydoux et Souleyet, 1841. *Decapterus macarellus* (Cuvier, 1833).
114. *Caranx pisquetus* Cuvier in C. & V., 1833. *Caranx crysos* (Mitchill, 1815).
115. *Caranx platessa* Cuvier in C. & V., 1833. *Pseudocaranx dentex* (Bloch et Schneider, 1801).
116. *Citula plumbea* Quoy et Gaimard, 1824. *nomen dubium.*
117. *Caranx petaurista* G. Saint-Hilaire, 1817. *Gnathanodon speciosus* (Forsskål, 1775).
118. *Caranx punctatus* Cuvier in C. & V., 1833. *Decapterus punctatus* (Cuvier, 1829).
119. *Selene quadrangularis* Lacepède, 1802. *nomen dubium.*
120. *Chorinemus quiebra* Cuvier in C. & V., 1832. *Oligoplites saurus* (Bloch et Schneider, 1801).
121. *Lichia quiebra* Quoy et Gaimard, 1824. *Oligoplites saurus* (Bloch et Schneider, 1801).
122. *Caranx rhonchus* G. Saint-Hilaire, 1817. *Caranx rhonchus* (G. Saint-Hilaire, 1817).
123. *Seriola Rivoliana* Valenciennes in C. & V., 1833. *Seriola rivoliana* Valenciennes, 1833.
124. *Olistus Ruppelii* Cuvier in C. & V., 1833. *nomen dubium.*
125. *Caranx Russelli* Rüppell, 1830. *nomen dubium.*
126. *Trachinotus Russelii* Cuvier in C. & V., 1832. *Trachinotus botla* (Shaw, 1803).
127. *Chorinemus saltans* Cuvier in C. & V., 1832. *Oligoplites saurus* (Bloch et Schneider, 1801).
128. *Scomberoides saltator* Lacepède, 1801. *Oligoplites saliens* (Bloch, 1793).
129. *Caranx Sanctae Helenae* Cuvier in C. & V., 1833. *Decapterus sanctaehelenae* (Cuvier, 1833).
130. *Vomer Sanctae-Marthae* Guichenot, 1866. *Selene browni* Agassiz, 1831.
131. *Chorinemus Sanctae-Petri* Cuvier in C. & V., 1832. *Scomberoides lysan* (Forsskål, 1775).
132. *Vomer Sanctae-Petri* Guichenot, 1866. *Selene browni* Agassiz, 1831.
133. *Caranx scombrinus* Valenciennes, 1855. *Decapterus scombrinus* (Valenciennes, 1855).
134. *Caranx sem* Cuvier in C. & V., 1833. *Caranx sem* Cuvier, 1833.
135. *Vomer Senegalensis* Guichenot, 1836. *Selene dorsalis* (Gill, 1862).
136. *Caranx senegallus* Cuvier in C. & V., 1833. *Caranx senegallus* Cuvier, 1833.
137. *Caranx sexfasciatus* Quoy et Gaimard, 1824. *Caranx sexfasciatus* Quoy et Gaimard, 1824.
138. *Caranx solea* Cuvier in C. & V., 1833. *Pseudocaranx dentex* (Bloch et Schneider, 1801).
139. *Caranx stellatus* Eydoux et Souleyet, 1841. *Caranx melampygus* Cuvier, 1833.
140. *Caranx suareus* Risso in C. & V., 1833. *Trachurus picturatus* (Bowdich, 1825).
141. *Seriola succinta* Valenciennes in C. & V., 1833. *Naucrates ductor* (Linnaeus, 1758).
142. *Blepharis sutor* Cuvier in C. & V., 1833. *Alectis ciliaris* (Bloch, 1788).
143. *Decapterus tabl* Berry, 1968. *Decapterus tabl* Berry, 1968.
144. *Chorinemus tala* Cuvier in C. & V., 1832. *Scomberoides tala* (Cuvier, 1832).
145. *Trachinotus teraia* Cuvier in C. & V., 1832. *Trachinotus teraia* Cuvier, 1832.
146. *Trachinotus teraiodes* Guichenot in Duméril, 1860. *Trachinotus maxillosus* Cuvier, 1832.
147. *Caranx tille* Cuvier in C. & V., 1833. *Caranx tille* Cuvier, 1833.

148. *Chorinemus tol* Cuvier in C. & V., 1832. *Scomberoides tol* (Cuvier, 1832).
149. *Chorinemus tolo* Cuvier in C. & V., 1832. *Scomberoides ? tala* (Cuvier, 1832).
150. *Trachurus trecae* Cadenat, 1949. *Trachurus trecae* Cadenat, 1949.
151. *Naclerus triacanthus* Valenciennes in C. & V., 1833. *Naucrates ductor* (Linnaeus, 1758).
152. *Caranx valenciennesi* Castelnau, 1873. *Caranx melampygus* Cuvier, 1833.
153. *Caranx vari* Cuvier in C. & V., 1833. *Alepes vari* (Cuvier, 1833).
154. *Caranx xanthopygus* Cuvier in C. & V., 1833. *nomen dubium*.
155. *Caranx xanthurus* [Kuhl et Van Hasselt] Cuvier in C. & V., 1833. *Alepes mate* (Cuvier, 1833).

INDEX

Les espèces nominales de l'annexe V (p. 53-57) n'ont pas été indexées ci-dessous.

- abreviatus (Nauclerus), 23.
aculeatus (Chorinemus), 45.
(Scomber), 45.
aegyptiacus (Gallichthys), 22.
affinis (Caranx), 4.
(Trachinotus), 27.
aguilus (Trachurus), 51.
albacora (Lichia), 40.
Alectis, 4.
Alectis alexandrinus, 23, 39, 41, 47.
 ciliaris, 8.
 indicus, 23, 39, 48.
Alepes, 3, 4, 16.
Alepes djedaba, 4, 12.
 kalla, 16.
 mate, 14, 19, 22.
 melanoptera, 4.
 para, 9, 15.
 vari, 4, 20.
alexandrina (Scyris), 47.
alexandrinus (Alectis), 23, 39, 41, 47.
 (Caranx), 45.
 (Gallus), 5, 6, 39, 47.
 (Vomer), 39, 41.
altus (Oligoplites), 40.
amblyrhynchus (Caranx), 8.
 (Hemicaranx), 8.
americanus (Irex), 23.
amia (Hypacanthus), 25, 38, 46.
 (Lichia), 46.
 (Scomber), 5, 6, 46.
 analis (Caranx), 37, 42.
annularis (Nauclerus), 24.
argentea (Selene), 6, 41.
argenteus (Centronotus), 50.
 (Porthmeus), 6, 25.
 (Trachinotus), 28.
Argyreiosus, 4, 42.
Argyreosus vomer, 42.
armata (Citula), 2, 5, 10, 42, 51.
armatus (Caranx), 42.
Arripis trutta, 52.
Atropus, 4.
Atropus atropus, 15.
atropus (Atropus), 15.
 (Brama), 4.
Atule, 4.
Atule mate, 4.
auroguttatus (Caranx), 8.
baillonii (Caesiomorus), 4, 36.
bailloni (Trachinotus), 29, 36, 49.
bajad (Citula), 8.
 (Scomber), 8.
Bancksii (Citula), 39.
Bartholomaei (Caranx), 9.
bartholomaei (Citula), 3, 9.
Belengerii (Caranx), 9.
bicolor (Caranx), 5.
binotata (Seriola), 25.
bipinnulata (Elagatis), 5, 23, 26, 40.
 (Seriola), 5, 26.
Blepharis, 4, 8.
Blepharis indicus, 8.
 major, 8.
 sutor, 8.
blochii (Caesiomorus), 6, 36.
 (Caranx), 9, 50.
blochi (Trachinotus), 28, 36.
Bonariensis (Seriola), 26.
boops (Caranx), 6, 9.
 (Selar), 9, 37.
Boscii (Seriola), 26.
botla (Trachinotus), 30.
Brama atropus, 4.
brachycentrus (Nauclerus), 24.
Brasiliensis (Vomer), 31, 32.
browni (Selene), 31, 32, 33.
brownii (Vomer), 7, 31, 32, 33.
cadenati (Uraspis), 31.
caeruleopinnatus (Caranx), 43.
Caesiomorus, 4, 36.
Caesiomorus baillonii, 4, 36.
 blochii, 6, 36.
 quadripunctatus, 49.
cambon (Caranx), 9.
Campogramma (glaycos), 38, 47.
capensis (Scomber), 51.
 (Trachurus), 45.
Carangoides, 3, 4.
carangoides (Seriolophus), 6, 33.
 (Uraspis), 6.
carangus (Caranx), 43.

- (Scomber), 4, 43.
Caranx, 3, 4, 7, 8, 11, 17, 37, 42, 50.
Caranx affinis, 4.
alexandrinus, 45.
amblyrhynchus, 8.
 analis, 37, 42.
armatus, 42.
auroguttatus, 8.
Bartholomaei, 9.
Belengerii, 9.
bicolor, 5.
Blochii, 9, 50.
boops, 6, 9.
caeruleopinnatus, 43.
cambon, 9.
carangus, 43.
chilensis, 10.
chrysophrys, 10.
ciliaris, 10.
cirrhosus, 10.
citula, 5, 10.
crysos, 12, 16, 18, 43.
cynodon, 19.
Daubentonii, 36.
Dumerili, 6, 10, 48.
ekala, 11.
elacate, 19.
erithrurus, 50.
fallax, 11.
fasciatus, 36.
Forsteri, 11.
fusus, 12, 43.
georgianus, 12, 17.
gervaisi, 37.
gymnostethus, 12.
hippos, 43, 44, 50.
ire, 12.
ignobilis, 11, 14.
immaculatus, 9.
Jacobeus, 12.
jarra, 36.
kalla, 12, 13, 16.
kiliche, 13, 22, 37.
kurra, 5, 37.
latus, 11.
leptolepis, 6, 13.
Lessoni, 14.
luna, 14.
macarellus, 14.
macrophthalmus, 43.
malabaricus, 43.
mate, 4, 14.
mauritanus, 14, 43.
melampygus, 12, 15, 16, 19, 43.
mentalis, 6, 37.
Mertensi, 37.
microchir, 15.
nigripes, 15.
Novae-guineae, 15.
oblongus, 15.
para, 6, 13, 15.
parasitus, 6.
Peronii, 16.
petaurista, 16.
pinnulatus, 16.
pisquetus, 16.
platessa, 12, 17.
Plumieri, 36, 45.
praeustus, 4.
punctatus, 17.
rhonchus, 3, 17, 45.
Rotleri, 45.
russelli, 13, 22, 37.
Sanctae Helenae, 17.
scombrinus, 18.
sem, 18.
senegallus, 18.
sexfasciatus, 9, 11, 16, 18, 19, 44.
solea, 18.
speciosus, 16, 44.
stellatus, 19.
suareus, 6, 19.
tille, 19.
trachurus, 30, 44.
valenciennei, 19.
vari, 20.
williamsi, 18.
xanthopygus, 38.
xanthurus, 19.
carolinus (Trachinotus), 28, 29.
carpenteri (Seriola), 26.
cayennensis (Trachinotus), 28.
Cayennensis (Vomer), 32.
Centronotus, 38, 50.
Centronotus argenteus, 50.
 glaycos, 38.
 vadigo, 5, 38, 47.
Chaetodon glaucus, 49.
 rhomboides, 49.
chevola (Gallichthys), 39.
chilensis (Caranx), 10.
 (Pseudocaranx), 10.
chloris (Scomber), 48.
Chloroscombrus, chrysurus, 48.
Chorinemus, 5, 20, 38, 45.
Chorinemus aculeatus, 45.
 commersonianus, 40, 46.
 exoletus, 38.
 Farkharii, 38.
 guaribira, 20.

- mauritianus, 20.
 moadetta, 20.
 occidentalis, 5.
 palometa, 20.
 quiebra, 21.
 saltans, 21.
 Sanctae-Petri, 21.
 tala, 21, 22.
 tol, 21.
 toloo, 38, 39.
 chrysophrys (Caranx), 10.
 (Citula), 10.
 chrysos (Scomber), 45.
 chrysurus (Chloroscombrus), 48.
 ciliaria (Citula), 10, 51.
 ciliaris (Alectis), 8.
 (Caranx), 10.
 (Zeus), 4, 5.
 cirrhosus (Caranx), 10.
 Citula, 3, 5, 25, 39.
 Citula armata, 2, 5, 10, 42, 51.
 bajad, 8.
 Bancksii, 39.
 bartholomaei, 3, 9.
 chrysophrys, 10.
 ciliaria, 10, 51.
 gymnostethus, 12.
 hedlandensis, 10, 25.
 malabaricus, 43.
 oblongus, 15.
 plumbea, 39.
 praeustus, 12.
 ruber, 3, 9, 50.
 citula (Caranx), 5, 10.
 Columbiensis (Vomer), 32.
 commersonianus (Chorinemus), 40, 46.
 commersonianus (Scomberoides), 5, 6, 38, 40, 46.
 compressus (Nauclerus), 5, 25.
 conductor (Naucrates), 5.
 cordyla (Megalaspis), 44, 51.
 (Scomber), 44, 51.
 cosmopolita (Seriola), 48.
 crumenophthalmus (Selar), 9, 14, 15, 36, 43, 44.
 crysos (Caranx), 12, 16, 18, 43.
 Cubae (Vomer), 31, 32.
 cupreus (Trachinotus), 28.
 cynodon (Caranx), 19.
 Daubentonii (Caranx), 36.
 Decapterus, 3, 5, 13, 17, 22.
 Decapterus kiliche, 13.
 macarellus, 12, 13, 14, 16.
 macrosoma, 5.
 muroadsi, 13.
 normani, 22.
 punctatus, 17.
 russelli, 13.
 sanctaehelenae, 17.
 scombrinus, 18.
 tabl, 22.
 dentex (Pseudocaranx), 12, 14, 17, 37, 39, 42.
 (Scomber), 6, 17.
 djedaba (Alepes), 4, 12.
 (Scomber), 12.
 Dominicensis (Vomer), 31, 32.
 dorsalis (Selene), 32, 33.
 drepanis (Trachinotus), 28.
 ductor (Gasterosteus), 5.
 ductor (Naucrates), 23, 24, 25, 26, 27, 47.
 (Scomber), 47.
 Dumerili (Caranx), 10, 48.
 dumerili (Seriola), 6, 11, 26, 48.
 Dumerilii (Seriola), 10, 48.
 Dussumieri (Seriola), 26.
 ekala (Caranx), 11.
 elacate (Caranx), 19.
 Elagatis, 5.
 Elagatis bipinnulata, 5, 23, 26, 40.
 erithrurus (Caranx), 50.
 exoletus (Chorinemus), 38, 55.
 falcata (Seriola), 26, 27.
 falcatus (Labrus), 6.
 (Scomber), 6.
 (Trachinotus), 26, 49.
 faleiger (Trachinotus), 28.
 fallax (Caranx), 11.
 Farkharî (Chorinemus), 38.
 fasciata (Seriola), 48.
 fasciatus (Caranx), 36.
 (Scomber), 48.
 Forsteri (Caranx), 11.
 fulvoguttatus (Scomber), 8.
 fuscus (Trachinotus), 28.
 fusus (Caranx), 12, 43.
 Gabonensis (Vomer), 32.
 Gallichthys, 5, 22, 39.
 Gallichthys aegyptiacus, 23.
 chevola, 39.
 major, 5, 23.
 Gallus, 4, 5, 39, 51.
 Gallus alexandrinus, 5, 6, 39, 47.
 virescens, 5, 51.
 gallus (Zeus), 51.
 Gasterosteus ductor, 5.
 occidentalis, 5, 21, 50.
 georgianus (Caranx), 12, 17.

- gervaisi (Caranx), 37.
glaucus (Chaetodon), 49.
 (Lichia), 46, 47.
 (Scomber), 46.
 (Trachinotus), 49.
glaycos (Campogramma), 38, 47.
 (Centronotus), 38.
Gnathanodon, 5.
Gnathanodon speciosus, 16, 44.
goodei (Trachinotus), 49.
goreensis (Hynnis), 5, 23.
 (Trachinotus), 28, 29.
Goreensis (Vomer), 32.
grandis (Seriola), 27.
guara (Scomber), 51.
guaribira (Chorinemus), 20.
gymnostethus (Caranx), 12.
 (Citula), 12.

hedlandensis (Citula), 10, 25.
 (Olistus), 6.
Hemicaranx, 3, 5.
Hemicaranx amblyrhynchus, 8.
 marginatus, 5.
hippos (Caranx), 43, 45, 50.
hippos (Scomber), 4, 45, 50.
Hynnis, 5, 23, 39.
Hynnis goreensis, 5, 23.
 insanus, 39.
Hypacanthus, 5.
Hypacanthus amia, 25, 38, 46.

ignobilis (Caranx), 11, 14.
immaculatus (Caranx), 9.
indica (Scyris), 48.
indicus (Alectis), 23, 39, 48.
 (Blepharis), 8.
 (Irex), 5, 40.
 (Naucrates), 25.
 (Scyris), 5.
insanus (Hynnis), 39.
intermedia (Seriola), 6.
ire (Caranx), 12.
Irex, 5, 23, 40.
Irex americanus, 23.
 indicus, 5, 40.

Jacobeus (Caranx), 12.
japonicus (Trachurus), 31.
jarra (Caranx), 36.

kalla (Alepes), 16.
 (Caranx), 12, 13, 16.
kiliche (Caranx), 13, 22, 37.
 (Decapterus), 13.

kurra (Caranx), 5, 37.

Labrus falcatus, 6.
lalandi (Seriola), 27, 51.
latus (Caranx), 11.
leiarchus (Seriola), 27.
Lepidomegas, 52.
Lepidomegas muelleri, 52.
 Mulleri, 52.
leptolepis (Caranx), 6, 13.
 (Selaroides), 13, 37.
Lessonii (Caranx), 14.
leucurus (Nauclerus), 24.
Lichia, 5, 23, 40, 46, 51.
Lichia albacora, 40.
 amia, 46.
 glaucus, 46, 47.
 moadetta, 20.
 Pappei, 51.
 quiebra, 23.
 vadigo, 47.
luna (Caranx), 14.
lysan (Scomberoides), 20, 21, 40, 45.

macarellus (Caranx), 14.
 (Decapterus), 12, 13, 14, 16.
macculochi (Trachurus), 31.
macrophthalmus (Caranx), 43.
macrosoma (Decapterus), 5.
macrurus (Selar), 20.
major (Blepharis), 8.
major (Gallichthys), 5, 23.
malabaricus (Caranx), 43.
 (Citula), 43.
 (Olistus), 6, 25.
 (Scomber), 6, 25, 43.
marginatus (Hemicaranx), 5.
 (Trachinotus), 29.
Martinicensis (Vomer), 31, 33.
mate (Alepes), 14, 19, 22.
 (Atule), 4.
 (Caranx), 4, 14.
mauritanus (Caranx), 14, 43.
 (Chorinemus), 20.
maxillosus (Trachinotus), 29, 30.
mediterraneus (Trachurus), 45.
Megalaspis cordyla, 45, 51.
melampygus (Caranx), 12, 15, 16, 19, 43.
melanoptera (Alepes), 4.
mentalis (Caranx), 6, 37.
 (Ulua), 10, 37.
Mertensi (Caranx), 37.
microchir (Caranx), 15.
moadetta (Chorinemus), 20.
 (Lichia), 20.

- mookalee (*Trachinotus*), 27, 29.
muelleri (*Lepidomegas*), 52.
Mulleri (*Lepidomegas*), 52.
muroadsi (*Decapterus*), 13.
murphyi (*Trachurus*), 45.
myrias (*Trachinotus*), 29.
- Nauclerus, 5, 23.
Nauclerus abbreviatus, 24.
 annularis, 24.
 brachycentrus, 24.
 compressus, 5, 24.
 leucurus, 24.
 triacanthus, 24.
Naucrates, 5, 24, 47.
Naucrates conductor, 5.
 ductor, 24, 25, 26, 27, 47.
 indicus, 24.
 novaboracensis, 25.
Nematistius, 1, 5.
Nematistius pectoralis, 5, 6, 33.
nigripes (*Caranx*), 15.
nigrofasciata (*Nomeus*), 6, 51.
 (*Seriolina*), 25, 51.
Noelii (*Scomberoides*), 40.
Nomeus nigrofasciata, 6, 51.
normani (*Decapterus*), 22.
novaboracensis (*Naucrates*), 25.
Novae-Boracensis (*Vomer*), 33.
Novae guineae (*Caranx*), 15.
novae zelandiae (*Trachurus*), 30, 31, 45.
- oblongus (*Caranx*), 15.
 (*Citula*), 15.
 (*Trachinotus*), 29.
occidentalis (*Chorinemus*), 5.
 (*Gasterosteus*), 5, 21, 50.
Oligoplites, 5.
Oligoplites altus, 40.
 palometa, 20, 46.
 saliens, 20, 40.
 saurus, 21, 23, 50.
Olistus, 6, 25, 51.
Olistus hedlandensis, 6.
 malabaricus, 6, 25.
 Ruppelii, 51.
ovatus (*Trachinotus*), 46, 47.
- paitensis (*Trachinotus*), 29.
palometa (*Chorinemus*), 20.
 (*Oligoplites*), 20, 46.
pampanus (*Trachinotus*), 29.
Pantolabus, 6.
Pantolabus para, 4.
Pappei (*Lichia*), 51.
- para (*Alepes*), 9, 15.
 (*Caranx*), 6, 13, 15.
 (*Pantolabus*), 4.
parasitus (*Caranx*), 6.
pectoralis (*Nematistius*), 5, 6, 33.
peronii (*Caranx*), 16.
peruvianus (*Selene*), 32, 33.
Peruvianus (*Vomer*), 32, 33.
petaurista (*Caranx*), 16.
picturata (*Seriola*), 6.
picturatus (*Trachurus*), 19, 45.
pinnulatus (*Caranx*), 16.
pisquetus (*Caranx*), 16.
platessa (*Caranx*), 12, 17.
plumbea (*Citula*), 39.
Plumieri (*Caranx*), 36, 44.
Plumieri (*Scomber*), 36, 44.
Porthmeus, 6, 25.
Porthmeus argenteus, 6, 25.
praeustus (*Caranx*), 4.
 (*Citula*), 12.
Pseudocaranx, 3, 4, 6.
Pseudocaranx chilensis, 10.
 dentex, 12, 14, 17, 37, 39, 42.
punctatus (*Caranx*), 17.
 (*Decapterus*), 17.
- quadrangularis (*Selene*), 41.
quadripunctatus (*Caesiomorus*), 49.
 (*Trachinotus*), 49.
quiebra (*Chorinemus*), 21.
 (*Lichia*), 23.
- Rafinesquii (*Seriola*), 51.
rhomboides (*Chaetodon*), 49.
 (*Trachinotus*), 49.
rhonchus (*Caranx*), 3, 17, 44.
richardsoni (*Ulua*), 6.
rivoliana (*Seriola*), 26, 27.
Rotleri (*Caranx*), 44.
Rotleri (*Scomber*), 44.
ruber (*Citula*), 3, 9, 50.
 (*Scomber*), 9, 50.
Ruppelii (*Olistus*), 51.
 (*Seriola*), 51.
russelli (*Caranx*), 13, 22, 37.
 (*Decapterus*), 13.
Russelii (*Trachinotus*), 30.
- saliens (*Oligoplites*), 20, 40.
 (*Scomber*), 40, 46.
saltans (*Chorinemus*), 21.
saltator (*Scomberoides*), 40, 46.
Sanctae Helenae (*Caranx*), 17.
sanctahelenae (*Decapterus*), 17.

- Sanctae-Marthae (Vomer), 33.
 Sanctae-Petri (Chorinemus), 21.
 (Vomer), 33.
 saurus (Oligoplites), 21, 23, 50.
 (Scomber), 5.
 Scomber aculeatus, 45.
 amia, 5, 6, 46.
 bajad, 8.
 capensis, 51.
 carangus, 4, 43.
 chloris, 48.
 chrysos, 44.
 cordyla, 45, 51.
 dentex, 6, 17.
 djedaba, 12.
 ductor, 47.
 falcatus, 6.
 fasciatus, 48.
 fulvoguttatus, 8.
 glaucus, 46.
 guara, 51.
 hippos, 4, 44, 50.
 malabaricus, 6, 25, 43.
 Plumieri, 36, 45.
 Rotleri, 45.
 ruber, 9, 50.
 saliens, 40, 46.
 saurus, 5.
 speciosus, 5, 16, 44.
 trachurus, 44.
 scombrinus (Caranx), 18.
 (Decapterus), 18.
 Scomberoides, 6, 39, 40.
 Scomberoides commersonnianus, 5, 6, 38, 40, 46.
 lysan, 20, 21, 40, 45.
 Noelii, 40.
 saltator, 40, 46.
 tala, 21, 38, 39.
 tol, 21.
 Scyris, 6, 41.
 Scyris alexandrina, 47.
 indica, 48.
 indicus, 5.
 secunda (Uraspis), 31.
 Selar, 3, 6.
 Selar boops, 9, 37.
 crumenophthalmus, 9, 14, 15, 36, 43, 45.
 macrurus, 20.
 malam, 4.
 Selaroides, 6.
 Selaroides leptolepis, 13, 37.
 Selene, 2, 4, 6, 41.
 Selene argentea, 6, 41.
 browni, 31, 32, 33.
 dorsalis, 32, 33.
 peruvianus, 32, 33.
 quadrangularis, 41.
 setapinnis, 31, 32, 33.
 vomer, 41, 42.
 sem (Caranx), 18.
 Senegalensis (Vomer), 33.
 Senegallus (Caranx), 18.
 Seriola, 2, 6, 25, 27, 48, 51, 52.
 Seriola binotata, 26.
 bipinnulata, 5, 26.
 Bonariensis, 26.
 Boscii, 26.
 carpenteri, 26.
 cosmopolita, 48.
 dumerili, 6, 10, 11, 26, 48.
 Dumerilii, 10, 48.
 Dussumieri, 26.
 falcata, 26, 27.
 fasciata, 48.
 grandis, 27.
 intermedia, 6.
 lalandi, 27, 51.
 leiarchus, 27.
 picturata, 6.
 Rafinesquii, 51.
 Rivoliana, 26, 27.
 Ruppelii, 51.
 succinta, 27.
 zonata, 27.
 Seriolina, 6.
 Seriolina nigrofasciata, 26, 51.
 Seriolophus, 6, 33.
 Seriolophus carangoides, 6, 33.
 setapinnis (Selene), 31, 32, 33.
 sexfasciatus (Caranx), 9, 11, 16, 18, 19, 44.
 solea (Caranx), 18.
 speciosus (Caranx), 16, 44.
 (Gnathanodon), 16, 44.
 (Scomber), 5, 16, 44.
 stellatus (Caranx), 19.
 suareus (Caranx), 6, 19.
 succinta (Seriola), 27.
 sutor (Blepharis), 8.
 tabl (Decapterus), 22.
 tala (Chorinemus), 21, 22.
 (Scomberoides), 21, 28, 39.
 teraia (Trachinotus), 30.
 teraiodes (Trachinotus), 30.
 tille (Caranx), 19.
 tol (Chorinemus), 21.
 (Scomberoides), 21.
 toloo (Chorinemus), 38, 39.
 Trachinotus, 3, 6, 27, 49.
 Trachinotus affinis, 27.

- argenteus, 28.
 bailloni, 29, 36, 49.
 blochi, 28, 36.
 botla, 30.
 carolinus, 28, 29.
 cayennensis, 28.
 cupreus, 28.
 drepanis, 28.
 falcatus, 28, 49.
 falciger, 28.
 fuscus, 28.
 glaucus, 49.
 goodei, 49.
 goreensis, 28, 29.
 marginatus, 29.
 maxillosus, 29, 30.
 mookalee, 27, 29.
 myrias, 29.
 oblongus, 29.
 ovatus, 46, 47.
 paitensis, 29.
 pampanus, 29.
 quadripunctatus, 49.
 rhomboides, 49.
 Russelii, 30.
 teraia, 30.
 teraiodes, 30.
 Trachurus, 6, 17, 30.
 Trachurus aguilus, 51.
 capensis, 44.
 japonicus, 31.
 macculochi, 31.
 mediterraneus, 44.
 murphyi, 45.
 novae zelandiae, 30, 31, 45.
 picturatus, 19, 44.
 trachurus, 44.
 trecae, 31.
 trachurus (Caranx), 30, 45.
 (Scomber), 45.
 (Trachurus), 45.
 trecae (Trachurus), 31.
 triacanthus (Nauclerus), 24.
 trutta (Arripis), 52.
- Ulua, 6.
 Ulua mentalis, 10, 37.
 richardsoni, 6.
 Uraspis, 3, 6, 31.
 Uraspis cadenati, 31.
 carangoides, 6.
 secunda, 31.
 uraspis, 7.
 uraspis (Uraspis), 7.
 vadigo (Centronotus), 5, 38, 47.
 (Lichia), 47.
 valenciennae (Caranx), 17.
 vari (Alepes), 4, 20.
 (Caranx), 20.
 virescens (Gallus), 5, 51.
 Vomer, 4, 7, 31, 41.
 Vomer alexandrinus, 39, 41.
 Brasiliensis, 31, 32.
 browni, 7, 31, 32, 33.
 Cayennensis, 32.
 Columbiensis, 32.
 Cubae, 31, 32.
 Dominicensis, 31, 32.
 Gabonensis, 32.
 Goreensis, 32.
 Martinicensis, 31, 33.
 Novae-Boracensis, 33.
 Peruvianus, 32, 33.
 Sanctae-Marthae, 33.
 Sanctae-Petri, 33.
 Senegalensis, 33.
 Vomer (Argyreus), 42.
 (Selene), 41, 42.
 (Zeus), 4, 6.
 williamsi (Caranx), 18.
 xanthopygus (Caranx), 38.
 xanthurus (Caranx), 19.
 Zeus ciliaris, 4, 5.
 gallus, 51.
 (vomer), 4, 6.
 zonata (Seriola), 27.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- BAUCHOT, M. L., J. DAGET, J.-C. HUREAU et Th. MONOD, 1970. — Le problème des « auteurs secondaires » en taxionomie. *Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris*, 2^e sér., **42** (2) : 301-304.
- BERRY, F. H., 1963. — *Caranx fasciatus* Cuvier, an unidentifiable name for a carangid fish. *Copeia* **3** : 583-584.
- 1968. — A new species of carangid fish (*Decapterus tabl*) from the western Atlantic. *Contrib. Mar. Sci.*, **13** : 145-167.
- BERRY, F. H., et L. COHEN, 1974. — Synopsis of the genus *Trachurus* (Pisces, Carangidae). *Q. Jl Fla. Acad. Sci.*, **35** (4) 1972 : 177-211.
- BERTIN, L., et R. Ph. DOLLFUS, 1948. — Révision des espèces du genre *Decapterus* (Téléostéens Scombriformes). *Mém. Mus. natn. Hist. nat., nouv. sér.*, **26** (1) : 1-29.
- BLANC, M., et M. L. BAUCHOT, 1961. — Sur quatre genres de Carangidae (Téléostéens, Perciformes) de la côte occidentale d'Afrique : *Decapterus*, *Caranx*, *Trachurus*, *Suareus*. Affinités et rapports phylogéniques. *Bull. Mus. natn. Hist. nat.* 2^e sér., **32** (6) : 484-497.
- GINSBURG, I., 1952. — Fishes of the family Carangidae of the northern Gulf of Mexico and three related species. *Publs Inst. Mar. Sci., Univ. Texas.*, **11** (2) : 47-117.
- HUREAU, J.-C., et E. TORTONESE, 1973. — Family Carangidae in check-list of the fishes of the north-eastern Atlantic and the Mediterranean. vol. I et II. J.-C. Hureau et Th. Monod. UNESCO, Paris.
- JAMES, G. D., et A. B. STEPHENSON, 1974. — *Caranx georgianus* Cuvier, 1833 (Pisces, Carangidae) in temperate Australasian waters. *J. roy. Soc. N.Z.*, **4** (4) : 401-410.
- JORDAN, D. S., et C. H. GILBERT, 1882. — Synopsis of the fishes of North America. *Bull. U.S. Nat. Mus.*, **16** : 1-1018.
- KLAUSEWITZ, W., et J. G. NIELSEN, 1965. — On Forsskål's collection of fishes in the zoological Museum of Copenhagen. *Spolia zool. Mus. haun.*, **22** : 1-29, 38 pl.
- MATHER, F. J., 1971. — *Seriola carpenteri*, a new species of amberjack (Pisces ; Carangidae) from tropical western Africa. *Proc. biol. Soc. Wash.*, **84** (22) : 177-188.
- MCCULLOCH, A. R., 1929. — A check-list of the fishes recorded from Australia. Pt. II. *Aust. Mus Mem.*, **5** : 145-329.
- NORMAN, J. R., 1935. — The carangid fishes of the genus *Decapterus* Bleeker. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, sér. 10, **16** : 252-264.
- OGILBY, J. D., 1915. — Edible fishes of Queensland. Pt. III. — Carangidae (N^o 1). *Mem. Qd Mus.*, **3** : 57-98.
- RISSE, A., 1826. — Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale et particulièrement de celles des environs de Nice et des Alpes maritimes. Paris et Strasbourg, vol. III : 486 p., 16 pl.
- ROSENBLATT, R. H., et M. A. BELL, 1976. — Osteology and relationships of the roosterfish, *Nemastistius pectoralis* Gill. *Los Angeles County Mus. Contrib. Sci.*, **279** : 1-23.
- ROUX, C., 1973. — Les dates pour « l'Histoire naturelle des Poissons » de Lacepède. *Bull. Liaison Musées Hist. nat.*, **14** : 33-35.
- RÜPPELL¹, E., 1830. — Atlas zu der Reise im nördlichen Afrika. Zoologie. Fische des Rothen Meeres, 16 p : 95-118.

1. On date généralement cet ouvrage de 1828, mais comme l'ont noté SMITH-VANIZ et SPRINGER (1971, *Smithsonian Contrib. Sci.*, **73** : 19), il a été publié en trois parties en 1828, 1829 et 1830.

- SEAMAN, W., 1972. — Systematic, including osteology of *Hemicaranx* (Teleostei : Carangidae) with a discussion of related genera and materials for a revision of *Atule*. Ph. D. dissertation Univ. Fla., Gainesville, Fla.
- SMITH, J. L. B., 1968. — Studies in carangid fishes N° 4. The identity of *Scomber sansun* Forsskal, 1775. *Occ. Pap. Rhodes Univ. Dept. Ichthyol.*, **15** : 173-184.
- SMITH, M. M., 1972. — Studies in carangid fishes N° 6. Key to the western Indian Ocean species of the genus *Carangoides* Bleeker, 1851, with a description of *Carangoides nitidus* Smith (with plates 30, 31, and 44). *Occ. Pap. Rhodes Univ. Smith. Inst. Ichthyol.*, **18** : 229-239.
- 1973. — Identity of *Caranx armatus* (Pisces : Carangidae). *Copeia*, **2** : 352-355.
- SMITH-VANIZ, W.F., et J. C. STAIGER, 1973. — Comparative revision of *Scomberoides*, *Oligoplites*, *Parona* and *Hypacanthus* with comments on the phylogenetic position of *Campogramma* (Pisces : Carangidae). *Proc. Calif. Acad. Sci.*, **39** (13) : 185-256.
- STEPHENSON, A. B., et D. A. ROBERTSON, 1977. — The New Zealand species of *Trachurus* (Pisces : Carangidae). *J. roy. Soc. N.Z.*, **7** (2) : 243-253.
- SUZUKI, K., 1962. — Anatomical and taxonomical studies of carangid fishes of Japan, *Rep. Fac. Fish., Prefectural Univ. Mie*, **4** (2) : 43-232.
- WAKIYA, Y., 1924. — The carangoid fishes of Japan. *Ann. Carnegie Mus.*, **15** (2-3) : 139-293.
- WEBER, M., et L. F. DE BEAUFORT, 1931. — The fishes of the Indo-Australian Archipelago. E. J. Brill Ltd., Leiden, vol. 6, 488 p.
- WHITEHEAD, P. J. P., et G. S. MYERS, 1971. — Problems of nomenclature and dating of Spix and Agassiz's Brazilian fishes (1828-1831). *J. Soc. Bibl. phy. Nat. Hist.*, **5** (6) : 478-497.
- WILLIAMS, F., 1958. — Fishes of the family Carangidae in British east African waters. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, sér. 13, **1** (6) : 369-430.
- WILLIAMS, F., et V. K. VENKATARAMANI, 1978. — Notes on Indo-Pacific carangid of the genus *Carangoides* Bleeker. I. The *Carangoides malabaricus* group. *Bull. Mar. Sci.*, **28** (3) : 501-511.
- WILLIAMS, F., P. C. HEEMSTRA et A. SHAMEEM. — Notes on carangid fishes of the genus *Carangoides* Bleeker. II. The *Carangoides armatus* group. *Bull. Mar. Sci.*, **29** (3) (sous presse).

Manuscrit déposé le 11 octobre 1978.

Achevé d'imprimer le 30 juin 1979

IMPRIMERIE NATIONALE

8 564 002 5



Smith-Vaniz, William F, Bauchot, Marie-Louise, and Desoutter, Martine. 1979. "Catalogue critique des types de Poissons du Muséum national d'Histoire naturelle (Suite) (Familles des Carangidae et des Nematistiidae)." *Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle* 1(2 supplément), 1–67.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/266124>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/283211>

Holding Institution

Muséum national d'Histoire naturelle

Sponsored by

Muséum national d'Histoire naturelle

Copyright & Reuse

Copyright Status: In copyright. Digitized with the permission of the rights holder.

Rights Holder: Muséum national d'Histoire naturelle

License: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Rights: <http://biodiversitylibrary.org/permissions>

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.