




L'excursion du samedi 23 mai 2015 : balade malacologique dans la région de Gesves

Claude VILVENS - Photos: Christiane DELONGUEVILLE, Nicole SCAILLET et Claude VILVENS

La commune de Gesves se trouve approximativement au centre d'un triangle formé par Huy, Namur et Ciney. La région est verdoyante, propice aux balades en tous genres et, pourtant, nous n'avions jusqu'à présent effectué aucune prospection malacologique dans cette région.

Nous avons donc réparé cet oubli en nous basant sur les nombreuses balades proposées par la commune.

D'une part, nous nous sommes inspirés de la Balade de Surhuy, aux alentours du Verger conservatoire. Après nous être éloignés d'à peine 10 m des voitures parkées rue des Moulins que les premiers *Fruticicola fruticum* venaient nous dire bonjour ! L'espace ouvert parcouru puis le bois qui nous ramenait au point de départ devaient se révéler bien intéressants : - jugez-en plutôt dans le tableau ci-dessous.



Nous nous sommes ensuite mis en route pour un accès au Samson en nous basant cette fois sur la Balade des Forges et plus précisément la carrière d'Inzéfonds. Nos recherches furent moins fructueuses, mais nous permirent cependant de constater la présence de quelques mollusques d'eau douce comme les ubiquistes *Potamopyrgus* et *Ancylus*.

Pour terminer, nous avons poussé le souci du détail de notre étude en nous intéressant à un restaurant dénommé le "Petite Gesves" qui ne nous a pas déçu et n'est pas "petit" du tout : en fait, ce fut un "petit banquet" avant l'heure ☺ !

Listes des espèces de mollusques terrestres et dulcicoles observées le 23/5/2015 dans la région de Gesves
(déterminations : Johann Delcourt, Roni Maes, Etienne Meuleman & Claude Vilvens)

1) Premier site "rue des moulins" :


Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Arion distinctus</i> Mabilie, 1868	Limace noire
<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon 1855	Arion vulgaire [limace]
<i>Cepaea hortensis</i> (Müller, 1774)	Escargot des jardins
<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	Escargot des haies ou des bois
<i>Clausilia bidentata</i> (Ström, 1765)	Clausilie noirâtre
<i>Cochlicopa lubrica</i> (Müller, 1774)	Bulime brillant
<i>Deroceras invadens</i> (anc. <i>D. panorminum</i>) (Lessona & Pollonera, 1882)	Loche maltaise
<i>Deroceras reticulatum</i> (Müller, 1774)	Limace réticulée
<i>Discus rotundatus</i> (Müller, 1774)	Hélice bouton
<i>Fruticicola fruticum</i> (Müller, 1774)	Hélice des buissons
<i>Helix pomatia</i> Linnaeus, 1758	Escargot de Bourgogne
<i>Limax maximus</i> Linnaeus, 1758	Limace léopard
<i>Macrogastra rolpheii</i> (Turton, 1831)	Clausilie de Rolph
<i>Merdigera obscura</i> (Müller, 1774)	Bulime obscur
<i>Monachoides incarnatus</i> (Müller, 1774)	Moine des bois
<i>Oxychilus cellarius</i> (Müller, 1774)	Zonite des caves
<i>Oxychilus draparnaudi</i> (Beck, 1837)	Grand zonite
<i>Succinea putris</i> (Linnaeus, 1758)	Ambrette commune
<i>Tandonia budapestensis</i> (Hazay, 1880)	Limace souterraine
<i>Vitrina pellucida</i> (Müller, 1774)	Vitrine transparente

2) Deuxième site "Chaussée de Gramptine" (entrée bois carrière d'Inzefond) :

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	Paludine saumâtre
<i>Ancylus fluviatilis</i> Müller, 1774	Ancyle fluviatile
<i>Arion hortensis</i> (Férussac, 1819)	Limace des jardins
<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon 1855	Arion vulgaire [limace]
<i>Clausilia bidentata</i> (Ström, 1765)	Clausilie noirâtre
<i>Discus rotundatus</i> (Müller, 1774)	Hélice bouton
<i>Fruticicola fruticum</i> (Müller, 1774)	Hélice des buissons
<i>Helicodonta obvoluta</i> (Müller, 1774)	Helice planorbe
<i>Oxychilus helveticus</i> (Blum, 1881)	Zonite helvétique
<i>Oxyloma elegans</i> (Risso, 1826)	Ambrette élégante
<i>Pisidium</i> sp.	
<i>Sphaerium corneum</i> (Linnaeus, 1758)	Cyclade cornée



Fruticicola fruticum (Müller, 1774)
- Hélice des buissons



Succinea putris (Linnaeus, 1758)
- Ambrette commune



Oxytoma elegans (Risso, 1826)
- Ambrette élégante



Deroceras reticulatum (Müller, 1774)
- Limace réticulée



Limax maximus Linnaeus, 1758
- Limace léopard



Fruticicola fruticum (Müller, 1774)
- Hélice des buissons



Monachoides incarnatus (Müller, 1774) - Moine des bois et
Macrogastra rolpheii (Turton, 1831) - Clausilie de Rolph



Cochlicopa lubrica
(Müller, 1774)
- Bulime brillant



Merdigera obscura (Müller, 1774)
Bulime obscur



Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758)
- Escargot des haies ou des bois



Oxychilus helveticus (Blum, 1881)
Zonite helvétique



Tandonia budapestensis (Hazay, 1880)
- Limace souterraine



Vilvens, Claude et al. 2015. "L'excursion du samedi 23 mai 2015: balade malacologique dans la region de Gesves." *Novapex : trimestriel de la Société belge de malacologie* 16(3), 62–65.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/266911>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/283794>

Holding Institution

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Sponsored by

Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: In copyright. Digitized with the permission of the rights holder.

Rights Holder: Belgian Malacological Society

License: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Rights: <http://biodiversitylibrary.org/permissions>

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.