

CATÁLOGO

DE LAS

PERIANTIADAS CUBANAS,

ESPONTÁNEAS Y CULTIVADAS,

POR

D. MANUEL GÓMEZ DE LA MAZA.

(Sesión del 6 de Diciembre de 1893.)

ORDEN II.—**GAMOPÉTALAS** (1).

SUBORDEN I.—**Gamopétalas superovariadas.**

Soláneas. — Convolvuláceas. — Apocíneas. — Asclepiádeas. — Escrofularíneas. —
Gesneráceas. — Acantáceas. — Verbenáceas.

Soláneas.

Solanum torvum Sw.—*Prendedera*.

— *esculentum* Dun.—*Berengena*.

— *igneum* Lin.

γ, *inermis* Dun.

δ, *Persicæfolium* [*Solanum* Dun.]

— *nigrum* Lin.—*Hierba mora*.

— *triste* Jacq.—*Tabaco cimarrón*.

— *Boldoense* A. Cand. [*S. cardiophyllum* Dun.; no
Lindl.] (381, 3023).—*Jazmín de Italia*.

— *Jasminoides* Paxt. (Cult.!)—*Jazmín de Italia*.

— *inclusum* Gris. [*S. tetramerum* Durv.; A. Cand.]

— *tuberosum* Lin. (Cult.!)—*Papa*.

(1) Véanse los tomos XIX, p. 213 y XXIII, p. 41, de estos mismos ANALES.

Solanum indecorum Rich.

- *Callicarpæfolium* Kunth y Bouché.—*Prendedera macho* (tipo y var.).
 - β , *asperum* [*Solanum* Valh].
 - γ , *radula* [*Solanum* Valh].
- *Edwardi* Kunth y Bouché.—Omitido por Sauval.
- *Verbascifolium* Lin. (3031). — *Prendedera macho*, *P. hedionda*, *Tabaco cimarrón*.
- *fragile* Wr. (3024).
- *Havanense* Jacq. (3025).—*Tomatillo de la Habana*, *Aji de China?*—El S. Havanense, Vellozo, es muy dudoso.
- *lentum* Cav. (3026).
- *virgatum* Lam.^k (385).
- *Aquartia* Dun. (1642).
- *Crotonoides* Lam.^k (382).
- *lanceæfolium* Jacq. (exót.)
 - γ ?, *scabrum* [*Solanum* Vahl] (3028).—*Ajicón*.
 - δ ?, *Sagrænum* [*Solanum* Rich].
- *Cubense* Dun.—No descrito en el *Prodromus*, omitido por Sauval.
- *Jamaicense* Sw. (380).
- *aculeatissimum* Jacq. (3029).
- *latifolium* Poir. (3030).
- *Chamæacanthum* Gris. (3634).
- *mammosum* Lin. (Cuba?)—*Güirito*.

Lycopersicum esculentum Mill. [*Solanum Lycopersicum* Lin.] (Cult.!)—*Tomate*.

Capsicum pendulum Willd.—*Aji* (tipo y var.)
 β , *minus* Dun. [C. Havanese Kunth].

- *baccatum* Lin.—*Aji guagua*.
- *annuum* Lin. (cult.)—*Aji común*, *Pimiento*.

Physalis pubescens Lin. (3635?)—*Pantomima*, *Vejiga de perro*.
 — *angulata* Lin. (3637).—*Tomatillo*.

δ , *Capsicifolia* Gris. [*Physalis* Dun.] (Cult.! silv.?)—*Farolillo*.

γ , *Linkiana* Gris., A Gray [*Physalis* Nees].—*Pantomima*, *Vejiga de perro*.

- *Hermanni* Dun. (3636).—*Pantomima*, *Vejiga de perro*.

Lycium Acnistoides Gris.—*Palo gallina*, *Belladona de la tierra*.

Datura Stramonium Lin.—*Chamico*.

β, *Tatula* Dun.—*Chamico*, *C. azulado*.

— *Metel* Lin.—*Chamico*.

— *fastuosa* Lin.—*Chamico de la tierra?*, *Túnica de Cristo*, *Ñangué*.

— *ceratocaula* Ortega.—*Chamico silvestre*.

— *suaveolens* Kunth.—*Campanilla blanca*, *Flor de campana*, *Floripundio blanco*, *Árbol de la bibijagua*.

Solandra grandiflora Sw.—*Chamico bejuco*.

— *longiflora* Tuss.—*Chamico bejuco*.

Cestrum nocturnum Lin.—*Galán de noche*.

— *Laurifolium* L'Hérit. (1352, 1352^a).—*Galán de día*, *de sabana*.

— *hirtum* Sw. (386).

— *album* Ferrero.

— *fastigiatum* Jacq.

— *Moquinianum* Dun.

— *odontospermum* Jacq.—Omitido por Sauval.

— *diurnum* Lin. (387, en parte, 3032).—*Galán de día* (tipo y var.)

γ, *tinctorium* [*Cestrum* Gris.; no Jacq.?; *C. diurnum* A. Gray?; no Lin.] (376).

— *macrophyllum* Vent. (387, en parte).

— *Daphnoides* Gris. (1351).

Petunia parviflora Juss. (3638).

— *Nyctaginiflora* Juss. (Cult.)—*Petunia*.

— *violacea* Lindl. (Cult.)—*Petunia*.

Nicotiana repanda Willd.—*Tabaco cimarrón*.

— *Tabacum* Lin. [*N. Havanensis* Lagasca] (Cult.)—*Tabaco*.

— *Plumbaginifolia* Viv.

— *Doniana* Dun.

Brunfelsia nitida Benth. [*B. sinuata* Rich.; *B. parvifolia* Rich.] (3021).—*Galán de noche*, *arbusto*, *Nabaco*.

— *Cestroides* Rich. [*B. purpurea* Gris.; *B. Vinciflora* Gris.] (393, 394, 1349).—*Galán de noche morado*, *Lila de las Antillas*.

— *Americana* Sw.—Omitida por Sauval.

Schwenkia Americana Lin. [*S. adscendens* Gris.; no Kunth].

— *Tabaco cimarrón*.

Convolvuláceas.

- Argyreia speciosa Sweet (Cult.!)
- Ipomæa (Calonyction) bona-nox Lin. [Calonyction megalocarpum Rich.; C. speciosum Rich.].—*Flor de Y, blanca, Bejuco de campanillas.*
- (Operculina) pterodes Choisy.—*Almorrana, Tomate de mar, de flor amarilla.*
- — tuberosa Lin.—*Bejuco de indio?*
- (Schizips) dissecta Pursh.—*Aguinaldo de almendra.*
- — pentaphylla Jacq. [Batatas Choisy].—*Aguinaldo velludo.*
- — quinquefolia Gris. [Batatas Choisy].
- (Batatas) Batatas Lam.^k (ofrece algunas var.) (Cult.) —*Boniato.*
- — fastigiata Sweet.—*Aguinaldo.*
- — Sidæfolia Choisy.—*Campanilla blanca, Aguinaldo blanco.*
- — alterniflora Gris. [I. obtusata Gris.; I. digitata Lin.; var., Gris.; I. punctata Wr.; I. Pes-Capræ Gris., *Cat.* 203? no Sw.?]—*Aguinaldo de pinares.*
- — Jalapoides Gris.
- — calantha Gris.
- (Pentadactylis) Cavanillesii Röm. y Schult.
- — triloba Lin.—*Marrullero, Aguinaldo rosado* (tipo y var.)
- β, Eustachiana Jacq.
- tenuissima Choisy.
- (Xanthifos) umbellata Mey.—*Aguinaldo amarillo.*
- (Pes-Capræ) Pes-Capræ Sw.—*Boniato de playa.*
- — Acetosæfolia Röm. y Schult.—*Boniato de playa.*
- — Martinicensis Mey. [Aniseia Choisy].
- — Nymphæifolia Gris.—*Boniato de playa.*
- — Imperati Gris. [Convolvulus Vahl.; Batatas litoralis Choisy; no I. litoralis Blum.; I. arenaria Röm. y Schult.; no Steud.]—*Boniato de playa.*

Ipomæa (Pes-Capræ) *sagittata* Desf.

— — *heptaphylla* Gris.—*Bejuco de indio criollo, morado*.

— — *dactylophylla* Gris.

— — *calophylla* Wr.—*Terciopelo de monte*.

— — *Hypargyrea* Gris.

— — *præcox* Sauval.

— (Exogonium) *repanda* Jacq.

β, *pratensis* Wr.

γ, *undulata* Wr.

— — *arenaria* Stend.—Omitida por Sauval.

— — *microdactyla* Gris.

— — *Fuchsioides* Gris.

— — *racemosa* Poir.

— — *argentifolia* Rich.—*Terciopelo solferino*.

— (Quamoclit) *Quamoclit* Lin. [*Q. vulgaris* Choisy].—*Cambustera de hojas menudas*.

— (Mina) *coccinea* Lin.—*Cambustera de hojas anchas, punzó*.

— — *Hederæfolia* Lin. [*H. coccinea* Lin.; β, *Hederæfolia* A. Gray].

— (Pharbitis) *punctata* Sauval (no Wr.)

— — *Cissoides* Gris.

— — Nil Roth.—*Manto de la Virgen, Aguinaldo azul claro*.

— — *purpurea* Lam.^k [*Pharbitis hispida* Choisy].—*Aguinaldo purpúreo*.

— — *acuminata* Röm. y Schult. [*Pharbitis mutabilis* Choisy; *Ph. calycosa* Rich.?)

— — *cathartica* Poir.—*Aguinaldo*.

— — *Jamaicensis* Don.—Omitida por Sauval, así como la var.

β, *glabrata* Gris.

— — *heterophylla* Ortega.

— (Apharbitis) *Rudolphi* Röm. y Schult.

— (sección?) *commutata* Röm. y Schult.

— — ? *Ramoni* Choisy.

— — ? *pinnatifida* Don.

— — ? *Serpyllifolia* Don.

— ? — ? *Falkioides* Gris.

Ipomæa ? (sección?) ? [*Pharbitis Ostrina* Lindl., *Bot. Reg.*, lámina 51.] (Cuba, según Benth. y Hook., *Gen. pl.*, II, 872.)

Jacquemontia Tamnifolia Gris. [*Ipomæa* Lin.].—*Aguinaldo azul*.

Convolvulus pentanthus Jacq.

— *micranthus* Röm. y Schult.

— *Jamaicensis* Jacq.

— *Valenzuelanus* Rich.

— *Havanensis* Jacq. [*Ipomæa* Choisy; *C. ruderarius* Kunth.]

β, *corolla-majori* Gris.

— *nodiflorus* Desr.

— *tricolor* Lin. (Cult.).—*Don Diego de día*.

Evolvulus Alsinoides Lin.

— *arbuscula* Poir.

— *sericeus* Sw.

β, *argenteus* Gris. [*Evolvulus* Pursh.]

— *incanus* Pers.

— *Serpylloides* Sauval, nombre [*Convolvulus* (*Orthocaulos*) *Serpylloides* Gris.]

— *nummularius* Lfn.—*Aguinaldito rastrero*.

— *Congifolius* Choisy (Habana, según Choisy, en Cand., *Prodr.*, IX, 449).—Omitido por Sauval.

Dichondra repens Forst.—*Aguinaldito rastrero*.

Cuscuta (*Grammica*) *Americana* Lin.—*Bejuco fideo*.

— — *umbellata* Kunth.

— — *indecora* Choisy [*C. decora* Engelm.]

— — *obtusiflora* Kunth.

Apocíneas.

Allamanda cathartica Lin.—*Jazmín de la tierra*, *Barbero*, *Flor de barbero*.

Carissa grandiflora Cand. (cult.)

Thevetia Neriifolia Juss.—*Cabalonga*, *Cobalonga*.

Rauwolfia nitida Lin.—*Huevo de toro*.

— *canescens* Lin.—*Palo boniato*.

— *Lamarckii*, A. Cand. [*R. nitida* Lam.^k; *R. latifolia* A. Cand.; *R. lanceolata* Gris.; *Veg. Kar.*, A. Cand.?]]

— *Ternifolia*, Kunth.—*Frutillo*.

Rauwolfia Alphonsiana J. Müll. [R. parvifolia Spreng.; β , Cubana A. Cand.; R. parvifolia Rich.]

— Salicifolia Gris.—*Lirio de paredón*.

— Cubana A. Cand.—*Lirio de costa*.

Vallesia glabra Link.—*Palo boniato*.

Tabernæmontana Citrifolia Lin.—*Pegojo, Jazmín de la montaña?*

— Laurifolia Lin. (Cuba?)

— Berterii A. Cand. (exót.)

δ , parviflora A. Cand.—*Lechoso, Palo lechoso*.

— discolor Sw.

— apoda Sauval.

Cameraria latifolia Lin. [Neriandra Havanensis, J. Müll.]—*Maboa*.

— retusa Gris.—*Maboa de sabana*.

Strempeleopsis Cubensis [Rauwolfia? Strempeleioides Gris.]—*Palo boniato*.

Vinca (Lochnera) rosea Lin. [Lochnera Reich.]—*Vicaria*.

Stemmadenia Galeottiana [Odontostigma Galeottianum Rich.]

Plumieria alba Lin.—*Lirio, L. blanco, Alelí blanco, Atabaiba* (tipo y var.)

β , glabra Gris.

— obtusa Lin. (exót.?)

γ ?, lævis Gris.—*Lirio amarillo, L. de playa, L. morado*.

— emarginata Gris.—*Lirio* (tipo y var.)

β , Sericifolia [Plumieria Wr.]

— Clusioides Gris.—*Lirio* (tipo y var.)

β , parviflora [P. obtusa Lin.; δ , parviflora, Gris.]

— Filifolia Gris.—*Lirio*.

— rubra Lin.? (Cuba? silv.?)—*Lirio tricolor?*, *L. chuchó?*, *L. dulce?*

— especie (cult.!)—*Lirio de Méjico*.


Malouetia Cubana A. Cand.

Anechites asperuginis Gris. [Echites Sw., E. Lappulacea Lam.^k; β , asperuginis A. Cand.]

Haplophyton cimidum (1) A. Cand. [Echites cinerea Rich.]

Nerium Oleander Lin. (cult.!)—*Adelfa, Rosa francesa*.

(1) En Benth. y Hook., *Gen. pl.*, II, 723, se lee *cimifugum*; y en A. Gray, *The Gamop.*, II, 82, *cimicidum*.



- Forsteronia corymbosa Mey.—*Curamagüey prieto*, *Bejuco prieto*.
 — Alexandri Gris.—*Curamagüey prieto*, *Bejuco prieto*.
 — (Syringostachyun) Corylifolia Gris. [Thyrsanthus? Corylifolius Gris.; Echites spicata Jacq.?; Forsteronia spicata Mey.?
 Echites (Laubertia) biflora Jacq.—*Clavelitos de sabana*, *C. de manglar*.
 — — paludosa Vahl. [E. concolor Hamilt.]—*Clavelitos de manglar*.
 — (Euechites) torosa Jacq.—*Bejuco de mangle*.
 — — rosea A. Cand. [E. Myrtifolia Röm. y Schult., no Poir.; Mesechites Myrtifolia J. Müll.]—*Rosa de sabana*.
 — — repens Jacq.
 — — umbellata Jacq.
 — β , longiflora Gris.
 — γ , crassipes [Echites Rich.]
 — — litorea Kunth.
 — (Laseguea) calycosa Rich.
 — (Mandevilla) Valenzuelana Rich. [Rhabdadenia Wrigh-
 tiana J. Müll.]
 — — Sagræi Cand. [Rhabdadenia J. Müll.; E. ferruginea Rich.]
 — (Rhabdadenia) Cubensis Gris. [Rhabdadenia J. Müll.]
 — — Lindeniana Gr. [Rhabdadenia J. Müll.]
 — (Urechites) Andrewsii Chapm. [E. Neriandra Gris.; Neriandra suberecta A. Cand.; E. Catesbæi Don.?
 — — Jamaicensis Gris. [E. Domingensis Sw., no Jacq.]
 — — suberecta Jacq. [Urechites J. Müll.]—*Clavelitos de sabana*, *de flor amarilla*.

Asclepiádeas.

Marsdenia clausa R. Br. [M. affinis Rich.] (1374) (1).—*Curamagüey*, *C. blanco*. (tip. y var.) (2).

(1) Es erróneo 1378, en Sauval.

(2) Hay que distribuir entre las variedades las *exsiccatas* de Wr., 1375 y 2970.

Marsdenia β , *campanulata* [*Marsdenia* Gris.]

γ , *bifida* [*Marsdenia campanulata* Gris.; β , *bifida* Gris.]

— *agglomerata* Dec.^{sne}

— *elliptica* Dec.^{sne}

— *umbellata* Gris. (1) (2972).

— *fusca* Wr. (2976).

— *Saturejifolia* Rich.—Omitida por Sauval.

Metastelma parviflorum R. Br.

— *hamatum* Gris. (2959).

— *penicillatum* Gris. (2960).

β , *brachystephanum* [*Metastelma* Gris.; *Astephanus Cubensis* Kunth; β , *pauciflora* Gris.] (1665, 2961, en parte) (2).

— *linearifolia* Rich. [*Amphistelma* Gris.] (3) (2957).

— *fuscum* Sauval.

— *Cubense* Dec.^{sne} (3528).

— *Bahamense* Gris., *Cat.* 174 [*M. Cubense* Gris., *Flora*, 417, no Dec.^{sne}; *M. Schlechtendalii* Chapm., no Dec.^{sne}]

Poicilla Tamnifolia Gris.

— *ovatifolia* Gris. (4).

Vincetoxicum palustre A. Gray [*Ceropegia palustris* Pursh.;

Lyonia maritima Ell.; *Cynanchum angustifolium* Nutt.; *Seutera maritima* Dec.^{sne}; *Cynanchum maritimum* Maximo; *Amphistelma salinarum* Wr., en Gris., *Cat.* 175; *Metastelma salinarum*, atribuido á Wr. por Sauval, autor de este nombre] (2958).

— *scoparium* A. Gray [*Cynanchum scoparium* Nutt.; *Cynoctonum?* *scoparium*, Chapm.; *Amphistelma filiforme* Gris.; *A. Ephedrioides* Gris.; *A. Graminifolium* Gris.; *Metastelma filiforme* Wr., según A. Gray, pero creemos que este nombre es de Sauval] (405, 2962, 2969).

(1) Sinónima de la *M. elliptica* Dec.^{sne}?

(2) La otra parte es algún *Astephanus*, según Benth. y Hook.

(3) ¿Será *Vincetoxicum*?

(4) Véase *Astephanus ovalifolius* Rich.

- Vincetoxicum acuminatum [Orthosia acuminata Gris.] (2966).
 — oblongatum [Orthosia oblongata Gris.] (2967).
 Gonolobus Tigrinus Gris. (1667).
 β , angustifolius Gris.
 — stephanotrichus Gris. (407, 2969).
 — Ottonis Koch y Bouché.
 Oxypetalum riparium Kunth (406).
 Metalepis Cubensis Gris. (2977?) [Gonolobus Rich., excluyendo sinonimia Jacq.?
 Lachnostoma maritima [Ibatia Dec.^{sne}
 — mollis [Ibatia Gris] (2978).
 Philibertia viminalis A. Gray [Asclepias Sw.; Sarcostemma Brownei Mey.; S. clausum Rich.] (1666).
 — ? scandens [Fischeria Cand.; Cynanchum crispiflorum Sw.; Salisb. Gonolobus crispiflorus Röm. y Schult.; Holostemma Candolleanum Spreng.] (1378).—*Curamagüey de costa, Huevo de toro, bejuco, Guáuro*.
 Fischeria Havanensis Dec.^{sne}—*Curamagüey de costa*.
 Astephanus Grisebachii [Tyloclontia Cubensis Gris.] (2564).
 — ovalifolius Rich. (403, 2968).—Gris., *Pl. Wright.*, 520, cita la exsiccata de Wr., 1379.—Esta especie será sinónima de la Poicilla ovatifolia Gris.? (2965).
 — urceolatus Gris.
 — Cubensis Kunth (404).
 Stephanotis longiflora [Marsdenia Rich.] (2974).—*Curamagüey*.
 — Vincæflora [Marsdenia Gris.] (2975).
 — floribunda A. Brongn. (Cult.!)—*Estefanotis*.
 Hoya carnosá R. Br. (Cult.!)—*Flor de cera*.
 — especie (Cult.!)
 Calotropis herbacea Wallisch? (Cult.!)
 Stapelia variegata Lin. (Cult.!)—*Estrella, Africana*.
 Asclepias Curassavica Lin. (401).—*Flor de calentura, F. de la calentura, encarnada*.
 — nivea Lin. [A. perennis Sauval, no Walt.?] (402).—*Flor de calentura, blanca*.
 — Cornuti Dec.^{sne} (Cult.)—*Hierba acolchada, Asclepias de Siria*.

Escrofularíneas.

Micranthemum (Eumicranthemum)	(1)	orbiculatum Mich. [*]
—	—	(2) rotundatum Wr.
—	(Hemianthus)	(3) Nuttallii A. Gray [Hem. Micranthemoides Nutt.]
—	—	punctatum Sauval, nombre [Hem. punctatus Wr.]
—	—	multiflorum Sauval, nombre [Hem. multiflorus Wr.; Hem. erosus Wr.]
—	—	trisetosum Sauval, nombre [Hem. trisetosus Wr.]
—	—	Elatinoides Sauval, nombre [Hemianthus Gris.]
—	—	Callitrichoides Sauval, nombre [Hemianthus Gris.] (1640, en parte) (4).
—	—	adenander Sauval, nombre [Hemiantus Wr.]
—	—	(5) reflexum Sauval, nombre [Hemianthus reflexus Wr.]
—	(Amphiolanthus)	Bryoides [Amphiolanthus Gris.]
—	—	Arenarioides [Amphiolanthus Gris.]
—	(sección?)	ciliolatum Sauval.
—	—	? tetrandrum Sauval (6).

Hydranthelium humifusum Sauval, nombre [Herpestis (Bramia) humifusa Gris.; Herpestris obovata Pöpp.?] (7).

Encopa tenuifolia Gris.

(1) Subsección *Eumicranthemum propios*.

(2) Subsección *Micropeplidium*.

(3) Subsección *Euhemianthus*.

(4) La otra parte es la *Oldenlandia Callitrichoides* Gris.: *Rubiacea*.

(5) Subsección *Hemiolanthus*.

(6) Estambres 4-3.—*Micranthemum*?

(7) *Herpestis*?

Bonnaya alterniflora Sauval (1).

Ilysanthus Gratioloides Benth.

Capraria biflora Lin.—*Escabiosa*, *Majuito*.

Scoparia dulcis Lin.—*Escobilla*.

Buchnera elongata Sw.—*Escabiosa*.

— Americana Lin.

Gerardia purpurea Lin.

— hispidula Mart.

— Domingensis Spreng.—*Fernandina blanca*.

Synapsis Illicifolia Gris.

Russelia sarmentosa Jacq.—Omitida por Sauval.

— Juncea Zuccar (Cult.!).—*Lágrimas de amor*, *L. de Júpiter*.

Scrophularia micrantha Desv.; no d'Urville.

Stemodia maritima Lin.

— Durantifolia Sw.

— parviflora Ait.

— Ageratifolia Sauval.

— radicans Gris.

Conobea innominata G.-M. (2) (3003).—Omitida por Gris. y Sauval.

Herpestis reflexa Benth.

— repens Champ. y Schlecht.

— β multistriata Wr.

— Beccabunga Gris.

— sessiliflora Benth.

— rotundifolia Pursh.

— obovata Pöpp. (3).

— Chamædryoides Kunth [H. Cubensis Pöpp.]

— Monnieria Kunth.—*Graciola*.

— Micro-Monnieria Gris.

Torenia (Nortenia) Asiatica Lin. (Cult.!)—*Violeta china*.

Angelonia Salicariæfolia Kunth [A. angustifolia Gris.; no Benth.?]—*Fernandina (enana y grande)*.

Linaria (Elatinoides) Elatine Mill. (Cult.)

Antirrhinum majus Lin. (Cult.!)—*Boca de dragón*, *Monigote*.

(1) *Ilysanthus*?

(2) Enana, postrada, muy ramosa. Hojas diminutas.

(3) Véase *Hydranthelium*.

Gesneráceas.

Sesamum Indicum Cand. (exót.)

γ, subindivisum Cand. (Cult.!)—*Ajonjolí*.

Crescentia Cujete Lin. [*C. acuminata* Kunth].—*Güira*, *G. cimarrona*, *Totuma*.

— Cucurbitina Lin.—*Magüira*.

Schlegelia parasitica Miers (1) [*Tanæcium* (2) parasiticum Sw.]

—*Güira macho*.

— brachyantha Gris.

Bellonia spinosa Lin.

Niphæa pulchella Gris.

Heppiella rupicola Wr. [*Rhytidophyllum petiolare* Gris. *Cat.*, 198, en parte; no Cand.].—*Boca de león*.

Pentarhaphia (Eupentarhaphia) Duchartreoides Sauval.

— triflora Gris.

— incurva Gris.

— ferruginea Sauval.

— Salicifolia Gris.

— glandulosa Gris.

— verrucosa Dec.^{sne}

— Cubensis Dec.^{sne}

— (Duchartrea) viridifolia [Duch. Dec.^{sne}] (3).

— (Synanthera) humilis [Conradia Mart.]

— — depressa [Conradia Gris.]

— — Celsioides [Conradia Gris.]

— — Gloxiniioides [Conradia Gris.]

— — Libanensis [Gesneria Morr.; Ophianthe Hanst.; Conradia Gris.; Rhytidophyllum floribundum Houtt.; Lem. Herincquia floribunda Dec.^{sne}]

(1) Sauval hace sinónimas ambas especies bajo el nombre de *Tanæcium parasiticum* Sw., lo que es erróneo. Esta última especie, su sinonimia y demás, debe borrarse del catálogo de las *Bignoniáceas* (ANALES, XIX, 264).

(2) El género *Tanæcium*, admitido modernamente y distinto de *Schlegelia*, no tiene especies cubanas. Ambos son *Gesneráceas*.

(3) Gris., *Cat.*, 199, admite *D. viridiflora* Dec.^{sne}

Pentarhaphia (Sytnanthera) reticulata [Conradia Gris.]

β , obovata [Conradia reticulata
Gris.; β , obovata Gris.]

— — corrugata [Conradia Gris.]

Rhytidophyllum crenulatum Cand. (Rhytidophyllum).—*Boca de león*.

— tomentosum Mart. (Rhytidophyllum) [Rhytidophyllum exertum Gris.]—*Boca de león, de paredón; Salvilla*.

— petiolare Cand. (Rhytidophyllum) [Rhytidophyllum petiolare Gris., *Cat.*, 198, en parte].—*Boca de león, de paredón*.

— Wrightianum Gris. (Rhytidophyllum).—*Boca de león*.

Tussacia pulchella Reichb. [Besleria Don].

Allopectus cristatus Mart.

Columnea (Eucolumnea) scandens Lin.

— — tinctoria Gris.

— (Collandra) sanguinea [Besleria Pers.; Collandra
Gris.; Allopectus sanguineus Mart.]

Martynia diandra Glox.—*Martinia, Alacrancillo, Araña-gato*.

Acantáceas.

Thunbergia fragrans Roxb. (Silv.)—*Tumbergia*.

γ , Nees. (Silv.)—*Tumbergia*.

— alata Bojer (Cult.)—*Anteojito de poeta, Ojo de poeta*.
Ofrece algunas variedades.

— grandiflora Roxb. (Cult.)—*Tumbergia azul*.

— erecta (Cult.) [Meyenia Benth.]

Elytraria tridentata Vahl. (Cuba?)

γ , Wrighti (3053).

Hygrophila hispida Nees. (3056) [Ruellia Rich.]

Calophanes Cubensis Rich.

Ruellia geminiflora Kunth (3054) [Dipteracanthus geminiflorus
Nees.; α , procumbens Nees.; D. nanus Nees.]—*Fulminante*.

γ , canescens Gris. (366) [Dipteracanthus Nees.]—*Fulminante*.

Ruellia diffusa Gris. (Rugel, 741) [*Dipteracanthus diffusus* Nees.]

— *simplex* Sauval.

— *paniculata* Lin. (3054) [*Dipteracanthus paniculatus* Nees.; *Hygrophila paniculata* Grosourdy (*Hygrophylla*)].

— *tuberosa* Lin. (Silv.!) [*Cryphiacanthus Barbadosensis* Nees.]—*Salta-Perico*.

ξ, *humilis* (Silv.) [*Cryphiacanthus Barbadosensis* Nees.; δ, *humilis* Nees.] (1)—*Salta-Perico*.

— (*Stephanophysum*) *Maravilla* (3055) [*Stemonacanthus macrophyllus* Nees.] (2)—*Maravilla*.

Blechum Brownei Juss. (3057).—*Mazorquilla*.

Dædalacanthus nervosus G.-M. (Cult.!) [*Eranthemum nervosum* R. Br.]—*Azulejo*.

Sanchezia nobilis Hook. (Cult.!)

Acanthus mollis Lin. (Cult.!)—*Acanto*, *Hierba gigante*.

Barleria Prionitis Lin. (Cult.!)

Barleriola Solanifolia (3058) [*Eranthemum Cubense* Spreng.; *Barleria Solanifolia* Lin.]

γ, *humilis* (Silv.) [*Barleria Solanifolia* Lin.; β Nees.]

δ, *Lindeniana* (Linden 1830).

ε, *bispinosa* (1342) [*Anthacanthus bispinosus* Gris.]

— *Saturejoides* (3059) [*Barleria* Gris.]

Stenandrium rupestre Nees. (3060).

— *Droseroides* Nees. (3061).

— *scabrosum* Nees. (1344) [*Ruellia scabrosa* Sw.]

— *punctatum* Gris. (3062).

Eranthemum bicolor Schrank (Cult.!)

— *atropurpureum* Hort. Angl.? (Cult.!)

Anthacanthus microphyllus Nees. (368) [*A. spinosus* Gris.; en parte en *Pl. Wright.* y en *Cat. pl. Cub.*, no Nees.]

— *spinosus* Nees.? (3) (369) [*A. spinosus* Gris.; en parte en *obras citadas*].

(1) Corresponden al tipo ó á la variedad el número Wrightiano 1343 y el Ruge-
liano 742.

(2) La *Ruellia Humboldtiana* Klotzsch, ha sido recolectada en Nueva Granada y
dada erróneamente como cubana.

(3) Especie omitida en Sauval, *Flora*.

Anthacanthus purpurascens Gris. (3066).

— *tetrastichus* Wr., en Gris., *Cat. pl. Cub.*, 198 (3067).

Andrographis paniculata Nees. (Cult.) [*Justicia* Burm.]

Aphelandra tetragona Nees. (Cult.) [*Justicia cristata* Jacq.]

Justicia Origanoides Gris. [*Adhatoda* Nees.]

— (*Sarotheca*) *neo-glandulosa* (3065) [*Dianthera glandulosa* Gris.]

— (*Gendarussa*) *Peruviana* Cav., *Icon.*, t. lám. 28 (Cult.!) [*Gendarussa Peruviana* Nees.; *Adhatoda furcata* A. Cand.]

Adhatoda Vasica Nees. (Cult.!) [*Justicia Adhatoda* Lin.]—*Justicia, Adatoda*.

Jacobinia (*Cyrtanthera*) *Harpochiloides* (3063) [*Dianthera* Gris.]

— — *Catalpæfolia* G.-M. (Cult.!) [*Cyrtanthera* Hook.]—*Cirtantera amarilla*.

— — *Pohliana* (Cult.!) [*Cyrtanthera* Nees.; *Justicia carnea* Lindl.; *Hostul.*; *Bot. Reg.*]—*Cirtantera rosada*.

— (*Pachystachys*) *coccinea* (362) [*Pachystachys* Nees.]

Dianthera Sagræana Gris. (367) [*Rhytiglossa* Rich.; *Rh. obtusifolia* Nees.; β , *hirsuticaulis* Nees.; *D. obtusifolia* Gris.; *hirsuta* Gris.] ¿Será una *Justicia*?

— *Rugeliana* Gris. (3064) [*D. obtusifolia* Gris.; en pl. Rugel, 377].

— *reptans* Gris. (364) [*Rhytiglossa* Nees.]

— *Peplodes* Gris. (365).

— *comata* Lin. (1) (363) [*Rhytiglossa Havanensis* Nees.]

— *ovata* Walth. (3641) [*Rhytiglossa humilis* Nees.; α].

Fittonia argyroneura Cömans (Cult.!)

Thyrsacanthus nitidus Nees.; α (2) (la Ossa en herb. Cand.)

Graptophyllon hortense Nees. (*Graptophyllum*) (Cult.!) [*Justicia picta* Lin.]

(1) En el *Prodr.* no se cita, y se lee: 1.º *Rhytiglossa Havanensis* Nees. (Greene, 26) [*Justicia humilis* Greene], 2.º *Leptostachya comata* Nees. (la Sagra, 601), siendo las dos especies sinónimas de la *Dianthera comata* Lin., según Sauval; 3.º *Leptostachya Martiana* Nees.; α (Pöpp. en herb. Berl.), omitida por Sauval, sinónimo de la *D. comata* Lin., según Gris., *Flora*, 456.

(2) El número Wrightiano 3058 corresponde al tipo ó á una variedad.

Dicliptera sexangularis Juss. (3068).—*Gallitos*.

— *assurgens* Juss. (1638).

γ, *Vahlia* (Silv.!) [*Dicliptera* Nees.]

Verbenáceas.

Cornutia pyramidata Lin.

Stachytarpheta (1) *Jamaicensis* Vahl. (Silv.!) [*S. strigosa* Vahl.]

— *Verbena azul*.

— *angustifolia* Vahl.—*Verbena de hoja angosta*.

— *elatior* Schrad.—*Verbena*.

— *Orubica* Vahl.—*Verbena cimarrona*.

— *mutabilis* Vahl.—Omitida por Sauval.

Tamonea Verbenacea Sw.

Petrea volubilis Jacq. (Cult.!, Silv.?)—*Petrea*.

Espadæa amœna Rich. [*Gœtzea* Gris.; *Armeniastrum apiculatum* Lemaire].—*Rasca-barriga*, *Arrayán*.

Priva echinata Juss. (Cult.!)—*Amor seco*.

Citharexylon (2) *villosum* Jacq. (*Citharexylum*) (438).—*Roble amarillo*.

— *cinereum* Lin. (*Citharexylum*).

— *lucidum* Champ. y Schlecht. (*Citharexylum*) (436, 437, en parte, 1359).—*Guáiro santo de costa*, *Palo guitarra*.

— *caudatum* Lin. (*Citharexylum*) (3183).—*Penda*.

— *Berteri* Spreng. (*Citharexylum Berterii*) (437, en parte, 1356).—*Palo guitarra*, *Roble amarillo*.

Lantana Camara Lin. (439).—*Filigrana*.

— *involucrata* Lin. (3165).—*Hierba de la sangre*, *M... de gallina*, *Filigrana cimarrona*, *Té de costa*.

— *reticulata* Pers. (441, 3166, 3167, en parte) [*L. odorata* Gris.; no Lin.].—*Filigrana*.

— *odorata* Lin.—*Filigrana*.

— *microcephala* Rich.

— *trifolia* Lin. (1630).—*Filigrana de piña*.

(1) O *Stachytarpha*.

(2) O *Citharexylum*.

Lippia Citriodora Kunth (Cult.!) [*Aloysia* Ortega]. — *Hierba Luisa*.

- *Betulæfolia* Kunth (3161). — *Filigrana*.
- *nodiflora* Rich.
- *reptans* Kunth.
- *micromera* Schauer.
- *canescens* Kunth.
- *geminata* Kunth (3159). — *Salvia americana*.
- *dulcis* Trev. (440). — *Orozuz de la tierra*.
- *Stœchadifolia* Kunth (3163).
- *acuminata* Wr. (3162).
- *Myrtifolia* Gris. (3160).

Bouchea Ehrenbergii Cham. y Schlecht. (3660).

Verbena Urticæfolia Lin. (3659).

- *officinalis* Lin. (3658). — *Verbena*.
- *Aubletia* Lin. (Cult.!) — *Verbena*.

Duranta Plumieri Jacq. (Silv.! 1358). — *Celosa*, *Violetina*.

Petitia Poeppigii Schauer (428, 1353) [*Callicarpa cinerea* Rich.?] *Roble guayo*.

Gmelina arborea Roxb. (Cult.!) — *Jobo de África*.

- *Asiatica* Lin. (Cult.!) — *Jobo de Asia*. — Una de estas especies está mal empleada, siendo la *Gm. parvifolia* Roxb.

Vitex divaricata Sw. (3171). — *Ofón criollo*, *Roble güiro*.

- *umbrosa* Sw. (1355). — *Roble güiro*.
- *Avicennioides* Rich. (431).
- *ringens* Gris. (3181). — *Copalillo*, *Chicharrón de costa*.
- *Ilicifolia* Rich. (3168). — *Granadillo de costa*.

Callicarpa Americana Lin. (3180). — *Filigrana de fruto morado*, *F. de mazorca*.

- *acuminata* Kunth (3169). — *Filigrana de fruto blanco*, *F. del pinar*.
- *ferruginea* Sw. (430, 1357, 3170, 3171, 3173) [*C. fulva* Rich.] — *Filigrana*.
- *reticulata* Sw. (3172). — *Filigrana de mazorquilla*.

Ægiphila Martinicensis Lin. — *Lengua de vaca*.

- *elata* Sw. (428, 1354). — *Guáiro santo*.

Clerodendron aculeatum Gris. (3174) [*Volkameria aculeata* Lin.]

- *Cubense* Schauer (3175). — *Oviedo amarillo*, *Hiel de perro*.

- Clerodendron Sagræi* Schauer (3176).—*Oviedo de flor blanca*.
 — *Lindenianum* Rich. (3177) [*C. tuberculatum* Rich.?]—*Roble guayo*.
 — *Ligustrinum* R. Br. (Cult.?)
 — *fallax* Lindl. (Cult.!)
 — especie (Cult.!)—*Mil-flores, Mil-rosas, Cógelo-todo*.
 — especie (Cult.?)—*Mil-flores, Mil-rosas*.
Avicennia nitida Jacq. (3182).—*Mangle prieto*.
 — *tomentosa* Jacq. (Silv.!)—*Mangle blanco*.

SUBORDEN II.—**Gamopétalas inferovariadas.**

Cucurbitáceas.—Rubiáceas.

Cucurbitáceas.

- Momordica Charantia* Lin.—*Cundeamor*.
 — *Balsamina* Lin.—*Cundeamor*.
Luffa cylindrica Röm. (Cult.!)—*Estropajo*.
 — *acutangula* Roxb.—*Estropajo*.
Melothria Guadalupensis Cogn. [*M. pervaga* Gris.]
 — *Fluminensis* Gardn. [*M. microcarpa* Gris.]
Anguria pedata Jacq.
 — *Plumieriana* Schlecht.
 — *Ottoniana* Schlecht.
Cayaponia excisa Cogn. [*Sicana* Gris.]
 — *racemosa* Cogn. [*Trianospermum racemosum* Gris.]
 ♂, *acutiloba* Cogn.
 — *Americana* Cogn.
 γ, *vulgaris* Cogn. [*Trianospermum graciliflorum* Gris.; *Cionandra graciliflora* Gris.]
Elaterium Carthaginense Jacq.
Sicydium Tamnifolium Cogn. [*Triceratia Bryonioides* Rich.]
Lagenaria vulgaris Seringe (Cult.!)—*Güiro cimarrón*.
Cucumis Melo Lin. (Cult.!)—*Melón de Castilla*.
 — *sativus* Lin. (Cult.!)—*Pepino*.
 — *Anguria* Lin. (Cult.!)—*Pepino cimarrón*.
Citrullus vulgaris Schr. (Cult.)—*Melón de agua*.
Cucurbita maxima Duchesne (Cult.!)—*Calabaza amarilla*.

Cucurbita Melopepo Lin. (Cult.!)—*Calabaza bonetera*.

Sechium edule Sw. (Cult.!)—*Chayote*.

Feuillea cordifolia Lin.—*Sécua, Pepita amarga?*

Rubiáceas.

Manettia coccinea Willd. [M. Havanensis Kunth, Cand. M. cuspidata Bertero].—*Cambustera cimarrona*.

— Lygistoides Gris.—*Cambustera del país*.

Ferdinandusa angustata Wr. (Ferdinandea) [Rondeletia Sauval, nombre].—*Caobilla de sabana, de flor punzó, Hatillo*.

— stellata Gris. (Ferdinandea) [Rondeletia Sauval, nombre].—*Caobilla de sabana, Encospe, Hatillo*.

— brachycarpa Gris. (Ferdinandea) [Rondeletia Sauval, nombre].

β, hispidula Gris. (Ferdinandea brachycarpa, var. hispidula).

Calycophyllon candidissimum Cand. (Calycophyllum).—*Dagame*.

Hillia longiflora Sw.

— tetrandra Sw.

Exostema floribundum Röm. y Schult. (Exostemma).—*Chinchona, Quina, Quina pitón, Vigüeta, Vigüeta naranjo, blanca*.

— ellipticum Gris. (Exostemma).—*Chinchona* (tipoy var.) β, rotundatum [Exostemma rotundatum Gris.] (1).

γ, triflorum [Exostemma triflorum Gris.] (2), no G. Don.]

— Caribæum Röm. y Schult. (Exostemma).—*Macagua de costa, Cerillo*.

— longiflorum Röm. y Schult. (Exostemma).—*Clavelina de río*.

— parviflorum L. C. Rich. (3). [Exostemma Valenzuelæ A. Rich.]

(1) Es error de Sauval el *Exostemma rotundifolium* Gris.

(2) *Cat.*

(3) Es erróneo *Exostemma parviflorum* L. C. Rich.

Exostema Salicifolium Gris. (*Exostemma*.)

- *Vavasorii* Gris. (*Exostemma*) [*Catesbæa* Spreng.]
- *purpureum* Gris. (*Exostemma*).
- *Myrtifolium* Gris. (*Exostemma*).
- *Neriifolium* A. Rich. (*Exostemma*).—*Agracejo car-*
bonero.
- *triflorum* G. Don. (*Exostemma*).

Chimarrhis cymosa Jacq. [*Psychotria Chimarrhoides* Cand.,
en lo referente al ejemplar cubano de la Sa-
gra (1).]

Oldenlandia herbacea, Cand. [*O. corymbosa* Gris., no Lin.?

- *Halei* A. Gray., Chapm. [*Pentodon* A. Gray.,
O. succulenta Wr.]
- *Callitrichoides* Gris. (1640, en parte (2).]
- *capillipes* Gris.
- *glomerata* Mich.^x [*Hedyotis* Ellis.]
- *cœrulea* A. Gray. (exót.?) [*Houstonia* Lin., *Hedyo-*
tis Hook.]
- *β, patens* (Silv.) [*Hedyotis cœrulea* Hook., var. *pa-*
tens Ellis, según Gris., *Hedyotis patens* Ellis.]
- *tuberosa* Lam.^k [*Lucya* Cand.]

Macrocnemum Cubense Gris.

Mitreola petiolata Torrey y A. Gray.

Portlandia pendula Wr.

- *longiflora* Meissn. [*Goniantes Sagræana* Rich.]
- *Gypsophila* Macf. [*Gonianthes Lindeniana* Rich.]

Rondeletia odorata Jacq. *Rondelecia*, *Cordobancillo*, *Careicillo*
de monte.

- *Americana* Lin.
- *umbellulata* Sw.? [*R. Buxifolia*, Gris., no Vahl.]
- *Camarioca* Sauval.
- *hypoleuca* Gris.
- *pedicellaris* Sauval.
- *venosa* Wr.—*Rondelecia del pinar*.
- *Chamæbuxifolia* Gris.
- *avenia* Sauval.

(1) En lo demás, esa *Psychotria* es una *Uragoga*.

(2) La otra parte es el *Micranthemum Callitrichoides* Sauval, nombre: *Escrofulari-*
nea silvestre.

Rondeletia Phialanthoides Gris.—*Rondelecia de cuabal*, *R. pyramidal*.

- Buxifolia Vahl. [R. Poitæi Gris., Stevensia Buxifolia Poit.?.]
- Correifolia Gris.
- Tinifolia Gris.—*Adedica*, *Caobilla de sabana*, *de flor blanca*.
- peduncularis Rich.
- microphylla Gris.—*Rondelecia de hojas menudas*.
- rigida Gris.
- Alaternoides Rich.—*Caobilla de sabana*, *Vigueta blanca*.
- microdon Cand.
- lævigata Ait.

Rhachicallis rupestris Cand.

Polypremum procumbens Lin.

Posoqueria Havanensis Cand.

Genipa Americana Lin.—*Jagua*.

- Caruto Kunth.—*Jagua*, *Jagüilla*.
- florida G.-M. (Cult.!) [Gardenia Lin.]—*Jazmín del Cabo*, *Gardenia*.
- aculeata [Randia Lin. R. latifolia Lam.^k, R. aculeata Gris., *Cat. pl. Cub.* y *Pl. Wright.*, en parte.]—*Agalla de costa*, *Pitajoni bravo*, *P. espinoso*.
- Clusiæfolia Gris.—*Jagua amarilla*, *J. de costa*, *Pera del mar*.
- nigrescens [Randia Gris.]—*Palo cabra*.
- ciliolata [Randia aculeata Gris., *Cat. pl. Cub.* y *Pl. Wright.*, en parte, Randia ciliolata Sauval.]—*Agalla*.
- Sagraæana [Randia Rich., no Gris.]
- calophilla [Casasia Rich. (1) Randia Gris.]—*Árbol de la nuez*, *Guayacancillo de loma*, *Rascabarriga amarillo*.
- longiflora [Sphinctanthus longiflorus Gris.]

Amaioua edulis H. B.^{rr} [Alibertia Rich.]—*Pitajoni*, *P. hembra*.

- fagifolia Desf.—*Pitajoni cimarrón*, *P. macho*.
- Jacquinioides [Alibertia Gris.]

(1) En la Sagra *Hist. Cuba*, descripción de la especie; no lám. 49, que es una *Ebenácea* silvestre: la *Maba Caribæa*.

Catesbæa spinosa Lin. [*C. macrantha* Rich.].—*Catesbea*.

- *macracantha* Sauval.
- *holacantha* Wr.
- *Grayi* Gris.
- *Phyllacantha* Gris.—*Ja sin hojas*.

Hamelia patens Jacq.—*Ponasi*, *Palo de coral*, *Coral*, *Bonasi*.

- *ventricosa* Sw.?
- *lutea* Rohr.—*Panasi amarillo*.
- *cuprea* Gris.

Bertiera Gonzaleoides Wr.

Schradera cephalophora Gris.

Isertia Hænkeana Cand.

Gonzalagunia spicata Cand. (Gonzalea).—*Vinagrera*.

- *leptantha* Rich. (Gonzalea).
- *Petesia* Gris. (Gonzalea) [*Petesia spicata* Sw.]

Coccocypselum repens Sw.

- *nummulariæfolium* Cham. y Schlecht.

Cephalanthus Occidentalis Lin.—*Aroma de laguna*.

Guettarda scabra Lam.^k [*G. rugosa* Sw.; *G. Viburnoide* Cham. y Schlecht; *G. Havanensis* Cand.; *G. ambigua* Rich., no Cand.].—*Cuero*.

- *longiflora* Gris.—*Cuero*.
- *elliptica* Sw. [*G. odorata* Lam.^k; *G. Blodgettii* Shuttlew].—*Cuero de sabana*.
- *Lindeniana* Rich.—*Cuero* (tip. y var.)
β, *reticulata* [*G. reticulata* Gris.]
- *calyptrata* Rich.—*Cuero de hojas grandes*, *Guayabillo*, *Guayabito* (tipo y var.)
β, *ferruginea* Sauval, nombre [*G. ferruginea* Wr.]
- *macrocarpa* Gris.—*Cuero de hojas medianas*.
- *undulata* Gris.—*Cuero*.
- *rigida* Rich.—*Cuero duro*.
- *holcocarpa* Sauval.—*Cuero de hojas menudas*.
- *bracteata* Gris.—*Cuero*.
- *retusa* Sauval.—*Cuero*.
- *zygophlebia* Sauval.—*Cuero*.
- *echinodendron* Sauval, nombre [*Stenostomum microphyllum* Gris.]
- *pauciflora* [*Stenostomum pauciflorum* Sauval; *St. radiatum* Gris., var.].—*Vera*.

Guettarda lucida Pers. [St. lucidum Gärtn.] — *Llorón, Palo llorón*.

- nitida [St. nitidum Cand.; St. granulatum Gris.; variedad]. — *Vera*.
- rotundata [St. rotundatum Gris.] — *Caobilla de costa*.
- Myrtifolia [St. Myrtifolium Gris.]
- densiflora [St. densiflorum Wr.]
- granulata [St. granulatum Gris. (excluyendo la variedad)]. — *Vera*.
- resinosa Pers. [St. resinosum Gris.]
- fasciculata [Chomelia Sw.; Rondeletia leptacantha Cand.]
- triacantha [Chomelia Gris.]

Machaonia cymosa Gris. — *Espino*.

- microphylla Gris. — *Espino de hojas chicas*.

Erithalis fruticosa Lin. — *Jayajabico, Yayajabico* (tipo y var.)

- β, odorifera Gris. (1) [Erithalis Jacq.]
- rotundata Gris. — *Huevo de perro, Vibona*.
- parviflora Gris. — *Vibona*.
- angustifolia Cand. — *Jayajabico, Yayajabico*.
- ? pentagonia Cand. — *Vibona*.
- Vacciniæfolia Sauval, nombre [Chione Gris.]

Ceratopyxis Verbenacea Hook. Sr. [Rondeletia? Verbenacea Gris.; Phialanthus spicatus Sauval, nombre].

Chiococca racemosa Jacq. — *Bejuco de berraco, Cainca* (tipo y variedad).

- θ, Jacquiniiana Gris., nombre. — *Pl. Wright.*, 508.
- nitida, Benth.
- densifolia Mart. (exót.)
- β, Cubensis Cand. — Omitida por Sauval.
- anguifuga Mart. (Cuba?). — Gris. y Sauval la omiten.
- parvifolia Wulschlägel.

Phialanthus rigidus Gris. — *Guacanijo*.

- resinifluus Gris.
- stillans Gris. — *Jaragua*.
- Myrtilloides Gris. — *Jaragua*.

Scolosanthus parviflorus Sauval, nombre [Catesbæa parviflo-

(1) Var. considerada por Sauval como sinónimo del *E. rotundata* Gris.

ra Gris., Sw., Lam.^k; Echinodendrum campanulatum Rich.] (1).—*Jia*, *Catesbea*.

Scolosanthus crucifer Sauval. [Randia Sagraeana Gris., no Rich.]

— Wrightii Sauval, nombre [Randia Wrightiana Gris.] (2).

Chione elliptica Gris.—*Icaquillo*.

— Myrtifolia Gris.

— lucida Gris.

Ixora Bandhuca Roxb. [I. coccinea Lin.] (Cult.!)—*Santa Rita*.

— ferrea Benth. [Siderodendron triflorum Vahl.]—*Lengua de vaca*.

— floribunda Gris. [Siderodendrum floribundum Rich.]—*Lengua de vaca*.

— odorata Hook. (Cult.!)—*Ixora*.

Coffea Arabica Lin. (Cult.!)—*Café*, *Cafeto*.

Phyllomelia coronata Gris.

Morinda Royoc Lin.—*Piña ratón*, *arbusto*, *Raiz de indio*, *Ruibarbo de la tierra?* (tipo y var.)

β, latifolia Gris.

γ, ferruginea Rich.

Spermacoce parviflora A. Gray [Borreria Mey.; S. asperia Vahl.; Spreng.; S. laevis Spreng.; S. hirta Sw.; Mitracarpum hirtum Cand.]

— laevis Lam.^k [Borreria Gris.]

— aspera Aubl. [Borreria Perrottetii Cand.]

— Eritrichoides Gris.—*Hierba de Garro*.

— tenuior Lin.—*Hierba de Garro*.

— squamosa Wr.

— Garro [S. radicans Willd., nombre; no Aubl. Dioidia radicans Cham. y Schlecht.]—*Hierba de Garro*.

— rubricaulis Sauval.

— Thymocephala Sauval, nombre.


— Domingensis Sauval, nombre.

— Strumpfioides Wr.

— simplex [Dioidia Sw.]

(1) Es erróneo Echinodendro parviflorum Rich.

(2) Es erróneo Randia Wrightii Gris.



- Spermacoce spinosa Lin. [Borreria Cham. y Schlecht.]
- podocephala A. Gray [Borreria Cand.; S. pygmæa Sauval.]
 - Richarsonioides Sauval, nombre (2776) [Richardsonia muricata Gris., en parte].
 - verticillata Sw. [Borreria Mey.; S. verticillata Lin.; var. Americana Lin.].—Omitida por Sauval.
 - squarrosa Pöpp. [Mitracarpum squarrosum Cham. y Schlecht.]
 - sarcophylla [Mitracarpum crassifolium Rich.]
 - læteviride [Mitracarpum Sauval.]
 - Sagraæana [Mitracarpum Cand.]
 - Disdioides [Mitracarpum Rich.]
 - Lippioides [Diodia Gris.].—*Hierba de Garro*.
 - maritima [Diodia Schum.]
 - rigida Willd.; Kunth.; no Salisb.—*Hierba de Garro*.
 - villosa Sw. [S. hirta Jacq.; Lin.?].—Omitida por Sauval.
 - ? obscura Cand.—Omitida por Gris.? y Sauval.
 - rubra Jacq. [Crusea Cham. y Schlecht.]
- Richardia scabra Lin. [Richardsonia S.^t-Hil.; Richardia Brasiliensis Gómez].
- muricata Gris. (Richardsonia), en parte (2777).—La otra parte es el Spermacoce Richarsonioides Sauval, nombre.
- Coussarea odoratissima [Faramea Cand.].—*Cafè cimarrón, Cafetillo, Jujúano, Nabaco, Palo de toro*.
- ? sertulifera [Faramea Cand.].—*Lechoso?*
- Uragoga (Margaritopsis) acuifolia G.-M., *Dicc. bot.*, 88 [Margaris nudiflora Gris., no Cand.; Margaritopsis acuifolia Sauval.].—*Perlitas*.
- (Euuragoga) muscosa G.-M., *Rev. de Cienc. Méd.*, Habana, 1889, pág. 105 [Morinda Jacq.; Tapogomea Poir.; Cephælis Sw.].—*Ipecacuana cimarrona*.
 - (Geophila) reniforme [Geophila reniformis Don., Cham. y Schlecht.; Psychotria herbacea Lin.].—*Bejuco guará*.
 - (Psychotria) grandis [Psychotria Sw.]
 - — marginata [Ps. Sw.; Ps. lasiophthalma]

Gris., en parte].—*Lengua de vaca*, *Tapacamino*.

Uragoga (Psychotria) Brownei [Ps. Spreng.; Ps. Asiatica Lam.^k; Ps. Celastroides Gris.; *Cat.*, en parte, no *Flora*; Palicourea crocea Gris., en parte, no Cand.; Ps. puberula Wr.; Ps. obovalis Rich.].—*Palo moro*.

— undata [Ps. Jacq.; Ps. nervosa Sw.; Ps. stipulacea Sw.; Ps. oligotricha Cand.; Ps. horizontalis Spreng., no Sw.; Ps. undulata Poir.; Ps. lanceolata Nutt., no Gris., ni Sauval; Ps. Chimarrhoides Gris.; Cand., en parte?; Ps. rufescens Kunth.; Ps. Porto-Riccensis Cand.?]

— tenuifolia [Ps. Sw.; Ps. lanceolata Gris.; Sauval, no Nutt.]

— tubulosa [Ps. Rich.; Ps. lasiophthalma Gris., en parte; Ps. Celastroides Gris.; *Cat.*, en parte, no *Flora*; Ps. longicollis Benth.; Ps. alba R. y Pav.?]

— floribunda [Ps. Kunth.].—Omitida por Sauval.

— dura [Ps. Smith.]

— Laurifolia [Ps. Sw.; Ps. glabrata Sw.; Ps. Carthagenensis Jacq.?; Faramea erythrocarpa Gris.]

— coronata [Ps. Gris.].—*Lengua de vaca*, *Taburete*.

— costivenia [Ps. Gris.].—*Lengua de vaca*.

— trispicata [Ps. Gris.]

— auriculata [Ps. Wr.]

— rufovaginata [Ps. Gris.; Ps. evenia Wr.]

— uliginosa [Ps. Sw.; Ps. lævis Cand.; Ps. crassa Gris., *Cat.* y *Pl. Wright.*?, no Benth.].—*Tapacamino*.

— parasitica [Ps. Sw.; Ps. crassa Gris., *Cat.* y *Pl. Wright.*?, no Benth.].—*Tapacamino*?

— nutans [Ps. Sw.; Ps. oligantha Cand.].—*Tapacamino*.

Uragoga (Psychotria) subulata [Ps. Wr.]—*Tapa-camino*.

— — odorata [Ps. Wr.]—*Tapa-camino*.

— — bialata [Ps. Wr.]—*Tapa-camino*.

— — vaginata [Faramaea Gris.; Coussarea G.-M., nombre].—*Nabaco*.

— — patens [Ps. Sw.]

— — pubescens [Ps. Sw.]—*Taburete*.

— — Berteriana [Ps. Cand.]

— — pyramidalis [Ps. Gris.]

— — brachiata [Ps. Sw.; Ps. Hebecladoides Gris.]

— — involucrata [Ps. Rich.]—*Taburete de flor blanca*.

— — tribracteata [Ps. Wr.; Ps. oligantha A. Gray., no Cand.]

— (Palicourea) crocea [Pal. Cand., no Rich.; Gris. en parte; Ps. Sw., no Mey.]—*Taburete de flor marañuela*.

— — Tapa-camino [Pal. crocea Cand.; β , tenuiflora Gris.; Pal. species? Sauval, nombre].—*Tapa-camino*.

— — Alpina [Pal. Cand.; Pal. crocea Rich., no Cand.; Ps. crocea Mey., no Sw.; Pal. eriantha Cand.]—*Tapa-camino*.

— — Pavetta [Pal. Cand.]—*Taburete, Tapa-camino*.

— — didymocarpa [Ronabea? didymocarpos A. Rich., Cand.; Pal. didymocarpa Gris.]

— (sección?) foveolata [Ps. R. y Pav.]

Declieuxia Mexicana Cand.? (2733); ó D. Chiococcoides Kunth?

Lasianthus lanceolatus [Hoffmannia? lanceolata Gris.; Sabicea Moralesii Gris.; Lasianthus Moralesii Sauval, nombre].

Strumpfia maritima Jacq.

APÉNDICE 1.

Leguminosas.

Según se dijo en los ANALES, XIX, 237, solamente se exponía el catálogo de las Leguminosas, Mimóseas y Cesalpíneas, refiriéndose, para las Papilionáceas, á nuestro *Estudio sobre la representación de las Leguminosas Papilionáceas en Puerto-Rico y en Cuba*. Posteriormente, hemos considerado conveniente anular ese trabajo, por lo que necesitamos completar el catálogo de aquella familia con el presente, que se refiere á las Papilionáceas.

Vicia sativa Lin. (Cult.)—*Alverja*.

— Faba Lin. [Faba vulgaris Möncb.] (Cult.)—*Haba*.

Pisum sativum Lin. (Cult.)—*Guisante*, *Chicharo*.

Cicer arietinum Lin. (Cult.)—*Garbanzo*.

Abrus precatorius Lin.—*Peonia*, *P. de Saint-Thómas*.

Phaseolus lunatus Lin.—*Frijolito*.

— gibbosifolius Ortega.

— vulgaris Lin. (Cult.)—*Frijol*.

— microspermus Ortega.

— semierectus Lin. [Ph. Crotalarioides Rich.]

β, gracilis [Ph. linearis Kunth].

γ, atropurpureus [Phaseolus *Fl. Mex. icon. ined.*]

— multiflorus Willd. (Cult.)

— trichocarpus Sauval. [Ph. ovatus Gris., no Benth.]

— Clitorioides Mart.? [Ph. Crotalarioides Gris.]

— Caracalla Lin. (Cult.!)—*Caracol real*.

— tuberosus Lours. (Cult.)—*Jicama*.

Dolichos Lablab Lin. (ofrece algunas var.) (Cult.!)—*Frijol caballero*.

— sesquipedalis Lin. (Cult.)—*Frijol grande*.

— melanophthalmus Cand. (Cult.)—*Judia de carita*, *Frijol de carita*.

Vigna luteola Benth. [*V. glabra* Savi.; *V. villosa* Savi.; *Dolichos repens* Lin.; *D. luteus* Sw.; *D. luteolus* Jacq.]—*Frijol cimarrón*.

— *vexillata* Rich. [*Dolichos vexillatus* Kunt.; Idem, α , Cand.; *Phaseolus vexillatus* Lin.]—*Marrullero, Caracolillos de cerca*.

— *unguiculata* Walp. [*Dolichos unguiculatus* Jacq.]—*Frijol*.

Pachyrhizus angulatus Rich.—*Jicama dulce*.

Galactia filiformis Bents. [*G. Berteriana* Cand.] (136, 1593).

β , *Cubensis* [*Galactia* Kunth.]

— *angustifolia* Kunth. (1179).—*Soplillo*.

— *monophylla* Gris.

— *brachyodon* Gris. (135, 1180).

— *parvifolia* Rich.

— *odonia* Gris.

— *Rudolphioides* Benth. y Hook. [*Dioclea* Gris.] (1181).

— *impressa* Wr. [*Dioclea Galactioides* Gris.]

Calopogonium cæruleum Benth. [*Stenolobium* Benth.]—*Jicama cimarrona*.

Erythrina glauca Willd.—*Búcare*.

— *Corallodendron* Lin.—*Piñón espinoso, P. de costa*.

— *Cubensis* Sauval. [*E. Corallodendron* Gris., Lin.; *E. enneandra* Cand.?]—*Piñón de sierra*.

— *carnea* Ait.—Omitida por Sauval.

— *rosea*, autor? (Cult.)

— *reticulata*, autor? (Cult.)

— *Crista-Galli* Lin. (Cult.)—*Piñón francés*.

— *velutina* Willd.—*Piñón real, P. inglés*.

— *mitis* Jac. (Cuba?).—*Piñón de Cuba?* Especie dudosa.

Mucuna pruriens Cand.—*Pica-pica*.

— *altissima* Cand.

— *urens* Cand.—*Ojo de buey*.

Canavali ⁽¹⁾ *obtusifolia* Cand. (*Canavalia*) [*Canavalia rosea* Cand.; *Canavalia miniata* Cand.; *Dolichos emarginatus* Jacq.]—*Cayajabo, Mate de costa*.

— *reflexa* Hook. h. (*Canavalia*) [*Canavalia miniata* Gris.?, no Cand.]—*Ojo de buey, de costa*.

(1) Es erróneo el término *Canavallia*; Sauval lo emplea.

Canavali gladiata Cand. (Canavalia).—*Soplillo*.

— Cubensis Gris. (Canavalia).—*Mate*.

Herpyza grandiflora Sauval. [Teramnus? grandiflorus Gris.]—

Papo de yegua.

Teramnus uncinatus Sw.—*Cresta de gallo, blanca*.

Centrosema Plumieri Benth.

— pubescens Benth.

— Virginianum Benth. (131).

β, angustifolium Gris. (1177, 1178).

— hastatum Benth. (1591).

Clitoria Ternatea Lin. (Cult.)—*Conchita azul, Bejuco de conchitas*.

— Glycinoides Cand.

— glomerata Gris.—*Conchita*.

— speciosa Cav. (Cuba?)—*Frijol de olor*.

— Cajanifolia Benth.

Cajanus Indicus Spreng. (Cult.)—*Gandul*.

Fagelia bituminosa Cand. (Cult.)—*Papito de la reina, Papo de la reina*.

Rhynchosia minima Cand.—*Peonia chica*.

— Phaseoloides Cand.—*Peonia criolla*.

— reticulata Cand. [R. macrophylla Rich.]—*Peonia de semilla blanca*.

— Caribæa Cand.—*Peonia de sabana*.

— parvifolia Cand.—*Peonia*.

Eriosema crinitum E. Mey.

— violaceum E. Mey.

Barbieria pinnata H. B.ⁿ [B. polyphylla Cand.]

Tephrosia cinerea Pers.—*Barbesco* (tipo y var.)

β, litoralis Gris.

— Apollinea Cand.—Omitida por Sauval.

— Domingensis Pers.

— rufescens Benth.?

Gliricidia Cubensis Sauval, nombre [Robinia? Cubensis Kunth.;


Lonchocarpus Cubense Rich.]—*Peñón plumago,*

P. violento.

— platycarpa Gris.—*Cucharillo, Frijolillo, Jurabáina*.

— Sepium Kunth [Lonchocarpus Cand.; Robinia Jacq.]
(Cuba?)

Corynella inmarginata Sauval.



Corynella gracilis Gris.

Sesbania Ægyptiaca Pers.—*Añil francés*.

— *Occidentalis* Pers.

— *grandiflora* Poir. [*Æschynomene* Lin.; *Agati* Desv.]
(Cult.)

Indigofera Anil Lin.—*Añil*.

— *microcarpa* Desv. [*I. Domingensis* Spreng.; *Dalea Fephrosioides* Gris.]—*Añil*.

— *Lespedezioides* Kunth?—*Añil cimarrón, Jiquilete*.

— *Cytisoides* Thunb. (Cult.)

— *Pascuorum* Benth.—*Añil*.

— *tinctoria* Lin.—*Añil*.

Harpalyce Cubensis Gris.—*Cerillo de costa*.

Dalea mutabilis Willd.

Æschynomene sensitiva Sw.

— *tuberculata* Gris.

— *Americana* Lin.—*Pega-pega*.

— *viscidula* Mich.^x [*Æ. Brasiliana* Cand.; *Æ. falcata* Cand.; *Æ. paucijuga* Cand. Id.; β , *subscabras* Cand.]—*Dormidera*.

— *tenuis* Gris.

— *evenia* Sauval.

Brya ebenus Cand.—*Granadillo*.

Pictetia angustifolia Gris.

— *marginata* Sauval. [*P. ternata* Gris.; Sauval; no Cand.]
Jamaquey, J. de tres hojas.

Poiretia refracta Gris.

Stylosanthes procumbens Sw.

— *viscosa* Sw.

Zornia Sloanei Gris.

— *diphylla* Pers. [*Z. angustifolia* Smith?, *Z. reticulata* Smith., Id., β , *puberula* Cand., *Z. gracilis* Cand., *Z. Havanensis* Rich., *Z. elatior* Benth.]

β , *stenophylla* Gris.

Arachis hypogæa Lin. (Cult.)—*Mani*.

Desmodium triflorum Cand.

— *adscendens* Cand. (Cuba? Cult?)

— *incanum* Cand. (*D. adscendens* Gris., para Cuba, no Cand.)—*Amor seco*.

— *barbatum* Benth.—*Amor seco*.

Desmodium axillare Cand.—*Amor seco*.

- *Scorpiurus* Desv.
- *spirale* Cand.
- *tortuosum* Cand.
- *ciliare* Cand.—*Amor seco*, *Pega-pega*.
- *uncinatum* Cand.?
- *canescens* Cand. (Cuba, Cult.?)—*Amor seco*, *chico?*
- *infractum* Cand. (Cuba?, Cult.?).—*Amor seco*, *mediano?*
- *umbellatum* Cand. (Cuba?, Cult.?)

Lespedeza polystachya Mich.^x (Cuba?, Cult.?)—*Amor seco*, *grande?*

Ecastaphyllum Brownei Pers. (*Ecastaphyllum*) [*Ecastaphyllum frutescens* P. Br.]—*Péndola*.

- *Monetaria* Cand. (*Ecastaphyllum*) [*Ecastaphyllum Plumieri* Poir., *Ecastaphyllum Benthianum* Miq.]—*Péndola*.

Dalbergia Amerimnum Benth.—*Péndola*.

Andira inermis Kunth. [no *A. racemosa* Lam.^k]—*Saba*.

- *Cubensis* Benth.—Omitida por Sauval.
- *microcarpa* Desv. [*A. retusa* Gris., no Kunth.]—*Saba amarilla*.

Lonchocarpus pyxidarius Cand.—*Palo de caja?*

- *Blainii*, Sauval.—*Guamá de San Bartolomé*.
- *latifolius* Kunth.—*Guamá de costa*.
- *sericeus* Kunth.—*Guamá*, *G. bobo*.

Piscidia erythrina Lin.—*Guamá hediondo*, *Candelón*.

Behaimia Cubensis Gris.—*Guayacancillo de costa*.

Lupinus albus Lin. (Cult.)—*Chochó*.

Crotalaria sagittalis Lin. [*C. stipularis* Desv.; *C. Espadilla* Kunth.]

- *verrucosa* Lin. (exót.)
- β , *obtusata* Cand. (α) [*C. cærulea* Jacq.; *C. angulosa* Lam.^k] (Cult.!)—*Cascabelillo*.
- *retusa* Lin.
- *pterocaula* Desv.—*Maromera*, *Marimena*.
- *Vilaroi* G.—M. y Mol.^t [*C. pumila* Ortega; *C. litoralis* Kunth; *C. Lupulina* Cand.?]—*Maromera*.
- *Lotifolia* Lin. [*C. axillaris* Ait.]—*Cascabelillo*.
- *incana* Lin. [*C. Cubensis* Cand.]—*Canario*.

Crotalaria Anagyroides Kunth.? [*C. striata* Cand.]—*Maruga*
(tipo y var.)

β, *pauciflora* Gris.

Sophora tomentosa Lin.—*Tambalisa*.

Ateleia Cubensis Gris. [*Swartzia multijuga* Rich.; *Pterocarpus*
gummifer Rich.?]—*Guayacancillo bobo*, *Guamacillo*.

— *apetala* Gris.—*M... de gallina*.

Belairia spinosa Rich.—*Jamaquey de loma*.

— *mucronata* Gris.—*Jamaquey*.

— *ternata* Wr.—Omitida por Sauval.

Myrospermum frutescens Jacq. (exót.)

β, *emarginatum* [*Myrospermum* Klotzsch] (Cult.)

—*Bálsamo de Guatemala*.

Toluiifera Balsamum Lin., Mill. [*Myroxilum Toluiiferum* Rich.]
(Cult.)—*Bálsamo de Tolú*.

β, *Peruiferum* [*Myrospermum* Cand.] (Cult.)—*Bálsamo del Perú*.

APÉNDICE 2.

Mirtáceas.

En el catálogo de esa familia (ANALES, XIX, 245) se hizo inadvertidamente referencia á nuestro *Ensayo de Farmacofitología cubana*; pero en esta obra no se citan los géneros *Myrcia*, *Psidium* y *Mouriri* (*Mouriria*), por cuyo motivo se expone á continuación el catálogo de las especies cubanas de los dos primeros géneros y se hace la corrección adecuada al *Mouriri*.

Myrcia coriacea Cand.—*Pimiento de monte*, *P. malagueta* (tipo y var.)

β, *reticulata* Gris.

— *splendens* Cand.

— *ferruginea* Gris.?

— *Lindeniana* Sauval, nombre [*Gomidezia* Berg.]

Myrcia Valenzuelana Rich.—*Pimiento cimarrón*.

Psidium Guayava Raddi (ofrece alguna var.)—*Guayabo agrio*,
G. silvestre, *G. blanco*, *G. del Perú*.

— Calycolpoides Gris.

— Guayavita Rich. (ofrece algunas var.)—*Guayabo del pinar*, *Guayabita del pinar*.

— cordatum Sims.

var.?, parvifolium Gris.

— nitidum Sauval.

— nummularia Sauval, nombre [Calyptranthes Berg.;
Eugenia Wr.]

— parvifolium Gris.—*Guayabito San Antonio*.

— rotundatum Gris.

var., triflorum Gris.

Entiéndase *Mouriri spathulata* Gris. (*Mouriria*).—*Mirto del país*.

Disposición de las familias de las Periantiadas.

Además de las 101 familias que representan en Cuba la sub-clase de las Periantiadas, ésta comprende 15, completamente exóticas. El total de esas 116 familias, el orden en que se disponen, las exóticas en Cuba—que se indican con un asterisco y las que tienen su catálogo en la primera parte del actual, se expone en el siguiente cuadro (1):

ORDEN I.—Dialipétalas.

SUBORDEN I.—Dialipétalas superovariadas.

Ranunculáceas. I.

Anonáceas.

Magnoliáceas. I.

Monimiáceas. *

Menisperméas.

Miristíceas. *

Berberídeas. I.

Lauríneas.

Ninfeáceas. I.

Malváceas. I.

Ternstremiáceas. I.

Clusiáceas.

Dileniáceas.

Ocnáceas.

Dipterocarpeas. *

Sarcoléneas. *

Humírieas. *

Euforbiáceas.

(1) Tomado de nuestras *Nociones de Botánica sistemática*. Habana, 1893, páginas 20 y 21.

Búxeas.	Papaveráceas. I.	Poligáleas. I.
Empétréas. *	Geraniáceas. I.	Tremándreas. *
Cístéas. I.	Lináceas. I (y II).	Voquisiáceas. *
Bixáceas.	Crasuláceas. I (y II).	Leguminosas. I (y II).
Samídeas.	Elatíneas. I.	Connáreas. I.
Pasiflóreas.	Cariofileas. I.	Rosáceas. I.
Hipericáceas. I.	Portuláceas. I.	Moríngéas. I.
Tamariscíneas. I.	Zigofileas. I.	Celastráceas. I.
Violáceas. I.	Rutáceas. I.	Dicapetáleas. I.
Droseráceas. I.	Meliáceas.	Ilicíneas. I.
Sarracéneas. *	Simarúbeas. I.	Olacíneas. I.
Nepéntéas. I.	Anacardiáceas.	Víteas.
Resedáceas. I.	Sapindáceas.	Rámneas. I.
Crucíferas.	Sábíeas.	
Caparídeas. I.	Malpigiáceas. I.	

SUBORDEN II.—**Dialipétalas inferovariadas.**

Cáceas. I.	Combretáceas. I.	Umbelíferas. I.
Saxifragáceas. I.	Rizoforáceas.	Arálieas. I.
Litráceas. I.	Melastomáceas.	Pitospóreas. I.
Enoteráceas.	Mirtáceas. I.	Córneas. I.
Haloráceas.	Loáseas. I.	

ORDEN II.—**Gamopétalas.**

SUBORDEN I.—**Gamopétalas superovariadas.**

Ericáceas. I.	Estiráceas. I.	Oleáceas. I.
Epacrídeas. *	Soláneas.	Escrofularíneas.
Diapensiáceas. *	Boragíneas. I.	Labiadas. I.
Lennoéas. *	Hidrofileas. I.	Utriculárieas. I.
Ciríleas. I.	Polemoniáceas. I.	Gesneráceas.
Primuláceas. I.	Convolvuláceas.	Bignoniáceas. I.
Plumbagíneas. I.	Genciáneas. I.	Acantáceas.
Mirsíneas. I.	Logáníneas. I.	Selagináceas. I.
Sapóteas. I.	Apocíneas.	Verbenáceas.
Ebenáceas. I.	Asclepiádeas.	Plantagináceas. I.

SUBORDEN II.—**Gamopétalas inferovariadas.**

Campanuláceas. *	Cucurbitáceas.	Dipsáceas. I.
Lobélieas. I.	Rubiáceas.	Calicéreas. *
Estilídieas. *	Caprifoliáceas. I.	Compuestas. I.
Goodéníneas. I.	Valeriáneas. I.	



Go

mez de la Maza, Manuel. 1894. "Catálogo de las periantias cubanas, espontáneas y cultivadas." *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural* 23(3), 267–302.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/33958>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/285800>

Holding Institution

MBLWHOI Library

Sponsored by

MBLWHOI Library

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.