

l'abdomen, dont les deux premiers segments sont aussi lisses que les suivants; on remarque seulement chez une ♀ quelques vestiges à peine sensibles de petites rides longitudinales; chez le *leucogaster*, le premier segment et la partie antérieure du deuxième sont toujours rugueux. La tarière est plus courte, n'ayant que la moitié de la longueur du corps. Taille variable, comme celle du *leucogaster*. Le ♂ est ordinairement, mais pas toujours, plus petit; il ne diffère de la ♀ que par les caractères sexuels.

L'envoi de M. Seurat contient 13 exemplaires de cet Insecte, dont quelques-uns, des plus petits, sont signalés comme parasites sociaux de *Callidium variabile* L. La coque brunâtre pâle n'a point la forme singulière des coques de *Cæloïdes*, étant simplement cylindrique, un peu inégale.

Patrie. — Aïn Draham, Tunisie.

DESCRIPTION DE LÉPIDOPTÈRES DE MADAGASCAR,

PAR M. L. MABILLE.

M. Guillaume Grandidier, dans le long et remarquable voyage qu'il vient d'accomplir à Madagascar, a rapporté un certain nombre de Lépidoptères, dont les uns ajoutent à nos connaissances sur la distribution des espèces, et les autres enrichissent la faune de l'île.

Nous mentionnons quelques-unes des espèces les plus remarquables et décrivons celles qui nous ont paru nouvelles.

Pieridæ.

ANTHOCHARIS ZOE Grand.

ANTHOCHARIS GUENEI Mab. — Je rapporte provisoirement à ce type une femelle rapportée de Tuléar, mais qui diffère surtout par le dessous des ailes inférieures.

IDMAIS DYNAMENE Klg.

PAPILIO ANTENOR Dru., etc.

Pieris (herpaenia) Callianira n. sp.

P. alis albis nigro late fasciatis. Anticis fascia lata, nigra longitudinaliter currit a basi usque ad marginem externum, qui cum apice niger est, describitque duas fascias albas, unam costalem, alteram a margine interno usque ad mediam alam procedentem. In parte nigra sunt duæ maculæ albæ in apice et duæ ad marginem externum. Alæ posticæ albæ cum lato margine nigro sex maculis albis diviso et fasciola nigra transversa ad basim. Pagina inferior alarum posticarum griseo-rosea atomis nigris consita, et fasciis paginæ superioris obsolete fusco representatis.

Cette espèce ressemble beaucoup à la *P. Eriphia*, mais ses ailes sont d'un blanc pur; les supérieures ont l'apex et le bord externe noirs; avec quatre taches blanches, deux à l'apex et deux autres au bord externe, une large bande noire suit le milieu de l'aile, isolant une bande blanche costale qui se recourbe et s'élargit au-devant de la cellule, et une seconde qui, partie du bord interne, s'arrête à la cellule.

Les ailes inférieures sont blanches avec une large bordure noire divisée par six taches blanches anguleuses; une bandelette noire part vers l'angle antérieur de la bordure noire et va en s'amincissant jusqu'au pli abdominal.

En dessous, les dessins sont reproduits inégalement; la cellule est d'un gris bleu pâle aux ailes supérieures, et l'apex gris rosé chargé d'atomes noirs. Les inférieures sont en entier de cette couleur gris rosé, toutes piquetées d'atomes noirs, et les dessins noirs du dessus y sont reproduits par des bandes de taches gris noirâtre peu accusées.

Cette belle espèce est d'autant plus remarquable que la *P. eriphia* Klg. se trouve aussi à Madagascar et qu'on n'a pas rencontré d'autre espèce qui lui ressemble. Madagascar, environs de Tuléar.

Nymphalidæ.

Euralia (Diadema B.) Grandidieri n. sp.

E. alis nigris : anticis puncto basilari cœruleo tribusque ordinibus macularum albarum, quarum duo priores obliqui, tertius submarginalis; inferioribus macula medi ocri alba in basi, et duplici serie punctorum submarginalium, exteriori cœrulescente. Pagina inferior posticarum macula alba media tricorni, et margine antico albo.

Les quatre ailes sont d'un noir profond; les supérieures ont trois séries de taches blanches et un point bleuâtre à la base près de la côte; d'abord une série médiane en forme de bande, composée d'une tache plus longue que large dans la cellule; d'une seconde ovale au-dessous et d'une troisième petite, séparée de la précédente par le rameau 2; puis d'une bande apicale de trois taches, oblique; enfin d'une rangée de sept points, parallèle au bord, dont l'apical et le dernier sont plus gros. En outre, un rang de trois ou quatre points bleus entre les rameaux 3 et 5. Les ailes inférieures ont une grande tache ovale arrondie, blanche, une rangée de six points blancs, parallèle au bord, et une ligne de traits bleus entre celle-ci et la frange qui est noire avec les échancrures blanches.

Le dessous est semblable, mais d'une teinte mate, ou blanchâtre. La bande apicale aux premières ailes est fondue sur le bord externe en une large tache blanc terne et prolongée en une bandelette marginale, divisée par un liséré noir.

Les ailes inférieures ont le bord antérieur suivi par une bande blanche,

très nette, et offrent une large tache médiane blanche, aussi grande qu'en dessus, mais s'étendant sur tout le bord abdominal et projetant deux pointes, l'une vers l'angle antérieur et l'autre vers le milieu du bord externe; un liséré noir précède la frange et s'appuie sur un rang de taches blanchâtres, remplaçant les points bleus du dessus, mais qui, ici, sont contigus et cerclés de noir. Le corps est noir, le ventre roussâtre et les palpes blancs. — Dédié à M. G. Grandidier.

Lycaenidæ.

Hypolycæna Margites n. sp.

H. alis nigris, anticis interiore parte, posticis toto fere limbo obscure cœruleis; subtus anticis basi griseo rufa usque ad medium ubi limitatur linea albida, obliqua; parte terminali lilacea ad apicem, rubescente in margine ad angulum; posticis similibus, caudatis, linea media, alba.

Plus petit que *Ceres* Hew. Ailes supérieures noires avec une éclaircie bleu sombre sur la partie interne. Ailes inférieures presque entièrement bleues, excepté le bord antérieur. Dessous des quatre ailes d'un brun rougeâtre; les supérieures sont traversées, un peu au delà du milieu, par une ligne oblique blanchâtre; au delà, l'espace terminal est lilas vers l'apex et brun rougeâtre au bord externe vers l'angle interne; la partie lilas est traversée par des linéoles rouges, ondulées. L'intervalle 1 entre 1 et 2 est irisé et lavé de bleu. La frange est grise et précédée d'un liséré rouge. Les inférieures ont la même couleur et sont traversées par une ligne blanche doublée d'une autre rouge, anguleuse sur le pli abdominal. Sur la partie basilaire il y a deux raies rouges, une courte dans la cellule, une autre ondulée plus près de la base: toutes les deux passent sur les ailes antérieures où elles forment deux raies rouges dans la cellule. L'espace terminal est gris pâle, traversé par une ligne rouge et lavé de blanchâtre au bord antérieur et de rougeâtre au bord postérieur qui est terminé en une longue queue filiforme, marquée à sa base d'une tache brun rouge, et le bord est suivi par un liséré rouge.

Parmi les nocturnes, M. G. Grandidier n'a rapporté qu'une espèce assez rare, qui est le *Macroglossa æsalon* Mab.



Mabille, L. 1899. "Description de lépidoptères de Madagascar." *Bulletin du Muse*

um d'histoire naturelle 5(7), 373–375.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/27191>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/289738>

Holding Institution

New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library

Sponsored by

MSN

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.