

M. H. BAILLON. — *Sur le genre Pseudoseris*. — Ce nouveau genre est formé de plantes de Madagascar, dont les capitules sont à peu près ceux des Cichoriées, et qui en ont dans la plupart de leurs parties les caractères essentiels, mais dans lesquelles la corolle est bilabiée, avec une petite lèvre postérieure, formée, dans les fleurs du rayon, de deux languettes libres, linéaires ou filiformes, très-courtes et étroites par rapport à la lèvre antérieure, qui, elle, est semblable à la ligule tridentée d'un grand nombre de Cichoriées. Dans les fleurs du disque, au contraire, l'inégalité entre les deux lèvres est bien moindre, et cela parce que la lèvre antérieure devient relativement plus courte, et la postérieure, plus large et plus longue. Par là ce genre relie les Cichoriées aux Mutisiées, mais il appartient forcément à ces dernières. Les anthères ont à leur base deux soies linéaires, et le style n'est pas le même dans les fleurs du disque et dans celles du rayon. Dans les premières, il est indivis et capitellé; dans les dernières, il est partagé en deux lobes courts et obtus. Le fruit, oblong et étranglé au sommet, est surmonté d'une aigrette de nombreuses soies serrulées. Les deux *Pseudoseris* que nous connaissons sont acaules, avec des capitules solitaires au sommet des hampes. Les feuilles radicales sont entières, peu nombreuses dans une espèce récoltée par Rutenberg (*P. Rutenbergi*). Dans le *P. Grandidieri*, qui a les hampes velues, le duvet roussâtre et les fleurs d'un rouge cuivreux ou saumoné, nous ne pouvons voir les feuilles, et M. Grandidier nous assure que la plante n'en portait pas quand il l'a récoltée, dans un terrain absolument sec et rocailleux.

H. BAILLON. — *Sur le genre Placus*. — Des deux espèces attribuées en 1790 par Loureiro à ce genre, la première est bien un *Blumea*, comme le prouve l'échantillon authentique de l'herbier du *British Museum*. Peu importe, en somme, la valeur du *P. laevis* qui demeure inconnu. Le genre *Blumea* DC. ne date que de 1833, et son nom doit être oublié. D'ailleurs, le genre *Pluchea* de Cassini date de 1819, et il n'est pas séparable des *Blumea*, non plus que les *Laggera* SCH. BIP. qui ne peuvent, à notre avis, en constituer qu'une section mal délimitée.

On a blâmé Schultz et Miquel d'avoir attribué le nom de *Conyza* au genre qui renfermerait les *Pluchea* et *Blumea*, c'est-à-dire



Baillon, H. 1879. "Sur le genre Pseudoseris." *Bulletin mensuel de la Socie*

te

linne

enne de Paris 1(36), 282.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/41445>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/292623>

Holding Institution

Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by

Missouri Botanical Garden

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.

This file was generated 20 July 2023 at 20:47 UTC