revoluto (l. 2—2½ cm.); spicæ laxæ (l. 2—3½ cm.). Bracteæ exteriores lanceolatæ, margine ciliolate (l. 5 mm.); bracteæ int. minores, cæterum exterioribus similis. Corollæ bracteis duplo longior; (l. 8—10 mm.); limbi quinquepartiti, lobi ovati in appendicem linearem recurvam excurrentes.

Distr. geogr. Kurdistan.

Hab.: « in declivibus montium ».

Les espèces du genre *Crucianella* peuvent se subdiviser en deux groupes d'après les caractères des organes floraux :

Les ovaires du **1er groupe** sont 3-4 fois plus larges que la base des corolles correspondantes; les corolles sont un peu moins longues ou aussi longues que les bractées externes.

Le **second groupe** possède des ovaires de même largeur que la base des corolles et les corolles 2-3 fois plus longues que les bractées extérieures.

Cette division se justifie par la répartition géographique des espèces: les espèces du 1er groupe sont occidentales (Espagne, France méridionale, Italie, Balcans, Asie-Mineure, Egypte, Maroc).

Celles du 2e sont orientales (Kurdistan, Arménie, Arabie, Perse, Afganistan) : *Crucianella Kurdistanica* sp. n. appartient à ce second groupe.

LE BUIS

DANS LE

BASSIN DE SALLANCHES (HAUTE-SAVOIE)

PAR

Gustave BEAUVERD.

Le **Buxus sempervirens** L., si abondant en diverses localités de la Hte-Savoie, n'était jusqu'alors connu dans les montagnes de la vallée de l'Arve que par les quelques taches situées aux abords de la cascade d'Arpenaz et du village de Passy (environs de Sallanches). — Une excursion que nous avions entreprise en Juin 1908 nous permit de constater sa présence sur la rive opposée de l'Arve, où il occupe une aire considérable (9 kil. carrés, entre 550-1100 m. d'altitude) comme sous-bois des forêts de Blancheville, commune de St-Roch, à l'extrémité Nord-Est de la chaîne des Aravis (Alpes d'Annecy).

Cette trouvaille qui enrichit la flore des Aravis d'une bonne unité nouvelle, offre un intérêt géographique évident en soulignant l'importance de la vallée de l'Arly considérée comme principale voie d'immigration de l'élément méridional dans le bassin de Sallanches; d'autre particularités importantes relatives à cette trouvaille et à celle de certaines espèces concomitantes seront développées ultérieurement.

Blancheville près Sallanches, 24 août 1908.

Beauverd, Gustave. 1908. "LE BUIS DANS LE BASSIN DE SALLANCHES (Haute-Savoie)." *Bulletin de l'Herbier Boissier* 8(9), 624–625.

View This Item Online: https://www.biodiversitylibrary.org/item/104945
Permalink: https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/292943

Holding Institution
New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library

Sponsored by
The LuEsther T Mertz Library, the New York Botanical Garden

Copyright & Reuse
Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.
Rights: https://www.biodiversitylibrary.org/permissions/

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at https://www.biodiversitylibrary.org.

This file was generated 4 June 2023 at 13:08 UTC