

# SPECIES HEPATICARUM

AUCTORE

Franz STEPHANI

(Suite.)

## 4. *Calypogeia Mülleriæna* Schffn. Lotos 1900, p. 23.

Monoica brunnescens depresso-cæspitosa. *Caulis* ad 15 mm. longus repens crassus viridis parum ramosus. *Folia caulina* sub 1 mm. longa dense imbricata valde convexa, oblique patula oblique cordiformia lata basi inserta antice cauli sat late incumbentia postice vix decurrentia apice obtusa, inferiora acutiuscula vel bidentula sæpe longe decurrentia. *Cellulæ* superæ 30  $\mu$  basales 40  $\times$  60  $\mu$  leptodermes. *Amphigastria caulina* magna appressa caule subtriplo latiora reniformia sinuatim inserta apice ad  $\frac{1}{4}$  vel  $\frac{1}{2}$  inciso-biloba, sinu recto obtuso vel acuto lobis late triangulatis obtusissimis. *Folia floralia* irregulariter 4-5 lobata lobis acutis. *Marsupia* et sporangia ut in *C. Trichomanis*, *elateres* parum validiores 14  $\mu$ , *sporæ* quidem multo minores (10-11  $\mu$ ). *Andräcia* parva monandria et diandria, bracteis 3-4 lobatis lobis acutis.

Hab. Germania, Baden (C. Müller, Friburg); Silesia (Hora).

## 5. *Calypogeia cordifolia* St. n. sp.

Sterilis major fusco-viridis flaccida in humo late expansa. *Caulis* ad 4 cm. longus validus fuscus debilis parum ramosus. *Folia caulina* 0,8 mm. longa imbricata recte patula plano-disticha antice ampliata caulem tegentia, postice vix decurrentia ambitu cordiformia i. e. e basi angustiore late triangulata apice obtusa vix longiora quam lata. *Cellulæ* superæ 27  $\mu$  basales 36  $\times$  54  $\mu$  trlgonis majusculis. *Amphigastria caulina* majuscula caule subtriplo latiora reniformia transverse inserta apice recurvula integrerrima.

Hab. Japonia (Faurie).

Cum *C. integriflora* comparanda, quæ differt foliis longioribus granditextis et amphigastriis profunde sinuatim insertis.

**6. *Calypogeia renistipula* St. n. sp.**

Sterilis mediocris in sicco rufo-brunnea aliis hepaticis consociata. *Caulis* ad 2 cm. longus tenuis fuscus parum ramosus, radicellis subnullis. *Folia caulina* adulta 1,5 mm. longa, contigua vel parum imbricata subrecte patula, ovato-oblonga, basi angustiora apice acuta, antice brevissime inserta postice haud decurrentia. *Cellulæ superæ* 27  $\mu$  basales  $36 \times 54 \mu$  trigonis magnis, cuticula levis. *Amphigastria caulina* caule quadruplo latiora sinuatim inserta optime reniformia integerrima sæpe recurvo-patula.

Hab. *Himalaya, Sikkim* (Hartless.) (Gamble).

**7. *Calypogeia integrifistipula* St. n. sp.**

Sterilis mediocris glauco-virens in humo compacte cæspitosa sæpe propagulifera. *Caulis* ad 25 mm. longus crassus viridis fragilis parum ramosus radicellis longis arcte repens. *Folia caulina* 1,5 mm. longa conferta oblique patula, plano-disticha vel leniter concava *optime ovata dorso breviter inserta* ventre vix decurrentia apice normaliter obtusa rarissime bidentula. *Cellulæ superæ* 36  $\mu$  basales  $45 \times 90 \mu$  trigonis nullis. *Amphigastria maxima* appressa caule triplo latiora sinuatim inserta utrinque decurrentia subcircularia apice *rotundata integerrima* vel leniter retusa.

Hab. *Europa, Japonia, communis.*

Spruce hat schon diese Pflanze, die er mit *K. Trichomanis* bezeichnete, von der ächten mit tief zweilappigen Amphigastrien versehenen Art getrennt und letztere mit *Kantia Sprengelii* bezeichnet. Es unterliegt aber keinem Zweifel, dass die älteren Autoren und unter diesen besonders Nees von Esenbeck. (Hep. Eurp. vol. III, p. 14) die Pflanze mit tief 2 lappigen Unterblättern *C. Trichomanis* nannten und dem bin ich auch hier gefolgt; hiervon ist *C. Sprengelii* (Martius) höchstens eine Form; sonach blieb nichts übrig, als unserer Pflanze einen neuen Namen zu geben.

**8. *Calypogeia submersa* Arnell. sub *Kantia*. Rev. bryol. 1902, p. 30.**

Sterilis, submersa, flaccida, viridis. *Caulis* ad 4 cm. longus fragilis, simplex vel parum ramosus. *Folia caulina* plano-disticha minus imbricata oblique patula, postice longius decurrentia, ovato-triangulata vel ovata vel ovato-oblonga, obtusa, antice breviter inserta. *Cellulæ superæ* 36  $\mu$  basales  $36 \times 90 \mu$  leptodermes. *Amphigastria caulina* subtransverse inserta appressa caule duplo latiora semilunaria late emarginata, lobis late ligulatis inæqualiter breviterque bilobis, interdum subrotunda ad  $\frac{2}{3}$  exciso-biloba, lobis porrectis anguste triangulatis subacutis.

Hab. *Suecia* (Nordstedt).

Die Pflanze steht an einem so abnormen Standort und ihre Entwicklung kann von demselben so bedeutend beeinflusst sein, dass ich sie nur der Vollständigkeit halber hier aufführe.

**9. *Calypogeia angusta* St. n. sp.**

*Dioica minor rigidissima brunneola vel olivacea dense depresso-cæspitosa terricola. Caulis ad 3 cm. longus maxime crassus, parum longeque ramosus, basi tantum radicans superne longe procumbens strictissimus. Folia caulina 0,8 mm. longa conferta oblique patula, angulo 45°, concaviuscula ovata antice cauli longe incumbentia ventre breviter decurrentia apice angustata obtusa. Cellulæ superæ 27 μ basales 36 × 45 μ parietibus validis trigonis nullis cuticula levi. Amphigastria caulina caule parum latiora sinuatim inserta late cordata ad 1/2 exciso biloba, sinu angusto, lobis triangulatis obtusissimis. Andraecia solitaria vel geminata majuscula capitata, bracteis 3 jugis confertis conduplicatim concavis apice subtruncatis angulis acutis.*

Hab. *Japonia* (Faurie).

**10. *Calypogeia hawaica* St. n. sp.**

*Sterilis major pallide virens in cortice gregaria. Caulis ad 4 cm. longus validus viridis arcte repens parum ramosus. Folia caulina 2 mm. longa parum imbricata oblique patula angulo 45° plano-disticha ovato-oblonga, duplo longiora quam lata superne sensim angustata obtusissima vel truncatulo-obtusata, rarius retusula, rarissime obtuse bidentula. Cellulæ supera 36 μ mediæ 36 × 63 μ basales 36 × 90 μ trigonis nullis cuticula levis. Amphigastria caulina parva caulem utrinque parum superantia sinuatim inserta subcircularia ad 1/2 exciso-biloba, sinu angusto lobis porrectis triangulatis acutis.*

Hab. *Hawai* (Baldwin).

**11. *Calypogeia Elliottii* St. n. sp.**

*Sterilis major fusco-brunnea in cortice longe lateque expansa. Caulis ad 8 cm. longus parum ramosus validus fuscus et tenax. Folia caulina 1,2 mm. longa contigua subrecte patula plano-disticha subquadrata parum longiora quam lata apice late truncato-rotundata antice brevissime inserta postice breviter decurrentia. Cellulæ marginales 18 × 36 μ radialiter dispositæ vix prominulæ limbum distinctum formantes, superæ 54 μ basales 36 × 72 μ trigonis majusculis, cuticula aspera. Amphigastria caulina magna 0,6 mm. longa contigua transverse inserta, ovato-oblonga appressa, cellulis longis angustis formata, margine irregulariter angulata.*

Hab. *Insula Dominica* (Elliot).

**12. *Calypogeia cyclostipa* (Spruce) St.**

Syn. : *Kantia cyclostipa* Spruce Hep. Am. et And., p. 411.

Dioica mediocris rufo-badia in cortice gregaria, rarius terricola. *Caulis* ad 4 cm. longus validus fuscus interdum multiramosus ramis brevibus simplicibus vel ex angulo amphigastrii oppositis. *Folia caulinata* 1,5 mm. longa parum imbricata oblique patula, plano-disticha late ligulata apice truncato-rotundata. *Cellulæ marginales* parvæ 18  $\mu$  limbum distinctum formantes subapicales 27  $\mu$  basales  $36 \times 54 \mu$  trigonis magnis, cuticula valde papillata. *Amphigastria caulinata* caule duplo latiora transverse inserta subcircularia concava appressa margine cellulis prominulis angulata. *Andraecia* parva, bracteis confertis 6 jugis concavis bifidis angulatis. *Flores feminei* solitarii, bracteis concavis bifidulis vel subulatis.

Hab. *Andes Peruviae* in monte Campana (Spruce); *Venezuela* (Fendler); *Peruvia* (d'Orbigny); *Columbia* (Moritz); *Rio Huallaga* (Ule).

**13. *Calypogeia tenax* (Spruce) St.**

Syn. : *Kantia tenax* Spruce Hep. Am. et And., p. 416.

Dioica mediocris pallide olivacea « matteolas latas tenaces efformans ». *Caulis* ad 10 cm. longus vage divaricato-ramosus repens. *Folia caulinata* ad 2 cm. longa parum imbricata recte patula plano-distscha oblongo-ligulata, apice rotundata integerrima, *Cellulæ apicales* 36  $\mu$  basales  $36 \times 72 \mu$  cuticula striolata. *Amphigastria caulinata* parva caule duplo latiora sinuatim inserta ad basin fere biloba, lobis ligulatis divergentibus obtusis interdum acutis. *Rami feminei* saepe fasciculati, bracteis quam folia duplo brevioribus ovato-oblongis. *Amphigastria floralia* breviter bifida.

Hab. *Rie Negro et Uaupes* (Spruce).

**14. *Calypogeia Uleana* St.**

Syn. : *Kantia Uleana* St. Hedwigia 1895, p. 54.

Sterilis major pallida fragillima laxe depresso-cæspitosa. *Caulis* ad 5 cm. longus longe prostratus basi parum ramosus radicans. *Folia caulinata* 1,75 mm. longa subrecte patula plano-disticha parum imbricata oblonga subligulata marginibus parum arcuatis apice quam basis duplo angustiore truncato-rotundato. *Cellulæ superæ*  $27 \times 36 \mu$  basales  $36 \times 54 \mu$  leptodermes; cuticula dense valideque papillata. *Amphigastria caulinata* maxima caule duplo latiora, duplo longiora quam lata, subtransverse inserta basi utrinque denticulata, ad  $\frac{3}{4}$  inciso-bifida laciniis porrectis lanceolatis saepe repando-angulatis.

Hab. *Brasilia subtropica* (Ule).

**15. *Calypogeia parallelogramma* (Spruce) St.**

Syn. : *Kantia parallelogramma* Spr. Hep. Am. et And., p. 413.

Dioica minor rigida rufo-olivacea vel nigrescens, in plaga latas prostrata terricola et corticola. *Caulis* ad 7 cm. longus parum ramosus fuscus et durus, ramis assurgentibus paucis flagellatis. *Folia caulina* ad 1 mm. longa parum imbricata recte patula, sub-plano disticha, oblongo-rectangulata apice truncato rotundata. *Cellulæ* 27  $\mu$ , basales parum longiores trigonis magnis, cuticula aspera. *Amphigastria caulina* magna, caule triplo latiora subrotunda transverse inserta margine repando-angulata ad  $\frac{1}{3}$  exciso-biloba, lobis cuspidatis conniventibus. *Andræcia* minuta bracteis arcte imbricatis concavis.

Hab. *America tropica* ad flumen Uaupes (Spruce); *Cuba* (Wright).

#### 16. **Calypogeia nephrostipa** (Spruce) St.

Syn.: *Kantia nephrostipa* Spr. Hep. Am. et And., p. 412.

Dioica mediocris pallide-virens vel plus minus rufescens, corticola. *Caulis* ad 5 cm. longus vase ramosus fuscus durus et rigidus. *Folia caulina* 1,2 mm. longa, imbricata recte patula plano-disticha, oblongo-ligulata, postice decurrentia antice brevissime inserta apice late truncata angulis rotundatis. *Cellulæ* superæ 36  $\mu$  basales  $27 \times 36 \mu$  trigonis magnis acutis. *Amphigastria caulina* majuscula caule 3 plo latiora reniformia vel subrotunda, ad medium biloba sinu acuto lobis rotundatis hic illic denticulo armatis. *Folia floralia* ovata rotundata valde concava breviter bifida superne argute dentata. *Andræcia* spicata bracteis ad 10 jugis secundis ovato-rotundatis concavis breviter bifidis.

Hab. *America tropica*. Rio Negro (Spruce).

Bei der Untersuchung dieser Pflanze fand ich an einem Stengel ein Blatt — das einzige im ganzen Rasen — welches aus Zellen von riesenhafter Grösse aufgebaut war; diese Form der Variabilität ist mir noch niemals bisher begegnet; im übrigen war weder Form noch Anheftung des Blattes abweichend; die Mutation tritt also auch hier sprungweise auf, als Folge innerer Vorgänge, die sich unserer Beurtheilung völlig entziehen.

#### 17. **Calypogeia cæspitosa** (Spruce) St.

Syn.: *Kantia cæspitosa* Spruce Hep. Am. et And., p. 412.

Dioica majuscula olivacea, adulta flavescens in cortice et ligno latissime expansa. *Caulis* ad 3 cm. longus erectus fastigiatus ramosus parum rhiziferus. *Folia caulina* 1,3 mm longa oblique patula plano-disticha parum imbricata antice breviter incumbentia postice longius decurrentia, optime ligulata apice truncato-rotundata. *Cellulæ* superæ  $18 \times 27 \mu$  basales  $36 \times 51 \mu$  trigonis parvis cuticula papillata; cellulæ marginales distincte seriatæ longiores quam latae radialiter dispositæ limbum distinctum

formantes. *Amphigastria caulina* magna, caule subtriplo latiora transverse inserta cordiformia integerrima, cellulis elongatis formata margine apicali irregulariter angulato. *Folia floralia* parva amphigastriis caulinis simillima valde concava integerrima vel breviter incisa.

Hab. *Andes quitenses*. Canelos (Spruce).

18. ***Calypogeia fusca*** (Lehm.) St. Hedwigia 1895, p. 55 sub Kantia.

Syn. : *Lejeunea fusca* Lehm. Linnæa 1829, p. 360.

Dioica mediocris rufo-brunnea muscis consociata. *Caulis* ad 2 cm. longus validus fuscus strictus parum ramosus. *Folia caulina* 0,8 mm. longa oblique patula plano-disticha antice breviter inserta postice longe decurrentia late ligulata apice late rotundata vel truncato-retusa. *Cellulæ* marginales angustæ radialiter dispositæ conico-prominulæ subapicales  $27 \times 36 \mu$  mediæ  $36 \times 54 \mu$  basales  $36 \times 90 \mu$  trigonis nullis cuticula valide verrucosa verrucis ellipticis. *Amphigastria caulina* remota caule triplo latiora plano-appressa subtransverse inserta subcircularia vel subcordiformia margine supero crenulato. *Folia floralia* conduplicatim concava apice similiter crenata.

Hab. *Prom. bonæ spei* (Ecklon).

Cum *Calypogeia cellulosa* cui simillima comparanda.

19. ***Calypogeia alternifolia*** (Nees) St.

Syn. : *Mastigobryum alternifolium* Nees. Syn. Hep., p. 216.

*Calypogeia Baldwinii* Austin. Bot. Gaz. I, p. 32.

Sterilis mediocris rufo-brunneola rigidula corticola. *Caulis* ad 2 cm. longus tenuis fuscus parum ramosus et parum radicellosus. *Folia caulina* 1,2 mm. longa, ovato-falcata vix imbricata subrecte patula plano-disticha postice longe decurrentia, antice breviter inserta apice obtusa cellulisque irregulariter prominulis angulatim erosa. *Cellulæ* superæ  $36 \mu$  mediæ  $36 \times 45 \mu$  basales  $36 \times 63 \mu$  leptodermes basi tantum trigone incrassatæ. Cuticula grosse aspera. *Amphigastria caulina* remota subtransverse inserta minus aspera subcircularia apice breviter biloba sinu lato obtuso lobis obtusis.

Hab. *Hawai* (Baldwin); *Java* (Junghuhn, Kurz); *Sumatra* (Kehding); *Ceylon*.

20. ***Calypogeia cellulosa*** (Spr.) St.

Syn. : *Mastigobryum cellulosum* Ldbg. Syn. Hep., p. 217.

*Jungerm. cellulosa* Spr. Syst. Veg. IV, p. 232.

Sterilis mediocris flaccida brunnea in cortice late expansa. *Caulis* ad 6 cm. longus minus crassus fuscus debilis arcte repens parum ramosus

ramis longe procumbentibus. *Folia caulina* contigua 1 mm. longa subrecte patula plano-disticha optime ligulata subdupo longiora quam lata antice brevissime inserta postice parum decurrentia apice late truncato-rotundata. *Cellulæ* marginales angustæ radialiter dispositæ angulatim prominulæ, subapicales duplo latiores  $36 \mu$  basales  $36 \times 54 \mu$  trigonis majusculis, cuticula dense verruculosa. *Amphigastria caulina* caule duplo latiora transverse inserta subcircularia margine angulatō-dentata

Hab. *India occidentalis*. *Guadeloupe* (Perrin, l'Herminier); *Dominica* (Elliot); *Peru* (Lechler); *Brasilia tropica*, Caraça (Weinio).

#### 21. **Calypogeia mastigophora** (Spruce) St.

Syn. : *Kantia mastigophora*. Spruce Hep. Am. et And., p. 413.

*Dioica* pallide virens in cortice laxe intricata. *Caulis* ad 4 cm. longus tenuis repens sat ramosus, ramis sæpe flagellatim attenuatis subaphyllis radicantibus. *Folia caulina* sub 1 mm. longa parum imbricata plano-disticha oblongo-falcata apice rotundato cellulisque acute prominulis serrato, ceterum integerrima postice decurrentia, basi antica rotundata. *Cellulæ* superæ  $18 \mu$  mediae  $27 \times 36 \mu$  basales  $36 \times 54 \mu$  cuticula dense papillata. *Amphigastria caulina* parva appressa caule vix latiora sinuatim inserta subrotunda apice serrato, rarius bilobato. « *Rami feminei* solitarii vel geminati, *bracteis* bijugis erecto-incurvis quam folia caulina plus duplo brevioribus ovalibus vel lanceolatis bifidis, laciniis subacuminatis grosse serratis ».

Hab. *America tropica* Rio Negro (Spruce).

#### 22. **Calypogeia Hartlessiana** St. n. sp.

Sterilis minor rigida virens superne rufo-brunnea muscis consociata. *Caulis* ad 5 cm. longus validus carnosus fragilis fuscus parum ramosus. *Folia caulina* 1,2 mm. longa contigua vel parum imbricata oblique patula maxime concava et valde decurva, in plano ovata symmetrica antice cauli longe incumbentia postice vix decurrentia. *Cellulæ* superæ  $27 \mu$  basales  $36 \times 54 \mu$  trigonis magnis. *Amphigastria caulina* maxima foliis parum minora reniformia profunde sinuatim inserta integerrima recurvo-patula.

Hab. *Himalaya*, Sikkim 7500' (Hartless, Stevens).

#### 23. **Calypogeia rhombifolia** (Spuce) St.

Syn. : *Kantia rhombifolia* Spruce. Hep. Am. et And., p. 413.

Sterilis mediocris pallide viridis vel fuscidula in plaga latas laxas prostrata. *Caulis* ad 5 cm. longus tenuis flaccidus parum ramosus. *Folia caulina* contigua 0,8 mm. longa recte patula plano-disticha late ligulata asymmetrica, margine postico valde arcuato antico stricto, apice acuto. *Cellulæ* superæ  $18 \times 36 \mu$  basales  $27 \times 54 \mu$  marginales *suturis* prominulæ.

*nulis erosula*, cuticula striolata. *Amphigastria caulina* parva cauli æquilata transverse inserta appressa profunde biloba rima angusta obtusa, lobis oblongis obtusis.

Hab. *Andes ad flumen Bombonasa* (Spruce).

24. **Calypogeia apiculata** St. Hedwigia 1895, p. 51 (sub Kantia).

Dioica major pallide virens aliis hepaticis consociata. *Caulis* ad 5 cm. longus arcte repens crassus parum ramosus in sectione transversa anguste ellipticus plus duplo latior quam crassus apice saepe flagellatim attenuatus. *Folia caulina* ad 2 mm. longa late ovata, margine antico magis arcuato postico longius decurrente apice apiculato. *Cellulæ* apicales 36  $\mu$  mediæ  $36 \times 54 \mu$  basales  $36 \times 72 \mu$  leptodermes cuticula levis. *Amphigastria caulina* majuscula caule duplo latiora exciso-inserta apice profunde inciso-biloba lobis late ovatis obtusiusculis vel inæqualiter bifidulis. *Flores feminei* numerosi saepe oppositi bracteis plurijugis irregulariter laceratis.

Hab. *Java* (Stahl, Nyman); *Ceylon* (Fleischer).

25. **Calypogeia acuta** St. n. sp.

Monoica mediocris pallide virens vel flavicans in cortice expansa depresso-cæspitosa. *Caulis* ad 3 cm. longus parum ramosus validissimus arcte repens. *Folia caulina* 1,5 mm. longa conferta recte patula plano-disticha late ovato-triangulata apice acuta. *Cellulæ* superæ 36  $\mu$ , basales  $36 \times 72 \mu$  leptodermes. *Amphigastria caulina* magna caule duplo latiora sinuatim inserta profunde excisa lobis triangulatis conniventibus obtusis. *Rami feminei* breves, masculis oppositi, bracteis bijugis triseriatis ovato-triangulatis bi-vel trifidis irregularibus. *Andræcia* breviter spicata bracteis parvis 3-4 jugis confertis inflatis bi-vel trispinosis.

Hab. *America septentr.* Pennsylvania (Rau).

26. **Calypogeia cordistipula** St. Soc. nat. Cherbourg, vol. 29, p. 210 (sub Kantia).

Dioica mediocris glauco-virens aliis hepaticis corticalibus consociata. *Caulis* ad 2 cm. longus parum ramosus validus viridis carnosus et rigidus arcte repens. *Folia caulina* 1,6 mm. longa confertissima recte patula plano-disticha late triangulata marginibus æqualiter curvatis symmetrica, sublatiora quam longa optime acuta vel subapiculata, antice dorso longe incumbentia caulemque obvelantia postice vix decurrentia. *Cellulæ* superæ 36  $\mu$  basales  $36 \times 54 \mu$  trigonis nullis, cuticula levis. *Amphigastria caulina* magna caule subtriplo latiora sinuatim inserta, cordiformia apice breviter lunatim excisa lobis brevibus obtusiusculis. *Marsupia magna*

4 mm. longa cylindrica 6 plo longiora quam lata sparsim radicellifera, *bracteis floralibus* parvis lanceolatis vel bifidis incurvis integerrimis.

Hab. *China*, Hokin, in jugo Yentze-Hay (Delavay).

**27. *Calypogeia lunata* Mitten Proc. Linn. Soc. V, p. 107.**

Sterilis major glauco-virens terricola laxe intricata. *Caulis* ad 25 mm. longus parum ramosus crassus pallidus. *Folia caulina* 1,5 mm. longa parum imbricata recte patula plano-disticha antice breviter inserta postice parum decurrentia late triangulata vix longiora quam lata symmetrica, marginibus parum arcuatis apice acuto vel apiculato vix unquam bidentulo. *Cellulæ* superæ 27  $\mu$  basales 36  $\times$  72  $\mu$  trigonis nullis cuticula levis. *Amphigastria caulina* adulta magna profunde sinuatim inserta profunde emarginato-biloba, lobis iterum emarginatis grosse bidentatis, dente externo minore.

Hab. *Himalaya*, Assam (Griffith); Sikkim (Hartless); Mussoorie (Gollan).

**28. *Calypogeia cuspidata* St. n. sp.**

Sterilis mediocris aeruginosus in cortice putrido expansa. *Caulis* ad 3 cm. longus validus viridis rigidus parum ramosus. *Folia caulina* 1,3 mm. longa, recte patula plano-disticha ovata acuminata acuta vel obtusiuscula. *Cellulæ* superæ 36  $\mu$  basales 27  $\times$  54  $\mu$  trigonis nullis, cuticula levis. *Amphigastria caulina* magna sinuatim inserta ad basin fere bipartita, sinu rotundato lobis magnis oblongis cuspidatis porrectis acutis.

Hab. *Hawai* (Heller).

**29. *Calypogeia grandistipula* St. Hedwigia 1895, p. 52 sub Kantia.**

Sterilis mediocris pallide virens in sicco albicans terricola. *Caulis* ad 2 cm. longus crassus pallide virens rigidus parum ramosus. *Folia caulina* 1 mm. longa subrecte patula plano-disticha confertissima ovato-triangulata symmetrica antice cauli late incumbentia postice vix decurrentia apice acuta marginibus parum arcuatis vel substrictis. *Cellulæ* apicales 36  $\mu$  mediae 27  $\times$  45  $\mu$  basales 27  $\times$  72  $\mu$  trigonis parvis cuticula levis. *Amphigastria caulina* gigantea appressa caule sextuplo latiora profundissime sinuatim inserta apice ad medium inciso-biloba sinu angusto obtuso lobis late ovatis porrectis obtusis.

Hab. *Brasilia subtropica* (Weinio).

Die Amphigastrien sind an der Spitze so tief eingeschnitten und von der entgegengesetzten Seite so tief buchtig inserirt dass zwischen diesen 2 opponirten Einschnitten nur eine schmale Brücke bleibt, welche die rechte und die linke Hälfte der Unterblätter verbindet.

30. ***Calypogeia Yoshinagana* St. n. sp.**

Sterilis major glauco-virens in terra late expansa. *Caulis* ad 3 cm. longus parum ramosus crassus arcte repens. *Folia caulina* confertissima 1,2 mm. longa recte patula plano-disticha, late triangulata latiora quam longa marginibus arcuatis apice acuto vel apiculato. *Cellulæ* 45  $\mu$ , apice parum minores trigonis nullis, cuticula levis. *Amphigastria caulina* caule subtriplo latiora profundissime sinuatim inserta apice profunde exciso-biloba lobis oblique truncatis bidentatis.

Hab. *Japonia* in monte Yokogura (Yoshinaga) Sakurassima (Faurie).

31. ***Calypogeia imbricata* (Mitten) St. Hedwigia 1895, p. 55, sub Kantia.**

Syn. : *Mastigobryum imbricatum* Mitten. Proc. Linn. soc., V, p. 104.

Sterilis minor rufo-brunnea flaccida laxe intricata vel muscis consociata. *Caulis* ad 2 cm. longus validus fuscus (in sectione transversa ellipticus) parum ramosus. *Folia caulina* 0,8 mm. longa remotiuscula oblique patula plano-disticha vel parum concava apice decurva, optime ovata antice cauli incumbentia postice longe decurrentia apice brevissime inciso-bidentula sinu angusto obtuso vel acuto dentibus triangulatis obtusis porrectis. *Cellulæ* superæ 27  $\mu$  basales 27  $\times$  36  $\mu$  trigonis magnis cuticula aspera. *Amphigastria caulina* magna foliis duplo minora sinuatim inserta distincte decurrentia recurvo patula in plano circularia integerrima.

Hab. *Himalaya*, Sikkim (Hooker, Stevens).

32. ***Calypogeia suberectifolia* St. n. sp.**

Sterilis mediocris viridis vel fusco-virens in sicco subnigra, in rupibus humidis longe lateque stratificata. *Caulis* ad 6 cm. longus parum ramosus tenuis valde compressus. *Folia caulina* 0,8 mm. longa contigua oblique patula plano-disticha vel leniter decurva, ovata asymmetrica, margine antico substricto, postico valde arcuato apice brevissime exciso-bidentulo, dentibus triangulatis acutis leniter divergentibus. *Cellulæ* superæ 18  $\mu$  mediae 27  $\times$  36  $\mu$  basales 27  $\times$  72  $\mu$  leptodermes. *Amphigastria caulina* parva cauli æquilata subtransverse inserta ad medium exciso-biloba lobis breviter ovatis leniter conniventibus.

Hab. *Insula Dominica* (Elliott); *Guadeloupe* (l'Herminier).

33. ***Calypogeia microstipula* St. Hedwigia 1895, p. 53, sub Kantia.**

Sterilis mediocris rufa rigida graminibus consociata. *Caulis* ad 2 cm. longus procumbens fuscus et durus validus inferne radicellis longis repens parum ramosus ramis recte patulis. *Folia caulina* adulta 1 mm.

longa contigua oblique patula, plano-disticha, ovato-oblonga (juniora ovata) antice breviter inserta postice parum decurrentia apice emarginato-bidentula, dentibus 2 cellulas longis. *Cellulæ* 36  $\mu$  basales duplo longiores trigonis parvis cuticula minute aspera. *Amphigastria caulinæ* parva, patula cauli æquilata subtransverse inserta ad medium biloba sinu lato acuto lobis ovatis obtusis.

Hab. *Madagascar* (Rev. R. Baron).

**34. *Calypogeia sphagnicola* (Arn. et Perss.) St.**

Syn. : *Kantia sphagnicola* Arn. et P. Rev. bryol. 1902, p. 26.

Monoica minor et gracilis viridis vel pallida vel flavicans, nitidula rigida gregaria vel sphagno consociata, *Caulis* ad 3 cm. longus pallidus subsimplex. *Folia caulinæ* densa oblique patula angulo 45° convexa oblique ovata postice decurrentia antice cauli longe incumbentia apice rotundato vel obtuso interdum emarginato. *Cellulæ* basales 35  $\times$  45  $\mu$  apicales breviores, trigonis distinctis. *Amphigastria caulinæ* patula caule duplo latiora rotundata ad  $\frac{1}{2}$  biloba, rima angusta lobis acutis vel obtusis extus utrinque unidentatis. *Andräcia* parva bracteis ad 8 jugis monandris confertis valde concavis apice ad  $\frac{1}{2}$  bi-vel trifidis lobis lanceolatis incurvis. *Ramulus* femineus subglobosus. *Propagula* in caule attenuato parvifolio terminalia aggregata bicellularia.

Hab. *Suecia*, Dalarne, Skane (Persson); *Scotland* (Macvicar); *Germania*, Silesia (Schiffner); *Helvetia*.

**35. *Calypogeia bidentula* (Weber) Nees Syn. Hep. p. 199.**

Syn. *Jung. bidentula* Weber. Prodr. p. 38.

Dioica mediocris pallide virens, in cortice laxe cæspitans. *Caulis* ad 3 cm. longus parum ramosus validus pallidus rigidus fragilis arcte repens. *Folia caulinæ* parum imbricata 1 mm. longa subrecte patula plano-disticha late ovata dorso breviter inserta postice vix decurrentia subsymmetrica, apice breviter emarginato-bidentula, dentibus obtusis. *Cellulæ* superæ 36  $\mu$  basales 36  $\times$  54  $\mu$  leptodermes cuticula levis. *Amphigastria caulinæ* majuscula caule duplo latiora patula sinuatim inserta ad  $\frac{1}{2}$  emarginato-biloba sinu angusto lobis porrectis triangulatis acuminatis obtusis vel acutis. *Marsupia* 4 mm. longa cylindrica parum radicellosa, bracteis magnis ovatis concavis ad medium exciso-bilobis lobulis acutis integerrimis.

Hab. *Cape of good hope* (Ecklon); *Transvaal* (Rehmann Wilms); *Masca-reignes* (Lepervanche, Vieillard, de l'Isle); *Insula St-Paul* (de l'Isle); *Usambara* (Holst).

**36. *Calypogeia biapiculata* (Spruce) St.**

Syn. : *Kantia biapiculata* Spruce. Hep. Am. et And., p. 414.

Dioica mediocris vel major interdum gigantea et longissima in humo expansa, olivacea vel rufo-badia. *Caulis* ad 8 cm. longus tenuis coloratus parum longeque ramosus superne arhizus longeque procumbens. *Folia caulina* 2,4 mm. longa imbricata recte patula plano-disticha vel leniter concava dorso breviter inserta ventre haud decurrentia late ovata i. e. ipsa basi leniter angustata, quarto infero amplissima, apice breviter emarginato-bidentula dentibus porrectis acutis. *Cellulæ superæ* 36  $\mu$ , reliquæ 54  $\mu$ . cuticula levis. *Amphigastria caulina* magna, caule quadruplo latiora leniter recurva, profunde sinuatim inserta, ambitu reniformia, apice late lunatim emarginata lobis obtusis extus repando-angulatis vel subdentatis, sinu levi. *Flores feminei* bracteis suborbiculatis concavis inæqualiter quadrifidis.

Hab. *Peruvia* in Monte Campana (Spruce); *Bogota* (Apollinaire); *Dominica* (Elliott); *Guadeloupe* (l'Herminier); *Jamaica* (Rehder); *Mexico, Brasilia subtropica* (Ule); *Apiah* (Puiggari).

### 37. *Calypogeia Dussiana* St. n. sp.

Monoica major flavo-rufescens in cortice palmarum laxe cæspitans. *Caulis* ad 3 cm. longus tenuis pallidus debilis pluriramosus. *Folia caulina* 1,5 mm. longa parum imbricata oblique patula per paria approximata plano-disticha oblique ovata marginibus æqualiter curvatis postico longiore haud decurrente antico breviter inserto, apice breviter emarginato-bidentulo, denticulis porrectis vel divergentibus. *Cellulæ superæ* 36  $\mu$  basales  $36 \times 54 \mu$  trigonis nullis, cuticula levis. *Amphigastria caulina* magna caule triplo latiora profunde sinuatim inserta apice profunde emarginata, lobis porrectis ovato-triangulatis obtusiusculis. *Andræcia geminata* vel flori femineo opposita breviter spicata curvula bracteis 6 jugis confertis hamatis bifidis. *Marsupia* 2 mm. longa parum radicellosa cylindrica bracteis apicalibus concavis bi-trifidis.

Hab. *Guadeloupe* (Duss.); *Caracas*, Galipan (Funk et Schlim).

### 38. *Calypogeia suecica* (Arn. et Perss) St.

Syn. : *Kantia suecica* (Arn. et Perss. Rev. bryol. 1902, p. 29.

Dioica, gracillima, dense cæspitosa, pallide virens. *Caulis* ad 5 mm. longus viridis sat ramosus. *Folia caulina* remota oblique patula semi-erecta subplana vel convexa apice deflexa oblique ovato-triangulata *dorso caulem tegentia* decurrentia apice rotundata vel leviter emarginata. *Cellulæ* 35  $\mu$  trigonis distinctis. *Amphigastria caulina* appressa *caule duplo latiora* convexa rotundata ad medium biloba, sinu lato obtuso vel lunato, lobis late triangulatis acutis. *Rami masculi* breves numerosi densifolii bracteis monandris confertis patulis concavis bi-quadrifidis. *Rami feminei* paryi subglobosi, folia floralia ad medium bi-vel trifida.

*Propagula* in caule attenuato terminalia aggregata globosa bicellularia parum granulosa.

Hab. *Suecia*, Herjedalen, Vestmanland in trunco (Persson); *Germania*, Baden (Müller); *Scotland*, *Gallia*, *Helvelia*, *America septentr.* (Evans).

**39. *Calypogeia Puiggarii* St. n. sp.**

Dioica mediocris flavo-virens vel flavescens in cortice gregaria. *Caulis* ad 15 mm. longus simplex vel parum ramosus validissimus strictus carnosus arcte repens. *Folia caulina* 0,8 mm. longa oblique patula valde concava decurva in plano late ovata dorso caulem late tegentia basi postica leniter rotundata apice brevissime inciso-bidentula dentibus obtusis vel acutis unicellularibus. *Cellulæ* superæ 36  $\mu$  basales parum longiores trigonis majusculis, cuticula levis. *Amphigastria caulina* foliis parum minora profunde sinuatim inserta ad basin fere inciso-biloba, sinu recto acuto lobis ovatis obtusiusculis. *Marsupia* ad 1 cm. longa, anguste clavata longissime radicellifera. *Folia floralia* parva pauca ovato-rotundata bifida integerrima orificio sacculi hamatim obvelantia.

Hab. *Brasilia*, Apiah (Puiggari).

**40. *Calypogeia Miquelii* Mont. Syn. Hep., p. 200.**

Sterilis minor pallide virens. *Caulis* ad 2 cm. longus pluriramosus fuscus et validus. *Folia caulina* 1,2 mm. longa contigua vel parum imbricata subrecte patula ovato-oblonga apice late exciso-biloba lobis triangulis porrectis subacutis. *Folia ramulina* remotiuscula minora breviter exciso-bidentula. *Cellulæ* valde irregulares ubique elongatæ apice tantum breviores, ad  $40 \times 80 \mu$  leptodermes. *Amphigastria caulina* magna transverse inserta normaliter ad  $\frac{2}{3}$  biloba sinu recto acuto lobis lanceolatis divergentibus acutis integerrimis.

Hab. *America tropica*. Surinam (Miquel).

**41. *Calypogeia portoricensis* St. Hedwigia 1888, p. 280, sub *Kantia*.**

Sterilis mediocris pallide virens in cortice gregaria. *Caulis* ad 3 cm. longus simplex vel parum ramosus tenuis pallidus rigidus et fragilis. *Folia caulina* 1 mm. longa imbricata subrecte patula plano-disticha ovato-triangulata asymmetrica, margine postico stricto decurrente antico bene arcuato breviterque inserto, apice brevissime emarginato-bidentulo. *Folia ramulina* magis symmetrica optimeque ovata. *Cellulæ* apicales 36  $\mu$  basales  $36 \times 54 \mu$  trigonis nullis, cuticula levis. *Amphigastria caulina* parva caule vix latiora sinuatim inserta apice late emarginata lobis divergentibus oblique truncatis saepe emarginato-bidentulis.

Hab. *Puertorico* (Sintenis).

42. ***Calypogeia laxa*** L. et G. Syn. Hep., p. 713.

Sterilis minor pallide olivacea aliis hepaticis consociata. *Caulis* ad 2 cm. longus simplex validus fuscus et tenax. *Folia caulinata* 1,2 mm. longa contigua subrecte patula plano-disticha optime ovata antice breviter inserta postice parum decurrentia apice angustato breviter exciso dentibus porrectis acutis. *Cellulæ* superæ 27  $\mu$  basales 36  $\times$  72  $\mu$  trigonis parvis cuticula levis. *Amphigastria caulinata* caule vix duplo latiora ambitu subquadrata leviter sinuatim inserta ad medium exciso-biloba, lobis porrectis apice inæqualiter bifidis, lacinia externa breviore.

Hub. *Mexico*, Mirador (Liebman); *Guatemala* Alta Vera Paz 1800' (von Türkheim).

Unter den Handzeichnungen Gottsches liegt eine Abbildung dieser Pflanze, welche, in geringer Vergrösserung gezeichnet, die Amphigastrien deutlich vierzählig darstellt. Trotz dieser richtigen Abbildung werden sie in der Synopsis Hepat wie in den Hep. Mexican. als *bifida* beschrieben.

43. ***Calypogeia arguta*** Nees et Mont. Hep. Europ. III, p. 24.

Syn. : *Calypogeia Sullivanti* Austin. Torrey Bot. Club VI, p. 48.

Sterilis minor glauco-virens in rupibus humidis (calcareis ?) laxe cæspitans. *Caulis* ad 2 cm. longus pluriramosus, ramis sæpe flagellatim attenuatis, tenuis arcte repens. *Folia caulinata* adulta 1 mm. longa parum imbricata sæpe remotiuscula recte patula plano-disticha, late ovata apice quam basis quadruplo angustiore emarginato-biloba, lobis porrectis triangulatis acutissimis. *Folia ramulina* remota vulgo multo angustiora. *Cellulæ* apicales 36  $\mu$  mediae 36  $\times$  54  $\mu$  basales 36  $\times$  72  $\mu$  parietibus validis, *cuticula minute aspera*. *Amphigastria* caule triplo latiora patula late obtuse emarginato-biloba, lobis profunde emarginato-bifidis.

Hab. *Gallia*, *Hispania*, *Italia*, *Britannia* Cornwall (Curnow); *Madeira* (Mandon); *Açores* (Simroth); *Formosa* (Faurie).

44. ***Calypogeia latifolia*** St. n. sp.

Sterilis mediocris rigida pallide virens in humo longe lateque expansa. *Caulis* ad 5 cm. longus validus viridis parum longeque ramosus, radicellis longissimis repens. *Folia caulinata* adulta 1 mm. longa contigua subrecte patula plano-disticha antice brevissime inserta postice parum decurrentia late ovata symmetrica, normaliter breviter exciso-bidentata sinu recto acuto vel obtuso dentibus triangulatis divergentibus 7 cellularibus. *Cellulæ* giganteæ superæ ad 60  $\mu$  basales 60  $\times$  118  $\mu$  parietibus validis

cuticula distincte papillata. *Amphigastria caulinia* parva caule vix duplo latiora sinuatim inserta ad basin fere biloba sinu latissimo lobis itaque late divergentibus oblongis apice inaequaliter bifidulis, lacinula externa breviore.

Hab. *Africa*. Kilimandscharo. 2300 m. ad ripas rivulorum communis (Volkens).

45. **Calypogeia heterophylla** St. Hedwigia 1895, p. 53 sub *Kantia*.

Sterilis major pallide virens flaccida terricola et muscicola. *Caulis* ad 5 cm. longus simplex vel pauciramosus validus fuscus debilis. *Folia caulinia* 1,2 mm. longa imbricata recte patula plano-disticha vel leniter concava apice incurva, in plano optime ovata symmetrica vel obliqua postice parum decurrentia antice breviter inserta apice obtusa vel acutiuscula vel minute bidentula. *Cellulæ* superæ 36  $\mu$  mediae 36  $\times$  54  $\mu$  basales 45  $\times$  80  $\mu$  leptodermes cuticula levigata. *Amphigastria caulinia* majuscula caule duplo latiora profunde sinuatim inserta apice late lunatim emarginata lobis divergentibus ligulatis apice inciso-bilobis vel oblique truncatis rarius acuminatis.

Hab. *Brasilia*, Sao Francisco (Ule); *Caraça* (Weinio).

46. **Calypogeia decurrens** St. Hedwigia 1895, p. 2 sub *Kantia*.

Sterilis major rufescens flaccida muscis consociata. *Caulis* ad 6 cm. longus minus validus debilis parum ramosus. *Folia caulinia* imbricata subrecte patula plano-disticha late ovata vel ovato-triangulata, antice breviter inserta postice longius decurrentia subsymmetrica, apice angustata ad  $\frac{1}{4}$  inciso-biloba sinu acuto lobis triangulatis porrectis acutis. *Cellulæ* superæ 36  $\times$  45  $\mu$  basales 54  $\times$  72  $\mu$  cuticula levigata. *Amphigastria caulinia* parva caule parum latiora sinuatim inserta apice late emarginata lobis late divergentibus inaequaliter bifidulis, lacinia externa breviore.

Hab. *Sumatra* (Kehding).

47. **Calypogeia bifurca** Austin Academ. Philad. 1869.

Sterilis minor hyalina rigidula in terra gregaria. *Caulis* ad 2 cm. longus validus pallidus pluriramosus ramis saepe flagellatim attenuatus. *Folia caulinia* 0,8 mm. longa remotiuscula obliqua patula angulo 45° plano-disticha obliqua ovata antice breviter inserta postice vix decurrentia apice angustata quam basis triplo angustiora emarginato-bispinosa spinis leniter divergentibus. *Cellulæ* magnæ superæ 45  $\mu$  mediae 54  $\mu$  basales 45  $\times$  108  $\mu$  leptodermes cuticula distincte striolata. *Amphigastria minima*, caule vix latiora subtransverse inserta, profundissime emarginata.

nato-biloba, lobis late divergentibus profunde bifidulis laciniis parallelis inequalibus externa breviore.

Hab. *Hawai* (Baldwin, Bolander, Heller); *Java* (Nyman).

48. ***Calypogeia birostris*** (Taylor ms.) Austin. Bot. Gaz. 1876, I, p. 32.

Sterilis pallida muscicola. *Caulis* ad 35 mm. longus procumbens parum ramosus. *Folia caulina* plano-disticha ovata concaviuscula apice exciso-bidentula dentibus acutis. *Amphigastria caulina* subquadrata, profunde exciso-biloba, lobis bidentatis.

Hab. *Nepal* (Herb. Taylor).

Die Pflanze ist nicht zu erhalten gewesen.

49. ***Calypogeia abnormis*** Angstr. Kongl. Vet Ak. 1876, p. 81.

Sterilis mediocris rigida pallide flavo-virens. *Caulis* ad 2 cm. longus validus arcte repens fragilis parum ramosus. *Folia caulina* 1 mm. longa contigua, plano-disticha subrecte patula, antice vix decurrentia postice breviter inserta late ovata apice brevissime emarginato-bidentula. *Cellulæ* superæ 54  $\mu$  basales 54  $\times$  81  $\mu$  cuticula dense papillata inferne striolata. *Amphigastria caulina* parva caule vix latiora late emarginata, lobis divergentibus anguste bifidulis.

Hab. *Brasilia* Caldas (Angström).

50. ***Calypogeia densifolia*** St. Hedwigia 1895, p. 52 sub Kantia.

Sterilis minor fusco-virens vel rufescens in terra dense depresso-cæspitosa. *Caulis* ad 2 cm. longus minus validus strictus rigidus fuscus parum ramosus. *Folia caulina* conferta oblique patula concava dorso ventreque breviter inserta, oblique ovata margine antico substricto postico valde arcuato apice emarginato-bidentula sinu semicirculari lobis late triangulatis acutis vel apiculatis decurvis. *Cellulæ* superæ 27  $\mu$  basales 27  $\times$  36  $\mu$  trigonis nullis cuticula levis. *Amphigastria caulina* caule plus duplo latiora transverse inserta profunde lateque emarginata lobis divergentibus apice emarginato-bispinosis, spinis inæqualibus externo breviore.

Hab. *Brasilia subtropica* (Ule).

51. ***Calypogeia fissa*** Raddi. Att. soc. Modena, 1818, p. 44.

Syn. : *Kantia Trichomanes* var. *fissa* Lindb. Hep. Hib. 1874, p. 508.

*Kantia calypogea* Lindb. Hep. utveckl., p. 20.

*Calypogeia Trichomanes* var. *repanda* Nees. Syn. Hep., p. 198.

Monoica mediocris glauco-viridis vel hyalina sæpe fusca terricola. *Caulis* ad 2 cm. longus parum ramosus crassus viridis vel fuscus. *Folia caulina* 1 mm. longa conferta subrecte patula disticha concava apice

decurvo, in plano late ovata antice breviter inserta postice vix decurrentia apice breviter angustata plus minus profunde inciso-bidentula dentibus acutis vel obtusis porrectis. *Cellulæ* superæ 27  $\mu$ . basales 36  $\times$  72  $\mu$ . trigonis nullis cuticula levis. *Amphigastria caulina* caule plus duplo latiora appressa sinuatim inserta ad medium emarginato-biloba, lobis porrectis oblique emarginato-bilobis lobulo externo breviore obtuso. *Flores feminei* parvi bracteis confertis plus minus spinulosis. *Marsupia* 1,5 mm. longa grosse sacculata. *Capsula* magna plus 3 mm. longa purpurea. *Elateres* attenuati 200  $\mu$  spiris duplicatis validis teretibus laxe tortis. *Sporæ* 15  $\mu$  brunneæ leves. *Andræcia* parva bracteis ad 4 jugis confertis erecto-appressis bifidis.

Hab. *Italia, Gallia, Hispania, Madeira, Acores. Germania, Florida, Japonia.*

### 52. *Calypogeia gigantea* St. n. sp.

Sterilis maxima debilis fusco-viridis vel rufo-brunnea. in cortice et humo late expansa. *Caulis* ad 12 cm. longus crassus fuscus debilis inferne sæpe pinnatim pluriramosus superne simplex longeque procumbens. *Folia caulina* 2,4 mm. longa confertissima subrecte patula, parum concava antice breviter inserta postice vix decurrentia optime ovata symmetrica apice emarginato-bidentula sinu sat amplio lunato. *Cellulæ* superæ 36  $\mu$  mediæ 36  $\times$  54  $\mu$ . basales 45  $\times$  108  $\mu$  parietibus validis trigonis nullis cuticula levis. *Amphigastria caulina* caule duplo latiora recurvo-patula profunde sinuatim inserta apice ad  $1/3$  lunatim excisa lobis triangulatis porrectis acutis interdum bifidis.

Hab. *Insula Dominica* (Elliott).

### 53. *Calypogeia Gœbelii* (Scffn) St.

Syn. : *Kantia Gœbelii* Schffn. Nova Acta, vol. 60, p. 260.

Monoica minor sed longa flaccida in sicco brunnea muscis consociata. *Caulis* ad 5 cm. longus validus fuscus parum ramosus debilis. *Folia caulina* 1,2 mm. longa parum imbricata subrecte patulæ plano-disticha ovato-triangulata asymmetrica, margine antico magis curvato postico longius decurrentia apice breviter emarginato-bidentulo. *Cellulæ* superæ 36  $\mu$  basales 36  $\times$  54  $\mu$  trigonis nullis, cuticula levis. *Amphigastria caulina* parva caule duplo latiora subtransverse inserta profunde emarginato biloba, lobis divergentibus breviter emarginato-bifidulis. *Flores feminei* in ramulo brevissimo bracteis minutis dentatis. *Marsupia* breviter clavata, *Andræcia* minutissima.

Hab. *Java* (Kurz, Gœbel).

### 54. *Calypogeia lophocoleoides* St. n. sp.

*Dioica major* pallide virens rigida in humo late expansa. *Caulis* ad 4 cm. longus crassus viridis fragillimus valde ramosus ramis simplicibus arcte repentibus. *Folia caulina* 1,8 mm. longa contigua subrecte patula plano-disticha vel leniter concava, in plano late ligulata saepe basi leniter angustata ideoque subspathulata dorso breviter inserta ventre baeviter decurrentia, apice rotundata valide bispinosa spinis approximatis parvis sinu angusto discretis porrectis saepe hamatim decurvis. *Folia ramulina* interdum profundius excisa, lobis magnis e lata basi attenuatis, iis Lophocolearum similibus. *Cellulæ* superæ 54  $\mu$ , mediæ 54  $\times$  90  $\mu$  basales 36  $\times$  108  $\mu$  cuticula aspera. *Amphigastria caulina* parva sinuatim inserta ambitu obovata vel subquadrata cellulis elongatis formata ad  $\frac{1}{2}$  vel  $\frac{3}{4}$  biloba sinu obtuso lobis parallelis porrectis acutis extns unidentatis. *Folia floralia* parva concava bi-vel trifida, laciiniis hamatim incurvis. *Marsupia* ovato-oblonga valde radicellosa. *Capsula* ut in congeneribus. *Elateres* ad 400  $\mu$  attenuati, spiris 2 teretibus laxe tortis. *Sporæ* bruneæ 13-15  $\mu$ . *Andrœcia* ?

Hab. *Dominica* (Elliott).

**55. *Calypogeia subtropica* St. Hedwigia 1895, p. 54 (sub *Kantia*).**

Sterilis minor pallide virens in solo humido gregaria. *Caulis* ad 2 cm. longus simplex vel parum ramosus repens. *Folia caulina* 1,4 mm. longa parum imbricata subcontigua oblique patula plano-disticha oblique ovata, margine postico quam anticus minus late rotundato medioque breviter exciso-bidentulo. *Cellulæ* superæ 36  $\mu$  mediæ 36  $\times$  45  $\mu$  basales 36  $\times$  54  $\mu$  trigonis parvis. *Amphigastria caulina* parva caule parum latiora transverse inserta profunde lateque emarginato-biloba, lobis divergentibus anguste bifidulis.

Hab. *Brasilia subtropica* (Ule).

**56. *Calypogeia tosana* St.**

Syn. *Kantia tosana* St. Hedwigia 1895, p. 54.

Sterilis glauco-virens vel fulva in humo et cortice dense depresso-cæspitosa. *Caulis* ad 2 cm. longus validus simplex vel parum ramosus ex apice interdum flagellatim attenuatus. *Folia caulina* 1,6 mm. longa confertissima subrecte patula late ovata asymmetrica, margine postico quam anticus magis arcuato, folia itaque leniter falcata apice exciso-bidentula dentibus obtusis rarius obtusa integerrima. *Cellulæ* superæ 27  $\mu$  mediæ 36  $\mu$  basales 36  $\times$  72  $\mu$  trigonis nullis; cuticula levis. *Amphigastria caulinæ* caule duplo latiora sinuatim inserta fere ad basin usque exciso-biloba lobis iterum exciso-bifidis laciiniis inæqualibus externo breviore.

Hab. *Japonia* valde communis; *Hawai* (Baldwin).

57. **Calypogeia vincentina** (Wright) St.

Syn. : *Kantia vincentina* (Wright) J. of Bot. 1891, p. 107.

Sterilis major æruginosa in rupibus et cortice laxe cæspitosa. *Caulis* ad 2 cm. longus validus pluriramosus apice interdum flagellatim attenuatus. *Folia caulina* ad 2 mm. longa parum imbricata plano-disticha recte patula ovato-falcata asymmetrica margine postico stricto antico valde arcuato apice emarginato-bidentato sinu lunato sæpe obliquo dentibus validis late triangulatis. *Cellulæ* superæ 27  $\mu$  basales 45  $\times$  54  $\mu$  trigonis parvis. *Amphigastria caulina* magna caule triplo latiora profunde sinuatim inserta apice profunde emarginato-biloba, lobis magnis triangulatis irregulariter valideque paucidentatis vel spinosis.

Hab. : *Insula St-Vincent* 1500' (Herbert. H. Smith).

58. **Calypogeia peruviana** Nees. Hep. Eur. III, p. 26.

Sterilis major pallide virens vel brunnea in cortice gregaria. *Caulis* ad 6 cm. longus vase pluriramosus validus carnosus viridis. *Folia caulina* 1,6 mm. longa contigua vel parum imbricata subplano-disticha oblique patula antice breviter inserta postice longius decurrentia, optime ovata subsymmetrica, apice breviter exciso-bidentata, dentibus acutis vel apiculatis. *Cellulæ* superæ 27  $\mu$  mediæ 36  $\mu$  basales 36  $\times$  54  $\mu$  trigonis subnullis. *Amphigastria caulina* parva caule parum latiora sinuatim inserta ad medium late lunatim excisa, lobis divergentibus late truncatis vel breviter exciso-bilobis.

Hab. *Peruvia* (d'Orbigny); *Guatemala* (von Türkheim); *Guadeloupe* (l'Herminier); *Nova Granada* (Lindig).

59. **Calypogeia furcata** St. n. sp.

Sterilis mediocris pallida rigidula terricola. *Caulis* ad 3 cm. longus minus crassus pallidus arcte repens pauciramosus. *Folia caulina* 1 mm. longa contigua vel remotiuscula oblique vel subrecte patula plano-disticha antice breviter inserta postice decurrentia optime ovata (juvenilia ovato-oblonga) apice late profundeque exciso-biloba lobis cuspidatis plus minus divergentibus quasi furcatis. *Cellulæ* superæ 36  $\mu$  mediæ 36  $\times$  72  $\mu$  basales 54  $\times$  90  $\mu$  trigonis nullis cuticula striolato-verrucosa. *Amphigastria caulina* parva transverse inserta utrinque unispina apice latissime emarginata laciniis setaceis late divergentibus caulem superantibus.

Hab. *Java* (Stahl. Fleischer); *Nicobaren* (Kurz); *Singapore* (Fleischer); *Nova Guinea* (Nyman); *Formosa* (Faurie); *Japonia* (Makino, Faurie).

Die Pflanze steht der *C. arguta* sehr nahe und unterscheidet sich durch wesentlich grössere Blattzellen.

60. ***Calypogeia amazonica*** (Spruce) St.

Syn. : *Kantia amazonica* Spruce Hep. Am. et And., p. 415.

*Monoica major pallide-virens terricola late effusa. Caulis ad 25 mm. longus validus vage ramosus arcte repens. Folia caulina 1,5 mm. longa, subimbricata subrecte patula plano-disticha oblonga plus duplo longiora quam lata apice brevissima emarginato-bifidula. Cellulæ apicales 36×90 μ basales 36×108 μ leptodermes cuticula levigata. Amphigastria caulina parva caule parum latiora transverse inserta profunde emarginato-bifida lobis divergentibus inaequaliter bifidulis. Rami masculi et feminei oppositi, bracteis femineis parvis profundissime bi-vel trifidis, laciis subulatis incurvis. Marsupia foliis dimidio longiora cylindrico-conoidea. Capsula oblongo-cylindrica. Andræcia parva bracteis minutis 3-5 jugis bifidis.*

Hab. *Amazonas* (Spruce); *Paraguay* (Balansa); *Dominica* (Elliott).

61. ***Calypogeia Lechleri*** St. Hedwigia, 1895, p. 53 sub *Kantia*.

*Dioica minor pallide virens saepe rufescens, muscis et hepaticis corticolis consociata vel terricola. Caulis ad 2 cm. longus validus fuscus parum ramosus basi tantum repens apice saepe fragellatim attenuatus. Folia caulina 0,7 mm. longa contigua subrecte patula plano-disticha ovato-rotundata asymmetrica margine postico quam anticus magis arcuato postice parum decurrentia apice breviter exciso-bispinoso, spinis angustis porrectis. Cellulæ superæ 27 μ reliquæ 27×54 μ, marginales elongatae, retusæ, limbum angustum angulosum formantes; cuticula aspera. Amphigastria caulina parva, cauli æquilata sinuatim inserta profunde bifida sinu lato obtuso lobis late divergentibus apice inaequaliter bifidulis lacinia externa breviore; amphigastria ramulina minima ad dentes geminatos reducta. Flores feminei solitarii bracteis parvis concavis ad medium bilobis, lobis profunde bifidis hamatim incurvis, cuticula levi.*

Hab. *Peruvia* (Lechler, Weberbauer); *Chile* (Lechler); *Surinam* (Herb. Sande-Lacoste); *Brasilia subtropica* (Ule).

62. ***Calypogeia leptoloma*** (Spruce) St.

Syn. : *Kantia leptoloma* Spr. Hep. Am. et And., p. 414.

*Monoica mediocris pallide virens laxe cæspitosa corticola. Caulis ad 5 cm. longus tenuis parum ramosus, ramis interdum flagellatis. Folia caulina 0,8 mm. longa parum imbricata subplana, postice subdecurrentia antice breviter inserta oblongo-ligulata limbata i. e. margine cellulis angustis excisis et angulatim prominulis subdentato, apice angustato acute biapiculato sinu rotundato apiculis brevisubulatis 2-4 cellulas longis. Cellulæ 42×50 μ vel 42×63 μ. Amphigastria caulina remota foliis quadruplo breviora, subrotunda profunde biloba lobis bifidulis vel biden-*

tatis. *Flores feminei* ad 3 vel 4 in axilla amphigastrii aggregati, bracteis 3-4 jugis ovato-orbiculatis profunde tri- vel quadrifidis laciniis acutis inæqualibus. *Antheridia* majuscula globoso in axilla bractearum ♀ solitaria.

Hab. *Andes Peruviæ* ad flum. Panure et Uaupes.

Ich habe die Pflanze nicht gegeben; die Inflorescentia monoica hypogyna wäre, wenn nicht ein Irrthum vorliegt, etwas sehr Auffälliges.

## Mastigobryum Nees 1844.

Plantæ foliiferæ majores interdum pusillæ saepe elatae et robustæ, in arborum cortice putrescente cæspitosæ, vulgo olivaceæ saepe flavescentes vel rufescentes. *Caulis* quoad magnitudinem plantæ semper validus saepe crassus subteres ramis lateralibus pseudo-dichotomis, ceterum strictus procumbens, flagellis posticis radicantibus sustentus, rarissime radicellis fasciculatis e basi amphigastrii ortis repens. *Flagella* ex angulo interno amphigastrii orta, stricta, saepe valida et rigida, squamulifera vel minute foliata, foliolis triseriatis basi radicelliferis. *Folia caulinæ* incubæ alternantia vel ± opposita, dorso ampliata caulem plus minus late obvelantia, recte patula plus minus decurva in caule ramisque æquimagna, posse breviter inserta, apice vulgo tridentata vel trilobata, in paucis integra vel bidentula, saepe in plano falcata. *Folium* axillare dichotomiæ semper ovatum acuminatum integrum. *Cellulæ* foliorum valde inæquales, marginales semper minores, limbum plus minus latum formantes, centrales multo majores, vittam distinctam folii margini postico approximatam formantes; cuticula saepe papillata. *Amphigastria caulinæ* magna vel maxima, in paucis parva, libera vel foliis utrinque coalita, vulgo patula vel recurva, apice saepe truncata et dentata vel lobata; cellulæ iis foliorum saepe similimæ, in aliis marginales aberrantes limbum distinctum formantes. *Inflorescentia* dioica. *Rami sexuales* postici, ex angulo amphigastrii orti, brevissimi; folia et amphigastria floralia subæqualia paucijuga, intima multo majora conduplicatim concava, appressa superne recurvo-patula plus minus longe armata. *Perianthia* in paucis cognita, fusiformia, basi pluristrata carnosa superne profunde triplicata, plica tertia *postica*, ore consticto plurifido ciliato vel pilifero; pistillis sub 12, *Calyptera* libera, subcylindrica, basi crassa, pistillis sterilibus obsita. *Capsula* longe pedicellata

oblonga, ad basin quadrivalvis, valvulis pluristratis, strato interno semi-annulatim incrassato. *Elateres* bispiri. *Sporæ* parvæ. *Andræcia* amentiformia vel capitata, bracteis 4-5 jugis confertis ovatis conduplicatim concavis, appressis apice obtusis vel acutis vel denticulatis. *Antheridia* geminata longe stipitata.

\* \* \*

Die Gattung *Mastigobryum* ist über die ganze Erde verbreitet, entwickelt aber ihre grösste Artenzahl und ihre schönsten Formen im tropischen Asien und Oceanien; auch im tropischen America ist sie noch reich vertreten, während das australische Gebiet und das grosse nördliche Waldgebiet der Erde nur wenige aber sehr weitverbreitete Arten besitzen; ich habe bereits früher die Meinung geäussert, dass diese unsere nordischen Arten wohl nur Relicte aus einer früheren wärmeren Periode sind; die Gattung ist ähnliche wie *Lepidozia* von unseren nordischen Lebermoosformen so abweichend und isolirt, die Anzahl der Arten so gering, dass an ein Entstehen dieser Formen bei uns nicht wohl gedacht werden kann und ein Herüberwandern zur Zeit einer geologisch und climatisch günstigen Epoche zu vermuten ist.

Die Gruppe der *Inæquilateræ* weicht durch Form der Blätter und Unterblätter nicht unerheblich ab, insofern jene an der Spitze zweitheilig diese aber tief dreitheilig sind; da die Arten dieser Gruppe unter sich wieder grosse Verschiedenheiten zeigen und über ein grosse Gebiet zerstreut sind, so haben wir es hier mit einer sehr alten Abzweigung vom normalen *Mastigobryum*-Typus zu thun, die sich in den einzelnen Gebieten zu sehr characteristischen Formen entwickelt hat, und eine *geschlossene Gruppe* bildet, welche ich als Subgenus an den Schluss gestellt habe; es ist zugleich die schönste Abtheilung mit meist ganz abenteuerlichen Blattformen. Die Verzweigung, die Ausbildung von ventralen Flagellen und die Stellung der weiblichen und männlichen Aeste sind aber völlig in Uebereinstimmung mit denen der übrigen Arten unserer Gattung, so dass eine völlige Abtrennung von dieser nicht wohl gerechtfertigt ist.

Aehnlich wie die Gattung *Lophocolea* hat auch unser Genus eine ausserordentliche Einförmigkeit der Blattform, die sich wohl zeichnerisch festhalten, aber sehr schwer durch Beschreibung darstellen lässt; es ist daher die Angabe des Zellbaus stets ausführlich berücksichtigt worden. Die Unterblätter bieten die beste Handhabe zur Unterscheidung und sie sind hier benutzt worden um das grosse Material zu gruppieren.

Da die Gattung eine rein dioecische ist und die vegetative Vermehrung leicht von Statten geht, daher meist ganz sterile Rasen vorliegen, so sind Perianthien nur selten vorhanden gewesen; was ich davon gesehen habe, zeigt aber eine solche Einförmigkeit der Ausbildung und zwar sowohl des Perianths wie dessen Hüllblätter als auch der ♂ Aeste, dass sich diese Organe niemals zu einer Gruppierung werden verwenden lassen.

Die vegetative Vermehrung ist eine so ausgiebige dass sie allein die Arten, auch in abgerissenen Stücken, zu erhalten vermag, was wir am besten an unserem *Mastigobryum trilobatum* beobachten können, das in nur seltenen Fällen fruchtend gefunden wird, obgleich es eine sehr häufige und weitverbreitete Pflanze ist.

Da die Arten eines Florengebiets auf andere Gebiete nicht übergreifen, ergab sich zunächst eine rein geographische Gliederung: auffallend ist die geringe Anzahl der afrikanischen Arten, wie aus der nachstehenden Zusammenstellung zu ersehen ist :

Wir kennen :

Vom nördlichen Waldgebiet der Erde .....	3 Arten
trop. und subtrop. Asien und Oceanien .....	202 "
trop. und subtrop. Amerika .....	90 "
Australien nebst Inseln .....	20 "
Afrika nebst Inseln .....	28 "

Zur Erleichterung des Auffindens verwandter Arten ist das Gesamt-Material wie folgt gruppiert:

A. **Integritolia**

B. **Bidentata**.

C. **Tridentata**

1. *Parvistipula*.

2. *Grandistipula*.

    α Connata.

    β Libera.

3. *Serrulata*.

    α Connata.

    β Libera.

4. *Appendiculata*.

5. *Fissistipula*.

6. *Cordistipula*.

7. *Vittata*.

D. **Inaequilatera**.

Nicht zu unserer Gattung gehören, sondern zur Gattung:

- Calypogeia : Mast. imbricatum. Mitt.
- 
- Mast. cellulosum (Sprengel) Ldbg.
- Mast. alternifolium. Nees.
- Lembidium : Mast. nutans. Taylor.
- Schisma : Mast. tenacifolium. Mitt.
- Acromastigum : Mast. integrifolium. Austin.
- Saccogyna ? : Mast. flavescens Sande.

**Adn :** Es ist von fachmännischer Seite gewünscht worden, dass am Schlusse jeder Diagnose ein Hinweis auf die nächst verwandte Art gegeben werden möchte. Es ist selbstverständlich, dass bei Beschreibung *einzelner* Arten, in einem Aufsatz, deren Stellung den verwandten Arten gegenüber zu erwähnen ist. Bei einer synoptischen Bearbeitung, wie die vorliegende, sind die verwandten Arten bereits zusammengestellt und es ist den Bedürfnissen des leichteren Auffindens bereits entsprochen, dies um so mehr, als das Material bereits geographisch und anderweit so gruppiert ist, dass selbst bei umfangreichen Gattungen kein mühsames Suchen erforderlich ist.

#### A. *Integrifolia* (Elobata).

1. *Mastigobryum recurvum* Ldbg., Pulo Penang.
2. *Mastigobryum distans* Nees, Java.
3. *Mastigobryum cordifolium* St., China
4. *Mastigobryum loricatum* Nees, Java.
5. *Mastigobryum nuanuense* Cooke, Hawaii.
6. *Mastigobryum obtusatum* Mitten, Ceylon.
7. *Mastigobryum acutifolium* St., Banca.
8. *Mastigobryum angustisedens* St., Java.
9. *Mastigobryum callidum* Sande-Lac., Ceylon.
10. *Mastigobryum Zollingeri* L. et G., Java.
11. *Mastigobryum insigne* De Not., Borneo.
12. *Mastigobryum Semperi* St., Luzon.
13. *Mastigobryum grandirete* St., Java.
14. *Mastigobryum involutiforme* De Not., Borneo.

\* \* \*

15. *Mastigobryum Schwaneckei* Hpe. et G., Puerto Rico.
16. *Mastigobryum diversicuspe* Spr., Amazonas.

\* \* \*

17. *Mastigobryum fasciculatum* St., Australia.
18. *Mastigobryum pulvinatum* St., Africa.

**B. Bidentata.**

19. *Mastigobryum fallax* Sande-Lac., Banca.
20. *Mastigobryum irregulare* St., Amboina.
21. *Mastigobryum Perrottetii* St., Ind. orient.
22. *Mastigobryum sikkimense* St., Himalaya.
23. *Mastigobryum pulvinatulum* De Not., Borneo.
24. *Mastigobryum alpinum* St., China.
25. *Mastigobryum bidentulum* St., China.
26. *Mastigobryum emarginatum* St., Hawai.
27. *Mastigobryum Wiltensii* Sande-Lac., Banca.

\* \* \*

28. *Mastigobryum gracile* H. et G., Portorico.
29. *Mastigobryum Fendleri* St., Venezuela.
30. *Mastigobryum roraïmensis* St., Guiana.
31. *Mastigobryum variabile* G., Portorico.
32. *Mastigobryum Herminieri* G., Guadeloupe.
33. *Mastigobryum cuneistipulum* G. et L., Jamaica.
34. *Mastigobryum tenerum* G. et L., St. Christoph.
35. *Mastigobryum parvum* St., Brasilia.
36. *Mastigobryum dissodontum* Spruce, Peru.
37. *Mastigobryum phyllobolum* Spruce, Peru.
38. *Mastigobryum bidens* L. et G., Portorico.

\* \* \*

39. *Mastigobryum hamatum* St., Japan.

**C. Tridentata.****I. *Parvistipula.***

40. *Mastigobryum assamicum* St., Assam.
41. *Mastigobryum Lowii* Sande-L., Borneo.
42. *Mastigobryum olivaceum* St., Java.
43. *Mastigobryum Gaudichaudii* G., Singapore.
44. *Mastigobryum Everettii* St., Borneo.
45. *Mastigobryum pulchellum* St., Samoa.
46. *Mastigobryum inaequitextem* St., N. Guinea.
47. *Mastigobryum densum* Sande-L., Java.
48. *Mastigobryum tridens* Nees, Sumatra.
49. *Mastigobryum sumbavense* G., Tahiti.

- 50. *Mastigobryum patens* Ldbg., Hawai.
- 51. *Mastigobryum halconiensis* St., Mindoro.
- 52. *Mastigobryum Reinwardti* Sande-L., Celebes.
- 53. *Mastigobryum ovistipulum* St., Ceylon.
- 54. *Mastigobryum himalayanum*, Sikkim.
- 55. *Mastigobryum mindorensis*, Philippinæ.
- 56. *Mastigobryum pectinatum* L. et G., Java.
- 57. *Mastigobryum conophyllum* Sande-L., Banca.
- 58. *Mastigobryum gibbum* Sande-L., Java.
- 59. *Mastigobryum longidens* St., Amboina.
- 60. *Mastigobryum Beecheyanum* St., Oahu.
- 61. *Mastigobryum siamense* St., Siam.
- 62. *Mastigobryum deciduum* Spruce, Peru.

\* \* \*

- 63. *Mastigobryum Krugianum* St., S.-Domingo.
- 64. *Mastigobryum elegantulum* G., Jamaica.
- 65. *Mastigobryum tenue* St., Guadeloupe.
- 66. *Mastigobryum tricuspidatum* St., Guiana.

\* \* \*

- 67. *Masticobryum verticale* St., N. Zealand.

## II. *Grandistipula*.

### ꝝ Connata.

- 68. *Mastigobryum marginatum* St., Nova Caledonia.
- 69. *Mastigobryum morokense* St., N. Guinea.
- 70. *Mastigobryum Kowaldianum* St., N. Guinea.
- 71. *Mastigobryum rigidum* St., Gr. Natunas.
- 72. *Mastigobryum apiculatum* St., N. Guinea.
- 73. *Mastigobryum Bescherellei* St., N. Caledonia.
- 74. *Mastigobryum crassitextum* St., Amboina.
- 75. *Mastigobryum cucullistipulum* St., Japan.
- 76. *Mastigobryum japonicum* Sande-L., Japan.
- 77. *Mastigobryum flavo-virens* St., Japan.
- 78. *Mastigobryum connatum* Sande-L., Sumatra.
- 79. *Mastigobryum Parisii* St., N. Caledonia.
- 80. *Mastigobryum semiconnatum* St., Japan.

\* \* \*

81. *Mastigobryum Mollerii* St., San Thomé.
82. *Mastigobryum Seychellarum* G., Seychelles.
83. *Mastigobryum mascarenium* St., Bourbon.
84. *Mastigobryum pumilum* Mitt., Africa.
85. *Mastigobryum pellucidum* St., Kamerun.
86. *Mastigobryum pulvinatum* St., Kilimandscharo.

\* \* \*

87. *Mastigobryum accretum* L. et L., Australia.
88. *Mastigobryum spectabile* St., New Zealand.
89. *Mastigobryum Kirkianum* St., New Zealand.
90. *Mastigobryum Novæ Zelandiæ* Mitt., New Zealand.
91. *Mastigobryum involutum* Ldbg., New Zealand.

\* \* \*

92. *Mastigobryum peruvianum* Nees, Andes.
93. *Mastigobryum cerinum* St., Patagonia.

$\beta$  Libera.

94. *Mastigobryum Fleischeri* St., Ceylon.
95. *Mastigobryum intermedium* G. et L. Java.
96. *Mastigobryum grandistipulum* St., Ceylon.
97. *Mastigobryum Rabenhorstii* St., Ceylon.
98. *Mastigobryum Didrichsenii* St., Hawai.
99. *Mastigobryum subintegrum* St., N. Caledonia.
100. *Mastigobryum Motelayi* St., N. Caledonia.
101. *Mastigobryum squarrosum* St., Tahiti.
102. *Mastigobryum hawaicum* St., Hawai.
103. *Mastigobryum platycnemon* Schwäg., Marianæ.
104. *Mastigobryum Gammianum* St., Sikkim.
105. *Mastigobryum vitiense* Mitt., Viti.
106. *Mastigobryum pinniforme* St., Sikkim.
107. *Mastigobryum cornutistipulum* St., Tonkin.
108. *Mastigobryum lobulistipum* St., Assam.
109. *Mastigobryum Baldwini* Austin, Hawai.
110. *Mastigobryum aspernum* St., Annam.
111. *Mastigobryum borneense* St., Borneo.
112. *Mastigobryum ceylanicum* Mitt., Asia tropica.
113. *Mastigobryum oblongum* Mitt., Sikkim.
114. *Mastigobryum Brighamii* Austin., Hawai.

\* \* \*

- 145. *Mastigobryum ovifolium* St., Japan.
- 146. *Mastigobryum takeanum* St., Japan.
- 147. *Mastigobryum nagasakienses* St., Japan.
- 148. *Mastigobryum albicans* St., Japan.
- 149. *Mastigobryum tenuistipulum* St. Japan.
- 150. *Mastigobryum oshimense* St. Japan.
- 151. *Mastigobryum Formosæ* St., Formosa.
- 152. *Mastigobryum Faurianum* St., Japan.

\* \* \*

- 153. *Mastigobryum brevifolium* G., N.-Granada.
- 154. *Mastigobryum corticolum*, St., Brasilia.
- 155. *Mastigobryum Hansenii* St., Jamaica.
- 156. *Mastigobryum Fendleri* St., Venezuela.
- 157. *Mastigobryum Eggersianum* St., Cuba.
- 158. *Mastigobryum Gottscheanum* Ldbg., Guadeloupe.
- 159. *Mastigobryum Spruceanum* St., Peru.
- 160. *Mastigobryum Lechleri* St., Chile.
- 161. *Mastigobryum scutigerum* Ldbg. N. Granada.
- 162. *Mastigobryum Cuervi* G., Nova Granada.
- 163. *Mastigobryum longistipulum* Ldbg., St. Vincent.
- 164. *Mastigobryum affine* L. et G., Mexico.
- 165. *Mastigobryum stoloniferum* Ldbg., Jamaica.
- 166. *Mastigobryum Lindigii* St., N. Granada.
- 167. *Mastigobryum Quelchii* St., Guiana.
- 168. *Mastigobryum longum* Nees, Trinidad.
- 169. *Mastigobryum Puiggarii* St., Brasilia.
- 170. *Mastigobryum longicuspe* St., Brasilia.
- 171. *Mastigobryum pellidevirens* St., Brasilia.

\* \* \*

- 172. *Mastigobryum reflexistipulum* Ldbg., Aucklands Ins.
- 173. *Mastigobryum filiforme* St., Australia.
- 174. *Mastigobryum Wattsianum* St., Australia.
- 175. *Mastigobryum reflexum* G., Madagascar.

\* \* \*

- 176. *Mastigobryum trilobatum* Nees, Europa etc.
- 177. *Mastigobryum triangulare* (Schleich.), Europa etc.
- 178. *Mastigobryum Pearsoni* St., Ireland.

III. *Serrulata.*

α Connata.

149. *Mastigobryum Bernieri* St., Nova Caledonia.
150. *Mastigobryum Lenormandii* St., Nova Caledonia.
151. *Mastigobryum combinatum* Jack., Samoa.
152. *Mastigobryum Rechingeri* St., Samoa.
153. *Mastigobryum acinaciforme* St. Samoa.

\* \* \*

154. *Mastigobryum elegans* Col., New Zealand.
155. *Mastigobryum Bayleyanum* St., Australia.
156. *Mastigobryum laceratum* St., New Zealand.
157. *Mastigobryum adnexum* (L. et L.) St., Australia.

\* \* \*

158. *Mastigobryum decrescens* L. et L., Mascarenæ.
159. *Mastigobryum curvidens* St., Madagascar.
160. *Mastigobryum Roberti* St., Bourbon.

β Libera.

161. *Mastigobryum spirale* Nees, Java.
162. *Mastigobryum serrulatum*, Mitten, Samoa.
163. *Mastigobryum confertifolium* St., N. Guinea.
164. *Mastigobryum erosum* Nees, Java etc.
165. *Mastigobryum indicum* L. et G., Singapore.
166. *Mastigobryum subæquitextum* St., Nova Guinea.
167. *Mastigobryum horridulum* Schffn., Amboina.
168. *Mastigobryum parvifolium* St., N. Guinea.
169. *Mastigobryum serrifolium* St. N. Caledonia.
170. *Mastigobryum paucidens* St., N. Caledonia.
171. *Mastigobryum subtile* Sande-L., Asia tropica.
172. *Mastigobryum Wallichianum* Ldbg., Asia tropica.
173. *Mastigobryum subacutum*, Mitt. Samoa.
174. *Mastigobryum vagum* De Not., Malacca.
175. *Mastigobryum concinnum* De Not., Borneo.
176. *Mastigobryum hamatifolium* St., Viti.
177. *Mastigobryum desciscens* St., Java.
178. *Mastigobryum patentistipum* St., Borneo.
179. *Mastigobryum manillanum* G., Manila.

180. *Mastigobryum obcuneatum* St., Tahiti.  
 181. *Mastigobryum australe* Ldbg., Viti.  
 182. *Mastigobryum philippinense* Jack, Philippinæ.  
 183. *Mastigobryum samoanum* St., Samoa.  
 184. *Mastigobryum cincinnatum* De Not., Sumatra.  
 185. *Mastigobryum longicaule* Sande-Lac., Sumatra.

\* \* \*

186. *Mastigobryum armatistipulum* St., Jamaica.

\* \* \*

187. *Mastigobryum Perrotanum* St., Madagascar.

\* \* \*

188. *Mastigobryum Yoshinaganum* St., Japan.

#### IV. *Appendiculata*.

189. *Mastigobryum natunense* St., Natunas Ins.  
 190. *Mastigobryum Modigliani* St. Engano Ins.  
 191. *Mastigobryum Græffei* G., Samoa.  
 192. *Mastigobryum Lürssenii* St., Bauca.  
 193. *Mastigobryum Macgregorii* St., Louisiades.  
 194. *Mastigobryum harpago* De Not., N. Guinea.  
 195. *Mastigobryum linguæforme* Sande-L. Java.,  
 196. *Mastigobryum malaccense* St., Malacca.  
 197. *Mastigobryum Levieri* St., Celebes.  
 198. *Mastigobryum Merrillanum* St., Luzon.  
 199. *Mastigobryum Kernii* St., Nova Guinea.  
 200. *Mastigobryum Fleischeri* St., Java.  
 201. *Mastigobryum cuspidatum* St., Sikkim.  
 202. *Mastigobryum caudistipulum* St., Viti.  
 203. *Mastigobryum dentatum*, Mitt. Samoa.  
 204. *Mastigobryum paradoxum* Sande, Sumatra.  
 205. *Mastigobryum candatum* St., Pulo Penang.  
 206. *Mastigobryum lancifolium* St., Celebes.  
 207. *Mastigobryum Geheebei* St., Nova Guinea.  
 208. *Mastigobryum sumatranaum* Sande-L., Sumatra.  
 209. *Mastigobryum appendiculatum*, Mitt. Bhotan.  
 210. *Mastigobryum calcaratum* Sande-Lac, Java.

\* \* \*

- 211. *Mastigobryum superbum* Mont., Peru.
- 212. *Mastigobryum acanthostipum* Spruce, Peru.
- 213. *Mastigobryum tocotianum* G., Trinidad.
- 214. *Mastigobryum falcatum* Ldbg., Guadeloupe.
- 215. *Mastigobryum spinigerum* Spruce, Brasilia.
- 216. *Mastigobryum robustum* Spruce, Rio Negro.
- 217. *Mastigobryum ancistrodes* Spruce, Andes.
- 218. *Mastigobryum heterocladum* Spruce, Peru.

V. *Fissistipulæ.*

- 219. *Mastigobryum fissifolium* St., Japan.
- 220. *Mastigobryum Karstenii* St., Amboina.
- 221. *Mastigobryum vastifolium* St., Japan.
- 222. *Mastigobryum lacerostipulum* St., Ceylon.
- 223. *Mastigobryum palmatifidum* St., N. Guinea.
- 224. *Mastigobryum malaccense* St., Malacca.
- 225. *Mastigobryum Pompeanum* Sande-L., Japan.
- 226. *Mastigobryum uncigerum* Nees, Java.
- 227. *Mastigobryum strictum* St., Ceylon.
- 228. *Mastigobryum Deplanchei* G., N. Caledonia.
- 229. *Mastigobryum shusensicum* St., Japan.
- 230. *Mastigobryum inaequabile* St., Hawaii.
- 231. *Mastigobryum sinense* G., Honkong.
- 232. *Mastigobryum trifidum* St., India orient.

\* \* \*

- 233. *Mastigobryum denticulatum* L. et G., Mexico.
- 234. *Mastigobryum aurescens* Spruce, Andes.
- 235. *Mastigobryum cubense* G., Cuba.
- 236. *Mastigobryum pycnophyllum* Tayl., Jamaica.
- 237. *Mastigobryum quadricrenatum* G., Guadeloupe.

\* \* \*

- 238. *Mastigobryum Staudtianum* St., Kamerun.
- 239. *Mastigobryum comorense* St., Comoren.
- 240. *Mastigobryum Burchellii* St. Fretum mag.

VI. *Cordistipula.*

- 241. *Mastigobryum Griffithianum* St., Bhotan,
- 242. *Mastigobryum commutatum* L. et G., Java.

- 243. *Mastigobryum Wichuræ* St., China.
- 244. *Mastigobryum rotundistipulum* St., Ceylon.
- 245. *Mastigobryum sandvicense* G. Hawai.
- 246. *Ma tigobryum* Sandei St., Birma, Sumatra.
- 247. *Mastigobryum revolutum*, St., Birma.
- 248. *Mastigobryum Miquelianum* Lehm., Java.
- 249. *Mastigobryum latifolium* St., Philippinæ.
- 250. *Mastigobryum resurvo-limbatum* St., Siam.
- 251. *Mastigobryum præruptum* Nees, Sumatra.
- 252. *Mastigobryum cordistipulum* Ldbg., Hawai.
- 253. *Mastigobryum dubium* L. et G., Manila.
- 254. *Mastigobryum decurvum* Nees, India orient.
- 255. *Mastigobryum javanicum* Sande-Lac., Java.
- 256. *Mastigobryum serpentinum* Nees, Java.
- 257. *Mastigobryum Gammianum* St., Sikkim.
- 258. *Mastigobryum constrictum* St., Birma.
- 259. *Mastigobryum Cardoti* St., India orient.
- 260. *Mastigobryum renistipulum* St., Sumatra.
- 261. *Mastigobryum Schadenbergii* St., Luzon.
- 262. *Mastigobryum Whitfordii* St., Philippinæ.
- 263. *Mastigobryum sandvicense* G. Hawai.
- 264. *Mastigobryum Fruhstorferi* St., Celebes.

\* \* \*

- 265. *Mastigobryum brevifolium* G., Nova Granada.
- 266. *Mastigobryum Müllerianum* G., Mexico.
- 267. *Mastigobryum orizabense* G., Mexico.
- 268. *Mastigobryum acuminatum* L. et G., Mexico.
- 269. *Mastigobryum canelense* St., Andes.
- 270. *Mastigobryum guadalupense* St., Guadeloupe.
- 271. *Mastigobryum Breutelianum* L. et G., St. Christoph.
- 272. *Mastigobryum subfalcatum* G., Guadeloupe,
- 273. *Mastigobryum Taleanum* G., Mexico.
- 274. *Mastigobryum humifusum* Spruce, Andes.
- 275. *Mastigobryum bogotense* St., Peru.
- 276. *Mastigobryum speciosum* G., Martinique.
- 277. *Mastigobryum Schlimianum* G., Merida.
- 278. *Mastigobryum Braunianum* St., Caracas.
- 279. *Mastigobryum brasiliense* G. et L., Brasilia.
- 280. *Mastigobryum viridissimum* Spruce, Peru.
- 281. *Mastigobryum teretiusculum* L. et G., Mexico.
- 282. *Mastigobryum chilense* St., Chile.

283. *Mastigobryum Hookeri* Ldbg., Guadeloupe.
284. *Mastigobryum Liebmianum* L. et G., Mexico.
285. *Mastigobryum leptostipum* Spruce, Andes.
286. *Mastigobryum Wrightii* G., Cuba.
287. *Mastigobryum verrucosum* St., Guiana.
288. *Mastigobryum jamaicense* L. et L., Jamaica.
289. *Mastigobryum Martianum* G., Brasilia.
290. *Mastigobryum caraçanum* St., Brasilia.
291. *Mastigobryum papillatum* St., Dominica.
292. *Mastigobryum portoricense* Hpe. et G., Portorico.
293. *Mastigobryum vincentinum* L. et L., St. Vincent.
294. *Mastigobryum chimborazense* Spruce, Andes.
295. *Mastigobryum arcuatum* L. et G., Ecuador.
296. *Mastigobryum armatum* St., Brasilia.
297. *Mastigobryum javitense* St., Andes.
298. *Mastigobryum Glaziovii* G., Brasilia.
299. *Mastigobryum flavicans* Spruce, Andes.
300. *Mastigobryum latidens* G., Brasilia.
301. *Mastigobryum Uleanum* St., Rio Negro.
302. *Mastigobryum venezuelanum* St., Venezuela.

\* \* \*

303. *Mastigobryum schismoideum* St., Réunion.
304. *Mastigobryum borbonicum* St., Réunion.

\* \* \*

305. *Mastigobryum Lehmannianum* Ldbg., Australia.

#### VII. *Vittata.*

306. *Mastigobryum vittatum* G., Java.
307. *Mastigobryum Lessonii* St., Nova Hibernia.
308. *Mastigobryum Temarianum* St., Tahiti.
309. *Mastigobryum heterostipum* St., Brasilia.
310. *Mastigobryum Richardianum* Mitt., Fret magell.
311. *Mastigobryum trichoideum* Spruce, Chimborazo.

\* \* \*

312. *Mastigobryum Taylori* Mitten, New Zealand.
313. *Mastigobryum fissistipum* St., New Zealand.
314. *Mastigobryum Hochstetteri* Reich., New Zealand.
315. *Mastigobryum monilinerve* Nees, Australia.

\* \* \*

316. *Mastigobryum exile* Ldbg., Cape good Hope.  
 317. *Mastigobryum convexum* Ldbg., Mascarenæ.  
 318. *Mastigobryum Stephanii* Jack., Comoræ.

♂. Inæquilateræ.

319. *Mastigobryum obliquatum* Mitt., Oceania.  
 320. *Mastigobryum linganum* De Not., Borneo.  
 321. *Mastigobryum Brotheri* St., Borneo.  
 322. *Mastigobryum echinatum* G., Banca.  
 323. *Mastigobryum inæquilaterum* L. et L., Nepal.  
 324. *Mastigobryum Notarisii* St., Borneo.  
 325. *Mastigobryum echinatiforme* De Not., Amboina.  
 326. *Mastigobryum divaricatum* Nees, Java.  
 327. *Mastigobryum bifidum* St., Entrecastaux Ins.  
 328. *Mastigobryum fimbriatum* St., Borneo.  
 329. *Mastigobryum filum* St., N. Caledonia.  
 330. *Mastigobryum exiguum* St., Australia.  
 331. *Mastigobryum anisostomum* L. et L., Aucklands Islands.  
 332. *Mastigobryum Colensoi* Mitt., Tasmania.  
 333. *Mastigobryum Mooreanum* St., Tasmania.

\* \* \*

334. *Mastigobryum lætevirens* Angstr., Chile.  
 335. *Mastigobryum Cunninghamii* St., Fret. magellan.

\* \* \*

Unbekannt sind mir geblieben :

- Mastigobryum pallidum* Mitten. Fl. Viti p. 406.  
*Mastigobryum pusillum* Mitten ibidem p. 406.  
*Mastigobryum fuegianum* Sull. J. of. Bot. 1850.  
*Mastigobryum minutum* Austin. Torrey. Bot. Cl. V. p. 2,  
*Mastigobryum bancanum* Sande-L. Ann. Mus. Lugd. Bat. 1863.

1. ***Mastigobryum recurvum*** (Mont.) Ldbg. Syn. Hep., p. 220.

Syn. : *Herpetium recurvum* Mont. Ann. sc. nat. 1843, p. 253.

*Bazzania pallens* Trevis. Mem. Ist. Lomb. 1877, p. 414.

Planta major gracilis flavo-rufescens vel brunneola rigida in cortice late expansa. *Caulis* ad 8 cm. longus validus pluriramosus, flagellis brevibus validis. *Folia caulinata* confertissima subrecte patula, apice et margine postico anguste incurva, in plano oblique reniformia 1,46 mm.

lata et 1,6 mm. longa, integra marginibus ubique minute denticulatis, denticulis basalibus brevissimis versus folii apicem sensim validioribus, omnibus obtusis. *Cellulæ superæ*  $18 \times 27 \mu$  basales  $36 \times 72 \mu$ , trigonis magnis acutis, basalibus maximis. *Amphigastria caulina* conferta transverse inserta caule triplo latiora reniformia 1,2 mm. lata, 0,65 mm. longa, similiter denticulata ceterum oblique patula apice cucullatim reflexa.

Hab. *Pulo-Penang* (Gaudichaud); *Banca* (Kurz); *Sumatra* (Korthals); *Borneo* (Beccari).

**2. Mastigobryum distans** Nees. Syn. Hep., p. 216.

Syn. : *Jung. distans* Nees. Hep. Javan., p. 65.

Planta minor sed longa et gracillima, muscis consociata flavo-virens. *Caulis* ad 5 cm. longus capillacens longe ramosus, flagellis parvis parum numerosis. *Folia caulina* 0,65 mm. longa contigua in ramis remota, recte patula parum decurva late ovato-triangulata asymmetrica, margine antico e basi valde arcuato substricto, postico stricto, apice obtuso integerrimo. *Folium axillare* ut in congeneribus ovato-triangulatum acuminatum acutum. *Cellulæ superæ* et dorsales  $18 \mu$ , basales  $18 \times 36 \mu$ , trigonis ubique magnis subnodulosis, cuticula aspera. *Amphigastria caulina* remotiuscula recurvo-patula, in plano reniformia, basi cordata, auriculis majusculis rotundatis repandis, apice late truncato-rotundata integerrima vel varie repanda, e basi radicellifera.

Hab. *Java* (Junghuhn. Kurz).

**3. Mastigobryum cordifolium** St. Soc. sc. nat. Cberbourg. Vol. 29, p. 223.

Planta mediocris fusco-brunnea vel flavescens rigida dense cæspitosa vel muscis consociata. *Caulis* ad 7 cm. longus fuscus irregulariter ramosus, ramis brevibus subpinnatus, flagellis brevibus capillaceis numerosis. *Folia caulina* 1,33 mm. longa, imbricata, subrecte patula, valde concava, apicibus decurvis, in plano late ovato-triangulata, basi 1,33 mm. lata, apice acuta, interdum bidentula. *Cellulæ superæ*  $27 \mu$ , basales  $36 \times 54 \mu$  trigonis majusculis. *Amphigastria caulina* remota, patula, transverse inserta, caule triplo latiora, *reniformia integerrima*. *Perianthia* ovato-oblonga ore contracto breviter denseque inciso-spinuloso. *Folia floralia* et amph. *floralia* appressa, intima late ovata, apice breviter biloba, lobis triangulatis breviter acuminatis denticulatis.

Hab. *China*, Yünnan (Delavay); *Japan* (Faurie).

**4. Mastigobryum loricatum** Nees. Syn. Hep., p. 217.

Planta spectabilis flavo-rufescens, flaccida in cortice dense stratificata. *Caulis* ad 15 cm. longus, irregulariter ramosus, debilis crassus, carnosus,

flagellis numerosis brevibus. *Folia caulina* 3,2 mm. longa confertissima subrecte patula, valde decurva, in plano late cordiformia, basi 2,8 mm. lata, dorso valde ampliata caulemque superantia, margine antico itaque valde arcuato postico multo minus curvato, folia dein asymmetrica apice obtusa circumcirca minuta denticulata, basin versus subnuda. *Cellulæ* superæ 36  $\mu$ , trigonis maximis acutis, basales  $36 \times 54 \mu$  trigonis maximis truncatis saepe trabeculatim confluentibus. *Amphigastria caulina* maxima, caule quadruplo latiora, sinuatim inserta, subcircularia, appressa, plana et dense imbricata, margine ut in folio caulino minute denticulato. *Perianthia* magna, ad 6 mm. longa, superne longe acuminata profunde plicata ore parvo duplicatim ciliolato. *Folia* et *amph.* floralia sexjuga dense imbricata valde concava et appressa, intima ovalia libera integra, superne minute denticulata.

Hab. Java (Junghuhn, Kurz, Treub, Stahl, Giesenhausen); Sumatra (Wiltens); Malacca (Kelsall); Philippinæ Insulæ (Merrill.).

### 5. ***Mastigobryum nuanuense* (Cooke) St.**

Syn. : *Bazzania nuanensis* Cook. Trans. Conn. Acad. 1904.

Planta viridis laxe cæspitans. *Caulis* adscendens dichotomus, flagellis numerosis tenuibus. *Folia caulina* alterna, dense imbricata recte patula decurva, late ovata, antice caulem superantia et subcordata, postice breviter inserta, apice truncato-rotundata. *Cellulæ* apicales 20  $\mu$ , mediæ  $27 \times 35 \mu$ , basales  $28 \times 50 \mu$  trigonis ubique maximis nodulosis, apice late confluentibus. *Amphigastria caulina* contigua caule duplo latiora, integerrima subcircularia basi cordata apice truncatula.

Hab. Hawaï (Cooke).

### 6. ***Mastigobryum obtusatum* Mitt. Linn. Soc. Vol. 5, p. 106.**

Planta mediocris brunnea rigida muscis consociata corticola. *Caulis* ad 6 cm. longus, fuscus durus et validus regulariter furcatus multiramosus, flagellis numerosis fuscis brevibus validis. *Folia caulina* conferta recte patula, disticha 0,7 mm. longa late ligulata, basi 0,4 mm. apice 0,2 mm. lata, parum concava apice truncato-rolundata integra vel parum repanda. interdum subacuta. *Cellulæ* superæ 27  $\mu$  trigonis magnis acutis basales  $27 \times 54 \mu$  trigonis maximis angulatim-nodulosis vel grosse trabeculatis. *Amphigastria caulina* magna, conferta, transverse inserta, imbricata obconica, apice late truncata, *angulis* plus minus longe productis acutis breviterque cornutis.

Hab. Ceylon centralis (Gardner. Nietner. Fleischer).

(*Fortsetzung folgt.*).



BHL

# Biodiversity Heritage Library

Stephani, Franz. 1908. "SPECIES HEPATICARUM (suite)." *Bulletin de l'Herbier Boissier* 8(9), 661–696.

**View This Item Online:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/104945>

**Permalink:** <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/292947>

## Holding Institution

New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library

## Sponsored by

The LuEsther T Mertz Library, the New York Botanical Garden

## Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

Rights: <https://www.biodiversitylibrary.org/permissions/>

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.