premiers articles sont entièrement rugueux; le 6^e est un peu âpre, porifère aux deux extrémités, avec la région médiane luisante; les suivants ne sont pas entièrement porifères, comme ils le sont chez *M. sinica*, mais luisants au milieu, leur surface étant plus ou moins irrégulière.

Les yeux ressemblent à ceux du *M. sinica*, mais leur lobe inférieur est un peu plus étroit, un peu plus allongé transversalement.

La tête est finement granuleuse avec quelques granules plus forts près des yeux; elle offre, comme le reste du corps, une pubescence d'un gris jaunâtre qui est faiblement condensée en quatre taches sur le pronotum; celui-ci est, comme chez *M. sinica*, un peu étranglé en avant, avec les angles postérieurs plus saillants. L'écusson est très pubescent; les élytres, dentés à l'angle sutural et régulièrement pubescents, sont très finement granuleux, avec quelques granules plus forts à la base; leurs côtes sont très faibles, les deux côtes internes étant réunies au quart postérieur et seules nettement distinctes à cause des quelques granules plus prononcés qui les couvrent. Les pattes sont semblables à celles du *M. sinica*.

La teinte est d'un brun foncé, un peu rougeâtre en dessous et sur les antennes; les élytres sont limbés de noirâtre.

La longueur est de 50 millimètres.

Nouveaux Cérambycides [COL.] de la Chine méridionale II ⁽¹⁾

par Maurice PIC.

Aeolesthes aurosignatus, n. sp. — *Elongatus, nitidus, niger, superne et infra pro parte signaturis aureis ornatus*.

Allongé, brillant, noir, en partie orné, en dessus et en dessous, de bandes ou de macules pubescentes dorées. Tête allongée, impressionnée ou sillonnée au milieu; antennes à peu près de la longueur du corps, à articles en partie pubescents de fauve, les 3^e à 5^e un peu épaissis au sommet; les suivants allongés et aplatis. Prothorax étroit et long, sinué et tuberculé sur les côtés, irrégulièrement plissé et ridé sur le disque, avec de petits plis transversaux sur la base, orné sur les côtés de macules allongées ou bandes pubescentes dorées. Élytres assez larges à la base, atténués à l'extrémité, subtronqués au sommet, ornés chacun de 4 lignes, plus ou moins longues, de pubescence

(1) Voir *Bulletin* [1915], p. 313.

dorée; les intervalles un peu saillants et brillants. Pattes moyennes, tarses plus clairs. — Long. 28 mm.

Espèce très distincte par son revêtement doré non continu et pouvant prendre place près d'*A. chysothrix* Bates.

Trachystola asidiformis, n. sp. — *Elongata, fere glabra, nigra, antennis apice brunnescentibus, elytris pro parte nitidis et tuberculatis, pro parte opacis et laevibus.*

Allongé, presque glabre, un peu pubescent de fauve par places, noir avec le sommet des élytres brunâtre; élytres très particuliers, en partie mats et lisses, en partie ornés de tubercules émoussés brillants. Tête assez longue, plissée et ruguleuse; antennes n'atteignant pas le sommet des élytres, à 1^{er} article ruguleux. Prothorax court, rétréci-étranglé postérieurement, à longue épine latérale, plissé et granuleux en dessus, sans parties très saillantes. Élytres subparallèles en avant, dilatés latéralement en dessus près de l'extrémité, rétrécis et un peu creusés vers le sommet et sur le milieu postérieur, ornés d'une petite arête humérale et de nombreux tubercules émoussés et brillants sur la base et le milieu du disque, ceux-ci s'effaçant sur la partie médiane interne, sur les côtes et au sommet. — Long. 21 mm.

Cette espèce est des plus distinctes par la singulière conformation de ses élytres.

Oberea curtilineata, n. sp. — *Elongata, postice attenuata, nitida, nigra, dorso pedibusque anticis pro parte rufo-testaceis, elytris ad humeros breviter nigro lineatis.*

Allongé, atténué postérieurement, brillant, noir, dessus d'un roux-testacé de même qu'une partie des pattes antérieures, élytres ornés d'une courte ligne humérale noire. Tête large, un peu détachée du prothorax, subsillonnée au milieu, rousse, avec les yeux et le labre noirs; antennes noires, grêles, dépassant les élytres de deux articles et demi; prothorax court, sinué sur les côtés, impressionné transversalement en avant et en arrière, un peu inégal sur le disque; écusson noir; élytres un peu plus larges que le prothorax, pas très longs, progressivement atténués en arrière, subtronqués obliquement au sommet, ornés de rangées de points forts et s'effaçant à l'extrémité, avec de petites côtes latérales et l'arête externe marquée; pattes assez grêles, noires avec les cuisses et partie des tibias antérieurs d'un roux testacé; dessous du corps noir, pygidium un peu testacé au sommet. — Long. 11 mm.

Pic, Maurice. 1915. "Nouveaux Cérambycides [Col.] de la Chine méridionale II." *Bulletin de la Société entomologique de France* 1915, 325–326.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/36403>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/30266>

Holding Institution

Smithsonian Libraries

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.