

BESCHRIJVING

eener nieuwe soort van het genus *Exotrocha* Meyr.

(*Exotrocha Haemacta*),

DOOR

P. C. T. SNELLEN.

In de Proceedings van de Linnaean Society of New South Wales, 2 Ser. I p. 693 (1886) wordt het tot de Arctiadae (of Lithosina) behorende genus *Exotrocha* s. door den heer Meyrick aldus gekarakteriseerd: «Tongue well developed. Antennae in ♂ filiform, moderately ciliated (1), with scattered longer single cilia. Palpi short, porrected, tolerably filiform. Forewings in ♂ beneath with round, membranous excrescence beneath costa beyond middle; 2 from $\frac{3}{4}$ of cell, 5 absent, 7 and 8 stalked, 9 absent, 10 and 11 distorted. Hindwings with veins 3 and 4 stalked, 5 parallel, 6 and 7 stalked, 8 from middle of cell. The distortion caused by the subcostal excrescence makes the neurulation of the forewings somewhat doubtful; the ♀ is required to obtain certainty.»

Ik heb bij deze duidelijke, de voornaamste kenmerken vermeldende beschrijving niets anders te voegen dan dat bij de cenige, door den heer Meyrick opgenoemde soort van het genus (*Liboria* Cram. IV, p. 106, pl. 345 D), de voorvleugels lang en smal en de breedere achtervleugels driekant zijn, met vrij duidelijke hoeken en bijna geheel ongebogen achterrandsrand. De vleugelvorm herinnert dus zeer aan dien van *Lithosia* en *Emydia*, waar echter de achterrandsrand der achtervleugels rond gebogen is. Verder zou ik liever

zeggen dat ader 2 der voorvleugels uit $\frac{7}{8}$ van den binnenrand der middencel komt. De aderen 3 en 4 der voorvleugels zijn kort gesteld en de achterscheenen viersporig; de pooten zijn glad beschubd en het achterlijf weinig langer dan de achtervleugels.

Ik heb, behalve *Liboria* Cram., een mannelijk exemplaar voor mij eener onbeschreven soort van Sumatra die, wat de generieke kenmerken aangaat, geheel met *Liboria* overeenkomt. Vlugt 32 mm. Sprieten, palpen en kop zwart; iets vaal, evenzoo het midden der schouderdeksels die op zijde bloedrood zijn. Thorax-rug zwart, met eene groote bloedroode vlek op het schildje. Achterlijf zwart, met flauwen bronsglans, de buik aan het eind met een rood vlekje tusschen de staartkleppen. Voorvleugels zwart, iets groenachtig, dof, met eene langwerpige, wortelwaarts spitse bloedroode vlek op het midden der voorrandshelft. Achtervleugels met doorschijnende wortelhelft; een gedeelte van het aderbeloop, de randen, maar niet scherp begrensd, zoo ook de punt, zijn vaal zwart.

Op de onderzijde zijn de vleugels geteekend als boven, maar veel valer zwart, weinig meer dan zwartgrijs; de roode vlek van boven schijnt flauw door. Voorborst bloedrood, het overige, de buik en pooten als de bovenzijde van het achterlijf.

Door de geelroode kleur van de zwartgerande voorvleugels onderscheidt *Liboria* zich dadelijk, evenzoo *Exotr. Securinervis* Butl., Tr. Ent. Soc. of Lond. 1889, p. 389, pl. 12, f. 2, van de Salomons-eilanden. *Cinnaberrina* Pagenst., Jahrb. des Nass. Vereins 37, p. 216 (1884), van Amboina, is ook overwegend rood gekleurd. Nader verwant schijnt mij toe *Coccineiceps* Mabilie, C. R. Séanc. Soc. Ent. Belge 1884, p. 189, van Madagascar. Zij moet zwart zijn, terwijl de kop, de thorax, de voorvleugel- en de achterlijfswortel eene roode kleur hebben. Van de beide andere in Kirby's Catalogus op p. 314 genoemde soorten: *Tricolora* Butl. en *Miles* Butl., van de Aroe- en Salomons-eilanden, kan ik de beschrijvingen nu niet vergelijken, maar ik herinner mij toch dat zij beiden veel nader aan *Liboria* dan aan *Haemacta* verwant zijn.

Misschien behoort tot *Exotrocha* ook wel *Gnophrioides Flaviplaga*

Heylaerts, C. R. Séanc. Soc. Ent. Belge 1891 Dec., p. 4, maar deze vlinder moet geel gevlekt zijn. Het nieuwe genus *Gnophrioïdes* Heyl. is, l. c. overigens door den auteur nog niet nader beschreven.

Van *Exotrocha Haemacta* bevindt zich het origineel in de collectie Lepidoptera van het Koloniaal Museum te Haarlem. Het is van de Westkust van Sumatra afkomstig, uit de Padangsche bovenlanden (Fort de Kock).



Snellen, P. C. T. 1896. "Beschrijving eener nieuwe soort van het genus Exotrocha Meyr (Exotrocha haemacta)." *Tijdschrift voor entomologie* 39, 160–162.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/40975>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/30974>

Holding Institution

Smithsonian Libraries and Archives

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.