Stamina medio tubi inserta, filamentis 2 mm. longis in parte libera. Antheræ incognitæ (planta dioica?). Ovarium subglobosum, dense villosum, pilis ferrugineis, longis, stylo glabro. Ovula ad basin vel medium loculorum inserta.

Paraguay, sur les collines rocheuses et incultes de Carapé-gua, n^{os} 2390 et 4647 [*Balansa*].

Fig. 21. — X, fragment de corolle avec staminodes et filet staminal, $\times 5$; XI, ovaire, 5.

70. A. FINET. — Orchidées nouvelles ou peu connues.

DENDROBIUM CONVEXUM Bl. var. *trilamellatum* A. Finet.

A specie typica differt : labelli lobis lateralibus brevioribus et apice rotundatis ; lobii medii lobulis dolabriformibus et acutis ; limbo lamellis 3 (nec 2), lateralibus intermedia paulo longioribus, a basi usque ad isthmum lobi medii percurso.

Java : 1905 [*Chaffanjon*].

Diffère de l'espèce type par son port plus trapu et par le labelle surtout, qui est muni de trois lames longitudinales au lieu de deux, la médiane plus courte, droite et arrondie à l'extrémité, les latérales formant vers leur sommet un pli demi-circulaire vers l'extérieur et se terminant un peu plus haut par une section brusque formant dent comme dans le type ; par les lobes latéraux arrondis ; par les lobules du lobe médian aigus au sommet et arrondis extérieurement en forme de fer de hache ou de couperet, au lieu d'être coupés carrément en figurant des rectangles irréguliers.

BOLBOPHYLLUM CALAMARIUM Ldl. var. *albo-ciliatum* A. Finet.

A specie typica differt : scapo gracillimo, floribus paucis, maxime dissitis ; bractea triangulari, ovarii pedicellati vix dimidiam partem æquante ; perigonii foliis omnino atro-rubris ; sepalis margine ciliatis ; labello atro-rubro, pilis albis, longissimis, antrorsis, a medio usque ad apicem marginibus ciliato ; lobis lateralibus ima basi ad aurículas fere obsoletas deminutis ; antheræ crista minute dentata.

Congo français [*Lousteau*] ; fleurit dans les serres du Muséum en sept. 1910.

Cette variété présente les pseudo-bulbes et la feuille unique du type. Les différences sont presque uniquement quantitatives; cependant, sur le vif, les longs cils blancs qui bordent le sommet du labelle, tranchent vivement sur le fond rouge-foncé du limbe légèrement velouté en dedans.

Finet, E.-A. 1911. "Orchidées nouvelles ou peu connues." *Notulae systematicae* 1(12), 383–384.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/7368>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/324285>

Holding Institution

Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by

Missouri Botanical Garden

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.