Je crois donc pouvoir conclure que *Ptychoneura rufitarsis* Meig. est un Miltogrammine et non pas un Tachinaire. Par la forme de l'appareil buccal de la larve primaire, cette espèce montre une affinité assez marquée avec le genre *Metopia*.

Description d'un nouvel Homoptère français [FULGORIDAE]

par le Dr V. LALLEMAND.

Stiroma Ribauti, n. sp. — Coloration générale jaune pâle; les cuisses et les tibias ont trois lignes longitudinales brun noir s'étendant sur toute leur longueur; les élytres blancs, translucides, ont des nervures jaunâtres à granulations brun noir, la partie du clavus interne aux nervures est jaune moins translucide, les antennes sont brun jaunâtre bordé de jaune. Le front est sexangulaire, ses carènes, bien nettes, s'étendant du bord du vertex au clypéus, très légèrement convergentes vers le bas, restent séparées sur toute leur étendue. Le clypéus porte une carène tranchante sur sa ligne médiane; les deux premiers articles des antennes sont aplatis, le 1^{er} est triangulaire, le second est plus ou moins ovale, légèrement plus long que le 1^{er}, la soie terminale est à peu près aussi longue que les deux précédents articles réunis. Sur le vertex se trouvent deux fossettes vaguement triangulaires. Le mésonotum est plus de deux fois aussi long que le pronotum, leurs carènes sont bien marquées. Les élytres ont environ deux fois la longueur du corps, ils sont terminés en angle aigu arrondi.

♂. La partie ventrale du bord postérieur de l'urite génital n'est pas échancrée et, sur son milieu, se trouvent deux petits appendices fortement pigmentés, en forme d'hameçon. Les styles sont pâles, un peu rembrunis à leur extrémité; dirigés vers le dos et l'arrière à leur base, ils s'infléchissent brusquement d'abord vers l'extérieur, puis vers le dos et enfin de nouveau vers l'extérieur à leur extrémité qui a la forme d'un bec; leur ensemble affecte la forme d'un col de cygne. Le premier urite anal se prolonge vers le ventre de chaque côté, en une pointe acérée assez courte, droite, pigmentée. Le pénis est digitiforme, légèrement incurvé vers le dos; ses ornements sont disposés d'une manière symétrique; sur la moitié distale de son bord dorsal se trouve une arête découpée en dents de scie; une arête à peu près semblable et de même longueur s'étend sur sa face gauche, se reliant

Stiroma Ribauti, n. sp. — Fig. 1. Tête, thorax et élytre droit; — fig. 2. Tête vue de face; — fig. 3. Région génito-anale, vue postérieure; — fig. 4. Région génito-anale, vue latérale; — fig. 5. Pénis, face droite; — fig. 6. Pénis, face ventrale; — fig. 7. Pénis, face gauche.

à l'extrémité de l'arête dorsale, tandis que sa face droite en est dépourvue; le canal défèrent s'ouvre près de l'extrémité de la face ventrale, qui est taillée en biseau. — Long. 4,25 mm.

Habitat : Bormes (Var) en assez grand nombre en avril au pied des touffes isolées de graminées (H. RIBAUT).

Types : Coll. du P^r RIBAUT et la mienne.

Je dédie cette espèce à mon aimable et savant correspondant M. le P^r RIBAUT, de Toulouse, qui a bien voulu en exécuter les dessins.

Cette espèce diffère de tous les *Stiroma* connus par la structure des organes génitaux du ♂.

Elle se distingue de *S. ruficeps* Mel., *S. bicarinata* H.S., *S. affinis* Fieb., *S. nigrolineata* Scott, *S. thoracica* Stål et *S. pteridis* Bohem. par les carènes frontales bien nettes et isolées. Chez *pteridis* le front est quadrangulaire, l'écusson, les élytres et l'abdomen sont brun noir. Chez *thoracica*, les carènes sont presque effacées vers la base et à peine plus claires que le reste du front, qui est brun; elles sont réunies vers le clypéus. Chez *affinis* et *bicarinata* le front est maculé de noir, près du clypéus et, à la base de l'écusson, existent deux taches triangulaires noires. Chez *nigrolineata*, les deux carènes sont réunies vers le clypéus et, à cet endroit, sont bordées de noir; le pronotum, le mésonotum et les élytres portent des lignes noires longitudinales.

Elle se différencie de *S. montana* Horv., *S. albomarginata* Curt. et *S. moesta* Boh. par la couleur du front, les carènes n'étant pas bordées de noir. Chez *moesta* Boh. et *montana* Horv., les carènes frontales se réunissent un peu au-dessus de clypéus; chez *albomarginata*, les trois carènes longitudinales du pronotum et de l'écusson sont peu marquées et la coloration de l'insecte est toute différente.

Le Secrétaire-gérant : L. CHOPARD.

Lallemand, V. 1921. "Description d'un nouvel Homoptère français (Fulgoridae)." *Bulletin de la Société entomologique de France* 1921, 222-224.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/38460>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/32646>

Holding Institution

Smithsonian Libraries

Sponsored by

Smithsonian

Copyright & Reuse

Copyright Status: NOT_IN_COPYRIGHT

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.