

COMMUNICATIONS.

CATALOGUE DES OISEAUX RAPPORTÉS PAR M. GEAY
DE LA GUYANE FRANÇAISE ET DU CONTESTÉ FRANCO-BRÉSILIEU,
PAR M. A. MENEGAUX.

(PREMIÈRE NOTE.)

Ces collections ont été recueillies par M. Geay pendant ses campagnes de 1898 dans le Haut-Carsevenne (Ancien Contesté) et de 1900 et 1902 dans les diverses régions de la Guyane française. Elles sont importantes, tant par le nombre des spécimens rapportés que par celui des espèces différentes qui atteint 159, et renferment environ 40 espèces qui n'ont pas encore été signalées dans la Guyane française et une femelle de Formicaridé non encore décrite. Ces collections apportent donc un complément intéressant à la faune ornithologique de notre Colonie et nous permettront de combler certaines lacunes de la Collection générale du Muséum.

Psittacidés.

1*⁽¹⁾. *Pyrrhura picta* Müll., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XX, p. 217.

Un mâle et une femelle des bords du Camopi. Granivore.

Signalé dans la Guyane anglaise et à l'île Trinidad. Il n'est donc pas étonnant de le rencontrer dans la Guyane française. D'après Finsch, on le trouve même dans le Para.

2*. *Chrysotis farinosa* Bodd., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XX, p. 280.

Spécimen de la Rivière Lunier, dans le Haut-Carsevenne, et une jeune femelle des environs de Saint-Georges d'Oyapock. Nom vulgaire *Jaco meunier*.

Signalé dans les Guyanes hollandaise et anglaise. Il se trouve donc aussi dans la Guyane française et le Contesté franco-brésilien, et probablement dans le Nord-Est du Brésil.

3. *PIONUS MENSTRUUS* L., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XX, p. 322.

Une jeune femelle des Mornes du Mahury.

Se trouve depuis le Costa-Rica jusqu'au Pérou et probablement jusqu'à la Bolivie, à travers la Colombie, l'Équateur, le Bassin de l'Amazone, les Guyanes et l'île Trinidad.

(1) L'astérisque indique les espèces nouvelles pour la Guyane française.

4*. **P. fuscus** Müll., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XX, p. 334.

Échantillon de la Rivière Lunier (Contesté franco-brésilien) et une femelle des Mornes du Mahury.

Signalé dans la Guyane anglaise et le Bas-Amazone jusqu'au Rio-Negro. C'est donc aussi une espèce de la Guyane française.

Falconidés.

5. **IBYCTER AMERICANUS** Bodd., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. I, p. 35.

Un mâle et deux femelles de Saint-Georges d'Oyapock. Nom vulgaire *Caucan*.

Signalé dans l'Amazonie, l'Équateur, la Colombie. Au Sud, le long de la côte, il descend jusqu'au Tropique du Capricorne; au Nord, il atteint le Guatemala et le Honduras. Il n'est donc pas étonnant qu'on le rencontre en Guyane.

6. **GERANOSPIZIAS COERULESCENS** Vieill., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. I, p. 81.

Une femelle de Saint-Georges d'Oyapock. Nom vulgaire *Pagani*.

Signalé du Sud du Mexique au Panama et dans l'Équateur, les Guyanes, l'Amazonie jusqu'au 70° degré de longitude occidentale, et dans le Sud du Brésil et la Bolivie.

7. **URUBITINGA ALBICOLLIS** Lath., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. I, p. 216.

Un mâle de l'Ouanary. Nom vulgaire *Pagani*.

Se trouve dans l'Amazonie, le Vénézuéla, les Guyanes et Trinidad.

8. **U. MALANOPS** Leth., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. I, p. 220.

Femelle de Saint-Georges d'Oyapock. Nom vulgaire *Pagani blanc*.
Connu dans l'Amazonie et les Guyanes.

9. **HERPETOTHERES CACHICAMUS** L., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. I, p. 278.

Signalé depuis le Sud du Mexique jusqu'à la Bolivie et au Paraguay.

10*. **Elanoïdes furcatus** L., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. I, p. 317.

Un mâle de Saint-Georges d'Oyapock.

Signalé dans le Sud des États-Unis, l'Amérique centrale, la Colombie et le Brésil. Il habite donc aussi la Guyane française. Accidentellement, on le voit en Europe.

11* **HARPAGUS BIDENTATUS** Lath., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. I, p. 362.

Échantillon de l'Ouanary et un mâle du Camopi.

Signalé dans le Haut Amazone, la Colombie, le Vénézuéla, la Guyane hollandaise, le Brésil et l'île Trinidad. Il existe donc aussi dans la Guyane française.

Picidés.

12. *DENDROBATES CASSINI* Malh., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVIII, p. 360.

Trois mâles venant de Saint-Georges d'Oyapock, de l'Ouanary et de Saint-Jean du Maroni. Nom vulgaire *Charpentier*.

Spécial aux Guyanes, où il était déjà signalé.

13*. *D. affinis* Sw., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVIII, p. 363.

Un spécimen de Saint-Georges et un mâle du Mahury.

Déjà signalé dans le Brésil oriental, mais pas dans la Guyane française.

14*. *D. Cœciliæ* Malh., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVIII, p. 366.

Trois mâles du Sinnamary et du Mana et une femelle de Macouria. Nom vulgaire *Charpentier*.

Signalé dans l'Équateur, la Colombie et la province de Chiriqui, dans le Panama, mais pas dans la Guyane.

15. *CELEUS JUMANA* Spix, *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVIII, p. 428.

Un mâle du Camopi, et deux spécimens du Bas et du Haut Carsevenne (Contesté).

Signalé déjà dans l'État de Para et près des bords de l'Oyapock.

16. *C. RUFUS* Gm., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVIII, p. 431.

Mâle et femelle de l'Ouanary. Nom vulgaire *Charpentier*.

Ce pic roux de Cayenne a été signalé dans les Guyanes et dans le Nord du Brésil, au Sud de Barra do Rio-Negro.

17*. *Cerchneipicus torquatus* Bodd., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVIII, p. 437.

Mâle de Saint-Georges d'Oyapock. Nom vulgaire *Charpentier*.

Le pic à cravate noire a été signalé dans les Guyanes anglaise et hollandaise et dans le Nord du Brésil, de Barra do Rio-Negro jusqu'à Pernambuco. Il n'est donc pas étonnant qu'on le trouve dans la Guyane française.

18. *CROCOMORPHUS FLAVUS* Müll., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVIII, p. 440 et 572.

Un mâle de l'Ouanary et une femelle du Mana. Nom vulgaire *Charpentier*.

Ce pic jaune est signalé dans les Guyanes, le Para, le Pérou oriental et l'Équateur.

19. *CAMPOPHILUS RUBRICOLLIS* Bodd., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVIII, p. 467.

Un mâle de la rivière Lunier dans le Haut Carsevenne; un mâle et une femelle des Montagnes du Mahury.

Habite les Guyanes et la portion du bassin de l'Amazone comprise entre cette région et l'Équateur oriental.

20*. *Picummus minutus* L., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVIII, p. 542.

Spécimen du Mahury. Nom vulgaire *Charpentier*.

Signalé dans la province de Bahia et le Pérou. Il remonte donc au Nord jusqu'à la Guyane française.

21. *P. UNDULATUS* Cab., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVIII, p. 543.

Mâle de Saint-Georges d'Oyapock.

Déjà signalé dans les Guyanes, où il paraît confiné.

Bucconidés.

22*. *Bucco Swainsoni* Gray, *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIX, p. 183.

Échantillon sans indication de lieu. Guyane française.

Ce Barbu n'est signalé que dans le Sud-Est du Brésil. Il remonte donc jusque dans la Guyane française.

23. *B. TAMATIA* Gm., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIX, p. 188.

Femelles de Saint-Georges d'Oyapock et du Maroni. Nom vulgaire *Matani*.

Le Tamatia est signalé dans les Guyanes et dans l'Amazonie jusqu'au Rio-Negro.

24. *MONACHA NIGRA* P. L. S. Müll., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIX, p. 202.

Un mâle de l'Ouanary et une femelle de la Rivière Lunier (Contesté). Régime insectivore.

Le Coucou noir de Cayenne a été signalé dans les Guyanes anglaise et française ainsi que dans la partie inférieure du bassin de l'Amazone.

25. *CHELIDOPTERA TENEBROSA* Pallas, *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIX, p. 207.

Un mâle et une femelle des monts Sinery.

Signalé dans le Vénézuéla, les Guyanes et le bassin inférieur de l'Amazone.

Capitonidés.

26. *CAPITO NIGER* P. L. S. Mull., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIX, p. 111.

Un mâle et une femelle de l'Ouanary. Insectivore et granivore.
Ce Barbu tacheté a été signalé dans les Guyanes.

Rhamphastidés.

27. *RHAMPHASTOS ERYTHORHYNCHUS* Gm., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIX, p. 128.

Mâles et femelles venant de la rivière Lunier dans le Haut Carsevenne, du Camopi et des montagnes de Roura.

Nom vulg. : *Gros bec*.

Déjà signalé dans les Guyanes, le Para et l'Amazone inférieur.

28. *RHAMPHASTOS VITELLINUS* Licht., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIX, p. 132.

Mâles venant de la rivière Lunier, de Saint-Georges d'Oyapock et de l'Ouanary. Régime granivore. Nom vulg. : *Criard à gros bec* (Saint-Georges).
Signalé dans les Guyanes, à l'île Trinidad et dans l'Amazone inférieur.

29. *PTEROGLOSSUS ARACARI* L., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIX, p. 138.

Échantillon du Camopi.

Déjà signalé dans les trois Guyanes et l'Amazone inférieur.

30. *SELENIDERA PIPERIVORA* L., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIX, p. 152.

Un mâle de la rivière Lunier et une femelle de l'Ouanary; nom indigène : *Gros bec*. Régime granivore.

Signalé dans les Guyanes et l'Amazone inférieur.

Galbulidés.

31. *GALBULA VIRIDIS* Lath., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIX, p. 164.

1 mâle des bords du Sinnamary.

Ce Jacamar a déjà été signalé dans les Guyanes, l'Amazone inférieur et le Vénézuéla.

32*. *Galbula albirostris* Lath., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIX, p. 169.

Échantillon du Camopi. Insectivore et granivore.

Déjà signalé dans les Guyane anglaise et hollandaise, dans la portion péruvienne du haut Amazone et dans l'Est de l'Équateur. Il existe donc dans la Guyane française.

Cucullidés.

PIAYA CAYANA L., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIX, p. 373.

Mâle de l'Ouanary; nom vulg. : *Piaye grande espèce.*

Signalé depuis l'Amérique centrale jusqu'à la République Argentine.

34. P. MINUTA Vieill., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. 19, p. 378.

Deux femelles de l'Ouanary et un jeune sans nom de localité.

Nom vulg. : *Piaye petite espèce.* Régime insectivore.

Habite le Panama, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Brésil central et les Guyanes.

35. DIPLOPTERUS NÆVIUS L., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIX, p. 423.

Deux mâles et deux femelles (dont un jeune) de l'Ouanary, où on le désigne par le nom de Fontange.

Un mâle et une femelle du Mahury, où on l'appelle *Flesté.*

Ce coucou tacheté de Cayenne a été signalé dans l'Amérique centrale jusqu'au Mexique et dans toutes les parties chaudes de l'Amérique du Sud, par conséquent dans les Guyanes.

Momotidés.

36. MOMOTUS MOMOTA L., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVII, p. 319.

Deux mâles et deux femelles des rives du Camopi et des Mornes du Mahury; nom vulg. : *Outouc.* Régime insectivore et granivore.

Déjà signalé dans les Guyanes, sur les bords du Rio Negro et dans le Para.

Trogonidés.

37. TROGON VIRIDIS L., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVII, p. 458.

Un mâle et une femelle des rives de l'Ouanary; nom vulg. : *Rocoua.*

Le Couroucou de la Guyane a été signalé dans toute l'Amérique du Sud, au Nord du tropique du Capricorne et à l'île Trinidad.

Alcédinidés.

38. CERYLE AMERICANA Gm., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVII, p. 131.

Une femelle venant des bords du Camopi; régime insectivore.

Signalé dans la plus grande partie de l'Amérique du Sud : Colombie, Équateur, Guyanes, Amazonie et Brésil.

39. C. SUPERCILIOSA L., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVII, p. 139.

Échantillons de Saint-Georges d'Oyapock et des rives du Maroni.

Signalé dans les immenses régions de la Bolivie, de l'Amazonie, du Brésil et au Nord dans les Guyanes et l'île Trinidad.

40. C. INDA L., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVII, p. 137.

Échantillon des rives de l'Oyapock.

Déjà signalé dans l'Amérique centrale à partir du Guatémala et dans l'Amérique du Sud jusqu'à l'Équateur, le Pérou, les Guyanes, Amazonie et le Brésil.

Caprimulgidés.

41*. **Stenopsis ruficervix** Scl., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVI, p. 584.

Mâle et femelle des environs de Saint-Georges d'Oyapock; nom vulg.: *Moæilio*.

Signalé dans les montagnes de la Colombie, de l'Équateur, du Vénézuéla et de la Guyane britannique. Il est donc naturel de le rencontrer dans la Guyane française.

42. **NYCTIDROMUS ALBICOLLIS** Gm., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVI, p. 587.

Mâle de Saint-Georges d'Oyapock; nom vulg.: *Moælio*.

Le Montvoyau de Buffon se trouve partout depuis le Mexique jusqu'au Sud du Brésil, mais il manque dans les Antilles.

Trochilidés.

43. **GLAUCIS HIRSUTA** Gin., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVI, p. 42 et 655.

Femelle du bas Mahury.

Signalé depuis le Costa-Rica jusqu'à Bahia, à travers la Colombie, le bassin de l'Amazone, les Guyanes et Trinidad.

44. **PRASITIS PRASINA** Less., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVI, p. 56.

L'Orvert de Buffon se trouve dans les Guyanes et à travers l'Amazonie, jusqu'au pied des Andes de l'Équateur et du Pérou.

45*. **Thalurania furcata** Gm., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVI, p. 84.

Mâles de l'Ouanary, du Mahury et de Saint-Jean-du-Maroni; femelles de l'Ouanary et du Camopi.

La Thaluranie à queue fourchue n'habite que les Guyanes. Boucard la signale dans le haut bassin de l'Amazone.

46. **CHRYSOLAMPIS MOSCHITUS** L., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVI, p. 183 et 657.

Mâle du Sinnamary.

Le Rubis-Topaze est répandu depuis l'état de Bolvie jusqu'à l'île Trinidad, à la Guyane, au Vénézuéla, et à la Colombie à travers la vallée de l'Amazone.

47. *Doleromyia fallax* Bourc., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVI, p. 177.

Un échantillon de la Guyane sans lieu précis d'origine.

Cette espèce est rare et a été signalée dans le Nord de la Colombie, le Vénézuéla, mais pas encore dans la Guyane française.

48. *AGYRTRIA LEUCOGASTER* Gm., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVI, p. 181.

Un mâle des bords du Mana.

Se trouve dans la Guyane française et le Brésil oriental, jusqu'à Bahia.

49*. *A. niveipectus* Cab. et Heine, *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVI, p. 180.

Un échantillon.

Signalé dans le Vénézuéla, la Guyane anglaise et l'île Trinidad. Il doit donc aussi se tenir dans la Guyane française.

50. *A. TOBACI* Gm., Boucard *Genera Humming Birds*, p. 150. —
A. VIRIDISSIMA, *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVI, p. 186.

Mâles et femelles de l'Ouanary.

Ce Colibri se rencontre dans les îles Tobago et Trinidad, dans les Guyanes et le Vénézuéla et, d'après Salvin, dans le bas Amazone.

51. *EUCEPHALA COERULEA* Vieill., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVI, p. 241.

Mâles et femelles de l'Ouanary et du Mana.

L'Éucéphale à gorge bleue est abondant dans les Guyanes, aux îles Tobago et Trinidad, mais se trouve encore dans le Vénézuéla, l'Équateur oriental, jusqu'au Sud-Est du Brésil.

52. *PHÆTORNIS SUPERCILIOSUS* L., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVI, p. 270.

Mâle de Saint-Jean du Maroni.

Le Phætornis à bande sourcilière, qui est bien connu dans les Guyanes, se trouve aussi dans la vallée de l'Amazone jusqu'au pied des Andes.

53. *P. BOURCIERI* Less., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVI, p. 278.

Spécimen de l'Ouanary.

Signalé dans les Guyanes, la vallée de l'Amazone et au pied des Andes, dans l'Équateur et le Pérou.

54*. *Pygmornis striigularis* Gould, *Cat. Birds Cat. Mas.*, t. XVI, p. 281.

Échantillon du Mahury.

Vit dans la Colombie, l'Équateur, le haut bassin de l'Amazone. Son aire d'habitat s'étend donc jusqu'en Guyane.

55. *Pygmornis longuemarei* Less., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVI, p. 283.

Mâle de l'Ouanary.

Signalé seulement à Cayenne et dans l'île Trinidad.

56. *Campylopterus longipennis* Bodd., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVI, p. 288.

Échantillons du Maroni.

Spécial aux Guyanes anglaise, hollandaise et française.

57. *Lophornis ornatus* Bodd., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XVI, p. 420.

Jeune mâle des environs de Saint-Georges d'Oyapock.

Le *Lophornis* huppe-col est connu dans les Guyanes, l'île Trinidad et le Vénézuéla.

Timélidés.

Thryothorus coraya Gm., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. VI, p. 234.

Une femelle de Saint-Georges d'Oyapock et un mâle du Mahury.

Le *Coraya* est déjà signalé dans la Guyane anglaise et à Cayenne.

59*. *Troglodytes striatulus* Lafr., *Cat. Birds Brit.*, t. VI, p. 254.

Deux mâles de Saint-Georges d'Oyapock et du Mahury.

Ce *Troglodyte*, signalé déjà dans le Panama et la Colombie, paraît nouveau pour la Guyane.

60*. *Donacobius atricapillus* L., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. VI, p. 364.

Trois mâles et une femelle de Saint-Georges d'Oyapock. Nom vulgaire *Oiseau jaloux*.

Signalé dans l'Amérique du Sud, et en particulier au Brésil. Il vit donc aussi dans la Guyane.

Turdidés.

61*. *Turdus phæopygus* Cab., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. V, p. 208.

Deux femelles de l'Ouanary. Régime insectivore.

Signalé dans les îles Trinidad et Tobago, à l'Est et à l'Ouest de la Guyane; dans le Vénézuéla, la Colombie, la portion péruvienne du bassin de l'Amazone et le Para. Il n'est donc pas étonnant qu'il vive dans la Guyane française.

62*. *Turdus fumigatus* Licht, *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. V, p. 216.

Un mâle de Saint-Georges d'Oyapock. Nom vulgaire *Grive*.

Cette *Grive*, signalée au Vénézuéla, près de l'Orénoque, se trouve donc aussi dans la Guyane française.

Hirundinidés.

62. TACHYGINETA ALBIVENTRIS Bodd., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. X, p. 113.

Un mâle de Sinnamary; nom vulg. : *Hirondelle blanche ou de rivière.*

Cette Hirondelle est signalée depuis le Sud du Brésil, dans le bassin de l'Amazone, le Pérou, l'Équateur, la Colombie et les Guyanes.

63. PROGNE CHALYBEA Gm., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. X, p. 118.

Une femelle de Mahury; nom vulg. : *Hirondelle noire (de Cayenne).*

Signalée depuis le Mexique jusqu'au Sud du Brésil et à la Bolivie.

64. P. TAPERA L., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. X, p. 180.

Un échantillon de l'Oyapock.

On trouve cette Hirondelle depuis la République Argentine, le Sud du Brésil et la Bolivie jusqu'aux Guyanes, au Vénézuéla et à la Colombie.

Coerébidés.

65. COEREBEA COERULEA L., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XI, p. 33.

Nombreux mâles et femelles du Kourou, du Sinnamary, du Mahury.

Cet animal est signalé dans la Colombie, l'Équateur, l'Est du Pérou et de la Bolivie ainsi que dans le bassin de l'Amazone, de l'Orénoque et dans les Guyanes.

66. CERTHIOLA CHLOROPYGA Cab., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XI, p. 44.

Deux mâles et une femelle du Camopi et de l'Îlet la Mère. — Insectivore.

Signalé dans les Guyanes, le Para, le Sud-Est du Brésil et la Bolivie.

Tyrannidés.

67. FLUVICOLA PICA Bodd., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIV, p. 35.

Mâle de la pointe de Macouria.

Signalé dans la Colombie, le Vénézuéla, les Guyanes et l'île Trinidad.

68. TODIROSTUM CINEREUM L., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIV, p. 69.

Deux mâles du Mahury; nom vulg. : *Bec Canard.*

Se trouve dans l'Amérique centrale depuis le Mexique, dans le Nord de l'Amérique méridionale jusqu'au Sud-Est du Brésil.

69*. T. pictum Salv., *Ibis*, janv. 1898, p. 153.

Un femelle de Saint-Jean du Maroni; nom vulg. : *Bec Canard.*

La description de Salvin, faite sur un seul échantillon de la collection H. Whitely, n'indique pas le sexe. Elle correspond à la femelle rapportée par M. Geay. Mais celle-ci, avec une tête d'un noir très brillant, a un bec qui, tout en ayant la longueur signalée, frappe par sa largeur. Il a 7 millimètres, tandis que celui de *cinereum* n'en a que 5 1/2. Très voisin de *T. guttatum*.

Signalé à Aunai dans la Guyane anglaise. Il se trouve donc aussi dans la Guyane française. Il paraît très rare.

70*. **T. signatum** Sclat. et Salv., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIV, p. 74.

Échantillon de Saint-Georges d'Oyapock.

Se trouve dans le haut bassin de l'Amazone et dans l'Est du Pérou, donc n'est pas signalé dans la Guyane française.

71. **COLOPTERUS GALEATUS** Bodd., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIV, p. 91.

Un mâle (?) de Saint-Jean du Maroni.

Cet animal, décrit par M. Daubenton sous le nom de *Figuier huppé de Cayenne*, existe dans le Vénézuéla, les Guyanes et le bas Amazone.

72. **MIONECTES OLEAGINEUS** Licht., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIV, p. 112.

Deux mâles du Mahury.

Signalé dans la Colombie, l'Équateur, l'Est du Pérou, l'Amazonie, les Guyanes et le Sud-Est du Brésil.

73. **MYIOPATIS SEMIFUSCA** Sclat., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIV, p. 123.

Un mâle du Mahury.

Se trouve dans la Colombie, le Vénézuéla, les Guyanes, le Para et le Brésil oriental.

74. **TYRANNULUS ELATUS** Lath., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIV, p. 128.

Une femelle du Mahury.

Signalé dans l'Amazonie, les Guyanes, la Colombie et le Panama au Nord.

75. **TYRANNISCUS GRACILIPES** Sclat. et Salv., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIV, p. 133.

Une femelle du Mahury.

Vit dans la Bolivie, l'Amazonie, le Vénézuéla et les Guyanes.

76. **ELAINEA PAGANA** Licht., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIV, p. 137.

Une femelle des environs de Saint-Georges d'Oyapock; nom vulg. : *Fon-tange*.

Se trouve depuis le Mexique jusque dans la Bolivie et le Sud du Brésil, ainsi que dans les îles Tobago et Trinidad.

77. *MYIOZETETES CAYENNENSIS* L., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIV, p. 160.

Mâle et femelle du fleuve Mahury; nom vulg. : *Quiquivi*.

Signalé dans le Panama, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Vénézuéla, les Guyanes et le bas Amazone.

78. *RHYNCHOCYCLUS POLIOCEPHALUS SCLATERI* Hellm.

Hellmayr, U. neue u. wenig bekannte sudam. Vögel., *Verh. Zool.-Bot. Gesell. Wien.*, 1903, p. 207.

Rh. poliocephalus (nom Nud.). Pelz., *Onith. Brasil*, p. 110.

Rh. sulphurescens (non Spix). Sclat. et Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 578.

Rh. megacephalus (non Swains). Sclat., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIV, p. 170.

Rh. poliocephalus, Berl. et Hart., *Nov. Zool.*, 1902, p. 47.

Signalé dans le bassin de l'Amazone et de l'Orénoque, dans les Guyanes et la province de Bahia.

79*. *Pitangus derbianus* Kaup. var. *rufipennis* Lafr., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIV, p. 175.

Deux femelles de l'Ouanary et du Mana; nom vulg. : *Quiquivi*. Régime insectivore, granivore.

Variété signalée dans la Colombie, le Vénézuéla et l'île Trinidad, donc pas encore dans la Guyane.

80*. *Myiodynastes solitarius* Vieill., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIV, p. 185.

Une femelle de l'Iracouba; nom vulg. : *Quiquivi*.

Signalé dans le Paraguay, l'Est du Pérou, le Sud du Brésil et accidentellement dans le Nord de la Guyane anglaise, donc aussi dans la Guyane française.

81*. *Myiobius sulphureipygius* Scl., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIV, p. 200.

Mâle et femelle des environs de Saint-Georges d'Oyapock et un mâle de Saint-Jean du Maroni; n. vulg. : *Mésange* ♀ et *Fontange* ♂ (Saint-Georges).

Signalé dans le Mexique et l'Amérique centrale jusqu'au Chiriqui dans le Panama. Son air d'habitat est donc beaucoup plus vaste qu'on ne l'admettait.

82. *MYIARCHUS NIGRICEPS* Sclat., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIV, p. 258.

Spécimen de l'Ouanary.

Signalé dans l'Équateur, la Colombie, le Vénézuéla, l'Amazonie et les Guyanes.

83. *M. FEROX* Gm., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIV, p. 253.

Mâles et femelle de Saint-Georges d'Oyapock, du Mahury et de l'Ilet de la Mère; nom vulg. : *Fontange*.

Signalé depuis Veragua, à travers toute l'Amérique du Sud, jusqu'à la République Argentine.

84. *TYRANNUS MELANCHOLICUS* Vieill., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIV, p. 273.

Deux mâles de l'Ouanary et du Mahury, deux femelles du Sinnamary; nom vulg. : *Quiquivi*. Régime granivore.

Cette espèce s'étend depuis le Mexique jusqu'aux environs de Buenos-Ayres, dans l'Uruguay et dans la Bolivie.

ANTHICIDES NOUVEAUX DES COLLECTIONS DU MUSÉUM DE PARIS,

PAR M. MAURICE PIC.

***Macratría Decorsei* nov. sp.**

Robuste, modérément allongé, noir de poix avec la tête d'ordinaire roussâtre, densément revêtu d'une pubescence grisâtre longue; antennes et pattes testacées avec les tibias postérieurs rembrunis ou obscurcis. Tête longue, rétrécie derrière les yeux, avec le vertex profondément impressionné, fortement et densément ponctuée; yeux éloignés du bord postérieur de la tête. Antennes grêles et assez courtes, à 3 derniers articles plus longs et peu épaissis. Prothorax long mais robuste, peu rétréci postérieurement, plus ou moins impressionné sur le disque, et sillonné latéralement à la base, fortement et densément ponctué. Élytres assez longs, atténués au sommet, un peu plus larges que la base du prothorax, faiblement striés. Pattes robustes, testacées, avec les tibias postérieurs rembrunis ou obscurcis. Extrémité de l'abdomen et pygidium testacés.

Longueur : 6 à 8 millimètres. Madagascar, Androy, Haut Manambovo (D^r J. Decorse, 1901).

Espèce remarquable par sa forme robuste jointe à la densité de sa pubescence.

FORMICOMUS FORTIPES Fairm., var. *anguliceps*.

Noir, avec les élytres verts, ces derniers assez larges, la majeure partie



Menegaux, Auguste. 1904. "Catalogue des Oiseaux rapportés par M. Geay de la Guyane française et du Contesté franco-brésilien." *Bulletin du Muse*

um d'histoire naturelle 10(3), 107–119.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/137056>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/327431>

Holding Institution

University Library, University of Illinois Urbana Champaign

Sponsored by

University of Illinois Urbana-Champaign

Copyright & Reuse

Copyright Status: Not provided. Contact Holding Institution to verify copyright status.

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.